JULIANA ISABEL GIULI DA SILVA FERREIRA

**Descrição morfológica e Filogenia de parasitas do gênero
Trypanosoma em pequenos mamíferos silvestres do Brasil**

São Paulo
2020

JULIANA ISABEL GIULI DA SILVA FERREIRA

Descrição morfológica e Filogenia de parasitas do gênero *Trypanosoma* em pequenos mamíferos silvestres do Brasil

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Ciências.

Departamento:

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal

Área de concentração:

Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses

Orientador:

Prof. Dr. Arlei Marcili

De acordo:

Orientador

Coorientadora:

Profa. Dra. Andréa Pereira da Costa

São Paulo

2020

Obs.: A versão original encontra-se disponível na Biblioteca da FMVZ/USP.

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte.

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

(Biblioteca Virgínie Buff D'Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo)

T. 3964
FMVZ

Ferreira, Juliana Isabel Giuli da Silva
Descrição morfológica e Filogenia de parasitas do gênero *Trypanosoma* em pequenos mamíferos silvestres do Brasil / Juliana Isabel Giuli da Silva Ferreira. – 2020.
64 f. : il.

Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, São Paulo, 2020.

Programa de Pós-Graduação: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses.

Área de concentração: Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses.

Orientador: Prof. Dr. Arlei Marcili.

Coorientadora: Profa. Dra. Andréa Pereira da Costa

1. Trypanosoma. 2. Filogenia. 3. Marsupiais. 4. Roedores. I. Título.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Comissão de Ética no Uso de Animais

São Paulo, 12 de dezembro de 2018
CEUA N 8978250216

Ilmo(a). Sr(a).
Responsável: Arlei Marcili
Área: Medicina Veterinária Preventiva E Saúde Animal

Título da proposta: "Descrição morfológica e Filogenia de parasitas do gênero Trypanosoma em pequenos mamíferos silvestres do Brasil".

Parecer Consubstanciado da Comissão de Ética no Uso de Animais FMVZ (ID 004275)

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no cumprimento das suas atribuições, analisou e **APROVOU** a Alteração do cadastro (versão de 09/outubro/2018) da proposta acima referenciada.

Resumo apresentado pelo pesquisador: "Os roedores tem importante papel na saúde pública, como reservatórios de doenças, como as zoonoses na peste bubônica, hantavirose e mais recentemente em tripanossomíases como Trypanosoma lewisi-like e Trypanosoma rangeli. No Brasil, há apenas relatos de prevalência e detecção molecular de tripanosomas em roedores sinantrópicos do subgênero Herpetosoma e Megatrypanum. O objetivo deste trabalho é fazer a descrição morfológica e filogenia de parasitas do gênero Trypanosoma em pequenos mamíferos silvestres nos diferentes biomas do Brasil: da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas, do Pantanal, da Mata Atlântica. Serão coletadas amostras de sangue em tubos de vacutainer, após a confirmação dos positivos será transferido para cultivo células de mamíferos e insetos. Além disso, será feita a microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e transmissão dos parasitas encontrados. Os genes utilizados serão SSU rDNA e gGAPDH. As sequências recém-geradas serão alinhadas com sequências previamente determinadas para outras espécies de tripanosomas, disponíveis no GenBank utilizando ClustalX e serão ajustadas manualmente usando GeneDoc. O alinhamento que será utilizado para construir árvores filogenéticas usando máxima parcimônia, como implementado no PAUP versão 4.0b10 e análise Bayesiana utilizando MrBayes v3.1.2. Não há no Brasil um estudo em tripanossomas com o enfoque em pequenos mamíferos silvestres nos diferentes biomas brasileiros."

Comentário da CEUA: ""

Profa. Dra. Anneliese de Souza Traldi
Presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

Roseli da Costa Gomes
Secretária
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Autor: FERREIRA, Juliana Isabel Giuli da Silva

Título: Descrição morfológica e Filogenia de parasitas do gênero *Trypanosoma* em pequenos mamíferos silvestres do Brasil.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutora em Ciências.

Data: ____/____/____

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Julgamento: _____

Dedico este trabalho a minha filha, Marina, meu sol de todas as manhãs. Como forma de agradecimento e reconhecimento por todo o apoio, amor e confiança depositada a mim.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pela Vida e Saúde e a todos os ajudantes espirituais por guiar meus passos e pensamentos;

Ao Dr. Arlei Marcili pela orientação, pela amizade, paciência, oportunidade no Mestrado e agora no Doutorado;

Aos **meus pais** Ivan e Maria Angela pelo amor incondicional, por incentivarem sempre meus estudos e me apoiarem em minhas decisões, viagens e principalmente, pelos conselhos e ensinamentos;

Ao **meu esposo** Ademar pelo carinho, compreensão e incentivo;

Ao **meu irmão** Marcelo que sempre acreditou no meu potencial e sonhou comigo;

A Dra. Andréa Pereira da Costa, pela amizade e valiosas sugestões;

Aos professores Profa. Dra. Solange Maria Gennari e ao Prof. Dr. Marcelo Bahia Labruna, que abriram as portas para o mundo científico;

As bibliotecárias da biblioteca FMVZ- USP, pela ajuda na formatação da Tese,

Aos colegas do Laboratório de Doenças Parasitárias da FMVZ/USP contribuíram para aprendizado nesta caminhada, ao grupo Tryp/Leish: Ryan Emiliano da Silva. Aos colegas grupos Ticks, Toxo, LEB: Bianca, Ana, Marina, Tatiana Jimenez, Carolina Serpa, Amália Barbieri, pela amizade, companhia e por proporcionarem um ambiente agradável com boas risadas;

A todos os colegas e funcionários do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo: Renato, Pedro, Washington, Dra. Hilda, Sheila, Dra. Sueli, Danival e Vanessa;

A todos os professores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Faculdade de Saúde Pública e Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que contribuíram de forma determinante para a minha formação;

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Brasil (CAPES) pelo auxílio financeiro, CAPES/PROEX 1841/2016.

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos.”

Isaac Newton

RESUMO

FERREIRA, J. I. G. S. **Descrição morfológica e Filogenia de parasitas do gênero *Trypanosoma* em pequenos mamíferos silvestres do Brasil.** 64 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

Todas as espécies de roedores e marsupiais descritas na literatura são potenciais hospedeiros de diferentes espécies de tripanossomas. Análises filogenéticas baseadas em genes SSU rRNA e gGAPDH tem apoiado a formação de novos clados, mesclando os tripanossomas já descritos com novos. Desde ano de 2011, diversos animais silvestres foram capturados nos diferentes biomas brasileiros (Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia e Pantanal) para o isolamento de tripanossomatídeos com o objetivo da montagem da Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos. Foram obtidos isolados de parasitas do gênero *Trypanosoma* de pequenos mamíferos silvestres e que apresentaram padrão de crescimento em meios de cultura axênicos e monocamada de células. Os perfis distintos foram apresentados por isolados obtidos de roedores e marsupiais capturados no estado de Mato Grosso nos municípios, de Poconé e Chapada Guimarães. Foi feito o cultivo e manutenção, microscopia de varredura e transmissão dos isolados, associados a análise filogenética. Foram descritas 4 espécies novas de parasitas do gênero *Trypanosoma* em 10 pequenos mamíferos pertencentes a uma espécie de roedor (*Hylaeamys megacephalus*) e duas espécies de marsupiais (*Phyllomys opossum* e *Didelphis albiventris*). Os resultados deste estudo ressaltam a descrição de novos tripanossomas brasileiros em pequenos mamíferos, diminuindo as brechas de informação em filogenia e evolução.

Palavras-chave: *Trypanosoma*. Filogenia. Marsupiais. Roedores.

ABSTRACT

FERREIRA, J. I. G. S. **Morphological description and Phylogeny of parasites of the genus *Trypanosoma* in small wild mammals of Brazil.** 64 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

All rodent and marsupial species described are potential hosts for different trypanosome species. Phylogenetic analyzes based on genes SSU rRNA and gGAPDH have supported the formation of new clades by merging the previously described trypanosomes with new ones. Since 2011, several wild animals have been captured in different Brazilian biomes (Atlantic Forest, Caatinga, Cerrado, Amazon and Pantanal) for the isolation of trypanosomatids in order to assemble the Brazilian Collection of Trypanosomatids. Isolates of parasites of the *Trypanosoma* genus were obtained from small wild mammals that showed growth pattern in axenic culture media and cell monolayer. The distinct profiles were presented by isolates obtained from rodents and marsupials captured in the state of Mato Grosso in the municipalities of Poconé and Chapada Guimarães. Cultivation and maintenance, scanning microscopy and transmission of the isolates were done together with the phylogenetic analysis. Four new species of *Trypanosoma* spp. Were identified in 10 small mammals belonging to one specie of rodent (*Hylaeamys megacephalus*) and two species of marsupials (*Phylander opossum* and *Didelphis albiventris*). The results of this study highlight the description of new Brazilian trypanosomes in small mammals by decreasing information gaps in phylogeny and evolution.

Keywords: *Trypanosoma*. Phylogeny. Marsupials. Rodents.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Representação esquemática do cistron ribossômico de rRNA.....	23
Figura 2 -	Representação esquemática dos genes gGAPDH e cGAPDH	24
Figura 3 -	Localização dos isolados de <i>Trypanosoma</i> de acordo com seu bioma de origem no estado do Mato Grosso, MT.....	28
Figura 4 -	Microscopia eletrônica de transmissão dos novos isolados obtidos no estado de Mato Grosso	35
Figura 5 -	Microscopia eletrônica de varredura	36
Figura 6 -	Árvore filogenética do gênero <i>Trypanosoma</i>	38
Figura 7 -	Árvore obtida pelo método Máxima Parcimônia e Bayesiana com base no gene SSUrDNA concatenado com o gene Clado Lagartos / Serpentes gGAPDH (2874 caracteres, 292 sítios informativos). Os números nos nós correspondem aos valores de suporte de ramificação (bootstrap / probabilidade a posteriori). Bootstrap obtida a partir de 500 replicatas	39

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Sequências dos primers utilizados nas reações de PCR e seus respectivos tamanhos de fragmentos amplificados.....	31
Quadro 2 - Isolado de Tripanossoma, código do isolado, hospedeiro e origem geográfica dos animais silvestres infectados	33
Quadro 3 - Condições de cultivo de parasitas.....	34

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

BAB =	Blood Agar Base
CBT =	Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos
CEUA =	Comissão de Ética no Uso de Animais
DNA =	Ácido Desoxirribonucleico
FBS =	Soro fetal bovino
FMVZ =	Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
GENBANK =	Banco de dados de sequência de nucleotídeos
gGAPDH =	gliceraldeído fosfato desidrogenase
IBAMA =	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
ICMBIO =	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
SNIF=	Sistema Nacional Informação Florestas
LIT =	“Liver Infusion Tryptose”
M =	molar
MT =	Mato Grosso
PCR =	Reação em cadeia pela polimerase (“polymerase chain reaction”)
RPMI =	Roswell Park Memorial Institute
SF9 =	Células de inseto pupa <i>Spodoptera frugiperda</i>
SISBIO =	Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
SSU rDNA =	Subunidade menor do gene ribossômico
Taq =	<i>Thermus aquaticus</i>
TC100 =	Meio de cultivo de célula de inseto
UNESP =	Universidade Estadual Paulista
USP =	Universidade de São Paulo
VPS =	Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal
VERO =	Células epiteliais renais de macaco verde africano
μM =	micromolar
μL =	microlitro

Sumário

1	INTRODUÇÃO GERAL.....	14
1.1	TRIPANOSSOMAS EM MAMÍFEROS	15
1.2	PEQUENOS MAMÍFEROS TERRESTRES.....	17
1.3	EVOLUÇÃO DOS PEQUENOS MAMÍFEROS	21
1.4	GENES TRADICIONAIS UTILIZADOS PARA FILOGENIAS DE TRIPANOSSOMAS: SSURDNA E GGAPDH.....	23
2	JUSTIFICATIVA.....	26
3	OBJETIVOS.....	27
4	MATERIAIS E MÉTODOS	28
4.1	ISOLADOS DE TRIPANOSSOMA.....	28
4.2	ISOLAMENTO E CULTURA DE TRIPANOSSOMA EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS E INSETOS.....	29
4.3	CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA.....	29
4.3.1	Microscopia eletrônica de varredura	29
4.3.2	Microscopia eletrônica de Transmissão	30
4.4	EXTRAÇÃO DE DNA	30
4.5	REAÇÃO DE CADEIA DA POLIMERASE	30
4.6	ELETROFORESE.....	32
4.7	ANÁLISE FILOGENÉTICA	32
4.8	APROVAÇÃO ÉTICA	32
5	RESULTADOS.....	33
6	DISCUSSÃO	44
7	CONCLUSÃO	47
	REFERÊNCIAS.....	48

1 INTRODUÇÃO GERAL

De acordo, com a classificação mais atual dos protistas, os tripanossomas são divididos em Supergrupo: Excavata; Grupo: Euglenozoa; Subgrupo: Kinetoplastea (ADL et al., 2005). No entanto, encontramos a maior parte das referências bibliográficas com a classificação tradicional Filo: Euglenozoa, Cavalier-Smith, 1981; Classe: Kinetoplastea, (Konigberg, 1963) Vickerman, 1976; Ordem: Trypanosomatidae, (Kent, 1880) Holande, 1952; Família: Trypanosomatidae, Doflein, 1901; Gênero: Trypanosoma, Gruby, 1843.

A família Trypanosomatidae alberga protozoários flagelados que detêm como principal peculiaridade, uma área especial de sua única mitocôndria: o cinetoplasto, constituído por corpúsculos em forma circular de DNA organizados e localizados na origem do corpo flagelar (VICKERMAN, 1976). Esta família alberga parasitas divididos em gêneros com ciclo de vida monoxênicos ou heteroxênicos que infectam plantas, invertebrados e vertebrados (SIMPSON; STEVENS; LUKES, 2006; STEVENS, 2008; DESCHAMPS et al., 2011).

Os representantes do ciclo de vida heteroxênicos são: *Phytomonas*, *Endotrypanum*, *Trypanosoma*, *Leishmania* e *Parcisia* (LEONARD; SOANES; STEVENS, 2011; MASLOV et al., 2013; LUKES et al., 2014; PORCEL et al., 2014; KAUFER et al., 2017). E os parasitas do ciclo de vida monoxênicos: *Angonomas*, *Blastocrithidia*, *Lafontella*, *Herpetomonas*, *Novymonas*, *Kentomonas*, *Lotmaria*, *Paratrypanosoma*, *Sergeia*, *Strigomonas*, *Leptomonas*, *Jaenimonas*, *Blechomonas*, *Rhynchoidomonas*, *Wallacemonas*, *Zelonia* e *Crithidia* (VICKERMAN, 1976; SVOBODOVÁ et al., 2007; VOTÝPKA et al., 2013; D'AVILA-LEVY et al., 2015).

Os tripanossomatídeos monoxênicos são descritos como restritos a insetos das ordens: Diptera, Hymenoptera, Siphonaptera e Hemiptera. No entanto, alguns ciclos de vida heteroxênicos, com exceções, foram relatados: A) *Leptomonas seymouri* é observada em coinfeções com *Leishmania donovani* em pacientes com leishmaniose visceral (GHOSH et al., 2012; KRAEVA et al., 2015); B) *Leptomonas* sp. e *Herpetomonas samuelpeessoai* com infecção mista em um paciente HIV positivo (PACHECO et al., 1998; MORIO et al., 2008); C) membros de plantas infectantes por *Herpetomonas* (BORGHESAN et al., 2013) e D) um relato de *Blastocrithidia* sp. infectando morcegos (HODO et al., 2016). Os tripanossomas (*Trypanosoma* spp.) pertencem a um grupo monofilético de parasitas heteroxênios, os quais estão bem-

adaptados a várias espécies de vertebrados e são transmitidos por vetores sugadores de sangue, como sanguessugas, carrapatos e insetos (ZINGALES et al., 2012).

O estudo da variedade de tripanosomas que circulam em animais silvestres, continua sendo escasso, da mesma forma entre os mamíferos, mesmo sendo o grupo mais pesquisado (PODLIPAEV, 1990; MAIA DA SILVA et al., 2004, 2009; LIMA et al., 2012, 2015; RODRIGUES et al., 2008; FERREIRA et al., 2017; LOPES et al., 2018).

1.1 TRIPANOSSOMAS EM MAMÍFEROS

Trypanosoma é um gênero de flagelados cinetoplastídeos que inclui mais de 500 espécies descritas, parasitando todas as classes de vertebrados, com maior número de descrições de mamíferos (PODLIPAEV, 1990).

Nas espécies do gênero *Trypanosoma*, as formas tripomastigotas são descritas nos hospedeiros invertebrados (tripomastigota metacíclico e epimastigota) e vertebrados (amastigota e tripomastigota sanguíneo) (HOARE, 1972).

A Secção Salivaria engloba os parasitas que infectam os mamíferos dos subgêneros *Duttonella* (*Trypanosoma vivax*), *Pycnomonas* (*Trypanosoma suis*), *Trypanozoon* (*Trypanosoma brucei*, *Trypanosoma equiperdum* e *Trypanosoma evansi*) e *Nannomonas* (*Trypanosoma congolense*, *Trypanosoma simiae*, *Trypanosoma godfreyi*). Os tripanossomas encontrados na América do Sul, desta secção são: *T. evansi*, *T. vivax* são mecanicamente transmitidos e *T. equiperdum* é apontada como uma enfermidade venérea por transmissão direta em cavalos. Nesta secção os tripanossomas são encontrados nas glândulas produtoras de saliva do vetor, sendo disseminadas as formas tripomastigotas durante a picada do inseto. As exceções não se desenvolvem em insetos e são mesmo na África transmitidos mecanicamente, são: *T. evansi* (insetos hematófagos) e *T. equiperdum* (via sexual) (HOARE, 1972; HAMILTON; GIBSON; STEVENS, 2007; STEVENS, 2008; RODRIGUES et al., 2016; WEN et al., 2016).

Na Secção Stercoraria, as espécies crescem somente, no canal digestivo do vetor, disseminadas por transmissão com formas tripomastigotas metacíclicas, eliminadas com os excrementos dos insetos durante a picada. Engloba os

subgêneros *Schizotrypanum*, *Herpetosoma* e *Megatrypanum*, respectivamente *Trypanosoma cruzi*, *Trypanosoma lewisi*, *Trypanosoma theileri* (HOARE, 1972).

As análises filogenéticas baseadas em diversos genes têm apoiado os grandes clados no gênero: o Clado *T. brucei*, o Clado *T. cruzi* e o Clado aquático, clado *T. theileri*; Clado *T. cyclops*, Clado *T. copemani*; Clado *T. avium/T. corvi*, Clado *T. lewisi*, Clado *T. terrestris*, Clado lagartos/ serpentes/ mamíferos e Clado crocodilianos (RODRIGUES et al., 2006; FERMINO et al., 2013; HAMILTON; GIBSON; STEVENS, 2007; SARATAPHAN et al., 2007; VIOLA et al., 2009 a, b; MAIA DA SILVA et al., 2010; ACOSTA et al., 2013; FERREIRA et al., 2017).

O Clado *T. brucei* é composto por isolados patogênicos que tiveram origem na África. Infecta o homem e mamíferos ungulados silvestres e domésticos (interesse na pecuária) e tem como vetor a mosca tsé-tsé (STEVENS; RAMBAUT, 2001; HAMILTON et al., 2009; VAN DEN BOSSCHE et al., 2010). Este clado reúne: *T. brucei*, *T. evansi*; *T. vivax*; *T. suis*; *T. congolense* e *T. simiae* (HOARE, 1972; ADAMS et al., 2010).

Clado *T. cruzi*: composto pelo *T. cruzi* e tripanossomas de morcegos do velho e novo mundo, *T. conorhini* de ratos e um tripanossoma de canguru da Austrália. Os tripanossomas *T. rangeli* e *T. rangeli-like* integram um conjunto correlacionado com as espécies do subgênero *Schizotrypanum* (STEVENS, 2008; LIMA et al., 2013).

Clado Aquático: composto por tripanossoma de tartaruga, de ornitorrinco, peixes e anfíbios. Com a inserção de tripanossomas de anuros na filogenia foi sugerida uma ramificação do Clado aquático em dois grupos (tripanossomas de peixes predominantes) e outro (tripanossoma de anuros). Os sanguessugas são os vetores das espécies que infectam peixes, tartarugas, serpentes aquáticas e anuros. Nos tripanossomas de anuros também são vetores moscas e mosquitos hematófagos (FERREIRA et al., 2007, 2008; VIOLA et al., 2009b; SPODAREVA et al., 2018).

Clado *T. grayi*: abrange tripanossomas de crocodilianos de origem africana (disseminados por moscas tsé-tsé) e no continente Sul americano os vetores são as lesmas e os tabanídeos (VIOLA et al., 2009b, FERMINO et al., 2013; 2015; 2019).

Clado *T. theileri*: compreende tripanossomas não patogênicos e específicos de mamíferos ungulados da ordem Artiodactyla, que abrange os bovinos, bubalinos, cervídeos, ovinos e antílopes, e tem como vetores moscas hematófagas

(RODRIGUES et al., 2006; HAMILTON et al., 2009). Também neste clado reúne espécies como *T. cyclops* e *Trypanosoma* spp. encontrados em primatas da Ásia, tripanossoma de wallaby e sanguessugas terrestres (HAMILTON; GIBSON; STEVENS, 2007; RODRIGUES, 2010; LIMA et al., 2013).

Clado dos Tripanossomas de origem australiana compõem tripanossomas de coala e marsupiais (THOMPSON; GODFREY; THOMPSON, 2014).

Clado *T. avium*/ *T. corvi* integra tripanossomas de aves. Tem como vetores artrópodes (VOTÝPKA et al., 2012).

Clado *T. lewisi* relatados nas ordens Lagomorpha, Rodentia e primatas (MAIA DA SILVA et al., 2010). Este clado tem como vetor pulga e possuem especificidade por hospedeiro vertebrado (HOARE, 1972).

Clado *T. terrestris* constituído por tripanossoma de anta brasileira (*Tapirus terrestris*) (ACOSTA et al., 2013).

Clado lagartos/ serpentes/ mamíferos é formado de relatos de tripanosomas parasitando serpentes brasileiras, lagartos da América do Norte e da África e um pequeno marsupial do Cerrado brasileiro (VIOLA et al., 2008; 2009 a, b; FERREIRA et al., 2017). Transmitidos principalmente por insetos flebotomíneos, o clado lagarto / cobra é composto por *Trypanosoma varani* e *Trypanosoma* sp., que infectam lagartixas, e *Trypanosoma cascavelli* e *Trypanosoma serpentis*, que parasitam cobras no Brasil (PESSÔA; DE BIASI, 1972; VIOLA et al., 2009a; ACOSTA et al., 2014). *Trypanosoma gennarii* (Marcili, 2017), foi encontrado em *Monodelphis domestica* e *Gracilinanus agilis*, com possíveis vetores insetos dípteros (FERREIRA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2019).

1.2 PEQUENOS MAMÍFEROS TERRESTRES

Eisenberg; Redford (1999), classificaram como pequenos mamíferos, animais cujo peso corporal não ultrapassa 2 kg. Integram este grupo os marsupiais, como gambás e cuícas da Ordem Didelphimorphia, Família Didelphidae e ratos da Ordem Rodentia, Famílias: murídeos, cavídeos, esquilos e ratos-de-espinhos.

Os pequenos mamíferos brasileiros são relatados em todos os exemplos de ecossistema, tais como florestas fechadas, campos e dunas. Apresentam diferentes hábitos de vida: semi-fossorial e terrestre; escansorial (solo e o subosque); arborícola (subosque e dossel) e semiaquático (FONSECA et al., 1996). Sobre a

dieta podem ser insetívoros, onívoros, frugívoros, piscívoros (alguns marsupiais) e podem consumir ovos (FONSECA et al., 1996; BARBINI; PASSAMANI, 2003). Já os roedores parecem comer grãos, são herbívoros e alguns insetívoros (GASPAR, 2003).

Entre os marsupiais, a família Didelphidae conta com mais de 70 espécies, distribuídas pelas Américas e 55 espécies no Brasil (REIG, 1981; VOSS; LUNDE; JANSÁ, 2005). Já o gênero *Didelphis*, é encontrado desde o Canadá até a Argentina (AUSTAD, 1988).

Fazem parte do grupo dos didelfídeos as seguintes espécies: *Didelphis albiventris* e *Philander opossum*. *Didelphis albiventris* (Lund, 1840) pertence a Classe Mammalia, Ordem Didelphimorphia, Família Didelphidae. Tem como nomes populares: Gambá orelha-branca, Saruê, *White-eared Opossum*, Comadreja Común, Comadreja Overa. Ocorre nos territórios brasileiro, paraguaio, uruguaio, argentino e boliviano. Também é um dos maiores marsupiais do Brasil, pesando de 500 g a 2,8 Kg (EISENBERG; REDFORD, 1999). Possuem dieta onívora, são arborícolas, noturnos e solitários (FONSECA et al., 1996), e considerados sinantrópicos. Os representantes do gênero *Didelphis* tem demonstrado competência para serem bioacumuladores de *T. cruzi* (DEANE; LENZI; JANSEN, 1984; ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002).

Philander opossum (Linnaeus, 1758) pertence a Classe Mammalia, Ordem Didelphimorphia, Família Didelphidae. Tem como nomes populares: *Philander frenatus*, Cuíca quatro-olhos, *Southeastern Four-eyed Opossum*. Está presente do nordeste do México, planícies tropicais das Américas Central e do sul até a Bolívia e centro-sul do Brasil, em altitudes usualmente abaixo de 1000 m (PATTON; SILVA, 2007). Marsupial de porte médio que vive em florestas e matas de galeria, habitando tanto o dossel quanto o solo, são terrestres e solitários. São onívoros, alimentam-se de frutos, de pequenos invertebrados e vertebrados e até mesmo carniça. Peso corporal de 341 a 910 g (VOSS; LUNDE; SIMMONS, 2001)

A Ordem Rodentia, a qual pertence os roedores, repleto em torno de 44% das espécies dentro da classe Mammalia, sendo descritos no Brasil 75 gêneros e 243 espécies (MUSSER; CARLETON, 2005; REIS et al., 2011). Genericamente, esta ordem compreende animais de poucos gramas, como os microrroedores murídeos até os mais pesados como a capivara, o maior roedor conhecido (CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2007).

A Família Cricetidae está dividida em seis subfamílias, dentre elas, a subfamília Sigmodontinae, é a segunda maior em número de espécies e na diversidade de roedores (SWIER et al., 2009). Esta subfamília é exclusiva das Américas, ocorrendo principalmente na América do Sul e contém 377 espécies em 74 gêneros e 9 tribos (REIG, 1980; SMITH; PATTON, 1999; D'ELÍA; PARDIÑAS; MYERS, 2005; MUSSER; CARLETON, 2005).

Faz parte do grupo dos sigmodontinos a seguinte espécie: *Hylaeamys megacephalus* (Fischer, 1814 e Weksler; Percequillo; Voss, 2006). Pertence a Classe Mammalia, Ordem Rodentia, Família Cricetidae a qual apresenta ampla radiação no Neotrópico e um grande número de espécies, com diversas variações morfológicas e ecológicas (EISENBERG; REDFORD, 1999). Tem ampla distribuição geográfica na América do Sul e uma das maiores do gênero *Hylaeamys*, ocorrendo em florestas desde a Amazônia até o Cerrado e Mata Atlântica. Foi encontrada nos seguintes territórios: venezuelano, guianense, trinidense, paraguaio e brasileiro (PRADO; PERCEQUILLO, 2013). E ainda tem hábito terrestre (MARES; ERNEST; GETTINGER, 1986; NITIKMAN; MARES, 1987).

Os roedores têm importante papel na transmissão de zoonoses, como reservatórios de parasitas, entre eles: *Leishmania* spp, *T. cruzi*, *T. evansi*, *T. rangeli* e *T. conorhini* (DEANE; DEANE, 1961; PINTO et al., 2006; NAIFF; BARRETT, 2013; HONG et al., 2017).

Os roedores têm a capacidade de estarem infectados com mais de um tripanosoma ao mesmo tempo, como *Trypanosoma musculi* e *T. lewisi*, ambos os parasitas têm vida semelhante, ciclos com duas formas proliferativas principais: tripomastigotas e epimastigotas (HONG et al., 2017). Os tripomastigotas de *T. lewisi* têm comprimento do corpo e largura similares, o que torna difícil a distinção destes dois tripanossomas morfológicamente, sendo necessária a diferenciação molecular (HOARE, 1972; TALIAFERRO; PAVLINOVA, 1936).

T. lewisi (Kent, 1880), é considerada uma espécie de grande especificidade pelo hospedeiro vertebrado. Encontrada circulando ao redor do mundo, em lagomorfos, morcegos e primatas (inclusive humanos imunodeprimidos), com preferência em parasitar roedores (JOHNSON, 1933; MARINKELLE, 1966; SHRIVASTAVA; SHRIVASTAVA, 1974; LAINSON; BRÍGIDO; SILVEIRA, 2004; HOWIE et al., 2006; KAUR et al., 2007; SARATAPHAN et al., 2007; DOKE; KAR 2011; VERMA et al., 2011; TRUC et al., 2013; HONG et al., 2017). Esta espécie não

parece ser patogênica, é geralmente autolimitante no seu hospedeiro roedor, devido a sua capacidade reduzida de variação antigênica (D'ALESSANDRO; BEHR, 1991).

No Brasil, a espécie *T. lewisi-like*, foi encontrada em um esquilo (*Sciurus spadiceus*) na região Amazônica (LAINSON; BRÍGIDO; SILVEIRA, 2004).

As pulgas (Siphonaptera), são consideradas como insetos vetores para a maior parte dos parasitas do subgênero *Herpetosoma*. Os roedores adquirem a infecção ao lambem essas fezes da pulga contaminadas desses insetos presentes em sua pele ou pela ingestão de pulgas durante a autolimpeza (MOLYNEUX, 1976).

Marcadores moleculares tradicionais têm sido utilizados para distinguir *T. lewisi* e *T. rangeli* (Tejera, 1920), o que vem revelando muitas sinonímias (NOYES et al., 2002). No entanto, o comportamento do vetor e sua gama de hospedeiros e filogenia molecular validaram o subgênero *Herpetosoma*, contendo o clado *T. lewisi*, excluindo o *T. rangeli* (HAMILTON; GIBSON; STEVENS, 2007; MAIA DA SILVA et al., 2007).

Já em marsupiais foi descrito infecção mista em *Monodelphis domestica* com *Trypanosoma gennarii* e *T. cruzi* (FERREIRA et al., 2017) e *Monodelphis americana* com *T. cascavelli*, *T. dionisii* e *Trypanosoma* sp (DARIO et al., 2017).

A tripanossomíase americana causada pelo *T. cruzi* que em humanos pode resultar na doença de Chagas, atualmente é considerada um desafio global à saúde (COURA; VIÑAS; JUNQUEIRA, 2014; JANSEN; XAVIER; ROQUE, 2018). Essa doença é distribuída em 21 países latino-americanos e estuda-se que entre 6 a 8 milhões de seres humanos no mundo estejam contaminados com *T. cruzi* (WHO, 2018).

T. cruzi (Chagas, 1909) é um parasita generalista e de grande sucesso, pois é encontrado em uma centena de espécies de mamíferos distribuídos do sul dos EUA ao sul da Argentina. Essa espécie de parasita é transmitida por insetos triatomíneos, exclusivamente, hematófagos (insetos da ordem Hemiptera), nas quais o parasita estabelece infecções permanentes (JANSEN; XAVIER; ROQUE, 2018).

Em seus hospedeiros mamíferos, *T. cruzi* também estabelece infecções estáveis e duradouras, que apresentam peculiaridades inerentes às diferentes espécies hospedeiras e até indivíduos. Outros múltiplos fatores também contribuem para essas peculiaridades tais como: como subpopulações de parasitas, rota de infecção, estado nutricional do hospedeiro e infecção concomitante com unidades de tipagem discreta (DTUs) distintas de *T. cruzi* (JANSEN; XAVIER; ROQUE 2018). Os

genótipos de *T. cruzi* foram agrupados em seis unidades de tipagem discreta (DTUs), TcI- TcVI, além do Tcbat, o sétimo DTU (ZINGALES et al., 2009; MARCILI et al., 2009).

Todos os genótipos de *T. cruzi* são capazes de infectar seres humanos, e a doença de Chagas tem possíveis resultados clínicos graves (ZINGALES et al., 2012). A distribuição geográfica dessas DTUs varia de acordo com aos diferentes cenários de transmissão em que seus hospedeiros estão envolvidos. *T. cruzi* é colocado dentro do clado *T. cruzi*, que engloba outras espécies de tripanossomas que infectam uma diversidade de mamíferos (incluindo humanos) e morcegos, em particular (RANGEL et al., 2019).

Marsupiais e morcegos são reconhecidos como hospedeiros muito antigos do clado *T. cruzi* (LOPES et al., 2018).

No Brasil, foram reportadas as espécies *T. freitasi*; *T. saloboense*; *T. cruzi* e *T. rangeli* infectando diversas espécies de marsupiais (RÊGO; MAGALHÃES; SIQUEIRA, 1957; DEANE et al., 1972; MAIA DA SILVA et al., 2004; LAINSON, DA SILVA; FRANCO 2008). Ainda no país, um dos primeiros relatos de tripanossomas foi *T. samueli* em *Monodelphis domestica* um pequeno marsupial; nos roedores o *T. amileari* em *Oryzomys eliurus*, *T. conorhini* em *Rattus rattus* (HOARE, 1972; MELLO, 1977; 1979). Além de *T. shawi* em capivaras com parasitemia extremamente baixa (NUNES et al., 1987); *Mesomys hispidus*, roedor com *T. lainsoi* (NAIFF; BARRETT, 2013) e outro tripanossoma relatado em roedor no Brasil foi *T. mariae* em *Calomys callosus* (MELLO, 1978; BORGES; MELO; TEIXEIRA, 1982).

Os trabalhos realizados no Brasil, descrevem apenas as características morfológicas do parasita. Em marsupiais, recentemente foi descrito *T. gennarii* em *Monodelphis domestica* e *Gracilinanus agilis* (FERREIRA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2019) e *T. janseni* em *D. aurita* e *D. albiventris* (LOPES et al., 2018; RODRIGUES et al., 2019) com descrição morfológica, estudo molecular e filogenia.

1.3 EVOLUÇÃO DOS PEQUENOS MAMÍFEROS

Entre marsupiais e placentários, a divergência, é de cerca de 100 milhões de anos. Os marsupiais, tem sua origem incerta alguns estudos pressupõem sua origem na América do Norte, de onde chegaram a extinção cerca de 15 milhões de anos ao mesmo tempo. Avançaram a expansão na América do Sul, prosseguindo até

a Austrália, em que, por ausência de competidores, houve sua grande diversificação (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002).

A ampla distribuição dos marsupiais didelfídeos nas Américas tende-se a sua excelente adaptabilidade, principalmente. A resistência ao endocruzamento é outro fator positivo à dispersão da espécie, já que somente um pequeno número de animais é suficiente para formar uma colônia (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002).

Nas Américas, os marsupiais evoluíram de forma isolada e foram eficazes ao ocuparem diversos nichos (TYNDALE-BISCOE, 2005). Referências são desconhecidas de ordens de marsupiais anteriores ao Cretáceo tardio (ARCHER; KIRSCH, 2006). No entanto, todas as linhagens de marsupiais já eram descritas, no início do Terciário (TYNDALE-BISCOE, 2005). Os mais antigos registros fósseis do gênero *Didelphis* datam de 4 milhões de anos (ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2002; COZZUOL et al., 2006).

Os roedores sigmodontinos (ratos-de-algodão e arroz, grama, camundongos etc.) estão presentes em toda a América do Sul, do nível do mar aos altos Andes e da Amazônia ao Atacama (LESSA et al., 2014). A subfamília Sigmodontinae inclui 86 gêneros e cerca de 400 espécies existentes, das quais 85 gêneros e 381 espécies habitam a América do Sul (D'ELÍA; PARDIÑAS, 2015). Os gêneros sigmodontinos foram unidos em vários grupos, com alguns formalizados como tribos. Análises filogenéticas baseadas em sequências de DNA levaram a mudanças importantes na distinção e composição das tribos (LESSA et al., 2014).

Foi proposto, de acordo com o modelo de paleobiogeografia sigmodontina, que os roedores sigmodontinos evoluíram na América do Norte pelo menos 7 milhões de anos. Eles invadiram a América do Sul por dispersão da América Central entre 5 e 7 milhões de anos durante uma queda mundial do nível do mar (MARSHALL et al., 1979; ENGEL et al., 1998; SMITH; PATTON, 1999).

Steppan, Adkins e Anderson, et al. (2004), usando genes nucleares, propuseram que apenas uma linhagem tenha chegado a América do Sul antes da formação da ponte terrestre panamenha. Uma vez estabelecidos na América do Sul, os sigmodontinos passaram por uma grande radiação adaptativa, responsável por sua diversidade atual (ENGEL et al., 1998), cerca de 60% de todas as espécies de roedores da América do Sul (LEITE et al., 2014). Já Schenk, Rowe e Steppan (2013) demonstraram que a diversificação dos sigmodontinos na América do Sul se deve a um processo de oportunidade ecológica. Leite et al. (2014) sugerem que a

diversificação da subfamília Sigmodontinae envolve mudanças paleogeográficas nas escalas continental e global, o que possibilitou uma primeira invasão da região noroeste da Colômbia no mioceno médio e tardio.

1.4 GENES TRADICIONAIS UTILIZADOS PARA FILOGENIAS DE TRIPANOSSOMAS: SSUrDNA E gGAPDH

A utilização de genes ribossômicos tem permitido inferir relacionamentos filogenéticos entre as espécies de diferentes gêneros, refletindo a história evolutiva da família Trypanosomatidae, devido a sua ampla presença e função essencial em todos os seres vivos descritos (ESPINOSA, 2014).

A estrutura de DNA ribossômico (rDNA) consiste em unidades de repetição com uma unidade de transcrição (cistrons ribossômico) e um espaçador intergênico (IGS), com cópias enfileiradas repetitivas no genoma dos tripanossomatídeos. Esses genes são processados como um pré-RNA originando 3 moléculas muito conservadas de RNA maduros, nomeados: 18S (SSU ou subunidade menor), 5,8S e 24S (LSU, subunidade maior). A subunidade maior, 24S é composta por duas unidades de grande peso molecular (24S α e 24S β) e por quatro unidades menores de rRNAs de pequeno peso molecular: S1 (entre 24S α e 24S β); S2, S4 e S6 (extremidade 5' da 24S β). As três moléculas 18S, 5,8S e 24S, são separadas por regiões transcritas: os espaçadores transcritos internos (ITS) e os espaçadores transcritos externos (ETS), com grau de conservação mediano (SOGIN; ELWOOD; GUNDERSON, 1986; HERNÁNDEZ et al., 1990). (Figura 1).

Figura 1 - Representação esquemática do cistron ribossômico de rRNA

Fonte: Modificado de Marcili (2008).

O SSU (subunidade menor) é composta por sítios globalmente conservados (U1-U8), cercados por partes instáveis (V1-V9) (HERNÁNDEZ et al., 1990). Regiões parcialmente conservadas concedem, ao mesmo tempo, alinhamentos altamente confiáveis, com habilidade de resolver relacionamentos entre organismos distantes, tal como entre espécies muito relacionadas. As regiões V7-V8 que compõem fragmentos da SSUrDNA, foram empregadas como marcadores, para inferir filogenias dos tripanossomatídeos e análises de *DNA barcoding*. Os espaçadores intergênico (IGS) e espaçadores transcritos internos (ITS), possuem alto grau de polimorfismo e são bastante variáveis, até mesmo entre isolados da mesma espécie, ao contrário da região SSU e LSU (LIMA et al., 2013).

A enzima gGAPDH (Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase glicossomal) atua no metabolismo da glicose pelo glicossoma, muito importante aos cinetoplastídeos. Nos parasitas da família Trypanosomatidae, a enzima gGAPDH é composta por dois genes iguais organizados em cópias enfileiradas. Fora a versão glicossomal, há uma cópia de outro gene que codifica uma isoforma citoplasmática da enzima (cGAPDH) (Figura 2) (HANNAERT; OPPERDOES; MICHELS, 1998).

Entre os tripanossomatídeos, os genes de gGAPDH são muito preservados dentro de cada espécie com pequena variação de tamanho, sem regiões ambíguas, o que permite inúmeros alinhamentos muito confiáveis. Estes atributos permitem que o gene completo possa ser utilizado em filogenias de organismos muito distantes (HAMILTON et al., 2004)

Figura 2 - Representação esquemática dos genes gGAPDH e cGAPDH

Fonte: Modificado de Vargas (2014).

As sequências do gene gGAPDH, ajudam a compreender as relações filogenéticas entre os tripanosomas e apresentam grande harmonia com os produtos gerados em relações filogenéticas semelhantes com o gene SSU rRNA (HAMILTON

et al., 2004). Em trabalhos evolutivos da família Trypanosomatidae, o gene gGAPDH é o segundo mais utilizado (em análises individuais e / ou combinadas), logo após o gene SSU rRNA. Com as sequências concatenadas de gGAPDH e SSUrDNA têm formado, pelas análises filogenéticas, topologias bastante robustas e confiáveis. Desse modo, são bastante úteis na diferenciação dos gêneros, dos subgêneros e das espécies desta família (HAMILTON; GIBSON; STEVENS, 2007; FERMINO et al., 2013).

2 JUSTIFICATIVA

Todas as espécies de roedores e marsupiais descritas são possíveis hospedeiros de diferentes espécies de tripanosomas com potencial patogênico para humanos e animais domésticos.

Os biomas Cerrado e Pantanal são considerados hotspots da biodiversidade mundial e vem continuamente sofrendo processos de degradação como a perda de área, pressão para áreas de pastagens e cultivo, além dos focos de queimadas que aumentaram significativamente no último ano.

Estes fatores alteram a dinâmica de transmissão de diversos patógenos devido a perda da diversidade de hospedeiros e vetores propiciando a dispersão ou a mudança de hospedeiros.

A descrição de novas espécies atentam para a diversidade de áreas com constantes processos de degradação e ainda alertam para novos patógenos com potencial zoonótico ainda desconhecido.

3 OBJETIVOS

Objetivo Geral

- Realizar a caracterização morfológica e posicionamento filogenético dos isolados obtidos de roedores e marsupiais silvestres.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ISOLADOS DE TRIPANOSSOMA

Desde ano de 2011, diversos animais silvestres foram capturados nos diferentes biomas brasileiros (Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia e Pantanal) para o isolamento de tripanossomatídeos com o objetivo da montagem da Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos (CBT) locada no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ-USP sob curadoria do Prof. Dr. Arlei Marcili.

Dentre os isolados obtidos, um total de 10 isolados apresentaram comportamento biológico em culturas distintos e morfologia singulares e foram selecionados para a realização deste estudo. Estes isolados com perfis distintos foram obtidos de roedores e marsupiais capturados no estado de Mato Grosso de dois municípios, Poconé (16° 15' 24" S e 56° 37' 22" W) e Chapada Guimarães (15° 27' 38" S e 55° 44' 59" W) (Figura 3).

Figura 3 - Localização dos isolados de *Trypanosoma* de acordo com seu bioma de origem no estado do Mato Grosso, MT

Fonte: Modificado de SFB, 2020.

AM: Amazônia; CE: Cerrado; MA: Mata Atlântica; PA: Pantanal; CA: Caatinga; P: Pampa.

Ponto vermelho: Poconé, MT; Ponto preto: Chapada dos Guimarães, MT.

4.2 ISOLAMENTO E CULTURA DE TRIPANOSSOMA EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS E INSETOS

Amostras de sangue de animais selvagens foram coletadas em tubos de vacutainer, contendo ágar-sangue (base com 15% de glóbulos vermelhos de ovelhas) e com meio líquido LIT suplementado com 20% de soro fetal bovino (MARCILI et al., 2013). Os isolados foram acondicionados em nitrogênio líquido na Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos (CBT), no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Brasil. Além disso, foi feito esfregaço sanguíneo em lâminas de vidro para estudos morfológicos.

Parasitas foram utilizados para infectar células epiteliais renais de mamíferos (Vero) e células de insetos (C6 / 36 e SF9). As células foram preservadas em cultura em meio RPMI (Invitrogen), suplementado com 10% de soro fetal bovino, penicilina (Sigma) 10.000 unidades / mL e estreptomicina (Sigma) 10.000 µg / mL a 37° C e células de inseto (SF9) cultivadas com TC100 suplementadas com 10 % de soro fetal bovino (Invitrogen), em estufa a 25-28°C. Essas culturas foram usadas para fazer microscopia eletrônica de varredura e transmissão (FERREIRA et al., 2017). Os meios axênicos (LIT, RPMI e TC100) suplementados com soro fetal bovino a 10% foram utilizados para o crescimento do parasita.

4.3 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA

4.3.1 Microscopia eletrônica de varredura

Parasitas cultivados em células de insetos e células de mamíferos foram fixados com Karnovsky (v / v) em tampão de cacodilato 0,1 M (pH 7,4) por 2 horas. A lamela tratada com poli-L'Lysine a 0,1% foi revestida com células fixas, seguida pela desidratação em uma série crescente de etanol e acetona (95%) (Balzers CPD 030). As lamelas secas foram revestidas com ouro por pulverização com um Sputter Coater Balzers SCD 050 e as amostras foram digitalizadas usando uma digitalização HITACHI TM3000 no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, UNESP, campus de Rio Claro, Rio Claro, SP, Brasil.

4.3.2 Microscopia eletrônica de Transmissão

O material foi fixado em glutaraldeído a 2,5% e depois fixado em tampão fosfato sendo pós-fixado com tetróxido de ósmio a 1% v / v em 50 mM de tampão cacodilato (pH 7,4) e corado com acetato de uranil por 12 h. Posteriormente, as amostras foram desidratadas em acetona e embebidas em resina Araldite-EPON por 12 horas a 60 °C. Os cortes foram corados com acetato de uranila e citrato de chumbo por, respectivamente 45 minutos e 10 minutos (REYNOLDS, 1963). Eles foram observados em um equipamento Philips CM 100 TEM no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, UNESP, campus de Rio Claro, Rio Claro, SP, Brasil.

4.4 EXTRAÇÃO DE DNA

O DNA foi extraído e purificado das culturas de tripanossomas utilizando o Kit DNA Genômico DNA Purelink (Thermofisher), de acordo com as instruções do fabricante e foram quantificados em espectrofotômetro miniaturizado, do tipo Nanodrop, padronizados para 100µg (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA). As amostras foram armazenadas até -20°C até a utilização nas reações de PCR.

4.5 REAÇÃO DE CADEIA DA POLIMERASE

As amostras de DNA foram submetidas à reação em cadeia da polimerase convencional (PCR) para os genes completos SSUrDNA e gGAPDH (Quadro 1).

Quadro 1 - Sequências dos primers utilizados nas reações de PCR e seus respectivos tamanhos de fragmentos amplificados

Primer	Código Primer	Sequência de primer (5'-3')	Tamanho amplificado (bp)	Condições	Referências
gGAPDH	gGAPDSF	GTG GCG GTK GTY GACATG AAC A	~ 680	ciclo 95°C, 180s por 30 ciclos, 60s a 95°C, 30s a 55°C, 60s a 72°C e extensão final 72°C por 400s.	Hamilton et al., (2004; 2009)
	gGAPDSR	TTG GAG TCR TAG ATR GAG CT			
SSUrDNA	KDR3	GAT CTG GTT GAT TCT GCC AGT AG	~900	ciclo 95°C, 5 min por 5 ciclos, 1 min a 95°C, 30s a 45°C, 1 min a 65°C e 35 ciclos a 95°C por 1 min, 50°C por 30 s, 72°C por 1 min e a extensão final a 65°C por 30 min.	Ferreira et al., (2008); Borghesan et al., (2013)
	KDR5	GAT CCA GCT GCA GGT TCA CCT AC			

Fonte: Ferreira (2020).

A mistura do PCR constitui 50µl de volume final composto por 1µl de DNA [50ng/µl]; 2µl primers; 31,5µl água pura; 10µl DNTP; 5µl Tampão; 0,5µl de Taq DNA polimerase (Invitrogen, Inc., Oregon, USA).

Foi utilizado um controle positivo da reação de PCR, a própria amostra e dois controles negativos com água Mili-Q e um livre de DNA.

4.6 ELETROFORESE

Fragmentos de DNA amplificados por reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional foram separados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, em tampão Tris-Acetato-EDTA (TAE) a 50V/100mA e corados com Syber Safe (Invitrogen, Inc., Oregon, USA), de acordo com especificações do fabricante.

4.7 ANÁLISE FILOGENÉTICA

Os produtos de PCR do tamanho esperado foram purificados em reações de exonucleases e foram submetidos a reações de sequenciamento, utilizando o kit Big Dye Terminator (Perkin Elmer), de acordo com especificações do fabricante e sequenciados em um sequenciador automático (modelo Genetic Applied Biosystems / Perkin-Elmer). As sequências obtidas neste estudo foram depositadas no GenBank.

As sequências obtidas foram alinhadas com as sequências prévias de outras espécies de tripanossomatídeos, prontos no GenBank, usando Clustal X (THOMPSON, 1997). Foram ajustadas manualmente usando GeneDoc (NICHOLAS; NICHOLAS; DEERFIELD, 1997). As sequências completas de SSUrDNA e gGAPDH foram concatenadas com 2874 caracteres. O alinhamento resultante foi utilizado para reconstrução filogenética por meio de métodos de máxima parcimônia, implementados através do PAUP versão 4.0b10 (SWOFFORD, 2002) e a análise bayesiana foi realizada usando MrBayes v3.1.2 (HUELSENBECK; RONQUIST, 2001).

4.8 APROVAÇÃO ÉTICA

Os animais foram capturados e manipulados de acordo com as recomendações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (IBAMA; ICMBio). Os procedimentos foram aprovados pelo CEUA da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (CEUA número 8978250216).

5 RESULTADOS

Foram obtidos dez isolados de espécies de roedores (*Hylaeamys megacephalus*) e marsupiais (*Phylander opossum* e *Didelphis albiventris*). Os animais infectados foram amostrados do estado de Mato Grosso em dois municípios: Poconé e Chapada dos Guimarães, bioma Pantanal e Cerrado, respectivamente (Quadro 2).

Quadro 2 - Isolado de *Trypanosoma*, código do isolado, hospedeiro e origem geográfica dos animais silvestres infectados

<i>Trypanosoma</i> sp	Código do Isolado	Hospedeiro	Origem Geográfica	
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 1	CBT 51	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 2	CBT 52	<i>Phylander opossum</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 3	CBT 127	<i>Didelphis albiventris</i>	Chapada Guimarães	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 228	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 229	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 230	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 231	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 232	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 233	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT
<i>Trypanosoma</i> sp. n. 4	CBT 272	<i>Hylaeamys megacephalus</i>	Poconé	MT

Fonte: Ferreira (2020).

Os dados mostram a denominação de quatro novas espécies de *Trypanosoma* e respectivo código do isolado, bem como as espécies dos animais infectados e sua origem geográfica. MT- Mato Grosso; CBT- Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos.

Durante o isolamento dos parasitas, as culturas apresentaram diferentes padrões de exigências nutricionais. Os isolados CBT127, CBT228, CBT229,

CBT230, CBT231, CBT232, CBT233 e CBT272 crescem em monocamada de células VERO com meio RPMI. No entanto, CBT51 o crescimento pleno ocorre em monocamada de células SF9 com meio TC100 (Quadro 3) e, crescimento parcial no meio axênico TC100. O isolado CBT52 foi o único capaz de crescer em meio axênico LIT. Nenhum dos isolados cresceu em meio axênico RPMI.

Quadro 3 - Condições de cultivo de parasitas

Isolados (CBT)	Meio de cultura e monocamada de células				
	LIT	TC100	RPMI	Vero+RPMI	SF9+TC100
51	-	+	-	-	+
52	+	-	-	-	-
127	-	-	-	+	-
228	-	-	-	+	-
229	-	-	-	+	-
230	-	-	-	+	-
231	-	-	-	+	-
232	-	-	-	+	-

Fonte: Ferreira (2020).

As hemoculturas foram aplicadas ao meio de isolamento de campo (LIT). Os meios foram utilizados para infectar as monocamadas de células de mamíferos (Vero) cultivadas em meio RPMI suplementado com 10% de FBS a 37 ° C e em células de inseto (SF9) cultivadas em TC100 suplementadas com 10% de FBS a 25-28 °C. Os parasitas foram testados em meios de cultura e monocamadas celulares. + indica crescimento do parasita e - indica ausência de crescimento do parasita.

No isolado obtido de *Hylaeamys megacephalus*, as formas epimastigotas de *Trypanosoma* sp. n. 1 são grandes, largas e com pouca mobilidade do flagelo e com grande membrana ondulante (Figura 3B a e Figura 4A a-c). As formas tripomastigotas são mais curtas e delgadas que as formas epimastigotas, com uma membrana ondulante pouco desenvolvida e flagelo curto (Figura. 4A b).

No isolado obtido de *Phylander opossum*, as formas epimastigotas de *Trypanosoma* sp. n. 2 são muito grandes, com membrana ondulante bem desenvolvida e sem motilidade do flagelo (Figura 3B b e Figura 4B b-c). As formas de tripomastigotas não foram evidenciadas em esfregaços sanguíneos.

No isolado obtido de *Didelphis albiventris*, as formas epimastigotas de *Trypanosoma* sp. n. 3 são grandes, delgadas e com pouca motilidade do flagelo e com grande membrana ondulante (Figura 3A a-c e Figura 4C a). As formas

tripomastigotas são grandes e largas, com uma membrana ondulante muito bem desenvolvida e flagelo curto (Figura 3B c; Figura 4C b-c).

Nos isolados obtidos de *Hylaeamys megacephalus*, apresentaram morfologias semelhantes e os mesmos desenvolvimentos em cultura. Durante a fase estacionária, as formas epimastigotas de *Trypanosoma* sp. n. 4, possuem flagelos e membrana ondulante com pouca motilidade, são grandes e largos (Figura 3B d e Figura 4D a-c). As formas tripomastigotas são mais curtas que as formas epimastigotas, com pouca motilidade do flagelo e membrana ondulante não desenvolvida (Figura 4D b).

Figura 4 - Microscopia eletrônica de transmissão dos novos isolados obtidos no estado de Mato Grosso

Fonte: Ferreira (2020).

K- cinetoplasto; M- mitocôndrias e * reservossomos estão indicados na figura.

Figura 5 - Microscopia eletrônica de varredura

Fonte: Ferreira (2020).

n. A. *Trypanosoma* sp. n. 1 (CBT 51), B. *Trypanosoma* sp. n. 2 (CBT 52), C. *Trypanosoma* sp. n. 3 (CBT 127), D. *Trypanosoma* sp. n. 4 (CBT 230). Formas epimastigotas (E) e tripomastigotas (T) dos parasitas.

As filogenias obtidas com a análise concatenada do gene SSUrDNA e gGAPDH pelos métodos de Máxima Parcimônia e Bayesiana geraram topologias idênticas por ambos os métodos e corroboram as relações filogenéticas já descritas para o gênero *Trypanosoma*, com clados bem suportados (100% bootstrap e 1,0 de probabilidade a posteriori) (Figura 5). Todos os novos isolados foram agrupados em Clado Lagartos / Serpentes / Mamíferos (Figura 6). Três subclasses foram formadas, um composto pelas espécies que parasitam lagartos (*T. varani* e *Trypanosoma* sp Gecko) (100% de bootstrap e 1,0 a posteriori); outro composto por *T. lainsoni* e *Trypanosoma* sp. n. 4 (100% de bootstrap e probabilidade 1,0 a posteriori) e um grupo constituído por *Trypanosoma* sp. n. 1, *Trypanosoma* sp. n. 2, *Trypanosoma* sp. n. 3., *T. freitasi*, *T. gennarii* e tripanossomas de serpentes (*T. cascavelli* e *T. serpentis*) (100% bootstrap e 1,0 a posteriori). As novas espécies de tripanossomas apresentam valores entre 1,4 e 4,3% de divergência de sequências.

Figura 6 - Árvore filogenética do gênero *Trypanosoma*

Fonte: Ferreira (2020).

Árvore obtida pelo método Máxima Parcimônia e Bayesiana baseado no gene SSUrDNA concatenada ao gene gGAPDH com *Phytomonas* como grupo externo (2874 caracteres, 973 sítios informativos). Os números nos nós correspondem aos valores de suporte de ramificação (bootstrap / probabilidade a posteriori). Bootstrap obtido a partir de 500 replicatas.

Figura 7 - Árvore obtida pelo método Máxima Parcimônia e Bayesiana com base no gene SSUrDNA concatenado com o gene Clado Lagartos / Serpentes gGAPDH (2874 caracteres, 292 sítios informativos). Os números nos nós correspondem aos valores de suporte de ramificação (bootstrap / probabilidade a posteriori). Bootstrap obtida a partir de 500 replicatas.

Fonte: Ferreira (2020).

Taxonomia

Filo: Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981

Classe: Kinetoplastida Konigberg, 1963 emend. Vickerman, 1976

Ordem: Trypanosomatida (Kent, 1880) Holande, 1952

Família: Trypanosomatidae Doflein, 1901

Trypanosoma sp. n. 1

Trypanosoma sp. n. 2

Trypanosoma sp. n. 3

Trypanosoma sp. n. 4

***Trypanosoma* sp. n. 1**

Morfologia

As formas epimastigotas são grandes, largas e com pouca motilidade do flagelo, com grande membrana ondulante. As formas tripomastigotas são mais curtas e delgadas do que as formas epimastigotas, com uma membrana ondulante pouco desenvolvida e flagelo curto. Não foram encontradas formas de tripomastigotas no esfregaço de sangue do hospedeiro.

Hospedeiro tipo

Mammalia, Rodentia, Sigmodontinae, *Hylaeamys megacephalus* (Fischer, 1814) Weksler; Percequillo; Voss, 2006

Vetor

Desconhecido

Localidade tipo

Os espécimes de *Hylaeamys megacephalus* foram capturados no bioma Pantanal, localizado no município de Poconé (16° 15 '24" S e 56° 37 '22"O), no estado de Mato Grosso, Brasil.

Material tipo

Hapantótipo, isolado CBT 51. As culturas estão depositadas CBT.

Sequências

Trypanosoma sp. n.1, hapantótipo CBT 51. As sequências de SSUrDNA foram depositadas no GenBank e a sequência gGAPDH.

***Trypanosoma* sp. n. 2**

Morfologia

As formas epimastigotas são muito grandes, com membrana ondulante bem desenvolvida e sem motilidade do flagelo. As formas de tripomastigotas de cultura são grandes, menores que as formas epimastigotas e com membrana ondulante desenvolvida e pouca motilidade do flagelo. Não foram encontradas as formas tripomastigotas no esfregaço sanguíneo.

Hospedeiro tipo

Mammalia, Didelphimorphia, Didelphidade, *Philander opossum* (Linnaeus, 1758).

Vetor

Desconhecido

Localidade tipo

Os espécimes de *Philander opossum* foram capturados no bioma Pantanal, localizado no município de Poconé (16° 15 '24" S e 56° 37 '22"O), no estado de Mato Grosso, Brasil.

Material tipo

Hapantótipo, isolado CBT 52. As culturas estão depositadas CBT.

Sequências

Trypanosoma sp. n. 2, hapantótipo CBT 52. As sequências de SSUrDNA e a sequência gGAPDH foram depositadas no GenBank.

***Trypanosoma* sp. n. 3**

Morfologia

As formas epimastigotas são grandes, delgadas e com pouca motilidade no flagelo, com grande membrana ondulante. As formas tripomastigotas são grandes e largas, com uma membrana ondulante muito bem desenvolvida, ainda maior quando comparada a forma epimastigota e com flagelo curto. Não foram encontradas as formas tripomastigotas no esfregaço sanguíneo do hospedeiro.

Hospedeiro tipo

Mammalia, Didelphimorphia, Didelphidade, *Didelphis albiventris* (Lund 1840)

Vetor

Desconhecido

Localidade tipo

Os espécimes de *Didelphis albiventris* foram capturados no bioma Cerrado, localizado no município de Chapada dos Guimarães (15° 27 '38" S e 55° 44 '59"O), no estado de Mato Grosso, Brasil.

Material tipo

Hapantótipo, isolado CBT 127. As culturas estão depositadas CBT.

Sequências

Trypanosoma sp. n. 3, hapantótipo CBT 127. As sequências de SSUrDNA e a sequência gGAPDH foram depositadas no GenBank.

Trypanosoma* sp. n. 4*Morfologia**

As formas epimastigotas são grandes, largas e com pouca motilidade no flagelo e membrana ondulante. As formas tripomastigotas são grandes, mas menores que as formas epimastigotas, com pouca motilidade do flagelo e membrana ondulante não desenvolvida. Não foram encontradas formas de tripomastigotas no esfregaço de sangue do hospedeiro.

Hospedeiro tipo

Mammalia, Rodentia, Sigmodontinae, *Hylaeamys megacephalus* (Fischer, 1814) Weksler; Percequillo; Voss, 2006

Vetor

Desconhecido.

Localidade tipo

Os espécimes de *Hylaeamys megacephalus* foram capturados no bioma Pantanal, localizado no município de Poconé (16° 15 '24" S e 56° 37 '22"O), no estado de Mato Grosso, Brasil.

Material tipo

Hapantótipo, isolado CBT 228. Parátipos: isolados CBT 229, CBT 230, CBT 231, CBT 232, CBT 233 e CBT 272. As culturas estão depositadas CBT.

Sequências

Trypanosoma sp. n. 4, hapantótipo CBT 228. As sequências de SSUrDNA foram depositadas no GenBank e a sequência gGAPDH. Para os parátipos CBT 229, CBT 230, CBT 231, CBT 232, CBT 233 e CBT 272, respectivamente, as sequências SSUrDNA e as sequências gGAPDH foram depositadas no GenBank.

6 DISCUSSÃO

O Cerrado e o Pantanal passaram por um processo de degradação de seus recursos naturais, tanto na redução quanto na fragmentação da cobertura vegetal e da fauna, devido ao constante crescimento das cidades e da expansão da atividade agropastoril (KLINK; MACHADO, 2005; ALHO et al., 2019). Como consequência, a perda de biodiversidade leva a uma mudança na ecologia das espécies remanescentes, incluindo seus parasitas, restrição de área e alimento, além de maior contato entre animais silvestres e animais domésticos / humanos, aumentando a transmissão de patógenos e incidência de doenças (ROQUE; JANSEN, 2008; KEESING et al., 2010).

Pequenos roedores e marsupiais são considerados bons bioindicadores ambientais, pois possuem numerosas populações, têm um ciclo de vida curto e são encontrados em todos os biomas e habitats naturais e modificados, respondendo rapidamente as mudanças ambientais (EPSTEIN; DOBSON; VANDERMEER, 1997). Também, sofrem predação pela maioria dos carnívoros de pequeno e médio porte, o que potencializa a transmissão de patógenos, como os tripanossomatídeos (RADEMAKER, 2010).

Assim, a identificação, caracterização e avaliação de parasitas são ferramentas importantes para ações estratégicas de conservação da biodiversidade e prevenção da saúde humana. Aqui descrevemos, com base em aspectos morfológicos, moleculares e filogenéticos, quatro novas espécies de tripanossomas em marsupiais e roedores, denominados *Trypanosoma* sp. n. 1, *Trypanosoma* sp. n. 2, *Trypanosoma* sp. n. 3. e *Trypanosoma* sp. n. 4, estas posicionadas dentro do Clado lagartos/ serpentes / mamíferos.

Muitas espécies de tripanossomas são descritas na vida selvagem, no mundo, abrangendo o Brasil (JANSEN et al., 1991; FERREIRA et al., 2008; MARCILI et al., 2013; PAPARINI et al., 2014; BOTERO et al., 2016; FERREIRA et al., 2017). A filogenia baseada nos genes SSUrDNA e gGAPDH é eficaz para o posicionamento filogenético de espécies, gêneros e família Trypanosomatidae. Com a ajuda dessa ferramenta, foi possível separar espécies em clados por seus hospedeiros vertebrados (RÊGO; MAGALHÃES; SIQUEIRA, 1957; HAAG; O'HUIGIN; OVERATH, 1998; NOYES et al., 1999; PALMA, 2003; HAMILTON et al., 2004; FERREIRA et al.,

2007; HAMILTON; GIBSON; STEVENS, 2007; GARCIA et al., 2012; LIMA et al., 2012; 2013).

Um ponto importante é que ainda não sabemos nada sobre a biologia desses novos parasitas na natureza, nem sobre os vetores. Os achados de flebotomíneos infectados pelo tripanossoma de lagarto (*T. varani*) e por um tripanossoma filogeneticamente, próximo aos tripanossomas identificados em serpentes, sugerem que os flebotomíneos são possíveis vetores dos tripanossomas desse clado (MINTER-GOEDBLOED et al., 1993; VIOLA et al., 2008). Além disso, dentro do clado, é importante destacar que *T. serpentis* e *T. cascavelli* crescem em células de insetos da linhagem HI-5 (VIOLA et al., 2008; 2009a) e *T. gennarii* cresce nas células C6 / 36 e SF9 (FERREIRA et al., 2017). Em nosso estudo, *Trypanosoma* sp. n. 1 cresceu em células SF9, *Trypanosoma* sp. n. 2, cresceu em meio axênico, contendo LIT e *Trypanosoma* sp. n. 3 e *Trypanosoma* sp. n. 4, cresceram na célula Vero, indicando que seus possíveis vetores são flebotomíneos. Além disso, Cutolo et al. (2014) reportam a presença de flebotomíneos associados a ninhos de gambá no Brasil. Quaresma et al. (2012), relataram que roedores e marsupiais eram fontes de alimento para flebotomíneos.

No entanto, *Trypanosoma* sp. n. 2 e *Trypanosoma* sp. n. 3, que eram espécies isoladas de didelfídeos, que cresceram em meio axênico e células Vero, respectivamente, dificultam a associação com os dípteros hematófagos.

Em Didelphimorphia, duas novas espécies de *Trypanosoma* foram isoladas de *Phylander opossum* (*Trypanosoma* sp. n. 2) e *Didelphis albiventris* (*Trypanosoma* sp. n. 3). Por usarem todos os estratos da floresta, esses marsupiais são nômades e onívoros; os didelfídeos estão expostos a vários tripanossomas no ambiente natural, incluindo todos os ciclos de transmissão de *T. (S.) cruzi* (DEANE; LENZI; JANSEN, 1984; JANSEN; XAVIER; ROQUE, 2018). De fato, esses marsupiais são reservatórios conhecidos de inúmeras outras espécies de *Trypanosoma*, entre as quais: *T. rangeli*, *T. freitasi*, *T. gennarii*, *T. janseni*, *T. dionisii* e *T. cascavelli* (ROCHA E SILVA; PATTOLI; CAMARGO, 1976; VIOLA et al., 2009a; FERREIRA et al., 2017; LOPES et al., 2018; BRANDÃO et al., 2019; RODRIGUES et al., 2019). Destas espécies, *T. freitasi*, *T. gennarii* e *T. janseni* foram descritas apenas em Didelphimorphia.

Estudos relacionados ao papel dos roedores como reservatórios de tripanossomatídeos documentaram diferentes espécies de *Trypanosoma*, sendo

fundamentais para a análise da dinâmica de transmissão desses protozoários na natureza. Assim, estudos anteriores relataram infecção em roedores por *T. rochasilvai*, *T. cruzi*, *T. amileari*, *T. evansi*, *T. lewisi*, *T. musculi* e *Trypanosoma lainsoni* (HERRER, 1942; ROCHA E SILVA; PATTOLI; CAMARGO, 1976; MELLO, 1979; RODRIGUES; FERRAZ FILHO, 1985; HERRERA; URDANETA-MORALES, 1997; NAIFF; BARRETT, 2013; PUMHOM et al., 2014; HONG et al., 2017; SANTOS et al., 2019).

Há muito ainda o que estudar nos pequenos mamíferos (marsupiais e roedores) em relação a ecologia destes animais que vivem em áreas de ambiente degradado ou parcialmente degradado e principalmente na relação parasita-hospedeiro com potenciais riscos de infecção por esses tripanossomas em humanos e animais domésticos.

7 CONCLUSÃO

Foi possível a caracterização morfológica e o posicionamento filogenético dos isolados obtidos de roedores e marsupiais silvestres do Bioma Pantanal e Cerrado, realizando a descrição de novas espécies de tripanossomas: *Trypanosoma* sp. n. 1, *Trypanosoma* sp. n. 2, *Trypanosoma* sp. n. 3, *Trypanosoma* sp. n. 4 inseridos no Clado Lagartos /Serpentes/ Mamíferos.

REFERÊNCIAS

- ACOSTA, I. C. et al. Morphological and molecular characterization and phylogenetic relationships of a new species of trypanosome in *Tapirus terrestris* (lowland tapir), *Trypanosoma terrestris* sp. nov., from atlantic rainforest of southeastern Brazil. **Parasites & Vectors**, v. 6, p. 349, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24330660/>> Acesso em: 20 jan. 2020.
- ACOSTA, I. C. L. et al. Survey of *Trypanosoma* and *Leishmania* in Wild and Domestic Animals in an Atlantic Rainforest Fragment and Surroundings in the State of Espírito Santo, Brazil. **Journal Medical Entomology**, v. 51, p. 686–693, 2014. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jme/article/51/3/686/901437>> Acesso em: 10 jan. 2020.
- ADAMS, E. R. et al. New *Trypanosoma* (*Duttonella*) *vivax* genotypes from tsetse flies in East Africa. **Parasitology**, v. 137, n. 4, p. 641-50, 2010. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19961657/>> Acesso em: 05 dez. 2019.
- ADL, S. M. et al. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. **Journal of Eukaryotic Microbiology**, v. 52, p. 399-451, 2005. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x>> Acesso em: 19 jul. 2019.
- ALHO, C. J. R. et al. Ameaças à biodiversidade do Pantanal brasileiro pelo uso e ocupação da terra. **Ambiente & Sociedade**, São Paulo, v. 22, p. 1-22, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2019000100318&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt> Acesso em: 05 jun. 2020.
- ANDRADE, A.; PINTO, S. C.; OLIVEIRA, R. S. (Org.). **Animais de laboratório: criação e experimentação**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. 388 p. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/livro/animais-de-laboratorio-criacao-e-experimentacao>>. Acesso em: 23 jan. 2020.
- ARCHER, M.; KIRSH, J. The evolution and classification of marsupials: a bit of history. In: ARMATI, P. J.; DICKMAN, C. R.; HUME, I. D. (Ed.). **Marsupials**. Edimburgo: Cambridge University, 2006. p. 1-21.
- AUSTAD, S. N. The adaptable opossum. **Scientific American**, v. 258, p. 54-59, 1988.
- AUSTEN, J. et al. Morphological and molecular characterization of *Trypanosoma copemani* n.sp. (Trypanosomatidae) isolated from Gilbert's potoroo (*Potorous gilbertii*) and quokka (*Setonix brachyurus*). **Parasitology**, v. 136, n. 7, p. 783-792, 2009. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19416553/>>. Acesso em: 28 jan. 2020.
- AVERIS, S. et al. The diversity, distribution and host-parasite associations of trypanosomes in Western Australian wildlife. **Parasitology**, v. 136, p. 1269–1279, 2009. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19660159/>>. Acesso em: 22 jan. 2020.

BARBINI, I. G.; PASSAMANI, M. Pequenos mamíferos e a predação de ninhinhos artificiais no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (ES). **Natureza on line**, v. 1, n. 2, p. 56-61, 2003. Disponível em: <http://naturezaonline.com.br/natureza/conteudo/pdf/Revista_Online_Barbini.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2020.

BORGES, M. M.; MELO, D. A.; TEIXEIRA, M. L. Experimental infection of *Calomys callosus* (Rodentia) with humans strains of *Trypanosoma cruzi*. **Revista Saúde Pública**, v. 16, n. 4, p. 233-242, 1982. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/rsp/1982.v16n4/233-242/>>. Acesso em: 20 jun. 2020.

BORGHESAN, T. C. et al. Molecular phylogenetic redefinition of *Herpetomonas* (Kinetoplastea, Trypanosomatidae), a genus of insect parasites associated with flies. **Protist**, v. 164, n. 1, p. 129-152, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22938923/>> Acesso em: 15 jul. 2019.

BOTERO, A. et al. The kinetoplast DNA of the Australian trypanosome, *Trypanosoma copemani*, shares features with *Trypanosoma cruzi* and *Trypanosoma lewisi*. **International Journal for Parasitology**, v. 48, p. 691-700, 2018. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29778329/>> Acesso em: 25 ago. 2019.

BOTERO, A. et al. Morphological and phylogenetic description of *Trypanosoma noyesi* sp. nov.: an Australian wildlife trypanosome within the *T. Cruzi* Clade. **Protist**, v. 167, n. 5, p. 425-439, 2016. Disponível: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27561173/>> Acesso em: 20 abr. 2020.

BOTERO, A. et al. Trypanosomes genetic diversity, polyparasitism and population decline of the critically endangered australian marsupial, the brush tailed bettong or wolie (*Bettongia penicillata*). **Internationa Journal Parasitology: Parasites and Wildlife**, v. 29, n. 2, p. 77-89, 2013. Disponível: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3862532/>> Acesso em: 07 jun. 2019.

BRANDÃO, E. M. V. et al. Trypanosomatids in small mammals of an Agroecosystem in central Brazil: another piece in the puzzle of parasite transmission in an Anthropogenic Landscape. **Pathogens**, v. 8, n. 190, p. 1-15, 2019. Disponível: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31615153/>> Acesso em: 02 jun 2020.

COURA, J. R.; VIÑAS, P. A.; JUNQUEIRA, A. C. Ecoepidemiology, short history and control of Chagas disease in the endemic countries and the new challenge for non-endemic countries. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 109, p. 856-862, 2014. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25410988/>> Acesso em: 03 jun. 2020.

COZZUOL, et al. The oldest species of *Didelphis* (Mammalia, Marsupialia, Didelphidae), from the late miocene of Amazonia. **Journal of Mammal**, v. 87, n. 4, p. 663-667, 2006. Disponível em: <<https://academic.oup.com/jmammal/article/87/4/663/962546>> Acesso em: 20 jun 2020.

CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. **Tratado de animais selvagens – Medicina Veterinária**. São Paulo, SP: ROCA, 2007. 1354 p.

CUTOLO, A. A. et al. Sandflies (Diptera: Psychodidae) associated with opossum nests at urban sites in southeastern Brazil: a risk factor for urban and periurban zoonotic *Leishmania* transmission? **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 109, n. 3, p. 391-393, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762014000300391> Acesso em: 20 abr. 2019.

D'ALESSANDRO, P. A.; BEHR, M. A. *Trypanosoma lewisi* and its relatives. In: KRERER, J.; BAKER, J. R. (Ed.). **Parasitic protozoa**. New York: Academic Press, 1991. p. 225–263.

D'AVILA-LEVY, C. M. et al. Exploring the environmental diversity of kinetoplastid flagellates in the high-throughput DNA sequencing era. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 110, p. 956–965, 2015. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26602872/>> Acesso em: 18 abr. 2019.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U. F. J. Subfamily sigmodontinae. In: PATTON, J. L.; PARDIÑAS, U. F. J.; D'ELÍA, G. (Ed.). **Mammals of South America**. Chicago: University of Chicago Press, 2015. v. 2, p. 63-73.

D'ELÍA, G.; PARDIÑAS, U. F. J.; MYERS, P. An introduction to the genus *Bibimys* (Rodentia: Sigmodontinae): phylogenetic position and alpha taxonomy. In: LACEY, E.; MYERS, P. (Ed.). **Mammalian diversification: from chromosomes to Phylogeography**. Berkeley: University of California Publications in Zoology, 2005. p. 211-246.

DARIO, M. A. et al. High *Trypanosoma* spp. diversity is maintained by bats and triatomines in Espírito Santo state, Brazil. **PLoS One**, v. 12, p. e0188412, 2017. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188412>> Acesso em: 16 abr. 2019.

DEANE, M. P.; DEANE, L. M. Studies on the cycle of *Trypanosoma conorhini*. “In vitro” development multiplication of the bloodstream trypanosomes. **Revista Instituto Medicina Tropical**, São Paulo, v.3, p.149-160, 1961.

DEANE, L. M. et al. *Trypanosoma cruzi* e outros tripanossomas em primatas brasileiros. **Revista Sociedade Brasileira Medicina Tropical**, v. 6, p. 361, 1972.

DEANE, M. P.; LENZI, H. L.; JANSEN, A. *Trypanosoma cruzi*: vertebrate and invertebrate cycles in the same mammal host, the opossum *Didelphis marsupialis*. **Memoria Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 79, n. 4, p. 513-515, 1984.

DESCHAMPS, P. et al. Phylogenomic analysis of kinetoplastids supports that trypanosomatids arose from within bodonids. **Molecular Biological Evolution**, v. 28, p. 53-58, 2011. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21030427/>> Acesso em: 11 abr. 2020.

DOKE, P. P.; KAR, A. A fatal case of *Trypanosoma lewisi* in Maharashtra, India. **Annals Tropical Medicine Public Health**, v. 4, n. 2, p. 91–95, 2011. Disponível em: < <http://www.atmph.org/article.asp?issn=1755-6783;year=2011;volume=4;issue=2;spage=91;epage=95;aulast=Doke> > Acesso em: 19 jun. 2020.

EISENBERG, J. F.; REDFORD, K. H. **Mammals of the Neotropics**: the central neotropics. Chicago: University of Chicago Press, 1999. v. 3.

ENGEL, S. R. et al. Molecular systematics and paleobiogeography of the South American sigmodontine rodents. **Molecular Biology and Evolution**, v. 15, n. 1, p. 35–49, 1998. Disponível em: < <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9491603/> > Acesso em: 24 jun. 2020.

EPSTEIN, P. R.; DOBSON, A. P.; VANDERMEER, J. Biodiversity and emerging infectious emerging diseases: Integrating health and ecosystem monitoring. In: GRIFO, F.; ROSENTHAL, J. (Ed.). **Biodiversity and Human Health**. Washington: Island Press, 1997. cap. 3, p. 60-86.

ESPINOSA, Z. C.C. **Origem, evolução e relações filogenéticas de homólogos de prolina recemase em espécies de *Trypanosoma***. 2014. 44 f. Tese (Doutorado em Biologia da Relação Patógeno- Hospedeiro) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

FERMINO, B. R. et al. The phylogeography of trypanosomes from South American alligatorids and African crocodilids is consistent with the geological history of South American river basins and the transoceanic dispersal of *Crocodylus* at the Miocene. **Parasites & Vectors**, v. 6, n. 1, p. 313, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24499634/>> Acesso em: 24 jun. 2020.

FERMINO, B. R. et al. Field and experimental evidence of a new caiman trypanosome species closely phylogenetically related to fish trypanosomes and transmitted by leeches. **International Journal Parasitology. Parasites and Wildlife**, v.4, n.3, p.368–78, 2015. Disponível: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26767165/>> Acesso em: 07 out. 2020.

FERMINO, B. R. et al. Shared species of crocodilian trypanosomes carried by tabanid flies in Africa and South America, including the description of a new species from caimans, *Trypanosoma kaiowa* n. sp. **Parasites & Vectors**, v. 12, p. 225, 2019. Disponível em: <<https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-019-3463-2>> Acesso em: 02 out. 2020.

FERREIRA, J. I. G. S. et al. New trypanosoma species, *Trypanosoma gennarii* sp. nov., from South American marsupial in Brazilian Cerrado. **Acta Tropica**, v. 176, p. 249–255, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28847674/>> Acesso em: 22 jun. 2020.

FERREIRA, R. C. et al. Morphological and molecular diversity and phylogenetic relationships among anuran trypanosomes from the Amazonia, Atlantic Forest and Pantanal biomes in Brazil. **Parasitology**, v. 134, pt. 11, p. 1623-1638, 2007.

Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17577425/>> Acesso em: 20 jun. 2020.

FERREIRA, R. C. et al. A phylogenetic lineage of closely related trypanosomes (Trypanosomatidae, Kinetoplastida) of anurans and sand flies (Psychodidae, Diptera) sharing the same ecotopes in Brazilian Amazonia. **Journal of Eukaryotic Microbiology**, v. 55, p. 427- 435, 2008.

FONSECA, G. A. B. et al. **Lista Anotada dos mamíferos do Brasil**. Belo Horizonte: Conservation International & Fundação Biodiversitas. 1996. (Occasional Paper no. 4).

GARCIA, L. et al. Phylogenetic analysis of Bolivian bat trypanosomes of the subgenus *Schizotrypanum* based on cytochrome B sequence and minicircle analyses. **PloS One**, v. 7, n. 5, p. e36578, 2012. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0036578>> Acesso em: 24 jun. 2020.

GASPAR, D. A. Eficiência de iscas naturais e artificiais na atração de mamíferos. In. CONGRESSO BRASILEIRO DE MASTOZOOLOGIA, 2., 2003. **Resumos...** Belo Horizonte, MG. 2005.

GHOSH, S. et al. Coinfection of *Leptomonas seymouri* and *Leishmania donovani* in Indian leishmaniasis. **Journal Clinical Microbiology**, v. 50, n. 8, p. 2774–2778, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1128/JCM.00966-12>> Acesso em: 12 nov. 2019.

HAAG, J.; O'HUIGIN, C.; OVERATH, P. The molecular phylogeny of trypanosomes: evidence for an early divergence of the salivaria. **Molecular and Biochemical Parasitology**, v. 91, n. 1, p. 37-49, 1998. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9574924/>> Acesso em: 20 jun. 2020.

HAMILTON, P. B. et al. The inadvertent introduction into Australia of *Trypanosoma nabiasi*, the trypanosome of the European rabbit (*Oryctolagus cuniculus*), and its potential for biocontrol. **Molecular Ecology**, v. 14, n. 10, p. 3167-375, 2005. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16101782/>> Acesso em: 20 dez. 2019.

HAMILTON, P. B. et al. Phylogenetic analysis reveals the presence of the *Trypanosoma cruzi* clade in African terrestrial mammals. **Infection Genetics Evolution**, v. 9, n. 1, p. 81-86, 2009.

HAMILTON, P. B. et al. Trypanosomes are monophyletic: evidence from glyceraldehyde phosphate dehydrogenase genes for subunit ribosomal RNA and small. **International Journal for Parasitology**, v. 34, n. 12, p. 1393-1404, 2004. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15542100/>> Acesso em: 20 abr. 2019.

HAMILTON, P. B.; GIBSON, W. C.; STEVENS, J. R. Patterns of co-evolution between trypanosomes and their hosts deduced from ribosomal RNA and protein coding gene phylogenies. **Molecular Phylogenetics Evolution**, v. 44, n. 1, p. 15-25, 2007.

HANNAERT, V.; OPPERDOES, F. R.; MICHELS, P. A. Comparison and evolutionary analysis of the glycosomal glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from different Kinetoplastida. **Journal Molecular Evolution**, v. 47, n. 6, p. 728-738, 1998.

HERNÁNDEZ, R. et al. Primary structure of *Trypanosoma cruzi* small- subunit ribosomal RNA coding region: comparison with other trypanosomatids. **Molecular Biochemical Parasitology**, v. 41, n. 2, p. 207-212, 1990. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2204830/>> Acesso em: 19 abr. 2019.

HERRER, A. *Trypanosoma phyllotis* sp. n.. Y infecciones asociadas em una titira, el *Phebotomus noguchi*. **Revista de Medicina Experimental**, Lima, v. 1, p. 40-55, 1942.

HERRERA, L.; URDANETA-MORALES, S. Synanthropic rodent reservoirs of *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* in the valley of Caracas, Venezuela. **Revista Instituto Medicina Tropical**, São Paulo, v. 39, p. 279-282, 1997.

HOARE, C. A. **The Trypanosomes of mammals**: a zoological monograph. Oxford, England: Blackwell Scientific Publications, 1972. p. 748.

HODO, C. L. et al. Trypanosome species, including *Trypanosoma cruzi*, in sylvatic and peridomestic bats of Texas, USA. **Acta Tropica**, v. 164, p. 259–266, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2016.09.013>> Acesso em 08 jul. 2019.

HONG, XIAO-KUN. et al. PCR-based identification of *Trypanosoma lewisi* and *Trypanosoma musculi* using maxicircle kinetoplast DNA. **Acta Tropica**, v. 171, p. 207-212, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28427957/>> Acesso em 02 jul. 2019.

HOWIE, S. et al. A Gambian infant with fever and an unexpected blood film. **PLoS Medicine**, v. 3, n. 9, p. e355, 2006. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1576315/>> Acesso em 08 jul. 2019.

HUELSENBECK, J. P.; RONQUIST, F. MRBAYES: Bayesian inference of phylogenetic trees. **Bioinformatics**, v. 17, n. 8, p. 754–755, 2001.

JANSEN, A. M. et al. *Trypanosoma cruzi* in the opossum *Didelphis marsupialis*: parasitological and serological follow-up of the acute infection. **Experimental Parasitology**, v. 73, n. 3, p. 249-259, 1991. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1915740/>> Acesso em: 07 nov. 2019

JANSEN, A. M.; XAVIER, S. C. C.; ROQUE, A. L. R. *Trypanosoma cruzi* transmission in the wild and its most important reservoir hosts in Brazil. **Parasites & Vectors**, v. 11, p. 502. 2018. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6127949/>> Acesso em 09 jun. 2020.

JOHNSON, P. D. A case of infection by *Trypanosoma lewisi* in a child. **Transactions Royal Society Tropical Medicine Hygiene**, v. 26, p. 467-468, 1933.

KAUFER, A. et al. The evolution of trypanosomatid taxonomy. **Parasites & Vectors** v. 10, n. 287, p. 1-17, 2017. Disponível em:

<<https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-017-2204-7>> Acesso em: 20 jun. 2019.

KAUR, R. et al. A rare case of trypanosomiasis in a two month old infant in Mumbai, India. **Journal Communicable Diseases**, v. 39, n. 2, p. 71–74, 2007.

KEESING, F. et al. Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. **Nature**, v. 468, n. 7324, p. 647-652, 2010.

KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. Conservation of the Brazilian Cerrado. **Conservation Biology**, v. 19, n. 3, p. 707-713, 2005.

KRAEVA, N. et al. *Leptomonas seymouri*: adaptations to the Dixenous Life Cycle Analyzed by Genome Sequencing, Transcriptome Profiling and Co-infection with *Leishmania donovani*. Tibayrenc M, editor. **Plos Pathogens**, v. 11, n. 8, p. e1005127, 2015. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005127>> Acesso em: 23 jun. 2020.

LAINSON, R.; BRÍGIDO, M. C.; SILVEIRA, F. T. Blood and intestinal parasites of squirrels (Rodentia: Sciuridae) in Amazonian Brazil. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 99, n. 6, p. 577-579, 2004.

LAINSON, R.; DA SILVA, F. M.; FRANCO, C. M. *Trypanosoma (Megatrypanum) saloboense* sp. n.. (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) parasite of *Monodelphis emiliae* (Marsupiala: Didelphidae) from Amazonian Brazil. **Parasite**, v. 15, n. 2, p. 99-103, 2008. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18642501/>> Acesso em: 21 jun. 2020.

LEITE, R. N. et al. In the Wake of Invasion: tracing the Historical Biogeography of the South American Cricetid Radiation (Rodentia, Sigmodontinae). **PLos One**, v. 9, n. 6, p. e100687, 2014. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0100687>> Acesso em: 21 jun. 2020.

LEONARD, G.; SOANES, D. M.; STEVENS, J. R. Resolving the question of trypanosome monophyly: a comparative genomics approach using whole genome data sets with low taxon simpling. **Infection, Genetics Evolution: journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases**, v. 11, n. 5, p. 955-959, 2011.

LESSA, E. P. et al. Rodent diversity in South America: transitioning into the genomics era. **Frontiers Ecology Evolution**, v. 2, p. 1-7, 2014. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2014.00039/full>>. Acesso em: 02 abr. 2020.

LIMA, L. et al. Evolutionary Insights from Bat Trypanosomes: morphological, developmental and phylogenetic evidence of a new species, *Trypanosoma (Schizotrypanum) erneyi* sp. nov., in african bats closely related to *Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* and allied species. **Protist**, v. 163, n. 6, p. 856–872, 2012. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22277804/>> Acesso em: 21 jun. 2018.

LIMA, L. et al. New insights into the evolution of the *Trypanosoma cruzi* clade provided by a new trypanosome species tightly linked to Neotropical *Pteronotus* bats and related to an Australian lineage of trypanosomes. **Parasites & Vectors**, v. 8, p. 657, 2015. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26701154/>> Acesso em: 24 dez. 2019.

LIMA, L. et al. *Trypanosoma livingstonei*: a new species from African bats supports the bat seeding hypothesis for the *Trypanosoma cruzi* clade. **Parasites & Vectors**, v. 6, p. 221, 2013. Disponível em: <<https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-221>> Acesso em: 02 jun. 2019.

LOPES, C. M. T. et al. *Trypanosoma janseni* sp. n. (Trypanosomatida: Trypanosomatidae) isolated from *Didelphis aurita* (Mammalia: Didelphidae) in the Atlantic Rainforest of Rio de Janeiro, Brazil: integrative taxonomy and phylogeography within the *Trypanosoma cruzi* clade. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 113, n. 1, p. 45-55, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0074-02762018000100045&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 04 jun. 2020.

LUKES, J. et al. Evolution of parasitism in kinetoplastid flagellates. **Molecular Biochemical Parasitology**, v. 195, n. 2, p. 115-122, 2014. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24893339/>> Acesso em: 10 jun. 2020

LUKES, J. et al. Kinetoplast DNA network: evolution of an improbable structure. **Eukaryotic Cell**, v. 1, p. 495-502, 2002. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12455998/>> Acesso em: 21 jun. 2020.

MAIA DA SILVA, F. et al. Comparative phylogeography of *Trypanosoma rangeli* and *Rhodnius* (Hemiptera: Reduviidae) supports a long coexistence of parasite lineages and their sympatric vectors. **Molecular Ecology**, v. 16, p. 3361-3373, 2007.

MAIA DA SILVA, F. et al. Phylogenetic, morphological and behavioural analyses support host switching of *Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi* from domestic rats to primates. **Infection, Genetics Evolution: journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases**, v. 10, n. 4, p. 522-529, 2010.

MAIA DA SILVA, F. et al. Phylogeny, taxonomy and grouping of *Trypanosoma rangeli* isolates from man, triatomines and sylvatic mammals from widespread geographical origin based on SSU and ITS ribosomal sequences. **Parasitology**, v. 129, pt. 5, p. 549-561. 2004.

MAIA DA SILVA, F. et al. *Trypanosoma rangeli* isolates of bats from Central Brazil: genotyping and phylogenetic analysis enable description of a new lineage using spliced-leader gene sequences. **Acta Tropica**, v. 109, n. 3, p. 199-207, 2009. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19063857/>> Acesso em: 08 jun. 2018.

MARCILI, A. ***Trypanosoma cruzi*: Diversidade, relações filogenéticas e padrões ecogeográficos de isolados silvestres**. 2008. 70 f. Tese (Doutorado em Biologia da relação Parasita-Hospedeiro) - Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade

de São Paulo, São Paulo, 2008. (parcial). Disponível em:
<<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42135/tde-28112008-155050/en.php>>
Acesso em: 24 jun. 2019.

MARCILI, A. et al. Isolation and phylogenetic relationships of bat trypanosomes from different biomes in Mato Grosso, Brazil. **The Journal of Parasitology**, v. 99, n. 6, p. 1071-1076, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23859496/>>
Acesso em: 21 jun. 2019.

MARCILI, A. et al. A new genotype of *Trypanosoma cruzi* associated with bats evidenced by phylogenetic analyses using SSU rDNA, cytochrome b and Histone H2B genes and genotyping based on ITS1 rDNA. **Parasitology**, v. 136, n. 6, p. 641-655, 2009.

MARES, M. A.; ERNEST, K. A.; GETTINGER, D. D. Small Mammal Community Structure and Composition in the Cerrado Province of Central Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, v. 2, n. 4, p. 289-300, 1986.

MARINKELLE, C. J. Observations on human, monkey and bat trypanosomes and their vectors in Colombia. **Transactions Royal Society Tropical Medicine Hygiene**, v. 60, n. 1, p. 109-116, 1966.

MARSHALL, L. G. et al. Calibration of the Great American Interchange. **Science**, v. 204, n. 4390, p. 272-279, 1979.

MASLOV, D. A. et al. Diversity and phylogeny of insect trypanosomatids: all that is hidden shall be revealed. **Trends Parasitology**, v. 29, n. 1, p. 43-52, 2013.

MASLOV, D. A. et al. Phylogeny of trypanosomes as inferred from the small and large subunit rRNAs: implications for the evolution of parasitism in the trypanosomatid protozoa. **Molecular Biochemical Parasitology**, v. 75, n. 2, p. 197-205, 1996.

MCINNES, L. M. et al. Novel trypanosome *Trypanosoma gilletti* sp. n.. (Euglenozoa: Trypanosomatidae) and the extension of the host range of *Trypanosoma copemani* to include the koala (*Phascolarctos cinereus*). **Parasitology**, v. 138, p. 59-70, 2011.

MCINNES, L. M. et al. *Trypanosoma irwini* sp. n.. (Sarcomastigophora: Trypanosomatidae) from the koala (*Phascolarctos cinereus*). **Parasitology**, v. 136, p. 875-885, 2009.

MELLO, D. A. *Trypanosoma* (*Megatrypanum*) *amileari* sp. n.. isolated from *Oryzomys eliurus* (Wagner, 1845) (Rodentia- Cricetidae). **Annales de Parasitologie Humaine et Comparee**, v. 54, n. 5, p. 489-494, 1979.

MELLO, D. A. *Trypanosoma* (*Megatrypanum*) *mariae* sp. n.. isolated from *Calomys callosus* Rengger, 1830 (Rodentia- Cricetidae). **Annales de Parasitologie Humaine et Comparee**, v. 53, n. 4, p. 345-50, 1978.

MELLO, D. A. *Trypanosoma* (*Megatrypanum*) *samueli* sp. n., a Trypanosomatidae isolated from *Monodelphis domestica* (Wagner, 1842) (Marsupialia). **Annales de Parasitologie Humaine et Comparee**, v. 52, n. 4, p. 391-395, 1977. Disponível em: <<https://europepmc.org/article/med/931316>> Acesso em: 02 nov. 2019.

MINTER-GOEDBLOED, E. et al. *Trypanosoma varani* and *T. grayi*-like trypanosomes: development in vitro and insect hosts. **Parasitology Research**, v. 79, p. 329-333, 1993.

MOLYNEUX, D. Biology of the trypanosomes of the subgenus *Herpetosoma*. In: LUMSDEN, W. H. R.; EVANS, D. A (Ed.). **Biology of the Kinetoplastida**. London: Academic Press, 1976. 285-325.

MORIO, F. et al. Isolation of a protozoan parasite genetically related to the insect trypanosomatid *Herpetomonas samuelpessoai* from a human immunodeficiency virus-positive patient. **Journal Clinical Microbiology**, v. 46, n. 11, p. 3845–384, 2008.

MUSSER, G. C.; CARLETON, M. D. Superfamily Muroidea. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. A. M. (Ed.). **Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference**. 3rd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. v. 2, p. 894-1531.

NAIFF, R. D.; BARRET, T. V. *Trypanosoma (Megatrypanum) lainsoni* n.sp. from *Mesomys hispidus* (Rodentia: Echimyidae) in Brazil: trypomastigotes described from experimentally infected laboratory mice. **Parasite**, v. 20, p. 1-5, 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3853975/>> Acesso em: 08 fev. 2020.

NICHOLAS, K. B.; NICHOLAS, H. B. J. R.; DEERFIELD, D. W. II. GeneDoc: analysis and visualization of genetic variation. **Emblnew News**, v. 4, p. 14, 1997.

NITIKMAN, L. Z.; MARES, M. A. Ecology of small mammals in a gallery forest of central Brazil. **Annals of Carnegie Museum**, v. 56, n. 2, p. 75-95, 1987.

NOYES, H. A. et al. Host specificity of *Trypanosoma* (Herpetosoma) species: evidence that bank voles (*Clethrionomys glareolus*) carry only one *T. (H.) evotomys* 18S rRNA genotype but wood mice (*Apodemus sylvaticus*) carry at least two polyphyletic parasites. **Parasitology**, v. 124, p. 185-190, 2002. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/11501974_Host_specificity_of_Trypanosoma_Herpetosoma_species_evidence_that_bank_voles_Clethrionomys_glareolus_carry_only_one_T_H_evotomys_18S_rRNA_genotype_but_wood_mice_Apodemus_sylvaticus_carry_at_least_two_> Acesso em: 15 fev. 2020.

NOYES, H. A. et al. A Nested PCR for the SSUrRNA gene detects *Trypanosoma binneyi* in the Platypus and *Trypanosoma* sp. in Wombats and Kangaroos in Australia. **International Journal for Parasitology**, v. 29, n. 2, p. 331-339, 1999. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10221634/>> Acesso em: 17 mar. 2020.

NUNES, V. L. B. et al. *Trypanosoma (Megatrypanum) shawi* n.sp. um parasita de capivara, *Hydrochaeris hydrochaeris* (Linnaeus, 1766) (Rodentia: Hydrochoeridae). **Semina**, v. 8, n. 1, p. 21-23, 1987. Disponível em: <<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/view/4880>> Acesso em: 19 abr. 2020.

PACHECO, R. S. et al. Parasite Genotypically Related to a Monoxenous Trypanosomatid of Dog's Flea Causing Opportunistic Infection in an HIV Positive Patient. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 93, p. 531–537, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02761998000400021> Acesso em: 19 abr. 2020

PALMA, R. E. Evolution of American marsupials and their phylogenetic relationships with Australian metatherians. In: JONES, M.; DICKMAN, C.; ARCHER, M. (Ed.). **Predators with pouches: the biology of carnivorous marsupials**. Collingwood: CSIRO Publishing, 2003. pt. 1, p. 21-29.

PAPARINI, A. et al. Identification of novel trypanosome genotypes in native Australian marsupials. **Veterinary Parasitology**, v. 183, n. 1-2, p. 21-30, 2011.

PAPARINI, A. et al. Novel genotypes of *Trypanosoma binneyi* from wild platypuses (*Ornithorhynchus anatinus*) and identification of a leech as a potential vector. **Experimental Parasitology**, v. 145, p. 42-50, 2014. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25045852/>> Acesso em: 19 mai. 2019.

PATTON, J. L.; SILVA, M. N. F. Genus *Philander* (Brisson, 1762). In: GARDNER, A. L. (Ed.). **Mammals of South America**. Chicago: the University of Chicago Press, 2007. v. 1, p. 27-35.

PESSÔA, S. B.; DE BIASI, P. *Trypanosoma cascavelli* sp. n. parasita da cascavel: *Crotalus durissus terrificus* (Laurenti). **Atas da Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro**, v. 15, p. 67–70, 1972.

PINTO, C. M. et al. Infection by trypanosomes in marsupials and rodents associated with human dwellings in Ecuador. **Journal Parasitology**, v. 92, n. 6, p. 1251-1255, 2006. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17304802/>> Acesso em: 24 abr. 2019.

PODLIPAEV, S. A. Catalogue of world fauna of trypanosomatidae (Protozoa). **Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences**, Leningrad, v. 217, p. 1-177, 1990.

PORCEL, B. M. et al. The streamlined genome of *Phytomonas* spp. relative to human pathogenic kinetoplastids reveals a parasite tailors for plants. **Plos Genetics**, v. 10, n. 2, p. e1004007, 2014. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004007>> Acesso em 04 jun. 2020.

PRADO, J. R.; PERCEQUILLO, A. R. Geographic distribution of the genera of the tribe Oryzomyini (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae) in South America: patterns of distribution and diversity. **Arquivos de Zoologia**, v. 44, n. 1, p. 1-120, 2013. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/azmz/article/view/85236>> Acesso em: 21 abr. 2020.

PUMHOM, P. et al. Molecular prevalence of *Trypanosoma* spp. In wild rodents of Southeast Asia: influence of human settlement habitat. **Epidemiol Infection**, v. 142, p. 1221-1230, 2014. Disponível em: <<https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/div->

classtitlemolecular-prevalence-of-span-classitalictrypanosomaspan-spp-in-wild-rodents-of-southeast-asia-influence-of-human-settlement-habitatdiv/D58B59F0D0AABC9D57E4BA665A1430A8> Acesso em: 19 jun. 2020.

QUARESMA, P. F. et al. Natural *Leishmania* sp. reservoirs and phlebotomine sandfly food source identification in Ibitipoca State Park, Minas Gerais. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v.107, n. 4, p. 480-485, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762012000400007> Acesso em: 05 abr. 2020.

RADEMAKER, V. **O Papel dos pequenos roedores e marsupiais no ciclo de transmissão de *Trypanosoma cruzi* e *T. evansi* em áreas com diferentes características ambientais no Pantanal Sul- Matogrossense**. 2010. 86 f. Tese de Doutorado em Biologia Parasitária, Instituto Oswaldo Cruz- Fiocruz, Rio de Janeiro. 2010. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/5656>> Acesso em: 10 abr. 2020.

RANGEL, D. A. et al. Isolation and characterization of trypanosomatids, including *Crithidia mellificae*, in bats from the Atlantic Forest of Rio de Janeiro, Brazil. **Plos Neglected Tropical Diseases**, v. 13, n. 7, p. e0007527, 2019. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0007527>> Acesso em: 10 jun. 2020.

RÊGO, S. F. M.; MAGALHÃES, A. E. A.; SIQUEIRA, A. F. Um novo tripanossoma do gambá, *Trypanosoma freitasi* sp. n.. **Revista Brasileira Malariologia**, v. 9, p. 277-284, 1957.

REIG, O. **Teoria Del origin y desarrollo de la fauna de mamíferos de América del Sur**. Mar del Plata: Museu Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, 1981.

REIG, O. A. A new fossil genus of South American cricetid rodents allied to *Wiedomys*, with an assessment of the Sigmodontinae. **Journal of Zoology**, v. 192, n. 2, p. 257-281, 1980.

REIS, N. R. et al. **Mamíferos do Brasil**. Londrina, PR.: Editora Londrina, 2011. v. 2.

REYNOLDS, E. S. The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy. **The Journal of Cell Biology**, v. 17, p. 208-212, 1963.

ROCHA E SILVA, E. O.; PATTOLI, D. B. G.; CAMARGO, J. C. Novo encontro do *Trypanosoma (Megatrypanum) freitasi*, parasita do gambá. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 10, p. 121-124, 1976. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89101976000100011&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 10 jun. 2020.

RODRIGUES, C. M. F. **Tripanossomas de ungulados no Brasil e na África: novas abordagens em estudos epidemiológicos de genótipos, vetores e reservatórios e patologia de isolados brasileiros**. 2016. 51 f. Tese (Doutorado em Biologia da relação Parasita-Hospedeiro) - instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42135/tde-18012017->

143556/publico/carlamonadelifilgueirarodrigues_doutorado_p.pdf> Acesso em: 10 abr. 2020.

RODRIGUES, A. C. Characterization of spliced leader genes of *Trypanosoma (Megatrypanum) theileri*: phylogeographical analysis of Brazilian isolates from cattle supports spatial clustering of genotypes and parity with ribosomal markers. **Parasitology**, v. 137, n. 1, p. 111-122, 2010. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19765336/>> Acesso em: 20 jun. 2018.

RODRIGUES, A. C. et al. Brazilian isolates of *Trypanosoma (Megatrypanum) theileri*: diagnosis and differentiation of isolates from cattle and water buffalo based on biological characteristics and randomly amplified DNA sequences. **Veterinary Parasitology**, v. 116, n. 3, p. 185-207, 2003. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14559162/>> Acesso em: 14 jun. 2019.

RODRIGUES, A. C. et al. Phylogenetic analysis of *Trypanosoma vivax* supports the separation of South American/West African from East African isolates and a new T. Vivax-like genotype infecting a nyala antelope from Mozambique. **Parasitology**, v. 135, n. 11, p. 1317-1328, 2008. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18752705/>> Acesso em: 10 jun. 2020.

RODRIGUES, A. C. et al. Phylogeny of *Trypanosoma (Megatrypanum) theileri* and related trypanosomes reveals lineages of isolates associated with artiodactyl hosts diverging on SSU and ITS ribosomal sequences. **Parasitology**, v. 132, n. 2, p. 215-24, 2006. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16197590/>> Acesso em: 08 mai. 2019.

RODRIGUES, M. S. et al. Uncovering *Trypanosoma* spp. diversity of wild mammals by the use of DNA from blood clots. **International Journal Parasitology: Parasites and Wildlife**, v. 8, p. 171-181, 2019.

RODRIGUES, V. L. C. C.; FERRAZ FILHO, A. N. *Trypanosoma (Megatrypanum) rochasilvai*, sp. n., encontrada no Estado de São Paulo, Brasil, parasitando o *Oryzomys laticeps* (Leche, 1886) (Rodentia-Cricetidae). **Revista Brasileira de Biologia**, v. 44, p. 299-304, 1985.

ROQUE, A. L. R.; JANSEN, A. M. Importância dos animais domésticos sentinelas na identificação de áreas de risco de emergência de doença de Chagas. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 41, p. 191-193, 2008. (Suplemento 3). Trabalho apresentado na XXIV Reunião Anual de Pesquisa Aplicada em Doenças de Chagas e XII Reunião Anual de Pesquisa Aplicada em Leishmanioses, Maceió, Alagoas, 2008. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/284534365_Importancia_dos_animais_do_mesticos_sentinelas_na_identificacao_de_areas_de_risco_de_emergencia_de_doenca_de_Chagas> Acesso em: 20 abr. 2019.

SANTOS, F. M. et al. The reservoir system for *Trypanosoma* (Kinetoplastida, Trypanosomatidae) species in large neotropical wetland. **Acta Tropica**, v. 199, p. 1-7, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31356788/>> Acesso em: 10 jun. 2020.

SARATAPHAN, N. et al. Diagnosis of a *Trypanosoma lewisi-like* (Herpetosoma) infection in a sick infant from Thailand. **Journal Medical Microbiology**, v. 56, pt. 8, p.1118-1121, 2007. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3066167/>> Acesso em: 04 jun. 2019.

SCHENK, J. J.; ROWE, K. C.; STEPPAN, S. J. Ecological opportunity and incumbency in the diversification of repeated continental colonizations by muroid rodents. **Systematic Biology**, v. 62, p. 837–864, 2013.

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO (SFB). Sistema Nacional de Informações Florestais- SNIF. **Florestas nos biomas brasileiros**. Brasília, DF, 2020. Disponível em:< <http://snif.florestal.gov.br/pt-br/os-biomas-e-suas-florestas/608-florestas-nos-biomas-brasileiros> > Acesso em 10 out. 2020.

SHRIVASTAVA, K. K.; SHRIVASTAVA, G. P. Two cases of *Trypanosoma* (*Herpetosoma*) species infection of man in India. **Transactions Royal Society Tropical Medicine Hygiene**, v. 68, n. 2, p. 143–144, 1974.

SIMPSON, A. G. B.; STEVENS, J. R.; LUKES, J. The evolution and diversity of kinetoplastid flagellates. **Trends Parasitology**, v. 22, n. 4, p. 168-174, 2006.

SMITH, M. F.; PATTON, J. L. Phylogenetic Relationships and the Radiation of Sigmodontine Rodents in South America: Evidence from Cytochrome *b*". **Journal of Mammalian Evolution**, v. 6, n. 2, p. 89–128, 1999. Disponível em:<https://www.researchgate.net/publication/263214817_Phylogenetic_Relationships_and_the_Radiation_of_Sigmodontine_Rodents_in_South_America_Evidence_from_Cytochrome_b> Acesso em: 24 jun. 2020.

SOGIN, M. L.; ELWOOD, H. J.; GUNDERSON, J. H. Evolutionary diversity of eukaryotic small- subunit rRNA genes. **Proceedings National Academy Sciences of the United States of America**, v. 83, n. 5, p. 1383-1387, 1986. Disponível em:<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC323080/>> Acesso em: 24 jun. 2020.

SPODAREVA, V. et al. Diversity and evolution of anuran trypanosomes: insights from the study of European species. *Parasites Vectors*, v. 11, p.447, 2018. Disponível em:<http://www.parazitologie.cz/protozoologie/Personal%20homepages/Votypka/Trypanosomes_anura_evolution.pdf> Acesso em: 10 out. 2020.

STEPPAN, S. J.; ADKINS, R. M.; ANDERSON, J. Phylogeny and divergence date estimates of rapid radiations in muroid rodents based on multiple nuclear genes. **Systematic Biology**, v. 53, p. 533-553, 2004. Disponível em:<https://www.researchgate.net/publication/8344075_Phylogeny_and_Divergence-Date_Estimates_of_Rapid_Radiations_in_Muroid_Rodents_Based_on_Multiple_Nuclear_Genes> Acesso em: 24 jun. 2020.

STEVENS, J.; NOYES, H.; GIBSON, W. The evolution of trypanosomes infecting humans and primates. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 93, n. 5, p. 669-676, 1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02761998000500019&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 05 jun. 2020.

STEVENS, J. R. Kinetoplastid phylogenetics, with special reference to the evolution of parasitic trypanosomes. **Parasite Journal**, v. 15, p. 226–232, 2008. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/23280254_Kinetoplastid_phylogenetics_with_special_reference_to_the_evolution_of_parasitic_trypanosomes> Acesso em: 24 jun. 2020.

STEVENS, J. R.; RAMBAUT, A. Evolutionary rate differences in trypanosomes. **Infection Genetics and Evolution**, v. 1, n. 2, p. 143-150, 2001.

SVOBODOVÁ, M. et al. *Sergeia podlipaevi* gen. nov., sp. nov. (Trypanosomatidae, Kinetoplastida), a parasite of biting midges (Ceratopogonidae, Diptera). **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, v. 57, pt. 2, p. 423–432, 2007. Disponível em: <<https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/ijms.0.64557-0>> Acesso em: 15 jun. 2020.

SWIER, V. J. et al. Patterns of chromosomal evolution in *Sigmodon*, evidence from whole chromosome paints. **Cytogenetic and Genome Research**, v. 125, p. 54-66, 2009. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/26681461_Patterns_of_Chromosomal_Evolution_in_Sigmodon_Evidence_from_Whole_Chromosome_Paints> Acesso em: 19 jun. 2020.

SWOFFORD, D. L. PAUP*: **phylogenetic analysis using parsimony (*and other methods**: version 4.0b10. Massachusetts: Sinauer and Associates, Sunderland, 2002.

TALIAFERRO, W. H.; PAVLINOVA, Y. The course of infection of *Trypanosoma duttoni* in normal and splenectomized and blocked mice. **Journal Parasitology**, v. 22, p. 29-41, 1936.

THOMPSON, C. K.; GODFREY, S. S.; THOMPSON, R. C. Trypanosomes of Australian mammals: a review. **International Journal Parasitology Parasites Wildlife**, v. 3, n. 2, p. 57–66, 2014. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142263/>> Acesso em: 21 jun. 2020

THOMPSON, J. D. The CLUSTAL_X windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. **Nucleic Acids Research**, v. 25, n. 2, p. 4876-4882, 1997.

TRUC, P. et al. Atypical human infections by animal trypanosomes. **PloS Neglected Tropical Diseases**, v. 7, n. 9, p. e2256, 2013. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0002256>> Acesso em: 25 jun. 2020

TYNDALE- BISCOE, H. **The life of marsupials**. Australia: CSIRO Publishing. 2005.

VAN DEN BOSSCHE, P. et al. A changing environment and the epidemiology of tsetse transmitted livestock trypanosomiasis. **Trends in Parasitology**, v. 26, p. 236-243, 2010.

VARGAS, P. A. O. Genes de cisteína proteases de *Trypanosoma* spp. de mamíferos: polimorfismo e relações filogenéticas. 2014. 171F. Tese de Doutorado em Biologia da relação Parasita-Hospedeiro, Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014. Disponível em:

<<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42135/tde-22092014-175527/pt-br.php>> Acesso em 21 jun. 2020.

VERMA, A. et al. *Trypanosoma lewisi* or *T. lewisi-like* infection in a 37 day old infant. **American Journal Tropical Medicine Hygiene**, v. 85, n. 2, p. 221-224, 2011. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144816/>> Acesso em 05 jun. 2020.

VICKERMAN, K. The diversity of the kinetoplastid flagellates. In: LUMDSEN, W. H. R.; EVANS, D. A. (Ed.). **Biology of the kinetoplastida**. New York: Academic Press, 1976. p. 1-34. Disponível em: <Acesso em 21 jun. 2020.

VICKERMAN, K. The evolutionary expansion of the trypanosomatid flagellates. **Internacional Journal Parasitology**, v. 24, n. 8, p. 1317-1331, 1994. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7729984/>> Acesso em 04 jun. 2018.

VIOLA, L. B. et al. Evolutionary history of trypanosomes from South American caiman (*Caiman yacare*) and African crocodiles inferred by phylogenetic analyses using SSU rRNA and gGAPDH genes. **Parasitology**, v. 136, p. 55-65, 2009b.

VIOLA, L. B. et al. Phylogenetic analyses based on small subunit rRNA and glycosomal glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase genes and ultrastructural characterization of two snake Trypanosomes: *Trypanosoma serpentis* sp. n.. from *Pseudoboa nigra* and *Trypanosoma cascavelli* from *Crotalus durissus terrificus*. **Journal of Eukaryotic Microbiology**, v. 56, p. 594-602, 2009a.

VIOLA, L. B. et al. Phylogeny of snake trypanosomes inferred by SSU rDNA sequences, their possible transmission by phlebotomines, and taxonomic appraisal by molecular, cross-infection and morphological analysis. **Parasitology**, v. 135, n. 5, p. 595-605, 2008.

VOSS, R. S.; LUNDE, D. P.; JANSÁ, S. A. On the contents of *Gracilinanus* Gardner and Creighton, 1989, with the description of a previously unrecognized clade of small didelphid marsupials. **American Museum Novitates**, v. 3482, p. 1-34, 2005. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/232679210_On_the_Contents_of_Gracilinanus_Gardner_and_Creighton_1989_with_the_Description_of_a_Previously_Unrecognized_Clade_of_Small_Didelphid_Marsupials> Acesso em 21 jun. 2020.

VOSS, R. S.; LUNDE, D. P.; SIMMONS, N. B. The mammals of Paracou, French Guiana: a Neotropical lowland rainforest fauna, part 2. Nonvolant species. **Bulletin of the American Museum of Natural History**, v. 263, p. 3-236, 2001. Disponível em: <<http://digitallibrary.amnh.org/handle/2246/386>> Acesso em 19 jun. 2020.

VOTÝPKA, J. et al. Diversity of trypanosomatids (Kinetoplastea: Trypanosomatidae) parasitizing fleas (Insecta: Siphonaptera) and description of a new genus

Blechnomonas gen. n. **Protist**, v. 164, n. 6, p. 763-81, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24113136/>> Acesso em 09 jun. 2018.

VOTÝPKA, J. et al. *Trypanosoma culicavium* sp. nov., an avian trypanosome transmitted by *Culex* mosquitoes. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, v. 62, n.3, p. 745-754, 2012. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21515704/>> Acesso em 07 jun. 2020.

WALLACE, F. G. Biology of the Kinetoplastida of Arthropods. In: LUMSDEN, W. H. R.; EVANS, D. A. (Ed.). **Biology of the Kinetoplastida**. New York: Academic Press, 1979. p. 213-240.

WELLS, E. A. Subgenus *Megatrypanum*. In: LUMSDEN, W. H. R.; EVANS, D. A. (Ed.). **Biology of the Kinetoplastida**. New York: Academic Press, 1976. p. 257-284.

WEN, Y. Z. et al. Further evidence from SSCP and ITS DNA sequencing support *Trypanosoma evansi* and *Trypanosoma equiperdum* as subspecies or even strain of *Trypanosoma brucei*. *Infection, Genetics and Evolution*. v. 41, p. 56-62. 2016. Disponível em: <<http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/38638/1/Wen%20YZ%20et%20al%202016%20Aut hors%20Accepted%20Manuscript.pdf>> Acesso em: 10 out. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). [Global distribution of cases of Chagas diseases, based on official estimates, 2018]. In: _____. **Chagas disease (American trypanosomiasis)**. Disponível em: <site: https://www.WHO.int/health-topics/chagas-disease#tab=tab_1 Acesso 27 de abril de 2020.

ZINGALES, B. et al. A new consensus for *Trypanosoma cruzi* intraspecific nomenclature: second revision meeting recommends TcI to TcVI. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 104, p. 1051-1054, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762009000700021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 out. 2020.

ZINGALES, B. et al. The revised *Trypanosoma cruzi* subspecific nomenclature: rationale, epidemiological relevance and research applications. **Infection, Genetics and Evolution**, v. 12, n. 2, p. 240-53, 2012. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/15331/2/Zingales%20B%20The%20revision%20d....pdf>>. Acesso em: 18 jun. 2020.