**RESISTÊNCIA EM MILHO (*Zea mays* L.) A *Colletotrichum*
graminicola (Ces.) Wils**

REGINA MÉLO SARTORI COÊLHO MORELLO

Engenheiro Agrônomo

Orientador: Prof. Dr. **LUIS EDUARDO ARANHA CAMARGO**

Tese apresentada à Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade
de São Paulo, para obtenção do título de
Doutor em Agronomia, Área de Concentração:
Fitopatologia.

PIRACICABA

Estado de São Paulo – Brasil

Dezembro – 2000

ERRATA

Página 27, segundo parágrafo, quarta linha, onde lê-se item 3.2, leia-se item 3.3;

Página 30, segundo parágrafo, segunda linha, onde lê-se 5g, leia-se, 5g ou 150 mg;

Página 30, segundo parágrafo, quinta linha, onde lê-se 50 mL, leia-se, 50 mL ou em eppendorfs de 1,5 mL;

Página 31, primeira linha, onde lê-se 10 mL, leia-se, 10 mL ou 200 µL;

Página 36, terceiro parágrafo, primeira linha, onde lê-se 10 e 14, leia-se 12 e 16;

Página 36, terceiro parágrafo, terceira linha, onde lê-se 16, leia-se 10;

Página 52, Tabela 13, primeira linha, onde lê-se S seguido de R, leia-se R seguido de S;

Página 56, Tabela 14, segunda linha, onde lê-se 135, 66, 201, leia-se, 142, 62, 204;

Página 57, Tabela 15, sexta linha, onde lê-se 209, leia-se, 202.

Página 94, apêndice 1, primeira coluna, onde lê-se nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, leia-se, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - Campus "Luiz de Queiroz"/USP

Morello, Regina Mélo Sartori Coêlho
Resistência em milho (*Zea mays* L.) a *Colletotrichum graminicola* (Ces.) Wils /
Regina Mélo Sartori Coêlho Morello. - - Piracicaba, 2000.
94p.

Tese (Doutorado) -- - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2000.
Bibliografia.

1. Antracnose 2. Colmo 3. Milho 4. Parâmetro genético 5. Relação planta-
patógeno 6. Resistência à doença I. Título

CDD 633.15

"Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor"

Às minhas filhas Alícia e Amanda,
ao meu esposo Camilo e
às minhas sobrinhas Letícia e Ana Caroline,
DEDICO.

Aos meus pais, Rildo e Josète,
e aos meus irmãos Luciana,
Rilda e Antônio Ricardo,
OFEREÇO.

AGRADECIMENTOS

À Deus;

Ao Prof. Luis Eduardo Aranha Camargo pelos ensinamentos, constante apoio e valiosa orientação;

Aos professores do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola pelos conhecimentos transmitidos;

Ao Eng. Agron. Herberto P. da Silva (EBS/Dow Agrosience) por ter contribuído para a viabilização do trabalho;

Ao meu pai e Prof. Rildo Sartori B. Coêlho pelo incentivo, valiosas sugestões e pelo seu exemplo de profissional dedicado;

Ao meu esposo e Prof. Camilo de Lelis Morello por ter contribuído durante a execução e finalização deste trabalho, pelo apoio e amizade;

À Célia C. Malvas, Juliana B. Ogliari e Kátia R. Brunelli pelo incentivo, pelo auxílio nas atividades científicas e pela amizade;

À Mariana S. Quirino e Ana Paula M. Teixeira pelo companheirismo e auxílio nas atividades científicas;

Aos colegas do laboratório de Genética Molecular pelo agradável convívio;

À Universidade do Tocantins pela oportunidade e recursos concedidos;

Ao CNPq pelo apoio financeiro destinado ao desenvolvimento deste projeto;

A todos que direta ou indiretamente contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho, professores, funcionários e colegas do curso de pós-graduação, em especial a Adriane Wendland, Andréia K. Nakatani, Ângela M. Vieira, Herberto P. da Silva, Leila de C. Louback, Leonardo Gianasi, Maurício P. Barbosa, Quelmo Novaes e Renato B. Bassanesi.

SUMÁRIO

Página

LISTA DE FIGURAS.....	viii
LISTA DE TABELAS.....	ix
RESUMO.....	xii
SUMMARY.....	xv
1 INTRODUÇÃO.....	1
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	4
2.1 O patossistema <i>Colletotrichum graminicola</i> /milho.....	4
2.1.1 Importância.....	4
2.1.2 Etiologia e epidemiologia.....	6
2.2 Mecanismos de resistência.....	10
2.3 Resistência genética.....	11
2.4 Mapeamento de genes de resistência.....	15
2.5 Método de análise de segregantes agrupados (ASA).....	18
3 MATERIAL E MÉTODOS.....	21
3.1 Material Vegetal.....	21
3.2 Obtenção dos isolados de <i>Colletotrichum graminicola</i>	22
3.3 Comparação entre diferentes variáveis de avaliação da resistência à antracnose foliar.....	23
3.4 Patogenicidade de isolados de <i>Colletotrichum graminicola</i>	24

3.5 Determinação do método de inoculação no colmo.....	25
3.6 Herança da resistência em milho à antracnose.....	26
3.6.1 Antracnose foliar.....	26
3.6.2 Antracnose do colmo.....	27
3.6.3 Ligação entre genes de resistência à antracnose foliar e do colmo.....	28
3.7 Penetração de <i>C. graminicola</i> em genótipos resistente e suscetível.....	28
3.8 Localização dos genes de resistência à antracnose foliar e do colmo.....	30
3.8.1 Material Vegetal.....	30
3.8.2 Extração de DNA Vegetal.....	30
3.8.3 Amplificação de locos microssatélites.....	32
3.8.4 Análise de segregantes agrupados.....	33
3.8.5 Análise da segregação de locos microssatélites em indivíduos suscetíveis da população F ₂	34
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	35
4.1 Comparação entre diferentes variáveis para avaliação da resistência à antracnose foliar.....	35
4.2 Patogenicidade de isolados de <i>Colletotrichum graminicola</i>	44
4.3 Determinação do método de inoculação no colmo.....	48
4.4 Herança da resistência em milho à antracnose.....	48
4.4.1 Antracnose foliar.....	48
4.4.2 Antracnose do colmo.....	53
4.4.3 Ligação entre genes de resistência à antracnose foliar e do colmo.....	54

4.5 Penetração de <i>C. graminicola</i> em milho em genótipos resistente e suscetível.....	56
4.6 Localização dos genes de resistência à antracnose foliar e do colmo.....	60
4.6.1 Extração de DNA vegetal.....	60
4.6.2 Análise de segregantes agrupados.....	60
4.6.3 Análise da segregação de indivíduos da população F ₂ com as regiões microssatélites polimórficas entre as linhagens genitoras.....	61
5 CONCLUSÕES.....	67
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	69
APÊNDICES.....	91

LISTA DE FIGURAS

Página

Figura 1. Comprimento de lesões no colmo (cm) em plantas F ₂ oriundas do híbrido L186 x L64, após 30 dias da inoculação com <i>Colletotrichum graminicola</i> pelos métodos do palito e injeção.....	49
Figura 2. Sintoma típico de queima foliar causada por <i>Colletotrichum graminicola</i>	51
Figura 3. Reações das linhagens L64, L186 e do híbrido L186 x L64 a <i>Colletotrichum graminicola</i> aos 30 dias após a inoculação.....	55
Figura 4. Visualização de folhas da linhagem de milho susceptível à antracnose foliar sob microscópio eletrônico de varredura, após inoculação em uma microcâmara úmida. (A). Germinação de apressórios 10 horas após a inoculação. (B). Detalhe de um conídio com apressório. (C). Aspecto da folha 15 horas após a inoculação.....	59
Figura 5. Genotipagem dos indivíduos susceptíveis à antracnose foliar causada por <i>Colletotrichum graminicola</i> com o primer nc003 que amplifica região microssatélite ligada ao gene de resistência à antracnose foliar.....	65

LISTA DE TABELAS

Página

Tabela 1. Número de lesões de antracnose foliar milho em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.....	37
Tabela 2. Área total de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.....	38
Tabela 3. Área média de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.....	39
Tabela 4. Comprimento total de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.....	40
Tabela 5. Comprimento médio de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação....	41
Tabela 6. Nota para tipo de lesão de antracnose foliar em condições de casa de vegetação.	42
Tabela 7. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total de lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 10 dias da inoculação.....	45
Tabela 8. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL)	

avaliadas aos 12 dias da inoculação.....	45
Tabela 9. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 14 dias da inoculação.....	46
Tabela 10. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 16 dias da inoculação.....	46
Tabela 11 Comportamento médio de genótipos de milho frente a dois isolados de <i>Colletotrichum graminicola</i> , para as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas 14 dias após a inoculação.....	47
Tabela 12. Média e variância do comprimento de lesão aos 30 dias após inoculação no colmo avaliado em plantas F ₂ , oriundas do híbrido L186 x L64.....	49
Tabela 13. Número de plantas F ₂ resistentes (R) e suscetíveis (S) à antracnose foliar avaliadas em três experimentos em casa de vegetação (CV) e um experimento em campo (campo).....	52
Tabela 14. Número de plantas F ₂ resistentes (R) e suscetíveis (S) à antracnose do colmo.....	56

Tabela 15. Frequências observadas e esperadas de plantas F ₂ suscetíveis (S) e resistentes (R) à antracnose foliar (AF) e podridão do colmo (PC).....	57
Tabela 16. Média de apressórios germinados 10 horas após a inoculação com <i>Colletotrichum graminicola</i> nas folhas de milho.....	58
Tabela 17. Localização cromossômica e protocolos utilizados na amplificação de locos microssatélites de milho, nos cromossomos 1 a 7.....	62
Tabela 18. Localização cromossômica e protocolos utilizados na amplificação de locos microssatélites de milho, nos cromossomos 7 a 10 e em locos não localizados.....	63

RESISTÊNCIA EM MILHO (*Zea mays* L.) A *Colletotrichum* *graminicola* (Ces.) Wils

Autor: REGINA MÉLO SARTORI COÊLHO MORELLO

Orientador: Prof. Dr. LUIS EDUARDO ARANHA CAMARGO

RESUMO

Entre as doenças que ocorrem na cultura do milho, a antracnose, causada por *Colletotrichum graminicola*, tem potencial para se tornar limitante ao cultivo dessa gramínea. A forma mais eficiente de controle desta doença é através do emprego de genótipos resistentes. Assim, informações sobre procedimentos de avaliação da resistência, análise de raças do patógeno, e herança da resistência a este patógeno são de grande importância para programas de melhoramento.

Em experimento realizado em casa de vegetação compreendendo seis linhagens e quatro híbridos, verificou-se variabilidade genética entre genótipos para resistência ao ataque de *C. graminicola* em folhas, para as variáveis área total de lesão/planta (ATL), área média/lesão (AML), comprimento total de lesão/planta (CTL), comprimento médio/lesão (CML), número de lesões (NL) e tipo de lesão. As variáveis CTL, ATL e nota para tipo de lesão apresentaram-se altamente relacionadas, sendo que a variável tipo de lesão possibilitou uma

distinção dos materiais em um maior número de classes. As variáveis CML e AML resultaram no mesmo agrupamento dos materiais, porém não proporcionaram a mesma distinção entre materiais S e R como verificado para as demais variáveis avaliadas. Não constatou-se comportamento diferenciado dos genótipos de milho quando inoculados com dois isolados, indicando a não distinção dos isolados em raças, considerando o material genético avaliado.

Ambos os métodos de inoculação do colmo, por injeção de suspensão de conídios e por introdução de palito envolto na massa de conídios, foram eficientes. Entretanto, utilizando-se o método de injeção, obteve-se uma melhor distribuição dos valores referentes à podridão do colmo em classes fenotípicas em relação ao método do palito, que mesmo apresentando o mesmo número de plantas doentes, no geral, estas plantas apresentaram menor severidade da doença.

A análise das frequências observadas de plantas F_2 resistentes (sem sintomas) e suscetíveis (com sintoma) à antracnose foliar, oriundas do cruzamento entre as linhagens L186 e L64, em três ensaios de casa de vegetação e um de campo, indicou a ocorrência de herança monogênica com dominância completa para o alelo que confere resistência. No estudo da herança da resistência para a podridão do colmo, também foram observadas frequências próximas às esperadas para herança monogênica, também com dominância completa para o alelo que confere resistência. O híbrido apresentou o mesmo padrão de resistência que o genitor L64. A análise de co-segregação indicou segregação independente entre os dois genes.

A partir da visualização do tecido de milho inoculado com *C. graminicola*, ao microscópio eletrônico de varredura, constatou-se que 5 horas após a inoculação os conídios já estavam aderidos à superfície da folha, tendo os apressórios germinado com cerca de 10 horas após a inoculação. Quinze horas após a germinação, apenas na superfície foliar da linhagem genitora suscetível foi observado evidências da penetração do patógeno.

A análise genotípica das linhagens genitoras, através de marcadores microssatélites, permitiu identificar 19 locos polimórficos dentre os 171 primers analisados nos dez cromossomos de milho. Através da amplificação das regiões polimórficas nos genótipos dos indivíduos suscetíveis à antracnose foliar, encontrou-se associação entre a região amplificada com o primer nc003, localizada na posição 0.6 do cromossomo 2, e o gene que confere resistência à queima foliar, RCG1, causada por *C. graminicola*.

RESISTANCE TO *Colletotrichum graminicola* (Ces.) Wils IN MAIZE (*Zea mays* L.)

Author: REGINA MÉLO SARTORI COÊLHO MORELLO

Adviser: Prof. Dr. LUIS EDUARDO ARANHA CAMARGO

SUMMARY

Among the diseases that affect maize, anthracnose, caused by *C. graminicola* has the potential to limit its productivity. The most efficient way to control this disease is to use resistant genotypes. Therefore, information about screening methods, the existence of races, and inheritance of resistance to this pathogen are of great importance to breeding programs.

In an experiment carried out in greenhouse using six inbred lines and four hybrids, genetic variability for resistance to leaf anthracnose was detected among maize genotypes for the variables total lesion area (ATL), mean lesion area (AML), total lesion length (CTL), mean lesion length (AML), number of lesions (NL), and lesion type. The variables ATL, CTL and lesion type were highly correlated (higher than 0.90). The variable lesion type allowed a greater phenotypic discrimination. No difference was detected in the host genotype rank when the variables AML and CML were used.

No differential interaction was detected when two isolates were inoculated on maize genotypes, indicating that there was no distinction between isolates at the race level.

Two methods for stalk inoculation were compared: stem injection of conidial suspension and stem piercing with toothpick. Both were found to be highly effective in causing disease. However, the injection method resulted in higher severity values, facilitating detection of extreme genotypes.

Studies on the mode of resistance to leaf anthracnose, the inbred lines L186 and L64 were susceptible and resistant, respectively, whereas the hybrids L184 x L64 were resistant. The observed frequency of susceptible and resistant F_2 plants derived from F_1 plants indicates monogenic, dominant control of resistance. Similarly, resistance to stalk anthracnose was monogenic dominant, however controlled by different genes since leaf and stalk anthracnose resistance segregated as independent traits.

Scanning electronic microscope was used to study the infection process with *C. graminicola*. In five hours after inoculation, the spores had already adhered to the leaf surface, and in ten hours the appressoria had germinated. Fifteen hours after germination there was evidence for penetration in the susceptible genotype.

Nineteen out of 171 loci tested with microsatellite markers were polymorphic among inbred lines. The nc003 locus, located on chromosome 2, was found to be linked (37.1 cM) to the gene that confers resistance to leaf anthracnose.

1 INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.) é cultivado em grande extensão do território brasileiro, em lavouras de tamanho variável e sob diferentes sistemas de produção, dependendo das condições sócio-econômicas da região. Sua principal forma de utilização relaciona-se, direta ou indiretamente, com a alimentação humana, o que faz com que este produto ocupe posição das mais relevantes no plano social e econômico. Níveis crescentes de produção são exigidos devido ao crescimento populacional e econômico e podem ser obtidos tanto com a expansão da área de cultivo como pelo aumento da produtividade.

Programas de melhoramento genético têm alcançado sucesso no desenvolvimento de cultivares com atributos agronômicos desejáveis para os mais diversos sistemas de produção. Em um programa de melhoramento visando o desenvolvimento de cultivares de alto potencial produtivo, a seleção pode ser feita de forma direta, tendo-se como alvo o peso de grãos, ou de forma indireta, praticando-se a seleção para caracteres relacionados com a produção. Neste sentido, destacam-se as relações entre produção e resistência genética a doenças.

Dentre as doenças que afetam a cultura do milho no Brasil, a antracnose tem se apresentado como limitante à obtenção de altas produtividades a exemplos de países como França, Índia e Filipinas (Shurtleff, 1980). Nos Estados Unidos, a antracnose despertou a atenção de melhoristas e produtores devido ao aumento de sua incidência e de perdas de 19 a 28% na safra de 1980 (Carson e Hooker, 1981a), embora trabalhos anteriores já tivessem chamado a atenção para o aumento da frequência e extensa distribuição geográfica desta enfermidade e de seu potencial destrutivo (Williams & Willis, 1963; Morgan & Krantizes, 1967; Leonard & Thompson, 1969; Poneleit et al., 1972; Warren et al., 1973; Wheeler et al., 1974; Nicholson & Warren, 1976).

No Brasil, a antracnose tem chamado a atenção de técnicos e pesquisadores como uma doença capaz de reduzir a produtividade da cultura em determinadas regiões (Léon, 1994). O primeiro registro da ocorrência de antracnose no Brasil foi feito por Silveira et al. (1965), na região de Campinas (SP), em campos de produção de sementes de milho híbrido. No trabalho, os autores referem-se a perdas de até 30% na produção. No Nordeste, a antracnose ocorre nos Estados de Pernambuco e Paraíba, mas não há relatos sobre perdas (Pontes, 1987).

Diante o impacto da doença na produtividade da cultura, faz-se necessário o desenvolvimento de genótipos tropicais resistentes. Assim, informações sobre a herança da resistência ao patógeno são fundamentais.

Dentre as metodologias utilizadas para identificar genes de interesse agrônomo, destaca-se a técnica de marcadores moleculares microssatélites.

Através desta técnica, indivíduos extremamente resistentes e suscetíveis são genotipados com locos marcadores na tentativa de identificar marcadores ligados aos genes em estudo. Os marcadores microssatélites são seqüências simples de dois a seis nucleotídeos repetidos em tandem e flanqueados por seqüências não repetidas de DNA. O número de repetições das seqüências é extremamente variável entre indivíduos, supostamente em decorrência de 'crossing-over' desigual entre segmentos homólogos, o que resulta em um elevado nível de polimorfismo para este tipo de marcadores. Além desta característica desejável, os marcadores microssatélites são fáceis de serem manipulados em laboratório, uma vez que podem ser amplificados via reação em cadeia por polimerase (PCR) e visualizados em gel de agarose corado com brometo de etídeo. Os primers utilizados na PCR correspondem às seqüências não repetidas que flanqueiam os microssatélites.

O presente trabalho objetivou estimar parâmetros genéticos, tais como tipo de ação gênica e número de genes envolvidos no controle genético da resistência do milho à antracnose foliar e do colmo e identificar marcadores microssatélites ligados a estes genes.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O patossistema *Colletotrichum graminicola*/milho

2.1.1 Importância

O termo antracnose engloba várias manifestações sintomáticas resultantes da infecção por *Colletotrichum graminicola*. No Brasil, as formas mais importantes são a antracnose de folha e a de colmo, hoje consideradas limitantes à produtividade principalmente devido ao aumento na área de cultivo do milho safrinha e de plantio direto, que proporcionam ao patógeno tecido hospedeiro para sua manutenção e reprodução.

Desde o primeiro relato da antracnose do milho no Brasil, feito por Silveira et al. (1965) na região de Campinas (SP), alguns trabalhos foram feitos considerando-se os principais sintomas da antracnose (Pereira, 1983; Silva, 1983 e Pontes, 1987; Kimati, 1975; Minussi, 1977). No entanto, apenas recentemente a antracnose do colmo foi reconhecida como um dos principais problemas da cultura do milho em áreas que adotam o cultivo safrinha ou o sistema de plantio direto (Silva, 1997; Fancelli & Dourado Neto, 2000).

Nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, vários trabalhos já haviam alertado para o aumento na frequência e distribuição geográfica da antracnose do milho e do seu potencial para tornar-se fator limitante da produção (Williams & Willis, 1963; Morgan & Krantizes, 1967; Leonard & Thompson, 1969; Poneleit et al., 1972; Warren et al., 1973; Wheeler et al., 1974; Nicholson & Warren, 1976 e Perkins & Hooker, 1979). Ainda na década de 60, Williams & Willis (1963) relataram que, em Ohio (EUA), 50% dos isolados obtidos de colmos com sintoma de podridão eram de *C. graminicola* e, em alguns campos avaliados por Lipps (1983), a incidência de podridão no colmo variou de 10 a 90%. Em Illinois, nos anos de 1982 e 1983, o patógeno foi isolado em 34 a 46% de colmos apresentando podridão (Anderson & White, 1987). Na Carolina do Norte, no período de 1972 a 1974, a antracnose foi uma das doenças mais importantes, causando manchas foliares e podridão de colmo (Leonard, 1974). Entretanto, apenas na safra de 1980 esta doença despertou a atenção dos melhoristas e produtores devido ao aumento de sua incidência e consecutivas perdas de 19 a 28% (Carson & Hooker, 1981b) e até 40 % (Smith, 1976; Perkins & Hooker, 1979; White et al., 1979 e Callaway et al., 1992). Mesmo assim, Shurtleff (1980) considerou a antracnose como uma doença de importância secundária nos Estados Unidos.

Várias epidemias foram relatadas no norte-central e leste dos Estados Unidos (Hooker, 1976; Hooker & White, 1976; Perkins & Hooker, 1979; Warren et al., 1973; Wheeler et al., 1974 e White et al., 1979). Nas décadas de 80 e 90, o aumento da incidência de podridão do colmo foi associada em parte ao

aumento da população da lagarta *Ostrinia nubilalis*, que causa injúria no colmo do milho e dá condições de entrada ao fungo (Smith, 1976; Perkins & Hooker, 1979; White et al., 1979 e Keller et al., 1986). O estresse da planta devido a fatores ambientais e nutricionais, lesões de nematóides ectoparasitas nas raízes, assim como injúrias de insetos também favorecem o desenvolvimento da doença (Bergstrom et al., 1983; Keeler et al., 1986; Muimba-kankolongo & Bergstrom, 1990; 1992).

2.1.2 Etiologia e epidemiologia

Os sintomas da doença ocorrem em qualquer parte da planta. Nas folhas, as lesões necróticas de coloração pardacenta, a princípio arredondadas ou ovaladas, de coloração amarelo pálida, podem coalescer e ocasionar dano extenso. No colmo, os sintomas surgem geralmente na epiderme, logo após a polinização, como lesões estreitas, longitudinais, com aspecto encharcado, inicialmente de coloração pardo-avermelhadas, que se tornam castanho escuro e pretas. Além das folhas e colmo, este patógeno também pode afetar raiz, palha (bráctea) e semente. A podridão de colmo e antracnose foliar, no entanto, são os sintomas mais comumente encontrados (Messiaen et al., 1959; Dale, 1963; Williams & Willis, 1963; Silveira et al., 1965; Warren et al., 1973 e Shurtleff, 1980).

Condições ótimas para o desenvolvimento da antracnose compreendem temperaturas entre 25 e 35°C e alta umidade relativa do ar. Esta amplitude de

temperatura favorece a germinação e a formação do apressório e penetração do fungo (Skoropad, 1967). A doença se desenvolve melhor em tecidos mais velhos, embora também possa acometer plântulas (Jamil & Nicholson, 1987). Nicholson et al. (1985) preconizam que tecido foliar em expansão é pouco suscetível à queima e que folhas baixas e maduras são mais suscetíveis. Sementes infectadas pelo patógeno podem resultar em queima, enfezamento, redução do estande de plantas e podridão de raízes (Warren & Nicholson, 1975).

O tecido infectado presente na área de cultivo constitui a principal fonte de inóculo primário para a próxima cultura. De acordo com Bergstrom & Nicholson (1999), o aumento da antracnose em campos de cultivo nos Estados Unidos é menos dramático em áreas de produção de silagem, uma vez que menor quantidade de restos culturais permanece no campo após a colheita. A infecção inicial de folhas de plântulas ocorre a partir de conídios produzidos em acérvulos sobre restos de cultura. A exemplo da antracnose do morango, a dispersão horizontal dos conídios é limitada a curtas distâncias (Madden et al., 1996). O inóculo secundário é responsável tanto por novas lesões foliares como pela infecção do colmo.

C. graminicola forma acérvulos esféricos ou piriformes (8-15 μm) com setas sobre o tecido afetado. Seus conídios são alantóides, medindo 23,5 – 29,0 μm x 3,5 – 5,0 μm , respectivamente, para comprimento e largura, quando cultivado em meio de cultura BDA (Sutton, 1980; Pontes, 1987). Sob material seco, as setas medem em torno de 121,5 μm e possuem, na sua maioria, três

septos (Williams & Willis, 1963). De acordo com Wheeler et al. (1971), a formação de apressórios, a penetração e a formação de acérvulos ocorrem 5, 8 e 24 horas após a inoculação, respectivamente. A formação de apressórios sob o tecido foliar é induzida pela topografia da folha do hospedeiro (Lapp & Skoropad, 1978). O teleomorfo, *Glomerella graminicola* Pol., produz peritécios eruptivos quando inoculado em tecido foliar esterilizado, apresentando ascósporos curvos (Politis, 1975).

C. graminicola pode sobreviver em colmos infectados por um período de até dez meses (Naylor & Leonard, 1977) e em sementes armazenadas durante 3 anos (Warren, 1977). Envoltos por uma massa gelatinosa produzida durante sua produção, os conídios podem permanecer viáveis por semanas a meses, dependendo da umidade relativa do ar. Sem a matriz gelatinosa, a viabilidade dos conídios reduz-se a horas, mesmo em alta umidade relativa (Nicholson & Moraes, 1980). A dispersão vertical dos conídios de *C. graminicola* pode ocorrer tanto pelos respingos da chuva ou pelo vento (Bergstrom & Nicholson, 1999).

A presença de água mostra-se necessária para a germinação dos conídios devido à presença de inibidores de germinação, solúveis em água, na matriz mucilaginosa. Esta matriz não está somente envolvida na sobrevivência e disseminação dos conídios, mas também na indução da patogênese em milho (Bergstrom & Nicholson, 1983). Existem evidências de que essa matriz possui, além de inibidores de germinação de conídios, enzimas que são importantes no estabelecimento do patógeno (Nicholson & Moraes, 1980; Bergstrom & Nicholson, 1983; Pascholati et al., 1993 e Anderson & Nicholson, 1996).

Assim como a antracnose foliar, a podridão do colmo pode ocorrer devido à penetração direta do fungo. Conídios formados em folhas podem ser levados para a bainha e iniciar uma infecção na parede do colmo. No entanto, a deposição de conídios na bainha não é um método eficiente de inoculação. Frequentemente, considera-se que a colonização deste patógeno no exterior do colmo coincide com a infecção no interior, mas nem sempre isso é verdadeiro (Bergstrom & Nicholson, 1999).

Além do milho, isolados de *C. graminicola* de milho podem infectar aveia, cevada, trigo e sorgo (Chowdhury, 1936). Para Shurteleff (1980), no entanto, a capacidade de isolados de milho infectar sorgo é discutível. De acordo com Bergstrom & Nicholson (1999), conídios de *C. graminicola* de gramíneas próximas à cultura podem constituir inóculo para infecção de folhas maduras, mas só inóculo de isolados de milho é significativo para a epidemia. No Brasil, Kimati (1975) observou que isolados de *C. graminicola* do milho e do sorgo não são patogênicos à cana-de-açúcar e isolados da cana-de-açúcar e do sorgo não são patogênicos ao milho. De acordo com o autor, os três tipos de isolados podem ser considerados como formas especializadas de *C. graminicola*, validando a nomenclatura sugerida por Messiaen et al. (1959), que sugeriram a criação das formas *specialis* de *C. graminicola* f. sp. *zeae*, *C. graminicola* f. sp. *sorghii* e *C. graminicola* f. sp. *sacchari*. Os resultados obtidos foram confirmados por Minussi (1977) que mostrou que os isolados só causam sintomas típicos em seus hospedeiros originais. Embora o isolado de sorgo encontre-se classificado

como *C. sublineolum* (Sherriff et al., 1995), trabalhos recentes não têm adotado esta nova classificação (Snyder & Nicholson, 1990 e Schadeck et al., 1998).

Ainda não há evidências da existência de raças fisiológicas de *C. graminicola* (Nicholson & Warren, 1981; Jenns et al., 1982; White et al., 1987 e Carson, 1999) em milho, ao contrário do que ocorre em sorgo, onde o patógeno é reconhecido como hipervariável (Rosewich et al., 1998).

2.2 Mecanismos de resistência

Pouco se sabe sobre os mecanismos específicos de resistência do milho à antracnose. No entanto, há conhecimento de respostas fisiológicas e bioquímicas gerais à infecção de fungos patogênicos. A defesa do milho é baseada, principalmente, no aumento do metabolismo de compostos fenólicos, especificamente de fenilpropanóides (Bergstrom & Nicholson, 1999) e de compostos pré-formados, como os ácidos hidroxâmicos (Lyons & Nicholson, 1989). Hammerschmidt & Nicholson (1977) sugerem o envolvimento do metabolismo de fenóis na resistência de milho a *C. graminicola* em face da correlação entre restrição ao crescimento da lesão, o acúmulo de compostos fenólicos totais e produção de antocianina.

Estudos realizados por Sherwood (1987) mostraram que o aumento na frequência da formação de papila em células apicais da raiz relaciona-se com a redução na penetração do patógeno. No entanto, Politis & Wheeler (1973), ao

contrário desse autor, mostraram que a penetração em folhas pode ocorrer onde foram formadas papilas.

Como o desenvolvimento da doença é favorecido por extensos períodos de umidade e baixa intensidade de luz, a alta intensidade de luz aumenta a resistência das plantas de milho (Hammerschmidt & Nicholson, 1977, Jeans & Leonard, 1985 e Schall et al., 1980), uma vez que a expressão da resistência a antracnose envolve a biossíntese de compostos fenólicos que é altamente dependente de luz (Lyons et al., 1993).

2.3 Resistência genética

Vários trabalhos foram realizados objetivando identificar genes de resistência a antracnose foliar e do colmo, resultando na identificação de um a poucos genes de maior efeito ou vários genes com pequenos efeitos aditivos, dependendo dos cruzamentos analisados.

Estudos relativos a resistência à podridão do colmo em milho mostram que há predominância de herança quantitativa. Já com relação a resistência à antracnose foliar, a literatura aponta o envolvimento de poucos genes com efeitos aditivos, em detrimento de genes com efeitos dominantes.

Lim & White (1978) encontraram efeitos heteróticos significativos em 45 híbridos obtidos de cruzamentos dialélicos entre 10 progenitores, sugerindo dominância parcial para a resistência à antracnose foliar e do colmo. Em um dos

cruzamentos, no entanto, predominou a ação de genes dominantes para resistência à antracnose foliar.

Carson & Hooker (1981a) verificaram que os efeitos aditivos explicaram mais de 90% do total da variação em resistência à podridão do colmo entre médias de gerações em todas as populações estudadas, com efeitos dominantes significativos em algumas populações.

Carson & Hooker (1981b) encontraram efeitos aditivos significativos em quatro famílias e efeitos dominantes em três famílias ao avaliarem cinco famílias resultantes do cruzamento entre cinco linhagens resistentes e uma suscetível à antracnose foliar do milho. Acredita-se que o efeito dominante deve ter maior importância do que a indicada pela análise.

Pereira (1983) forneceu evidências que os mecanismos que conferem resistência a *C. graminicola* em folhas de plântulas, folhas de plantas adultas e colmo são diferentes. Em folha, o mecanismo que condiciona resistência à doença na nervura central foi diferente do mecanismo que ocorre no limbo foliar. Em ambos os casos houve evidência de herança quantitativa com efeitos genéticos aditivos e dominantes, com predominância de efeitos genético dominante para a suscetibilidade à podridão do colmo.

Silva (1983) estimou a ação de 1 a 4 genes na resistência à infecção do limbo foliar em seis linhagens de milho e as gerações F_1 , F_2 , RC_1 e RC_2 , ocorrendo efeitos genéticos dominantes e aditivos e ação de 1 a 2 genes no caso da infecção da nervura central.

Badu-Apraku et al. (1987a; 1987b) observaram resistência do tipo monogênica dominante para a antracnose foliar e do colmo. A avaliação para a podridão do colmo foi feita através de uma escala de pontuação que envolve a soma do número de internódios apresentando podridão e o número de internódios com mais de 75% de podridão. Plantas com notas entre 1 e 3 foram consideradas resistentes (padrão da linhagem resistente) e plantas com notas entre 8 e 14 como suscetíveis. O teste qui-quadrado não foi significativo, sugerindo que a linhagem LB31 é portadora de um gene simples dominante para a resistência à podridão do colmo. Utilizando outras linhagens, Badu-Apraku et al. (1987c) identificaram que efeitos aditivos, dominantes e epistáticos são importantes na expressão da resistência. Ainda neste trabalho, em outro cruzamento, a análise dos dados indica que dois genes co-dominantes condicionaram a resistência à antracnose foliar na fase de plântula e planta adulta. Neste estudo foi realizada a análise com base nas médias das gerações F_1 , seus respectivos retrocruzamentos e plantas F_2 resultantes dos cruzamentos entre germoplasmas tropicais.

Callaway et al. (1990) encontraram heterose e capacidade de combinação específica e geral significativas, no caso de resistência a antracnose de colmo, indicando que ambos efeitos, aditivos e não aditivos, foram importantes nestes cruzamentos.

Weldekidan & Hawk (1993) relataram efeitos aditivos mais importantes que os não aditivos na resistência à podridão do colmo. Neste trabalho foi utilizada a linhagem DE811ASR [(DE811)⁴ x Mp305)], indicando que a

dominância relatada para a linhagem Mp305, fonte de resistência conforme Carson & Hooker (1981b), depende do conjunto genético do material utilizado no cruzamento.

Toman Junior & White (1993) desenvolveram uma linhagem [(FrB73 x MP305)^{sg}] para verificar seu padrão de resistência à podridão do colmo. Neste trabalho foi usado o modelo de análise de geração de Mather & Jinks (1971) e, em adição ao exame dos dados quantitativos, foi testada a segregação observada contra a segregação esperada no caso da ocorrência de um gene dominante responsável pela resistência. A transformação de dados quantitativos em classes qualitativas foi realizada mediante uso do procedimento paramétrico com análise discriminante, pelo uso do programa SAS. Através da análise de gerações foram identificados efeitos aditivos e dominantes explicando a resistência. De acordo com os dados coletados, considerando-se uma avaliação, foi encontrado um gene simples dominante de resistência. Mather & Jinks (1984) alertam que a genética biométrica é, conceitualmente, um descendente da genética mendeliana. Os autores consideram que usar a genética biométrica preferencialmente à Mendeliana, em caso das classes genéticas serem facilmente reconhecidas pelo seu fenótipo, é ineficiente e equivocado. Na ausência de alguma razão obrigatória, a análise Mendeliana seria sempre preferida à biométrica. Ver as duas abordagens como alternativas rivais é não compreender que cada técnica de análise tem o seu próprio campo de aplicação, ao qual a outra é menos adequada, ou mesmo impossível de ser adaptada.

2.4 Mapeamento de genes de resistência

Carson & Hooker (1982) foram os primeiros a mapearem genes de resistência à antracnose de colmo. Os autores trabalharam com uma linhagem resistente e 19 materiais-estoque contendo translocações recíprocas em 15 braços de cromossomos e encontraram genes de resistência em um dos braços dos cromossomos 1, 4 e 8 e em ambos os braços do cromossomo 6. Com o advento dos marcadores moleculares, inúmeros outros genes a várias doenças também foram mapeados (McMullen & Simcox, 1995), incluindo um gene de resistência a podridão do colmo de grande efeito fenotípico (Jung et al., 1994). Esses autores verificaram a existência de efeitos aditivos significativos em cruzamentos entre uma linhagem derivada da linhagem resistente MP305 e duas linhagens suscetíveis. Apenas em uma das populações foi encontrado, além dos efeitos aditivos, efeito de dominância. Neste trabalho, os autores encontraram, através da técnica de RFLP (restriction fragment length polymorphism), um marcador no cromossomo 4 significativamente associado com resistência em ambas as populações estudadas.

Muitos programas de melhoramento de plantas e animais têm se beneficiado grandemente das técnicas moleculares, por possibilitarem, entre outros, o acompanhamento da introgressão de genes, a identificação e seleção de QTLs (quantitative trait loci) e a determinação de relações genéticas (Vogel, 1997). Um mapa de ligação de marcadores moleculares pode ser usado para selecionar genes ligados a um determinado marcador. O polimorfismo do DNA

pode ser detectado e utilizado para estabelecer uma correlação entre genótipo e fenótipo para dada característica.

Os quatro tipos mais comuns de marcadores moleculares são RFLP, RAPD (random amplified polymorphic DNA), microssatélites ou SSR (simple sequence repeats) e AFLP (amplified fragment length polymorfism) (Vogel, 1997). Cada marcador possui suas vantagens e desvantagens, sendo que somente RFLP e microssatélites são marcadores co-dominantes, ou seja, possibilitam a distinção entre indivíduos heterozigotos e homozigotos.

Microssatélites são os mais informativos e geram informações com facilidade e rapidez. Estes marcadores baseiam-se na amplificação de regiões de seqüências repetitivas (Mullis et al., 1986). Essas seqüências são freqüentes e distribuídas regularmente no genoma dos eucariotos (Chin et al., 1996; Morchen et al., 1996). Os locos amplificados são específicos e estáveis, freqüentemente conservados entre espécies (Kresovich et al., 1995). Esses marcadores foram descritos em espécies arbóreas tropicais (Condit & Hubbell, 1991), soja (Akkaya et al., 1992; Morgante & Olivieri, 1993 e Rongwen et al., 1995), arroz (Wu & Tanksley, 1993), milho (Holm et al., 1994; Chin et al., 1996 e Senior et al., 1996), brássicas (Lagercrantz et al., 1993), arabidopsis (Bell & Ecker, 1994), trigo e cevada (Saghai-Maroo et al., 1994) e videira (Browers et al., 1996), entre outras.

Regiões microssatélites são constituídas de seqüências curtas de 1 a 6 nucleotídeos comumente repetidas de 10 a milhares de vezes em tandem (Gupta et al., 1996; Morchen et al., 1996 e Brown et al., 1996). As seqüências de

DNA que flanqueiam as regiões microssatélites são conservadas, o que permite a seleção de primers específicos e sua amplificação via PCR. Em estudo de bibliotecas de DNA de cinco espécies de árvores tropicais e *Zea mays* L., Condit & Hubbell (1991) observaram que os motivos AC/GT e AG/CT foram abundantes nos genomas de todas as seis espécies vegetais examinadas. Chin et al., (1996) observaram que, além do motivo (AG/CT)_n, que correspondeu a 47% dos dinucleotídeos repetidos, os motivos (CCT/GGA)_n e (CCG/GGC)_n também revelaram-se abundantes em milho. De acordo com Moore et al. (1991), Morgante & Olivieri (1993) e Wang et al. (1994) os motivos mais comumente encontrados em plantas são (AT/TA), (A/T)_n e (AG/CT)_n.

A variabilidade dos locos microssatélites provavelmente está ligada a ocorrência de crossing-over desigual (Levinson & Gutman, 1987; Strand et al., 1993 e Charlesworth et al., 1994). A variação no comprimento do produto amplificado é função do número de unidades de seqüências repetidas e pode ser utilizada para distinguir alelos de um loco. Em algumas espécies, o polimorfismo encontrado entre indivíduos dentro de populações é sete a dez vezes maior comparado a RFLPs (Wu & Tanksley, 1993).

A frequência de ocorrência de locos microssatélites em vegetais é variável. Dicotiledôneas e monocotiledôneas têm frequência de 1 loco a cada 21.000 pares de base (pb) e de 1 a cada 65.000 pb, respectivamente (Wang & Paterson, 1994). Em milho, a frequência média é de 1 loco para 50.000 pb (Morgante & Olivieri, 1993 e Chin et al., 1996). Com relação à distribuição, Wang et al. (1994) observaram que 57% dos trinucleotídeos com C-G estão

localizados em regiões codificadoras, ao passo que mono, di, tri e tetranucleotídeos contendo A-T estão localizados em regiões não codificadoras. A maioria dos motivos presentes em milho foi encontrada em bibliotecas de cDNAs, sítios de seqüências expressas (ESTs) e genes conhecidos, incluindo íntrons e seqüências flanqueadoras 5' - 3' em regiões internas ou adjacentes aos genes (Chin et al., 1996). Hoje há grande disponibilidade de seqüências de primers que amplificam microssatélites em milho (<http://www.agron.missouri.edu>) o que facilita grandemente sua utilização em trabalhos de mapeamento gênico.

2.5 Método de análise de segregantes agrupados (ASA)

Independente da aplicação dos marcadores moleculares, a análise de segregantes agrupados (ASA) pode ser adotada para agilizar e facilitar a genotipagem de uma população segregante. Trata-se de uma estratégia proposta por Arnheim et al. (1985) e modificada por Michelmore et al. (1991) que permite identificar rapidamente regiões genômicas associadas a caracteres de herança simples ou complexa. Quando a abordagem envolve uma região particular do genoma, a ASA possui várias vantagens quando comparada ao uso de linhagens quase isogênicas. A primeira refere-se a dificuldade de obtenção de linhagens isogênicas que requer muitos retrocruzamentos, recursos e tempo. Em adição a isto, a frequência de falsos positivos, isto é, marcadores aparentemente ligados, mas que na realidade segregam independentemente do

loco de interesse, também é maior no caso de linhagens quase isogênicas (Michelmore et al., 1991).

ASA consiste em cruzar dois indivíduos contrastantes para o caráter de interesse e obter gerações F_1 , F_2 e F_3 . Essas últimas têm a finalidade de identificar plantas F_2 homozigóticas e contrastantes para o caráter de interesse. O DNA das plantas homozigóticas de cada classe fenotípica é extraído e misturado com o de plantas de mesmo genótipo, obtendo assim amostras agrupadas de DNA ("bulks"). No caso de genes dominantes, podem ser constituídos dois "bulks": um constituído por indivíduos dominantes e outro por indivíduos recessivos homozigotos. Desta forma, espera-se que ocorra também homozigose para a região do DNA que flanqueia tais alelos. Nas regiões do DNA não ligadas ao gene de interesse, ocorre recombinação aleatória dos segmentos de DNA dos pais. Conseqüentemente, as duas amostras são polimórficas para as marcas ligadas ao gene de interesse e monomórficas para todas as outras regiões não ligadas. Excetuando-se a região do genoma ligada ao loco selecionado, todas as demais comportam-se como se estivessem em equilíbrio de ligação (Tingey & Tufo, 1993).

A estratégia de ASA é indicada quando se deseja uma posição aproximada do gene num mapa de ligação. Encontrando-se marcadores ligados a região de interesse por meio desta técnica, a ligação entre marcador e gene ainda deve ser confirmada por meio de análise de co-segregação para efeito de cálculo de distância genética. Uma outra limitação da técnica reside no fato de que só permite identificar marcadores ligados ao gene de interesse a uma

distância máxima de 30 cM considerando populações F_2 (Michelmore et al., 1991).

Na seleção assistida por marcadores moleculares, a ASA pode ser utilizada com marcadores que ainda não estão mapeados no genoma da espécie estudada (Michelmore et al., 1991; Barua et al., 1993; Miklas et al., 1993 e Haley et al., 1994). Há vários trabalhos na literatura envolvendo marcadores moleculares que adotaram com sucesso a estratégia de ASA para identificação de genes de resistência (Michelmore et al., 1991; Barua et al., 1993; Kesseli et al., 1993; Haley et al., 1993; Miklas et al., 1993; Zhang et al., 1994; Chagué et al., 1996; Miklas et al., 1996; Urrea et al., 1996; Chagué et al., 1997; Kasuga et al., 1997; Page et al., 1997; Malvas et al., 1999; Ogliari, 1999).

3 MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e no campo experimental da Empresa Brasileira de Sementes (EBS)/Dow Agrosience, em Cravinhos-SP.

3.1 Material Vegetal

Foram utilizadas oito linhagens de milho (L21, L22, L1, L38, L62, L2, L186 e L64), cinco híbridos simples (L21 x L186, L21 x L1, L21 x L62, L21 x L2 e L186 x L64) e indivíduos F_2 resultantes da autofecundação de L186 x L64. As referidas linhagens e híbridos foram cedidas pela Empresa Brasileira de Sementes (EBS)/Dow Agrosience para a realização desse trabalho. Os indivíduos F_2 foram obtidos na área experimental do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ-USP.

As linhagens L21, L22 e L1 são linhagens de ciclo precoce de grãos duros alaranjados, oriundas de sintético constituído de linhas tropicais com predominância de germoplasma Suwan DMR. L38, L62 e L2 são linhagens

precoces de grãos semiduros alaranjados oriundas de sintético constituído de linhas tropicais com predominância de germoplasma Amarillo Dentado. A linhagem L186 tem origem tropical, é de ciclo precoce e tem porte médio e grãos semiduros alaranjados. Foi extraída de um sintético constituído por linhagens oriundas da população Amarillo Dentado e populações "flints" do Caribe. A linhagem L64 origina-se do mesmo sintético, é de ciclo precoce e possui porte baixo e grãos semiduros alaranjados.

3.2 Obtenção dos isolados de *Colletotrichum graminicola*

C. graminicola foi isolado de acérvulos retirados de colmos de milho naturalmente infectados com sintomas típicos da doença. Pequenos fragmentos de colmo foram desinfetados superficialmente por imersão em álcool 70% por um minuto, seguido de imersão em hipoclorito de sódio a 2%, por um minuto, e rinsagem em água esterilizada. Os fragmentos de colmo foram então depositados em placas de Petri contendo meio de cultura aveia-ágar (40g de farinha de aveia, 17g de ágar, 1000mL de água), sob condições assépticas.

As placas foram mantidas em câmara de crescimento, a $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$, sob lâmpadas fluorescentes Sylvânia, luz do dia, distanciadas verticalmente 40 cm das placas de Petri, em regime de 12 horas luz/12 horas escuro. Após 7 dias, acérvulos de cada colônia foram depositados em tubos de ensaios contendo meio de cultura BDA e armazenados em temperatura ambiente. O patógeno foi transferido para novas placas a cada 30 dias. Para manutenção da

patogenicidade, os isolados foram inoculados a cada dois meses em plântulas de milho, com 4 a 5 folhas, e reisolados.

3.3 Comparação entre diferentes variáveis de avaliação da resistência à antracnose foliar

O presente ensaio objetivou avaliar a resistência de linhagens e híbridos de milho à *C. graminicola*, bem como identificar a melhor variável para diferenciar genótipos resistentes de suscetíveis. Foram utilizadas as linhagens L21, L1, L38, L62, L2 e L186 e os híbridos L21 x L186, L21 x L1, L21 x L62 e L21 x L2.

O isolado CRV (Cravinhos-SP) foi cultivado por 20 dias em meio de aveia-ágar, sob regime de alternância luminosa, a cerca de 22°C. A suspensão do inóculo foi obtida pela adição de 20 mL de água destilada às placas de Petri e raspagem superficial da cultura com escalpelo para liberação dos conídios. A suspensão de conídios foi filtrada através de uma camada dupla de gaze, a fim de separar conídios de micélio e fragmentos de meio de cultura. A padronização do inóculo foi feita com o auxílio de uma câmara de Neubauer e sua concentração final da suspensão foi ajustada para $2,0 \times 10^5$ conídios/mL. A cada 100 mL da suspensão foi adicionada uma gota de espalhante adesivo Tween 20®.

As inoculações foram feitas mediante pulverização das folhas em plantas com 5-6 folhas. Vinte e quatro horas antes da inoculação e 24 horas após, as

plantas foram acondicionadas em casa-de-vegetação sob condições de alta úmida. A avaliação dos sintomas foi feita através de escala de notas proposta por Pereira (1983) e Silva (1983) (Apêndice 1) e pela determinação do número de lesões, comprimento total de lesão, comprimento médio da lesão, área foliar lesionada e área média da lesão. Ao todo, foram realizadas cinco avaliações, aos 8, 10, 12, 14 e 16 dias após a inoculação.

Os tratamentos foram arranjos segundo o delineamento experimental inteiramente casualizado com 3 repetições. A parcela experimental foi constituída de um vaso contendo 5 plantas. As plantas foram mantidas em casa de vegetação a uma temperatura média de 24°C, sob alta umidade relativa do ar.

3.4 Patogenicidade de isolados de *Colletotrichum graminicola*

Foram utilizados dois isolados de *C. graminicola*, sendo um proveniente de colmo infectado naturalmente na região de Cravinhos – SP (CRV) e o outro da região de Cristalina – GO (CRI). Nesse estudo foram utilizadas as linhagens L21, L22, L186 e L64 e os híbridos L21 x L186 e L186 x L64. O preparo de inóculo e inoculação foram feitos de acordo com o item 3.3.

A avaliação dos sintomas foi realizada dez dias após a inoculação, através da determinação do número de lesões, comprimento total de lesão, comprimento médio da lesão, área foliar lesionada e área média da lesão.

Os tratamentos foram arranados em esquema fatorial 6 x 2, segundo o delineamento experimental em blocos ao acaso com 3 repetições. A parcela experimental foi constituída de um vaso contendo 5 plantas. As plantas foram mantidas em casa de vegetação a uma temperatura média de 30°C, sob alta umidade relativa do ar.

3.5 Determinação do método de inoculação no colmo

Nesta etapa, foram utilizadas 279 plantas da geração F₂, resultantes da autofecundação de plantas F₁ obtidas do cruzamento L186 x L64.

A inoculação no colmo foi realizada aos 58 dias da emergência, no início do florescimento, de acordo com Pereira (1983). O primeiro tratamento consistiu na inoculação através da injeção de 1 mL de suspensão de esporos (2×10^6 conídios/mL) com o auxílio de uma seringa de uso veterinário, de 50 mL, acima do primeiro internódio do colmo. Para facilitar a penetração da agulha da seringa e não ocasionar seu entupimento, realizou-se uma perfuração do tecido com o auxílio de um furador de diâmetro semelhante ao da agulha e comprimento suficiente para que os tecidos internos do colmo não fossem danificados antes da injeção. O segundo tratamento consistiu na inoculação através da introdução de um palito envolto na massa mucilaginosa de esporos de *C. graminicola* acima do primeiro internódio do colmo de milho.

A avaliação dos sintomas foi feita através da medição do comprimento da área lesionada do colmo 30 dias após a inoculação.

3.6 Herança da resistência em milho à antracnose

3.6.1 Antracnose foliar

Neste experimento, realizado em 1997 e 1998, foram avaliadas progênies F_2 obtidas a partir da autofecundação do híbrido simples selecionado no item 3.3, a partir de linhagens genitoras com extremos de resistência. Estas progênies foram avaliadas quanto à doença foliar em casa de vegetação (1997) e campo (safra 98/99). Plantas da geração F_1 e as linhagens genitoras foram utilizadas como controle.

As plantas foram inoculadas com suspensões de conídios (2×10^5 conídios/mL) obtidas de culturas puras do isolado CRI com 20 dias de idade em meio de cultura aveia-água (40g de aveia, 17g de água, 1000mL de água destilada), ajustadas à concentração de cerca de 2×10^5 conídios/mL. A cada 100 mL da suspensão foi adicionada uma gota de espalhante adesivo Tween 80®.

Em casa de vegetação, a inoculação foi realizada mediante pulverização das folhas em plantas com 30 dias (cinco folhas). Esse experimento foi repetido três vezes, com 264, 308 e 248 plantas F_2 . Em condições de campo, foram realizadas três inoculações, aos 20, 27 e 34 dias após a emergência em 209 plantas da geração F_2 . A avaliação dos sintomas foi feita mediante determinação de presença ou ausência de sintomas nas plantas. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. O teste qui-quadrado foi utilizado para determinar o

número de genes envolvidos na resistência, bem como o efeito gênico dos mesmos, com base nas frequências observadas e esperadas de plantas resistentes e suscetíveis.

3.6.2 Antracnose do colmo

Para estudar a resistência do milho à podridão do colmo 209 plantas da geração F_2 derivadas do híbrido L186 X L64 foram avaliadas sob condições de campo. Plantas das linhagens genitoras e híbridas foram utilizadas como controle. O ensaio foi conduzido em Cravinhos-SP na safra 1998/1999. Estas mesmas plantas foram avaliadas para a antracnose foliar possibilitando verificar a existência de ligação entre os genes envolvidos na resistência a antracnose foliar e do colmo (item 3.6.3).

A inoculação no colmo foi realizada aos 58 dias da emergência, 15 dias antes do florescimento, mediante injeção de 1 mL de suspensão (2×10^6 conídios do isolado CRI/mL) no primeiro internódio. A suspensão de conídios foi preparada conforme item 3.2.

A avaliação dos sintomas foi feita através da medição da secção lesionada do colmo, 40 dias após a inoculação. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. O teste qui-quadrado foi utilizado para determinar do número de genes envolvidos na resistência, bem como o efeito gênico, com base nas frequências observadas e esperadas de plantas resistentes e suscetíveis.

3.6.3 Ligação entre genes de resistência à antracnose foliar e podridão do colmo

A inoculação de folhas e colmos em plantas F₂ no experimento de campo realizado na safra 1998/1999 possibilitou verificar a existência de ligação entre os genes envolvidos na resistência à antracnose foliar e do colmo por meio do teste qui-quadrado.

3.7 Penetração de *Colletotrichum graminicola* em genótipos resistente e suscetível

No presente estudo, foi realizada a visualização, em microscópio eletrônico de varredura, de amostras de folhas de milho 5, 10 e 15 horas após a inoculação, visando acompanhar o processo de penetração em material resistente (L64 e L186 x L64) e suscetível (L186).

A inoculação foi feita com uma microcâmara úmida modificada de Bergstrom e Nicholson (1983), onde duas placas de acrílico transparente foram acopladas à folha de milho com o auxílio de prendedores. A placa superior (10 cm de comprimento x 6 cm de largura x 3 mm de profundidade) possui doze perfurações circulares com 3mm de largura e 3mm de profundidade. Antes da junção das placas à folha, uma espuma com cerca de 3 mm foi adicionada à placa inferior. Após a inoculação com 50 µL de uma suspensão de conídios a

uma concentração de 2×10^6 conídios/mL, as perfurações foram fechadas com o auxílio de uma fita adesiva transparente até a coleta da amostra.

As amostras foram preparadas segundo protocolo padrão do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica aplicada à Pesquisa Agropecuária (NAP/MEPA) da ESALQ – USP. Amostras com cerca de 5 x 3 mm foram fixadas com aldeído (Fixador Karnovsky modificado – glutaraldeído 2,5%, formaldeído 2,5%, em tampão cacodilato de sódio 0,05M, pH 7,2), à temperatura ambiente, por 7 dias. O volume do fixador foi cerca de 10 X o volume das amostras. As amostras foram pós-fixadas com tetróxido de ósmio (OsO_4) por meio de três lavagens com cerca de 10 minutos cada, em tampão cacodilato 0,05M e imersão em uma solução 1% de tetróxido de ósmio (diluído em tampão cacodilato 0,1M, pH 7,2), por uma hora, à temperatura ambiente, em uma capela de exaustão. Logo após a fixação em OsO_4 , as amostras foram lavadas em água destilada e desidratadas em soluções de concentrações crescentes de acetona (30, 50, 70, 90 e 100%), permanecendo cerca de 10 minutos em cada solução. As amostras foram lavadas três vezes na solução de acetona 100%. Em seguida, as amostras foram colocadas em gaiolas individuais, as quais foram submetidas à secagem ao ponto crítico com lavagens sucessivas de gás carbônico em aparelho Balzers® CPD 050, e metalizadas com ouro no metalizador da Balzers® MED 010. Logo após a metalização, as amostras foram visualizadas no microscópio eletrônico de varredura Zeiss® DMS 900.

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial, com três níveis do fator material e três níveis do fator período de

inoculação, perfazendo um de 9 tratamentos. Cada repetição consistiu de 26 campos visualizados ao acaso. A avaliação foi realizada através da contagem do número de apressórios germinados em 26 campos ao acaso nos diferentes tratamentos.

3.8 Localização dos genes de resistência à antracnose foliar e do colmo

3.8.1 Material Vegetal

Nesta etapa foram utilizadas duas linhagens de milho, L186 e L64, seu híbrido simples e a população segregante F_2 oriunda da autofecundação do híbrido. O DNA utilizado foi obtido de plantas avaliadas no experimento de avaliação da resistência a antracnose foliar realizado no ano de 1997 (item 3.6.1) e de avaliação da resistência à podridão do colmo realizado na safra 1998/1999 (item 3.6.2).

3.8.2 Extração de DNA vegetal

A extração de DNA foi realizada com base no protocolo descrito por Hoisington et al. (1994). Foram utilizadas aproximadamente 5g de folhas de milho, previamente coletadas, mantidas em ultrafreezer (-80°C), e maceradas em cadinho com auxílio de um bastão de porcelana na presença do nitrogênio líquido. Cada amostra foi colocada em tubos de propileno de 50 mL e

ressuspensa em 10 mL de tampão de extração CTAB 1x (NaCl, 70 μ M; EDTA, 50 μ M, pH 8,0; tris-HCl, 100 μ M, pH 7,5; hexadecil-trimetilamônio de bromida, 1% p/v; β -mercapto-etanol, 140 μ M), previamente aquecido a 65°C. A seguir as amostras foram incubadas em banho-maria, a 65°C, por 90 minutos, sendo gentilmente invertidas a cada 10 minutos.

Após a remoção dos tubos do banho quente, os mesmos foram invertidos gentilmente por várias vezes e, então, adicionados de igual volume de clorofórmio-álcool isoamílico (CIA) na proporção de 24:1 (v:v) efetuando-se nova inversão, seguida de centrifugação por 10 minutos a 3400 rpm (tubos de 50 mL) ou 5 minutos a 11000 rpm (tubos de 1,5mL). Após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido para novos tubos e foi feita nova extração com CIA 24:1, nas mesmas condições descritas anteriormente.

O sobrenadante foi cuidadosamente transferido para novos tubos, aos quais foram adicionados igual volume de álcool etílico absoluto resfriado a -20°C. Após inversão dos tubos por várias vezes, os mesmos foram submetidos à centrifugação seguindo as condições anteriores para precipitação do DNA.

Em seguida, o precipitado de DNA foi lavado em álcool etílico 75%, por 2 minutos; álcool etílico 90%, por 2 minutos; e álcool etílico absoluto, por 2 minutos. Após secagem a temperatura ambiente, o DNA foi ressuspensa em 500 μ L ou 200 μ L de tampão (TE) (tris-HCl, 10 μ M, pH 8,0 e EDTA, 1 μ M, pH 8,0). Após 12 horas, o DNA ressuspensa foi incubado por duas horas em RNase (1 μ g/200 μ L de suspensão) a 37°C. Em seguida, a suspensão de DNA foi armazenada a 4°C até o momento do uso.

3.8.3 Amplificação de locos microssatélites

Locos microssatélites foram amplificados por PCR em um termociclador MJ Research® PTC-200 (MJ Research, Alameda, CA, EUA). Dois protocolos foram utilizados na amplificação das regiões microssatélites: o protocolo otimizado por Ogliari et al. (2000) e o desenvolvido por Senior et al. (1996), com algumas adaptações.

No protocolo otimizado por Ogliari et al. (2000) as reações foram constituídas de 10 ng de DNA molde; 0,1 mM de cada dNTPs (desoxinucleosídeostri-fosfato); 1 U de Taq polimerase (Promega); 1 x tampão de reação (KCl, 50 mM; Tris-HCl, 10 mM, pH 9,0; e Triton X – 100, 0,1%); MgCl₂, 2,5 mM e concentrações de 0,165 µM a 1,0 µM de cada par de “primers” (Maize MapPairs™; Research Genetics) em um volume final de 30 µL. Antes de iniciar a reação, adicionou-se cerca de 50 µL de óleo mineral sobre cada reação. Os programas de termociclagem incluíram uma desnaturação de um minuto a 94°C, anelamento de um minuto a uma dada temperatura e uma extensão de dois minutos a 72°C. Ao todo foram utilizados oito programas anteriormente descritos por Ogliari et al. (2000).

Para o segundo protocolo utilizado (Senior et al., 1996) foram empregados 40 ng de DNA molde; 0,1 mM de cada dNTPs (desoxinucleosídeostri-fosfato); 0,7 U de Taq polimerase (Promega); 1 x tampão de reação (KCl, 50 mM; Tris-HCl, 10 mM, pH 9,0; e Triton X – 100, 0,1%); MgCl₂, 2,5 mM e concentração de 0,35 µM de cada par de “primers” (Maize

MapPairs™; Research Genetics), em um volume final de 20 µL. Antes de dar início à reação adicionou-se cerca de 50 µL de óleo mineral sobre cada reação. Para amplificação de cada loco estudado foi utilizado apenas o programa 1, descrito por Ogliari et al. (2000).

Locos microssatélites amplificados foram resolvidos em gel de agarose na concentração de 3,5%, preparado com tampão TBE 1x (Tris-borato, 0,09M; EDTA, 2,0mM) e previamente corado através de imersão em bandeja com solução de brometo de etídio na concentração de 5µg/mL de solução por 30 segundos. Foram utilizados 20 µL de cada reação acrescida de 3 µL de tampão de carregamento (azul de bromofenol, 0,25%; sacarose, 40%) para cada corrida. Como padrão de pesos moleculares foi utilizado 0,5 µg de DNA padrão 100 pb (GibcoBRL®), juntamente com 2 µL de tampão de carregamento e 8µL de água destilada deionizada esterilizada.

A eletroforese foi realizada em tampão TBE 1x a uma voltagem constante de 11V/cm, durante um período de 1 a 2 horas, dependendo da separação dos fragmentos. A visualização do gel foi feita em luz ultravioleta, com o auxílio de um transiluminador UV e registrada através do aparelho Pharmacia Biotech® Image Master VDS (Pharmacia Biotech, San Francisco, CA, EUA).

3.8.4. Análise de segregantes agrupados

Para análise dos segregantes agrupados foram utilizadas alíquotas iguais do DNA de 10 indivíduos de cada uma das classes fenotípicas (resistente e

suscetível) para compor os 'bulks'. A classe fenotípica resistente englobou plantas heterozigotas e homozigotas e a classe suscetível, plantas homozigotas para os genes estudados em ambas as resistências (colmo e folha).

Ao todo foram utilizados 171 primers que amplificam regiões microssatélites em milho (Research Genetics, Missouri, EUA).

Os protocolos utilizados para amplificação dos primers microssatélites foram descritos no item 3.8.3.

3.8.5. Análise da segregação de locos microssatélites em indivíduos suscetíveis da população F_2

Locos microssatélites que revelaram polimorfismo entre as linhagens genitoras resistente e suscetível, bem como aqueles próximos a estas regiões, foram utilizados para genotipar os indivíduos suscetíveis recessivos para efeito de cálculo da distância entre locos marcadores e o gene estudado.

Os protocolos de amplificação dos locos microssatélites encontram-se descritos no item 3.8.3.

A distância entre marcadores e genes de resistência foi estimada usando o programa MAPMAKER versão 3.0 (Lander et al., 1987) com um LOD score > 2. As frações de recombinação foram transformadas pelo método Kosambi (Kosambi, 1944).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Comparação entre diferentes variáveis para avaliação da resistência à antracnose foliar

Os resultados obtidos nesse experimento são apresentados nas Tabelas 1 a 6, e as análises de variância no Apêndice 2. Verificou-se variabilidade entre genótipos, independente da variável avaliada, em condições de casa de vegetação.

Considerando-se as variáveis avaliadas, aos oito dias da inoculação, não foi possível diferenciar materiais entre resistentes e suscetíveis (Tabelas 1 a 5). No entanto, a partir de 10 dias após a inoculação, as variáveis já permitiram tal discriminação.

Para a variável número de lesões (NL), 10 dias após a inoculação, as linhagens L21 e L186 apresentaram maior suscetibilidade, e as linhagens L62, L2 e os híbridos L21 X L1 e L21 x L2 não apresentaram lesões. Aos 14 dias após a inoculação o número de lesões decresceu devido a coalescência das mesmas (Tabela1).

Para área total de lesões/planta (ATL), 10 dias após a inoculação, as

linhagens L38 (testemunha suscetível) L186, L21 e L1 e o híbrido L21 x L186 apresentaram maior área lesionada/planta, ao passo que o híbrido L21 x L62 mostrou-se intermediário (Tabela 2).

A área média por lesão (AML), aos 10 dias após a inoculação, foi maior nas linhagens L1 e L38, sendo que aos 14 dias da inoculação as linhagens L1, L38, L186, L21 e o híbrido L21 x L186 não diferiram quanto a essa variável. Aos 12 dias L38 apresentou maior área, enquanto que aos 16 dias L1 mostrou maior área média/lesão (Tabela 3).

As linhagens L186, L21, L38, L1 e o híbrido L21 x L186, entre os 10 e 14 dias da inoculação, apresentaram maior comprimento total de lesões/planta (CTL), o híbrido L21 x L62 apresentou menor comprimento de lesão (Tabela 4).

Entre os 10 e 14 dias após a inoculação, o comprimento médio de lesões (CML) foi maior para os seguintes materiais: L1, L38, L186, L21 x L186 e L21, sendo que aos 16 dias após a inoculação a linhagem L38 apresentou maior comprimento médio de lesões (Tabela 5).

Empregando-se a escala de notas utilizadas por Silva (1983) e Pereira (1983), aos 14 dias após a inoculação, os materiais L62, L2, L21 x L1, L21 x L62 e L21 X L2 mostraram-se altamente resistentes (AR), L21 e L21 x L186, resistentes (R) a medianamente resistentes (MR), L1 medianamente resistente, L186 suscetível (S) a altamente suscetível (AS), e L38 altamente suscetível (Tabela 6). De acordo com os resultados verificados por Pereira (1983), aos 14 dias da inoculação, o tamanho médio das dez maiores lesões é uma variável

Tabela 1. Número de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.

Tratamento	Período após a inoculação (dias)				
	8	10	12	14	16
L21	8,6 a	25,2 a	21,7 a	16,5 a	11,5 a
L186	0,0 a	14,4 ab	15,7 a	9,1 a	11,5 a
L21 X L186	7,0 a	7,0 bc	10,3 a	2,9 bc	6,2 ab
L1	0,0 a	4,3 bcd	6,4 ab	4,2 b	4,1 ab
L38	11,6 a	7,2 bc	7,8 ab	8,8 ab	4,0 ab
L21 X L62	2,6 a	0,6 cd	0,8 b	0,8 c	1,1 ab
L62	0,0 a	0,0 d	0,0 b	0,0 c	0,0 b
L2	0,0 a	0,0 d	0,0 b	0,0 c	0,0 b
L21 X L1	0,0 a	0,0 d	0,0 b	0,0 c	0,0 b
L21 X L2	0,0 a	0,0 d	0,0 b	0,0 c	0,0 b

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2. Área total de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.

Tratamento	Período após a inoculação (dias)				
	8	10	12	14	16
L38	4,3 a	31,0 a	37,3 a	16,5 a	103,5 a
L186	0,0 a	18,9 a	40,2 a	9,1 a	99,3 a
L21	2,6 a	16,5 a	24,4 a	2,9 a	63,6 a
L1	0 a	13,2 a	18,6 a	4,2 a	54,7 a
L21 X L186	2,6 a	9,2 ab	17,0 ab	8,8 ab	25,0 a
L21 X L62	1,0 a	0,4 bc	0,5 b	0,8 b	1,7 ab
L62	0,0 a	0,0 c	0,0 b	0,0 b	0,0 b
L2	0,0 a	0,0 c	0,0 b	0,0 b	0,0 b
L21 X L1	0,0 a	0,0 c	0,0 b	0,0 b	0,0 b
L21 X L2	0,0 a	0,0 c	0,0 b	0,0 b	0,0 b

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 3. Área média de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.

Tratamento	Período após a inoculação (dias)				
	8	10	12	14	16
L1	0,0 a	3,8 a	2,8 ab	8,6 a	27,2 a
L38	0,1 a	4,4 a	7,1 a	5,5 a	14,3 a
L186	0,0 a	1,2 ab	2,8 ab	7,3 a	8,1 a
L21 X L186	0,1 a	1,6 ab	2,1 b	5,2 ab	4,5 a
L21	0,1 a	0,6 abc	1,1 bc	2,9 a	6,0 a
L21 X L62	0,1 a	0,0 bc	0,0 cd	0,1 b	0,1 ab
L62	0,0 a	0,0 c	0,0 d	0,0 b	0,0 b
L2	0,0 a	0,0 c	0,0 d	0,0 b	0,0 b
L21 X L1	0,0 a	0,0 c	0,0 d	0,0 b	0,0 b
L21 X L2	0,0 a	0,0 c	0,0 d	0,0 b	0,0 b

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 4. Comprimento total de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.

Tratamento	Período após a inoculação (dias)				
	8	10	12	14	16
L38	4,6 a	34,3 a	14,6 ab	62,9 a	44,1 a
L186	0,0 a	27,5 a	41,9 a	56,7 a	81,9 a
L21	2,6 a	21,0 a	21,5 a	36,0 a	44,8 a
L1	0,0 a	12,1 a	20,9 ab	28,7 a	39,3 a
L21 X L186	2,3 a	16,8 a	23,2 ab	30,4 a	37,3 a
L21 X L62	1,0 a	0,4 b	0,5 bc	0,8 b	2,5 b
L62	0,0 a	0,0 b	0,0 c	0,0 b	0,0 b
L2	0,0 a	0,0 b	0,0 c	0,0 b	0,0 b
L21 X L1	0,0 a	0,0 b	0,0 c	0,0 b	0,0 b
L21 X L2	0,0 a	0,0 b	0,0 c	0,0 b	0,0 b

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 5. Comprimento médio de lesões de antracnose foliar em cinco períodos após a inoculação, em condições de casa de vegetação.

Tratamento	Período após a inoculação (dias)				
	8	10	12	14	16
L1	0,0 a	3,1 ab	3,2 a	6,8 a	11,5 a
L38	0,1 a	4,8 a	3,4 a	4,9 a	7,5 a
L186	0,0 a	1,8 ab	2,9 a	6,1 a	6,9 a
L21 X L186	2,3 a	3,0 ab	2,7 a	5,1 a	6,1 a
L21	0,1 a	0,8 bc	1,0 ab	2,3 ab	4,3 ab
L21 X L62	0,1 a	0,0 c	0,0 bc	0,1 b	0,2 b
L62	0,0 a	0,0 c	0,0 c	0,0 b	0,0 b
L2	0,0 a	0,0 c	0,0 c	0,0 b	0,0 b
L21 X L1	0,0 a	0,0 c	0,0 c	0,0 b	0,0 b
L21 X L2	0,0 a	0,0 c	0,0 c	0,0 b	0,0 b

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 6. Nota para tipo de lesão de antracnose foliar em condições de casa de vegetação.

Material	Nota para tipo de lesão	Classificação*
L38	6,0 a	AS
L186	5,3 a	S a AS
L1	3,0 b	MR
L21 X L186	2,6 b	R a MR
L21	2,3 b	R a MR
L62	1,0 c	AR
L2	1,0 c	AR
L21 X L1	1,0 c	AR
L21 X L62	1,0 c	AR
L21 X L2	1,0 c	AR

* AS - altamente suscetível; S - suscetível; MR - medianamente resistente; R - resistente; AR - altamente resistente.

relacionadas com a severidade determinada através da escala de notas utilizada. Segundo o autor, plantas classificadas em MS a AS apresentam lesões maiores, plantas R a MR, lesões de tamanho médio e plantas AR, lesões menores. Nesse trabalho, o tamanho médio de lesões permitiu maior relacionamento com a classificação baseada em nota, provavelmente por terem sido consideradas apenas as dez maiores lesões para obtenção do tamanho médio de lesões, procedimento adotado também por Nicholson & Warren (1976) e Hooker (1976).

As linhagens suscetíveis (S a AS) não apresentaram comprimento médio de lesão ou área média de lesão maiores que as linhagens classificadas como MR ou R, em nenhuma das épocas avaliadas. No entanto, os valores médios

da área total de lesões nas linhagens suscetíveis foram superiores, a partir dos dez dias da inoculação, aos demais materiais, diferindo estatisticamente dos materiais AR.

As linhagens suscetíveis (S a AS) não apresentaram tamanhos médios de lesão ou área média de lesão maiores que as linhagens classificadas como MR ou R, em nenhuma das épocas avaliadas. No entanto, os valores médios da área total de lesões nas linhagens suscetíveis foram superiores, a partir dos dez dias da inoculação, aos demais materiais, diferindo estatisticamente dos materiais AR.

Quanto ao comprimento total de lesões, aos 14 dias após a inoculação, as linhagens suscetíveis apresentaram valores médios maiores que as linhagens resistentes, diferindo estatisticamente dos materiais AR.

As Tabelas 7 a 9 apresentam uma análise de correlação entre as variáveis avaliadas aos 10, 12, 14 e 16 dias após a inoculação. Nos diferentes períodos de avaliação as variáveis CTL e ATL mostraram-se estatisticamente correlacionadas. Aos 14 dias da inoculação verificou-se que essas variáveis também mostraram-se altamente correlacionadas com a variável nota, baseada no tipo de lesão, apesar de que a variável nota permitiu uma distribuição dos materiais em um maior número de classes, distintas estatisticamente (Tabela 6). Ressalta-se que o comprimento de lesões é influenciado pela luminosidade a que a folha está exposta, diferente do tipo de lesão que não sofre influência de luminosidade. De acordo com Hammerschmidt & Nicholson (1977), plantas expostas a uma maior luminosidade apresentam lesões menores. Desta forma,

há uma variação maior no comprimento de lesões, entre plantas do mesmo material, devido à disposição das plantas nas bancadas da casa de vegetação, favorecendo ou não a entrada de luz, dependendo do porte da planta que está próxima. Uma opção para minimizar esta influência seria a condução do experimento em uma área maior, a fim de que as plantas não sombreiem umas as outras. As variáveis CML e AML mostraram-se bastante correlacionadas e permitiram o mesmo agrupamento dos materiais, porém não permitiram a mesma distinção entre os materiais S e R como verificado nas demais avaliações. Quanto ao número de lesões, apesar de ter apresentado correlação com as variáveis CTL e ATL aos 10 e 12 dias após a inoculação, esta não constitui-se em uma boa variável, uma vez que tende a decrescer em material suscetível com o desenvolvimento da doença, devido a coalescência das lesões (Tabela 1).

4.2 Patogenicidade de isolados de *Colletotrichum graminicola*

Não verificou-se interação significativa entre o fator material genético e o fator isolados, em todas as variáveis utilizadas, indicando a não distinção de isolados em raças considerando o material genético (Apêndice 3). Os isolados testados não apresentaram variações em agressividade (Apêndice 3). Entretanto, plantas inoculadas com o isolado CRI apresentaram sintomas da doença cerca de quatro dias mais cedo que as plantas inoculadas com o isolado CRV. Os resultados obtidos corroboram com os verificados por Nicholson & Warren

Tabela 7. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 10 dias da inoculação.

Variável	CTL	ATL	CML	AML	NL
CTL		0,97*	0,82*	0,72*	0,70*
ATL	0,97*		0,85*	0,82*	0,63*
CML	0,82*	0,85*		0,95*	0,28
AML	0,72*	0,82*	0,95*		0,21
NL	0,70*	0,63*	0,28	0,21	

*As correlações marcadas são significativas a $p < 0,05$ pelo teste de Pearson.

Tabela 8. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 12 dias da inoculação.

Variável	CTL	ATL	CML	AML	NL
CTL		0,88*	0,80*	0,53	0,84*
ATL	0,88*		0,86*	0,83*	0,79*
CML	0,80*	0,86*		0,86*	0,55
AML	0,53*	0,83*	0,86*		0,40
NL	0,84*	0,79*	0,55	0,40	

*As correlações marcadas são significativas a $p < 0,05$ pelo teste de Pearson.

Tabela 9. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 14 dias da inoculação.

Variável	CTL	ATL	CML	AML	NL	NOTA
CTL		0,91*	0,84*	0,83*	0,77*	0,97*
ATL	0,91*		0,76*	0,71*	0,50	0,93*
CML	0,84*	0,76*		1,00*	0,51	0,81*
AML	0,83*	0,71*	1,00*		0,52	0,80*
NL	0,77*	0,50	0,51	0,52		0,61
NOTA	0,97*	0,93*	0,81*	0,80*	0,61	

*As correlações marcadas são significativas a $p < 0,05$ pelo teste de Pearson.

Tabela 10. Correlações entre as variáveis de severidade de antracnose foliar, comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas aos 16 dias da inoculação.

Variável	CTL	ATL	CML	AML	NL
CTL		0,91*	0,79*	0,57	0,91*
ATL	0,91*		0,78*	0,64*	0,76*
CML	0,79*	0,78*		0,93*	0,60
AML	0,57	0,64*	0,93*		0,35
NL	0,91*	0,76*	0,60	0,35	

*As correlações marcadas são significativas a $p < 0,05$ pelo teste de Pearson.

(1981), Jenns et al. (1982), White et al. (1987) e Carson (1999), os quais também não constatarem evidência da existência de raças virulentas de *C. graminicola* em milho.

A Tabela 11 apresenta a classificação do material estudado quanto à resistência à antracnose foliar, para as variáveis mencionadas acima. Para os parâmetros NL, AML e CML, a linhagem L186 foi mais suscetível que a linhagem L21, e a linhagem L64, juntamente com o híbrido L186 x L64, não apresentou lesões. Considerando CTL, os materiais L186, L21 x L186, L22 e L21 foram semelhantes quanto à suscetibilidade à antracnose foliar. Entretanto, para a ATL, a linhagem L186 foi mais suscetível que as demais (Tabela 11).

Tabela 11. Comportamento médio de genótipos de milho frente a dois isolados de *Colletotrichum graminicola* para as variáveis de severidade de antracnose foliar comprimento e área total lesionada (CTL e ATL), comprimento e área média da lesão (CML e AML) e número de lesões (NL) avaliadas 14 dias após a inoculação.

GENÓTIPO	CTL		ATL		CML		AML		NL	
L186	146,4	a	406,2	a	36,3	a	83,0	a	34,9	a
L21 X L186	110,7	a	183,7	b	25,5	ab	48,7	ab	26,0	ab
L22	78,6	a	119,5	b	16,3	ab	33,5	ab	17,4	ab
L21	53,4	a	71,1	b	11,2	b	20,3	b	13,8	b
L64	0,0	b	0,0	c	0,0	c	0,0	c	0,0	c
L186 X L64	0,0	b	0,0	c	0,0	c	0,0	c	0,0	c

* Médias na vertical seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan, ao nível de 1% de significância.

4.3 Determinação do método de inoculação no colmo

Ambos os métodos avaliados para inoculação no colmo foram eficientes. Entretanto, utilizando-se o método de injeção, obteve-se uma maior dispersão dos valores de comprimento de lesão (cm), em relação ao método do palito, que mesmo apresentando o mesmo número de plantas doentes, no geral, resultou no menor desenvolvimento das lesões (Figura 1). Esta maior dispersão de valores possibilita uma maior distinção entre os materiais avaliados e, portanto, facilita a identificação dos extremos de manifestação de resistência. Essa maior dispersão também pode ser verificada pela maior variância (Tabela 12).

O método de inoculação por injeção de suspensão de inóculo no primeiro internódio vem sendo utilizado em avaliações em estudos e programas de melhoramento de milho, obtendo-se bons resultados (Hooker, 1976, White et al., 1979; Carson e Hooker, 1981b; Pereira, 1983).

4.4 Herança da resistência em milho à antracnose

4.4.1 Antracnose Foliar

No estudo da herança da resistência à antracnose foliar causada pelo fungo *C. graminicola*, o critério de avaliação foi presença ou ausência de sintomas da doença. Nos três ensaios realizados em casa de vegetação e no

Figura 1. Comprimento de lesões no colmo (cm) em plantas F_2 , oriundas do híbrido L186 x L64, após 30 dias da inoculação com *Colletotrichum graminicola* pelos métodos do palito e injeção.

Tabela 12. Média e variância do comprimento de lesão aos 30 dias após inoculação no colmo avaliado em plantas F_2 oriundas do híbrido L186 x L64.

Método de inoculação	Média (cm)	Variância
PALITO	3,69	21,80
INJEÇÃO	9,89	67,03

ensaio de campo, a linhagem genitora L 186 comportou-se como suscetível, enquanto a linhagem L64 e o híbrido L186 x L64 mostraram-se resistentes.

Em condições de casa de vegetação, 229, 196 e 188 plantas, correspondendo a cerca de 3/4 das plantas, não apresentaram lesões características da doença, respectivamente nos ensaios 1,2 e 3. Assim, cerca de 1/4 dessas plantas apresentaram o fenótipo suscetível (Figura 2). Empregando-se a frequência observada de plantas com e sem lesão, obteve-se diferença não significativa em relação à frequência esperada no caso de herança monogênica com dominância completa para o alelo que confere resistência. Resultados semelhantes foram obtidos em condições de campo, cuja frequência observada também correspondeu a segregação esperada em caso de herança monogênica, com dominância completa para o alelo que confere resistência (Tabela 13).

Lim & White (1978) e Carson e Hooker (1981b), estudando a resistência a antracnose foliar causada pelo referido patógeno, relataram que essa resistência envolve poucos genes, sendo os efeitos aditivos mais importantes do que os dominantes. Pereira (1983) estimou que 1 a 4 genes estariam envolvidos na resistência de milho à infecção do limbo foliar. Adicionalmente, detectou que genes com efeitos dominantes e aditivos estariam envolvidos na resistência. Badu-Apraku et al. (1987b) identificaram um gene de grande efeito controlando a resistência à antracnose foliar. No entanto, este é o primeiro relato, no Brasil, de um monogene com dominância completa para o alelo que confere resistência em que há ausência de sintomas no genótipo resistente.

Figura 2. Sintoma típico de antracnose foliar causada por *Colletotrichum graminicola*.

Tabela 13. Número de plantas F₂ resistentes (R) e suscetíveis (S) à antracnose foliar avaliadas em três experimentos em casa de vegetação (CV) e um experimento em campo (campo).

Experimento	S	R	χ^2	p<
1/CV _(D.F.=1)	229* ¹ (228)* ²	75 (76)	0,01	0,92
2/CV _(D.F.=1)	196 (198)	68 (66)	0,04	0,84
3/CV _(D.F.=1)	188 (186)	60 (62)	0,04	0,83
4/Campo _(D.F.=1)	148 (157)	61 (53)	0,82	0,36
Total χ^2 _(D.F.=4)				0,91
χ^2 _{(pool)(D.F.=1)}	761 (769)	264 (257)	0,14	
Heterogeneidade χ^2 _(D.F.=5)			1,05 ^{n.s.}	

$\chi^2_{0,05;1}=3,84$; $\chi^2_{0,05;4}=9,49$; $\chi^2_{0,05;5}=11,07$;

*¹freqüência observada;

*²freqüência esperada para segregação de um gene com dominância para o alelo resistente;

^{n.s.} não significativo

4.4.2 Antracnose do colmo

Ao contrário dos trabalhos sobre avaliação de podridão do colmo, onde avalia-se de maneira indireta a podridão do colmo através de uma escala baseada na área lesionada (Hooker, 1976; Carson & Hooker, 1981b; Pereira, 1983, Silva, 1983), neste trabalho optou-se pela determinação direta da área lesionada (comprimento x largura da lesão), visto que essa medida é mais precisa.

Estudando a resistência do milho a podridão do colmo causada por *C. graminicola*, Pereira (1983) utilizou como variáveis a % de tecido de colmo afetado e o número de internódios com mais de 50% da área afetada. O autor verificou alta correlação ($r=0,985$) entre essas variáveis e ambas permitiram distinguir os genótipos quanto à intensidade da manifestação da doença.

Hooker (1976) avaliou o número total de internódios afetados, o número de internódios com mais de 50% de área afetada, o número de internódios com mais de 75% de área afetada, o grau e tipo de podridão no internódio inoculado e o número de plantas com morte prematura. O autor verificou que todas as variáveis mostraram correlação entre si. Carson e Hooker (1981b) avaliaram a podridão do colmo através de uma escala baseada no desenvolvimento da doença e severidade nos seis primeiros internódios a partir do primeiro internódio inoculado. A avaliação de uma planta individual é realizada através da determinação do número de internódios com mais de 75% de podridão somado ao número de internódios com podridão.

Neste ensaio foram consideradas resistentes plantas com área lesionada dentro do padrão apresentado pela linhagem genitora L64 e suscetíveis aquelas que apresentaram mesmo padrão que a linhagem genitora L186 (Figura 3). Foi considerado padrão de resistência plantas apresentando lesões com área menor que 24 cm², não ultrapassando o primeiro internódio acima do ponto de inoculação. Empregando-se esses padrões, o híbrido L186 x L64 apresentou resistência à podridão do colmo bem como, cerca de 3/4 das plantas F₂.

Analisando-se a frequência observada (Tabela 14), esta correspondeu a uma segregação esperada em herança monogênica com dominância completa para o alelo de resistência. O híbrido apresentou o mesmo padrão de resistência que o genitor L64 (Figura 3), o que confirma esta hipótese. Sugere-se que o gene encontrado receba a denominação de *RCG2*. Resultados semelhantes de resistência monogênica à antracnose do colmo também foram relatados por Badu-Apraku et al. (1987a). Neste trabalho, no entanto, os autores utilizaram a mesma escala de notas usada por Carson & Hooker (1981b), a qual tem relação indireta com a área lesionada (comprimento x largura de lesão). Por outro lado, também obtiveram resultados indicativos da presença de poligenes, com predominância de efeitos aditivos ao analisarem outros genótipos (Badu-Apraku et al., 1987c).

4.4.3 Ligação entre genes de resistência à antracnose foliar e do colmo

Figura 3. Reações das linhagens L64, L186 e do híbrido L186 x L64 a *Colletotrichum graminicola* aos 30 dias após a inoculação.

Tabela 14. Número de plantas F₂ resistentes (R) e suscetíveis (S) à antracnose do colmo.

Experimento	Plantas resistentes	Plantas suscetíveis	Total de Plantas	χ^2	p<
Podridão do colmo (D.F.=1)	135*	66*	201	2,66	0,10
	(153)**	(51)**			
$\chi^2_{0,05;1}=3,84$					
* Frequência observada					
** Frequência esperada para segregação de um gene com dominância para o alelo resistente					

A análise das frequências de plantas F₂ resistentes e suscetíveis à podridão do colmo e antracnose foliar por meio de teste qui-quadrado indicou segregação independente ($p < 0,01$) destes dois genes (Tabela 15). Portanto, descarta-se a possibilidade de ligação. Os resultados obtidos estão de acordo com os encontrados nos trabalhos realizados por Hooker (1976), Lim & White (1978), Zuber et al. (1981) e Pereira (1983), nos quais não foram verificadas correlações entre resistência à antracnose foliar e do colmo, o que indica a existência de sistemas genéticos diferentes controlando estes dois tipos de infecção.

4.5 Penetração de *Colletotrichum graminicola* em genótipos resistente e suscetível

Tabela 15. Frequências observadas e esperadas de plantas F₂ suscetíveis (S) e resistentes (R) à antracnose foliar (AF) e podridão do colmo (PC).

Classes	Frequência observada	Frequência esperada*	p<
R à PC e AF	98	117,5	0,02
R à PC e S à AF	37	39,2	
S à PC e R à AF	46	39,2	
S à PC e AF	21	13,1	
Total de plantas	209		

$$\chi^2=9,30$$

* Frequências esperadas no caso de ligação gênica entre dois genes com dominância completa para o alelo de resistência.

A visualização do tecido foliar de milho inoculado com *C. graminicola*, ao microscópio eletrônico de varredura, indicou que os esporos já estavam aderidos à superfície da folha 5 horas após a inoculação. Os apressórios germinaram cerca de 10 horas após a inoculação. A percentagem de apressórios germinados foi maior na linhagem suscetível L186 que na linhagem resistente L64 e híbrido L186 x L64 (Tabela 16). Quinze horas após a germinação foram observadas evidências da penetração do patógeno apenas na superfície foliar da linhagem suscetível (Figura 4).

Pouco se sabe sobre os mecanismos específicos que ativam a resistência do milho à antracnose. No entanto, há conhecimento de respostas fisiológicas e bioquímicas gerais à infecção de fungos fitopatogênicos. De acordo com Lyons & Nicholson (1989), a defesa do milho pode estar relacionada com compostos pré-formados, tais como ácidos hidroxâmicos. Em trabalhos realizados no

Tabela 16. Média de apressórios germinados 10 horas após a inoculação com *Colletotrichum graminicola* nas folhas de milho.

TRATAMENTO	MÉDIA*
L186	85,8 a
L64	65,4 b
L186 X L64	44,1 c

* Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

patossistema milho – *C. graminicola*, Hammerschmidt & Nicholson (1977) sugerem o envolvimento do metabolismo de fenóis na resistência, face a correlação entre restrição do crescimento da lesão e acúmulo de compostos fenólicos e a produção de antocianina.

Politis & Wheeler (1973) e Sherwood et al. (1987) observaram que a formação de papila pode ser responsável pela redução na frequência de penetração de *C. graminicola* em milho, mas não impede o aparecimento de lesões que ocorrem em incidência bem menor. Como no presente estudo, não houve ocorrência de sintomas nas plantas resistentes, evidenciando que o processo de infecção não foi completado, provavelmente outro mecanismo deve estar envolvido na resistência estudada.

Figura 4. Visualização de folhas da linhagem de milho suscetível à antracnose foliar sob microscópio eletrônico de varredura, após inoculação em uma microcâmara úmida. (A). Germinação de apressórios 10 horas após a inoculação. (B). Detalhe de um conídio com apressório. (C). Aspecto da folha 15 horas após a inoculação.

4.6 Localização dos genes de resistência a antracnose foliar e do colmo

4.6.1 Extração de DNA vegetal

A extração realizada em tubos de 50 mL resultou em maior quantidade de DNA por amostra. A concentração de DNA foi em média 1000 ng/ μ L, num volume total de 500 μ L. Já a extração de DNA feita em "eppendorfs" de 1,5 mL resultou em uma concentração menor, entre 100 e 200 ng/ μ L, num volume total de 200 μ L/extração. No entanto, a extração de DNA feita em eppendorfs resultou em uma quantidade suficiente de DNA para ser usada em PCR. Por exemplo, em uma amostra com 200 ng/ μ L de DNA é possível realizar até 1000 reações de PCR utilizando-se uma concentração de 40 ng de DNA/reação. Adicionalmente, a extração em "eppendorfs" é mais rápida por utilizar centrífugas menores com maior número de células, além de reduzir o tempo de centrifugação. Além disso, essa extração também é vantajosa por diminuir drasticamente a quantidade de reagentes utilizada.

4.6.2 Análise de segregantes agrupados

Os primers testados, bem como sua localização e protocolo utilizado para amplificação, estão apresentados nas Tabelas 21 e 22. A análise genotípica das linhagens genitoras com estes marcadores permitiu identificar 19 locos polimórficos entre 171 primers analisados (Tabelas 17 e 18).

Dentre os 19 locos polimórficos, nenhum foi identificado como possivelmente ligado a um dos genes estudados, pois os "bulks" não apresentaram polimorfismo entre si. Portanto, esse resultado é indicativo que nenhuma das regiões amplificadas se encontram a menos de 30 cM dos genes estudados (Michelmore et al., 1991), sendo necessária a genotipagem dos indivíduos da classe homozigota recessiva para detectar possíveis marcadores ligados aos genes a uma distância maior que a permitida pelo método ASA.

O baixo grau de polimorfismo encontrado, cerca de 11% comparado, por exemplo, a 50% descrito por Ogliari (1999), provavelmente está relacionado à similaridade genética entre as linhagens genitoras, as quais foram obtidas de um mesmo sintético, sendo consideradas linhagens com um conjunto gênico próximo. De acordo com Michelmore et al. (1991), o sucesso da técnica da análise de segregantes agrupados depende da divergência genética entre os progenitores, pelo menos na região que está envolvida com a característica estudada. Os autores afirmam que a ASA permite identificar polimorfismos apenas para marcadores localizados a menos de 30 cM da região alvo, em estudos envolvendo populações F_2 .

4.6.3 Análise da segregação de indivíduos da população F_2 com as regiões microssatélites polimórficas entre as linhagens genitoras

Tabela 17. Localização cromossômica e protocolos utilizados na amplificação de locos microssatélites de milho, nos cromossomos 1 a 7.

Loco*	Primer	Loco*	Primer	Loco*	Primer
1.00 ^{R1P2}	p-bnlg149 ^m	2.06 ^{R1P1}	p-bnlg121 ^m	5.01 ^{R1P1}	p-bnlg143 ^p
1.01 ^{R1P1}	p-phi056 ^m	2.06 ^{R4P1}	p-nc003 ^p	5.01 ^{R4P1}	p-phi024 ^m
1.01 ^{R1P1}	p-phi097 ^m	2.07 ^{R4P1}	p-bnlg1045 ^m	5.01 ^{R4P1}	p-nc07 ^m
1.02 ^{R2P6}	p-bnlg147 ^m	2.07 ^{R4P1}	p-mmcc0271 ^m	5.02 ^{R4P1}	p-bnlg565 ⁿ
1.02 ^{R1P1}	p-bnlg109 ^m	2.07-2.08 ^{R4P1}	p-mmcc0191 ^m	5.02 ^{R4P1}	p-bnlg105 ^m
1.03 ^{R2P7}	p-bnlg182 ^m	2.08 ^{R4P1}	p-bnlg198 ^m	5.02 ^{R4P1}	p-dupssr1 ^p
1.03 ^{R4P1}	p-bnlg176 ^m	2.08 ^{R1P1}	p-dupssr24 ^m	5.03 ^{R4P1}	p-bnlg557 ^p
1.03 ^{R1P1}	p-bnlg439 ^m	2.08 ^{R4P1}	p-dupssr25 ^m	5.03 ^{R4P1}	p-phi008 ^m
1.03 ^{R1P1}	p-phi001 ^m	2.08 ^{R4P1}	p-phi090 ⁿ	5.04 ^{R1P1}	p-bnlg150 ^m
1.03 ^{R1P1}	p-phi095 ^m	2.09 ^{R4P1}	p-bnlg1520 ^m	5.04 ^{R1P1}	p-bnlg603 ^m
1.05 ^{R1P1}	p-bnlg652 ^m	3.04 ^{R1P1}	p-bnlg602 ^m	5.04 ^{R2P2}	p-bnlg653 ^m
1.06 ^{R1P1}	p-bnlg421 ^m	3.04 ^{R4P1}	p-nc030 ^m	5.04 ^{R2P4}	p-dupssr10 ^m
1.07 ^{R4P1}	p-bnlg257 ^m	3.04 ^{R1P1}	p-phi029 ^m	5.05-5.06 ^{R4P1}	p-bnlg278 ^m
1.07 ^{R1P1}	p-bnlg615 ^m	3.05 ^{R1P1}	p-bnlg420 ^m	5.06 ^{R2P2}	p-bnlg609 ^m
1.08 ^{R2P4}	p-dupssr12 ^m	3.05 ^{R4P1}	p-phi053 ^m	5.07 ^{R1P1}	p-bnlg118 ^m
1.09 ^{R4P1}	p-bnlg400 ^m	3.05 ^{R4P1}	p-phi073 ^p	5.07 ^{R4P1}	p-phi085 ^p
1.09-1.10 ^{R1P1}	p-bnlg100 ^m	3.06 ^{R4P1}	p-dupssr17 ^m	5.09 ^{R1P1}	p-bnlg389 ^m
1.09 ^{R1P1}	p-phi055 ^m	3.06 ^{R1P1}	p-dupssr23 ^m	6.00 ^{R1P1}	p-bnlg238 ^m
1.09 ^{R1P1}	p-phi094 ^m	3.07 ^{R4P1}	p-bnlg197 ^p	6.00 ^{R1P1}	p-phi075 ^m
1.09 ^{R1P1}	p-phi011 ^p	4.00 ^{R1P1}	p-bnlg372 ^m	6.01 ^{R1P1}	p-bnlg249 ^m
1.11 ^{R1P1}	p-bnlg131 ^p	4.01 ^{R1P1}	p-phi072 ^p	6.01 ^{R1P1}	p-bnlg426 ^m
1.11 ^{R4P1}	p-bnlg504 ^m	4.03 ^{R4P1}	p-nc004 ^p	6.01 ^{R1P1}	p-bnlg107 ^m
1.11 ^{R1P1}	p-phi064 ^m	4.03 ^{R1P1}	p-phi021 ^m	6.01 ^{R1P1}	p-phi077 ^m
2.00-2.04 ^{R4P1}	p-mmcc0063 ⁿ	4.04 ^{R4P1}	p-phi096 ^p	6.04 ^{R2P3}	p-bnlg480 ^m
2.01 ^{R4P1}	p-bnlg1092 ^m	4.04 ^{R1P1}	p-phi074 ^m	6.04 ^{R4P1}	p-nc010 ⁿ
2.02 ^{R4P1}	p-bnlg125 ^m	4.05 ^{R4P1}	p-bnlg667 ^m	6.04 ^{R4P1}	p-nc009 ⁿ
2.02 ^{R2P2}	p-bnlg469 ^m	4.05 ^{R1P1}	p-bnlg490 ^m	6.05 ^{R4P1}	p-nc012 ^m
2.02 ^{R4P1}	p-bnlg1017 ^p	4.05 ^{R3P2}	p-nc005 ^m	6.05 ^{R3P3}	p-phi078 ^m
2.03 ^{R1P1}	p-bnlg381 ^m	4.05 ^{R4P1}	p-phi026 ^p	6.05 ^{R1P1}	p-phi081 ^m
2.03 ^{R2P2}	p-bnlg469 ^m	4.05 ^{R4P1}	p-phi079 ^p	6.05 ^{R4P1}	p-phi025 ⁿ
2.03-2.04 ^{R4P1}	p-umc1026 ^m	4.06 ^{R1P1}	p-bnlg252 ^m	6.05 ^{R4P1}	p-umc1020 ^m
2.04 ^{R4P1}	p-bnlg166 ^p	4.08 ^{R1P1}	p-phi092 ^m	6.06 ^{R1P1}	p-bnlg345 ^m
2.04 ^{R1P1}	p-bnlg108 ^m	4.08 ^{R4P1}	p-phi093 ^m	6.06 ^{R3P8}	p-dupssr15 ^m
2.04 ^{R1P1}	p-phi083 ^p	4.08 ^{R4P1}	p-dupssr28 ^m	6.06 ^{R3P3}	p-phi070 ^m
2.05 ^{R1P1}	p-umc1003 ^m	4.11 ^{R4P1}	p-bnlg589 ^m	7.00-7.02 ^{R4P1}	p-phi112 ^m
2.05 ^{R4P1}	p-bnlg180 ^m	4.11 ^{R4P1}	p-phi006 ^m	7.01 ^{R4P1}	p-phi057 ^m
2.05 ^{R2P3}	p-bnlg371 ^m	4.11 ^{R4P1}	p-phi076 ^m	7.02 ^{R2P1}	p-bnlg398 ^m
2.05 ^{R4P1}	p-dupssr21 ^p	4.11 ^{R4P1}	p-phi019 ⁿ	7.02 ^{R4P1}	p-phi034 ^m

* Localização encontrada (www.agron.missouri.edu)

R1 a 4 Reações com 0,165, 0,33, 0,50 e 0,35 μ M de primer, respectivamente

PN Programas utilizados na amplificação das regiões microssatélites

p Primer que amplificou região microssatélite com polimorfismo entre os genitores

m Primer que amplificou região microssatélite sem polimorfismo entre os genitores

n Primer que não amplificou região microssatélite nos genitores

Tabela 18. Localização cromossômica e protocolos utilizados na amplificação de locos microssatélites de milho, nos cromossomos 7 a 10 e em locos não localizados.

Loco*	Primer	Loco*	Primer	Loco*	Primer
7.02 ^{R4P1}	p-bnlg657 ^m	8.09 ^{R4P1}	p-phi080 ^m	9.07 ^{R4P1}	p-dupssr29 ^m
7.02- 7.03 ^{R1P1}	p-dupssr9 ⁿ	8.09 ^{R1P1}	p-phi015 ^m	10.02 ^{R1P2}	p-phi063 ^m
7.02 ^{R4P1}	p-phi114 ^m	8.09 ^{R2P4}	p-dupssr14 ^m	10.02 ^{R4P1}	p-phi059 ^m
7.03 ^{R3P1}	p-bnlg434 ^m	9.01 ^{R2P2}	p-phi033 ^m	10.03 ^{R1P1}	p-bnlg210 ^m
7.03 ^{R1P1}	p-bnlg339 ^m	9.02 ^{R2P2}	p-bnlg244 ⁿ	10.03 ^{R2P2}	p-bnlg640 ^m
7.03 ^{R2P3}	p-bnlg572 ^m	9.02 ^{R4P1}	p-dupssr19 ⁿ	10.03 ^{R1P1}	p-phi054 ^m
7.04 ^{R1P1}	p-bnlg155 ^m	9.02 ^{R1P1}	p-dupssr6 ^m	10.04 ^{R2P2}	p-phi062 ^m
7.04 ^{R1P1}	p-dupssr13 ^m	9.03 ^{R1P1}	p-bnlg127 ^m	10.04 ^{R1P2}	p-phi084 ^m
7.05 ^{R1P1}	p-phi069 ^m	9.03 ^{R1P1}	p-bnlg430 ^m	10.04 ^{R2P6}	p-phi071 ^m
7.05 ^{R1P1}	p-phi082 ^m	9.03 ^{R2P2}	p-bnlg469 ^m	10.05 ^{R2P6}	p-bnlg137 ^m
7.06 ^{R1P1}	p-bnlg469 ^m	9.03 ^{R2P1}	p-phi022 ⁿ	10.06 ^{R2P3}	p-bnlg236 ^m
7.06 ^{R4P1}	p-phi116 ^m	9.03 ^{R4P1}	p-phi027 ^p	10.06-10.07 ^{R2P6}	p-bnlg153 ⁿ
8.03 ^{R4P1}	p-bnlg669 ⁿ	9.03 ^{R1P1}	p-phi065 ^m	10.06 ^{R2P5}	p-bnlg594 ^m
8.03 ^{R2P6}	p-dupssr3 ⁿ	9.03 ^{R4P1}	p-phi061 ^m	10.06 ^{R4P1}	p-phi035 ^m
8.03 ^{R4P1}	p-phi115 ^m	9.04 ^{R4P1}	p-phi032 ^m	NL ^{R4P1}	p-dupssr07 ⁿ
8.04 ^{R1P1}	p-bnlg119 ^m	9.04 ^{R4P1}	p-phi016 ⁿ	NL ^{R4P1}	p-dupssr16 ^m
8.04 ^{R1P1}	p-phi060 ^m	9.04 ^{R4P1}	p-phi042 ^p	NL ^{R4P1}	p-dupssr20 ^m
8.05 ^{R3P1}	p-bnlg162 ^m	9.06 ^{R4P1}	p-bnlg292 ^m	NL ^{R4P1}	p-dupssr26 ^m
8.05 ^{R2P1}	p-bnlg666 ^m	9.07 ^{R4P1}	p-bnlg279 ^m	NL ^{R4P1}	p-dupssr31 ⁿ
8.06 ^{R1P1}	p-bnlg240 ^m	9.07- 9.08 ^{R2P1}	p-bnlg619 ^m	NL ^{R4P1}	p-dupssr33 ^m

* Localização encontrada (www.agron.missouri.edu)

NL Primer que amplifica regiões microssatélites ainda não localizadas no cromossomo

^{R1 a 4} Reações com 0,165, 0,33, 0,50 e 0,35 μ M de primer, respectivamente

^{PN} Programas utilizados na amplificação das regiões microssatélites

^p Primer que amplificou região microssatélite com polimorfismo entre os genitores

^m Primer que amplificou região microssatélite sem polimorfismo entre os genitores

ⁿ Primer que não amplificou região microssatélite nos genitores

A genotipagem da classe extrema permite a localização do gene de interesse desde que os genótipos esperados sejam homozigotos para o alelo recessivo no loco de interesse (Zhang et al., 1994).

Em comparação a análise da classe recessiva, foi feita a genotipagem para o loco amplificado pelo primer Nc003 (2.08) de toda a população F₂ estudada. Nesta genotipagem, utilizando o mesmo procedimento descrito anteriormente, obteve-se que este loco amplificado esta a cerca de 31,9 cM do gene *RCG1*, evidenciando, portanto, que este gene provavelmente está situado no braço longo do cromossomo 2 do milho. Na literatura não há relatos de nenhum marcador ligado a genes que conferem resistência em milho à antracnose foliar.

Através da amplificação das regiões polimórficas nos genótipos dos indivíduos suscetíveis a antracnose foliar, que correspondem à classe recessiva, verificou-se associação da região amplificada com o primer nc003 (Loco 2.06) com o gene que confere resistência a antracnose foliar, *RCG1*, causada por *C. graminicola* (Figura 5).

Em análise feita pelo programa Mapmaker 3.0b, observou-se que esta região se encontra a 31.9 cM do gene *RCG1*. Como as regiões amplificadas pelos primers *phi083* e *bnlg1017*, que se encontram localizados no cromossomo 2, posições 2.04 e 2.02, respectivamente, não estão ligadas ao gene de resistência *RCG1*, portanto, acredita-se que o mesmo se encontre na região abaixo do loco 2.06, provavelmente no loco 2.08. Na região do loco 2.08, se encontram vários genes de resistência mapeados em milho, entre eles, quatro

Figura 5. Genotipagem dos indivíduos suscetíveis a antracnose foliar causada por *Colletotrichum graminicola* com o primer nc003 que amplifica região microssatélite ligada ao gene de resistência à antracnose foliar.

que conferem resistência a doença foliar causada por *Exserohilum turcicum* (McMullen & Simcox, 1995; Ogliari, 1999). Este loco do cromossomo 2 é também conhecido por apresentar baixo polimorfismo entre as regiões microssatélites.

Quanto à resistência à podridão do colmo não verificou-se nenhum polimorfismo próximo ao gene *RCG2*. Provavelmente este gene deve estar a mais de 50 cM das regiões microssatélites polimórficas que foram encontradas.

Jung et al. (1994) localizaram um QRL de grande efeito, responsável pela resistência em milho à podridão do colmo causada por *C. graminicola*, no cromossomo 4, localização 4.08, responsável por 70% da variação fenotípica encontrada no cruzamento realizado. No presente estudo as linhagens genitoras não apresentaram divergência na localização 4.08 do cromossomo 4 (Tabela

13), não sendo possível verificar se tal região onde se encontra o QRL marcado poderia estar associada ao gene estudado.

Desde janeiro de 1999, encontra-se disponível mais de 1000 primers que amplificam regiões microssatélites mapeados ao longo dos dez cromossomos de milho, o que possibilita, em futuros trabalhos, o mapeamento dos genes *RCG1* e *RCG2*.

5 CONCLUSÕES

O presente trabalho permitiu concluir que:

1. Foi constatada a ocorrência de variabilidade entre genótipos quanto à resistência a antracnose foliar, em plântulas de linhagens e híbridos de milho;

2. A partir de 10 dias após a inoculação, as variáveis avaliadas permitiram discriminar genótipos resistentes de suscetíveis à antracnose foliar;

3. As variáveis CTL, ATL e tipo de lesão mostraram-se altamente correlacionadas;

4. Não verificou-se a ocorrência de interseção diferencial entre genótipos do hospedeiro e do patógeno;

5. O método de inoculação no colmo com suspensão de *C. graminicola* através do uso de injeção, permitiu uma maior dispersão dos valores referentes

a podridão do colmo (comprimento de lesão), em relação ao método do palito;

6. As frequências fenotípicas para a resistência à antracnose foliar e do colmo foram indicativas da ocorrência de herança monogênica, com dominância completa para o alelo que confere resistência;

7. Os genes responsáveis pela resistência a queima foliar e podridão do colmo segregaram independentemente;

8. Cinco horas após a inoculação, os esporos de *C. graminicola*, já se encontram aderidos à superfície da folha e a germinação de apressórios ocorre cerca de 10 horas após a inoculação;

9. A percentagem de apressórios germinados foi maior na linhagem L186 do que na linhagem L64 e no híbrido L186 x L64;

10. Verificou-se associação da região amplificada com o primer nc003 (Loco 2.06) com o gene que confere resistência a antracnose foliar, *Rcg1*, causada por *C. graminicola*;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKKAYA, M.S.; BHAGWAT, A.A.; CREGAN, P.B. Length polymorphisms of simple sequence repeat DNA in soybean. **Genetics**, v. 132, p. 1131-1139, 1992.

ANDERSON, B.; NICHOLSON, R.L. Characterization of a laccase in the conidial mucilage of *Colletotrichum graminicola*. **Mycologia**, v. 88, p. 996-1002, 1996.

ANDERSON, B.; WHITE, D.G. Fungi associated with comstalks in Illinois in 1982 and 1983. **Plant Disease**, v. 71, p. 135-137, 1987.

ARNHEIM, N.; STARNGE, C.; ERLICH, H. Use of pooled DNA samples to detect linkage disequilibrium of polymorphic restriction fragments and human disease: studies of the HLA class II loci. **Proceedings National Academy of Sciences USA**, v. 82, p. 6970-6974, 1985.

BADU-APRAKU, B.; GRACEN, V.E.; BERGSTROM, G.C. A major gene for resistance stalk rot in maize. **Phytopathology**, v. 77, p. 957-959, 1987a.

BADU-APRAKU, B.; GRACEN, V.E.; BERGSTROM, G.C. A major gene for resistance to anthracnose leaf blight in maize. **Plant Breeding**, v. 98, p.194-199, 1987.b

BADU-APRAKU, B.; GRACEN, V.E.; BERGSTROM, G.C. Inheritance of resistance to anthracnose stalk rot and leaf blight in a maize inbred derived from a temperate by tropical germoplasm combination. **Maydica**, v. 32, p. 221-237, 1987c.

BARUA, U.M.; CHALMERS, K.J.; HACKETT, C.A.; THOMAS, W.T.B.; POWEL, W.; WAUGH, R. Identification of RAPD markers linked to a resistance locus in barley using near-isogenics and bulked segregant analysis. **Heredity**, v. 71, p. 177-184, 1993.

BELL, C.J.; ECKER, J.R. Assignment of 30 microsatellite loci to the linkage map of *Arabidopsis*. **Genomics**, v.19, p. 137-144, 1994.

BERGSTROM, G.C.; CROSKEY, B.S.; CARRUTHERS, R.I. Interaction between European corn borer and anthracnose stalk rot in corn. **Proceedings Annual Northeastern Corn Improvement Conference**, v.38, p. 131-134, 1983.

BERGSTROM, G.C.; NICHOLSON, R.L. Effect of the *Colletotrichum graminicola* conidial matrix on the development of anthracnose seedling blight in maize. **Fitopatologia Brasileira**, v. 8, p. 447-453, 1983.

BERGSTROM, G.C.; NICHOLSON, R.L. The biology of corn anthracnose: knowledge to exploit for improved management. **Plant Disease**, v. 83, p. 596-608, 1999.

BROWERS, J.E.; DANGI, G.S.; VIGNANI, R.; MEREDITH, C.P. Isolation and characterization of new polymorphic simple sequence repeat loci in grape (*Vitis vinifera* L.). **Genome**, v.39, p. 628-633, 1996.

BROWN, S.M.; SZEWC-MCFADDEN, A.K.; KRESOVICH, S. Development and application of simple sequence repeat (SSR) loci for plant genome analysis. In: JAUHAR, P.P. (Ed.) **Methods of genome analysis in plants**. Boca Raton: CRC Press, 1996. Cap. 9, p. 147-159.

CALLAWAY, M.B.; SMITH, M.E.; COFFMAN, W.R. Diallel analysis of resistance to anthracnose stalk rot in maize inbreds. **Crop Science**, v. 30, p. 335-337, 1990.

CALLAWAY, M.B.; SMITH, M.E.; COFFMAN, W.R. Effect of anthracnose stalk rot on grain yield and related traits of maize adapted to the northeastern United States. **Canadian Journal Plant Science**, v. 72, p. 1031-1036, 1992.

CARSON, M.L. Leaf blight. In: WHITE, D.G. (ed.). **Compendium of corn diseases**. 3rd ed. Saint Paul: American Phytopathological Society, 1999. 128p.

CARSON, M.L.; HOOKER, A.L. Inheritance of resistance to anthracnose leaf blight in five inbred lines of corn. **Phytopathology**, v.71, p. 488-491, 1981a.

CARSON, M.L.; HOOKER, A.L. Inheritance of resistance to stalk rot of corn caused by *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v.71, p. 1190-1196, 1981b.

CARSON, M.L.; HOOKER, A.L. Reciprocal translocation testcross analysis of genes for anthracnose stalk rot resistance in a corn inbred line. **Phytopathology**, v. 72, p. 175-177, 1982.

CHAGUÉ, V.; MERCIER, J.C.; GUÉNARD, M.; COURCEL, A.; VEDEL, F. Identification and mapping on chromosome 9 of RAPD markers linked to Sw-5 in tomato by bulked segregant analysis. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 92, p. 1045-1051, 1996.

- CHAGUÉ, V.; MERCIER, J.C.; GUÉNARD, M.; COURCEL, A.; VEDEL, F.
Identification of RAPD markers linked to a locus involved in quantitative resistance to TYLCV in tomato by bulked segregant analysis. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 95, p. 671-677, 1997.
- CHARLESWORTH, B.; SNIEGOWSKY, P.; STEPHAN, W. The evolutionary dynamics of repetitive DNA in eukaryotes. **Nature**, v. 371, p. 215-220, 1994.
- CHIN, E.C.L.; SENIOR, M.L.; SHU, H.; SMIYH, J.S.C. Maize simple repetitive DNA sequences: abundance and allelic variation. **Genome**, v. 39, p. 866-873, 1996.
- CHOWDHURY, S.C. A disease of Zea mays caused by *Colletotrichum graminicolum* (Ces.) Wils. **Review Applied Mycology**, v.15, p.795, 1936.
- CONDIT, R.; HUBBELL, S.P. Abundance and DNA sequence of two-base repeat regions in tropical tree genomes. **Genome**, v. 34, p. 66-71, 1991.
- DALE, J. L. Corn anthracnose. **Plant Disease Reporter**, v. 47, p.245-249, 1963.
- FACELLI, A.L. & DOURADO NETO, D. **Produção de milho**. Guaíba: Agropecuária, 2000.

- GUPTA, P.K.; BALYAN, H.S.; SHARMA, P.C.; RAMESH, B. Microsatellites in plants: a new class of molecular markers. **Current Science**, v. 70, p.45-54, 1996.
- HALEY, S.D.; AFANADOR, L.; KELLY, J.D. Identification and application of random amplified polymorphic DNA marker for the I gene (potyvirus resistance) in common bean. **Phytopathology**, v. 84, p. 157-160, 1994.
- HALEY, S.D.; MIKLAS, P.N.; STAVELY, J.; BYRUM, J.; KELLY, J.D. Identification of RAPD markers linked to a major rust resistance gene block in common bean. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 86, p. 505-512, 1993.
- HAMMERSCHMIDT, R.; NICHOLSON, R.L. Resistance of maize to anthracnose: Effect of light intensity on lesion development. **Phytopathology**, v. 67, p. 247-250, 1977.
- HOISINGTON, D.; KHAIRALLAH, M.; LEÓN, G.D.; **Laboratory protocols: CIMMYT applied molecular genetics laboratory**. 2 ed. México: CIMMYT, 1994, 51p.
- HOLM, T.; MATZ, E.; BURR, B.; OLIPHANT, A.; PETERSON, C.; EVANS, J.; WRIGTH, S.; SMITH, S. **Maize Genetics Cooperation Newsletter**, 1994.

HOOKER, A.L. Corn anthracnose leaf blight and stalk rot. Proceedings of the thirty-first annual corn and sorghum research conference. **American Seed Trade Association**, p. 167-183, 1976.

HOOKER, A.L.; WHITE, D.G. Prevalence of corn stalk rot fungi in Illinois. **Plant Disease Reporter**, v. 60, p. 1032-1034, 1976.

JAMIL, F.F.; NICHOLSON, R.L. Susceptibility of corn to isolates of *Colletotrichum graminicola* pathogenic to other grasses. **Plant Disease**, v. 71, p. 809-810, 1987.

JENNS, A.E.; LEONARD, K.J. Effect of illuminance on the resistance of inbred of corn to isolate of *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v. 75, p. 281-286, 1985.

JENNS, A.E.; LEONARD, K.J.; MOLL, R.H. Variation in the expression of specificity in two maize diseases. **Euphytica**, v. 31, p. 269-279, 1982.

JUNG, M. WELDEKIDAN, T.; SCHAFF, D.; PATERSON, A.; TINGEY, S.; HAWK, J. Generation-means analysis and quantitative trait locus mapping of anthracnose stalk rot genes in maize. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 89, p. 413-418, 1994.

KASUGA, T.; SHANMUKHASWAMI, S.S.; SHI, J.; GIJZEN, M.; BUZZELL, R.I.; BHATTACHARYYA, M.K. High resolution genetic and physical mapping of molecular markers linked to the *Phytophthora* resistance gene rps1-k in soybean. **Molecular Plant Microbe Interaction**, v. 10, p. 1035-1044, 1997.

KELLER, N.P.; BERGSTROM, G.C.; CARRUTHERS, R.I. Potential yield in maize associated with an anthracnose/european corn borer pest complex in New York. **Phytopathology**, v. 76, p. 586-589, 1986.

KESSELI, R.; WITSENBOER, H.; STANGHELLINI, M.; VANDERMARK, G.; MICHELMORE, R. Recessive resistance to *Plasmopara lactucae-radicis* maps by bulked segregant analysis to a cluster of dominant disease resistance genes in lettuce. **Molecular Plant Microbe Interaction**, v. 6, p. 722-728, 1993.

KIMATI, H. **Taxonomia, esporulação e patogenicidade de *Colletotrichum graminicola* (Ces.) Wils. (sensu ARX, 1957)**. Piracicaba, 103p. 1975. Tese (L. D.) Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – Universidade de São Paulo.

KOSAMBI, D.D. The estimation of map distances from recombination values. **Annual Eugenics**, v. 12, p. 172-175, 1944.

- KRESOVICH, S.; SZEWE-MCFADEN, A.K.; BLIEK, S.M.; MCFERSON, J.R.
Abundance and characterization of simple sequence repeats (SSRs) isolated from a size-fractionated genomic library of *Brassica napus* L. (rapeseed). **Theoretical and Applied Genetics**, v. 91, p. 206-211, 1995.
- LAGERCRANTZ, U.; ELLEGREN, H.; ANDERSSON, L. The abundance of various polymorphic microsatellite motifs differs between plants and vertebrates. **Nucleic Acids Research**, v. 21, p. 1111-1115, 1993.
- LANDER, E.S.; GREEN, P.; ABRAHAMSON, J.; BARLOW, A.; DALY, M.J.; LINCOLN, S.E.; NEWBURG, L. MAPMAKER: an interactive computer package for constructing primary genetic linkage maps of experimental and natural populations. **Genomics**, v. 1, p. 174-181, 1987.
- LAPP, S.M.; SKOROPAD, W.P. Location of apressoria of *Colletotrichum graminicola* on natural and artificial barley leaf surfaces. **Transaction British Mycological Society**, v. 70, p. 225-228, 1978.
- LÉON, C. **Moléstias do milho**: Guia para sua identificação no campo. Campinas: Fundação Cargill, 1984. 119 p.
- LEONARD, K.J. Foliar pathogens of corn in North Carolina. **Plant Disease Reporter**, v. 58, p. 532-534, 1974.

LEONARD, K.J.; THOMPSON, D.L. Corn stalk rot fungi in North Carolina. **Plant Disease Reporter**, v. 53, p. 718-720, 1969.

LEVINSON, G.; GUTMAN, G.A. Slipped-strand mispairing: a major mechanism for DNA sequence evolution. **Molecular Biology Evolution**, v. 4, p. 203-221, 1987.

LIM, S.M.; WHITE, D.G. Estimates of heterosis and combining ability for resistance of maize to *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v.68, p. 1336-1342, 1978.

LIPPS, P.E. Survival of *Colletotrichum graminicola graminicola* in infested corn residues in Ohio. **Plant Disease Reporter**, v. 67, p. 102-104, 1983.

LYONS, P.C.; HIPSKIND, J.; VICENT, J.R.; NICHOLSON, R.L. Phenylpropanoid dissemination in maize resistant or susceptible to *Helminthosporium maydis*. **Maydica**, v. 38, p. 175-181, 1993.

LYONS, P.C.; NICHOLSON, R.L. Evidence that cyclic hydroxamate concentrations are not related to resistance of corn leaves to anthracnose. **Canadian Journal Plant Pathology**, v. 11, p. 215-220, 1989.

- MADDEN, L.V.; YANG, X.; WILSON, L.L. Effects of rain intensity on splash dispersal of *Colletotrichum acutatum*. **Phytopathology**, v. 86, p. 864-874, 1996.
- MALVAS, C.C.; COELHO, R.M.S.; CAMARGO, L.E.A. Identificação de genes de resistência à podridão negra em *Brassica oleracea* por meio de genotipagem seletiva. **Fitopatologia Brasileira**, v. 24, p. 143-148, 1999.
- MATHER, K.; JINKS, J.L. **Biometrical genetics**. New York: Cornell University Press, 1971. 382p.
- MATHER, K.; JINKS, J.L. **Introdução à genética biométrica**. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1984. 242p.
- MCMULLEN, M.D.; SIMCOX, K.D. Genomic organization of disease and insect resistance genes in maize. **Molecular Plant Microbe Interactions**, v. 8, p. 811-815, 1995.
- MESSIAEN, C.M.; LAFON, R.; MOLCOT, P. Necroses de racines, pourritures de tiges et verve parasitaire du maïs. **Annales des Epiphyties**, v. 9, p. 441-473, 1959.

MICHELMORE, R.W.; PARAN, I.; KESSELI, R.V. Identification of markers linked to disease-resistance genes by bulked segregant analysis: a rapid method to detect markers in specific genomic regions by using segregating populations. **Proceedings National Academy of Sciences USA**, v. 88, p. 9828-9832, 1991.

MIKLAS, P.N.; JOHNSON, E.; STONE, V.; BEAVER, J.S; MONTOYA, C.; ZAPATA, M. Selective mapping of QTL conditioning disease resistance in common bean. **Crop Science**, v. 36, p. 1344-1351, 1996.

MIKLAS, P.N.; STAVELY, J.; KELLY, J.G. identification and potential use of a molecular marker for rust resistance in common bean. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 85, p. 745-749, 1993.

MINUSSI, E. **Taxonomia e esporulação de *Colletotrichum graminicola* (Ces.) Wils. (sensu ARX, 1957) e patogenicidade em sorgo *Sorghum bicolor*. Piracicaba, 105p. 1977. Tese (D.) Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – Universidade de São Paulo.**

MOORE, S.S.; SARGEANT, L.L.; KING, T.G.; MATICK, J.S.; GEORGES, M.; HERTZEL, D.J.S. Conservation of dinucleotide microsatellites among mammalian genomes allows use of heterologous PCR primer pairs in closely related species. **Genomics**, v. 10, p. 654-660, 1991.

- MORCHEN, M.; CUGUEN, J.; MICHAELIS, G.; HANNI, C.; SAUMITOU-LAPRADE, P. Abundance and length polymorphism of microsatellite repeats in *Beta vulgaris* L. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 92, p. 326-333, 1996.
- MORGAN, O.D.; KRANTZES, J. Observations of *Colletotrichum graminicola* on T corn and blends in Maryland. **Plant Disease Reporter**, v. 55, p755, 1967.
- MORGANTE, M.; OLIVIERI, A.M. PCR-amplified microsatellites as markers in plant genetics. **The Plant Journal**, v. 3, p. 175-182, 1993.
- MUIMBA-KANKOLONGO, A.; BERGSTROM, G.C. Transitory wound predisposition of maize to anthracnose stalk rot. **Canadian Journal of Plant Pathology**, v. 12, p. 1-10, 1990.
- MUIMBA-KANKOLONGO, A.; BERGSTROM, G.C. Wound predisposition of maize to anthracnose stalk rot as affected by internode position and inoculum concentration of *Colletotrichum graminicola*. **Plant Disease**, v. 76, p. 188-195, 1992.
- MULLIS, K.; FALOONA, F.; SCHARF, S.; SAIKI, R.; HORN, G.; ERILICH, H. Specific enzymatic amplification of DNA *in vitro*: the polymerase chain

reaction. **Cold Spring Harbor Symposium Quantitative Biology**, v. 51, p. 263-273, 1986.

NAYLOR, D.V.; LEONARD, K.J. Survival of *Colletotrichum graminicola* in infected corn stalks in North Carolina. **Plant Disease Reporter**, v. 61, p. 382-383, 1977.

NICHOLSON, R.L.; BERGESON, G.B.; De GENARO, F.P.; VIVEIROS, D.M. Single and combined effects of the lesion nematode and *Colletotrichum graminicola* on growth and anthracnose leaf blight on corn. **Phytopathology**, v. 75, p. 654-661, 1985.

NICHOLSON, R.L.; MORAES, W.B.C. Survival of *Colletotrichum graminicola*: importance of the spore matrix. **Phytopathology**, v. 70, p. 255-261, 1980.

NICHOLSON, R.L.; WARREN, H.L. The issue race of *Colletotrichum graminicola* pathogenic to corn. **Plant Disease Reporter**, v. 65, p. 143-145, 1981.

NILCHOLSON, R.L.; WARREN, H.L. Criteria for evaluation of resistance to maize anthracnose. **Phytopathology**, v.66, p. 86-90, 1976.

OGLIARI, J.B.; BOSCARIOL, R.L.; CAMARGO, L.E.A. Optimization of PCR amplification maize microsatellites loci. **Genetic and Molecular Biology**, v. 23, p. 395-398, 2000.

OGLIARI, J.B.; **Identificação e localização de um gene de resistência de milho a *Exserohilum turcicum* (Pass.) Leonard & Suggs através do uso de marcadores microssatélites**. Piracicaba, 1999. 115p. Tese (D.) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.

PAGE, D.; DELCLOS, B.; AUBERT, G.; BONAVENT, J.F.; MOUSSET-DÉCLAS, C. Sclerotinia rot resistance in red clover: identification of RAPD markers using bulked segregant analysis. **Plant Breeding**, v. 116, p.73-78, 1997.

PASCHOLATI, S.F.; DEISING, H.; LEITE, B.; ANDERSON, D.; NICHOLSON, R.L. Cutinase and non-specific esterase activities in the conidial mucilage of *Colletotrichum graminicola*. **Physiological Molecular Plant Pathology**, v. 42, p. 37-51, 1993.

PEREIRA, O.A.P. **Herança da resistência à podridão do colmo em milho (*Zea mays* L.) causada por *Colletotrichum graminicola* (Ces.) Wils.** 1983. Tese (D.) Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo.

PERKINS, J.M.; HOOKER, A.L. Effects of anthracnose stalk rot on corn yields in Illinois. **Plant Disease Reporter**, v. 63, p. 26-30, 1979.

POLITIS, D.J. The identify and perfect state of *Colletotrichum graminicola*. **Mycologia**, v. 67, p.57-62, 1975.

POLITIS, D.J.; WHEELER, H.L. Ultrastructural study of penetration of maize leaves by *Colletotrichum graminicola*. **Physiology Plant Pathology**, v. 3, p. 465-471, 1973.

PONELEIT, C.G.; POLITIS, D.J.; WEELER, H. Resistance to corn anthracnose. **Crop Science**, v. 12, p. 875-876, 1972.

PONTES, M.F.C. **Características fisiológicas e morfológicas de *Colletotrichum graminicola* (Ces.) Wils. e avaliação de fontes de resistência em milho (*Zea mays* L.).** Recife, 1987. 82 p. Dissertação (M. S.) – Universidade Federal Rural de Pernambuco.

RONGWEN, J.; GREGAN, P.B.; AKKAYA, M.S.; BHAGWI, A.A.; LAVI, V. The use of simple sequence repeat DNA markers for soybean identification. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 90, p. 43-48, 1995.

- ROSEWICH, U.L.; PETTWAY, R.E.; McDONALD, B.A.; DUNCAN, R.R.; FREDERIKSEN, R.H. Genetic structure and temporal dynamics of a *Colletotrichum graminicola* a sorghum disease nursery. **Phytopathology**, v. 88, p. 1087-1093. 1998
- SAGHAI-MAROOF, M.; BIYASHEV, R.M.; YANG, G.P.; ZHANG, Q.; ALLARD, R.W. Extraordinarily polymorphic microsatellite DNA in Barley: species diversity, chromosomal locations, and population dynamics. **Proceedings National Academy of Sciences USA**, v. 91, p. 5466-5470, 1994.
- SCHADECK, R.J.G.; BUCHI, D.F.; LEITE, B. Ultrastructural aspects of *Colletotrichum graminicola* conidium germination, apressorium formation and penetration on cellophane membranes: focus on lipid reserves. **Journal of Submicrosc. Cytol. Pathol.**, v. 30, p. 555-561, 1998.
- SCHALL, R.A.; NICHOLSON, R.L.; WARREN, H.L. Influence of light on maize anthracnose in the greenhouse. **Phytopathology**, v. 70, p. 1023-1026, 1980.
- SENIOR, M.L.; CHIN, E.C.L.; LEE, M.; SMITH, J.S.C.; STUBER, C.W. Simple sequence repeat markers developed from maize sequences found in the GENBANK Database: map construction. **Crop Science**, v. 36, p. 1676-1683, 1996.

SHERRIFF, C.; WHELAN, M.J.; ARNOLD, G.M.; BAILEY, J.A. rDNA sequence analysis confirm the distinction between *Colletotrichum graminicola* and *C. sublineolum*. **Mycological Research**, v. 99, p. 475-478, 1995.

SHERWOOD, R.T. Papilla formation in corn root cap cells and leaves inoculated with *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v. 77, p.930-934, 1987.

SHURTLEFF, M.C. (Ed.). **A compendium of corn disease**. Saint Paul: The American Phytopathological Society, 1980. 64p.

SILVA, H.P. **Herança da resistência à antracnose foliar em milho (*Zea mays* L.) e métodos de avaliação**. Piracicaba, 1983. 74p. Dissertação (M. S.) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.

SILVA, H.P. Incidência de doenças fúngicas na "safrinha". In: Duarte, A.P., coord. **Seminário sobre a cultura do milho "safrinha"**, 4. Campinas, IAC/CDV, p.81-86, 1997.

SILVA, H.P.; PEREIRA, O.A.P.; MIRANDA FILHO, J.B.; BALMER, E. Herança da resistência à antracnose foliar *Colletotrichum graminicola* (Ces.)Wils. em milho. **Fitopatologia Brasileira**, v. 11, p. 617-626, 1986.

SILVEIRA, A.P.; FIGUEIREDO, M.F.; CRUZ, B.P. Ocorrência de antracnose do milho no Estado de São Paulo. **O Biológico**, v. 31, p. 192-194, 1965.

SKOROPAD, W.P. Effect of temperature on the ability of *Colletotrichum graminicola* to form apressoria and penetrate barley leaves. **Canadian Journal of Plant Science**, v. 47, p. 431-434, 1967.

SMITH, D.R. Yield reduction in dent corn caused by *Colletotrichum graminicola*. **Plant Disease Reporter**, v. 60, p. 967-970, 1976.

SNYDER, B.A.; NICHOLSON, R.L. Synthesis of phytoalexins in sorghum as a site-specific response to fungal ingress. **Science**, v. 248, p.637-639, 1990

STRAND , M.; PROLLA, T.A.; LISKAY, R.M.; PETES, T.D. Destabilization of tracts of simple repetitive DNA in yeast by mutations affecting DNA mismatch repair. **Nature**, v. 365, p. 274-276, 1993.

SUTTON, B.C. **The coelomycetes**. Commonwealth Agricultural Bureaux, 1980. 696p.

TINGEY, S.Y.; TUFO, J.P. Genetic analysis with random amplified polymorphic DNA markers. **Plant Physiology**, v. 101, p. 349-352, 1993.

- TOMAN JR., J.; WHITE, D.J. Inheritance of resistance to stalk rot of com. **Phytopathology**, v. 83, p. 981-986, 1993.
- URREA, A.C.; MIKLAS, P.N.; BEAVER, J.S.; RILEY, R.H. A codominant randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) marker useful for indirect selection of bean golden mosaic virus resistance in common bean. **Journal American Society of Horticultural Science**, v. 121, p. 1035-1039, 1996.
- VOGEL, J.M. Application of molecular markers to plant breeding and genetics. In: Thirty-third of Illinois Com Breeders School, University of Illinois at Urbana-Champaign. **Anais...** Urbana-Champaign, 1997. p. 51-68.
- WANG, G.L.; PATERSON, A.H. Assessment of DNA pooling strategies for mapping of QTLs. **Theoretical and Applied Genetics**, v. 88, p. 355-361, 1994.
- WARREN, H.L. Survival of *Colletotrichum graminicola* in corn kernels. **Phytopathology**, v. 67, p. 160-162, 1977.
- WARREN, H.L.; NICHOLSON, R.L. Kernel infection, seedling blight, and wilt of maize caused by *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v. 65, p. 620-623, 1975.

- WARREN, H.L.; NICHOLSON, R.L.; ULLSTRUP, A.J.; SHARVELLE, E.J.
Observations of *Colletotrichum graminicola* to foliar and kernels infection.
Plant Disease Reporter, v. 57, p. 143-144, 1973.
- WELDEKIDAN, T.; HAWK, J.A. Inheritance of anthracnose stalk rot resistance in maize. **Maydica**, v. 38, p. 189-192, 1993.
- WHEELER, H.; POLITIS, D.J.; PONELEIT, C.G. Pathogenicity, host range, and distribution of *Colletotrichum graminicola* on corn. **Phytopathology**, v. 64, p.293-296, 1974.
- WHEELER, H.L.; POLITIS, D.J. ; WILLIAMS, A.S. Host responses and ultrastructural changes in maize leaves infected with *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v. 61, p. 917, 1971.
- WHITE, D.G.; YANNEY, J.; ANDERSON, B. Variation in pathogenicity, virulence, and aggressiveness of *Colletotrichum graminicola* on corn. **Phytopathology**, v. 77, p. 999-1001, 1987.
- WHITE, D.G.; YANNEY, J.; NATTI, T.A. Anthracnose stalk rot. Proceedings of the thirty-fourth annual corn and sorghum research conference. **American Seed Trade Association**, p. 1-15, 1979.

- WILLIAMS, L.E.; WILLIS, G.M. Disease of corn caused by *Colletotrichum graminicola*. **Phytopathology**, v. 53, p. 364-365, 1963.
- WU, K.S.; TANKSLEY, S.D. Abundance, polymorphism and genetic mapping of microsatellites in rice. **Molecular General Genetics**, v. 241, p. 225-235, 1993.
- ZHANG, Q.; SHEN, B.Z.; DAI, X.K.; MEI, M.H.; SAGHAI-MAROOF, M.A.; LI, Z.B. Using bulked extremes and recessive class to map genes for photoperiod-sensitive genic male sterility in rice. **Proceedings National Academy of Sciences USA**, v. 91, p. 8675-8679, 1994.
- ZUBER, M.S.; AINSWORTH, T.C.; BLANCO, M.H.; DARRAH, L.L. Effect of anthracnose leaf blight on stalk rind strength and yield in F1 single crosses in maize. **Plant Disease**, v. 65, p. 719-722, 1981.

APÊNDICES

Apêndice 1. Escala de Notas baseadas no tipo de lesão causada por *Colletotrichum graminicola* em folhas de milho (Pereira, 1993; Silva, 1983).

NOTA	Classificação	Comportamento
1	AS (altamente susceptível)	Grandes áreas foliares necrosadas na primeira folha, lesões retangulares de coloração marrom claro, com círculos concêntricos de coloração mais escura, ocorrendo coalescência entre as mesmas. Morte das primeira e segunda folhas.
2	S (susceptível)	Lesões na terceira folha semelhante ao tipo AS, porém com necrose parcial na primeira e até na segunda folha.
3	MS (moderadamente susceptível)	Lesões individualizadas do tipo susceptível, sem ou com pouca necrose nas folhas inferiores.
4	MR (moderadamente resistente)	Lesões finas ou circulares tendendo para ovaladas, com halos cloróticos, com centro mais claro nas lesões da terceira folha e com algumas áreas necrosadas nas folhas inferiores.
5	R (resistente)	Lesões semelhantes a MR, mas sem áreas necrosadas nas folhas inferiores.
6	AR (altamente resistente)	Poucos pontos cloróticos ou necróticos com halos cloróticos.

Apêndice 2. Resumo das análises de variância para os parâmetros número de lesões (NL), comprimento total de lesão (CTL) e área total lesionada (ATL), em cm²; comprimento médio/lesão (CML) e área média/lesão (AML), em cm, e tipo de lesão, avaliados em 10 genótipos de milho, aos 8, 10, 12, 14 e 16 dias após a inoculação com *Colletotrichum graminicola*, em condições de casa de vegetação.

Fontes de variação	GL	Quadrados médios				
		8 dias	10 dias	12 dias	14 dias	16 dias
NL ¹						
Tratamento	9	2,050	9,958**	9,578**	7,309**	5,841**
Resíduo	20	2,967	0,544	0,779	0,365	0,753
CTL ¹						
Tratamento	9	0,0988	18,34**	19,78**	35,01**	38,59**
Resíduo	20	0,118	0,737	2,107	1,687	2,673
ATL ¹						
Tratamento	9	0,098	14,66**	21,16**	42,86**	57,54**
Resíduo	20	0,118	1,108	1,385	2,813	4,447
CML ¹						
Tratamento	9	0,0312	2,329**	2,065**	4,00**	5,508**
Resíduo	20	0,047	0,119	0,0951	0,172	0,323
AML ¹						
Tratamento	9	0,0312	2,069**	2,435**	4,747**	8,635**
Resíduo	20	0,047	0,184	0,128	0,312	0,330
Tipo de lesão						
Tratamento	9				95,37**	
Resíduo	20				2,00	

¹ Médias transformadas em RAIZ(X);

** Significativos ao nível de 1% de probabilidade.

Apêndice 3. Resumo das análises de variância para os parâmetros número de lesões (NL), comprimento total de lesão (CTL) e área total lesionada (ATL), em cm²; comprimento médio/lesão (CML) e área média/lesão (AML), em cm, avaliados em 6 genótipos de milho, aos 14 dias após a inoculação com dois isolados de *Colletotrichum graminicola*, em condições de casa de vegetação.

Fontes de variação	GL	Quadrados médios				
		NL	CTL	ATL	CML	AML
Tratamento	5	36,89**	166,00**	339,2**	39,09**	83,42**
Isolado	1	2,143	21,20	23,18	2,298	8,541
Bloco	2	0,311	3,187	1,782	1,623	1,078
Tratamento x Isolado	5	0,316	2,982	1,724	0,359	3,059

[†] Médias transformadas em RAIZ(X);

** Significativos ao nível de 1% de probabilidade.