Helen Alves Penha

Bióloga

Desenvolvimento de marcadores microssatélites em *Passiflora alata*
Curtis

Orientadora:

Prof^ª. Dra. **MARIA LUCIA CARNEIRO VIEIRA**

Dissertação apresentada para obtenção do título de Mestre
em Agronomia. Área de concentração: Genética e
Melhoramento de Plantas

PIRACICABA

2007

ERRATA

Penha, H.A. Desenvolvimento de marcadores microssatélites em *Passiflora alata* Curtis.

p.	item	linha	onde se lê	leia-se
8	resumo	décima oitava	...transferibilidade foi de 34%, indicando que essas seqüências...	...transferibilidade foi de 34%, a partir de 33 pares de <i>primers</i> , indicando que essas seqüências...
19	2.3	décima terceira	...(HEYWOOD; IRIONDO, 2003)...	acrescenta-se, na p. 84 das referências, HEYWOOD, V.H.; IRIONDO, J.M. Plant conservation: old problems, new perspectives. Biological Conservation , Washington, v. 113, p. 321-335, 2003.
25	3.1	terceira	...Há dois acessos de maracujá-doce...	...Os seguintes acessos de maracujá-doce...
30	3.4.2	vigésima quarta	...2 h a 20 °C.	...2h a 20°C.
31,34, 35, 36 e 37	3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 e 3.5	diversas	...°C...	...°C...
36	3.4.8	décima primeira	...continham no mínimo 10, 10, 9, 3, 3 e 3.....	...continham no mínimo 10, 5, 3, 3, 3 e 3...
56	4.2	décima	...(GA) ₃₃ ...	...(GA) ₂₀ CTT(GA) ₁₃ ...
60	4.2	sétima	...(AG) ₁₄ ...	...(AG) ₈ GTG(AG) ₆ ...
69 e 70	4.3	terceira	...aos indivíduos SV1 e 1(10), respectivamente...	...aos indivíduos SV1 e 1(10), respectivamente, e o <i>Ladder</i> é de 25 pb.
73	4.3	quinta	...Os cinco últimos <i>primers</i> amplificaram apenas o alelo esperado...	....Os cinco últimos <i>primers</i> amplificaram apenas o alelo esperado, e o <i>Ladder</i> é de 10 pb.
74	4.3	quarta	...amplificaram apenas o alelo predito pelo seqüenciamento (LBA)...	...amplificaram apenas o alelo predito pelo seqüenciamento (LBA), e o <i>Ladder</i> é de 10 pb.
75	4.3	quarta	...apresentaram-se polimórfico entre os genitores...	...apresentaram-se polimórfico entre os genitores, e o <i>Ladder</i> é de 10 pb.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP

Penha, Helen Alves

Desenvolvimento de marcadores microssatélites em *Passiflora alata* Curtis / Helen
Alves Penha - - Piracicaba, 2007.

92 p.; il.

Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2008.
Bibliografia.

1. Genética molecular vegetal 2. Maracujá 3. Marcador molecular 4. Melhoramento
genético vegetal 5. Primers do DNA 6. Variação genética em plantas I. Título

CDD 634.425

"Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor"

*Aos meus pais e familiares, por todo amor, apoio,
incentivo, e por sempre acreditarem em mim.*

DEDICO

*Aos meus amigos, os quais se
tornaram parte de minha família*

OFEREÇO

AGRADECIMENTOS

À Escola Superior de Agronomia “Luiz de Queiroz” (ESALQ) e ao Programa de Pós Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas;

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão de bolsas de estudo;

À Profa. Dra. Maria Lucia Carneiro Vieira por seus ensinamentos, oportunidade e orientação;

À Dra. Maria Imaculada Zucchi, do Instituto Agrônomo (IAC), por todo incentivo e pela valiosa contribuição na construção da biblioteca genômica enriquecida;

À Profa. Dra. Maria Helena Pelegrinelli Fungaro e à Bióloga Francine Matias de Paula, da Universidade Estadual de Londrina, pelo valioso apoio no seqüenciamento da biblioteca genômica enriquecida;

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, pelos conhecimentos compartilhados;

Ao técnico de laboratório Carlos Alberto de Oliveira, pela amizade, paciência e apoio no desenvolvimento deste trabalho;

Aos funcionários do Departamento de Genética da ESALQ, em especial à secretária Léia;

Aos amigos do Laboratório de Biologia Celular e Molecular de Plantas: Carla, Luciane, Alessandra, Luciano, Eder, Hanai, Anselmo, Bruno, Thiago, Endson, Larissa e Marcelo;

À Deus, por sempre me iluminar e me guiar;

À minha família, pelo seu amor incondicional e apoio em todos os momentos de minha vida;

Às amigas de moradia, Maria, Larissa e Ligia, por todo carinho, paciência, incentivo e diversão;

Ao meu namorado Cesar, por toda paciência, compreensão, apoio, incentivo e carinho nos momentos mais difíceis;

Aos amigos de Piracicaba, os quais sempre me proporcionaram momentos de alegria e descontração, em especial ao Carlos e Kátia Prado por todo apoio nos momentos mais críticos;

Aos amigos de Londrina e Sorocaba que, mesmo distantes, sempre me deram apoio e incentivo;

A todos aqueles que de forma direta ou indireta tenham contribuído para a realização deste trabalho.

SUMÁRIO

RESUMO.....	8
ABSTRACT	9
1 INTRODUÇÃO	10
2 DESENVOLVIMENTO	13
2.1 Botânica	13
2.2 A cultura do maracujá-doce.....	14
2.3 Marcadores microssatélites: Aspectos gerais, importância, e metodologias de obtenção.....	16
3 MATERIAL E MÉTODOS.....	25
3.1 Material Vegetal	25
3.2 Extração e quantificação de DNA.....	26
3.2.1 Extração de DNA genômico	26
3.2.2 Quantificação do DNA	27
3.3 Transferibilidade de <i>primers</i> de <i>P. edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> para <i>P. alata</i>	27
3.4 Construção da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites.....	30
3.4.1. Restrição do DNA.....	30
3.4.2 Ligação dos adaptadores	30
3.4.3 Pré-amplificação.....	31
3.4.4 Seleção dos fragmentos contendo microssatélites	32
3.4.5 Amplificação dos fragmentos selecionados, clonagem e transformação	34
3.4.6 Amplificação dos insertos clonados contendo microssatélites	35
3.4.7 Seleção e seqüenciamento dos clones positivos	35
3.4.8 Análise das seqüências.....	36
3.5 Validação de uma amostra de <i>primers</i>	37

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	39
4.1 Transferibilidade de <i>primers</i> de <i>P. edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> para <i>P. alata</i>	39
4.2 Biblioteca genômica enriquecida em microssatélites.....	49
4.3 Validação de uma amostra de <i>primers</i>	68
5 CONCLUSÕES.....	77
REFERÊNCIAS.....	78

RESUMO

O gênero *Passiflora* possui cerca de 450 espécies tropicais e subtropicais. Algumas delas têm crescente importância comercial, sendo cultivadas devido às características do fruto, como plantas ornamentais ou devido ao valor medicinal. Além de *Passiflora edulis* Sims f. *flavicarpa* Deg., o maracujá-amarelo, *Passiflora alata* Curtis, o maracujá-doce vem ganhando espaço no mercado, principalmente para consumo *in natura*. No entanto, não há variedades comerciais oriundas de programas de melhoramento genético, e os pomares mostram susceptibilidade a algumas pragas e doenças. Por isso, há a necessidade de um esforço para melhorar a produção de frutos e desenvolver variedades resistentes. O desenvolvimento de marcadores moleculares tem importância nesse processo, já que podem estar ligados a regiões genômicas que controlam caracteres agrônômicos. Os microssatélites são a classe mais informativa existente de marcadores genéticos. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de marcadores microssatélites de *P. alata* a partir de análises de transferibilidade de *primers* desenhados para *P. edulis* f. *flavicarpa*; a construção de uma biblioteca enriquecida em microssatélites de *P. alata* e o desenho de *primers* para tais seqüências; e a validação de uma amostra desses pares de *primers*, usando parte de uma população segregante (F_1) de *P. alata* e os respectivos genitores. A taxa de transferibilidade foi de 34%, indicando que essas seqüências flanqueadoras de microssatélites são conservadas em ambas as espécies. A biblioteca genômica enriquecida de *P. alata* forneceu 221 clones contendo microssatélites, com uma eficiência de enriquecimento da ordem de 42%. Foram desenhados pares de *primers* para 177 seqüências, uma amostra de 59 deles foi validada e os alelos foram identificados. Obteve-se elevada qualidade nas amplificações, via PCR, dando suporte ao uso destes locos em estudos genéticos de *P. alata*.

Palavras-chave: Maracujá-doce; *Passiflora alata* Curtis; Microssatélites; Biblioteca genômica enriquecida; Transferibilidade de *primers*.

ABSTRACT

The *Passiflora* genus contains approximately 450 tropical and subtropical species. Some of them have increasing commercial value and are cultivated for their fruit characteristics, as ornamental plants or due to medical value. Besides *Passiflora edulis* Sims f. *flavicarpa* Deg., the yellow passion fruit, *Passiflora alata* Curtis, the sweet passion fruit is growing presence in the market for fresh consumption. However, there are no commercial varieties based on genetic breeding programs, and the orchards are susceptible to some pests and diseases. Therefore efforts to improve fruit production and develop resistant varieties should be done. The development of molecular markers is important for this process, as markers could be linked to genomic regions that control agronomical traits. Microsatellites are the most informative class of genetic markers. The objective of this study was the development of microsatellites for *P. alata*, based on transferability of primers designed for *P. edulis flavicarpa*; the construction of a microsatellite-enriched genomic library and the design of primers for those sequences; and the validation of a sample of primer-pairs using part of a segregating population (F_1) of *P. alata* and its parents. Transferability level was 34%, indicating that those microsatellite-flanking regions are conserved in both species. The enriched genomic library produced 221 clones containing microsatellites, meaning an efficiency of the enrichment process of 42%. Primer pairs were designed for 177 sequences, a sample of 59 of them was validated and the alleles were identified. PCR amplifications of good quality were obtained suggesting the use of these loci in *P. alata* genetic studies.

Key words: Sweet passion fruit; *Passiflora alata* Curtis; Microsatellites; Enriched genomic library; Primer transferability.

1 INTRODUÇÃO

Os maracujazeiros são originários da América tropical, aonde existem 465 espécies de *Passiflora*, das quais 60 são usadas para o consumo humano ou uso medicinal. As espécies mais cultivadas no Brasil são o maracujá-amarelo (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*), o maracujá-roxo (*Passiflora edulis*) e o maracujá-doce (*Passiflora alata* Curtis) (LIMA; CUNHA, 2004; MANICA et al., 2005).

As características relativas a tamanho, coloração externa, aroma, propriedades medicinais e baixa acidez tornam o maracujá-doce bastante aceitável pelos consumidores brasileiros e europeus. Por isso, esta espécie vem ganhando espaço dentro do mercado de frutas *in natura*, havendo, portanto, maior interesse pelo seu cultivo e produção de frutos.

Diferentemente dos pomares de maracujá-amarelo, onde se cultivam variedades comerciais derivadas de seleção dirigida (MELETI; SANTOS; MINAMI, 2000), não há para o maracujá-doce variedades ou cultivares definidas, sendo que os produtores selecionam plantas produtivas, com frutos desejáveis, e as multiplicam por semente ou estaquia (VASCONCELLOS et al., 2001).

A principal forma de plantio do maracujá-doce, devido ao baixo custo, é por semente (MANICA et al., 2005). Entretanto, estas sementes são geradas em plantios onde a polinização é aberta, levando à grande heterogeneidade entre plantas em relação à qualidade dos frutos, potencial produtivo e resistência a pragas e doenças. Assim, a comercialização fica comprometida, por que são produzidos frutos desuniformes em relação a tamanho, peso e coloração, entre outras características.

É evidente a necessidade do desenvolvimento de programas de melhoramento genético para a criação de variedades comerciais, visando obter maior produtividade e frutos de alta qualidade.

Dentro deste contexto, os marcadores moleculares têm relativa importância, pois podem estar associados a regiões genômicas responsáveis pelo controle de caracteres de interesse agrônomo como, por exemplo, resistência a doenças, entre elas, a bacteriose causada por *Xanthomonas axonopodis* pv. *passiflorae*, e a virose causada pelo vírus do endurecimento do fruto (PWV).

Com o advento de marcadores moleculares, baseados na técnica de PCR (*Polimerase Chain Reaction*), como RAPD, AFLP e microssatélites, estudos genéticos de populações foram facilitados. Entre estes marcadores, destacam-se os microssatélites, os quais, devido à sua reprodutibilidade, rapidez da técnica, pequena quantidade de DNA requerida, baixo custo de utilização, grande poder de resolução e detecção de polimorfismo, vêm substituindo os demais (BRONDANI et al., 1998; CHEN et al., 1997; GIANFRANCESCHI et al., 1998; RALLO, DORADO; MATIN, 2000). Devido a isto, podem ser utilizados em diversos estudos, entre eles, a avaliação da diversidade genética de populações e espécies e, também, a construção de mapas de ligação.

O desenvolvimento dos locos microssatélites pode se basear no aproveitamento de *primers* desenvolvidos para outras espécies, os quais, devido à natureza conservada das seqüências flanqueadoras dos microssatélites, podem ser transferidos de um grupo para outro. Esta característica é denominada de transferibilidade ou amplificação heteróloga.

Os microssatélites também podem ser identificados por um *screening* na base de dados de DNA (*GeneBank*) da espécie a ser estudada e, então, serem desenhados para a sua amplificação, a partir da análise das seqüências flanqueadoras. Entretanto, há registros de poucas seqüências microssatélites disponíveis para *P. alata* (PÁDUA et al., 2005), havendo a necessidade da construção e do *screening* de uma biblioteca enriquecida, seqüenciamento de clones positivos para microssatélites, desenho e validação de *primers* para posterior depósito no banco de dados e disponibilização dos mesmos.

Sendo assim, este trabalho teve como objetivos:

- (a) a geração de marcadores microssatélites para *P. alata*, baseando-se em análises de transferibilidade de pares de *primers* desenhados a partir de seqüências oriundas de uma biblioteca enriquecida com microssatélites de *P. edulis* f. *flavicarpa*;
- (b) a construção de uma biblioteca genômica enriquecida com microssatélites de *P. alata*;
- (c) o desenho de *primers* microssatélites a partir das seqüências da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites;

(d) a validação de uma amostra de pares de *primers* em uma parte de uma população segregante F_1 e respectivos genitores.

No sentido mais amplo, tem a finalidade de fornecer marcadores para a posterior construção de mapas de ligação de *P. alata* e colaborar em estudos sobre diversidade de populações naturais e comerciais desta espécie.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Botânica

O gênero *Passiflora* L. faz parte de um grupo de plantas popularmente denominadas maracujás, sendo encontradas, na maioria, nas regiões tropicais das Américas e da África. Há cerca de 400 espécies de *Passiflora*, sendo que 120 destas são nativas do Brasil. Pertencem à classe Dicotyledonae, subclasse Archichlamydeae, ordem Passiflorales, subordem Flacoutiineae e família Passifloraceae (LIMA; CUNHA, 2004; ULMER; MAC DOUGAL, 2004).

As *Passifloras* apresentam-se na forma de trepadeiras vigorosas, que se prendem a suportes, utilizando gavinhas desenvolvidas principalmente nas axilas da folhas (BRUCKNER; PICANÇO, 2001). Possuem flores actinomorfas, variando de tamanhos de 1 cm (*P. multiflora* e *P. suberosa*) a 22 cm (*P. speciosa*). As flores possuem variáveis cores, podendo ser de cor vinho, branca, azul, violeta, rosa ou vermelha (ULMER; MAC DOUGAL, 2004).

Os frutos são arredondados ou alongados, e possuem coloração verde, amarela-alaranjada, ou com manchas verde-claras. Possuem tamanhos que variam de 0,7 cm (*P. suberosa*) até 30 cm (*P. quadrangularis*). As folhas também possuem tamanhos e formas variadas, podendo ser arredondadas ou partidas (ULMER; MAC DOUGAL, 2004). As sementes do gênero *Passiflora* apresentam-se compridas lateralmente, achatadas e pretas, cobertas por um arilo gelatinoso saciforme (BRUCKNER; PICANÇO, 2001).

As plantas do gênero *Passiflora* são dependentes da fecundação cruzada para a formação do fruto, pelo fato de suas flores apresentarem mecanismos que dificultam a ocorrência da auto-polinização, como a presença de estigmas no ápice androginóforo, em uma posição superior às anteras, que estão localizadas logo abaixo dos estigmas. Ocorre o fenômeno de protandria, e algumas espécies apresentam auto-incompatibilidade, ou compatibilidade parcial, devido a um sistema esporofítico homomórfico, como *P. edulis* e *P. alata* (BRUCKNER et al., 1995; MANICA et al., 2005).

Por ser em espécies auto-incompatíveis, as flores de *Passiflora* requerem polinizadores, sendo as mamangavas (*Xylocopa* ssp.) os principais agentes, devido ao seu tamanho possibilitar a coleta de pólen e a polinização ao mesmo tempo (MELETTI, 2003).

2.2 A cultura do maracujá-doce

O maracujá-doce é uma espécie indígena de ocorrência bastante generalizada no Brasil, onde também é conhecido vulgarmente como maracujá-grande, maracujá de refresco, maracujá-guaçu, maracujá-alado e maracujá de comer (SOUZA; MELETTI, 1997). Pertence ao sub-gênero *Passiflora*, superseção *Laurifolia*, serie *Quadrangulares*, espécie *Passiflora alata* Curtis (ULMER; MAC DOUGAL, 2004).

Segundo Salomão e Andrade (1987), é uma espécie originária do Brasil, com distribuição nos estados da Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Foi verificada a existência de maracujá-doce também no Espírito Santo, Rondônia, Amazonas e Pará (JUNQUEIRA et al., 2003), e no Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás e Distrito Federal (MANICA et al., 2005).

A exploração comercial dessa fruta no Brasil teve início a partir de 1960, quando tipos silvestres cultivados começaram a ser vendidos, se destacando por serem muito aromáticos e com baixa acidez, apesar de casca grossa e pouca polpa. O maracujá-doce também é cultivado para fins medicinais, porque produz passiflorina, um calmante natural (MELETTI; MAIA, 1999). Seu valor ornamental está associado às flores, coloridas e perfumadas.

Percebendo o potencial econômico dessa espécie, produtores iniciaram um processo de seleção, no sentido de obter frutos maiores e mais atrativos e, em meados da década de 70, os frutos começaram a chegar aos grandes mercados nacionais e, atualmente, estão também nos mercados internacionais, principalmente na Europa (MANICA et al, 2005).

A cultura do maracujazeiro-doce exige mão-de-obra especializada para a execução dos tratos culturais, como podas, polinização artificial, controle de plantas

daninhas e fitossanitário (DAMATTO Jr; LEONEL; PEDROSO, 2005). Pode ser formada através de semente ou por métodos vegetativos, como enxertia, estaquia e micropropagação. A cultura adapta-se muito bem às condições das propriedades de pequenos produtores, que empregam a mão-de-obra familiar, além de servir como alternativa de diversificação na propriedade (DAMATTO Jr; LEONEL; PEDROSO, 2005). Outro importante aspecto relacionado à cultura é a possibilidade de bons rendimentos ao produtor por unidade de área, porque o maracujá-doce atinge preços unitários muito expressivos no segmento de frutas frescas (MANICA et al., 2005).

O maracujá-doce é uma espécie com grande potencial produtivo, sendo os estados brasileiros com maior produção Santa Catarina, Distrito Federal e o estado de São Paulo, onde a produção pode chegar a 50 toneladas de frutos por hectare. Neste estado, destacam-se os municípios de Registro, Iguape e Marília como os maiores produtores. Entretanto, a produtividade nacional ainda é muito baixa, situando-se ao redor de 10 a 15 t/ha (KAVATI; PIZA JR.; 2002; MANICA et al., 2005). Apesar da pequena quantidade de fruta que chega ao mercado, ela atinge melhores cotações que o maracujá-amarelo, ocorrendo uma variação nos preços em função da época do ano, qualidade da fruta e distância do mercado consumidor (CEASA/MINAS, 2007).

Com a expansão da cultura, algumas doenças têm se desenvolvido, como a bacteriose (*Xanthomonas axonopodis* pv. *passiflorae*), a virose do endurecimento do fruto (*PWV*), e o nematóide das galhas (*Meloidogone* spp.), os quais são limitantes ao seu cultivo, podendo provocar perdas totais. Há outras doenças, como a fusariose ou murcha (*Fusarium oxysporum* f. *passiflorae*), podridão do pé (*Fusarium solani*) e antractose (*Colletotrichum gloeosporioides*) que vêm provocando perdas expressivas, porém não limitantes (MANICA et al., 2005).

Poucos são os dados sobre estimativas de parâmetros genéticos para a espécie, fundamentais para a condução e o sucesso de programas de melhoramento genético. Devido à escassez de estudos nesta área, o melhoramento do maracujá-doce constitui um vasto campo de pesquisas muito promissor. Neste contexto, o desenvolvimento de marcadores moleculares, entre eles os microssatélites, para a espécie é de fundamental importância, como será discutido a seguir.

2.3 Marcadores microssatélites: Aspectos gerais, importância, e metodologias de obtenção.

Os microssatélites consistem de seqüências simples repetidas, de um a seis nucleotídeos repetidos *em tandem*, que encontram-se amplamente distribuídos em genomas de eucariotos e procariotos. Podem ser designados por SSR (*Simple Sequence Repeats*), STR (*Short Tandem Repeats*) ou microssatélites, como serão denominadas no presente trabalho.

Segundo Weber (1990), os microssatélites podem ser classificados em: perfeitos, quando a seqüência repetida não é interrompida por qualquer base que não pertença ao motivo, por exemplo: ATATATATATATATATATATAT; imperfeitos, quando existem, entre os motivos, pares de bases que não correspondem ao microssatélite, por exemplo: ATATATATATcATATATAATA; compostos, quando a seqüência contém duas seqüências repetidas distintas adjacentes, por exemplo: ATATATATATATGTGTGTGT. Ainda podem ser classificados em relação à unidade repetitiva, como mononucleotídica, dinucleotídica, trinucleotídica, tetranucleotídica, pentanucleotídica e hexanucleotídica.

Os microssatélites são regiões do genoma que estão sob taxas de mutação muito elevadas, que variam de loco para loco, sendo esta variação de 10^{-2} a 10^{-6} nucleotídeos por loco, por geração (SCHLÖTTERER, 2000). Diferentes hipóteses têm sido formuladas para explicar os mecanismos que levam a essas altas taxas de mutação, como será descrito a seguir.

Durante o pareamento meiótico, pode ocorrer *crossing-over* desigual devido à natureza repetida das seqüências (Fig. 2.1). Este mecanismo pode ser responsável pelas altas taxas de polimorfismo dos microssatélites e são estas mutações que tornam os microssatélites tão informativos do ponto de vista genético, pois muitos alelos são gerados por loco (STRAND et al., 1993).

Figura 2.1 - Mecanismo de *crossing-over* desigual

O *slippage*, ou deslizamento da DNA polimerase, é o segundo e principal mecanismo por trás do surgimento e amplificação dos microsatélites nos genomas, gerando altas taxas de mutação nestas seqüências. Neste processo, surgem repetições de DNA através de outros tipos de mutação, como inserções e deleções (*indels*), que duplicam seqüências adjacentes, formando um "proto-microsatélite". (ROSE; FALUSH, 1998; ZHU et al., 2000). Durante a replicação dos "proto-microsatélites", ou de outras regiões repetidas já existentes, uma das fitas de DNA se dissocia, momentaneamente, da outra, sendo reaneladas, em seguida, em posições diferentes. Quando ocorrem estes erros de pareamento na fita de DNA a ser sintetizada, e a elongação da síntese desta fita continua, ocorre um aumento no comprimento do microsatélite, ao passo que se o erro ocorre na outra fita, haverá uma deleção de *repeats*. Assim, se a síntese continua nesta molécula, o número de *repeats* do microsatélite é alterado (LEVINSON; GUTMAN, 1987; FIELD; WILLS, 1996).

Um terceiro mecanismo de origem dos microsatélites, o qual não está bem esclarecido, está associado a retrotransposons, onde se supõe que microsatélites

ricos em adenina são gerados pela extensão terminal 3' dos retrotranscritos, semelhante ao mecanismo de poliadenilação dos RNAm (ARCOT et al., 1995).

A geração de polimorfismo em cada loco microssatélite, é resultado do diferente número de repetições do motivo que o caracteriza. Supondo um loco onde o nucleotídeo “AT” é a unidade de repetição, o polimorfismo que distinguirá os alelos deste loco dependerá da presença de números variáveis desta unidade de repetição. Então um alelo pode ser definido, por exemplo, pela ocorrência de 20 unidades de “AT” adjacentes lado a lado, enquanto outro alelo pode apresentar 18 repetições. Vários alelos de um mesmo loco podem então ser distinguidos por tamanho.

As seqüências microssatélites em um loco variam de um indivíduo para o outro, entretanto as seqüências de DNA que as flanqueiam são bastante conservadas entre indivíduos da mesma espécie. Conhecendo estas regiões adjacentes às seqüências microssatélites, é possível o desenho de pares de *primers* específicos, possibilitando a amplificação, via PCR, dos fragmentos que contêm o DNA repetitivo em diferentes genótipos.

A detecção dos alelos microssatélites, via PCR, é feita em gel de poliacrilamida, ou agarose especial de alta resolução, uma vez que é necessário uma matriz adequada para a separação eletroforética de segmentos que diferem por poucos pares de bases (Fig. 2.2). Podem ainda ser detectados pelo uso de *primers* fluorescentes por eletroforese em equipamento utilizado para seqüenciamento.

Cada loco de microssatélite é analisado a partir do par de *primers* construído especificamente para a sua amplificação. Mais do que um loco pode ser analisado simultaneamente quando os alelos de cada loco têm tamanhos suficientemente diferentes e migram para zonas separadas do gel. Nestes métodos de genotipagem, denominados “multiplex”, mais de um par de *primers* específicos é utilizado na mesma reação de PCR, otimizando, portanto, o processo de genotipagem.

Figura 2.2.- Detecção do polimorfismo em marcadores microsatélites

Segundo Sukanuma e Ciampi (2005), os microsatélites apresentam características altamente desejáveis como marcador: i) são marcadores co-dominantes, ou seja, ambos alelos de um indivíduo heterozigótico podem ser visualizados no gel; ii) estão amplamente distribuídos no genoma dos eucariotos; iii) são multialélicos; iv) são amplificados via PCR, o que facilita sua detecção mesmo com poucas quantidades de DNA, iv) uma vez desenvolvidos os *primers* que amplificam tais regiões do genoma, estes podem facilmente ser compartilhados entre laboratórios.

Os marcadores microsatélites fornecem relevantes informações para a construção de mapas de ligação, na análise gênica e de locos quantitativos (HAMWIEH et al., 2005; KNAPIK, 1998; OLIVEIRA et al., 2007; SCHULER et al., 1996; TEMNYKH, 2000), na identificação de acessos em unidades de conservação de germoplasma (MASONA et al., 2005), e para a investigação processos genéticos, como padrão de fluxo gênico, ocorrência de deriva (HEYWOOD; IRIONDO, 2003), proteção de variedades (PRIOLLI et al., 2002), análise de *pedigrees* (DREISIGACKER et al., 2004) sendo, portanto, um dos marcadores mais utilizados.

Apesar de todas as vantagens citadas, há desvantagens: a grande quantidade de trabalho necessário para o desenvolvimento prévio dos marcadores microsatélites e

o alto custo para o desenvolvimento de *primers* específicos para a amplificação dos locos, via PCR (CHEN, 1997; MCCOUCH et al., 1997).

Entretanto, vários estudos vêm demonstrando a utilização de *primers* heterólogos, resultando em uma minimização dos custos de implementação desses marcadores em espécies que apresentam uma baixa frequência de microssatélites, ou naquelas em que as seqüências de DNA repetitivo são de difícil isolamento. Esta característica dos microssatélites é denominada transferibilidade ou amplificação heteróloga, sendo possível devido à natureza conservada da seqüência de nucleotídeos das regiões flangeadoras.

Vários estudos vêm relatando altas taxas de transferibilidade em espécies pertencentes ao mesmo gênero (ALVES et al., 2006; BRAVO et al., 2006; CIPRIANI et al., 1999; GIMENEZ et al., 2007; HOSHINO et al., 2006; MORETZSOHN et al., 2004), e até entre espécies de diferentes gêneros (SANTOS et al., 2007). Como exemplo, Zhang et al. (2005), em estudos com *Triticum aestivum*, obtiveram taxas de transferibilidade de até 90,4% entre espécies de *Triticum*. Ao analisar a transferibilidade entre *T. aestivum* e *Oryza sativa*, obtiveram-se taxas mais baixas (28,3%), demonstrando que quanto menor a distância filogenética entre as espécies, menor é o nível de transferibilidade. Entretanto, resultados contraditórios foram observados por Roa et al. (2000), em estudos com *Manihot esculenta*.

Primers microssatélites desenvolvidos para diversas fruteiras vêm sendo testados em relação à sua transferibilidade, como em pêssego (CIPRIANI et al., 1999), cacau (ALVES et al., 2006), goiabeira-serrana (SANTOS et al., 2007) e maçã (COART et al., 2003).

Foi observada absoluta transferibilidade de locos microssatélites desenvolvidos para o pequi (*Caryocar brasiliense*) para cinco outras espécies do mesmo gênero, *C. coryaceum*, *C. edule*, *C. glabrum*, *C. pallidum* e *C. villosum*, revelando um alto nível de conservação nas regiões flangeadoras de microssatélites nestas espécies, permitindo assim, estudos comparativos sobre estrutura genética (COLEVATTI et al., 1999).

Pesquisas também têm evidenciado uma alta razão de transferibilidade de locos microssatélites entre espécies arbóreas taxonomicamente relacionadas, como ocorre dentro das Leguminosae (DAYANADAN et al., 1997) e Meliaceae (WRITE; POWELL,

1997), dentre espécies de *Eucaliptus* (BRONDANI et al. 1998), *Citrus* (KIJAS et al., 1995), *Prunus* (CIPRIANI et al., 1999), *Elaeis* (BILLOTE et al., 2001), *Picea* (HODGETTS et al., 2001), *Pinus* (LIEWLAKSANEEYANAWIN et al., 2004).

Segundo Morgante e Olivieri (1993), a frequência de microssatélites em plantas é menor do que em humanos e vertebrados. Por exemplo, foi observada uma densidade de microssatélites de 0,85% em *Arabidopsis thaliana*, 1,07% no cromossomo 22 humano e 3,21% em *Tetraodon nigroviridis*, uma espécie de peixe. Entretanto, as plantas possuem maior frequência de microssatélites do que os invertebrados (*Caenorhabditis elegans*, 0,21%) e as leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*, 0,30%) (MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002).

Os microssatélites do tipo dinucleotídeos AT/TA, AG/TC e AC/GT são os mais encontrados em plantas, sendo TAT e TCT os trinucleotídeos mais frequentes. Entretanto, apesar de ocorrerem em alta frequência, os microssatélites AT/TA são difíceis de serem detectados. Isto ocorre devido a sua auto-complementariedade, que prejudica o processo de hibridização. Por isso, utilizam-se com maior frequência as sondas GA e CA (MORGANTE; OLIVIERI, 1993; WANG et al., 1994).

Em plantas, foi verificado, através da observação da relação entre a quantidade de DNA de cópia única no genoma e a frequência de microssatélites, que a frequência dessas seqüências repetidas é inversamente correlacionada ao tamanho do genoma. Estas seqüências, geralmente, estão associadas a DNA não-repetitivo, pois, frequentemente, ocorrem dentro ou próximos aos genes. Em ESTs (*Expressed Sequence Tags*) de arroz, aproximadamente 65% dos microssatélites são compostos pelo trinucleotídeo CCG/CGG, sendo menos freqüentes em *Arabidopsis* e soja. A presença de maiores quantidades de microssatélites do tipo trinucleotídeos em regiões expressas ocorre devido à seleção negativa contra mutações do tipo “frameshift” (que ocorrem em outros tipos de motivos) pois podem levar a alterações das funções gênicas (MORGANTE; HANAFEY; POWELL, 2002).

Dentro das regiões transcritas dos genomas de plantas, encontra-se também um gradiente de distribuição de microssatélites. Foi verificado, em *Arabidopsis thaliana* e *Oryza*, uma maior quantidade de microssatélites trinucleotídicos em éxons do que em íntrons, fato este não verificado em mamíferos, como humanos e camundongos.

Verificou-se também que há uma maior concentração de microssatélites em regiões 5' UTR, no primeiro e último éxons, e na região 3' UTR. Estes microssatélites, por sofrerem pressão seletiva nestas regiões, podem estar trazendo algum benefício para o sistema biológico destas espécies de plantas, como controladores da transcrição, por exemplo (FUJIMORI et al., 2003).

Para se trabalhar com marcadores microssatélites, de início pode-se procurar por seqüências desta natureza em bancos de dados disponíveis, ou capturá-las em uma biblioteca genômica enriquecida. Em maracujá-doce a construção dessas bibliotecas é particularmente interessante, já que há poucas seqüências de microssatélites de *Passiflora* depositadas no *GeneBank* (<http://www.ncbi.nih.gov>).

Como método tradicional de isolamento de microssatélites, têm-se as bibliotecas genômicas, que consistem em um conjunto de clones de DNA nos quais são selecionados os fragmentos de interesse (SNUSTAD; SIMMONS, 2001). Entretanto, as mesmas resultam em baixa eficiência, pois o número de clones contendo microssatélites varia de 12% até 0,04% (ZANE; BARGELLONI; PATARNELLO, 2002). Butcher e Moran (2000) encontraram eficiência de apenas 1% em bibliotecas genômicas de *Acácia mangium*, eficiência esta muito baixa comparada aos 40% em uma biblioteca enriquecida construída para esta espécie.

Portanto, a utilização dessas bibliotecas tradicionais não é eficiente em casos de espécies que possuem baixas freqüências de microssatélites, como ocorre em alguns pássaros e algumas plantas, ou quando é necessário um grande número de microssatélites, como em estudos de distância genética entre populações (COOPER et al., 1999), ou quando se deseja construir mapas genéticos (HAMWIEH et al., 2005; KNAPIK, 1998; OLIVEIRA et al., 2007; SCHULER et al., 1996; TEMNYKH, 2000).

Para evitar a construção e *screening* de bibliotecas, alguns autores têm proposto modificações na técnica de RAPD (WILLIAMS et al., 1990) para a amplificação de microssatélites, baseando-se no fato de que existem regiões repetitivas nos *amplicons* detectados pela técnica de RAPD. Para isto, ou se utilizam *primers* randômicos ancorados às repetições (WU et al., 1994), ou se utilizam os *primers* de RAPD e posterior hibridização com sonda de microssatélites (CIFARELLI; GALLITELLI; CELLINI, 1995).

Uma outra opção para o isolamento de microssatélites é baseada na extensão de *primers*, para a qual relatam-se altos níveis de enriquecimento de repetições AC, variando de 40% até 100% (OSTRANDER et al., 1992; PAETKAU, 1999). Este protocolo envolve a construção de uma biblioteca genômica, onde o DNA fragmentado é inserido em vetores de fagos, obtendo-se uma biblioteca de DNA de fita simples, a qual é usada como molde para uma reação de extensão do *primer*, constituído por uma sequência repetitiva, que gera DNA de fita dupla apenas nos vetores contendo as repetições desejadas.

Uma outra alternativa é a técnica denominada FIASCO (*Fast Isolation by AFLP of Sequences Containing Repeats*), que se baseia na técnica de AFLP, na qual o DNA é, ao mesmo tempo, digerido com a enzima *MseI* e ligado a adaptadores. Em seguida, é realizada uma pré-amplificação com uma mistura de *primers* contendo quatro bases seletivas, o que permite amplificar todos os fragmentos que estão flanqueados por sítios *MseI*. Em seguida, o DNA é hibridizado com sondas marcadas e associadas à biotina, sendo recuperado com o uso das contas magnéticas ligadas à estreptavidina (CIFARELLI; GALLITELLI; CELLINI, 1995). Os fragmentos que possuem microssatélites são então selecionados e, após muitas etapas de lavagens para remover o DNA ligado, o DNA é eluído e amplificado por PCR. Esta seleção corresponde ao enriquecimento da biblioteca. O DNA, então, é clonado e depois sequenciado para análise das sequências e desenho dos *primers* (CIFARELLI; GALLITELLI; CELLINI, 1995).

O método mais utilizado para isolamento de microssatélites e que resulta em maior eficiência, é o método de bibliotecas enriquecidas (BILLOTE et al., 1999; KIJAS et al., 1994). Os métodos de enriquecimento oferecem uma maior eficiência na captura de microssatélites do que o método tradicional (genômico), levando à obtenção de grandes quantidades de clones contendo microssatélites e apropriados para o desenho de *primers* (HAMILTON, 1999). Para o desenvolvimento da biblioteca enriquecida, primeiramente, se fragmenta o DNA com enzimas de restrição com corte abrupto para, posteriormente, este ser ligado a adaptadores específicos. Os fragmentos, após amplificação e purificação, são hibridizados com sondas contendo repetições de microssatélites, sendo a sonda ligada a uma membrana de nylon (EDWARDS, et al., 1996), ou biotinilada. As sondas ligadas aos fragmentos que tem afinidade pela biotina

aderem a contas magnéticas que estão aderidas à estreptavidina (BILLOTE et al., 1999; KIJAS, et al., 1994). O restante dos passos é feito da mesma forma como descrito na metodologia anterior.

Devido ao desenvolvimento de protocolos cada vez mais otimizados e às tecnologias de seqüenciamento automático, baseadas em fluorescência, o desenvolvimento de bibliotecas enriquecidas tem se tornado mais acessível. Atualmente, encontram-se bibliotecas desenvolvidas para diversos grupos taxonômicos, como pode ser observado na Figura 2.3, segundo revisão feita por Zane, Bargelloni e Patarnello (2002).

Figura 2.3 – Número de artigos publicados no periódico *Molecular Ecology (Primer Notes)* (Janeiro 1999 a Março 2001), relatando o isolamento de microsatélite pela metodologia tradicional (barra cinza-escura) e através do desenvolvimento de biblioteca enriquecidas (barra cinza-claro), segundo o grupo taxonômico

Fonte: Zane; Bargelloni e Patarnello, 2002

Já foram desenvolvidos *primers* de microsatélites para vários grupos de plantas de interesse agrônomo, como cana-de-açúcar (CORDEIRO et al., 2000), eucalipto (BRONDANI et al., 1998), batata (ASHKENAZI et al., 2001), palmito (GAIOTTO et al., 2000), mogno (LEMES et al., 2002), arroz (BRONDANI et al., 2001), ipê (BRAGA et al., 2007), incluindo diversas fruteiras, como pêra (YAMAMOTO et al., 2001), oliva, (DÍAZ et al., 2006), manga (HONSHO e al., 2005), maçã (SILFVERBERG-DILWORTH et al., 2006), pêssego, (YAMAMOTO et al., 2002), maracujá-amarelo (OLIVEIRA et al., 2005), pequi (COLLEVATTI et al., 1999) e melão (RITSCHER et al., 2002), entre outras.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material Vegetal

Há dois acessos de maracujá-doce (*Passiflora alata*) disponíveis em nosso Laboratório:

(a) um acesso cultivado, designado por **SV**, cedido pelo Sr. José Odorico Rolim, proprietário do sítio “Chácara Verde” (Piracicaba, SP);

(b) cinco progênies de meios-irmãos e respectivas progenitoras (1,2,3,4 e 5), oriundas da Embrapa Cerrados, Brasília, DF, cedidas pelo Dr. Nilton Junqueira.

No presente estudo, para os ensaios de transferibilidade de *primers*, foram usados 12 indivíduos, sendo 9 deles pertencentes a uma das progênies de meios-irmãos [plantas 2(1) a 2(9)] e a sua progenitora (2). Utilizaram-se, também, os acessos de maracujá-amarelo (*P. edulis* f. *flavicarpa*) IAPAR-123 e IAPAR-06, cedidos pelo Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR, Londrina, PR), a partir dos quais foi construída a primeira biblioteca enriquecida com seqüências microssatélites (Oliveira, 2006).

A planta SV1 foi usada para o desenvolvimento da biblioteca enriquecida com microssatélites de *P. alata*. Para a validação de uma amostra de pares de *primers* desenhados a partir das seqüências oriundas desta biblioteca, utilizou-se o DNA dos indivíduos SV1 e 1(10).

Outros indivíduos usados na validação de uma amostra de *primers* de *P. alata* foram os genitores SV3 e 2(12) e uma amostra de 10 plantas da geração filial (F_1), que está sendo usada para a construção de um mapa de ligação. A escolha destes genitores foi feita em função do seu contraste molecular, revelado por análises por AFLP, e devido a sua origem geográfica distinta (NUNES et al., 2007).

3.2 Extração e quantificação de DNA

3.2.1 Extração de DNA genômico

A extração do DNA genômico foi feita de acordo com Doyle e Doyle (1987), com algumas modificações. Para o rompimento das paredes e membranas celulares, 2g de tecido foliar jovem de cada indivíduo foram macerados em um almofariz com nitrogênio líquido usando um pistilo. O tecido pulverizado foi adicionado a um tubo de 15 ml contendo 8 mL de tampão de extração CTAB [100 mM de Tris HCl pH 8,0; 1,4 M de NaCl; 2% (p/v) de CTAB; 20 mM de Na₂EDTA pH 8,0; 1% (p/v) de PVP 40.000] previamente aquecido a 65°C. As amostras foram homogeneizadas e incubadas a 65°C por 1h em banho-maria, com leve agitação a cada 10 min. Em seguida, foi realizada a extração da parte orgânica das amostras pela adição de 6 mL de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1), seguida de agitação por inversão durante 5 min e centrifugação por 10 min a 10.000 rpm. A fase aquosa foi, então, transferida para novos tubos de 15 mL, tratados com RNase (0,01 mg/ml) e incubados por 2 h a 37°C. Para a precipitação do DNA, foram adicionados 5 mL de isopropanol absoluto e os tubos foram mantidos por 2hs a 4°C. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 10000 rpm por 5 min, e o sobrenadante foi descartado e o *pellet* lavado duas vezes. A primeira foi realizada com uma solução de lavagem (7,5 M de AcNH₃ e 70% de etanol) e a segunda com etanol 70%. O DNA foi, então, ressuscitado em 1,0 mL de TE (10 mM de Tris HCl pH 8,0; 1 mM de Na₂EDTA pH 8,0), deixando a solução *overnight*. A solução contendo ácidos nucléicos passou, em seguida, por duas extrações orgânicas. Ao tubo de 2,0 mL, contendo 1,0 mL de solução de ácidos nucléicos, foi adicionado 1,0 mL de fenol saturado, suavemente agitado e centrifugado por 10 min a 10.000 rpm. A fase aquosa foi recuperada e adicionada a um novo tubo de 2,0 mL, contendo 750 µL de clorofórmio. A suspensão foi suavemente agitada e centrifugada por mais 10 min a 10.000 rpm. A fração contendo DNA (cerca de 500 µL) foi transferida para novo tubo de 2,0 mL e o DNA foi precipitado pela adição de 1.250 µL de etanol absoluto e 250 µL de acetato de amônio (7,5 M). Os tubos foram mantidos por 20 min a -20°C para favorecer a precipitação. Em seguida, os tubos foram centrifugados por 5 min a 8.000 rpm e o *pellet*

lavado com 500 μL de álcool 70%. O álcool foi descartado e os tubos foram colocados para secar por 2 h à temperatura ambiente. Por fim, o DNA foi ressuspensionado em 200 μL de TE e estocado a -20°C para uso posterior.

3.2.2 Quantificação do DNA

A quantificação foi realizada após eletroforese (3 V/cm) de alíquotas de cada amostra, em gel de agarose 1,0% (p/v), comparando-as com uma série de concentrações conhecidas de DNA do fago Lambda (Invitrogen).

A concentração do DNA foi estimada a partir da comparação visual das intensidades das bandas, reveladas por coloração com brometo de etídeo (1,0 $\mu\text{g/mL}$) por 20 minutos, sendo a fluorescência proporcional à concentração de DNA. O resultado foi documentado por fotografia sob luz UV, usando equipamento de fotodocumentação (Geldoc – Bio Rad).

Uma alíquota do DNA dos indivíduos utilizados nos ensaios de transferibilidade de *primers* foi diluída na concentração de 10 ng/ μL para o uso. Uma alíquota do DNA do acesso SV1 foi diluído na concentração de 250 ng/ μL para a utilização no desenvolvimento da biblioteca enriquecida em microssatélites, e uma alíquota dos indivíduos usados para a validação de uma amostra dos *primers* de *P. alata* foi diluída na concentração de 10ng/ μL para o uso.

3.3 Transferibilidade de *primers* de *P. edulis* f. *flavicarpa* para *P. alata*.

Foi testada a transferibilidade de 97 pares de *primers* de *P. edulis* f. *flavicarpa*, desenhados a partir de sequências oriundas de uma biblioteca enriquecida em microssatélites, desenvolvida por Oliveira et al. (2005), segundo o protocolo de Kijas et al. (1994). Parte destes pares de *primers* foi usada para a construção de um mapa molecular integrado de maracujá-amarelo, por Oliveira et al. (2007).

Inicialmente, foram utilizadas as mesmas condições de amplificação (*Mix*, TM) estabelecidas por Oliveira (2006) para o maracujá-amarelo. Para os pares de *primers*

que não apresentaram amplificação, ou apresentaram amplificação de bandas inespecíficas em *P. alata*, foi feita a otimização das condições de PCR usando quatro diferentes *mix* de reação (Tab.3.1).

Tabela 3.1 – Concentração dos reagentes e relação dos *mix* utilizados para a otimização da PCR para cada par de *primers* usados nos testes de transferibilidade

Reagentes	Mix 2	Mix 4	Mix 5	Mix 7
Tampão	1X	2X	1X	1X
Primer F+R*	0,3 µM	0,3 µM	0,3 µM	0,3 µM
DNA	20 ng	20 ng	20 ng	20 ng
MgCl ₂	1,5 mM	1,5 mM	2,5 mM	2,5 mM
dNTP	200 µM	200 µM	200 µM	350 µM
<i>Taq</i> Polimerase	0,2 U	0,2 U	0,2 U	0,2 U
Água deionizada	9,7 µL	7,7µL	8,9µL	7,7µL

* F e R –*primers* Forward e Reverse, respectivamente.

Foram usadas as temperaturas de anelamento de 60°C ou 56°C, e duas condições de amplificação em esquema *touch-down*, com base nos programas TD60 e TD56 (Tab. 3.2).

Tabela 3.2 - Condições de amplificação usados nos testes de transferibilidade

Programa TD60			Programa TD56		
Nº de ciclos	Temperatura	Tempo	Nº de ciclos	Temperatura	Tempo
1	94 °C	5 min	1	94 °C	5 min
8	94 °C	40 s	12	94 °C	40 s
	60°C - 0,5 °C por ciclo	40 s		56°C - 0,5 °C por ciclo	40 s
	72 °C	50 s		72 °C	50 s
24	94 °C	40 s	20	94 °C	40 s
	56 °C	40 s		56 °C	40 s
	72 °C	50 s		72 °C	50 s
1	72 °C	5 min	1	72 °C	5 min
1	8 °C	∞	1	8 °C	∞

Os produtos resultantes da PCR foram separados em gel de poliacrilamida [acrilamida/bisacrilamida (19:1) 5%, uréia 7,0 M, tampão TBE 1X] de 0,4 mm de espessura. O gel foi corrido a uma potência constante de 80 W por cerca de 2 h 30 min, usando um aparato de eletroforese Sequi-Gen® (Bio-Rad). O *Ladder* de 10 pb (Invitrogen) foi usado como marcador de peso molecular.

A coloração foi realizada com nitrato de prata (AgNO_3) em cinco etapas, de acordo com Creste, Tulmann Neto e Figueira (2001), com algumas modificações, como descrito a seguir:

Etapa 1 (fixação): a fixação do gel foi feita por imersão em solução de etanol 10% e ácido acético 1%, agitando por 10 min, seguida de uma lavagem com água destilada e deionizada, durante 1 min, com agitação.

Etapa 2 (oxidação): o pré-tratamento foi realizado com solução de ácido nítrico 1,5% durante 3 min, seguindo-se uma nova lavagem do gel com água destilada deionizada durante 1 min.

Etapa 3 (impregnação com prata): a impregnação do gel foi feita em solução de nitrato de prata 0,2% durante 20 min, sob agitação, seguida de duas novas lavagens com água destilada deionizada, com duração de 30 segundos cada.

Etapa 4 (revelação): para a revelação dos géis, foi utilizada uma solução de 2L contendo 60 g de Na_2CO_3 e 2,0 mL de formaldeído (37%). Nesta etapa, 1 litro da solução foi aplicada sobre o gel até começarem a surgir bandas. Após este passo, a solução foi descartada e o outro litro foi adicionado para finalizar o processo de revelação. Após a revelação da placa, a solução foi descartada.

Etapa 5 (bloqueio): o bloqueio da revelação foi feito em solução de ácido acético 5% durante 5 min, seguindo-se de uma nova lavagem com água destilada deionizada durante 1 min. Após este passo, para a secagem do gel, a placa foi colocada em posição vertical em um local seco e arejado, sob temperatura ambiente.

Os géis foram analisados colocando-se a placa sobre uma fonte de luz branca, e digitalizados por um scanner (Genius Color Page 3200).

3.4 Construção da biblioteca genômica enriquecida com microssatélites

A construção da biblioteca genômica enriquecida foi feita utilizando-se os protocolos desenvolvidos por Billote et al. (1999) e Kijas et al. (1994), com algumas modificações, tal como está descrito a seguir:

3.4.1 Restrição do DNA

O DNA genômico (5 µg) foi digerido por hidrólise enzimática (Fig. 3.1), adicionando-se na reação 10 µL de tampão de reação 10X, 5,0 µL da enzima de restrição *RsaI* (10 u/µL, Invitrogen), 10 µL de espermidina 40 mM e água Mili-Q para completar 100 µL. O material foi incubado a 37°C *overnight* para restrição. A título de controle foram aplicados 10 µL da digestão + 2 µL stop em um gel de agarose 1,2% preparado em TAE 1X (60V), o qual foi corado em brometo de etídeo (1,0 µg/mL) por 20 min, após a corrida eletroforética (3V/cm).

3.4.2 Ligação dos adaptadores

Esta etapa foi realizada para garantir que todos os fragmentos digeridos tivessem uma terminação comum e conhecida para que, na próxima etapa, uma amplificação via PCR pudesse ser realizada, possibilitando a pré-seleção de seqüências com microssatélites. Assim, para atender a esta etapa, os fragmentos digeridos foram ligados a adaptadores específicos (Fig. 3.1). Para a ligação dos adaptadores *Rsa21* (5' CTCTTGCTTACGCGTGGACTA 3') e *Rsa25* (5' TAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA 3'), a reação foi feita com: 1 µg do DNA digerido na etapa anterior, 10 µL de tampão 5X [Promega - (150 mM Tris-HCl (pH 7,8), 50 mM de MgCl₂, 50 mM de DTT e 5 mM de ATP)], 2 µL de cada adaptador (10 µM), 4 U de T4 DNA ligase (Promega) e água para completar 50 µL. A reação foi incubada por 2 h a 20°C.

3.4.3 Pré-amplificação

Os fragmentos ligados aos adaptadores foram pré-amplificados usando-se o *primer Rsa21* (Fig. 3.1). A reação foi feita adicionando-se 5 µL do produto da ligação, 2 µL de *primer* (10 µM), 5 µL de tampão 10X [Fermentas - (100 mM Tris-HCl (pH 8,8), 500 mM de KCl e 0,8% de Nonidet P40)], 1,5 µL de MgCl₂ (50 mM), 4 µL de dNTP (2,5 mM), 3 U de Taq DNA polimerase (Fermentas) e água Mili-Q para completar 50 µL. Os ciclos de amplificação por PCR foram feitos conforme descrito a seguir: 95°C por 4 min, seguindo-se 20 ciclos de 94°C por 30 s, 60°C por 1 min, 72°C por 1 min e extensão final a 72°C por 8 min. A título de controle, foi feito um gel de agarose 1%, preparado com TAE 1X (110V), onde foram aplicados 10 µL da digestão + 2 µL stop. O gel foi corado com brometo de etídeo (1,0 µg/mL) por 20 min, após a corrida eletroforética (3 V/cm). A reação de amplificação foi purificada usando o Kit Wizard® PCR Preps (Promega), para remover tampões, Mg e Taq, em um volume final de 100 µL.

Figura 3.1- Etapas do desenvolvimento da biblioteca enriquecida em SSR: Digestão do DNA genômico, ligação dos adaptadores *Rsa21* e *Rsa25* e pré-amplificação com o *primer Rsa21*

Fonte: Zane, Bargelloni e Patarnello (2002)

3.4.4 Seleção dos fragmentos contendo microssatélites

Nesta etapa, que corresponde ao enriquecimento, foi feita uma seleção dos fragmentos que contêm regiões microssatélites (Fig. 3.2). Para isto, os fragmentos foram selecionados por hibridização com oligonucleotídeos biotinilados [biotina (CT)₈, biotina (TTC)₈ e biotina (GT)₈], que foram recuperados com estreptavidinas ligadas a contas magnéticas (KIJAS et al., 1994).

Como as contas magnéticas marcadas com estreptavidina precisam de uma preparação prévia, homogeneizou-se um tubo do produto Streptavidin Magnesfere Paramagnetic Particle (Promega), usando vortex. Em seguida, os 600 µL do produto foram magnetizados (deixados aderir na parede), por 30 segundos, e o sobrenadante foi descartado. Após este processo, foram feitas três lavagens com 300 µL de SSC 0.5X. A cada lavagem, descartou-se o líquido, mantendo as esferas magnéticas na parede do tubo com um rack MagneSphere® Technology Magnetic Separation Stand (Promega). No final, as esferas foram ressuspensas em 100 µL de SSC 0.5X.

Para o preparo do DNA, juntaram-se 400 µL de água aos 100 µL de DNA purificado. Esta solução foi incubada a 95°C por 15 min. Em seguida, adicionaram-se 13 µL de SSC 20X e 2 µL de cada sonda de microssatélite; os tubos foram deixados à temperatura ambiente por 20 min, com agitação suave a cada 2 min. As esferas magnéticas marcadas com estreptavidina formam um complexo com a sonda marcada com biotina. Nesta etapa (Fig. 3.2), a sonda, que está em complexo com as esferas magnéticas, devido à afinidade da biotina pela estreptavidina, hibridiza-se com os fragmentos de DNA que têm seqüências complementares (microssatélites).

Figura 3.2 - Etapas do desenvolvimento da biblioteca enriquecida em microssatélites: Hibridização de sondas (biotinizadas) de microssatélites com o DNA digerido e amplificado, e seleção dos fragmentos, por magnetização

Fonte: Zane, Bargelloni e Patarnello (2002).

Os 100 μL de esferas pré-lavadas foram misturados com os 519 μL da mistura de hibridização, sendo incubados por 10 min à temperatura ambiente, agitando suavemente o tempo todo. Após este procedimento, a solução foi magnetizada por 30 segundos, o sobrenadante descartado e a solução ressuspensa em 300 μL de SSC 0,1X. Esta etapa foi repetida por 3 vezes.

Na última etapa, a solução foi ressuspensa em 100 μL de água e magnetizada por 30 segundos. O sobrenadante foi reservado em um tubo *ependorf* e a solução novamente ressuspensa e magnetizada com 150 μL de água. As duas partes foram misturadas num volume final de 250 μL e conservadas a -20°C .

3.4.5 Amplificação dos fragmentos selecionados, clonagem e transformação

Nesta etapa, foi feita uma amplificação dos fragmentos selecionados (previamente ligados à adaptadores) para gerar fragmentos de fita dupla em maior quantidade. Os fragmentos foram amplificados por PCR utilizando o *primer Rsa21*, nas seguintes condições: 20 µL dos fragmentos selecionados pelas contas magnéticas, 4 µL de *primer* (10 µM), 10 µL de tampão 10X (Fermentas), 3 µL de MgCl₂ (50 mM), 8 µL de dNTP (2,5 mM), 1 U de Taq DNA polimerase (Fermentas) e água Mili-Q para completar 100 µL. A PCR foi feita conforme descrito a seguir: 95°C por 1 min, seguindo-se 20 ciclos de 94°C por 40 s, 60°C por 1 min, 72°C por 2 min e extensão final de 72°C por 5 min. A título de controle, foi feito um gel de agarose 1,2% preparado com TAE 1X, (3V/cm), onde foram aplicados 10 µL da digestão + 2 µL stop, o qual foi corado em brometo de etídeo (1,0 µg/mL) por 20 min após a corrida eletroforética.

Em seguida, os fragmentos foram clonados no vetor pGEM-T (Promega), utilizando-se 1 µL do vetor, 10 µL de tampão 2X, 1 µL de T4 DNA ligase, 2 µL de água deionizada autoclavada e 6 µL do produto da amplificação.

A transformação bacteriana foi feita por choque térmico. Para isso, 50 µL da solução com células competentes de *Escherichia coli* (SAMBROOK; RUSSEL, 2001) foram colocados em gelo, 10 min antes da manipulação. Após este tempo, adicionaram-se 6 µL da ligação e 24 µL de Transfobuffer (KCM 10 X e 10% de PEG), em suave agitação, sendo deixados em gelo por 20 min. Após este período, foi dado um choque a 42°C durante 2 min, e os tubos colocados em seguida em gelo por 5 min. A seguir, foram retirados do gelo, levados ao fluxo e adicionados 450 µL de meio SOC (SAMBROOK; RUSSEL, 2001) pré-aquecido, e os tubos colocados a 37°C, durante 50 min. Após este período, os tubos foram centrifugados a 1300 rpm por 30 segundos e, em seguida, foram descartados 420 µL do sobrenadante, sendo ressuspensionado o restante. A amostra de células transformadas, mais 60 µL de X-Gal 2% (DimetilformamidaMF; Amersham Biosciences) e 60 µL de IPTG 20% (Amersham Biosciences) foram plaqueadas em meio LB sólido contendo ampicilina (100 mg/mL; Amersham Biosciences). As placas foram incubadas em estufa a 37°C *overnight*, e

deixadas em refrigerador para ficarem mais azuis, facilitando, na hora do repique, a seleção de colônias brancas.

3.4.6 Amplificação dos insertos clonados contendo microssatélites

As colônias transformadas (brancas) foram transferidas individualmente no fluxo, usando-se palitos esterilizados, para placas de ELISA com fundo em U. Cada poço continha 200 μL de meio 2YT-HMFM com ampicilina (100 $\mu\text{g/mL}$), sendo, em seguida, incubadas *overnight* em estufa a 37°C e, posteriormente, congeladas a -80°C.

Foi transferida uma amostra de 4 μL de cada clone para uma placa de PCR 96 wells, e preparada uma reação contendo: 2,5 μL do *primer Rsa21* (10 μM), 5 μL de tampão 10X, 2,0 μL de MgCl_2 (50 mM), 4 μL de dNTP (2,5 mM), 3 U de *Taq polimerase* (Invitrogen) e água Mili-Q para completar 50 μL . A PCR foi feita como a seguir: 95°C durante 4 min, seguindo-se de 30 ciclos de 94°C por 30 segundos, 52°C por 45 segundos, 72°C por 1 min:30 segundos, e 72°C por 8 min. Esta reação foi feita para confirmar a presença dos insertos de interesse nas colônias selecionadas.

3.4.7 Seleção e seqüenciamento dos clones positivos

O DNA plasmidial contendo os insertos foi extraído utilizando o procedimento de lise alcalina (SAMBROOK; RUSSEL, 2001), sendo, ao final, ressuspenso em 30 μL de água Milli-Q autoclavada e sua concentração estimada em gel de agarose 1%.

As reações de seqüenciamento foram feitas com 2,0 μL de água Milli-Q autoclavada, 3 μL DNA, 1,0 μL de *primer F* ou *R* (10 pmoles/ μL) e 4,0 μL de DYEnamic^{TM} ET terminator (Amersham Biosciences). A precipitação da reação foi feita colocando-se 1 μL acetato de amônia (7,5M) e 27,5 μL de etanol absoluto gelado, por aproximadamente 1 h. As amostras, foram centrifugadas por 40 min a 4000 rpm (20°C), e seu conteúdo foi vertido, com cuidado para não deixar cair o *pellet*. Foram acrescentados 150 μL de álcool 70%, e os tubos centrifugados por 15 min a 4000 rpm. Posteriormente, as amostras foram vertidas e colocadas em estufa a 42°C para secar,

por 20 min. Em seguida, adicionaram-se 10 µL de água deionizada esterilizada para, posteriormente, as amostras serem aplicadas no seqüenciador.

Inicialmente, 864 clones foram seqüenciados utilizando o *primer* M13 *forward*. Os seqüenciamentos foram realizados em plataformas de seqüenciamento automático MegaBACE 1000, no Laboratório de Genética Molecular da Universidade Estadual de Londrina.

3.4.8 Análise das seqüências

Para a identificação das seqüências contendo microssatélites, utilizou-se o programa TROL-*Tandem Repeat Occurrence Locator* (CASTELO, 2002). As seqüências de microssatélites selecionadas para serem desenhados pares de *primers* foram as que continham no mínimo 10, 10, 9, 3, 3 e 3 repetições do motivo microssatélite do tipo mono, di, tri, tetra, penta e hexanucleotídeo, respectivamente.

Pares de *primers* específicos para a amplificação dos locos microssatélites foram desenhados utilizando o programa *Primer3* (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi) (ROZEN; SKALETISKY, 2000). O desenho dos *primers* foi feito segundo alguns critérios: tamanho dos oligonucleotídeos variando entre 18 a 22 bases, temperatura de anelamento variando entre 45°C e 60°C, diferença de temperatura de anelamento máxima entre cada *primer* do par igual ou menor que 3°C e conteúdo GC variando entre 40 e 60% (Fig. 3.3). Visando facilitar a posterior análise dos géis, os *primers* foram desenhados, sempre que possível, de forma que o produto de amplificação (banda) tivesse, no mínimo, 100 pb e no máximo 330 pb. As seqüências foram analisadas quanto à qualidade dos eletroforegramas no programa *Chromas* v. 2.31. Para a análise da formação de estruturas secundárias nos *primers* desenhados, como *hairpins*, dímeros e *loops*, utilizou-se o programa *Gene Runner*. Para evitar o desenho de pares de *primers* redundantes, todas as seqüências obtidas foram alinhadas entre si. O alinhamento foi realizado com o auxílio do programa de alinhamento múltiplo Clustal X (THOMPSON et al., 1997).

As amplificações foram realizadas em termociclador da Applied Biosystems, e os resultados foram visualizados em gel de agarose 3% (p/v) sendo que o tamanho dos

fragmentos foi determinado por comparação com a corrida do marcador de peso molecular *Ladder* 25pb (Invitrogen).

Após a realização dessa etapa, todos os pares de *primers* que resultaram em uma amplificação positiva, foram submetidos à novas reações, a partir de um conjunto de 12 indivíduos de *P. alata* composto pelos genitores de uma população de mapeamento, SV3 e 2(12), e 10 indivíduos da F_1 . Os produtos resultantes destas reações foram separados em gel desnaturante 6% de poliacrilamida 7M de uréia, em tampão TBE 1X, e visualizados por coloração com prata (CRESTE; TYLMANN NETO; FIGUEIRA, 2001).

O tamanho dos fragmentos foi determinado por comparação com a corrida do marcador de peso molecular *Ladder* 10pb (Invitrogen), e os géis foram digitalizados por um scanner (Genius Color Page HR3200).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Transferibilidade de *primers* de *P. edulis* f. *flavicarpa* para *P. alata*.

Para o desenvolvimento de marcadores microssatélites, é necessário um alto investimento financeiro, conhecimento técnico especializado, além de um tempo relativamente grande. Existe uma alternativa para minimizar estas dificuldades, principalmente, em espécies que apresentam uma baixa frequência de microssatélites, ou naquelas em que as seqüências de DNA repetitivo são de difícil isolamento. Esta alternativa, denominada de transferibilidade ou amplificação heteróloga, aproveita a natureza conservada da seqüência de nucleotídeos das regiões flanqueadoras de espécies aparentadas e assim utilizam-se pares de *primers* desenvolvidos a partir dessas espécies, no novo estudo.

Neste contexto, um conjunto de 97 pares de *primers* desenvolvidos para o maracujá-amarelo (OLIVEIRA et al., 2005) foi testado quanto à sua transferibilidade para *P. alata*.

Dos 97 pares de *primers* avaliados (Tabela 4.1), 33 produziram resultados favoráveis, observando-se os seguintes padrões de amplificação: 10 pares de *primers* amplificaram o alelo esperado pelo seqüenciamento, mas outros locos foram amplificados (LBA + OL) (Fig. 4.1a); 11 não amplificaram o alelo seqüenciado, mas outros locos foram amplificados (AOL) (Fig. 4.1b) e 12 amplificaram o loco correspondente ao de maracujá-amarelo, com presença do alelo esperado (LBA) (Fig. 4.1c). Os 64 pares de *primers* restantes não amplificaram nenhuma banda (AS) (Fig. 4.1d).

Figura 4.1 - Exemplos de padrões de amplificação de *primers* desenhados para *P. edulis* f. *flavicarpa* e transferidos para *P. alata*: (a) *primer* 06E2DP1, apresentando o padrão LBA+OL, (b) *primer* ED23, apresentando o padrão AOL, (c) *primer* EA12, apresentando o padrão LBA e (d) *primer* ED11, apresentando o padrão AS. Os indivíduos 1 a 9 pertencem a uma progênie de meios-irmãos de *P. alata*, 10 é a progenitora e 11,12 são os acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 de *P. edulis flavicarpa*. As setas contínuas indicam os alelos esperados e as setas pontilhadas indicam outros alelos observados. O *Ladder* é de 10pb

Tabela 4.1- Sequência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), *mix* usado, temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para *Passiflora edulis* f. *flavicarpa* (Oliveira, 2006) e para *Passiflora alata*

(continua)

<i>Par de primers</i>	Alelo esperado(pb)	Alelo observado (pb)	<i>Mix</i>	TA	Tipo de amplificação em <i>P. edulis</i> f. <i>flavicarpa</i>	Tipo de amplificação em <i>P. alata</i>
06E02DP01F	171	168, 183	7	TD60	AOL	LBA+OL
06E05DP01F	215	167	4	TD60	LBA	AOL
E10BP1F	156	0	2	TD60	LBA	AS
E12EP2F	235	0	5	TD60	LBA	AS
06E01AP01F	187	0	4	TD60	LBA+OL	AS
06E02AP01F	138	0	4	TD60	LBA	AS
EC11F	282	0	4	TD56	LBA+OL	AS
EA12F	268	270	4	TD56	LBA+OL	LBA
06E04DP01F	234	0	4	TD60	LBA	AS
06E05AP01F	178	0	4	TD60	LBA	AS
06E02CP01F	150	0	7	TD60	LBA+OL	AS
E11FP1F	172	0	4	TD60	LBA+OL	AS
ED07*	204	204	7	60	LBA	LBA
ED19	240	0	7	60	LBA+OL	AS
06EF01F	295	0	4	TD56	LBA+OL	AS
ED23	220	243	7	TD60	LBA+OL	AOL
EF01F	245	0	5	52	LBA	AS
ED10	242	0	7	TD60	LBA+OL	AS
06EG06F	238	0	4	TD60	LBA+OL	AS
06EG04F	241	310	5	TD60	LBA+OL	AOL
ED49	206	0	7	TD56	LBA+OL	AS
ED53	294	0	5	TD60	LBA+OL	AS
ED22	246	0	4	56	LBA+OL	AS
DD09P04F	277	0	4	TD60	LBA+OL	AS
DE10P03F	139	0	5	TD60	LBA	AS
EC02F	243	0	4	TD60	LBA	AS
E11EP1F	314	0	7	TD60	LBA	AS
ED17	307	300	7	TD60	LBA+OL	LBA
EC09*	359	> 330	5	60-56	LBA+OL	LBA+OL

Tabela 4.1- Sequência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), *mix* usado, temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para *Passiflora edulis* f. *flavicarpa* (Oliveira, 2006) e para *Passiflora alata*

(continua)

<i>Par de primers</i>	Alelo esperado(pb)	Alelo observado (pb)	<i>Mix</i>	TA	Tipo de amplificação em <i>P. edulis</i> f. <i>flavicarpa</i>	Tipo de amplificação em <i>P. alata</i>
ED42	200	195	2	TD60	LBA+OL	LBA+OL
ED43	368	0	-	-	Rastro	AS
ED14	225	0	7	TD60	LBA	AS
ED09F	232	0	2	TD60	LBA	AS
ED40	223	220	5	TD60	LBA+OL	LBA
ED41	220	221	5	TD60	LBA	LBA
ED16	216	216	7	TD60	LBA	LBA+OL
EE06F	241	0	2	TD60	LBA+OL	AS
06EB01P13F	165	0	4	TD60	LBA+OL	AS
06EE10F	249	0	5	TD60	AOL	AS
06EF02*	294	175-176	7	TD60	LBA+OL	AOL
ED08	364	maior 330	7	TD56	LBA+OL	LBA
06EE07F	283	280	5	TD60	LBA+OL	LBA+OL
ED21	212	0	5	TD56	AS	AS
ED26	206	195/233	5	TD60	AOL	AOL
ED06	245	0	5	TD60	LBA+OL	AS
06EG03F	296	0	5	TD60	AOL	AS
ED11	176	0	2	60	LBA	AS
06EH02F	207	0	7	TD60	AOL	AS
06EG09F	200	0	5	TD56	LBA+OL	AS
06EH01F	243	215	2	TD60	LBA	LBA
ED28*	276	260	7	TD56	LBA	AOL
ED24	139	0	4	TD56	LBA	AS
ED25	242	0	4	TD60	Rastro	AS
D30	228	237	5	TD60	LBA+OL	LBA
ED31	150	143	7	TD60	Rastro	LBA-RASTRO
ED27	228	228	4	TD56	LBA	LBA+OL
ED33	247	0	4	TD60	AOL	AS
06EG11F	290	290	5	TD60	LBA	LBA
ED18	371	153/238	5	TD60	LBA+OL	AOL

Tabela 4.1- Sequência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), *mix* usado, temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para *Passiflora edulis* f. *flavicarpa* (Oliveira, 2006) e para *Passiflora alata*

(continua)

<i>Par de primers</i>	Alelo esperado(pb)	Alelo observado (pb)	<i>Mix</i>	TA	Tipo de amplificação em <i>P. edulis</i> f. <i>flavicarpa</i>	Tipo de amplificação em <i>P. alata</i>
ED32	235	0	4	60	LBA+OL	AS
06EG08P16F	190	0	5	TD56	LBA+OL	AS
ED50	151	0	5	TD60	LBA+OL	AS
ED02*	324	324	5	60	LBA+OL	LBA+OL
ED03	215	0	2	TD56	LBA	AS
ED44	178	0	7	TD60	LBA	AS
ED46	392	0	7	TD60	Rastro	AS
ED47	126	128	7	60	LBA+OL	LBA+OL
EB01F	299	0	4	TD60	AOL	AS
EB08F	244	0	7	TD56	LBA+OL	AS
EC01F	246/389	265	7	TD60	AS	AOL
B10F	245	0	7	TD60	Rastro	AS
EB12F	239	280	5	TD60	Rastro	AOL
EC08F	161	0	5	TD56	AS	AS
ED36	293	293	7	TD60	LBA	LBA-RASTRO
EC07F	245	0	5	TD60	LBA	AS
DG11P01F	184	0	4	TD60	LBA+OL	AS
ED01	176	0	7	60	AOL	AS
D06EH11P01F	154	0	2	TD60	LBA+OL	AS
D06EH12P01F	289	0	5	TD60	AOL	AS
EA10F	246	0	5	TD60	LBA+OL	AS
ED45	288	0	2	TD56	LBA+OL	AS
DC10P04F	166	0	5	TD60	AOL	AS
DE11P05F	231	0	5	TD60	AOL	AS
DF12P04F	176	170	5	TD60	Rastro	LBA
06ED08P15F	160	173	4	TD60	AOL	AOL
EF04P06F	191	0	7	T56	AS	AS
ED 13	106	0	5	60-56	AS	AS
ED 15	208	0	2	60-56	AS	AS
ED 29	134	134	4	56-50	AS	LBA+OL

Tabela 4.1- Seqüência, tamanho do alelo esperado (pb), tamanho do alelo observado (pb), *mix* usado, temperatura de anelamento (TA) e tipo de amplificação obtida para *Passiflora edulis* f. *flavicarpa* (Oliveira, 2006) e para *Passiflora alata*

<i>Par de primers</i>	Alelo esperado(pb)	Alelo observado (pb)	<i>Mix</i>	TA	(conclusão)	
					Tipo de amplificação em <i>P. edulis</i> f. <i>flavicarpa</i>	Tipo de amplificação em <i>P. alata</i>
ED 37	240	0	5	60-56	AS	AS
ED 55	186	0	7	56-50	AS	AS
DD10P3	216	0	5	60-56	AS	AS
D06EA12P01F	209	0	5	TD60	LBA+OL	AS
D06EC02P01F	150	0	5	TD60	LBA+OL	AS
D06ED03P01F	179	0	5	TD60	LBA+OL	AS
D06ED05P01F	219	0	5	TD60	LBA+OL	AS
D06EF10P01F	236	0	5	TD60	LBA+OL	AS

* *Primers* que se apresentaram polimórficos. As seqüências dos *primers* podem ser obtida sob consulta pelo seguinte e-mail: <hapenha@esalq.usp.br>.

LBA: O par de *primers* amplifica em *P. alata* o mesmo loco descrito em *P. edulis* f. *flavicarpa*, com a presença do alelo esperado; AOL: o par de *primers* não amplifica em *P. alata* o loco descrito em *P. edulis* f. *flavicarpa*, mas amplifica bandas (alelos) de outros locos; AS: ausência de amplificação.

Portanto, a taxa de transferibilidade entre *P. edulis* f. *flavicarpa* e *P. alata* foi de 34,02%, demonstrando haver homologia nas seqüências flanqueadoras dos locos de microssatélites nestas espécies. Entre os locos transferidos, cinco deles apresentaram-se polimórficos entre os indivíduos da progênie analisada, havendo diferenças de poucos pares de bases entre um alelo e outro, como pode ser observado na Figura 4.2.

Figura 4.2 – Amplificação com os *primers* ED07 (a), EC09 (b), 06EF2 (c), ED28 (d) e ED02 (e). Os indivíduos 1 a 9 pertencem a uma progênie de meios irmãos de *P. alata*, 10 é a progenitora e 11,12 são os acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 de *P. edulis flavicarpa*. As setas contínuas indicam os alelos observados, e as setas pontilhadas indicam o alelo esperado e amplificado em *P. edulis f. flavicarpa*

Alguns desses pares de *primers* foram utilizados por Ferreira et al. (2007), em estudos sobre o sistema de reprodução de *P. alata*, baseados em marcadores RAPD e microsatélites. Cinco progênies e 20 indivíduos por progênie foram analisados, assim como as progenitoras femininas, totalizando 105 indivíduos (Fig. 4.3), incluindo a progênie 2, a qual foi utilizada nos ensaios de transferibilidade no presente trabalho. As análises dos locos microsatélites e RAPD sugeriram que *P. alata* pratica alogamia quase perfeita, com uma taxa de cruzamento $t_m=0,986$.

Figura 4.3 – Resultado da PCR com o *primer* ED07 em cinco progênies de meios irmãos de *P. alata*. Em cada progênie, a ultima banda corresponde à sua progenitora. As setas indicam os alelos observados do loco de microsatélite e o *Ladder* é de 10 pb

Vários estudos com plantas vêm relatando altas taxas de transferibilidade, confirmando que *primers* desenhados para uma espécie podem ser utilizados em outras espécies de um mesmo gênero. A maioria deles relatou a ocorrência de maiores taxas de transferibilidade quanto mais próximas filogeneticamente forem as espécies.

Em *Arachis*, as taxas de transferibilidade de *primers* são elevadas, o que foi comprovado por diversos autores. Moretzsohn et al. (2004) analisaram 36 espécies e observaram a transferibilidade de 76% dos *primers* de microsatélites de *Arachis hypogaea* para a seção *Arachis*, e 45% para outras oito seções do gênero. Taxas de transferibilidade da ordem de 91% e 100% foram relatadas por Hoshino et al. (2006) e Bravo et al. (2006), respectivamente, entre espécies deste mesmo gênero. Gimenez et al. (2007), analisando também espécies do gênero *Arachis*, realizaram análises de transferibilidade por loco de microsatélite, e observaram 100% de transferência para o loco Ah6-125 e 54% para o loco Ah30. As altas taxas de transferência apresentadas

podem ser devidas à proximidade filogenética entre as espécies de *Arachis*. A pouca variação nas taxas de transferibilidade encontradas por estes autores pode ser devido às diferentes concentrações de $MgCl_2$ e de temperaturas utilizadas em seus processos de otimização. Concentrações de *primers* também podem interferir em maior ou menor taxas de amplificação.

Devido à dificuldade de manipulação de géis de poliacrilamida, principalmente na etapa de coloração, um mesmo loco ser detectado em um gel, e não em outro, acarretando em uma falsa impressão de não-transferibilidade. Este fato ocorreu neste trabalho com o loco EA12, que foi detectado apenas na terceira tentativa de coloração (Fig. 4.4). Por esta razão, utilizou-se o DNA de dois acessos de *P. edulis* f. *flavicarpa* (IAPAR 06 e IAPAR 123) como controle, sendo um destes, o genótipo usado para o desenvolvimento da biblioteca enriquecida (OLIVEIRA et al., 2005). Sendo assim, quando não houve a amplificação de bandas nestes indivíduos, como ocorreu, por exemplo, para o par de *primers* ED11 (Fig. 4.1d), pode se pressupor alguma falha técnica na PCR ou na coloração do gel.

Figura 4.4- Visualização do resultado da amplificação usando o par de *primers* EA12 em gel de poliacrilamida: primeira tentativa de coloração (a), segunda (b), terceira coloração (c). Os indivíduos 1 a 9 pertencem a uma progênie de meios irmãos de *P.alata*, 10 é a progenitora e 11,12 são os acessos IAPAR-06 e IAPAR-123 de *P. edulis* f. *flavicarpa*. A seta indica o loco amplificado, e o *Ladder* é de 10pb

Vários estudos com fruteiras também vêm relatando altas taxas de transferibilidade de *primers* entre espécies próximas, como em pêssego (*Prunus persica*). Taxas de 59% de transferibilidade foram observadas para outras espécies do gênero *Prunus*, e, ainda três locos foram detectados em maçã (*Malus domestica*) (CIPRIANI et al., 1999). Alves et al. (2006) testaram a transferibilidade de *primers* de microssatélites do cacau (*Theobroma cacao*) para cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*), sendo que 60,4% dos locos foram transferidos.

Santos et al. (2007) avaliaram a transferibilidade de 180 *primers* desenvolvidos para *Eucalyptus* spp, de um total de 404, para a goiabinha serrana (*Acca sellowiana*), observando uma taxa de 44,55% de transferibilidade entre estas distintas espécies. Destes, 38 locos (21,1%) apresentaram-se polimórficos. Embora pertençam à mesma família (Myrtaceae), estão em gêneros diferentes, demonstrando, portanto, que taxas médias de transferibilidade podem ocorrer em espécies mais distantes filogeneticamente.

Entretanto, Zucchi et al. (2002) testaram a transferibilidade destes mesmos *primers* de microssatélites de *Eucalyptus* spp. utilizados por Santos et al. (2007) para outras Myrtáceas, como *Eugenia dysenteria*. Apenas 10 *primers* foram transferidos para esta espécie, representando uma taxa de apenas 2,8%. Roa et al. (2000) confirmaram, em testes de transferibilidade entre *Manihot esculenta* e outras seis espécies do gênero, que quanto maior a distância filogenética entre estas espécies, menor foi a transferibilidade.

Para as duas espécies de *Passiflora* aqui estudadas, apesar de pertencerem ao mesmo gênero (*Passiflora*), também não se observaram taxas de transferibilidade altas. Portanto, não existem dados suficientes comprovando a relação direta e simples entre sucesso na transferibilidade de *primers* de microssatélites e proximidade filogenética. Pode-se supor, que a transferibilidade não depende somente da distância filogenética, mas, também, da taxa de mutação associada à região flanqueadora de cada loco de microssatélite e de condições técnicas, associadas à qualidade das seqüências, do desenho dos *primers* e das condições de amplificações.

4.2 Biblioteca Genômica enriquecida em microssatélites.

Uma biblioteca genômica foi desenvolvida a partir de sondas contendo repetições GT, CT e TTC, usando o indivíduo SV1 de *P. alata*. A clonagem desta biblioteca apresentou-se muito eficiente, obtendo-se 960 clones.

A amplificação destes fragmentos resultou em 864 clones (eficiência de 90%) candidatos a possuírem seqüências microssatélites. Todos os fragmentos possuíam, em média, entre 300 a 700 pb (Fig. 4.5), tamanhos ideais para se obter sucesso no seqüenciamento. Cuidados durante a extração do DNA plasmidial (mini-prep), e na preparação das reações de seqüenciamento desses 864 clones garantiram que 61,22% (529) destes tivessem suas seqüências de bases reveladas.

Figura 4.5 - Visualização da amplificação via PCR de 96 clones da placa 04, obtidos a partir do desenvolvimento da biblioteca enriquecida com microssatélites de *P. alata*. Os clones estão numerados em ordem, conforme sua disposição na placa (A1, A2, A3.....H10, H11 E H12), e o *Ladder*, é de 100 pb

Para a detecção dos microssatélites utilizou-se o programa *TROL - Tandem Repeat Occurrence Locator* (CASTELO et al., 2002). Dados da literatura indicam que não existe correlação entre o tamanho da repetição (motivo) do microssatélite com o número de alelos (BURT et al., 2003). Portanto, adotou-se como critério para a detecção de um microssatélite a presença de, no mínimo, dez repetições de mononucleotídeos, cinco repetições de dinucleotídeos e três repetições de tri, tetra, penta e hexanucleotídeos.

Após a análise de todas as 529 sequências, detectaram-se 221 contendo microssatélites (com 246 microssatélites, no total). Isto representa um enriquecimento da biblioteca de 41,77%.

As porcentagens de enriquecimento de bibliotecas podem ser influenciadas pelo critério utilizado para se estabelecer o tamanho mínimo de uma repetição para a sequência ser classificada como microssatélite. Por exemplo, Kumar et al. (2007) classificam como microssatélites apenas sequências dinucleotídicas com mais de quatro repetições. Comparando-se com os resultados e critérios estabelecidos para a biblioteca desenvolvida no presente estudo, isso pode ter influenciado para a obtenção de uma taxa de enriquecimento mais alta.

Os resultados aqui obtidos se assemelham aos encontrados em algumas espécies frutíferas, como o cacau, onde se obteve 39,92% de enriquecimento (ARAÚJO et al., 2007), e o pêssago, com 50% de enriquecimento (CIPRIANI et al., 1999), mas um pouco menor do que em manga, onde os autores relataram 61% de enriquecimento (DUVAL et al., 2005). No entanto, o enriquecimento de bibliotecas desenvolvidas para diversas outras frutíferas ficaram abaixo do resultado aqui obtido, como em mamão – 2,1% de enriquecimento (SANTOS et al., 2003), melão – 28% de enriquecimento (RISTCHELI et al., 2004) e em maracujá-amarelo – 11,3% de enriquecimento (OLIVEIRA et al., 2005).

De maneira geral, pode observar-se que o enriquecimento da biblioteca desenvolvida no presente estudo ficou acima da média do encontrado na literatura. É certo que alguma variação entre os dados da literatura pode ser atribuída a diferenças nos critérios utilizados no desenvolvimento das mesmas. No entanto, neste trabalho, diversos cuidados foram tomados, como, por exemplo, a utilização de controles,

visualizados após várias etapas da técnica. Foram observadas: a digestão do DNA genômico (Fig. 4.6a), a pré-amplificação dos fragmentos (Fig. 4.6b) e a amplificação dos fragmentos selecionados (Fig. 4.6c). Os cuidados na hibridização das sondas e o controle da quantidade de ciclos de amplificação pós-hibridização também podem ser razões do sucesso do enriquecimento da biblioteca de *P. alata*.

Figura 4.6 - Controles realizados durante o desenvolvimento da biblioteca enriquecida em microssatélites para *P. alata*: (a) controle da digestão do DNA genômico, (b) controle da pré-amplificação dos fragmentos e (c) controle da amplificação dos fragmentos selecionados

Todas as seqüências obtidas foram alinhadas entre si e, aproximadamente, 7,23% (16 seqüências) apresentaram redundância, sendo as seqüências complementares ou sobrepostas excluídas (Fig. 4.7). Em uma biblioteca desenvolvida para *Arachis hypogaea*, 67% das seqüências apresentaram redundância (HE et al., 2003). Díaz et al. (2006) encontraram uma taxa de 14,81% de seqüências repetidas em estudos com oliveira (*Olea europaea*). A redundância destas seqüências contendo microssatélites reduz a eficiência na obtenção de *primers*, exigindo nos casos de taxas altas, um maior número de clones para se detectar maior número de locos de microssatélites.

Foi encontrado um baixo número de seqüências redundantes neste trabalho, comparando-se com outros estudos, e uma taxa próxima ao encontrado em *Passiflora edulis* f. *flavicarpa* (5,2%) por Oliveira (2006).

Figura 4.7 - Arquivo de saída do programa *Clustal X*, mostrando, em destaque, quatro seqüências que apresentaram redundância, duas a duas (ALP6E05 e ALP12H12; ALP4B11 e ALP4E07)

Dos 246 microssatélites encontrados, foi possível o desenho de *primers* para 177 (72%) (Tab. 4.2). O desenho dos pares de *primers* (Programa *Primer 3*) para as seqüências restantes (69) não foi possível devido à ocorrência de seqüências com baixa qualidade, observadas nos respectivos eletroforegramas (Fig. 4.8), ou devido à seqüência de microssatélite encontrar-se próxima ao sítio de clonagem (Fig. 4.9). Em 12 seqüências, foram encontrados dois microssatélites. Nestes casos, foi desenhado um par de *primers* para a amplificação de ambos os locos.

No processo de seqüenciamento, pode ocorrer o término da polimerização em função da repetição nas seqüências, como nos microssatélites, possibilitando, como consequência, a leitura de apenas um dos lados da seqüência flanqueadora. Outro

problema ocorre no final da polimerização que, geralmente, é acompanhada de um decréscimo de qualidade da seqüência, dificultando o desenho de *primers* nesta região. Isto poderia ser resolvido promovendo o seqüenciamento no outro sentido da fita de DNA, possibilitando o desenho do *primer* e/ou melhoria em sua qualidade.

Tabela 4.2 – Caracterização dos clones oriundos da construção da biblioteca enriquecida com microssatélites de *P. alata*

Neste trabalho, a alta taxa de aproveitamento das seqüências para o desenho dos *primers* foi devido à sua boa qualidade. Isto significa que as mesmas apresentaram uma qualidade com, pelo menos, 99% de confiança de que o pico visualizado no cromatograma corresponde à base correta (Prhred >20). Em muitos estudos, é possível o desenho de poucos *primers*, comparando-se com o número de seqüências que possuem microssatélites. Em amendoim, foi relatado que apenas 22,67% de seqüências foram utilizadas no desenho de *primers* (He et al., 2003) e, em oliva, esta porcentagem foi de 55,55% (DÌAZ et al., 2006).

Todos os pares de *primers* aqui desenhados foram analisados, posteriormente, pelo programa *Gene Runner* para a análise de formação de estruturas secundárias, como *hairpins*, dímeros e *loops*, baseando-se na variação de entalpia (ΔG). Quando ocorre a formação de uma estrutura secundária, há liberação de energia para o sistema (ΔG negativo). Portanto, quanto mais negativo este valor, mais estáveis são as ligações dessa estrutura secundária. Um ΔG de -4 Kcal/mol corresponde a um rendimento de 70% em uma PCR, um ΔG de -8 Kcal/mol corresponde a um rendimento de 20% e quando se tem um ΔG de -12 Kcal/mol, não ocorrerá amplificação. Portanto, os *primers* que apresentaram a formação de estruturas secundárias com um $\Delta G < -2,5$ Kcal/mol (cerca de 80% dos *primers*) foram redesenhados. Desta forma, obtiveram-se amplificações de melhor qualidade, como será discutido no item 4.3.

O nome do loco, a sequência de bases, o motivo, o tamanho e a classe dos 177 pares de *primers* de microssatélites desenhados para *P. alata* encontram-se na tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)

Loco	Motivo	Classe	Alelo (pb)
ALP3A01	(TC)5(N)3(CT)7(N)11(CT)5	INTERROMPIDO	196
ALP3A07	(GA)8	PERFEITO	240
ALP3A10	(GT)6	PERFEITO	183
ALP3A11A	(GT)5 e (T)10	PERFEITO	181
ALP3B01A	(TTC)6	PERFEITO	191
ALP3B01B	(T)10	PERFEITO	269
ALP3B10	(A)10	PERFEITO	225
ALP3C09	(AG)9	PERFEITO	157
ALP3C12	(CTT)4	PERFEITO	161
ALP3D09	(AC)5	PERFEITO	248
ALP3D12	(AAG)9	PERFEITO	249
ALP3E06	(GA)7	PERFEITO	159
ALP3E07	(CT)8	PERFEITO	226
ALP3E09	(AC)6	PERFEITO	184
ALP3F02	(TC)11	PERFEITO	207
ALP3F07	(GT)7	PERFEITO	228
ALP3G06	(TC)8(N)4(CT)5(N)6(TC)7	INTERROMPIDO	223
ALP3H11	(AC)6	PERFEITO	196
ALP4A03A	(CA)5	PERFEITO	241
ALP4A03B	(AAG)4	PERFEITO	165
ALP4A06	(CA)7 ; E (AC)6	PERFEITO	178
ALP4A09	(CTT)4	PERFEITO	195
ALP4A10	(TG)6	PERFEITO	206
ALP4A11	(AC)7	PERFEITO	233

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)

Loco	Motivo	Classes	Alelo (pb)
ALP4A12	(TTC)4	PERFEITO	169
ALP4B03	(GT)6	PERFEITO	228
ALP4B06	(AAG)9	PERFEITO	262
ALP4B07	(GAA)5	PERFEITO	254
ALP4B09	(GA)33	IMPERFEITO	150
ALP4B10	(AGA)4	PERFEITO	185
ALP4B11	(GT)5	PERFEITO	272
ALP4B12	(TG)8	PERFEITO	207
ALP4C01	(CT)9	PERFEITO	282
ALP4C07	(AC)5	PERFEITO	225
ALP4C09	(GA)5(N)11(GA)15	INTERROMPIDO	215
ALP4C10	(AC)8	PERFEITO	174
ALP4C11	(TG)5	PERFEITO	261
ALP4C12	(CT)8(N)6(CT)5	INTERROMPIDO	190
ALP4D04	(TG)6	PERFEITO	152
ALP4D09	(CA)6	PERFEITO	100
ALP4D10	(TG)6	PERFEITO	220
ALP4D11	(CA)5	PERFEITO	203
ALP4E06	(TC)5; E (CA)6	PERFEITO	231
ALP4E08	(TG)7	PERFEITO	243
ALP4E10	(TG)5	PERFEITO	271
ALP4E11A	(GTT)4 (N)10(TTC)7	COMPOSTO/ INTERROMPIDO	292
ALP4F08	(TCT)6; E (TTTC)3	PERFEITO	247
ALP4F09	(CAAT)3(AC)9	PERFEITO	228

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)

Loco	Motivo	Classes	Alelo (pb)
ALP4F10	(CAAT)3(N)19(AC)9	COMPOSTO/ INTERROMPIDO	227
ALP4F12	(TG)5	PERFEITO	205
ALP4G03	(GAA)4	PERFEITO	272
ALP4G05	(CTT)4	PERFEITO	186
ALP4G08	(A)12	PERFEITO	288
ALP4H01	(AC)5	PERFEITO	300
ALP4H02	(GTGA)3; E (AGA)5	PERFEITO	203
ALP4H03	(TTA)4	PERFEITO	269
ALP4H04	(GT)11	PERFEITO	252
ALP4H07	(CT)5; (n)17 (CTTCTC)3	COMPOSTO	152
ALP5A01	(AGA)4	PERFEITO	288
ALP5A04A	(GCAT)4	PERFEITO	216
ALP5C04	(AAG)4	PERFEITO	269
ALP5C06	(AC)6	PERFEITO	221
ALP5C07	(CA)7(N)9(A)10	COMPOSTO INTERROMPIDO	231
ALP5C09	(TG)6	PERFEITO	168
ALP5E05	(AC)6	PERFEITO	213
ALP5E08	(GA)7	PERFEITO	176
ALP5F02	(CAGA)3	PERFEITO	199
ALP5F03	(CT)8	PERFEITO	274
ALP5F05	(AAG)4	PERFEITO	195
ALP6A10	(AC)5	PERFEITO	287
ALP6B02A	(TCT) ₆	PERFEITO	289
ALP6B02B	(TCGA)3	PERFEITO	210

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)

Loco	Motivo	Classes	Alelo (pb)
ALP6B03	(TG) ₁₁	PERFEITO	253
ALP6B04	(CA) ₅	PERFEITO	219
ALP6B07	(CT)9(N)8(CT)5	INTERROMPIDO	161
ALP6B09	(CA) ₆	PERFEITO	283
ALP6C09	(TTGCA) ₃	PERFEITO	254
ALP6C10	(CA) ₇	PERFEITO	165
ALP6C12	(AGA) ₅	PERFEITO	166
ALP6D10	(GT) ₇	PERFEITO	261
ALP6D11A	(GA) ₁₁ ,	PERFEITO	161
ALP6D11B	(AG) ₁₀	PERFEITO	161
ALP6E08	(AC)5(n)13(AC)5	INTERROMPIDO	
ALP6E11	(TC) ₁₄	PERFEITO	233
ALP6F02	(GAA) ₄	PERFEITO	228
ALP6G02	(TG) ₆	PERFEITO	289
ALP6H02	(TG) ₉	PERFEITO	211
ALP6H05	(AGA) ₄	PERFEITO	209
ALP6H11	(TCACA) ₃	PERFEITO	239
ALP6H12	(CT)5(n)11(CT)5	INTERROMPIDO	280
ALP7A01	(TG) ₅	PERFEITO	280
ALP7A06	(AAG) ₆	PERFEITO	266
ALP7A07	(GCA) ₃	PERFEITO	247
ALP7B09	(TG) ₆	PERFEITO	190
ALP7C06	(GAAA)3 (n)6 (AGA)4	COMPOSTO	188
ALP7D03	(AC) ₇	PERFEITO	231

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)			
Loco	Motivo	Classes	Alelo (pb)
ALP7E10A	(A)11	PERFEITO	222
ALP7E10B	(GAA)6	PERFEITO	179
ALP7F01	(CA)5 (n)24 (TA)5	COMPOSTO	180
ALP7F10A	(GAACC)3	PERFEITO	162
ALP7F10B	(CA)7	PERFEITO	298
ALP7F12	(CT)7(N)5(CT)5(N)5(CT)5	INTERROMPIDO	251
ALP7G07	(CA)6	PERFEITO	176
ALP8A01A	(CATG)3	PERFEITO	151
ALP8A01B	(CTT)4(CTT)4	INTERROMPIDO	273
ALP8A04	(AG)11	PERFEITO	239
ALP8C02	(AC)5	PERFEITO	278
ALP8C05	(AGA)4	PERFEITO	253
ALP8C07	(AC)6	PERFEITO	185
ALP8D02	(TTC)6	PERFEITO	193
ALP8D07	(GT)5	PERFEITO	260
ALP8D10	(CA)5	PERFEITO	166
ALP8E01	(TC)8	PERFEITO	162
ALP8F03	(TG)6	PERFEITO	216
ALP8F10	(TG)6	PERFEITO	222
ALP8G03	(AC)5	PERFEITO	249
ALP8G09	(CA)5	PERFEITO	246
ALP8H05	(CCAG)3	PERFEITO	160
ALP10A06A	(TCT)5	PERFEITO	267
ALP10A06B	(CT)6	PERFEITO	190

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)

Loco	Motivo	Classes	Alelo (pb)
ALP10A07	(GT)7	PERFEITO	266
ALP10A10	(AG)14	IMPERFEITO	152
ALP10A12	(GGTT)3	PERFEITO	171
ALP10B05	(TG)6	PERFEITO	266
ALP10B08	(TG)11	PERFEITO	159
ALP10B10	(TG)7	PERFEITO	280
ALP10C01	(CT)7	PERFEITO	169
ALP10D03	(ATAATG)3	PERFEITO	214
ALP10D11	(GT)5	PERFEITO	208
ALP10E01	(CA)5	PERFEITO	214
ALP10E03	(TG)5	PERFEITO	183
ALP10E04	(CT)5 (CTT)4/(CTT)A	COMPOSTO	248
ALP10E08A	(TCT)5	PERFEITO	266
ALP10E08B	(CT)5	PERFEITO	218
ALP10E10	(AC)6	PERFEITO	259
ALP10G04A	(AG)8	PERFEITO	288
ALP10G04B	(CA)8	PERFEITO	282
ALP10H06a	(CA)5	PERFEITO	261
ALP10H07A	(TCT)4	PERFEITO	233
ALP10H07B	(TC)5	PERFEITO	241
ALP11A03	(TTC)4	PERFEITO	225
ALP11A05	(CT)8	PERFEITO	207
ALP11A06	(GAA)4	PERFEITO	218
ALP11A08	(TG)5	PERFEITO	224

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

(continua)			
Loco	Motivo	Classes	Alelo (pb)
ALP11C01	(TGCG)3(GT)5	COMPOSTO	226
ALP11C04	(TTAG)3	PERFEITO	295
ALP11C11	(CT)7(N)11(CT)11	INTERROMPIDO	200
ALP11C12	(TG)9	PERFEITO	203
ALP11D01	(GT)6	PERFEITO	299
ALP11D02	(TC)10	PERFEITO	231
ALP11D05	(AC)7	PERFEITO	222
ALP11D08	(TG)10	PERFEITO	288
ALP11D11	(AG)11	PERFEITO	152
ALP11E01	(AACC)3	PERFEITO	294
ALP11E03	(AC)6	PERFEITO	286
ALP11E07	(CTT)5(TC)7	COMPOSTO	205
ALP11E08	(GGTTC)3	PERFEITO	236
ALP11E09	(GAA)4 E (AGA)4	PERFEITO	224
ALP11E09	(GAA)4 E (AGA)4	PERFEITO	224
ALP11F04	(TG)7	PERFEITO	277
ALP11F06	(CA)5	PERFEITO	164
ALP11F08	(TG)6	PERFEITO	189
ALP11F09	(GGAA)3	PERFEITO	255
ALP11F11	(ATCTTC)3 E (TTC)5	PERFEITO	290
ALP11G02	(AC)5	PERFEITO	263
ALP11G06	(CA)5	PERFEITO	160
ALP11G08	(TG)6	PERFEITO	167
ALP11G09	(GA)5(N)5(GA)8	INTERROMPIDO	290

Tabela 4.3 - Locos de microssatélites gerados por 177 pares de *primers*, desenhados para *P. alata*, motivo, classe e tamanho do alelo seqüenciado (pb)

Loco	Motivo	Classes	(conclusão)
			Alelo (pb)
ALP11H01	(AG)47	PERFEITO	257
ALP11H05	(CT)8	PERFEITO	300
ALP11H08	(TTTCT)3; E (CTT)6	PERFEITO	238
ALP12A02	(AGCTT)4	PERFEITO	200
ALP12B10	(AGA)4	PERFEITO	278
ALP12D10	(AC)6	PERFEITO	191
ALP12E01	(GGTTTG)3	PERFEITO	183
ALP12F09	(CA)5	PERFEITO	261
ALP12H10	(TC)6	PERFEITO	218

As seqüências dos *primers* podem ser obtidos sob consulta pelo seguinte e-mail: <hapenha@esalq.usp.br>.

Considerando que os microssatélites imperfeitos e interrompidos apresentam repetições do tipo di, tri, tetra, penta e hexanucleotídicas, observou-se que a classe de dinucleotídeos foi a mais freqüente, estando presente em 63,7% das seqüências, seguida das classes de trinucleotídeos (19,6%), tetranucleotídeos (4,9%), mononucleotídeos (3,2%), pentanucleotídeos (2,9%) e hexanucleotídeos (2,0%). Os microssatélites compostos, classificados à parte por apresentarem variados tipos de unidade repetitivas, representaram 3,7% das seqüências. (Tab. 4.4 e Fig. 4.10). As altas porcentagens de microssatélites do tipo dinucleotídeos (63,7%) e trinucleotídeos (19,6%) são explicadas pela utilização de sondas do tipo di e trinucleotídicas durante o desenvolvimento da biblioteca.

Resultados semelhantes foram observados em uma biblioteca desenvolvida para *Cymbopogon jwarancusa*. Sondas do tipo dinucleotídicas e trinucleotídicas foram usadas e 68,8% e 21,8% das seqüências foram do tipo dinucleotídicas e trinucleotídicas, respectivamente (KUMAR et al., 2007). Araújo et al. (2007), utilizando a

mesma metodologia utilizada neste trabalho, também encontraram resultados semelhantes para o cacau (*Theobroma cacao*).

Tabela 4.4 - Números de microssatélites encontrados, em relação ao tipo de unidade repetitiva (motivo)

Número de microssatélites	Unidade repetida
8	Mononucleotídeo
156	Dinucleotídeo
48	Trinucleotídeo
12	Tetranucleotídeo
7	Pentanucleotídeo
5	Hexanucleotídeo
9	Compostos*
245	Total

*Os microssatélites compostos são aqueles que apresentaram variados tipos de unidades repetitivas

Figura 4.10 - Porcentagem de microssatélites encontrados em relação à unidade repetitiva

Em relação ao tipo de repetição ou motivo (WEBER, 1990), a classe dos microssatélites **perfeitos** (quando a seqüência repetida não é interrompida por qualquer base que não pertença ao motivo) foi a mais abundante, estando presente em 88,6% das seqüências, seguida dos **interrompidos** (quando existe mais de um par de bases que não corresponde ao microssatélite), em 6,5%, **compostos perfeitos** (quando a seqüência contém duas seqüências repetidas adjacentes), em 2,0%, **compostos interrompidos** (quando a seqüência contém duas seqüências repetidas adjacentes, e os microssatélites estão interrompidos), em 1,6%, e **imperfeitos** (quando existe, entre os motivos, um par de bases que não corresponde ao microssatélite), presente em 1,3% das seqüências (Tab. 4.5 e Fig. 4.11). Estes resultados são interessantes, pois segundo Weber (1990), os microssatélites perfeitos são mais polimórficos do que as seqüências que contêm interrupções dentro dos motivos. Resultados semelhantes aos aqui apresentados foram observados por Gimenez et al. (2007), que observaram, em uma biblioteca de *Arachis hypogaea*, que os microssatélites perfeitos também foram mais abundantes (63,1%).

Tabela 4.5 - Números de microssatélites encontrados na biblioteca de *P. alata*, em relação à classe

Número de microssatélites	Classe
217	Perfeitos
3	Imperfeitos
16	Interrompidos
5	Compostos perfeitos
4	Compostos Interrompidos
245	Total

Figura 4.11 - Porcentagem de microssatélites encontrados em relação à classe

Ao se desenvolver uma biblioteca genômica enriquecida se espera obter microssatélites complementares às sondas utilizadas, como obtido por Garcia et al. (2004) que, ao utilizar sondas dinucleotídicas (GA), obtiveram 90% de microssatélites em *Entandrophragma cylindricum* com repetições do tipo TC/CT. Entretanto, é comum ser encontrada, em outras bibliotecas genômicas enriquecidas, a presença de outros tipos de microssatélites, além dos complementares às sondas utilizadas na construção (SHI et al., 2007; EMELINE et al., 2006). Como a biblioteca de *P. alata* foi desenvolvida com as sondas GT, CT e TTC, esperavam-se apenas microssatélites dos tipos CA, GA e AAG, e repetições do tipo di e trinucleotídicas. Entretanto, foram observados microssatélites com os mais variáveis tipos de repetição e motivos, como apresentado na Tabela 4.6. Este fato pode ser explicado pela baixa estrigência adotada nos procedimentos de hibridização, fazendo com que as sondas se hibridizassem não completamente pareadas com as seqüências-alvo.

Tabela 4.6 - Número de microssatélites encontrados em *P. alata*, em relação ao tipo de unidade repetida e ao motivo

(continua)

Número de microssatélites	Motivo [Base(s)]	Tipo de repetição
2	T	Mononucleotídeos
6	G	
49	AC/TG	Dinucleotídeos
54	CA/GT	
28	AG/TC	
24	GA/CT	
1	AT	Trinucleotídeos
9	AGA	
6	TTC	
8	GAA	
5	CTT	
8	TCT	
9	AAG	
2	CGCA	
1	TTA	
1	TCTT	Tetranucleotídeos
1	TTAG	
1	AACC	
1	GGTT	
1	TCGA	
1	GCAT	
1	CAGA	
1	GTGA	
1	CATG	
1	CCAG	Pentanucleotídeos
1	AGCTT	
1	GGTTC	
1	GGAA	
1	TTTCT	
1	GAACC	
1	TTGCA	
1	TCACA	

Tabela 4.6 - Número de microssatélites encontrados em *P. alata*, em relação ao tipo de unidade repetida e ao motivo

(conclusão)

Número de microssatélites	Motivo [Base(s)]	Tipo de repetição
1	TTTTC	Hexanucleotídeos
1	GGTTTG	
1	ATCTTC	
1	ATAATG	
1	TTTCTT	
1	AAAAAT	Compostos
1	(CTT) _n (TC) _n	
1	(TGCG) _n (GT) _n	
1	(GTT) _n (TTC) _n	
1	(CAAT) _n (AC) _n	
1	(CT) _n (CTTCTC) _n	
1	(CA) _n (A) _n	
1	(GAAA) _n (AGA) _n	
1	(GAG) _n (GAA) _n	
1	(CT) _n (CTT) _n	

A distribuição das classes de microssatélites é extremamente variável entre as diferentes espécies de plantas. As repetições dinucleotídicas (TG/AC)_n e (CA/GT)_n foram muito abundantes neste estudo, semelhante ao relatado em estudos com *Saccharum* sp. (CORDEIRO et al., 2000) e *Solanum tuberosum* (ASHKENAZI et al., 2001). Na análise da biblioteca de *P. alata*, observou-se que repetições do tipo GT são mais abundantes do que as do tipo CT, fato este também observado na biblioteca construída por Oliveira et al. (2005) para *P. edulis* f. *flavicarpa*. Já Ashworth et al. (2004), trabalhando com abacate (*Persea americana*), observaram maiores quantidades de motivos do tipo CT, em comparação com motivos GT.

A baixa quantidade de motivos AT/TA (apenas uma sequência), fato também observado em outras bibliotecas, pode ser atribuído a baixas temperaturas de anelamento, à auto-complementariedade das repetições (TA)_n e às dificuldades de amplificação de sequências ricas em AT (BROWN et al., 1996; KUMAR et al., 2007).

O porquê das variações dos motivos de microssatélites entre as mais diversas espécies de plantas, entretanto, permanece ainda não esclarecido, podendo ter relação

com o tipo de enzima escolhida para a restrição do DNA genômico (HAMILTON; FLEISCHER, 1999).

4.3 Validação de uma amostra de *primers*

Foram desenhados 177 pares de *primers* para os marcadores microssatélites desenvolvidos para *P. alata* e, destes, uma amostra de 91 *primers* foi sintetizada e submetida a testes de validação.

Os produtos da PCR, usando-se 91 *primers*, foram visualizados após a corrida eletroforética em géis de agarose. Um bom padrão de amplificação foi observado em 59 deles, como pode ser visto nas Figuras 4.12 e 4.13 (a numeração nos géis corresponde à mesma utilizada para designar os *primers* apresentados na tabela 4.7). Vale ressaltar que o DNA de um dos indivíduos utilizados nesta etapa de validação (SV1), corresponde àquele usado no desenvolvimento da biblioteca genômica enriquecida. Este procedimento serviu como controle da amplificação, pois, obrigatoriamente, o tamanho do alelo predito pelo desenho dos *primers* deveria ser observado.

Figura 4.12 – Seleção de *primers*: Na primeira linha, os números de 1 a 43 correspondem aos *primers* avaliados, cuja lista está tabela 4.7, e, na segunda linha, os números 1 e 2 correspondem aos indivíduos SV1 e 1(10), respectivamente

Figura 4.13 - Seleção de *primers*: Na primeira linha, os números de 44 a 91 correspondem aos *primers* avaliados, cuja lista está tabela 4.7, e, na segunda linha, os números 1 e 2 correspondem aos indivíduos SV1 e 1(10), respectivamente

Como os microsatélites são seqüências cuja amplificação pode gerar polimorfismos visualmente detectáveis a partir de 1 pb, foi necessária a utilização de géis de alta resolução para a sua visualização e determinação precisa do tamanho dos alelos amplificados. Novas reações foram realizadas com os pares de *primers* que amplificaram bandas no teste acima descrito, utilizando-se uma amostra de 12 indivíduos de *P. alata* pertencentes a uma população F_1 e seus genitores. Os produtos da PCR foram visualizados em gel de poliacrilamida (Figuras 4.14, 4.15 e 4.16).

O código dos 59 *primers* validados (loco), tamanho do alelo seqüenciado (esperado), tamanho do(s) alelo(s) observado(s), motivo, se monomórfico ou polimórfico entre SV1 e 1(10), e a qualidade da amplificação estão apresentados na tabela 4.7. O código do loco é referente às duas letras iniciais da espécie (*P. alata*), e as letras seguintes referem-se à placa de seqüenciamento e respectiva posição. Por exemplo: AL (*P. alata*), P8 (placa 8), A08 (posição na placa: linha "A" e coluna "08").

Tabela 4.7 – Código do loco, tamanho do alelo esperado e do alelo observado (pb), motivo, temperatura de anelamento do *primer* (Tm), se polimórfico ou monomórfico entre os indivíduos SV1 e 2(12) e qualidade de amplificação dos 59 pares de *primers* de microssatélites validados para *P. alata*

(continua)

Número	Loco	Alelo esperado (pb)	Alelo observado (pb)	Motivo	Tm	Análise genética	Qualidade da amplificação
1	ALP3A01	196	196	(TC)5(N)3(CT)7 (N)11(CT)5	60	M	LBA+AOL
2	ALP3A07	240	230, 212/218	(GA)8	60	P	LBA
3	ALP3A10	183	183	(GT)6	60	M	LBA
4	ALP3B10	224	224	(A)10	60	M	LBA
5	ALP3C09	157	157	(AG)9	60	M	LBA
6	ALP3C12	150	150	(CTT)4	60	M	LBA+OL
7	ALP3D09	248	248	(AC)5	60	M	LBA
11	ALP3E09	184	185,	(AC)6	60	M	LBA+AOL
12	ALP3F02	202	205	(TC)11	60	M	LBA
13	ALP3F07	296	291	(GT)7	60	M	LBA
15	ALP6B02B	210	210	(TCGA)3	60	M	LBA+AOL
14	ALP3G06	249	249/243	(TC)8(N)4(CT)5 (N)6(TC)7	60	P	LBA
16	ALP6B03	196	196/183	(TG)11	60- 56	P	LBA
17	ALP6B04	219	219	(CA)5	60- 56	M	LBA
18	ALP6B07	161	160/161	(CT)9(N)8(CT)5	60	P	LBA+AOL
19	ALP6B09	283	283	(CA)6	60- 56	M	LBA
20	ALP6C09	254	254	(TTGCA)3	60- 56	M	LBA
22	ALP6C12	166	166	(AGA)5	60	M	LBA
24	ALP6E08	192	192	(AC)5(n)13(AC) 5	60	M	LBA
26	ALP6F02	228	228	(GAA)4	60	M	LBA
27	ALP6H02	211	211/212	(TG)9	60	P	LBA
28	ALP6H11	239	239	(TCACA)3	60- 56	M	LBA
30	ALP7A07	247	247	(GCA)3	60- 56	P	LBA
31	ALP7B09	190	190	(TG)6	60- 56	M	LBA
32	ALP7C06	188	188	(GAAA)3 (n)6 (AGA)4	60- 56	M	LBA
36	ALP7F10A	162	162/163	(GAACC)3	60	P	LBA
38	ALP7G07	176	176	(CA)6	60	M	LBA
43	ALP8C05	253	253	(AGA)4	60- 56	M	LBA+AOL
49	ALP11C04	293	290	(TTAG)3	60	M	LBA
50	ALP11C11	200	200	(CT)7(N)11(CT) 11	60	M	LBA

Tabela 4.7 – Código do loco, tamanho do alelo esperado e do alelo observado (pb), motivo, temperatura de anelamento do *primer* (Tm), se polimórfico ou monomórfico entre os indivíduos SV1 e 2(12) e qualidade de amplificação dos 59 pares de *primers* de microssatélites validados para *P. alata*

							(conclusão)
Número	Loco	Alelo esperado (pb)	Alelo observado (pb)	Motivo	Tm	Análise genética	Qualidade da amplificação
51	ALP11C12	181	181	(TG)9	60	M	LBA
52	ALP11D01	250	250	(GT)6	60	M	LBA
53	ALP11D02	231	231	(TC)10	60	M	LBA
54	ALP11D05	222	228	(AC)7	60	M	LBA
55	ALP11D08	289	291	(TG)10	60	M	LBA
57	ALP11E01	294	294	(AACC)3	60	M	LBA
60	ALP11E08B	236	242	(GGTTC)3	60	M	LBA
61	ALP11E09	224	224	(GAA)4 E (AGA)4	60	M	LBA
62	ALP11F04	277	277	(TG)7	60	M	LBA
63	ALP11F06	164	170	(CA)5	60	M	LBA
64	ALP11F08	189	189	(TG)6	60	M	LBA
67	ALP11G02	326	326	(AC)5	60	M	LBA+AOL
69	ALP11G09	290	290	(GA)5(N)5(GA)8	60	P	LBA+AOL
72	ALP10A06A	267	267	(TCT)5	60	M	LBA
73	ALP10A06B	190	190	(CT)6	60	M	LBA
74	ALP10A07	266	266	(GT)7	60	M	LBA
78	ALP10A10	152	152	(AG)14	60	M	LBA
76	ALP10A12	171	175	(GGTT)3	60	M	LBA
77	ALP10B05	266	266	(TG)6	60	M	LBA
78	ALP10B08	283	283/282	(TG)11	60	P	LBA+AOL
80	ALP10C01	169	169	(CT)7	60	M	LBA+AOL
81	ALP10D03	210	210	(ATAATG)3	60	M	LBA
82	ALP10D11	274	270	(GT)5	60	M	LBA
83	ALP10E01	297	300	(CA)5	60	M	LBA
84	ALP10E03	259	259	(TG)5	60	M	LBA
85	ALP10E04	248	248/250	(CT)5 (CTT)4/(CTT)A	60	P	LBA
87	ALP10E08B	218	218	(CT)5	60	M	LBA
88	ALP10E10	285	285	(AC)6	60	M	LBA
91	ALP10H06A	261	261	(CA)5	60	M	LBA

LBA-O par de *primers* amplifica em *P. alata* o alelo esperado; LBA+AOL: o par de *primers* amplifica em *P. alata* o alelo esperado, mas amplifica bandas (alelos) de outros locos. As seqüências dos pares de *primers* de cada loco podem ser obtidas sob consulta pelo e-mail: hapenha@esalq.usp.br

Os alelos amplificados variaram de 150 a 326 pb, como era predito pelo desenho dos *primers* (150 a 330 pb). Os *primers* validados apresentaram os seguintes padrões de amplificação, sendo que uma amostra pode ser visualizada nas figuras 4.14, 4.15 e 4.16: 10 pares de *primers* amplificaram o alelo esperado pelo seqüenciamento, mas outros locos foram amplificados (LBA+AOL) e 49 amplificaram apenas o alelo esperado pelo seqüenciamento (LBA).

Figura 4.14 - Validação dos *primers* de *P. alata*: o código do *primer* (loco) está acima de cada figura (gel). Os números 1 e 2 correspondem aos genitores SV3 e 2(12), respectivamente, e 3 a 12, às plantas da respectiva F_1 . As setas indicam os alelos esperados. Os cinco primeiros *primers* (topo) amplificaram, além do alelo predito pelo seqüenciamento, outras bandas inespecíficas (LBA+AOL). Os cinco últimos *primers* amplificaram apenas o alelo esperado

Figura 4.15 - Validação dos *primers* de *P. alata*: o código do *primer* (loco) está acima de cada figura (gel). Os números 1 e 2 correspondem aos genitores SV3 e 2(12), respectivamente, e 3 a 12, às plantas da respectiva F_1 . As setas indicam os alelos esperados. Todos os *primers* (topo) amplificaram apenas o alelo predito pelo seqüenciamento (LBA)

Figura 4.16 - Validação dos *primers* de *P. alata*: o código do *primer* (loco) está acima de cada figura (gel). Os números 1 e 2 correspondem aos genitores SV3 e 2(12), respectivamente, e 3 a 12, às plantas da respectiva F_1 . As setas indicam os alelos esperados. Todos os 5 *primers* (topo) apresentaram-se polimórficos entre os genitores

Verificou-se que 9 pares de *primers* revelaram polimorfismo entre SV3 e 2(12), correspondendo à taxa de 15,25% (Fig. 4.16). Este nível de polimorfismo se deve ao número reduzido de locos e indivíduos analisados no presente trabalho e dos genitores utilizados para cruzamento, mas isto parece ser característico do genoma de *Passiflora*, tal como relatado por Oliveira et al. (2007).

A totalidade dos *primers* (100%) amplificou o alelo esperado, e apenas 17% deles amplificaram, também, outros locos. Estes resultados foram bastante satisfatórios, quando comparados a outras espécies vegetais, como *Eucalyptus grandis* e *E. urophylla*. Apenas 35% das amplificações foram perfeitamente claras e de fácil interpretação em *Eucalyptus* (BRONDANI et al., 1998). Oliveira (2006), que desenvolveu *primers* de microssatélites para o maracujá-amarelo, obteve, em um total de 108, apenas 64,5% de amplificações com o tamanho do loco predito pelo sequenciamento, sendo que em 35,2% delas outros locos também foram observados.

A qualidade das seqüências observadas neste trabalho deve-se aos cuidados no desenho dos *primers* (citados o tópico 3.4.8), por exemplo $\Delta G < -2,5$ Kcal/mol,

garantindo assim, pelo menos, 80% de amplificação via PCR. Outros cuidados também foram tomados, como não desenhar *primers* com terminações com mais de 3 guaninas ou citosinas no terminal 3', evitando o seu anelamento inespecífico e, também, não desenhar *primers* com terminações 3' com várias adeninas e timinas, para que esta região, a qual servirá de início para a extensão da cadeia pela DNA polimerase, permita estabilidade para o anelamento do *primer*.

A presença de bandas inespecíficas na amplificação de locos de microssatélites pode ser resultado da ocorrência de locos duplicados no genoma de espécies diplóides ou da natureza poliplóide da espécie da espécie em estudo (BUTELER et al., 1999; ASHWORTH et al., 2004).

Neste trabalho, bandas inespecíficas foram observadas em 17% dos casos e são mais comuns em microssatélites muito grandes, tal como observado no loco ALP3A01 de tamanho $\{(TC)_5(N)_3(CT)_7(N)_{11}(CT)_5\}$. Isto resultou em amplificação de baixa qualidade com muitas bandas inespecíficas (Fig. 4.14, primeiro gel). Cregan et al. (1994) atribuíram o aparecimento de bandas inespecíficas, na maioria dos casos, à natureza dinucleotídica da sequência de microssatélites.

As sequências de microssatélites de *P. alata* disponibilizadas neste trabalho, aliada à alta qualidade das mesmas, abrem a possibilidade de diversos estudos genéticos para esta espécie.

5 CONCLUSÕES

É possível a transferibilidade de pares de *primers* de microssatélites de *Passiflora edulis* f. *flavicarpa* (maracujá-amarelo) para *P. alata* (maracujá-doce), indicando que as seqüências flanqueadoras de microssatélites estudadas são conservadas.

O protocolo para o desenvolvimento de bibliotecas enriquecidas em microssatélites é eficiente em maracujá-doce, e permite a obtenção de uma elevada quantidade de seqüências microssatélites de *P. alata*.

Os procedimentos adotados para o desenho dos pares de *primers* de microssatélites são eficientes, permitindo a obtenção de amplificações de boa qualidade.

Os locos de microssatélites validados em *P. alata* podem ser utilizados como marcadores genéticos.

REFERÊNCIAS

- ALVES, R.M.; SEBBENN, A.M.; ARTERO, A.S.; FIGUEIRA, A. Microsatellite loci transferability from *Theobroma cacao* to *Theobroma grandiflorum*. **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 6, p. 1219-1221, 2006.
- ARAÚJO, I.S.; INTORNE, A.C.; PEREIRA, M.G.; LOPES, U.V.; SOUZA-FILHO, G.A. Development and characterization of novel tetra-, tri- and di-nucleotide microsatellite markers in cacao (*Theobroma cacao* L.). **Molecular Breeding**, New York, v. 20, p. 73-81, 2007.
- ARCOT, S.S.; WANG, Z.; WEBER, J.L.; DEININGER, L.; BATZER, M.A. Alu repeats: A source for the genesis of primate microsatellites. **Genomics**, San Diego, v. 29, p. 136-144, 1995.
- ASHWORTH, V.E.T.M.; KOBAYASHI, M.C.; de la CRUZ, M.; CLEGG, M.T. Microsatellite markers in avocado (*Persea americana* Mill.): development of dinucleotide and trinucleotide markers. **Scientia Horticulturae**, New York, v. 101, p. 255-267, 2004.
- ASKENAZI, V.; CHANI, E.; LAVI, U.; LEVY, D.; HILLEL, J. ; VEILLEUX, E. Development of microsatellite markers in potatoe and their use in phylogenetics and fingerprint analyses. **Genome**, Otawwa, v. 44, p. 50-62, 2001.
- BILLOTE, N.; LAGODA, P.J.L.; RISTERUCCI, A.M.; BAURENS, F.C. Microsatellite – enriched libraries: applied methodology for the development of SSRs markers in tropical crops. **Fruits**, New York, v. 54, p. 277-288, 1999.
- BILLOTE, N.; RISTERUCCI, A.M.; BARCELOS, E.; NOYER, J.L.; AMBLARD, P.; BAURENS, F.C. Development, characterization and across-taxa utility of oil palm (*Elaeis guineensis* Jacq) microsatellites markers. **Genome**, Otawwa, v. 44, p. 413-425, 2001.

BRAGA, A.C.; REIS, A.M.M.; LEOI, L.T.; PEREIRA, R.W.; COLLEVATTI, R. G. Development and characterization of microsatellite markers for the tropical tree species *Tabebuia aurea* (Bignoniaceae). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 7, p. 53-56, 2007.

BRAVO, J.P.; HOSHINO, A.A.; ANGELICI, C.M.L.C.D.; LOPES, C.R.; GIMENES, M.A. Transferability and use of some microsatellite markers for the genetic analysis of germplasm of some *Arachis* section species of the genus *Arachis*. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 3, p. 516-124, 2006.

BRONDANI, R.P.V.; BRONDANI, C.; TARCHINI, R.; GRATTAPAGLIA, D. Development, characterization and mapping of microsatellite markers in *Eucalyptus grandis* and *E. urophylla*. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 97, p. 816-827, 1998.

BRONDANI, C.B.; RANGEL, P.H.; FERREIRA, M.E. Development and mapping of *Oryza glumaepatula* – derived microsatellite markers in the interspecific cross *Oryza glumaepatula* x *O. sativa*. **Hereditas**, Mendelskasauullskapet, v. 134, p. 59-71, 2001.

BROWN, A.H.D.; GARVIN, D.F.; BURDON, J.J.; ABBOTT, D.C.; READ, B.J. The effect of combining scald resistance genes on diseases levels, yield and quality traits in barley. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 93, p. 361-366, 1996.

BRUCKNER, C.H.; CASALI, V.W.D.; MORAES, C.F.de; REGAZZI, A.J.; SILVA, E.A.M. da. Self-incompatibility in passion fruit (*Passiflora edulis* Sims), **Acta Horticulturae**, The Hague, v. 370, p. 45-57, 1995.

BRUCKNER, C.H.; PICANÇO, M.C. **Maracujá: tecnologia de produção, pós-colheita, agroindústria, mercado**. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2001. 472p.

BURT, D.W.; MORRICE, D.R.; SEWALEN, A.; SMITH, J.; PATON, I.R.; SMITH, E.J.; BENTLEY, J.; HOCKING, P.M. Preliminary linkage map of the Turkey (*Meleagris gallopavo*) based on microsatellite markers. **Animal Genetics**, Netherlands, v. 34, p. 399-409, 2003.

BUTCHER, P.A.; MORAN, G.F. Genetic linkage mapping in *Acacia mangium*. Development of an integrated map from two outbred pedigrees using RFLP and microsatellite loci. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v.101, p. 1282-1290, 2000.

BUTELER, M.I.; JARRET, R.L.; LABONTE, D.R. Sequence characterization of microsatellites in diploid and polyploidy *Ipomoea*. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 99, p. 123-132, 1999.

CASTELO, A., MARTINS, W., GAO, G. TROLL - Tandem repeat occurrence locator. **Bioinformatics Journal**, Oxford, v. 18, p. 634-636, 2002.

CEASA MINAS. Disponível em: < <http://www.ceasaminas.com.br/>>. Acesso em: 27 nov., 2007.

CHEN, X.; TEMNYKH, S.; XU, Y.; CHO, Y.G.; McCOUCH, S.R. Development of a microsatellite *framework* map providing genome-wide coverage in rice (*oryza sativa* L.). **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 95, p. 553-567, 1997.

CIFARELLI, R.A.; GALLITELLI, M.; CELLINI, F. Random amplified hybridization microsatellites markers. **American Journal of Human Genetics**, Chicago, v. 23, p. 3802-3803, 1995.

CIPRIANI, G.; LOT, G.; HUANG, W.G.; MARRAZO, M.T.; PETERLUNGER, E.; TESTOLIN, R. AC/GT and AG/CT microsatellite repeats in peach [*Prunus persica* (L) Batsch]: isolation, chraracterization and cross-species amplification in *Prunus*. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 99, p. 65-72, 1999.

COART, E.; VEKEMANS, X.; SMULDERS, M.J.M., WAGNER, I., HUYLENBROECK, J.V., BOCKSTAELE, E.V.; ROLDÁN-RUIZ, I. Genetic variation in the endangered will apple (*Malus sylvestris*) in Belgium as revealed by amplified fragment length polymorphism and microsatellite markers. **Molecular Ecology**, Oxford, v. 12, p. 845-857, 2003.

COLLEVATI, R.G.; BRONDANI, R.V.; GRATTAPAGLIA, D. Development and characterization of microsatellite markers for genetic analysis of a Brazilian endangered tree species *Caryocar brasiliense*. **Heredity**, London, v. 83, p. 748-756, 1999.

COOPER, G.; AMOS, W.; BELLAMY, R. An empirical exploration of the genetic distance for 213 human microsatellite markers. **American Journal of Human Genetics**, Chicago, v. 65, p. 1125-1133, 1999.

CORDEIRO, G.M., TAYLOR, G.O., HENRY, R.J. Characterization of microsatellite markers from sugarcane (*Saccharum* sp.) a highly polyploid species. **Plant Science**, Oxford, v. 155, p. 161–168, 2000.

CRESTE, S., TULMANN, A., FIGUEIRA, A. Detection of single sequence repeat polymorphisms in denaturing polyacrylamide sequencing gels by silver staining. **Plant Molecular Biology Reports**, New York, v. 19, p. 229-306, 2001.

CREGAN, P.B.; BHAGWAT, A.A.; AKKAYA, S.S.; RONGWEN, J. Microsatellite fingerprinting and mapping soybean. **Methods in Molecular and Cellular Biology**, New York, v. 5, p. 49-61, 1994.

DAMATO JR, E.R.; LEONEL, S.; PEDROSO, C.J. Adubação orgânica na produção e qualidade de frutos de maracujá-doce. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 27, p. 188-190, 2005.

DAYANANDAN, S.; BAWA, K.S.; KESSELI, R. Conservation of microsatellites among tropical tree (Leguminosae). **American Journal of Botany**, St, Louis, v. 84, p.1658-1663, 1997.

DÍAZ, A.; ROSA, R.; MARTÍN, A.; RALLO, P. Development, characterization and inheritance of new microsatellites in olive (*Olea europaea* L.) and evaluation of their usefulness in cultivar identification and genetic relationship studies. **Tree Genetics & Genomes**, Davis, v. 2, p. 165–175, 2006.

DOYLE, J.J.; DOYLE, J.L. A rapid DNA isolation procedure to small amounts of fresh leaf tissue. **Phytochemical Analysis**, Sussex, v. 19, p. 11-15, 1987.

DREISIGACKER, S.; ZHANG, P.; WARBURTON, M.L.; van GINKEL, M.; HOISINGTON, D.; BOHN, M.; MELLCHINGER, A.E. SSR and pedigree analyses of genetic diversity among CIMMYT wheat lines targeted to different megaenvironments. **Crop Science**, Madison, v. 44, p. 381-388, 2004.

DUVAL, M. F.; BUNEL, J., SITBON, C., RISTERUCCI, A. M. Development of microsatellite markers for mango (*Mangifera indica* L.). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 5, p. 824-826, 2005.

EDWARDS, K.J.; BARKER, J.H.A., JONES, D.A.; KARP, A. Microsatellites libraries enriched for several microsatellites in plants. **Biotechniques**, Natick, v. 20, p. 758, 1996.

EMELINE, L.; ALEXANDRE, V.; JEAN-FRANÇOIS B.; JEAN-MARC, B. Isolation and characterization of microsatellite loci in *Santalum insulare*, Santalaceae. **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 6, p. 653–655, 2006.

FERREIRA, T.G.T.; OLIVEIRA, C.A.; JUNQUEIRA, N.; FIDELES, M.; ZUCCHI, M.I.; VIEIRA, M.L.C. Estimativa da Taxa de cruzamento de *Passiflora alata* Curtis utilizando marcadores moleculares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GENÉTICA, 53, 2007, Águas de Lindóia. **Resumos...** Ribeirão Preto:USP, 2007. Resumo GP070.

FIELD, D.; WILLS, C. Long polymorphic microsatellites in simple organisms. **Proceeding of the Royal Society of London**, London, v. 263, p. 209-215, 1998.

FUJIMORI, S.; WASHIO, W.; HIGO, K.; OHTOMO, Y.; MURAKAMI, K.; MATSUBARA, K.; KAWAI, J.; CARNINCI, P.; HAYASHIZAKI, Y.; KIKUCHI, S.; TOMITA, M. A novel feature of microsatellite implants: a distribution gradient along the direction of transcription. **FEBS Letters**, Heidelberg, p. 17-22, 2003.

GAIOTTO, F.A.; BRONDANI, R.P.V.; GRATTAPAGLIA, D. Microsatellite markers for heart of palm – *Euterpe edulis* and *E. oleraceae* Mart. (Arecaceae). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v.1, p. 86-88, 2001.

GARCIA, F.; NOVER, J.L.; RISTERUCCI, A.M.; CHEVALLER, M.H. Genotyping of mature trees of *Entandrophragma cylindricum* with microsatellites. **Journal of Heredity**, London, v. 95, p. 454–457, 2004.

GIANFRANCESCHI, L.; SEGLIAS, N.; TARCHINI, R.; GESSLER, C. Simple sequence repeats for the genetic analysis of apple. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 96, p. 1069-1076, 1998.

GIMENEZ, M.A.; HOSHINO, A.A.; BARBOSA, A.V.G.; PALMIERI, D.A.; LOPES, C.R. Characterization and transferability of microsatellite markers of the cultivated peanut (*Arachis hypogaea*). **BMC Plant Biology**, London, v. 7, p. 1-13, 2007.

HAMILTON, M.B.; PINCUS, E.L.; Di-FIORE, A.; FLEISHER, R.C. Universal linker and ligation procedures for construction of genomic DNA libraries enriched for microsatellites. **Biotechniques**, Natick, v. 27, p. 500-507, 1999.

HAMWIEH, A.; UDUPA, S.M.; CHOUMANE, W.; SARKER, A.; DREYER, F.; JUNG, C.; BAUM, M. A genetic linkage map of *Lens* sp. Based on microsatellite and AFLP markers and the localization of fusarium vascular wilt resistance. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 110, p. 669-677, 2005.

HE, G.; MENG, R.; NEWMAN, M.; GAO, G.; PITTMAN, R.N.; PRAKASH, C.S. Microsatellites as DNA markers in cultivated peanut (*Arachis hypogaea* L.). **BMC Plant Biology**, London, v. 3, p. 1-6, 2003.

HODGETTS, R.B.; ALEKSIUK M.A.; BROWN, A.; CLARCKE, C.; MacDONALD, E.; NADDEM, S.; KHASA, D. Development of microsatellite markers for white spruce (*Picea glauca*) and related species. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 102, p. 1252-1258, 2001.

HONSHO, C.; NISHIYAMA,K.; EIADTHONG, W.; YONEMORI, K. Isolation and characterization of new microsatellite markers in mango (*Mangifera indica*). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 5, p. 152–154, 2005.

HOSHINO, A.A.; BRAVO, J.P.; ANGELICI, C.M.L.C.D.; BARBOSA, A.V.G.; LOPES, C.R.; GIMENES, M.A. Heterologous microsatellite primers pairs informative for whole genus *Arachis*. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 29, p. 665-675, 2006.

JUNQUEIRA, N.T.V.; ANSELMO, R.M.; PINTO, A.C.Q.; RAMOS, V.H.V.; PEREIRA, A.V.; NASCIMENTO, A.C. Severidade da antracnose e perda de matéria fresca de frutos de dez procedências de maracujazeiro-doce (*Passiflora alata* Dryander) em dois ambientes de armazenamento. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 25, n.1; p.71-73, 2003.

KAVATI, R.; PIZA JR, C.T. **A cultura do maracujá-doce**. Campinas:CATI, 2002. 46p.

KIJAS, J.M.; FOWLER, J.C.; GARBETT, C.A.; THOMAS, M.R. Enrichment of microsatellites from the citrus genome using biotinylated oligonucleotide sequences bound to streptavidin coated magnetic particles. **Biotechniques**, Natick, v. 16, p. 656-662, 1994.

KIJAS, J.M.H.; FOWLER, J.C.S.; THOMAS, M.R. An evaluation of sequence tagged microsatellite site markers for genetic analysis within Citrus and related species. **Genome**, Ottawa, v. 38, p. 349-355, 1995.

KNAPIK, E.W.; GOODMAN, A.; EKKER, M.; CHEVRETTE, M.; DELGADO, J.; NEUHAUSS, S.; SHIMODA, N.; DRIEVER, W.; FISHMAN, M.C.; JACOB, H.J. A microsatellite genetic linkage map of zebrafish (*Danio rerio*). **Nature Genetics**, New York, v. 18, p. 338-343, 1998.

KUMAR, J.; VERMA, V.; SHAHI, A.K.; QAZI, G.N.; BALYAN, H.S. Development of Simple Sequence Repeat Markers in *Cymbogon Species*. **Planta Med**, New York, v. 73, p. 262-266, 2007.

LEMES, M.R.; BRONDANI, R.P.V., GRATTAPAGLIA, D. Multiplexed Systems of Microsatellite Markers for Genetic Analysis of Mahogany, *Swietenia macrophylla* King (Meliaceae), a Threatened Neotropical Timber Species. **The Journal of Heredity**, London, v. 4, p. 93, 2002.

LEVINSON, G.; GUTMAN, G.A. Slippedstrand mispairing: A major mechanism for DNA sequence evolution. **Molecular and Biology Evolution**, New York, v. 4, p. 203-221, 1987.

LIEWLAKSANEEYANAWIN, C.; RITLAND, C.E.; EI-KASSABY, Y.; RITLAND, K. Single-copy, species-transferable microsatellite markers developed from loblolly pine ESTs. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 109, p. 361-369, 2004.

LIMA, A.A.; CUNHA, M.A.P.da. **Maracujá: produção e qualidade na passicultura**. Cruz das Almas: EMBRAPA, 2004. 396p.

MANICA, I.; BRANCHER, A.; SANZONOWICZ, I.; ICUMA, I.M.; AGUIAR, J.L.P.; AZEVEDO, J.A.; VASCONCELLOS, M.A.S.; JUNQUEIRA, N.T.V. **Maracujá-doce: tecnologia de produção, pós-colheita, mercado**. Porto Alegre: 2005. 198p.

MASONA, S.L.; STEVENSA, M.R.; JELLENA, E.N.; BONIFACIOB, A.; FAIRBANKSA, D.J.; COLEMANA, C.E.; McCARTYA, R.R.; RASMUSSENA, A.G.; MAUGHANA, P.J. Development and use of microsatellite markers for germplasm characterization in quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.). **Crop Science**, Madison, v. 45, p. 1618-1630, 2005.

McCOUCH, S.R.; CHEN, X.; PANAUD, O.; TEMNYKH, S.; XU, Y.; CHO, Y.G.; HUANG, N.; ISHII, T.; BLAIR, M. Microsatellite marker development, mapping and applications in rice genetics and breeding. **Plant Molecular Biology**, Oxford, v. 35, p. 89-99, 1997.

MELETTI, L.M.M.; MAIA, M.L. **Maracujá: produção e comercialização**. Campinas, Instituto Agrônômico, 1999. 62p.

MELETTI, L.M.M.; SANTOS, R.R.; MINAMI, K. Melhoramento do maracujazeiro-amarelo: obtenção do 'Composto IAC-27', **Scientia Agrícola**, Piracicaba, v. 56, p. 491-498, 2000.

MELETTI, L.M.M. Comportamento de híbridos e seleções de maracujazeiro (*passifloraceae*). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A CULTURA DO MARACUJAZEIRO, 6., 2003, Campo dos Goyacazes. **Palestras...** Campo dos Goyacazes: Cluster Informática, 2003.1 CD-ROM.

MORETZSOHN, M.C.; HOPKINS, M.S.; MITCHELL, S.E.; KRESOVICH, S.; VALLS, J.F.M.; FERREIRA, M.ME. Genetic diversity of peanut (*Arachis hypogaea* L.) and its wild relatives based on the analysis of hypervariable regions of the genome. **BMC Plant Biology**, London, v. 4, p. 11, 2004).

MORGANTE, M.; OLIVIERI, A.M. PCR-amplified microsatellites as markers in plant genetics. **The Plant Journal**, Gaisnesville, v. 3, p. 175-182, 1993.

MORGANTE, M.; HANAFEY, M.; POWELL, W. Microsatellites are preferentially associated with nonrepetitive DNA in plant genomes. **Nature Genetics**, New York, v. 30, p. 194-200, 2002.

OLIVEIRA, E.J.; PÁDUA, J.G.; ZUCCHI, M.I.; CAMARGO, L.E.A.; FUNGARO, M.H.P.; VIEIRA, M.L.C. Development and characterization of micrfosatellite markers from the yellow passion fruit (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 5, p. 331-333, 2005.

OLIVEIRA, E.J. **Desenvolvimento e uso de marcadores microssatélites para construção e integração de mapas genéticos de maracujá-amarelo (*Passiflora edulis* Sims f. *flavicarpa* Deg.).** 2006. 152 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.

OLIVEIRA, E.J.; GARCIA, A.A.F.; MUNHOZ, C.F.; MARGARIDO, G.R.A.; CONSOLI, L.; MATTA, F.P.; MORAES, M.C.; ZUCCHI, M.I.; FUNGARO, M.H.P.; VIEIRA, M.L.C. An integrated molecular map of yellow passion fruit based on simultaneous maximum-likelihood estimation of linkage and linkage phases. **Journal of The American Society for Horticultural Science**, Geneva, v. 32, p.1-7, 2007.

OSTRANDER, E.A.; JONG, P.M.; RINE, J.; DUYK, G. Construction of small-insert genomic DNA libraries highly enriched for microsatellite repeat sequences. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA**, Washington, v. 89, p. 3419-3423, 1992.

PÁDUA, J. G.; OLIVEIRA, E.J.; ZUCCHI, M.I.; OLIVEIRA, G.X.; CAMARGO, L.E.A.; VIEIRA, M.L.C. Isolation and characterization of microsatellite markers from the sweet passion fruit (*Passiflora alata* Curtis:Passifloraceae). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 5, p.863-865, 2005.

PAETKAU, D. Microsatellites obtained using strand extension: An enriched protocol. **Biotechniques**, Natick, v.26, p. 690-697, 1999.

PRIOLLI, R.H.G.; MENDES-JUNIOR, C.T.; ARANTES, N.E.; CONTEL, E.P.B. Characterization of Brazilian soybean cultivars using microsatellite markers. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 25, p. 185-193, 2002.

RALLO, P.; DORADO, G.; MARTÍN, A. Development of simple sequence repeats (SSRs) in olive tree (*Olea europaea* L.). **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 101, p. 984-989, 2000.

RISTCHEL, P.S.; LINS, T.C.L.; TRISTAN, R.L.; BUSO, G.S.C.; FERREIRA, M.E. Development os microsatellite markers from na enriched genomic library for genetic analisys of melon (*Cucumis melo* L.). **BMC Plant Biology**, London, v. 4, p. 1-14, 2004.

ROA, A.C.; CHAVARRIAGA-AGUIRRE, P.; DUQUE, M.C.; MAYA, M.M.; BONIERBALE, M.W.; IGLESIAS, C.; TOHME, J. Cross-species amplification of cassava (*Manihot esculenta*) (Euphorbiaceae) microsatellites: Allelic polymorfism and degree of relationship. **American Journal of Botany**, St. Louis, v. 87, p. 1647-1655, 2000.

ROSE, O.; FALUSH, D. A threshold size for microsatellite expansion. **Molecular Biology and Evolution**, New York, v. 15, p. 613-615, 1998.

ROZEN, S.; SKALETISKY, H.J. (2000). **PRIMER3**. Disponível em: <<http://www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3-www.cgi>>. Acesso em: 20 jul. 2007.

SAMBROOK, J.; RUSSELL, D.W. **Molecular cloning: a laboratory manual**. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.

SANTOS, S.C.; RUGGIERO, C.; SILVA, C.L.S.P.; LEMOS, E.G.M. A microsatellite library for *Carica papaya* L. cv. Sunrise Solo. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 25, p. 263-267, 2003.

SANTOS, K.L.; LEOCIR, J.W.; DANTAS, A.C.M.; GUERRA, M.P.; DUCROQUET, J.P.H.J.; NODARI, R.O.N. Transference of microsatellite markers from *Eucalyptus* spp to *Acacia sellowiana* and the successful use of this technique in genetic characterization. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 30, p. 73-79, 2007.

SCHLÖTTERER, C. Evolutionary dynamics of microsatellite DNA. **Chromossoma**, Berlin, v. 109, p. 365-371, 2000.

SCHULER, G.D.; BOGUSKI, M.S.; STEWART, E.A.; STEIN, L.D.; GYAPAY, G.; RICE, K.; WHITE, R.E.; RODRIGUEZ-TOME, P.; AGGARWAL, A.; BAJOREK, E.; BENTOLILA, S.; BIRREN, B.B.; BUTLER, A.; CASTLE, A.B.; CHIANNILKULCHAI, N.; CHU, A.; CLEE, C.; COWLES, S.; DAY, P.J.; DIBLING, T.; DROUOT, N.; DUNHAM, I.; DUPRAT, S.; EAST, C.; HUDSON, T.J. A gene map of human genome. **Science**, New York, v. 274, p. 540-546, 1996.

SHI, Y.; YANG, G.; LIU, Y.; LIAO, M.; JIE, X.; CON, Y. Development of 18 polymorphic microsatellite DNA markers of *Laminaria japonica* (Phaeophyceae). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 7, p. 620–622, 2007.

SILFVERBERG-DILWORTH E. ; MASTACI, C.L.; VAN de WEG, W.E.; KAAUWEN, M.P.W.; WALSER, M.; KODDE, L.P.; SOGLIO, V.; GIANCANFRANCESCHI, C.; DUREL, C.E.; COSTA, F.; YAMAMOTO, T.; KOLLER, B.; GESSLER, C.; PATOCCHI, A. Microsatellite markers spanning the apple (*Malus x domestica* Borkh.) genome. **Tree Genetics & Genomes**, Davis, v. 2, p. 202–224, 2006.

SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M.J. **Fundamentos de genética**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2001. 755p.

SOUZA, J.S.I.; MELETTI, L.M.M. **Maracujá: espécies, variedades, cultivo**. Piracicaba: ESALQ, 1997. 179p.

STRAND M.; PROLLA, T.A.; LISKAY, R.M.; PETES, T.D. Destabilization of tracts of simple repetitive DNA in yeast by mutations affecting DNA mismatch repair. **Nature**, London, v. 365, p. 274-276, 1993.

SUGANUMA, E.; CIAMPI, A.Y. **Análise genética populacional de jatobá (*Hymenaea* spp Leguminosaea) utilizando microsátélites**. Disponível em: www.redbio.org/porta1/encuentros/enc_2001/posters;03/03pdf/03-007.pdf. Acesso em: 8 out. 2007.

TEMNYKH, S.; PARK, W.D.; AYRES, N.; CARTINHO, S.; HAUCK, N.; LIPOVICH, L.; CHO, Y.G.; ISHII, T.; MCCOUCH, S.R. Mapping and genome organization of microsatellites sequences in rice (*Oryza sativa* L.). **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 100, p. 697-712, 2000.

THOMPSON, J.D., GIBSON, T.J., PLEWNIAK, F., JEANMOUGIN, F.; HIGGINS, D.G. (1997). Disponível em: < <http://www.ib.usp.br/hennig/softwares.htm>>. Acesso em: 20 out. 2007.

ULMER, T.; MACDOUGAL, J.M. **Passiflora**: passionflowers of the world. Cambridge: Timber Press, 2004. 430p.

VASCONCELLOS, M.A.; BRANDÃO FILHO, J.U.T.; VIEITES, R.L. Maracujá-doce. In: BRUCKNER, C.H.; PICANÇO, M.C. **Maracujá**: tecnologia de produção, pós-colheita, agroindústria, mercado. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2001, chap.14, p. 387-408.

WANG, Z.; WEBER, J.L.; ZHONG, G.; TANKSLEY, S.D. Survey of plant short tandem DNA repeats. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 88, p. 1-6, 1994.

WEBER, J.L. Informativeness of human (dC-dA)_n (dG-dT)_n polymorphisms. **Genomics**, San Diego, v. 7, p. 524-530, 1990.

WHITE, G.; POWELL, W. Cross-species amplification of SSR loci in the Meliaceae family. **Molecular Ecology**, Oxford, v. 6, p. 1195-1197, 1997.

WILLIAMS, J.G.K.; KUBELICK, A.R.; LIVAK, K.J.; RAFALSKI, J.A.; TINGEY, S.V. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. **Nucleic Acids Research**, London, v. 18, p. 6531-6535, 1990.

WU, S.B.; COLLINS, G.; SEDGLEY, M.A. A molecular linkage map of olive (*Olea europaea* L.) based on RAPD, microsatellite, and SCAR markers. **Genome**, Ottawa, v. 47, p. 26-35, 2004.

YAMAMOTO, T.; KIMURA, T.; SAWAMURA, Y.; KOTOBUKI, K.; BAN, Y.; HAYASHI, T.; MATSUTA, N. SSRs isolated from apple can identify polymorphism and genetic diversity in pear. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 102, p. 865-870, 2001.

YAMAMOTO, T.; MOCHIDA, K.; IMAI, T.; SHI, Y.Z.; OGIWARA, I.; HAYASHI, T. Microsatellite markers in peach [*Prunus persica* (L.) Batsch] derived from an enriched genomic and cDNA libraries. **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 2, p. 298–301, 2002.

ZANE, L.; BARGELLONI, L.; PATARNELLO, T. Strategie for microsatellite isolation: a review. **Molecular Ecology**, Oxford, v. 11, p.1-16, 2002.

ZHANG, L.Y.; BERNARD, M.; LEROY, P.; FEUILLER, C. High transferability of bread wheat EST-derived SSRs to other cereals. **Theoretical and Applied Genetics**, Berlin, v. 111, p. 677-687, 2005.

ZHU, Y., STRASSMANN, J.E.; QUELLER, D.C. Insertions, substitutions, and the origin of microsatellites. **Genetics Research**, London, v. 76, p. 227-236, 2000.

ZUCCHI, M.I.; BRONDANI, R.V.; PINHEIRO, J.B.; BRONDANI, C.; VENCovsky, R. Transferability of microsatellite markers from *Eucalyptus* ssp. To *Eugenia dysenterica* (Myrtaceae family). **Molecular Ecology Notes**, Oxford, v. 2, p. 512-514, 2002.