ATIVIDADE CELULOLÍTICA E PROTOPLASTIZAÇÃO EM *HUMICOLA SP*
E *TRICHODERMA PSEUDOKONINGII* VAR. RIFAI

MARIA BERNARDETE DE LÉO AGUILAR

Aprovada em: 06.12.1991

Comissão julgadora:

Profa Dra Aline A. Pizzirani-Kleiner	ESALQ/USP
Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo	ESALQ/USP
Profa Dra Maria Lúcia Carneiro Vieira	ESALQ/USP
Prof. Dr. Pedro Magalhães Lacava	UNESP
Profa Dra Dejanira de Franceschi de Angelis	UNESP

Profa Dra ALINE A. PIZZIRANI-KLEINER
Orientadora

Aos meus pais, José Deléo
e Maria Antonia Sêga e à
minha irmã Maria Aparecida
Deléo Nicolletto (in memoriam),

DEDICO

A minha família e, em especial,
ao meu marido, Juan Fernando
Aguilar Morán, por tudo que
representam na minha vida,

OFEREÇO

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho e, em especial

- A Profa Dra Aline A. Pizzirani - Kleiner, pela orientação, amizade e confiança constantes;
- A Márcia Cristina Furlanetto e Eleonora Carmona Rodrigues, pela concessão das linhagens de *Trichoderma pseudokoningii* e *Humicola sp*, respectivamente;
- Ao Dr. João Lúcio Azevedo, na qualidade de Chefe do Departamento de Genética, pelas facilidades concedidas;
- Aos professores do Departamento de Genética pelos conhecimentos adquiridos;
- A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos;
- Aos funcionários e amigos do Departamento de Genética pelos serviços prestados e convívio enriquecedor;
- Aos funcionários do laboratório de microrganismos, Antônio Rocha Campos, Sandra R. Rocha e, em particular, Carlos A. Nolasco, pela eficiência nos serviços técnicos prestados e amizade;
- A Vânia A. Vicente pela grande ajuda prestada nas dosagens enzimáticas;

- Ao Victor Warwar pelo auxílio na técnica de eletrofusão;
- A Dra Nilce M. Martinez-Rossi, funcionários e colegas do laboratório de Genética de Microrganismos de Ribeirão Preto, pela acolhida cordial e disponibilidade de uso do local para obtenção de protoplastos de confídios.
- Ao Juan Fernando Aguilar Morán pela confecção das análises estatísticas, companheirismo e compreensão sempre presentes;
- A tia Benedicta Anna Sêga pela carinhosa hospedagem e exemplo de vida;
- A minha irmã Rosa Maria Deléo por tudo que tem me ensinado e pelo incentivo e amizade constantes.

ÍNDICE

	<u>Página</u>
LISTA DE FIGURAS	xi
LISTA DE TABELAS	xii
RESUMO	xv
SUMMARY	xvii
1. INTRODUÇÃO	1
2. REVISÃO DE LITERATURA	3
2. 1. Materiais Celulósicos	3
2. 1. 1. Estrutura da Celulose	3
2. 1. 2. Degradação da Celulose	4
2. 2. Celulases	5
2. 2. 1. Estrutura e Funções das Celulases	5
2. 2. 2. Biossíntese das Celulases ...	9
2. 2. 3. Produção e Aplicações das Celulases	12

Página

2. 3. Posição Taxonômica e Aspectos Biológicos dos Fungos Estudados	14
2. 3. 1. <i>Humicola</i> sp	14
2. 3. 2. <i>Trichoderma pseudokoningii</i> ..	19
2. 4. Melhoramento de Microrganismos Celulolíticos	20
2. 4. 1. Mutação e Clonagem	20
2. 4. 2. Obtenção e Fusão de Protoplastos	29
3. MATERIAL E MÉTODOS	41
3. 1. Linhagens Utilizadas	41
3. 1. 1. <i>Trichoderma pseudokoningii</i> var. Rifai	41
3. 2. 2. <i>Humicola</i> sp	41
3. 2. Meios de Cultura e Soluções Utilizados .	41
3. 2. 1. Meio Mínimo (PONTECORVO et alii 1953)	41
3. 2. 2. Meio Mínimo para <i>Humicola</i> sp .	42

	<u>Página</u>
3. 2. 3. Meio Completo (PONTECORVO et alii, 1953, modificado por AZEVEDO & COSTA, 1973)	42
3. 2. 4. Meio de Farelo de Trigo (YOSHIOKA et alii, 1982)	42
3. 2. 5. Meio para Regeneração de Protoplastos	42
3. 2. 6. Solução Estoque de Biotina ..	43
3. 2. 7. Solução Estoque de Tiamina ..	43
3. 2. 8. Soluções de Biotina e Tiamina .	43
3. 2. 9. Solução de Vitaminas	43
3. 2. 10. Solução Salina	44
3. 2. 11. Solução de Acido Dinitro-Salicílico (DNS)	44
3. 2. 12. Tampão Acetato 0,05 M	44
3. 2. 13. Solução de Salicina (D-Salicin Riedel-de Haen)	44
3. 2. 14. Solução "C"	45

	<u>Página</u>
3. 2. 15. Reativo de Folin - Ciocalteau (Laborclin Ltda)	45
3. 2. 16. Tampão Fosfato 0,2 M	45
3. 2. 17. Tampão Fosfato 0,02 M	45
3. 2. 18. Solução de $MgSO_4$ 1,0 M	46
3. 2. 19. Solução de $MgSO_4$ 0,5 M	46
3. 2. 20. Tampão de Mc Ilvaine's	46
3. 2. 21. Solução de $(NH_4)_2SO_4$ 1,2 M ..	47
3. 2. 22. Solução de $(NH_4)_2SO_4$ 0,6 M ..	47
3. 2. 23. Solução de KCl 1,4 M	47
3. 2. 24. Solução de KCl 0,7 M	47
3. 2. 25. Soluções de Sorbitol 1,6 e 0,8 M	47
3. 2. 26. Solução de Enzimas para Obten- ção de Protoplastos (HAMLYN, 1981)	48
3. 2. 27. Solução de Citrato de Sódio 20 mM	48

	<u>Página</u>
3. 2. 28. Solução de Polietilenoglicol (PEG)	48
3. 2. 29. Solução de Sorbitol para Ele- trofusão (SCHNETTLER & ZIMMER- MANN, 1985, modificado)	49
3. 3. Esterilização e Conservação	49
3. 4. Análise de Crescimento	49
3. 5. Dosagem Enzimática e Proteica	50
3. 5. 1. Ensaios Utilizados	50
3. 5. 2. Cultivo em Meio Semi- Sólido (YOSHIOKA et alii, 1982)	50
3. 5. 2. 1. Determinação das Atividades da Avicelase e Carboximetil- celulase	51
3. 5. 2. 2. Determinação da Atividade da β -glucosidade	52
3. 5. 2. 3. Dosagem de Proteínas Totais (LOWRY et alii, 1951)	52
3. 6. Obtenção de Heterocários	54

Página

3. 7. Obtenção e Regeneração de Protoplastos .	54
3. 7. 1. Protoplastos de micélio	54
3. 7. 2. Protoplastos de conídios	55
3. 8. Técnica do Doador Morto	56
3. 9. Fusão de Protoplastos	56
3. 9. 1. Fusão de Protoplastos por Tra- tamento com Polietilenoglicol (PEG)	56
3. 9. 2. Eletrofusão	58
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	60
4. 1. Análise de Crescimento	60
4. 2. Produção de Proteínas e Atividades Enzi- máticas de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma</i> <i>pseudokoningii</i>	66
4. 2. 1. Produção de Proteínas Totais .	66
4. 2. 2. Dosagem da Avicelase	69
4. 2. 3. Dosagem da Carboximetilcelulase	71

	<u>Página</u>
4. 2. 4. Dosagem da β -glucosidase	72
4. 3. Obtenção de Heterocáries	76
4. 4. Obtenção e Regeneração de Protoplastos .	76
4. 5. Fusão de Protoplastos	84
4. 5. 1. Uso do Agente Fusogênico Poli- etilenoglicol	85
4. 5. 2. Eletrofusão	90
5. CONCLUSÕES	93
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	95

LISTA DE FIGURAS

<u>Figura</u>	<u>Página</u>
1. Estrutura da celulose	4
2. Etapas da hidrólise da celulose	8
3. Mecanismos de regulação da síntese de celulase	10
4. Síntese e excreção das celulasas	12
5. Genealogia de linhagens celulolíticas mutantes de <i>Trichoderma reesei</i>	23
6. Retas padrões de glicose e soroalbumina bovina	53
7. Diagrama de operação do eletromanipulador BTX 401 A	59

LISTA DE TABELAS

<u>Tabela</u>	<u>Página</u>
1. Microrganismos produtores de celulasas	6
2. Protoplastos obtidos e estabilizadores osmóticos utilizados em espécies de fungos filamentosos	31
3. Crescimento da linhagem selvagem de <i>Humicola sp</i> (média de 4 repetições)	60
4. Crescimento da linhagem mutante <i>mor₁₃</i> de <i>Humicola sp</i> (média de 4 repetições)	60
5. Crescimento da linhagem selvagem de <i>Trichoderma pseudokoningii</i> (média de 4 repetições)	61
6. Crescimento da linhagem mutante <i>leu</i> de <i>Trichoderma pseudokoningii</i> (média de 4 repetições)	61
7. Crescimento da linhagem mutante <i>ribo</i> de <i>Trichoderma pseudokoningii</i> (média de 4 repetições)	61
8. Análise de variância do crescimento das linhagens selvagens e mutantes de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	62
9. Teste de Tukey para as médias de diâmetro das	

	<u>Página</u>
colônias de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i> , no 20 dia de crescimento	64
10. Quantidades de proteínas totais das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i> .	67
11. Análise de variância para as quantidades de proteínas totais produzidas pelas linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i> ...	67
12. Atividades da avicelase das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i> ...	69
13. Atividades da carboximetilcelulase das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	71
14. Atividades da β -glucosidase das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i> ...	72
15. Análise de variância das atividades da avicelase, carboximetilcelulase e β -glucosidase das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	74
16. Valores médios e significâncias das atividades enzimáticas relativas às linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	75
17. Número de protoplastos obtidos em 4 repetições	

Página

para as linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	77
18. Número médio de protoplastos obtidos para as linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	79
19. Porcentagens de regeneração obtidas em 4 repetições para protoplastos das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i> ..	82
20. Porcentagens médias de regeneração de protoplastos das linhagens de <i>Humicola sp</i> e <i>Trichoderma pseudokoningii</i>	82
21. Número de protoplastos regenerados da linhagem selvagem de <i>Trichoderma pseudokoningii</i> utilizada como doador morto	85

RESUMO

No presente trabalho foram realizados estudos com as linhagens selvagem e mutante morfológico *mor₁₃* de *Humicola sp* e as linhagens selvagem e mutantes auxotróficos *leu* e *ribo* de *Trichoderma pseudokoningii*, através da utilização de técnicas de obtenção, regeneração e fusão de protoplastos, visando o melhoramento genético da produção de celulases.

A análise de crescimento sob três temperaturas de incubação revelou que a temperatura de 37° C foi favorável tanto para as linhagens de *Humicola sp* como para as linhagens de *Trichoderma pseudokoningii*.

Foram realizadas dosagens das atividades das enzimas avicelase, carboximetilcelulase e β -glucosidase das cinco linhagens com a finalidade de comparar sua capacidade celulolítica. As atividades da avicelase e carboximetilcelulase foram altas e não houveram diferenças significativas entre as linhagens. As atividades da β -glucosidase entre as linhagens foram estatisticamente diferentes, sendo que a atividade do mutante *mor₁₃* de *Humicola sp* foi superior às atividades da β -glucosidases das demais linhagens.

Os protoplastos das linhagens de *Humicola sp* foram obtidos após 1 hora de tratamento enzimático sendo o melhor estabilizador osmótico, o sulfato de magnésio ; enquanto que para as linhagens de *Trichoderma pseudokoningii*, o tratamento enzimático foi de 3 horas e o melhor estabilizador osmótico foi o sulfato de amônia.

A regeneração dos protoplastos de todas as linhagens dos dois gêneros foi conseguida pela utilização de uma mistura de sulfato de magnésio e sulfato de amônia.

Através do uso de polietilenoglicol e da técnica de eletro-fusão, não foram obtidos produtos de fusão.

SUMMARY

In this work studies were carried out with the wild and morphological *mor*₁₃ mutant strains of *Humicola sp* and the wild, auxotrophic *leu*, *ribo* mutants strains of *Trichoderma pseudokoningii*, aiming the genetic breeding for the cellulase production through the improvement of the techniques of obtention, regeneration and fusion of protoplasts.

The growth analysis under three incubation temperatures revealed that the temperature of 37° C was favorable for the growth of the *Humicola sp* strains as much as the *Trichoderma pseudokoningii* strains.

The dosages of the enzymes activities, endoglucanase, exoglucanase and β -glucosidase of the five strains were performed with the objective of to compare your cellulolytic ability. The endoglucanase and exoglucanase activities were high and no significative differences were detected among the strains. The β -glucosidase activities were different statistically among the strains and the activity of the *mor*₁₃ mutant of *Humicola sp* was higher than the activities of β -glucosidases of the others strains.

The protoplasts of the *Humicola sp* strains were obtained after one hour of enzymatic treatment, and the better osmotic stabilizer was magnesium sulphate; while that for the *Trichoderma pseudokoningii* strains, the enzymatic treatment was of three hours and the better osmotic stabilizer was ammonium sulphate.

The regeneration of the protoplasts of each strain of the both genera was obtained by use of the mixture of magnesium sulphate with ammonium sulphate. Through the

use of polyethylene glycol or of the electrofusion technique
no fusion products was obtained.

1. INTRODUÇÃO

A celulose é a fonte mais abundante de carbono renovável da natureza, constituindo 45-60% do peso seco dos vegetais. Adicionalmente, a celulose e derivados representam uma fração de resíduos de diversas origens bastante relevante em potencial energético. O aproveitamento desta energia acumulada pelas plantas e resíduos pode ser uma das opções mais viáveis para o atendimento das necessidades crescentes de alimentos e combustíveis, para uma população mundial estimada em 6,8 bilhões de pessoas no final do século (COUGHLAN, 1985).

O princípio da produção de enzimas microbianas tem sido utilizado como forma adicional e alternativa aos processos puramente industriais. Muitas espécies de microrganismos têm a capacidade de degradar a celulose até glicose, sendo que os fungos são preferencialmente escolhidos por possuírem a capacidade de degradar celulose nativa e não se formarem complexos físicos entre as celulases, facilitando sua extração e utilização.

A complexidade da molécula de celulose é determinada por regiões cristalinas altamente ordenadas e regiões amorfas, sendo que sua digestão é efetuada pela ação conjunta de três enzimas de um complexo enzimático: enzima β -1,4- glucan celobiohidrolase (C_1 - exoglucanase) que retira unidades de celobiose (duas moléculas de glicose- ligação β -1,4); enzima β -(1-4) glucanase (C_x -endoglucanase) que produz celobiose e, β - glucosidase que hidrolisa celobiose a

glicose. Existe sinergismo na ação hidrolítica entre a celobiohidrolase e a endoglucanase.

A hidrólise enzimática da celulose é vantajosa por ser eficiente e não produzir compostos secundários indesejáveis, ao contrário da hidrólise ácida. Por esta razão, estudos microbiológicos e genéticos têm se intensificado, objetivando melhorar a produção de celulasas e consequentemente diminuir os custos operacionais.

A obtenção do complexo celulolítico a partir de alguns gêneros de fungos têm se incrementado, principalmente utilizando linhagens de *Trichoderma reesei* em programas de melhoramento através de mutação-seleção e técnicas mais recentes como fusão de protoplastos, transformação e clonagem de genes.

Em estudos preliminares, outras espécies de fungos têm se mostrado bons produtores de enzimas celulolíticas, diferenciando-se por produzir em maior quantidade uma das três enzimas que compõem o complexo celulase. Sob este aspecto, o fungo *Humicola sp* se evidencia pela produção de grande quantidade de β -glucosidase, superando espécies do gênero *Trichoderma*.

Neste estudo são comparadas as produções de enzimas celulolíticas de linhagens selvagens e mutantes de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii* var. Rifai e, foram utilizadas técnicas de obtenção, regeneração e fusão de protoplastos visando o melhoramento genético da produção de celulasas.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Materiais Celulósicos

A celulose é o mais abundante composto orgânico na natureza, estando presente na parede celular das plantas, algas e muitos fungos. Os tecidos vegetais variam quanto ao teor de celulose; madeira, palha e folhas são os mais ricos. As gramíneas e leguminosas jovens têm, em média, 15% e as madeiras, 50% de celulose (ALEXANDER, 1976). GOK-SOYR & ERIKSEN (1980), relacionaram as porcentagens de celulose em produtos naturais, industriais e agrícolas.

A matéria prima de maior utilidade para uma indústria de hidrólise enzimática de celulose pode ser recursos florestais não utilizáveis, resíduos de madeira de indústrias de papel, resíduos agrícolas e urbanos, etc. Estes materiais são compostos de 40 a 60% de celulose, 15 a 30% de hemicelulose e 10 a 30% de lignina. Dessa forma, seriam produzidos somente nos Estados Unidos, cerca de 400 a 600 milhões de toneladas de resíduos celulósicos por ano. Na Comunidade Económica Européia, considerando-se restos domésticos, urbanos, industriais e agrícolas, tem-se um total de 2300 milhões de toneladas (COUGHLAN, 1985).

2.1.1. Estrutura da Celulose

A celulose é um polímero de glicose de fórmula $(C_6H_{10}O_5)_n$, na qual podem estar unidas outras substâncias como hemicelulose, lignina, pectina, suberina, etc

(RAWITCHER, 1979; Rees (1978), citado por COUGHLAN, 1985). É composta por resíduos de anidroglicose em configuração de "cadeira", unidos por ligações glicosídicas β -1,4. Cada resíduo tem rotação de 180° sobre o eixo principal, em relação aos resíduos vizinhos. As cadeias de celulose estão orientadas paralelamente e associadas através de pontes de hidrogênio, formando fibrilas. Dentro das fibras de celulose há áreas altamente ordenadas denominadas áreas cristalinas e regiões amorfas que são menos organizadas (COUGHLAN, 1985).

Em média a celulose contém 15% de regiões amorfas e 85% de áreas cristalinas, sendo esta a principal dificuldade para a hidrólise da molécula, além da associação bastante comum com a lignina (TSAO et alii, 1978).

A Figura 1 mostra a estrutura da celulose.

Figura 1. Estrutura da celulose (COUGHLAN, 1985).

2.1.2. Degradação da Celulose

A solubilidade dos poli β -1-4 glicosídeos decresce rapidamente na água. As fibras de celulose absorvem

água e incham, embora este inchaço se limite à região amorfa da fibra; enquanto que na região cristalina nada ocorre devido à força das pontes de hidrogênio. Ácidos minerais e álcalis em altas concentrações podem induzir o entumescimento da fibra inteira, rompendo as pontes de hidrogênio e penetrando nas áreas cristalinas.

A conversão da celulose em açúcares tem sido feita por via ácida ou enzimática. O método de hidrólise ácida apresenta várias desvantagens como o requerimento adicional de calor, formação de subprodutos e necessidade de equipamentos resistentes à corrosão. Por outro lado, este processo tem sido o mais utilizado porque o uso do sistema enzimático se torna difícil devido ao alto custo da enzima. Para superar este problema tem-se procurado desenvolver linhagens microbianas hiperprodutoras de celulase e com maior especificidade pelo substrato (GHOSE & GHOSH, 1979).

A capacidade de utilizar a celulose como fonte de carbono e energia é encontrada em bactérias, actinomicetos e fungos, sendo que o conjunto de enzimas celulolíticas difere entre os microrganismos pois alguns podem degradar a celulose nativa e muitos não têm esta capacidade. A Tabela 1 apresenta uma relação de microrganismos produtores de celulasas de uso comercial ou potencial estabelecido.

2.2. Celulasas

2.2.1. Estrutura e Funções das Celulasas

Em 1950, REESE et alii, introduziram o conceito $C_1 - C_x$ do complexo celulase. C_1 era um componente que formava cadeias lineares mais curtas a partir da celulose natural. Estas cadeias eram hidrolisadas por C_x . Segundo SIU (1951); SELBY (1968), C_1 seria uma enzima que quebra as

Tabela 1. Microrganismos produtores de celulasas (COUGHLAN, 1985).

Grupo	Organismo	Grupo	Organismo
Bactérias	Acetivibrio cellulolyticus	Fungos	Pellicularia filamentosa
	Bacteroides cellulosolvens		Penicillium citrinum
	Bacteroides succinogenes		Penicillium funiculosum
	Cellulomonas spp		Penicillium irensis
	Cellvibrio fulvus		Penicillium janthinellum
	Cellvibrio vulgaris		Pestalotiopsis westerdijkii
	Clostridium thermocellulaseum		Polyporus adustus
	Clostridium thermocellum		Polyporus tulipiferae
	Clostridium thermomonospora		(Irpex lacteus)
	Pseudomonas fluorescens		Polyporus versicolor
	Ruminococcus albus		Poria spp
Actinomicetos	Streptomyces griseus		Sporotrichum cellulophilum
	Thermoactinomyces spp		Sporotrichum dimorphosporum
	Thermomonospora curvata		Sporotrichum pulverulentum
	Thermomonospora fusca		(Chrysosporium lignorum)
Fungos	Agaricus bisporus		Sporotrichum pruinosum
	Aspergillus fumigatus		Sporotrichum thermophile
	Aspergillus niger		Talaromyces emersonii
	Aspergillus terreus		Thermoascus aurantiacus
	Botryodiplodia theobromae		Thielavia terrestris
	Chaetomium thermophilum		Tranetes sanguinea
	Eupenicillium javanicum		Trichoderma harzianum
	Fusarium solani		Trichoderma koningii
	Humicola insolens		Trichoderma lignorum
	Macrophoma phaseolina		Trichoderma longibrachiatum
	Myrothecium verrucaria		Trichoderma pseudokoningii
	Myceliophthora thermophila		Trichoderma reesei
			Trichosporon cutaneum
			Trichosporon pullulans

pontes de hidrogênio, tornando as cadeias expostas para a ação de C_x . A hidrólise máxima da celulose é determinada pela ação da celobiase dando como produto final a glicose.

Diversos autores como GONG & TSAO (1979);

MONTENECOURT et alii (1979); LEE & FAN (1980) ; RYU & MANDELS (1980), afirmam que o complexo celulase é formado pelas seguintes enzimas:

- Exo β -1,4 glucanase ou β -1,4- glucan celobiohidrolase (EC 3.2.1.9.1.), comumente designada como avicelase, celulase C_1 ou exocelulase;
- Endo β -1,4 glucanase ou β -1,4 glucan glucohidrolase (EC 3.2.1.4.), designada como carbóximetil-celulase (CMCase), celulase C_x ou endocelulase;
- β -1,4 glucosidase (EC 3.2.1.2.1.) ou celobiase.

As exoglucanases (C_1) retiram as unidades de glicose e celobiose dos terminais não redutores da cadeia, resultando num incremento de grupos redutores com mudança na fluidez da molécula (GONG & TSAO, 1979; RYU & MANDELS, 1980). As endoglucanases (C_x) hidrolisam as cadeias ao acaso atacando os polímeros de celulose internamente (RYU & MANDELS, 1980). Apresenta atividade limitada sobre as regiões cristalinas da celulose mas, após tratamento da celulose nativa com endocelulase há aumento da susceptibilidade à exocelulase, devido à criação de novos sítios reativos para a mesma (GONG & TSAO, 1979). Observa-se, portanto, um mecanismo de ação sinérgico pelo qual a atividade de um componente enzimático é favorecida pela presença e ação hidrolítica de outro. A última etapa do processo é efetuada pela β - glucosidase que hidrolisa a celobiose produzindo glicose.

O esquema a seguir (Figura 2) demonstra as etapas de hidrólise da celulose.

Figura 2. Etapas da hidrólise da celulose (RYU & MANDELS, 1980).

As enzimas do complexo celulase apresentam algumas características mostradas pela maioria das enzimas exocelulares, principalmente a multiplicidade de formas, a natureza glicoproteica e a grande resistência à denaturação (GRIFFIN, 1981). Estudos de fracionamento de amostras de celulases demonstraram as múltiplas formas para cada componente do sistema celulolítico. Discute-se que estas formas podem ser produtos de vários genes ou produtos de proteólise (NAKAYAMA et alii, 1976); ou ainda o resultado da glicosilação diferencial de uma única proteína (GUM & BROWN, 1977).

2.2.2. Biossíntese das Celulases

A celulase extracelular é produzida pelos organismos em resposta à presença de certos componentes no meio de cultura. Entre os indutores da síntese da celulase podem ser citados a celulose, celobiose, sofrorose e lactose, sendo que o nível da resposta varia conforme o tipo e concentração do indutor (MANDELS et alii, 1962, 1975). Além da indução, a síntese pode ser inibida pela presença de glicose ou outros açúcares (repressão catabólica), sendo portanto um processo de indução-repressão (GONG & TSAO, 1979).

O mecanismo de entrada de indutores na célula tem sido descrito como sendo um processo de "síntese basal" onde pequenas quantidades de celulase são produzidas e liberadas ao meio, ocorrendo hidrólise da celulose, entrada de celobiose na célula e indução da síntese de celulase (MANDELS & REESE, 1960). Os mesmos autores ressaltaram que em altas concentrações a celobiose inibe a síntese de celulase por ser hidrolisada pela celobiase intracelular levando ao acúmulo de glicose que age como repressor. GONG & TSAO (1979), citaram a lactose como indutor, sendo que a célula é insensível à alta concentração de lactose, devido ao nível baixo de enzima intracelular que hidrolisa a lactose.

Os mecanismos de regulação da síntese de celulase estão ilustrados na Figura 3.

(1) Celobiose e glicose representam os produtos originados da hidrólise de celulose pelo processo de síntese basal de celulase. A celobiose age como fonte de carbono e indutor.

(2) O transporte ativo da celobiose através da membrana celular é realizado pelo desenvolvimento de um sistema enzimático de transporte adaptativo. Glicosidase constitutiva po-

Figura 3. Mecanismos de regulação da síntese de celulase
(GONG & TSAO, 1979).

deria estar presente como uma enzima limitada pela membrana, a qual hidrolisaria parte da celobiose em glicose. Glicosidase adaptativa também poderia ser formada em resposta à presença de celobiose ou outros indutores como soforose ou lactose, no meio de crescimento.

(3) Após a entrada da celobiose na célula, a celobiose intracelular poderia agir como indutor ativo e reagir com a

proteína repressora, tornando-a inativa e permitindo que ocorra a indução. Ou o indutor em potencial poderia ser hidrolisado pela glicosidase intracelular, resultando em acúmulo de glicose e repressão da síntese de celulase.

(4) A afinidade do indutor ativo pela proteína repressora determina a eficiência da indução.

(5) A indução da síntese ocorre quando a proteína repressora foi inativada pelo indutor ativo, seguindo-se a transcrição e tradução. As quantidades reais de exocelulases e endocelulases são controladas pela atividade de tradução (neste modelo, assumiu-se que a expressão dos dois genes da celulase é controlada pelo mesmo regulador).

(6) A celulase recém sintetizada, em resposta à indução, poderia permanecer no interior da membrana. A liberação das celulasas através da membrana é regulada por um mecanismo específico, provavelmente uma protease ácida intracelular específica (pH baixo aumenta a liberação da celulase e pH alto, inibe).

(7) A celulase extracelular recém liberada hidrolisa a celulose em glicose e celobiose. A quantidade de celulase liberada afeta as quantidades de glicose e celobiose produzidas. Por sua vez, glicose e celobiose sustentam o crescimento celular, estando envolvidas em indução e repressão.

(8) A glicosidase intracelular hidrolisa parte da celobiose intracelular em glicose.

(9) Altos níveis de glicose intracelular inibem a atividade da glicosidase intracelular.

(10) Certos organismos como *Sporotrichum*, possuem a capaci-

dade de produzir glicose-oxidase adaptativa, em resposta ao acúmulo de glicose dentro da célula. A glicose-oxidase age na oxidação da glicose a ácido glucônico e gluconolactona.

(11) A gluconolactona inibe a atividade da glicosidase, ocorrendo a diminuição da repressão da síntese da celulase.

(12) A concentração de glicose intracelular influencia a síntese de celulase pelo mecanismo de repressão.

Supondo que o aparecimento da celulase no meio seja devido ao transporte ativo da enzima pela membrana celular, ROSS et alii (1983), propuseram o seguinte modelo para explicar a síntese e excreção das celulases (Figura 4).

Figura 4. Síntese e excreção das celulases.

2.2.3. Produção e Aplicações das Celulases

O número de microrganismos celulolíticos é extenso (FREIRE, 1975; AUNSTRUP, 1978; COUGHLAN, 1985), mas a habilidade de produzir celulase de alta atividade, capaz de degradar extensivamente a celulose nativa se restringe a algumas espécies fúngicas como: *Trichoderma reesei*,

Trichoderma koningii, *Trichoderma lignorum*, *Sporotrichum pulverulentum*, *Penicillium funiculosum*, *Penicillium iriense*, *Aspergillus wentii*, *Polyporus adustus*, *Fusarium solani*, *Fusarium lini*, *Sclerotium rolfsii*, *Eupenicillium javanicum*, *Schizophyllum commune* e, poucas espécies bacterianas como *Clostridium thermocellum*, *Thermomonospora* sp, *Cellulomonas* sp e o actinomiceto *Streptomyces flavogriseus*. Alguns fungos termofílicos tais como *Chaetomium thermophile* var. *dissitum* e *Humicola* sp, também produzem celulase capaz de degradar celulose nativa (BISARIA & GHOSE, 1981).

Destes microrganismos citados, o mais estudado é *Trichoderma reesei*, que possui um complexo celulase ativo e bem balanceado, em níveis extracelulares, capaz de hidrólise intensa de concentrações altas de celulose (MONTE-NECOURT et alii, 1979; RYU & MANDELS, 1980).

A maioria dos processos estudados atualmente, em escala pré-industrial, utilizam as enzimas produzidas por *Trichoderma reesei* em fermentação submersa. Inicialmente, a produção de celulasas em laboratório era efetuada utilizando-se celulose como fonte única de carbono. Por razões de alto custo e muita viscosidade no meio de cultura; em escala industrial, a celulose não pôde ser utilizada como fonte única, tendo sido aperfeiçoados meios contendo outros açúcares como, por exemplo, lactose. Os outros constituintes do meio de cultura são sais minerais usuais além da adição de extrato de levedura, como suplemento vitamínico. A excreção de celulasas é facilitada pela presença de tensoativos no meio. A produção de celulasas em escala piloto, para uma linhagem de *Trichoderma reesei* geneticamente melhorada, em um meio à base de lactose e celulose, utilizou um reator de 3 m³ com agitação mecânica a uma velocidade de 120 rpm, aeração de 0,5 volume de ar por volume do fermentador por minuto temperatura regulada para 27° C, durante as primeiras 40 ho-

ras, depois em 25° C, pH livre nas primeiras 20 horas e, em seguida regulado para 5,0. A fermentação para a produção de celulasas é um processo lento com duração total de 140 horas (FOURQUIE & VANDECASTEELE, 1985).

As aplicações usuais e potenciais das celulasas são citadas por Mandels (1985), citado por COUGHLAN, (1985); salientando-se as utilizações em indústrias de alimentos e rações animais e na decomposição de resíduos.

Para a maioria dos usos das celulasas, a hidrólise extensiva do substrato não é requerida e, portanto, o uso da enzima é pequeno. Não há, ainda, processo economicamente viável para a conversão direta de materiais celulósicos a produtos finais desejáveis com dextrose e etanol. Entretanto, devido ao fato de materiais lignocelulósicos de fontes primárias de resíduos domésticos, agrícolas ou industriais serem, potencialmente, estoques imensos de energia e alimentos, as pesquisas para a descoberta de um processo mais econômico continuam (COUGHLAN, 1985).

2.3. Posição Taxonômica e Aspectos Biológicos dos Fungos Estudados

2.3.1. *Humicola sp*

A posição taxonômica do fungo *Humicola sp*, segundo AINSWORTH (1971); AINSWORTH et alii (1973); LASKIN & LECHEVALIER (1978); ALEXOPOULOS & MIMS (1979) é a seguinte:

Divisão: Amastigomycota
Sub-Divisão: Deuteromycotina
Classe: Hyphomycetes
Sub-Classe: Hyphomycetidae
Ordem: Moniliales

Família-forma: Dematiaceae

O gênero *Humicola* sp, apresenta conidióforos simples ou pouco ramificados, hialinos com células conidio-gênicas pequenas, hialinas que não se diferenciam do micélio produzindo conídios apicais, mais ou menos globosos, unicelulares (amerosporos), sendo que não ocorre a formação de fiálides verdadeiras. Os conídios, hialinos quando jovens adquirem pigmentação escura na maturidade.

Existem na literatura trabalhos que descrevem a ocorrência, morfologia, caracteres culturais e taxonomia de várias espécies termofílicas como *Humicola insolens*, *Humicola grisea*, *Humicola stellata* e *Humicola lanuginosa* (WHITE & DOWNING, 1953; COONEY & EMERSON, 1964; TANSEY, 1971).

A grande variabilidade do gênero *Humicola* é discutida no trabalho de De BERTOLDI (1972), onde foi verificada a presença de esporos uninucleados e multinucleados. A composição de base do DNA (conteúdo de citosina-guanina) de 25 linhagens de *Humicola* foi analisada por LEPIDI et alii (1972). Os autores observaram grande variação no conteúdo CG, indicando que possam haver várias origens filogenéticas.

Em 1982, CHAVES estudou um fungo termofílico isolado de compostagem, classificando-o como *Humicola* por apresentar conidióforos curtos, conídios globosos, multinucleados, escuros; com temperatura ótima de crescimento de 42° C e pH do meio igual a 6,0. MACEDO (1986), determinou para esta mesma linhagem de *Humicola*, o melhor redutor de colônia como sendo o citrato de sódio. Através de coloração de conídios verificou a presença de 5 a 9 núcleos por conídio. Adicionalmente, foram determinadas as melhores condições para

obtenção e regeneração de protoplastos; além de curvas de sobrevivência à luz ultra-violeta para conídios e protoplastos.

RODRIGUES (1987), ampliou os resultados obtidos por MACEDO (1986), tendo testado 5 redutores de crescimento e comprovou ser o citrato de sódio juntamente com a sorbose, os melhores. Foi determinado o meio mínimo para crescimento, sendo requeridos, além dos sais minerais e fonte de carbono do meio mínimo proposto por PONTECORVO (1953), a presença de biotina e tiamina. A sobrevivência a vários agentes mutagênicos (ácido nitroso, etilmetano sulfonato, luz ultra-violeta e radiação gama) também foi avaliada. Através de observações citológicas, RODRIGUES (1987), constatou que o número de núcleos em conídios variou de 5 a 18, sendo 12 a classe mais frequente e, nas células miceliais foram verificados de 1 a 8 núcleos. O acompanhamento das fases de divisão nuclear permitiu a observação de 6 a 8 cromossomos em conídios no final da metáfase. A constatação de anastomose de hifas indicou a possibilidade de ocorrência do ciclo parassexual, como descrito por De BERTOLDI & CATEN (1975).

A maioria dos estudos efetuados sobre *Humicola*, envolve a produção de celulasas pelas diversas espécies do gênero. A espécie *Humicola insolens*, obtida em produtos de tabaco produziu amilase e celulase extracelulares (OGUNDERO, 1979). JAIN et alii (1979), observaram que *Humicola insolens* e *Humicola lanuginosa*, apresentaram atividade celulolítica quando crescidos em meio com farelo de trigo, mas apenas um isolado de *Humicola insolens* possui atividade em meio com celulose cristalina.

HAYASHIDA & YOSHIOKA (1980 a), purificaram e analisaram a avicelase e carboximetilcelulase de *Humicola*

insolens YH-8, tendo verificado que a temperatura ótima de ambas as enzimas era de 50° C. A avicelase permaneceu estável após aquecimento por 5 minutos a 65° C e a carboximetilcelulase reduziu a 45% sua atividade após 5 minutos de aquecimento a 95° C. Em faixas de pH de 3,5 a 9,0 e 3,0 a 11,0, a avicelase e carboximetilcelulase, respectivamente, mantiveram sua estabilidade. A β -glicosidase de *Humicola insolens* YH-8 também foi purificada por YOSHIOKA & HAYASHIDA (1980), mostrando temperatura ótima de atividade a 50° C, para uma faixa de pH de 4,5 a 7,5, sendo 5,0 seu pH ótimo.

HAYASHIDA & YOSHIOKA (1980 b), sugeriram que a estabilidade das glicoenzimas avicelase e carboximetilcelulase está associada à presença dos carboidratos manose e N-acetilglicosamina, covalentemente ligados à estrutura molecular das mesmas, pois a remoção destes carboidratos levou ao decréscimo da estabilidade térmica e variação de pH.

A linhagem YH-78 de *Humicola grisea* var. *thermoidea* apresentou alta atividade de carboximetilcelulase a 50° C, quando cultivada em meio de farelo de trigo, mas baixa atividade de avicelase. A enzima carboximetilcelulase adsorvida em avicel mostrou atividade em carboximetilcelulose e nenhuma atividade em avicel e papel de filtro, entretanto houve grande ação sinérgica com a celulase de *Humicola insolens* YH-8, na hidrólise de avicel (YOSHIOKA et alii, 1982).

A linhagem de *Humicola* sp isolada por CHAVES (1982), apresentou alta atividade da avicelase ligada à massa celular e a fração carboximetilcelulase mostrou baixa atividade, sendo encontrada no sobrenadante e no precipitado. A atividade da β -glucosidase foi medida apenas no sobrenadante e foi superior quando a fonte de carbono era a carboximetilcelulose e o pH igual a 7,0. Em comparação com a ati-

vidade da β -glucosidase da linhagem QM 9414 de *Trichoderma reesei*, foi verificado por ARAUJO et alii (1983), que a atividade de *Humicola sp* foi 4 vezes superior.

Vários autores concentraram seus estudos na β -glucosidase de *Humicola* por ser um campo promissor, devido a alta atividade desta enzima. Segundo MORAES et alii (1985) a β -glucosidase de *Humicola sp* apresenta uma diminuição de 20 a 25% em sua atividade em meio com glicose como fonte de carbono; atividade duas vezes superior em meio com carboximetilcelulose em comparação a meio com celobiose. A glicose reprime a atividade da β -glucosidase induzida por carboximetilcelulose, mas não há repressão quando a celobiose é o indutor e, o sistema da β -glucosidase é constituído por 4 componentes que variam em proporção conforme a natureza do indutor. O efeito inibidor competitivo da glicose sobre a β -glucosidase também foi verificado por POLIZELI & TERNENZI (1986).

As β -glucosidases de *Humicola nigricans* foram estudadas por FERREIRA FILHO & FELIX (1986), sendo que a enzima excretada no meio pode ser constituída por uma ou várias espécies de pesos moleculares muito semelhantes, enquanto que a enzima intracelular compreende duas espécies distintas. Em 1987, os mesmos autores purificaram quatro espécies de β -glucosidase de *Humicola sp* e verificaram que o pH ótimo estava entre 4,5 e 6,0 e a temperatura ótima entre 60 e 70° C, para todos os componentes analisados. Estas formas de β -glucosidase quando comparadas entre si, apresentaram estabilidades térmicas diferentes e também variações na relação carboidrato: proteína. HARGER et alii (1986), constataram que a β -glucosidase intracelular tem síntese constitutiva em meio com glicose como fonte de carbono.

A produção de celulasas por *Humicola* foi ava-

liada por MONTI & JORGE (1986) sob várias condições de cultivo, tendo sido comprovado que há um aumento de 3 a 4 vezes na atividade da carboximetilcelulase extracelular por adição de extrato de malte ao meio de cultura, em relação ao extrato de levedura e, aumento de 3 a 4 vezes na atividade da avicelase extracelular usando outros substratos naturais em vez de celulose.

NEIROTTI (1988), obteve aumento da atividade enzimática de *Humicola sp* através de 3 ciclos de seleção, utilizando 3 tratamentos (protoplastos irradiados com luz ultra-violeta; protoplastos não irradiados e testemunha, sem protoplastização e irradiação. RODRIGUES (1987), estudando a mesma linhagem obteve um mutante com produção de β -glucosidase superior à linhagem selvagem e constatou que o coeficiente de correlação entre as atividades avicelase - carboximetilcelulase foi altamente significativo, sugerindo que as atividades destas enzimas devem ser correguladas.

2.3.2. *Trichoderma pseudokoningii*

A posição taxonômica da espécie *Trichoderma pseudokoningii*, segundo vários autores (AINSWORTH, 1971; AINSWORTH et alii, 1973; LASKIN & LECHEVALIER, 1978; ALEXOPOULOS & MIMS, 1979; ONIONS et alii, 1981), é a seguinte:

Divisão: Amastigomycota
 Sub-Divisão: Deuteromycotina
 Classe: Hyphomycetes
 Sub-Classe: Hyphomycetidae
 Ordem: Moniliales
 Família-forma: Moniliaceae

A espécie *Trichoderma pseudokoningii* var. Rifai apresenta micélio hialino e esparso, composto de hifas

ramificadas e septadas. Os conidióforos se agrupam em feixes tornando-se pulverulentos na maturidade. Os conídios uninucleados são produzidos isoladamente na extremidade de cada fiálide, tendo forma oval e coloração que varia do branco ao verde. (RIFAI, 1969).

COUGHLAN (1985), citou a espécie *Trichoderma pseudokoningii* como microrganismo produtor de celulase de uso potencial, em meio às espécies *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma koningii*, *Trichoderma lignorum*, *Trichoderma longibrachiatum* e *Trichoderma reesei*.

FANELLI & CERVONE (1977), analisaram a produção de poligalacturonase e celulase (C_x) por *Trichoderma koningii* e *Trichoderma pseudokoningii* em meios contendo pectina e carboximetilcelulose e, verificaram que a atividade pectinolítica de *Trichoderma koningii* foi muito maior que a de *Trichoderma pseudokoningii*, entretanto a atividade celulólitica de *T. pseudokoningii* superou em muito a de *T. koningii*, tendo atingido seu ponto máximo em pH 4,0 e permanecendo ativa até pH 7,0.

ZALDIVAR et alii (1987), selecionaram mutantes de *T. pseudokoningii* resistentes à repressão catabólica. FURLANETTO (1989), obteve mutantes mono e duplo auxotróficos de *T. pseudokoningii* que apresentaram atividade celulólitica superior à linhagem selvagem e ao mutante hipercelulólitico QM 9414 de *T. reesei*.

2.4. Melhoramento de Microrganismos Celulolíticos

2.4.1. Mutação e Clonagem

O conhecimento dos mecanismos reguladores da síntese da celulase é fundamental para se aumentar o

rendimento da fermentação fúngica e possibilitar a obtenção de valores superiores na produção da enzima por linhagens mutantes. A razão pela qual tem sido obtido aumento de 3 a 4 vezes na produção de celulase, por agentes mutagênicos reside no fato da celulase ser induzível (MANDELS et alii, 1971) além da quantidade de enzima-proteína necessária para a hidrólise da celulose. Por enquanto, as linhagens hiperprodutoras secretam cerca de 2,0 mg de proteína por ml, limitando as possibilidades de alto incremento (Stenberg, 1975, citado por MENEZES, 1985).

Segundo Stenberg (1975), citado por MENEZES (1985), três tipos de mutantes deveriam ser procurados: a) mutantes produtores de celulase constitutiva; b) mutantes com produção mínima de proteína de outras origens (proteína que não seja celulase), permitindo maior produção de proteína precursora da produção de celulase; c) mutantes com super produção de fração particular do complexo celulolítico, possibilitando a obtenção de um complexo mais ativo pela mistura de diferentes filtrados de culturas.

A seleção de mutantes pode ser feita em cultura submersa (meios contendo glicose em frascos sob agitação) e, técnica semi-quantitativa por semeadura. Esta técnica permite o isolamento de mutantes constitutivos de *T. reesei* e outros microrganismos celulolíticos e, também, a determinação da concentração em que a glicose e o glicerol inibem a síntese de celulase por repressão catabólica nas linhagens selvagens (MENEZES, 1985).

A espécie *T. reesei* é considerada uma das melhores fontes de produção do complexo $C_1 - C_x$ e, por esta razão, tem sido muito utilizada em programas de melhoramento. Os mutantes hipercelulolíticos têm sido obtidos desde a década de sessenta, salientando-se o trabalho do "U.S. Army

Natick Development Center" e da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos; e do "VTT Biotechnical Laboratory", na Finlândia. A linhagem de *T. reesei* utilizada nesses estudos foi designada como QM 6a e, embora não apresente boa atividade de β -glucosidase, produz avicelase e carboximetilcelulase em grandes quantidades. A genealogia das linhagens mutantes obtidas através de irradiação com acelerador linear, luz ultra-violeta e nitrosoguanidina a partir da linhagem QM 6a é apresentada na Figura 5.

MONTENECOURT et alli (1979), consideraram sete linhas principais para seleção de mutantes regulatórios de maior produção de celulase:

1. Mutantes resistentes à repressão catabólica;
2. Mutantes resistentes a antimetabólitos;
3. Mutantes para uso no fermentador;
4. Linhagens revertentes celulase positivas a partir de mutantes celulase negativos;
5. Mutantes resistentes ao produto final;
6. Mutantes secretores;
7. Mutantes constitutivos

A técnica de seleção de mutantes hipercelulolíticos faz uso de redutores de colônia em meios onde a única fonte de carbono é a celulose. O tamanho das zonas claras de degradação da celulose são comparados entre a linhagem selvagem e os mutantes bem como a comparação da medida radial das colônias, são critérios adotados para a seleção de mutantes (MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977 a; NEVALAINEN & PALVA, 1978; BISARIA & GHOSE, 1981).

Em se tratando de mutantes resistentes à repressão catabólica, o isolamento é efetuado observando-se a atividade celulólitica em substratos celulósicos; na presença

ça de catabólitos repressores (glicose, glicerol, etc). O método semiquantitativo inclui o uso de rosa bengala ou oxi-

Figura 5. Genealogia de linhagens celulolíticas mutantes de *Trichoderma reesei* (MANDELS et alii, 1971).

gal que limitam o tamanho da colônia e permitem melhor visualização dos halos claros ao redor da colônia. Esta técnica também inclui o uso sequencial de concentrações crescentes do substrato (mutantes RUT-M 7, 1% de celulose; RUT-NG 14, 2% de celulose; série S, 2,5% de celulose) e, ainda, variação seletiva do substrato utilizado (mutantes RUT-C 30, celobiose; RUT-NG 14, celulose).

Um procedimento de seleção adotado especificamente para mutantes β -glucosidase, emprega esculina como substrato, citrato férrico de amônia como agente na visualização e, repressores similares. A esculina é hidrolisada pela β -glucosidase, liberando esculetina e glicose. Como a esculetina forma um complexo negro com os sais ferricos de amônia, os mutantes que são β -glucosidase resistentes à repressão catabólica podem ser facilmente visualizados como colônias com zonas negras circundantes (MONTENECOURT & EVELEIGH, 1978).

O mutante RUT-NG 14 produziu cinco vezes mais atividade de degradação de papel de filtro/ml de meio de cultura e duas vezes mais a atividade específica/mg de proteína excretada em cultura submersa, quando comparado com o melhor mutante existente (QM 9414). Este mutante também apresentou produção elevada de endo β -glucanase e β -glucosidase. Embora o mutante RUT-NG 14 tenha sido isolado em presença de 5% de glicerol em placa de ágar; em meio líquido, mostrou somente desrepressão parcial do complexo celulase (MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977 a, 1977 b).

As linhagens QM-MCG 77 e QM-MCG 80 originaram através de seleção para resistência ao antibiótico kabicidin e à repressão catabólica em presença de 8% de glicerol. A linhagem QM-MCG 77 apresenta produção alta de celulase em concentrações de celulose mais elevadas, demonstrando rendi-

mento semelhante aos mutantes QM 9414 e RUT-NG 14, nas fermentações normais de celulose. Entretanto seu crescimento se verifica em substratos solúveis sem restrições subsequentes na síntese de celulase, tendo uma taxa metabólica e produção enzimática mais rápida (Gallo et alii (1978), citados por MONTENECOURT et alii, 1979).

A linhagem QM-MCG 80 é excelente produtora de celulase e proteína extracelular, a partir de várias fontes de carbono; todas elas bons indutores do sistema celulase de *T. reesei* e, algumas, de custo reduzido e facilmente disponíveis, como soro de leite; o que tornou o processo de conversão enzimática da celulose mais atraente. Parece possível melhorar a produção de celulases utilizando-se este mutante, através da otimização do processo de fermentação (Allen & Andreotti (1982), citados por NEIROTTI, 1985).

A resistência a antimetabólitos como a 2-deoxiglucose pode surgir por diversos mecanismos, incluindo aqueles de resistência à repressão catabólica. Um organismo resistente à repressão catabólica quando cultivado em meio com 2-deoxiglucose e celulose, hidrolisa a celulose produzindo glicose e evita, desta forma, o uso do antimetabólito. Por outro lado, linhagens selvagens podem utilizar somente a 2-deoxiglucose tóxica e, então, são mortas. Os mutantes resistentes são visualizados como colônias grandes crescendo nestas placas. Se a resistência ao análogo surgir por outros mecanismos, como a incapacidade de absorver a 2-deoxiglucose, estes mutantes resistentes ao antimetabólito são selecionados posteriormente para determinar quais são as linhagens resistentes à repressão catabólica.

Utilizando-se a metodologia da esculina, como confirmação, foi selecionado o mutante RUT-C 30 que apresenta atividade celulolítica comparável a RUT-NG 14, além de

crescimento extremamente rápido e, produção de celulase em meio de cultura contendo licor de cereais (MONTENECOURT & EVELEIGH, 1978; MONTENECOURT et alii, 1979). Outros dois mutantes da linhagem QM 9414 (QM 9414 MCG 4 e QM 9414 MCG 5), desreprimidos e hiperprodutores de β -glucosidase (5 vezes mais que QM 9414) foram isolados por COSTA & VAN UDEN (1980) utilizando 2- deoxiglucose.

O mutante VTT-D 78085, obtido a partir do tratamento da linhagem QM 9414 com nitrosoguanidina, mostrou um aumento de duas ou três vezes na atividade celulolítica e a atividade da β -glucosidase foi seis vezes superior às atividades correspondentes de QM 9414, quando utilizado no fermentador em escala piloto de produção (Nevalainen et alii (1980), citados por BISARIA & GHOSE, 1981). A partir deste mutante, foram obtidos após indução com nitrosoguanidina e radiação gama, os mutantes VTT-D 80132 e VTT-D 80133, que se mostraram mais estáveis geneticamente e, com atividade celulolítica semelhante à linhagem parental (BAILEY & NEVALAINEN 1981).

Os mutantes celulase negativos podem ser selecionados utilizando meio ágar- celulose, como sendo aqueles cujas colônias deixam de produzir halos hidrolíticos. Mutantes hipercelulolíticos podem ser produzidos por retro-mutação devido ao desajuste no controle da síntese enzimática, entretanto não foi conseguida nenhuma linhagem altamente produtora. Através desta metodologia podem ser obtidos mutantes celulase negativos que produziram linhagens revertentes β -glucosidase positivas (QM 9977) e, mutantes celulase negativos que falharam na produção de retromutantes celulase positivos (QM 9136).

As características dos mutantes celulase negativos que produziram revertentes permitiram inferir que a

enzima β -glucosidase está sob um controle independente e distinto do controle das outras enzimas do complexo celulolítico. Os mutantes celulase negativos que não reverteram podem ser interpretados como linhagens com deleções, embora esta explicação seja muito simples já que foram prontamente obtidos, enquanto que mutantes com deleções não são frequentemente obtidos em estudos análogos com outros sistemas enzimáticos de eucariotos (MONTENECOURT et alii, 1979). Outros mutantes obtidos a partir da linhagem QM 9414 de *T. reesei* são mencionados por FURLANETTO (1989); GOLDMAN & AZEVEDO (1989).

Uma série de ciclos envolvendo os processos de mutação e seleção através da utilização do mutagênico químico 8- metoxipsoraleína, além da irradiação com luz ultra-violeta, resultou na obtenção de mutantes hiperprodutores constitutivos para celulasas. A diversidade destas linhagens foi analisada por SHOEMAKER et alii (1981).

MACRIS (1984), utilizou radiação gama para obter mutantes de *Alternaria alternata*, tendo selecionado um mutante não esporulante (M 7) que produziu cerca de cinco vezes mais β -glucosidase que o tipo selvagem. Vários mutantes foram obtidos de *Penicillium pinophilum* (*P. funiculosum*) utilizando-se luz ultra-violeta e meio de cultura contendo palha delignificada e 5% de glicerol, sendo que houve aumento na produção de celulase em relação à linhagem selvagem (WOOD et alii, 1980).

Em mutantes de *Sporotrichum pulverulentum*, as atividades das celulasas foram iguais ou superiores às do tipo selvagem, sendo que a atividade da β -glucosidase foi seis vezes superior à de *T. reesei* QM 9414 (ERIKSSON & JOHNSRUD, 1983).

Em fungos termofílicos foram efetuados estudos com a espécie *Talaromyces emersonii*, tratada com nitrosoguanidina e ultra-violeta; onde se isolou um mutante resistente à repressão catabólica (UCG 42), com atividade em papel de filtro superior à da linhagem selvagem (MOLONEY et alii, 1983).

Em *Humicola grisea* var. *thermoidea*, após tratamento com nitrosoguanidina e ultra-violeta, foi obtido um mutante (YH 78) que apresentou maior atividade de endoglucanase que a linhagem parental (HAYASHIDA & MO, 1986). RODRIGUES (1987), isolou o mutante morfológico (mor₁₃) através do tratamento da linhagem selvagem de *Humicola* sp com ácido nítrico, sendo que este mutante apresentou produção de β -glucosidase superior à do tipo selvagem.

A produtividade baixa de celulases fúngicas como resultado de períodos longos de fermentação poderia ser resolvida através de clonagem dos genes que codificam a celulase em bactérias, que se dividem rapidamente. Segundo KNOWLES et alii (1987), já foram clonados os genes de uma β -glucosidase de *Aspergillus niger*, *Candida pelliculosa* e *Kluyveromyces fragilis*; genes de uma celobiohidrolase de *Phanerochaete chrysosporium*; genes de uma endoglucanase de *Schizophyllum commune*; genes de duas celobiohidrolases (genes cbh 1 e cbh 2) e duas endoglucanases (genes eg 11 e eg 13) de *T. reesei*.

As estratégias para a clonagem de genes de *Trichoderma* em *E. coli* foram formuladas, no entanto, surgiram problemas pois, primeiramente, *E. coli* não tem capacidade de glicosilação e, há evidências indicando que a maioria, senão todas as celulases fúngicas são glicoproteínas e a glicosilação é essencial para secreção, atividade e estabilidade destas enzimas (MERIVUORI et alii, 1985). Um segundo

problema deriva do fato que os genes de fungos contêm introns, sendo que o gene que codifica a celobiohidrolase 1 de *T. reesei* contém duas sequências de introns e *E. coli* não pode processar os RNAs mensageiros transcritos de tais genes (SHOEMAKER et alii, 1983; Teeri et alii (1983), citados por COUGHLAN, 1985; MERIVUORI et alii, 1985).

O uso de leveduras, em vez de *E. coli*, como hospedeiras dos genes clonados permite que os mRNAs possam ser processados e que a glicosilação da proteína ocorra. Transformantes de *S. cerevisiae*, contendo genes de *A. niger* foram examinados para muitas glicoproteínas secretadas por fungos. Dessas glicoproteínas, somente a β -glucosidase foi expressa na levedura e em baixo nível de expressão, indicando que existem diferenças entre a regulação de genes de leveduras e fungos filamentosos (Pentilla et alii (1984), citados por COUGHLAN, 1985).

Em 1987, o mesmo autor construiu cinco linhagens de *S. cerevisiae* que expressaram os genes *cbh 1*, *cbh 3*, *eg 1* e *eg 2* de *T. reesei*, bem como o gene da β -glucosidase de *A. niger*. Todas as leveduras recombinantes foram capazes de hidrolisar substratos celulósicos. A cópia (cDNA) do gene *eg 1* de *T. reesei* foi transferida para uma linhagem industrial de levedura, através do uso de plasmídeo multicópia e integração cromossômica. A levedura hidrolisou eficientemente os β -glucanos presentes no mosto (Pentilla et alii (1987; Nevalainen (1988), citados por GOLDMAN & AZEVEDO, 1989).

2.4.2. Obtenção e Fusão de Protoplastos

A ausência de parede celular torna os protoplastos um sistema útil para várias manipulações experimentais muito difíceis ou impossíveis em células intactas, como por exemplo, a extração de organelas celulares, a transfe-

rência gênica através do processo de transformação, a produção de novos genótipos pela formação de híbridos entre linhagens ou espécies sexualmente incompatíveis e a obtenção de citoplasmas híbridos pela combinação de organelas de espécies diferentes.

Os estudos sobre isolamento de protoplastos de fungos filamentosos iniciaram com os trabalhos de EMERSON & EMERSON (1958) e BACHMAN & BONNER (1959) em *Neurospora crassa*. Muitos são os fatores que afetam a liberação de protoplastos em fungos; entre eles devem ser considerados os que se referem às condições fisiológicas de crescimento (meio de cultura, pH, temperatura, etc), à composição da parede celular do organismo, ao tratamento enzimático e ao estabilizador osmótico. A composição da parede celular é bastante variável nos diferentes grupos de fungos. Em geral, as paredes celulares fúngicas são compostas de homo e heteropolissacarídeos, proteínas, complexos proteína-polissacarídeos e quantidades variáveis de lipídeos e melaninas (GRIFFIN, 1981).

As enzimas utilizadas na obtenção de protoplastos têm ação diferenciada conforme a espécie de fungo. Têm sido usadas celulase, quitinase, glucanase, helicase, driselase e zimoliase. O tipo e a concentração do estabilizador osmótico também exercem influência na produção e estabilidade dos protoplastos. Como exemplos de estabilizadores frequentemente utilizados temos NaCl, KCl, $MgSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$, NH_4Cl , sorbitol, manitol e sucrose (PEBERDY & FERENCZY, 1985). Em geral sais inorgânicos proporcionam melhores resultados na obtenção de protoplastos de fungos filamentosos e açúcares alcoólicos são mais eficientes em leveduras. (DAVIS, 1985). Na Tabela 2 estão apresentadas várias espécies de fungos e os respectivos estabilizadores osmóticos utilizados no processo de obtenção de protoplastos.

Tabela 2. Protoplastos obtidos e estabilizadores osmóticos utilizados em espécies de fungos filamentosos (FUNGARO, 1987).

Organismo	Estabilizador osmótico
<i>Aspergillus awamori</i>	KCl
<i>A. chrysogenum</i>	NaCl
<i>A. flavus</i>	KCl, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
<i>A. flavus</i> (conídios)	KCl, MgSO_4 , MgCl_2
<i>A. fumigatus</i>	KCl, NH_4Cl
<i>A. heterothallicus</i>	KCl
<i>A. nidulans</i>	KCl, MgSO_4 , NH_4Cl
<i>A. niger</i>	KCl + CaCl_2
<i>A. quadrilineatus</i>	KCl
<i>A. rugulosus</i>	KCl
<i>A. stellatus</i>	KCl
<i>A. unguis</i>	KCl
<i>A. violaceus</i>	KCl
<i>Beauveria tenella</i>	MgSO_4
<i>Claviceps purpurea</i>	MgSO_4 , NaCl
<i>Conidiobolus lampruges</i>	sorbitol
<i>Coprinus cinereus</i>	MgSO_4 , sucrose
<i>Coprinus macrorhizus</i>	manitol
<i>Coprinus</i> sp	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
Dermatophytes	MgSO_4
<i>Emericellopsis glabra</i>	NaCl
<i>E. salmosynnemata</i>	NaCl
<i>Fusarium culmorum</i>	KCl
<i>F. oxysporum</i>	KCl
<i>F. tricinctum</i>	MgSO_4
<i>Geotrichum candidum</i>	MgSO_4
<i>Humicola</i> sp	MgSO_4
<i>Laccaria bicolor</i>	manitol e sucrose
<i>Metarhizium anisopliae</i>	KCl
<i>Mucor rouxii</i>	MgSO_4
<i>Neurospora crassa</i>	sucrose
<i>Penicillium chrysogenum</i>	KCl, CaCl_2 , NH_4
<i>Phycomyces blakesleanus</i>	sorbitol
<i>Phytophthora infestans</i>	manitol
<i>Pleurotus cornucopiae</i>	KCl, manitol
<i>Pyricularia oryzae</i>	KCl
<i>Pythium</i>	KCl, MgSO_4 , NH_4Cl
<i>Trichoderma reesei</i>	MgSO_4
<i>T. roseum</i>	manitol
<i>Volvariella volvacea</i>	MgSO_4 , NaCl

A idade da cultura também é um fator importante na liberação de protoplastos. PEBERDY et alii (1976), estudaram o efeito da idade da cultura em protoplastos de *A. flavus*, *A. nidulans*, *P. chrysogenum*, *F. culmorum* e *N. crassa*, usando enzimas líticas de *Streptomyces*. Foi constatado que a produção máxima de protoplastos ocorria no final da fase exponencial de crescimento.

Em 1983, PICATAGGIO et alii, prepararam protoplastos de várias linhagens mutantes de *T. reesei* (QM 6a, QM 9136, RUT-NG 14 e RUT-C 30), geneticamente marcadas; através da hidrólise enzimática de suspensões miceliais, utilizando "driselase", uma preparação comercial de enzimas líticas. A eficiência da formação dos protoplastos foi dependente da idade e concentração do micélio e, o estabilizador osmótico que se mostrou mais eficiente foi o sulfato de amônia 0,6 M.

A frequência de reversão dos protoplastos varia muito de organismo para organismo e vários padrões de regeneração têm sido descritos. Os estudos para determinação das condições de formação e regeneração de protoplastos têm se concentrado em *T. reesei*. Foram realizados estudos de micélios com 16, 18, 24 e 26 horas de cultivo para analisar as diferenças ocorridas na regeneração da parede celular. Após 18 horas de cultivo foram obtidos muitos protoplastos através do método de lise utilizados para *Streptomyces venezuelae* e *Micromonospora chalybeata*, tendo ocorrido germinação direta dos protoplastos (BENITEZ et alii, 1975 a).

Os protoplastos de *T. reesei* quando semeados em meio com estabilizador, sintetizaram parede aberrante, diferente da normal, não septada e irregular. Posteriormente regeneraram nova parede, semelhante à original. Os polímeros componentes da parede normal eram, principalmente, β -(1, 3)

glucan, β -(1, 6) glucan e quitina, sendo que a quitina estava ausente nas paredes aberrantes (BENITEZ et alii, 1975 b).

Em geral, uma frequência de regeneração de 100% nunca é conseguida. Em *A. nidulans* está na faixa de 20 a 30% (ISAAC, 1978). QUEIROZ (1989), observou taxas de regeneração que variaram de 4 a 27%, conforme a linhagem utilizada e o tempo de exposição à enzima lítica; sendo que o tempo de 3 horas de tratamento enzimático proporcionou a melhor frequência de regeneração.

FURLANETTO (1989), obteve taxas de regeneração para protoplastos de *T. pseudokoningii* que variaram de 0 a 12,24%, utilizando sulfato de amônia como estabilizador osmótico.

Em *Humicola sp.*, MACEDO (1986), utilizou o método "simplex" de LONG (1969), onde foi efetuada uma variação programada dos fatores envolvidos na protoplastização, tendo determinado como ideais o tempo de crescimento de 20 horas e 30 minutos, a temperatura de 41°C, a proporção de 4,2 mg de enzima: 50 mg de micélio e o tempo de tratamento enzimático de 186 minutos. O melhor estabilizador osmótico para a obtenção e regeneração dos protoplastos foi o sulfato de magnésio 0,5 M e a maior taxa de regeneração foi de 0,67%. NEIROTTI (1988), observou valores semelhantes aos de MACEDO (1986), para a porcentagem de regeneração de protoplastos de *Humicola sp* após 3 horas de tratamento enzimático mas obteve taxa de 1,2% de regeneração após 30 minutos de tratamento enzimático, tendo observado que os protoplastos são maiores e apresentam maior número de núcleos à medida que se aumenta o tempo de tratamento enzimático. Segundo FEBERDY & GIBSON (1971), a frequência de regeneração de protoplastos é, em alguns casos, tão variável e baixa devido à ausência de núcleos e à origem dos protoplastos a partir de

diferentes regiões da hifa.

GOLDMAN (1988), obteve taxas de regeneração de 11,4 a 23,3% para *A. niger* e observou que para a obtenção houve melhor resposta com a utilização de KCl, enquanto que para a regeneração, o sorbitol se mostrou mais eficiente.

Devido ao seu sítio de origem, os protoplastos obtidos a partir de conídios são mais homogêneos quanto a tamanho, distribuição de organelas e número de núcleos e, portanto, oferecem vantagens sobre protoplastos obtidos a partir de micélio (BOS & SLAKHORST, 1981).

Em 1958, EMERSON & EMERSON, obtiveram protoplastos de macroconídios de um mutante de *N. crassa* após tratamento com hemicelulase; entretanto estes protoplastos eram menos uniformes que os originados de micélio. Em estudos realizados por BACHMANN & BONNER (1959) em *N. crassa* e GARCIA ACHA & VILLANUEVA (1964) em *Fusarium culmorum*, onde foram utilizados o suco digestivo de *Helix pomatia* e uma preparação enzimática de *Streptomyces* sp, respectivamente, os protoplastos não emergiram dos conídios, permanecendo como estruturas esféricas rodeadas pela parede parcialmente digerida.

A formação de protoplastos e, especialmente, suas propriedades dependem do tipo de enzimas líticas usadas. A liberação do protoplasto pode ocorrer por meio de um poro ou ser total quando a digestão da parede do esporo é completa e uniforme. GARCIA ACHA & VILLANUEVA (1963), observaram diferenças na formação do protoplasto quando compararam as formas de ação das enzimas de *Helix pomatia* e de *Streptomyces* em esporos de *Trichothecium roseum*. Os autores concluíram que os protoplastos obtidos pelo tratamento com enzimas de *Streptomyces* eram completamente desprovidos de

resíduos da parede celular e consideraram que este era o melhor tratamento enzimático.

As condições de crescimento também influenciam a produção de protoplastos de conídios. MOORE & PEBERDY (1976), relataram a conversão de 99% dos conídios de *A. flavus* crescidos em meio líquido e, a alta resistência à digestão, dos conídios obtidos em meio de cultura sólido. A indução de um microciclo pode solucionar este problema, como demonstrado por SAXENA & SINHA (1978) em *A. nidulans*. Os conídios incubados a 48°C por 48 horas, aumentaram de tamanho sem germinar e, após subsequente incubação a 37°C, houve conidiação profusa sem crescimento vegetativo extensivo.

A idade dos esporos também afeta a produção de protoplastos, pois TOYAMA et alii (1984), obtiveram alta produção de protoplastos a partir de conídios jovens de *T. reesei*. Além disso, a sensibilidade dos conídios à lise pode ser aumentada com a inclusão de uma etapa de pré-incubação. Segundo BOS & SLAKHORST (1981), embora conídios recém formados sejam muito insensíveis às enzimas líticas de *Oerskovia*, após tratamento de pré-incubação com 2-deoxi-D-glucose, 99% dos conídios foram convertidos em protoplastos. PFEIFER & KHACHATOURIANS (1987), observaram que conídios de *Beauveria bassiana* pré-incubados em dithiotreitol e tratados com uma mistura enzimática de celulase, quitinase, glucuronidase e lisozima foram totalmente resistentes à lise.

O sucesso de uma determinada técnica de preparação de protoplastos a partir de esporos depende de uma combinação de fatores relacionados diretamente com a estrutura e composição da parede celular do conídio e com o sistema lítico utilizado.

O processo de fusão de protoplastos foi de-

envolvido para transpor as barreiras para a troca genética impostas pelos sistemas convencionais de cruzamentos.

A ocorrência de fusão espontânea tinha frequências muito baixas e, foi somente após a descoberta de KAO & MICHAYLUKE (1974), em protoplastos de plantas, que o polietilenoglicol (PEG) atuava como agente fusogênico, que foi possível o desenvolvimento de técnicas de fusão controladas capazes de aumentar a frequência da mesma. As condições ideais para o uso de polietilenoglicol foram constatadas por ANNE & PEBERDY (1975, 1976), como sendo concentrações de 30 a 40% de PEG, além da adição de íons cálcio em concentração 0,01 M.

Através do uso de fusão de protoplastos, barreiras de heterocariose entre grupos de *A. nidulans* foram transpostas (DALES & CROFT, 1977). KEVEI & PEBERDY (1977, 1979), realizaram cruzamentos entre oito espécies de *Aspergillus* tendo obtido produtos de fusão e híbridos entre quatro espécies, somente heterocários entre outras quatro e ausência de produtos de fusão em cruzamentos envolvendo três espécies. Os produtos de fusão obtidos foram denominados "aneuplóides parciais", pois continham o genoma de uma das espécies e um ou poucos cromossomos da outra espécie.

Em cruzamentos dentro do gênero *Penicillium*, os híbridos foram mais facilmente obtidos que em *Aspergillus* indicando maior compatibilidade entre as espécies de *Penicillium* (ANNE & PEBERDY, 1975; ALFOLDI, 1982). PICATAGGIO et alii (1983), obtiveram heterocários estáveis através da fusão de linhagens marcadas de *T. reesei*, entretanto não foi possível o isolamento de diplóides heterozigotos.

As linhagens de *T. reesei* QM 9414 (boa produ-

tora de celulase) e QM 9136 (não produtora de celulase), foram utilizadas por TOYAMA et alii (1984), para fusão de protoplastos. Foram obtidos protoplastos a partir de conídios jovens com auxotrofia para dois aminoácidos, sendo um desses requerimentos comum a ambas as linhagens. Os protoplastos forma fundidos em presença de polietilenoglicol e a frequência de regeneração foi de 3,0 a 4,9 X 10⁻². Os produtos de fusão e seus segregantes foram analisados e um deles apresentou o dobro de atividade da carboximetilcelulase em comparação com a linhagem parental QM 9414.

MANCZINGER & FERENCZY (1985); MURKOVIC et alii (1987); OGAWA et alii (1989), também realizaram estudos com a linhagem QM 9414 de *T. reesei*, visando o melhoramento genético da produção de celulases e o conhecimento mais aprofundado do sistema celulolítico. Os recombinantes obtidos apresentaram atividades similares ou maiores que os parentais.

Em estudos com *T. pseudokoningii*, FURLANETTO (1989), obteve uma grande variação nas porcentagens de regeneração de protoplastos e maior eficiência na obtenção de recombinantes via fusão de protoplastos em relação à anastomose de hifas. Foi observado um efeito negativo da protoplastização sobre a atividade celulolítica, sendo que fatores estruturais ou funcionais devem estar envolvidos.

NEIROTTI (1988), obteve frequências de fusão de 0,0033 a 0,1% para protoplastos de *Humicola sp* em meio contendo sulfato de magnésio 0,25 M como estabilizador osmótico.

Em cruzamentos intergenéricos, os estudos se concentram principalmente em leveduras e se caracterizam pela grande instabilidade dos produtos de fusão e predomi-

nância do genoma de um dos gêneros (PROVOST et alii, 1978; NECAS & SVOBODA, 1985). BALL (1984), relatou o cruzamento entre *Candida utilis* e *Trichoderma viride*, indicando baixa viabilidade dos produtos de fusão, não recuperação das marcas genéticas e caracterização dos híbridos pelo espectro de fermentação.

A técnica de eletrofusão se baseia na exposição das células ou protoplastos a um campo elétrico alternado, não uniforme e de baixa intensidade, seguido pela aplicação de um ou mais pulsos elétricos de alta intensidade. As etapas do processo consistem no alinhamento celular, compressão e fusão celular.

A membrana plasmática, sob o ponto de vista eletrônico pode ser considerada um capacitor, isto é, um dispositivo que armazena energia elétrica. Na presença de um campo elétrico, a membrana se torna polarizada porque há formação de dipolos dentro da membrana e na solução eletrolítica que a circunda (POHL, 1978). Os dipolos do interior da membrana fazem com que haja uma separação intracelular de cargas elétricas transformando a própria célula em dipolo. Ao se tornar um dipolo, a célula exerce uma força ao seu redor, atraindo outros dipolos e formando com outras células uma configuração do tipo colar-de-contas. Este fenômeno é designado como dieletroforese e consiste na primeira etapa da eletrofusão (ZIMMERMANN, 1982).

As células ou protoplastos já justapostos pela dieletroforese são submetidos a um pulso elétrico de alta intensidade e curta duração, para que ocorra o colapso dielétrico da membrana e consequente compressão celular. Nesta etapa há formação de poros na membrana que levam ao aumento da permeabilidade celular permitindo o livre trânsito de íons para dentro e para fora da célula (ZIMMERMANN,

1982; ZIMMERMANN & VIENKEN, 1982). Estes poros seriam responsáveis pelo fenômeno de fusão propriamente dito pois, ocorrendo em células adjacentes permitiriam o intercâmbio de componentes celulares por difusão. Quanto maior a intensidade e o tempo de exposição ao pulso elétrico, maior será o tamanho da molécula que poderá passar; entretanto se os parâmetros requeridos para produzir a quebra forem excedidos demasiadamente, a destruição da membrana e consequentemente da célula será irreversível (ZIMMERMANN & SCHEURICH, 1981). WARWAR (1990), apresenta considerações detalhadas sobre o processo de eletrofusão, baseando-se em equações representativas da força dieletroforética de células submetidas a um campo elétrico.

A maioria dos estudos sobre a técnica de eletrofusão se concentra na área vegetal (SENDA et alii, 1979; ZIMMERMANN & SCHEURICH, 1981; ZIMMERMANN, 1982) e animal (ZIMMERMANN & VIENKEN, 1982; OKADA et alii, 1984).

Em microrganismos, a primeira ocorrência de eletrofusão de protoplastos foi verificada por WEBER et alii (1981), em *S. cerevisiae*. Em 1983, HALFMANN et alii, efetuaram eletrofusão entre linhagens de *S. cerevisiae* com o mesmo tipo de reação sexual. Foram obtidas células haplóides onde havia ocorrido recombinação a nível de citoplasma (plasmogamia) e células cujo tamanho indicou constituição diplóide, além de serem prototróficas.

BERG et alii (1984), realizaram estudos de fusão celular entre vários organismos como *S. cerevisiae*, *S. lypolytica*, *B. thuringiensis*, *B. cereus* e *Hordeum vulgare*. Não foram obtidos híbridos mas as fusões foram observadas ao microscópio, demonstrando a grande flexibilidade que a eletrofusão permite.

Em fungos filamentosos foram efetuadas eletrofusões em *T. reesei* por MURKOVIC (1987) e KATENKAMP et alii (1989). Os autores obtiveram híbridos entre duas linhagens auxotróficas e demonstraram que o uso de vários pulsos elétricos de baixa intensidade foi mais eficiente que um único pulso de alta intensidade. NEIROTTI (1988), realizou tentativas de eletrofusão de protoplastos de *Humicola sp* sendo que, segundo WARWAR (1990), não obteve sucesso por ter utilizado solução de hidróxido de sódio para ajuste do pH, que fez com que ocorresse efeito Joule na câmara de eletrofusão. WARWAR (1990), testou parâmetros de eletrofusão em *A. niger*, tendo obtido como eficiência máxima 5% de colônias prototróficas.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Linhagens Utilizadas

3.1.1. *Trichoderma pseudokoningii* var. Rifai

A linhagem selvagem e os mutantes auxotróficos para leucina (*leu*) e riboflavina (*ribo*), foram cedidos pelo Departamento de Genética da ESALQ/USP. Os mutantes *leu* e *ribo* foram obtidos através de tratamento com luz ultravioleta, pelo método de isolamento total (FURLANETTO, 1989).

3.1.2. *Humicola* sp

A linhagem selvagem e o mutante morfológico (*mor₁₃*) foram cedidos pelo Departamento de Genética da ESALQ/USP. O mutante *mor₁₃* foi obtido utilizando-se tratamento com ácido nitroso (RODRIGUES, 1987).

3.2. Meios de Cultura e Soluções Utilizadas

3.2.1. Meio Mínimo (PONTECORVO et alii, 1953)

NaNO ₃	6,0 g
KH ₂ PO ₄	1,5 g
KCl.....	0,5 g
MgSO ₄ . 7 H ₂ O.....	0,5 g
FeSO ₄	traços
ZnSO ₄	traços
Glicose.....	10,0 g

Ágar..... 15,0 g
 Água destilada..... 1000,0 ml

pH ajustado para 6,8 com NaOH 1 N.

3.2.2. Meio Mínimo para *Humicola sp*

Preparado segundo o item 3.2.1., acrescentando-se 5,0 ml das soluções de biotina e tiamina.

3.2.3. Meio Completo (PONTECORVO et alii, 1953, modificado por AZEVEDO & COSTA, 1973)

Adicionou-se ao Meio Mínimo:

Peptona 2,0 g
 Caseína hidrolisada 1,5 g
 Extrato de levedura 2,0 g
 Solução de vitaminas 1,0 ml

pH ajustado para 6,8 com NaOH 1 N.

3.2.4. Meio de Farelo de Trigo (YOSHIOKA et alii, 1982)

Farelo de trigo 5,0 g
 Água de torneira 5,0 ml

3.2.5. Meio para Regeneração de Protoplastos

Meio completo (item 3.2.3.), duas vezes concentrado, diluído na proporção 1:1 com o estabilizador osmótico.

3.2.6. Solução Estoque de Biotina

Biotina	4,0 g
Água destilada esterilizada	100,0 ml

A solução foi esterilizada em banho-maria a 90° C, por 20 minutos e conservada no refrigerador.

3.2.7. Solução Estoque de Tiamina

Tiamina	4,0 g
Água destilada esterilizada	100,0 ml

A solução foi esterilizada em banho-maria a 90° C, por 20 minutos e conservada no refrigerador.

3.2.8. Soluções de Biotina e Tiamina

Biotina	1,0 ml da solução estoque
Água destilada esterilizada	9,0 ml

Tiamina	1,0 ml da solução estoque
Água destilada esterilizada	9,0 ml

As soluções foram preparadas no momento do uso.

3.2.9. Solução de Vitaminas

Ácido nicotínico	100,0 mg
Ácido paraminobenzóico	10,0 mg
Biotina	0,2 mg
Piridoxina	50,0 mg
Riboflavina	100,0 mg
Tiamina	50,0 mg

A solução foi esterilizada em banho-maria a 90°C , por 20 minutos e conservada sob clorofórmio, em frasco escuro, no refrigerador.

3.2.10. Solução Salina

NaCl	0,85 g
Água destilada	100,0 ml

3.2.11. Solução de Ácido Dinitro-Salicílico (DNS)

Acido 3,5 dinitro-salicílico	1,0 g
Solução de NaOH 2 N	20,0 ml
Tartarato de sódio e potássio	30,0 g
Água destilada	20,0 ml

O ácido DNS foi dissolvido na solução de NaOH mais água, sob agitação e aquecimento. Após a dissolução, foi adicionado o tartarato de sódio e potássio e o volume foi completado para 100,0 ml com água destilada. A mistura foi conservada em frasco escuro à temperatura ambiente.

3.2.12. Tampão Acetato 0,05 M

Acetato de sódio	4,10 g
Água destilada	800,0 ml

pH ajustado para 5,0 com ácido acético glacial e o volume completado para 1000,0 ml, com água destilada.

3.2.13. Solução de Salicina (D-Salicin, Riedel-de-Haen)

Salicina	1,0 g
----------------	-------

Tampão acetato 0,05 M 100,0 ml

3.2.14. Solução " C "

Solução de Na_2CO_3 em NaOH 0,1 N 100,0 ml

Solução de CuSO_4 1% 1,0 ml

Solução de tartarato de Na e K 1% .. 1,0 ml

A solução foi preparada por homogeneização de seus componentes, no momento de ser utilizada.

3.2.15. Reativo de Folin-Ciocalteu (Laborclín)

O reativo foi diluído na proporção 1:1, em água destilada.

3.2.16. Tampão Fosfato 0,2 M pH 5,8

Solução A₁

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 27,6 g

Água destilada 1000,0 ml

Solução B₁

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ 71,6 g

Água destilada 1000,0 ml

Adicionou-se a solução B₁ em 920,0 ml da solução A₁ até atingir pH 5,8.

3.2.17. Tampão Fosfato 0,02 M pH 5,6

Solução A₂

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	2,76 g
Água destilada	1000,0 ml

Solução B₂

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	5,36 g
Água destilada	1000,0 ml

Adicionou-se a solução B₂ em 920,0 ml da solução A₂ até atingir pH 5,6.

3.2.18. Solução de MgSO_4 1,0 M

$\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	246,0 g
Solução A ₂	500,0 ml

Adicionou-se a solução B₂ até atingir pH 5,6 e o volume foi completado para 1000,0 ml com tampão fosfato 0,02 M pH 5,6.

3.2.19. Solução de MgSO_4 0,5 M

Diluiu-se na proporção 1:1, a solução de MgSO_4 1,0 M em tampão fosfato 0,02 M pH 5,6.

3.2.20. Tampão Mc Ilvaine's pH 5,8

Solução de ácido cítrico

Ácido cítrico	21,0 g
Água destilada	1000,0 ml

Solução de Na_2HPO_4

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	32,0 g
--	--------

Água destilada 1000,0 ml

Misturou-se 184,25 ml da solução de ácido cítrico com 315,75 ml da solução de Na_2HPO_4 .

3.2.21. Solução de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 1,2 M

Dissolveu-se 158,4 g de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ em pequeno volume de tampão Mc Ilvaine's. Ajustou-se o pH para 5,8 com a solução de Na_2HPO_4 e completou-se o volume para 1000,0 ml com o referido tampão.

3.2.22. Solução de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 0,6 M

Diluiu-se na proporção 1:1, a solução de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 1,2 M em tampão Mc Ilvaine's pH 5,8.

3.2.23. Solução de KCl 1,4 M pH 5,8

KCl	104,38 g
Solução A ₁	500,0 ml

Adicionou-se a solução B₁ até atingir pH 5,8 e completou-se o volume para 1000,0 ml com tampão fosfato 0,2 M pH 5,8.

3.2.24. Solução de KCl 0,7 M

Diluiu-se na prporção 1:1, a solução de KCl 1,4 M em tampão fosfato 0,2 M pH 5,8.

3.2.25. Soluções de Sorbitol 1,6 M e 0,8 M

Foram preparadas segundo os ítems 3.2.19. e 3.2.20., respectivamente, sendo que em vez de KCl, utilizou-

se 291,47 g de sorbitol.

3.2.26. Solução de Enzimas para Obtenção de Protoplastos (HAMLYN et alii, 1981)

Para cada 1,0 ml da solução estabilizadora de sulfato de magnésio e sulfato de amônia foram adicionados 5,0 mg do complexo lítico, sendo 2,5 mg de "celulase CP" (JOHN STURGES, SELBY, YORKSHIRE, UK) e 2,5 mg de "novozym 234" (NOVO INDUSTRI, DENMARK).

3.2.27. Solução de Citrato de Sódio 20 mM

Citrato de sódio	5,882 g
Água destilada	20,0 ml

Adicionou-se esta solução em 1000,0 ml de meio completo.

3.2.28. Solução de Polietilenoglicol (PEG)

Solução A

CaCl_2	11,0 g
Água destilada	1000,0 ml

Solução B

Glicina	3,75 g
Água destilada	1000,0 ml

Adicionou-se 10,0 ml da solução A em 10,0 ml da solução B, completando-se o volume com água destilada. O pH foi corrigido para 8,0 com NaOH 4 % e, acrescentou-se PEG 6000 (SIGMA) em concentração final de 30 % .

3.2.29. Solução de Sorbitol para Eletrofusão 0,8M
pH 7,0 (SCHNETTLER & ZIMMERMANN, 1985,
modificado)

Sorbitol.....	14,57 g
CaCl ₂	0,011 g
MgCl ₂	0,010 g
Água destilada	100,0 ml

ou

Sorbitol	9,1 g
Histidina	0,01 g
CaCl ₂	0,0147 g
Água destilada	100,0 ml

pH ajustado para 7,0 com NaOH 10 % .

3.3. Esterilização e Conservação

Exceto quando mencionado no próprio ítem, os meios de cultura e soluções utilizados foram esterilizados em autoclave a 1,0 atm de pressão, por 20 minutos e conservados no refrigerador.

3.4. Análise de Crescimento

Os conídios das linhagens selvagens e mutantes de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii* var. Rifai foram inoculados, com de fio de níquel-cromo no centro de placas contendo meio completo (4 repetições) e incubados em estufas a 28° C, 37° C e 44° C de temperatura. A taxa de crescimento foi avaliada a cada 24 horas, durante 8 dias, através da medida do diâmetro das colônias em centímetros.

Para tal experimento utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado, com distribuição fatorial (5 linhagens, 3 temperaturas).

3.5. Dosagem Enzimática e Proteica

3.5.1. Ensaios Utilizados

Foram utilizados métodos colorimétricos para determinação das atividades enzimáticas e dosagem de proteínas totais. O equipamento utilizado foi um espectrofotômetro Micronal B- 382. As Figuras 6 e 7 descrevem as retas padrões utilizadas para as dosagens das atividades de enzimas celulolíticas e quantidade de proteínas totais, estimadas por regressão linear. Foram utilizadas 3 repetições em delineamento inteiramente casualizado, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey.

Convém salientar que os métodos utilizados para as dosagens enzimáticas e proteica que serão descritos a seguir, foram os mesmos empregados por RODRIGUES (1987), para as linhagens selvagem e mutantes de *Humicola sp*, inclusive o *mor₁₃*.

3.5.2. Cultivo em Meio Semi-Sólido (YOSHIOKA et alii, 1982)

As linhagens selvagem e mutante *mor₁₃* de *Humicola sp* e as linhagens selvagem e mutantes *leu* e *ribo* de *Trichoderma pseudokoningii*, foram cultivadas em meio de farelo de trigo, para a determinação da quantidade de proteínas totais e das atividades enzimáticas. A partir de colônias crescidas em meio completo por 7 dias a 37 ° C, foram preparadas suspensões aquosas de 10,0 ml com 10⁶ a 10⁷

esporos por mililitro, as quais foram inoculadas em erlenmeyers contendo o meio de farelo de trigo.

Após 4 dias de cultivo em estufa a 37°C, foi efetuada a extração das enzimas, adicionando-se 30,0 ml de água gelada esterilizada em cada erlenmeyer, agitando-se e permanecendo os frascos em geladeira por 3 horas. O extrato fúngico foi separado por filtração em tela de nylon, a vácuo. Os filtrados foram recolhidos em tubos de centrifuga, centrifugados a 7°C, 12000 g por 15 minutos em centrífuga SORVAL e, os sobrenadantes foram conservados em "freezer" até o momento do uso.

3.5.2.1. Determinação das Atividades da Avicelase e da Carboximetilcelulase

A glicose foi utilizada como padrão (Figura 6) e a atividade enzimática expressa como número de atividades por miligrama de proteínas totais. Definiu-se unidade enzimática como a quantidade de enzima capaz de liberar 1 μ mol de açúcar redutor por hora.

A atividade da avicelase (exoglucanase) foi determinada utilizando-se como substrato a celulose microcristalina (Avicel- RIEDEL de HAEN), enquanto que para a determinação da atividade da carboximetilcelulase (endoglucanase), o substrato foi a carboximetilcelulose - CMC (tipo CM- 23- FLUKA A.G.).

A 50,0 mg do substrato, adicionou-se 3,5 ml de tampão acetato de sódio 0,05 M e 1,5 ml do sobrenadante da cultura, obtido conforme o item 3.4.1. Incubou-se a mistura a 50°C e interrompeu-se a reação aos 60 e 120 minutos, retirando-se 1,0 ml da amostra do fungo e adicionando-se 1,0 ml do reagente DNS. O substrato não hidrolisado foi separado

por centrifugação em centrífuga "Baby" por 5 minutos. Todos os tubos dos tempos zero (T_0), 60 minutos (T_1) e 120 minutos (T_2) foram colocados em banho-maria por 5 minutos. Após resfriamento, diluiu-se com 10,0 ml de água e procedeu-se a leitura da absorbância a 540 nm contra o branco (MILLER, 1959).

3.5.2.2. Determinação da Atividade da β -glucosidase

A atividade da β -glucosidase foi determinada utilizando-se como substrato a solução de salicina 1 % em tampão acetato de sódio 0,05 M. Foi adicionado a 0,5 ml do substrato, 0,15 ml do extrato da cultura diluído em 0,35 ml de tampão, totalizando-se um volume de 1,0 ml. A mistura foi incubada a 50° C, interrompendo-se a reação aos 30 e 60 minutos, pela adição de 1,0 ml do reagente DNS. O produto formado foi quantificado como anteriormente descrito (item 3.5.2.1.). Utilizou-se a glicose como padrão (Figura 6), sendo que, neste caso, a unidade enzimática foi definida como a quantidade de enzima capaz de liberar 1 μ mol de açúcar redutor por minuto.

3.5.2.3. Dosagem de Proteínas Totais (LOWRY et alii, 1951)

A concentração de proteínas extracelulares totais presentes no filtrado da cultura, foi determinada utilizando-se soroalbumina bovina (SAB) como padrão (Figura 7). Foram tomadas alíquotas de 0,1, 0,2 e 0,3 do extrato da cultura, completando-se o volume para 1,0 ml com água destilada. Adicionou-se em cada tubo, 5,0 ml da solução "C" e, após 15 minutos, acrescentou-se 0,5 ml do reagente de Folin Ciocalteu diluído. Após um período de 30 minutos foi feita a leitura da absorbância a 660 nm contra o branco.

$a = -0,0937; b = 0,6832; r = 0,99$

$a = 0,0272; b = 1,9138; r = 0,99$

Figura 6. Retas padrões da glicose e soroalbumina bovina.

3.6. Obtenção de Heterocáries

Os conídios das linhagens em estudo foram colocados em tubos de ensaio contendo 2,5 ml de meio mínimo líquido mais 4 % de meio completo líquido. Após 15 dias de incubação a 37° C foi observada a formação de película.

3.7. Obtenção e Regeneração de Protoplastos

3.7.1. Protoplastos de micélio

Os conídios das linhagens em estudo foram suspensos em solução salina numa concentração de $7,5 \times 10^8$ conídios por ml. Um mililitro da suspensão foi inoculada em erlenmeyer com 50,0 ml de meio completo líquido e incubados por 18 a 20 horas a 37° C, sob agitação rotatória (150 rpm). Após este período, o micélio foi filtrado a vácuo, em papel de filtro e lavado com estabilizador osmótico. Determinou-se o peso úmido do micélio e montou-se o sistema lítico (item 3.2.26.), juntando-se enzima, estabilizador osmótico e micélio, nas seguintes proporções: 3,0 ml de estabilizador: 15,0 mg de enzima: 150,0 mg de micélio.

Incubou-se a mistura por 1 a 3 horas a 37° C, com agitação rotatória (120 rpm). Após este período, confirmou-se a presença de protoplastos sob microscópio, centrifugou-se a 500 rpm por 30 segundos. O sobrenadante foi coletado e centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos. Desprezou-se o sobrenadante e o precipitado foi ressuspenso em estabilizador osmótico. Repetiu-se o procedimento por mais três vezes. Fez-se a contagem do número de protoplastos em câmara de Neubauer.

Os protoplastos foram semeados em placas com

meio de regeneração (item 3.2.5.) e meio completo e, incubados por 24 horas a 28° C e mais 72 horas a 37° C. A porcentagem de regeneração foi obtida através da seguinte fórmula:

$$\% \text{ de regeneração} = \frac{B - A}{C} \times 100$$

onde:

A = número de colônias em meio completo

B = número de colônias em meio de regeneração

C = número de protoplastos/ ml de suspensão

3.7.2. Protoplastos de conídios

Os conídios das linhagens selvagem de *Humicola sp* e auxotrófica para leucina de *T.pseudokoningii*, crescidas em meio completo por 5 dias a 37°C, foram suspensos em solução de Triton X 100 0,1%. As suspensões foram agitadas vigorosamente, filtradas em tubos com fibra de vidro e novamente agitadas. A concentração de conídios de cada linhagem foi determinada em câmara de Neubauer sob microscópio e, em seguida, procedeu-se a centrifugação a 2500 rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi desprezado, o precipitado ressuspense em água deionizada e centrifugado a 2500 rpm por 15 minutos.

Os conídios coletados foram pré-incubados em 50,0 ml de meio completo líquido mais 2-deoxi-D-glucose (25 ug/ml) durante 3 horas em agitador recíproco (150 rpm) a 37°C. Após este período, centrifugou-se a suspensão a 2500 rpm por 15 minutos. Repetiu-se esta operação mais uma vez e o precipitado foi ressuspense em 3,0 ml de estabilizador osmótico (MgSO₄ 0,5 M para *Humicola sp* e (NH₄)₂SO₄ para *T.pseudokoningii*) contendo 20,0 mg das enzimas "novozym 234" e "celulase CP", na proporção 1:1.

Incubou-se em agitador recíproco a 37°C (100 rpm) por vários tempos nos quais foram retiradas alíquotas para observação da presença de protoplastos (6, 8, 10, 12, 14 e 16 horas). Tendo-se constatado a presença de protoplastos, centrifugou-se a suspensão por 30 segundos a 500 rpm, retirou-se o sobrenadante e o mesmo foi centrifugado por 15 minutos a 2500 rpm. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado ressuspensionado em estabilizador osmótico e novamente centrifugado por 15 minutos a 2500 rpm. Finalmente o precipitado foi ressuspensionado em estabilizador e os protoplastos contados em câmara de Neubauer sob microscópio.

Os protoplastos obtidos foram semeados "pour plate" em placas contendo meio completo e meio completo mais MgSO_4 0,5 M e $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. O cálculo da porcentagem de regeneração de protoplastos foi feito conforme indicado no item 3.7.1.

3.8. Técnica do Doador Morto

A linhagem selvagem de *T. pseudokoningii* foi submetida ao tratamento enzimático para obtenção de protoplastos, como descrito no item 3.7.. Uma vez obtidos e contados, os protoplastos foram transferidos para tubos de ensaio e colocados em banho-maria a 45, 50, 55, 60 e 65 °C por períodos de 10, 20, 30, 40 e 60 minutos. Em seguida, foram semeados em meio completo mais estabilizador osmótico, incubados por 24 horas a 28 °C e transferidos a 37 °C até completar 10 dias de incubação.

3.9. Fusão de Protoplastos

3.9.1. Fusão de Protoplastos por Tratamento com Polietilenoglicol (PEG)

A obtenção do micélio, conídios e protoplastos foi realizada como descrito nos itens 3.7.1. e 3.7.2. A fusão com o uso de PEG seguiu o método indicado por ANNE & PEBERDY (1976).

Os protoplastos das linhagens a serem fundidas foram colocados em tubo de centrífuga de modo a misturar alíquotas aproximadamente iguais de cada uma delas (10^6 a 10^7 / ml). Os tubos contendo o restante das suspensões de protoplastos das duas linhagens foram conservados para as placas controle.

O tubo com 1,0 ml de cada uma das linhagens foi centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos em centrífuga baby "Excelsa". O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em 1,0 ml de polietilenoglicol previamente aquecido a 30°C. A suspensão foi mantida a 30°C por 10 minutos. Adicionou-se a solução estabilizadora e centrifugou-se a 2500 rpm por 10 minutos. Retirou-se o sobrenadante e o precipitado foi ressuspenso e novamente centrifugado por 10 minutos. Esta operação foi repetida mais duas vezes. Finalmente ressuspendeu-se o precipitado em 5,0 ml da solução estabilizadora.

De cada uma das linhagens, foram feitas diluições em solução estabilizadora com a finalidade de semeadura das placas controle (3 repetições). Semearam-se placas com meio completo e meio completo mais estabilizador osmótico.

Da suspensão de protoplastos tratada com PEG, foram semeadas alíquotas de 1,0 ml em placas com meio mínimo mais estabilizador osmótico e meio completo mais estabilizador osmótico (5 repetições).

A porcentagem de regeneração foi calculada pela fórmula apresentada no item 3.7.1. e a frequência de fusão consiste na relação entre o número de colônias crescidas em meio mínimo mais estabilizador osmótico e o número de colônias crescidas no meio completo mais estabilizador osmótico.

3.9.2. Eletrofusão

Após a obtenção de protoplastos conforme o item 3.7., os mesmos foram lavados três vezes em solução de sorbitol 0,8 M pH 7,0. Foi utilizado um eletromanipulador celular BTX 401 A, provido de câmara coaxial de eletrodos e de microlâminas. As microlâminas têm a vantagem de permitir o acompanhamento do processo sob o microscópio ótico para determinação dos parâmetros que serão utilizados para se conseguir a fusão. A Figura 7 mostra um diagrama de operação do eletromanipulador BTX 401 A.

Utilizando-se uma seringa injetou-se 50 μ l da suspensão de protoplastos das duas linhagens na microlâmina e, através do processo de fusão manual, foram experimentados os seguintes parâmetros de fusão, observando-se o comportamento dos protoplastos sob o microscópio: 1) Alinhamento celular: tempo de 10 a 60 segundos com amplitude nominal de 50 a 350 V . cm⁻¹ e frequência de 1 Mhz; 2) Compressão celular: tempo de 5 a 10 segundos com amplitude nominal de 100 a 450 V . cm⁻¹ e frequência de 1 Mhz e, 3) Fusão celular tempo de 20 a 99 microsegundos com amplitude nominal de 300 a 600 V . cm⁻¹ e de 1 a 5 pulsos elétricos.

Figura 7. Diagrama de operação do eletromanipulador BTX 401 A (WARWAR, 1990).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Análise de Crescimento

Os valores, em centímetros, da análise de crescimento das linhagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii* medidos durante 8 dias em placas contendo meio completo e incubadas a 28°, 37° e 44° C estão apresentados nas Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7.

Tabela 3. Crescimento da linhagem selvagem de *Humicola sp* (média de 4 repetições).

Temperatura	Dias de incubação							
	1	2	3	4	5	6	7	8
28° C	0,00	0,42	1,52	2,70	3,50	4,37	4,70	4,90
37° C	2,00	5,40	8,32	9,00#	-	-	-	-
44° C	2,90	7,00	9,00#	-	-	-	-	-

O crescimento atingiu o diâmetro total da placa de Petri.

Tabela 4. Crescimento da linhagem mutante *mor₁₃* de *Humicola sp* (média de 4 repetições).

Temperatura	Dias de incubação							
	1	2	3	4	5	6	7	8
28° C	0,00	0,09	0,15	0,42	0,50	0,62	0,65	0,85
37° C	0,55	1,20	3,35	7,10	7,57	8,77	9,00#	-
44° C	0,62	2,50	4,85	7,92	9,00#	-	-	-

O crescimento atingiu o diâmetro total da placa de Petri.

Tabela 5. Crescimento da linhagem selvagem de *Trichoderma pseudokoningii* (média de 4 repetições).

Temperatura	Dias de incubação							
	1	2	3	4	5	6	7	8
28° C	1,92	5,95	9,00#	-	-	-	-	-
37° C	2,30	5,75	8,75	9,00#	-	-	-	-
44° C	0,55	1,75	1,77	2,15	= ##	=	=	=

O crescimento atingiu o diâmetro total da placa de Petri.

O crescimento estacionou no último valor indicado.

Tabela 6. Crescimento da linhagem mutante *leu* de *Trichoderma pseudokoningii* (média de 4 repetições).

Temperatura	Dias de incubação							
	1	2	3	4	5	6	7	8
28° C	2,20	6,35	9,00#	-	-	-	-	-
37° C	2,25	5,32	8,77	9,00#	-	-	-	-
44° C	0,80	1,27	2,62	= ##	=	=	=	=

O crescimento atingiu o diâmetro total da placa de Petri.

O crescimento estacionou no último valor indicado.

Tabela 7. Crescimento da linhagem mutante *ribo* de *Trichoderma pseudokoningii* (media de 4 repeticoes).

Temperatura	Dias de incubacao							
	1	2	3	4	5	6	7	8
28° C	0,45	0,90	1,25	1,60	2,05	2,40	2,70	3,05
37° C	0,60	1,21	2,20	2,80	3,60	4,20	4,92	5,35
44° C	0,30	0,37	0,67	1,00	1,45	1,51	1,90	2,50

A análise de variância do crescimento das 5 linhagens em 3 temperaturas, consta da Tabela 8.

Tabela 8. Análise de variância do crescimento das linhagens selvagens e mutantes de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

F. V.	G. L.	Q. M.	F
Tratamentos	14	25,6277	257,1345 **
1º DESDOBRAMENTO			
Linhagens (L)	4	36,7999	369,2308 **
Temperaturas (T)	2	11,0732	111,1020 **
L x T	8	23,6802	237,5945 **
2º DESDOBRAMENTO			
T / L ₁	2	42,3925	425,3428 **
T / L ₂	2	4,7358	47,5167 **
T / L ₃	2	29,0325	291,2960 **
T / L ₄	2	28,8100	289,0635 **
T / L ₅	2	0,8233	8,2609 **
Entre linhagens	4	36,7999	369,2308 **
3º DESDOBRAMENTO			
L / T ₁	4	38,9120	390,4214 **
L / T ₂	4	20,9267	209,9674 **
L / T ₃	4	24,3217	244,0309 **
Entre temperaturas	2	11,0732	111,1020 **
Resíduo	45	0,0997	
Total	59		

** Valores significativos ao nível de 1 % .

$$x = 2,9333$$

$$CV_e = 10,76 \%$$

A partir da análise da Tabela 3, observa-se que a linhagem selvagem de *Humicola sp* tem seu melhor crescimento a 44° C, atingindo o diâmetro total da placa em 3 dias; embora a 37° C apresente pouca diferença, completando a placa em 4 dias. A 28° C, o crescimento é retardado e, após 8 dias, não se verificou crescimento total (4,90 cm).

A linhagem mutante *mor₁₃* de *Humicola sp* (Tabela 4), mostrou melhor crescimento a 44° C, atingindo 9,0 cm de diâmetro no 5º dia de crescimento; a 37° C, no 7º dia e a 28° C houve grande dificuldade de crescimento, mostrando um diâmetro de apenas 0,85 cm no 8º dia de crescimento.

A linhagem selvagem de *T. pseudokoningii*, apresentou como temperatura ideal de crescimento, 28° C, atingindo 9,0 cm de diâmetro da colônia no 3º dia. A 37° C, completou o crescimento em 4 dias e a 44° C teve seu crescimento paralisado no 4º dia com 2,15 cm de diâmetro (Tabela 5). O mutante *leu*, repetiu o comportamento da linhagem selvagem nas temperaturas de 28° C e 37° C e, a 44° C, estacionou o crescimento no 3º dia com 2,62 cm de diâmetro da colônia (Tabela 6).

O mutante *ribo*, considerado como de crescimento compacto por FURLANETTO (1989), contrariamente às linhagens selvagem e mutante *leu*, que tiveram crescimento mais rápido a 28° C, mostrou melhor crescimento a 37° C, atingindo 5,35 cm de diâmetro da colônia no 8º dia, enquanto que a 28° C apresentou 3,05 cm de diâmetro. A 44° C houve maior dificuldade de crescimento, apresentando, no 8º dia, 2,50 cm de diâmetro de colônia (Tabela 7).

A alta significância dos valores de F, verificada nos três desdobramentos, comprova as diferenças que

existem entre as linhagens em relação às temperaturas ideais para crescimento, isto é, para uma determinada linhagem há uma temperatura ótima que difere da temperatura adequada à outra linhagem (Tabela 8). Como citado anteriormente, a temperatura ótima para o crescimento de *Humicola sp* selvagem e para o mutante *mor₁₃* foi a de 44° C; a temperatura de 28° C se mostrou ideal para *T. pseudokoningii* selvagem e para o mutante *leu*, enquanto que para o mutante *ribo*, a temperatura de 37° C foi melhor para o seu crescimento (Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7).

Considerando-se que as linhagens selvagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii* e o mutante *leu* de *T. pseudokoningii*, atingiram o diâmetro máximo possível da placa de Petri no 3º dia e que, por esta razão o valor de 9,0 cm poderia estar subestimado, optou-se por efetuar a comparação das medidas dos diâmetros das colônias das 5 linhagens no 2º dia de crescimento, com o objetivo de se estabelecer quais cruzamentos teriam mais chance de proporcionar heterocários, tendo em vista o ritmo de desenvolvimento da colônia (Tabela 9).

Tabela 9. Teste de Tukey para as médias de diâmetro das colônias de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*, no 2º dia de crescimento.

Linhagens	Temperaturas		
	28° C	37° C	44° C
<i>Humicola sp</i> selvagem	0,42 BC	5,40 A	7,00 A
<i>Humicola sp mor₁₃</i>	0,09 C	1,20 B	2,50 B
<i>T. pseudokoningii</i> selvagem	5,95 A	5,75 A	1,75 C
<i>T. pseudokoningii leu</i>	6,35 A	5,32 A	1,27 C
<i>T. pseudokoningii ribo</i>	0,90 B	1,21 B	0,37 D

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si. DMS= 0,79 cms.

Foram efetuadas as comparações possíveis e

concluiu-se que a temperatura de 37° C favorecia o maior número de cruzamentos. Estes cruzamentos poderiam ser efetuados entre as linhagens de *Humicola sp* selvagem e *T. pseudokonigii* selvagem; *Humicola sp* selvagem e *T. pseudokoningii leu*; *Humicola sp mor₁₃* e *T. pseudokoningii ribo* e, entre *T. pseudokoningii* selvagem e *T. pseudokoningii leu*, sendo que este último cruzamento não é interessante pois se trata de cruzamento intraespecífico e os objetivos deste estudo se referem a cruzamentos entre os dois gêneros. Analisando-se a Tabela 9, pode-se verificar que nas temperaturas de 28° C e 44° C são favorecidos unicamente os cruzamentos intraespecíficos para *T. pseudokoningii* e *Humicola sp*, respectivamente.

Em relação ao gênero *Humicola*, os resultados verificados por CHAVES (1982), comprovaram como sendo próxima a 40° C, sua temperatura ótima de crescimento e pH ideal igual a 6,0, em meio mineral contendo celulose microcristalina como fonte de carbono; MACEDO (1986), utilizou meio completo e temperatura de 40° C para o crescimento de *Humicola sp*. NEIROTTI (1988), usou meio completo, pH 6,8 e temperatura em torno de 42° C para o crescimento da mesma linhagem. Os dados obtidos por RODRIGUES (1987), indicaram melhor crescimento de *Humicola sp* em meio completo, pH 6,8 e temperatura de 42° C, tendo a colônia completado o diâmetro total da placa (9,0 cm), em 4 dias.

A partir dos resultados acima citados e acrescentando-se os dados obtidos neste estudo, pode-se realmente afirmar que o fungo do gênero *Humicola* é termofílico, conforme considerações de ALEXOPOULOS & MIMS (1979); GRIFFIN (1981). Estes autores citam como fungo termofílico aquele que cresce na faixa de 20 a 50° C, tendo como temperatura ótima 35 - 40° C.

Quanto à espécie *T. pseudokoningii*, BISSETT (1984), relatou que as colônias atingem 8,0 a 9,0 cm de diâmetro após 4 dias de incubação a 20° C. Na espécie *T. reesei* o pH adequado para cultivo foi determinado como sendo 5,5 (CASTRO, 1982). FURLANETTO (1989), indicou os valores de pH de 5,0 a 6,0 em meio completo e meio mineral para microrganismos celulolíticos e, temperatura de 28° C como sendo as condições ideais para crescimento de *T. pseudokoningii* var. Rifai. VICENTE (1989), verificou que *T. pseudokoningii* var. Rifai apresentou a mesma taxa de crescimento em meio mínimo e meio completo, pH 6,8 e meio batata-dextrose ágar (BDA), pH 5,6.

Neste estudo, exceto para o mutante *ribo*, que cresceu melhor a 37° C; a temperatura de 28° C se mostrou adequada para *T. pseudokoningii* var. Rifai, caracterizando a espécie como mesofílica (temperatura ótima entre 15 e 40° C, segundo GRIFFIN, 1981).

4.2. Produção de Proteínas e Atividades Enzimáticas de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*

4.2.1. Produção de Proteínas Totais

As quantidades de proteínas totais (mg/ml) produzidas pelas linhagens selvagens e mutantes dos gêneros em estudo, bem como comparações feitas através do teste de Tukey, estão relacionadas na Tabela 10.

Tabela 10. Quantidades de proteínas totais das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	Repetições		
	1a	2a	3a
<i>Humicola sp</i> selvagem	1,5640 BC	1,9729A	2,4327A
<i>Humicola sp</i> mor ₁₃	1,8841AB	1,5261 B	1,6337 CD
<i>T. pseudokoningii</i> selvagem	2,064A	2,1153A	1,8436 BC
<i>T. pseudokoningii</i> leu	1,4726 C	1,7991AB	1,4164 D
<i>T. pseudokoningii</i> ribo	1,9144A	1,9912A	2,0761 B

Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si. DMS= 0,43 mg/ml.

Considerando-se que a quantidade de proteínas é denominador utilizado no cálculo das atividades enzimáticas, efetuou-se a análise de variância, que consta da Tabela 11.

Tabela 11. Análise de variância para as quantidades de proteínas totais produzidas pelas linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

F. V.	G. L.	Q. M.	F
Linhagens (L)	4	0,830	20,60**
Concentração do extrato (C)	1	0,217	5,39*
L x C	4	0,109	2,71*
Dosagens (D)	2	0,071	1,77ns
L x D	8	0,411	10,21**
C x D	2	0,028	0,70ns
L x C x D	8	0,220	5,45**
Resíduo	60	0,040	
Total	79		

* * Valores significativos ao nível de 1 % .

* Valores significativos ao nível de 5 % .

CV_e = 10,83 %

Verifica-se através da Tabela 11 que o efeito de dosagens não foi significativo, indicando que não houve variação nas quantidades de proteínas totais produzidas por

uma mesma linhagem nas três extrações e subsequentes dosagens efetuadas. Poder-se-ia, portanto, utilizar os dados obtidos de uma única extração e dosagem proteica, para todas as dosagens de atividades enzimáticas de uma linhagem.

As comparações feitas através do teste de Tukey revelaram que as linhagens diferem entre si quanto à quantidade de proteínas totais produzidas numa mesma dosagem. A linhagem mutante *leu* de *T. pseudokoningii* foi a que produziu menor quantidade de proteínas totais, enquanto que o mutante *ribo* produziu a maior quantidade de proteínas.

Deve-se salientar que o crescimento menor do mutante *ribo* em meio completo, não ocorreu em meio de farelo de trigo, provavelmente devido à maior quantidade de riboflavina presente no farelo de trigo em relação ao meio completo. Através de avaliação visual e pela quantidade de micélio obtido após filtração, pôde-se constatar que o farelo de trigo praticamente iguala as condições de crescimento para todas as linhagens. Convém ressaltar a importância do uso do farelo de trigo como substrato em fermentações industriais.

Em se tratando da relação existente entre a concentração de proteínas e a atividade celulolítica, GOLDMAN (1988), considerou que estariam associadas pois, segundo NEVALAINEN (1985), *T. reesei* é, entre as espécies de fungos conhecidas, aquela que mais excreta proteínas e; em estudo comparativo entre a linhagem hipercelulolítica QM 9414 de *T. reesei* e *A. niger*, GOLDMAN (1988), verificou que tanto a atividade celulolítica específica como a concentração de proteínas da linhagem QM 9414 de *T. reesei* foram superiores às de *A. niger*.

Com o objetivo de visualizar a abundância re-

lativa das celulases nas duas espécies, o autor acima citado efetuou eletroforese em gel de poliacrilamida com revelação para as celulases e constatou que não havia diferença na abundância relativa das celulases das duas espécies e, embora *T. reesei* tenha apresentado maior excreção de proteínas totais do que *A. niger*, a atividade celulolítica de ambos é semelhante.

Neste estudo não se verificou relação direta entre a quantidade de proteínas totais e a atividade celulolítica (Tabelas 11 e 16).

4.2.2. Dosagem da Avicelase

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos para as atividades da avicelase, nas 5 linhagens.

Tabela 12. Atividades da avicelase das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	U/mg de proteínas totais Repetições			Média
	1a	2a	3a	
<i>Humicola sp</i> selvagem	557,41	534,54	553,51	548,49
<i>Humicola sp</i> mor ₁₃	624,42	577,90	617,79	606,70
<i>T. pseudokoningii</i> selvagem	461,31	528,56	536,23	508,70
<i>T. pseudokoningii</i> leu	602,37	509,96	545,60	552,64
<i>T. pseudokoningii</i> ribo	491,35	547,48	492,07	510,30

Os resultados obtidos por CHAVES (1982), permitiram verificar que a quantidade de avicelase produzida por *Humicola sp* era alta e se encontrava na massa celular (precipitado). MACEDO (1986), utilizou o método de dosagem da atividade em papel de filtro (FPA) indicado por MANDELS (1976), para determinação das celulases totais em *Humicola sp* e concluiu que a excreção destas enzimas foi pequena e

que permaneceu parte no interior da célula e parte ligada à parede celular.

As atividades das avicelases extracelulares de *Humicola sp* selvagem e do mutante morfológico *mor₁₃* foram medidas por RODRIGUES (1987) e apresentaram valores inferiores aos obtidos neste estudo. A atividade média obtida, a partir de 4 repetições, para a linhagem selvagem foi de 271,72 U/mg de proteínas totais e, para o mutante *mor₁₃*, foi encontrado o valor 173,01 U/mg de proteínas totais; enquanto que neste estudo os valores foram 548,49 U/mg de proteínas totais e 606,70 U/mg de proteínas totais para a linhagem selvagem e mutante *mor₁₃*, respectivamente. No caso da linhagem selvagem a atividade foi o dobro e para o mutante superou em 3,5 vezes às atividades verificadas por RODRIGUES (1987), que não considerou *Humicola sp* bom produtor de avicelase.

VICENTE (1989), encontrou bastante variação nas dosagens efetuadas, sendo que foi utilizado o mutante QM 9414 de *T. reesei*, considerado hipercelulolítico, como padrão comparativo para as diversas espécies estudadas. Como média de 4 repetições, a linhagem QM 9414, apresentou o valor de 700,37 U/mg de proteínas totais, para a avicelase e, uma linhagem de *T. pseudokoningii* mostrou atividade de avicelase igual a 115,73 U/mg de proteínas totais.

Os valores apresentados na Tabela 12, para as 3 linhagens de *T. pseudokoningii* (selvagem e mutantes *leu* e *ribo*) foram aproximadamente 5,0 vezes superiores ao encontrado por VICENTE (1989) e se aproximam ao valor da atividade da avicelase do mutante hipercelulolítico QM 9414 de *T. reesei*.

A partir da comparação dos resultados obtidos

com os dos autores acima citados (RODRIGUES, 1987; VICENTE, 1989), pode-se considerar que tanto as linhagens de *Humicola sp* como as de *T. pseudokoningii*, apresentaram alta atividade da avicelase.

4.2.3. Dosagem da Carboximetilcelulase

A Tabela 13 apresenta os valores obtidos para as atividades da carboximetilcelulase nas cinco linhagens.

Tabela 13. Atividades da carboximetilcelulase das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	U/mg proteínas Repetições			Média
	1a	2a	3a	
<i>Humicola sp</i> selvagem	467,34	395,95	343,99	402,43
<i>Humicola sp mor</i> ₁₃	394,24	432,01	410,46	412,24
<i>T. pseudokoningii</i> selvagem	353,10	333,29	380,35	355,58
<i>T. pseudokoningii leu</i>	436,59	362,92	416,19	405,23
<i>T. pseudokoningii ribo</i>	449,72	384,02	357,92	397,22

A atividade da carboximetilcelulase de *Humicola sp*, verificada por CHAVES (1982) foi considerada baixa, tendo sido dosada tanto no precipitado como no sobrenadante. RODRIGUES (1987), também considerou baixas as atividades da carboximetilcelulase verificadas para a linhagem selvagem (297,77 U/mg de proteínas totais) e mutante *mor*₁₃ (198,71 U/mg de proteínas totais) e salientou que a procedência do substrato de carboximetilcelulose utilizado influencia a atividade da carboximetilcelulase; indicou a CMC Hercules tipo 7 H 35F como a melhor.

Os dados obtidos por VICENTE (1989), mostraram um valor médio de 748,99 U/mg de proteínas totais para a atividade da carboximetilcelulase da linhagem QM 9414 de *T.*

reesei e uma atividade igual a 108,11 U/mg de proteínas totais, para a linhagem de *T. pseudokoningii*.

Os valores apresentados na Tabela 13 são superiores aos encontrados por RODRIGUES (1987), para as linhagens de *Humicola sp* e por VICENTE (1989), para a linhagem de *T. pseudokoningii*; estando abaixo do valor da atividade da carboximetilcelulase da linhagem QM 9414 de *T. reesei*.

4.2.4. Dosagem da β -glucosidase

As atividades da β -glucosidase das linhagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii* constam da Tabela 14.

Tabela 14. Atividades da β -glucosidase das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagens	U/mg proteínas totais Repetições			Média
	1a	2a	3a	
<i>Humicola sp</i> selvagem	803,03	705,92	614,09	707,68
<i>Humicola sp mor</i> ₁₃	925,34	1058,97	1139,94	1041,42
<i>T. pseudokoningii</i> selvagem	713,41	733,61	749,75	732,26
<i>T. pseudokoningii leu</i>	572,46	553,44	538,29	554,73
<i>T. pseudokoningii ribo</i>	531,07	544,80	431,32	502,40

A partir da Tabela 14 verifica-se que as da β -glucosidase foram altas em todas as linhagens, sendo que o mutante *mor*₁₃ de *Humicola sp* sobressaiu-se em relação aos demais, com uma atividade média de 1041,42 U/mg de proteínas totais. Foram encontrados valores semelhantes de atividades da β -glucosidase para a linhagem selvagem e mutante *mor*₁₃ de *Humicola sp* (754,04 U/mg de proteínas totais e 1112,37 U/mg de proteínas totais, respectivamente), por RODRIGUES (1987). ARAÚJO (1983), também observou elevada produção de

β -glucosidase na linhagem selvagem de *Humicola sp.* Observa-se que o mutante *mor*₁₃ mostrou superioridade também em relação à linhagem selvagem de *Humicola sp.*

O método de dosagem de β -glucosidase utilizado por CHAVES (1982); MACEDO (1986) foi a quantificação do p-nitrofenil (p-NF) formado a partir do uso de p-nitrofenil β -D-glucosídeo (p-NPG) como substrato. O primeiro autor citado verificou que o pH do meio de cultura afetou a produção de β -glucosidase de *Humicola sp.*, pois em meio com pH 7,0 houve maior produção do que em meio com pH 4,5. Este fato já havia sido notado por Stenberg, citado por HERR (1979), em relação à baixa produção de β -glucosidase por *T. reesei* em seu meio ótimo de crescimento (pH 4,5). CHAVES (1982), observou também que houve maior produção de β -glucosidase quando a fonte de carbono no meio de cultura era a carboximetilcelulose em vez de celulose microcristalina.

Em relação à produção de β -glucosidase por *T. pseudokoningii*, VICENTE (1989) encontrou o valor de 146,80 U/mg de proteínas totais, que superou ao da linhagem QM 9414 de *T. reesei* (76,24 U/mg de proteínas totais).

As atividades das β -glucosidases observadas para as linhagens de *T. pseudokoningii*, neste estudo, foram superiores às acima citadas, sendo que a linhagem selvagem superou os mutantes *leu* e *ribo*, estando próxima da atividade da β -glucosidase verificada para a linhagem selvagem de *Humicola sp.* e abaixo da atividade do mutante *mor*₁₃, que foi o melhor produtor de β -glucosidase.

RODRIGUES (1987), argumentou sobre a alta produção de β -glucosidase deste mutante sugerindo que possa haver algum tipo de alteração na regulação e/ou liberação desta enzima. O fato de ter sido confirmada a alta produção

de β -glucosidase pelo mutante *mor*₁₃ de *Humicola sp*, justificou a continuidade de sua utilização neste trabalho.

A Tabela 15 apresenta a análise de variância em delineamento fatorial inteiramente casualizado das atividades da avicelase, carboximetilcelulase e β -glucosidase das linhagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii*.

Tabela 15. Análise de variância das atividades da avicelase carboximetilcelulase e β -glucosidase das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*

F. V.	G. L.	Q. M.	F
Tratamentos	14	92402,3324	35,3041 **
1º DESDOBRAMENTO			
Linhagens (L)	4	61953,2403	23,6404 **
Atividades (A)	2	367916,9883	140,5699 **
L x A	8	38748,2144	14,8045 **
2º DESDOBRAMENTO			
A / L ₁ @	2	69927,8195	26,7173 **
A / L ₂	2	311330,2197	118,9498 **
A / L ₃	2	107654,3145	41,1314 **
A / L ₄	2	22041,6578	8,4214 **
A / L ₅	2	11955,8402	4,5679 *
Entre linhagens	4	61953,2403	23,6704 **
3º DESDOBRAMENTO			
L / Avicelase	4	4799,2399	1,8336 ns
L / CMCase	4	1511,0872	0,5773 ns
L / β -glucosidase	4	133139,3424	50,8685 **
Entre atividades	2	367916,9883	140,5699 **
Resíduo	30	2617,3236	
Total	44		

@ L₁, L₂, L₃, L₄, L₅ representam as linhagens selvagem e mutante *mor*₁₃ de *Humicola sp* e as linhagens selvagem, mutantes *leu* e *ribo* de *T. pseudokoningii*, respectivamente.

** e * Valores significativos ao nível de 1 % e 5 %.

x = 549,2007 U/mg proteínas totais ; CV_e = 9,32 % .

Pela observação da Tabela 15, pode-se verificar que a maioria dos valores de F foram altamente significativos, indicando as diferenças existentes entre as linhagens, entre as atividades das três enzimas e na interação entre linhagens e atividades enzimáticas (1º desdobramento). O 2º desdobramento confirma a existência de diferenças altamente significativas nas atividades enzimáticas dentro de cada uma das linhagens, sendo que as menores diferenças entre as atividades das três enzimas foram verificadas dentro da linhagem mutante *ribo* de *T. pseudokoningii* (A/L₅), com significância ao nível de 5 %.

A partir da análise das significâncias obtidas no 3º desdobramento, pode-se constatar que os únicos valores que diferiram estatisticamente entre si, se referem às atividades da β -glucosidase nas diferentes linhagens.

Na Tabela 16, estão relacionados os valores médios das atividades das três enzimas do complexo celulolítico das linhagens de *Humicola* sp e *T. pseudokoningii*, que foram comparados entre si através do teste de Tukey.

Tabela 16. Valores médios e significâncias das atividades enzimáticas relativas às linhagens de *Humicola* sp e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagens	U/mg de proteínas totais			Total **
	Avicelase	CMCase	β -glucosidase	
<i>Humicola</i> sp selv.	548,49 A	402,43 A	707,68 B	552,87 AB
<i>Humicola</i> sp mor ₁₃	606,70 A	412,24 A	1041,42 A	686,79 A
<i>T. pseudokoningii</i> selv.	508,70 A	355,58 A	732,26 B	532,18 B
<i>T. pseudokoningii</i> leu	552,64 A	405,23 A	554,73 C	504,20 B
<i>T. pseudokoningii</i> ribo	510,30 A	397,22 A	502,40 C	469,97 B

* Médias de 3 repetições.

** Média geral de enzimas.

DMS (5 %) = 152,11 U/mg proteínas totais.

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si.

As comparações apresentadas na Tabela 16, confirmam os resultados encontrados na análise de variância, pois somente nas atividades da β -glucosidase as linhagens diferiram entre si. O mutante *mor*₁₃ foi o melhor produtor, as linhagens selvagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii*, mostraram valores médios de atividades que não são diferentes entre si estatisticamente e, os mutantes *leu* e *ribo* apresentaram os menores valores de atividades da β -glucosidase. Considerando-se a média geral de enzimas, observa-se que as linhagens de *Humicola sp* são superiores às de *T. pseudokoningii*, isto é, têm um complexo celulolítico mais eficiente.

4.3. Obtenção de Heterocários

Em todas as tentativas de cruzamento entre os dois gêneros, através da mistura de quantidades iguais de esporos das duas linhagens, em tubos contendo meio mínimo mais 4, 6 e 10% de meio completo, não houve a formação de película, demonstrando que através deste método convencional de cruzamento, via ciclo parassexual, as linhagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii* são incompatíveis.

4.4. Obtenção e Regeneração de Protoplastos

Os tempos de crescimento e tratamento enzimático das linhagens em estudo foram diferentes pois a linhagem selvagem e o mutante *mor*₁₃ de *Humicola sp*, mostraram melhores resultados na obtenção de protoplastos, com micélio crescido por 20 horas e tratamento enzimático de 1 hora, enquanto que a linhagem selvagem e mutantes *leu* e *ribo* de *T. pseudokoningii*, produziram maior número de protoplastos após crescimento por 18 horas e tratamento enzimático de 3 horas (Tabela 17).

A partir destes resultados pode-se supor que existem diferenças entre a parede celular do gênero *Humicola* sp em relação à espécie *T. pseudokoningii*, isto é, as enzimas utilizadas têm ação mais eficiente na parede celular de *Humicola* sp, demonstrando maior afinidade com os componentes da mesma. Houve a tentativa de agilizar o processo de degradação da parede em *T. pseudokoningii*, aumentando-se a quantidade de enzima em relação à quantidade de micélio utilizado, mas não ocorreu resposta positiva.

Tabela 17. Número de protoplastos obtidos em 4 repetições para as linhagens de *Humicola* sp e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	MgSO ₄				(NH ₄) ₂ SO ₄				Ambos†			
	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a
<i>Humicola</i> sp selv.	800	610	720	830	9,6	8,6	8,8	9,0	6	10	14	10
<i>Humicola</i> sp mor ₁₃	1000	1800	1200	2000	5	3,2	3,6	4,2	12	22	14	20
<i>T. pseudokoningii</i> selv.	10	12	14	12	320	420	300	260	18	10	26	18
<i>T. pseudokoningii</i> leu	10	14	10	10	20	12	30	26	2	3	2	1,4
<i>T. pseudokoningii</i> ribo	2,8	4,2	4	3	70	54	66	70	3	2,8	3,4	2,8

* Mistura de MgSO₄ e (NH₄)₂SO₄.

** Número de protoplastos X 10⁵.

Existem numerosos dados na literatura concernentes à composição química das paredes celulares de vários grupos de fungos, sendo que esta composição está estreitamente correlacionada com a classificação taxonômica dos fungos (Bartnicki - Garcia (1968), citados por FARKAS, 1985). Em geral, as paredes celulares fúngicas são compostas de homo e heteropolissacarídeos, proteínas, complexos proteína-polissacarídeos e quantidades variáveis de constituintes menores tais como lipídeos e melaninas (Bartnicki - Garcia (1968); Rosenberger (1976), citados por FARKAS, 1985).

Segundo Walton & Blackwell (1973), citados por FARKAS (1985), a quitina é o constituinte esquelético típico da parede celular da maioria dos fungos. É um homopolímero linear de N-acetil-D-glucosamina, muito similar à celulose, exceto pelo fato de um grupo acetamido substituir o grupo hidroxil na posição C-2. Em termos de porcentagem de peso seco da parede, no gênero *Fusarium*, da classe Hyphomycetes, à qual também pertencem os gêneros *Humicola* e *Trichoderma*, há 39 % de quitina, 0 % de celulose, 29 % de outros polissacarídeos, 6 % de lipídeos, 7 % de proteína e 2 % de resíduos (Barran et alii (1975), citados por GRIFFIN, 1981).

As enzimas utilizadas no processo de obtenção de protoplastos deste estudo foram as celulasas "CP" e "Novozym 234". As atividades de quitinase verificadas na celulase "CP" (Sturge) e na "Novozym 234" (Novo) foram de $0,049 \times 10^{-2}$ e $0,225 \times 10^{-2}$ moléculas de N-acetil-D-glucosamina/mg de proteína/minuto, respectivamente (HAMLYN et alii, 1981).

Embora estas celulasas tenham ação sobre a quitina pela semelhança existente entre as moléculas de celulose e quitina, seria interessante que em futuros estudos com fungos da classe Hyphomycetes fossem utilizadas quitinases que teriam maior especificidade pelo componente principal da parede, a quitina, e portanto, mais eficiência na degradação da parede celular e consequentemente, na produção de protoplastos.

O número médio de protoplastos obtidos com os vários estabilizadores osmóticos utilizados, estão relatados na Tabela 18 (média de 4 repetições).

Tabela 18. Número médio de protoplastos obtidos para as linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	Estabilizador osmótico			
	MgSO ₄	(NH ₄) ₂ SO ₄	Ambos*	KCl
<i>Humicola sp</i> selv.	7,4x10 ⁷	9,0x10 ⁵	1,0x10 ⁶	0,0
<i>Humicola sp</i> "mor ₁₃	1,5x10 ⁸	4,0x10 ⁵	1,7x10 ⁶	0,0
<i>T. pseudokoningii</i> selv.	1,2x10 ⁶	3,2x10 ⁷	1,8x10 ⁶	3,5x10 ⁵
<i>T. pseudokoningii</i> "leu "	1,1x10 ⁶	2,2x10 ⁶	2,1x10 ⁵	0,0
<i>T. pseudokoningii</i> "ribo "	3,5x10 ⁵	6,5x10 ⁶	3,0x10 ⁵	0,0

* Mistura de MgSO₄ e (NH₄)₂SO₄.

Pode-se verificar através da Tabela 18 que o sulfato de magnésio favoreceu as linhagens de *Humicola sp* e o sulfato de amônia foi o melhor estabilizador osmótico para as linhagens de *T. pseudokoningii*.

Em 1986, MACEDO utilizou o método "simplex" (LONG, 1969), com variação programada dos fatores envolvidos na obtenção de protoplastos de *Humicola sp*, tendo determinado como melhores condições um tempo de crescimento de vinte horas, na temperatura de 41^o C e tratamento enzimático de 186 minutos. Avaliou vários estabilizadores osmóticos tendo definido o sulfato de magnésio 0,5 M como sendo o mais adequado, tanto para a obtenção como para a regeneração de protoplastos. A autora obteve um valor médio de $1,23 \times 10^8$ protoplastos/ml, para a linhagem selvagem de *Humicola sp*.

NEIROTTI (1988), verificou após 30 minutos de digestão enzimática, $3,6 \times 10^6$ protoplastos/ml e um número máximo de $1,9 \times 10^7$ protoplastos/ml, com 3 horas de tratamento, utilizando sulfato de magnésio 0,5 M como estabilizador. Os protoplastos uninucleados foram observados em maior número após 30 minutos (75,5 %), enquanto que protoplastos de tamanho maiores foram verificados após a digestão de 3

horas, demonstrando uma provável relação entre o tamanho e o número de núcleos do protoplasto.

Através dos resultados citados na Tabela 18, vê-se que nas condições de obtenção de protoplastos de *Humicola sp.*, deste estudo (crescimento por 20 horas, temperatura de 37° C, tratamento enzimático de 60 minutos e sulfato de magnésio como estabilizador osmótico), os números de protoplastos obtidos estão próximos aos dos autores acima citados. Em sulfato de amônia os valores foram menores e em cloreto de potássio, não apareceram protoplastos.

Em geral, sais inorgânicos são mais apropriados para a obtenção de protoplastos de fungos filamentosos e açúcares e álcoois para leveduras (Davis (1985), citado por FEBERDY & FERENCZY, 1985). Segundo GAMBINO et alii (1984), o uso de "tween" 80 juntamente com a enzima propiciou a obtenção de maior número de protoplastos em *A. nidulans*, mas GOLDMAN (1988), não observou este efeito positivo em *A. niger*.

A obtenção de protoplastos de *T. pseudokoningii* foi melhor sucedida em sulfato de amônia 0,6 M, tendo sido obtidos resultados muito semelhantes aos de FURLANETTO (1989), para a linhagem selvagem. Em sulfato de magnésio, os valores foram inferiores e em cloreto de potássio, somente a linhagem selvagem liberou protoplastos, em pequeno número.

Foi utilizado sorbitol para a obtenção de protoplastos, mas não se verificou resultado positivo em nenhuma das linhagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii*.

As maiores quantidades de protoplastos obtidos a partir de conídios foram verificadas após 12 horas de

tratamento enzimático, para o mutante *leu* de *T. pseudokoningii* ($8,0 \times 10^5$ protoplastos/ml) e, após 16 horas para a linhagem selvagem de *Humicola sp* ($2,0 \times 10^6$ protoplastos/ml). O acompanhamento do processo de ação enzimática permitiu constatar que para ambas as linhagens, os protoplastos emergiram através de poros formados nas paredes dos conídios.

A observação dos protoplastos ao microscópio permitiu verificar que, em *Humicola sp*, foram menos uniformes que os originados a partir de micélio, tanto em tamanho como em morfologia. Em *T. pseudokoningii*, houve maior variação quanto ao tamanho, pois os protoplastos provenientes de micélio também são bastante heterogêneos em sua morfologia. EMERSON & EMERSON (1958), também observaram desuniformidade em protoplastos originados de conídios de *N. crassa*.

As porcentagens de regeneração das linhagens de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii*, obtidas em 4 repetições estão na Tabela 19. Na Tabela 20, estão relacionadas as porcentagens médias obtidas.

As linhagens de *Humicola sp* selvagem e mutante tiveram porcentagens maiores de regeneração em meio completo- MgSO_4 0,5 M, isto é, no mesmo estabilizador osmótico utilizado para a obtenção de seus protoplastos. MACEDO (1986), encontrou uma porcentagem de 0,67 % de regeneração para a linhagem selvagem de *Humicola sp* no mesmo meio de regeneração. Em sorbitol e sacarose ocorreram porcentagens insignificantes e em KCl, não houve regeneração, sendo que estes resultados, exceto para a sacarose que não foi utilizada também foram obtidos no presente estudo. Em meio completo - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, não houve regeneração dos protoplastos.

Tabela 19. Porcentagens de regeneração obtidas em 4 repetições, para protoplastos das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	MgSO ₄				(NH ₄) ₂ SO ₄				Ambos†			
	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a
<i>Humicola sp</i> selv.	1,50	1,82	2,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,60	1,00	0,90
<i>Humicola sp</i> mor ₁₃	1,60	2,32	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	1,20	1,27
<i>T. pseudokoningii</i> selv.	2,20	2,00	1,60	1,40	6,50	8,00	8,10	7,40	3,10	3,86	4,00	2,00
<i>T. pseudokoningii</i> leu	1,50	1,40	1,66	2,00	4,80	4,00	3,20	4,00	0,56	0,70	0,60	0,74
<i>T. pseudokoningii</i> ribo	1,10	2,00	1,00	1,00	1,00	1,22	2,10	1,28	0,45	0,24	0,20	0,31

* Mistura de MgSO₄ e (NH₄)₂SO₄.

Tabela 20. Porcentagens médias de regeneração de protoplastos das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

Linhagem	Estabilizador osmótico			
	MgSO ₄	(NH ₄) ₂ SO ₄	Ambos*	Sorbitol
<i>Humicola sp</i> selv.	1,73	0,00	1,00	0,21
<i>Humicola sp</i> mor ₁₃	1,73	0,00	0,82	0,13
<i>T. pseudokoningii</i> selv.	1,80	7,50	3,24	0,00
<i>T. pseudokoningii</i> leu	1,64	4,00	0,65	0,00
<i>T. pseudokoningii</i> ribo	1,29	1,40	0,30	0,00

* Mistura de MgSO₄ e (NH₄)₂SO₄.

SIESTMA & BOER (1973), indicaram que estabilizadores inorgânicos são mais eficientes na obtenção e estabilizadores orgânicos são melhores na regeneração de protoplastos; entretanto os resultados de MACEDO (1986) e deste trabalho indicaram que o uso de sorbitol na regeneração não foi benéfico. Para a espécie *A. niger*, BORGES (1987); GOLDMAN (1988), confirmaram a indicação de SIESTMA & BOER (1973).

NEIROTTI (1988), obteve o valor máximo de regeneração (1,2%), após tratamento enzimático de 30 minutos, sendo que, com 3 horas de tratamento, houve redução deste valor para 0,7 %, fato que está de acordo com as indicações de PICATAGGIO et alii (1983), onde a frequência de regeneração depende, entre outros fatores, do tempo de tratamento enzimático do micélio.

AHN & PACK (1985), citaram as condições osmóticas como sendo um outro fator muito importante envolvido na regeneração e, recomendaram a pré-adaptação das células a serem protoplastizadas às mesmas condições hipertônicas utilizadas na regeneração.

NECAS (1971), considerou que em menores tempos de digestão pela enzima, ficam resquícios da parede celular que facilitariam na reconstituição da nova parede, no processo de regeneração de protoplastos.

As porcentagens de regeneração verificadas para as linhagens de *T. pseudokoningii* foram maiores em sulfato de amônia mas também ocorreu regeneração em sulfato de magnésio. Em KCl e sorbitol não houve regeneração. FURLANETTO (1989), obteve valor superior ao deste estudo na regeneração da linhagem selvagem de *T. pseudokoningii* (12,245%) em meio completo - sulfato de amônia 0,6 M.

A utilização da mistura dos estabilizadores $MgSO_4$ e $(NH_4)_2SO_4$ se justifica pelo fato de que se tentou obter um meio onde os dois gêneros de fungos sob estudo, regenerassem para que se pudesse efetuar a fusão de ambos.

As porcentagens de regeneração verificadas em todas as linhagens foram baixas, mas houve regeneração das linhagens de *Humicola sp.*, que não ocorria em meio completo -

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Os estabilizadores foram misturados na proporção 1:1 com pH 5,8.

O mutante *mor*₁₃ de *Humicola sp* apresentou valor de regeneração próximo ao da linhagem selvagem; enquanto que os mutantes *leu* e *ribo* de *T. pseudokoningii* tiveram valores bem inferiores ao da linhagem selvagem. Provavelmente isto ocorreu porque, no caso de *Humicola sp*, trata-se de um mutante morfológico que tem as mesmas auxotrofias da linhagem selvagem (biotina e tiamina), entretanto a linhagem selvagem de *T. pseudokoningii* é prototrófica e os mutantes *leu* e *ribo* têm auxotrofias para o aminoácido e para a vitamina que suas siglas indicam, respectivamente. Estas deficiências nutricionais possivelmente dificultam o processo de regeneração da parede celular por afetarem o metabolismo da célula como um todo.

Os resultados obtidos para protoplastos originados de conídios mostraram uma porcentagem de regeneração de 0,075% para a linhagem *leu* de *T. pseudokoningii*, sendo que não houve regeneração dos protoplastos de *Humicola sp*.

As linhagens de *Humicola sp* (selvagem e "*mor*₁₃"), devido às auxotrofias para biotina e tiamina apresentam alterações nas carboxilações e transcarboxilações e, na descarboxilação oxidativa do piruvato a acetil Co A e do cetoglutarato a succinil Co A, onde atua a coenzima pirofosfato de tiamina (TPP), respectivamente. Os mutantes *leu* e *ribo* têm falhas na formação de proteínas e no metabolismo do piruvato onde a riboflavina age como coenzima para a desidrogenase (flavina-mononucleotídeo - FMN e flavina-adenina-dinucleotídeo - FAD), respectivamente (VIEIRA et alii, 1979; GRIFFIN, 1981).

4.5. Fusão de Protoplastos

4.5.1. Uso do Agente Fusogênico Polietilenoglicol

A fusão de protoplastos de *Humicola* sp e *T. pseudokoningii* por tratamento com polietilenoglicol (PEG) não mostrou resultados positivos pois não apareceram produtos de fusão nas placas contendo meio mínimo mais estabilizador osmótico incubadas por um período de até 20 dias. Para evitar o ressecamento do meio de cultura nas placas, foram colocados frascos com água na estufa de incubação e as placas foram mantidas em bandejas de plástico forradas com papel de filtro umedecido.

Foi também realizada a tentativa de regeneração inicial dos possíveis produtos de fusão, em meio mínimo líquido mais 4 % de meio completo, além do estabilizador osmótico, por 24 horas, sob agitação leve (100 rpm) e posterior transferência para meio mínimo sólido mais estabilizador, mas não se observou nenhum crescimento.

A utilização da linhagem selvagem de *T. pseudokoningii* como doador morto, também não foi bem sucedida. Pode-se constatar que o tratamento a 50 °C por 30 minutos foi satisfatório para matar os protoplastos de *T. pseudokoningii* (Tabela 21).

Tabela 21. Número de protoplastos regenerados da linhagem selvagem de *Trichoderma pseudokoningii* (média de 3 repetições).

Tempo (minutos)	Temperatura (°C)				
	45	50	55	60	65
10	204	161	123	65	12
20	186	73	61	28	0
30	120	0	0	0	0
40	98	0	0	0	0
60	73	0	0	0	0

inóculo: 10^6 protoplastos/ml
placa controle: 230 colônias.

NEIROTTI (1988) obteve protoplastos mortos de *Humicola sp* após tratamento a 62°C por 10 minutos, mas indicou que, segundo Baltz & Matsushima (1983), tratamentos mais prolongados e em temperaturas mais baixas foram mais efetivos para a utilização do doador morto, na obtenção de recombinantes de *Streptomyces*. Em estudos com *Streptomyces coelicolor*, HOPWOOD & WRIGHT (1981), utilizaram uma das linhagens como doador morto através de tratamento com luz ultra-violeta e obtiveram recombinantes que apresentavam 1/6 do genoma do doador morto (irradiado) e 5/6 do genoma da linhagem não irradiada.

A utilização de protoplastos obtidos de conídios para o processo de fusão não mostrou resultados satisfatórios, sendo que, após 15 dias de incubação, as placas não apresentaram nenhum sinal de crescimento de possíveis produtos de fusão.

Entre dois mutantes auxotróficos simples de *Humicola sp*, NEIROTTI (1988) obteve frequências de fusão que variaram de 10×10^{-4} a $0,33 \times 10^{-4}$, enquanto que FURLANETTO (1989) observou frequência média de $3,88 \times 10^{-1}$ colônias entre duplo-mutantes de *T. pseudokoningii*, salientando que este valor foi aproximadamente 1000 vezes superior à frequência obtida a partir de heterocários resultantes de anastomose de hifas.

Existem muitos estudos sobre fusão de protoplastos em fungos, especialmente cruzamentos intraespecíficos e interespecíficos. Em cruzamentos intraespecíficos, as vantagens da fusão de protoplastos se referem a espécies onde o ciclo parassexual dificilmente é obtido devido às in-

compatibilidades existentes; por exemplo em *Candida tropicalis* e *Cephalosporium acremonium* (Sipiczky & Ferenczy (1977); Ball & Hamlyn (1978), citados por AZEVEDO, 1981).

Em espécies como *A. niger* e *M. anisopliae*, onde os cruzamentos são considerados incompatíveis pela grande divergência entre as linhagens, a fusão de protoplastos também tem sido empregada com êxito (Azevedo & Bonatelli Jr. (1981), citados por AZEVEDO, 1981). Em espécies de *Penicillium*, ANNE & FEBERDY (1976), realizaram fusões intra-específicas de protoplastos.

Em experimentos de hibridização interespecífica, após fusão de protoplastos, DALES & CROFT (1977), observaram que barreiras de heterocariose entre grupos de *A. nidulans* poderiam ser transpostas. Segundo JINKS et alii (1966), a incompatibilidade aparece como consequência da diversidade genética e isolamento entre espécies. Estes autores chegaram à conclusão acima citada a partir da análise de progênies de três tipos de cruzamentos: 1) entre linhagens derivadas do mesmo isolado selvagem; 2) entre isolados selvagens independentes, pertencentes ao mesmo grupo de compatibilidade heterocariótica; 3) entre isolados selvagens pertencentes a grupos de compatibilidades heterocarióticas diferentes.

Entre espécies de *Aspergillus*, oito foram utilizadas em cruzamentos interespecíficos, sendo que foram obtidos produtos de fusão e híbridos entre 4 espécies; somente heterocários entre outras quatro e, ausência de produtos de fusão em cruzamentos envolvendo 3 espécies. Entre *A. nidulans*, produtor da penicilina; lactam e *A. rugulosus*, não produtor (espécies estreitamente relacionadas entre si), foram obtidos híbridos que produziam quantidades diferentes de penicilina, demonstrando que sua produção tem controle

poligênico.

Entre espécies consideradas pouco relacionadas como *A. nidulans* e *A. fumigatus*, os "híbridos" tinham em sua maioria, o genoma de *A. nidulans* mais a parte do genoma de *A. fumigatus* que complementava a deficiência nutricional; foram designados como "aneuplóides interespecíficos" ou, mais precisamente, "aneuplóides parciais" (KEVEI & PEBERDY, 1977, 1979).

FERENCZY et alii (1977), indicaram que uma pré-condição para a complementação interespecífica entre fungo incompatíveis, poderia ser a desintegração do núcleo de uma das espécies. Esta desintegração poderia ser seguida pela retenção de um ou poucos cromossomos e, levaria à baixa frequência de complementação e à incapacidade para recuperar ambos os parceiros da fusão simultaneamente numa colônia.

Por outro lado, *A. flavus* e *A. parasiticus* são espécies consideradas bastante relacionadas, mas não se cruzam (KEVEI & PEBERDY, 1979).

Em cruzamentos interespecíficos dentro do gênero *Penicillium*, os híbridos foram mais facilmente obtidos que em *Aspergillus*, mostrando maior compatibilidade entre as espécies de *Penicillium* (ANNE & PEBERDY, 1975; Peberdy et alii (1978); Anne & Eyssen (1978), citados por ALFOLDI, 1982).

VIALTA & BONATELLI JR. (1990), obtiveram um híbrido entre as espécies *A. awamori* e *A. niger*, sugerindo homologia entre os grupos de ligação das duas espécies e dando indicações sobre a proximidade filogenética entre estas espécies.

Em leveduras têm sido feitos muitos cruzamentos entre diferentes espécies de *Saccharomyces*, *Schizosaccharomyces*, *Candida* e *Kluyveromyces* (Ferenczy (1985), citado por PEBERDY & FERENCZY, 1985).

Os trabalhos envolvendo cruzamentos intergenéricos são poucos e se referem principalmente a leveduras. PROVOST et alii (1978), relatou complementação entre *Candida tropicalis* e *Saccharomycopsis fibuligera*, tendo-se formado aloplóides parciais. SVOBODA (1980), observou produtos de fusão entre *S. cerevisiae* e *Schizosaccharomyces pombe*, instáveis e que continham o genoma completo de *S. cerevisiae* e um cromossomo adicional de *Schizosaccharomyces pombe*.

Entre as espécies *S. cerevisiae* e *K. lactis*, os produtos de fusão também se mostraram extremamente instáveis (Stewart (1981 a, b), citado por NECAS & SVOBODA, 1985). Os produtos de fusão de *S. cerevisiae* e *Schwanniomyces alluvius*; *Saccharomycopsis lipolytica* e *Pichia guilliermondii* (Spata & Weber (1980); Wilson et alii (1982), citados por NECAS & SVOBODA, 1985), reverteram aos tipos parentais confirmando sua instabilidade. BALL (1984), relatou o cruzamento entre *Candida utilis* e *Trichoderma viride*, indicando a baixa viabilidade dos produtos de fusão; não tendo havido recuperação de marcas genéticas, sendo que os híbridos foram caracterizados pelo espectro de fermentação de compostos de carbono.

O processo de fusão em si, isto é, a coalescência de dois ou mais protoplastos em um compartimento está primariamente relacionada à atividade do agente fusogênico, entretanto o desenvolvimento posterior do protoplasto fundido se baseia na interação bem sucedida dos genomas, garantindo a proliferação preferencial do híbrido. A complementação dos genomas é manifestada pela renovação da síntese ma-

cromolecular, levando à reversão dos protoplastos fundidos a células híbridas (NECAS & SVOBODA, 1985).

4.5.2. Eletrofusão

Pelo fato da solução de sorbitol 0,8 M pH 7,0 ter sido considerada a mais adequada nos estudos de eletrofusão com protoplastos de *Humicola sp*, realizados por NEIROTTI (1988), utilizou-se a mesma solução neste experimento, apesar de se tratar de eletrofusão entre protoplastos de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii*.

Os parâmetros de alinhamento, compressão e fusão celular referentes ao tempo e amplitude, utilizados por NEIROTTI (1988), não mostraram resultado positivo e, por esta razão, foram feitas diversas tentativas alterando estas variáveis. Foi efetuado o acompanhamento microscópico nas microlâminas mas não se observou alinhamento. Variou-se também a frequência de voltagem de 100 KHz a 10 MHz, mas não se verificou diferença.

O único fenômeno observado foi a movimentação lenta e desuniforme dos protoplastos. Segundo instruções contidas no Manual do Eletromanipulador Celular BTX, células pequenas requerem tempo maior de alinhamento, maior voltagem e maior concentração de células em relação a células grandes. As etapas de alinhamento, compressão e fusão celular ocorrem a partir de 2 processos físicos denominados dieletroforese e quebra dielétrica. A dieletroforese governa o movimento das células, incluindo o alinhamento e a compressão e a quebra dielétrica determina o evento de fusão.

O campo elétrico induz à separação de cargas na célula. Se o campo for homogêneo, a célula permanecerá no

lugar; no entanto, no caso de um campo elétrico não homogêneo, gerado por eletrodos, a força do campo num lado da célula, próximo ao ponto de concentração, é maior que a força no lado oposto, fazendo com que a célula se mova através do campo. Especificamente no caso dos protoplastos de *Humicola sp* e *T. pseudokoningii* pode ter ocorrido que o campo elétrico não fosse suficientemente heterogêneo para propiciar a movimentação correta e alinhamento dos protoplastos.

WEBER et alii (1981); SCHNETTLER & ZIMMERMANN (1985); NEIROTTI (1988), indicaram a manutenção da câmara de fusão em repouso, sob temperatura ambiente para assegurar a fusão. Este procedimento foi adotado no presente estudo, tendo a câmara permanecido em repouso por 60 minutos, fato que não alterou os resultados anteriormente verificados. Optou-se pela continuidade do processo, efetuando-se, inclusive o plaqueamento, porque, apesar de não ter sido observada sob microscópio, a fusão poderia ter ocorrido.

Existem poucos estudos utilizando eletrofusão sendo que como tentativa para melhorar a eficiência de fusão foi sugerido o uso de pronase ou polietilenoglicol, adicionados à solução de sorbitol (Halfmann et alii (1982), citados por NEIROTTI (1988). Em células linfoblásticas de rato, a utilização de íons cálcio se mostrou essencial no processo de eletrofusão (OKADA et alii, 1984).

Entre protoplastos de linhagens da mesma espécie, a eletrofusão se mostrou efetiva tanto para *Humicola sp* (NEIROTTI, 1988), como para o cruzamento de mutantes duplo-auxotróficos de *T. reesei* (KATENKAMP et alii, 1989). WARWAR (1990), obteve 5% de colônias prototróficas em cruzamentos de linhagens de *A. niger*, utilizando frequência de 1,0 MHz nas etapas de alinhamento e compressão amplitude de 400 V.cm^{-1} e tempo de 20 segundos, para alinha-

mento; amplitude de 520 V. cm^{-1} e tempo de 5 segundos para compressão e, amplitude de $5,77 \text{ kV. cm}^{-1}$, tempo de 30 microsegundos e 5 pulsos na etapa de fusão.

5. CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos permitiu que fossem tiradas as seguintes conclusões:

1. A temperatura de 37° C se mostrou favorável para o crescimento das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

2. O mutante compacto *ribo* de *Trichoderma pseudokoningii* apresentou melhor crescimento na temperatura de 37° C em vez da temperatura de 28° C, considerada ideal para a sua espécie.

3. Não há variação significativa entre as quantidades de proteínas totais produzidas por uma mesma linhagem em diferentes extrações.

4. Não há relação direta entre a quantidade de proteínas totais e a atividade celulolítica das linhagens de *Humicola sp* e *Trichoderma pseudokoningii*.

5. As atividades da avicelase de todas as linhagens foram semelhantes e se mostraram altas; as atividades da carboximetilcelulase foram inferiores às da avicelase e as atividades da β -glucosidase diferiram significativamente entre as linhagens, sendo que a atividade do mutante *mor₁₃* de *Humicola sp* superou às demais.

6. Protoplastos das linhagens de *Humicola sp* podem ser obtidos após 1 hora de tratamento enzimático,

sendo o melhor estabilizador o sulfato de magnésio 0,5 M pH 5,6, enquanto que para as linhagens de *Trichoderma pseudokoningii*, o tratamento enzimático mais adequado foi de 3 horas e o melhor estabilizador osmótico foi o sulfato de amônia 0,6 M pH 6,0.

7. A regeneração de cada um dos gêneros foi conseguida utilizando-se uma mistura de sulfato de magnésio e sulfato de amônia.

8. Foram obtidos protoplastos a partir de conídios de ambos os gêneros, mas a regeneração ocorreu somente em *Trichoderma pseudokoningii*.

9. Não foram obtidos produtos de fusão através do uso de polietilenoglicol (PEG) ou da técnica de eletrofusão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHN, J. S. & PACK, M. Y. Improvement of protoplast regeneration by growing yeast cells hipertonicallly. *Applied Environmental Microbiology*, Washington, 49 (6): 1550 - 2, 1985.
- AINSWORTH, G. C. *Ainsworth and Bisby's Dictionary of the fungi*, 6^a ed., Kew, Surrey, Commonwealth Mycological Institute, 1971. 395 p.
- AINSWORTH, G. C.; SPARROW, F. K.; SUSSMAN, A. S. *The Fungi: An Advanced Treatise*, vol. 4 A, New York, San Francisco, London, Academic Press, 1973. 867 p.
- ALEXANDER, M. *Introduction to Soil Microbiology*, 2^a ed., New York, John Wiley & Sons, 1976. 472 p.
- ALEXOPOULOS, C. J.; MIMS, C. W. *Introductory Micology*, 3^a ed., New York, John Wiley & Sons, 1979. 611 p.
- ALFOLDI, L. Fusion of Microbial Protoplasts: Problems and Perspectives. In: HOLLAENDER, A. (coord.). *Genetic Engineering of Microorganisms for Chemicals*, vol. 19, New York London, Plenum Press, 1982. p. 59 - 71.
- ANNÉ, J.; PEBERDY, J. F. Condition for induced fusion of fungal protoplasts in polyethylene glycol solutions. *Archives of Microbiology*, Berlin, 105: 201 - 5, 1975.
- ANNÉ, J.; PEBERDY, J. F. Induced fusion of fungál proto-

- plasts following treatment with polyethylene glycol. *Journal of General Microbiology*, London, 92: 413 - 7, 1976.
- ARAÚJO, E. F.; BARROS, E. G.; CALDAS, R. A.; SILVA, D. O. β -glucosidase activity of the thermophilic and cellulytic fungus *Humicola* sp. *Biotechnology Letters*, Kew, 5: 781 - 4, 1983.
- AUNSTRUP, K. Enzymes of industrial interest: traditional products. In: PERLMAN, D. & TSAO, G. T. *Annual Reports on Fermentation Processes*, vol. 2, New York, Academic Press, 1978. p. 125 - 154.
- AZEVEDO, J. L. Fusão de protoplastos na produção de híbridos intra e interespecíficos em fungos. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GENETIC ENGINEERING, Piracicaba, 1981, *Proceedings*, São Paulo, PROMOCET, 1981. p. 55 - 6.
- AZEVEDO, J. L.; COSTA, S. O. P. *Exercícios práticos de genética*, São Paulo, EDUSP, 1973. 288 p.
- BACHMANN, B. J. & BONNER, D. M. Protoplast from *Neurospora crassa*. *Journal of Bacteriology*, Baltimore, 78: 550 - 6, 1959.
- BAILEY, M. J. & NEVALAINEN, K. M. H. Induction, isolation and testing of stable *Trichoderma reesei* mutants with improved production of solubilizing cellulase. *Enzyme and Microbial Technology*, Guildford, 3: 153 - 7, 1981.
- BALL, C. *Genetics and Breeding of Industrial Microorganisms*, Boca Raton, CRC Press, 1984. p. 128 - 32.
- BENITEZ, T.; RAMOS, S.; ACHA, I. G. Protoplasts of

Trichoderma viride: Formation and Regeneration. *Archives of Microbiology*, Berlin, 103: 199 - 203, 1975 a.

BENITEZ, T.; VILLA, T. G.; ACHA, I. G. Chemical and structural differences in mycelial and regeneration walls of *Trichoderma viride*. *Archives of Microbiology*, Berlin, 105: 277 - 82, 1975 b.

BERG, H.; AUGSTEN, K.; BAUER, E.; FORSTER, W.; JACOB, H.; MUHLIG, P.; WEBER, H. 664 - possibilities of cell fusion and transformation by electrostimulation. *Bioelectrochemistry and Bioenergetics*, Lausanne, 12: 119 - 33, 1984.

BISARIA, V.S. & GHOSE, T. H. Reviews: Biodegradation of cellulosic materials: substrates, microorganisms, enzymes and products. *Enzyme and Microbial Technology*, Guildford, 3: 90 - 104, 1981.

BISSETT, J. A revision of the genus *Trichoderma*, section *longibrachiatum*. *Canadian Journal of Botany*, Ottawa, 62: 924 - 31, 1984.

BORGES, M. I. Técnicas de protoplastização e isolamento de DNA de alto peso molecular de *Aspergillus niger*. Campinas 1987. 112 p. (Mestrado - Universidade Estadual de Campinas).

BOS, C. J. Protoplast from fungal spores. In: FEBERDY, J. F. & FERENCZY, L. *Fungal Protoplasts*, vol. 6, New York, Basel, Marcel Dekker, Inc., 1985. p. 73 -85.

BOS, C. J. & SLAKHORST, S. M. Isolation of protoplast from *Aspergillus nidulans* conidiospores. *Canadian Journal of Microbiology*, Ottawa, 27: 400 - 7, 1981.

- CASTRO, V. G. Aspectos básicos da biologia e genética do *Trichoderma reesei*. Belo Horizonte, 1982. 134 p. (Mestrado - Universidade Federal de Minas Gerais).
- CHAVES, V. M. G. Características fisiológicas de um fungo termófilo isolado de compostagem e propriedades de seu complexo celulase. Viçosa, 1982. 60 p. (Mestrado - Universidade Federal de Viçosa).
- COONEY, D. G. & EMERSON, R. *Thermophilic fungi: An account of their biology, activities and classification*. San Francisco, W. H. Freeman, 1964. 188 p.
- COSTA, M. B. & VAN UDEN, N. Use of 2 - deoxyglucose in the selective isolation of mutants of *Trichoderma reesei* with enhanced B-glucosidase production. *Biotechnology and Bioengineering*, New York, 22: 2429 - 32, 1980.
- COUGHLAN, M. P. The properties of fungal and bacterial cellulases with comment on their production and applications. In: RUSSEL, G. E.; ed. *Biotechnology and Genetic Engineering Reviews*, Newcastle upon Tyne, Intercept, 1985 p. 39 - 109.
- DALES, R. B. G. & CROFT, J. H. Protoplast fusion and the isolation of heterokaryons and diploids from vegetatively incompatible strains of *Aspergillus nidulans*. *FEMS Microbiological Letters*, Amsterdam, 1: 201 - 3, 1977.
- De BERTOLDI, M. Nuclear distributions in some strains referred to the genus *Humicola*. *Annual Botany*, Oxford, 31: 187 - 96, 1972.
- De BERTOLDI, M. & CATEN, C. E. Isolation and haploidization of heterozygous diploid strains in a species of *Humicola*.

- Journal of General Microbiology*, London, 91: 63 - 73, 1975.
- EMERSON, S. & EMERSON, M. R. Production, reproduction and reversion of protoplast like structures in the osmotic strain of *Neurospora crassa*. *Proceedings of National Academy of Science*, Washington, 44: 668 - 74, 1958.
- ERIKSSON, K. E. & JOHNSRUD, S. C. Mutants of white-rot fungus *Sporotrichum pulverulentum* with increased cellulase and B-D-glucosidase production. *Enzyme and Microbial Technology*, Guildford, 5: 425 - 9, 1983.
- FANELLI, C. & CERVONE, F. Polygalacturonase and cellulase production by *Trichoderma koningii* and *Trichoderma pseudokoningii*. *Transactions of British Mycological Society*, London, 68 (2): 291 - 4, 1977.
- FARKAS, V. The Fungal Cell Wall. In: PEBERDY, J. E. & FERENCZY, L. *Fungal Protoplasts*, vol. 6, New York, Basel, Marcel Dekker, Inc., 1985. p. 3 - 30.
- FERENCZY, L.; KEVEI, F.; SZEGEDI, M. Increased fusion frequency of *Aspergillus nidulans* protoplasts. *Experientia*, New York, 31 (1): 50 - 2, 1975.
- FERENCZY, L.; SZEGEDI, M.; KEVEI, F. Interspecific protoplast fusion and complementation in *Aspergilli*. *Experientia*, New York, 33 (2): 184 - 6, 1977.
- FERREIRA FILHO, E. X. & FELIX, C. R. Characterization of partially purified extracellular and cell-associated forms of beta-glucosidase of the cellulolytic fungus *Humicola* sp. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba, 30: 120, 1987.

- FERREIRA FILHO, E. X. & FELIX, C. R. Isolation and characterization of the intracellular and extracellular forms of beta-glucosidase of *Humicola nigricans*. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba, 29: 46, 1986.
- FREIRE, J. R. J. *Microbiologia do Solo*. Porto Alegre, Faculdade de Agronomia (UFRGS), 1975. p. 104 - 10.
- FUNGARO, M. H. P. Isolamento, regeneração e fusão de protoplastos em plantas superiores e fungos filamentosos. Piracicaba, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP, 1987. 103 p.
- FURLANETTO, M. C. Recombinação genética e produção de celulases em *Trichoderma pseudokoningii* var. Rifai. Piracicaba, 1989. 151 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- GARCIA ACHA, I. & VILLANUEVA, J.R. Differences in the mode of action of strepzyme and *Helix pomatia* enzyme preparations on *Trichotecium roseum* spores. *Nature*, London, 200: 1231, 1963.
- GARCIA ACHA, I. & VILLANUEVA, J. R. Protoplasts from conidia of *Fusarium culmorum*. *Canadian Journal of Microbiology*, Ottawa, 10: 99 - 101, 1964.
- GHOSE, T. K. & GHOSH, P. Cellulase production and cellulose hydrolysis. *Process Biochemistry*, London, 14: 20 - 4, 1979.
- GOKSOYR, J. & ERIKSEN, J. Cellulase. In: ROSE, A. H., ed. *Microbial Enzymes and Bioconversions*, vol. 5, London, Academic Press, 1980. p. 283 - 330.

- GOLDMAN, G. H. Estudos genéticos e produção de celulases em *Aspergillus niger*. Piracicaba, 1988. 153 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- GOLDMAN, G. H. & AZEVEDO, J. L. Melhoramento genético de microrganismos produtores de celulase. *Ciência e Cultura*, São Paulo, 41 (3): 229 - 40, 1989.
- GONG, C. S. & TSAO, C. T. Cellulase and biosynthesis regulation. In: PERLMAN, D., ed. *Annual Reports on Fermentation processes*. London, Academic Press, 1979, vol. 3, p. 111 - 40.
- GRIFFIN, D. H. *Fungal Physiology*. New York, Toronto, Singapore, John Wiley & Sons, 1981. 383 p.
- GUM, E. K. & BROWN, R. D. Comparison of four purified extracellular 1, 4- β -D-glucan cellobiohydrolase enzymes from *Trichoderma viride*. *Biochemistry Biophysics Acta*, Amsterdam, 492: 225 - 31, 1977.
- HAMLYN, P. F.; BRADSHAW, R. E.; MELLOW, F. M.; SANTIAGO, C. M.; WILSON, J. M.; PEBERDY, J. F. Efficient protoplast isolation from fungi using commercial enzymes. *Enzyme and Microbial Technology*, Guildford, 3: 321 - 5, 1981.
- HARGER, C. C.; PASSOS, J. B.; SILVA, D. O. Is the constitutive intracellular β -D-glucosidase of *Humicola sp* responsible for glycosylation? *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba, 29: 47, 1986.
- HAYASHIDA, S. & MO, K. Production and characteristics of avicel-desintegrating endoglucanase from a protease-negative *Humicola grisea* var. *thermoidea* mutant. *Applied Environmental Microbiology*, Washington, 51 (5):

1041 - 6, 1986.

HAYASHIDA, S. & YOSHIOKA, H. Production and purification of thermostable cellulases from *Humicola insolens* YH - 8. *Agriculture Biological Chemistry*, Tokyo, 44: 1721 - 8, 1980 a.

HAYASHIDA, S. & YOSHIOKA, H. The role of carbohydrate moiety on thermostability of cellulases from *Humicola insolens* YH - 8. *Agriculture Biological Chemistry*, Tokyo, 44: 481 - 7, 1980 b.

HOPWOOD, D. A. & WRIGHT, H. M. Protoplast fusion in *Streptomyces*: Fusions involving ultraviolet irradiated protoplasts. *Journal of General Microbiology*, London, 126 (1): 21 - 7, 1981.

JAIN, M. K.; KAPOOR, K. K.; MISHRA, M. M. Cellulase activity, degradation of cellulose and lignin and humus formation of thermophilic fungi. *Transactions of British Mycological Society*, London, 73: 85 - 9, 1979.

JINKS, J. L.; CATEN, C. E.; SIMCHEN, G.; CROFT, J. H. Heterokaryon incompatibility and variation in wild populations of *Aspergillus nidulans*. *Heredity*, London, 21: 227 - 39, 1966.

KAO, K. N. & MICHAYLUKE, M. R. A method for high-frequency intergeneric fusion of plant protoplasts. *Planta*, Berlin, 115: 355 - 67, 1974.

KATENKAMP, U.; JACOB, H. E.; KERNS, G.; DALCHOW, E. Hybridization of *Trichoderma reesei* protoplasts by electrofusion. *Biological Abstracts*, Philadelphia, 89 (1): 3369, 1989.

- KNOWLES, J.; LEHTOVAARA, P.; TEERI, T. Cellulase families and their genes. *Trends in Biotechnology*, Amsterdam, 5: 255 - 61, 1987.
- KEVEI, F. & PEBERDY, J. F. Interspecific hybridization between *Aspergillus nidulans* and *Aspergillus rugulosus* by fusion of somatic protoplasts. *Journal of General Microbiology*, London, 102: 255 - 62, 1977.
- KEVEI, F. & PEBERDY, J. F. Induced segregation in interspecific hybrids of *Aspergillus nidulans* and *Aspergillus rugulosus* obtained by protoplast fusion. *Molecular General Genetics*, Berlin, 170: 213 - 18, 1979.
- LASKIN, A. I. & LECHEVALIER, H. A. *Handbook of Microbiology* vol II, 2^a ed., Flórida, CRC Press, 1978. 874 p.
- LEE, Y. H. & FAN, L. T. Properties and mode of action of cellulase. *Advances in Biochemical Engineering*, Berlin, 18: 101 - 29, 1980.
- LEPIDI, A. A.; NUTI, M. P.; De BERTOLDI, M.; SANTULLI, M. Classification of the genus *Humicola* Traaen: II. The DNA base composition of some strains within the genus. *Mycopathologia et Mycologia Applicata*, Den Haag, 47: 153 - 9, 1972.
- LONG, D. E. Simplex optimization of the response from chemical systems. *Analytical Chemical Acta*, Berlin, 49: 193 - 206, 1969.
- LOWRY, O. H.; ROSEN BROUGH, N. J.; FARR, A. L.; RANDALL, R. J. Protein measurements with the folin phenol reagent. *Journal of Biological Chemistry*, Baltimore, 193: 265 - 75, 1951.

- MACEDO, J. M. B. Avaliação do comportamento de *Humicola* sp com vistas ao melhoramento genético para a produção de celulases. Rio de Janeiro, 1986. 90 p. (Mestrado - Universidade Federal do Rio de Janeiro).
- MACRIS, B. J. Enhanced cellulase and β -glucosidase production by a mutant of *Alternaria alternata*. *Biotechnology Bioengineering*, New York, 26: 194 - 6, 1984.
- MANCZINGER, L. & FERENCZY, L. Somatic cell fusion of *Trichoderma reesei* resulting in new genetic combinations. *Applied Microbiology and Biotechnology*, Berlin, 22: 72 - 6, 1985.
- MANDELS, M. Microbial sources of cellulase. *Biotechnology Bioengineering*, New York, 5: 81 - 105, 1975.
- MANDELS, M.; FARRISH, F. W.; REESE, E. T. Sophorose as an inducer of cellulase in *Trichoderma viride*. *Journal of Bacteriology*, Baltimore, 83: 400 - 8, 1962.
- MANDELS, M. & REESE, E. T. Induction of cellulase in fungi by cellobiose. *Journal of Bacteriology*, Baltimore, 79: 816 - 26, 1960.
- MANDELS, M.; WEBER, I.; PARIZER, R. Enhanced cellulase production by a mutant of *Trichoderma viride*. *Applied Microbiology*, Baltimore, 21: 152 - 4, 1971.
- MENEZES, T. J. B. Genética e outros aspectos na produção de enzimas por microrganismos para fins energéticos. In: AZEVEDO, J. L. *Genética de Microrganismos em Biotecnologia e Engenharia Genética*. Piracicaba, Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", 1985. p. 155 - 60.

- MERIVUORI, H.; SIEGLER, K. M.; SANDS, J. A.; MONTENECOURT, B. S. Regulation of cellulase biosynthesis and secretion in fungi. *Biochemical Society Transactions*, Essex, 13: 411 - 4, 1985.
- MONTENECOURT, B. S. & EVELEIGH, D. E. Preparation of mutants of *T. reesei* with enhanced cellulose production. *Applied and Environmental Microbiology*, Baltimore, 34: 777 - 82, 1977 b.
- MONTENECOURT, B. S. & EVELEIGH, D. E. Semiquantitative plate assay for determination of cellulase production by *T. viride*. *Applied and Environmental Microbiology*, Baltimore, 33: 178 - 83, 1977 a.
- MONTENECOURT, B. S. & EVELEIGH, D. E. Hypercellulolytic mutants and their role in saccharification. In: SHUSTER, W., ed. *Second Annual Fuels from Biomass*. New York, Academic Press, 1978. p. 613 - 25.
- MONTENECOURT, B. S.; SCHAMHART, D. H. J.; EVELEIGH, D. E. Mechanisms controlling the synthesis of the *Trichoderma reesei* cellulase system. In: BERKELEY, E. C. W.; GOODAY, G. W.; ELLWOOD, D. C., eds. *Microbial Polysaccharides and Polysaccharases*. New York, Academic Press, 1979. p. 327 - 37.
- MONTI, R. & JORGE, J. A. Cellulase production in *Humicola* sp. R. P. 17. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba 29: 42, 1986.
- MOORE, P. M. & PEBERDY, J. F. Release and regeneration of protoplast from the conidia of *Aspergillus flavus*. *Transactions of British Mycological Society*, London, 66: 421 - 5, 1976.

- MORAES, M. L. T.; PRADE, R. A.; TERENCEI, H. F. Characterization of the β -glucosidase system of the cellulolytic fungus *Humicola* sp. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba, 28: 57, 1985.
- MURKOVIC, M.; STEINER, W.; ESTERBAUER, H. Electrofusão of *T. reesei* protoplasts. *Letters in Applied Microbiology*, Oxford, 5: 107 - 9, 1987.
- NAKAYAMA, M.; TOMITA, Y.; SUZUKI, H.; NISIZAWA, K. Partial proteolysis of some cellulase components from *Trichoderma viride* and substrate specificity of the modified products *Journal of Biochemistry*, Tokyo, 79: 955 - 66, 1976.
- NECAS, O. Cell wall synthesis in yeast protoplasts. *Bacteriological Reviews*, Baltimore, 35: 149 - 70, 1971.
- NECAS, O. & SVOBODA, A. Cell wall regeneration and protoplast reversion. In: PEBERDY, J. F. & FERENCZY, L. *Fungal Protoplasts*, vol. 6. New York, Basel, Marcel Dekker, 1985 p. 115 - 33.
- NEIROTTI ROUMAS, E. Aspectos genéticos da produção de celulasas. Piracicaba, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP, 1985. 68 p.
- NEIROTTI ROUMAS, E. Produção de celulasas e fusão de protoplastos em *Humicola* sp. Piracicaba, 1988. 168 p. (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).
- NEVALAINEN, K. M. H. Genetic improvement of enzyme production in industrially important fungal strains. Helsinki, 1985. 243 p. (Doutoramento - University of Helsinki).

- NEVALAINEN, K. M. H. & PALVA, E. T. Production of extra-cellular enzyme in mutants isolated from *T. viride* unable of hydrolize cellulose. *Applied and Environmental Microbiology*, Baltimore, 35: 11 - 6, 1978.
- OGAWA, K.; OHARA, H.; KOIDE, T.; TOYAMA, N. Intraspecific hybridization of *Trichoderma reesei* by protoplast fusion. *Journal of Fermentation and Bioengineering*, Osaka, 67: 207 - 9, 1989.
- OGUNDERO, V. W. Amylase and cellulase activities of thermophilic fungi causing deterioration of tobacco products in Nigeria. *Mycopathologia*, Den Haag, 69: 131 - 6, 1979.
- OKADA, Y.; OHNO - SHOSAKU, T.; OIKI, S. Ca^{2+} is prerequisite for cell fusion induced by electric pulses. *Biomedical Research*, Bethesda, 5 (6): 511 - 6, 1984.
- ONIONS, A. H. S.; ALLSOPP, D.; EGGINS, H. O. W. *Smith's Introduction to Industrial Mycology*, 7^a ed., London, Edward Arnold, 1981. 398 p.
- PEBERDY, J. F. Fungal protoplasts: Isolation, reversion and fusion. *Annual Review of Microbiology*, Palo Alto, 33: 21 - 39, 1979.
- PEBERDY, J. F. & FERENCZY, L. *Fungal Protoplasts; applications in biochemistry and genetics*. New York, Basel, Marcel Dekker Inc., 1985. 354 p.
- PICATAGGIO, S. K.; SCHAMHART, D. H. J.; MONTENECOURT, B. S.; EVELEIGH, D. E. Sphaeroplast formation and regeneration in *Trichoderma reesei*. *European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology*, Berlin, 17: 121 - 8, 1983.

- POHL, H. A. *Dielectrophoresis*. Cambridge, Cambridge University Press, 1978. 252 p.
- POLIZELI, M. L. T. M. & TERENCEI, H. F. Study of the β -glucosidase activity of the fungus *Humicola* sp. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*, Curitiba, 29: 44, 1986.
- PONTECORVO, G.; ROPER, J. A.; HEMMONS, L. M.; McDONALD, K. F.; BUFTON, A. W. J. The genetics of *Aspergillus nidulans* *Advances in Genetics*, New York, 5: 141 - 8, 1953.
- PROVOST, A.; BOURGUIGNON, C.; FOURNIER, P.; RIBET, A. M.; HESLOT, H. Intergeneric hybridization in yeasts through protoplast fusion. *FEMS Microbiological Letters*, Amsterdam, 3: 309 - 12, 1978.
- POURQUIE, J. & VANDECASTEELE, J. P. Conversão de compostos lignocelulósicos por hidrólise enzimática e fermentação acetona - butanol. In: SCRIBAN, R. *Biotecnologia*. São Paulo, Editora Manole Ltda, 1985. p. 427 - 40.
- RAWITCHER, F. *Elementos Básicos de Botânica*. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1979. 382 p.
- REESE, E. T.; SIU, R. G. H.; LEVINSON, H. S. The biological degradation of soluble cellulose derivatives and its relationship to the mechanism of cellulose hydrolysis. *Journal of Bacteriology*, Baltimore, 59: 485 - 97, 1950.
- RIFAI, M. A. A revision of the genus *Trichoderma*. *Mycological Papers*, Oxon, 116: 1 - 56, 1969.
- RODRIGUES, E. C. Caracterização citogenética e bioquímica do fungo celulolítico *Humicola* sp. Piracicaba, 1987. 152 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de

Queiroz" / USP).

- ROSS, A.; SCHUGERL, K.; SCHEIDING, W. Cellulase production by *Trichoderma reesei*. *Environmental Journal of Applied Microbiological Biotechnology*, Berlin, 18 (1): 29 - 37, 1983.
- RYU, D. D. Y. & MANDELS, M. Cellulases: biosynthesis and applications. *Enzyme and Microbial Technology*, Guildford, 2: 91 - 102, 1980.
- SAXENA, R. K. & SINHA, U. Metabolic status of temperature induced swollen conidia of *Aspergillus nidulans*. *Experientia*, New York, 34: 43, 1978.
- SCHNETTLER, R. & ZIMMERMANN, U. Influence of the composition of the fusion medium on the yield of electrofused yeast hybrids. *FEMS Microbiological Letters*, Amsterdam, 27: 195 - 8, 1985.
- SELBY, K. *Biodeterioration of Materials*. Amsterdam, London, New York, Elsevier Publishing Company Ltda, 1968. 1856 p.
- SENDA, M.; TAKEDA, I.; ABE, S.; NAKAMURA, T. Induction of cell fusion of plant protoplasts by electrical stimulation. *Plant Cell Physiology*, Tokyo, 20: 1441 - 3, 1979.
- SHOEMAKER, S. ; RAYMOND, J. C.; BRUNER, R. Cellulase: diversity amongst improved *Trichoderma* strains. In: HOLLAENDER A. R.; RABSON, R.; ROGERS, P.; SANPIETRO, A.; VALENTINE, R.; WOLFE, R., eds. *Trends in the biology of fermentations for fuels and chemicals*, Plenum Publishing Company, 1981. p. 89 - 109.
- SHOEMAKER, S.; SCHWEIKART, V.; LADNER, M.; GELFAND, D.;

- KWOX, S.; MYAMBO, K.; INNIS, M. Molecular cloning of exocellobiohydrolase from *Trichoderma reesei* strain L 27. *Biotechnology*, New York, 1: 691 - 6, 1983.
- SIESTMA, J. H. & BOER, W. R. Formation and regeneration of protoplasts from *Pythium* PRL 2142. *Journal of General Microbiology*, London, 74: 211 - 7, 1973.
- SIU, R. G. H. *Microbial Decomposition of Cellulose*. New York, Reinhold, 1951. 386 p.
- TANSEY, M. R. Agar - diffusion assay cellulolytic ability of thermophilic fungi. *Archives of Microbiology*, Berlin, 77: 1 - 11, 1971.
- TOYAMA, H.; YOKOYAMA, T.; SHINMYO, A.; OKADA, H. Interespecific protoplast fusion of *Trichoderma*. *Journal of Biotechnology*, Amsterdam, 1: 25 - 35, 1984.
- TSAO, G. T.; LADISCH, M.; LADISCH, C.; HSU, T. A.; DALE, B.; CHOU, T. Fermentation substrates from cellulosic materials. Production of fermentable sugars from cellulosic materials. In: PERLMAN, D. *Annual Reports on Fermentation Processes*, vol. 2, Academic Press, 1978. p. 1 - 22.
- VIALTA, A. & BONATELLI JR., R. Parasexual analysis of *Aspergillus awamori* by using intraspecific diploids and interspecific hybrids with *A. niger*. *Revista Brasileira de Genética*, São Paulo, 13 (3): 445 - 58, 1990.
- VICENTE, V. A. Isolamento e seleção de fungos lignocelulósicos. Piracicaba, 1989. 173 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- VIEIRA, E. C.; GAZZINELI, G.; MARES-GUIA, M. *Bioquímica*

- Celular*. Rio de Janeiro, São Paulo, Livraria Atheneu, 1979. 339 p.
- WARWAR, V. Parassexualidade e eletrofusão em *Aspergillus niger*. Piracicaba, 1990. 134 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).
- WEBER, H.; FORSTER, W.; BERG, H.; JACOB, H. E. Parasexual hybridization of yeasts by electric field stimulated fusion of protoplasts. *Current Genetics*, New York, 4: 165 - 6, 1981.
- WHITE, W. L. & DOWNING, M. H. *Humicola grisea*, a soil-inhabiting cellulolytic Hyphomycete. *Mycologia*, Lancaster, 45: 951 - 63, 1953.
- WOOD, T. M.; McCRAE, S. I.; MACFARLANE, C. C. The isolation purification and properties of the cellobiohydrolase component of *Penicillium funiculosum* cellulase. *Biochemical Journal*, Cambridge, 189: 51 - 65, 1980.
- YOSHIOKA, H.; ANRAKU, S. I.; HAYASHIDA, S. Production and purification of a novel type of CMCase from *Humicola grisea* var. *thermoidea* YH-78. *Agriculture and Biological Chemistry*, Tokyo, 46 (1): 75 - 82, 1982.
- YOSHIOKA, H. & HAYASHIDA, S. Purification and properties of beta-glucosidase from *Humicola insolens* YH-8. *Agriculture and Biological Chemistry*, Tokyo, 44: 1729 - 35, 1980.
- ZALDIVAR, M.; STEINER, J.; MUSALEM, M.; CONTRERAS, I. Aislamiento de un mutante de *Trichoderma pseudokoningii* hiperprodutor de celulasas. *Microbiologia*, Santiago, 3: 33 - 44, 1987.

ZIMMERMANN, U. Electric field - mediated fusion and related electrical phenomena. *Biochemical Biophysics Acta*, Amsterdam, 694: 227 -77, 1982.

ZIMMERMANN, U. & SCHEURICH, P. High frequency fusion of plant protoplasts by electric fields. *Planta*, Berlin, 151: 26 - 32, 1981.

ZIMMERMANN, U. & VIENKEN, I. Electric field - induced cell-to-cell fusion. *Journal of Membrane Biology*, New York, 67: 165 - 82, 1982.