REAÇÃO DE *Lactuca* sp. AO *Sclerotinia minor* JAGGER
E HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA NO GÊNERO *Lactuca*

INGRID BERGMAN INCHAUSTI DE BARROS
Engenheiro Agrônomo

Orientador: Prof. Dr. CYRO PAULINO DA COSTA

Tese apresentada à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Doutor em Agronomia - Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas.

PIRACICABA
Estado de São Paulo - Brasil
Julho de 1988

B277r

Barros, Ingrid Bergman Inchausti de
Reação de Lactuca sp. ao Sclerotinia minor
Jagger e hibridação interespecífica no gênero
Lactuca. Piracicaba, 1988.
167p. illus.

Tese - ESALQ
Bibliografia

1. Alface - Hibridação. 2. Alface - Melhora-
mento. 3. Alface - Resistência à doença. 4. Fun-
go fitopatogênico. 5. Hibridação em alface.
I. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei-
rós", Piracicaba.

CDD 635.52

REAÇÃO DE *Lactuca* sp. ao *Sclerotinia minor* JAGGER E
HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA NO GÊNERO *Lactuca*

INGRID BERGMAN INCHAUSTI DE BARROS

Aprovada em: 22.09.1988

Comissão Julgadora:

Dr. Hiroshi Nagai	IAC
Dr. Norberto da Silva	FCA/UNESP
Dr. Otto Jesu Crocomo	ESALQ/USP
Dr. Akihiko Ando	ESALQ/USP

Prof. Dr. Cyro Paulino da Costa
-Orientador-

Aos queridos FRANCISCO, NEIVA, JUAREZ, ZAIRA,
JACEGUÃY, ELISABETE, HOSANA e LEONARDO, mi-
nha valorosa retaguarda,

OFEREÇO.

Ao querido VALCIR, pela cumplicidade em
sonhar com a realização deste trabalho,

DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Às seguintes Instituições, pela oportunidade do curso e facilidades concedidas na execução do trabalho de tese:

Faculdade de Agronomia/UFRGS
Departamento de Genética/ESALQ-USP
Seção de Radiogenética/CENA-USP
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-PICD)

Ao apoio, colaboração, incentivo e amizade de:

Dr. Cyro Paulino da Costa
Dr. Akihiko Ando
Dr.^a Margarida L.R. de Aguiar-Perecin
Dr.^a Maria Lúcia Carneiro Vieira
Dr. Itamar Soares de Melo
Dr. Satoru Yokoyama
Eng.^a Agr.^a Arlete Benedetti Marchi
Eng.^o Agr.^o José Luís Susumu Sasaki
Eng.^a Agr.^a Maria Bernadete Silvarola
Dr.^a Maria Suely Pagliarini
Alcides Martins
João Araújo
Alaor de Oliveira
Benedita Inês P. Rodrigues
Terezinha J.L. Barrete

A todos que de alguma maneira contribuíram para a realização deste trabalho.

A Autora.

ÍNDICE

	Página
RESUMO	x
SUMMARY	xiii
1. INTRODUÇÃO	01
2. REVISÃO DE LITERATURA	04
2.1. Agentes causais da podridão de esclerotinia em alface	04
2.2. Resistência de podridão de esclerotinia em alfa ce	10
2.3. Hibridação interespecífica em alface	13
2.3.1. <i>L. sativa</i> x <i>L. serriola</i>	15
2.3.2. <i>L. sativa</i> x <i>L. virosa</i>	18
2.3.3. <i>L. serriola</i> x <i>L. virosa</i>	21
2.3.4. Transferência de genes de <i>L. virosa</i> para <i>L. sativa</i>	23
2.4. Técnicas para superar as barreiras interes- pecíficas	26
2.4.1. Cruzamento ponte	26
2.4.2. Anfidiplóides	27
2.4.3. Cultura 'in vitro' de embrião	28
3. MATERIAL E MÉTODOS	31
3.1. Local de investigação	31
3.2. Germoplasma de <i>Lactuca</i>	31
3.2.1. Obtenção de mudas	31
3.3. Isolados de <i>Sclerotinia minor</i>	33
3.3.1. Isolamento do patógeno	34
3.3.2. Identificação do patógeno	34

3.4. Reação de <i>Lactuca</i> sp. o <i>S. minor</i>	36
3.4.1. Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> , sob cultivos em vasos, em solo artifici- almente infestado com <i>S. minor</i> . Ex- perimento I	37
3.4.2. Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> , sob cultivo em área artificialmente ino- culada com <i>S. minor</i> . Avaliação úni- ca aos 64 dias após a inoculação. Ex- perimento II	39
3.4.3. Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> , sob cultivo em área artificialmente ino- culada com <i>S. minor</i> . Avaliações pe- riódicas semanais até 56 dias após a inoculação. Experimento III	40
3.4.4. Reação do híbrido F_1 do cruzamen- to <i>L. sativa</i> cv. Maioha x <i>L. virosa</i> PI 271938 e dos parentais em experi- mento com folhas destacadas. Expe- rimento IV	42
3.5. Hibridação interespecífica em <i>Lactuca</i>	44
3.5.1. Obtenção do híbrido F_1 do cruzamen- to <i>L. sativa</i> x <i>L. virosa</i>	47
3.5.2. Cruzamento ponte entre <i>L. sativa</i> , <i>L.</i> <i>serriola</i> x <i>L. virosa</i>	47
3.5.3. Obtenção da geração F_2 de <i>L. sativa</i> x <i>L. virosa</i> através da poliploidiza- ção do F_1	49
3.5.4. Obtenção da geração F_1RC_1 do cruza- mento (<i>L. sativa</i> x <i>L. virosa</i>) x <i>L.</i> <i>sativa</i>	50
3.6. Cultura 'in vitro' de embriões	51
3.6.1. Cultura de embriões híbridos em di- ferentes meios de cultura	52

3.6.2. Cultura de embriões híbridos do cruzamento <i>L. sativa</i> cv. Maioba x <i>L. virosa</i> PI 271938, em diferentes estádios de desenvolvimento	55
3.7. Caracterização citogenética de híbrido interespecífico de <i>Lactuca</i>	56
3.7.1. Análise biométrica de metáfases mitóticas	56
3.7.2. Análise meiótica de <i>L. sativa</i> cv. Maioba, <i>L. virosa</i> PI 271938 e do híbrido F ₁ interespecífico	58
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	59
4.1. Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> ao <i>S. minor</i>	59
4.1.1. Ocorrência dos patógenos causadores da podridão de esclerotínia em alface .	59
4.1.2. Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> , sob cultivo em vasos, em solo artificialmente infestado com <i>S. minor</i> . Experimento I	61
4.1.3. Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> sob cultivo em solo artificialmente inoculado com <i>S. minor</i> . Avaliação única aos 64 dias após a inoculação. Experimento II	67
4.1.4 Reação de germoplasma de <i>Lactuca</i> ao <i>S. minor</i> , sob cultivo em área artificialmente inoculada. Experimento III.	71
4.1.4.1. Percentagem de plantas mortas (PM)	71
4.1.4.2. Índice de resistência (IR).	74

4.1.5. Reação do híbrido F_1 (<i>L. sativa</i> cv. Maioba x <i>L. vírosa</i> PI 271938) e dos parentais em experimentos com folhas destacadas. Experimento IV....	78
4.2. Hibridação interespecífica em <i>Lactuca</i>	84
4.2.1. Obtenção de híbridos F_1 do cruzamento <i>L. sativa</i> x <i>L. vírosa</i>	84
4.2.2. Retrocruzamento (<i>L. sativa</i> x <i>L. vírosa</i>) x <i>L. sativa</i>	94
4.2.3. Cruzamento ponte entre <i>L. sativa</i> , <i>L. serriola</i> e <i>L. vírosa</i>	95
4.2.3.1. Obtenção de híbridos F_1 (<i>L. sativa</i> x <i>L. serriola</i>)..	95
4.2.3.2. Obtenção de híbridos F_1 (<i>L. serriola</i> x <i>L. vírosa</i>)	
4.2.3.3. Cruzamento ponte (<i>L. sativa</i> x <i>L. serriola</i>) x <i>L. vírosa</i>	100
4.2.4. Tentativas de obtenção do F_2 (<i>L. sativa</i> x <i>L. vírosa</i>) através da poliploidização	103
4.3. Cultura de embriões 'in vitro'	109
4.3.1. Comportamento de híbridos interespecíficos de <i>Lactuca</i> em diferentes meios de cultura	109
4.3.1.1. Meio de cultura L_1	109
4.3.1.2. Eficiência e comparação dos meios L_1 e L_2	111
4.3.1.3. Meio de cultura T_0	118
4.3.2. Comportamento de híbridos interespecíficos de <i>Lactuca</i> em diferentes estádios de desenvolvimento	120
4.4. Caracterização citogenética do híbrido <i>L. sativa</i> x <i>L. vírosa</i>	126

4.4.1. Análise biométrica de metáfases mitóticas	127
4.4.2. Tentativa de análise meiótica comparativa entre os parentais e o híbrido interespecífico	134
4.5. Inviabilidade e esterilidade de híbridos interespecíficos de <i>Lactuca</i>	138
4.5.1. Inviabilidade e fraqueza do embrião.	141
4.5.2. Esterilidade do híbrido interespecífico	147
5. CONCLUSÕES	151
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	153
APÊNDICE	164

REAÇÃO DE *Lactuca* sp. AO *Sclerotinia minor* Jagger
E HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA NO GÊNERO *Lactuca*

Autora: Ingrid Bergman Inchausti de Barros
Orientador: Prof. Dr. Cyro Paulino da Costa

RESUMO

Sclerotinia minor é um patôgeno do solo que causa a podridão de esclerotinia em alface. Esta é considerada uma das doenças mais limitantes na produção desta hortaliça por ser de difícil controle.

Neste trabalho, numa primeira etapa, procurou-se identificar fontes de resistência e avaliar a reação de espécies selvagens de *Lactuca* e cultivares de *L. sativa* ao *S. minor*. Numa segunda etapa procurou-se fazer hibridações interespecíficas e posterior obtenção de população segregante para seleção, visando resistência ao *S. minor*.

O material utilizado nestas investigações consistiu de 18 introduções de espécies tais como *L. aculeata*, *L. quercina*, *L. dregeana*, *L. virosa*, *L. augustana*, *L. saligna*, *L. altaica*, *L. serriola* e *L. sativa* (tipo selvagem) e cerca de 22 cultivares de alface (*L. sativa*). A avaliação da reação de resistência foi feita através da inoculação artificial das plantas com esclerócios de *S. minor* e expressa em porcentagem de área foliar atacada, de plantas mortas e índice de resistência.

A introdução PI 271938 (*L. virosa*) foi a mais resistente e mostrou-se a mais promissora fonte de resistência ao *S. minor*. Várias introduções das outras espécies e os cultivares Celtuce, Valmaine e Gallega apresentaram resistência de campo, do tipo tolerância ao patógeno, relacionada a arquitetura foliar erecta. Os cultivares de alface dos grupos Great Lakes e Manteiga foram altamente suscetíveis ao *S. minor*.

Foram feitos cruzamentos entre *L. sativa* e o F_1 (*L. sativa* x *L. serriola*) com *L. virosa*, como o progenitor polinizador. A compatibilidade dos cruzamentos foi avaliada pelo número de sementes por capítulo e de plantas híbridas obtidas na cultura de embrião. Os cruzamentos apresentaram fortes barreiras interespecíficas como inviabilidade dos embriões e esterilidade, devidas a interações incompatíveis de fatores de natureza gênica e polimorfismo cromossômico. O grau de compatibilidade foi variável em função da congruência entre os genótipos parentais.

As sementes híbridas foram rudimentares, com embriões imaturos, porém plantas híbridas de *Lactuca* spp com *L. virosa* foram recuperadas pela cultura 'in vitro' de embriões. O estágio ideal dos embriões para serem implantados no meio de cultura é com oito dias após a polinização.

A esterilidade masculina dos híbridos foi determinada pela observação da morfologia das anteras e a do lado feminino, pelo número de sementes obtidas através do retrocruzamento unidirecional para *L. sativa* ou *L. serriola*. No

híbrido interespecífico a esterilidade masculina foi total mas a feminina foi parcial, permitindo a obtenção de sementes através do retrocruzamento com *L. sativa* ou *L. serriola*.

A tentativa de usar *L. serriola* como espécie ponte entre *L. sativa* e *L. virosa* não foi viável.

Lactuca sp REACTION TO *Sclerotinia minor* Jagger
AND INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION IN THE *Lactuca* GENUS

Author: Ingrid Bergman Inchausti de Barros
Adviser: Prof. Dr. Cyro Paulino da Costa

SUMMARY

Sclerotinia minor is a soil born pathogen which cause the lettuce drop disease. It is considered one the most limiting and difficult disease to control. In this paper at first step the aim was to identify resistance source and evaluate the reaction of wild *Lactuca* species and commercial lettuce cultivars to *S. minor*. At the second step, the aim was to make interspecific hybridization and further selection of segregant population for disease resistance. The material used in this research was 18 species introductions such as, *L. aculeata*, *L. quercina*, *L. drageana*, *L. virosa*, *L. augusta* na, *L. saligna*, *L. altaica*, *L. serriola* and *L. sativa* (wild type) and about 22 lettuce cultivars (*L. sativa*). The resistance reaction evaluation was made through the artificial inoculation of plants with *S. minor* sclerotia and expressed by dead plant percentage, resistance index and foliar area infected percentage. The PI 271938 introduction (*L. virosa*) was the most resistant and showed one the most reliable and

promising resistance source in the *Lactuca* genus to *S. minor*. Several introductions of other species plus Celtuce, Valmaine and Gallega lettuce cultivars, showed field resistance with tolerance to the pathogen and related to the erect foliar architecture. The Great Lakes and the Butter-Head lettuce group cultivars were highly susceptible to *S. minor*. It was made crossing between *L. sativa* and the F1 *L. sativa* x *L. serriola* with *L. virosa* as a pollinator parent. The cross compatibility was analyzed by the seed number per inflorescence and number of hybrid plant obtained from embryo culture. The hybrids showed strong interspecific barriers such as embryo inviability and sterility due to the incompatible interactions of genic and chromosomal polymorphism factors. The compatibility degree was variable in function of congruency among parental genotypes. The hybrid seeds were rudimentary with immature embryo but the hybrid plants of *Lactuca* spp with *L. virosa* were rescued by 'in vitro' embryo culture. The ideal embryo stage to be inoculated in the culture media is about 8 days after the pollination. The male sterility of hybrid was determined by anther morphology observation and the female side by the seed number obtained from the unilateral backcrossing to *L. sativa* or *L. serriola*. The interspecific hybrid male sterility is total but the female one is partial because it allowed to set seeds when the F1 was backcrossed to either *L. sativa* or *L. serriola*. The attempt to use *L. serriola* as a bridge species among *L. sativa* and *L. virosa* was not helpful.

1. INTRODUÇÃO

A produção de alface é uma atividade altamente especializada onde vários cultivos se sucedem de maneira contínua numa mesma área. No Estado de São Paulo a alfaccultura tem grande expressão em Mogi das Cruzes por ser uma região que oferece condições muito propícias como o microclima de altitude e os solos turfosos. A falta de rotação da cultura de alface na mesma área tem aumentado os problemas fitossanitários. Verificou-se nos últimos anos um aumento alarmante das perdas na pré e pós-colheita, causadas pela doença conhecida como a podridão de esclerotínia.

Esta doença é causada por fungos do solo, do gênero *Sclerotinia*, e há relatos de que ela também tem sido muito problemática em cultivos de alface nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e em vários países da Europa. Nestes locais, bem como em Mogi das Cruzes, a espécie fitopatogênica predominante tem sido *Sclerotinia minor*.

S. minor é um fungo polífago, patogênico a mais de 200 hospedeiros e que produz esclerócios, estruturas de resistência que permitem sua sobrevivência por vários anos, e que se constituem em inóculo primário no solo.

As recomendações para o controle de *S. minor* quase sempre são economicamente inviáveis na sua aplicação, como a inundação das áreas infestadas por quarenta dias ou a rotação cultural contínua com outras espécies imunes, como o milho.

O controle químico também não tem se mostrado eficiente. Como é um controle preventivo para proteger a cultura são necessárias várias aplicações localizadas na superfície do solo, junto à base das plantas, mas o hábito de crescimento da alface impede uma aplicação protetora adequada. Por outro lado, a eficiência dos fungicidas 'per se' é parcial. Eles reduzem a germinação dos esclerócios e o crescimento micelial, mas não diminuem o potencial de inóculo existente. Em adição a isto, há relatos de ocorrência de formas resistentes do patógeno aos fungicidas mais frequentemente utilizados como o benomyl.

Verifica-se desse modo a urgente necessidade de se procurar formas alternativas de controle a *S. minor*. Os trabalhos na área de controle biológico são ainda muito incipientes no controle de doenças causadas por fungos do solo, como *S. minor*. A alternativa ideal seria o uso de resistência genética mas desconhece-se cultivares de alface resistentes a este patógeno. A introgressão de genes para resistência à patógenos e pragas vem ganhando uma destacada importância nos programas de melhoramento. Através de hibridação interespecífica é possível transferir resistência de espécies selvagens para as domesticadas.

A alface cultivada, *Lactuca sativa*, possui quatro espécies relacionadas: *L. serriola*, *L. altaica*, *L. saligna* e *L. virosa*. Seu cruzamento com elas é possível embora apresentando diferentes graus de dificuldade devido a barreiras interespecíficas. O potencial destas espécies selvagens relacionadas à alface tem sido muito pouco explorado no seu melhoramento. Existem referências de resultados promissores com a identificação e transferência de genes de resistência a pragas e patógenos, específica de espécies selvagens de *Lactuca* para a espécie domesticada.

Quanto à reação de espécies de *Lactuca* ao *S. minor*, o trabalho de ABAWI *et alii* (1980) evidenciou que algumas introduções de *L. virosa* parecem apresentar resistência ou tolerância à podridão de esclerotinia. Neste sentido, tendo em vista levantar subsídios para futuros programas de melhoramento de alface visando obter cultivares resistentes a *S. minor*, este trabalho objetiva, numa primeira etapa, identificar fontes de resistência e avaliar a reação de espécies selvagens de *Lactuca* e cultivares de *L. sativa* a isolados locais de *S. minor*. Numa segunda etapa o trabalho visa obter híbridos interespecíficos entre cultivares de *L. sativa* e introduções de espécies selvagens que apresentem resistência a *S. minor*, bem como identificar os procedimentos que viabilizem superar possíveis barreiras interespecíficas.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. AGENTES CAUSAIS DA PODRIDÃO DE ESCLEROTÍNIA EM ALFACE

A podridão de esclerotínia em alface pode ser causada pelos fungos *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib) de Bary ou *Sclerotinia minor* Jagger (HAWTHORNE, 1974; PURDY, 1979). Estes fungos são cosmopolitas e, devido à sua ampla distribuição e grande importância econômica, desde 1837, quando foi descrito o agente causal da podridão de esclerotínia pela primeira vez, inúmeros estudos tem sido realizados sobre os patógenos e a doença. No entanto, os resultados destes numerosos estudos até há pouco tempo eram discordantes entre si e isto devido ao fato das espécies terem sido confundidas como sendo uma só: *Sclerotinia sclerotiorum* (PURDY, 1979).

Com os trabalhos de PURDY (1979), ABAWI & GORGAN (1979) e a excelente revisão organizada por WILLETTS & WONG (1980) ficou completamente elucidado o fato de que são *S. sclerotiorum* e *S. minor* os agentes causais da podridão de esclerotínia em alface.

Uma forma prática que possibilita a identifi-

cação destas espécies é a observação das características gerais dos esclerócios, que são suas estruturas de resistência, em meio de cultura BDA, distribuído em placas de Petri com 9 cm de diâmetro. *S. sclerotiorum* apresenta esclerócios grandes, com 2 a 6 mm de diâmetro, redondos a semi-esféricos e na placa de Petri os esclerócios formam-se próximos à borda da placa, formando um anel com 20 a 60 esclerócios. *S. minor* tem esclerócios pequenos, com 0,3 a 2 mm de diâmetro, geralmente redondos, às vezes unidos assemelhando-se a um estroma, o padrão de distribuição na placa é irregular, cobrindo toda a superfície do meio de cultura e chegando a formar de 1.000 a 3.000 esclerócios (WILLETTS & WONG, 1980).

A gama de espécies hospedeiras destes fungos é muito grande e as mais suscetíveis encontram-se nas famílias Cruciferae, Compositae, Solanaceae, Umbelliferae, Chenopodiaceae e Leguminosae, mas em condições especiais favoráveis ao fungo, um número muito maior de famílias podem ser infectadas. PARTYKA & MAI (1962) citaram como possíveis hospedeiros de *S. sclerotiorum* 172 espécies de 118 gêneros em 37 famílias, afirmando que, com pequena diferença, o mesmo se dá com *S. minor*. Por outro lado, Adams (1978), em comunicação pessoal a PURDY (1979), afirmou que *S. sclerotiorum* e *S. minor* possuem hospedeiros em 361 espécies pertencentes a 225 gêneros compreendidos em 64 famílias de plantas.

As plantas hospedeiras, de um modo geral, podem ser atacadas em qualquer estágio de desenvolvimento e sob

condições de umidade relativa alta (85 a 100%) e temperatura baixa (10 a 25°C) com um ótimo em 18°C, o fungo cresce rapidamente invadindo os tecidos do hospedeiro, no qual uma podridão aquosa se desenvolve e um micélio branco cotonoso cresce sobre os tecidos infectados. Após alguns dias de crescimento micelial, estruturas pequenas e compactas desenvolvem-se tanto na superfície do hospedeiro quanto em cavidades, no seu interior. Estas estruturas são os novos esclerócios que se formam. Com o avançar da doença um grande número de esclerócios acumulam-se no hospedeiro, que ao decompor-se permite que estes fiquem no solo, onde podem permanecer dormentes por períodos tão longos como oito anos ou mais, ou podem germinar após curto período de dormência (PURDY, 1979; WILLETTS & WONG, 1980; IMOLEHIN, GROGAN & DUNIWAY, 1980).

Diferentes tipos de germinação podem ocorrer entre os esclerócios de *S. minor* e *S. sclerotiorum*. Segundo WILLETTS & WONG (1980) a germinação pode ser carpogênica, hifal ou eruptiva. É importante o conhecimento do comportamento das duas espécies quanto à germinação de seus esclerócios, pois esta condiciona a forma como as plantas hospedeiras vão sofrer a ação do inóculo (ABAWI & GROGAN, 1979).

A germinação hifal dos esclerócios ocorre com o desenvolvimento de uma hifa individual, que emerge através do envoltório do esclerócio. Esta hifa parasita primeiramente matéria orgânica em decomposição, pois necessita de uma fonte de nutrientes para continuar seu desenvolvimento, for

mando um micélio que cresce em direção ao hospedeiro, infectando-o (WILLETTS & WONG, 1980).

Na germinação carpogênica o esclerócio germina produzindo apotécios, onde são originados os ascósporos, que são os esporos sexuais do fungo. Os ascósporos são produzidos em grande quantidade e quando maduros são liberados violentamente no ar e disseminados pelo vento sobre hospedeiros suscetíveis. Estes ascósporos, sob condições ambientais favoráveis, germinam, emitindo uma hifa infectiva e um novo ciclo de infecção se estabelece (WILLETTS & WONG, 1980).

Para o desenvolvimento do apotécio e a germinação dos ascósporos são necessárias condições especiais como longos períodos de umidade alta, temperaturas entre 10 a 15°C e água livre na superfície do hospedeiro. A germinação carpogênica ocorre com maior frequência em *S. sclerotiorum* e são os ascósporos o principal inóculo desta espécie (IMOLEHIN, GROGAN & DUNIWAY, 1980; HAWTHORNE, 1973).

A germinação eruptiva dos esclerócios é uma particularidade da espécie *S. minor*, pois os esclerócios grandes de *S. sclerotiorum* não germinam desta maneira. Neste tipo de germinação ocorre o rompimento do envoltório do esclerócio e uma massa micelial cresce vigorosamente (Le TORNEAU, 1979). ADAMS & TATE (1976) observaram este micélio proveniente da germinação eruptiva, infectando plântulas de alface diretamente, sem necessidade de primeiro colonizar matéria orgânica em decomposição.

HAWTHORNE (1974) e WONG (1978) relatam que a infecção micelial direta, causada por *S. minor*, é de fundamental importância epidemiológica para algumas culturas como a alface, onde foram realizados estudos comprovando que este é o tipo de germinação preferencial em *S. minor*, mas os esclerócios pequenos também podem germinar dos outros dois modos, conforme as condições ambientais.

A alface é suscetível tanto a *S. sclerotiorum* quanto a *S. minor*, mas a podridão de esclerotínia em alface, em muitos locais, é causada quase que exclusivamente por *S. minor*, mesmo que *S. sclerotiorum* esteja presente no mesmo local (WILLETTS & WONG, 1980). O intervalo de temperatura ótimo para o crescimento de *S. minor* e *S. sclerotiorum* é semelhante, variando entre 10 a 25°C, mas a germinação carpogênica de *S. sclerotiorum* é favorecida pelo limite inferior de temperatura, isto é, 10 a 15°C. Isto leva a crer que a diferença em relação às flutuações de temperatura é a razão porque *S. minor* usualmente predomina nos campos de produção de alface (HAWTHORNE, 1974; IMOLEHIN, GROGAN & DUNIWAY, 1980).

PATTERSON & GROGAN (1984) afirmaram que a podridão de esclerotínia causada por *S. minor* ocorre consistentemente nos campos infestados, a cada novo cultivo de alface, em contraste, *S. sclerotiorum* é esporádico e sua ocorrência está associada com prolongados períodos de umidade ambiental. Os pesquisadores citam ainda que no Vale de São Joaquim nos Estados Unidos, *S. minor* ocorre nas culturas de ou-

tono, mas ambas as espécies podem ocorrer durante o inverno e a primavera.

PATTERSON & GROGAN (1984) relembram ainda que a germinação eruptiva dos esclerócios de *S. minor* ocorre até em solos relativamente bem secos, enquanto a germinação car-pogênica, com a posterior formação de apotécios, em *S. sclerotiorum* ocorre somente quando a umidade do solo é mantida próxima à saturação por duas ou mais semanas. Além disso, água livre sobre as folhas de alface, por 48 horas ou mais, é requerido para que ocorra a infecção pelos ascósporos e se estabeleça a progressão da doença.

Com estas informações verifica-se que, sob o aspecto epidemiológico, *S. minor* tem um papel de maior destaque na ocorrência da podridão de esclerotínia nos cultivos de alface (ABAWI & GROGAN, 1979).

As medidas de controle recomendadas para o combate à podridão de esclerotínia não são eficientes. As principais são:

a) inundação - promove a completa destruição dos esclerócios se o terreno infestado permanecer inundado por períodos longos como 20 a 45 dias. Este método dificilmente é aplicado porque, na maioria das situações, tem se mostrado técnica e economicamente inviável (CHAVES, 1961).

b) rotação cultural - visa reduzir o potencial de inóculo no solo, mas é ineficiente devido ao longo período que os esclerócios sobrevivem no solo. Além disso, é di-

fácil a escolha das espécies e planejamento da rotação devido ao grande número de espécies hospedeiras entre as culturas olerícolas ou não.

c) aplicação de fungicidas - tem controlado parcialmente o patógeno, inibindo a germinação dos esclerócios e o subsequente desenvolvimento micelial (HAWTHORNE & JARVIS, 1973). No entanto, não reduz o potencial de inóculo no solo, exige um grande número de aplicações durante os cultivos e já existem relatos da ocorrência de formas resistentes do patógeno aos fungicidas recomendados, como certos isolados de *S. minor* resistentes ao Benomyl (WILLETTS & WONG, 1980).

O método de controle ideal seria através do uso de cultivares de alface resistentes à podridão de esclerotinia.

2.2. RESISTÊNCIA A PODRIDÃO DE ESCLEROTINIA EM ALFACE

A primeira iniciativa para identificar fontes de resistência a *Sclerotinia* spp. em alface foi realizada por NEWTON & SEQUEIRA (1972). Os autores avaliaram 178 introduções de alfaves cultivadas e selvagens e concluíram que 21 destas populações mostraram algum grau de resistência a *S. sclerotiorum*. Embora afirmando que a resistência de campo identificada nestas linhas, parecia estar condicionada ao hábito de crescimento das plantas, suas conclusões não foram

muito consistentes e o trabalho não é claro quanto ao material e a metodologia usada, deixando muitas dúvidas.

Em 1974, HAWTHORNE, com o objetivo de determinar a importância do crescimento e do hábito de crescimento da alface na epidemiologia da podridão causada por *S. minor*, desenvolveu uma série de ensaios. Primeiramente HAWTHORNE observou que a alface precisa atingir um certo estágio de desenvolvimento a partir do qual a infecção ocorre mais pronunciadamente. Verificou que, em seis dos sete cultivos de alface realizados para observar o pico de infecção, este ocorreu cerca de duas a três semanas após a fase logarítmica do crescimento.

Este estágio, nas variedades usadas no Brasil, alfaces do grupo manteiga, corresponde ao final da formação das cabeças e a senescência das primeiras folhas que vão ficando cada vez mais em contato permanente com o solo.

Continuando sua pesquisa, HAWTHORNE (1974) usou três variedades de alface bem características quanto ao hábito de crescimento: 'Buttercrunch', com folhas soltas, 'Great Lakes' que forma cabeças compactas e 'Cos', com folhas eretas. As três mostraram-se suscetíveis quando inoculadas com uma suspensão micelial de *S. minor* aplicada na axila das folhas. Mas no campo, quando inoculadas com esclerócios de *S. minor*, a infecção pelo patógeno foi sensivelmente menor em 'Cos', com hábito de crescimento ereto. Esta cultivar do tipo romana apresentou o que se chama de resistência de cam

po, isto é, a arquitetura das plantas de 'Cos' permite um tipo de escape ao ataque severo de *S. minor*, mas não impede a incidência da doença, pois o cultivar é geneticamente suscetível ao patógeno. HAWTHORNE (1974) concluiu que a severidade da doença sobre alfaces do tipo romana é condicionada pela densidade do inóculo no solo e pelas condições climáticas favoráveis ao patógeno.

Buttercrunch e Great Lakes, por terem a disposição das folhas mais aberta, quando no máximo desenvolvimento vegetativo, próximo à época de colheita, as folhas de uma planta ficam em contato direto com as das plantas vizinhas. HAWTHORNE (1974) observou que isto também determina o grau de severidade do ataque de *S. minor* sofrido por estas plantas. Elas, além do inóculo primário no solo, sofreram uma inoculação secundária pelo contato foliar das plantas sadias com as infectadas.

Uma tentativa mais recente para encontrar fontes de resistência genética a *S. minor* em alface foi realizada por ABAWI et alii (1980) que estudaram 49 cultivares comerciais de alface e 43 introduções, correspondentes a 11 espécies do gênero *Lactuca*. Avaliaram a reação deste germoplasma de *Lactuca* através de inoculações artificiais com *S. minor*, em casa de vegetação, e verificaram que todas os cultivares comerciais de alface mostraram-se suscetíveis. Entre as espécies selvagens introduzidas destacaram-se pelo nível de resistência *Lactuca dentada*, *L. perennis* e a introdução de *L. serriola* PI 271938. Os autores comentam ainda que esta

introdução difere das demais populações de *L. serriola* testadas, todas suscetíveis, e se assemelha à forma bienal de *L. virosa*. Um dado interessante deste trabalho é que várias introduções de *L. virosa* mostraram um bom nível de resistência, expresso por uma baixa porcentagem de plantas mortas. ABAWI et alii (1980) observaram que *L. dentada* e *L. perenis* não se cruzam com *L. sativa* e que se faz necessário verificar a correta identificação botânica do PI 271938. Por outro lado, concluíram que *L. virosa* parece ser promissora como uma fonte de resistência à podridão de esclerotinia.

2.3. HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA EM ALFACE

Analisando-se os relatos anteriormente citados, fica a constatação de que provavelmente não há variedades cultivadas de alface com resistência a *S. minor*.

A base genética dos atuais cultivares de alface é bastante estreita, pois a grande maioria deles conta com os mesmos parentais em sua genealogia. É possível exemplificar este fato através das afirmações de WHITAKER (1974) e RYDER (1979) mostrando que cultivares como Calmar, Great Lakes 659, Merit, Empire, Empress, Minetto, etc, foram originados de seleções e cruzamentos de linhagens do cultivar Great Lakes e são, inclusive, chamadas alfaces do grupo Great Lakes ou americanas. Por sua vez, Great Lakes foi obtido, em

1941, de linhagens do cultivar New York. No Brasil, cultivava-se principalmente alfaces do grupo Manteiga, como as da série Brasil, Áurea, Vivi, Regina, Piracicaba 65 e outros, conforme revisão de ZATARIN (1985). Verifica-se que elas são todas originárias de cruzamentos envolvendo o cultivar White Boston.

Neste sentido, os cruzamentos interespecíficos são altamente desejáveis, na medida que podem aumentar a variabilidade genética disponível nas plantas cultivadas, permitindo uma seleção efetiva entre os novos grupos varietais.

Comentando a respeito de cruzamentos interespecíficos envolvendo cultivares, MAXON SMITH (1984) afirmou que há um paradoxo entre as espécies mais distantemente relacionadas, e conseqüentemente de mais difícil hibridização, porque é justamente entre elas que poderão surgir recombinantes potencialmente mais valiosos para o melhoramento da espécie cultivada. Naquelas espécies onde o intercruzamento ocorre facilmente na natureza, fica pressuposto que têm muito do seu "pool" gênico em comum, enquanto que entre as mais isoladas, houve menos oportunidades de trocas de genes e conseqüentemente tiveram chances de evoluírem através de linhas divergentes.

A alface cultivada, *Lactuca sativa* L., ocupa uma posição isolada dentro do gênero *Lactuca*, juntamente com as espécies *L. serriola*, *L. saligna* e *L. virosa*, todas com $2n = 2x = 18$ cromossomos pertencem ao grupo *Serriola* (THOMP

SON, 1943; LINDQVIST, 1960a,b; RYDER & WHITAKER, 1976). De acordo com Ferakova (1977)¹ citado por EENINK et alii (1982a) as espécies acima pertencem a primeira subseção *Lactuca*, a qual também contém as espécies *L. altaica* e *L. livida*.

Tendo em vista os objetivos do presente trabalho e tomando por base o relato de ABAWI et alii (1980) sobre a reação de um germoplasma de *Lactuca* ao *S. minor*, onde as oito introduções de *L. saligna* analisadas mostraram-se suscetíveis, esta revisão sobre hibridação interespecífica especificará somente em relação aos cruzamentos envolvendo *L. sativa*, *L. serriola* e *L. virosa*.

2.3.1. *L. sativa* x *L. serriola*

Dentro do grupo *Serriola* a relação entre *L. sativa* e *L. serriola* é muito mais próxima do que a relação destas duas com *L. virosa* e tem sido sugerido que *L. sativa* originou-se de *L. serriola* (WHITAKER, 1974; LINDQVIST, 1960b). Os cruzamentos entre *L. sativa* e *L. serriola* produzem híbridos F₁ férteis e os híbridos entre estas espécies obtidos por WHITAKER & JAGGER (1939) e THOMPSON, WHITAKER & KOSAR (1941) mostraram-se plantas vigorosas, onde predominaram as características de *L. serriola*. LINDQVIST (1960a) obteve su

¹ FERAKOVA, V. The genus *Lactuca* L. in Europe. Univerzita Komenskeho, Bratislava, 1977. 122p.

cesso em todos os cruzamentos recíprocos que fez entre 12 variedades cultivada e 4 formas primitivas de *L. sativa* e 5 introduções de *L. serriola*. Observou que não houve um notável efeito de heterose, mas que, em algumas combinações, o híbrido excedeu o melhor dos pais em alguns caracteres.

Sob o aspecto citogenético WHITAKER & JAGGER (1939) relataram que os 9 cromossomos de *L. serriola* eram morfológicamente bastante semelhantes aos de *L. sativa*. Em função das semelhanças entre os dois genomas, obtiveram híbridos F_1 interespecíficos, os quais apresentaram meiose com pareamento regular. A porcentagem de pólen viável foi aproximadamente a mesma dos parentais: 90 a 95% para *L. sativa* e 80 a 90% para *L. serriola*. LINDQVIST (1960a) em seus estudos observou que, de modo geral, a meiose destes híbridos era regular, apresentando menos irregularidades do que a meiose das linhas puras ou híbridos dentro de *L. sativa* ou de *L. serriola*. No entanto, muitos híbridos apresentaram esterilidade parcial do pólen. Resultados diferentes quanto à fertilidade do pólen foram obtidos entre as diferentes linhas de *L. serriola* cruzadas com os cultivares de *L. sativa*, mas praticamente todos os híbridos F_1 entre *L. serriola* e as formas primitivas de *L. sativa* foram parcialmente estéreis. Em outro trabalho, estudando as gerações segregantes de cruzamentos entre *L. sativa* e *L. serriola*, LINDQVIST (1960b) observou a ocorrência de plantas completamente estéreis. Como ocorreu o abortamento do pólen não ficou bem esclarecido, mas

investigações mostraram que a meiose era caracterizada por um alto grau de assíndese e quase todos os cromossomos apresentaram-se como univalentes na metáfase I. Esta macho-esterilidade apresentou efeito pleiotrópico sobre a forma das folhas. As plantas macho-estéreis tinham folhas curtas e estreitas, o que tornava possível sua identificação antes do florescimento. Quanto à fertilidade feminina LINDQVIST (1960a) observou que foi boa, algumas vezes foi melhor do que a observada nas linhas parentais. A formação de sementes não foi fortemente correlacionada com a fertilidade do pólen, alguns híbridos parcialmente macho-estéreis tiveram uma reduzida produção de sementes, enquanto em outros, houve uma muito boa produção.

Com relação às comparações que os autores acima fizeram quanto ao comportamento meiótico dos pais, cabe citar o trabalho de HAQUE & GODWARD (1984) que observaram a ocorrência normal de 9 bivalentes na meiose de *L. sativa* e de *L. serriola*, com raro aparecimento de 2 univalentes e 8 bivalentes e pontes ocasionais na anáfase I. De acordo com a meiose regular, foi alta a fertilidade do pólen: 93 a 98% para *L. sativa* e 94 a 97% para *L. serriola*. WHITAKER & JAGGER (1939) afirmaram que em *L. sativa* podem ocorrer ocasionais irregularidades quando as plantas ficam sujeitas a temperaturas muito altas durante a meiose.

2.3.2. *L. sativa* x *L. virosa*

WHITAKER & THOMPSON (1941) e THOMPSON *et alii* (1941) em vários cruzamentos recíprocos entre *L. sativa* e *L. virosa* só obtiveram algum sucesso quando *L. sativa* foi usada como planta mãe, entretanto, LINDQVIST (1960a) teve sucesso em ambas as direções, mas os híbridos foram obtidos mais facilmente quando *L. sativa* foi o progenitor materno.

THOMPSON *et alii* (1941) cruzaram *L. sativa* cv Imperial D com *L. virosa* e obtiveram um híbrido com características intermediárias às dos pais. O hábito de florescimento anual foi dominante, herdado de Imperial D e todos os híbridos foram estéreis.

Em várias tentativas de cruzamentos entre variedades cultivadas de *L. sativa* e introduções de *L. viro*sa LINDQVIST (1960a) não obteve nenhum híbrido viável. Em alguns casos as sementes F_1 não germinaram e em outros, os híbridos morreram no estágio de plântulas. Diferenças na viabilidade foram observadas entre as combinações parentais envolvendo os cultivares ou populações selvagens de *L. sativa* e as linhas de *L. virosa*. O cruzamento *L. sativa* cv. Berliner x *L. virosa* K, comparado aos outros, mostrou um certo grau de viabilidade, isto é, as plantas F_1 eram vigorosas e sobreviveram por um considerável tempo mas morreram antes do florescimento. Porém, quando usou as formas primitivas de *L. sativa* nos cruzamentos, LINDQVIST (1960a) obteve melhores re

sultados, mesmo assim plantas de algumas combinações embora tendo um desenvolvimento vegetativo normal, com a elongação da haste floral pararam o crescimento, desenvolvendo uma cor avermelhada e morreram em pouco tempo. Outros híbridos chegaram a florescer, mas murcharam antes do término do florescimento. Quase todos os híbridos que chegaram a florescer foram estéreis.

Resultados semelhantes foram encontrados por EENINK et alii (1982a) nos cruzamentos de *L. sativa* cv. Suzan, Magiola e Deci-minor com 3 introduções de *L. virosa*. Todas as plantas destes cruzamentos morreram num período de 30 dias após a germinação por falta do desenvolvimento de raízes ou por um tipo de necrose dos tecidos.

Outro trabalho que vem confirmar que o sucesso na obtenção de híbridos entre estas duas espécies está na dependência de determinadas combinações parentais é o de MAXON SMITH (1984). Este autor cruzou *L. virosa* B 9056 e K 7095 com *L. sativa* cvs. Amanda, Dandie, Emerald, Magnet e Ambassador. Na maioria dos cruzamentos onde B 9056 foi o polinizador nenhum híbrido foi obtido. Somente uma combinação produziu 14 sementes F_1 pequenas e mal formadas. Mas, quando *L. virosa* K 7095 foi usada como polinizador, a produção de sementes híbridas foi consideravelmente mais alta. Foram obtidas 70 sementes de aspecto quase normal. As plantas híbridas originadas de todas as sementes obtidas mostraram-se muito vigorosas, mas foram altamente estéreis.

LINDQVIST (1960a) sugeriu que esta inviabilidade é controlada por um limitado número de genes com ação complementar.

Sob o aspecto citogenético verifica-se primeiramente que *L. virosa* possui claras diferenças na morfologia dos cromossomos em relação às demais espécies do grupo *Serriola* (LINDQVIST, 1960a; Ferakova, 1977, citado por EENINK *et alii*, 1982).

Observando o comportamento meiótico de híbridos F_1 de *L. sativa* e *L. virosa*, WHITAKER & THOMPSON (1941) notificaram que a sinapse não foi completa. Frequentemente, um par, e as vezes, dois pares, de bivalentes permaneceram não conjugados. Pontes de cromatina ocorreram com frequência na anáfase I, intercinese e anáfase II. Numerosos fragmentos foram observados, muitos deles pareceram ser acêntricos e estavam perdidos no citoplasma. Confirmando muitas das observações dos citados autores, LINDQVIST (1960a) encontrou pareamento incompleto em muitas células mães de pólen e naquelas com pareamento completo e número médio de bivalentes em anel foi baixo, indicando baixa frequência de quiasmas. Pontes foram comuns na anáfase I e em estádios mais avançados da meiose e o autor afirmou que elas foram o resultado de 'crossing-over' de segmentos invertidos e evidenciaram a existência de diferenças estruturais, as quais eram esperadas em vista das diferenças entre os cromossomos das duas espécies parentais.

WHITAKER & THOMPSON (1941) encontraram somente 3 % de pólen viável nos híbridos F_1 de *L. sativa* e *L. virosa*, mas LINDQVIST (1960a) encontrou valores de 34,9 a 76,8%, muito melhores do que os esperados em função das irregularidades meióticas. Muitos dos grãos de pólen viáveis eram bem maiores do que o tamanho normal e como não encontrou nenhuma evidência de duplicação cromossômica somática, o autor supôs que os mesmos surgiram por não redução. A produção de sementes nos híbridos obtidos por LINDQVIST foi menor do que 1%.

EENINK (1982a) discordou de LINDQVIST e, com base no seu trabalho, achou improvável a ocorrência de grãos de pólen gigantes nestes híbridos.

2.3.3. *L. serriola* x *L. virosa*

Os resultados dos cruzamentos entre *L. serriola* e *L. virosa* são semelhantes em todos os aspectos aos cruzamentos entre *L. sativa* e *L. virosa* mas, parece que *L. serriola* está mais proximamente relacionada a *L. virosa* do que *L. sativa* (LINDQVIST, 1960a; EENINK et alii, 1982a; MAXON SMITH, 1984).

EENINK et alii (1982a) foram relativamente bem sucedidos nos cruzamentos recíprocos entre *L. serriola* e *L. virosa*, obtendo plantas normais, embora com reduzida fertilidade masculina e feminina, devido a sérios distúrbios na meio

se. Os autores observaram que a fertilidade feminina das plantas híbridas F_1 diferiu conforme a capacidade de combinação entre as introduções de *L. serriola* e as de *L. virosa*. A fertilidade feminina das progênies, expressa pelo número de sementes por capítulo, aumentou de 0,15 para 0,79 e deste para 7,10 sementes durante as três primeiras gerações. A fertilidade masculina também sofreu uma mudança em função da recombinação genética, uma vez que nas duas primeiras gerações não houve formação de sementes pela autopolinização, enquanto que na terceira geração de retrocruzamento já foi possível a obtenção de sementes. Estes autores estudando as três primeiras gerações de cruzamentos *L. serriola* x *L. virosa* observaram que não há uma correspondência marcante entre a fertilidade feminina e a masculina, o que implica em que diferentes genes governam estes dois caracteres. Observaram a ocorrência de plantas sem nenhum grão de pólen, outras com pólen de má qualidade, enquanto as mesmas plantas apresentaram uma boa fertilidade feminina, expressa pela formação de sementes oriundas de retrocruzamentos. A grande variação observada quanto ao grau e tipo de macho-esterilidade sugere que vários genes estão envolvidos, resultando na ausência de anteras e diferentes tipos de anteras rudimentares, que mostraram-se enrugadas e mais ou menos necróticas, com variáveis quantidades de grãos de pólen de diferentes tamanhos, formas e qualidade. EENINK et alii (1982a) sugerem que esta macho-esterilidade pode ser parcialmente resultante de interação entre genes citoplasmáticos de um progenitor e genes nucleares do outro.

2.3.4. Transferência de genes de *L. virosa* para *L. sativa*

Existem muito poucos relatos de transferências de genes de *L. virosa* para *L. sativa* e o primeiro caso reportado é o da obtenção do cultivar Vanguard por THOMPSON & RYDER (1961). Para isto *L. virosa* PI 125130 foi cruzada com um híbrido complexo envolvendo três introduções de *L. serriola* PI 114512, PI 125819, PI 114535 e a linhagem de *L. sativa* de onde Great Lakes foi derivada. A descrição da metodologia utilizada nestes cruzamentos interespecíficos é sumária. Os autores relatam somente que obtiveram um híbrido estéril, o qual foi tratado com colchicina originando plantas tetraplóides, que foram retrocruzadas com *L. sativa*. Após vários retrocruzamentos, envolvendo os cultivares Red Benson, Great Lakes e Climax, obtiveram o cultivar Vanguard, com folhas de coloração verde escura, um sistema radicular extensivo e um grande vigor, características estas herdadas de *L. virosa*.

Com o objetivo de transferir genes de resistência ao pulgão *Nasononia ribis nigri* de *L. virosa* para *L. sativa*, EENINK et alii (1982a) desenvolveram um trabalho envolvendo cruzamentos interespecíficos entre *L. virosa*, *L. serriola* (usada como espécie ponte) e *L. sativa*. Encontraram muitas irregularidades nos híbridos interespecíficos, anteriormente já citadas, mas conseguiram superar barreiras in-

terespecíficas como a inviabilidade das sementes híbridas e o alto grau de esterilidade das plantas híbridas, através do emprego da técnica de cultura 'in vitro' de embrião e de inúmeros retrocruzamentos. Os retrocruzamentos com *L. sativa*, *L. serriola* ou híbridos F_1 *L. sativa* x *L. serriola* permitiram um incremento na fertilidade masculina e feminina nas gerações subseqüentes. Seis gerações após o primeiro cruzamento interespecífico os pesquisadores obtiveram linhagens melhoradas, com as características de *L. sativa* e com resistência a *Nasonovia ribis nigræ*, herdada de *L. virosa*. As linhagens foram colocadas à disposição dos melhoristas para introgressão de genes de resistência nas alfaces cultivadas.

Com o material obtido dos cruzamentos interespecíficos, EENINK et alii (1982b) estudaram a herança da resistência ao pulgão *Nasonovia ribis nigræ*. As linhagens resistentes I₄a (*L. sativa* cvs. Deci-Minor, Suzan; *L. serriola* PIVT 254, PIVT 255; *L. virosa* PIVT 280), e I₄b (*L. sativa* cv. Suzan; *L. serriola* PIVT 255; *L. virosa* PIVT 280, cd 73723) foram cruzadas com o cultivar suscetível Ravel e os parentais e as populações F_1 e F_2 foram testadas. Os autores observaram que, em ambas as linhagens, um único gene dominante é responsável pela resistência ao *Nasonovia ribis nigræ*, mas não descartaram a possibilidade de que possa ocorrer também genes modificadores.

Com cruzamentos diretos entre *L. sativa* e *L. virosa*, MAXON SMITH (1984) transferiu os caracteres resistên-

cia ao míldio, causado por *Bremia lactucae*, e a cor marron das sementes de *L. virosa* para *L. sativa*. O autor afirmou que a esterilidade dos híbridos, a baixa germinação e a pequena sobrevivência das plantas foram fatores muito limitantes na obtenção dos resultados. Para tentar superar a esterilidade, o pesquisador obteve alopoliplóides com a aplicação de colchicina nos híbridos e a outra estratégia usada foi realizar inúmeros retrocruzamentos com diferentes cultivares de alface, como fez EENINK (1982a). Após algumas gerações de retrocruzamentos foram obtidas linhagens com características mais próximas a *L. sativa* e com razoável fertilidade. Estas linhagens segregaram para cor de semente e a cor marrom foi dominante sobre a preta. Analisando os dados de retrocruzamentos em uma das linhagens, ficou evidente que a cor marrom é determinada por dois genes dominantes complementares. Quanto ao caráter resistência ao míldio, linhagens parcialmente férteis foram testadas com o isolado Tv de *Bremia lactucae*. Três linhagens alopoliplóides e uma diplóide mostraram um alto nível de resistência. Estas linhagens selecionadas foram posteriormente testadas contra um grande número de isolados e a resistência permaneceu efetiva contra todas raças conhecidas. Estudos estavam em andamento para determinar a herança desta resistência.

2.4. TÉCNICAS PARA SUPERAR AS BARREIRAS INTERESPECÍFICAS

2.4.1. Cruzamento ponte

Rotas alternativas de introgressão de geroplasma tem sido sugeridas quando a hibridização direta é difícil ou impossível. Cruzamentos ponte tem sido usados quando a transferência de genes pelos métodos simples falharam. O método tem sido empregado só em condições especiais quando uma espécie A hibridiza com uma B, mas não hibridiza com C, e as espécies B e C formam híbridos viáveis (STALKER, 1980).

No trabalho pioneiro de THOMPSON & RYDER (1961) a transferência de caracteres de *L. virosa* para *L. sativa* envolveu um cruzamento ponte complexo, onde foram usadas três introduções de *L. serriola* como ponte.

EENINK et alii (1982a) só foram bem sucedidos nas suas tentativas de transferir genes de *L. virosa* para *L. sativa* quando *L. serriola* foi usada como espécie ponte. *L. virosa* foi cruzada diretamente com *L. serriola* ou com híbridos entre *L. serriola* e cultivares de *L. sativa*.

STALKER (1980) chama a atenção de que o uso de espécies ponte é complicado e o método dificulta os processos de seleção dos genes desejáveis. Sem adequados procedimentos de avaliação aplicados no processo seletivo, genes desejáveis poderão facilmente ser perdidos. A probabilidade de sucesso na transferência de caracteres quantitativos é

muito menor do que a de caracteres monogênicos dominantes. Neste sentido, MAXON SMITH (1984) comentou que é muito difícil avaliar em que extensão os genótipos de *L. serriola* foram envolvidos na transferência de genes descrita por THOMPSON & RYDER (1961) e qual a sua interferência no processo de seleção dos caracteres desejáveis de *L. virosa*.

2.4.2. Anfidiplóides

A obtenção de híbridos interespecíficos anfidiplóides pela aplicação de colchicina tem permitido a obtenção de plantas F_1 férteis ou parcialmente férteis (STALKER, 1980).

Esta técnica foi empregada por THOMPSON & RYDER (1961) na obtenção do cultivar Vanguard, porque, mesmo usando *L. serriola* como espécie ponte, o híbrido interespecífico entre *L. sativa* e *L. virosa* foi estéril. Os autores não descrevem a metodologia utilizada, apenas citam que plantas F_1 do híbrido complexo foram tratadas com colchicina e obtiveram anfidiplóides férteis, que foram retrocruzados com *L. sativa* cv. Red Benson.

MAXON SMITH (1984) também conseguiu obter ramos anfidiplóides férteis em plantas estéreis do F_1 entre *L. sativa* e *L. virosa*. O procedimento adotado foi colocar chumaços de algodão impregnados com uma solução de colchicina a 0,4%, sobre gemas axilares por 2 ou 4 horas e após la-

var abundantemente a área tratada com água. No entanto, os resultados obtidos com o uso desta técnica não mostraram ser muito promissores. Na geração F_1 anfidiplóide também ocorreram falhas na germinação, surgiram plântulas deformadas e outras plantas morreram antes de atingir a maturidade. Além disso, as gerações anfidiplóides posteriores foram parcialmente férteis e quando retrocruzadas com *L. sativa* originaram triplóides altamente estéreis. Foram necessários numerosos retrocruzamentos com *L. sativa* para reverter as plantas ao estado diplóide e recuperar a fertilidade, não apresentando nenhuma vantagem significativa em comparação com a hibridação direta, sem poliploidização.

2.4.3. Cultura "in vitro" de embrião

Segundo STALKER (1980) a cultura de embrião pode ser vantajosamente usada para obter plantas quando o endosperma degenera ou quando as sementes não atingem a maturidade fisiológica. A técnica está sendo largamente utilizada como um passo importante na obtenção de híbridos interespecíficos ou intergenéricos.

EENINK et alii (1982a) empregaram a técnica de cultura de embrião com sementes F_1 ou RC_1 , da segunda geração de híbridos entre *L. serriola*, *L. sativa* e *L. virosa*. Foram colocadas 130 sementes rudimentares em meio MS, modificado pelos autores, chamado no presente trabalho de L_2 .

e dentro de poucas semanas algumas sementes rudimentares começaram a germinar, sendo que 34 plantas foram obtidas e transplantadas para vasos com 2 a 3 folhas verdadeiras. Muitas outras sementes só formaram calos e mesmo após a transferência destes calos para diferentes meios de cultura, não especificados pelos autores, nenhuma outra planta se desenvolveu.

Já o trabalho de MAISONNEUVE (1987) teve como objetivo central estudar a cultura 'in vitro' de embriões imaturos oriundos de cruzamentos entre *L. sativa*, *L. saligna* e *L. virosa*. Sementes F_1 *L. sativa* x *L. saligna* e RC_1 (*L. sativa* x *L. virosa*) x *L. sativa* foram colocadas em 4 diferentes meios de cultura chamados M8, N2, T0 e B5. Verificou-se que a maioria das sementes colocadas nos meios T0 e B5 germinaram e desenvolveram-se, enquanto somente 25%, ou menos, dos materiais colocados nos meios M8 e N2 chegaram a se desenvolver. Foi realizado um ensaio para determinar o ponto ótimo de desenvolvimento do embrião para permitir maior eficiência na obtenção de plantas 'in vitro'. Foram testados embriões de *L. sativa* x *L. saligna* com até 21 dias após a polinização e os resultados mostraram que embriões com 7 a 10 dias apresentaram cotilédones diferenciados. Colocados em meio T0 (Tabela 3), após 2 a 4 semanas, foi possível obter plântulas bem formadas. Foi observado que embriões com mais de 11 dias após a polinização foram expulsos do tegumento das sementes. Os embriões atrofiados ou sem cotilédones diferenciados, in-

dependente da data de colheita após a polinização, não se desenvolveram em nenhum dos meios de cultura testados. Concluindo, MAISONNEUVE (1987) afirmou que a cultura 'in vitro' de embriões imaturos parece ser uma técnica interessante para facilitar a concretização de cruzamentos dentro do gênero *Lactuca*, mesmo que sua eficiência esteja na dependência da capacidade de combinação dos genótipos das espécies parentais.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. LOCAL DE INVESTIGAÇÃO

Este trabalho foi realizado no campo experimental e laboratórios do Departamento de Genética, ESALQ, e no laboratório do Setor de Radiogenética do CENA, localizados no campus da USP de Piracicaba, SP, latitude 22°42'30"S.

3.2. GERMOPLASMA DE *Lactuca*

O material avaliado é representado pelo conjunto de introduções de espécies selvagens procedentes do Vegetable Production Research Unit - USDA, USA, de populações em processo de melhoramento e cultivares tradicionais de alface. O material, pertencente ao Setor de Hortaliças do Departamento de Genética, ESALQ/USP, está relacionado na Tabela 1.

3.2.1. Obtenção de mudas

As sementes foram submetidas a um tratamento

Tabela 1. Relação das espécies selvagens de *Lactuca* e cultivares de *L. sativa* utilizadas, hábito de crescimento das espécies selvagens (HS) ou grupo dos cultivares (GC) e procedência.

Nº	População	Espécie	HC ou GC	Procedência
1	PI 271938	<i>L. virosa</i>	roseta	USDA - USA
2	PI 274375	<i>L. virosa</i>	roseta	USDA - USA
3	Nº 009	<i>L. saligna</i>	roseta	USDA - USA
4	Nº 001	<i>L. aculeata</i>	ereto	USDA - USA
5	Nº 002	<i>L. quercina</i>	ereto	USDA - USA
6	PI 273574 A	<i>L. dregeana</i>	ereto	USDA - USA
7	PI 273574 B	<i>L. dregeana</i>	ereto	USDA - USA
8	PI 274898	<i>L. augustana</i>	ereto	USDA - USA
9	Nº 90023	<i>L. saligna</i>	ereto	USDA - USA
10	PI 281876	<i>L. saligna</i>	ereto	USDA - USA
11	PI 289015	<i>L. altaica</i>	ereto	USDA - USA
12	Nº 012	<i>L. altaica</i>	ereto	USDA - USA
13	PI 274372	<i>L. serriola</i>	ereto	USDA - USA
14	PI 274380	<i>L. serriola</i>	ereto	USDA - USA
15	PI 271939	<i>L. serriola</i>	ereto	USDA - USA
16	PI 273617	<i>L. serriola</i>	ereto	USDA - USA
17	PI 251245	<i>L. sativa</i>	ereto	USDA - USA
18	PI 250020	<i>L. sativa</i>	ereto	USDA - USA
19	Regina 55	<i>L. sativa</i>	manteiga	IGEN/ESALQ-SP, BR
20	Regina 68	<i>L. sativa</i>	manteiga	IGEN/ESALQ-SP, BR
21	Regina 49	<i>L. sativa</i>	manteiga	IGEN/ESALQ-SP, BR
22	Babá	<i>L. sativa</i>	manteiga	Agrocere-MG, BR
23	Vivi	<i>L. sativa</i>	manteiga	IGEN/ESALQ-SP, BR
24	Aurélia	<i>L. sativa</i>	manteiga	Clause - França
25	Monstruese R.d'Etè	<i>L. sativa</i>	manteiga	Vilmorin - França
26	Brasil 202	<i>L. sativa</i>	manteiga	IAC-SP, BR
27	Brasil 221	<i>L. sativa</i>	manteiga	IAC-SP, BR
28	White Boston	<i>L. sativa</i>	manteiga	Asgrow - EUA
29	Áurea	<i>L. sativa</i>	manteiga	Agroflora-SP, BR
30	GL Mesa 659	<i>L. sativa</i>	americana	Asgrow-EUA
31	Empress	<i>L. sativa</i>	americana	Ferry Morse - EUA
32	Vitória S. Antão	<i>L. sativa</i>	folhosa	IPA - PE, BR
33	Gorga A-11-4	<i>L. sativa</i>	folhosa	IGEN/ESALQ-SP, BR
34	Gorga A-11-76	<i>L. sativa</i>	folhosa	IGEN/ESALQ-SP, BR
35	Grand Rapids	<i>L. sativa</i>	folhosa	Ferry Morse - EUA
36	Slowbolting	<i>L. sativa</i>	folhosa	Ferry Morse - EUA
37	Maioba	<i>L. sativa</i>	folhosa	São Luiz-MA, BR
38	Gallega	<i>L. sativa</i>	latina	INFA - Argentina
39	Valmaine	<i>L. sativa</i>	romana	Ferry Morse - EUA
40	Celtuce	<i>L. sativa</i>	aspargo	Japão

antes da sementeira, para superar a dormência e uniformizar a germinação. Esta técnica consistiu em umedecer as sementes e deixá-las em refrigerador a 4°C por 2 dias. Como as sementes dos materiais 1, 2, 4, 8, 15, 17, 19, 20, 21, 32, 33, 37 e 38 não respondessem satisfatoriamente ao choque frio, foram deixadas sob luz contínua (lâmpada Gro-Lux à distância de 50 cm), em temperatura ambiente, por 2 dias, procedimento que foi bastante eficiente.

As mudas foram obtidas pelo sistema "speedling", que utiliza bandejas de isopor, como canteiros suspensos. As sementes pré-tratadas foram colocadas em bandejas com 128 células, cada uma com capacidade para 21 cm³ de substrato. Este, uma mistura 1:1:1 de terra, roxa, esterco curtido e vermiculita, foi previamente autoclavado a 120°C por 2 horas.

Após 15 a 20 dias as mudas estavam prontas para o transplante em vasos ou canteiros, em casa de vegetação ou no campo, onde seguiu-se as técnicas convencionais quanto à adubação e tratamentos fitossanitários aplicados à cultura da alface.

3.3. ISOLADOS DE *Sclerotinia minor*

Foram utilizados isolados de *S. minor* obtidos de plantas infectadas, encontradas nos campos de produ

ção da região alfaceira de Mogi das Cruzes, SP. Os isolados constam na Tabela 2.

3.3.1. Isolamento do patógeno

O isolamento foi realizado mediante a cultura de micélio ou de esclerócios, colhidos sobre plantas infectadas e plaqueados em meio BDA cuja composição foi: extrato de 200 g de batata, 20 g de dextrose e 20 g de ágar por litro.

O micélio foi retirado cuidadosamente da superfície da área infectada, com uma alça de platina previamente flambada, e plaqueado imediatamente. Os esclerócios foram desinfectados por imersão em uma solução de hipoclorito de sódio a 1,5% (QBoa 30%), durante 5 minutos, em seguida lavados por 3 vezes em água esterilizada e plaqueados. As placas foram incubadas a 20°C.

Após 10 dias de incubação, discos com 8 mm de diâmetro foram retirados dos bordos das culturas e plaqueados em meio de aveia (40g de aveia em flocos, 2g de dextrose, 20 g de agar e 1000 ml de água destilada), onde verificou-se um crescimento mais rápido do fungo.

3.3.2. Identificação do patógeno

A identificação das espécies *S. minor* e *S. sclerotiorum* foi feita segundo WILLETS & WONG (1980), pela ob

Tabela 2. Isolados de *Sclerotinia* e procedência.

Data do isolamento	Nº do isolado	Espécie	Procedência	
			Produtor	Região
19.06.1985	1	<i>S. minor</i>	I. Aiko	- Mogi das Cruzes, SP
	2	<i>S. minor</i>	L. Yabasi I	- Mogi das Cruzes, SP
	3	<i>S. minor</i>	T. Hasegawa	- Mogi das Cruzes, SP
	4	<i>S. minor</i>	J. Horita	- Mogi das Cruzes, SP
10.10.1985	5	<i>S. sclerotiorum</i>	J. Horita	- Mogi das Cruzes, SP
	6	<i>S. minor</i>	L. Yabasi II	- Mogi das Cruzes, SP
	7	<i>S. sclerotiorum</i>	L. Yabasi II	- Mogi das Cruzes, SP
	8	<i>S. minor</i>	S. Aoyagui	- Mogi das Cruzes, SP
29.01.1986	9	<i>S. minor</i>	Y. Oride	- Mogi das Cruzes, SP

servação das características gerais dos esclerócios formados em meio de cultura BDA. Foram feitos isolamentos individuais das amostras de cada local, para possibilitar a identificação da espécie ocorrente e a sua procedência.

3.3.3. Manutenção dos isolados de *S. minor*

A manutenção foi feita através de culturas de *S. minor* em meio de aveia e após 15 a 20 dias, quando toda a superfície da cultura estava coberta por novos esclerócios, estes foram desalojados do meio com o auxílio de um pincel macio e água destilada. Foram lavados várias vezes para que todo resíduo do meio de cultura fosse retirado, secos sobre papel absorvente, por 2 dias, e guardados em frascos fechados em geladeira.

3.4. REAÇÃO DE *Lactuca* sp a *S. minor*

Com a finalidade de estudar a reação de espécies selvagens de *Lactuca*, progênies em processo de melhoramento e cultivares de *L. sativa*, foram realizados três experimentos, empregando-se diferentes metodologias. Um quarto experimento foi idealizado para se especular a respeito da reação de resistência do híbrido interespecífico *L. sativa* x *L. virosa* ao *S. minor*.

Além de averiguar a reação deste germoplasma de *Lactuca* e a identificação de prováveis fontes de resistência ao *S. minor*, estes experimentos também permitem avaliar a adequação das diferentes técnicas empregadas.

Em todos os experimentos foi utilizada uma mistura dos isolados de *S. minor* obtidos em Mogi das Cruzes, SP (Tabela 2).

3.4.1. Reação de germoplasma de *Lactuca* sob cultivo em vasos, em solo artificialmente infestado com *S. minor*. Experimento I.

Neste ensaio utilizou-se, com modificações, o método empregado por ABAWI et alii (1980) para analisar a reação de resistência genética de um germoplasma de *Lactuca* a *S. minor*.

Foram testados os materiais, relacionados na Tabela 1, com exceção dos cultivares Brasil 202 e Maioba, não disponíveis na época.

Esclerócios de *S. minor* foram utilizados como inóculo, obtidos e multiplicados como descrito em 3.3.3, desinfectados como em 3.3.1 e guardados em frascos esterilizados em geladeira, até serem utilizados.

Como os esclerócios apresentam dormência, antes da inoculação foi analisada a viabilidade dos mesmos, através do teste de germinação eruptiva proposto por ADAMS & TA-

TE (1976). Os isolados testados apresentaram uma viabilidade média de 56%.

Preparou-se o substrato para o cultivo das plantas com uma mistura 2:1 de terra roxa peneirada e esterco curtido. A mistura foi autoclavada a 120°C por 2 horas e após colocada em vasos de plástico de 500 ml. A inoculação foi feita espalhando-se 150 a 200 esclerócios por vaso, na superfície do substrato. Incorporou-se os esclerócios à mistura, o mais uniformemente possível, até 2 cm de profundidade.

O transplante foi realizado em 27/04/85 com mudas de 10 a 12 dias, produzidas conforme 3.2.1. Duas mudas foram transplantadas para cada vaso, com substrato artificialmente inoculado, somando um total de 8 plantas por tratamento.

A avaliação da reação de *Lactuca* a *S. minor*, foi realizada 64 dias após o transplante (30/6/85), foi feita através da percentagem de plantas mortas (PM), calculada pela fórmula seguinte:

$$PM = \frac{\text{número de plantas mortas}}{\text{número de plantas testadas}} \times 100$$

3.4.2. Reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em área artificialmente inoculada com *S. minor*. Avaliação única aos 64 dias após a inoculação. Experimento II.

Este segundo experimento foi idealizado visando contornar o problema de um possível escape que tivesse ocorrido durante o experimento I e observar a reação do material em estudo em condições de campo.

O material utilizado é o que consta na Tabela 1, exceto as introduções de *L. aculeata* e *S. serricola*, PI 271939 e do cultivar Maioba.

No campo, utilizou-se como inóculo grãos de arroz integral colonizados por *S. minor*. Para isto o arroz foi colocado em frascos de 500 ml até 2/3 da capacidade e esterilizado em autoclave, a 120°C por 2 horas. Após colocou-se em cada frasco 200 a 300 esclerócios desinfectados e 40ml de água destilada estéril. Os frascos foram mantidos em incubadora por 30 dias, a 24°C e no final deste período os grãos de arroz estavam totalmente cobertos pelo micélio do fungo, prontos para serem usados.

O presente ensaio foi instalado em uma área do Campo Experimental do Departamento de Genética da ESALQ/USP, sem histórico de podridão esclerotínia. O terreno foi preparado para o plantio em linhas, com 40 cm entre linhas e 25 cm entre as covas, nas linhas.

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com duas repetições, sendo cada parcela constituída por uma linha com 8 plantas. Como controle foi usada uma linha com o cultivar *Áurea*, sabidamente suscetível a *S. minor*, sem inoculação artificial.

Em 18/04/86, mudas com 20 dias foram transplantadas para o campo e 10 dias após procedeu-se à inoculação. Esta foi feita segundo o método de ABAWI *et alii* (1980) colocando-se junto ao colo de cada planta 3 grãos de arroz colonizados por *S. minor*.

A avaliação foi realizada aos 64 dias após a inoculação (em 30/06/86) através da porcentagem de plantas mortas (PM), como no experimento I.

A análise estatística foi realizada com os dados transformados em $\arcsin \sqrt{\% / 100}$ (STEEL & TORRIE, 1980) e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (GOMES, 1982).

3.4.3. Reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em área artificialmente inoculada com *S. minor*. Avaliações periódicas semanais até 56 dias após a inoculação. Experimento III.

Com a finalidade de observar-se a reação do germoplasma de *Lactuca* no tempo, instalou-se este ensaio onde foram feitas oito avaliações entre a inoculação e o iní-

cio da emissão da haste floral nos cultivares de alface.

Neste experimento foi utilizado o material relacionado na Tabela 1, e na sua condução foi empregada a mesma metodologia adotada no experimento II. O transplante foi realizado em 10/07/87 e a inoculação em 31/07/87.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três repetições. Cada parcela foi constituída por uma linha com dez plantas. Como controle foi mantida em cada bloco uma parcela com o cultivar Áurea sem inoculação.

A avaliação da reação de resistência baseou-se em dois critérios: a percentagem de plantas mortas (PM), avaliada aos 56 dias após a inoculação, e o índice de resistência preconizado por CARDOSO (1967). O índice de resistência (IR) expressa o número de dias de sobrevivência das plantas inoculadas com *S. minor* e é obtido pela seguinte fórmula:

$$IR = \frac{\sum x \cdot y}{\sum y} \times 100$$

onde:

x = número de plantas mortas dentro do período de valor y.

y = valor do período no qual se colhem o número x de plantas mortas.

Para o período no qual se observou a primeira planta morta o valor de y = 1, para o segundo período onde se observou a ocorrência de plantas mortas y = 2, e assim

por diante. Considerou-se um período igual ao espaço de 7 dias e foi computado o número de plantas mortas durante 8 períodos.

Multiplicou-se o índice por 100 para se trabalhar com números inteiros, após a transformação dos dados, como recomendado por CARDOSO (1967).

Para a análise estatística os dados obtidos em porcentagem foram transformados em $\arcsin \sqrt{\%/100}$ e os dados em índice de resistência em $\sqrt{x}$, conforme indicado por STEEL & TORRIE (1980).

As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, segundo GOMES (1982).

3.4.4. Reação do híbrido F_1 do cruzamento *L. sativa* cv. Maíoba x *L. virosa* PI 271938 e dos parentais em experimento com folhas destacadas. Experimento IV.

Com o objetivo de avaliar a reação do híbrido interespecífico F_1 , economizando material vegetal uma vez que foi bastante difícil obter o híbrido entre *L. sativa* e *L. virosa*, idealizou-se um pequeno ensaio empregando-se, com modificações, a metodologia utilizada por MORAES (1981) com folhas destacadas.

O inóculo neste ensaio constou de discos de cultura recente de *S. minor* em meio de aveia, conforme item

3.3.1. Os discos, com 4 mm de diâmetro, foram cortados dos bordos das colônias.

As folhas foram obtidas de 5 plantas do cultivar Maioba, de 5 plantas do PI 271938 e de 3 plantas híbridas. As folhas foram destacadas da região mediana dos caules e acondicionadas em placas de Petri grandes (15 cm de diâmetro e 2 cm de altura). Foi colocada uma folha por placa, sobre um papel filtro umedecido com 2 ml de uma solução de cinetina a 100 ppm, para retardar a senescência. Antes de cada folha ser colocada na placa, o pecíolo foi cortado com uma lâmina desinfectada e sua extremidade envolvida com algodão umedecido em uma solução de Distreptine a 100 ppm.

Com as folhas acondicionadas a inoculação foi feita colocando-se um disco de meio de cultura com micélio de *S. minor* próximo à base da nervura central, na face superior de cada folha. Logo após as placas foram fechadas e para manter alta a umidade relativa no seu interior, evitar o secamento do papel filtro, do algodão e, em consequência, o murchamento das folhas, a face interna das tampas das placas foram pulverizadas com água esterilizada diariamente. As placas foram mantidas sob condições ambientes, por 10 dias.

O experimento foi realizado em parcelas subdivididas no tempo, inteiramente casualizado, com cinco repetições. Cada parcela constou de uma folha acondicionada em placa de Petri e a subparcela se referiu aos quatro períodos de avaliação.

O acondicionamento e a inoculação foram realizados em 19/08/87 e as avaliações foram feitas aos 5, 6, 7 e 8 dias após a inoculação. As avaliações foram expressas em porcentagem de área foliar atacada e, para isto, papéis com uma área equivalente à área danificada das folhas em teste foram pesados em balança analítica e os valores em peso (mg), transformados em área foliar relativa atacada (%).

Para a análise da variância os dados foram transformados em $\text{arc sen } \sqrt{\%/100}$.

A interação entre os genótipos e os períodos de avaliação foi desdobrada para se detectar diferenças entre genótipos para cada período de avaliação. Estas médias foram comparadas pelo teste de Tukey, segundo descrição de GOMES (1978) para comparações de tratamentos A em diferentes níveis de B, isto é, a comparação dos genótipos em cada período de avaliação. A equação da reta dos valores médios da área foliar danificada, em função dos quatro períodos de avaliação, para cada genótipo, foi estimada através da regressão linear simples conforme metodologia descrita por STEEL & TORRIE (1980).

3.5. HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA EM *Lactuca*

Com base nos resultados obtidos no experimento I e nas informações bibliográficas sobre o assunto, plane

jou-se a realização de cruzamentos entre *L. sativa*, *L. serriola* e *L. virosa*, esta última, um possível doador de genes de resistência a *S. minor* para os cultivares de alface.

Os cruzamentos foram realizados em diversas épocas e com diferentes combinações parentais em cada etapa visto a dificuldade em se conseguir a coincidência do período de florescimento entre as espécies de interesse.

Após o primeiro plantio observou-se o comportamento das espécies em relação ao início e duração do período de florescimento e adotou-se alguns procedimentos para minimizar o problema da não coincidência de floração entre *L. virosa* e as outras espécies. Foram feitos plantios escalonados de *L. virosa* e, além disso, as mudas foram tratadas com ácido giberélico a 50 ppm, para antecipar o florescimento. Por outro lado, procurou-se prolongar o período de florescimento através da poda do terço superior da haste floral, forçando o surgimento de novos ramos floríferos.

Os primeiros cruzamentos foram realizados entre plantas cultivadas em canteiros, em casa de vegetação; posteriormente as plantas foram cultivadas em vasos, com capacidade para 10 kg de solo, e mantidas, sempre que possível, em casa telada.

Além dos tratos culturais normalmente realizados em plantios em vasos, as plantas foram adubadas, via foliar, com cálcio e boro na base de 3 ml/l de Nutrimins (8% de Ca e 0,5% de B), quinzenalmente.

Para a realização dos cruzamentos interespecíficos procedeu-se a emasculação conjugando-se o método de Ernst-Schwanzenbach (1932)² com o de Oliver (1910)³ citados por RYDER & JOHNSON (1974). Antes da abertura dos capítulos, as pétalas foram cortadas na altura das sépalas deixando a mostra o conjunto de anteras de cada floreta. Com uma pinça de ponta muito fina retirou-se os conjuntos de anteras puxando-os pelas extremidades. Logo após cada capítulo foi lavado com um jato fino de água, seco e estava pronto para ser polinizado.

A polinização foi efetuada passando-se sobre os estigmas das floretas emasculadas os estigmas cobertos de pólen das inflorescências das plantas polinizadoras.

As combinações parentais dos híbridos interespecíficos foram avaliadas pelo número médio de sementes por capítulo, uma vez que em alface a semente se confunde com o próprio fruto (aquênio), e pelo número de plantas híbridas obtidas.

²ERNST-SCHWARTZENBACH, M. Zur genetick und fertilitat von *Lactuca sativa* L. und *Cichorium endivia* L. Arb. Inst. Allg. Bot. Univ. Zürich, ser. 2, nº 15, 1932.

³OLIVER, G. New methods of plant breeding. U.S. Bur. Plant Indus. Bull. 167, 1910.

3.5.1. Obtenção do híbrido F_1 do cruzamento

L. sativa x *L. virosa*

As introduções PI 271938 e PI 274375 de *L. virosa*, foram escolhidas para serem os polinizadores em todos os cruzamentos porque, segundo WHITAKER & THOMPSON (1941) e LINDQVIST (1960a), há maior chance de obtenção de híbridos entre estas espécies quando *L. sativa* é usada como progenitor feminino.

No período entre 08/10/85 a 10/03/86 foi possível fazer cruzamentos de *L. virosa* PI 271938 e PI 274375 com as introduções de *L. sativa* PI 251245 e PI 250020 e com a progênie Gorga A-11-76 e os cultivares Grand Rapids, Brasil 221 e Áurea. Na segunda época, de 15/05/86 a 13/09/86, os PI 271938 e PI 274375 foram cruzados com PI 251245, PI 250020, Regina 49, Gorga A-11-76 e Maioba. E, na terceira época, de 15/11/86 a 10/08/87, trabalhou-se somente com a introdução PI 271938 de *L. virosa* e o cultivar Maioba de *L. sativa*, procurando-se obter o maior número possível de sementes híbridas.

3.5.2. Cruzamento ponte entre *L. sativa*,

L. serriola e *L. virosa*

O cruzamento em ponte entre algumas espécies tem permitido superar a inviabilidade das sementes híbridas

e a esterilidade das plantas F_1 originadas destas. Com base em relatos na literatura, decidiu-se realizar cruzamentos entre *L. sativa* e *L. virosa* utilizando *L. serriola* como espécie ponte.

Numa primeira etapa procurou-se obter híbridos F_1 de *L. sativa* x *L. serriola* e *L. serriola* x *L. virosa* para depois tentar cruzá-los com *L. virosa* e *L. sativa*, respectivamente.

Nos cruzamentos envolvendo os materiais PI-274372, PI 271939 e PI 273617 de *L. serriola* e os cultivares Vitória do Santo Antão, Gorga A-11-4, Babã, Aurélia, Grand Rapids, Brasil 221, Valmaine, White Boston, Áurea e Celtuce, observou-se preliminarmente que a produção e a viabilidade de sementes foram normais, não se fazendo avaliações posteriores.

Nos cruzamentos envolvendo as introdução PI-271938 e PI 274375 de *L. virosa* e as PI 274372, PI 271939 e PI 273617 de *L. serriola*, as últimas se constituíram nos progenitores maternos.

Devido a várias limitações foi impossível trabalhar-se com todo o material obtido na primeira etapa, concretizando-se somente o cruzamento em ponte (*L. sativa* cv. Valmaine x *L. serriola* PI 271939) x *L. virosa* PI 271938.

3.5.3. Obtenção da geração F_2 de *L. sativa* x *L. virosa* através da poliploidização do F_1

A obtenção de alopoliplóides, com o uso de colchicina, tem sido uma técnica preconizada para superar problemas de esterilidade em híbridos interespecíficos.

Com este fim, para tentar obter a geração F_2 de *L. sativa* cv. Maioxa x *L. virosa* PI 271938 empregou-se, por tentativa, métodos de poliploidização que foram aplicados com sucesso em outros gêneros (WERNER, 1983; SCHIFINO, 1985).

O método do gotejamento foi o primeiro utilizado e constou da pipetagem (pipeta de 1 ml) de uma gota de solução de colchicina sobre gemas apicais axilares de 4 plântulas. Empregou-se uma solução de colchicina na concentração de 0,2%, preparada em 04/04/74 e conservada em congelador. As plântulas obtidas de cultura de embrião foram previamente transplantadas para copos plásticos (200 ml) com substrato preparado conforme item 3.2.1. A pipetagem foi feita de 8 em 8 horas, por 24 horas e os copos, mantidos em câmaras úmidas improvisadas com sacos plásticos. Após o tratamento pulverizaram-se as gemas com água destilada. Duas plântulas foram usadas como controle e gotejadas com água destilada.

No segundo método, pequenos chumaços de algodão foram colocados sobre gemas axilares, de porção mediana do caule, de plantas no estágio de alongação da haste floral (pendoamento). Nesta segunda tentativa, a solução foi

preparada no dia da aplicação (21/08/87), a partir da colchicina pura diluída em água destilada, na concentração de 0,1%. A aplicação da droga foi feita embebendo os chumaços na solução e mantendo-os sobre as gemas por 12, 24 e 48 horas. Para cada tempo de exposição à droga, foram tratadas 3 gemas de cada planta híbrida, num total de 3 plantas. O algodão foi periodicamente umedecido com 0,2 ml de solução, em cada aplicação, com o auxílio de uma agulha hipodérmica de 1 ml. Após o tratamento as gemas foram abundantemente lavadas com água destilada. Três gemas de cada uma das plantas foram tratadas somente com água destilada e constituíram-se nos controles.

O número de plantas tratadas foi muito restrito devido às dificuldades inerentes à obtenção do próprio híbrido F_1 interespecífico.

Os métodos foram analisados quanto a taxas de gemas atrofiadas, mortalidade de plantas e número de poliploides.

3.5.4. Obtenção da geração F_1RC_1 do cruzamento

(*L. sativa* x *L. virosa*) x *L. sativa*

No período entre 22/09/87 a 04/10/87 foram realizados vários retrocruzamentos do híbrido *L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938, utilizando-se o pai recorrente, o cultivar Maioba, como polinizador porque o híbrido mostrou-se macho-estéril.

A avaliação do retrocruzamento também foi feita quanto ao número de sementes F_1RC_1 por capítulo e o número de plantas obtidas.

3.6. CULTURA 'IN VITRO' DE EMBRIÕES

A partir de setembro de 1986, foi aplicada a técnica de cultura de embrião para tentar superar os problemas de inviabilidade das sementes híbridas provenientes dos cruzamentos entre *L. sativa*, *L. serriola* e *L. virgata*.

Foram utilizados pequenos ensaios visando averiguar a adequação de meios de cultura e idade de embriões. Estes ensaios, realizados em várias épocas e em diferentes etapas, pela dificuldade em se conseguir o material experimental, foram, no entanto, avaliados em conjunto.

Foram colocados em meio de cultura embriões imaturos esterilizados em hipoclorito de sódio a 1,0% (QBoa 20%) por 10 minutos e lavados 3 vezes em água estéril.

Os meios de cultura foram preparados com água destilada e tanto estes quando as vidrarias foram esterilizados por autoclavagem a 120°C por 20 minutos. As operações foram realizadas em condições assépticas, em câmara de fluxo

laminar. Os fracos, contendo 10 ml de meio de cultura e as sementes, foram vedados com filme plástico de PVC.

A composição completa dos meios de cultura utilizados constam na Tabela 3, e todos eles foram ajustados para pH 5,8.

As plântulas obtidas da cultura de embriões foram transferidas para copos plásticos (200 ml) tendo como substrato a mistura Rendmax, autoclavada por 2 horas a 120°C. As plântulas foram irrigadas com uma solução fertilizante na base de 1 g/l de adubo Ouro Verde (10-10-10 mais micronutrientes) e até a completa adaptação foram mantidas em câmara úmida, sendo após, transferidas para casa telada.

3.6.1. Cultura de embriões híbridos em diferentes meios de cultura

Nos seguintes ensaios foram utilizados sementes rudimentares maduras, isto é, colhidas com 14 dias ou mais após a polinização.

Entre 26/09/86 a 28/10/86 foi realizada a primeira tentativa de cultura de embrião, sendo testadas 40 sementes do cruzamento *L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI-271938, no meio L₁. O meio de cultura L₁ apresenta a seguinte composição por litro: 50% dos sais de MS (MURASHIGUE & SKOOG, 1962), 30 g de sacarose, 8 g de ágar.

Tabela 3. Composição dos meios de cultura utilizados para cultura 'in vi tro' de embriões híbridos interespecíficos de *Lactuca* sp. (con centração em mg/l).

Componentes	L ₁	L ₂	TO	CB ₁	CB ₂
NH ₄ .NO ₃	825	825	1650	-	-
(NH ₄) ₂ .SO ₄	-	-	-	134	134
KNO ₃	950	950	1900	3000	3000
NaH ₂ PO ₄ .H ₂ O	-	-	-	150	150
CaCl ₂ .2H ₂ O	220	220	440	150	150
MgSO ₄ .7H ₂ O	185	185	370	500	500
KH ₂ .PO ₄	85	85	170	-	-
Na ₂ .EDTA	18,7	18,7	37,3	37,3	37,3
FeSO ₄ .7H ₂ O	13,9	13,9	27,8	27,8	27,8
H ₃ BO ₃	3,1	3,1	1	3	3
MnSO ₄ .4H ₂ O	11,15	11,15	-	-	-
MnSO ₄ .H ₂ O	-	-	0,76	10	10
ZnSO ₄ .7H ₂ O	4,3	4,3	1	2	2
KI	0,415	0,415	0,01	0,75	0,75
Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O	0,125	0,125	-	0,25	0,25
CuSO ₄ .5H ₂ O	0,012	0,012	0,02	0,025	0,025
CoCl ₂ .6H ₂ O	0,012	0,012	-	0,025	0,025
NiCl ₂ .6H ₂ O	-	-	0,035	-	-
AlCl ₃ .6H ₂ O	-	-	0,055	-	-
ácido nicotínico	-	-	1	1	-
tiamina HCl	-	0,4	1	10	-
piridoxina HCl	-	-	1	1	-
pantotenato de Ca	-	-	1	-	-
biotina	-	-	0,1	-	-
ácido fólico	-	-	10	-	-
mio-inositol	-	100	100	4000	-
caseína hidrolisada	-	500	-	-	-
l-alanina	-	-	-	1000	-
l-glutanina	-	-	-	800	-
l-serina	-	-	-	160	-
l-triptofano	-	-	-	50	-
l-cisteína	-	-	-	10	-
ATA	-	0,5	-	-	-
ANA	-	-	-	0,05	-
sacarose (g/l)	30	20	20	120	10
agar (g/l)	8	7	8	1	7

Um segundo ensaio foi realizado entre 11/02/87 à 13/06/87, comparando o meio L₁ com o modificado por EENINK et alii (1982a), chamado neste trabalho meio L₂, cuja composição por litro é: 50% de sais de MS, 100 mg de caseína, 0,5 mg de IAA, 20 g de sacarose, 7 g de ágar (Tabela 3).

Foram colocados em cada meio 20 sementes de *L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938, 8 sementes de *L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 274375 e 40 sementes de (*L. sativa* cv. Valmaine x *L. serriola* PI 291939) x *L. virosa* PI 271938.

Em 14/09/87 tomou-se conhecimento do meio TO, preconizado por MAISONNEUVE (1987), cuja composição por litro é: macroelementos de MS, microelementos de Heller (1953)⁴ citado por MURASHIGUE & SKOOG (1962), vitaminas de MOREL & WETMORE (1951), 20 g de sacarose e 8 g de ágar.

As 8 únicas sementes obtidas do retrocruzamento (*L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938) x *L. sativa* cv. Maioba foram colocadas no meio TO.

⁴HELLER, R. Recherches sur la nutrition minérale de tissus végétaux cultivés in vitro. Ann. Sci. Nat. Bot. et Biol. Vég. 11th series, 14: 1, 1953.

3.6.2. Cultura de embriões híbridos do cruzamento

L. sativa cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938,
em diferentes estádios de desenvolvimento

Neste experimento, realizado entre 06/87 a 09/87, objetivou-se estudar o comportamento de embriões imaturos, em diferentes estádios de desenvolvimento, em um meio de crescimento e posteriormente em um meio de germinação, conforme proposição de CHANDLER & BEARD (1983) para cultura 'in vitro' de embriões interespecíficos de *Helianthus*.

Primeiramente obteve-se sementes do cruzamento *L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938 com 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dias após a polinização. Estas foram colocadas em meio de crescimento CB₁ constituído pelos sais do B5 (GAMBORG et alii, 1968), vitaminas, aminoácidos e hormônios de CHANDLER & BEARD (1983), 120 g de sacarose e 7 g de ágar por litro. Os frascos foram mantidos no escuro, a $26 \pm 2^{\circ}\text{C}$, durante 12 dias.

A seguir os materiais em cultura foram transferidos para o meio de germinação CB₂, constituído somente pelos sais do B5, 10 g de sacarose e 8 g de agar, por litro. Os embriões neste meio foram mantidos em um fotoperíodo de 16 horas a uma intensidade luminosa de 2000 Lux e a uma temperatura de $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

3.7. CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DE HÍBRIDO INTERESPECÍFICO DE *Lactuca*

3.7.1. Análise biométrica de metáfases mitóticas

Análises mitóticas foram efetuadas em metáfases de células obtidas de pontas de raízes. Para isto sementes de 'Maioba' e do PI 271938 foram colocadas para germinar em placas de Petri, sobre papel de filtro umedecido, à temperatura ambiente e sob luz contínua (ver item 3.2.1). Radículas em crescimento ativo com 2 a 2,5 mm de comprimento foram coletadas. As pontas de raízes dos híbridos interespecíficos, obtidos através de cultura de embrião, foram coletadas de plântulas recém tiradas do meio de cultura. Todas as pontas de raízes foram pré-tratadas com 8-hidroxiquinolina a 0,002 M por 3 a 4 horas, à temperatura ambiente. A seguir, foram lavadas com água destilada e fixadas em Carnoy (3:1 de etanol e ácido acético) por 24 horas. Após a fixação, as raízes foram mantidas em álcool 70%, em geladeira, até a análise.

Para o preparo das pontas de raízes usou-se o método de Feulgen citado por AGUIAR-PERECIN (1979). As raízes foram hidrolisadas em HCl 1N, a 60°C, por 10 minutos, lavadas em água destilada e coloridas pelo reativo de Schiff, durante 40 minutos. O material foi lavado em água corrente por 5 minutos e procedeu-se o esmagamento das raízes em carmin acético a 1%. As lamínulas foram removidas em ácido

acético a 45%, secas ao ar e montadas em bálsamo do Canadá.

As melhores metáfases foram fotografadas e as medidas cromossômicas foram obtidas a partir das fotografias de 5 metáfases de cada material. Os cromossomos foram medidos utilizando-se um compasso, o qual forneceu os valores em mm posteriormente convertidos em μm . Com estas medidas, foram obtidos os parâmetros relação de braços (RB) e comprimento relativo (CR), que permitem identificar cada par cromossômico. Os parâmetros foram calculados como segue:

$$RB = \frac{\text{braço maior}}{\text{braço menor}} \quad \text{e}$$

$$CR = \frac{\text{comprimento do cromossomo}}{\text{comprimento do lote haplóide}} \times 100$$

Na construção do cariótipo, além dos parâmetros RB e CR, foi utilizada a melhor fotografia metafásica de cada espécie, de onde os cromossomos foram recortados, ordenados pelo tamanho e alinhados pelo centrômero. Com os valores médios dos comprimentos cromossômicos obtidos em 5 metáfases construiu-se os idiogramas de cada espécie. A classificação dos cromossomos quanto à posição do centrômero foi efetuada conforme a metodologia proposta por LEVAN et alii (1964).

Empregou-se os procedimentos estatísticos usuais (GOMES, 1982), calculando-se o desvio padrão e o coeficiente de variação do comprimento absoluto dos cromossomos, do comprimento relativo e da relação de braços, para o lote haplóide de cada espécie avaliada.

3.7.2. Análise meiótica de *L. sativa* cv. Maioba,
L. viçosa PI 271938 e do híbrido F₁
interespecífico

Neste trabalho procurou-se observar o processo meiótico na microesporogênese, em anteras jovens de inflorescências (capítulos) com 1 a 2 mm de comprimento. As inflorescências foram coletadas entre 10 e 12 horas da manhã, fixadas em Carnoy por 24 horas, estocadas em álcool 70% e mantidas em refrigerador até a análise (EENINK, 1975).

As lâminas foram observadas procurando-se registrar, dentro das possibilidades, a maior quantidade de in formações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. REAÇÃO DO GERMOPLASMA DE *Lactuca* AO *S. minor*

4.1.1. Ocorrência dos patógenos causadores da podridão esclerotínia em alface

Ao isolar-se os agentes causadores da podridão de esclerotínia em alface, em três épocas e em diferentes áreas de produção, na região de Mogi das Cruzes, SP, verificou-se ser *S. minor* a única espécie de ocorrência em 19/06/85 e em 29/01/86 e a mais frequente em 10/10/85 (Tabela 2). A espécie *S. sclerotiorum* foi encontrada em dois locais, mas isolada, a partir de uma única planta doente dentre amostras de 10 plantas, em média.

Os isolamentos individuais das amostras, segundo o método de WILLETTS & WONG (1980), possibilitaram a perfeita identificação das espécies *S. minor* e *S. sclerotiorum*, conforme mostra a Figura 1.

Estes dados vêm mostrar que *S. minor* está predominando nos campos de produção de alface em Mogi das Cruzes.

Observações anteriores de HAWTHORNE (1974) na Nova Zelândia e de IMOLEHIN et alii (1980) e PATTERSON & GROGAN (1984) nos Estados Unidos indicam que o fato também ocorre em outros países.

Figura 1. Agentes causadores da podridão esclerotínia em alface, isolados em Mogi das Cruzes, SP. Espécies identificadas pelo tamanho dos esclerócios: A - *Sclerotinia minor*, B - *S. sclerotiorum*.

No relato de PATTERSON & GROGAN (1984) a ocorrência de *S. sclerotiorum* tem sido observada no inverno e na primavera nos Estados Unidos, é esporádica e está associada a condições anteriores de prolongados períodos de temperatura amena e alta umidade ambiental. Fato semelhante parece ocorrer em Mogi das Cruzes, pois somente na primavera (10/10/

85) detectou-se a presença desta espécie entre os isolados amostrados. Na mesma região, TOKESHI¹ tem constatado a presença de *S. sclerotiorum* causando podridão nas folhas de feijão vagem durante a primavera e início do verão. A única maneira pela qual *S. sclerotiorum* poderia estar causando doença na parte superior da folhagem deste hospedeiro seria através da ação dos ascósporos, disseminados pelo vento. Estas informações vêm concordar com as notificações de COLEY-SMITH & COOKE (1971), HAWTHORNE (1973) e IMOLEHIN et alii (1980) de que os ascósporos são o principal inóculo de *S. sclerotiorum* e, devido às condições ambientais necessárias à sua ocorrência, têm ação mais restrita, sob o aspecto epidemiológico, do que o micélio oriundo da germinação eruptiva dos esclerócios de *S. minor*.

4.1.2. Reação do germoplasma de *Lactuca* sob cultivo em vasos, em solo artificialmente infestado com *S. minor*. Experimento I

A Tabela 4 apresenta o resultado da avaliação das plantas, aos 64 dias após o transplante em vasos, através da percentagem de plantas mortas.

¹TOKESHI, H. (ESALQ/USP - Departamento de Fitopatologia, Piracicaba). Comunicação Pessoal, 1988.

Tabela 4. Reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em vasos, em solo artificialmente infestado com *Sclerotinia minor*, expressa em porcentagem de plantas mortas (PM). Avaliação aos 64 dias após o transplante. Experimento I.

Populações	Espécie	PM (%)
PI 271938	<i>L. virosa</i>	0
PI 274375	<i>L. virosa</i>	38
PI 274898	<i>L. augustana</i>	38
PI 274380	<i>L. serriola</i>	38
PI 251245	<i>L. sativa</i>	38
PI 250020	<i>L. sativa</i>	38
Áurea	<i>L. sativa</i>	38
Celtuce	<i>L. sativa</i>	50
PI 281876	<i>L. saligna</i>	63
PI 289015	<i>L. altaica</i>	63
Aurélia	<i>L. sativa</i>	63
PI 273574 A	<i>L. dregeana</i>	75
PI 274372	<i>L. serriola</i>	75
PI 273617	<i>L. serriola</i>	75
Vitória Santo Antão	<i>L. sativa</i>	75
Grand Rapids	<i>L. sativa</i>	75
Valmaine	<i>L. sativa</i>	75
Slowbolting	<i>L. sativa</i>	75
Nº 002	<i>L. quercina</i>	88
PI 273574 B	<i>L. dregeana</i>	88
Nº 90023	<i>L. saligna</i>	88
Nº 012	<i>L. altaica</i>	88
Gallega	<i>L. sativa</i>	88
Gorga A-11-4	<i>L. sativa</i>	88
Regina 55	<i>L. sativa</i>	88
Babá	<i>L. sativa</i>	88
Nº 001	<i>L. aculeata</i>	100
Nº 009	<i>L. saligna</i>	100
PI 271939	<i>L. serriola</i>	100
Regina 68	<i>L. sativa</i>	100
Regina 49	<i>L. sativa</i>	100
Gorga A-11-76	<i>L. sativa</i>	100
Vivi	<i>L. sativa</i>	100
Monstruese R. d'Etê	<i>L. sativa</i>	100
GL Mesa 659	<i>L. sativa</i>	100
Empress	<i>L. sativa</i>	100
Brasil 221	<i>L. sativa</i>	100
White Boston	<i>L. sativa</i>	100

A hierarquia das médias, para suscetibilidade das populações ao patógeno, evidenciou que cultivares e introduções de *L. sativa* foram suscetíveis em diferentes graus, bem como as demais espécies selvagens, com exceção de uma introdução de *L. virosa* (PI 271938) que se mostrou bastante resistente.

Comparando-se a disposição hierárquica das médias dos materiais comuns a este trabalho e ao de ABAWI et alii (1980), verifica-se que há uma certa concordância entre os resultados obtidos em ambos os estudos quanto ao grau de suscetibilidade (Tabela 5).

Um fato importante é que a introdução PI 271938 destacou-se como o único material com um alto nível de resistência, apresentando em ambos os trabalhos zero por cento de plantas mortas.

Com relação à introdução PI 271938, cabe um esclarecimento sobre sua identificação botânica. No trabalho de ABAWI et alii (1980) ela consta como *L. serriola*, embora os autores tenham alertado que ela mostrou-se morfológicamente diferente de todas as outras introduções de *L. serriola* por eles testadas, mas assemelhou-se à forma bienal de *L. virosa*, inclusive apresentando resistência ao florescimento. WAYCOTT² pesquisou os resultados de ABAWI et alii (1980) e comunicou que os materiais considerados resistentes por es-

² WAYCOTT, W. (USDA/UPRU-US. Agricultural Research Station - Salinas, Ca). Comunicação pessoal, 1984.

tes autores, ou seja, PI 234204 (*L. dentata*), PI 274376 (*L.* sp) e PI 271938 (*L. serriola*) estão todos erroneamente classificados naquele trabalho. Agora *L. dentata* está classificada no gênero *Ixeris*, a introdução PI 274376 pertence ao gênero *Sonchus* e o PI 271938 é realmente *L. virosa* e não *L. serriola*.

Tabela 5. Comparação da reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em vasos, expressa em percentagem de plantas mortas (PM), em função de dois métodos de inoculação: com grãos de cevada colonizados por *S. minor* (GCC) e com esclerócios incorporados ao solo (EIS).

Populações	Espécies	PM (%)	
		GCC ¹	EIS ²
PI 271938	<i>L. virosa</i>	0	0
PI 274375	<i>L. virosa</i>	62	38
PI 274898	<i>L. augustana</i>	100	38
Celtuce	<i>L. sativa</i>	100	50
PI 281876	<i>L. saligna</i>	81	63
PI 289015	<i>L. altaica</i>	62	63
PI 274372	<i>L. serriola</i>	96	75
Grand Rapids	<i>L. sativa</i>	100	75
Valmaine	<i>L. sativa</i>	100	75
PI 273574	<i>L. dregeana</i>	92	88

¹ Fonte: ABAWI et alii (1980)

² Fonte: Experimento I (1985)

Com isto o presente trabalho confirma que fontes de resistência ao *S. minor* podem ser encontradas entre introduções de *L. virosa*. Como esta espécie está relacionada a *L. sativa*, é possível a sua utilização em programas de melhoramento da alface cultivada via introgressão de genes de resistência a *S. minor*.

Neste trabalho, da mesma forma que no de ABAWI et alii (1980), o germoplasma avaliado incluiu todos os grupos varietais de alface, ou seja: ereta (a maioria das espécies selvagens), roseta aberta (como *L. virosa*, *L. saligna* Nº 009), folhosa (como 'Vitória do Santo Antônio'), manteiga (como 'Áurea'), romana (como 'Valmaine'), aspargo ('Celtuce'), americana (como 'Great Lakes'). O objetivo da escolha dos diferentes grupos foi estudar o comportamento dos materiais e compará-los com os dados de NEWTON & SEQUEIRA (1972) e HAWTHORNE (1974) que observaram que materiais com hábito de crescimento mais ereto foram menos suscetíveis ao *S. minor*, em condições de campo, do que aqueles com folhas basais prostradas, com maior contato com o solo. No entanto, neste ensaio em vasos obteve-se resultados semelhantes ao de ABAWI et alii (1980), sendo que nenhuma diferença evidente ocorreu entre os vários grupos de alface.

Na inoculação deste experimento foram usados esclerócios, incorporados ao substrato dos vasos, como propágulos infectivos. A escolha desta metodologia baseou-se na justificativa de ABAWI et alii (1980) de que este método se-

ria menos severo do que o usado por eles (grãos colonizados por *S. minor*), e poderia permitir a identificação de materiais com diferentes níveis de resistência ao *S. minor*. Comparando-se a reação dos mesmos materiais presentes neste trabalho e no de ABAWI et alii (1980), constantes na Tabela 5, verifica-se que a inoculação com os esclerócios foi realmente menos severa.

Quanto a uma melhor discriminação dos materiais resistentes, embora pareça ter havido uma tendência neste sentido observando-se a Tabela 5, os resultados completos do experimento I, Tabela 4, não são suficientemente consistentes para permitir uma afirmação. Parece ter ocorrido escapes ao ataque de *S. minor*. Um exemplo é a presença do cultivar *Áurea*, com 38% de plantas mortas, entre os materiais menos suscetíveis. Na região de Mogi das Cruzes onde *Áurea* é intensamente cultivada, tem se mostrado muito suscetível, conforme relato de ZATARIN³ e IKUTA⁴. Outra razão para se acreditar na ocorrência de um escape é o fato de que *Áurea* e os demais cultivares de alface são linhas puras, portanto, são populações geneticamente muito homogêneas.

³ZATARIN, M. (EMPAER - Setor de Olericultura, Campo Grande). Comunicado pessoal, 1986.

⁴IKUTA, H. (ESALQ/USP - Estação Experimental de Hortaliças - Mogi das Cruzes). Comunicação pessoal, 1987.

Talvez a avaliação da reação de resistência de *Lactuca* ao *S. minor*, em ensaios em vasos usando esta metodologia de inoculação, seja inadequada, por não apresentar as condições favoráveis à ocorrência da doença igualmente em todos os vasos.

Com o método de inoculação empregado no experimento I, a ocorrência da doença fica na dependência da presença, ao acaso, de esclerócios viáveis na superfície do solo e muito próximos das plantas. A inoculação com grãos colonizados por *S. minor*, embora sendo mais drástica, permite que todas as plantas avaliadas estejam sujeitas às mesmas condições, em relação ao patógeno.

4.1.3. Reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em solo artificialmente inoculado com *S. minor*. Avaliação única aos 64 dias após a inoculação. Experimento II

Os resultados deste experimento estão na Tabela 6 e a análise da variância detectou pelo menos um contraste significativo entre as populações testadas, ao nível de 1% de probabilidade (Apêndice 1).

Pelos dados obtidos neste experimento verifica-se que, biologicamente, *L. virosa* foi a única espécie, desta coleção de germoplasma de *Lactuca*, que mostrou-se resistente ao *S. minor*. A introdução PI 271938, com 12% de plan-

Tabela 6. Reação de germoplasma de *Lactuca* sob cultivo em solo artificialmente infestado com *Sclerotinia minor*, expressa em percentagem de plantas mortas (PM). Avaliação aos 64 dias após a inoculação. Experimento II. Dados não transformados.

Populações	Espécie	PM (%)	
PI 271938	<i>L. virosa</i>	12	a
PI 274375	<i>L. virosa</i>	18	a
PI 274898	<i>L. augustana</i>	50	a b c
Nº 009	<i>L. saligna</i>	69	b d
Vitória Santo Antão	<i>L. sativa</i>	74	
Gorga A-11-4	<i>L. sativa</i>	75	
PI 274372	<i>L. serriola</i>	75	
Babã	<i>L. sativa</i>	76	
White Boston	<i>L. sativa</i>	76	
Slowbolting	<i>L. sativa</i>	78	
PI 274380	<i>L. serriola</i>	81	
PI 250020	<i>L. sativa</i>	82	
Brasil 221	<i>L. sativa</i>	82	
Valmaine	<i>L. sativa</i>	82	
Nº 012	<i>L. altaica</i>	86	
Celtuce	<i>L. sativa</i>	86	
Regina 49	<i>L. sativa</i>	86	
Nº 002	<i>L. quercina</i>	88	
Monstruese R d'Etê	<i>L. sativa</i>	89	
Grand Rapids	<i>L. sativa</i>	90	
Regina 68	<i>L. sativa</i>	91	
Vivi	<i>L. sativa</i>	92	
Regina 55	<i>L. sativa</i>	92	
PI 273574 B	<i>L. dregeana</i>	94	
PI 289015	<i>L. altaica</i>	94	c
Empress	<i>L. sativa</i>	100	
PI 273764 A	<i>L. dregeana</i>	100	
Aurélia	<i>L. sativa</i>	100	
PI 273617	<i>L. serriola</i>	100	
Áurea	<i>L. sativa</i>	100	
Gorga A-11-76	<i>L. sativa</i>	100	
PI 281376	<i>L. saligna</i>	100	
GL Mesa 659	<i>L. sativa</i>	100	
PI 251245	<i>L. sativa</i>	100	
Gallega	<i>L. sativa</i>	100	
Nº 90023	<i>L. saligna</i>	100	d

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo de Tukey a 5% de probabilidade.

tas mortas, sobressaiu-se novamente pelo alto nível de resistência, embora estatisticamente semelhante às introduções PI 274375 e PI 274898 com 18 e 50% de plantas mortas, respectivamente.

A percentagem média de plantas mortas das demais introduções de *Lactuca* e dos cultivares de *L. sativa* variaram entre 69 a 100%. isto é, mostraram-se altamente suscetíveis.

Os altos valores das médias de percentagem de plantas mortas, obtidas neste experimento, podem ser devidos, em parte, ao tipo de propágulo infectivo usado na inoculação. Como ABAWI et alii (1980) consideraram no seu trabalho, a inoculação com grãos colonizados por *S. minor* permite que uma massa de hifas em vigoroso crescimento fique sob as plantas, onde a constante umidade do solo e a temperatura favorecem o ataque do fungo. Por outro lado, a eficiência do inóculo não parece ter sido drástica ao ponto de não permitir a detecção de materiais com níveis médios ou baixos de resistência. Comparando-se os dados deste experimento, Tabela 6, com os do experimento I, Tabela 4, verifica-se que, de modo geral, os resultados são concordantes.

Com relação à resistência de campo, condicionada pelo hábito de crescimento ereto de algumas introduções ou cultivares, referida por NEWTON & SEQUEIRA (1972) e por HAWTHORNE (1974), verificou-se pelo teste de médias que *L. augustana*, com 50% de plantas mortas, foi o único material

de hábito de crescimento ereto que distinguiu-se dos demais. Todavia, no campo observou-se diferenças na evolução da doença em função da arquitetura das plantas. Em plantas eretas, de caules mais fibrosos, principalmente das espécies *L. augustana*, *L. saligna* (PI 231876, Nº 90023), *L. serriola* (PI 274372) e as introduções selvagens de *L. sativa* (PI 251245 e PI 250020), o fungo cresceu sobre os caules vários centímetros acima do solo, penetrando no interior dos mesmos e colonizando parte da região medular, onde formou uma grande quantidade de esclerócios, antes da morte da planta. ABAWI *et alii* (1980) também fizeram observações semelhantes.

Estes resultados parecem indicar que a resistência de campo apresentada por alguns materiais não ficou muito evidente em função da forma como foi expressa a reação de resistência e não devido à metodologia de inoculação. Embora sendo geneticamente suscetíveis ao *S. minor*, nas condições de campo alguns materiais sobreviveram por um período maior do que outros. Mas, por ocasião da avaliação, 64 dias após a inoculação, a contagem do número de plantas mortas, posteriormente transformada em percentagem, indicou que todas as espécies, de hábito ereto ou não, foram igualmente suscetíveis, com exceção de *L. virosa* e *L. augustana*.

A inoculação com grãos de arroz colonizados por *S. minor*, usada no experimento II, foi mais eficiente por reduzir a ocorrência de escapes.

4.1.4. Reação de germoplasma de *Lactuca* à *S. minor*,
sob cultivo em área artificialmente inoculada.

Experimento III

4.1.4.1. Percentagem de plantas mortas (PM)

As médias dos tratamentos estão na Tabela 7. A análise da variância detectou pelo menos um contraste significativo entre populações, ao nível de 5% de probabilidade (Apêndice 2).

Este terceiro experimento vem confirmar que *L. virosa* PI 271938 é o único material que apresenta maior grau de resistência ao *S. minor*, com 26% de PM, embora não tenha diferido estatisticamente de outros materiais considerados suscetíveis com 67 a 81% de PM.

L. virosa PI 274375 e *L. augustana* PI 274898 mantiveram as mesmas posições que nos experimentos I e II, porém com 67 e 70% de PM respectivamente, mostraram-se apenas menos suscetíveis que as demais populações, sem diferir estatisticamente das mesmas.

A ausência de diferença significativa entre *L. virosa* PI 271938 e os outros materiais não reflete o fato biológico que ocorreu no campo e isto é devido em parte à metodologia de avaliação e em parte aos procedimentos estatísticos adotados, como a transformação dos dados em arco seno $\sqrt{\%/100}$, em busca de variâncias mais homogêneas na análise estatística.

Tabela 7. Reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em área inoculada artificialmente, expressa em percentagem de plantas mortas (PM). Experimento III.

População	Espécie	PM (%)	
PI 271938	<i>L. virosa</i>	26	a
PI 274375	<i>L. virosa</i>	67	b
PI 274898	<i>L. augustana</i>	70	
PI 273574 A	<i>L. dregeana</i>	76	
Celtuce	<i>L. sativa</i>	78	
PI 289015	<i>L. altaica</i>	81	
Grand Rapid	<i>L. sativa</i>	81	a
PI 273574 B	<i>L. dregeana</i>	82	
PI 274372	<i>L. serriola</i>	82	
GL Mesa 659	<i>L. sativa</i>	85	
Vitória Santo Antão	<i>L. sativa</i>	86	
Gallega	<i>L. sativa</i>	86	
Vivi	<i>L. sativa</i>	86	
Slowbolting	<i>L. sativa</i>	86	
Áurea	<i>L. sativa</i>	86	
Babá	<i>L. sativa</i>	87	
Aurélia	<i>L. sativa</i>	87	
Regina 68	<i>L. sativa</i>	87	
Gorga A-11-4	<i>L. sativa</i>	88	
PI 273617	<i>L. serriola</i>	89	
Nº 90023	<i>L. saligna</i>	90	
Nº 012	<i>L. altaica</i>	90	
PI 271939	<i>L. serriola</i>	90	
PI 251245	<i>L. sativa</i>	90	
PI 250020	<i>L. sativa</i>	90	
Maioba	<i>L. sativa</i>	90	
Nº 001	<i>L. aculeata</i>	91	
PI 281876	<i>L. saligna</i>	91	
Monstruese R. d'Etê	<i>L. sativa</i>	91	
Empress	<i>L. sativa</i>	91	
Brasil 202	<i>L. sativa</i>	91	
Regina 55	<i>L. sativa</i>	91	
Valmaine	<i>L. sativa</i>	93	
Nº 009	<i>L. saligna</i>	93	
PI 274380	<i>L. serriola</i>	93	
Brasil 221	<i>L. sativa</i>	93	
Nº 002	<i>L. quercina</i>	96	
Regina 49	<i>L. sativa</i>	96	
White Boston	<i>L. sativa</i>	96	
Gorga A-11-76	<i>L. sativa</i>	100	b

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 8. Reação de germoplasma de *Lactuca*, sob cultivo em área inoculada artificialmente, expressa em índice de resistência (IR). Experimento III. Dados transformados.

População	Espécie	IR*	
PI 271938	<i>L. virosa</i>	14,33	a
PI 274375	<i>L. virosa</i>	13,04	b
PI 274898	<i>L. augustana</i>	12,53	
PI 281876	<i>L. saligna</i>	12,11	
PI 273617	<i>L. serriola</i>	11,90	
Nº 90023	<i>L. saligna</i>	11,80	
PI 251245	<i>L. sativa</i>	11,78	
PI 273574 A	<i>L. dregeana</i>	11,53	
PI 273574 B	<i>L. dregeana</i>	11,39	
PI 289015	<i>L. altaica</i>	11,25	
Nº 001	<i>L. aculeata</i>	11,23	
PI 274372	<i>L. serriola</i>	11,12	
Celtuce	<i>L. sativa</i>	11,12	
Nº 012	<i>L. altaica</i>	11,00	
Gallega	<i>L. sativa</i>	11,00	
Grand Rapid	<i>L. sativa</i>	10,89	
Valmaine	<i>L. sativa</i>	10,88	a
Nº 002	<i>L. quercina</i>	10,77	
Babá	<i>L. sativa</i>	10,77	
GL Mesa 659	<i>L. sativa</i>	10,64	
Regina 68	<i>L. sativa</i>	10,51	
Vivi	<i>L. sativa</i>	10,51	
Slowbolting	<i>L. sativa</i>	10,51	
PI 250020	<i>L. sativa</i>	10,48	
PI 271939	<i>L. serriola</i>	10,45	
Regina 49	<i>L. sativa</i>	10,39	
PI 274380	<i>L. sativa</i>	10,39	
Áurea	<i>L. sativa</i>	10,39	
Nº 009	<i>L. saligna</i>	10,33	
Maioba	<i>L. sativa</i>	10,32	
Gorga A-11-4	<i>L. sativa</i>	10,30	
Aurélia	<i>L. sativa</i>	10,29	
Vitória Santo Antão	<i>L. sativa</i>	10,22	
Empress	<i>L. sativa</i>	10,21	
Regina 55	<i>L. sativa</i>	9,92	
Monstruese R. d'Etè	<i>L. sativa</i>	9,89	
Brasil 202	<i>L. sativa</i>	9,80	
Gorga A-11-76	<i>L. sativa</i>	9,76	
Brasil 221	<i>L. sativa</i>	9,37	
White Boston	<i>L. sativa</i>	9,31	b

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Por outro lado, é necessário considerar que houve uma diferença altamente significativa entre blocos, pelo teste de F (Apêndice 2). Isto ocorreu porque o bloco C, localizado em uma área mais baixa, apresentou umidade relativa do solo mais alta que os blocos A e B, fatores que podem promover o crescimento do fungo e a rápida evolução do processo infectivo (IMOLEHIN et alii, 1980). Foi possível observar primeiramente no bloco C plantas com uma massa cotonosa de micélio de *S. minor* envolvendo as folhas basais, com um grande número de novos esclerócios. Então, supõe-se que as plantas do bloco C não estiveram sob as mesmas condições que as dos blocos A e B. No bloco C deve ter havido um significativo aumento do potencial de inóculo, de tal magnitude que se refletiu na média geral de PM e de forma mais evidente nos materiais menos suscetíveis. Mesmo o material considerado resistente, a introdução PI 271938 de *L. viçosa*, apresentou uma média de 26% de PM, bem mais alta do que a observada no experimento II (Tabela 6).

4.1.4.2. Índice de resistência (IR)

As médias dos tratamentos referentes a este parâmetro estão na Tabela 8. A análise da variância detectou pelo menos um contraste significativo entre populações, ao nível de 1% de probabilidade (Apêndice 2).

A avaliação da reação de resistência do germo plasma de *Lactuca* através do IR também indicou o PI 271938 de *L. virosa* como o material mais resistente com um IR de 14,33, seguido novamente pelas introduções PI 274375 de *L. virosa* com IR de 13,04 e PI 274898 de *L. augustana* com IR de 12,53. Entretanto estas duas introduções não diferiram das demais populações, com valores de IR variando entre 12,11 a 9,31.

Apesar de algumas populações com altas percentagens de PM, isto é, mais suscetíveis, tenderem a apresentar também valores mais baixos de IR, não houve uma correspondência na distribuição hierárquica das médias destes dois parâmetros. Este resultado vem de encontro às observações feitas no experimento II, quanto à resistência de campo.

Analisando comparativamente as médias das populações em relação a PM e IR nota-se que materiais considerados altamente suscetíveis com 90% de PM, em média, como *L. saligna* PI 281876 e Nº 90023, *L. serriola* PI 273617, *L. sativa* PI 251245 e outros, situam-se entre os menos suscetíveis quando avaliados pelo IR. São justamente aquelas populações, que por apresentarem hábito de crescimento ereto e caules mais fibrosos, não permitem boas condições para o ataque rápido do patógeno. Embora doentes, estas plantas sobrevivem por um tempo significativamente maior.

Ao presente caso ajustam-se perfeitamente as considerações de CARDOSO (1967) de que a doença é um proces-

so dinâmico, resultante da interação patógeno, hospedeiro e meio ambiente, e é possível avaliá-la de dois modos diferentes. No primeiro, a avaliação é feita considerando-se o resultado final do processo, após um tempo determinado. No segundo modo, avalia-se a evolução do processo propriamente dito.

Uma das avaliações deste experimento III e as dos experimentos I e II foram feitas computando-se apenas o resultado final do processo patogênico, expresso em percentagem de plantas mortas (PM) no fim do experimento. Através deste método foi possível identificar uma fonte de resistência e avaliar grosseiramente os dois métodos de inoculação utilizados neste trabalho, mas não permitiu uma idéia clara da variação da resistência nos demais tratamentos.

Porém quando a doença foi avaliada pela evolução do processo patogênico, no experimento III, através do IR, foi possível diferenciar, coerentemente com as observações de campo, três grupos de populações quanto a reação ao *S. minor*: resistente, tolerante e suscetível.

O PI 271938 é indiscutivelmente o material de maior nível de resistência ao *S. minor*, desta coleção de germoplasma de *Lactuca*.

Pode-se dizer que os materiais tolerantes são aqueles que apresentam IR entre 13,04 a 10,88 e que na grande maioria são espécies selvagens de *Lactuca*, plantas herbáceas de hábito de crescimento ereto, caule bastante fibroso

e muitas apresentando um vigoroso crescimento vegetativo. Também estão neste grupo os cultivares de alface que apresentam as características estudadas por HAWTHORNE (1974) como folhas eretas e com pouco contato com o solo como 'Celtuce' do tipo aspargo, 'Gallega' do tipo latina e 'Valmaine' do tipo romana. Assim confirma-se as observações de NEWTON & SEQUEIRA (1972) e de HAWTHORNE (1974) de que há materiais que apresentam uma resistência de campo, por possuírem uma arquitetura foliar que não permite a formação de microclima favorável ao patógeno. Desse modo, a resistência é expressa por um atraso no aparecimento dos sintomas.

O último grupo é formado pelos materiais suscetíveis, com IR variando de 10,77 a 9,31. Observa-se, na Tabela 8, que são justamente os cultivares de alface do tipo manteiga, os mais suscetíveis nos cultivos comerciais, que apresentam os valores mais baixos de IR. Estes dados também estão de acordo com aqueles encontrados por HAWTHORNE (1974).

Como NEWTON & SEQUEIRA (1972) argumentaram, se a resistência de campo for somente o resultado de um mecanismo morfológico de escape ao ataque do patógeno, a seleção para tipos de plantas com cabeças de valor comercial poderá resultar em total perda desta resistência.

Pelos resultados obtidos, dados bibliográficos e observações de campo, verifica-se que o caráter resistência de campo ao *S. minor* não terá maior importância para o melhoramento da alface no Brasil, pois paradoxalmente se-

rão selecionadas plantas do tipo manteiga, com hábito de crescimento em roseta, com folhas basais largas, formando um ângulo reto em relação ao solo e folhas internas embricadas para formar cabeças bem fechadas, pouca fibra e pendoamento lento. Mesmo que a alface romana fosse o tipo preferido no mercado local, ainda assim seria muito questionável usar a resistência de campo como uma medida de controle ao *S. minor* porque, como HAWTHORNE (1974) enfatizou, ela é geneticamente suscetível ao patógeno e a severidade da doença sobre os tipos eretos de alface está condicionada pela densidade do inóculo no solo e pelas condições climáticas favoráveis ao patógeno.

Lactuca virosa apresentou, em todos os experimentos, um mecanismo de reação de resistência ao *S. minor* mais consistente. Desse modo *L. virosa* PI 271938 destacou-se como a única fonte de resistência genética a este patógeno, dentre as populações da coleção de germoplasma de *Lactuca* avaliadas neste trabalho.

4.1.5. Reação do híbrido F_1 (*L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938) e dos parentais em experimento com folhas destacadas. Experimento IV.

Os dados da análise de variância referentes à reação foliar do F_1 (*L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938) e de seus parentais ao *S. minor*, expressa em porcentagem de área foliar atacada, em quatro períodos de avaliação, estão no Apêndice 3.

O quadrado médio relativo à fonte de variação genótipos (parcela) não foi significativo contrariando o resultado esperado. Provavelmente isto foi devido ao reduzido número de repetições, o que causou uma menor precisão experimental, indicada pelo coeficiente de variação "a" igual a 38,76%. No entanto os quadrados médios de períodos de avaliação (subparcela) e da interação genótipos x períodos de avaliação mostraram-se significativos ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de F. O coeficiente de variação "b", igual a 9,87%, indicou uma razoável precisão experimental.

O desdobramento genótipos dentro de cada período de avaliação mostrou que houve diferenças significativas entre genótipos no 3º e 4º período (Apêndice 3). Isto indica que a reação de resistência dos genótipos variou diferentemente para cada período. Este resultado é expresso com maior clareza na Figura 2 pelos diferentes graus de inclinação das retas obtidas, para os três genótipos, pela regressão linear simples dos valores de área foliar atacada por *S. minor*, em função dos quatro períodos de avaliação. A percentagem de área foliar atacada aumentou com o passar do tempo, como era esperado, mas de uma forma mais acentuada nas folhas de *L. sativa* cv. Maioba.

Na Tabela 9 encontram-se as percentagens médias de área foliar atacada dos três genótipos testados nos quatro períodos e a comparação destas médias pelo teste de Tukey.

Tabela 9. Reação foliar do híbrido F_1 *L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938 e dos parentais ao *S. minor*, expressa em % de área foliar relativa atacada, em quatro períodos de avaliação. Experimento IV. Dados transformados em $\sqrt{\%/100}$.

Genótipos	Período de avaliação (nº dias pós-inoculação)			
	1	2	3	4
	(5)	(6)	(7)	(8)
Maioba (A)	23,06 a	37,63 a	63,79 a	89,05 a
PI 271938 (B)	20,73 a	39,94 a	51,53 b	66,8 b
F_1 (AxB)	20,19 a	30,36 a	43,42 b	59,90 b

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5%, para cada período.

Nos primeiros dois períodos os valores observados não diferiram entre si, mas nos dois últimos houve diferença significativa entre o cultivar Maioba, suscetível ao *S. minor* e a introdução PI 271938 de *L. virosa*, resistente.

Convém destacar que o híbrido interespecífico entre o parental resistente e o suscetível mostrou uma reação de resistência levemente superior a do parental resistente, durante toda a condução do experimento, conforme mostram as Figuras 2 e 3 e a Tabela 9.

Figura 2. Regressão linear simples dos valores de área foliar atacada por *Sclerotinia minor* (%) observados em função de quatro períodos de avaliação para três genótipos de *Lactuca sp.*

Figura 3. Reação foliar de *Lactuca* sp. ao *Sclerotinia minor* 7 dias após a inoculação. A - *L. sativa* cv. Maioba (suscetível); B-F, (Maioba x PI 271938), C - *L. virosa* PI 271938 (resistente).

Embora os resultados tenham sido obtidos de uma pequena amostragem, que originou valores muito variáveis, gerando uma baixa precisão experimental, não é possível desprezã-los pois se constituem em um indicativo importante de que a resistência de *L. virosa* ao *S. minor* pode ser transferida para *L. sativa*.

De um modo geral, a metodologia empregada usando folhas de alface destacadas, para a avaliação da reação ao *S. minor*, mostrou-se adequado, mesmo considerando-se que *S. minor* não é propriamente um patógeno foliar.

Anteriormente Stevens e Hall⁵ e Ransey⁶ citados por CHAVES (1961) já haviam usado a técnica de folhas de alface destacadas para o estudo da infecção causada por ascorpos de *S. sclerotiorum*.

O emprego desta metodologia comprovou algumas das vantagens citadas por YARWOOD (1946) como economia de espaço e material do hospedeiro, menor quantidade de inóculo, facilidade em se fazer as observações.

Por outro lado EENINK & DE JONG (1982) argumentaram que o uso de folhas destacadas, cotilédones ou discos foliares permitem a superação de boa parte das influências ambientais, tornando muito eficiente a avaliação da resistência de um grande número de materiais bem como de populações segregantes. Mas estes autores alertam que é necessário cuidado na interpretação dos resultados, lembrando que é preciso correlacionar as reações foliares com as das plantas adultas no campo.

No presente caso, a reação do PI 271938 e do cultivar Maioba em condições de campo, avaliada no experi-

⁵STEVENS, F.L. & HALL, J.G. A serious lettuce disease (sclerotiose) and a method of control. North Carol. Agr. Exp. Sta. Tech. Bul. 8: 87-146, 1911.

⁶RAMSEY, G.B. Sclerotinia species causing decay of vegetables under transit and market conditions. Jour. Agr. Res. 31: 597-632, 1925.

mento III através da percentagem de plantas mortas e do índice de resistência (Tabelas 7 e 8) permite confirmar a reação foliar de resistência e de suscetibilidade, respectivamente de cada material, como está evidenciado na Figura 3.

4.2. HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA EM *Lactuca*.

4.2.1. Obtenção de híbridos F₁ do cruzamento

L. sativa x *L. virosa*

A Tabela 10 resume os resultados dos trabalhos de hibridação interespecífica entre *L. sativa* e *L. virosa*, realizadas em três períodos diferentes.

As combinações parentais entre os materiais das duas espécies não foram previamente determinadas. Os cruzamentos foram casuais e condicionados ao florescimento de *L. virosa*. Na primeira etapa dos cruzamentos, praticamente não se conhecia nada da ecofisiologia das espécies selvagens de *Lactuca*.

O polinizador *L. virosa* é bienal e requer obrigatoriamente um período de vernalização, na fase de roseta, para ser induzido ao florescimento. A diferenciação floral inicia e ocorre estimulada por fotoperíodo longo e temperatura elevada. Dessa forma, *L. virosa* é incapaz de entrar naturalmente na fase reprodutiva após a vegetativa, no mesmo ano. (PRINCE, 1980).

Tabela 10. Hibridação interespecífica de *Lactuca sativa* x *L. virosa* expressa em número médio de sementes por capítulo (NSC) e número de plantas obtidas (NP).

Período	Cruzamentos		NCP	NS	NSC	NP
1º (out/85- mar/86)	PI 251245 x PI 271938		26	12	0,46	0
	PI 250020 x PI 271938		111	34	0,31	0
	Gorga A-11-76 x PI 271938		150	18	0,12	0
	Grand Rapids x PI 271938		150	78	0,52	0
	Brasil 221 x PI 271938		70	10	0,14	0
	Áurea x PI 271938		25	0	0	0
	Gorga A-11-76 x PI 274375		25	3	0,12	0
	Grand Rapids PI 274375		150	89	0,59	0
2º (mai/86-	Brasil 221 x PI 274375		100	20	0,20	0
	PI 251245 x PI 271938		120	40	0,33	0
	PI 250020 x PI 271938		27	1	0,04	0
	Regina 49 x PI 271938		10	0	0	0
	Gorga A-1176 x PI 271938		80	11	0,14	0
	Maioba x PI 271938		138	89	0,64	8*
	Regina 49 x PI 274375		15	0	0	0
3º (nov/86- ago/87)	Maioba x PI 274375		130	99	0,76	3*
	Maioba x PI 271938		327	199	0,61	9*
	Controle Maioba		30	533	17,77	-
	Controle PI 271938		30	353	11,90	-

NCP = número de capítulos polinizados

NS = número de sementes colhidas

* = plantas obtidas através de cultura 'in vitro' de embriões.

No primeiro período *L. virosa* foi semeada em 12/4/85, como as demais espécies, e enquanto a maioria das populações floresceram entre 30/6/85 e 15/8/85, *L. virosa* só veio a florescer em 08/10/85. Na tentativa de obter-se a coincidência de florescimento entre as espécies, foram feitos plantios escalonados.

O segundo período de cruzamentos iniciou em maio de 1986, quando novas plantas de *L. virosa* floresceram. Estas plantas, cuja semeadura ocorreu em 15/01/86, foram tratadas com ácido giberélico a 50 ppm, para indução artificial ao florescimento e este tratamento provocou uma resposta satisfatória, antecipando o florescimento em dois meses, em comparação com o primeiro período.

Outro tratamento que mostrou ser interessante foi a poda da haste floral, forçando a emissão lateral de ramos floríferos, o que, em alguns casos, permitiu dilatar o período de florescimento de *L. virosa* por quatro meses.

Estes procedimentos viabilizaram uma maior coincidência de florescimento entre as espécies em questão.

Com exceção dos cruzamentos Áurea x PI 271938, no primeiro período e Regina 49 x PI 271938 e Regina 49 x PI 274375 todos os demais produziram sementes híbridas (Tabela 10. Estas sementes foram facilmente reconhecidas por apresentarem coloração mais clara, serem enrugadas, muito pequenas ou atrofiadas, em alguns casos parecendo haver somente o tegumen-

to, enquanto as sementes oriundas de autopolinização eram normais. Estas mesmas características foram observadas por LINDQVIST (1960a) e EENINK et alii (1982) em sementes de F_1 (*L. sativa* x *L. virosa*).

Os resultados obtidos confirmaram as observações de LINDQVIST (1960), EENINK et alii (1982), MAXON SMITH (1984) e MAISONNEUVE (1987) de que há uma variação no grau de compatibilidade entre materiais de *L. sativa* e *L. virosa*. Há materiais de *L. sativa* que são mais compatíveis com *L. virosa* em termos de hibridação, fato que pode ser observado na Tabela 10, através do indicador expresso pelo número médio de sementes produzidas por capítulo. Os cultivares Grand Rapids no primeiro período, e Maioba, no segundo, cruzados com as introduções PI 271938 e PI 274375 de *L. virosa*, apresentaram o melhor desempenho.

Os cultivares Áurea e Regina 49, respectivamente no primeiro e segundo períodos cruzados com *L. virosa*, foram os exemplos de cruzamentos mal sucedidos, onde não houve formação de sementes híbridas.

Das introduções selvagens de *L. sativa*, o PI 251245 parece ter maior afinidade genética com o PI 271938 de *L. virosa* do que o PI 250020, pelos dados obtidos no primeiro e segundo períodos, mas ao contrário do que LINDQVIST (1960a) observou nos seus experimentos, estas formas selvagens não se destacaram quanto à capacidade de combinação com *L. virosa*, em comparação com as variedades cultivadas usadas neste trabalho.

Por outro lado, também há diferenças entre as introduções de *L. virosa*. No presente trabalho obteve-se um menor número médio de sementes por capítulo no cruzamento Maioba x PI 271938 do que no Maioba x PI 274375. No entanto, as sementes provenientes deste último eram de pior qualidade, muito mais rudimentares e mal formadas, o que posteriormente se traduziu em um menor número de plantas. Fatos semelhantes foram notificados por LINDQVIST (1960a), MAXON SMITH (1984) e MAISONNEUVE (1987).

As sementes híbridas obtidas no primeiro período de cruzamento foram semeadas no sistema "speedling", com substrato autoclavado, mas não conseguiram germinar. Como todas as sementes F_1 , pelas suas características deveriam possuir embriões rudimentares, então o insucesso na obtenção de plantas foi devido à inadequação do método de propagação.

A partir do segundo período, todas as sementes híbridas foram colocadas em meio apropriado para cultura 'in vitro' de embrião, cuja metodologia foi apresentada no item 3.6. Na cultura 'in vitro' muitas sementes germinaram, mas um significativo número de plântulas oxidaram e morreram poucos dias após. Somente obtiveram-se plantas dos cruzamentos envolvendo o cultivar Maioba com as introduções de *L. virosa* (Tabela 10).

Maioba (Figura 4) é um cultivar rústico, que não forma cabeça, bastante produtivo e de pendoamento rã-

pido (ZATARIN, 1985). Segundo KERR⁶ este material provavelmente foi introduzido no Maranhão por volta de 1.600 por colonizadores portugueses e adaptou-se muito bem às condições da Ilha São Luiz, onde é tradicionalmente cultivado.

A introdução PI 271938 de *L. virosa* (Figura 5) por ter sido identificada como uma fonte de resistência ao *S. minor*, tornou-se o material mais importante deste trabalho.

Como, aparentemente, a melhor combinação parental ocorreu entre Maioba e o PI 271938, no terceiro período trabalhou-se exclusivamente com estes materiais para melhor caracterizar o híbrido entre eles.

No terceiro período obteve-se, em média, 0,61 semente por capítulo no cruzamento Maioba x PI 271938, dado que concorda com o anteriormente obtido, que foi de 0,64 (Tabela 10). No entanto, a avaliação do número de plantas ficou prejudicada devido à ocorrência de perdas por contaminação do meio de cultura para embrião, resultante principalmente da deficiência no fechamento dos tubos. Mesmo assim, foram obtidas 9 plantas híbridas, que, superada a fase de adaptação após a cultura 'in vitro', mostraram-se muito vigorosas e com características intermediárias dos pais, o que se pode concluir pela observação das Figuras 4, 5 e 6. Os híbridos (Figura 6) apresentaram pigmentação na nervura central e na lâmina foliar como *L. virosa* e hábito anual como *L. sativa*, características também observadas por THOMPSON et alii (1941).

⁶ KERR, E.W. (Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Biologia, São Luiz). Comunicação pessoal, 1987.

Figura 4 - *Lactuca sativa* cv. Maioba

Figura 5 - *Lactuca virosa* PI 271938

Figura 6. Híbrido F_1 (*Lactuca sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938).

As plantas F_1 exibiram um curto período vegetativo (fase de roseta) seguido da elongação dos internós superiores e a formação da haste floral. Logo após ocorreu a diferenciação floral e, do mesmo modo como PRINCE (1980) observou em *L. serriola*, houve um curto período de alta taxa de crescimento, com uma acelerada elongação dos ramos floríferos. Nesta fase observou-se, em várias plantas híbridas, a ocorrência de uma anormalidade. Os ramos em intenso crescimento passavam a apresentar uma súbita murcha, ficando flácidos e pendentes, com grande exudação de látex após um ou dois dias. Finalmente desenvolvia-se uma necrose na ponta dos ramos envolvendo botões florais (capítulos) ainda em desenvol-

vimento e até mesmo flores já polinizadas artificialmente.

Os sintomas deste distúrbio parecem estar ligados a deficiência de cálcio (Milliaway & Wilersholm⁷ citados por CASTELLANE, 1988).

Anomalia semelhante foi registrada por MAISON NEUVE (1987) em híbridos F_1 (*L. sativa* x *L. saligna*).

Esta desordem, aparentemente fisiológica, acarretou a perda de vários cruzamentos e retrocruzamentos e limitou a obtenção de dados nos dois primeiros períodos de trabalho.

Dos vários procedimentos adotados para tentar superar o problema, as pulverizações foliares quinzenais com cálcio e boro (item 3.5) mostraram-se eficientes e foram realizadas como tratamento preventivo de rotina.

Os híbridos herdaram de *L. virosa* o caráter bracteas reflexas, que não mantêm protegidos os aquênios no capítulo, permitindo que, quando maduros, seja intensa a sua dispersão. Isto dificultou a colheita e ocasionou perdas de sementes. Este caráter, que é a expressão de um gene dominante, tem sido encontrado somente nas espécies selvagens, com exceção de *L. altaica* (WHITAKER & MCCOLLUM, 1964; LINDQVIST, 1956).

⁷ MILLIAWAY, R.M. & WILERSHOLM, E.A. Calcium and metabolic disorders. Commum. Soil Sci. Plant Anal., 10: 1 - 28, 1979.

As plantas híbridas que atingiram a maturidade e floresceram, mostraram-se altamente estéreis. O mesmo fato foi observado por THOMPSON et alii (1941), LINDQVIST (1960a), NORWOOD et alii (1980), EENINK et alii (1982) e MAXON SMITH (1984).

Em uma única planta foi verificada a presença de poucos e muito pequenos grãos de pólen aderidos aos estigmas, mas apesar de várias tentativas de autopolinização, não obteve-se sementes F_2 . Nas flores das demais plantas híbridas notou-se a presença de anteras murchas e sem grãos de pólen. EENINK et alii (1982) comentaram que a esterilidade masculina dos híbridos interespecíficos entre *L. sativa* e *L. virosa*, apresenta uma gradação. Há plantas que não produzem sementes após autopolinização porque não têm grãos de pólen ou porque estes são anormais.

Neste trabalho observou-se que os híbridos permaneciam com as flores abertas por um maior período de tempo do que as plantas progenitoras. Em alguns casos as flores das plantas híbridas permaneciam abertas até às 16:00, enquanto as de 'Maioba' fechavam às 11:00 e as do PI 271938 às 12:00. Esta característica apresentada por híbridos interespecíficos de *Lactuca* foi correlacionada por EENINK et alii (1982a) com falhas na microsporogênese e com a menor quantidade e qualidade do pólen, isto é, com aspectos da esterilidade. Estes autores afirmaram que a característica pode ser útil para identificar rapidamente casos de esterilidade masculina e

feminina após autopolinização, fazendo-se uma observação macroscópica do comportamento de fechamento das flores, quando esta planta é autopolinizada naturalmente ou cruzada.

Tanto a inviabilidade das sementes híbridas como a esterilidade das plantas se constituem em barreiras interespecíficas presentes no cruzamento *L. sativa* x *L. viro*-*sa*.

4.2.2. Retrocruzamento (*L. sativa* x *L. virosa*) x *L. sativa*

Oito plantas do F_1 (*L. sativa* cv. Maioba x *L. virosa* PI 271938) foram retrocruzadas com Maioba, o progenitor masculino, mas somente duas chegaram a produzir sementes F_1RC_1 . De 53 capítulos, polinizados artificialmente, obteve-se somente oito sementes de aparência quase normal e com as características de *L. virosa*. Este retrocruzamento produziu, em média, 0,15 sementes por capítulo. Apesar de ser muito baixo, este valor é bastante importante porque vem demonstrar que existe um baixo grau de fertilidade feminina no híbrido (*L. sativa* x *L. virosa*).

Das oito sementes F_1RC_1 , colocadas em meio de cultura para embrião, somente uma germinou, originando uma plântula perfeita e vigorosa (Figura 10). Porém, perdeu-se acidentalmente este material durante a fase de adaptação, logo após seu transplante do tubo para vaso.

Os resultados acima vem de encontro aos de MAXON SMITH (1984) que em 135 capítulos polinizados obteve 19 sementes F_1RC_1 . Destas, somente cinco germinaram. Duas plantas morreram antes do florescimento, uma foi completamente estéril e as duas restantes chegaram a produzir sementes.

MAISONNEUVE (1987) retrocruzou híbridos F_1 (*L. sativa* x *L. virosa*), com quatro combinações parentais diferentes, usando como polinizadores sete variedades cultivadas de alface e obteve resultados semelhantes aos acima comentados, mas notificou que o maior ou menor sucesso na obtenção de sementes e plantas F_1RC_1 está também na dependência da harmonia entre os genomas parentais envolvidos.

4.2.3. Cruzamento ponte entre *L. sativa*, *L. serriola* e *L. virosa*

4.2.3.1. Obtenção de híbridos F_1 (*L. sativa* x *L. serriola*)

Dezenas de cruzamentos de maneira recíproca foram feitos entre *L. sativa* (Vitória de Santo Antão, Gorga A-11-4, Babá, Aurélia, Grand Rapids, Brasil 221, Valmaine, White Boston, Áurea e Celtuce) e *L. serriola* (PI 274372, PI 271939 e PI 273617).

A produção de sementes híbridas foi normal. Em avaliações preliminares registrou-se uma produção média de 14 a 18 sementes por capítulo.

As plantas F_1 não apresentaram irregularidades e em algumas combinações parentais o efeito da heterose foi bastante evidente. Os híbridos apresentaram, predominantemente, características do progenitor selvagem, *L. serriola*, como observado por WHITAKER & JAGGER (1939) e THOMPSON et alii (1941).

O florescimento foi normal e as plantas F_1 produziram sementes viáveis, sem mostrarem sinais evidentes da existência de algum tipo de esterilidade parcial, em nenhuma combinação parental, ao contrário do observado por LINDQVIST (1960a,b) entre certos F_1 (*L. sativa* x *L. serriola*) e suas gerações segregantes.

Resultados semelhantes aos do presente trabalho indicaram que não há nenhuma barreira à hibridação ou à transferência de genes entre *L. sativa* x *L. serriola* (GLOBERSON et alii, 1980; NORWOOD et alii, 1980; EENINK et alii, 1982a e MAXON SMITH, 1984).

4.2.3.2. Obtenção de híbridos F_1

(*L. serriola* x *L. virosa*)

Os resultados dos cruzamentos envolvendo *L. serriola* (PI 274372, PI 271939 e PI 273617) e *L. virosa* (PI 271938 e PI 274375) estão na Tabela 11.

Como era esperado, de acordo com relatos de LINDQVIST (1960a) e EENINK et alii (1982a), os cruzamentos

Tabela 11. Híbridação interespecífica de *L. serriola* x *L. virosa* e cruzamento (*L. sativa* x *L. serriola*) x *L. virosa*, expresso em número médio de sementes por capítulo (NSC) e número de plantas obtidas (NP).

Período	Cruzamentos	NCP	NS	NSC	NP
Abr/ Jul/86	PI 274372 x PI 271938	60	13	0,22	3 *
	PI 271939 x PI 271938	182	78	0,43	1 *
	PI 273617 x PI 271938	90	16	0,18	0
	PI 274372 x PI 274375	110	18	0,16	1 *
Ago/ Out/86	PI 271939 x PI 274375	50	14	0,28	0
	PI 273617 x PI 274375	58	10	0,17	0
Ago/ Out/86	('Valmaine x PI 271939) x PI 271938	56	107	1,91	6 **
	Controle ('Valmaine' x PI 271939)	20	348	17,40	-

NCP = número de capítulos polinizados

NS = número de sementes colhidas

* = plantas obtidas através do sistema "speedling"

** = plantas obtidas pela cultura 'in vitro' de embriões

entre *L. serriola* e *L. virosa* apresentaram problemas devido a barreiras interespecíficas, a semelhança do que foi comentado no item 4.2.1 sobre a obtenção de híbridos F_1 (*L. sativa* x *L. virosa*).

Os cruzamentos entre materiais das espécies em questão também produziram um reduzido número de sementes pequenas e mal formadas e mostraram que houve diferenças na congruência entre as combinações parentais. O parâmetro que mostrou este fato foi o número médio de sementes por capítulo. Entre os materiais de *L. serriola* destacou-se o PI-271939, pois quando polinizado por *L. virosa* PI 271938 ou PI 274375 produziu, respectivamente, 0,43 e 0,28 sementes por capítulo, os maiores valores observados entre os cruzamentos destas espécies. Por sua vez, também registrou-se diferenças entre os materiais de *L. virosa*. Observando-se a Tabela 11, nota-se que as introduções de *L. serriola*, quando polinizadas pelo PI 271938 produziram relativamente um número maior de sementes por capítulo, do que quando polinizadas pelo PI-274375. Neste trabalho a melhor combinação parental obtida entre *L. serriola* e *L. virosa*, em relação ao número médio de sementes por capítulo, foi (PI 271939 x PI 271938). O PI 271938 de *L. virosa* confirmou desse modo sua melhor capacidade de combinação já observada na Tabela 9, nos cruzamentos com *L. sativa*.

As sementes F_1 (*L. serriola* x *L. sativa*) foram semeadas no sistema "speedling", onde somente cinco plân-

tulas foram obtidas (Tabela 11). Como comentado no item 4.2.1, este sistema não foi adequado porque sendo as sementes pequenas e mal formadas, possivelmente os embriões eram rudimentares e sem reservas suficientes para uma efetiva germinação no substrato usado. Dessa forma, os resultados obtidos, quanto ao número de plantas híbridas, são inconclusivos.

Todos os cinco híbridos foram inviáveis. Do cruzamento PI 274372 x PI 271938 obteve-se três plantas mal formadas onde o sistema radicular era ausente ou atrofiado, apresentaram necrose letal nas folhas e morreram ainda no estágio de plântulas. EENINK *et alii* (1982a) citaram a ocorrência de sintomas semelhantes em híbridos F_1 dos cruzamentos (*L. sativa* cv. Susan x *L. virosa* PIVT 280 ou α 73723).

A única planta do cruzamento PI 271939 x PI-271938 mostrou-se muito raquítica e após um mês, aproximadamente, desenvolveu uma coloração avermelhada e foi definhando até morrer. Estes sintomas, entre outros, foram observados por LINDQVIST (1960a) em híbridos entre *L. virosa* e *L. altaica*, esta última tida como uma variante da forma selvagem de *L. sativa*.

A outra planta obtida foi do cruzamento PI 274372 x PI 274375, que apresentou um desenvolvimento normal durante a fase de crescimento vegetativo, mas com o início da formação da haste floral paralizou seu crescimento ficando enfezada. Houve um início de formação dos botões florais,

porém, ocorreu uma necrose generalizada dos mesmos e a planta morreu antes do florescimento; como os híbridos F_1 (*L. sativa* cv. Berliner x *L. virosa* K) obtidos por LINDQVIST (1960a).

Desse modo, por impropriedade do método de propagação e inviabilidade dos híbridos não houve êxito na obtenção de plantas F_1 (*L. serriola* x *L. virosa*) para servir de elemento ponte nos cruzamentos planejados com *L. sativa*.

4.2.3.3. Cruzamento ponte

(*L. sativa* x *L. serriola*) x *L. virosa*

Foi possível realizar um único cruzamento ponte devido a uma série de limitações como a não obtenção de híbridos F_1 (*L. serriola* x *L. virosa*) e a não coincidência de florescimento entre vários F_1 (*L. sativa* x *L. serriola*) e *L. virosa*. Uma outra dificuldade surgida foi a falta de espaço nas casas de vegetação fazendo com que os F_1 tivessem que ser mantidos no campo. O florescimento de um significativo número de plantas coincidiu com os períodos chuvosos de meados de agosto de 1986. As condições ambientais dificultaram a realização das hibridações e além disso intensificou-se a ocorrência de patógenos como *Septoria*, nas folhas, e *Botrytis*, nos botões florais, causando perdas em muitos cruzamentos e até mesmo plantas.

Optou-se então por trabalhar mais intensivamen

te com um número limitado de plantas transferidas para casa telada coberta com filme plástico de polietileno. Escolheu-se o híbrido (Valmaine x PI 271939) para ser o progenitor materno no cruzamento ponte com *L. virosa* PI 271938 por estar, na época, em pleno florescimento e por ter parte do genoma proveniente do PI 271939, introdução de *L. serriola* que, aparentemente, poderia melhor harmonizar-se com o PI 271938 (Tabela 11).

Os resultados da Tabela 11 mostram que, quanto ao número médio de sementes por capítulo, o valor obtido, 1,91 sementes, excedeu as expectativas quando comparado com 0,79 sementes por capítulo, em média, conseguidos por EENINK et alii (1982a) nos cruzamentos ponte entre (*L. serriola* PIVT 254 ou 255 x *L. sativa* cvs. Magiola ou Deci-minor) e *L. virosa* PIVT 280 ou cd 73723. Sob este aspecto pode se considerar (Valmaine x PI 271939) x PI 271938 como um cruzamento interespecífico interessante.

As sementes eram muito pequenas e atrofiadas e foram colocadas em um meio nutritivo para cultura de embrião. Várias sementes chegaram a germinar, mas as plântulas oxidaram logo. Quatro plantas foram perdidas durante a fase de adaptação e somente seis conseguiram se desenvolver normalmente. EENINK et alii (1982a) obtiveram resultados semelhantes.

As plantas oriundas do cruzamento ponte (Figura 7) mostraram-se bastante vigorosas, com características in

intermediárias entre *L. serriola* e *L. virosa*, em nada lembrando o cultivar Valmaine. Floresceram abundantemente mas mostraram-se estéreis.

Figura 7. Híbrido F₁ (*L. sativa* cv. Valmaine x *L. serriola* PI 271939) x *L. virosa* PI 271938.

A esterilidade em cruzamento ponte envolvendo *L. sativa*, *L. serriola* e *L. virosa* foi notificada por THOMPSON & RYDER (1961) e EENINK *et alii* (1982a). Os últimos autores conseguiram mostrar a existência de uma fertilidade feminina parcial, através de centenas de retrocruzamentos. A fertilidade feminina, expressa em número de sementes por capítulo polinizado artificialmente, sofreu aumentos consec-

tivos de 0,15, 0,19 e 7,10 sementes nas três primeiras gerações de retrocruzamentos. A esterilidade masculina também sofreu mudanças, pois os autores verificaram que a partir da terceira geração houve a formação de algumas sementes resultantes de autopolinização. Conforme os mesmos pesquisadores este restabelecimento gradual da fertilidade através das gerações foi devido a um aumento da recombinação genética. Ainda sobre estes resultados EENINK et alii (1982a) comentaram que não há correspondência direta entre a fertilidade feminina e a masculina nestes híbridos e isto implica em que diferentes genes governam ambas as características.

Infelizmente, no presente trabalho, o F_1 originado do cruzamento ponte não sofreu retrocruzamentos e não se tem dados para confrontar com os de EENINK et alii (1982a). Analisando-se de um modo geral os cruzamentos *L. sativa* x *L. virosa* e *L. serriola* x *L. virosa*, nas Tabelas 10 e 11, verifica-se que o cruzamento ponte (Valmaine x PI 271939) x PI-271938, envolvendo as três espécies, criou um conjunto gênico mais harmônico, expresso através da formação de um maior número de sementes F_1 por capítulo.

4.2.4. Tentativas de obtenção do F_2 (*L. sativa* x *L. virosa*) através da poliploidização

Os resultados das tentativas de poliploidização do F_1 (*L. sativa* cv. Maicoba x *L. virosa* PI 271938) estão na Tabela 12.

Tabela 12. Comparação de métodos para indução de poliploidia no híbrido F_1 *Lactuca sativa* x *L. virosa*, quanto a percentagem de gemas atrofiadas, mortalidade de plantas e número de poliplóides.

Tratamentos	Colchicina (%)	Tempo de exposição (h)	Nº de plantas trat.	Nº de gemas atrofiadas trat.	Gemas atrofiadas (%)	Plantas mortas (%)	Nº de poliplóides
Gotejamento sobre gemas axilares de plântulas	0,2	24	4	17	100	100	0
Controle	0,0	24	2	9	0	0	0
Algodão embebido sobre gemas axilares de plantas adultas	0,1	12	3	9	100	0	0
	0,1	24	3	9	100	0	0
	0,1	48	3	9	100	0	0
Controle	0,0	48	3	9	0	0	0

O gotejamento de solução de colchicina a 0,2%, por 24 horas, sobre gemas axilares do híbrido interespecífico provocou o atrofiamento das gemas. Num período de 15 dias todas as plântulas tratadas morreram.

Como a primeira tentativa foi desastrosa e não havia mais disponibilidade de plantas jovens, fez-se uma segunda, usando a metade da concentração anterior e variando o tempo de contato dos tecidos vegetais com o alcalóide. Mas, a aplicação de algodão embebido em colchicina a 0,1% por 12, 24 e 48 horas, sobre gemas axilares de plantas adultas, também provocou um severo retardamento das mesmas. Em algumas gemas notou-se um crescimento incipiente dos tecidos foliares, que eram espessos e deformados, porém definharam e nenhum ramo poliplóide desenvolveu-se.

Apesar do total insucesso na obtenção de poliplóides, alguns pontos merecem ser discutidos com base na literatura e nos procedimentos adotados nestes ensaios.

LINDQVIST (1960a), tratando com colchicina plântulas do híbrido F_1 (*L. sativa* SL x *L. viçosa* K), que era totalmente estéril, conseguiu sementes tetraplóides, e estas originaram uma geração F_2 tetraplóide. THOMPSON & RYDER (1961) também usaram colchicina para poliploidizar um híbrido F_1 complexo, envolvendo *L. sativa*, *L. serriola* e *L. viçosa*, e que apresentou completa esterilidade. Conseguiram um tetraplóide fértil que foi retrocruzado com *L. sativa* cv. Red Benson. No entanto, nenhum dos trabalhos citados elucidaram como foram obtidos os anfidiplóides.

Trabalhos clássicos sobre a poliploidização em alface indicam como um dos métodos mais eficientes o tratamento de sementes com solução de colchicina (THOMPSON & KOSAR, 1938; HIRAOKA, 1967; EENINK & ALVAREZ, 1975). Todavia, os tetraplóides obtidos através deste procedimento também podem apresentar uma série de distúrbios como retardamento ou ausência do crescimento radicular (THOMPSON & KOSAR, 1938), folhas anormais, quimerismo (EENINK & ALVAREZ, 1975), baixa fertilidade (HIRAOKA, 1967; EENINK, 1980).

SCHIFFINO (1985), discutindo a eficiência de métodos de poliploidização em *Trifolium*, afirmou, citando vários exemplos em outros gêneros, que o tratamento de sementes com colchicina, em geral, é muito drástico, provocando alta taxa de mortalidade das plântulas.

Com estas referências e considerando a redução da quantidade e viabilidade das sementes F_1 (*L. sativa* x *L. virosa*), optou-se, num primeiro momento, por usar plântulas obtidas através da cultura de embriões.

Sem informações objetivas, na época da execução dos ensaios, sobre dosagens e tempo de aplicação da colchicina em plantas de *Lactuca*, adotou-se procedimentos usados com sucesso em plantas de outros gêneros (WERNER, 1983; SCHIFFINO, 1985), descritos em 3.5.3.

Posteriormente tomou-se conhecimento das pesquisas de MAXON SMITH (1984) que, aplicando colchicina a 0,4%, por 2 a 4 horas, em gemas axilares de plantas estéreis do F_1

(*L. sativa* cv. Dandie x *L. virosa* B9056), obteve ramos poliplóides e sementes C_1 que originaram plantas tetraplóides parcialmente férteis.

Mais recentemente, MAISONNEUVE (1987) aplicou discos de um meio gelatinoso contendo 5 ppm de colchicina sobre gemas axilares de plantas jovens do F_1 (*L. sativa* x *L. saligna*) e conseguiu obter sementes F_2 nas plantas tratadas. A autora não fez referências sobre o tempo de aplicação da colchicina, mas, mesmo sem esta informação, pode se concluir que a ação da droga foi suave, uma vez que a dosagem usada por ela, 5 ppm (0,0005%) foi baixíssima, em comparação com a solução de 0,2%, gotejada por 24 horas nas plântulas testadas neste trabalho.

Analizando-se a segunda tentativa de poliploidização, onde usou-se uma metodologia semelhante à de MAXON SMITH (1984), verifica-se que o tempo de permanência da droga em contato com as gemas, 12, 24 ou 48 horas, foi longo. Embora MAXON-SMITH (1984) tenha usado uma dosagem quatro vezes maior de colchicina, esta foi aplicada durante um período bem menor: 2 ou 4 horas.

O atrofiamento das gemas e a morte das plântulas possivelmente ocorreu devido a ação tóxica da colchicina, causando alterações morfológicas e/ou fisiológicas, nem sempre ligadas à duplicação do número cromossômico. No tratamento por gotejamento a fitotoxicidade pode ter sido causada por um efeito aditivo da concentração e do tempo de aplica-

ção da colchicina, enquanto no tratamento com algodão, ela foi causada pelo excessivo tempo de aplicação.

Quanto à mortalidade de plântulas híbridas, não se pode descartar a hipótese de que possa ser também devida a outros problemas, associados à desarmonia da combinação parental e/ou à fase de adaptação após o cultivo 'in vitro'.

Em função da metodologia usada e dos problemas da infraestrutura disponível, os resultados obtidos (Tabela 12) não são conclusivos, mas com base na literatura é possível inferir que, como técnica para superar a barreira da esterilidade em híbridos F_1 interespecíficos de *Lactuca*, o uso da poliploidização é questionável.

Os autotetraplóides ou anfidiplóides derivados de plantas diplóides são geralmente pouco vigorosos e semi-férteis (STALKER, 1980). No processo de seleção pode ser difícil e trabalhosa a identificação de plantas $4n$, $3n$ e $2n$ de *Lactuca*, exigindo a medição do comprimento de estômatos e do diâmetro de capítulos e grãos de pólen (EENINK & ALVAREZ, 1975; EENINK, 1980) ou a contagem de cromossomos (LINDQVIST, 1960a; MAXON SMITH, 1984).

A poliploidização dos F_1 interespecíficos gera certo grau de fertilidade, permitindo a obtenção de sementes C_1 , mas o problema é transferido às gerações posteriores, como atesta o trabalho de MAXON SMITH (1984) que, ao retrocruzar as gerações C_1 e C_2 em diante, obteve plantas tri

plóides altamente estéreis. Em comunicação pessoal a MAISON NEUVE (1987) o autor acima afirmou que é possível recuperar tipos interessantes diplóides, oriundos de híbridos interespecíficos poliploidizados, mas somente através de exaustivos retrocruzamentos e tentativas de autopolinização, por várias gerações.

4.3. CULTURA DE EMBRIÕES 'IN VITRO'

4.3.1. Comportamento de híbridos interespecíficos de *Lactuca* em diferentes meios de cultura

Os resultados da recuperação de híbridos F_1 interespecíficos de *Lactuca* sp, através da cultura de embrião nos meios L_1 , L_2 e T_0 estão na Tabela 13.

4.3.1.1. Meio de cultura L_1

A primeira tentativa de cultura de embriões F_1 (*L. sativa* cv. Maioba x *L. vícosa* PI 271933) foi realizada implantando-se 40 embriões imaturos no meio L_1 . um meio básico sem hormônios de crescimento (Tabela 3). Após uma semana as sementes começaram a germinar e, 20 dias após, as primeiras plântulas perfeitamente formadas foram transferidas para vasos.

Tabela 13. Recuperação de híbridos F_1 (*L. sativa* x *L. vírosa*), (*L. sativa* x *L. serviola*) x *L. vírosa* e F_1RC_1 (*L. sativa* x *L. vírosa*) x *L. sativa* através de cultura 'in vitro' de embriões rudimentares, em diferentes meios, expressa em percentagem de germinação (G%), número de plantas (PL) e percentagem de sementes que originaram plantas (SP%).

Período	Cruzamento	ME	NS	SG	G%	CA	OX	CT	PL	SP%
Set-Out/86	Maioba x PI 271938	L ₁	40	17	42	-	6	3	8	20
	Maioba x PI 271938	L ₁	20	20	100	-	9	5	6	30
		L ₂	20	10	50	7	7	-	3	15
Fev-jun/87	Maioba x PI 274375	L ₁	8	7	87	-	5	-	2	25
		L ₂	8	2	25	3	1	-	1	12
	(Valmaine x PI 271939) x	L ₁	40	9	22	-	5	2	2	5
		L ₂	40	5	12	9	4	-	4	10
Set/87	(Maioba x PI 271938) x Maioba	TO	8	1	12	-	-	-	1	12

ME = meios de cultura empregados

NS = número de sementes implantadas em meio de cultura

SG = número de sementes que germinaram

CA = número de calos formados

OX = número de plântulas oxidadas

CT = número de plântulas perdidas por contaminação

Ao final do ensaio conseguiu-se oito plantas vigorosas (Figura 6), sendo que sete apresentaram folhas de coloração verde-cinza, como o PI 271938, e uma, de menor porte, tinha folhas de coloração verde claro semelhante à Maioba. Todas as oito plantas floresceram cerca de 4 meses após o início da cultura de embrião.

Com 42% de germinação das sementes híbridas esperava-se obter um número maior de plantas, mas só 20% das sementes originaram plantas que completaram seu ciclo reprodutivo. Poucas sementes foram perdidas por contaminação do meio de cultura, porém perdeu-se seis plântulas por oxidação.

4.3.1.2. Eficiência e comparação dos meios

L_1 e L_2

Sementes rudimentares dos híbridos (Maioba x PI 271938), (Maioba x PI 274375) e (Valmaine x PI 271939) x PI 271938 foram cultivadas comparativamente nos meios de cultura L_1 e L_2 .

Cinco dias após a implantação dos embriões, em ambos os meios, (Maioba x PI 271938) e (Maioba x PI 274375) começaram a germinar.

Os híbridos oriundos do cruzamento ponte iniciaram a germinação três dias mais tarde. Uma semana após o início da germinação, várias plântulas de todos os cruzamentos, em am-

bos os meios, mostravam sinais de oxidação dos tecidos, principalmente da radícula. Foram feitas transferências para meios de cultura recém preparados, mas o procedimento não foi eficiente e ocorreu a total oxidação destes materiais.

No meio L_1 , apesar das perdas por oxidação, houve a formação de plântulas normais (Figura 8) e o resultado obtido neste segundo período, confirma o obtido no período anterior (Tabela 13), quando os dados são comparados são comparados relativamente, considerando-se apenas o mesmo material: $\bar{O} F_1$ (Maiba x PI 271938). A diferença entre os valores 42 e 100% de germinação em 20 e 30% de sementes que originaram plantas, obtidos respectivamente nos períodos setembro - outubro/86 e fevereiro - junho/87, são possivelmente devidas a influências ambientais. Estas atuaram tanto na ocasião da polinização e formação das sementes híbridas, por ter ocorrido em épocas diferentes, como durante a cultura 'in vitro' que foi realizada em locais diferentes e portanto sujeita a variações principalmente quanto à luminosidade e temperatura.

Nos dois ensaios houve significativa perda de plântulas por oxidação. Portanto, o meio L_1 precisa ser melhorado através da adição de substâncias anti-oxidantes como carvão ativado.

Dentre as sementes colocadas no meio L_2 que conseguiram germinar, uma parte apresentou plântulas com radículas grossas e curtas e folhas cotiledonares espessas, e outra parte apresentou plântulas muito disformes, todas sem radículas.

Figuras 8 a 10. Cultura de embriões interespecíficos de *Lactuca* 'in vitro'. 8 - híbrido F_1 (*L. sativa* x *L. virosa*) em meio L_1 ; 9 - híbrido F_1 (*L. sativa* x *L. virosa*) em meio L_2 ; 10 - híbrido F_1RC_1 (*L. sativa* x *L. virosa*) x *L. sativa* em meio TO.

As plântulas com radícula cresceram lentamente mas quando foram transferidas para vasos, desenvolveram-se de maneira normal. Nas plântulas sem raízes, verificou-se a formação de calos na região do hipocótilo e o desenvolvimento de folhas espessas, retorcidas e sem expansão do limbo foliar (Figura 9). Os calos cresceram rapidamente, apresentaram um aspecto friável e eram de coloração esverdeada, provavelmente devido ao seu cultivo na luz (2.000 Lux). Em sub-culturas no meio L_2 , os calos apresentaram processo de morfogênese somática com a formação de gemas adventícias anormais. Em alguns destes calos ocorreu o desenvolvimento de folhas grossas e retorcidas, mas não houve formação de raízes, no meio L_2 . Uma tentativa foi cultivar este material em meio L_1 e após várias sub-culturas, durante quatro meses, ocorreu a formação de raízes em diversos calos, possibilitando a recuperação de duas plantas do cruzamento Maioba x PI 271938 e três plantas do cruzamento ponte. A maioria dos calos não chegaram a formar raízes e perderam-se por completa oxidação.

Os resultados e observações da cultura de embrião no meio L_2 confirmaram algumas das observações feitas primeiramente por EENINK et alii (1982a). Estes autores conseguiram recuperar 34 plântulas de 130 sementes rudimentares de um cruzamento ponte (*L. serricola* x *L. virosa*) x *L. sativa*, através da cultura de embrião. Contudo não esclareceram se todas as 34 plântulas chegaram ao fim do ciclo e se também houve perdas por oxidação ou contaminação. Para não su-

pervalorizar seus dados, estima-se que obtiveram em torno de 26% de germinação, no meio L_2 . Dessa forma, não considerou-se este valor como sendo a percentagem de sementes que originaram plantas adultas. Mesmo com este artifício não é aconselhável uma comparação direta entre os seus dados e os da presente investigação, em função das implicações inerentes às combinações parentais dos híbridos usados em ambos os trabalhos e do reduzido número de sementes usados aqui, mas é possível inferir que os resultados obtidos, mostram equivalência quanto à percentagem de germinação (Tabela 13).

EENINK et alii (1982a) também observaram a formação de calos em muitas sementes implantadas no meio L_2 que não regeneraram plantas, mesmo transferindo-os para outros diferentes meios, por eles citados. Então, os resultados obtidos neste trabalho, quanto a obtenção de híbridos F_1 interespecíficos a partir de calos, podem ser devidos a dois fatores. Ou os calos foram oriundos de combinações parentais mais compatíveis que, 'per se', favoreceram a regeneração de plântulas, ou a transferência para o meio L_1 promoveu uma condição mais adequada para a organogênese ou a ambos.

Comparando-se os meios L_1 e L_2 (Tabela 3) verifica-se que ambos foram constituídos por 50% dos sais de MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) e o que os diferenciou foi a presença de tiamina, inositol, caseína hidrolisada e o ácido indol-3-acético (AIA), no meio L_2 . A tiamina é uma vitami-

na promotora de crescimento e da germinação enquanto o inositol e a caseína hidrolizada são substâncias osmóticas, usadas geralmente para evitar a germinação prematura de embriões jovens (NORSTOG, 1979; REINERT & YEOMAN, 1982; CHANDLER & BEARD, 1983). É possível que estas tenham interferido consideravelmente no processo de germinação. Como foram usadas sementes de diferentes idades, provavelmente alguns embriões muito pouco desenvolvidos não tenham germinado em função do alto valor osmótico do meio L_2 . Como observa-se na Tabela 12, todos os materiais testados apresentaram menor taxa de germinação (G%) no meio L_2 , com uma redução em relação ao L_1 de 50% ou mais.

No entanto, a substância que teve papel marcante nos resultados obtidos em L_2 foi o hormônio AIA. As folhas expressas e retorcidas, as radículas curtas e grossas ou ausentes e a formação de calos (Figura 9) são efeitos da ação desta auxina.

NARAYANASWAMI & NORSTOG (1964) fizeram uma revisão bibliográfica sobre o uso de auxinas na cultura de embriões e verificaram que os relatos sobre a influência das auxinas no crescimento embriônico tem sido conflitantes e algumas vezes inconclusivos. Por exemplo, Guttenberg & Wiedow⁸, citados pelos autores acima, observaram a estimulação do cres-

⁸GUTTENBERG, H. & WIEDOW, H.L. Über den wirkstoffbedarf isolierter hofarembryonen. Planta, 42: 142-166, 1952.

cimento radicular de embriões de aveia cultivados em meio com 10^{-5} ppm de AIA, enquanto a estimulação do crescimento de gemas, do coleóptilo e mesocótilo ocorreu a uma concentração de 1 ppm de AIA. Por outro lado, Gardiner⁹, também citado por NARAYANASWAMI & NORSTOG (1964), notificou a formação de calos em hipocótilos de embriões de feijão, resultante de concentração de AIA de 1 a 100 ppm.

CHANDLER & BEARD (1983) eliminaram a formação de calos, na cultura de embriões interespecíficos de *Helianthus*, mudando a concentração da auxina de 1 mg de AIA para 0,05 mg/l de ANA ou eliminando-a totalmente. Notificaram também que o baixo nível de ANA permitiu uma sobrevivência de plântulas levemente superior em comparação com nenhuma auxina.

Com estas referências, o que se pode deduzir é que 0,5 mg/l de AIA (0,5 ppm), no meio L₂, foi uma concentração inadequada para o cultivo de embriões interespecíficos de *Lactuca* ou talvez fosse até mesmo dispensável o seu uso, visto que no meio L₁ ocorreu o enraizamento e a formação de plântulas perfeitas (Figura 8). Isto parece indicar que estes embriões possuem um balanço hormonal endógeno satisfatório.

⁹GARDINER, M.S. The effect of beta-indole-acetic acid upon isolated plant embryos. Bull. Mt. Desert I., Biol. Lab. p. 22, 1940.

4.3.1.3. Meio de cultura TO

Como relatado no item 4.2.2, após várias tentativas somente em setembro de 1987 foi possível obter sementes do híbrido F_1RC_1 (*L. sativa* x *L. virosa*) x *L. sativa*. Nesta época também tomou-se conhecimento do trabalho inédito de MAISONNEUVE (1987), que estudou especificamente a cultura 'in vitro' de embriões imaturos, de cruzamentos entre *L. sativa*, *L. saligna* e *L. virosa*, em quatro diferentes meios de cultura. A autora concluiu que os melhores resultados foram obtidos no meio TO (Tabela 3).

Assim inoculou-se as oito sementes do retrocruzamento (Maioba x PI 271938) x Maioba em meio TO. Após quatro dias uma semente germinou e uma plântula perfeita desenvolveu-se (Figura 10). As demais sementes, embora tivessem aspecto externo quase normal, não germinaram (Tabela 13).

Não é possível comparar os valores de percentagem de germinação e de sementes que originaram plantas obtidas no meio TO, com os obtidos nos meios L_1 e L_2 , em virtude dos embriões híbridos testados nos diferentes meios serem provenientes de diferentes cruzamentos.

MAISONNEUVE (1987) investigou o desenvolvimento de embriões (*L. sativa* x *L. virosa*) x *L. sativa*, originados de diversas combinações parentais, em meio TO. Para isto foi feita a excisão dos embriões de aquênios com 7 a 10 dias após a polinização e somente foram implantados no meio

de cultura os embriões que apresentaram cotilédones bem desenvolvidos. Os resultados foram expressos em número de embriões colocados em meio de cultura e em número de plantas desenvolvidas. Estes dados permitiram a dedução de uma taxa de recuperação de plantas comparável ao parâmetro percentagem de sementes que originaram plantas (SP%), usado no presente estudo. A taxa de recuperação de embriões variou de 4 a 91%, refletindo, em primeiro plano, a maior ou menor harmonia entre os cruzamentos.

No presente caso, a SP do híbrido (Maioba x PI 271938) x Maioba foi de 12% (Tabela 13). Em comparação com os valores da taxa de recuperação de embriões conseguidos por MAISONNEUVE (1987), 12% é um valor subestimado, porque no presente estudo, não foi feita uma otimização através da seleção de embriões melhor desenvolvidos para serem implantados no meio de cultura. Mesmo assim, o valor da SP igual a 12% enquadra-se entre os obtidos por aquela pesquisadora.

Os resultados conseguidos na presente pesquisa, com o meio TO, por si só não são conclusivos, no entanto reforçam os de MAISONNEUVE (1987).

Comparando-se a composição do meio TO com L_1 e L_2 , verifica-se que ele é muito mais rico e completo, tanto em sais minerais quanto em vitaminas, mas não apresenta hormônios. Como várias plantas normais foram obtidas tanto no meio L_1 (Tabela 13) quanto no TO (MAISONNEUVE, 1987), fi-

ca evidente que as falhas no desenvolvimento dos embriões híbridos são prioritariamente de ordem nutricional.

Contudo, são necessários estudos para avaliar a resposta destes embriões imaturos de *Lactuca* a reguladores de crescimento e identificar as condições que permitam incrementar a taxa de germinação e uma organogênese equilibrada, como tem sido feito para a cultura de embriões híbridos interespecíficos de outros gêneros como *Cucurbita* (GARDINGO, 1986), *Lycopersicon* (FONSECA, 1987) e *Helianthus* (CHANDLER & BEARD, 1983).

4.3.2. Comportamento de híbridos interespecíficos de *Lactuca* em diferentes estádios de desenvolvimento

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos na cultura de embriões imaturos, em diferentes estádios de desenvolvimento, em meio de crescimento (CB₁) e após, em meio de germinação (CB₂).

No meio CB₁ ocorreu uma perda considerável de material devido a contaminação com vários fungos e bactérias. O fato ocorreu pela entrada de formigas em alguns tubos, atraídas possivelmente pela constituição do meio, muito rico em açúcares (Tabela 3), e pela inadequação das tampas que não permitiram um perfeito fechamento.

Tabela 14. Cultura de embriões híbridos do cruzamento L. satíva cv. Maioba x L. viciosa PI 271938 em meio de crescimento (CB₁) e de germinação (CB₂), em diferentes estádios representados por dias após a polinização (DAP), expressa em percentagem de germinação (G%).

DAP	Meio de cultura								
	CB1			CB2					
	NS	CT	EC	NS	CT	NG	SG	G%	
4	47	36	0	11	0	11	0	0	
5	57	28	2	29	0	27	2	7	
6	95	39	3	56	3	41	12	21	
7	35	23	1	12	4	6	2	17	
8	52	5	16	47	0	26	23	49	
11	43	3	11	40	0	27	13	32	

NS = número de sementes implantadas no meio de cultura

CT = número de sementes perdidas por contaminação

EC = número de embriões com crescimento aparente

NG = número de sementes que não germinaram

SG = número de sementes que germinaram.

No material restante foram feitas observações diárias e aos doze dias de cultura constatou-se visualmente que houve o crescimento de alguns embriões. Este crescimento ocorreu em embriões com cinco dias ou mais após a polinização e foi muito evidente nos materiais com oito dias.

Após doze dias no meio CB_1 todas as sementes remanescentes, com ou sem crescimento dos embriões, foram transferidas para o meio CB_2 , onde começaram a germinar quatro dias depois.

Observa-se na Tabela 14 que em embriões com quatro dias, aparentemente, não houve crescimento embriônico no meio CB_1 e nem germinação no meio CB_2 . Com quatro dias os embriões de cultivares de *L. sativa* estão iniciando a formação de cotilédones (BORTHWICK & ROBBINS, 1928), ou seja, estão nos primeiros estádios de desenvolvimento. Vários autores citados por NARAYANASWANI & NORSTOG (1964) afirmaram que embriões muito pequenos, com menos de um terço do seu tamanho final, são incapazes de se desenvolverem em plântulas em meio de cultura. No entanto, CHANDLER & BEARD (1983) tiveram sucesso na cultura de pré-embriões híbridos interespecíficos de *Helianthus*, com 3 a 7 dias após a polinização, nos estádios globular e coração, usando os meios CB_1 e CB_2 .

Nesta pesquisa a germinação ocorreu em embriões com cinco dias após a polinização em diante e a percentagem de germinação foi crescente, em função da idade dos em-

briões, isto é, do maior desenvolvimento dos embriões, chegando a um máximo de 49% nos materiais com oito dias, porém caiu para 32% nas sementes com onze dias. Um fato a ser considerado é que a avaliação do crescimento e germinação dos embriões oriundos de sementes com sete dias ficou prejudicada. Em função do que era esperado, os valores obtidos não expressam a realidade, possivelmente devido às significativas perdas por contaminação.

MAISONNEUVE (1987) verificou que sementes do cultivar Columbus de *L. sativa* estavam completamente maduras aos catorze dias após a polinização. Investigando o desenvolvimento de embriões interespecíficos de *Lactuca*, notou que eles podem apresentar-se atrofiados, sem cotilédones ou razoavelmente bem formados mas muito pequenos em comparação com os de *L. sativa*, da mesma idade. Constatou também em sementes híbridas, com onze dias ou mais, a ocorrência da expulsão de embriões dos tegumentos das sementes. Para identificar a melhor taxa de obtenção de plântulas 'in vitro' em função do estágio de desenvolvimento de embriões do cruzamento *L. sativa* x *L. saligna*, a autora implantou em meio de cultura embriões com 3 a 21 dias após a polinização. Notificou que os melhores resultados foram obtidos com embriões com 7 a 10 dias.

A queda da percentagem de germinação em sementes com onze dias (Tabela 14) foi devida ao abortamento de embriões e estes resultados concordam com os de MAISONNEUVE (1987).

Como as diversas tentativas de cultura de embriões realizadas neste trabalho foram feitas com sementes colhidas com catorze dias ou mais após a polinização, concluiu-se que houve uma considerável perda de embriões por abortamento. Se forem implantadas, em meios de cultura adequados, sementes em estádios anteriores, por volta dos oito dias após a polinização, é possível a obtenção de um significativo incremento na taxa de recuperação de embriões híbridos interespecíficos.

Estes ensaios também vieram mostrar a necessidade de estudos objetivando determinar os mecanismos que atuam nas barreiras pós-fertilização, impedindo o desenvolvimento normal dos embriões híbridos até a maturidade e em que estágio e como ocorre o abortamento. Estas informações são fundamentais para que seja possível superá-las eficientemente, através da cultura de embriões, uma vez que elas ocorrerem em híbridos F_1 , cruzamentos ponte e retrocruzamentos.

Sobre os meios de cultura CB_1 e CB_2 verifica-se que, para a cultura de embriões de *Lactuca*, não mostraram a eficiência observada por CHANDLER & BEARD (1983) na cultura de embriões de *Helianthus*.

Pelo resultado final (Tabela 14) nota-se que o meio CB_1 não foi eficaz em permitir que embriões muito jovens de *Lactuca* pudessem crescer e posteriormente germinar no meio CB_2 . Por sua vez, o meio CB_2 permitiu a germinação de embriões maiores, mas nenhuma plântula desenvolveu-se e

todas oxidaram completamente alguns dias após. Muitos embriões apresentaram germinação anormal, onde somente os cotilédones cresceram e as radículas permaneceram presas nos tegumentos das sementes.

CHANDLER & BEARD (1983) comunicaram que, nas tentativas de definir os meios para a cultura de embriões de *Helianthus*, várias mudanças foram feitas na etapa da germinação, no meio CB₂, para melhorar a sobrevivência e o desenvolvimento radicular das plântulas. Foi necessário suprimir algumas substâncias para aumentar a formação de raízes nos embriões. Os autores discutem que isto pode ter sido devido simplesmente ao efeito osmótico de componentes como inositol, glutamina e alanina, usados em altas concentrações no meio CB₁ (Tabela 3).

NORSTOG (1979) comunicou que a germinação prematura ocorre pela ação do mRNA que foi produzido antes da dessecação das sementes e que este pode ser inibido utilizando-se substâncias osmóticas ou ácido abscísico.

Possivelmente o alto valor osmótico do meio CB₁ tenha afetado as sementes híbridas de *Lactuca* e determinou, em parte, os resultados obtidos no CB₂. Mas o efeito mais drástico observado no meio CB₂ foi a total oxidação do material. Como indicado para os outros meios testados, há a necessidade de se estudar o efeito da adição de antioxidantes.

4.4. CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DO HÍBRIDO

L. sativa x *L. virosa*

4.4.1. Análise biométrica de metáfases mitóticas

Os dados cariotípicos das espécies progenitoras do híbrido (Maioba x PI 271938) estão na Tabela 15. Nas Figuras 11, 12 e 13 podem ser observadas metáfases somáticas dos progenitores Maioba x PI 271938 e do híbrido interespecífico, todos com $2n = 18$ cromossomos. Os cariótipos de *L. sativa* e *L. virosa* constam na Figura 14. Os idiogramas destas espécies estão na Figura 15 e foram elaborados com base na Tabela 15.

A Tabela 15 e as Figuras 14 e 15 indicam que os cromossomos de *L. sativa* cv. Maioba variam de 5,29 a 2,59 μm de comprimento total. Conforme a relação de braços (RB), os cromossomos maiores são todos do tipo sub-metacêntrico, enquanto os menores são metacêntricos, de acordo com a classificação de LEVAN et alii (1964). Dois pares de cromossomos possuem satélites e é fácil distinguir um par do outro. O número 3 é razoavelmente mais longo, com centrômero sub-terminal, com uma RB igual a 2,88, enquanto o número 5 é mais curto, com centrômero sub-mediano, com uma RB igual a 2,45. O comprimento total do lote haplóide foi de 32,98 μm .

Estes dados cariomorfológicos de *L. sativa* cv. Maioba concordam com aqueles da literatura consultada.

Tabela 15. Dados cariomorfológicos* de *Lactuca sativa* cv. Maioba e *L. vitifolia* PI 271938 relativos a comprimento absoluto (CA), comprimento relativo (CR), relação de braços e classificação dos cromossomos do lote haplóide de cada espécie.

Cromossomo	<i>L. sativa</i> cv. Maioba			Tipo	<i>L. vitifolia</i> PI 271938			Tipo
	CA (m)	CR (%)	RB		CA (m)	CR (%)	RB	
1	5,29 ± 0,61 11,55	16,04 ± 1,54 9,60	2,16 ± 0,16 7,41	submetacêntrico	5,33 ± 0,55 10,29	14,80 ± 0,43 3,24	1,86 ± 0,11 6,02	submetacêntrico
2	4,53 ± 0,35 7,78	13,74 ± 0,32 2,34	2,68 ± 0,25 9,33	submetacêntrico	4,85 ± 0,54 11,24	13,54 ± 0,47 3,49	1,99 ± 0,11 5,54	submetacêntrico
3	4,31 ± 0,37 8,70	13,05 ± 0,48 3,69	2,88 ± 0,70 24,31	submetacêntrico	4,62 ± 0,49 10,57	12,96 ± 0,25 1,95	2,02 ± 0,21 10,61	submetacêntrico
4	3,85 ± 0,62 16,06	11,62 ± 1,06 9,10	2,26 ± 0,36 15,94	submetacêntrico	4,14 ± 0,38 9,15	11,60 ± 0,33 2,84	2,92 ± 0,57 19,66	submetacêntrico
5	3,40 ± 0,25 7,32	10,35 ± 0,90 8,68	2,45 ± 0,24 11,02	submetacêntrico	3,55 ± 0,40 11,24	9,96 ± 0,47 4,88	1,81 ± 0,24 13,02	submetacêntrico
6	3,31 ± 0,40 12,17	10,00 ± 0,43 4,31	1,86 ± 0,60 32,26	submetacêntrico	3,51 ± 0,21 6,07	9,85 ± 0,36 3,63	2,80 ± 0,34 12,16	submetacêntrico
7	2,94 ± 0,26 8,75	8,93 ± 0,43 4,85	1,46 ± 0,11 7,53	metacêntrico	3,49 ± 0,37 10,73	9,73 ± 0,32 3,27	2,35 ± 0,32 13,45	submetacêntrico
8	2,76 ± 0,23 8,18	8,38 ± 0,38 4,52	1,29 ± 0,14 10,35	metacêntrico	3,14 ± 0,14 4,51	8,85 ± 0,33 4,35	4,54 ± 0,82 18,19	subtelocêntrico
9	2,59 ± 0,31 11,96	7,86 ± 0,60 7,68	1,25 ± 0,19 15,47	metacêntrico	3,03 ± 0,14 4,62	8,52 ± 0,42 5,00	1,13 ± 0,06 5,02	metacêntrico
CLH	32,98				CLH	35,64		

* Os valores correspondem à média de 5 metáfases; ao lado de cada valor está o desvio padrão e embaixo o coeficiente de variação (%).

Figuras 11-13. Metáfases somáticas de espécies de *Lactuca* (1.350x). 11 - *L. sativa* cv. Maioba; 12 - *L. virosa* PI 271938; 13 - híbrido interespecífico (Maioba x PI 271938), onde os números sublinhados correspondem aos cromossomos herdados do pai selvagem, PI 271938.

Figura 14. Cariótipos de espécies de *Lactuca*. A - *L. sativa* cv. Maioba; B - *L. virosa* PI 271938.

Figura 15. Idiograma comparativo de espécies de *Lactuca*. A - *L. sativa* cv. Maioba; B - *L. virosa* PI 271938.

LINDQVIST (1960a) estudou doze cultivares e doze introduções selvagens de *L. sativa* e notificou que os nove pares de cromossomos dos diversos materiais mostraram variação em relação ao comprimento total e à posição dos centrômeros. Este autor apresentou os idiogramas do cultivar Berliner e de uma introdução selvagem de *L. sativa* com cromossomos variando entre 6,04 a 3,19 μm e 4,58 a 2,53 μm de comprimento, respectivamente.

HAQUE & GODWARD (1985a) compararam os cariótipos dos cultivares de *L. sativa* Lobjoit's Green Cos, Tom Thumb e Webb's Wonderful e verificaram que o tamanho cromossômico era variável entre eles, que apresentaram um comprimento total do lote haplóide de 33,61, 32,19 e 30,10 μm , respectivamente. Em outro trabalho HAQUE & GODWARD (1986) mostraram que Lobjoit's Green Cos, com maior tamanho, possui uma quantidade de DNA significativamente maior do que os outros dois cultivares.

Comparando-se os valores de CA e RB, da Tabela 15, com os do trabalho de HAQUE & GODWARD (1985a), nota-se que o cultivar Maioba tem características cariomorfológicas semelhantes ao Lobjoit's Green Cos.

LINDQVIST (1960a) encontrou diferenças no tamanho dos satélites entre os diversos materiais de *L. sativa*, porém HAQUE & GODWARD (1985a) constataram não haver diferenças significativas entre o tamanho dos satélites dos cultivares analisados. Estes comentaram que aparentes diferen-

ças podem ser causadas pelo comportamento dos satélites, que podem aparecer bastante expandidos e individualizados em cada cromátide ou estarem tão juntos que parecem fundidos. Sobre este comportamento dos cromossomos com região organizado ra do nucléolo (O.N.), HAQUE & GODWARD (1985a) encontraram que há diferenças, quanto a expansão da região O.N. A região O.N. do cromossomo 3 mostrou ser frequentemente muito mais expandida do que a do cromossomo 5, nos cultivares Lobjoit's Green Cos e Tom Thumb. Este fato também ocorre no cultivar Maioba, conforme atestam as Figuras 11 e 14.

A análise de metáfases somáticas de *L. virosa* PI 271938 revelou que seus cromossomos variam de 5,33 a 3,03 μ m de comprimento absoluto (Tabela 15 e Figuras 14 e 15). A RB mostrou que há uma assimetria dos cromossomos de *L. virosa*, em comparação com os de *L. sativa*, o que comprovou a afirmação de WHITAKER & THOMPSON (1942) e de LINDQVIST (1960a) de que a morfologia dos cromossomos de *L. virosa* mostra claras diferenças se comparada à das outras espécies membros do grupo *serriola*, o que pode ser constatado nas Figuras 11, 12, 14 e 15. Os cromossomos 1, 2, 3 e 5 apresentam centrômero sub-mediano enquanto no 4, 6 e 7 o centrômero é sub-terminal, mas todos eles foram classificados no tipo sub-metacêntrico. O cromossomo 8 tem um braço muito curto e nenhum cromossomo com uma posição centromérica correspondente foi encontrado nas outras espécies do grupo *serriola* (LINDQVIST, 1960a; HAQUE & GODWARD, 1985a). O 8 é do tipo sub-telocêntrico enquanto o 9 é metacêntrico.

Lactuca virosa apresenta um único par de cromossomos com satélites, identificado no presente trabalho como o número 7, e esta é outra característica que a distingue das demais espécies relacionadas.

LINDQVIST (1960a) mostrou um idiograma para *L. virosa* que é bastante concordante com o elaborado neste trabalho (Figura 15), entretanto o autor observou satélites no quinto par de cromossomos.

Além das diferenças reais entre o tamanho dos cromossomos e sua posição relativa no cariótipo, outras diferenças podem ser devidas a problemas metodológicos e até mesmo à contração diferencial dos cromossomos.

LINDQVIST (1960a) realizou suas análises biométricas sobre desenhos feitos através de câmara lúcida, com um aumento de 5.800 vezes, e comentou que a coloração do material, pela técnica de Feulgen, não foi satisfatória. A metodologia usada por este autor é mais sujeita a erros do que a aplicada neste trabalho e descrita no item 3.7.1.

Sobre este assunto SCHIFFINO-SAMPAIO (1979) afirmou que "algumas das diferenças entre os cariótipos, apresentadas por diferentes pesquisadores para a mesma espécie, ou detectadas entre plantas da mesma espécie, não devem, necessariamente, ser consideradas como expressando uma variabilidade real, já que, mesmo entre células de um mesmo indivíduo, os cromossomos podem apresentar tamanhos relativos diferentes".

Por outro lado, deve se considerar que, tanto neste trabalho quanto no de LINDQVIST (1960a), poucas plantas por espécie foram examinadas. Talvez, à medida que amostras maiores forem analisadas, constate-se que a variabilidade cromossômica intraespecífica, existente em *Lactuca*, seja muito maior do que se tem conhecimento atualmente.

Lactuca virosa PI 271938 apresentou um comprimento total do lote haplóide de 33,64 μm . Se existir uma correlação positiva entre conteúdo de DNA e tamanho cromossômico, então *L. virosa* deverá ter uma maior quantidade de DNA do que *L. sativa*.

A análise biométrica de metáfases mitóticas dos híbridos F_1 (Maioba x PI 271938) foi realizada com o objetivo de se caracterizar citogeneticamente a natureza híbrida das plantas, obtidas por cultura 'in vitro' de embrião, através da comparação com os parentais.

Plantas regeneradas de culturas de calos, de células e de protoplastos têm mostrado, ocasionalmente, variabilidade fenotípica e genotípica conhecida como variação somaclonal (ILLG & SIQUEIRA, 1984). Esta variação tem sido encontrada em plantas de alface derivadas de calos (SIBI, 1976; BROWN et alii, 1986) ou protoplastos (ENGLER & GROGAN, 1984). Fenotipicamente esta variação tem sido constatada principalmente na morfologia e coloração das folhas (SIBI, 1976; BROWN et alii, 1986; ENGLER & GROGAN, 1984); mas até a fertilidade de plantas regeneradas 'in vitro' pode mostrar-se severamente reduzida (ENGLER & GROGAN, 1984).

Durante a condução do presente trabalho algumas dúvidas foram levantadas sobre a veracidade da natureza híbrida das plantas obtidas, embora apenas duas plantas, do cruzamento Maioba x PI 27.1938, foram obtidas através de calos, conforme discutivo no item 4.3.1.2.

Conhecidos os cariótipos de *L. sativa* cv. Maioba e de *L. virosa* PI 27.1938 (Figura 14) e elaborados os seus idiogramas (Figura 15), foi possível identificar no híbrido o genoma haplóide de cada progenitor, como indicado na Figura 13, e provar a natureza híbrida de todas as plantas obtidas do cruzamento Maioba x PI 27.1938.

A metodologia utilizada permitiu que o objetivo fosse atingido, no entanto é muito trabalhosa, morosa e, portanto, inadequada para uso rotineiro em um programa de melhoramento. Para isso o uso da técnica da eletroforese permitiria a caracterização bioquímica de diferentes materiais genéticos, com precisão e maior rapidez. Já foram estabelecidos padrões eletroforéticos para esterases de *Lactuca* e, inclusive, provada a eficiência em se determinar a natureza híbrida de plantas provenientes de cruzamentos entre *L. sativa* e *L. virosa* (ROUX et alii, 1985).

4.4.2. Tentativa de análise meiótica comparativa entre os parentais e o híbrido interespecífico

Em virtude das características do material,

dos problemas da infraestrutura disponível e da metodologia utilizada, os resultados obtidos são muito limitados.

A análise meiótica de *L. sativa* cv. Maioba foi regular, observando-se o completo pareamento dos bivalentes e anáfase I e II normal. Foi observado dois bivalentes associados a um nucléolo e um número considerável de quiasmas durante a diacinese, principalmente entre os bivalentes mais longos (Figura 16). O mesmo fato foi notificado por HAQUE & GODWARD (1985b) em outros cultivares de *L. sativa*.

Em estudos de meiose de *L. sativa*, a formação regular de nove bivalentes tem sido encontrada em praticamente todas as células mães de pólen analisadas (WHITAKER & JAGGER, 1939; LINDQVIST, 1960a) e é aceito que *L. sativa* é uma espécie muito estável quanto ao comportamento cromossômico (WHITAKER & JAGGER, 1939). Entretanto, ocasionalmente ocorre a formação de dois univalentes e oito bivalentes, pontes na anáfase I, cromossomos retardatários e pontes na anáfase II (LINDQVIST, 1960a).

HAQUE & GODWARD (1984) encontraram meiose regular em três cultivares de *L. sativa*, onde observaram a ocorrência de uma ponte em 500 células em anáfase I, no cultivar Tom Thumb.

A viabilidade do pólen de Maioba foi de 95,11%. Em outros trabalhos, a viabilidade do pólen de *L. sativa* variou entre 95,34 a 97,19% (LINDQVIST, 1960a) e 95,07 a 95,93% (HAQUE & GODWARD, 1984).

Figuras 16 e 17. Meiose em *Lactuca* (1700x). 16 - *L. sativa* cv. Maioba, diacinese com 9 bivalentes, dois deles associados ao nucléolo; 17 - *L. virosa* PI 271938, diacinese com 9 bivalentes, um deles associado ao nucléolo.

A meiose de *L. virosa* PI 271938, analisada no presente estudo, também foi normal, não observando-se nenhuma irregularidade. Nas células em diacinese observou-se um bivalente associado ao nucléolo, confirmando-se a presença de um só par satelitado em *L. virosa* (Figura 17), ao contrário de *L. sativa* que apresentou dois bivalentes associados ao nucléolo (Figura 16). Aparentemente a frequência de quiasmas em *L. virosa* é menor que em *L. sativa*.

LINDQVIST (1960a) estudou a meiose de duas

introduções de *L. virosa* e encontrou muito poucas irregularidades, em geral pontes na anáfase I.

A viabilidade do pólen do PI 271938 foi de 94,60%. LINDQVIST (1960a) analisou a fertilidade de pólen de quatro introduções de *L. virosa* que variou de 93,90% a 99,0%.

No presente estudo não foi possível realizar a análise meiótica dos híbridos (Maioba x PI 271938) porque as plantas híbridas, disponíveis na época da análise, apresentaram anteras rudimentares onde nenhuma célula mãe de pólen foi encontrada. Consequentemente, estas plantas foram totalmente macho-estéreis, sem nenhum grão de pólen formado.

LINDQVIST (1960a) analisou a meiose em três híbridos diferentes entre *L. sativa* e *L. virosa*. O pareamento foi incompleto em um grande número de células mães de pólen e, naquelas com pareamento completo, o número de bivalentes em anel foi pequeno, indicando uma baixa frequência de quiasmas. Pontes foram comuns nas anáfases I e II. Muitas certamente resultantes de "crossing-over" de segmentos invertidos e evidenciaram a existência de diferenças estruturais entre os cromossomos das duas espécies parentais.

A fertilidade do pólen destes híbridos variou entre 34,90 a 76,80% e mostrou ser muito melhor do que era esperado, em função das irregularidades ocorridas na meiose.

EENINK et alii (1982a) investigaram a microsporogênese de híbridos oriundos de cruzamentos entre *L. sati*

va, *L. serriola* e *L. virosa*. Encontraram meiose irregular, pareamento anormal e presença de uni, tri e quadrivalentes. Muitas plantas apresentaram anteras rudimentares, marrons e enrugadas, sem grãos de pólen, enquanto em outras plantas as anteras apresentavam quantidades variáveis de grãos de pólen, de diferentes tamanhos, formas e qualidade, porém não foram encontrados grãos de pólen gigantes, como os citados por LINDQVIST (1960a). Nas plantas com grãos de pólen, os citados autores verificaram que a fertilidade do pólen variou de 50 a 95%.

4.5. INVIABILIDADE E ESTERILIDADE DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DE *Lactuca*

Como foi anteriormente comentado as espécies *L. sativa*, *L. serriola*, *L. saligna* e *L. virosa* pertencem ao grupo *serriola* e são comuns na Europa e no Oriente Médio. Os estudos citogenéticos de THOMPSON et alii (1941) e THOMPSON (1943) indicam que o grupo *serriola* está isolado dentro do gênero *Lactuca* por barreiras genéticas. No grupo *serriola*, *L. sativa* e *L. serriola* estão muito mais relacionadas entre si do que com *L. saligna* e *L. virosa* (LINDQVIST, 1960a,b; RYDER & WHITAKER, 1976), o que foi recentemente comprovado através de diagramas de eletroforese de esterases (ROUX et alii, 1985) e estudos anatômicos, análises de cariótipos e de cru-

zamentos interespecíficos (HAQUE & GODWARD, 1985 a,b; 1987).

Dentro da espécie *L. sativa*, as formas cultivadas são marcadamente distintas, devido à imensa variação morfológica das folhas e dos diferentes modos como elas estão arrançadas, antes da emissão da haste floral. Sob o ponto de vista citogenético HAQUE & GODWARD (1986) mostraram que há diferenças no comprimento total de cromossomos e consequentemente na quantidade de DNA, entre os cultivares de alface.

As formas primitivas e selvagens de *L. sativa* apresentam um polimorfismo complexo, com características intermediárias entre *L. sativa* e *L. serriola* e recebem vários nomes como *L. altaica*, *L. augustana*, *L. livida*, *L. dregeana* e outros (LINDQVIST, 1960a,b; RYDER, 1979).

Ferakova¹⁰ citado por EENINK et alii (1982a) considera *L. altaica* e *L. livida* como espécies distintas de *L. sativa* e também pertencentes à primeira sub-seção *Lactuca*.

Segundo PRINCE (1980) há algumas espécies selvagens de alface, não européias, as quais pertencem à sub-seção *Lactuca*, mas não são muito conhecidas como, *L. aculeata*.

¹⁰FERAKOVA, V. The genus *Lactuca* L. in Europe. Univerzitat Komenského, Bratislava, 122p. 1977.

No entanto, Parker em comunicação pessoal ao próprio PRINCE (1980) informou que o cariótipo de *L. aculeata* é indistinguível de *L. serriola*. Mais recentemente, ROUX et alii (1985) verificaram que, para esterases foliares, os padrões eletroforéticos de *L. aculeata* mostraram-se muito semelhantes aos de *L. serriola*.

Com estas informações observa-se que, pela literatura consultada, não há um consenso entre os taxonomistas sobre o assunto. Pode-se supor que há um complexo *sativa* - *serriola* representado por um amplo conjunto gênico. Os dados indicam que deve haver uma grande variabilidade genética intra e interespecífica, uma vez que os diferentes germoplasmas são provenientes de vários países, originaram-se em diferentes ecossistemas de plantas.

Pelos motivos expostos acima é compreensível a multiplicidade de resultados obtidos da hibridação de *L. virosa* com *L. sativa* ou *L. serriola* por diferentes pesquisadores, em diferentes épocas e com diferentes ecotipos destas espécies. O fato comum a todas as investigações sobre o assunto é a constatação de que as principais barreiras à transferência de genes são a inviabilidade dos híbridos, expressa pela formação de poucas sementes, baixa germinação e morte prematura de plantas, e a esterilidade.

4.5.1. Inviabilidade e fraqueza do embrião

Sobre as causas imediatas da inviabilidade, de geração ou fraqueza dos híbridos interespecíficos, STEBBINS (1968) agrupou-as em três categorias: 1) falta de harmonia entre cromossomos e genes das espécies parentais. Esta incompatibilidade pode ser de natureza geral ou devida a ação de genes específicos; 2) Interação desarmoniosa entre cromossomos ou genes de uma espécie e o citoplasma de outra; 3) Incompatibilidade entre o embrião híbrido e os tecidos circundantes.

As evidências encontradas na presente pesquisa e na literatura permitem afirmar que as causas da inviabilidade dos híbridos entre *L. virosa* e *L. sativa* ou *L. serriola* pertencem à categoria 1. Se as causas estivessem incluídas nas categorias 2 ou 3, haveria uma diferença significativa entre os cruzamentos recíprocos, mas estes não são bem sucedidos em ambas as direções (LINDQVIST, 1960a; EENINK et alii, 1982a; MAXON SMITH, 1985).

Na literatura há vários exemplos de inviabilidade de híbridos interespecíficos em função de uma incompatibilidade de ordem geral e que tem sido atribuído a interações desarmoniosas entre os cromossomos parentais.

Em híbridos obtidos entre espécies mais proximamente relacionadas, as anormalidades não são evidentes nas primeiras mitoses do zigoto nem no pró-embrião, mas elas ocor

rem em vários estágios posteriores do desenvolvimento do embrião (STEBBINS, 1958; BARBANO & TOPOLESKI, 1984; GARDINGO, 1985; FONSECA, 1986).

A degeneração do embrião muitas vezes coincide com períodos críticos ou de máxima diferenciação dos tecidos. Em híbridos interespecíficos de *Nicotiana* o abortamento do embrião ocorre no estágio em que está diferenciando o ponto de crescimento vegetativo (STEBBINS, 1958).

MAISONNEUVE (1987) observou o abortamento de embriões, híbridos entre *L. sativa* e *L. saligna* ou *L. viro-sa*, com onze dias após a polinização, ou seja, três dias antes do estágio de completa maturação das sementes.

No presente trabalho, sementes do híbrido (*L. sativa* x *L. viro-sa*), com onze dias após a polinização, apresentaram uma menor porcentagem de germinação, do que sementes em estádios anteriores (Tabela 13).

McCray¹¹ citado por STEBBINS (1958), trabalhando com híbridos de *Nicotiana*, reconheceu três diferentes estádios onde ocorre o colapso do embrião: 1) das primeiras divisões do zigoto à formação do pró-embrião globular; 2) no estágio de diferenciação do ponto de crescimento vegetativo e 3) no estágio de germinação da semente. Cada um destes estádios pode ser um momento crítico no desenvolvimento do

¹¹ McCRAY, F.A. Embryo development in *Nicotiana* species hybrids. Genetics, 18: 95-110, 1933.

embrião. No primeiro, os cromossomos do híbrido devem ser capazes de atuarem juntos no processo de mitose e na síntese de novos componentes citoplasmáticos e nucleares. O segundo estágio depende da habilidade das células em formar um meristema apical com seus centros de crescimento integrados, pois destes depende o perfeito crescimento vegetativo da futura planta. No terceiro estágio, o desenvolvimento correto do embrião em plântula, e a consequente germinação da semente, depende da habilidade dos cromossomos e genes, presentes no híbrido, em atuarem juntos e formarem um eficiente mecanismo para fotossintetizar e elaborar protoplasma com os produtos imediatos da fotossíntese.

Em qualquer destes estádios podem ocorrer distúrbios mitóticos, devido a diferenças estruturais dos cromossomos parentais, tanto no embrião como no endosperma. Não se conhece relatos destes distúrbios mitóticos em híbridos de *Lactuca*, mas as evidentes diferenças entre *L. virosa* e *L. sativa* (Figuras 14 e 15) e entre *L. virosa* e *L. serriola* (LINDQVIST, 1960a) podem estar originando estes distúrbios.

A morte de embriões híbridos do cruzamento *Lycopersicon esculentum* x *L. peruvianum* pode ser ocasionada por distúrbios no endosperma, que prejudicam a nutrição do embrião. Estas seriam anormalidades mitóticas do endosperma híbrido e possivelmente também do zigoto, ocasionadas por deleções e inversões dos cromossomos, com a formação de pontes durante a anáfase (BARBANO & TOPOLESKI, 1984; FONSECA, 1987).

STEBBINS (1958) em sua revisão sobre o comportamento cromossômico em endospermas híbridos salientou que, as quebras cromossômicas, durante a mitose, é o início da degeneração dos mesmos e são causadas pelo desbalanceamento quantitativo entre cromossomos parentais. Em híbridos entre os gêneros *Trillium* e *Paris*, a quebra de cromossomos é observada quando *Paris* é o progenitor materno. A quebra é confinada a certos cromossomos de *Trillium* e é mais frequente na região distal destes cromossomos. A explicação lógica para isto é que o citoplasma híbrido ou algumas condições do metabolismo das células híbridas, exercem um forte efeito sobre os cromossomos de *Trillium*, mas, têm pouco ou nenhum efeito sobre os de *Paris*.

Esta explanação de STEBBINS (1958) pode explicar, em parte, o maior sucesso obtido nos cruzamentos de *L. virosa* com *L. sativa* ou *L. serriola*, quando as duas últimas são os progenitores maternos e também as variações na viabilidade dos híbridos dependentes das linhas parentais. Estas três espécies tem o mesmo número cromossômico, mas os resultados deste trabalho (Tabela 14) juntamente com os de LINDQVIST (1960a) mostram que há diferenças no comprimento total dos cromossomos de *L. virosa* em relação aos de *L. sati*va e *L. serriola*. HAQUE & GODWARD (1985a; 1986) também encontraram variações no comprimento total dos cromossomos de cultivares de *L. sativa*. Estas pequenas diferenças de tamanho cromossômico intraespecíficas, possivelmente também con-

dicionam a maior ou menor congruência entre as combinações parentais interespecíficas.

Além de ser ocasionada por interações incompatíveis entre cromossomos, a inviabilidade dos híbridos também pode ser devida a ação de genes específicos. LINDQVIST (1960a) defendeu a hipótese de que a inviabilidade em híbridos de *Lactuca* é devida a poucos genes de ação complementar, baseado no fato de que entre nove plantas obtidas do cruzamento entre *L. altaica* e *L. virosa*, somente três foram viáveis e vigorosas. Para argumentar, citou o clássico exemplo de *Crepis* de Hollingshead¹², onde um único gene decide quais as linhagens de *C. tectorum* produzirão híbridos viáveis ou não com *C. capillaris*.

A situação em *Lactuca* é mais complexa. As evidências citológicas indicam que há a interação de vários fatores. As causas da inviabilidade não parecem ser unicamente de natureza gênica, porém também cromossômica.

MAISONNEUVE (1987) observou embriões híbridos de *Lactuca* atrofiados, sem cotilédones ou normais, mas muito pequenos em relação aos de *L. sativa*, da mesma idade. Os primeiros não se desenvolveram 'in vitro', independente do estágio em que foram colhidas as sementes ou do meio de cultura. Nestes casos, as anormalidades parecem ser devidas a

¹²HOLLINGSHEAD, L. A lethal factor in *Crepis* effective only in an interespecific hybrid. Genetics, 15: 114-140, 1930.

ação de genes letais no endosperma e no embrião. É provável que um desbalanceamento nos reguladores de crescimento e no metabolismo das células criou condições desfavoráveis ao crescimento e perfeita organogênese dos embriões. Por outro lado, os embriões normais, mas muito pequenos, parecem ter sido resultantes de interações incompatíveis, gênicas ou cromossômicas, que ocorreram somente no endosperma. Este, anormalmente desenvolvido, não teria permitido, em consequência, a adequada nutrição dos embriões.

STEBBINS (1958) comentou que a obtenção de híbridos interespecíficos depende não só da habilidade de genes das espécies parentais atuarem de maneira compatível no embrião em desenvolvimento, mas também em produzir um endosperma capaz de nutrir o jovem embrião. A presença de incompatibilidade gênica somente no endosperma pode ocorrer porque este tecido contém dois conjuntos de cromossomos oriundos do tecido materno e somente um, do gameta paterno. Nos cruzamentos interespecíficos, esta desigualdade pode causar um desbalanceamento na dosagem de vários alelos, os quais não são compensados, como ocorre nos cruzamentos de indivíduos da mesma espécie.

As anormalidades podem ser parcialmente devidas também aos distúrbios do relacionamento quantitativo entre os conjuntos cromossômicos do endosperma, tecido materno e embrião, mas, de modo geral, provavelmente, é a ação gênica a responsável pela inviabilidade.

4.5.2. Esterilidade do híbrido interespecífico

Se o desequilíbrio gênico ou cromossômico afeta primariamente os processos que ocorrem no desenvolvimento inicial do zigoto, embrião ou do organismo jovem, estabelece-se a inviabilidade do híbrido, mas se o efeito primário do desequilíbrio é sobre os ovários, anteras e gametas, então o resultado é a esterilidade do híbrido.

A esterilidade dos híbridos interespecíficos pode ser gênica ou cromossômica e a única prova prática para se distinguir uma da outra é através da poliploidização artificial.

A duplicação do número cromossômico, particularmente no tecido somático, resulta durante a meiose, na presença de um homólogo completo para cada cromossomo, na célula híbrida. O pareamento e a segregação dos cromossomos é regular, nenhum desequilíbrio é gerado e as plantas são férteis. Se a esterilidade é gênica o desequilíbrio existente no tecido somático do diplóide é conservado no tecido tetraplóide correspondente e a esterilidade persiste (STEBBINS, 1958).

Em *Lactuca* a esterilidade dos híbridos interespecíficos tanto quanto a inviabilidade dos embriões parece ser complexa, envolvendo desequilíbrios gênicos e cromossômicos.

A esterilidade gênica parece ser ocasiona-

da por vários genes, com diferentes tipos de ação. Eles podem interferir no desenvolvimento dos órgãos reprodutivos em qualquer estágio. As anormalidades mais frequentes ocorrem durante a diferenciação dos tecidos reprodutivos ou, conforme JOHN & LEWIS (1973), durante o próprio processo da meiose.

STEBBINS (1958) afirmou que o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, nos primeiros estádios, pode ser mais facilmente desorganizado pela incompatibilidade gênica do que o de outros órgãos. Por sua vez, os órgãos masculinos são mais suscetíveis do que os femininos.

As pesquisas de EENINK et alii (1982a) mostraram que a esterilidade nos híbridos de *Lactuca* deve ser controlada por diversos genes, atuando em várias etapas do desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. Encontraram plantas com grãos de pólen de má qualidade ou totalmente ausentes que, ao serem polinizadas artificialmente, formaram sementes, indicando que havia um razoável grau de fertilidade feminina.

No presente trabalho também verifica-se que plantas do híbrido (Maioba x PI 271938), completamente macho estêreis, ao serem polinizadas por Maioba formaram sementes F_1RC_1 , mostrando que a fertilidade feminina não foi tão severamente afetada como a masculina.

Estes resultados confirmam as notificações de STEBBINS (1958) evidenciando que não há uma correspondência en

tre a fertilidade feminina e a masculina e que diferentes genes governam estas duas características.

A grande variação no grau e no tipo de macho-esterilidade sugere que este caráter também é controlado por vários genes. EENINK et alii (1982a) observaram desde a ausência de anteras a diferentes tipos de anteras rudimentares sem pólen ou com quantidades variáveis de grãos de pólen de diferentes tamanhos, formas e qualidade.

A esterilidade, pelo menos em parte, também parece ser devida a desbalanço cromossômico. Como foi discutido em 4.4.2, o processo meiótico de híbridos entre *L. sativa*, *L. serriola* e *L. virosa* mostrou uma série de irregularidades no comportamento cromossômico.

Este tipo de esterilidade é o mais frequente em híbridos interespecíficos e a literatura apresenta muitos exemplos. Em todos estes exemplos a falta de homologia estrutural entre os cromossomos parentais é indicada não só pela reduzida taxa de pareamento, mas também pela presença ocasional de anéis e cadéias, indicando heterozigosidade ocasionada por trocas ou translocações, e a presença de pontes e fragmentos, os quais sugerem heterozigosidade por inversões, ou indicam diferenças entre os cromossomos parentais quanto à posição do centrômero. Todas estas irregularidades foram observadas na meiose de híbridos interespecíficos de *Lactuca* (LINDQVIST, 1960a; EENINK et alii, 1982a).

Alguns pesquisadores conseguiram obter plan-

tas híbridas parcialmente férteis através da duplicação cromossômica com colchicina (LINDQVIST, 1960a; THOMPSON & RYDER, 1961; MAXON SMITH, 1984; MAISONNEUVE, 1987). Isto comprova as afirmações de STEBBINS (1958), citadas anteriormente, de que a poliplóidização elimina os problemas do desequilíbrio cromossômico entre os genomas parentais. Como a recuperação da fertilidade não foi significativamente alta, parece claro que parte da esterilidade não recuperada no tetraplóide é devida a ação gênica.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem as seguintes conclusões:

- *Lactuca virosa* PI 271938 destacou-se como a melhor e mais consistente fonte de resistência ao *Sclerotinia minor*.

- Algumas introduções de *L. serriola*, *L. saligna*, *L. altaica*, *L. augustana*, *L. aculeata*, formas primitivas de *L. sativa* bem como cultivares de alface como Valmaine, Gallega e Celtuce apresentaram tolerância ao patógeno, relacionada com a arquitetura foliar ereta.

- Cultivares de alface tanto do grupo americana como do grupo manteiga, mostraram-se altamente suscetíveis ao *Sclerotinia minor*.

- O cruzamento de *L. sativa* ou *L. serriola* com *L. virosa* apresenta barreiras interespecíficas na forma de inviabilidade dos embriões e, posteriormente, esterilidade das

plantas. Ambas são devidas a interações incompatíveis de natureza gênica e de polimorfismo cromossômico. O grau de compatibilidade é variável em função da congruência entre os genótipos parentais.

- Híbridos interespecíficos de cruzamentos entre *L. sativa*, *L. serriola* com *L. virosa* foram recuperados através da cultura 'in vitro' de embriões. O estágio ideal dos embriões, para serem implantados no meio de cultura, é com 8 dias após a polinização.

- Diferentes fatores controlam a esterilidade dos híbridos. A esterilidade masculina é muito drástica, mas a feminina é parcial e permite, através de retrocruzamentos para *L. sativa* ou *L. serriola*, que sejam obtidas sementes.

- A tentativa de usar *L. serriola* como espécie ponte entre *L. sativa* e *L. virosa* não foi viável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABAWI, G.S. & GROGAN, R.G. Epidemiology of diseases caused by *Sclerotinia* species. Phytopathology, Lancaster, 69: 899-904, 1979.
- ABAWI, G.S.; ROBINSON, R.W.; COBB, A.C. & SHAIL, J.W. Reactions of lettuce germ plasm to artificial inoculations with *Sclerotinia minor* under greenhouse conditions. Plant Disease, St. Paul, 64: 668-71, 1980.
- ADAMS, P.B. & TATE, C.J. Mycelial germination of sclerotia of *Sclerotinia sclerotiorum* on soil. Plant Dis. Rep., Washington, 60(6): 515-18, 1976.
- AGUIAR-PERECIN, M.L.R. Estudo dos cromossomos somáticos de milho (*Zea mays* L.) e de suas regiões heterocromáticas. Piracicaba, 1979. 138p. (Livre-docência - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).
- BARBANO, P.P. & TOPOLESKI, L.D. Postfertilization hybrid seed failure in *Lycopersicon esculentum* x *Lycopersicon peruvianum* ovules. J. Amer. Soc. Hort. Sci., Geneva, 109(1): 95-100, 1984.
- BORTHWICK, H.A. & ROBINS, W.W. Lettuce seed and its germination. Hilgardia, Berkeley, 3(11): 275-305, 1928.

BROWN, C.; LUCAS, J.A.; CRUTE, I.R.; WALKEY, D.G.A.; POWER, J.B. An assessment of genetic variability in somacloned lettuce plants (*Lactuca sativa*) and their offspring. Am. Appl. Biol., Cambridge, 109: 391-407, 1986.

CARDOSO, C.O.N. Contribuição ao estudo das relações entre *Fusarium oxysporum* f. *phaseoli* (Schlecht) Kendr. e Snyder e *Phaseolus vulgaris* L. Piracicaba, 1967. 47p. (Mestrado-Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).

CASTELLANE, P.D. Podridão apical em frutos de tomateiro. Jaboticabal, FUNEP, 1988. 39p.

CHANDLER, J.M. & BEARD, B.H. Embryo culture of *Helianthus* hybrids. Crop Science, Madison, 23: 1004-7, 1983.

CHAVES, G.M. Estudos sobre *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) De Bary. Viçosa, 1961. 81p. (Livre-Docência - Escola Superior de Agricultura / UREMG).

COLEY-SMITH, J.R. & COOKE, R.C. Survival and germination of fungal sclerotia. Annu. Rev. Phytopathol., Palo Alto, 9: 65-92, 1971.

EENINK, A.H. Matromorphy in *Brassica oleracea* L. VII. Research on products of microsporogenesis and gametogenesis from prickle pollinated plants. Euphytica, Wageningen, 24: 45-52, 1975.

EENINK, A.H. & ALVAREZ, J.M. Indirect selection for tetraploidy in lettuce (*Lactuca sativa* L.). Euphytica, Wageningen, 24: 661-68, 1975.

EENINK, A.H. Plant characteristics for distinction of diploid, triploid and tetraploid lettuce. Scientia Hortic., Amsterdam, 12: 109-15, 1980.

EENINK, A.H.; GROENWOLD, R.; DIELEMAN, F.L. Resistance of lettuce (*Lactuca*) to the leaf aphid *Nasonovia ribis nigr*. 1. Transfer of resistance from *L. virosa* of resistant breeding lines. Euphytica, Wageningen, 31: 291 - 300, 1982a.

EENINK, A.H.; DIELEMAN, F.L.; GROENWOLD, R. Resistance of lettuce (*Lactuca*) to the leaf aphid *Nasonovia ribis nigr*. 2. Inheritance of the resistance. Euphytica, Wageningen, 31: 301-4, 1982b.

EENINK, A.H. & DE JONG, C.J. Partial resistance in lettuce to downy mildew (*Bremia lactucae*). 3. Correspondence between resistance levels of cotyledons and leaf discs and resistance of adult plants. Euphytica, Wageningen, 31: 761-70, 1982.

ENGLER, D.E. & GROGAN, R.G. Variation in lettuce plants regenerated from protoplasts. Jour. Hered., Washington, 75: 426-30, 1984.

FONSECA, M.I.S. Cultura de embriões imaturos para obtenção de híbridos interespecíficos em tomateiro. Campinas, 1987. 157p. (Mestrado - Universidade Estadual de Campinas).

GARDINGO, J.R. Aplicação das técnicas de cultura de embrião e diversidade gamética na hibridação interespecífica no gênero *Cucurbita*. Piracicaba, 1986. 139p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).

- GAMBORG, O.L.; MILLER, R.A.; OJIMA, K. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. Exp. Cell Res., New York, 50: 151-58, 1968.
- GLOBERSON, D.; NETZER, D.; SACKS, J. Wild lettuce as a source for improving cultivated lettuce. In: EUCARPIA MEET. ON LEAFY VEGETABLES, Littlehampton, 1980. Proceedings. Littlehampton, Maxon Smith, J.W. & Langton, F. A. (eds.), 1980. p.86-96.
- GOMES, F.P. Curso de Estatística Experimental. 10.ed. Piracicaba, Nobel, 1982. 430p.
- HAGUE, M.Z. & GODWARD, M.B.E. Effects of seed-irradiation on meiosis in M_1 plants of *Lactuca* and related plants. Genetica, Gravenhage, 65: 179-86, 1984.
- HAQUE, M.Z. & GODWARD, M.B.E. Comparision between two genera, species and cultivars in Lactuceae. I. Karyotype analysis. Cytologia, Tokio, 50: 723-38, 1985a.
- HAQUE, M.Z. & GODWARD, M.B.E. Comparision between to genera, species and cultivars in Lactuceae. II. Effects of seed-irradiation on chiasma frequency. Cytologia, Tokio, 50: 841-53, 1985b.
- HAQUE, M.Z. & GODWARD, M.B.E. Comparision between to genera, species and cultivars in Lactuceae. III. DNA amount and radiosensitivity. Cytologia, Tokio, 51: 341-48, 1986.
- HAQUE, M.Z. & GODWARD, M.B.E. Relationships between *Lactuca serriola* L. and *Lactuca sativa* L. cultivars. Genet.Agr., Roma, 41: 275-82, 1987.

- HAWTHORNE, B.T. & JARVIS, W.R. Differential activity of fungicides on various stages in the cycle of *Sclerotinia* spp. N.Z. Jour. Agric. Res., Wellington, 16: 551-7, 1973.
- HAWTHORNE, B.T. Production of apothecia of *Sclerotinia minor*. N.Z. Jour. Agric. Res., Wellington, 16: 559 - 60, 1973.
- HAWTHORNE, B.T. *Sclerotinia minor* on lettuce: effect of plant growth on susceptibility to infection. N.Z. Jour. Agric. Res., Wellington, 17: 387-92, 1974.
- HIRAOKA, T. On producing polyploid lettuce by colchicine treatment. Bull. Kanagawa Hort. Exp. Sta., s.l., 15: 65-72, 1967. Apud Plant Breed. Abst. Cambridge, 38: 5481, 1968 (Resumo).
- ILLG, R.D. & SIQUEIRA, W.J. Variabilidade genética induzida através da cultura de tecidos. In: Aguiar-Perecin, M.L. R.; Martins, P.S.; Bandel, G. (eds.). Tópicos de genética e evolução de plantas. Piracicaba, 1984.
- IMOLEHIN, E.D.; GROGAN, R.G.; DUNIWAY, J.M. Effect of temperature and moisture tension on growth, sclerotial production, germination and infection by *Sclerotinia minor*. Phytopathology, Lancaster, 70(12): 1153-57, 1980.
- JOHN, B. & LEWIS, K.R. The meiotic mechanism. Oxford, Head J.J. (ed.), 1973. 32p.
- Le TOURNEAU, D. Morphology, cytology and physiology of *Sclerotinia* species in culture. Phytopathology, Lancaster, 69: 887-90, 1979.

- LEVAN, A.; FREDGA, K.; SANDBERG, A.A. Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas, Lund, 52: 201-20, 1964.
- LINDQVIST, K. Reflexed and erect involucre in *Lactuca*. Hereditas, Lund, 42: 436-42, 1956.
- LINDQVIST, K. Cytogenetics studies in the Serriola groups of *Lactuca*. Hereditas, Lund, 46: 75-151, 1960a.
- LINDQVIST, K. On the origin of cultivated lettuce. Hereditas, Lund, 46: 319-50, 1960b.
- MAISONNEUVE, B. Utilisation de la culture 'in vitro' d'embryons immatures pour les croisements interspécifiques entre *Lactuca sativa* L. ou *L. saligna* L. ou *L. virosa* L.; étude de des hybrides obtenus. Agronomie, Paris, 7(5): 313-19, 1987.
- MAXON SMITH, J.W. Interspecific hybridisation in *Lactuca* with particular reference to *L. sativa* L. x *L. virosa* L. In: EUCARPIA MEETING ON LEAFY VEGETABLES, Versailles, 1984. Proceedings. Versailles, Bannerot, H. & Meheut, C. (eds.). 1984, p. 21-34.
- MORAES, S.A. Técnicas de folhas destacadas para testar reações de cultivares de amendoim (*Arachis hypogea*, L.) aos fungos *Cercospora arachidicola* Hori e *Cercospora personata* (Berk. & Curt.) Ell. & Everh. Piracicaba, 1981. 106p. (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).
- MOREL, G. & WETMORE, R.H. Tissue culture of monocotyledons. Amer. J. Bot., New York, 38: 138-40, 1951.

- MURASHIGE, T. & SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Phys. Plantar., Lund, 15: 473-97, 1962.
- NARAYANASWAMI, S. & NORSTOG, K. Plant embryo culture. Bot. Rev., Lancaster, 30: 578-628, 1964.
- NEWTON, H.C. & SEQUEIRA, L. Possible sources of resistance in lettuce to *Sclerotinia sclerotiorum*. Plant. Dis. Rep., Washington, 56(10): 875-78, 1972.
- NORSTOG, K. Embryo culture as a tool in studie of comparative and developmental morphology. In: SHARP, W.R.; LARSEN, P.O.; PADDOCK, E.F.; RAGHAVAM, V., ed. Plant Cell and Tissue Culture. Columbus, Ohio State Univ. Press, 1979. p.179-202.
- NORWOOD, J.M.; JOHNSON, A.G.; CRUTE, I.R. The utilisation of novel sources of resistance to *Bremia lactucae* from wild *Lactuca* species. In: EUCARPIA MEETING ON LEAFY VEGETABLES, Littlehampton, 1980. Proceedings. Littlehampton, Maxon Smith, J.W. & Langton, F.A., eds. 1980. p.97-103.
- PARTYKA, R.E. & MAI, W.F. Effects of environment and some chemicals on *Sclerotinia sclerotiorum* in laboratory and potato field. Phytopathology, Lancaster, 52: 766 - 70, 1962.
- PATERSON, C.L. & GROGAN, R.G. Cause and control of lettuce drop in California. Depart. Plant. Pathol., Univ. Calif., Davies (s.n.t.), (1984).
- PRINCE, S.D. Ecophysiology of wild lettuce. In: EUCARPIA MEETING ON LEAFY VEGETABLES, Littlehampton, 1980. Proceedings. Littlehampton, Maxon Smith, J.W. & Langton, F. A. eds., 1980. p.63-73.

PURDY, L.H. *Sclerotinia sclerotiorum*: history diseases and Symptomatology, host range, geographic distribution and impact. Phytopathology, Lancaster, 69(8): 875-80, 1979.

REINERT, J. & YEOMAN, M.M. Plant cell and tissue culture - A laboratory manual. Heidelberg. Springer-Verlag, 1982. 83p.

ROUX, L.; CHENGJIU, Z.; ROUX, Y. Caractérisation de *Lactuca sativa* L. et des espèces apparentées par électrofocalisation des estérases. Agronomie, Paris, 5(10): 915 - 21, 1985.

RYDER, E.J. Lettuce. In: _____. Leafy Salad vegetables. Westport, AVI Publ. Co., 1979. cap. 2, p.13-94.

RYDER, E.J. & JOHNSON, A.S. Mist depollination of lettuce flowers. HortScience, St. Joseph., 9(6): 584, 1974.

RYDER, E.J. & WHITAKER, T.W. Lettuce (*Lactuca sativa* L.). In: SIMMONDS, N.W., ed. Evolution of Crop Plants. London, Longman Publ. Co., 1976. cap. 14, p.39-41.

SCHIFINO-SAMPAIO, M.T. Citotaxonomia do complexo Briza (*Gramineae*): número cromossômico, cariótipo, quantidade de DNA nuclear, comportamento meiótico. Porto Alegre, 1979. 145p. (Mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

SCHIFINO, M.T. Estudos citogenéticos em *Trifolium riograndense* Bukart, *T. polymorphum* Poir. e *T. repens* L.: indução de poliplodia, número cromossômico, cariótipo, comportamento meiótico. Porto Alegre, 1985. 255p. (Doutorado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

- SIBI, M. La notion de programme genetique chez les vegetaux superieurs. II. Aspect experimental. Obtention de variants par culture de tissus in vitro sur *Lactuca sativa* L. apparition de viguer chez les croisements. Ann. Amélior. Plante, Paris, 26: 523-47, 1976.
- STALKER, H.T. Utilizations of wild species for crop improvement. Adv. in Agron., New York, 33: 111-47, 1980.
- STEBBINS, G.L. The inviability, weakness and sterility of interspecific hybrids. Adv. in Gen., New York, 9: 147-215, 1958.
- STEEL, R.G. & TORRIE, J.H. Principles and procedures of statistics; a biometrical approach. 2.ed. New York, McGraw Hill, 1980. 633p.
- THOMPSON, R.C. & KOSAR, W.F. Polyploidy in lettuce induced by colchicine. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., Geneva, 36: 641-44, 1938.
- THOMPSON, R.C.; WHITAKER, T.W.; KOSAR, W.F. Interestpecific genetic relationships in *Lactuca*. J. Agric. Res., Washington, 63: 91-107, 1941.
- THOMPSON, R.C. Further studies on interestpecific genetic relationships in *Lactuca*. J. Agric. Res., Washington, 66: 41-8, 1943.
- THOMPSON, R.C. & RYDER, E.J. Description and pedigrees of nine varieties of lettuce. Washington, Agric. Res. Serv. USDA, 1961. 19p. (Technical Bulletin n° 1244).

- WERNER, M. Induced allopolyploid derivatives of intergeneric *Lo^lium multiflorum* Lam ($2n = 14$) x *Festuca pratensis* Huds. ($2n = 14$) hybrid. Genetica Polonica, Poznan, 24(2): 151-61, 1983.
- WHITAKER, T.W. & MCCOLLUM, G. Shattering in lettuce - Its inheritance and biological significance. Bull. Torrey Bot. Club, New York, 81: 104-10, 1954.
- WHITAKER, T.W. & JAGGER, I.C. Cytogenetic observations in *Lactuca*. J. Agric. Res., Washington, 58(4): 297-306, 1939.
- WHITAKER, T.W. & THOMPSON, R.C. Cytological studies in *Lactuca*. Bull. Torrey Bot. Club, New York, 68: 388-94, 1941.
- WHITAKER, T.W. Lettuce: evolution of weedy cinderella. Hort Science, St. Joseph, 9: 512-14, 1974.
- WHITAKER, T.W.; RYDER, E.J.; RUBATSKY, V.E.; VAIL, P.V. Lettuce production in the United States. Washington, USDA, 1974. 43p. (Agriculture Handbook n^o 221).
- YARWOOD, C.E. Detached leaf culture. The Botanical Review, New York, 12(1): 1-56, 1946.
- WILLETS, H.J. & WONG, J.A.L. The biology of *Sclerotinia sclerotiorum*, *S. trifoliorum* and *S. minor* with emphasis on specific nomenclature. The Botanical Review, New York, 46(2): 101-66, 1980.
- WONG, J.A.L. Identity, host range and modes of infection of *Sclerotinia* spp. their implications for the control of *Sclerotinia* diseases. Austr. Plant Pathol. Soc. Newsl., Camberra, 7: 35, 1978.

ZATARIN, M. Comportamento de progênies de alface (*Lactuca sativa* L.) em diferentes épocas de plantio. Piracicaba, 1985. 90p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).

APÊNDICE

Apêndice 1. Valores e significâncias dos quadrados médios da expressão de reação de *Lactuca* ao S. *minor* em porcentagem de plantas mortas (PM). Experimento II.

F.V.	G.L.	Q.M.
Populações	35	372,82**
Resíduo	36	63,02
Média	67,00	
Coefficiente de Variação	11,85%	
Transformação arco seno $\sqrt{x/100}$		
Unidade $x = \%$		

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de F.

Apêndice 2. Valores e significâncias dos quadrados médios para duas expressões de reação de *Lactuca* ao *S. minor*. Experimento III.

F.V.	GL	Quadrados Médios		
		PM	IR	
Blocos	2	2.976,06**	109,22**	
Populações	39	203,50**	2,87**	
Resíduo	78	105,45	1,16	
Médias		69,06	10,90	
Coefficientes de Variação		14,87%	9,88%	
Transformações		arco seno $\sqrt{x/100}$	$\sqrt{y}$	
Unidade		x = %	y = IR	

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

PM = percentagem de plantas mortas; IR = índice de resistência.

Apêndice 3. Valores e significâncias dos quadrados médios da análise da variância relativa a reação foliar do híbrido F_1 (*L. sativa* cv. Maioba x *L. viçosa* PI 271938) e seus parentais ao S. *minor*, em quatro períodos de avaliação. Experimento IV.

F.V.	GL	QM
Genótipos (G)	2	1.145,06 ns
Resíduo (a)	12	304,39
Períodos (P)	3	7.174,85 **
G x P	6	211,35 **
G/P ₁	2	11,61 ns
G/P ₂	2	67,55 ns
G/P ₃	2	473,11 *
G/P ₄	2	1.226,84 **
Resíduo (b)	36	90,90
Média	44,93	
Coefficientes de Variação	(a) 38,76% (b) 9,87%	
Transformação	arco seno $\sqrt{x/100}$	
Unidade	x = %	