CRUZAMENTOS DIALÉLICOS EM MANDIOCA (*Manihot esculenta* CRANTZ)

TERESA LOSADA VALLE

Engenheira Agrônoma

Orientador: PROF. DR. ISAIAS OLÍVIO GERALDI

Tese apresentada à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Doutora em Agronomia -
- Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas

P I R A C I C A B A

Estado de São Paulo

Novembro - 1990

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Livros da
Divisão de Biblioteca e Documentação - PCAP/USP

Valle, Teresa Losada

V181c Cruzamentos dialélicos em mandioca (Manihot esculenta
Crantz). Piracicaba, 1990.

180 p.

Tese - ESALQ

Bibliografia.

1. Genética quantitativa 2. Mandioca - Cruzamento dialé
lico 3. Mandioca - Melhoramento I. Escola Superior de Agri
cultura Luiz de Queiroz, Piracicaba

CDD 633.4

Dedico

Ao meu pai

José Losada Domínguez

que decidiu e trilhou
seus próprios caminhos

CRUZAMENTOS DIALÉLICOS EM MANDIOCA

(Manihot esculenta Crantz)

TERESA LOSADA VALLE

Aprovada em 10 de dezembro de 1991.

Comissão Julgadora:

Prof. Dr. José Branco de Miranda Filho **ESALQ/USP**
(Substituto do Orientador)

Prof. Dr. Natal Antonio Vello **ESALQ/USP**

Prof. Dr. Paulo Sodero Martins **ESALQ/USP**

Pesquisador Científico Dr. Celso Valdevino Pommer **IAC**

Pesquisador Científico Dr. José Alfredo Usberti Filho **IAC**

Prof. Dr. ISAIAS OLÍVIO GERALDI
Orientador

AGRADECIMENTOS

- Ao Prof. Dr. Isaias Olívio Geraldi pela orientação.
- Ao Prof. Dr. José Branco de Miranda Filho da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP pelo apoio, sugestões e colaboração.
- Aos Pesquisadores Científicos Newton do Prado Granja e Hilário da Silva Miranda Filho, do Instituto Agronômico, cuja participação intelectual e operacional foi imprescindível para a realização deste trabalho.
- Aos Pesquisadores Científicos Walter José Siqueira e Manoel Albino Coelho de Miranda do Instituto Agronômico; e Nelson Salin Abbud do Instituto Agronômico do Paraná, pelas sugestões, apoio e incentivo.
- Ao Pesquisador Científico Otávio Tisselli Filho, do Instituto Agronômico, Chefe do Centro Experimental de Campinas, pelo apoio na experimentação de campo.
- Ao Pesquisador Científico Waldemar Atílio Malavolta Júnior, do Instituto Biológico, pela colaboração na inoculação das plântulas.
- Ao Pesquisador Científico José Osmar Lorenzi, do Instituto Agronômico, pelos ensinamentos transmitidos sobre a cultura da mandioca.
- Ao Pesquisador Científico José Carlos Sabino, do Instituto Agronômico e Chefe da Estação Experimental de Tietê, pela condução dos cruzamentos.
- À Pesquisadora Científica Cláudia Conti Medugno e à Bibliotecária Maria Amélia de Toledo Leme do Centro Nacional

de Pesquisa da Defesa da Agricultura da EMBRAPA, pela revisão dos originais.

- Ao Prof. Dr. Cosme Damião Cruz, da Universidade Federal de Viçosa, pela cessão dos programas estatísticos, e Dr. Paulo de Souza Gonçalves do Programa Seringueira, Instituto Agronômico/EMBRAPA pela cessão da literatura.

- A todos os funcionários da Seção de Raízes e Tubérculos e do Centro Experimental de Campinas, do Instituto Agronômico, em especial, aos Auxiliares Agropecuários Sidisnei Quinalha e Paulo Lessa Filho pela colaboração.

- Ao Auxiliar Agropecuário Hugo Machado e a Escriturária Rosemeire Araújo de Oliveira, da Seção de Raízes e Tubérculos do Instituto Agronômico, pela eficiência e gentil colaboração.

- Ao Instituto Agronômico, pela oportunidade de estudo.

- Aos colegas do curso de pós-graduação, pela proveitosa convivência.

- Ao corpo docente do Departamento de Genética, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP, pelos conhecimentos transmitidos.

- À CAPES, pela concessão de Bolsa.

- Especialmente, à família Prado Granja pela gentil acolhida em sua casa.

ÍNDICE

	Página
RESUMO.....	I
SUMMARY.....	IV
1. INTRODUÇÃO.....	1
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	5
2.1. Produção de raízes.....	9
2.2. Resistência à bacteriose.....	19
2.3. Avaliação genética.....	22
3. MATERIAL E MÉTODOS.....	31
3.1. Cultivares parentais.....	31
3.2. Cruzamentos.....	33
3.3. Avaliação da fertilidade dos parentais.....	35
3.4. Seleção ao nível de plântulas.....	35
3.5. Primeira geração de multiplicação vegetativa....	36
3.6. Segunda geração de multiplicação vegetativa.....	38
3.6.1. Características avaliadas.....	40
3.6.2. Análise estatística dos dados.....	41
3.6.3. Análise genética e estimativa de parâmetros..	43
3.6.3.1. Efeitos recíprocos	43
3.6.3.2. Endogamia.....	43
3.6.3.3. Capacidade de combinação.....	44
3.6.3.4. Capacidade de combinação pós-seleção....	48
3.6.3.5. Avaliação dentro de cruzamentos.....	49
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	56
4.1. Fertilidade.....	56
4.2. Resistência à bacteriose.....	60
4.3. Segunda geração de multiplicação vegetativa.....	64
4.3.1. Produção de raízes e outras características..	67
4.3.2. Efeitos recíprocos	72
4.3.3. Endogamia.....	74
4.3.4. Análise de cruzamentos dialélicos.....	75
4.3.5. Avaliação pós-seleção.....	93
4.3.6. Avaliação dentro de cruzamentos.....	111
4.4. Avaliação final.....	120
5. CONCLUSÕES.....	125
6. LITERATURA CITADA.....	127
7. TABELAS.....	140

CRUZAMENTOS DIALÉLICOS EM MANDIOCA**(*Manihot esculenta* Crantz)****Autor: TERESA LOSADA VALLE****Orientador: Prof. Dr. ISAIAS OLÍVIO GERALDI****RESUMO**

A multiplicação vegetativa possibilita reproduzir infinitas vezes o mesmo genótipo sem que sejam perdidos os efeitos positivos das interações alélicas e não-alélicas. Essa possibilidade faz com que os parentais sejam melhor avaliados pela frequência de genótipos superiores na progênie do que pela média de suas progênies.

Sete parentais de mandioca ('Vassourinha', 'Branca de Santa Catarina', 'Santa', 'Carapê', 'Taquari', 'Mico' e 'Cigana') foram intercruzadas em forma dialélica. Avaliou-se a fertilidade dos parentais através da quantidade e qualidade das sementes botânicas. Na primeira multiplicação vegetativa quantificou-se a resistência à bacteriose nas progênies, e na segunda foram analisados os seguintes caracteres: peso de raízes (PR), peso de parte aérea (PA), peso total (PT), índice de colheita (IC) e número de raízes (NR). Nessa segunda multiplicação vegetativa avaliaram-se apenas 21 cruzamentos e quatro autofecundações, uma vez que não se dispunha do número mínimo de indivíduos para avaliar os parentais restantes. Analisou-se o dialelo pelo método 4 de Griffing, considerando-se como fixos os efeitos de tratamentos.

A fertilidade dos cruzamentos variou de 0,6 a 232,5 sementes botânicas por planta, onde a quantidade e qualidade foram determinadas principalmente pelo parental feminino. A frequência de genótipos resistentes à bacteriose foi diretamente proporcional à resistência dos parentais. Os resultados indicam que cruzamentos envolvendo parentais suscetíveis devem ter progênies suficientemente grandes, visando à manutenção de variabilidade genética adequada para outros caracteres, após intensa pressão de seleção para resistência à bacteriose.

A precisão experimental obtida foi satisfatória (CV = 12,6%) na segunda multiplicação vegetativa. A média geral do ensaio foi de 7,78kg/genótipo, considerada muito boa, em se tratando de material não selecionado. Para esse grupo de materiais não se detectou efeito recíproco. Também, o efeito de endogamia, avaliado de forma indireta, não se mostrou muito pronunciado.

A capacidade geral de combinação (CGC) foi a principal responsável pela variação entre as médias em todas as características. O parental com maior efeito foi 'Taquari' e o menor foi 'Santa'. Também fez-se análise dialélica com as médias dos genótipos selecionados, dentro de cada cruzamento, para PR (dez, cinco, dois e o genótipo com maior PR dentro de cada parcela), sendo que cada parcela continha 20 genótipos avaliados com cinco plantas). Verificou-se que, com o aumento da pressão de seleção, a variância da CGC permaneceu aproximadamente constante mas a variância da CEC cresceu em importância relativa com o rigor da seleção. Na análise com seleção, 'Mico' e 'Branca de Santa Catarina' foram os parentais com maior CGC enquanto 'Santa' teve a menor

CGC em qualquer nível de seleção. Os cruzamentos com maior CEC foram: 'Mico' x 'Taquari' (avaliado com os cinco melhores clones) e 'Carapé' x 'Mico' (avaliados com os dois melhores e com o melhor clone). Os cruzamentos com maiores médias foram: 'Mico' x 'Taquari' sem seleção e pressões de seleção moderadas, 'Mico' x 'Carapé' com pressões de seleções altas, porque neste último cruzamento somaram-se a CGC da 'Mico' com a CEC do cruzamento.

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade, do coeficiente de variação genético e do progresso esperado com seleção, evidenciam boas perspectivas de progresso com seleção dentro de cruzamentos. Os cruzamentos promissores, normalmente, envolvem cruzamentos entre 'Mico' com os demais e entre 'Branca de Santa Catarina' com os demais, devido provavelmente à alta capacidade geral de combinação de ambos. O cruzamento 'Taquari' x 'Mico' também se mostrou promissor, devido, provavelmente, à alta capacidade específica de combinação.

As estimativas das correlações genéticas entre PR e PA foram normalmente altas (em média 0,66), indicando que um descarte inicial de material, baseado em PA e em baixa intensidade, pode ser realizado, agilizando os trabalhos de campo na seleção.

DIALLEL CROSSES IN CASSAVA (*Manihot esculenta* Crantz)

Author: TERESA LOSADA VALLE

Adviser: Prof. Dr. ISAIAS OLÍVIO GERALDI

SUMMARY

The vegetative propagation enhances the possibility of multiplication of a genotype, maintaining the positive aspects of the non-allelic and allelic interactions. Crosses in this kind of plants are better evaluated, based on the frequency of selected genotypes rather than on family means.

Seven cassava cultivars, 'Vassourinha', 'Branca de Santa-Catarina', 'Santa', 'Carapé', 'Taquari', 'Mico' and 'Cigana' were intercrossed, following the diallel mating design. The male and female fertility of the parents were evaluated by the number and the quality of the botanical seeds obtained from crosses. In the first generation of vegetative propagation, the bacterial resistance of the seedlings was measured.

In the second generation of vegetative multiplication the evaluations were made for the following characteristics: root yield (PR), stem yield (PA), total yield (PT), harvest index (IC) and number of roots (NR). In this generation, the available plant material allowed the evaluation of only 21 crosses and four selfed parents. The statistical analysis

was according to Griffing's model IV, and the effects of treatments were considered to be fixed.

The number of botanical seeds per plant in the female parents ranged from 0.6 to 232.5 and their quantity and quality were dependent mainly on the female parent. The frequency of bacterial resistant genotypes was directly proportional to the resistance of the parents. The results showed that, when susceptible parents are involved in the crosses, it is necessary to obtain progenies large enough to permit the maintenance of necessary genetic variability for the selection of the other traits, after the strong selection for disease resistance.

The CV value of 12.6% in the second vegetative generation shows that the experimental precision for root yield was rather good. The general mean of 7.78kg/genotype may be considered very good, for non selected genotypes. In this group of parents, it was detected no reciprocal effects. Also, the inbreeding depression was not very expressive.

In all characteristics, the general combining ability (CGC) was the main source of variations among genotype means. 'Taquari' was the parent that showed the highest CGC; the smallest CGC was found in 'Santa'. The diallel analysis also was performed after selection of the 10, 5, 2, and 1 best genotype from the original 20 plants/plot. With increasing selection pressure, the CGC variance was rather

constant; while the CEC increased in relative importance, following the increase in selection.

With selection, 'Mico' and 'Branca de Santa Catarina' were the parents with the highest CGC. Again, 'Santa' showed the smallest value. The crosses with highest CEC were: 'Mico' x 'Taquari', when the 10 and the 5 best genotypes were analysed; and 'Carapé' x 'Mico', for the two best genotypes. The cross with the highest mean without and with moderated selection was 'Mico' x 'Taquari'; under strong selection, the highest mean occurred in 'Mico' x 'Carapé', where the high CEC of the cross was added to the high CGC of 'Mico'.

The estimates of the coefficient of broad sense heritability, of the coefficient of genetic variation and the expected gain show the good perspectives of genetic advance with the selection within the crosses. In this way, crosses with 'Mico' and 'Branca de Santa Catarina' are the most promising ones, due to the high CGC of these parents. The cross 'Taquari' x 'Mico' also showed superior performance, due to the high CEC of the cross.

The estimates of genetic correlations between PR and PA were very high, averaging 0.66, showing that the initial selection for PA, may contribute to increase the efficiency of field selection.

1. INTRODUÇÃO

A mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), espécie tipicamente tropical, é cultivada em cerca de 95 países em desenvolvimento, entre as latitudes de 30°N e 30°S, em áreas com até 2000m de altitude, concentrando-se principalmente abaixo de 1500m.

É normalmente cultivada em áreas marginais, sujeitas a deficiências hídricas e ou nutricionais, onde outras culturas são inviáveis ou de alto risco. Mesmo nessas condições, armazena quantidades razoáveis de matéria seca em suas raízes. Em ambientes mais favoráveis, este potencial é maximizado, podendo produzir 80t/ha/ano em condições experimentais e 60t/ha/ano em cultivo, contendo 20% a 40% de matéria seca (CIAT, 1978; 1979; 1980). Além disso, pode ser considerada como fonte de alimento protéico na maior parte dos países da África Equatorial, onde suas folhas são consumidas (COCK, 1985). No entanto, sua importância deve ser ressaltada, principalmente, como fonte energética, sendo hoje sua produção mundial média da ordem de 3 t/ha de matéria seca, superior a qualquer outra cultura explorada nos países em desenvolvimento (HORTON & FANO, 1985). Nestes países, é a quarta cultura em quantidade produzida (127 milhões de tone-

ladas) e a sexta no valor da produção anual (9 bilhões de dólares por ano).

A mandioca sempre teve papel muito importante na agricultura e na alimentação da população brasileira. O Brasil é, historicamente, o maior produtor e consumidor mundial, explorando uma área de cerca de 2 milhões de hectares e com produção estabilizada, na última década, entre 20 e 25 milhões de toneladas. É a segunda mais importante cultura em termos de tonelagem produzida, sendo superada apenas pela cana-de-açúcar, observando-se ainda extremas diferenças entre os incentivos recebidos por estas duas atividades.

A cultura da mandioca tem elevada importância social. A quase totalidade da sua produção é obtida em pequenas propriedades, com emprego mínimo de insumos modernos (corretivos, fertilizantes, herbicidas, cultivares melhorados e defensivos), utilizando freqüentemente cultivares nativos de baixo valor genético, explorando solos de baixa fertilidade natural, com alto teor de alumínio e sob deficiências hídricas que os tornam inadequados à exploração por outras culturas anuais ou bianuais.

Ocorrem grandes diferenças regionais na produtividade da mandioca. Em São Paulo e outros Estados, onde a exploração da cultura é mais intensiva, a utilização de cultivares melhorados permite que a produtividade atinja 21t/ha, cerca de 70% superior à média nacional (FIBGE, 1990), mesmo consumindo muito menos insumos do que outras espécies.

Até a década de 40, o cultivar Vassourinha Paulista (SRT-1) foi amplamente utilizado para consumo *in natura* e processamento industrial. Com o aumento da incidência da bacteriose, passaram a ser utilizados cultivares com maior resistência ao patógeno: 'Guaxupé' (SRT-454) para o mercado hortifrutigranjeiro e 'Branca de Santa Catarina' (SRT-59) para a produção de farinha de mesa e farinha de raspas, ambos selecionados e recomendados pelo Instituto Agrônômico (IAC) para o Estado de São Paulo, respondendo pela quase totalidade da área explorada pela cultura até a década de 70. Com o ressurgimento dos problemas causados pela bacteriose, 'Guaxupé' foi substituído por outros cultivares: IAC Jaganã, IAC 59-210, IAC 576-70, IAC 24-2 'Mantiqueira'.

Em relação aos cultivares de uso industrial, surgiram outros clones com maior resistência à bacteriose do que 'Branca de Santa Catarina' mas suas outras qualidades mantiveram-na como principal cultivar para fins industriais. A introdução de outros cultivares teve efeito paliativo.

A história do melhoramento científico de plantas tem vários exemplos em que as técnicas estatístico-genéticas subsidiaram seu desenvolvimento. O estudo mais detalhado dos componentes da variabilidade fenotípica e a estrutura da variabilidade genética em termos de parâmetros genéticos permitiu um enfoque mais racional ao melhoramento, e aumentou a sua eficiência.

O primeiro passo em um programa de melhoramento que pretenda gerar variabilidade através de recombinação sexual é selecionar os parentais. A partir de modelos desenvolvidos pela genética quantitativa é possível identificar os indivíduos com superioridade genética ou cruzamentos com complementação gênica mais favorável. Deste modo, é possível reduzir o número de cruzamentos e/ou indivíduos a serem manuseados sem reduzir a probabilidade de encontrar genótipos superiores. Esses modelos são extremamente desenvolvidos para atender espécies que se reproduzem via sexual, cujo objetivo é encontrar os parentais que produzam a melhor progênie, isto é, a de melhor média. Há poucas alternativas para análise genética, cujo objetivo seja identificar o cruzamento que produza o melhor indivíduo como é o caso de espécies que se cultivam através de estruturas de multiplicação vegetativa como a mandioca.

Face à esta situação, a partir de 1979 o IAC ampliou seu programa de melhoramento genético tradicional, objetivando obter novos clones industriais e, paralelamente, efetuar estudos genéticos e metodológicos que permitissem aumentar a eficiência do programa.

O presente trabalho teve por objetivo estimar o valor genético de sete cultivares parentais inter cruzados em sistema dialélico completo e estimar parâmetros genéticos que permitam maior racionalização dos trabalhos de melhoramento.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A mandioca foi domesticada por povos pré colombianos visando produzir raízes tuberosas e facilitar a multiplicação vegetativa a partir de espécies selvagens do gênero *Manihot*. Evidências acumuladas indicam que o cultivo iniciou-se há cerca de 3000 a 7000 anos, em múltiplos locais não bem definidos (vários autores citados por HERSHEY, 1985). Características marcantes da espécie (tolerância a solos ácidos e de baixa fertilidade, déficits hídricos prolongados e adaptabilidade ao calor) indicam alguns centros de domesticação: a) região semi-árida e/ou cerrados brasileiros (De Candolle e Vavilov *apud* ROGERS, 1972) que, também, são centros de dispersão do gênero *Manihot*; b) savanas da bacia do rio Orinoco na Colômbia - Venezuela (SAUER, 1952) e berço das tribos indígenas Aruak, exímios agricultores e cultivadores de mandioca (SCHMIDT, 1951); c) regiões quentes e secas do México e Guatemala, grande centro de especiação do gênero, onde são encontradas espécies com morfologia muito próxima à espécie cultivada (ROGERS, 1963 e 1972); d) áreas desérticas da costa peruana que em tempos pós-glaciais foram savanas (UGENT *et al.*, 1986). As florestas tropicais da Amazônia possivelmente não foram um centro de domesticação como

eventualmente é sugerido em literatura menos especializada. HARLAN (1971) classificou-a como um cultivo não cêntrico.

As espécies ancestrais de *M. esculenta* obedecem três modelos propostos. O primeiro propõe que a domesticação ocorreu a partir de poucas espécies em um único local e levada para outras áreas onde houve introgressões gênicas com espécies simpátricas. O segundo sugere domesticação em vários locais a partir de várias espécies de forma independente. O terceiro é uma síntese das anteriores; o cultígeno poderia ter sido domesticado em vários locais a partir de várias espécies e através da dispersão provocada por migrações indígenas passaram a sofrer introgressões com espécies selvagens e recombinações dentro da própria espécie de tal modo que, atualmente, não há grupos gênicos com características geográficas específicas dentro de *Manihot esculenta*, fato constatado por ROGERS & FLEMING (1973).

Estudos genéticos não fornecem evidências que melhor possam elucidar a origem da espécie. O gênero *Manihot* encontra-se disperso, aproximadamente, entre 33° N e 35° S em terras baixas de todo território americano. As 98 espécies existentes mostram evidências de isolamento reprodutivo na natureza, mas inter cruzam-se entre si e com *M. esculenta*. Todas as espécies estudadas têm 36 cromossomos e formam 18 bivalentes na metáfase (vários autores citados por VALLE, 1991). Configurações citogenéticas indicam que *M. esculenta* é um tetraplóide segmental (MAGOON et al., 1970). A ausência de séries poliplóides indica ser este o grau de ploidia que

permite a melhor adaptabilidade do gênero e não colabora para o conhecimento da filogenia da espécie.

Manihot esculenta é tida como um cultígeno por Martius e De Candolle e por botânicos mais recentes como ROGERS & APPAN (1973). No entanto, ALLEN (1987) relata a existência da espécie na forma selvagem difundida em vários países da América do Sul.

Essas informações deixam clara a existência de um fluxo gênico entre várias espécies selvagens e a espécie cultivada, fato que deve ter colaborado em sua expansão geográfica, principalmente, no início da domesticação. Atualmente é considerada uma espécie com genótipos adaptados a diversos ecossistemas e modos de cultivo mas a transferência de genes deve ter importância reduzida, graças ao eficiente isolamento reprodutivo proporcionado pela multiplicação vegetativa e sistemas de cultivo mais apurados.

A estrutura orgânica reprodutiva de *M. esculenta* é típica de espécies alógamas. As plantas são monóicas, as inflorescências têm flores unissexuadas e as femininas amadurecem antes das masculinas. É uma espécie heterozigótica, pois clones autofecundados formam progênies segregantes.

Para fins de melhoramento, a taxa de cruzamento é facilmente manejável, permitindo valores desde 100% de auto-

fecundação até 100% de cruzamento. Obtém-se sementes botânicas¹ originadas exclusivamente por autofecundação plantando-se populações monoclonais isoladas. Obtém-se sementes botânicas originadas exclusivamente por cruzamentos em populações policlonais em que os demais clones foram emasculados ou têm macho-esterilidade. Valores intermediários são obtidos quando são colhidas sementes botânicas provenientes de polinização aberta em populações policlonais, como nos ensaios de variedades. Neste caso a taxa de cruzamento é função de vários fatores: arranjo dos genótipos na população, época de florescimento, quantidade de pólen produzido, agente polinizador, etc.

O melhoramento de mandioca no Brasil, teve início na Bahia (ZEHNTER, 1919). De acordo com NORMANHA², em 1935, o Instituto Agrônomo iniciou a exploração da variabilidade existente entre cultivares nativos. Em 1940, iniciou-se a

1. Semente, em sentido amplo, é toda a estrutura utilizada para reproduzir um vegetal (FERRI *et al.*, 1978). Assim, nas plantas anuais e bianuais em que se utiliza órgãos de propagação vegetativa para instalação da cultura, o termo semente é utilizado como referência a esses órgãos. Quando se refere a sementes, *sensu strictu*, destinadas à propagação sexual, é adjetivado como botânica ou verdadeira. No presente texto, utiliza-se (a) semente botânica para referir-se à propagação sexuada; (b) maniva para identificar o segmento de caule utilizado na propagação vegetativa.

2. NORMANHA, E. S. (Instituto Agrônomo, Campinas, SP). Comunicação pessoal, 1990.

a recombinação entre genótipos através de cruzamentos controlados, seguidos de seleção para produtividade, bom padrão culinário, baixo teor de ácido cianídrico e alto teor de matéria seca, além de resistência a doenças (NORMANHA, 1971). A estratégia adotada foi aquela comumente empregada para plantas de multiplicação vegetativa: cruzamento entre parentais heterozigóticos e seleção durante gerações sucessivas de multiplicação vegetativa.

2.1. Produção de Raízes

A mandioca é cultivada quase que exclusivamente para a produção de raízes, destacadamente o principal fator de seleção. Esta é, entretanto, fortemente influenciada por fatores ambientais, exigindo experimentação intensiva e extensiva para ser avaliada com precisão. Dessa forma, o estudo de características correlacionadas com a produção de raízes é de vital importância.

Os coeficientes de correlação linear têm sido freqüentemente utilizados para avaliar o grau de associação entre a produção de raízes com outras características. De modo geral, são relatados como significativamente positivos quando as características correlacionadas estão ligadas ao vigor das plantas: em maior magnitude quando se referem ao peso da parte aérea e, em menor magnitude com a altura da planta, projeção da copa, hábito de crescimento, época e número de ramificações, características que podem ser consideradas componentes do vigor. Tais correlações fenotípicas têm-se mantido entre e dentro de genótipos em competição in-

tra e intergenotípica ou mesmo sem competição. Essas associações são importantes na medida em que permitem generalizar o perfil de clones superiores ou, sob o ponto de vista fitotécnico, estimar a produtividade. O número, comprimento e peso médio de raízes também têm mostrado associação positiva em maior ou menor grau com a produção (MENDES, 1940; GROSSMAN, 1946; MAGOON et al., 1972; KAMALAN et al., 1978; SILVA et al., 1983; ACOSTA-ESPINOZA, 1984; DANTAS, 1984; FUKUDA & CALDAS, 1987; FUKUDA et al., 1987).

Equações lineares e quadráticas relacionando produção a outras características foram desenvolvidas por RODRIGUEZ & GARCIA (1989). Avaliando dados de quatro anos, oito locais e dez genótipos e correlacionando a produção com a velocidade de cobertura do campo pela folhagem e com o número de raízes comerciais, observaram valores positivos mas não significativos. Coeficientes de determinação (r^2) positivos e significativos para as equações quadráticas foram observados para altura da primeira ramificação ($0,62 < r^2 < 0,66$), para altura total da planta ($0,40 < r^2 < 0,45$) e número de ramificações ($0,42 < r^2 < 0,48$). Os autores também citam que MANSO et al.¹ obtiveram resultados similares. Desse modo, o acréscimo na produção de raízes acompanha o crescimento positivo das características citadas até determinado valor, a partir do qual os acréscimos são negativos.

1. MANSO, R. J.; TUCRO, M.; RODRIGUEZ, S.; GARCIA, M. Estudio de la interacción genótipo-ambiente, caracteres fenológicos y su relación con los rendimientos en yuca (*Manihot esculenta* Crantz). 1985, 60p. Tesis ingeniero agrônomo CEMSA - ISCAH)

Outro tipo de correlação de extremo interesse no melhoramento é a estabilidade das características avaliadas em populações segregantes¹ e em gerações sucessivas de multiplicação vegetativa. De modo geral, o grau de associação da produção de raízes, em avaliações precoces e culturas monoclonaes, tende a crescer na medida em que a competição intergenotípica é reduzida (KAWANO *et al.*, 1982; BATISTA & BULLOW, 1971). Entretanto, mesmo em baixa competição intergenotípica, BUENO (1987) não encontrou relação direta entre um dado genótipo presente numa população segregante com o mesmo disposto em linha, quando avaliou peso de raízes e de parte aérea. FUKUDA *et al.* (1987) em situação similar, encontraram valores positivos, significativos ou não, porém sempre de pequena magnitude, para a correlação entre o peso de raízes e de parte aérea.

O índice de colheita (IC) mede a proporção de biomassa total que está alocada às raízes e tem sido amplamente utilizado em melhoramento de mandioca. Ganhou importância quando KAWANO *et al.* (1982) observaram que: (a) o IC avaliado em populações segregantes ou prova de fileiras, tem maior

1. É usual, em melhoramento de mandioca, utilizar-se a seguinte terminologia relativa à experimentação: (a) **população segregante**: conjunto de genótipos originados de sementes botânicas, em que cada genótipo é representado por uma única planta; (b) **linhas ou fileiras**: são linhas que contêm um único genótipo, representado geralmente por cinco a dez plantas; (c) **parcelas monoclonais**: são conjuntos de três a cinco linhas com 30 a 40 plantas do mesmo genótipo que simulam o comportamento em competição monoclonal observado em cultivo.

coeficiente de correlação linear com a produção de raízes avaliada em parcelas monoclonais do que a própria produção de raízes, mesmo quando avaliado com algum grau de competição intergenotípica; (b) apresenta maior estabilidade durante as diversas fases de seleção. Experimentação posterior mostrou que genótipos com maior IC tendem a ser mais produtivos em parcelas monoclonais (FUKUDA *et al.*, 1983; SILVA *et al.*, 1983; DANTAS, 1984; KAWANO, 1985; FUKUDA & CALDAS, 1987).

Observa-se maior correlação entre o IC, medido em populações segregantes, com a produção de raízes, medida em parcelas monoclonais, comparativamente à correlação obtida entre a produção de raízes por ciclos consecutivos, devido a diferenças na capacidade competitiva entre genótipos. Aqueles com maior capacidade competitiva, ou seja, mais vigorosos, alocam mais recursos para a parte aérea e por isso apresentam menor IC. No entanto, mesmo com menor IC, são mais produtivos porque ocupam mais rapidamente o espaço disponível, o que equivale a desenvolver-se sob maior espaçamento, em detrimento do menor desenvolvimento dos genótipos que apresentam maior IC. Quando plantados em parcelas monoclonais, aqueles genótipos mais vigorosos têm menor produção de raízes do que aqueles que sendo menos vigorosos, destinam uma maior proporção de biomassa às raízes, resultando numa correlação negativa entre IC e produção de raízes (KAWANO & THUNG, 1982).

Em tese, maior IC é indicativo de maior produtividade, porque é característica de genótipos que alocam maior biomassa às raízes, e que permitem maior densidade populacional pela redução proporcional da parte aérea. No entanto, utilizado isoladamente, leva à seleção de genótipos cuja capacidade de reprodução por manivas fica comprometida. Outro fator negativo está ligado ao balanço fonte-dreno. Genótipos com elevada capacidade de dreno nas raízes podem limitar o desenvolvimento da própria fonte produtora de carboidratos e o próprio dossel da planta. Genótipos com índice de área foliar um pouco superior ao ótimo e com grande produção de biomassa, podem ter maior estabilidade de produção em ambientes estressantes por fatores bióticos ou abióticos. Altas produtividades podem ser alcançadas, mesmo com IC moderado, da ordem de 50% a 65%, se este for compensado por maior produção total (COCK & EL-SHARKAWY, 1988).

A lógica da fisiologia, as necessidades agronômicas e as comprovações factuais, levantam a importância da capacidade de produção total de biomassa por um genótipo como principal critério de seleção, transformando o IC moderado em critério auxiliar na discriminação de genótipos.

As correlações, a nível genético ou fenotípico, parecem ser de difícil generalização. Se cada programa determinar os seus próprios valores, estes podem ser utilizados com maior eficiência. Os valores de magnitude relativa revelam que, numa situação rotineira, a seleção deve ser feita com base em um conjunto de critérios. A incompatibili-

dade da associação entre características como produção e grande número de raízes, implica em selecionar os recombinantes, o que exige o conhecimento da influência ambiental e a estrutura genética dos parentais.

A partição da importância relativa de cada característica associada à produção tem sido feita através da regressão múltipla. ACOSTA-ESPINOZA (1984) estudou sete variáveis em uma população segregante sem competição, e obteve uma equação com coeficiente de determinação 0,86. O peso da parte aérea e o IC isolados respondiam por 49% e 10% da variação, respectivamente, mas quando associados explicavam 83% da variação da produção. KAMALAN *et al.* (1978) avaliaram cinco características em genótipos plantados em prova de fileiras e calcularam que 60% da variação total deveu-se ao IC, número de raízes e peso da parte aérea. KAWANO (1985), relatando a experiência do programa de melhoramento do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), sugere que a seleção deve procurar um balanço entre a capacidade de produção total da planta e IC, principalmente, em ambientes desfavoráveis.

A variabilidade existente entre genótipos de mandioca é muito alta para quase todas as características de interesse: produção de raízes, vigor, peso total, resistência a pragas e doenças, IC, matéria seca. Essa ampla variabilidade é encontrada em populações segregantes ou coleções de variedades nativas.

O IAC realizou projeto de coleta sistemática de germoplasma cultivado no Estado de São Paulo. Foram reunidos 250 genótipos distintos, com ampla variabilidade para produção de raízes, vigor, deterioração pós-colheita e resistência à bacteriose. Nenhum genótipo reunia um conjunto satisfatório de todas estas características, e quase todos tinham perfil inferior aos cultivares melhorados. Resultados similares foram relatados por KAWANO *et al.* (1978b) e HERSHEY (1985) em relação ao banco de germoplasma do CIAT, além de outros trabalhos de avaliação de germoplasma.

Observa-se que a amplitude entre o melhor e o pior genótipo para a produção de raízes varia de oito a 13 vezes em cultivares nativos ou populações segregantes (SILVA *et al.*, 1983; ACOSTA-ESPINOZA, 1984; FUKUDA *et al.*, 1987). As variâncias genética e fenotípica são, também, altas para a produção de raízes, peso da parte aérea, peso total e IC, principalmente se avaliadas em ambientes favoráveis (ACOSTA-ESPINOZA, 1984; BUENO, 1985). Porém, as interações genótipos x anos têm mostrado valores altos (DANTAS, 1984; BUENO, 1985; PEREIRA, 1989) e prejudicam a eficiência da seleção, principalmente em fases mais adiantadas, quando a variância entre genótipos é menor. BUENO (1985) quantificou a magnitude da interação genótipos x anos, com 14 genótipos e quatro anos, onde se verificou variância da interação três vezes superior à variância genética e quase de mesma magnitude que a variância ambiental.

Parâmetros que comparam a importância relativa da variabilidade genotípica e fenotípica são referidos na literatura como herdabilidade no sentido amplo (h^2_a), e coeficiente de determinação genotípica (b). Estes, são afetados pela precisão com que é estimada a variância ambiental, portanto só comparáveis entre si quando esta for da mesma magnitude. Geralmente, os valores de h^2_a e b são altos para todas as características em populações segregantes ou prova de fileiras, mesmo que não haja rigoroso controle ambiental, uma vez que a variação genética é muito superior à ambiental ou possíveis interações genótipos x ambiente. LIAN (1985) cita vários autores que obtiveram h^2_a superior a 76% para peso de raízes, IC e teor de matéria seca, mas não faz referência à base genética da população ou ao tipo de experimentação. DANTAS (1984) obteve coeficientes de determinação genotípica, para 146 clones avaliados em parcelas monogenotípicas, superiores a 0,85 para produção de raízes, IC e pesos da parte aérea e total. Em genótipos mais selecionados, o valor de b reduziu-se por diminuição da variabilidade genotípica, pelo maior valor relativo da variação ambiental e devido às interações genótipos x anos (BUENO, 1985), principalmente se o controle ambiental for menos eficiente. O IC tem demonstrado maior estabilidade em todas as situações.

Embora as estimativas de variabilidade genética sejam altas e indiquem facilidade para elevar-se o nível de produtividade em populações segregantes, não indicam facilidade para a obtenção de genótipos superiores, porque as mé-

dias dessas populações são muito inferiores às dos cultivares utilizados como parentais (KAWANO *et al.*, 1978a; ACOSTA-ESPINOZA, 1984). Quando a agricultura se utiliza de genótipos melhorados, os novos clones, mesmo em fase final de avaliação, raramente são mais produtivos que as testemunhas comerciais, como ocorre no Estado de São Paulo (VILLELA *et al.*, 1985; e outros).

Clones que apresentam alguma similaridade fenotípica, podem ter valor genético bastante diverso. ABRAHAM (1957) faz referência a parentais com capacidade de combinação diferenciada. COURTS (1951) também se refere a cruzamentos com maior número de indivíduos selecionáveis. JENNINGS (1972) estudando oito parentais, constatou que o maior valor parental aditivo era quatro vezes superior ao menor valor parental aditivo e não detectou interação entre parentais. O autor só utilizou genótipos da progênie com produção superior a 2kg de raízes/genótipo. MAHUNGU *et al.* (1983) estudaram dois grupos de genótipos (germoplasma africano e americano mais indiano) e quatro cruzamentos. Observaram grande diferença nos parâmetros indicadores de variabilidade genética e fenotípica, além de resposta diferenciada à seleção para todas as características de interesse no melhoramento.

Kawano e colaboradores estimaram o coeficiente de regressão linear entre o valor médio do parental e da descendência. Os resultados são resumidos por KAWANO (1985) e expressos como herdabilidade no sentido restrito (h^2_r). São

os seguintes: 0,08 a 0,40 para peso de raízes; 0,68 a 0,62 para IC; 0,19 a 0,73 para peso total da planta e 0,51 a 0,67 para teor de matéria seca. Pelos altos valores obtidos, concluíram que essas características de interesse no melhoramento têm controle poligênico e efeitos gênicos aditivos.

ACOSTA-ESPINOZA (1984) estudou progênies policruzadas de nove parentais, todos cultivares importantes. Através do cálculo de variância aditiva, obteve os seguintes valores para h^2_r (a nível de plantas individuais): 0,12 para peso de raízes; 0,30 para peso de parte aérea; 0,58 para IC e 0,23 para número de raízes. A avaliação da importância relativa das variâncias aditiva e dominante, indicaram ação gênica aditiva para IC, dominância parcial para peso de parte aérea e número de raízes e sobredominância para peso de raízes.

RAJENDRAN (1989) avaliou geneticamente oito parentais através da capacidade de combinação e concluiu que: (a) o peso de raízes foi determinado, principalmente, pela capacidade geral de combinação. A capacidade específica de combinação teve importância reduzida, indicando que genes com efeito aditivo predominam na determinação deste caráter em relação a genes com efeito dominante; (b) o número de raízes e IC foram determinados pela capacidade específica de combinação e genes com efeito dominante controlam as duas características.

As autofecundações indicam que, geralmente, a endogamia leva à depressão, cuja magnitude é variável conforme

o genótipo e a característica considerada (KAWANO *et al.*, 1978a). O nível de depressão, aparentemente, também não se expressa no comportamento fenotípico do clone. Dados obtidos no IAC, mas não publicados, revelam a existência de genótipos capazes de gerar indivíduos vigorosos e produtivos mesmo com alto nível de endogamia. ABRAHAM (1957) também refere-se a clones de primeira, segunda e terceira geração de autofecundação, omitindo porém o grau de depressão endogâmica.

À medida em que os programas de melhoramento atingem fases mais adiantadas, os bons parentais tornam-se raros, o progresso é mais lento, e informações genéticas específicas são necessárias. Os trabalhos citados demonstram que há diferenças significativas entre o valor genético de cada parental, que deve ser considerado individualmente.

2.2. Resistência à bacteriose

A bacteriose da mandioca é uma doença causada pela *Xanthomonas campestris*, patovar *manihotis* (Arthaud-Berthet) Starr. Biótipos suficientemente virulentos para provocar epidemias ocorrem em todas as regiões do país onde se cultiva mandioca (ALVES & TAKATSU, 1984). Em algumas regiões raramente há condições de umidade e temperatura para a ocorrência de epifitias e variedades suscetíveis são cultivadas. Ecossistemas em que as temperaturas média das mínimas e média das máximas, são inferiores, respectivamente, a 20°C e 30°C e onde a precipitação pluviométrica anual é superior a 1.300mm têm condições favoráveis às epifitias (TAKATSU *et*

al., 1979). No Brasil esses ecossistemas são encontrados em todo o país, exceto Amazônia e Nordeste.

A *X. campestris* pv *manihotis* é um patógeno vascular do xilema (TAKATSU & LOZANO, 1975), que penetra no hospedeiro pelas aberturas estomatais ou lesões no tecido epidérmico. A velocidade de colonização é função da resistência do hospedeiro e agressividade do biótipo. A resistência pode ser expressa na forma de hipersensibilidade através da queda prematura das folhas (LOZANO & SEQUEIRA, 1974), barreiras à penetração do patógeno e menor velocidade de colonização do sistema vascular (TAKATSU & LOZANO, 1975). A hipersensibilidade não produz quadros sintomatológicos graves, mas reduz a produtividade. A resistência à penetração do patógeno, se isolada, é extremamente vulnerável, porque é facilmente quebrada por intempéries climáticas como o granizo, ventos ou qualquer outro agente que provoque ferimentos na planta. Alguns genótipos, em condições de campo, têm reações que podem ser ditas de tolerância. Apesar de apresentarem sintomas relativamente severos, recuperam-se rapidamente quando as condições ambientais tornam-se desfavoráveis à doença e são capazes de ter produtividades altas (PERIN & TAKATSU, 1979).

A bactéria sobrevive durante pouco tempo no solo (IKOTUN, 1982), mas é capaz de sobreviver em ervas daninhas (ELANGO & LOZANO, 1981), embora estas não sejam consideradas como importantes colaboradoras em epifitias. O material contaminado é o principal disseminador da doença, de acordo com os trabalhos existentes na literatura. TAKATSU (1981)

encontrou-a nos tecidos de plantas assintomáticas após 18 meses de erradicação sistemática em casa de vegetação. O melhor controle para a doença é o material de plantio sadio, porém este só pode ser obtido se práticas culturais estiverem associadas a algum nível de resistência genética e, para menor risco, utilizando genótipos com menor velocidade de colonização do sistema vascular. A melhor maneira para selecionar-se esse tipo de resistência é a avaliação de genótipos em plantios sucessivos, em ambientes favoráveis às epifitias (LOZANO & LABERRY, 1982).

Fontes de resistência a *X. campestris* pv *manihotis* são encontradas em variedades nativas de regiões sujeitas a epifitias, mas a avaliação de coleções tem mostrado que genótipos com alto grau de resistência ocorrem em baixa frequência¹ (FUKUDA et al., 1984 e outros).

Alguns estudos têm sido feitos para verificar a variabilidade patogênica dessa bactéria. ROBBS et al. (1972) RICCI et al. (1980) e ALVES & TAKATSU (1984), estudaram isolados brasileiros e apenas detectaram maior virulência entre os isolados, mas não identificaram a existência de raças. ELANGO & LOZANO (1981) e MARAITE et al. (1981) encontraram resultados similares em isolados americanos, africanos e asiáticos. Esses resultados indicam que deve ser procurada apenas resistência horizontal.

1. Relatórios da Seção de Raízes e Tubérculos, Instituto Agrônomo, 1985. Dados não publicados.

O controle gênico da resistência foi detalhadamente estudado em condições de campo por UEMURA & KAWANO (1983). Quando cruzaram genótipos suscetíveis entre si, algumas famílias apresentaram clones suscetíveis, enquanto outras apresentaram ampla segregação. Outras combinações resistente x suscetível e resistente x moderadamente resistente também produziram famílias com ampla variação mas quanto maior a resistência dos parentais, maior a frequência de indivíduos com maior nível de resistência. A correlação linear entre parentais e descendentes foi de 0,79 e a herdabilidade no sentido restrito igual a 0,63. Os autores concluíram que a resistência é um caráter poligênico, com genes de efeitos aditivos e não-aditivos e a suscetibilidade tem ação dominante sobre a resistência. Mecanismos gênicos similares de controle da doença também foram relatados por JENNINGS (1977) e HAHN *et al.*, (1980).

2.3. Avaliação genética

Capacidade combinatória é um termo de uso rotineiro em melhoramento para indicar o comportamento de genótipos em cruzamentos. A história do melhoramento de plantas mostra que indivíduos com boa capacidade de combinação tem influência marcante no melhoramento sistemático de determinadas espécies cultivadas. 'Peterson's Victoria' é um cultivar de batata (*Solanum tuberosum* L.) presente na genealogia de quase todos os cultivares britânicos e os cultivares 'Garnet Chili' e 'Kathadin' (possivelmente o primeiro é ancestral do segundo) participam de quase todos os programas dos princi-

pais centros de melhoramento da Europa Ocidental e Estados Unidos (MIRANDA FILHO¹). Nos Estados Unidos, o cultivo de milho (*Zea mays*) baseia-se num grande número de híbridos, porém, o número de linhagens utilizadas na sua produção é relativamente pequeno e as melhores linhagens provém de poucos cultivares (ALLARD, 1960, p. 218). O germoplasma de soja (*Glycine max*) nos Estados Unidos é quase que totalmente restrito a onze ancestrais asiáticos (genes nucleares) e cinco citoplasmas de cultivares americanos (NAS-NRC, 1972; Specht & Williams, 1983, *apud* HIROMOTO & VELLO, 2, 3 1986). No Brasil, onze ancestrais contribuem com 89% do conjunto gênico dos cultivares nacionais, seis deles muito frequentes na genealogia de cultivares americanos (HIROMOTO & VELLO, 1986). É necessário salientar que a soja é uma das principais culturas mundiais, e esses dois países são os maiores produtores. PEIXOTO (1986) revendo literatura sobre o melhoramento da cana-de-açúcar (*Sacharum* spp), relata que o clone POJ 2878, selecionado em Java em 1921, está na genealogia de

-
1. MIRANDA FILHO, H. S. (Instituto Agronômico, Campinas, SP) Comunicação pessoal, 1988.
 2. NAS-NRC (1972). *Genetic vulnerability of major crops*. Report of the Committee on Genetic Vulnerability of Major Crops, Agricultural Board, Division of Biology and Agriculture, National Research Council. Washington D.C., National Academy of Sciences, pp. 307.
 3. SPECHT, J. E. & WILLIAMS, J. H. (1983). Contribution of genetic technology to soybean productivity - retrospect and prospect. In: *Genetic contributions to the yield gains to five major crop plants* (Fehr, W. R. ed.). Special Publication nº7, Crop Science Society of America, Madison, pp.49-74.

todos os cultivares atuais e que a base genética, manipulada em programas de melhoramento, restringe-se a 20 representantes de *S. officinarum* e dez de *S. spontaneum*. POMMER & BASTOS (1984) estudaram a genealogia de 23 cultivares de cana-de-açúcar selecionadas no programa do IAC, verificando que a maioria descende direta ou indiretamente de dois parentais: Co 290 e POJ 2878.

Dos exemplos acima, conclui-se que as altas capacidades de combinação de alguns indivíduos, capazes de gerar genótipos com bom perfil para os atuais sistemas de produção agrícola de exploração em grande escala, parecem ter alto grau de responsabilidade na redução da base genética das plantas cultivadas. Por outro lado, prestaram grandes contribuições para a obtenção de cultivares de alto potencial genético que viabilizaram os mecanismos de produção agrícola modernos. Deste modo, a identificação de indivíduos de boa capacidade combinatória deve ser parte importante no melhoramento de espécies pouco trabalhadas.

Estudos mais profundos sobre a utilização da capacidade combinatória no melhoramento de plantas estão vinculados ao melhoramento de milho, cujos modelos têm servido a outras espécies. As autógamias utilizam esses modelos em razão do paralelismo existente entre essas espécies e as linhagens homozigóticas e as alógamas porque se reproduzem sexualmente de modo similar a qualquer população de milho.

A capacidade de combinação teve uma conceituação bem definida e de uso imediato feita por Sprague & Tatum,

1942 *apud* GRIFFING,¹ 1956. Estes autores denominaram Capacidade Geral de Combinação (CGC) ao comportamento médio de uma linhagem em combinações híbridas e Capacidade Específica de Combinação (CEC) ao desvio deste comportamento em combinações específicas. Em decorrência da própria definição, a capacidade combinatória deve ser avaliada através de progênies, surgindo então a figura do testador. Este pode ser um genótipo (clone, linhagem, híbrido simples) ou um grupo de genótipos (populações, híbridos duplos). Os materiais a serem avaliados também podem ser cruzados entre si, sendo seus próprios testadores. Quando se utiliza um ou alguns poucos testadores, há uma vasta literatura que analisa o papel do testador. Destaca-se, pela abrangência e atualização, o texto de HALLAUER & MIRANDA FILHO (1988). Quando os materiais a serem avaliados são intercruzados, forma-se um delineamento genético chamado dialelo. Há uma ampla literatura sobre aspectos práticos e teóricos dos cruzamentos dialélicos.

Os dialelos adquiriram conceituação precisa na década de 50 quando HAYMAN (1954) e GRIFFING (1956) assim os definiram: "delineamento genético em que n linhagens puras formam um conjunto de n^2 possíveis genótipos. Esse conjunto deve conter: (1) as próprias linhagens puras n ; (2) um sub-

1. SPRAGUE, G. F. & TATUM, L. A. General vs specific combining ability single crosses of corn. *Journal of the American Society of Agronomy*, Madison, 34: 923-932, 1942.

conjunto de $n(n-1)/2$ híbridos F_1 e (3) um subconjunto de $n(n-1)/2$ híbridos F_1 recíprocos". A análise de cruzamentos dialélicos completos tem a desvantagem de exigir grande número de cruzamentos. Para atenuar tal desvantagem, desenvolveram-se metodologias de avaliação que utilizam subconjuntos desses cruzamentos. Inicialmente, para atender esquemas em que: (a) não há interesse por cruzamentos recíprocos porque não há diferença entre eles ou, ainda, quando tais cruzamentos são de difícil execução; (b) o interesse restringe-se apenas aos cruzamentos. Posteriormente, os métodos de análise evoluíram de tal modo que já é possível analisar e estimar parâmetros genéticos a partir de híbridos entre dois grupos distintos (MIRANDA FILHO & GERALDI, 1984; GERALDI & MIRANDA FILHO, 1988) ou mesmo, tomar alguns cruzamentos como amostra de todos os cruzamentos preconizados no subgrupo completo. Revisão abrangente sobre dialelos amostrados foi feita por SAMPAIO (1989).

Cruzamentos dialélicos entre genótipos homozigóticos têm sido tradicionalmente avaliados pelo método de Jinks-Hayman. A metodologia desses autores é extremamente exigente, o que restringe a sua utilização mas, quando satisfeitas as exigências do método, fornecem informações genéticas detalhadas. Esse modelo tem-se adaptado muito bem a espécies autógamas, principalmente depois que foi desenvolvido para utilizar a geração F_2 no cálculo de estimativas de parâmetros genéticos (HAYMAN, 1958).

Em 1956, GRIFFING propôs uma análise dialélica bastante abrangente, com poucas restrições, adaptável a diversas situações e, por isso, de amplo uso. O autor apresenta modelos e metodologia de análise para quatro situações em função do grupo de progênies disponível no dialelo: (1) parentais, híbridos F_1 e recíprocos; (2) parentais e híbridos F_1 , sem recíprocos; (3) híbridos F_1 e recíprocos sem parentais; (4) somente híbridos F_1 sem parentais e sem recíprocos. O modelo ainda prevê que os tratamentos sejam de efeitos fixos ou aleatórios. Neste último caso, se respeitados os princípios de amostragem, é possível obter parâmetros genéticos sobre a população original. Outra vantagem desse modelo é ser extensivo a genótipos com qualquer nível de endogamia.

O terceiro modelo foi proposto por GARDNER & EBERHART (1966) para a avaliação de populações de polinização aberta. Tem como vantagem, em relação a outros métodos, desmembrar a CEC em efeitos de cultivares e heterose (esta decomposta em heterose média, heterose de cada parental e heterose específica de cada cruzamento). É necessário, para obter essas estimativas, a avaliação dos parentais e das progênies.

As três metodologias são clássicas na avaliação de cruzamentos dialélicos por serem rotineiramente empregadas ou adaptáveis às novas exigências do melhoramento. Consequentemente, as três são comparadas com frequência na literatura. BAKER (1978) avaliou duas restrições críticas e co-

muns: distribuição independente dos genes nos parentais e ausência de epistasia. Segundo o autor, na literatura há consenso de que essa independência não existe e pode superestimar alguns parâmetros do modelo de Hayman, mas a influência desses pressupostos nas estimativas da CGC e CEC é conflitante na literatura. Em relação aos efeitos gênicos epistáticos, que os três modelos citados admitem não existir, também há consenso de que esses efeitos existem e se rendem às evidências da genética mendeliana e fisiológica. Estudo de Matzinger & Kempthorne (1956), citado por BAKER¹ (1978), demonstra que os desvios provocados por genes com efeitos epistáticos são incorporados à variância da CGC se a interação provocada for do tipo aditivo x aditivo. Se a interação for de qualquer outro tipo, os desvios são incluídos à variância da CEC.

As variâncias da CGC e CEC foram estudadas, sob o ponto de vista estatístico e genético, através da decomposição da variância genética feita por Matzinger & Kempthorne, 1956 (*apud* BAKER¹, 1978). Esses autores demonstraram que a variância da CGC está ligada à variância genética aditiva e à variância genética epistática devidas às interações não-alélicas do tipo aditivo x aditivo. A variância genética aditiva é provocada pela segregação de genes com ação aditiva e dominante, enquanto a variância epistática é conse

MATZINGER, D. F. & KEMPTHORNE, O. The modified diallel table with partial inbreeding and interactions with environment. *Genetics*, Princeton, 41: 822-833, 1956.

quência da segregação de genes com ação epistática. A variância da CEC é ligada à variância genética de dominância e à variância genética epistática não-aditiva, conseqüentemente envolve genes com ação epistática e genes com ação dominante e ação gênica epistática com efeito de dominância.

Como foi citado anteriormente, os modelos de análise de dialelos admitem que não há epistasia. HALLAUER & MIRANDA FILHO (1988) avaliaram as informações existentes na literatura sobre a importância das interações não alélicas na composição da variância genética em milho. Constataram que a variância epistática existe para quase todas as características avaliadas, em maior ou menor grau, dependendo do material genético analisado, mas sua magnitude é reduzida quando comparada com a da variância genética total. Os autores concluíram que a variância epistática é realmente pequena ou os modelos estatístico-genético não foram eficientes para quantificá-la, ou ambos.

Em plantas que se reproduzem por via sexual cruzada, e que são selecionadas através do comportamento médio de suas progênies, é possível e provável que grupos gênicos com efeito epistático favorável tenham sido fixados durante a seleção, principalmente, se atuam em característica que são objeto direto de seleção, como a produção. No entanto, em plantas de reprodução vegetativa, aproveitam-se todas as ações gênicas favoráveis imediatamente e é possível que indivíduos com alto valor genotípico sejam fruto de genes favoráveis com ação epistática em heterozigose, sujeitos por-

tanto a segregação. Por esta razão podem ter diferentes valores genéticos e a variância epistática pode ter importância relativa maior do que ocorre em milho.

A CGC de um parental é atribuído ao seu patrimônio genético *per se* e/ou às suas combinações híbridas. Alta CGC representa, no caso de dialelos, maior concentração relativa de genes favoráveis de efeito aditivo e/ou potencial heterótico, consequência da divergência genética do parental em relação à média da população. CRUZ & VENCovsky (1989) compararam as informações fornecidas pelos modelos de Gardner & Eberhart e Griffing (métodos dois e quatro) e concluíram que nenhum dos métodos consegue separar esses dois componentes da CGC. A CEC é o somatório dos efeitos de dominância provocados pela diferença entre as frequências gênicas no mesmo *locus*, isto é, pela divergência genética.

A autofecundação, por conduzir rapidamente à homozigose, é considerado um eficiente método para revelar a existência de genes recessivos com efeitos deletérios ou menos favoráveis. Nas plantas de propagação vegetativa, espera-se que os genótipos sejam altamente heterozigotos para genes letais ou pouco favoráveis. Essa composição genética manifesta-se na descendência, gerando progênes com maior ou menor depressão endogâmica.

É importante salientar que os parâmetros genéticos são específicos do material avaliado. Somente após a análise de uma série de dados com informações convergentes, podem ser aceitos como reflexo de um comportamento generalizado.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Cultivares parentais

Para o presente estudo foram selecionados sete cultivares com boas características agronômicas. Por serem cultivares nativos (exceto 'Taquari') e não existirem informações sobre suas genealogias, admitiu-se não possuírem qualquer grau de parentesco. São descritos a seguir:

1. 'Vassourinha Paulista' (SRT-1)¹. Coletado em 1935 em Campinas (SP). Foi o cultivar mais plantado no Estado de São Paulo até a década de 40, para o consumo *in natura*, forragem e indústria. Muito produtivo, tem raízes de película escura (característica prejudicial para a produção de farinha), aspecto e forma considerados padrão para o mercado de mandioca *in natura*. Tem alto teor de matéria seca, é de fácil colheita mas muito suscetível à bacteriose.

2. 'Branca de Santa Catarina' (SRT-59). Originado do Estado de Santa Catarina e introduzido no IAC em 1935, através da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Foi difundido no Estado de São Paulo pelo IAC para substituir a 'Vassourinha Paulista' nas indústrias, quando da epifi-

1. A sigla SRT seguida de um número corresponde à identificação desse genótipo no Banco de Germoplasma de Mandioca da Seção de Raízes e Tubérculos do IAC e indica ser um genótipo recebido de outra instituição ou um cultivar nativo coletado pelo próprio IAC.

tia de bacteriose. É, atualmente, cultivar industrial padrão por ter raízes regulares de excelente aspecto e película clara. Muito produtivo, tem ângulos de ramificação muito abertos, o que dificulta a execução dos tratos culturais. Está deixando de ser cultivado devido à ocorrência de surtos epifitóticos em suas lavouras. Não se dispõe de dados experimentais que confirmem tratar-se de adaptação da população do patógeno, quer pela seleção de patovares mais virulentos durante cinco décadas de intenso cultivo monoclonal, quer pela quebra de resistência por acúmulo de outros patógenos assintomáticos na mandioca.

3. 'Santa' ou 'Santista' (SRT-120). Cultivar coletado em Ubatuba (SP) em 1937. Muito plantado no litoral paulista para o consumo *in natura* e fornecimento a pequenas indústrias de farinha características da região. Tem película escura, feloderma róseo e boa arquitetura da planta. Apesar de ser cultivado apenas na região litorânea, não se adaptando às condições do planalto pela sensibilidade a baixas temperaturas. É o parental feminino do cultivar Mantiqueira (IAC 24-2), que possui a maior estabilidade espacial conhecida, sendo cultivado comercialmente em diversos países: Cuba, Colômbia, Panamá, entre outros. Aparentemente, tem boa resistência à bacteriose.

4. 'Carapé' (SRT-521). Coletado em Capela (RS) e introduzido no IAC em 1944. Produtivo, com raízes de bom aspecto e película marrom. Tem porte muito baixo, permitindo alta densidade de plantio. Tem boa resistência à bacteriose.

5. 'Taquari' (SRT-1099). Selecionado com o código S-18-7 na Estação Experimental de Taquari (RS), foi introduzido no IAC em 1969. Nas condições de São Paulo, é relativamente produtivo, tendo raízes de película clara e aspecto irregular. Apresenta boa arquitetura da planta. Tem alta resistência à bacteriose e apenas em condições muito favoráveis mostra sintomas da moléstia nas hastes.

6. 'Mico', 'Chuamba' ou 'Roxinha' (SRT-1105). Cultivar nativo de Santa Catarina, coletado e distribuído pela Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária, introduzido no IAC em 1969. Atualmente é cultivado em grande escala nos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina para as indústrias. É produtivo mas tem película escura, o que dificulta sua comercialização quando ocorrem excedentes de produção. Tem porte relativamente alto e ângulos de ramificação abertos. Boa resistência à bacteriose, com alguma instabilidade espacial.

7. 'Cigana' ou 'Cigana Preta' (SRT-1116). Cultivar nativo da Bahia, enviado ao IAC pela Escola de Agronomia de Cruz das Almas (BA) em 1972. É muito cultivado para a produção de farinha de mesa. É produtivo, tem película marrom clara e raízes de bom aspecto. A arquitetura da planta permite fácil execução de tratos culturais. É muito suscetível à bacteriose.

3.2. Cruzamentos

Para obter-se todas as combinações genéticas possíveis foram conduzidos sete campos de cruzamentos (um para

cada parental polinizador) na Estação Experimental de Tiete, do IAC, durante o ano agrícola 84/85.

Os campos de cruzamento foram instalados a partir de mudas produzidas em casas de vegetação e assintomáticas em relação a *Xanthomonas campestris* pv *manihotis*. Utilizou-se um espaçamento suficientemente largo (2,0m x 1,5m) para evitar competição entre plantas e prejuízos ao florescimento, além de facilitar os trabalhos de condução do campo.

Em cada campo foram plantadas duas fileiras (40 plantas) de cada clone parental feminino, intercaladas com uma fileira (20 plantas) do parental masculino. As plantas utilizadas como fêmeas foram sistematicamente emasculadas. Assim, as sementes coletadas nessas plantas são do cruzamento desse cultivar com o cultivar polinizador, e as sementes coletadas nas plantas polinizadoras resultam de autofecundação. Todos os campos estavam espacialmente isolados entre si, e de qualquer outra planta de mandioca. Os frutos foram protegidos com sacos plásticos para evitar a perda de sementes por deiscência e do ataque de pragas.

Nesses sete campos foi possível obter-se 21 cruzamentos, 21 recíprocos e sete autofecundações. Convencionou-se identificar os parentais com números de 1 a 7 (conforme descrito no início do capítulo) e mencionar o parental feminino em primeiro lugar, por exemplo: no cruzamento 1x2 o parental feminino é o cultivar Vassourinha e o parental masculino é o cultivar Branca de Santa Catarina.

3.3. Avaliação da fertilidade dos parentais

Avaliou-se, quantitativa e qualitativamente, a fertilidade dos clones parentais em cruzamentos, quer como polinizadores (fertilidade masculina), quer como produtores de sementes botânicas (fertilidade feminina). Analisaram-se as autofecundações separadamente.

A fertilidade de cada cultivar foi avaliada através do número de sementes botânicas produzidas em cada cruzamento onde participou como macho, como fêmea, autofecundado e ainda com a média dos seis cruzamentos em que participou como macho e como fêmea.

Em termos qualitativos, a fertilidade de cada cultivar, foi avaliada de duas maneiras: (a) separando-se e medindo a porcentagem de sementes com baixa densidade (flutuam n'água) e que apresentam, em geral, baixa taxa de germinação; (b) através da taxa de germinação (porcentagem de plântulas sobreviventes após 45 dias do plantio). Esta porcentagem foi calculada em lotes de 150 sementes de alta densidade. Excepcionalmente, quando o número de sementes com alta densidade não era suficiente, utilizaram-se todas as disponíveis, independentemente da densidade.

3.4. Seleção ao nível de plântulas

Em outubro de 1985, em canteiros a plena insolação, plantaram-se sementes botânicas de cada um dos 49 tratamentos no espaçamento de 5cm x 10cm. O espaçamento reduzido destina-se a criar condições predisponentes à manifestação de sintomas e disseminação da bacteriose. Cerca de 60

dias após o plantio as plântulas apresentavam aproximadamente 40cm de altura, foram feridas com uma "chuva" de areia grossa e inoculadas na forma de pulverização com uma suspensão de *X. campestris* pv *manihotis* (10^7 bactérias/ml), visando posterior seleção de genótipos resistentes à bactéria.

Durante o desenvolvimento vegetativo foram eliminados os genótipos que apresentaram sintomas evidentes de bacteriose, sensibilidade ao tripses, á ácaros, ou qualquer anomalia.

Após dez meses foram selecionados os clones dos quais era possível retirar uma maniva em condições de ser levada ao campo para a primeira multiplicação vegetativa. Esta maniva deveria ter pelo menos 20cm de comprimento, 1cm de diâmetro e três gemas, sem sintomas evidentes de doenças. Selecionaram-se somente cruzamentos com, no mínimo, dez genótipos satisfazendo a essas condições.

3.5. Primeira geração de multiplicação vegetativa

O plantio da primeira geração de multiplicação vegetativa, realizada no Centro Experimental de Campinas, do IAC, em setembro de 1986, destinava-se: (a) multiplicação e uniformização do material de propagação para os plantios subsequentes; (b) avaliação da resistência de campo à bacteriose.

A avaliação deveria ser realizada em ensaio com quatro repetições e 30 genótipos por parcela, em três fileiras de dez plantas no espaçamento de 1,00m x 1,00m. Como o número de genótipos foi muito variável, os cruzamentos foram

representados ora por 120 genótipos (4 repetições de 30 plantas), ora por 90 (3 x 30) ou 60 (2 x 30) ou ainda por 30, 20 ou 10 genótipos, sem repetição do cruzamento.

A avaliação para resistência à bacteriose em cada genótipo foi feita em março/abril de 1987, após o período mais favorável ao desenvolvimento da doença no Estado de São Paulo. Utilizou-se, para a avaliação, uma adaptação da escala de notas do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, *circa* 1982), a seguir discriminada:

Nota 1 - Sem sintomas visíveis ou presença de manchas angulares nas folhas.

Nota 2 - Lesões visíveis ou presença de pus bacteriano nas hastes ainda herbáceas.

Nota 3 - Morte descendente das hastes herbáceas (ponteiros).

Nota 4 - Mais de 70% da haste morta.

Plantas apresentando mais de uma haste sintomática, tiveram a haste mais atacada como representativa do genótipo.

Estudos de TAKATSU *et alii* (1979) sobre a ação da temperatura na germinação de manivas infectadas com *X. campestris* pv *manihotis*, constataram que o cultivo sob temperaturas oscilantes (20°C-28°C e 20°C-25°C) tem taxa de germinação quatro vezes inferior às manivas sadias. Embora tivesse sido feita uma seleção visual rigorosa das manivas, muitas delas certamente foram portadoras da bactéria em condições assintomáticas. Em função dos resultados citados na literatura e as condições térmicas com que foi desenvolvido

o experimento (Quadro 1), considerou-se que esse patógeno foi responsável pela incidência de falhas no campo até o limite de 83%. Adotou-se esse valor porque foi o estande médio do cruzamento de 'Taquari' com 'Santa', 'Carapé' e 'Mico', os menos afetados pela doença. Decidiu-se que genótipos mortos antes da fase de avaliação receberiam nota quatro até que o tratamento atingisse o estande de 83%. Os restantes 17% de falhas foram atribuídos a fatores desconhecidos.

Quadro 1. Temperatura do ar (°C) em Campinas nos meses de setembro a dezembro de 1986.

Mes	Média	Máxima	Mínima
Setembro	19,9	26,7	14,9
Outubro	21,5	28,6	16,1
Novembro	23,2	29,6	18,3
Dezembro	22,1	27,7	19,0

Fonte: Resenha Climatológica. *O Agrônomo*, Campinas, 39(1): 104, 1987.

A avaliação genética de cada cruzamento obedeceu à distribuição porcentual dos genótipos na escala de notas e a avaliação de cada parental foi feita calculando-se a porcentagem média de todos os cruzamentos em que participou e a progênie autofecundada.

3.6. Segunda geração de multiplicação vegetativa

Para avaliar e quantificar a variabilidade disponível na população quando da segunda multiplicação vegetativa, plantou-se um ensaio com manivas provenientes do campo de multiplicação, já referido no item anterior. Foram utilizados somente genótipos que pudessem fornecer, pelo menos,

cinco manivas de 20cm de comprimento, diâmetro superior a 2,5cm, com no mínimo quatro gemas, e de boa qualidade sanitária.

O ensaio continha 25 tratamentos (15 cruzamentos, seis recíprocos e quatro autofecundações), no delineamento em blocos ao acaso, com três repetições. Cada parcela era formada por 20 genótipos (cinco plantas por genótipo) de uma família de irmãos germanos. O espaçamento utilizado foi de 0,80m entre plantas e 1,20m entre genótipos, neste último caso o espaçamento maior que o convencional foi para evitar a competição intergenotípica. Cada parcela ocupava aproximadamente 96m². Plantou-se o clone testemunha 'Mantiqueira' (IAC-24-2) no início e final de cada parcela.

Dos 49 cruzamentos existentes, avaliaram-se apenas 25, não sendo possível analisar os 24 restantes, pelo reduzido número de genótipos remanescentes. Julgou-se que nesta fase de seleção, seriam necessárias pelo menos duas repetições de 20 genótipos para fazer-se a avaliação da segregação de cada cruzamento. Cinco cruzamentos (1x3, 2x1, 4x1, 4x3, 6x3) forneceram material de plantio suficiente para duas repetições. Foi estimado o valor para a terceira repetição segundo a metodologia relatada por STEEL & TORRIE (1960).

Durante o planejamento e execução inicial deste ensaio, julgou-se conveniente incluir como testemunhas os próprios clones parentais que seriam utilizados como participantes do dialelo (parentais + cruzamentos) para obter informações genéticas mais detalhadas, além de testemunhas e

controle ambiental. Após o plantio, verificou-se que estes não mostraram boa germinação e foram imediatamente substituídos pelo IAC 24-2 'Mantiqueira'. Este cultivar é recomendado como testemunha em ensaios internacionais.

O ensaio foi conduzido no Centro Experimental de Campinas, em Latossolo roxo eutrófico (Typic Eutrorthox), sem adubação, com solo arado, gradeado e riscado tradicionalmente. Controlou-se o mato com aplicação de trifluralina e capinas manuais. Foi plantado em outubro de 1987 e colhido em setembro de 1988, ocupando aproximadamente 1ha.

3.6.1. Características avaliadas

Peso de Raízes (PR): o peso de raízes foi avaliado pesando-se todas as raízes tuberosas das plantas pertencentes a um único genótipo. Valores em kg/genótipo. (Unidade: cinco plantas/genótipo).

Peso Total (PT): obtido pela soma do peso de raízes tuberosas, cepa e parte aérea, das plantas de um mesmo genótipo. Valores em kg/genótipo. (Unidade: cinco plantas/genótipo).

Peso da Parte Aérea + Cepa (PA): calculou-se subtraindo do peso total o peso das raízes tuberosas. Valores em kg/genótipo. (Unidade: cinco plantas/genótipo).

Índice de Colheita (IC): Quociente entre o peso das raízes e peso total. Valores em porcentagem.

Número de Raízes (NR): número total de raízes tuberosas dividido pelo número de plantas. Valores em número de raízes por planta.

3.6.2. Análise estatística dos dados

As análises estatísticas dos dados experimentais foram feitas segundo o seguinte modelo matemático:

$$Y_{ik} = m + t_i + b_k + e_{ik}.$$

onde:

Y_{ik} : valor do caráter do cruzamento i no bloco k ;

m : média geral. Efeito fixo;

t_i : desvio da média devido ao efeito do tratamento de índice i ($i : 1, 2, \dots, 25$). Efeito fixo;

b_k : desvio da média devido ao efeito do bloco do índice k ($k : 1, 2, 3$). Efeito aleatório;

e_{ik} : desvio da média devido ao efeito do erro experimental associado à parcela de índice i . Efeito aleatório.

A análise da variância (ANAVA) foi feita de acordo com o esquema mostrado no Quadro 2. Os quadrados médios foram calculados com a média de cada parcela expressa em kg, % ou nº/genótipo e cada genótipo avaliada pelo total de cinco plantas (estande ideal). Estimativas de variâncias com valores negativos foram consideradas iguais a zero.

Para comparação de médias usaram-se três testes citados por HOFFMAN (1980): (a) Teste t , para comparar médias entre cruzamentos recíprocos; (b) Tukey, para comparar médias entre dois cruzamentos quaisquer; (c) Scheffé, para comparar médias entre famílias autofecundadas e o cruzamento de seu respectivo parental (grupo de contrastes não-ortogonais).

Quadro 2. Análise da variância entre e dentro de cruzamentos (delineamento em blocos ao acaso) e esperança dos quadrados médios. Análise realizada ao nível de indivíduos (indivíduo = genótipo avaliado com cinco plantas).

FV	GL	QM ²	E(QM)	F
Repetições(R)	$(r-1)=2$	$nQMR$	$\sigma^2_d + n\sigma^2_e + nt\sigma^2_r$	$QMR \div QMRE$
Tratamento(T)	$(t-1)=24$	$nQMT$	$\sigma^2_d + n\sigma^2_e + nrV_t$	$QMT \div QMRE$
Resíduo(RE)	$(r-1)(t-1)-5=43$	$nQMRE$	$\sigma^2_d + n\sigma^2_e$	
Total	$(rt-1)-5=69$			
Genótipos/T	$(n-1)(r_1t)$	$QM_{G/T}$	$(\sigma^2_a + \sigma^2_g) = \sigma^2_d$	$QM_{G/T} \div QMCT$
Clone Testemunha	65	$QMCT$	σ^2_a	

em que:

- σ^2_d : variância fenotípica entre médias de genótipos, dentro de tratamentos e repetições;
 σ^2_e : variância ambiental entre parcelas;
 σ^2_r : variância ambiental entre repetições;
 V_t : variância genética devido ao efeito fixo de tratamentos;
 $\sigma^2_d + n\sigma^2_e$: variância do erro experimental entre parcelas;
 σ^2_a : variância ambiental entre genótipos dentro de tratamentos, obtida através da variação entre fileiras do clone testemunha (IAC 24-2 'Mantiqueira');
 σ^2_g : variância genotípica média, dentro de tratamentos e repetições;
 n : número de indivíduos por parcela (genótipos dentro de tratamentos); n igual a 20, para médias onde não houve seleção e n igual a 10, 5, 2, 1, quando houve seleção;
 r : número de repetições para avaliações entre tratamentos ($r=3$);
 r_1 : número de repetições para avaliações dentro de tratamentos ($r_1=2$);
 t : número de tratamentos ($t=25$);

1. Subtraiu-se 5 gl do resíduo (5 parcelas estimadas).
2. Calculados com a média de n genótipos por parcela, sendo cada genótipo avaliado com cinco plantas (estande ideal).

3.6.3. Análise genética e estimativa de parâmetros

A análise genética para identificar parentais e cruzamentos superiores obedeceu a dois critérios: (1) avaliação de médias e variâncias entre cruzamentos; (2) avaliação de médias, variâncias e frequências dentro de cruzamentos. Ambos os casos foram analisados em populações sem seleção (20 genótipos/parcela) e com seleção. Utilizou-se o método de seleção massal estratificada, em que cada parcela era um estrato. Selecionaram-se os genótipos com maior produção de raízes na seguinte pressão de seleção: 10 melhores (50%), 5 melhores (25%), 2 melhores (10%), o melhor (5%). As demais características foram avaliadas nos genótipos selecionados.

3.6.3.1. Efeitos recíprocos

Os efeitos recíprocos foram avaliados comparando-se as médias dos cruzamentos recíprocos através do Teste t. Não foram feitas comparações entre cruzamentos com seleção porque possíveis diferenças poderiam ser atribuídas a efeitos da segregação e da seleção.

3.6.3.2 Endogamia

O efeito da homozigose foi avaliado indiretamente pela comparação das famílias autofecundadas com a média em cruzamentos do respectivo parental. A significância das diferenças foi avaliada pelo teste de Scheffé. A avaliação do efeito da homozigose foi feita de forma indireta porque não se dispunha da avaliação do parental *per se*, apenas dos seus cruzamentos.

3.6.3.3. Capacidade de combinação

A capacidade geral de combinação (CGC) e a capacidade específica de combinação (CEC) foram estimadas pela metodologia de GRIFFING (1956) - Método 4 (somente os cruzamentos participam da análise), modelo misto B (os tratamentos são de efeito fixo e os blocos de efeito aleatório).

Optou-se pelo Método 4 que não prevê o uso de recíprocos porque a comparação entre médias de recíprocos feita através do teste *t* não mostrou significância mesmo a 1% de probabilidade. Além disso, não se dispunha de recíprocos para um grande número de cruzamentos.

A análise foi feita com a média dos 15 cruzamentos de seis parentais. Não se obteve número suficiente de descendentes para avaliar o sétimo parental, o cultivar Cigana.

Quando existiram cruzamentos recíprocos, fez-se as seguintes opções: (1) se o cultivar Branca de Santa Catarina foi parental, optou-se pelos cruzamentos em que participou como fêmea por sua alta fertilidade feminina e macho-esterilidade parcial; (2) nos cruzamentos 'Mico' x 'Carapé' e 'Taquari' x 'Carapé' e seus respectivos recíprocos optou-se pelos cruzamentos em que 'Carapé' foi doador de pólen, porque quando fêmea produz sementes de qualidade inferior; (3) nos cruzamentos em que participaram os cultivares 'Mico' e 'Taquari' optou-se por aquele em que 'Mico' foi a fêmea porque se observou a maior média de produção de raízes.

A tabela dialélica para análise segundo o modelo de Griffing tem a seguinte forma:

P A R E N T A I S

		1	2	3	4	5	6	Média
P A R E N T A I S	1		Y ₁₂	Y ₁₃	Y ₁₄	Y ₁₅	Y ₁₆	Y _{1.}
	2			Y ₂₃	Y ₂₄	Y ₂₅	Y ₂₆	Y _{2.}
	3				Y ₃₄	Y ₃₅	Y ₃₆	Y _{3.}
	4					Y ₄₅	Y ₄₆	Y _{4.}
	5						Y ₅₆	Y _{5.}
	6							Y _{6.}
								Y

O trabalho de GRIFFING (1956) propõe o desdobramento do efeito de tratamentos em capacidade geral e capacidade específica de combinação de acordo com o seguinte modelo matemático:

$$\bar{Y}_{IJ} = m + t_{IJ} + \bar{e}_{IJ}$$

e

$$t_{IJ} = g_I + g_J + s_{IJ}$$

sendo:

$\bar{Y}_{IJ}$: média do cruzamento I/J (3 repetições, 20 genótipos por parcela, sem seleção ou 10, 5, 2, 1, com seleção);

m : média geral;

t_{IJ} : efeito fixo do cruzamento I/J ;

$\bar{e}_{IJ}$: erro experimental associado à média do cruzamento I/J ;

g_I : efeito fixo da capacidade geral de combinação do parental I ;

g_J : efeito fixo da capacidade geral de combinação do parental J ;

s_{IJ} : efeito fixo da capacidade específica de combinação do cruzamento I/J ;

A análise da variância e esperança dos quadrados médios são mostrados no Quadro 3.

Quadro 3. Análise da variância e esperança dos quadrados médios da capacidade geral e específica de combinação, segundo o modelo 4 misto de Griffing.

FV	GL	SQ	QM	E(QM)
CGC	$p-1=5$	SQ_{CGC}	QM_{CGC}	$\sigma^2 + \frac{(p-2)}{(p-1)} \sum_i g^2_i$
CEC	$p(p-3)/2=9$	SQ_{CEC}	QM_{CEC}	$\sigma^2 + \frac{2}{p(p-3)} \sum_{i,j} s^2_{ij}$
Resíduo	$m=13$	-	QM'_R	σ^2

onde:

$$SQ_{CGC} = \frac{1}{p-2} \sum_i Y^2_{i.} - \frac{4}{p(p-2)} Y^2_{..}$$

$$SQ_{CEC} = \sum_{i,j} Y^2_{ij} - \frac{1}{p-2} \sum_i Y^2_{i.} + \frac{2}{(p-1)(p-2)} Y^2_{..}$$

QM'_R : Quadrado Médio do Resíduo da análise convencional (Quadro 2) dividido pelo número de repetições e número de indivíduos (3.n) com $n = 20, 10, 5, 2$ e 1 ;

m : graus de liberdade do resíduo;

p : número de clones parentais ($p=6$);

$\bar{Y}_{ij}$: média do cruzamento ij ;

$Y_{i.}$: somatório das médias dos cruzamentos em que participa o parental i ;

$Y_{..}$: somatório das médias de todos os cruzamentos.

Os componentes de médias e as respectivas variâncias são estimados pelas seguintes equações:

$$\hat{\mu} = \frac{2}{p(p-1)} Y_{..}$$

$$\text{Var}(\hat{\mu}) = \frac{2}{p(p-1)} \sigma^2$$

$$\hat{g}_i = \frac{1}{p(p-2)} (pY_{i.} - 2Y_{..})$$

$$\text{Var}(\hat{g}_i) = \frac{p-1}{p(p-2)} \sigma^2$$

$$\hat{s}_{ij} = \bar{Y}_{ij} - \frac{1}{p-2} (Y_{i.} + Y_{j.}) + \frac{2}{(p-1)(p-2)} Y_{..}$$

$$\text{Var}(\hat{s}_{ij}) = \frac{p-3}{p-1} \sigma^2$$

Verificou-se se as estimativas de g_i e s_{ij} diferem de zero utilizando-se o teste t, segundo as equações:

$$t = \frac{\hat{g}_i - 0}{s(\hat{g}_i)} ; \quad e \quad t = \frac{\hat{s}_{ij} - 0}{s(\hat{s}_{ij})}$$

onde:

$s(g_i)$ e $s(s_{ij})$ são as estimativas do desvio padrão.

A importância relativa entre CGC e CEC foi avaliada através do quociente $\Sigma g_i^2 / \Sigma s_{ij}^2$. Estes dados foram extraídos da análise da variância (Quadro 3) conforme é demonstrado a seguir:

$$\Sigma g_i^2 = \frac{(p-1)}{(p-2)} (QM_{CGC} - QM'R)$$

$$\Sigma s_{ij}^2 = p(p-3)(QM_{CEC} - QM'R)/2$$

O coeficiente de variação para verificar a dispersão relativa das capacidades de combinação foi calculado conforme as fórmulas a seguir:

$$CV(\hat{g}_i) = \frac{\sqrt{\Sigma g^2_i / 5}}{\bar{Y}} \times 100$$

$$CV(\hat{s}_{ij}) = \frac{\sqrt{\Sigma s^2_{ij} / 14}}{\bar{Y}} \times 100$$

onde $\bar{Y}$ é a média geral dos cruzamentos que participaram da análise.

3.6.3.4. Capacidade de combinação pós-seleção

O método desenvolvido por Griffing prevê o cruzamento entre linhagens, ou seja, indivíduos que produzem gametas iguais. Essas linhagens são selecionadas entre indivíduos provenientes de várias gerações de autofecundação em indivíduos heterozigotos. A CGC informa sobre o comportamento médio das linhagens através de seus híbridos e a CEC sobre as interações manifestadas também nos híbridos. Este assunto foi discutido com maiores detalhes no item Revisão de Literatura.

Os gametas produzidos por um indivíduo heterozigoto podem ser considerados linhagens possíveis de serem extraídas desse indivíduo. Quando os gametas, "linhagens", desse indivíduo cruzam-se com outros gametas, "linhagens", formam um novo grupo de indivíduos híbridos que podem ser considerados os híbridos formados pelas "linhagens" dos parentais.

Linhagens com maior CGC formam híbridos melhores porque seus gametas têm maior quantidade de genes com efeito aditivo. Cruzamentos com maior CEC são aqueles cujos genes, quando reunidos, manifestam ação gênica de dominância favorável. Em ambos os casos, maior CGC e/ou CEC são importantes porque levam a híbridos melhores. Portanto, selecionando-se híbridos melhores dentro das progênies de um grupo de cruzamentos é possível identificar os pais que produzem "fileiras-gens" com maior CGC e/ou CEC. A reprodução vegetativa substituiu a função das linhagens de perpetuar o mesmo híbrido.

De acordo com raciocínio desenvolvido anteriormente, aplicou-se a metodologia de Griffing para estimar os componentes das médias obtidas apenas com os clones selecionados dentro de cada cruzamento, o que permitiria selecionar um parental através da comparação de seus melhores híbridos, em vez do comportamento médio de todos os seus possíveis híbridos.

Para os cálculos, utilizou-se o programa GENES para análise genética e estatística desenvolvido pelo Prof. Dr. Cosme Damião Cruz, da Universidade Federal de Viçosa.

3.6.3.5. Avaliação dentro de cruzamentos

A análise dentro dos tratamentos teve por objetivo avaliar o potencial específico de cada cruzamento ou autofecundação, para uso imediato na seleção de genótipos superiores, utilizando-se o recurso da multiplicação vegetativa.

A testemunha anexa a algumas parcelas não apresentou desenvolvimento satisfatório e foi eliminada. Assim, as estimativas da média, variância (σ^2_a) e covariância ambiental (Cov_a) foram calculadas com 65 graus de liberdade ao invés dos 199 planejados, porém todo o campo experimental foi amostrado.

Utilizaram-se apenas a primeira e segunda repetições porque continham todos os 25 tratamentos. Deste modo, foram avaliados com o mesmo grau de precisão. Na terceira repetição não foram avaliados cinco tratamentos.

Foram estimados os seguintes parâmetros: a) Variância genética, b) herdabilidade no sentido amplo, c) coeficiente de variação genético, d) progresso genético esperado, e) frequência de genótipos superiores, f) coeficientes de correlação, g) respostas correlacionadas, que serão descritos a seguir.

a) Variância genética (s^2_g)

A variância genética dentro de cada tratamento foi calculada desdobrando-se os graus de liberdade da fonte de variação genótipos dentro de tratamentos (G/T) da análise da variância mostrada no Quadro 2 e detalhada a seguir conforme o Quadro 4.

Quadro 4. Análise da variância dentro de cruzamentos, delimitamento em blocos ao acaso, e esperança dos quadrados médios. Análise realizada ao nível de indivíduos (indivíduo = genótipo avaliado com cinco plantas).

FV	GL	QM	E(QM)
Genótipos/Repetição	$n-2$	QM_2	$\sigma^2_a + \sigma^2_g(ij)$
Clone testemunha	65	QM_1	σ^2_a

em que:

n : somatório do número de genótipos avaliados nas duas parcelas (I e II repetições);

$\sigma^2_g(ij)$: variância genética dentro do cruzamento ij onde ij são os parentais;

σ^2_a : variância ambiental entre genótipos dentro de cruzamentos, obtida através do clone testemunha 'Mantiqueira' (IAC 24-2);

Portanto, $\sigma^2_g = QM_2 - QM_1$.

Nesta situação, QM_2 corresponde à própria estimativa da variância fenotípica (σ^2_F).

b) Herdabilidade no sentido amplo (h^2_A)

A herdabilidade mede a proporção da variância total (fenotípica) que é de origem genética, isto é, a diferença da composição genotípica entre clones. A multiplicação vegetativa permite que seja explorada a variância genética total (aditiva e não aditiva) na seleção, portanto utilizou-se neste caso como herdabilidade no sentido amplo. É calculada do seguinte modo para cada tratamento:

$$h^2_A (\%) = 100 \times \sigma^2_g / \sigma^2_F \quad \text{ou}$$

$$h^2_A (\%) = 100 \times (QM_2 - QM_1) / QM_2$$

c) Coeficiente de variação genético (CV_g)

O CV_g é um parâmetro de dispersão relativa que informa a magnitude da dispersão de origem genética em relação à média, portanto, a possibilidade de progresso na seleção.

É calculado do seguinte modo para cada tratamento:

$$CV_g (\%) = 100 \times s_g / m$$

onde:

$$s_g = \sqrt{\sigma^2_g} \quad \text{ou} \quad s_g = \sqrt{(QM2 - QM1)}$$

m : média do cruzamento

d) Progresso genético esperado (ΔG_S)

O progresso genético esperado foi calculado pelas equações:

$$\Delta G_S = (\bar{F}_S - \bar{F}_0) h^2_A$$

e

$$\Delta G_S(\%) = 100 \times \Delta G_S / m$$

onde:

$\bar{F}_0$: média do cruzamento com todos os genótipos;

$\bar{F}_S$: média do cruzamento com os genótipos selecionados.

No presente trabalho estimou-se o progresso selecionando-se os 25% e 10% melhores clones para a produção de raízes em cada parcela, isto é, os cinco e os dois clones com maior peso de raízes.

A média estimada após a seleção em cada cruzamento foi calculada somando-se à média sem seleção ($\bar{F}_0$) o progresso genético estimado.

e) Frequência de genótipos superiores

Em plantas de multiplicação vegetativa, um único genótipo de alto valor é de maior interesse que alguns genótipos de valores não tão bons. Para verificar perfis de segregação mais convenientes entre cruzamentos, avaliou-se a frequência de genótipos com peso de raízes superior a dez e 15 kg/genótipo.

f) Coeficientes de correlação

A associação entre produção de raízes e outras características dentro de cruzamentos foi avaliada através da correlação genética (r_g) e fenotípica (r_F). Para o cálculo, utilizaram-se as estimativas da variância genética e ambiental obtidas a partir da análise da variância mostrada no Quadro 4 e as covariâncias genética e ambiental obtidas a partir da análise da covariância mostrada no Quadro 5.

Quadro 5. Análise da covariância entre duas características (X,Y) dentro de cruzamentos, delineamento em blocos ao acaso e esperança dos produtos médios. Análise realizada ao nível de indivíduos (indivíduo = genótipo avaliado com cinco plantas).

FV	GL	PM	E(PM)
Genótipos/Repetição	$n-2$	PM_2	$Cov_a + Cov_g(IJ)$
Clone testemunha	65	PM_1	Cov_a

onde:

n : somatório do número de genótipos avaliados nas duas parcelas (I e II repetições);

$Covg(IJ)$: covariância genética das características (X,Y) dentro do cruzamento IJ onde I e J são os parentais;

$Cova$: covariância ambiental das características (X,Y) entre genótipos dentro de cruzamentos, obtida através do clone testemunha 'Mantiqueira' (IAC 24-2);

X : peso de raízes;

Y : as demais características (PA, IC, NR).

O cálculo foi feito através das seguintes fórmulas:

$$r_G(X,Y) = \frac{Cov_g(XY)}{s_g(X) \cdot s_g(Y)} \quad \text{onde: } Cov_g(XY) = PM_2 - PM_1$$

$$s_g(X \text{ ou } Y) = \sqrt{QM_2 - QM_1}$$

$$r_F(X,Y) = \frac{Cov_f(XY)}{s_f(X) \cdot s_f(Y)} \quad \text{onde: } Cov_f(XY) = PM_2$$

$$s_f(X \text{ ou } Y) = \sqrt{QM_2}$$

g) Resposta correlacionada

A existência de correlação entre duas características determina que a seleção em uma delas implica obrigatoriamente em alteração da outra. É, portanto, de interesse saber se a seleção para peso de raízes altera as demais características (peso de parte aérea, índice de colheita e número de raízes). O cálculo obedeceu à seguinte fórmula, mostrada por VENCOSKY (1978):

$$RC_{X,Y} = ds_X \frac{Cov_G(X,Y)}{\sigma^2_{FX}}$$

ou

$$RC_{X,Y} = (F_S - F_0) \frac{PM_2 - PM_1}{QM_2}$$

onde:

- X : peso de raízes (kg/genótipo, unidade: genótipo avaliado com cinco plantas), onde é feita a seleção diretamente;
- Y : as demais características (PA, IC, NR);
- $RC_{X,Y}$: resposta correlacionada esperada no caráter Y , na unidade em que foi avaliado, por seleção efetuada no peso de raízes;
- ds_X : igual a $(F_S - F_0)$, diferencial de seleção no peso de raízes avaliado com dois níveis de seleção, 25% e 10%;
- $Cov_G(X, Y)$: covariância genética entre as características X e Y ;
- σ^2_{FX} : variância fenotípica do peso de raízes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Fertilidade

O melhoramento de espécies de multiplicação vegetativa, ainda que involuntariamente, favorece a seleção negativa para a propagação sexual, exceto nas espécies cujo objetivo da produção está ligado a estruturas de reprodução sexual, como as frutíferas. Vários clones com alto valor genético têm uso restrito em melhoramento porque têm esterilidade masculina e/ou feminina ou, ainda, fertilidade reduzida.

Os resultados que avaliam a fertilidade de cada cruzamento são apresentados na Tabela 1. Estes evidenciam que alguns são de difícil execução, porque produzem poucas sementes botânicas e com baixa viabilidade (por exemplo, 'Santa' x 'Mico'). Outros, produzem sementes em abundância e de boa qualidade, por exemplo 'Taquari' x 'Mico'. O número médio de sementes botânicas oscilou entre 0,6 e 232,5 por planta, nos cruzamentos 'Santa' x 'BSC' e 'Taquari' x 'Mico', respectivamente. Os fatores que determinam a fertilidade de um cruzamento são variados (número de flores femininas produzidas não abortadas, quantidade e viabilidade de pólen, etc.), e muito sensíveis a alterações ambientais, principalmente em clones de fertilidade reduzida. Portanto, os dados

obtidos são de difícil generalização e apenas indicativos, devido às interações genótipos x local e genótipos x anos.

A taxa de germinação de cada tratamento é mostrada também na Tabela 1. Observam-se valores altos e próximos, normalmente superiores a 70% e inferiores a 95%, salvo duas situações: (a) quando 'Santa' foi o parental feminino, gerando valores entre 20% e 57%; (b) nos cruzamentos 'Cigana' x 'Vassourinha' e 'Cigana' x 'Mico' e na autofecundação de 'Cigana' que apresentaram os valores de 47%, 50% e 23%, respectivamente. Os resultados mostram que a separação das sementes botânicas por densidade é uma prática eficiente para obter-se uniformidade de germinação em canteiros. Em termos práticos, essas informações mostram que o número de plantas de cada parental, em campos de cruzamentos, pode ser variável e que parentais mais férteis permitem uso de menor número de plantas, reduzindo-se os trabalhos de campo.

Os resultados específicos dos parentais são mostrados na Tabela 2. O comportamento das fêmeas esteve sujeito à disponibilidade de pólen e à influência ambiental, uma vez que as médias são provenientes dos dados de seis campos de cruzamentos. O comportamento de cada parental como macho resultou da produção de pólen e da fertilidade feminina dos outros parentais no ambiente específico em que foi alocado o campo de cruzamento.

Os parentais 'Vassourinha', 'Santa' e 'Cigana' produziram, comparativamente, menos sementes botânicas do que os demais, porque têm poucas flores femininas, várias

são abortadas e algumas plantas não florescem, fato observado no acompanhamento dos campos de cruzamento. 'Santa' foi o clone de menor fertilidade, produziu poucas sementes botânicas, freqüentemente, com densidade inferior a um. Os demais parentais têm boa fertilidade e são capazes de produzir sementes botânicas em alta quantidade e de boa qualidade.

O comportamento dos parentais como macho foi mais homogêneo, e genótipos com fertilidade feminina reduzida são mais facilmente recombinaados se utilizados como polinizadores, fato evidenciado na Tabela 2. 'Branca de Santa Catarina' foi um mau polinizador, comportamento também relatado por PEREIRA *et al.* (1978), mas este fato não deve ser atribuído apenas à ação prejudicial do ambiente onde se estabeleceu o campo de cruzamentos. CREPALDI (1987) estudou detalhadamente a microsporogênese desse clone, verificando que 99,7% do pólen é inviável devido à não degenerescência das células do tapete. Por razões desconhecidas, o campo onde 'Cigana' foi instalado como polinizador mostrou-se um ambiente excepcionalmente favorável ao florescimento, daí seu bom desempenho como parental masculino.

A autofertilidade reduzida pode ser atribuída às seguintes causas: aborto de flores femininas e frutos, condições ambientais desfavoráveis e/ou escassez de pólen como no caso de 'Vassourinha'; pólen com baixa viabilidade como no caso de 'Branca de Santa Catarina'; pequena produção de flores femininas nos casos de 'Santa' e 'Cigana'.

Em alguns genótipos a autofertilidade reduzida pode ter sido provocada por autoincompatibilidade, porém, sua confirmação depende de estudos mais apurados.

A qualidade das sementes botânicas é determinada, preferencialmente, pelo parental feminino (Tabela 2). Este fato pode ser observado de duas maneiras: a) a autofecundação origina sementes com densidade inferior a um em porcentagens similares às médias desse parental quando este é utilizado como fêmea, mas guarda pouca relação quando o parental é doador de pólen; b) os desvios da porcentagem de sementes com densidade inferior a um, são menores quando o parental é utilizado como fêmea. Portanto, há maior uniformidade na qualidade das sementes, independentemente do doador de pólen.

A porcentagem de germinação foi alta e apresentou valores próximos para todos os parentais, quer como fêmea, quer como polinizador, exceto para 'Santa' quando fêmea. Isto pode ser atribuído à homogeneização provocada pela separação das sementes com densidade baixa, e não ao comportamento similar dos parentais.

Os resultados mostram que a fertilidade entre os cruzamentos e a porcentagem de sementes com densidade inferior a um, são os principais parâmetros indicativos para o dimensionamento de campos de cruzamentos. Observações de campo indicam que é necessário determinar condições edáficas favoráveis ao florescimento, principalmente quando a fertilidade dos clones é baixa.

1.2 Resistência à bacteriose

A seleção de plântulas, em canteiros, foi avaliada através da relação entre o número de genótipos selecionados e o número de genótipos avaliados. Os resultados estão na Tabela 3. Ao inocular-se artificialmente *X. campestris* pv *manihotis* esperava-se que o principal fator de seleção fosse a resistência à colonização do xilema pela bactéria, pois a resistência à penetração foi quebrada quando foram feitas lesões com "chuva" de areia. Porém, a hierarquia da taxa de seleção de cada cruzamento e/ou parental (Tabelas 3 e 4) mostra que esse não foi o principal fator de seleção, porque cruzamentos que sabidamente teriam maior número de indivíduos resistentes, tiveram menor taxa de seleção, e vice-versa. Este fato torna-se mais evidente comparando-se a autofecundação de 'Cigana' (7 ♂) ou o seu cruzamento com 'Vasourinha' (7 x 1) que são os dois parentais mais suscetíveis. Estes tiveram taxas de seleção de 25,6% e 21,3%, respectivamente, enquanto os cruzamentos envolvendo 'Taquari' com outros parentais resistentes (5 x 3, 5 x 4, 5 ♂) apresentaram taxas de seleção 12,1%; 15,6% e 10,1% respectivamente.

Esses resultados indicam que fatores de seleção objetivos (resistência à bacteriose) foram definitivos em cruzamentos onde o número de indivíduos é pequeno, como por exemplo, nos cruzamentos que envolveram 'Santa'. Em cruzamentos com grande número de indivíduos, é possível, e até prática usual, que fatores subjetivos somem-se aos objetivos na seleção de clones. Assim, as progênes de 'Carapé' têm

grande número de indivíduos, mas com porte reduzido (principalmente a autofecundada) e a haste inteira da plântula permanece herbácea; conseqüentemente, são mortas pelas temperaturas baixas do inverno. Progenies de 'Cigana' têm alguns indivíduos cloróticos. Portanto, a resistência não foi o único fator para selecionar genótipos em canteiros.

A inoculação das plântulas nos canteiros mostrou efetivo resultado na avaliação feita durante a primeira multiplicação vegetativa, porque os genótipos já foram levados para o campo com o patógeno, mesmo que assintomático. Dessa forma, os indivíduos que não eram portadores da bactéria foram submetidos a fontes de inóculo dos demais.

Na avaliação dos resultados, procurou-se diferenças entre cruzamentos recíprocos, mas não se verificou comportamento diferenciado. Então, os cruzamentos recíprocos foram agrupados para melhor avaliar cada cruzamento. Os resultados estão na Tabela 5. Estes indicam que em todos os cruzamentos há indivíduos distribuídos em todos os níveis de resistência, diferenciando-se apenas pela frequência de genótipos dentro da escala de notas. Maior frequência de indivíduos resistentes é encontrada em cruzamentos cujos parentais têm maior nível de resistência. Resultados similares também foram encontrados por UEMURA & KAWANO (1983).

Durante o desenvolvimento do experimento de campo para a avaliação da resistência à bacteriose, houve condições favoráveis à ocorrência da doença: temperaturas amenas (Quadro 1), precipitação pluviométrica suficiente, inó-

culo levado pelo próprio material de plantio e hospedeiros com suscetibilidade. Observou-se a ocorrência da doença e foi possível avaliar-se o material em condições discriminatórias, portanto, esperava-se baixa taxa de escape. Porém, a seleção de genótipos com alto grau de resistência à colonização vascular em condições de campo, só é possível com avaliações sucessivas em ambientes favoráveis à doença, como foi demonstrado por LOZANO & LABERRY (1982).

Os resultados da Tabela 5 mostram que, se genótipos suscetíveis ('Vassourinha' e 'Cigana') são utilizados como parentais, estes devem ser cruzados com os mais resistentes ('Taquari' e 'Carapé') para se obter o máximo possível de sementes botânicas, uma vez que o número de indivíduos com resistência aceitável é pequeno e, entre eles deve haver variabilidade para outras características. Parentais com resistência intermediária ('Branca de Santa Catarina' e 'Mico'), quando cruzados entre si, tem somente cerca de um terço da progênie com nível de resistência satisfatório. Parentais com alta resistência ('Taquari' e 'Carapé') tem 71% dos descendentes com nota 1. Portanto, o número de indivíduos suscetíveis da progênie é diretamente proporcional ao grau de suscetibilidade média dos parentais, fato já relatado por UEMURA & KAWANO, 1983. Quando ambos são muito suscetíveis ('Vassourinha' e 'Cigana'), o cruzamento é praticamente inócuo e, caso se pretenda utilizar seus genes na obtenção de variedades para ecossistemas sujeitos a epidemias,

são necessários métodos de melhoramento mais apurados do que a simples obtenção de progênes biparentais.

A Tabela 6 mostra a frequência de genótipos resistentes na progênie de cada parental, em cruzamentos e autofecundação. Observa-se que houve uma boa correspondência na hierarquia dos parentais nos dois modos de avaliação, porém as autofecundações foram mais discriminatórias do que os cruzamentos na identificação dos respectivos valores genéticos. Segundo os dados, 'Carapé' e 'Taquari' têm os maiores valores genéticos. O valor obtido para 'Santa' quando autofecundado (75% dos indivíduos com nota um) é pouco confiável, porque apenas oito descendentes foram avaliados; certamente a avaliação mais apropriada é a feita em cruzamentos que indicam comportamento mais próximo a 'Mico' que, embora com resistência aceitável, é inferior aos parentais 'Carapé' e 'Taquari'.

Outros dois fatos revelados pelas Tabelas 5 e 6 são: a) o cultivar 'Vassourinha' é, em termos de resistência, geneticamente superior ao 'Cigana', o que também foi observado a nível fenotípico nos campos de cruzamento. Portanto, apesar de 'Vassourinha' ser considerado atualmente padrão de suscetibilidade em São Paulo, teve resistência suficiente para ser cultivado até a década de 40, quando a cultura era menos expressiva; b) o cultivar Branca de Santa Catarina não possui alta resistência genética para a variabilidade do patógeno encontrada atualmente, fato demonstrado pela segregação encontrada nas progênes. Portanto, a queda

de resistência relatada atualmente pode ser atribuída à seleção natural no patógeno para maior virulência em relação a esse clone, permitida pelo seu cultivo ininterrupto em milhares de hectares durante mais de meio século. A possibilidade de que tenha havido o acúmulo de patógenos em plantas assintomáticas, uma das hipóteses cogitadas para explicar a diminuição da resistência, parece reduzida, uma vez que as sementes botânicas funcionam como filtro para a maioria dos patógenos, o que permitiria a manifestação da resistência genética na progênie obtida via sexual, fato que não foi observado.

Genótipos com bom perfil fenotípico e alta resistência à bacteriose são raros. A mandioca evoluiu em sistemas de cultivo, como o consórcio, que exigem menor grau de resistência, comparativamente a outras culturas extensivas. Este fato certamente funciona como redutor da variabilidade, disponível em programas de melhoramento para regiões sujeitas a epifitias. O aumento da base genética pode ser feito através de estratégias de melhoramento mais apuradas como seleção recorrente e/ou retrocruzamentos.

4.3 Segunda geração de multiplicação vegetativa

Os 25 tratamentos avaliados na segunda multiplicação vegetativa somaram 1.400 genótipos e 7.000 indivíduos (excluindo-se a testemunha). Avaliaram-se, na colheita, 96,8% dos genótipos e 76,0% dos indivíduos plantados (Tabela 7); portanto, apenas 3,2% dos genótipos plantados tiveram estande zero. A primeira e a segunda repetições mostraram

valores próximos, tanto para o número de genótipos avaliados dentro de cada cruzamento, como para o número médio de plantas dentro de cada genótipo; no entanto, a terceira teve valores inferiores para ambos os estandes. As diferenças podem ser atribuídas à sistematização do material de plantio entre os blocos, porque o de melhor qualidade é destinado ao primeiro, e assim sucessivamente. No que se refere ao terceiro bloco, o comportamento inferior também pode ser atribuído às condições de solo menos favoráveis. No entanto, estande médio de 76% pode ser considerado satisfatório para avaliar a população nesta fase de seleção.

A observação mais detalhada da Tabela 7 evidencia que a variável estande/genótipo pode estar ligada ao nível de resistência à bacteriose da progênie, isto é, famílias originadas do cruzamento de parentais com maior resistência apresentam maior estande. Os resultados da análise da variância dessa característica encontram-se na Tabela 8, e mostram efeito significativo para tratamentos e boa precisão experimental, uma vez que 6,46% pode ser considerado um coeficiente de variação satisfatório para avaliação de doenças em condições de campo. A hierarquização das médias e a comparação das significâncias (Tabela 9) mostram que cruzamentos entre clones com maior resistência à bacteriose produzem genótipos que, após a seleção para resistência à que foram submetidos, tem em média maior estande do que genótipos provenientes de cruzamentos cuja resistência média dos parentais é menor.

O número médio de plantas/genótipo pertinente a cada parental em progênes autofecundadas e na média de seus cruzamentos, encontram-se na Tabela 10. Estes dados também corroboram o observado na tabela anterior de que parentais com maior resistência à bacteriose tem progênes com maior número de plantas por genótipo. Os descendentes de 'Taquari' e 'Carapé' originados de cruzamentos ou autofecundações tiveram estande, em média, superior aos demais.

As famílias autofecundadas de 'Branca de Santa Catarina' e 'Mico' têm, em média, menor número de plantas por genótipo do que as autofecundadas de 'Carapé' e 'Taquari' (Tabela 10). No entanto, verificou-se que nas primeiras há grande variabilidade e é possível selecionar genótipos com estande alto, portanto, com nível de resistência satisfatório. Estes, apenas, ocorrem com menor frequência.

A associação entre a resistência à bacteriose e estande é explicada pelos seguintes fatores: (a) em genótipos mais resistentes à *X. campestris* pv *manihotis*, a colonização dos vasos do xilema ocorre com menor velocidade (TAKATSU & LOZANO, 1975); (b) manivas infectadas, mesmo assintomáticas, têm menor taxa de germinação e, quando germinam, se houver condição ambiental favorável (fato verificado no decorrer do ensaio), haverá morte das plantas (TAKATSU *et al.*, 1979).

Populações segregantes, notadamente se obtidas a partir do intercruzamento de cultivares com algum grau de suscetibilidade à bacteriose, têm ampla variabilidade para

esta característica. Estudos anteriores desenvolvidos no IAC mostraram que, sem pré-seleção para resistência é impossível avaliar genótipos para outras características, nas condições existentes em Campinas, sem que a bacteriose seja o principal fator responsável pelo comportamento da população. Obter-se genótipos com altíssimo nível de resistência levaria à uma drástica redução da variabilidade residual, e dificuldades na seleção de genótipos com outras características favoráveis. A resistência à bacteriose também se manifesta no estande, como já foi discutido anteriormente. No ensaio para avaliação da segunda multiplicação vegetativa, o estande médio dos tratamentos com pior desempenho (médias não diferenciadas estatisticamente, acompanhadas da letra e na Tabela 9) foi de 3,64 plantas/genótipo, 73% do ideal, valor próximo a um plantio comercial com cultivares recomendados. A partir deste fato, arbitrou-se que o nível de resistência dessa população, é suficiente para considerar a resistência manifestada via estande como mais um atributo genético para o seu desempenho na avaliação final, que é a produção de raízes.

Não se encontrou na literatura uma metodologia para a correção do estande mas, pela riqueza de formas exibida pelo dossel da espécie, espera-se que seja complexo, e com resultados de difícil generalização.

4.3.1. Produção de raízes e outras características

A mandioca é cultivada quase que exclusivamente para a produção de raízes, e por essa razão esta será a característica analisada mais detalhadamente neste trabalho.

Outras características adquirem importância, qualitativa ou quantitativa, se associadas à produção.

As médias da produção de raízes (PR) de cada cruzamento e autofecundação encontram-se na Tabela 11. A média geral de produtividade, 7,78kg/genótipo, equivalente a 16,2t/ha/ano, pode ser considerada satisfatória, principalmente por tratar-se de uma população nunca selecionada para a produção de raízes. As médias referentes às demais características: peso de parte aérea (PA), peso total (PT), Índice de colheita (IC) e número de raízes (NR) encontram-se na Tabela 12. Seus valores também estão dentro do esperado para populações segregantes.

A análise da variância para todas as características dos tratamentos e do cultivar IAC 24-2 'Mantiqueira', utilizado como testemunha, estão na Tabela 13. O efeito dos tratamentos foi significativo para todas características a 1% de probabilidade; portanto, há cruzamentos e/ou autofecundações, cuja média dos seus descendentes é superior à média de outros cruzamentos e/ou autofecundações. O quadrado médio do resíduo do delineamento em blocos ao acaso contém a variação dentro de parcelas (σ^2_d) e a variação entre parcelas multiplicada pelo número de indivíduos existentes na parcela ($n\sigma^2_e$) como pode ser observado na esperança dos quadrados médios do Quadro 2. A fonte de variação genótipos/tratamento é estimativa da variação dentro de parcelas (σ^2_d). Quando são comparadas essas duas fontes de variação, por exemplo, para o peso de raízes mostrado na Tabela 13,

observa-se $\sigma^2_d = 16,21(\text{kg/gen})^2$ e $\sigma^2_e = 0,14 (\text{kg/gen})^2$, equivalente a $(\text{QMRE} - \text{QM}_{G/T})/20$, e a variação entre a média de tratamentos $V_t = 0,44 (\text{kg/gen})^2$, equivalente a $(\text{QM}_T - \text{QMRE})/60$. Portanto, a maior fonte de variabilidade útil encontra-se dentro de parcelas, o que corresponde à segregação dos cruzamentos.

Os coeficientes de variação: 12,55%, 13,44%, 11,33%, 7,68% e 10,62% para PR, PA, PT, IC e NR, respectivamente, são consideravelmente inferiores aos citados na literatura. Estes valores demonstram que, além da boa precisão experimental, 20 genótipos são uma amostra suficiente para cada cruzamento. Caso o tamanho da amostra estivesse subestimado, ocorreria uma variação de origem genética entre parcelas do mesmo tratamento, na qual seria adicionada a variação ambiental e conseqüente aumento do coeficiente de variação. Por exemplo, o coeficiente de variação de 12,55% observado para PA, é causado por um desvio médio de 0,98kg/genótipo ($\sqrt{19,08120/20}$), tão pequeno que pode ser atribuído apenas a influências ambientais. Dados de literatura de ensaios de competição de cultivares (parcelas monogenotípicas) relatam valores que oscilam, normalmente, entre 20% a 30% (LORENZI *et al.*, 1983; VILLELA *et al.*, 1985; BUENO, 1985 e outros).

A testemunha IAC 24-2 'Mantiqueira' teve média aquém do esperado para todas as características. Também apresentou desenvolvimento desuniforme, o que resultou em variâncias ambientais superiores às observadas rotineira-

mente. Porém, a imprecisão dessas estimativas causou prejuízos reduzidos, porque utilizou-se, sempre que possível, estimativas provenientes do resíduo da análise em blocos ao acaso.

A média de cada cruzamento e autofecundação, e sua hierarquia para PR, PA, PT, IC e NR, assim como a respectiva diferença mínima significativa, encontram-se na Tabela 14. Para PR os cruzamentos com maiores médias foram 6 x 5 (9,99 kg/gen); 2 x 5 (9,16kg/gen), 5 x 6 (8,93kg/gen) e as médias menores foram 4 x 3 (6,75kg/gen); 1 x 3 (6,33kg/gen) e 6 x 3 (6,24kg/gen).

A maior média foi 60% superior à mais baixa, valor suficientemente alto para considerar-se a escolha do cruzamento o primeiro passo importante do melhoramento. Apesar das médias apresentarem diferenças expressivas, apenas as três menores são significativamente inferiores. Por exemplo, as médias de um cruzamento, 40% inferior (5 x 3; 7,11kg/gen) e a média do melhor cruzamento, não são estatisticamente diferentes. Esta situação deve ser atribuída ao reduzido poder discriminatório do teste de Tukey, por ser extremamente rigoroso em não cometer erros do tipo I (rejeitar a hipótese da nulidade quando esta é verdadeira). O teste Tukey foi adotado porque preferiu-se a situação de selecionar cruzamentos, mesmo que inferiores, à de descartar cruzamentos não inferiores. A escolha teve por objetivo manter o máximo de variabilidade para as outras características existentes entre os cruzamentos. Em situações nas quais há disponibili-

dade de um grande número de cruzamentos, e apenas alguns devem ser selecionados, testes mais discriminatórios (t , Dunnet e Bonferrone), recomendados por CONAGIN & ZIMMERMANN (1990) são mais úteis. O reduzido poder discriminatório do teste de Tukey também se repete na comparação das médias das demais características.

O conjunto de médias de PA tem maior amplitude do que PR (Tabela 14). A diferença mínima significativa permite estabelecer maior número de contrastes significativos entre as médias. A maior variabilidade é atribuída, principalmente, a dois fatores. O primeiro, de ordem fisiológica intrínseco à espécie, é o crescimento preferencial da parte aérea, sendo que apenas o restante dos elaborados é armazenado nas raízes tuberosas (COCK, 1979). O segundo, de ordem patológica (bacteriose), provoca morte e secagem das partes herbáceas da planta e das folhas e, portanto, diminui o peso verde da parte aérea, como pode ser verificado nas hierarquias inferiores dos cruzamentos originados do parental 'Vassourinha'.

No peso total da planta (PT, Tabela 14), expresso pela média da progênie, observa-se diversas diferenças significativas entre os tratamentos. É uma característica indicativa da constituição genética do próprio indivíduo e do grau de favorecimento do ambiente. Na seleção de genótipos, o PT pode ser útil como mais um fator indicador de maior ou menor estabilidade em gerações consecutivas de multiplicação vegetativa e entre ambientes. Por essas

razões, é recomendado por alguns autores como critério de seleção (BUENO, 1987; COCK *et al.*, 1988).

O IC médio de cada cruzamento ou autofecundação (Tabela 14) oscilou entre 57,25% no cruzamento 6 x 1 e 41,26% no cruzamento 5 x 2. Apenas as cinco menores médias (4 x 5; 5 x 4; 5 x 6, 6 x 3 e 5 x 2) foram significativamente inferiores à maior. O IC é uma característica de importância considerável como critério de seleção auxiliar, pelas razões já discutidas na revisão de literatura, para a seleção de genótipos individuais. No entanto, ao nível de média de populações segregantes, tem reduzida importância. Resultados obtidos por ACOSTA-ESPINOZA (1984) mostraram que, para essas populações, a predisposição genética para armazenar maior ou menor porcentagem de biomassa nas raízes é um fator menos importante para a determinação do seu peso; nesse caso, prevalece o peso da parte aérea. As médias são importantes para o estudo do controle gênico do caráter, o que será feito mais adiante.

A média do número de raízes por planta, dentro de cada cruzamento, está na Tabela 14. Este foi um fator pouco discriminatório entre as médias dos cruzamentos, independentemente da pressão de seleção. Essa característica é citada como correlacionada à produção de raízes, e sugerida como critério de seleção. Porém, deve ser vista com reservas porque nas plantas com muitas raízes, elas são pequenas e sem valor comercial. Em estudos de fisiologia, COCK *et al.* (1979) observaram que um número inferior a nove raízes pode

ser fator limitante à capacidade de dreno, limitando a produção. A característica de variação dentro de cada cruzamento parece ser mais apropriada, já que não deve ser um critério suficientemente importante para a seleção de parentais ou apenas de cruzamentos de genótipos. Assim como para o IC, as médias são importantes para o estudo do controle gênico.

As médias existentes na Tabela 14 demonstram que as três primeiras características (PR, PA e PT) têm hierarquia similar, o que é explicado pela forte correlação existente entre elas (SILVA *et al.*, 1983; ACOSTA-ESPINOZA, 1984; FUKUDA & CALDAS, 1987). Para as duas últimas (IC e NR) a classificação hierárquica é aleatória em relação a PR devido à existência de uma menor correlação nos dados, embora haja citações relatando alta magnitude (KAMALAN *et al.*, 1978, FUKUDA & CALDAS, 1987).

4.3.2. Efeitos recíprocos

A comparação das médias de cinco características avaliadas em seis cruzamentos recíprocos é mostrada na Tabela 15. Não se detectou influência significativa para qualquer das características estudadas quando o mesmo parental é utilizado como macho ou fêmea. Deste modo, pressupõe-se que a influência de genes citoplasmáticos no controle dessas características inexistente ou é muito reduzido nos parentais estudados. Portanto, os cruzamentos podem ser orientados de acordo com a fertilidade dos parentais.

4.3.3 Endogamia

Os efeitos da endogamia foram analisados em quatro parentais, dos quais se dispunha de famílias autofecundadas. A avaliação foi feita de modo indireto, isto é, comparando-se a média da autofecundação com a média das médias dos cruzamentos do respectivo parental. A avaliação direta deveria ser feita comparando-se a média do próprio genótipo parental com a média da progênie autofecundada. No entanto, não se dispunha da avaliação do parental *per se*.

O nível de endogamia avaliado foi de 50% dos genes em homozigose, que corresponde a uma geração de autofecundação, admitindo-se que esses genótipos não tivessem qualquer nível de endogamia anterior e segregação dissômica.

Na análise dos resultados (Tabela 16), constatou-se que a diferença entre as médias das cinco características, obtidas em cruzamentos e autofecundações, não foram estatisticamente significativas para qualquer parental. No entanto, observa-se que, para todos os cultivares, exceto 'Branca de Santa Catarina', as autofecundações tiveram comportamento inferior aos cruzamentos, evidenciando efeitos negativos de endogamia, embora não pronunciados. A ausência ou efeito brando da endogamia pode ser atribuído à pré-seleção feita antes da avaliação da segunda multiplicação vegetativa. Por exemplo, 'Carapé' teve os genótipos com porte muito reduzido, eliminados. A progênie autofecundada de 'Branca de Santa Catarina' apresentou média superior à média de todos os seus cruzamentos para PR, PA e PT, embora

a diferença não seja significativa, e similar para IC e NR. Estes dados indicam que a autofecundação pode ser utilizada diretamente para a seleção de cultivares. Portanto, a autofecundação, como parece à primeira vista, não é necessariamente uma fonte sem qualquer potencial para obter genótipos superiores, embora, certamente, parentais com esse potencial devam ocorrer em baixa frequência.

A autofecundação, como método de averiguar potencial genético de parentais, pode ser muito útil devido à facilidade de se obter sementes botânicas autofecundadas, pois basta coletá-las em um campo monoclonal isolado. Este método mostrou-se eficiente para identificar 'Branca de Santa Catarina' como bom parental, porque o bom desempenho de sua progênie autofecundada coincidiu com o bom desempenho apresentado em cruzamentos.

A endogamia é tradicionalmente relatada como tendo ação negativa em espécies alógamas, particularmente nas que também dispõem de reprodução vegetativa, porque supostamente tem maior nível de heterozigose. Em mandioca, a ação negativa da homozigose foi relatada por KAWANO *et al.* (1978a). Porém, a análise mais detalhada de seus resultados mostra que genótipos têm depressão endogâmica variável, e em alguns casos é nula, o que coincide com os resultados aqui obtidos.

4.3.4. Análise dos cruzamentos dialélicos

A partir dos 25 tratamentos analisados na segunda multiplicação vegetativa, foi possível arranjar-los de forma a estabelecer um conjunto de cruzamentos dialélicos 6 x 6.

Os dados organizados na forma de tabelas dialéticas são apresentados nas Tabelas 17, 18, 19, 20 e 21, para as características PR, PA, PT, IC e NR, respectivamente. Embora apenas 15 cruzamentos tivessem participado na análise dialética, as médias das características são bastante próximas das observadas no conjunto dos 25 tratamentos (Tabelas 12 e 13).

Os parentais com maiores médias de PR foram 'Taquari' (8,54kg/gen), 'Branca de Santa Catarina' (8,01kg/gen) e 'Mico' (7,94kg/gen). Os cruzamentos mais favoráveis foram 5 x 6, 2 x 5 e 2 x 4. As menores médias foram de 'Santa' (6,74kg/gen) e 'Vassourinha' (7,38kg/gen), e os piores cruzamentos foram 6 x 3 e 1 x 3. O valor para todos os cruzamentos e parentais está na Tabela 17. A hierarquia dos parentais e cruzamentos para as maiores médias de PA e PT (Tabelas 18 e 19) foi similar observada em PR, fato esperado, uma vez que essas três características são correlacionadas entre si (FUKUDA & CALDAS, 1987 e outros). Nestas duas últimas características, PA e PT, destacaram-se: 'Taquari', superior aos demais, certamente pela exuberância da parte aérea de seus descendentes; e 'Vassourinha', pelo reduzido peso de parte aérea, provocado pelo ataque da bacteriose, e pela morte de alguns indivíduos de suas progênies.

Quanto ao IC (Tabela 20), 'Vassourinha' teve a maior média em cruzamentos (52,04%) e 'Taquari' a menor, o que se reflete também em seus cruzamentos de modo geral. Esta característica, além de avaliar a tendência em alocar

biomassa nas raízes, reflete, em parte, a suscetibilidade à bacteriose, quando o ataque da bactéria é causador da morte da parte aérea. No entanto, essa interferência não impediu a separação dos parentais quanto ao seu potencial genético, para maior ou menor IC.

O NR (Tabela 21), cujo ideal é próximo a nove raízes por planta, mostrou valores superiores ao desejado. ● melhor parental foi 'Mico', com média igual a 8,16 raízes/planta e os cruzamentos 2 x 6 e 2 x 3. 'Taquari' causou um número excessivo de raízes nos cruzamentos em que participou.

Os resultados da análise da variância dos cruzamentos dialélicos e a estimativa das médias, são apresentadas na Tabela 22. A análise mostra os seguintes resultados: (a) as análises de todas as características apresentaram significância dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC); portanto, há, pelo menos, um parental com g_i estatisticamente diferente; (b) os efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) não foram significativos para qualquer característica, exceto PA, mesmo assim a 5% de probabilidade; (c) as estimativas da média de todas as características tiveram desvios nunca superiores a 2%, o que permite considerá-las precisas. Portanto, a principal razão da diferença entre as médias dos cruzamentos foi o comportamento individual dos parentais, sendo que uma possível interação entre eles teve importância restrita.

Maior importância dos efeitos da CGC para PR também foi encontrada por JENNINGS (1972) e RAJENDRAN (1989). Porém, o último autor relatou que, para IC e NR, os efeitos da CEC foram superiores, principalmente para IC. Os resultados aqui obtidos também convergem para os observados por KAWANO (1985), que determinou genes de efeito aditivo, sendo mais importantes para PR e IC, mas divergem dos obtidos por ACOSTA-ESPINOZA (1984), que constatou a superioridade da ação gênica de dominância. Convém ressaltar que esses parâmetros são específicos dos materiais trabalhados, e somente poderão ser generalizados após estudos que mostrem resultados convergentes.

As estimativas dos $\hat{g}_i$'s de cada parental e os respectivos desvios, amplitudes e coeficientes de variação estão na Tabela 23. As estimativas das $\hat{s}_{ij}$'s de cada cruzamento, amplitude e coeficientes de variação estão na Tabela 24. As duas tabelas serão analisadas conjuntamente dentro de cada característica para facilitar a discussão dos resultados.

a) Peso de raízes (PR)

Os valores das $\hat{g}_i$'s (Tabela 23) indicam 'Taquari' como o melhor parental ($\hat{g}_5 = 1,01$), valor três vezes superior ao de 'Branca de Santa Catarina' ($\hat{g}_2 = 0,35$), o segundo na hierarquia; o terceiro foi 'Mico' ($\hat{g}_6 = 0,25$). O parental de mais baixo desempenho foi 'Santa' ($\hat{g}_3 = -1,24$), seguido de 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = -0,44$) e 'Carapé' praticamente nulo ($\hat{g}_4 = 0,07$). Estes três últimos têm, comparativamente, menor

quantidade de genes de efeito aditivo (alélico ou não-alélico), sendo os parentais de menor interesse dentro do grupo. Estatisticamente, apenas os $\hat{g}_i$'s com o maior e o menor valor diferem de zero.

Apesar de existirem parentais com $\hat{g}_i$'s diferenciados, o maior deles ($\hat{g}_5 = 1,01$) eleva a média em apenas 13%.

Os cultivares utilizados como parentais são considerados elite e, possivelmente, já portadores de grande quantidade de genes favoráveis, que se expressam na alta média obtida. Os $\hat{g}_i$'s seriam desvios pequenos, provocados por alguns genes de efeito aditivo, que ainda não estariam fixados no conjunto gênico formado pelos seis parentais. Tais genes encontram-se em maior frequência em 'Taquari' e, em menor, na cultivar 'Santa'. O coeficiente de variação desses efeitos, 9,92%, mostra que a dispersão é relativamente pequena. Assim, os parentais com menor $\hat{g}_i$ não são, necessariamente, de baixo valor genético e não devem ser descartados porque, se comparados com outros genótipos, podem apresentar valores mais altos para $\hat{g}_i$.

Os valores dos $\hat{g}_i$'s foram estimados com progênies que já haviam sofrido seleção para resistência à bacteriose, mas ainda restaram genótipos com diversos graus de suscetibilidade. A baixa CGC da 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = -0,44$) pode ser atribuída à maior participação de genes que determinam suscetibilidade à bacteriose no conjunto de características responsáveis pela produção final, quer pela sua frequência mais alta nesse genótipo, quer pelo modo de ação. Segundo

JENNINGS (1976) e UEMURA & KAWANO (1983), há algum grau de dominância da suscetibilidade sobre a resistência. O mesmo pode estar acontecendo em menor intensidade com os outros parentais que têm progênes também suscetíveis, como 'Branca de Santa Catarina' e 'Mico'. Conseqüentemente, 'Taquari' é favorecido na avaliação deste efeito pelo alto grau de resistência de seus descendentes. Portanto, a classificação hierárquica dos parentais, segundo seus $\hat{g}_i$'s, é subordinada a um efeito fixo pré-determinado, o grau de seleção da resistência à bacteriose feito na progênie. A pré-seleção é um fator negativo porque transforma um efeito que poderia ser aleatório em fixo. Porém, esse parâmetro assim determinado é mais representativo da situação real e, portanto, mais utilizável. Tentativas anteriores de se trabalhar com progênes sem seleção não permitiram qualquer tipo de avaliação além da própria suscetibilidade. Em regiões onde a bacteriose é epifitótica, essa alternativa parece ser a mais viável.

O cultivar 'Carapé' tem porte baixo e seus descendentes foram muito variáveis quanto a esta característica. O ensaio foi conduzido com reduzida competição intergenotípica e espaçamentos largos, o que favorece genótipos com alto vigor vegetativo, não característico das progênes de 'Carapé'. Seu desempenho, acima do esperado, pode ser explicado pela eliminação involuntária dos genótipos de menor porte, que ocorre em duas fases: em canteiros, onde os menores ficam totalmente herbáceos e são eliminados pelo frio; e no plantio do ensaio de produção, quando não atingiram de-

envolvimento suficiente para produzir as cinco manivas necessárias. Sua alta resistência à bacteriose deve ter colaborado positivamente, pelas razões já expostas.

As estimativas das capacidades específicas de combinação dos 15 cruzamentos (efeitos $\hat{s}_{ij}$, Tabela 24), não diferem entre si, estatisticamente, na análise da variância (Tabela 22). O teste t identificou que, para a produção de raízes, apenas $\hat{g}_{5 \times 6} = 0,99$ é superior a zero, a 5% de probabilidade. A capacidade de provocar desvios positivos, em relação à média geral, por cruzamentos específicos foi muito pequena. Isto é demonstrado pelo baixo coeficiente de variação dos efeitos ($CV[\hat{s}_{ij}] = 5,31\%$) e pela pequena amplitude ($1,55\text{kg/gen}$). Portanto, genes com efeitos não aditivos, alélicos ou não alélicos, associados à CEC, tiveram pouca importância na composição das médias dos cruzamentos.

A pré-seleção para resistência à bacteriose também influenciou nas estimativas dos efeitos s_{ij} , pelas mesmas razões expostas anteriormente. Porém, no conjunto geral, alguns cruzamentos indicam a existência de uma interação favorável entre os parentais, interação esta que pode ser devida à própria resistência ou a outras características determinantes da produção. O cruzamento 5 x 6 teve $\hat{g}_{5 \times 6} = 0,99$, embora o nível de resistência média dos parentais seja inferior ao 4 x 5, que apresentou $\hat{g}_{4 \times 5} = -0,44$. Os cultivares 5 e 6 são fenotipicamente muito contrastantes, o que evidencia divergência genética juntamente com CEC alta. Os cultivares 4 e 5

são similares, exceto em relação ao porte, o que evidencia baixa divergência genética.

Para a produção de raízes, a composição da média dos três melhores cruzamentos, de acordo com o modelo $Y_{ij} = \mu + g_i + g_j + s_{ij}$, foi:

$$1^{\circ}) \quad 5 \times 6 : \quad 9,99 = 7,73 + 1,01 + 0,25 + 0,99$$

$$2^{\circ}) \quad 2 \times 5 : \quad 9,16 = 7,73 + 0,35 + 1,01 + 0,07$$

$$3^{\circ}) \quad 2 \times 4 : \quad 8,40 = 7,73 + 0,35 + 0,07 + 0,24$$

No primeiro colocado, a superioridade da média é devida, principalmente, à boa CGC de 'Taquari' ($\hat{g}_5 = 1,01$) e à sua interação favorável com 'Mico' ($\hat{s}_{5 \times 6} = 0,99$). O segundo reúne os benefícios dos parentais com maiores $\hat{g}_i$'s, mas não têm complementação gênica superior. O terceiro colocado na hierarquia, aproveitou-se de dois parâmetros de magnitude moderada $\hat{g}_2 = 0,35$ e $\hat{s}_{2 \times 4} = 0,24$ para ter um desempenho razoável.

A composição das médias de menor valor foi:

$$1^{\circ}) \quad 3 \times 6 : \quad 6,24 = 7,73 - 1,24 + 0,25 - 0,51$$

$$2^{\circ}) \quad 1 \times 3 : \quad 6,33 = 7,73 - 0,44 - 1,24 + 0,28$$

$$3^{\circ}) \quad 3 \times 5 : \quad 7,11 = 7,73 - 1,24 + 1,01 - 0,39$$

Observa-se a ação negativa do parental 'Santa' ($\hat{g}_3 = -1,24$) em todos os cruzamentos, que não foi superada nem pelo melhor parental 'Taquari' ($\hat{g}_5 = 1,01$), e também porque não houve complementação favorável em termos genéticos.

b) Peso de Parte Aérea (PA)

A estimativa da média do PA na análise dialélica foi 8,30kg/genótipo. O desvio padrão 0,17kg/genótipo, apenas

2% do valor da média, indica ser uma estimativa com boa precisão (Tabela 18). Os desvios dessa média, atribuíveis ao efeito genético dos parentais são mostrados na Tabela 23. Têm amplitude 5,72 kg/genótipo, duas vezes e meia superior à do PR, mas coeficiente de variação muito próximo ($CV\hat{g}_i = 10,03\%$). Isto porque, para PR, os $\hat{g}_i$'s têm menor amplitude, mas estão mais dispersos em relação à média. Para PA, há apenas dois efeitos com magnitude alta ($\hat{g}_5 = 3,16$ e $\hat{g}_1 = -2,56$) e um terceiro com baixa magnitude ($\hat{g}_3 = -0,52$), mas todos significativamente diferente de zero, sendo que os demais foram estatisticamente nulos.

O aumento do vigor do conjunto dos cruzamentos, expresso em PA, em termos de C&C, deve-se exclusivamente ao parental Taquari ($\hat{g}_5 = 3,16$), sendo que os demais parentais contribuíram para a diminuição da média. Este clone exibe o genótipo com maior vigor, e os dados demonstram que esta característica é pronunciadamente transmitida às suas progênie, fato também constatado por ACOSTA-ESPINOZA (1984). 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = -2,56$) teve ação negativa pronunciada, em parte, devido à suscetibilidade de seus descendentes à bacteriose.

Em termos de CEC, os efeitos $\hat{s}_{ij}$'s mostraram maior variação em PA do que em PR, o que é expresso pelo maior coeficiente de variação ($CV\hat{s}_{ij} = 10,45$). O cruzamento que apresentou maior CEC foi 'Branca de Santa Catarina' x 'Santa' ($\hat{s}_{2 \times 3} = 1,15$), estatisticamente não diferenciado de

zero, e o menor foi 'Branca de Santa Catarina' x 'Mico' ($\hat{\Sigma}_{2 \times 6} = -1,49$) significativo a 5% de probabilidade.

A composição das médias foi a seguinte:

1) Cruzamentos com maior PA

$$1^{\circ}) \quad 5 \times 6 : \quad 12,50 = 8,30 + 3,16 - 0,03 + 1,08$$

$$2^{\circ}) \quad 4 \times 5 : \quad 11,91 = 8,30 - 0,01 + 3,16 + 0,47$$

$$3^{\circ}) \quad 2 \times 5 : \quad 10,26 = 8,30 - 0,04 + 3,16 - 1,15$$

Observa-se que nos cruzamentos com maior PA, a CGC de 'Taquari' ($\hat{g}_5 = 3,16$) é o mais importante efeito, os demais $\hat{g}_i$'s são praticamente nulos, e os $\hat{\Sigma}_{ij}$'s dos cruzamentos apresentam importância reduzida.

11) Cruzamentos com menor PA

$$1^{\circ}) \quad 1 \times 4 : \quad 4,61 = 8,30 - 2,56 - 0,01 - 1,12$$

$$2^{\circ}) \quad 1 \times 3 : \quad 4,92 = 8,30 - 2,56 - 0,52 - 0,30$$

$$3^{\circ}) \quad 1 \times 6 : \quad 5,92 = 8,30 - 2,56 - 0,03 + 0,21$$

Os cruzamentos que apresentaram as menores médias têm como principal causa o efeito negativo de 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = -2,56$), sendo que os demais efeitos, $\hat{g}_i$'s e $\hat{\Sigma}_{ij}$'s, foram de pequena importância.

c) Peso Total (PT)

As estimativas dos efeitos $\hat{g}_i$'s e parâmetros afins são mostradas na Tabela 23. Os $\hat{g}_i$'s foram estimados com precisão satisfatória ($s[\hat{g}_i] = 0,49\text{kg/gen}$), e os valores foram relativamente dispersos (amplitude 7,17kg/gen e coeficiente de variação de 15,20%).

O parental 'Taquari' apresentou o maior efeito positivo ($\hat{g}_5 = 4,17$), 'Vassourinha' e 'Santa' tiveram efeitos

negativos respectivamente: $\hat{g}_1 = -3,00$ e $\hat{g}_3 = -1,77$; para os demais, as estimativas foram estatisticamente nulas.

As estimativas dos efeitos $\hat{s}_{ij}$'s (Tabela 24) tiveram desvio ($s[\hat{s}_{ij}]$) de 0,84kg/gen, amplitude 4,09kg/gen e coeficiente de variação 6,75%. Os valores mais pronunciados foram $\hat{s}_{5 \times 6} = 2,06$ e $\hat{s}_{2 \times 6} = -2,03$; significativamente diferentes de zero a 5% de probabilidade. Os demais não se diferenciaram estatisticamente de zero.

Uma vez que o PT é a soma de PR e PA, os efeitos da característica PT são a soma dos respectivos efeitos de PR e PA, tanto para a CGC como CEC. Exemplificando: $\hat{g}_1$ (PT) = $\hat{g}_1$ (PR) + $\hat{g}_1$ (PA) ou $\hat{s}_{1 \times 2}$ (PT) = $\hat{s}_{1 \times 2}$ (PR) + $\hat{s}_{1 \times 2}$ (PA). Conseqüentemente, verifica-se que 'Taquari' é o principal responsável pela maior produção total de biomassa (PT) dos cruzamentos, determinado, principalmente, pelo aumento de PA. Situação inversa ocorre em relação a 'Vassourinha', o cultivar que provocou o maior efeito negativo para diminuição do vigor ($\hat{g}_1 = -3,00$), reduzindo principalmente o PA. 'Santa' teve efeito negativo, de considerável magnitude ($\hat{g}_3 = -1,77$), devido à baixa produção de raízes e, em menor escala, PA. O efeito $\hat{s}_{ij}$ que mais contribuiu para maior PT foi o do cruzamento 5 x 6 ($\hat{s}_{5 \times 6} = 2,06$), e o que mais reduziu PT foi 2 x 6 ($\hat{s}_{2 \times 6} = -2,03$); os demais efeitos não diferiram estatisticamente de zero, embora no cruzamento 2 x 3 tenha mostrado magnitude considerável ($\hat{s}_{2 \times 3} = 1,59$). De modo geral, os efeitos da CEC do PT têm maior influência do PA porque estes tem maior magnitude (exemplificando 1 x 2, 1 x 4,

e outros). O cruzamento 5 x 6 teve comportamento observado mais favorável ao melhoramento e refletido no aumento do potencial de produção de biomassa de forma equilibrada entre PR e PA.

A composição das médias do PT foi o seguinte:

1) Cruzamentos com a maior média.

$$1^{\circ}) \quad 5 \times 6 \quad : \quad 22,49 = 16,03 + 4,17 + 0,23 + 2,06$$

$$2^{\circ}) \quad 4 \times 5 \quad : \quad 20,28 = 16,03 + 0,06 + 4,17 + 0,02$$

$$3^{\circ}) \quad 2 \times 5 \quad : \quad 19,43 = 16,03 + 0,31 + 4,17 - 1,08$$

As maiores médias são função, principalmente, da CGC de 'Taquari' ($\hat{g}_5 = 4,17$) e, no caso do cruzamento 5 x 6, da CEC favorável com 'Mico' ($\hat{s}_{5 \times 6} = 2,06$). Os demais efeitos componentes dessas médias foram, comparativamente, de menor importância.

II) Cruzamentos com a menor média

$$1^{\circ}) \quad 1 \times 3 \quad : \quad 11,25 = 16,03 - 3,00 - 1,77 - 0,01$$

$$2^{\circ}) \quad 1 \times 4 \quad : \quad 12,01 = 16,03 - 3,00 + 0,06 - 1,08$$

$$3^{\circ}) \quad 1 \times 6 \quad : \quad 13,56 = 16,03 - 3,00 + 0,23 + 0,30$$

As menores médias são consequência principalmente do efeito negativo do parental 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = -3,00$). No cruzamento 1 x 3, a CGC de 'Santa' ($\hat{g}_3 = -1,17$) também teve participação considerável; no cruzamento 'Vassourinha' x 'Carapé' a CEC ($\hat{s}_{1 \times 4} = -1,08$) contribuiu moderadamente para a diminuição da média. Os demais efeitos foram reduzidos.

O PT mede a capacidade de produção de biomassa total ou a expressão do vigor completo. Estudos futuros poderão generalizar indicações da experimentação já existente,

de que o PT confere maior estabilidade quando se transferem genótipos de ambientes favoráveis para desfavoráveis (COCK, 1976 e COCK & EL-SHARKAWY, 1988). Essa generalização será extremamente útil na seleção de parentais de genótipos. Os dados obtidos demonstram que 'Taquari' é um parental importante pela resistência à bacteriose e vigor que confere às suas progênes, principalmente para a obtenção de cultivares destinados a ecossistemas agrícolas com fatores estressantes, onde a mandioca é, de fato, plantada e pode expandir a área cultivada. Trabalhos para avaliação de progênes conduzidos por ACOSTA-ESPINOZA (1984) em solos menos férteis que os do Centro Experimental de Campinas, onde foi realizada esta avaliação, concluíram que 'Taquari' é parental de altíssimo potencial.

d) Índice de Colheita (IC)

A média do IC (48,08) foi estimada com precisão satisfatória $s(m) = 0,64$. A variação entre as médias dos cruzamentos foi causada pela CGC diferenciada dos parentais. As estimativas dos $\hat{g}_i$'s assim como o desvio padrão de 0,80%, amplitude de 9,19% e coeficiente de variação 7,22%, encontram-se na Tabela 23. Destes dados é possível concluir que as estimativas têm boa precisão, mas mostram pequena dispersão em torno da média. Os parentais que mais contribuíram para alterar as médias dos cruzamentos foram: 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = 4,95$) positivamente, e 'Santa' e 'Taquari' ($\hat{g}_3 = -3,76$ e $\hat{g}_5 = -4,24$), negativamente. Os três cruzamentos mostraram efeitos significativamente diferentes de zero.

Os efeitos da CEC (Tabela 24) também tiveram dispersão reduzida (amplitude = 7,62% e $CV(\hat{\sigma}_{ij}) = 5,00\%$), e apenas dois cruzamentos tiveram efeitos significativamente diferentes de zero ($\hat{\sigma}_{1 \times 2} = -4,75$ e $\hat{\sigma}_{3 \times 6} = -4,08$), ambos negativos, o que não é desejável para o melhoramento. Em nenhum cruzamento observaram-se $\hat{g}_i$'s estatisticamente superiores a zero.

A composição das três médias de maior e menor valor foi a seguinte:

1) Cruzamentos com maior média:

$$1^{\circ}) \quad 1 \times 6 : 57,25 = 48,08 + 4,95 + 1,43 + 2,79$$

$$2^{\circ}) \quad 1 \times 4 : 56,03 = 48,08 + 4,95 + 0,11 + 2,87$$

$$3^{\circ}) \quad 2 \times 6 : 53,46 = 48,08 + 1,51 + 1,43 + 2,43$$

As maiores médias devem-se ao efeito positivo do parental 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = 4,95$) e aos pequenos efeitos de 'Branca de Santa Catarina' ($\hat{g}_2 = 1,51$) e 'Mico' ($\hat{g}_6 = 1,43$). Os efeitos da CEC tiveram participação considerável, notadamente no cruzamento 1 x 4.

II) Cruzamentos com menor média

$$1^{\circ}) \quad 3 \times 6 : 41,67 = 48,08 - 3,76 + 1,43 - 4,08$$

$$2^{\circ}) \quad 4 \times 5 : 42,07 = 48,08 + 0,11 - 4,24 - 1,88$$

$$3^{\circ}) \quad 3 \times 5 : 42,42 = 48,08 - 3,76 - 4,24 + 2,34$$

Os efeitos responsáveis pelas menores médias são a CGC de 'Santa' ($\hat{g}_3 = -3,76$) e sua baixa CEC com 'Mico' ($\hat{\sigma}_{3 \times 6} = -4,08$). A segunda menor média deve-se ao comportamento da CGC de 'Taquari' ($\hat{g}_5 = -4,24$), e à má combinação com 'Carapé' ($\hat{g}_4 = -1,88$). A terceira menor média reúne os dois pa-

rentais com os menores efeitos, mas amenizados pela CEC favorável ($\hat{S}_{3 \times 5} = 2,34$).

A média do IC observada, 48,08%, pode ser considerada baixa, principalmente se comparada ao valor obtido em ensaios de cultivares melhoradas. Estas comumente têm IC entre 50 e 65%. Estudos de fisiologia também recomendam selecionar genótipos dentro desse intervalo (COCK & SHARKAWY, 1988). Médias de IC baixas em populações segregantes podem ser explicadas em termos evolutivos. Espécies selvagens do gênero *Manihot*, possíveis ancestrais de mandioca, têm IC praticamente nulo, embora algumas tenham tuberação rudimentar. Cultivares nativos normalmente têm IC menores do que os melhorados, porque a espécie evoluiu visando cultivos multiespecíficos, situação na qual maior vigor na parte aérea leva a vantagens na competição (KAWANO & THUNG, 1982; HERSHEY, 1985). Conseqüentemente, existe resposta positiva a maiores espaçamentos, ou seja, a baixas densidades populacionais. Portanto, genótipos com maior acúmulo relativo de biomassa nas raízes tuberosas (IC), devem ser mais adaptados aos sistemas atuais de monocultivo.

Os dados obtidos neste trabalho apontam maior importância da CGC do que da CEC na determinação do IC, o que indica ser este caráter controlado, predominantemente, por genes de efeito aditivo. ACOSTA-ESPINOZA (1984), estudando variância entre progênies policruzadas estimou grau médio de dominância zero. KAWANO (1985) citou valores altos para h^2_R , informações que reforçam a importância dos genes com efeito

aditivo. No entanto, RAJENDRAN (1989), estudando modelo de componentes de médias, encontrou que os efeitos da CEC eram os mais importantes, indicando predominância de genes com ação dominante. A divergência entre os dados pode ser atribuída a diferentes estruturas genéticas das populações estudadas. Os resultados aqui relatados e os obtidos por ACOSTA-ESPINOZA, referem-se a populações com estruturas genéticas similares porque têm parentais comuns. Nos dois trabalhos, o IC reflete a distribuição de biomassa e, também, a suscetibilidade à bacteriose, de modo que, os genótipos mais suscetíveis terão maior IC e determinarão um valor maior para o g_1 do parental mais suscetível, o que superestima genes de efeito aditivo na distribuição de elaborados.

e) Número de Raízes (NR)

As estimativas dos $\hat{g}_1$'s do NR estão na Tabela 23, juntamente com o desvio padrão, amplitude e coeficiente de variação. Os valores mostram que as estimativas foram obtidas com precisão satisfatória e pequena dispersão relativa. O maior efeito positivo foi do parental 'Taquari' ($\hat{g}_5 = 1,30$) e os menores foram de 'Mico' ($\hat{g}_6 = -0,75$) e 'Branca de Santa Catarina' ($\hat{g}_2 = -0,60$), os três significativamente diferentes de zero.

As estimativas dos efeitos $\hat{s}_{1j}$ estão na Tabela 24. Estas foram menos dispersas e menos precisas que as estimativas dos $\hat{g}_1$'s. Apenas $\hat{s}_{1 \times 4} = -0,96$ foi significativamente diferente de zero.

A média estimada (8,74 raízes/planta), pode ser admitida como um valor próximo do adequado para as condições favoráveis em que foi avaliada a população segregante. Deste modo, os parentais devem ser avaliados pela sua capacidade em não alterar a média ou causar pequena redução. Sob este ponto de vista, estes devem ser os melhores parentais. A seguir, a título de exemplo, é mostrada a composição das três médias com menor e maior valor:

1) Cruzamentos com a menor média

$$1\text{a}) \quad 2 \times 6 : \quad 6,79 = 8,74 - 0,75 - 0,60 - 0,61$$

$$2\text{a}) \quad 3 \times 6 : \quad 7,23 = 8,74 - 0,75 - 0,24 - 0,52$$

$$3\text{a}) \quad 1 \times 4) : \quad 8,06 = 8,74 + 0,31 - 0,02 - 0,96$$

II) Cruzamentos com a maior média

$$1\text{a}) \quad 4 \times 5 : \quad 10,56 = 8,74 + 1,30 - 0,02 + 0,54$$

$$2\text{a}) \quad 1 \times 5 : \quad 10,36 = 8,74 + 1,30 + 0,31 + 0,00$$

$$3\text{a}) \quad 5 \times 6) : \quad 9,56 = 8,74 + 1,30 - 0,75 + 0,26$$

Os cruzamentos com as duas menores médias devem-se aos efeitos negativos dos parentais 'Branca de Santa Catarina' ($\hat{g}_2 = -0,60$), 'Santa' ($\hat{g}_3 = -0,24$) e 'Mico' ($\hat{g}_6 = -0,75$) e os $\hat{s}_{ij}$'s dos cruzamentos de 'Mico' com os outros dois parentais; o terceiro cruzamento (1 x 4) teve média reduzida devido à sua CEC ($\hat{s}_{1 \times 4} = -0,96$). Os cruzamentos com maior número de raízes são consequência, fundamentalmente, do efeito de 'Taquari'.

O número de raízes é determinado por genes de ação não-aditiva, segundo RAJENDRAN (1989), e grau de dominância parcial segundo ACOSTA-ESPINOZA (1984). No entanto, os re-

sultados aqui obtidos indicam que a CGC tem maior importância na determinação dessa característica e, deste modo, genes com efeito aditivo ou efeito epistático do tipo aditivo x aditivo, determinaram o número de raízes. Esses genes concentram-se no parental 'Taquari'.

f) Avaliação conjunta

A análise dos cruzamentos dialélicos para avaliar o rendimento e seus componentes mostrou que a CGC (genes de efeito aditivo e/ou epistático aditivo x aditivo) é o fator mais importante na determinação das médias dos cruzamentos. A interação entre os cruzamentos, associada a genes com ação dominante alélica e/ou epistática, avaliada através da CEC, teve importância secundária. Dessa maneira deve-se procurar, para efeito de seleção, parentais com $\hat{g}_i$ mais conveniente, visto que $\hat{g}_i$ reflete a superioridade das frequências alélicas, exceto em casos incomuns com sobredominância muito pronunciada entre alelos e frequências alélicas muito altas (CRUZ & VENCovsky, 1989). Nesta situação, selecionar parentais com maior $\hat{g}_i$. No caso do peso de raízes, levarão à formação de populações com genes favoráveis em maior frequência e maior média.

Para as três características (PR, PA e PT), as estimativas dos $\hat{g}_i$'s e $\hat{s}_{ij}$'s superiores a zero estão nos mesmos parentais, fato que facilita a seleção. Contudo, para PR os genes estão distribuídos de modo mais uniforme entre os parentais e cruzamentos, notadamente os responsáveis pela CEC. Em se tratando de PA e PT, os genes que têm efeito po-

sitivo estão mais concentrados em 'Taquari' e aqueles que têm efeito negativo em 'Vassourinha'; genes com ação dominante e/ou *loci* em que haja complementação gênica, responsáveis pela CEC dos cruzamentos, são aproveitados apenas nos cruzamentos 5 x 6 e 2 x 3. Na determinação do IC, 'Santa' e 'Taquari' têm, comparativamente, a menor quantidade de genes que aumentam a média do caráter e, 'Vassourinha', a maior quantidade. A significância do NR não ocorre nos mesmos parentais que as outras características, exceto 'Taquari' que, desfavoravelmente, aumenta a média; os parentais selecionáveis para esta característica são 'Branca de Santa Catarina' e 'Mico'.

Sob o ponto de vista da seleção recorrente, que utiliza CGC e CEC estimadas a partir de médias de cruzamentos, os melhores parentais são aqueles que têm maior $\hat{g}_i$ para PR, preferencialmente cruzados com outros parentais com os quais tenham boa CEC. Para melhorar a população formada a partir desses cruzamentos, deve-se, durante a seleção dentro de progênies, diminuir a frequência de genes controladores de outras características desfavoráveis, por exemplo, cruza-se preferencialmente 'Taquari' com 'Mico' e 'Branca de Santa Catarina' e selecionando-se nas progênies indivíduos que tenham, além de maior produção e resistência à bacteriose, os maiores IC e menores NR.

4.3.4. Avaliação após seleção

A propagação vegetativa, sob o ponto de vista genético, pode ser considerada o mais evoluído mecanismo de

multiplicação de plantas. Uma vez encontrado um bom genótipo, este é facilmente perpetuado, permitindo a exploração imediata de todos os modos de ação gênica: aditiva, dominante e epistático. Deste modo são incorporados à média da população (monoclonal) todos os efeitos aditivos ou não aditivos existentes em populações plurigenotípicas sem o difícil trabalho de se obter um híbrido via linhagens homozigóticas.

A facilidade da multiplicação vegetativa leva a uma concepção um pouco diferente daquela que é aplicada ao melhoramento de plantas de reprodução sexuada. Um cruzamento é superior quando a média de seus descendentes for superior. Se há possibilidade de utilizar-se multiplicação vegetativa, um cruzamento é tanto melhor quanto melhor for o seu melhor descendente. Portanto, a média geral do cruzamento pode ser considerada um parâmetro secundário. Deste modo, o experimento foi reavaliado com o objetivo de analisarem-se os parentais e cruzamentos quanto à sua capacidade para produzir os melhores genótipos com maior peso de raízes.

As médias obtidas somente com os clones selecionados estão na Tabela 25. A média do peso de raízes sem seleção foi 7,78kg/genótipo, mas a média dos dez clones com maior produção foi 42,2% superior e, a dos cinco melhores, 67,5%. Em situações de rigorosa pressão de seleção, quando selecionou-se apenas os dois melhores clones ou ainda o melhor clone, as médias foram aproximadamente 100% superiores à média sem seleção.

Em populações segregantes, a variabilidade genotípica e fenotípica é tão superior a qualquer outro efeito que até 50% de seleção, a rigor, pode ser considerado descarte. Por outro lado, altas pressões de seleção podem levar a genótipos com superioridade momentânea, favorecidos por interações com locais e anos. Pressões de seleção intermediárias (25%, por exemplo) permitem reter genótipos com bom potencial para produção de raízes, possuidores de variabilidade residual para características secundárias importantes, tais como: arquitetura da planta, formato de raízes e outras.

A análise da variância dos tratamentos sem seleção e pós-seleção é mostrada na Tabela 26. O efeito de tratamentos foi significativo a 5% de probabilidade em todos os níveis de seleção, exceto a 25% que esteve próximo da significância; portanto, há tratamentos com médias estatisticamente superiores a outros. A variância de genótipos dentro de tratamentos é muito alta quando não há seleção, como já foi discutido, e reduz-se progressivamente com a seleção sob pressão superior a 25%.

O coeficiente de variação (Tabela 26), ao nível de médias de tratamentos, aumenta gradualmente com o crescimento da pressão de seleção e atinge o valor máximo de 17,29% com 5%, mas ainda é baixo se comparado aos valores encontrados na literatura que são, normalmente, superiores a 20%. O comportamento do coeficiente de variação pode ser explicado por: (a) redução do tamanho da parcela diminuindo a precisão experimental; (b) resposta diferencial para a se-

leção dos tratamentos dentro das parcelas, aumentando a interação blocos x tratamentos, que no modelo matemático é adicionado ao resíduo.

Utilizaram-se três critérios para avaliar o potencial dos cruzamentos para formar recombinantes com maior peso de raízes. Serão discutidos a seguir:

- I. Hierarquia das médias com diferentes pressões de seleção;
- II. Análise dialélica da composição das médias pós seleção, utilizando-se o modelo de GRIFFING (1956): $Y_{ij} = m + g_i + g_j + S_{ij}$
- III. Frequência de genótipos com peso de raízes superior a 10 e 15kg/genótipo.

I. Hierarquia das médias com diferentes pressões de seleção

As médias sem seleção e pós-seleção, assim como sua hierarquia, estão na Tabela 27. As maiores médias foram desde 52% (a 50% de seleção) até 67% (a 5% de seleção) superiores às menores. Apesar das diferenças altas, poucas foram significativamente inferiores, segundo o teste de Tukey.

Acompanhando-se o deslocamento das médias na hierarquia, observa-se que, embora as diferenças entre elas sejam pequenas, mesmo em posições afastadas, os tratamentos têm três padrões de comportamento: (a) aqueles que sistematicamente estão nos últimos lugares da hierarquia (6 x 3, 1 x 3, 4 x 3, 5 x 3); (b) aqueles que sistematicamente são bem classificados (6 x 5, 2 x 5), evidentemente os de maior interesse para melhoramento; (c) aqueles que migram na hier-

quia (1×3 , 2×1 , 5×2 , etc.). A migração é causada por diferentes frequências de genótipos com maior ou menor produção. Os tratamentos que são rebaixados na classificação têm comparativamente bons genótipos, em média, mas pouca variabilidade dentro do cruzamento. Aqueles que têm comportamento inverso, isto é, melhoram a posição com a seleção, apresentam genótipos melhores com maior frequência, e a sua posição hierárquica deve ser avaliada a cada nível de seleção.

A frequência de genótipos com maior peso de raízes pode refletir a segregação genética do cruzamento e, também, uma resposta fenotípica a maiores espaçamentos, o que é característica de alguns genótipos mais vigorosos (COCK, 1976). Como, por exemplo, a autofecundação de 'Branca de Santa Catarina' (2,23 plantas/genótipo) tem posição destacada na hierarquia, mesmo quando as comparações são feitas sem considerar o estande. Tratamentos que, com a seleção, melhoram seu desempenho (1×3 , 6×2), podem refletir também a segregação para resistência a bacteriose, porque são selecionados genótipos com maior estande, consequência da maior resistência à colonização vascular pelo patógeno. De modo geral, têm esse comportamento os cruzamentos em que o parental tem maior grau de suscetibilidade à bacteriose.

Admitindo-se que 25% e 10% sejam aceitáveis nesta fase da seleção, os cinco melhores tratamentos são: 6×1 , 6×2 , 6×4 , 6×5 , 5×2 e $2 \otimes$. Constitui destaque na Tabela 27 o bom desempenho da autofecundação de 'Branca de

Santa Catarina', fato raro no melhoramento de plantas.

Os parentais avaliados através da média de seus cruzamentos, também oscilam na hierarquia (Tabela 28). Sem seleção, 'Vassourinha' e 'Santa' foram inferiores e os demais não diferiram entre si. Com seleção, as diferenças entre médias tenderam à não-significância. 'Taquari' teve a maior média em cruzamentos sem seleção mas, com seleção, foi o penúltimo colocado. 'Mico' teve comportamento análogo, mas inverso, subindo do terceiro para o primeiro lugar após seleção. Esse comportamento pode ser explicado porque o primeiro tem progênies mais homogêneas do que o segundo, e conseqüentemente, respondem menos à seleção. 'Santa' e 'Vassourinha' mostraram os piores desempenhos, sem e com seleção, o que não deve estar associado a baixo estande porque, em média, este foi similar ao dos outros parentais (Tabela 14) que tiveram bom desempenho.

Embora o teste de Tukey não permita diferenciar a maioria das médias, no caso do presente trabalho, o modelo de avaliação fenotípica aqui utilizado pode ser útil quando não é possível uma análise genética mais apurada.

11. Análise dos cruzamentos dialélicos pós-seleção

As médias dos cruzamentos pós-seleção, na forma de tabelas dialélicas, estão na Tabela 29. Nesta tabela são mostradas as médias dos 30 genótipos com maior peso de raízes (10 genótipos x 3 repetições - 50% seleção); 15 genótipos com maior peso de raízes (5 genótipos x 3 repetições - 25% de seleção); 6 genótipos com maior produção de raízes (2

genótipos x 3 repetições), e os 3 genótipos com maior produção de raízes (melhor genótipo x 3 repetições). Os valores obtidos diferem minimamente das médias em que participaram todos os cruzamentos mostrados na Tabela 25.

A análise da variância dos efeitos da CGC e CEC, o somatório dos efeitos sem seleção e pós-seleção estão, na Tabela 30. Conforme a análise, verifica-se que há diferença significativa entre $\hat{g}_i$'s. A estimativa da variância de efeito fixo da CGC ($\sum_i \hat{g}_i^2$) foi de 2,56 e da CEC ($\sum_{ij} \hat{s}_{ij}^2$) foi de -0,51 de modo que a última pode ser considerada nula. Em termos genéticos, isto significa que a diferença entre os cruzamentos é causada pela diferença na frequência de genes de efeito aditivo e daqueles de efeito epistático do tipo aditivo x aditivo existente entre os parentais. Genes de efeito dominante e epistases envolvendo dominância não tiveram participação na composição das médias de tratamentos. RAJENDRAN (1989) obteve resultados similares em um dialélico 4 x 4.

Os efeitos da CGC com seleção tendem a perder a significância, mas os somatórios de suas magnitudes ficam próximos, caso se utilize para estimativa um número de indivíduos superior aos cinco melhores genótipos (a 25% de seleção) para estimá-los. Com o uso de menor quantidade de indivíduos, isto é, maiores pressões de seleção o $\sum \hat{g}_i^2$ é menor. Os efeitos da CEC têm comportamento inverso, isto é, se estimados com número de indivíduos superior a cinco, podem ser considerados nulos; porém, com maiores pressões de se-

leção aumentam rapidamente de valor ($\Sigma \hat{s}_{ij}^2 = 6,38$ com 10% de seleção e $\Sigma \hat{s}_{ij}^2 = 19,27$ com 5% de seleção), embora não provoquem variância significativa em qualquer situação. De modo geral, os indícios são que, com a seleção, a CGC tende a ser constante e a CEC aumenta rapidamente com altas pressões de seleção. Quando utilizou-se apenas o melhor genótipo (seleção a 5%) a relação entre as variâncias ($\Sigma \hat{s}_{ij}^2 / \Sigma \hat{g}_i^2$) foi aproximadamente 15.

A significância da variância dos $\hat{g}_i$'s e $\hat{s}_{ij}$'s está estritamente vinculada à estimativa do resíduo, conforme evidenciado na esperança dos QM (Quadro 3). Com a seleção, a estimativa do resíduo mostrou tendência a aumentar em termos absolutos (Tabela 30) e relativos, como é possível observar na composição porcentual da soma de quadrados (SQ) calculada a partir da Tabela 30 e mostrada a seguir:

FV	sem sel.	50%	25%	10%	5%
CGC	42,4	33,1	20,8	11,2	10,6
CEC	8,5	12,9	13,2	20,9	25,2
Resíduo	49,1	54,0	66,0	67,9	64,3

Assim, a não-significância observada é devida ao crescimento relativo superior do erro, e não à diminuição da variância dos efeitos.

Em geral, os dados mostram que, mesmo no conjunto de genótipos superiores, a complementação gênica favorável entre parentais (CEC) é mais importante para a determinação dos melhores genótipos do que o comportamento médio dos parentais (CGC). Deste modo, para se obter bons genótipos, é

necessário reunir-se genes com ação dominante favorável, alélicos ou não alélicos, procurando parentais com valor gênico aditivo alto, sempre em grupos genéticos divergentes e heteróticos.

O crescimento da importância relativa da CEC em relação à CGC com a continuidade do melhoramento é fato corriqueiro no melhoramento de plantas. É relatado em batata (TAI, 1976), milho (HALLAUER & MIRANDA FILHO, 1988) e outros. No caso do milho, o melhoramento é feito com base em populações, linhagens e híbridos. De acordo com os dados obtidos no presente trabalho, este fato também se repete ao nível de indivíduos.

A Tabela 31 mostra as estimativas da média ($\bar{m}$), dos g_i de cada parental estimado sem seleção e após a seleção, e ainda outros parâmetros afins. Os dados mostram que o parâmetro mais afetado com a seleção é a média, que duplica o valor entre os extremos sem seleção (7,73) até 5% de seleção (15,71). Admitindo-se 25% como índice usual nesta fase da seleção, a média (12,61) tem 63% de acréscimo em relação à média sem seleção. As estimativas dos g_i 's tornam-se menos precisas na medida em que cresce a pressão de seleção, uma vez que os desvios padrão tornam-se maiores, este fato é atribuível ao crescimento do resíduo. Contudo, diminui a dispersão relativa expressa através do coeficiente de variação, devido ao maior crescimento relativo da média; mas a amplitude dos efeitos permanece aproximadamente constante com a seleção. Portanto, mantém-se a capacidade diferencia-

tiva da CGC dos parentais mas essa diferença diminui proporcionalmente em relação à média.

Os $\hat{g}_1$'s dos parentais sofrem alterações na hierarquia e na magnitude após a seleção. 'Vassourinha' tem $\hat{g}_1 = -0,44$ sem seleção e $\hat{g}_1 = 0,03$ a 5% de seleção, mas em nenhum caso é diferente estatisticamente de zero e a posição na hierarquia é pouco alterada. 'Branca de Santa Catarina' aumentou o valor $\hat{g}_2$ apenas quando houve seleção até 50%; com índices de seleção superiores tendeu a estabilizar-se e permanecer na 2ª posição hierárquica. 'Santa' teve a magnitude de $\hat{g}_3$ pouco alterada com a seleção, sempre estatisticamente inferior a zero, e foi sempre o pior parental. 'Carapé' diminuiu a CGC até $\hat{g}_4 = -0,44$ com 25% de seleção, quando atingiu o 5º lugar na hierarquia, e aumentou o valor de sua CGC com maiores pressões de seleção; porém, não melhorou sua posição relativa, e também seus efeitos não foram estatisticamente diferentes de zero. Esse crescimento nos valores de $\hat{g}_4$ pode ser atribuído à seleção de genótipos com maior vigor e mais produtivos, mas que existem em menor frequência. 'Taquari' é o parental com maior CGC sem seleção ($\hat{g}_5 = 1,01$) e único efeito estatisticamente superior a zero. Os valores de $\hat{g}_5$ diminuem de magnitude até $\hat{g}_5 = -0,63$ com 5% seleção e é o 5º colocado na hierarquia. 'Mico' teve desempenho regular, $\hat{g}_5 = 0,25$ sem seleção, mas com seleção as estimativas de $\hat{g}_5$ tiveram o maior crescimento em magnitude e foi, comparativamente, o parental de melhor CGC quando avaliado com os

cinco melhores clones, atingindo $\hat{g}_5 = 1,04$ com 10% e 5% de seleção.

O crescimento da magnitude dos $\hat{g}_i$'s com a seleção, comportamento observado em 'Vassourinha', 'Branca de Santa Catarina' e 'Mico', pode ser atribuído inicialmente ao aumento do nível de resistência das progênies, refletido em maior estande. Porém, o efeito do estande diminui na medida em que aumenta a pressão de seleção; no entanto, esses genótipos continuam sendo bons parentais. Seu comportamento deve ser atribuído a variabilidade genética existente entre seus gametas ("linhagens"), o que é detectado através da seleção. O comportamento de 'Taquari' indica que, em média, este cultivar, produz gametas ("linhagens") com maior frequência de alelos favoráveis, mas uniformes, causando sua queda na hierarquia com o aumento da seleção. Em termos do melhoramento de plantas de multiplicação vegetativa, o comportamento de 'Mico' é mais interessante que o de 'Taquari'. Estabelecendo-se um paralelo com plantas alógamas, 'Taquari' equivaleria a uma população com média superior, mas com menor potencial para a extração de linhagens.

Os valores dos $\hat{s}_{ij}$'s e parâmetros afins sem seleção e após seleção estão na Tabela 32. Com o aumento da pressão de seleção diminui a precisão das estimativas dos efeitos, porque os desvios padrão tornam-se maiores, mas alguns $\hat{s}_{ij}$ atingem magnitudes diferenciadas estatisticamente de zero. O coeficiente de variação e a amplitude dos $\hat{s}_{ij}$ tornam-se maiores com a seleção, indicando que adquirem

maior dispersão em relação à média, fato que não ocorre com a CEC, e mais uma vez reforça-se o crescimento da importância relativa da CGC na formação de genótipos superiores.

A CEC é consequência da frequência de gametas formados pelos dois parentais, ambos portadores de complementação gênica favorável. Com a seleção, as magnitudes que estimam esses efeitos tendem a aumentar consideravelmente, principalmente com pressões de seleção muito elevadas. Contudo, os acréscimos não são distribuídos de forma homogênea. Alguns sofrem grandes alterações como por exemplo 'Carapé' x 'Mico' ($\hat{S}_{4 \times 6} = -0,01$) sem seleção, mas atingiu 3,40 quando se utilizou apenas do melhor genótipo para avaliá-lo, indicando que através desses dois parentais é possível obter genótipos que se utilizam de boa complementação, ação de dominância dos genes, mas essa interação positiva ocorre em frequência comparativamente menor.

Existem cruzamentos que têm sua posição hierárquica alterada com a seleção (4 x 6; 5 x 6), indicando que estas combinações produzem genótipos com ação gênica de dominância, favorável ou desfavorável, em maior frequência que outros cruzamentos. Outros se alteram pouco na classificação (1 x 3; 2 x 6; 3 x 6), o que demonstra comportamento mais homogêneo em relação à segregação dos genes complementares. Entre os que sofrem pequena alteração na hierarquia, há os que têm comportamento mais favorável independentemente da seleção, tendo sempre maiores $\hat{S}_{ij}$, e permitindo o aproveita-

mento da ação gênica de dominância com maior facilidade, como 1 x 3.

A composição das maiores médias dos cruzamentos após a seleção encontram-se na Tabela 33. Observa-se que as maiores médias são do cruzamento entre parentais que têm $\hat{g}_i$ e $\hat{s}_{ij}$ altos, isto é, ambos têm concentração superior de genes favoráveis, mas em *loci* diferentes e com ação dominante. A média dos melhores genótipos dentro de cada cruzamento também é formada pelos parentais com o maior $\hat{g}_i$ no respectivo nível de seleção e, eventualmente, podem aparecer médias que contenham um componente negativo (cruzamento 4 x 6 com 25% de seleção, onde $\hat{g}_4 = -0,44$; ou os cruzamentos 4 x 6, 5 x 6 e 2 x 3 com 10% de seleção) desde que este componente seja compensado por outros efeitos positivos. No entanto, com os aumentos da pressão de seleção, de modo geral, crescem as magnitudes dos $\hat{s}_{ij}$'s. Entre as melhores médias, destacam-se as dos cruzamentos 5 x 6, 2 x 5 e 4 x 6, a última obtida nas maiores pressões de seleção.

Os cruzamentos com menores médias são determinados, principalmente, pelo mau comportamento do parental 'Santa' que, em todos os níveis de seleção, tem o efeito com maior valor negativo.

É usual nesta fase de seleção (2ª multiplicação vegetativa) utilizarem-se pressões de seleção por volta de 25%. Nessa situação os melhores parentais foram 'Mico' ($\hat{g}_6 = 0,89$), 'Branca de Santa Catarina' ($\hat{g}_2 = 0,75$) e 'Taquari' ($\hat{g}_5 = 0,30$). 'Branca de Santa Catarina' não teve boa CEC

com 'Mico' ($\hat{S}_{2 \times 6} = -0,54$), e apenas razoável com 'Taquari' ($\hat{S}_{2 \times 5} = 0,32$), mas devido à sua boa *performance*, seus cruzamentos devem ser mais promissores com clones com os quais tenha boa complementação gênica, o que se espera que ocorra em genótipos não originados da região subtropical do Brasil. 'Mico' e 'Taquari' têm boa capacidade geral e específica de combinação, portanto, esse cruzamento deve ser repetido e ambos testados com outros clones. 'Vassourinha' ($\hat{g}_1 = -0,13$) devido ao comportamento frente a pressões de seleção crescentes, poderia ser melhor aproveitado, se cruzada com 'Mico' ($\hat{S}_{1 \times 6} = -0,41$) e se sua progênie fosse a seleção mais rigorosa para resistência à bacteriose. 'Carapé' ($\hat{g}_4 = -0,44$) também, devido à evolução resultante da seleção, deve ser cruzada com 'Mico' ($\hat{S}_{4 \times 6} = 0,99$) e sofrer fortes pressões de seleção para porte. 'Santa' teve comportamento inverso ao de 'Branca de Santa Catarina', de modo peculiar, teve boa complementação com os demais parentais (exceto 'Taquari' e 'Mico') mas sua inferioridade numérica quanto à frequência de alelos favoráveis recomendam que não seja mais utilizada em cruzamentos, a menos que se leve em conta outras características não avaliadas aqui, por exemplo, qualidades culinárias.

Não foi encontrada na literatura análise de cruzamentos dialélicos após seleção mas o artigo de TAI *et al.* (1986) tem algum paralelismo com os resultados do presente trabalho. Estes autores avaliaram dados de 15 anos do Programa Nacional de Melhoramento de Batata do Canadá, e cons-

tatarem que parentais, mesmo os de uso rotineiro, têm diferenças altamente significativas quanto à porcentagem de indivíduos selecionados nas três primeiras gerações de multiplicação vegetativa. O cultivar 'Kathadin', o parental de batata mais importante em nível mundial, teve 0,34% de descendentes selecionados, enquanto o melhor e o pior tiveram 0,69% e 0,08%, respectivamente. Os autores justificam a permanência de parentais que produzem poucos indivíduos selecionáveis devido a características especiais como alto rendimento e precocidade, entre outros.

As capacidades de combinação (geral e específica) são efeitos de componentes de médias que permitem identificar parentais com composição genética diferencial *per se* ou em cruzamentos, e ainda, quantificar as diferenças. O estudo desses efeitos passou a ganhar importância quando se verificou que os melhores cruzamentos eram aqueles realizados entre parentais com maior capacidade geral de combinação. Desse modo, a utilização desses parâmetros está ligada à repetibilidade. Para que os parâmetros g_i e s_{ij} tenham repetibilidade, devem-se respeitar alguns princípios: (a) trabalhar com o número mínimo de indivíduos que represente o cruzamento em cada estrato de seleção; (b) definir o número de indivíduos selecionados em termos absolutos, isto é, os dois melhores, os cinco melhores, etc.; (c) repetibilidade das condições de pré-seleção, por exemplo, resistência à bacteriose; (d) efeito fixo dos parentais, espera-se que na repetição de um mesmo cruzamento a seleção de um número determi-

nado de clones apresentem média para o caráter avaliado, mantendo a segregação para os demais; (e) manter similaridade de condições ambientais.

É importante notar que a fixação do efeito parental em plantas de propagação sexual está sempre intrinsicamente ligada à homozigose, enquanto que nas plantas de propagação vegetativa, essa condição é independente da heterozigose do genótipo parental. Esse fato demonstra que nos processos de racionalização do melhoramento de plantas de propagação vegetativa, devem-se empregar metodologias desenvolvidas para atender espécies que tenham essa característica, independentemente de seu processo de recombinação sexual.

A estimativa de parâmetros genéticos e fenotípicos tem sido muito pouco utilizada em mandioca, mesmo as de fácil estimação (CORREA & RAMALHO, 1982), o que também ocorre em outras plantas de multiplicação vegetativa. Uma das razões é que as avaliações exigidas por esses parâmetros não são feitas rotineiramente no melhoramento dessas espécies. Normalmente, nesses programas trabalha-se com grande número de genótipos e alta pressão de seleção, e a maioria é descartada visualmente, porque não tem qualquer valor agrônômico. Deste modo, agiliza-se o trabalho de campo, porque apenas os genótipos selecionados são de fato quantificados quanto a suas características.

Estimar parâmetros que utilizem somente genótipos selecionados pode permitir que essas espécies se beneficiem

do racionalismo que a genética quantitativa fornece ao melhoramento, pelas seguintes razões: (a) maior compatibilidade entre os parâmetros genéticos e a rotina de campo no melhoramento; (b) no caso específico de avaliação da capacidade de combinação é possível estimar parâmetros que permitam identificar parentais com superioridade numérica de genes favoráveis controladores de características quantitativas; (c) adequar os parâmetros ao objetivo das plantas de multiplicação vegetativa, isto é, o melhor cruzamento é aquele capaz de produzir o melhor genótipo e não a melhor média.

III. Frequência de genótipos superiores

As variâncias são afetadas pela frequência e magnitude dos desvios de tal modo que cruzamentos com a mesma variância, podem ser somatório de grande número de pequenos desvios ou desvios grandes em pequeno número. A última situação é mais favorável ao melhoramento de plantas propagadas vegetativamente. Para verificar-se o comportamento de cada cruzamento calculou-se a média, desvio padrão e frequência de genótipos com produção superior a 10 e 15kg (Tabela 34). Observou-se que há cruzamentos com os seguintes comportamentos: (a) médias altas e desvios altos (por exemplo, 2 $\otimes$), os de maior interesse para a seleção; (b) médias altas e desvios moderados (5 x 2); (c) médias moderadas e desvios altos (2 x 6); (d) médias baixas e desvios altos (2 x 6), também com algum interesse para seleção; (e) média

baixa e desvios baixos (5×3), que, a não ser por razões especiais, podem ser descartados.

A frequência de genótipos acima de determinado patamar pode refletir o comportamento da média e desvio padrão simultaneamente, de modo mais explícito e conveniente, principalmente se forem estabelecidos vários patamares. Verifica-se na Tabela 34 que a ordenação hierárquica não é a mesma para médias, desvio padrão e frequências, pelas próprias características intrínsecas à variância.

Encontra-se freqüentemente na literatura a amplitude para caracterizar esse tipo de dados, porém esta não informa sobre o tamanho do conjunto de genótipos que atendem ao mínimo necessário para serem submetidos a outros critérios de seleção. Deste modo, a frequência parece ser um parâmetro mais informativo.

A avaliação de parentais através da média da frequência de indivíduos com produção superior a valores mínimos estabelecidos, dentro de cada cruzamento, mostra comportamentos diferenciados (Tabela 35). 'Branca de Santa Catarina' e 'Mico' geraram os genótipos mais produtivos, com frequência superior à dos demais parentais, quando o valor mínimo é 10kg/genótipo. No entanto, 'Mico' tem progênie mais segregantes e, quando o mínimo estabelecido é 15kg/genótipo, demonstra maior potencial genético para a produção de genótipos superiores.

A comparação dos três métodos para identificar bons parentais, sob o ponto de vista do melhoramento de

plantas de multiplicação vegetativa, mostra que a análise dialélica é extremamente superior aos demais, como já era esperado. A grosso modo, a hierarquização das médias e frequência de genótipos superiores permitiram identificar parentais e cruzamentos mais interessantes, e até houve razoável coincidência desses resultados com as informações obtidas na análise dialélica. No entanto, a riqueza de informações genéticas (ação gênica envolvida nas características avaliadas, quantificação da superioridade numérica das frequências alélicas, boa complementação gênica entre parentais) que aponta diretrizes para futuros cruzamentos, como já foi discutido, representa grande avanço no melhoramento da mandioca. Assim, não se justifica a resistência encontrada entre os melhoristas em planejar cruzamentos e coordenar experimentação rotineira de campo para atender as exigências das estimativas de parâmetros genéticos. Evidentemente, esse progresso será maior à medida que os modelos genéticos e estatísticos tornem-se mais adequados a espécies de multiplicação vegetativa. Neste último-caso a informática deve prestar grande colaboração à popularização desse tipo de estudo.

4.3.6. Avaliação dentro de cruzamentos

A segregação dentro de cada cruzamento é o potencial imediato para a seleção de genótipos superiores. A variabilidade de cada cruzamento foi estimada através da variância genética (σ^2_g) e herdabilidade no sentido amplo (h^2_A). A dispersão relativa à média, de origem genética, foi

avaliada através do coeficiente de variação genético (CV_g). Com estes parâmetros é possível avaliar o progresso estimado na primeira fase da seleção.

Os parâmetros relativos ao peso de raízes são mostrados na Tabela 36. A média dos cruzamentos foi superior à média da testemunha, o que indica que essa população dispõe de bons genótipos em todos os cruzamentos. A σ^2_g foi alta, fato muito comum em mandioca quando se avaliam populações segregantes, e somente em quatro cruzamentos foi menor que a ambiental ($\sigma^2_a = 4,80\text{kg}^2/\text{gen}^2$). Porém, o valor da σ^2_a está superestimado devido à excessiva desuniformidade da testemunha, sendo comum que esse tipo de experimentação resulte em estimativas menores. Portanto, a grande variabilidade fenotípica observada no campo é devido a diferenças genotípicas.

A alta variância genética, juntamente com a avaliação precisa de cada genótipo (cinco plantas) refletiram-se em herdabilidades e coeficientes de variação genético altos, também observadas em outros trabalhos (CORREA & RAMALHO, 1982; MAHUNGU *et al.*, 1983). Deste modo, todos os parâmetros genéticos indicam alto progresso na seleção para maior produção de raízes, uma vez que há ampla variação genotípica, o que explica as altas pressões de seleção usualmente aplicadas em populações segregantes. Porém, nem todos os cruzamentos liberam a mesma quantidade de variabilidade. Os cruzamentos de 'Carapé' e 'Taquari' (exceto quando cruzada com 'Branca de Santa Catarina'), tem menor variância e menor expectativa de progresso.

Os parâmetros estimados para peso de parte aérea e peso total (Tabelas 37 e 38) convergem no mesmo sentido do peso de raízes, isto é, têm alta magnitude e indicam respostas extremamente favoráveis à seleção. Este fato pode ser explicado pela alta correlação genética e fenotípica existente entre as três características.

Os parâmetros referentes a índice de colheita estão na Tabela 39. Embora aproximadamente um terço dos cruzamentos tenha IC médio superior a 50%, a variância genética é alta para todos os cruzamentos. A herdabilidade alta é causada pela variação genética muito elevada, e não por controle ambiental preciso, visto que a estimativa da influência ambiental foi alta ($s^2_a = 20,37\%$). No entanto, o coeficiente de variação genético tem valores mais modestos que os encontrados nas características já anteriormente citadas; portanto, esperam-se progressos menos auspiciosos com a seleção.

O número de raízes e respectivos parâmetros são mostrados na Tabela 40. De modo geral, os tratamentos têm número médio de raízes superior ao desejado, mas a variância genética, herdabilidade e o coeficiente de variação genético têm magnitudes suficientes para diminuir o número de raízes a valores um pouco menores.

Todas as características avaliadas podem responder satisfatoriamente à seleção em qualquer tratamento, devido à grande variação genética. No entanto, alguns tratamentos podem responder de modo mais satisfatório do que outros, e a

alguns podem ser aplicadas pressões de seleção diferentes, dependendo da característica em questão. Por exemplo, a pro-
gênes de 'Taquari', deve ser aplicado maior rigor na se-
leção, para diminuir o número de raízes/planta e aumentar o
índice de colheita. Deste modo, é possível sanar defeitos
graves de progênes já nas primeiras gerações de multipli-
cação vegetativa, principalmente se a finalidade é também
utilizá-las em processo de seleção recorrente.

A estimativa do progresso genético é quase que a
avaliação global de todos os demais parâmetros indicadores
de sucesso com a seleção. E, como os parâmetros anterior-
mente calculados indicaram, o progresso esperado é alto
(Tabela 42).

Os três tratamentos que permitiram os maiores ga-
nhos quando selecionados os 25% melhores genótipos foram
'Mico' x 'Carapé' (85,60%) 'Mico' x 'Branca de Santa Cata-
rina' (73,07%) e autofecundação de 'Mico' (60,52%), que
atingiram média superior a 13kg/genótipo. Os demais trata-
mentos permitiram ganhos variáveis mas, de modo geral altos.
Quando se selecionaram os 10% melhores genótipos, houve cru-
zamentos ('Mico' x 'Branca de Santa Catarina' e 'Mico' x
'Carapé') nos quais o progresso genético foi igual e supe-
rior a 100%, e em vários outros cruzamentos superior a 50%.

É importante observar que, embora haja alguma re-
lação positiva, os tratamentos que têm o maior progresso
percentual nem sempre resultam na maior média estimada. Isto
deve ser atribuído fundamentalmente a dois fatores: (a)

quantidade de variabilidade genética liberada; (b) valor mais alto das médias. Sob o ponto de vista do melhoramento, a situação ideal é um cruzamento ou autofecundação com média elevada e alta variabilidade. Como na maioria das vezes isso não ocorre, é mais conveniente uma média alta com variabilidade um pouco menor, mas que permita maiores opções para outros fatores de seleção. Enquadram-se neste último caso a autofecundação de 'Branca de Santa Catarina', 'Mico' x 'Taquari' e outros.

Entretanto, o objetivo do melhoramento de mandioca, na fase de seleção a que se refere este trabalho, é identificar indivíduos geneticamente superiores para a produção de raízes. As demais características devem ser consideradas conjuntamente e, para tal, determinaram-se os coeficientes de correlação genética (r_g) e fenotípica (r_f) que constam da Tabela 42. Entre o peso de raízes e o peso total ($PR \times PT$ - Tabela 42), ambos os coeficientes são altos, indicando que quanto maior o peso de raízes maior o peso total a nível genético e fenotípico, fato esperado, uma vez que o peso de raízes é um componente do peso total. No entanto, esta correlação é de pouca utilidade, uma vez que necessita ser avaliada conjuntamente com o peso de raízes, e não apresenta qualquer vantagem inerente que tenha sido realmente comprovada.

● peso de raízes tem coeficiente de correlação positiva e de alta magnitude com peso de parte aérea ($PR \times PA$ - Tabela 42) a nível fenotípico e genético. Deste modo, a

seleção de genótipos, com maior peso de parte aérea, automaticamente leva à seleção de genótipos mais produtivos. Esta correlação é extremamente útil na agilização dos trabalhos de campo, porque permite que genótipos com pequeno vigor da parte aérea, o que é feito em rápida avaliação visual, não necessitem ser arrancados para o exame das raízes. No entanto, a utilização dessas correlações não pode ser feita de modo indiscriminado. Os dados de literatura mostram que coeficientes de correlação linear só têm magnitude suficientemente alta em populações segregantes ou provas de fileiras, isto é, em conjuntos de genótipos em que o vigor seja o principal efeito na produção de raízes, possivelmente por expressar maior capacidade fotossintética (ACOSTA-ESPINOZA, 1984). Com a seleção, ambos os coeficientes diminuem, principalmente o coeficiente de correlação genético; o fenotípico reduz-se em escala menor porque tende a manter-se alto uma vez que a correlação ambiental que é alta e, deste modo, não deve ser utilizado para efetuar pressões de seleção superiores a 50% (VALLE, dados não publicados). Em genótipos selecionados, avaliados em parcelas monoclonais (ensaios típicos de competição de cultivares), os coeficientes de correlação entre essas duas características adquirem magnitudes altas, mas negativas. BUENO (1985) encontrou valores $r_f = -0,31$ e $r_g = -0,96$. Nesta fase, os genótipos têm aproximadamente o mesmo potencial produtivo de biomassa total, mas aqueles com maior vigor da parte aérea têm menos raízes.

De modo geral, os dois coeficientes de correlação (r_F e r_G) entre o peso de raízes e índice de colheita ($PR \times IC$ - Tabela 42), foram de pequena magnitude, praticamente nulos. Assim, fica evidente que os genótipos que destinaram, proporcionalmente, maior biomassa às raízes, nem sempre foram aqueles que tiveram maior peso fresco de raízes. O maior peso de raízes em populações segregantes, sem competição, é determinado pela parte aérea, que permite maior capacidade fotossintética. Em populações segregantes, a ausência de correlação entre PR e IC também foi encontrada em nível fenotípico (KAWANO *et al.*, 1982; ACOSTA-ESPINOZA, 1984; FUKUDA & CALDAS, 1987) e em nível genético por ACOSTA-ESPINOZA, 1984. Deste modo, em gerações precoces de seleção, é possível selecionar genótipos vigorosos, alto peso de raízes e alto índice de colheita, e tornar a seleção mais eficiente, uma vez que na fase final da avaliação de clones elite, os mais produtivos têm maior índice de colheita. De fato, BUENO (1985) relata valores $r_F = 0,38$ e $r_G = 0,94$.

O número e peso de raízes ($NR \times PR$, Tabela 42) tiveram coeficientes de correlação genéticos e fenotípicos positivos, indicando que quando são selecionados genótipos mais produtivos, há tendência a aumentar o número de raízes. No entanto, ambos os coeficientes são de magnitude moderada para a maioria dos tratamentos, mostrando que entre os genótipos mais produtivos é possível selecionar alguns que tenham 6 a 10 raízes/planta, número próximo ao desejado.

Entre as quatro características avaliadas que têm correlação com produção de raízes, o vigor da parte aérea é importante para agilizar os trabalhos de campo, quando usado como indicador da produção de raízes, mas somente em baixas pressões de seleção. O peso total é de pouca utilidade, porque necessita do próprio peso de raízes para ser avaliado, podendo ser até desnecessário, caso não fosse indispensável para o cálculo do índice de colheita. No entanto, o índice de colheita é extremamente útil para tornar a seleção mais eficiente, por razões já discutidas. O número alto de raízes é um fator adverso, mas é facilmente contornado, porque os coeficientes de correlação genético indicam associação parcial entre as duas características.

Se duas características se correlacionam geneticamente, sabe-se que a seleção em uma delas afeta a outra. Para verificar-se as alterações que ocorrem com o peso total, índice de colheita e número de raízes, foram aplicadas duas pressões de seleção (25 e 10%) no peso de raízes, estimando-se o progresso genético e a média pós-seleção para as três características. Os resultados estão nas Tabelas 43 e 44.

A seleção dos 25% melhores clones em termos de peso de raízes levou a progressos altos em valores absolutos e relativos no vigor dos genótipos, mantendo um certo paralelismo com o progresso do peso de raízes, indicando que esta é uma característica que não demanda maiores atenções

durante a seleção, a não ser pela arquitetura, resistência a doenças, etc.

O índice de colheita sofre alterações diferentes dependendo do tratamento, conforme é mostrado na Tabela 43. A população avaliada tem índice de colheita médio de 48,0%, que é baixo, mas característico de populações segregantes. Deste modo, a seleção do peso de raízes deve ser acompanhada da seleção para maior índice de colheita, principalmente em alguns tratamentos que têm ganhos negativos e média baixa (por exemplo, 2 @, 2 x 3, 5 x 3 e outros). Evidentemente, é necessário atenção para que o maior IC reflita a distribuição favorável de elaborados nas raízes ao invés de suscetibilidade da parte aérea à bacteriose. Outros tratamentos têm progresso genético estimado variando entre 3,83% a 16,33%, e supõem-se que com a seleção, automaticamente, serão alcançadas maiores médias para o índice de colheita, evitando-se valores superiores a 65%, máximo recomendado (COCK & EL-SHARKAWY, 1988).

A seleção de genótipos com maior peso de raízes levou a um maior número de raízes por planta, em média, exceto no cruzamento 2 x 5. Nos demais, o progresso genético estimado variou de 5% (1 x 3) a 27,69% (4 @). Em consequência, espera-se que o número de raízes dos tratamentos atinja valores superiores ao desejado; para que isso não ocorra é necessário selecionar-se simultaneamente genótipos com produção de raízes satisfatória e, entre eles, os que apresentarem menor número de raízes.

Quando se empregou maior pressão de seleção no peso de raízes (10%), os resultados obtidos (Tabela 44), mostraram as mesmas tendências observadas com 25% de seleção apenas, com maiores valores. Portanto, os procedimentos de seleção independem do seu rigor. Em genótipos com pelo menos o mínimo de produção aceitável, deve-se selecionar os que apresentam: (a) parte aérea sadia, com arquitetura de planta favorável às práticas culturais e à produção de manivas; (b) maior índice de colheita, mas não superior a 65%; (c) de 6 a 10 raízes tuberosas por planta; (d) outras características específicas de cada programa de melhoramento, não consideradas neste trabalho. É importante notar que cada tratamento exige pressão de seleção diferente para a mesma característica.

4.4. Avaliação final

A Tabela 45 apresenta o resumo das características dos sete parentais e seus inter cruzamentos, visando seu potencial no melhoramento.

O cultivar 'Vassourinha' tem fertilidade restrita e baixa frequência de descendentes resistentes à bacteriose, levando a uma superestimada frequência de indivíduos com IC superior a 50% em suas progênes. Deve ser cruzado com parentais que tenham alto nível de resistência à bacteriose e devem-se obter progênes com grande número de indivíduos para efetuar uma rigorosa seleção. Os campos de cruzamentos devem ser conduzidos em áreas de exclusão do patógeno. 'Vassourinha' tem baixa CGC e CEC mediana quando cruzado com

'Santa', mas não o suficiente para ser um cruzamento de destaque.

'Branca' de Santa Catarina' foi o cultivar que, em aspecto global, teve o melhor desempenho como progenitor. Deve ser utilizado preferencialmente como parental feminino, a fim de se obter progênes com grande número de indivíduos, o que é extremamente fácil, pela sua fertilidade, e fazer-se uma rigorosa seleção para resistência à bacteriose. Tem CGC satisfatória sem e com seleção para PR, mas não teve boa CEC com os outros bons parentais. Outro aspecto favorável é que em suas progênes há maior frequência de indivíduos com IC e NR próximos ao desejado, do que nas progênes de outros parentais. Seu valor genético é suficientemente alto para permitir que a progênie originada de sua autofecundação tenha real potencial para a seleção de novos cultivares.

'Santa', de modo geral, teve desempenho inferior aos demais parentais, fato agravado pela dificuldade de cruzá-la. A análise dialélica mostra ser este o parental de menor CGC para a produção de raízes. Salvo por características não avaliadas aqui, é o menos recomendado dentre os parentais estudados.

'Carapé' é um cultivar de porte baixo que transmite fortemente essa característica às suas progênes mas, devido à alta fertilidade, é possível selecionar facilmente indivíduos com porte conveniente, principalmente se o objetivo for obter genótipos para altas densidades populacionais. É excelente fonte de resistência à bacteriose. Teori-

camente, terá maior CGC para PR se suas progênes forem avaliadas em maiores densidades populacionais. Mostrou excelente CEC com 'Mico' para PR, principalmente com altas pressões de seleção, indicando um cruzamento que deve ser melhor explorado.

'Taquari' é um parental cujos pontos favoráveis são a fertilidade masculina e feminina, e a resistência à bacteriose. Tem boa CGC para PR sem seleção, mas diminui na medida em que aumenta o rigor na seleção. Suas progênes têm média alta mas pequena variabilidade, o que dificulta a seleção. Tem boa CEC com 'Mico' e, neste caso, produz genótipos com peso de raízes elevado, principalmente em pressões de seleção moderadas. O pronunciado efeito gênico para diminuir o IC e aumentar o NR são seus principais defeitos.

'Mico' é um parental com alta fertilidade, boa frequência de indivíduos resistentes à bacteriose, razoável CGC para PR sem seleção e alta CGC para pressões de seleção rigorosas. Tem boa complementação gênica com 'Taquari' para PR, e nas progênes tem um número considerável de genótipos com boa produção de raízes, mas poucos com IC e NR favorável.

'Cigana' é um cultivar de difícil utilização, devido a sua extrema suscetibilidade à bacteriose, o que dificulta sua própria sobrevivência em campos de cruzamentos. Produz sementes botânicas em pequena quantidade e de má qualidade. Devido à suscetibilidade de suas progênes à bacte-

riose, não foi possível avaliá-la em fases de seleção mais avançadas.

Entre os cruzamentos destacaram-se:

- 6 x 2, pelo peso médio de raízes dos cinco melhores genótipos (15,33kg); frequência de genótipos com índice de colheita superior a 50% (75%) entre os melhores clones.

- 2 @, pelo peso médio de raízes dos cinco melhores genótipos (14,73kg), frequência de genótipos superiores a 10kg, frequência de genótipos com índice de colheita e número de raízes favorável entre os 50% melhores clones. Embora a autofecundação de 'Branca de Santa Catarina' produza poucas sementes botânicas, estas podem ser facilmente coletadas em grandes quantidades nos cultivos comerciais.

- 6 x 5, pelo peso médio de raízes dos cinco melhores genótipos (14,57kg), frequência de indivíduos resistentes à bacteriose, frequência de genótipos com peso superior a 10kg, embora a frequência de indivíduos com índice de colheita e número de raízes satisfatórios seja baixo entre os melhores clones.

- 6 x 4, pelo peso médio de raízes dos cinco melhores genótipos (14,05kg), boa capacidade específica de combinação, frequência alta de genótipos com peso superior a 10kg.

- 2 x 6, pela fertilidade e frequência elevadas de genótipos com índice de colheita e número de raízes favoráveis entre os 50% melhores clones.

De modo geral, todos os cruzamentos têm potencial para seleção de genótipos superiores, mas os piores são aqueles que envolvem 'Santa', exceto quando cruzada com 'Branca de Santa Catarina'.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem apontar as seguintes conclusões:

1. O número de sementes botânicas e a taxa de germinação são específicos para cada cruzamento, mas o parental feminino é o mais importante na determinação do caráter;

2. Parentais suscetíveis à bacteriose devem ser cruzados preferencialmente com parentais resistentes, visando a obtenção de segregantes com graus de resistência aceitáveis em futuros cultivares;

3. Parentais com resistência intermediária à bacteriose devem ter progênies suficientemente grandes quando intercruzados, visando a manutenção de suficiente variabilidade genética para outras características, após intensa pressão de seleção para bacteriose;

4. Não se constatou efeito recíproco para os caracteres avaliados, de modo que a designação de cada parental como macho ou fêmea pode ser feita em função da sua fertilidade;

5. A capacidade geral de combinação foi a principal responsável pela variação entre médias de cruzamentos para todas as características analisadas;

6. O parental 'Taquari' teve maior g_i para peso de raízes, peso de parte aérea, peso total, número de raízes e o menor para índice de colheita. Em nível de médias de cruzamentos, destacou-se também, pela magnitude dos efeitos, fertilidade e como fonte de resistência à bacteriose;

7. A análise dialélica para peso de raízes com os melhores genótipos dentro de cada cruzamento mostrou que a capacidade geral de combinação permanece aproximadamente

constante, mesmo com seleção. Maior rigor na seleção aumenta a importância da capacidade específica de combinação;

8. A composição das médias pós-seleção evidenciou que genótipos superiores para peso de raízes devem explorar a boa capacidade geral de combinação de, pelo menos, um parental e boa capacidade específica de combinação do cruzamento;

9. Os parentais 'Mico' e 'Branca de Santa Catarina' destacaram-se por apresentarem alta capacidade geral de combinação pós-seleção, enquanto 'Santa' destacou-se por apresentar a mais baixa capacidade geral de combinação, sem e com seleção para peso de raízes;

10. As combinações que se destacaram quanto ao efeito da capacidade específica de combinação para produção de raízes foram: 'Taquari' x 'Mico' (melhor combinação) e 'Santa' x 'Mico' (pior combinação);

11. As correlações genéticas entre peso de raízes e peso da parte aérea foram altas (em média 0,66), indicando que pode ser realizado o descarte inicial de material baseado no peso da parte aérea e com baixa pressão de seleção, agilizando os trabalhos de campo;

12. As estimativas do progresso esperado com seleção dentro de cruzamentos indicam que materiais promissores para seleção de genótipos visando a produção de raízes envolvem, principalmente, cruzamentos entre 'Mico' com os demais e entre 'Branca de Santa Catarina' com os demais, provavelmente, devido à alta capacidade geral de combinação de ambos.

13. O cruzamento entre 'Taquari' e 'Mico' se mostrou bastante promissor para a produção, provavelmente, devido à alta capacidade específica de combinação.

14. A autofecundação de 'Branca de Santa Catarina' mostrou-se bastante promissora para a produção de raízes.

6. BIBLIOGRAFIA

- ABRAHAM, A. Breeding of tuber crops in India. *Indian Journal of Genetics & Plant Breeding*, New Delhi, 17(2): 212-217. 1957.
- ACOSTA-ESPINOZA, J. Variabilidade e associações genéticas entre caracteres de mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) combinando policruzamento e propagação vegetativa. Piracicaba, 1984. 118p. (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).
- ALLARD, R. W. *Princípios do melhoramento genético das plantas*. São Paulo. Edgard Blücher, 1960. 310p.
- ALLEN, A. C. *Manihot esculenta* is a native of the neotropics. *Plant Genetic Resources Newsletter*, Roma, 71: 22-24, 1987.
- ALVES, M. L. B. & TAKATSU, A. Variabilidade em *Xanthomonas campestris* pv *manihotis*. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, 9: 485-494, 1984.
- BAKER, R. J. Issues in diallel analyses. *Crop Science*, Madison, 18(4): 533-536, 1978.
- BATISTA, E. M. & von BÜLOW, J. F. W. Estudo preliminar de um teste precoce de clones novos de mandioca (*Manihot*

esculenta Crantz). *Agronomia*, Campo Grande, 29: 7-14, 1971.

BUENO, A. Estimativas e uso das variâncias genéticas e fenotípicas no melhoramento de mandioca. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 4(2): 19-36, 1985.

BUENO, A. Competição intergenotípica e seleção em mandioca. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 6(1): 21-27, 1987.

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT). Tablas de evaluación de plagas y enfermedades. In: CIAT. *Yuca: investigación, producción y utilización*. Cali, PNUD/CIAT. 660p. s.d. [circa 1982]. p.594.

Cassava program systems. In: CIAT, *Annual Report 1977*. Cali, 1978.

Cassava program systems. In: CIAT, *Annual Report 1978*. Cali, 1979.

Cassava program systems. In: CIAT, *Annual Report 1979*. Cali, 1980.

COCK, J. H. Characteristics of high yielding cassava varieties. *Experimental Agriculture*, London, 12: 135-143, 1976.

COCK, J. H. *Cassava - new potential for a neglected crop*. London, Westview Press. 1985. 192p.

- COCK, J. H. & EL-SHARKAWY, M. A. Physiological characteristics for cassava selection. *Experimental Agriculture*, London, 24: 443-448, 1988.
- COCK, J. H. ; FRANKLIN, D.; SANDOVAL, G.; JURI, P. The ideal cassava plant for maximum yield. *Crop Science*, Madison, 19: 271-279, 1979.
- CONAGIN, A. & ZIMMERMANN, F. J. Z. Seleção de materiais nos trabalhos de melhoramento de plantas. II. Poder discriminativo de diferentes testes estatísticos. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, 25: 1415-1428, 1990.
- CORREA, H. & RAMALHO, M. P. Estimativa dos parâmetros genéticos e fenotípicos para caracteres de mandioca. Projeto Mandioca, relatórios 76/79. Belo Horizonte, 1982. p.115-116.
- COURS, G. Le manioc a Madagascar. *Mémoires de L'Institut Scientifique de Madagascar. Serie B*, 3: 203-400, 1951.
- CREPALDI, I. C. Biologia da reprodução em *Manihot* Mill. Campinas, 1987. 162p. (Mestrado - Instituto de Biologia/UNICAMP).
- CRUZ, C. D. & VENCOVSKY, R. Comparação de alguns métodos de análise dialélica. *Revista Brasileira de Genética*, Ribeirão Preto, 12: 425-438, 1989.
- DANTAS, J. L. L. Genótipos de mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) para programas de seleção no Recôncavo Baiano. Piracicaba, 1984. 103p. (Mestrado - ESALQ/USP)

- ELANGO, F. & LOZANO, J. C. Pathogenic variability of *Xanthomonas manihotis* the causal agent of cassava bacterial blight. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, 6: 57-65, 1981.
- FERRI, M. G.; MENEZES, N. L. & MONTEIRO-SCANAVACCA, W. R. Glossário ilustrado de botânica. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1978. 197p.
- FIBGE. *Anuário Estatístico 1989-1990*, Rio de Janeiro. 1990.
- FUKUDA, G.; ROMEIRO, R. S.; FUKUDA, W. M. G. Avaliação de resistência de cultivares de mandioca a *Xanthomonas campestris* pv *manihotis*. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 3(1): 7-12, 1984.
- FUKUDA, W. M. G. & CALDAS, R. C. Correlação entre caracteres morfológicos e agronômicos de mandioca. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 6(2): 35-40, 1987.
- FUKUDA, W. M. G.; CARVALHO, H. W. L. de; SILVA, S. O.; CALDAS, R. Avaliação de clones de mandioca no Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 2(1): 1-8, 1983.
- FUKUDA, W. M. G.; CALDAS, R. C.; MELO, Q. M. S. & QUEIROZ, G. M. Critérios de seleção em populações segregantes de mandioca. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 6(2): 41-55, 1987.

- GARDNER, C. O. & EBERHART, S. A. Analysis and interpretation of the variety cross diallel and related populations. *Biometrics*, Washington, 22: 439-452, 1966.
- GERALDI, I. O. & MIRANDA FILHO, J. B. Adapted model for the analysis of combining ability of varieties in partial diallel crosses. *Revista Brasileira de Genética*, Ribeirão Preto, 11: 419-430, 1988.
- GRIFFING, B. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. *Australian Journal of Biological Sciences*, Melbourne, 9(4): 463-493, 1956.
- GROSSMAN, F. A cultura da mandioca no Rio Grande do Sul. *Revista de la Facultad de Agronomia*, Montevideo, 42: 1-36, 1946.
- HAHN, S.K.; HOWLAND, A. K.; TERRY, G. R. Correlated resistance of cassava to mosaic and bacterial blight diseases. *Euphytica*, Wageningen, 29: 305-311, 1980.
- HARLAN, R.J. Agricultural origins: Centers and non centers. *Science*, Washington, 174: 468-474, 1971.
- HAYMAN, B. I. The theory and analyses of diallel crosses. *Genetics*, Princeton, 39: 789-809, 1954.
- HAYMAN, B. I. The theory and analyses of diallel crosses. II. *Genetics*, Princeton, 43: 63-85, 1958.

- HALLAUER, A. R. & MIRANDA FILHO, J. B. *Quantitative genetics in maize breeding*. 2ed. Ames, Iowa State University Press, 1988, 468p.
- HERSHEY, C. H. Cassava germplasm resources. In: HERSHEY, C. H. ed. *Cassava breeding: a multidisciplinary review* (Proceedings). Philippines, UNDP/CIAT/IITA/PRCRTC/VISCA. 1985. p.1-24
- HIROMOTO, D.M. & VELLO, N.A. The genetic basis of Brazilian soybean (*Glycine max* [L.] Merrill) cultivars. *Revista Brasileira de Genética*, Ribeirão Preto, 9: 295-306, 1986.
- HOFFMAN, R. *Estatística para economistas*. São Paulo. Livraria Pioneira Editora. 1980. 379p.
- HORTON, D. E. & FANO, H. *Atlas de la papa*. Lima, Centro Internacional de la Papa, Lima. 1985. 135p.
- IKOTUN, T. The survival of *Xanthomonas manihotis* (Arthaud-Berthet) Starr in the soil. *Fitopatologia Brasileira*, Brasília, 7: 29-36, 1982.
- JENNINGS, D. L. Recognising good parents in root crop breeding. *Tropical Root and Tuber Crops Newsletter*, Kapaa, 5: 11-13, 1972.
- JENNINGS, D. L. Breeding for resistance to African cassava mosaic disease: progress and prospects. In: WORKSHOP ON AFRICAN CASSAVA MOSAIC, Muguga, 1976. *Proceedings*. Ottawa, IRDC, 1976. p.39-44.

- JENNINGS, D. L. Inheritance of linked resistances to Africa cassava mosaic and bacterial blight diseases. In: CASSAVA PROTECTION WORKSHOP, Cali, 1977. *Proceedings*. Cali, CIAT, 1977. p.45-50.
- KAMALAN, P.; LICY, J.; HIRISHI, N. Association of characters in some selfed progenies of cassava *Manihot esculenta* Crantz. *Journal Root Crops*, Trinvandrum, 4(2): 27-29, 1978.
- KAWANO, K. Inherent and environmental factors related to cassava varietal selection. In: HERSHEY, C. H. ed. *Cassava breeding: a multidisciplinary review* (Proceedings). Philippines, UNDP/CIAT/IITA/PRCRTC/VISCA. 1985. p.207-226
- KAWANO, K. & THUNG, M. D. Intergenotypic competition with associated crops in cassava. *Crop Science*, Madison. 22(3): 59-63, 1982.
- KAWANO, K.; AMAYA, A.; DAZA, P. & RIOS, M. Factors affecting efficiency of hybridization and selection in cassava. *Crop Science*, Madison, 18(3): 373-376, 1978a.
- KAWANO, K.; DAZA, P.; AMAYA, A.; RIOS, M.; GONÇALVES, W. M. G. Evaluation of cassava germplasm for productivity. *Crop Science*, Madison. 18(3): 377-380, 1978b.
- KAWANO, K.; TIRAPORN, C.; TONGSRI, S. & KANO, Y. Efficiency of yield selection in cassava populations under

different plant spacings. *Crop Science*, Madison. 22(3): 560-564, 1982.

LIAN, T. S. Selection for yield potencial. In: CASSAVA: RESEARCH, PRODUCTION AND UTILIZATION. Cali, UNDP/CIAT, 1985. p.133-163.

LORENZI, J. O.; MONTEIRO, D. A.; PEREIRA, A. S. Avaliação de variedades de mandioca no Estado de São Paulo. *Bragantia*, Campinas, 42: 79-89, 1983.

LOZANO, J. C. & LABERRY, R. Screening for resistance to cassava bacterial blight. *Plant Disease Report*, Beltsville, 66(4): 316-318, 1982.

LOZANO, J. C. & SEQUEIRA, L. Bacterial blight of cassava in Colombia: epidemiology and control. *Phytopathology*, St. Paul, 64(1): 83-88, 1974.

MAGOON, M. L.; KRISHNAN, R. & BAI, K. W. Cytogenetics of the F₁ hybrid between cassava and ceara rubber, and its backcross. *Genetica*, The Hague, 41: 425-436, 1970.

MAGOON, M. L.; KRISHNAN, R. & LAKSHMI, K. Association of plant and tuber characters with yield of cassava. *Tropical Root and Tuber Crops Newsletter*, Kapaa, 5: 29-30, 1972.

MAHUNGU, N. M.; CHEDA, H. R.; HAHN, S. K. & IATOKUN, C. A. Genetic parameters of cassava. In: TROPICAL ROOT CROPS: PRODUCTION AND USES IN AFRICA, Douala, 1983. *Proceedings*. Douala, 1983. p.37-40.

- MARAITE, H.; WEYNS, J.; YINKWAN, O.; LIPEMBRA, P.; PERRAUX, D. Physiological and pathogenic variation in *Xanthomonas campestris* pv *manihotis*. In: LOZANO, J. C., ed. INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT PATHOGENIC BACTERIA, 5., Cali, 1981. *Proceedings*. Cali, CIAT, 1981. p. 358-368.
- MENDES, C. T. *Contribuição para o estudo da mandioca*. São Paulo, Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo, 1940. 99p.
- MIRANDA FILHO, J. B. & GERALDI, I. O. An adapted model for the analysis of partial diallel crosses. *Revista Brasileira de Genética*, Ribeirão Preto, 7: 677-688, 1984.
- NORMANHA, E. S. O trabalho de melhoramento da mandioca no Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. *O Agrônomo*, Campinas, 23: 91-100, jan./dez, 1971.
- PEIXOTO, T. C. Estudo complementar ao melhoramento genético da cana-de-açúcar (*Saccharum* spp). Piracicaba, 1986. 119p. (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- PEREIRA, A. S.; LORENZI, J. O.; NORMANHA, E. S.; SILVA, J. R. Fecundação cruzada no cultivar de mandioca Branca de Santa Catarina. *Bragantia*, Campinas, 37: 45-46, 1978.
- PEREIRA, A. V. Utilização de análise multivariada na caracterização de germoplasma de mandioca (*Manihot esculenta*

- Crantz). 1989, 180p. (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP)
- PERIN, S. & TAKATSU, A. Seleção de variedades de mandioca resistentes à bacteriose para a região dos cerrados. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 1., 1979. Salvador. *Anais*. Salvador, 1981. p.513-522.
- POMMER, C. V. & BASTOS, C. R. Genealogia de variedades IAC de cana-de-açúcar: vulnerabilidade genética e necessidade de programas básicos de melhoramento. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, 19: 623-629, 1984.
- RAJENDRAN, P. G. Combining ability in cassava. *Journal Root Crops*, Trivadrum, 15(1): 15-18, 1989.
- RICCI Jr., A.; LORENZI, J. O. SOAVE, J.; PARADELA Fz., O.; SUGIMORI, M. H. Patogenicidade de isolados de *Xanthomonas manihotis* (Arthaud-Berthet)Starr no Estado de São Paulo. In: CONGRESSO PAULISTA DE FITOPATOLOGIA, 3., Jaboticabal, 1980. *Resumos*. Jaboticabal, Grupo Paulista de Fitopatologia, 1980. p.19.
- ROBBS, C. F.; RIBEIRO, R. de L. C.; KIMURA, O.; AKIBA, F. Variações em *Xanthomonas manihotis* (Arthaud-Berthet)Starr *Revista da Sociedade Brasileira de Fitopatologia*, Piracicaba, 5: 67-75, 1972.
- RODRIGUEZ, S. & GARCIA, M. Relación entre el rendimiento y determinados caracteres fenológicos en yuca (*Manihot*

- esculenta*). *Ciencia y Tecnica en la Agricultura*. Viandas Tropicales. Villa Clara, 12(2): 7-15, 1989.
- ROGERS, D. J. Studies of *Manihot esculenta* Crantz and related species. *Bulletin of the Torrey Botanical Club*, New York, 90: 43-54, 1963.
- ROGERS, D. J. Some further considerations on the origin of *Manihot esculenta* Crantz. *Tropical Root and Tuber Crops Newsletter*, Mayaguez, 6: 4-10, 1972.
- ROGERS, D. J. & APPAN, S. G. *Manihot* and *Manihotoides* (Euphorbiaceae). *Flora Neotropics*, New York, 13: 1-272, 1973.
- ROGERS, D. J. & FLEMING, H. S. A monograph of *Manihot esculenta* - with an explanation of the taximetric methods used. *Economic Botany*, New York, 27: 1-113, 1973.
- SAMPAIO, N. F. Potencial genético de progênies de melos-irmãos de milho (*Zea mays* L.) na obtenção de híbridos intermediários. Piracicaba, 1989. 171p. (Doutorado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP)
- SAUER, J. *Agricultural origins and dispersals*. New York, American Geographyc Society, 1952.
- SHMIDT, C. B. A mandioca - contribuição para o conhecimento de sua origem. *Boletim da Agricultura*, São Paulo, 25: 73-128, 1951.
- SILVA, S. O. de; FUKUDA, W. M. G.; CARVALHO, H. W. L. & CALDAS, R. C. Estudo do comportamento de cultivares de man-

dioca no Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura. *Revista Brasileira de Mandioca*, Cruz das Almas, 2(1):9-16, 1983.

STEEL, R. G. D. & TORRIE, J. H. *Principles and Procedures in Statistics*. New York, McGraw-Hill, 1960. 481p.

TAI, G. C. C. Estimation of general and specific combining abilities in potato. *Canadian Journal of Genetic and Cytology*, Ottawa, 18: 463-470, 1976.

TAI, G.C.C.; JUI, P. Y. & YOUNG, D. A. Evaluation of parents based of long-term selection records. *Zeitschrift für Pflanzenzüchtung*, Berlin, 96: 39-46, 1986.

TAKATSU, A. Survival of *Xanthomonas manihotis* in host tissues. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT PATHOGENIC BACTERIA, 5., Cali, 1981. *Proceedings*. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT, 1981. p.214.

TAKATSU, A. & LOZANO, J. C. Translocacion del agente causal de anubio bacterial de la yuca (*Manihot esculenta* Crantz) em los tejidos del hospedero. *Fitopatologia*, Santiago, 10 (1): 13-22. 1975.

TAKATSU, A.; FUKUDA, G. & PERIN, S. Epidemiological aspects of bacterial blight of cassava in Brazil. In: MARAITE, H. & MEYER, J. A., ed. *Diseases of Tropical food crops*. Louvain-la-Neuve, Universite Catholique de Louvain, 1979. p.141-149.

- UEMURA, Y. & KAWANO, K. Field assessment and inheritance to cassava bacterial blight. *Crop Science*, Madison, 23(6): 1127-32, nov./dez. 1983.
- UGENT, D.; POZORSKI, S. & POZORSKI, T. Archaeological manioc (*Manihot*) from coastal Peru. *Economic Botany*, New York, 40: 78-102, 1986.
- VALLE, T. L. Utilização de espécies selvagens no melhoramento de mandioca: passado, presente e futuro. In: HERSHEY, C.H. ed. *Mejoramiento Genético de la Yuca*, Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1991. p.163-176.
- VENCOVSKY, R. Herança quantitativa. In: PATERNIANI, E. Coord. *Melhoramento e produção de milho no Brasil*. Piracicaba, ESALQ/USP, 1978. p.122-201.
- VILLELA, O. V.; PEREIRA, A. S.; LORENZI, J. O.; VALLE, T. L.; MONTEIRO, D. A.; RAMOS, M. T. B.; SCHMIDT, N. C. Competição de clones de mandioca selecionados para mesa e indústria. *Bragantia*, Campinas, 44(2): 559-568, 1985.
- ZEHNTER, L. *Estudos sobre algumas variedades de mandiocas brasileiras*. Rio de Janeiro, Imprensa Inglesa, 1919. 112p.

Tabela 1. Avaliação quantitativa e qualitativa da fertilidade dos parentais através dos seus cruzamentos e autofecundações.

♂ ♀	1	2	3	4	5	6	7
1	2,7(1) 32,3(2) 68,7(3)	0,9 11,8 76,5	12,9 33,1 78,5	4,7 12,5 80,0	9,2 20,4 76,0	9,4 53,4 92,0	6,5 27,0 83,5
2	16,9 8,5 91,0	7,6 11,3 80,0	53,2 14,1 79,0	34,1 11,3 87,0	43,0 18,8 85,0	136,5 13,6 87,5	119,4 15,0 96,5
3	1,4 94,6 37,5	0,6 75,0 41,7	1,1 95,6 22,0	1,4 81,0 57,0	4,3 75,7 52,0	3,2 100,0 32,3	5,0 100,0 20,0
4	31,3 43,8 89,5	24,5 22,6 83,5	27,6 65,1 75,0	55,3 54,2 76,5	127,8 37,6 85,0	118,7 51,2 75,0	35,8 67,8 86,0
5	36,7 27,6 84,0	41,7 13,4 75,5	64,6 23,2 85,5	101,3 10,3 79,0	189,1 20,5 86,0	232,5 15,3 91,0	183,6 37,5 70,0
6	31,8 18,2 76,5	37,7 12,8 82,0	27,1 24,6 81,5	55,7 16,3 81,0	76,7 24,4 86,5	181,1 36,9 76,0	113,3 30,1 83,0
7	4,0 80,2 47,0	8,5 29,0 88,6	28,3 65,7 73,0	8,4 52,5 85,3	32,2 61,8 82,0	14,6 85,6 50,6	4,1 97,8 23,3

(1) Número médio de sementes produzidas por planta

(2) Porcentagem de sementes com densidade < 1

(3) Porcentagem de germinação

Parentais: 1.Vassourinha, 2.Branca de Santa Catarina,
3.Santa, 4.Carapé, 5.Taquari, 6.Mico, 7.Cigana

Tabela 2. Médias dos parentais e respectivos desvios da fertilidade masculina, feminina e autocompatibilidade (A) avaliada através do número, densidade e germinação das sementes botânicas.

Parental Caráter		♀	♂	(A)
1	1	7,3 ± 4,2	20,3 ± 15,2	2,7
	2	26,4 ± 15,6	45,5 ± 34,8	32,3
	3	80,6 ± 6,3	71,0 ± 22,8	68,7
2	1	67,2 ± 48,9	19,0 ± 18,3	7,6
	2	13,6 ± 3,5	27,4 ± 24,3	11,3
	3	87,7 ± 5,9	74,5 ± 16,8	80,0
3	1	2,7 ± 1,8	35,6 ± 19,3	1,1
	2	87,7 ± 11,8	37,6 ± 22,3	95,6
	3	40,2 ± 13,5	78,7 ± 45,0	22,0
4	1	61,0 ± 48,5	34,3 ± 38,9	55,3
	2	48,0 ± 17,1	30,6 ± 29,4	54,2
	3	82,3 ± 6,0	78,0 ± 10,8	76,5
5	1	110,1 ± 80,7	48,8 ± 46,6	189,1
	2	21,2 ± 10,3	39,8 ± 23,8	20,5
	3	80,8 ± 7,5	77,7 ± 13,2	86,0
6	1	57,0 ± 33,0	85,8 ± 92,6	181,1
	2	21,1 ± 6,4	53,2 ± 35,4	36,9
	3	81,7 ± 3,2	71,4 ± 24,7	76,0
7	1	16,0 ± 11,6	79,3 ± 70,3	4,1
	2	62,5 ± 20,4	46,2 ± 31,7	97,8
	3	71,2 ± 18,0	73,1 ± 27,3	23,3

(1) Número médio de sementes produzidas por planta

(2) Porcentagem de sementes com densidade menor que 1

(3) Taxa de germinação

Parentais: 1.Vassourinha, 2.Branca de Santa Catarina, 3.Santa, 4.Carapé, 5.Taquari, 6.Mico, 7.Cigana

Tabela 3. Número de sementes botânicas plantadas (SP), número de genótipos avaliados (GA) e selecionados (GS) porcentagem de seleção ($100 \times GS/GA$) e classificação hierárquica (CH) dos tratamentos.

Tratamento ♀ x ♂	SP	GA(1) nº	GS(1)	GS/GA (%)	CH	Tratamento ♀ x ♂	SP	GA(1) nº	GS(1)	GS/GA (%)	CH
1 x 0	300	161	20	12,4	(30)	5 x 1	1050	253	60	23,8	(13)
1 x 2	34	26	0	0,0	(45)	5 x 2	1500	226	56	24,8	(10)
1 x 3	300	122	60	49,2	(1)	5 x 3	2100	256	31	12,1	(31)
1 x 4	50	45	0	0,0	(41)	5 x 4	1800	236	37	15,6	(20)
1 x 5	293	190	60	31,6	(6)	5 x 0	1800	257	26	10,1	(36)
1 x 6	150	150	30	20,0	(15)	5 x 6	1800	272	45	16,6	(18)
1 x 7	450	250	30	12,0	(34)	5 x 7	1800	290	35	12,1	(33)
2 x 1	600	194	32	17,0	(17)	6 x 1	1050	230	34	14,8	(23)
2 x 0	1200	240	38	15,8	(19)	6 x 2	1350	245	27	10,9	(35)
2 x 3	1950	237	31	13,1	(26)	6 x 3	900	244	30	12,3	(31)
2 x 4	1050	186	24	12,9	(28)	6 x 4	1800	266	26	9,8	(36)
2 x 5	1500	275	26	9,4	(38)	6 x 5	1800	260	20	7,7	(38)
2 x 6	2100	262	17	6,5	(43)	6 x 0	1800	227	33	14,5	(24)
2 x 7	2100	286	17	5,9	(44)	6 x 7	2100	248	23	9,3	(40)
3 x 1	56	21	0	0,0	(45)	7 x 1	100	47	10	21,3	(14)
3 x 2	24	10	0	0,0	(45)	7 x 2	250	133	20	15,0	(22)
3 x 0	150	33	10	30,3	(7)	7 x 3	450	220	30	13,6	(25)
3 x 4	58	33	0	0,0	(41)	7 x 4	150	128	20	15,6	(20)
3 x 5	150	78	30	38,5	(4)	7 x 5	450	247	60	24,3	(11)
3 x 6	130	42	20	47,6	(2)	7 x 6	300	76	30	39,5	(3)
3 x 7	150	30	10	33,3	(5)	7 x 0	300	39	10	25,6	(9)
4 x 1	750	269	36	13,4	(26)						
4 x 2	450	250	60	24,0	(12)						
4 x 3	450	225	60	26,7	(8)						
4 x 0	2100	135	10	7,4	(42)						
4 x 5	1800	256	20	7,8	(41)						
4 x 6	2250	225	29	12,9	(28)						
4 x 7	600	257	45	17,5	(16)						

(1) Valores referentes ao máximo de 300 sementes.

Parentais: 1.Vassourinha, 2.Branca de Santa Catarina, 3.Santa, 4.Carapé, 5.Taquari, 6.Mico, 7.Cigana

Tabela 4. Parentais, médias (m) e respectivos desvios (dp) da taxa de seleção em canteiros, quando macho, fêmea ou autofecundado e classificação hierárquica (CH).

Parentais	♀			♂			⊗	
	CH	m	dp	CH	m	dp	CH	m
1. Vass.	(3)	18,8 ±	19,2	(4)	15,0 ±	8,4	(6)	12,4
2. BSC	(6)	10,8 ±	4,3	(6)	12,4 ±	11,0	(3)	15,8
3. Santa	(2)	19,9 ±	22,3	(2)	21,2 ±	14,8	(1)	30,3
4. Carapé	(5)	17,1 ±	7,2	(7)	9,0 ±	7,3	(7)	7,4
5. Taquari	(4)	17,5 ±	5,6	(3)	19,9 ±	13,5	(4)	10,1
6. Mico	(6)	10,8 ±	2,5	(1)	23,8 ±	16,1	(5)	14,5
7. Cigana	(1)	21,6 ±	9,7	(4)	15,0 ±	9,7	(2)	25,6

Parental: 1-Vassourinha, 2-Branca de Santa Catarina.

Tabela 5. Cruzamentos e autofecundações, número de genótipos avaliados e distribuição de frequências (%) na escala de notas de resistência à bacteriose.

Tratamento	Genótipos avaliados	Escala de notas				Tratamento	Genótipos avaliados	Escala de notas			
		1	2	3	4			1	2	3	4
1x2	75	17,3	10,7	26,7	45,3	5x1	151	44,4	17,2	15,9	22,2
1x3	50	30,0	14,0	22,0	34,0	5x2	201	48,8	20,9	13,4	16,9
1x4	80	40,0	13,7	25,0	21,3	5x3	132	56,8	10,6	12,7	20,5
1x5	151	44,4	17,2	15,9	22,2	5x4	197	71,1	13,2	9,1	6,6
1x6	128	30,5	18,7	15,6	35,2	5x6	205	68,8	16,1	7,8	10,3
1x7	33	6,1	0,0	12,1	81,8	5x7	151	21,8	14,6	26,5	37,1
.....											
1.	517	28,0	12,4	19,6	40,0	5.	1037	51,8	15,3	14,1	18,8
10	17	11,8	5,9	0,0	82,3	50	105	76,2	8,6	5,7	9,5
.....											
2x1	75	17,3	10,7	26,7	45,3	6x1	128	30,5	18,7	15,6	53,2
2x3	102	26,5	20,6	13,7	39,2	6x2	200	34,5	18,5	12,0	35,0
2x4	182	56,6	12,1	9,9	21,4	6x3	93	59,3	5,4	12,9	22,6
2x5	201	48,8	20,9	13,4	16,9	6x4	203	47,3	17,2	9,4	26,1
2x6	200	34,5	18,5	12,0	35,0	6x5	205	65,8	16,1	7,8	10,3
2x7	116	3,4	3,4	6,1	87,1	6x7	125	12,0	9,5	16,0	62,5
.....											
2.	876	31,2	14,4	13,6	40,8	6.	954	41,5	14,2	12,3	32,0
20	100	30,0	13,0	16,0	41,0	60	98	36,7	12,2	8,2	42,9
.....											
3x1	50	30,0	14,0	22,0	34,0	7x1	33	6,0	0,0	12,1	81,8
3x2	102	26,5	20,6	13,7	39,2	7x2	116	3,4	3,4	6,1	87,1
3x4	76	64,5	7,9	10,5	17,1	7x3	36	25,0	5,5	16,7	52,8
3x5	132	56,8	10,6	12,7	20,5	7x4	92	28,3	8,7	16,3	47,8
3x6	93	59,1	5,4	12,9	22,6	7x5	151	21,8	14,6	26,5	37,1
3x7	36	25,0	5,5	16,7	52,8	7x6	125	12,0	9,5	16,0	62,5
.....											
3.	489	43,6	10,7	14,7	31,0	7.	553	16,1	6,9	15,5	61,5
30	8	75,0	12,5	0,0	12,5	70	8	0,0	0,0	0,0	100,0
.....											
4x1	80	40,0	13,7	25,0	21,3	Nota 1 = resistente..4 = suscetível Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico, 7. Cigana					
4x2	182	56,6	12,1	9,9	21,4						
4x3	76	64,5	7,9	10,5	17,1						
4x5	197	71,1	13,2	9,1	6,6						
4x6	203	47,3	17,2	9,4	26,1						
4x7	92	28,3	8,7	16,3	47,8						
.....											
4.	830	50,1	11,9	13,4	23,4						
40	104	71,1	11,6	9,6	7,7						

Tabela 6. Frequência de genótipos resistentes à bacteriose (nota = 1) e respectiva classificação hierárquica (entre parêntesis) dos parentais em cruzamentos e autofecundações.

Parental	CRUZAMENTOS		AUTOFECUNDAÇÃO	
	Genótipos avaliados (nº)	Genótipos c/nota = 1 (%)	Genótipos avaliados (nº)	Genótipos c/nota = 1 (%)
1. Vass.	517	28,0 (6)	17	11,8 (6)
2. BSC	899	31,2 (5)	100	30,0 (5)
3. Santa	489	43,6 (3)	8	75,0 (2)
4. Carapé	853	50,1 (2)	104	71,1 (3)
5. Taquari	1037	51,8 (1)	105	76,2 (1)
6. Mico	954	41,5 (4)	98	36,7 (4)
7. Cigana	553	16,1 (7)	8	0,0 (7)

Parental: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina

Tabela 7. Estande por tratamento e por genótipo, médias de tres repetições, médias geral e respectivas porcentagens do stand ideal em cada cruzamento.

Tratamento	Estande/tratamento				Estande/genótipo			
	I	II	III	média	I	II	III	média
1x3	20(1)	20	--(2)	20,0	3,0(3)	3,2	---	3,10
2x1	20	18	--	19,0	3,4	3,1	---	3,25
2x	20	18	19	19,0	3,5	3,1	2,9	3,23
2x3	17	20	13	16,7	3,6	4,0	1,6	3,07
2x4	20	20	19	19,7	4,2	4,2	2,9	3,77
2x5	20	20	20	20,0	4,3	4,3	4,1	4,23
2x6	20	18	19	19,0	3,5	2,8	3,3	3,20
4x1	20	20	--	20,0	4,1	4,0	---	4,05
4x2	20	20	19	19,7	4,8	4,4	3,2	4,13
4x3	18	20	--	19,0	3,6	4,3	---	3,95
4x	20	20	18	19,3	4,7	4,5	3,0	4,07
4x5	20	20	20	20,0	4,7	4,4	4,3	4,47
4x6	20	20	20	20,0	4,1	4,2	4,2	4,17
5x1	20	20	18	19,3	4,6	4,3	3,3	4,07
5x2	20	20	19	19,7	4,9	4,6	4,3	4,60
5x3	20	20	19	19,7	4,5	4,1	3,3	3,97
5x4	20	20	20	20,0	4,8	4,8	4,3	4,63
5x	19	20	20	19,7	4,5	4,4	4,0	4,30
5x6	20	20	20	20,0	4,8	4,3	4,2	4,43
6x1	19	19	17	18,3	3,2	3,3	2,0	2,83
6x2	20	19	19	19,3	3,8	3,6	2,3	3,23
6x3	20	20	--	20,0	3,4	3,6	---	3,50
6x4	20	20	18	19,3	4,6	4,3	2,8	3,90
6x5	20	20	20	20,0	4,6	4,4	4,7	4,57
6x	20	18	19	19,0	4,2	3,7	3,0	3,63
média	19,7	19,6	18,8	19,4	4,2	4,0	3,4	3,80
%	98,5	98,0	94,0	96,8	84,0	80,0	68,0	76,0

(1) Estande ideal de 20 genótipos

(2) Não plantado

(3) Estande ideal de 5 plantas

Parentais: 1.Vassourinha, 2.Branca de Santa Catarina, 3.Santa, 4.Carapé, 5.Taquari, 6.Mico

Tabela 8. Análise da variância do estande de plantas por genótipo. Dados de duas repetições.

F V	G L	S Q	Q M	F
Blocos	1	0,3698	0,3698	5,30*
Tratamentos	24	12,9600	0,5400	7,74**
Resíduo	24	1,6752	0,0698	

média = 4,09 plantas

C.V. = 6,46 %

Tabela 9. Estande médio de cada tratamento (plantas por genótipo) e significância(1). Dados de duas repetições.

Tratamento	estande	Tratamento	estande
5x4	4,80 a	4x6	4,15 abcd
5x2	4,75 a	4x1	4,05 abcde
4x2	4,60 a	4x3	3,95 abcde
4ø	4,60 a	6ø	3,95 abcde
4x5	4,55 ab	2ø	3,90 abcde
5x6	4,55 ab	2x3	3,80 abcde
6x5	4,50 ab	6x2	3,80 abcde
5x1	4,45 ab	6x3	3,50 bcde
5ø	4,45 ab	2x1	3,25 cde
6x4	4,45 ab	6x1	3,25 cde
2x5	4,30 abc	2x6	3,15 de
5x3	4,30 abc	1x3	3,10 e
2x4	4,20 abcd		

(1) Significância conforme o teste de Tukey a 5% de probabilidade, médias acompanhadas pela mesma letra não diferem entre si estatisticamente.

Parentais: 1.Vassourinha, 2.Branca de Santa Catarina, 3.Santa, 4.Carapé, 5.Taquari, 6.Mico

Tabela 10. Parentais e respectivo estande (plantas/genótipo) quando cruzados e autofecundados. Dados de duas repetições.

Parental	Cruzamentos			Autofecundação		
	I	II	média	I	II	média
1. Vass.	3,66	3,68	3,67	--(1)	--	--
2. BSC	3,92	3,80	3,86	4,45	3,30	3,87
3. Santa	3,82	3,84	3,83	--	--	--
4. Carapé	4,34	4,32	4,33	4,70	4,25	4,57
5. Taquari	4,56	4,38	4,47	4,25	4,40	4,45
6. Mico	3,86	3,78	3,82	4,15	3,30	3,75

(1) Não avallados

Parental: 1.Vassourinha, 2.Branca de Santa Catarina

Tabela 11. Peso médio de raízes (kg/genótipo) sem seleção e médias dos tratamentos. Colheita aos 11 meses.

Trata- mento	Repetições			Média
	I	II	III	
1x3	6,52(1)	8,61	3,86	6,33
2x1	8,76	8,58	5,04	7,46
2x	10,05	8,93	6,28	8,42
2x3	8,36	8,69	4,75	7,27
2x4	9,86	9,23	6,10	8,40
2x5	9,15	9,73	8,59	9,16
2x6	9,23	6,89	7,22	7,78
4x1	8,22	8,99	4,97	7,39
4x2	9,16	7,23	5,80	7,40
4x3	7,69	8,26	4,30	6,75
4x	9,31	6,86	5,48	7,22
4x5	8,69	8,15	7,60	8,15
4x6	8,83	8,53	6,41	7,92
5x1	10,04	7,56	6,63	8,08
5x2	10,31	8,39	7,28	8,66
5x3	7,50	7,59	6,24	7,11
5x4	9,03	9,00	7,09	8,37
5x	7,80	7,64	5,99	7,14
5x6	9,85	8,55	8,40	8,93
6x1	10,27	7,88	4,75	7,63
6x2	8,90	8,06	5,98	7,65
6x3	7,23	7,72	3,77	6,24
6x4	10,71	8,27	5,17	8,05
6x5	10,23	11,24	8,49	9,99
6x	9,31	7,28	4,80	7,13
Média	8,98	8,35	6,09	7,78

(1) Média de 20 genótipos (Unidade: 5 plantas/genótipo)
 Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 12. Média de tratamentos com três repetições para peso de parte aérea (PA), peso total (PT), Índice de colheita (IC) e número de raízes (NR). Colheita aos 11 meses.

Tratamento	PA (kg/genótipo)			PT (kg/genótipo)			IC (%)			NR (nr/planta)		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
												Média
1x3	5,63	7,39	1,73	12,15	16,00	5,59	53,17	53,82	44,02	50,34	9,01	7,35
2x1	7,68	8,34	3,32	16,44	16,92	8,36	54,67	51,25	43,45	49,79	9,51	6,40
2x0	11,71	10,74	6,95	21,76	19,67	13,13	47,20	48,10	48,52	47,94	10,68	6,44
2x3	10,02	12,07	4,50	18,38	20,76	9,33	46,25	42,75	50,43	46,48	9,90	7,67
2x4	9,66	11,13	6,12	19,52	20,36	12,22	50,38	45,78	51,63	49,26	8,23	8,35
2x5	10,22	11,76	8,85	19,37	21,49	17,44	47,64	45,11	49,63	47,46	9,85	9,38
2x6	9,37	5,63	5,26	18,60	12,52	12,48	48,35	53,19	58,83	53,46	6,75	6,91
4x1	5,81	6,62	1,41	14,03	15,61	6,38	59,00	59,13	49,95	56,03	8,85	6,10
4x2	10,59	10,47	6,29	19,75	17,70	12,06	46,67	42,83	49,00	46,17	10,88	7,26
4x3	7,37	10,94	4,54	15,06	19,20	8,84	51,52	43,94	37,89	44,45	9,99	6,50
4x0	8,91	9,14	5,22	18,22	16,00	10,70	50,76	40,60	51,61	47,66	9,20	7,89
4x5	14,15	11,45	8,87	22,84	19,60	16,47	38,97	41,97	45,73	42,22	12,11	8,84
4x6	7,93	10,20	5,59	16,76	18,73	12,00	54,40	47,91	47,94	50,08	8,35	9,36
5x1	11,87	9,55	6,65	21,91	17,11	13,28	45,62	44,58	50,22	46,81	10,74	9,55
5x2	13,78	13,88	8,98	24,09	22,27	16,26	44,05	36,34	43,40	41,26	10,27	7,69
5x3	10,87	11,76	7,60	18,37	19,35	13,84	40,96	40,68	45,61	42,42	9,57	8,60
5x4	12,45	12,75	10,53	21,48	21,75	17,62	43,31	42,32	40,57	42,07	11,05	9,77
5x0	9,18	11,25	9,21	16,98	18,09	15,20	45,20	40,65	39,49	41,78	10,48	9,94
5x6	13,55	13,82	7,90	23,40	22,37	16,30	42,40	39,73	51,93	44,69	10,03	29,32
6x1	7,69	6,00	4,08	17,96	13,88	8,83	58,53	57,43	55,79	57,25	9,72	9,60
6x2	8,43	6,90	5,48	17,33	16,96	11,46	48,33	48,06	51,23	49,21	9,06	7,19
6x3	8,04	10,76	4,80	15,27	18,48	8,57	49,46	40,55	34,99	41,67	7,96	8,49
6x4	9,43	10,16	5,37	20,14	18,43	10,54	53,23	43,59	50,33	49,05	9,80	6,17
6x5	13,23	14,85	9,42	23,46	26,09	17,91	43,91	42,57	47,60	44,69	10,54	9,87
6x0	7,24	8,11	4,09	16,25	15,39	8,89	56,83	47,55	50,89	51,76	7,28	6,00
Média	9,47	10,31	6,11	18,79	18,62	12,15	48,54	45,53	47,49	47,36	9,61	8,82
												8,75

(1) Média de 20 genótipos; (2) Média de todos os genótipos avaliados na parcela. Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 13. Análise da variância para cinco características: peso de raízes (PR - kg/genótipo), peso de parte aérea (PA - kg/genótipo), peso total (PT - kg/genótipo), índice de colheita (IC - %) e número de raízes (NR - nº/planta). Campinas, 1987/88. Colheita aos 11 meses.

FV	GL	PR	PA	PT	IC	NR
Repetições	2	1200,97**	2621,92**	7173,76**	1319,20ns	110,92**
Tratamentos (T)	24	45,39**	279,60**	501,60**	1166,80**	60,43**
Resíduo	43	19,08	27,56	70,13	372,35	17,28
CV (%)	-	12,55	13,44	11,33	7,68	10,62
Média (kg/gen)	-	7,78	8,74	16,52	47,36	8,75
Genótipos/T	933	16,21**	25,01**	70,84**	76,85**	8,96**
Clone testemunha	65	4,80	5,13	19,47	20,37	1,21
Média testemunha	-	7,06	7,43	14,44	48,44	5,12

ns.: não significativo.

* significativo a 5% de probabilidade.

** significativo a 1% de probabilidade.

Tabela 14. Média de tratamentos e classificação hierárquica (entre colchetes) e DMS de cinco características. Colheita aos 11 meses.

Tratamento	PR (kg/gen)	PA (kg/gen)	PT (kg/gen)	IC (%)	NR nº/planta
1 x 3	6,33[25]	4,92[24]	11,25[25]	50,34[5]	9,29[7]
2 x 1	7,46[15]	6,45[22]	13,91[21]	49,79[7]	8,34[18]
2 ⊗	8,42[5]	9,77[9]	18,19[7]	47,94[11]	8,23[19]
2 x 3	7,22[18]	8,89[13]	16,16[14]	46,48[15]	8,61[14]
2 x 4	8,40[6]	8,97[12]	17,37[9]	49,26[8]	8,35[16]
2 x 5	9,16[2]	10,28[6]	19,43[6]	47,46[13]	9,23[8]
2 x 6	7,78[12]	6,75[20]	14,53[18]	53,46[3]	6,79[25]
4 x 1	7,37[17]	4,61[25]	12,01[24]	56,03[2]	8,06[21]
4 x 2	7,40[16]	9,11[11]	16,50[12]	46,17[16]	8,69[13]
4 x 3	6,75[23]	7,62[18]	14,37[19]	44,45[19]	8,44[15]
4 ⊗	7,22[19]	7,76[17]	14,97[17]	47,66[12]	8,34[17]
4 x 5	8,15[8]	11,49[5]	19,64[5]	42,22[21]	10,20[3]
4 x 6	7,92[11]	7,91[15]	15,83[15]	50,08[6]	8,87[12]
5 x 1	8,08[9]	9,36[10]	17,43[8]	46,81[14]	10,36[2]
5 x 2	8,66[4]	12,21[2]	20,87[2]	41,26[25]	9,03[10]
5 x 3	7,11[22]	10,08[7]	17,19[10]	42,42[20]	9,21[9]
5 x 4	8,37[7]	11,91[3]	20,28[4]	42,07[22]	10,56[1]
5 ⊗	7,14[20]	9,88[8]	17,02[11]	41,78[23]	9,65[5]
5 x 6	8,93[3]	11,76[4]	20,69[3]	44,69[18]	10,02[4]
6 x 1	7,63[14]	5,92[23]	13,56[23]	57,25[1]	8,94[11]
6 x 2	7,65[13]	7,60[19]	15,25[16]	49,21[9]	7,67[22]
6 x 3	6,24[24]	7,87[16]	14,11[20]	41,67[24]	7,23[23]
6 x 4	8,05[10]	8,32[14]	16,37[13]	49,05[10]	8,21[20]
6 x 5	9,99[1]	12,50[1]	22,49[1]	44,69[17]	9,56[6]
6 ⊗	7,13[21]	6,48[21]	13,61[22]	51,76[4]	6,93[24]
DMS(1)	3,12	3,75	5,97	13,77	3,02

(1) Diferença mínima significativa a 5% de probabilidade, teste de Tukey.

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 15. Médias do peso de raízes (PR), peso de parte aérea (PA), peso total (PT), índice de colheita (IC) e número de raízes (NR) de seis cruzamentos e seus recíprocos.

♂	♀	PR	PA (kg/genótipo)	PT	IC (%)	NR (nº/pl.)
2 x 4		8,40	8,97	17,37	49,26	8,35
4 x 2		7,40	9,11	16,50	46,17	8,69
		ns	ns	ns	ns	ns
2 x 5		9,16	10,26	19,43	47,46	9,23
5 x 2		8,66	12,21	20,87	41,26	9,03
		ns	ns	ns	ns	ns
2 x 6		7,78	6,75	14,53	53,46	6,79
6 x 2		7,65	7,60	12,25	49,21	7,67
		ns	ns	ns	ns	ns
4 x 5		8,15	11,49	19,64	42,22	10,20
5 x 4		8,37	11,91	20,28	42,07	10,56
		ns	ns	ns	ns	ns
4 x 6		7,92	7,91	15,83	50,08	8,87
6 x 4		8,05	8,32	16,37	49,05	8,21
		ns	ns	ns	ns	ns
5 x 6		8,93	11,76	20,69	44,69	10,02
6 x 5		9,99	12,50	22,49	44,69	9,56
		ns	ns	ns	ns	ns

ns = Não significativo a 5% de probabilidade (teste t).
 Parentais: 2. Branca de Santa Catarina, 4. Carapé,
 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 16. Médias do peso de raízes (PR), peso de parte aérea (PA), peso total (PT), Índice de colheita (IC) e número de raízes (NR) de quatro parentais avaliados em autofecundações e cruzamentos para estimar depressão endogâmica.

Paren- tal		PR ——	PA (kg/genótipo)	PT ——	IC (%)	NR (nº/pl)
BSC	A	8,42	9,77	18,19	47,94	8,23
	C	7,85	8,78	16,75	47,89	8,34
	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Carapé	A	7,22	7,76	14,97	47,46	8,34
	C	7,66	8,74	16,55	47,45	8,92
	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Taquari	A	7,14	9,88	17,02	41,78	9,65
	C	8,40	11,12	19,75	43,99	9,77
	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Mico	A	7,13	6,48	13,61	51,76	6,93
	C	7,81	8,58	16,60	48,76	8,41
	ns	ns	ns	ns	ns	ns

A - Autofecundação

C - Média de oito cruzamentos

ns - Não significativo a 5% de probabilidade (teste Scheffé)

Tabela 17. Médias de produção de raízes (PR - kg/genótipo) dos cruzamentos dialélicos de seis parentais. Média de três repetições, 20 genótipos por parcela.

	1	2	3	4	5	6	Média
1	-	7,46	6,33	7,39	8,08	7,63	7,38
2		-	7,27	8,40	9,16	7,78	8,01
3			-	6,75	7,11	6,24	6,74
4				-	8,37	8,05	7,79
5					-	9,99	8,54
6						-	7,94

Média geral = 7,73 kg/genótipo

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 18. Médias de produção de parte aérea (PA - kg/genótipo) dos cruzamentos dialélicos de seis parentais. Média de três repetições, 20 genótipos por parcela

	1	2	3	4	5	6	Média
1	-	6,45	4,92	4,61	9,36	5,92	6,65
2		-	8,89	8,97	10,26	6,75	8,26
3			-	7,62	10,08	7,87	7,88
4				-	11,91	8,32	8,29
5					-	12,50	10,82
6						-	8,27

Média geral = 8,30 kg/genótipo

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 19. Médias de peso total (PT - kg/genótipo) dos cruzamentos dialélicos de seis parentais. Média de três repetições, 20 genótipos por parcela.

	1	2	3	4	5	6	Média
1	-	13,91	11,25	12,01	17,43	13,56	13,63
2		-	16,16	17,37	19,43	14,53	16,28
3			-	14,37	17,19	14,11	14,62
4				-	20,28	16,37	16,08
5					-	22,49	19,36
6						-	16,21

Média geral = 16,03 kg/genótipo

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 20. Médias de índice de colheita (IC - %) dos cruzamentos dialélicos de seis parentais. Média de três repetições, 20 genótipos por parcela

	1	2	3	4	5	6	Média
1	-	47,79	50,34	56,03	46,81	57,25	52,04
2		-	46,48	49,26	47,46	53,46	49,29
3			-	44,45	42,42	41,67	45,07
4				-	42,07	49,05	48,17
5					-	44,69	44,69
6						-	49,22

Média geral = 48,08 %

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 21. Médias de número de raízes (NR - nº/planta) dos cruzamentos dialélicos de seis parentais. Média de três repetições, 20 genótipos por parcela.

	1	2	3	4	5	6	Média
1	-	8,34	9,26	8,06	10,36	8,94	8,99
2		-	8,61	8,35	9,23	6,79	8,26
3			-	8,44	9,21	7,23	8,55
4				-	10,56	8,26	8,73
5					-	9,56	9,72
6						-	8,16

Média geral = 8,74 raízes/planta

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 22. Quadrados médios e significâncias, capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de combinação (CEC), média ($\bar{u}$) e desvio padrão $s(\bar{u})$ de tabelas dialélicas para os caracteres: peso de raízes (PR - kg/genótipo), peso de parte aérea (PA - kg/genótipo), peso total (PT - kg/genótipo), índice de colheita (IC - %) e número de raízes (NR - nº/planta). Campinas. 1987/88. Colheita aos 11 meses.

FV	GL	PR	PA	PT	IC	NR
Tratamentos	14	1,0124**	5,4843**	9,6346**	23,2193**	1,0447**
CGC	5	2,3637**	3,4208**	23,7047**	48,7953**	2,2115**
CEC	9	0,2616ns	1,0751*	1,8178ns	9,0104ns	0,3964ns
Resíduo	43	0,3181	0,4593	1,1688	6,2058	0,2880
Média	-	7,73	8,30	16,03	48,08	8,74
s	-	0,15	0,17	0,28	0,64	0,14

ns não significativo

* significativo a 1% de probabilidade.

** significativo a 5% de probabilidade.

Tabela 23. Estimativa dos efeitos da capacidade geral de combinação ($\hat{g}_i$) de seis parentais, classificação hierárquica (entre colchetes), desvio padrão ($s[\hat{g}_i]$), amplitude e coeficiente de variação para cinco características: peso de raízes (PR - kg/genótipo; peso de parte aérea (PA - kg/genótipo), peso total (PT - kg/genótipo), índice de colheita (IC - %) e número de raízes (NR - nº/planta).

Efeito	PR	PA	PT	IC	NR
$\hat{g}_1$	-0,44[5]	-2,56[6]**	-3,00[6]**	4,95[1]**	0,31[2]
$\hat{g}_2$	0,35[2]	+0,04[2]	+0,31[2]	1,51[2]	-0,60[5]*
$\hat{g}_3$	-1,24[6]**	-0,52[5]*	-1,77[5]**	-3,76[5]**	-0,24[4]
$\hat{g}_4$	0,07[4]	-0,01[3]	0,06[4]	0,11[4]	-0,02[3]
$\hat{g}_5$	1,01[1]**	3,16[1]**	4,17[1]**	-4,24[6]**	1,30[1]**
$\hat{g}_6$	0,25[3]	-0,03[4]	0,23[3]	1,43[3]	-0,75[6]**
$s[\hat{g}_i]$	0,26	0,31	0,49	1,29	0,24
amplitude	2,25	5,72	7,17	9,19	2,05
CV [$\hat{g}_i$]	9,92	10,03	15,20	7,22	8,51

** Diferente de zero segundo o teste t a 1% de probabilidade.

* Diferente de zero segundo o teste t a 5% de probabilidade.

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 24. Estimativa dos efeitos da capacidade específica de combinação ($\hat{S}_{ij}$) de 15 cruzamentos, classificação hierárquica (entre colchetes), desvio-padrão $s(\hat{S}_{ij})$, amplitude e coeficiente de variação ($CV\hat{S}_{ij}$) para: peso de raízes, PR (kg/genótipo), peso de parte aérea, PA (kg/genótipo), peso total, PT (kg/genótipo), índice de colheita, IC(%) e número de raízes, NR (nº/planta).

Efeito	PR	PA	PT	IC	NR
$\hat{S}_{1 \times 2}$	-0,18[10]	0,75[3]	0,57[4]	-4,75[15]*	-0,11[10]
$\hat{S}_{1 \times 3}$	0,28[3]	-0,30[11]	-0,01[10]	1,07[6]	0,45[4]
$\hat{S}_{1 \times 4}$	0,03[8]	-1,12[13]*	-1,08[12]	2,87[1]	-0,96[15]*
$\hat{S}_{1 \times 5}$	-0,22[11]	0,46[6]	0,23[6]	-1,98[13]	0,00[8]
$\hat{S}_{1 \times 6}$	0,09[6]	0,21[7]	0,30[5]	2,79[2]	0,63[2]
$\hat{S}_{2 \times 3}$	0,43[2]	1,15[1]*	1,59[2]	0,65[7]	0,71[1]
$\hat{S}_{2 \times 4}$	0,24[4]	0,73[4]	0,97[3]	-0,44[9]	0,23[7]
$\hat{S}_{2 \times 5}$	0,07[7]	-1,15[14]*	-1,08[12]	2,11[5]	-0,21[11]
$\hat{S}_{2 \times 6}$	-0,56[15]	-1,49[15]**	-2,03[15]*	2,43[3]	-0,61[14]
$\hat{S}_{3 \times 4}$	0,19[5]	-0,14[10]	0,05[7]	0,02[8]	-0,04[9]
$\hat{S}_{3 \times 5}$	-0,39[12]	-0,85[12]	-1,24[14]	2,34[4]	-0,58[13]
$\hat{S}_{3 \times 6}$	-0,51[14]	0,13[8]	-0,38[11]	-4,08[14]*	-0,52[12]
$\hat{S}_{4 \times 5}$	-0,44[13]	0,47[5]	0,02[9]	-1,88[12]	0,54[3]
$\hat{S}_{4 \times 6}$	-0,01[4]	0,07[9]	0,05[7]	-0,57[10]	0,24[6]
$\hat{S}_{5 \times 6}$	0,99[1]*	1,08[2]*	2,06[1]*	-0,58[11]	0,26[5]
$s[\hat{S}_{ij}]$	0,44	0,52	0,84	1,93	0,44
amplitude	1,55	4,11	4,09	7,62	1,67
$CV[\hat{S}_{ij}]$	5,31	10,45	6,75	5,00	5,77

* Diferente de zero a 5% de probabilidade (Teste t).

** Diferente de zero a 1% de probabilidade (Teste t).

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 25. Média de tratamentos com três repetições para peso de raízes (kg/genótipo, total de 5 plantas/genótipo) com quatro níveis de seleção. Colheita aos 11 meses.

Tratamento	50% de Seleção(1)			25% de Seleção(2)			10% de Seleção(3)			5% de Seleção(4)		
	I	II	Média	I	II	Média	I	II	Média	I	II	Média
1x3	9,90	11,93	6,21	12,76	14,76	8,84	12,12	15,80	17,15	11,21	14,72	16,60
2x1	12,08	12,58	7,72	13,72	14,18	9,04	12,31	16,00	17,00	11,24	14,75	18,10
2 0	12,34	14,32	10,31	13,90	17,72	12,56	14,73	16,05	21,75	14,20	17,33	16,50
2x3	12,72	11,52	8,88	14,30	12,96	11,88	13,05	16,50	15,25	14,25	15,33	17,00
2x4	13,88	10,98	8,33	17,60	12,06	9,30	12,99	21,35	14,15	10,75	15,42	24,50
2x5	11,65	13,77	11,44	13,64	15,18	13,12	13,98	15,55	15,80	14,25	15,20	17,50
2x6	13,05	11,16	10,93	15,84	12,10	13,40	13,78	16,85	12,75	15,50	15,03	17,00
4x1	10,92	12,06	6,83	12,44	13,70	8,10	11,41	13,60	14,40	8,58	12,19	14,70
4x2	10,90	9,34	8,30	12,12	10,36	10,06	10,85	12,35	11,65	11,95	11,98	12,50
4x3	11,05	11,28	6,48	12,68	12,60	7,64	10,97	16,55	14,40	10,15	13,70	17,10
4 0	12,81	10,19	8,50	14,52	13,30	9,86	12,56	15,95	16,05	11,40	14,47	16,30
4x5	11,02	10,68	10,45	12,94	12,68	12,70	12,77	14,75	15,15	13,65	14,52	16,00
4x6	11,47	11,71	8,47	12,98	14,56	9,76	12,43	13,80	16,20	11,80	13,93	14,10
5x1	12,91	9,40	10,42	15,12	9,96	13,60	12,89	16,80	10,30	15,75	14,28	18,00
5x2	13,42	11,67	10,40	15,60	13,88	12,58	14,02	17,75	15,20	14,70	15,88	17,80
5x3	9,18	10,13	6,56	10,62	12,38	9,80	10,93	11,90	16,00	10,20	12,70	12,00
5x4	11,11	11,10	9,23	12,12	12,30	11,22	11,88	13,55	13,75	14,60	13,97	14,80
5 0	10,51	9,83	7,50	11,94	11,58	8,90	10,81	13,30	13,05	10,70	12,35	13,50
5x6	12,26	11,34	10,87	13,64	13,06	12,52	13,07	16,05	14,25	14,45	14,92	19,00
6x1	13,97	11,54	7,48	17,28	14,10	9,94	13,77	19,25	18,65	11,75	16,55	20,00
6x2	13,87	11,87	9,90	16,40	15,26	14,34	15,33	19,05	19,65	20,00	19,57	20,20
6x3	9,98	11,45	6,00	11,48	12,86	7,14	10,49	13,45	14,40	8,50	12,12	13,90
6x4	14,19	12,01	8,48	16,68	14,42	11,06	14,05	20,80	17,00	14,70	17,50	25,30
6x5	12,69	15,86	10,86	13,88	17,70	12,14	14,57	15,50	19,10	13,85	16,15	16,00
6 0	12,97	11,30	7,43	15,54	14,14	9,06	12,91	17,35	14,65	11,05	14,35	18,00
Média	12,03	11,56	8,72	13,99	13,51	10,74	12,75	15,99	15,51	12,77	14,76	17,06
												16,54
												13,53
												15,71

(1) Média dos 10 genótipos com maior peso de raízes; (2) Média dos 5 genótipos com maior peso de raízes; (3) Média dos 2 genótipos com maior peso de raízes; (4) Peso de raízes do melhor genótipo. Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 26. Quadrados médios da análise da variância do peso de raízes entre médias de cruzamento, dentro de cruzamentos e do clone testemunha IAC-24-2 'Mantiqueira'.

FV	GL	5% sel.	50% sel.	25% sel.	10% sel.	5% sel.
Repetições	2	1200,97**	803,60**	384,23**	151,33**	90,77**
Tratamentos (T)	24	45,39*	37,90*	27,09ns	19,75*	14,07*
Resíduo	43	19,08	17,22	15,66	10,16	7,38
CV (%)	-	12,55	12,18	13,88	15,27	17,29
média (kg/gen)	-	7,78	10,77	12,75	14,76	15,71
Genótipo/T	933	16,21**	8,98**	5,89*	3,58ns	0
Clone Testemunha	65	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Média (testem.)	-	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12

ns = Não significativo

* = Significativo a 5% de probabilidade

** = Significativo a 1% de probabilidade

Tabela 27. Média da produção de raízes (kg/genótipo, total de 5 plantas/genótipo) de cada tratamento e classificação hierárquica (entre colchetes) sem seleção e com quatro níveis de seleção. Colheita aos 11 meses.

Trata- mento	s/sel.	50% sel.	25% sel.	10% sel.	5% sel.
1 x 3	6,33[24]	9,35[22]	12,12[18]	14,72[13]	16,13[9]
2 x 1	7,46[15]	10,79[13]	12,31[17]	14,75[12]	17,17[5]
2 ⊗	8,42[5]	12,32[2]	14,73[2]	17,33[3]	18,03[3]
2 x 3	7,22[18]	11,04[10]	13,05[10]	15,33[8]	16,10[10]
2 x 4	8,40[6]	11,06[9]	12,99[11]	15,42[7]	17,10[6]
2 x 5	9,16[2]	12,29[3]	13,98[6]	15,20[9]	16,03[11]
2 x 6	7,78[12]	11,71[6]	13,78[7]	15,03[10]	15,47[14]
4 x 1	7,37[17]	9,94[19]	11,41[20]	12,19[23]	12,77[22]
4 x 2	7,40[16]	9,51[21]	10,85[23]	11,98[25]	12,57[24]
4 x 3	6,75[23]	9,60[20]	10,97[21]	13,70[20]	14,50[19]
4 ⊗	7,22[19]	10,50[17]	12,56[15]	14,47[15]	15,33[15]
4 x 5	8,15[8]	10,72[14]	12,77[14]	14,52[14]	15,93[12]
4 x 6	7,92[11]	10,55[16]	12,43[16]	13,93[19]	14,37[20]
5 x 1	8,08[9]	10,91[12]	12,89[13]	14,28[17]	14,93[17]
5 x 2	8,66[4]	11,83[5]	14,02[5]	15,88[6]	15,93[12]
5 x 3	7,11[22]	8,62[25]	10,93[22]	12,70[21]	13,60[21]
5 x 4	8,37[7]	10,48[18]	11,88[19]	13,97[18]	14,67[18]
5 ⊗	7,14[20]	9,28[23]	10,81[24]	12,35[22]	12,73[23]
5 x 6	8,93[3]	11,49[8]	13,07[9]	14,92[11]	16,17[8]
6 x 1	7,63[14]	11,00[11]	13,70[8]	16,55[4]	17,67[4]
6 x 2	7,65[13]	11,88[4]	15,33[1]	19,57[1]	20,90[1]
6 x 3	6,24[25]	9,14[24]	10,49[25]	12,12[24]	12,37[25]
6 x 4	8,05[10]	11,56[7]	14,05[4]	17,50[2]	20,37[2]
6 x 5	9,99[1]	13,14[1]	14,57[3]	16,15[5]	16,83[7]
6 ⊗	7,13[21]	10,57[15]	12,91[12]	14,35[16]	15,03[16]
DMS[1]	3,12	4,19	4,24	7,19	8,61

[1] Diferença mínima significativa a 5% de probabilidade, teste de Tukey.

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 28. Média do peso de raízes (kg/genótipo, total de cinco planta/genótipo) tratamentos (1) de cada parental sem seleção, com quatro níveis de seleção e classificação hierárquica entre colchetes.

Parental	s/sel.	50% sel.	25% sel.	10% sel.	5% sel.
1. Vass.	7,38[5]	10,30[5]	12,49[4]	14,50[4]	15,73[4]
2. BSC	8,01[2]	11,38[1]	13,22[2]	15,15[2]	16,37[2]
3. Santa	6,74[6]	9,48[6]	11,51[6]	13,71[6]	14,54[6]
4. Carapé	7,79[4]	10,53[4]	12,26[5]	14,56[3]	15,88[3]
5. Taquari	8,54[1]	11,02[3]	12,85[3]	14,46[5]	15,21[5]
6. Mico	7,94[3]	11,31[2]	13,32[1]	15,47[1]	16,54[1]
DMS(2)	0,85	1,14	1,53	1,95	2,35

(1) Valores referentes aos cinco cruzamentos participantes da análise dialélica.

(2) Diferença mínima significativa a 5% de probabilidade (teste de Scheffé).

Parental: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina

Tabela 29. Média do peso de raízes (kg/genótipo) dos cruzamentos dialélicos de seis parentais após quatro níveis de seleção. Média de três repetições e n genótipos por parcela, sendo $n = 10, 5, 2, 1$, respectivamente, para 50%, 25%, 10%, 5% de seleção.

	1	2	3	4	5	6	Média
..... 50% seleção							
1	-	10,79	9,35	9,94	10,91	11,00	10,30
2		-	11,04	11,06	12,29	11,71	11,38
3			-	9,60	8,62	9,14	9,48
4				-	10,48	11,56	10,53
5					-	13,14	11,02
6						-	11,31
Média geral = 10,71							
..... 25% seleção							
1	-	12,31	12,12	11,41	12,89	13,70	12,49
2		-	13,05	12,99	13,98	13,71	13,22
3			-	10,97	10,93	10,49	11,51
4				-	11,88	14,05	12,26
5					-	14,57	12,85
6						-	13,32
Média geral = 12,61							
..... 10% seleção							
1	-	14,75	14,72	12,19	14,28	16,55	14,50
2		-	15,33	15,42	15,20	15,03	15,15
3			-	13,70	12,70	12,12	13,71
4				-	13,97	17,50	14,56
5					-	16,15	14,46
6						-	15,47
Média geral = 14,64							
..... 5% seleção							
1	-	17,17	16,13	12,77	14,93	17,67	15,73
2		-	16,10	17,10	16,03	15,47	16,37
3			-	14,50	13,60	12,37	14,54
4				-	14,67	20,37	15,88
5					-	16,83	15,21
6						-	16,54
Média geral = 15,71							

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 30. Quadrados médios da análise da variância das capacidades de combinação geral e específica (CGC e CEC) e relação entre os efeitos, sem seleção e com quatro níveis de seleção, na produção de raízes.

FV	GL	QM	$\Sigma \hat{g}^2$	$\Sigma \hat{s}^2$ J	$\Sigma \hat{s}^2$ J / $\Sigma \hat{g}^2$
s/ seleção					
Cruzamentos	14	1,0124**	-	-	0
CGC	5	2,3637**	2,56	-	-
CEC	9	0,2616ns	-	-0,51	-
Resíduo	43	0,3181			
50% seleção					
Cruzamentos	14	1,5033*	-	-	0,24
CGC	5	3,0315**	3,07	-	-
CEC	9	0,6543ns	-	0,72	-
Resíduo	43	0,5740			
25% seleção					
Cruzamentos	14	1,6481ns	-	-	0
CGC	5	2,8204*	2,22	-	-
CEC	9	0,9967ns	-	-0,42	-
Resíduo	43	1,044			
10% seleção					
Cruzamentos	14	2,3754ns	-	-	8,03
CGC	5	2,3296ns	0,80	-	-
CEC	9	2,4019ns	-	6,38	-
Resíduo	43	1,6933			
5% seleção					
Cruzamentos	14	4,1978ns	-	-	15,18
CGC	5	3,4754ns	1,27	-	-
CEC	9	4,5991ns	-	19,27	-
Resíduo	43	2,4600			

ns - não significativo

* - significativo a 5% de probabilidade

** - significativo a 1% de probabilidade

Tabela 31. Estimativas da capacidade geral de combinação (g_i) sem seleção e com quatro níveis de seleção do peso de raízes de cada parental e classificações hierárquicas (entre colchetes).

Efeito	Sem Seleção	Nível de seleção			
		50%	25%	10%	5%
$\hat{g}_1$	-0,44[5]	-0,39[5]	-0,13[4]	-0,18[4]	0,03[4]
$\hat{g}_2$	0,35[2]	0,84[1]*	0,75[2]	0,63[2]	0,82[2]
$\hat{g}_3$	-1,24[6]**	-1,45[6]**	-1,37[6]**	-1,16[6]	-1,47[6]*
$\hat{g}_4$	0,07[4]	-0,23[4]	-0,44[5]	-0,11[3]	0,21[3]
$\hat{g}_5$	1,01[1]**	0,48[3]	0,30[3]	-0,22[5]	-0,63[5]
$\hat{g}_6$	0,25[3]	0,75[2]*	0,89[1]	1,04[1]	1,04[1]
$s(\hat{g}_i)$	0,26	0,35	0,47	0,59	0,72
Média ($\hat{\mu}$)	7,73	10,71	12,61	14,64	15,71
CV $\hat{g}_i$ (%)	9,92	8,15	6,67	5,22	5,94
Amplitude	2,25	2,29	2,26	2,20	2,51

** Diferente de zero segundo o teste t a 1% de probabilidade.

* Diferente de zero segundo o teste t a 5% de probabilidade.

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapê, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 32. Estimativas da capacidade específica de combinação ($\hat{\sigma}_{ij}$) sem seleção e com quatro níveis de seleção do peso de raízes de 15 cruzamentos e classificações hierárquicas (entre colchetes).

Efeito	Sem Seleção	Nível de seleção			
		50%	25%	10%	5%
$\hat{\sigma}_{12}$	-0,18[10]	-0,37[11]	-0,91[14]	-0,34[10]	0,61[6]
$\hat{\sigma}_{13}$	0,28[3]	0,48[4]	1,02[2]	1,42[2]	1,86[2]
$\hat{\sigma}_{14}$	0,03[8]	-0,15[9]	-0,63[13]	-2,16[14]*	-3,18[15]*
$\hat{\sigma}_{15}$	-0,22[11]	0,12[7]	0,11[8]	0,04[9]	-0,18[11]
$\hat{\sigma}_{16}$	0,09[6]	-0,07[8]	0,41[5]	1,05[4]	0,90[5]
$\hat{\sigma}_{23}$	0,43[2]	0,94[2]	1,06[1]	1,22[3]	1,03[3]
$\hat{\sigma}_{24}$	0,24[4]	-0,26[10]	0,07[9]	0,25[7]	0,35[7]
$\hat{\sigma}_{25}$	0,07[7]	0,27[6]	0,32[7]	0,15[8]	0,12[8]
$\hat{\sigma}_{26}$	-0,56[15]	-0,59[13]	-0,54[10]	-1,28[13]	-2,10[13]
$\hat{\sigma}_{34}$	0,19[5]	0,57[3]	0,17[6]	0,32[6]	0,04[9]
$\hat{\sigma}_{35}$	-0,39[12]	-1,11[15]	-0,61[12]	-0,56[12]	-0,02[10]
$\hat{\sigma}_{36}$	-0,51[14]	-0,87[14]	-1,63[15]*	-2,40[15]*	-2,91[14]*
$\hat{\sigma}_{45}$	-0,44[13]	-0,48[12]	-0,60[11]	-0,34[10]	-0,63[12]
$\hat{\sigma}_{46}$	-0,01[9]	0,32[5]	0,99[3]	1,93[1]	3,40[1]**
$\hat{\sigma}_{56}$	0,99[1]*	1,20[1]*	0,77[4]	0,70[5]	0,71[4]
$s(\hat{\sigma}_{ij})$	0,44	0,59	0,79	1,01	1,21
Média $\hat{\mu}$	7,73	10,71	12,61	14,64	15,71
CV(%)	5,31	6,06	6,36	8,50	10,94
Amplitude	1,55	2,31	2,69	4,33	6,58

* Diferente de zero a 5% de probabilidade (Teste t).

** Diferente de zero a 1% de probabilidade (Teste t).

Parentais: 1. Vassourinha, 2. BSC, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 33. Estimativa dos componentes das maiores e menores médias de produção de raízes (kg/genótipo, cada genótipo avaliado com cinco plantas) sem seleção e com quatro níveis de seleção

Cruza- mento	$\hat{Y}_{ij}$	$\hat{\mu}$	Maiores médias			Cruza- mento	$\hat{Y}_{ij}$	$\hat{\mu}$	Menores médias		
			$\hat{g}_i$	$\hat{g}_j$	$\hat{s}_{ij}$				$\hat{g}_i$	$\hat{g}_j$	$\hat{s}_{ij}$
Sem seleção											
5x6	9,99	7,73	1,01	0,25	0,99	3x6	6,24	7,73	-1,24	0,25	-0,51
2x5	9,16	7,73	0,35	1,01	0,07	1x3	6,33	7,73	-0,44	-1,24	0,26
2x4	8,40	7,73	0,35	0,07	0,24	3x5	7,11	7,73	-1,24	1,01	-0,39
50 % seleção											
5x6	13,14	10,71	0,48	0,75	1,20	3x5	8,62	10,71	-1,45	0,48	-1,11
2x5	12,29	10,71	0,48	0,84	0,25	3x6	9,14	10,71	-1,45	-0,75	-0,87
2x6	11,71	10,71	0,75	0,84	-0,59	1x3	9,35	10,71	-1,45	-0,39	0,48
25 % seleção											
5x6	14,57	12,61	0,89	0,30	0,77	3x6	10,49	12,61	-1,37	0,89	-1,63
4x6	14,05	12,61	0,89	-0,44	0,99	3x5	10,93	12,61	-1,37	0,30	-0,61
2x5	13,98	12,61	0,75	0,30	0,34	3x4	10,97	12,61	-1,37	-0,44	0,17
10 % seleção											
4x6	17,50	14,64	1,04	-0,11	1,93	3x6	12,12	14,64	-1,16	1,04	-2,40
5x6	16,15	14,64	1,04	-0,42	0,70	1x4	12,19	14,64	-0,11	-0,18	-2,16
2x4	15,42	14,64	0,63	-0,11	0,25	3x5	12,70	14,64	-1,16	-0,22	-0,56
5 % seleção											
4x6	20,37	15,71	0,21	1,04	3,40	3x6	12,37	15,71	-1,47	1,04	-2,91
1x6	17,67	15,71	0,03	1,04	0,90	1x4	12,77	15,71	0,03	0,21	-3,18
1x2	17,17	15,71	0,03	0,82	0,61	3x5	13,60	15,71	-1,47	-0,63	-0,04

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 34. Média e desvio padrão (dp) do peso de raízes (kg/genótipo), frequência de genótipos (%) com produção superior a 10kg e a 15kg e classificação hierárquica (entre colchetes) dos tratamentos(1).

Trat.		média	dp		> 10kg		> 15kg
1x3	[23]	7,56 ±	4,41	[19]	30,0	[8]	12,5
2x1	[12]	8,67 ±	4,69	[6]	42,5	[16]	7,5
2 ⊗	[3]	9,49 ±	5,25	[2]	45,0	[8]	12,5
2x3	[14]	8,52 ±	4,46	[2]	45,0	[14]	10,0
2x4	[2]	9,54 ±	4,27	[13]	35,0	[8]	12,5
2x5	[5]	9,44 ±	4,09	[6]	42,5	[2]	17,5
2x6	[20]	8,06 ±	4,76	[2]	45,0	[8]	12,5
4x1	[13]	8,60 ±	3,43	[11]	37,5	[16]	7,5
4x2	[18]	8,20 ±	2,48	[24]	25,0	[25]	0,0
4x3	[21]	7,97 ±	4,15	[16]	32,5	[16]	7,5
4 ⊗	[19]	8,08 ±	4,34	[9]	40,0	[8]	12,5
4x5	[16]	8,42 ±	3,29	[21]	27,5	[20]	5,0
4x6	[11]	8,68 ±	3,76	[16]	32,5	[8]	12,5
5x1	[10]	8,78 ±	3,20	[19]	30,0	[14]	10,0
5x2	[6]	9,34 ±	4,18	[6]	42,5	[2]	17,5
5x3	[24]	7,54 ±	3,07	[25]	20,0	[24]	2,5
5x4	[9]	9,01 ±	2,78	[9]	40,0	[20]	5,0
5 ⊗	[22]	7,72 ±	3,17	[25]	22,5	[25]	0,0
5x6	[7]	9,20 ±	3,42	[13]	35,0	[16]	7,5
6x1	[8]	9,07 ±	5,02	[13]	35,0	[2]	17,5
6x2	[15]	8,48 ±	5,53	[11]	37,5	[2]	17,5
6x3	[25]	7,47 ±	3,95	[21]	27,5	[20]	5,0
6x4	[3]	9,49 ±	4,86	[2]	45,0	[7]	15,0
6x5	[1]	10,47 ±	4,52	[1]	52,5	[1]	25,0
6 ⊗	[17]	8,29 ±	4,74	[16]	32,5	[2]	17,5

(1) Dados referentes às primeira e segunda repetições (40 genótipos).

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 35. Porcentagem média e classificação hierárquica (entre colchetes) da frequência de indivíduos com peso de raízes superior a 10kg/genótipo e 15kg/genótipo dos parentais [1].

Parental	> 10kg/genótipo		> 15kg/genótipo	
1. Vass.	[5]	35,00 $\pm$ 5,30	[4]	11,00 $\pm$ 4,18
2. BSC	[1]	42,00 $\pm$ 4,11	[2]	12,00 $\pm$ 3,71
3. Santa	[6]	31,00 $\pm$ 9,12	[6]	7,50 $\pm$ 3,95
4. Carapé	[3]	38,00 $\pm$ 4,81	[5]	9,50 $\pm$ 4,11
5. Taquari	[4]	37,00 $\pm$ 12,45	[2]	12,00 $\pm$ 9,25
6. Mico	[2]	41,00 $\pm$ 9,78	[1]	15,00 $\pm$ 7,29

(1) - Valores referentes aos cinco cruzamentos participantes da análise dialélica.

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina

Tabela 36. Média e classificação hierárquica (entre colchetes), variância genética (σ^2_g), herdabilidade no sentido amplo (h^2_A), coeficiente de variação genético (CV_g) e variância ambiental (σ^2_a) para peso de raízes.

Tratamento	média (kg/gen)	σ^2_g (kg/gen) ²	h^2_A %	CV_g %
1x3	7,56 [23]	14,68	75,4	50,7
2x1	8,67 [12]	13,84	74,2	42,9
2 ⊗	9,49 [3]	19,42	80,2	46,4
2x3	8,52 [14]	16,76	77,7	48,0
2x4	9,54 [2]	5,37	52,8	25,3
2x5	9,44 [5]	11,93	71,3	36,6
2x6	8,06 [20]	16,14	77,1	49,9
4x1	8,60 [13]	6,98	59,2	30,5
4x2	8,20 [18]	1,33	21,7	14,1
4x3	7,97 [21]	9,76	67,0	39,2
4 ⊗	8,08 [19]	14,06	74,6	46,4
4x5	8,42 [16]	6,03	55,7	29,2
4x6	8,68 [11]	9,34	66,0	35,2
5x1	8,78 [10]	5,46	53,2	30,0
5x2	9,34 [6]	12,65	72,5	38,1
5x3	7,54 [24]	4,60	48,9	28,4
5x4	9,01 [9]	2,91	37,7	18,9
5 ⊗	7,72 [22]	3,80	44,2	27,0
5x6	9,20 [7]	6,87	58,9	28,5
6x1	7,07 [8]	16,87	77,8	58,1
6x2	8,48 [15]	25,73	84,3	59,8
6x3	7,47 [25]	10,79	69,2	44,4
6x4	9,49 [3]	18,78	79,6	45,6
6x5	10,47 [1]	15,62	76,5	37,7
6 ⊗	8,29 [17]	15,68	76,6	47,8

Testemunha 7,01 $\sigma^2_a = 4,80$

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 37. Média, variância genética (σ^2_g), herdabilidade no sentido amplo (h^2_A), coeficiente de variação genético (CV_g) e variância ambiental (σ^2_a) para peso de parte aérea.

Tratamento	média [kg/gen]	σ^2_g [kg/gen] ²	h^2_A %	CV_g %
1x3	6,51	6,75	60,2	40,0
2x1	8,01	15,63	77,8	49,4
2 ⊗	11,23	41,77	90,4	57,6
2x3	10,62	23,65	51,2	45,8
2x4	10,40	16,97	79,2	39,6
2x5	10,99	19,60	81,5	40,3
2x6	7,50	10,84	70,8	43,9
4x1	6,22	7,38	48,2	43,7
4x2	8,40	16,19	78,3	47,7
4x3	9,16	25,84	85,3	55,5
4 ⊗	9,03	12,70	74,0	39,5
4x5	12,80	25,35	85,0	39,3
4x6	9,07	27,74	84,7	58,1
5x1	10,71	10,84	70,8	30,7
5x2	13,83	37,56	89,4	44,3
5x3	11,32	22,38	83,4	41,8
5x4	12,60	27,28	85,9	41,4
5 ⊗	10,72	8,23	64,9	26,8
5x6	13,68	28,17	86,3	38,8
6x1	6,85	18,03	80,2	62,0
6x2	8,67	24,39	84,5	57,0
6x3	9,40	24,16	84,4	52,3
6x4	9,80	19,32	81,2	44,9
6x5	14,04	29,39	86,8	38,6
6 ⊗	7,68	16,92	79,1	53,6
Testemunha	7,63	$\sigma^2_a = 4,46$		

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 38. Média, variância genética (σ^2_g), herdabilidade no sentido amplo (h^2_A), coeficiente de variação genético (CV_g) e variância ambiental (σ^2_a) para peso total.

Tratamento	média [kg/gen]	σ^2_g [kg/gen] ²	h^2_A %	CV_g %
1x3	14,08	34,97	32,9	42,0
2x1	16,68	52,96	75,6	43,2
2 ⊗	20,72	105,68	86,1	49,6
2x3	19,57	95,76	84,8	50,0
2x4	19,94	38,15	69,0	31,0
2x5	20,43	45,55	72,7	16,7
2x6	19,56	50,20	74,6	36,2
4x1	14,82	26,49	60,7	37,4
4x2	18,73	22,16	56,4	25,1
4x3	17,13	53,54	75,8	42,7
4 ⊗	17,11	48,34	78,3	40,6
4x5	12,22	50,04	75,4	77,9
4x6	17,75	55,64	75,6	42,0
5x1	14,51	23,33	57,7	33,3
5x2	23,18	78,56	82,1	38,2
5x3	18,86	41,15	70,6	34,0
5x4	21,62	35,44	67,4	27,5
5 ⊗	17,94	12,62	42,4	19,8
5x6	22,89	53,23	75,7	31,9
6x1	15,92	64,28	79,0	50,4
6x2	17,15	93,28	85,4	56,3
6x3	16,88	55,62	76,5	39,5
6x4	19,29	69,25	80,2	43,1
6x5	24,78	78,90	82,2	35,8
6 ⊗	15,97	57,82	77,2	47,6
Testemunha	14,44	$\sigma^2_a = 17,12$		

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 39. Média, variância genética (σ^2_g), herdabilidade no sentido amplo (h^2_A), coeficiente de variação genético (CV_g) e variância ambiental (σ^2_a) para índice de colheita.

Tratamento	média [%]	σ^2_g [%] ²	h^2_A %	CV_g %
1x3	53,50	93,33	82,1	18,1
2x1	53,36	39,39	65,9	11,7
2 ⊗	47,65	61,86	75,2	16,5
2x3	44,50	32,40	61,4	12,8
2x4	48,08	48,71	70,5	14,5
2x5	46,38	99,88	83,1	21,5
2x6	50,86	52,23	71,9	14,2
4x1	59,06	24,01	54,1	8,3
4x2	44,75	43,28	68,0	14,7
4x3	47,73	20,60	50,3	9,5
4 ⊗	45,68	51,38	71,6	15,7
4x5	40,57	38,01	65,1	15,2
4x6	51,26	78,81	79,5	17,3
5x1	45,10	46,47	69,5	15,1
5x2	40,20	85,71	80,8	23,0
5x3	40,82	27,43	57,4	12,8
5x4	42,82	56,15	73,4	17,5
5 ⊗	42,93	58,36	76,3	17,8
5x6	41,07	36,48	64,2	14,7
6x1	58,98	32,04	61,1	9,6
6x2	48,20	155,62	88,4	25,9
6x3	45,00	114,94	84,9	23,8
6x4	48,41	52,37	72,0	14,9
6x5	43,24	23,79	53,9	11,3
6 ⊗	52,29	39,22	65,8	12,0
Testemunha	48,44	$\sigma^2_a = 20,37$		

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 40. Média, variância genética (σ^2_g), herdabilidade no sentido amplo (h^2_A), coeficiente de variação genético (CV_g) e variância ambiental (σ^2_a) para número de raízes.

Tratamento	média ($\bar{x}$)	σ^2_g [$\bar{x}/p$] ²	h^2_A %	CV_g %
1x3	10,21	9,94	85,9	30,9
2x1	9,31	8,81	88,3	31,9
2 ⊗	9,13	9,47	89,0	33,7
2x3	9,08	7,93	87,1	31,0
2x4	8,41	6,13	84,0	29,4
2x5	9,15	3,40	74,4	20,2
2x6	6,74	4,91	80,8	32,9
4x1	9,04	4,56	85,7	23,6
4x2	9,41	7,77	86,9	29,6
4x3	9,41	11,36	9,07	35,8
4 ⊗	8,56	9,01	88,5	35,1
4x5	10,28	3,74	76,2	18,8
4x6	8,86	7,66	86,7	31,2
5x1	10,52	5,77	83,1	22,8
5x2	9,70	6,17	84,1	25,6
5x3	9,51	2,75	70,2	17,4
5x4	10,99	7,62	86,7	25,1
5 ⊗	10,01	8,98	88,5	29,9
5x6	10,37	17,96	93,9	40,9
6x1	8,47	8,27	87,6	34,0
6x2	7,87	8,06	87,3	36,1
6x3	8,23	6,15	84,0	30,1
6x4	9,24	5,58	82,7	25,6
6x5	10,19	7,96	87,2	27,7
6 ⊗	7,39	14,98	92,7	52,1
Testemunha	5,12	$\sigma^2_a = 1,77$		

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico

Tabela 41. Progresso genético (ΔG_S , porcentagens em relação a média) e estimativa da média (kg/genótipo, genótipo com total de cinco plantas) para peso de raízes com 10% e 25% de seleção(1)

Tratamento	25%		10%	
	ΔG_S (%)	Média Estimada	ΔG_S (%)	Média Estimada
1x3	61,48	12,23	88,96	14,29
2x1	45,19	12,60	67,01	14,50
2 ⊗	53,41	14,56	79,52	17,04
2x3	46,60	12,49	67,12	14,24
2x4	29,28	12,33	45,44	13,87
2x5	37,54	12,98	47,13	13,89
2x6	56,53	12,62	64,47	13,26
4x1	30,77	11,25	37,17	11,80
4x2	7,65	8,83	10,06	9,02
4x3	39,26	11,10	63,13	13,00
4 ⊗	53,83	12,43	73,12	13,99
4x5	29,10	10,87	43,53	12,09
4x6	38,70	12,04	48,06	12,85
5x1	22,78	10,78	28,90	11,32
5x2	43,48	13,40	57,49	14,71
5x3	25,49	9,46	41,57	10,67
5x4	13,39	10,22	19,41	10,76
5 ⊗	23,13	9,21	26,11	9,44
5x6	26,57	11,64	39,05	12,79
6x1	56,78	14,22	84,75	16,76
6x2	73,07	14,68	108,06	17,64
6x3	43,54	10,72	59,84	11,94
6x4	85,60	13,91	100,00	14,98
6x5	42,62	14,54	49,90	15,69
6 ⊗	60,52	13,31	71,24	14,20

(1) Seleção massal extratificada considerando-se cada parcela um extrato com 20 genótipos e cinco plantas por genótipo.

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 42. Correlação fenotípica (rf) e genética (rg) dentro de cada tratamento entre peso de raízes (PR) com peso total (PT), peso de parte aérea (PA), índice de colheita (IC) e número de raízes (NR).

Tratamento	PRxPT		PRxPA		PRxIC		PRxNR	
	rf	rg	rf	rg	rf	rg	rf	rg
1 x 3	0,95	0,95	0,72	0,67	0,38	0,36	0,21	0,13
2 x 1	0,97	0,97	0,81	0,79	0,00	-0,19	0,34	0,26
2 x 3	0,92	0,92	0,78	0,78	-0,09	-0,25	0,67	0,68
2 x 4	0,95	0,95	0,69	0,65	0,04	-0,13	0,27	0,20
2 x 5	0,90	0,87	0,82	0,84	0,39	0,58	0,49	0,48
2 x 6	0,85	0,81	0,55	0,42	0,48	0,50	0,15	-0,01
4 x 1	0,97	0,97	0,87	0,87	0,52	0,71	0,46	0,42
4 x 2	0,96	0,91	0,85	0,83	-0,67	-0,56	0,67	0,71
4 x 3	0,80	0,67	0,56	0,48	0,15	-0,19	0,52	0,75
4 x 5	0,91	0,90	0,87	0,90	0,09	-0,16	0,39	0,35
4 x 6	0,96	0,95	0,82	0,77	0,55	0,59	0,66	0,68
5 x 1	0,89	0,88	0,74	0,75	0,15	0,03	0,43	0,36
5 x 2	0,90	0,88	0,82	0,70	-0,08	-0,27	0,61	0,63
5 x 3	0,87	0,79	0,62	0,44	0,45	0,47	0,37	0,32
5 x 4	0,87	0,85	0,67	0,65	0,45	0,46	0,52	0,50
5 x 5	0,87	0,85	0,69	0,69	0,18	-0,06	0,46	0,37
5 x 6	0,71	0,54	0,42	0,28	0,34	0,31	0,43	0,44
6 x 1	0,81	0,60	0,40	0,07	0,65	0,84	0,30	0,23
6 x 2	0,86	0,83	0,67	0,65	0,15	-0,03	0,46	0,48
6 x 3	0,96	0,96	0,64	0,57	-0,06	-0,28	0,41	0,39
6 x 4	0,96	0,95	0,78	0,78	0,51	0,52	0,54	0,53
6 x 5	0,89	0,86	0,71	0,68	0,36	0,34	0,47	0,43
6 x 6	0,95	0,95	0,81	0,80	0,41	0,35	0,68	0,70
6 x 7	0,93	0,93	0,79	0,79	0,38	0,37	0,56	0,55
6 x 8	0,89	0,87	0,79	0,77	0,16	0,04	0,36	0,33

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina, 3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari, 6. Mico.

Tabela 43. Progresso genético (ΔG_s , porcentagem em relação à média) e estimativa da média do peso da parte aérea (PA), índice de colheita (IC) e número de raízes (NR) após 25% de seleção praticada no peso de raízes

Tratamento	PA		IC		NR	
	ΔG_s (%)	Média Estimada (kg/gen)	ΔG_s (%)	Média Estimada (%)	ΔG_s (%)	Média Estimada (nº/pl)
1x3	32,57	8,63	7,89	57,72	5,00	10,72
2x1	37,83	11,31	-2,36	52,10	8,92	10,14
2 ⊗	51,47	17,01	-4,68	45,42	26,51	11,55
2x3	28,81	13,68	-1,66	43,76	5,95	9,62
2x4	40,00	14,56	10,09	52,93	17,24	9,86
2x5	18,65	13,04	11,04	51,42	0,00	9,15
2x6	43,33	10,75	8,45	55,37	15,88	7,81
4x1	36,50	8,49	-4,61	56,34	17,04	10,58
4x2	13,10	9,50	-1,47	44,09	12,86	10,62
4x1	49,67	13,71	-1,51	70,01	12,65	10,60
4 ⊗	36,54	12,33	10,66	50,55	27,69	10,93
4x5	29,06	16,52	4,40	40,75	6,81	10,44
4x6	42,45	12,92	-5,17	48,61	21,56	10,80
5x1	11,67	11,96	6,08	47,84	6,37	11,19
5x2	31,53	18,19	11,59	44,86	14,33	11,09
5x3	25,97	14,26	-0,69	40,54	5,99	10,08
5x4	8,33	13,65	3,83	44,46	7,83	11,85
5 ⊗	0,00	10,81	13,72	48,82	6,29	10,64
5x6	23,39	16,88	-0,39	40,91	18,42	12,28
6x1	44,67	9,91	-3,41	56,97	16,65	9,88
6x2	52,71	13,24	16,33	56,07	23,51	9,72
6x3	35,43	12,73	8,31	48,74	13,12	9,31
6x4	39,90	13,71	8,78	52,66	20,02	11,09
6x5	33,40	18,43	4,30	45,10	15,90	11,81
6 ⊗	52,08	11,68	0,67	52,64	21,52	8,98

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 44. Progresso genético (ΔG_s , porcentagem em relação à média) e estimativa da média do peso da parte aérea (PA), Índice de colheita (IC) e número de raízes (NR) após 10% de seleção praticada no peso de raízes

Tratamento	PA		IC		NR	
	ΔG_s (%)	Média Estimada (kg/gen)	ΔG_s (%)	Média Estimada (%)	ΔG_s (%)	Média Estimada (nº/pl)
1x3	46,85	9,56	11,36	59,58	6,84	10,94
2x1	61,05	12,90	-3,50	51,49	13,21	10,54
2 x	76,67	19,84	-6,99	44,32	39,54	12,92
2x3	38,04	15,02	-2,36	43,45	8,48	10,08
2x4	62,12	16,86	15,64	55,60	29,96	10,66
2x5	23,48	13,59	13,86	52,76	0,00	9,15
2x6	49,33	11,20	9,63	56,00	18,10	7,96
4x1	44,05	8,96	-5,57	55,77	20,58	10,90
4x2	21,43	10,20	-1,94	43,88	16,05	10,92
4x3	79,91	16,48	-2,43	46,57	20,30	11,32
4 x	49,72	13,52	14,49	52,30	37,62	11,78
4x5	43,83	18,41	6,70	40,84	10,31	11,34
4x6	52,70	13,85	-6,42	47,92	27,09	11,26
5x1	14,85	12,30	7,72	48,58	12,64	11,85
5x2	41,65	19,59	15,35	46,37	18,87	11,53
5x3	42,05	16,08	-1,10	40,37	9,67	10,43
5x4	12,06	14,12	5,56	45,20	11,37	12,24
5 x	0,01	10,73	15,49	49,58	7,09	10,72
5x6	34,36	18,38	-0,58	40,83	27,10	13,18
6x1	66,72	11,42	-5,09	55,98	24,79	10,57
6x2	77,97	15,43	23,57	59,83	34,69	10,06
6x3	48,62	13,97	11,18	50,03	17,98	9,71
6x4	61,94	15,87	10,25	53,37	31,06	12,11
6x5	40,10	19,67	5,53	45,63	20,31	12,26
6 x	61,33	12,39	0,78	52,70	25,30	9,26

Parentais: 1. Vassourinha, 2. Branca de Santa Catarina,
3. Santa, 4. Carapé, 5. Taquari e 6. Mico.

Tabela 45. Avaliação das principais características de cada cruzamento, autofecundação e parental.

Tratamento	Fertilidade feminina(1)	Resistência à bacteriose(2)	Produção de raízes(3)	cc(4)	Genótipos superiores(5)	IC(6)	Nº de raízes(7)
1 x 3	12,9	30,0	12,12	1,02	30,0	65	45
2 x 1	16,9	17,3	12,31	-0,91	42,5	70	40
2 @	7,6	30,0	14,73	-	45,0	45	50
2 x 3	53,2	26,5	13,05	1,06	45,0	15	50
2 x 4	34,1	56,6	12,99	0,07	35,0	50	80
2 x 5	43,0	48,8	13,98	0,32	42,5	35	65
2 x 6	136,5	34,5	13,78	-0,54	45,0	80	70
4 x 1	31,3	40,0	11,41	-0,63	37,5	80	50
4 x 2	24,5	56,6	10,85	0,07	25,0	25	40
4 x 3	27,6	65,5	10,97	0,17	32,5	50	40
4 @	55,3	71,1	12,56	-	40,0	45	50
4 x 5	127,8	71,1	12,77	-0,60	27,5	20	35
4 x 6	118,7	47,3	12,43	0,99	32,5	45	55
5 x 1	36,7	44,4	12,89	0,11	30,0	55	30
5 x 2	41,7	48,8	14,02	0,32	42,5	30	35
5 x 3	64,6	56,8	10,93	-0,61	20,0	5	40
5 x 4	101,3	71,1	11,88	-0,60	40,0	25	15
5 @	189,1	76,2	10,81	-	22,5	45	30
5 x 6	232,5	68,8	13,07	0,77	35,0	20	35
6 x 1	31,8	30,5	13,77	0,41	35,0	80	45
6 x 2	37,7	34,5	15,33	-0,54	37,5	75	35
6 x 3	27,1	59,3	10,49	-1,63	27,5	50	70
6 x 4	55,7	47,3	14,05	0,99	45,0	55	30
6 x 5	76,7	65,8	14,57	0,77	52,5	20	15
6 @	181,1	36,7	12,91	-	32,5	65	70
1. Vass.	9,3	28,0	12,49	-0,13	35,0	70	42
2. BSC	67,2	30,1	13,22	0,75	42,0	48	52
3. Santa	2,7	43,6	11,51	-1,37	31,0	37	49
4. Carapé	61,0	50,1	12,26	-0,44	38,0	44	43
5. Taquari	110,1	51,8	12,85	0,30	37,0	26	34
6. Mico	57,0	41,5	13,32	0,89	41,0	53	44
7. Cigana	16,0	16,1	-	-	-	-	-

(1) - Número de sementes botânicas/planta.

(2) - Porcentagem de indivíduos com nota 1 (1-resistente, 4-suscetível).

(3) - Média (kg/genótipo) dos 5 genótipos com maior peso de raízes.

(4) - Capacidade de combinação pós seleção, avaliada com os 5 melhores genótipos.

(5) - Frequência de genótipos (%) com peso de raízes superior a 10 kg/genótipo.

(6) - Frequência de genótipos (%) com IC > 50% entre os dez genótipos com maior peso de raízes.

(7) - Frequência de genótipos (%) com 6 a 10 raízes/planta entre os dez genótipos com maior peso de raízes.

Obs: Cada genótipo avaliado com cinco plantas.