OBTENÇÃO E FUSÃO DE PROTOPLASTOS EM
Metarhizium anisopliae (METSCH.) SOROKIN

WANDERLEY DIAS DA SILVEIRA

Prof. Dr. JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO

- Orientador -

Dissertação apresentada à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em Agronomia. Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas.

PIRACICABA
Estado de São Paulo - Brasil
Dezembro 1982

Aos meus pais, irmãos
e à minha noiva e
família,

DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos aqueles que contribuíram para a realização desse trabalho e, em especial:

- . Ao mestre e amigo Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo, que, como modelo de pessoa, orientação, estímulo e dedicação possibilitou-me a realização deste trabalho.
- . À Profª Drª Aline Aparecida P. Kleiner, pela orientação inicial e amizade.
- . Ao prof. Dr. Felizardo Penalva da Silva, pela amizade, estímulo, apoio e conhecimentos transmitidos.
- . Ao Prof. Dr. Manoel Vitor Franco Lemos, pela primeira chance de contato com a Genética de Microrganismos.
- . Ao Prof. Spartaco Astolfi Filho, pelo estímulo e apoio.
- . Ao amigo Nuno M. Chacel, pela realização de parte do trabalho fotográfico, pela concessão da linhagem Manaus e companheirismo constante.
- . Ao Prof. Mário Pederneiras, pela revisão dos originais.
- . Ao Departamento de Genética, na pessoa de seu Diretor, Dr. Ernesto Paterniani, pelas facilidades iniciais concedidas.
- . Ao Laboratório de Genética e Evolução da Universidade de Brasília, na pessoa do Chefe de Departamento do Instituto de Biologia Animal, pelo apoio material e humano sem os quais este trabalho não seria possível.

- . Ao amigo Paulo Eduardo Moretti, pela convivência.
- . Aos técnicos dos Laboratórios de Genética da ESALQ/USP e Genética e Evolução da UnB.
- . Aos amigos do Laboratório de Genética e Evolução da UnB, Elza Luna, Maria de Fátima Alves, Elaine Santos, Leide Rovênia, Petrônio Timo, Walter Cêzar, Gláucia, Pedro, Ornil, Rose e Pituka, pela amizade e auxílio.
- . À Adriana, pela amizade, amor, compreensão e estímulo.
- . Aos meus pais Djalma e Irene, pela confiança e tranquilidade que demonstraram ao longo deste "caminho".

ÍNDICE

	Página
LISTA DE TABELAS	xi
LISTA DE FIGURAS	xiii
RESUMO	xv
SUMMARY	xvii
1. INTRODUÇÃO	1
2. REVISÃO DE LITERATURA	4
2.1. O fungo <i>Metarhizium anisopliae</i>	4
2.1.1. Classificação e Descrição	4
2.2. Isolamento e Caracterização de Mutantes	7
2.3. O Ciclo Parassexual	16
2.4. Protoplastos	23
2.4.1. Isolamento	23
2.4.2. Fusão	32
3. MATERIAL E MÉTODOS	41
3.1. Linhagens utilizadas	41
3.2. Meios de Cultura e soluções utilizadas	41
3.2.1. Meio mínimo (MM)	41
3.2.2. Meio completo (MC)	42
3.2.3. Meio mínimo líquido	42
3.2.4. Meio completo líquido	43
3.2.5. Meio mínimo mais 2% de Meio completo e meio mínimo mais 4% de Meio completo.....	43
3.2.6. Meio completo 2 vezes concentrado	43
3.2.7. Meio mínimo 2 vezes concentrado	43

	Página
3.2.8.Meio mínimo líquido para enriquecimento..	44
3.2.9.Meio para crescimento de micélio	44
3.2.10.MMKCl para reversão e obtenção de produ- tos de fusão	44
3.2.11.MCKCl para obtenção de crescimento de <u>cé</u> lulas totais	44
3.2.12.Solução de vitaminas	45
3.2.13.Solução de ácido nucleico de leveduras .	45
3.2.14.Suplementos adicionados ao meio mínimo..	46
3.2.15.Solução Salina	47
3.2.16.Solução de Tween	47
3.2.17.Solução de Caseína Hidrolisada	47
3.2.18.Solução de Albumina 5%	47
3.2.19.Solução de Cloroneb	48
3.2.20.Tampão fosfato pH 5,8	48
3.2.21.Tampão fosfato pH 6,9	49
3.2.22.Tampão Lítio-Borato pH 8,3	49
3.2.23.Tampão Tris-Citrato pH 8,3	49
3.2.24. α -Naftilacetato	50
3.2.25. β -Naftilacetato	50
3.2.26.Solução para revelação de esterases	50
3.2.27.Solução de persulfato de amônia (AP) ..	50
3.2.28.Solução de Álcool Etílico	50
3.2.29.Solução de Giemsa	51
3.2.30.Solução de Fixação	51

	Página
3.2.31. Solução de KCL 1,4 M pH 5,8	51
3.2.32. Solução de KCL 0,7 M pH 5,8	52
3.2.33. Solução de PEG	52
3.2.34. Solução de enzimas para produção de pro- toplastos	53
3.2.35. Solução de Difenilamina	53
3.2.36. Solução de ácido perclórico	53
3.2.37. Solução 5 mM NaOH	53
3.2.38. Solução estoque de DNA	54
3.2.39. Gel de acrilamida	54
3.2.40. Sistema de filtro para técnica de enri- quecimento	54
3.2.41. Filtros Buchner para micélio	54
3.2.42. Uso de palitos para transferência de co- lônias	55
3.2.43. Esterilização e incubação	55
3.3. Sobrevivência à luz ultra-violeta	55
3.3.1. Determinação do tempo de enriquecimento por filtração para obtenção de mutantes auxotróficos	56
3.3.2. Obtenção de mutantes morfológicos	57
3.3.3. Obtenção de mutantes auxotróficos	58
3.3.4. Teste de Reversão	59
3.3.5. Determinação do tempo para produção de protoplas- tos	59
3.3.5.1. Produção de Protoplastos	60

	Página
3.3.6. Contagem de protoplastos	61
3.3.7. Fusão de protoplastos	61
3.3.8. Verificação da presença de hifas, esfero- plastos e conídios na suspensão de proto- plastos	62
3.3.9. Teste de reversão em protoplastos	62
3.3.10.Obtenção de heterocários	63
3.3.10.1.Fusão de Protoplastos	63
3.3.10.2.Frequencia de fusão de protoplas- tos	63
3.3.10.3.Análise de setores oriundos de colônias obtidas em fusão de pro- toplastos	63
3.3.10.4.Obtenção de heterocário pela me- todologia clássica	64
3.3.10.5.Obtenção de diplóides	65
3.3.10.6.Haploidização de diplóides	65
3.4. Coloração de conídios	65
3.4.1. Medida do tamanho dos conídios	66
3.4.2. Determinação do número de núcleos por coní- dio	66
3.5. Determinação dos padrões de esterases	67
3.5.1. Preparação das amostras	67
3.5.2. Placa de gel de acrilamida	67
3.5.3. Aplicação das amostras e corrida de eletro- forese	68

	Página
3.5.4. Revelação das esterases e plastificação do gel.	69
3.6. Extração e dosagem de DNA	69
4. RESULTADOS	71
4.1. Sobrevivência à Luz ultra-violeta	71
4.2. Determinação do tempo de enriquecimento por filtração e obtenção de mutantes auxotróficos	76
4.3. Teste de reversão	82
4.4. Produção de protoplastos	83
4.5. Obtenção de heterocários	86
4.5.1. Metodologia clássica	86
4.5.1.2. Obtenção de diplóides e segregação	87
4.5.1.3. Análise da variabilidade genética das linhagens selvagens, mutantes e setores	92
4.5.1.4. Tamanho dos conídios e conteúdo de DNA por conídio das linhagens selvagens, mutantes e setores..	92
4.5.2. Fusão de Protoplastos	96
5. DISCUSSÃO	105
5.1. Indução de mutação com luz UV e obtenção de mutantes auxotróficos	105
5.2. Ciclo parassexual	107

	Página
5.2.1. Análise clássica	87
5.2.2. Produção e fusão de protoplastos	110
5.2.3. Análise genética dos cruzamentos realiza dos	113
6. CONCLUSÃO	115
7. LITERATURA CITADA	118

LISTA DE TABELAS

		Página
Tabela		
1	Número e porcentagem relativa de conídios sobre vivos a luz ultra-violeta do isolado selva - gem E ₆	72
2	Número e porcentagem relativa de conídios sobre vivos a luz ultra-violeta do isolado selvagem RJ-3	73
3	Porcentagem relativa no número de colônias mutan tes e selvagens dos isolados E ₆ e RJ-3 para os diferentes tempos de agitação após filtração ...	78
4	Mutantes obtidos com a técnica de enriquecimento por filtração	78
5	Mutantes obtidos nos isolados E ₆ e RJ-3 através de irradiação com luz ultravioleta	81
6.	Frequência de reversão espontânea dos mutantes u tilizados	82
7.	Número de protoplastos produzidos em diferentes tempos de tratamento com o complexo lítico	83
8.	Cruzamentos realizados para obtenção de heteroca riose em <i>M. anisopliae</i>	88
9.	Diâmetro de conídios, número de núcleos por co nídio e conteúdo de DNA por conídio das linha - gens selvagens e cruzamentos a partir dos mutan tes obtidos a partir das primeiras	95

10. Frequência de reversão dos protoplastos utilizados para fusão, cruzamentos realizados e frequência de fusão para cada cruzamento.	99
11. Segregantes obtidos nas diferentes fusões de protoplastos em <i>M. anisopliae</i>	104

LÍSTA DE FIGURAS

Figura		Página
1	Curva de sobrevivência do isolado E ₆ de <i>M.anisopliae</i> com luz ultra violeta ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{seg}$)	74
2	Curva de sobrevivência do isolado RJ-3 de <i>M.anisopliae</i> com luz ultra-violeta ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{seg.}$)	75
3	Esquema seguido para enriquecimento e obtenção de mutantes morfológicos e auxotróficos	73
4	Porcentagem relativa entre colônias auxotróficas e prototróficas por tempo de cultivo em MM do isolado E ₆	79
5	Porcentagem relativa entre colônias auxotróficas e prototróficas do tempo de cultivo em MM do isolado RJ-3	80
6	Produção de protoplastos dos isolados E ₆ e RJ-3 em diferentes tempos de tratamento frente ao complexo lítico	84
7	Protoplastos produzidos a partir de micélio de <i>M.anisopliae</i> tratado com complexo lítico, podendo-se observar a presença de esferoplastos e hifas (Aumento de 400X).....	85
8	Colônias heterocarióticas obtidas nos cruzamentos (Metodologia clássica) dentro do isolado E ₆ de <i>M. anisopliae</i>	89

9	Películas heterocarióticas resultantes do cruzamento (metodologia clássica) entre mutantes dos isolados E_6 e RJ-3 de <i>M.anisopliae</i>	90
10	Película heterocariótica apresentando "setores vigorosos" já em MM (cruzamentos: $E_6 \times E_6$, $E_6 \times$ RJ-3).....	91
11	Eletroforese em Gel de poliacríamida. Padrões de esterases (α e β) das linhagens envolvidas no experimento.....	93
12	Esquema obtido a partir dos padrões de esterase da figura 11.....	94
13	Esquema da metodologia utilizada para fusão de protoplastos em <i>M. anisopliae</i>	98
14 a.b.	Desenvolvimento de colônias heterocarióticas em MM provenientes da fusão de protoplastos entre isolados de <i>M.anisopliae</i> (cruzamentos: $E_6 \times E_6$, $E_6 \times$ RJ-3).....	100
15-16	Desenvolvimento de colônias oriundas de fusão de protoplastos em MC entre isolados de <i>M. anisopliae</i> (cruzamentos: $E_6 \times E_6$, $E_6 \times$ RJ-3).....	101
17	Placa mestra utilizada para repique em meios de cultura diferenciais, mostrando colônias obtidas de setores em MC (Disposição 5 x 5 + 1).....	102
18	Colônias de <i>M.anisopliae</i> provenientes de fusão de protoplastos e apresentando desenvolvimento de coloração verde entre as mesmas (Fusão $E_6 \times E_6$).....	103

OBTENÇÃO E FUSÃO DE PROTOPLASTOS EM
Metarhizium anisopliae (METSCH.) SOROKIN

WANDERLEY DIAS DA SILVEIRA

- Autor -

JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO

Orientador -

RESUMO

O presente trabalho foi conduzido com a finalidade de se estudar a possibilidade de obtenção do ciclo parassexual no fungo *Metarhizium anisopliae*, dentro e entre duas linhagens designadas E₆ e RJ-3 que se diferenciam em várias características genéticas seja através de metodologia clássica ou através da fusão de protoplastos. Para isso, obtiveram-se mutantes morfológicos e auxotróficos induzidos por luz ultravioleta. Desenvolveu-se também uma técnica de enriquecimento por filtração para obtenção de mutantes auxotróficos, conseguindo-se um máximo de 6,13% de mutantes após crescimento em meio líquido por períodos intercalados de 20-24 horas e subsequente filtração em cinco camadas de gaze esterilizada. O au

mento de mutantes obtidos em relação ao processo de isolamento total foi de 613 X prevalecendo a obtenção de mutantes auxotróficos para aminoácidos e ácido nucléico sobre os deficientes para vitaminas. Produção de heterocário foi obtida entre mutantes auxotróficos complementares da linhagem E₆, porém, não se logrou chegar ao estado diplóide. Com relação a heterocários entre mutantes auxotróficos das linhagens E₆ e RJ-3, com raras exceções, estes não foram obtidos. Os heterocários que se desenvolveram entre estas linhagens produziram setores que, através da medida da quantidade de DNA por conteúdo e padrão eletroforético de esterases, mostraram-se ser diplóides e hiper-haplóides. A produção média de protoplastos em cada linhagem foi de $0,9 \times 10^7/\text{ml}$ para a linhagem E₆ e $1,33 \times 10^7/\text{ml}$ para a linhagem RJ-3 após 2 horas e meia a 3 horas de tratamento frente ao complexo lítico. A técnica de fusão de protoplastos entre os mutantes auxotróficos e morfológicos envolvidos, ocorre com uma alta frequência ($0,83 \cdot 10^{-5}$ - $44,1 \cdot 10^{-5}$) e demonstrou que o estado heterocariótico é obtido, tanto nos cruzamentos dentro de linhagens como entre linhagens, ocorrendo recombinação e segregação, sem a obtenção do estado diplóide. Desse modo, a técnica de fusão de protoplastos constitui uma maneira viável para a obtenção de recombinação e variabilidade entre linhagens de *M. anisopliae* que sejam incapazes de apresentarem recombinação via metodologia clássica de ciclo parassexual, bem como abre a possibilidade de futuros estudos genéticos na referida espécie.

OBTAINMENT AND FUSION OF PROTOPLASTS IN
Metarhizium anisopliae (METSCH.) SOROKIN

WANDERLEY DIAS DA SILVEIRA

- Author -

JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO

- Adviser -

SUMMARY

The present work was carried out aiming the study of parasexuality in the fungus *Metarhizium anisopliae* using two different strains designated E₆ and RJ-3 which have several distinct genetic characteristics. This was done by the classical processes and protoplast fusion. For this morphological and auxotrophic mutants were obtained after ultra-violet induction. Also a technique of enrichment by filtration was developed for auxotrophic mutants derivation. A maximum total of 6.13% mutants after growth by intercalated periods of 20-24 hours in liquid medium and filtration. An increase of 613 X in relation of the total isolation method was obtained in this way most in relation to mutants which required amino-acids. Heterokaryon were produced between complementing aux-

otrophic and morphological mutants from strain E₆ but diploids were not produced. In relation to heterokaryon and auxotrophic mutants from E₆ x RJ₃, with rare exceptions heterokaryon were not produced. However, the rare heterokaryon produced sectors which were diploids and hyperhaploids after being tested by their DNA content and electrophoresis. Protoplast production was $0.9 \times 10^7/\text{ml}$ for strain E₆ and $1.33 \times 10^7/\text{ml}$ for strain RJ-3 after 2.1/2 to 3 hours treatment by a lytic complex. The fusion protoplast technique has shown that heterokaryon were obtained in all crosses, with the occurrence of recombination and segregation without the diploid state. The protoplast fusion technique is in this way appropriated for the derivation of recombinants and to increase variability among strains of *M. anisopliae*.

1. INTRODUÇÃO

O fungo entomopatogênico *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorokin, assume grande importância econômica no Brasil, pois é utilizado no controle de pragas das pastagens e cana-de-açúcar. Estas pragas (cigarrinhas), insetos da ordem Homoptera, família Cercopidae, atacam as culturas acima descritas e constituem-se em um dos sérios problemas para a Agricultura e especialmente para a pecuária em diversas regiões do país.

O estudo do ponto de vista genético neste fungo, portanto, reveste-se de importância primordial, pois é através dele que vai ser possível o melhoramento genético do mesmo incluindo, por exemplo, a combinação em uma única linhagem de características consideradas favoráveis no controle biológico, tais como produção de exoenzimas, patogenicidade, grau de infectividade, produção de conídios, velocidade de

crescimento, resistência a altas temperaturas e radiações. Além disso, o uso de linhagens melhoradas vai permitir a redução do uso de inseticidas, que entre tantas desvantagens propiciam o aparecimento de insetos resistentes, são dispendiosos quando aplicados em larga escala, destroem o equilíbrio ecológico, e são, em geral, altamente tóxicos.

O *M. anisopliae* contudo, sendo um Deuteromyceto, é desprovido de ciclo sexual e assim a recombinação genética é obtida apenas pelo ciclo parassexual recentemente determinado por MESSIAS e AZEVEDO em 1980. Este ciclo é dependente de processos como a fusão de hifas para obtenção de heterocário, a fusão de núcleos levando em geral a um estado diploide e obtenção de recombinação via permuta mitótica e não disjunção. É importante então um estudo mais aprofundado desse ciclo, por exemplo, em outras linhagens além daquela onde o mesmo foi descrito. A determinação do ciclo parassexual dentro e entre outras linhagens de *M. anisopliae* ainda não estudadas geneticamente, permitirá que programas de melhoramento genético sejam feitos objetivando-se reunir em uma única linhagem características desejáveis existentes em inúmeras outras. Permitirá também verificar a possibilidade de cruzamento entre diferentes linhagens pelo processo parassexual clássico e pela técnica moderna que envolve fusão de protoplastos.

O presente trabalho terá então como objetivo o estudo de duas linhagens de *M. anisopliae* ainda não pesquisadas com relação aos diversos aspectos de sua

parassexualidade. Para isso, técnicas de enriquecimento para obtenção de mutantes auxotróficos nas mesmas serão pesquisadas, bem como serão tentados cruzamentos entre e dentro dessas linhagens pelo processo clássico e pela fusão de protoplastos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. O FUNGO *Metarhizium anisopliae*

2.1.1. CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO

O fungo *Metarhizium anisopliae* é um Deuteromiceto pertencente à ordem Moniliales, família Monileaceae e foi descrito pela primeira vez em 1879 (METSCHNIKOFF, apud PETCH, 1931 e KENDRICK, 1971) quando encontrado na praga do milho *Anisopliae austriaca*, e classificado como *Entomophthora anisopliae*. Este mesmo autor (METSCHNIKOFF), reclassificou-o como *Isaria destructor* em 1880 e finalmente, foi classificado como *Metarhizium anisopliae* em 1883 por SOROKIN.

Foi descrito por BARON (1968) como tendo uma estrutura de formação de conídios agregada a hifas entrelaçadas e contendo uma massa compacta de conidióforos simples ou ramificau

cados, provenientes de células denominadas fiálides, as quais originam fialósporos não septados, cilíndricos e hialinos. Do mesmo modo, BARNETT (1960) verificou que as fiálides são simples, em pares ou espiraladas e MARCHIONATO (1942), verificou diferença na coloração de hifas produzidas internamente e externamente em insetos parasitados, sendo as internas arroxeadas e as externas hialinas.

Quanto à morfologia e tamanho dos conídios MARCHIONATO (1942), verificou que estes são cilíndricos, medindo $8 - 9\mu\text{m} \times 2,5 - 3,0\mu\text{m}$. Por sua vez BARNETT (1960), constatou que os conídios possuem morfologia variada de ovóide a cilíndricos, unicelulares, hialinos ou levemente pigmentados, dando ao conjunto um aspecto verde-oliva em massas compactas. Do mesmo modo, foi verificada a existência de duas formas em *Metarhizium anisopliae* (JOHNSTON, 1915); uma com conídios de 3,0 a 11,9 u de comprimento, denominada de variedade *Major* e outra com comprimento variando de 2-3,0 a 3,5 u e denominada variedade *Minor*. Esta variabilidade foi confirmada por FRIEDERICH (1930; *apud* TULLOCH, 1976) que verificou a existência de uma forma longa de conídios variando de 6,0 a 8,0 u e por KAMAT *et al.* (1952; *apud* TULLOCH, 1976) sendo que neste último a variabilidade foi dependente do meio de cultura, sugerindo que a mesma (5 - 7,6 e 2,5 - 3,5 u) em nutriente ágar; 8-14 e 3-4,5 u em meio de arroz) seria de natureza fisiológica. TINLINE (1971), procurando correlacionar tamanho de conídios com número de núcleos e quantidade de DNA por conídio nes

tas duas variedades (*Major* e *Minor*), verificou que o aumento no tamanho dos conídios não levava a um aumento no número de núcleos por conídio, embora houvesse variação na quantidade de DNA, com uma quantidade máxima na variedade *Major*.

Na mesma linha de estudos, FARGUES *et al.* (1975) através de estudos com imunoeletroforese, não detectaram diferenças imunológicas importantes entre as linhagens de conídios grandes (*Major*) e a de conídios pequenos (*Minor*).

Por sua vez, BALFOR-BROWE (1960) tratando larvas de *Eretria* sp com conídios provenientes de linhagens que apresentavam esta variabilidade (*Major* e *Minor*), verificou que as mesmas eram afetadas e mortas pelas linhagens com conídios menores.

Quanto ao número de núcleos por conídios, normalmente o fungo apresenta-se com conídios uninucleados, provenientes de um conidióforo também uninucleado, sendo que os conídios maduros são provenientes da divisão durante a germinação, quando um núcleo filho migra para o tubo de germinação, enquanto o outro permanece no conidióforo (TINLINE, 1971). Do mesmo modo, VEEN (1967) e ZACHARUK (1970a) estudando estes conídios através de microscopia eletrônica, haviam demonstrado que os mesmos eram uninucleados. ZACHARUK (1970 b), confirmou estes estudos constando a existência de conídios uninucleados sendo que, a presença de conídios binucleados seria resultante da germinação e migração de núcleos para o tubo de germinação. Por outro lado, MESSIAS *et al.* (1978) constataram através de coloração por Giemsa, a presença de conídios binucleados numa porcentagem de 5%.

Quanto à necessidade de requisitos nutricionais e condições de temperatura e pH para crescimento, o fungo *M.anisopliae* apresenta bom desenvolvimento nos mais variados meios de cultura (MARCHIONATTO, 1942; ADAMEK, 1965; EVLAKHOVA, 1966; HIDALGO-SALVATIERRA e BERRIOS, 1972; MARQUES e VILAS-BOAS, 1973; AQUINO, 1974; VILLACORTA, 1978; MESSIAS, 1980), apresenta uma temperatura de crescimento ótima localizada entre 25°C e 30°C e pode desenvolver-se em grande faixa de pH (2,0 a 8,5) com um ótimo em torno de 6,9 (LIHNELL, 1944; ADAMEK, 1965).

Devido ao grande número de isolados obtidos deste fungo, estudos comparativos para a caracterização através de métodos eletrofóreticos (FARGUES, 1975; DE CONTI *et al.*, 1980) e produção de enzimas extracelulares (ROSATO *et al.*, 1981) têm sido realizados.

2.2. ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MUTANTES

Praticamente todos os estudos em genética de fungos são baseados no estudo de mutações em loci específicos dos cromossomos, pois sem mutações os loci nunca poderiam ser identificados nem suas funções estudadas. A maioria das investigações genéticas são possíveis devido à ocorrência e preservação de mutantes em laboratório que dificilmente sobreviveriam em condições naturais. O desenvolvimento de métodos e-

ficientes de isolamento e caracterização de mutantes é então de grande importância.

O método mais direto, porém menos eficiente, para isolar mutantes auxotróficos em fungos, consiste em tratar uma população de esporos com um mutagênico qualquer e ensaiar individualmente sua capacidade de crescimento em meio mínimo com posterior passagem para meio completo. Deste modo, mutantes morfológicos, podem ser visualizados diretamente e mutantes auxotróficos, podem ser detectados pela ausência de crescimento em meio mínimo. Este método porém envolve manipulação de grande quantidade de células prototróficas e é limitado a fungos que crescem formando colônias de bordos definidos.

Se o fungo usado não possui crescimento colonial limitado, tanto mutantes para esta característica podem ser utilizados (linhagens que formam colônias compactas em qualquer meio), como também podem ser usados meios especiais que induzam a morfologia colonial em linhagens normais.

TATUM *et al.* (1950), trabalhando com *Neurospora* utilizaram os dois métodos acima mencionados, usando em alguns experimentos o duplo mutante *pe^m col-1* que possui crescimento colonial em qualquer meio de cultura e em outros o duplo mutante *pe^m inos* que cresce formando microcolônias em meios com concentrações limitantes de inositol. Os mesmos autores (TATUM *et al.*, 1949) utilizaram um meio no qual o açúcar sacarose foi parcialmente substituído por um açúcar não

utilizável (sorbose) que reduz o crescimento colonial.

MACKINTOSH e PRITCHARD (1963), introduziram o uso de desoxicolato de sódio a 0,08% no meio de cultura para acentuar a formação de microcolônias em *Aspergillus nidulans*.

LINDEGREN e LINDEGREN (1950), tentando usar conídios uninucleados, trabalharam com mutante microcolonial "fluuffy" de *Neurospora crassa* que produz somente conídios uninucleados, após a superfície do meio ter sido umidecida com água esterelizada.

TATUM et al. (1950), para a mesma *Neurospora crassa*, preferiram usar outro mutante (pe^m) que tem a virtude de formar grande número de microconídios nos meios de cultura ordinariamente utilizados.

BEADLE E TATUM (1945), já haviam tentado resolver o problema de outra maneira, ou seja, irradiando macroconídios e usando-os para fertilizar protoperitécios de tipos de reação sexual oposta sendo que os ascósporos formados eram isolados em tubos de meio completo e germinados com choque térmico, esperando desse modo que os ascósporos mutantes constituíssem metade dos existentes nos peritécios.

ROBERTS (1959), tentando diminuir o número de repicagens em *Aspergillus nidulans* necessárias para ensaiar a auxonografia (PONTECORVO, 1949) de muitas colônias que este método requer, desenvolveu um repicador multifio que consiste de vários pinos de aço ajustados em uma superfície sólida.

MACKINTOSH E PRITCHARD (1963), utilizando o mesmo fungo (*Aspergillus nidulans*) e um repicador de veludo, foram capazes de replicar acima de 600 colônias de uma única vez simplesmente diminuindo o tamanho das colônias (meio de cultura com de-soxicolato de sódio 0,08%).

MALING (1960), usou superfícies ou de veludo ou de papel de filtro para replicar colônias de *Neurospora* carregando duas marcas morfológicas (*crisp* e *ragged*) e que conferiam característica de microcolônias à mesma.

PONTECORVO (1949), estabeleceu metodologia para identificar facilmente um mutante auxotrófico (após o mesmo não ter crescido em meio mínimo). Esta consiste em inocular-se suspensão de conídios do mutante auxotrófico em meio mínimo fundido, esperando-se esfriar e introduzindo pequenos cristais de várias substâncias em posições bem definidas na superfície do ágar. Após incubação, substâncias promotoras de crescimento propiciam o aparecimento de zonas de crescimento ao redor das mesmas.

Uma segunda metodologia que visa diminuir o número de células que passam por um selecionamento é a denominada de "Rescue" e que permite visualizar as colônias auxotróficas entre as prototróficas. Deste modo, REAUME e TATUM (1949) inocularam (após diluições convenientes) uma suspensão de células haplóides irradiadas de *Saccharomyces cerevisiae* em meio mínimo e incubaram por vários dias para permitir crescimento das células prototróficas. A posição em que estas células cresceram foi marcada e uma segunda

camada de meio completo fundido (ã temperatura que não matasse os esporos, 45 - 50°C) foi adicionada sobre a primeira. As colônias que se desenvolveram apõs este procedimento foram isoladas e as mesmas apõs auxonografia, mostraram ser auxotrõficas.

LEIN *et al.* (1948), usaram uma metodologia alternativa para a descrita acima (REAUME e TATUM, 1949) utilizando *Neurospora*; com o uso de microscõpio foram transferidos para meio enriquecido os esporos que não cresciam ou que tinham crescimento retardado em meio mĩnimo. A mesma metodologia foi utilizada por BOONE *et al.* (1956) para *Venturia inaequalis*. A grande maioria dos esporos assim obtidos mostraram ser auxotrõficos.

Em anos recentes, procedimento de isolamento total e mētodos nos quais mutantes sã obtidos por visualização direta, tēm sido substituídos por mētodos que resultem na eliminação seletiva dos sobreviventes prototõficos e permitem a sobrevivência de mutantes auxotrõficos.

Assim, metodologia para enriquecimento por filtração, na qual uma suspensão de conídios selvagens tratados com agente mutagênico ē suspensa em meio mĩnimo lĩquido e o prototrõfico em crescimento ē eliminado por filtrações sucessivas, atravēs de alguma espēcie de filtro esterilizado, faz com que o auxotrõfico passe atravēs do mesmo. Isto tem sido descrito para *Ophiosstoma* (FRIES, 1947) *Neurospora* (WOODWARD *et al.*, 1945; CATCHESIDE, 1954).

STRAUSS (1958), utilizando o método de enriquecimento por filtração com *Neurospora*, verificou que as células capazes de crescer em pequenas quantidades de vitaminas (liberadas pelos esporos quebrados, mortos ou prototróficos em crescimento) ou aqueles que requerem piridoxina ou inositol (morrem rapidamente em meio mínimo) não são obtidos no total de mutantes auxotróficos analisados. Obteve por outro lado, um grande número de mutantes requerendo arginina.

TAKAHASHI (1959), utilizou esta metodologia em uma linhagem floculante de *Saccharomyces cerevisiae* na qual células em brotamento tendem a permanecer juntas. O autor removeu conjuntos multicelulares de uma suspensão inicial por filtração em lã de fibra de vidro, irradiou as células resultantes, suspendeu-as em meio mínimo e após incubação, removeu a maioria dos prototróficos sobreviventes com uma série de filtrações posteriores.

A técnica de enriquecimento por filtração tem sido também utilizada para obtenção de mutantes auxotróficos que venham a ser usados em posteriores estudos genéticos como em *Coprinus lagopus* (DAY e ANDERSON, 1961) e *Schizophyllum commune* (ANDERSON e DEPPE, 1977).

FRIES (1947), trabalhando com *Ophiostoma* mostrou que duplos mutantes para deficiência nutricionais, algumas vezes sobrevivem mais tempo em meio mínimo do que os mutantes únicos que lhe deram origem.

PONTECORVO *et al.* (1953), utilizaram estas observações (FRIES, 1947) e estabeleceram metodologia efetiva para obter mutantes auxotróficos em *A. nidulans*. Conídios de um mutante auxotrófico para biotina foram irradiados com luz ultra-violeta para que resultasse uma porcentagem de 5% de sobrevivência, semeados em meio mínimo (ágar) e cobertos com uma segunda camada do mesmo meio. Após um período de incubação que levasse à morte 99% dos mutantes com requerimento para biotina, uma camada de meio completo foi adicionada. Acima de 60% das colônias que cresceram após este procedimento, demonstrou-se serem auxotróficas. Este método foi denominado de enriquecimento por "Starvation".

LESTER e GROSS (1959), aplicando o mesmo princípio em *Neurospora*, isolaram duplos mutantes auxotróficos a partir de um mutante único requerendo inositol. Verificaram que o mutante auxotrófico único para inositol requeria de 2 - 4 dias a 34°C para morrer. O mesmo método com inositol foi usado com *Saccharomyces cerevisiae* para obtenção de mutantes auxotróficos (CULBERTSON e HENRY, 1975).

ROMAN (1955), verificou que em *Saccharomyces cerevisiae*, mutantes para adenina acumulavam pigmento vermelho e que uma segunda mutação na mesma via biossintética da adenina em um passo anterior à formação de pigmento vermelho, levava ao acúmulo de pigmento branco ou rosa. Esta segunda mutação confere à levedura uma vantagem seletiva de tal modo que retarda o seu cres

cimento em meio de cultura quando comparada a primeira.

BACH E LACROUTE (1959), usando o princípio de bloquear a formação de um intermediário tóxico isolaram mutantes auxotróficos para Pirimidina em leveduras.

MOAT *et al.* (1959), usando os mesmos princípios de DAVIS (1948) para obtenção de auxotróficos em *E. coli* com auxílio de penicilina, mostraram que em *Saccharomyces* com o auxílio de vários antibióticos entre os quais *anfotericina B*, *endomicina* e *nistatina* em meio mínimo líquido seguido de centrifugação e posterior semeadura em meio livre de antibióticos, a proporção de auxotróficos entre as células sobreviventes era 5 vezes maior do que na população original livre do agente de seleção. Verificou que uma alta proporção das células sobreviventes eram deficientes respiratórios citoplasmáticos. Este problema foi eliminado com o uso de uma forma mais solúvel de *anfotericina B* (Fungozone) (MOAT *et al.*, 1966).

A efetividade da *nistatina* através da mesma metodologia tem sido confirmada para *Saccharomyces* (SNOW, 1966), *Penicillium chrysogenum* (Mac DONALD, 1968) e *Rhodotorula mucilaginosa* (COOK, 1974). YANO *et al.* (1981) por sua vez, utilizaram o efeito sinérgico da combinação da *Nistatina* e *Periolenitrina* para enriquecimento de mutantes defectivos na utilização de hidrocarbonetos em *Candida tropicalis* e *Candida maltose*.

BAL *et al.*, (1975), mostraram que o antibiótico N-glicosil polifungina mata conídios em germinação mas não coní

dios não germinados de *Aspergillus nidulans*. Os autores usaram esta morte diferencial para a seleção de segregantes haplóides de prototróficos heterozigotos.

YOUNG *et al.* (1976), usando *Saccharomyces cerevisiae* e o antibiótico *neotropsina*, verificaram que este último tem a capacidade de selecionar auxotróficos, sendo que a razão para a seleção dos mesmos não é conhecida, mas suspeita-se que afete a síntese da membrana celular.

MAGNET (1965, 1965a) verificou que o análogo da glicose, 2 deoxiglicose, seleciona contra células em divisão em *Schizosaccharomyces pombe* e usou este composto para seleção de mutantes auxotróficos nesta levedura.

BIELY *et al.* (1971) usando o mesmo composto (2 deoxiglicose) em *Saccharomyces cerevisiae*, mostraram que o mesmo era incorporado nas paredes celulares das células tipo selvagem, causando aumento na sensibilidade devido a diminuições abruptas na pressão osmótica.

Um método que tem sido aplicado com muito sucesso em *Aspergillus flavus* (DONKERSLOOT e MATELES, 1968) *Saccharomyces cerevisiae* (LITTLEWOOD e DAVIS, 1973) e *Neurospora crassa* (RUSSEL e COHEN, 1976), depende da incorporação pelas células selvagens em meio mínimo ou a altas temperaturas de precursores de ácidos ribonucleicos ou proteínas marcados com trítium (^3H). Durante subsequente estocagem a baixa temperatura as células selva

gens tendem a ser mortas pela radiotividade que elas incorporam enquanto os mutantes auxotróficos e temperatura-sensíveis, que não são ativos em síntese macro-molecular durante o período de exposição ao precursor marcado, tendem a sobreviver. O método parece ser efetivo no enriquecimento para mutantes auxotróficos e temperatura-sensíveis. MARTINDALE e PEARLMAN (1979), estabeleceram metodologia alternativa em *Tetrahymena thermophila* para obtenção de mutantes defeituosos em divisão celular e temperatura sensíveis tratando-se culturas com 5-bromodeoxiuridina (BUdR) e luz ultra-violeta. Deste modo, ocorre morte preferencial de células pela U.V. que tenham incorporado BUdR.

Em *M. anisopliae* mutantes morfológicos e auxotróficos tem sido obtidos para estudos de heterocariose (TINLINE *et al.*, 1971) parassexualidade e estudos genéticos (AL-AIDROSS, 1980; MESSIAS e AZEVEDO, 1980) porém sem o uso de métodos de enriquecimento.

2.3. O CICLO PARASSEXUAL

Apesar dos fungos apresentarem uma série de vantagens em estudos genéticos - crescimento rápido, facilidade de obtenção de um grande número de indivíduos (esporos) em espaço reduzido, crescimento em meios de cultura tanto definidos como complexos, facilidade de manuseio e obtenção de mutantes com o uso de agentes mutagênicos - até praticamente o primeiro terço deste século limitavam-se àqueles que apresentavam ciclo sexual (FICOMICETOS, ASCOMICETOS e BASIDIOMICETOS) envolvendo união de células haplóides e

posterior meiose com recombinação em seus grupos de ligação. Desta maneira, os fungos imperfeitos (DEUTEROMICETOS) por não apresentarem um mecanismo conhecido de recombinação genética na natureza, não se prestavam para estudos genéticos. Esta impossibilidade, porém, foi removida com os estudos de ROPER (1952) em *Aspergillus nidulans*, no qual o autor descreveu técnica usando mutantes morfológicos e nutricionais complementares, obtendo deste modo diplóides estáveis após fusão de hifas. A seguir, PONTECORVO E ROPER (1952) verificaram através deste mesmo fungo que os diplóides poderiam permanecer neste estado permanentemente ou produzir "diplóides homozigotos" para um ou vários marcadores; diplóides estes que teriam sido originados por algum tipo de "permuta" mitótica ou somática. A partir destes estudos, diversos trabalhos com *A. nidulans* foram publicados, tentando-se a localização de genes nos devidos grupos de ligação (PONTECORVO e ROPER, 1952; PONTECORVO et al., 1953 e PONTECORVO E KÄFER, 1958).

Uma vez este processo ter sido constatado, FORBES (1959) estabeleceu técnica baseada em segregação mitótica para localizar novos mutantes em grupos de ligação de *A. nidulans* e outros fungos, sendo a mesma fundamentada na observação de que linhagens diplóides sofrem haploidizações raras porém regulares sem apresentarem permuta. Desse modo, os membros individuais de cada par de grupos de ligação segregam como unidades inteiras e independentes, fazendo com que marcadores localizados em diferentes grupos de ligação mostrem livre

recombinação, enquanto que marcadores no mesmo grupo não re_{combinam}. Assim, FORBES (1959), construiu linhagens mestras tendo marcadores em cada grupo de ligação. KAFER (1958), usando o mesmo princípio localizou cerca de 40 genes nos 8 grupos de ligação que *A.nidulans* possui, sendo que estes genes foram confirmados com o uso de análise meiótica.

Deste modo, para que se estabeleça a ocorrência de um ciclo parassexual, é necessária a fusão de hifas com marcas auxotróficas diferentes e complementares com conseqüentes estabelecimento de um heterocário (núcleos diferentes em um citoplasma comum) em meio mínimo, fusão de núcleos, recombinação via permuta ou não dos grupos de ligação (PONTECORVO e KÄFER, 1958) e haploidização via não disjunção (KÄFER, 1960, 1961; McCULLY e FORBES, 1965; BAL et al., 1975). A heterocariose, além de ser originada por fusão de hifas, também pode ocorrer por mutação (ISHITANI e SAKAGUCHI, 1956 e TINLINE, 1961) enquanto que a frequência de diplóides formados pode ser aumentada por agentes químicos ou físicos (PONTECORVO et al, 1953; DAY e JONES, 1969 e IKEDA et al., 1957).

Uma maneira de se reconhecer conídios diplóides após heterocariose é através de medidas do volume desses conídios quando comparados com a linhagem haplóide. Também o conteúdo de DNA por núcleo pode ser utilizado. Algumas vezes o diplóide pode apresentar o volume igual ao dobro da haplóide (*A. nidulans*; ROPER, 1952) em outras não (*Ustilago maydis*; HOLLIDAY, 1961 - *Cochiliobolus sativus*; TINLINE, 1962). O conteúdo de

DNA por núcleo é um método seguro para indicar a formação de diplóides (HEAGY e ROPER, 1952).

A descoberta do ciclo parassexual permitiu que houvesse melhoramento de fungos que possuem valor industrial pois a maioria desses é desprovida de ciclo sexual. Assim, a descoberta do ciclo parassexual, em *Penicillium chrysogenum* aumentou a esperança de melhorar a produção de penicilina (PONTECORVO e SERMONTI, 1954) por exemplo. Nas primeiras tentativas (SERMONTI, 1959), a única linhagem que teve título de produção melhorada foi um diplóide. Mac DONALD *et al.* (1964, 1965) e Mac DONALD (1968), encontraram duas dificuldades principais em seus trabalhos com *Penicillium*: a possível seleção contra segregantes de título alto e "segregação de genomas parentais", nos quais os haplóides do tipo parental eram preferencialmente recuperados. Esta última dificuldade foi provavelmente devido ao uso de haplóides parentais que diferiam um do outro no arranjo cromossômico; por exemplo, uma translocação recíproca em um dos parentais poderia prevenir a recombinação e haploidização entre grupos de ligação. Isto foi resolvido contornando-se os problemas que são encontrados na haploidização e foi possível construir mapas de ligação que deram uma base para um programa de cruzamento mais racional usando-se mutantes com poucas marcas auxotróficas e o uso de p-fluorfenilalanina (pFA) como agente haploidizante (BALL, 1971). Dentro desta mesma espécie, SERMONTI (1956) já havia localizado por parassexualidade 2 locos que afetavam a produção de penicilina atra

vês do uso de heterocários balanceados e diplóides heterozigotos, obtendo-se também recombinantes através do uso de marcas auxotróficas complementares (SERMONTI e SPADA-SERMONTI, 1956).

Em fungos fitopatogênicos o ciclo parassexual foi descrito em *Penicillium expansum* (GARBER e BEHARA, 1965), embora BARRON (1962) não tivesse conseguido o ciclo neste mesmo fungo. Do mesmo modo, BUXTON (1956, 1962) conseguiu estabelecer o ciclo parassexual em *Fusarium oxysporum* com a obtenção de vários recombinantes entre as marcas parentais, inclusive marcas recombinantes para patogenicidade; BOONE *et al.* (1956) estabeleceu o ciclo parassexual em *Venturia inaequalis*; DUTTA e GARBER (1960) em *Colletotrichum lagenarium*; STROMNAES *et al.* (1964) em *Penicillium italicum*, e *Penicillium digitatum*; HOLLIDAY (1961) em *Ustilago maydis*; KATZ e SUSSMAN (1972), MOSSES *et al.* (1975) e LOOMIS (1979) em *Dictyostelium discoideum*; HASTIE (1962, 1964) em *Verticillium albo-atrum*; BAUCH (1952) e DAY e JONES (1968) em *Ustilago violacea*. Este processo nos referidos fungos pode explicar o aparecimento de novas raças fisiológicas e permitir o estudo genético dos mesmos com a localização e quantificação dos genes envolvidos na patogenicidade.

Do mesmo modo, em outros fungos de importância econômica o ciclo parassexual também tem sido determinado (*Aspergillus oryzae* e *Aspergillus sojae*, ISHITANI e SAKAGUCHI - 1956; ISHITANI *et al.* - 1956; *A. oryzae*, IKEDA *et al.* - 1957); havendo neste último caso um melhoramento na produtividade de protease em linhagens diplóides e

tetraplóides quando comparadas com as haplóides. Em *A.niger*, DAS(1980) procurou através de ciclo parassexual, obter melhoramento na produtividade de ácido cítrico porém o diplóide obtido e seus segregantes não diferiram significativamente dos haplóides parentais. De maneira semelhante, MESSIAS (1977) procurando correlacionar a parassexualidade em *A. flavus* com a produção de aflotoxina, estabeleceu que este caráter é complexo e possivelmente dependente de muitos genes.

Este processo de análise genética, mostrou ser um bom instrumento de localização de genes com consequente determinação do número de grupos de ligação em *Aspergillus nidulans* (PONTECORVO *et al.*, 1953; KÄFER, 1958; FORBES, 1959; Mc CULLY e FORBES, 1965); *Aspergillus niger* (PONTECORVO *et al.*, 1953; LHOAS, 1967) ; *Aspergillus flavus* (PAPA, 1973,1976); *Aspergillus fumigatus* (LEVA DOUX *et al.*, 1981); *Aspergillus parasiticus* (VINNET e GOYNES,1980; *Aspergillus sp* (PEREIRA, 1978); *Dictyostelium discoideum* (WRIGHT *et al.*, 1977); *Aspergillus tamarii*, *A. ochraceus*, *A.wentii* (ISHITANI e SAKAGUCHI, 1956); *Cochliobolus sativus* (TINLINE, 1962) e *A.nidulans* (MENEZES e AZEVEDO, 1978) sendo que neste último, foi estudado a localização e tipos de genes (Mutação ou repressão) responsáveis pelo aparecimento de variantes deteriorados que reverterem para o tipo morfológico parental.

Ressalte-se que no fungo entomopatogênico *Metarhizium anisopliae* a determinação do ciclo parassexual foi recentemente estabelecida (MESSIAS E AZEVEDO, 1980 e AL-AIDROOS, 1980). Os autores trabalharam com marcas para resistência (AL-AIDROOS) e marcas

para coloração e auxotrofia (MESSIAS, AZEVEDO, 1980; AL-AIDROOS, ... 1980); sendo que os heterocários obtidos pelos primeiros autores foram verdes como o parental tipo selvagem. Diplóides foram obtidos, porém, com relação ao tamanho dos conídios, estes não a apresentaram diferença significativa dos haplóides, havendo contudo, diferença no número de núcleos por conídio (os diplóides não se apre sentaram binucleados), diâmetro dos núcleos dos conídios (o diâmetro nuclear dos diplóides foi maior) e a quantidade de DNA dos diplóides foi praticamente o dobro. Através do uso de Cloroneb (100 ug/ml) MESSIAS E AZEVEDO obtiveram, a partir dos diplóides, setores em meio completo que analisados mostraram-se ser em sua maio ria do tipo parental, porém, alguns mostraram-se recombinantes. Por meio desses resultados, concluíram que este microrganismo pos sui poucos grupos de ligação com um número não superior a 4; o Cloroneb poderia estar atuando selecionando certas combinações gê nicas que não apareceriam nos haplóides segregantes ou então, por efeito de luz ultra-violeta, translocações teriam ocorrido prevenido o aparecimento de certos tipos de recombinantes. Deste modo, abrem-se perspectivas de uso para esta metodologia em análise ge nética e melhoramento para aplicação industrial deste microrganismo.

2.4. PROTOPLASTOS

2.4.1. ISOLAMENTO

A técnica de obtenção e fusão de protoplastos, desde os primeiros relatos (EDDY e WILLIAMSON, 1957, 1959; BACHMANN e BONNER, 1959), tem adicionado uma nova dimensão ao estudo dos fenômenos parassexuais nos organismos que, ou não possuam o ciclo sexual bem estabelecido, ou que apresentem barreira impedindo a troca gênica, recombinação e conseqüente variabilidade genética entre e dentre linhagens. Essa técnica tem sido usada como uma "ferramenta" para a manipulação genética e cruzamento entre organismos de interesse industrial (PEBERDY, 1980) ou organismos que sejam utilizados em pesquisa básica (PEBERDY, 1979).

O isolamento de protoplastos de células microbianas, envolve a digestão total ou perfuração localizada da parede celular por enzimas, permitindo que o conteúdo celular envolvido pela membrana celular, seja liberado e mantenha-se estável em meio hipertônico.

Normalmente, a liberação de protoplastos envolve o uso de enzimas líticas que liberam os referidos protoplastos de uma maneira muito rápida. Isolamento de protoplastos de leveduras, geralmente envolve o uso de enzimas comerciais, sendo que EDDY e WILLIAMSON (1957, 1959) foram os primeiros a introduzir o uso de suco digestivo de *Helix pomatia* como complexo lítico para obter

protoplastos em *Saccharomyces cerevisiae*. Do mesmo modo, esta enzima tem sido usada extensivamente por outros pesquisadores em diferentes leveduras como *Saccharomyces cerevisiae* (DEUTCH e PARRY, 1974), *Schizosaccharomyces pombe* (SHAHIN, 1971, 1972; FOURY e GOFFEAU, 1973), *Candida albicans* e *Candida tropicalis* (PARTRIDGE e DREW, 1974). Por outro lado, numerosas outras enzimas têm-se mostrado úteis na obtenção de protoplastos. Assim, Zimoliase, uma enzima derivada de *Arthrobacter luteus*, tem sido usada para isolamento de protoplastos em *Candida albicans*, *C. guilliermondii*, *C. intermedia* e *C. tropicalis* (YAMAMURA et al., 1975). Outros microorganismos que produzem enzimas para obtenção de protoplastos como *Spicaria violacea* em *Gliocadium virens* (BEHLING e FISCHER, 1980); *Trichoderma viride* em *Schizophyllum commune* (de VRIES e WESSELS, 1972, 1973 a e 1973 b); *Streptomyces satsumaensis* em *Geotrichum candidum* (DOOIJEWAAARD et al., 1973); *Micromonospora* em *Candida utilis*, *Oospora suaveolens* e *Geotrichum lactis* (GASLON et al., 1964); *Myxobacter* em *Mucor racemosus* (GENTHNER e BORGIA, 1978); *Streptomyces* na em *A. nidulans* (GIBSON e PEBERDY, 1972), *Trichoderma harzanium* em *A. fumigatus* (HEARN et al., 1980); *Streptomyces* sp em *S. fragilis*, *Candida utilis*, *S. rosei*, *S. cerevisiae*, *Kloeckera opiculata* e *Torula utilis* (MENDOZA e VILLANNUEVA, 1962); em *A. nidulans* (PEBERDY e GIBSON 1971), em *Mortierella vinacea* (PEBERDY, 1971), em *Fusarium calmodium* (LABORDA et al., 1974 LOPES BELMONTE et al., 1966), em *Pythium* (SIESTMA et al., 1967); *Trichoderma viride* em *S. cerevisiae*, *C. albicans*, *C. neoformans* e *H. anomala* (MIEGEVILLE et al., 1979); *Penicillium purpugenum* em *A. niger* (MUSILKOVA et al., 1969); *Bacillus circulans* em *Pyricularia oryzae* (TANAKA et al., 1981), têm sido utilizados.

Com poucas exceções (HAMLYN *et al.*, 1981; STEPHEN e NASIM (1981), preparações comerciais de enzimas líticas não tem sido efetivas para liberação de protoplastos em fungos filamentosos.

As preparações de enzimas líticas a partir de suco digestivo têm sido efetivas na liberação de protoplastos de *Neurospora crassa* (EMERSON e EMERSON, 1958; BACHMANN e BONNER, 1959); *Penicillium chrysogenum* e *Cephalosporium acremonium* (FAWCETT *et al.*, 1973); *Geothricum candidum* (FERENCZY *et al.*, 1974); *A. niger* (MUSILKOVÁ e FENCL, 1968); *Penicillium purpugenum* (MUSILKOVÁ *et al.*, 1969). Porém a maioria dos grupos que trabalham com fungos miceliiais, acham que a produção de complexos enzimáticos a partir de microorganismos, em seu próprio laboratório, é o caminho mais efetivo na obtenção de protoplastos. A lista destes microorganismos que mostram atividade micolítica é muito grande e continua a crescer (descritos anteriormente)

Em muitos casos, a síntese do complexo enzimático pelo organismo lítico requer a presença de substratos indutores no meio de crescimento. Estes meios de cultura, na sua grande maioria, têm sido supridos com micélio homogeneizado esterilizado do organismo da qual se quer produzir protoplastos (MUSILKOVA *et al.*, 1969; SIETSMA *et al.*, 1967), ou com parede celular purificada (BEHLING e FISCHER, 1980; de VRIES e WESSELS, 1972). Tentativas têm sido feitas para produzir meios de crescimentos mais definidos para obtenção de enzimas, pelo uso de polissacarídeos idênticos ou semelhantes àqueles encontrados em paredes de fungos. Deste modo, suplemen

tação do meio com quitina e laminarina (HOUSSET *et al.*, 1975; PEBERDY e GIBSON, 1971) ou celulase (SIETSMA e BOER, 1973) tem-se mostrado efetiva.

Os componentes da mistura de enzimas líticas envolvidas na liberação de protoplastos são conhecidos em apenas alguns casos. Os estudos mais extensivos foram feitos com enzimas de *Trichoderma harzanium* com respeito ao isolamento de protoplastos em *Schizophyllum commune* (de VRIES e WESSELS, 1973). Deste modo, três componentes principais, S-glucanase (α -1,3 - glucanase), R-glucanase (β -1,3 -, β -1,6-glucanase) e quitinase, foram isolados por filtração em coluna de gel e verificou-se que todos os três componentes foram necessários para a liberação de protoplastos em *S. commune*. Por outro lado, um complexo lítico útil no isolamento de protoplastos de *Pythium* foi obtido de *Streptomyces satsumaensis* e mostrado conter dois importantes componentes, uma celulase e uma exo-laminarase (SIETSMA *et al.*, 1968).

Enriquecimento de complexos líticos com polissacarídeos específicos pode aumentar a produção de protoplastos ou a velocidade de liberação dos mesmos. Assim, HOUSSET *et al.*, (1975) adicionaram α -1,3- glucanase e β - 1,3 glucanase a enzimas de suco digestivo e aumentaram ambos os parâmetros no isolamento de protoplastos de *Schizosaccharomyces pombe*. MORRIS (1978), verificou que a adição de glucilase ao complexo lítico proveniente de *Trichoderma harzanium* aumentou a velocidade de liberação de protoplastos em *A. nidulans* e ANNÉ *et al.* (1976), obtiveram produção máxima de protoplastos em *Penicillium chrysogenum* quando enzimas produzidas por

Trichoderma foram misturadas com uma preparação proveniente de *Streptomyces gramineofasciens* e uma celulase comercial.

Complexos enzimáticos constituídos por diferentes polissacarases (celulase, gumase, maltase, hemicelulase e quitinase) purificadas têm sido utilizados para obtenção de protoplastos em *Neurospora crassa* (EMERSON e EMERSON, 1958). Do mesmo modo, tanto preparações de enzimas líticas obtidas a partir de suco digestivo de caramujo (suco digestivo bruto, helicasel lipolítica e citohelicase a diferentes concentrações) DIATEWA *et al.*, 1981), quanto polissacarases de origem comercial provenientes de outros microrganismos para uso em diferentes tipos de fungos (*A. nidulans*, *A. niger*, *A. rugulosus*, *A. ochraceus*, *S. cerevisiae*, *A. chrysogenum* e *P. chrysogenum*; HAMLYN *et al.*, 1981, tem sido comparadas.

Protoplastos isolados de culturas de levedura ou fungo filamentoso, por definição, deve ser heterogêneo com respeito à sua fisiologia e bioquímica. A nível de população, o estado fisiológico da cultura é o principal fator que determina a produção de protoplastos. Por outro lado, a idade fisiológica da cultura influencia esta mesma produção. Assim, PEBERDY *et al.* (1976) estudaram os diversos fatores (pH, estabilizadores osmóticos, idade do micélio) que afetam a liberação de protoplastos em *A. flavus*, *A. nidulans*, *P. chrysogenum*, *Fusarium culmorum* e *Neurospora crassa*. Verificaram que para *A. flavus* a produção de protoplastos foi maior quando foram usadas culturas em fase exponencial de crescimento, o mesmo ocorrendo para os outros fungos

estudados. ANNÉ e PEBERDY (1975), verificaram o mesmo fenômeno em *P.chrysogenum*. ZOCHER e KLEINKAUF (1980), obtiveram boa produção de protoplasto em *Claviceps purpurea* ao utilizarem micélio em fase estacionária de crescimento (fase em que ocorre síntese de ergotamina). Por outro lado, MENDOZA e VILLANUENA (1962) produziram protoplastos em grande quantidade em *S.grafilis* e *S. rossei*, usando micélio de culturas novas frente à ação da enzima lítica desde que fizessem um pré-inóculo de 24 horas. Do mesmo modo, MUSILKOVÁ e FENCL (1968, 1969) obtiveram a mais alta produção de protoplastos em *A. niger* com o uso de hifas jovens. Resultados semelhantes têm sido encontrados por de VRIES e WESSELS (1972) em *Schizophyllum commune* e por TANAKA *et al.* (1981) com *Pyricularia oryzae*.

Deste modo, outros trabalhos com a idade da cultura afetando a liberação de protoplastos têm sido realizados em *Saccharomyces cerevisiae*, DEUTCH e PARRY (1974) verificaram que células em fase exponencial de crescimento são sensíveis à produção de protoplastos, enquanto que as de fase estacionária não o são. O mesmo foi observado por SHAHIM (1972). KOVÁČ *et al.* (1968), porém, obtiveram protoplastos de *S.cerevisiae* em fase estacionária de crescimento para estudo de fosforilação oxidativa de suas mitocôndrias. DEUTCH E PARRY (1974), observando que células tratadas com cloranfenicol ou 5 - fluoruracil durante este período (fase exponencial) não desenvolvem resistência à ação enzimática, sugerindo que, as mudanças envolvidas neste fenômeno são dependentes de RNA e síntese proteica. Do mesmo modo, EDDY e WILLIAM

SON (1957), trabalhando com *Sacharomyces carlsbergensis* obtiveram protoplastos de células com 2 idades de cultivo (18 h. a temperatura ambiente e 5 h a 25°C), sendo que nestas condições a produção foi máxima; SHAHIN (1971) usando a enzima Helicase, produziu protoplastos em células de *Schizosaccharomyces pombe* em fase estacionária de crescimento; STEPHEN e NASIM (1981) , testaram várias espécies de levedura (*S.cerevisiae*, *Schizosaccharomyces pombe*, *Kluyveromyces lactis*, *Trichosporon pullulans* e *Schwanniomyces alluvius*) com a enzima Mutanse (NOVO), sendo que o tempo ótimo de exposição variou com a idade da cultura e a espécie de levedura utilizada; BROWN (1971), tratou células de *Torulopsis glabrata*, *Candida albicans* e *Saccharomyces cerevisiae* em diferentes fases de seu ciclo de crescimento com a enzima Helicase e verificou que a susceptibilidade de *T.glabrata* desapareceu completamente dentro de 2 horas durante a transição da fase exponencial de crescimento para a fase estacionária, enquanto que em *C. albicans* e *S.cerevisiae* a susceptibilidade diminuiu gradualmente durante a fase estacionária.

Poucos trabalhos que relacionam o efeito do meio de cultura na liberação de protoplastos têm sido publicados. MUSILKOVÁ e FENCL (1968), mostraram os efeitos da cultura na liberação de protoplastos de *A. niger* em um meio definido e em meio complexo. A aeração dos meios de cultura resultou na produção de mais protoplastos do que nos meios sem aeração. Concluíram que o meio residual de cultivo deve ser retirado da sus

pensão de micélio pela lavagem com solução de alta pressão osmótica. OKANISHI *et al.* (1974), verificaram em *S. griseus* e *S. venezuelae* que o número de protoplastos formados é maior e a velocidade de reversão e estabilização melhores em meio contendo $MgCl_2$. Por sua vez, FOURY E GOUFFEAU (1973), estabeleceram que em *Schizosaccharomyces pombe* a produção de protoplastos é aumentada quando as células são pré-incubadas na presença de 2-deoxi-D-glucose. No entanto, longos períodos de incubação nesta substância fazem com que os protoplastos percam sua capacidade respiratória.

Uma outra maneira de aumentar a velocidade de produção de protoplastos consiste em fazer pré-tratamento das células com certas substâncias como, principalmente, compostos de TiO_2 . Assim DOOIJEWAAARD *et al.* (1973) estimularam a produção de protoplastos em *Geotrichum candidum* pela adição de Dithiothreitol, 2-Mercaptoetanol ou cisteamina ao meio de incubação; FAWCETT *et al.* (1973), verificaram que pré-tratamento do micélio com Dithiothreitol era necessário em *Cephalosporium acremonium* para produção de protoplastos enquanto que para *Penicillium chrysogenum* o mesmo não foi necessário; FINKELMAN *et al.* (1980), através do uso de 2-Mercaptoetanol em *Aureobasidium pullulans* com incubação anaeróbica, lograram a produção de protoplastos frente a uma mistura de enzimas líticas e ALIMDZHANOVA E BEZBORODOV (1980), demonstraram que tratamento das células de *Cospora lactis* com solução de TRIS (Hidroximetil)

Aminometano é essencial para a lise da parede celular com enzima digestiva e conseqüente liberação de protoplastos. Outra maneira de promover a liberação de protoplastos, quando são usados estabilizadores orgânicos, consiste em fazer-se um pré tratamento do micélio com um detergente (Desoxicolato, lauril-sulfato ou Triton X 100). SIETSMAN e BOER (1973), compararam a ação destes detergentes na produção de protoplastos em *Pythium* sp e verificaram que o Triton X 100 é o mais eficaz.

Esporos também constituem-se em uma fonte útil de protoplastos, especialmente em espécies onde eles são estruturas uninucleadas. Destes protoplastos, espera-se que sejam mais homogêneos em sua composição de organelas e portanto em seu desenvolvimento; o que foi observado por GENTHNER e BORGIA (1978) em *Mucor racemosus* e BOS e SLAKHORST (1981) em *A. nidulans* e *A. niger*. Por outro lado, aspecto diferente foi observado por EMERSON e EMERSON (1958) em *Neurospora crassa*, onde os protoplastos produzidos diretamente a partir de conídios pareceram ser menos uniformes do que os originados da hifa, especialmente, a baixas concentrações de açúcares e enzimas.

2.4.2. FUSÃO

O ímpeto para usar técnicas de fusão de protoplastos em fungos surgiu de trabalhos similares com células animais e protoplastos de plantas. Fusão espontânea foi primeiramente descrita, como um evento raro, em protoplastos de *Fusarium culmorum* (LOPEZ-BELMONTE *et al.*, 1966), sendo a enzima lítica proveniente de *Streptomyces ra*, testando vários estabilizadores, entre os quais os melhores foram: NH_4Cl , manitol, NaCl ou ramnose, o estímulo para a fusão sendo desconhecido. A primeira tentativa de fusão controlada foi feita com *Geotrichum candidum* (FERENCZY *et al.*, 1974), baseada em práticas genéticas padrões, com a seleção de heterocários sendo feita por complementação nutricional em meio mínimo. A frequência de fusão foi baixa, estabelecendo-se o estado heterocariótico mas não o diplóide. A seguir, BINDING (1974) aumentou a frequência de fusão em protoplastos de *Phycomyces blakesleeanus* através do uso de mutantes auxotróficos complementares e como agentes de fusão, água de mar e $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ tamponado, sendo que, neste último a frequência de fusão foi duas vezes maior do que a obtida em água do mar e 37 vezes maior do que a obtida por FERENCZY *et al.* (1974). FERENCZY *et al.* (1975), aplicando os mesmos princípios conseguiram aumentar a frequência de fusão em *A. nidulans* obtendo heterocários irregulares e colônias apresentando-se diferentes dos mutantes parentais.

As observações de CONSTABEL e KAO (1974) em protoplastos obtidos em plantas e subsequente aumento na frequên

cia de fusão através do uso de polietileno glicol (PEG), levaram a estudos envolvendo este composto.

ANNÉ e PEBERDY (1975), verificaram em proto-plastos de *Penicillium chrysogenum* os parâmetros envolvendo solução fusogênica (PEG), pH e concentração de íons cálcio. A concentração de PEG foi estabelecida como um ótimo em 30% (p/v) a um tempo de exposição de 10 minutos a 30°C. Já PEBERDY *et al.* (1975), com fusões intraespecíficas em protoplastos de *A. flavus*, *A. niger*, *P. frequentans* e *P. ramigena*, *A. nidulans* foi de 25%, sendo a frequência de fusão baixa para *A. niger*, enquanto que as de *A. flavus* e *Penicillium* foram maiores e semelhantes à de *A. nidulans*. Estas frequências de fusão foram cerca de 1000 vezes maiores do que as previamente achadas. A partir destes estudos, ANNÉ e PEBERDY (1976) estabeleceram uma metodologia de fusão de protoplastos que pode ser aplicada com sucesso a várias espê-cies de fungos. Assim, estes autores através de mutantes auxotróficos complementares estabeleceram fusões intraespecíficas em *Penicillium chrysogenum*, *P. patulum*, *P. roquefortii*, *A. ni*dulans e *Cephalosporium acremonium*, realizando também fusões interespecíficas entre *P. chrysogenum* e *P. notatum*, sendo que as frequências de fusão foram sempre aproximadamente as mes-mas. Heterocários foram confirmados pelo crescimento de colô-nias em meio mínimo, alguns diplóides foram formados e confirmados por prototrofia, coloração de esporos, tamanho de espo-ros e conteúdo de DNA.

Estes estudos com conseqüente aprimoramento na tecnologia de fusão, deram um grande avanço aos vários campos da Genética, fazendo com que significativos progressos tenham sido obtidos com fusões a níveis intra e interespecíficos e intergenéricos. Desse modo, fusões envolvendo células com mesmo tipo de reação sexual tem sido realizados em *S. cerevisiae*, SVOBODA (1978), obteve com mutantes auxotróficos complementares e PEG, frequências de fusão de 1 a 3%. Análises citológicas e genéticas preliminares sugeriram a formação de um sincário e integração de marcas genéticas parentais, embora o mesmo autor (1976) não houvesse conseguido fusão de protoplastos entre linhagens de *Saccharomyces cerevisiae* de diferentes tipos de reação sexual, sendo que a conjugação ocorreu somente quando os protoplastos já tinham concluído a regeneração de uma nova parede celular. van SOLINGEN e van der PLAAT (1977), por sua vez, fusionaram linhagens do mesmo tipo de reação sexual com auxílio de β -mercaptoetanol, ao mesmo tempo que estudaram se fusão por PEG poderia ser aplicada em leveduras. Da mesma maneira, CHRISTENSEN (1979) fusionou protoplastos de *S. cerevisiae* de mesmo tipo de reação sexual e a segregação dos alelos para esta característica com marcas auxotróficas associadas, na proporção 4:4, mostrou que não poderia ter ocorrido mutação. A análise genética dos marcadores demonstrou ter havido recombinação. Experimento semelhante foi realizado por YAMAMOTO e FUKUI (1977).

Em *Schizosaccharomyces pombe*, fusões de proto-

plastos entre linhagens de mesma " reação sexual" também foram obtidas com formação de progênie diplóide (SIPICZKI e FERENCZY, 1977) e localização de genes em grupos de ligação (THURIAUX, 1980). De maneira semelhante, em *Candida albicans*, fusões de protoplastos foram realizadas em presença de PEG (JEFFREY *et al.*, 1981) estabelecendo-se o estado diplóide, sendo confirmado pelo volume celular, ocorrendo perdas cromossômicas que originaram aneuplóides a vários níveis. Também foi verificado por SARACHEK *et al.* (1981) que as perdas de cromossomos e indução de permuta por irradiação podem afetar a recombinação para as marcas parentais nos híbridos. Da mesma forma, em *Candida tropicalis*, têm sido obtidas fusões de protoplastos com estabelecimento de heterocário que podem levar ao estado diplóide (VALLIN e FERENCZY, 1978) ou não (FOURNIER *et al.*, 1977), sendo que neste último caso foi obtido apenas um diplóide e a partir deste foram observados recombinantes para os vários marcadores genéticos envolvidos.

Nos fungos filamentosos e bactérias filamentosas, fusão de protoplastos tem sido usada com sucesso para produzir heterocários com conseqüente diploidia e recombinantes intraespecíficos em diversos gêneros (*Streptomyces fradie*, *S. griseofulvus*; BALTZ, 1978 - *S. coelicolor*; HOPWOOD e WHRIGT, 1979 - *Streptomyces* sp.; HOPWOOD *et al.*, 1977, 1978 - *S. coelicolor*, *S. parvulus*, *S. lividans*, *S. griseus*, *S. acrimycini*; COHEN, 1977 - *S. fradie*; BALTZ, 1978 - *Trichoderma viride*; BOJNANSKÁ *et al.*, 1980 - *Geotrichum candidum*; FERENCZY *et al.*,

1974 - *Mucor racemosus*, GENTHNER e BORGIA, 1978 - *P. chrysogenum*; ANNÉ e PEBERDY, 1975 - *Fusarium cumorum*; LOPEZ - BELMONTE *et al.*, 1966 - *A. nidulans*; FERENCZY *et al.*, 1975 e *Phycomyces blakesleeianus*; BINDING, 1974). Porém, BALL e HAMLYN (1982) não obtiveram evidências nítidas de formação de diplóides e heterozigotos foram raramente detectados em fusões de linhagens estreitamente relacionadas e divergentes de *Cephalosporium acremonium*. Recombinantes, presumivelmente haplóides, foram recuperados através de repique da mistura de fusão de protoplastos para uma série de meios seletivos de regeneração.

De grande significância é o uso de técnicas de fusão na produção de híbridos interespecíficos e intergenéricos. Assim, FERENCZY *et al.* (1976) lograram a fusão e complementação nutricional entre *A. nidulans* e *A. fumigatus* a uma baixa frequência, sugerindo que esta complementação foi devido a aneuploidias. KEVEI e PEBERDY (1977, 1979), ao realizarem fusões entre *A. nidulans* e *A. rugulosus* obtiveram heterocários de crescimento lento em meio mínimo que deram origem a setores diplóides vigorosos. Estes ao serem agora estudados com marcadores em todos os grupos de ligação da linhagem de *A. nidulans* mostraram distribuição ao acaso destes grupos de ligação nos setores após haploidização sugerindo um alto grau de homologia entre as espécies. PEBERDY *et al.* (1977), isolaram em meio mínimo heterocários interespecíficos após fusão entre *P. chrysogenum* e *P. cyaneo-fulvum* e semelhantemente aos trabalhos de KEVEI e PEBERDY (1977, 1979) obtiveram diplóides e re

combinantes para as marcas parentais, GODFREY *et al.* (1978), cruzaram mutantes auxotróficos de *S. fradiae* e *S. birkinienensis* e verificaram um aumento de 200 a 1000 vezes na recombinação obtida quando comparada com o cruzamento por técnicas convencionais.

Usando linhagens com menor grau de parentesco (*P. roquefortii* e *P. chrysogenum*), ANNÉ *et al.* (1976) obtiveram colônias "híbridas" após fusão que prontamente segregaram a primeira linhagem parental; contudo a prototrofia dessas colônias e sua capacidade de produzir penicilina indicou a presença, ao menos em parte, do genoma de *P. chrysogenum*.

Fusão de protoplastos entre gêneros diferentes de leveduras (*S. cerevisiae* e *Schizosaccharomyces pombe*) foi obtida com sucesso por CARRAU *et al.* (1982), usando como meio de recuperação de heterocários, meios providos de fontes de carbono adequadas para os prováveis produtos de fusão.

A fusão de protoplastos é também utilizada para transferência de determinantes genéticos citoplasmáticos como os presentes em mitocôndrias. Desse modo, FERENCZY e MARÁZ (1977) transferiram mitocôndrias entre linhagens de mesmo tipo de reação sexual de *S. cerevisiae*, FUKUDA e KIMURA (1980), YAMASHITA *et al.* (1981) fizeram transferência intergenérica de mitocôndrias de *Hansenula wingei* para protoplastos de *S. cerevisiae* usando a metodologia de miniprotoplastos e MARÁZ e SUBIK (1981) fusionaram protoplastos de linhagens auxotróficas de *S. cerevisiae* de "reações sexuais" iguais e opostas, carregando

diferentes marcadores mitocondriais. Neste último caso, a expressão dos genes mitocondriais não foi prejudicada nem pelos genes nucleares ("mating-type") nem pelo método de transferência de genomas, tornando-se deste modo, possível o estudo genético por fusão de protoplastos. Recentemente TSUBOI (1981), trabalhando em *S. cerevisiae* com linhagens diplóides que eram deficientes respiratórios ou eram homozigotas para o locus tipo de reação sexual (a/a ou α/α) e portanto, incapazes de esporular, foram cruzados por fusão de protoplastos e induzidos a esporular sem reversão a células normais. Para isto, linhagens diplóides deficientes respiratórias foram cruzadas com linhagens haplóides respiratória competentes, com marcadores mitocondriais para resistência, e linhagens haplóides homozigotas para locus de tipos de reação sexual foram cruzadas com linhagens haplóides de tipos de reação sexual opostos. Este procedimento levou à formação de esporos, e a análise dos genótipos dos esporos revelou que quando os produtos de fusão foram cultivados sob condições para esporulação não ocorre cariogamia, núcleos diplóides sofrem meiose e ambos os núcleos, diplóide e haplóide, são capazes de desenvolver esporos.

Outros estudos têm sido realizados com os protoplastos ou com produtos de fusão destes. Assim, HINNEN *et al.* (1978), transformaram protoplastos de *S. cerevisiae* leu 2⁻ com plasmídeo bacteriano Col E1 carregando o gene de levedura leu 2⁺, ocorrendo inserção deste em várias regiões do genoma, incluindo a região leu 2⁻; BEGGS (1978), de maneira similar ,

transformou protoplastos de *S. cerevisiae* com um plasmídeo químico entre Col E1 e o plasmídeo 2 μ m juntamente com o gene leu 2⁺. GURINA *et al.* (1979), estudaram a composição proteica de protoplastos de *Candida utilis* e MANN e MECKE (1980), isolaram e caracterizaram membranas nucleares e núcleo de *S. cerevisiae* através de sua composição química e padrão eletrofórico de proteína total. DARLING *et al.* (1969) em *S. cerevisiae*; HAVELKOVÁ (1966) em *C. utilis*, *S. carlsbergensis*, *S. cerevisiae*, *S. lactis* e *Schizosaccharomyces pombe*; MIEGEVILLE *et al.* (1979) em *S. cerevisiae*, *C. albicans*, *C. neoformans* e *H. anomala* e NUNO CHACEL (1982 - comunicação pessoal) em *M. anisopliae* realizaram estudos com microscopia eletrônica do processo de formação de protoplastos e dos próprios protoplastos. GUMPERT (1980), realizou estudos com microscopia eletrônica da fusão de protoplastos em *Streptomyces hygroscopicus*. MORRIS (1978), utilizou protoplastos de *A. nidulans* para obtenção de DNA de alto peso molecular. BIRNBOIM (1971), obteve ácido ribonucléico e polirribossomos a partir de protoplastos de *Schizosaccharomyces pombe*. ROBINSON *et al.* (1981), verificaram a homologia de DNA entre *S. fumonjinensis* e *S. lipmanii* através da fusão de protoplastos dos mesmos e análise em gel de agarose.

Uma nova metodologia que tem sido aplicada com sucesso na fusão de protoplastos e que foi verificada em *S. cerevisiae* (WEBER *et al.*, 1981) é o estímulo da referida fusão por um campo elétrico de alto pulso, fazendo com que a fre-

qüência de fusão seja aumentada em cerca de 200 vezes quando comparada com experimentos sem tratamento com o campo elétrico.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. LINHAGENS UTILIZADAS

As linhagens utilizadas de *Metarhizium anisopliae* foram provenientes de diferentes Estados brasileiros e originariamente isoladas de insetos adultos de *Deois* (Homoptera, Cercopidae). Assim, foram usados as seguintes linhagens: E₆ (Espírito Santo); RJ-3 (Rio de Janeiro) e M (Manaus).

3.2. MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES UTILIZADAS

3.2.1. MEIO MÍNIMO (MM) (PONTECORVO e col., 1953)

NaNO ₃	6,0 g
KH ₂ PO ₄	1,5 g
KCl.....	0,5 g

MgSO ₄ . 7 H ₂ O.....	0,5 g
FeSO ₄	0,02 g
ZnSO ₄	0,02 g
Glicose.....	10,0 g
Agar.....	15,0 g
Água destilada.....	1000,0 g

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4%

3.2.2. MEIO COMPLETO SÓLIDO (MC) (AZEVEDO e COSTA, 1973)

Adicionou-se ao meio mínimo:

Extrato de levedura.....	0,5 g
Peptona.....	2,0 g
Caseína hidrolisada.....	1,5 g
Solução de vitaminas.....	1,0 ml
Solução de ácidos nucleicos.....	1,0 ml

pH ajustado para 6,8 com H₂SO₄ 4%

3.2.3. MEIO MÍNIMO LÍQUIDO (PONTECORVO e col., 1953)

Preparado segundo o item 3.2.1., não sendo adicionado ágar.

3.2.4. MEIO COMPLETO LÍQUIDO (PONTECORVO e col., 1953)

Preparado segundo os itens 3.2.1. e 3.2.2., não sendo adicionado o ágar.

3.2.5. MEIO MÍNIMO MAIS 2% DE MEIO COMPLETO E MEIO MÍNIMO MAIS 4% DE MEIO COMPLETO

Em tubos de ensaio, foram adicionados 2,5 ml de meio mínimo líquido mais 2% de meio completo líquido e meio mínimo mais 4% de meio completo líquido, respectivamente. Estes tubos foram autoclavados e conservados em refrigerador.

3.2.6. MEIO COMPLETO 2X CONCENTRADO

Preparado segundo os itens 3.2.1. e 3.2.2., onde de cada componente foi colocado em quantidade dobrada, com exceção da água.

3.2.7. MEIO MÍNIMO 2X CONCENTRADO

Preparado segundo o item 3.2.1., onde cada componente foi colocado em quantidade dobrada, com exceção da água.

3.2.8. MEIO MÍNIMO LÍQUIDO PARA CRESCIMENTO DE MICÉLIO

Ao meio mínimo preparado segundo o item 3.2.1., foram adicionados o(s) requisito(s) para cada marca auxotrófica.

3.2.9. MEIO PARA CRESCIMENTO DE MICÉLIO

Ao meio mínimo líquido preparado segundo o item 3.2.1., foram adicionados 2,0 g/l de caseína hidrolisada e 5,0 g/l de extrato de levedura.

3.2.10. MMKCl PARA REVERSÃO E OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE FUSÃO

Preparado segundo o item 3.2.7., onde o mesmo foi diluído no momento de uso com KCl 1,4M em tampão fosfato pH 5,8, na proporção 1:1.

3.2.11. MCKCl PARA OBTENÇÃO DE CRESCIMENTO DE CÉLULAS TOTAIS (PROTOPLASTOS, MICÉLIO E CONÍDIOS NÃO DIGERIDOS)

Preparado segundo o item 3.2.6., onde o mesmo foi diluído no momento de uso com KCl 1,4M em tampão fosfato pH 5,8 na proporção de 1:1.

3.2.12. SOLUÇÃO DE VITAMINAS

Ácido nicotínico.....	100,0 mg
Ácido p-aminobenzóico.....	10,0 mg
Biotina.....	0,2 mg
Piridoxina.....	50,0 mg
Riboflavina.....	100,0 mg
Tiamina.....	50,0 mg
Água destilada esterilizada.....	100,0 ml

A solução foi aquecida em banho-maria a 98°C por 15 minutos e guardada em frasco escuro, no refrigerador a 4°C sob clorofórmio.

3.2.13. SOLUÇÃO DE ÁCIDO NUCLEÍCO DE LEVEDURAS

- a) Ácido nucleico de leveduras: 2,0 g em 15,0 ml de HCl 1N
- b) Ácido nucleico de leveduras: 2,0 g em 15,0 ml de NaOH 1N

Ambas as soluções foram aquecidas a 98°C durante 20 minutos, misturadas, o pH ajustado para 6,0 com NaOH 4 % e filtradas. Completou-se o volume para 40 ml e manteve-se em refrigerador a 4°C sob clorofórmio.

3.2.14. SUPLEMENTOS ADICIONADOS AO MEIO MÍNIMO

Estoque de suplementos foram preparados, adicionando-se cada um deles em frascos contendo água destilada esterilizada. Estes foram aquecidos em banho-maria (98°C) por 15 minutos e conservados em refrigerador a 4°C (os estoques de vitaminas foram conservados em frascos escuros).

	Solução Estoque (20ml de água)	Quantidade adicionada por placa (20 ml de meio de cultura)	Concentração fi- nal no meio de cultura
Adenina	500,0 mg	0,1 ml	25,00 µg/ml
Lisina	1,0 g	0,1 ml	50,00 µg/ml
Cisteína	1,0 g	0,1 ml	50,00 µg/ml
Metionina	1,0 g	0,1 ml	50,00 µg/ml
Piridoxina	5,0 mg	0,1 ml	0,25 µg/ml
Biotina	4,0 mg	0,1 ml	0,20 µg/ml
Ácido nicotínico	10,0 mg	0,1 ml	0,50 µg/ml

3.2.15. SOLUÇÃO SALINA (0,85%)

Preparou-se uma solução de 8,5 g de NaCl em 1000 ml de água destilada. Foram colocados 10 ml em frascos e a seguir os mesmos foram autoclavados e conservados à temperatura ambiente.

3.2.16. SOLUÇÃO DE TWEEN 80 (0,1%)

Foram adicionados 0,1 ml de Tween 80 em 100,0 ml de água destilada com homogeneização e 2,5 ml da solução foram colocados em tubos de ensaio, que foram a seguir autoclavados e mantidos à temperatura ambiente.

3.2.17. SOLUÇÃO DE CASEÍNA HIDROLISADA

Preparou-se a solução, dissolvendo-se 100 mg de caseína hidrolisada em 10 ml de H₂O destilada esterilizada. Esta foi aquecida em banho-maria (98°C) por 15 minutos e a seguir conservada em refrigerador a 4°C.

3.2.18. SOLUÇÃO DE ALBUMINA 5%

Preparou-se uma solução com 5,0 ml de clara de ovo em 100 ml de água destilada. Filtrou-se e conservou-se em congelador.

3.2.19. SOLUÇÃO DE CLORONEB (1,4-dicloro-dimetoxil benzeno) (Du Pont, 65% P.A.)

Preparou-se a solução dissolvendo-se 100 mg de Cloroneb em 10 ml de água destilada esterilizada (concentração final de 6.500 µg/ml P.A.). Conservou-se em refrigeração a 4°C.

3.2.20. TAMPÃO FOSFATO pH 5,8

. Solução A

NaH ₂ PO ₄	24,0 g
Água destilada.....	1000,0 ml

. Solução B

Na ₂ HPO ₄ . 12 H ₂ O.....	71,6 g
Água destilada.....	1000,0 ml

Adicionaram-se 920,0 ml de solução A em 80,0 ml de solução B. As soluções A e B foram conservadas no refrigerador e o tampão fosfato foi preparado no momento de uso.

3.2.21. TAMPÃO FOSFATO pH 6,9

. Solução A

NaH_2PO_4	27,8 g
Água destilada.....	1000,0 ml

. Solução B

Na_2HPO_4	53,65 g
Água destilada.....	1000,0 ml

Adicionaram-se 45,0 ml da solução A em 55,0 ml da solução B e completou-se o volume para 200,0 ml com água destilada. As soluções A e B foram conservadas em refrigerador e o tampão foi preparado no momento de uso.

3.2.22. TAMPÃO LÍTIO-BORATO pH 8,3

Hidróxido de lítio (anidro).....	1,2 g
Ácido bórico.....	11,8 9 g
Água destilada.....	1000,0 ml

3.2.23. TAMPÃO TRIS-CITRATO pH 8,3

Trizma Base.....	6,3 g
Ajustar o pH com ácido cítrico.....	($\pm 1,6$ g)
Água destilada.....	1000,0 ml

3.2.24. α -NAFTILACETATO

α -naftilacetato.....	0,2 g
Acetona.....	10,0 ml
Água destilada.....	10,0 ml

3.2.25. β -NAFTILACETATO

β -naftilacetato.....	0,2 g
Acetona.....	20,0 ml

3.2.26. SOLUÇÃO PARA REVELAÇÃO DE ESTERASES

Fast Blue R.....	100,0 mg
α -naftilacetato.....	3,0 ml
β -naftilacetato.....	3,0 ml
Tampão fosfato pH 6,9.....	100,0 ml

3.2.27. SOLUÇÃO DE PERSULFATO DE AMÔNIA (AP)

Solução aquosa a 10% de AP.

3.2.28. SOLUÇÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO

As soluções foram preparadas nas concentrações de 95, 70 e 50%. As diluições do álcool para a produção das soluções foram realizadas com água destilada.

3.2.29. SOLUÇÃO DE GIEMSA

Diluiu-se uma parte de Giemsa em 66 partes de glicerina a 60°C e após o resfriamento, misturou-se com 66 partes de metanol. Esta solução foi mantida à temperatura ambiente.

3.2.30. SOLUÇÃO DE FIXAÇÃO

No momento de uso, foi preparada uma solução na proporção de 6 álcool etílico absoluto: 1 ácido acético glacial: 1 ácido lático.

3.2.31. SOLUÇÃO DE KCl 1,4M pH 5,8

Para o preparo desta solução, 104,38 g de KCl foram dissolvidos com agitação e aquecimento em 500 ml de solução A (tampão fosfato pH 5,8). Levou-se ao potenciômetro e adicionou-se solução B (tampão fosfato pH 5,8) até atingir-se pH 5,8. O volume final foi acertado para 1000 ml com tampão fosfato pH 5,8. Autoclavou-se e conservou-se em refrigerador.

3.2.32. SOLUÇÃO DE KCl 0,7M pH 5,8

Para preparo desta solução, um volume de KCl 1,4M foi diluído em igual volume de tampão fosfato pH 5,8. Autoclavou-se e armazenou-se em refrigerador.

3.2.33. SOLUÇÃO DE PEG 30%

. Solução A

CaCl ₂	11,0 g
Água destilada.....	1000,0 ml

. Solução B

Glicina.....	3,75 g
Água destilada.....	1000,0 ml

pH ajustado para 8,0 com NaOH 4 %.

Foram adicionados 10,0 ml da solução A em 10,0 ml da solução B e o volume corrigido para 100,0 ml com água destilada. O pH foi corrigido para 8,0 com NaOH 4 % e adicionado PEG 6000 em concentração final de 30%.

3.2.34. SOLUÇÃO DE ENZIMAS PARA PRODUÇÃO DE PROTOPLASTOS (HAMLIN *et al.*, 1981)

Para cada 1,0 ml de KCl 0,7M em tampão fosfato pH 5,8 foram adicionados 5,0 mg de enzima lítica, sendo 2,5 mg de "celulase CP" e 2,5 mg de "NOVO".

3.2.35. SOLUÇÃO DE DIFENILAMINA

Colocou-se 10,0 g de difenilamina pura em 100,0 ml de ácido acético glacial e adicionou-se 2,7 ml de ácido sulfúrico concentrado. Conservou-se no escuro e, no momento de uso, aqueceu-se a 100°C por 15 minutos.

3.2.36. SOLUÇÕES DE ÁCIDO PERCLÓRICO

0,5M	50,18 g	1000 ml (H ₂ O)
1N	100,36 g	1000 ml (H ₂ O)

3.2.37. SOLUÇÃO 5mM NaOH

Procedeu-se à confecção de uma solução estoque 1N e desta, fez-se a solução 5mM.

3.2.38. SOLUÇÃO ESTOQUE DE DNA PARA CURVA PADRÃO

Preparou-se a solução dissolvendo-se 80 mg de DNA purificado em 10 ml de solução 5mM de NaOH. As diluições para preparação de curva padrão foram realizadas com ácido perclórico 1N.

3.2.39. GEL DE ACRILAMIDA

Cyanogum a 5% em uma mistura de tampões Tris-Citrato pH 8,3 e Lítio-Borato pH 8,3 (na proporção 9:1).

3.2.40. SISTEMA DE FILTRO PARA TÉCNICA DE ENRIQUECIMENTO

No interior de filtros plásticos foram fixadas 6 camadas de gaze (mantidas esticadas) com o auxílio de fita crepe. Este conjunto foi envolto em papel de alumínio e autoclavado por 15 minutos a 120°C.

3.2.41. FILTROS BÜCHNER PARA FILTRAÇÃO DE MICÉLIO

Estes foram preparados, mantendo-se em seu interior duas folhas de papel de filtro Whatman nº 1. Foram envolvidas em papel de alumínio e papel comum e autoclavados por 15 minutos a 120°C.

3.2.42. USO DE PALITOS PARA TRANSFERÊNCIA DE COLÔNIAS

Palitos roliços adquiridos no comércio foram autoclavados em água por 6 vezes consecutivas (sendo lavado e a água trocada a cada vez) e então esterilizados em forno por 3 horas. Depois de usados, eram novamente autoclavados, secos e esterilizados para posterior uso.

3.2.43. ESTERILIZAÇÃO E INCUBAÇÃO

Os meios de culturas e as soluções foram esterilizadas em autoclave por 15 minutos a 120°C (exceto nos casos assinalados). Os frascos que necessitaram ser utilizados e esterilizados, foram autoclavados a 120°C por 35 minutos (filtros; frascos de produção de protoplastos, etc.). A temperatura de incubação foi de 28°C, exceto quando foi necessário deixar o material à temperatura ambiente.

3.3. SOBREVIVÊNCIA À LUZ ULTRAVIOLETA

Suspensões de conídios das linhagens selvagens E₆ e RJ em tween 80 foram observados ao microscópio com o auxílio de uma Câmara de Neubauer, determinando-se assim o número de conídios por mililitro. Estas suspensões foram diluídas em solução salina (1:10), colocadas em placas de Petri esteril

lizadas, irradiadas com luz ultravioleta a diferentes intensidades ($\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{s}$). Após cada irradiação, diluições apropriadas foram feitas em solução salina 0,85% e 0,1 ml foi semeado em placa contendo MC. As placas foram incubadas a 28°C em ausência de luz. Findo este período, as colônias sobreviventes foram contadas e procedeu-se o cálculo da curva de sobrevivência, tomando-se o número de colônias obtidas no tempo 0 minutos como 100% de sobrevivência. Estimou-se deste modo, o tempo de irradiação que permitia 5% de sobrevivência para as diferentes linhagens.

3.3.1. DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ENRIQUECIMENTO POR FILTRAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE MUTANTES AUXOTRÓFICOS

Suspensões de conídios em tween 80 (0,1%) das linhagens selvagens (E_6 e RJ) e mutantes para uma marca auxotrófica e uma marca para coloração (E_6A^-Y e RJA^-Y), foram produzidas com conídios crescidos em MC inclinado por 7-8 dias (28°C).

Para cada linhagem, quantidades de cerca de 10^7 conídios por ml foram misturados (E_6 e E_6A^-Y ; RJ e RJA^-Y) e adicionadas em erlenmeyers contendo 50 ml de meio mínimo líquido, para os tempos 0 - 5 - 10 - 15 - 20 e 25 horas. Estes erlenmeyers foram incubados com agitação rotatória (150 rpm) a 28°C. Após cada período de incubação, o conteúdo do frasco foi passado através de filtro contendo 6 camadas de gaze e centri

fugado (10 minutos a 3000 rpm). Diluições apropriadas foram feitas em solução salina 0,85% e semeadas em placas contendo MC. As placas foram incubadas por 7-8 dias (28°C). Após este período, as colônias foram contadas (sendo possível diferenciar mutantes de selvagens, pois os primeiros são amarelos) e estabeleceu-se a porcentagem de cada linhagem em relação ao número total de colônias para cada tempo.

3.3.2. OBTENÇÃO DE MUTANTES MORFOLÓGICOS

Suspensões de conídios das linhagens selvagens (E₆ e RJ), contendo 10⁷ conídios/ml (contados com o auxílio da Câmara de Neubauer), foram diluídas em solução salina 0,85% (1:10) e irradiadas na intensidade de luz ultravioleta que propiciasse 95% de morte.

As suspensões irradiadas foram diluídas e semeadas em placa contendo MC de modo que crescessem de 30 a 100 colônias por placa. Estas placas foram incubadas a 28°C por 7-8 dias. Findo este período, as colônias que possuíam coloração ou morfologia alteradas e que também cresciam em MM foram consideradas mutantes morfológicos.

3.3.3. OBTENÇÃO DE MUTANTES AUXOTRÓFICOS

Suspensões de conídios das linhagens mutantes morfológicos em tween 80 0,1% foram obtidas com conídios crescidos em MC inclinado por 7-8 dias. A concentração destas suspensões foram determinadas como descrito no item 3.3., sendo irradiadas do mesmo modo. Após irradiação, a suspensão total foi transferida para frasco contendo 50 ml de MM líquido que foi agitado por um período de 20-25 horas. Após este período, o MM foi filtrado através de gaze (item 3.2.41.) para um outro frasco erlenmeyer esterilizado e vazio e novamente agitado a 28°C no período acima citado. Este procedimento foi repetido por três vezes, sendo que após a última filtração o MM foi centrifugado (3000 rpm 10 minutos), o "Pellet" ressuspense em cerca de 3,0 ml de solução salina esterilizada e semeado em MC. As placas foram incubadas (28°C) por um período de 7-8 dias. Todas as colônias que se desenvolveram nestas placas, foram transferidas para placas contendo MM, com auxílio de palitos de madeira esterilizados na disposição de 5 x 5 + 1 (AZEVEDO *et al.*, 1976). Colônias que não se desenvolveram neste meio foram consideradas como sendo mutantes auxotróficos. O local do ágar em que as mesmas foram inoculadas, foi cortado e transferido para tubo contendo MC. Estes foram agora incubados a 28°C por 7 - 8 dias, conseguindo-se deste modo, conídios para ensaios de deficiências nutritivas.

Placas contendo MM sólido mais cada uma das soluções (caseína hidrolisada, ácidos nucleicos, vitaminas e ex

trato de leveduras) foram feitas e deixadas secar em estufa a 28°C por 24 horas. Após este período, conídios provenientes dos mutantes auxotróficos foram colocados de maneira equidistante nas referidas placas e as mesmas foram incubadas por 2-3 dias (28°C). Assim, o crescimento dos mutantes em uma das placas, e não em MM, indicava a deficiência de cada um, o que levou à obtenção de mutantes morfológicos e auxotróficos simples. Para a obtenção de mutantes morfológicos e com dupla auxotrofia o mesmo procedimento foi realizado, adicionando-se o requisito para a primeira marca ao MM líquido (usado para filtração) e ao MM sólido adicionado de aminoácidos, vitaminas, ácidos nucleicos e extrato de leveduras.

3.3.4. TESTE DE REVERSÃO

Para o referido teste, suspensões de conídios de todos os mutantes obtidos, foram feitas em solução de tween 80, de tal modo que as mesmas tivessem 10^7 conídios/ml. Estas foram semeadas em MM e incubadas a 28°C por 7-8 dias. Após este período verificou-se a presença ou ausência de crescimento de colônias.

3.3.5. DETERMINAÇÃO DO TEMPO PARA PRODUÇÃO DE PROTOPLASTOS

Quantidades constantes de micélio obtido por

24 horas de agitação em meio produzido segundo o item 3.2.9., foram resuspendidas em quantidades constantes de estabilizador osmótico (KCl 0,7M) e complexo enzimático (HAMLYN *et al.*, 1981) por períodos variáveis de tempo (0 - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 minutos). Após cada um destes períodos, a suspensão de micélio foi lavada com KCl 0,7M por centrifugação (500 rpm - 30 segundos). O sobrenadante foi novamente lavado por centrifugação (4000 rpm - 10 minutos), ressuspendido em quantidades constantes de KCl 0,7M e o número de protoplastos determinados por contagem em câmara de Neubauer.

3.3.5.1. Produção de protoplastos

Conídios crescidos em MC inclinado a 28°C por 7-8 dias, foram suspensos em solução salina e determinadas suas concentrações (conídios/ml) com o auxílio de Câmara de Neubauer e microscópio. Estas foram adicionadas em meio para produção de micélio (item 3.2.9.) mais os requisitos de cada mutante para uma concentração final de 10^6 conídios/ml. O meio assim obtido, foi mantido em agitador rotatório (150 rpm) a 28°C por 24 horas. Findo este período, o micélio desenvolvido foi filtrado em filtro Büchner com auxílio de bomba de vácuo e lavado em KCl 1,4M (tampão fosfato pH 5,8). Determinou-se a seguir, seu peso úmido. Este micélio foi colocado em presença de KCl 0,7M (tampão fosfato pH 5,8) e complexo de enzimas líticas na proporção de 50 mg de micélio: 1,0 ml de KCl 0,7M : 5 mg de enzima (50% de celulase CP e 50% de NOVO) (HAMLYN *et*

al., 1982). Agitou-se em agitador recíproco (120 rpm) por 2:30 a 3:00 horas. Após este período, verificou-se a presença de protoplastos com o auxílio de microscópio (uma gota da suspensão que havia sido agitada sobre lâmina e lamínula). Uma vez observada a presença de protoplastos, centrifugou-se a suspensão por 30 segundos a 500 rpm, retirou-se o sobrenadante e o mesmo foi centrifugado por 10 minutos a 4000 rpm. O sobrenadante foi desprezado, ressuspensão o "pellet" em KCl 0,7M esterilizado e novamente centrifugado (4000 rpm; 15 minutos). Repetiu-se esta operação mais 2 vezes.

3.3.6. CONTAGEM DE PROTOPLASTOS

Os protoplastos obtidos no item 3.3.5.1. ("pellet") foram ressuspensos em KCl 0,7 M (tampão fosfato pH 5,8) (volume fixo) e contados em Câmara de Neubauer com o auxílio de microscópio óptico.

3.3.7. FUSÃO DE PROTOPLASTOS (PEBERDY, 1979)

Os protoplastos obtidos em KCl 0,7M foram misturados em quantidades iguais (nunca menos que 10^6 protoplastos/ml) centrifugados a 4000 rpm - 10 minutos e o pellet lavado por centrifugação em presença de KCl 0,7M mais 2 vezes. O pellet assim obtido, foi ressuspensão em PEG (1,0 ml) pré-a-

quecido (30°C) e mantido em banho-maria (30°C) por 10 minutos. Após este período, adicionou-se KCl 0,7M (cerca de 25 ml) e centrifugou-se por 10 minutos 4000 rpm. Este procedimento foi repetido duas vezes. O pellet assim obtido, foi ressuspenso em 1 ml de KCl 0,7M e diluições apropriadas (1:10) foram feitas também em KCl 0,7M. Estas diluições foram semeadas "pour plate" (1,0 ml) em MMKCl (-1; -2) e MCKCl (diluições conforme o número de protoplastos).

3.3.8. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE HIFAS, ESFEROPLASTOS E CONÍDIOS NA SUSPENSÃO DE PROTOPLASTOS

Os protoplastos das linhagens mutantes obtidos no item 3.3.5.1. foram semeados por "pour plate" em MC e MCKCl (45 - 50°C). O crescimento de colônias neste meio de cultura (MC), indica o número de hifas e conídios que existem na solução de protoplastos quando comparado com a suspensão semeada em placas com MCKCl. A semeadura foi feita com diversas diluições.

3.3.9. TESTE DE REVERSÃO EM PROTOPLASTOS

Suspensões de protoplastos obtidos no item 3.3.5.1. foram semeados por "pour plate" em MMKCl (45 - 50°C) sem diluição. As placas foram incubadas a 28°C por 7-8 dias e constatou-se a presença de revertentes pelo crescimento de co

lônias.

3.3.10. OBTENÇÃO DE HETEROCÁRIOS

3.3.10.1. Fusão de protoplastos (PEBERDY, 1979)

Das placas de MMKC1, oriundas de fusão de protoplastos (item 3.3.7.) e contendo pequenas colônias, foram recortados blocos de ágar (contendo estas colônias) que foram transferidas para placas contendo MM e MC. Incubou-se estas placas a 28°C por 15-20 dias.

3.3.10.2. Frequência de fusão de protoplastos

Esta foi determinada como sendo:

$$\frac{\text{colônias desenvolvendo em MMKC1}}{\text{colônias desenvolvendo em MCKC1}}$$

3.3.10.3. Análise de setores oriundos de colônias obtidas em fusão de protoplastos

Dos setores obtidos nas placas contendo MC, foram feitas suspensões em solução salina 0,85%. Estas soluções, após serem diluídas convenientemente, foram semeadas em MC de tal modo que se obtivessem colônias isoladas (10 a 15 colônias

por placa). Estas placas foram incubadas (28°C) por 7-8 dias. As colônias isoladas que a^í se desenvolveram, foram transferidas para placas contendo MC na disposição de 5 x 5 + 1 para confecção de placas mestras. Destas placas, as colônias foram transferidas com o auxílio de um replicador multifio (AZEVEDO *et al.*, 1976) para placas contendo MM mais uma combinação dos requisitos nutricionais exigidos pelos mutantes participantes da fusão. Estas placas foram incubadas por 48 horas (28°C), periodo ap^ós a qual fez-se a leitura dos mesmos.

3.3.10.4. Obtenção de heterocário pela metodologia clássica (ROPER, 1952)

Conídios das diferentes linhagens (com complementação para marcas auxotróficas e morfológicas) foram colocados em tubos de ensaio contendo 2,5 ml de MM líquido suplementado com 2% e 4% de MC líquido (permite uma germinação inicial dos conídios). Estes tubos foram incubados por 10 dias (28°C) e a película formada na superfície do meio foi transferida para placas contendo MM s^ólido. Ap^ós incubação (28°C - 10 dias) uma extremidade desta película foi novamente transferida para placas contendo MM s^ólido e novamente incubadas a 28°C por mais 10 dias, para evitar-se crescimento devido a resquícios de MC vindos dos tubos.

3.3.10.5. Obtenção de diplóides

Tanto os conídios de colônias heterocarióticas em MM, provenientes de fusão de protoplastos, quanto os de película (metodologia clássica), foram usados para obtenção de suspensões em Tween 80, 0,1% (cerca de 10^7 conídios/ml). Estas soluções foram semeadas em MM sem diluição e com diferentes diluições (10^{-5} e 10^{-6}) e incubadas (28°C) por 6-7 dias. As colônias que se desenvolveram nestas placas foram transferidas novamente para MM (prováveis diplóides) e MC (para testar estabilidade). Incubou-se por 7-8 dias (28°C).

3.3.10.6. Haploidização dos diplóides

Todos os prováveis diplóides, foram inoculados em MC mais quantidades de Cloroneb (AZEVEDO *et al.*, 1977) para dar concentrações finais de 75, 100 e 150 µg/ml.

3.4. COLORAÇÃO DE CONÍDIOS

Conídios com 7-8 dias de crescimento em MM a 28°C, foram coletados, colocados sobre lamínula em presença de albumina 5% e homogeneizados com o auxílio de outra lamínula. Após um período de secagem, os conídios foram fixados por 15 minutos em solução de álcool absoluto: ácido acético glacial: ácido lático. Este procedimento foi seguido de hidratação com

soluções de álcool (95 - 70 - 50%) e água destilada por cinco minutos em cada fase. A seguir, o material sofreu hidrólise ácida em presença de HCl 1N durante 20 minutos a 62°C em banho-maria e foi lavado com água destilada duas vezes. Logo após, o material foi corado com 10 ml de tampão fosfato pH 6,9 mais 16 gotas de solução de Giemsa, lavado com tampão fosfato e observado ao microscópio óptico (as lamínulas foram tornadas permanentes pela passagem em acetona e xilol um minuto em cada fase e colocadas sobre lâmina na presença de Bálsamo do Canadá). O tamanho dos conídios foi determinado com o auxílio de uma escala graduada em microscópio óptico.

3.4.1. MEDIDA DO TAMANHO DOS CONÍDIOS

Com o material preparado como no item 3.4., determinou-se a medida de conídios, usando-se para isto, uma ocular micrométrica adaptável ao microscópio óptico. As medidas tomadas foram diâmetros maior e menor dos conídios.

3.4.2. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE NÚCLEOS POR CONÍDIO

Conídios desenvolvidos em MM e MC por 7-8 dias a 28°C foram preparados como no item 3.4., observados ao microscópio óptico e determinada a porcentagem média de núcleos por conídio. Foram empregados 400 conídios.

3.5. DETERMINAÇÃO DOS PADRÕES DE ESTERASES EM *M. anisopliae* POR ELETROFORESE EM GEL DE ACRILAMIDA

O método usado foi o de SCANDALIOS (1969) mo
dificado.

3.5.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

O material a ser ensaiado (*M. anisopliae*) foi crescido em tubos de ensaio contendo MC líquido (3,0 ml) por 5 a 7 dias. A película de micélio formada na superfície do meio foi triturada em outro frasco com o auxílio de um bastão de vidro em presença de 0,5 ml do tampão do gel (9 partes de Tris-Citrato pH 8,3 para 1 parte de Lítio-Borato pH 8,3). Este material foi centrifugado a 4000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi diluído (1:10) com o mesmo tampão e aplicado no gel de eletroforese.

3.5.2. PLACA DE GEL DE ACRILAMIDA

Foram dissolvidos 5 g de Cyanogum em 90 ml de tampão Tris-Citrato pH 8,3 e 10 ml de tampão Lítio-Borato pH 8,3. Após a completa dissolução do Cyanogum, foram adicionados 0,1 ml de TEMED (Tetramethyl-ethylenodiamine) e 0,8 ml de solução AP (persulfato de amônio). Imediatamente, a mistura foi vertida em uma placa de vidro de 15 cm x 16 cm x 0,3 cm .

Uma outra placa de vidro foi posta por cima do gel, tendo-se o cuidado de não deixar bolhas de ar.

Deixou-se polimerizar em temperatura ambiente por 20 minutos e depois colocou-se em geladeira (4°C) por, no mínimo, mais 20 minutos.

Uma vez polimerizado o gel, a placa de vidro de cima foi retirada e canaletas no gel foram feitas, com o auxílio de um pente de metal com 12-14 dentes.

3.5.3. APLICAÇÃO DAS AMOSTRAS E CORRIDA DA ELETROFORESE

Cada amostra foi embebida num pequeno retângulo de papel de filtro Whatman nº 3, o qual, depois de ser retirado o excesso com o auxílio de um papel poroso, foi colocado em um dos canais feitos no gel.

Após a aplicação das amostras a placa foi posta em uma cuba de eletroforese horizontal. O tampão do eletrodo foi o Lítio-Borato pH 8,3 e a corrida foi feita do pólo negativo para o positivo com uma amperagem de 25 mA - 30 mA / 170V - 200V, em geladeira, por um tempo de 4 a 5 horas.

3.5.4. REVELAÇÃO DAS ESTERASES E PLASTIFICAÇÃO DO GEL

Após a corrida, o gel foi colocado em uma cuba de plástico em presença de 100 ml da solução para revelação (item 3.2.26.) a 37°C por 40 minutos).

Este procedimento sendo realizado, seguiu-se a retirada da solução corante, lavagem do gel em água destilada e fixação em álcool etílico 50%, por no mínimo, 10 minutos a 40°C.

Para plastificar o gel, retirou-se o álcool, lavou-se em água corrente e a plastificação foi feita em papel celofane com auxílio de um bastidor de bordado.

3.6. EXTRAÇÃO E DOSAGEM DE DNA

Uma grande quantidade de conídios foi obtida a partir de uma suspensão bem concentrada em tween 80 0,1% por lavagens sucessivas com água destilada em centrifugação (10 minutos - 4000 rpm). Estes conídios foram ressuspensos em 10 ml de tween 80 0,1% e divididos em 3 frações a saber: 1,0 ml para contagem de esporos, 2,0 ml para determinação de peso seco e 7,0 ml para extração de DNA. Esta última fração foi centrifugada (10 minutos - 4000 rpm) e o precipitado foi ressuspendido em acetona fria. Centrifugou-se novamente e o precipitado ressuspensionado em 7,0 ml de éter sulfúrico P.A.. Repetiu-se este procedimento mais uma vez (centrifugação e ressuspensão do "Pellet") e o pricipi

tado foi deixado à temperatura ambiente até não haver mais odor de éter. Conservou-se em gelo aproximadamente 20 minutos e o precipitado foi ressuspenso em 4,0 ml de ácido perclórico 0,5M frio mais 0,1 ml de tween 80 0,1% e deixado a 0°C por 20 minutos. Após este tratamento, foi incubado em banho-maria (70°C - 50 minutos) centrifugado (4000 rpm - 10 minutos) e coletado o sobrenadante. A seguir, ao precipitado restante, adicionou-se mais 3,0 ml de ácido perclórico 0,5M e novamente centrifugou-se, guardando este segundo sobrenadante juntamente com o primeiro. Este procedimento foi repetido mais uma vez e o conjunto de sobrenadantes foi conservado em refrigerador para dosagem de DNA.

Para a dosagem de DNA, a cada 2,0 ml da solução de concentração desconhecida, adicionou-se 4,0 ml de solução de difenilamina. Como "blank" utilizou-se 2,0 ml da solução que se extraiu o DNA do fungo e 4 ml de ácido acético glacial mais 0,1 ml de ácido sulfúrico concentrado. Realizou-se a leitura em 550 nm. Antes da leitura, as soluções foram aquecidas a 100°C por 15 minutos.

4. RESULTADOS

4.1. SOBREVIVÊNCIA À LUZ ULTRAVIOLETA (U.V.)

Suspensões de conídios das linhagens selvagens E₆ e RJ-3 foram irradiadas com diferentes intensidades de luz ultravioleta ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$) conforme descrito no item 3.3.. Para as duas linhagens, estimou-se a intensidade de irradiação necessária para obtenção de 5% de sobrevivência (BARACHO *et al.*, 1977). Nas Tabelas 1 e 2 estão os resultados obtidos para as duas linhagens selvagens (E₆, RJ-3). A partir destes dados, determinaram-se as curvas de sobrevivência das referidas linhagens (Figuras 1 e 2). As intensidades necessárias para conseguir-se 95% de morte a partir de uma suspensão de conídios em E₆ e RJ-3 foram de $97,72 \mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$ e $77,27 \mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$, respectivamente.

TABELA 1 - Número e porcentagem relativa de conídios sobreviventes a luz ultravioleta (média de duas repetições) do isolado selvagem E₆.

Intensidade de irradiação ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$)	Número de sobreviventes			Porcentagem de sobreviventes
	($\times 10^7$)	($\times 10^7$)	($\bar{M}$)	
0	0,613	4,501	$2,55 \times 10^7$	$1,00 \times 10^2$
18	0,788	1,131	$0,95 \times 10^7$	$7,70 \times 10^1$
36	0,204	0,561	$0,38 \times 10^7$	$2,30 \times 10^1$
72	0,100	0,213	$0,15 \times 10^7$	$0,95 \times 10^1$
108	0,016	0,042	$0,03 \times 10^7$	$0,18 \times 10^1$
216	0,0001	0,002	$0,90 \times 10^4$	$5,90 \times 10^{-2}$
432	0,0002	0,000	$0,10 \times 10^4$	$4,60 \times 10^{-2}$

TABELA 2 - Número e porcentagem relativa de conídios sobreviventes a luz ultravioleta do isolado selvagem RJ-3.

Intensidade de irradiação ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$)	Número de sobreviventes			Porcentagem de sobreviventes
	($\times 10^7$)	($\times 10^7$)	($\bar{M}$)	
0	4,920	0,930	$2,93 \times 10^7$	$1,00 \times 10^2$
18	3,990	0,810	$2,40 \times 10^7$	$8,20 \times 10^1$
36	2,380	0,730	$1,56 \times 10^7$	$6,38 \times 10^1$
72	0,309	0,050	$0,18 \times 10^6$	$5,82 \times 10^0$
108	0,029	0,005	$0,15 \times 10^6$	$4,44 \times 10^{-1}$
216	0,001	0,0005	$0,62 \times 10^4$	$1,40 \times 10^{-2}$
432	0,0004	0,000	$0,95 \times 10^2$	$2,00 \times 10^{-4}$

Figura 1 - Curva de sobrevivência do isolado E₆ de *M. anisopliae*, com luz ultravioleta ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^2/\text{s}$).

Figura 2 - Curva de sobrevivência do isolado RJ-3 de *M. anisopliae*, com luz ultravioleta ($\mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^2/\text{s}$).

4.2. DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ENRIQUECIMENTO POR FILTRAÇÃO E OBTENÇÃO DE MUTANTES AUXOTRÓFICOS

Suspensões de conídios preparados conforme item 3.3., foram utilizadas para determinação do tempo necessário na obtenção de número máximo de colônias auxotróficas a partir das linhagens selvagens e auxotróficas obtidas por irradiação com luz ultravioleta ($E_6 : 92,72 \mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$ RJ3 $77,27 \mu\text{W}/\text{cm}^2 \cdot 10^{-2}/\text{s}$). A Figura 3 mostra o esquema para este enriquecimento e posteriores passos utilizados para caracterização. A Tabela 3 mostra a porcentagem relativa no número de colônias mutantes e selvagens dos isolados E_6 e RJ-3 para os diferentes tempos de agitação e as Figuras 4 e 5 mostram as curvas obtidas com o uso destes procedimentos. A Tabela 4 mostra os mutantes obtidos, bem como o número de mutantes para cada marca auxotrófica e a Tabela 5 mostra os mutantes com as marcas auxotróficas duplas, bem como a simbologia usada para caracterizá-los. Deste modo, estabeleceu-se o tempo entre 20 e 24 horas como o ideal para crescimento em meio líquido com agitação e obtenção de colônias auxotróficas. A porcentagem de mutantes auxotróficos obtidos através desta metodologia variou de 2,34% a 6,13%.

Figura 3 - Esquema seguido para enriquecimento e obtenção de mutantes morfológicos e auxotróficos.

Tabela 3 - Porcentagem relativa no número de colônias mutantes e selvagens dos isolados E₆ e RJ-3 para os diferentes tempos de agitação após filtração (média de duas repetições).

Tempo (h)	E ₆		RJ-3	
	Selvagem	Mutante	Selvagem	Mutante
0	92,97	7,02	62,8	37,2
5	82,26	17,73	57,95	42,05
10	81,53	18,46	58,3	41,7
15	47,0	53,0	73,3	27,7
20	12,78	87,21	6,19	93,8
25	6,14	93,85	3,94	96,05

Tabela 4 - Número de cada tipo de mutantes obtidos com a técnica de enriquecimento por filtração.

Deficiência	Isolado	
	E ₆	RJ
Adenina	02	02
Lisina	13	02
Metionina	01	02
Cisteína	01	01
Valina	-	01
Piridoxina	01	01*
Biotina	01	01*
Ácido nicotínico	01	-
	Σ 20	10

* Colônias que apresentam crescimento colonial.

Figura 4 - Porcentagem relativa entre colônias auxotróficas e prototróficas por tempo de cultivo em MM do isolado E₆.

Figura 5 - Porcentagem relativa entre colônias auxotróficas e prototróficas por tempo de cultivo em MM do isolado RJ-3.

Tabela 5 - Mutantes obtidos nos isolados E₆ e RJ-3 através de irradiação com luz U.V.

Isolado selvagem irradiado	Morfologia (código)	Mutante auxotrófico	Símbologia da linhagem
E ₆	Y (amarelo) (YLO)	[Piridoxina (PIR) Adenina (ADE)	YP ⁻ A ⁻
		[Piridoxina (PIR) Lisina (LYS)	YP ⁻ L ⁻
		[Adenina (ADE) Lisina (LYS)	YA ⁻ L ⁻
		[Adenina (ADE) Cisteína (CYS)	YA ⁻ C ⁻
	V (violeta) (VIN)	[Metionina (MET) Biotina (BIO)	VM ⁻ B ⁻
RJ-3	Y (amarelo) (YLO)	[Adenina (ADE) Metionina (MET)	YA ⁻ M ⁻
		[Adenina (ADE) Cisteína (CYS)	YA ⁻ C ⁻
		[Adenina (ADE) Lisina (LYS)	YA ⁻ L ⁻
	V (violeta)	[Lisina (LYS) Ácido nicotínico (NIC)	VL ⁻ N ⁻
		[Lisina (LYS) Cisteína (CYS)	VL ⁻ C ⁻
		[Lisina (LYS) Metionina (MET)	VL ⁻ M ⁻

4.3. TESTE DE REVERSÃO

Os mutantes utilizados tanto para obtenção de heterocário como para fusão de protoplastos, foram ensaiados quanto à reversibilidade das suas marcas auxotróficas e morfológicas, para servirem como controles dos testes realizados. A Tabela 6 mostra a frequência de reversão espontânea para cada mutante.

Tabela 6 - Frequência de reversão espontânea dos mutantes utilizados na referida dissertação.

Isolado	Mutantes	Frequência de reversão em 10^7 conídios
E ₆	YP ⁻ A ⁻	<1
	YP ⁻ L ⁻	<1
	YA ⁻ L ⁻	<1
	YA ⁻ C ⁻	<1
	VM ⁻ B ⁻	<1
RJ-3	YA ⁻ M ⁻	<1
	YA ⁻ C ⁻	<1
	YA ⁻ L ⁻	<1
	VL ⁻ N ⁻	<1
	VL ⁻ C ⁻	<1
	VL ⁻ M ⁻	<1
Manaus*	YA ⁻ M ⁻	<1

* Obtido e gentilmente cedido por Nuno Chacel, do Laboratório de Genética da Universidade de Brasília.

4.4. PRODUÇÃO DE PROTOPLASTOS

Protoplastos, tanto do isolado E₆ quanto do isolado RJ-3, foram produzidos segundo o item 3.3.5..

Determinando-se assim um tempo ideal (20 a 24 horas), no qual ocorre uma produção máxima de protoplastos homogêneos. A Tabela 7 demonstra o número de protoplastos obtidos nos diferentes isolados; a Figura 6 compara a produção dos mesmos e a Figura 7 mostra estes protoplastos.

Tabela 7 - Número de protoplastos produzidos em diferentes tempos de tratamento com o complexo lítico ($\times 10^6$).

Tempo (minutos)	Isolado E ₆				Isolado RJ-3			
	$\bar{M}$				$\bar{M}$			
30	0,15	0,25	0,40	0,26	3,86	1,25	1,30	2,14
60	0,30	0,65	1,50	0,82	3,65	12,00	7,84	7,83
90	0,90	1,95	2,40	1,75	17,25	6,60	15,30	13,05
120	1,50	2,55	2,60	2,22	19,40	8,10	16,40	14,63
150	3,00	3,10	2,25	2,78	23,00	7,80	21,20	17,33
180	2,70	3,45	2,05	2,73	20,40	12,20	27,90	20,17

Figura 6 - Produção de protoplastos dos isolados E₆ e RJ-3 em diferentes tempos de tratamento frente ao complexo lítico.

Figura 7 - Protoplastos produzidos a partir de micélio de *M. anisopliae* tratado com complexo lítico, podendo-se observar a presença de esferoplastos e hifas. (Aumento de 400X).

4.5. OBTENÇÃO DE HETEROCÁRIOS

4.5.1. METODOLOGIA CLÁSSICA (ROPER, 1952)

Metodologia para obtenção de heterocários entre mutantes auxotróficos e morfológicos complementares E_6 e mutantes do isolado RJ-3, bem como dentro dos mutantes do isolado E_6 e RJ-3 foi realizada segundo o item 3.4.10.4., os quais constam da Tabela 8.

As películas obtidas entre os mutantes do mesmo isolado (E_6) em MM + 4% MC, quando transferidos para placas contendo somente MM, cresceram vigorosas com as mesmas apresentando coloração mista dos dois parentais ou não, isto é, não apresentaram a coloração verde do parental selvagem (Fig. 8). Quando, pedaços de ágar foram retirados das bordas destas colônias e novamente transferidos para MM, estes apresentaram-se de forma idêntica às colônias heterocarióticas anteriores e não formando setores.

As películas obtidas, por sua vez, entre mutantes dos isolados E_6 e RJ-3, na sua grande maioria, quando transferidas para MM não conseguiram se desenvolver em colônias heterocarióticas (Fig. 9), com exceção dos cruzamentos $E_6YA^-P + RJVL^-N^-$, $E_6YA^-P^- + RJVL^-C^-$, $E_6VM^-B^- + RJVL^-C^-$ que já nestas placas (MM), produziram (por uma única vez) setores vigorosos e com características diferentes das linhagens envolvidas nos cruzamentos (Fig. 10). Do mesmo modo, os cruzamentos dentro

do isolado RJ-3, na grande maioria das vezes, não produziram películas de heterocário, sendo porém, colônias com as mesmas características ($E_6 + RJ-3$) obtidas por uma única vez nos cruzamentos $RJYA^-M^- + RJVL^-N^-$ e $RJYA^-M^- + RJVL^-C^-$.

4.5.1.2. Obtenção de diplóides e segregação

Das suspensões de conídios (10^7 conídios/ml) , obtidas a partir das colônias heterocarióticas provenientes dos cruzamentos dentro do isolado E_6 e plaqueadas em MM (10^6 conídios/ml), somente o cruzamento $E_6VM^-B^- + E_6YA^-C^-$ (por uma única vez) originou conídios capazes de crescer neste meio. Estes conídios eram amarelos e uma vez tratados com Cloroneb em MC (item 3.2.19) não produziram setores.

Dos setores vigorosos obtidos nos demais cruzamentos, conídios foram semeados tanto em MM como MC. Neste último meio as colônias apresentaram-se com crescimento estável enquanto que, no MM cresciam, mas com a produção de pequenos setores. Estes pequenos setores quando novamente transferidos para o mesmo meio (MM), comportaram-se da mesma maneira. Conídios das colônias estáveis em MC quando crescidos em MC com Cloroneb, produziram setores que apresentaram o mesmo comportamento.

Tabela 8 - Cruzamentos realizados para obtenção de heterocariose (PONTE-CORVO e ROPER, 1952) em *M. anisopliae*.

Isolados	Cruzamento
$E_6 + E_6$	$VM^{-}B^{-} + YA^{-}P^{-}$ $VM^{-}B^{-} + YA^{-}C^{-}$ $VM^{-}B^{-} + YP^{-}L^{-}$ $VM^{-}B^{-} + YA^{-}L^{-}$
$E_6 + RJ-3$	$VM^{-}B^{-} + YA^{-}L^{-}$ $VM^{-}B^{-} + VL^{-}N^{-}$ $VM^{-}B^{-} + VL^{-}C^{-}$ $YA^{-}P^{-} + VL^{-}N^{-}$ $YA^{-}P^{-} + VL^{-}C^{-}$ $YA^{-}P^{-} + VL^{-}M^{-}$ $YA^{-}C^{-} + VL^{-}N^{-}$ $YA^{-}C^{-} + VL^{-}M^{-}$ $YP^{-}L^{-} + YA^{-}C^{-}$ $YP^{-}L^{-} + YA^{-}M^{-}$
$RJ-3 + RJ-3$	$YA^{-}C^{-} + VL^{-}M^{-}$ $YA^{-}M^{-} + VL^{-}N^{-}$ $YA^{-}M^{-} + VL^{-}C^{-}$

Figura 8 - Colonias heterocarióticas obtidas nos cruzamentos (metodologia clássica) dentro do isolado E₆ de *M. anisopliae*.

Figura 9 - Película heterocariótica resultante do cruzamento entre mutantes dos isolados E₆ e RJ-3 e dentro do isolado RJ-3.

Figura 10 - Película heterocariótica apresentando "setores vigorosos" já em MM. (Cruzamentos $E_6 \times E_6$ e $E_6 \times RJ_3$).

4.5.1.3. Análise da variabilidade genética das linhagens selvagens, mutantes e setores de *M. anisopliae*

Esta análise foi feita através de eletroforese de esterases em gel de poliacrilamida como descrito no item 3.5. As Figuras 11 e 12 mostram a variabilidade apresentada entre as linhagens utilizadas.

4.5.1.4. Tamanho dos conídios e conteúdo de DNA por conídio das linhagens selvagens, mutantes e setores de *M. anisopliae*

O tamanho dos conídios foi determinado segundo o item 3.4. e conteúdo de DNA por conídio segundo o item 3.6. A Tabela 9 mostra os resultados obtidos nos dois métodos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PADRÕES

LINHAGEM

1	RJ-3
2	RJYA ^{-M-}
3	RJVL ^{-C-}
4	E ₆
5	E ₆ VM ^{-B-}
6	E ₆ YA ^{-P-}
7	setor proveniente E ₆ YA ^{-P-} + RJVL ^{-N-}
8	setor proveniente E ₆ VM ^{-B-} + RJVL ^{-C-}
9	setor vigoroso proveniente E ₆ YA ^{-P-} + RJVL ^{-N-}
10	setor vigoroso proveniente E ₆ YA ^{-P-} + RJVL ^{-C-}
11	setor vigoroso proveniente E ₆ VM ^{-B-} + RJVL ^{-C-}
12	setor vigoroso proveniente RJYA ^{-M-} + RJVL ^{-C-}

Figura 11 - Eletroforese em gel de poliacrilamida. Padrões de esterases das linhagens envolvidas no experimento.

Figura 12 - Esquema obtido a partir dos padrões de esterases da Fig. 11.

PADRÕES	LINHAGEM
1	RJ-3
2	RJYA ⁻ M ⁻
3	RJVL ⁻ C ⁻
4	E ₆
5	E ₆ VM ⁻ B ⁻
6	E ₆ YAP ⁻
7	setor proveniente E ₆ YA ⁻ P ⁻ + RJVL ⁻ N ⁻
8	setor proveniente E ₆ VM ⁻ B ⁻ + RJVL ⁻ C ⁻
9	setor vigoroso proveniente E ₆ YA ⁻ P ⁻ + RJVL ⁻ N ⁻
10	setor vigoroso proveniente E ₆ YA ⁻ P ⁻ + RJVL ⁻ C ⁻
11	setor vigoroso proveniente E ₆ VM ⁻ B ⁻ + RJVL ⁻ C ⁻
12	setor vigoroso proveniente RJYA ⁻ M ⁻ + RJVL ⁻ C ⁻

* Bandas correspondentes a α-esterases.

Tabela 9 - Diâmetro de conídios, número de núcleos por conídio e conteúdo de DNA por conídio das linhagens selvagens e cruzamentos a partir dos mutantes obtidos a partir das primeiras.

Linhagem	Tamanho dos conídios em μm ¹		% de conídios binucleados ²	Conteúdo de DNA (em g) por conídio
	Comprimento maior	Comprimento menor		
E ₆	17,4	7,0	2	$0,55 \cdot 10^{-13}$
RJ	19,36	7,36	4,75	$0,50 \cdot 10^{-13}$
E ₆ YA ⁻ P ⁻ //RJVL ⁻ C ⁻	19,82	9,11	0	$1,00 \cdot 10^{-13}$
E ₆ VM ⁻ B ⁻ //RJVL ⁻ C ⁻	19,24	8,7	0	$1,10 \cdot 10^{-13}$
RJYA ⁻ M ⁻ //RJVL ⁻ C ⁻	19,36	7,88	0	$2,90 \cdot 10^{-13}$
E ₆ YA ⁻ P ⁻ //RJVL ⁻ N ⁻	19,43	9,03	0	$3,76 \cdot 10^{-13}$
E ₆ VM ⁻ B ⁻ //RJVL ⁻ C ⁻	19,80	9,18	0	$5,50 \cdot 10^{-13}$

¹ Média de 25 medidas.

² % em 400 conídios contados para cada linhagem.

4.5.2. FUSÃO DE PROTOPLASTOS

A metodologia utilizada para obtenção de "produtos de fusão" entre mutantes auxotróficos e morfológicos complementares, dentro do isolado E₆ e entre os isolados E₆ e RJ-3, foi realizada segundo o item 3.3.7., a qual encontra-se resumida no esquema da Figura 13. Os cruzamentos realizados, as freqüências de reversão dos protoplastos de cada linhagem utilizada e as freqüências (média) de fusão de cada cruzamento são mostrados na Tabela 10.

As suspensões de protoplastos obtidas após tratamento com PEG (polietileno glicol), item 3.3.7., foram semeadas em MMKCl e incubadas por um período de 8 dias. As "pequenas" colônias que se desenvolveram neste meio, como "prováveis" produtos de fusão, foram transferidas para placas com MM ou MC por recorte de um bloco de ágar.

No meio mínimo, estas "pequenas" colônias, após um período de incubação, desenvolveram-se ou não em colônias heterocarióticas (Fig. 14a) apresentando coloração mista entre as linhagens parentais mutantes ou com coloração de somente um dos pais (Fig. 14b). Suspensões de conídios (10^6 conídios/ml) em tween 80, 0,1%, dessas colônias heterocarióticas, quando transferidas novamente para MM, não apresentaram o desenvolvimento de colônias prototróficas.

No meio completo, estas "pequenas" colônias, após um período de incubação, apresentaram setores com caracte

rísticas de um ou de ambos os pais do cruzamento (Figuras 15 e 16). Destes setores, suspensões de conídios foram feitas em tween 80 0,1%, que após diluições apropriadas, foram semeadas em MC para obtenção de colônias isoladas. Após este procedimento ser realizado, procedeu-se à auxonografia dos setores, pela técnica de placa mestra e conseqüente semeadura em meios diferenciais (Fig. 17). O resultado obtido para cada cruzamento, encontra-se relacionado na Tabela 11.

Na auxonografia, obtiveram-se colônias que apresentaram coloração verde e cresciam em MM (Fig. 17). Quando suspensões de conídios destas colônias foram novamente semeadas em MM e MC, obtiveram-se colônias que apresentaram as características de ambos os pais separadamente, e que não cresceram em MM evidenciando-se, deste modo sua natureza heterocariótica.

Figura 13 - Esquema da metodologia utilizada para fusão de protoplastos em *M. anisopliae*.

Tabela 10 - Frequências de reversão dos protoplastos utilizados para fusão, cruzamentos realizados e frequência de fusão para cada cruzamento.

Linhagens	Frequência de reversão (10^7 protoplastos)	Cruzamento	Frequência de fusão
$E_6VM^-B^-$	<1	$E_6VM^-B^- \times E_6YA^-L^-$	$20,2 \cdot 10^{-5}$
$E_6YA^-L^-$	<1	$E_6VM^-B^- \times E_6YA^-C^-$	$0,83 \cdot 10^{-5}$
$E_6YA^-C^-$	<1	$E_6VM^-B^- \times E_6YP^-L^-$	$44,1 \cdot 10^{-5}$
$E_6YP^-L^-$	<1	$E_6VM^-B^- \times E_6YA^-P^-$	$2,6 \cdot 10^{-5}$
$E_6YA^-P^-$	<1	$E_6VM^-B^- \times RJYA^-L^-$	$34,16 \cdot 10^{-5}$
$RJVL^-N^-$	<1	$E_6YA^-C^- \times RJVL^-N^-$	$0,88 \cdot 10^{-5}$
$RJYA^-L^-$	<1	$E_6YP^-L^- \times MYM^-A^-$	$33,63 \cdot 10^{-5}$
MYA^-M^-	<1

Figuras 14a,b - Desenvolvimento de colônias heterocarióticas em MM provenientes da fusão de protoplastos entre isolados de *M. anisopliae* (cruzamentos: $E_6 \times E_6$, $E_6 \times RJ-3$).

15.

16.

Figuras 15 e 16 - Desenvolvimento de colônias oriundas de fusão de protoplastos em MC entre isolados de *M. anisopliae*.
(cruzamentos: $E_6 \times E_6$, $E_6 \times RJ-3$).

Figura 17 - Placa mestra utilizada para repique em meios de cultura diferentes, mostrando colônias obtidas de setores em MC. (Disposição 5 x 5 + 1).

Figura 18 - Colônias de *M. anisopliae* provenientes de fusão de protoplas-
tos e mostrando o desenvolvimento de coloração verde entre as
mesmas (Fusão : $E_6 \times E_6$).

Tabela 11 - Segregantes obtidos nas diferentes fusões de protoplastos em *M. anisopliae*.

Cruzamento	Número de setores analisados	Recombinantes (Nº)
$E_6VM^-B^- \times E_6YA^-L^-$	61	$Y A^-$ (1) L^- (1) $A^-L^-B^-$ (1) $V M^-$ (2) A^- (1) B^- (1) $A^-L^-B^-$ (1)
$E_6VM^-B^- \times E_6YA^-C^-$	51	$Y A^-C^-B^-$ (1) $V/Y M^-$ (14) M^-B^- (7) VERDE M^-B^- (1)
$E_6VM^-B^- \times E_6YP^-L^-$	45	$Y P^-$ (4) M^- (2) B^- (2) L^- (5) B^-L^- (5) $B^-L^-P^-$ (13) $M^-L^-P^-$ (1) $V M^-$ (1) B^- (1) $H^* M^-$ (1) B^- (5)
$E_6VM^-B^- \times E_6YA^-P^-$	20	$Y A^-$ (1) $A^-P^-B^-$ (1) $A^-P^-M^-$ (3) $V B^-$ (2) $V/Y M^-$ (1)
$E_6YA^-C^- \times RJVLN^-$	28	$Y A^-C^-L^-$ (1) $V L^-$ (1) N^- (1)
$E_6YP^-L^- \times MYA^-M^-$	30	$Y P^-$ (1) $P^-L^-A^-$ (2)

* Coloração heterocariótica.

5. DISCUSSÃO

5.1. INDUÇÃO DE MUTAÇÃO COM LUZ UV E OBTENÇÃO DE MUTANTES AUXOTRÓFICOS

O estabelecimento de curvas de sobrevivência para as duas linhagens (E_6 e RJ-3) frente à luz ultravioleta, mostrou haver diferenças das mesmas quanto à sensibilidade para o comprimento de onda utilizado ($2573 \text{ \AA}$) sendo que, a linhagem RJ-3 é mais sensível que a linhagem E_6 (Figuras 1 e 2, Tabelas 1 e 2). Do mesmo modo, esta mesma característica foi observada em outras linhagens (VALE *et al.*, 1980) e tanto naqueles casos como no presente, parece existir uma alta variabilidade. Assim, o caráter que é importante para o controle biológico (resistência à luz solar) pode vir a ser melhorado não apenas por mutação para resistência, como também por recombinação através do ciclo parassexual recentemente determinado (MESSIAS e AZEVEDO, 1980).

Estas curvas de sobrevivência com luz ultravioleta, ao contrário do que normalmente se faz (SANTOS, 1978; MESSIAS e AZEVEDO, 1980) com o fungo *M. anisopliae*, foi determinada com o auxílio de um espectrômetro para luz ultravioleta (Ultra Violet Products, Inc., CA., USA), fazendo com que para cada ponto de irradiação a medida fosse tomada em $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{s}$. Este procedimento, faz com que para a mesma linhagem ou mesmo para linhagens semelhantes não haja necessidade de ser construída uma nova curva de sobrevivência sempre que se for trabalhar com uma lâmpada ultravioleta nova, desde que se tenha uma curva padronizada. O presente trabalho além de abrir essas perspectivas, ao mesmo tempo possibilita também estudos para obtenção de mutantes com resistência aumentada para a luz ultravioleta (AZEVEDO *et al.*, 1981); tais mutantes são de grande valia em controle biológico por sua maior resistência a radiações que chegam ao solo durante ou após a aplicação dos conídios no campo.

O estabelecimento de técnica de enriquecimento que consiste em suspender conídios do tipo selvagem, tratados com agente mutagênico, em MM líquido, remover os prototróficos por filtração repetida em gaze esterilizada e posterior semeadura dos conídios restantes em MC (FRIES, 1947); permitiu que houvesse um aumento no número de mutantes auxotróficos obtidos de 0,01% (MESSIAS, 1980) para 2,34% a 6,13% ou seja, um aumento máximo de 613 vezes. Assim, grande número desses mutantes foram obtidos (Tabela 4), havendo predominância de mutantes deficientes na síntese de aminoácidos e ácidos nucleicos sobre os deficientes na

síntese de vitaminas. Este fato, indica que este último grupo de mutantes é contra-selecionado pela filtração devido à facilidade com que cresce em quantidades mínimas de vitaminas liberadas, ou pelos prototróficos em crescimento, ou resultantes da lise de células mortas durante o período de crescimento (STRAUSS, 1958). Esta metodologia, permite que, duplos auxotróficos sejam obtidos com facilidade, o que torna estudos de análise genética mais seguros devido ao número de marcas envolvidas com conseqüente diminuição da freqüência de reversão.

5.2. CICLO PARASSEXUAL

5.2.1. ANÁLISE CLÁSSICA

Os heterocários produzidos através da metodologia clássica entre todos os mutantes auxotróficos da linhagem E₆ mostraram complementação com conseqüente formação de películas, demonstrando que as marcas utilizadas são recessivas. Por sua vez, na maioria das vezes, não houve formação de películas heterocárricas entre os mutantes auxotróficos das linhagens E₆ e RJ-3. No primeiro caso, as películas de heterocário apresentaram conídios com coloração predominantemente igual a um dos parentais, de ambos ou com uma coloração intermediária entre estas. Como a maioria dos conídios de *M. anisopliae* é uninucleada (VEEN, 1967;

TINLINE, 1971; MESSIAS *et al.*, 1978), MESSIAS e AZEVEDO (1980), estudando a formação de heterocários com coloração verde após o cruzamento de mutantes morfológicos (violetas e amarelos) na linhagem E₉, concluíram ser este caráter não autônomo. Porém, a partir dos dados acima expostos, pode-se considerar que, ao menos nestas linhagens (E₆ e RJ-3), o caráter para coloração se expressa de maneira autônoma como em *Aspergillus flavus* (PAPA, 1973) e *Aspergillus parasiticus* (PAPA, 1978). Nestas linhagens, isto pode ser devido a produtos gênicos não difusíveis que se expressam somente por ocasião da maturação dos conídios e de maneira dependente do genótipo presente nos mesmos. Por outro la-dô, colônias oriundas de fusão de protoplastos (setores advindos de MC), mostraram neste caso ser este caráter do tipo não autô-nomo (Fig.18). Desse modo, o processo de extração da parede ce-lular com conseqüente regeneração poderia indicar que o fenôme-no tem sua regulação e expressão gênica dependente da integrida-de da parede.

A grande dificuldade de obtenção de películas de heterocário entre as linhagens E₆ e RJ-3, pode ser explicada por um alto grau de divergência entre as mesmas, divergência esta, que pode ser refletida no padrão eletroforético de esterases (Fi-guras 11 e 12), diferença no número de protoplastos frente a um mesmo complexo lítico (Fig. 6), tamanho de conídio (Tab. 9) e crescimento em meios diferenciais (LUNA e AZEVEDO, comunica-ção pessoal). Por outro lado, a formação de raras películas hete-rocarióticas com produção de setores vigorosos já na placa de

MM e que continuam a produzir novos setores tanto em MM como em MC com Cloroneb, indica que fusão de hifas pode ocorrer em frequências muito baixas, levando à formação de diplóides e hiperhaplóides instáveis em MM, porém, estáveis em MC. Este alto grau de poliploidia é constatado através de medidas do conteúdo de DNA por conídio (Tab. 9), padrão de bandas de isozimas (Figs. 11 e 12) e poderá vir a ser confirmado nos estudos envolvendo diminuição na frequência de obtenção de mutantes nestas linhagens, quando comparadas com as linhagens parentais. Por outro lado, o padrão eletroforético de isozimas, demonstrou esta variabilidade genética através do aparecimento de novas combinações gênicas nos setores analisados e presença de loci responsáveis por padrões com diferentes posições de migração. Esses resultados indicam a provável diploidia ou hiperhaploidia das colônias obtidas, tornando-se esta, uma metodologia de valor comprovado para estudos onde hereditariedade precisa ser demonstrada. Entretanto, mais estudos são necessários para identificar os componentes genômicos envolvidos na formação desses híbridos (ANNÉ e PEBERDY, 1981). Por outro lado, o presente trabalho confirmou os achados de MESSIAS e AZEVEDO (1980), verificando-se a inexistência de conídios binucleados entre as linhagens obtidas (diplóides e hiperhaplóides) e presença de baixa frequência de conídios binucleados entre os haplóides parentais (E_6 : 2%; RJ-3: 4,75%) (Tab. 9).

5.2.2. PRODUÇÃO E FUSÃO DE PROTOPLASTOS

Produção de protoplastos tem sido obtida com o uso de estabilizadores osmóticos que variam para cada tipo de microrganismo (*A. chrysogenum*: NaCl 0,7M; *P. chrysogenum*: NaCl 0,7M; *Aspergillus* sp.: KCl 0,6M; *V. volvacea*: MgSO₄ 0,6M; *S. cerevisiae*: Sorbitol 1,2M); estes estabilizadores, juntamente com um grande número de enzimas líticas (celulases, quitinasas, β -D-glucanase, helicase, enzima lítica L₁, novozima, β -D-glucuronidase) utilizadas isoladamente ou em diferentes combinações permitem produção máxima de protoplastos no menor tempo possível (HAMLYN *et al.*, 1981). Deste modo, protoplastos das linhagens E₆ e RJ-3 foram obtidos com o uso de KCl 0,7M em tampão fosfato 0,2M (pH 5,8) como estabilizador (AZEVEDO, comunicação pessoal) e um complexo de enzimas líticas constituído das enzimas Novozima e Celulase CP (HAMLYN *et al.*, 1981). Após a determinação do tempo ideal para produção de protoplastos (Fig. 6), evidenciou-se grande diferença no número de protoplastos produzidos entre as duas linhagens, com grande predomínio de RJ-3 sobre E₆. Esta diferença provavelmente deve ser devida às diferentes constituições das paredes celulares das duas linhagens, o que é passível de confirmação através de estudos correspondentes das mesmas. De qualquer forma, assim como essas linhagens são distintas em várias características, algumas delas já citadas anteriormente, também os dados de produção de protoplastos confirmam as grandes diferenças existentes entre

as mesmas.

Os protoplastos acima obtidos foram usados para fusões, as quais ocorreram com um alto índice e com frequência variável nos diferentes cruzamentos (Tab.10). Esta variação provavelmente foi devida às pequenas diferenças nas condições de trabalho em cada experimento realizado. Deste modo, observou-se que no MMKCl, protoplastos advindos da mistura de fusão originaram colônias muito pequenas e que, ao serem transferidas para MM e MC, desenvolveram-se ou não em colônias heterocarióticas com coloração de um ou de ambos os pais no primeiro caso (MM, Figs.14a e 14b) e em colônias instáveis com produção de setores no segundo caso (MC, Figs. 15 e 16). Das colônias heterocarióticas formadas em MM, suspensões de conídios foram feitas (10^7 conídios/ml) e novamente semeadas em MM, porém, não originaram colônias (diplóides) que pudessem crescer no referido meio. Por outro lado, ao realizar-se a análise genética em meios diferenciais dos setores oriundos de MC, observou-se que estes podiam ser do tipo parental ou recombinantes (Tab.11). Estes dados podem levar às seguintes hipóteses:

- . as pequenas colônias que cresceram em MMKCl, poderiam ter se originado devido à lise de protoplastos na solução de fusão com conseqüente liberação de nutrientes em quantidades suficientes para um pequeno crescimento.

- . ocorre fusão de protoplastos entre as duas linhagens, porém, como cada protoplasto pode ter desde zero até vários núcleos, há possibilidade de se formar um heterocário com razão nuclear não balanceada (mais núcleos de um tipo do que outro) levando ou não ao crescimento da colônia.
- . ocorre fusão entre protoplastos com conseqüente fusão nuclear e recombinação, porém, este estado não é estável, fazendo com que ocorra segregação cromossômica e nuclear já a nível de hifa.

A primeira hipótese é improvável, uma vez que as colônias que se originaram em MMKCl podem continuar a crescer em MM. Assim, ocorrendo fusão nuclear, recombinação ou não de cromossomos e segregação cromossômica e nuclear, uma diferença na razão de núcleos poderia levar a um pequeno crescimento em MMKCl. Resultados semelhantes foram observados em *Cephalosporium acremonium* (BALL e HAMLYN, 1982), onde os autores após fusão de protoplastos não obtiveram evidências para a formação de diplóides estáveis; porém, recombinantes presumivelmente haplóides, foram recuperados em uma variedade de meios seletivos de regeneração. A mesma observação foi feita em *Aspergillus niger* por BONATELLI e AZEVEDO (comunicação pessoal) ao obterem recombinantes sem a formação de diplóides. Este fenômeno que parece ter freqüência generalizada, foi designado de parameios se por BONATELLI et al. (1983).

5.2.3. ANÁLISE GENÉTICA DOS CRUZAMENTOS REALIZADOS

Dos dados obtidos (Tab. 11) foi possível evidenciar-se a ocorrência de transferência gênica através da presença de recombinantes com mais marcadores genéticos que os existentes nas duas linhagens parentais (cruzamentos: $E_6VM^-B^- \times E_6YA^-L^-$; $E_6VM^-B^- \times E_6YP^-L^-$). Este fato é de grande importância pois, em programas de melhoramento genético, transferência pode ser feita com marcadores de reconhecido valor em controle biológico.

O número e tipo de recombinantes obtidos nos cruzamentos entre os mutantes da linhagem E_6 , indica que recombinação mitótica ocorre com frequência relativamente alta ($E_6VM^-B^- \times E_6YA^-C^-$, $E_6VM^-B^- \times E_6YP^-L^-$); sendo difícil distinguir entre os segregantes se houve haploidização, só permuta mitótica ou permuta mitótica mais haploidização. Por outro lado, no cruzamento $E_6VM^-B^- \times E_6YA^-L^-$ a grande maioria dos setores analisados mostraram ser do tipo parental indicando que *M. anisopliae* deve ter um pequeno número de grupos de ligação o que aliás já havia sido mencionado por MESSIAS e AZEVEDO(1980). Este fato, deve ser melhor analisado em estudos futuros com cruzamentos deste mutante ($E_6YA^-L^-$) com outros que venham a ser obtidos pois, como o mesmo foi selecionado após irradiação com luz ultravioleta é possível que algum tipo de alteração estrutural existente no mesmo (translocação ou inversão) exerça uma contra-seleção para os recombinantes, resultando assim nu-

ma maior proporção de marcas parentais. Dos cruzamentos $E_6VM^-B^- \times E_6YP^-L^-$ e $E_6VM^-B^- \times E_6YA^-P^-$ é possível inferir - se que provavelmente as marcas L^- e P^- estão ligadas (14 do total de recombinantes apresentam estas marcas) e que as marcas Y e P^- também estão ligadas (18 no primeiro cruzamento e 4 no segundo, respectivamente). Nos cruzamentos envolvendo as linhagens RJ-3, e M com E_6 , como era de se esperar, ocorreram poucos recombinantes indicando que a recombinação de cromossomos e permuta mitótica é dificultada provavelmente por diferentes rearranjos cromossômicos existentes nas linhagens RJ-3 e M que aumentam a inviabilidade. Este fato pode ser constatado através do fato que, no cruzamento $E_6YA^-C^- \times RJVL^-N^-$, dos 28 setores analisados apenas 3 são recombinantes; no cruzamento $E_6YP^-L^- \times MYA^-M^-$ dos 30 setores analisados apenas 3 são recombinantes, dando um total de cerca de 12%, enquanto que nos cruzamentos envolvendo os mutantes da linhagem E_6 , de 177 setores analisados, 86 são recombinantes (cerca de 48%) ou quatro vezes maior do que os outros cruzamentos.

6. CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos no presente trabalho podem ser formuladas as seguintes conclusões:

1. A padronização da curva de sobrevivência à luz ultravioleta com o auxílio de um espectrômetro, pode auxiliar em futuros estudos para obtenção de mutantes resistentes a este comprimento de onda.
2. A técnica de enriquecimento para obtenção de mutantes auxotróficos por filtração, permitiu um aumento máximo de 61,3 vezes no número de mutantes deficientes na síntese de aminoácidos; por outro lado, observa-se apenas raros mutantes deficientes para a síntese de vitaminas.
3. Obtiveram-se películas heterocarióticas, sem a formação de diplóides, entre mutantes morfológicos e nutricionais den-

tro da mesma linhagem. Com raras exceções, estas películas não foram formadas entre mutantes morfológicos e nutricionais de linhagens distintas..

4. As raras películas heterocarióticas entre diferentes linhagens produziram setores vigorosos ao serem transportadas para MM, e que mostraram ser instáveis em MM e estáveis em MC, após posteriores passagens para estes meios. Estes foram confirmados como diplóides ou hiperhaplóides quando analisados através de eletroforese para padrões de isozimas e medidas do conteúdo de DNA por conteúdo.
5. Confirmou-se a inexistência de conteúdos binucleados nestes diplóides e hiperhaplóides e existência de conteúdos binucleados (em baixa frequência) nos haplóides parentais.
6. Eletroforese para padrões de isozimas, constitui-se um bom método para determinação de variabilidade entre linhagens haplóides e diplóides.
7. A obtenção de protoplastos em grande número nas linhagens usadas, através de complexo lítico, torna esta metodologia viável para experimentos com fusão de protoplastos.
8. A fusão de protoplastos, dentro e entre linhagens, ocorre com uma alta frequência, o que permite aplicá-la para melhoramento genético desta espécie para posterior uso em controle biológico.

9. Através da fusão de protoplastos, ocorre fusão nuclear, com segregação e recombinação mitótica, o que torna esta metodologia uma eficiente alternativa do ciclo parassexual para estudos genéticos e melhoramento.

7. LITERATURA CITADA

- AL-AIDROOS, K., 1980. Demonstration of a parasexual cycle in the entomopathogenic fungus *Metarrhizium anisopliae*. *Canadian Journal of Genetic and Cytology*, 22: 309-314.
- AQUINO, M.L.N., 1974. O fungo entomôgeno *Metarrhizium anisopliae* (Metsch.) Sorokin, no Estado de Pernambuco. *Boletim Técnico do Instituto de Pesquisas Agronômicas*, Recife, 72: 1-26.
- ALIMDZHANOVA, I.S. e A.M. BEZBORODOV, 1980. Lipase activity of *Oospora lactis* protoplasts. *Microbiology*, 49: 298-302.
- ANDERSON, M.R. e C.S. DEPPE, 1977. Selection for conditional lethals: a general negative selection for *Schizophyllum commune*. *Genetical Research*, 29: 93-96.

ANNÉ, J.; H. EYSEN; P. DE SOMER, 1976. Somatic hybridisation of *Penicillium roquefortii* with *P. chrysogenum* after protoplast fusion. *Nature*, 262: 719-721.

ANNÉ, J. e J.F. PEBERDY, 1975. Conditions for induced fusion of fungal protoplasts in polyethylene glycol solutions. *Archives of Microbiology*, 105: 201-205.

ANNÉ, J. e J.F. PEBERDY, 1976. Induced fusion of fungal protoplasts following treatment with polyethylene glycol. *Journal of General Microbiology*, 92: 413-417.

ANNÉ, J. e J.F. PEBERDY, 1982. Protoplast fusion and interspecies hybridization in *Penicillium*. In fungal protoplasts. Their uses in Physiology, Biochemistry and Genetics, ed. J.F. PEBERDY and L. FERENCZY, in press, New York.

AZEVEDO, J.L. e S.O.P. da COSTA, 1973. Exercícios práticos de Genética, ed. USP. 288p.

AZEVEDO, J.L.; N.M. CHACEL; P. TIMO, 1981. Resistência à luz ultravioleta e mutantes de *Metarhizium anisopliae*. Resumos da VIII Reunião de Genética de Microrganismos. p.1.

AZEVEDO, J.L.; A. OLIVEIRA e A.J. ROCHA CAMPOS, 1976. Replicador multifio para transferência de esporos de fungos filamentosos. *Summa Phytopathologica*, 237-241.

- AZEVEDO, J.L.; E.P.SANT'ANA e R.BONATELLI Jr., 1977. Resistance and mitotic instability to Chloroneb and 1,4-oxathin in *Aspergillus nidulans*. *Mutation Research*, 47:163-172.
- BACH, M.L. e F.LACROUT, 1972. Direct selective techniques for the isolation of pyrimidine auxotrophs in yeast. *Molecular and General Genetics*, 115:126-130.
- BACHMANN, B.J. e D.M.BONNER, 1959. Protoplasts from *Neurospora crassa*. *Journal of Bacteriology*, 78:550-556.
- BAL, J.; E. BARTNIK, B.GORYLUK; N.J.PIENIAZEK, 1975. An easy way of obtaining *Aspergillus nidulans* haploids in the parasexual cycle using N-glycosyl polifungin. *Genetical Research*, 25: 249-252.
- BALL, C., 1971. Haploidization analysis in *Penicillium chrysogenum*. *Journal of General Microbiology*, 66:63-69.
- BALL, C. e P.F. HAMLYN, 1982. Genetic recombination studies with *Cephalosporium acremonium* related to the production of the industrially important antibiotic cephalosporin C. *Revista Brasileira de Genética*, V(1):1-13.
- BALFOUR-BROWNE, F.L., 1960. The green muscardine diseases of insects, with special reference to an epidemic in a swarm of Locusts in Eritrea. *Proceedings of Royal Entomological Society of London, Ser.A.*, 35:65-74.

- BALTZ, R.H., 1978. Genetic recombination in *Streptomyces fradiae* by protoplast fusion and cell regeneration. *Journal of General Microbiology*, 107:93-102.
- BARACHO, I.R. e R.T. ROSIN, 1977. Tabelo por la kalkulado de MO₉₅, en fungoj. *Sciencia Revue de Internacia Sciencia Asocio Esperontista Beograda, Jugoslavia*, 28:223-226.
- BARNETT, H.L., 1960. Illustrated genera of imperfecti fungi. Minneapolis Burgess Publishing Company, 225p.
- BONATELLI Jr., R.; J.L. AZEVEDO e J.V. VALENTE, 1983. Parasexuality in citric Acid-production strain of *Aspergillus niger*. *Revista Brasileira de Genética*, (in press).
- BARON, G., 1968. The genera of Hyphomycetes from soil. Baltimore, The Willians & Wilkins Company, 686p.
- BARRON, G.L., 1962. The parasexual cycle and linkage relationships in the storage rot fungus *Penicillium expansum*. *Canadian Journal of Botany*, 40:1603-1613.
- BAUCH, R., 1952. Kopulationsbedingungen und sekundäre geschlechtsmerkmale bei *Ustilago violacea*. *Biol. Zbl*, 42: 9-38.

- BEADLE, G.W. e E.L. TATUM, 1945. *Neurospora* II. Methods of producing and detecting mutations concerned with nutritional requirements. *American Journal of Botany*, 32:678-686.
- BEGGS, J.D., 1978. Transformation of yeast by a replicating hybrid plasmid. *Nature*, 275:104-109.
- BEHLING, R.A. e A.G. FISHER, 1980. Formation of protoplasts from *Gliocadium virens*. *The International Journal of Biochemistry*, 11:449-456.
- BIELY, P.; Z. KRÁTKÝ; J. KOVÁRIK; S. BAUER, 1971. Effect of α -deoxyglucose on cell wall formation in *Saccharomyces cerevisiae* and its relation to cell growth inhibition. *Journal of Bacteriology*, 107:121-129.
- BINDING, H., 1974. The isolation, regeneration and fusion of *Phycomyces* protoplasts. *Molecular and General Genetics*, 135:273-276.
- BIRNBOIM, H.C., 1971. New method for extraction of ribonucleic acid and polyribosomes from *Schizosaccharomyces pombe*. *Journal of Bacteriology*, 107:659-663.
- BOJNANSKÁ, A.; M. SÍPICZKI; L. FERENCZY, 1980. Characterization of conidiation mutants in *Trichoderma viride* by hyphal anastomosis and protoplast fusion. *Acta Microbiologica*, 27:305-308.

- BOONE, D.M.; J.F.STAUFFER; M.A.STAHMANN; G.W. KEITT, 1956. *Venturia inaequalis* (Cke.)Wint. VII. Induction of mutants for studies on genetics nutrition and pathogenicity. American Journal of Botany, 43:198-204.
- BOS, C.J. e S.M. SLAKHORST, 1981. Isolation of protoplasts from *Aspergillus nidulans* conidiospores. Canadian Journal of Microbiology, 27:408-416.
- BROWN, J.P., 1971. Susceptibility of the cell walls of some yeasts to lysis by enzymes of *Helix pomatia*. Canadian Journal of Microbiology, 17:205-208.
- BUXTON, E.W., 1956. Heterocaryosis and parasexual recombination in pathogenic strains of *Fusarium oxysporum*. Journal of General Microbiology, 15:133-139.
- BUXTON, E.W., 1962. Parasexual recombination in the banana-milt *Fusarium*. Transactions of the British Mycological Society, 45:274-279.
- CARRAU, J.L.; J.L. AZEVEDO; P. SUDBERY; D. CAMPBELL, 1982. Methods for recovering fusion products among oenological strains of *Saccharomyces cerevisiae* and *Schizosaccharomyces pombe*. Revista Brasileira de Genética, V(1):221-226.
- CATCHESIDE, D.G., 1954. Isolation of nutritional mutants of *Neurospora crassa* by filtration enrichment. Journal of General Microbiology, 11:34-36.

- CHRISTENSEN, B.E., 1979. Somatic hybridization in *Saccharomyces cerevisiae*. Analysis of products of protoplasts fusion. Carlsberg Research Communication, 44:225-227.
- CONTI, E.; C.L.MESSIAS; H.M. MYRINA e J.L.AZEVEDO, 1981. Electrophoretic variation in esterases and phosphatases in eleven wild-type strains of *Metarhizium anisopliae*. Experientia, 36:293-294.
- CONSTABEL, F. e K.N.KAO, 1974. Agglutination and fusion of plant protoplasts by polyethyleneglicol. Canadian Journal of Botany, 52:1603-1606.
- COOK, K.A., 1974. Regulation of aromatic metabolism in fungi : Selection of mutants of yeast *Rhodotorula mucilaginosa* with nystatin. Journal of General Microbiology, 85:29-36.
- CULBERTSON, M.R. e S.A.HENRY, 1975. Inositol-requiring mutants of *Saccharomyces cerevisiae*. Genetics, 80:23-40.
- DARLING, S.; J.THEILADE; A.BIRCH-ANDERSEN, 1969. Kinetic and morphological observations on *Saccharomyces cerevisiae* during spheroplast formation. Journal of Bacteriology, 98: 797-810.
- DAS, A., 1980. Parasexual hybridization and citric acid production by *Aspergillus niger*. European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology, 9:117-122.

- DAVIS, B.D., 1948. Isolation of biochemically deficient mutants of bacteria by penicillin. Journal of American Chemistry Society, 70: 4267.
- DAY, A.W. e J.K. JONES, 1968. The production and characteristics of diploids in *Ustilago violacea*. Genetics Research Cambridge, 11: 63-81.
- DAY, A.W. e J.K. JONES, 1969. Sexual and parasexual analysis in *Ustilago violacea*. Genetical Research, 11: 63-81.
- DAY, P.R. e G.E. ANDERSON, 1961. Two linkage groups in *Coprinus lagopus*. Genetical Research, Camb., 2: 414-423.
- DEUTCH, C.E. e J.M. PARRY, 1974. Sphaeroplasts formation in yeast during the transition from exponential phase to stationary phase. Journal of General Microbiology, 80: 259-268.
- DE VRIES, O.M.H. e J.G.H. WESSELS, 1972. Release of protoplasts from *Schizophyllum commune* by a lytic enzyme preparation from *Trichoderma viride*. Journal of General Microbiology, 73: 13-22.

- DE VRIES, O.M.H. e J.G.H. WESSELS, 1973a. Effectiveness of a lytic enzyme preparation from *Trichoderma viride* In Releasing spheroplasts from fungi, particularly Basidiomycetes. *Antonie van Leeuwenhoek*, 39: 397-400.
- DE VRIES, O.M.H. e J.G.H. WESSELS, 1973b. Release of protoplasts from *Schizophyllum commune* by combined action of purified α -1,3-glucanase e chitinase derived from *Trichoderma viride*. *Journal of General Microbiology*, 76: 319-330.
- DIATEWA, M.; I. VIARD; A.J.C. STAHL, 1981. Yeast protoplasts gained with various preparations of *Helix pomatia* digestive juice. *Biochimie*, 63: 67-69.
- DONKERSLOOT, J.A. e R.I. MATELES, 1968. Enrichment of auxotrophic mutants of *Aspergillus flavus* by tritium suicide. *Journal of Bacteriology*, 96: 1551 -1555.
- DOOIJEWAAARD, A.M.P.; J.H. SIESTMA; J.T.M. WOUTERS, 1973. Formation and regeneration of *Geotrichum candidum* protoplasts. *Journal of General Microbiology*, 74: 205-209.
- DUELL, E.A.; S. INOUE; M.F. UTTER, 1964. Isolation and properties of intact mitochondria from spheroplasts of yeast. *Journal of Bacteriology*, 88: 1762-1773.

DUTTA, S.K. e E.D. GARBER, 1960. Genetics of phytopathogenic fungi. III - An attempt to demonstrate the parasexual cycle in *Colletotrichum lagenarium*. Botanical Gazette, 122: 118-121.

EDDY, A.A. e D.H. WILLIAMSON, 1957. A method of isolating protoplasts from yeast. Nature, 179: 1252-1253.

EDDY, A.A. e D.H. WILLIAMSON, 1959. Formation of aberrant cell walls and of spores by the growing yeast protoplast. Nature, 183: 1101-1104.

EMERSON, S. e M.R. EMERSON, 1958. Production, reproduction and reversion of protoplasts - like structures in the osmotic strain of *Neurospora crassa*. Proceedings of National Academy of Science , USA, 44: 668-671.

EVLAKHOVA, A., 1966. Mass culture of entomopathogenic fungi. Zashchita Rastenii;Mask., 11: 43.

EVELEIGH, D.E.; J.H. SIETSMA; R.H. HASKINS, 1968. The involvement of cellulase and laminarase in the formation of *Pythium* protoplasts. Journal of General Microbiology, 52: 89-97.

- FARGUES, J.; T. DURIEZ; J. ANDRIEU; R. POPEYE; P. ROBERT, 1975. Étude immunologique comparée de souches de *Metarhizium anisopliae* (Delack.) sien champignon hyphomycète entomopathogène. Comptes Rendus Hebdomadaires: des Séances de l'Académie des Sciences, Ser. D., 281: 1781-1784.
- FAWCETT, P.A.; P.B. LODER, M.J. DUNCAN; T.J. BEESLEY; E.P. ABRAHAM, 1973.—Formation and properties of protoplasts from antibiotic-producing strains of *Cephalosporium acremonium*. Journal of General Microbiology, 79: 293-309.
- FERENCZY, L. e A. MARÁZ, 1977. Transfer of mitochondria by protoplast fusion in *Saccharomyces cerevisiae*. Nature, 268: 524-525.
- FERENCZY, L.; F. KEVEI; J. ZSOLT, 1974. Fusion of fungal protoplasts. Nature, 793-794.
- FERENCZY, L.; F. KEVEI; M. SZEGEDI, 1975. High-frequency fusion of fungal protoplasts. Experientia, 31: 1028-1030.
- FERENCZY.; F. KEVEI; M. SZEGEDI, 1975. Increased fusion frequency of *Aspergillus nidulans* protoplasts. Experientia, 31: 50-52.

FERENCZY, L.; F. KEVEI; M. SZEGDI; A. FRANKÖ; I. ROJIK, 1976.

Factors affecting high-frequency fungal protoplasts fusion.
Experientia, 32: 1156-1158.

FERENCZY, L.; M. SZEGEDI; F. KEVEI, 1977. Interspecific protoplasts fusion and complementation in *Aspergilli*. *Experientia*, **33**. 184-186

FINKELMAN, M.A.J.; J.E. ZAJIC; A. VARDANIS, 1980. New method of producing protoplasts of *Aureobasidium pullulans*.
Applied and Environmental Microbiology, 39: 923-925.

FORBES, E., 1959. Use of mitotic segregation for assigning genes to linkage groups in *Aspergillus nidulans*. *Heredity*, 13: 67-80.

FOURNIER, P.; A. PROVOST; C. BOURGUIGNON; H. HESLOT, 1977.
Recombination after protoplast fusion in the yeast *Candida tropicalis*. *Archiver für Mikrobiologie*, 115: 143-149.

FOURY, F. e A. GOFFEAU, 1973. Combination of 2-deoxyglucose and snail-gut enzyme treatments for preparing sphaeroplasts of *Schizosaccharomyces pombe*. *Journal of General Microbiology*, 75: 227-229.

- FRIES, N., 1947. Experiments with different methods of isolating physiological mutations of filamentous fungi. *Nature*, 159: 199.
- FUKUDA, H. e A. KIMURA, 1980. Transfer of mitochondria into protoplasts of *Saccharomyces cerevisiae* by mini-protoplasts fusion. *FEBS Letters*, 113: 58-60.
- GARBER, G.W. e L. BEHARA, 1965. Genetic of phytopathogenic fungi. XIV - The parasexual cycle in *Penicillium expansum*. *Genetics*, 52: 487-492.
- GASLON, S.; A.G. OCHOA; J.R. VILLANUEVA, 1964. Production of yeast and mold protoplasts by treatment with the strepzyme of *Micronospora* as. *Canadian Journal of Microbiology*, 11: 573-580.
- GENTHNER, F.J. e P.T. BORGIA, 1978. Spheroplasts fusion and heterokaryon formation in *Mucor racemosus*. *Journal of Bacteriology*, 134: 349-352.
- GIBSON, R.K. e J.F. PEBERDY, 1972. Fine structure of protoplasts of *Aspergillus nidulans*. *Journal of General Microbiology*, 72: 529-538.

- GODFREY, O.; L. FORD; M.L.B. HUBER, 1978. Interspecies matings of *Streptomyces fradiae* with *Streptomyces bikiniensis* mediated by conventional and protoplast fusion techniques. Canadian Journal of Microbiology, 24: 994-997.
- GUMPERT, J., 1980. Electron microscopic analysis of protoplast fusion in *Streptomyces hygroscopicus* and consideration on structural alterations in fusing membranes. Archives of Microbiology, 126: 263-270.
- GURINA, L.V.; S.B. PETRIKEVICK; A.V. SHUL'GA; S.S. RYLKIN 1979. Study of fractional composition of protein from protoplasts of *Candida utilis* during growth and development. Microbiology, 48: 195-197.
- HAMLYN, P.F.; R.E. BRADSHAW; F.M. MELLON; C.M. SANTIAGO; J.M. WILSON; J.F. PEBERDY, 1981. Efficient protoplast isolation from fungi using commercial enzymes. Enzyme and Microbial Technology, 3: 321-325.
- HASTIE, A.C., 1962. Genetic recombination in the hop-wilt fungus *Verticillium albo-atrum*. Journal of General Microbiology, 27: 373-382.

- HASTIE, A.C., 1964. The parasexual cycle in *Verticillium albo-atrum*. Genetical Research, 5: 305-315.
- HAVELKOVÁ, M., 1966. A comparative study of submicroscopic structures of protoplasts of various yeast species. Folia Microbiologica, II, 453-458.
- HEAGY, F.C. e J.A. ROPER, 1952. Deoxyribosenucleic acid content of haploid and diploid *Aspergillus* conidia. Nature, 170: 713.
- HEARN, V.M.; E.V. WILSON; D.W.R. MACKENZIE, 1980. The preparation of protoplasts from *Aspergillus fumigatus* mycelium. Sabouraudia, 18: 75-77.
- HIDALGO-SALVATIERRA, O. e B. BERRIOS, 1972. Studies on the shootborer *Hypsiphyla grandella* Zeller (Lep., Pyralidae). XII. Determination of the LD₅₀ of *Metarhizium anisopliae* (Metschnikoff) Sorokin spores on fifth instar larvae. Turrialba, 22: 435-438.
- HINNEN, A.; J.B. HICKS; G.R. FINK, 1978. Transformation of yeast. Proceedings of National Academie of Science, USA, 75: 1929-1933.

HOLLIDAY, R., 1961. Induced mitotic crossing-over in *Ustilago maydis* Genetical Research, 2: 231-249.

HOPWOOD, D.A. e H.M. WRIGHT, 1978. Bacterial protoplast fusion: recombination in fused protoplasts of *Streptomyces coelicolor*. Molecular and General Genetics, 162: 307-317.

HOPWOOD, D.A. e H.M. WRIGHT, 1979. Factors affecting recombinant frequency in protoplast fusion of *Streptomyces coelicolor*. Journal of General Microbiology, 111: 137-143.

HOPWOOD, D.A.; H.M. WRIGHT; M.J. BIBB, 1977. Genetic recombination through protoplast fusion in *Streptomyces*. Nature, 268: 171-177.

HOUSSET, P.; M. NAGY; J. SCHWENCKE, 1975. Protoplasts of *Schizosaccharomyces pombe*: an improved method for their preparation and the study of their guanine uptake. Journal of General Microbiology, 90: 260-264.

IKEDA, Y.; R. NAKAMURA; K. UCHIDA; G. ISHITANI, 1957. Two attempts upon improving and industrial strain of *Aspergillus oryzae* through somatic recombination and polyploidization. Journal of General and Applied Microbiology, 3: 93-101.

ISHITANI, C. e K.I. SAKAGUCHI, 1956. Hereditary variation and recombination in koji-molds (*Aspergillus oryzae* and *Aspergillus sojae*). V. Heterocaryosis. Journal of General and Applied Microbiology, 2: 345-400.

ISHITANI, C.; Y. IKEDA; K.I. SAKAGUCHI, 1956. Heditary variation and genetic recombination in koji-molds (*Aspergillus oryzae* and *Aspergillus sojae*). VI. Genetic recombination in heterozygous diploids. Journal of General and Applied Microbiology, 2: 401-430.

JEFFREY, K.; M.J. HUBARD; M.G. SHEPHERD; P.A. SULLIVAN, 1981. Parasexual genetic analysis of *Candida albicans* by spheroplast fusion. Journal of Bacteriology, 146: 833-840.

JOHNSTON, J.R., 1915. The entomogenous fungi of Porto Rico. Puerto Rico Board of Commissioners of Agriculture Bulletin, 10: 1-33.

KÄFER, E., 1958. An 8-chromossome map of *Aspergillus nidulans*. Advances in Genetics, 9: 105-145.

KÄFER, E., 1960. High frequency of spontaneous and induced somatic segregation in *Aspergillus nidulans*. Nature, 186: 619-620.

- KÄFER, E., 1961. The process of spontaneous recombination in vegetative nuclei of *Aspergillus nidulans*. *Genetics*, 46: 1581-1604.
- KAMAT, M.M.; M.K. PATEL; G.W. DHANDE, 1952. Occurrence of the green muscardine fungus on *Pyrilla* species in Bombay. *Current Science*, 21: 317. Apud: TULLOCH, M., 1976. The genus *Metarhizium*. *Transactions British Mycological Society*, 66: 407-411.
- KATZ, E.R. e M. SUSSMAN, 1972. Parasexual recombination in *Dictyostelium discoideum* and stable haploids segregants. *Proceedings of National Academy of Science , USA*, 69: 495-498.
- KENDRIK, W.B., 1971. *Taxonomy of fungi imperfecti*. University of Toronto Press. 390p.
- KEVEI, F. e J.F. PEBERDY, 1977. Interspecies hybridization between *Aspergillus nidulans* and *Aspergillus rugulosus* by fusion of somatic protoplast. *Journal of General Microbiology*, 102: 255-262.
- KEVEI, F. e J.F. PEBERDY, 1979. Induced segregation in interspecific hybrids of *Aspergillus nidulans* and *Aspergillus rugulosus* obtained by protoplast fusion. *Molecular and General Genetics*, 170: 213-218.

KOVÁČ, L.; H. BEDNAROVÁ; M. GREKSÁK, 1968. I. Isolation and properties of phosphorylating mitochondria from stationary phase cells. *Biochemistry Biophysical Acta*, 153: 32-42.

LABORDA, F.; I.G. ACHA; J.R. VILLANUEVA, 1974. Studies on a strepzyme capable of obtaining protoplasts from *Fusarium culmorum* conidia. *Transactions of British Mycological Society*, 62: 509-518.

LEIN, J.; H.K. MITCHELL; M.B. MITCHELL, 1948. A method for the selection of biochemical mutants of *Neurospora*. *Proceedings of National Academy of Science*, 34: 435-442.

LESTER, H.E. e S.R. GROSS, 1959. Efficient method for selection of auxotrophic mutants of *Neurospora*. *Science*, 129: 572.

LEVADOUX, W.L.; K.F. GREGORY; A. TAYLOR, 1981. Sequential cold-sensitive mutations in *Aspergillus fumigatus*. II. Analysis by the parasexual cycle. *Canadian Journal of Microbiology*, 27: 295-303.

LHOAS, P., 1967. Genetic analysis by means of the parasexual cycle in *Aspergillus niger*. *Genetical Research*, 10: 45-61.

- LIHNELL, D., 1944. Gronmykos Fororsakeo an *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorok. II. Fisiologiska Undersokningar over Gronmykosens Svamp. Stat. Vaxtskyodsanst. Stockholm meddel, 43: 59-90.
- LINGEGRENN, C.G. e G. LINDEGREN, 1950. X-ray and ultra-violet induced mutations in *Neurospora*: I.X-ray Mutations; II. Ultra-violet Mutations. J.Hered., 32:405-435.
- LITTLEWOOD, B.S. e J.E. DAVIS, 1973. Enrichment for temperature-sensitive and auxotrophic mutants in *Saccharomyces cerevisiae* by trytium suicide. Mutation Research, 17: 315-322.
- LOOMIS, W.F., 1979. Temperature-sensitive mutants of *Dictyostelium discoideum*. Journal of Bacteriology, 99: 65-69.
- LOPEZ-BELMONTE, F.; I.G. ACHA; J.R. VILLANUEVA, 1966. Observations on the protoplasts of *Fusarium culmorum* and on their fusion. Journal of General Microbiology, 45: 127-134.
- MacDONALD, K.D., 1968. The selection of auxotrophs of *Penicillium chrysogenum* with nystatin. Genetical Research, 11: 327-330.

MacDONALD, K.D., 1968a. The persistence of parental genome segregation in *Penicillium chrysogenum* after nitrogen mustard treatment. *Mutation Research*, 5: 302-305.

MacDONALD, K.D.; J.M. HUTICHINSON; W.A. GILLET, 1964. Properties of heterozygous diploids between strains of *Penicillium chrysogenum* selected for high penicillin yield. *Antonie van Leeuwenhoek*, 33: 209-224.

MacDONALD, K.D.; J.M. HUTICHINSON; W.A. GILLET, 1965. Heterozygous diploids of *Penicillium chrysogenum* and their segregation patterns. *Genetics*, 36: 378-397.

MACKINTOSH, M.E. e R.H. PRITCHARD, 1963. The production and replicating of micro-colonies of *Aspergillus nidulans*. *Genetical Research*, 4: 320-322.

MALING, B., 1960. Replica Plating and rapid ascus collection of *Neurospora*. *Journal of General Microbiology*, 23: 257-260.

MANN, K. e D. MECKE, 1980. Isolation and characterization of nuclei and nuclear membrane from *Saccharomyces cerevisiae* protoplasts. *FEBS Letters*, 122: 95-99.

MĀRAZ, A. e J. SUBIK, 1981. Transmission and recombination of mitochondrial genes in *Saccharomyces cerevisiae* after protoplast fusion. *Molecular and General Genetics*, 181: 131-133.

MARCHIONATO, J.B., 1972. Nota sobre la "muscardina verde"

[*Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sor.]. Revista de História Natural, 1942-1943: 12-14.

MARQUES, E.J. e A.M. VILASBOAS, 1973. Contribuição ao estudo da cultura e aplicação de *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) no controle da cigarrinha da folha (*Mahanarva posticata* Stal) no Nordeste do Brasil. Anais da 1ª Reunião Anual da Sociedade Entomológica do Brasil, Viçosa, MG. p.70.

MARTINDALE, D.W. e R.E. PEARMAN, 1979. An enrichment for temperature-sensitive mutants in *Tetrahymena thermophila*. Genetics, 92: 1079-1092.

MCCULLY, K.S. e E. FORBES, 1965. The use of p-fluorfenil-alanine with "mestra strains" of *Aspergillus nidulans* for assigning genes to linkage groups. Genetical Research, 6: 352-359.

MEGNET, R., 1965. Screening of auxotrophic mutants of *Schizosaccharomyces pombe* with 2-Deoxyglucose. Mutation Research, 2: 328-331

MEGENET, R., 1965a. Effect of 2-Deoxyglucose on *Schizosaccharomyces pombe*. Journal of Bacteriology, 90: 1032-1035

MENDOZA, C.G. e J.R. VILLANUENA, 1962. Production of yeast protoplasts by an enzyme preparation of *Streptomyces* sp. Nature, 195: 1326-1327.

- MENEZES, E.M. e AZEVEDO, J.L., 1978. Reversion in variants from a duplication strain of *Aspergillus nidulans*. Molecular and General Genetics, 164: 255-258.
- MESSIAS, C.L., 1977. Parasexualidade e produção de aflatoxina em *Aspergillus flavus* Link. Piracicaba, ESALQ/USP. 75p. [Tese de Mestrado]
- MESSIAS, C.L. e J.L. AZEVEDO, 1980. Parasexuality in the Deuteromycete *Metarhizium anisopliae*. Transactions of British Mycological Society, 75: 473-477.
- MESSIAS, C.L.; J.L. AZEVEDO; E. de CONTI; H.M.L. de SOUZA, 1978. Aspectos biológicos e indução de mutantes em *Metarhizium anisopliae*. Resumos do III Congresso Latinoamericano de Entomologia e V Congresso Brasileiro de Entomologia, Bahia. p.69.
- MIEGEVILLE, M.; M. BASTIDE; J.M. BASTIDE; C. VERMEIL, 1979. Scanning electron microscope study on the formation of protoplasts in different types of yeast. Cellular and Molecular Biology, 25: 17-23.
- MOAT, A.G.; I.J. BARNES; E.H. McCURLEY, 1966. Factors affecting the survival of auxotrophs of *Saccharomyces cerevisiae* in mixed populations. Journal of Bacteriology, 92: 297-301.

- MOAT, A.G.; N. PETER Jr.; A.M. SRB, 1959. Selection and isolation of auxotrophic yeast mutants with the aid of antibiotics. *Journal of Bacteriology*, 7: 673-677.
- MORRIS, N.R., 1978. Preparation of large molecular weight from the fungus *Aspergillus nidulans*. *Journal of General Microbiology*, 106: 387-389.
- MOSSES, D.; K.L. WILLIAMS; P.C. NEWELL, 1975. The use of mitotic crossing-over for genetic analysis in *Dictyostelium discoideum*: mapping of linkage group II. *Journal of General Microbiology*, 90: 247-259.
- MUSÍLKOVÁ, M. e Z. FENCL, 1968. Some factors affecting the formation of protoplasts in *Aspergillus niger*. *Folia Microbiologica*, 13: 235-239.
- MUSÍLKOVÁ, M.; Z. FENCL; O. SEICHERTOVÁ, 1969. Release of *Aspergillus niger* protoplasts by *Penicillium purpurogenum* enzymes. *Folia Microbiologica*, 14: 47-50.
- OCHI, K. e E. KATZ, 1980. Genetic analysis of the Actinomycin - producing determinants (plasmid) in *Streptomyces parvulus* using the protoplast fusion technique. *Canadian Journal of Microbiology*, 26: 1460-1464.

- OKANISHI, M.; K. SUZUKI; H. UMEZAWA, 1974. Formation and reversion of Streptomyces protoplasts: Cultural conditions and morphological study. *Journal of General Microbiology*, 80: 394-400.
- PAPA, K.E., 1973. The parasexual cycle in *Aspergillus flavus*. *Mycologia*, 68: 1201-1205.
- PAPA, K.E., 1978. The parasexual cycle in *Aspergillus parasiticus*. *Mycologia*, 70: 766-773.
- PAPA, K.E., 1976. Linkage groups in *Aspergillus flavus*. *Mycologia*, 67: 159-165.
- PARTRIDGE, B.M. e J.A. DREWE, 1974. *Candida* protoplasts and their ultrastructure. *Sabouradia*, 12: 166-178.
- PEBERDY, J.F., 1971. Protoplasts from *Mortierella vinacea*. *Transactions of the British Mycological Society*, 56: 67-72.
- PEBERDY, J.F., 1979. Fungal protoplasts: isolation, reversion and fusion. *Annual Review of Microbiology*, 33: 21-39.
- PEBERDY, J.F., 1979. Protoplasts - applications in microbial genetics. *A Handbook of Experimental Methods*. Published by Department of Botany, University of Nottingham, England, 60p.

- PEBERDY, J.F., 1980. Protoplast fusion - a total for genetic manipulation and breedings in industrial microorganisms. *Enzyme Microbiology and Technology*, 2: 23-29.
- PEBERDY, J.F.; C.E. BUCKLEY; D.C. DALTREY; P.M. MOORE, 1976. Factor affecting protoplasts release in some filamentous fungi. *Transactions of British Mycological Society*, 67: 23-26.
- PEBERDY, J.F.; H. EYSEN; J. ANNÉ, 1977. Interspecific hybridization between *Penicillium chrysogenum* and *Penicillium cyaneo-fulvum* following protoplast fusion. *Molecular and General Genetics*, 157: 281-284.
- PEBERDY, J.F. e R.K. GIBSON, 1971. Regeneration of *Aspergillus nidulans* protoplasts. *Journal of General Microbiology*, 69: 325-330.
- PEREIRA, J.O., 1978. Ocorrência do ciclo parassexual em uma espécie do gênero *Aspergillus*. Piracicaba, ESALQ/USP. 108p. [Tese de Mestrado]
- PETCH, T., 1931. Notes on entomogenous fungi. *Transactions British Mycological Society*, 16: 55-75.

PONTECORVO, G., 1949. Auxonographic techniques in biochemical genetics. *Journal of General Microbiology*, 3: 122-126.

PONTECORVO, G. e E. KAUFER, 1958. Genetic analysis by means of mitotic recombination. *Advances in Genetics*, 9: 71-104.

PONTECORVO, G. e G. SERMONTI, 1954. Parasexual recombination in *Penicillium chrysogenum*. *Journal of General Microbiology*, 11: 94-104.

PONTECORVO, G. e J.A. ROPER, 1952. Genetic analysis without sexual reproduction by means of polyploidy in *Aspergillus nidulans*. *Journal of General Microbiology*, 6: viii.

PONTECORVO, G.; J.A. ROPER; E. FORBES, 1953. Genetic recombination without sexual reproduction in *Aspergillus niger*. *Journal of General Microbiology*, 8: 198-210.

PONTECORVO, G.; J.A. ROPER, L.M. HEMMONS; K.D. McDONALD e W.J. BUFTON, 1953. The Genetics of *Aspergillus nidulans*. *Advances in Genetics*, 5: 141-238.

REAUME, S.E. e E.L. TATUM, 1949. Spontaneous and nitrogen mustard induced nutritional deficiencies in *Saccharomyces cerevisiae*. *Archives of Biochemistry*, 22: 331-338.

- ROBERTS,C.F.,1959. A replica plating techniques for the isolation of nutritionally exacting mutants of a filamentous fungus (*Aspergillus nidulans*). Journal of General Microbiology, 20:540-548.
- ROBINSON,M.; E.LEWIS; E.NAPIER, 1981. Occurrence of reiterated DNA sequences in strains of *Streptomyces* produced by an interspecific protoplast fusion. Molecular and General Genetics, 182:336-340.
- ROMAN,H.; 1955. A system selective for mutations affecting the synthesis of adenine in yeast. C.R. Lab. Carlsberg, Ser.
- ROPER,J.A., 1952. Production of heterozygous diploids in filamentous fungi. Experientia, 8:14-15.
- ROSATO,Y.B.; C.L.MESSIAS; J.L.AZEVEDO, 1981. Production of extracellular enzymes by isolates of *Metarhizium anisopliae*. Journal of Invertebrate Pathology, 38:1-3.
- RUSSEL,P.J. e M.P. COHEN, 1976. Enrichment for auxotrophic and heat-sensitive mutants of *Neurospora crassa* by trytium suicide. Mutation Research, 34:359-366.
- SANTOS,A.L.L., 1978. Influência de alguns fatores no crescimento, Germinação e produção de conídios de *Metarhizium anisopliae*(Metsch) Sorokin.Tese apresentada à ESAL-USP para obtenção do grau de Mestre em Microbiologia Agrícola, 148 p.

- SARACHEK,A.; D.D.RHOADS; R.H.SCHWARZHOFF, 1981. Hybridization of *Candida albicans* trough fusion of protoplasts. Archives of Microbiology, 129:1-7.
- SCANDALIOS,J.G., 1969. Genetic control of multiple molecular from of enzymes in plants. A. review, Biochemical Genetics, 3:37-79.
- SERMONTI,G., 1956. Complementary gen which effect penicillin yields. Journal of General Microbiology, 15:599-608.
- SERMONTI,G., 1959. Genetics of penicillin production. Annals of the New York Academy of Science, 81:950-966.
- SHAHIN,M.M., 1971. Preparation of protoplasts from stationary phase cells of *Schizosaccharomyces pombe*. Canadian Journal of Genetics and Cytology, 13:714-719.
- SIETSMA,J.H. e J.T.M.WOUTERS, 1971. Cell wall composition and protoplasts formation of *Geotrichum candidum*. Archives fur Mikrobiologie, 79:263-273.
- SIETSMA,J.H.; D.E.EVELEIGH; R.H. HASKINS; J.F.T. SPENCER,1967. "Protoplast" from *Pythium* sp. PRL 2142, Canadian Journal of Botany, 13:1701-1704.

SIETSMA, J.H. e W.R. de BOER, 1973. Formation and regeneration of protoplasts from *Pythium* PRL 2142. *Journal of General Microbiology*, 74: 211-217.

SIPICZKI, M. e C. FERENCZY, 1977. Protoplasts fusion of *Schizosaccharomyces pombe* auxotrophic mutants of identical mating-type. *Molecular and General Genetics*, 151: 77-81.

SNOW, S.R., 1966. An enrichment method for auxotrophic yeast mutants using the antibiotic "nystatin". *Nature*, 211: 206-207.

SOROKIN, N., 1883. Les parasites des plantes de l'homme et des animaux. *Rastielinye parazyt celovekai-zivotnyh*. Band, 11: 268-290. Apud: PETCH, T., 1931. Notes on Entomogenous fungi. *Transactions British Mycological Society*, 16: 55-75.

SPENCER, J.F.T.; P. LAUD; D.M. SPENCER, 1980. The use of mitochondrial mutants in the isolation of hybrids involving industrial yeast strains. 2. Use in isolation of hybrids obtained by protoplast fusion. *Molecular and General Genetics*, 178: 651-654.

- STAHL, V., 1978. Zygote formation and recombination between like mating-types in the yeast *Saccharomyces lipolytica* by protoplast fusion. *Molecular and General Genetics*, 160: 111-113.
- STEPHEN, E.R. e A. NASIM, 1981. Production of protoplasts in different yeasts by mutanase. *Canadian Journal of Microbiology*, 27: 550-553.
- STRAUSS, B.S., 1958. Cell death and "unbalanced growth" in *Neurospora*. *Journal of General Microbiology*, 18: 658-669.
- STROMNAES, Ø.; E.D. GARBER; L. BEHARA, 1964. Genetics of phytopathogenic fungi. IX. Heterocariosys and the parasexual cycle in *Penicillium italicum* and *Penicillium digitatum*. *Canadian Journal of Botany*, 42: 423-427.
- SUAREZ, J.A. e K.F. CHATER, 1980. Polyethylene glycol - Assisted transfection of *Streptomyces* protoplasts. *Journal of Bacteriology*, 142: 8-14.
- SVOBODA, A., 1976. Conjugation of yeast protoplasts. *Folia Microbiologica*, 21: 193-194.

SVOBODA, A., 1976. Mating reaction in yeast protoplasts.

Archives of Microbiology, 110: 313-318.

SVOBODA, A., 1978. Fusion of yeast protoplasts induced by polyethylene glycol. Journal of General Microbiology,

109: 169-175.

TAKAHASHI, T., 1959. Filtration methods for selection of auxotrophic mutants of flocculent type yeast. Report

Kihara Institute Biological Research, 10: 57-59.

TANAKA, H.; N. OGASAWARA; S. KAMIMIYA, 1981. Protoplasts

of *Pyricularia oryzae* P₂: preparation and regeneration

into hyphal form. Agricultural and Biological Chemistry,

45: 1541.

TATUM, E.L.; R.W. BARRATT; N. FRIES; D.M. BONNER, 1950. Biochemical mutant strains of *Neurospora* produced by physical

and chemical treatment. American Journal of Botany, 37:

38-46.

TATUM, E.L.; R.W. BARRATT; V.M. CUTTER, 1949. Chemical

induction of colonial paramorphs in *Neurospora* and *Syncephelastrum*. Science, 109: 509-511.

- THURIAUX, P., 1980. Genetical analysis of a sterile mutant by protoplast fusion in the fission yeast *Schizosaccharomyces pombe*. The Journal of General Microbiology, 116: 525-528.
- TINLINE, R.D., 1961. *Cochliobolus sativus*. IV - Drug resistance color and nutritional exacting mutants. Canadian Journal of Botany, 39: 1695-1704.
- TINLINE, R.D., 1962. *Cochliobolus sativus*. V. Heterocaryosis and parasexuality. Canadian Journal of Botany, 40: 425-437.
- TINLINE, R.D., 1971. Nuclear distribution in *Metarhizium anisopliae*. Mycologia, 63: 713-721.
- TINLINE, R.D. e C. NOVIELLO, 1971. Heterocaryosis in the entomogenous fungus, *Metarhizium anisopliae*. Mycologia, 63: 701-712.
- TSUBOI, M., 1981. Sporulation of products of protoplasts fusion without regeneration in *Saccharomyces cerevisiae*. Molecular and General Genetics, 182: 1-6.

TULOCH, M., 1976. The genus *Metarhizium anisopliae*.

Transactions British Mycological Society, 66: 407-411.

VALE, T.L.; S.M. FRIGO; J.L. AZEVEDO; C.L. MESSIAS, 1980.

Variabilidade em linhagens haplóides e diplóides de *Metarhizium anisopliae*. Resumos do VII Congresso Brasileiro de Entomologia, Campinas, p.347.

VALLIN, C. e L. FERENCZY, 1978. Diploid formation of *Candida tropicalis* via protoplast fusion. Acta Microbiologica, 25: 209-212.

van SOLINGEN, P. e J.B. van der PLAAT, 1977. Fusion of yeasts spheroplasts. Journal of Bacteriology, 130: 946-947.

VEEN, K.H., 1967. A technique for monospore cultures and the determination of nucleus numbers in *Metarhizium anisopliae*. Journal of Invertebrate Pathology, 9: 276-278.

VILACORTA, A., 1978. Efeito da temperatura e da nutrição sobre o desenvolvimento de vários isolamentos de *Metarhizium anisopliae* Sorok. Resumos do III Congresso Latinoamericano de Entomologia e V Congresso Brasileiro de Entomologia, Bahia, p.70.

- VINNET, C.N. e W.R. GOYNES Jr., 1980. Aspects of parasexual analysis in *Aspergillus parasiticus*. Canadian Journal of Microbiology, 26: 706-713.
- ZACHARUK, R.Y., 1970a. Fine structure of the fungus *Metarhizium anisopliae* infecting three species of larvae Elateridae (Coleoptera). I. Dormant and germinating conidia. Journal of Invertebrate Pathology, 15: 63-80.
- ZACHARUK, R.Y., 1970b. Fine structure of the fungus *Metarhizium anisopliae* infecting three species of larvae Elateridae (Coleoptera). II. Conidial germ tubes and apresoria. Journal of Invertebrate Pathology, 15: 81-91.
- WEBER, H.; W. FORSTER; H. BERG; H.E. JACOB, 1981. Parasexual hybridization of yeasts by electric field stimulated fusion of protoplasts. Current Genetics, 4: 165.
- WOODWARD, D.O.; J.R. DEZEEUW; A.M. SRB, 1946. The separation and isolation of particular biochemical mutants of *Neurospora* by differential germination of conidia followed by filtration and selective plating. Proceedings of National Academy of Science, 40: 192-200.

- WRIGHT, D.M.; K.L. WILLIAM; P.C. NEWELL, 1977. Ethidium bromide resistance: A selective marker located on linkage group IV of *Dyctyostelium discoideum*. *Journal of General Microbiology*, 102: 423-426.
- YAMAMOTO, M. e S. FUKUI, 1977. Fusion of yeast protoplasts. *Agricultural and Biological Chemistry*, 41: 29-30.
- YAMAMURA, M.; Y. THERANISHI; A. TANAKA; S. FUKUI, 1955. Preparation of protoplasts of hydrocarbon - utilizing yeast cells and their respiratory activities. *Agricultural and Biological Chemistry*, 39: 13-20.
- YAMASHITA, K.; H. FUKUDA; K. MARATA; A. KIMURA, 1981. Transfer of mitochondria of *Hansenula wingei* into protoplast of *Saccharomyces cerevisiae* by mini-protoplast fusion. *FEBS Letters*, 132: 305-307.
- YANO, K.; M. KAWAMURA; M. TAKAGI, 1981. Enrichment of n-alkane assimilation-deficient mutants of *Candida* yeast by synergistic effect of nystatin and pyrrolnitrin. *Agricultural and Biological Chemistry*, 45: 1017 - 1020.
- YOUNG, J.D., J.D. GORMAN, J.A. GORMAN e R.M. ROCK, 1976. Indirect selection for auxotrophic mutants of *Saccharomyces cerevisiae* using the antibiotic netropsin. *Mutation Research*, 35: 423 - 428.