**Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”**

**Estratégias de seleção para resistência a percevejos e alta produtividade em
populações segregantes de soja**

Felipe Bermudez Pereira

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em
Ciências. Área de concentração: Genética e Melhoramento
de Plantas

**Piracicaba
2015**

Felipe Bermudez Pereira
Engenheiro Agrônomo

Estratégias de seleção para resistência a percevejos e alta produtividade em populações segregantes de soja

versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011

Orientador:
Prof. Dr. **JOSÉ BALDIN PINHEIRO**

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Ciências. Área de concentração: Genética e Melhoramento de Plantas

**Piracicaba
2015**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP

Pereira, Felipe Bermudez

Estratégias de seleção para resistência a percevejos e alta produtividade em populações segregantes de soja / Felipe Bermudez Pereira. - - versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011. - - Piracicaba, 2015.

75 p. : il.

Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz".

1. Índices de seleção 2. Resistência a insetos 3. *Euschistus heros* 4. *Piezodorus guildinii* 5. *Nezara viridula* I. Título

CDD 633.34
P436e

"Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor"

AGRADECIMENTOS

À Universidade de São Paulo, especialmente ao campus da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Cursos de Pós-Graduação (Capes) pelo apoio financeiro.

Ao meu orientador, o professor Dr. José Baldin Pinheiro, por manter a porta de sua sala sempre aberta, e sempre me receber com calma para resolver problemas e debater sobre minhas dúvidas, me ensinando a ser um profissional e uma pessoa muito melhor.

Aos professores e técnicos do Departamento de Genética da ESALQ/USP, obrigado pela amizade e contribuição na minha formação.

Ao professor Dr. Brian Diers, que me recebeu no doutorado sanduiche, e toda a sua equipe, pela paciência e ensinamentos.

Aos meus pais, Manoel e Clarice, que sempre me apoiaram e vibraram com as minhas conquistas.

A minha noiva, Marisângela, por todo carinho, atenção, paciência e apoio, principalmente nos momentos mais difíceis. Agradeço por ser minha melhor amiga.

Aos meus irmãos, Manoel Jr. e André, e minhas cunhadas Fania e Carolina, pelo apoio e exemplos de pessoas.

Aos amigos Felipe Leite Silva, Miguel Angelo e Diogo Salaberrie por, mesmo estando distantes, sempre foram fiéis e recíprocos.

Aos meus colegas do doutorado pelo constante apoio e amizade, a todos vocês que fizeram parte deste meu aprendizado e de uma forma muito especial agradeço a: Vitor Correa Pavinato, Marcos Siqueira, Fabiani da Rocha, Mônica Christina Ferreira, Fabiana Freitas, Vanessa Rizzi, Matheus Dominiquini, Caio Canella e Sabrina DellaBruna.

SUMÁRIO

RESUMO	7
ABSTRACT	9
1 INTRODUÇÃO.....	11
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
2.1 Importância econômica da soja.....	13
2.2 Principais insetos-praga de ocorrência na soja	14
2.3 Complexo de percevejos	15
2.4 Resistência de plantas a insetos	18
2.5 Base genética e germoplasma	21
2.6 Análise de Trilha.....	22
2.7 Seleção simultânea.....	23
3 MATERIAL E MÉTODOS.....	27
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	35
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	59
REFERÊNCIAS	61

RESUMO

Estratégias de seleção para resistência a percevejos e alta produtividade em populações segregantes de soja

Na fase reprodutiva da soja, surgem os percevejos sugadores de vagens e sementes que causam danos desde a formação das vagens até o final do período de granação. Os percevejos são responsáveis por perdas significativas de produção, qualidade e potencial germinativo da semente, além de dificultarem a colheita mecanizada. Uma forma de aumentar o êxito nos programas de melhoramento refere-se à seleção simultânea de um conjunto de caracteres de importância econômica. O peso de sementes boas (não danificadas pelos percevejos) é um caráter que apresenta potencial para a seleção de genótipos resistentes e altamente produtivos. Com este trabalho buscou-se comparar diferentes critérios de seleção com base em seus ganhos estimados, para resistência ao complexo de percevejos e produtividade de grãos em duas diferentes populações de soja. Para isto, a avaliação fenotípica foi realizada na geração $F_{2:3}$, em dois experimentos distintos, sendo a população derivada do cruzamento de IAC-100 x PI 295952 considerada a “população 1”, e a população derivada de IAC-100 x PI 306712 considerada a “população 2”. Os experimentos foram instalados em Piracicaba-SP, no ano agrícola de 2013/14, em delineamento alfa-látice 18x9, com três repetições para cada população. Foram avaliados caracteres agrônômicos (número de dias para o florescimento, NDF; altura da planta na maturidade, APM; número de dias para a maturidade, NDM; acamamento, AC; valor agrônômico, VA; e produtividade de grãos, PG) e de resistência (período de granação, PEG; retenção foliar, RF; peso de sementes boas, PSB; e peso de cem sementes, PCS). Foram realizadas as análises de variância, estimativas de correlações, análise de trilha, índices de seleção e análise de fatores. Além disso, as seleções foram simuladas em quatro arranjos de caracteres, sendo eles: PSB e PG; todos os caracteres de resistência; todos os caracteres de resistência e PG; e todos os caracteres. Todos os caracteres apresentaram variabilidade suficiente para a seleção. A análise de trilha foi realizada sob colinearidade, pois foi detectada a presença de multicolinearidade na matriz de correlações. A produtividade de grãos, além de estar altamente correlacionada, apresentou alto efeito direto com peso de sementes boas, além de efeito indireto pelos outros caracteres. A seleção considerando apenas o peso de sementes boas mostrou que plantas com caracteres indesejáveis podem ser selecionadas. O índice com Base em Soma de Postos, no arranjo com todos os caracteres, foi o ideal para a seleção de progênies na população 1. Já o índice Multiplicativo, no arranjo com todos os caracteres de resistência, foi aceitável para a seleção de progênies na população 2, mas não é o ideal. Portanto, sem a conformidade de resultados entre as populações, não foi possível obter um índice de seleção eficiente para todos os caracteres. A elaboração de índices de seleção pela análise de fatores não foi interessante para as populações em estudo. Com isso, estudos complementares devem ser realizados com outros índices de seleção nestas populações, para se estabelecer um índice em que todos os caracteres sejam selecionados de forma favorável e com ganhos satisfatórios para a aplicação em programas de melhoramento.

Palavras-chave: Índices de seleção; Resistência a insetos; *Glycine max*; *Euschistus heros*; *Piezodorus guildinii*; *Nezara viridula*

ABSTRACT

Selection strategies for resistance to stink bugs and high yield in soybean segregating populations

At the soybean reproductive stage arise stink bugs pods and seeds suckers that cause damage from the formation of the pods to the end of grain filling period. Stink bugs are responsible for significant losses in yield, quality and seed germination potential, and hinder mechanical harvesting. One way to increase the success in the breeding program refers to the simultaneous selection of a set of traits of economic importance. The weight of good seeds (do not damage by the stink bugs) is a character that has potential for selection of resistant and highly productive genotypes. The aimed of this study is to compare different selection criteria based on their estimates gains for resistance to stink bugs complex and grain yield in two different soybean populations. For this, the phenotypic evaluation was performed in F_{2:3}, in two separate experiments, being the population derived from the cross IAC-100 x PI 295952 considered the "population 1", and the population derived from IAC-100 x PI 306712 considered the "population 2." The experiment was installed in Piracicaba-SP, in the agricultural year 2013/14, in a 18x9 alpha-lattice design, with three replications for each population. There were evaluated agronomic (number of days to flowering, NDF; plant height at maturity, APM; number of days to maturity, NDM; lodging, AC; agronomic value, VA, and grain yield, PG) and resistance traits (grain filling period, PEG; leaf retention, RF; weight of good seeds, PSB; and weight of hundred seeds, PCS). Analyzes of variance, estimates of correlations, path analysis, selection indices and factor analysis were performed. Moreover, the selections were simulated in four arrangements of characters, as follows: PSB and PG; all the resistance characters; all the resistance characters and PG; and all characters. All characters showed enough variability for selection. Path analysis was performed under colinearity because it was detected the presence of multicollinearity in the correlation matrix. Grain production, besides being highly correlated, had a high direct effect with weight of good seed and an indirect effect by other characters. The selection considering only the weight of good seed showed that plants with undesirable characters may be selected. The index Based on Sum of Ranks, in the arrangement with all the characters, was ideal for progeny selection in population 1. The Multiplicative index, the arrangement with all the strength of character, it was acceptable for selecting progeny in population 2, but is not ideal. Therefore, without the compliance results between populations, it was not possible to obtain an efficient selection index for all characters. The development of selection indexes by factor analysis was not interesting to this populations under study. Thus, further studies should be done with other selection indices in these populations, to establish an index in which all characters are favorably selected with satisfactory gains to use in breeding programs.

Keywords: Selection indices; Insect resistance; *Glycine max*; *Euschistus heros*; *Piezodorus guildinii*; *Nezara viridula*

1 INTRODUÇÃO

A soja [*Glycine max* (L) Merrill] ($2n = 40$ cromossomos) é uma planta autógama, cuja composição taxonômica se insere na sub-classe Rosidae, ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Papilionoideae, tribo Phaseoleae, gênero *Glycine* (NCBI, 2015). O centro de origem desta planta localiza-se no leste da Ásia, sendo o centro-sul da China o centro primário, e a região da Manchúria, onde foi domesticada, o centro secundário (XU et al., 1989).

Quando cultivada, a soja está sujeita ao ataque de insetos-praga desde a germinação até a colheita. Em termos gerais, na fase vegetativa a principal praga é a lagarta desfolhadora e na fase reprodutiva são os percevejos, especialmente os da família Pentatomidae. No Brasil, os percevejos mais abundantes nesta leguminosa são: *Nezara viridula* (L.), *Piezodorus guildinii* (West.) e *Euschistus heros* (F.) (Heteroptera: Pentatomidae). As populações destes pentatomídeos estão presentes em frequência e abundância variáveis dependendo da região e do ano, com predominância de uma ou outra espécie, dependendo das condições climáticas e da cultivar semeada (CIVIDANES; PARRA, 1994; MAGRINI et al. 1996).

Por se alimentarem diretamente dos grãos, os percevejos são responsáveis por perdas significativas de produção, qualidade e potencial germinativo da semente, além de dificultarem a colheita mecanizada (PANIZZII; SLANSKY JÚNIOR, 1985). Visando o controle desta praga, o aumento na utilização de inseticidas tem sido frequente, ocasionando danos ambientais e elevando o custo de produção da cultura. Além disso, a utilização indiscriminada de inseticidas em determinadas culturas tem contribuído para a seleção de populações de insetos resistentes.

O investimento na característica de resistência genética a pragas deve ser valorizado, já que há um aumento na incidência de insetos-praga na cultura da soja, devido, provavelmente, ao cultivo sucessivo e ao aumento da área cultivada (MOURA, 1999). Além disso, a obtenção de cultivares resistentes culminaria na redução da utilização de inseticidas, o que traria benefícios econômicos em virtude da diminuição dos custos de produção, benefícios ecológicos pela redução do nível de agressão ao meio ambiente, e benefícios sociais por permitir que a cultura seja praticada por agricultores com menor disponibilidade de capital e de equipamentos para aplicação de defensivos (VENTURA; PINHEIRO, 1999). Também tem se verificado que o processo de melhoramento genético dirigido para a produtividade de grãos e para a qualidade das plantas ou de seus derivados pode torná-las mais vulneráveis a insetos-praga (PANIZZII et al. 1986; LUSTOSA et al. 1999).

Para se obter materiais genéticos superiores, é necessário que o material selecionado reúna, simultaneamente, uma série de atributos favoráveis que lhe confira produção comparativamente mais elevada e que satisfaça tanto as exigências do consumidor quanto do produtor. Uma maneira de aumentar a chance de êxito de um programa de melhoramento é por meio da seleção simultânea de um conjunto de caracteres de importância econômica. Para tal, a teoria de índice de seleção pode ser uma alternativa promissora, pois permite combinar as múltiplas informações contidas na unidade experimental, de modo que seja possível a seleção com base em um complexo de variáveis que reúna vários atributos de importância econômica (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Quando diferentes critérios de seleção são considerados, a predição de ganhos para cada critério é importante para direcionar o melhorista na utilização do material genético disponível, visando maximizar os ganhos para os caracteres de interesse (PAULA et al., 2002).

Portanto, o objetivo desse trabalho foi comparar diferentes critérios de seleção por meio de seus ganhos estimados, determinando os métodos superiores para seleção de genótipos resistentes ao complexo de percevejos e altamente produtivos em duas populações segregantes de soja.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Importância econômica da soja

A primeira referência sobre soja no Brasil data de 1882, relatando seu cultivo na Bahia. Em 1908, imigrantes japoneses introduziram-na em São Paulo. Em 1914, E.C. Craig introduziu-a no Rio Grande do Sul; e em 1949 foi realizada a primeira exportação de soja brasileira (SEDIYAMA et al., 2005), mas seu impulso maior aconteceu em meados dos anos 70, em razão da grande quebra da safra da Rússia e a incapacidade dos Estados Unidos suprirem a demanda mundial. Nesta época, o Brasil superou a China, que era a segunda maior produtora mundial de soja com 8.500.000 toneladas e ficou logo atrás dos Estados Unidos, o maior produtor mundial (MISSÃO, 2006).

Atualmente, os maiores produtores mundiais de soja são Estados Unidos, Brasil e Argentina. A China é hoje um dos maiores importadores de soja, devido ao grande consumo interno para alimentação humana (USDA, 2015).

As estimativas de produção mundial na safra 2014/15 são de 318,25 milhões de toneladas (t), sendo os Estados Unidos responsáveis por aproximadamente 34%, ou seja, 108,01 milhões de toneladas, tornando-o o maior produtor mundial (USDA, 2015). O Brasil tem ocupado o segundo lugar, sendo que a safra de soja 2014/15 está estimada em 95,1 milhões de toneladas produzidas em 31,6 milhões de hectares (ha), o que representa um incremento de 10,4 e 4,6%, respectivamente, em relação à safra passada. A produtividade média nacional é de 3,011 kg ha⁻¹, o que corresponde a um crescimento de 5,5%, sendo o Estado do Mato Grosso o principal produtor, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul (CONAB, 2015).

Estima-se que, em média, cada dez hectares de soja gerem um emprego direto e um indireto, na cadeia e nos serviços associados. Considerando que a soja ocupasse cerca de 27,5 milhões de hectares no Brasil, o total de empregos gerados seria de 5,5 milhões e o setor participaria com pelo menos 16% dos mais de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro gerado pela agroindústria (GAZZONI, 2013).

A soja é responsável por boa parte do PIB brasileiro (RAMOS, 2013), que encerrou 2013 com um crescimento de 2,3% em relação a 2012, em valores correntes totalizou R\$ 4.838,00 bilhões. Na agropecuária, várias culturas de destaque apresentaram ganhos em produção e produtividade, sendo a soja responsável por 24,3% desses ganhos (IBGE, 2013).

O último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2015) ainda não apresentou dados da safra nova (2015/16), no qual poderá se

confirmar ou não os dados da intenção de plantio de soja nos Estados Unidos em 34,25 milhões de hectares.

Assim, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2015), com o aumento de área e caso não venha a ocorrer nenhum problema climático, a safra americana de soja em grãos deverá ser maior que os 108 milhões de toneladas colhidos na safra atual, e se não houver nenhum aumento significativo de consumo interno (esmagamento) ou exportação, os estoques de passagem nos Estados Unidos deverão permanecer altos na safra 2015/16. Além disso, as lavouras da América do Sul, especificamente Brasil e Argentina, tiveram um bom desenvolvimento e têm bons níveis de produtividade, fato que pesará no total de soja disponível no mercado internacional.

As exportações norte americanas começaram a diminuir o ritmo, pelo fato do mercado direcionar as atenções para Brasil e Argentina, isto ajudou a pressionar os preços da soja na Bolsa de Chicago, provocando uma volatilidade forte nas cotações, as quais, variaram entre US\$ 9,48 por bushel (bu) (US\$ 348,61/t) e US\$ 9,89/bu (US\$ 363,62/t), fechando o mês maio de 2015 em US\$ 9,78/bu (US\$ 359,50/t). Para o próximo mês os preços internacionais deverão continuar com o viés de baixa, já que o plantio da soja estará em ritmo acelerado e as condições climáticas do Meio Oeste dos Estados Unidos estão, até o momento, favoráveis, além da maior disponibilidade da oleaginosa no mercado, diante do final da colheita da safra da América do Sul (CONAB, 2015).

2.2 Principais insetos-praga de ocorrência na soja

A cultura da soja está sujeita ao ataque de insetos-praga desde a germinação até a colheita. Logo após a germinação, a partir do início do estágio vegetativo, vários insetos como o bicudo-da-soja (*Sternechus subsignatus*), a lagarta elasm (*Elasmopalpus lignosellus*), os corós (Scarabaeoidea) e os percevejos-castanhos-da-raiz (*Scaptocoris castanea* e *Atarsocoris brachiariae*) danificam a cultura. Mais adiante, a lagarta-da-soja (*Anticarsia gemmatilis*), a lagarta falsa-medideira (*Pseudoplusia includens*) e vários outros desfolhadores atacam as plantas, ocorrendo em maior número durante as fases vegetativa e de floração (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000).

No ano agrícola de 2012/2013 a *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) ganhou importância como uma nova praga. A primeira notificação ocorreu nos Estados de Goiás, na cultura da soja; Bahia, em tigueria (germinação espontânea de sementes

remanescentes) de soja; e Mato Grosso, na cultura do algodoeiro (CZEPAK et al., 2013). Nesta safra em função das irregularidades climáticas (baixo índice pluviométrico e má distribuição das chuvas), aliadas ao manejo inadequado das culturas implantadas no cerrado, houve um aumento considerável da *H. armigera* nas áreas de cultivo, o que culminou com a elevação dos custos com a utilização de inseticidas estimados em US\$ 150 ha⁻¹ (ADAB, 2013).

Com o início da fase reprodutiva, surgem os percevejos sugadores de vagens e sementes (*Nezara viridula*, *Piezodorus guildinii* e *Euschistus heros*), dentre outras espécies, que causam danos desde a formação das vagens até o final do período de granação. A soja pode, também, ser atacada por outras espécies de insetos, consideradas pragas esporádicas, cujos aumentos populacionais são determinados por alterações climáticas, ou outros fatores, como, por exemplo, os sistemas de produção específicos de cada região (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000).

Dentre os insetos-praga, os percevejos sugadores de sementes são considerados, em vários países, como de maior importância, pelos danos que causam na cultura (GODOI e PINHEIRO, 2009; GUEDES et al., 2012).

2.3 Complexo de percevejos

Percevejos (Hemiptera: Pentatomidae) são pragas de importância econômica para a maioria das culturas e geralmente são as de maior dificuldade de controle (KAMMINGA et al., 2012). Na soja, são considerados como o principal problema entomológico (PANIZZI; BUENO e SILVA 2012). Conhecidos como "complexo de percevejos", as espécies *Nezara viridula*, *Piezodorus guildinii* e *Euschistus heros*, são predominantes no Brasil (GUEDES et al., 2012) e ocorrem principalmente na fase de formação e maturação de vagens (PANIZZI; SLANSKY JUNIOR, 1985; GODOI et al., 2002).

As populações destes pentatomídeos estão presentes em frequência e abundância variáveis de região para região e de ano para ano, com predominância de uma ou outra espécie, dependendo das condições climáticas e da cultivar semeada (CIVIDANES; PARRA, 1994; MAGRINI et al. 1996).

A espécie que ocorre em densidades mais elevadas é *E. heros*, sendo considerada, portanto, de maior importância (ROGGIA et al., 2011). As ninfas deste percevejo iniciam a alimentação no segundo ínstar, mas apenas causam danos a partir do terceiro. Na soja, este percevejo geralmente completa três gerações (PANIZZI; BUENO; SILVA 2012).

Nos Estados Unidos os percevejos são um problema típico no Sul (BOYD; BAILEY, 2000). Em Missouri as espécies *Acrosternum hilare* (Say) e *Euschistus spp.* infestam os campos de soja. Em Lousiana são predominantes *P. guildinii*, *N. viridula* L., *E. servus* (Say) e *A. hilare* (TEMPLE et al., 2013a). Recentemente *P. guildinii* tem se tornado a maior praga da soja em Lousiana e começou a infestar os campos de soja no Meio-Sul (TEMPLE et al., 2013b). Uma nova espécie, *Halyomorpha halys* (Stal), tem preocupado os produtores de soja do Médio-Atlântico (HOOKS, 2011).

A colonização da soja por percevejos inicia tipicamente durante a pré-floração, alcançando o máximo no final do período de granação (CORRÊA-FERREIRA; PANIZZI, 1999). À medida que a soja senesce, os insetos deslocam-se para outras espécies de plantas hospedeiras. As ninfas e adultos alimentam-se através da inserção dos estiletes nas vagens, atingindo diretamente as sementes causando um dano direto, além da extração dos nutrientes (JONES et al., 2011).

De modo geral, ao atingir as sementes, os percevejos danificam diretamente os tecidos, tornando-as chochas e enrugadas, afetando consequentemente a produção e a qualidade dos grãos (PANIZZI; SLANSKY JUNIOR, 1985). Os pentatomídeos fitófagos, ao se alimentarem das sementes, injetam saliva contendo enzimas digestivas e sugam o conteúdo liquefeito (TODD; HERZOG, 1980). Essas enzimas alteram a fisiologia e a bioquímica dos tecidos próximos à punção feita pelo inseto (HORI, 2000). A difusão da saliva pode causar morte celular dos tecidos vegetais sem envolvimento de danos mecânicos causados pelos estiletes (NUORTEVA; REINIUS, 1953).

Como resultado tem-se redução no rendimento e na qualidade dos grãos devido a baixa percentagem de germinação, diminuição do vigor, redução no tamanho dos grãos, redução no conteúdo de óleo, pequeno incremento no conteúdo de proteína e redução no período de estocagem em consequência das picadas e da transmissão de moléstias, como a levedura *Eremothecium coryli* (antes denominada *Nematospora coryli* Peglion), causador da mancha de levedura (DAUGHERTY, 1967; FOSTER; DAUGHERTY, 1969; KIMURA, 2007; TURNIPSEED; KOGAN, 1976;). Os grãos com dano por percevejo apresentam aumento na incidência de *Fusarium spp* e algumas bactérias (RUSSIN et al., 1988). Ainda, os danos causados nos grãos favorecem a colonização por microrganismos, acelerando o processo de fermentação durante o beneficiamento e armazenamento, e estes se transformam em grãos fermentados, que tem seu percentual diretamente somado aos demais grãos avariados (QUIRINO, 2012 apud ROCHA, 2015). Importadores podem rejeitar grãos se o dano por

percevejos for expressivo, resultando em grandes perdas econômicas (CHYEN et al., 1992). De acordo com Degrande e Vivan (2007) quando os percevejos atacam vagens, as perdas podem ser superiores a 30%, e as perdas no valor germinativo das sementes podem ser superiores a 50%.

Em função do ataque pelo complexo de percevejos, tem-se ainda atraso na maturação da cultura (PANIZZI; SLANSKY JUNIOR, 1985), com consequências negativas importantes, já que a retenção foliar afeta de sobremaneira a produção da cultura (ROSSETTO et al., 1986). O índice de retenção foliar depende de qual percevejo realizou a punctura. Em estudos com infestação artificial de *P. guildinii* ocasionou maior índice de retenção foliar que *N. viridula* e *E. heros*. Para este último, praticamente nenhuma retenção foliar foi observada (SOSA-GÓMEZ; MOSCARDI, 1995).

O dano na qualidade dos grãos é expressivo. Da mesma forma que para a retenção foliar, os efeitos de *P. guildinii* têm se mostrado mais graves, quando é avaliado o peso dos grãos, bem como qualidade pelo teste visual e de tetrazólio (CORRÊA-FERREIRA; AZEVEDO, 2002).

Uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos apontou o complexo de percevejos como os mais importantes insetos-praga na cultura da soja, sendo que os produtores fazem em média um tratamento com inseticida por ano para o controle, com custo médio estimado de US\$ 18,50 ha⁻¹ (CAMPOS et al., 2010). Já em Mississipi, entre os anos de 2003 e 2009, o custo de controle variou de 27 a US\$ 49 ha⁻¹ (MUSSER; CATCHOT 2008; MUSSER et al. 2010, 2011). De acordo com Musser et al. (2010), os percevejos infestaram 80% da área cultivada com soja, causando perdas de 126.000 toneladas em 2009.

O custo de aplicação em Sorriso/MT em 2011 foi estimado em R\$ 6,80 ha⁻¹, com a utilização do metamidofós (uso proibido desde 30 de junho de 2012), R\$ 5,88 ha⁻¹ com acefato (em vias de proibição), R\$ 9,15 ha⁻¹ com Beta ciflutrina + Imidacloprido e R\$ 10,89 ha⁻¹ com Tiametoxam + Lambdacialotrina. Os gastos com inseticida são relativamente pequenos por hectare dentro do custo operacional de produção, mas considerando-se a extensão de terra cultivada, os impactos podem ser significativos aos produtores (CEPEA, 2011).

Os inseticidas têm apresentado papel importante no controle, no entanto, tem deixado a desejar nos últimos anos: casos de resistência de percevejos aos produtos, queda na eficiência no controle (PANIZZI; BUENO; SILVA, 2012), reduzido número de moléculas disponíveis (CORRÊA-FERREIRA et al., 2013) e falta de inovação em moléculas (GUEDES et al., 2012). Além disso, não existe perspectiva para a liberação de novas moléculas de inseticidas nesta década (GAZZONI, 2012).

Estima-se que em torno de 40% das aplicações de inseticidas na cultura da soja sejam voltadas ao controle de percevejos. Este fato se agrava quando se considera o aumento das populações desses insetos e a interação com outras culturas, nas quais também são pragas. Vinculando-se isto ao uso de transgênicos com o gene “Bt”, estima-se que 60% das aplicações de inseticida em soja serão para controle de percevejos até o final desta década (GAZZONI, 2012).

Muitas vezes, a aplicação dos inseticidas é realizada de forma inadequada, através de aplicações preventivas, podendo causar desequilíbrios pela eliminação precoce de inimigos naturais presentes nas lavouras de soja. Além disso, pode acelerar o processo de seleção de insetos resistentes ao inseticida utilizado (EMBRAPA, 2013).

Neste panorama, torna-se necessário o desenvolvimento de cultivares de soja resistentes ao complexo de percevejos. O controle de insetos através do uso de cultivares resistentes oferece uma série de vantagens, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico: i) Não gera ônus adicional para o agricultor, por esta razão, o controle de pragas com variedades resistentes pode representar economia para o agricultor e possibilidade de aumento de renda líquida; ii) Não é poluente nem acarreta problemas de resíduos tóxicos nos alimentos produzidos, oferecendo grande vantagem de segurança tanto para o produtor como para o consumidor; iii) Não apresenta problemas de transferência de tecnologia, indo através da semente melhorada diretamente da pesquisa para o usuário; iv) Benefícios sociais, por permitir que a cultura seja praticada por agricultores com menor disponibilidade de capital e de equipamentos para aplicação de defensivos (VENTURA; PINHEIRO, 1999); v) Não interfere com outras práticas agrícolas, especialmente com a colheita, inexistindo tempo de carência entre sua aplicação e a data da colheita; e vi) O uso de plantas resistentes é geralmente compatível com medidas de controle biológico de pragas e também com outras medidas de controle (GODOI et al., 2002; LARA, 1991; LOPES et al., 1997; ROSSETTO et al., 1981a).

2.4 Resistência de plantas a insetos

O uso de cultivares resistentes a insetos-praga é o método mais desejável e ecologicamente adequado para o seu controle. Se a população de um específico inseto-praga não pode se desenvolver ao ponto de causar danos severos a um cultivar resistente, deve-se dar preferência a este cultivar. Um exemplo disso é o uso de cultivares de soja com presença de pubescência, sobre o qual altas populações de *Empoasca fabae* não se desenvolvem. Todavia,

para outros insetos-praga ou complexo de pragas, os procedimentos de combinação de práticas culturais, cultivares resistentes, controle aplicado e outras táticas de manejo podem ser necessários (SEDIYAMA, 2005).

No Brasil, o programa de melhoramento do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC) já lançou cultivares resistentes a insetos pragas como a IAC-100, IAC-17 (PINHEIRO, 1993; ROSSETTO et al., 1989; VEIGA et al., 1999), IAC-23 e IAC-24 (MIRANDA et al., 2001; MIRANDA; LOURENÇÃO, 2002). Porém, são poucas, adaptadas somente à região Sudeste (GODOI et al., 2002) e estão obsoletas em relação ao patamar de produtividade atual. Com isto, torna-se fundamental o desenvolvimento de novas cultivares que agreguem produtividades expressivas e resistência ao complexo de percevejos.

A resistência de plantas é definida como a soma relativa de qualidades hereditárias apresentadas pela planta, as quais influenciam a intensidade do dano provocado pelo inseto (PAINTER, 1951), o que, na prática agrícola, representa a capacidade de certas variedades apresentarem maior quantidade de produto de boa qualidade que as demais, num mesmo nível de população do inseto. Assim, pode-se considerar que uma planta ou variedade é resistente quando, devido a sua constituição genotípica, ela é menos danificada que outras em condições de igualdade para o ataque da praga (VENDRAMIM; NISHIKAWA, 2001).

Existem três tipos de resistência: antixenose, antibiose e tolerância (HESLER; THARP, 2005; SILVA et al., 2013). A antixenose ou não preferência é verificada quando uma planta ou variedade é não atrativa ou não preferida pelo inseto, pela presença de fatores morfológicos ou químicos, em comparação com outra planta (RECTOR et al., 2000). A antibiose ocorre quando o inseto usa a planta normalmente como seu hospedeiro, porém esta afeta a sua biologia. Já a tolerância refere-se à capacidade da planta de suportar ou recuperar-se de uma injúria causada por um inseto sem afetar a sua biologia ou comportamento (SMITH, 2005).

No geral, estes três mecanismos têm se mostrado associados à resistência da soja ao complexo de percevejos. Em estudo realizado por Rossetto e Lourenção (1981b) as linhagens IAC-73/228 e IAC-77/656, apresentaram um baixo número de picadas, o que configura resistência do tipo não-preferência. Por outro lado, a PI229358 ocasionou mortalidade de ninfas, alongamento do período de desenvolvimento e menor ganho de peso para ninfas, o que condiz com o mecanismo de antibiose (JONES; SULLIVAN, 1979). Para a PI171444, quando as avaliações foram feitas a campo, a resistência foi explicada pelos mecanismos de antibiose, não-preferência e evasão; e em laboratório a resistência foi associada apenas a não-preferência (KESTER; SMITH; GILMAN 1984). É importante salientar que a evasão é uma pseudo-

resistência, e ocorre quando a planta passa rapidamente pela sua fase de maior suscetibilidade (LARA, 1991). Rossetto e Lara (1991) propuseram outro mecanismo de pseudo-resistência denominado diluição de dano. De acordo com estes autores a cultivar de soja IAC-100 tem produtividade semelhante a IAS 5, porém, o tamanho da semente é menor. Dessa forma, uma lavoura de IAC-100 tem o dobro de sementes que uma lavoura de IAS 5, o que provoca uma diluição de 50% no dano de percevejos. Embora estes fenômenos não sejam casos de resistência propriamente ditos, podem ser utilizados na prática, contribuindo para o controle de determinados insetos-praga. Silva et al. (2013), identificaram que os genótipos PI 229358, PI 274454, L1-1-01, IAC-19, PI 171451, PI227687, IAC-100, IAC-78-2318, PI 274453, e IAC-74-2832 causam alta mortalidade ninfal de *P. guidinii* (maior que 90%), o que demonstra a expressão de antibiose. A mortalidade ninfal pode ser relacionada a fatores físicos, como a distância que separa o grão da vagem, fazendo que o alimento fique inacessível (PANIZZI; SILVA, 2009). Além disso, os materiais IAC-100, IAC-74-2832, PI 274453, e IAC-24 também alongam o estágio ninfal, mostrando o mesmo mecanismo de resistência. O período ninfal maior pode estar relacionado a um menor conteúdo proteico presente nos grãos destes genótipos (PANIZZI, 1991). A PI 227687 ocasionou a menor taxa de viabilidade ninfal (SILVA et al., 2013). O efeito deste genótipo sobre o inseto pode estar relacionado a alta concentração das isoflavonas genisteína e daidzeína (CARRÃO-PANIZZI; KITAMURA, 1995; PIUBELLI et al., 2005).

Souza et al. (2013) verificaram em grãos maduros dos genótipos TMG 117RR, TMG 121RR, Conquista, TMG 103RR, e PI 227687 que estes são menos atrativos a adultos de *N. viridula*, sugerindo a presença de compostos voláteis indesejáveis aos insetos ou mesmo resistência física a alimentação. Em relação à atratividade de vagens verdes, esses autores observaram que IAC-17 e PI 227687 são menos atrativos, e um alto nível de atração foi observado pelos genótipos IAC-19 e TMG 117RR. As vagens de IAC-17 apresentam ainda valores menores quanto ao número de picadas e tempo de alimentação, logo este genótipo é menos preferido e menos consumido, indicando a não preferência como mecanismo de resistência. A presença de um alto número de tricomas pode ser considerada como o principal fator de resistência desse genótipo contra *N. viridula*.

A variedade de soja IAC-100 foi lançada no mercado brasileiro em 1987, e é uma variedade precoce, resistente a percevejos e insetos desfolhadores. Essa variedade apresenta cerca de 13 vezes menos (em porcentagem) retenção foliar em relação a variedade suscetível

Paraná. Além disso, a área foliar desta variedade consumida por insetos desfolhadores foi três vezes menor do que em variedades suscetíveis (LARA, 1991).

A cultivar IAC-100 apresenta resistência a insetos (PIUBELLI et al., 2005; ROSSETTO et al., 1995), provocada por muitos mecanismos, como menor período de granação e rejeição de sementes novas danificadas, por exemplo. Além disso, o teor elevado de isoflavonas possivelmente está envolvido nos mecanismos de resistência dessa cultivar, pois alguns estudos demonstram que as isoflavonas têm papel fundamental na resistência de plantas contra insetos (PIUBELLI et al., 2005; RAO et al., 1990).

2.5 Base genética e germoplasma

Estudos sobre a variabilidade genética da cultura destacam que o germoplasma brasileiro possui uma base estreita, originada a partir de poucas linhagens ancestrais (HIROMOTO; VELLO, 1986; WYSMIERSKI; VELLO, 2013). O estreitamento da base genética representa uma limitação para o desenvolvimento de programas de melhoramento, como indisponibilidade de alelos para enfrentar estresses bióticos e abióticos, menor adaptabilidade e limitação do potencial produtivo. A uniformidade genética das cultivares é também corroborada por estudos de variabilidade e parentesco empregando marcadores moleculares (HYTEN et al., 2006; PRIOLLI et al., 2002, 2010 e 2013).

Em estudo recente, identificou-se a participação de 60 genótipos ancestrais no desenvolvimento de 444 cultivares brasileiras, sendo que os quatro principais ancestrais (CNS, S-100, Roanoke e Tokyo) contribuíram com 55,3% da base genética do conjunto de materiais. Estima-se que 26 destes ancestrais são os mesmos ancestrais da base genética encontrada nos materiais da América do Norte (WYSMIERSKI, 2013).

A maior parte da variabilidade genética da soja é mantida em bancos de germoplasma existentes em diversos países, sendo as principais coleções localizadas nos EUA, China e Japão. No Brasil, em 2007, a coleção de germoplasma de soja contava com aproximadamente 5.000 acessos caracterizados e disponíveis. A partir do referido ano, iniciou-se o processo de introdução de materiais provenientes da coleção do Banco de Germoplasma dos Estados Unidos, composta por 22 mil acessos, visando enriquecer a coleção brasileira. Contudo, apesar dos esforços, a variabilidade genética para caracteres fisiológicos, morfológicos e agrônômicos, permanece pouco utilizada pela maioria dos programas de melhoramento. Este fato decorre, principalmente, da preferência dos melhoristas por materiais mais produtivos e adaptados para

uso em cruzamentos, colaborando com o estreitamento da base genética (NASS, 2001; NASS; SIGRIST, 2009). Para superar estas limitações, tem sido proposta a introdução de genes presentes nos germoplasmas exóticos em materiais adaptados, identificados pelos programas de pré-melhoramento.

2.6 Análise de Trilha

Os coeficientes de correlação, apesar de serem de grande utilidade na quantificação da magnitude e direção das influências de fatores na determinação de caracteres complexos, não dão a exata importância relativa dos efeitos diretos e indiretos destes fatores. Estudos sobre o desdobramento do coeficiente de correlação são feitos pela análise de trilha, desenvolvida por Wright (1921, 1923) e pormenorizada por Li (1975).

A análise de trilha (ou “*path analysis*”) consiste no estudo dos efeitos diretos e indiretos de caracteres sobre um caráter básico, cujas estimativas são obtidas por meio de equações de regressão, em que os caracteres são previamente padronizados. Apesar de a correlação ser uma característica intrínseca a dois caracteres em uma dada condição experimental, sua decomposição é dependente do conjunto de caracteres estudados, que normalmente são avaliados pelo conhecimento prévio do pesquisador, de suas importâncias e de possíveis inter-relações expressas em “diagrama de trilha” (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2004).

Para ser realizada a análise de trilha é necessário que a matriz $X'X$, sendo X a matriz de correlações, esteja bem condicionada para obtenção dos efeitos diretos e indiretos. Problemas de multicolinearidade podem torná-la singular, consequentemente fazendo com que as estimativas de mínimos quadrados não sejam confiáveis (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Quando os caracteres estão correlacionados entre si, diz-se que há inter-relação ou multicolinearidade entre eles. Algumas vezes o termo multicolinearidade é utilizado apenas nos casos em que a correlação entre os caracteres é muito alta ou perfeita (NETES; WASSERMAN, 1974). Os problemas causados pela multicolinearidade não são devidos simplesmente à sua presença, mas sim ao grau em que se manifesta. Existindo multicolinearidade, em níveis considerados moderados a severos, entre um conjunto de caracteres explicativos, torna-se difícil avaliar a influência destes sobre a resposta no caráter principal, e ignorar seus efeitos pode provocar resultados danosos ou absurdos. Dessa forma, diagnósticos de multicolinearidade devem ser feitos de forma a viabilizar certos estudos. Carvalho (1994) ressalta a importância

deste estudo quando se tem o objetivo de realizar análises de regressões, de trilha, de índice de seleção e de correlações parciais e canônicas, entre outras.

Em presença de multicolinearidade, moderada a severa, as variâncias associadas a certos estimadores, como, por exemplo, dos coeficientes de trilha que medem efeitos diretos de caracteres explicativos sobre um principal, podem atingir valores demasiadamente elevados, sendo evidência de serem estimativas pouco confiáveis. Adicionalmente, as estimativas dos parâmetros podem assumir valores absurdos ou sem nenhuma coerência com o fenômeno biológico estudado (CRUZ; CARNEIRO, 2006). Shrivastava e Sharma (1976), por exemplo, fazendo estudo baseado em análise de trilha, envolvendo componentes primários de produção de arroz, encontraram efeito direto negativo na produtividade para caracteres número de perfilhos, número de grãos, peso de grãos e comprimento da panícula. Sendo componentes primários, fica difícil explicar esses valores negativos encontrados.

Em muitos casos, quando é envolvido grande número de caracteres ou não há conhecimento prévio da associação entre eles, resultados inapropriados podem ser interpretados, gerados pela multicolinearidade, levando a conclusões que não seriam as mais pertinentes. A solução para o problema é a de sempre fazer o diagnóstico de multicolinearidade dos dados antes de se realizar o processamento. A diagnose, e o grau da multicolinearidade na matriz de correlação são estabelecidos com base no número de condição (NC), que é a relação entre o maior e o menor autovalor da matriz. Se $NC \leq 100$, a multicolinearidade é denominada fraca e não constitui problema para análise; se $100 < NC < 1000$, a multicolinearidade é denominada moderada à forte; e se $NC \geq 1000$, é considerada severa (MONTGOMERY; PECK, 1981).

Assim, havendo problemas de multicolinearidade, duas alternativas são recomendadas. A primeira consiste em fazer o diagnóstico de multicolinearidade, identificando aqueles caracteres que estão provocando maiores problemas e eliminá-los, realizando a análise com o número de caracteres menor. A segunda se aplica quando a exclusão de caracteres não é de interesse do pesquisador. Assim, realiza-se a análise de trilha com todos os caracteres, mas adota-se procedimentos equivalentes ao de análise de regressão em crista, tal como preconizado por Carvalho (1994) e Carvalho e Cruz (1996).

2.7 Seleção simultânea

De acordo com Castoldi (1997), se o objetivo de um programa de melhoramento for somente alterar um caráter, a seleção direta é o caminho mais viável e fácil. Esta é uma estratégia em que o melhorista está, a princípio, interessado em obter ganhos em um único caráter, sobre o qual ele praticará a seleção. Esta é a maneira mais fácil e prática de obter ganhos para um único caráter, sendo a resposta à seleção direta, a modificação na média original de um caráter da população, em consequência da seleção praticada no próprio caráter (PAULA, 1997).

Tradicionalmente, o melhoramento de uma população para um dado caráter é resultado do ganho de seleção, que depende do diferencial de seleção, que é a diferença entre a média do grupo selecionado e a média da população original. Portanto, em processo de seleção, quanto maior for a pressão de seleção, maior será esse diferencial e, conseqüentemente, o progresso genético (PATERNIANI; MIRANDA FILHO, 1987).

Na literatura, há diversos trabalhos comparando e avaliando a eficiência da seleção direta em diferentes culturas, como, por exemplo, em *Eucalyptus grandis* (MARTINS et al., 2001), *Virola surinamensis* (MAÊDA et al., 2001), soja (OLIVEIRA, 1996) e milho (CASTOLDI, 1997; FURTADO, 1996).

Para a resistência de soja ao complexo de percevejos, Rocha et al. (2014) propuseram a utilização de peso de sementes boas (PSB) para a seleção direta de genótipos resistentes e altamente produtivos, comparando os mesmos genótipos em dois experimentos, nos quais em um houve o controle químico dos insetos e no outro a infestação natural.

Porém, para se obter materiais genéticos realmente superiores, é necessário que o material selecionado reúna, simultaneamente, uma série de atributos favoráveis que lhe confira produtividade comparativamente mais elevada e que satisfaça as exigências do agricultor. A seleção com base em um, ou em poucos caracteres, tem se mostrado inadequada, por conduzir a um produto final superior em relação aos caracteres selecionados, mas com desempenho não tão favorável em relação aos vários outros caracteres não considerados. Isto poderá, em última instância, levar à rejeição do produto por parte dos agricultores (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Uma maneira de aumentar a chance de êxito em um programa de melhoramento é por meio da seleção simultânea de um conjunto de caracteres de importância econômica. Para tal, a utilização da teoria de índice de seleção pode ser uma alternativa promissora, pois permite combinar as múltiplas informações contidas na unidade experimental, de modo que seja possível a seleção com base em um complexo de variáveis que reúna vários atributos de interesse econômico. Atualmente, existem várias propostas para obtenção de índices (CRUZ; CARNEIRO, 2006). Dentre eles, segundo Costa et al. (2004), o índice com Base em Soma de

Postos (ou “ranks”) é o mais indicado para populações segregantes de soja, com progressos superiores em várias condições quando comparado com outros índices.

Este tipo de índice foi proposto por Mulamba e Mock (1978) e consiste em classificar os materiais genéticos em relação a cada um dos caracteres, em ordem favorável ao melhoramento. Uma vez classificados, são somadas as ordens de cada material genético referente a cada caráter, resultando em uma medida adicional tomada como índice de seleção.

Outro índice, já demonstrado por Oliveira et al. (2013) como satisfatório para a seleção de soja resistente a percevejos e altamente produtiva, é o Multiplicativo, proposto por Subandi et al. (1973).

Estes índices, por não necessitarem de estimativas de parâmetros genéticos e não pressupor a existência de pesos econômicos, adaptam-se tanto aos programas de seleção recorrente, como às etapas finais dos programas de melhoramento para obtenção de cultivares, o que não ocorre com os índices lineares. Neste contexto, todos os caracteres recebem a mesma ênfase na seleção, sendo impossível atribuir-lhes qualquer peso (GARCIA, 1998). Trabalhos com índices de seleção foram realizados com sucesso com eucalipto (PAULA et al., 2002), soja (BÁRBARO et al., 2007; COSTA et al., 2004), milho pipoca (RANGEL et al., 2011), açaí (TEIXEIRA et al., 2012) e maracujá (OLIVEIRA et al., 2008; ROSADO et al., 2012), entre outras culturas.

Além destes métodos, o melhorista pode elaborar um índice de seleção pela análise de fatores (AF). Esta é uma técnica de análise multivariada que trata das relações internas de um conjunto de caracteres correlacionados por um número menor de *fatores*. A cada fator corresponde um grupo de caracteres iniciais que estejam fortemente correlacionados entre si, mas fracamente correlacionados com os outros caracteres iniciais (GRANATE, 2000).

A técnica da análise de fatores tem por objetivos a estruturação e a simplificação de dados originais, de forma que um número relativamente grande de caracteres possa ser representado por um número menor, expresso por combinações lineares desses dados originais, conservando o máximo possível de suas informações. Nesta análise, considera-se que cada caráter analisado possa ser explicado por um conjunto de fatores comuns e por um fator específico. O peso ou carga fatorial de cada fator comum é estimado, de forma que os fatores, em função dos caracteres em que incidem, passam a ter interpretação biológica. A partir daí, realiza-se a análise complementar em que os fatores comuns são expressos como combinações lineares de caracteres. Estes caracteres, agrupados em um fator, estão fortemente

correlacionadas entre si e fracamente correlacionadas com outro fator (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Para se determinar as cargas fatoriais, um dos métodos utilizados é o de componentes principais. Infelizmente, o nome para o método de estimação é responsável por uma parcela de confusão existente entre análise de fatores e a análise de componentes principais. A razão da adoção desse nome para o método é função da utilização das matrizes de autovalores e autovetores para a determinação das cargas fatoriais (FERREIRA, 2011). Alguns pesquisadores adotam como critério a utilização de um número de fatores equivalente ao número de autovalores, obtidos na matriz de correlação, superiores à unidade (CASTOLDI, 1997; JOHNSON; WICHERN, 1992). Outro critério é estabelecer o número de fatores correspondente ao número de componentes principais que envolvam no mínimo 80% da variação total entre os caracteres analisados (PELÚZIO, 1999).

De acordo com Castoldi (1997), durante anos a análise de fatores (AF) teve seu uso bastante limitado em função da complexidade dos cálculos envolvidos. Atualmente, graças às facilidades computacionais, esta técnica tem sido retomada, abrangendo as mais diversas áreas. De acordo com Cruz e Carneiro (2006), a análise de fatores tem sido utilizada em diversos estudos na área biológica.

Portanto, a análise de fatores é uma técnica que pode ser utilizada na predição de ganhos por seleção, em substituição ao método tradicional, ou complementando as técnicas de seleção simultânea de caracteres baseadas em índices de seleção.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Três genitores foram utilizados para a realização dos cruzamentos. Um deles, a cultivar IAC-100, foi utilizado na síntese de ambas as populações deste trabalho. Esta cultivar foi desenvolvida pelo Instituto Agrônomo de Campinas, do Estado de São Paulo, apresentando resistência ao complexo de percevejos por diversos mecanismos (CARRÃO-PANIZZI; KITAMURA, 1995; PINHEIRO, 1993; PINHEIRO et al., 2005; ROSSETTO, 1989).

Os outros dois genitores foram escolhidos ponderando-se a distância generalizada de Mahalanobis e Rogers-W, realizada previamente por MULATO (2009) com 79 genótipos exóticos de soja. A PI 295952 e a PI 306712 apresentaram os maiores valores de dissimilaridade quando levado em consideração as duas distâncias, a generalizada de Mahalanobis (3.811,20) e a de Rogers-W (0,837).

A PI 295952, originada da Rússia, apresenta flores roxas, tegumento amarelo, hilo amarelo, está classificada no grupo de maturação 00, é suscetível à fitóftora (*Phytophthora sojae*), suscetível ao pulgão (*Aphis glycines* Matsumura), moderadamente suscetível à mancha olho-de-rã (*Cercospora sojina*) e suscetível às raças 3, 4 e 5 de nematoide do cisto. Esse material já foi cultivado no país de origem com o nome comercial Salut216.

A PI 306712, originada da Tanzânia, apresenta flores roxas, tegumento amarelo, hilo marrom, está classificada no grupo de maturação X, é resistente à ferrugem (*Phakopsora pachyrhizi*), resistente à raça 1 de fitóftora (*Phytophthora sojae*), resistente ao cancro da haste (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*), suscetível às raças 3 e 5 de nematoide do cisto e suscetível à lagarta falsa-medideira (*Pseudoplusia includens*). Esse material já foi cultivado no país de origem com o nome comercial HLS 219 (GRIN, 2015).

A semeadura desses três genitores foi realizada em vasos de oito litros, semanalmente, de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, em casa de vegetação, com irrigação controlada, no Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba, SP. Os cruzamentos controlados para a obtenção da geração F₁ iniciaram no momento do florescimento, continuando até que não houvesse produção de flores.

As sementes F₁ supostamente resultantes de cruzamento foram semeadas em casa de vegetação no inverno de 2012. Foram coletadas folhas novas dessas plantas para extração de DNA, com uma modificação do método CTAB (KEIM et al., 1988). Foram utilizados dez marcadores moleculares do tipo microssatélites, polimórficos entre os genitores, para a

realização da genotipagem para confirmar a autenticidade dos híbridos. As plantas que tiveram sua paternidade confirmada geraram, por autopolinização natural, a geração F₂.

Para o avanço de geração, as sementes da geração F₂ e dos três genitores (IAC-100, PI 295952 e PI 306712) foram semeadas em campo de multiplicação de sementes na safra 2011/12, no Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba, SP. Nesse período, todos os tratamentos culturais para evitar a infestação de doenças, insetos-praga e plantas daninhas foram realizados.

A avaliação fenotípica foi realizada na geração F_{2:3} em dois experimentos distintos, sendo a população derivada do cruzamento de IAC-100 x PI 295952 considerada a “população 1”, e a população derivada de IAC-100 x PI 306712 considerada a “população 2”. Ambos foram compostos por 160 indivíduos e os respectivos genitores (IAC-100 e um dos genótipos exóticos), totalizando 323 indivíduos. Esses experimentos foram instalados no dia 06/12/2013, em uma área homogênea localizada na Estação Experimental Anhumas (22°17'43"S e 51°23'14"W), do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), localizada no município de Piracicaba, SP. Intercalando as fileiras úteis de cada experimento foram semeadas duas fileiras de bordadura, utilizando a cultivar suscetível BRS133, para evitar o pisoteio das parcelas durante as avaliações e aproximar as condições ambientais de um cultivo comercial. A parcela experimental foi representada por cinco plantas derivadas de uma planta F₂. A distância entre as covas foi de 50 cm nas linhas úteis e a distância entre as linhas úteis foi de 1,5 m, totalizando 3,75 m² por parcela. Foram semeadas três sementes por cova e feito o desbaste após duas semanas, para permanecer apenas uma planta por cova. Foi adotado o delineamento alfa-látice 18x9, com três repetições.

Não foi realizado o controle químico de insetos e, após o florescimento, o nível de infestação de percevejos foi avaliado pelo método do pano de batida, durante dez semanas, sendo realizadas no mínimo oito batidas por dia de avaliação.

Os caracteres agronômicos avaliados foram:

NDF: número de dias para o florescimento, contados da semeadura até a antese da primeira flor (R1 na escala de FEHR et al., 1971);

NDM: número de dias para a maturidade, contados desde a semeadura até a data em que 95% das vagens apresentarem-se maduras (R8 na escala de FEHR et al, 1971);

APM: altura da planta (cm) na maturidade, medida desde a base da planta (solo) até a haste principal;

AC: acamamento, avaliado na maturidade por uma escala de notas visuais de 1 a 5, sendo a nota 1 correspondente à planta ereta e a 5 à planta totalmente acamada;

VA: valor agrônômico, avaliado na maturidade através de uma escala de notas visuais de 1 a 5, sendo a nota 1 correspondente à planta sem nenhum valor agrônômico e a nota 5 à planta com excelentes caracteres agrônômicos (grande número de vagens, altura superior a 60 cm, vigor, sem acamamento, ausência de hastes verdes e retenção foliar, sem deiscência de vagens e sem sintomas de doenças);

PG: produtividade de grãos, avaliada pelo peso dos grãos (g) de cada planta;

Foram avaliados, também, os caracteres associados à resistência aos insetos:

PEG: período de granação (dias), obtido pela diferença entre R5 (início da granação) e R7 (término da granação) (FEHR et al., 1971);

RF: retenção foliar, avaliada na maturidade por uma escala de notas visuais de 1 a 5, sendo a nota 1 atribuída à planta sem retenção foliar (senescência normal) e 5 à planta com total retenção foliar (folhas e hastes verdes);

PCS: peso de cem sementes (g), a partir de uma amostra ao acaso após padronização da umidade.

PSB: peso de sementes boas (g), ou seja, sem danos provocados por percevejos, avaliado por peneiras após colheita e beneficiamento dos grãos.

Foram utilizadas as médias das cinco plantas de cada parcela para as análises estatísticas.

Inicialmente, para todos os caracteres avaliados, foram realizadas as análises de variância em cada população, por meio do seguinte modelo:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + r_j + b_{k(j)} + \varepsilon_{ijk}$$

em que, Y_{ijk} é o valor observado para o caráter no i -ésimo genótipo, na j -ésima repetição, no k -ésimo bloco; μ é a média geral para o caráter; α_i é o efeito do i -ésimo genótipo ($i=1, 2, 3, \dots, 160$), considerado como de efeito aleatório, em que, $\mathbf{g} \sim \text{NID}(0, \sigma_g^2)$; r_j é o efeito da j -ésima repetição ($j=1, 2, 3$); $b_{k(j)}$ é o efeito do bloco dentro da repetição ($k=1, 2, 3, \dots, 9$); ε_{ik} é o efeito do erro aleatório associado à observação de ordem ijk , em que $\mathcal{E} \sim \text{NID}(0, \sigma^2)$.

As variâncias fenotípicas ($\hat{\sigma}_F^2$) e genotípicas ($\hat{\sigma}_G^2$) foram estimadas utilizando os quadrados médios obtidos nas análises de variância pelas fórmulas: $\hat{\sigma}_F^2 = QM_T/R$ e $\hat{\sigma}_G^2 = (QM_T - QM_E)/R$ (SEARLE; CASELA; MACCULLOCK, 1992). Sendo QM_T e QM_E os quadrados médios das progênies $F_{2:3}$ e dos erros, respectivamente; e R é o número de repetições. Os coeficientes de herdabilidade foram estimados por $\hat{h}^2 = \hat{\sigma}_G^2/\hat{\sigma}_F^2$. Para a estimação das

correlações fenotípicas e genotípicas, foram realizadas as análises de covariâncias entre os pares de caracteres, de acordo com Vencovsky e Barriga (1992). As correlações fenotípicas e genotípicas entre os caracteres x e y foram realizadas pelas fórmulas: $\hat{r}_{F(xy)} = \widehat{Cov}_{F(xy)} / \hat{\sigma}_{Fx} \hat{\sigma}_{Fy}$ e $\hat{r}_{G(xy)} = \widehat{Cov}_{G(xy)} / \hat{\sigma}_{Gx} \hat{\sigma}_{Gy}$, respectivamente, sendo $\hat{\sigma}_F$ e $\hat{\sigma}_G$ as raízes quadradas das estimativas de variância fenotípica e genotípica, respectivamente. As significâncias das correlações genéticas foram realizadas de acordo com Falconer e Mackay (1996), e as significâncias das correlações fenotípicas foram realizadas de acordo com Steel e Torrie (1980).

Posteriormente foi realizada a diagnose de multicolinearidade entre os caracteres explicativos e o seu grau na matriz de correlação foi estabelecido com base no número de condição (MONTGOMERY; PECK, 1981). O desdobramento das correlações fenotípicas, em efeitos diretos e indiretos dos caracteres explicativos sobre a PSB (caráter dependente), foi feito por meio da análise de trilha (WRIGHT, 1921).

Para a obtenção das estimativas dos ganhos diretos sobre PSB e PG, adquiridos sobre seleção direta das 25 progênies superiores, foi usada a expressão:

$$GS = h^2(\bar{X}_S - \bar{X}_O)$$

Em que:

h^2 : é a herdabilidade do caráter;

$\bar{X}_S$ e $\bar{X}_O$: são as médias dos selecionados e da população original, respectivamente.

Já para a predição da resposta indireta nos demais caracteres, utilizou-se a fórmula:

$$GS_{y(x)} = h_x^2 \cdot (\bar{X}_{Sy(x)} - \bar{X}_{Ox})$$

Em que:

$GS_{y(x)}$: é o ganho de seleção em x pela seleção praticada no caráter principal y ;

h_x^2 : é a herdabilidade do caráter auxiliar x ;

$\bar{X}_{Sy(x)}$: é a média dos selecionados no caráter auxiliar x , pela seleção no caráter principal y ;

$\bar{X}_{Ox}$: média original do caráter auxiliar x .

O índice de seleção com Base em Soma de Postos, proposto por Mulamba e Mock (1978), foi estimado considerando o seguinte modelo:

$$I_i = \sum n_{ij}$$

Em que:

I_i : índice para o genótipo i ;

n_{ij} : número de classificação do caráter j para o genótipo i .

Já para o índice Multiplicativo proposto por Subandi et al. (1973) foi estimado considerando o seguinte modelo:

$$I = y_1^{k1} y_2^{k2} \dots y_n^{kn}$$

Em que:

y_j : valor da média do caráter j ;

k_j : proporcionalidade relativa, ou seja, é igual a 1 se for considerada a relação direta do índice ao caráter ou -1 se for inversa.

Além disso, as seleções foram simuladas em quatro arranjos de caracteres, sendo eles: (I) PSB e PG; (II) todos os caracteres de resistência; (III) todos os caracteres de resistência e PG; e (IV) todos os caracteres. Ademais, foi estipulada a direção preferencial para cada caráter, sendo desejável o aumento dos caracteres NDF, VA, PG, PSB e PCS; e a diminuição dos caracteres PEG, AC, RF, para as duas populações. Porém, dois caracteres tiveram direções preferenciais diferentes em cada população, sendo desejável a não modificação de NDM e o aumento de APM na população 1, enquanto a diminuição dos mesmos na população 2 é mais interessante. Com isto, apenas o NDM não foi incluído no arranjo (IV) da população 1.

Para a realização da análise de componentes principais, considera-se que x_{ij} seja a média padronizada do j -ésimo caráter ($j = 1, 2, \dots, v$) avaliado no i -ésimo genótipo ($i = 1, 2, \dots, g$). A técnica dos componentes principais consiste em transformar o conjunto de v caracteres ($x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iv}$) em um novo conjunto ($Y_{i1}, Y_{i2}, \dots, Y_{iv}$), que são funções lineares dos x_i 's e independentes entre si.

Com isso, um componente principal pode ser dado pela seguinte combinação linear:

$$Y_{i1} = a_1 x_{i1} + a_2 x_{i2} + \dots + a_v x_{iv}$$

Entre todos os componentes, o primeiro apresenta maior variância que o segundo e, assim, sucessivamente. Adicionalmente, a covariância entre cada par de componentes é nula. A cada autovalor corresponde um autovetor com o mesmo número de elementos que os caracteres iniciais.

O modelo de análise de fatores utilizado foi o sugerido por Cruz e Carneiro (2006):

$$X_j = I_{j1}F_1 + I_{j2}F_2 + \dots + I_{jm}F_m + \varepsilon_j$$

Em que:

X_j : é o j -ésimo caráter, com $j = 1, 2, \dots, v$;

I_{jk} : é a carga fatorial para o j -ésimo caráter associado ao k -ésimo fator, sendo $k = 1, 2, \dots, m$;

F_k : é o k -ésimo fator comum;

ε_j : é o fator específico.

A análise de fatores procura explicar o máximo da variação em X_j , com o menor número possível de fatores, tornando ε_j mínimo.

A carga fatorial inicial representa a correlação entre o caráter j e o fator k , de modo que:

$$I_{ij} = \lambda_i V_{ij}^2$$

Em que:

λ_i : é o i -ésimo autovalor maior que 1 obtido na matriz de correlações fenotípicas;

V_{ij} : é o j -ésimo valor do i -ésimo autovalor.

A fração da variância de X_j explicada pelos fatores chama-se *comunalidade* e representa-se:

$$C_j = I_{j1}^2 + I_{j2}^2 + \dots + I_{jm}^2$$

A técnica envolve vários estágios, com o estabelecimento do número de fatores comuns a ser usado, o cálculo das cargas iniciais destes fatores e a relação dos fatores, obtendo-se as cargas finais e permitindo definir os fatores. O último passo envolve a estimação dos escores fatoriais.

Em síntese, a cada autovalor maior que a unidade, corresponde um autovetor que, por sua vez, é constituído por um número de valores igual ao número de caracteres originais. Logo, um dado fator terá cargas individuais para todos os caracteres, o que esclarece a razão da denominação “fator comum”, empregada na teoria de análise de fatores.

O método de rotação empregado foi o Varimax, já que foi assumido serem fatores comuns ortogonais entre si. O objetivo da rotação é, em resumo, fazer com que, dentro de um mesmo fator, as cargas fatoriais apresentem variância máxima, o que equivale a dizer que algumas cargas fatoriais assumem valores próximos à unidade e outros, próximos a zero.

Este é um passo importante da análise de fatores, pois quantifica o efeito de cada fator comum na expressão dos caracteres. Os escores finais são obtidos por meio da equação apresentada por Manly, 1986, citado por Castoldi (1997), qual seja:

$$F^* = (\Lambda' \Lambda)^{-1} \Lambda' X$$

Em que:

F^* : é o vetor de dimensão 1 x m de escores fatoriais;

Λ : é a matriz de dimensão p x m das cargas fatoriais finais;

X : é o vetor de dimensão p x 1 dos caracteres do k -ésimo genótipo.

Com isso, foram obtidos os escores fatoriais para cada caráter, para a criação dos “supercaracteres”. Estes foram elaborados para verificar se a seleção nestes novos caracteres

poderia fornecer melhores ganhos simultâneos nos caracteres originais do que os encontrados via índices de seleção.

Os fatores criados pelas somas das multiplicações dos escores fatoriais pelos caracteres, quando apresentaram valores negativos, foram transformados pela soma da constante:

$$1 + [z]$$

Em que:

[z]: é o módulo do menor valor.

Os fatores foram submetidos à análise de variância pelo mesmo modelo utilizado para os caracteres avaliados diretamente.

Para obtenção da estimativa dos ganhos percentuais de seleção dos fatores, adotou-se a mesma fórmula que foi previamente utilizada para os índices de seleção.

As análises de variância foram realizadas com a utilização do programa estatístico computacional *Statistical Analysis System* (SAS) versão 9.2 (SAS Institute, 2007). As diagnoses de multicolinearidade, análises de trilha, índice de seleção, componentes principais e análise de fatores foram realizadas com auxílio do Programa Genes - Aplicativo Computacional em Genética e Estatística (CRUZ, 2013).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todas os caracteres apresentaram distribuição normal e homogeneidade dos resíduos a 5% de probabilidade (dados não mostrados).

Nos gráficos referentes à flutuação populacional dos percevejos, verificou-se que em ambos os experimentos a população de percevejos superou o nível de dano econômico (NDE), que, segundo Corrêa-Ferreira et al. (2009), é de um a dois percevejos por metro de fileira, em campo de produção de sementes e grãos, respectivamente, considerando sempre as ninfas grandes (3, 4 e 5 ínstar) e os adultos das diferentes espécies de percevejos fitófagos (Figura 1).

O número médio de percevejos na população 1 foi metade do verificado na população 2, durante o período de granação. Isso pode ser justificado pela maior precocidade da população 1, passando pelo período de maior suscetibilidade aos percevejos em um momento em que as colheitas de áreas próximas ainda não haviam iniciado, o que é evidenciado pelo aumento no final do período de granação (PEG), quando as demais áreas começaram a ser colhidas e os percevejos migraram para a área do experimento. Esse comportamento também foi observado por Santos (2012). Já a população 2 teve um número médio de percevejos mais estável durante o PEG.

Figura 1 – Número médio de percevejos por amostragem em duas populações $F_{2:3}$ de soja durante os experimentos, com destaque para o estágio de período de granação (PEG), compreendido entre os estádios fenológicos R_5 e R_7 , Piracicaba-SP, 2014

As análises de variância para as duas populações evidenciaram a existência de variabilidade, permitindo selecionar os genótipos tanto para caracteres de resistência quanto para caracteres agrônômicos (Tabelas 1 e 2). Os coeficientes de variação estiveram

Tabela 1 – Resumo da análise de variância, médias da população e dos genitores, variância fenotípica (σ_F^2) e genotípica (σ_G^2), h^2 (herdabilidade), CV(%) (coeficiente de variação em porcentagem) para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

FV	GL	NDF _(dias)	PEG _(dias)	NDM _(dias)	APM _(cm)	AC _(notas)	RF _(notas)	VA _(notas)	PG _(g)	PSB _(g)	PCS _(g)
Repetição	2	108,58**	181,73**	136,21**	461,39**	4,64**	7,10**	13,91**	5116,29**	5096,15**	22,91**
Bloco(Rep)	24	6,92**	17,93**	25,29**	199,62**	1,34**	2,57**	1,71**	253,36**	223,66**	1,45 ^{ns}
Tratamento	161	16,39**	25,34**	36,00**	418,95**	0,59**	0,51*	0,43**	101,07**	84,98**	13,86**
Erro	298	3,46	4,38	7,12	46,31	0,31	0,40	0,21	60,38	55,86	0,98
CV(%)		3,44	6,42	2,26	13,22	29,22	36,37	14,47	21,50	22,26	8,16
μ		54,04	32,59	117,81	51,49	1,90	1,74	3,20	36,14	33,58	12,15
μ - IAC-100		56,34	29,64	120,72	57,10	2,66	1,55	3,28	41,90	38,87	9,73
μ - PI-295952		51,12	34,19	112,97	42,21	1,35	1,76	2,76	37,44	34,83	18,45
σ_F^2		5,46	8,45	12,00	139,65	0,20	0,17	0,14	33,69	28,33	4,62
σ_G^2		4,31	6,99	9,63	124,21	0,09	0,04	0,07	13,57	9,71	4,29
h^2		0,79	0,83	0,80	0,89	0,48	0,21	0,50	0,40	0,34	0,93

^{ns}não significativo, * significativo a 5% e ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 2 – Resumo da análise de variância, médias da população e dos genitores, variância fenotípica (σ_F^2) e genotípica (σ_G^2), h^2 (herdabilidade), CV(%) (coeficiente de variação em porcentagem) para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014

FV	GL	NDF _(dias)	PEG _(dias)	NDM _(dias)	APM _(cm)	AC _(notas)	RF _(notas)	VA _(notas)	PG _(g)	PSB _(g)	PCS _(g)
Repetição	2	32,85*	49,93*	1820,57**	3106,99**	8,39**	26,52**	0,43 ^{ns}	1853,35**	1872,95**	297,63**
Bloco(Rep)	24	16,33**	12,04 ^{ns}	66,23**	289,65**	1,59**	1,48**	0,67**	204,09**	161,35**	16,67**
Tratamento	161	110,21**	18,02**	340,73**	344,49**	0,78**	1,89**	0,80**	202,34**	182,17**	19,48**
Erro	298	8,71	10,80	28,70	73,63	0,38	0,49	0,30	54,98	43,24	5,87
CV(%)		4,42	11,81	3,82	12,27	24,72	26,66	24,36	32,72	45,56	28,63
μ		66,83	27,84	140,39	69,92	2,49	2,64	2,24	22,66	14,43	8,46
μ - IAC-100		56,99	29,42	118,06	44,80	2,14	1,21	3,21	27,51	24,29	9,53
μ - PI-306712		79,26	25,98	152,76	88,17	3,71	2,76	1,54	8,07	1,00	6,56
σ_F^2		36,74	6,01	113,58	114,83	0,26	0,63	0,27	67,45	60,72	6,49
σ_G^2		33,83	2,41	104,01	90,29	0,13	0,46	0,17	49,12	46,31	4,54
h^2		0,92	0,40	0,92	0,79	0,51	0,74	0,63	0,73	0,76	0,70

^{ns}não significativo, * significativo a 5% e ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.

entre 2,26 (NDM) e 45,56 (PSB). Valores elevados de CV podem ser explicados pelo ataque dos percevejos, já que a distribuição desses insetos não é uniforme no campo, resultando em alguns genótipos serem mais atacados do que outros. Altos valores de CV também foram encontrados em outros trabalhos com soja para resistência aos percevejos, como Möller (2010), Pinheiro (1993), Rocha (2014) e Santos (2012).

A eficiência do alfa-látice foi satisfatória, aumentando a acurácia experimental quando comparado ao delineamento de blocos ao acaso, sendo a eficiência média de 124,12% para a população 1 e 114,12 para a população 2.

As populações apresentaram médias intermediárias em relação aos seus respectivos genitores, exceto para PG e PSB na população 1 que foram inferiores ao menor genitor. Essas médias intermediárias são esperadas em soja, devido aos genes terem evoluído para a interação aditiva, sem grandes efeitos de heterose.

Seria esperado que a população 2 fosse mais resistente pelos mecanismos de pseudo-resistência apresentados, ou seja, menor PEG e PCS, pois quando PEG é menor, a evasão hospedeira é mais provável de ocorrer (PAINTER, 1951), e o dano pelos percevejos é reduzido (Tabela 2). Além disso, Lourenção, Rossetto e Miranda (1985) e Miranda et al. (1979) observaram que genótipos resistentes produzem sementes menores e um grande número de vagens, permitindo uma grande porcentagem de sementes que se manterão livres do ataque de percevejos. Este mecanismo de pseudo-resistência é chamado de “diluição do dano” (ROSSETTO; LARA, 1991) e explicam a alta média de IAC-100. Porém, a maior infestação por percevejos na população 2 explica a menor média de PG e PSB, o que pode ser corroborado pela menor média de PG e PSB do genitor resistente e pela maior média geral de RF.

Ao mesmo tempo, o genitor exótico PI-306712, que poderia ser considerado como resistente quando considerado o menor PEG e PCS, apresentou alta suscetibilidade, com PG e PSB muito abaixo da média da população. Tal fato reforça que a cultivar IAC-100 apresenta outros mecanismos de resistência aos percevejos, que não estão presentes no material exótico.

Os resultados encontrados para PSB mostram que a IAC-100 foi menos atacada pela levedura *E. coryli* (antes conhecida como *N. coryli*), que é transmitida pelos percevejos. De acordo com Rossetto et al. (1995), a resistência a essa levedura é um dos mecanismos de resistência ao complexo de percevejos. Em um outro estudo, Carlini-Garcia et al. (2011) avaliaram 25 populações de soja de cruzamentos intra-específicos entre 11 genótipos, e observaram que as progênies provenientes do cruzamento entre CD-215 e IAC-100 tem alta porcentagem de sementes livres de levedura.

Em ambas as análises, as médias das populações e dos genitores exóticos foram mais afetadas pela retenção foliar do que a média da IAC-100. De acordo com Rossetto e Lara (1991), IAC-100 apresenta senescência foliar normal na colheita, sob ataque de percevejos. O índice de retenção foliar é considerado um importante componente de resistência aos percevejos, uma vez que as plantas maduras tenham um processo de senescência normal sob o ataque de insetos irão ainda permitir a colheita mecanizada (SOUZA; TOLEDO, 1995)

De acordo com Brogin, Arias e Toledo (2003), os valores de herdabilidade são considerados baixos quando eles são menores do que 30%; intermediários, se estiverem entre 30% e 60%; e altos quando forem maiores do que 60%. Os caracteres com estimativas de herdabilidade maiores do que 30% já permitem ganhos genéticos pela seleção em gerações iniciais de endogamia, como na geração F_3 . Em ambas as populações, os caracteres tiveram herdabilidade entre intermediária a alta, evidenciando que a variância foi basicamente de natureza genética, exceto para RF na população 1. A população 2 apresentou maior quantidade de caracteres com herdabilidade considerada alta, inclusive para RF. Portanto, quando a herdabilidade é alta, a seleção nas gerações iniciais de autofecundação é eficaz (FALCONER; MACKAY, 1996; FEHR, 1987; ROBINSON, 1963). Isto chama a atenção para a escolha correta dos genitores no momento de programar os cruzamentos para a geração das progênes segregantes, para que os genitores tenham divergência genética entre eles, resultando em variabilidade genética para a seleção dos caracteres de interesse no programa de melhoramento.

Os coeficientes de correlação foram calculados para cada par de combinações dos caracteres. Estes coeficientes de correlação são interpretados de acordo com o proposto por Franzblau (1958) em que: 0 – 0,19, são nulas ou desprezíveis; 0,2 – 0,39 são baixas; 0,4 – 0,59 são moderadas; 0,6 – 0,79 são acentuadas; e 0,81 – 1,00 são altas. (FRANZBLAU, 1958 apud BERMAN et al., 2014)

A correlação fenotípica e genotípica mais alta e positiva na população 1 ocorreu entre as variáveis PSB e PG (Tabela 3). Santos (2012) e Rocha (2015) também encontraram correlação alta e positiva entre esses caracteres. Com isto, as progênes com maior produtividade de grãos sob ataque de percevejos deverão também apresentar maior PSB. Porém, a correlação positiva entre PSB e PCS refuta a teoria de este fenômeno ser explicado somente pela diluição de dano, proporcionado pela redução de PCS, mas também pelo maior número de sementes por planta, independente do tamanho pequeno.

Tabela 3 – Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os caracteres número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), fenotípica (acima da diagonal) e a genotípica (abaixo da diagonal), avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

	NDF _(dias)	PEG _(dias)	NDM _(dias)	APM _(cm)	AC _(notas)	RF _(notas)	VA _(notas)	PG _(g)	PSB _(g)	PCS _(g)
NDF _(dias)		-0,70**	0,57**	0,40**	0,39**	-0,10 ^{ns}	0,16*	-0,23**	-0,28**	-0,67**
PEG _(dias)	-0,83**		-0,15*	-0,65**	-0,49**	0,20**	0,03 ^{ns}	0,12 ^{ns}	0,17**	0,60**
NDM _(dias)	0,64**	-0,19 ^{ns}		0,04 ^{ns}	0,17*	0,18**	0,11 ^{ns}	-0,07**	-0,15*	-0,42**
APM _(cm)	0,50**	-0,75**	0,04 ^{ns}		0,55**	0,00 ^{ns}	-0,38**	0,21**	0,08 ^{ns}	-0,18**
AC _(notas)	0,70**	-0,76**	0,26 ^{ns}	0,77**		-0,07 ^{ns}	-0,22**	-0,05 ^{ns}	-0,09 ^{ns}	-0,45**
RF _(notas)	-0,25 ^{ns}	0,32 ^{ns}	0,35 ^{ns}	-0,05 ^{ns}	-0,38 ^{ns}		-0,34**	-0,01 ^{ns}	-0,05 ^{ns}	0,24**
VA _(notas)	0,29 ^{ns}	-0,01 ^{ns}	0,26 ^{ns}	-0,62**	-0,11 ^{ns}	-0,94**		-0,05 ^{ns}	0,06 ^{ns}	-0,32**
PG _(g)	-0,20 ^{ns}	0,12 ^{ns}	-0,06 ^{ns}	0,25 ^{ns}	-0,16 ^{ns}	-0,22 ^{ns}	-0,31 ^{ns}		0,97**	0,31**
PSB _(g)	-0,30 ^{ns}	0,22 ^{ns}	-0,18 ^{ns}	0,05 ^{ns}	-0,26 ^{ns}	-0,31 ^{ns}	-0,08 ^{ns}	0,94**		0,28**
PCS _(g)	-0,77**	0,67**	-0,48**	-0,19 ^{ns}	-0,66**	0,45*	-0,49**	0,48*	0,49*	

^{ns}não significativo, * significativo a 5% e ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste *t*.

Tabela 4 – Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os caracteres número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), fenotípica (acima da diagonal) e a genotípica (abaixo da diagonal), avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014

	NDF _(dias)	PEG _(dias)	NDM _(dias)	APM _(cm)	AC _(notas)	RF _(notas)	VA _(notas)	PG _(g)	PSB _(g)	PCS _(g)
NDF _(dias)		-0,29**	0,86**	0,54**	0,34**	0,67**	-0,67**	-0,69**	-0,77**	-0,68**
PEG _(dias)	-0,45*		-0,13*	-0,33**	-0,17**	-0,02 ^{ns}	0,06 ^{ns}	0,05 ^{ns}	0,09 ^{ns}	0,25**
NDM _(dias)	0,90**	-0,25 ^{ns}		0,51**	0,35**	0,81**	-0,77**	-0,73**	-0,85**	-0,73**
APM _(cm)	0,62**	-0,48*	0,58**		0,63**	0,38**	-0,48**	-0,18**	-0,33**	-0,34**
AC _(notas)	0,45*	-0,34 ^{ns}	0,48**	0,79**		0,22**	-0,52**	-0,08 ^{ns}	-0,18**	-0,14*
RF _(notas)	0,78**	-0,07 ^{ns}	0,92**	0,48**	0,38 ^{ns}		-0,76**	-0,71**	-0,75**	-0,60**
VA _(notas)	-0,83**	0,21 ^{ns}	-0,95**	-0,60**	-0,63**	-0,95**		0,59**	0,64**	0,56**
PG _(g)	-0,81**	0,06 ^{ns}	-0,83**	-0,29 ^{ns}	-0,19 ^{ns}	-0,85**	0,79**		0,93**	0,60**
PSB _(g)	-0,89**	0,13 ^{ns}	-0,94**	-0,44*	-0,29 ^{ns}	-0,90**	0,84**	0,95**		0,69**
PCS _(g)	-0,81**	0,45*	-0,85**	-0,46**	-0,24 ^{ns}	-0,71**	0,74**	0,65**	0,80**	

^{ns}não significativo, * significativo a 5% e ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste *t*.

A correlação com estimativa mais alta e negativa foi a genotípica entre RF e VA. Para a avaliação do VA da planta, utilizando uma escala de notas na maturidade desta, observa-se o aspecto geral, sendo que é levada em consideração a presença ou ausência de hastes verdes e retenção foliar. Portanto, nota-se que a retenção foliar reflete negativamente na avaliação do valor agronômico. Resultado semelhante foi encontrado por Rocha (2015).

Correlações positivas foram encontradas para NDF e NDM; e genotípicas positivas para NDF e APM. Resultado similar foi encontrado por Alliprandini e Vello (2004), indicando que populações com florescimento tardio apresentam maiores alturas na maturidade, e também tem ciclos de vida mais longos. Porém, isto nem sempre resulta em maior PEG, o que é indicado pela correlação negativa com NDF. Além disso, plantas mais altas tendem ao maior índice de acamamento, como indica a correlação positiva entre APM e AC.

A correlação positiva para PEG e PCS indica que menor período de granação resulta em menor peso de cem sementes, o que também foi encontrado por Santos (2012). A ocorrência de menor período de granação é desejável porque isto representa menor exposição da soja aos percevejos durante o período crítico de dano (R5-R7) (PINHEIRO, 1993). No entanto, o menor período de granação resulta em sementes menores, um dos muitos caracteres de resistência de cultivares aos percevejos. Correlações negativas também foram encontradas entre o NDF e o NDM com o PCS, reforçando o que foi previamente discutido.

Quase a totalidade das correlações citadas tiveram o mesmo comportamento na população 2 (Tabela 4). Além destas, as correlações entre os caracteres de ciclo (NDF e NDM) tiveram correlação negativa com os componentes de produção, o que indica que esta população não converte o período vegetativo em maiores produções. Tal fato também pode ter sido influenciado pela maior exposição a fatores climáticos e pragas que reduzem a produtividade, o que é corroborado pela correlação positiva de RF com os caracteres relacionados ao ciclo, e negativa com todos os componentes de produção e VA.

As correlações fenotípicas foram inferiores às genotípicas para os pares de caracteres, ou seja, o ambiente afeta as correlações fenotípicas. Porém, isto não foi observado para PG e PSB na população 1, em que a correlação fenotípica foi superior à genotípica, o que indica que o ambiente pode ter favorecido a população 1 nestes caracteres.

Os coeficientes de correlação, apesar de serem de grande utilidade na quantificação da magnitude e direção das influências de fatores na determinação de caracteres complexos, não dão a exata importância relativa dos efeitos diretos e indiretos destes fatores (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

A diagnose de multicolinearidade constatou a presença de colinearidade nas matrizes de correlações fenotípicas entre os caracteres explicativos nas duas populações, com nível moderado, sendo 239,90 e 163,77 o número de condição (NC) para a população 1 e 2, respectivamente (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Como todos os caracteres são importantes e não poderiam ser eliminados, a análise de trilha foi realizada sob multicolinearidade (CARVALHO; CRUZ, 1996). Nas duas populações não ocorreram valores dos fatores que inflacionaram as variâncias (FIV's) superiores a cinco (Tabela 5). Isto indica que os coeficientes foram pouco influenciados pela multicolinearidade. Além disso, o valor escolhido da constante k para a estabilização das estimativas foi pequeno, ocasionando pouco viés na análise de regressão (CARVALHO; CRUZ, 1996). Os coeficientes de determinação das duas análises apresentaram valores elevados, acima de 0,8, o que indica que grande parte da variação do caráter principal foi determinada pelos caracteres explicativos.

Os caracteres que apresentaram correlações significativas com PSB na população 1, tiveram, em sua maioria, efeitos diretos sobre o caráter principal inferiores ao efeito da variável residual, exceto PG, que apresentou valor direto superior. Isto indica que o caráter PG é o determinante de PSB, o que corrobora o trabalho de Rocha (2015). Com isto, ao selecionar plantas com alta produtividade de grãos em experimentos sob ataque de percevejos, seleciona-se as plantas mais resistentes.

Na população 2, também não houveram efeitos diretos superiores ao efeito da variável residual, exceto PG. Este manteve-se como o que apresenta maiores efeitos diretos e indiretos sobre PSB nos demais caracteres. Porém, há o efeito indireto de NDM sobre NDF, APM e RF. Com isto, o aumento de NDM ocasiona o aumento destes caracteres, que consequentemente reduzem o PSB. Já o efeito indireto sobre VA, PG e PSB, indica que a diminuição do NDM faz aumentar estes caracteres, consequentemente aumentando PSB. Isto corrobora o previamente discutido nas matrizes de correlações.

Tabela 5 – Estimativas dos efeitos diretos e indiretos, que envolvem o caráter principal peso de sementes boas (PSB em g) e os caracteres independentes explicativas: para número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agronômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliado em 162 genótipos $F_{2:3}$ de soja nas duas populações, Piracicaba-SP, 2014 (continua)

Caráter	Efeitos de Associação	Estimativas			
		População 1	FIV*	População 2	FIV*
NDF	Efeito direto sobre PSB	-0,04	3,17	-0,09	3,29
	Efeito indireto via PEG	-0,01	1,30	0,01	0,09
	Efeito indireto via NDM	-0,04	0,52	-0,21	2,38
	Efeito indireto via APM	-0,02	0,35	-0,01	0,46
	Efeito indireto via AC	0,01	0,23	0,00	0,17
	Efeito indireto via RF	-0,00	0,01	-0,05	0,99
	Efeito indireto via VA	0,01	0,04	0,02	1,02
	Efeito indireto via PG	-0,20	0,06	-0,35	0,90
	Efeito indireto via PCS	0,01	1,05	-0,07	0,76
	Total	-0,28		-0,77	
PEG	Efeito direto sobre PSB	0,01	3,14	-0,02	1,38
	Efeito indireto via NDF	0,03	1,31	0,03	0,21
	Efeito indireto via NDM	0,01	0,04	0,03	0,06
	Efeito indireto via APM	0,04	0,93	0,01	0,17
	Efeito indireto via AC	-0,02	0,38	-0,00	0,05
	Efeito indireto via RF	0,00	0,04	0,00	0,00
	Efeito indireto via VA	0,00	0,00	-0,00	0,01
	Efeito indireto via PG	0,11	0,02	0,03	0,01
	Efeito indireto via PCS	-0,01	0,83	0,03	0,10
	Total	0,17		0,09	
NDM	Efeito direto sobre PSB	-0,07	1,88	-0,25	4,20
	Efeito indireto via NDF	-0,02	0,88	-0,08	1,86
	Efeito indireto via PEG	-0,00	0,06	0,00	0,02
	Efeito indireto via APM	-0,00	0,00	-0,01	0,42
	Efeito indireto via AC	0,01	0,04	0,00	0,18
	Efeito indireto via RF	0,00	0,04	-0,06	1,46
	Efeito indireto via VA	0,01	0,02	0,02	1,35
	Efeito indireto via PG	-0,07	0,01	-0,37	0,99
	Efeito indireto via PCS	0,01	0,40	-0,07	0,88
	Total	-0,15		-0,85	
APM	Efeito direto sobre PSB	-0,06	2,62	-0,02	2,11
	Efeito indireto via NDF	-0,02	0,43	-0,05	0,72
	Efeito indireto via PEG	-0,00	1,11	0,01	0,11
	Efeito indireto via NDM	-0,00	0,00	-0,13	0,84
	Efeito indireto via AC	0,02	0,48	0,00	0,60
	Efeito indireto via RF	0,00	0,00	-0,03	0,32
	Efeito indireto via VA	-0,04	0,21	0,01	0,52
	Efeito indireto via PG	0,19	0,05	-0,09	0,06
	Efeito indireto via PCS	0,00	0,08	-0,03	0,19
	Total	0,08		-0,33	

Tabela 5 – Estimativas dos efeitos diretos e indiretos, que envolvem o caráter principal peso de sementes boas (PSB em g) e os caracteres independentes explicativas: para número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja nas duas populações, Piracicaba-SP, 2014 (continuação)

Caráter	Efeitos de Associação	Estimativas			
		População 1	FIV*	População 2	FIV*
AC	Efeito direto sobre PSB	0,03	1,83	0,00	1,97
	Efeito indireto via NDF	-0,02	0,40	-0,03	0,29
	Efeito indireto via PEG	-0,00	0,65	0,00	0,03
	Efeito indireto via NDM	-0,01	0,05	-0,09	0,38
	Efeito indireto via APM	-0,03	0,68	-0,01	0,64
	Efeito indireto via RF	-0,00	0,01	-0,02	0,11
	Efeito indireto via VA	-0,02	0,07	0,02	0,62
	Efeito indireto via PG	-0,04	0,00	-0,04	0,01
	Efeito indireto via PCS	0,01	0,47	-0,01	0,03
	Total	-0,09		-0,18	
RF	Efeito direto sobre PSB	0,00	1,37	-0,08	2,94
	Efeito indireto via NDF	0,00	0,03	-0,06	1,11
	Efeito indireto via PEG	0,00	0,10	0,00	0,00
	Efeito indireto via NDM	-0,01	0,05	-0,20	2,08
	Efeito indireto via APM	-0,00	0,00	-0,01	0,23
	Efeito indireto via AC	-0,00	0,01	0,00	0,07
	Efeito indireto via VA	-0,03	0,17	0,02	1,32
	Efeito indireto via PG	-0,01	0,00	-0,37	0,95
	Efeito indireto via PCS	-0,01	0,13	-0,06	0,59
	Total	-0,05		-0,75	
VA	Efeito direto sobre PSB	0,09	1,73	-0,03	2,98
	Efeito indireto via NDF	-0,01	0,07	0,06	1,13
	Efeito indireto via PEG	0,00	0,00	-0,00	0,00
	Efeito indireto via NDM	-0,01	0,02	0,19	1,90
	Efeito indireto via APM	0,02	0,32	0,01	0,37
	Efeito indireto via AC	-0,01	0,08	-0,00	0,41
	Efeito indireto via RF	-0,00	0,13	0,06	1,30
	Efeito indireto via PG	-0,05	0,00	0,31	0,66
	Efeito indireto via PCS	0,01	0,24	0,06	0,52
	Total	0,06		0,64	
PG	Efeito direto sobre PSB	0,90	1,37	0,51	2,48
	Efeito indireto via NDF	0,01	0,14	0,06	1,19
	Efeito indireto via PEG	0,00	0,04	-0,00	0,00
	Efeito indireto via NDM	0,01	0,01	0,18	1,68
	Efeito indireto via APM	-0,01	0,10	0,00	0,05
	Efeito indireto via AC	-0,00	0,00	-0,00	0,01
	Efeito indireto via RF	-0,00	0,00	0,05	1,13
	Efeito indireto via VA	-0,01	0,00	-0,02	0,80
	Efeito indireto via PCS	-0,01	0,22	0,06	0,59
	Total	0,97		0,93	

Tabela 5 – Estimativas dos efeitos diretos e indiretos, que envolvem o caráter principal peso de sementes boas (PSB em g) e os caracteres independentes explicativas: para número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja nas duas populações, Piracicaba-SP, 2014 (conclusão)

Caráter	Efeitos de Associação	Estimativas			
		População 1	FIV*	População 2	FIV*
PCS	Efeito direto sobre PSB	-0,02	2,70	0,10	2,19
	Efeito indireto via NDF	0,03	1,23	0,06	1,15
	Efeito indireto via PEG	0,00	0,97	-0,01	0,06
	Efeito indireto via NDM	0,03	0,28	0,18	1,70
	Efeito indireto via APM	0,01	0,07	0,01	0,19
	Efeito indireto via AC	-0,02	0,32	-0,00	0,03
	Efeito indireto via RF	0,00	0,06	0,05	0,80
	Efeito indireto via VA	-0,03	0,16	-0,02	0,71
	Efeito indireto via PG	0,28	0,11	0,31	0,67
	Total	0,28		0,69	
Coeficiente de determinação		0,89		0,87	
Valor de k usado na análise		0,08		0,15	
Efeito da variável residual		0,33		0,36	
Determinante da matriz		0,07		0,03	

*Fatores que inflacionam as variâncias.

Os resultados obtidos reforçam o que foi apresentado no trabalho de Rocha (2015). Porém, não se sabe qual o efeito da seleção sobre PSB ou PG nos demais caracteres. Para isto, procedeu-se a simulação de ganhos indiretos quando é realizada a seleção em PSB ou PG. Além disso, os índices com Base em Soma de Postos e o Multiplicativo também foram utilizados, em diferentes arranjos de caracteres, para comparar com as seleções diretas e possivelmente propor um índice que possa apresentar ganhos mais interessantes.

A seleção direta em PSB ou em PG na população 1, além dos arranjos (I) de ambos os índices, não apresentaram comportamento favorável nos caracteres NDF e PEG, diminuindo o primeiro e aumentando o segundo (Tabela 6). Seria interessante o aumento de NDF para aumentar o período juvenil dos materiais. Já a diminuição de PEG é especificamente um caráter de resistência aos percevejos, sendo interessante que este período fosse reduzido para diminuir a exposição aos percevejos no período mais suscetível da planta.

A utilização de ambos os índices nos arranjos (II) e (III) ocasionou o aumento do caráter AC, além da diminuição de PCS. O aumento de AC pode estar associado à seleção de plantas mais altas nestas combinações índices-arranjos. A altura mínima de plantas que é desejável para colheita mecanizada em solos de topografia plana é em torno de 50 a 60 cm. Geralmente, plantas com 70 a 80 cm de altura induzem a uma eficiente operação da colheitadeira e acima de 100 cm tendem ao acamamento (SEDIYAMA et al., 2005). Este acamamento das plantas é um caráter que pode causar perdas de grãos durante a colheita mecanizada. Plantas altas e ou, de caule muito fino tendem ao acamamento com relativa facilidade. Esse caráter pode ser influenciado por vários fatores ambientais, sendo maior em solos férteis, argilosos e mais úmidos do que em solos pobres e/ou arenosos (SEDIYAMA et al., 2005). As notas de acamamento superiores a 3,0 (plantas moderadamente inclinadas) tornam inviável a recomendação do cultivar para o uso comercial (BONETTI, 1983). Já a redução de PCS é indesejada, pois os grãos de cultivares destinadas a indústria de óleos e farelo geralmente pesam de 10 a 20 g por 100 unidades (SEDIYAMA, 2005).

A seleção utilizando o índice Multiplicativo com o arranjo (IV), além de selecionar progênies com menor NDF, também reduziu o NDM. Estes dois caracteres, mesmo sendo conhecido seu alto grau de correlação positivo, são desejados que se comportem de forma inversamente proporcional. A diminuição de NDM não é interessante para esta população devido ao fato de a mesma já apresentar uma média de interesse, com ciclo precoce.

Tabela 6 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média ($\bar{X}_s$) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e Multiplicativo (Multi), média ($\bar{X}$) e intervalo de confiança (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; IV=todos os caracteres, avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 (continua)

Índice			NDF _(dias)	PEG _(dias)	NDM _(dias)	APM _(cm)	AC _(notas)	RF _(notas)
PSB	Direta	GS _(%)	-1,58	2,87	-0,42	3,63	-1,31	-1,06
		$\bar{X}_s$	52,96	33,72	117,20	53,59	1,85	1,66
PG	Direta	GS _(%)	-1,28	1,34	-0,27	9,04	0,57	-0,45
		$\bar{X}_s$	53,16	33,12	117,41	56,72	1,92	1,71
M&M	(I)	GS _(%)	-1,34	1,87	-0,26	8,15	0,15	-0,96
		$\bar{X}_s$	53,12	33,33	117,44	56,21	1,90	1,67
	(II)	GS _(%)	2,3	-7,87	-0,14	15,13	6,77	-4,35
		$\bar{X}_s$	55,61	29,49	117,60	60,25	2,17	1,39
	(III)	GS _(%)	1,8	-5,60	0,08	15,4	7,87	-2,79
		$\bar{X}_s$	55,27	30,39	117,93	60,41	2,21	1,52
	(IV)	GS _(%)	1,54	-4,49	-0,01	10,4	-2,49	-2,96
		$\bar{X}_s$	55,10	30,83	117,80	57,51	1,80	1,50
Multi	(I)	GS _(%)	-1,34	1,87	-0,26	8,15	0,15	-0,96
		$\bar{X}_s$	53,12	33,33	117,44	56,21	1,90	1,67
	(II)	GS _(%)	1,98	-6,20	-0,31	11,97	7,07	-5,47
		$\bar{X}_s$	55,39	30,15	117,35	58,42	2,18	1,30
	(III)	GS _(%)	1,16	-4,58	-0,20	11,29	6,36	-4,03
		$\bar{X}_s$	54,83	30,79	117,52	58,03	2,15	1,41
	(IV)	GS _(%)	-0,35	-0,28	-0,76	6,58	-6,57	-3,37
		$\bar{X}_s$	53,80	32,48	116,70	55,30	1,64	1,47
População 1 (original)		$\bar{X}$	54,04	32,59	117,81	51,49	1,90	1,74
		IC	(53,63; 54,45)	(32,08; 33,10)	(117,20; 118,42)	(49,41; 53,57)	(1,82; 1,98)	(1,67; 1,82)

Tabela 6 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média ($\bar{X}_s$) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e Multiplicativo (Multi), média ($\bar{X}$) e intervalo de confiança (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; IV=todos os caracteres, avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014 (conclusão)

Índice			VA _(notas)	PG _(g)	PSB _(g)	PCS _(g)	Total
PSB	Direta	GS _(%)	0,05	10,4	8,89	7,06	28,53
		$\bar{X}_s$	3,20	45,47	42,29	13,07	
PG	Direta	GS _(%)	-1,07	10,77	8,76	6,71	34,12
		$\bar{X}_s$	3,13	45,80	42,16	13,03	
M&M	(I)	GS _(%)	-1,04	10,76	8,79	6,74	32,86
		$\bar{X}_s$	3,13	45,80	42,19	13,03	
	(II)	GS _(%)	2,25	2,81	2,5	-14,89	4,51
		$\bar{X}_s$	3,34	38,66	36,03	10,20	
	(III)	GS _(%)	-0,04	7,51	6,11	-9,68	20,66
		$\bar{X}_s$	3,19	42,88	39,56	10,88	
	(IV)	GS _(%)	2,72	6,47	5,41	1,08	17,67
		$\bar{X}_s$	3,37	41,95	38,88	12,29	
Multi	(I)	GS _(%)	-1,04	10,76	8,79	6,74	32,86
		$\bar{X}_s$	3,13	45,80	42,19	13,03	
	(II)	GS _(%)	2,84	2,59	2,61	-13,28	3,80
		$\bar{X}_s$	3,38	38,46	36,14	10,41	
	(III)	GS _(%)	0,90	6,43	5,41	-11,45	11,29
		$\bar{X}_s$	3,25	41,91	38,89	10,65	
	(IV)	GS _(%)	2,64	7,06	6,12	7,84	18,91
		$\bar{X}_s$	3,37	42,48	39,57	13,17	
População 1 (original)		$\bar{X}$	3,20	36,14	33,58	12,15	
		IC	(3,13; 3,26)	(35,12; 37,16)	(32,64; 34,52)	(11,77; 12,53)	

Com isto, a seleção utilizando o índice com Base em Soma de Postos com o arranjo (IV) é a mais interessante ao melhorista, por proporcionar ganhos nos sentidos desejados para todos os caracteres na população 1.

A população 2 apresentou comportamento diferente quando submetida à seleção pelos métodos propostos (Tabela 7). Todas as estratégias apresentaram comportamento indesejável para NDF, ocasionando a redução do seu valor. Isto pode ter ocorrido devido à alta correlação positiva com NDM, as correlações negativas com todos os componentes de produção e a média alta da população original para NDF.

A seleção direta em PSB, além dos arranjos (I) e (IV) de ambos os índices, ocasionou o aumento de PEG, o que resultaria em materiais com maior exposição aos percevejos no período de maior suscetibilidade.

Já a seleção direta em PG, manteve as médias de APM e AC inalteradas, quando comparadas às médias da população. A redução destes valores é desejada para esta população, pois apresenta média elevada para ambos os caracteres. Pode-se observar que os arranjos (II) e (III) do índice com Base em Soma de Postos também apresentam este mesmo comportamento para AC, além de aumentarem APM.

Com o índice Multiplicativo no arranjo (III) tem-se uma proximidade ao comportamento ideal. Porém, não há modificação na média de PEG quando comparada à média original da população. Por isto, chega-se ao arranjo (II) deste índice que, mesmo apresentando seleção para NDF menor, como em todas as demais estratégias, apresenta direções favoráveis para os demais caracteres.

Outra estratégia que pode ser utilizada pelos melhoristas é a elaboração de um índice de seleção por análise de fatores, para obter ganhos maiores nos caracteres de interesse, do que os obtidos nos índices pré-estabelecidos. Esta é uma técnica de análise multivariada que trata das relações internas de um conjunto de caracteres correlacionados por um número menor de *fatores*. A cada fator corresponde um grupo de caracteres iniciais que estejam fortemente correlacionados entre si, mas fracamente correlacionados com os outros caracteres iniciais (GRANATE, 2000). Nesta análise, considera-se que cada caráter analisado possa ser explicado por um conjunto de fatores comuns e por um fator específico. O peso ou carga fatorial de cada fator comum é estimado, de forma que os fatores, em função dos caracteres em que incidem, passam a ter interpretação biológica (CRUZ; CARNEIRO, 2006).

Para a determinação das cargas fatoriais, realizou-se a análise de componentes principais, obtendo-se seus autovalores e respectivos autovetores para cada população. Para se

Tabela 7 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média ($\bar{X}_s$) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e Multiplicativo (Multi), média ($\bar{X}$) e intervalo de confiança (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agrônômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; IV=todos os caracteres, realizados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014

Índice			NDF _(dias)	PEG _(dias)	NDM _(dias)	APM _(cm)	AC _(notas)	RF _(notas)
PSB	Direta	GS _(%)	-10,72	1,11	-10,18	-6,66	-2,42	-25,03
		$\bar{X}_s$	59,05	28,61	124,78	63,99	2,37	1,74
PG	Direta	GS _(%)	-7,55	0,37	-6,78	-0,85	-0,73	-21,46
		$\bar{X}_s$	61,36	28,10	129,99	69,16	2,46	1,87
M&M	(I)	GS _(%)	-10,26	0,89	-9,45	-4,61	-2,35	-23,84
		$\bar{X}_s$	59,39	28,46	125,90	65,82	2,38	1,79
	(II)	GS _(%)	-2,22	-4,05	-4,43	2,67	-0,26	-21,53
		$\bar{X}_s$	65,22	25,02	133,59	72,29	2,48	1,87
	(III)	GS _(%)	-3,66	-3,47	-4,96	2,91	1,36	-22,52
		$\bar{X}_s$	64,18	25,43	132,77	72,50	2,56	1,83
	(IV)	GS _(%)	-11,86	1,02	-11,49	-12,37	-9,57	-29,34
		$\bar{X}_s$	58,23	28,54	122,77	58,92	2,03	1,59
Multi	(I)	GS _(%)	-10,26	0,89	-9,45	-4,61	-2,35	-23,84
		$\bar{X}_s$	59,39	28,46	125,90	65,82	2,38	1,79
	(II)	GS _(%)	-7,54	-1,14	-8,98	-4,82	-3,98	-31,77
		$\bar{X}_s$	61,36	27,04	126,62	65,63	2,30	1,50
	(III)	GS _(%)	-7,92	-0,17	-8,82	-3,19	-2,40	-29,86
		$\bar{X}_s$	61,09	27,72	126,86	67,08	2,38	1,57
	(IV)	GS _(%)	-11,98	1,16	-11,57	-11,66	-8,11	-30,98
		$\bar{X}_s$	58,14	28,64	122,64	59,55	2,10	1,53
População 2	$\bar{X}$	66,83	27,84	140,39	69,92	2,49	2,64	
	IC	(65,76; 67,90)	(27,41; 28,27)	(138,51; 142,26)	(68,03; 71,81)	(2,40; 2,58)	(2,50; 2,78)	

Tabela 7 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos, média ($\bar{X}_s$) da população selecionada por seleção direta, índices de seleção com Base em Soma de Postos (M&M) e Multiplicativo (Multi), média ($\bar{X}$) e intervalo de confiança (IC) da população original para número de dias para florescimento (NDF), período de granação (PEG), número de dias para a maturidade (NDM), altura da planta na maturidade (APM), acamamento (AC), valor agronômico (VA), retenção foliar (RF), produtividade de grãos (PG), peso de sementes boas (PSB) e peso de cem sementes (PCS), em três arranjos: I=PSB+PG ; II=todas de resistência; III= todas de resistência+PG; IV=todos os caracteres, realizados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014 (conclusão)

Índice			VA _(notas)	PG _(g)	PSB _(g)	PCS _(g)	Total
PSB	Direta	GS _(%)	13,14	37,46	69,78	24,11	90,59
		$\bar{X}_s$	2,70	34,32	27,64	11,38	
PG	Direta	GS _(%)	10,11	41,2	63,3	15,95	93,56
		$\bar{X}_s$	2,60	35,48	26,41	10,39	
M&M	(I)	GS _(%)	13,00	39,61	68,64	22,56	94,19
		$\bar{X}_s$	2,70	34,99	27,42	11,19	
	(II)	GS _(%)	9,61	19,32	31,16	1,31	31,58
		$\bar{X}_s$	2,58	28,67	20,33	8,62	
	(III)	GS _(%)	10,52	27,42	43,17	2,14	52,91
		$\bar{X}_s$	2,61	31,19	22,60	8,72	
	(IV)	GS _(%)	20,75	27,66	57,88	30,1	62,78
		$\bar{X}_s$	2,97	31,27	25,39	12,10	
Multi	(I)	GS _(%)	13,00	39,61	68,64	22,56	94,19
		$\bar{X}_s$	2,70	34,99	27,42	11,19	
	(II)	GS _(%)	18,17	30,42	56,37	15,14	61,87
		$\bar{X}_s$	2,88	32,12	25,10	10,29	
	(III)	GS _(%)	15,55	36,05	63,57	15,45	78,26
		$\bar{X}_s$	2,79	33,88	26,46	10,33	
	(IV)	GS _(%)	20,62	30,06	61,32	31,03	69,89
		$\bar{X}_s$	2,97	32,01	26,04	12,22	
População 2	$\bar{X}$	2,24	22,66	14,43	8,46		
	IC	(2,15; 2,33)	(21,21; 24,11)	(13,06; 15,81)	(8,01; 8,91)		

envolvam, no mínimo, 80% da variação total entre os caracteres analisados, o que também coincidiu com a seleção de fatores que considera o número de autovalores superiores à unidade. Com isto, foram obtidos quatro fatores para a população 1 (Tabela 8) e três para a população 2 (Tabela 9).

Posteriormente, foi realizada a análise de fatores para cada população, e as cargas fatoriais finais foram obtidas após rotação pelo método *varimax*. A comunalidade é a medida da eficiência da representação do caráter por uma parte comum, também envolvido nas demais caracteres analisados (CRUZ; CARNEIRO, 2006). De acordo com Souza (1988), tem sido aceitos como razoáveis os valores de comunalidade superiores a 0,64, o que é equivalente a se ter um coeficiente de correlação superior a 0,80 entre os fatores comuns e o caráter.

Após obtidas as cargas fatoriais finais, as comunalidades foram superiores a 0,64, exceto para AC. Nas cargas fatoriais finais fica evidente que o Fator 1 pode ser interpretado como o determinante dos caracteres APM, AC e PEG; o Fator 2 expressa os caracteres PG e PSB; já o Fator 3 explica os caracteres VA e RF; enquanto o Fator 4 é o determinante dos caracteres NDM, NDF e PCS (Tabela 10). Foram, então, obtidos os escores fatoriais para cada fator, sendo eles:

$$F1 = 0,11NDF - 0,30PEG - 0,13NDM + 0,37APM + 0,31AC - 0,11RF - 0,22VA + 0,03PG + 8,99 \cdot 10^{-5}PSB - 0,08PCS$$

$$F2 = 0,01NDF + 0,02PEG + 0,10NDM + 0,10APM - 0,01AC + 0,01RF + 0,08VA + 0,50PG + 0,49PSB + 0,05PCS$$

$$F3 = 0,04NDF - 0,12PEG - 0,20NDM - 0,13APM - 0,03AC - 0,55RF + 0,45VA - 4,22 \cdot 10^{-3}PG + 0,07PSB - 0,22PCS$$

$$F4 = 0,32NDF + 0,02PEG + 0,60NDM - 0,10APM - 0,06AC + 0,28RF + 0,20VA + 0,09PG + 0,07PSB - 0,22PCS$$

Já na população 2, todas as comunalidades foram superiores a 0,64 (Tabela 11). Além disso, o Fator 1 é o determinante da grande maioria dos caracteres; enquanto o Fator 2 expressa os caracteres AC e APM; e o Fator 3 explica apenas o PEG. Os escores fatoriais, obtidos para cada fator, são dados por:

$$F1 = -0,14NDF - 0,04PEG - 0,16NDM + 0,09APM + 0,15AC - 0,17RF + 0,09VA + 0,24PG + 0,22PSB + 0,18PCS$$

$$F2 = 0,03NDF + 0,07PEG + 0,05NDM + 0,41APM + 0,57AC + 0,03RF - 0,24VA + 0,19PG + 0,12PSB + 0,13PCS$$

Tabela 8 – Autovalores (λ_j), porcentagem acumulada da variância ($\lambda_j(\%)$) e autovetores obtidos da matriz de correlação fenotípica entre os caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

λ_j	$\lambda_j(\%)$	NDF	PEG	NDM	APM	AC	RF	VA	PG	PSB	PCS
3,40	34,04	0,47	-0,44	0,26	0,28	0,34	-0,09	0,02	-0,22	-0,25	-0,44
2,07	54,73	0,01	-0,21	-0,10	0,48	0,27	-0,03	-0,25	0,56	0,51	0,10
1,61	70,81	0,11	-0,03	0,03	-0,22	-0,14	-0,50	0,65	0,26	0,33	-0,26
1,22	83,00	0,23	0,17	0,70	-0,11	-0,15	0,54	0,06	0,24	0,20	-0,04
0,59	88,88	-0,29	0,42	0,19	-0,25	0,75	-0,14	-0,07	0,00	0,05	-0,20
0,48	93,63	-0,15	-0,15	-0,46	-0,03	0,21	0,66	0,42	-0,03	0,10	-0,30
0,29	96,58	0,04	0,23	0,12	0,48	0,23	0,01	0,56	-0,10	-0,17	0,54
0,19	98,46	0,59	-0,14	-0,22	-0,52	0,30	0,05	-0,04	0,01	0,11	0,46
0,14	99,86	-0,51	-0,67	0,35	-0,23	0,10	-0,01	0,11	-0,02	-0,02	0,30
0,01	100	0,00	0,01	0,08	0,10	-0,04	-0,01	-0,05	-0,71	0,69	0,03

Tabela 9 – Autovalores (λ_j), porcentagem acumulada da variância ($\lambda_j(\%)$) e autovetores obtidos da matriz de correlação fenotípica entre os caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014

λ_j	$\lambda_j(\%)$	NDF	PEG	NDM	APM	AC	RF	VA	PG	PSB	PCS
5,75	57,53	-0,37	0,09	-0,40	-0,24	-0,18	-0,36	0,35	0,34	0,37	0,33
1,57	73,20	0,05	-0,40	-0,04	0,54	0,58	-0,16	-0,08	0,33	0,24	0,10
1,01	83,32	-0,15	0,78	0,03	0,06	0,39	0,17	-0,31	0,07	0,07	0,27
0,42	87,55	-0,02	-0,33	-0,14	-0,36	0,32	-0,01	-0,10	-0,45	-0,21	0,62
0,38	91,35	-0,24	-0,25	-0,07	-0,52	0,14	0,24	-0,52	0,23	0,28	-0,35
0,33	94,69	-0,08	-0,18	0,04	0,28	-0,46	0,63	-0,14	0,15	0,17	0,45
0,24	97,09	0,73	0,05	0,31	-0,31	-0,09	-0,19	-0,12	0,30	0,24	0,26
0,15	98,60	-0,01	-0,03	0,28	-0,27	0,36	0,48	0,66	0,23	-0,05	-0,03
0,10	99,63	0,47	0,10	-0,69	0,03	0,10	0,31	0,13	-0,23	0,30	-0,16
0,04	100	-0,14	-0,0018	0,40	0,05	0,02	-0,05	0,11	-0,55	0,71	-0,04

Tabela 10 – Valores das comunalidades, cargas fatoriais iniciais e finais obtidos na análise de fatores a partir das médias dos caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

Caracteres	Comunalidade	Cargas Iniciais				Cargas Finais			
		Fatores				Fatores			
		1	2	3	4	1	2	3	4
APM	0,83	0,52	0,69	-0,28	-0,13	0,88	0,19	-0,19	-0,00
AC	0,61	0,64	0,39	-0,18	-0,16	0,77	-0,07	-0,02	0,11
PEG	0,80	-0,82	-0,31	-0,04	0,19	-0,82	0,12	-0,24	-0,24
PG	0,99	-0,41	0,80	0,33	0,27	0,03	0,99	-0,04	-0,07
PSB	0,98	-0,47	0,73	0,42	0,22	-0,06	0,98	0,06	-0,11
VA	0,82	0,05	-0,36	0,83	0,07	-0,38	0,05	0,75	0,33
RF	0,78	-0,17	-0,04	-0,63	0,60	-0,19	-0,03	-0,83	0,25
NDM	0,85	0,48	-0,15	0,04	0,77	0,02	-0,04	-0,17	0,91
NDF	0,84	0,87	0,01	0,14	0,26	0,53	-0,19	0,19	0,70
PCS	0,80	-0,81	0,14	-0,33	-0,05	-0,42	0,28	-0,46	-0,58

Tabela 11 – Valores das comunalidades, cargas fatoriais iniciais e finais obtidos na análise de fatores a partir das médias dos caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

Caracteres	Comunalidade	Cargas Iniciais			Cargas Finais		
		Fatores			Fatores		
		1	2	3	1	2	3
PSB	0,90	0,90	0,30	0,07	0,95	-0,08	0,04
PG	0,84	0,82	0,42	0,07	0,92	0,05	-0,02
PCS	0,70	0,78	0,13	0,28	0,78	-0,08	0,29
VA	0,82	0,84	-0,10	-0,31	0,71	-0,55	-0,14
NDF	0,82	-0,89	0,06	-0,15	-0,80	0,33	-0,27
RF	0,79	-0,85	-0,20	0,17	-0,84	0,25	0,13
NDM	0,90	-0,95	-0,05	0,03	-0,88	0,34	-0,06
AC	0,86	-0,42	0,73	0,39	-0,06	0,92	-0,01
APM	0,78	-0,57	0,67	0,06	-0,24	0,79	-0,31
PEG	0,92	0,21	-0,50	0,79	0,04	-0,14	0,95

$$F3 = -0,16NDF + 0,84PEG + 0,02NDM - 0,15APM + 0,14AC + 0,19RF - 0,23VA - 0,03PG - 1,18.10^{-3}PSB + 0,22PCS$$

A partir destas relações, foram estimados os novos “supercaracteres”, aqui chamados de “Fatores”. Posteriormente, foi realizada a análise de variância para todos os Fatores, nas duas populações (Tabela 12). Pelo teste F foi verificada a presença de variabilidade entre os genótipos, permitindo a seleção de genótipos superiores. Os coeficientes de variação estiveram dentro do esperado para as populações submetidas ao ataque de percevejos.

Os resultados da seleção direta no Fator 1 e 2 aumentou a média de AC das progênes selecionadas, além de diminuir as de VA (Tabela 13). Além disso, houve redução na média de NDF para o Fator 2. Esta redução em NDF também pode ser observada no Fator 3, no qual também houve aumento de PEG e diminuição de APM. O Fator 4, além de também reduzir APM, selecionou progênes com maior NDM e menor PCS. Não obstante, este Fator não aumentou PG e PSB, o que seria desejado em programas de melhoramento. Portanto, nenhum dos fatores selecionou progênes com todos os caracteres de forma favorável, não sendo interessante a sua utilização para a população 1.

Enquanto isto, na população 2, os Fatores 1 e 3 selecionaram progênes com menor NDF, o que também foi observado nas estratégias anteriores para esta população, e maior PEG (Tabela 14). Já o Fator 2, mesmo resolvendo a seleção para NDF, selecionou progênes desfavoráveis para os caracteres APM, AC e VA, aumentando as médias nos dois primeiros e reduzindo no último. Portanto, nenhum dos fatores selecionou progênes com todos os caracteres de forma favorável, não sendo interessante a sua utilização para a população 2.

Com isto, pode-se perceber que não é ideal a extrapolação de resultados encontrados em uma população para outras populações, pois não houve conformidade de resultados em ambas as populações aqui estudadas.

Tabela 12 – Resumo da análise de variância, médias e coeficiente de variação em porcentagem (CV(%)) dos escores dos fatores das duas populações, avaliado em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

FV	GL	População 1				População 2		
		Fator 1	Fator 2	Fator 3	Fator 4	Fator 1	Fator 2	Fator 3
Repetição	2	76,70**	4633,58**	36,05**	188,42**	1239,53**	1229,21**	2,27 ^{ns}
Bloco(Rep)	24	32,15**	251,96**	4,60**	14,93**	64,30**	67,47**	15,95 ^{ns}
Tratamento	161	84,14**	97,82**	5,01**	24,10**	107,76**	67,93**	37,14**
Erro	298	7,37	57,76	1,30	4,11	17,17	20,91	11,18
μ		-0,41	53,25	-33,81	86,86	-16,56	47,76	6,67
CV(%)		22,42	14,27	14,51	2,34	23,84	9,57	24,47

^{ns}não significativo, * significativo a 5% e ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 13 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos ($GS_{(\%)}$) e média ($\bar{X}_s$) da população selecionada por seleção direta dos escores dos fatores, média ($\bar{X}$) e intervalo de confiança (IC) da população original para os caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 1, Piracicaba-SP, 2014

Fator		NDF	PEG	NDM	APM	AC	RF	
Pop. 1	1	GS _(%)	2,18	-9,73	-0,51	41,27	9,67	-0,05
		$\bar{X}_s$	55,53	28,76	117,07	75,38	2,28	1,74
	2	GS _(%)	-0,62	-0,16	-0,13	12,01	3,37	-0,49
		$\bar{X}_s$	53,61	32,53	117,62	58,44	2,03	1,70
	3	GS _(%)	-1,81	1,86	-1,99	-14,46	-5,94	0,01
		$\bar{X}_s$	52,80	33,32	114,89	43,12	1,66	1,75
	4	GS _(%)	2,45	-0,94	2,64	-8,55	-1,12	0,51
		$\bar{X}_s$	55,72	32,22	121,69	46,54	1,85	1,79
População 1	$\bar{X}$	54,04	32,59	117,81	51,49	1,90	1,74	
	IC	(53,63; 54,45)	(32,08; 33,10)	(117,20; 118,42)	(49,41; 53,57)	(1,82; 1,98)	(1,67; 1,82)	

Fator		VA	PG	PSB	PCS	Total	
Pop. 1	1	GS _(%)	-5,7	4,91	2,71	-2,58	42,17
		$\bar{X}_s$	2,83	40,54	36,23	11,81	
	2	GS _(%)	-1,92	10,66	8,57	4,53	35,82
		$\bar{X}_s$	3,07	45,71	41,98	12,74	
	3	GS _(%)	0,37	2,54	3,19	0,77	-15,46
		$\bar{X}_s$	3,22	38,42	36,70	12,25	
	4	GS _(%)	3,01	-0,09	-0,04	-13,90	-16,03
		$\bar{X}_s$	3,39	36,06	33,54	10,33	
População 1	$\bar{X}$	3,20	36,14	33,58	12,15		
	IC	(3,13; 3,26)	(35,12; 37,16)	(32,64; 34,52)	(11,77; 12,53)		

Tabela 14 – Estimativas de percentuais de ganhos preditos ($GS_{(\%)}$) e média ($\bar{X}_s$) da população selecionada por seleção direta dos escores dos fatores, média ($\bar{X}$) e intervalo de confiança (IC) da população original para os caracteres número de dias para florescimento (NDF em dias), período de granação (PEG em dias), número de dias para a maturidade (NDM em dias), altura da planta na maturidade (APM em cm), acamamento (AC em notas), valor agrônômico (VA em notas), retenção foliar (RF em notas), produtividade de grãos (PG em g), peso de sementes boas (PSB em g) e peso de cem sementes (PCS em g), avaliados em 162 genótipos F_{2:3} de soja da população 2, Piracicaba-SP, 2014

Fator		NDF	PEG	NDM	APM	AC	RF	
Pop. 2	1	GS(%)	-12,22	1,11	-11,70	-6,70	-4,40	-28,18
		$\bar{X}_s$	57,96	28,61	122,45	63,96	2,28	1,63
	2	GS(%)	2,15	-1,23	0,76	16,42	9,34	-4,16
		$\bar{X}_s$	68,39	26,98	141,55	84,52	2,95	2,49
	3	GS(%)	-10,79	5,20	-7,91	-14,64	-7,55	-13,26
		$\bar{X}_s$	59,00	31,45	128,26	56,90	2,13	2,16
População 2		$\bar{X}$	66,83	27,84	140,39	69,92	2,49	2,64
		IC	(65,76; 67,90)	(27,41; 28,27)	(138,51; 142,26)	(68,03; 71,81)	(2,40; 2,58)	(2,50; 2,78)

Fator		VA	PG	PSB	PCS	Total	
Pop. 2	1	GS(%)	16,64	35,57	68,29	29,59	88,00
		$\bar{X}_s$	2,83	33,73	27,36	12,04	
	2	GS(%)	-2,63	14,97	12,44	1,06	49,12
		$\bar{X}_s$	2,14	27,32	16,79	8,59	
	3	GS(%)	10,86	13,27	34,64	23,53	33,35
		$\bar{X}_s$	2,62	26,79	20,99	11,31	
População 2		$\bar{X}$	2,24	22,66	14,43	8,46	
		IC	(2,15; 2,33)	(21,21; 24,11)	(13,06; 15,81)	(8,01; 8,91)	

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produividade de grãos, além de estar altamente correlacionada com o peso de sementes boas, apresenta alto efeito direto, além de efeito indireto através dos demais caracteres. Portanto, a seleção em peso de sementes boas é bastante interessante, pois também selecionaria plantas altamente produtivas e resistentes ao complexo de percevejos, uma das principais pragas da cultura da soja. Entretanto, no presente trabalho, a seleção em peso de sementes boas resultou na seleção indireta de plantas com maior período de granação, o que resultaria em maior exposição aos percevejos no período de maior suscetibilidade da cultura.

O índice de seleção com Base em Soma de Postos, no arranjo com todos os caracteres, foi eficiente para selecionar plantas com todos os caracteres favoráveis na população 1. Porém, não houve conformidade na população 2, no qual nenhum dos índices e arranjos foi suficiente para selecionar plantas com todos os caracteres favoráveis. Nesta última população, o índice Multiplicativo, no arranjo com todos os caracteres de resistência, foi a estratégia mais aceitável. O uso de diferentes índices em cada uma das populações não é o ideal. Portanto, sem a conformidade de resultados entre as populações, não foi possível obter um índice de seleção eficiente para todos os caracteres.

A análise de fatores poderia fornecer novos índices para a seleção, nos quais todos os caracteres tivessem a resposta desejada. Porém, a seleção nos “super caracteres” resultou em efeitos indesejados nas variáveis originais, não sendo ideais para as populações em estudo.

Com isso, estudos complementares devem ser realizados com outros índices de seleção nestas populações, para se estabelecer um índice em que todos os caracteres sejam selecionados de forma favorável e com ganhos satisfatórios para a aplicação em programas de melhoramento, como o índice Classico de Smith e Hazel sob colinearidade. Além disso, o descarte de um dos caracteres que contribui para a colinearidade pode permitir o uso de outros índices de seleção que utilizam a inversa da matriz de correlação para a estimação dos ganhos preditos. Para isto, sugere-se o descarte do caráter produtividade de grãos, pois este possui correlação quase perfeita e positiva com peso de sementes boas.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA – ADAB. **Programa de supressão da *Helicoverpa armigera***, 2013. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/PROGRAMA%20SUPRESSAO%20BAHIA%20013%20-%20MAPA%20_2_.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2015.
- ALLIPRANDINI, L.F.; VELLO, N.A. Heritability and correlations among traits in four-way soybean crosses. **Euphytica**, Dordrecht, v. 136, p. 81-91, 2004.
- BÁRBARO, I.M.; DA CRUZ CENTURION, M.A.P.; DI MAURO, A.O.; UNÊDA-TREVISOLI, S.H.; COSTA, M.M. Comparação de estratégias de seleção no melhoramento de populações F₅ de soja. **Revista Ceres**, Viçosa-MG, v. 54, n. 313, p. 250-261, 2007.
- BERMAN, M.; GOPALAN, D.; SHARPLES, L.; SCREATON, N.; MACCAN, C.; SHEARES, K.; PEPKE-ZABA, J.; DUNNING, J.; TSUI, S.; JENKINS, D.P. Right ventricular reverse remodeling after pulmonary endarterectomy: magnetic resonance imaging and clinical and right heart catheterization assessment. **Pulmonary Circulation**, Chicago, v. 4, n. 1, p. 36-44, 2014.
- BONETTI, L.P. Cultivares e seu melhoramento genético. In: FUNDAÇÃO CARGILL. **Soja e melhoramento**. 1983. v.2, p.741-800.
- BORÉM, A.; ALMEIDA, L.A.; KIIHL, R.A.S. Hibridação de soja. In: BORÉM, A. (Ed.) **Hibridação artificial de plantas**. Viçosa: UFV, 1999. p. 443-462.
- BOYD, M.L.; BAILEY, W.C. **Soybean Pest Management: Stink Bugs**. State Extension Entomology Specialists. Columbia: MU Extension, University of Missouri-Columbia, 2000. 2p. Disponível em: <<http://extension.missouri.edu/explorepdf/agguides/pests/g07151.pdf>>. Acesso em: 10 mar. 2015.
- BROGIN, R.L.; ARIAS, C.A.A.; TOLEDO, J.F.F. Genetic control of soybean resistance to brown spot (*Septoria glycines*): First studies. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, Viçosa-MG, v. 3, n. 1, p. 35-44, 2003.
- CAMPOS, M.; KNUTSON, A.; HEITHOLT, J.; CAMPOS, C. Resistance to Seed Feeding by Southern Green Stink Bug, *Nezara viridula* (Linnaeus), in Soybean, *Glycine max* (L.) Merrill. **Southwestern Entomologist**, Washington, v.35, n.3, p. 233-239, 2010.
- CARLINI-GARCIA, L.A.; LOURENÇÃO, A.L.; PINHEIRO, J.B.; SCARPELLINI, J.R.; SANTOS, M.da F.; MORAES, L.K.de. Avaliação de populações de soja quanto à

produtividade e resistência a percevejos. **Pesquisa & Tecnologia**, Campinas, v. 8, n. 32, p. 1-3, 2011. Disponível em: < <http://www.aptaregional.sp.gov.br/acesse-os-artigos-pesquisa-e-tecnologia/edicao-2011/2011-julho-dezembro/876-avaliacao-de-populacoes-de-soja-quanto-a-produtividade-e-resistencia-a-percevejos/file.html>>. Acesso em: 15 maio 2015.

CARRÃO-PANIZZI, M.C.; KITAMURA, K. Isoflavone content in Brazilian soybean cultivars. **Breeding Science**, Kyoto, v. 45, p. 295-300, 1995.

CARVALHO, S.P. **Métodos alternativos de estimação de coeficientes de trilha e índices de seleção, sob multicolinearidade**. 1994. 163p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 1994.

CARVALHO, S.P.; CRUZ, C.D. Diagnosis of multicollinearity: assessment of the condition of correlation matrices used in genetic studies. **Revista Brasileira de Genética**, Ribeirão Preto, v.3, p. 479-484, 1996.

CASTOLDI, F.L. **Comparação de métodos multivariados aplicados na seleção em milho**. 1997. 118p. Tese (Doutorado em Melhoramento Genético) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 1997.

CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – CEPEA. **Proibição do metamidofós deve elevar custos no controle de percevejos**, 2011. Disponível em: < <http://cepea.esalq.usp.br/soja/custos/2011/03Ago.pdf>>. Acesso em: 4 mar. 2015.

CHYEN, D.; WETZSTEIN, M.E.; MCPHERSON, R.M.; GIVAN, W.D. An economic evaluation of soybean stink bug control alternatives for the Southeastern United States. **Southern Journal of Agricultural Economics**, Mississippi, v. 24, n.2, p. 83-94, 1992.

CIVIDANES, F.J.; PARRA, J.R.P. Zoneamento ecológico de *Nezara viridula* (L.), *Piezodorus guildinii* (West.) e *Euschistus heros* (Fabr.) (Heteroptera: Pentatomidae) em quatro estados produtores de soja do Brasil. **Anais da Sociedade Entomológica do Brasil**, Londrina, v. 23, p. 219-226, 1994.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. **Acompanhamento de safra brasileira: grãos – Décimo primeiro levantamento / Agosto, 2015**. Disponível em:<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_08_09_10_43_44_boletim_portugues_agosto_2013_port.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2015.

CORRÊA-FERREIRA, B.S.; CASTRO, L.C. de; ROGGIA, S.; CESCINETTO, N.L.; COSTA, J.M. da; OLIVEIRA, M.C.N. de. **MIP-Soja: resultados de uma tecnologia eficiente e sustentável no manejo de percevejos no atual sistema produtivo da soja**. 2013. Disponível

em: <<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/87596/1/Doc-341.pdf>>. Acesso em: 03 mar. 2015.

CORRÊA-FERREIRA, B.S.; AZEVEDO, J. Soybean seed damage by different species of stink bugs. **Agricultural and Forest Entomology**, Malden, v.4, n.2, p.145–150, 2002.

CORRÊA-FERREIRA, B.S.; KRZYZANOWSKI, F.C.; MINAMI, C.A. **Percevejos e a Qualidade da Semente de Soja – Série Sementes**. Londrina: Embrapa Soja, 2009. 15p. (Embrapa Soja: Circular Técnica, 67)

CORRÊA-FERREIRA, B.S.; PANIZZU, A.R. **Percevejos da soja e seu manejo**. Londrina: EMBRAPA-CNPSO, 1999. 45p.

COSTA, M.M.; DI MAURO, A.O.; UNÊDA-TREVISOLI, S.H.; ARRIEL, N.H.C.; BÁRBARO, I.M.; MUNIZ, F.R.S. Ganho genético por diferentes critérios de seleção em populações segregantes de soja. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 39, n. 11, p. 1095-1102, 2004.

CRUZ, C.D.; CARNEIRO, P.C.S. **Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético**. 2ª ed. Viçosa: UFV, 2006. v.2. 585p.

CRUZ, C.D.; REGAZZI, A.J.; CARNEIRO, P.C.S. **Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético**. 3ª ed. Viçosa: UFV, 2006. v.1. 480p.

CRUZ, C.D. GENES - a software package for analysis in experimental statistics and quantitative genetics. **Acta Scientiarum**, Maringá, v.35, n.3, p.271-276, 2013.

CZEPAK, C.; ALBERNAZ, K.C.; VIVAN, L.M.; GUIMARÃES, H.O.; CARVALHAIS, T. Primeiro registro de ocorrência de *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) no Brasil. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v.43, n.1, p. 110-113, 2013.

DAUGHERTY, D.M. Pentatomidae as vectors of yeast spot disease of soybeans. **Journal of Economic Entomology**, Lanham, v.60, n.1, p.147-152, 1967.

DEGRANDE, P.E.; VIVAN, L.M. Pragas da soja. In: YUYAMA, M. M.; SUZUKI, S.; CAMACHO, S.A. **Boletim de Pesquisa de Soja**. Rondonópolis: Fundação MT, v.11, 2007. 274p.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. **Tecnologias de produção de soja – Região Central do Brasil**, 2014. Londrina: Embrapa Soja, 2013. 265p.

FALCONER, D.S.; MACKAY, T.F.C. **Introduction to quantitative genetics**. 4th ed. New York: Longman, 1996. 464p.

FEHR, W.R. **Principles of Cultivar Development: Crop Species**. New York: Macmillan Publishing Company, 1987. V. 2. 536p.

FEHR, W.R.; CAVINESS, C.E.; BURMOOD, D.T.; PENNINGTON, J.S. Stage of Development Descriptions for Soybeans, *Glycine Max* (L.) Merrill. **Crop Science**, Medison-WI, v.11, n. 6, p. 929-931, 1971.

FERREIRA, D.F. **Estatística multivariada**. 2. ed. Lavras-MG: UFLA, 2011. 675p.

FOSTER, J.E.; DAUGHERTY, D.M. Isolation of the organism causing yeast-spot disease from the salivary system of the green stink bug. **Journal of Economic Entomology**, Lanham, v.62, n.2, p.424-427, 1969.

FURTADO, M.R. **Alternativas de seleção no delineamento I de Comstock e Robinson, em milho**. 1996. 94p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 1996.

GARCIA, A.A.F. **Índice para seleção de cultivares**. 1998. 112p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1998.

GAZZONI, D.L. **A sustentabilidade da soja no contexto do agronegócio brasileiro e mundial** – Londrina: Embrapa Soja, Novembro de 2013. Disponível em: <<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94641/1/Doc-344-online.pdf>>. Acesso em 12 jun. 2015.

GAZZONI, D.L. Perspectivas do manejo de pragas. In: HOFFMANN-CAMPO, C.B.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; MOSCARDI, F. **Soja - Manejo Integrado de Insetos e outros Artrópodes-Praga**. Brasília: EMBRAPA, 2012. cap.12, p. 789 - 829.

GERMPLASM RESOURCES INFORMATION NETWORK - GRIN. **Base de dados Online**. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Disponível em: <<http://www.ars-grin.gov.4/cgi-bin/npgs/html/crop.pl?51>>. Acesso em: 17 jun. 2015.

GODOI, C.R.C.; PINHEIRO, J.B. Genetic parameters and selection strategies of soybean genotypes resistant to stink bug complex. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v.32, n.2, p.328-336, 2009.

GODOI, C.R.C.; PEREIRA, F.S.; UMEMO, F.; ÁZARA, N.A.; LIMA, P.M.S.; SILVA, R.P.; OLIVEIRA, A.B.; ARAÚJO, I.M.; ZUCCHI, M.I.; PINHEIRO, J.B. Resistência a insetos em populações de soja com diferentes proporções gênicas de genitores resistentes. **Revista Agropecuária Tropical**, Goiânia, v.1, n.32, p.47-55, 2002.

GRANATE, M.J. **Número mínimo de famílias de meios-irmãos de milho pipoca, critérios de seleção e predição de ganhos por seleção**. 2000. 236p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 2000.

GUEDES, J.V.C.; ARNEMANN, J.A.; STÜRMER, G.R.; MELO, A.A.; BIGOLIN, M.; PERINI, C.R.; SARI, B.G. Percevejos da soja: novos cenários, novo manejo. **Revista Plantio Direto**, Passo Fundo, p.28-34, jan./fev., 2012.

HESLER, L.S.; THARP, C. Antibiosis and antixenosis to *Rhopalosiphum padi* among triticales accessions. **Euphytica**, Dordrecht, v.143, n.1/2, p.153-160, 2005.

HIROMOTO, D.M.; VELLO, N.A. The genetic base of Brazilian soybean (*Glycine max*) cultivars. **Revista Brasileira de Genética**, Ribeirão Preto, v. 9, p. 295-306, 1986.

HOFFMANN-CAMPO, C.B.; MOSCARDI, F.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; OLIVEIRA, L.J.; SOSA-GÓMEZ, D.R.; PANIZZU, A.R.; CORSO, I.C.; GAZZONI, D.L.; OLIVEIRA, E.B. **Pragas da soja no Brasil e seu manejo integrado**. Londrina: Embrapa Soja, 2000. 70p.

HOOKS, C. **Stink bug and their soybean obsession**. Agronomy News, University of Maryland Extension, 2011. Disponível em: <http://www.mdcrops.umd.edu/UMDextension/AgronomyNewsAugust_18_2011.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2014.

HORI, K.Z. Possible causes of disease symptoms resulting from the feeding of phytophagous Heteroptera. In: SCHAEFER, C.W.; PANIZZU, A.R. (Ed.). **Heteroptera of economic importance**. Boca Raton: CRC Press, 2000. p. 11-35.

HYTEN, D.L.; SONG, Q.; ZHU, Y.; CHOI, I.Y.; NELSON, R.L.; COSTA, J.M.; SPECHT, J.E.; SHOEMAKER, R.C.; CREGAN, P.B. Impacts of genetic bottlenecks on soybean genome diversity. **Proceedings...** Washington, v. 103, p. 16666–16671, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Contas Nacionais Trimestrais** - Indicadores de Volume e Valores Correntes, Outubro/Dezembro 2013. Disponível em: <
ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2013/pib-vol-val_201304caderno.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2015.

JOHNSON, R.A.; WICHERN, D.W. **Applied multivariate statistical analysis**. New Jersey-USA. Englewood Cliffs, 1992. 642p.

JONES, J.L.; ALLEN, T.W.; TOMASO-PETERSON, M.; CATCHOT, A.L.; MUSSER, F.R.; GORE, J. Relationship between stink bugs and seed decay in Mississippi soybean production. In: APS-IPPC JOINT MEETING, 2011, Honolulu. **Proceedings...** Honolulu: The American Phytopathological Society, 2011. Disponível em: <
http://www.apsnet.org/meetings/Documents/2011_Meeting_Abstracts/a11ma494.htm>. Acesso em: 28 maio 2015.

JONES, W.; SULLIVAN, M.J. Soybean Resistance to the Southern Green Stink Bug, *Nezara viridula*. **Journal of Economic Entomology**, Lanham, v. 72, n. 4, p.628-632, 1979.

KAMMINGA, K.L.; KOPPEL, A.L.; HERBERT, JR. D.A.; KUHAR, T.P. Biology and Management of the Green Stink Bug. **Journal of Integrated Pest Management**, Annapolis, v. 3, n. 3, 2012.

KEIM, P.; OLSON, T.C.; SHOEMAKER, R.C. A rapid protocol for isolating soybean DNA. **Soybean Genetics Newsletter**, Columbia-MO, v. 15, p. 150-152, 1988.

KESTER, K.M.; SMITH, C.M.; GILMAN, D.F. Mechanisms of Resistance in Soybean (*Glycine max* [L.] Merrill) genotype PI 171444 to the Southern Green Stink Bug, *Nezara viridula* (L.) (Hemiptera: Pentatomidae). **Environmental Entomology**, Annapolis, v.13, n.5, p.1208-1215, 1984.

KIMURA, S. Yeast-spot disease of soybean [*Glycine max*] caused by *Eremothecium coryli* (Peglion) kurtzman in Japan. **Japanese Journal of Phytopathology**, Tokyo, v. 73, n. 4, p. 283-288, 2007.

LARA, F.M. **Princípios de resistência de plantas a insetos**. 2ª ed. São Paulo: Ícone, 1991. 336p.

LI, C.C. **Path analysis** – a primer. Boxwood: Pacific Grove, 1975. 346p.

LOPES, E.C.A.; DESTRO, D.; MONTALVÁN, R.; VENTURA, M.U.; GUERRA, E.P. Genetic gain and correlations among traits for stink bug resistance in soybeans. **Euphytica**, Dordrecht, v. 97, n. 2, p.161-166, 1997.

LUSTOSA, P.R.; ZANUNCIO, J.C.; LEITE, G.L.D.; PICANÇO, M. Qualidade da semente e senescência de genótipos de soja sob dois níveis de infestação de percevejos (Pentatomidae). **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 34, n. 8, p. 1347-1351, 1999.

MAÊDA, J.M.; PIRES, I.E.; BORGES, R. de C.G.; CRUZ, D.C. Critérios de seleção uni e multivariados no melhoramento genético da *Virola surinamensis* Warb. **Floresta e Ambiente**, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p.61 - 69, jan./dez. 2001.

MAGRINI, E.A.; SILVEIRA NETO, S.; BOTELHO, P.S.M.; NEGRIM, S.G. Ocorrência de percevejos no município de Pirassununga-SP, associada com a fenologia da soja. **Revista de Agricultura**, Piracicaba, v. 71, p. 187-193, 1996.

MARTINS, I.S.; MARTINS, R. de C.C.; CORREIA, H. de S. Comparação entre seleção combinada e seleção direta em *Eucalyptus grandis*, sob diferentes intensidades de seleção. **Floresta e Ambiente**, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p.36 - 43, jan./dez. 2001.

MIRANDA, M.A.C.; BRAGA, N.R.; MIRANDA, F.T.S.; UNEDA, S.H.; LOURENÇÃO, A.L.; ITO, M.F. IAC-23 e IAC-24: cultivares de soja resistentes a insetos para o estado de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 2001, Goiânia. **Anais...** Goiânia: SBMP, 2001. p. 12.

MIRANDA, M.A.C.; LOURENÇÃO, A.L. Melhoramento genético da soja para a resistência a insetos: uma realidade para aumentar a eficiência do controle integrado de pragas e viabilizar a soja orgânica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA E MERCOSOJA, 2., 2002, Londrina. **Anais...** Londrina: Embrapa-Soja, 2002. p. 52-60.

MISSÃO, M.R. Soja: origem, classificação, utilização e uma visão abrangente do mercado. **Revista de Ciências Empresariais**, Umuarama, v. 3, n.1, p.7-15, 2006.

MÖLLER, M. **Mapeamento de locos de resistência quantitativa da soja ao complexo de percevejos**. 2010. 86p. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.

MONTGOMERY, D.C.; PECK, E.A. **Introduction to linear regression analysis**. New York: John Wiley, 1981. 504 p.

MOURA, M.F. **Avaliação de linhagens de soja (*Glycine max* (L.) Merrill) visando adaptação às condições de cerrado e resistência a insetos.** 156p. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 1999.

MULAMBA, N.N.; MOCK, J.J. Improvement of yield potential of the Eto Blanco maize (*Zea mays* L.) population by breeding for plant traits. **Egyptian Journal of Genetics and Cytology**, Alexandria, v.7, p.40-51, 1978.

MULATO, B.M. **Diversidade genética em germoplasma de soja identificada por marcadores SSR, EST-SSR e caracteres agromorfológicos.** 2009. 86p. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2009.

MURTY, B.R.; ARUNACHALAM, V. The nature of divergence in relation to breeding system in some crop plants. **Indian Journal of Genetics and Plant Breeding**, New Delhi, v.26, n.2, p.188-198, 1966.

MUSSER, F.R. CATCHOT, A.L.; GIBSON, B.K.; KNIGHTEN, K.S. Economic injury levels for southern green stink bugs (Hemiptera: Pentatomidae) in R7 growth stage soybeans. **Crop Protection**, Amsterdam, v. 30, n. 1, p. 63-69, 2011.

MUSSER, F.R.; CATCHOT, A.L. Mississippi soybean insect losses. **Midsouth Entomologist**, Mississippi, v. 1, p. 29-36, 2008.

MUSSER, F.R.; LORENZ, G.M.; STEWART, S.D.; CATCHOT, JR, L. Soybean Insect Losses for Mississippi, Tennessee, and Arkansas. **Midsouth Entomologist**, Mississippi, v. 4, p. 22-28, 2010.

NASS, L.L. Utilização de recursos genéticos vegetais no melhoramento. In: NASS, L.L.; VALOIS, A.C.C.; MELO, I.S.; VALADARES-INGLIS, M.C. (Ed.). **Recursos genéticos e melhoramento de plantas**. Rondonópolis: Fundação MT, 2001. cap. 2, p. 29-56.

NASS, L.L.; SIGRIST, M.S. Espécies silvestres: potencial de exploração via pré-melhoramento. In: BORÉM, A.; LOPES, M.T.G.; CLEMENT, C.R. (Ed.). **Domesticação e melhoramento: espécies amazônicas**. Viçosa: Suprema, 2009. p. 101–116.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, TAXONOMY – NCBI. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3847>> Acesso em: 12 mar. 2015.

NETER, J. ; WASSERMAN, W. **Applied linear statistical models**. Homewood: Richard D. Irwin, 1974. 842p.

NUORTEVA, P.; REINIUS, L. Incorporation and spread of C14-labeled oral secretions of wheat bugs in wheat kernels. **Annales Entomologici Fennici**, Helsinki, v. 19, p. 95-104, 1953.

OLIVEIRA, C.B. de. **Estudos quantitativos e moleculares de caracteres de soja (*Glycine max* (L.) Merrill) cultivada em dias curtos**. 1996. 97p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 1996.

OLIVEIRA, E.J.; da SILVA SANTOS, V.; LIMA, D.S.; MACHADO, M.D.; LUCENA, R.S.; MOTTA, T.B.N.; SILVA CASTELLEN, M. Seleção em progênies de maracujazeiro-amarelo com base em índices multivariados. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 43, n. 11, p. 1543-1549, 2008.

OLIVERIA, K.C.; DOMINQUINI, M.R.; PEREIRA, F.B.; SILVA, L.R.; VIEIRA, C.C.; PINHEIRO, J.B. Índice de Seleção em Soja Visando Resistência ao Complexo de Percevejos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 2013, Uberlândia, **Anais...** Uberlândia: SBMP, 2013.

PAINTER, R.H. **Insect resistance in crop plants**. New York: Macmillan, 1951. 520p.

PANIZZI, A.R.; PANIZZI, M.C.C.; BAYS, I.A.; ALMEIDA, L.A. Danos por percevejos em genótipos de soja com semente pequena. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 21, n. 6, p. 571-577, 1986.

PANIZZI, A.R.; SLANSKY JUNIOR, F. Review os phytophagous pentatomids (Hemiptera: Pentatomidae) associated with soybean in the Americas. **Florida Entomologist**, Lutz, v. 68, p. 184-214, 1985.

PANIZZI, A.R. Ecologia nutricional de insetos sugadores de sementes. In: PANIZZI, A.R.; PARRA, J.R.P. (Ed.) **Ecologia nutricional de insetos e suas implicações no manejo de pragas**. Brasília: Manole, 1991. cap. 7, p. 253–287.

PANIZZI, A.R.; BUENO, A.F.; SILVA, F.A.C. Insetos que atacam vagens e grãos. In: HOFFMANN-CAMPO, C.B.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; MOSCARDI, F. **Soja manejo integrado de insetos e outros artrópodes-praga**. Londrina: Embrapa Soja, 2012. cap. 5, p. 335-420.

PANIZZI, A.R.; SILVA, F.A.C. Insetos sugadores de sementes (Heteroptera). In: PANIZZI, A.R.; PARRA, J.R.P. (Ed.). **Bioecologia e nutrição de insetos**. Brasília: Embrapa, 2009. cap. 12, p 465–522.

PATERNIANI, E.; MIRANDA FILHO, J.B. Melhoramento de populações. In: PATERNIANI, E.; VEIGAS, G.P. (Coord.). **Melhoramento e produção de milho no Brasil**. Campinas: Fundação Cargill, 1987. v.1, p.217-274.

PAULA, R.C.; PIRES, I.E.; BORGES, R.D.C.G.; CRUZ, C.D. Predição de ganhos genéticos em melhoramento florestal. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 37, n. 2, p. 159-165, 2002.

PAULA, R.C. **Avaliação de diferentes critérios de seleção aplicados em melhoramento florestal**. 1997. 74p. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 1997.

PELÚZIO, J.B. **Utilização de métodos multivariados na seleção de milho**. 1999. 119p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 1999.

PINHEIRO, J.B. **Dialelo parcial entre parentais de soja resistentes e suscetíveis a insetos**. 1993. 143 p. Dissertação de mestrado (Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1993.

PINHEIRO, J.B.; VELLO, N.A.; ROSSETTO, C.J.; ZUCCHI, M.I.; Potential of soybean genotypes as insect resistance sources. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, Viçosa, v. 5, p. 293-300, 2005.

PIUBELLI, G.C.; HOFFMANN-CAMPO, C.B.; MOSCARDI, F.; MIYAKUBO, S.H.; DE OLIVEIRA, M.C. Are chemical compounds important for soybean resistance to *Anticarsia gemmatilis*? **Journal of Chemical Ecology**, Verlag, v. 31, n. 7, p. 1509–1524, 2005.

PRIOLLI, R.H.G.; MENDES-JUNIOR, C.T.; ARANTES, N.E.; CONTEL, E.P.B. Characterization of Brazilian soybean cultivars using microsatellite markers. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 25, p. 185-193, 2002.

PRIOLLI, R.H.G.; WYSMIERSKI, P.T.; CUNHA, C.P.; PINHEIRO, J.B.; VELLO, N.A. Genetic structure and selected core set of Brazilian soybean cultivars. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 36, p. 382-390, 2013.

PRIOLLI, R.H.G.; PINHEIRO, J.B.; ZUCCHI, M.I.; BAJAY, M.M.; VELLO, N.A. Genetic diversity among Brazilian soybean cultivars based on SSR loci and pedigree data. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, Curitiba, v. 53, p. 519-531, 2010.

RAMOS, C. **A Potencialidade da Soja na Economia Brasileira**, 2013. Disponível em: <<http://www.jornalestrondo.com.br/a-potencialidade-da-soja-na-economia-brasileira/>>. Acesso em: 26 jan. 2015.

RANGEL, R.M.; AMARAL JÚNIOR, A.; GONÇALVES, L.S.A.; FREITAS JÚNIOR, S.; CANDIDO, L.S. Análise biométrica de ganhos por seleção em população de milho pipoca de quinto ciclo de seleção recorrente. **Revista Ciência Agronômica**, Fortaleza, v. 42, n. 2, p. 473-481, 2011.

RAO, K.V.; CHATTOPADHYAY, S.K.; REDDY, G.C. Flavonoids with mosquito larval toxicity. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, Freising, v. 38, p. 1427-1430, 1990.

RECTOR, B.G.; ALL, J.N.; PARROTT, W.A.; BOERMA, H.R. Quantitative trait loci for antibiosis resistance to corn earworm in soybean. **Crop Science**, Madison, v.40, n.1, p.233-238, 2000.

ROBINSON, P. Heritability: a second look. In: HANSON, W.D.; ROBINSON, H.F. **Statistical genetics and plant breeding**. Washington: NAS-NCR, 1963. p.609-614.

ROCHA, F da. **Seleção de genótipos de soja para resistência ao complexo de percevejos**. 2015. 81p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2015.

ROCHA, F.; BERMUDEZ, F.; FERREIRA, M.C.; OLIVEIRA, K.C.; PINHEIRO, J.B. Effective selection criteria for assessing the resistance of stink bugs complex in soybean. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, Viçosa-MG, v. 14, p. 174-179, 2014.

ROGGIA, S.; CORRÊA-FERREIRA, B.S.; BUENO, A.F.; ALVES, J.B. Efeito de inseticidas reguladores de crescimento sobre a sobrevivência, desempenho reprodutivo e atividade alimentar do percevejo marrom da soja. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 32., 2011. São Pedro. **Resumos...** Londrina: Embrapa Soja, 2011. Resumo 44.

ROSADO, L.D.S.; SANTOS, C.E.M.D.; BRUCKNER, C.H.; NUNES, E.S.; CRUZ, C.D. Simultaneous selection in progenies of yellow passion fruit using selection indices. **Revista Ceres**, Viçosa-MG, v. 59, p. 95-101, 2012.

ROSSETTO, C.J. Breeding for resistance to stink bugs. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 4., 1989. Buenos Aires. **Proceedings...** Buenos Aires: Asociacion Argentina de la Soja Press. 1989. v. 4, p. 2046-2060.

ROSSETTO, C.J.; GALLO, P.B.; RAZERA, L.F.; BORTOLETTO, N.; IGUE, T.; MEDINA, P.F.; TISSELI, FILHO, O.; AQUILERA, V.; VEIGA, R.F.A.; PINHEIRO, J.B. Mechanisms of resistance to stink bug complex in the soybean cultivar IAC-100. **Anais da Sociedade Entomológica do Brasil**, Jaboticabal, v. 24, n. 3, p. 517-522, 1995.

ROSSETTO, C.J.; IGUE, T.; MIRANDA, M.A.C.; LOURENÇÃO, A.L. Resistência de soja a insetos: VI. Comportamento de genótipos em relação a percevejos. **Bragantia**, Campinas, v.45, n. 2, p.323-335, 1986.

ROSSETTO, C.J.; LARA, F.M. Diluição de dano, mecanismo de pseudoresistência. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13,1991, Recife. **Resumos...** Recife: Sociedade Entomológica do Brasil, 1991. p. 525.

ROSSETTO, C.J.; LOURENÇÃO, A.L. Picadas de alimentação de *Nezara viridula* em cultivares e linhagens de soja de diferentes graus de suscetibilidade. **Bragantia**, Campinas, v.40, n.1, p.109-114, 1981b.

ROSSETTO, C.J.; NAGAI, V.; IGUE, T.; ROSSETTO, D.; MIRANDA, M.A.C. Preferência de alimentação de adultos de *Diabrotica speciosa* (Germar) e *Cerotoma arcuata* (Oliv.) em variedades de soja. **Bragantia**, Campinas, v.40, n.1, p. 179-183, 1981a.

RUSSIN, J.; ORR, D.B.; LAYTON, M.B.; BOETHEL, D.J. Incidence of microorganisms in soybean seeds damaged by stink bug feeding. **Phytopathology**, Saint Paul, v.78, n.3, p.306-310, 1988.

SANTOS, M.F. **Mapeamento de QTL e expressão gênica associados à resistência da soja ao complexo de percevejos**. 2012. 119p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2012.

SAS INSTITUTE. **The SAS system for Windows**, version 9.2. SAS Institute Inc, Cary. 2007.

SEARLE, S.P.; CASELA, G.; MacCULLOCK. **Variance components**. New York: John Wiley, 1992. 501 p.

SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R.C.; REIS, M.S. Melhoramento de soja. In: BOREM, A. (Ed.) **Melhoramento de plantas cultivadas**. Viçosa: UFV. 2. ed. 2005. p. 553-604.

SHRIVASTAVA, M.N; SHARMA, K.K. Analysis of path coefficients in rice. **Zeitschrift fuer Pflanzenzuechtung**, Berlin, v. 77, p. 174-177, 1976.

SILVA, J.P.G.F.; BALDIN, E.L.L.; SOUZA, E.S.; CANASSA, V.F.; LOURENÇO, A.L. Characterization of antibiosis to the redbanded stink bug *Piezodorus guildinii* (Hemiptera: Pentatomidae) in soybean entries. **Journal of Pest Science**, Berlin, v. 86, n.4, p. 649-657, 2013.

SMITH, C.M. **Plant resistance to arthropods molecular and conventional approaches**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2005. 423p.

SOSA-GÓMEZ, D.R.; MOSCARDI, F. Retenção foliar diferencial em soja provocada por percevejos (Heteroptera: Pentatomidae). **Anais da Sociedade Entomológica do Brasil**, Londrina, v.24, n.2, p.401-404, 1995.

SOUZA, E.S.; BALDIN, E.L.P.; SILVA, J.P.G.F.; LOURENÇO, A.L. Feeding preference of *Nezara viridula* (Hemiptera: Pentatomidae) and attractiveness of soybean genotypes. **Chilean Journal of Agricultural Research**, Chillán, v.73, n.4, p. 351-357, 2013.

SOUZA, J. **Métodos estatísticos nas ciências psicossociais: análise de componentes principais**. Brasília: Thesaurus, 1988. 633p.

SOUZA, R.F.; TOLEDO, J.F.F. Genetic analysis of soybean resistance to stink bug. **Brazilian Journal of Genetic**, Ribeirão Preto, v. 18, n. 4, p. 593-598, 1995.

STEEL, R.G.D.; TORRIE, J.H. **Principles and procedures of statistics**. New York: McGraw-Hill Book, 1980. 633 p.

SUBANDI; COMPTON, W.A.; EMPIG, L.T. Comparison of the efficiencies of selection indices for three traits in two variety crosses of corn. **Crop Science**, Madison, v. 13, p. 184-186, 1973.

TEIXEIRA, D.H.L.; DE OLIVEIRA, M.D.S.P.; GONÇALVES, F.M.A.; NUNES, J.A.R. Índices de seleção no aprimoramento simultâneo dos componentes da produção de frutos em açaizeiro. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 47, n. 2, p. 237-243, 2012.

TEMPLE, J.H.; DAVIS, J.A.; HARDKE, J.T.; MOORE, J.; LEONARD, B.R. Susceptibility of Southern Green Stink Bug and Redbanded Stink Bug to Insecticides in Soybean Field Experiments and Laboratory Bioassays. **Southwestern Entomologist**, Washington, v. 38, n. 3, p. 393-406, 2013b.

TEMPLE, J.H.; DAVIS, J.A.; MICINSKI, S.; HARDKE, J.T.; PRICE, P.; LEONARD, B.R. Species Composition and Seasonal Abundance of Stink Bugs (Hemiptera: Pentatomidae) in Louisiana Soybean. **Environmental Entomology**, Annapolis, v. 42, n. 4, p. 648-657, 2013a.

TODD, J.W.; HERZOG, D.C. Sampling phytophagous Pentatomidae on soybean. In: KOGAN, M.; HERZOG, D.C. (Ed.). **Sampling methods in soybean entomology**. New York: Springer, 1980. p. 438-478.

TURNIPSEED, S.G.; KOGAN, M. Soybean entomology. **Annual Review of Entomology**, Stanford, v. 21, n. 1, p. 247-282, 1976.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – U.S.D.A. **World Agricultural Supply and Demand Estimates**. 10 de junho de 2015. Disponível em: <<http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf>>. Acesso em: 12 jun. 2015.

VEIGA, R.F.A.; ROSSETO, C.J.; RAZERA, L.F.; GALLO, P.B.; BORTOLETO, N.; MEDINA, P.F.; TISSELLI FILHO, O.; CIONE J. **Caracterização morfológica e agrônômica do cultivar de soja IAC-100**. São Paulo: Instituto Agrônômico de Campinas, 1999. 23p. (Boletim Técnico, 177).

VENCOVSKY, R.; BARRIGA, P. **Genética biométrica aplicada ao fitomelhoramento**. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1992. 496 p.

VENDRAMIM, J.D.; NISHIKAWA, M.A.N. Melhoramento para resistência a insetos. In: NASS, L.L.; VALOIS, A.C.C.; MELO, I.S.; VALADARES-INGLIS, M.C. (Eds.) **Recursos genéticos e melhoramento** – plantas. Rondonópolis, MT. Fundação MT. 2001. cap. 24, p. 737-782.

VENTURA, M.U.; PINHEIRO, J.B. Resistência a insetos. In: DESTRO, D.; MONTALVÁN, R. (Org.). **Melhoramento genético de plantas**. Londrina: UEL, 1999. p. 467-516.

WRIGHT, S. Correlation and causation. **Journal of Agricultural Research**, Lahore, v. 20, p. 557-585, 1921.

WRIGHT, S. The theory of path coefficients – a replay to Niles' criticism. **Genetics**, Austin, v. 8, p. 239-255, 1923.

WYSMIERSKI, P.T.; VALLO, N.A. The genetic base of Brazilian soybean cultivars: evolution over time and breeding implications. **Genetics and Molecular Biology**, Ribeirão Preto, v. 36, p. 547-555, 2013.

XU, B.; ZHEN, H.; LU, Q.; ZHAO, S. Three new evidences of the original area of soybean. In: WORLD SOYBEAN RESEARCH CONFERENCE, 4., Buenos Aires. **Proceedings...** Buenos Aires: AASOJA, 1989. , p. 123-130