EFEITO DE BICARBONATO DE SÓDIO, LASALOCIDA E CANA-DE-
AÇÚCAR SOBRE O DESEMPENHO DE BOVINOS ALIMENTADOS COM
BAGAÇO DE CANA TRATADO SOB PRESSÃO DE VAPOR.

FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS
Engenheiro Agrônomo

Orientador: Prof. Dr.
VIDAL PEDROSO DE FARIA

Dissertação apresentada à Escola
Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz" da Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de
Mestre em Agronomia, Área de
Concentração: Nutrição Animal e
Pastagens.

PIRACICABA
Estado de São Paulo - Brasil
Janeiro - 1991

EFEITO DE BICARBONATO DE SÓDIO, LASALOCIDA E CANA-DE-
AÇÚCAR SOBRE O DESEMPENHO DE BOVINOS ALIMENTADOS COM
BAGAÇO DE CANA TRATADO SOB PRESSÃO DE VAPOR.

FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS

Aprovada em 22:03.1991

Comissão julgadora:

Prof. Dr. Vidal Pedroso de Faria

ESALQ/USP

Prof. Dr. Celso Boin

ESALQ/USP

Prof. Dr. Pedro de Andrade

FCAVJ/UNESP

Prof. Dr. Vidal Pedroso de Faria

Orientador

Aos meus pais

JOSÉ E VERA

DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Vidal Pedroso de Faria, pela amizade, orientação dedicada e incentivo permanente.

Ao Prof. Dr. Celso Boin, pelo apoio, sugestões e orientação durante a elaboração e condução do trabalho.

Ao Prof. Alexandre Vaz Pires, pela amizade, incentivo e colaboração.

Aos Profs. Moacyr Corsi e Max L. V. Bose, pela amizade e orientação profissional.

Aos amigos Sila Carneiro da Silva, Luiz Gustavo Nussio e Marco Antonio Pennati, pelo incentivo e colaboração.

Aos estagiários Heitor Machado de Campos Neto, Luis Gustavo Barioni, José Carlos P. Carramate, Ednir José Gaspar e Laura Maria Vieira da Silva, que tornaram possível a execução do trabalho.

À Plano Consultoria pela colaboração, amizade e auxílio na obtenção de recursos.

À Destilaria Alcídia S/A, de Teodoro Sampaio, S.P., pelo auxílio na obtenção de recursos.

À Roche do Brasil pelo auxílio na obtenção de recursos.

A João Elias de Lara pelo trabalho de digitação e composição gráfica da Tese.

Ao Laboratório de Bromatologia do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP, pelas análises realizadas.

SUMÁRIO

	Página
LISTA DE TABELAS	vii
LISTA DE TABELAS DO APÊNDICE	ix
RESUMO	x
SUMMARY	xiii
1. INTRODUÇÃO	1
2. REVISÃO DE LITERATURA	3
2.1. Potencial do BTPV na alimentação de ruminan- tes	3
2.2. Uso de agentes tamponantes	10
2.2.1. Considerações gerais	10
2.2.2. Efeito sobre os parâmetros ruminais ...	12
2.2.3. Efeito de trato digestivo inferior	18
2.2.4. Efeito sobre o desempenho animal	20
2.3. Uso de ionóforos	24
2.3.1. Considerações Gerais	24
2.3.2. Mecanismo básico de ação dos ionóforos sobre os microrganismo ruminais	27
2.3.3. Alterações no rúmen e ação sobre utili- zação de energia e metabolismo proteico	35
2.3.4. Efeito sobre o consumo, a digestibilida- de e a taxa de passagem	40
2.3.5. Outros efeitos dos ionóforos	43
2.3.6. Desempenho animal	46

3. MATERIAIS E MÉTODOS	49
3.1. Hipóteses de trabalho	49
3.2. Local e animais	51
3.3. Tratamentos	52
3.4. Condução do experimento	56
3.4.1. Período pré-experimental	56
3.4.2. Período experimental	56
3.4.3. Coleta de dados	57
3.5. Delineamento experimental	59
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	62
4.1. Consumo de matéria seca	62
4.1.1. Nível e comportamento de consumo	62
4.1.2. Efeito das dietas sobre o consumo	69
4.2. Ganho de peso vivo diário	83
4.2.1. Nível e comportamento de ganho de peso	83
4.2.2. Efeito das dietas sobre o ganho de peso	86
4.3. Conversão alimentar	96
5. CONCLUSÃO	106
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	108
APÊNDICE	117

LISTA DE TABELAS

	Página
Tabela 1. Formulação dos concentrados usados no experimento	53
Tabela 2. Proporção dos ingredientes nas dietas experimentais	54
Tabela 3. Composição estimada dos alimentos utilizados, expressa em base de matéria seca	54
Tabela 4. Composição estimada das dietas experimentais expressa em base de matéria seca.....	55
Tabela 5. Efeito das dietas sobre o consumo diário de MS estimado	62
Tabela 6. Consumo diário de nutrientes por um bovino (macho) médio de 393 Kg, e por um bovino (fêmea) médio de 335 Kg comparado com suas exigências nutricionais	66
Tabela 7. Efeito do sexo e do sub-período experimental sobre o consumo de matéria seca	68
Tabela 8. Efeito das dietas e dos sub-períodos sobre o consumo de MS	69
Tabela 9. Efeito do sexo e das dietas sobre o consumo de matéria seca	71
Tabela 10. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre o consumo das dietas A e B	72

Tabela 11. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimen	
taís sobre o consumo das dietas B e D	76
Tabela 12. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimen	
taís sobre o consumo das dieta A e D	78
Tabela 13. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimen	
taís sobre o consumo das dietas C e D ...	83
Tabela 14. Ganho de peso diário de machos e fêmeas ...	84
Tabela 15. Efeito do sexo e das dietas sobre o ganho	
de peso	87
Tabela 16. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimen	
taís sobre o ganho de peso nas dietas A e	
B	88
Tabela 17. Efeito das dietas e dos sub-períodos sobre	
o ganho de peso	90
Tabela 18. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimen	
taís sobre o ganho de peso nas dietas B e	
D	92
Tabela 19. Efeito do sexo e do sub-período experimen	
tal sobre o consumo de matéria seca	97
Tabela 20. Efeito das dietas e dos sub-períodos sobre	
a conversão alimentar	100
Tabela 21. Efeito do sexo e das dietas sobre a conver	
são alimentar	101

LISTA DE TABELAS DO APÊNDICE

	Página
Tabela 1. Análise de variância para consumo de matéria seca por (g/Kg $PV^{0,75}$)	118
Tabela 2. Análise de variância para ganho de peso em (Kg/cab/dia)	119
Tabela 3. Análise de variância para conversão alimen- tar	120
Tabela 4. Planilha de dados usados para a análise de consumo (CPM) e conversão alimentar (CA) ...	121
Tabela 5. Planilha de dados usados para a análise de ganho de peso corrigido para o peso vivo inicial	124

EFEITO DE BICARBONATO DE SÓDIO, LASALOCIDA E CANA-DE-
AÇÚCAR SOBRE O DESEMPENHO DE BOVINOS ALIMENTADOS COM
BAGAÇO DE CANA TRATADO SOB PRESSÃO DE VAPOR.

Autor: FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS
Orientador: Prof. Dr. VIDAL PEDROSO DE FARIA

RESUMO

O experimento foi conduzido para avaliar o efeito do NaHCO_3 (1% na matéria seca), da lasalocida sódica (20 a 30 ppm da matéria seca), e da ausência de cana-de-açúcar como fonte de fibra íntegra para bovinos confinados recebendo dietas à base de bagaço de cana tratado sob pressão de vapor (BTPV). Foram utilizados 40 animais da raça nelore com peso vivo médio inicial de 329 Kg e idade inicial de 18,9 meses, sendo 24 machos e 16 fêmeas. O delineamento estatístico usado foi o fatorial em blocos casualizados, constando de 3 blocos, 4 dietas, 2 sexos e 5 sub-períodos experimentais. As 4 dietas utilizadas foram: A (50% BTPV, 10% de cana picada e 40% de concentrado, base seca); B (50% BTPV, 10% de cana picada, 40% de concentrado e lasalocida sódica); C (60% BTPV, 40% de concentrado, lasalocida sódica e NaHCO_3) e D (50% BTPV, 10% de cana picada, 40% de concentrado, lasalocida sódica e NaHCO_3). Todas as dietas eram isoproteicas (12,76 a 13,77% PB) e isoenergéticas (58,8 a 60,4% de NDT), apresentando 0,27 a 0,36% de Ca e 0,13 a 0,14% de P. Mistura

mineral à vontade foi oferecida continuamente. O período pré-experimental foi de 25 dias e o experimental teve duração de 66 dias. O consumo de matéria seca ($\text{g/Kg PV}^{0,75}$), ganho de peso (Kg) e conversão alimentar para as dietas foram: A: 135,53, 1,15, 11,47; B: 129,07, 1,17, 10,92; C: 130,02, 1,18, 10,14; D: 139, 71, 1,30, 10,50. A adição de lasalocida sódica reduziu o consumo de matéria seca sem afetar o ganho de peso, havendo tendência de melhorar a conversão alimentar. A adição de bicarbonato de sódio em presença de lasalocida aumentou o consumo de matéria seca, havendo tendência de melhorar o ganho de peso e a conversão alimentar nos primeiros 56 dias do período experimental. Após esta fase, o NaHCO_3 prejudicou o desempenho animal. O efeito depressivo da lasalocida sódica sobre o consumo de matéria seca e o desempenho animal na fase inicial de fornecimento foi reduzido ou anulado pelo NaHCO_3 . A associação NaHCO_3 e lasalocida sódica aumentou o consumo de matéria seca, havendo tendência de melhorar o ganho de peso e a conversão alimentar nos primeiros 56 dias de fornecimento. Após esta fase a associação NaHCO_3 e lasalocida prejudicou o desempenho animal. A ausência de cana picada reduziu o consumo de matéria seca, havendo tendência de piorar o ganho de peso, porém a conversão alimentar não foi afetada. De modo geral a associação do bicarbonato de sódio com a lasalocida sódica parece ser benéfica em dietas à base de BTPV enquanto a adição de cana picada só se justifica quando se pretende estimular o consumo da dieta. Os machos ganharam significativamente mais peso, e foram mais

eficientes que as fêmeas, que consumiram mais alimento por unidade de peso metabólico. O ganho de peso médio foi elevado sendo obtido para machos 1,33 Kg e para as fêmeas 1,06 Kg, sendo proposto a possível existência de efeito compensatório no ganho. Houve efeito significativo de período e em todas as variáveis estudadas, ocorrendo com o tempo no consumo e ganho de peso tendência de redução, e na conversão alimentar tendência de piora. Não foram detectadas interações significativas entre as variáveis estudadas a não ser entre período e tratamento para conversão alimentar.

EFFECT OF SODIUM BICARBONATE, SODIUM LASALOCID AND SUGAR
CANE ON THE PERFORMANCE OF BOVINES FED DIETS BASED ON
STEAM PRESSURE TREATED SUGARCANE BAGASSE.

Author: FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS

Adviser: VIDAL PEDROSO DE FARIA, Dr.

SUMMARY

One trial was conducted to determine the effect of sodium bicarbonate (1% of DM), sodium lasalocid (20 to 30 ppm of DM), and chopped sugar cane (10% of DM) on the performance of growing and finishing beef yearling bulls and heifers fed steam pressure treated sugarcane bagasse (SPTB) diets. Forty animals (26 nelores yearling bulls and 14 heifers) aging 18,9 months and showing initial weigh of 329Kg were used in a randomized block factorial design with 3 blocks, 4 diets, 2 sexes and 5 experimental periods (10 to 14 days). Diets used on a dry bases were: A (50% SPTB, 10% sugar cane and 40% concentrate); B (50% SPTB, 10% sugar cane, 40% concentrate and lasalocid); C (60% SPTB, 40% concentrate, lasalocid and sodium bicarbonate); D (50% SPTB; 10% sugar cane, 40% concentrate, lasalocid and sodium bicarbonate). All

diets were isonitrogenous (12-13% CP) and isocaloric (59-60% TDN), presenting 0,27 a 0,36% Ca and 0,14% P. Free choice mineral mixture was offered continuously. Preliminary period was 25 days and the experimental 66 days. Average dry matter intake (g/Kg PV^{0,75}), daily gain (Kg) and feed conversion (Kg DM/Kg gain) were: A: 135,53, 1,15, 11,47; B: 129,07, 1,17, 10,92; C: 130,02, 1,18, 10,14; D: 139, 71, 1,30, 10,50. The addition of sodium lasalocid decreased dry matter intake but did not affect daily gain; there was tendency to improve feed conversion. The addition of sodium bicarbonate and sodium lasalocid increased dry matter intake, and there was a tendency. to improve daily gain and feed conversion only in the first 56 days of the experimental period. After this point sodium bicarbonate reduced animal performance. Sodium bicarbonate reduced or annulled the negative effect of sodium lasalocid on dry matter intake, daily gain and feed conversion in the first period. The association of sodium bicarbonate and sodium lasalocid increased dry matter intake, and there was a tendency to improve daily gain and feed conversion in the first 56 days of the experimental period. After this phase, its effect was negative. No addition of sugar cane reduced dry matter intake, and there was tendency to reduce daily gain, but feed conversion was not affected. Yearling bulls showed faster gains and were more efficient than heifers which had a higher dry matter intake (g/Kg PV^{0,75}). Both yearling bulls (1,33 Kg) and heifers (1,06 Kg) average daily gains were high, and it was suggested that

there was compensatory growth occurre. There was a significant effect of period and it was observed from the beggining to the end a tendency for reduced dry matter intake and daily gain and higher values for feed conversion. There was a significant interaction between period and treatment for feed conversion.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de resíduos agro-industriais na alimentação de ruminantes tem despertado o interesse de diversos pesquisadores no mundo todo durante os últimos anos. Um melhor aproveitamento das áreas e produtos agrícolas, assim como a redução da competição entre ruminantes e o homem por áreas e produtos alimentícios nobres, são aspectos discutidos por estudiosos no assunto.

O principal resíduo lignocelulósico produzido no Brasil é o bagaço de cana-de-açúcar. Proveniente da moagem da cana, o bagaço se apresenta como um alimento de baixo valor nutritivo, limitando o desempenho animal quando ultrapassa 30 a 40% da matéria seca da dieta. Com a finalidade de melhorar o valor nutritivo deste resíduo, o tratamento sob pressão de vapor vem sendo bastante utilizado pela indústria sucro-alcooleira.

O bagaço de cana-de-açúcar tratado sob pressão de vapor (BTPV) apresenta características bem distintas do material original, tais como: a) maior digestibilidade; b) maior teor de carboidratos solúveis; c) maior acidez; d) maior friabilidade; e) menor tamanho de partícula. Por ser um

alimento bastante ácido, com pH entre 2,8 a 3,6, bastante friável e com partículas de tamanho reduzido, é de se supor que o pH ruminal característico em dietas à base de BTPV seja desfavorável à degradação da sua fração fibrosa. Distúrbios metabólicos como acidose e timpanismo também poderiam ocorrer, prejudicando o desempenho animal.

Vários trabalhos de pesquisa têm mostrado o efeito benéfico do uso de agentes tamponantes, evitando a queda brusca do pH ruminal em animais recebendo dietas ricas em grãos ou à base de alimentos ácidos como a silagem. Ionóforos também têm se mostrado eficientes em evitar queda brusca do pH ruminal, em reduzir a incidência de timpanismo e em aumentar a eficiência de utilização do alimento, resultando em melhor desempenho animal.

O presente trabalho teve por finalidade avaliar o efeito da adição de bicarbonato de sódio, lasalocida sódica e a ausência de cana-de-açúcar como fonte de fibra íntegra no desempenho de bovinos confinados, recebendo dietas à base de BTPV.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Potencial do BTPV na Alimentação de Ruminantes

Com a implantação do Pró-álcool no Brasil, ocorreu inicialmente uma grande expansão das destilarias anexas às usinas e, em uma segunda fase, a implantação de destilarias autônomas. Estas, com uma tecnologia mais avançada, principalmente quanto à geração de vapor, conseguem obter uma maior sobra de bagaço por tonelada de cana moída, o que inicialmente tornou-se um fator de custo. Estudos foram então realizados com a finalidade de dar um destino econômico ao bagaço (RUAS, 1989). Geração de energia, produção de papel, chapas e aglomerados e alimentação animal, são algumas das alternativas para a utilização do bagaço de cana-de-açúcar, que vem deixando de ser considerado um resíduo problema para se transformar em um sub-produto com importante valor comercial (BURGI, 1987; RUAS, 1989).

Nas regiões industrializadas existe mercado para o bagaço de cana-de-açúcar, que é utilizado principalmente como fonte de energia por outras indústrias, sendo que o valor alcançado pela tonelada de bagaço pode chegar a se igualar ou até mesmo superar o preço da tonelada

de cana (BURGI, 1987). Durante a safra de 1987/1988, o preço médio obtido pela tonelada de bagaço no estado de São Paulo foi de 75 a 80% do preço da tonelada de cana colocada na usina (RUAS, 1989). As usinas e destilarias localizadas longe dos centros industriais dificilmente conseguem comercializar as sobras de bagaço, e quando o fazem, o preço obtido é bem inferior ao mencionado anteriormente (RUAS, 1989).

O interesse na utilização das sobras de bagaço na alimentação animal vem crescendo nos últimos anos, pois muitas destilarias de álcool foram instaladas em regiões tipicamente de pecuária de corte, sendo os sócios e fornecedores dessas destilarias, em sua maioria, pessoas ligadas à atividade pecuária (BURGI, 1987). Além disso, com a atual crise do Pró-Alcool, existe uma tendência de diversificação das atividades da indústria sucroalcooleira e o aproveitamento do bagaço aparece como uma das opções para essa diversificação.

Na atualidade, o bagaço de cana tratado sob pressão de vapor (BTPV) vem sendo utilizado principalmente na engorda de bovinos em confinamentos nas próprias usinas e destilarias. Como essas indústrias têm capacidade para confinar um número bastante grande de animais, a tendência que está se verificando é que as usinas e destilarias têm confinado um determinado número de animais de sua propriedade e oferecido instalação, alimentação e mão-de-obra para a engorda de bois de pecuaristas em um esquema de "prestação de

serviços", que reduz os riscos e o valor do investimento para a aquisição de animais (PLANO CONSULTORIA, 1990).

Uma indústria com capacidade para moer 10.000 toneladas de cana por dia, durante 6 a 8 meses de safra, teria uma sobra de 500 toneladas por dia de bagaço ou 120.000 toneladas por safra. Esta quantia permitiria alimentar aproximadamente 60.000 bois durante 120 dias em regime de confinamento.

Outra opção que vem sendo bastante utilizada é a venda do BTPV ou da própria ração completa (BTPV + concentrado) para pecuaristas com propriedades próximas às indústrias, seja para a engorda em confinamento ou para a suplementação à pasto de vacas de cria e animais em recria. BERCHIELLI et alii (1989), utilizando dietas com 85% de BTPV e 15 % de concentrado na matéria seca, obtiveram ganhos de peso de 0,52 Kg/dia com bovinos de 10 meses de idade pesando em média 200 Kg. Segundo BURGI (1986) o fornecimento diário de 12 Kg de BTPV, 80 g de uréia, e suplemento mineral, pode atender às exigências de manutenção de vacas de cria não lactantes.

Essas práticas podem se tornar interessantes para pecuaristas localizados próximos às usinas e destilarias, desde que o preço do BTPV seja compensador, e possibilitariam explorar intensivamente as pastagens durante o período das chuvas, sem a necessidade de se reservar áreas para a produção de alimentos ou pastejo diferido.

A sobra de bagaço de cana no Brasil situa-se na faixa de 5 a 12 milhões de toneladas por ano (BURGI, 1987). Na hipótese de se contar com 5,5 milhões de toneladas, seria possível alimentar 2.700.000 cabeças durante 120 dias de confinamento. O número oficial de bovinos abatidos diariamente no Brasil situou-se entre 30 a 40 mil durante o ano de 1989 (PREÇOS AGRÍCOLAS, 1989). Com um abate médio de 30.000 cabeças por dia, a engorda de 2.700.000 cabeças poderia suprir o mercado nacional durante os 3 meses críticos do período da entressafra.

O número total de animais confinados no Brasil nos últimos 4 anos tem oscilado entre 300 a 600 mil cabeças (BURGI, 1987), sendo a participação dos animais alimentados com BTPV em torno de 10 a 15% do total.

Resultados de desempenho animal com rações à base de BTPV foram compilados e são apresentados nos dados que se seguem, referentes a confinamentos experimentais.

Referên- cia No	PVi Kg	Dias Confinamento	%BTPV MS	%Outro Volumo so MS	%Con- centra- do MS	GPD Kg	Conversão Kg MS/ Kg GPD	Consumo MS %PV	Consumo MSa Kg PV 0,75
1	363	91	0	14,3	85,7	1,1	9,28	2,47	
	363	91	14	--	86	1,23	8,89	2,6	
	366	91	30	--	70	1,40	8,18	2,7	
	366	91	46	--	54	0,88	11,84	2,6	
2	324,5	72	42,6	26,8	30,6	0,96	10,33	2,8	120
	329,6	72	52,2	17,5	30,3	0,816	12,25	2,8	121
	332	72	61,6	8,6	29,8	0,87	11,62	2,8	122
	333	72	--	70,6	29,4	0,699	9,60	1,84	81,5

Referên- cia HQ	PVi Kg	Dias Confinamento	%BTPV MS	%Outro Volumo so MS	%Con- centra- do MS	Conversão GPD Kg	Kg MS/ Kg GPD	Consumo MS %PV	Consumo MSg, Kg PV, 75
3	389,5	84	50	--	50	1,18	10,99	2,7	
	389,5	84	50	--	50	1,26	9,15	2,59	
	389,5	84	50	--	50	1,28	9,90	2,64	
	389,5	84	50	--	50	1,041	10,73	2,33	
	389,5	84	--	75	25	1,032	12,52	2,99	
4	200	112	85,5	--	15	0,522	9,51	1,93	
	200	112	67,5	--	32,5	0,536	8,34	1,86	
	200	112	50,0	--	50,0	0,934	6,0	2,36	
5	316,5	122	50,0	12,5	37,5	0,58	14,9	2,48	
	316,5	122	50,0	12,5	37,5	0,989	10,3	2,74	
	316,5	122	50,0	12,5	37,5	0,843	11,7	2,68	
6	199	87	54,0	8,0	38,0	0,909	7,41	2,79	109,5
	199	87	53,0	8,0	39,0	0,867	7,24	2,64	104
	* 199	87	53,0	8,0	33,0	1,019	6,97	2,94	116
7	234	126	55	5,0	40	0,93	8,47	--	108,9
	* 234	126	55	5,0	40	0,95	8,66	--	113,12
	* 234	126	55	5,0	40	0,9	8,80	--	114,66
	* 234	126	55	5,0	40	0,89	8,73	--	110,33

6) ² = 1,1% de NaHCO₃ na MS da dieta Fonte:

7) * = 0,5% NaHCO_3 1. PATE (1982) 5. LACORTE (1987)
* = 1,0% NaHCO_3 2. BURGI (1985) 6. LANNA & BOIN (1988)
* = 1,0; 0,5 e 0% de NaHCO_3 durante 3. LIMA & ZANETTI (1989) 7. NUSSIO et alii (1990)
os 3 subperíodos experimentais. 4. BERGHELLI et alii (1989)

Para alguns confinamentos comerciais, os dados obtidos em 1988 são sumarizados a seguir:

Indústria	Dias Confinamento	Cons. MS % PV	GPD Kg	Conv Alim.
Alcidia	112	3,07	0,986	11,73
Vale Rosário	112	2,16	0,993	8,8
Pioneiros	112	2,53	---	---
Goianésia	112	2,63	0,873	11,05
Olho D'água	98	2,99	1,12	10,0
Itapetingui	99	2,61	1,07	9,34

Fonte: PLANO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA (1989)

Os dados apresentados mostram que resultados satisfatórios de desempenho animal podem ser obtidos com rações onde o BTPV representa 50 a 60% da matéria seca. Como mencionado anteriormente, um aspecto que chama a atenção nos trabalhos realizados é o alto consumo de matéria seca obtido em dietas à base de BTPV, da ordem de 2,7 a 2,94% do peso vivo.

O tratamento do bagaço de cana-de-açúcar sob pressão de vapor altera a sua estrutura física, resultando em um alimento com partículas de tamanho reduzido, o que pode aumentar a taxa de passagem pelo rúmen, estimulando um maior consumo. Essa proposição pode ser observada no trabalho realizado por CASTRO (1989), que mostrou também que a taxa de passagem pós-rúmen é menor para o BTPV quando comparado ao bagaço "in natura" (BIN) em função de um menor estímulo ao peristaltismo intestinal. Sob o ponto de vista de aproveitamento da fração fibrosa do BTPV, a alta taxa de passagem ruminal pode ser prejudicial, mas por outro lado, esta característica pode favorecer a utilização do concentrado, que seria menos atacado no rúmen, e portanto digerido no intestino delgado (CASTRO, 1989).

Sendo • BTPV um alimento rico em componentes da parede celular, a sua utilização eficiente pelos ruminantes requer que a fração fibrosa seja degradada a nível de rúmen. Portanto, um ambiente ruminal adequado à atividade das bactérias celulolíticas é fundamental, principalmente no

que se refere a aspectos como pH, nível de amônia, tempo de retenção, disponibilidade de isoácidos e outros fatores (BERGEN & YOKOYAMA, 1977; BALDWIN & ALLISON, 1983; OWENS & GOETSCH, 1984; YOKOYAMA & JOHNSON, 1985).

O crescimento de bactérias celulolíticas é bastante prejudicado quando o pH ruminal cai a valores inferiores a 6,0 (YOKOYAMA e JOHNSON, 1985). Diversos fatores podem afetar o pH ruminal, tais como a produção de saliva, produção e absorção de ácidos graxos voláteis (AGV) e o nível de consumo (WHELLER, 1980). As características físicas do alimento estimulando a ruminação e conseqüentemente a produção de saliva, o próprio pH do alimento e o teor de carboidratos solúveis rapidamente fermentecíveis, também podem afetar o pH ruminal (CASTRO, 1989).

Devido ao tratamento, o BTPV apresenta elevado teor de carboidratos solúveis e elevada acidez, com um valor de pH normalmente entre 2,8 a 3,6 (BURGI, 1987). Em função do tamanho reduzido de partícula e da sua alta friabilidade, o BTPV parece estimular uma baixa atividade de ruminação, resultando em baixa produção de saliva (CASTRO, 1989). Assim sendo, o BTPV poderá apresentar características desfavoráveis à manutenção de um pH ruminal adequado à degradação da sua fração fibrosa. Os dados publicados por COSTA (1987) confirmam estas suposições. Utilizando dietas à base de BTPV, o autor verificou que apesar do pH ruminal médio ser de 6,34, houve variação durante o dia, chegando os valores a

permanecerem abaixo de 6,0 por mais de 6 horas. CASTRO (1989) estudando a degradação da fração fibrosa do BTPV, verificou que o ambiente ruminal com dietas à base de BTPV foi inadequado à eficiente degradação desta fração. Apesar do tratamento sob pressão de vapor elevar acentuadamente a "degradação potencial", a "degradação efetiva" do BTPV permaneceu muito baixa.

Técnicas que melhorem o ambiente ruminal, poderiam favorecer a atividade das bactérias celulolíticas e devem contribuir para aumentar a eficiência de utilização das dietas à base de BTPV por ruminantes. Segundo CASTRO (1989), apesar da elevada taxa de passagem ruminal do BTPV afetar de forma negativa a degradação da sua fração fibrosa, seria mais interessante procurar obter condições ruminais que aumentassem a taxa de degradação do BTPV ao invés de aumentar o tempo de retenção deste alimento no rúmen.

2.2. Uso de agentes tamponantes

2.2.1. Considerações gerais

Um agente tamponante verdadeiro é um sal de um ácido fraco ou de um óxido ou hidróxido, que neutraliza ácidos presentes nos alimentos ou ácidos produzidos durante a digestão e metabolismo dos nutrientes (STAPLES & LOUGH, 1989). A caracterização de um agente tamponante é dada por seu pKa, ou seja, o pH no qual metade dos seus grupos

ionizáveis está ionizado. Agentes tamponantes com mais de um grupo ionizável apresentam um número correspondente de valores de pKa. O poder tamponante é máximo quando o pH do meio é igual ao pKa do agente tamponante. Tais compostos oferecem resistência à variações de pH do meio dentro de mais ou menos uma unidade de pH do seu pKa (ARMENTANO & SOLORZANO, 1988; STAPLES & LOUGH, 1989).

Um agente tamponante verdadeiro deve evitar a queda do pH do meio sem causar a elevação deste, pois compostos que neutralizam ácidos, mas também elevam o pH não são agentes tamponantes verdadeiros, mas sim agentes alcalinizantes (ARMENTANO & SOLORZANO, 1988; STAPLES & LOUGH, 1989).

Compostos solúveis no rúmen, que apresentam um pKa maior ou igual a 6,0, deveriam ser benéficos em dietas ricas em concentrados, como é o caso dos bicarbonatos. Bases fortes ou agentes tamponantes com pKa maior que 7,0, quando usados em doses elevadas, podem ocasionar uma elevação do pH ruminal acima dos níveis desejados (ARMENTANO & SOLORZANO, 1988).

Diversos agentes tamponantes e agentes alcalinizantes vêm sendo testados com a finalidade de melhorar o desempenho de animais ruminantes. Alguns compostos químicos já comprovados como agentes tamponantes verdadeiros no fluido ruminal são: bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio e

bentonita. Outros compostos como carbonato de sódio, carbonato de potássio, óxido de magnésio, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio, têm se mostrado eficientes agentes alcalinizantes (STAPLES & LOUGH, 1989).

As informações abaixo sumarizadas apresentam a solubilidade e o poder tampão do bicarbonato de sódio (agente tamponante) e do carbonato de sódio (agente alcalinizante).

Ítem	Na_2CO_3	NaHCO_3
Poder Tampão (emg/g)	9,77	3,77
Solubilidade (%)		
20 Minutos	48,89	55,14
40 Minutos	68,11	57,04
60 Minutos	56,58	56,72

Fonte: BYERS et alii (1985)

2.2.2. Efeito sobre os parâmetros ruminais

O pH ruminal é função da produção de saliva, acidez da dieta, produção e absorção de ácidos graxos voláteis, nível de consumo e troca de bicarbonato através do epitélio ruminal (WHEELER, 1980). A produção de saliva é essencial para a manutenção do pH ruminal dentro de níveis adequados à atividade de bactérias celulolíticas. A ação tamponante da saliva se deve à ação de certos ânions como bicarbonato, fosfato e cloreto e certos cátions como sódio e

potássio. A secreção de saliva deve ser contínua com a finalidade de evitar grandes variações no pH ruminal durante o dia. No entanto, o pH ruminal não permanece constante o dia todo, diminuindo rapidamente após a alimentação (WHEELER, 1980).

O fornecimento de dietas ricas em concentrados ou de dietas à base de BTPV + concentrado, têm como característica um pequeno estímulo à ruminação, limitando a produção de saliva. Além disso, estimulam uma elevada produção de ácidos graxos voláteis, resultando em condições de pH ruminal desfavoráveis à ação das bactérias celulolíticas (WHEELER, 1980; CASTRO, 1989).

STAPLES & LOUGH (1989), revisando um grande número de trabalhos de pesquisa realizados a partir de 1980, sobre o uso de agentes tamponantes em dietas de vacas de leite, citaram que animais suplementados com bicarbonato de sódio (NaHCO_3) apresentaram maior pH ruminal e maior proporção de ácido acético ruminal, teores mais elevados de gordura no leite, e algumas vezes, digestibilidade maior da fibra que animais controle

Trabalhos conduzidos com animais em crescimento e terminação têm mostrado o efeito tamponante do bicarbonato de sódio no rúmen (WHEELER et alii, 1981b; OKEKE et alii, 1983; BYERS et alii, 1985; STROUD et alii, 1985; TEH et alii, 1985; KOVACIK et alii, 1986; BOERNER et alii, 1987b). Os dados apresentados a seguir sugerem que, com

animais em crescimento e terminação, o pH ruminal é afetado pelo uso de NaHCO_3 somente quando o nível de concentrado na dieta é elevado, ou seja, superior a 60%.

Refe- ren- cia	Concen- trado % na MS	NaHCO_3 % na MS	pH rúmen	taxa de Passagem % h ⁻¹		C2 %	C3 %	Digestibilidade no trato Digestivo Total		
				Sólido	Líquido			MS	ADF ou NDF	Amido
	91	----	6,6	----	----	50,8	32,3	----	----	59
	91	0,9	6,7	----	----	50,6	33,4	----	----	60
	85	----	5,84 ^a	----	----	49,2 ^a	36,6 ^a	66,2	62,1 ^a	85,4 ^b
	85	0,75	6,11 ^b	----	----	45,5 ^b	41,1 ^b	66,5	62,8 ^a	84,6 ^b
2	85	1,50	6,30 ^c	----	----	44,2 ^b	41,9 ^b	66,8	64,9 ^c	83,0 ^a
	50	0	a	5,3 ^a	6,2 ^a	a	----	----	----	----
	50	0,75	a	5,3 ^a	6,2 ^a	a	----	----	----	----
	50	2,50	b	6,5 ^b	8,3 ^b	b	----	----	----	----
3	50	5,0	b	6,6 ^b	8,4 ^b	b	----	----	----	----
	80	0	a	5,0 ^a	6,3 ^a	a	----	----	----	----
	80	0,75	a	5,0 ^a	6,4 ^a	a	----	----	----	----
	80	2,50	b	6,6 ^b	8,9 ^b	b	----	----	----	----
4	80	5,0	b	6,7 ^b	9,0 ^b	b	----	----	----	----
	85	0	6,2	----	14,0	----	----	61,3	33,7	94,2
	85	1,0	6,3	----	13,5	----	----	61,6	33,7	93,0
	84	0	6,17	----	----	----	----	74,5 ^a	74,5	98,6
6	84	0,75	6,64	----	----	----	----	76,9 ^b	79,0	97,8
	87,7	0	5,4 ^a	----	----	53,9	32,4	77,9 ^a	49,2 ^a	94,9
7	84,0	1,0	5,7 ^b	----	----	53,9	30,3	84,6 ^b	66,9 ^b	95,4
8	50	0	a	3,1	5,5	----	----	71,2	58,8	----
	50	1,5	b	2,4	5,8	----	----	71,8	60,5	----
	50	3,0	c	4,7	6,7	----	----	71,7	60,1	----
	50	4,5	d	2,9	5,4	----	----	72,5	61,8	----
9	50	0	6,66 ^a	3,7 ^a	8,7 ^a	66,9 ^a	18,4 ^a	57,0 ^a	51,5 ^a	78,8 ^a
	50	1,0	6,62 ^a	3,9 ^a	8,5 ^a	67,4 ^a	18,1 ^a	56,8 ^a	49,3 ^a	78,0 ^a
	16	0	6,76 ^f	3,4 ^f	7,4 ^f	67,0 ^f	19,5 ^f	57,6 ^f	52,2 ^f	84,1 ^f
	16	1,0	6,80 ^f	3,6 ^f	7,8 ^f	67,2 ^f	19,1 ^f	56,8 ^f	49,9 ^f	82,8 ^f
10	90	0	----	----	----	a	a	70,8 ^a	38,1	87,8
	90	1,0	----	----	----	a	b	71,8 ^a	49,0	90,1
	50	0	----	----	----	a	c	52,6 ^b	47,5	78,5
	50	1,0	----	----	----	a	cd	59,9 ^c	42,5	81,6

Referência	Concentração % na MS	NaHCO ₃ % na MS	pH rúmen	taxa de Passagem % h ⁻¹		C2 % Molar	C3	Digestibilidade no trato Digestivo Total		
				Sólido	Líquido			MS	ADF ou NDF	Amido
11	60	0	6,46	4,5	6,46	----	----	----	----	----
	60	0,8	6,46	4,9	5,24	----	----	----	----	----
12	50	0	5,89	----	----	a	a	52,6 ^a	47,5	78,5
	50	1,0	5,89	----	----	a	a	59,9 ^b	46,2	81,6
	90	0	5,55 ^a	----	----	f	f	70,8	38,1	87,8
	90	1,0	5,61 ^b	----	----	g	f	71,8	49,0	90,1
13	60	0	6,46 ^a	----	6,63	59,5	15,3	----	----	----
	60	1,0	6,66 ^b	----	5,32	58,1	16,1	----	----	----

a,b,c,d na mesma coluna médias seguidas de letras diferentes diferem entre si (P ≤ 0,05).

f,g na mesma coluna médias seguidas de letras diferentes diferem entre si (P ≤ 0,05).

1. RUSSELL et alii (1980)
2. WHEELER et alii (1981b)
3. OKEKE et alii (1983)
4. OKEKE et alii (1983)
5. PEIRCE et alii (1983)
6. JAMES e WOHLT (1985)
7. STROUD et alii (1985)
8. KOVACIK et alii (1986)
9. JACQUES et alii (1986)
10. BOERNER et alii (1987a)
11. TEH et alii (1987)
12. BYERS et alii (1985)
13. TEH et alii (1985)

Quando o bicarbonato entra no rúmen, ele reage com H₃O⁺ dando H₂CO₃ + H₂O elevando assim o pH. No entanto o valor de pH do equilíbrio:

é 6,25, o que leva a concluir que bicarbonato só terá um papel importante como agente tamponante se o pH ruminal for 6,25 ou mais baixo (COUNOTTE et alii, 1979).

A adição de agentes tamponantes em dietas normalmente utilizadas para vacas de leite de alta produção, onde o nível de concentrado tem variado de 50 a 60% da matéria seca, tem resultado em aumento da porcentagem molar de ácido acético e redução na porcentagem molar de ácido

propiónica (DIVEN, 1975a; STAPLES & LOUGH, 1989). Entretanto, essa tendência muitas vezes não é verificada em rações para gado de corte, onde o nível de concentrado é superior a 80% da matéria seca, sendo verificado redução de ácido acético e elevação de ácido propiónico (DIVEN, 1975a). A produção total de ácidos graxos voláteis parece ser pouco afetado pelo uso de agentes tamponantes (DIVEN, 1975a).

A adição de soluções com elevada pressão osmótica tem geralmente elevado a taxa de passagem ruminal de fluidos. Solutos derivados dos alimentos, da saliva e os produtos da fermentação devem elevar a taxa de passagem ruminal de fluidos (OWENS & GOETSCH, 1984). A elevada taxa de passagem ruminal do BTPV verificada por CASTRO (1989), foi apontada pelo autor como um fator prejudicial à sua degradabilidade.

O uso de agentes tamponantes pode acelerar a taxa de passagem ruminal. No entanto, segundo STAPLES & LOUGH (1989), isto só ocorre quando níveis elevados são utilizados. Níveis de bicarbonato de sódio entre 0,8 a 1,0% da matéria seca da dieta normalmente não provocam alterações na cinética de fluidos e sólidos ruminais, de acordo com os dados publicados por OKEKE et alii (1983); PEIRCE et alii (1983); KOVACIK et alii (1986); JACQUES et alii (1986); TEH et alii (1985); TEH et alii (1987); STAPLES & LOUGH (1989).

A adição de bicarbonato de sódio em dietas de ruminantes poderia favorecer a degradação da fração fibrosa

dos alimentos a nível de rúmen, mas os resultados de pesquisa não permitem uma conclusão definitiva sobre o assunto (WHEELER et alii, 1981b; PEIRCE et alii, 1983; JAMES e WOHLT, 1985; BYERS et alii, 1985; STROUD et alii, 1985; KOVACIK et alii, 1986; JACQUES et alii, 1986; BOERNER et alii, 1987a). DIVEN (1975a) afirmou haver pouco ou nenhum efeito de agentes tamponantes na digestibilidade dos alimentos.

A baixa degradação ruminal da fração fibrosa do BTPV deve-se principalmente a um ambiente ruminal desfavorável, em termos de pH (CASTRO, 1989). FRANCISCO Jr. & MACHADO (1990), trabalhando com níveis crescentes de uréia em rações à base de BTPV, obtiveram elevação significativa dos níveis de amônia e pH ruminal, resultando em maior degradação da fração fibrosa do BTPV, indicando que deficiências de nitrogênio também são responsáveis pela pequena ação de microrganismos.

A amônia é a principal fonte de nitrogênio para as bactérias do rúmen que, na presença de cadeias carbônicas, sintetizam os aminoácidos necessários para o seu próprio uso. Acredita-se que 5 a 7 mg de $N-NH_3$ / 100 ml de fluido ruminal sejam requeridas para maximizar a síntese de proteína microbiana de acordo com a revisão apresentada por TAMMINGA (1979) e BONDI (1981). Entretanto, TAMMINGA (1979) relatou que outros autores, verificaram que taxas máximas de fermentação ruminal foram obtidas com níveis de 23,5 mg de $N-NH_3$ /100 ml de fluido ruminal.

A elevação do pH ruminal, através da ação de agentes tamponantes, poderia elevar a solubilidade da proteína, favorecendo a síntese de proteína microbiana e a digestão de fibra de acordo com citações de ARMENTANO & SOLORZANO (1988) e TEH et alii (1987).

A ação de agentes tamponantes sobre a disponibilidade de amônia no rúmen é controvertida, pois a adição de bicarbonato de sódio em níveis entre 0,8 a 1,5% da matéria seca da dieta de novilhos em crescimento não alterou o nível de amônia no rúmen (WHEELER et alii, 1981b; HAALAND & TYRRELL, 1982; TEH et alii, 1987), mas outros trabalhos têm mostrado redução do nível de amônia com a adição dessas substâncias (HAALAND et alii, 1982; TEH et alii, 1985).

2.2.3. Efeito no trato digestivo inferior

A manutenção de um pH intestinal próximo da neutralidade vem sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores, pois alguns dados de pesquisa têm mostrado que a adição de agentes tamponantes pode afetar a digestão do amido e da proteína no trato digestivo inferior (WHEELER, 1980; WHEELER et alii, 1981b; TEH et alii, 1985; TEH et alii, 1987; CHRISTIANSEN & WEBB, 1987/88). A elevação do pH intestinal para níveis próximos da neutralidade favorece a ação da enzima alfa-amilase pancreática, responsável pela digestão do amido e de diversas enzimas proteolíticas

secretadas no intestino delgado de ruminantes (WHEELER, 1980). CHRISTIANSEN & WEBB (1987/88) verificaram um efeito favorável de agentes tamponantes na utilização da proteína por novilhos confinados, através de um maior fluxo de proteína para o duodeno e de aumento na absorção de aminoácidos como isoleucina, leucina, valina, alanina e ácido aspártico.

O bicarbonato de sódio parece ter pouco efeito a nível de intestino, agindo principalmente como um agente tamponante ruminal (DIVEN, 1975b; WHEELER et alii, 1981b; TEH et alii, 1985; TEH et alii, 1987), enquanto o óxido de magnésio pode agir tanto a nível de rúmen como de intestino (PEIRCE et alii, 1983; JAMES e WOHLT, 1985; TEH et alii, 1985; STROUD et alii, 1985; TEH et alii, 1987). O calcário tem sido citado frequentemente como um agente tamponante eficiente a nível de intestino (WHEELER, 1980; WHEELER et alii, 1981a; HAALAND & TYRRELL, 1982; HAALAND et alii, 1982; TEH et alii, 1985). Entretanto, alguns trabalhos têm mostrado que calcários de alta reatividade podem também agir a nível de rúmen (WHEELER et alii, 1981b; HAALAND et alii, 1982; TEH et alii, 1985).

Além da elevação do pH ruminal e intestinal, os agentes tamponantes podem também estimular a secreção do abomaso e do pâncreas, afetando a digestão dos alimentos (TEH et alii, 1985; TEH et alii, 1987). O abomaso de ruminantes assemelha-se bastante ao estomago dos monogástricos na sua

capacidade de secretar ácido clorídrico e pepsina, apresentando um pH entre 2,0 a 3,0 WHEELER (1980). A adição de agente tamponante na dieta, poderia ocasionar uma maior liberação de ácido clorídrico pelo abomaso na tentativa de manter o pH entre 2,0 a 3,0, em função tanto do efeito do agente tamponante como devido a um maior fluxo de aminoácidos para o duodeno. O ácido clorídrico parece ser um importante estimulante da secreção pancreática no duodeno. Assim, uma maior secreção do abomaso, poderia resultar em maior secreção pancreática, aumentando a digestão intestinal dos alimentos (TEH et alii, 1985; TEH et alii, 1987).

2.2.4. Efeito sobre o desempenho animal

Dos 40 trabalhos revisados por STAPLES & LOUGH (1989), sobre o uso de bicarbonato de sódio, 28 utilizaram silagem de milho como volumoso básico, havendo efeito positivo na produção de leite, teor de gordura e leite corrigido para 4% de gordura em vacas tanto no início como no meio da lactação. Vacas recebendo bicarbonato de sódio parecem perder mais peso no início da lactação, havendo uma reversão deste efeito a partir do meio da lactação. A maior produção de leite corrigido para 4% de gordura durante o início da lactação e o maior ganho de peso durante o meio da lactação, podem estar relacionados a um maior consumo de matéria seca quando bicarbonato de sódio é fornecido. Os

dados compilados sobre o efeito de bicarbonato de sódio, mostram que além do nível de concentrado, o tipo de volumoso utilizado tem influência no efeito deste agente tamponante. Alimentos ácidos como silagens, parecem ter seu consumo aumentado quando bicarbonato de sódio é adicionado. Os autores concluíram que o melhor efeito do bicarbonato de sódio é obtido quando este é utilizado ao nível de 0,75% da matéria seca da dieta, sendo esta dieta constituída de 40-50% de silagem de milho e 50-60% de concentrado.

Dentre os fatores que podem ser responsáveis pelo efeito positivo do uso de agentes tamponantes podem ser incluídos:

- a) Maior consumo de matéria seca (STAPLES & LOUGH, 1989)
- b) Melhor condição ruminal para a atividade microbiana (DIVEN, 1975a; WHEELER, 1980; ARMENTANO & SOLORZANO, 1988; STAPLES & LOUGH, 1989).
- c) Melhor condição de pH intestinal e maior secreção gástrica e pancreática, afetando a digestão e absorção dos nutrientes (WHEELER, 1980; WHEELER et alii, 1981b; TEH et alii, 1985; TEH et alii, 1987).
- d) Influência no balanço ácido-básico (KRONFELD, 1978; ROBY et alii, 1987).
- e) Influência no balanço de eletrólitos (KRONFELD, 1978; ROBY et alii, 1987).

A adição de bicarbonato de sódio à dieta pode reduzir a excreção urinária de cálcio, fósforo e magnésio,

favorecendo o desempenho de animais em crescimento, reduzindo o problema de cálculos renais e a ocorrência de hipocalcemia em animais adultos. A maior retenção de cálcio pode ajudar na prevenção de distúrbios como paresia pós parto, tetania da lactação, distocia e retenção de placenta (ROBY et alii, 1987).

Foram conduzidos estudos com a finalidade de se avaliar o efeito de agentes tamponantes na concentração de metabólitos hormonais no plasma, principalmente somatotropina. Os mecanismos de ação da somatotropina e do bicarbonato de sódio parecem ser independentes um do outro, ou seja, o fornecimento de bicarbonato de sódio provavelmente não tem efeito sobre a digestão e metabolismo via sistema endócrino (STAPLES & LOUGH, 1989).

Os resultados de desempenho animal com o uso de agentes tamponantes para animais em crescimento e engorda são bastantes variáveis, dificultando uma conclusão segura e definitiva sobre o assunto. Diversos trabalhos comprovando a atuação desses agentes a nível fisiológico e metabólico sugerem efeito positivo no desempenho, em termos de ganho de peso e conversão alimentar.

DIVEN (1975b), revisando o assunto, afirmou que a utilização de agentes tamponantes aumentou a taxa de ganho de peso e a eficiência alimentar nos casos onde houve elevação de consumo, havendo dados onde a eficiência alimentar foi aumentada sem elevação no consumo, e dados

mostrando efeitos negativos no desempenho animal, quando o nível fornecido do agente tamponante foi muito elevado.

O dados a seguir apresentam alguns resultados da utilização de agentes tamponantes para animais em crescimento e engorda.

Referência HQ	Concentrado % na MS	Agente Tamponante Tipo	% na MS	C o n s u m o		GPD Kg	Conversão Alimentar
				Kg MS	% PV		
1	91	-	-	10,07	-	1,34 ^a	7,55
	91	NaHCO ₃	0,9	10,12	-	1,32 ^a	7,73
	91	Calcário	1,8	9,62	-	1,27 ^{ab}	7,61
	91	NaHCO ₃ + Calc.	0,9 + 1,8	9,70	-	1,18 ^b	8,23
2*	85	Calcário B	1,6	9,3 ^a	-	1,04 ^a	9,0 ^a
	85	Calcário A	1,8	9,5 ^b	-	1,34 ^b	7,4 ^b
3	85	Calcário A	0,7	10,1 ^b	-	1,3 ^b	7,8 ^b
	85	Calc. A + NaHCO ₃	0,7 + 0,75	10,1 ^b	-	1,26 ^b	8,2 ^b
	85	Calc. A + NaHCO ₃	0,7 + 1,5	9,2 ^a	-	0,97 ^a	9,5 ^a
	85	Calcário A	1,7	10,7 ^b	-	1,52 ^c	7,1 ^c
	85	Calc. A + NaHCO ₃	1,7 + 0,75	10,8 ^b	-	1,43 ^c	7,4 ^{bc}
	85	Calc. A + NaHCO ₃	1,7 + 1,5	9,1 ^a	-	0,94 ^a	9,7 ^a
	85	Controle	-	7,0 ^a	2,04 ^a	-	-
4	85	MgO	0,5	8,0 ^a	2,18 ^a	-	-
	85	NaHCO ₃	1,0	8,5 ^b	2,39 ^b	-	-
	85	NaHCO ₃ + MgO	1,0 + 0,5	7,7 ^a	2,07 ^a	-	-
	85	Controle	-	7,0 ^a	2,04 ^a	-	-
5**	84	-	-	1,081	-	0,22	-
	84	NaCl	0,52	1,123	-	0,216	-
	84	MgO	0,18	1,150	-	0,231	-
	84	NaHCO ₃	0,75	1,099	-	0,231	-
	84	Calcário	0,47	1,085	-	0,227	-
6	87,7	-	-	9,95	-	1,3	7,75
	84,0	-	-	10,18	-	1,45	7,01
	84,0	NaHCO ₃	1,0	9,67	-	1,40	6,91
7	50	-	0	7,7 ^f	-	-	-
	50	NaHCO ₃	1,0	8,3 ^g	-	-	-
	50	Bentonita	2,0	7,5 ^f	-	-	-

Referência Nº	Concentrado % na MS	Agente Tamponante Tipo	% na MS	C o n s u m o		GPD Kg	Conversão Alimentar
				Kg MS	% PV		
8	90	-	-	6,4	-	-	-
	90	NaHCO ₃	1,0	6,3	-	-	-
	90	TRONA	1,0	6,3	-	-	-
8	50	-	-	6,5	-	-	-
	50	NaHCO ₃	1,0	6,5	-	-	-
	50	TRONA	1,0	6,4	-	-	-
9	90	-	-	-	2,9	1,16	7,9
	90	NaHCO ₃	1,0	-	3,1	1,04	8,7

a,b,c,d na mesma coluna médias seguidas de letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

f,g na mesma coluna médias seguidas de letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,01$).

Calcário A = alta reatividade, B = baixa reatividade

Experimento conduzido com ovinos

1. RUSSEL et alii (1980)	6. STROUD et alii (1985)
2. WHEELER et alii (1981a)	7. JACQUES et alii (1986)
3. WHEELER et alii (1981b)	8. BOERNER et alii (1987a)
4. PEIRCE et alii (1983)	9. BYERS et alii (1985)
5. JAMES & WOHLT (1985)	

2.3. Uso de ionóforos

2.3.1. Considerações gerais

A utilização de substâncias que estimulam o crescimento vem sendo estudada intensamente, com o objetivo de aumentar a produção animal, seja através de um aumento na quantidade ou qualidade dos nutrientes disponíveis aos tecidos animais ou de um aumento na eficiência com a qual estes nutrientes são utilizados (CHALUPA, 1977; MACHADO & MADEIRA, 1990).

Em ruminantes, a manipulação da fermentação ruminal com o objetivo de aumentar a quantidade e ou a

qualidade dos nutrientes disponíveis ao animal, através de alterações na proporção de ácidos graxos voláteis, redução das perdas via metano e melhor aproveitamento da proteína da dieta, pode ser conseguida com a utilização de ionóforos (BERGEN & BATES, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989; STROBEL et alii, 1989).

Ionóforos são moléculas que contém uma estrutura onde átomos de oxigênio espaçados estrategicamente em anéis ou cavidade, ligam-se a diferentes cátions (CHALUPA, 1980), servindo como transportadores destes íons através da membrana celular (BERGEN & BATES, 1984). Os ionóforos são produzidos por várias linhagens de *Streptomyces* (BERGEN & BATES, 1984). Dentro deste grupo de compostos incluem-se: monensina, lasalocida, salinomycin e narasin (SCHELLING, 1984; BERGEN & BATES, 1984), tetrinas, lisocelina e laidlomycin (RUSSELL & STROBEL, 1989).

O uso de ionóforos na dieta de ruminantes foi aprovado nos Estados Unidos da América em meados da década de setenta, e desde então vêm sendo utilizados intensamente, principalmente nos confinamentos de gado de corte (RUSSELL & STROBEL, 1989). Caso todos os bovinos confinados para a produção de carne nos Estados Unidos da América, recebessem 350mg de monensina por cabeça por dia, durante 140 dias, a despesa anual com este ionóforo seria da ordem de setenta milhões de dólares e considerando uma eficiência de 8:1, o benefício total seria da ordem de 560 milhões de dólares

(RUSSELL & STROBEL, 1989).

SHELLING (1984), propôs 7 modos de ação através dos quais a monensina, o ionóforo mais estudado, melhora o desempenho animal:

- a) Alteração na produção de ácidos graxos voláteis (AGV).
- b) Alteração no consumo de alimentos.
- c) Alteração na produção de gases.
- d) Alteração na digestibilidade dos alimentos.
- e) Alteração no enchimento do rúmen e taxa de passagem.
- f) Alteração na utilização da proteína.
- g) Outros modos de ação ruminal.

Os itens acima citados dão ênfase principalmente à ação dos ionóforos a nível de rúmen e são enfatizados em diversas revisões sobre o assunto (BERGEN & BATES, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989). Entretanto já se sabe que a ação dos ionóforos não se limita aos microrganismos do rúmen, podendo afetar diretamente o metabolismo do ruminante (ARMSTRONG & SPEARS, 1988; BENZ et alii, 1989), já que parte do ionóforo é absorvido pelo organismo animal (ARMSTRONG & SPEARS, 1988).

As principais alterações observadas na fermentação ruminal com o uso de ionóforos deve-se à ação seletiva destes compostos sobre a população microbiana do rúmen. De modo geral, bactérias gram-positivas são mais sensíveis aos ionóforos que as gram-negativas. Bactérias celulolíticas como *Ruminococcus albus*, *Ruminococcus*

flavefaciens, algumas linhagens de *Butyrivibrio fibrisolvens* e bactérias lácticas como *Streptococcus bovis*, são bastante sensíveis aos ionóforos. *Bacteroides succinogenes* e *Bacteroides ruminicola* são menos sensíveis, enquanto *Selenomonas ruminantium* são bastante resistentes aos ionóforos (BERGEN & BATES, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989).

A sensibilidade ou não das bactérias ruminais aos ionóforos parece estar relacionada à presença ou ausência de uma membrana externa de revestimento e à ocorrência de fosforilação oxidativa através da enzima fumarato redutase. BERGEN & BATES (1984) enfatizaram a ocorrência da fosforilação oxidativa via fumarato redutase como fator mais importante para a resistência das bactérias aos ionóforos, enquanto RUSSELL & STROBEL (1989) atribuíram a presença da membrana externa nas bactérias resistentes como o fator mais importante.

2.3.2. Mecanismo básico de ação dos ionóforos sobre os microrganismos ruminais.

Por serem os ionóforos substâncias capazes de interagir estequiometricamente com íons metálicos, funcionando como transportadores de íons através da membrana celular, qualquer análise sobre a ação dos ionóforos deve considerar suas interações com as membranas biológicas (BERGEN & BATES, 1984).

Ionóforo carboxílico, como a monensina, localizado na interface da membrana na forma aniônica, liga-se a um cátion metálico, formando um complexo capaz de se difundir através da membrana celular. Dessa forma ele atinge a face oposta da membrana onde o cátion é liberado. O retorno do ionóforo é feito na forma protonada, e assim, efetua-se o transporte ionóforo-cátion e ionóforo-próton em direções opostas através da membrana celular (PRESSMAN, 1976) conforme o esquema abaixo:

Pelo fato da monensina mediar obrigatoriamente o transporte em direções opostas de um cátion e próton, ela é tida como um cátion/próton "antiporter" (transportador) (BERGEN e BATES, 1984). A lasalocida no entanto, pelo fato de poder mediar a troca $Ca^{2+}/2K^+$ não é tida como um cátion/próton "antiporter" obrigatório (BERGEN & BATES, 1984).

A reação catalizada pelo ionóforo depende do gradiente de concentração de íons, da afinidade do ionóforo por diferentes cátions e do mecanismo específico pelo qual a translocação de íon ocorre (BERGEN & BATES, 1984). Segundo PRESMAN (1976) a monensina tem maior afinidade por sódio do que por potássio, enquanto a lasalocida tem uma afinidade muito maior por potássio do que por sódio.

As bactérias ruminais obtém sua energia, ou seja, ATP, através de 2 mecanismos (HINKLE & McCARTY, 1980):

a) Fosforilação a nível do substrato

b) Fosforilação oxidativa: algumas bactérias, principalmente certas gram-negativas, possuem um sistema de transporte de elétrons que pode ser utilizado para produzir ATP.

A extrusão de prótons através das ATP-ases ligadas à membrana de bactérias que produzem ATP por fosforilação ao nível do substrato, ou a extrusão de prótons através da cadeia transportadora de elétrons nas bactérias que possuem fosforilação oxidativa, criam um gradiente químico de pH (ΔpH) e um gradiente elétrico (ΔY). Estes 2 gradientes juntos estabelecem a "força motora de prótons" (FMP) (BERGEN & BATES, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989). A energia acumulada na "FMP" pode ser usada para produzir ATP (nas bactérias que possuem sistemas de transporte de elétrons), para a absorção de solutos pela célula e para

motilidade (RUSSELL & STROBEL, 1989).

A capacidade do ionóforo em transportar cátions e prótons através da membrana celular pode afetar o gradiente estabelecido entre o interior e o exterior da célula. A adição de monensina em cultura de *Streptococcus bovis* inverteu o gradiente de pH estabelecido entre o interior da célula e o meio, resultando em decréscimo da "FMP". Como o gradiente elétrico não foi afetado pela monensina, qualquer influxo de cátions deve ter sido compensado por um efluxo de cátions ou influxo de ânions (RUSSELL, 1987). A redução do nível de ATP celular devido à tentativa da célula em restabelecer o ΔpH pode ser o principal motivo da inibição de crescimento das bactérias sensíveis ao ionóforo (RUSSELL, 1987; RUSSELL & STROBEL, 1989).

Existem 2 proposições básicas até o momento de como o ionóforo monensina modula a troca de cátions/prótons através da membrana de microrganismos ruminais:

1) Proposição de BERGEN & BATES (1984)

Segundo estes autores a monensina mediará um influxo celular do próton H^+ e um efluxo celular do cátion sódio. Desta maneira, o pH e a concentração de sódio no meio ruminal deveriam ter um papel importante no efeito do ionóforo. O autor propõe que a adição de bicarbonato de sódio ao meio ruminal poderia bloquear a ação da monensina devido

à elevação do pH (redução do ΔpH) e elevação da concentração de sódio no rúmen. Foi verificada em trabalhos experimentais uma redução no efeito da monensina devido à adição de bicarbonato de sódio, mas os autores consideraram que a lasalocida não seria afetada pela adição de bicarbonato de sódio.

2) Proposição de RUSSELL (1987)

Trabalhando com *Streptococcus bovis*, um microrganismo encontrado no rúmen, o autor verificou que a monensina mediu inicialmente a troca potássio/hidrogênio ao invés de sódio/hidrogênio, ou seja, a monensina ocasionou um influxo celular de hidrogênio (H^+) e efluxo de potássio (K^+). Após o pH celular ter sido revertido, a monensina provocou um influxo celular de sódio (Na^+) e um efluxo de H^+ . Os dados a seguir mostram o efeito de monensina sobre a "FMP" e a concentração de cátions em *Streptococcus bovis*, de acordo com o autor:

Parâmetros	Controle	Monensina
pH do meio	6,65	6,65
pH celular	7,08	6,20
ΔpH (mV)	-26	+28
$\Delta\gamma$ (mV)	77	71
FMP (mV)	103	43
K meio (mM)	9	9
K celular (mM)	613	134
Na meio (mM)	89	93
Na celular (mM)	237	543

Com base no trabalho, RUSSELL (1987) propôs que o nível extracelular de potássio era mais importante que o nível de sódio quanto ao efeito do ionóforo, ou seja, um nível elevado de potássio no fluido ruminal poderia bloquear o efeito da monensina.

RUMPLER et alii (1986) testando monensina e lasalocida na presença e na ausência de dois tipos de cátions (controle; 2,5% de sódio; 2,5% de potássio na matéria seca da dieta) verificaram que a adição de sódio via cloreto de sódio melhorou a eficiência da monensina e tendeu a melhorar a eficiência da lasalocida em reduzir a produção de metano. A adição de potássio, via cloreto de potássio, tendeu a aumentar a produção de metano na presença de lasalocida. DAWSON & BOLING (1987), testando monensina e lasalocida com níveis baixo, médio e alto de potássio, verificaram que o efeito dos ionóforos foi prejudicado pelo nível alto de potássio. FUNK et alii (1986) observaram que níveis altos de potássio na dieta, apesar de não afetarem o desempenho de cordeiros suplementados com lasalocida, anularam o efeito do ionóforo em favorecer a produção de ácido propiônico.

SPEARS & HARVEY (1987) testando o efeito de níveis de sódio e potássio sobre o desempenho de animais suplementados com lasalocida, verificaram que o ionóforo foi eficiente em melhorar a conversão alimentar de novilhos em terminação, exceto quando a dieta tinha nível alto de potássio e baixo de sódio.

RUSSELL & STROBEL (1989) revisando trabalhos de pesquisa, relataram que à medida que o nível de potássio na dieta aumentou, o efeito da lasalocida e o da monensina foi reduzido.

RUSSELL (1987) contestou o esquema proposto por BERGEN & BATES (1984), afirmando que:

- a) A proposta dos autores mencionados não foi baseada em determinações experimentais, mas sim, em extrapolações de dados obtidos com mitocôndria e *Escherichia coli*, não utilizando microrganismos ruminantes.
- b) A proposta apresentada considerou a maior afinidade da monensina por sódio em relação ao potássio, não levando em conta que a concentração de potássio no interior da célula, que é muito maior que a de sódio, e que o gradiente de potássio através da membrana também é superior ao gradiente de sódio.

STAPLES & LOUGH (1989) revisando diversos trabalhos sobre a utilização de agentes tamponantes em dietas de vacas de leite, verificaram que bicarbonato de sódio foi eficiente em manter o pH ruminal dentro de níveis mais favoráveis à atuação das bactérias celulolíticas. Entretanto, os autores ressaltaram que um tamponante verdadeiro, como o bicarbonato de sódio, deve agir evitando a queda do pH

ruminal sem ocasionar a elevação deste. A análise dos dados de STAPLES e LOUGH (1989) permite observar que, mesmo quando o bicarbonato de sódio foi utilizado em níveis bem acima do recomendado, a elevação do pH ruminal jamais ultrapassou 0,21 unidades e o pH ruminal médio de vacas recebendo até 418 gramas por dia do agente tamponante foi 6,04 contra 5,91 das vacas controle.

Com base nos dados compilados por STAPLES & LOUGH (1989), parece ser reduzida a possibilidade do bicarbonato de sódio elevar o pH ruminal a níveis próximos do pH intracelular, bloqueando o influxo de prótons na célula microbiana mediado pelo ionóforo, como propuseram BERGEN & BATES (1984).

A resistência de diversos microrganismos ruminais gram-negativos aos ionóforos, segundo BERGEN & BATES (1984), parece estar relacionada à ocorrência de fosforilação oxidativa nestas bactérias. Um sistema de transporte de elétrons e a presença da enzima fumarato redutase, permitiriam a estas bactérias, manterem a sua reserva energética devido à uma maior produção de ATP quando comparadas à bactérias gram-positivas, que só produzem ATP através da fosforilação ao nível do substrato.

RUSSELL & STROBEL (1989), sem discordarem das vantagens advindas da ocorrência da fosforilação oxidativa em diversas bactérias gram-negativas, acreditam que a maior resistência destas bactérias aos ionóforos está mais

fortemente correlacionada à presença de uma membrana externa, que funcionaria como uma barreira física à penetração dos ionóforos na célula. Esta membrana estaria ausente em diversas bactérias e outros microrganismos como fungos e protozoários sensíveis aos ionóforos.

Alguns estudos têm sido conduzidos com a finalidade de avaliar as vantagens de um sistema de rotação de ionóforos visando reduzir a resistência de certas bactérias ou aumentar o efeito positivo dos ionóforos sobre o desempenho animal (RUSSELL & STROBEL, 1989). A rotação de monensina, lasalocida e tilosina, pode favorecer o ganho de peso e a conversão alimentar em bovinos (BRANINE et alii, 1989).

2.3.3. Alterações no rúmen e ação sobre utilização de energia e metabolismo proteico.

O efeito mais marcante do ionóforo sobre a fermentação ruminal é a alteração nas proporções de ácido acético e ácido propiônico. De modo geral ocorre elevação na proporção molar de ácido propiônico e redução de ácido acético, resultando em menor relação ácido acético/ácido propiônico, mantendo inalterada a produção total de AGV (BERGEN & BATES, 1984; SCHELLING, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989).

Acredita-se que a manipulação da fermentação

ruminal visando favorecer a produção de ácido propiônico resulte em ganho energético para o animal, em função de diversos fatores, tais como:

- a) Maior eficiência da fermentação da hexose a ácido propiônico (109%) em relação a ácido acético (62%) (CHALUPA, 1977).
- b) O conceito de utilização mais eficiente de ácido propiônico em relação a ácido acético pelos tecidos, proposto (SCHELLING, 1984) e que tem sido questionado (BERGEN & BATES, 1984).
- c) A maior flexibilidade do ácido propiônico como fonte energética, já que este pode ser utilizado tanto para a oxidação no ciclo de Krebs como para a gluconeogênese (SCHELLING, 1984).

BERGEN & BATES (1984), analisando trabalhos de pesquisa relataram que houve um acréscimo de 20% na energia metabolizável disponível ao ruminante recebendo monensina, enquanto DELFINO et alii (1988), avaliando o desempenho e a partição de energia em bovinos suplementados com lasalocida, obtiveram um aumento de 7% na energia metabolizável da dieta, levando os autores a concluir que este parece ser o principal meio pelo qual lasalocida melhora a conversão alimentar.

A redução na produção de metano durante o processo fermentativo no rúmen, é outro aspecto que pode aumentar a densidade energética de dietas suplementadas com

ionoforos (RUMPLER et alii, 1986). Reduções de 4 a 31% da produção de metano, devido ao uso de monensina foram relatados por SCHELLING (1984) em sua revisão sobre o assunto. A redução na produção de metano não é consequência de um efeito direto do ionóforo sobre as bactérias metanogênicas, mas sim, função de uma menor disponibilidade de hidrogênio para estas bactérias, devido à inibição de bactérias que o produzem (*Ruminoçoccus albus*), e predomínio de bactérias que utilizam hidrogênio para a produção de ácido succínico (*Bacteroides succinogenes* e *Bacteroides ruminícola*), e para a produção de ácido propiônico (*Selenomonas ruminantium*) (CHALUPA, 1980; SCHELLING, 1984).

RUMPLER et alii (1986), observaram maior eficiência da monensina em inibir a produção de metano quando comparada à lasalocida enquanto DELFINO et alii (1988) não verificaram efeito da lasalocida na produção de metano.

A energia perdida como metano normalmente representa 7 a 10% da energia bruta da dieta, dessa maneira, considerando reduções máximas de 30% na produção de metano na presença de ionóforos, o aumento na energia líquida da dieta não deve ser superior a 3 a 5% segundo SCHELLING (1984) e DELFINO et alii (1988). SCHELLING (1984), afirmou que a redução da produção de metano resulta em pequena melhoria da produção animal.

Segundo STROBEL et alii (1989), a maior produção de ácido propiônico e a redução na produção de

metano não explicam metade dos benefícios derivados dos ionóforos, havendo portanto, outros fatores importantes, determinando o efeito positivo destes compostos na produção animal.

Diversos autores afirmam que a monensina reduz a degradação ruminal de proteína, resultando em menor nível de amônia ruminal e maior escape de proteína da dieta para o abomaso, justificando a suposição de que um dos modos de ação dos ionóforos em ruminantes é através de uma utilização mais eficiente da proteína, ou seja, o ionóforo economiza proteína (CHALUPA, 1980; BERGEN & BATES, 1984; SCHELLING, 1984; GOODRICH et alii, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989). BERGEN & BATES (1984) relataram que a monensina aumentou o escape ruminal de proteína em 22 a 55%, enquanto GOODRICH et alii (1984) analisando seis experimentos com novilhos de corte, concluíram que monensina reduziu a necessidade de proteína da dieta para ganho de 1,0 kg/cabeça/dia de 11,6% para 11,2%, suportando a teoria de que monensina tem efeito de poupar proteína. Reduzir a degradação ruminal da proteína da dieta, maximizar a produção de proteína microbiana a partir do nitrogênio não protéico e suplementar aminoácidos resistentes à degradação ruminal, podem resultar em melhor desempenho de animais de alto potencial que estavam sofrendo alguma limitação, como também, em economia de proteína para aqueles animais que já estavam adequadamente supridos (CHALUPA, 1977).

A resistência à monensina de bactérias com elevada capacidade de degradar proteínas e aminoácidos (*Bacteroides ruminicola*, *Megasphaera elsdenii* e *Selenomonas ruminantium*), torna difícil explicar o efeito do ionóforo, reduzindo a degradação de proteína no rúmen. Porém, a descoberta de um *peptostreptococcus* ruminal sensível à monensina e com um potencial de produzir amônia vinte vezes maior que o dos microrganismos anteriormente citados, pode ser uma das explicações para este fato, de acordo com RUSSELL & STROBEL (1989).

SHELLING (1984) afirmou que apesar do pequeno número de trabalhos sobre o assunto, normalmente a monensina reduz a taxa de diluição ruminal. Esta redução pode levar à uma maior exigência de manutenção dos microrganismos, reduzindo a produção de proteína microbiana no rúmen (HESPELL & BRYANT, 1979). A menor eficiência de síntese de proteína microbiana na presença de monensina é discutida por BERGEN & BATES (1984) enquanto RUSSELL & STROBEL (1989) relatando trabalhos com culturas adaptadas à monensina, em sistema semicontínuo de longa duração, não observaram efeito negativo do ionóforo sobre a produção celular microbiana.

Assim como monensina, a lasalocida parece melhorar a eficiência de utilização da proteína da dieta visto que tem sido verificado aumento na digestibilidade do nitrogênio da dieta na presença deste ionóforo (PATERSON et alii, 1983; RICKE et alii, 1984; DELFINO et alii, 1988).

Entretanto, a lasalocida parece não reduzir a degradação de proteína no rúmen como a monensina, pois diversos trabalhos não têm verificado efeito da lasalocida sobre o nível de amônia ruminal (RICKE et alii, 1984; SPEARS & HARVEY, 1984; FUNK et alii, 1986; ANDERSEN & HORN, 1987; DELFINO et alii, 1988). Ao que parece a lasalocida e a monensina não se comportam de forma semelhante no rúmen com relação à degradação de proteína (RICKE et alii, 1984; FUNK et alii, 1986).

STARNES et alii (1984) observaram redução de 66 e 28% na atividade da urease ruminal em presença de lasalocida e monensina respectivamente, o que pode ser interessante a fim de se proporcionar uma utilização mais eficiente da uréia no rúmen.

2.3.4. Efeito sobre o consumo, a digestibilidade e a taxa de passagem.

De modo geral, com dietas ricas em grãos, o uso de ionóforos resulta em redução de consumo (BERGEN & BATES, 1984), da ordem de 5 a 6% segundo revisão feita por SCHELLING (1984). Quando a dieta é constituída basicamente por forragens, os ionóforos normalmente não deprimem o consumo (BERGEN & BATES, 1984). A redução no consumo parece ser menos acentuada com a lasalocida do que com a monensina (THONNEY et alii, 1981). Entretanto, alguns trabalhos com

dietas ricas em grãos não têm mostrado efeito depressivo da lasalocida sobre o consumo (FUNK et alii, 1986, SPEARS & HARVEY, 1987; DELFINO et alii, 1988).

Considerando o efeito depressivo do ionóforo sobre diversas bactérias celulolíticas (*Ruminococcus albus*, *Ruminococcus flavefaciens* e algumas linhagens de *Butyrivibrio fibrisolvens*), é de se esperar que a digestibilidade da fração fibrosa da dieta seja reduzida. Ensaio "in vitro" de curta duração, têm confirmado esta suposição, o mesmo não ocorrendo com ensaios "in vivo" utilizando animais adaptados (SCHELLING, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989). Um conjunto de fatores pode explicar este fato, tais como: a capacidade de *Bacteroides succinogenes*, um microrganismo com atividade celulolítica e menos sensível a ionóforos, poder compensar a redução de *Ruminococcus* e *Butyrivibrio*. *Bacteroides succinogenes* tem um "lag time" bastante longo, assim, em experimentos "in vitro", de curta duração, sua ação fica limitada (RUSSELL & STROBEL, 1989). O menor consumo, o maior tempo de permanência do alimento no rúmen (CHALUPA, 1980) e a menor produção de ácido láctico, mantendo o pH em níveis favoráveis a ação das bactérias celulolíticas (STROBEL et alii, 1989), causados pelos ionóforos, podem favorecer a digestão de fibra.

FUNK et alii (1986), obtiveram maior digestibilidade da matéria seca no trato digestivo total, sendo que a digestibilidade do amido, nitrogênio e NDF não

foram afetados por lasalocida. Houve tendência de redução na degradação ruminal da matéria orgânica e amido, sugerindo que a lasalocida pode alterar o local de digestão do rúmen para o intestino.

PATERSON et alii (1983), RICKE et alii (1984) e DELFINO et alii (1988), obtiveram maior digestibilidade do nitrogênio devido à lasalocida, porém, não observaram efeito sobre a digestibilidade da matéria seca e NDF. ANDERSEN & HORN (1987) e STROBEL et alii (1989) também não observaram efeito da lasalocida sobre a digestibilidade da matéria seca. Segundo SCHELLING (1984), o aumento na digestibilidade devido à monensina parece ser pequeno e é afetado por diversos fatores, tais como, nível de consumo, enchimento do rúmen e taxa de passagem ruminal.

Os mecanismos pelos quais os ionóforos parecem reduzir a taxa de passagem ruminal ainda não estão esclarecidos. A capacidade dos ionóforos em transportar íons pode alterar a concentração osmótica do fluido ruminal (STARNES et alii, 1984). A redução na concentração de cálcio, magnésio e potássio, no fluido ruminal de animais recebendo rações com 33 ppm de lasalocida ou monensina, foi considerada por STARNES et alii (1984) como a principal causa da redução da osmolalidade do fluido ruminal observada nesses animais. Segundo DESWYSEN & ELLIS (1988), o maior tempo de retenção de partículas no rúmen de animais suplementados com monensina, pode ser causado pelo efeito do ionóforo em reduzir o número

e a força das contrações ruminais.

2.3.5. Outros efeitos dos ionóforos.

A utilização de dietas ricas em concentrado, comuns em confinamentos de países desenvolvidos, tem apresentado grande incidência de distúrbios metabólicos, principalmente acidose, resultando em queda de consumo, de ganho de peso e até mesmo a morte do animal (BRITTON & STOCK, 1989; STROBEL et alii, 1989). Acidose é um distúrbio metabólico causado por rápida produção e absorção de ácidos orgânicos ruminais e de endotoxinas a partir de excessiva fermentação ruminal de carboidratos. Este conceito deixa claro que acidose não é consequência do acúmulo de ácido láctico apenas, mas de todos os ácidos orgânicos produzidos no rúmen (BRITTON & STOCK, 1989). Apesar do ácido láctico não ser o único responsável pela acidose (BRITTON & STOCK, 1989), ele é um ácido muito mais forte que os ácidos graxos voláteis produzidos no rúmen. Técnicas que reduzam a sua produção no rúmen podem auxiliar no controle da acidose (STROBEL et alii, 1989).

O ácido láctico é inicialmente produzido no rúmen devido à fermentação de carboidratos solúveis por *Streptococcus bovis*, ocasionando queda do pH e facilitando a proliferação de *Lactobacillus*, aumentando ainda mais a produção de ácido láctico. Dessa maneira, a inibição de

Streptococcus bovis é fundamental para se evitar o acúmulo de ácido láctico no rúmen (NAGARAJA et alii, 1981). Diversos trabalhos têm mostrado que ionóforos inibem o crescimento de *Streptococcus bovis*, sem no entanto, afetar os microrganismos que fermentam o ácido láctico (NAGARAJA et alii, 1981; NAGARAJA et alii, 1982, STROBEL et alii, 1989).

A suplementação com monensina ou lasalocida mostrou-se eficiente em evitar acidose em animais recebendo dietas ricas em carboidratos solúveis, reduzindo o acúmulo de ácido láctico e a queda do pH ruminal de acordo com NAGARAJA et alii (1981) e NAGARAJA et alii (1982). Estes autores também verificaram que a lasalocida foi mais eficiente que a monensina em prevenir acidose.

BERGEN & BATES (1984) comentaram que o potencial dos ionóforos em reduzir o timpanismo é, provavelmente, devido à menor viscosidade do fluido ruminal, uma vez que microrganismos produtores de muco como os protozoários e *Streptococcus bovis*, são inibidos pelos ionóforos.

Acredita-se que parte do efeito dos ionóforos no desempenho animal seja devido à alterações no metabolismo intermediário, através de mecanismos que não envolvam alterações no metabolismo ruminal, já que 36 a 50% da monensina é absorvida por ruminantes de acordo com ARMSTRONG & SPEARS (1988). Os mesmos autores relataram que a aplicação intravenosa de monensina em ruminantes reduziu a concentração

sanguínea de potássio, magnésio e fósforo, aumentou a concentração de glicose e ácidos graxos voláteis e alterou a secreção de insulina e LH, o que pode resultar em alterações na composição corporal, e portanto, no ganho de peso e eficiência alimentar. Estes resultados reforçaram a suposição de que os ionóforos podem agir sobre o metabolismo dos ruminantes independente de alterações no rúmen. As observações experimentais revelaram que a lasalocida não afetou as concentrações de minerais, hormônios e outros metabólitos no sangue. De acordo com os autores, este fato pode estar relacionado à diferenças na habilidade da monensina e lasalocida de alterarem os níveis intracelulares de sódio e cálcio.

Alterações nos níveis de metabólitos intermediários do metabolismo de carboidratos no fígado, sugerem alterações no metabolismo hepático de carboidratos favorecendo a gluconeogênese em animais recebendo monensina e lasalocida (BENZ et alii, 1989). Elevação no nível de glucose sanguínea em animais recebendo lasalocida foi observada por THONNEY et alii (1981) e por SPEARS & HARVEY (1984), enquanto outros pesquisadores verificaram que as concentrações de minerais no sangue foram alteradas por lasalocida (SPEARS & HARVEY, 1984; STARNES et alii, 1984; CHIRASE et alii, 1988; STABEL et alii, 1989).

Segundo ARMSTRONG & SPEARS (1988), os dados existentes não permitiam conclusões definitivas, sendo

necessário maior número de trabalhos de pesquisa para se caracterizar a relevância do efeito dos ionóforos sobre o metabolismo intermediário independente do efeito no rúmen.

2.3.6. Desempenho animal

O efeito dos diferentes ionóforos parece ser semelhante em termos de desempenho animal. Em dietas ricas em grãos, os ionóforos normalmente reduzem o consumo sem afetar o ganho de peso, melhorando a eficiência alimentar. Em dietas ricas em forragens os ionóforos aumentam o ganho de peso sem afetar o consumo, melhorando assim a eficiência alimentar (BERGEN & BATES, 1984; GOODRICH et alii, 1984).

Os dados a seguir resumem os efeitos dos ionóforos sobre o desempenho de bovinos alimentados com dietas ricas em grãos.

Ionóforo	Ganho de Peso	Conversão Alimentar
	% do Controle	
Monensina	99 - 110	88 - 95
Lasalocida	99 - 107	90 - 96
Narasina	87 - 100	84 - 90
Salinomycin	102 - 106	93

Fonte: BERGEN & BATES (1984)

Os efeitos de monensina sobre o desempenho de bovinos recebendo dietas com diferentes concentrações de energia são mostrados a seguir:

Dieta	Nº de Ensaio	Desempenho (% do Controle)		
		Consumo	Ganho de Peso	Conversão Alimentar
Confinamento	19	94	102	92
Pastagem	12	--	117	--
Forragem Verde Picada	3	98	123	85

Fonte: CHALUPA (1977)

O efeito de lasalocida e monensina sobre o desempenho de bovinos confinados está sumarizado nos dados que se seguem:

Medidas	% do Controle			
	Lasalocida (ppm)			Monensina (ppm)
	11	22	33	33
Consumo	98	97	95	102
Ganho	104	106	105	108
Conversão	96	91	91	94

Fonte: CHALUPA (1980)

Analisando 228 ensaios que envolveram 11.274 bovinos utilizando dietas ricas em grãos, GOODRICH et alii (1984) concluíram que monensina aumentou o ganho de peso em 1,6%, reduziu o consumo em 6,4% melhorando a conversão

alimentar em 7,5%. Um resumo dos dados pode ser visto abaixo:

Medidas	Controle	Monensina	Alteração %
Nº cabeças	5696	5578	
Peso Vivo inicial (Kg)	284	283	
Peso Vivo Final (Kg)	430	432	
E.M. da Dieta (Mcal/Kg MS)	2,98	2,98	
Monensina (mg/cab/dia)	----	246	
Ganho de Peso (Kg/dia)	1,09	1,1	+ 1,6
Consumo (Kg/MS/dia)	8,27	7,73	- 6,4
Kg MS/Kg ganho de Peso Vivo	8,09	7,43	- 7,5

Fonte: GOODRICH et alii (1984)

SPEARS & HARVEY (1987) e DELFINO et alii (1988), utilizando dietas com 85 e 90% de concentrado na matéria seca, verificaram efeito positivo da lasalocida sobre a conversão alimentar de novilhos enquanto THONNEY et alii (1981), trabalhando com dietas à base de cubos de alfafa e SPEARS & HARVEY (1984) e ANDERSEN & HORN (1987) trabalhando com bovinos em regime de pasto, verificaram maior ganho de peso com animais recebendo lasalocida.

SPROTT et alii (1988) revisando os trabalhos sobre o efeito dos ionóforos em vacas de cria e novilhas para reposição, recebendo dietas à base de forragens, verificaram efeito positivo destes agentes sobre o ganho de peso, conversão alimentar, intervalo do parto ao primeiro cio, redução na idade à puberdade e nenhum efeito prejudicial sobre a fertilidade em machos e fêmeas. A produção de leite na maioria dos trabalhos não foi prejudicada, podendo até ser aumentada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Hipóteses de trabalho

No presente trabalho, foram propostas quatro dietas, com a finalidade de se avaliar o efeito do bicarbonato de sódio, da lasalocida e de cana-de-açúcar picada como fonte de fibra íntegra, em dietas à base de bagaço de cana-de-açúcar tratado sob pressão de vapor (BTPV) para bovinos confinados.

O uso conjunto do bicarbonato de sódio e lasalocida, em dietas à base de BTPV, pode apresentar resultados interessantes, tanto pelo efeito isolado de cada composto a nível de rúmen e metabolismo intermediário, como também, pelo possível efeito benéfico de um nível mais elevado de sódio na dieta, acentuando a ação do ionóforo.

O BTPV apresenta elevada acidez, baixo estímulo a ruminação, e consenquente baixa produção de saliva pelo ruminante, podendo resultar em um ambiente ruminal desfavorável à degradação da sua fração fibrosa (CASTRO, 1989), e propício à distúrbios metabólicos, como acidose (STROBEL et alii 1989). O uso de agentes tamponantes apresenta maior potencial de resposta quando o volumoso

utilizado é caracteristicamente ácido (STAPLES & LOUGH, 1989). Assim sendo, as dietas à base de BTPV parecem ter todas as características favoráveis à uma resposta positiva à adição de agentes tamponantes. Os dados de LANNA & BOIN (1988) confirmam esta proposta, porém NUSSIO et alii (1990) não verificaram resposta positiva à adição de bicarbonato de sódio em dietas à base de BTPV.

O BTPV apresenta elevada taxa de passagem ruminal (CASTRO, 1989), e acredita-se também, que este alimento reduz a digestibilidade da proteína (PATE, 1982; CASTRO, 1989). O uso de lasalocida poderia melhorar a eficiência de utilização do BTPV através de um processo fermentativo mais eficiente no rúmen, devido à maior produção de ácido propiônico e redução na produção de metano (RUSSELL, 1987). A lasalocida parece aumentar a digestibilidade da proteína da dieta (PATERSON et alii, 1983; RICKE et alii, 1984; DELFINO et alii, 1988) e também reduz a taxa de passagem ruminal (SCHELLING, 1984), o que poderia melhorar o aproveitamento da fração fibrosa do BTPV. Entretanto, CASTRO (1989), afirmou que seria mais interessante aumentar a taxa de degradação da fração fibrosa do BTPV em vez de aumentar o tempo de retenção deste no rúmen. A lasalocida também poderia auxiliar na manutenção de um pH ruminal favorável à degradação da fibra, devido à inibição de microrganismos produtores de ácido láctico (NAGARAJA et alii, 1981; NAGARAJA et alii, 1982; STROBEL et alii, 1989).

Admite-se que a adição de uma fonte de fibra íntegra em dietas à base de BTPV, poderia estimular a ruminação, promovendo uma maior produção de saliva, melhorando o ambiente ruminal (LANNA & BOIN, 1988). A cana-de-açúcar tem sido utilizada em confinamentos comerciais em dietas à base de BTPV, como fonte de fibra. Entretanto, a sua utilização é considerada problemática, por aumentar o trabalho de preparo e distribuição de alimento. A validade de uso de cana picada tem sido questionada mas não pesquisada.

3.2. Local e animais

O trabalho de campo foi conduzido nas instalações do Departamento de Zootecnia da ESALQ-USP em Piracicaba - SP, de 24 de fevereiro a 26 de maio de 1988. Foram utilizadas 20 baias com piso de concreto, cochos cobertos e área de 28 m² por baia ou 14 m² por animal.

Utilizou-se 40 animais da raça nelore, irmãos por parte de pai (com exceção de apenas 2 animais) sendo 24 machos e 16 fêmeas com idade média de 18,9 meses e peso vivo médio de 329 Kg no início do período experimental. Durante o ano de 1987, logo após a desmama, os animais foram mantidos em confinamento experimental, por um período de 107 dias entre julho e outubro. Após este período, os animais foram mantidos em regime de pasto até 24 de fevereiro de 1988, quando teve início o período pré-experimental deste trabalho.

3.3. Tratamentos

O trabalho experimental foi conduzido através do uso de quatro dietas.

- A -> Bagaço tratado sob pressão de vapor (BTPV) + concentrado + cana picada
- B -> BTPV + concentrado + cana picada + lasalocida
- C -> BTPV + concentrado + lasalocida + bicarbonato de sódio
- D -> BTPV + concentrado + cana picada + lasalocida + bicarbonato de sódio.

O nível de lasalocida na matéria seca das dietas B, C e D foi calculado para situar-se entre 20 a 30 ppm conforme os dados da literatura (CHALUPA, 1980; GOODRICH et alii, 1984), enquanto o nível de bicarbonato de sódio na matéria seca das dietas C e D foi calculado para atingir 1,0% (LANNA & BOIN, 1988).

Tomando-se com base a matéria seca, a proporção concentrado:volumoso de 40:60, foi mantida nas 4 dietas, sendo as dietas formuladas para serem isoprotéicas e isoenergéticas.

Foram formulados 3 concentrados à base de milho triturado, farelo de algodão (28% de PB), uréia, calcário e mistura mineral. A diferença entre estes concentrados foi a presença ou ausência de lasalocida e de

bicarbonato de sódio. A tabela 1 mostra a formulação dos concentrados usados para formulação das dietas experimentais.

Tabela 1. Formulação dos concentrados usados no experimento.

COMPONENTES (% da Matéria Seca)	Concentrado (C1)	Concentrado (C2)	Concentrado (C3)
Milho Triturado	45,6	45,6	44,4
Farelo de Algodão (28)	45,6	45,6	44,4
Uréia	3,8	3,8	3,7
Calcário [†]	2,5	2,5	2,5
Suplemento Mineral [*]	1,25	1,25	1,25
Cloreto de Potássio	1,25	1,25	1,25
Bicarbonato de Sódio	-	-	2,5
Taurotec [*]	-	0,037	-

[†] Taurotec - Produto comercializado pela Roche do Brasil com 15% de lasalocida sódica.

^{*} Suplemento mineral: Sulfato de amônio: 41,5% Iodato de potássio: 0,017%
 Cloreto de sódio : 41,5% Sulfato de cobalto: 0,014%
 Óxido de magnésio: 13,8% Selenito de sódio : 0,011%
 Sulfato de zinco : 0,34% Vitamina ADE : 2,8%
 Sulfato de cobre : 0,083%

^{*} Calcário dolomítico com PRNT = 90% (Minercal)

A tabela 2 apresenta a proporção estimada dos ingredientes das 4 dietas empregadas no experimento, expressa em base de matéria seca.

Tabela 2. Proporção dos ingredientes nas dietas experimentais.

Ingredientes (% da MS)	A	B	C	D
BTPV %	50	50	60	50
Concentrado %				
C1	40	-	-	-
C2	-	40	-	-
C3	-	-	40	40
Cana Picada %	10	10	-	10

A tabela 3 apresenta a composição estimada dos alimentos empregados na formulação das dietas experimentais, expressa em base de matéria seca.

Tabela 3. Composição estimada dos alimentos utilizados, expressa em base de matéria seca.

Composição na matéria seca	BTPV	cana-de-açúcar	Concentrado		
			C1	C2	C3
MS (% na MO)	39,90	22,90	90,40	90,20	90,30
PB (%)	1,40	2,32	31,20	32,10	29,80
ENN (%)	51,80	65,90	50,00	49,00	51,10
EE (%)	0,50	0,57	2,10	2,00	2,15
MM (%)	4,20	4,80	7,00	6,20	7,10
FB (%)	42,10	26,40	9,80	10,80	9,90
NDF (%)	65,20	53,50	-----	-----	-----
ADF (%)	64,70	36,50	14,00	16,00	16,90
IVIV (%) [*]	64,00	-----	-----	-----	-----
NDT (%) [*]	47,80	62,80	75,52	74,72	75,28
Ca (%)	-----	-----	0,67	0,87	0,90
P (%)	-----	-----	0,32	0,36	0,35
Lasalocida (ppm) ^{**}	-----	-----	-----	61,60	66,10
NaHCO ₃	-----	-----	-----	-----	-----

^{*} Estimado pela equação de regressão de KEARL, compilada por BOIN (1988).

^{**} Durante o 49 sub-período experimental o concentrado C2 apresentou 93 ppm de lasalocida sódica e o C3 apresentou 51 ppm.

Através de análises laboratoriais, foi possível estimar a composição média das quatro dietas empregadas no experimento. A tabela 4 apresenta a composição estimada das 4 dietas empregadas no experimento expressa em base de matéria seca.

Tabela 4. Composição estimada das dietas experimentais expressa em base de matéria seca.

Composição na matéria seca	Dietas			
	A	B	C	D
MS (% na MO)	46,90	46,90	51,40	46,90
PB (%)	13,41	13,77	12,76	12,85
ENN (%)	52,50	52,10	51,52	52,94
EE (%)	1,15	1,11	1,16	1,17
MM (%)	5,38	5,06	5,36	5,42
FB (%)	27,56	27,96	29,22	27,60
ADF (%)	41,60	42,40	45,58	42,76
NDT (%)	60,39	60,00	58,79	60,29
Ca (%) [†]	0,27	0,35	0,36	0,36
P (%) [†]	0,13	0,14	0,14	0,14
Lasalocida (ppm) [*]	-----	24,64	26,44	26,44

[†] Análise realizada pela Roche

Durante o 4º sub-período a dieta B apresentou 37,2 ppm de lasalocida e as dietas C e D apresentaram 20,4 ppm.

O BTPV utilizado foi produzido na Destilaria Alcídia (Teodoro Sampaio, SP), tendo sido tratado a uma pressão de 17 Kgf/cm² durante 5 minutos, de acordo com a proposta de BURGI (1985), e armazenado em silo tipo trincheira por um período de aproximadamente 6 meses. Removido para a E.S.A.L.Q., o material foi colocado sobre o solo, compactado com trator e coberto com lona plástica.

3.4. Condução do experimento

3.4.1. Período pré-experimental

O período pré-experimental teve início no dia 24 de fevereiro de 1988, e teve a duração de 25 dias. Os animais foram vacinados contra febre aftosa e vermifugados no primeiro dia deste período, utilizando o produto comercial Ripercol injetável, (cujo princípio ativo é o levamisole), na dosagem de 1 ml para cada 20 Kg de peso vivo.

Durante os primeiros dez dias de confinamento, os animais receberam uma dieta à base de BTPV à vontade, 2 Kg de concentrado com 25% de proteína bruta, 2 Kg de feno de coast-cross por cabeça/dia e o suplemento mineral empregado pelo Departamento de Zootecnia para o rebanho de corte à vontade. Nos quinze dias subsequentes, até o início do período experimental os animais receberam também à vontade, uma dieta básica com 50% de BTPV, 10% de cana picada e 40% de concentrado (base de matéria seca), sendo feita a adaptação à uréia.

3.4.2. Período experimental

Este período teve duração de 66 dias, sendo composto de 4 sub-períodos de 14 dias e um sub-período final de 10 dias, que teve que ser encurtado para permitir a retirada dos animais do Departamento de Zootecnia. Acreditou-

se na ocasião que no final do experimento, 10 dias seriam suficientes para avaliar o ganho de peso do sub-período.

Tanto a lasalocida como o bicarbonato de sódio foram introduzidos nas dietas no primeiro dia deste período, sem adaptação prévia, devido ao atraso no recebimento do ionóforo. Sabia-se que este fato reconhecidamente interferiria com o desempenho dos animais devido à falta de adaptação (GOODRICH et alii, 1984; SCHELLING, 1984).

A alimentação foi fornecida apenas uma vez ao dia, às 18 hs. Os volumosos e os concentrados respectivos eram pesados e então homogeneizados nos cochos com o auxílio de forcas, gadanhos e enxadas.

No início os animais foram pesados após jejum de 18 horas de alimento e água. Procedeu-se a uma nova vermifigação 44 dias após a primeira aplicação, utilizando o produto comercial tetramisol injetável (cujo princípio ativo é o tetramisole), na dosagem de 1 ml para cada 15 Kg de peso vivo.

Durante todo o experimento os animais tinham a disposição, à vontade, em cochos especiais, a mistura mineral utilizada pelo Departamento de Zootecnia para o rebanho de corte.

3.4.3. Coleta de dados

As pesagens dos animais foram feitas a cada 14

dias com exceção do 5º sub-período que teve duração de 10 dias. Os animais foram mantidos em jejum de água e alimento por 18 a 20 horas antes de cada pesagem. A balança era sempre aferida antes do início da coleta de dados.

Tanto o BTPV como a cana-de-açúcar eram amostrados semanalmente para determinação da matéria seca, a fim de que as proporções dos ingredientes da dieta fossem aferidas. Estas amostras também foram utilizadas para a análise bromatológica completa, realizada pelo Laboratório de Bromatologia do Departamento de Zootecnia.

Para a avaliação de consumo, o alimento fornecido era pesado diariamente, e as sobras retiradas e também pesadas diariamente. Amostras compostas eram preparadas para a determinação da matéria seca, semanalmente. Procurou-se manter um nível de sobra sempre inferior a 10% do consumido.

Os concentrados foram preparados em batidas de 250 Kg, coletando-se uma amostra por batida para a análise bromatológica.

As determinações de matéria seca em estufa, extrato etéreo, fibra bruta, extrativo não nitrogenado e cinzas foram efetuadas segundo os métodos da A.O.A.C. (1965). As determinações de NDF e ADF foram efetuadas segundo GOERING & VAN SOEST (1970). A análise de digestibilidade verdadeira "in vitro" do BTPV foi efetuada pelo método TILLEY e TERRY (1963), substituindo o segundo estágio de digestão por

extração com solução de detergente neutro segundo GOERING & VAN SOEST (1970). Essa determinação foi usada para aferir o efeito do tratamento sob pressão de vapor e tem sido usada rotineiramente pelo Departamento de Zootecnia com essa finalidade.

3.5. Delineamento experimental

O delineamento estatístico utilizado foi o fatorial em blocos casualizados, constando de 3 blocos, 4 dietas, 2 sexos e 5 sub-períodos experimentais de avaliação de desempenho. Os blocos eram desbalanceados, sendo que os de nº 1 e nº 2 eram completos, ou seja, haviam 4 parcelas (bacias) para machos e 4 para fêmeas, com dois animais em cada parcela. O bloco nº 3 continha apenas 4 parcelas experimentais referentes aos machos, pois não haviam fêmeas suficientes para completar o bloco. Havia portanto, 20 parcelas experimentais (bacias), com 2 animais cada uma, perfazendo um total de 40 animais. Os animais foram pesados e agrupados nos blocos, procurando se obter a maior uniformidade possível dentro de cada bloco. Procedeu-se então ao sorteio dos tratamentos (dietas).

A análise estatística dos dados foi realizada através do procedimento "GLM" de análise de variância do programa estatístico "SAS (1988)".

As variáveis analisadas foram: consumo de

matéria seca, ganho de peso e conversão alimentar, sendo a comparação entre médias realizada pelo teste "Média dos quadrados mínimos" (LSM), adotando o nível de probabilidade igual ou inferior a 5% como estatisticamente significativo. A análise estatística para ganho de peso individual foi efetuada por covariância, sendo os dados ajustados ao peso vivo inicial dos animais.

O esquema de análise de variância utilizado foi o seguinte.

Causa da Variação	Graus de Liberdade
Bloco	2
Sub-período (P)	4
Dieta D	3
Sexo (S)	1
DxS	3
PxD	12
PxS	4
PxDxS	12
Resíduo	53
Total	94

Durante o transcorrer do experimento houve a perda de 3 parcelas experimentais relacionadas a seguir:

- No bloco 1 foi perdido o tratamento referente a dieta D para fêmeas nos sub-períodos 4 e 5.
- No bloco 3 foi perdido o tratamento referente a dieta D para machos nos sub-períodos 4 e 5.
- No bloco 3 foi perdido o tratamento referente a dieta A para machos no sub-período 5.

A perda das parcelas foi devido ao fato de que alguns animais apresentaram problemas de saúde não caracterizados, que afetaram o comportamento e o consumo. Foram, por esse motivo, eliminados do confinamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Consumo de matéria seca

4.1.1. Nível e comportamento de consumo

A tabela 5 mostra que a análise estatística realizada para avaliar o efeito das dietas utilizadas no presente estudo sobre o consumo diário de matéria seca, indicou efeitos semelhantes quando a variável foi analisada em termos de Kg de MS/cabeça.dia, Kg MS em %PV ou g MS/Kg PV^{0,75}. Assim sendo os resultados foram discutidos somente em função da estimativa que mostra de maneira mais precisa do ponto de vista biológico os efeitos das dietas sobre a ingestão de alimentos, ou seja, consumo em função do peso metabólico (A.R.C., 1984).

Tabela 5. Efeito das dietas sobre o consumo diário de MS estimado.

Variável	Dietas			
	A	B	C	D
g MS/Kg PV ^{0,75}	135,53 ^a	129,07 ^b	130,02 ^b	139,71 ^c
s	1,17	1,21	1,14	1,27
Kg MS/cabeça	11,52 ^a	10,96 ^b	11,11 ^b	11,95 ^c
s	0,11	0,11	0,10	0,12
Kg MS em % PV	3,09 ^a	2,94 ^b	2,96 ^b	3,18 ^c
s	0,03	0,03	0,02	0,03

a,b,c - na mesma linha médias seguidas de letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

O nível de consumo verificado neste experimento foi superior à média obtida em outros trabalhos que utilizaram dietas à base de bagaço tratado sob pressão de vapor (BTPV), e obtiveram valores entre 104 e 116 g MS/Kg PV^{0,75} (LANNA & BOIN, 1988; NUSSIO et alii, 1990). Vale ressaltar que o BTPV utilizado no presente ensaio permaneceu armazenado em silo trincheira durante aproximadamente 6 meses. Observações de campo têm levado à suposição de que o armazenamento do BTPV por um certo período antes do fornecimento aos animais, pode favorecer um consumo mais elevado de matéria seca. Este fato acentua a importância de se estudar o processo de conservação desse resíduo industrial.

O elevado consumo de matéria seca verificado em dietas à base de BTPV deve-se principalmente à alta taxa de passagem ruminal, conforme observações realizadas por CASTRO (1989). O tratamento sob pressão de vapor reduz o tamanho das partículas do bagaço, aumentando a sua friabilidade e densidade, favorecendo assim uma rápida taxa de passagem ruminal (CASTRO, 1989).

É fato conhecido que o BTPV é um alimento pobre em proteína e minerais e de médio valor energético (MATTOS, 1985). Entretanto, o elevado consumo verificado em diversos trabalhos de pesquisa (BURGI, 1985; LANNA & BOIN, 1988; NUSSIO et alii, 1990), e em confinamentos comerciais (PLANO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA, 1989), pode ser considerado

como um fator altamente positivo para o uso desse alimento. O consumo superior a praticamente 130 g de matéria seca por Kg PV^{0,75} verificado no presente experimento, possibilitou que os animais ingerissem quantidades de energia, proteína e minerais adequados para um bom desempenho, como pode ser visto na Tabela 6, que mostra o consumo estimado médio de nutrientes, comparado com as exigências nutricionais dos bovinos.

A observação das estimativas apresentadas na tabela 6 mostra que o consumo de todos os nutrientes, com exceção do fósforo, foi suficiente para níveis de ganho de peso diários entre 1,2 e 1,4 Kg para machos e superior a 1 Kg para fêmeas. Deve-se ressaltar que, a aparente deficiência de fósforo, não afetou o consumo nem o ganho de peso dos bovinos confinados. Esse fato talvez possa ser explicado pela existência de mistura mineral completa à vontade no cocho durante todo o experimento, cujo consumo não foi medido.

O consumo de PB estimado para machos e fêmeas do experimento pode ser considerado elevado, quando comparado com os níveis propostos pelo NRC (1984). Entretanto, deve se considerar que dietas ricas em constituintes da parede celular podem ser melhor utilizadas pelos bovinos quando em presença de níveis mais elevados de nitrogênio, capazes de elevar a quantidade de NH_3 no fluido ruminal (TAMMINGA, 1979). Além desse aspecto, alimentos fibrosos apresentando elevada taxa de passagem ruminal, como o BTPV, poderiam ser

utilizados mais eficientemente com um nível mais elevado de proteína, capaz de favorecer uma maior taxa de degradação da fração fibrosa no rúmen (FRANCISCO Jr. & MACHADO, 1990). Pode-se também considerar que o efeito tamponante, principalmente da uréia, poderia ser benéfico em dietas à base de BTPV, já que as condições de pH no rúmen tendem a ser baixas, com o uso desse alimento (FRANCISCO Jr. & MACHADO, 1990). Outro fator a ser considerado, é que os trabalhos de PATE (1982) e CASTRO (1989) indicaram um efeito negativo do BTPV sobre a digestibilidade da proteína, e este fato poderia justificar a utilização de níveis de proteína bruta em dietas à base de BTPV acima das recomendações do NRC (1984).

A análise de variância levada a efeito para a variável consumo de matéria seca (Tabela 1 do apêndice) indicou efeitos significativos para sub-períodos e sexo, mas a interação não foi significativa. A tabela 7 mostra a análise do consumo de matéria seca nos diferentes sub-períodos experimentais para machos e fêmeas, indicando que as fêmeas consumiram significativamente mais alimento que os machos. Essa mesma característica foi observada por LANNA & BOIN (1988) trabalhando com BTPV, e foi explicado pelos autores citados, como decorrente da diferença na composição do ganho de peso corporal entre os sexos.

Tabela 6. Consumo diário de nutrientes por um bovino (macho) médio de 393 Kg, e por um bovino (fêmea) médio de 335 Kg comparado com suas exigências nutricionais.

Nutrientes	Consumo estimado	Exigências para ganhos diários		
		Macho		
		1,0 Kg	1,2 Kg	1,4 Kg
MS/cabeça/dia Kg	11,36	9,00	9,10	8,90
MS/Kg PV ^{0,75} g	128,07	100,60	101,70	99,50
NDT/dia ² Kg	6,80	6,04	6,44	6,81
PB/dia Kg	1,50	0,88	0,93	0,97
Ca/dia g	38,60	30,00	33,00	36,00
P/dia g	16,00	19,00	20,00	21,00
		Fêmea		
		0,6 Kg	0,8 Kg	1,0 Kg
MS/cabeça/dia Kg	11,40	7,30	7,40	7,20
MS/Kg PV ^{0,75} g	139,09	90,21	91,45	88,98
NDT/dia ² Kg	6,82	4,70	5,20	5,60
PB/dia Kg	1,50	0,68	0,73	0,77
Ca/dia g	38,76	21,00	23,00	26,00
P/dia g	16,00	15,00	16,00	17,00

¹ Adaptado do NRC (1984) por BOIN (1990) para bovinos (machos) de 400 Kg PV e bovinos (fêmeas) de 350 Kg PV.

² Estimado pela equação de regressão de KEARL, compilada por BOIN (1988).

Pode também ser observado na tabela 7 que o consumo de matéria seca permaneceu estável nos três primeiros sub-períodos experimentais, havendo redução a partir do 4º

sub-período. O consumo inicial mais elevado pode ser talvez explicado por um efeito compensatório, já que os animais estavam em regime de pasto durante os 4 meses que antecederam o experimento, e o período pré-experimental foi curto, com duração de 25 dias. Outra possível explicação para a queda de consumo, poderia ser uma possível alteração na qualidade de um dos ingredientes das dietas. Dentre os ingredientes utilizados, o BTPV é o que estaria mais sujeito a algum tipo de modificação. Apesar das análises bromatológicas não indicarem qualquer modificação no valor nutritivo dos alimentos, pode ter ocorrido alguma deterioração aeróbica do BTPV pela ação de microrganismos. Visualmente não foram detectadas alterações no material utilizado, apesar ter se notado a presença de fungos em pontos localizados. Trabalhos sobre conservação do BTPV são inexistentes, e a ausência de informações sobre o assunto abre a perspectiva de um novo campo de pesquisa sobre este alimento, como mencionado anteriormente. Deve-se ressaltar que apesar da queda observada durante a fase final do experimento, o consumo de matéria seca permaneceu elevado, acima de $126 \text{ g/Kg PV}^{0,75}$, nível este que possibilitou a ingestão de nutrientes em quantidades adequadas, como comentado anteriormente.

Tabela 7. Efeito do sexo e do sub-período experimental sobre o consumo de matéria seca.

Sub-período	Consumo de MS g/Kg PV ^{0,75}		
	Machos	Fêmeas	Médias
1	131,67	139,50	135,58 ^x
s	1,57	1,99	1,26
2	132,14	145,50	138,81 ^x
s	1,57	1,99	1,26
3	132,60	144,28	138,42 ^x
s	1,57	1,99	1,26
4	123,45	133,13	128,29 ^y
s	1,67	2,22	1,40
5	120,50	133,14	126,82 ^y
s	1,77	2,22	1,44
Médias	128,07 ^a	139,09 ^b	
s	0,73	1,05	

a,b,c - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).x,y,z - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

A análise de variância (Tabela 1 do apêndice) indicou efeitos significativos das dietas sobre o consumo de matéria seca, mas a interação tratamento período não foi significativa. A tabela 8 mostra os valores estimados para o consumo de matéria seca das diferentes dietas dentro dos sub-períodos experimentais, e indica que a tendência de queda de consumo com o decorrer do experimento ocorreu para todas as dietas. Assim sendo, pode-se propor que os aditivos usados não tiveram relação com os fatos observados.

Tabela 8. Efeito das dietas e dos sub-períodos sobre o consumo de MS.

Sub-período	Consumo de MS g/Kg PV ^{0,75}				Médias
	A	B	C	D	
1	140,14 ^a	128,32 ^b	134,83 ^{ab}	139,04 ^a	135,58 ^x
s	2,49	2,49	2,49	2,49	1,26
2	140,72 ^{ac}	133,65 ^b	134,50 ^{ab}	146,38 ^c	138,81 ^x
s	2,49	2,49	2,49	2,49	1,26
3	137,82 ^a	133,61 ^a	135,82 ^a	146,42 ^b	138,41 ^x
s	2,49	2,49	2,49	2,49	1,26
4	129,62 ^{ab}	125,72 ^a	122,93 ^a	134,88 ^b	128,29 ^y
s	2,49	2,76	2,49	3,16	1,40
5	129,36 ^a	124,07 ^{ab}	122,03 ^b	131,83 ^a	126,82 ^y
s	2,76	2,76	2,49	3,16	1,44
Média	135,53 ^a	129,07 ^b	130,02 ^b	139,71 ^c	
s	1,17	1,21	1,14	1,27	

a,b,c - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).x,y,z - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

4.1.2. Efeito das dietas sobre o consumo

a. Adição de lasalocida sódica

Analisando os dados contidos na tabela 8, e comparando a dieta testemunha A com a dieta B, verifica-se que o aditivo lasalocida promoveu uma redução significativa no consumo de matéria seca, de aproximadamente 4,7%. Reduções de 5% no consumo em presença de lasalocida sódica, estão de acordo com os dados da literatura para bovinos confinados, e o fato parece bem estabelecido para dietas ricas em grãos

(CHALUPA, 1977; CHALUPA, 1980; BERGEN & BATES, 1984 e GOODRICH et alii, 1984). Entretanto, observações sobre dietas com níveis intermediários de concentrado são escassas, apesar de SCHELLING (1984) ter citado, em sua revisão, reduções de 3% no consumo com dietas mais volumosas.

A redução no consumo nos primeiros sub-períodos experimentais em que os animais receberam a ração com lasalocida, poderia ser atribuída à falta de adaptação ao aditivo. No presente trabalho os animais não foram adaptados ao ionóforo durante o período pré experimental, ou seja, o aditivo foi introduzido na dieta no primeiro dia do período experimental, e em dose normal, porque houve atraso no recebimento do produto. Revisando o uso de ionóforos em dietas para bovinos, SCHELLING (1984) relatou que em animais não adaptados, o efeito depressivo do aditivo sobre o consumo era acentuado na fase inicial de fornecimento. O autor mencionou que redução de até 16% pode ser observada quando o ionóforo é introduzido de forma abrupta e, à medida que ocorre a adaptação, há tendência de redução do efeito depressivo. Esse fato foi observado no presente experimento pois, como pode ser visto na tabela 8, após o 2º sub-período experimental não mais ocorreu a mencionada redução.

A tabela 9 mostra o consumo estimado de matéria seca para machos e fêmeas nas diferentes dietas testadas. A análise de variância (Tabela 1 do apêndice) mostrou efeitos significativos para sexo, mas a interação

dessa variável com as dietas não foi significativa. Pode-se observar, que a tendência de redução no consumo pela adição de lasalocida (A comparada com B) ocorreu tanto para machos (redução de 5,5%) quanto para fêmeas (redução de 4,0%).

Tabela 9. Efeito do sexo e das dietas sobre o consumo de matéria seca.

Dietas		Consumo de MS g/Kg PV ^{0,75}		
		Machos	Fêmeas	Médias
A	s	129,94 ^x 1,47	141,12 ^x 1,80	135,53 ^x 1,17
B	s	122,74 ^y 1,55	135,40 ^y 1,80	129,07 ^y 1,21
C	s	125,45 ^y 1,40	134,59 ^y 1,80	130,02 ^y 1,14
D	s	134,15 ^z 1,40	145,27 ^x 2,12	139,71 ^z 1,27
Médias	s	128,07 ^a 0,73	139,09 ^b 1,05	

a,b,c - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

x,y,z - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

A observação da tabela 10 mostra que o efeito depressivo da lasalocida sódica sobre o consumo de matéria seca por machos e fêmeas, dentro de cada sub-período experimental, foi diferente. Pode-se verificar que para os machos foram detectados reduções significativas no 1º (redução de 13,0%) e no 2º sub-período (redução de 6,8%) ao passo que para as fêmeas o efeito não foi observado, apesar dos valores absolutos de consumo terem indicado tendência de

redução em todos os sub-períodos.

Tabela 10. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre o consumo das dietas A e B.

Sub-período	Dieta	Consumo de MS g/Kg PV ^{0,75}			
		Machos	s	Fêmeas	s
1	A	137,93 ^x	3,13	142,34 ^x	3,88
	B	119,93 ^y	3,13	136,71 ^x	3,88
2	A	133,72 ^x	3,13	147,72 ^x	3,88
	B	124,67 ^y	3,13	142,64 ^x	3,88
3	A	131,46 ^x	3,13	144,19 ^x	3,88
	B	129,00 ^x	3,13	138,22 ^x	3,88
4	A	123,09 ^x	3,13	136,15 ^x	3,88
	B	121,87 ^x	3,87	129,57 ^x	3,88
5	A	123,53 ^x	3,87	135,20 ^x	3,88
	B	118,25 ^x	3,87	129,90 ^x	3,88

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

A observação dos efeitos mencionados parece indicar uma maior sensibilidade dos machos em relação ao uso da lasalocida, principalmente na fase inicial de fornecimento. A literatura revisada não fornece nenhuma referência de comportamento diferenciado entre machos e fêmeas à lasalocida. Além desse aspecto, deve-se atentar para o fato que, na tabela 9, quando foi verificado o efeito dos tratamentos sobre o consumo de machos e fêmeas, havia sido detectada uma redução significativa, da ordem de 4,05% no consumo de fêmeas. O pequeno número de observações realizados para fêmeas pode ter afetado a análise da interação tripla

para este sexo. Entretanto; trabalhando com dietas semelhantes às utilizadas neste experimento, SILVA (1990) não obteve efeito depressivo da lasalocida sódica sobre o consumo de matéria seca de vacas leiteiras adaptadas ao ionóforo.

b. Adição de bicarbonato de sódio às dietas contendo lasalocida

No presente trabalho não foi possível caracterizar o efeito isolado do bicarbonato de sódio sobre o consumo de matéria seca. Assim o efeito desse aditivo foi analisado de duas maneiras distintas, ou seja, o efeito da adição de bicarbonato em dietas contendo lasalocida (B comparada com D) e o efeito combinado dos dois aditivos (A comparada com D).

Através dos dados inseridos na tabela 8, pode-se verificar que a comparação das dietas B (129,07 g MS/Kg $PV^{0,75}$) e D (139,71 g MS/Kg $PV^{0,75}$) indicou que na média, a adição de bicarbonato à dieta contendo lasalocida promoveu um aumento significativo no consumo da ordem de 8,2%. Revisando cerca de 40 trabalhos sobre o efeito do bicarbonato de sódio na produção de leite e gordura, STAPLES & LOUGH (1989) relataram que o incremento de produção poderia estar relacionado com um maior consumo, sendo o efeito observado para dietas contendo alimentos ácidos. Uma das hipóteses para justificar esse efeito seria o aumento na taxa de passagem de alimentos pelo rúmen, devido às alterações na concentração

osmótica do fluido ruminal, mas o efeito só é observado com níveis muito elevados de bicarbonato, provocando nesse caso redução no consumo (STAPLES & LOUGH, 1988). Segundo LANNA & BOIN (1988) a neutralização no cocho dos ácidos existentes no BTPV poderia ser o fator a promover o consumo. Outra possibilidade para explicar o incremento de consumo com o BTPV seria o efeito positivo do bicarbonato sobre o ambiente ruminal, favorecendo a taxa de degradação da fração fibrosa no rúmen, fato esse que aumentaria o consumo (LANNA & BOIN, 1988)

A ausência de efeito positivo do NaHCO_3 sobre o consumo de matéria seca de dietas à base de BTPV, contendo (SILVA, 1990) ou não (NUSSIO et alii, 1990) lasalocida pode ser consequência da presença de calcário calcítico de granulometria reduzida, utilizado nas dietas. Trabalhos têm mostrado que calcários calcíticos de alta reatividade podem agir como agentes tamponantes a nível de rúmen (WHEELER et alii, 1981b; TEH et alii, 1985).

Analisando na tabela 8 o efeito do bicarbonato sobre as dietas contendo lasalocida (B comparada com D), observa-se que o efeito significativo de aumento de consumo ocorreu no 4 primeiros sub-períodos experimentais. No 5º sub-período experimental o nível de significância detectado para a diferença foi de $P < 0,05$. Assim sendo pode-se considerar que também na fase final do experimento houve tendência de aumento. Essas observações não estão de acordo com a

literatura, já que revisando o assunto WHEELER (1980) relatou que, de modo geral, o efeito benéfico do bicarbonato sobre o consumo ocorre principalmente na fase inicial do fornecimento. Trabalhando com dietas à base de BTPV, LANNA & BOIN (1988) também verificaram efeito positivo do bicarbonato apenas na fase inicial do experimento. Deve-se ressaltar que no presente experimento o efeito do bicarbonato foi avaliado na presença de lasalocida sódica, que pode talvez afetar o padrão de resposta dos animais à presença do bicarbonato.

Na tabela 9, pode-se verificar que o efeito significativo do NaHCO_3 sobre o consumo da dieta contendo lasalocida (B comparada com D), foi observado tanto para machos quanto para fêmeas. Para o caso dos machos o aumento foi de 9,3%, enquanto que para as fêmeas o incremento foi de 7,3%. Trabalhando com animais semelhantes aos do presente experimento, LANNA e BOIN (1988) não verificaram efeito de NaHCO_3 sobre o consumo de fêmeas recebendo dietas sem a adição de lasalocida.

Verifica-se na tabela 11, que a análise do efeito do NaHCO_3 sobre o consumo de machos e de fêmeas dentro de cada sub-período experimental, indicou efeitos diferentes. Os dados parecem indicar que os efeitos foram bem pronunciados nos machos, já que ocorreram diferenças significativas nos três primeiros sub-períodos experimentais, ao passo que para as fêmeas, a análise estatística não indicou incrementos significativos, apesar de se observar

tendência de aumento pela análise dos dados coletados. Como discutido anteriormente, o pequeno número de observações realizadas para fêmeas, pode não ter sido suficiente para detectar efeitos significativos. Tomando-se por base a análise, aparece também neste caso a sugestão de que os machos foram mais sensíveis que as fêmeas à ação do bicarbonato de sódio.

Na análise dos dados inseridos na tabela 11, aparece a tendência relatada na literatura de que o efeito benéfico do bicarbonato ocorre principalmente na fase inicial de fornecimento (WHEELER, 1980; LANNA & BOIN, 1988), sendo o efeito caracterizado para os machos.

Tabela 11. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre as dietas B e D.

Sub-período	Dietas	Consumo de MS g/Kg PV ^{0,75}			
		Machos	s	Fêmeas	s
1	B	119,93 ^x	3,13	136,71 ^x	3,88
	D	134,44 ^y	3,13	143,64 ^x	3,88
2	B	124,67 ^x	3,13	142,64 ^x	3,88
	D	141,20 ^y	3,13	151,55 ^x	3,88
3	B	129,00 ^x	3,13	138,22 ^x	3,88
	D	142,27 ^y	3,13	150,56 ^y	3,88
4	B	121,87 ^x	3,88	129,57 ^x	3,88
	D	128,92 ^x	3,13	140,84 ^x	5,49
5	B	118,25 ^x	3,88	129,90 ^x	3,88
	D	123,91 ^x	3,13	139,75 ^x	5,49

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

Considerando na tabela 8 a comparação entre as dietas D e A, verifica-se que houve um efeito significativo da associação dos dois aditivos testados, aumentando o consumo de matéria seca em 3,1% (D = 139,71 e A = 135,53 g/Kg PV^{0,75}). Na mesma tabela pode-se observar que houve uma tendência de efeito positivo em todos os sub-períodos, mas efeito significativo somente no terceiro. Como discutido anteriormente a adição de lasalocida sódica reduziu o consumo de matéria seca na fase inicial de fornecimento da dieta, enquanto que efeito da adição de NaHCO₃ ocorreu em todos os sub-períodos. Os dados indicam que o bicarbonato em associação com a lasalocida, foi capaz de evitar o efeito depressivo do ionóforo sobre consumo de matéria seca na fase inicial, favorecendo assim a adaptação dos animais.

Os dados da tabela 9 mostram que a associação do NaHCO₃ com o ionóforo (D comparado com A) promoveu aumentos significativos no consumo de matéria seca dos machos da ordem de 3,2% (D = 134,15 e A = 129,94 g/Kg PV^{0,75}) ao passo que para as fêmeas a análise estatística não detectou aumentos significativos (2,94%).

A tabela 12 mostra o efeito das dietas e de sexo dentro dos sub-períodos experimentais e indica que, como nos desdobramentos anteriores, o efeito associado (D comparada com A) do bicarbonato e da lasalocida promoveu resultados diferentes em machos e fêmeas.

Tabela 12. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre o consumo das dietas A e D.

Sub-período	Dietas	Consumo de MS g/Kg $PV^{0,75}$			
		Machos	s	Fêmeas	s
1	A	137,92 ^x	3,13	142,35 ^x	3,88
	D	134,44 ^x	3,13	143,64 ^x	3,88
2	A	133,72 ^x	3,13	147,72 ^x	3,88
	D	141,20 ^x	3,13	151,55 ^x	3,88
3	A	131,46 ^x	3,13	144,19 ^x	3,88
	D	142,27 ^y	3,13	150,56 ^x	3,88
4	A	123,09 ^x	3,13	136,15 ^x	3,88
	D	128,92 ^x	3,13	140,85 ^x	5,49
5	A	123,53 ^x	3,88	135,20 ^x	3,88
	D	123,91 ^x	3,13	139,75 ^x	5,49

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

Para o caso dos machos, o aumento significativo no consumo de matéria seca pelo efeito associado de lasalocida sódica e do bicarbonato, só apareceu no 3º sub-período experimental, de acordo com a informação já discutida dos dados contidos na tabela 8. Para as fêmeas pode ser notado novamente a tendência de aumento em todos os sub-períodos, sem a caracterização de diferença significativa, como ocorrida anteriormente.

Com base nas comparações efetuadas entre os efeitos das dietas sobre o consumo de matéria seca (A x B, B x D, e A x D), pode-se concluir que o bicarbonato de sódio foi capaz de anular o efeito depressivo da lasalocida. O mecanismo pelo qual o NaHCO_3 pode anular ou reduzir o efeito depressivo do ionóforo sobre o consumo é desconhecido, mas

existem informações sobre o fato de que a lasalocida reduz o consumo afetando a taxa de passagem ruminal, através da redução na taxa de degradação da porção fibrosa, principalmente de animais não adaptados (RUSSELL & STROBEL, 1989), alteração na osmolalidade do fluido ruminal (STARNES et alii, 1984), e redução no número e força das contrações do trato digestivo (DESWYSEN & ELLIS, 1988). Não existem na literatura informações quanto ao efeito do NaHCO_3 sobre as contrações do trato digestivo. Com respeito a osmolalidade do fluido ruminal STAPLES e LOUGH (1989) afirmam que esta não é afetada por níveis de NaHCO_3 entre 0,7 a 1,5% da MS da dieta, porém, a degradação da fração fibrosa da dieta pode ser afetada pelo NaHCO_3 . Assim sendo, em dietas à base de BTPV, onde a fração fibrosa é considerável, o NaHCO_3 poderia talvez reduzir o efeito depressivo do ionóforo sobre a taxa de degradação desta fração na fase inicial de fornecimento do aditivo. Pode-se propor que a manutenção de um pH ruminal acima de 6,0 criaria uma condição mais favorável às bactérias celulolíticas sensíveis ao ionóforo, como *Ruminococcus* e *Butyrovibrio*, como também poderia acelerar a taxa de crescimento (reduzir o "lag time") de bactérias pouco sensíveis ao ionóforo como *Bacteroides succinogenes* (RUSSELL & STROBEL, 1989). Esses fatos poderiam permitir uma adaptação mais rápida dos animais ao ionóforo. SILVA (1990) não verificou efeito depressivo da lasalocida sódica sobre o consumo de matéria seca de vacas leiteiras recebendo dietas

à base de BTPV, quando o pH médio do fluido ruminal foi de 6,74. Além desse aspecto, a literatura indica que o efeito depressivo do ionóforo é maior em dietas ricas em grãos, onde o pH ruminal é mais baixo (CHALUPA, 1977; BERGEN & BATES, 1984).

c) Ausência de cana-de-açúcar em dietas contendo lasalocida e bicarbonato.

Tomando-se como base os dados inseridos na tabela 8, pode-se verificar que a comparação entre as dietas D (139,71 g/Kg PV^{0,75}) e C (130,02 g/Kg PV^{0,75}) indicou uma redução significativa no consumo de matéria seca da ordem de 6,9%, quando a cana-de-açúcar picada foi retirada da dieta à base de BTPV contendo lasalocida e bicarbonato. Na realidade, o maior valor estimado de consumo foi para a dieta D, havendo uma tendência de se observar esse fato em praticamente todos os sub-períodos experimentais, com exceção do primeiro. Pode-se também verificar consumos elevados para a dieta A, onde os animais receberam a dieta de BTPV sem aditivos mas com cana picada.

A análise detalhada dos dados contidos na tabela 8, indica que efeitos significativos da retirada da cana picada sobre o consumo só foram observados à partir do segundo sub-período experimental. Esse fato pode estar relacionado com a ação depressiva do ionóforo na fase

inicial, como discutido anteriormente, e ao fato do bicarbonato ter mostrado efeito positivo sobre o incremento no consumo de matéria seca no tratamento T3.

O efeito negativo da retirada da cana-de-açúcar picada sobre o consumo de matéria seca, poderia ser atribuído ao efeito fisiológico da fração fibrosa no rúmen e no trato digestivo inferior, pois o tratamento sob pressão de vapor reduz o tamanho das partículas do bagaço e aumenta a sua friabilidade (BURGI, 1985). Esse fato pode limitar a atuação da fração fibrosa do BTPV no estímulo à ruminação e ao peristaltismo intestinal (CASTRO, 1989).

Pode-se sugerir, com base em observações de campo, não sistemáticas, que a cana pode ter também atuado como um agente palatabilizante. Durante a condução do ensaio, foi observado que após a distribuição do alimento, os animais recebendo dietas contendo cana-de-açúcar, dirigiam-se ao cocho rapidamente, e começavam a comer antes de todos os outros. Essa suposição pode ser de certa maneira suportada pelo fato de que nos experimentos onde a fonte de fibra íntegra era o bagaço de cana, sem tratamento, não houve estímulo de consumo (SILVA, 1990), talvez por ser esse volumoso de baixa palatabilidade.

Na tabela 9 pode-se verificar que, tanto para os machos quanto para as fêmeas, a retirada de cana picada reduziu significativamente o consumo de matéria seca (D comparada com C). Para o caso dos machos, a redução foi de

6,5% ($D = 134,15$ e $C = 125,45$ g/Kg $PV^{0,75}$) enquanto que para as fêmeas, a redução foi de 7,3% ($D = 145,27$ e $C = 134,59$ g/Kg $PV^{0,75}$). Na média, o consumo da dieta C ($130,02$ g/Kg $PV^{0,75}$) foi significativamente inferior ao consumo da dieta D ($139,71$ g/Kg $PV^{0,75}$), sendo a diferença da ordem de 6,9%.

A análise da tabela 13, mostra que a redução no consumo de matéria seca observada para machos e fêmeas dentro de cada sub-período experimental foi diferente. Pode-se verificar que para os machos os efeitos significativos de redução no consumo de matéria seca só apareceram a partir do 2º sub-período, permanecendo o efeito até o 4º. Para o caso das fêmeas o efeito foi menos evidente. Apesar desse fato, deve-se observar que a tendência de redução foi nítida em todos os sub-períodos para as fêmeas, mas não para os machos, onde no primeiro sub-período não apareceu a tendência. Esse fato pode estar associado com a maior sensibilidade dos machos à lasalocida, como discutida anteriormente.

Levando-se em consideração o elevado consumo da dieta C (adição de lasalocida e bicarbonato, sem cana picada), da ordem de 130 g MS/Kg $PV^{0,75}$, e a ausência de distúrbios digestivos durante o experimento, pode-se propor que a adição de cana picada às dietas de BTPV, comuns em confinamentos comerciais, pode ser dispensada quando a ração contém lasalocida e bicarbonato.

Tabela 13. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre o consumo das dietas C e D.

Sub-período	Dietas	Consumo de MS g/Kg PV ^{0,75}			
		Machos	s	Fêmeas	s
1	C	134,38 ^x	3,13	135,29 ^x	3,88
	D	134,43 ^x	3,13	143,64 ^x	3,88
2	C	128,97 ^x	3,13	140,02 ^x	3,88
	D	141,20 ^y	3,13	151,55 ^y	3,88
3	C	127,67 ^x	3,13	143,98 ^x	3,88
	D	142,27 ^y	3,13	150,57 ^x	3,88
4	C	119,92 ^x	3,13	125,94 ^x	3,88
	D	128,92 ^y	3,13	140,84 ^y	5,49
5	C	116,32 ^x	3,13	127,74 ^x	3,88
	D	123,91 ^x	3,13	139,74 ^x	5,49

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

4.2. Ganho de peso vivo diário

4.2.1. Nível e comportamento de ganho de peso

A análise de variância (Tabela 2 do apêndice) revelou que o ganho de peso diário estimado no presente experimento, só foi afetado significativamente pelo sexo e por sub-período. A tabela 14, apresenta o ganho de peso diário de machos e fêmeas nos diferentes sub-períodos experimentais e indica que os machos ganharam significativamente mais peso (25%) do que as fêmeas. Essas observações estão de acordo com o esperado, já que inúmeros trabalhos de pesquisa revelam que os machos são capazes de

ganhar mais peso que as fêmeas da mesma raça (SILVEIRA & DOMINGUES, 1978; ROCHE & QUIRKE, 1986; LANNA & BOIN, 1988; NUSSIO et alii, 1990), devido à secreção de hormônios esteróides sexuais, principalmente testosterona (ROCHE & QUIRKE, 1986).

Tabela 14. Ganho de peso diário de machos e fêmeas.

Sub-período		Ganho diário em Kg		
		Machos	Fêmeas	Médias
1	s	1,11 ^{xy} 0,084	0,93 ^{xy} 0,128	1,02 ^x 0,082
2	s	1,63 ^z 0,082	1,26 ^z 0,115	1,44 ^y 0,069
3	s	1,40 ^z 0,098	1,23 ^z 0,104	1,31 ^{yz} 0,068
4	s	1,42 ^{xz} 0,129	0,88 ^y 0,115	1,15 ^{xz} 0,091
5	s	1,09 ^y 0,166	1,03 ^{yz} 0,121	1,06 ^x 0,116
Médias	s	1,33 ^a 0,067	1,06 ^b 0,057	

a,b - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

x,y,z - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

Com os dados inseridos na tabela 14, pode-se verificar que o ganho de peso do lote experimental durante os 66 dias de confinamento foi de 1,20 Kg/cab/dia. Este nível pode ser considerado muito bom, principalmente levando-se em conta que 40% dos animais eram fêmeas. Deve-se mencionar que

o ganho dos machos está de acordo com a expectativa estimada de consumo de nutrientes (Tabela 6), como discutido anteriormente, enquanto o ganho de peso das fêmeas não foi compatível com o elevado consumo verificado. As estimativas indicam que dietas contendo 60% de BTPV e 40% de concentrado com base na matéria seca possibilitam desempenho satisfatório de bovinos com idade inferior a 20 meses. Sem dúvida, como apontado anteriormente, o elevado consumo de matéria seca das dietas contribuiu para a obtenção de ganhos satisfatórios.

Para a análise de ganho de peso, deve-se atentar para o fato de que durante os 4 meses que antecederam o experimento, os animais permaneceram em regime de pasto, onde o ritmo de crescimento foi reduzido, porque haviam saído de um confinamento de 107 dias, onde ganharam 0,930 Kg/cab/dia. Colocados novamente no confinamento, durante o período pré-experimental de 25 dias, ganharam 1,16 Kg/cab/dia, ao passo que no primeiro sub-período experimental, o ganho médio foi reduzido para 1,02 Kg/cab/dia (Tabela 14), talvez devido ao efeito depressivo do ionóforo, reduzindo o consumo de alimento (Tabela 9). Nos sub-períodos 2 e 3, os ganhos de peso foram bastante elevados (Tabela 14) tanto para fêmeas quanto para machos, atingindo uma média 1,44 Kg/cab/dia e 1,31 Kg/cab/dia, respectivamente. Esses fatos permitem sugerir a possibilidade de ter ocorrido nessa fase um efeito de ganho compensatório. Em condições normais o consumo de 132,14 g de MS/Kg PV^{0,75} pelos machos (Tabela 7)

durante o 2º sub-período, dificilmente permitiria ganhos diários da ordem de 1,63 Kg/cabeça (NRC, 1984), principalmente considerando que cerca de 45 a 50% do NDT estimado da dieta era proveniente do BTPV. O ganho verificado para os machos durante o 5º sub-período experimental, onde provavelmente já não havia mais efeito do ganho compensatório, pode ser considerado satisfatório.

Na análise dos ganhos de peso elevados obtidos no presente experimento, deve-se considerar ainda o fato de que animais zebuínos bem alimentados, entre 15 e 20 meses, provavelmente encontram-se na fase da puberdade. Sabe-se que esta é a fase onde o ritmo de crescimento é máximo (SILVEIRA e DOMINGUES, 1978), e assim sendo, os animais apresentavam condições ideais para um bom desempenho.

4.2.2. Efeito das dietas sobre o ganho de peso

a. Adição de lasalocida sódica

A tabela 15 mostra o efeito das dietas sobre o ganho de peso. Pode-se observar, na comparação entre as dietas B e A, que a adição de lasalocida sódica não afetou o ganho diário. Além disso, a ausência de efeito ocorreu tanto para machos quanto para fêmeas. A análise de variância (Tabela 2 do apêndice) não indicou interação significativa entre essas variáveis.

A observação de que o ganho diário não foi

aumentado pela adição do ionóforo esta em desacordo com a literatura, pois CHALUPA (1977) e GOODRICH et alii (1984) relataram aumentos superiores a 13% para animais recebendo dietas mais volumosas adicionadas de ionóforos. Deve-se atentar que ocorreu em machos uma tendência (não significativa) de aumento no ganho de peso. A curta duração do experimento (66 dias), o número reduzido de observações e o elevado coeficiente de variação para ganho de peso, podem ter contribuído para que não fossem caracterizados efeitos esperados.

Tabela 15. Efeito do sexo e das dietas sobre o ganho de peso.

Dietas		Ganho diário em Kg		
		Machos	Fêmeas	Médias
A	s	1,25 0,094	1,04 0,095	1,15 ^x 0,063
B	s	1,33 0,095	1,00 0,096	1,17 ^x 0,064
C	s	1,29 0,092	1,07 0,094	1,18 ^x 0,063
D	s	1,44 0,093	1,15 0,110	1,30 ^x 0,069
Médias	s	1,33 ^a 0,067	1,06 ^b 0,057	

a,b - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

Na tabela 16, pode ser observado o efeito das dietas sobre o ganho diário de machos e fêmeas dentro de cada

sub-período experimental. Pode ser visto que a adição de lasalocida sódica à dieta básica de BTPV (A) reduziu significativamente o ganho diário dos machos na fase inicial do trabalho, ou seja, quando os animais não estavam adaptados, tendo seu desempenho prejudicado pela introdução abrupta do ionóforo na dieta ao nível de 24,6 ppm da matéria seca. Para o caso das fêmeas a tendência de redução não foi significativa, talvez devido ao número reduzido de observações e o elevado coeficiente de variação verificado.

Tabela 16. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre o ganho de peso nas dietas A e B.

Sub-período	Dietas	Ganho diário em Kg			
		Machos	s	Fêmeas	s
1	A	1,35 ^x	0,16	0,94 ^x	0,21
	B	0,79 ^y	0,16	0,60 ^x	0,21
2	A	1,39 ^x	0,16	1,25 ^x	0,21
	B	1,66 ^x	0,16	1,34 ^x	0,21
3	A	1,20 ^x	0,17	1,07 ^x	0,20
	B	1,37 ^x	0,17	1,21 ^x	0,20
4	A	1,24 ^x	0,19	0,68 ^x	0,20
	B	1,43 ^x	0,22	0,66 ^x	0,20
5	A	1,07 ^x	0,24	1,26 ^x	0,20
	B	1,39 ^x	0,24	1,19 ^x	0,24

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

Apenas a redução no consumo de matéria seca de cerca de 13,0% (Tabela 10), devido à inclusão do ionóforo na dieta, talvez não explique totalmente a queda de ganho de peso de 41,5% observada para os machos na dieta B (Tabela 16)

no 12 sub-período experimental. Pode-se também observar que para as fêmeas, apesar de não ter sido identificada significância, a redução foi de 36,2%. O consumo de 119,93 g MS/Kg PV^{0,75} para os machos e de 136,71 g MS/Kg PV^{0,75} para as fêmeas (Tabela 10) durante o 12 sub-período, seria suficiente para permitir ganhos bem mais elevados que os observados. Sabe-se que a eficiência da utilização do alimento é prejudicada quando o animal ainda não está adaptado ao ionóforo (SCHELLING, 1984; GOODRICH et alii, 1984), e o efeito deve ser pronunciado nas dietas ricas em alimentos fibrosos, como o BTPV.

b. Adição de bicarbonato de sódio às dietas contendo lasalocida

A observação da Tabela 15 permite ver que a comparação entre as dietas B e D indica que a adição de NaHCO₃ em uma dieta contendo lasalocida não promoveu aumentos significativos no ganho de peso dos bovinos confinados. Entretanto, torna-se possível verificar que houve tendência de aumento tanto para o grupo dos machos quanto para o grupo das fêmeas, como também, para a média dos tratamentos (11% de incremento). Na realidade, era de se esperar uma elevação do ganho de peso, pois como discutido anteriormente (Tabela 8), a adição do bicarbonato à dieta contendo lasalocida elevou significativamente o consumo de matéria seca em 8,2%, e a

literatura mostra efeitos benéficos do uso de NaHCO_3 sobre a ingestão de matéria seca (STAPLES & LOUGH, 1989; LANNA & BOIN, 1988).

Na Tabela 17, pode-se observar que houve no 1º sub-período aumento significativo no ganho de peso dos bovinos que receberam bicarbonato de sódio na dieta (D), quando comparado com aqueles que receberam a ração básica contendo lasalocida (B), sendo o incremento da ordem de 67,1%.

Tabela 17. Efeito das dietas e dos sub-períodos sobre o ganho de peso.

Sub-período	Ganho diário em Kg				Médias
	A	B	C	D	
1	1,15 ^a	0,70 ^b	1,08 ^a	1,17 ^a	1,02 ^x
s	0,14	0,14	0,14	0,14	0,082
2	1,32 ^a	1,50 ^a	1,38 ^a	1,57 ^a	1,44 ^x
s	0,13	0,13	0,13	0,14	0,069
3	1,14 ^a	1,29 ^a	1,34 ^a	1,49 ^a	1,31 ^x
s	0,13	0,13	0,13	0,13	0,068
4	0,96 ^a	1,04 ^{ab}	1,22 ^{ab}	1,39 ^b	1,15 ^x
s	0,14	0,15	0,14	0,17	0,091
5	1,17 ^{ab}	1,29 ^a	0,89 ^b	0,88 ^{ab}	1,06 ^x
s	0,17	0,16	0,16	0,19	0,116
Média	1,15 ^a	1,17 ^a	1,18 ^a	1,30 ^a	
s	0,063	0,064	0,063	0,069	

a,b,c - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

O efeito bastante pronunciado do NaHCO_3 sobre o ganho diário durante o 1º sub-período experimental está de acordo com as observações de WHEELER (1980) que relatou que o efeito benéfico dos agentes tamponantes sobre o desempenho dos bovinos manifesta-se principalmente na fase inicial do fornecimento. Os dados de LANNA & BOIN (1988), utilizando dietas com 55% de BTPV, 5% de BIN e 40% de concentrado, na base de matéria seca, também indicaram efeito positivo do NaHCO_3 sobre ganho na fase inicial do fornecimento da dieta. Deve-se atentar para o fato de que houve tendência de melhor desempenho do lote recebendo a dieta D até o 4º sub-período. Esse melhor desempenho pode ser atribuído ao fato de que o consumo de matéria seca foi significativamente maior para a dieta D comparada com B (Tabela 8), aparecendo também a tendência de maior consumo durante todo o período experimental. Como discutido anteriormente, a adição de NaHCO_3 à dietas de BTPV contendo lasalocida pode elevar o consumo e resultar em melhor desempenho animal.

A Tabela 18 sumariza o efeito das dietas sobre o ganho de peso diário de machos e fêmeas dentro de cada sub-período experimental. Pode-se observar que tanto nos machos como nas fêmeas o efeito do NaHCO_3 sobre o ganho de peso ocorreu principalmente durante o 1º sub-período experimental, sendo o efeito significativo somente para as fêmeas. Entretanto, pode-se observar que houve tendência de ganhos maiores para a dieta D em quase todos os sub-períodos

experimentais, para os dois sexos. A resposta mais acentuada para as fêmeas no 1º sub-período, talvez possa ser atribuído ao consumo elevado de 143,64 g MS/Kg PV^{0,75} (Tabela 13) naquela fase experimental. Como discutido anteriormente, os machos apresentaram tendência de maior sensibilidade à ação da lasalocida na fase inicial de fornecimento, e por isso, talvez o efeito do bicarbonato tenha sido menos evidente. LANNA & BOIN (1988) não verificaram resposta de fêmeas à adição de NaHCO₃ em dietas baseadas em BTPV.

Tabela 18. Efeito do sexo e dos sub-períodos experimentais sobre o ganho de peso nas dietas B e D.

Sub-período	Dietas	Ganho diário em Kg			
		Machos	s	Fêmeas	s
1	B	0,79 ^x	0,16	0,60 ^x	0,21
	D	1,13 ^x	0,16	1,21 ^y	0,21
2	B	1,66 ^x	0,16	1,34 ^x	0,21
	D	1,82 ^x	0,16	1,32 ^x	0,21
3	B	1,37 ^x	0,17	1,21 ^x	0,20
	D	1,58 ^x	0,17	1,39 ^x	0,20
4	B	1,43 ^x	0,22	0,66 ^x	0,20
	D	1,55 ^x	0,19	1,24 ^x	0,28
5	B	1,39 ^x	0,24	1,19 ^x	0,20
	D	1,15 ^x	0,21	0,61 ^x	0,29

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si (P ≤ 0,05).

Vale a pena ressaltar, novamente, com base nos dados apresentados na Tabela 18, os elevados ganhos de peso conseguidos no trabalho experimental. Pode-se observar que a partir do 2º sub-período, onde o efeito depressivo do ionóforo era menos pronunciado, a dieta D, que possibilitou

como mencionado na Tabela 8 os maiores consumos de matéria seca, permitiu ganhos de peso diários médios de 1,82 Kg, 1,58 Kg e 1,55 Kg para os machos e 1,32 Kg, 1,39 Kg e 1,24 Kg para as fêmeas.

A tendência de restrição no nível de ganho no 5º sub-período, não se justifica quando o nível de consumo é analisado na Tabela 11, nas comparações entre as dietas B e D para machos e fêmeas nas diferentes fases do experimento.

Comparando-se na Tabela 17 as dietas D e A, verifica-se que a associação de bicarbonato e lasalocida, quando comparado com a dieta testemunha, não provocou efeitos significativos no ganho diário, apesar de haver tendência de ganhos maiores para todos os sub-períodos, com exceção do 5º. Deve-se ressaltar que as dietas contendo bicarbonato (C e D) foram as que possibilitaram os menores ganhos de peso no 5º sub-período, sendo os valores da dieta C significativamente menores que os observados para a dieta B, que continha somente lasalocida. Essa ocorrência é difícil de ser explicada, já que o nível de consumo observado (Tabela 8) para as dietas mencionadas no 5º sub-período do experimento, foi elevado, da ordem de 122,03 g MS/Kg PV^{0,75} para a dieta C e 131,83 g MS/Kg PV^{0,75} para a dieta D. Essa observação parece sugerir que a eficiência de utilização das dietas foi reduzida pela utilização de bicarbonato no final do experimento, já que os elevados consumos observados para as dietas contendo o agente tamponante não resultaram em ganho.

Assim sendo, o bicarbonato deveria ser empregado somente no início do confinamento (56 dias) de maneira a não afetar a melhoria esperada de aumento de eficiência com uso da lasalocida (CHALUPA, 1980). Como o experimento foi de curta duração, na média, esse possível efeito depressivo do bicarbonato sobre o ganho das dietas contendo lasalocida não foi observado e, assim, uma conclusão final é difícil de ser apontada.

Considerando-se os resultados das dietas B, C e D (Tabela 17) conjuntamente, pode-se verificar que a adição de NaHCO_3 às dietas contendo lasalocida possibilitou, no primeiro sub-período, anular o efeito negativo do ionóforo sobre o ganho de peso de animais não adaptados (SCHELLING, 1984) pela elevação significativa no consumo de matéria seca, como apresentada na Tabela 8. Nos 2º e 3º sub-períodos, a ação do bicarbonato não foi tão nítida, mas no 4º houve tendência mais evidente de ganhos mais elevados, ao passo que no 5º, como mencionado, houve redução significativa.

Os dados sugerem que a presença do bicarbonato em dietas contendo lasalocida pode potencializar a ação do ionóforo, através de adaptação mais fácil, aumento no consumo e maior eficiência na utilização dos nutrientes no início do confinamento. BERGEN & BATES (1984) propuseram um mecanismo de ação dos ionóforos, no qual a adição de bicarbonato poderia anular o efeito do ionóforo, contradizendo assim os resultados obtidos. Por outro lado, RUSSELL (1987) propondo

outro mecanismo de ação do ionóforo, relatou que o bicarbonato poderia potencializar o efeito daquele aditivo. Trabalhando com dietas à base de BTPV, SILVA (1990) verificou que o bicarbonato potencializou a ação do ionóforo no rúmen, resultando em maior produção de ácido propiônico e redução na produção de metano, fatos esses que coincidem com os resultados obtidos. Seria importante o estabelecimento de trabalhos de pesquisa para verificar se o benefício da associação de lasalocida e bicarbonato tem curta duração, como sugerido no presente trabalho, e para caracterizar a razão da perda de eficiência observada.

c) Ausência de cana-de-açúcar picada como fonte de fibra em dietas contendo lasalocida e bicarbonato.

Comparando-se na Tabela 17 as dietas D e C, verifica-se que a retirada de cana-de-açúcar picada da dieta contendo lasalocida e bicarbonato não afetou significativamente o ganho de peso. Entretanto, deve-se atentar para o fato de que em todos os sub-períodos experimentais, com exceção do 5º, apareceu tendência de redução. Como discutido anteriormente (Tabela 8), a ausência da cana-de-açúcar provocou um consumo mais baixo de matéria seca, sendo o efeito notado também nos sub-períodos experimentais. Como consequência, foi possível caracterizar

tendência de ganhos mais baixos do 1º ao 4º sub-período do experimento.

A comparação entre as dietas C e A (Tabela 17), indica que não ocorreram diferenças significativas no ganho diário pela substituição da cana-de-açúcar como fonte de fibra em uma ração básica de BTPV (60%) e concentrado (40%), por bicarbonato de sódio e lasalocida. Com base nessa informação e considerando que não foram observados distúrbios digestivos entre os animais que não receberam cana, é possível propor que a cana picada pode ser dispensada. Entretanto, deve-se considerar nessa proposição os aumentos significativos obtidos no consumo (Tabela 8), a tendência de ganhos maiores nas dietas com cana (Tabela 17).

4.3. Conversão alimentar

A análise de variância (Tabela 3 do apêndice) revelou que a variável conversão alimentar foi significativamente influenciada pelo sub-período e pelo sexo, ocorrendo também interação significativa entre dietas e sub-períodos. A Tabela 19 mostra os valores da conversão alimentar estimado para machos e fêmeas dentro de cada sub-período experimental.

Tabela 19. Efeito do sexo e do sub-período experimental sobre o consumo de matéria seca.

Sub-Período	Conversão alimentar Kg MS/Kg Ganho		
	Machos	Fêmeas	Médias
1	10,52 ^a	12,82 ^a	11,67 ^x
s	0,96	1,23	0,78
2	7,15 ^a	9,29 ^a	8,22 ^y
s	0,96	1,23	0,78
3	8,72 ^a	10,19 ^a	9,45 ^y
s	0,96	1,23	0,78
4	8,29 ^a	15,18 ^b	11,73 ^x
s	1,03	1,36	0,86
5	11,85 ^a	13,57 ^a	12,68 ^x
s	1,09	1,36	0,89
Médias	9,31 ^a	12,21 ^b	
s	0,45	0,65	

a,b - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

A conversão média durante o período experimental foi de 9,31 Kg MS/Kg ganho para os machos e 12,21 Kg MS/Kg ganho para as fêmeas, valores esses significativamente diferentes. A menor eficiência das fêmeas, no que diz respeito ao aproveitamento dos nutrientes para o crescimento e engorda, é fato bem estabelecido na pesquisa (ROCHE & QUIRKE, 1986). Trabalhando com animais semelhantes e usando rações à base de BTPV, LANNA & BOIN (1988) também obtiveram dados mostrando a maior eficiência dos machos submetidos ao confinamento. Na análise da conversão alimentar de machos e fêmeas dentro dos sub-períodos experimentais, diferença estatística só foi observada no 4º sub-período.

Entretanto a tendência geral foi de valores sempre melhores para os machos.

Os dados de conversão alimentar obtidos no presente trabalho, estão dentro do esperado para rações de engorda (NRC, 1984). Os trabalhos experimentais que utilizaram BTPV, obtiveram valores de conversão de 6 a 14,9 Kg MS/Kg ganho (PATE, 1982; BURGI, 1985; LIMA & ZANETTI, 1989, BERCHIELLI et alii, 1989; LACORTE, 1987; LANNA & BOIN, 1988; NUSSIO et alii, 1990). Trabalhando com animais de mesma origem que os utilizados no presente experimento, mas bem mais jovens, LANNA & BOIN (1988) e NUSSIO et alii (1990) obtiveram valores de conversão alimentar variando de 6,9 a 8,8 Kg MS/Kg ganho.

Verificando-se o comportamento de conversão alimentar na Tabela 19, pode-se verificar que no segundo e terceiro sub-períodos os resultados foram significativamente melhores, indicando maior eficiência do uso das rações experimentais. A pior conversão alimentar observada no 1º sub-período experimental, pode ser atribuída, ao problema já mencionado da falta de adaptação ao ionóforo (SCHELLING, 1984). A perda de eficiência detectada nos dois últimos sub-períodos, onde o valor de conversão alimentar foi significativamente elevado (Tabela 19), poderia ser explicado pela tendência de redução no ganho de peso (Tabela 17), associada aos consumos elevados (126 a 128 g MS/Kg PV^{0,75}) de matéria seca, obtidos no presente trabalho (Tabela 8). Deve-

se também considerar a proposta apresentada de que no início do experimento pode ter havido ganho compensatório, quando a eficiência é maior (VILLARES, 1978).

4.3.1. Efeito das dietas sobre a conversão alimentar

a. Efeito da lasalocida sódica

A análise de variância (Tabela 3 do apêndice) não mostrou efeitos significativos das dietas sobre a conversão alimentar estimada para o trabalho experimental. Pode-se verificar na Tabela 20, que a comparação entre as dietas B e A, indicou que a adição de lasalocida sódica não afetou significativamente a conversão alimentar dos bovinos durante o período experimental. Entretanto, pode-se notar claramente, eliminando-se o sub-período 1 onde ocorreu adaptação dos animais ao ionóforo, que a tendência foi da dieta B apresentar melhor conversão alimentar (4,8% melhor na média). Essa tendência é semelhante à verificada por GOODRICH et alii (1984), que revisaram 228 ensaios envolvendo 11.274 bovinos, recebendo dietas ricas em grãos no confinamento. Os autores verificaram na média, uma melhoria de 7,5% no índice de conversão alimentar pela adição de ionóforos.

Pode-se também verificar na Tabela 20, que no 1º sub-período experimental, quando os animais não estavam adaptados, a adição de lasalocida piorou significativamente a conversão alimentar (B comparada com A) em cerca de 54,2%.

Esse efeito do ionóforo alterando o funcionamento do rúmen e a eficiência de utilização dos alimentos foi discutida anteriormente (SCHELLING, 1984; RUSSELL & STROBEL, 1989). Deve-se notar que, após o primeiro sub-período a presença do ionóforo promoveu melhorias não significativas nos índices de conversão de 17,7% no 2º sub-período, 12,6% no 3º, 13,8 no 4º e 25,5% no 5º.

Tabela 20. Efeito das dietas e dos sub-períodos sobre a conversão alimentar.

Sub-período	Conversão alimentar Kg MS/Kg ganho				
	Dieta A	Dieta B	Dieta C	Dieta D	Médias
1	10,13 ^a	15,62 ^b	10,23 ^a	10,71 ^a	11,67 ^x
s	0,53	1,53	1,53	1,53	0,78
2	9,09 ^a	7,48 ^a	8,38 ^a	7,94 ^a	8,22 ^y
s	1,53	1,53	1,53	1,53	0,78
3	10,60 ^a	9,26 ^a	9,10 ^a	8,86 ^a	9,45 ^y
s	1,53	1,53	1,53	1,53	0,78
4	15,22 ^a	13,11 ^{ab}	9,69 ^b	8,90 ^b	11,73 ^x
s	1,53	1,70	1,53	1,94	0,86
5	12,29 ^{ab}	9,11 ^a	13,30 ^{ab}	16,08 ^b	12,68 ^x
s	1,70	1,70	1,53	1,94	0,89
Média	11,47 ^a	10,91 ^a	10,14 ^a	10,50 ^a	
s	0,72	0,74	0,70	0,78	

a,b,c - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si ($P \leq 0,05$).

Na análise da Tabela 21 verifica-se que a adição de lasalocida sódica não afetou os índices de conversão alimentar tanto em machos quanto em fêmeas (B comparada com A), apesar de se verificar também neste caso a

tendência já mencionado de melhora. Nessa análise pode se observar um comportamento mais uniforme na conversão alimentar de machos (variando de 8,88 a 9,74) e de fêmeas (variando de 10,59 a 13,20) durante o experimento.

Tabela 21. Efeito do sexo e das dietas sobre a conversão alimentar.

		Conversão alimentar Kg MS/Kg ganho		
Dietas		Machos	Fêmeas	Médias
A	s	9,74 ^x 0,91	13,20 ^x 1,11	11,47 ^x 0,72
B	s	8,88 ^x 0,95	12,95 ^x 1,11	10,92 ^x 0,74
C	s	9,69 ^x 0,86	10,59 ^x 1,11	10,14 ^x 0,70
C	s	8,91 ^x 0,86	12,09 ^x 1,30	10,50 ^x 0,78
Médias	s	9,31 ^a 0,45	12,21 ^b 0,65	

a,b,c - Na mesma linha médias seguidas por letras diferentes diferem entre si (P ≤ 0,05).

x,y - Na mesma coluna médias seguidas por letras diferentes diferem entre si (P ≤ 0,05).

b) Adição de bicarbonato às dietas contendo lasalocida

A análise da Tabela 20 indica que a comparação entre as dietas D (10,50 Kg MS/Kg ganho) e B (10,91 Kg MS/Kg ganho) revela que na média, a adição de NaHCO₃ à dieta contendo lasalocida não alterou a conversão alimentar durante o período experimental. Entretanto, a verificação do

comportamento das dietas dentro do período experimental indica que a adição de bicarbonato melhorou significativamente a conversão alimentar no 1º sub-período. O efeito benéfico da adição de bicarbonato no 1º sub-período indica que o agente tamponante foi capaz de anular ou reduzir o efeito depressivo do ionóforo sobre animais não adaptados (SCHEELING, 1984), trazendo como discutido anteriormente consumos significativamente maiores de matéria seca (Tabela 8), e ganhos de peso também significativamente mais elevados (Tabela 17). Esse efeito precisa ser estudado em detalhes para a caracterização do efeito associativo. Analisando parâmetros ruminais de vacas fistuladas, SILVA (1990) detectou efeitos significativos da associação dos dois aditivos alterando as produções estimadas de ácido propiônico e de metano.

Os dados inseridos na Tabela 20 também mostram que o efeito benéfico da adição de bicarbonato à dieta contendo lasalocida (D comparada com B) não foi significativo no 2º e 3º sub-períodos. Essa observação está de acordo com os dados obtidos por LANNA & BOIN (1988) que relataram vantagens da adição do NaHCO_3 somente no início do período experimental. Não se encontrou uma explicação lógica para a aparente tendência de melhora da conversão alimentar durante o 4º sub-período, a não ser o fato de que a partir dessa fase a ração passou a ter um nível mais elevado de lasalocida sódica (37 ppm na MS) como detectado nas análises de

laboratório. Nos primeiros sub-períodos a quantidade detectada foi de 24,6 ppm e, assim sendo, pode aparecer de novo o efeito do agente tamponante inibindo o efeito depressivo do ionóforo.

Efetuando-se a comparação entre as dietas D e A, com os dados inseridos na Tabela 20, pode-se verificar que na média, não ocorreram diferenças significativas entre a dieta testemunha (A) e aquela contendo os dois aditivos empregados no experimento (D). Observa-se que em todos os sub-períodos experimentais, com exceção do 5º, as dietas tiveram comportamentos idênticos, apesar de se notar tendência de melhoria para a dieta contendo lasalocida sódica e bicarbonato. Esse efeito havia sido notado para consumo de matéria seca (Tabela 8) e ganho de peso (Tabela 17).

A comparação entre todas as dietas apresentadas na Tabela 20 mostra uma tendência aparente de superioridade para as duas dietas contendo bicarbonato. Como discutido anteriormente, essa mesma tendência foi observada para as variáveis consumo de matéria seca e ganho de peso, indicando possíveis efeitos diretos e associativos entre os aditivos. Deve-se porém atentar para o fato de que no 5º sub-período o desempenho do lote recebendo bicarbonato foi reduzido, aparecendo inclusive piora significativa na conversão da dieta D. Assim sendo, a proposta sugerida na discussão relativa ao ganho de peso para as dietas com bicarbonato parecem válidas. Havia sido caracterizado no 5º

sub-período, consumo relativamente elevado de matéria seca (Tabela 8) e tendência de ganho de peso menor, sugerindo perda de eficiência. Seria então, de grande importância, estudar o efeito prolongado do uso do bicarbonato, para caracterizar um possível efeito depressivo, sugerido no presente trabalho.

c) Ausência de cana-de-açúcar picada como fonte de fibra em dietas contendo lasalocida e bicarbonato

A observação dos dados contidos na Tabela 20, indicam não haver diferenças significativas entre as médias das dietas C e D, que tiveram um comportamento muito semelhante durante todo o transcorrer do experimento. Com base nesses resultados, pode-se sugerir, como feito anteriormente, que a cana-de-açúcar pode ser suprimida das dietas contendo BTPV, apesar do seu efeito benéfico sobre o consumo e o ganho de peso. Deve-se também ser lembrado que não foram detectados distúrbios digestivos a nível de rúmen com a dieta sem cana-de-açúcar.

A comparação entre as dietas A e C, sugere que a substituição de cana pelos dois aditivos utilizados resultou em tendência de redução no consumo de matéria seca (Tabela 8) e não afetou, de maneira geral o ganho de peso (Tabela 17) e a conversão alimentar (Tabela 20).

5) CONCLUSÃO

Dietas contendo 50-60% de bagaço de cana tratado sob pressão de vapor (BTPV) com base na matéria seca, possibilitam elevado consumo e ganho de peso com uma conversão alimentar satisfatória em bovinos jovens. A adição de lasalocida sódica prejudica o desempenho de bovinos não adaptados, porém quando os animais já estão adaptados parece existir melhor eficiência de utilização dos alimentos. A adição de bicarbonato de sódio pode anular o efeito depressivo da lasalocida sódica sobre o consumo, o ganho de peso e a conversão alimentar de animais não adaptados ao ionóforo. A partir da adaptação dos bovinos à lasalocida sódica, a adição de bicarbonato de sódio apresenta tendência em melhorar o desempenho animal, porém após 56 dias de fornecimento ele pode prejudicar o ganho de peso e a conversão alimentar. Este efeito negativo do bicarbonato de sódio precisa ser melhor estudado, através de experimento de longa duração. Há um efeito benéfico da associação bicarbonato de sódio e lasalocida sódica sobre o desempenho dos animais, seja devido à ação tamponante do NaHCO_3 e ou à ação da lasalocida sódica potencializada pelo NaHCO_3 . Em

dietas à base BTPV suplementadas com NaHCO_3 + lasalocida, a ausência de cana-de-açúcar não afeta a eficiência de utilização dos alimentos. O bom desempenho dos bovinos recebendo dietas sem cana-de-açúcar e a ausência de distúrbios metabólicos, indicam que é possível utilizar o BTPV como único alimento volumoso quando NaHCO_3 + lasalocida são fornecidos. Em situações onde se pretenda estimular o consumo de matéria seca, a adição de cana-de-açúcar pode ser um recurso interessante.

O experimento conduzido não permitiu uma avaliação conclusiva sobre o efeito de adição do ionóforo lasalocida, do agente tamponante bicarbonato de sódio, e da cana-de-açúcar como fonte de fibra íntegra em dietas à base de BTPV.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDERSEN, M.A. & HORN, G.W. Effects of lasalocid on weight gains, ruminal fermentation and forage intake of stocker cattle grazing winter wheat pasture. *Journal of Animal Science*, 65(4):865-71, 1987.
- A.O.A.C. Official methods of analysis Association of Official Agricultural Chemists. Tenth edition. Washington, D.C., 1965.
- A.R.C. The Nutrient Requirements of Ruminants Livestock. Second edition. London, D.C., 1984.
- ARMENTANO, L.E. & SOLORZANO, L.C. Choice of buffers should depend on diet, environment. *Feedstuffs*, 60(3):19-62, 1988.
- ARMSTRONG, J.D. & SPEARS, J.W. Intravenous administration of ionophores in ruminants: effects on metabolism independent of the rumen. *Journal of Animal Science*, 66(7):1807-17, 1988.
- BALDWIN, R.L. & ALLISON, M.J. Rumen metabolism, *Journal of Animal Science*, 57:461, 1983.
- BENZ, D.A.; BYERS, F.M.; SCHELLING, G.T.; GREENEM L.W.; LUNT, D.K. and SMITH, S.B. Ionophores alter hepatic concentrations of intermediary carbohydrate metabolites in steers. *J. Animal Science*, 67(9):2393, 1989.
- BERCHIELLI, T.T.; ANDRADE, P.; PINOTTI, R.F. & KRONKA, S.N. Níveis de concentrado e uréia na alimentação de bovinos nelore com bagaço de cana hidrolisado. In: SBZ Anais da XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Porto Alegre - RS, 1989. p. 157.
- BERGEN, W.G. & YOKOYAMA, M.T. Productive limits to rumen fermentation. *Journal of Animal Science*, 45(3):573-584, 1977.

- BERGEN, G.W & BATES, D.B. Ionophores: Their effect on production efficiency and mode of action. *Journal of Animal Science*, 58(6):1465-83, 1984.
- BOERNER, B.J.; BYERS, F.M.; SCHELLING, G.T.; COPPOCK, C.E. & GREENE, L.W. Trona and sodium bicarbonate in beef cattle diets: Effects on site and extent of digestion. *Journal of Animal Science*, 65(1):303-8, 1987a.
- BOERNER, B.J.; BYERS, F.M.; SCHELLING, G.T.; COPPOCK, C.E. & GREENE, L.W. Trona and sodium bicarbonate in beef cattle diets: Effects on pH and volatile fatty acid concentrations. *Journal of Animal Science*, 65(1):309-16, 1987b.
- BOIN, C. Formulação de rações para bovinos de corte em confinamento. In: Peres, F.C. & Marques, P.V. ed. *Manual de Cálculo de Rações de Custo Mínimo*. Piracicaba, FEALQ, 1988. Cap. 141-191.
- BOIN, C. Exigências nutricionais de Bovinos de Corte. In: Peixoto, A.M. e outros. ed. *Alimentação de Bovinos de Corte*. Piracicaba, FEALQ, 1990. Cap. 257-270.
- BONDI, A. Metabolism of protein in ruminant animals. A Review. *Nutrition Reports International*, 23(5):993, 1981.
- BRANINE, M.E., LOFGREEN, G.P.; GALYEAN, M.L.; HUBBERT, M.E.; FREEMAN, A.S. and GARCIA, D.R. Comparison of continuous with daily and weekly alternate feeding of lasalocid and monensin plus tylosin on performance of growing finishing steers. *J. Animal Science*, 67(Supl 2):206, 1989.
- BRITTON, R. & STOCK, R. Acidosis: a continual problem in cattle fed high grain diets. In: *Conference for Feed Manufacturers. Proceedings. Cornell Nutrition*, Syracuse Marriott, East Syracuse, N.Y., 1989. p. 8-15.
- BURGI, R. Produção do bagaço de cana-de-açúcar (*Saccharum* sp.L.) auto-hidrolisado e avaliação do seu valor nutritivo para ruminantes. Piracicaba, 1985. 61 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- BURGI, R. Utilização de resíduos agroindustriais na alimentação de ruminantes. *Congresso Brasileiro de Pastagens*, 1986.
- BURGI, R. O bagaço de cana-de-açúcar no confinamento de bovinos de corte. 6º Congresso Paulista de Agronomia, apostila, 1987, 6p.

- BYERS, F.M.; SCHELLING, G.T. and COPPOCK, C.E. Scientist test a new buffer for ruminants. *Feedstuffs*, september 16, p. 18-20, 1985.
- CASTRO, F.B. Avaliação do processo de digestão do bagaço de cana-de-açúcar (*Saccharum* sp.L) auto-hidrolisado em bovinos. Piracicaba, 1989. 123 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- CHALUPA, W. Manipulating rumen fermentation. *J. Animal Science*, 46(3):585, 1977.
- CHALUPA, W. Chemical Control of Rumen Microbial metabolism. In' RUCKELSHAUS & THIVEND, ed. *Digestive Physiology and Metabolism in Ruminants*. AVI Publishing Co., Westport, CT, 1980. p 325-347.
- CHIRASE, N.K.; GREENE, L.W.; LUNT, D.K; BAKER, J.F. & KNUTSON; R.E. Serum and ruminal fluid characteristics of beef cows grazing oat pasture and supplemented with or without lasalocid. *Journal of Animal Science*, 66(7):1746-54, 1988.
- CHRISTIANSEN, M.L. & WEBB Jr., K.E. Starch and protein digestibility and amino acid absorption in beef cattle fed a high concentrate diet euith mineral acid-neutralizing compounds. *Virginia Iech Livestock Reaserch Report*, 1987/1988, pg. 100-105.
- COSTA, L.R.O. Suplementação de uréia em dietas de bagaço de cana (*Saccharum* sp. L.) auto-hidrolisado para ruminantes. Piracicaba, 1987. 111 p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz" / USP).
- COUNOTTE, G.H.M.; VAN'T KLOOSTER, A.Th.; VAN DER KUILEN, J. and PRINS, R.A. An analysis of the buffer system in the rumen of dairy cattle. *J. Animal Science*, 49(6):1536, 1979.
- DAWSON, K.A. & BOLING, J.A. Effects of potassium ion concentrations on the antimicrobial activities of ionophores against ruminal anaerobes. *Applied Enviromental Microbiology*, 53(10):2363-67, 1987.
- DELFINO, J.; MATHISON, G.W. & SMITH, M.W. Effect of lasalocid on feedlot performance and energy partitioning in cattle. *Journal of Animal Science*, 66(1):136-50, 1988.

- DESWYSEN, A.G. and ELLIS, W.C. Site and extent of neutral detergent fiber digestion, efficiency of ruminal digesta flux and fecal output as related to variations in voluntary intake and chewing behavior in heifers. *J. Animal Science*. 66:2678, 1988.
- DIVEN, R.H. Bicarbonates in Ruminants nutrition and physiology. *Feedstuffs*, August 4:21-26, 1975a.
- DIVEN, R.W. Bicarbonates in Ruminant Nutrition and Physiology. *Feedstuffs*, August 11, p. 23-25, 1975b.
- FRANCISCO Jr., J.C.; MACHADO, P.F. Efeito da uréia sobre a atividade fermentativa do rúmen e degradação de bagaço auto-hidrolisado. *Anais da 27ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia*, Campinas, SP, Brasil, 1990.
- FUNK, M.A.; GALYEAN, M.L. and ROSS, T.T. Potassium and lasalocid effects on performance and digestion in lambs. *J Animal Science*, 63:685, 1986.
- GOERING, H.K. & VAN SOEST, P.J. Forage fiber analyses (Apparatus reagents, procedures and some applications). Washington, D.C. Agricultural Research Service, USDA. 19 p. *Agricuture Handbook*, p. 379, 1970.
- GOODRICH, R.D. GARRETT, J.E.; GAST, D.R.; KIRICK, M.A.; LARSON, D.A. & MEISKE, J.C. Influence of monensin on the performance of cattle. *Journal of Animal Science*, 58(6):1484-98, 1984.
- HAALAND, G.L. & TYRRELL, H.F. Effects of limestone and sodium bicarbonate buffers on rumen measurements and rate of passage in cattle. *Journal of Animal Science*, 55(4):935-42, 1982.
- HAALAND, G.L.; TYRREL, H.F.; MOE, P.W. & WHEELER, W.E. Effect of crude protein level and limestone buffer in diets fed at two levels of intake on rumen pH, ammonia-nitrogen, buffering capacity and volatile fatty acid concentration of cattle. *Journal of Animal Science*, 55(4):943-50, 1982.
- HINKLE, P.C. and McCARTY, E. How cells make ATP. In: *molecules to living cells*. W.H. Freeman and Company, San Francisco, California, USA. p. 154-169, 1980.
- HESPELL, R.B. and BRYANT, M.P. Efficiency of rumen microbial growth: Influence of some therethical and experimental factor on y ATP. *J. Animal Science*, 49(6):1640, 1979.

- JACQUES, K.A.; AXE, D.E.; HARRIS, T.R.; HARMON, D.L.; BOLSEN, K.K. & JOHNSON, D.E. Effect of sodium bicarbonate and sodium bentonite on digestion, solid and liquid flow, and ruminal fermentation characteristics of forage sorghum silage-based diets fed to steers. *Journal of Animal Science*, 63():923-32, 1986.
- JAMES, L.G. & WOHLT, J.E. Effect of supplementing equivalent cation amounts from NaCl, MgO, NaHCO₃ e CaCO₃ on nutrient utilization and acid-base status of growing dorset lambs fed high concentrate diets. *Journal of Animal Science*, 60(1):307-15, 1985.
- KOVACIK, A.M.; LOERCH, S.C. & DEHORITY, B.A. Effect of supplemental sodium bicarbonate on nutrient digestibilities and ruminal pH measured continuously. *Journal of Animal Science*, 62:226-34, 1986.
- KRONFELD, D.S. Sodium, osmolarim and hydration. Regulation of Acid-Base balance. Chuich J night Co, Inc. Ed. W.H. Hale and Paul Meinhardt, 1978.
- LACORTE, M.C.F. Desempenho de bovinos confinados à base de bagaço de cana-de-açúcar auto-hidrolisado, levedura e vinhaça, subprodutos da indústria de açúcar e álcool. Piracicaba, 1987. 71p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" / USP).
- LANNA, D.P.D. & BOIN, C. Efeito da adição de bicarbonato de sódio, feno e bagaço de cana-de-açúcar "In Natura" em dietas à base de bagaço hidrolisado, 1988. (A ser publicado nos Anais da E.S.A. Luiz de Queiroz).
- LIMA, M.L.P. & ZANETTI, M.A. Utilização do bagaço hidrolisado como alimento volumoso para bovinos confinados. In: SBZ. Anais da XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Porto Alegre, RS, 1989. p. 156.
- MACHADO, P.F. & MADEIRA, H.M.F. Manipulação de Nutrientes em nível de rúmen - efeitos do uso de ionóforos. In: Novas Técnicas de Produção Animal, SBZ, Campinas - SP, 1990. p.41-58.
- MATTOS, W.R.S. Utilização do bagaço de cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes. In: D'ARCE, R.D.; BOIN, C. & MATTOS, W.R.S. Utilização de resíduos agro-industriais da cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes. Piracicaba - SP, FEALQ, 1985. p. 53-72.

- NAGARAJA, T.G.; AVERY, T.B.; BARTLEY, E.E.; GALITZER, S.J. & DAYTON, A.D. Prevention of lactic acidoses in cattle by lasalocid or monensin. *Journal of Animal Science*, 53(1):206-15, 1981.
- NAGARAJA, T.G.; AVERY, T.B.; BARTLEY, E.E.; ROOF, S.K. & DAYTON, A.D. Effect of lasalocid, monensin or thiopeptin on lactic acidosis in cattle. *Journal of Animal Science*, 54(3):649-58, 1982.
- N.R.C. Commite on Animal Nutrition. Nutrient requirements of beef cattle. Sixth edition. Washington, D.C., 1984.
- NUSSIO, L.G.; SILVA, S.C.; BOIN, C. e SANTOS, F.A.P. Avaliação do uso de bicarbonato de sódio em dietas com bagaço de cana auto-hidrolisado no desempenho de bovinos confinados. XXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Campinas, SP. 1990.
- OKEKE, G.C.; BUCHANAN-SMITH, J.G.. & GROVUM, W.L. Effects of buffers on ruminal rate of passage and degradation of soyban meal in steers. *Journal of Animal Science*. 56(6):1393-99, 1983.
- OWENS, F.N. e GOETSCH, A.L. Digesta passage and microbial protein synthesis. In: Sixth International Symposium on Ruminant Physiology, Canadá. Proceedings, 1984.
- PATE, F.M. Value of treating bagasse with steam under pressure for cattle fed. *Tropical Agriculture*, 59(4):293-7, 1982.
- PATERSON, J.A.; ANDERSON, B.M.; BOWMAN, D.K.; MORRISON, R.L. and WILLIAMS, J.E. Effect of protein source and Lasalocid on N digestibility and growth by ruminants. *J. Animal Science*, 57(6):1537, 1983.
- PEIRCE, S.B.; MULLER, L.D. & HARPSTER, H.W. Influence of sodium bicarbonate and magnesium oxide on digestion and metabolism in yearling beef abruptly changed from high forage to high energy diets. *Journal of Animal Science*, 56(6):1561-7, 1983.
- PLANO CONSULTORIA AGROPECUARIA. Relatórios Técnicos Finais de Confinamentos Comerciais, 1989.
- PLANO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA. (1990). Comunicação pessoal.
- PREÇOS AGRICOLAS. Piracicaba (38):140, dez. 1989.
- PRESSMAN, B.C. Biological application of ionophores. *Animal Review of Biochemistry*, 45:501, 1976.

- RICKE, S.C.; BERGER, L.L.; VAN DER AAR & FAHEY Jr, G.C. Effects of lasalocid and monensin on nutrients digestion, metabolism and rumen characteristics of sheep. *Journal of Animal Science*, 58(1):194-202, 1984.
- ROBY, K.A.W.; CHALUPA, W.; ORSINI, J.A.; ELSER, A.H. & KRONFELD, D.S. Acid-base and electrolyte balance in dairy heifers fed forage and concentrate rations: Effects of sodium bicarbonate. *Am. J. Vet. Res.*, 48(6):1012-16, 1987.
- ROCKE, J.F. & QUIRKE, J.F. The Effects of Steroid Hormones and Xenobiotics on growth of in animals. Control and manipulation of animal growth, p. 39, 1986.
- RUAS, D.G.G., Utilização do bagaço por usinas e destilarias da Região Centro-Sul. *Rev. Alcool e Açúcar* nº 50, 1989.
- RUMPLER, W.V; JOHNSON, D.E. & BATES, D.B. The effect of high dietary cation concentration on methanogenesis by steers fed diets with and without ionophores. *Journal of Animal Science*, 62(6):1737-41, 1986.
- RUSSELL, J.R.; YOUNG, A.W. & JORGENSEN, N.A. Effect of sodium bicarbonate and limestone additions to high grain diets on feedlot performance and ruminal and fecal parameters in finishing steers. *Journal of Animal Science*, 51(4):996-1002, 1980.
- RUSSELL, J.B. A proposed mechanism of monensin action in inhibiting ruminal bacterial growth: effects on ion flux and protonmotive force. *Journal of Animal Science*, 64(5):1519-25, 1987.
- RUSSELL, J.B. & STROBEL, H.J. Effect of ionophores on ruminal fermentation. *Applied and Environmental Microbiology*, 55(1):1-6, 1989.
- SAS Institute Inc. SAS/STAT User's Guide ed. Cary, NC, 1988.
- SCHELLING, G.T. Monensin mode of action in the rumen. *Journal of Animal Science*, 58(6):1518-1527, 1984.
- SILVEIRA, A.C. & DOMINGUES, C.A. Sistemas de Alimentação de novilhas em crescimento. *Anais do 3º Simpósio Sobre Manejo de Bovinos no Trópico, Botucatu, S.P.*, 1978, p. 134.
- SPEARS, J.W. & HARVEY, R.W. Performance, ruminal and serum characteristics of steers fed lasalocid on pasture. *Journal of Animal Science*, 58(2):460-4, 1984.

- SPEARS, J.W. and HARVEY, R.W. Lasalocid and dietary sodium and potassium effects on mineral metabolism ruminal volatile fatty acids and performance of finishing steers. *J Animal Science*, 65:830, 1987.
- SPROTT, L.R.; GOEHRING, T.B.; BEVERLY, J.R. and COPRAH, L.R. Effects of ionophores on cow herd production: a Review. *J. Animal Science*, 66:1340, 1988.
- STABEL, J.R.; SPEARS, J.W., HARVEY, R.W. and LUCAS, D.M. Salinomycin and lasalocid effects on growth rate, mineral metabolism and ruminal fermentation in steers. *J. Animal Science*, 67:2735, 1989.
- STAPLES, C.R. & LOUGH, D.S. Efficacy of supplemental dietary neutralizing agents for lactating dairy cows. A review. *Animal Feed Science and Technology*, 277-303, 1989.
- STARNES, S.R.; SPEARS, J.W.; FROETSCHER, M.A. & CROOM Jr., W.J. Influence of monensin and lasalocid on mineral metabolism and ruminal urease activity in steers. *The Journal of Nutrition*, 114(3):518-25, 1984.
- STROBEL, H.J.; CHOW, J.M. & RUSSELL, J.B. Ruminal ionophores: Manipulating fermentation and control of acidosis. In: Conference for Feed Manufacturers. Proceedings Cornell Nutrition, Syracuse Marriott, East Syracuse, N.Y., 1989. p. 16-21.
- STROUD, T.E.; WILLIAN, J.E.; LEDOREX, D.R. and PATERSON, J.A. The influence of sodium bicarbonate and dehydrated alfalfa as buffers on steer performance and ruminal characteristics. *J. Animal Science*, 60(2):551, 1985.
- TAMMINGA, S. Protein Degradation in the forestomachs of ruminants. *J. Animal Science*, 49(6):1615, 1979.
- TEH, T.H.; HEMKEN, R.W. & HARMON, R.J. Comparisons of buffers and their modes in the rumen and abomasum. *Nutritional Reports International*, 32(6):1339-48, 1985.
- TEH, T.H.; HEMKEN, R.W.; BRESSEL, D.R. and HARMON, R.I. Comparison of buffers on rumen functions, turnover rate and gastric secretions in holstein steers. *Animal Feed Science and Technology*, 17:257-290, 1987.
- THONNEY, M.L.; HEIDE, E.K.; DUHAIME, D.J.; HAND, R.J. & PEROSIO, D.J. Growth, feed efficiency and metabolite concentrations of cattle fed high forage diets with lasalocid or monensin supplements. *Journal of Animal Science*, 52(2):427-33, 1981.

- TILLEY, J.M.A. & TERRY, R.A. A two stage technique for the "in vitro" digestion of forage crops. *Journal Brit. Grassl. Soc.*, 18:104-11, 1963.
- VILLARES, J.B. Exploração do ganho compensatório para a produção de bovinos no trópico. *Anais do 3º Simpósio Sobre Manejo de Bovinos no Trópico*, Botucatu, S.P., 1978, p. 249.
- WHEELER, W.E. Gastrointestinal tract pH environment and the influence of buffering materials on the performance of ruminants. *Journal of Animal Science*, 51(1):224-35, 1980.
- WHELLER, W.E.; NOLLER, C.H. & WHITE, J.L. Comparasion between limistones and cement kiln dusts of similar rates of reactivity used in high concentrate diets for beef steers. *Journal of Animal Science*, 52(4):873-81, 1981a.
- WHEELER, W.E.; NOLLER, C.H.; WHITE, J.L. Effect of level of calcium and sodium bicarbonate in high concentrate diets on performance and nutriente utilization by beef steers. *Journal of Animal Science*, 53(2):499-514, 1981b.
- YOKOYAMA, M.T. & JOHNSON, K.A. Microbiology of the rumen and lower intestine. Michigan - State University. 1985.

Apêndice

Tabela 1. Análise de variância para consumo de matéria seca (g/Kg PV^{0,75}).

Causa da Variação	Graus de liberdade	Soma dos quadrados	Quadrado Médio	F	Pr > F
BLOCO	2	866,807	433,403	14,7	0,0001
SUB-PERÍODO (P)	4	2157,064	539,266	18,29	0,0001
DIETA (D)	3	1554,819	518,273	17,58	0,0001
SEXO (S)	1	2309,935	2309,935	78,36	0,0001
DxS	3	36,217	12,072	0,41	0,7468
PxD	12	264,777	22,064	0,75	0,6983
PxS	4	93,807	23,451	0,80	0,5334
PxDxS	12	267,275	22,272	0,76	0,6916
RESÍDUO	53	1562,414	29,479		
TOTAL	94	9337,620			

C.V. = 4,128%

Tabela 2. Análise de variância para ganho de peso (Kg/cab/dia).

Causa da Variação	Graus de liberdade	Soma dos quadrados	Quadrado Médio	F	Pr > F
BLOCO	2	0,0852	0,0426	0,27	0,7639
SUB-PERÍODO (P)	4	4,5120	1,1280	7,14	0,0001
DIETA (D)	3	0,5793	0,1931	1,22	0,3039
SEXO (S)	1	1,1350	1,1350	7,18	0,0082
DxS	3	0,1170	0,0390	0,25	0,8634
PxD	12	3,3714	0,2809	1,78	0,0568
PxS	4	1,1752	0,2938	1,86	0,1207
PxDxS	12	1,4130	0,1177	0,75	0,7054
PESO INICIAL	1	0,0003	0,0003	0,00	0,9647
RESÍDUO	147	23,2332	0,1580		
TOTAL	189	40,2691			

C.V. = 32,844%

Tabela 3. Análise de variância para conversão alimentar.

Causa da Variação	Graus de liberdade	Soma dos quadrados	Quadrado Médio	F	Pr > F
BLOCO	2	20,4635	10,2317	0,92	0,4060
SUB-PERÍODO (P)	4	242,0762	60,5190	5,42	0,0010
DIETA (D)	3	22,6575	7,5525	0,68	0,5701
SEXO (S)	1	159,8770	159,8770	14,33	0,0004
DxS	3	33,5013	11,1671	1,00	0,3998
PxD	12	286,4233	23,8686	2,14	0,0295
PxS	4	83,1303	20,7825	1,86	0,1307
PxDxS	12	158,6378	13,2198	1,18	0,3180
RESÍDUO	53	591,4403	11,1592		
TOTAL	94	1541,3063			

C.V. = 32,77%

Tabela 4. Planilha de dados usados para a análise de consumo (CPM) e conversão alimentar (CA),

Bloco	Periodo	Die- ta	Sexo	Cons Kg MS	GPDM Kg	CA	CPV %	CPM g/Kg PV ^{0,75}	PVm Kg
b1	p1	A	M	10,37	1,36	7,62	2,93	127,20	353,50
b1	p1	B	M	9,76	0,61	16,00	2,79	120,55	350,25
b1	p1	C	M	10,62	0,89	11,93	3,01	130,47	352,75
b1	p1	D	M	11,14	1,43	7,79	3,12	135,64	357,00
b1	p2	A	M	10,87	1,53	7,10	2,91	127,88	373,75
b1	p2	B	M	10,33	1,89	5,46	2,81	123,01	367,75
b1	p2	C	M	10,46	1,36	7,69	2,84	124,37	368,50
b1	p2	D	M	12,60	1,75	7,20	3,32	146,61	379,25
b1	p3	A	M	11,06	1,14	9,70	2,82	125,42	392,50
b1	p3	B	M	11,33	1,11	10,20	2,91	129,41	388,75
b1	p3	C	M	10,39	1,00	10,39	2,70	119,54	385,00
b1	p3	D	M	12,88	1,68	7,67	3,19	143,13	403,25
b1	p4	A	M	10,47	1,39	7,53	2,55	114,86	410,25
b1	p4	B	M	10,81	1,46	7,40	2,66	119,35	406,75
b1	p4	C	M	10,31	1,10	9,37	2,58	115,32	399,75
b1	p4	D	M	11,91	1,25	9,53	2,81	127,52	423,75
b1	p5	A	M	11,00	0,70	15,71	2,60	117,83	423,50
b1	p5	B	M	11,10	1,40	7,93	2,62	118,80	424,00
b1	p5	C	M	10,22	0,90	11,35	2,48	111,76	412,00
b1	p5	D	M	11,52	1,50	7,68	2,62	119,91	440,00
b1	p1	A	F	10,66	0,89	11,98	3,34	141,31	318,75
b1	p1	B	F	9,64	0,46	20,96	3,04	128,39	316,75
b1	p1	C	F	9,67	0,82	11,79	3,01	127,29	321,75
b1	p1	D	F	10,34	1,18	8,76	3,22	136,27	321,25
b1	p2	A	F	11,54	1,32	8,74	3,45	147,62	334,25
b1	p2	B	F	10,86	1,25	8,69	3,30	140,66	328,75
b1	p2	C	F	10,16	1,00	10,16	3,04	129,90	334,50
b1	p2	D	F	11,25	1,36	8,27	3,32	142,40	339,00
b1	p3	A	F	11,52	1,21	9,52	3,27	141,76	352,00
b1	p3	B	F	11,49	1,46	7,87	3,30	142,68	347,75
b1	p3	C	F	10,80	1,36	7,94	3,08	133,18	351,00
b1	p3	D	F	11,75	1,68	6,99	3,26	142,10	360,25
b1	p4	A	F	10,83	0,36	30,10	2,98	130,23	363,00
b1	p4	B	F	10,68	0,82	13,02	2,94	128,22	363,75
b1	p4	C	F	9,72	0,82	11,85	2,65	116,10	366,25
b1	p4	D	F	P a r c e l a		P e r d i d a			
b1	p5	A	F	11,26	1,85	6,09	3,00	132,20	374,75
b1	p5	B	F	10,80	0,90	12,00	2,89	126,99	374,00
b1	p5	C	F	10,10	1,10	9,18	2,68	117,93	377,50
b1	p5	D	F	P a r c e l a		P e r d i d a			
b2	p1	A	M	10,79	1,57	6,87	3,39	143,29	318,00
b2	p1	B	M	8,33	1,04	8,00	2,63	110,94	316,75
b2	p1	C	M	10,07	1,18	8,53	3,18	134,28	316,25
b2	p1	D	M	9,31	0,64	14,55	2,98	125,41	312,00

Bloco	Periodo	Diet- ta	Sexo	Cons Kg MS	GPDM Kg	CA	CPV %	CPM g/Kg PV ^{0,75}	PVm Kg
b2	p2	A	M	10,94	1,61	6,79	3,22	138,09	340,25
b2	p2	B	M	9,25	1,29	7,17	2,78	118,66	333,00
b2	p2	C	M	10,38	1,78	5,83	3,09	132,19	336,25
b2	p2	D	M	10,24	1,68	6,09	3,12	132,78	328,25
b2	p3	A	M	11,17	1,36	8,21	3,09	134,87	361,00
b2	p3	B	M	10,02	1,71	5,86	2,83	122,78	354,00
b2	p3	C	M	10,74	1,68	6,39	2,97	129,61	361,25
b2	p3	D	M	11,23	1,25	8,98	3,22	139,15	348,75
b2	p4	A	M	10,90	1,04	10,48	2,89	127,21	377,75
b2	p4	B	M	10,17	1,32	7,70	2,71	119,28	375,25
b2	p4	C	M	10,26	1,18	8,69	2,69	118,92	381,25
b2	p4	D	M	10,25	1,53	6,70	2,78	121,93	368,25
b2	p5	A	M	10,93	1,35	8,10	2,79	124,13	391,75
b2	p5	B	M	9,90	1,30	7,61	2,53	112,59	391,00
b2	p5	C	M	9,96	0,55	18,10	2,54	113,00	392,25
b2	p5	D	M	10,70	1,15	9,30	2,78	123,17	384,75
b2	p1	A	F	9,73	0,93	10,46	3,35	138,28	290,50
b2	p1	B	F	9,84	0,68	14,47	3,39	139,93	290,25
b2	p1	C	F	9,78	1,11	8,81	3,34	138,19	292,75
b2	p1	D	F	10,28	0,86	11,95	3,53	145,91	291,00
b2	p2	A	F	10,41	1,11	9,38	3,42	142,72	304,75
b2	p2	B	F	10,17	1,36	7,48	3,34	139,52	304,50
b2	p2	C	F	10,69	1,21	8,83	3,46	145,05	309,00
b2	p2	D	F	11,37	1,21	9,40	3,72	155,60	305,50
b2	p3	A	F	10,67	0,86	12,41	3,35	141,52	318,50
b2	p3	B	F	9,74	0,89	10,94	3,04	128,66	320,25
b2	p3	C	F	11,45	1,03	11,12	3,53	149,67	324,75
b2	p3	D	F	11,68	1,03	11,34	3,64	153,93	321,25
b2	p4	A	F	10,63	0,93	11,43	3,21	136,98	331,00
b2	p4	B	F	9,73	0,43	22,63	2,95	125,81	329,50
b2	p4	C	F	10,33	1,03	10,03	3,04	130,68	339,25
b2	p4	D	F	11,00	1,18	9,32	3,27	139,93	336,75
b2	p5	A	F	10,55	0,60	17,58	3,10	133,10	340,50
b2	p5	B	F	10,10	1,40	7,21	2,97	127,70	339,50
b2	p5	C	F	10,74	0,90	11,93	3,06	132,44	351,00
b2	p5	D	F	11,18	0,55	20,33	3,21	138,83	347,75
b3	p1	A	M	12,96	1,14	11,37	3,19	143,29	406,00
b3	p1	B	M	11,47	0,75	15,30	2,87	128,30	399,75
b3	p1	C	M	12,47	1,43	8,72	3,09	138,38	404,00
b3	p1	D	M	12,67	1,32	9,60	3,19	142,26	397,75
b3	p2	A	M	12,57	1,03	12,20	2,98	135,19	421,25
b3	p2	B	M	12,23	1,82	6,72	2,93	132,35	417,75
b3	p2	C	M	12,23	1,75	6,99	2,87	130,37	426,25
b3	p2	D	M	13,41	2,03	6,60	3,18	144,22	421,25
b3	p3	A	M	12,80	1,11	11,53	2,93	134,09	436,25
b3	p3	B	M	12,94	1,28	10,03	2,94	134,81	439,50
b3	p3	C	M	13,08	1,64	7,97	2,91	133,87	450,00

Bloco	Periodo	Die- ta	Sexo	Cons Kg MS	GPDm Kg	CA	CPV %	CPM g/Kg PV ^{0,75}	PVm Kg
b3	p3	D	M	14,08	1,82	7,74	3,14	144,53	448,25
b3	p4	A	M	12,49	1,28	9,76	2,76	127,20	453,00
b3	p4	B	M		P a r c e l a		P e r d i d a		
b3	p4	C	M	12,80	2,14	5,98	2,69	125,51	476,50
b3	p4	D	M	13,95	1,86	7,50	2,94	137,32	474,00
b3	p5	A	M		P a r c e l a		P e r d i d a		
b3	p5	B	M		P a r c e l a		P e r d i d a		
b3	p5	C	M	13,04	0,75	17,39	2,63	124,21	495,25
b3	p5	D	M	13,42	0,80	16,77	2,73	128,66	491,00

Tabela 5, Planilha de dados usados para a análise de ganho de peso corrigido para o peso vivo inicial.

Bloco	Período	Dieta	Sexo	P_Inic Kg	GPD Kg
b1	p1	A	F	305	0,93
b1	p1	A	F	320	0,86
b1	p1	B	F	318	0,71
b1	p1	B	F	309	0,21
b1	p1	C	F	296	1,00
b1	p1	C	F	336	0,64
b1	p1	D	F	323	1,28
b1	p1	D	F	303	1,70
b1	p2	A	F	318	1,71
b1	p2	A	F	332	0,93
b1	p2	B	F	328	1,36
b1	p2	B	F	312	1,14
b1	p2	C	F	310	0,64
b1	p2	C	F	345	1,36
b1	p2	D	F	341	1,21
b1	p2	D	F	318	1,50
b1	p3	A	F	342	1,07
b1	p3	A	F	345	1,36
b1	p3	B	F	328	1,28
b1	p3	B	F	347	1,64
b1	p3	C	F	364	1,36
b1	p3	C	F	319	1,36
b1	p3	D	F	358	1,36
b1	p3	D	F	339	2,00
b1	p4	A	F	357	0,00
b1	p4	A	F	364	0,71
b1	p4	B	F	370	0,78
b1	p4	B	F	346	0,86
b1	p4	C	F	338	0,50
b1	p4	C	F	383	1,14
b1	p4	D	F	Parcela Perdida	
b1	p4	D	F	Parcela Perdida	
b1	p5	A	F	357	2,00
b1	p5	A	F	374	1,70
b1	p5	B	F	381	0,90
b1	p5	B	F	358	0,90
b1	p5	C	F	345	1,10
b1	p5	C	F	399	1,10
b1	p5	D	F	Parcela Perdida	
b1	p5	D	F	Parcela Perdida	
b1	p1	A	M	333	1,43
b1	p1	A	M	355	1,28
b1	p1	B	M	347	0,21
b1	p1	B	M	345	1,00
b1	p1	C	M	332	0,64

Bloco	Periodo	Dieta	Sexo	P_Inic Kg	GPD Kg
b1	p1	C	M	361	1,14
b1	p1	D	M	349	1,14
b1	p1	D	M	345	1,71
b1	p2	A	M	353	1,28
b1	p2	A	M	373	1,78
b1	p2	B	M	350	2,14
b1	p2	B	M	359	1,64
b1	p2	C	M	341	1,36
b1	p2	C	M	377	1,36
b1	p2	D	M	365	1,71
b1	p2	D	M	369	1,78
b1	p3	A	M	371	1,07
b1	p3	A	M	398	1,21
b1	p3	B	M	382	1,14
b1	p3	B	M	380	1,07
b1	p3	C	M	396	1,21
b1	p3	C	M	360	●,79
b1	p3	D	M	389	1,28
b1	p3	D	M	394	2,●7
b1	p4	A	M	386	1,42
b1	p4	A	M	415	1,36
b1	p4	B	M	395	0,92
b1	p4	B	M	398	2,00
b1	p4	C	M	371	1,42
b1	p4	C	M	413	0,78
b1	p4	D	M	407	1,64
b1	p4	D	M	423	0,86
b1	p5	A	M	406	0,70
b1	p5	A	M	434	0,70
■1	p5	B	M	408	1,70
b1	p5	B	M	426	1,10
b1	p5	C	M	391	0,90
b1	p5	C	M	424	0,90
b1	p5	D	M	430	1,50
b1	p5	D	M	435	1,50
b2	p1	A	M	297	1,64
b2	p1	A	M	317	1,50
b2	p1	B	M	314	1,36
b2	p1	B	M	305	0,71
b2	p1	C	M	302	1,64
b2	p1	C	M	314	0,71
b2	p1	D	M	321	0,79
b2	p1	D	M	294	0,50
b2	p2	A	M	320	1,50
b2	p2	A	M	338	1,71
b2	p2	B	M	333	1,21
b2	p2	B	M	315	1,36
b2	p2	C	M	325	1,78

Bloco	Periodo	Dieta	Sexo	P_Inic Kg	GPD Kg
b2	p2	C	M	324	1,78
b2	p2	D	M	332	1,57
b2	p2	D	M	301	1,78
b2	p3	A	M	341	1,43
b2	p3	A	M	362	1,28
b2	p3	B	M	334	1,64
b2	p3	B	M	350	1,78
b2	p3	C	M	349	2,14
b2	p3	C	M	350	1,21
b2	p3	D	M	354	1,36
b2	p3	D	M	326	1,14
b2	p4	A	M	361	1,36
b2	p4	A	M	380	0,71
b2	p4	B	M	375	0,86
b2	p4	B	M	357	1,78
b2	p4	C	M	367	1,00
b2	p4	C	M	379	1,36
b2	p4	D	M	373	1,64
b2	p4	D	M	342	1,42
b2	p5	A	M	380	1,70
b2	p5	A	M	390	1,00
b2	p5	B	M	387	1,10
b2	p5	B	M	382	1,50
b2	p5	C	M	381	0,50
b2	p5	C	M	398	0,60
b2	p5	D	M	396	1,10
b2	p5	D	M	362	1,20
b2	p1	A	F	282	1,14
b2	p1	A	F	286	0,71
b2	p1	B	F	291	0,79
b2	p1	B	F	280	0,57
b2	p1	C	F	284	1,07
b2	p1	C	F	286	1,14
b2	p1	D	F	286	0,86
b2	p1	D	F	284	0,86
b2	p2	A	F	298	1,07
b2	p2	A	F	296	1,14
b2	p2	B	F	302	1,36
b2	p2	B	F	288	1,36
b2	p2	C	F	299	1,28
b2	p2	C	F	302	1,14
b2	p2	D	F	298	1,28
b2	p2	D	F	296	1,14
b2	p3	A	F	313	0,64
b2	p3	A	F	312	1,07
b2	p3	B	F	307	1,14
b2	p3	B	F	321	0,64
b2	p3	C	F	318	1,21

Bloco	Periodo	Dieta	Sexo	P_Inic Kg	GPD Kg
b2	p3	C	F	317	0,86
b2	p3	D	F	316	1,00
b2	p3	D	F	312	1,07
b2	p4	A	F	322	0,86
b2	p4	A	F	327	1,00
b2	p4	B	F	330	0,71
b2	p4	B	F	323	0,14
b2	p4	C	F	329	1,14
b2	p4	C	F	335	0,92
b2	p4	D	F	330	1,21
b2	p4	D	F	327	1,14
b2	p5	A	F	334	0,80
b2	p5	A	F	341	0,40
b2	p5	B	F	340	1,50
b2	p5	B	F	325	1,30
b2	p5	C	F	345	0,80
b2	p5	C	F	348	1,00
b2	p5	D	F	347	0,80
b2	p5	D	F	343	0,30
b3	p1	A	M	371	1,14
b3	p1	A	M	425	1,14
b3	p1	B	M	416	1,43
b3	p1	B	M	373	0,07
b3	p1	C	M	379	0,43
b3	p1	C	M	409	2,43
b3	p1	D	M	389	2,07
b3	p1	D	M	388	0,57
b3	p2	A	M	387	1,14
b3	p2	A	M	441	0,93
b3	p2	B	M	436	1,71
b3	p2	B	M	374	1,93
b3	p2	C	M	385	2,00
b3	p2	C	M	443	1,50
b3	p2	D	M	418	2,14
b3	p2	D	M	396	1,93
b3	p3	A	M	403	1,36
b3	p3	A	M	454	0,86
b3	p3	B	M	401	1,50
b3	p3	B	M	460	1,07
b3	p3	C	M	464	1,71
b3	p3	C	M	413	1,57
b3	p3	D	M	448	2,00
b3	p3	D	M	423	1,64
b3	p4	A	M	422	1,21
b3	p4	A	M	466	1,36
b3	p4	B	M	Parcela	
b3	p4	B	M	Perdida	
b3	p4	C	M	435	2,07

Bloco	Periodo	Dieta	Sexo	P_Inic Kg	GPD Kg
b3	p4	C	M	488	2,21
b3	p4	D	M	476	1,78
b3	p4	D	M	446	1,93
b3	p5	A	M		Parcela
b3	p5	A	M		Perdida
b3	p5	B	M		Parcela
b3	p5	B	M		Perdida
b3	p5	C	M	464	0,40
b3	p5	C	M	519	1,10
b3	p5	D	M	501	0,30
b3	p5	D	M	473	1,30