TRANSFORMAÇÕES DO NITROGENIO NO SISTEMA SOLO-PLANTA-
ATMOSFERA, SOB CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO E CASA DE VEGETAÇÃO,
COM ÊNFASE A DENITRIFICAÇÃO.

WALDECIRO COLAÇO

Farmacêutico-Bioquímico

Orientador: Prof. Dr. Reynaldo Luiz Victória

Tese apresentada à Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz", da
Universidade de São Paulo, para
obtenção do título de Doutor em
Agronomia. Área de Concentração:
Solos e Nutrição de Plantas.

P I R A C I C A B A

Estado de São Paulo - Brasil

Novembro - 1988

Aos Brasileiros que lutam por um Brasil

Futuro, Autêntico, Natureza.

Ofereço

- As árvores, meu filho, não têm alma!

E esta árvore me serve de empecilho ...

E preciso cortá-la, pois, meu filho,

Para que eu tenha uma velhice calma!

- Meu pai, por que sua ira não se acalma?

Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?!

Deus pôs almas nos cedros ... no junquilha

Esta árvore, meu pai, possui minh'alma!

- Disse - e ajoelhou-se, numa rogativa:

"Não mate a árvore, pai, para que eu viva!"

E quando a árvore, olhando a pátria serra,

Caiu aos golpes do machado bronco,

O moço triste se abraçou com o tronco

E nunca mais se levantou da terra!

(A ARVORE DA SERRA)

Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos

1884 - 1914

Aos meus pais,
Sergio (in memoriam) e
Haydée, exemplos de
alta dignidade,

minha homenagem e
minha gratidão

A Antonina e a Renatha,
elos queridos de
afeição, encorajamento e
compreensão,

Dedico.

AGRADECIMENTOS

A Universidade de São Paulo (USP), a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ) e, em especial, ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), a aceitação e as condições de trabalho oferecidas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e ao Departamento de Energia Nuclear (DEN), a liberação e a oportunidade.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o apoio financeiro.

Ao Prof. Reynaldo L. Victória, a orientação, o estímulo, e a amizade.

Ao Prof. Admar Cervellini o apoio, a confiança e a amizade.

Aos colegas professores do CENA e do DEN, em especial a Paulo C.O. Trivelin, Eiichi Matsui, Atilio Dall'Olio, Klaus Reichardt, Paulo L. Libardi, Siu Mui Tsai Saito, Clemente G.C. da Silva, Everardo V.S.B. Sampaio, Ignácio H. Salcedo e Takashi Muraoka, as valiosas sugestões, a atenção e a amizade.

A Prof. Maria Cristina S. Nogueira, à Dra. Maria Izalina F. Alves e ao Dr. Gabriel A. Sarriès a atenção, a amizade e a orientação nas análises estatísticas.

A todos os que fazem a Seção de Isótopos Estáveis e Hidrologia (CENA), o apoio e a amizade e, em especial, aos técnicos José Aurélio Bonassi, Geraldo Arruda Junior e João Jurandir Isac, pela ajuda nas análises isotópicas.

As bibliotecárias, Janete L.B. de Moura, Pedrila de F. Pellegrinotti, Cristina Pereira, Lliamar D. Antonioli, Silvia Maria Zinsly, Heidi Ephifanio, Lidionete Brajão o apoio, a amizade e as orientações.

Ao casal Marcio - Sandra Lambais e ao pequeno Guilherme, o acolhimento, o carinho e a grande amizade.

A todas aquelas inesquecíveis pessoas que através de sua pequena-grande participação contribuíram para a realização deste trabalho.

Muito Obrigado.

SUMARIO

	Página
RESUMO	xiv
SUMMARY	xvi
1. INTRODUÇÃO	1
2. REVISÃO DE LITERATURA	5
2.1. Nitrogênio no solo, interações e inter- relações com a denitrificação	5
2.2. Denitrificação: caracterização e perspectivas	7
2.2.1. Antecedentes bioquímicos e fisiológicos do processo	9
2.2.1.1. Redução do nitrato	10
2.2.1.2. Redução do nitrito	11
2.2.1.3. Redução do óxido nítrico	11
2.2.1.4. Redução do óxido nitroso	12
2.2.1.5. Outros possíveis inter- mediários	12
2.2.1.6. Sistema de transporte de elétrons e fosforilação	13
2.2.2. Redução dissimilatória versus redução assimilatória do nitrato: distinção terminológica	15

Página

2.2.3.	Evolução de óxido nitroso, denitrificação e nitrificação ...	17
2.2.4.	Identidade microbiológica: determinantes gerais	19
2.2.5.	Fatores que afetam a denitrificação	21
2.2.5.1.	Disponibilidade de oxigênio	21
2.2.5.2.	Teor de água e seus efeitos no processo	23
2.2.5.3.	Quantidade e disponibi- lidade de carbono: matéria orgânica e fontes de energia	25
2.2.5.4.	Níveis de nitrato	28
2.2.5.5.	pH e temperatura	30
2.2.6.	Produtos gasosos e análise da denitrificação	32
2.3.	Volatilização de amônia	38
2.3.1.	Fatores que afetam a volatilização de amônia	39
2.3.2.	Importância da água	40
2.3.3.	Efeitos do pH: implicações associadas	42

	Página
2.3.4. Efeitos da temperatura	45
2.3.5. Concentração de amônia e seus efeitos nas perdas	46
2.3.6. Aeração e suas implicações	47
2.3.7. Volatilização de amônia em sistemas alagados	48
2.4. Sistemas alagados: o meio e suas mudanças	50
2.4.1. Desenvolvimento das operações de alagamento	51
2.4.2. Solos submersos e particularidades principais	52
2.4.3. Alguns detalhes dos processos de oxidação e redução	54
2.4.4. Aspectos gerais das transformações do N em solos submersos	56
2.4.5. Fontes de nitrogênio para o arroz	57
2.4.6. Importância das formas orgânicas do N do solo	58
2.4.7. Mineralização e imobilização: implicações em sistema solo-arroz inundado	59
2.4.8. Efeitos da incorporação de materiais orgânicos a solos submersos	64

Página

2.4.9. Nitrogênio na produção do arroz ..	69
2.4.10. Eficiência de utilização do N em sistema solo-arroz, em alagamento	73
2.5. Balanço do nitrogênio do solo: considerações gerais e compromissos	75
2.5.1. Métodos gerais de estudo do balanço do nitrogênio	76
2.5.2. Técnica de traçadores - uso do ¹⁵ N	77
2.5.3. Relações gerais entre os estudos do balanço do N, convencionais e isotópicos	78
2.5.4. Balanço do N e medida de denitrificação - implicações gerais	80
2.5.5. Balanço do nitrogênio em sistemas alagados	83
2.5.6. Condições gerais dos estudos de balanço do nitrogênio	85
2.5.7. Ganhos e perdas de nitrogênio em sistema solo-planta alagado	87
2.5.8. Perdas de nitrogênio em estudos de ¹⁵ N balanço - N	88

3. MATERIAL E METODOS	91
3.1. Perdas gasosas e transformações do N do solo, em condições de laboratório	91
3.1.1. Localização do experimento	91
3.1.2. Solos	91
3.1.3. Dispositivo experimental	93
3.1.4. Adição de matéria orgânica	93
3.1.5. Fonte de nitrogênio	94
3.1.6. Tratamentos	94
3.1.7. Condução do experimento	96
3.1.8. Extração e análise de N-NO_3^- e N-NH_4^+	97
3.1.9. Análise em N-orgânico	99
3.1.10. Análise da concentração isotópica ^{15}N de N	100
3.1.11. Delineamento experimental - análise dos dados	100
3.2. Perdas gasosas e balanço do nitrogênio, em sistema solo-planta, em casa de vegetação	102
3.2.1. Localização do experimento	102
3.2.2. Dispositivo experimental	102
3.2.3. Solo	102

3.2.4. Cultura desenvolvida: variedade utilizada	103
3.2.5. Adição de matéria orgânica	104
3.2.6. Calagem	104
3.2.7. Adubação, doses e fontes	105
3.2.8. Tratamentos	107
3.2.9. Delineamento experimental - análise dos dados	107
3.2.10. Transplante das plântulas	108
3.2.11. Alagamento	109
3.2.12. Controle fitossanitário	109
3.2.13. Amostragem das plantas e do solo .	110
3.2.14. Preparo das amostras de planta ...	110
3.2.15. Preparo das amostras do solo	111
3.2.16. Parâmetros avaliados	112
3.2.16.1. Matéria seca	112
3.2.17. Nitrogênio na planta	112
3.2.17.1. Teor de nitrogênio total	112
3.2.18. Nitrogênio derivado do fertilizante	114
3.2.18.1. Porcentagem de nitrogênio derivado do fertilizante	114

Pagina

3.2.18.2. Quantidade de nitrogênio derivado do fertilizante	115
3.2.18.3. Eficiência de utilização do fertilizante	116
3.2.19. Nitrogênio no solo	117
3.2.19.1. Teor de nitrogênio total	117
3.2.19.2. Quantidade de nitrogênio total	117
3.2.20. Nitrogênio derivado do solo	118
3.2.20.1. Porcentagem de nitrogênio no solo derivado do fertilizante	118
3.2.20.2. Quantidade de N no solo derivado do fertilizante	119
3.2.21. Balanço do nitrogênio no sistema solo-planta	119
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	125
4.1. Transformações do nitrogênio no solo	125
4.1.1. Nitrogênio nativo e adicionado ...	125
4.1.1.1. Comportamento do nitrogênio orgânico	125
4.1.1.2. Comportamento do N-NH ₄ ..	136
4.1.1.3. Comportamento do N-NO ₃ ..	146

Página

4.1.2. Nitrogênio no solo, derivado das fontes de ¹⁵ N	156
4.1.2.1. Transformações do ¹⁵ N- orgânico	156
4.1.2.2. Transformações do ¹⁵ N-NH ₄ ⁺	160
4.1.2.3. transformações do ¹⁵ N-NO ₃ ⁻	172
4.1.3. Inter-relações gerais nas transformações do N no solo	180
4.2. Transformações do nitrogênio no sistema solo-arroz	192
4.2.1. Produção de matéria seca	192
4.2.2. Nitrogênio na planta	198
4.2.2.1. Teor e quantidade de nitrogênio total na planta	198
4.2.2.2. Nitrogênio derivado do fertilizante	211
4.2.2.2.1. Porcentagem de nitrogênio na planta deriva- do do fertili- zante	211

4.2.2.2.2. Quantidade de nitrogênio na planta deriva- do do fertili- zante	217
4.2.2.3. Eficiência de utilização do fertilizante	226
4.2.2.4. Porcentagem e quantidade do nitrogênio na planta derivado do solo	234
4.2.3. Nitrogênio no solo	236
4.2.3.1. Teor e quantidade de nitrogênio total no solo	236
4.2.3.2. Porcentagem e quantidade do nitrogênio total no solo derivado do fertilizante	239
4.2.4. Balanço do nitrogênio no sistema solo-planta	248
5. CONCLUSÕES	260
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	262
APÊNDICE	327

TRANSFORMAÇÕES DO NITROGENIO NO SISTEMA SOLO-PLANTA-
ATMOSFERA, SOB CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO E CASA DE VEGETAÇÃO,
COM ENFASE A DENITRIFICAÇÃO.

Autor: WALDECIRO COLAÇO

Orientador: PROF. DR. REYNALDO LUIZ VICTÓRIA

RESUMO

Embora a ocorrência dos processos de perdas do nitrogênio dos solos, no estado gasoso, seja conhecida, muito poucas informações sobre o significado desses processos, nas condições existentes no Brasil, são disponíveis. A fim de examinar a magnitude desses mecanismos torna-se importante conhecer o que acontece com o N aplicado aos solos, particularmente em condições de alagamento. Experimentos de laboratório e de casa de vegetação foram conduzidos para investigar as transformações e os processos de perdas gasosas do nitrogênio em dois solos de várzea e em sistema solo-planta. Nas condições de laboratório foram empregados sistemas de incubação abertos para estudar o destino das frações (N-orgânico, $N-NH_4^+$, $N-NO_3^-$) provenientes das fontes - N^{15} aplicadas aos solos. Os tratamentos incluíram um controle e adições de uréia e palha de milho e a incubação (16 dias) dos solos em dois níveis de água

(capacidade de campo e alagamento). Em casa de vegetação foi realizado um experimento em vasos para estudar o balanço isotópico da uréia - ¹⁵N, localizada em profundidade, em três doses equivalentes (0, 50, 100 kg N.ha⁻¹), aplicadas por ocasião do transplante do arroz, na condição de alagamento, a um solo Aluvial ao qual a palha de milho foi incorporada. Os dados apresentados sugerem que a palha de milho, durante sua decomposição, imobiliza o nitrogênio do solo e o nitrogênio da uréia adicionada, nos dois regimes de água empregados. A matéria seca do arroz e a absorção do nitrogênio foram significativamente afetadas pelas doses do fertilizante nitrogenado. A eficiência de utilização do fertilizante pelo arroz foi baixa (7,9%) aos quarenta dias após o transplante das plântulas, alcançando valores de 51% (100-DAT) para o tratamento com dose mais elevada de uréia aplicada (100 kg N.ha⁻¹). A recuperação do nitrogênio da palha de milho, na planta, foi de 13% (100-DAT). As perdas de uréia foram modificadas pela incorporação da palha de milho. Para o solo sem o transplante do arroz as perdas de nitrogênio foram apreciáveis e parecem ter ocorrido, principalmente devido à denitrificação. Os resultados obtidos enfatizam a necessidade de um cuidadoso manejo para a redução das perdas do N-uréia, particularmente em solos que possam estar, ocasionalmente, sob condição de alagamento.

TRANSFORMATIONS OF NITROGEN IN THE SOIL-PLANT-ATMOSPHERE
SYSTEM, UNDER LABORATORY AND GREENHOUSE CONDITIONS, WITH
EMPHASIS ON DENITRIFICATION.

Author: WALDECIRO COLAÇO

Adviser: PROF. DR. REYNALDO LUIZ VICTÓRIA

SUMMARY

Gaseous losses of nitrogen from soils are known to occur, but very little information is available on the significance of the processes under Brazilian conditions. In order to examine the magnitude of such mechanisms it is important to know what happens to N applied to soils, particularly under waterlogged condition. Laboratory and greenhouse experiments were performed to investigate N-transformations and gaseous losses from two floodplain soils and a soil-plant system. In the laboratory open system incubations were conducted to follow the fate of the N-fractions (organic-N, NH_4^+ -N, NO_3^- -N) derived from ^{15}N -sources applied to soils. Treatments included a control and amendments with urea and maize straw, and incubations (16 days) at two moisture levels (field capacity and waterlogged). In the greenhouse a pot experiment was carried out to study the balance sheet of deep placed ^{15}N -labelled

-1

urea at three rates (0, 50, 100 kg N.ha⁻¹) applied to transplanted rice under continuous flooded condition in an Aluvial soil, that was incorporated with maize straw. The data presented suggested that maize straw immobilizes nitrogen from the soil and from the added urea during its decomposition under both water regimes used. Rice dry weight and N uptake were significantly affected by N-fertilizer rates. The average N-urea efficiency by the rice was low (7.9%), forty days after transplantation, reaching values of 51% (100-DAT) for the highest rate of urea amended treatment (100 kg N.ha⁻¹). The recovery of the straw nitrogen in the plant was 13% (100-DAT). Urea N-losses are modified by the incorporation of straw. In the non-planted soil, losses of nitrogen were appreciable. Nitrogen losses appeared to occur mainly due to denitrification. The results obtained stressed the need for careful management to reduce losses of N-urea, particularly for soils that can be occasionally under waterlogged condition.

*"Ideas must work through
the brains and the arms
of good and brave men,
or they are no better
than dreams."*

- EMERSON

1. INTRODUÇÃO

O estudo da dinâmica do nitrogênio em ecossistemas agrícolas e naturais tem despertado um crescente interesse, nos últimos anos, devido ao aumento na demanda por alimentos e fibras determinado pela rápida expansão da população mundial e, devido ao fato de que a ampliação de áreas desmatadas, cultivadas, o uso de fertilizantes e a fixação biológica do nitrogênio podem provocar modificações no equilíbrio do ambiente, as quais são causadas pelo aumento na ciclagem de compostos nitrogenados (RENNIE et alii, 1976; FIRESTONE, 1982; KEENEY, 1982). No caso da denitrificação, em particular, este aumento de interesse tem sido justificado não só devido a natureza do processo e suas reações mas, também, pela sua potencial significado em práticas agrícolas e poluição (PAYNE, 1973; CRUTZEN, 1974, 1981; CAST, 1976; COLAÇO, 1979).

A denitrificação é considerada o processo mais importante e a causa mais difundida de perdas gasosas do nitrogênio do solo (NOMMIK, 1956; BREMNER e SHAW, 1958a, 1958b; BROADBENT e CLARK, 1965; MACRAE e ANCAJAS, 1970;

DELWICHE e BRYAN, 1976; FIRESTONE, 1982; FILLERY, 1983). Devido ao fato de que o nitrogênio é perdido para a atmosfera, o processo tem sido qualificado como indesejável em solos agrícolas (ALEXANDER, 1977; BURESH e PATRICK, 1978), embora, sob condições apropriadas, ofereça um meio de minimizar a lixiviação do excesso de nitrato gerado pela aplicação de fertilizantes e insumos orgânicos, que iriam contaminar supridores de águas superficiais e subsuperficiais (STANFORD et alii, 1975b; COLAÇO, 1984).

O processo de denitrificação foi descoberto em 1886 por GAYON e DUPETIT. Embora um grande número de publicações tenha sido apresentado, ao longo desses anos e, considerável progresso tenha sido conseguido nos estudos da denitrificação, vários pontos do processo necessitam, ainda, um melhor esclarecimento (GARCIA, 1975c; CAST, 1976; FIRESTONE, 1982; FILLERY, 1983). Estudos realizados anteriormente indicavam que as perdas não contáveis em experimentos com balanço do nitrogênio eram atribuídas a denitrificação (ALLISON, 1955, 1965; HAUCK, 1971).

Contudo, recentes pesquisas sobre volatilização de amônia de solos inundados e sobre perdas gasosas de N via folhas mostraram que estes mecanismos podem ser mais importantes que do modo como foram considerados anteriormente, enfatizando a necessidade de pesquisas sobre

denitrificação em sistemas solo-planta (FILLERY, 1983). Além disso, em agrossistemas tropicais as perdas podem ser elevadas, pois a maioria dos processos microbiológicos é, dentro de certo limite, acelerada em condições de temperatura elevada (WETSELAAR et alii, 1981) e, portanto, as perdas de nitrogênio devidas ao processo de denitrificação podem ser ampliadas em teores de água extremamente elevados, condição associada ao cultivo de arroz inundado, um dos mais importantes ecossistemas nos trópicos (WETSELAAR e GANRY, 1982) e, também, no Brasil (FONSECA et alii, 1983). No Brasil, só recentemente começaram a aparecer estudos específicos sobre a denitrificação (AMARAL SOBRINHO et alii, 1983; COLAÇO, 1984; COLAÇO E VICTÓRIA, 1988).

Os estudos incluindo balanços do nitrogênio têm sido utilizados para determinar a recuperação, por uma cultura, do N-fertilizante aplicado tendo, ainda, como principal função, a determinação das perdas líquidas do nitrogênio ou perdas não possíveis de serem contabilizadas em um dado sistema de produção agrícola (ALLISON, 1965; LEGG e MEISINGER, 1982). Tais avaliações são particularmente apropriadas em condições tropicais por causa da instabilidade dos solos em períodos de estiagem (WETSELAAR e GANRY, 1982). De acordo com KOYAMA e APP (1979), a falta de estudos de balanço do nitrogênio, particularmente em arroz

cultivado em condições tropicais, representa uma séria lacuna de conhecimento.

Ao lado dos aspectos apresentados anteriormente, que em parte justificam a necessidade de estudos sobre perdas de nitrogênio nas condições existentes no Brasil, particularmente pela necessidade de dados sobre perdas gasosas deste nutriente, o presente estudo foi desenvolvido no sentido de identificar e quantificar os processos de perdas que ocorrem em condições de solo e clima existentes no Brasil, possibilitando o desenvolvimento de metodologia em determinados sistemas de cultivo, cujas contribuições serão utilizadas no sentido de melhorar a eficiência de utilização do nitrogênio em diversas culturas agrícolas, possibilitando uma avaliação posterior de métodos de manejo e sua contribuição na diminuição das perdas do referido elemento em condições de campo.

O objetivo deste estudo será avaliar as perdas gasosas de nitrogênio em laboratório e em casa de vegetação, em solos e em sistema solo-planta (arroz), através do balanço de nitrogênio empregando matéria orgânica e uréia marcadas com ¹⁵N.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Nitrogênio do solo, interações e inter-relações com a denitrificação

A produção de compostos nitrogenados é realizada por reações químicas e processos industriais a partir do nitrogênio elementar da atmosfera. Somente um limitado número de microrganismos, entretanto, tem a habilidade de utilizar essa fonte primária de nitrogênio. Todos os demais organismos vivos existentes sobre a Terra necessitam do nitrogênio combinado, ligado a matéria orgânica, ou nas formas inorgânicas, NO_3^- (nitrato) e NH_4^+ (amônio), para desempenhar suas atividades (STEVENSON, 1965).

Os compostos nitrogenados, na natureza, sofrem inúmeras conversões, sendo as taxas de transformações do nitrogênio, de um composto a outro, significativamente mudadas pelos fatores físicos e/ou biológicos atuantes no solo (DONNER e McLAREN, 1976). Observando as muitas reações envolvidas, não é de admirar que exista uma grande

diversidade no conteúdo e na composição do nitrogênio do solo (ALLISON, 1965, 1966; BEEVERS, 1976; ALEXANDER, 1977). O resultado de todas as interações expressa o estado do nitrogênio do solo, que é, por sua vez, função de vários processos, particularmente decomposição microbiana, fixação, nitrificação e denitrificação.

O nitrogênio é reciclado na natureza através de várias reações, as quais compõem o chamado ciclo do nitrogênio. Assim, durante a mineralização, o nitrogênio é liberado na forma inorgânica. Esse elemento pode ser retroconvertido a uma forma orgânica pelo processo de imobilização e pode ser mudado também de um estado reduzido a um oxidado, através do processo de nitrificação. O nitrato produzido, resultante da nitrificação, pode ser absorvido pelas plantas superiores e, posteriormente, metabolizado (JANSSON, 1972; BEEVERS, 1976; ALEXANDER, 1977). Em condições anaeróbias, contudo, o nitrato pode ser convertido (denitrificado) a nitrogênio gasoso (N_2) e óxido nitroso (NO), que escapam através da atmosfera (CAST, 1976; ALEXANDER, 1977; CRUTZEN, 1981; DELWICHE, 1981). O óxido nitroso se difunde na estratosfera produzindo o nitrogênio (N_2) e pequenas quantidades de óxido nítrico e dióxido de nitrogênio (NO_2), que reage com ozônio (O_3), convertendo-o a oxigênio (O_2) (PAYNE, 1973; CRUTZEN, 1974, 1981; CAST, 1976; DELWICHE, 1970, 1981).

2.2. Denitrificação: caracterização e perspectivas

O processo de denitrificação, redução dissimilatória do nitrato ou respiração do nitrato, tem sido considerado um dos mais importantes mecanismos e a causa mais extensamente difundida de perdas gasosas do nitrogênio do solo (NOMMIK, 1956; BREMNER & SHAW, 1958a, 1958b; BROADBENT & CLARK, 1965; DOMMERGUES e MANGENOT, 1970; PAYNE, 1973; RUSSELL, 1973; GARCIA, 1974; DELWICHE e BRYAN, 1976; ALEXANDER, 1977; FIRESTONE, 1982; FILLERY, 1983). E, geralmente, definido como a redução bioquímica de nitrato ou nitrito a nitrogênio gasoso, seja como nitrogênio elementar (N_2) ou como um óxido de nitrogênio.

2

Embora os termos denitrificação e redução dissimilatória de nitrato sejam usados, frequentemente, como sinônimos (empregados quando o nitrato serve como aceptor de elétrons num organismo que oxida um composto orgânico ou, algumas vezes, inorgânico, obtendo energia no processo), DELWICHE (1981) esclarece que o termo denitrificação implica tecnicamente na produção de compostos gasosos, comumente N_2 e NO , enquanto o termo redução dissimilatória é mais apropriado ao caso em que o íon amônio é formado em excesso ao que é requerido para o crescimento da célula.

Uma característica singular do processo é que

a denitrificação, no sentido clássico, não é interpretada como respiração anaeróbia; ela tem um caráter aeróbio básico, com o nitrato substituindo o oxigênio, não em termos do nitrato como fonte de oxigênio, mas como um aceitador de hidrogênio ou elétron (DELWICHE e BRYAN, 1976; ALEXANDER, 1977).

Diferentes aspectos da denitrificação têm sido estudados e revisados por vários autores: BROADBENT e CLARK (1965), DOMMERGUES e MANGENOT (1970), RUSSELL (1973), PAYNE (1973), GARCIA (1975c), DELWICHE e BRYAN (1976), DAY et alii (1978), FOCHT (1978), ROLSTON (1978), COLAÇO (1979). Compilações mais atualizadas têm sido apresentadas por BRYAN (1981), CRUTZEN (1981), DELWICHE (1981), PAYNE (1981), PAYNE et alii (1981), GARCIA e TIEDJE (1982), FILLERY (1983), RYDEN e ROLSTON (1983).

Embora um grande número de publicações tenha sido apresentado e considerável progresso tenha sido conseguido nos estudos de denitrificação, vários pontos duvidosos ou obscuros desse processo necessitam, ainda, ser melhor entendidos ou mais amplamente esclarecidos. No Brasil, só recentemente, começaram a aparecer estudos sobre o processo de denitrificação (AMARAL SOBRINHO et alii, 1983; COLAÇO & PAUL, 1984a, 1984b; COLAÇO, 1984; COLAÇO & VICTORIA, 1988; VICTORIA et alii, 1987).

Há, portanto, uma necessidade urgente de estimativas das perdas ocasionadas pela denitrificação nas condições existentes no Brasil, além de estudos das influências de técnicas de manejo agrícola, do desenvolvimento de métodos que aumentem a eficiência de utilização de fertilizantes e das transformações coordenadas dos processos componentes do ciclo do nitrogênio, aspectos gerais que deverão ser bastante perturbados pelo processo de perdas gasosas por denitrificação.

2.2.1. Antecedentes bioquímicos e fisiológicos do processo

A denitrificação biológica compreende a redução de nitrato a nitrogênio elementar. O processo requer a síntese de vários sistemas enzimáticos complexos, tendo como consequência biológica final a produção de energia sob a forma de ATP (PAYNE, 1973; INGRAHAM, 1981; PAYNE et alii, 1981), a qual é realizada através do transporte de elétrons de uma fonte orgânica ou inorgânica para nitrato ou para um óxido de nitrogênio, derivado do nitrato e, portanto, em forma mais reduzida (BRYAN, 1981; INGRAHAM, 1981; PAYNE et alii, 1981). A denitrificação pode ser considerada, então, um processo respiratório anaeróbico, em cascatas, que pode utilizar como aceptores de elétrons nitrato, nitrito, óxido nítrico e óxido nitroso, produtos intermediários

frequentemente observados (KLUYVER e VERHOEVEN, 1954; WIJLER e DELWICHE, 1954; NOMMIK, 1956, PAYNE, 1973, 1981; INGRAHAM, 1981). De acordo com PAYNE (1973, 1981) a denitrificação se realiza através da sequência de reações enzimáticas e quimicamente definível, a seguir:

2.2.1.1. Redução do nitrato

O primeiro estágio do processo de denitrificação corresponde a redução de nitrato a nitrito, tendo sido, até agora, o mais detalhadamente estudado. Entretanto, alguns organismos reduzem nitrito, e não nitrato, a nitrogênio elementar (VANGAI e KLEIN, 1974; PICHINOTY et alii, 1976), enquanto outros produzem somente óxido nitroso, não apresentando a atividade da redutase do óxido nitroso (MATSUBARA e MORI, 1968; RENER e BECKER, 1970; PAYNE, 1973).

(1) número de oxidação do nitrogênio em cada intermediário formado.

A enzima envolvida nesta primeira etapa do processo é denominada redutase respiratória do nitrato e corresponde ao tipo redutase A de Pichinoty (PICHINOTY, 1964; PAYNE, 1973).

2.2.1.2. Redução do nitrito

A redução do nitrito é o segundo passo no processo de denitrificação. O metabolismo do nitrito tem sido demonstrado em extratos livres de células e é mediado pela redutase do nitrito (IWASAKI et alii, 1963; IWASAKI e MATSUBARA, 1972). O óxido nítrico e o óxido nítrico têm sido identificados como produtos da redução do nitrito (MIYATA et alii, 1969; PICHINOTY, 1973).

2.2.1.3. Redução do óxido nítrico

A inclusão do óxido nítrico como intermediário no processo de denitrificação tem sido, ao longo dos anos, duvidosa e bastante discutida. Em uma revisão cuidadosa sobre o assunto, PAYNE (1981) discute detalhadamente os fatos que evidenciam de modo consistente a aceitação deste composto como intermediário obrigatório no processo. O óxido nítrico é geralmente o principal produto da redução de nitrito por intermédio da redutase do nitrito (PAYNE, 1973; DELWICHE e BRYAN, 1976).

2.2.1.4. Redução do óxido nitroso

Muitos organismos utilizam o óxido nitroso como único aceitador de elétrons, durante o crescimento (DELWICHE, 1959; PAYNE, 1973, 1981). Contudo, muito pouco é conhecido sobre o sistema da redutase do óxido nitroso. Isto porque a atividade enzimática é inteiramente perdida quando as células sofrem tratamentos de ruptura, mesmo com métodos moderados (MATSUBARA e IWASAKI, 1971; MATSUBARA, 1975).

2.2.1.5. Outros possíveis intermediários

Vários compostos, entre os quais estão o ácido hiponitroso (H N O_2), a nitramida (NO NH_2), o radical nitroxila ($-\text{NOH}$) e o ácido imidonitríco [$\text{NH}(\text{NO H})_2$], têm sido postulados como envolvidos no processo de denitrificação (CAMPBELL e LEES, 1967; DOELLE, 1975; DELWICHE e BRYAN, 1976). Nenhum desses compostos tem sido convincentemente demonstrado como intermediário na reação, nem excluído (DELWICHE e BRYAN, 1976; ALEXANDER, 1977). Desde que não existe suficiente evidência para sugerir a produção química do N O_2 a partir do nitrito (NO_2^-), fenilenodiamina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2$) ou hidroxilamina (NH_2OH), a presença do N O_2 é aceita como comprovação da ocorrência da denitrificação (FOCHT et alii, 1974; FOCHT et alii, 1978).

2.2.1.6. Sistema de transporte de elétrons e fosforilação

Os resultados dos estudos sobre os sistemas de transporte de elétrons e fosforilação, em denitrificação, são contraditórios. É sabido que a redução do nitrato envolve nucleotídeos, piridina, flavinas e quinonas (DeGROOTH e STOUTHAMER, 1970; DOWNEY, 1971; PAYNE, 1973; DOELLE, 1975; DELWICHE e BRYAN, 1976). Citocromos estão participando do processo, na maioria dos organismos (JOHN e WHATLEY, 1970; KODAMA, 1970; PAYNE et alii, 1971; COX et alii, 1971; SAWHNEY e NICHOLAS, 1978; ZUMFT et alii, 1979).

Com base nos conhecimentos correntes, a sucessão de eventos que caracterizam a denitrificação, proposta por PAYNE et alii (1981), é apresentada na Figura 1:

Figura 1 - Sucessão de eventos que caracterizam a denitrificação, adaptado de PAYNE et alii (1981).

2.2.2. Redução dissimilatória versus redução assimilatória do nitrato: distinção terminológica

A redução dissimilatória do nitrato é definida, de acordo com VERHOEVEN (1956), como incluindo não somente a conversão de NO_3^- a N_2 mas, também, a redução do NO_3^- a NH_4^+ , em condições anaeróbicas. Aparentemente, poucos organismos capazes de reduzir NO_3^- a NH_4^+ e N_2 têm sido identificados. Um exemplo é o *Bacillus licheniformis* (VERHOEVEN et alii, 1954; VERHOEVEN, 1956; YORDY e RUOFF, 1981). Entretanto, como foi citado, DELWICHE (1981) distingue conceitualmente a denitrificação da redução dissimilatória do nitrato, este último processo referindo-se à formação de amônio quando este íon está em excesso ao exigido para o crescimento celular. Por outro lado, YORDY e RUOFF (1981) informaram que a redução de nitrato ou nitrito a amônia é classicamente identificada como redução assimilatória, desde que a função primária assumida nesta transformação é a produção de uma forma de nitrogênio reduzida, fisiologicamente utilizável. Ainda, esses autores esclareceram que o consenso geral entre os investigadores do processo da redução dissimilatória do nitrato, ou do nitrito, é de que a função primária desta reação não é a assimilação, pelo menos no caso dos anaeróbios facultativos. Assim, existem dois mecanismos distintos pelos quais se

processa o metabolismo do nitrato em bactérias: o nitrato pode ser reduzido ao nível de amônia ou nitrogênio amídico como um constituinte da célula (processo assimilatório) ou, em certas condições, ele é utilizado na respiração, como um acceptor terminal de elétrons (processo dissimilatório) (PAYNE, 1973; DELWICHE e BRYAN, 1976; BRYAN, 1981). De acordo com DELWICHE (1981), a redução assimilatória do nitrato e a redução dissimilatória do nitrato podem ser consideradas, de certo modo e num ponto de vista químico, geral, como processos idênticos; porém, a diferença em terminologia reflete a função para a qual o processo serve ou, em alguns casos, a natureza do produto. Com base nos conhecimentos correntes e de acordo com CAMPBELL e LEES (1967) e ALEXANDER (1977), a sequência bioquímica mais provável através da qual os microrganismos reduzem o NO_3^- a NH_4^+ , na redução assimilatória do nitrato, é a seguinte:

O processo assimilatório ocorre aeróbia e anaerobiamente, é reprimido por amônia e, ao lado do fato de que a amônia não é excretada no meio, não produz energia. O processo dissimilatório, ao contrário, não ocorre,

provavelmente, em condições aeróbias, não é afetado por amônia e é um mecanismo que produz energia (DELWICHE, 1981; BRYAN, 1981).

2.2.3. Evolução de óxido nitroso, denitrificação e nitrificação

Embora a maior parte da literatura relacionada aos estudos da denitrificação e de fontes e sumidouros do óxido nitroso da atmosfera reflita a suposição geral de que este gás é originado em larga escala, senão inteiramente, através da redução anaeróbia do nitrato pelos microrganismos denitrificadores, em sistemas naturais terrestres e aquáticos, recentes informações têm chamado a atenção para o fato de que a evolução do N_2O pode ocorrer também durante a oxidação de amônia a nitrato, em condições aeróbias, pelos microrganismos nitrificadores (BLACKMER e BREMNER, 1978; FRENEY et alii, 1979; BREMNER e BLACKMER, 1981). De acordo com estes autores o mecanismo sugerido para a produção de N_2O , nesse processo, ocorre do seguinte modo:

Evidências de que *Nitrosomonas europaea* tem a capacidade enzimática de produzir N_2O foram primeiramente apresentadas por FALCONE et alii (1962). Por outro lado, a produção de N_2O através da oxidação de amônia ou hidroxilamina a nitrito, em células de *Nitrosomonas europaea*, foi demonstrada por YOSHIDA e ALEXANDER (1970, 1971).

A inibição da oxidação de amônia em culturas de *Nitrosomonas europaea* por acetileno foi informada por HYNES e KNOWLES (1978).

Em solos canadenses, incubados em condições aeróbias e na presença de acetileno, COLAÇO (1979) observou a ocorrência de um mecanismo inibitório no processo referido, semelhante ao relatado em cultura pura de *Nitrosomonas europaea* por HYNES e KNOWLES (1978). Observações semelhantes foram informadas por WALTER et alii (1979) e BREMNER e BLACKMER (1979). AULAKH et alii (1982), em estudos sobre perdas gasosas do nitrogênio, em campos de trigo da região de Saskatchewan, Canadá, mostraram que os fluxos de N_2O foram resultado tanto do processo redutivo (denitrificação) como do oxidativo (nitrificação), geralmente ocorrendo simultaneamente nas condições de campo. Foi confirmada, também, a inibição da nitrificação por acetileno, em um modo semelhante à inibição com N-serve [2-

cloro-6-(triclorometil)-piridina], conhecido inibidor da nitrificação. BREMNER e BLACKMER (1981) concluíram que uma significativa porção do N_2O que se evola dos solos é produzida por microrganismos nitrificadores e que a nitrificação merece uma maior atenção em pesquisas sobre fontes terrestres do N_2O atmosférico.

2

2.2.4. Identidade microbiológica: determinantes gerais

Certas espécies bacterianas, e não outras formas biológicas, são capazes de respirar anaerobiamente. A redução de nitrato a nitrogênio elementar representa uma das formas mais predominantes deste tipo de respiração, para a qual uma grande variedade de aeróbios ordinários pode mudar se o oxigênio se tornar limitante. As bactérias que levam a efeito estas transformações são denominadas de denitrificadoras (PAYNE et alii, 1981).

No sentido estrito, os organismos denitrificadores são aqueles capazes de realizar o processo metabólico inteiro (redução de nitrato a nitrogênio). Contudo, a atividade combinada de microrganismos individualmente capazes de catalisar um ou alguns estágios do caminho metabólico afeta, também, a denitrificação. Assim sendo, num sentido ecológico, qualquer organismo que catalise algum estágio do processo pode contribuir como

mediador para a denitrificação e, então, ser considerado um denitrificador parcial (INGRAHAM, 1981).

Mesmo os organismos capazes de catalisar o processo completo da denitrificação diferem em sua habilidade para utilizar intermediários no caminho metabólico, particularmente o óxido nitroso (INGRAHAM, 1981; PAYNE et alii, 1981). Todos os denitrificadores, virtualmente, são "aeróbios estritos" (BRYAN, 1981; GARCIA e TIEDJE, 1982; FILLERY, 1983); entretanto, algumas espécies de anaeróbios fermentadores têm sido isoladas (van GENT-RUIJTERS et alii, 1975; GARCIA, 1977; PICHINOTY, 1979; KASPAR et alii, 1981). A denitrificação, na verdade, está associada a "aeróbios estritos", de certo modo, porém é encontrada, também, entre anaeróbios facultativos e mesmo entre anaeróbios estritos (INGRAHAM, 1981).

Poucos gêneros de bactérias podem realizar o processo de denitrificação. PAYNE (1973) apresentou uma lista de classificação dos organismos capazes de denitrificar, que inclui um total de 15 gêneros. Revisões mais recentemente publicadas (KESSEL, 1976; FOCHT e VERSTRAETE, 1977; HALL, 1978; FIRESTONE, 1982; INGRAHAM, 1981; JETER e INGRAHAM, 1981; FILLERY, 1983) incluem novos gêneros identificados, considerando, particularmente, a significativa e surpreendente informação de que exemplos típicos de bactérias fixadoras, dos gêneros *Azospirillum*

(NEYRA et alii, 1977) e *Rhizobium* (ZABLOTOWICZ et alii, 1978; ZABLOTOWICZ e FOCHT, 1979; DANIEL et alii, 1982; O'HARA e DANIEL, 1985), são capazes de denitrificar. Estas últimas informações reforçam a necessidade de estudos coordenados dos componentes do ciclo do nitrogênio, principalmente quanto às características de interligação entre os processos de fixação do nitrogênio e de denitrificação, nos quais tais bactérias desempenham importante papel (PAYNE et alii, 1981; FILLERY, 1983).

2.2.5. Fatores que afetam a denitrificação

Estudos de laboratório e de campo têm indicado que os fatores influenciando a denitrificação incluem: disponibilidade de oxigênio, conteúdo de água, quantidade e disponibilidade de carbono, níveis de nitrato no solo, pH e temperatura (BREMNER e SHAW, 1958a, 1958b; GARCIA, 1975a, 1975b, 1975c; DELWICHE e BRYAN, 1976; COLAÇO, 1979; BRYAN, 1981; ROLSTON, 1981). Poucos destes fatores físicos, químicos e biológicos atuam independentemente de cada um dos outros, sendo a integração de todos eles frequentemente muito complicada (ROLSTON, 1981).

2.2.5.1. Disponibilidade de oxigênio

Muitas informações contraditórias sobre o

efeito do oxigênio têm sido apresentadas. É geralmente aceito que a denitrificação ocorre em condições anaeróbias. Contudo, DELWICHE e BRYAN (1976) enfatizam que, na maioria das condições sob as quais a denitrificação é encontrada na natureza, a microbiota está envolvida e, sem dúvida, reações fermentativas estão se processando de modo simultâneo. Estes autores salientaram que as informações observando o efeito do oxigênio são, talvez, contraditórias por causa das diferentes condições experimentais envolvidas e/ou diferenças em organismos, tendo relatado, ainda, organismos aerobiamente denitrificantes. De acordo com BRYAN (1981), estes relatos iniciais sobre denitrificadores aeróbios foram, provavelmente errôneos, porque, conforme COLLINS (1955), é possível que os organismos tenham sido capazes de limitar o oxigênio do meio pela respiração, de modo rápido, nos frascos de cultura.

Vários autores têm sugerido que, à exceção do que acontece nos solos saturados, a denitrificação ocorre em zonas anaeróbias, dentro de uma matriz, comumente aeróbia (SKERMAN e MacRAE, 1957; GREENWOOD, 1961; CURRIE, 1961; BROADBENT e CLARK, 1965; FOCHT, 1974).

2.2.5.2. Teor de água e seus efeitos no processo

Os efeitos do conteúdo da água no solo e da disponibilidade de oxigênio na denitrificação estão intimamente relacionados.

O teor de água influencia a denitrificação, diretamente, como meio disponível aos microrganismos, favorecendo o desenvolvimento de uma população microbiana ativa, e, indiretamente, através do bloqueio dos poros do solo, redução do oxigênio e seu transporte às zonas de atividade microbiana intensa e à respiração das raízes das plantas (ROLSTON, 1981). Assim sendo, à medida em que o teor de água no solo aumenta, isto é, à medida em que os poros do solo vão sendo cheios com água, o oxigênio poderá alcançar os locais de consumo elevado, somente através da difusão pela água, a qual é cerca de 3 a 4 vezes mais lenta que no ar. Os maiores potenciais para denitrificação ocorreriam nos casos em que os solos estivessem completamente saturados com água. No campo, isto ocorre durante pequenos períodos, devido a chuvas ou irrigação, ou poderá ocorrer em períodos mais longos, quando existem camadas de impedimento, em geral no perfil do solo (ROLSTON, 1981).

2.2.5.3. Quantidade e disponibilidade de carbono: matéria orgânica e fontes de energia

Evidências de que a quantidade de matéria orgânica presente nos solos influencia a quantidade de produtos gasosos do nitrogênio perdidos do solo foram apresentadas por CLARK e BEARD (1960). O suprimento de carbono influencia a denitrificação, diretamente, fornecendo o substrato necessário ao crescimento dos denitrificadores e, indiretamente, através do consumo de oxigênio por outros microrganismos que diminuem o teor de oxigênio no solo (ROLSTON, 1981).

O aumento da denitrificação a partir de adições de carbono é bem estabelecido (BREMNER e SHAW, 1958b). As taxas e as quantidades de denitrificação são modificadas em grande extensão pela quantidade de carbono, sua posição no perfil e sua localização em relação ao NO_3^- do solo. Assim, a movimentação do NO_3^- para regiões mais profundas do perfil, por chuva ou irrigação, diminui o potencial para alguma denitrificação substancial (ROLSTON, 1981). ROLSTON et alii (1976) não observaram denitrificação em um solo aluvial da Califórnia, que tinha sido mantido próximo à saturação, na superfície, depois que o NO_3^- foi lixiviado dos 60 cm superiores do solo. Ainda, PRATT et alii

(1976), estudando perdas de nitrogênio em relação às características de perfis de solo, determinaram que a denitrificação foi limitada, principalmente, aos 60 cm superficiais de três perfis, aos quais tinha sido aplicado esterco por 4 anos. Por outro lado, MEEK et alii (1969) observaram que as concentrações de NO_3 continuaram a decrescer abaixo da zona radicular ativa, em solos argilosos com um lençol freático a aproximadamente 2 metros. O movimento do C solúvel, com a água no solo, foi evidentemente o suficiente para levar a uma significativa denitrificação abaixo da zona radicular.

A presença de uma cultura não só contribui com materiais orgânicos de raízes mortas e exsudatos mas, também, com a diminuição da concentração de oxigênio através da respiração das raízes. Assim, tal presença no tempo em que o fertilizante é aplicado pode levar a aumentar o potencial para denitrificação (ROLSTON, 1981). Ainda, o espaço de tempo em que as plantas estão sendo cultivadas em um solo aumenta muito a denitrificação ROLSTON et alii (1978).

Estudando a influência de glucose e concentrações de nitrato sobre a denitrificação, BOWMAN e FOCHT (1974) observaram que relações C/N em torno de 2 parecem fornecer as maiores taxas de denitrificação e que

relações C/N mais largas (estendendo-se além deste valor), ou altas concentrações de glucose, retardam o processo. Nas relações mais largas, eles observaram crescimento de fungos com subsequente queda nos valores de pH. Esses autores concluíram que a redução assimilatória do nitrato não foi significativa em comparação à denitrificação.

Em estudo de laboratório, utilizando solos do Pernambuco, COLAÇO (1984) observou que as perdas de $N - NO_3^-$ apresentaram uma tendência a aumentar com o aumento das relações C/N e com os percentuais de C - total. Tendências semelhantes foram relatadas por WESTERMAN e TUCKER (1978) para o aumento das perdas por denitrificação com o aumento das relações C/N e da matéria orgânica presente nos solos (CLARK e BEARD, 1960).

STANFORD et alii (1975a, 1975b, 1975c) demonstraram que as quantidades de matéria orgânica disponível nos solos exercem uma influência dominante nas taxas de denitrificação e mostraram que, em diversos solos, as taxas foram melhor correlacionadas com a fração solúvel do C do solo (equivalente-glucose) que com o carbono total do solo. Também, BURFORD e BREMNER (1975) observaram que a capacidade de denitrificação de 17 solos de Iowa era altamente correlacionada com o C - orgânico solúvel em água ou C - mineralizável. De acordo com STANFORD et alii (1975a,

1975b, 1975c) esses resultados não surpreenderam, pois a maioria do C - total dos solos é altamente resistente à decomposição.

2.2.5.4. Níveis de nitrato

O nitrogênio presente no solo como nitrato pode ser perdido por denitrificação se as condições de anaerobiose se desenvolverem (BROADBENT e CLARK, 1965; FOCHT, 1974; SMITH, 1977). As perdas são extremamente variáveis, podendo chegar a um terço, ou mais, do nitrogênio aplicado como fertilizante (ALLISON, 1955, 1965; GARDINER, 1964). Tem sido postulado que a denitrificação é indiretamente aumentada pelo aumento da fixação do nitrogênio (McELROY, 1976; CRUTZEN, 1974, 1981). Adicionalmente a isto, muitas publicações enfatizam que a maior parte do N_2O produzido nos solos, via denitrificação, é reduzida a N_2 antes que escape para a atmosfera (CADY e BARTHOLOMEW, 1961; COOPER e SMITH, 1963; CAST, 1976; DELWICHE, 1981; ROLSTON, 1981).

ROLSTON et alii (1978) demonstraram que a denitrificação pode ocorrer em taxas muito elevadas sendo as taxas mais altas observadas após a aplicação de KNO_3 aos solos mantidos constantemente molhados. Por outro lado, AVNIMELECH e RAVEH (1976), estudando o escape de nitrogênio

a partir de solos diferindo em textura e em aplicação pesada de nitrogênio, estabeleceram que as altas concentrações de NO_3^- superaram a inibição do oxigênio na denitrificação. Sugeriu-se que tal efeito ocorreu devido a uma competição entre o NO_3^- e o O_2 por doadores de hidrogênio disponíveis.

Observações semelhantes, para o desaparecimento de $\text{N} - \text{NO}_3^-$ em sistemas de incubação, na presença de glucose, têm sido relatadas (BURESH e PATRICK, 1978; WESTERMAN e TUCKER, 1978; COLAÇO, 1984). Entretanto, em solos que receberam adições simultâneas de $\text{N} - \text{NO}_3^-$ e glucose, incubados em condições de alagamento e na presença de acetileno, observou-se diminuição nos níveis do $\text{N} - \text{N}_2\text{O}$ evoluído em comparação com os níveis de $\text{N} - \text{N}_2\text{O}$ na ausência de glucose (COLAÇO, 1979). Ainda, nesses estudos utilizando adições de glucose, foram observados teores de $\text{N} - \text{NH}_4^+$ substancialmente aumentados. BOWMAN e FOCHT (1974) salientaram que a adição de glucose, particularmente em níveis elevados, tem resultado num decréscimo do potencial de denitrificação em solos. Ainda, BURESH e PATRICK (1978) esclareceram que a conversão do NO_3^- a NH_4^+ e N-orgânico parece ser significativa quando o NO_3^- é adicionado a solos intensamente reduzidos, sem adubação, ou a solos que receberam adição de glucose.

2.2.5.5. pH e temperatura

Fatores ambientes como temperatura e pH afetam a denitrificação e seus produtos. Vários pesquisadores têm encontrado que a faixa ótima de valores de pH na qual a denitrificação se realiza está entre 5,0 e 9,0 (WIJLER e DELWICHE, 1954; NOMMIK, 1956; BREMNER E SHAW, 1958a, 1958b; GARCIA, 1975c; FOCHT e VERSTRAETE, 1977). Assim, na maioria das situações existentes no campo, as taxas de denitrificação são provavelmente afetadas só em pequeno grau nos valores de pH em torno da neutralidade (ROLSTON, 1981; FILLERY, 1983). O principal efeito do pH é refletido na distribuição dos produtos gasosos da denitrificação. Assim, em condições ácidas, o N_2O tem sido encontrado como o mais importante produto; contudo, sob condições neutras ou alcalinas, o N_2 se torna o produto predominante (FOCHT, 1954; WIJLER e DELWICHE, 1954; NOMMIK, 1956, 1965; GARCIA, 1975c; HAUCK e MELSTEAD, 1956). WIJLER e DELWICHE (1954) relataram que, com a microbiota, o NO é o maior produto da denitrificação quando o valor de pH é inferior a 5,0. Acima de 7,0 o N_2O é produzido mas, subsequentemente, reabsorvido e reduzido a N_2 . Abaixo do valor de pH 7,0 algum N_2O é formado mas existe pouca reabsorção com denitrificação posterior; essa reação parece ser distintamente afetada por condições ácidas (DELWICHE e BRYAN, 1976).

O aumento da atividade biológica quando a temperatura do solo aumenta leva ao aumento da denitrificação (ALEXANDER, 1977; ROLSTON, 1981). A denitrificação aumenta com a temperatura até 70 °C e então decresce com posteriores elevações de temperatura. A faixa ótima de temperatura observada para o processo encontra-se entre 40 e 70 °C (NOMMIK, 1956; BREMNER E SHAW, 1958b).

Análises cromatográficas realizadas por BAILEY e BEAUCHAMP (1973) indicaram que a diminuição da temperatura decresce a produção de N_2 e aumenta a de NO , mas não afeta significativamente a produção de N_2O . O aumento na produção de NO foi atribuído à quimiodenitrificação, quando NO era a única fonte de nitrogênio. FOCHT e VERSTRAETE (1977), contudo, salientaram que as quantidades de N_2O e N_2 parecem não serem afetadas significativamente pela temperatura. Entretanto, BAILEY (1976) observou que a quantidade de N_2 produzida diminuía quando a temperatura decrescia de 30 a 8 °C e que a denitrificação era completamente inibida a 5 °C. Ainda, SMID E BEAUCHAMP (1976) indicaram que a denitrificação pode ocorrer à temperatura de 0 °C ou próximo dela, e COLAÇO (1979) observou que a evolução de $N_2 - N_2O$ foi marcadamente afetada pelo aumento de temperatura de 5 a 25 °C, em incubações de laboratório, sendo as taxas mais elevadas obtidas em condições de alagamento.

2.2.6. Produtos gasosos e análise da denitrificação

O nitrogênio molecular (N_2) é um dos principais produtos da denitrificação e é produzido em quantidades normalmente insuficientes para serem medidas contra sua concentração ambiental. É por esta razão que as perdas por denitrificação em solos, no campo, representam o parâmetro desconhecido em estudos de quantificação do ciclo do nitrogênio (RYDEN e ROLSTON, 1983). É correntemente aceito que o N_2O é um intermediário livre, obrigatório, no processo (PAYNE, 1973; StJOHN e HOLLOCHER, 1977; BALDERSTON et alii, 1976). O óxido nitroso está presente na atmosfera em concentrações que variam de 260 a 360 ppb (em volume) (GOODY, 1969; SCHUTZ et alii 1970; WENTWORTH e FREEMAN, 1973; DELWICHE et alii, 1978; BURFORD et alii, 1978; MOSIER e MACK, 1980). Foi observado que as concentrações de N_2O no solo variam desde bem abaixo da concentração atmosférica ambiente até muitas vezes aquela (BURFORD et alii, 1978).

O progresso nas pesquisas sobre a magnitude da denitrificação tem sido restrito pelas dificuldades encerradas na realização de medidas acuradas a campo. Numerosos estudos de laboratório têm fornecido informações úteis sobre os fatores que afetam a denitrificação em solos, mas estas informações não podem ser empregadas para

predições da extensão do processo em condições de campo (RYDEN e ROLSTON, 1983).

Revisões atualizadas sobre os métodos de análises da denitrificação têm sido apresentadas (FOCHT, 1978; COLAÇO, 1979; ROLSTON, 1981; GARCIA e TIEDJE, 1982; DENMEAD, 1983; RYDEN e ROLSTON, 1983). Métodos diretos e indiretos têm sido utilizados no estudo do processo. As técnicas previamente adotadas envolviam ensaios manométricos para produtos gasosos (McGARITY, 1961), estudos de balanço do nitrogênio (ALLISON, 1955, 1965; HAUCK, 1971) e estimativas do potencial de denitrificação de um solo através de índices como carbono disponível, potencial redox, potencial da água no solo e enumeração de denitrificadores (FOCHT, 1978). A determinação da denitrificação pelo desaparecimento do nitrato tem sido adotada em numerosos estudos de laboratório (PILOT e PATRICK, 1972; BOWMAN e FOCHT, 1974; DUBEY e FOX, 1974; STANFORD et alii, 1975b; WESTERMAN e TUCKER, 1978; REDDY et alii, 1980; COLAÇO, 1984), sendo considerada uma medida indireta bastante útil na determinação das perdas através do referido processo.

O isótopo estável do nitrogênio, ¹⁵N, tem sido extensivamente empregado como traçador em solos, plantas, animais e água. Os métodos para medida direta da denitrificação usando ¹⁵N dependem da aplicação de

fertilizantes ^{15}N , altamente enriquecidos, aos solos, no campo, seguidos da medida do enriquecimento isotópico dos gases evoluídos (RYDEN e ROLSTON, 1983). O princípio básico é estabelecer um balanço do ^{15}N no solo e admitir que as perdas são devidas ao processo de denitrificação (HAUCK, 1979; GARCIA e TIEDJE, 1982). Estes métodos medem somente a denitrificação do fertilizante aplicado e não podem medir a denitrificação a partir do N nativo ou residual.

Mais recentemente, foi demonstrado o uso do isótopo radioativo do nitrogênio, ^{13}N , nos estudos da denitrificação em experimentos de curta duração (GERSBERG et alii, 1976; TIEDJE et alii, 1979; HOLLOCHER et alii, 1980). O uso deste traçador é limitado, porque exige acesso a um ciclotron, o qual deve estar nas proximidades do laboratório, além do fato de que o ^{13}N apresenta pequena meia-vida (GARCIA e TIEDJE, 1982; RYDEN e ROLSTON, 1983).

FEDEROVA et alii (1973) informaram que o acetileno (C_2H_2) bloqueava a redução do N_2O a N_2 por bactérias do solo. A inibição da redução do óxido nítrico por acetileno em cultura pura foi confirmada posteriormente por YOSHINARI e KNOWLES (1976). BALDERSTON et alii (1976) e YOSHINARI e KNOWLES (1976) usaram esse método para inibir a denitrificação no estágio de N_2O e mostraram que ele poderia ser usado como um ensaio para determinar as taxas de

denitrificação. De acordo com YOSHINARI et alii (1977) a denitrificação em solo foi fácil e sensivelmente monitorada pela medida da produção de N_2O na presença de acetileno. SMITH et alii (1978), utilizando N_2^{13} juntamente com análises por cromatografia em gás, confirmaram que o acetileno efetivamente inibiu a redução do N_2O em solos aeróbios. O método foi empregado também para determinar taxas de denitrificação em agregados de solos incubados aeróbia e anaerobiamente. Resultados semelhantes foram apresentados por PAUL e VICTORIA (1978), utilizando medidas com N_2^{15} em sistemas anaeróbios de solo.

A aplicação da técnica de inibição por acetileno da redução do óxido nitroso, em solos e sedimentos, tem sido relatada em vários estudos de laboratório e de campo (YOSHINARI et alii, 1977; KLEMEDTSSON et alii, 1977; SMITH et alii, 1978; YEOMANS e BEAUCHAMP, 1978; PATRIQUIN et alii, 1978; COLAÇO, 1979; RYDEN et alii, 1979a, 1979b; CHAN e KNOWLES, 1979). Os métodos empregando acetileno usam duas aproximações, ou princípios básicos: 1) medidas da acumulação do N_2O em dispositivos de cobrimento "in situ", após adição de acetileno ao solo e 2) medidas das taxas de produção do N_2O em amostras indeformadas, em presença de acetileno. Um dos métodos utilizando o bloqueio da redução do óxido nitroso por acetileno em amostras de solo com estrutura natural,

fluxo contínuo de ar da atmosfera. Estes métodos têm sido melhorados e utilizados em diferentes estudos para determinação das perdas gasosas do nitrogênio do solo (RYDEN et alii, 1979a, 1979b; RYDEN e LUND, 1980; MOSIER et alii, 1981; HUTCKINSON e MOSIER, 1981; COCHRAN et alii, 1981).

Ao lado dos métodos apresentados para medidas de perdas gasosas do N em campo, mais recentemente desenvolvidos, destacam-se as técnicas micrometeorológicas. Através dessas técnicas, a densidade de fluxo vertical do gás é medida no ar livre, acima da superfície do solo (DENMEAD, 1983).

2.3. Volatilização de amônia

A contabilização dos dados de balanço de nitrogênio tem mostrado que considerável quantidade de N é perdida dos solos agrícolas anualmente (ALLISON, 1955, 1965, 1973). A importância dos diferentes mecanismos de perda é pobremente entendida mas muitos pesquisadores concordam que a volatilização de NH_3 é um caminho potencialmente importante (DENMEAD et alii, 1974, 1976; MIKKELSEN et alii, 1978; MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; VLEK e CRASWELL, 1979; NELSON, 1982). Em certas condições existentes no solo, amônia pode volatilizar para a atmosfera, se materiais contendo amônio ou materiais contendo nitrogênio orgânico ou inorgânico, os quais podem ser convertidos a amônio, são aplicados ao solo (JEWITT, 1942; WAHHAB et alii, 1957; ERNST e MASSEY, 1960; KRESGE e SATCHELL, 1960; CHAO e KROONTJE, 1964; FENN e KISSEL, 1973; NELSON, 1982).

Algumas considerações gerais sobre o processo de volatilização serão apresentados aqui, sendo a maior parte das informações orientadas para a ocorrência do processo em condições de alagamento. Maiores detalhes poderão ser obtidos de FENN e KISSEL (1973, 1974, 1976), FENN e ESCARZAGA (1976, 1977), DENMEAD et alii (1974, 1977), VLEK e CRASSWELL (1979, 1981) e NELSON (1982).

Amônia, portanto, um produto da mineralização do nitrogênio é formada continuamente no solo e na água, em sistemas inundados. A sua velocidade de formação depende da natureza dos materiais orgânicos presentes no solo e de vários fatores que atuam sobre o mesmo (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979). Além de resultar da decomposição da matéria orgânica, ela pode ser liberada por espécies aquáticas ocorrendo, também, como um produto em excesso no metabolismo do N em solos arrozeiros inundados (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; DeDATTA, 1981; NELSON, 1982).

Por outro lado, compostos de amônio podem alcançar o solo através da sua ocorrência em águas de chuva ou de irrigação. Além disso, grandes quantidades de N-amônio podem ocorrer, nos solos, imediatamente após a aplicação de fertilizantes nitrogenados na maioria das vezes fontes potenciais de amônio (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; NELSON, 1982).

2.3.1. Fatores que afetam a volatilização de amônia

A volatilização de amônia é função das várias propriedades e dos fatores que atuam sobre o sistema solo envolvido, destacando-se como particularmente importantes, dentre outros, o teor de umidade, pH, temperatura, capacidade de troca catiônica, textura, conteúdo de matéria

orgânica, concentração de NH_3 , conteúdo de carbonato de cálcio e condições atmosféricas que atuam acima do solo (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; NELSON, 1982; PATRICK, 1982). Práticas culturais envolvendo fontes e doses de fertilizantes nitrogenados aplicados e épocas, métodos de aplicação e localização desses fertilizantes são, também, importantes (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; NELSON, 1982).

2.3.2. Importância da água

A importância da água e das taxas de perda de água do solo, para a volatilização de amônia, tem sido enfatizada por vários autores. JEWITT (1942) e WAHHAB et alii (1957) encontraram que as perdas de amônio de solos não alagados eram, em parte, dependentes do teor de umidade do solo, ocorrendo uma relação constante entre amônia e vapor de água, quando da aplicação de sulfato de amônio a solos alcalinos. Para ERNST e MASSEY (1960) e FENN e ESCARZAGA (1976) as perdas atribuídas a volatilização de amônia foram relacionadas diretamente aos valores iniciais de umidade do solo. Os últimos autores observaram que uréia, uréia + $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ e NH_4NO_3 quando aplicados como sais ou como soluções aquosas, na superfície de um solo seco ao ar, resultaram em igual absorção do N pela planta, com maior absorção quando aplicados na superfície do solo úmido até saturação.

As perdas totais do N foram baixas, quando da aplicação da uréia como sal, ou na forma líquida, a solos secos ao ar. A aplicação da uréia na superfície de solos úmidos, quando eles estão rapidamente secando, resultou em baixas perdas de N-NH_3 . De acordo com CHAO e KROONTJE (1964) as taxas de volatilização de amônia e de evaporação de água, a partir dos solos, seguiram diferentes funções e não estavam relacionadas a água do solo ou a velocidade ou umidade relativa do ar acima da superfície do solo. As taxas de evaporação de amônia decresceram com o tempo embora as taxas de evaporação da água tenham permanecido constantes próximo das condições de solo seco ao ar. Quando a umidade do solo aumentou da condição de solo seco em estufa até 30% de umidade a quantidade de amônia retida diminuiu grandemente, sugerindo a falha das moléculas de amônia em substituir as moléculas de água que estavam sorvidas nos locais de adsorção do solo por fenômeno semelhante (MORTLAND, 1955; BROWN e BARTHOLOMEW, 1963; NOMMIK e NILSSON, 1963; SHIMPI e SAVANT, 1975). O aumento no teor de umidade do solo, de 30% para saturação aumentou grandemente a sorção de amônia por causa da dissolução na água do solo (PARR e PAPENDICK, 1966; SHIMPI e SAVANT, 1975). Estes autores informaram que a retenção de amônia em solos alagados foi intensificada nos primeiros 15 dias pela quimiosorção com sistemas $\text{Fe}(\text{OH})_3\text{-Fe}^{++}$ e $\text{Mn}(\text{OH})_3\text{-Mn}^{++}$, através de formação de complexos coordenados e produtos da

decomposição anaeróbia.

2.3.3. Efeitos do pH: implicações associadas

O pH do solo influencia a volatilização de amônia e quanto mais alto ele for, mais elevado será o potencial de perdas (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979). Numerosos estudos têm demonstrado que considerável volatilização de amônia pode ocorrer, seguindo a aplicação de uréia ou sais de amônio na superfície de solos alcalinos com valores de pH em torno de 8,0 (MARTIN e CHAPMAN, 1951; WAHHAB et alii, 1957; ERNST e MASSEY, 1960; KRESGE e SATCHELL, 1960; CHAO e KROONTJE, 1964; DuPLESSIS e KROONTJE, 1964; BLASCO e CORNFELD, 1966; WATKINS et alii, 1972).

E, normalmente, esperado que ocorra pouca volatilização com valores de pH menores que 6,0. Contudo, quantidades significantes de NH_3 em solos ácidos podem ser perdidas, se grandes quantidades de uréia ou sais de amônio são aplicadas na superfície dos solos ou, quando temperaturas de incubação, elevadas, são empregadas (ERNST e MASSEY, 1960; DuPLESSIS e KROONTJE, 1964; BLASCO e CORNFELD, 1966). De acordo com NELSON (1982), o pH na solução imediatamente em volta dos grânulos de uréia ou de sais de amônio pode ser muito mais importante em determinar as perdas, que o pH do solo. Por outro lado, vários

investigadores têm observado que a capacidade de troca cationica do solo influencia a volatilização de amônia (MARTIN e CHAPMAN, 1951; GASSER, 1964; DuPLESSIS e KROONTJE, 1966). MARTIN e CHAPMAN (1951) observaram que as perdas de amônia foram mais elevadas para um solo saturado com K^+ e Na^+ que para um solo saturado com Ca^{++} e Mg^{++} , possivelmente por causa das diferenças de pH em elevadas pressões parciais de dióxido de carbono na solução do solo. DU PLESSIS e KROONTJE (1966) mostraram que uma argila- Mg^{++} perde mais amônia que uma argila- Ca^{++} e atribuíram essas maiores perdas a uma maior precipitação de carbonato de cálcio, o que resultou em um pH mais elevado no caso da argila- Mg^{++} .

Um outro importante fator associado com os valores absolutos de pH é a capacidade de tamponamento dos solos, isto é a habilidade para resistir a mudanças de pH, a qual está frequentemente associada com a quantidade de calcário (carbonato de cálcio) no solo. Tem sido observado que maiores perdas por volatilização de amônia ocorrem após adição de sais de amônio a solos calcários, comparados a solos não calcários (JEWITT, 1942; TERMAN e HUNT, 1964; FENN e KISSEL, 1973, 1974, 1976; TERRY et alii, 1978). Além disso, a adição de calcário ou outros materiais alcalinos, ao solo, aumenta a proporção do NH_4^+ evoluído como NH_3 (ERNST e MASSEY, 1960; RAISON e MCGARITY, 1978).

O carbonato de cálcio ou espécies contendo carbono inorgânico podem reagir diretamente com compostos de amônio para produzir carbonatos de amônio, instáveis (JEWITT, 1942; TERMAN e HUNT, 1964; FENN e KISSEL, 1973, 1974). MARION e DUTT (1974) sugerem que o pareamento de íons é importante para quantificar o sistema amônia-dióxido de carbono-água, no solo. FEAGLEY e HOSSNER (1978) avaliando os mecanismos de reação de sulfato de amônio com carbonatos concluíram que se alguma forma sólida for formada, ela deverá ser bicarbonato de amônio e não, carbonato de amônio. Estes autores informaram que a hidrólise de carbonatos desempenha importante papel na volatilização de amônia-dióxido de carbono, com HCO_3^- e Ca^{++} existindo como pares de íons em solução. Para os referidos autores, bicarbonato de amônio, intermediário, forma-se, o qual se decompõe numa relação 1:1 entre amônia e dióxido de carbono. Contudo, se o dióxido de carbono evoluído, for readsorvido, como por exemplo pela biota aquática, a relação será modificada.

O pH do solo é um fator significativo que influencia a proporção de uréia volatilizada como NH_3 , a partir da adição de uréia ou de sais de amônio, por causa do efeito da concentração do íon H^+ no equilíbrio $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3$ no solo. Contudo, em certas condições outros fatores como textura e capacidade de troca catiônica (CTC) podem ser

fatores primários que podem influenciar as perdas de NH_4^+ , como foi sugerido (ERNST e MASSEY, 1960; BLASCO e CORNFIELD, 1966) nos casos de evolução de NH_3 de solos ácidos. Diversos autores têm observado que mais NH_3 é volatilizado após adição de N-NH_4^+ a solos de textura grosseira do que a solos de textura fina, quando todas as condições são semelhantes nos dois casos (WAHHAB et alii, 1957; GASSER, 1964; FENN e KISSEL, 1976; TERRY et alii, 1978). Esses autores sugeriram que o efeito da textura do solo na volatilização de amônia é devido a uma mais elevada CTC dos solos de textura fina. Com essa mais alta CTC, uma proporção maior do NH_4^+ adicionado estaria presente no complexo de troca e menos NH_4^+ estaria presente na solução do solo. Para GASSER (1964) a CTC foi o mais importante fator governando as perdas de NH_3 , após a aplicação de uréia ou sais de amônio, aos solos.

2.3.4. Efeitos da temperatura

As perdas por volatilização de amônia após a aplicação de uréia ou sais de amônio, aos solos, aumentam, com o aumento da temperatura (MARTIN e CHAPMAN, 1951; WAHHAB et alii, 1957; WATKINS et alii, 1972; PRASAD, 1976). Contudo, FENN e KISSEL (1974) demonstraram que a volatilização resultante da aplicação de sais de amônio a solos calcários, formando precipitados de cálcio, foi levemente aumentada pela temperatura. Altas temperaturas,

por outro lado, podem aumentar a velocidade de difusão do NH_3 do solo, permitindo a conversão mais rápida de NH_3 da água para o ar (NELSON, 1982).

2.3.5. Concentração de amônia e seus efeitos nas perdas

De acordo com MARTIN e CHAPMAN (1951), CHAO e KROONTJE (1964) e VLEK e STUMPE (1978) a quantidade de NH_3 evoluída aumenta com o aumento das taxas de aplicação de N^+ - NH_4 ao solo, mas a proporção do N adicionado, volatilizado como NH_3 é constante.

Por outro lado, WAHHAB et alii (1957) e OVERREIN e MOE (1967) relataram que a proporção de NH_4^+ ou N^+ -urêia adicionada, evoluída como NH_3 aumenta com a taxa de aplicação do fertilizante. FENN e KISSEL (1974) observaram que a percentagem de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, evoluída como N^+ - NH_3 a partir de solos calcários aumentou com o aumento da quantidade adicionada. Os autores concluíram que a taxa de aplicação de sais de amônio que forma precipitados solúveis pela reação com CaCO_3 é de importância crítica em determinar a perda total de NH_3 e a proporção de NH_4^+ evoluído como NH_3 . De acordo com NELSON (1982) o aumento na proporção do N adicionado, volatilizado como NH_3 , com o aumento das taxas

de aplicação de uréia ou NH_4^+ , pode resultar dos elevados valores do pH do solo, obtidos das aplicações de quantidades elevadas de uréia, NH_4OH ou $(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$ ou pode resultar das interações de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ e $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ com CaCO_3 conforme FENN e KISSEL (1974).

2.3.6. Aeração e suas implicações

O movimento rápido do ar através da superfície do solo também promove a volatilização de amônia, mantendo uma baixa pressão parcial de NH_3 na atmosfera adjacente ao solo e permitindo uma difusão do NH_3 do solo, em resposta a um grande gradiente de pressão parcial (NELSON, 1982).

Em solos tratados com uréia e sulfato de amônio, tem sido informado que a volatilização de amônia aumenta com o aumento na velocidade do fluxo de ar sobre a superfície das amostras de solo (CHAO e KROONTJE, 1964; OVERREIN e MOE, 1967; WATKINS et alii, 1972; TERRY et alii, 1978).

Informações obtidas em trabalhos mais recentes (KISSEL et alii, 1977; VLEK e STUMPE, 1978) indicam que as taxas máximas de volatilização e as maiores

quantidades de NH_3 envolvidas do solo, foram atingidas em câmaras de volatilização, nas quais ocorreram entre 15 a 20 trocas de ar por minuto, equivalentes a velocidade do vento em torno de 0,1 a 0,3 km/hora.

2.3.7. Volatilização de amônia em sistemas alagados

Embora muitos fatores que afetam as perdas por volatilização de amônia nos solos não alagados atuem na situação de submergência dos solos, algumas particularidades significativas existem neste caso; essas diferenças ocorrem principalmente em relação a saturação do meio com água, a restrição das trocas gasosas e as propriedades químicas e eletroquímicas dos solos alagados (MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; PATRICK, 1982).

Relativamente poucos estudos têm sido conduzidos sobre as perdas por volatilização de amônia em solos alagados (CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983; MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; NELSON, 1982) e só nos últimos anos a magnitude das perdas através desse processo foi reconhecida (MIKKELSEN et alii, 1978; VLEK e CRASSWELL, 1979).

SREENIVASAN e SUBRAHMANYAN (1935) informaram a ocorrência de amônia de até 40%, proveniente da aplicação de fertilizantes nitrogenados, em condições de alagamento.

Por outro lado, MITSUI (1954) encontrou perdas de amônia de somente 9% do N aplicado como uréia, em solos em alagamento, sugerindo, o autor, que o processo de volatilização de amônia tem pouco significado prático, em solos inundados. Utilizando métodos de incubação em laboratório, OKUDA (1960) determinou perdas por volatilização de amônia de 16%, ocasionadas pela aplicação de uréia na superfície de solos saturados. As menores perdas (1,7%) ocorreram quando o sulfato de amônio foi incorporado na camada saturada com água, 1 cm abaixo da superfície do solo.

Estudos desenvolvidos em laboratório, indicam perdas de volatilização de amônia, através da aplicação de sulfato de amônio e de uréia, respectivamente da ordem de 7% e 19% (MacRAE e ANCAJAS, 1970) e da ordem de 4% e 8% (YOSHIDA e PADRE, 1977). Para um solo com pH 8.1, em casa de vegetação, esses últimos autores encontraram perdas em torno de 17%. As perdas por volatilização foram reduzidas a cerca de 50% quando os fertilizantes amoniacais foram incorporados ao solo. Em solos arrozeiros, BOULDIN e ALIMAGNO (1976) demonstraram a importância do crescimento de algas no controle do pH da camada de água de alagamento e, assim, das perdas de amônio quando da fertilização com sulfato de amônio. Os autores informaram perdas de amônia em torno de 60% do sulfato de amônio aplicado a lanco, sem incorporação.

Em estudos de campo realizados mais recentemente MIKKELSEN et alii (1978) informaram perdas de amônia da ordem de 20% do N aplicado a um solo argiloso (Maahas), cuja camada de água de alagamento apresentou valores diurnos de pH que variaram na faixa de 7.2 a 10.0.

Para um solo argiloso ácido (Luisiana), que não desenvolveu extensivo crescimento de algas, as perdas foram menores que 1%. Os estudos de MIKKELSEN et alii (1978) confirmam ainda que, a volatilização de amônia é de pouco significado agronômico em solos, quando o pH da camada de água permanece abaixo de 7.0.

A localização em profundidade e o uso de uréia revestida reduziram as perdas de amônia a menos de 1% (MIKKELSEN et alii, 1978; VLEK e CRASSWELL, 1979).

2.4. Sistemas alagados: o meio e suas mudanças

As mudanças que normalmente acontecem em solos submersos, alagados ou inundados, são tão variadas e numerosas, que é difícil conciliar os processos acontecendo simultaneamente em condições aeróbias e anaeróbias, em um sistema unificado simples, ou mesmo, avaliar o significado de uma reação isoladamente (YOSHIDA, 1975; PATRICK, 1982). Contudo os principais processos bioquímicos podem ser

olhados como uma série de reações de oxidação e redução, mediadas por diferentes espécies de bactérias (YOSHIDA, 1975). Essas sucessivas mudanças microbianas, além da sequência combinada de etapas de redução química e bioquímica do solo, são acompanhadas pelo abaixamento do potencial de oxi-redução e por modificações no pH (YOSHIDA, 1975; PATRICK, 1982). Tais mudanças podem mascarar diferenças no solo, até certo ponto e, também, influenciar o crescimento das plantas em solos alagados (YOSHIDA, 1975). Esses aspectos orientam, aqui, a necessidade de serem apresentadas algumas considerações sobre transformações envolvendo o nitrogênio em solos submersos e as condições através das quais, elas acontecem. A maior parte das informações será confinada a solos arrozeiros inundados. Informações mais detalhadas sobre o assunto poderão ser encontradas em MITSUI (1954); PONNAMPERUMA (1972); CRASSWELL e VLEK (1979, 1983); MURAYAMA (1979); GARCÍA e TIEDJE (1982) e PATRICK (1982).

2.4.1. Desenvolvimento das operações de alagamento

De acordo com YOSHIDA (1975) as operações envolvidas no cultivo de arroz por inundação compreendem:

- 1) a submergência do solo com ou sem a "pudlagem" ou revolvimento do solo para o período de cultivo, incluindo ou não a secagem do solo no período de crescimento da cultura;

2) drenagem ou secagem do solo antes da colheita e 3) realagamento para o próximo cultivo, algumas semanas a alguns meses após a colheita. Sobrepostas a essas operações, estão as propriedades inerentes ao solo e ao meio, que afetam o regime microbiano nos solos arrozeiros (YOSHIDA, 1975).

2.4.2. Solos submersos e particularidades principais

Nos solos alagados, o processo normal de trocas gasosas entre o solo e a atmosfera é interrompido (SAH e MIKKELSEN, 1983a). A camada de água, livre sobre o solo, bloqueia a entrada do oxigênio no solo e cria, assim, condições reduzidas na maior parte da camada arável (MITSUI, 1954; YOSHIDA, 1975; CRASSWELL e VLEK, 1983; PATRICK, 1982). Uma outra propriedade particular desses solos é que a camada de água exerce pressão, que pode promover escoamento superficial, infiltração e perdas por lixiviação, do nitrogênio fertilizante (GARCIA e TIEDJE, 1982; CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983; PATRICK, 1982).

De modo geral, os solos arrozeiros inundados são formados por duas camadas distintas: uma camada superficial oxidada, aeróbia, tendo de alguns milímetros a alguns centímetros de profundidade, dependente da quantidade de matéria orgânica resultante do consumo de oxigênio

através da respiração dos microrganismos e, da estrutura do solo, que influencia a taxa de difusão do oxigênio através da interface solo-água e, portanto, o fornecimento de oxigênio através da água de inundação. Abaixo desta camada está uma outra camada, reduzida, anaeróbia (ALBERTA, 1953; MITSUI, 1954; YOSHIDA e PADRE, 1974; GARCIA e TIEDJE, 1982; EMBRAPA, 1985). E nesta camada que se localiza o sistema radicular do arroz. Também, é principalmente aí que ocorrem os processos de respiração e de fermentação (YOSHIDA, 1975).

A rizosfera oxidada das plantas aquáticas, em particular do arroz, também estabelece uma interface aeróbia-anaeróbia (STURGIS, 1936; AMSTRONG, 1964; YOSHIDA, 1975), que afeta as transformações do N e outros processos. As plantas que evoluíram para se desenvolverem em um meio aquático, transportam oxigênio da atmosfera para as raízes através de uma estrutura porosa interna, o aerênquima (YOSHIDA, 1975; GARCIA e TIEDJE, 1982; PATRICK, 1982). Este fornecimento alternado de oxigênio é necessário à respiração das raízes, desde que a zona radicular é normalmente destituída deste elemento (PATRICK, 1982). O oxigênio que alcança as raízes difunde através das células radiculares para o solo circundante, criando uma fina zona aeróbia, rodeada por uma mais vasta zona anaeróbia. Esta interface é aparentemente importante para os processos de

denitrificação-nitrificação e de fixação do nitrogênio.

2.4.3. Alguns detalhes dos processos de oxidação e redução

Conforme PATRICK (1982), contanto que O_2 esteja presente no solo, $N-NO_3^-$ e outros componentes oxidados do solo não sofrerão reduções biológicas e químicas extensivas. Após o desaparecimento do oxigênio de um solo submerso, a necessidade de aceitadores de elétrons por organismos anaeróbios, facultativos ou verdadeiros, resulta na redução de $N-NO_3^-$, óxidos de manganês de maior número de oxidação, SO_4^{2-} e mesmo CO_2 . Nitrato e MnO_2 são reduzidos em potenciais redox regularmente elevados, enquanto SO_4^{2-} e CO_2 são reduzidos, somente, em condições anaeróbias associadas a potenciais extremamente baixos. A redução de óxido férrico é intermediária (PATRICK, 1982). Evidências de que, após a diminuição do oxigênio, seguindo a submergência do solo, a redução dos componentes inorgânicos oxidados é sequencial, têm sido apresentadas por diversos autores (CONNELL e PATRICK, 1968; TURNER e PATRICK, 1968; PATRICK e DeLAUNE, 1972; MARTENS e BERNER, 1974; PATRICK e GOTOH, 1974), sendo $N-NO_3^-$ e Mn^{+6} seguidos, em ordem, pela redução de Fe^{3+} a Fe^{2+} , SO_4^{2-} a S^{2-} e, por último, CO_2 a

CH₄. Muitas vezes um componente não é completamente reduzido antes que a redução do próximo comece (PATRICK, 1982). A redução de N-NO₃⁻ e Mn usualmente começa antes que o O₂ desapareça completamente. A redução de outros componentes, contudo, é inibida por O₂ ou N-NO₃⁻ e, consequentemente, solos contendo esses oxidantes não produzirão Fe²⁺, S²⁻ ou CH₄. Conquanto O₂ e N-NO₃⁻ sejam importantes na redução, eles estão normalmente presentes em quantidades tão pequenas, que são rapidamente reduzidos e, consequentemente, desaparecem logo após o alagamento. Por outro lado, óxido férrico hidratado e MnO₂ estão normalmente presentes em maiores quantidades no solo (PATRICK, 1982). O sistema Fe, em particular, geralmente tem uma grande reserva de material reduzível na fase sólida. A oxidação e a redução desses compostos são cíclicas: eles são reduzidos em alagamento e reoxidados quando o solo é subsequentemente drenado e exposto ao oxigênio. As reações de nitrogênio são também cíclicas, em um certo sentido, pois sob condições aeróbicas todas elas estão se processando na direção da forma N-NO₃⁻, enquanto sob condições anaeróbicas N-NO₃⁻ é convertido, a formas mais reduzidas normalmente N₂ e N₂O e algumas vezes NH₄⁺ (STURGIS 1936; PATRICK e STURGIS, 1955; PATRICK, 1960; TAKAHASHI, 1960; TAKAI e UEHARA, 1973; PATRICK e REDDY, 1976a, 1976b; GARCIA e TIEDJE, 1982; CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983).

2.4.4. Aspectos gerais das transformações do N em solos submersos

A submergência do solo para o cultivo do arroz influencia marcadamente as transformações do N no solo (PONNAMPERUMA, 1972; YOSHIDA, 1975; SAVANT e DeDATTA, 1980). A presença de uma fina camada aeróbia, intimamente aproximada de uma camada anaeróbia (ALBERTA, 1953; MITSUI, 1954; YOSHIDA, 1975; PATRICK, 1982) tem importantes efeitos relacionados a essas transformações. O nitrato não é prontamente denitrificado na camada aeróbia, mas é denitrificado na anaeróbia, enquanto o N-NH^+ será convertido a N-NO_3^- na camada aeróbia, mas não na anaeróbia (PATRICK, 1960; PATRICK e GOTOH, 1974; PATRICK e REDDY, 1976a, 1976b). Vários processos envolvendo o nitrogênio e tomando lugar nos solos submersos podem ser explicados com base na movimentação dessas duas formas de nitrogênio, de uma camada para outra e, nas reações biológicas que elas, conseqüentemente, sofrem (PATRICK e STURGIS, 1955; PATRICK e REDDY, 1976a, 1976b; PATRICK, 1982). Assim, de modo geral, o nitrogênio presente no ar e o que está dissolvido na água de inundação podem se difundir até a camada oxidada, na superfície do solo, através da fixação por algas verde-azuladas e bactérias, transformando-se em nitrogênio orgânico. Este nitrogênio, bem como o existente em resíduos orgânicos ou em fertilizantes, sofre mineralização até a

produção de N-NH_4^+ , que pode ser absorvido pelas plantas de arroz. O amônio presente na camada oxidada por nitrificação deve ser convertido a nitrato, o qual poderá ser absorvido pelas plantas ou percolado para a camada reduzida do solo onde poderá ser imobilizado na matéria orgânica ou perdido por lixiviação ou denitrificação (GARCIA e TIEDJE, 1982; PATRICK, 1982; CRASSWELL E VLEK, 1983; EMBRAPA, 1985).

2.4.5. Fontes de nitrogênio para o arroz

As fontes de nitrogênio para plantas de arroz podem ser classificadas em dois tipos: as existentes normalmente no solo e as aplicadas artificialmente (MURAYAMA, 1979). Ambas as fontes têm grande significado no cultivo do arroz e desempenham importante papel na produtividade da cultura. A relação do N absorvido pelas plantas, a partir de cada um desses tipos de fontes, é afetada por diversas condições, as quais incluem propriedades do solo, variedade de arroz, período de cultivo e época, quantidade e método de aplicação de fertilizantes (MURAYAMA, 1979; PATNAIK e RAO, 1979; STANGEL, 1979). Em geral, o N fornecido naturalmente, particularmente o N do solo, é distinto do fornecido através da fertilização química devido ao fato de que ele está sendo continuamente fornecido de toda a camada arável (MURAYAMA, 1979). Conquanto a quantidade de N, suprida naturalmente durante o

período de cultivo, seja influenciada por muitos fatores, ela é considerada variar dentro da faixa de 30 a 130 kgN/ha. Condições ambientes e, em particular, propriedades do solo, e período de cultivo mudam o processo de liberação e a quantidade do N liberado (MURAYAMA, 1979; FONSECA et alii, 1983). Por outro lado, os fertilizantes solúveis são efetivos para o arroz somente por um pequeno período de tempo. Quando a liberação do N do solo não satisfaz as necessidades nutricionais das plantas, os fertilizantes químicos são empregados para regular o suprimento deste nutriente (MURAYAMA, 1979; PATNAIK e RAO, 1979; FONSECA et alii, 1983; WETSELAAR e GANRY, 1982). É importante, entretanto, que os fertilizantes sejam aplicados eficientemente, não só para melhorar o crescimento e aumentar a produtividade mas, para evitar a poluição do ambiente (STANFORD et alii, 1975a; BROADBENT, 1979; MURAYAMA, 1979).

2.4.6. Importância das formas orgânicas do N do solo

O arroz, mais que a maioria das culturas, é dependente da mineralização das formas orgânicas do N do solo, mesmo nos casos onde N-fertilizante é aplicado em doses elevadas (BROADBENT, 1979). Normalmente, 50 a 80%, ou mais, do N na cultura tem sua origem no solo, particularmente matéria orgânica (KOYAMA et alii, 1977;

PATRICK e REDDY, 1976b; BROADBENT, 1979; PATNAIK e RAO, 1979; DeDATTA, 1981). Naturalmente, em condições de não fertilização, o arroz obtém, ainda, uma maior proporção do seu nitrogênio, através da mineralização de fontes orgânicas; na verdade, potencialmente, todo ele, porque o nitrogênio atmosférico pode ser fixado através do arroz em alagamento, devendo ser convertido a formas minerais, a partir de formas orgânicas, antes de ser utilizado (BROADBENT, 1979). A secagem do solo ao ar antes do alagamento, temperatura elevada, pudlagem ou remisturamento do solo e aplicações de calcário e de N-inorgânico estranho ao solo, estimulam a mineralização do N do solo (BROADBENT, 1979; PATNAIK e RAO, 1979). A reciclagem de resíduos orgânicos ajuda a manter o N no solo em um nível regularmente alto (PATNAIK e RAO, 1979).

2.4.7. Mineralização e imobilização: implicações em sistema solo-arroz inundado

Conforme BROADBENT e REYES (1971) a absorção do N do solo concorre com a do N aplicado como fertilizante. O chamado efeito "priming" no qual a aplicação do N estimula a liberação do N do solo é observado largamente nos solos arrozeiros (WESTERMAN e KURTZ, 1973; MURAYAMA, 1979). O suprimento do N do solo, através da mineralização, é um processo principalmente microbiano e bioquímico (ALEXANDER, 1977; PATNAIK e RAO, 1979). De acordo com ALEXANDER (1977) e

PATRICK (1982) as principais características da degradação anaeróbica da matéria orgânica, por bactérias, em solos submersos são: incompleta decomposição de carboidratos em CH_4 , ácidos orgânicos, H_2 e CO_2 , com baixo nível de energia; baixa energia de fermentação, resultando na síntese de poucas células microbianas por unidade de carbono orgânico degradado e, baixo requerimento de N do metabolismo anaeróbico levando a uma mais rápida liberação de íons NH_4^+ que aquela ordinariamente esperada, quando da decomposição do material vegetal com relações C/N altas ou, em virtude da velocidade lenta da decomposição anaeróbica de resíduos vegetais.

Informações obtidas de PATRICK (1982) esclarecem que as formas de nitrogênio presentes nos solos submersos são geralmente semelhantes àsquelas dos solos não alagados, com algumas diferenças reconhecidas, como nos conteúdos relativos de N-NO_3^- e N-NH_4^+ . Amônio é a forma mineral dominante (PATNAIK e RAO, 1979). Contudo, as transformações do N, diferem marcadamente nessas duas situações sendo, tal mudança de comportamento, ocasionada pela diferença na atividade dos microrganismos funcionando em condições aeróbicas e anaeróbicas (PATRICK, 1982). Conforme este autor, a decomposição de compostos nitrogenados orgânicos a formas inorgânicas, em solos submersos, pode ser diferenciada da decomposição aeróbica em dois aspectos

particulares: em primeiro lugar, pela velocidade mais lenta e, em segundo, pela natureza do produto final. Por outro lado, a decomposição anaeróbia é largamente dependente da atividade de bactérias anaeróbias ou anaeróbias facultativas, que operam em menor nível de energia sendo, portanto, menos eficientes que as aeróbias. Consequentemente, os processos de decomposição e ressintese são mais lentos em solos submersos que em solos bem drenados. A decomposição de vários constituintes químicos de diferentes materiais vegetais em condições anaeróbias, conforme TENNEY e WAKSMAN (1930), foi mais lenta que em condições aeróbias, não obstante os tipos de material vegetal empregado. A diferença nas taxas de decomposição, em ambas as condições, foi mais pronunciada para substâncias complexas, com nitrogênio orgânico. Para diversos solos, WARING e BREMNER (1964) observaram uma mais rápida liberação de N-inorgânico em condições de alagamento que em condições aeróbias e WILLIAM et alii (1968) concluíram que a exigência de N durante a decomposição de palha de arroz em solos submersos correspondeu a terça parte da concentração média do N exigido na decomposição aeróbia de resíduos de plantas. PATRICK (1982) informa que a liberação do NH_4^+ durante a decomposição anaeróbia é extremamente importante para o arroz em condições de alagamento. Em solos aeróbios, ABICHANDANI e PATNAIK (1958) relataram que a nitrificação foi ativa e o N-amônio diminuiu gradualmente com o tempo. Em

um solo alagado, entretanto, houve acumulação de amônia, enquanto o nitrato diminuiu ao nível de traços. ACHARYA (1935a, 1935b, 1935c) observou que os microrganismos imobilizam menos N durante a decomposição anaeróbica da matéria orgânica do solo que no estado aeróbico. O referido autor mostrou que a quantidade de N necessária a decomposição da palha de arroz foi mais elevada em condições aeróbicas que sob anaerobiose. Entretanto o N liberado pela decomposição da palha, em condições anaeróbicas foi cerca de 5 a 6 vezes mais elevado que o liberado no sistema aeróbico.

De acordo com PATRICK (1982) a mineralização do N, em solos alagados é sensível a mudanças no pH. Contudo, ela não é normalmente limitada em condições adversas de pH. Este autor informa, ainda, que os solos alagados apresentam uma faixa de valores de pH mais estreita que os solos não alagados. Conforme PONNAMPERUMA (1972) a submergência dos solos tende a dirigir o pH dos solos ácidos ou alcalinos para a faixa de neutralidade. As bactérias operam de modo mais eficiente em valores de pH dentro desta faixa (PATRICK, 1982). Para este autor, isto pode explicar porque a aplicação de calcário tem sido alegada como causa apreciável do aumento da amonificação em solos alagados no Japão (MITSUI, 1954). Segundo ABICHANDANI e PATNAIK (1961) a aplicação de calcário estimulou a mineralização do N nativo em solos quase neutros, contendo de 0,05 a 0,08% N. Para

estes autores a adição de calcário aumentou temporariamente o pH do solo, causando a dispersão e o ataque microbiano rápido da matéria orgânica do solo e a liberação adicional do nitrogênio.

A adição de fontes inorgânicas estranhas, também estimula a mineralização do N nativo bem como da matéria orgânica adicionada (PATNAIK, 1965). Conforme o autor, parte do N químico adicionado foi imobilizado, o qual sofreu mineralização relativamente rápida, em função do tempo. STANFORD et alii (1970) em estudos utilizando ¹⁵N mostraram, também, que a distribuição do ¹⁵N e do N nativo do solo foram notavelmente semelhantes. Os autores postularam que o ¹⁵N se tornou incorporado em complexos similares, em composição, aqueles já presentes no solo. ASAMI (1971) relatou que a distribuição do N imobilizado, marcado estava principalmente nas frações amônia hidrolizável, N-alfa amino e frações não hidrolizáveis. Em um solo alagado adubado com palha de arroz TUSNEEN e PATRICK (1971) encontraram 41% do N imobilizado na fração alfa-amino comparado com 14% nas outras frações combinadas, com quantidades negligíveis na componente não hidrolizável. De acordo com BROADBENT (1968), embora o N do solo ocorra de fontes dissimilares, a maior parte do N é incorporada em complexos de elevado peso molecular e comparável resistência ao ataque microbiano, após o processo de humificação. A

complexa variedade de compostos nitrogenados que podem estar presentes em solos inundados é, no final das contas, em sua maioria convertido a amônia (BROADBENT, 1979).

Em quase todas as condições no solo, os processos de mineralização estão se processando ao mesmo tempo (JANSSON, 1966). A disponibilidade do N para o arroz é largamente controlada pela magnitude relativa desses processos e por fatores diversos que incluem temperatura, teor de umidade, secagem e irrigação do solo, aeração, teor de matéria orgânica e conteúdo de argila (BROADBENT, 1979; KAI e WADA, 1979). O estado de aeração do solo desempenha importante papel em determinar se a mineralização líquida ou imobilização líquida irá ocorrer (JANSSON, 1966; KAI e WADA, 1979). O efeito líquido resultante depende, normalmente, da relação entre a fonte de energia, ou seja, do material rico em carbono e o nitrogênio das substâncias que estão sofrendo a decomposição (JANSSON, 1966).

2.4.8. Efeitos da incorporação de materiais orgânicos a solos submersos

O arroz, mais que as culturas não alagadas, depende do fornecimento de nutrientes a partir das reservas existentes no solo (KAI e WADA, 1979; PATNAIK e RAO, 1979). Em muitos países, materiais orgânicos como adubos verdes,

palha de arroz e outros resíduos vegetais são empregados através da compostagem ou da incorporação direta ao solo. Tais materiais são fontes de nutrientes, especialmente nitrogênio, para o desenvolvimento da cultura, desempenhando importante papel na fertilidade dos solos inundados (YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a, 1977b; KAI e WADA, 1979; PATNAIK e RAO, 1979).

Numerosos estudos têm indicado que a incorporação de resíduos vegetais com baixo teor de nitrogênio, diminui o nitrogênio inorgânico disponível no solo (KAI e WADA, 1979; YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a, 1977b; BROADBENT, 1979; PATNAIK e RAO, 1979). O conteúdo de nitrogênio da palha de arroz é, normalmente, cerca de 0,5% da sua massa seca (YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a). Conforme estes autores a palha de arroz necessita então, mais N do que ela contém, para a sua decomposição no solo. Esta deficiência é compensada, geralmente, através do N absorvido do solo, para satisfazer as necessidades dos microrganismos na síntese de novos talos microbianos com conteúdo de N, normalmente, elevado (KAI e WADA, 1979).

YONEYAMA e YOSHIDA (1977b) observaram que, durante a decomposição da palha de arroz, a palha imobilizou N tanto do solo, como do fertilizante adicionado. A quantidade do N imobilizado foi maior no solo em alagamento

do que no solo não alagado. Em alagamento, a quantidade imobilizada foi pequena, na primeira semana de incubação, mas aumentou após três a quatro semanas; no solo não alagado a imobilização alcançou seu máximo na primeira semana de incubação, porém as quantidades foram menores que nas condições de alagamento. Por outro lado, para um solo incubado em diferentes condições, BROADBENT e NAKASHIMA (1971) observaram que a quantidade do N imobilizado em alagamento, quando o solo recebeu adição de palha de arroz, foi intermediária entre a quantidade imobilizada em condição aeróbia e aquela imobilizada em condição anaeróbia. De acordo com KOYAMA et alii (1977) e KAI e WADA (1979), uma parte regularmente grande do N-fertilizante é imobilizada em solos arrozeiros inundados mesmo quando resíduos de plantas, ou adubos compostos, são aplicados. Uma parte deste N imobilizado é remineralizada e recuperada pelo arroz, porém cerca de 10-20% do N-fertilizante permanece na forma orgânica, no solo.

Informações obtidas de BROADBENT e TUSNEEM (1971) e YOSHIDA e PADRE (1977) indicam que a adição de palha de arroz retardou o crescimento do arroz. As quantidades do N disponível no solo diminuíram significativamente nos estádios iniciais do crescimento da planta, mas se tornaram mais elevadas que aquelas do solo que não recebeu palha, nos estádios intermediários e finais

do crescimento do arroz (NAKAYA e ONIKURA, 1974; YOSHIDA e PADRE, 1977). Os últimos autores mostraram, também, que a adição conjunta da palha e do N-fertilizante não retardou o crescimento das plantas. Houve um aumento da mineralização do N do solo, pela adição do fertilizante, aumentando a absorção do N pelo arroz, com o aumento da quantidade do N-fertilizante aplicado, devido ao efeito "priming" (estimulação da liberação do N do solo) provocado pela aplicação do fertilizante, o que concordou com observações feitas por BROADBENT e REYES (1971). Ainda, de acordo com YOSHIDA e PADRE (1977), as diferentes quantidades de N-fertilizante adicionado ao solo não afetaram significativamente a liberação do N imobilizado.

Os efeitos de incorporação de materiais orgânicos a solos inundados têm sido investigados e revisados por OH (1979). Este autor destaca o fato de que materiais não completamente decompostos, ou palha de arroz fresca, apresentam um efeito notável na formação de agregados no solo. A aplicação da palha de arroz tem, por outro lado, mostrado um melhor efeito na produção de arroz do que o uso de adubos compostos orgânicos, quando bastante fertilizantes químicos são aplicados. Esta superioridade da palha parece ser devida, principalmente, a sua ação protetora para com os nutrientes, fazendo com que esses sejam utilizados nos estádios posteriores do desenvolvimento

do arroz. De acordo com OH (1979), a aplicação de matéria orgânica e o alagamento, diminuem o pH do solo. Entretanto, para o mesmo autor, o efeito de certos materiais orgânicos em elevar o pH do solo, deve ser enfatizado; tal aumento ocorre através da redução dos materiais no solo, mas podem ser causados pela mineralização a amônia, desses materiais orgânicos.

Vários autores têm informado que a incorporação de materiais orgânicos na zona de localização da uréia, acelerou o processo de volatilização do NH_3 a partir desse fertilizante (MOE, 1967; RASHID, 1977). Entretanto, outras observações indicam que a incorporação de resíduos orgânicos com uréia diminui as perdas gasosas de N-uréia, como NH_3 (TRIPATHI e BENARJEE, 1955; TRIPATHI, 1958). Além disso, VERMAN et alii (1974) observaram que a adição de 5%, em peso, de esterco não afetou as perdas por volatilização do NH_3 após aplicação de uréia a um solo barrento, calcário. Esses efeitos não consistentes, da adição de resíduos orgânicos na volatilização da amônia, segundo NELSON (1982), podem resultar de dois fatos associados com a aplicação dos resíduos: primeiramente, porque o N-orgânico no resíduo pode ser mineralizado com a liberação do NH_4^+ como informou OH (1979), o que aumentará a concentração de amônio na solução do solo; em segundo lugar, porque os materiais podem apresentar alguma capacidade de

troca catiônica, ou elevada relação C/N (que promoverá imobilização do N-NH_4^+), ou serem acidicos. Todas essas características dos resíduos diminuirão a concentração de amônia. O efeito líquido na volatilização de amônia dependerá, então, da natureza e da quantidade de resíduos aplicados (NELSON, 1982).

2.4.9. Nitrogênio na produção do arroz

Para aumentar a produtividade é necessário elevar a eficiência produtiva do nitrogênio, pelo aumento da quantidade de N fornecido naturalmente e pelo uso apropriado de fertilizantes nitrogenados (MURAYAMA, 1979). Conforme este autor, as plantas devem absorver maiores quantidades de nitrogênio para alcançarem uma maior produção de grãos. Contudo, o fornecimento maior de nitrogênio nem sempre leva a uma maior produção sendo possível, entretanto, atingir uma tal produção quando existe uma diminuição no fornecimento do N fertilizante (BROADBENT, 1979; KOYAMA e APP, 1979; MURAYAMA, 1979).

Em uma revisão sobre a importância do nitrogênio para a produção de arroz, particularmente relacionado ao estado nutricional e absorção pela cultura, MURAYAMA (1979) informa que a palha de plantas de arroz comum, na maturidade, contém de 0,5 a 0,6% de N; as de

plantas de produtividade elevada, 0,7 a 0,8% N e, raramente, mais que 1% de N. Naturalmente as plantas de arroz de alta produtividade apresentam concentrações de N elevadas, através de todo o seu crescimento. Valores observados em vários locais do Japão, segundo o referido autor, indicam que a concentração ótima de nitrogênio na lâmina foliar dessas plantas de alta produtividade, varia entre 2,3 - 4,3% no estágio de formação das panículas e entre 2,2 - 3,3% no estágio de florescimento. Ainda, de acordo com MURAYAMA (1979) cerca de 50 - 60% do nitrogênio total da planta, nas plantas de alta produtividade com concentração de nitrogênio alta, foi absorvido no estágio inicial de formação das panículas; 70 - 80% até o estágio de florescimento e os 20 - 30% restantes durante o período de amadurecimento. FONSECA et alii (1983) indicam que, no estágio de diferenciação das panículas, os teores de N considerados deficientes, críticos e adequados, na folha da planta de arroz correspondem, respectivamente, a 1,8%, 1,8 a 2,6% e 2,6 a 4,2%. Por outro lado, DeDATTA et alii (1968a) observaram que cultivares de arroz de porte baixo (anão), como o IR-8 e o "Taichung" (Native 1) possuem maior concentração de N que os cultivares de porte alto do tipo "Peta". Conforme FONSECA et alii (1983) os cultivares de arroz modernos, altamente produtivos, foram selecionados no sentido de responderem a altas doses de N, o que não significa que esses cultivares necessitem, somente, de mais nitrogênio. Entretanto, as

necessidades quantitativas (extração) de macronutrientes pelo arroz variam com o cultivar plantado, quantidade colhida, condições ambientais e nível de fertilidade do solo. Dessa forma, encontra-se uma diferença muito grande entre dados de extração de nutrientes pelo arroz nas mais diversas partes do Brasil e do mundo (BARBOSA FILHO, 1987).

Informações sobre os aspectos relacionados ao crescimento e desenvolvimento do arroz podem ser encontradas em FONSECA et alii (1983); EMBRAPA (1985); FERRAZ (1987).

O conhecimento da absorção e da acumulação de nutrientes nas diversas fases de desenvolvimento da planta é importante, pois pode determinar épocas de maiores exigências dos nutrientes e corrigir eventuais deficiências que possam ocorrer durante o desenvolvimento da cultura (BARBOSA FILHO, 1987). Em geral, os nutrientes são absorvidos durante todo o ciclo da cultura e no caso do N, este elemento é absorvido ativamente do início da fase vegetativa até o florescimento, ocorrendo maior demanda de 30 a 40 dias após a germinação (FONSECA et alii, 1983; BARBOSA FILHO, 1987).

O nutriente aplicado e acumulado no referido período, poderá ser utilizado, em parte, para o crescimento

posterior, se o fornecimento não for mantido (FONSECA et alii, 1983).

De acordo com YOSHINAKI (1971) a concentração deste nutriente é alta no primeiro estágio de crescimento, decresce ligeiramente com o tempo após a translocação e torna a crescer até a diferenciação do primórdio floral quando ocorre outro decréscimo até o estágio de desenvolvimento do grão, com a concentração permanecendo constante até sua completa maturação. Em trabalho recente, utilizando três cultivares de arroz irrigado, MUELLER et alii (1984) observaram que as concentrações de nitrogênio nos colmos decresceram com o tempo. Nas folhas superiores e inferiores houve uma diminuição, dos 28 dias após a emergência das plântulas para a diferenciação do primórdio floral, aumentando no florescimento; para as folhas superiores (folhas bandeiras) uma nova diminuição na colheita foi observada. Dentro de uma mesma época, foram observadas variações nas concentrações de N em alguns órgãos dos cultivares estudados. Em relação as panículas não foi possível observar alterações na concentração de N, ao longo do tempo (MUELLER et alii, 1984).

O processo de absorção de nitrogênio compete com todas as outras transformações deste nutriente, no solo (CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983). As plantas de arroz podem

absorver N-nitrato tão facilmente como N-amônio (FRIED et alii, 1965; BARBOSA FILHO, 1987). Mas, a proporção das duas formas absorvidas pelo arroz, no campo, provavelmente depende do regime de água no solo. Contudo, qualquer que seja a forma, o N é absorvido mais rapidamente, quando a planta possui um sistema radicular bem desenvolvido (TANAKA et alii, 1959; CRASSWELL e VLEK, 1979). Então, é nos estádios iniciais de crescimento da cultura que o N fertilizante é mais suscetível aos processos de perdas (CRASSWELL e VLEK, 1979). Vale ressaltar que, para o arroz, as curvas de acumulação de macronutrientes e de produção de matéria seca apresentam tendência sigmoide típica, tal como acontece com as outras culturas; verifica-se em relação à matéria seca que, até o perfilhamento, há um crescimento na sua produção, a qual se intensifica de modo quase linear em relação ao tempo a partir desse estágio até o estágio de florescimento, quando começa a mostrar tendência assintótica (MALAVOLTA, 1978; MALAVOLTA e FORNASIERI FILHO, 1983; BARBOSA FILHO, 1987).

2.4.10. Eficiência de utilização do N em sistema solo-arroz, em alagamento

A eficiência de utilização do N-fertilizante no desenvolvimento do arroz cultivado em condições de submergência é notoriamente baixa, particularmente quando doses elevadas de nitrogênio são aplicadas para exploração

do potencial de produção de variedades de arroz de produtividade elevada (ZIA e WARING, 1987). As taxas de utilização variam normalmente na faixa de 20 a 50% devido aos processos que tendem a favorecer as perdas do nitrogênio (CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983). Entre esses processos, que influenciam a recuperação do N aplicado no cultivo do arroz, a denitrificação é comumente citada como mais importante (CRASSWELL e VLEK, 1979; FILLERY e VLEK, 1982), embora sob certas condições, a lixiviação, a volatilização de amônia e o escoamento superficial, sejam relatados (VLEK e CRASSWELL, 1979; FILLERY e DeDATTA, 1986; FILLERY et alii, 1986; DeDATTA, 1981; PRASAD e DeDATTA, 1979; SING et alii, 1984).

A disponibilidade de N também poderá ser reduzida pela imobilização (YOSHIDA e PADRE, 1977; YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a, 1977b). De qualquer modo, mesmo com as melhores práticas agronômicas e em condições estritamente controladas, como através da localização do N-fertilizante na camada reduzida do solo, a recuperação do fertilizante pela cultura, em estudos com ¹⁵N, pode atingir, no máximo, valores em torno de 60 a 68% (CRASSWELL e VLEK, 1979; DeDATTA, 1978, 1981; PRASAD e DeDATTA, 1979).

A recuperação em vasos é mais elevada que em campo (DeDATTA et alii, 1968b). A aplicação básica, em geral,

produz os mais baixos valores de recuperação do N (7 - 38%). A recuperação é melhorada com aplicação parcelada (35 a 61%), aplicação tardia (27 - 77%) ou localização em profundidade (18 - 68%) (CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983; De DATTA et alii, 1968b; De DATTA, 1981).

A utilização de fertilizantes de solubilidade controlada e o emprego de inibidores da nitrificação, parecem promissores em um número de países cultivadores de arroz (PRASAD e De DATTA, 1979).

2.5. Balanço do nitrogênio do solo: considerações gerais e compromissos

O resultado líquido da somatória dos processos de ganhos e perdas de nitrogênio no solo em condições experimentais controladas, para solos diversos e em diferentes condições climáticas existentes na natureza é comumente chamado de balanço do nitrogênio do solo (ALLISON, 1965). Conforme WETSELAAR e GANRY (1982), em ecossistemas naturais as perdas de nitrogênio (saídas) são, em geral, completamente compensadas pelos ganhos de nitrogênio (entradas). A interferência do homem, por exemplo, através da imposição de um determinado agrossistema, perturba esse balanço e pode causar um decréscimo no estado do N do solo. Isto reduz a produção agrícola, a não ser que haja uma

compensação, por um meio artificial, como a utilização de fertilizantes nitrogenados. Para esses autores, uma diminuição no estado do nitrogênio do solo reflete, também, uma diminuição no seu conteúdo de matéria orgânica. Isto leva a taxas mais baixas de infiltração e menor capacidade de retenção de água, tornando o solo mais vulnerável às perdas por erosão. Por essa razão, o decréscimo contínuo no conteúdo de N do solo ao longo do tempo resultará, em última análise, em solos agrícolas anti-econômicos. Esses aspectos, aliados a observação de que as mudanças no teor de N do solo são sensíveis indicadores do balanço entre entradas e saídas do nitrogênio e da estabilidade ou diferenças de um agrossistema, têm reforçado a necessidade de estabelecer-se balanços do N em diferentes agrossistemas (BREMNER e HAUCK, 1982; LEGG e MEISINGER, 1982; WETSELAAR e GANRY, 1982). Tais avaliações são particularmente apropriadas em condições tropicais (KOYAMA e APP, 1979; WETSELAAR e GANRY, 1982).

2.5.1. Métodos gerais de estudo do balanço do nitrogênio

Nos estudos de balanço do nitrogênio, dois métodos gerais são normalmente empregados (LEGG e MEISINGER, 1982). Um deles, método da diferença ou indireto, envolve o balanço total do nitrogênio do sistema e documenta as apropriadas entradas totais, saídas etc., sem o uso de

compostos marcados ou traçadores caracterizando-se pela diferença entre o N removido do solo controle, pela cultura e aquele removido pela cultura a partir do solo fertilizado. O outro método, método de diluição isotópica, direto ou do traçador, introduz uma entrada específica de N marcado, tal como fertilizante ^{15}N e calcula o balanço do N-marcado (ALLISON, 1965; HAUCK e BREMNER, 1976; LEGG e MEISINGER, 1982). Informações sobre aplicações dos métodos referidos podem ser encontradas em LOWENSTEIN et alii (1957), LEGG e ALLISON (1959), CADY e BARTHOLOMEW (1961), ALLISON (1965), BROADBENT e TUSNEEM (1971), ALLEN et alii (1973), YOSHIDA e PADRE (1974, 1977) e LEGG e MEISINGER (1982).

2.5.2. Técnica de traçadores - uso do ^{15}N

As técnicas de traçadores baseadas no uso do isótopo ^{15}N têm sido comumente empregadas em laboratórios engajados nas pesquisas de nitrogênio (HAUCK, 1971, 1973, 1978, 1979; FIEDLER e PROKSCH, 1975; HAUCK e BREMNER, 1976; BREMNER e HAUCK, 1982). Materiais com concentrações de ^{14}N e ^{15}N bastante diferentes, quer sejam altas, quer sejam baixas, em relação a abundância natural, podem ser utilizados como traçadores desde que tais composições isotópicas sejam mensuravelmente diferentes daquela da abundância natural, no tempo em que o sistema sob investigação está sendo amostrado e avaliado (HAUCK, 1973,

1986; HAUCK e BREMNER, 1976). A adição, a um sistema, de um material com essas concentrações diferentes resultará num aumento ou numa diminuição na concentração do ^{15}N em todas as partes do mesmo, até certo ponto dependente de quanto do traçador foi incorporado aos vários componentes nitrogenados desse sistema. A mudança na relação isotópica do N em amostras obtidas do sistema possibilita o estudo das transformações do material traçador adicionado. O resultado dessas mudanças a partir de um nível inicial de abundância (normalmente abundância natural) permite determinar a extensão através da qual o traçador interage com o sistema e se torna parte do mesmo (HAUCK, 1973, 1978, 1979; HAUCK e BREMNER, 1976).

2.5.3. Relações gerais entre os estudos do balanço do N, convencionais e isotópicos

Em uma revisão sobre estudos de balanço do N considerando pesquisas selecionadas, cobrindo diferentes métodos e sistemas de cultivo, LEGG e MEISINGER (1982) observaram que os trabalhos sobre balanço do N, convencionais e isotópicos, apresentam aspectos gerais comuns e contrastantes. Alguns desses aspectos comuns qualitativos são: "mineralização lenta do ^{15}N " uma vez incorporado em formas orgânicas; o uso preferencial do NH_4^+ por microrganismos do solo; a rápida "transformação do ^{15}N mineral" logo após a sua adição; a acumulação e/ou

transporte de N fora do sistema solo-cultura quando as taxas de nitrogênio excedem a capacidade de assimilação da cultura; a significativa incorporação do ¹⁵N no reservatório do N-orgânico do solo; as expressivas perdas de N em formas gasosas e, ainda, o mais eficiente uso de N por culturas adaptadas, as quais são fertilizadas com taxas moderadas de nitrogênio fornecido em harmonia com a demanda dessas culturas. Conforme LEGG e MEISINGER (1982) quando são feitas tentativas para resumir quantitativamente esses dados para os processos do ciclo do nitrogênio, as características contrastantes se tornam evidentes. Para esses autores, uma aproximação é considerar somente faixas de recuperação, como as relatadas por KUNDLER (1979), indicando incorporação na matéria orgânica do solo (10-40%), recuperação pela cultura (30-70%), perda por lixiviação (5-10%) e perdas gasosas (10-30%) ou, as apresentadas por HAUCK (1973), indicando recuperação pela cultura (50-75%) e perdas por denitrificação (0-40%), embora valores hipotéticos (HAUCK, 1971) sejam 15% para perdas por denitrificação, 55% para remoção pela cultura e 30% para imobilização. De acordo com HAUCK (1973), valores tais como os apresentados são função, não só do tipo de solo, espécie de cultura, estação, regime de água e quantidade e espécie de fertilizante mas, também, da técnica experimental usada na obtenção da informação. Para LEGG e MEISINGER (1982) os valores antecedentes apresentados são úteis para generalizações e, raramente,

podem ser aplicados a sistemas agrícolas específicos. Isto não é surpresa se considerarmos as complexas transformações do N, que estão ocorrendo na natureza, pois a contabilização final do balanço do nitrogênio representa o produto de muitos processos físico-químico-biológicos, todos interagindo com o meio e entre si, ao longo do tempo. Ainda, segundo os referidos autores mudanças no ambiente, aparentemente não prejudiciais, muitas vezes têm maior impacto nas transformações do N que mudanças ambientais grandes, as quais, de modo contrário, podem levar a impacto negligível. Essas anomalias nos estudos de balanços do N enfatizam a impropriedade de relatar médias, medianas ou faixas de variação nas transformações do N em diferentes sistemas agrícolas, ou mesmo, num único sistema em diferentes tempos e condições experimentais (LEGG e MEISINGER, 1982).

2.5.4. Balanço do N e medida de denitrificação - implicações gerais

Revisões sobre as suposições básicas,
vantagens e desvantagens, metodologia analítica e uso do ¹⁵N
em pesquisas de solo têm sido apresentadas por vários
autores (HAUCK, 1973; HAUCK e BREMNER, 1976; LEGG e
MEISINGER, 1982; HAUCK, 1986). Ao longo dos anos o número de
estudos de balanços do nitrogênio tem sido notavelmente

aumentado (ALLISON, 1955, 1966; BREMNER e HAUCK, 1982; LEGG e MEISINGER, 1982). De acordo com HAUCK e BREMNER (1976) e HAUCK (1986) o balanço do nitrogênio é um dos métodos indiretos mais comumente usados para medida da denitrificação, compreendendo a determinação da diferença no conteúdo do N de um sistema solo-planta no começo e no fim de um determinado período experimental. Essa diferença é presumida ser a perda do N principalmente via denitrificação (feitas as correções para a remoção do N por outros caminhos conhecidos e para amostragem e erros analíticos). As principais vantagens desse método, para os referidos autores, incluem a sua conveniência e o fato de que o resultado líquido das várias transformações opostas do nitrogênio é determinado sem requerer extrapolações no tempo e no espaço. As suas principais limitações são devidas ao fato de que todos os componentes na contabilização do balanço do nitrogênio não podem ser medidos com comparável precisão e, que os valores líquidos para as perdas de nitrogênio envolvem uma acumulação de erros sistemáticos (tendências desconhecidas), que variam em magnitude, acoplados a erros ao acaso, provenientes de fontes interdependentes.

LEGG e MEISINGER (1982) chamam a atenção para dois importantes problemas nos estudos sobre balanço do nitrogênio. Um deles é a inadequada descrição do processo

analítico e das condições experimentais empregadas, o outro, envolve o uso de estatística incompleta para relatar os dados do balanço de nitrogênio. Estes autores discutem os erros envolvidos em estudos de balanço de nitrogênio e as aproximações estatísticas para minimizar os seus efeitos e esclarecem que erros em balanços de N resultam de fontes ao acaso e de tendências ou fontes sistemáticas. Para os mesmos autores, algumas vezes é estabelecido que esses erros são cumulativos e que as perdas estimadas são, mais propriamente, grosseiras. Esta visão da estrutura de erros segundo os referidos autores não é completamente acurada. Para eles, a afirmação é uma descrição imprecisa da componente ao acaso porque assume tacitamente que os reservatórios de transformação do nitrogênio são independentes. Assumir reservatórios independentes, de acordo com LEGG e MEISINGER (1982) é ignorar a completa natureza interativa das transformações do nitrogênio.

De acordo com HAUCK (1986) o principal, entre os erros analíticos nos estudos de balanço do nitrogênio, é aquele associado com a determinação do N total do solo. Esse autor esclarece que os métodos de Kjeldahl para medidas do N total são muito insensíveis para estimar acuradamente a mudança no conteúdo de N-total de um sistema solo-planta, no campo, em uma única estação. Contudo, quando o N-trapador é usado para seguir a mudança no conteúdo do nitrogênio do

solo, o efeito do erro do Kjeldahl é muito menos importante porque a magnitude desse erro é diminuída através do uso das equações de diluição isotópica para calcular a percentagem de recuperação do N aplicado. Ainda, de acordo com HAUCK (1986), como em estudos com não-trapadores, a variabilidade na amostragem do solo é a principal fonte de erro em estudos de balanço do nitrogênio. Além disso, a variabilidade na produtividade da cultura pode ser um fator maior limitando a determinação acurada da absorção, pela cultura, do N aplicado, porque o valor da produção é uma componente importante nos cálculos. Apesar dessas limitações, segundo HAUCK (1986), o balanço com ¹⁵N é o meio mais confiável para estimar as perdas do N em experimentos de longa duração (vários meses a anos) em diferentes sistemas de produção de culturas. Se as perdas podem ser imputadas principalmente a denitrificação, dependerá da certeza, em bases de observação, medidas e inferências, de que o nitrogênio não foi perdido do sistema via outros canais (HAUCK, 1986).

2.5.5. Balanço do nitrogênio em sistemas alagados

Os estudos das transformações e balanços do nitrogênio em solos alagados são muito mais complexos que em sistemas convencionais porque a submergência dos solos oferece um grupo particular de condições físicas, químicas e biológicas que influenciam as transformações e o destino do

nitrogênio (YOSHIDA, 1975; KOYAMA e APP, 1979; LEGG e MEISINGER, 1982; PATRICK, 1982). Essas condições geralmente resultam em um grande potencial de perdas do nitrogênio do solo através dos processos de nitrificação-denitrificação, volatilização de amônia, e lixiviação ou, após ciclos alternados de secagem e irrigação do solo (HAUCK, 1979; KOYAMA e APP, 1979; LEGG e MEISINGER, 1982).

De acordo com KOYAMA e APP (1979) diferentemente do que acontece com balanços do N para culturas em solos não alagados, o balanço do N para solos arrozeiros inundados é, frequentemente, um excesso de recuperação sobre o fornecimento, particularmente quando o N-fertilizante não é aplicado. Supõe-se que esse desbalanceamento seja devido a fixação biológica do nitrogênio (BROADBENT, 1978, 1979; KOYAMA e APP, 1979). A aplicação de fertilizantes nitrogenados normalmente elimina essa fonte extra e, de fato, a recuperação se torna menor que o suprimento (KOYAMA e APP, 1979). A pobre eficiência de fertilização como resultado das perdas é a suposta responsável por essa reversão no balanço do nitrogênio do solo (BROADBENT, 1979; CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983; KOYAMA e APP, 1979; PATNAIK e RAO, 1979).

2.5.6. Condições gerais dos estudos de balanço do nitrogênio

Os estudos de balanço do nitrogênio em solos arrozeiros inundados podem ser considerados em três situações gerais: casa de vegetação, lisímetro e campo (KOYAMA e APP, 1979; LEGG e MEISINGER, 1982). A maioria dos estudos de balanço do N ou de processos particulares do ciclo do nitrogênio têm sido conduzidos em laboratório ou casa de vegetação (HAUCK e BREMNER, 1976). O alto custo e a disponibilidade limitada do ¹⁵N restringe o seu uso, em larga escala, para estudos de campo e, frequentemente, tem ditado o tamanho e a natureza de alguns poucos estudos feitos nessas condições (HAUCK, 1971, 1973, 1979; HAUCK e BREMNER, 1976; BREMNER e HAUCK, 1982; LEGG e MEISINGER, 1982). Lisímetros e casa-de-vegetação permitem um exame melhor dos mecanismos específicos de entradas e saídas de nitrogênio. Como na prática geralmente observada, quanto melhor o controle das condições experimentais, menos relevante para as condições reais de campo, o estudo poderá se tornar (KOYAMA e APP, 1979). Os lisímetros têm sido usados em diferentes estudos de balanço do nitrogênio (MARTIN e ROSS, 1968; CATCHPOOLE, 1975; CRASSWELL e MARTIN, 1974; CHICHESTER, 1977; VLEK e CRASSWELL, 1979), especialmente, no campo, em estudos de transformações associadas com o movimento de água, tais como lixiviação e

escoamento superficial. Uma aproximação do método é o lisímetro com gás, uma extensão do estudo em vasos, confinando a atmosfera desses e permitindo uma estimativa direta das perdas gasosas nas condições experimentais impostas (LEGG e MEISINGER, 1982).

Em geral, os estudos de campo fornecem uma estimativa aproximada das mudanças líquidas em um certo período de tempo. Quanto mais longo o experimento e maior o número de colheitas, melhor a estimativa (HAUCK, 1971, 1979; KOYAMA e APP, 1979; BREMNER E HAUCK, 1982). No campo, parcelas confinadas e não confinadas, de pequeno tamanho (microparcelas), têm sido usadas por vários investigadores (CARTER et alii, 1967; CRASSWELL e MARTIN, 1974; KISSEL e SMITH, 1978). Esses estudos envolvem a aplicação de N^{15} a pequenas áreas, desenvolvendo uma cultura ou incubando o solo e fazendo a amostragem da área em várias etapas, para seguir o destino do N marcado nos vários reservatórios mineral e orgânico. Nos últimos anos, as tendências seguidas em estudos de balanço de nitrogênio do solo refletem a utilização de vários desses métodos simultaneamente (CATCHPOOLE, 1975; CRASSWELL e MARTIN, 1974; ROLSTON et alii, 1976, 1979). Isto inclui extensiva instrumentação, envolvendo a amostragem das fases gasosa e líquida, amostragem dos gases evoluídos, bem como dos reservatórios convencionais, tais como, nitrogênio absorvido pela cultura

e nitrogênio orgânico do solo (LEGG e MEISINGER, 1982). Para estes autores, não existe um método único melhor adaptado a construção de balanços do nitrogênio. O próprio método experimental a ser empregado dependerá dos recursos disponíveis, dos objetivos do estudo e das transformações principais do N no sistema em investigação.

2.5.7. Ganhos e perdas de nitrogênio em sistema solo-planta alagado

As principais fontes, adições ou entradas de nitrogênio em sistema solo-arroz inundado incluem fertilizantes, resíduos vegetais e animais ou outras correções ou melhoramentos, sementes ou plântulas, precipitações ou deposições por chuvas ou irrigações, fixação não simbiótica do nitrogênio e absorção de gases atmosféricos. As perdas, remoção ou saídas incluem absorção pela cultura, volatilização de amônia, denitrificação, fixação de amônia, lixiviação e escoamento superficial (KOYAMA e APP, 1979; HAUCK, 1979; LEGG e MEISINGER, 1982). Obviamente, alguns desses ganhos e perdas podem ser melhor medidos do que outros (KOYAMA e APP, 1979; HAUCK, 1979, 1986). A absorção de amônia, o movimento do N no sub-solo, a volatilização de amônia, a denitrificação e a lixiviação são mais difíceis de serem medidas ou mesmo em certos casos, estimadas. Das principais entradas de N, a contribuição do

fertilizante, resíduo de cultura e outros melhoramentos podem ser determinadas acuradamente (HAUCK, 1986). Quanto mais alto o nível de enriquecimento mais precisa a estimativa da quantidade do fertilizante que permanece no solo. O N aplicado, absorvido pela planta, pode ser medido mais acuradamente que o N aplicado que remanesce no solo, porque o primeiro é menos diluído (HAUCK, 1971, 1979). A contribuição do N, relativamente pequena, por precipitação e deposição também pode ser determinada com aceitável precisão. A estimativa do N ganho através da fixação biológica usualmente é menos confiável que para as outras principais entradas (HAUCK, 1986). Por outro lado, pequenas mudanças no conteúdo de N total do solo são particularmente difíceis de serem evidenciadas devido aos problemas de amostragem (HAUCK e BREMNER, 1976; KOYAMA e APP, 1979; BREMNER e HAUCK, 1982; LEGG e MESINGER, 1982; HAUCK, 1986).

2.5.8. Perdas de nitrogênio em estudos de balanço - ¹⁵N

Os resultados de vários experimentos nos quais os solos foram analisados para ¹⁵N e os balanços do N calculados para obtenção de uma medida indireta de perdas têm sido resumidos e apresentados por CRASSWELL e VLEX (1979, 1983) e LEGG e MEISINGER (1982). A maioria dos dados de balanços do nitrogênio foram obtidos de estudos de casa

de vegetação possivelmente, como esclarecido anteriormente, pelas dificuldades na condução de experimentos com ¹⁵N no campo. Os dados observados informam que aplicações superficiais de uréia, sulfato de amônio ou bicarbonato de amônio, no transplante causaram perdas extensivas (até 64%). As perdas de sulfato de amônio (12-40%) foram menores que as com uréia (19-50%), nos estudos nos quais as comparações diretas, entre as duas fontes, foram realizadas, mas as perdas na presença de bicarbonato de amônio (à lanço) foram as mais extensivas (64%). Essas tendências implicam em perdas por volatilização de amônia desde que a susceptibilidade da uréia e a do bicarbonato de amônio para perdas de NH_3 seriam maiores que aquela do sulfato de amônio (VLEK e CRASSWELL, 1979, 1981). Contudo, a extensão de tais perdas é governada pelo pH da água de alagamento que, por sua vez, é controlado pelo CO_2 relacionado com a fotossíntese aquática, a respiração do solo e as reações químicas bem como com as práticas de manejo de fertilizantes como época, localização e taxas de aplicação de nitrogênio (LEGG e MEISINGER, 1982). De acordo com BROADBENT e MIKKELSEN (1968) a localização afeta as perdas tendo a aplicação em faixa lateral, no plantio, apresentado as mais baixas perdas, a aplicação em cobertura as perdas maiores e a aplicação parcelada valores intermediários de perdas. No único estudo, no qual a aplicação tardia foi comparada com a aplicação básica, à lanço (YOSHIDA e PADRE, 1977), as perdas

foram reduzidas pelo retardamento da aplicação. Ainda, o crescimento de plantas reduziu as perdas de modo considerável mostrando a extensão pela qual as plantas podem competir com os mecanismos de perdas (MANGUIAT e BROADBENT, 1977; FILLERY e VLEK, 1982). A colocação de fertilizantes em profundidade (amônio e amônia) diminuiu as perdas na maioria dos experimentos. A baixa perda, na localização do fertilizante em profundidade, tem sido atribuída a uma redução da nitrificação - denitrificação (ALEKSIC et alii, 1968), porém a colocação em profundidade também reduz as perdas por volatilização do NH_3 (MIKKELSEN et alii, 1978; VLEK e CRASSWELL, 1979). Os dados, em geral, apresentam uma indicação da magnitude das perdas do N-fertilizante, porém não fornecem informações sobre os mecanismos de perdas. Contudo, os principais mecanismos responsáveis pelo déficit relatado nos estudos considerados foram, provavelmente, perdas gasosas causadas por nitrificação - denitrificação e por volatilização de amônia, porque a lixiviação e as perdas por escoamento superficial ou foram medidas, ou evitadas, na maioria dos experimentos relatados (CRASSWELL e VLEK, 1983).

3. MATERIAL E METODOS

3.1. Perdas gasosas e transformações do N do solo, em condições de laboratório

3.1.1. Localização do experimento

O experimento foi conduzido nos laboratórios da Seção de Hidrologia e Isótopos Estáveis no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba, São Paulo.

3.1.2. Solos

Dois solos foram utilizados: Glei pouco húmico - solo de várzea de uma região de cultivo de cana-de-açúcar da Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco e Aluvial - coletado na Estação Experimental de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, solo de várzea de uma região de cultivo de arroz sob irrigação, por inundação. Algumas características físico-químicas, dos solos estudados, estão apresentados na Tabela 1 (pág. 92).

Tabela 1 - Algumas características químicas e físicas dos
(1)
solos em estudo

Solo	Profundidade	pH (H ₂ O)	Corg.	NT	3- PO ₄	+ K	2+ Ca	2+ Mg	3+ Al	+ 3+ H + Al
		1:25								
	-----cm-----		-----%		-----meq./100ml-----					
Glei pouco hêmico	0 - 20	5,7	1,34	0,11	0,21	0,15	3,65	1,20	0,20	0,72
Aluvial	0 - 20	4,9	1,26	0,14	0,12	0,40	2,56	1,44	1,34	5,18

Solo	(2) d	(3) CTC	(4) V	Análise Granulométrica			U. gravimétrica		
				Areia	Silte	Argila	33.5 KPa	10.1 KPa	TPSA(5)
	---meq./100ml---		---%	-----%			-----%		
Glei pouco hêmico	5,0	5,7	87,7	42,0	41,0	17,0	21,54	29,58	2,94
Aluvial	4,4	9,6	45,8	21,0	36,5	42,5	18,65	29,18	4,39

(1) Análise do Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes - Centro de Estudos do Solo - ESALQ/USP

(2) Soma de Bases

(3) Capacidade de Troca Catiônica

(4) Saturação em Bases

(5) Terra Fina Seca ao Ar

As amostras de solo foram coletadas a 0-20 cm de profundidade, compostas, misturadas, secas ao ar e peneiradas (2,00 mm). Tais amostras foram mantidas em sacos de plástico, em teor de água equivalente a 10% do peso do solo e a 25 °C, por 30 dias, antes do início do experimento.

3.1.3. Dispositivo experimental

Foram empregados copos de plástico (vasos) descartáveis, de 300 cm³ de capacidade, cobertos com tampas de papel alumínio contendo pequenos furos para aeração, sendo essas tampas removidas, diariamente, para assegurar que as trocas gasosas não fossem limitantes quanto as taxas de fluxo gasoso. A terra (50 g, massa seca em estufa), foi colocada nos copos de plástico com tampas de alumínio (sistema aberto), de acordo com os tratamentos planejados. Os vasos assim preparados foram mantidos em laboratório a uma temperatura de 25 ± 2 °C, durante o período de incubação, que durou 16 dias.

3.1.4. Adição de matéria orgânica

A adição de matéria orgânica foi realizada na forma de palha de milho (carbono total 49,8%; nitrogênio total 0,6%), seca a 70 °C e peneirada (2,00 mm), marcada (1,281 at.%¹⁵ N) e não marcada (0,371 at.%¹⁵ N), de acordo

com os casos especificados. As palhas empregadas provieram de um experimento de campo, executado anteriormente, o qual incluiu tratamento utilizando fertilizante nitrogenado marcado (N^{15}). Vale observar que, embora sejam resultantes de tratamentos diferentes, elas apresentaram composições idênticas em termos de carbono e nitrogênio. A dose equivalente de C-orgânico, a ser aplicada, foi calculada em relação a área dos vasos.

3.1.5. Fonte de nitrogênio

Como fonte de nitrogênio empregou-se uréia marcada, $\text{CO}(\text{NH})_2^{15}$ ($46,0\% \text{ N}^{15}$; $3,431 \text{ at}\% \text{ N}^{15}$). A dose equivalente de nitrogênio aplicada foi calculada em relação a área dos vasos.

3.1.6. Tratamentos

Os tratamentos empregados foram caracterizados da seguinte maneira:

Controle: o solo, nos copos de plástico, foi trazido a teor de água equivalente a $33,5 \text{ kPa}$ (aqui denominado capacidade de campo) e incubado em sistema aberto, como descrito.

Urêia: o solo recebeu adição de urêia marcada, equivalente a 100 kgN.ha^{-1} (0,05 g de urêia/vaso, ou seja, $460 \text{ mgN.kg solo}^{-1}$), foi trazido a teor de água equivalente a 33,5 kPa e, em seguida incubado.

Matéria orgânica: foi adicionada ao solo palha de milho marcada, em quantidade equivalente a $4.500 \text{ kgC-orgânico.ha}^{-1}$ (1,8 g de palha/vaso, isto é, $18 \text{ gC.kg solo}^{-1}$) após o que o solo foi trazido a capacidade de campo.

Completo (matéria orgânica + urêia): o solo recebeu adições simultâneas de matéria orgânica (1,8 g palha/vaso) e de urêia (0,05 g urêia/vaso) e, em seguida, foi trazido a capacidade de campo e incubado.

Um grupo de tratamentos semelhante ao descrito foi, também, empregado porém, desta vez, a incubação foi realizada em condições de alagamento. Estes tratamentos foram assim caracterizados:

Controle: o solo, nos copos de plástico, foi colocado em condições de alagamento, com a água adicionada (130 cm^3 de água desionizada) formando uma camada líquida de aproximadamente 3 cm de espessura sobre a camada de solo, sendo incubado como descrito, em sistema aberto.

Urêia: o solo recebeu adição de urêia marcada (0,05 g urêia/vaso), foi alagado, imediatamente após a adição e, em seguida, incubado.

Matéria orgânica: o solo recebeu a palha de milho marcada (1,8 g palha/vaso), foi trazido a condição de alagamento desejada e, em seguida, foi incubado.

Completo (matéria orgânica + urêia): o solo recebeu adições simultâneas de palha de milho não marcada (1,8 g palha/vaso) e de urêia marcada (0,05 g urêia/vaso), tendo sido alagado imediatamente após e, em seguida, incubado.

3.1.7. Condução do experimento

Nos tratamentos denominados matéria orgânica, a quantidade de palha de milho adicionada foi bem misturada com o solo, em cada copo, com o auxílio de uma espátula. Para esses tratamentos, em teor de água equivalente a 33,5 kPa, foi adicionado 1 cm³ extra de água desionizada por grama de matéria orgânica adicionada. A quantidade de urêia, requerida nos tratamentos incluindo este fertilizante, foi administrada em forma de solução (2 cm³/vaso) com o auxílio de uma pipeta, em cada copo, sendo localizada na parte central da superfície do solo que, no regime de água

estabelecido, foi incubado.

Para os tratamentos em condições de alagamento, após as adições de matéria orgânica e uréia com posterior alagamento do solo e, antes das incubações especificadas, as amostras de solo, em cada copo, foram resuspensas por agitação manual suave com o auxílio de um bastão de vidro, não sendo mais perturbadas até o momento de serem analisadas.

Durante o período de incubação (16 dias), foram feitos controles diários das perdas de água por evaporação, completando-se o peso inicial dos vasos, quando necessário. Em ambos os regimes de água empregados, isto é, teor de água equivalente a 33,5 kPa (denominado capacidade de campo) e condições de alagamento, foram utilizadas quatro repetições para cada um dos tratamentos estabelecidos.

3.1.8. Extração e análise de N-NO_3^- e N-NH_4^+

Após 1, 6, 11 e 16 dias de incubação, os vasos de cada um dos tratamentos descritos foram retirados (por quadruplicado) para análise de nitrogênio (N-NO_3^- e N-NH_4^+). As amostras incubadas em condições de alagamento foram resuspensas em 150 cm³ de KCl 1N. As amostras incubadas a capacidade de campo foram resuspensas em 150 cm³ de KCl 1N

e receberam 130 cm^3 de água desionizada, quantidade adicionada aos tratamentos em alagamento, no início da incubação. Em ambos os casos, isto é a capacidade de campo e em condições de alagamento, as suspensões de solo foram deixadas em repouso por alguns minutos separando-se o sobrenadante para bēquer contendo 100 cm^3 de KCl 1N. O solo foi ressuspenso em 250 cm^3 de KCl 1N, agitado por duas horas, filtrado (SAHRAWAT e PONNAMPERUMA, 1978) em funil Buchner, com papel de filtro Whatman no. 42, lavado com a suspensão de solo contida no bēquer e, em seguida, com duas aliquotas de 250 cm^3 de KCl 1N.

As análises para amônio e nitrato foram realizadas por macrodestilação do filtrado recolhido, seguindo-se o procedimento descrito por BREMNER (1965), com duas destilações sucessivas com arraste de vapor de água, a primeira com MgO e a segunda com liga de Devarda, recolhendo-se 300 cm^3 do destilado em solução de ácido bórico (H_3BO_3) a 2%, com indicador, para, finalmente, titular com 3 cm^3 de ácido clorídrico (HCl) 0,1N padronizado, em titulador automático. A velocidade da destilação foi regulada em $7 - 9 \text{ cm}^3/\text{min}$. Objetivando-se a análise da concentração isotópica de ^{15}N , procedeu-se de acordo com MULVANEY (1986), para reduzir possíveis contaminações cruzadas entre destilações consecutivas, seguindo-se modificações sugeridas pelo próprio autor para melhor

efetividade do procedimento. Assim sendo, após destilações de cada amostra destilou-se 50 cm³ de álcool etílico (C₂H₅OH - 95%), durante 5 minutos coletando-se, este, na amostra já destilada, a qual foi separada para titulação e posteriormente, concentrada. Em seguida, 15 cm³ de ácido fórmico (HCOOH 1M foi destilado por 2 minutos e descartado destilando-se, finalmente, 50 cm³ de álcool etílico por 5 minutos e descartando-se, também, este destilado.

3.1.9. Análise de N-orgânico

As amostras de solo retidas no funil Buchner foram preparadas para análise de N-orgânico. Para isto, o solo extraído foi ressuspensão em água (200 cm³), bem misturado, recebendo 10 cm³ de HCl 1:4, sendo colocado em estufa a 70 °C até peso constante, após o que foi triturado em almofariz, peneirado (0,149 mm) e mantido em sacos de plástico até o momento de ser analisado (IAEA, 1976). As amostras de solo (2 g, peso seco em estufa) foram digeridas e destiladas seguindo o método semi-micro Kjeldahl descrito por BREMNER (1965), recolhendo-se 80 cm³ do destilado em solução de H₃BO₃ a 2%, com indicador, para finalmente titular com HCl 0,1N padronizado. Para redução de contaminação cruzada entre amostras a serem analisadas para N, procedeu-se, como descrito anteriormente, seguindo sugestões de MULVANEY (1986). As quantidades empregadas de

álcool etílico (95%) e de ácido fórmico 1M e os respectivos tempos de destilação durante o procedimento foram, sequencialmente: 10 cm $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ (1 minuto), 3 cm HCOOH (3 minutos) e 30 cm $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (5 minutos).

3.1.10. Análise da concentração isotópica de ^{15}N

Após as determinações de N-NO_3^- , N-NH_4^+ e N-org , nas amostras de solo analisadas, os destilados foram retidos para análise da concentração isotópica de ^{15}N , sendo acidificados com 0,1 cm³ de H_2SO_4 0,1N e concentrados a 2 cm³ em estufa com circulação de ar, mantida a 70 °C. Para as amostras contendo menos de 1 mg de nitrogênio, foi adicionado um padrão interno, na forma de sulfato de amônio com abundância natural de ^{15}N (1 mg/cm³), antes da concentração do destilado a 2 cm³ (IAEA, 1976). Na determinação da concentração isotópica de ^{15}N as amostras foram preparadas pelo método de Rittemberg (BREMNER e EDWARDS, 1965; TRIVELIN et alii, 1973; IAEA, 1976) sendo realizada, a análise das mesmas, num espectrômetro de massa MAT 230.

3.1.11. Delineamento Experimental - Análise dos dados

O experimento consistiu de 256 copos (vasos), dispostos completamente ao acaso, compreendendo as

combinações entre níveis de solo (2), regimes de água (2), tratamentos (4) e períodos de incubação (4). A análise de variância foi feita segundo modelo inteiramente ao acaso, esquema fatorial $2 \times 2 \times 4 \times 4$, com 4 repetições. Foi utilizado o teste de Tukey para comparação entre combinações de média duas a duas dos fatores solo, tratamento, água e tempo. O teste F foi empregado para desdobramento dos graus de liberdade de tratamento em contrastes ortogonais.

Para os níveis equidistantes de tempo (1, 6, 11 e 16 dias) utilizou-se a regressão polinomial para estudar o efeito dos níveis de tempo (período de incubação) dentro do fator solo, nas análises das variáveis em estudo.

3.2. Perdas gasosas e balanço do nitrogênio, em sistema solo-planta, em casa-de-vegetação

3.2.1. Localização do experimento

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação totalmente aberta, coberta com tela de plástico e recoberta com duas camadas de plástico transparente, com área aproximadamente igual a $31,0 \text{ m}^2$ e altura central de 2,5 m, localizada no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, São Paulo.

3.2.2. Dispositivo experimental

Foram utilizados latões (vasos) de chapa de ferro comum, com 56 cm de diâmetro por 40 cm de profundidade, revestidos internamente com sacos plásticos, os quais, através de suas extremidades abertas, foram estendidos seguindo a forma dos latões, formando uma camada de proteção para evitar o contato do solo com o ferro.

3.2.3. Solo

Foi utilizado o solo Aluvial coletado da Estação Experimental de Pindamonhangaba, cujas

características físico-químicas encontram-se na Tabela 1 (pág. 92). O solo coletado a 0-20 cm de profundidade foi transportado ao CENA, passado em peneira (5,00 mm) e, em seguida, colocado dentro dos sacos de plástico (60 kg solo.vaso⁻¹, peso seco em estufa), nos latões, formando uma camada de aproximadamente 25 cm de profundidade.

3.2.4. Cultura desenvolvida: variedade utilizada

Utilizou-se a variedade de arroz (*Oryza sativa* L.) IAC-4440, obtida da Seção de Arroz e Cereais Diversos do Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo. Esta variedade tem as seguintes características: é um cultivar moderno de arroz irrigado proveniente do cruzamento CICA-4 x (Ir-665-23-3-1 x TETEP), que apresenta plantas de porte baixo (80-90 cm) com coloração verde escura, colmos curtos e grossos, folhas eretas curtas, largas e pilosas e panículas densas com comprimento médio de 17 cm. Apresentam ciclo de florescimento de 107 a 110 dias, ciclo de maturação tardio (140-150 dias), bom potencial de perfilhamento e resistência ao acamamento. Mais informações sobre o cultivar utilizado podem ser encontradas em FONSECA et alii (1983) e USBERTI FILHO et alii (1986).

3.2.5. Adição de matéria orgânica

Após a distribuição do solo nos latões procedeu-se a adição de matéria orgânica. Utilizou-se palha de milho (carbono total 49,8%; nitrogênio total 0,6%), seca a 70 °C, peneirada (2,00 mm), marcada (1,281 at.% ¹⁵N) e não marcada (0,371 at.% ¹⁵N), de acordo com os tratamentos planejados, a qual foi incorporada ao solo em quantidade equivalente a 3000 kgC.ha⁻¹ (148 g de palha/vaso, ou 1228 mgC.kg solo⁻¹), calculada em relação a área do latão. O solo e a palha foram bem misturados, em cada latão e deixados em repouso por 50 dias, a temperatura de 30 ± 2 °C e em teor de água equivalente a 10% do peso do solo.

3.2.6. Calagem

A calagem do solo foi realizada em todos os latões seguindo sugestões de ALLEN et alii (1976), tendo sido procedida 50 dias após a adição de matéria orgânica e antes do transplante das plântulas de arroz (*Oryza sativa* L.) e do alagamento do solo. Foi empregada uma mistura de carbonatos (CaCO₃ pa + MgCO₃ pa, na relação 4:1) na quantidade de 5³ g da mistura/5 kg solo (60 g CaCO₃ + MgCO₃.vaso⁻¹) aproximadamente equivalente a 2500³ kg calcário.ha⁻¹, calculada em relação a área do latão e suficiente para elevar o pH do solo, em água, para 6,5.

3.2.7. Adubação, doses e fontes

Procedeu-se a adubação do solo, nos latões, um dia após a calagem, por ocasião do transplante das plântulas. As adubações com fósforo, potássio e com micronutrientes foram efetuadas em todos os latões seguindo sugestões de ALLEN et alii (1976). A adubação com nitrogênio foi realizada somente nos latões cujos tratamentos incluíam a adição deste nutriente aplicado, de uma única vez, no momento do transplante das plântulas de arroz. As doses equivalentes de macro e micronutrientes a serem aplicadas, foram calculadas em relação a área dos latões. As fontes e doses empregadas são descritas a seguir:

Fósforo: como fonte de fósforo foi utilizado o superfosfato triplo (SPT , $45\% \text{ P}_2\text{O}_5$) na quantidade de $5 \text{ gP}/5 \text{ kg}$ de solo, ou seja, $60 \text{ g SPT.vaso}^{-1}$, dose equivalente a 487 kgP.ha^{-1} , calculada em relação a área do latão. O SPT foi triturado em almofariz, administrando-se a quantidade requerida, ao solo, a qual foi bem misturada com o solo, em cada latão.

Potássio: foi empregado o sulfato de potásio (K_2SO_4 , $54\% \text{ K}_2\text{O}$) na quantidade de $1 \text{ g}/5 \text{ kg}$ de solo, isto é, $26,5 \text{ g K}_2\text{SO}_4.\text{vaso}^{-1}$, dose equivalente a 472 kg K.ha^{-1} , administrada ao solo em forma de solução (1000 cm^3).

Micronutrientes: utilizou-se uma mistura de sulfato de zinco, sulfato de cobre e borato de sódio ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ + $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ + $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$: 250 g, 100 g e 100 g, respectivamente), sendo empregados 6 g da mistura/latão, isto é, 6 g mistura.60 kg solo⁻¹, equivalente a 56 ppm de Zn, 22 ppm de Cu e 22 ppm de B.

Nitrogênio: uréia, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ (46% N; 10,472 at.% N) foi empregada como fonte de nitrogênio, aplicada nos latões dos dois tratamentos que incluíam adição do nutriente, nas quantidades de 2,6 g uréia.vaso⁻¹ e 5,3 g uréia.vaso⁻¹, ou seja, 1220 mg N/latão e 2440 mg N/latão, doses respectivamente equivalentes a 50 e 100 kgN.ha⁻¹. A quantidade do fertilizante nitrogenado a ser administrada, foi aplicada sob forma de solução (1000 cm³), em cada latão, em seguimento a aplicação das doses de fósforo, potássio e micronutrientes. Para isto, retirou-se uma camada de solo de cada latão, equivalente em espessura, a profundidade desejada (10 cm), distribuindo-se a solução fertilizadora sobre a superfície da camada de solo imediatamente inferior recobrindo-se, logo em seguida, com a porção de solo anteriormente retirada do latão. Após a adubação ter sido realizada, procedeu-se o transplante das plântulas e o alagamento imediato do solo.

3.2.8. Tratamentos

Os seguintes tratamentos foram empregados:

U-0 = solo em alagamento contínuo, sem
adição de uréia, com arroz
transplantado.

U-50 = solo em alagamento contínuo com
adição de uréia marcada equivalente a
 50 kgN.ha^{-1} , com arroz transplantado.

U-100 = solo em alagamento contínuo com
adição de uréia marcada equivalente a
 100 kgN.ha^{-1} , com arroz transplantado.

Controle = solo em alagamento contínuo, sem
adição de uréia, sem plantas.

Todos os tratamentos receberam adição de
matéria orgânica. Para os tratamentos U-50 e U-100 foi
adicionada palha de milho não marcada ($0,371 \text{ at.}\%^{15} \text{ N}$) e
para os tratamentos U-0 e Controle foi utilizada palha de
milho marcada ($1,281 \text{ at.}\%^{15} \text{ N}$).

3.2.9. Delineamento experimental - Análise dos dados

O experimento consistiu em 12 latões (vasos)
dispostos completamente ao acaso, os quais compreenderam 4

tratamentos (U-0, U-50, U-100 e Controle) e 3 repetições, em duas épocas de amostragem de plantas, 40 e 100 DAT (Dias após transplante) e quatro de solo (10, 40, 70 e 100 DAT). A análise de variância foi feita segundo modelo inteiramente ao acaso, em parcelas subdivididas no tempo; foi utilizado o teste de Tukey para comparação entre médias duas a duas de tratamentos e épocas.

Para os níveis equidistantes de tratamento (N-urêia) utilizou-se a regressão polinomial para estudar o efeito dos níveis de tratamento dentro do fator época e para os níveis equidistantes de época (DAT) utilizou-se a regressão polinomial para estudar o efeito dos níveis de época dentro do fator tratamento, nas análises de variáveis em estudo.

3.2.10. Transplante das plântulas

As sementes de arroz foram enroladas em tubos de toalha interfolha de papel, colocadas em água destilada e germinadas em sala de crescimento com temperatura de 25 ± 2 °C e fotoperíodo de 12 horas, isto é, 12h/12h (claro/escuro). Após 20 dias, as plântulas com 18 cm, em média, foram destacadas e transplantadas para os solos nos latões. Um número de 35 plântulas de arroz foi transplantado em cada latão. Grupos de plântulas foram separados para

determinação do teor de N total e da determinação da concentração de átomos de ¹⁵N no material vegetal (Apendice 33, página 360).

3.2.11. Alagamento

Foi realizado logo após o transplante das plântulas de arroz, utilizando-se água desionizada para formar, inicialmente, uma camada de água de 5 cm de profundidade sobre a camada submersa de solo, controlando-se o nível da camada de água, em 10 cm de profundidade, a partir do décimo dia de alagamento e mantendo-se este nível até o final do período experimental (alagamento contínuo).

3.2.12. Controle fitossanitário

Foi realizado com a finalidade de controlar o ataque da lagarta (*Elasmopalpus lignosellus*, L.) e para manutenção da sanidade das plantas. Utilizou-se THIODAN E.C. (C₁₂H₉ClO₃S), inseticida emulsionável, na dosagem de 1 cm³ / 1000 cm³ de água desionizada, aplicada por pulverizações leves na bainha das folhas 15, 35 e 60 dias após o transplante das plântulas.

3.2.13. Amostragem das plantas e do solo

A amostragem das plantas de arroz foi estabelecida em duas épocas do desenvolvimento da cultura, a primeira aos 40 dias após o transplante das plântulas (40 DAT) e a segunda e final, aos 100 dias após o transplante do arroz (100 DAT). A amostragem do solo foi realizada aos 10, 40, 70 e 100 DAT, ou seja, 10, 40, 70 e 100 dias após o alagamento do solo.

3.2.14. Preparo das amostras de planta

Aos 40 DAT, foram coletadas 20 plantas/vaso para os três vasos correspondentes a cada um dos tratamentos compreendendo o transplante do arroz. As plantas de cada latão foram separadas em raízes e colmos+folhas e, assim, independentemente analisadas. As raízes foram separadas, desprendidas do solo e lavadas com água desionizada. O solo e a água de lavagem foram deixados por algum tempo em repouso, despresando-se o excesso de água, após decantação e, retornando-se a pasta de solo, bem misturada, ao latão de origem. O material vegetal coletado foi separadamente colocado em sacos de papel e secado em estufa com circulação de ar, a 70 °C, até peso constante. Após a secagem, o material foi pesado e finamente moído em moinho Wiley. Na coleta realizada aos 100 DAT, as plantas restantes

(15 plantas/vaso) foram separadas em raízes, colmos+folhas e paniculas, seguindo-se o procedimento descrito.

3.2.15.Preparo das amostras de solo

Para cada época de amostragem estabelecida, foram coletadas quatro amostras de solo por latão, as quais foram compostas, bem misturadas e drenadas do excesso de água que continham retornando-se a água em excesso para os latões de origem. As amostras foram coletadas com o auxílio de tubos de PVC rígido de 33 mm de diâmetro, os quais foram pressionados suavemente sobre o solo até alcançarem o fundo dos latões. A quantidade de solo necessária às análises das formas de N mineral (N-NO_3^- e N-NH_4^+) foram separadas e analisadas por duplicado, imediatamente. Em alguns casos, entretanto, algumas amostras tiveram de ser mantidas em refrigeração a 4 °C, até o momento de serem analisadas. As amostras para N-total foram acidificadas com uma solução de HCl 1:4, misturadas, secadas em estufa até peso constante, trituradas em almofariz (IAEA, 1976) e mantidas em sacos de plástico até o momento de serem analisadas. Também, foram retiradas amostras de solo para determinação do teor de água (umidade) e posterior correção dos valores de análises retornando-se, o restante do solo coletado, ao latão de origem.

3.2.16. Parâmetros avaliados

3.2.16.1. Matéria seca

A produção de matéria seca foi determinada nos diferentes órgãos ou partes da planta em estudo. Para raízes e colmos+folhas, a produção de matéria seca foi registrada em cada uma das duas épocas de coleta estabelecidas (40 e 100 DAT) e, para panículas, só a segunda época de amostragem das plantas (100 DAT). A produção de matéria seca, para a planta inteira, foi obtida pela somatória dos valores encontrados para matéria seca produzida nas diferentes partes da planta, em cada época de coleta. Os resultados foram expressos em g.vaso⁻¹.

3.2.17. Nitrogênio na planta

3.2.17.1. Teor de nitrogênio total

Nas diversas partes da planta consideradas, os teores de nitrogênio total foram obtidos através da análise química dos respectivos materiais coletados e estão expressos em porcentagem. Na planta inteira, os teores de nitrogênio total foram encontrados dos valores ponderados entre as porcentagens de N total extraídas por cada uma das partes da planta e as produções ou rendimentos de matéria

seca correspondentes.

3.2.17.2. Quantidade de nitrogênio total

As quantidades de nitrogênio total encontradas nas diferentes partes da planta, expressadas em mg.vaso^{-1} , foram calculadas pela equação:

$$QNTTP = \frac{TNTP \times MS}{100} \quad (4)$$

onde,

TNTP = teor de nitrogênio total na parte da planta considerada (%)

MS = matéria seca produzida na parte da planta considerada (mg.vaso^{-1})

As quantidades de N total acumuladas pela planta inteira foram obtidas pela somatória dos valores encontrados para cada uma das partes consideradas, num mesmo tratamento, em cada época de coleta de planta.

3.2.18. Nitrogênio derivado do fertilizante

3.2.18.1. Porcentagem de nitrogênio derivado do fertilizante

Nos diferentes órgãos ou partes da planta considerados, as porcentagens de nitrogênio derivado do fertilizante foram calculadas pela equação (VOSE, 1980):

$$\text{PNPDF} = \frac{\text{At.}\% \text{ }^{15}\text{Np} - \% \text{ AN}}{\text{At.}\% \text{ }^{15}\text{Nf} - \% \text{ AN}} \times 100 \quad (5)$$

onde,

$\text{At.}\% \text{ }^{15}\text{Np}$ = porcentagem de átomos de ^{15}N presentes na parte da planta em questão

$\text{At.}\% \text{ }^{15}\text{Nf}$ = porcentagem de átomos de ^{15}N presentes no fertilizante

$\% \text{ AN}$ = abundância natural de $\text{at.}\% \text{ }^{15}\text{N}$

No caso presente, foram consideradas as contribuições, para a planta, tanto do nitrogênio derivado da uréia, como do nitrogênio derivado da palha de milho

adicionada admitindo-se assim, como fertilizante, além da uréia, a palha de milho, de acordo com os tratamentos especificados. Os valores de abundância natural de uréia e da palha de milho, encontram-se no Apêndice 32 (página 359). A abundância natural das amostras de plantas foi considerada como sendo aquela determinada para grupos de 35 plântulas germinadas com 20 dias, separados quando da ocorrência do transplante das mesmas para os latões (Apêndice 33, página 360).

3.2.18.2. Quantidade de nitrogênio derivado do fertilizante

As quantidades de nitrogênio nas diferentes partes da planta de arroz e na planta inteira, derivadas do fertilizante e expressadas em mg.vaso^{-1} , foram calculadas pela seguinte equação:

$$\text{QNPDF} = \frac{\text{PNPDF} \times \text{QNTF}}{100} \quad (6)$$

tendo sido já apresentados PNPFD (%) e QNTF (mg.vaso^{-1}) nas equações 5 e 4, páginas 114 e 113.

3.2.18.3. Eficiência de utilização do fertilizante

Para cada uma das diversas partes da planta em estudo a eficiência de utilização do fertilizante (EUF) foi determinada, nas duas épocas de amostragem estabelecidas, para os tratamentos incluindo o transplante das plântulas, na ausência e na presença de uréia. Na ausência de uréia, a EUF refere-se à contribuição, na planta, do nitrogênio proveniente da matéria orgânica incorporada ao solo sob forma de palha de milho, tendo sido determinada no tratamento sem uréia (U-0), pelo fato de ter sido empregada a palha de milho marcada com ¹⁵N. A expressão usada (IAEA, 1983) foi a seguinte:

$$EUF = \frac{PNPDF \times QNTP}{QNA} \quad (7)$$

onde:

PNPDF = porcentagem de nitrogênio na parte da planta considerada, proveniente do fertilizante

QNTP = quantidade de nitrogênio total na parte da planta em estudo

QNA = quantidade de nitrogênio aplicada
 (mgN.vaso^{-1})

A EUF para a planta inteira foi calculada pela somatória dos valores das eficiências obtidas para cada uma das diversas partes da planta consideradas, de acordo com os tratamentos empregados, numa mesma época de amostragem.

3.2.19. Nitrogênio no solo

3.2.19.1. Teor de nitrogênio total

O teor de nitrogênio total no solo foi fornecido pela análise química.

3.2.19.2. Quantidade de nitrogênio total

A quantidade de N-total no solo, expressada em g.vaso^{-1} foi calculada pela seguinte expressão:

$$QNTS = \frac{TNTS \times Mso}{100} \quad (8)$$

onde,

TNTS = Teor de nitrogênio total no solo (%)

Mso = Massa do solo contida nos latões (no presente caso, 60 kg)

3.2.20. Nitrogênio derivado do solo

3.2.20.1. Porcentagem de nitrogênio no solo derivado do fertilizante

A porcentagem de nitrogênio no solo proveniente do fertilizante foi determinada pela equação a seguir:

$$\text{PNSDF} = \frac{\frac{15}{(\text{At.}\% \text{ Ns} - \% \text{ AN})}}{\frac{15}{(\text{At.}\% \text{ Nf} - \% \text{ AN})}} \times 100 \quad (9)$$

onde,

$\text{At.}\% \text{ Ns}$ = porcentagem de átomos de N presente no solo

os demais elementos da expressão foram descritos anteriormente. Os valores para % AN no solo, estão informados no Apêndice 33 (página 360).

3.2.20.2. Quantidade de N no solo derivado do fertilizante

A quantidade de N no solo derivado do fertilizante, expressa em mg.vaso^{-1} , por sua vez, foi calculada pela expressão:

$$\text{QNSDF} = \frac{\text{PNSDF} \times \text{QNTS}}{100} \quad (10)$$

Os elementos da equação foram apresentados nas expressões (7) e (8).

3.2.21. Balanço do nitrogênio no sistema solo-planta

O balanço do nitrogênio no sistema solo-arroz estudado foi realizado através da contabilização das entradas e saídas do nutriente, no volume de solo e no período de tempo considerados. Foram levadas em conta, como entradas ou ganhos de N, ao lado da quantidade inicialmente presente no solo (N-nativo), por ocasião do alagamento, a quantidade de N adicionada através da incorporação da fonte de matéria orgânica (palha de milho) e, a adicionada como uréia, nas doses aplicadas, de acordo com os tratamentos especificados. A contribuição do N das plântulas por ocasião do transplante, também foi levada em consideração mas, para

facilidade de cálculos, esta quantidade de N, muito pequena, foi subtraída diretamente dos valores obtidos nas épocas de coleta consideradas. A contribuição às entradas de N no sistema proveniente de precipitações pluviométricas ou através da água de irrigação, não foram consideradas, pela própria natureza da realização do experimento, conduzido em casa-de-vegetação e irrigado com água desionizada. Também, no caso da fixação biológica do N, a sua contribuição não foi considerada pois, não sendo o processo quantificado, estabeleceu-se que os possíveis ganhos que porventura tenham ocorrido, foram confundidos dentro do próprio balanço. Como saídas de N do sistema solo-planta estudado, foram consideradas, ao lado da quantidade extraída pela planta (ou recuperada pela planta), as contribuições relativas às perdas gasosas do N do sistema. As perdas por lixiviação ou por escoamento superficial, não ocorreram, devido as condições experimentais (tipo de dispositivo) empregadas.

Deste modo, a equação geral do balanço do N no sistema solo-planta, para o presente experimento pode ser dada pela expressão:

$$\Delta N = N_e - N_s \quad (11)$$

onde:

ΔN = variação do N no solo, no período
considerado

N_e = entradas de nitrogênio no período
considerado

N_s = saídas de nitrogênio no período
considerado

Levando em conta as observações anteriormente feitas, foram realizados o balanço de massa do N e o balanço de massa isotópico (^{15}N); as expressões para cada caso, a partir da equação geral, são dadas por:

a) Balanço do N

$$\Delta N = N_e - N_s$$

considerando: $N_e = N_{si} + N_f + N_{mo}$ e

$$N_s = N_p + N_{sf} + N_{pg}$$

onde:

N_{si} = nitrogênio inicial no solo

N_f = nitrogênio do fertilizante adicionado
ao solo

N_{mo} = nitrogênio da matéria orgânica
incorporada ao solo e

N_p = nitrogênio extraído pelas plantas

N_{sf} = nitrogênio final no solo

N_{pg} = nitrogênio devido à perda gasosa

então,

$$\Delta N = N_{si} + N_f + N_{mo} - N_p - N_{sf} - N_{pg} \quad (12)$$

b) Balanço isotópico do N (^{15}N)

Considerando, do mesmo modo, na equação

geral:

$$N_e = N_f^* \text{ e}$$

$$N_s = N_{p*} + N_{s*} + N_{pg*}$$

onde:

N_f^* = nitrogênio adicionado ao solo como fertilizante

N_p^* = nitrogênio na planta proveniente do fertilizante

N_s^* = nitrogênio no solo proveniente do fertilizante

N_{pg}^* = nitrogênio derivado do fertilizante, devido à perda gasosa

então, chamando aqui, $\Delta N = \Delta N_I$ (para a variação do N isotópico)

temos:

$$N_I = N_f^* - N_p^* - N_s^* - N_{pg}^* \quad (13)$$

Vale observar que para os cálculos do balanço do nitrogênio e do balanço isotópico, considerou-se a distribuição do N nas diversas partes da planta (raiz, colmo e folhas, panículas) para se determinar a quantidade de N total na planta inteira no primeiro caso, e a quantidade de nitrogênio total nas partes da planta derivado do fertilizante, para se determinar a quantidade de ¹⁵N na planta inteira, no segundo caso. Os dados para solo corresponderam aos valores da quantidade de N total obtidos para o balanço do nitrogênio e, no segundo caso, a partir daí, as quantidades de N total no solo proveniente do fertilizante. No caso da ocorrência de perdas as quantidades em ambos os balanços foram determinadas por diferença. Assim, quando $N_s = N_e$ teremos:

$$N_{si} + N_f + N_{mo} = N_p + N_{sf} + N_{pg} \quad e$$

$$N_f^* = N_p^* + N_s^* + N_{pg}^*$$

e, daí:

$$Npg = Nsi + Nf + Nmo - Np - Nsf \quad (14)$$

e

$$Npg^* = Nf^* - Np^* - Ns^* \quad (15)$$

Deve-se destacar que no tratamento que inclui a adição de palha de milho marcada, foi feito o balanço independente, para esta fonte, ao lado do balanço realizado para a uréia.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Transformações do nitrogênio no solo

4.1.1. Nitrogênio nativo e adicionado

4.1.1.1. Comportamento do nitrogênio orgânico

As quantidades de nitrogênio orgânico encontradas para os solos em estudo, em diferentes tratamentos, regimes de água e tempos de incubação estão apresentadas na Tabela 2 e informadas, também, pelos dados que constam nos Apêndices (páginas 327, 328, 329 e 330).

Através dos dados apresentados na Tabela 2, observa-se que as quantidades médias de N-orgânico, para os diferentes tratamentos empregados, apresentaram-se diferentes, um dia após o início da incubação. Isto reflete as diferentes contribuições do N-nativo + N-adicionado, nas quantidades de N-orgânico determinadas em cada tratamento especificado, para o primeiro dia de incubação dos solos. Esses resultados inicialmente observados mostram pequenas variações nos valores indicados para os dois regimes de

água, em cada tratamento considerado. Tais valores apresentaram-se significativamente diferentes entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% nos vários tratamentos empregados, para os solos em estudo e para o tempo de incubação especificado não se mostrando significativamente diferentes ($\alpha = 0,05$) entre si, nos dois regimes de água impostos (Apêndice 2, página 328). De modo geral os valores indicados informam a tendência das quantidades de N-orgânico de diminuírem com o aumento no tempo de incubação, sendo essa diminuição mais acentuada nos tratamentos incubados em condição de alagamento, particularmente nos tratamentos que receberam uréia (Uréia e Completo). A comparação entre as médias das combinações dos vários fatores em estudo (Apêndice 1, página 327) pelo teste de Tukey, ao nível de 5%, indicou que as combinações com valores mais elevados, foram apresentadas pelo solo aluvial, o tratamento completo e a condição de alagamento e pelo solo aluvial, o tratamento completo, a capacidade de campo (33,5 KPa) ambos na época 1 (1 dia após o início da incubação), indicadas respectivamente por 2T4A2E1 e 2T4A1E1; tais combinações embora não tenham se apresentado significativamente diferentes entre si, diferiram de todas as demais combinações. Observa-se ainda que, para o tratamento controle, em alagamento, houve diferenças significativas entre as quantidades de N-orgânico na primeira (1 dia) e na quarta (16 dias) épocas de

incubação (Tabela 2, Apêndice 1). Ainda, para os tratamentos uréia e completo (N-orgânico + uréia) o teste de Tukey indicou diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades de N-orgânico da primeira (1 dia) e da segunda (6 dias) épocas de incubação e, também, da primeira e da quarta (16 dias) épocas de incubação, para os dois solos e para os regimes de água impostos.

Através das informações apresentadas no Apêndice 2 (pág. 328), observa-se que a estatística F, ou teste F, acusou diferenças significativas, ao nível de 1%, dos vários fatores analisados (solo, tratamento, regime de água e tempo de incubação) e para as interações entre esses fatores (solos versus tratamentos; solos versus regimes de água; solos versus tempos de incubação; tratamentos versus níveis de água; tratamento versus tempos de incubação e níveis de água versus tempo de incubação). O desdobramento da análise de variância através da comparação das médias pelo teste de Tukey, ao nível de 5% indicou que as médias das quantidades de nitrogênio orgânico para os solos, diferiram significativamente entre si, dentro dos fatores tratamento, regime de água e tempo de incubação (Apêndice 2). Os valores indicados para o solo Glei pouco húmico foram, de modo geral mais baixos que os observados para o solo Aluvial. Também, foram indicadas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) pelo teste de Tukey entre as quantidades

médias de nitrogênio orgânico (Apêndice 3, pág. 329) obtidas para os regimes de água estudados, dentro dos fatores tratamento, solo e tempo de incubação. Os valores indicados para capacidade de campo apresentaram-se, de modo geral, mais elevados que os obtidos nas condições de alagamento.

A comparação das médias de tratamentos pelos contrastes ortogonais, através do teste F (Apêndice 4, pág. 330) indicou diferenças significativas ao nível de 1% para os níveis de tratamento dentro dos fatores solo, regime de água e tempo de incubação. Isto indica que os tratamentos uréia, matéria orgânica e completo foram superiores ao tratamento controle. Também, que o tratamento matéria orgânica superou o tratamento uréia. Ainda, que o tratamento completo (matéria orgânica + uréia) foi melhor que os tratamentos uréia e matéria orgânica individualmente. A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito significativo, quadrático para níveis equidistantes de tempo de incubação dentro dos fatores solo, tratamento (uréia e completo) e água e, linear, para níveis equidistantes de tempo dentro do fator tratamento (controle e matéria orgânica), nas quantidades de nitrogênio orgânico presentes no solo e influenciadas pela ação conjunta dos vários fatores em estudo.

As regressões polinomiais e suas respectivas

equações são mostradas através das figuras 2, 3 e 4. No Apêndice 48 são informados os coeficientes de determinação e os valores de F calculados, obtidos para os modelos ajustados ou estimados (pág. 375).

Observando-se as quantidades médias de N-orgânico informadas para o primeiro e o último tempos de incubação dos solos em sistema aberto, sob influência dos fatores estudados (Tabela 2) verifica-se que, de modo geral, as quantidades de N-orgânico apresentaram-se mais elevadas para o solo aluvial que para o solo Glei pouco húmico. Tais quantidades foram influenciadas pelas adições de uréia e de matéria orgânica separadas ou conjuntamente, e pelos regimes de água impostos. Os valores obtidos no tratamento controle permaneceram mais ou menos idênticos, a capacidade de campo, diminuindo com o aumento do tempo de incubação para os solos em condição de alagamento. A adição de uréia aos solos elevou os níveis de N-orgânico inicialmente observados, em relação ao controle, os quais diminuíram no tempo de incubação, principalmente pelo alagamento dos solos. Para o tratamento com matéria orgânica, a adição de palha de milho elevou os níveis de N-orgânico observados para o primeiro tempo de incubação, em relação ao controle, porém relativamente mais baixos que os valores para o tratamento uréia. As quantidades de N-orgânico apresentaram-se dentro de certa faixa, a capacidade

Tabela 2 - Quantidades médias de nitrogênio orgânico presentes nos solos para tratamentos, regimes de água e períodos de incubação, em estudo.

NITROGENIO ORGANICO											
TEMPO (dias)	Glei pouco hêmico					Aluvial					
	Controle	Uréia	M.orgânica	Completo	X	Controle	Uréia	M.orgânica	Completo	X	M.Geral(1)
-----ug.g-1-----											
Capacidade de Campo											
	(3)										
1	1077	1519	1287	1739	1405	1450	1902	1657	1998	1752	1579
6	1058	1089	1287	1468	1225	1435	1528	1591	1770	1581	1404
11	1054	1085	1263	1365	1192	1451	1499	1625	1713	1572	1382
16	1056	1046	1233	1374	1172	1447	1469	1612	1658	1546	1362
X	1061	1185	1267	1486	1250	1446	1599	1621	1785	1613	
Alagamento											
1	1073	1538	1240	1746	1399	1444	1902	1651	2019	1754	1577
6	981	860	1207	1356	1101	1422	1407	1584	1707	1530	1315
11	944	870	1208	1229	1063	1368	1374	1588	1771	1525	1294
16	919	801	1206	1186	1028	1317	1349	1560	1778	1501	1265
X	979	1017	1215	1379	1148	1388	1508	1596	1819	1578	
(2)											
M.G.	1020	1101	1241	1433		1417	1554	1609	1802		

X = média parcial

(1) - média de regime de água dentro do fator tempo de incubação

(2) - média de solo dentro do fator tratamento

(3) - média de quatro repetições

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 1 DO FATOR SOLO

$$Y = 1445.931 - 55.19469X + 2.146563X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 2 DO FATOR SOLO

$$Y = 1784.127 - 43.17906X + 1.722188X^2$$

Figura 2 - Transformações do N-orgânico no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os solos A) Glei e B) Aluvial.

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE CONT. DO FATOR TRAT.

$$Y = 1261.004 - 4.99125X$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE UREIA DO FATOR TRAT.

$$Y = 1795.469 - 110.2713X + 4.53375X^2$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE M.ORG DO FATOR TRAT.

$$Y = 1453.269 - 3.3X$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE COMEL. DO FATOR TRAT.

$$Y = 1933.744 - 71.28938X + 2.798125X^2$$

Figura 3 - Transformações do N-orgânico no solo influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os tratamentos, A) Controle, B) Uréia, C) Matéria Orgânica e D) Completo (matéria orgânica + uréia).

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE C.CAMPO DO FATOR AGUA

$$Y = 1609.353 - 39.79844X + 1.550313X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE ALAG. DO FATOR AGUA

$$Y = 1620.705 - 58.57532X + 2.318438X^2$$

Figura 4 - Transformações do N-orgânico no solo influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os regimes de água: A) Capacidade de Campo e B) Alagamento.

de campo, com tendência à diminuição no decorrer do tempo, em condição de alagamento. A adição conjunta de uréia e matéria orgânica (tratamento completo) revelou os níveis iniciais de N-orgânico, mais elevados, em relação aos outros tratamentos, os quais foram diminuindo no decorrer do tempo de incubação, nos dois regimes de água impostos aos solos.

Essas indicações sugerem que as fontes de N-nativas (controle) e as adicionadas como matéria orgânica (palha de milho, tratamento matéria orgânica) apresentaram-se resistentes quanto à decomposição ou mineralização das formas de N-orgânico à capacidade de campo e que a possível mineralização lenta ocorreu, não sendo possível evidenciar diferenças nos valores de N-orgânico no espaço de tempo em que o experimento se realizou. Ainda, é possível que o erro observado nas determinações analíticas do N-orgânico (normalmente maior que 2%) possa ter contribuído para a não evidência dessas mudanças. Entretanto, os valores informados para os referidos tratamentos na condição de alagamento sugerem a possibilidade através das tendências observadas de que alguma mineralização tenha ocorrido. Para o tratamento com uréia, os valores obtidos indicam a provável ocorrência do processo de decomposição enzimática, ou hidrólise do fertilizante, sugerindo a provável ocorrência da mineralização do N, a partir dessa fonte e das fontes nativas existentes no solo, nos dois regimes de água em

estudo, no decorrer do tempo de incubação. A adição conjunta de uréia e matéria orgânica (tratamento completo) reflete em parte as observações referentes aos tratamentos uréia e matéria orgânica, separadamente. As quantidades de N-orgânico determinadas para o tratamento completo, apesar de mais elevadas que os valores obtidos no tratamento uréia e no tratamento matéria orgânica, informam o possível efeito da hidrólise e mineralização do N-uréia, aliado aos efeitos das fontes de N nativas e da fonte de N da matéria orgânica adicionada, orientando uma provável atuação da uréia em relação a matéria orgânica o que parece refletir uma certa estimulação das fontes nativa e da adicionada como matéria orgânica, pela uréia, quando da comparação dos dados encontrados neste tratamento com os obtidos para os tratamentos incluindo a fonte de matéria orgânica adicionada isoladamente (além da fonte nativa) ou com aqueles cujos dados informam a quantidade de N-orgânico proveniente das fontes nativas existentes no solo. Essas sugestões para explicar o comportamento do N-orgânico no presente experimento encontram-se, de certo modo, baseadas em informações semelhantes obtidas da literatura (JANSSON e CLARK, 1952; BROADBENT, 1965; MACRAE e ANCAJAS, 1970; BROADBENT e TUSNEEM, 1971; PILOT e PATRICK, 1972; YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a, 1977b; WESTERMAN e TUCKER, 1978; PATRICK, 1982; PERUCCI et alii, 1982; WEERARATNA e CRASSWELL, 1985). Entretanto os resultados observados isoladamente são apenas

indicações, havendo a necessidade de integrá-los com outras informações referentes às demais formas de nitrogênio que foram determinadas, o que será feito nos itens a seguir.

4.1.1.2.. Comportamento do N-NH_4^+

As quantidades de N-amônio encontradas para os solos em estudo, em diferentes tratamentos, regimes de água e de acordo com os tempos de incubação, estão apresentadas na Tabela 3 e informadas, também pelos dados que constam nos Apêndices 5, 6, 7 e 8 (pág. 331 a 334).

Através dos dados apresentados na Tabela 3 verifica-se que as quantidades de N-NH_4^+ presentes no solo revelaram-se aumentadas com o aumento do tempo de incubação; em alguns casos essas quantidades mostraram-se mais elevadas, para a condição de alagamento dos solos. Os aumentos no tempo, entretanto, não foram observados para o tratamento matéria orgânica, nos solos à capacidade de campo e para o tratamento controle, também à capacidade de campo, no solo Aluvial. Observa-se também, que as quantidades de N-NH_4^+ não se mostraram significativamente diferentes entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% para os vários tratamentos, solos e regimes de água, na primeira época (1 dia) de incubação planejada (Apêndice 5, pág. 331).

Através das informações apresentadas no Apêndice 6, pág. 332 observa-se que a estatística F, acusou diferenças significativas ao nível de 1% dos vários fatores em estudo e para as interações entre os mesmos. A comparação das médias de solos, pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que as quantidades médias de $N-NH^+$ diferiram significativamente entre si, para os solos, dentro dos fatores tratamento, regime de água e tempo de incubação. Os valores indicados para o solo Glei pouco húmico foram, de modo geral, mais elevados que os observados para o solo Aluvial (Apêndice 6). Também, foram indicadas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) pelo teste de Tukey entre os valores médios para regime de água dentro dos fatores tratamento, solo e tempo de incubação. Para capacidade de campo os valores médios apresentaram-se, de modo geral, mais baixos que os observados para as condições de alagamento (Apêndice 7, pág. 333).

A comparação entre as médias das combinações dos vários fatores em estudo (Apêndice 8, pág. 334), pelo teste de Tukey ao nível de 5%, indicou que as combinações com valores mais elevados foram apresentadas pelo solo Glei pouco húmico no tratamento uréia, à capacidade de campo e em alagamento, na segunda e na terceira épocas (6 dias, 11 dias) de incubação dos solos, isto é, combinações 1T2ATE2, 1T2A2E3 e 1T2A2E2, as quais, embora não tenham se

apresentado significativamente diferentes entre si, diferiram de todas as demais combinações ($\alpha = 0,05$). Observa-se ainda que, para o tratamento controle, (Tabela 3, Apêndice 5) no solo Glei pouco húmico, nos dois níveis de água, houve diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades de $N-NH^+$ na primeira (1 dia) e na quarta (16 dias) épocas de incubação. Também, para o tratamento uréia, o teste de Tukey acusou diferenças significativas entre a primeira e a segunda épocas de incubação (1 dia e 6 dias) e entre a primeira e a quarta épocas (1 dia e 16 dias) de incubação, nos solos e nos regimes de água empregados. Diferenças significativas semelhantes foram observadas para o tratamento completo, no solo Glei pouco húmico, para os dois regimes de água; para o solo Aluvial, o teste de Tukey acusou diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) em todos os tempos de incubação, nos dois regimes de água impostos aos solos. A comparação das médias de tratamento pelos contrastes ortogonais, através do Teste F indicou, a exceção dos valores obtidos no tempo de incubação de 1 dia, diferenças significativas ao nível de 1% para os níveis de tratamento dentro dos fatores solo, água e tempo (Apêndice 8). Isto indica que os tratamentos uréia, matéria orgânica e completo foram superiores ao tratamento controle. Também, o tratamento com uréia superou o tratamento com matéria orgânica. Ainda, o tratamento completo (uréia + matéria orgânica) foi melhor que os tratamentos uréia e matéria

orgânica separadamente.

A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito significativo, quadrático para os níveis equidistantes de tempo de incubação dentro dos fatores solo, tratamento (uréia e completo) e água, e linear, para níveis equidistantes de tempo dentro do fator tratamento (controle), nas quantidades de nitrogênio-amônio presentes no solo sob influência conjunta dos vários fatores em estudo. As regressões polinomiais e respectivas equações são mostradas nas figuras 5, 6 e 7. No Apêndice 48 encontram-se os coeficientes de determinação e os valores de F calculados, obtidos para os modelos ajustados.

Os resultados obtidos para as quantidades médias de $N-NH_4^+$, presentes em diferentes tempos de incubação, para os diferentes tratamentos e regimes de água impostos ao solo indicam que, de modo geral, as quantidades médias de $N-NH_4^+$ foram mais elevadas no solo Glei pouco húmico que no solo Aluvial, as quais influenciadas pelos níveis de água em estudo, apresentaram-se mais elevadas na condição de alagamento, do que à capacidade de campo.

Os valores indicados para o tratamento controle mostrou que a mineralização das fontes nativas existentes no solo, estão se processando, com o decorrer do tempo, de maneira lenta, como foi sugerido em relação aos valores informados para N-orgânico, também uma provável

Tabela 3 - Quantidades médias de N-NH_4^+ presentes nos solos para tratamentos, regimes de água e períodos de incubação, em estudo.

N-NH_4^+											
TEMPO (dias)	Glei pouco húmico					Aluvial					
	Controle	Uréia	M.orgânica	Completo	X	Controle	Uréia	M.orgânica	Completo	X	M.Geral(1)
-1											
ug.g											
Capacidade de Campo											
(3)											
1	10,9	21,5	11,3	23,7	16,8	11,5	29,0	13,7	20,2	18,6	17,7
6	29,2	463	8,0	297	199	4,7	355	2,7	243	151	175
11	33,3	445	6,7	287	193	4,8	372	2,1	210	147	170
16	35,5	426	4,7	230	174	4,1	320	1,9	158	121	148
X	27,2	338	7,7	210	146	6,3	269	5,1	158	110	
Alagamento											
1	10,7	22,7	11,8	30,7	19,1	12,6	31,7	17,1	27,2	22,2	20,5
6	38,9	455	22,6	398	228	31,5	374	24,7	310	185	207
11	47,6	456	25,9	400	232	28,0	308	20,1	211	142	187
16	52,6	401	27,8	325	201	29,4	259	16,9	162	116	159
X	37,5	334	22,0	289	170	25,4	243	19,7	178	116	
(2)											
M.G.	32,4	336	14,9	249		15,8	256	12,4	168		

X = média parcial

(1) - média de regime de água dentro do fator tempo de incubação

(2) - média de solo dentro do fator tratamento

(3) - média de quatro repetições

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO_1 DO FATOR SOLO

$$Y = -18.96516 + 47.76566X - 2.211594X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 2 DO FATOR SOLO

$$Y = -4.288317 + 34.92981X - 1.735563X^2$$

Figura 5 - Transformação do $N-NH_4^+$ no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os solos: A) Glei pouco húmico e B) Aluvial.

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE CONT. DO FATOR TRAT.

$$Y = 14.0185 + 1.185875X$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE UREIA DO FATOR TRAT.

$$Y = -42.86563 + 92.16188X - 4.293125X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE COMPL. DO FATOR TRAT.

$$Y = -25.77 + 69.6125X - 3.455X^2$$

Figura 6 - Transformação do $N-NH_4^+$ no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os tratamentos: A) controle, B) uréia, C) completo (matéria orgânica + uréia).

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE C.CAMPO DO FATOR AGUA

$$Y = -11.5316 + 38.35366X - 1.804094X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE ALAG. DO FATOR AGUA

$$Y = -11.72188 + 44.34181X - 2.143063X^2$$

Figura 7 - Transformação do $N-NH_4^+$ no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os regimes de água : A) capacidade de campo e B) alagamento.

indicação de que a amonificação dessas fontes, está ocorrendo, sendo a acumulação de amônio estabelecida, particularmente, pela própria condição de alagamento imposta aos solos.

Para o tratamento uréia, verificou-se que a maior parte da uréia deve ter sido hidrolisada, estando presente na forma de amônio, aos 6 dias de incubação. A amonificação, nesse caso, parece ainda mais ativa. Na maior parte dos casos, os teores de amônia mostraram a tendência de diminuição, com o decorrer do tempo de incubação, a qual parece mais acentuada pelo alagamento dos solos. Esses resultados parecem indicar que parte do déficit observado pela diminuição nos teores de N-orgânico neste tratamento foi compensada pela transformação do N-uréia, através dos processos de hidrólise e mineralização, em N-NH_4^+ . A tendência de diminuição dos valores de N-NH_4^+ , no tempo, combinadamente com a tendência de decréscimo dos valores de N-orgânico, entretanto, podem sugerir a ocorrência da nitrificação e, conseqüentemente, de processos de perdas do N dos solos, no sistema em observação.

No tratamento matéria orgânica a adição de palha de milho aos solos parece indicar, através dos valores apresentados, que a mineralização das fontes nativas e da adicionada foi retardada, em relação aos valores obtidos para o tratamento controle, a capacidade de campo. Em

alagamento, é observada, como ocorreu para as fontes nativas no tratamento controle, o aumento das quantidades de N-amônio, com o decorrer do tempo. Entretanto, nota-se ainda, para o tratamento com palha de milho incubada à capacidade de campo, uma tendência de diminuição dos valores com o tempo, em relação aos inicialmente determinados para os dois solos, o que pode sugerir a ocorrência de imobilização (o que é difícil de observar pelos valores de N-orgânico, de ordem de grandeza maior) ou da nitrificação levando à formação de nitrato.

As quantidades de N-NH_4^+ obtidas no tratamento completo (matéria orgânica + uréia) indicam que a amonificação também foi importante nesse tratamento. Os valores de N-NH_4^+ determinados, foram superiores aos obtidos no tratamento com matéria orgânica mas, de modo geral, inferiores aos observados para o tratamento uréia. Esses resultados comparados aos de N-orgânico, no tratamento correspondentemente indicado, para os mesmos solos e os outros fatores em estudo, embora indiquem uma possível estimulação da mineralização da matéria orgânica do solo e da palha adicionada, pela adição de uréia, sugere também a provável imobilização do N-uréia, pela palha adicionada.

Observações sobre o comportamento do N-NH_4^+ em pesquisas incluindo adição de uréia e resíduos vegetais a

solos, particularmente em solos alagados (MACRAE e ANCAJAS, 1970; BOWMAN e FOCHT, 1974; STANFORD et alii, 1975a, 1975b; VENTURA e YOSHIDA, 1977; YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a, 1977b; SAH e MIKKELSEN, 1983a, 1983b; COLAÇO, 1984; SMITH e DELAUNE, 1984; WEERARATNA e CRASSWELL, 1985; COLAÇO E VICTÓRIA, 1988) concordam, no geral dos casos, com as indicações informadas no presente experimento, ressalvadas algumas características particulares inerentes aos solos estudados e às condições experimentais.

4.1.1.3. Comportamento do N-NO_3^-

3

As quantidades de N-nitrato encontradas para os solos em estudo, em diferentes tratamentos, regimes de água e tempos de incubação, estão apresentados na Tabela 4 e informados, também, pelos dados que constam nos Apêndices 9, 10, 11 e 12 (páginas 335 a 339).

Através dos dados informados na Tabela 4 observa-se que as quantidades de N-NO_3^- para a primeira época de incubação (1 dia) não diferiram entre si nos tratamentos uréia e matéria orgânica (Apêndice 9) no solo Glei pouco húmico, apresentando-se significativamente diferente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% para o solo Aluvial, à capacidade de campo; para este mesmo tempo de incubação os valores não se apresentaram significativamente diferentes

($\alpha = 0,05$) entre si nos tratamentos à capacidade de campo e em alagamento. Observa-se ainda que, à exceção do tratamento uréia para os dois solos à capacidade de campo, as quantidades de N-NO_3 obtidas diminuíram com o aumento do período de incubação, sendo essa diminuição mais acentuada nos tratamentos em condição de alagamento. A comparação entre as médias das combinações dos vários fatores em estudo (Apêndice 9) pelo teste de Tukey ao nível de 5%, indicou que a combinação com valor mais elevado foi apresentada pelo solo Aluvial, no tratamento uréia à capacidade de campo, no sexto dia de incubação, ou seja 2T1A1E2; tal combinação diferiu significativamente ($\alpha = 0,05$) das demais. A exceção do tratamento controle, para os dois solos à capacidade de campo, o teste de Tukey acusou diferenças significativas ao nível de 5%, entre os valores apresentados para o primeiro e último tempo da incubação (1 dia e 16 dias) estabelecidos, nos demais tratamentos e nos regimes de água impostos.

Através dos resultados informados no Apêndice 10 (pág. 337) nota-se que a estatística F acusou diferenças significativas, ao nível de 1%, dos fatores analisados e para as interações entre os mesmos.

A comparação das médias de solos, pelo teste de Tukey ao nível de 5% (Apêndice 10), indicou que as

quantidades de N-NO_3 diferiram significativamente entre si para o tratamento uréia, dentro do fator tratamento; para capacidade de campo, dentro de regime de água e para as duas primeiras épocas de incubação (1 dia e 6 dias), dentro de tempo de incubação. Também, pelo teste de Tukey houve diferença significativa ($\alpha = 0,05$) entre os valores médios de regime de água (Apêndice 11) dentro dos fatores tratamento, solo e tempo de incubação. Os valores para capacidade de campo, de modo geral, mostraram-se mais elevados do que os observados para as condições de alagamento.

A comparação das médias de tratamentos pelos contrastes ortogonais através do teste F, ao nível de 1% acusou diferenças significativas para os níveis de tratamento dentro dos fatores solo, água e tempo, nos contrastes entre o tratamento controle versus os demais tratamentos e entre o tratamento uréia versus o tratamento matéria orgânica.. Para o contraste uréia + matéria orgânica versus completo, houve diferença significativa para níveis de tratamentos dentro do solo Glei pouco húmico, dentro de alagamento e dentro da primeira época (1 dia) de incubação. Isto indica que as quantidades de N-NO_3 nos tratamentos uréia, matéria orgânica e completo superaram significativamente, nesses casos, o tratamento controle. Também, que o tratamento uréia foi significativamente melhor

que o tratamento matéria orgânica. Ainda, que o tratamento completo (matéria orgânica + uréia) superou significativamente os tratamentos uréia e matéria orgânica, separadamente, com exceção dos valores médios de N-NO_3 observados nos tempos 6, 11 e 16 dias de incubação.

A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito significativo quadrático para os níveis equidistantes de tempo de incubação dentro dos fatores solo (Aluvial), tratamento (uréia e completo) e água (alagamento), e linear, para níveis equidistantes de tempo dentro dos fatores solo (Glei pouco húmico), tratamento (matéria orgânica) e água (capacidade de campo), nas quantidades de N-NO_3 presentes nos solos. As regressões polinomiais são mostradas nas figuras 8, 9 e 10. No Apêndice 48 encontram-se os valores de F calculados, obtidos para os modelos estimados.

Os resultados obtidos para as quantidades de N-NO_3 determinadas nos solos, em diferentes tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em estudo, na maior parte dos casos, apresentaram-se bem semelhantes. Os valores informados mostraram-se mais elevados à capacidade de campo do que na condição de alagamento.

Observando-se os resultados indicados para a

Tabela 4 - Quantidades médias de N-NO_3 presentes nos solos para tratamentos, regimes de água e períodos de incubação, em estudo.

N-NO_3											
TEMPO (dias)	Glei pouco hêmico					Aluvial					
	Controle	Uréia	M.orgânica	Completo	X	Controle	Uréia	M.orgânica	Completo	X	M.Geral(1)
-1											
ug.g											
Capacidade de Campo											
(3)											
1	3,1	5,1	5,4	16,1	7,4	4,0	11,0	6,8	22,0	10,9	9,2
6	3,1	8,5	4,2	9,3	6,3	4,7	27,0	5,2	6,1	10,7	8,5
11	3,0	7,7	3,9	6,4	5,2	4,9	19,0	3,8	5,0	8,2	6,8
16	3,0	7,5	3,6	5,5	4,9	4,5	14,0	3,6	5,4	6,9	5,9
X	3,0	7,2	4,3	9,3	6,0	4,5	17,7	4,8	9,6	9,2	
Alagamento											
1	3,2	5,9	5,2	13,0	6,8	3,5	11,0	7,1	22,0	10,9	9,0
6	1,7	5,4	3,1	7,3	4,4	2,9	5,4	4,3	4,8	4,3	4,4
11	1,5	4,8	2,6	4,6	3,4	2,0	2,9	2,6	3,3	2,7	3,1
16	1,4	4,4	2,1	2,9	2,7	1,9	1,2	1,9	1,8	1,7	2,2
X	1,9	5,1	3,2	6,9	4,3	2,6	5,1	4,0	8,0	5,0	
(2)											
M.G.	2,5	6,2	3,8	8,1		3,6	11,6	4,4	8,8		

X = média parcial

(1) - média de regime de água dentro do fator tempo de incubação

(2) - média de solo dentro do fator tratamento

(3) - média de quatro repetições

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 1 DO FATOR SOLO

$$Y = 7.01625 - .219375X$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 2 DO FATOR SOLO

$$Y = 11.84094 - .8353749X + .022875X^2$$

Figura 8 - Transformações do $N-NO_3^-$ no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os solos: A) Gleba pouco húmico e B) Aluvial.

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE UREIA DO FATOR TRAT.

$$Y = 8.148938 + .7073126X - 5.093751E-02X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE M.ORG DO FATOR TRAT.

$$Y = 5.95825 - .21825X$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE COMPL. DO FATOR TRAT.

$$Y = 20.47156 - 2.686687X + .1048125X^2$$

Figura 9 - Transformações do N-NO no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os tratamentos: A) uréia, B) matéria orgânica e C) completo (matéria orgânica + uréia).

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE C.CAMPO DO FATOR AGUA

$$Y = 9.593438 - .2340625X$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE ALAG. DO FATOR AGUA

$$Y = 9.864656 - 1.069844X + 3.753125E-02X^2$$

Figura 10 - Transformações do $N-NO_3^+$ no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os regimes de água: A) capacidade de campo e B) alagamento.

primeira (1 dia) e a última (16 dias) épocas de incubação dos solos nota-se que, para o tratamento controle, a capacidade de campo, as quantidades de N-NO_3^- foram bem aproximadas, reforçando as suposições feitas em relação as possibilidades sugeridas para N-orgânico e NH_4^+ , da ocorrência, a partir do solo e da fonte de N adicionada, dos processos de mineralização e de hidrólise da uréia levando, através da amonificação à nitrificação do N-nativo e do adicionado aos solos. Por outro lado, a tendência de diminuição observada, principalmente no solo Aluvial parece indicar que possíveis perdas de N possam ter acontecido no referido tratamento, ou que o N-NO_3^- foi reduzido, embora os dados para N-orgânico e N-NH_4^+ não possam confirmar este fato.

Para o tratamento matéria orgânica, observa-se que os níveis de nitrato informados para os solos à capacidade de campo decresceram com o decorrer do tempo de incubação. Entretanto, apesar desse decréscimo a partir do primeiro dia de incubação foram observados valores mais elevados do que para o tratamento controle. Também esses valores foram, no geral, menores que as quantidades de N-NO_3^- observadas para o tratamento uréia.

As quantidades de N-NO_3^- finais (16 dias), entretanto, apresentaram-se diminuídas em relação às

quantidades observadas no tempo de incubação inicial (1 dia), sugerindo que a possível ocorrência dos mecanismos de mineralização e nitrificação, de modo geral, mais lenta ou menos efetiva do que para o tratamento uréia, deve ter levado aos processos de perdas de nitrogênio das fontes de nitrogênio nativas e da adicionada (palha de milho). O tratamento com matéria orgânica e uréia, conjuntamente (completo) revelou os mais elevados níveis de N-NO_3^- no primeiro dia de incubação. Essas quantidades foram bastante reduzidas no final da incubação (16 dias), o que parece refletir o efeito da combinação das fontes de N adicionadas conjuntamente (palha de milho e uréia), e das nativas, superando o efeito de transformação a nitrato, dessas fontes, quando as mesmas foram adicionadas separadamente aos solos. Considerando os dados observados para o tratamento completo, em relação aos dados para os tratamentos independentes, uréia e matéria orgânica, os resultados informados parecem sugerir que a adição de uréia pode ter influenciado a mineralização e conseqüentemente a nitrificação das fontes nativas e da adicionada como palha de milho. Ainda, para esse tratamento, a possibilidade da ocorrência de perdas do N não deve ser desprezada, embora no presente caso, as condições impostas, pelo nível de água adotado, sejam menos favoráveis ao processo de denitrificação do que para os casos em alagamento.

As quantidades de N-NO_3 determinadas para esta última condição, entretanto, nos diferentes tratamentos efetuados, para o primeiro e último tempo de incubação (1 dia e 16 dias) nos dois solos, sugerem de modo mais convincente a ocorrência de perdas provavelmente via denitrificação, as quais parecem ter sido mais elevadas para o tratamento completo, pela comparação dos dados informados para as quantidades iniciais (1 dia) e finais (16 dias) neste tratamento, com as determinadas nos demais tratamentos. Essas observações de modo geral, encontram concordância com observações semelhantes apresentadas por PILOT e PATRICK (1972); PATRICK e REDDY (1976b); COLAÇO (1984); SMITH e DELAUNE (1984); RAO e SHINDE (1985); COLAÇO e VITÓRIA (1988).

4.1.2. Nitrogênio no solo, derivado das fontes de ^{15}N

4.1.2.1. Transformações do ^{15}N - orgânico

As quantidades de N-orgânico derivado das fontes matéria orgânica e uréia marcadas, presentes nos solos em estudo, em diferentes combinações de tratamentos, regimes de água e tempos de incubação estão apresentadas na Tabela 5 e informadas, também, pelos dados que se encontram nos Apêndices 13, 14, 15 e 16 (páginas 340-343).

Através dos dados apresentados na Tabela 5 observa-se que as quantidades médias de ¹⁵N-orgânico inicialmente presentes nos solos (dia 1) apresentaram-se de modo geral, mais elevadas nos tratamentos uréia e completo, do que no tratamento matéria orgânica, nos dois regimes de água impostos aos solos. Aos 6 dias de incubação a quantidade de ¹⁵N-orgânico derivado da uréia aplicada apresentou-se diminuída nos tratamentos uréia e completo, para os dois solos, a capacidade de campo, não se verificando a mesma tendência para o N-orgânico derivado da palha de milho no tratamento matéria orgânica. Para cada solo, a diminuição na quantidade de ¹⁵N-orgânico foi mais acentuada no tratamento uréia, do que no tratamento completo; a partir deste período de incubação (6 dias), com exceção do tratamento completo para o solo Glei pouco húmico, os valores observados apresentaram-se levemente alterados. Em condições de alagamento foram observados tendências semelhantes às indicadas para capacidade de campo, nos tratamentos uréia e completo nos solos em estudo, porém o tratamento com matéria orgânica revelou níveis mais baixos de ¹⁵N-orgânico, em relação as quantidades encontradas para capacidade de campo. A comparação entre as médias das combinações dos vários fatores em estudo (Apêndice 13) pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que as melhores combinações, ou melhores respostas obtidas, foram apresentadas para o primeiro tempo de incubação (1 dia),

alagamento, nos tratamentos uréia e completo, para os dois solos, dadas por 2T3A2E1, 2T1A2E1, 1T3A2E1 e 1T1A2E1; tais combinações, embora não tenham diferido significativamente entre si, diferiram das demais. Observa-se, também, através das combinações que para o tratamento uréia houve diferença significativa ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades de N-¹⁵orgânico determinadas na primeira (1 dia) e segunda (6 dias) épocas de incubação, para os dois solos e, ainda, nas épocas intermediárias (dia 6 e dia 11) e na quarta época de incubação (dia 16), para o solo Aluvial, nos dois regimes de água adotados. Para o tratamento matéria orgânica, o teste de Tukey só acusou diferenças significativas ($\alpha = 0,05$)¹⁵ entre as quantidades de N-¹⁵orgânico no primeiro e no último dia de incubação, para os dois solos em alagamento. Além disso, as quantidades de N-¹⁵orgânico no tratamento completo diferiram significativamente entre si ($\alpha = 0,05$), em todos os tempos de incubação à capacidade de campo e, também, no primeiro e no último dias, em alagamento, para o solo Glei pouco húmico. Para o solo Aluvial houve diferenças¹⁵ significativas entre as quantidades de N-¹⁵orgânico determinadas no primeiro (1 dia) e no segundo (6 dias) tempos de incubação e para aquele (1 dia) em relação ao último dia (16 dias), à capacidade de campo; os valores observados nas condições de alagamento, diferiram significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% em todos os tempos de incubação estabelecidos.

Através das informações apresentadas no Apêndice 14 observou-se que a estatística F acusou diferenças significativas ao nível de 1%, dos vários fatores analisados e para as interações entre esses fatores. O desdobramento da análise de variância através da comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que os valores médios das quantidades de ¹⁵N-orgânico nos solos diferiram significativamente entre si, dentro dos fatores tratamento, regime de água e tempo de incubação, apresentando-se, de modo geral, mais elevados para o solo Glei pouco húmico do que para o solo Aluvial (Apêndice 14). Também, foram indicadas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades médias de ¹⁵N-orgânico para os regimes de água dentro dos fatores tratamento, solo e tempo de incubação (Apêndice 15), tais valores apresentando-se, em geral, mais elevados para capacidade de campo do que os obtidos nas condições de alagamento. A comparação das médias de tratamentos pelos contrastes ortogonais, através do teste F (Apêndice 16) indicou diferenças significativas ao nível de 1% para os níveis de tratamento dentro dos fatores solo, regime de água e tempo de incubação. Isto indica que o tratamento completo superou os tratamentos uréia e matéria orgânica. Também que o tratamento matéria orgânica foi melhor que o tratamento uréia, a exceção do primeiro tempo de incubação (1 dia).

Tabela 5 - Quantidades médias de N-orgânico derivado das fontes de N marcadas (¹⁵N), presentes no solo para tratamentos, regimes de água e períodos de incubação em estudo.

15 (1) N-orgânico (QNSDF)									
TEMPO (dias)	Glei pouco hídrico				Aluvial				
	Uréia	N.orgânica	Completo	X	Uréia	N.orgânica	Completo	X	M.Geral(2)
-1									
-Ug.g									
Capacidade de Campo									
(4)									
1	441	215	450	369	442	216	431	363	366
6	34	213	170	139	58	206	192	152	145
11	34	215	205	152	74	216	188	159	155
16	37	215	265	172	87	215	187	163	160
X	137	214	273	208	165	213	249	209	
Alagamento									
1	457	199	461	372	465	216	477	386	379
6	15	164	60	80	51	172	135	119	100
11	19	151	67	79	63	176	171	137	108
16	23	144	74	80	92	150	209	150	115
X	129	164	165	153	168	179	248	198	
(3)									
M.G.	133	189	219		167	196	249		

X : média parcial

- (1) - quantidade do N-orgânico no solo derivado do fertilizante
 (2) - médias de regime de água dentro do fator tempo de incubação
 (3) - médias de solo dentro do fator tratamento
 (4) - média de quatro repetições

A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito significativo quadrático para os níveis equidistantes de tempo de incubação dentro dos fatores solo, tratamento (uréia e completo) e água e, linear, para os níveis equidistantes de tempo dentro do fator tratamento (matéria orgânica), nas quantidades de ^{15}N -orgânico presentes no solo. As regressões polinomiais e suas respectivas equações são mostradas nas figuras 11, 12 e 13. No Apêndice 48 são informados os valores de F calculados, obtidos para os modelos estimados.

4.1.2.2. Transformações do $^{15}\text{N-NH}_4^+$

As quantidades de $^{15}\text{N-NH}_4^+$ derivado das fontes matéria orgânica e uréia marcadas, presentes nos solos em estudo, em diferentes combinações de tratamentos, regimes de água e tempos de incubação estão apresentadas na Tabela 6 e informadas, também, pelos dados que se encontram nos Apêndices 17, 18, 19 e 20.

Através dos dados apresentados na Tabela 6 observa-se que as quantidades médias de $^{15}\text{N-NH}_4^+$ apresentaram-se, de modo geral, mais elevadas nos tratamentos uréia e completo, do que no tratamento matéria orgânica, nos dois regimes de água impostos aos solos. Aos 6 dias de incubação a quantidade de $^{15}\text{N-NH}_4^+$ derivado da uréia

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 1 DO FATOR SOLO

$$Y = 415.7608 - 60.85584X + 2.724167X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 2 DO FATOR SOLO

$$Y = 414.3563 - 54.91292X + 2.475417X^2$$

Figura 11 - Transformações do N-orgânico (QNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os solos: A) Glei pouco húmico e B) Aluvial.

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE UREA DO FATOR TRAT

$$Y = 521.9794 - 95.42938X + 4.240625X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE M.ORG DO FATOR TRAT

$$Y = 208.3375 - 1.8375X$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE COMPL. DO FATOR TRAT

$$Y = 509.0163 - 73.96375X + 3.41625X^2$$

15

Figura 12 - Transformações do N-orgânico (QNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os tratamentos: A) uréia, B) matéria orgânica e C) completo (matéria orgânica + uréia).

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE C. CAMPO DO FATOR AGUA

$$Y = 403.5658 - 51.2725X + 2.3275X^2$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE ALAG. DO FATOR AGUA

$$Y = 426.5513 - 64.49625X + 2.872084X^2$$

15

Figura 13 - Transformações do N-orgânico (QNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os regimes de água: A) capacidade de campo e B) alagamento.

aplicada apresentou-se aumentada nos tratamentos uréia e completo, para os dois solos, a capacidade de campo, não se verificando a mesma tendência para o tratamento matéria orgânica. Para cada solo, o aumento na quantidade de N-NH_4^{15+} foi mais acentuado no tratamento uréia do que no tratamento completo; a partir desse período de incubação (6 dias) os valores observados diminuíram com o aumento no tempo de incubação dos solos. Em condições de alagamento, foram observadas tendências semelhantes às indicadas para capacidade de campo, nos tratamentos uréia e completo, embora em alguns casos estes valores tenham se mostrado mais elevados nestas condições, em relação à capacidade de campo. Os resultados para o tratamento matéria orgânica revelaram-se, de modo geral, mais elevados do que os informados para os tempos de incubação idênticos, a capacidade de campo.

A comparação entre as médias das combinações dos vários fatores em estudo (Apêndice 17) pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que as melhores combinações ou melhores respostas obtidas, foram apresentadas pelo segundo tempo de incubação (6 dias), no tratamento uréia, nos dois regimes de água, para o solo Glei pouco húmico, dadas por 1T1A1E2 e 1T1A2E2; embora não tenham diferido significativamente entre si, essas combinações diferiram das demais. Observa-se, também, através das combinações que para o tratamento matéria orgânica, as quantidades de N-NH_4^{15+} não

diferiram significativamente entre si, pelo teste de Tukey ($\alpha = 0,05$), nos tempos de incubação e nos regimes de água impostos aos dois solos. Os três tratamentos não se mostraram significativamente diferentes entre si, no primeiro tempo de incubação, quanto aos valores de $\frac{15}{4} \text{ N-NH}^+$ para os solos, à capacidade de campo e em alagamento. Observa-se também, que houve diferenças significativas entre os valores encontrados para as quantidades de $\frac{15}{4} \text{ N-NH}^+$, nos tratamentos com uréia e completo, para o primeiro (1 dia) e o segundo (6 dias) tempos de incubação e, ainda, para estes em relação ao último dia de incubação (16 dias), nos regimes de água empregados para os dois solos. Entretanto, os valores para os dois regimes de água, não diferiram significativamente ($\alpha = 0,05$) entre si, no primeiro e no último tempo de incubação, para o tratamento uréia, no solo Glei pouco húmico e para o tratamento completo, no solo Aluvial.

Através das informações apresentadas no Apêndice 18 observou-se que a estatística F acusou diferenças significativas ao nível de 1% dos vários fatores analisados e para as interações entre esses fatores. O desdobramento da análise da variância através da comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que os valores médios das quantidades de $\frac{15}{4} \text{ N-NH}^+$ no solos diferiram significativamente entre si, dentro do fator tratamento para

os tratamentos uréia e completo, dentro do fator água e dentro do fator tempo de incubação aos 6, 11 e 16 dias, apresentando-se, na maioria dos casos, mais elevados para o solo Glei pouco húmico do que para o Aluvial (Apêndice 18). Também, foram observadas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades médias de $N-NH^{15+4}$ para os regimes de água dentro do fator tratamento para os tratamentos uréia e completo, dentro do fator solo para o Glei pouco húmico e dentro do tempo de incubação para 6 dias.

A comparação das médias de tratamentos pelos contrastes ortogonais, através do teste F (Apêndice 20) indicou diferenças significativas ao nível de 1% para os níveis de tratamento dentro dos fatores solo, regime de água e tempo de incubação aos 6, 11 e 16 dias. Isto significa que o tratamento completo foi superior aos tratamentos matéria orgânica e uréia. Também, que o tratamento uréia foi melhor que o tratamento matéria orgânica.

A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito signifivativo quadrático para os níveis equidistantes de tempo de incubação dentro dos fatores solo, tratamento (uréia, completo) e água, nas quantidades de $N-NH^{15+4}$ presentes no solo. As regressões polinomiais e respectivas equações são mostradas nas figuras 14, 15 e 16. No Apêndice 48 são informados os valores de F calculados,

+
Tabela 6 - Quantidades médias de N-NH⁴ derivado das fontes
15 4
marcadas (N), presentes nos solos para
tratamentos, regimes de água e períodos de
incubação, em estudo.

15 + (1) N-NH ₄ (QNSDF)									
Glei pouco húmico					Aluvial				
TEMPO (dias)	Ureia	M.orgânica	Completo	X	Ureia	M.orgânica	Completo	X	M.Geral(2)
-1 ug.g									
Capacidade de Campo									
1	11	0,9	10	7,7	15	0,9	12	9,2	8,3
6	427	0,9	263	246	321	0,6	208	176	203
11	400	0,7	248	216	326	1,1	172	116	191
16	378	0,4	179	186	276	1,0	125	134	160
X	304	0,7	175	160	234	0,9	129	121	
Alagamento									
1	10	1,1	13	8,0	16	1,1	17	11,2	9,6
6	422	3,4	377	267	321	2,7	269	198	233
11	419	3,4	373	266	248	2,9	165	139	202
16	359	3,7	278	213	203	3,0	115	107	160
X	302	2,9	260	189	197	2,4	142	114	
(3) M.G.	303	1,8	218		216	1,7	135		

X = média parcial

- (1) - quantidade do N-NH₄ no solo derivado do fertilizante
 (2) - médias de regime de água dentro do fator tempo de incubação
 (3) - médias de solo dentro do fator tratamento
 (4) - média de quatro repetições

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 1 DO FATOR SOLO

$$Y = -38.03612 + 59.38128X - 2.825159X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 2 DO FATOR SOLO

$$Y = -18.47417 + 41.44269X - 2.088579X^2$$

Figura 14 - Transformações do $^{15}\text{N-NH}_4^+$ (QNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os solos: A) Glei pouco húmico e B) Aluvial.

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE UREIA DO FATOR TRAT

$$Y = -50.59494 + 85.70131X - 4.041688X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE COMPL. DO FATOR TRAT

$$Y = -35.00556 + 65.31818X - 3.319813X^2$$

Figura 15 - Transformações do $^{15}\text{N-NH}_4^+$ (QMSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os tratamentos: A) uréia, B) completo (matéria orgânica + uréia).

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE C.CAMPO DO FATOR AGUA

$$Y = -27.35286 + 47.35225X - 2.264509X^2$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE ALAG. DO FATOR AGUA

$$Y = -29.15743 + 53.47173X - 2.649229X^2$$

Figura 16 - Transformações do $^{15}\text{N-NH}_4^+$ (QNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os regimes de água: A) capacidade de campo e B) alagamento.

obtidos para os modelos ajustados.

4.1.2.3. Transformações do $\frac{15}{3}\text{-NO}_3^-$

As quantidades de $\frac{15}{3}\text{-NO}_3^-$ derivado das fontes matéria orgânica e uréia marcadas, presentes nos solos em estudo, em diferentes combinações de tratamentos, regimes de água e tempos de incubação estão apresentados na Tabela 7 e informados, também, pelos dados que se acham nos Apêndices 21, 22, 23 e 24.

Através dos dados apresentados na Tabela 7 observa-se que as quantidades médias de $\frac{15}{3}\text{-NO}_3^-$ apresentaram-se, de modo geral, para o primeiro tempo de incubação, mais elevadas para o tratamento completo, do que para os tratamentos uréia e matéria orgânica, nos regimes de água e solos em estudo. Para o tratamento uréia, mostraram-se aproximados nos regimes de água em estudo para o solo Glei pouco húmico. Entretanto, para o solo Aluvial as quantidades de $\frac{15}{3}\text{-NO}_3^-$ mostraram-se mais elevadas do que para o solo Glei pouco húmico, à capacidade de campo. Esses valores foram diminuídos, com o aumento no tempo de incubação, para o solo Aluvial, em alagamento. As quantidades de $\frac{15}{3}\text{-NO}_3^-$ encontradas no tratamento matéria orgânica para os dois solos foram, de modo geral, diminuídas com o aumento do tempo de incubação, tanto à capacidade de campo como em alagamento. Essa mesma tendência foi

observada, também para o tratamento completo, apesar dos valores mais elevados apresentados no primeiro tempo de incubação.

A comparação entre as médias das combinações dos vários fatores em estudo (Apêndice 21) pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que as combinações com valores mais elevados foram apresentadas pelo solo Aluvial, no tratamento uréia, a capacidade de campo, aos 6 dias de incubação, ou seja, 2T1A1E2. Ainda, através da comparação dessas combinações o teste de Tukey indicou que as quantidades de N-NO_3^{15-} não se apresentaram significativamente diferentes entre si ($\alpha = 0,05$) nos tempos de incubação e regimes de água especificados para o solo Glei pouco húmico. Para o solo Aluvial, entretanto, os valores obtidos diferiram significativamente ($\alpha = 0,05$) entre si, a capacidade de campo, nos tempos de incubação em estudo; nas condições de alagamento houve diferença significativa entre as quantidades de nitrato derivado do fertilizante, pelo teste de Tukey ($\alpha = 0,05$) entre o primeiro e o último (1 dia e 16 dias, respectivamente) tempos de incubação. No tratamento matéria orgânica, nota-se que houve diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades de N-NO_3^{15-} determinadas para 1 dia e 6 dias e, para 1 dia e 16 dias de incubação, nos dois níveis de água, para os dois solos em estudo. Também, para o tratamento completo, foram acusadas diferenças significativas pelo

teste de Tukey ($\alpha = 0,05$) entre os dados de $\frac{15}{3}$ N-NO no primeiro e no sexto dias de incubação e no primeiro e no último (16 dias) dias de incubação.

Através das informações apresentadas no Apêndice 22 observou-se que a estatística F acusou diferenças significativas ao nível de 1% dos vários fatores analisados e para as interações entre tais fatores. O desdobramento da análise de variância através da comparação das médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% indicou que as quantidades médias de $\frac{15}{3}$ N-NO nos solos diferiram significativamente entre si, dentro do fator tratamento para os tratamentos uréia e completo, dentro do fator regime de água e dentro do fator tempo de incubação. Os valores, em geral, foram mais elevados para o solo Aluvial do que para o solo Glei pouco húmico (Apêndice 22). Também, foram observadas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as quantidades de $\frac{15}{3}$ N-NO para os regimes de água dentro do fator tratamento para os tratamentos uréia e completo, dentro do fator solo para o solo Aluvial e dentro do fator tempo aos 6 e 11 dias de incubação.

A comparação das médias de tratamento pelos contrastes ortogonais através do teste F (Apêndice 23) indicou diferenças significativas ao nível de 1% para os níveis de tratamento dentro dos fatores solo, regime de água

(alagamento, para o contraste uréia + matéria orgânica versus completo; capacidade de campo, para o contraste matéria orgânica versus uréia) e tempo (1 dia, respectivamente para o primeiro contraste e aos 6, 11 e 16 dias para o segundo). Isto quer dizer que o tratamento completo superou os tratamentos matéria orgânica e uréia somente em relação aos solos, em alagamento e no primeiro dia de incubação. Também que o tratamento uréia foi superior ao tratamento matéria orgânica em relação aos solos, à capacidade de campo e aos 6 e 11 dias de incubação.

A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito significativo quadrático para os níveis equidistantes de tempo de incubação dentro dos fatores solo (Aluvial), tratamento e níveis de água (alagamento) e, linear, para os níveis equidistantes de tempo dentro do fator solo (Glei pouco húmico), e água (capacidade de campo), nas quantidades de $\frac{15}{3}$ N-NO₃ presentes no solo. As regressões polinomiais e respectivas equações são mostradas nas figuras 17, 18 e 19. No Apêndice 48, pág. 375 são informados os valores de F calculados, obtidos para os modelos ajustados.

Tabela 7 - Quantidades médias de N-NO_3^{15} derivado das fontes marcadas (N^{15}), presentes nos solos para tratamentos, regimes de água e períodos de incubação, em estudo.

N-NO_3 (QNSDF)									
TEMPO (dias)	Glei pouco hêmico				Aluvial				
	Urêia	M.orgânica	Completo	X	Urêia	M.orgânica	Completo	X	M.Geral(1)
-1									
ug.g									
Capacidade de Campo									
(3)									
1	3,2	2,3	8,1	4,5	4,6	3,6	18,2	8,8	6,6
6	3,5	0,5	3,6	2,5	22,6	0,1	3,4	8,7	5,6
11	3,1	0,4	3,0	2,1	15,1	0,6	2,7	6,1	4,1
16	2,8	0,2	2,6	1,8	10,5	0,9	3,5	5,0	3,4
-									
X	3,1	0,8	4,3	2,8	13,2	1,3	6,9	7,1	
Alagamento									
1	2,4	2,6	6,2	3,7	4,5	3,1	19,1	8,9	6,3
6	2,3	0,4	1,4	1,4	3,8	0,5	1,8	2,0	1,7
11	2,2	0,3	0,5	1,0	1,8	0,3	0,9	1,0	1,0
16	2,1	0,2	0,2	0,8	0,5	0,2	0,4	0,4	0,5
-									
X	2,2	0,3	2,1	1,7	2,6	1,0	5,6	3,1	
(2)									
M.G.	2,7	0,3	3,2		7,9	1,2	6,3		

X : média parcial

(1) - média de regime de água dentro do fator tempo de incubação

(2) - média de solo dentro do fator tratamento

(3) - média do quatro repetições

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 1 DO FATOR SOLO

$$Y = 3.737017 - .1737667X$$

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TEMPO DENTRO DE SOLO 2 DO FATOR SOLO

$$Y = 9.61327 - .8412374X + .0256125X^2$$

Figura 17 - Transformações do $^{15}\text{N}-\text{NO}_3$ (QNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os solos: A) Glei pouco húmico e B) Aluvial.

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE UREIA DO FATOR TRAT

$$Y = 3.14375 + .9781249X - 5.937499E-02X^2$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE M.ORG DO FATOR TRAT

$$Y = 3.324406 - .5757813X + 2.496875E-02X^2$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE COMPL. DO FATOR TRAT

$$Y = 14.77036 - 2.427837X + .1024125X^2$$

Figura 18 - Transformações do $^{15}\text{N}-\text{NO}_3^+$ (GNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os tratamentos: A) ureia, B) matéria orgânica e C) completo (matéria orgânica + ureia).

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE C.CAMPO DO FATOR AGUA

$$Y = 6.8602 - .2237X$$

REGRESSÃO POLINOMIAL PARA OS NÍVEIS DE TEMPO DENTRO DE ALAG. DO FATOR AGUA

$$Y = 7.164538 - 1.070954X + .0420625X^2$$

Figura 19 - Transformações do N-NO_3 (GNSDF) no solo, influenciadas por tipos de solo, tratamentos, regimes de água e tempos de incubação em sistema aberto, para os regimes de água: A) capacidade de campo e B) Alagamento.

4.1.3. Inter-relações gerais nas transformações do N no solo

Os resultados encontrados no estudo das transformações do nitrogênio nos dois solos indicam que, as tendências apresentadas pelos dados de nitrogênio das fontes nativas e adicionadas presentes nos solos sob a influência dos vários fatores observados, no geral dos casos, apresentaram-se bastante aproximadas entre si, refletindo pequenas diferenças relativas às características intrínsecas e propriedades inerentes a cada solo.

Assim sendo, no que se refere ao N-nativo existente no solo observou-se que as quantidades de N-orgânico, apesar de terem se mostrado mais elevadas no solo Aluvial do que no Gleí pouco húmico, não parecem ter sido modificadas nos dois solos, a capacidade de campo, no período de incubação em estudo (16 dias). Em alagamento, entretanto, as quantidades de N-orgânico presentes nos solos diminuíram com o aumento no tempo representando variações entre o primeiro e o último dias de incubação que indicam diminuição nos teores de N-orgânico da ordem de 154 e 127 $\mu\text{g N.g}^{-1}$ solo, respectivamente para o solo Gleí pouco húmico e para o solo Aluvial. Em relação às quantidades de N-NH_4^+ determinadas nos dois solos observou-se, de modo geral, que os valores foram mais elevados para o solo Gleí pouco húmico

do que para o Aluvial, a capacidade de campo, no período de incubação observado. Tais resultados mostraram a tendência de aumento dos valores de $N-NH_4^+$ com o tempo no primeiro solo, os quais se apresentaram dentro da mesma faixa, para o segundo solo referido. Para os dois solos verificou-se que, as quantidades de $N-NO_3^-$ observadas, a capacidade de campo, apresentaram níveis ³ que permaneceram mais ou menos semelhantes com o decorrer do tempo e que se mostraram mais elevados para o solo Aluvial em relação aos determinados no solo Glei pouco húmico. Na condição de alagamento imposta, as quantidades de $N-NH_4^+$ provenientes das fontes nativas existentes no solo apresentaram-se mais elevadas do que as correspondentemente observadas, nos dois solos, a capacidade de campo, sendo esses aumentos mais acentuados para o solo Glei pouco húmico do que para o solo Aluvial. Na mesma condição, os valores indicados para $N-NO_3^-$, em ambos os solos, tenderam a diminuição com o aumento no tempo de incubação, apresentando-se bastante aproximados entre si, no geral dos casos.

A adição de N-urêia aos solos indicou, para o primeiro dia de incubação, a capacidade de campo que, praticamente, toda a urêia (96%, em relação à quantidade do N adicionado) foi incorporada à fração N-orgânico, nos solos. Essas quantidades médias de N-orgânico, entretanto, foram reduzidas após 6 dias de incubação a valores

correspondentes a 13% (no solo Aluvial) e a 7% (no solo Glei pouco húmico) do N-urêia adicionado. A partir dos 6 dias, os níveis de N-orgânico apresentaram a tendência de aumento, com o decorrer do tempo de incubação, particularmente mais acentuada no solo Aluvial. Ainda, a capacidade de campo, as quantidades médias do N-NH^+_{4} derivado da urêia aplicada aumentaram do primeiro ao sexto dia de incubação nos dois solos em estudo. Os valores indicaram que aos 6 dias de incubação, aproximadamente 70% (Aluvial) e 92% (Glei pouco húmico) do N-urêia adicionado foi transformado a N-NH^+_{4} . Esses valores apresentaram-se diminuídos, a partir deste tempo de incubação, com o decorrer do tempo. Ainda, a capacidade de campo, as quantidades de N-NO^-_3 provenientes da urêia, determinadas no solo Aluvial mostraram-se aumentadas do primeiro ao sexto dia de incubação, tendendo a diminuir com o decorrer do tempo. Essa tendência não foi evidenciada para o solo Glei pouco húmico, que mostrou valores de N-NO^-_3 derivado do fertilizante, bem menores do que os do solo Aluvial.

Observando-se as quantidades de nitrogênio não marcado, ou seja, nitrogênio nativo no solo, no tratamento com adição de urêia-marcada, a capacidade de campo (Apêndice 29, pág. 356) verificou-se que os valores informados para N-orgânico nos dois solos se mostraram bem aproximados, de modo geral, em relação aos respectivos

teores observados no tratamento controle. Observou-se, também, a tendência dos valores determinados para N-NH_4^+ nos solos, de se apresentarem mais elevados do que os observados para o controle; tais valores mostraram-se, de certo modo, aumentados com o decorrer do tempo. As quantidades do N-NO_3^- não marcado, nesse mesmo tratamento em geral, ou foram aproximadas (Glei pouco húmico) ou se mostraram levemente aumentadas (Aluvial) em relação ao tratamento controle, tendendo a diminuir, um pouco, com o aumento no tempo de incubação.

Em condições de alagamento, as quantidades do N-orgânico derivado da uréia, para os dois solos, mostraram a mesma tendência observada à capacidade de campo. Também, para o N-NH_4^+ derivado da uréia os valores observados nos dois solos indicaram uma tendência de diminuição, com o tempo, semelhante à apresentada pelo valores obtidos à capacidade de campo, porém um pouco mais acentuada. Os valores obtidos para o N-NO_3^- derivado do fertilizante, na condição de alagamento, nos dois solos mostraram, de modo geral, tendência de diminuição com o tempo semelhante à observada à capacidade de campo, a qual foi bem mais acentuada principalmente no solo Aluvial.

Em relação aos valores indicados para o nitrogênio nativo no solo, na condição de alagamento, verificou-se que as quantidades de N-orgânico diminuíram com

o tempo, particularmente no solo Glei pouco húmico, em relação à capacidade de campo. Os valores para $N-NH_4^+$ mostraram-se equivalentes (Glei pouco húmico) ou aumentados (Aluvial) e, para $N-NO_3^-$, diminuídos nos dois solos em relação aos observados no mesmo tratamento à capacidade de campo.

Essas quantidades de $N-NH_4^+$, quando comparadas aos valores de $N-NH_4^+$ nativo, indicados no tratamento controle em alagamento mostraram-se, de modo geral, mais elevadas (no solo Aluvial), ou levemente menores (no Glei pouco húmico). Os níveis de $N-NO_3^-$ não marcado apresentaram-se um pouco diferentes aos dois solos (levemente mais baixo no Aluvial e mais elevado no Glei pouco húmico) em relação aos valores de $N-NO_3^-$ nativo observados para o tratamento controle.

Através dos resultados informados no tratamento matéria orgânica verificou-se que, de modo geral, as quantidades do nitrogênio nos solos derivado da palha de milho, no primeiro dia de incubação à capacidade de campo, foram mais ou menos idênticas às quantidades adicionadas no início da incubação, em sua quase totalidade, não se modificando no período observado. Os níveis de $N-NH_4^+$ e $N-NO_3^-$ foram, de modo geral, bastante baixos, variando muito em cada tempo indicado; apesar dessas variações os valores para

-
 N-NO₃ mostraram-se com tendência à diminuição, no decorrer do tempo de incubação. Os valores observados para o N-orgânico nativo no solo, para o mesmo tratamento e à capacidade de campo foram semelhantes aos indicados para o tratamento controle nos dois solos, durante o período em estudo. As quantidades do N-NH₄⁺ derivado do solo, apresentaram-se mais baixas do que as informadas para o controle, nos dois solos. Os valores para N-NO₃ não marcado, no solo Gleí pouco húmico também não se revelaram muito diferentes dos observados para o tratamento controle apresentando-se, no geral dos casos, um pouco mais baixos para o solo Aluvial.

Na condição de alagamento imposta, no tempo de incubação em estudo, observou-se a diminuição das quantidades de N-orgânico derivado da palha de milho adicionada aos solos, em relação aos dados obtidos à capacidade de campo. As quantidades do N-NH₄⁺ derivado da matéria orgânica (palha de milho) mostraram-se mais elevadas, com o decorrer do tempo, também, em relação à capacidade de campo. Ainda, os níveis de nitrato, ou foram semelhantes aos obtidos à capacidade de campo (Gleí pouco húmico) ou se apresentaram um pouco diminuídos (Aluvial) em relação àqueles.

Para o N nativo no solo em alagamento,

observou-se que as quantidades de N-orgânico permaneceram semelhantes, de certa forma, às informadas para capacidade de campo, nos dois solos em estudo e, também, parecidas às informadas para a condição de alagamento, no tratamento controle. Os níveis de N-NH^+ nativo mostraram-se mais elevados do que os observados à capacidade de campo, porém mais baixos do que para o tratamento controle. Os valores para N-NO_3^- não marcado (ou nativo) mostraram algumas pequenas variações no decorrer do tempo de incubação mas, em geral, apresentaram tendência de diminuição com o tempo, similar à informada através dos valores de N-NO_3^- no controle.

As quantidades de nitrogênio derivado da uréia no tratamento que inclui a adição simultânea deste fertilizante e da palha de milho (tratamento completo), indicaram que, no primeiro dia de incubação, como foi observado para o tratamento uréia, separadamente, à capacidade de campo, a maior parte da uréia (92 - 97%) estava participando da fração N-orgânico dos solos. Entretanto aos 6 dias de incubação as quantidades de nitrogênio mostraram-se mais elevadas no tratamento completo do que no tratamento com uréia, correspondendo a 45 e 57% do nitrogênio inicialmente adicionado, respectivamente para o solo Aluvial e para o Glei pouco húmico. Tais valores permaneceram mais ou menos equivalentes entre si no solo Aluvial aumentando, com o decorrer do tempo de incubação, no

solo Gleí pouco húmico. As quantidades do nitrogênio nos solos derivado da uréia, na fração $N-NH^+$, mostraram-se aumentadas aos 6 dias, em relação ao primeiro dia de incubação. Entretanto, esses valores foram mais baixos do que os informados nos solos, para o tratamento uréia, mostrando ainda, a tendência de diminuição nas quantidades de $N-NH^+$ com o aumento no tempo de incubação. Para a fração $N-NO^-$ observou-se que os valores indicados para o primeiro dia de incubação foram mais elevados nos solos, do que os respectivamente informados para o tratamento com uréia; tais valores diminuíram aos 6 dias, apresentando-se daí por diante mais ou menos no mesmo nível, de modo geral mais baixos do que os observados para o tratamento uréia.

As quantidades do N-orgânico não marcado no solo apresentaram-se à capacidade de campo, em geral, mais elevadas do que os valores correspondentemente registrados para o tratamento controle, não variando no decurso do tempo de incubação em observação. Em ambos os solos, no geral, os teores de $N-NH^+$ nativo no solo apresentaram-se elevados com o tempo, em relação ao tratamento controle. Os teores de $N-NO^-$ apresentaram-se variados, nos vários tempos observados, em alguns casos relativamente mais baixos no solo Gleí pouco húmico ou, mais elevados, no solo Aluvial em relação aos valores informados no controle.

A incubação dos solos em condições de alagamento, revelou quantidades do N-orgânico derivado da uréia mais baixas do que a capacidade de campo no solo Glei pouco húmico em todos os tempos de incubação e no solo Aluvial, aos 6 e aos 11 dias, em relação aos valores informados a capacidade de campo, mostrando uma leve tendência ao aumento, no final do tempo de incubação. As quantidades de N-NH_4^+ apresentaram tendência idêntica em relação aos valores informados a capacidade de campo, para o solo Aluvial, apresentando-se no solo Glei pouco húmico elevados, também em relação aos apresentados a capacidade de campo, com tendência a diminuição com o decorrer do tempo de incubação. Em ambos os solos as quantidades do N-NO_3^- derivado da uréia foram diminuídas no tempo, de modo geral mais baixas que aquelas informadas a capacidade de campo.

Em relação ao N nativo (N-não marcado) no solo observou-se que os valores para N-orgânico permaneceram mais ou menos dentro da faixa indicada pelos dados obtidos a capacidade de campo. Os valores de N-NH_4^+ revelaram, também, tendência idêntica aquela informada pelos dados a capacidade de campo, porém mostraram-se mais elevados que aqueles, no solo Aluvial e menores, no solo Glei pouco húmico. Tendências semelhantes a essas foram, também, informadas através dos dados de NH_4^+ , em relação ao

tratamento controle. Ainda, as quantidades de N-NO³ não marcado seguiram tendências semelhantes àquelas dos valores informados para essa fração de nitrogênio, a capacidade de campo; também, de modo geral, os valores foram diminuídos, com o decorrer do tempo de incubação, de maneira similar àquela revelada pelo tratamento controle.

Os resultados informados, de certo modo, concordam com observações gerais da literatura, de acordo com BROADBENT e TUSNEEN (1971), PILOT e PATRICK (1972), REDDY e PRASAD (1975), VENTURA E YOSHIDA (1977), YONEYAMA e YOSHIDA (1977a), NELSON (1982), PATRICK (1982), PERUCCI et alii (1982), COLAÇO (1984), HAUCK (1986), COLAÇO E VICTÓRIA (1988).

As tendências gerais observadas e as inferências delas determinadas, orientam as seguintes considerações:

- a mineralização ocorreu, a partir das fontes nativas no solo e das fontes adicionadas, à capacidade de campo e em alagamento;

- o processo de mineralização foi lento refletindo uma certa resistência das fontes nativas e da adicionada como matéria orgânica ao processo de decomposição;

- o curto espaço de tempo, na incubação, e o provável erro analítico envolvido na determinação do N-orgânico no solo (normalmente superior a 2%), podem ter contribuído em não evidenciar as transformações do N-orgânico;

- os níveis de N-orgânico e, em particular, os valores totais de N-orgânico inicialmente observados refletem, principalmente as influências dos solos e tratamentos empregados; as quantidades de ¹⁵N-orgânico foram influenciadas pelo tempo;

- o N-urêia foi inicialmente incluído na fração N-orgânico; a hidrólise da urêia ocorreu nos 6 primeiros dias de incubação. Observou-se, a partir desta fonte, que a mineralização e, particularmente, a amonificação foram efetivas nos dois regimes de água estudados; parte do N-urêia a partir deste dia foi imobilizada a N-orgânico e parte sofreu nitrificação;

- a adição de matéria orgânica (palha de milho) ao solo favoreceu a imobilização do nitrogênio das fontes nativas e adicionadas;

- a adição conjunta de palha de milho e urêia indicou aumento na imobilização do N-urêia a N-orgânico, diminuindo a amonificação a partir desta fonte. Parte do N da palha foi incorporado ou retido na fração N-orgânico não

marcada, no solo;

- a acumulação de N-NH_4^+ e a diminuição, em alguns casos do N-NO_3^- foram observadas a capacidade de campo;

- na condição de alagamento observou-se diminuição dos níveis de N-orgânico, elevação dos níveis de N-NH_4^+ acumulado e decréscimo dos níveis de N-NO_3^- em relação à capacidade de campo, tanto para as fontes nativas como para as adicionadas. As quantidades de N-NH_4^+ e de N-NH_4^{15} foram mais influenciadas pelos tratamentos e pelo tempo de incubação do que pelos tipos de solos e níveis de água; as quantidades de N-NO_3^- , particularmente pelos tratamentos e pelos níveis de água e, as de N-NO_3^{15} pelos tipos de solo, tratamentos e níveis de água;

- as quantidades de N-orgânico, N-NH_4^+ e N-NO_3^- provenientes das fontes nativas e das adicionadas, nas várias determinações referentes ao tempo de incubação, indicam possíveis perdas do N do solo como N_2O , por nitrificação - à capacidade de campo - e, principalmente, por denitrificação - na condição de alagamento. A ocorrência da volatilização de amônia apesar de não ter sido evidenciada, não deve ser desprezada, embora o processo não pareça ter sido importante nas condições em que o estudo se realizou.

4.2. Transformações do nitrogênio no sistema solo-arroz

4.2.1. Produção de matéria seca

Os resultados de produção de matéria seca obtidos para as diferentes partes da planta de arroz e para a planta inteira, em duas épocas de desenvolvimento da cultura e em tratamentos sem e com adição de N-uréia, encontram-se na Tabela 8, (página 197) elaborada a partir dos dados que constam nos Apêndices (páginas 361-362). Vale lembrar que os dados indicados para quarenta dias após o transplante do arroz (40 DAT) referem-se a 20 plantas coletadas e, que, os dados para cem dias após o transplante (100 DAT) referem-se as 15 plantas restantes, das 35 plântulas de arroz inicialmente transplantadas para os latões. Também, vale lembrar que todos os tratamentos incluíram a adição de matéria orgânica (palha de milho incorporada ao solo) e a calagem do solo. Ainda, vale ressaltar que, embora o presente experimento tenha incluído quatro tratamentos (página 107), somente três deles U-0, U-50 e U-100 (uréia em doses equivalentes, respectivamente, a 0, 50 e 100 kgN⁻¹.ha⁻¹), estão considerados na Tabela 8, obviamente porque o quarto tratamento realizado (Controle) não incluiu plantas de arroz, cultivar IAC-4440.

Através dos dados da Tabela 8, de modo geral,

verifica-se que houve um aumento de produção de matéria seca - o que se traduz em um aumento de peso nas partes da planta consideradas e na planta inteira - em função da idade da planta, sendo esse aumento acentuado nos tratamentos que receberam uréia (U-50 e U-100). A estatística F acusou diferenças significativas ($\alpha = 0,01$) para tratamentos, para épocas e para a interação tratamentos versus épocas na planta inteira. Para raiz e colmo + folha, a interação tratamentos x épocas foi significativa para $\alpha = 0,05$.

Analisando-se os dados apresentados (Tabela 8) observa-se que, na primeira amostragem realizada, isto é, aos 40-DAT, o tratamento sem adição de uréia (U-0) mostrou valores de produção de matéria seca para raiz, colmo e folhas e planta inteira, respectivamente iguais a 0,25, 0,87 e 1,12 g.pl⁻¹. Nos tratamentos com uréia foram verificados incrementos de produção de matéria seca que variaram, para as partes da planta consideradas, respectivamente, em torno de 28, 6 e 10% (U-50) e 40, 16 e 22% (U-100), em relação ao tratamento sem adição de uréia. Entretanto, apesar desses incrementos, a análise estatística indicou que não houve diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre os tratamentos estudados, na produção de matéria seca nos diferentes órgãos da planta e na planta inteira, nessa época de desenvolvimento da cultura. Isto quer dizer que, efetivamente, a aplicação de uréia por ocasião do

transplante das plântulas com posterior alagamento do solo, não afetou a produção de matéria seca, nesse período de desenvolvimento da cultura. É possível que esses resultados reflitam, até certo ponto, uma certa atuação do sistema radicular ainda pouco desenvolvido, nessa época considerada. Aliado a isto, possíveis efeitos ocasionados pelas condições experimentais impostas, que incluíram o transplante das plântulas, o alagamento imediato do solo e principalmente a incorporação de palha de milho ao solo, poderiam ser contributivos ao fato. Tais inferências, entretanto, só poderão ser confirmadas através da análise de outros parâmetros avaliados, os quais serão considerados posteriormente.

Aos 100-DAT, de modo geral, os dados obtidos para matéria seca produzida nas diferentes partes da planta e na planta inteira de arroz apresentaram-se significativamente diferentes entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, na ausência e na presença de uréia. Para os tratamentos incluindo adição de uréia (U-50, U-100) não se evidenciaram variações estatisticamente significativas entre os valores médios de matéria seca das panículas nessa época de amostragem das plantas. A análise estatística, entretanto, mostrou diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre os valores médios de produção de matéria seca de raiz, colmo + folha e planta inteira. Os resultados apresentados

na Tabela 8 indicam aumentos de produção de matéria seca para raiz, colmo + folha e panícula, respectivamente, da ordem de 16, 13 e 37% no tratamento com dose de uréia aplicada, mais baixa (U-50) e de 28, 27 e 54% no tratamento com dose mais alta (U-100), em relação aos dados indicados para as mesmas partes da planta, no tratamento sem uréia. Para a planta inteira, observa-se que os tratamentos considerados revelaram aumentos em torno de 17% (U-50) e de 31% (U-100), quando comparados ao tratamento U-0. A duplicação da dose de uréia (tratamento U-100) mostrou aumentos significativos ($\alpha = 0,05$) na produção de matéria seca de raiz, colmo + folha, panícula e planta inteira, respectivamente da ordem de 10, 12, 12 e 12% em relação aos valores encontrados no tratamento com dose menor (U-50), nessa época de desenvolvimento da cultura.

Considerando os dados de matéria seca produzida na raiz, no colmo e folha e na planta inteira, para as duas épocas de coleta estabelecidas, observa-se que os valores indicados para 100-DAT, no tratamento sem uréia (Tabela 8) apresentaram-se significativamente diferentes dos informados para 40-DAT. Também, para os tratamentos com adição de uréia, a produção de matéria seca de raiz, colmo + folha e planta inteira diferiu significativamente dos valores registrados para 40-DAT. Essas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) nos tratamentos sem e com adição

de uréia representaram, em geral, aumentos nos valores médios de matéria seca produzida, que variaram entre 9 e 12 vezes os valores respectivamente encontrados na primeira época de coleta das plantas, para as partes consideradas e para a planta inteira de arroz. Vale ressaltar, ainda, que os valores encontrados para produção de matéria seca nas partes da planta e na planta inteira, no tratamento sem adição de uréia, representaram 80-90% (40 DAT) e 75-85% (100-DAT) da matéria seca produzida nos tratamentos que incluíram adição de uréia (U-50 e U-100, respectivamente) mostrando até certo ponto, a efetividade das fontes de nitrogênio nativas e da adicionada como matéria orgânica (palha de milho), no desenvolvimento da variedade de arroz estudada. Tendo em vista as inferências admitidas para os 40 DAT, pode-se considerar que, os dados obtidos aos 100 DAT, demonstraram uma certa intensificação na produção de matéria seca no período entre a primeira e a segunda épocas de amostragem, provavelmente refletindo a recuperação da cultura ou melhor ainda, o comportamento da variedade, na transcorrência do seu desenvolvimento.

A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito linear para os níveis equidistantes de tratamento (U-0, U-50, U-100), na produção de matéria seca nas diversas partes da planta e na planta inteira. As equações de regressão polinomial obtidas, estão apresentadas

Tabela 8 - Matéria seca produzida no arroz, (cultivar IAC-4440), em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

MATERIA SECA							
Tratamentos	Raiz		Colmo e Folha		Panicula	Planta Inteira	
	(1)						
	40 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT

-1							
-----g.pl-----							
(2)	(3)						
U-0	0,25Ba	2,68Ac	0,87Ba	7,79Ac	1,89b	1,12Ba	12,35Ac
U-50	0,32Ba	3,11Ab	0,92Ba	8,83Ab	2,59a	1,24Ba	14,53Ab
U-100	0,36Ba	3,43Aa	1,01Ba	9,91Aa	2,91a	1,37Ba	16,25Aa

F Tratamentos (T)	19,98		10,90		37,53	21,33	
Epoças (E)	2012,40		1721,55			2537,41	
Trat x Epo (T x E)	9,04		9,08			16,41	
CV (%)							
Parcelas	4,99		6,05		6,00	4,98	
Subparcelas	7,73		8,27			7,08	
Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)							
T (E)	0,28		0,91		0,37	1,22	
E (T)	0,26		0,81			1,10	

(1) Dias após transplante

(2) Tratamentos incluem adição de palha de milho

(3) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, para cada parte da planta e para a planta inteira diferem entre si, ao nível de significância $p/ \alpha = 0,05$.

x significativa para $\alpha = 0,05$

xx significativa para $\alpha = 0,01$

na Tabela 9. Embora os dados obtidos representem somente duas épocas de desenvolvimento da cultura, pode-se aceitar que os resultados de produção de matéria seca para a variedade estudada concordam, no geral, com informações obtidas da literatura nacional e estrangeira para diversas variedades de arroz, inclusive as de sequeiro (YOSHIDA, 1981; FONSECA et alii, 1983; MALAVOLTA e FORNASIERI FILHO, 1983; SAH e MIKKELSEN, 1983a, 1983b; ZIA e WARING, 1987).

4.2.2. Nitrogênio na planta

4.2.2.1. Teor e quantidade de nitrogênio total na planta

As porcentagens e as quantidades de nitrogênio total absorvidas nas partes da planta e na planta inteira de arroz, em duas épocas de amostragem e em função dos tratamentos nos quais o transplante das plântulas de arroz foi realizado, na ausência ou presença de uréia, estão indicados nas Tabelas 10 e 12 obtidas dos dados apresentados nos Apêndices (páginas 363-364). Através da Tabela 10 observa-se, no geral dos dados, a tendência dos teores de nitrogênio total a diminuírem, com o desenvolvimento da planta, a partir dos 40 DAT, sendo tais teores aumentados com o aumento das doses de uréia administradas. A estatística F acusou diferenças significativas ao nível de

Tabela 9 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de N-urêia para matéria seca acumulada no cultivar IAC-4440⁽¹⁾

Parâmetro considerado	Epoca (2) (DAT)	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação r^2
Raiz	100	$Y = 2,6967 + 0,0075 X$	59,96	0,9916
Colmo + Folha	100	$Y = 7,7828 + 0,0213 X$	38,59	0,9999
Panicula	100	$Y = 1,9511 + 0,0102 X$	71,62	0,9543
Planta Inteira	100	$Y = 12,4305 + 0,0389 X$	75,17	0,9953

(1) - Significativas $p/\alpha < 0,05$

(2) - Dias após transplante

1% para tratamentos, para épocas referentes a colmo + folha e planta inteira e para a interação tratamentos versus épocas.

Os teores de nitrogênio total nas partes da planta e na planta inteira, aos 40 DAT, não se mostraram significativamente diferentes ($\alpha = 0,05$) entre si, nos tratamentos sem e com adição de uréia. As porcentagens de nitrogênio total encontradas para colmo e folha foram, na maioria dos casos mais elevadas do que as obtidas para raiz.

Para 100 DAT, verifica-se que as porcentagens de nitrogênio total, nas diferentes partes da planta, apresentaram-se mais aproximadas, dentro de um mesmo tratamento. Nos tratamentos com adição de uréia (U-50, U-100) os teores de nitrogênio total nas diferentes partes da planta e na planta inteira mostraram-se mais elevados que os encontrados no tratamento sem uréia. Os mais elevados teores foram observados para o tratamento correspondente a aplicação da uréia em dose mais elevada (U-100). De modo geral, com exceção das porcentagens indicadas para panícula, nos dois tratamentos com adição de uréia, os teores de nitrogênio obtidos aos 100 DAT, para as partes da planta e para a planta inteira, nos tratamentos efetuados, diferiram significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. Comparando-se os resultados apresentados para 40 DAT e 100 DAT, observa-se que os teores de nitrogênio total para

colmo + folha e planta inteira apresentaram-se mais baixos, aos 100 DAT, do que aos 40 DAT, não sendo verificada a mesma tendência para as porcentagens de nitrogênio na raiz. A exceção dos valores encontrados para raiz nos tratamentos U-0 e U-50, a análise estatística indica que houve variações significativas entre os teores médios de nitrogênio total para raiz, colmo + folha e planta inteira, nas duas épocas de coleta consideradas. Observou-se também, que houve efeito linear para os níveis equidistantes de tratamento (U-0, U-50, U-100), nos teores de nitrogênio total nas diversas partes da planta e na planta inteira de arroz, através da análise de regressão polinomial. As equações de regressão polinomial obtidas, estão apresentadas na Tabela 11.

E interessante observar que a tendência apresentada pelos dados de produção de matéria seca é diferente da observada para teor de N total (expressados em porcentagem) para as duas épocas consideradas. Isto reflete o fato de que, provavelmente, a medida que a planta se desenvolveu a produção de matéria seca aumentou. Entretanto, este aumento não foi acompanhado com a mesma intensidade pelos teores de N total acumulados nas diversas partes da planta e na planta inteira do arroz. Esse comportamento é esperado e, até certo ponto, parece concordar com informações gerais tiradas da literatura (YOSHINAKI, 1971; FONSECA et alii, 1983; YOSHIDA, 1981; MALAVOLTA e FORNASIERI

Tabela 10 - Teor de nitrogênio total no arroz, (cultivar IAC-4440), em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

TEOR DE NITROGENIO TOTAL							
Tratamentos	R a i z (1)		Colmo e Folha		Panicula	Planta	Inteira
	40 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT
-----x-----							
(2)	(3)						
U-0	2,03Aa	1,80Ac	3,06Aa	1,60Bc	7,70b	2,83Aa	1,70Bc
U-50	1,97Aa	2,10Ab	3,10Aa	2,20Bb	2,03a	2,83Aa	2,13Bb
U-100	1,93Ba	2,43Aa	3,27Aa	2,47Ba	2,20a	2,93Aa	2,40Ba

F	xx		xx		xx	xx	
Tratamentos (T)	16,08		55,50		13,46	24,05	
			xx			xx	
Epocas (E)	4,50		564,06			252,05	
Trat x Epo (TxEx)	11,34xx		21,81xx			12,95xx	
CV (x)							
Parcelas	2,82		2,38		6,08	2,86	
Subparcelas	6,52		3,60			4,26	
Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)							
T (E)	0,29		0,20		0,30	0,23	
E (T)	0,27		0,19			0,21	

(1) Dias após transplante

(2) Tratamentos incluem adição de palha de milho

(3) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, para cada parte da planta e para a planta inteira diferem entre si, ao nível de significância $p/\alpha = 0,05$.

x significativa para $\alpha = 0,05$

xx significativa para $\alpha = 0,01$

Tabela 11 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de N-urêia para teores de N-
(1)
total no cultivar IAC-4440

Parâmetro considerado	Epoca (2) (DAT)	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação r ²
Raiz	100	$Y = 1,7944 + 0,0063 X$	90,25	0,9991
Colmo + Folha	40	$Y = 3,0444 + 0,0020 X$	7,71	0,8710
	100	$Y = 1,6556 + 0,0086 X$	144,86	0,9530
Panicula	100	$Y = 1,7278 + 0,0050 X$	25,96	0,9643
Planta Inteira	100	$Y = 1,7278 + 0,0069 X$	73,49	0,9815

(1) Significativas p/ $\alpha < 0,05$

(2) Dias após transplante

FILHO, 1983; EMBRAPA, 1985; MULLER et alii, 1984; BARBOSA FILHO, 1987; FERRAZ, 1987), ressalvado o fato de que no presente caso, apenas duas épocas de desenvolvimento da variedade estudada, foram observadas. Os teores obtidos, portanto, retratam o comportamento do cultivar estudado (IAC-4440, moderno, altamente produtivo), quanto à elevação e à acumulação do N na planta, nas condições empregadas no presente experimento. A comparação dos valores encontrados com outros dados informados da literatura, entretanto, torna-se difícil quando são considerados cultivar utilizado, épocas de coletas, partes da planta consideradas, propriedades e características do solo, condições ambientais e condições inerentes à execução do experimento. Esses atributos fazem variar as necessidades quantitativas (extração) de macronutrientes pelo arroz (DeDATTA et alii, 1968a; MURAYAMA, 1979; FONSECA et alii, 1983; MULLER et alii, 1984) embora para efeito de comparação, seja considerada a informação geral de que a matéria seca do arroz contém de 2 a 4% de nitrogênio (MURAYAMA, 1979; BARBOSA FILHO, 1987). Deste modo, aceita-se os teores de N total, encontrados no presente estudo, como possíveis com os níveis adequados, normalmente informados para a cultura do arroz (MURAYAMA, 1979; FONSECA et alii, 1983; MULLER et alii, 1984; BARBOSA FILHO, 1987).

A quantidade do nitrogênio total absorvido

pela planta como um todo, ou por cada uma das partes consideradas é função, de acordo com a equação 4 (página 113) do teor de nitrogênio total contido e do seu rendimento de matéria seca. Isto representa dizer que, desde que um desses fatores permaneça constante, o aumento no outro implicará num aumento da quantidade do N absorvido pela planta. Através dos dados obtidos para matéria seca, observa-se um aumento na sua produção, para as diferentes partes da planta e para a planta inteira, no decorrer do desenvolvimento do arroz. Entretanto, os teores de nitrogênio total informaram, no geral, uma tendência a diminuição, no período estudado. Apesar disso, observa-se que a quantidade de N total nas diferentes partes da planta e na planta inteira (Tabela 12) apresentou-se aumentada, tanto em função da idade da planta como em função das doses de N-uréia administradas. A estatística F indicou diferenças significativas para $\alpha = 0,01$, para tratamentos, épocas e na interação tratamentos versus épocas. Através da análise de regressão polinomial observou-se que houve efeito linear para níveis equidistantes de tratamento (U-0, U-50, U-100), na quantidade de nitrogênio total nas diversas partes da planta e na planta inteira do arroz, estando as equações polinomiais obtidas, apresentadas na Tabela 13.

As quantidades de N total presentes nas diferentes partes da planta e na planta inteira do arroz, variedade IAC-4440 (Tabela 12), aos 40 DAT, para o tratamento sem adição de uréia (U-0) foram 100, 536 e 636 mg.vaso⁻¹ para raiz, colmo e folha e planta inteira, respectivamente.

Os resultados obtidos nos tratamentos com adição de uréia (U-50, U-100) mostraram-se levemente aumentados em relação ao tratamento anteriormente considerado, porém não diferiram significativamente entre si, ao nível de 5% pelo teste de Tukey. Também, não foram significativamente diferentes ($\alpha = 0,05$) as quantidades de nitrogênio total encontradas para as partes da planta (raiz, colmo + folha) e para a planta inteira de arroz, em cada um dos tratamentos empregados. De qualquer modo, vale observar que, nessa fase de desenvolvimento da cultura 82 - 87% do nitrogênio total da planta, estava no colmo + folhas, na ausência ou na presença de uréia, na condição de alagamento imposta.

Aos 100 DAT, para o tratamento sem uréia (U-0), as quantidades médias de nitrogênio total acumuladas pela raiz, colmo + folha, panícula e planta inteira foram, nesta ordem, 719, 1862, 481 e 3063 mg.vaso⁻¹ (Tabela 12). Os valores indicados para raiz, colmo + folha e planta inteira

mostraram-se significativamente diferentes ($\alpha = 0,05$) dos obtidos aos 40 DAT apresentando-se 7, 3 e 5 vezes superiores aos respectivamente indicados para a primeira época de coleta. Os resultados obtidos nos tratamentos com adição de uréia (U-50, U-100) para raiz, colmo + folha e planta inteira, revelaram-se significativamente diferentes, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, daqueles correspondentemente obtidos aos 40 DAT, indicando aumentos na quantidade do N total absorvido que, de modo geral, aos 100 DAT, variaram na faixa de 5 a 9 vezes as quantidades determinadas na primeira época de coleta das plantas (40 DAT). Também, aos 100 DAT, os tratamentos com adição de uréia mostraram resultados significativamente diferentes dos encontrados no tratamento sem uréia. Para o tratamento U-50, os valores indicados na Tabela 12 representaram, em relação ao tratamento U-0, aumentos de 36, 56, 39 e 53%, respectivamente para raiz, colmo + folha, panícula e planta inteira. A duplicação da dose de uréia aplicada (tratamento U-100) mostrou aumentos nas quantidades de N total absorvidas na raiz, colmo + folha, panícula e planta inteira, da ordem de 74, 97, 99 e 92%, respectivamente, em relação ao tratamento U-0 e, também, aumentos de 28, 26, 21 e 25%, respectivamente, quando tais quantidades foram comparadas aquelas obtidas no tratamento U-50. É interessante observar ainda, que, cerca de 62% do N-total da planta inteira, aos 100 DAT, estava presente no colmo + folha, nos três tratamentos efetuados e,

que, aproximadamente 17% do N-total, da planta inteira, estava fazendo parte da panícula, nessa fase de desenvolvimento da cultura.

Os resultados obtidos demonstram a importância das fontes de nitrogênio e a provável contribuição, a partir das mesmas (N-nativo + N-palha de milho no tratamento U-0; N-nativo + N-palha de milho + N-urêia nos tratamentos U-50 e U-100), para o desenvolvimento do arroz. Observa-se, mais uma vez, como foi informado para outros parâmetros já discutidos, a superioridade da aplicação da urêia em relação ao tratamento sem este fertilizante, indicada pelos aumentos na quantidade do N-total absorvido nas diferentes partes da planta e na planta inteira, particularmente na segunda época de coleta realizada. O aumento na absorção do N-fertilizante no arroz, com o aumento do nitrogênio aplicado, tem sido informado por outros autores (BROADBENT e REYES, 1971; YOSHIDA e PADRE, 1977).

Tabela 12 - Quantidade de nitrogênio total no arroz (cultivar IAC-4440), em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

QUANTIDADE DE NITROGENIO TOTAL							
Tratamentos	R a i z (1)		Colmo e Folha		Panicula	Planta	Inteira
	40 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT
mg. Vaso							
(2)	(3)						
U-0	100Ba	719Ac	536Ba	1862Ac	481c	636Ba	3063Ac
U-50	126Ba	980Ab	570Ba	2910Ab	789b	696Ba	4688Ab
U-100	139Ba	1251Aa	658Ba	3665Aa	958a	797Ba	5875Aa
F Tratamentos (T)	xx		xx		xx	xx	
	160,55		158,85		77,95	358,56	
Epocas (E)	3339,24xx		3040,40xx			7281,40xx	
Trat x Epo (Tx E)	91,09xx		146,77xx			293,66xx	
CV (%)							
Parcelas	3,53		3,90		6,39	2,60	
Subparcelas	5,73		5,03			3,63	
Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)							
T (E)	65,44		198,01		118,95	211,40	
E (T)	63,21		170,96			190,32	

(1) Dias após transplante

(2) Tratamentos incluem adição de palha de milho

(3) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, para cada parte da planta e para a planta inteira diferem entre si, ao nível de significância $p/ \alpha = 0,05$.

x significativa para $\alpha = 0,05$

xx significativa para $\alpha = 0,01$

Tabela 13 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de N-urêia para quantidade de N total no cultivar IAC-4440 (1)

Parâmetro considerado	Epoca (2) (DAT)	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação 2 r
Raiz	100	$Y = 717,83 + 5,32 X$	558,06	0,9999
Colmo + Folha	100	$Y = 1910,89 + 18,03 X$	554,54	0,9913
Panicula	100	$Y = 504,11 + 4,77 X$	151,64	0,9627
Planta Inteira	100	$Y = 3135,83 + 28,12 X$	1275,75	0,9919

(1) - Significativas p/ $\alpha < 0,05$

(2) - Dias após transplante

4.2.2.2. Nitrogênio derivado do fertilizante

4.2.2.2.1. Porcentagem de nitrogênio na planta derivado do fertilizante

As porcentagens de nitrogênio total na planta derivado do fertilizante (PNPDF), para as diversas partes da planta consideradas e para a planta inteira do arroz, em duas épocas de coleta das plantas, de acordo com os tratamentos estudados, acham-se na Tabela 14 obtida dos resultados que constam nos Apêndices (páginas 365-368). Os resultados obtidos foram calculados pela equação 5 (página 114).

Os resultados apresentados para o tratamento U-0 referem-se as porcentagens (Tabela 14) do nitrogênio na planta derivado da matéria orgânica, ou seja, da palha de milho marcada com ¹⁵N, enquanto que aqueles para os tratamentos U-50 e U-100 referem-se ao nitrogênio na planta derivado da uréia- ¹⁵N aplicada nas doses equivalentes a 50 e 100 kg.ha⁻¹ (página 107); isto quer dizer que fertilizante é empregado aqui, indistintamente, como matéria orgânica ou uréia estando a diferença, em ambos os casos, implícita nos tratamentos especificados. A exceção do efeito de época, para planta inteira, a estatística F acusou diferenças significativas ao nível de 1% para tratamentos, épocas e

para a interação tratamentos versus épocas.

Analisando os dados da Tabela 14 observa-se, para 40 DAT, que as porcentagens médias de nitrogênio derivado do fertilizante nos três tratamentos empregados, para as partes da planta e para a planta inteira, diferiram significativamente entre si ($\alpha = 0,05$), sendo mais elevadas para os tratamentos com adição de urêia correspondendo, as maiores porcentagens, ao tratamento com dose mais elevada de urêia aplicada. Também, para 100 DAT, as PNPDF foram significativamente diferentes entre si ($\alpha = 0,05$) nos tratamentos empregados, para as diferentes partes da planta e para a planta inteira. Nas duas épocas de amostragem e dentro de cada um dos tratamentos considerados, as PNPDF para raiz, colmo e folha e para planta inteira apresentaram-se significativamente diferentes entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. Observa-se, ainda, nas duas épocas estudadas, a tendência geral das PNPDF de se apresentarem mais elevadas para colmo e folha do que para raiz, embora essa tendência tenha sido menos acentuada no tratamento sem urêia. Entre as duas épocas consideradas e para cada um dos tratamentos estudados, verifica-se que as PNPDF diferiram significativamente entre si ($\alpha = 0,05$) apresentando-se, no geral, mais elevadas na segunda época de coleta das plantas, do que na primeira. Isto mostra que, no decorrer do seu desenvolvimento, a planta absorveu proporcionalmente, mais

do nitrogênio da palha de milho do que do nitrogênio do solo (tratamento U-0) e mais do N-fertilizante do que do N do solo + palha de milho (tratamento U-50). Por outro lado, para o tratamento U-100, os valores encontrados no colmo e folha e na planta inteira apresentaram-se diminuídos aos 100 DAT, em relação aos 40 DAT. Esta diminuição pode ter sido causada provavelmente pela ocorrência da redistribuição do N para outras partes da planta ou, também, pela existência de perdas por senescência.

A análise de regressão polinomial indicou que houve efeito linear para os níveis equidistantes de tratamento (U-0, U-50, U-100) no teor de nitrogênio derivado do fertilizante, nas diversas partes da planta e na planta inteira. As equações polinomiais obtidas acham-se na Tabela 15.

A ocorrência de perdas de N por volatilização de amônia tem sido informada por vários autores, através das folhas senescentes de milho (FARQUHAR et alii, 1983), associada a transpiração através das folhas de diferentes culturas (STUTTE e WEILAND, 1978) e, através das folhas de arroz (SILVA e STUTTE, 1980, 1981a, 1981b). De acordo com esses autores, as folhas mais recentemente amadurecidas perdem N em taxas mais elevadas que as folhas mais velhas. Entretanto, as folhas mais velhas supridas, com taxas mais

altas de N, perdem N em taxas mais elevadas do que aquelas desenvolvidas em meio com baixas taxas de nitrogênio; as perdas do N volatilizado em cada planta aumentam com o fornecimento de N (devido, principalmente, à maior área foliar e à maior taxa de perda das folhas mais velhas), variam com o cultivar e o estágio de crescimento e, são influenciadas pela temperatura e pela fonte de N aplicada. Por outro lado, de acordo com VIETS (1965) e RUMBURG e SWEVA (1970), o N pode ser perdido das plantas pela queda natural ou mecânica das folhas e de outras partes da planta. A possibilidade de que a tendência de diminuição observada para o tratamento U-0, além de ser atribuída ao processo de volatilização revele, também, a ocorrência dos mecanismos de perdas sugeridas por VIETS (1965) e RUMBURG e SWEVA (1970), não deve ser descartada.

Retornando aos resultados informados na Tabela 14 vale observar que, provavelmente, as maiores contribuições para o N da planta, foram provenientes das fontes nativas existentes no solo. Tais informações ratificam observações anteriormente feitas por BROADBENT (1979) e PATNAIK e RAO (1979) de que, normalmente, o solo contribui com 50 a 80% do seu N (particularmente da matéria orgânica) para a cultura do arroz em alagamento, mesmo quando ele recebe taxas elevadas de aplicação do N-fertilizante. Adicionalmente a isto e considerando os dados

Tabela 14 - Porcentagem de nitrogênio total no arroz (cultivar IAC-4440), derivado do fertilizante, em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

PORCENTAGEM DO NITROGENIO TOTAL NA PLANTA DERIVADO DO FERTILIZANTE (PNPDF)							
Tratamentos	R a i z		Colmo e Folha		Panicula	Planta	Inteira
	(1)						
	40 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT
-----x-----							
(2)	(3)						
U-0	1,2Bc	3,8Ac	1,5Bc	4,2Ac	3,1c	1,5Bc	3,9Ac
U-50	8,8Bb	11,3Ab	11,4Bb	13,0Ab	12,3b	11,0Bb	12,5Ab
U-100	15,7Ba	17,0Aa	26,0Aa	23,0Ba	20,2a	24,9Aa	21,3Ba

F	**		**		**		**
Tratamentos (T)	12075,65		19960,31		1893,57		46852,17
Épocas (E)	1619,52**		21,12**				1,62
Trat x Epo (Tx E)	63,96**		342,87**				576,24**

CV (%)							
Parcelas	1,13		1,01		2,86		0,65
Subparcelas	1,17		1,52				1,33

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)							
T (E)	0,30		0,43		0,85		0,32
E (T)	0,22		0,40				0,33

(1) Dias após transplante * significativa para $\alpha = 0,05$

(2) Tratamentos incluem adição de palha de milho ** significativa para $\alpha = 0,01$

(3) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, para cada parte da planta e para a planta inteira diferem entre si, ao nível de significância $p/ \alpha = 0,05$.

Tabela 15 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de N-urêia para porcentagem de nitrogênio total derivado do fertilizante (PNUF), no cultivar IAC- 4440⁽¹⁾.

Parâmetro considerado	Epoca (2) (DAT)	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação 2 r
Raiz	40	$Y = 1,289 + 0,145 X$	13262,51	0,9992
	100	$Y = 4,117 + 0,132 X$	10885,46	0,9945
Colmo + Folha	40	$Y = 0,711 + 0,245 X$	25391,99	0,9877
	100	$Y = 3,994 + 0,188 X$	14963,66	0,9986
Panicula	100	$Y = 3,333 + 0,171 X$	3780,92	0,9984
Planta Inteira	40	$Y = 0,778 + 0,234 X$	61600,49	0,9887
	100	$Y = 3,911 + 0,173 X$	33799,99	1,000

(1) - Significativas p/ $\alpha < 0,05$

(2) - Dias após transplante

de PNPDF obtidos, é possível admitir que, as fontes de nitrogênio (palha de milho e uréia) e provavelmente a calagem do solo, tenham influenciado, através do processo de mineralização dessas fontes adicionadas e das fontes nativas, a absorção do N pela planta, como foi observado por ABICHANDANI e PATNAIK (1961), PATNAIK (1965) e PATNAIK e RAO (1979).

4.2.2.2.2. Quantidade de nitrogênio na planta derivado do fertilizante

A quantidade média de nitrogênio total derivado do fertilizante, nas diversas partes da planta e na planta inteira do arroz (QNP⁻¹DF, mg.vaso), para os tratamentos estudados e em duas épocas de amostragem, estão apresentadas na Tabela 16 obtida dos resultados que se acham nos Apêndices (páginas 365-368). Os dados encontrados foram calculados pela equação 6 (página 115) e, no tratamento U-0 referem-se ao nitrogênio na planta derivado da fonte de matéria orgânica incorporada (palha de milho - ¹⁵N).

Através da Tabela 16 observa-se que houve um aumento na quantidade do nitrogênio na planta derivado do fertilizante, de modo geral, em função do desenvolvimento da cultura, sendo esse aumento intensificado nos tratamentos

que incluíram a adição do fertilizante (U-50 e U-100). Verifica-se também que, para tratamentos, épocas e para a interação tratamentos versus épocas, a estatística F acusou diferenças significativas ao nível de 1%.

Analisando os dados obtidos para QNDF, nas diferentes partes da planta e na planta inteira, aos 40 DAT, observa-se que esses valores indicados apresentaram-se significativamente diferentes, entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, revelando aumentos na quantidade de nitrogênio derivado do fertilizante, com o aumento da quantidade de uréia administrada. Nesses tratamentos com uréia as quantidades de N acumuladas nas diversas partes da planta e na planta inteira foram equivalentes a valores que variam em torno de 8 (U-50) e 20 (U-100) vezes aqueles observados para o tratamento sem adição deste fertilizante (U-0). Neste último caso, é informado o fornecimento do N para a planta, a partir da palha de milho incorporada ao solo.

A duplicação da dose de uréia (U-100) mostrou QNDF aproximadamente equivalentes ao dobro das quantidades encontradas para a dose de uréia mais baixa (U-50), nas diversas partes da planta e na planta inteira do arroz, nessa época de desenvolvimento da cultura.

Aos 100 DAT, foram verificadas, também, diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) na quantidade de nitrogênio derivado do fertilizante na raiz, no colmo + folha e na planta inteira, entre os tratamentos estudados, indicando aumentos em torno de 4 (U-50) e 9 (U-100) vezes em relação aos valores observados respectivamente para as partes da planta e para a planta inteira, no tratamento sem adição de uréia. Também para esta época de amostragem os valores observados para o tratamento com dose mais elevada de uréia (U-100) mostrou-se aumentado em relação ao tratamento com dose mais baixa de uréia (U-50) sendo, esses valores, aproximadamente equivalentes ao dobro das quantidades de nitrogênio derivado do fertilizante indicadas para as diferentes partes da planta e para a planta inteira no tratamento U-50. Para as duas épocas de amostragem observou-se um maior acúmulo do nitrogênio derivado do fertilizante no colmo + folha, em relação a quantidade contida na raiz; essa tendência foi informada, também, para os outros parâmetros discutidos anteriormente. A análise estatística revelou que houve diferenças significativas, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, entre as duas épocas de amostragem, para as partes da planta e para a planta inteira, dentro de um mesmo tratamento, observando-se aumento nas quantidades do nitrogênio derivado do fertilizante, nas partes da planta e na planta inteira, em função da idade da planta. Através da análise de regressão

polinomial foi indicado efeito linear para níveis equidistantes de tratamento (U-0, U-50, U-100), na quantidade de nitrogênio na planta derivado do fertilizante, nas diversas partes da planta e na planta inteira do arroz. Na Tabela 17 acham-se as equações polinomiais obtidas.

Os resultados informados reforçam as observações anteriormente feitas, para os vários parâmetros considerados anteriormente, indicando a efetividade da aplicação da uréia. Entretanto, para o tratamento sem a adição desse fertilizante, verifica-se o comportamento da palha de milho incorporada ao solo, o que traduz a importância desta fonte de nitrogênio para o desenvolvimento do arroz em alagamento. Em ambos os casos, isto é, na incorporação da palha e na presença de uréia, a absorção do N ocorreu em todo o período de crescimento da planta, sendo intensificada nos estádios finais do desenvolvimento da cultura. Isto parece confirmar que a mineralização do nitrogênio, das várias fontes nativas e adicionadas, está se processando mostrando também, que, ou está havendo maior disponibilidade de nitrogênio dessas fontes para a planta, ou está havendo uma maior exploração dessas fontes devido ao maior desenvolvimento do sistema radicular, levando a uma maior absorção do nutriente com o decorrer do desenvolvimento da cultura. Informações obtidas da literatura indicam que o processo de absorção do N, compete

com todas as outras transformações do N do solo, sendo o N absorvido mais rapidamente quando a planta tem um sistema radicular bem desenvolvido (TANAKA et alii, 1959; FRIED et alii, 1965; CRASSWELL e VLEK, 1979). Além disso, o crescimento do emaranhado de raízes começa no fim do estágio de perfilhamento tornando o sistema radicular, mais denso e com muitos pelos radiculares, no estágio de emborrachamento; tal emaranhado de raízes deve aumentar a absorção do nitrogênio (ALBERDA, 1954). O aumento da absorção do fertilizante da primeira para a segunda época de amostragem parece indicar a concordância dos resultados obtidos com esses relatos da literatura. Por outro lado, estudos realizados por BROADBENT e REYES, 1971; NAKAYA e ONIKURA, 1974; YONEYAMA e YOSHIDA, 1977a, 1977b; YOSHIDA e PADRE, 1977) em solos alagados, aos quais foram adicionados palha de arroz e sulfato de amônio, indicaram que a adição de palha de arroz, ao solo, imobilizou o N disponível do solo, em formas orgânicas; a quantidade do N disponível foi diminuída nos estádios iniciais do crescimento do arroz, tornando-se mais elevada do que a do solo sem palha, dos estádios intermediários para os estádios finais do desenvolvimento da planta. Nos tratamentos com fertilizante as plantas absorveram mais N do solo que do controle; a palha de arroz parece que retardou o crescimento das plantas, o que não ocorreu quando da aplicação conjunta de palha de arroz e do fertilizante. O aumento da mineralização

do N do solo, na aplicação da palha de milho e a maior absorção do N fertilizante ocorreram devido ao efeito "priming" (promovedor). Levando em conta essas informações e as tendências, então, observadas e, considerando o comportamento geral apresentado pelos dados da Tabela 16, é possível admitir a ocorrência do efeito promovedor ("priming") nos tratamentos estudados. A ocorrência da imobilização, causada pela adição da palha de milho, no presente estudo, embora não possa ser confirmada, não deve ser desprezada.

Observando os dados das Tabelas 16 e 12 é possível aceitar que os efeitos dos tratamentos estudados, sobre a quantidade de N proveniente do fertilizante nas diversas partes da planta e na planta inteira, assemelham-se bastante aos efeitos observados sobre a quantidade total de nitrogênio absorvido, sugerindo que o comportamento das fontes diferentes deve ter sido influenciado por fatores comuns, os quais regularam o acúmulo do nutriente valendo, portanto, neste caso, as mesmas considerações feitas em 4.2.2.1.

É interessante observar, através das quantidades do N total absorvido (Tabela 12) que, se considerarmos o tratamento U-0, o qual representa a contribuição do N do solo + N da palha de milho incorporada,

descontando-se esses valores dos obtidos para os tratamentos sem uréia, a diferença encontrada corresponderá a contribuição do N fertilizante absorvido pela planta (método da diferença). Essas diferenças, por exemplo, para a planta inteira indicam, para 40 e 100 DAT, valores respectivamente da ordem de 9% (U-50) e 20% (U-100) e de 35% (U-50) e 48% (U-100). Esses resultados calculados apresentam-se bem superiores aos informados para a porcentagem de N derivado do fertilizante (Tabela 14). Observações semelhantes, informando que os resultados calculados pelo método da diferença fornecem valores mais altos do que os calculados pelo método isotópico, têm sido apresentadas por PATNAIK, 1965; BROADBENT e REYES, 1971; YOSHIDA e PADRE, 1977. Essas diferenças são atribuídas ao fato de que, provavelmente, no caso do método da diferença o N-fertilizante e o efeito promovedor ("priming") são determinados, enquanto que no método isotópico é determinada a absorção real do fertilizante (YOSHIDA e PADRE, 1977).

Tabela 16 - Quantidade do nitrogênio total no arroz (cultivar IAC-4440), derivado do fertilizante em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

QUANTIDADE DO NITROGENIO TOTAL NA PLANTA DERIVADO DO FERTILIZANTE (QNPDF)							
Tratamentos	R a i z		Colmo e Folha		Panicula	Planta Inteira	
	(1)						
	40 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT

-1							
-----mg.vaso-----							
U-0(2)	1,2Bc(3)	27,3Ac	8,2Bc	78,0Ac	15,0c	9,4Bc	120,3Ac
U-50	11,1Bb	110,7Ab	65,2bb	379,0Ab	96,7b	76,3Bb	588,3Ab
U-100	21,8Ba	212,3Aa	171,3Ba	844,3Aa	193,3a	198,4Ba	1249,6Aa

F	xx		xx		xx	xx	
Tratamentos (T)	929,68		1039,15		1904,20	2211,25	
Epoças (E)	2275,10xx		2655,49xx			8222,24xx	
Trat x Epo (Tx E)	462,53xx		657,18xx			1976,11xx	

CV (%)							
Parcelas	4,56		4,89		3,48	3,26	
Subparcelas	7,32		5,63			3,51	

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)							
T (E)	9,75		35,81		8,88	33,71	
E (T)	9,36		28,96			26,14	

(1) Dias após transplante x significativa para $\alpha = 0,05$

(2) Tratamentos incluem adição de palha de milho xx significativa para $\alpha = 0,01$

(3) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, para cada parte da planta e para a planta inteira diferem entre si, ao nível de significância $p/ \alpha = 0,05$.

Tabela 17 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de N-urêia para quantidade de nitrogênio total, derivado do fertilizante (1)
(QNDF), no cultivar IAC-4440

Parâmetro considerado	Epoca (2) (DAT)	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação 2 r
Raiz	40	$Y = 1,033 + 0,207 X$	37,44	0,9995
	100	$Y = 24,278 + 1,850 X$	3000,24	0,9967
Colmo + Folha	40	$Y = 5,55.10^{-2} + 1,631 X$	125,75	0,9707
	100	$Y = 50,611 + 7,663 X$	2777,17	0,9849
Panicula	100	$Y = 12,500 + 1,783 X$	3799,45	0,9976
Planta Inteira	40	$Y = 1,089 + 1,837 X$	171,07	0,9760
	100	$Y = 87,389 + 11,297 X$	6466,85	0,9899

(1) - Significativas p/ $\alpha < 0,05$

(2) - Dias após transplante

4.2.2.3. Eficiência de utilização do fertilizante

Os resultados que expressam a eficiência de utilização do fertilizante (EUF), para as diferentes partes da planta e para a planta inteira, nas duas épocas de amostragem e de acordo com os tratamentos estudados, estão apresentados na Tabela 18 obtida dos dados que constam no Apêndice (página 368). Os valores informados foram calculados através da equação 7 (página 116). Para o tratamento U-0, os dados referem-se a eficiência de utilização da fonte de matéria orgânica, desde que foi empregada a palha de milho -
15

N, neste tratamento. De acordo com as informações da Tabela 18 a estatística F indicou que houve efeito significativo ao nível de 1% para tratamentos, épocas e para a interação tratamentos versus épocas.

Através dos dados apresentados observa-se que, de modo geral, a absorção do N aos 40 DAT foi pouco eficiente. Os valores obtidos para raiz, apesar de baixos, mostraram-se significativamente diferentes entre si, pelo teste de Tukey para $\alpha = 0,05$, para os tratamentos com e sem uréia não diferindo, entretanto, nos tratamentos que receberam uréia em doses equivalentes a 50 e 100 kg N.ha⁻¹. A eficiência de utilização das fontes administradas para colmo e folha foi mais elevada do que para raiz, nos

tratamentos estudados, aumentando com o aumento das doses de uréia aplicadas; os valores observados diferiram significativamente, entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%. Na planta inteira, os valores de eficiência informados diferiram significativamente ($\alpha = 0,05$), entre si, para os tratamentos empregados, indicando que a eficiência de utilização da uréia foi superior à eficiência de utilização da palha de milho; os valores mais elevados corresponderam ao tratamento com aplicação de uréia em dose mais elevada, cuja eficiência média, foi equivalente a 7,91%.

Para 100 DAT, os valores de eficiência de utilização para raiz e colmo + folha apresentaram um comportamento semelhante ao observado para 40 DAT, ou seja, foram mais elevados para colmo + folha do que para raiz e, para esta parte da planta apresentaram-se significativamente diferentes ($\alpha = 0,05$) nos tratamentos com e sem uréia, não diferindo significativamente, entre si, nos tratamentos com uréia (U-50, U-100). Para colmo e folha, os valores obtidos nos tratamentos efetuados mostraram-se significativamente diferentes entre si ($\alpha = 0,05$), sendo aumentados com o aumento da quantidade de uréia aplicada.

Para as duas épocas estudadas a eficiência de utilização, para a palha de milho e para a uréia nas doses

equivalentes empregadas (U-50, U-100), apresentaram-se significativamente diferentes entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, nas diferentes partes da planta e na planta inteira, alcançando valores de eficiência, aos 100 DAT, na planta inteira, de 13,59, 47,58 e 51,25%, respectivamente para o tratamento com palha de milho (U-0) e para os tratamentos U-50 e U-100. Os tratamentos com uréia apresentaram-se, também, significativamente diferentes entre si ($\alpha = 0,05$), pelo teste de Tukey. A análise de regressão polinomial mostrou que houve efeito linear para níveis equidistantes de tratamentos (U-0, U-50, U-100) na eficiência de utilização do fertilizante. As equações de regressão linear para as diferentes partes da planta e para a planta inteira acham-se na Tabela 19.

Os resultados encontrados mostram que a eficiência de utilização do N, a partir das fontes empregadas (palha de milho e uréia), de modo geral, aumentou com a aplicação de uréia, sendo bastante aumentada, com o desenvolvimento do arroz, da primeira para a segunda época de coleta das plantas. Esse comportamento observado parece confirmar as indicações sugeridas anteriormente, quando da análise dos outros parâmetros estudados, particularmente no que se refere aos efeitos relacionados ao desenvolvimento do sistema radicular e à imobilização pela palha de milho, os quais, provavelmente, ocorreram no período que antecede a

Tabela 18 - Eficiência de utilização do N-fertilizante pelo arroz (cultivar IAC-4440), em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

EFICIENCIA DE UTILIZAÇÃO DO N-FERTILIZANTE (EOF)							
Tratamentos	Raiz		Colmo e Folha		Panicula	Planta	Inteira
	(1)						
	40 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT	100 DAT	40 DAT	100 DAT
-----x-----							
U-0(2)	0,13Bb(3)	3,10Ab	0,90Bc	8,80Ac	1,69b	1,03Bc	13,59Ac
U-50	0,91Ba	9,05Aa	5,33Bb	31,01Ab	7,92a	6,24Bb	47,98Ab
U-100	0,89Ba	8,72Aa	7,02Ba	34,61Aa	7,93a	7,91Ba	51,25Aa

F Tratamentos (T)	xx 455,80		xx 790,61		xx 469,95		xx 1621,03
Epocas	xx 3083,78		xx 5212,99				xx 12300,75
Trat x Epo (Tx E)	xx 216,49		xx 492,96				xx 1161,92
CV (%)							
Parcelas	4,04		3,61		4,92		2,46
Subparcelas	6,35		4,10				2,92
Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)							
T (E)	0,51		1,49		0,72		1,51
E (T)	0,48		1,20				1,24

(1) Dias após transplante

(2) Tratamentos incluem adição de palha de milho (U-0 relativo a N-palha)

(3) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, para cada parte da planta e para a planta inteira diferem entre si, ao nível de significância $p/\alpha = 0,05$.

x significativa para $\alpha = 0,05$

xx significativa para $\alpha = 0,01$

Tabela 19 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de N-uréia para eficiência de utilização do N-fertilizante pelo cultivar IAC-4440⁽¹⁾.

Parâmetro considerado	Epoca (2) (DAT)	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação ² r
Raiz	40	$Y = 0,2617 + 0,0076 X$	18,52	0,7369
	100	$Y = 4,1494 + 0,0562 X$	1002,90	0,7861
Colmo + Folha	40	$Y = 1,3605 + 0,0612 X$	101,04	0,9372
	100	$Y = 11,9011 + 0,2581 X$	1798,52	0,8523
Panicula	100	$Y = 2,7317 + 0,0624 X$	705,30	0,7504
Planta inteira	40	$Y = 1,6222 + 0,0689 X$	128,74	0,9192
	100	$Y = 18,7822 + 0,3766 X$	3857,59	0,8147

(1) - Significativas p/ $\alpha < 0,05$

(2) - Dias após transplante

primeira coleta realizada. Além disso, é possível que os resultados reflitam a concorrência de processos de perdas, que devem ter acontecido, principalmente, na primeira época estudada. O aumento na eficiência de utilização do nitrogênio, evidenciado nos resultados indicados para 100 DAT é mais uma indicação de que dos 40 para os 100 DAT, houve uma maior absorção do nutriente pela planta, provavelmente ocasionada pela intensificação do processo de mineralização, que está ocorrendo nas condições experimentais estudadas.

Diversos autores têm informado que a adição de resíduos vegetais, em solos submersos, são conducentes a imobilização tanto do N do solo como do N do fertilizante aplicado (BROADBENT e NAKASHIMA, 1971; BROADBENT e TUSNEEM, 1971; YOSHIDA e PADRE, 1977). Entretanto, mesmo quando resíduos vegetais e adubos orgânicos compostos não são utilizados, cerca de 30% do N-fertilizante aplicado em cobertura, no plantio, é imobilizado em solos arrozeiros inundados (KAI e WADA, 1979). Uma parte do N imobilizado, porém, é remineralizada e recuperada pelas plantas de arroz (BROADBENT e REYES, 1971; YOSHIDA e PADRE, 1977; KAI e WADA, 1979). Essas informações indicam concordância com as observações realizadas no presente experimento. Por outro lado, é interessante observar aqui, o resumo dos resultados obtidos em projetos de pesquisa sobre arroz, desenvolvidos

sob os auspícios da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1970, 1978), em diversos países cultivadores de arroz, por períodos que variaram em torno de 5 anos. Os estudos em casa de vegetação e em campo revelaram que: a localização do fertilizante em profundidade (5-15 cm), no transplante, ou a aplicação na superfície, duas semanas antes do início do primórdio da panícula, em uma única dose, aumentou a eficiência de utilização do N na maioria dos solos estudados. No campo e em casa de vegetação foi observado que, em solos com valores de pH extremamente baixos, ou altos, a localização em profundidade não teve efeito apreciável na utilização do N-fertilizante o que, provavelmente, ocorreu pela falta de nitrato para a denitrificação, devida à nitrificação lenta, em tais condições. Os estudos de casa de vegetação sugeriram que a maior eficiência na utilização do N-fertilizante pela localização em profundidade, comparada a aplicação superficial, foi devida às maiores perdas gasosas do N, da superfície dos solos. No projeto desenvolvido posteriormente (1978), foi observado que, a absorção e a utilização do N fertilizante em solos arroseiros, em alagamento, foram dependentes, em grande extensão, do estágio fisiológico de crescimento do arroz. O N aplicado nesses experimentos, por ocasião do transplante do arroz, foi utilizado com uma eficiência de 12%, comparada a uma eficiência de 34% para a aplicação no início do primórdio da panícula. A recuperação

foi normalmente maior, quando o N foi aplicado nos estádios mais tardios. As explicações para esses fatos foram que:

- a denitrificação e a imobilização do N aplicado nos estádios iniciais são maiores, quando comparadas aos estádios mais tardios do desenvolvimento do arroz;

- o sistema radicular é bem desenvolvido nos estádios tardios e absorve N mais rapidamente; uma parte considerável do N absorvido nos estádios iniciais, é perdida, devido a queda das folhas.

Essas observações, de modo geral, indicam opiniões semelhantes, em relação às tendências notadas aqui, para os dados de eficiência de utilização do fertilizante; algumas dessas tendências foram inferidas, anteriormente, de outros parâmetros avaliados no presente estudo. A eficiência de utilização do N, na segunda época de amostragem das plantas, entretanto, se enquadra na faixa de valores obtida por outros autores (PATRICK e REDDY, 1981; SAH E MIKKELSEN, 1983b), os quais consideram o fato de que ela depende, principalmente, das condições de cultivo e das taxas de aplicação do nitrogênio. Além disso, foi observado que a recuperação do ¹⁵N em estudos sobre a eficiência de utilização de fertilizantes marcados, foi mais alta, em casa de vegetação, do que em condições de campo (DeDATTA et

alii, 1968; YOSHIDA e PADRE, 1977). De qualquer modo, os valores aqui obtidos concordam com a informação geral de que a eficiência de utilização do nitrogênio em arroz é baixa, normalmente maior do que 30-40%, raramente chegando a 60-65%; isto devido a ocorrência, no meio alagado único, de processos que podem conduzir a perdas deste nutriente (De DATTA et alii, 1968; CRASSWELL e VLEK, 1979; ZIA E WARING, 1987).

4.2.2.4. Porcentagem e quantidade do nitrogênio na planta derivado do solo

A porcentagem e a quantidade do nitrogênio total derivado do solo, nas diferentes partes da planta e na planta inteira, para os tratamentos efetuados, em duas épocas de amostragem das plantas de arroz, encontram-se nos Apêndices (página 369-370). Os resultados apresentados, como se pode facilmente deduzir, foram calculados por diferença, a partir dos valores indicados para QNT (Tabela 12) e QNPDF, (Tabela 16) nas diversas partes da planta e na planta inteira. De uma vez que todos os tratamentos incluíram a incorporação de matéria orgânica ao solo considerou-se como fontes de N-disponível, para a planta, o solo (que representa a contribuição conjunta do N nativo + N adicionado da palha de milho) e o fertilizante (uréia

adicionado; valendo, assim, no presente caso a expressão:

Total N (planta) = N-fertilizante (planta) + N-solo (planta)

ou, em termos relativos (IAEA, 1976, 1983):

$$\% \text{ NPDF} + \% \text{ NSDF} = 100$$

Pode-se verificar, através dos resultados informados (Apêndice 43) que a quantidade de nitrogênio proveniente do solo, acumulada na planta, apresentou-se aumentada em função do desenvolvimento da cultura, de acordo com os valores, indicados em cada uma das épocas de amostragem das plantas. Esta variação crescente, a partir dos 40 DAT, indica tendências semelhantes aquelas observadas para os parâmetros QNT e QNPDF, o que parece sugerir que, os efeitos e as variações provocados por fatores comuns atuando sobre esses parâmetros foram os mesmos que orientaram a QNPDS. Tais observações demonstram o efeito positivo da aplicação da uréia, refletido aos 100 DAT, o qual foi ampliado com o aumento da taxa de aplicação do fertilizante. Isto indica para a primeira época considerada, o efeito da imobilização do N do solo e do fertilizante, o qual parece ter sido superado a partir dos 40 DAT, através da mineralização ou remineralização das fontes de N no solo (nativa + adicionada), levando a uma estimulação da liberação do N no solo, pela aplicação do fertilizante. Este

aumento na disponibilidade do nitrogênio do solo para a planta, é o efeito "priming" (efeito promovedor aparente do fertilizante nitrogenado), o qual tem sido observado por outros autores e informado ocorrer largamente em solos arrozeiros inundados (BROADBENT e REYES, 1971; WESTERMAN e KURZ, 1973; FRIED e BROESHART, 1974; FRIED et alii, 1975; MURAYAMA, 1979).

4.2.3. Nitrogênio no solo

4.2.3.1. Teor e quantidade de nitrogênio total no solo

O teor e a quantidade de nitrogênio total no solo, em quatro épocas de amostragem e para os diferentes tratamentos efetuados, acham-se na Tabela 20 obtida dos dados que constam no Apêndice 45 (página 372). O teor de N total foi fornecido pela análise química; a quantidade, expressada em g.vaso⁻¹, foi calculada pela equação 8 (página 117).

Observando-se os dados da Tabela 20 nota-se que os valores informados para porcentagem e para quantidade de N total no solo indicaram, de modo geral, um comportamento similar dentro de cada tratamento estudado, revelando a tendência de diminuição desses valores, com o decorrer do tempo. Tanto em relação aos teores, como para as

quantidades de N total no solo, a estatística F acusou diferenças significativas ao nível de 1%, de tratamentos, épocas e para a interação tratamentos versus épocas. As quantidades de N total no solo, obtidas para os tratamentos controle e U-0, com exceção da primeira época de amostragem, apresentaram-se significativamente diferentes entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5%. Os tratamentos com uréia (U-50 e U-100) diferiram significativamente ($\alpha = 0,05$) do controle, nas quatro épocas de realização da amostragem do solo. Entre os tratamentos com planta (U-0, U-50 e U-100), houve diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) somente para a primeira época de amostragem; também, para esses tratamentos o teste de Tukey indicou diferenças significativas entre o tratamento sem uréia e os que incluíam este fertilizante aos 40 DAT, mostrando ainda, que as quantidades de N total no solo, diferiram entre si ($\alpha = 0,05$), para os tratamentos que receberam uréia, aos 10 e 100 DAT. Verificou-se, ainda, através da análise de regressão polinomial que houve efeito linear para os níveis equidistantes de época (10, 40, 70 e 100 DAT) na quantidade de nitrogênio total no solo; as equações de regressão polinomial estão apresentadas na Tabela 21. Todas essas observações mostram que os teores e as quantidades de N total foram afetados pelos tratamentos empregados, refletindo variações nas épocas de amostragem do solo, possivelmente influenciadas pelos processos de transformação do N e, particularmente, pelos teor e

quantidades do N, no solo, absorvido pelas plantas. Por outro lado, os resultados parecem indicar, através da observada tendência de diminuição com o tempo, a influência da mineralização das fontes de N nativas e adicionadas mostrando, também, prováveis efeitos dessas fontes, no aumento da disponibilidade do nutriente a partir do solo, nas condições experimentais estudadas, o que deve ter possibilitado uma maior absorção desse nutriente pelas plantas. Considerações sobre esses aspectos foram apresentadas no item 4.2.2.1 e (páginas 201-208), em relação aos dados de porcentagem e de quantidade do N total na planta. Entretanto, os dados de quantidade de N total no solo, quando analisadas comparativamente com as quantidades de N total na planta (Tabela 10) revelam, através das tendências observadas, em ambos os casos, quantidades maiores do que aquelas justificadas como devidas à acumulação do N na planta de arroz, o que aventa a possibilidade da ocorrência de processos de perdas, influenciando a quantidade de N total no solo, no sistema solo-planta estudado. Transparece, ainda, através dos resultados obtidos, o fato de que as plantas, aparentemente, exibiram necessidades extrativas diferentes (o que traduz, de certo modo, a resposta do cultivar utilizado aos efeitos das fontes de N, nas condições em que o experimento se realizou). Essa resposta da planta, como pode ser observado no item 4.2.2., embora demonstre, no geral, a absorção do

N pela planta a partir das fontes existentes no solo, não parece ter influenciado sobremaneira, a quantidade de nitrogênio total no solo. De qualquer modo, observando as quantidades de N total acumulado pela planta (aos 40 e 100 DAT) e, através dos valores indicados para N total no solo (Tabela 20), particularmente nessas épocas de amostragem, percebe-se, como foi considerado antes, a possibilidade de ocorrência de perdas, as quais, provavelmente, foram ocasionadas através dos processos de nitrificação-denitrificação e de volatilização. Esses processos de perdas gasosas têm sido identificados como potenciais mecanismos responsáveis pelas perdas do N do solo em sistemas solo-planta, em condições de alagamento. (CRASSWELL e VLEK, 1979; MIKKELSEN e DeDATTA, 1979).

4.2.3.2. Porcentagem e quantidade do nitrogênio total no solo derivado do fertilizante

A porcentagem e a quantidade de N total no solo proveniente do fertilizante, para os diferentes tratamentos estudados e em quatro épocas de amostragem do solo, encontram-se na Tabela 22, obtida dos dados que constam no Apêndice 46 (página 373). A quantidade do nitrogênio no solo derivado do fertilizante foi calculada através da equação 10 página 119, expressada em mg.vaso⁻¹.

Tabela 20 - Teor e quantidade de nitrogênio total no solo, em diferentes tratamentos e épocas de amostragem.

PERCENTAGEM E QUANTIDADE DE NITROGENIO TOTAL NO SOLO								
Tratamento	DIAS APÓS TRANSPLANTE							
	10	40	70	100	10	40	70	100
	-----x-----				----- ⁻¹ -----			
(1)	(2)				g. Vaso			
U-0	0,133Ac	0,128Bb	0,125Ca	0,121Da	79,5Ac	76,8Bb	74,7Ca	72,8Ca
U-50	0,137Ab	0,132Ba	0,123Ca	0,121Da	82,3Ab	79,1Ba	73,7Ca	72,5Ca
U-100	0,141Aa	0,130Bab	0,122Ca	0,113Dc	84,9Aa	78,0Bab	73,0Ca	57,8Dc
Controle	0,312Ac	0,124Bc	0,118Cb	0,116Cb	78,9Ac	74,4Bc	71,0Cb	69,8Cb
F - Tratamento(T)	35,11				40,11			
Epoca(E)	314,75				314,83			
Tra x Epo(TxE)	13,24				13,82			
CV (%)								
Parcelas	0,55				0,52			
Subparcelas	1,21				1,21			
Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)								
T(E)	3,31.10 ⁻³				1,96			
E(T)	3,41.10 ⁻³				2,06			

(1) Tratamentos incluem adição de palha de milho

(2) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, diferem entre si, ao nível de significância $p/\alpha = 0,05$

x significativa para $\alpha = 0,05$

xx significativa para $\alpha = 0,01$

Tabela 21 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de época para nitrogênio total
(1)
no solo .

Parâmetro considerado	Tratamento	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação r ²
(2)				
PNT	U-0	$Y = 0,13351 - 0,00012 X$	89,59	0,9924
	U-50	$Y = 0,13863 - 0,00019 X$	216,26	0,9521
	U-100	$Y = 0,14347 - 0,00031 X$	556,01	0,9927
	Controle	$Y = 0,13203 - 0,00017 X$	173,83	0,9353
(3)				
QNT	U-0	$Y = 80,022 - 0,074 X$	87,92	0,9936
	U-50	$Y = 83,263 - 0,116 X$	216,68	0,9511
	U-100	$Y = 86,271 - 0,188 X$	569,83	0,9938
	Controle	$Y = 79,151 - 0,102 X$	169,00	0,9431

(1) - Significativo p/ $\alpha = 0,05$

(2) - Porcentagem de N total

(3) - Quantidade de N total

Através da Tabela 22 observa-se, também, que a estatística F acusou diferenças significativas de tratamentos, épocas e para a interação tratamentos versus épocas, ao nível de 1%, para as porcentagens e as quantidades do N total no solo derivado do fertilizante. Vale lembrar que, para o tratamento U-0 os valores indicados referem-se ao N no solo proveniente da fonte de matéria orgânica (palha de milho - ¹⁵N) incorporada ao solo. Os dados obtidos, no geral, indicam que as tendências apresentadas nas PNSDF foram as mesmas observadas para a QNSDF, dentro de cada um dos tratamentos efetuados, nas diversas épocas de amostragem.

Analisando-se mais detalhadamente os resultados informados, verifica-se que houve uma tendência de diminuição dos valores de QNSDF com o decorrer do tempo, de acordo com os tratamentos impostos ao sistema estudado. Para o tratamento controle, houve diferenças significativas pelo teste de Tukey ao nível de 5%, entre as três primeiras épocas de amostragem, não se apresentando significativamente diferentes entre si, os dados para 70 e 100 DAT. Este comportamento é observado, também, para o tratamento U-0. Os resultados obtidos para esses dois tratamentos à exceção da primeira época de amostragem, mostraram-se significativamente diferentes entre si ($\alpha = 0,05$), aos 40, 70 e 100 DAT.

Os tratamentos que incluíram a adição de uréia (U-50, U-100) apresentaram-se significativamente diferentes, entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%, para as quatro épocas nas quais foram realizadas as amostragens do solo. Também, houve diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as QNSDF encontradas nos tratamentos com uréia e no tratamento controle, aos 10, 40 e 70 DAT. Para essas mesmas épocas, foram verificadas diferenças significativas ($\alpha = 0,05$) entre as QNSDF no tratamento com dose mais baixa de uréia (U-50) e naquele com dose mais elevada (U-100). Ainda, para os tratamentos com planta, (U-0, U-50 e U-100) houve diferenças significativas pelo teste de Tukey ($\alpha = 0,05$), entre os valores de QNSDF, nas duas primeiras épocas de amostragem do solo, não acontecendo o mesmo aos 70 dias (U-0 e U-50) e aos 100 DAT. A análise de regressão polinomial indicou efeito linear para os níveis equidistantes de época (10, 40, 70 e 100 DAT) na quantidade de N total no solo derivado do fertilizante. As equações polinomiais obtidas encontram-se na Tabela 23.

Os resultados obtidos informam que a QNSDF diminuiu no decorrer do tempo em que o experimento foi realizado. Esse fato confirma indicações anteriormente feitas da possível ocorrência de perdas do N no sistema estudado. Particularmente no tratamento controle, desde que este não incluiu o transplante do arroz, os decréscimos

observados, no tempo, orientam a indicação de que os mesmos aconteceram, provavelmente, a partir do solo, pelos processos de nitrificação-denitrificação e volatilização, nas condições experimentais impostas ao sistema solo-planta. Para os tratamentos que incluíram o transplante do arroz (U-0, U-50 e U-100) os referidos decréscimos representam, em parte, a extração do nutriente pela planta, como indicado na Tabela 16 valendo as condições apresentadas no item 4.2.2.2.2. Também, isto reflete as considerações apresentadas no item 4.2.2.3 através dos valores obtidos para a eficiência de utilização do fertilizante, os quais indicaram uma eficiência de utilização do N fertilizante, relativamente boa, quando comparados aos normalmente informados através da literatura. Verifica-se assim a efetividade das plantas em competir com os processos de perdas gasosas do N do solo. Essas observações concordam com informações semelhantes, obtidas por outros autores. BROADBENT e TUSNEEM (1971), observaram que, as plantas de arroz reduziram efetivamente a magnitude das perdas do N, em experimentos de laboratório e de casa-de-vegetação, em solos alagados.

Ainda, considerando os dados para QNPFD e para QNSDF, pode-se observar que, os processos de perdas devem ter sido mais atuantes na primeira fase de desenvolvimento da cultura, particularmente porque entre as épocas 40 e 100 DAT o processo de absorção pela planta

parece ter sido intensificado devido, como foi sugerido, a melhor atuação do sistema radicular bem desenvolvido, nesse período considerado. Além disso, observando-se as QNSDF verifica-se que as maiores quantidades das fontes de N adicionadas, retidas no solo, encontraram-se nos tratamentos com uréia, particularmente referentes à aplicação em dose mais elevada sendo tais quantidades, maiores, nas primeiras épocas de amostragem. É possível que esse comportamento observado traduza, até certo ponto, o efeito da imobilização causada pela incorporação da palha de milho, como sugerido anteriormente. Tal efeito deve controlar a disponibilidade do nutriente para a planta de arroz no período inicial do seu desenvolvimento, colaborando para a maior disponibilidade nas épocas posteriores, o que é indicado pela maior absorção, dada pelo aumento na QNPDF e pela diminuição, no tempo, da QNSDF. BROADBENT e TUSNEEM (1971) observaram perda substancial do N em solos que receberam $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ e foram mantidos em condições de alagamento durante todo o período experimental. Para os autores, as perdas foram associadas com a presença do NH_4^+ na solução do solo, e no complexo de trocas; quando os níveis de NH_4^+ foram reduzidos através da imobilização por microrganismos do solo, fixação em minerais de argila ou absorção pela planta, as perdas do N do sistema, diminuíram. Contudo, o N do solo foi perdido em quantidade considerável, embora a conservação do N nos solos alagados possa ter sido melhorada pela

Tabela 22 - Porcentagem e quantidade do nitrogênio total no solo derivado do fertilizante (PNSDF; QNSDF).

PERCENTAGEM E QUANTIDADE DE NITROGENIO NO SOLO DERIVADO DO FERTILIZANTE (PNSDF, QNSDF)								
Tratamento	DIAS APÓS TRANSPLANTE							
	10	40	70	100	10	40	70	100
	-----x-----				----- ⁻¹ mg. vaso-----			
U-0(1)	0,92Ac	0,62Bc	0,51BCb	0,40Bd	727Ac	478Bc	383BCb	292Ca
U-50	1,33Ab	1,06Bb	0,60Cb	0,23Db	1095Ab	835Bb	441Cb	169Db
U-100	2,52Aa	1,98Ba	0,84Ca	0,34Dab	2144Aa	1544Ba	615Ca	232Dab
Controle	0,92Ac	0,48Bd	0,32BCc	0,26Cb	693Ac	355Bd	234Cc	179Cb
F - Tratamento(T)	xx 704,68				xx 1138,48			
Epoca(E)	xx 888,18				xx 935,49			
EpoxTrat(EXT)	129,29xx				136,71xx			
CV (%)								
Parcelas	3,28				2,68			
Subparcelas	6,88				7,31			
Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)								
T(E)	0,12				99,45			
E(T)	0,13				107,09			

(1) Tratamentos incluem adição de palha de milho

(2) Média de três repetições; médias seguidas por letras distintas, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, diferem entre si, ao nível de significância $p/\alpha = 0,05$

x significativa para $\alpha = 0,05$

xx significativa para $\alpha = 0,01$

Tabela 23 - Equações de regressão polinomial de níveis equidistantes de época para nitrogênio derivado do fertilizante no solo (1).

Parâmetro considerado	Tratamento	Equação Polinomial	F (modelos)	Coef. Determinação r^2
(1)				
PN3DF	U-0	$0,9167 - 0,0055 X$	125,36	0,9310
	U-50	$1,4917 - 0,0125 X$	647,52	0,9915
	U-100	$2,8323 - 0,0256 X$	2722,96	0,9747
	Controle	$0,8507 - 0,0068 X$	191,62	0,7764
(2)				
QNSDF	U-0	$726,91 - 4,67 X$	130,24	0,9299
	U-50	$1216,75 - 10,58 X$	668,01	0,9934
	U-100	$2355,81 - 22,22 X$	2946,49	0,9779
	Controle	$669,97 - 5,54 X$	183,42	0,8678

(1) - Significativas $p/ \alpha < 0,05$

(2) - Porcentagem de nitrogênio no solo derivado do fertilizante

(3) - Quantidade de nitrogênio no solo derivado do fertilizante

localização do fertilizante em profundidade e pela época de aplicação, no caso da presença de um sistema radicular ativo.

Por outro lado, vários autores têm observado aumento nas perdas de N-urêia na ausência de plantas de arroz ou, redução significativa das perdas, na presença de plantas (REDDY e PATRICK, 1980; SMITH e DELAUNE, 1984); tais perdas, atribuídas a ocorrência das reações de nitrificação-denitrificação se tornam elevadas quando níveis altos de NH_4^+ inorgânico são mantidos por extensos períodos de tempo, condição comumente encontrada em solos alagados, sem planta. Essas informações ratificam as inferências em relação aos resultados obtidos para QNSDF, concordando com as observações gerais indicadas neste experimento.

4.2.4. Balanço do nitrogênio no sistema solo-planta

O balanço do nitrogênio total e o balanço do N-fertilizante, no sistema solo-arroz em estudo, em diferentes tratamentos e épocas do desenvolvimento da cultura, encontram-se nas Tabelas 24 e 25, respectivamente. Os elementos integrantes do balanço de massa do nitrogênio, nos casos especificados, no presente estudo, foram apresentados no item 3.2.21 (página 119). Para o balanço do N-

total, a quantidade do N inicialmente presente no solo foi considerada como sendo aquela dada pela média dos valores obtidos (Apêndice 49, página 377) na coleta de amostras dos latões correspondentes a cada tratamento, antes da aplicação do fertilizante, com o transplante posterior das plântulas e alagamento imediato do solo (0 DAT).

Para obtenção da Tabela 24 além do N total inicial (que já inclui o NT da palha adicionada) e do N-adicionado como fertilizante (urêia), foram considerados os valores médios da quantidade de N-total na planta inteira e os valores médios da quantidade de N-total no solo, para os vários tratamentos empregados, aos 40 e 100 DAT. Para 40 DAT, esses valores foram corrigidos, levando-se em conta as 15 plantas que permaneceram nos latões após a primeira coleta das plantas e, para 100 DAT, os valores foram corrigidos para incluir a quantidade de N-extraída pelas 20 plantas coletadas na primeira época de amostragem.

De modo geral, através dos resultados informados para 40 DAT (Tabela 24), verifica-se que as somas das quantidades de nitrogênio total na planta e no solo (saldas de N do sistema) foram bem aproximadas, para os tratamentos na ausência e na presença de urêia (78, 80 e 79 g.vaso⁻¹, respectivamente, para U-0, U-50 e U-100). Aos 100 DAT, isto também se verifica; entretanto, o tratamento U-100

parece apresentar uma leve diminuição em relação aos outros, nesta época. Esses valores, de certo modo, seguem as tendências informadas pela quantidade de N total retido no solo, nos vários tratamentos e nas duas épocas, o que reflete uma certa influência desses valores muito maiores, através da adição, sobre os valores de N extraído pela planta. Para o tratamento controle (sem planta), nas duas épocas, observa-se os menores valores totais (saldas) em relação aos tratamentos com planta.

Em relação aos dados obtidos para perda do nitrogênio total, determinados pela diferença entre os valores totais de entradas e saldas do N no sistema solo-arroz, nos vários tratamentos e épocas indicados, observa-se a tendência desses valores de se apresentarem mais elevados para o tratamento sem planta, do que para os tratamentos com planta. Esses resultados informam variações aproximadamente em torno de 2 a 7% (40 DAT) e de 5 a 12% (100 DAT) do N perdido. Nota-se, também, que as perdas do N-total no sistema em estudo indicam a tendência de serem aumentadas com o aumento da taxa de aplicação do fertilizante, embora a quantidade do N recuperado pela planta, aparentemente, aumente com o aumento da quantidade de N-urêia aplicado. As tendências observadas para 40 e 100 DAT foram, de modo geral, semelhantes. Entretanto, as percentagens de perdas (apesar das tendências de valores maiores, na segunda época

de desenvolvimento da cultura) parecem indicar perdas maiores, provavelmente, para os 100 DAT.

A contabilização dos dados de entradas e saídas do N no sistema solo-arroz parece indicar a ocorrência de perdas pelo menos para os tratamentos U-100 e controle, aos 100 DAT. De modo geral, entretanto, os resultados obtidos devem ser observados com cautela. Deve ser considerado que, o erro analítico na determinação (HAUCK e BREMNER, 1976; LEGG e MEISINGER, 1982; HAUCK, 1986) do N-total no solo, comumente, é maior que 2%. Por esta razão, na Tabela 24 estão informados os erros propagados nas várias determinações dos parâmetros considerados no balanço de massa do N total, nas condições em que o presente experimento se realizou. Essas indicações dos erros, para os valores de perdas obtidos por diferença, reproduzam algumas considerações de HAUCK (1986), o qual informa que os métodos de Kjeldahl, para medir o N-total no solo, são demasiados insensíveis para estimar mudanças no conteúdo de N total em um sistema solo-planta, no campo, em uma única estação. Essa insensibilidade do método, dificultando a interpretação dos dados, como foi observado no presente experimento, sugere que o balanço do N-total, devido a magnitude do erro obtido, além de exigir uma cuidadosa interpretação dos resultados, deve ser preterido por métodos mais sensíveis, particularmente em estudos de curta duração,

quando se deseja seguir a mudança no conteúdo do N no solo.

15

Para o balanço do N, foram consideradas, a quantidade do N derivado do fertilizante nas diferentes partes da planta e a quantidade do N proveniente do fertilizante, no solo, obtidas aos 40 e 100 DAT, cujos valores médios compreendem os dados da Tabela 25.

As quantidades de N derivado do fertilizante nas diversas partes da planta, aos 40 DAT foram corrigidas para 35 plantas, considerando as plantas que ficaram nos latões, após a primeira coleta realizada. Para 100 DAT, também, os valores de QNDF nas diferentes partes da planta foram corrigidos, levando em conta a quantidade extraída pelas partes da planta, coletadas na primeira época de amostragem.

Como se pode observar nos resultados apresentados para 40 DAT, a soma das quantidades de N-total nos órgãos da planta e do N no solo, provenientes do fertilizante, foi de 494 mg.vaso⁻¹ para o tratamento sem uréia e de 968 e 1882 mg.vaso⁻¹, respectivamente, para os tratamentos com uréia nas doses equivalentes a 50 e 100 kg N.ha⁻¹. Esses resultados revelam que a eficiência do fertilizante N ureia foi de 24% para o tratamento U-0, 21% para U-50 e 23% para U-100.

Aos 100 DAT, a quantidade de N total no sistema solo-planta, mostrou-se mais baixa que os valores obtidos aos 40 DAT, correspondendo a 421 mg.vaso⁻¹ (U-0), 832 mg.vaso⁻¹ (U-50) e 1673 (U-100). Nesta época de desenvolvimento da cultura as perdas do N fertilizante, para os tratamentos indicados, na mesma ordem, foram equivalentes a 53, 32 e 31%, do N-fertilizante, aplicado em profundidade por ocasião do transplante do arroz. Vale notar que, aos 40 DAT, a quantidade do N proveniente do fertilizante, retida no solo, mostrou-se bastante elevada em relação à quantidade extraída pela planta, nos tratamentos efetuados. Aos 100, entretanto, a situação inversa ocorreu nos tratamentos com uréia, ou seja, a quantidade do N derivado do fertilizante, na planta, aumentou e a quantidade no solo, diminuiu. O mesmo, não aconteceu para o tratamento sem uréia, o qual mostrou que a quantidade do N proveniente da palha e retido no solo continuou, ainda, alta nesta época do desenvolvimento da cultura, representando 33% da quantidade aplicada. De modo geral, valores encontrados na segunda época de amostragem, porém, apresentaram-se aumentados na planta e diminuídos, no solo, em relação aos indicados para 40 DAT. Essas indicações reafirmam, mais uma vez, a efetividade da planta em reduzir as perdas do N no sistema estudado. É interessante observar que, para os dados obtidos aos 100 DAT nos tratamentos com uréia (U-50, U-100), apesar do aumento das perdas do N-fertilizante com o aumento da

quantidade aplicada, houve uma maior absorção do N fertilizante, pela planta, determinando porcentagens de perdas aproximadamente equivalentes. Por outro lado, é apontada, também, a tendência de aumento da disponibilidade do N do fertilizante, da primeira para a segunda época de desenvolvimento da cultura, a qual, em conformidade com os tratamentos estudados, parece ter sido controlada, em parte, como foi sugerido anteriormente, pela imobilização causada, tanto pela adição da palha de milho, como pelas próprias condições de submergência do solo, como foi informado por KAI e WADA (1979). Tais indicações, concordam com observações semelhantes apresentadas por BROADBENT e TUSNEEM (1971); YOSHIDA e PADRE (1977); REDDY e PATRICK (1980) e SMITH e DELAUNE (1984). Considerando o fato que o tratamento controle (sem planta) incluiu a incorporação de palha de milho marcada, realizou-se, também, o balanço de 15

N para esse tratamento. Tal balanço, para quatro épocas de amostragem do solo, em alagamento, encontra-se no Apêndice, página 374. Nos dados apresentados no Apêndice para o tratamento controle, verifica-se que as quantidades de N derivado da palha de milho, no solo, diminuíram nas várias épocas de amostragem realizadas, mostrando que as perdas do N da palha foram da ordem de 60%, aos 40 DAT, alcançando valores em torno de 80%, aos 100 DAT. Esses resultados demonstram, para esse tratamento sem planta, perdas do N da palha bem superiores aos valores observados

para os tratamentos com planta, tanto na ausência como na presença de uréia, nas épocas indicadas, concordando com indicações semelhantes apresentadas por BROADBENT e TUSNEEM (1971); REDDY e PATRICK (1980) e SMITH e DELAUNE (1984). De modo geral, para o balanço do ¹⁵N realizado, observa-se que as porcentagens de perdas do N-fertilizante, a partir do sistema solo-planta em estudo, aumentaram, da primeira para a segunda época de amostragem da planta. Apesar dos aumentos com o decorrer do tempo, as perdas afiguram-se mais elevadas, na primeira época, em relação à segunda época de desenvolvimento da cultura. Por outro lado, verifica-se a superioridade do balanço isotópico que, além de informar as quantidades reais do N-fertilizante identificando melhor os caminhos e processos de transformação do nitrogênio no sistema estudado, torna o efeito do erro de Kjeldahl menos importante, diminuindo a magnitude deste erro. Esses aspectos informam observações semelhantes, as quais são mais amplamente esclarecidas por HAUCK e BREMNER, 1976; BREMNER e HAUCK, 1982; KOYAMA e APP, 1979; LEGG e MEISINGER, 1982).

As informações obtidas, particularmente através do balanço do ¹⁵N no sistema solo-arroz em estudo, sugerem a ocorrência dos processos de denitrificação e volatilização como principais mecanismos de perdas confirmando, mais uma vez, indicações feitas, tanto na observação dos dados para outros parâmetros já avaliados,

como em observações semelhantes obtidas da literatura (BREMNER e SHAW, 1958a, 1958b; CLARK e BEARD, 1960; STANFORD et alii, 1975b, 1975c; BURESH e PATRICK, 1978; CRASSWELL e VLEK, 1979, 1983; MIKKELSEN e DeDATTA, 1979; ROLSTON, 1981; FIRESTONE, 1982; GARCIA e TIEDJE, 1982; NELSON, 1982 e PATRICK, 1982). Entretanto, nas condições em que o experimento se realizou os resultados são mais favoráveis ao processo de denitrificação. Isto se justifica, em primeira lugar, devido à localização do fertilizante (urêia) em profundidade, o qual foi administrado em solução e aplicado ao solo com baixo teor de água, sendo realizado o alagamento imediato do solo, logo em seguida. Além disso, os resultados informados anteriormente indicam um razoável valor de eficiência de utilização do N-fertilizante, pelo cultivar estudado mostrando, ainda, que a absorção do nutriente foi ampliada com o desenvolvimento da cultura, o que parece demonstrar a concorrência da planta por amônia. Em segundo lugar, o solo foi mantido durante todo o período experimental em alagamento contínuo. Durante este período, verificou-se que o desenvolvimento de algas não foi muito intenso; isto, em parte, parece refletir o efeito do solo em controlar o índice de acidez, nas condições de alagamento impostas, o que foi indicado através da determinação do pH de amostras da camada de água de alagamento e do solo, coletadas por volta do meio dia, em três dos primeiros 10 dias de condução do experimento cujos valores obtidos nos

vários tratamentos efetuados, em momento algum, mostraram-se superiores a 6,8 (dados não apresentados). Além disso, determinações da quantidade de amônia volatilizada, utilizando esponjas embebidas em H_2SO_4 e glicerina (dados não incluídos), apresentaram valores muito baixos, do NH_3 volatilizado, indicando que as perdas determinadas, em relação aos dados sugerindo desnitrificação devem ter sido mínimas. Essas análises concordam com observações semelhantes informadas por MAC RAE e ANCAJAS (1970); VENTURA e YOSHIDA (1977), MIKKELSEN et alii (1978); VLEK e CRASSWELL (1979), NELSON (1982) e PATRICK (1982).

Tabela 24 - Balanço do nitrogênio total no sistema solo-planta, em duas épocas de desenvolvimento do cultivar IAC-4440.

DISTRIBUIÇÃO DO NITROGENIO TOTAL NO SISTEMA SOLO-PLANTA								
Tratamento	NT-INICIAL			NT-FINAL				
	Solo(1)	Fertilizante	Total (entrada)	Planta	Solo	Total (saida)	Perda	

-1								
-----g.vaso-----x-----								
(2)								
40 DAT								
U-0(3)	81,41	0	81,41	1,11	76,84	77,95	3,46 (± 2,55)	4,25
U-50	81,65	1,22	82,87	1,22	79,13	80,35	2,52 (± 1,36)	3,04
U-100	81,81	2,44	84,25	1,39	77,98	79,37	4,88 (± 2,37)	5,79
Controle	81,41	0	81,41	0	74,32	74,32	7,00 (± 2,40)	8,71
100 DAT								
U-0	81,41	0	81,41	3,54	72,79	76,33	5,08 (± 2,43)	6,24
U-50	81,65	1,22	82,87	5,21	72,50	77,71	5,16 (± 1,18)	6,23
U-100	81,81	2,44	84,25	6,47	67,81	74,28	9,97 (± 2,41)	11,83
Controle	81,41	0	81,41	0	69,78	69,78	11,63 (± 2,27)	14,28

(1) Inclui N-palha de milho incorporada; refere-se a 0-DAT (antes da aplicação do fertilizante)

(2) Dias após transplante

(3) Tratamentos incluem matéria orgânica (palha de milho incorporada)

(4) Perda calculada em relação ao total (entrada); valor entre parênteses indica erro propagado

15

Tabela 25 - Balanço do nitrogênio N no sistema solo-planta, em duas épocas de desenvolvimento do cultivar IAC-4440.

DISTRIBUIÇÃO DO N-FERTILIZANTE NO SISTEMA SOLO-PLANTA									
Tratamento	15 N PLANTA				15N SOLO	15 N-Sistema Solo-planta NDF(Total){1}	N-aplicado	15N-perda	
	Raiz	Colmo + Folha	Panicula	Planta Inteira					

-1									
-----mg.vaso----- --1--									
40 DAT									
(2)	(3)								
U-0	2	14	-	16	478	494	888	394	44,37
U-50	19	114	-	133	835	968	1220	252	20,65
U-100	38	300	-	338	1544	1882	2440	558	22,86

100 DAT									
(4)									
U-0	28	86	15	129	292	421	888	467	52,59
U-50	122	444	97	663	169	832	1220	388	31,80
U-100	234	1013	193	1440	232	1672	2440	768	31,47

(1) - Nitrogênio derivado do fertilizante

(2) - Referente à incorporação de palha de milho - N

(3) - Valores calculados, estão corrigidos para 35 plantas de arroz

(4) - Valores calculados incluem a correção para 20 plantas coletadas aos 40 DAT

5. CONCLUSOES

Com base nos objetivos propostos e resultados obtidos, são possíveis as seguintes conclusões:

- A palha de milho, durante sua decomposição, imobilizou o nitrogênio disponível - das fontes nativas e adicionadas - a formas orgânicas, no solo;

- A produção de matéria seca e a absorção do nitrogênio foram dependentes das etapas de desenvolvimento do cultivar estudado (40, 100 DAT) e, significativamente aumentadas pelo aumento na quantidade do N-urêia aplicado;

- A recuperação do N-fertilizante pela planta aumentou com a quantidade do N-urêia aplicado sendo bastante ampliada com o desenvolvimento do cultivar, dos 40 para os 100 DAT;

- As maiores contribuições para o N da planta foram provenientes do solo, embora a urêia tenha se mostrado superior a palha de milho e, esta fonte de N tenha se

apresentado importante para o arroz;

- As plantas de arroz foram efetivas em acumular nitrogênio reduzindo os processos de perdas gasosas do N no sistema solo-planta estudado; a disponibilidade do N para a planta foi em parte controlada pela fonte de N orgânico (palha de milho) através do processo de imobilização;

- As perdas gasosas do N aplicado foram maiores na primeira época de desenvolvimento do cultivar estudado (40 DAT) do que na segunda época (100 DAT). As perdas gasosas foram influenciadas pela adição de palha de milho e aumentadas com o aumento na quantidade do N-urêia aplicado; as mais elevadas perdas ocorreram na ausência de plantas;

- Em condições de laboratório e de casa de vegetação as perdas gasosas ocorreram, principalmente, através do processo de denitrificação.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABICHANDANI, C.T. & PATNAIK, S. Nitrogen changes and fertilizer losses in lowland waterlogged soils. J. Indian Soc. Soil Sci., New Delhi, 6: 87-93, 1958.

ABICHANDANI, C.T. & PATNAIK, S. Effect of line application on nitrogen availability and rice yields in waterlogged soils. J Indian Soc. Soil Sci., New Delhi, 9: 55-62, 1961.

ACHARYA, C.N. Studies on the anaerobic decomposition of plant materials. I - The anaerobic decomposition of rice straw (*O. sativa*). Biochem. J., Cambridge, 29: 528-41, 1935a.

ACHARYA, C.N. Studies on the anaerobic decomposition of plant materials. II- Some factors influencing the anaerobic decomposition of rice straw (*O. sativa*). Biochem. J., Cambridge, 29: 953-60, 1935b.

ACHARYA, C.N. Studies on the decomposition of plant materials. III- Comparison of the course of decomposition under anaerobic, aerobic and partially aerobic conditions. Biochem. J., Cambridge, 29: 1116-20, 1935c.

ALBERTA, T. Growth and root development of lowland rice and its relation to oxygen supply. Plant and Soil, The Hague, 5: 1-28, 1953.

ALECKSIC, Z.; BROESHART, M. & MIDDELBOE, V. Shallow depth placement of $(\text{NH})_4\text{SO}_4$ in submerged rice soils as related to gaseous losses of fertilizer nitrogen and fertilizer efficiency. Plant and Soil, The Hague, 29: 338-42, 1968.

ALLEN, A.L.; STEVENSON, F.J. & KURTZ, T. Chemical distribution of residual fertilizer nitrogen in soil as revealed by nitrogen - 15 studies. J. Environ. Quality, Wisconsin, 2(1): 120-4, 1973.

ALLEN, S.E.; TERMAN, G.L. & CLEMENTS, L.B. Greenhouse techniques for soil-plant-fertilizer research. Alabama, National Fertilizer Development Center, 1976. 90p.

ALEXANDER, M. Introduction to soil microbiology. 2.ed. New York, John Wiley, 1977. 467p.

ALLISON, F.E. The enigma of soil nitrogen balance sheets.

Adv. Agron., New York, 7: 213-50, 1955.

ALLISON, F.E. Evaluation of incoming and outgoing processes that affect soil nitrogen. In: BARTHOLOMEW, W.V. & CLARK, F.E., ed. Soil nitrogen. Madison, American Society of Agronomy. 10, 1965. p. 573-606.

ALLISON, F.E. The fate of nitrogen applied to soils. Adv. Agron., New York, 18: 219-258, 1966.

ALLISON, F.E. Soil Organic matter and its role in crop production. Elsevier, New York. 1973. 673p.

AMARAL SOBRINHO, N.M.B.; VELLOSO, A.C.X.; LEAL, J.R. & ROSIELLO, R.O.P. Denitrificação e imobilização de nitrogênio em solo tratado com vinhaça. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 7: 257-61, 1983.

AMSTRONG, W. Oxygen diffusion from the roots of some British bog plants. Nature, London, 204: 801, 1964.

ASAMI, T. Immobilization and mineralization of nitrogen compounds in paddy soils. 2. Re-mineralization of immobilized nitrogen and the difference in mineralization between immobilized nitrogen and soil nitrogen. J. Sci. Soil Manure, Japan. 42: 22-5, 1971.

AULAKH, M.S.; RENNIE, D.A. & PAUL, E.A. Gaseous nitrogen losses from cropped and summer-fallowed soils. Can. J. Soil Sci., Ottawa, 62: 187-95, 1982.

AULAKH, M.S.; RENNIE, D.A. & PAUL, E.A. The effect of various clover management practices on gaseous N losses and mineral N accumulation. Can. J. Soil Sci., Ottawa, 63: 593-605, 1983a.

AULAKH, M.S.; RENNIE, D.A. & PAUL, E.A. Field studies on gaseous losses from soils under continuous wheat versus a wheat-fallow rotation. Plant and Soil, The Hague, 75(1): 15-27, 1983b.

AULAKH, M.S.; RENNIE, D.A. & PAUL, E.A. Gaseous N losses from soils under zero-till as compared with conventional-till management systems. J. Environ. Quality, 13(1): 130-6, 1984a.

AULAKH, M.S.; RENNIE, D.A. & PAUL, E.A. Acetylene and N₂O serve effects upon N₂O emissions from NH₄⁺ and NO₃⁻ treated soils under aerobic and anaerobic conditions. Soil Biol. Biochem., Oxford, 16(4): 351-6, 1984b.

AVNIMELECH, Y. & RAVEH, J. Nitrate leakage from soils differing in texture and nitrogen load. J. Environ. Quality, Wisconsin, 5: 79-82, 1976.

BAILEY, L.D. Effects of temperature and root on denitrification in soils. Can. J. Soil Sci., Ottawa, 56: 79-87, 1976.

BAILEY, L.D. & BEAUCHAMP, E.G. Effects of temperature on NO_3 and NO_2 reduction, nitrogenous gas production and redox potential in a saturated soil. Can. J. Soil Sci., Ottawa, 53: 213-18, 1973.

BALDERSTON, W.L.; SHERR, B. & PAYNE, W.J. Blockage by acetylene of nitrous oxide reduction in *Pseudomonas perfectomarinus*. Appl. Environ. Microbiol., Washington, 31: 504-8, 1976.

BARBOSA FILHO, M.P. Nutrição e adubação do arroz. (sequeiro e irrigado). Piracicaba, Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1987. 129p. (Boletim Técnico, 9).

BEEVERS, L. Nitrogen metabolism in plants. London. Edward Arnold. 1976. iv.

BLACKMER, A.M. & BREMNER, J.M. Denitrification of nitrate in soils under different atmospheres. Soil Biol. Biochem., Oxford, 9: 141-2, 1977.

BLACKMER, A.M. & BREMNER, J.M. Inhibitory effect of nitrate on reduction of N_2O to N_2 by soil microorganisms. Soil Biol. Biochem., Oxford, 10: 187-91, 1978.

BLASCO, M.L. & CORNFIELD, A.H. Volatilization of nitrogen as ammonia from acid soils. Nature, London, 212: 1279-80, 1966.

BOULDIN, D.R. & ALIMAGNO, B.V. NH_3 volatilization losses from IRRI paddies following broadcast application of fertilizer nitrogen. Los Baños, International Rice Research Institute, 1976. 1v. (Internal Report).

BOWMAN, R.A. & FOCHT, D.D. The influence of glucose and nitrate concentrations upon denitrification rates in a sandy soil. Soil Biol. Biochem., Oxford, 6: 297-301, 1974.

BREMNER, J.M. & BLACKMER, A.M. Nitrous oxide emission from soil during nitrification of fertilizer nitroge. Science, Washington, 199: 2295-6, 1978.

BREMNER, J.M. & BLACKMER, A.M. Effects of acetylene and soil water content on emission of nitrous oxide from soils. Nature, London, 280: 380-381, 1979.

BREMNER, J.M. & BLACKMER, A.M. Terrestrial nitrification as a source of atmospheric nitrous oxide. In: DELWICHE, C.C., ed. Denitrification, nitrification and atmospheric nitrous oxide. New York. John Wiley, 1981. p.151-170.

BREMNER, J.M. & EDWARDS, A.P. Determination and isotope rates analysis of different forms of nitrogen in soils: 1. Apparatus and procedure for distillation and determination of ammonium. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 29: 504-8, 1965.

BREMNER, J.M. & HAUCK, R.D. Advances in methodology for research on nitrogen transformations in soils. In: STEVENSON, F.J., ed. Nitrogen in Agricultural soils. Madison, American Society of Agronomy, 1982. p.467-502. (Agronomy, 22).

BREMNER, J.M. & SHAW, K. Denitrification in soil. I. Methods of investigation. J. Agric. Sci., London, 51: 22-39, 1958a.

BREMNER, J.M. & SHAW, K. Denitrification in soil. II. Factors affecting denitrification. J. Agric. Sci., London, 51: 40-52, 1958b.

BREMNER, J.M. Inorganic forms of nitrogen. In: BLACK, C.A., ed. Methods of soil analysis. Madison, American Society of Agronomy, Part II. Agronomy. 9, 1965. p.1179-1237.

BROADBENT, F.E. & CLARK, F.E. Denitrification. In: BARTHOLOMEW, W.V. & CLARK, F.E. ed. Soil nitrogen. Madison, American Society of Agronomy. Agronomy. 9, 1965. p.344-59.

BROADBENT, F.E. & MIKKELSEN, D.S. Influence of placement on uptake of tagged nitrogen by rice. Agron. J., Madison, 60: 674-7, 1968.

BROADBENT, F.E. & NAKASHIMA, T. Effect of added salts on nitrogen mineralization in three California soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 35: 457-60, 1971.

BROADBENT, F.E. & REYES, O.C. Uptake of soil and fertilizer nitrogen by rice in some Philippine soils. Soil Sci., Baltimore, 112: 200-5, 1971.

BROADBENT, F.E. & TUSNEEM, M.E. Losses of nitrogen from some flooded soils in tracer experiments. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 35: 922-26, 1971.

BROADBENT, F.E. Effect of fertilizer nitrogen on the release of soil nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 29: 692-6, 1965.

BROADBENT, F.E. Nitrogen immobilization in relation to N-containing fractions of soil organic-matter. In: SYMPOSIUM ON THE USE OF ISOTOPES AND RADIATION IN SOIL ORGANIC-MATTER STUDIES. Vienna, 1968. Proceedings. Vienna, IAEA. 1968. p. 131-142.

BROADBENT, F.E. Nitrogen transformation in flooded soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Soils and rice. Los Baños, IRRI, 1978. p. 543-559.

BROADBENT, F.E. Mineralization of organic nitrogen in paddy soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and rice. Los Baños, IRRI, 1979. p. 105-118.

BROWN, J.M. & BARTHOLOMEW, W.V. Sorption of gaseous ammonia by clay minerals as influenced by sorbed aqueous vapour and exchangeable cations. Soil Sci. Soc. Am. Proc. Madison, 27: 160-4, 1963.

BRYAN, B.A. Physiology and biochemistry of denitrification.
In: DELWICHE, C.C., ed., Denitrification, nitrification,
and atmospheric nitrous oxide. New York, John Wiley,
1981. p.67-84.

BURESH, R.J. & PATRICK, W.G.Jr. Nitrate reduction to
ammonium in anaerobic soil. Soil Sci. Soc. Am. J.,
Madison, 42: 913-18, 1978.

BURFORD, J.R.; DOWDELL, R.J. & LYNCH, J.M. Relationships
among microbial populations and rates of nitrification
and denitrification in a Hanford soil. In: NIELSEN, D.R.
& MacDONALD, J.G., ed. Nitrogen in the environment. New
York, Academic Press, 1978. v.2, p. 365-77.

BURFORD, J.R. & BREMNER, J.M. Relationships between the
denitrification capacities of soils and total water-
soluble and readily decomposable organic matter. Soil
Biol. Biochem. Oxford. 7: 389-94. 1975.

BURTON, D.C. & BEAUCHAMP, E.C. Field techniques using the
acetylene blockage of nitrous oxide reduction to measure
denitrification. Can. J. Soil Sci. Ottawa, 64: 555-62,
1984.

CADY, F.B. & BARTHOLOMEW, W.V. Influence of low NO_2 on denitrification processes and products. Soil Sci. Soc. Am. Proc. Madison, 25: 362-5. 1961.

CAMPBELL, N.E.R. & LEES, H. The nitrogen cycle. In: McLAREN, A.D. & PETERSON, G.H., ed. Soil Biochemistry New York, Marcel Dekker, 1967. v.1, p. 194-215.

CARTER, J.N.; BENNETT, O.L. & PEARSON, R.W. Recovery of fertilizer nitrogen under field conditions using nitrogen-15. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 31: 50-6, 1967.

CATCHPOOLE, V.R. Pathways for losses of fertilizer nitrogen from a Rhodes Grass pasture in Southeastern Queensland. Aust. J. Agric. Res. 26: 259-68, 1975.

CHAN, Y.D. & KNOWLES, R. Measurement of denitrification in two fresh water sediments by an in-situ acetylene inhibition method. Appl. Environ. Microb., Washington, 37: 1067-72, 1979.

CHAO, T.T. & KROONTJE, W. Relationship between ammonia volatilization, ammonia concentration and water evaporation. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 28: 393-5, 1964.

CHATARPAUL, L; PAUL, E.A. & COLAÇO, W. Denitrification in Saskatchewan soil under field conditions. In: ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF MICROBIOLOGY, 80. Miami Beach. Abstracts. Miami, A.S.M. 1980.

CHICHESTER, F.W. Effects of increased fertilizer rates on nitrogen content of remoff and percolate from monolith lysimeters. J. Environ. Qual., Wisconsin, 6: 211-16, 1977.

CLARK, F.E. & BEARD, W.E. Influence of organic matter on volatile loss of nitrogen from soil. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 7. Madison, Transaction, SSSA. 1960, III. 6: 501-503.

COCHRAN, V.S.; ELLIOT, L.F. & PAPENDICK, R.I. Nitrous oxide emissions from a fallow field fertilized with anhydrous ammonia. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison 45: 307-10, 1981.

COLAÇO, W. & PAUL, E.A. Denitrification studies under Saskatchewan conditions. I. Laboratory determinations. Recife, UFPE, Departamento de Energia Nuclear, 1984a. 21p.

COLAÇO, W. & PAUL, E.A. Denitrification studies under Saskatchewan conditions. II. Field determinations. Recife, UFPE, Departamento de Energia Nuclear, 1984b. 22p.

COLAÇO, W. & VICTÓRIA, R.L. Denitrificação em solos com adição de nitrato e glucose medida pela técnica de inibição da redução de óxido nitroso por acetileno. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 12: 81-6, 1988.

COLAÇO, W. Denitrification in soils under a wheat-fallow rotation Saskatoon, University of Saskatchewan, 1979. 100p. (MSc. - University of Saskatchewan).

COLAÇO, W. Denitrificação em três solos da Zona da Mata de Pernambuco. R. bras. Ci. Solo, Campinas, 8: 17-23, 1984.

COLLINS, F.M. Effect of aeration in the formation of nitrate-reducing enzymes by *Pseudomonas aeruginosa*. Nature, London, 175: 173-4, 1955.

CONNELL, W.E. & PATRICK, W.H.Jr. Sulfate reduction in soil: Effect of redox potential and pH. Science, Washington, 159: 86-7, 1968.

COOPER, G.S. & SMITH, R.L. Sequence of products formed during denitrification in some diverse western soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., Madison, 27: 659-62, 1963.

COUNCIL FOR AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (CAST). Effect of increased nitrogen fixation on stratospheric ozone. Iowa. Iowa State University, 1976. 33p.

COX, C.D.Jr.; PAYNE, W.J. & DEVARTANIAN, D.V. Electron paramagnetic resonance studies on the nature of hemoproteins in nitrite and nitric oxide reduction. Biochem. Biophys. Acta, Amsterdam, 253: 290-4, 1971.

CRASSWELL, E.T. & MARTIN, A.E. Effect of moisture content on denitrification in a clay soil. Soil Biol. Biochem. Oxford, 6: 127-9, 1974.

CRASSWELL, E.T. & VLEK, P.L.G. Fate of fertilizer nitrogen applied to wetland rice. INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and Rice. IRRI, Los Baños, 1979. p.175-92.

CRASSWELL, E.T. & VLEK, P.L.G. Fate of fertilizer nitrogen applied to wetland rice. In: FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R., ed., Gaseous losses of nitrogen from plant-soil systems. Martinus Nijhoff, The Hague, 1983. p.237-64.

CRUTZEN, P.J. Estimates of possible variations in total ozone due to natural causes and human activities. *Ambio*, Elmsford, 3: 201-10, 1974.

CRUTZEN, P.J. Atmospheric chemical processes of the oxides of nitrogen, including nitrous oxide. In: DELWICHE, C.C., ed. Denitrification, nitrification, and atmospheric nitrous oxide. New York, John Wiley, 1981. p. 17-44.

CURRIE, J.A. Gaseous diffusion in the aeration of aggregated soils. *Soil Sci.*, Baltimore, 92: 40-5, 1961.

DANIEL, R.M.; LIMMER, A.W.; STEELE, K.N. & SMITH, I.M. Anaerobic growth, nitrate reduction and denitrification in 46 *Rhizobium* strains. *J. Gen. Microbiol.*, London, 128: 1811-15, 1982.

DAY, P.R.; DONER, M.E. & McLAREN, A.D. Relationships among microbial populations and rates of nitrification and denitrification in a Hanford Soil. In: NIELSEN, D.R. & MacDONALD, J.G., ed. Nitrogen in the environment, New York, Academic Press, 1978. v.2, p. 305-63.

DeDATTA, S.K.; TAURO, A.C. & BALAOING, S.N. Effect of plant type and nitrogen level on the growth characteristics and grain yield of indica rice in the tropics. Agron. J., Madison, 60: 643-7, 1968a.

DeDATTA, S.K.; MANGNAYE, C.P. & MOOMAW, J.C. Efficiency of
15
fertilizer nitrogen (¹⁵N-labelled) for flooded rice. In:
INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 9. Adelaide,
Transaction. SSSA. 1968b. IV: 67-76.

DeDATTA, S.K. Fertilizer management for efficient use in
Wetland rice soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH
INSTITUTE. Soils and rice. Los Baños, IRRI, 1978. p.671-
701.

DeDATTA, S.K. Principles and practices of rice production.
New York, Wiley, 1981. 618p.

DeGROOT, G.N. & STOUTHAMER, A.H. Regulation of reductase
formation in *Proteus mirabilis*. II. Influence of growth
with azide and of haem difficulty on nitrate reductase
formation. Biochem. Biophys. Acta., Amsterdam, 208: 414-
27, 1970.

DELWICHE, C.C.; BISSELL, S. & VIRGINIA, R. Soil and other sources of nitrous oxide. In: NIELSEN, D.R. & MacDONALD, J.G., ed. Nitrogen in the environment. New York, Academic Press, v.1, p. 459-56, 1978.

DELWICHE, C.C. Production and utilization of nitrous oxide by *Pseudomonas denitrificans*. J. Bacteriology, Washington, 77: 55-9, 1959.

DELWICHE, C.C.; & BRYAN, B.A. Denitrification. Ann. Rev. Microbiol., Palo Alto, 30: 241-62, 1976.

DELWICHE, C.C. The nitrogen cycle. Sci. Amer., New York, 23: 137-46, 1970.

DELWICHE, C.C. The nitrogen cycle and nitrous oxide. In: DELWICHE, C.C., ed. Denitrification, nitrification and atmospheric nitrous oxide. New York, John Wiley, 1981.

DENMEAD, O.T.; FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R. A closed ammonia cycle within a plant canopy. Soil Biol. Biochem. Oxford, 8: 161-4, 1976.

- DENMEAD, O.T.; FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R. Atmospheric dispersion of ammonia during application of anhydrous ammonia fertilizer. J. Environ. Quality., Wisconsin, 11: 568-72, 1982.
- DENMEAD, O.T.; NULSEN, R. & THURTELL, G.W. Ammonia exchange over a corn crop. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 840-42, 1978.
- DENMEAD, O.T.; SIMPSON, J.R. & FRENEY, J.R. Ammonia flux into the atmosphere from a grazed pasture. Science, Washington, 185: 609-10, 1974.
- DENMEAD, O.T.; SIMPSON, J.R. & FRENEY, J.R. A direct field measurement of ammonia emission after injection of anhydrous ammonia. Soil Sci. Soc. Am. J., madison, 41: 1001-4, 1977.
- DENMEAD, O.T. Micrometeorological methods for measuring gaseous losses of nitrogen in the field. In: FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R., ed. Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems. The Hague. Martinus Nijhoff, 1983. p. 133-57.
- DOELLE, H.W. Bacterial matabolism. 2.ed. New York, Academic Press. 1975. 517p.

DOMMERGUES, Y. & MANGENOT, F. *Ecologie microbienne du Sol*.
Paris, Masson, 1970. 796p.

DONER, H.E. & McLAREN, A.D. Soil nitrogen transformations:
a modeling study. In: NRIAGU, J.O., ed., *Environmental
Biogeochemistry*. Michigan, Ann. Arbor Science, v.1., p.
245-58, 1976.

DOWNEY, R.J. Characterization of a reduced nicotinamide
adenine dinucleotide phosphate-nitrate reductase from
Aspergillus nidulans. *J. Bacteriology*, Washington, 105:
759-68, 1971.

DUBEY, H.D. & FOX, R.H. Denitrification losses from humid
tropical soils of Puerto Rico. *Soil Sci. Soc. Amer.
Proc.*, Madison, 38: 917-20, 1974.

DuPLESSIS, M.C.F. & KROONTJE, W. The relationship between pH
and ammonia equilibria in soil. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*,
Madison, 28: 751-4, 1964.

DuPLESSIS, M.C.F. & KROONTJE, W. The effect of carbon
dioxide on the chemisorption of ammonia by base saturated
clays. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, Madison, 30: 693-6,
1966.

ERNST, J.W. & MASSEY, H.F. The effects of several factors on volatilization of ammonia formed from urea in the soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 24: 87-90, 1960.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA (EMBRAPA).
Fundamentos para a cultura do arroz irrigado. Fundação
Cargill, Campinas, 1985. 317p.

FALCONE, A.B.; SHUG, A.L. & NICHOLAS, D.J.D. Oxidation of hydroxylamine by particles from Nitrosomonas. Biochem. Biophys. Res. Commun., New York, 9: 126-31, 1962.

FARQUHAR, G.D.; WETSELAAR, R. & WEIR, B. Gaseous nitrogen losses from plants. In: FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R., ed. Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems. The Hague, Martinus Nijhoff, 1983. p. 159-80.

FEAGLEY, S.E. & HOSSNER, L.R. Ammonia volatilization reactions mechanisms between ammonium sulfate and carbonate systems. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 364-67, 1978.

FEDEROVA, R.I.; MILEKHINA, E.I. & ILLYUKHINA, N.I.
Evaluation of the method of "gas metabolism" for
detecting extraterrestrial life. Identification of
nitrogen fixing microorganisms. Izv. Akad. Nauk. SSSR.
Serv. Biol., Moscow, 6: 797-806, 1973.

FENN, L.B. & ESCARZAGA, R. Ammonia volatilization from
surface applications of ammonium compounds on calcareous
soils: V. Soil water content and method of nitrogen
application. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 40: 537-41,
1976.

FENN, L.B. & ESCARZAGA, R. Ammonia volatilization from
surface applications of ammonium compounds to calcareous
soils: VI. Effects of initial soil water content and
quantity of applied water. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison,
41: 358-62, 1977.

FENN, L.B. & KISSEL, D.E. Ammonia volatilization from
surface applications of ammonium compounds on calcareous
soils. I. General theory. Soil Sci. Soc. Am. Proc.,
Madison, 37: 855-59, 1973.

FENN, L.B. & KISSEL, D.E. Ammonia volatilization from surface applications of ammonium compounds on calcareous soils. II. Effects of temperature and rate of ammonium nitrogen application. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 38: 606-10, 1974.

FENN, L.B. & KISSEL, D.E. The influence of cation exchange capacity and depth of incorporation on ammonia volatilization from ammonium compounds applied to calcareous soils. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 40: 394-8, 1976.

FERRAZ, E.C. Ecofisiologia do arroz. In: CASTRO, P.R.C., FERREIRA, S.O. & YAMADA, T., ed. Ecofisiologia da produção agrícola. Piracicaba, Associação Brasileira para pesquisa da potassa e do fosfato, 1987. p. 185-202.

FIEDLER, R. & PROKSCH, G. The determination of nitrogen-15 by emission and mass spectrometry in biochemical analysis: A review. Anal. Chim. Acta, Amsterdam, 78: 1-62, 1975.

FILLERY, I.R.P.; ROGER, P.A. & DeDATTA, S.K. Ammonia volatilization from nitrogen sources applied to rice fields. II: floodwater properties and submerged photosynthetic biomass. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 50: 86-91, 1986.

FILLERY, I.R.P. & DeDATTA, S.K. Ammonia volatilization from nitrogen sources applied to rice fields. I: Methodology, ammonia fluxes, and nitrogen-15 loss. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 50: 80-6, 1986.

FILLERY, I.R.P. & VLEK, P.L.G. The significance of denitrification of applied nitrogen in fallow and cropped rice soils under different flooding regimes. Plant and Soil, The Hague, 65: 153-69, 1982.

FILLERY, I.R.P. Biological denitrification. In: FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R. Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems. The Hague, Martinus Nijhoff, 1983. p. 33-64.

FIRESTONE, M.K. Biological denitrification. In: STEVENSON, F.J.; BREMNER, J.M.; HAUCK, R.D. & KEENEY, D.R., ed. Nitrogen in agricultural soils. Madison, American Society of Agronomy, 1982. p. 289-326. (Agronomy, 22).

FOCHT, D.D.; STOLZY, L.H. & MEEK, B.D. Sequential reduction of nitrate and nitrous oxide under field conditions brought about by organic amendments and irrigation management. Soil Biol. Biochem. Oxford. 11: 370-46, 1974.

FOCHT, D.D. & STOLZY, L.H. Long-term denitrification studies¹⁵ in soils fertilized with (NH) SO . Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 894-8, 1978.
4 2 4

FOCHT, D.D.; VALORAS, N. & LETEY, J. Use of interfaced gas chromatography mass spectrometry for detection of concurrent mineralization and denitrification. J. Environ. Quality., Wisconsin, 9: 218-23, 1980.

FOCHT, D.D. & VERSTRAETE, W. Biochemical ecology of nitrification and denitrification. In: ALEXANDER, M., ed. Advances in microbial ecology., New York, Plenum Press, 1977. p. 135-214.

FOCHT, D.D. The effect of temperature, pH and aeration on the production of nitrous oxide and gaseous nitrogen - a zero order kinetic model. Soil Sci., Baltimore, 118: 173-79, 1974.

FOCHT, D.D. Methods for analysis of denitrification in soils. In: NIELSEN, D.R. e MacDONALD, J.G., ed. Nitrogen in the environment. New York, Academic Press, 1978, v.2, p. 433-523.

FONSECA, H.; SOAVE, J.; AZZINI, N.V.; BANZATTO & CAMARGO, O.B.A. Arroz: produção, pré-processamento e transformação agroindustrial ESALQ/USP/IAC. Secretaria Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1983. v.1, 358p.

FRENEY, J.R.; DENMEAD, O.T. & SIMPSON, J.R. Nitrous oxide emission from soils at low moisture content. Soil Biol. Biochem., Oxford, 11: 167-73, 1979.

FRIED, M.; ZSOLDOS, F.; VOSE, P.B. & SHATOKHIN, I.L. Characterizing the nitrate and ammonium uptakes process of rice roots by use of ¹⁵N-labeled ammonium nitrate. Physiol. Plant., Copenhagen, 18: 313-20, 1965.

FRIED, M. & BROESHART, H. Priming effect of nitrogen fertilizers on soil nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison 38: 858, 1974.

GARCIA, J.L. & TIEDJE, J.M. Denitrification in rice soils.
In: DOMMERGUES, Y.R. & DIEM, H.G., ed. Microbiology of
tropical soils and plant productivity. The Hague,
Martinus Nijhoff, 1982. p. 187-208.

GARCIA, J.L. Reduction de l'oxyde nitreux dans les sols de
rizieres du Senegal: Mesure de l'activité dénitrifiante.
Soil Biol. Biochem., Oxford. 6: 79-84, 1974.

GARCIA, J.L. Evaluation de la dénitrification dans les
rizieres par la methode de reduction de N O. Soil Biol.
Biochem., Oxford, 7: 251-6, 1975a.
2

GARCIA, J.L. Effect rhizosphere du riz sur la
dénitrification. Soil Biol. Biochem., Oxford, 7: 139-41,
1975b.

GARCIA, J.L. La dénitrification dans les sols. Bull. Inst.
Pasteur. Paris, 73: 167-93, 1975c.

GARCIA, J.L. Analyse de differents groupes composant la
microflore dénitrifiante de sols de riziére du Sénégal.
Ann. Microbiol. Inst. Pasteur, Paris, 128A: 433-46,
1977.

GARDINER, R.T. The effect of moisture stress and nitrogen fertilization on the disposition of mineral nitrogen during crop growth. Saskatoon, University of Saskatchewan, 1964. 120p. (M.Sc. - University of Saskatchewan).

GASSER, J.K.R. Some factors affecting the losses of ammonia from urea and ammonium sulfate applied to soils. J. Soil Sci., Neasden, 15: 258-72, 1964.

GAYON, U. & DUPETIT, F. Recherches sur la réduction des nitrates par les infiniment petits. Bordeaux, Soc. Sci. Phys. Nat., 1886. v.2, p. 201-307, (série 3).

GERBERG, R.; KROHN, K.; PEEK, N. & GOLDMAN, C.R.
Denitrification studies with ¹³N-labelled nitrate.
Science, Washington, 192: 1229-31, 1976.

GREENWOOD, D.J. The effect of oxygen concentration on the decomposition of organic materials in soils. Plant and Soil, The Hague, 14: 360-76, 1961.

GOODY, R. Time variations in atmospheric N²O in eastern Massachussets. Plan. Space Sci., London, 17: 1319-26, 1969

- HALL, J.B. Nitrate reducing bacteria. In: SCHLESSINGER, D., ed. Microbiology American Society for Microbiology. Washington, 1978. p. 296-98.
- HAUCK, R.D. & BREMNER, J.M. Use of tracers for soil and fertilizer nitrogen research. Adv. Agron., New York, 28: 219-66, 1976.
- HAUCK, R.D. & MELSTEAD, S.W. Some aspects of the problem of evaluating denitrification in soils. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 20: 361-4, 1956.
- HAUCK, R.D. Quantitative estimates of nitrogen cycle processes: concepts and review. In: Nitrogen in soil-plant studies. Sofia, 1969. Proceedings. Vienna. IAEA. 1971.
- HAUCK, R.D. Nitrogen tracers in nitrogen cycle studies - past use and future needs. J. Environ. Qual., Wisconsin, 2(3): 317-27, 1973.
- HAUCK, R.D. Critique of field trials with isotopically labeled nitrogen fertilizer. In: NIELSEN, D.R. & McDONALD, J.G., ed. Nitrogen in the environment. Academic Press, New York, 1978. v.1, p. 63-77.

HAUCK, R.D. Methods for studying N transformations in paddy soils: review and comments. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and rice. Los Baños, IRRI. 1979. p. 73-94.

HAUCK, R.D. Field measurement of denitrification - an overview. In: HAUCK, R.D. & WEAVER, R.W., ed. Field measurement of dinitrogen fixation and denitrification., Madison, SSSA, 1986. p. 59-72 (special publication no. 18).

HOLLOCHER, T.C.; GARBERS, E.; COOPER, A.J.L. & REIMAN, R.F.
13 15
N, N isotope kinetic evidence against hyponitrite as an intermediate in denitrification. J. Biol. Chem., Baltimore, 255: 5027-30, 1980.

HUTCKINSON, G.L. & MOSIER, A.R. Improved soil cover method for field measurement of nitrous oxide fluxes. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 45: 311-16, 1981.

HYNES, R.K. & KNOWLES, R. Inhibition by acetylene of ammonia oxidation in *Nitrosomonas europaea*. FEMS. Microb. Lett., Amsterdam, 4: 319-21, 1978.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. (IAEA) Rice fertilization. IAEA, Vienna, 1970. 177p. (Technical reports series 108).

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. (IAEA) Tracer manual on crops and soils. IAEA, Vienna, 1976. 277p. (Technical reports series 171).

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. (IAEA) Isotopes studies on rice fertilization. IAEA, Vienna, 1978. 134p. (Technical reports series 181).

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. (IAEA) A guide to the use of nitrogen-15 and radioisotopes in studies of plant nutrition: calculations and interpretation of data. IAEA, Vienna, 1983. 64p. (Technical document 288).

INGRAHAM, J.L. Microbiology and genetics of denitrifiers. In: DELWICHE, C.C. ed. Denitrification, nitrification, and atmospheric nitrous oxide. John Wiley, New York. 1981. p.45-66.

IWASAKI, H.; SHIDARA, S.; SUZUKI, H. & MORI, T. Studies on denitrification. VII. Further purification and properties of denitrifying enzymes. J. Biochem., Tokyo, 53: 299-303, 1963.

IWASAKI, H. & MATSUBARA, T. A nitrite reductase from *Achromobacter cyclocastes*. J. Biochem., Tokyo, 71: 645-52, 1972.

JANSSON, S.L. & CLARK, F.E. Losses of nitrogen during decomposition of plant material in the presence of inorganic nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 16: 330-4, 1952.

JANSSON, S.L. Nitrogen transformation in soil organic matter. In: USE OF ISOTOPES IN SOIL ORGANIC MATTER STUDIES, BRUNSWICK VOLKENRODE, 1963. FAO/IAEA Report. Pergamon Press, New York, 1966. p.415-22.

JANSSON, S.L. Role of humus decomposition in the terrestrial nitrogen cycles. In: INTERNATIONAL MEETING ON HUMIC SUBSTANCES. PUDOC, 1971. Proceedings. Wageningen, SAS, 1972.

JETER, R.M. & INGRAHAM, J.L. Denitrifying procariotes. In: STARR, M.P., ed. The procariotes. Spring-Verlag, New York. 1981. v.1, p.913-25.

JEWITT, T.N. Loss of ammonia from ammonium sulfate applied to alkaline soils. Soil Sci. Baltimore. 54: 401-9, 1942.

JONH, P. & WHATLEY, F.R. Oxidative phosphorylation coupled to oxygen uptake and nitrate reduction in *Micrococcus denitrificans*. *Biochem. Biophys. Acta.*, Amsterdam, 216: 342-52, 1970.

KAI, H. & WADA, K. Chemical and biological immobilization of nitrogen in paddy soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Soil and Rice. IRRI Los Baños, 1979. p.157-74.

KASPAR, H.F.; TIEDJE, J.M. & FIRESTONE, R.B. Denitrification and dissimilatory nitrate reduction to ammonium by digested sludge. *Can. J. Microbiol.* Ottawa, 27: 878-85, 1981.

KEENEY, D.R. Nitrogen management for maximum efficiency and minimum pollution. In: STEVENSON, F.J. Nitrogen in agricultural soils. Madison, American Society of agronomy 1982. p.605-50 (Agronomy 22).

KESSEL, J.F. van. Influence of denitrification in aquatic sediments on the nitrogen content of natural waters. *Agricultural Research*, Wageningen, 1976. iv, (Agricultural research report, 858).

KISSEL, D.E.; BREWER, H.L. & ARKIN, G.F. Design and test of a field sampler for ammonia volatilization. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 41: 1133-8, 1977.

KISSEL, D.E. & SMITH, S.J. Fate of fertilizer nitrate applied to coastal bermudagrass on a swelling clay soil. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 77-80, 1978.

KLEMEDTSSON, L.; SVENSSON, B.H.; LINDBERG, T. & ROSSWALL, T. The use of acetylene inhibition of nitrous oxide reductase in quantifying denitrification in soils. Swed. J. Agric. Res. 7: 179-85, 1977.

KLUYVER, A.J. & VERHOEVEN, N. Studies on true dissimilatory nitrate reduction. II. The mechanism of denitrification. Antonie van Leeuwenhoek J. Microb. Serol., Amsterdam, 20: 241-62, 1954.

KNOWLES, R. & DENIKE, D. Effect of ammonium-nitrite and nitrate-nitrogen on anaerobic nitrogenase activity in soil. Soil Biol. Biochem., Oxford, 6: 353-58, 1974.

KODAMA, T. Effects of growth conditions on formation of cytochrome systems of a denitrifying bacterium *Pseudomonas stutzeri*. Plant Cell Physiol., Tokyo, 11: 231-39, 1970.

KOYAMA, T.; SHIBUYA, M.; TOKUYASU, T; SHIMOMURA, T. & IDE, K. Balance sheet and residual effects of fertilizer nitrogen in saga paddy field. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON SOIL ENVIRONMENT AND FERTILITY MANAGEMENT IN INTENSIVE AGRICULTURE. Tokyo. 1977. Preceedings. Tokyo, Society of the Science of Soil and Manure, 1977. p. 289-96.

KOYAMA, T. & APP, A. Nitrogen balance in flooded rice soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. IRRI, Los Baños, 1979. p.95-104.

KRESGE, C.B. & SATCHELL, D.P. Gaseous loss of ammonia from nitrogen fertilizers applied to soil. Agron. J., Madison, 52: 104-107, 1960.

KRISTJANSSON, J.K. & HOLLOCHER, T.C. Substrate binding site for nitrate reductase of Escherichia coli is on the inner aspect of the membrane. J. Bacteriol., Baltimore, 137: 1227-33, 1979.

KUNDLER, P. Utilization, fixation and loss of fertilizer nitrogen (review of international results of the last 10 years basic research). Albrecht-Thaer-Arch. 14: 191-210, 1970.

- LEGG, J.O. & ALLISON, F.E. Recovery of ¹⁵N-tagged nitrogen from ammonium-fixing soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 23: 131-4, 1959.
- LEGG, J.O. & MEISINGER, J.J. Soil nitrogen budgets. In: STEVENSON, F.J., ed. Nitrogen in agricultural soils. Madison, American Society of Agronomy. 1982. p.503-66. (Agronomy, 22).
- LOWENSTEIN, H.; ENGELBERT, L.E.; ATTOE, O.J. & ALLEN, O.N. Nitrogen loss in gaseous form from soils as influenced by fertilizers and management. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 21: 397-400, 1957.
- MACRAE, J.C. & ANCAJAS, R. Volatilization of ammonia from submerged tropical soils. Plant and Soil, The Hague, 33: 97-103, 1970.
- MALAVOLTA, E. & FORNASIERI FILHO, D. Nutrição mineral da cultura do arroz, In: FERREIRA, M.E., YAMADA, T. & MALAVOLTA, E., ed. Cultura do arroz de sequeiro - fatores afetando a produtividade. Piracicaba, Instituto da Potassa e do Fosfato, 1983. p. 95-140.

MALAVOLTA, E. Nutrição mineral e adubação do arroz de sequeiro. São Paulo, Ultrafertil, 1978. 36p.

MANGUIAT, J.J. & BROADBENT, F.E. Recoveries of tagged N¹⁵ (N-labelled) under some management practices for lowland rice. Philipp. Agric., Laguna, 60: 367-77, 1969.

MARION, G.M. & DUTT, G.R. Ion association in the ammonia - carbon - dioxide - water system. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 38: 889-91, 1974.

MARTENS, C.S. & BERNER, R.A. Methane production in the interstitial water of sulfate depleted marine sediments. Science, Washington, 185: 1167-69, 1974.

MARTIN, J.P. & CHAPMAN, H.D. Volatilization of ammonia from surface fertilized soils. Soil Sci. Baltimore, 71: 25-34, 1951.

MARTIN, A.E. & ROSS, P.J. A nitrogen balance study using labelled fertilizer in a gas lysimeter. Plant and Soil, The Hague, 28: 182-6, 1968.

MATSUBARA, T. & IWASAKI, H. Nitric oxide activity of *Alcaligenes faecalis* cytochrome cd. J. Biochem., Tokyo. 72: 57-62, 1972.

- MATSUBARA, T. & MORI, T. Studies on denitrification. IX. Nitrous oxide, its production and reduction to nitrogen. J. Biochem., Tokyo, 64: 863-71, 1968.
- MATSUBARA, T. The participation of cytochromes in the reduction of N_2O to N_2 by a denitrifying bacterium. J. Biochem., Tokyo, 77: 627-32, 1975.
- McELROY, M.B. Chemical processes in the solar system. A Kinetic perspective. Int. Rev. Sci. Phys. Chem. Ser. 29: 127, 1976.
- MCGARITY, J.M. Denitrification studies on some South Australian soils. Plant and Soil, The Hague, 14: 1-21, 1961.
- MEEK, B.D. & MACKENZIE, A.J. The effect of nitrite and organic matter on aerobic gaseous losses of nitrogen from a calcareous soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 29: 176-8, 1965.
- MEEK, B.D.; GRASS, L.B. & MACKENZIE, A.S. Applied nitrogen losses in relation to oxygen status of soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 33: 575-78, 1969.

- MIKKELSEN, D.S.; DeDATTA, S.K. & OBCEMEA, W.N. Ammonia volatilization losses from flooded rice soils. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 296-300, 1978.
- MIKKELSEN, D.S. & DeDATTA, S.K. Ammonia volatilization from Wetland rice soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and rice. Los Baños, IRRI, 1979. p. 135-56.
- MITSUMI, S. Inorganic nutrition fertilization and amelioration for lowland rice. Yokendo, Tokyo, 1954. 107p.
- MIYATA, M.; MATSUBARA, T. & MORI, T. Studies on denitrification, XI. some properties of nitric oxide reductase. J. Biochem., Tokyo, 66: 759-65, 1969.
- MIYATA, M. & MORI, T. Studies on denitrification. X. The "denitrifying enzyme" as a nitrite reductase and the electron donating system for denitrification. J. Biochem., Tokyo, 66: 463-71, 1969.
- MIYATA, M. Studies on denitrification. XIV. The electron donating system in the reduction of nitric oxide and nitrate. J. Biochem., Tokyo, 70: 205-13, 1971.

MOE, P.G. Nitrogen losses from urea as affected by altering soil urease activity. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 31: 380-2, 1967.

MORTLAND, M.M. Absorption of ammonia by clays and muck. Soil Sci., Baltimore. 80: 11-18, 1955.

MOSIER, A.R.; STILLWELL, M.; PARTON, W.J. & WOODMANSEE, R.G. Nitrous oxide emissions from a native shortgrass prairie. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 45: 617-19, 1981.

MOSIER, A.R. & MACK, L. Gas chromatographic system for precise rapid analysis of nitrous oxide. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 44: 1121-3, 1980.

MUELLER, S.; GOMES, A. da S. & BRAUNER, J.L. Análise de nitrogênio em tecidos de três cultivares de arroz. Pesq. agropec. bras., Brasília, 19(9): 1085-90, 1984.

MULVANEY, R.L. Comparison of procedures for reducing cross-contamination in nitrogen-15 tracer research. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 50: 92-6, 1986.

• MURAYAMA, N. The importance of nitrogen for rice production. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE, Nitrogen and rice. Los Baños, IRRI, 1979. p. 5-23.

NAKAYA, N. & ONIKURA, Y. A case study on the effect of rice-straw incorporation in flooded soil, emphasizing the fate of ammonium nitrogen. J. Sci. Soil Manure., Japan. 45: 546-48, 1974.

NELSON, D.W. Gaseous loss of nitrogen other than through denitrification. In: STEVENSON, F.J., ed., Nitrogen in agricultural soils. Madison, American Society of Agronomy. Agronomy 22, 1982. p.327-64.

NEYRA, C.A.; DOBEREINER, J.; LALANDE, R. & KNOWLES, R. Denitrification by N²-fixing *Spirillum lipoferum*. Can. J. Microbiol., Ottawa, 23: 300-5, 1977.

NOMMIK, H. & NILSSON, K. O. Nitrification and movement of anhydrous ammonia in soil. Acta Agric. Scand. Stockolm. 13: 205-219, 1963.

NOMMIK, H. Investigation on denitrification in soil. Acta Agric. Scand. Stockolm. 6: 195-228, 1956.

NOMMIK, H. Ammonium fixation and other reactions involving a nonenzymatic immobilization of mineral nitrogen in soil. In: BARTHOLOMEW, W.V. & CLARK, F.E., ed., Soil nitrogen. Madison, American Society of Agronomy, 10. 1965. p.198-258.

NOMMIK, H. Assessment of volatilization loss of ammonia from surface-applied urea on forest soil by N¹⁵ recovery. Plant and Soil, The Hague, 38: 589-603, 1973.

OH, W.K. Effect of incorporation of organic materials on paddy soils. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and rice. Los Banos. 1979. p.436-449.

O'HARA, G.W. & DANIEL, R.M. Rhizobial denitrification: a review. Soil Biol. Biochem. Oxford, 17: 1-9, 1985.

OKUDA, A.; TAKAHASI, E. & YOSHIDA, M. On the volatilization of the ammonia transformed from urea applied under upland and waterlogged conditions. J. Sci. Soil Manure. Japan, 31: 273-278, 1960.

OVERREIN, L.M. & MOE, P.G. Factors affecting urea hydrolysis and ammonia volatilization in soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 31: 57-61, 1967.

PARKIN, T.B.; KASPAR, H.F.; SEXSTONE, A.J. & TIEDJE, J.M. A gas-flow soil core method to measure field denitrification rates. Soil Biol. Biochem., Oxford. 16: 323-30, 1984.

PARKIN, T.B.; SEXSTONE, A.J. & TIEDJE, J.M. Comparison of field denitrification rates determined by acetylene-based soil core and nitrogen-15 methods. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 49: 94-99, 1985.

PARR, J.F., Jr.; & PAPENDICK, R.I. Retention of anhydrous ammonia by soil. II. Effect of ammonia concentration and soil moisture. Soil Sci., Baltimore, 10: 109-19, 1966.

PATNAIK, S. & RAO, M.V. Sources of nitrogen for rice production. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and rice. IRRI, Los Baños, 1979. p.25-44.

PATNAIK, S. ¹⁵N tracer studies on the transformation of applied nitrogen in submerged rice soils. Proc. Indian Acad. Sci., New Delhi, 61: 25-30, 1965.

PATRICK, W.H., Jr. & DELAUNE, R.D. Characterization of the oxidized and reduced zones in flooded soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 36: 573-6, 1972.

PATRICK, W.H., Jr. & GOTOH, S. The role of oxygen in nitrogen loss from flooded soils. Soil Sci., Baltimore, 18: 78-81, 1974.

PATRICK, W.H., Jr. & REDDY, K.R. Nitrification-denitrification reactions in flooded soils and water bottoms: dependence on oxygen supply and ammonium diffusion. J. Environ. Qual., Wisconsin, 5: 469-72. 1976a.

PATRICK, W.H., Jr. & REDDY, K.R. Fate of fertilizer nitrogen in a flooded rice soil. Soil Sci. Soc. Am. J. Madison, 40: 678-81, 1976b.

PATRICK, W.H., Jr. & STURGIS, M.B. Concentration and movement of oxygen as related to absorption of ammonium and nitrate nitrogen by rice. Soil Sci. Soc. Am. Proc. Madison, 19: 59-62, 1955.

PATRICK, W.H., Jr. Nitrate reduction rates in a submerged soil as affected by redox potential. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 7. Madison, Transaction, SSSA. 1960. II. 5: 494-50.

PATRICK, W.H., Jr. Nitrogen transformations in submerged soils. In: STEVENSON, F.J., ed., Nitrogen in agricultural soils. Madison, American Society of Agronomy, Agronomy 22, 1982. p.449-466.

PATRIQUIN, D.G.; MACKINNON, J.G. & WILKIE, K.I. Seasonal patterns of denitrification and leaf nitrate reductase activity in a corn field. Can. J. Soil. Sci. Ottawa, 58: 283-85, 1978.

PAUL, E.A. & VICTORIA, R.L. Nitrogen transfers between the soil and atmosphere. In: KRUMBEIN, W.E., ed. Environmental biogeochemistry and geomicrobiology., Michigan, Ann Arbor Science. 1978. v.2, p. 525-41.

PAYNE, W.J.; RILEY, P.S. & COX Jr., C.P. Separate nitrate, nitric oxide, and nitrous oxide reducing fractions from *Pseudomonas perfectomarinus*. J. Bacteriol., Baltimore, 106: 356-61, 1971.

PAYNE, W.J.; SHERR, B.F. & CHALMERS, A. Nitrification-denitrification associated with plant root. In: VOSE, P.B. & RUSCHEL, A.P., ed., Associative N fixation. CRC Press, Florida, 1981, v.1, p.37-48.

PAYNE, W.J. Reduction of nitrogenous oxide by microorganisms. Bacteriol. Rev., Baltimore, 37: 409-52, 1973.

- PAYNE, W.J. The status of nitric oxide and nitrous oxide as intermediates in denitrification. In: DELWICHE, C.C., ed., Denitrification, nitrification and atmospheric nitrous oxide. New York, John Wiley, 1981. p.85-104.
- PERUCCI, P.; GIUSQUIANI, P.L. & SCARPONI, L. Nitrogen losses from added urea and urease activity of a clay-loam soil amended with crop residues. Plant and Soil, The Hague, 69(3): 457-63, 1982.
- PICHINOTY, F.; BIGLIARDI-ROUVIER, J.; MANDEL, M.; GREENWAY, B.; METENIER, G. & GARCIA, J.L. The isolation and properties of a denitrifying bacterium of the genus Flavobacterium. Antonie van Leeuwenhoek, J. Microbiol. Serol., Amsterdam, 42: 349-54, 1976.
- PICHINOTY, F.; MANDEL, M. & GARCIA, J.L. The properties of novel mesophilic denitrifying Bacillus culture found in tropical soil. J. Gen. Microbiol., London, 115: 419-30, 1979.
- PICHINOTY, F. La réduction bactérienne des composés oxygénés minéraux de l'azote. Bull. Inst. Pasteur, Paris. 71: 317-95, 1973.

PICHINOTY, F. A propos des nitrate-reductases d'une bacterie denitrifiante. Biochem. Biophys. Acta., Amsterdam. 89: 378-81, 1964.

PICHINOTI, F. Les nitrate reductases bacteriennes. I. Substrats, etat particulaire et inhibiteurs de l'enzyme. Arch. Mikrobiol., Berlin, 68: 51-64, 1969.

PILOT, L. & PATRICK, W.H. Nitrate reduction in soils: effect of soil moisture tension. Soil Sci., Baltimore. 114: 312-16, 1972.

PONNAMPERUMA, F.N. The chemistry of submerged soils. Adv. Agron., New York, 24: 29-96, 1972.

PRASAD, R. & DeDATTA, S.K. Increasing fertilizer nitrogen efficiency in Wetland rice. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Nitrogen and rice. IRRI, Los Baños, 1979. p.465-84.

PRASAD, M. Gaseous loss of ammonia from sulfur-coated urea, ammonium sulfate and urea applied to calcareous soil (pH 7.3). Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 40: 130-4, 1976.

PRATT, P.F.; LUND, L.J. & WARNEKE, J.E. Nitrogen losses in relation to soil profile characteristics. In: NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Nitrates in effluents from irrigation lards. California, University of California, 1976. p.141-66 (Annual Report).

RAISON, R.J. & MCGARITY, J.W. Effect of plant ash on nitrogen fertilizer transformations and ammonia volatilization. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 140-3, 1978.

RAO, K.V. & SHINDE, J.E. Transformation of ¹⁵N-labelled urea and its modified forms in tropical Wetland rice culture. Plant and Soil, The Hague, 85: 413-21, 1985.

RASHID, G.H. The volatilization losses of nitrogen from added urea in some soils of Bangladesh. Plant and Soil, The Hague, 48: 549-56, 1977.

REDDY, K.R.; PATRICK, W.H. & PHILLIPS, R.E. Evaluation of selected processes controlling nitrogen loss in flooded soil. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 44: 1241-6, 1980.

REDDY, R.N.S. & PRASAD, R. Studies on the mineralization of urea, coated urea, and nitrification inhibitor treated urea in soil. J. Soil. Sci., Neasden, 26(3): 304-12, 1975.

RENER, E.D. & BECKER, G.E. Production of nitric oxide and nitrous oxide during denitrification by *Corynebacterium nephridii*. J. Bacteriol., Baltimore, 101: 821-5, 1970.

RENNIE, D.A.; RACZ, G.J. & McBEATH, D.K. Nitrogen losses. In: PROCEEDINGS OF WESTERN CANADA NITROGEN SYMPOSIUM. CALGARY, 1976. Proceedings, Edmonton Alberta Agricultural Station, 1976. p.325-53.

ROLSTON, D.E.; FRIED, M. & GODHAMER, D.A. Denitrification measured directly from nitrogen and nitrous oxide gas fluxes. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 40: 259-66, 1976.

ROLSTON, D.E.; HOFFMAN, D.L. & TOY, D.M. Field measurement of denitrification. I. Flux of N_2 and N_2O . Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 863-869, 1978.

ROLSTON, D.E.; BROADBENT, F.E. & GOLDHAMER, D.A. Field measurement of denitrification. II. Mass balance and uncertainty. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 43: 703-8, 1979.

- ROLSTON, D.E. Application of gaseous-diffusion theory to measurement of denitrification. In: NIELSEN, D.R. & MacDONALD, J.G., ed. Nitrogen in the environment. New York, Academic Press, 1978. v.1, p.309-35.
- ROLSTON, D.E. Nitrous oxide and nitrogen gas production. In: DELWICHE, C.C., ed. Denitrification, nitrification, and atmospheric nitrous oxide. John Wiley. New York, 1981. p. 127-49.
- RUMBURG, C.B. & SWEVA, F.A. Accumulation and loss of nitrogen during growth and maturation of cereal rye (*Secale cereale*). Agron. J., Madison, 62: 311-13, 1970.
- RUSSELL, E.W. Soil conditions and plant growth. 10 ed. New York, Longman, 1973. 849p.
- RYDEN, J.C.; LUND, L.J. & FOCHT, D.D. Direct in-field measurement of nitrous oxide flux from soils. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 731-7, 1978.
- RYDEN, J.C.; LUND, L.J.; LETEY, J. & FOCHT, D.D. Direct measurement of denitrification loss from soils. I. Laboratory evaluation of acetylene inhibition of nitrous oxide reduction. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 43: 104-10, 1979a.

RYDEN, J.C.; LUND, L.J.; LETEY, J. & FOCHT, D.D. Direct measurement of denitrification loss from soils. II. Development and application of field methods. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 43: 110-18, 1979b.

RYDEN, J.C. & LUND, L.J. Nature and extent of directly measured denitrification losses from some irrigated vegetable crop production units. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 44: 505-11, 1980.

RYDEN, J.C. & ROLSTON, D.E. The measurement of denitrification. In: FRENEY, J.R. & SIMPSON, J.R., ed. Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems. Martinus Nijhoff, The Hague, 1983. p.91-132.

SAH, R.N. & MIKKELSEN, D.S. Availability and utilization of fertilizer nitrogen by rice under alternate flooding. I. Kinetics of available nitrogen under rice culture. Plant and Soil, The Hague, 75: 221-26, 1983a.

SAH, R.N. & MIKKELSEN, D.S. Availability and utilization of fertilizer nitrogen by rice under alternate flooding. II. Effects on growth and nitrogen use efficiency. Plant and Soil, The Hague, 75: 227-34, 1983b.

SAHRAWAT, K.L. & PONNAMPERUMA, F.N. Measurement of
exchangeable NH_4^+ in tropical rice soils. Soil Sci. Soc.
Am. J., Madison, 42: 282-3, 1978.

SAVANT, N.K. & DeDATTA, S.K. Movement and distribution of
ammonium-N following deep placement of urea in wetland
rice soil. Soil Sci. Soc. Amer. J., Madison, 44: 559-65,
1980.

SAWHNEY, V. & NICHOLAS, D.J.D. Sulphide-linked nitrite
reductase from *Thiobacillus denitrificans* with cytochrome
oxidase activity: purification and properties. J. Gen.
Microbiol., London, 106: 119-28, 1978.

SCHUTZ, K.; JUNGE, C. & ALBRECHT, B. Studies of the
atmospheric N_2O . J. Geophys. Res., Washington, 75: 2230-
40, 1970.

SHIMPI, S.S. & SAVANT, N.K. Ammonia retention in tropical
soils as influenced by moisture content and continuous
submergence. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 39: 153-
4, 1975.

SILVA, P.R.F. da & STUTTE, C.A. Volatilização de nitrogênio pelas folhas de arroz através da transpiração. Lavoura arrozeira, Porto Alegre, 8: 10-18, 1980.

SILVA, P.R.F. da & STUTTE, C.A. Nitrogen volatilization from rice leaves. II. Effects of source of applied nitrogen in nutrient solution. Crop Science, Madison, 21: 913-16, 1981a.

SILVA, P.R.F. da & STUTTE, C.A. Nitrogen loss in conjunction with transpiration from rice leaves as influenced by growth stage, leaf position and N supply. Agron. J., Madison, 73: 38-43, 1981b.

SING, M.; YADAV, D.S. & KUMAR, V. Leaching and transformation of urea in dry and wet soils as affected by irrigation water. Plant and Soil., The Hague, 81(3): 411-20, 1984.

SKERMAN, V.B.D. & MACRAE, I.C. The influence of oxygen availability on the degree of nitrate reduction by *Pseudomonas denitrificans*. Can. J. Microbiol., Ottawa, 3: 505-30, 1957.

SMID, A.E. & BEAUCHAMP, E.G. Effects of temperature and organic matter on denitrification in soil. Can. J. Soil Sci., Ottawa, 56: 385-91, 1976.

SMITH, C.J. & DELAUNE, R.D. Effect of rice plants on nitrification-denitrification loss of nitrogen under greenhouse conditions. Plant and Soil, The Hague, 79(2): 287-90, 1984.

SMITH, M.S.; FIRESTONE, M.K. & TIEDJE, J.M. The acetylene inhibition method for short-term measurement of soil denitrification and its evaluation using Nitrogen-13. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 611-15, 1978.

SMITH, K.A. Soil aeration. Soil Sci., Baltimore, 22: 430-3. 1977.

SREENIVASAN, A. & SUBRAHMANYAN, V. Biochemistry of waterlogged soils. Part IV. Carbon and nitrogen transformations. J. Agric. Sci., Cambridge. 25: 6-21, 1935.

STANFORD, G.J.; LEGG, J.O. & CHICHESTER, F.W.
Transformations of fertilizer nitrogen in soil. I.
Interpretations based upon chemical extractions of
labelled and unlabelled nitrogen. Plant and Soil, The
Hague, 33: 425-35, 1970.

STANFORD, G.; LEGG, J.O.; DZIENIA, S. & SIMPSON, E.C., Jr.
Denitrification and associated nitrogen transformations
in soils. Soil Sci., Baltimore, 120: 147-52, 1975a.

STANFORD, G.; LEGG, J.O. & STANLEY, T.E. Fate of ¹⁵N
labelled nitrate in soils under anaerobic conditions. In:
KLEIN, E.R. & KLEIN, P.D., ed., INTERNATIONAL CONFERENCE
ON STABLE ISOTOPES, 2. Oak Brook, 1975. Proceedings.
Argonne. U.S. Energy and Development. 1975b. III: 667-73.

STANFORD, G.; POL, R.A.V. & DZIENIA, S. Denitrification
rates in relation to total and extractable soil carbon.
Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 39: 284-289, 1975c.

STANGEL, P.J. Nitrogen requirement and adequacy of supply
for rice production. In: INTERNATIONAL RICE RESEARCH
INSTITUTE. Nitrogen and rice, Los Baños, IRRI, 1979. p.
45-69.

STEVENSON, F.J. Origm and distribution of nitrogen in soils.
In: BARTHOLOMEW, W.V. & CLARK, F.E., ed. Soil nitrogen,
Madison, American Society of Agronomy. 1965. p.1-42.
(Agronomy).

ST.JONH, R.T. & HOLLOCHER, T.C. Nitrogen-15 tracer studies
on the pathway of denitrification in *Pseudomonas*
aeruginosa. J. Biol. Chem., Baltimore, 252: 212-18, 1977.

STURGIS, M.B. Changes in the oxidation-reduction in soils as
related to the physical properties of the soil and the
growth of rice. Lousiana State University. Lousiana.
1936. iv. (Agric. Exp. Stn. Bull. 271).

STUTTE, C.A. & WEILAND, R.T. Gaseous nitrogen loss and
transpiration of several crop and weed species. Crop.
Sci., Madison, 18: 887-9, 1978.

TAKAI, Y. & UEHARA, Y. Nitrification and denitrification in
the surface layer of submerged soil. Part I. Oxidation-
reduction condition, nitrogen transformation and
bacterial flora in the surface and deep layers of
submerged soils. J. Sci. soil. Manure, Japan, 44: 403-
502, 1973.

TAKAHASHI, J. Review of investigations on physiological diseases of rice. Part I. Int. Rice. Commun. News Letter., Rome. 9: 1-6, 1960.

TANAKA, A.; PATNAIK, S. & ABICHANDANI, C.T. Studies on the nitrogen nutrition of rice plant (*O. sativa* L.) Part III. Partial efficiency of nitrogen absorbed by rice plant at different stages of growth in relation to yield. Proc. Indian. Acad. Sci., New Delhi, 49: 207-16, 1959.

TENNEY, F.G. & WAKSMAN, S.A. Composition of natural organic materials and their decomposition in the soil. V. Decomposition of various chemical constituents in plant materials under anaerobic conditions. Soil Sci., Baltimore, 30: 143-60, 1930.

TERMAN, G.L. & HUNT, C.M. Volatilization losses of nitrogen from surface-applied fertilizers, as measured by crop response. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 28: 667-72, 1964.

TERRY, R.F.; NELSON, D.W.; SOMMERS, L.E. & MEYER, G.J. Ammonia volatilization from wastewater sludge applied to soil. J. Water Pollut. Control. Fed., Washington, 50: 2657-65, 1978.

TURNER, F.T. & PATRICK, W.H. Chemical changes in waterlogged soils as result of oxigen depletion. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 9. Adelaide. Transaction. ISSA. 1968. IV: 53-65.

TUSNEEM, M.E. & PATRICK, W.H., Jr. Nitrogen transformations in waterlogged soil. Louisiana State University, Louisiana, 1971. 1v. (Agric. Exp. Stu. Bull. 657).

TIEDJE, J.M.; FIRESTONE, R.B.; FIRESTONE, M.K.; BETLACH, M.R.; SMITH, M.S. & CASKEY, W.H. Methods for the production and use of nitrogen-13 in studies of denitrification. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 43: 709-15, 1979.

TRIVELLIN, P.C.; SALATI, E.; MATSUI, E. Preparo de amostras para análise de ¹⁵N por espectrometria de massa. Piracicaba, CENA, 1973. 1v. (Boletim Técnico 2).

TRIPATHI, O.N. & BENARJEE, S.N. Decomposition of urea as such and in the presence of glucose in Sagar soil. Indian Acad. Sci. Proc., New Delhi, 24: 257-62, 1955.

TRIPATHI, O.N. Role of energy-rich materials as conservators in presence of nitrogenous fertilizers in Sagar soil. Indian Acad. Sci. Proc., New Delhi, 27: 215-20, 1958.

USBERTI FILHO, J.A.; AZZINI, L.E.; CAMARGO, O.B.A.; SOAVE, J.; SCHMIDT, N.C. & VILELLA, O.V. IAC-4440: Novo cultivar de arroz irrigado para o estado de São Paulo. Instituto Agrônômico, Campinas, 1986. 1v. (Boletim Técnico, 107).

VANGAI, S. & KLEIN, D.A. Nitrite-dependent dissimilatory microorganisms isolated from Oregon soils. Soil Biol. Biochem., Oxford, 6: 335-39, 1974.

van GENT-RUIJTERS, M.L.W., de URIES, W. & STOUTHAMER. Influence of nitrate on fermentation patterns, molar growth yields and synthesis of cytochrome b in *Propionibacterium pentosaceum*. J. Gen. Microbiol., London, 80: 36-48, 1975.

VENTURA, W.B. & YOSHIDA, T. Ammonia volatilization from a flooded tropical soil. Plant and Soil, The Hague, 46: 521-31, 1977.

VERHOEVEN, W.; KOSTER, A.L. & van NIEVELT, M.C.A. Studies on true dissimilatory nitrate reduction. III. *Micrococcus denitrificans* Beijerinck, a bacterium capable of using molecular hydrogen in denitrification. Antonie van Leeuwenhoek J. Microb. Serol., Amstendan, 20: 273-84, 1954.

VERHOEVEN, W. Studies on true dissimilatory nitrate reduction. V. Nitric oxide production and consumption by micro-organisms. *Antonie van Leeuwenhoek J. Microb. Serol.*, Amsterdam, 22: 385-406, 1956.

VERMAN, R.; SINGH, N. & SARKAR, M.C. Some soil properties affecting loss of nitrogen from urea due to ammonia volatilization. *J. Indian Soc. Soil Sci.*, New Delhi, 22: 80-3, 1974.

VICTORIA, R.L.; COLAÇO, W. & MAGALHÃES, A.M.T. Mineralização e volatilização do nitrogênio do solo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO. 21. CAMPINAS, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 1987 (no prelo).

VIETS, F.G.Jr. The plant's need for and use of nitrogen. In: BARTHOLOMEW, W.V. & CLARK, F.E. *Soil nitrogen*. Madison, American Society of Agronomy 1965. p.503-49. (Agronomy, 10).

VLEK, P.L.G.; BYRNES, B.H. & CRASSWELL, E.T. Effect of urea placement on leaching losses of nitrogen from flooded rice soils. *Plant and Soil.*, The Hague, 54: 441-9, 1980.

VLEK, P.L.G. & CRASSWELL, E.T. Effect of nitrogen source and management on ammonia volatilization losses from flooded rice-soil systems. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 43: 352-58, 1979.

VLEK, P.L.G. & CRASSWELL, E.T. Ammonia volatilization from flooded soils. Fert. Res., London. 2: 227-45, 1981.

VLEK, P.L.G. & STUMPE, J.M. Effect of solution chemistry and environmental conditions on ammonia volatilization losses from aqueous systems. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 42: 416-21, 1978.

VOSE, P. Introduction to nuclear techniques in agronomy and planta biology. New York, Pergamon Press, 1980. 291p.

WAHHAB, A.; RANDHAWO, M.S. & ALAM, I.Q. Loss of ammonium sulfate under different conditions when applied to soils. Soil Sci., Baltimore, 84: 249-55, 1957.

WALTER, H.M.; KEENEY, D.R. & FILLERY, I.R. Inhibition of nitrification by acetylene. Soil Sci. Soc. Am. J., Madison, 43: 195-6, 1979.

- WARING, S.A. & BREMNER, J.M. Ammonium production in soil under waterlogged conditions as an index of nitrogen availability. *Nature*, London, 201: 951-2, 1964.
- WATKINS, S.M.; STRAND, R.F.; DeBELL, D.S. & ESCH, J., Jr. Factors influencing ammonia losses from urea applied to northwestern forest soils. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, Madison, 36: 354-7, 1972.
- WEERARATNA, C.S. & CRASSWELL, E.T. Nitrogen losses from labelled ammonium sulphate and urea applied to a flooded rice soil. *Fert. Res.*, London, 6: 199-203, 1985.
- WENTWORTH, W.E. & FREEMAN, R.R. Measurement of atmospheric nitrous oxide using an electron capture detector in conjunction with gas chromatography. *J. Chromatography.*, Amsterdam, 79: 322-24, 1973.
- WESTERMAN, R.L. & KURZ, L.T. Priming effect of N-labeled fertilizers on soil nitrogen in field experiments. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, Madison, 37: 725-7, 1973.
- WESTERMAN, R.L. & TUKER, T.C. Factors affecting denitrification in a Sonoran Desert soil. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Madison, 42: 596-9, 1978.

WETSELAAR, R.; DENMEAD, O.T. & GALBALLY, I.E. Environmental problems associated with terrestrial nitrogen transformations in agrosystems in the wet monsoonal tropics. In: WETSELAAR, R.; SIMPSON, J.R. & ROSSWALL, T., ed. Nitrogen cycling in South-East Asian wet monsoonal ecosystems. Canberra, Australian Academy of Science, 1981. p.157-164.

WETSELAAR, R. & GANRY, F. Nitrogen balance in tropical agrosystems. In: DOMMERGUES, Y.R. & DIEM, M.G. Microbiology of tropical soils and plant productivity. Martinus Nijhoff, The Hague, 1982. p.1-36.

WIJLER, J. & DELWICHE, C.C. Investigations on the denitrifying process in soil. Plant and Soil, The Hague, 10: 49-77, 1954.

WILLIAMS, W.A.; MIKKELSEN, D.S.; MUELLER, K.E. & RUCKMAN, J.E. Nitrogen immobilization by rice straw incorporated in lowland rice production. Plant and Soil, The Hague, 28: 49-60, 1968.

YEOMANS, J.C. BEAUCHAMP, E.G. Limited inhibition of nitrous oxide reduction in soil in the presence of acetylene. Soil Biol. Biochem, Oxford, 10: 517-19, 1978.

YONEYAMA, T. & YOSHIDA, T. Decomposition of rice residues in tropical soils. I. Nitrogen uptake by rice plants from straw incorporated, fertilizer (ammonium sulfate) and soil. Soil Sci. Plant Nutr., Tokyo, 23: 33-40, 1977a.

YONEYAMA, T. & YOSHIDA, T. Decomposition of rice residue in tropical soils. 2. Immobilization of soil and fertilizer nitrogen by intact rice residue in soil. Soil Sci. Plant Nutr., Tokyo, 23: 41-48. 1977b.

YORDY, D.M. & RUOFF, K.L. Dissimilatory nitrate reduction to ammonia. In: DELWICHE, C.C., ed., Denitrification, nitrification, and atmospheric nitrous oxide. New York. John Wiley. 1981. p.171-90.

YOSHIDA, S. Fundamental of rice science. Los Baños, IRRI, 1981. 269p.

YOSHIDA, T. & ALEXANDER, M. Nitrous oxide formation by *Nitrosomonas europaea* and heterotrophic microorganisms. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 34: 880-2, 1970.

YOSHIDA, T. & ALEXANDER, M. Hydroxylamine oxidation by *Nitrosomonas europaea*. Soil Sci., Baltimore, 111: 307-12, 1971.

YOSHIDA, T. & PADRE, B.C.Jr. Transformation of soil and fertilizer nitrogen in paddy soil and their availability to rice plants. Plant and Soil, The Hague, 47: 113-23, 1977.

YOSHIDA, T. & PADRE, B.C.Jr. Nitrification and denitrification in submerged Maahas clay soil. Soil Sci. Plant Nutr., Tokyo, 20: 241-7, 1974.

YOSHIDA, T. Microbial metabolism of flooded soil. In: PAUL, E.A. & McLAREN, A.D., ed., Soil Biochemistry. New York, Marcel Dekker, 1975. v.3, p.83-122.

YOSHINARI, T.; HYNES, R. & KNOWLES, R. Acetylene inhibition of nitrous oxide reduction and measurement of denitrification and nitrogen fixation. Soil Biol. Biochem., Oxford, 9: 177-83, 1977.

YOSHINARI, T. & KNOWLES, R. Acetylene inhibition of nitrous oxide reduction by denitrifying bacteria. Biochem. Biophys. Res. Comm., New York, 69: 705-10, 1976.

YOSHINAKI, I. Physiology of the rice plant. Adv. Agron., New York, 23: 241-315, 1971.

ZABLOTOWICZ, R.M.; ESKEW, D.L. & FOCHT, D.D. Denitrification in *Rhizobium*. Can. J. Microbiol., Ottawa, 24: 757-60, 1978.

ZABLOTOWICZ, R.M. & FOCHT, D.D. Denitrification and anaerobic nitrate-dependent acetylene reduction in cowpea *Rhizobium*. J. Gen. Microbiol., London. 111: 445-8, 1979.

15
ZIA, M.S. & WARING, S.A. Balance sheet of ¹⁵N labelled urea applied to rice in three Australian vertisols differing in soil organic carbon. Fert. Res., London, 12: 53-65, 1987.

ZUMFT, W.G.; SHERR, B.F. & PAYNE, W.J. A reappraisal of the nitric oxide-binding protein of denitrifying *Pseudomonas*. 31²
Biochem. Biophys. Res. Commun., New York, 88: 1230-6, 1979.

A P E N D I C E

Apêndice 1 - Comparação entre médias das combinações dos fatores solo, tratamento, regime de água e tempo de incubação, através do teste de Tukey para N-orgânico.

NUM.ORDEN	NUM.TRAT.	NOME	NUM.REPET.	MEDIAS	MEDIAS ORIGINAIS	SZ
1	61	2T4A2E1	4	2019.500000	2019.500000	a
2	57	2T4A1E1	4	1998.000000	1998.000000	a
3	41	2T2A1E1	4	1901.750000	1901.750000	b
4	45	2T2A2E1	4	1901.750000	1901.750000	b
5	64	2T4A2E4	4	1778.250000	1778.250000	c
6	63	2T4A2E3	4	1771.250000	1771.250000	c
7	58	2T4A1E2	4	1770.500000	1770.500000	c
8	29	1T4A2E1	4	1746.250000	1746.250000	c
9	25	1T4A1E1	4	1739.000000	1739.000000	c
10	59	2T4A1E3	4	1712.750000	1712.750000	cd
11	62	2T4A2E2	4	1707.250000	1707.250000	cd
12	60	2T4A1E4	4	1658.000000	1658.000000	de
13	49	2T3A1E1	4	1657.500000	1657.500000	de
14	53	2T3A2E1	4	1651.500000	1651.500000	de
15	51	2T3A1E3	4	1625.500000	1625.500000	ef
16	52	2T3A1E4	4	1612.000000	1612.000000	efs
17	50	2T3A1E2	4	1591.500000	1591.500000	efgh
18	55	2T3A2E3	4	1588.500000	1588.500000	efgh
19	54	2T3A2E2	4	1584.500000	1584.500000	efgh
20	56	2T3A2E4	4	1559.750000	1559.750000	fghi
21	13	1T2A2E1	4	1537.750000	1537.750000	ghij
22	42	2T2A1E2	4	1528.500000	1528.500000	hiik
23	9	1T2A1E1	4	1519.000000	1519.000000	hiikl
24	43	2T2A1E3	4	1499.000000	1499.000000	ijklm
25	44	2T2A1E4	4	1468.750000	1468.750000	ijklm
26	26	1T4A1E2	4	1468.250000	1468.250000	ijklm
27	35	2T1A1E3	4	1451.250000	1451.250000	klmno
28	33	2T1A1E1	4	1450.250000	1450.250000	klmno
29	36	2T1A1E4	4	1446.750000	1446.750000	lmnop
30	37	2T1A2E1	4	1444.500000	1444.500000	lmnop
31	34	2T1A1E2	4	1435.500000	1435.500000	mnpqr
32	38	2T1A2E2	4	1421.750000	1421.750000	mnpqr
33	46	2T2A2E2	4	1406.750000	1406.750000	nopqr
34	47	2T2A2E3	4	1374.250000	1374.250000	opqrs
35	28	1T4A1E4	4	1373.750000	1373.750000	opqrs
36	39	2T1A2E3	4	1368.000000	1368.000000	pqrs
37	27	1T4A1E3	4	1364.750000	1364.750000	qrst
38	30	1T4A2E2	4	1355.750000	1355.750000	rst
39	48	2T2A2E4	4	1349.500000	1349.500000	rst
40	40	2T1A2E4	4	1316.750000	1316.750000	stuv
41	17	1T3A1E1	4	1287.000000	1287.000000	tuv
42	18	1T3A1E2	4	1287.000000	1287.000000	tuv
43	19	1T3A1E3	4	1262.750000	1262.750000	uvwx
44	21	1T3A2E1	4	1240.500000	1240.500000	uvwx
45	20	1T3A1E4	4	1233.500000	1233.500000	vw
46	31	1T4A2E3	4	1229.000000	1229.000000	vw
47	23	1T3A2E3	4	1208.000000	1208.000000	vw
48	22	1T3A2E2	4	1207.500000	1207.500000	w
49	24	1T3A2E4	4	1206.500000	1206.500000	w
50	32	1T4A2E4	4	1186.000000	1186.000000	w
51	10	1T2A1E2	4	1089.250000	1089.250000	x
52	11	1T2A1E3	4	1085.250000	1085.250000	x
53	1	1T1A1E1	4	1077.000000	1077.000000	x
54	5	1T1A2E1	4	1073.000000	1073.000000	x
55	2	1T1A1E2	4	1058.500000	1058.500000	xy
56	4	1T1A1E4	4	1056.250000	1056.250000	xy
57	3	1T1A1E3	4	1054.000000	1054.000000	xy
58	12	1T2A1E4	4	1046.000000	1046.000000	xy
59	6	1T1A2E2	4	981.000000	981.000000	yz
60	7	1T1A2E3	4	944.000000	944.000000	z
61	8	1T1A2E4	4	918.750000	918.750000	z{
62	15	1T2A2E3	4	869.750000	869.750000	{}
63	14	1T2A2E2	4	859.750000	859.750000	}
64	16	1T2A2E4	4	801.500000	801.500000	}

MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO
DMS 1% = 87.400065364151 DMS 5% = 79.28788517921448

(1) 1 e 2 (Solo: 1 - Gleí pouco húmico, 2 - Aluvial); T (tratamento: T1 - controle, T2 - uréia, T3 - matéria orgânica, T4 - completo); A (regime de água: A1 - capacidade de campo, A2 - alagamento); E (época, tempo de incubação: E1 - 1 dia, E2 - 6 dias, E3 - 11 dias, E4 - 16 dias).

Apêndice 2 - Transformações do nitrogênio orgânico em função dos tratamentos,, regimes de água e períodos de incubação, nos solos em estudo.

Nitrogênio orgânico									
Tratamento				Regime de água		Tempo de incubação (dias)			
				(1)	(2)				
Controle	Uréia	M. orgânica	Completo	CC	Alag	1	6	11	16
-1									
ug. g									

Apêndice 3 - Efeito dos regimes de água sobre a quantidade de nitrogênio orgânico, influenciado pelos tratamentos, tipos de solo e período de incubação impostos.

Nitrogênio orgânico									
Tratamento				Solo		Tempo de incubação (dias)			
				(1)	(2)				
Controle	Urêia	M. orgânica	Completo	Solo 1	Solo 2	1	6	11	16
-1									
-0,8									

Capacidade de campo

(3)									
1254 A	1392 A	1444 A	1636 A	1250 A	1613 A	1579 A	1404 A	1382 A	1362 A

Alagamento

1183 B	1263 B	1406 B	1599 B	1148 B	1578 B	1577 A	1315 B	1294 B	1265 B
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)

A(T) 20,72

A(S) 14,75

A(t) 20,72

(1) Glei pouco húmico

(2) Aluvial

(3) Média de regime de água; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 4 - Valores de F para contrastes entre os níveis de
tratamento (T) dentro dos fatores solo (S),
níveis de água (A) e tempo de incubação (t).

(1) Níveis de T (fator)	(2) Contraste		
	^ Y1	^ Y2	^ Y3
	-----	-----	-----
T(S)			
(3)			
Solo 1	759,36 XX	176,32 XX	813,85 XX
Solo 2	758,30 XX	27,06 XX	579,17 XX
T(A)			
(4)			
C.C.	752,60 XX	24,51 XX	561,50 XX
Alag.	765,08 XX	183,04 XX	835,09 XX
T(t)			
(5)			
TPo 1	1192,50 XX	292,28 XX	495,50 XX
TPo 6	218,11 XX	172,40 XX	390,18 XX
TPo 11	212,66 XX	204,58 XX	250,78 XX
TPo 16	196,85 XX	249,57 XX	273,25 XX

(1) = controle, uréia, matéria orgânica e completo

^

(2) Y1 = controle versus demais

X = significativo para $\alpha = 0,05$

^

Y2 = uréia versus matéria orgânica

XX = significativo para $\alpha = 0,01$

^

Y3 = uréia + m.orgânica versus completo

(3) solo 1 = Glei pouco húmico; solo 2 = Aluvial

(4) C.C. = capacidade de campo; Alag. = alagamento

(5) TPo = tempo (dias)

Apêndice 5 - Comparação entre médias das combinações dos
fatores solo, tratamento, regime de água e
tempo de incubação, através do teste de Tukey
+
para N-NH.

4						
NÚM. ORDER	NÚM. TRAT.	NOME	NÚM. REPET.	MÉDIAS	MÉDIAS ORIGINAIS	SZ
1	10	1T2A1E2	4	463.000000	463.000000	a
2	15	1T2A2E3	4	455.750000	455.750000	a
3	14	1T2A2E2	4	454.750000	454.750000	a
4	11	1T2A1E3	4	445.500000	445.500000	ab
5	12	1T2A1E4	4	425.750000	425.750000	b
6	16	1T2A2E4	4	400.750000	400.750000	c
7	31	1T4A2E3	4	400.500000	400.500000	c
8	30	1T4A2E2	4	397.750000	397.750000	c
9	46	2T2A2E2	4	374.250000	374.250000	d
10	43	2T2A1E3	4	371.750000	371.750000	d
11	42	2T2A1E2	4	355.250000	355.250000	d
12	32	1T4A2E4	4	324.750000	324.750000	e
13	44	2T2A1E4	4	320.000000	320.000000	e
14	62	2T4A2E2	4	310.000000	310.000000	ef
15	47	2T2A2E3	4	307.750000	307.750000	ef
16	26	1T4A1E2	4	297.500000	297.500000	fg
17	27	1T4A1E3	4	287.750000	287.750000	g
18	48	2T2A2E4	4	259.250000	259.250000	h
19	58	2T4A1E2	4	243.500000	243.500000	hi
20	28	1T4A1E4	4	230.250000	230.250000	ij
21	63	2T4A2E3	4	211.000000	211.000000	jk
22	59	2T4A1E3	4	209.750000	209.750000	k
23	64	2T4A2E4	4	160.500000	160.500000	l
24	60	2T4A1E4	4	158.250000	158.250000	l
25	8	1T1A2E4	4	52.650002	52.650002	n
26	7	1T1A2E3	4	47.625000	47.625000	nn
27	6	1T1A2E2	4	38.974998	38.974998	noo
28	4	1T1A1E4	4	35.474998	35.474998	noop
29	3	1T1A1E3	4	33.299999	33.299999	noopq
30	45	2T2A2E1	4	31.750000	31.750000	noपर
31	38	2T1A2E2	4	31.500000	31.500000	noपरrs
32	29	1T4A2E1	4	30.750000	30.750000	noपरrst
33	40	2T1A2E4	4	29.424999	29.424999	noपरrstu
34	2	1T1A1E2	4	29.174999	29.174999	noपरrstu
35	41	2T2A1E1	4	29.000000	29.000000	noपरrstu
36	39	2T1A2E3	4	28.050001	28.050001	noपरrstu
37	24	1T3A2E4	4	27.824999	27.824999	noपरrstuv
38	61	2T4A2E1	4	27.250000	27.250000	oपरrstuv
39	23	1T3A2E3	4	25.950001	25.950001	oपरrstuvw
40	54	2T3A2E2	4	24.699999	24.699999	oपरrstuvw
41	25	1T4A1E1	4	23.750000	23.750000	oपरrstuvwxy
42	13	1T2A2E1	4	22.750000	22.750000	oपरrstuvwxy
43	22	1T3A2E2	4	22.625002	22.625002	oपरrstuvwxy
44	9	1T2A1E1	4	21.500000	21.500000	oपरrstuvwxy
45	57	2T4A1E1	4	20.250000	20.250000	oपरrstuvwxy
46	55	2T3A2E3	4	20.075001	20.075001	oपरrstuvwxy
47	53	2T3A2E1	4	17.150002	17.150002	परrstuvwxy
48	56	2T3A2E4	4	16.875000	16.875000	परrstuvwxy
49	49	2T3A1E1	4	13.725000	13.725000	परrstuvwxy
50	37	2T1A2E1	4	12.600000	12.600000	rstuvwxy
51	21	1T3A2E1	4	11.775000	11.775000	stuvwxy
52	33	2T1A1E1	4	11.474999	11.474999	tuvwxy
53	17	1T3A1E1	4	11.300001	11.300001	tuvwxy
54	1	1T1A1E1	4	10.900000	10.900000	uvwxy
55	5	1T1A2E1	4	10.750000	10.750000	uvwxy
56	18	1T3A1E2	4	8.025001	8.025001	vxy
57	19	1T3A1E3	4	6.750000	6.750000	xy
58	35	2T1A1E3	4	4.825000	4.825000	xy
59	34	2T1A1E2	4	4.750000	4.750000	xy
60	20	1T3A1E4	4	4.725000	4.725000	xy
61	36	2T1A1E4	4	4.100000	4.100000	xy
62	50	2T3A1E2	4	2.675000	2.675000	y
63	51	2T3A1E3	4	2.150000	2.150000	y
64	52	2T3A1E4	4	1.925000	1.925000	y

MÉDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA INDICADO

ONS 12 = 21.87903242671967

ONS 52 = 19.84829420497894

(1) 1 e 2 (Solo: 1 - Gleí pouco húmico, 2 - Aluvial); T (tratamento: T1 - controle, T2 - uréia, T3 - matéria orgânica, T4 - completo); A (regime de água: A1 - capacidade de campo, A2 - alagamento); E (época, tempo de incubação: E1 - 1 dia, E2 - 6 dias, E3 - 11 dias, E4 - 16 dias).

Apêndice 6 - Transformações do $N-NH_4^+$ em função dos tratamentos, regimes de água e períodos de incubação, nos solos em estudo.

				$N-NH_4^+$					
Tratamento				Regime de água		Tempo de incubação (dias)			
				(1)	(2)				
Controle	Urêia	M. orgânica	Completo	CC	Alag	1	6	11	16
-1									
ug.g									
Glei pouco hêmico									
(3)									
32,4 A	336 A	14,9 A	249 A	146 A	170 A	17,9 A	214 A	213 A	189 A
Aluvial									
15,8 B	256 B	12,4 A	168 B	110 B	116 B	20,4 A	168 B	144 B	119 B

F Solo (S)	365,98 XX	CV (%)	13,93
Tratamento (T)	3492,51 XX	Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)	
Água (A)	43,82 XX	S(T)	9,24
Tempo (t)	1125,18 XX	S(A)	6,53
Sol x Tra (S x T)	77,60 XX	S(t)	9,24
Sol x Agu (S x A)	13,99 XX	X - significativo p/ $\alpha = 0,05$	
Sol x tem (S x t)	50,54 XX	XX - significativo p/ $\alpha = 0,01$	
Tra x Agu (T x A)	31,20 XX		
Tra x tem (T x t)	364,63 XX		
Agu x tem (A x t)	6,41 XX		

(1) - capacidade de campo

(2) - alagamento

(3) - média de solo; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 7 - Efeito dos regimes de água, sobre a quantidade
 de $N-NH_4^+$, influenciado pelos tratamentos, tipos
 de solo e períodos de incubação.

$N-NH_4^+$									
4									
Tratamento				Solo		Tempo de incubação (dias)			
				(1)	(2)				
Controle	Ureia	M. orgânica	Completo	Solo 1	Solo 2	1	6	11	16
-1									
ug.g									
Capacidade de campo									
(3)									
16,7 B	303,9 A	6,4 B	183,8 B	145,9 B	109,6 B	17,7 A	175,5 B	170,2 B	147,6 A
Alagamento									
31,4 A	288,4 B	20,9 A	232,8 A	170,4 A	116,4 A	20,6 A	206,8 A	187,1 A	159,0 A

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)

A(T) 9,24

A(S) 6,53

A(t) 9,24

(1) Glei pouco hídrico

(2) Aluvial

(3) Média de regime de água; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 8 - Valores de F para contrastes entre os níveis de
tratamento (T) dentro dos fatores solo (S),
níveis de água (A) e tempo de incubação t).

(1) Níveis de T (fator)	(2) Contraste		
	Y1	Y2	Y3
T(S)			
(3)			
Solo 1	1893,04 XX	4633,08 XX	323,87 XX
Solo 2	1129,07 XX	2664,95 XX	66,32 XX
T(A)			
(4)			
C.C.	1474,15 XX	3972,55 XX	49,23 XX
Alag.	1498,93 XX	3210,55 XX	365,72 XX
T(t)			
(5)			
TPo 1	3,58	3,65	0,95
TPo 6	1629,67 XX	3541,13 XX	293,32 XX
TPo 11	1349,67 XX	3264,23 XX	158,48 XX
TPo 16	903,12 XX	2571,97 XX	39,41 XX

(1) = controle, uréia, matéria orgânica e completo

(2) Y1 = controle versus demais

X = significativo para $\alpha = 0,05$

Y2 = uréia versus matéria orgânica

XX = significativo para $\alpha = 0,01$

Y3 = uréia + m.orgânica versus completo

(3) solo 1 = Glei pouco hêmico; solo 2 = Aluvial

(4) C.C. = capacidade de campo; Alag. = alagamento

(5) TPo = tempo (dias)

Apêndice 9 - Comparação entre médias das combinações dos
fatores solo, tratamento, regime de água e
tempo de incubação, através do teste de Tukey
para N-NO .

3

NUM.ORDEN	NUM.TRAT.	NOME	NUM.REPET.	MEDIAS	MEDIAS ORIGINAIS	SZ
1	42	2T2A1E2	4	27.000000	27.000000	a
2	61	2T4A2E1	4	22.250000	22.250000	b
3	57	2T4A1E1	4	21.975000	21.975000	b
4	43	2T2A1E3	4	19.500000	19.500000	c
5	25	1T4A1E1	4	15.950001	15.950001	d
6	44	2T2A1E4	4	14.000000	14.000000	e
7	29	1T4A2E1	4	13.050000	13.050000	e
8	45	2T2A2E1	4	11.500000	11.500000	f
9	41	2T2A1E1	4	11.250000	11.250000	f
10	26	1T4A1E2	4	9.275000	9.275000	g
11	10	1T2A1E2	4	8.525000	8.525000	gh
12	11	1T2A1E3	4	7.675000	7.675000	hi
13	12	1T2A1E4	4	7.525000	7.525000	hi
14	30	1T4A2E2	4	7.300000	7.300000	hij
15	53	2T3A2E1	4	7.150000	7.150000	hij
16	49	2T3A1E1	4	6.850000	6.850000	ijk
17	27	1T4A1E3	4	6.450000	6.450000	ijkl
18	58	2T4A1E2	4	6.099999	6.099999	ijklm
19	13	1T2A2E1	4	5.950000	5.950000	ijklmn
20	28	1T4A1E4	4	5.500000	5.500000	klmno
21	46	2T2A2E2	4	5.425000	5.425000	lmno
22	14	1T2A2E2	4	5.400000	5.400000	lmnop
23	60	2T4A1E4	4	5.400000	5.400000	lmnop
24	17	1T3A1E1	4	5.375000	5.375000	lmnop
25	50	2T3A1E2	4	5.200000	5.200000	lmnopq
26	21	1T3A2E1	4	5.175000	5.175000	lmnopq
27	9	1T2A1E1	4	5.150000	5.150000	lmnopq
28	59	2T4A1E3	4	4.975000	4.975000	mnpqrs
29	35	2T1A1E3	4	4.900000	4.900000	mnpqrs
30	15	1T2A2E3	4	4.825000	4.825000	mnpqrs
31	62	2T4A2E2	4	4.825000	4.825000	mnpqrs
32	34	2T1A1E2	4	4.750000	4.750000	mnpqrs
33	31	1T4A2E3	4	4.650000	4.650000	mnpqrst
34	36	2T1A1E4	4	4.500000	4.500000	opqrstu
35	16	1T2A2E4	4	4.375000	4.375000	opqrstuv

Apêndice 9 - Comparação entre médias das combinações dos fatores solo, tratamento, regime de água e tempo de incubação, através do teste de Tukey para N-NO.

3

NUM.ORDEN	NUM.TRAT.	NOME	NUM.REPET.	MEDIAS	MEDIAS ORIGINAIS	SZ
36	54	2T3A2E2	4	4.300000	4.300000	opqrstuvw
37	18	1T3A1E2	4	4.225000	4.225000	opqrstuvw
38	33	2T1A1E1	4	4.000000	4.000000	pqrstuvwxy
39	19	1T3A1E3	4	3.900000	3.900000	qrstuvwxy
40	51	2T3A1E3	4	3.800000	3.800000	qrstuvwxy
41	52	2T3A1E4	4	3.650000	3.650000	rstuvwxy
42	20	1T3A1E4	4	3.575000	3.575000	rstuvwxy
43	37	2T1A2E1	4	3.500000	3.500000	stuvwxyz
44	63	2T4A2E3	4	3.325000	3.325000	tuvwxyzf
45	5	1T1A2E1	4	3.225000	3.225000	uvwxyzfi
46	2	1T1A1E2	4	3.150000	3.150000	uvwxyzfi
47	1	1T1A1E1	4	3.150000	3.150000	uvwxyzfi
48	22	1T3A2E2	4	3.125000	3.125000	uvwxyzfi
49	3	1T1A1E3	4	3.050000	3.050000	vwxyzfij
50	4	1T1A1E4	4	3.000000	3.000000	vwxyzfij
51	47	2T2A2E3	4	2.950000	2.950000	wxyzfij
52	32	1T4A2E4	4	2.875000	2.875000	xyzfij
53	38	2T1A2E2	4	2.875000	2.875000	xyzfij
54	55	2T3A2E3	4	2.650000	2.650000	yzfij
55	23	1T3A2E3	4	2.600000	2.600000	yzfij
56	24	1T3A2E4	4	2.150000	2.150000	zfiijC
57	39	2T1A2E3	4	2.000000	2.000000	fiijC
58	56	2T3A2E4	4	1.925000	1.925000	fiijC
59	40	2T1A2E4	4	1.925000	1.925000	fiijC
60	64	2T4A2E4	4	1.825000	1.825000	ijC
61	6	1T1A2E2	4	1.700000	1.700000	jC
62	7	1T1A2E3	4	1.525000	1.525000	C
63	8	1T1A2E4	4	1.450000	1.450000	C
64	48	2T2A2E4	4	1.175000	1.175000	C

MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO
 CMS 15 = 1.55973209849 2384 CMS 5X = 1.414983009897503

(1) 1 e 2 (Solo: 1 - Gleí pouco hêmico, 2 - Aluvial); T (tratamento: T1 - controle, T2 - uréia, T3 - matéria orgânica, T4 - completo); A (regime de água: A1 - capacidade de campo, A2 - alagamento); E (época, tempo de incubação: E1 - 1 dia, E2 - 6 dias, E3 - 11 dias, E4 - 16 dias).

Apêndice 10 - Transformações do $N-NO_3$ em função dos tratamentos, regimes de água e períodos de incubação nos solos em estudo.

$N-NO_3$									
3									
Tratamento				Regime de água		Tempo de incubação (dias)			
				(1)	(2)				
Controle	Uréia	H. orgânica	Completo	CC	Alag	1	6	11	16
-1									
ug.g									
Glei pouco hêmico									
(3)									
2,5 A	6,2 B	3,8 A	8,1 A	6,0 B	4,3 A	7,1 B	5,3 B	4,3 A	3,8 A
Aluvial									
3,6 A	11,6 A	4,4 A	8,8 A	9,2 A	5,0 A	11,1 A	7,6 A	5,5 A	4,3 A

F Solo (S)	50,42 XX	CV (%)	35,96
Tratamento (T)	117,61 XX	Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)	
Água (A)	114,53 XX	S(T)	1,08
Tempo (t)	64,36 XX	S(A)	0,76
Sol x Tra (S x T)	17,66 XX	S(t)	1,08
Sol x Agu (S x A)	22,66 XX	X	- significativo p/ $\alpha = 0,05$
Sol x tem (S x t)	7,37 XX	XX	- significativo p/ $\alpha = 0,01$
Tra x Agu (T x A)	29,28 XX		
Tra x tem (T x t)	34,22 XX		
Agu x tem (A x t)	10,91 XX		

(1) - capacidade de campo

(2) - alagamento

(3) - média de solo; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 11 - Efeito dos regimes de água sobre a quantidade de N-NO_3 , influenciado pelos tratamentos, tipos de solo e períodos de incubação impostos.

N-NO_3									
Tratamento				Solo		Tempo de incubação (dias)			
				(1)	(2)				
Controle	Urêia	M. orgânica	Completo	Solo 1	Solo 2	1	6	11	16
-1									
ug.g									
Capacidade de campo									
(3)									
3,8 A	12,6 A	4,6 A	9,4 A	6,0 A	9,2 A	9,2 A	8,5 A	6,8 A	5,9 A
Alagamento									
2,3 B	5,2 B	3,6 B	7,5 B	4,3 B	5,0 B	9,0 A	4,4 B	3,1 B	2,2 B

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)

A(T) 1,08

A(S) 0,76

A(t) 1,08

(1) Glei pouco hêmico

(2) Aluvial

(3) Média de regime de água; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 12 - Valores de F para contrastes entre os níveis de tratamento (T) dentro dos fatores solo (S), níveis de água (A) e tempo de incubação (t).

(1) Níveis de T (fator)	(2) Contraste		
	Y1	Y2	Y3
T(S)			
(3)			
Solo 1	60,30 XX	19,17 XX	43,83 XX
Solo 2	110,79 XX	168,82 XX	2,91 XX
T(A)			
(4)			
C.C.	126,26 XX	211,13 XX	3,39
Alag.	19,77 XX	8,07 XX	42,07 XX
T(t)			
(5)			
TPo 1	138,95 XX	8,90 XX	265,99 XX
TPo 6	48,69 XX	89,57 XX	2,31 XX
TPo 11	18,54 XX	49,82 XX	2,84 XX
TPo 16	7,82 XX	25,61 XX	1,77 XX

(1) = controle, uréia, matéria orgânica e completo

(2) Y1 = controle versus demais

(5) TPo = tempo (dias)

Y2 = uréia versus matéria orgânica

X = significativo para $\alpha = 0,05$

Y3 = uréia + m.orgânica versus completo

XX = significativo para $\alpha = 0,01$

(3) solo 1 = Glei pouco húmico; solo 2 = Aluvial

(4) C.C. = capacidade de campo; Alag. = alagamento

Apêndice 13 - Comparação entre médias das combinações dos
fatores solo, tratamento, regime de água e
tempo de incubação, através do teste de
15
Tukey, para N-orgânico.

NUM.ORDEN	NUM.TRAT.	NOME	NUM.REPET.	MEDIAS	MEDIAS ORIGINAIS	SZ
1	45	2T3A2E1	4	476.750000	476.750000	a
2	29	2T1A2E1	4	465.250000	465.250000	ab
3	21	1T3A2E1	4	461.000000	461.000000	abc
4	5	1T1A2E1	4	457.250000	457.250000	abc
5	17	1T3A1E1	4	450.250000	450.250000	bcd
6	25	2T1A1E1	4	442.000000	442.000000	cd
7	1	1T1A1E1	4	441.500000	441.500000	cd
8	41	2T3A1E1	4	431.500000	431.500000	d
9	20	1T3A1E4	4	265.000000	265.000000	e
10	37	2T2A2E1	4	216.500000	216.500000	f
11	35	2T2A1E3	4	215.750000	215.750000	f
12	33	2T2A1E1	4	215.750000	215.750000	f
13	9	1T2A1E1	4	215.250000	215.250000	f
14	11	1T2A1E3	4	215.250000	215.250000	f
15	36	2T2A1E4	4	214.750000	214.750000	f
16	12	1T2A1E4	4	214.750000	214.750000	f
17	10	1T2A1E2	4	212.750000	212.750000	f
18	48	2T3A2E4	4	208.750000	208.750000	fg
19	34	2T2A1E2	4	206.000000	206.000000	fgh
20	19	1T3A1E3	4	205.500000	205.500000	fgh
21	13	1T2A2E1	4	199.250000	199.250000	fgh
22	42	2T3A1E2	4	191.750000	191.750000	shi
23	43	2T3A1E3	4	188.000000	188.000000	hij
24	44	2T3A1E4	4	186.750000	186.750000	hij
25	39	2T2A2E3	4	176.000000	176.000000	ijk
26	38	2T2A2E2	4	172.500000	172.500000	ijk
27	47	2T3A2E3	4	171.250000	171.250000	jk
28	18	1T3A1E2	4	169.750000	169.750000	jkl
29	14	1T2A2E2	4	164.250000	164.250000	kl
30	15	1T2A2E3	4	150.750000	150.750000	lm
31	40	2T2A2E4	4	150.250000	150.250000	lm
32	16	1T2A2E4	4	143.750000	143.750000	m
33	46	2T3A2E2	4	134.750000	134.750000	m
34	32	2T1A2E4	4	92.500000	92.500000	n
35	28	2T1A1E4	4	87.500000	87.500000	n
36	24	1T3A2E4	4	74.500000	74.500000	no
37	27	2T1A1E3	4	74.000000	74.000000	no
38	23	1T3A2E3	4	67.250000	67.250000	op
39	31	2T1A2E3	4	62.750000	62.750000	op
40	22	1T3A2E2	4	59.750000	59.750000	op
41	26	2T1A1E2	4	58.500000	58.500000	op
42	30	2T1A2E2	4	51.750000	51.750000	pq
43	4	1T1A1E4	4	37.000000	37.000000	qr
44	3	1T1A1E3	4	34.250000	34.250000	qrs
45	2	1T1A1E2	4	34.000000	34.000000	qrs
46	8	1T1A2E4	4	23.000000	23.000000	rs
47	7	1T1A2E3	4	19.000000	19.000000	rs
48	6	1T1A2E2	4	15.500000	15.500000	s

MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO

DMS 1Z = 22.01838120689392

DMS SZ = 19.77476153411865

(1) 1 e 2 (Solo: 1 - Glei pouco húmico, 2 - Aluvial); T (tratamento: T1 - uréia, T2 - matéria orgânica, T3 - completo);

A (regime de água: A1 - capacidade de campo, A2 - alagamento); E (época, tempo de incubação: E1 - 1 dia, E2 - 6

dias, E3 - 11 dias, E4 - 16 dias).

Apêndice 14 - Transformações do N-orgânico no solo derivado
das fontes marcadas ¹⁵ (N) em função dos
tratamentos, regimes de água e períodos de
incubação nos solos em estudo.

15 N-orgânico (QNSDF)			(1) Regime de água		Tempo de incubação (dias)			
Tratamento			(2)	(3)				
Urêia	M. orgânica	Completo	CC	Alag	1	6	11	16
-1								
ug.g								
Glei pouco hêmico								
(4)								
133 B	189 B	219 B	208 A	153 B	371 A	109 B	115 B	126 B
Aluvial								
167 A	196 A	249 A	209 A	198 A	375 A	136 A	148 A	157 A

F Solo (S)	64,11 XX	CV (%)	10,52
Tratamento (T)	277,38 XX	Tukey (p/ α = 0,05)	
Água (A)	128,29 XX	S(T)	9,96
Tempo (t)	1708,77 XX	S(A)	8,13
Sol x Tra (S x T)	8,61 XX	S(t)	11,50
Sol x Agu (S x A)	56,57 XX	X - significativo p/ α = 0,05	
Sol x tem (S x t)	5,14 XX	XX - significativo p/ α = 0,01	
Tra x Agu (T x A)	28,47 XX		
Tra x tem (T x t)	373,85 XX		
Agu x tem (A x t)	28,24 XX		

(1) - quantidade de N-orgânico no solo derivado do fertilizante

(2) - capacidade de campo

(3) - alagamento

(4) - média de solo; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ α = 0,05 dentro do fator indicado

Apêndice 15 - Efeito dos regimes de água sobre as quantidades de N-orgânico no solo, derivado das fontes marcadas (¹⁵N), influenciado pelos tratamentos, tipos de solo e períodos de incubação impostos.

15N-orgânico (QNSDF)(1)								
Tratamento			Solo		Tempo de incubação (dias)			
			(2)	(3)				
Ureia	M.orgânica	Completo	Solo 1	Solo 2	1	6	11	16
-1								
-ug.g								

Capacidade de campo								
(4)								
151 A	214 A	261 A	204 A	209 A	366 B	145 A	155 A	168 A

Alagamento								
148 A	172 B	207 B	153 B	194 B	379 A	100 B	108 B	115 B

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)

A(T) 9,96

A(S) 8,13

A(t) 11,50

(1) Quantidade de N-orgânico no solo derivado do fertilizante

(2) Gleí pouco hêmico

(3) Aluvial

(4) Média de regime de água; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 16 - Valores de F para contrastes entre os níveis de tratamento (T) dentro dos fatores solo (S), níveis de água (A) e tempos de incubação (t).

(1) Níveis de T (fator)	(2) Contraste	
	A Y1	A Y2
T(S)		
(3)		
Solo 1	175,77 XX	126,35 XX
Solo 2	236,60 XX	33,28 XX
T(A)		
(4)		
C.C.	322,65 XX	153,83 XX
Alag.	113,99 XX	21,22 XX
T(t)		
(5)		
TPo 1	396,61 XX	1125,61 XX
TPo 6	15,78 XX	434,16 XX
TPo 11	40,78 XX	394,31 XX
TPo 16	104,61 XX	285,97 XX

(1) = uréia, matéria orgânica e completo

(2) Y1 = uréia + matéria orgânica versus completo X = significativo para $\alpha = 0,05$

Y2 = matéria orgânica versus uréia XX = significativo para $\alpha = 0,01$

(3) solo 1 = Glei pouco húmico; solo 2 = Aluvial

(4) C.C. = capacidade de campo; Alag. = alagamento

(5) TPo = tempo (dias)

Apêndice 17 - Comparação entre médias das combinações dos
fatores solo, tratamento, regime de água e
tempo de incubação, através do teste de
Tukey para $N-NH$.
15 +
4

NUM.ORDEN	NUM.TRAT.	NOME	NUM.REPET.	MEDIAS	MEDIAS ORIGINAIS	SZ
1	2	1T1A1E2	4	427.500000	427.500000	a
2	6	1T1A2E2	4	422.000000	422.000000	a
3	7	1T1A2E3	4	419.500000	419.500000	ab
4	3	1T1A1E3	4	399.750000	399.750000	b
5	4	1T1A1E4	4	377.750000	377.750000	c
6	22	1T3A2E2	4	377.000000	377.000000	c
7	23	1T3A2E3	4	373.500000	373.500000	c
8	8	1T1A2E4	4	358.750000	358.750000	c
9	27	2T1A1E3	4	325.750000	325.750000	d
10	26	2T1A1E2	4	321.000000	321.000000	d
11	30	2T1A2E2	4	320.750000	320.750000	d
12	24	1T3A2E4	4	278.000000	278.000000	e
13	28	2T1A1E4	4	276.750000	276.750000	e
14	46	2T3A2E2	4	269.500000	269.500000	e
15	18	1T3A1E2	4	263.000000	263.000000	ef
16	31	2T1A2E3	4	248.500000	248.500000	f
17	19	1T3A1E3	4	248.500000	248.500000	f
18	42	2T3A1E2	4	207.750000	207.750000	g
19	32	2T1A2E4	4	203.500000	203.500000	g
20	20	1T3A1E4	4	179.250000	179.250000	h
21	43	2T3A1E3	4	172.000000	172.000000	h
22	47	2T3A2E3	4	165.500000	165.500000	h
23	44	2T3A1E4	4	124.750000	124.750000	i
24	48	2T3A2E4	4	114.750000	114.750000	i
25	45	2T3A2E1	4	16.724998	16.724998	j
26	29	2T1A2E1	4	15.799999	15.799999	j
27	25	2T1A1E1	4	14.775001	14.775001	j
28	21	1T3A2E1	4	13.000000	13.000000	j
29	41	2T3A1E1	4	11.850000	11.850000	j
30	1	1T1A1E1	4	11.000000	11.000000	j
31	17	1T3A1E1	4	10.500000	10.500000	j
32	5	1T1A2E1	4	9.750000	9.750000	j
33	16	1T2A2E4	4	3.667500	3.667500	j
34	14	1T2A2E2	4	3.445000	3.445000	j
35	15	1T2A2E3	4	3.400000	3.400000	j
36	40	2T2A2E4	4	2.980000	2.980000	j
37	39	2T2A2E3	4	2.880000	2.880000	j
38	38	2T2A2E2	4	2.677500	2.677500	j
39	13	1T2A2E1	4	1.120000	1.120000	j
40	35	2T2A1E3	4	1.082500	1.082500	j
41	37	2T2A2E1	4	1.072500	1.072500	j
42	36	2T2A1E4	4	0.982500	0.982500	j
43	33	2T2A1E1	4	0.940000	0.940000	j
44	10	1T2A1E2	4	0.895000	0.895000	j
45	9	1T2A1E1	4	0.895000	0.895000	j
46	11	1T2A1E3	4	0.667500	0.667500	j
47	34	2T2A1E2	4	0.632500	0.632500	j
48	12	1T2A1E4	4	0.380000	0.380000	j

MEDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NIVEL DE SIGNIFICANCIA INDICADO
DMS 1% = 23.0824157081411 DMS 5% = 20.73037349884033

(1) 1 e 2 (Solo: 1 - Gleí pouco húmico, 2 - Aluvial); T (tratamento: T1 - uréia, T2 - matéria orgânica, T3 - completo);

A (regime de água: A1 - capacidade de campo, A2 - alagamento); E (época, tempo de incubação: E1 - 1 dia, E2 - 6 dias, E3 - 11 dias, E4 - 16 dias).

Apêndice 18 - Transformações do $N-NH^+$ no solo derivado
das fontes marcadas (N) em função dos
tratamentos, regimes de água e períodos de
incubação nos solos em estudo.

			15 + (1) N - NH (QNSDF) 4					
Tratamento			Regime de água		Tempo de incubação (dias)			
			(2)	(3)				
Uréia	M. orgânica	Completo	CC	Alag.	1	6	11	16
-1								
-ug.g								
Glei pouco hêmico								
(4)								
303 A	1,8 A	218 A	160 A	189 A	7,7 A	249 A	241 A	200 A
Aluvial								
216 B	1,7 A	135 B	121 B	114 B	10,2 A	187 B	153B	121 B
F Solo (S)	312,31 XX		CV (%)	15,22				
Tratamento (T)	2245,19 XX		Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)					
Água (A)	10,50 XX		S(T)	10,94				
Tempo (t)	866,60 XX		S(A)	8,93				
Sol x Tra, (S x T)	77,85 XX		S(t)	12,64				
Sol x Agu (S x A)	32,18 XX		X - significativo p/ $\alpha = 0,05$					
Sol x tem (S x t)	40,70 XX		XX - significativo p/ $\alpha = 0,01$					
Tra x Agu (T x A)	39,52 XX							
Tra x tem (T x t)	241,25 XX							
Agu x tem (A x t)	4,34 XX							

(1) - quantidade de $N-NH$ no solo derivado do fertilizante

(2) - capacidade de campo

(3) - alagamento

(4) - média de solo; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 19 - Efeito dos regimes de água sobre as quantidades de $N-NH_4^+$ no solo, derivado das fontes marcadas (^{15}N), influenciado pelos tratamentos, tipos de solo e períodos de incubação.

15N-NH ₄ ⁺ (QNSDF)(1)								
4								
Tratamento			Solo		Tempo de incubação (dias)			
			(2)	(3)				
Urêia	M. orgânica	Completo	Solo 1	Solo 2	1	6	11	16
			-1			•		
			ug.g					

Capacidade de campo								
(4)								
269 A	0,8 A	152 B	160 B	121 A	8,3 A	203 B	191 A	160 A

Alagamento								
250 B	2,6 A	201 A	189 A	114 A	9,6 A	233 A	202 A	160 A

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)

A(T) 10,94

A(S) 8,93

A(t) 12,64

(1) Quantidade de $N-NH_4^+$ no solo derivado do fertilizante

(2) Glei pouco hêmico

(3) Aluvial

(4) Média de regime de água; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 20 - Valores de F para contrastes entre os níveis de tratamento (T) dentro dos fatores solo (S), níveis de água (A) e tempo de incubação (t).

(1) Níveis de T (fator)		(2) Contraste	
		^A Y1	^A Y2
T(S)			
(3)			
Solo 1		184, 31 XX	2944, 48 XX
Solo 2		30, 57 XX	1486, 73 XX
T(A)			
C.C. (4)			
		12, 71 XX	2335, 67 XX
Alag.		241, 48 XX	1979, 57 XX
T(t)			
(5)			
TPo 1		0, 80	2, 26
TPo 6		182, 65 XX	2228, 88 XX
TPo 11		90, 39 XX	1943, 78 XX
TPo 16		9, 61 XX	1479, 51 XX

(1) = uréia, matéria orgânica e completo

^A
(2) Y1 = uréia + matéria orgânica versus completo X = significativo para $\alpha = 0,05$

^A
Y2 = matéria orgânica versus uréia XX = significativo para $\alpha = 0,01$

(3) solo 1 = Glei pouco hêmico; solo 2 = Aluvial

(4) C.C. = capacidade de campo; Alag. = alagamento

(5) TPo = tempo (dias)

Apêndice 21 - Comparação entre médias das combinações dos
fatores solo, tratamento, regime de água e
tempo de incubação, através do teste de
15 -
Tukey, para N-NO .

3

NUM.ORDEN	NUM.TRAT.	NOME	NUM.REPET.	MÉDIAS	MÉDIAS ORIGINAIS	SZ
1	26	2T1A1E2	4	22.600000	22.600000	a
2	45	2T3A2E1	4	19.100000	19.100000	b
3	41	2T3A1E1	4	18.174999	18.174999	b
4	27	2T1A1E3	4	15.075000	15.075000	c
5	28	2T1A1E4	4	10.474999	10.474999	d
6	17	1T3A1E1	4	8.075000	8.075000	e
7	21	1T3A2E1	4	6.200000	6.200000	f
8	25	2T1A1E1	4	4.575000	4.575000	g
9	29	2T1A2E1	4	4.475000	4.475000	gh
10	30	2T1A2E2	4	3.800000	3.800000	ghi
11	18	1T3A1E2	4	3.600000	3.600000	ghij
12	33	2T2A1E1	4	3.597500	3.597500	ghij
13	44	2T3A1E4	4	3.500000	3.500000	hijk
14	2	1T1A1E2	4	3.500000	3.500000	hijk
15	42	2T3A1E2	4	3.400000	3.400000	ijkl
16	1	1T1A1E1	4	3.200000	3.200000	ijkla
17	37	2T2A2E1	4	3.090000	3.090000	ijklmn
18	3	1T1A1E3	4	3.075000	3.075000	ijklmn
19	19	1T3A1E3	4	3.000000	3.000000	ijklmn
20	4	1T1A1E4	4	2.850000	2.850000	ijklmno
21	43	2T3A1E3	4	2.700000	2.700000	ijklmnop
22	20	1T3A1E4	4	2.650000	2.650000	ijklmnop
23	13	1T2A2E1	4	2.595000	2.595000	klmnop
24	5	1T1A2E1	4	2.425000	2.425000	lmnop
25	9	1T2A1E1	4	2.340000	2.340000	mno p q
26	6	1T1A2E2	4	2.325000	2.325000	mno p q
27	7	1T1A2E3	4	2.200000	2.200000	mno p q
28	8	1T1A2E4	4	2.150000	2.150000	nop q
29	46	2T3A2E2	4	1.850000	1.850000	op q r
30	31	2T1A2E3	4	1.800000	1.800000	p q r
31	22	1T3A2E2	4	1.400000	1.400000	q r s
32	47	2T3A2E3	4	0.910000	0.910000	r s t
33	36	2T2A1E4	4	0.887500	0.887500	r s t
34	35	2T3A1E3	4	0.645000	0.645000	st
35	23	1T3A2E3	4	0.525000	0.525000	st
36	38	2T2A2E2	4	0.505000	0.505000	st
37	32	2T1A2E4	4	0.475000	0.475000	st
38	10	1T2A1E2	4	0.467500	0.467500	st
39	48	2T3A2E4	4	0.450000	0.450000	st
40	14	1T2A2E2	4	0.425000	0.425000	st
41	11	1T2A1E3	4	0.367500	0.367500	t
42	15	1T2A2E3	4	0.317500	0.317500	t
43	39	2T2A2E3	4	0.302500	0.302500	t
44	40	2T2A2E4	4	0.247500	0.247500	t
45	24	1T3A2E4	4	0.200000	0.200000	t
46	16	1T2A2E4	4	0.190000	0.190000	t
47	12	1T2A1E4	4	0.162500	0.162500	t
48	34	2T2A1E2	4	0.092500	0.092500	t

MÉDIAS SEGUIDAS POR LETRAS DISTINTAS DIFEREM ENTRE SI AO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA INDICADO
DMS 1% = 1.115489222109318 DMS 5% = 1.001823574304531

(1) 1 e 2 (Solo: 1 - Gleí pouco hêmico, 2 - Aluvial); T (tratamento: T1 - uréia, T2 - matéria orgânica, T3 - completo);

A (regime de água: A1 - capacidade de campo, A2 - alagamento); E (época, tempo de incubação: E1 - 1 dia, E2 - 6

dias, E3 - 11 dias, E4 - 16 dias).

Apêndice 22 - Transformações do N-NO³⁵ no solo derivado das fontes marcadas (N) em função dos tratamentos, regimes de água e períodos de incubação nos solos em estudo.

			15	-	(1)				
			N - NO (QNSDF)						
			3						
Tratamento			Regime de água		Tempo de incubação (dias)				
			CC(2)	(3)					
Uréia	M.organica	Completo	Alag		1	6	11	16	
-1									
-ug.g									
Glei pouco hêmico									
(4)									
2,7 B	0,9 A	3,2 B	2,8 B	1,7 B	4,1 B	1,9 B	1,6 B	1,4 A	
Aluvial									
7,9 A	1,2 A	6,3 A	7,1 A	3,1 A	8,8 A	5,4 A	3,6 A	2,7 B	
F Solo (S)	61,43 XX		CV (%)	68,42					
Tratamento (T)	54,71 XX		Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)						
Água (A)	48,81 XX		S(T)	1,24					
Tempo (t)	29,81 XX		S(A)	1,01					
Sol x Tra (S x T)	15,05 XX		S(t)	1,43					
Sol x Agu (S x A)	17,33 XX		X - significativo p/ $\alpha = 0,05$						
Sol x tem (S x t)	4,31 XX		XX - significativo p/ $\alpha = 0,01$						
Tra x Agu (T x A)	20,74 XX								
Tra x tem (T x t)	29,48 XX								
Agu x tem (A x t)	4,44 XX								

(1) - quantidade de N-NO no solo derivado do fertilizante

3

(2) - capacidade de campo

(3) - alagamento

(4) - média de solo; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 23 - Efeito dos regimes de água sobre as quantidades de $N-NH^+$ no solo, derivado das fontes marcadas (N^{154}), influenciado pelos tratamentos, tipos de solo e períodos de incubação.

15N-NO⁻ (QHSDF)(1)

3

Tratamento			Solo		Tempo de incubação (dias)			
			(2)	(3)				
Uréia	M. orgânica	Completo	Solo 1	Solo 2	1	6	11	16
			-1					
			-0,8					

Capacidade de campo

(4)								
8,2 A	1,1 A	5,6 A	2,8 A	7,1 A	6,7 A	5,6 A	4,1 A	3,4 A

Alagamento

2,5 B	0,9 A	3,8 B	1,7 A	3,1 B	6,3 A	1,7 B	1,0 B	0,6 B
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tukey (p/ $\alpha = 0,05$)

A(T) 1,24

A(S) 1,01

A(t) 1,43

(1) Quantidade de N-NO⁻ no solo derivado do fertilizante

3

(2) Gleí pouco húmico

(3) Aluvial

(4) Média de regime de água; médias seguidas por letras distintas diferem entre si p/ $\alpha = 0,05$ dentro do fator indicado

Apêndice 24 - Valores de F para contrastes entre os níveis de tratamento (T) dentro dos fatores solo (S), níveis de água (A) e tempos de incubação (t).

(1) Níveis de T (fator)	(2) Contraste	
	A	A
	Y1	Y2
T(S)		
(3)		
Solo 1	6,75 XX	8,67 XX
Solo 2	9,93 XX	114,17 XX
T(A)		
(4)		
C.C.	3,47	126,71 XX
Alag.	15,09 XX	5,63
T(t)		
(5)		
TPo 1	154,50 XX	0,73
TPo 6	4,57	74,23 XX
TPo 11	2,37	37,08 XX
TPo 16	0,39	16,43 XX

(1) = uréia, matéria orgânica e completo X = significativo para $\alpha = 0,05$

A XX = significativo para $\alpha = 0,01$

(2) Y1 = uréia + matéria orgânica versus completo

A
Y2 = matéria orgânica versus uréia

(3) solo 1 = Glei pouco hêmico; solo 2 = Aluvial

(4) C.C. = capacidade de campo; Alag. = alagamento

(5) TPo = tempo (dias)

15

Apêndice 25 - Concentração de N nos solos Gleí pouco húmico (A) e Aluvial (B) no tratamento controle. (média de 4 repetições).

A	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
	at % 15 N			

CAPACIDADE DE CAMPO

1	0.368± 0.001	0.377± 0.002	0.371± 0.001
6	0.370± 0.001	0.374± 0.001	0.370± 0.001
11	0.370± 0.001	0.376± 0.002	0.374± 0.001
16	0.369± 0.001	0.375± 0.001	0.369± 0.001

ALAGADO

1	0.369± 0.001	0.373± 0.002	0.370± 0.001
6	0.368± 0.001	0.373± 0.001	0.371± 0.001
11	0.370± 0.001	0.379± 0.002	0.370± 0.001
16	0.369± 0.001	0.380± 0.006	0.371± 0.002

B	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
	at % 15 N			

CAPACIDADE DE CAMPO

1	0.369± 0.001	0.380± 0.005	0.379± 0.011
6	0.369± 0.501	0.380± 0.006	0.377± 0.004
11	0.369± 0.501	0.376± 0.002	0.377± 0.003
16	0.369± 0.501	0.401± 0.005	0.422± 0.012

ALAGADO

1	0.368± 0.001	0.380± 0.002	0.387± 0.008
6	0.368± 0.001	0.378± 0.002	0.379± 0.005
11	0.369± 0.002	0.388± 0.001	0.448± 0.014
16	0.369± 0.001	0.384± 0.010	0.446± 0.009

15

Apêndice 26 - Concentração de N nos solos Glei pouco húmico (A) e Aluvial (B) no tratamento uréia. (média de 4 repetições).

A	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
	at % 15 N			

CAPACIDADE DE CAMPO

1	1.260±0.008	1.923±0.059	1.662±0.028
6	0.467±0.004	3.195±0.016	1.637±0.076
11	0.467±0.005	3.117±0.037	1.635±0.050
16	0.478±0.005	3.084±0.007	1.529±0.055

ALAGADO

1	1.281±0.006	1.701±0.015	1.622±0.052
6	0.424±0.002	3.211±0.019	1.680±0.047
11	0.437±0.004	3.187±0.012	1.779±0.017
16	0.458±0.003	3.112±0.021	1.860±0.016

B	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
	at % 15 N			

CAPACIDADE DE CAMPO

1	1.080±0.037	1.931±0.026	1.608±0.065
6	0.486±0.002	3.138±0.027	2.932±0.034
11	0.520±0.011	3.052±0.013	2.736±0.041
16	0.552±0.007	3.020±0.009	2.655±0.021

ALAGADO

1	1.118±0.001	1.895±0.007	1.559±0.004
6	0.482±0.006	2.993±0.011	2.506±0.049
11	0.510±0.003	2.849±0.040	2.288±0.008
16	0.579±0.004	2.776±0.058	1.672±0.076

15

Apêndice 27 - Concentração de N nos solos Gleí pouco húmico (A) e Aluvial (B) no tratamento matéria orgânica. (média de 4 repetições).

A	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
	at % 15 N			

CAPACIDADE DE CAMPO

1	0.522± 0.004	0.441± 0.003	0.763± 0.018
6	0.521± 0.005	0.471± 0.006	0.471± 0.012
11	0.525± 0.006	0.459± 0.007	0.458± 0.008
16	0.529± 0.002	0.443± 0.010	0.425± 0.002

ALAGADO

1	0.517± 0.002	0.456± 0.006	0.828± 0.031
6	0.494± 0.005	0.508± 0.013	0.494± 0.012
11	0.484± 0.005	0.488± 0.006	0.478± 0.011
16	0.480± 0.007	0.490± 0.05	0.452± 0.006

B	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
	at % 15 N			

CAPACIDADE DE CAMPO

1	0.487± 0.002	0.431± 0.004	0.849± 0.037
6	0.487± 0.001	0.586± 0.033	0.386± 0.003
11	0.490± 0.004	0.827± 0.014	0.523± 0.016
16	0.490± 0.001	0.836± 0.027	0.591± 0.028

ALAGADO

1	0.488± 0.004	0.426± 0.008	0.763± 0.016
6	0.468± 0.001	0.468± 0.006	0.475± 0.006
11	0.470± 0.002	0.499± 0.007	0.473± 0.006
16	0.457± 0.002	0.530± 0.005	0.487± 0.012

15

Apêndice 28 - Concentração de N nos solos Glei pouco
húmico (A) e Aluvial (B) no tratamento
completo. (média de 4 repetições).

A	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH4+	N-NO3-
		at % 15 N		
		CAPACIDADE DE CAMPO		
	1	1.163± 0.007	1.644± 0.022	1.900± 0.015
	6	0.725± 0.006	3.078± 0.012	1.565± 0.007
	11	0.831± 0.008	3.015± 0.038	1.762± 0.069
	16	0.960± 0.031	2.756± 0.018	1.861± 0.077
		ALAGADO		
	1	1.178± 0.010	1.669± 0.003	1.890± 0.009
	6	0.505± 0.004	3.273± 0.009	0.956± 0.016
	11	0.537± 0.004	3.226± 0.011	0.721± 0.016
	16	0.562± 0.004	2.989± 0.065	0.538± 0.025

B	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH4+	N-NO3-
		at % 15 N		
		CAPACIDADE DE CAMPO		
	1	1.031± 0.009	2.167± 0.087	2.904± 0.022
	6	0.701± 0.003	2.980± 0.035	2.071± 0.077
	11	0.705± 0.004	2.883± 0.023	2.053± 0.039
	16	0.714± 0.005	2.876± 0.029	2.365± 0.015
		ALAGADO		
	1	1.091± 0.010	2.250± 0.033	2.999± 0.036
	6	0.611± 0.004	3.030± 0.046	1.541± 0.045
	11	0.665± 0.006	2.772± 0.002	1.208± 0.008
	16	0.729± 0.006	2.560± 0.017	1.031± 0.051

Apêndice 29 - Nitrogênio nativo (N-não marcado) para o tratamento uréia nos solos Glei pouco húmico (A) e Aluvial (B). (média de 4 repetições).

A	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH4+	N-NO3-
		μg.g		
	CAPACIDADE DE CAMPO			
	1	1077± 8	10.8± 0.7	2.0± 0.1
	6	1050± 35	35± 3	5.0± 0.5
	11	1051± 23	46± 5	4.5± 0.4
	16	1009± 43	48± 2	4.7± 0.3
	ALAGADO			
	1	1080± 16	13± 1	3.5± 0.3
	6	844± 19	33± 3	2.8± 0.3
	11	851± 47	36± 2	2.6± 0.2
	16	778± 35	42± 2	2.3± 0.1

B	TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH4+	N-NO3-
		μg.g		
	CAPACIDADE DE CAMPO			
	1	1460± 33	14± 1	6.7± 0.4
	6	1470± 15	34± 4	4.4± 0.1
	11	1425± 23	46± 2	4.4± 0.4
	16	1381± 35	43± 1	3.5± 0.2
	ALAGADO			
	1	1436± 26	16.0± 1	7.0± 0.3
	6	1355± 3.8	53± 3	1.6± 0.1
	11	1311± 35	59± 6	1.1± 0.1
	16	1257± 38	56± 8	0.7± 0.1

Apêndice 30 - Nitrogênio nativo (N-não marcado) para o tratamento matéria orgânica nos solos Glei pouco húmico (A) e Aluvial (B). (média de 4 repetições).

A

TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
<hr/> μg.g <hr/>			
CAPACIDADE DE CAMPO			
1	1072± 32	10.4± 0.6	3.0± 0.2
6	1074± 37	7.1± 0.1	3.7± 0.2
11	1047± 47	6.0± 0.4	3.5± 0.4
16	1019± 24	4.3± 0.3	3.4± 0.1
ALAGADO			
1	1041± 15	10.6± 0.9	2.6± 0.3
6	1043± 8.0	19.2± 1.4	2.7± 0.1
11	1057± 15	22.5± 1.0	2.3± 0.1
16	1063± 8.0	24.1± 0.3	1.9± 0.1

B

TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
<hr/> μg.g <hr/>			
CAPACIDADE DE CAMPO			
1	1442± 11	12.8± 0.4	3.2± 0.5
6	1385± 30	2.0± 0.2	5.1± 0.3
11	1410± 31	1.1± 0.1	3.1± 0.2
16	1397± 13	0.9± 0.1	2.7± 0.2
ALAGADO			
1	1435± 16	16.0± 0.5	4.0± 0.4
6	1412± 35	22.0± 1.2	3.8± 0.1
11	1412± 34	17.2± 0.3	2.3± 0.2
16	1409± 29	13.9± 0.4	1.7± 0.1

Apêndice 31 - Nitrogênio nativo (N-não marcado) para o tratamento completo nos solos Glei pouco húmico (A) e Aluvial (B). (média de 4 repetições).

A

TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
<hr/> μg.g <hr/>			
CAPACIDADE DE CAMPO			
1	1289± 19	13± 1	8.1± 0.5
6	1298± 15	34± 1	5.7± 0.7
11	1148± 42	39± 3	3.4± 0.2
16	1109± 18	51± 2	2.8± 0.3
ALAGADO			
1	1283± 14	18± 1	6.8± 0.9
6	1296± 37	21± 2	5.9± 0.1
11	1162± 27	27± 2	4.1± 0.1
16	1111± 42	46± 5	2.7± 0.1

B

TEMPO (dias)	N-ORG.	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻
<hr/> μg.g <hr/>			
CAPACIDADE DE CAMPO			
1	1566± 13	8.4± 0.9	3.8± 0.2
6	1579± 28	36.0± 2.0	2.7± 0.3
11	1525± 18	38.0± 2.0	2.3± 0.1
16	1471± 21	33.0± 1.0	1.9± 0.1
ALAGADO			
1	1543± 22	10.5± 0.5	3.1± 0.2
6	1572± 23	40.0± 6.0	3.0± 0.2
11	1600± 15	45.0± 2.0	2.4± 0.2
16	1569± 14	46.0± 1.0	1.4± 0.2

15

Apêndice 32 - Concentração de N determinadas nas fontes de
N empregadas.

Fonte de N	Concentração - ¹⁵ N
	-----at.% ¹⁵ N-----
Palha de milho natural	0,367 ± 0,002 (1)
Palha de milho marcada (15N)	1,281 ± 0,002 (2)
Uréia natural	0,366 ± 0,001 (1)
Uréia marcada (¹⁵ N)	10,839 ± 0,019 (2)
(1) - Abundância natural ¹⁵ N	
(2) - Abundância - ¹⁵ N (Total de at.% ¹⁵ N)	

Apêndice 33 - Concentração de átomos de ^{15}N , matéria seca produzida e N-total na plântula de arroz (cultivar IAC-4440), por ocasião do transplante.

Nº DE PLANTULAS	CONCENTRAÇÃO DE ^{15}N		MATERIA SECA		N-TOTAL	
	RAIZ	COLMO E FOLHA	RAIZ	COLMO E FOLHA	RAIZ	COLMO E FOLHA
	AT% ^{15}N		mg. plã ⁻¹		mg N. plã ⁻¹	
35	0.373	0.373	3.92	15.71	0.03	0.20
35	0.374	0.373	4.11	16.45	0.03	0.21
35	0.372	0.373	4.09	16.02	0.03	0.22
$\bar{X}$	0.373	0.373	4.04	16.06	0.03	0.21

Apêndice 34 - Matéria seca produzida no cultivar IAC-4440,
aos 40 dias após transplante.

TRATAMENTO	VASO Nº	Nº DE PLANTAS	PLANTAS COLETADAS	MATÉRIA SECA		
				RAIZ	COLMO E FOLHAS	PLANTA INTEIRA
				g.pl ⁻¹		
U-0	1	35	20	0.24	0.90	1.14
	2			0.24	0.86	1.10
	3			0.26	0.86	1.12
				0.25± 0.01	0.87± 0.02	1.12± 0.02
U-50	4	35	20	0.30	0.94	1.24
	5			0.32	0.90	1.22
	6			0.34	0.92	1.26
				0.32± 0.02	0.92± 0.02	1.24± 0.02
U-100	7	35	20	0.36	1.00	1.36
	8			0.34	0.98	1.32
	9			0.38	1.04	1.42
				0.36± 0.02	1.01± 0.03	1.37± 0.05

Apêndice 35 - Matéria seca produzida no cultivar IAC-4440,
aos 100 dias após transplante.

TRATAMENTO	VASO Nº	Nº DE PLANTAS	PLANTAS COLETADAS	MATÉRIA SECA			
				RAIZ	COLMO E FOLHAS	PANICULAS	PLANTA INTEIRA
				g.pl ⁻¹			
U-0	1	15	15	2.97	8.47	1.78	13.22
	2			2.66	7.96	2.12	12.74
	3			2.40	6.94	1.76	11.10
	2.68± 0.28 7.79± 0.78 1.89± 0.20 12.36± 1.11						
U-50	4	15	15	3.12	9.23	2.55	14.90
	5			3.21	8.72	2.75	14.68
	6			3.01	8.54	2.47	14.02
	3.11± 0.10 8.83± 0.36 2.29± 0.14 14.53± 0.46						
U-100	7	15	15	3.47	10.52	2.97	16.96
	8			3.43	9.55	2.90	15.88
	9			3.39	9.67	2.85	15.91
	3.43± 0.04 9.91±0.53 2.91± 0.06 16.25± 0.61						

Apêndice 36 - Teor de N-total determinado no cultivar IAC-4440, aos 40 e 100 dias após transplante.

TEOR DE NITROGENIO TOTAL								
DIAS APOS TRANSPLANTE								
TRAT.	VASO Nº	40			100			
		RAIZ	COLMO E PLANTA FOLHAS INTEIRA		RAIZ	COLMO E PLANTA FOLHAS INTEIRA		
		%			%			
U-0	1	2.1	3.1	2.9	1.7	1.5	1.6	1.6
	2	2.0	3.0	2.8	1.8	1.6	1.7	1.7
	3	2.0	3.1	2.8	1.9	1.7	1.8	1.8
		2.0±0.1	3.1±0.1	2.8±0.1	1.8±0.1	1.6±0.1	1.7±0.1	1.7±0.1
U-50	4	2.1	3.2	2.9	2.0	2.1	1.9	2.0
	5	1.8	3.0	2.7	2.1	2.2	2.0	2.1
	6	2.0	3.1	2.9	2.2	2.3	2.2	2.3
		2.0±0.1	3.1±0.1	2.8±0.1	2.1±0.1	2.2±0.1	2.0±0.1	2.1±0.1
U-100	7	2.0	3.2	2.9	2.3	2.4	2.1	2.3
	8	2.0	3.3	3.0	2.5	2.4	2.2	2.4
	9	1.8	3.3	2.9	2.5	2.6	2.3	2.5
		1.9±0.1	3.3±0.1	2.9±0.1	2.4±0.1	2.5±0.1	2.2±0.1	2.4±0.1

Apêndice 37 - Quantidade de N total determinado no cultivar
IAC-4440, aos 40 e 100 dias após transplante.

QUANTIDADE DE N TOTAL								
DIAS APOS TRANSPLANTE								
TRAT.	VASO Nº	40			100			
		RAIZ	COLMO E FOLHAS	PLANTA INTEIRA	RAIZ	COLMO E FOLHAS	PANICULAS	PLANTA INTEIRA
		mg. vaso ⁻¹			mg. vaso ⁻¹			
U-0	1	101	558	659	757	1906	427	3090
	2	96	516	612	718	1910	541	3169
	3	104	533	637	684	1770	475	2929
		100± 4	536± 21	636± 23	720± 36	1862± 80	481± 57	3063± 122
U-50	4	126	602	728	936	2907	727	4597
	5	115	540	655	1011	2878	825	4714
	6	136	570	706	993	2946	815	4754
		126± 10	571± 31	696± 37	980± 39	2910± 34	789± 54	4679± 81
U-100	7	144	640	784	1197	3787	935	5919
	8	136	647	783	1286	3438	957	5681
	9	137	686	823	1271	3771	983	6025
		139± 4	658± 25	797± 23	1251± 48	3665± 197	958± 24	5875± 176

15

Apêndice 38 - Concentração de N nas diferentes partes da planta de arroz (cultivar IAC-4440) aos 40 e 100 dias após transplante.

CONCENTRAÇÃO DE 15 N						
TRAT.	VASO Nº	40- DAT		100- DAT		
		RAIZ	COLMO E FOLHAS	RAIZ	COLMO E FOLHAS	PANICULAS
at. % 15N						
U-0	1	0.383	0.386	0.407	0.412	0.402
	2	0.385	0.387	0.409	0.409	0.400
	3	0.383	0.388	0.408	0.412	0.402
		0.384± 0.001	0.387± 0.001	0.408±0.001	0.411± 0.002	0.401± 0.001
U-50	4	1.294	1.542	1.554	1.750	1.674
	5	1.299	1.588	1.551	1.746	1.634
	6	1.295	1.582	1.557	1.718	1.670
		1.296± 0.003	1.571± 0.025	1.554± 0.003	1.738± 0.02	1.659± 0.02
U-100	7	2.015	3.097	2.135	2.753	2.531
	8	2.019	3.087	2.140	2.811	2.508
	9	2.013	3.116	2.181	2.795	2.421
		2.016± 0.003	3.100± 0.015	2.152± 0.02	2.786± 0.03	2.487± 0.06

Apêndice 39 - Porcentagem e quantidade do Nitrogênio nas diferentes partes da planta (cultivar IAC-4440), derivado do fertilizante aos 40-DAT.

TRAT.	VASO Nº	NPDF					
		RAIZ	COLMO E FOLHAS	PLANTA INTEIRA	RAIZ	COLMO E FOLHAS	PLANTA INTEIRA
		%			mg. vaso ⁻¹		
U-0	1	1.1	1.4	1.4	1.1	8.0	9.1
	2	1.3	1.5	1.5	1.3	7.8	9.2
	3	1.1	1.6	1.6	1.1	8.8	9.9
		1.2±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1	1.2±0.1	8.2±0.5	9.4±0.4
U-50	4	8.8	11.2	10.8	11.1	67.2	78.3
	5	8.8	11.6	11.2	10.2	62.7	72.9
	6	8.8	11.4	11.1	12.0	65.8	77.8
		8.8±0.02	11.4±0.2	11.1±0.2	11.1±0.9	65.2±2.3	76.3±3.0
U-100	7	15.7	26.0	24.8	22.6	166.5	189.1
	8	15.7	25.9	24.8	21.4	167.7	189.1
	9	15.7	26.5	25.1	21.5	179.7	201.2
		15.7±0.03	26.2±0.1	24.9±0.2	21.8±0.7	171.3±7.3	193.1±7.0

Apêndice 40 - Porcentagem e quantidade do Nitrogênio nas diferentes partes da planta (cultivar IAC-4440), derivado do fertilizante, aos 100-DAT.

NPDF									
TRAT.	VASO Nº	RAIZ	COLMO E PANICULAS		PLANTA INTEIRA	RAIZ	COLMO E PANICULAS		PLANTA INTEIRA
			FOLHAS				FOLHAS		
		%				mg. vaso ⁻¹			
U-0	1	3.7	4.3	3.2	4.0	28	82	14	124
	2	4.0	4.0	3.0	3.8	28	76	16	120
	3	3.8	4.3	3.2	4.0	26	76	15	117
		3.8± 0.1	4.2± 0.2	3.1± 0.1	3.9± 0.1	27± 1	78± 3	15± 1	120± 3
U-50	4	11.3	13.1	12.4	12.7	106	382	90	578
	5	11.2	13.1	12.0	12.5	114	377	99	590
	6	11.3	12.8	12.4	12.4	112	378	101	591
		11.3± 0.1	13.0± 0.2	12.3± 0.2	12.5± 0.1	111± 4	379± 3	97± 6	586± 7
U-100	7	16.8	22.7	20.6	21.2	201	861	193	1255
	8	16.9	23.3	20.4	21.3	217	800	195	1210
	9	17.3	23.1	19.6	21.3	219	872	192	1283
		17.0± 0.3	23.0± 0.3	20.2± 0.5	21.3± 0.1	212± 10	844± 39	193± 2	1250± 37

Apêndice 41 - Eficiência de utilização do fertilizante pelo cultivar IAC-4440, aos 40 e 100 dias após transplante.

EFICIENCIA DE UTILIZAÇÃO DO FERTILIZANTE								
DIAS APOS TRANSPLANTE								
TRAT.	VASO Nº	40-DAT			100-DAT			
		RAIZ	COLMO E FOLHAS	PLANTA INTEIRA	RAIZ	COLMO E FOLHAS	PANICULAS PLANTA INTEIRA	
U-0	1	0.12	0.88	1	3.15	9.23	1.54	13.92
	2	0.14	0.87	1.01	3.23	8.60	1.83	13.66
	3	0.13	0.96	1.09	2.93	8.57	1.71	13.21
	0.13± 0.01		0.90± 0.05	1.03± 0.05	3.10± 0.15	8.80± 0.37	1.69± 0.14	13.60± 0.36
	4	0.91	5.53	6.44	8.67	31.21	7.39	47.27
U-50	5	0.83	5.13	5.96	9.28	30.90	8.11	48.29
	6	0.98	5.34	6.32	9.20	30.91	8.28	48.39
	0.90± 0.07		5.33± 0.19	6.24± 0.25	9.05± 0.33	30.91± 0.30	7.93± 0.47	47.98± 0.62
U-100	7	0.93	6.82	7.75	8.24	35.23	7.89	51.36
	8	0.87	6.87	7.74	8.91	32.83	8.00	49.74
	9	0.88	7.37	8.25	9.01	35.76	7.90	52.67
	0.89± 0.03		6.95± 0.30	7.83± 0.28	8.72± 0.42	34.61± 1.56	7.93± 0.06	51.26± 1.47

Apêndice 42 - Porcentagem do nitrogênio no cultivar IAC-4440
derivado do solo.

(1)							
PORCENTAGEM DE NITROGENIO TOTAL NA PLANTA DERIVADO DO SOLO							
TRATAMENTO	RAIZ		COLMO E FOLHA		PANICULA	PLANTA INTEIRA	
	40-DAT	100-DAT	40-DAT	100-DAT	100-DAT	40-DAT	100-DAT
-----z-----							
	(2)						
U-0	100 (98,8)	100 (96,2)	100 (98,5)	100 (95,8)	100 (96,9)	100 (98,5)	100 (96,1)
U-50	91,2	88,7	88,6	87,0	87,7	88,9	87,5
U-100	84,3	83,0	74,0	77,0	79,8	75,1	78,7

(1) - N-nativo + N-palha de milho incorporada

(2) - Números entre parênteses referem-se somente a NT derivado do solo (N-nativo), descontando a contribuição do N-palha de milho.

Apêndice 43 - Quantidade do nitrogênio no cultivar IAC-4440
derivado do solo.

TRATAMENTO	(1) QUANTIDADE DE NITROGENIO TOTAL NA PLANTA DERIVADO DO SOLO						
	RAIZ		COLMO E FOLHA		PANICULA	PLANTA INTEIRA	
	40-DAT	100-DAT	40-DAT	100-DAT	100-DAT	40-DAT	100-DAT
	-----mg. vaso-1-----						
	(2)						
U-0	100 (99)	720 (696)	536 (528)	1862 (1784)	481 (466)	636 (623)	3063 (2942)
U-50	115	869	505	2531	692	620	4101
U-100	117	1039	487	2821	765	599	4625

(1) - N-nativo + N-palha de milho incorporada

(2) - Valores entre parênteses referem-se somente a quantidade NT derivado do solo (N-nativo)

15

Apêndice 44 - Concentração de N no solo, em quatro épocas de amostragem.

CONCENTRAÇÃO DE 15 N					
TRAT.	VASO Nº	DIAS APOS TRANSPLANTE			
		10	40	70	100
		at. % 15 N			
U-0	1	0.378	0.375	0.374	0.373
	2	0.377	0.375	0.373	0.372
	3	0.377	0.374	0.374	0.373
		0.377± 0.001	0.375± 0.001	0.374± 0.001	0.373± 0.001
U-50	4	0.508	0.469	0.434	0.393
	5	0.518	0.481	0.429	0.392
	6	0.499	0.489	0.432	0.395
		0.508± 0.009	0.480± 0.010	0.432± 0.002	0.393± 0.001
U-100	7	0.637	0.576	0.462	0.405
	8	0.628	0.579	0.456	0.403
	9	0.635	0.574	0.454	0.407
		0.633± 0.005	0.576± 0.002	0.457± 0.004	0.405± 0.001
CONTROLE	10	0.377	0.373	0.372	0.371
	11	0.376	0.374	0.372	0.372
	12	0.378	0.373	0.372	0.371
		0.377± 0.001	0.373± 0.001	0.372± 0	0.371± 0.001

Apêndice 45 - Porcentagem e quantidade de N-total no solo,
em quatro épocas de amostragem.

PORCENTAGEM E QUANTIDADE DE N-TOTAL NO SOLO									
DIAS APOS TRANSPLANTE									
TRAT. VASO	Nº	10	40	70	100	10	40	70	100
		%				g. vaso ⁻¹			
U-0	1	0.130	0.126	0.124	0.122	78.0	75.6	74.4	73.2
	2	0.134	0.129	0.124	0.122	80.2	77.4	74.4	73.2
	3	0.134	0.129	0.126	0.120	80.3	77.4	75.4	72.0
		0.133± 0.002	0.128± 0.002	0.125± 0.001	0.121± 0.001	79.5± 1.3	76.8± 1.0	74.7± 0.5	72.8± 0.7
U-50	4	0.136	0.132	0.124	0.122	81.9	79.4	74.3	73.2
	5	0.137	0.133	0.122	0.120	82.2	79.8	73.2	72.3
	6	0.138	0.130	0.122	0.120	82.8	78.0	73.5	72.0
		0.137± 0.001	0.132± 0.001	0.123± 0.001	0.121± 0.001	82.3± 0.5	79.1± 0.9	73.7± 0.6	72.5± 0.6
U-100	7	0.140	0.131	0.120	0.112	84.0	78.9	72.1	67.2
	8	0.142	0.130	0.122	0.115	85.4	78.0	73.0	69.0
	9	0.142	0.128	0.123	0.112	85.4	77.1	73.8	67.2
		0.141± 0.001	0.130± 0.001	0.122± 0.001	0.113± 0.001	84.9± 0.8	78± 0.9	73.0± 0.8	67.8± 1.0
CONT.	10	0.133	0.124	0.118	0.116	79.8	74.4	71.0	69.6
	11	0.132	0.126	0.117	0.115	79.2	75.6	70.3	69.0
	12	0.130	0.122	0.119	0.118	77.7	73.2	71.6	70.8
		0.132± 0.001	0.124± 0.002	0.118± 0.001	0.116± 0.001	78.9± 1.1	74.4± 1.2	71.0± 0.6	69.8± 0.9

15

Apêndice 47 - Balanço do N derivado da palha de milho, no solo, em diferentes épocas de amostragem.

DISTRIBUIÇÃO DO N-PALHA DE MILHO NO SOLO				
(1)	15	15		
DAT	N-Aplicado	N-Fertilizante	N-Perda	
	-1	-1	-1	
	---mg. Vaso ---	---mg. Vaso ---X---	---mg. Vaso ---X---	
	888			
10		693 78,04	195	21,96
40		355 39,98	533	60,02
70		234 26,35	654	73,65
100		179 20,16	709	79,84

(1) - Dias após transplante

Apêndice 48 - Valores de F e coeficientes de determinação
das regressões polinomiais de tempo para
(1)
frações do nitrogênio no solo .

Fração de Nitrogênio	Fator considerado	F (modelos)	Coef. Determinação r^2
N-organico	Solo:	Glei	205,59
		Aluvial	132,34
	Tratamento:	Controle	27,79
		Urêia	458,58
		M. orgânica	12,15
		Completo	174,67
	Água:	C. Campo	107,24
		Alagamento	239,84
N-NH ₄	Solo:	Glei	1097,24
		Aluvial	675,73
	Tratamento:	Controle	7,89
		Urêia	2067,33
		Completo	1338,93
	Água:	C. campo	730,15
		Alagamento	1030,29
N-NO ₃	Solo:	Glei	39,63
		Aluvial	8,62
	Tratamento:	Urêia	21,36
		M. orgânica	19,61
		Completo	90,46
	Água:	C. campo	45,11
		Alagamento	23,20

Apêndice 48 - Valores de F e coeficientes de determinação
das regressões polinomiais de tempo para
(1)
frações do nitrogênio no solo

Fração de Nitrogênio	Fator considerado	F (modelos)	Coef. Determinação ² r
15 N-orgânico	Solo: Glei	1089,37	0,9289
	Aluvial	899,50	0,9175
	Tratamento: Uréia	1759,85	0,9295
	M. orgânica	16,52	0,8029
	Completo	1142,13	0,9186
	Água: C. campo	795,22	0,9216
	Alagamento	1210,88	0,9252
15 + N-NH ₄	Solo: Glei	969,88	0,9392
	Aluvial	530,07	0,8702
	Tratamento: Uréia	1323,33	0,9204
	Completo	892,83	0,9055
	Água: C. campo	623,13	0,9274
	Alagamento	852,85	0,9005
15 - N-NO ₃	Solo: Glei	14,23	0,7728
	Aluvial	6,18	0,9987
	Tratamento: Uréia	22,16	0,7424
	M. orgânica	3,92	0,9269
	Completo	65,93	0,9560
	Água: C. campo	23,59	0,9852
	Alagamento	16,68	0,9695

(1) significativas p/ $\alpha = 0,05$

Apêndice 49 - Quantidade de N total inicialmente presentes
(1)
no solo

Tratamento	Linha	N TOTAL	
		-1	
		mgN.g solo	g.N. linha
(2)			
Controle	1	1,359	81,54
		1,367	82,02
	2	1,395	83,70
		1,389	83,34
	3	1,319	79,14
		1,312	78,72
(3)			
M.orgânica	4	1,384	81,41 ± 2,08 83,04
		1,376	82,56
	5	1,309	78,54
		1,305	78,30
	6	1,388	83,28
		1,379	82,74
Uréia	7	1,386	81,41 ± 2,33 83,16
		1,372	82,32
	8	1,362	81,72
		1,359	81,54
	9	1,348	80,88
		1,338	80,28
Uréia	10	1,379	81,65 ± 1,02 82,74
		1,386	83,16
	11	1,396	83,76
		1,386	83,16
	12	1,319	79,14
		1,315	78,90
		81,81 ± 2,19	

(1) - Valores correspondem a 0 - DAT (antes da aplicação do fertilizante/transplante/alagamento).

(2) - Determinação em amostra composta de quatro subamostras.