EFEITOS DO ALUMÍNIO E DE MICRONUTRIENTES
NO FEIJOEIRO (*Phaseolus vulgaris* L.)

ITAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

Engenheiro Agrônomo
CNPq - EMBRAPA

Orientador: E. MALAVOLTA

Tese apresentada à Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, para
obtenção do título de Doutor em Solos e Nutrição de
Plantas.

PIRACICABA
Estado de São Paulo - Brasil
Janeiro, 1980

O F E R E Ç O

Ao meu pai Dario

À minha mãe Albertina

Aos meus irmãos Raul, Maria, Carolina,
Sebastião, Darcy,
Carmem e Helena

À minha esposa Maria do Carmo

À minha filha Aline

D E D I C O

A G R A D E · C I M E N T O S

- Ao Professor Eurípedes Malavolta, pela amizade e orientação prestada na elaboração desta pesquisa;
- Ao Professor Cássio R. Melo Godoi, do Departamento de Matemática e Estatística da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", pela orientação nas análises estatísticas;
- Ao Pesquisador José Ruy Porto de Carvalho, do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, pela programação das análises de regressão;
- Ao Professor Francisco José Krug, pela orientação nas análises químicas;
- Ao Pesquisador Carlos Henrique Mattioli, do Departamento de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pela ajuda na programação e realização das análises de correlações;
- Aos Professores Eiichi Matsui e Virgílio Franco Nascimento Filho, pelas noções de manejo e cálculo com isótopos marcados;
- A Cooperação de José Osório Bertoli, no manejo de material marcado;
- A Contribuição de Maria Ângela Foltran Gheller, Iolanda Aparecida Rufini e Neusa Maria Mendes Tonin, nas análises químicas;

- A Dedicaco de Cleusa Pereira Cabral, no controle dos en-
saio^s, aparelhos e drogas qumicas;
- Ao Professor Francisco Dias Nogueira, pelas sugestes e cons
tante auxlio;
- Ao Colega Edson Lopes Reis, pela colaborao no desenvolvi-
mento de todo o trabalho;
- D. Dirce Pellegrino, pelas atenes recebidas;
- Ao Sr. Paulo Jos de Gspari, pelos trabalhos de datilogra-
fia e impresso;
- Comisso Nacional de Energia Nuclear, pelo apoio finan-
ceiro parcial para a conduo do trabalho;
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria, pela oportu-
nidade concedida para a realizao do Curso de Ps-Gra-
duao;

Enfim, agradecimentos a todos colegas, bem como a to
dos quantos, direta ou indiretamente, contribuíram para a rea
lizao desta pesquisa.

CURRICULUM . VITAE

ITAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, nasceu em Piraúba, a 20 de dezembro de 1944.

Fez o curso básico no "Ginásio Francisca Pereira Rodrigues", em Piraúba, M.G., onde recebeu a medalha "Honra ao Mérito", como melhor aluno de 1963.

Terminou o curso Técnico em Agricultura, em 1966 na Universidade Federal de Viçosa.

Graduou-se em Agronomia, pela Escola Superior de Agricultura da Universidade Federal de Viçosa, em 1970, e ingressou no Instituto de Pesquisa Agropecuária do Centro Oeste, em 1971.

Em 1975, terminou o curso de Mestrado em Fitotecnia, quando então continuou as atividades de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Iniciou o curso de Doutorado em Solos e Nutrição de Planta, em 1978, pretendendo reiniciar suas atividades profissionais, em 1980.

Í N D I C E

	Página
1 - RESUMO	1
2 - INTRODUÇÃO	6
3 - REVISÃO DE LITERATURA	9
3.1 - Alumínio	9
3.1.1 - Ocorrência	9
3.1.2 - Fatores que afetam a presença do alumínio no meio	10
3.1.3 - Efeitos do alumínio nos processos de desenvolvimento da planta	14
3.1.4 - Sintomas do alumínio nas plantas relacionados com o aspecto morfo- lógico e fisiológico	16
3.1.5 - Possibilidade de seleção de varie- dades tolerantes ao alumínio	18
3.2 - Manganês	22
3.2.1 - Ocorrência	22
3.2.2 - Fatores que afetam a presença do manganês no meio	24
3.2.3 - Efeitos do manganês nos processos de desenvolvimento da planta	27
3.2.4 - Sintomas do manganês nas plantas relacionados com o aspecto morfo- lógico e fisiológico	29

	Página
3.2.5 - Possibilidade de seleção de variedades tolerantes ao manganês	32
3.3 - Silício	35
3.3.1 - Ocorrência	35
3.3.2 - Fatores que afetam a presença do silício no meio	36
3.3.3 - Efeitos do silício nos processos de desenvolvimento da planta	37
3.3.4 - Sintomas do silício na planta relacionados com o aspecto morfológico e fisiológico	39
3.4 - Micronutrientes	43
3.4.1 - Boro	43
3.4.1.1 - Ocorrência	43
3.4.1.2 - Fatores que afetam a presença de boro no meio	43
3.4.1.3 - Efeitos do boro no processo de desenvolvimento da planta	45
3.4.2 - Molibdênio	47
3.4.2.1 - Ocorrência	47
3.4.2.2 - Fatores que afetam a presença de boro no meio	48
3.4.2.3 - Efeitos do molibdênio no processo de desenvolvimento da planta	50

	Página
3.4.3 - Zinco	53
3.4.3.1 - Ocorrência	53
3.4.3.2 - Fatores que afetam a presença do zinco no meio	53
3.4.3.3 - Efeito do zinco no processo de desenvolvimento da planta	55
4 - HIPÓTESE DE TRABALHO	58
5 - MATERIAL E MÉTODOS	60
5.1 - Primeira Etapa - Seleção de variedades ao alumínio e manganês	60
5.1.1 - Obtenção de mudas	61
5.1.2 - Tratamentos para a seleção	62
5.1.3 - Condução do ensaio	63
5.1.4 - Observações realizadas	63
5.1.5 - Colheita de plantas	63
5.1.6 - Delineamento experimental	63
5.1.7 - Características consideradas	64
5.1.8 - Determinação da composição mineral do material vegetal	64
5.1.9 - Método de seleção de variedades	65
5.1.10 - Relação peso seco total e outros componentes	66
5.2 - Segunda Etapa - Comportamento das variedades selecionadas ao alumínio em relação a absorção de ^{32}P	67

5.2.1 - Primeiro Experimento - Estudo da absorção de ^{32}P pelo feijoeiro cultivado em solução contendo alumínio	67
5.2.1.1 - Variedades usadas	67
5.2.1.2 - Sequência básica de operações	68
5.2.1.3 - Disposição dos tratamentos .	68
5.2.1.4 - Interpretação dos resultados .	69
5.2.2 - Segundo Experimento - Estudo da absorção de ^{32}P pelo feijoeiro cultivado em solução nutritiva na ausência de alumínio	69
5.2.2.1 - Variedades usadas	69
5.2.2.2 - Sequência básica de operações	69
5.2.2.3 - Disposição dos tratamentos	69
5.2.2.4 - Interpretação dos resultados .	70
5.2.3 - Terceiro Experimento - Efeito da concentração iônica externa na absorção de ^{32}P	70
5.2.3.1 - Variedades usadas	70
5.2.3.2 - Sequência básica de operações	71
5.2.3.3 - Disposição dos tratamentos ...	71
5.2.3.4 - Interpretação dos resultados .	71

	Página
5.3 - Terceira Etapa - Estudo do manganês na presença do silício	71
5.3.1 - Variedades usadas	72
5.3.2 - Sequência básica de operações	72
5.3.3 - Delineamento utilizado	72
5.3.4 - Características consideradas	73
5.3.5 - Determinação da composição mineral do material vegetal	73
5.3.6 - Método de avaliação das variedades .	74
5.4 - Quarta Etapa - Ensaio de micronutrientes..	74
5.4.1 - Primeiro Experimento - Efeito do boro no crescimento e na composição mineral do feijoeiro	74
5.4.1.1 - Variedades usadas	74
5.4.1.2 - Sequência básica de operações	74
5.4.1.3 - Delineamento Experimental ..	75
5.4.1.4 - Características consideradas .	75
5.4.1.5 - Determinação da composição mineral do material vegetal ..	75
5.4.1.6 - Avaliação dos efeitos dos tratamentos sobre as variedades	76
5.4.2 - Segundo Experimento - Efeito do <u>mo</u> libdênio no crescimento e na <u>compo</u> sição mineral do feijoeiro	76

	Página
5.4.2.1 - Variedades usadas	76
5.4.2.2 - Sequência básica de operações	76
5.4.2.3 - Delineamento experimental ..	77
5.4.2.4 - Características consideradas..	77
5.4.2.5 - Determinação da composição mineral do material vegetal..	77
5.4.2.6 - Avaliação do efeito dos tratamentos sobre variedades ..	77
5.4.3 - Terceiro Experimento - Efeito do zinco no crescimento e na composição mineral do feijoeiro	78
5.4.3.1 - Variedades usadas	78
5.4.3.2 - Sequência básica de operações	78
5.4.3.3 - Delineamento experimental ..	78
5.4.3.4 - Características consideradas..	79
5.4.3.5 - Determinação da composição mineral do material vegetal..	79
5.4.3.6 - Avaliação do efeito dos tratamentos sobre as variedades	79
6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO	80
6.1 - Primeira Etapa - Seleção de variedades ao alumínio e manganês	80
6.1.1 - Metodologia de seleção	80

	Página
6.1.2 - Efeito do alumínio e manganês nos fatores de crescimento	83
6.1.3 - Efeito do alumínio e manganês na composição mineral	89
6.1.4 - Relação entre os componentes de avaliação	96
6.2 - Segunda Etapa - Estudo da absorção de ^{32}P pelo feijoeiro na presença de alumí nio	98
6.2.1 - Estudos da absorção de ^{32}P pelo feijoeiro cultivado em solução con tendo alumínio	98
6.2.2 - Estudo da absorção de ^{32}P pelo feijoeiro cultivado em solução nu tritiva na ausência de alumínio	98
6.2.3 - Efeito da concentração iônica ex terna na absorção de ^{32}P	99
6.3 - Terceira Etapa - Estudo do manganês na presença do silício	103
6.3.1 - Efeito do manganês na presença do silício nos componentes de cresci mento	103
6.3.2 - Efeito do manganês na presença do silício na composição mineral	105
6.4 - Quarta Etapa - Ensaio de micronutrientes ..	107
6.4.1 - Efeito do boro no crescimento e na composição mineral do feijoei ro	107

6.4.1.1 - Efeito do boro nos componentes de crescimento	107
6.4.1.2 - Efeito do boro na composição mineral	108
6.4.2 - Efeito do molibdênio no crescimento e na composição mineral do feijoeiro	109
6.4.2.1 - Efeito do molibdênio nos componentes de crescimento ..	110
6.4.2.2 - Efeito do molibdênio na composição mineral	111
6.4.3 - Efeito do zinco no crescimento e na composição mineral do feijoeiro	111
6.4.3.1 - Efeito do zinco nos componentes de crescimento	111
6.4.3.2 - Efeito do zinco na composição mineral	113
7 - CONCLUSÕES	114
8 - SUMMARY	116
9 - LITERATURA CITADA	120
10 - APÊNDICE	138

1.- RESUMO

A - Trinta e oito variedades de feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) foram submetidas a tratamentos de 0 , 6 , 12 , 18 e 24 ppm de alumínio e 0 , 30 , 60 , 90 e 120 ppm de manganês, em solução nutritiva, em combinação fatorial. Análises de regressão do peso seco total, parte aérea e raiz, permitiram separar as variedades em três grupos em relação ao alumínio.

- a - Tolerantes - variedades que apresentaram máximos de produção na presença de 14 a 16 ppm de alumínio: - Jalo, Mulatinho paulista, Ricobão, 1014 e Roxo 760.
- b - Medianamente sensíveis - variedades que apresentaram mínimos de produção em solução contendo de 14 a 15 ppm de alumínio: - Jamapa e Porrilho sintético.
- c - Sensíveis - variedades que apresentaram mínimos de produção entre 2 a 9 ppm de alumínio: - Carioca , Costa Rica, Costa Rica 1031, Cuva 168 N , Goiano precoce, Rico pardo, Rio Tibagi e Tambô.

Análises de regressão deste mesmo parâmetro permitiram separar as variedades em dois grupos em relação ao manganês:

- a - Medianamente sensíveis - variedades que apresentaram mínimos de produção em solução contendo de 102 a 118 ppm, de manganês: - Carioca, CR 911, Cuva 168 N, Rico Pardo e Rio Tibagi.
- b - Sensíveis - variedades que apresentaram mínimos de produção em solução contendo de 72 a 99 ppm de manganês: - Costa Rica 1031, Goiano precoce, Jamapa, Porrião sintético e Rosinha.

Algumas variedades não puderam ser classificadas nos grupos tolerantes e sensíveis. As resoluções das respectivas equações de regressão apresentaram valores de x_1 fora do intervalo definido no trabalho ($0 > x_1 > 24$ ppm de alumínio e $0 > x_2 > 120$ ppm de manganês). Esses resultados saíram do campo real e por esse motivo não foi possível tirar conclusões seguras.

Correlações entre os componentes de crescimento: altura da planta (H), comprimento da raiz (CR), peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST), e concentrações de alumínio da parte aérea e raiz de duas variedades selecionadas em relação a este elemento e concentrações de manganês da parte aérea e raiz de uma variedade selecionada ao manganês permitiram indicar a parte aérea da planta como uma boa característica para estudos de seleção de variedades.

Ensaio com ^{32}P em raiz destacada, por um período de duas horas mostraram ser eficientes, qualitativamente, para agrupar variedades sensíveis e tolerantes ao alumínio.

Ao aumentar a concentração de alumínio na solução aumentou o teor de alumínio na matéria seca, havendo redução nos

teores de fósforo, cálcio e magnésio na parte aérea, contudo na raiz foi verificada alguma variação nos teores destes elementos. Variações nos teores destes elementos não mostraram relação com a classificação de variedades em relação ao alumínio.

Os teores de manganês aumentaram na parte aérea e raiz com o aumento das concentrações de manganês na solução ; os teores de ferro na parte aérea e raiz foram reduzidos com a presença dos maiores níveis de manganês na solução.

B - O silício isoladamente mostrou ser prejudicial ao desenvolvimento do feijoeiro para a maioria das variedades. As variedades Jalo e Rio Tibagi apresentaram efeitos lineares positivos, enquanto que as variedades Goiano precoce e Tambô apresentaram máximos com 110 e 102 ppm de manganês respectivamente.

O efeito do silício no controle da toxidez de manganês foi uniforme para as nove variedades estudadas. A dose de 104 ppm de silício foi suficiente para garantir a produção total máxima de matéria seca.

Embora a variedade Goiano precoce (sensível) exija-se maior concentração de silício na presença da dose subletal de manganês (60 ppm) devido à pequena exigência adicional, não se pode afirmar que as variedades sensíveis ao manganês sejam mais exigentes em silício que as medianamente sensíveis.

Ao aumentar a concentração de silício na solução (0, 100 e 200 ppm), na ausência de manganês, houve redução nas concentrações de manganês, cobre, ferro, fósforo e magnésio ; e aumento no teor de silício na parte aérea.

Quando o manganês estava presente (60 ppm), com o aumento da concentração de silício na solução foram verificados aumentos nos teores de fósforo, cobre e manganês na parte aérea. Embora o silício da solução contribuisse para o aumento

dos teores de silício e magnésio, houve redução nos teores desses elementos na presença da maior dose de silício (200 ppm).

O ferro teve seu teor reduzido, na parte aérea, quando o manganês estava presente na solução mesmo na presença do silício.

C - Dentre as nove variedades estudadas, seis apresentaram produção máxima, em solução nutritiva, em concentrações de boro situadas entre 24 e 25 ppm. As variedades Mulinho paulista, Jamapa e Goiano precoce tiveram suas produções reduzidas mesmo em níveis mais baixos de boro. A dose geral que permitiu a produção máxima do feijoeiro foi 24,590 ppm.

As concentrações de fósforo, magnésio, boro e ferro na matéria seca, aumentaram com o aumento das doses de boro. O potássio e o cálcio foram mais absorvidos pelo feijoeiro nas concentrações de 0,5 ppm de boro na solução.

Não foi possível estabelecer uma equação geral de regressão que exprimisse a relação produção de matéria seca e níveis de molibdênio. As doses de molibdênio suficientes para garantir as produções máximas das diferentes variedades estão situadas entre 0,497 e 0,502 ppm, tendo como média 0,50 ppm. A variedade Ricobaio 1014 não respondeu aos tratamentos de molibdênio.

Foram verificados aumentos nos teores de magnésio e molibdênio na parte aérea com o aumento de molibdênio na solução, enquanto que os teores de cobre e ferro sofreram redução. A dose de 0,01 ppm de molibdênio em solução mostrou ser favorável a absorção de fósforo e cálcio.

O efeito do zinco foi uniforme para variedades. As doses suficientes para garantir a produção máxima das diferentes variedades situaram entre 2,429 e 2,503 ppm de zinco, tendo como média 2,472 ppm.

Os teores de zinco, boro e cobre da parte aérea foram aumentados com o aumento da concentração de zinco na solução ; contudo os teores de fósforo e potássio foram reduzidos. A concentração de 0,05 ppm de zinco na solução mostrou ser favorável à absorção de cálcio, magnésio e ferro pelo feijoeiro.

2 - INTRODUÇÃO

A maioria dos solos ácidos do globo apresenta produtividade abaixo de sua capacidade. Nesta classe se incluem mais de um bilhão de hectares nos trópicos representando, assim, o maior potencial disponível aos programas de aumento de produção de alimentos.

Considera-se que 20 a 25% da área total do território brasileiro são revestidos por vegetação de cerrado, cujos solos são caracterizados por uma topografia plana ou levemente ondulada, de excelentes propriedades físicas sendo contudo muito baixa a sua fertilidade natural geralmente associada a um elevado teor de acidez.

Nas regiões ácidas, sujeitas a intensa lixiviação de bases, o problema de acidez chega a influenciar significativamente na retenção e disponibilidade de cátions e ânions fertilizantes. A dimensão desta situação é relevante e chega atingir 50% dos solos brasileiros. A acidificação gradativa também tem sido verificada na maioria dos solos agricultáveis causada pela retirada de bases trocáveis no uso intensivo de culturas semianuais.

Os diferentes fatores, atuando nas diversas regiões, levam, com pequenas variações, à consequências comuns: decréscimo nos teores de matéria orgânica ou a matéria orgânica quando presente encontra-se em pequena atividade microbiológica, níveis tóxicos de alumínio, manganês e ferro ; sendo comum plantas com deficiência de fósforo, cálcio, manganês, molibdênio e outros.

Nestes meios o fósforo fica imobilizado com o alumínio e manganês, formando compostos insolúveis, portanto inassimiláveis pelas plantas. Há então sérias limitações para o desenvolvimento dos vegetais cultiváveis economicamente. Em muitos países o alto custo das adições de grandes quantidades de fertilizantes e corretivos requeridos para contornar esses problemas torna a adubação proibitiva ou pouco utilizada.

A convencional tentativa de aproximação do controle do desequilíbrio nutricional tem sido o uso de fertilizantes fosfatados e/ou correções do solo. As calagens, calcítica ou dolomítica em excesso, acarretam também alguns problemas. Enquanto que em solos ácidos a retenção de fosfato está relacionada com a presença de alumínio e manganês, em solos alcalinos o fosfato encontra-se formando complexos com o cálcio e ferro. As plantas podem apresentar deficiências de ferro, cobre e principalmente zinco. Há, nesse meio, interferência na absorção de fósforo pelos vegetais e especialmente problemas no seu metabolismo. A assimilação e a utilização do boro são prejudicadas pela correção, além desta acarretar problemas em decorrência da variação drástica na concentração hidrogeniônica no solo.

Observações de campo e em vaso têm mostrado que o silicato apresenta bom controle do excesso de manganês nas plantas. Bom desenvolvimento de plantas tem sido alcançado em soluções ricas em sílica, em meios contendo areia e em solos tipicamente arenosos mesmo em presença de altos níveis de manganês.

As técnicas corretivas, de modo geral, têm validade temporária e não atingem maiores profundidades do solo onde razoável volume de raízes das plantas cultiváveis pode alcançar. Um meio promissor de aproximação dos problemas dos solos ácidos é manipular plantas geneticamente tolerantes e desenvolver-las adaptadas a condições ácidas.

Resultados experimentais com diversas culturas têm mostrado que plantas, mesmo dentro de uma espécie, diferem largamente em suas tolerâncias em soluções nutritivas e em solos ácidos contendo altos níveis de manganês e alumínio trocáveis ou solúveis. A seleção de plantas constitui uma estratégia, pois, uma vez definidas as características essenciais desejadas na planta, os gastos de produção por unidade de área tornam-se menores.

As plantas tolerantes ao alumínio geralmente são mais eficientes no uso de fósforo, no desenvolvimento das raízes e no crescimento geral, sejam gramíneas ou leguminosas. Grande número de trabalhos tem sido realizado com milho, trigo, arroz, soja, cevada, ervilha e sorgo, no entanto, pouco se sabe em relação ao feijão.

O conhecimento do grau de adaptabilidade das plantas cultiváveis é de interesse prático e a seleção para resistência a solos ácidos pode ser feita, de acordo com a literatura, indiretamente, via seleção para resistência à toxicidade em solução nutritiva.

3 - REVISÃO DE LITERATURA

3.1 - ALUMÍNIO

3.1.1 - OCORRÊNCIA

Dentre os elementos de maior abundância na crosta terrestre o alumínio ocupa o terceiro lugar de acordo com os dados discutidos por MASON (1971). Participa dos minerais primários, aparecendo em grande proporção nos minerais de argila nos solos das regiões tropicais e subtropicais, segundo BUCKMAN e BRADY (1965), apresentando predominância sobre o silício. WUTKE (1972) relata que o alumínio presente no complexo ativo do solo tem procedência do $Al(OH)_3$ livre, do Al_2O_3 ou do próprio reticulado do mineral de argila. Estudos de MALAVOLTA *et alii* (1976) revelam que a participação do alumínio na acidez do solo pode ser entendida como:

- a - os protons H^+ ou H_3O^+ resultantes da água carregada de gás carbônico provocam reações no mineral secundário x

- (um silicato de alumínio essencialmente) libertando ions de alumínio que permanecem em forma trocável;
- b - através de uma série de reações reversíveis, os ions monômeros do Al (ou os dímeros, trímeros e polímeros dele resultantes) libertam H_3O^+ sucessivamente;
  - c - o aumento no pH causa diminuição na carga dos ions de alumínio e o abaixamento do primeiro tem efeito o posto.

3.1.2 - FATORES QUE AFETAM A PRESENÇA DO ALUMÍNIO NO MEIO

Os solos de regiões úmidas são geralmente muito âci dos através de todo perfil e para EVANS e KAMPRATH (1970) o alumínio trocável é predominante nos solos minerais em pH abaixo de 5. Nos solos ácidos com alto teor de matéria orgânica, além do alumínio, o teor de hidrogênio trocável é impor tante. HOWELER e CADAVID (1976) confirmam que 500 milhões de oxissolos e ustissolos são no presente subutilizados, em parte devido a extrema acidez e baixa fertilidade. Culturas des tas áreas sofrem da toxicidade de alumínio e deficiências de fósforo e cálcio.

Revisões realizadas por MAGISTAD (1925) citam que a presença de alumínio no solo depende de pelo menos três fatores: do tipo de composto, da quantidade de alumínio e da rea ção do solo. Embora encontrado em considerável quantidade de solos, nem sempre está presente em certos tipos de areia e tur fas.

Os ácidos presentes nos solos ácidos reagem com cer tos compostos de alumínio produzindo sais solúveis. A gibsita é um composto severamente atacado pelos ácidos. Um excesso de alumínio acima do normalmente encontrado pode combinar

com sílica e formar caolim. As águas de modo geral possuem alumínio. Os ácidos minerais como ácido clorídrico, nítrico e sulfúrico presentes no solo dissolvem o alumínio e o colocam na solução do solo. Adubos sulfatados gradualmente formam ácido e finalmente a solução do solo contém considerável quantidade de sulfato de alumínio.

Solos representativos de várias regiões do Brasil , segundo ANASTÁCIO (1968) possuem em média 58% de saturação de alumínio trocável e pH 5 ou abaixo, enquanto que pH acima de 5,5 não contém essencialmente concentrações representativas de alumínio. Latossolos vermelhos são os principais solos encontrados nos campos de cerrados do Brasil. A média dos dados comumente encontrados de saturação de alumínio é 79%.

MASCARENHAS *et alii* (1969) relataram um aumento de 952 kg de feijão por ha, com aplicação de calcário em um solo Latossolo com uma saturação de alumínio trocável de 58% e pH 4,6. A aplicação de 4 toneladas de calcário por ha reduziu a saturação de alumínio trocável para 8% , elevando o pH para 5,4 , aumentando a resposta de produção à aplicação de calcário em torno de três vezes.

PRAKASHI e BRASKER (1969), em estudos em solos alcalinos e ácidos, observaram que a adsorção de fósforo correlacionou-se diretamente com a textura do solo, sendo maior nos solos ácidos que nos solos alcalinos. Trabalhos de BRYAN (1933) , KAMPRATH (1967) e KAMPRATH (1970) realizados para verificar o efeito da saturação de alumínio em relação à aplicação de calcário, concluíram que a neutralização deve reduzir o alumínio da CTC (capacidade de troca catiônica) a nível inferior a 20% para soja e 10% para algodão. Quantidades de calcário muito elevadas resultam em neutralização de acidez não trocável. A capacidade tampão de um solo em pH abaixo de 5,5 é devida à presença do alumínio ; por essa razão, as recomendações de calagens devem ser feitas para ocorrer a neutraliza

ção até a este nível de acidez.

O efeito da acidez nociva, em condições de campo, pode variar até mesmo com a época do ano. PLUCKNETT e SHERMAN (1963) extraíram maiores concentrações de alumínio nas épocas de maiores precipitações e, também, em solos que apresentavam má drenagem. Baixas concentrações de alumínio, extraídas nos meses de baixa precipitação, podem ser resultado da inativação do alumínio nos sítios de troca, devido à desidratação ou reação do alumínio livre com o fosfato.

Trabalhos realizados por McLEAN e GILBERT (1926) com culturas de beterraba, alface, trigo e outras em solução nutritiva, usando $Al_2(SO_4)_3$ e completando as soluções com sais inorgânicos, mostraram que sob esta condição o alumínio é precipitado muito rapidamente pela troca de acidez em direção à neutralidade ou pela presença de fosfatos na solução. O alumínio em presença de compostos orgânicos é menos facilmente precipitado e questiona-se a possibilidade de que nos solos argilosos e orgânicos este cation possa combinar com compostos desta natureza.

FOX (1979) observou em dois ustissolos que a maioria das culturas teve sua produção reduzida em solos com pH abaixo de 5,5 e 4,9 respectivamente, sendo que o ponto em comum entre ambos era a saturação de alumínio excedendo a 12%. Esses resultados o levaram a concluir que a saturação pelo alumínio no complexo de troca constitui um bom indicador para predizer as causas da reduzida produção geralmente ocorrida em solos ácidos. As produções conseguidas, mesmo a estes níveis de acidez, são devidas às altas concentrações de fósforo encontradas nestes solos.

Para reduzir a concentração do alumínio ativo no solo, segundo POLLE *et alii* (1978), são usados dois processos: o uso de fosfatagem e/ou calagem, tendo como princípios comuns a precipitação do alumínio e o aumento da disponibilidade de

fósforo às plantas.

HARTWELL e PEMBER (1918) verificaram que a curva de solubilidade do alumínio no solo em várias condições de acidez é a mesma curva de solubilidade do alumínio em água. Os dados relacionando a solubilidade do alumínio em água e soluções do solo mostraram que em pH 5 há de 1 a 2 ppm de alumínio na solução do solo. HOWELER e CADAVID (1976) relatam que 1 ppm no solo satura o complexo de troca a valores menores que 60% mas tóxicos o bastante para a grande maioria das culturas.

Considerando ser antieconômico aplicações corretivas com altas doses de fertilizantes fosfatados, JONES e FOX (1978) colocam em discussão a validade desta recomendação. Pesquisas realizadas com tomate mostraram que o uso de fertilizantes fosfatados em solos ácidos reduziu a concentração de alumínio na parte aérea da planta aumentando o seu crescimento, mas melhores resultados foram obtidos com os mesmos tratamentos de fósforo em pH próximo à neutralidade. Os resultados sugerem que o decréscimo de acumulação de alumínio na parte aérea é o resultado das reações de superfície das raízes ou dentro da planta antes que ocorresse precipitação do fósforo na solução do solo. Esta explicação é baseada no fato de que as plantas responderam ao fósforo em todos os níveis de acidez. No caso, o alumínio não constituiu a causa primária do baixo desenvolvimento e as altas concentrações de alumínio na parte aérea foram devidas à baixa concentração de fósforo que permitiu a acumulação deste elemento na planta.

Assim, da literatura consultada, pode-se resumir que a solubilidade do alumínio e a severidade de uma toxidez para as plantas são o resultado de uma interação de fatores incluindo pH, tipo de mineral de argila predominante, concentração de outros cations, concentração de sais e teor de matéria orgânica.

3.1.3 - EFEITOS DO ALUMÍNIO NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DA PLANTA

Estudos de FOY *et alii* (1972) em feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) verificaram que a variedade Dade foi muito mais tolerante ao alumínio que a variedade Romano. Ao adicionar 8 ppm de alumínio em solução nutritiva, em pH 4,8, a produção da parte aérea e raiz foi 94 e 107% respectivamente para a variedade Dade, enquanto que na variedade Romano os mesmos parâmetros atingiram somente 53 e 59% respectivamente em relação à testemunha. A variedade Dade absorveu mais fósforo, cálcio, magnésio e potássio encontrando no exudado desta variedade 76, 66, 42 e 80% desses elementos respectivamente, enquanto que na variedade Romano 43, 55, 68 e 51% respectivamente.

Trabalhos de RUSCHEL *et alii* (1968) em solução nutritiva de pH 3,6, estudando a influência do alumínio na possível deficiência de fósforo, verificaram que 7 ppm ou mais de alumínio no feijão apresentam diferenças significativas no teor deste elemento na raiz e na parte aérea. Não foi observada influência do alumínio na percentagem de fósforo na parte aérea da planta, entretanto, parece ter havido influência do alumínio da solução no teor percentual de fósforo na raiz. Doses iguais ou superiores a 3 ppm de alumínio na solução nutritiva prejudicaram o desenvolvimento da planta. Os resultados sugerem que os efeitos prejudiciais obtidos são causados pelo excesso do alumínio e não pela deficiência do fósforo na planta.

Resultados experimentais de NOGUEIRA (1979) com sorgo grãofero relatam que o alumínio, em trabalhos com 0, 3, 6, 12 e 24 ppm de alumínio em solução nutritiva, reduziu a absorção de cálcio e magnésio tanto nas raízes como na parte aérea. A interação fósforo-alumínio parece reduzir a translocação das raízes para a parte aérea, de modo geral devido à

presença do alumínio. O efeito do pH nos níveis de acidez em pH 2,9 e 4,5, na ausência de alumínio, não constituiu o fator limitante da absorção de fósforo para alguns híbridos indicando diferenças de resposta aos efeitos da concentração hidrogeniônica.

Os efeitos do alumínio em plantas, de modo geral, são semelhantes em todas as culturas. A intensidade dos efeitos, no entanto, varia com as espécies, variedades e idade das plantas. A toxicidade do alumínio na cevada, estudada por WRIGHT (1943), apresentou uma redução em torno de 73% nas plantas. A percentagem de fósforo nas plantas toxicadas foi maior que naquelas de aspecto normal. A acumulação de fósforo nas plantas pobremente desenvolvidas sugeriu que algum fósforo não estava sendo usado necessariamente no processo metabólico. Comparando os diferentes tratamentos foi constatada concentração suficiente de fósforo na planta toxicada e uma produção de matéria seca acima das demais, embora se verificasse redução de 50% na produção de raiz em relação a planta normal. A maior parte do fósforo é precipitada no sistema radicular e por isso torna-se indisponível para o desenvolvimento da planta. A baixa percentagem de fósforo solúvel em água de planta de cevada indica que o fósforo é inativado. Então conclui-se que a toxicidade de alumínio é demonstrada pela baixa produção das plantas. A alta percentagem de fósforo total e o baixo teor de fósforo solúvel em água são atribuídos à precipitação do fósforo pelo alumínio dentro da planta.

ANDREW *et alii* (1973) estudando o efeito do alumínio em 12 espécies de leguminosas obtiveram resultados de tolerância maior do que da planta considerada controle. A relação parte aérea / raiz não foi afetada nas diversas plantas utilizadas: (*Desmodium uncinatum* = *Macroptilium lathyroides* > *Latonia bainesii* = *Stylosanthes humilis* >> *Glycine wightii* > *Medicago sativa* representantes tropicais e *Trifolium rupe-*

pellianum = *Trifolium semipilosum* > *Trifolium repens* >> *Medicago scutellata* = *Medicago truncatula* = *Medicago sativa*, têm peradas). Os principais nutrientes afetados foram o cálcio e o fósforo. Os tratamentos reduziram a concentração de cálcio na parte aérea de todas as espécies e houve uma recíproca relação entre concentrações de cálcio, magnésio e potássio. Nas plantas sensíveis, os tratamentos de alumínio reduziram o fósforo na parte aérea e raiz e em algumas espécies intermediárias as concentrações de fósforo na parte aérea foram umentadas pelo tratamento de alumínio, entretanto, altas concentrações de alumínio reduziram a concentração de fósforo.

Para FOY *et alii* (1969) a diferença varietal na soja foi devida ao decréscimo nas concentrações de cálcio na parte aérea e raiz mas o alumínio não foi um fator importante para explicar a tolerância. As plantas apresentaram um colapso na parte aérea associado a deficiência de cálcio. O alumínio interferiu na absorção e uso de cálcio.

3.1.4 - SINTOMAS DO ALUMÍNIO NAS PLANTAS RELACIONADOS COM O ASPECTO MORFOLÓGICO E FISIOLÓGICO

O alumínio, como os cations de altas valências, geralmente, tende reduzir a permeabilidade do protoplasma. Aceita-se a hipótese de que a presença do alumínio pode restringir a entrada do fósforo na raiz da planta. Se o fósforo conseguir penetrar pode ser precipitado dentro da planta. A literatura suporta a idéia, conforme relata WALLIHAN (1948), que o alumínio reduz a atividade metabólica do fósforo no tecido da planta e que a concentração do alumínio na parte aérea é muito baixa. Supõe-se que cargas residuais do protoplasma causam a aderência desses cations. Trabalhos com trevo têm mostrado que o excedente de alumínio no meio não é absorvido, mas

acumulado na superfície da raiz e pode combinar com o fósforo das soluções, precipitando-o.

A precipitação do alumínio ocorre primariamente na raiz e causa então uma deficiência de fósforo na região meristemática a qual é refletida nas reduções de produção, de acordo com estudos de MAGISTAD (1925) e de WRIGHT (1943).

Trabalhos de McLEAN e GILBERT (1926), em solução nutritiva, mostraram que a acumulação de alumínio ocorre no córtex. Colorações com corantes químicos revelaram que a acumulação mais caracterizada ocorreu no protoplasma em geral, o qual ficou colorido muito profundamente. Danificações causadas pelo alumínio em plantas de trigo foram acompanhadas pela redução na absorção de corante, nitrato e água. O alumínio absorvido pela planta acumulou-se no córtex, principalmente no protoplasma sendo concentrado no núcleo. Nenhuma acumulação de alumínio foi detectada em plantas jovens, exceto nas raízes emergidas das plantas em solução.

As plantas, segundo HOWELER e CADAVID (1976), podem sofrer de toxicidade de alumínio quando a concentração na solução do solo está acima de 1 ppm e os sintomas aparecem nas folhas quando, em soluções nutritivas, encontra-se em concentrações acima de 25 ppm.

Cations com altas valências geralmente tendem a reduzir a permeabilidade e a precipitação de solutos dentro da planta, sendo que a ocorrência desta precipitação depende dos cations envolvidos.

As primeiras evidências de injúrias nas plantas ocorrem na raiz. Estas tornam-se descoloradas e suas ramificações atrofiadas, o desenvolvimento é prejudicado e todo o sistema radicular sofre redução. A sintomatologia vai se agravando havendo visível redução do desenvolvimento do ápice. Nas culturas sensíveis como beterraba e alface, as raízes morrem prontamente. Raízes de trigo, mais resistente, deformam

e podem morrer mas, principalmente, em altas concentrações de alumínio.

O alumínio é conhecido, segundo MAGISTAD (1925), estar presente na cinza da maioria das plantas e muitas águas naturais. A quantidade de alumínio presente é, entretanto, usualmente pequena. Na maioria das plantas a percentagem de Al_2O_3 é aproximadamente igual a de Fe_2O_3 e consideravelmente menor que a do fósforo. Pequenas quantidades de alumínio aceleram a germinação de muitas espécies enquanto que o excesso é sempre tóxico. Grandes quantidades de alumínio retardam o desenvolvimento das plantas. O alumínio solúvel é tóxico à planta porque age no protoplasma causando precipitações. Os sais de alumínio condensam-se na raiz e a tornam impermeável a soluções nutritivas. Na presença de alumínio a formação de amido é reduzida. Ao adicionar glicose às plantas cultivadas em soluções contendo alto teor de alumínio, a produção de amido volta ao normal. Conclui-se que o alumínio em grandes quantidades ocasiona diástase inativa na planta.

Revisões de MALAVOLTA (1976) relatam que o alumínio reage com as cadeias do ácido poligalacturônico das paredes das células jovens, dando compostos pectícos "errados", do que resultam perda de elasticidade e diminuição na elongação, interferência em reações de transferência de grupos fosforilados como na ação da hexoquinase, na formação de esteres de carboidratos e na de ácidos nucleicos.

3.1.5 - POSSIBILIDADES DE SELEÇÃO DE VARIEDADES TOLERANTES AO ALUMÍNIO

É conhecido o fato de que plantas crescendo em meio contendo alumínio tendem a trocar uma situação não favorável a seu desenvolvimento em direção a uma mais favorável, conforme

MAGISTAD (1925). Uma solução nutritiva, contendo sal de alumínio e uma reação desfavorável, é trocada mais lentamente para uma reação favorável que para uma reação similar em meio livre de sal de alumínio, sendo o efeito do alumínio atribuído ao seu poder tampão em manter a concentração hidrogeniônica no meio.

A possibilidade de seleção de genótipos de soja tolerantes ao alumínio, relatada por HANSON e KAMPRATH (1979), facilita o trabalho de melhoristas. Quando semente de alta qualidade foi usada, diferenças genéticas para tolerância não foram afetadas pelo meio, para produção de sementes. Genótipos selecionados para tolerância ao alumínio têm redução menor no desenvolvimento em solos com alta saturação de alumínio. Diferentes seleções tiveram o mesmo nível de metabólitos intermediários na raiz e parte aérea quando as plantas foram desenvolvidas na ausência de alumínio. Níveis de ATP e piruvato aumentaram significativamente em plantas de soja sob alta concentração de alumínio em solução. Em solos americanos a raiz é sempre limitada devido a alta saturação de alumínio no complexo de troca. A seleção de genótipos tolerantes ao alumínio constitui uma aproximação para superar o restrito desenvolvimento da raiz no subsolo ácido.

FOY *et alii* (1974) mostraram que variedades de feijão diferem amplamente em desenvolvimento da raiz e parte aérea em solos americanos em pH 4,4. Evidências preliminares mostram que a toxidez de alumínio é o fator limitante do desenvolvimento nestes solos. Variedades originadas de regiões ácidas, com poucas excessões, mostraram-se mais tolerantes que variedades provenientes de regiões não ácidas. Esses resultados sugerem a possibilidade de seleção de variedades de feijão tolerantes ao alumínio. Certas variedades enraizam mais profundamente em solução ácida, subsolo tóxico e são capazes de fazer melhor uso de água e nutrientes nesses meios.

- MUGWIRA *et alii* (1978) encontraram correlação entre comprimento de raiz e peso seco de trigo em 0,65 **. O alumínio reduziu o comprimento das raízes e aumentou o número delas nas variedades tolerantes e nas variedades sensíveis reduziu o peso radicular. Quando o pH foi ajustado diariamente, nenhuma diferença de acumulação de alumínio foi observada e, quando o pH não foi ajustado, foi observada uma maior acumulação de alumínio. Concluíram que o comprimento de raiz pode ser usado como parâmetro de seleção até 12 dias, em solução nutritiva. Aos 22 dias, além do comprimento da raiz, podem ser usados a concentração de alumínio e peso seco como critério para avaliar tolerância diferencial entre cultivares.

As dificuldades em encontrar um método de seleção de variedades podem ser resumidas em cinco itens para LIGON e PIERRE (1932): problemas para manter constantes os ions hidrogênios da solução, para manter as concentrações desejadas de alumínio, conhecer a intensidade de precipitação do alumínio e do fósforo em solução, tamanho dos recipientes para desenvolver plantas e idade da planta ideal para colheita.

Os estudos de FOY *et alii* (1969) na soja confirmaram a tolerância diferencial de campo em solução nutritiva. Esta diferença foi atribuída à redução de cálcio na parte aérea de 50 a 8 e 2 ppm ao aumentar o nível de alumínio na solução nutritiva. Os resultados sugerem que melhoradores são capazes de desenvolver variedades que podem ramificar mais efetivamente em solos ácidos e subsolos tóxicos em alumínio. As variedades que diferem na tolerância de alumínio podem proporcionar importante instrumento para estudos fundamentais de natureza fisiológica de toxicidade de alumínio nas plantas.

Outros resultados de FOY *et alii* (1974) mostraram que cultivares de trigo usadas em certos estados americanos são mais sensíveis que cultivares originadas de outros. Esta observação permitiu explicar as razões porque variedades de de-

terminadas origens apresentam menor rendimento que as outras. As variedades tolerantes foram provenientes de solos velhos de mostrando serem selecionadas naturalmente em relação ao alumínio solúvel ou trocável por si ou por alguma característica diretamente associada a ele.

Para VOSE e RANDAL (1962) um possível fator de resistência é a CTC (capacidade de troca catiônica) das raízes. Foi confirmado que a tolerância das plantas está relacionada com a baixa CTC. Resultados com diversas plantas mostraram que leguminosas têm, aproximadamente, duas vezes maior CTC que gramíneas e que dentro de diferentes grupos, espécies que mais exigem da fertilidade do solo tendem a ter maior CTC que espécies menos exigentes em suas necessidades. Trabalhos procurando estudar a teoria de Donnan mostraram que plantas com baixa CTC absorveram mais cations divalentes. A seleção à tolerância, baseada na CTC pode ser viável tendo em vista a possibilidade das plantas tolerantes absorverem monovalentes em lugar de manganês e alumínio.

Plântulas de milho tendem a variar mais suas respostas em relação ao alumínio que o trigo considerado como planta autopolinizante. Para POLLE *et alii* (1978) a variabilidade é menor quando são usadas sementes não melhoradas embora não seja um material requerido em programas de seleção. Efeitos de variabilidade podem ser superados pelo número de repetições ou tratamentos, entretanto, este procedimento tende limitar a ordem da metodologia. Outros trabalhos de POLLE *et alii* (1978) com trigo recomendam selecionar todas as linhas a um nível de tolerância. Esse nível pode ser escolhido de acordo com a tolerância esperada. Nesta etapa a maioria das linhas é eliminada e reduz o número destas a serem tratadas com outros níveis de alumínio. Métodos colorimétricos de cortes de raízes ou raízes inteiras podem ser usados para revelar níveis de tolerância, colorindo amostras de vegetais e comparan

do-as com padrões.

O uso de ^{32}P foi estudado por WRIGHT e DONAHUE (1953), em plântulas de *Hordeum vulgare*, durante quatro horas, sendo após esse tratamento as raízes destacadas e lavadas por 15 minutos. As raízes foram cortadas longitudinalmente e colocadas em contato com alumínio. A acumulação de alumínio, observada pelo teste de hematoxilina, se deu na superfície e na região cortical. Muito pouco alumínio foi encontrado no sistema vascular interno do endoderma. Revelações fotográficas mostraram modificação na estrutura interna. Esta modificação da estrutura das plantas e as distribuições do fósforo e alumínio evidenciaram o suporte geral da tese que o alumínio inativa o fósforo dentro da raiz interferindo então no metabolismo normal do fósforo na planta. A importância do método colorimétrico nos trabalhos de seleção é a constância de resultados nas diversas repetições dos tratamentos nas mesmas variedades.

3.2 - MANGANÊS

3.2.1 - OCORRÊNCIA

O manganês, depois do titânio, é o elemento mais abundante nas rochas ígneas, onde ocorre exclusivamente como Mn^{+2} , geralmente associado ao ferro, a cuja família pertence e ao qual se assemelha em suas propriedades químicas.

Dados analíticos médios, das diversas rochas ígneas, têm mostrado, de acordo com DANTAS (1971) e KRAUSKOF (1972), que o teor de manganês é bastante estável, ocorrendo em maior concentração nas rochas ultrabásicas. O caráter litófilo do manganês é muito pronunciado, mas tem uma certa tendência siderófila que se manifesta em seu comportamento nos processos metalúrgicos.

O manganês, em relatório de MASON (1971), encontra-se depositado como um dióxido sedimentar, sob a forma de dióxido de manganês hidratado, e esses depósitos e seus equivalentes metamorfoseados são as fontes significativas do minério deste elemento. O dióxido de manganês hidratado, sendo um colóide carregado negativamente, adsorve cations, devido o qual influencia nos teores de potássio, boro, cobre e zinco nos locais onde se encontram notáveis concentrações deste minério.

Uma das características geoquímicas principais do manganês é o fato de se ocultar, em sua maior parte, na estrutura cristalina dos minerais petrográficos de outros elementos, principalmente o ferro, de acordo com HOROWITZ (1966) e HOROWITZ e DANTAS (1971).

O manganês se concentra nos resíduos hidrolizados formados por meteorização laterítica. É encontrado nos sedimentos de oxidados, ao passo que nos sedimentos provenientes de solução sua precipitação ou cristalização é quase completa.

É encontrado no solo como vários óxidos e hidróxidos de solubilidade muito diversa. Para MALAVOLTA (1967), os minerais mais comuns são: pirolusita MnO_2 , pirolusita amorfa, hansmanita Mn_3O_4 e manita. Além da forma trocável, aparece ainda como complexo com a matéria orgânica do qual é retirado, pelo menos em parte, pelo EDTA.

Apresenta-se, no solo, em três estados de oxidação, isto é: 1 - Mn^{+2} , bivalente que aparece adsorvido (trocável) ou na solução do solo; 2 - Mn^{+3} , trivalente, possivelmente como óxido, Mn_2O_3 , muito reativo; 3 - Mn^{+4} , tetravalente, como pirolusita (MnO_2), um óxido estável, insolúvel e inaproveitável pelos vegetais, segundo DANTAS (1971), KRAUSKOF (1972) e FREIRE (1975).

Estes três estados, conforme HOROWITZ (1966), BUCKMAN e BRADY (1967) e MALAVOLTA *et alii* (1976), estão em equi-

líbrio dinâmico e a predominância de um estado sobre o outro depende das condições atuais do solo, como: teor de matéria orgânica, aeração, microorganismos, presença de determinados cations e anions, textura e pH.

A redução do MnO_2 ocorre na presença de *Thiobacillus* enquanto que a oxidação do Mn^{+2} ocorre sob a ação de fungos dos gêneros *Helminthosporium*, *Culvularia*, *Periconia* *Cephalosporium*.

3.2.2 - FATORES QUE AFETAM A PRESENÇA DO MANGANÊS NO MEIO

A deficiência de manganês pode ocorrer, para HOWELER (1978), em solos orgânicos ou em solos minerais, com alto pH. Para MURPHY e WALSH (1972), as deficiências são comumente observadas em solos bem drenados de reação neutra ou alcalina; entretanto solos orgânicos e alguns solos minerais contendo grandes quantidades de matéria orgânica podem apresentar deficiência de manganês com pH levemente ácido.

Excesso de manganês ou toxidade comumente ocorrem em solos extremamente ácidos ou em solos inundados. Normalmente as concentrações tóxicas não são encontradas em solos de pH acima de 6,5 a menos que o solo tenha quantidades abundantes de manganês no seu material de origem.

ELLIS e KNEZEK (1972) relatam que a adsorção de manganês pela montmorilonita e caulita pode ocorrer em condições ácidas. Alguns dados sugerem que a adsorção do manganês pela matéria orgânica pode formar complexos suficientemente estáveis para competir com a precipitação, como um mecanismo de controle do nível de manganês em certos solos, particularmente aqueles com alto teor de matéria orgânica.

FREITAS e PRATT (1969) estudaram o comportamento do feijoeiro (*Phaseolus vulgaris* L.) em vaso de oito tipos de solos do estado de São Paulo, em diferentes valores de pH, controlados por diferentes níveis de calcário, na presença e na ausência de 400 ppm de manganês. Concluíram que o pH mais adequado, nas condições do ensaio, situa-se em torno de 5,5. São preferíveis as aplicações de calcário de acordo com o pH do solo àquelas que apenas controlam a toxicidade do alumínio. Ao que parece, o manganês tóxico seria um dos responsáveis pelas baixas produções observadas na faixa de pH 4 - 5.

Do ponto de vista de utilização, o manganês pode ser encontrado no solo, segundo DANTAS (1971), em forma disponível ou em forma imobilizada. Em solos ácidos, pH até 6, os compostos de Mn^{+2} são solúveis nas formas de carbonatos e sulfatos. A um pH 8 o manganês se precipita e em contato com o ar oxida-se a Mn^{+3} , podendo ainda prosseguir a oxidação a Mn^{+4} , sendo ambas insolúveis na solução do solo.

O manganês, de acordo com HOROWITZ e DANTAS (1971) e MONIZ (1972), está no solo em concentrações consideradas suficientes para a planta, acima do limite de 20 ppm. Nas regiões pernambucanas, onde a deficiência surgiu em diversas culturas e que é dificilmente detectável naquelas condições de ensaio, encontra-se abaixo de 9 ppm.

Trabalhos de MASUI *et alii* (1976), com melões em areia tratada com solução nutritiva completa contendo 0,50, 30 e 60 ppm de Mn em combinação com 1,33; 4,00 e 12 mM Ca, observaram que o manganês da parte aérea da planta cresceu com o aumento da concentração de manganês, mas decresceu com o aumento da concentração de cálcio em solução. Indiferentemente aos níveis de cálcio, não houve queda de frutos até o fim da floração em meios tratados com 0,50 e 30 ppm de manganês, enquanto que foi observada queda de frutos com 60 ppm, na presença de 1,33 e 4 mM Ca. O aspecto dos frutos não foi considerado bom.

Um segundo experimento com níveis similares de manganês foi realizado em combinação com 1, 30 e 60 ppm de ferro. O teor de manganês nas plantas foi reduzido com o aumento dos níveis de ferro. O peso fresco dos frutos e teor de sólidos solúveis foram reduzidos na presença de 30 ppm de manganês, a medida que aumentaram os níveis de ferro. Não foi verificada queda de fruto até 30 ppm, contudo ocorreu queda de fruto em 60 ppm de manganês, indiferente aos níveis de ferro.

Para MALAVOLTA *et alii* (1976) os fatores que afetam a presença do manganês no solo são os seguintes:

- a - Solos de cerrados, muito ácidos, o manganês está frequentemente presente em concentrações tóxicas sendo responsável por colheitas baixas ; quanto mais baixo o pH, maior é a solubilidade do elemento. Ocorre em solos, seguramente, em pH abaixo de 5,5 , usando pH - HCl.
- b - Baixa aeração aumenta a concentração do Mn^{+2} devido à redução do Mn^{+3} e Mn^{+4} . Na Holanda é muito comum deficiência de manganês em culturas em solos argilo arenosos e argilo calcíferos. Neste último o pH é, naturalmente, muito alto para um seguro e ótimo desenvolvimento. É esporadicamente encontrado no campo todo, mas em pequenas áreas. É provocado pelo excesso de calagem.
- c - Fertilizantes que baixam o pH do solo (sulfato de amônia, uréia, fosfato de amônia, nitrato de amônia e outros) podem contribuir para aumentar a toxidade de manganês. A acumulação do elemento por uso continuado de sais de manganês ou de defensivos pode atingir concentrações tóxicas no solo.
- d - Condições de anaerobiose ocorridas por encharcamento, excesso de chuva ou irrigação, por inundações podem reduzir o manganês de formas oxidadas, aumentando assim o teor de Mn^{+2} trocável até níveis tóxicos.

3.2.3 - EFEITOS DO MANGANÊS NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DA PLANTA

Ao contrário do alumínio, o manganês é um elemento essencial às plantas, sendo relacionado entre a lista dos micronutrientes. Satisfaz tanto o critério direto quanto o indireto de essencialidade.

MALAVOLTA (1967) relata ser o manganês absorvido pelas raízes sendo encontrado nos pontos fisiologicamente ativos. Não se transloca apreciavelmente para os órgãos mais novos quando ocorre deficiência. As plantas podem absorvê-lo através de suas folhas o que permite o uso de sais de manganês em pulverizações para corrigir culturas deficientes.

É absorvido na forma bivalente sendo que vários tecidos têm mostrado duas fases características de absorção — uma fase inicial rápida, de caráter passivo e uma fase lenta, de caráter metabólico. Para MOORE (1972), em plantas destacadas, a temperatura, aeração e tempo de lavagem para o preparo de tecido têm afetado a absorção de manganês e problemas no metabolismo estão envolvidos.

Revisões de MALAVOLTA *et alii* (1967) , KRAUSKOPF (1972) , YNAMA e PRIMASI (1973) ; EPSTEIN (1975) e MENGEL e KIRKBY (1978) são unânimes em relatar que o manganês é ativador de enzimas oxidantes, da arginase, de muitas descarboxilases, desidrogenase isocítrica, enzima málica. A reductase da hidroxilamina, enzima que toma parte no sistema responsável pela redução do nitrato a nitrogênio amoniacal depende do manganês para sua atividade. A assimilação fotossintética fica reduzida a um terço em caso de carência, o que explica a possibilidade de funcionar como doador ou aceitador de eletrons. Controla os vários sistemas de oxiredução existentes na planta.

O conhecimento do fracionamento do manganês nos horizontes do solo é importante, segundo SHAWMAN (1979), para se

compreender o fenômeno de retenção e a disponibilidade do elemento para a planta. Os teores de manganês são maiores em solos de textura fina e em solos com maior teor de matéria orgânica. KLAMT (1969) considera que níveis de manganês acima de 20 ppm são tóxicos para a maioria das culturas enquanto que níveis inferiores a 2,5 ppm podem ser insuficientes para algumas plantas. A técnica de calagem é muito importante para aumentar a quantidade de manganês disponível. Neste trabalho, esta técnica trouxe a relação ferro : manganês que era de 1 : 3 a 3 : 1 , considerada ideal para as culturas.

Para JONES e NELSON (1979), em solos extremamente ácidos, o crescimento de soja tornou-se reduzido o que foi atribuído ao manganês, ou ao alumínio ou a ambos, presentes na solução do solo. Sintomas foliares não foram observados, do que se deduz que ausência de sintomas não denota, necessariamente, tolerância ao manganês. Ocorreram variações de respostas entre variedades mas a produção foi afetada devido a presença desses elementos.

HOYT e MYOVELLA (1979) observaram morte de plantas de trigo antes do encasqueamento em solo deficiente de manganês. A produção de trigo aumentou linearmente com a aplicação lateral do manganês. Foi observado no solo, após a aplicação do fertilizante, 1714 ppm de manganês que é atribuído à acidificação do solo devido a formulação de adubo combinado com sulfato e nitrato de amônia. O nitrato de cálcio e o super - fosfato triplo apresentaram-se menos efetivos na liberação de manganês.

Terras altas inglesas apresentam problemas para o desenvolvimento de legumes. Além da lixiviação de bases causada por precipitações, há problemas de toxicidade de plantas susceptíveis ao manganês como o *Phaseolus vulgaris*. Com algumas diferenças entre variedades as plantas apresentaram baixo teor de cálcio. VOSE e JONES (1963), desenvolvendo plantas em soluções nutritivas, verificaram que a 20 e 40 ppm de manganês

não houve diferença entre variedades e quase todas tiveram o crescimento reduzido com grandes áreas necróticas. Houve um consistente declínio no peso seco do caule e da raiz com aumento dos níveis de manganês e a produção não respondeu aos tratamentos de cálcio, mesmo nos níveis mais altos.

3.2.4 - SINTOMAS DO MANGANÊS NA PLANTA RELACIONADOS COM O ASPECTO MORFOLÓGICO E FISIOLÓGICO

Os sintomas de carência consistem, inicialmente, em um amarelecimento do limbo foliar. MALAVOLTA (1976) descreve que a nervura das plantas e uma estreita faixa de tecido ao longo da mesma permanecem verdes, o que dá ao conjunto o aspecto de um reticulado grosso.

O excesso de manganês em feijão, *Phaseolus vulgaris* prejudica o desenvolvimento da planta que cresce pouco, com tecido esverdeado nas internervuras das folhas trifoliadas em expansão. Para WILCOX e FAGERIA (1976) o tecido ao longo das nervuras é verde escuro, folhas pequenas com aparência rugosa. Com o desenvolvimento dos sintomas, aparecem linhas necróticas ao longo das nervuras das folhas. HOWELER (1978) relata que quando a toxidade é severa as folhas superiores tornam-se pequenas, enrugadas e encurvadas para baixo.

BREWER e CARR (1926) relatam que muitas culturas não têm sucesso na produção após adequadas aplicações de fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio, após a correção de acidez através de calagem. As plantas crescendo neste solo dão evidência de toxidade apresentando redução de crescimento, amarelecimento e listas brancas desenvolvendo nas folhas. Evidências deixam acreditar que a causa do desarranjo nas plantas está associada com as formas de manganês e ferro. Problemas de deficiência de manganês em cevada foram verifi-

cados por LEEPER e SWABY (1940) em pH acima de 8 . FARLEY e DRAYCOTT (1976) relatam ser comum deficiência de manganês nas condições alcalinas dos solos ingleses em beterraba açucareira.

Trabalhos de FUJIMOTO e SHERMAN (1948), com doses crescentes de calcário calcítico e dolomítico em solos de Hawaí, com culturas de abacaxi e cana-de-açúcar, observaram decréscimo na concentração de manganês, confirmando os resultados da análise química do solo. Por outro lado, aplicações de enxofre causam um aumento acentuado no teor de manganês no solo e um aumento surpreendentemente grande no teor de manganês nas plantas. Com a aplicação de sacarose, matéria orgânica como folhas de cana e restos de abacaxi, houve liberação de manganês do solo em um período relativamente curto de 24 horas. O teor de manganês cresce e decresce num período suficiente para ocorrer decomposição de matéria orgânica e acidificação do meio.

DUANGPATRA *et alii* (1979) observaram que plantas de tabaco e arroz, desenvolvendo em solos fortemente ácidos, exibem sintomas de toxidade de manganês, pobre desenvolvimento e baixa produção. Em contraste, plantas crescendo em solos alcalinos ou pesadamente corrigidos, podem se tornar deficientes em manganês. Grandes quantidades de fertilizantes comerciais comumente aplicadas ao solo provocam abaixamento do pH e a toxidez de manganês é aumentada. A técnica de inundação de solos também pode reduzir o pH. A técnica corretiva nem sempre aumenta a produtividade dos solos ácidos, explicado pela precipitação do MnO_2 ocorrendo uma competição na absorção do cálcio com o manganês.

Cultivos de cevada foram realizados por GUPTA (1971) em solos com 20 ppm e vasos com 0, 100 e 200 ppm de manganês e pH corrigido para 4,7 ; 5,2 ; 5,7 e 6,2 . A 100 ppm foram observados efeitos de excesso de manganês e, em relação ao

pH, mesmo na ausência deste elemento, foi observada toxidez nos topos nos pH de 4,2 a 4,7. A 200 ppm os sintomas foram mais severos e associados com pontas queimadas e mosqueadas na maioria das folhas. A concentração de manganês no tecido cor relacionou positivamente com o manganês solúvel em água e negativamente com o pH do solo, molibdênio, cobre e ferro nos tecidos. O teor de boro não foi afetado.

Trabalhos de SALCEDO e ELLIS (1979) com ^{54}Mn mostraram o efeito residual positivo de adubos que contêm manganês, em grama sudanesa. Para HOWELER (1978) plantas normais de feijão (*Phaseolus vulgaris*) apresentam teores de manganês que variam entre 75 - 200 ppm nas folhas superiores e, geralmente, as folhas deficientes contêm menos de 30 ppm. Os teores de manganês superiores a 500 ppm nas folhas, indicam toxicidade deste elemento. A deficiência pode ser corrigida aplicando no solo 5 - 10 kg de manganês/ha na forma de MnSO_4 ou MnO e também por aplicações foliares de quelatos de manganês. A aplicação de calcário e o melhoramento das condições de drenagem ajudam a solucionar o problema da toxicidade do manganês.

O manganês é importante nas reações que ocorrem no fotossistema II da fotossíntese. PRINCE *et alii* (1972) relatam que plantas em ausência de manganês não completam seu ciclo, morrendo antes. O elemento não pode ser substituído por nenhum outro e o seu efeito não se prende à eliminação de condições físicas, químicas ou biológicas desfavoráveis do meio.

Trabalhos com algas realizados por TEICHLER-ZALLEN (1969) mostraram o efeito da deficiência do manganês na atividade fotossintética e na estrutura das células. Na deficiência do manganês as células podem apresentar desenvolvimento a normal e distúrbios na corrente de transporte de elétrons no fotossistema II. As reações no fotossistema I não foram inibidas. Importantes alterações estruturais são observadas nas células deficientes, nos cloroplastos, no arranjo de dis

cos dentro das pilhas ou grana. A deficiência de manganês em folha de espinafre foi acompanhada por uma quebra de estrutura relacionada aos cloroplastos. Houve um decréscimo na habilidade para liberar o oxigênio e fixar o dióxido de carbono na fotossíntese e nenhum decréscimo na habilidade de carrear a fixação de dióxido de carbono na fotorespiração.

THOMPSON e TROEH (1978) relatam a atuação do manganês no sistema da clorofila e nos sistemas enzimáticos das plantas. Suas várias valências fazem-no passível de funcionar como coenzima metálica ou parte de uma molécula orgânica. O manganês, como o ferro é um elemento relativamente imóvel na planta. Os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas mais jovens, variando com a planta, mas de modo geral, são representados por colorações pálidas semelhantes a clorose causada pelo ferro entre as nervuras das folhas. A similaridade entre o manganês e o ferro causa, de certa forma, competição entre os dois elementos. Sintomas de toxicidade de manganês correspondem aos sintomas de deficiência de ferro e vice-versa.

3.2.5 - POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE VARIEDADES TOLERANTES AO MANGANÊS

MALAVOLTA (1976) relata que deficiência de manganês pode ser controlada ou melhor, contornada, através da escolha de uma variedade adequada. O teor de manganês das espécies não está relacionado com a capacidade de troca catiônica da raiz ou profundidade do sistema radicular, excreções radiculares, entretanto, parecem ter importância na regulação da absorção do manganês. Além disso a capacidade redutora das raízes pode ser um fator que controla a absorção e a translocação do manganês, de modo semelhante ao que ocorre com o ferro.

Espécies e variedades diferem na sua tolerância ao excesso de manganês solúvel ou trocável. Sabe-se que a tolerância ao excesso de manganês está associada à redução na absorção e / ou no transporte para a parte aérea.

Trabalhos realizados por MUNNS *et alii* (II - 1963) com aveia têm mostrado que diversos tipos de plantas podem diferir grandemente na composição, embora desenvolvidos sob condições idênticas. Isto implica na existência de significativa variação biótica nas taxas relativas de acumulação de nutrientes. Pesquisas preliminares com diferentes variedades, em solução nutritiva, mostraram que plantas jovens desenvolvem consistentes diferenças varietais na concentração de manganês no caule e na raiz. Admite-se que estas variações são herdáveis.

É importante conhecer a absorção de manganês pelas variedades levando em consideração: fenômeno de diluição do elemento no material vegetal e a sua relação com os outros cations e persistência desta relação no caule paralela a raiz, em diferentes condições de substrato (pH) e de meio (temperatura).

Diferentes variedades de aveia comportaram distintamente em relação a absorção de manganês em solução nutritiva. O experimento realizado por MUNNS *et alii* (III - 1963) com raízes de cevada e ^{54}Mn , permitiu concluir que uma fração em torno de 30% de manganês na planta é renovável. Este consiste de, no mínimo, duas frações que diferem na labilidade de movimento. O manganês entra na fração mais lábil rapidamente, e enquanto permanece aí, pode trocar com ions substratos, embora mais lentamente que na fração renovável, ou pode mover rapidamente para o caule. O manganês entra na fração não lábil lentamente, e uma vez aí, ele se transfere e troca frouxamente, e é translocado a taxas muito reduzidas, tão lento quanto o manganês é fornecido no substrato. A diferença nas velo

idades de absorção dessas duas frações não renováveis, observada pelo ^{54}Mn , permite separação e medida experimental.

Os diversos tratamentos de MUNNS *et alii* (I - 1963), referem-se a seleção de variedades ao manganês baseada em caracteres herdáveis relacionando a capacidade da absorção e translocação desse elemento em compartimentos na raiz das plantas.

O conhecimento do estado nutricional das plantas pode ser definido pelo nível crítico. Nível crítico é a quantidade total de um elemento por unidade de peso seco que é associado com a redução na produção de matéria seca. Os níveis críticos superior e inferior são definidos como a concentração no tecido associada com aproximadamente 10% de redução do máximo de crescimento devido a deficiência e toxicidade, respectivamente. Para OHKI (1977) o nível crítico inferior do manganês para algodão, soja e sorgo foi de 10 $\mu\text{g/g}$ em folhas adultas de plantas desenvolvidas em solução nutritiva sob condições de estufa. Sob condições de campo, onde o manganês foi colocado nas taxas de 0, 5,6, 11,2, 22,4 e 56 kg de manganês/ha, o nível crítico de manganês relacionado com a produção de feijão foi 10 $\mu\text{g/g}$ na folha amostrada no estágio R_2 de crescimento. Esse parâmetro serve como indicador do comportamento de cada variedade.

Várias leguminosas testadas por SOUTO e DÖBEREINER (1959) com 0, 50, 100 e 200 ppm de manganês como MnSO_4 , mostram ser diferentes na sensibilidade em relação a este elemento. *Centrosema pubescens* se mostrou mais tolerante tendo ao mesmo tempo maior desenvolvimento radicular. *C. pubescens*, *P. javanica* e *P. atropurpurens*, nesta ocasião apresentaram aproximadamente 50% das plantas noduladas enquanto que em três outras variedades, esta percentagem foi insignificante. Dois meses após o plantio, quando o experimento foi colhido, estas diferenças estavam ainda mais pronunciadas tendo sido altamen

te significativa a interação espécie - manganês para peso de nódulos, peso das plantas e teor de nitrogênio. Na época do desbaste já se notou efeito favorável da calagem na nodulação e no desenvolvimento das plantas, exceto no crescimento das raízes que foi prejudicado. A variedade SP-1 de *D. javanica* mostrou ser mais tolerante à toxicidade de manganês, principalmente, sendo sua simbiose menos afetada que a variedade Tinaroo.

Trabalhos realizados no IRRI (1979) têm mostrado o efeito limitante do alumínio e manganês no desenvolvimento de arroz de sequeiro em Oxisolos e Ultisolos. As variedades típicas de sequeiro como Palawan, Azucena, 056 e M₁-48 têm alta tolerância. IR 1754-F58-23, um híbrido do 056, com uma linha melhorada mostrou notada tolerância indicando a possibilidade de melhorar variedades em relação a esses dois elementos. Entre as mais susceptíveis estavam a Peta e a IR 20.

3.3 - SILÍCIO

3.3.1 - OCORRÊNCIAS

O silício, de acordo com MENGEL e KIRKBY (1978), é o segundo elemento mais abundante na litosfera após o oxigênio. Ocorre em altos teores em solos, principalmente na forma de silicatos e quartzo. Na solução do solo encontra-se, provavelmente, segundo VAN RAIJ e CAMARGO (1973) na forma de ácido monossilícico Si(OH)_4 . O fato de esta forma ser desprovida de carga elétrica tem interessantes consequências no comportamento da sílica com relação aos vegetais. O acesso do silício à planta depende grandemente da sua resistência à erosão; como quartzo, é indisponível.

3.2.2 - FATORES QUE AFETAM A PRESENÇA DO SILÍCIO NO MEIO

MASON (1971) e MONIZ (1972) relatam que, de um modo geral, a sílica pode ocorrer na natureza constituindo minerais cristalinos, criptocristalinos e amorfos. A sílica cristalina é o quartzo, considerado mais importante do grupo e por isso o mais estudado. A criptocristalina é representada pelos minerais calcedônia e sílex. A amorfa é a que constitui as o palas. Sob o aspecto agrônômico é conhecida a participação do silício nos feldspatos, feldspatóides, anfibólios e piroxênios.

Os teores totais de silício na fração argila dimi - nuem, como relatam VAN RAIJ e CAMARGO (1973), para o estado de São Paulo, com o grau de intemperismo e são menores nos so los com horizonte A latossólico do que naqueles com horizonte B textural.

O conhecimento da sílica solúvel em solo é relevante para a compreensão das diferenças de absorção de elementos pelas plantas que vegetam em vários tipos de solos. A solubi li lidade do ácido silícico na faixa de pH de 2 a 9 é da ordem de 120 e 140 ppm. Nos solos que não têm gradiente textural baixo, como a Terra Roxa Estruturada e os diversos Latossolos, nota-se o acúmulo de sílica na superfície, o que provavelmente é devido ao ciclo da sílica através das plantas e de volta ao solo. Nos solos com gradiente textural elevado (PV , Pc , Pml e Pln) o teor de argila mais elevado no horizonte B deve ser responsável pelos maiores teores de sílica.

O teor de argila nos solos parece ter influência nos teores de sílica solúvel. A comparação deve ser feita entre solos de grau de intemperismo idênticos. Assim pode-se consi derar a sequência decrescente dos teores de sílica solúvel pa ra os solos de horizonte B textural, TE , PV , LE , LV , LVr, LVt , LH e LEa em que diminuem, paralelamente, os teores de sílica solúvel e de argila.

Revisões de ELLIS e KNEZEK (1972) relatam a adsorção de Zn pela montmorilonita ao aumentar os níveis de sílica na solução. Evidências sugerem que, a uma larga faixa de pH e concentrações de zinco, há uma interação entre o zinco e a sílica solúvel que provavelmente foi restrita mais a uma camada adsorvida que uma separada fase de silicato de zinco. A presença de mineral de argila aumentou a formação do complexo $\text{Zn} - \text{Si}(\text{OH})_4$, presumivelmente devido a uma maior concentração de fatores reagentes na superfície de argila.

É conhecido o efeito benéfico das aplicações de sílica nos trópicos como meio de decrescer a fixação e aumentar a disponibilidade do fósforo. Para SANCHEZ (1976) a correção através de aplicações de silício, como silicato de cálcio ou silicato de sódio ou escória básica, funciona, como a calagem, bloqueando alguns locais fixadores de fósforo e deixando maior quantidade deste elemento disponível às plantas.

3.3.3 - EFEITOS DO SILÍCIO NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DA PLANTA

As plantas cultivadas em solo, invariavelmente contêm quantidades apreciáveis de silício, mas nos ensaios em solução, onde o elemento foi omitido, não ficou demonstrada sua essencialidade. O silício, entretanto, de acordo com EPSTEIN (1975), desempenha um papel no desenvolvimento normal de pelo menos algumas plantas que, quando crescendo no solo, acumulam grandes quantidades do mesmo. Não se considera que o silício seja um elemento "não essencial", mas se essencial, a exigência é menor que $0,2 \mu\text{mol}$ por grama de matéria seca.

A absorção de silício depende da planta e a disponibilidade deste elemento depende das características do solo. RUSSEL (1973) descreve que gramíneas e cereais normalmente apresentam 1% de SiO_2 na matéria seca, teor comum na maioria

das dicotiledôneas. Estes teores podem variar de 1 a 10% na matéria seca, e conteúdo médio entre 2 e 5%. A maioria das outras plantas apresenta teor abaixo de 1% e muitas, abaixo de 0,2%. As raízes absorvem o silício como ácido silícico. Palhas de cereais contêm entre 10 e 15 kg de silício por tonelada enquanto que feijões removem somente uns poucos kg por hectare.

Embora o silício não seja geralmente considerado como essencial, definidas deficiências de silício são encontradas em certas gramíneas particularmente a cana e o arroz, em solos lixiviados, sob intenso cultivo. Nos solos de arroz, segundo SANCHEZ (1976), a produção aumenta, a planta torna-se mais ereta, nota-se maior tolerância a insetos e ao ataque de doenças, mais baixa absorção de ferro e manganês e certamente um aumento no poder de oxidação na região das raízes.

A maior absorção de sílica entre grupos de plantas foi verificada por JONES e HANDRECK (1965). A proporção de sílica nas espécies gramíneas é da ordem de 20 vezes daquela encontrada nas espécies leguminosas. Não somente espécies diferem na absorção, mas plantas da mesma espécie absorvem diferentes quantidades de sílica quando cultivadas em diferentes solos. Plantas de aveia têm mostrado que a absorção do silício aumenta com o abaixamento do pH. Há uma relação entre sílica na solução do solo e absorção de sílica pela aveia. Óxidos de alumínio e ferro adsorvem ácido monosilícico da solução ora formando sal ora formando ponte hidrogeniônica. A concentração do silício do solo é mantida constante após muitas lavagens o que sugere que muito ácido silícico é derivado da superfície de adsorção. Os resultados do trabalho concluíram que a absorção de sílica pode ser explicada simplesmente em termos de sílica na solução do solo e água transpirada e isto confirma a hipótese da absorção passiva da sílica. Maiores concentrações de sílica na solução dentro das plantas fo-

ram encontradas nos dias de maiores temperaturas e nesses dias a taxa de transpiração e taxa de entrada de ácido silícico na planta aumentaram.

No tomate, trabalhos de TAKASHI e MIYAKE (1978), a absorção de silício é passiva. Os sintomas de deficiência não são observados até o primeiro florescimento, mas, após este estágio, aparecem sintomas anormais de características os quais são curados pelo suprimento de silício. Fatores climáticos (temperatura e intensidade de luz) e variedades são relacionados com os sintomas de deficiência. Através de pequenas quantidades de silício o tomate continua seu desenvolvimento normal no estágio reprodutivo.

3.3.4 - SINTOMAS DE SILÍCIO NA PLANTA RELACIONADOS COM O ASPECTO MORFOLÓGICO E FISIOLÓGICO

Praticamente, todos elementos têm suas plantas acumuladoras e em particular o silício e o alumínio tem muitos acumuladores. Existem acumuladores no Phylum Bryophyta, três classes no Pteridophyta (Lycosida, Sphenosidae e várias famílias de Pterosida) e várias famílias de Monocotyledoneae (Cyperaceae, Graminae e outras) mas não são encontrados em Dicotyledoneae. O teor médio de silício encontrado em 34 espécies acumuladoras foi 1,96% nas folhas secas e em 141 espécies não acumuladoras foi 0,25%. As acumuladoras contêm oito vezes mais silício que as não acumuladoras.

Para TAKASHI e MIYAKE (1978) o arroz é o mais importante representante do grupo acumulador. Muitos experimentos têm provado que grandes quantidades de silício são necessárias com a finalidade de produzir com pesadas aplicações de fertilizantes. Se o teor de SiO_2 na lâmina foliar é abaixo de 11% o teor no solo é menor que 10,5 mg/100 g e efeitos benéficos de silício podem ser esperados. O silício também é benéfico

ao trigo e à cevada. A absorção do silício pelo arroz é ativa, sendo reprimida por inibidores metabólicos como NaCN , $2-4 \text{ DNF}$, NaF e iodato.

Em plantas não acumuladoras como o tomate, a absorção é passiva. Este tipo de planta é caracterizada quando, suprida com suficientes quantidades de sílica solúvel, não absorvem tanta sílica como acumuladoras e não mostram reação positiva ao suprimento de silício. Esses autores observaram que plantas cultivadas em 100 ppm de silício mostraram diferença na produção de matéria seca.

Para JONES e MILNE (1963) as plantas, particularmente as monocotiledôneas, absorvem silício em grandes quantidades que são depositadas ou secretadas como sílica nas paredes celulares das células epidérmicas. A sílica no tecido de várias plantas é a opala ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$). Depósitos de sílica nas plantas têm sido conhecidos como fitólitos de opala porque pequenas partículas de silício são libertadas quando a matéria orgânica dos tecidos da planta é destruída. Fitólitos de opala podem ser isolados de solos e esses têm sido objeto de investigações.

Trabalhos de JONES *et alii* (1963) relatam que em trigo há mais sílica na palha que no grão e dentro das folhas há 7 a 8 vezes mais que nos nódulos e 4 a 5 vezes mais que nos internódulos. Estudos microscópicos revelam que tipos de células da epiderme abaxial, exceto das células da casca, têm parede silicatada. Parece que a sílica é depositada na lamela média até que a espessura da parede celular a solicite. Há evidência de uma íntima associação entre celulose da parede celular e impregnação de sílica, uma vez que água com sílica nem sempre pode penetrar na celulose cristalina. A sílica da planta tem sido usualmente referida como a opala, mas seu comportamento é mais como de uma sílica gel, que como opala mineral depositada pelos processos biológicos. Estudos de ab-

sorção do infra-vermelho não dão indicação de absorção de bandas devido a compostos organo silicatados no arroz, contudo, há evidências que na palha do centeio há complexos sílico-galactose. É conhecido que moléculas de ácido silícico rapidamente complexam com muitas substâncias (moléculas simples como álcool polihídrico e ácidos orgânicos ou moleculares complexos como: methemoglobina, albumina, colágeno, gelatina, insulina, pepsina e laminarina).

Para esses autores a cevada e o arroz, quando submetidos ao excesso de manganês, os sintomas de severidade desaparecem ou são reduzidos com aplicações de silício. Parece haver diluição do manganês devido ao maior crescimento da planta. O silício evita a toxidade de ferro. O ferro e manganês bivalentes são oxidados na superfície da raiz tornando-se insolúveis e sendo precipitados. Este efeito depende mais do silício dentro da planta que da solução externa. Em plantas deficientes em silício o ferro e o manganês foram transportados para a parte aérea.

LEWIN e REIMANN (1969) relatam que certos microorganismos necessitam de silício para sobreviver. Em espécies vegetais de Equisetaceae, Cyperaceae, Graminae e Urticaceae, o silício em forma sílica gel é depositado nas células epidérmicas e nas paredes celulares. Geralmente ocorre como estruturas morfológicas e esqueletos especiais como espinho, espícula e agulhas. Em muitas plantas nenhuma estrutura é reconhecida e o silício pode, entretanto, constituir uma alta proporção na cinza.

WILLIAMS e VLAMIS (1967) observaram ações antogonísticas entre o silício e manganês. Folhas maduras de cevada contendo 300 - 400 ppm de manganês na matéria seca era tóxico quando o silício não estava presente na solução, sendo porém inócula quando este estava presente.

Em trabalhos de HORST e MARSCHNER (1978) com feijão (*Phaseolus vulgaris*), o silício mostrou controlar a toxicidade causada pelo manganês. Em ausência de silício, 100 ppm de manganês foram tóxicos ao feijão, enquanto que com 40 ppm de silício, o nível crítico da folha se elevou a 1.000 ppm de manganês. A relação $Si / Mn = 6$ dentro do tecido foi suficiente para prevenir a toxicidade do manganês. Quando o manganês é muito alto, mesmo aumentando a relação Si / Mn para maior que 20, não evita a depressão no crescimento causada pela toxicidade do manganês. Estudos de manganês autoradiografados mostraram que a distribuição deste elemento não é homogênea, caracterizada por manchas localizadas de acumulação na lâmina da folha. Em presença de silício houve distribuição homogênea, mesmo em presença de altas concentrações de manganês. O efeito do silício refletiu também a nível celular. Na presença de silício, uma maior proporção de manganês na folha foi encontrada na seiva, tendo sido transportada no vacúolo mais intensamente que em ausência de silício. O aumento na tolerância de manganês na folha de feijão pelo silício parece ser primariamente causada pela prevenção do local de acumulação deste elemento. As manchas localizadas de toxidez de manganês nas folhas trifoliadas e nos pecíolos são menos pronunciadas em presença de silício. Tratamentos com silício aumentaram o peso seco, concentração de potássio, decresceram a concentração de cálcio e magnésio, reduziram a concentração de manganês e zinco e aumentaram a concentração de ferro.

3.4 - MICRONUTRIENTES

3.4.1 - BORO

3.4.1.1 - Ocorrência

O teor médio de boro na litosfera é de 10 ppm, variando nos solos de 2 a 100 ppm. Para EPSTEIN (1975) é um elemento singular entre os micronutrientes no que tange a estreita faixa de concentração no meio à qual muitas plantas estão restritas. Uma fração de parte por milhão pode ser exigida e algumas partes por milhão já podem ser tóxicas. Há, entretanto, muita variação a esse respeito entre as espécies. Revisões de MALAVOLTA *et alii* (1967) relatam que os minerais considerados como fonte de boro são, principalmente, a turmalina e o borax; a primeira é encontrada em porções diminutas em todos os terrenos cultivados, enquanto que o segundo é de distribuição muito restrita. O teor assimilável oscila normalmente entre 0,1 e 2,5 ppm resultando quase totalmente da matéria orgânica, podendo também provir de sais, da rede cristalina dos silicatos, ou dos sesquióxidos dos folhelhos. O boro segundo VALADARES (1972), encontra-se na solução do solo sob a forma do ânion borato e água de irrigação que contenha 2 ppm de boro é considerada prejudicial ao bom desenvolvimento da planta.

3.4.1.2 - Fatores que afetam a presença do boro no meio

A deficiência de boro é comum em solos com alto teor de granito, de textura média, como observaram CHAPMAN e VANSELOW (1955), e em solos com baixo teor de matéria orgânica e

alto teor de hidróxidos de alumínio e ferro. Relatórios de HO WELER (1978) descrevem, também, terem sido observadas deficiências em solos aluviais com alto pH e baixo teor de boro total. YNAMA e PRIMAVESI (1973) relatam ocorrência de deficiência em época muito quente do ano em condições de seca prolongada quando o boro é fixado no solo e ocorre pouca mineralização da matéria orgânica.

JOHNS et alii (1977) encontraram, em experimentos com espinafre, respostas à baixa aplicação de boro e fitotoxicidade a altas taxas em milho, relacionadas com disponibilidade, aplicação e adsorção de boro em planaltos erodidos, aluvial recente e solo orgânico. Aplicações de boro em diferentes solos correlacionaram com o boro do tecido da planta e boro solúvel em água quente. A aplicação deste elemento afetou significativamente as concentrações de cálcio e manganês de tecido da planta. Esses resultados refletiram os efeitos das propriedades do solo como superfície específica, teor de matéria orgânica, teores de alumínio e ferro.

Sedimentos de argila de origem marinha, de acordo com boletins da BORAX CONSOLIDATED LIMITED (s.d.), possuem, muitas vezes, altos teores de boro variando de 3 a 300 ppm devido a relativa alta concentração na água do mar, que segundo MASON (1971) está em torno de 4,6 mg/litro. Concluiu-se, deste modo, que a quantidade total de boro no solo depende largamente do material parental do solo e que a disponibilidade de boro para absorção da planta depende da sua forma na solução do solo e do seu poder de retenção.

RIBEIRO e BRAGA (1974), em estudos de solos de vários locais de Minas Gerais classificados como LVE, LVA e LR, observaram que a adsorção do boro condicionou-se a pH situado nas faixas alcalinas e que o cálcio teve participação ativa na retenção do boro pelo solo. Os solos mais novos apresentaram maior capacidade na absorção do boro e não foi encontrada,

nas condições do trabalho, correlação entre adsorção e teores de argila, matéria orgânica e óxidos livres de ferro e alumínio.

BRASIL SOBRINHO (1965) verificou em São Paulo que solos Podzolizados de Lins e Marília apresentavam bons teores de boro podendo ser considerados como bem supridos, enquanto que valores LVE fase arenosa, LVA fase arenosa e Regossolo podz. podem ser considerados como deficientes em boro.

3.4.1.3 - Efeitos do boro no processo de desenvolvimento da planta

Absorvido pela planta, segundo MALAVOLTA (1976), na forma de íon borato e não se transloca facilmente de um órgão para outro.

Plantas de feijoeiro (*Phaseolus vulgaris*) deficientes em boro, segundo HOWELER (1978), possuem talos e folhas muito grossas com manchas amarelas e necróticas. As folhas tornam-se enrugadas e tendem a curvar-se para baixo, as gemas principais morrem e as laterais proliferam. Sob condições de severa deficiência, as plantas se atrofiam e morrem ou morrem rapidamente, poucos dias depois da germinação. O teor de boro nas folhas superiores das plantas deficientes é menor que 25 ppm. Os feijões de cor negra parecem ser mais susceptíveis a deficiência de boro que os de cor vermelha.

A toxicidade causada pelo boro produz amarelamento e margens necróticas nas folhas primárias. Geralmente ocorre devido a aplicações pesadas de boro ou quando aplicado próximo da semente, especialmente durante a época seca.

WILCOX e FAGERIA (1976) observaram que o crescimento do feijoeiro é seriamente retardado em deficiência de boro, com as pontas das folhas tornando-se necróticas. As folhas desenvolvem cloroses internervais do pecíolo para a ponta. O

crescimento da raiz é seriamente afetado, o ponto de crescimento torna-se necrótico e pode morrer com deficiência forte.

BATISTA *et alii* (1974) concluíram, em trabalhos com o feijoeiro, que o teor crítico de boro está em torno de 70 ppm em uma planta normal. Embora os teores variem consideravelmente nas leguminosas são, geralmente, mais elevados. A época de plantio exerceu grande influência na absorção e na concentração de micronutrientes. No plantio das águas, todas as partes analisadas, sem exceção, apresentaram maiores quantidades de micronutrientes chegando a cinco vezes mais. O estágio de desenvolvimento da planta influi na concentração e na translocação de micronutrientes. Os teores mais elevados ocorreram aos 40 e 60 dias após a emergência das plântulas. O boro é praticamente absorvido durante todo o ciclo da planta.

RUSCHEL *et alii* (1966), em estudos de simbiose de bactérias com feijão, baseados que a eficiência de *Rhizobium* depende da quantidade adequada de nutrientes, concluíram — o número de nódulos foi aumentado pelo boro, especialmente na presença de magnésio. O boro aplicado isoladamente prejudicou o desenvolvimento do feijão, mas aplicado junto com o molibdênio aumentou o peso seco. A relação Ca/B é mais importante na nutrição das plantas que valores absolutos de ambos elementos. Em solos deficientes em cálcio, pequenas quantidades de boro podem causar toxidez. Calagem excessiva, por outro lado, pode no mesmo solo causar deficiência de boro. O processo de formação de nódulo necessita de mais boro que a própria planta.

EPSTEIN (1975) relata o papel regulador desempenhado pelo boro, desviando a degradação da glicose para a glicólise ou para o caminho da pentose, de acordo com os estudos de LEWIN e REIMANN (1969). Há, entretanto, vários outros efeitos altamente característicos do boro ou da sua deficiência que

ainda não podem ser analisados em termos de passos bioquímicos específicos.

Relacionam o cessamento no alongamento dos pontos de crescimento da parte aérea e das raízes em plantas deficientes com a redução do teor de RNA. Para ALBERT (1965), além de deficiências de açúcar no câmbio, nas pontas do caule, raiz, flores e frutos, a deficiência de boro causa cessação da divisão celular ocorrendo anormalidade na formação da parede celular e desorganiza a célula em suas funções na mitose. Ocorrem na região meristemática manchas escuras do citoplasma seguidas por uma desintegração resultando num vazio com células mortas. Paredes celulares vazias são mais densas que as paredes celulares que contêm citoplasma.

Outros trabalhos de RUSCHEL *et alii* (1970), em soja, mostraram que tratamentos de revestimento de semente com fosfato de cálcio, em presença de boro, molibdênio e magnésio, aumentaram o número de nódulos. O boro e o zinco aplicados juntamente com o revestimento aumentaram o tamanho dos nódulos e peso seco da planta, o que possivelmente indica influência do boro na expansão nodular.

BRAGA (1972) recomenda que em estudos de adubação do feijoeiro devem ser incluídos os micronutrientes. A mistura de micronutrientes aplicada por GUAZZELLI *et alii* (1973), em campo de cerrado, contendo boro, molibdênio e zinco, resultou em aumento, embora pequeno, na produção do feijoeiro.

3.4.2 - MOLIBDÊNIO

3.4.2.1 - Ocorrência

Aparece na litosfera na proporção de 2,3 ppm, variando de 0,2 a 5 ppm, podendo o valor médio ser considerado como

2 ppm. VALADARES (1972) relata que o molibdênio do solo é proveniente da decomposição da olivina, minerais de argila, sulfatos e outros minerais e, aparece na solução do solo sob a forma de ânion MoO_4^{-2} . Para HAGSTROM (1977), somente uma pequena porção da concentração da litosfera é disponível à planta.

Revisões realizadas por MENGEL e KIRKBY (1978) descrevem que o teor de molibdênio da solução do solo pode variar consideravelmente, entretanto, tem-se considerado a faixa de 2×10^{-8} a 8×10^{-8} M.

MÁLAVOLTA (1967) relata que há quatro formas de molibdênio no solo:

- a - molibdênio não disponível localizado na rede cristalina de minerais primários e secundários;
- b - molibdênio trocável, retido pelos minerais de argila como aniônio MoO_4^{-2} ;
- c - molibdênio presente na matéria orgânica ; e
- d - molibdênio solúvel em água.

MASON (1971) mostra, em tabelas da composição das rochas componentes da crosta terrestre, que o granito é bastante mais rico em molibdênio que o diabásio confirmando ser o material de origem muito importante para a composição mineralógica do solo a ser formado.

3.4.2.2 - Fatores que afetam a presença do molibdênio no meio

Estudos de BATAGLIA *et alii* (1977), na determinação de molibdênio em solos de São Paulo, observaram que os solos derivados do arenito Bauru e sedimentos modernos arenosos foram dos mais pobres, enquanto os derivados de rochas básicas e de sedimentos modernos foram os mais ricos. Os teores me-

dios, ponderados pela espessura dos diversos solos, variaram entre 0,12 e 5,74 ppm. Os teores de boro foram influenciados pelo material de origem e observou-se boa correlação com o teor de argila ($R = 0,75^{**}$). De modo geral, nos solos mais ricos, o teor de molibdênio decresce com a profundidade, ao contrário daqueles mais pobres.

A disponibilidade do molibdênio no solo aumenta com o aumento do pH, sendo maior sua deficiência em solos ácidos. Alumínio e ferro e o íon sulfato em grande quantidade diminuem sua disponibilidade. YNAMA e PRIMAVESI (1973) relatam que a presença do molibdênio aumenta a absorção do cálcio e este aumenta a disponibilidade daquele elemento no solo. Se o solo for muito ácido as fontes de molibdênio não são eficientes para correção de deficiência pelo processo de adubação.

Há geralmente maiores quantidades de molibdênio assimilável nos solos de reação neutra, nos ácidos, segundo MALAVOLTA (1967), com pH 5 - 5,5 é que as deficiências ocorrem mais frequentemente. Por outro lado, o teor total de 3,5 ppm, que nos terrenos de pH baixo representa um nível simplesmente adequado, poderá, em terras de reação próxima a neutralidade ou superior, constituir uma quantidade tóxica a animais que se alimentam de forragens aí cultivadas, isto porque uma fração muito maior do teor total se torna disponível.

Solos com valores de pH 6,0 - 6,5 requerem molibdênio. Solos arenosos são frequentemente mais deficientes que solos mais pesados como a argila e o limo.

A utilização de fosfatos pelos vegetais parece auxiliar a do molibdênio e vice-versa. De acordo com BUCKMAN e BRADY (1966) os sais de molibdatos são muitas vezes aplicados juntamente com superfosfatos, nos solos deficientes em molibdênio. Esta prática, ao que parece, estimula a assimilação dos dois elementos e é, naturalmente, um método conveniente para adicionar as quantidades muito reduzidas do molibdênio exigido.

- 3.4.2.3 - Efeitos do molibdênio no processo de desenvolvimento da planta

STEWART (1974) separa a disponibilidade de molibdênio em três classes:

- a - níveis em que resposta de fertilização é obtida;
- b - níveis em que a planta se apresenta aparentemente normal mas a concentração é tóxica para animais;
- c - níveis nos quais o desenvolvimento da planta é reduzido, devido ao excessivo suplemento do elemento.

Revisão de STEWART e NEPTUNE (1974) relata a essencialidade do molibdênio para a fixação simbiótica do nitrogênio por leguminosas especialmente em baixo pH. Respostas positivas têm sido observadas em pastagens de leguminosas e culturas de feijão em Minas Gerais e Paraná.

O molibdênio aparece em várias metaloenzimas das quais as mais proeminentes estão implicadas, conforme EPSTEIN (1975), na fixação do nitrogênio e na redução do nitrato. Participa da molécula da redutase do nitrato, comentado por LEHNINGER (1976) e da nitrogenase comentado por BURRIS *et alii* (1977). Influi na formação de aminoácidos e proteínas onde funciona como catalizador. Beneficia o desenvolvimento radicular.

As leguminosas, segundo YNAMA e PRIMAVESI (1973), requerem quantidades maiores de molibdênio que as não leguminosas. Em áreas onde a deficiência de molibdênio ocorre, as leguminosas mostram maior necessidade e resposta à fertilização do molibdênio. Os sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais velhas, atingindo as mais novas. As folhas tornam-se amareladas nos bordos e se enrolam. Entre as nervuras aparecem manchas e há necrose dos tecidos internos. As folhas mais novas ficam mais estreitas e curtas. A deficiência, nas leguminosas, provoca acúmulo de nitrato na folha atingindo níveis

tóxicos. Para HAGSTROM (1977), se a deficiência do molibdênio é diagnosticada em cultura em desenvolvimento, pode ser facilmente corrigida por meio de pulverizações foliares.

Plantas que contêm 1 ppm ou mais, não respondem ao molibdênio e se o teor cai abaixo de 1 ppm as deficiências, especialmente em leguminosas, podem ser observadas.

Toxidade de molibdênio raramente ocorre em plantas sob condição de campo. Se encontrada, entretanto, quando animais domésticos ingerem forragens com teores de 10 - 20 ppm, desenvolve neles uma molibdenose quase sempre fatal.

RUSCHEL *et alii* (1969), aplicando molibdênio em diferentes revestimentos de semente em feijão (*Phaseolus vulgaris*), concluíram que o molibdênio foi altamente eficiente para a fixação simbiótica do nitrogênio na planta e quando aplicado junto com fosforita mostrou também ser eficiente para o desenvolvimento da planta. A inoculação com fosfato de cálcio na presença de boro-molibdênio-magnésio no solo, aumentou a nodulação. Esses efeitos foram melhores nos solos com elevado nível de cálcio, aumentando o nitrogênio total da planta. O carbonato de cálcio na presença de boro-molibdênio aumentou significativamente o peso dos nódulos.

SINGH e KUMAR (1979), trabalhando com soja, verificaram que o molibdênio, nas suas condições de trabalho, não influenciou na produção de grão da soja, em solo deficiente em molibdênio. Durante a fase reprodutiva, entretanto, mais molibdênio foi translocado para as partes reprodutivas e na maturidade 2/3 do molibdênio total estavam contidos nos grãos e nas vagens.

Estudos da influência da especialidade hospedeira na simbiose com *Rhizobium* no feijão (*Phaseolus vulgaris*) e relacionando a influência de diferentes nutrientes, FRANCO e DÖBEREINER (1966), em casa de vegetação, concluíram que os efeitos dependem das variedades. O molibdênio é essencial para a

fixação de nitrogênio, mas o seu emprego em excesso prejudica mais a fixação do nitrogênio que o desenvolvimento da planta. Estes autores atribuíram estes resultados à diferença fisiológica entre as variedades. A variedade Venezuela mostrou nodulação mais abundante que o Rico 23, usando-se em casa de vegetação 10 ppm de boro em solução.

RUSCHEL *et alii* (1966) relatam a necessidade de se conseguir estirpes selecionadas em estudos de nutrição no sentido de obter melhores informações com a cultura do feijoeiro. O molibdênio reduziu o número de nódulos, aumentou, no entanto, o nitrogênio fixado. ALVAREZ *et alii* (1978), trabalhando com sorgo, observaram que não houve influência de micronutrientes na ausência de calagem. O molibdênio apresentou efeito significativo em interação com o zinco e com o manganês, embora considerando o efeito negativo do manganês devido às altas doses usadas no trabalho. BRAGA (1972) encontrou que a dose máxima de molibdênio para tratamento de semente de feijão é de 13,5 g/ha. Além desta dose a produção caiu, supondo-se um efeito fitotóxico. SANTOS *et alii* (1979) encontraram resposta positiva para a produção de grãos de feijão em dois solos de Viçosa, sendo que a dose máxima para um dos solos é 12,3 g/ha de molibdênio, embora no solo de Paula Cândido, a produção de feijão caiu linearmente com a aplicação de molibdênio. Trabalhos de JUNQUEIRA NETO *et alii* (1978) o feijoeiro teve sua produção aumentada com a aplicação de molibdênio em solo contaminado com *Rhizobium phaseoli*. Em solo não contaminado nenhuma resposta significativa foi observada.

3.4.3 - ZINCO

3.4.3.1 - Ocorrência

O zinco encontra-se na litosfera na proporção de 80 ppm. Nos solos, varia de 10 a 300 ppm, podendo o valor médio ser considerado como 50 ppm. As rochas básicas são mais ricas em zinco que as ácidas. Revisões de VALADARES (1972) acrescentam que o zinco ocorre na biotita e nos minerais dos grupos anfibólio e piroxênio que são constituintes importantes das rochas básicas. Segundo MASON (1971) o diabásio apresenta 82 ppm de zinco enquanto que o granito apresenta 45 ppm. O zinco aparece na solução do solo como cation Zn^{+2} e é retido fortemente pelo complexo de troca. Revisões de MENGEL e KIRKBY (1976) relatam que nas soluções do solo a concentração do zinco encontra-se na faixa 3×10^{-8} M a 3×10^{-6} M. Pode ocorrer em combinação pura com os silicatos ($ZnSiO_3$ e Zn_2SiO_4).

3.4.3.2 - Fatores que afetam a presença do zinco no meio

Trabalho de VALADARES (1975) com solos do estado de São Paulo mostrou que o material de origem foi o fator preponderante a condicionar os teores de zinco dos solos. Os solos derivados de rocha básica, mais ricos em zinco, têm os teores médios ponderados dos horizontes A e de seus perfis compreendidos entre 87 e 315 ppm ; os materiais aluviais e coluviais, 53 e 84 ppm ; os derivados de sedimentos modernos, entre 29 e 65 ppm ; os derivados de arenito de Bauru, entre 13 e 30 ppm; os derivados de sedimentos modernos arenosos, entre 1 e 17 ppm, os mais pobres em zinco. A TRE apresenta uma diminuição do teor de zinco do horizonte A para o horizonte B ; os LVE

fase arenosa, podzolizados de Lins e Marília, var. Marília, e LVA húmico apresentam aumento do teor de zinco do horizonte A para o B .

YNAMA e PRIMAVESI (1973) relatam que a deficiência desse elemento ocorre em solos pesados com muita matéria orgânica (com pouco zinco disponível) ou em solos alcalinos e leves. Esta falta pode ser provocada pela erosão, lavagem pelas chuvas, ou tempo muito seco, comuns nos solos tropicais. Calagens e adubações fosfatadas pesadas, excesso de manganês, e nitrogênio também diminuem a concentração de zinco no solo.

KALBASI *et alii* (1978) relatam que a adsorção específica do zinco pelos óxidos Al_2O_3 e Fe_2O_3 pode ser no mínimo responsável pela fixação e a não disponibilidade de zinco adicionado aos solos. Esta adsorção é dependente do pH e aumenta com o aumento de pH. Atribuem a adsorção do zinco em forma de cloreto não saturado que associa aos hidróxidos de ferro e/ou alumínio através do mecanismo de polaridades das valências opostas, embora não específica ao zinco, envolvendo somente aquo - grupos. Um segundo mecanismo de adsorção ocorre provavelmente mesmo num potencial elétrico desfavorável causado por uma grande afinidade química. O zinco bivalente é ligado a uma ponte química formando composto cíclico com dois óxidos de ferro e sua propriedade seria consistente com perda da reversibilidade de adsorção.

Revisões de HODGSON (1963) relatam que a máxima disponibilidade de zinco ocorre em pH 4 quando este elemento é adicionado ao solo sob a forma de $ZnSO_4$. Quando se adicionou Zn-EDTA, a máxima disponibilidade alcançada ocorreu em pH 7. Sob diferentes condições esses materiais têm capacidade de manter os micronutrientes no seio da solução do solo, facilitando a absorção pelas plantas.

Os compostos orgânicos em que os elementos traços são combinados variam consideravelmente incluindo proteínas,

amino ácidos, compostos do humo, certos ácidos cítricos e tartárico. Para BUCKMAN e BRADY (1966) estes complexos protegem os micronutrientes contra certas reações prejudiciais como precipitação de ferro e fosfato. É possível, por outro lado, que a formação de complexo reduza a disponibilidade de micronutrientes para níveis abaixo dos necessários às exigências normais das plantas.

3.4.3.3 - Efeito do zinco no processo de desenvolvimento da planta

Os sintomas de deficiência de zinco no feijão (*Phaseolus vulgaris*), de acordo com HOWELER (1978), manifestam-se como clorose internerval das folhas superiores, que logo se tornam necróticas. As plantas deficientes possuem teores de zinco menores que 20 ppm nas folhas ; os níveis normais estão em torno de 40 - 50 ppm. Para YNAMA e PRIMAVESI (1973) os primeiros sintomas aparecem nas folhas mais velhas progredindo para as mais novas. Há parada de crescimento das gemas terminais com clorose nas extremidades devido ao atrofiamento dos cloroplastos na falta de zinco, com isso reduz a produção de carboidratos. As manchas cloróticas podem ser atacadas por fungos e bactérias. Os ramos apresentam entrenós curtos e as plantas não se desenvolvem. As flores caem prematuramente e os frutos, quando chegam a se formar, são pequenos e deformados. Em casos graves as plantas morrem.

O zinco é essencial para a síntese de triptofano , precursor do ácido indol-3-acético nas plantas. Revisões de MALAVOLTA (1967) relatam que por esta razão a deficiência de zinco manifesta-se fundamentalmente por falta de distensão dos entrenós novos. O zinco, segundo EPSTEIN (1975), é um componente de numerosas enzimas inclusive de várias desidrogenases

como a do álcool e a do ácido lático, podendo funcionar como cofator de várias enzimas mas raramente com muita especificidade.

STEWART (1974) comenta que plantas de arroz, amostradas a 3 e 5 semanas após transplântio em solos deficientes em zinco, tinham menos que 15 ppm deste elemento. Entretanto após 6 a 8 semanas após transplântio normal, o crescimento reduziu e as plantas encontradas nesta época continham 30 ppm de zinco. Estes resultados indicam que neste solo a disponibilidade do zinco tinha reduzido. Entretanto, isso foi suficiente para retardar a maturidade, reduzir o perfilhamento e subsequentemente a produção. As causas de deficiência de zinco em solos inundados onde a taxa de CO_2 dissolvida é alta a adição de carboidratos energéticos como glucose induz a sintomas de deficiência.

Com a finalidade de estudar a resposta ao sorgo à aplicação de micronutrientes, ALVAREZ *et alii* (1978) observaram em LVA distrófico, na presença e na ausência de calagem, que o zinco foi importante para aumento de produção.

BAHIA (1973) observou em folhas de milho que tanto a adubação fosfatada como a calagem diminuíram o teor de zinco das folhas, tendo obtido níveis iguais ou inferiores a 14 ppm, valor inferior ao nível crítico para obtenção de colheitas superiores a 80% da produção máxima. A aplicação de 4,5 ppm de zinco ao solo foi suficiente para que o nível do elemento na folha fosse elevado acima do nível crítico, elevando também a produção, anteriormente limitada pela deficiência de zinco. A interação entre fósforo e zinco na planta ocorreu principalmente nas raízes, reduzindo a translocação do zinco para as folhas. A interação entre calagem e zinco foi verificada, principalmente, antes da absorção de zinco pela planta.

STEWART e NEPTUNE (1974) relatam que o zinco tem mostrado ser um importante fator no cultivo do feijão e BATISTA *et alii* (1975) confirmam que em soluções 10^{-3} ppm de zinco é suficiente para se verificar o efeito benéfico do zinco, em 10^{-1} ppm as plantas de feijão não se distinguiram das plantas normais. A presença de manganês, cobre e molibdênio dificulta a absorção do zinco e em níveis elevados chega a reduzir a absorção até em 50% de seus valor máximo. Também o fosfato tem efeito semelhante, dificultando a absorção.

MELTON *et alii* (1970), estudando a absorção de zinco pelo feijoeiro, variando o pH e a textura, observaram que o fosfato em elevadas concentrações provoca deficiência de zinco em solo com pH acima de 7 e elevado teor de CaCO_3 .

A absorção de zinco, segundo AMBLER e BROWN (1969), nas variedades Sanilac e Sanginaw, *Phaseolus vulgaris*, em solo e solução nutritiva, foi diferente para meios e variedades.

4 - HIPÓTESE DE TRABALHO

Muita responsabilidade é atribuída ao técnico que classifica variedades em relação ao comportamento de uma cultura em meios estranhos às condições normais de nutrição e desenvolvimento. Assim, a certeza de uma definição em grupos tolerantes e sensíveis deve ser corroborada por uma série de testes utilizando-se de parâmetros de crescimentos e nutricionais para maiores esclarecimentos do comportamento diferencial entre variedades. A hipótese deste trabalho está baseada no princípio de que variedades pertencentes a grupos tolerantes, ou não tolerantes devem possuir características comuns que as fazem semelhantes dentro de cada grupo e distintas entre grupos.

Para confirmação da hipótese, o comportamento varietal do feijoeiro (*Phaseolus vulgaris* L.) foi estudado considerando os seguintes aspectos:

- Comportamento do feijoeiro em doses crescentes de alumínio e manganês, em condições controladas, em doses associadas e independentes;
- Efeito das concentrações crescentes de alumínio e manganês na composição mineral do feijoeiro;

- Estudos de absorção de ^{32}P por algumas variedades caracterizadas distintamente nos grupos tolerantes e sensíveis ao alumínio;
- Influência do silício sobre a toxidez do manganês em variedades previamente caracterizadas quanto à tolerância ao último e ao alumínio;
- Efeitos de zinco, boro e molibdênio em variedades diferenciadas quanto à tolerância ao alumínio e ao manganês.

5 - MATERIAL E MÉTODOS

5.1 - PRIMEIRA ETAPA - SELEÇÃO DE VARIEDADES AO ALUMÍNIO E AO MANGANÊS

Foram testadas 38 variedades de feijão (*Phaseolus vulgaris*, L.) oriundas do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF - EMBRAPA) e Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA - ESALQ) em cinco níveis de alumínio e cinco níveis de manganês, conforme listagem abaixo:

V ₁ - Aroana	V ₉ - Costa Rica 1031
V ₂ - Bico de ouro claro brilhante	V ₁₀ - CR 911
V ₃ - Bico de ouro escuro	V ₁₁ - Cubano
V ₄ - Bico de ouro fosco	V ₁₂ - Cuva 168 N
V ₅ - Carioca	V ₁₃ - Goiano precoce
V ₆ - Chumbinho opaco	V ₁₄ - Guatemala 162
V ₇ - Cornell 49 : 242	V ₁₅ - Iguaçu
V ₈ - Costa Rica	V ₁₆ - Jalo

V ₁₇ - Jamapa	V ₂₈ - Rio Tibagi
V ₁₈ - Maquinê	V ₂₉ - Rosinha
V ₁₉ - Moruna	V ₃₀ - Roxinho
V ₂₀ - Mulatinho paulista	V ₃₁ - Roxo 735 F 8
V ₂₁ - Pai d'água	V ₃₂ - Roxo 748 F 8
V ₂₂ - Porrilho sintético	V ₃₃ - Roxo 760 F 8
V ₂₃ - P 686 F 78	V ₃₄ - Tambô
V ₂₄ - P 704 F 78	V ₃₅ - Tayhu
V ₂₅ - Rico 23	V ₃₆ - TMD ₁ 807 F 8
V ₂₆ - Ricobaio 1014	V ₃₇ - Turrialba
V ₂₇ - Rico pardo	V ₃₈ - Venezuela 350

5.1.1 - OBTENÇÃO DE MUDAS

As sementes foram germinadas em vermiculita umidecida com CaSO_4 10^{-4} M, MALAVOLTA (1975). As plântulas permaneceram neste meio até o quinto dia após emergência, quando então foram colocadas em solução nutritiva de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) modificada em relação à concentração de fósforo biácido de potássio (KH_2PO_4) reduzida a 0,5 M para evitar precipitações de alumínio. Os micronutrientes foram fornecidos utilizando-se a "Solução a" e como fonte de ferro e Fe-EDTA (etileno diamino tetra acetato dissódico) de acordo com MALAVOLTA (1975). O manganês também não foi colocado na solução básica, sendo acidionado nos tratamentos especiais de seleção.

5.1.2 - TRATAMENTOS PARA A SELEÇÃO

5.1.2.1 - Alumínio como cloreto de alumínio hexahidratado ($\text{AlCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$)

Níveis	Concentração
1 - Al_0	0 ppm
2 - Al_1	6 ppm
3 - Al_2	12 ppm
4 - Al_3	18 ppm
5 - Al_4	24 ppm

5.1.2.2 - Manganês como cloreto de manganês tetra-hidratado ($\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$)

Níveis	Concentração
1 - Mn_0	0 ppm
2 - Mn_1	30 ppm
3 - Mn_2	60 ppm
4 - Mn_3	90 ppm
5 - Mn_4	120 ppm

5.1.3 - CONDUÇÃO DO ENSAIO

Este ensaio foi desenvolvido através de cinco experimentos com oito variedades cada, em minitanques de plástico com capacidade de 30 litros tendo nos bordos superiores as dimensões de 70,00 x 46,50 cm e profundidade de 20,00 cm.

As plantas permaneceram em solução nutritiva em pH controlado num intervalo de 4,5 - 5,5 por um período de quatro semanas com arejamento permanente.

5.1.4 - OBSERVAÇÕES REALIZADAS

Foram realizadas observações diárias com a finalidade de acompanhar o efeito dos tratamentos sobre as variedades e procurar manter constante o nível das soluções.

5.1.5 - COLHEITA DAS PLANTAS

As plantas foram colhidas tendo suas raízes lavadas uma vez em água de torneira e três vezes em água destilada. As raízes das plantas inteiras foram destacadas das partes aéreas, sendo ambas as partes acondicionadas em sacos perfurados de papel e colocadas em estufa à temperatura entre 70 - 80°C segundo MALAVOLTA (1975), por um período de doze horas.

5.1.6 - DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

O delineamento utilizado foi blocos ao acaso com quatro repetições, sendo os tratamentos de alumínio e manganês em combinação fatorial. Foi considerada uma planta por repetição.

5.1.7 - CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS

Para avaliar os efeitos dos tratamentos sobre as variedades foram determinados: peso da matéria seca da parte aérea ; peso da matéria seca da raiz ; peso da matéria seca total ; altura da planta e comprimento das raízes.

Nas sete variedades selecionadas em relação ao alumínio foram analisados os seguintes elementos na parte aérea e na raiz:

- alumínio e fósforo por colorimetria, segundo REIS (1978), em sistema de injeção de fluxo contínuo segmentado;
- cálcio e magnésio por espectrofotometria de absorção atômica, conforme JORGENSEN (1977), em fluxo contínuo.

Nas três variedades selecionadas em relação ao manganês foram analisados os seguintes elementos na parte aérea e raiz:

- manganês e ferro pelo mesmo processo de análise do cálcio e magnésio.

5.1.8 - DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO MINERAL DO MATERIAL VEGETAL

As análises foram realizadas parcialmente no Laboratório de Rádio-Química do Centro de Energia Nuclear na Agricultura e parcialmente no Laboratório de Nutrição de Plantas no Centro de Energia Nuclear na Agricultura.

As plantas após secagem foram pesadas e moídas de acordo com as recomendações de SARRUGE e HAAG (1974) e as amostras submetidas a digestão nitro perclórica de acordo com JORGENSEN (1977).

Os extratos das variedades selecionadas tiveram análise dos seguintes elementos:

- fósforo, cálcio, magnésio, manganês e ferro pelos processos descritos no item 5.1.7.

5.1.9 - MÉTODO DE SELEÇÃO DE VARIEDADES

Os dados de produção de matéria seca total (y) foram submetidos a análise de variância e análise de regressão. Procurou-se adaptar esses dados por variedade em equações do modelo:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{11} x_1^2 + b_{12} x_1 x_2 + b_{22} x_2^2 ,$$

que substituindo os valores de x_i por alumínio, manganês, obtêm-se:

$$y = b_0 + b_1 Al + b_2 Mn + b_3 Al^2 + b_4 Al Mn + b_5 Mn^2$$

A precisão no ajustamento dos dados foi verificada através do nível de significância dos coeficientes de determinação (R^2). Como base para a classificação das variedades foram usados os valores máximos e mínimos obtidos pela resolução da equação de regressão ; no caso foi usado o método de matrizes discutido por MYERS (1971). Os valores reais x_i das variedades independentes (níveis de alumínio ou manganês) foram substituídos na equação de regressão por valores representativos X_i .

Níveis	Concentração	X_i	Níveis	Concentração	X_i
Al ₀	0	- 2	Mn ₀	0	- 2
Al ₁	6	- 1	Mn ₁	30	- 1
Al ₂	12	0	Mn ₂	60	0
Al ₃	18	1	Mn ₃	90	1
Al ₄	24	2	Mn ₄	120	2

Os dados referentes a altura de planta, peso seco da parte aérea, peso seco da raiz, comprimento da raiz foram submetidos a análise de variância. A interpretação dos resultados foi baseada nos valores médios apresentados nas tabelas procurando relacionar o efeito do alumínio e do manganês nos componentes de crescimento (altura da planta, comprimento da raiz, peso seco da parte aérea, peso seco da raiz, peso seco total) e composição mineral (teores de alumínio, manganês, fósforo, cálcio, magnésio e ferro da parte aérea e raiz).

5.1.10 - RELAÇÃO PESO SECO TOTAL E OUTROS COMPONENTES

Foram escolhidas duas variedades selecionadas em relação ao alumínio, sendo uma representando as variedades que apresentaram máximo na produção de matéria seca (Mulatinho paulista) e a outra representando as variedades que apresentaram mínimo (Rio Tibagi). Nestas variedades foram correlacionados os cinco componentes de crescimento e concentrações de fósforo da parte aérea e raiz, combinados 2 a 2.

Dentre as variedades selecionadas ao manganês foi escolhida apenas uma (Goiano precoce) porque todas apresentaram o mesmo comportamento (produção mínima de matéria seca). Os componentes de crescimento e concentrações de manganês da par

te aérea e raiz foram combinados do mesmo modo que nas variedades selecionadas ao alumínio.

5.2 - SEGUNDA ETAPA - COMPORTAMENTO DAS VARIEDADES SELECIONADAS AO ALUMÍNIO EM RELAÇÃO A ABSORÇÃO DE ^{32}P

A finalidade deste ensaio foi verificar se há diferenças na quantidade de ^{32}P absorvido pelas variedades caracterizadas como tolerantes em relação às variedades não tolerantes. Este ensaio compreendeu três experimentos.

5.2.1 - PRIMEIRO EXPERIMENTO - ESTUDO DE ABSORÇÃO DE ^{32}P PELO FEIJOEIRO CULTIVADO EM SOLUÇÃO CONTENDO ALUMÍNIO

Procurou-se com a realização deste experimento caracterizar as variedades tolerantes em relação às variedades não tolerantes quanto a absorção de ^{32}P com plantas cultivadas em solução nutritiva contendo alumínio.

5.2.1.1 - Variedades usadas

As variedades usadas foram as caracterizadas pelo teste inicial de seleção, sendo quatro do grupo das tolerantes e três do grupo das não tolerantes:

Grupo das tolerantes:	V ₁₆ - Jalo
	V ₂₀ - Mulatinho paulista
	V ₂₆ - Ricobaio 1014
	V ₃₃ - Roxo 760

Grupo das não tolerantes: V₁₇ - Jamapa
V₂₈ - Rio Tibagi
V₃₄ - Tambō

5.2.1.2 - Sequência básica de operações

Os processos de germinação, formação de mudas, colheita, secagem e outros foram semelhantes aos utilizados no ensaio 5.1.

As plantas foram cultivadas em solução nutritiva de HOAGLAND & ARNON Nº 2 (1950), diluída à metade, na presença de 0, 12 e 24 ppm de alumínio, por um período de quatro semanas.

5.2.1.3 - Disposição dos tratamentos

Plantas inteiras e raízes destacadas após lavagens foram submetidas a soluções, em vasos de dois litros de volume, contendo água destilada, 2,5 $\mu\text{Ci/ml}$ de ^{32}P como $\text{NaH}_2^{32}\text{PO}_4$ e 1 ml de MgSO_4 $2 \times 10^{-2} \text{ M}$, por um período de duas horas.

Após lavagens, foram submetidas a secagem, moagem manual e contagem no escalímetro Nuclear Chicago Corp. modelo 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para registrar contagens por minuto, das desintegrações radioativas, convertidas em cpm/grama de matéria seca por minuto.

As contagens médias são provenientes de quatro repetições considerando uma planta por repetição. As plantas inteiras após secagem eram separadas em parte aérea e raiz e contadas independentemente.

5.2.1.4 - Interpretação dos resultados

As médias foram transportadas para gráficos e a interpretação dos resultados foi realizada observando o comportamento varietal no perfil das curvas.

5.2.2 - SEGUNDO EXPERIMENTO - ESTUDO DE ABSORÇÃO DE ^{32}P PELO FEIJOEIRO CULTIVADO EM SOLUÇÃO NUTRITIVA EM AUSÊNCIA DE ALUMÍNIO

Este experimento objetivou caracterizar as variedades tolerantes e não tolerantes em relação a absorção de ^{32}P , colocando o alumínio por um período de apenas duas horas após retirar as variedades de solução nutritiva básica.

5.2.2.1 - Variedades usadas

Foram usadas as variedades dos grupos tolerantes e não tolerantes do experimento 5.2.1.

5.2.2.2 - Sequência básica de operações

A mesma sequência do experimento 5.2.1 foi acompanhada.

5.2.2.3 - Disposição dos tratamentos

Plantas inteiras e raízes destacadas após lavagens, foram submetidas a soluções, em vasos plásticos de dois litros de volume, contendo água destilada, 0 , 12 , 24 e 72 ppm de a

alumínio, 2,5 Ci/ml de ^{32}P como $\text{NaH}^{32}\text{PO}_4$ e 1 ml de MgSO_4 2×10^{-2} M, por um período de duas horas.

A média de contagens foi constituída de quatro repetições considerando uma planta por repetição.

5.2.2.4 - Interpretação dos resultados

Como no experimento 5.2.1, através dos perfis das curvas foi possível interpretar os resultados.

5.2.3 - TERCEIRO EXPERIMENTO - EFEITO DA CONCENTRAÇÃO IÔNICA EXTERNA NA ABSORÇÃO DE ^{32}P

É conhecido que a presença de ions na solução externa constitui um processo, dentre vários, que facilita a absorção de nutrientes pelas raízes.

A importância deste ensaio na caracterização de variedades e confirmação de resultados posteriores baseia-se no princípio de maior facilidade nas observações dos processos de absorção.

5.2.3.1 - Variedades usadas

Foram sorteadas três variedades dentre as nove selecionadas para estudos de alumínio e manganês, relacionadas a baixo:

V_{20}	-	Mulatinho paulista	-	tolerante
V_{26}	-	Ricobaio 1014	-	tolerante
V_{34}	-	Tambô	-	não tolerante.

5.2.3.2 - Sequência básica de operações

Foi seguida a mesma sequência básica dos experimentos 5.2.1 e 5.2.2.

5.2.3.3 - Disposição dos tratamentos

Foram usados quatro níveis de fósforo como NaH_2PO_4 nas concentrações de 10^{-7} , 10^{-5} , 10^{-3} e 10^{-1} M na presença de 48 ppm de alumínio. Esses tratamentos juntos com $2,5 \mu\text{Ci/ml}$ de ^{32}P foram colocados em recipientes de plástico de dois litros de volume onde receberam plantas inteiras e raízes destacadas.

Esta concentração de 48 ppm de alumínio foi indicada pelos resultados obtidos nos experimentos 5.2.1 e 5.2.2.

As médias das contagens foram resultados de quatro repetições, considerando uma planta por repetição.

5.2.3.4 - Interpretação dos resultados

A sensibilidade do teste foi observada pelas contagens de ^{32}P nas plantas inteiras e nas raízes destacadas. A representação gráfica mostrou pela seção da curva os tratamentos de NaH_2PO_4 que melhor caracterizam a absorção de ^{32}P .

5.3 - TERCEIRA ETAPA - ESTUDO DO MANGANÊS NA PRESENÇA DO SILÍCIO

Considerando que todas as variedades tiveram o mesmo comportamento em relação ao manganês, apresentando apenas mínimos, além das três variedades selecionadas ao manganês tam

bem foram submetidas aos tratamentos de silício as variedades selecionadas ao alumínio. Estas variedades adicionadas permitiram fazer comparações com variedades de comportamento diferente do padrão apresentado em relação ao manganês.

5.3.1 - VARIEDADES USADAS

Selecionadas ao manganês: V₁₃ - Goiano precoce
                                          V₂₂ - Porrilho sintético
                                          V₂₈ - Rio Tibagi

Selecionadas ao alumínio: V₁₆ - Jalo
                                          V₂₀ - Mulatinho paulista
                                          V₂₆ - Ricobaio 1014
                                          V₃₃ - Roxo 760
                                          V₁₇ - Jamapa
                                          V₂₈ - Rio Tibagi
                                          V₃₄ - Tambô

5.3.2 - SEQUÊNCIA BÁSICA DE OPERAÇÕES

Os processos de germinação, obtenção de mudas, secagem e outros foram comuns aos demais ensaios. A solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) foi modificada em relação aos níveis de manganês.

O controle de pH foi mantido na faixa 4,5 - 5,5.

5.3.3 - DELINEAMENTO UTILIZADO

O esquema experimental usado foi o de parcela subdividida.

Parcelas: 0 e 60 ppm de manganês

Subparcelas: 0 , 100 e 200 ppm de silício

A dose de 60 ppm de manganês, de acordo com as observações nos ensaios posteriores pode ser considerada como subletal e por isso escolhida para estudar a influência do silício no controle da toxicidade do manganês.

Para cada variedade utilizou-se quatro repetições sendo considerada uma planta por repetição.

5.3.4 - CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS

Para avaliação dos tratamentos foram utilizadas as seguintes características: peso da matéria seca da parte aérea ; peso da matéria seca da raiz ; peso da matéria seca total ; altura das plantas e comprimento das raízes.

Composição mineral da parte aérea: manganês , silício , cobre , ferro , fósforo e magnésio.

5.3.5 - DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO MINERAL DO MATERIAL VEGETAL

O local e os processos de análises da maioria dos elementos constam nos itens 5.1.7 e 5.1.8 do ensaio de seleção de variedades.

Os demais elementos foram analisados pelos seguintes processos:

- silício por colorimetria, do azul molibdênio, segundo GLÓRIA e RODELLA (1971).
- cobre pelo mesmo processo de análise do manganês, ferro, cálcio e magnésio, descrito anteriormente, no ensaio 5.1.

5.3.6 - METODO DE AVALIAÇÃO DAS VARIEDADES

Análise de variância dos componentes de crescimento e análises de regressão da produção de matéria seca total foram utilizadas para avaliação das variedades. Estas análises permitiram verificar o efeito do silício no controle da toxicidade de manganês.

5.4 - QUARTA PARTE - ENSAIO DE MICRONUTRIENTES

A finalidade deste ensaio foi caracterizar melhor as variedades selecionadas no ensaio 5.1, em relação às suas necessidades nutricionais. Procurou-se também, através do conjunto de experimentos, conhecer aqueles micronutrientes que maior número de problemas apresentam nos solos de cerrado, solos lixiviados e solos pobres. Este trabalho compreendeu três experimentos que estudaram o boro, o molibdênio e o zinco.

5.4.1 - PRIMEIRO EXPERIMENTO - EFEITO DO BORO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO MINERAL DO FEIJOEIRO

5.4.1.1 - Variedades usadas

As nove variedades usadas neste experimento foram aquelas selecionadas no ensaio 5.1.

5.4.1.2 - Sequência básica de operações

A única modificação ocorrida neste ensaio foi o uso de solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) modificada colocando

do o boro nos níveis ausentes, normal e excesso, conforme JOHN *et alii* (1977).

5.4.1.3 - Delineamento experimental

O delineamento utilizado foi blocos ao acaso com quatro repetições, considerando uma planta por repetição.

Níveis considerados:

- B_0 - solução nutritiva sem boro - ausência de boro;
- B_1 - solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) - 0,5 ppm de boro;
- B_2 - 100 vezes a concentração de boro da solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) - 50 ppm de boro.

5.4.1.4 - Características consideradas

Foram consideradas as seguintes características: peso da matéria seca da parte aérea ; peso da matéria seca da raiz ; peso da matéria seca total ; altura das plantas ; comprimento da raiz.

Composição mineral da parte aérea: fósforo , cálcio , magnésio , potássio , boro e ferro.

5.4.1.5 - Determinação da composição mineral do material vegetal

- Boro pelo processo colorimétrico cucurmina-ácido oxálico, descrito por JONSON e ULRICH (1959) e JAKSON (1964);
- Potássio por espectrofotometria de absorção atômica descrita em 5.1.7 do ensaio de seleção.

Os demais elementos tiveram seus métodos citados no ensaio 5.1.

5.4.1.6 - Avaliação do efeito dos tratamentos sobre as variedades

Os resultados da análise de variância das componentes de crescimento e as curvas de regressão dos dados de peso seco total permitiram encontrar o efeito dos tratamentos sobre as variedades, bem como os níveis de boro que permitem obter a produção máxima de matéria seca.

5.4.2 - SEGUNDO EXPERIMENTO - EFEITO DO MOLIBDÊNIO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO MINERAL DO FEIJOEIRO

5.4.2.1 - Variedades usadas

As nove variedades usadas neste experimento foram selecionadas no ensaio 5.1.

5.4.2.2 - Sequência básica de operações

A sequência das operações é semelhante a de outros experimentos, apenas a solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) foi modificada em relação aos níveis de molibdênio; ausência, normal e excesso, segundo SINGH e KUMAR (1979).

5.4.2.3 - Delineamento experimental

Foram utilizados blocos ao acaso com quatro repetições, considerando uma planta por repetição.

Níveis usados:

- Mo₀ - Solução sem molibdênio - ausência de molibdênio;
- Mo₁ - Solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) - 0,01 ppm de molibdênio;
- Mo₂ - 100 vezes a concentração de molibdênio da solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) - 1 ppm de molibdênio.

5.4.2.4 - Características consideradas:

Peso da matéria seca da parte aérea ; peso da matéria seca da raiz ; peso da matéria seca total ; altura das plantas e comprimento da raiz.

Composição mineral da parte aérea: fósforo , cálcio , magnésio , molibdênio , cobre e ferro.

5.4.2.5 - Determinação da composição mineral

- molibdênio - colorimetria pelo método do tiocianato , descrito por JOHNSON e ULRICH (1959) e JAKSON (1964).

Os demais elementos tiveram seus métodos de análise citados nos experimentos 5.1 e 5.4.1.

5.4.2.6 - Avaliação do efeito dos tratamentos sobre variedades

Análises de variância dos componentes de crescimento e análises de regressão dos dados de peso seco total foram

realizadas com a finalidade de verificar o efeito dos tratamentos sobre desenvolvimento do feijoeiro e estipular os níveis de molibdênio que permitem obter a produção máxima de matéria seca.

5.4.3 - TERCEIRO EXPERIMENTO - EFEITO DE ZINCO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO MINERAL DO FEIJOEIRO

5.4.3.1 - Variedades usadas

Foram usadas nove variedades selecionadas no ensaio 5.1.

5.4.3.2 - Sequência básica de operações

Apenas a solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) foi modificada em relação aos níveis de zinco ; ausência, normal e excesso de acordo com RAUSER (1973). A sequência das operações foi semelhante a todos os ensaios.

5.4.3.3 - Delineamento experimental

O delineamento experimental usado foi blocos ao acaso, com quatro repetições considerando uma planta por repetição.

Níveis usados:

Zn_0 - Solução sem zinco - ausência de zinco;

Zn_1 - Solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 (1950) - 0,05 ppm de zinco;

Zn₂ - 100 vezes a concentração de zinco da solução de HOAGLAND & ARNON nº 2 - 5 ppm de zinco.

5.4.3.4 - Características consideradas:

Peso de matéria seca da parte aérea ; peso da matéria seca da raiz ; peso da matéria seca total ; altura das plantas e comprimento da raiz.

Concentração dos seguintes elementos na parte aérea: fósforo , cálcio , magnésio , potássio , zinco , boro , cobre e ferro.

5.4.3.5 - Determinação da composição mineral do material vegetal

Os métodos de análises desses elementos foram citados nos trabalhos 5.1 e 5.4.1.

5.4.3.6 - Avaliação do efeito dos tratamentos sobre variedades

Os efeitos dos tratamentos de zinco sobre o feijoeiro foram verificados pela análise de variância dos componentes de crescimento e as doses que permitiram produção máxima de matéria seca foram obtidas pela análise de regressão.

6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 - PRIMEIRA ETAPA - SELEÇÃO DE VARIEDADES AO ALUMÍNIO E AO MANGANÊS

6.1.1 - METODOLOGIA DE SELEÇÃO

Os dados de produção de peso seco total, Tabelas 13 e 14, de cada variedade isoladamente submetida a análise de regressão, Tabela 16, permitiram através das resoluções das equações, Tabela 17, classificar as variedades em relação ao alumínio e manganês.

Dividindo em faixas de tolerância pode-se classificá-las em relação ao alumínio:

a - Tolerantes

As variedades que apresentaram máximos de produção na presença de 14 a 16 ppm de alumínio.

V ₁₆	- Jalo	- 16 ppm
V ₂₀	- Mulatinho paulista	- 14 ppm

V ₂₆	- Ricobaio 1014	- 14 ppm
V ₃₃	- Roxo 750	- 15 ppm

b - Medianamente sensíveis

Variedades que apresentam mínimos de produção de 14 a 15 ppm de alumínio:

V ₁₇	- Jamapa	- 15 ppm
V ₂₂	- Porrilho sintético	- 14 ppm

c - Sensíveis

Variedades que apresentaram mínimos de produção de 2 a 9 ppm de alumínio:

V ₅	- Carioca	- 6 ppm
V ₈	- Costa Rica	- 4 ppm
V ₉	- Costa Rica 1031	- 5 ppm
V ₁₂	- Cuva 168 N	- 7 ppm
V ₁₃	- Goiano precoce	- 8 ppm
V ₂₇	- Rico Pardo	- 7 ppm
V ₂₈	- Rio Tibagi	- 9 ppm
V ₃₄	- Tambô	- 2 ppm

Vários são os processos usados para comparar tolerâncias de variedades de alumínio. HANSON e KAMPRATH (1979) basearam em crescimento de raiz de soja em plântulas de 5 dias, FOY e GERLOF (1972), em percentagem de crescimento do feijão comparando à testemunha, HOWELER e CADAVID (1976) em arroz, basearam em crescimento relativo de raiz a 3 e 30 ppm de alumínio. FOY *et alii* (1969) relacionaram colapsos no pecíolo com aumento de concentração de alumínio e decréscimo na concentração de cálcio. Entretanto, para classificação de variedades, apenas Mc LEAN e GILBERT (1927), citados por MALAVOLTA *et alii* (1976) estimularam critérios definidos baseados na redução de crescimento de diferentes plantas observando a produção de matéria seca da parte aérea, raiz e peso seco to-

tal. O comportamento das variedades estudadas por esses autores foi sempre o mesmo — o alumínio sempre dificultando o desenvolvimento das plantas.

Os resultados aqui obtidos mostraram, em certas variedades, que o feijoeiro em presença de alumínio teve sua produção de matéria seca total aumentada, e o critério estabelecido por McLEAN e GILBERT (1927) foi seguido com algumas modificações, permitindo, desse modo, fazer o agrupamento das variedades em faixa de tolerância, dentro dos níveis estudados.

MAGISTAD (1925) acredita que pequenas quantidades de alumínio são benéficas às plantas devido a um efeito catalítico desse elemento no processo da fotossíntese. Quanto à diferença no comportamento das variedades pode ser atribuída ao grau de permeabilidade da membrana celular que permite o alumínio penetrar na célula. A entrada do alumínio provoca coagulação de proteínas e cria diferentes condições para os cations presentes, permitindo inclusive saída rápida de cálcio, potássio e outros cations da célula.

Considerando que todas as variedades tiveram o mesmo comportamento em relação ao manganês, apresentando mínimos, estas não foram classificadas como tolerantes, mas grupadas dentro das faixas de sensibilidade.

a - Medianamente sensíveis

As variedades que apresentaram mínimos na faixa de 102 a 118 ppm de manganês:

V ₅	- Carioca	- 109 ppm
V ₁₀	- CR 911	- 105 ppm
V ₁₂	- Cuva 168 N	- 102 ppm
V ₂₇	- Rico pardo	- 112 ppm
V ₂₈	- Rio Tibagi	- 118 ppm

b - Sensíveis

As variedades que apresentaram mínimos na faixa de 72 a 99 ppm de manganês:

V ₉	- Costa Rica 1031	- 83 ppm
V ₁₃	- Goiano precoce	- 95 ppm
V ₁₇	- Jamapa	- 90 ppm
V ₂₂	- Porrilho sintético	- 72 ppm
V ₂₉	- Rosinha	- 99 ppm

Trabalhos de MUNNS *et alii* (1963) procuram explicar, em aveia, as diferenças varietais através da cinética de absorção e translocação do manganês dentro da planta através de degraus de compartimentalização. As diferenças varietais são atribuídas à variação no volume e na taxa de realimentação da fração lábil. Diferenças varietais do efeito do manganês são pontificadas por VOSE e JONES (1963), SOUTO e DÖBEREINER (1979) em diversas espécies de variedades cultiváveis.

Algumas variedades não puderam ser classificadas nos grupos tolerantes e sensíveis. As resoluções das respectivas equações de regressão apresentaram valores de x_1 (níveis de a alumínio ou de manganês) fora do intervalo definido neste trabalho ($0 > x_1 > 24$ ppm de alumínio e $0 > x_2 > 0$ ppm de manganês). Esses resultados saíram do campo real e por esse motivo não foi possível tirar conclusões seguras.

6.1.2 - EFEITO DO ALUMÍNIO E MANGANÊS NOS COMPONENTES DE CRESCIMENTO

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas e numeradas de 1 a 17. Os dados de produção total de matéria se ca (parte aérea e raiz, das Tabelas 13 e 14) constituiram a base da seleção de variedades tolerantes e sensíveis. Os demais componentes, considerados importantes para conclusão final, foram correlacionados com os dados de produção de matê-

ria seca e encontram-se na Tabela 28. Os Quadros de 1 a 10 , abaixo relacionados, resumem os efeitos do alumínio e manganês nos componentes de crescimento, observados pelo teste de Tukey 1%.

QUADRO 1 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre a altura das plantas em centímetros, das variedades selecionadas ao alumínio (*)

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	51,800a	26,750b	30,500a	23,100a	31,200b	38,100b	28,300a
Al ₆	41,600b	43,450a	31,650a	34,100a	43,650a	40,400a	23,750b
Al ₁₂	29,950c	25,500b	26,900c	17,100c	16,550c	32,300c	19,650c
Al ₁₈	26,700d	21,300c	28,350b	16,900c	17,100c	33,050c	16,050d
Al ₂₄	24,900d	18,300d	24,000d	16,000c	14,500d	32,900c	14,550d

(*) Os valores seguidos pelas mesmas letras, não diferem significativamente entre si, ao nível de 1% pelo teste de Tukey. Observação válida para todos os quadros analisados.

QUADRO 2 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre a altura das plantas em centímetros, das variedades selecionadas ao manganês

	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i Mn ₀	25,900 a	28,700 a	36,900 a
Mn ₃₀	19,200 b	21,150 b	37,950 a
Mn ₆₀	16,550 c	20,500 b	33,050 b
Mn ₉₀	15,800 c	19,500 cb	32,200 b
Mn ₁₂₀	18,100 b	21,100 b	34,150 b

QUADRO 3 -- Resumo dos efeitos dos níveis do alumínio na solução sobre o comprimento da raiz em centímetros, das variedades selecionadas ao alumínio

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	52,350a	25,950b	32,550a	20,050b	35,750b	39,450b	30,650a
Al ₆	44,500b	42,050a	33,900a	36,100a	46,250a	41,550a	25,600b
Al ₁₂	30,100c	22,000c	28,650bc	17,550cd	17,750c	32,650dc	18,850c
Al ₁₈	27,150c	19,100d	31,850ab	17,900c	18,500c	34,250c	18,450c
Al ₂₄	26,950cd	16,300de	27,550c	16,300d	17,550c	34,400c	16,300d

QUADRO 4 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre o comprimento da raiz em centímetros, das variedades selecionadas ao manganês

	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i MnO	28,900 a	31,250 a	37,150 a
Mn ₃₀	22,250 b	23,850 b	38,250 a
Mn ₆₀	16,400 c	22,150 c	34,950 cb
Mn ₉₀	17,550 bc	22,150 c	37,500 ab
Mn ₁₂₀	20,650 b	23,800 b	36,250 b

QUADRO 5 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o peso seco da parte aérea em gramas, das variedades selecionadas ao alumínio

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	0,709a	0,356c	0,475c	0,381d	0,600a	0,596a	0,345a
Al ₆	0,632c	0,454ab	0,571b	0,371d	0,473c	0,532c	0,261c
Al ₁₂	0,659b	0,467a	0,598b	0,535b	0,515b	0,471d	0,225d
Al ₁₈	0,663b	0,478a	0,661a	0,606a	0,522ab	0,552ab	0,293b
Al ₂₄	0,626c	0,439b	0,493c	0,460c	0,547a	0,566b	0,304b

QUADRO 6 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre o peso seco da parte aérea em gramas, das variedades selecionadas ao manganês

	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i Mn ₀	0,554 a	0,543 a	0,713 a
Mn ₃₀	0,506 b	0,341 c	0,555 b
Mn ₆₀	0,428 d	0,309 d	0,524 c
Mn ₉₀	0,467 c	0,287 e	0,481 d
Mn ₁₂₀	0,444 d	0,383 b	0,444 e

QUADRO 7 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o peso da raiz em gramas, das variedades selecionadas ao alumínio

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	0,091c	0,075c	0,087c	0,098bc	0,143a	0,099b	0,047a
Al ₆	0,141a	0,150a	0,106a	0,154a	0,136a	0,105ab	0,042a
Al ₁₂	0,133ab	0,093b	0,113a	0,077c	0,103a	0,068c	0,026b
Al ₁₈	0,129b	0,054d	0,101ab	0,105b	0,093c	0,091b	0,048a
Al ₂₄	0,090c	0,083bc	0,085c	0,071c	0,083c	0,110a	0,042a

QUADRO 8 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre o peso da raiz em gramas, das variedades selecionadas ao manganês

	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i Mn ₀	0,107 a	0,099 a	0,116 a
Mn ₃₀	0,083 b	0,059 c	0,095 b
Mn ₆₀	0,066 c	0,048 dc	0,089 b
Mn ₉₀	0,069 c	0,055 c	0,089 b
Mn ₁₂₀	0,065 c	0,070 b	0,085 bc

QUADRO 9 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o peso seco total em gramas, das variedades selecionadas ao alumínio

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	0,659c	0,432d	0,582d	0,479d	0,743a	0,696a	0,393a
Al ₆	0,762a	0,604a	0,677c	0,618b	0,615b	0,638b	0,318b
Al ₁₂	0,791a	0,560b	0,711b	0,618b	0,618b	0,539c	0,251c
Al ₁₈	0,891a	0,532c	0,762a	0,712a	0,615b	0,643b	0,341ab
Al ₂₄	0,714b	0,524c	0,579d	0,529c	0,630b	0,676a	0,408a

QUADRO 10 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre o peso seco total em gramas, das variedades selecionadas ao manganês

	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i Mn ₀	0,661 a	0,627 a	0,829 a
Mn ₃₀	0,594 b	0,401 c	0,650 b
Mn ₆₀	0,495 c	0,354 d	0,613 b
Mn ₉₀	0,536 c	0,339 d	0,570 c
Mn ₁₂₀	0,509 d	0,453 b	0,529 d

O efeito do alumínio em excesso, de modo geral, Tabelas 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 13 e 15 , foi prejudicial aos componentes de crescimento. Embora havendo diferenças varietais, o alumínio atuou na altura da planta (Quadro 1), comprimento da raiz (Quadro 3) , peso seco da parte aérea (Quadro 5) , peso seco da raiz (Quadro 7) e peso seco total (Quadro 9). A literatura mostra através dos trabalhos de Mc LEAN e GILBERT (1926) com aveia , LIGON e PIERRE (1932) com milho, sorgo e cevada e de ANDREW *et alii* (1973) com várias leguminosas, efeitos semelhantes.

O efeito do manganês foi uniforme para todas as variedades e os resultados encontram-se nas Tabelas 2 , 5 , 8 , 11 e 14. É conhecido o efeito benéfico do manganês nas plantas, EPSTEIN (1975) , MALAVOLTA (1976) e WILCOX e FAGERIA (1976), mas as elevadas doses usadas no ensaio de seleção prejudicaram os componentes de crescimento. A solução nutritiva original usada possuía 0,5 ppm de manganês ($MnCl_2 \cdot 4 H_2O$ a 1,82 g/l) contudo FREITAS e PRATT (1969) trabalharam com até 400 ppm de manganês, com *Phaseolus vulgaris*, na presença de cálcio. SOUTO e DÖBEREINER (1969) trabalharam, com várias leguminosas, com doses até 200 ppm. POLLE *et alii* (1978) orientam a escolha de doses de elementos para seleção que devem ser a determinado nível, de maneira que, de primeira mão, o máximo de variedades possível seja eliminado. Outros testes posteriores podem complementar os resultados para auxiliar as possíveis conclusões sobre o assunto.

6.1.3 - EFEITOS DO ALUMÍNIO E MANGANÊS NA COMPOSIÇÃO MINERAL

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas enumeradas de 18 a 27. Foram considerados os elementos essenciais ao trabalho da parte aérea e raiz ; o alumínio encontra-

se nas Tabelas 18 e 19 , fósforo nas Tabelas 20 e 21 , cálcio nas Tabelas 22 e 23 , magnésio nas Tabelas 24 e 25 , manganês na Tabela 26 e ferro na Tabela 28.

Os Quadros de 11 a 20, abaixo relacionados resumem os efeitos de alumínio e manganês na composição mineral do feijoeiro.

QUADRO 11 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de alumínio em ppm da parte aérea

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	290	231	397	324	206	277	134
Al ₆	411	269	447	462	249	319	361
Al ₁₂	605	324	507	521	378	383	408
Al ₁₈	668	384	704	793	474	458	462
Al ₂₄	745	474	751	957	580	567	768

QUADRO 12 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de alumínio em ppm na raiz

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	446	382	238	783	268	219	249
Al ₆	1.389	1.293	1.238	1.508	710	473	489
Al ₁₂	2.168	1.303	1.453	2.083	1.636	1.130	839
Al ₁₈	2.496	1.662	1.682	2.156	1.954	1.512	1.188
Al ₂₄	2.379	2.306	1.783	2.148	2.478	1.683	1.240

QUADRO 13 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de fósforo em porcentagem da parte aérea

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	1,46	1,20	2,00	1,57	0,98	1,88	1,51
Al ₆	1,25	0,71	1,63	0,76	0,66	1,62	1,22
Al ₁₂	1,27	1,00	1,80	0,67	0,65	1,40	1,11
Al ₁₈	1,23	1,03	1,74	0,64	0,65	1,49	1,01
Al ₂₄	1,18	0,90	1,72	0,61	0,60	1,36	0,81

QUADRO 14 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de fósforo em percentagem da raiz

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	1,70	1,66	1,80	2,22	0,70	2,26	1,96
Al ₆	1,59	1,89	2,75	1,68	1,46	2,60	1,78
Al ₁₂	2,66	1,75	3,16	1,47	2,24	3,00	2,02
Al ₁₈	1,89	1,85	3,21	2,39	2,30	2,77	1,63
Al ₂₄	1,58	1,91	3,16	1,84	2,11	3,09	1,10

QUADRO 15 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de cálcio em percentagem na parte aérea

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₈	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	1,55	1,97	1,34	1,78	2,01	1,47	1,01
Al ₆	1,26	1,75	1,03	1,61	1,82	1,27	1,07
Al ₁₂	0,74	2,49	0,88	1,19	1,64	0,90	0,77
Al ₁₈	1,09	1,41	0,88	1,35	1,46	0,98	0,72
Al ₂₄	1,08	1,39	0,99	1,20	1,47	0,96	0,74

QUADRO 16 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de cálcio em percentagem na raiz

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	1,13	1,28	1,07	1,28	1,60	0,67	0,65
Al ₆	0,54	1,31	0,65	0,69	1,18	0,48	0,42
Al ₁₂	0,43	0,59	0,61	0,51	0,85	0,39	0,39
Al ₁₈	0,37	0,66	0,33	0,47	0,80	0,39	0,24
Al ₂₄	0,38	0,58	0,27	0,47	0,69	0,38	0,22

QUADRO 17 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de magnésio em percentagem na parte aérea

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	0,50	0,26	1,35	0,46	0,75	0,74	0,70
Al ₆	0,47	0,21	1,03	0,46	0,51	0,51	0,75
Al ₁₂	0,73	0,39	0,88	0,44	0,53	0,51	0,74
Al ₁₈	0,49	0,29	0,92	0,44	0,64	0,64	0,43
Al ₂₄	0,46	0,23	0,99	0,43	0,64	0,64	0,70

QUADRO 18 - Resumo dos efeitos dos níveis de alumínio na solução sobre o teor médio de magnésio em percentagem da raiz

	Tolerantes				Sensíveis		
	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄
Al ₀ Mn _i	0,44	0,79	1,09	0,88	0,69	0,69	0,77
Al ₆	0,53	0,65	0,65	0,95	0,73	0,78	0,79
Al ₁₂	0,90	0,54	0,55	0,92	0,44	0,45	0,59
Al ₁₈	0,51	0,52	0,33	0,70	0,53	0,53	0,25
Al ₂₄	0,59	0,68	0,27	0,64	0,58	0,58	0,48

QUADRO 19 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre o teor médio de manganês em ppm da parte aérea e raiz

	Parte aérea			Raiz		
	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i Mn ₀	151	93	109	182	189	212
Mn ₃₀	1.960	1.369	1.485	840	1.388	1.056
Mn ₆₀	2.770	2.271	1.912	1.705	2.345	1.656
Mn ₉₀	3.545	2.243	2.756	3.590	2.647	2.548
Mn ₁₂₀	5.032	3.485	3.100	3.945	3.521	3.109

QUADRO 20 - Resumo dos efeitos dos níveis de manganês na solução sobre o teor médio de ferro em ppm da parte aérea e raiz

	Parte aérea			Raiz		
	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈
Al _i Mn ₀	362	297	286	154	1.888	254
Mn ₃₀	418	376	339	687	2.718	1.358
Mn ₆₀	483	406	347	526	3.423	1.180
Mn ₉₀	381	309	359	462	2.564	829
Mn ₁₂₀	237	234	264	291	1.576	456

Os tratamentos de alumínio influenciaram nos teores de alumínio, Tabelas 18 e 19 e Quadros 11 e 12 ; fósforo nas Tabelas 20 e 21 e Quadros 13 e 14 ; cálcio nas Tabelas 22 e 23 e Quadros 15 e 16 ; magnésio nas Tabelas 24 e 25 e Quadros 17 e 18 , das partes aéreas e raízes. Ao aumentar o teor de alumínio dos tratamentos o teor de alumínio nas plantas aumentou, havendo redução nos teores de fósforo, cálcio e magnésio da parte aérea, contudo na raiz foi verificada alguma variação nestes resultados. Trabalho de RUSCHEL *et alii* (1968) com feijão (*Phaseolus vulgaris*) mostrou resultados semelhantes em relação às concentrações de cálcio e fósforo da parte aérea e raiz. FOY *et alii* (1972), em estudos com feijão, encontraram maior concentração de cálcio no exudado de uma variedade tolerante, na presença de alumínio, enquanto que na variedade não tolerante os efeitos foram os mesmos encontrados por RUSCHEL *et alii* (1968). No presente trabalho não foi possível verifi

car variações entre concentrações dos elementos nas variedades tolerantes e não tolerantes. Trabalhos de ANDREW *et alii* (1972), em diversas espécies de leguminosas, verificaram algumas variações comuns nas concentrações de fósforo, cálcio, magnésio e alumínio mas que não podem ser consideradas constantes para um certo grupo de variedades.

Os efeitos dos tratamentos do manganês foram verificados nos teores de manganês, Tabela 26 e Quadro 19, nos teores de ferro, Tabela 27 e Quadro 20, das partes aéreas e das raízes. Ao aumentar os níveis de manganês da solução nutritiva aumentaram os teores de manganês na parte aérea e na raiz, o que concorda com os resultados encontrados na parte aérea por SOUTO e DÖBEREINER (1969) em seis espécies de leguminosas e com os trabalhos de KEISLING e FUQUA (1979), com roseira em condições de campo.

O ferro teve seu teor reduzido na presença dos maiores níveis de manganês, na parte aérea e na raiz. Efeitos de repressão do manganês sobre o teor de ferro nas plantas são comentados nas revisões de KIRKBY e MENGEL (1978). Para MALAVOLTA (1967), nos vegetais deficientes há condições que favorecem a oxidação do ferro, não aproveitável, controlada pelo estado de oxidação - redução na planta devido a presença do manganês.

6.1.4 - RELAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DE AVALIAÇÃO

Os testes de correlação linear puderam indicar os componentes que podem ser usados para avaliação de variedades em relação aos tratamentos de alumínio e manganês, Tabela 28. Pelos resultados obtidos a parte aérea da planta pode ser indicada como a melhor característica de avaliação, confirmado pela altura da planta e peso seco em relação às três variedades testadas — Rio Tibagi (V_{28}), Mulatinho paulista (V_{20}) e Goia-

no precoce (V_{13}), Quadro 21. A altura da planta (H) correlacionou, significativamente, com o comprimento da raiz (CR) 0,9397 **, 0,9878 ** e 0,9682 ** nas três variedades respectivamente, e o peso seco da parte aérea (PSPA) com o peso seco total (PST) em 0,9569 **, 0,9709 ** e 0,9784 ** situando esses dois componentes entre os maiores coeficientes de correlação médios.

QUADRO 21 - Componentes comuns por grupos de correlações lineares (R), em três variedades de feijão; não tolerantes ao alumínio (V_{28}), tolerante ao alumínio (V_{20}) e sensível ao manganês (V_{13})

	V_{28}	V_{20}	V_{13}
Peso seco total	0,5546	0,6000	0,4257
Peso seco da parte aérea	0,5104	0,5055	0,4361
Peso seco da raiz	0,4328	0,5994	0,3030
Altura da planta	0,4436	0,5818	0,2780
Comprimento da raiz	0,4123	0,5812	0,2861
% P na parte aérea	0,2186	0,4553	-
% P na raiz	0,3984	0,3162	-
% Mn na parte aérea	-	-	0,3212
% Mn na raiz	-	-	0,3493

O peso seco total foi o componente que melhor correlacionou com todos os demais componentes considerados e que concorda com os resultados de NOGUEIRA (1979), contudo a indicação da parte aérea como a principal característica de avaliação refere-se a sua alta correlação com o peso seco total (PST) e média de correlação com os demais componentes, além de, na prática, ser um componente de fácil manipulação.

6.2 - SEGUNDA ETAPA - COMPORTAMENTO DAS VARIEDADES SELECIONADAS AO ALUMÍNIO EM RELAÇÃO A ABSORÇÃO DE ^{32}P

6.2.1 - ESTUDO DE ABSORÇÃO DE ^{32}P PELO FEIJOEIRO CULTIVADO EM SOLUÇÃO CONTENDO ALUMÍNIO

Os resultados do experimento 5.2.1 estão nas Tabelas 29 , 30 e 31 e foram representados nas Figura 1 , 2 e 3 .

Foi observado que a absorção do ^{32}P foi prejudicada ao cultivar as variedades em presença de alumínio por um período de 30 dias. Ao colocar estas variedades em solução contendo ^{32}P por duas horas após o tempo de cultivo as raízes já se encontravam bastante danificadas pelo alumínio não sendo possível verificar diferenças de absorção entre as variedades tolerantes e não tolerantes.

Problemas no desenvolvimento de raízes devido à ação do alumínio são comentados por MAGISTAD (1925), esse elemento ao condensar na raiz torna-se impermeável à soluções nutritivas. As plantas ao serem retiradas da solução contendo alumínio, possivelmente apresentavam deficiências de fósforo e cálcio, conforme resultados de RUSCHEL *et alii* (1968), FOY *et alii* (1972) e NOGUEIRA (1979). Ao serem submetidas aos tratamentos de ^{32}P , a absorção foi feita de maneira uniforme em todas as variedades até compensar seu estado de subnutrição.

6.2.2 - ESTUDO DE ABSORÇÃO DE ^{32}P PELO FEIJOEIRO CULTIVADO EM SOLUÇÃO NUTRITIVA EM AUSÊNCIA DE ALUMÍNIO

Os resultados do experimento 5.2.2 estão contidos nas Tabelas 32 , 33 e 34 e foram representados nas Figuras 4,

5 e 6 . O alumínio foi colocado junto com o ^{32}P por um período de duas horas.

As partes provenientes das plantas inteiras, após tratamentos não mostraram diferenças entre variedades. As raízes destacadas evidenciaram o efeito do alumínio na absorção de fósforo pelas variedades tolerantes em relação às variedades não tolerantes. As variedades tolerantes indicaram maior concentração de fósforo marcado nas raízes que as variedades sensíveis.

Para CROCOMO *et alii* (1965), a raiz destacada da parte aérea é o órgão da planta que mais tem sido utilizado para estudo de absorção de íons. Esta preferência se explica pela menor complexidade e também porque os trabalhos com raízes destacadas não são influenciados pela parte aérea.

6.2.3 - EFEITO DA CONCENTRAÇÃO IÔNICA EXTERNA NA ABSORÇÃO DE ^{32}P

Os resultados do experimento 5.2.3 estão contidos nas Tabelas 35 , 36 e 37 e foram representados nas Figuras 7, 8 e 9. O fósforo marcado foi estudado na presença de várias concentrações de fósforo estável na solução externa. A maior concentração de fósforo foi observada nas variedades tolerantes nas partes aéreas, raízes não destacadas e destacadas.

A sensibilidade deste teste foi maior que a dos testes 5.2.1 e 5.2.2. Estes resultados concordam com a afirmativa de BROYER (1956) que dentro de determinados limites, desde que as condições sejam favoráveis ao metabolismo da planta, o aumento da concentração externa aumenta a absorção.

Figura 1. Relação absorção de ^{32}P pela parte aérea de feijão cultivado em solução de alumínio durante um mês.

Figura 2. Relação absorção de ^{32}P pela raiz não destaca de feijão cultivado em solução de alumínio durante um mês.

Figura 3. Relação absorção de ^{32}P pela raiz destaca de feijão cultivado em solução de alumínio durante um mês.

Figura 4. Relação absorção de ^{32}P pela parte aérea de feijão cultivado em solução de alumínio durante duas horas.

Figura 5 - Relação de absorção de ^{32}P pela raiz não destacada de feijão cultivado em solução de alumínio durante duas horas.

Figura 6. Relação absorção de ^{32}P pela raiz des-
tacada de feijão cultivado em solução
de alumínio durante duas horas.

Figura 7. Relação absorção de ^{32}P pela parte aérea
feijão na presença de fósforo estável.

Figura 8. Relação absorção de ^{32}P pela raiz não destaca-
da de feijão na presença de fósforo estável.

Figura 9. Relação de absorção de ^{32}P pela raiz destacada
de feijão na presença de fósforo estável.

Várias são as teorias que tentam explicar a diferença varietal na tolerância ao alumínio, MAGISTAD (1925) pela permeabilidade da membrana, WRIGHT (1943) pela precipitação do fósforo, VOSE e RANDAL (1962) através da CTC das raízes. Contudo, BRYAN (1932) cita, entre várias culturas, a soja como planta acumuladora de fosfato. Como foi observado neste ensaio a concentração de fósforo marcado aumentou tanto na raiz como na parte aérea, o que leva a crer numa acumulação de fósforo pelas plantas tolerantes mesmo em presença de alumínio.

6.3 - TERCEIRA ETAPA - ESTUDO DO MANGANÊS NA PRESENÇA DE SILÍCIO

6.3.1 - EFEITO DO MANGANÊS NA PRESENÇA DO SILÍCIO NOS COMPONENTES DE CRESCIMENTO

Os resultados do efeito de manganês em presença do silício encontram-se nas Tabelas 38 a 45. Verifica-se pela análise de variância que o silício afetou a altura das plantas, Tabela 39 ; comprimento da raiz , Tabela 40 ; peso seco de parte aérea , Tabela 41 ; peso seco da raiz , Tabela 42 e peso seco total , Tabela 43. O resumo dos resultados encontra-se no Quadro 22.

Na ausência do manganês, o silício mostrou ser prejudicial aos fatores de crescimento. A dose de 100 ppm de silício pareceu controlar o efeito tóxico de 60 ppm de manganês em todas as variedades. A combinação de 60 ppm de manganês e 200 ppm de silício foi prejudicial ao feijoeiro, observada pelos resultados de todos os fatores de crescimento.

QUADRO 22 - Efeito do manganês na presença do silício nos componentes de crescimento: altura da planta (H), comprimento da raiz (CR), peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST).

	H	CR	PSPA	PSR	PST
Mn ₀ Si ₀	40,227	40,111	0,821	0,142	0,960
Mn ₀ Si ₁₀₀	26,611	22,555	0,673	0,225	0,883
Mn ₀ Si ₂₀₀	23,250	15,166	0,622	0,145	0,768
Mn ₆₀ Si ₀	19,027	21,694	0,398	0,084	0,483
Mn ₆₀ Si ₁₀₀	24,083	20,138	0,822	0,146	0,968
Mn ₆₀ Si ₂₀₀	21,166	16,083	0,461	0,088	0,548

A equação geral de regressão que explica a produção da matéria seca do feijoeiro (y), em função do silício, na presença de manganês, é:

$$y = 0,483444 + 0,009383 \text{ Si} - 0,000045 \text{ Si}^2$$

$$= 0,6308 **$$

A dose de silício que controla a toxicidade de manganês permitindo a produção máxima pode ser considerada, de modo geral, como 104 ppm, em solução nutritiva.

As Tabelas 44 e 45 mostram o efeito do silício nas diferentes variedades testadas. O silício mostrou efeito depressivo na maioria das variedades quando aplicado isoladamente.

As equações de regressão, Tabela 45, mostram que na presença de manganês o silício permitiu a todas as variedades estudadas a produção máxima de matéria seca.

O Quadro 23 mostra que a variedade sensível ao manganês exigiu, com pequena margem, maior concentração de silício para atingir o seu máximo em produção, quando o manganês estava presente.

QUADRO 23 - Doses de silício que permitem produção máxima na ausência e presença de manganês em três variedades selecionadas ao manganês

	0 ppm de Mn	60 ppm de Mn
V ₁₃ - Sensível	100	109
V ₂₂ - Medianamente sensível	linear negativa	103
V ₂₈ - Medianamente sensível	linear positiva	108

Trabalho de HORST e MARSCHNER (1978) com feijão (*Phaseolus vulgaris*) mostrou redução de produção da matéria seca ao aumentar o nível de manganês e aumento na produção de matéria seca ao aplicar silício em presença de manganês. TAKASHI e MIYAKE (1977) com arroz mostraram aumento de matéria seca da parte aérea, raiz, peso total, em solução nutritiva contendo 0, 100 e 200 ppm de silício, sendo que o maior aumento relativo ocorreu com 100 ppm de silício.

6.3.2 - EFEITO DO MANGANÊS NA PRESENÇA DO SILÍCIO NA COMPOSIÇÃO MINERAL

Os resultados do efeito do manganês e silício nos fatores nutricionais encontram-se na Tabela 46 e Quadro 24.

QUADRO 24 - Resumo dos efeitos do manganês em solução na presença de silício na composição mineral média da parte aérea, de nove variedades de feijão

		ppm				%	
		Mn	Si	Cu	Fe	P	Mg
Mn ₀	Si ₀	108	210	17	344	2,371	1,600
Mn ₀	Si ₁₀₀	66	356	17	262	2,131	1,602
Mn ₀	Si ₂₀₀	54	752	14	207	1,681	1,372
Mn ₆₀	Si ₀	207	202	13	375	1,530	1,342
Mn ₆₀	Si ₁₀₀	1.820	404	12	257	1,863	1,636
Mn ₆₀	Si ₂₀₀	2.076	369	15	190	2,125	1,262

O silício, na ausência de manganês, reduziu a concentração, de manganês, cobre, ferro, fósforo e magnésio. O teor de silício na parte aérea aumentou com o aumento da concentração deste elemento na solução.

Quando o manganês estava presente, com o aumento da concentração de silício na solução foram verificados aumentos nos teores de manganês, fósforo e cobre na parte aérea ; embora o silício na solução contribuisse para o aumento nos teores de silício e magnésio, houve redução nos teores desses elementos na presença da maior dose de silício.

O ferro teve seu teor reduzido na parte aérea quando o manganês estava presente na solução mesmo na presença do silício.

Houve aumento no teor de silício na planta ao aumentar a concentração de silício na solução. RUSSEL (1973) descreve que a absorção depende da planta e da disponibilidade desse elemento no meio.

Estudos de HORST e MARSCHNER (1978) revelam, em trabalhos radioautografados, que o controle da toxidade do manganês pelo silício é devido a uma homogeneidade na distribuição do manganês dentro da folha. A acumulação localizada desse elemento provoca desordem no metabolismo e efeito depressivo no crescimento. Nos resultados obtidos, neste ensaio, pode-se observar que o silício provocou um pequeno aumento no teor de manganês nas folhas, mas as plantas mostraram um melhor aspecto vegetativo.

A relação dos demais nutrientes pode ser considerada como efeitos de interações no balanço nutricional, discutidos por OLSEN (1972).

6.4 - QUARTA ETAPA - ENSAIO DE MICRONUTRIENTES

6.4.1 - EFEITO DO BORO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO MINERAL DO FEIJOEIRO

6.4.1.1 - Efeito do boro nos componentes de crescimento

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas e numeradas de 47 a 50 e Quadro 25. O efeito do boro para variedades, foi observado nos seguintes componentes: altura da planta (H), comprimento da raiz (CR). O peso seco da parte aérea (PSPA) e peso seco da raiz (PSR) podem ser interpretados juntos com o peso seco total (PST).

Os dados de peso seco total (y) foram submetidos a análise de regressão obtendo a seguinte equação geral para o feijoeiro:

$$y = 0,855666 + 0,815849 B - 0,016588 B^2$$

$$R^2 = 0,6789 **$$

QUADRO 25 - Resumo dos efeitos dos níveis de boro na solução sobre os fatores médios de crescimento de nove variedades de feijão

	H	CR	PSPA	PSR	PST
B ₀	24,166 b	18,138 b	0,761 b	0,094 b	0,855 b
B _{0,5}	42,805 a	34,166 a	1,077 a	0,185 a	1,262 a
B ₅₀	13,416 c	13,666 c	0,147 c	0,023 c	0,171 c

A dose geral que permite produção máxima no feijoeiro é 24,590 ppm de boro em solução nutritiva.

Dentre as nove variedades estudadas, Tabela 49, seis apresentaram produção máxima, em solução nutritiva, em concentrações de boro situadas entre 24 - 25 ppm. Há variedades, mostradas pelas equações de regressão, que mesmo em níveis mais baixos de boro, a produção é prejudicada como o Mulatinho paulista, Jamapa e Goiano precoce.

6.4.1.2 - Efeito do boro na composição mineral

A dose de 0,5 ppm de boro, Tabela 50 e Quadro 26, mostrou ser uma dose ideal para o balanço de cations na matéria seca. Os teores de fósforo, magnésio, boro e ferro na matéria seca aumentaram com aumento das doses de boro. O potássio e o cálcio foram mais absorvidos na concentração de 0,5 ppm de boro na solução nutritiva.

As concentrações de fósforo, magnésio, boro e ferro na matéria seca embora tenham sido aumentadas com o aumento das concentrações de boro na solução, de acordo com HOWELER (1974) estes elementos encontram-se em concentrações acima do

normal no feijoeiro.

Os resultados obtidos na análise da matéria seca com 0,5 ppm de boro podem ser equiparados, com algumas variações, aos encontrados por HOWELER (1974). As variações entre concentrações dos elementos acompanharam os efeitos de interações citados por OLSEN (1972).

QUADRO 26 - Resumo dos efeitos dos níveis de boro na solução sobre a composição mineral da parte aérea de nove variedades de feijão

	%				ppm	
	P	Ca	Mg	K	B	Fe
B ₀	1,900	1,890	0,930	0,950	86	31
B _{0,5}	2,160	2,071	1,190	1,150	108	230
B ₅₀	3,240	1,180	2,040	0,920	389	1.086

6.4.2 - EFEITO DO MOLIBDÊNIO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO MINERAL DO FEIJOEIRO

6.4.2.1 - Efeito do molibdênio nos componentes de crescimento

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas enumeradas de 51 a 54 e Quadro 27. O efeito do molibdênio foi estudado observando os seguintes componentes de crescimento: altura da planta (H) , peso seco da parte aérea (PSPA) , peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST).

QUADRO 27 - Resumo dos efeitos dos níveis de molibdênio na solução sobre os fatores médios de crescimento de nove variedades de feijão

	H	CR	PSPA	PSR	PST
Mo ₀	43,722 a	38,111 b	0,631 b	0,136 b	0,767 b
Mo _{0,01}	43,166 b	40,333 a	0,921 a	0,199 a	1,121 a
Mo ₁	47,805 a	44,000 a	0,664 b	0,139 b	0,803 b

Foi verificado aumento na altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) até mesmo na presença da dose mais e levada de molibdênio.

Não foi possível estabelecer uma equação geral de regressão que exprimisse uma relação produção de matéria seca (y) e níveis de molibdênio (x), devido a uniformidade nos e-feitos das doses usadas em algumas variedades observada na Tabela 51.

As análises de regressão individuais, Tabela 53, mostraram variações, embora pequenas, em relação a variedades. Diferenças varietais são comentadas por FRANCO e DÖBERREINER (1966) em trabalhos de fixação de nitrogênio na presença de molibdênio, em casa de vegetação. Para esses autores o molibdênio em excesso prejudica mais a fixação que o desenvolvimento da planta.

A variedade Ricobaino 1014 não respondeu aos tratamentos de molibdênio e por essa razão não foi possível descrever sua produção de matéria através da equação de regressão.

As doses de molibdênio encontradas para as diferen-tes variedades, em solução nutritiva, Tabela 52, situam-se no intervalo de 0,497 a 0,502 ppm, tendo como média 0,500 ppm.

6.4.2.2 - Efeito do molibdênio na composição mineral

Foi verificado, Tabela 54 e Quadro 28, aumento nos teores de magnésio e molibdênio com o aumento de molibdênio na solução, enquanto que os teores de cobre e ferro sofreram redução. A dose de 0,01 ppm de molibdênio em solução mostrou ser favorável à absorção de fósforo e cálcio.

QUADRO 28 - Resumo do efeito dos níveis de molibdênio na solução sobre composição mineral média da parte aérea de nove variedades de feijão

	%			ppm		
	P	Ca	Mg	Mo	Cu	Fe
Mo ₀	2,36	2,45	1,40	0,26	14	334
Mo _{0,01}	2,61	2,78	1,57	5,86	14	306
Mo ₁	2,55	2,56	1,64	9,16	13	278

Pelos resultados obtidos comparados com dados relatados por HOWELER (1974) pode-se observar que os teores encontrados no ensaio estão enquadrados nos limites de uma planta normal, apenas o fósforo apresentou concentrações acima do esperado.

6.4.3 - EFEITO DO ZINCO NO CRESCIMENTO E NA COMPOSIÇÃO MINERAL DO FEIJOEIRO

6.4.3.1 - Efeito do zinco nos componentes de crescimento

Os resultados obtidos estão contidos nas Tabelas e-

numeradas de 55 a 58 e Quadro 29.

O efeito do zinco foi uniforme para variedades, observado pelos componentes: altura da planta (H), comprimento da raiz (CR), peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST).

QUADRO 29 - Resumo do efeito dos níveis de zinco na solução sobre os fatores médios de crescimento de nove variedades de feijão

	H	CR	PSPA	PSR	PST
Zn ₀	37,194 b	37,222 b	0,808 b	0,143 b	0,951 b
Zn _{0,05}	42,555 a	40,972 a	1,137 a	0,197 a	1,335 a
Zn ₅	15,583 c	27,333 c	0,445 c	0,108 b	0,554 c

O zinco em excesso prejudicou todos os componentes de crescimento.

Como o molibdênio, não foi possível estabelecer uma equação geral de regressão que exprimisse a relação produção de matéria seca (y) e níveis de zinco (x). A média das doses máximas é 2,472 ppm e pode ser indicada para o desenvolvimento do feijoeiro em solução, definida no intervalo de 2,429 a 2,503 das doses máximas das diferentes variedades estudadas.

As análises de regressão individuais, Tabela 57, mostraram variações, embora pequenas, em relação a variedades. AMBLER e BROWN (1969) verificaram que a resposta do feijoeiro (*Phaseolus vulgaris*) ao zinco, em solo e solução nutritiva, foi diferente para meios e variedades.

6.4.3.2 - Efeito do zinco na composição mineral

Foram verificados, Tabela 58 e Quadro 30, aumentos nos teores de zinco, boro e cobre na matéria seca ao aumentar as concentrações de zinco das soluções nutritivas, contudo os teores de fósforo e potássio foram reduzidos. A concentração de 0,05 ppm de Zn na solução nutritiva mostrou ser melhor para absorção de cálcio, magnésio e ferro pelo feijoeiro.

Os teores dos elementos, com algumas variações, podem ser considerados como normais, segundo HOWELER (1974) e a relação dos demais nutrientes reflete as interações no balanço nutricional, conforme OLSEN (1972).

QUADRO 30 - Resumo do efeito do zinco na composição mineral média da parte aérea de nove variedades de feijão

	%				ppm			
	P	Ca	Mg	K	Zn	B	Cu	Fe
Zn ₀	2,65	2,28	1,49	1,23	28	29	8	233
Zn _{0,05}	2,42	2,44	1,56	1,20	42	38	9	279
Zn ₅	1,84	1,99	1,28	0,90	528	115	17	186

7 - CONCLUSÕES

- a - O uso de regressão utilizando o peso seco total, caule e raiz, permitiu agrupar as variedades em relação ao alumínio em tolerantes, medianamente sensíveis e sensíveis propriamente ditas.
- b - O mesmo processo, em relação ao manganês, permitiu classificar as variedades em medianamente sensíveis e sensíveis.
- c - Algumas variedades não puderam ser classificadas nos grupos tolerantes e sensíveis, porque seus valores de máximos ou de mínimos caíram fora do limite experimental.
- d - A parte aérea da planta, através da correlação linear da altura da planta (H) e peso seco da parte aérea (PSPA) com o peso seco total (PST) mostrou ser importante para a avaliação de variedades em relação à tolerância tanto ao manganês quanto ao alumínio.

- e - Ensaios com ^{32}P em raiz destacada, por um período de duas horas mostraram ser eficientes, qualitativamente, para agrupar variedades sensíveis e tolerantes.
- f - Variações nos teores de alumínio, fósforo, cálcio e magnésio, na matéria seca, não mostraram relação com a classificação de variedades em relação ao alumínio.
- g - O silício isoladamente mostrou ser prejudicial ao desenvolvimento do feijoeiro. A dose de 104 ppm de silício, em solução nutritiva, foi suficiente para garantir a produção total máxima de matéria seca e controlar o efeito tóxico do manganês.
- h - Embora a variedade sensível ao manganês exigisse maior concentração de silício na presença da dose subletal de manganês, devido à pequena exigência adicional, não se pode afirmar que as variedades sensíveis ao manganês sejam mais exigentes em silício que as medianamente sensíveis.
- i - As variedades comportaram-se diferentemente em relação ao fornecimento de boro e de molibdênio.
- j - O efeito de zinco foi uniforme para variedades, a dose média em solução necessária para garantir a produção máxima foi aproximadamente 2,5 ppm.
- k - As concentrações de boro suficientes para garantir a produção máxima, em solução, situaram-se entre 24 - 25 ppm para seis das nove variedades estudadas.
- l - O máximo da produção foi obtido, em relação ao molibdênio, quando o nível desse elemento na solução encontrava-se em torno de 0,5 ppm.

8 - SUMMARY

A - Thirty eight bean (*Phaseolus vulgaris* L.) varieties were grown in nutrient solution under a factorial treatment u sing 4 levels of Al (0 , 6 , 12 , 18 and 24 ppm) and 4 levels of Mn (0 , 30 , 60 , 90 and 120 ppm). By applying regression analysis to growth data it was possible to classify said varieties with respect to Al effect as such:

- a) Tolerant - varieties whose maximum yield appeared in the presence of the element (14 - 16 ppm) - Jalo, Mulatinho paulista, Ricobaio 1014 and Roxo 760 ;
- b) Moderately sensitive - varieties whose minimum yield occurred in solutions having between 14 and 15 ppm of Al - Jamapa and Porrilho sintético;
- c) Sensitive - varieties whose yield showed a minimum when the nutrient solution had between 2 an 9 ppm Al - Carioca, Costa Rica 1031, Cuva 168 N , Goiano precoce, Rico pardo, Rio Tibagi, and Tambō.

With respect to Mn toxicity regression analysis allowed for the following classification:

- a) Moderately sensitive - varieties showing minimum yield when the nutrient solution contained from 102 to 118 ppm Mn - Carioca, CR 911, Cuva 168 N , Rico pardo and Rio Tibagi.
- b) Sensitive - varieties showing minimum yield when the nutrient solution presented from 72 to 99 ppm Mn - Costa Rica 1031, Goiano precoce, Jamapa, Porriho sin tético and Rosinha.

The remaining varieties could not be classified because the estimated values of Al or Mn levels which would allow either for maximum or minimum growth fell outside the experimental concentrations.

Correlation analysis showed that top dry weight was a better growth characteristic for differentiation of varieties with respect both to Al and Mn effect than height, root length, root dry weight and total dry weight.

When the Al concentration in the nutrient solution was raised there was a decrease in P , Ca and Mg contents of the tops, no variation taking place in root composition. Al content was correspondingly increased in both plant parts. Variations in the contents of said elements did not present any correlation with the classification of the varieties with respect to Al tolerance.

Short term experiments on the influence of Al concentration on ^{32}P uptake proved to be able to differentiate varieties between sensitive and tolerant.

When the supply of Mn was increased its content both in root and tops was also increased, whereas Fe levels was reduced.

B - The majority of the varieties under study reacted negatively to the presence of Si in the nutrient solution, the element being supplied at the concentrations of 0 , 100 and 200 ppm. A positive, linear effect, however, was verified in the varieties Jalo and Rio Tibagi whereas maximum growth of Goiano precoce and Tambō took place at the levels of 110 and 102 ppm Si, respectively.

When supplied at the concentration of 104 ppm Si was able to control Mn toxicity in the nine varieties under study.

The small additional need for Si shown by the Mn sensitive varieties does not allow to conclude that they are more demanding than the moderately sensitive ones.

When Mn was not given in the substrate, raising Si supply caused a decrease in P , Mg , Cu , Fe , and Mn in the tops, and an increase in silicon content. In the presence of Mn, however, the opposite was found in the tops with respect to P , and Cu ; Mn and Si contents decreased when the latter was supplied at the highest concentration. Iron content was consistently reduced when Mn was supplied irrespective of the presence of Si.

C - Nine varieties previously classified with respect to Al and Mn tolerance into different groupings were used to determine their response to varying levels of B (0 , 0,5 and 50 ppm) , Mo (0 , 0,01 and 1 ppm) and Zn (0 , 0,05 and 5 ppm).

Boron requirement for maximum growth was 24 - 25 ppm in the nutrient solution for 6 of the 9 varieties under study. Lower levels proved to be detrimental for Mulatinho paulista, Jamapa and Goiano precoce.

Maximum growth took place when Mo level in the nutrient solution was circa 0,5 ppm. No growth response to Mo was observed in the case of Ricobaio 1014.

Zn response was uniform, the average need being nearly 2,5 ppm in the nutrient solution.

Dry matter content of P, Mg, B and Fe increased when boron supply was raised. A peak in K and Ca contents was observed at the intermediate level of B supply (0,5 ppm).

Raising the level of Mo in the nutrient solution caused increase in its concentration in the tops; a decrease took place in the contents of Cu and Fe. With respect to P and Ca a maximum was reached at the intermediate supply of molybdenum (0,01 ppm).

The increase in Zn supply caused: raises in the contents of B, Cu and Zn; decreases in the levels of P and K. Highest concentrations of Ca, Mg and Fe were observed when Zn was given at the intermediate rate (0,05 ppm).

9 - LITERATURA CITADA

- ALBERT, L. S., 1965. Ribonucleic Acid Content, Boron Deficiency Symptotoms, and Elongation of Tomato Root Tips. Plant Physiol., Washington, 40(4): 649-652.
- ALVAREZ, V. H. ; B. V. DEFELIPO e N. F. BARROS, 1978. Resposta do Sorgo à Aplicação de Micronutrientes num Latossolo Vermelho-Amarelo de Itamarandiba, Minas Gerais. Ceres. Viçosa, XXV(137): 79-86.
- AMBLER, J. E. e J. C. BROWN, 1969. Cause of Differencial susceptibility to Zinc Dificiency in two Varieties of Navy Beans (*Phaseolus vulgaris*). Agron. J., Madison, 61(1): 41-43.
- ANASTÁCIO, M. L. A., 1969. Fixação de fósforo nos solos brasileiros. Ministério da Agricultura, 24 p. (Boletim Técnico nº 48).

- ANDREW, C. S. ; A. D. JOHNSON e R. L. SANDLAND, 1973. Effect of Aluminium on the Growth and Chemical Composition of some Tropical and Temperate Pasture Legumes. Aust. J. Agric. Res., Vitória, 24(3): 325-339.
- BAHIA, F. G. F. T. C., 1973. Absorção de Zinco em Relação à Adubação Fosfatada e a Calagem em Dois Solos de Minas Gerais. Viçosa, ESA/UFV , 38 p. (Tese de Mestrado).
- BATAGLIA, O. C. ; P. R. FURLANI e A. S. VALADARES, 1975. O Molibdênio em Solos do Estado de São Paulo. In: Anais do XV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. p. 108-111.
- BATISTA, C. M. ; W. BRUNE e J. M. BRAGA, 1975. Efeitos da População de Plantas e da Época de Plantio no Crescimento do Feijoeiro (*Phaseolus vulgaris* L.): V - Absorção de Micronutrientes. Experimentiae. Viçosa, 19(3): 33-57.
- BORAX CONSOLIDATED LIMITED, (s.d.) Boron Deficiency its prevention and cause. Borax House, Carlisle Place. London, SW 1, 28 p.
- BRAGA, J. M., 1972. Resposta do Rico 23 à Aplicação de Enxofre, Boro e Molibdênio. Revista Ceres, Viçosa, 19(103): 222-227.
- BREWER, P. H. e R. H. CARR, 1926. Fertility of a Soils as Related to the Formes of its Iron and Manganese. Jour. Ind. Engin. Chem., Easton, 18: 165-173.
- BROYER, T. C., 1956. Current news on solute movement in plant roots. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., Greensboro, 67: 570-586.

- BRYAN, O. C., 1933. The Accumulation and Availability of Phosphorus in Old Citrus Grow Soils. Soil Sci, Baltimore, XXXVI(4): 245-255.
- BUCKMAN, H. O. e N. C. BRADY, 1966. Natureza e Propriedades dos Solos. São Paulo, Livraria Freitas Bastos. 594 p.
- BURRIS, R. H. ; T. L. JONES e D. W. EMERICH, 1978. In: DÖBEREINER, J. , R. H. BURRIS , A. HOLLAENDER , A. A. FRANCO , C. A. NEYRA e D. B. SCOTT eds. Limitations and Potentials for Biological Nitrogen Fixation in the Tropics. London, Plenum Press. p. 191-207.
- CHAPMAN, N. D. e A. P. VANSELOW, 1955. Boron Deficiency and Excess. Dept. of Soils and Plant Nutrition, University of California Citrus Experimentation, California Cito - graph. 4 p. (Private Communication).
- CROCOMO, O. J. ; A. M. L. NEPTUNE e H. R. ZUMETA, 1965. Ab-sorcion de iones por las plantas. Universidad del Zulia. Facultad de Agronomia. Maracaibo, Venezuela, 188 p.
- DANTAS, H. S., 1971. Manganês e cations permutáveis na unidade de Utinga. Pesq. Agr. Bras., Campo Grande, 6: 27-30.
- DUANGPATRA, P. ; J. L. SIMS e J. H. ELLIS, 1979. Estimating Plant Available Manganese in Selected Kentucky Soils. Soil Sci, Baltimore, 127(1): 35-40.
- ELLIS, G. B. e B. D. KNEZEK, 1972. Adsorption Reactions of Micronutrients in Soil. In: DINAUER, R. C. ed., Micro-nutrients in Agriculture. Madison, Soil Sci. Soc. of America, Inc., p. 59-75.

- EPSTEIN, E., 1975. Nutrição Mineral das Plantas. Princípios e Perspectivas. Rio de Janeiro, Editora da Universidade de São Paulo. Livros Técnicos e Científicos Editora, S.A. 341 p.
- EVANS, H. J. e S. A. KAMPRATH, 1970. Lime response as related to percent aluminium saturation, solution aluminium and organic matter content. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 34: 893-896.
- FARLEY, R. F. e A. P. DRAYCOTT, 1976. Diagnosis of Manganese Deficiency in Sugar Beet and Response to Manganese Applications. J. Sci. Fd. Agric., Oxford, 27: 991-998.
- FOX, R. H., 1979. Soil pH, Aluminium Saturation, and Corn Grain Yeld. Soil Sci., Baltimore, 127(6): 330-334.
- FOY, C. D. ; A. L. FLEMING e G. C. GERLOFF, 1972. Differential Aluminium Tolerance in Two Snapbean Varieties. Agron. J., Madison, 64: 815-818.
- FOY, C. D. ; A. L. FLEMING e W. H. ARMIGER, 1969. Aluminium Tolerance of Soybean Varieties in Relation to Calcium Nutrition. Agron. J., Madison, 61: 505-511.
- FOY, C. D. , H. N. LAFEVER ; J. W. SCHWARTZ e A. L. FLEMING, 1974. Aluminium Tolerance of Wheat Cultivars Related to Region of Origin. Agron. J., Madison, 66: 751-758.
- FOY, C. D. ; W. H. ARMIGER e W. J. ZAUMEYER, 1967. Differential Tolerance of Dry Bean, Snapbean, and Lima Bean Varieties to an Acid Soil High in Exchangeable Aluminium. Agron. J., Madison, 59: 561-565.

- FRANCO, A. A. e J. DÖBEREINER, 1966. Especificidade hospedeira na simbiose com *Rhizobium* - feijão e influência de diferentes nutrientes. Pesq. agr. bras., Campo Grande, 1: 147-149.
- FREIRE, J. P., 1975. Efeito de Cálcio e do pH na Absorção do Manganês pelos Solos e na Toxidez às Plantas. Piracicaba. ESALQ/USP, 49 p. (Tese de Mestrado).
- FREITAS, L. M. M. e P. P. PRATT, 1969. Respostas de três leguminosas e calcário em diversos solos ácidos de São Paulo. Pesq. agr. bras., Campo Grande, 4: 89-95.
- FUJIMOTO, C. K. e G. D. SHERMAN, 1948. Behavior of Manganese in the Soil and the Manganese Cycle. Soil Sci. Baltimore, 66: 131-145.
- GLÓRIA, N. A. e A. A. RODELLA, 1971. Determinação colorimétrica do silício em vegetais. Anais da ESALQ, Piracicaba, XXVIII: 83-100.
- GUZZELLI, R. J. ; J. F. MENDES ; G. R. BAUWIN e F. S. MILLER, 1973. Efeitos agronômicos e econômicos do calcário, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e micronutrientes, nos rendimentos de soja, feijão e arroz em Uberaba, Minas Gerais. Pesq. agr. bras., Campo Grande, 8: 29-37.
- GUPTA, U. C., 1971. Effects of Manganese and Lime on Yield and on the Concentrations of Manganese, Molybdenum, Boron, Copper and Iron in the Boot Stage Tissue of Barley. Soil Sci., Baltimore, 114(2): 131-136.
- HAGSTROM, G. R., 1977. A Closer Look at Molybdenum. Solutions, NFSA, Peoria, p. 18-28.

- HANSON, W. D. e E. J. KAMPRATH, 1979. Selection for Aluminium Tolerance in Soybeans Based on Seedling-Root Growth. Agron. J., Madison, 71: 581-586.
- HARTWELL, B. L. e F. R. PEMBER, 1918. The Presence of Aluminium as a Reason for the Difference in the Effect of So-called Acid Soil on Barley and Rye. Soil Sci., Baltimore, 4: 259-277.
- HOAGLAND, D. R. e D. I. ARNON, 1950. The Water Culture Method for Growing Plants Without Soil. Calif. Agr. Exp. Sta. (Circ. 347).
- HODGSON, F. J., 1963. Chemistry of the Micronutrient Elements in Soils. In: Advance in Agronomy, 15: 119-160.
- HOROWITZ, A. e H. S. DANTAS, 1966. Geoquímica dos elementos menores nos solos de Pernambuco. I. Manganês na zona da Mata e no Sertão. Pesq. agr. bras., Campo Grande, 1: 383-390.
- HORST, W. J. e H. MARSCHNER, 1978. Effect of Silicon en Manganese Tolerance of Bean Plants (*Phaseolus vulgaris* L.). Plant and Soil. The Hague, 50: 287-303.
- HOWELER, R. H., 1974. Análisis Foliar de Algunos Cultivos Tropicales. Centro Internacional de Agricultura Tropical. CIAT, Cali, Colômbia, 30 p.
- HOWELER, R. H., 1978. Desordenes Nutricionales. In: CIAT ed., Problemas de Campo en los Cultivos de Frijol en América Latina. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. p. 104-126.

- HOWELER, R. H. e C. J. MEDINA, 1977. La Fertilizacion en el Frijol *Phaseolus vulgaris*: Elementos Mayores y Secundarios. CIAT, Colômbia, 50 p.
- HOWELER, R. H. e L. F. CADAVID, 1976. Screening of Rice Cultivars for Tolerance to Al-toxicity in Nutrient Solutions as Compared with a Field Screening Method. Agron. J., Madison, 68: 551-555.
- HOYT, P. B. e G. G. S. MYOVELA, 1979. Correction of severe manganese deficiency in wheat with chemical fertilizers. Plant and Soil. The Hague, 52(3): 437-446.
- JAKSON, M. L., 1964. Analisis químicos de suelos. Englewood Cliffs. New Hersey. Prentice Hall. Inc. 576 p.
- JOHN, M. R. ; H. H. CHUAH e C. J. VAN LAERHOVEN, 1977. Boron Response and Toxicity as Affected by Soil Properties and Rates of Boron. Soil Sci., Baltimore, 124(1): 34-39.
- JOHNSON, C. M. e A. ULRICH, 1959. Analytical methods. Calif. Agr. Exp. Sta. (Bull. 766).
- JONES, L. H. P. e A. A. MILNE, 1963. Studies of Silica in the Oat Plant I. Chemical and Physical Properties of the Silica. Plant and Soil. The Hague, XVIII(2): 207-220.
- JONES, L. H. P. ; A. A. MILNE e S. M. WADHAM, 1963. Studies of Silica in the Oat Plant. II. Distribution of the Silica in the Plant. Plant and Soil. The Hague, XVIII(3): 358-371.

- JONES, L. H. P. e K. A. HANDRECK, 1965. Studies of Silica in the Oat Plant. III. Uptake of Silica from Soils by the Plant. Plant and Soil. The Hague, XXIII(1): 79-96.
- JONES, W. F. e L. E. NELSON, 1979. Manganese Concentration in Soybean Leaves as Affected by Cultivars and Soil Properties. Soil Sci. and Plant Analysis. New York, 10(5): 821-830.
- JONES, J. P. e R. L. FOX, 1979. Phosphorus Nutrition of Plants Influenced by Manganese and Aluminium Uptake from an Oxisol. Soil Sci., Baltimore, 126(4): 230-236.
- JORGENSEN, S. S., 1977. Guia Analítico; Metodologia utilizada para análises químicas de rotina. Piracicaba, CENA, 23 p.
- JUNQUEIRA NETTO, A. ; O. S. SANTOS ; H. AIDAR e C. VIEIRA, 1977. Ensaio Preliminares sobre a Aplicação de Molibdênio e de Cobalto na Cultura do Feijão (*Phaseolus vulgaris* L.). Rev. Ceres, Viçosa, 136: 628-633.
- KALBASI, M. ; G. J. RACZ e L. A. LOEWEN-RUDGERS, 1978. Mechanism of Zinc Adsorption by Iron and Aluminium Oxids. Soil Sci., Baltimore, 125(3): 146-150.
- KAMPRATH, E. J., 1967. Soil acidity and response to liming. Int. Soil Testing Ser. North Carolina State, Univ. Agric. Exp. Stn., Raleigh. (Tec. Bull., 4).
- KAMPRATH, E. J., 1970. Exchangeable aluminium as a criterion for liming leached mineral soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc. Madison, 34: 252-254.

- KEISLING, T. S. e M. C. FUQUA, 1979. Aluminium and Manganese Toxicity of Rose Plants Grown in East Texas. Hort Science. Mount Vernon, 14(4): 509-518.
- KLAMT, E., 1969. Calagem "Maciça" e Disponibilidade de Manganês. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia e Veterinária. Porto Alegre, 4p. (Folheto nº 1).
- KRAUSKOFF, K. B., 1972. Geochemistry of Micronutrients. In: DINAUER, R. C. ed., Micronutrients in Agriculture. Madison, Soil Sci. of América, Inc., p. 7-36.
- LAUN, C. R. P., 1975. Efeitos da Aplicação de Zinco e Boro em Solos sob Vegetação de Cerrado. Piracicaba, ESALQ/USP 120 p. (Tese de Mestrado).
- LEEPER, G. W. e R. J. SWABY, 1940. The Oxidation of Manganese Compounds by Microorganisms in the Soil. Soil Sci. Baltimore, 49: 163-169.
- LEHNINGER, A. L., 1976. Biossíntese dos aminoácidos e de alguns derivados; o metabolismo do nitrogênio inorgânico. In: Biossíntese e a Utilização de Energia das Ligações de Fosfatos. 2ª ed. São Paulo, Edgard Blücher. p. 486-510.
- LEWIN, J. e B. E. F. REIMANN, 1969. Silicon and Plant Growth. Ann. Rev. Plant Phys. Washington, 20: 289-304 (nº 480, Dept. of Oceanography, University of Washington).

- LIGON, W. S. e W. H. PIERRE, 1932. Soluble Aluminium Studies. II. Minimum Concentrations of Aluminium Found to be Toxic to Corn, Sorghum and Barley in Culture Solutions. Soil Sci., Baltimore, 34: 307-322.
- MAGISTAD, O. C., 1925. The Aluminium Content of the Soil Solution and its Relation to Soil Reaction and Plant Growth. Soil Sci., Baltimore, XX(3): 181-212.
- MALAVOLTA, E., 1967. Manual de Química Agrícola - Adubos e Adubação. São Paulo, Biblioteca Agronômica Ceres, 606 p.
- MALAVOLTA, E., 1976. Manual de Química Agrícola - Nutrição e Fertilidade do Solo. São Paulo, Editora Agronômica Ceres, 528 p.
- MALAVOLTA, E., 1976. Práticas de Nutrição Mineral de Plantas. Piracicaba, Depto. de Química, ESALQ, 65 p.
- MALAVOLTA, E. ; H. P. HAAG ; F. A. F. de MELLO e M. O. C. BRASIL SOBRINHO, 1967. Nutrição Mineral de Algumas Culturas Tropicais. São Paulo. Livraria Pioneira Editora. Editora da Universidade de São Paulo. 251 p.
- MALAVOLTA, E. ; J. R. SARRUGE e V. C. BITTENCOURT, 1976. Toxidez de Alumínio e de Manganês. In: FERRI, M.G., Coord. IV Simposio sobre o Cerrado - Bases para Utilização Agropecuária, Belo Horizonte, Livraria Itatiaia. Editora Ltda, p. 275-301.
- MASON, B. H., 1971. Princípios de Geoquímica. São Paulo. Editora Polígono S.A., 403 p.

- MASCARENHAS, J. A. A. ; L. D. ALMEIDA e A. L. VASCONCELOS, 1969. Adubação Mineral do Feijoeiro. XII. Efeitos de Calagem do Nitrogênio e do Fósforo em Latossol Vermelho - Amarelo do Vale do Ribeira. Bragantia, Campinas, 28(7): 71-83.
- MASUI, M. ; A. NUKAYA e A. ISHIDA, 1976. Studies on Manganese excess in muskmelon. J. Japanese Soc. Hort. Sci., Shimoka, 45(3): 267-274.
- Mc LEAN, F. T. e B. E. GILBERT, 1927. The Relative Aluminium Tolerance of Crop Plants. Soil Sci., Washington, XXIV: 163-175.
- MELTON, J. R. ; B. G. ELLIS e E. V. DOLL, 1970. Zinc, Phosphorus, and lime interaction with yield and zinc uptake by *Phaseolus vulgaris*. Soil Sci., Baltimore, 63(4): 91-93.
- MENGEL, K. e E. A. KIRKBY, 1978. Principles of Plant Nutrition. Worblaufen-Bern, International Potash Institute. 593 p.
- MONIZ, A. C., 1972. Elementos de Pedalogia. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Editora Polígono, 459 p.
- MOORE, D. P., 1972. Mechanisms of micronutrients uptake by plants. In: DINAUER, R. C. ed. Micronutrients in Agriculture. Madison, Soil Sci. of America, Inc., p. 171-192.

- MUGWIRA, L. M. ; S. M. ELGAWHARY e S. U. PATEL, 1978. Aluminium Tolerance in Triticale, Wheat and Rye as Mesured by Root Growth Characteristics and Aluminium Concentration. Plant and Soil. The Hague, 50: 681-690..
- MUNNS, D. N. ; C. M. JOHNSON e L. JACOBSON, 1963. Uptake and Distribution of Manganese in Oat Plants. I. Varietal variation. Plant and Soil. The Hague, XIX: 115-126.
- MUNNS, D. N. ; C. M. JOHNSON e L. JACOBSON, 1963. Uptake and Distribution of Manganese in Oat Plants. III. An analysis of biotic and environmental effects. Plant and Soil. The Hague, XIX: 285-295.
- MUNNS, D. N. ; L. JACOBSON e C. M. JOHNSON, 1963. Uptake and Distribution of Manganese in Oat Plants. II. A Kinetic Model. Plant and Soil. The Hague, XIX(2): 193-204.
- MURPHY, L. S. e L. M. WALSH, 1972. Correction of Micronu - trient Deficiencies with Fertilizers. In: DINAUER, R.C. ed., Micronutrients in Agriculture. Madison, Soil Sci. Soc. of America, Inc., p. 347-381.
- MYERS, R. H., 1971. Response Surface Methodology. Allyn & Bacon, Inc., Boston, 231 p.
- NOGUEIRA, F. D., 1979. Efeitos do Alumínio no Sorgo Granífe ro (*Sorghum bicolor* L. Moench). Piracicaba, ESALQ/USP , 120 p. (Tese de Doutorado).
- NYBORG, M. e S. S. MALHI, 1979. Increasing the efficiency of fall-applied urea fertilizer by placing in big pellets or in nests. Plant and Soil, The Hague, 52(3): 461-465.

- OHKI, R., 1977. Manganese and Zinc Status related to Maximum Growth for Selected. Agronomic Crops. In: Proceedings of the International Seminar on Soil Environment and Fertility Manegement in Intensive Agriculture. Tokyo, p. 603-611.
- OLSEN, S. R., 1972. Micronutrients Interactions. In: DI-NAUER, R. C. ed., Micronutrients in Agriculture. Madison, Soil Sci. Soc. of America, Inc., p. 243-261.
- PLUCKNETT, D. L. e G. D. SHERMAN, 1963. Extractable aluminium in some hawaian soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Madison, 27: 39-41.
- POLLE, E. ; G. F. KONZAK e J. A. KITTRICK, 1978. Rapid Screening of wheat for tolerance to Al in breeding varieties better adapted to acid soils, Stain Method. Washington, Office of Agriculture, Development Support Bureau, Agency for International Development, 21 p. (Agriculture Technology for Developing Countries, Technical Series Bulletin, nº 21).
- POLLE, E. ; C. F. KONZAK e J. A. KITTRICK, 1978. Screening for Al Tolerance in Maize. Washington, Office of Agriculture, Developmente Support Bureau, Agency for International Development, 23 p. (Agriculture Technology for Developing Countries, Technical Series Bulletin, nº 22).
- PRAKASHI, A. S. e T. D. BRASKER, 1969. Retension of phosphorus in some soils of Mysore State. J. Agron. Sci. Mysore, 17: 187-191.

- PRICE, C. A. ; H. E. CLARK e E. A. FUNKHOUSER, 1972. Func - tions of Micronutrients in Agriculture. In: DINAUER, R. C., Micronutrients in Agriculture, Madison, Soil Science Society of America. Inc. 287 p.
- RASMUSSEN, P. E. e L. C. BOAWN, 1969. Zinc Seed Treatment as a Source of Zinc for Beans (*Phaseolus vulgaris*). Agron. J. Madison, 61: 674-676.
- REIS, B. F. ; H. BERGAMIN FØ ; E. A. G. ZAGATTO e F. J. KRUG, 1978. Merging zones in flow injection analysis. Part III. Sepectrotometric determination of aluminium in plant and soil material with sequential addtion of pulsed rea - gents. Anal. Chim. Acta, 97: 427-435.
- RAUSER, W. E., 1973. Zinc toxicity in hydroponic culture. Can. J. of Botany. Ottawa, 51: 301-304.
- RIBEIRO, A. C. e J. M. BRAGA, 1974. Adsorção de Boro pelo Solo. Experientiae, Viçosa, 17(12): 293-310.
- RUSCHEL, A. P. ; A. C. M. ROCHA e A. F. PENTEADO, 1970. E- feito do Boro e do Molibdênio aplicados a diferentes re- vestimentos da semente de feijão (*Phaseolus vulgaris*). Pesq. agr. bras. Campo Grande, 5: 49-52.
- RUSCHEL, A. P. ; D. P. P. S. BRITO e L. F. CARVALHO, 1969. Efeito do Boro, Molibdênio e Zinco quando aplicados ao Revestimento da Semente na Fixação Simbiótica do Nitrogê- nio Atmosférico da Soja (*Glycine max*(L.) Merril): Pesq. agr. bras. Campo Grande, 4: 29-37.

- RUSCHEL, A. P. ; D. P. P. S. BRITO e J. DÖBEREINER, 1966. Fixação Simbiótica de Nitrogênio Atmosférico em Feijão (*Phaseolus vulgaris* L.). II. Influência do Magnésio, do Boro, do Molibdênio e da Calagem. Pesq. agr. bras. Campo Grande, 1: 141-145.
- RUSCHEL, A. P. ; R. ALVAYDO e I. B. M. SAMPAIO, 1968. Influência do Excesso de Alumínio no Feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivado em Solução Nutritiva. Pesq. agri. bras., Campo Grande, 3: 229-233.
- RUSSEL, E. W., 1973. Soil Condition and Plant Growth. 10th ed. London, Longmans, Green & Co., 849 p.
- SA, J. P. M. ; J. F. GOMEZ e A. L. VASCONCELOS, 1968. Retenção de fósforo em solos da Zona da Mata, Pernambuco. Pesq. agr. bras., Campo Grande, 3: 183-188.
- SALCEDO, I. H. e B. G. ELLIS, 1979. Manganese Labile Pool and Plant Uptake. Soil Sci., Baltimore, 127(4): 227-234.
- SANCHEZ, P. A., 1976. Properties and management of soils in the tropics. New York, John Wiley and Sons. 617 p.
- SANTOS, A. B. ; C. VIEIRA ; E. G. LOURES ; J. M. BRAGA e J.T. L. THIEBAUT, 1979. Resposta do Feijoeiro (*Phaseolus vulgaris* L.) ao Molibdênio e ao Cobalto em Solos de Viçosa e Paula Cândido, Minas Gerais. Revista Ceres, Viçosa, XXVI(143): 92-101.
- SARRUGE, J. R. e H. P. HAAG, 1974. Análise Química em Plantas. ESALQ/USP. 56 p.

- SHAUMAN, L. M., 1979. Zinc, Manganese, and Copper in Soil Fractions. Soil Sci. Baltimore, 127(1): 10-17.
- SINGH, M. e V. KUMAR, 1979. Sulfur, Phosphorus and Molybdenum Interactions on the Concentration and Uptake of Molybdenum in Soybean Plants (*Glycine max*). Soil Sci. Baltimore, 127(5): 307-312.
- STEWART, J. W. B., 1974. Micronutrients Series Tests and Plant Tissue Analysis. FAO/IAEA Panel and Research and Research Coordination Meeting on Nuclear Techniques in Research on Micronutrient Problems Pertaining to Crop Production. 19 p. (SIP nº R 149).
- STEWART, J. W. B. e A. M. L. NEPTUNE, 1974. Micronutrients Problems in Brazilian Soils with Special Emphasis on Zinc. FAO/IAEA Panel and Research and Research Co-ordination Meeting on Nuclear Techniques in Research on Micronutrient problems pertaining to Crop Production. 16 p. (S.I.P. 148).
- SOUTO, S. M. e J. DÖBEREINER, 1969., Toxidez de Manganês em Leguminosas Forrageiras Tropicais. Pesq. agr. bras. Campo Grande, 4: 129-138.
- TAKASHI, E. e Y. MYAKE; 1977. Sílica and Plant Growth. In: Proceedings of the International Seminar on Soil Environment and Fertility Management in Intensive Agriculture. Tokyo, p. 660-668.
- TEICHLER-ZALLEN, D., 1969. The Effect of Manganese on Chloroplast Structure and Photosynthetic Ability of *Chlamydomonas reinhardtii*. Plant Physiol. Washington, 44: 701-710.

THE INTERNAL RICE RESEARCH INSTITUTE - IRRI, 1976. Annual Report for 1976. 187 p.

THOMPSON, L. M. e F. R. TROEH, 1978. Soils and Soil Fertility. 4th ed. New York, Mc Graw-Hill Book Company. 516 p.

ULRICH, A. ; D. RIRIE ; F. J. HILLS ; A. G. GEORGE e C. M. JOHNSON, 1969. Plant analysis and analytical methods. California Agricultural Experiment Station. University of California. Division Agricultural Science. 78 p. (Bulletin 766).

VALADARES, J. M. A. S., 1972. Microelementos. In: MONIZ, A. C. coord. Elementos de Pedologia, São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, Editora Polígono. p. 199-208.

VALADARES, J. M. A. S. e R. A. CATANI, 1975. Zinco em Solos do Estado de São Paulo. Bragantia, Campinas, 34(5): 134-139.

VAN RAIJ, B. e O. A. CAMARGO, 1973. Sílica Solúvel em Solos. Bragantia, Campinas, 32(11): 223-236.

VOSE, P. B. e D. G. JONES, 1963. The Interaction of Manganese and Calcium on Nodulation and Growth in Varieties of *Trifolium repens*. Plant and Soil. The Hague, XVIII(3): 372-383.

VOSE, P. B. e P. J. RANDALL, 1962. Resistance to Aluminium and Manganese Toxicities in Plants Related to Variety and Cation - Exchange Capacity. Nature, London, 6: 85-86.

- WALLIHAN, E. F., 1948. The Influence of Aluminium on the Phosphorus Nutrition of Plants. An. J. of Bot., Burlington, XXXV(2): 106-112.
- WILCOX, G. E. e N. K. FAGERIA, 1976. Deficiências Nutricionais do Feijão, sua Identificação e Correção. Goiânia, EMBRAPA-CNPAP, 22 p.
- WILLIAMS, D. E. e J. VLAMIS, 1957. The effect of silicon on yield and manganese - 54 uptake and distribution in the leaves of barley plants grown in cultura solutions. Plant Physiol., Washington, 32(5): 404-409.
- WRIGHT, K. E., 1943. Internal Precipitation of Phosphorus in Relation to Aluminum Toxicity. Plant Physiol, Washington, 18(4): 709-12.
- WRIGHT, K. E. e B. DONAHUE, 1953. Aluminum Toxicity Studies with Radioactive Phosphorus. Plant Physiol, Washington, 28(4): 674-680.
- WUTKE, A. C. P., 1972. Acidez. In: MONIZ, A. C., Coord. Elementos de Pedalogia. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Editora Polígono, p. 149-168.
- YNAMA, R. e O. PRIMAVESI, 1973. Micronutrientes Naturais para a Agricultura. 3^a ed. São Paulo, Agrofertíl. 36 p.

10 - A P Ê N D I C E

TABELA 1 - Altura média de quatro repetições em centímetros, das variedades selecionadas em soluções nutritivas fixando as doses de alumínio e variando as doses de manganês.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	54,750	46,250	38,000	30,250	55,250	40,000	37,500	31,500	46,500
0 : 30	54,000	34,000	27,250	23,000	33,750	41,250	24,750	24,500	31,500
0 : 60	50,750	22,000	33,500	21,000	22,250	35,750	31,500	21,750	25,750
0 : 90	44,250	15,500	26,750	21,750	16,250	37,250	30,000	15,250	25,000
0 : 120	45,250	20,500	27,000	19,500	26,500	35,250	17,750	22,750	20,250
$\bar{x}$	51,800	27,650	30,500	23,100	31,200	36,100	28,300	23,150	31,400
6 : 0	56,000	57,000	40,000	47,750	61,250	43,250	36,500	38,250	30,750
6 : 30	33,500	39,000	32,500	33,500	39,250	45,500	24,250	28,000	20,500
6 : 60	39,250	44,500	28,000	22,750	45,250	36,000	21,250	23,000	20,750
6 : 90	36,750	39,250	32,500	36,500	36,750	39,750	18,000	22,500	22,250
6 : 120	40,500	37,500	25,250	30,000	35,750	37,500	18,750	27,750	24,750
$\bar{x}$	41,600	43,450	31,650	34,100	42,650	40,400	23,750	27,900	23,800
12 : 0	34,500	30,750	27,250	20,500	17,500	37,000	22,000	31,250	23,000
12 : 30	31,500	27,750	32,000	16,000	16,500	31,250	21,750	15,000	18,000
12 : 60	30,000	26,500	27,000	16,750	16,750	29,750	21,250	13,500	18,250
12 : 90	24,500	20,000	24,000	14,750	15,750	29,500	17,000	14,500	17,250
12 : 120	29,250	22,500	24,250	17,500	16,250	34,000	16,250	13,750	18,250
$\bar{x}$	29,950	25,500	26,900	17,100	16,550	32,300	19,650	17,600	18,950
18 : 0	26,000	23,500	31,750	21,000	19,500	35,750	19,250	14,750	21,500
18 : 30	27,250	21,500	26,000	16,750	16,500	35,250	14,750	14,000	18,250
18 : 60	28,500	20,250	29,000	14,500	14,000	30,750	14,000	13,750	19,000
18 : 90	28,000	21,000	28,500	17,250	17,750	33,000	15,750	14,250	15,000
18 : 120	23,750	20,250	26,500	13,000	17,750	30,500	16,500	13,750	16,500
$\bar{x}$	26,700	21,300	28,350	16,900	17,100	33,050	16,050	14,100	18,050
24 : 0	27,000	19,750	24,000	16,500	15,250	28,500	16,500	13,750	21,750
24 : 30	25,750	19,250	27,250	17,250	18,000	36,500	14,750	14,500	19,500
24 : 60	22,500	16,000	24,250	16,000	13,250	32,000	12,000	10,750	18,750
24 : 90	22,750	19,000	19,500	16,000	12,500	31,500	14,750	12,500	18,000
24 : 120	26,500	17,500	25,000	14,250	13,500	33,500	14,750	12,500	17,750
$\bar{x}$	24,900	18,300	24,000	16,000	14,500	32,400	14,550	12,800	19,150

TABELA 2 : Altura média de quatro repetições em centímetros, das variedades selecionadas em soluções nutritivas fixando as doses de manganês e variando as doses de alumínio.

Tratamentos Al ; Mn		V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 ; 0		64,750	46,250	38,000	30,250	55,250	40,000	37,500	31,500	46,500
6 ; 0		56,000	57,000	40,000	47,750	61,250	43,250	36,500	38,250	30,750
12 ; 0		34,500	30,750	27,250	20,500	17,500	37,000	22,000	31,250	23,000
18 ; 0		26,000	23,500	31,750	21,000	19,500	35,750	19,250	14,750	21,500
24 ; 0		27,000	19,750	24,000	16,500	15,250	28,500	16,500	13,750	21,750
$\bar{x}$		41,650	35,450	32,200	27,200	33,750	26,900	26,350	25,900	28,700
0 ; 30		54,000	34,000	27,250	23,000	33,750	41,250	24,750	24,500	31,500
6 ; 30		33,500	39,000	32,500	33,500	39,250	45,500	24,250	28,000	20,500
12 ; 30		31,500	27,750	32,000	16,000	16,500	31,250	21,750	15,000	16,000
18 ; 30		27,250	21,500	26,000	16,750	16,500	35,250	14,750	14,000	18,250
24 ; 30		25,750	19,250	27,250	17,250	18,000	36,500	14,750	14,500	19,500
$\bar{x}$		34,400	28,300	29,000	21,700	24,600	37,950	20,050	19,200	21,550
0 ; 60		50,750	22,000	33,500	21,000	22,250	36,750	31,500	21,750	25,750
6 ; 60		39,250	44,500	28,000	22,750	45,250	36,000	21,250	23,000	20,750
12 ; 60		30,000	26,500	27,000	16,750	16,750	29,750	21,250	13,500	18,250
18 ; 60		25,500	20,250	29,000	14,500	14,000	30,750	14,000	13,750	19,000
24 ; 60		22,500	16,000	24,250	16,000	13,250	32,000	12,000	10,750	18,750
$\bar{x}$		34,200	25,850	28,350	18,200	22,300	33,050	20,000	16,550	20,500
0 ; 90		44,250	15,500	26,750	21,750	18,250	37,250	30,000	15,250	25,000
6 ; 90		38,750	39,250	32,500	36,500	36,750	39,750	18,000	22,500	22,250
12 ; 90		24,500	20,000	24,000	14,750	15,750	29,500	17,000	14,500	17,250
18 ; 90		26,000	21,000	28,500	17,250	17,750	33,000	15,750	14,250	15,000
24 ; 90		22,750	19,000	19,500	16,000	12,500	31,500	14,750	12,500	18,000
$\bar{x}$		31,650	22,950	26,250	21,250	20,200	34,200	19,100	15,800	19,500
0 ; 120		45,250	20,500	27,000	19,500	26,500	35,250	17,750	22,750	28,250
6 ; 120		40,500	37,500	25,250	30,000	35,750	37,500	18,750	27,750	24,750
12 ; 120		29,250	22,500	24,250	17,500	16,250	34,000	16,250	13,750	18,250
18 ; 120		23,750	20,250	25,500	13,000	17,750	30,500	16,500	13,750	16,500
24 ; 120		26,500	17,500	25,000	14,250	13,500	33,500	14,750	12,500	17,750
$\bar{x}$		33,050	23,650	25,600	18,850	21,950	34,150	16,800	18,100	21,100

TABELA 3 - Análise de variância da altura de plantas em centímetros, das variedades selecionadas em soluções contendo 0, 6, 12, 18 e 24 ppm de alumínio e 0, 30, 60, 90 e 120 ppm de manganês.

F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₀
Erro	3	3,823333	2,186666	3,653333	1,573333	0,826666	4,196666	7,000000	2,010000	2,730000
Al	4	2611,010000**	1905,835000**	122,565000**	1160,360000**	3147,360000**	281,550000**	636,610000**	803,910000**	621,315000**
Mn	4	301,235000**	509,760000**	135,965000**	252,435000**	577,175000**	85,825000**	251,585000**	323,210000**	270,190000**
Al x Mn	16	86,485000**	113,803750**	46,502500**	55,105000**	189,237500**	24,812500**	63,785000**	54,077500**	42,121250**
Mn x Al ₀	4	273,590000**	516,950000**	102,125000**	70,325000**	854,800000**	24,200000**	221,675000**	136,075000**	310,825000**
Mn x Al ₆	4	287,825000**	257,550000**	125,450000**	338,075000**	441,700000**	62,325000**	227,125000**	160,325000**	71,800000**
Mn x Al ₁₂	4	53,300000**	72,975000**	41,575000**	18,575000**	1,675000	40,425000**	31,075000**	234,325000**	21,175000**
Mn x Al ₁₈	4	11,425000**	7,175000	20,950000**	41,325000**	16,575000**	23,925000**	16,425000**	0,700000	24,550000**
Mn x Al ₂₄	4	18,075000**	9,425000	31,875000**	4,975000*	19,175000**	34,200000**	10,425000**	8,175000	10,325000**
Al x Mn ₀	4	1250,200000**	502,425000**	189,425000**	629,425000**	2027,875000**	121,825000**	393,700000**	424,450000**	453,675000**
Al x Mn ₃₀	4	519,325000**	275,425000**	36,375000**	201,925000**	472,925000**	122,175000**	93,800000**	172,300000**	127,800000**
Al x Mn ₆₀	4	486,425000**	491,450000**	45,700000**	45,175000**	708,300000**	39,675000**	235,375000**	119,425000**	30,070000**
Al x Mn ₉₀	4	352,825000**	349,300000**	95,000000**	218,625000**	332,800000**	70,925000**	154,575000**	60,175000**	65,375000**
Al x Mn ₁₂₀	4	343,175000**	252,450000**	5,075000**	151,950000**	332,075000**	26,200000**	9,300000	183,950000**	104,950000**
Erro	72	3,121944	2,839444	1,653333	1,651380	3,562777	2,245277	3,840277	1,773869	1,827222
x		34,990	27,24	28,28	21,44	24,60	35,130	20,460	19,110	22,270
C. V.	%	5,049	6,185	4,546	6,065	7,672895	4,250	9,578	6,969	6,069
D.M.S ₄	1%	2,520	2,785	2,125	2,149	3,120	2,477	3,239	2,201	2,234
	5%	2,079	1,983	1,513	1,530	2,221	1,763	2,306	1,576	1,531
D.M.S ₂₀	1%	1,913	1,825	1,392	1,408	2,044	1,622	2,133	1,442	1,464
	5%	1,530	1,459	1,113	1,126	1,634	1,297	1,630	1,153	1,170

** Significativo ao nível de 1%

TABELA 4 - Comprimento médio das raízes de quatro repetições em centímetros, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de alumínio e variando doses de manganês.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	66,750	45,000	38,250	32,000	59,750	41,500	41,000	36,000	51,000
0 : 30	51,500	34,000	28,750	24,500	38,500	40,000	26,000	27,500	33,250
0 : 60	51,500	19,000	36,250	22,500	25,000	42,000	33,250	25,000	25,250
0 : 90	45,250	13,500	27,500	24,250	20,750	38,000	33,000	16,750	26,000
0 : 120	46,750	18,250	32,000	22,000	34,750	35,750	20,000	27,000	30,000
$\bar{x}$	52,350	25,950	32,650	20,050	35,750	39,450	30,650	26,450	33,100
6 : 0	58,000	54,250	42,500	52,250	65,500	44,000	38,000	41,500	33,000
6 : 30	36,500	35,000	33,250	35,250	39,750	47,000	25,750	29,000	23,000
6 : 60	41,250	47,250	30,000	23,250	50,000	36,500	25,500	25,250	25,000
6 : 90	40,000	38,750	35,750	38,750	37,000	41,000	18,000	25,000	25,000
6 : 120	47,000	35,000	24,000	31,000	39,000	39,250	20,750	30,500	28,750
$\bar{x}$	44,550	42,050	33,900	36,100	46,250	41,550	25,600	30,250	26,950
12 : 0	32,250	27,000	28,250	21,500	20,000	35,000	26,000	34,500	24,250
12 : 30	32,000	24,000	32,750	15,750	18,250	29,250	18,000	20,500	21,250
12 : 60	30,000	22,500	29,250	16,750	17,250	31,250	17,500	15,500	20,250
12 : 90	25,000	16,000	26,000	15,000	16,000	30,500	16,250	16,500	18,750
12 : 120	31,250	20,500	27,000	16,750	17,000	37,250	16,500	16,000	21,500
$\bar{x}$	30,000	22,000	28,650	17,550	17,750	32,650	18,850	20,500	21,200
18 : 0	25,250	22,500	39,000	22,250	21,250	36,250	21,250	17,250	23,500
18 : 30	26,000	18,000	27,000	19,000	16,000	37,000	18,000	17,250	20,250
18 : 60	28,000	18,000	31,250	14,750	14,250	31,000	17,000	16,500	20,250
18 : 90	30,000	19,000	32,000	19,750	19,000	35,000	16,250	17,000	16,000
18 : 120	26,500	18,000	30,000	13,750	20,000	32,000	19,750	15,500	18,750
$\bar{x}$	27,150	19,100	31,850	17,900	16,500	34,250	18,450	16,700	19,750
24 : 0	30,000	16,250	26,750	13,750	18,000	29,000	19,250	15,250	24,500
24 : 30	28,000	15,250	32,500	17,500	20,500	38,000	16,000	17,000	21,500
24 : 60	24,000	12,750	27,250	17,750	17,250	34,000	13,000	12,750	20,000
24 : 90	24,750	17,750	22,000	18,250	16,000	34,000	16,250	12,500	20,000
24 : 120	28,000	19,500	29,250	14,500	16,000	37,000	17,000	14,250	20,000
$\bar{x}$	26,950	16,300	27,550	16,350	17,550	34,400	16,300	14,350	21,200

TABELA 5 - Comprimento médio das raízes de quatro repetições em centímetros, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de manganês e variando doses de alumínio.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	66,750	45,000	38,250	32,000	59,750	41,500	41,000	36,000	51,000
6 : 0	58,000	54,250	42,500	52,250	65,500	44,000	38,000	41,500	33,000
12 : 0	32,250	27,000	28,250	21,500	20,250	35,000	26,000	34,500	24,250
18 : 0	25,250	22,500	39,000	22,250	21,250	36,250	21,250	17,250	23,500
24 : 0	30,000	16,250	26,750	13,750	18,000	29,000	19,250	15,250	24,500
$\bar{x}$	42,450	33,000	34,950	28,350	36,950	37,150	29,100	28,900	31,250
0 : 30	51,500	34,000	28,750	24,500	38,500	40,000	26,000	27,500	33,250
6 : 30	36,500	35,000	33,250	35,250	39,750	47,000	25,750	29,000	23,000
12 : 30	32,000	24,000	32,750	15,750	18,250	29,250	18,000	20,500	21,250
18 : 30	26,000	9,250	27,000	19,000	18,000	37,000	18,000	17,250	20,250
24 : 30	28,000	15,250	32,500	17,500	20,500	38,000	16,000	17,000	21,250
$\bar{x}$	34,000	23,500	30,850	22,400	27,000	38,250	20,750	22,250	23,850
0 : 60	51,500	19,000	36,250	22,500	25,000	42,000	33,250	25,000	25,250
6 : 60	41,250	47,250	30,000	23,250	50,000	36,500	25,500	12,750	25,000
12 : 60	30,000	22,500	25,250	16,750	17,250	31,250	17,500	15,000	20,250
18 : 60	28,000	18,000	31,250	14,750	14,250	31,000	17,000	16,500	20,250
24 : 60	24,000	12,750	27,250	17,750	17,250	34,000	13,000	12,750	20,000
$\bar{x}$	34,950	23,900	30,800	19,000	24,750	34,950	21,250	16,400	22,150
0 : 90	45,250	13,500	27,500	24,250	20,750	38,000	33,000	16,750	26,000
6 : 90	40,000	38,750	35,750	38,750	37,000	41,000	18,000	25,000	25,000
12 : 90	25,000	16,000	26,000	15,000	16,000	30,500	16,250	16,500	18,750
18 : 90	33,000	19,000	32,000	19,750	19,000	35,000	16,250	17,000	16,000
24 : 90	24,750	17,750	22,000	16,250	16,000	34,000	16,250	12,500	20,000
$\bar{x}$	33,000	21,000	28,650	23,200	21,750	35,700	19,950	17,550	21,150
0 : 120	46,750	18,250	32,000	22,000	34,750	35,750	20,000	27,000	30,000
6 : 120	47,000	35,000	28,000	31,000	39,000	29,250	20,750	30,800	28,750
12 : 120	31,250	20,500	27,000	18,750	17,000	37,250	16,500	16,000	21,500
18 : 120	26,500	18,500	30,000	13,750	20,000	32,000	19,750	15,500	18,750
24 : 120	28,000	19,500	29,250	14,500	16,000	37,000	17,000	14,250	20,000
$\bar{x}$	35,900	22,350	23,250	20,000	25,350	36,250	18,800	20,650	23,800

TABELA 6 - Análise de variância do comprimento da raiz em centímetros, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções contendo 0, 6, 12, 18 e 24 ppm de alumínio e 0, 30, 60, 90 e 120 ppm de manganês.

F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
Blancos	3	3,324	1,636	1,400	0,357	9,467	1,720	0,490	4,543	2,747
Al	4	2676,090**	2164,925**	144,550**	1274,535**	3470,560**	292,460**	713,965**	690,575**	621,435**
Mn	4	264,565**	450,850**	121,000**	265,910**	671,110**	32,910**	334,865**	405,225**	316,010**
Al x Mn	16	96,034**	178,931**	64,425**	88,510**	217,891**	45,616**	64,365**	103,206**	62,585**
Mn x Al ₀	4	290,575**	690,300**	66,425**	65,050**	925,125**	26,800**	294,450**	198,800**	442,075**
Mn x Al ₆	4	283,300**	286,175**	127,825**	455,700**	565,000**	66,800**	235,075**	430,750**	63,050**
Mn x Al ₁₂	4	35,575**	67,500**	27,075**	27,425**	10,373**	44,825**	65,950**	262,500**	16,300**
Mn x Al ₁₈	4	14,200**	96,550**	72,450**	50,700**	28,375**	27,750**	16,675**	2,175	29,625**
Mn x Al ₂₄	4	25,050**	26,050**	50,925**	17,075**	13,000**	49,200**	20,175**	13,825	15,300**
Al x Mn ₀	4	1367,175**	1022,375**	196,425**	691,825**	2219,425**	137,700**	303,075**	502,575**	547,750**
Al x Mn ₃₀	4	413,300**	513,875**	31,325**	249,325**	494,625**	162,250**	90,250**	126,750**	114,325**
Al x Mn ₆₀	4	506,300**	730,325**	45,550**	55,000**	860,375**	82,300**	262,250**	102,575**	29,575**
Al x Mn ₉₀	4	340,125**	410,075**	114,200**	346,550**	307,250**	63,000**	215,175**	63,050**	71,950**
Al x Mn ₁₂₀	4	413,325**	203,200**	14,750**	195,875**	460,450**	20,075**	14,675**	226,450**	108,175**
Erro	72	2,115	7,053	2,469	1,377	3,474	2,560	1,448	13,036	1,623
$\bar{x}$		36,220	24,750	30,900	22,500	27,160	36,460	21,970	21,150	24,440
C.V. %		4,020	10,730	5,090	5,200	6,650	4,990	5,480	17,070	5,520
D.M.S ₄	1%	3,488	6,371	3,769	2,815	4,471	3,838	2,887	8,661	3,239
	5%	2,805	5,269	3,477	2,328	3,697	3,174	2,387	7,163	2,678
D.M.S ₂₀	1%	1,560	2,849	1,665	1,259	1,999	1,716	1,291	3,873	1,448
	5%	1,290	2,356	1,394	1,041	1,653	1,419	1,067	3,203	1,190

** Significativo ao nível de 1%.

TABELA 7 - Peso seco médio de quatro repetições da parte aérea, em gramas, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de alumínio e variando doses de manganês.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	1,152	0,568	0,795	0,690	1,005	0,832	0,800	0,595	0,605
0 : 30	0,497	0,515	0,437	0,387	0,617	0,707	0,390	0,450	0,420
0 : 60	0,395	0,260	0,418	0,378	0,440	0,562	0,240	0,435	0,215
0 : 90	0,400	0,227	0,330	0,217	0,385	0,500	0,150	0,500	0,365
0 : 120	0,392	0,212	0,395	0,235	0,553	0,380	0,148	0,405	0,355
$\bar{x}$	0,709	0,356	0,475	0,381	0,600	0,596	0,345	0,477	0,408
6 : 0	1,147	0,660	0,792	0,630	0,628	0,732	0,455	0,550	0,515
6 : 30	0,652	0,365	0,563	0,152	0,487	0,520	0,265	0,440	0,332
6 : 60	0,457	0,468	0,435	0,332	0,387	0,577	0,272	0,508	0,453
6 : 90	0,547	0,447	0,520	0,412	0,403	0,510	0,153	0,285	0,345
6 : 120	0,357	0,330	0,547	0,328	0,463	0,362	0,160	0,444	0,450
$\bar{x}$	0,632	0,454	0,571	0,371	0,473	0,532	0,261	0,444	0,419
12 : 0	1,002	0,505	0,917	0,680	0,615	0,550	0,322	0,522	0,392
12 : 30	0,625	0,565	0,563	0,532	0,478	0,515	0,233	0,523	0,215
12 : 60	0,657	0,585	0,520	0,675	0,587	0,392	0,247	0,400	0,265
12 : 90	0,467	0,372	0,595	0,258	0,485	0,397	0,160	0,455	0,225
12 : 120	0,545	0,308	0,397	0,530	0,410	0,500	0,163	0,338	0,362
$\bar{x}$	0,659	0,467	0,598	0,535	0,515	0,471	0,225	0,447	0,292
18 : 0	0,770	0,745	0,817	0,690	0,708	0,725	0,378	0,552	0,475
18 : 30	0,767	0,395	0,595	0,590	0,515	0,507	0,212	0,588	0,338
18 : 60	0,685	0,515	0,822	0,572	0,440	0,562	0,400	0,450	0,302
18 : 90	0,565	0,268	0,642	0,725	0,410	0,487	0,260	0,660	0,205
18 : 120	0,530	0,477	0,430	0,455	0,537	0,478	0,215	0,550	0,360
$\bar{x}$	0,663	0,478	0,661	0,606	0,522	0,552	0,293	0,560	0,336
24 : 0	0,825	0,615	0,610	0,616	0,717	0,727	0,420	0,550	0,648
24 : 30	0,702	0,395	0,537	0,312	0,685	0,525	0,355	0,530	0,402
24 : 60	0,670	0,302	0,432	0,442	0,432	0,568	0,302	0,350	0,312
24 : 90	0,495	0,388	0,397	0,570	0,460	0,510	0,225	0,435	0,295
24 : 120	0,440	0,497	0,490	0,360	0,440	0,500	0,218	0,488	0,388
$\bar{x}$	0,626	0,439	0,493	0,460	0,547	0,566	0,304	0,470	0,409

TABELA 8 - Peso seco médio da parte aérea de quatro repetições em gramas, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de manganês e variando doses de alumínio.

Treatamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₅	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	1,152	0,568	0,795	0,690	1,050	0,832	0,800	0,595	0,685
6 : 0	1,147	0,660	0,792	0,630	0,628	0,732	0,455	0,550	0,515
12 : 0	1,002	0,505	0,917	0,680	0,615	0,550	0,322	0,522	0,392
18 : 0	0,770	0,745	0,817	0,690	0,708	0,725	0,378	0,552	0,475
24 : 0	0,825	0,615	0,610	0,616	0,717	0,727	0,420	0,550	0,648
$\bar{x}$	0,979	0,618	0,786	0,661	0,734	0,713	0,475	0,554	0,543
0 : 30	0,497	0,515	0,437	0,387	0,617	0,707	0,390	0,450	0,420
6 : 30	0,652	0,365	0,563	0,152	0,487	0,520	0,265	0,440	0,332
12 : 30	0,625	0,565	0,563	0,532	0,478	0,515	0,233	0,523	0,215
18 : 30	0,767	0,385	0,595	0,590	0,515	0,507	0,212	0,588	0,338
24 : 30	0,702	0,395	0,537	0,312	0,685	0,525	0,355	0,530	0,402
$\bar{x}$	0,648	0,445	0,539	0,395	0,555	0,555	0,291	0,506	0,341
0 : 60	0,395	0,260	0,418	0,378	0,440	0,562	0,240	0,435	0,215
6 : 60	0,457	0,468	0,435	0,332	0,387	0,537	0,272	0,508	0,453
12 : 60	0,657	0,585	0,520	0,675	0,587	0,392	0,247	0,400	0,265
18 : 60	0,685	0,515	0,822	0,572	0,440	0,562	0,400	0,450	0,302
24 : 60	0,670	0,302	0,432	0,442	0,432	0,568	0,302	0,350	0,312
$\bar{x}$	0,572	0,426	0,525	0,480	0,457	0,524	0,292	0,428	0,309
0 : 90	0,400	0,227	0,330	0,127	0,385	0,500	0,150	0,500	0,365
6 : 90	0,547	0,447	0,520	0,412	0,403	0,510	0,153	0,285	0,345
12 : 90	0,467	0,372	0,595	0,258	0,485	0,397	0,160	0,455	0,225
18 : 90	0,565	0,268	0,642	0,725	0,410	0,487	0,260	0,660	0,205
24 : 90	0,495	0,398	0,397	0,570	0,460	0,510	0,225	0,435	0,295
$\bar{x}$	0,494	0,340	0,497	0,436	0,428	0,481	0,189	0,467	0,287
0 : 120	0,392	0,212	0,395	0,235	0,553	0,360	0,148	0,405	0,355
6 : 120	0,357	0,330	0,547	0,328	0,463	0,362	0,160	0,444	0,450
12 : 120	0,545	0,308	0,397	0,530	0,410	0,500	0,163	0,338	0,362
18 : 120	0,530	0,477	0,430	0,455	0,537	0,478	0,215	0,550	0,360
24 : 120	0,440	0,497	0,490	0,360	0,440	0,500	0,218	0,488	0,388
$\bar{x}$	0,452	0,365	0,452	0,381	0,480	0,444	0,180	0,444	0,383

TABELA 9 - Análise de variância do peso seco em gramas da parte aérea das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas contendo 0,6, 12, 18 e 24 ppm de alumínio e 0, 30, 60, 90 e 120 ppm de manganês.

F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₂	V ₂₆	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
Blocos	3	0,000632	0,000509	0,000072	0,001316	0,000124	0,000013	0,000725*	0,000408	0,000173
Al	4	0,165487**	0,046582**	0,117820**	0,202053**	0,043395**	0,043823**	0,041254**	0,040070**	0,007954**
Mn	4	0,290082**	0,230017**	0,342032**	0,256730**	0,202000**	0,215930**	0,241151**	0,051346**	0,207101**
Al x Mn	16	0,074394**	0,040712**	0,07302**	0,055697**	0,033770**	0,019129**	0,039904**	0,021492**	0,003008**
Mn x Al ₀	4	0,333040**	0,116332**	0,134537**	0,143522**	0,230412**	0,125357**	0,207105**	0,002130**	0,116780**
Mn x Al ₆	4	0,023532**	0,065957**	0,070702**	0,119920**	0,036470**	0,069587**	0,059757**	0,040710**	0,024297**
Mn x Al ₁₂	4	0,163117**	0,593425**	0,149632**	0,117662**	0,026587**	0,020582**	0,016200**	0,025602**	0,000217**
Mn x Al ₁₈	4	0,030457	0,125617**	0,108632**	0,453950**	0,053967**	0,041730**	0,032242**	0,023012**	0,035182**
Mn x Al ₂₄	4	0,037504	0,057617**	0,025457**	0,609675**	0,080242**	0,035257**	0,029782**	0,025930**	0,075595**
Al x Mn ₀	4	0,238729**	0,033220**	0,049382**	0,004895**	0,099917**	0,041582**	0,141812**	0,002707**	0,055142**
Al x Mn ₃₀	4	0,079832**	0,031000**	0,014545**	0,122000**	0,032957**	0,029237**	0,024157**	0,014902**	0,025902**
Al x Mn ₆₀	4	0,108129**	0,077732**	0,116742**	0,080250**	0,023037**	0,022330**	0,016637**	0,013720**	0,031417**
Al x Mn ₉₀	4	0,016332**	0,032700**	0,063092**	0,181632**	0,007095**	0,009057**	0,010030**	0,072630**	0,023030**
Al x Mn ₁₂₀	4	0,020042**	0,058000**	0,017207**	0,082295**	0,015307**	0,018132**	0,004392**	0,026007**	0,006242**
Erro	72	0,043008	0,000491	0,000691	0,000711	0,000706	0,000668	0,000180	0,000438	0,000342
$\bar{x}$		0,570	0,439	0,560	0,470	0,531	0,543	0,285	0,470	0,370
C.V. %		4,280	5,050	4,690	5,660	5,000	4,760	4,690	4,360	4,960
D.M.S. ₄	1%	0,061	0,053	0,063	0,064	0,063	0,062	0,032	0,050	0,044
	5%	0,049	0,040	0,052	0,052	0,052	0,051	0,022	0,041	0,036
D.M.S. ₂₀	1%	0,022	0,023	0,028	0,028	0,028	0,027	0,014	0,022	0,019
	5%	0,018	0,019	0,023	0,023	0,023	0,022	0,011	0,016	0,016

** Significativo ao nível de 1%.

* Significativo ao nível de 5%.

TABELA 10 - Peso seco médio das raízes de quatro repetições, em gramas, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de alumínio e variando doses de manganês.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	0,152	0,132	0,115	0,170	0,240	0,130	0,125	0,127	0,120
0 : 30	0,083	0,067	0,072	0,062	0,177	0,090	0,040	0,102	0,045
0 : 60	0,085	0,053	0,107	0,105	0,130	0,097	0,032	0,100	0,032
0 : 90	0,070	0,027	0,060	0,065	0,078	0,095	0,020	0,098	0,077
0 : 120	0,065	0,077	0,060	0,087	0,090	0,085	0,020	0,090	0,120
$\bar{x}$	0,091	0,075	0,087	0,093	0,143	0,095	0,047	0,103	0,079
6 : 0	0,307	0,205	0,117	0,290	0,155	0,110	0,100	0,092	0,125
6 : 30	0,108	0,177	0,095	0,152	0,165	0,107	0,030	0,050	0,097
6 : 60	0,065	0,135	0,077	0,090	0,150	0,100	0,030	0,068	0,082
6 : 90	0,105	0,150	0,132	0,127	0,102	0,122	0,022	0,150	0,055
6 : 120	0,120	0,082	0,107	0,112	0,110	0,087	0,027	0,058	0,070
$\bar{x}$	0,141	0,150	0,106	0,154	0,136	0,105	0,042	0,060	0,086
12 : 0	0,190	0,137	0,172	0,087	0,137	0,077	0,035	0,120	0,108
12 : 30	0,082	0,147	0,103	0,050	0,108	0,070	0,042	0,055	0,042
12 : 60	0,130	0,082	0,077	0,055	0,100	0,060	0,027	0,027	0,040
12 : 90	0,125	0,037	0,100	0,050	0,082	0,060	0,022	0,058	0,060
12 : 120	0,138	0,072	0,112	0,105	0,087	0,072	0,012	0,037	0,077
$\bar{x}$	0,133	0,093	0,113	0,077	0,103	0,068	0,026	0,060	0,065
18 : 0	0,125	0,097	0,085	0,132	0,130	0,125	0,075	0,085	0,075
18 : 30	0,138	0,047	0,090	0,065	0,125	0,095	0,030	0,112	0,065
18 : 60	0,147	0,030	0,130	0,107	0,060	0,067	0,057	0,055	0,038
18 : 90	0,112	0,037	0,132	0,135	0,090	0,080	0,037	0,102	0,020
18 : 120	0,125	0,057	0,077	0,087	0,062	0,090	0,042	0,048	0,042
$\bar{x}$	0,129	0,054	0,101	0,105	0,093	0,091	0,048	0,087	0,048
24 : 0	0,108	0,127	0,087	0,080	0,115	0,137	0,070	0,110	0,070
24 : 30	0,070	0,062	0,115	0,055	0,097	0,112	0,045	0,097	0,048
24 : 60	0,140	0,032	0,090	0,080	0,068	0,120	0,037	0,063	0,047
24 : 90	0,060	0,062	0,045	0,085	0,062	0,090	0,030	0,072	0,062
24 : 120	0,750	0,130	0,090	0,057	0,072	0,090	0,027	0,093	0,042
$\bar{x}$	0,090	0,063	0,085	0,071	0,083	0,110	0,042	0,087	0,054

TABELA 11 - Peso seco médio da raiz de quatro repetições em gramas, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de manganês e variando doses de alumínio.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	0,152	0,132	0,115	0,170	0,240	0,130	0,125	0,127	0,120
6 : 0	0,307	0,205	0,117	0,290	0,155	0,110	0,100	0,092	0,125
12 : 0	0,190	0,127	0,172	0,087	0,137	0,077	0,025	0,120	0,108
18 : 0	0,125	0,097	0,085	0,132	0,130	0,125	0,075	0,085	0,075
24 : 0	0,108	0,127	0,087	0,080	0,115	0,137	0,070	0,110	0,070
$\bar{x}$	0,176	0,138	0,115	0,152	0,155	0,111	0,079	0,107	0,099
0 : 30	0,083	0,087	0,072	0,062	0,177	0,090	0,040	0,102	0,045
6 : 30	0,10 _n	0,177	0,095	0,152	0,165	0,107	0,030	0,050	0,097
12 : 30	0,082	0,147	0,103	0,090	0,108	0,070	0,042	0,055	0,042
18 : 30	0,138	0,047	0,080	0,065	0,125	0,095	0,030	0,112	0,065
24 : 30	0,070	0,062	0,115	0,055	0,097	0,112	0,045	0,097	0,048
$\bar{x}$	0,096	0,104	0,093	0,085	0,134	0,095	0,037	0,083	0,059
0 : 60	0,085	0,053	0,107	0,105	0,130	0,097	0,032	0,100	0,032
6 : 60	0,065	0,135	0,077	0,090	0,150	0,100	0,030	0,088	0,082
12 : 60	0,130	0,082	0,077	0,055	0,100	0,060	0,037	0,027	0,040
18 : 60	0,147	0,030	0,130	0,107	0,060	0,067	0,057	0,055	0,038
24 : 60	0,140	0,032	0,090	0,080	0,068	0,120	0,037	0,063	0,047
$\bar{x}$	0,113	0,066	0,096	0,087	0,101	0,089	0,037	0,066	0,048
0 : 90	0,070	0,027	0,060	0,065	0,078	0,095	0,020	0,098	0,077
6 : 90	0,105	0,150	0,132	0,127	0,102	0,122	0,022	0,150	0,055
12 : 90	0,125	0,037	0,100	0,050	0,082	0,060	0,022	0,058	0,060
18 : 90	0,112	0,037	0,132	0,135	0,090	0,080	0,037	0,102	0,020
24 : 90	0,060	0,062	0,045	0,085	0,062	0,090	0,030	0,072	0,062
$\bar{x}$	0,094	0,063	0,094	0,092	0,083	0,089	0,026	0,069	0,055
0 : 120	0,065	0,077	0,080	0,087	0,090	0,085	0,020	0,090	0,120
6 : 120	0,120	0,082	0,107	0,112	0,110	0,087	0,027	0,058	0,070
12 : 120	0,238	0,072	0,112	0,105	0,087	0,072	0,012	0,037	0,060
18 : 120	0,125	0,057	0,077	0,087	0,062	0,090	0,042	0,048	0,042
24 : 120	0,075	0,130	0,090	0,057	0,072	0,090	0,027	0,093	0,042
$\bar{x}$	0,104	0,064	0,093	0,089	0,084	0,085	0,026	0,065	0,070

TABELA 12 - Análise de variância do peso seco em gramas da raiz das variedades selecionadas, cultivadas em soluções contendo 0, 6, 12, 18 e 24 ppm de alumínio e 0, 30, 60, 90 e 120 ppm de manganês.

Quadrados médios											
F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂	
Blocos											
	3	0,000153	0,000084	0,000134	0,000177	0,000151	0,000212	0,000003	0,000055	0,000097	
Al	4	0,011832**	0,025601**	0,002870**	0,021566**	0,014126**	0,005483**	0,001626**	0,006929**	0,005180**	
M	4	0,023280**	0,019121**	0,001642**	0,016158**	0,020529**	0,003035**	0,009536**	0,006266**	0,008142**	
Al x M	16	0,007256**	0,003454**	0,003209**	0,005797**	0,002210**	0,000659**	0,001356**	0,002106**	0,001757**	
M x Al ₀	4	0,005007**	0,006230**	0,002192**	0,007652**	0,017867**	0,001255**	0,007800**	0,000807**	0,006682**	
M x Al ₆	4	0,036357**	0,008562**	0,001770**	0,025017**	0,003195**	0,006667**	0,004242**	0,003942**	0,002882**	
M x Al ₁₂	4	0,005892**	0,007776**	0,005080**	0,002275**	0,001680**	0,000242**	0,000470**	0,005192**	0,003117**	
M x Al ₁₈	4	0,000717**	0,002795**	0,003032**	0,003567**	0,004420**	0,001845**	0,001282**	0,003357**	0,001942**	
M x Al ₂₄	4	0,004330**	0,007580**	0,002555**	0,000795**	0,005000**	0,001652**	0,001167**	0,001480**	0,000545**	
Al x M ₀	4	0,025332**	0,006330**	0,004957**	0,029092**	0,009755**	0,002257**	0,005570**	0,001292**	0,002605**	
Al x M ₃₀	4	0,002895**	0,012480**	0,001167**	0,006307**	0,004967**	0,001112**	0,000300**	0,003332**	0,002117**	
Al x M ₆₀	4	0,005295**	0,007632**	0,002007**	0,001825**	0,006045**	0,002457**	0,000580**	0,003232**	0,001605**	
Al x M ₉₀	4	0,003155**	0,010130**	0,006557**	0,005960**	0,000880**	0,002060**	0,000207**	0,004995**	0,001812**	
Al x M ₁₂₀	4	0,004180**	0,002995**	0,001007**	0,001800**	0,001317**	0,000212**	0,000499**	0,002500**	0,000467**	
Erro	72	0,000104	0,000109	0,000109	0,000125	0,000114	0,000089	0,000429	0,000053	0,000066	
$\bar{x}$		0,117	0,091	0,098	0,101	0,112	0,095	0,104	0,078	0,066	
C.V. %		5,720	11,440	10,620	11,040	9,570	9,970	15,910	9,330	12,260	
D.F. ₄											
1%		0,024	0,025	0,025	0,026	0,025	0,022	0,015	0,017	0,019	
5%		0,020	0,020	0,020	0,022	0,021	0,018	0,013	0,014	0,016	
D.F. ₂₀											
1%		0,011	0,011	0,011	0,012	0,011	0,008	0,007	0,008	0,009	
5%		0,009	0,009	0,007	0,009	0,009	0,010	0,005	0,007	0,007	

** Significativo ao nível de 1%.

TABELA 13 - Peso seco total médio de quatro repetições, em gramas, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando as doses de alumínio e variando as doses de manganês.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	1,305	0,700	0,913	0,860	1,245	0,962	0,925	0,772	0,755
0 : 30	0,580	0,602	0,510	0,450	0,795	0,797	0,430	0,552	0,465
0 : 60	0,482	0,312	0,525	0,482	0,570	0,660	0,272	0,595	0,247
0 : 90	0,470	0,255	0,390	0,202	0,462	0,595	0,170	0,597	0,442
0 : 120	0,457	0,290	0,475	0,322	0,642	0,465	0,167	0,495	0,475
$\bar{x}$	0,659	0,432	0,562	0,479	0,743	0,696	0,393	0,580	0,477
6 : 0	1,455	0,865	0,910	0,920	0,782	0,843	0,555	0,642	0,615
6 : 30	0,772	0,543	0,658	0,770	0,677	0,623	0,295	0,490	0,430
6 : 60	0,523	0,603	0,512	0,423	0,578	0,638	0,303	0,505	0,543
6 : 90	0,652	0,597	0,652	0,540	0,505	0,632	0,250	0,300	0,398
6 : 120	0,478	0,412	0,655	0,440	0,573	0,450	0,186	0,497	0,520
$\bar{x}$	0,776	0,604	0,677	0,618	0,615	0,638	0,318	0,505	0,499
12 : 0	1,192	0,632	1,090	0,770	0,753	0,627	0,348	0,643	0,500
12 : 30	0,708	0,712	0,665	0,647	0,595	0,595	0,275	0,577	0,257
12 : 60	0,787	0,668	0,598	0,730	0,687	0,452	0,275	0,428	0,305
12 : 90	0,598	0,410	0,695	0,308	0,568	0,457	0,183	0,513	0,285
12 : 120	0,682	0,380	0,510	0,635	0,498	0,573	0,175	0,375	0,440
$\bar{x}$	0,791	0,560	0,711	0,618	0,618	0,539	0,251	0,507	0,357
18 : 0	0,895	0,843	0,902	0,822	0,837	0,850	0,452	0,637	0,550
18 : 30	0,895	0,433	0,675	0,655	0,640	0,603	0,243	0,700	0,402
18 : 60	0,833	0,545	0,952	0,680	0,500	0,630	0,457	0,505	0,315
18 : 90	0,677	0,305	0,775	0,860	0,500	0,568	0,298	0,762	0,225
18 : 120	0,655	0,535	0,508	0,542	0,600	0,567	0,258	0,598	0,402
$\bar{x}$	0,791	0,532	0,762	0,712	0,615	0,643	0,341	0,640	0,379
24 : 0	0,908	0,742	0,697	0,698	0,833	0,865	0,490	0,660	0,718
24 : 30	0,772	0,457	0,652	0,367	0,783	0,638	0,400	0,653	0,450
24 : 60	0,810	0,335	0,522	0,510	0,500	0,697	0,340	0,412	0,360
24 : 90	0,555	0,457	0,442	0,655	0,522	0,600	0,377	0,507	0,357
24 : 120	0,528	0,628	0,580	0,418	0,512	0,590	0,432	0,580	0,430
$\bar{x}$	0,714	0,524	0,579	0,529	0,630	0,676	0,408	0,562	0,463

TABELA 14 - Peso seco total médio de quatro repetições, em gramas, das variedades selecionadas, cultivadas em soluções nutritivas, fixando doses de manganês e variando doses de alumínio.

Tratamentos Al : Mn	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₅	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
0 : 0	1,305	0,700	0,913	0,860	1,245	0,962	0,925	0,722	0,755
6 : 0	1,455	0,865	0,910	0,920	0,782	0,843	0,555	0,642	0,615
12 : 0	1,192	0,632	1,090	0,770	0,753	0,627	0,348	0,643	0,500
16 : 0	0,895	0,843	0,902	0,822	0,837	0,850	0,452	0,637	0,550
24 : 0	0,908	0,742	0,697	0,698	0,833	0,865	0,490	0,660	0,718
$\bar{x}$	1,151	0,756	0,902	0,814	0,890	0,829	0,554	0,661	0,627
0 : 30	0,580	0,602	0,510	0,450	0,795	0,797	0,430	0,552	0,465
6 : 30	0,772	0,543	0,658	0,770	0,677	0,623	0,295	0,490	0,430
12 : 30	0,708	0,712	0,665	0,647	0,525	0,585	0,275	0,577	0,257
16 : 30	0,895	0,433	0,675	0,655	0,640	0,603	0,243	0,700	0,402
24 : 30	0,772	0,457	0,652	0,367	0,783	0,638	0,400	0,653	0,450
$\bar{x}$	0,745	0,549	0,632	0,578	0,696	0,650	0,328	0,594	0,401
0 : 60	0,482	0,312	0,525	0,482	0,570	0,660	0,272	0,535	0,247
6 : 60	0,523	0,603	0,512	0,423	0,538	0,638	0,303	0,595	0,543
12 : 60	0,787	0,668	0,598	0,730	0,687	0,452	0,275	0,428	0,305
16 : 60	0,833	0,545	0,952	0,660	0,500	0,630	0,457	0,505	0,315
24 : 60	0,810	0,335	0,522	0,510	0,500	0,687	0,340	0,412	0,360
$\bar{x}$	0,687	0,492	0,622	0,565	0,559	0,613	0,329	0,495	0,354
0 : 90	0,470	0,255	0,390	0,282	0,462	0,595	0,170	0,597	0,442
6 : 90	0,652	0,597	0,652	0,540	0,505	0,632	0,250	0,300	0,388
12 : 90	0,588	0,410	0,695	0,308	0,568	0,457	0,183	0,513	0,285
16 : 90	0,677	0,305	0,775	0,860	0,500	0,568	0,298	0,762	0,225
24 : 90	0,555	0,457	0,442	0,655	0,522	0,600	0,377	0,507	0,357
$\bar{x}$	0,588	0,405	0,591	0,529	0,511	0,570	0,255	0,536	0,339
0 : 120	0,457	0,290	0,457	0,322	0,642	0,465	0,167	0,495	0,475
6 : 120	0,478	0,412	0,655	0,440	0,573	0,450	0,186	0,497	0,520
12 : 120	0,682	0,380	0,510	0,635	0,498	0,573	0,175	0,375	0,440
16 : 120	0,655	0,535	0,508	0,542	0,600	0,567	0,258	0,598	0,402
24 : 120	0,528	0,628	0,580	0,418	0,512	0,590	0,432	0,580	0,430
$\bar{x}$	0,560	0,449	0,545	0,471	0,565	0,529	0,244	0,509	0,453

TABELA 15 - Análise de variância do peso seco total em gramas das variedades selecionadas, cultivadas em soluções contendo 0, 6, 12, 18 e 24 ppm de alumínio e 0, 30, 60, 90 e 120 ppm de manganês.

Quadrados médios											
F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂	
Blocos	3	0,000376	0,000812	0,000247	0,000942	0,000692	0,001006	0,002993**	0,000225**	0,001236**	
Al	4	0,067778**	0,080245**	0,147611**	0,161697**	0,061629**	0,073190**	0,079069**	0,063663**	0,078931**	
Mn	4	1,134500**	0,376367**	0,039447**	0,343485**	0,471209**	0,269262**	0,311841**	0,093946**	0,271178**	
Al x Mn	16	0,103102**	0,063731**	0,055378**	0,084851**	0,044623**	0,021496**	0,061172**	0,033792**	0,021037**	
Mn x Al ₀	4	0,531032**	0,166867**	0,164075**	0,209117**	0,373417**	0,146182**	0,309492**	0,030617**	0,131292**	
Mn x Al ₆	4	0,629670**	0,108620**	0,082812**	0,190295**	0,051875**	0,077305**	0,078592**	0,069312**	0,032982**	
Mn x Al ₁₂	4	0,221370**	0,094567**	0,199295**	0,133217**	0,041080**	0,025195**	0,020932**	0,047105**	0,045125**	
Mn x Al ₁₈	4	0,054732**	0,158017**	0,128537**	0,067117**	0,076605**	0,056057**	0,044570**	0,038642**	0,058157**	
Mn x Al ₂₄	4	0,110142**	0,103020**	0,041270**	0,083142**	0,106525**	0,050575**	0,012942**	0,043437**	0,087767**	
Al x Mn ₀	4	0,242682**	0,037932**	0,077337**	0,028932**	0,163550**	0,060342**	0,1946332**	0,009020**	0,048775**	
Al x Mn ₃₀	4	0,052642**	0,051580**	0,018892**	0,108317**	0,033082**	0,028900**	0,0263795**	0,027457**	0,027932**	
Al x Mn ₆₀	4	0,115280**	0,102667**	0,141130**	0,070587**	0,024057**	0,034407**	0,023442**	0,023062**	0,050832**	
Al x Mn ₉₀	4	0,027182**	0,072337**	0,110907**	0,235382**	0,005832**	0,018092**	0,02917**	0,112145**	0,029317**	
Al x Mn ₁₂₀	4	0,042400**	0,070632**	0,020855**	0,057882**	0,014600**	0,017432**	0,049520**	0,031157**	0,008220**	
Erro	72	0,001132	0,000662	0,000765	0,000729	0,000809	0,000640	0,002506	0,000365	0,000622	
$\bar{x}$		0,745	0,520	0,659	0,551	0,644	0,638	0,342	0,559	0,435	
C.V. %		4,510	4,850	4,200	4,570	4,410	3,960	14,860	3,510	5,730	
D.F.S ₄	1%	0,080	0,061	0,046	0,064	0,068	0,060	0,122	0,047	0,059	
	5%	0,066	0,051	0,054	0,063	0,066	0,060	0,100	0,039	0,049	
D.F.S ₂₀	1%	0,036	0,027	0,022	0,029	0,030	0,027	0,054	0,021	0,026	
	5%	0,030	0,022	0,024	0,023	0,025	0,022	0,045	0,017	0,022	

** Significativo ao nível de 1%.

TABELA 16 - Relação das equações de regressão dos dados de produção de matéria seca, parte aérea e raiz, das variedades submetidas aos tratamentos de alumínio e manganês.

V_1	$Y = 0,152043 - 0,074760X - 0,095110W + 0,014600W^2$ $R^2 = 0,0254^{**}$	V_{20}	$Y = 0,131289 - 0,073320W - 0,034210X^2 + 0,034110W^2 + 0,024330XW$ $R^2 = 0,4370^{**}$
V_2	$Y = 0,495450 - 0,046100X - 0,011020W + 0,031040X^2 + 0,005610XW$ $R^2 = 0,0455^{**}$	V_{21}	$Y = 0,17643 - 0,074740W + 0,032050XW$ $R^2 = 0,3501^{**}$
V_3	$Y = 0,267718 - 0,201350W + 0,074230W^2 + 0,006200XW$ $R^2 = 0,7523^{**}$	V_{22}	$Y = 0,305330 - 0,01400X - 0,040650W + 0,020030X^2 + 0,000250W^2$ $R^2 = 0,7001^{**}$
V_4	$Y = 0,297313 - 0,021010X - 0,034400W + 0,074320X^2 + 0,033470XW$ $R^2 = 0,3003^{**}$	V_{23}	$Y = 0,194422 - 0,057510X - 0,013340W + 0,038330W^2 + 0,041720XW$ $R^2 = 0,7714^{**}$
V_5	$Y = 0,24037 - 0,017250X - 0,037050W + 0,100100X^2 + 0,011200W^2$ $R^2 = 0,6418^{**}$	V_{24}	$Y = 0,139951 - 0,064040X - 0,131350W + 0,043990W^2 + 0,030100XW$ $R^2 = 0,6647^{**}$
V_6	$Y = 0,494510 - 0,018540X - 0,042250W + 0,046200W^2 + 0,023530XW$ $R^2 = 0,0324^{**}$	V_{25}	$Y = 0,044775 - 0,128740W + 0,029640X^2 + 0,027940W^2 + 0,031190XW$ $R^2 = 0,7262^{**}$
V_7	$Y = 0,393555 - 0,009240X - 0,065640W + 0,042820W^2$ $R^2 = 0,0781^{**}$	V_{26}	$Y = 0,660135 - 0,01170X - 0,073490W - 0,041430X^2 + 0,030630W^2 + 0,003720XW$ $R^2 = 0,4370^{**}$
V_8	$Y = 0,333056 - 0,017410X - 0,065590W + 0,05410X^2 + 0,021860W^2 + 0,009070XW$ $R^2 = 0,6124^{**}$	V_{27}	$Y = 0,720708 - 0,039010X - 0,124700W + 0,063570X^2 + 0,044350W^2 + 0,030360XW$ $R^2 = 0,7185^{**}$
V_9	$Y = 0,311777 - 0,041940X - 0,113630W + 0,00910X^2 + 0,072900W^2$ $R^2 = 0,7653^{**}$	V_{28}	$Y = 0,343074 - 0,060400W + 0,074120X^2 + 0,019240W^2 + 0,013900XW$ $R^2 = 0,7696^{**}$
V_{10}	$Y = 0,207849 - 0,027510X - 0,146740W + 0,023030X^2 + 0,004210W^2 + 0,001220XW$ $R^2 = 0,6274^{**}$	V_{29}	$Y = 0,712448 - 0,029100X - 0,136640W + 0,027430X^2 + 0,032330W^2$ $R^2 = 0,7053^{**}$
V_{11}	$Y = 0,446470 - 0,004400W + 0,027200W^2 + 0,038160XW$ $R^2 = 0,7094^{**}$	V_{30}	$Y = 0,732030 - 0,030400X - 0,119350W + 0,043460W^2 + 0,016130XW$ $R^2 = 0,7454^{**}$
V_{12}	$Y = 0,272276 - 0,062560W + 0,010710X^2 + 0,024110W^2 + 0,031260XW$ $R^2 = 0,7703^{**}$	V_{31}	$Y = 0,707793 - 0,043110X - 0,203640W + 0,074610W^2 + 0,056600XW$ $R^2 = 0,7468^{**}$
V_{13}	$Y = 0,503914 - 0,000920X - 0,030240W + 0,060400X^2 + 0,011670W^2$ $R^2 = 0,3198^{**}$	V_{32}	$Y = 0,707925 - 0,060250X - 0,121350W + 0,040810W^2 + 0,027900XW$ $R^2 = 0,7197^{**}$
V_{14}	$Y = 0,703239 - 0,101190W + 0,031200XW$ $R^2 = 0,6244^{**}$	V_{33}	$Y = 0,619430 - 0,072390W - 0,036100X^2 + 0,023600W^2 + 0,027740XW$ $R^2 = 0,2760^{**}$
V_{15}	$Y = 0,274362 - 0,002990W + 0,035740W^2 + 0,014300XW$ $R^2 = 0,6249^{**}$	V_{34}	$Y = 0,323352 - 0,007300W + 0,023570W^2 + 0,020000XW$ $R^2 = 0,7312^{**}$
V_{16}	$Y = 0,701912 - 0,133060W + 0,050790X^2 + 0,005040W^2 + 0,040320XW$ $R^2 = 0,7007^{**}$	V_{35}	$Y = 0,703114 - 0,432750W + 0,000100X^2 + 0,010700W^2 + 0,013770XW$ $R^2 = 0,1021^{**}$
V_{17}	$Y = 0,526059 - 0,027540X - 0,003440W + 0,019400X^2 + 0,041740W^2$ $R^2 = 0,7359^{**}$	V_{36}	$Y = 0,743370 - 0,003490X - 0,161840W + 0,028460W^2 + 0,047100XW$ $R^2 = 0,6597^{**}$
V_{18}	$Y = 0,463043 - 0,124340W + 0,041340W^2 + 0,000300XW$ $R^2 = 0,6108^{**}$	V_{37}	$Y = 0,540874 - 0,011230X - 0,059260W + 0,015620X^2 + 0,028600W^2 + 0,031010XW$ $R^2 = 0,5983^{**}$
V_{19}	$Y = 0,337946 - 0,107140W + 0,049400W^2 + 0,006700XW$ $R^2 = 0,7035^{**}$	V_{38}	$Y = 0,710042 - 0,175700W + 0,091130W^2 + 0,066240XW$ $R^2 = 0,3338^{**}$

** Significantive a 1%
* Significantive a 5%

TABELA 17 - Valores máximos e mínimos em relação aos tratamentos de alumínio e manganês obtidos pelas resoluções das equações de regressão; e os parâmetros destas equações empregados nas matrizes para obtenção e interpretação dos valores máximos e mínimos.

Variedades	Alumínio		Manganês		Valores de b			Valores de x
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	ΔB	b_{11}	b_{22}	
V ₁	-	-	-	-	$\Delta B = 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₃	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} = 0$	-
V ₄	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} = 0$	-
V ₅	-	6	-	109	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₆	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₇	-	-	-	-	$\Delta B = 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₈	-	4	-	-	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_2 > 2$
V ₉	-	5	-	83	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₀	-	-	-	105	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_1 < -2$
V ₁₁	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₂	-	7	-	102	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₃	-	8	-	95	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₄	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} = 0$	-
V ₁₅	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₆	16	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} < 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₇	-	15	-	90	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₈	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₁₉	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₀	14	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} < 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₁	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} = 0$	-
V ₂₂	-	14	-	72	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₃	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₄	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₅	-	-	-	-	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_1 < -2, x_2 > 2$
V ₂₆	14	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} < 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₇	-	7	-	112	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₈	-	9	-	118	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₂₉	-	-	-	99	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_1 < -2$
V ₃₀	-	-	-	-	$\Delta B > 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	$x_2 < -2$
V ₃₁	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₃₂	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₃₃	15	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} < 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₃₄	-	2	-	-	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_2 > 2$
V ₃₅	-	-	-	-	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_1 < -2, x_2 > 2$
V ₃₆	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-
V ₃₇	-	-	-	-	$\Delta B > 0$	$b_{11} > 0$	$b_{22} > 0$	$x_1 < -2, x_2 > 2$
V ₃₈	-	-	-	-	$\Delta B < 0$	$b_{11} = 0$	$b_{22} > 0$	-

TABELA 18 - Teores médios de alumínio em ppm de quatro repetições das partes aéreas das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Parte aérea						
Al : Mn ppm	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₅	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	$\bar{x}$
0 : 0	223	190	376	318	194	270	195	252
0 : 30	277	200	411	336	232	270	50	254
0 : 60	268	200	470	356	197	294	130	276
0 : 90	347	300	388	302	216	282	195	290
0 : 120	317	264	341	398	189	270	100	268
$\bar{x}$	290	231	397	342	206	277	134	268
6 : 0	411	300	423	400	270	342	362	358
6 : 30	411	200	435	462	270	342	317	348
6 : 60	435	290	470	471	248	308	362	369
6 : 90	447	264	435	489	216	308	375	362
6 : 120	352	291	470	489	240	292	387	360
$\bar{x}$	411	269	447	462	249	319	361	360
12 : 0	506	300	435	499	324	320	430	402
12 : 30	506	330	487	527	387	400	412	436
12 : 60	615	350	506	507	417	400	400	456
12 : 90	692	309	553	509	352	378	400	456
12 : 120	708	330	552	562	409	416	400	482
$\bar{x}$	605	324	507	521	378	383	408	447
18 : 0	769	350	553	891	491	434	500	570
18 : 30	646	363	769	720	468	468	437	553
18 : 60	635	400	752	834	400	491	475	570
18 : 90	646	436	692	720	580	422	412	558
18 : 120	646	372	754	800	431	476	486	566
$\bar{x}$	666	384	704	793	474	458	462	563
24 : 0	769	480	677	900	694	464	720	672
24 : 30	723	527	892	914	537	491	752	691
24 : 60	728	454	692	914	490	694	896	695
24 : 90	738	436	723	1028	637	491	800	693
24 : 120	769	473	769	1028	540	694	720	713
$\bar{x}$	745	474	751	957	580	567	778	693

TABELA 19 - Teores médios de alumínio em ppm de quatro repetições das raízes das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Raiz							
Al : Mn ppm		V ₁₆	V ₂₀	V ₂₅	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	$\bar{x}$
0 :	0	272	280	178	730	280	164	222	304
0 :	30	384	360	136	817	290	171	212	339
0 :	60	480	400	320	698	215	221	240	368
0 :	90	555	315	421	869	235	297	308	429
0 :	120	540	553	136	800	320	243	262	408
$\bar{x}$		446	382	238	783	268	219	249	370
6 :	0	814	1032	1218	1033	815	547	446	844
6 :	30	1895	1380	1143	1487	690	529	500	1089
6 :	60	1726	1366	1237	2100	525	412	520	1127
6 :	90	1625	1400	1500	1251	735	369	581	1066
6 :	120	887	1286	1092	1671	786	509	400	947
$\bar{x}$		1389	1293	1238	1508	710	473	489	1014
12 :	0	1600	1160	1014	2100	1442	1097	794	1315
12 :	30	1895	1630	1609	2000	1768	1185	847	1562
12 :	60	2448	1451	1750	2160	1684	1273	665	1633
12 :	90	2396	1152	1143	2020	1684	1058	937	1484
12 :	120	2500	1120	1750	2136	1600	1036	950	1585
$\bar{x}$		2168	1303	1453	2083	1636	1130	839	1516
18 :	0	2604	1218	1462	1960	1852	1455	1105	1665
18 :	30	2500	1635	1789	2260	1853	1485	1220	1820
18 :	60	2500	2000	1635	2300	2318	1328	1275	1908
18 :	90	2396	1437	1773	2200	1853	1636	1248	1792
18 :	120	2482	2020	1750	2060	1895	1658	1094	1851
$\bar{x}$		2496	1662	1662	2156	1954	1512	1188	1807
24 :	0	1894	2160	1790	2100	2500	1808	1188	1920
24 :	30	2396	2318	1750	2080	2395	1808	1358	2021
24 :	60	2500	2877	1750	2060	2600	1609	1358	2108
24 :	90	2604	2652	1750	2200	2395	1608	1200	2058
24 :	120	2500	1522	1837	2300	2500	1580	1094	1905
$\bar{x}$		2379	2306	1783	2148	2478	1683	1240	2002

TABELA 20 - Teores médios de fósforo em percentagem de quatro repetições das partes aéreas das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Parte aérea							$\bar{x}$
Al : Mn ppm		V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	
0 : 0		0,710	0,650	1,090	0,860	0,540	1,460	1,070	0,911
0 : 30		1,440	0,830	2,150	1,450	0,790	1,760	1,280	1,386
0 : 60		1,720	1,690	2,180	1,470	1,160	1,970	1,620	1,687
0 : 90		1,880	1,600	2,240	2,000	1,270	2,230	2,370	1,941
0 : 120		1,570	1,230	2,340	2,060	1,140	1,970	1,220	1,647
$\bar{x}$		1,464	1,200	2,000	1,568	0,980	1,878	1,512	1,514
6 : 0		0,680	0,660	1,320	0,600	0,420	1,150	0,710	0,820
6 : 30		1,130	0,650	1,680	0,930	0,650	1,430	1,240	1,101
6 : 60		1,370	1,030	1,640	1,000	0,760	1,850	1,220	1,267
6 : 90		1,530	0,640	1,660	0,760	0,760	1,970	1,610	1,276
6 : 120		1,360	0,550	1,870	0,500	0,710	1,700	1,340	1,147
$\bar{x}$		1,254	0,706	1,634	0,758	0,660	1,620	1,224	1,122
12 : 0		1,080	0,960	1,290	0,480	0,420	1,140	0,560	0,847
12 : 30		1,060	0,950	1,390	0,650	0,650	1,310	1,080	1,013
12 : 60		1,310	1,180	1,830	0,590	0,680	1,580	1,170	1,191
12 : 90		1,570	1,300	1,920	0,760	0,910	1,800	1,400	1,380
12 : 120		1,330	0,640	2,590	0,860	0,600	1,140	1,320	1,211
$\bar{x}$		1,270	1,006	1,804	0,668	0,652	1,394	1,106	1,128
18 : 0		1,180	0,640	0,540	0,440	0,420	1,140	0,520	0,840
18 : 30		1,030	0,950	1,580	0,550	0,650	1,680	0,900	1,049
18 : 60		1,290	1,650	1,630	0,670	0,660	1,660	1,330	1,270
18 : 90		1,370	1,320	1,910	0,610	0,870	1,660	1,330	1,296
18 : 120		1,300	0,600	2,050	0,950	0,660	1,300	0,990	1,121
$\bar{x}$		1,234	1,032	1,742	0,644	0,652	1,488	1,014	1,115
24 : 0		0,860	0,650	1,340	0,410	0,360	1,140	0,470	0,747
24 : 30		1,100	0,970	1,940	0,760	0,540	1,540	0,680	1,076
24 : 60		1,240	0,920	1,830	0,680	0,670	1,430	0,670	1,063
24 : 90		1,340	1,030	2,000	0,670	0,780	1,310	1,280	1,201
24 : 120		1,370	0,920	1,500	0,510	0,650	1,360	0,960	1,039
$\bar{x}$		1,182	0,898	1,722	0,606	0,600	1,356	0,812	1,025

TABELA 21 - Teores médios de fósforo em percentagem de quatro repetições das raízes das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Raiz							
Al : Mn ppm		V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	$\bar{x}$
0 :	0	0,670	0,950	1,490	1,010	0,600	1,380	1,000	1,014
0 :	30	1,110	1,500	1,790	1,010	0,950	2,100	1,580	1,434
0 :	60	1,340	1,930	2,260	3,080	0,730	2,890	2,260	2,070
0 :	90	3,050	1,950	2,320	3,080	0,600	2,830	2,630	2,351
0 :	120	2,340	1,980	1,140	2,940	0,600	2,100	2,320	1,917
$\bar{x}$		1,702	1,662	1,800	2,224	0,696	2,260	1,958	1,757
6 :	0	1,150	1,780	1,870	0,950	1,380	1,800	1,190	1,446
6 :	30	1,890	1,870	3,300	2,000	1,990	2,800	1,340	2,170
6 :	60	1,960	1,950	3,100	1,950	1,980	2,170	1,290	2,057
6 :	90	1,580	1,940	2,600	1,950	1,200	3,260	2,350	2,154
6 :	120	1,370	1,910	2,670	1,530	0,760	2,970	2,750	1,994
$\bar{x}$		1,590	1,890	2,748	1,676	1,462	2,600	1,84	1,964
12 :	0	1,910	1,580	2,600	1,480	2,740	2,200	1,630	2,020
12 :	30	3,510	1,870	3,290	1,760	2,250	3,360	1,750	2,541
12 :	60	3,630	1,910	3,340	1,950	2,150	3,420	2,970	2,767
12 :	90	2,290	1,800	3,290	1,180	2,060	3,010	2,760	2,341
12 :	120	1,980	1,590	3,290	0,980	1,990	3,000	1,000	1,976
$\bar{x}$		2,664	1,750	3,162	1,470	2,238	2,998	2,022	2,329
18 :	0	1,660	1,800	3,280	2,890	2,850	2,160	2,000	2,377
18 :	30	1,980	1,860	3,280	2,910	2,470	2,400	1,780	2,383
18 :	60	1,880	1,800	3,160	2,910	2,620	2,830	1,960	2,451
18 :	90	2,250	1,870	3,160	2,020	1,800	2,970	1,360	2,204
18 :	120	1,660	1,900	3,160	1,210	1,770	3,480	1,040	2,031
$\bar{x}$		1,886	1,846	3,208	2,368	2,302	2,768	1,628	2,329
24 :	0	1,370	1,870	3,150	1,960	2,100	2,920	1,120	2,070
24 :	30	1,500	2,060	3,240	2,050	2,080	3,480	1,280	2,241
24 :	60	1,700	1,910	3,340	2,060	2,590	3,060	1,220	2,268
24 :	90	1,800	1,910	3,120	2,060	2,650	3,090	1,190	2,260
24 :	120	1,53	1,81	2,97	1,050	1,130	2,920	0,710	1,731
$\bar{x}$		1,580	1,912	3,164	1,836	2,110	3,094	1,104	2,114

TABELA 22 - Teores médios de cálcio em percentagem de quatro repetições das partes aéreas das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Parte aérea							
Al : Mn ppm		V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	$\bar{x}$
0 : 0		2,540	2,850	1,630	1,760	3,070	1,880	1,230	2,137
0 : 30		1,630	2,000	1,390	1,720	2,110	1,420	1,110	1,626
0 : 60		1,370	1,720	1,280	1,900	1,960	1,500	1,100	1,547
0 : 90		1,300	1,660	1,180	1,790	1,460	1,480	1,000	1,410
0 : 120		0,910	1,610	1,230	1,740	1,470	1,070	0,610	1,234
$\bar{x}$		1,550	1,968	1,342	1,782	2,014	1,470	1,010	1,590
6 : 0		1,850	2,380	1,330	2,050	2,730	1,550	1,160	1,864
6 : 30		1,320	2,460	1,090	1,720	1,820	1,430	1,130	1,567
6 : 60		1,070	1,460	0,940	1,500	1,570	1,330	1,080	1,279
6 : 90		1,020	1,390	0,930	1,420	1,560	1,070	1,000	1,199
6 : 120		1,030	1,080	0,870	1,370	1,430	1,050	1,000	1,119
$\bar{x}$		1,258	1,754	1,032	1,612	1,822	1,286	1,074	1,405
12 : 0		0,800	3,760	1,110	1,120	1,880	0,960	0,800	1,490
12 : 30		0,610	4,130	0,850	1,410	1,820	0,960	0,800	1,511
12 : 60		0,860	1,960	0,880	1,320	1,630	0,910	0,800	1,194
12 : 90		0,700	1,460	0,880	1,120	1,500	0,840	0,750	1,036
12 : 120		0,720	1,120	0,660	1,00	1,390	0,820	0,720	0,919
$\bar{x}$		0,738	2,486	0,876	1,194	1,644	0,898	0,774	1,230
18 : 0		1,440	2,300	1,130	1,460	1,610	1,010	0,880	1,404
18 : 30		1,070	1,370	0,820	1,440	1,600	1,080	0,860	1,177
18 : 60		1,020	1,310	0,990	1,330	1,480	0,980	0,690	1,114
18 : 90		0,970	1,060	0,770	1,290	1,330	0,870	0,610	0,986
18 : 120		0,950	1,030	0,690	1,250	1,280	0,950	0,560	0,959
$\bar{x}$		1,090	1,414	0,880	1,354	1,460	0,978	0,720	1,128
24 : 0		1,310	1,280	0,860	1,190	1,500	1,160	0,780	1,154
24 : 30		1,050	1,650	1,130	1,290	1,480	0,990	0,810	1,200
24 : 60		1,070	1,570	1,070	1,330	1,520	0,890	0,720	1,167
24 : 90		1,000	1,460	1,040	1,110	1,430	0,880	0,670	1,084
24 : 120		0,980	0,980	0,840	1,100	1,420	0,860	0,700	0,982
$\bar{x}$		1,082	1,388	0,988	1,204	1,470	0,956	0,736	1,117

TABELA 23 - Teores médios de cálcio em percentagem de quatro repetições das raízes das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Raiz						
Al : Mn ppm	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	$\bar{x}$
0 : 0	1,410	1,050	1,540	1,500	2,360	0,800	0,730	1,341
0 : 30	1,070	2,010	0,930	1,810	1,520	0,750	0,770	1,266
0 : 60	1,060	1,290	1,030	1,230	1,500	0,730	0,760	1,086
0 : 90	1,060	1,070	0,990	1,110	1,470	0,580	0,690	0,996
0 : 120	1,050	0,970	0,880	0,770	1,130	0,470	0,320	0,799
$\bar{x}$	1,130	1,278	1,074	1,284	1,596	0,666	0,654	1,098
6 : 0	0,980	2,940	0,740	1,370	1,960	0,530	0,670	1,313
6 : 30	0,520	1,340	0,750	0,730	1,330	0,530	0,400	0,800
6 : 60	0,470	1,080	0,690	0,550	1,040	0,420	0,390	0,663
6 : 90	0,450	0,610	0,570	0,430	0,770	0,470	0,370	0,524
6 : 120	0,280	0,600	0,480	0,350	0,800	0,440	0,290	0,463
$\bar{x}$	0,540	1,314	0,646	0,686	1,180	0,478	0,424	0,753
12 : 0	0,480	1,100	0,660	0,570	1,280	0,430	0,500	0,717
12 : 30	0,520	0,680	0,820	0,900	1,060	0,470	0,490	0,706
12 : 60	0,470	0,440	0,680	0,410	0,990	0,370	0,450	0,544
12 : 90	0,380	0,400	0,460	0,380	0,500	0,360	0,280	0,394
12 : 120	0,300	0,350	0,440	0,310	0,430	0,330	0,240	0,349
$\bar{x}$	0,430	0,594	0,612	0,514	0,852	0,392	0,392	0,541
18 : 0	0,390	0,730	0,260	0,660	0,690	0,470	0,280	0,497
18 : 30	0,390	0,860	0,290	0,540	1,130	0,420	0,260	0,556
18 : 60	0,360	0,730	0,370	0,430	0,950	0,370	0,240	0,493
18 : 90	0,360	0,510	0,410	0,380	0,760	0,360	0,210	0,430
18 : 120	0,330	0,480	0,330	0,330	0,460	0,310	0,200	0,349
$\bar{x}$	0,366	0,662	0,332	0,468	0,798	0,390	0,238	0,465
24 : 0	0,520	0,750	0,270	0,610	1,140	0,380	0,250	0,560
24 : 30	0,440	0,600	0,310	0,450	1,000	0,430	0,260	0,499
24 : 60	0,36	0,58	0,35	0,45	0,510	0,370	0,230	0,407
24 : 90	0,300	0,400	0,310	0,460	0,460	0,370	0,220	0,360
24 : 120	0,260	0,560	0,120	0,360	0,330	0,330	0,150	0,301
$\bar{x}$	0,376	0,578	0,272	0,466	0,688	0,376	0,222	0,425

TABELA 24 - Teores médios de magnésio em percentagem de quatro repetições das partes aéreas das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos	Parte aérea							$\bar{x}$
	V_{16}	V_{20}	V_{26}	V_{33}	V_{17}	V_{28}	V_{34}	
Al : Mn ppm								
0 : 0	0,530	0,280	1,630	0,440	1,010	0,690	0,740	0,760
0 : 30	0,500	0,260	1,390	0,450	0,790	1,010	0,810	0,744
0 : 60	0,490	0,260	1,280	0,460	0,730	0,740	0,750	0,673
0 : 90	0,490	0,270	1,180	0,470	0,720	0,730	0,700	0,651
0 : 120	0,470	0,230	1,270	0,460	0,510	0,510	0,480	0,561
$\bar{x}$	0,496	0,260	1,350	0,456	0,752	0,736	0,695	0,677
6 : 0	0,490	0,250	1,330	0,460	0,760	0,760	0,790	0,691
6 : 30	0,490	0,210	1,090	0,470	0,510	0,510	0,730	0,573
6 : 60	0,480	0,210	0,940	0,450	0,520	0,510	0,740	0,550
6 : 90	0,460	0,200	0,920	0,470	0,480	0,480	0,750	0,537
6 : 120	0,450	0,200	0,870	0,430	0,300	0,300	0,750	0,471
$\bar{x}$	0,474	0,214	1,030	0,456	0,514	0,512	0,752	0,564
12 : 0	0,750	0,430	0,860	0,430	0,500	0,500	0,750	0,603
12 : 30	0,700	0,470	1,110	0,450	0,600	0,530	0,730	0,656
12 : 60	0,750	0,540	0,880	0,430	0,520	0,520	0,750	0,627
12 : 90	0,720	0,250	0,880	0,440	0,530	0,520	0,740	0,583
12 : 120	0,730	0,270	0,650	0,440	0,490	0,490	0,730	0,543
$\bar{x}$	0,730	0,392	0,876	0,438	0,528	0,512	0,740	0,602
18 : 0	0,510	0,440	1,130	0,430	0,720	0,720	0,50	0,636
18 : 30	0,480	0,300	0,820	0,450	0,730	0,730	0,490	0,571
18 : 60	0,480	0,270	0,990	0,450	0,700	0,700	0,490	0,583
18 : 90	0,480	0,250	0,760	0,450	0,510	0,510	0,470	0,490
18 : 120	0,480	0,200	0,890	0,420	0,520	0,520	0,220	0,464
$\bar{x}$	0,486	0,292	0,918	0,440	0,636	0,636	0,434	0,602
24 : 0	0,470	0,240	0,860	0,420	0,750	0,750	0,790	0,611
24 : 30	0,460	0,260	1,130	0,440	0,720	0,720	0,750	0,640
24 : 60	0,460	0,240	1,070	0,450	0,700	0,690	0,740	0,621
24 : 90	0,460	0,220	1,030	0,410	0,520	0,510	0,700	0,550
24 : 120	0,450	0,200	0,840	0,430	0,510	0,510	0,530	0,496
$\bar{x}$	0,460	0,232	0,986	0,430	0,640	0,636	0,702	0,583

TABELA 25 - Teores médios de magnésio em percentagem de quatro repetições das raízes das variedades selecionadas em relação ao alumínio.

Tratamentos		Raiz							
Al : Mn ppm		V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	$\bar{x}$
0 :	0	0,450	0,760	1,540	0,520	0,510	0,530	0,710	0,717
0 :	30	0,460	0,850	0,930	0,770	0,960	0,920	0,750	0,806
0 :	60	0,440	0,830	1,030	1,030	0,960	0,980	1,040	0,901
0 :	90	0,430	0,740	1,090	1,040	0,510	0,530	0,700	0,720
0 :	120	0,420	0,760	0,680	1,050	0,480	0,490	0,630	0,673
$\bar{x}$		0,440	0,768	1,094	0,882	0,684	0,690	0,766	0,763
6 :	0	0,680	0,810	0,740	0,930	0,700	0,810	0,710	0,769
6 :	30	0,500	0,720	0,750	0,870	0,980	0,970	0,720	0,787
6 :	60	0,520	0,740	0,690	1,000	0,740	0,760	0,970	0,774
6 :	90	0,500	0,530	0,570	0,960	0,620	0,730	0,780	0,670
6 :	120	0,460	0,460	0,480	1,000	0,600	0,650	0,760	0,630
$\bar{x}$		0,532	0,652	0,646	0,952	0,728	0,784	0,788	0,726
12 :	0	1,050	0,730	0,660	0,950	0,970	0,960	0,700	0,860
12 :	30	1,030	0,510	0,820	1,000	0,490	0,480	0,750	0,726
12 :	60	0,970	0,500	0,380	1,000	0,270	0,290	0,720	0,590
12 :	90	0,920	0,490	0,460	0,870	0,260	0,270	0,520	0,541
12 :	120	0,530	0,460	0,440	0,790	0,220	0,250	0,250	0,420
$\bar{x}$		0,900	0,538	0,552	0,922	0,442	0,450	0,588	0,627
18 :	0	0,490	0,510	0,400	0,750	0,710	0,730	0,290	0,554
18 :	30	0,510	0,530	0,370	1,000	0,480	0,460	0,280	0,519
18 :	60	0,760	0,510	0,320	0,760	0,500	0,520	0,250	0,517
18 :	90	0,520	0,550	0,290	0,490	0,500	0,490	0,220	0,437
18 :	120	0,290	0,510	0,260	0,480	0,480	0,460	0,200	0,383
$\bar{x}$		0,514	0,522	0,328	0,696	0,534	0,532	0,248	0,482
24 :	0	0,500	0,500	0,270	0,730	0,520	0,530	0,480	0,504
24 :	30	0,950	0,760	0,310	0,760	0,720	0,690	0,580	0,681
24 :	60	0,510	0,720	0,350	0,990	0,710	0,750	0,490	0,646
24 :	90	0,490	0,720	0,300	0,970	0,490	0,490	0,480	0,562
24 :	120	0,490	0,720	0,120	0,510	0,470	0,430	0,360	0,443
$\bar{x}$		0,568	0,684	0,270	0,792	0,582	0,578	0,478	0,567

TABELA 26 - Teores médios de manganês em ppm de quatro repetições das partes aéreas e das raízes das variedades selecionadas em relação ao manganês.

Tratamentos		Parte aérea				Raiz			
Al : Mn ppm		V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈	$\bar{x}$	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈	$\bar{x}$
0 : 0		69	80	121	90	152	161	157	157
0 : 30		2750	900	2175	1942	375	1695	1367	1146
0 : 60		3280	2132	2793	2735	2062	3750	2793	2868
0 : 90		6327	3500	4492	4777	3750	3360	5885	4332
0 : 120		9302	4492	3732	5842	4677	4870	5885	5144
$\bar{x}$		4346	2221	2663	3077	2203	2767	3217	2729
6 : 0		387	100	123	203	420	278	250	316
6 : 30		2687	2000	2836	2508	1125	2132	1865	1707
6 : 60		4257	3375	3348	3660	1187	2375	2500	2021
6 : 90		4620	3000	4492	4037	4961	3478	2687	3709
6 : 120		5277	4872	4365	4838	6163	4555	3418	4712
$\bar{x}$		3446	2669	3033	3049	2771	2564	2144	2493
12 : 0		118	114	131	121	131	250	280	220
12 : 30		1187	1517	937	1214	1200	937	937	1025
12 : 60		1812	2312	1432	1852	1812	1800	1302	1638
12 : 90		5632	2500	1630	3254	3687	2065	1500	2417
12 : 120		4430	3125	3280	3612	3495	4750	1500	3248
$\bar{x}$		2636	1914	1482	2011	2065	1960	1104	1710
18 : 0		97	88	87	91	108	143	224	158
18 : 30		1125	1302	750	1059	562	1062	437	687
18 : 60		2437	2000	1062	1833	2400	2250	875	1842
18 : 90		2465	1432	1865	1921	4365	2132	1367	2621
18 : 120		3216	2500	2562	2759	2812	2065	2875	2584
$\bar{x}$		1868	1464	1265	1533	2049	1530	1156	1578
24 : 0		86	83	82	84	100	111	151	121
24 : 30		2050	1125	625	1267	937	1125	676	913
24 : 60		2062	1536	927	1508	1062	1550	812	1141
24 : 90		3750	1782	1302	2278	1188	2200	1302	1563
24 : 120		2937	2437	1562	2312	2562	1367	1865	1931
$\bar{x}$		2177	1393	900	1490	1170	1271	961	1134

TABELA 27 - Teores médios de ferro em ppm de quatro repetições das partes aéreas e das raízes das variedades selecionadas em relação ao manganês.

Tratamentos		Parte aérea				Raiz			
Al : Mn ppm		V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈	$\bar{x}$	V ₁₃	V ₂₂	V ₂₈	$\bar{x}$
0 :	0	427	300	312	346	180	654	360	398
0 :	30	480	387	345	404	955	1846	1910	1570
0 :	60	500	327	372	400	596	2800	1192	1529
0 :	90	427	236	381	348	586	1413	1192	1064
0 :	120	272	209	297	259	360	720	720	600
$\bar{x}$		421	292	341	351	535	1487	1075	1032
6 :	0	380	318	340	346	237	1875	387	833
6 :	30	467	517	372	452	877	2500	1754	1710
6 :	60	577	825	390	597	481	3019	1058	1519
6 :	90	380	480	480	447	400	2978	962	1447
6 :	120	268	272	381	307	353	2916	529	1266
$\bar{x}$		414	482	393	430	470	2658	938	1355
12 :	0	375	349	276	333	136	3125	291	1184
12 :	30	360	435	390	395	685	3540	1270	1832
12 :	60	498	540	336	458	597	3957	848	1801
12 :	90	440	289	336	255	520	2915	635	1357
12 :	120	230	227	200	219	291	1875	328	831
$\bar{x}$		381	368	308	352	446	3082	674	1401
18 :	0	330	263	253	282	127	1951	136	738
18 :	30	375	291	278	315	520	3540	1000	1687
18 :	60	440	510	300	417	436	3750	1730	1972
18 :	90	330	318	318	322	409	3228	521	1386
18 :	120	225	245	248	239	236	1537	308	694
$\bar{x}$		340	325	279	315	346	2801	739	1295
24 :	0	298	254	247	266	91	1836	95	674
24 :	30	409	248	309	322	398	2164	855	1139
24 :	60	400	227	336	321	519	3592	1070	1727
24 :	90	330	223	282	278	395	2288	836	1173
24 :	120	188	218	198	201	214	832	395	480
$\bar{x}$		325	234	274	277	323	2142	650	1038

TABELA 28 - Coeficiente de correlação (R) entre os componentes de crescimento : altura da planta (H) , comprimento da raiz (GR) , peso seco da parte aérea (PSPA) , peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) ; entre percentagem de fósforo na parte aérea e raiz (% de P na parte aérea e % de P na raiz) em duas variedades selecionadas ao alumínio e entre componentes de crescimento e percentagem de manganês na parte aérea e raiz (% de Mn na parte aérea e % de Mn na raiz) em uma variedade selecionada ao manganês.

Variedade - Rio Tibagi - não tolerante ao alumínio								
	CR	% P na R	% P na PA	H	PSR	PSPA	PST	$\bar{x}$
CR	-	-0,4195*	0,1753	-0,9397 **	0,4031 *	0,2294	0,3068	0,4123
% P na R		-	0,0371	-0,5288 **	-0,3042	-0,5194 **	-0,5618**	0,3984
% P na PA			-	0,1598	-0,1517	-0,4384 *	-0,3695	0,2186
H				-	0,3802	0,3065	0,3663	0,4436
PSR					-	0,6115 **	0,7465**	0,4328
PSPA						-	0,9569**	0,5104
PST							-	0,5546
Variedade - Volatinho paulista - tolerante ao alumínio								
CR	-	-0,3855	-0,4523 *	0,9878 **	0,7505**	0,3899	0,5213**	0,5812
% P na R		-	0,2611	-0,3667	-0,2212	-0,2996	-0,3232	0,3162
% P na PA			-	-0,4385 *	-0,5846**	-0,4385 *	-0,5236**	0,4531
H				-	0,7617**	0,3870	0,5291**	0,5818
PSR					-	0,5474 **	0,7320**	0,5994
PSPA						-	0,9709**	0,5055
PST							-	0,6000
Variedade - Goiano precoce								
CR	-	-0,0728	-0,0845	0,9682 **	0,1581	0,1280	0,3051	0,2861
% Mn na R		-	0,7774 **	-0,1129	-0,3927	-0,3050	-0,4350 *	0,3493
% Mn na PA			-	-0,0996	-0,0705	-0,4176 *	-0,4779*	0,3212
H				-	0,2689	0,0919	0,1264	0,2780
PSR					-	0,6962 **	0,2316	0,3030
PSPA						-	0,9784**	0,4361
PST							-	0,4257

* Significativo ao nível de 5%

** Significativo ao nível de 1%

TABELA 29 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de parte aérea de feijão cultivado em solução nutritiva contendo alumínio durante quatro semanas e tratado com ^{32}P por um período de duas horas.

	R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$
$Al_0 = 0 \text{ ppm}$					
V_{16}	4470	3760	4400	3760	4160
V_{20}	1980	2500	2300	2210	2250
V_{26}	7970	7470	8110	7870	7850
V_{33}	5200	5140	5030	4500	4970
V_{17}	2110	2210	2390	2150	2210
V_{26}	12260	10940	11190	11820	11550
V_{34}	5130	4880	5260	4880	5040
$Al_1 = 12 \text{ ppm}$					
V_{16}	26270	27770	28030	28140	27550
V_{20}	17660	17850	16380	16550	17110
V_{26}	8580	8570	9380	9030	8890
V_{33}	31450	25800	26680	30080	30000
V_{17}	14670	14800	14760	15690	14980
V_{28}	30730	28930	27580	27910	28970
V_{34}	18130	19250	18840	19550	18940
$Al_2 = 24 \text{ ppm}$					
V_{16}	4800	4410	4690	5350	4810
V_{20}	8670	9040	8260	7850	8450
V_{26}	4670	5010	5090	4540	4830
V_{33}	12820	12980	13590	14460	13460
V_{17}	4530	4960	4630	5040	4790
V_{28}	10180	10390	12080	11900	11140
V_{34}	13300	13700	13090	12990	13270

TABELA 30 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de raiz não destacada de feijão cultivado em solução nutritiva contendo alumínio durante quatro semanas e tratado com ^{32}P por um período de duas horas.

	R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$
$Al_0 = 0 \text{ ppm}$					
V_{16}	10940	11460	9530	10930	10710
V_{20}	22260	22140	21840	20520	21690
V_{26}	26950	27750	27900	25650	27060
V_{33}	20600	22670	21020	20590	21320
V_{17}	12870	11640	11970	10220	11670
V_{28}	17050	12760	13640	11550	13750
V_{34}	23290	25290	25590	24970	24760
$Al_1 = 12 \text{ ppm}$					
V_{16}	129700	120460	122870	126580	125410
V_{20}	115760	110530	110000	123000	116830
V_{26}	119370	128790	130610	126920	126470
V_{33}	126590	133920	130940	128530	130090
V_{17}	103310	106560	91130	90290	97820
V_{28}	108300	111050	133630	132450	212410
V_{34}	117920	116720	121250	118000	119100
$Al_2 = 24 \text{ ppm}$					
V_{16}	127450	137010	114960	129160	127110
V_{20}	123160	143160	139750	123200	132320
V_{26}	184220	165260	178410	160000	173970
V_{33}	156340	150160	130240	148570	146330
V_{17}	131400	121240	135870	119870	127090
V_{28}	129530	135000	128760	134170	131870
V_{34}	161020	156000	149790	159470	157070

TABELA 31 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 1818, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de raiz destacada de feijão cultivado em solução nutritiva contendo alumínio durante quatro semanas e tratado com ^{32}P por um período de duas horas.

	R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$
$Al_0 = 0 \text{ ppm}$					
V_{16}	18540	16100	20140	21010	19150
V_{20}	40520	40120	41250	38030	39980
V_{26}	20350	19950	20290	21610	20700
V_{33}	25010	24970	23120	23170	24200
V_{17}	20810	21040	21510	21540	21220
V_{28}	35640	34950	37970	37250	36450
V_{34}	41180	42770	43060	42720	42430
$Al_1 = 12 \text{ ppm}$					
V_{16}	198820	177370	188230	187170	187900
V_{20}	113850	123890	129240	124960	122980
V_{26}	143690	147470	159970	145160	149070
V_{33}	119600	120220	115250	122350	119360
V_{17}	144800	148070	142500	140590	143990
V_{28}	189610	162560	179670	187690	179940
V_{34}	161110	155140	153600	152040	155470
$Al_2 = 24 \text{ ppm}$					
V_{16}	159160	170570	162990	162590	163830
V_{20}	132220	127880	138190	130270	132140
V_{26}	230020	262300	246920	243460	245660
V_{33}	130760	117650	135530	125810	127440
V_{17}	203960	229700	199520	205040	209550
V_{28}	244940	269760	226920	234660	244070
V_{34}	200360	206710	190900	170980	192240

TABELA 32 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente da parte aérea de feijão cultivado em solução nutritiva durante quatro semanas e tratado com alumínio juntamente com ^{32}P por um período de duas horas.

	R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$		R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$
$\text{Al}_0 = 0 \text{ ppm}$						$\text{Al}_1 = 12 \text{ ppm}$					
V_{16}	5540	4180	5410	4950	5020	V_{16}	12320	11690	12950	9660	11630
V_{20}	14780	11560	15020	12410	13440	V_{20}	15020	14720	13260	11830	13710
V_{26}	7490	6700	7060	7780	7260	V_{26}	10200	9640	8770	9710	9580
V_{33}	3590	3020	3340	3810	3440	V_{33}	3590	3060	3180	4190	3500
V_{17}	5690	5240	5360	5360	5410	V_{17}	7340	7390	8820	8740	8070
V_{28}	14480	19040	17960	19680	17790	V_{28}	13550	14320	14470	19130	15370
V_{34}	16690	19660	20600	20050	19750	V_{34}	19240	16750	17570	16230	17450
$\text{Al}_2 = 24 \text{ ppm}$						$\text{Al}_3 = 72 \text{ ppm}$					
V_{16}	10060	9800	9720	11540	10280	V_{16}	6700	6480	6820	7370	6770
V_{20}	8990	9720	8930	9720	9100	V_{20}	4830	4390	4890	4540	4650
V_{26}	11030	10390	11770	11300	11120	V_{26}	19770	16160	20550	15260	17940
V_{33}	15290	12340	14460	14220	14080	V_{33}	9610	10200	10140	9720	9920
V_{17}	14470	12760	17900	25290	17600	V_{17}	6910	6910	5850	6370	6510
V_{28}	12430	11170	9970	12180	11440	V_{28}	10840	11000	11470	10360	10920
V_{34}	11800	13990	14100	14900	13700	V_{34}	10030	9770	10550	9020	9840

TABELA 33 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de raiz não destacada de feijão cultivado em solução nutritiva durante quatro semanas e tratado com alumínio juntamente com ^{32}P por um período de duas horas.

	R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$		R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$
$\text{Al}_0 = 0 \text{ ppm}$						$\text{Al}_1 = 12 \text{ ppm}$					
V_{16}	30910	30960	25060	34070	31250	V_{16}	88180	74050	75530	89340	81780
V_{20}	71650	81790	80670	67090	76850	V_{20}	82280	101960	94930	105280	96110
V_{26}	54260	71180	66470	67320	64960	V_{26}	72800	79460	82650	74960	77470
V_{33}	73050	81650	55140	56980	66760	V_{33}	123040	118020	117610	112010	117670
V_{17}	131030	123030	124160	137560	129150	V_{17}	202130	146080	193410	177840	179840
V_{28}	57870	56070	62380	49590	56480	V_{28}	78330	98050	73540	83150	83270
V_{34}	49230	48560	44870	47320	47000	V_{34}	65920	71620	68130	65940	67900
$\text{Al}_2 = 24 \text{ ppm}$						$\text{Al}_3 = 72 \text{ ppm}$					
V_{16}	122950	114950	117010	115410	118590	V_{16}	79600	91550	78650	82630	83110
V_{20}	129800	136950	150660	144040	140410	V_{20}	152910	214780	200170	197070	201230
V_{26}	171160	175510	196680	183350	182710	V_{26}	183010	177400	187690	174210	183080
V_{33}	139710	134540	126840	150500	137850	V_{33}	224030	276810	237400	228900	241950
V_{17}	147020	123760	150030	127760	137150	V_{17}	116610	111110	103140	106630	109870
V_{28}	204030	221210	233910	226140	221360	V_{28}	209000	231850	229070	254740	231160
V_{34}	70040	72690	61180	73970	69470	V_{34}	119760	112600	126610	103160	113040

TABELA 34 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de raiz destacada de feijão cultivado em solução nutritiva durante quatro semanas e tratado com alúminio juntamente com ^{32}P por um período de duas horas.

	R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$		R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$
$\text{Al}_0 = 0 \text{ ppm}$						$\text{Al}_1 = 12 \text{ ppm}$					
V_{16}	173330	151460	150460	155950	157630	V_{16}	167570	173510	203640	181720	181620
V_{20}	53060	43700	43130	44200	47520	V_{20}	65240	79560	61290	64500	67550
V_{26}	27120	22330	31650	20760	25390	V_{26}	63190	61820	64780	55000	61420
V_{33}	40510	41900	56360	41230	39570	V_{33}	115140	101080	115760	95830	107950
V_{17}	223920	265910	205340	224330	234870	V_{17}	95400	86250	108720	76030	92740
V_{28}	145390	161700	153080	192060	164310	V_{28}	105840	127920	100780	115590	111530
V_{34}	114700	103500	119690	142690	127710	V_{34}	98400	85260	86220	91210	91020
$\text{Al}_2 = 24 \text{ ppm}$						$\text{Al}_3 = 72 \text{ ppm}$					
V_{16}	272160	209200	240900	232420	238600	V_{16}	207520	202370	166650	214110	202660
V_{20}	155590	187500	155460	168220	166940	V_{20}	118630	155640	173300	173600	156610
V_{26}	117560	110170	108460	114030	112550	V_{26}	342290	217440	306540	311790	300000
V_{33}	127780	120820	124800	116060	122360	V_{33}	292050	238440	215610	211070	239490
V_{17}	46090	51900	40410	50880	47320	V_{17}	21350	20540	23390	22190	21870
V_{28}	35560	46230	47320	53340	45610	V_{28}	45690	52550	47420	48040	48420
V_{34}	58680	61710	72990	66580	64910	V_{34}	16690	19800	14680	17500	17170

TABELA 35 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 181B, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de parte aérea de feijão cultivado em solução nutritiva durante quatro semanas e tratado com 48 ppm de alumínio juntamente com ^{32}P e fósforo estável por um período de duas horas.

NaH_2PO_4		R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$	Fator
10^{-7}M	V_{20}	50080	54890	50590	53820	52345	10^0
	V_{26}	63260	67090	66890	74030	67818	
	V_{28}	91690	79670	91880	80410	85913	
10^{-5}M	V_{20}	79630	74080	81840	79210	78690	10^2
	V_{26}	81470	87250	91230	90700	87653	
	V_{28}	93450	101870	100660	102140	99530	
10^{-3}M	V_{20}	14890	14840	15260	13950	14735	10^4
	V_{26}	16140	15810	16970	14240	15790	
	V_{28}	9660	9110	10030	9760	9640	
10^{-1}M	V_{20}	1480	1530	1800	1620	1608	10^6
	V_{26}	1480	1760	1390	1760	1598	
	V_{28}	1530	1430	1800	1800	1640	

TABELA 36 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 1818, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de raiz não destacada de feijão cultivado em solução nutritiva durante quatro semanas e tratado com 48 ppm de alumínio juntamente com ^{32}P e fósforo estável por um período de duas horas.

NaH_2PO_4		R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$	Fator
10^{-7}M	V_{20}	43000	43500	43500	43900	43475	10^0
	V_{26}	54600	62400	62900	57800	59425	
	V_{28}	29600	31900	32400	31000	31225	
10^{-5}M	V_{20}	49900	49500	49000	52700	50725	10^2
	V_{26}	55000	52300	50600	49200	51775	
	V_{28}	49000	44900	46700	44900	46375	
10^{-3}M	V_{20}	29600	31400	27700	29600	29575	10^4
	V_{26}	35100	36100	32800	31900	33975	
	V_{28}	15700	14800	16600	17100	16050	
10^{-1}M	V_{20}	9900	11100	10300	10600	10475	10^6
	V_{26}	29600	29600	31400	27700	29575	
	V_{28}	6900	7900	6900	6800	7125	

TABELA 37 - Contagens por minuto (cpm), por grama de matéria seca, obtidas no escalímetro nuclear Chicago Corp. Mod. 1818, com tubo Geiger Muller de janela fina para material proveniente de raiz destacada de feijão cultivado em solução nutritiva durante quatro semanas e tratado com 48 ppm de alumínio juntamente com ^{32}P e fósforo estável por um período de duas horas.

NaH_2PO_4		R_1	R_2	R_3	R_4	$\bar{x}$	Fator
10^{-7}M	V_{20}	78980	71260	75740	74960	75235	10^0
	V_{26}	71720	70700	76530	68340	71823	
	V_{28}	50820	52340	58120	56230	54378	
10^{-5}M	V_{20}	65110	64130	59230	61830	62575	10^2
	V_{26}	63850	65740	66450	62790	65708	
	V_{28}	58120	61220	61360	62150	60713	
10^{-3}M	V_{20}	13870	13920	11140	12530	12865	10^4
	V_{26}	12020	10680	11100	11930	11432	
	V_{28}	9200	9340	9020	9430	9248	
10^{-1}M	V_{20}	2130	2170	2260	1990	2138	10^6
	V_{26}	4520	4680	4240	4600	4510	
	V_{28}	1410	1660	1570	1390	1508	

TABELA 38 - Resultados médios dos componentes de crescimento das variedades selecionadas, em relação aos tratamentos de manganês e silício: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros; peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

		H	CR	PSPA	PSR	PST			H	CR	PSPA	PSR	PST
Mn ₀ Si ₀ 0 : 0 ppm	V ₁₆	48,250	37,250	0,460	0,115	0,575	Mn ₁ Si ₀ 60 : 0 ppm	V ₁₆	21,250	26,250	0,422	0,100	0,522
	V ₂₀	42,000	44,000	1,027	0,122	1,150		V ₂₀	23,500	31,000	0,465	0,130	0,595
	V ₂₆	43,000	40,750	1,060	0,145	1,205		V ₂₆	15,250	15,750	0,367	0,055	0,422
	V ₃₃	39,500	48,250	1,125	0,265	1,390		V ₃₃	16,000	26,750	0,496	0,125	0,620
	V ₁₇	49,250	51,500	1,182	0,217	1,400		V ₁₇	23,250	26,500	0,435	0,100	0,535
	V ₂₈	31,503	37,750	0,410	0,092	0,502		V ₂₈	20,500	26,250	0,355	0,082	0,437
	V ₃₄	33,000	38,250	0,670	0,102	0,747		V ₃₄	18,750	11,000	0,352	0,072	0,425
	V ₁₃	21,500	29,500	0,407	0,100	0,507		V ₁₃	13,750	10,500	0,315	0,035	0,350
	V ₂₂	54,500	37,750	1,052	0,120	1,172		V ₂₂	19,000	21,250	0,382	0,062	0,445
	$\bar{x}$	40,277	40,111	0,821	0,142	0,960		$\bar{x}$	19,027	21,964	0,398	0,084	0,483
Mn ₀ Si ₁ 0 : 100 ppm	V ₁₆	30,000	29,500	0,520	0,202	0,722	Mn ₁ Si ₁ 60 : 100 ppm	V ₁₆	30,000	22,750	0,685	0,155	0,840
	V ₂₀	23,250	19,250	0,715	0,185	0,900		V ₂₀	18,750	23,000	0,835	0,180	1,015
	V ₂₆	24,750	19,750	0,680	0,177	0,832		V ₂₆	24,500	15,750	0,687	0,077	0,765
	V ₃₃	22,000	24,250	0,735	0,360	1,097		V ₃₃	21,000	23,000	1,010	0,195	1,205
	V ₁₇	25,000	31,250	0,632	0,155	0,787		V ₁₇	27,750	25,500	0,880	0,182	1,062
	V ₂₈	23,250	20,500	0,677	0,182	0,760		V ₂₈	23,500	22,250	0,697	0,087	0,785
	V ₃₄	22,750	21,250	0,717	0,375	1,067		V ₃₄	25,000	14,000	0,712	0,100	0,807
	V ₁₃	15,750	15,250	0,625	0,165	0,790		V ₁₃	17,000	12,750	0,700	0,125	0,825
	V ₂₂	25,750	22,000	0,762	0,232	0,995		V ₂₂	29,250	22,250	1,195	0,220	1,415
	$\bar{x}$	23,611	22,555	0,673	0,225	0,683		$\bar{x}$	24,083	20,138	0,822	0,146	0,968
Mn ₀ Si ₂ 0 : 200 ppm	V ₁₆	26,000	22,500	0,785	0,145	0,940	Mn ₁ Si ₂ 60 : 200 ppm	V ₁₆	29,500	23,750	0,582	0,137	0,720
	V ₂₀	24,250	17,000	0,535	0,115	0,660		V ₂₀	22,500	18,500	0,292	0,095	0,387
	V ₂₆	27,000	14,500	0,550	0,145	0,700		V ₂₆	22,500	14,500	0,512	0,055	0,567
	V ₃₃	22,750	15,750	0,577	0,105	0,687		V ₃₃	18,500	16,250	0,792	0,157	0,925
	V ₁₇	23,500	15,750	0,517	0,150	0,667		V ₁₇	19,750	17,000	0,352	0,080	0,432
	V ₂₈	20,750	16,750	0,852	0,250	1,105		V ₂₈	20,250	21,000	0,425	0,100	0,525
	V ₃₄	21,000	9,750	0,532	0,180	0,760		V ₃₄	18,000	9,500	0,297	0,030	0,327
	V ₁₃	16,250	8,250	0,517	0,072	0,560		V ₁₃	15,750	8,250	0,422	0,077	0,500
	V ₂₂	25,750	14,250	0,675	0,145	0,820		V ₂₂	23,750	16,000	0,482	0,067	0,550
	$\bar{x}$	23,250	15,165	0,622	0,145	0,768		$\bar{x}$	21,116	16,083	0,461	0,088	0,548

TABELA 39 - Análise de variância da altura de plantas em centímetros, das variedades selecionadas e cultivadas em soluções nutritivas contendo 0 e 60 ppm de manganês nas parcelas e 0, 10 e 200 ppm de silício nas subparcelas.

Quadrados medios												
F.v.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₅	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂		
81300	3	4,777777	1,819444	4,111111	2,375000	4,611111	2,486111	4,944444	0,333333	0,337333		
Ln	1	433,500000**	408,375000**	704,166666**	551,041666**	486,000000**	84,375000**	150,000000**	32,666666**	770,666666**		
Erro (a)	3	10,500000	3,041666	0,944444	2,041666	2,375000	2,375000	3,666666	0,555555	2,777777		
Sl	2	80,166666**	308,791666**	52,541666**	120,791666**	445,291666**	60,541666**	85,041666**	5,791666**	316,166666**		
Sl x Ln	2	514,500000**	161,375000**	438,291666**	295,791666**	454,625000**	79,125000**	142,125000**	45,541666**	891,166666**		
Sl x Ln ₀	2	498,083333**	445,083333**	396,083333**	391,583333**	835,583333**	126,583333**	168,083333**	40,583333**	1102,083333**		
Sl x Ln ₆₀	2	96,583333**	25,003333*	94,750000**	25,000000**	64,333333**	13,083333**	59,083333**	10,750000**	105,250000**		
Erro (b)	12	4,555555	4,805555	4,661111	2,625000	6,069444	7,388888	1,138888	0,777777	2,777777		
$\bar{x}$		31,167	25,708	25,166	23,291	28,083	23,291	23,063	25,000	22,667		
C.V. Parc.	%	10,396	6,784	3,714	6,135	7,507	6,617	8,295	2,981	5,618		
C.V. Subparc.	%	6,648	6,527	8,426	6,956	8,772	11,671	4,623	3,527	5,618		
C.V. S _{Ln}	1%	8,933	4,803	2,679	3,939	5,812	4,249	5,279	2,048	4,898		
	5%	28,820	15,516	8,646	12,712	18,756	13,711	17,036	6,631	14,828		
C.V. S _{Sl}	1%	2,634	2,705	2,720	1,999	3,040	3,354	1,317	1,080	2,056		
	5%	4,490	4,612	4,638	3,409	5,183	5,715	2,245	1,855	3,506		
C.V. S _{Sl} x Ln	1%	4,151	4,263	4,288	3,151	4,792	5,297	2,075	1,715	3,241		
	5%	7,395	7,596	7,639	5,614	8,536	9,418	3,698	3,036	5,775		

** Significativo no nível de 1%

TABELA 40 - Análise de variância do comprimento da raiz em centímetros, das variedades selecionadas e cultivadas em soluções contendo 0 e 60 ppm de manganês nas parcelas e 0, 100 e 200 ppm de silício nas subparcelas.

Quadrados médios										
F.v.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂
Bloco	3	6,111111	4,375000	1,000000	4,611111	4,611111	0,055555	3,507222	2,000000	8,500000**
ln	1	181,500000**	40,041666**	500,666666**	330,041666**	500,106666**	37,500000	805,041666**	266,666666**	140,166666**
Erro (a)	3	1,611111	5,152777	4,777777	0,706333	0,611111	4,500000	1,930555	0,666666	0,277777
Si	2	153,375000**	892,791666**	413,166666**	950,541666**	1025,041667**	349,541666**	450,041666**	392,666666**	413,375000**
Si x ln	2	77,375000**	165,291666**	360,666666**	299,041666**	369,541666**	121,625000**	392,666666**	131,166666**	205,291666**
Si x ln ₀	2	217,750000**	897,750000**	771,750000**	1136,333333**	1285,583333**	441,083333**	822,333333**	439,083333**	573,583333**
Si x ln ₆₀	2	13,000000**	160,333333**	2,083333	113,250000**	109,000000**	30,083333	21,000000**	54,750000**	45,083333**
Erro (b)	12	1,466111	7,430555	2,972222	3,569444	2,902777	11,361111	1,722222	2,083333	1,880888
$\bar{x}$		27,000	25,458	20,167	25,708	27,917	24,417	17,291	14,093	22,250
C.V. Parc.	%	4,701	6,916	10,830	3,273	2,800	6,666	8,035	5,798	4,494
C.V. Subparc.	%	4,615	10,707	8,548	7,349	6,103	13,804	7,589	10,249	6,177
D.M. _{Si} ln	1% 5%	3,499 11,293	6,258 20,196	6,026 19,447	2,320 7,488	2,155 6,955	5,848 18,873	3,830 12,382	2,251 7,264	1,453 4,689
D.M. _{Si}	1% 5%	1,504 2,565	3,363 5,735	2,127 3,627	2,331 3,975	2,102 3,584	4,199 7,091	1,619 2,761	1,781 3,037	1,696 2,891
D.M. _{Si} x ln	1% 5%	2,371 4,224	5,302 9,445	3,353 5,973	3,674 6,546	3,314 5,903	6,556 11,679	2,552 4,547	2,807 5,001	2,673 4,762

** Significativo ao nível de 1%

TABELA 41 - Análise de variância do peso seco da parte aérea em gramas, das variedades selecionadas e cultivadas em soluções contendo 0 e 60 ppm de manganês nas parcelas e 0, 100 e 200 ppm de silício nas subparcelas.

Quadrados médios											
F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₂	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂	
Bloco	3	0,003027	0,001066	0,004148	0,004194	0,003255	0,003479 *	0,000561	0,002907	0,013522	
Mn	1	0,003750 *	0,312816 **	0,348004 **	0,013066	0,294816 **	0,148837 **	0,240000 **	0,006437	0,123266 **	
Erro (a)	3	0,000338	0,000416	0,001059	0,003400	0,003605	0,000293	0,001211	0,000793	0,000300	
Si	2	0,121079 **	0,322512 **	0,076616 **	0,072916 **	0,327529 **	0,217587 **	0,104316 **	0,186179 **	0,330004 **	
Si x Mn	2	0,067762 **	0,233204 **	0,307016 **	0,512216 **	0,489229 **	0,120412 **	0,057335 **	0,018807 **	0,611379 **	
Si x Mn ₀	2	0,119633 **	0,322512 **	0,260033 **	0,317775 **	0,505300 **	0,207025 **	0,018433 *	0,047300 **	0,156175 **	
Si x Mn ₆₀	2	0,070008 **	0,233204 **	0,102700 **	0,267358 **	0,322058 **	0,130975 **	0,203233 **	0,157078 **	0,785208 **	
Erro (b)	12	0,001170	0,001391	0,001483	0,003055	0,003934	0,009222	0,003094	0,001544	0,007352	
$\bar{x}$		0,576	0,645	0,643	0,709	0,666	0,571	0,555	0,497	0,759	
C.V. Parc.	%	3,192	3,162	5,061	7,390	9,015	2,888	6,270	6,012	7,958	
C.V. Subparc.	%	5,938	5,702	5,969 *	7,005	9,417	16,818	11,243	7,506	11,317	
D.F. S _{Mn}	1%	0,050	0,056	0,069	0,160	0,165	0,047	0,095	0,082	0,082	
	5%	0,163	0,101	0,200	0,510	0,536	0,152	0,309	0,265	0,267	
D.F. S _{Si}	1%	0,042	0,046	0,047	0,060	0,077	0,110	0,077	0,040	0,106	
	5%	0,072	0,070	0,081	0,116	0,132	0,202	0,171	0,082	0,140	
D.F. S _{Si x Mn}	1%	0,060	0,072	0,075	0,107	0,122	0,106	0,121	0,076	0,166	
	5%	0,118	0,129	0,133	0,191	0,217	0,302	0,216	0,136	0,287	

** Significativo ao nível de 1%

* Significativo ao nível de 5%

TABELA 42 - Análise de variância do peso total em gramas, das variedades selecionadas e cultivadas em soluções contendo 0 e 60 ppm de manganês nas parcelas e 0, 100 e 200 ppm de silício nas subparcelas.

Quadrados médios												
F.V.	C.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₀	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂		
Bloco	3	0,002177	0,001615	0,000259	0,004593	0,005261	0,012483	0,010827	0,008015	0,028015		
ln	1	0,016016*	0,332437**	0,643537**	0,120416**	0,493750**	0,258266**	0,086816**	0,027337*	0,071504		
Erro (a)	3	0,001572	0,000459	0,001270	0,000694	0,002150	0,004077	0,006961	0,001781	0,025201		
61	2	0,180712**	0,422054**	0,079100**	0,239887**	0,422315**	0,283116**	0,373629**	0,303179**	0,417875*		
SI x ln	2	0,056954**	0,226287**	0,312650**	0,606514**	0,652200**	0,213116**	0,015254	0,018762**	0,670304**		
SI x ln ₀	2	0,134858**	0,240133**	0,274225**	0,496100**	0,617408**	0,365558**	-	0,086108**	0,124258		
SI x ln ₆₀	2	0,102808**	0,408608**	0,118225**	0,342433**	0,457108**	0,130675**	-	0,235833**	0,963433**		
Erro (b)	12	0,002003	0,001054	0,001269	0,003309	0,003563	0,007377	0,007536	0,002481	0,062673		
x		0,720	0,764	0,748	0,987	0,814	0,685	0,689	0,592	0,899		
C.V. Parc.	%	5,506	2,732	4,764	2,669	5,696	9,321	12,109	7,128	17,666		
C.V. Subparc.	%	6,339	5,492	4,762	5,828	7,333	12,538	12,599	8,413	27,847		
D.L.S _{ln}	1%	0,109	0,059	0,098	0,072	0,128	0,170	0,230	0,166	0,438		
	5%	0,352	0,190	0,317	0,234	0,412	0,568	0,742	0,375	1,414		
D.L.S _{SI}	1%	0,956	0,053	0,044	0,071	0,073	0,106	0,107	0,061	0,309		
	5%	0,096	0,090	0,075	0,121	0,125	0,161	0,102	0,105	0,527		
D.L.S _{SI x ln}	1%	0,089	0,084	0,069	0,112	0,116	0,167	0,169	0,097	0,487		
	5%	0,158	0,151	0,123	0,199	0,207	0,297	0,300	0,172	0,867		

** Significativo ao nível de 1%

* Significativo ao nível de 5%

TABELA 43 - Análise de variância do peso seco da raiz em gramas, das variedades selecionadas e cultivadas em soluções contendo 0 e 60 ppm de manganês nas parcelas e 0, 100 e 200 ppm de silício nas subparcelas.

Quadrados médios												
F.V.	G.L.	V ₁₆	V ₂₀	V ₂₆	V ₃₃	V ₁₇	V ₂₈	V ₃₄	V ₁₃	V ₂₂		
Bloco	3	0,000405	0,000681	0,000350	0,000840	0,000150	0,000494	0,001227	0,000267	0,000115		
ln	1	0,03266	0,000204	0,022266**	0,042504**	0,017066**	0,016016*	0,138016**	0,011676*	0,014504**		
Erro (a)	3	0,001322	0,000115	0,000077	0,000804	0,000200	0,000850	0,001650	0,000514	0,000070		
Si	2	0,010162**	0,012029**	0,002016*	0,043012**	0,006537**	0,021016**	0,053816**	0,008738**	0,003300**		
Si x ln	2	0,000904	0,000379	0,000066	0,028325**	0,010929**	0,014616**	0,001166**	0,003726*	0,002216*		
Si x ln ₀	2	-	-	-	0,006433**	0,005658**	0,035308**	0,078950**	0,005025**	0,013958**		
Si x ln ₆₀	2	-	-	-	0,004906*	0,011803**	0,000325	0,004975	0,003439*	0,003008**		
Erro (b)	12	0,000272	0,000215	0,000380	0,000793	0,000633	0,000305	0,001672	0,000768	0,000453		
$\bar{x}$		0,142	0,138	0,109	0,201	0,147	0,132	0,143	0,096	0,141		
C.V. Parc.	%	25,605	7,771	8,050	14,107	9,620	22,087	27,405	23,616	5,934		
C.V. Subpare.	%	11,614	10,625	17,084	14,010	17,115	13,230	28,594	28,867	15,250		
D.M.S _{ln}	1%	0,100	0,029	0,024	0,078	0,039	0,080	0,112	0,062	0,023		
	5%	0,323	0,095	0,078	0,252	0,126	0,259	0,361	0,201	0,074		
D.M.S _{Si}	1%	0,020	0,016	0,024	0,034	0,031	0,021	0,050	0,034	0,025		
	5%	0,034	0,031	0,041	0,059	0,053	0,036	0,086	0,058	0,045		
D.M.S _{Si x ln}	1%	0,032	0,028	0,038	0,054	0,049	0,034	0,079	0,054	0,042		
	5%	0,057	0,051	0,067	0,097	0,087	0,060	0,141	0,096	0,074		

** Significativo ao nível de 1%

* Significativo ao nível de 5%

TABELA 44 - Relação das equações de regressão dos dados de produção de matéria seca, parte aérea e raiz, das variedades selecionadas e submetidas aos tratamentos de silício na ausência de manganês.

Variedade	Equações de regressão	R ²	Si em ppm(x) para produção máxima(y)	Produção máxima(y)
V ₁₆	y = 0,563333 + 0,001825 Si	0,9346 **	-	-
V ₂₀	y = 1,148333 - 0,002450 Si	0,9766 **	-	-
V ₂₆	y = 1,165000 - 0,002525 Si	0,9133 **	-	-
V ₃₃	y = 1,409583 - 0,003512 Si	0,9743 **	-	-
V ₁₇	y = 1,317916 - 0,003662 Si	0,8609 **	-	-
V ₂₈	y = 0,515416 + 0,002187 Si	0,9549 **	-	-
V ₃₄	y = 0,747500 + 0,006337 Si - 0,000031 Si ²	0,6756 **	102,209	1,071
V ₁₃	y = 0,507500 + 0,005287 Si - 0,000024 Si ²	0,8479 **	110,146	0,798
V ₂₂	y = 1,172083 - 0,001762 Si	0,9080 **	-	-

** Significativo a 1%

TABELA 45 - Relação das equações de regressão dos dados de produção de matéria seca, parte aérea e raiz, das variedades selecionadas e submetidas aos tratamentos de silício na presença de 60 ppm de manganês.

Variedade	Equações de regressão	R ²	Si em ppm (x) para produção máxima(y)	Produção máxima(y)
V ₁₆	$y = 0,522500 + 0,005360 \text{ Si} - 0,000021 \text{ Si}^2$	0,9078 **	127,619	0,827
V ₂₀	$y = 0,595000 + 0,009437 \text{ Si} - 0,000052 \text{ Si}^2$	0,9795 **	90,740	1,023
V ₂₆	$y = 0,422500 + 0,006125 \text{ Si} - 0,000027 \text{ Si}^2$	0,9600 **	113,426	0,770
V ₃₃	$y = 0,620000 + 0,010175 \text{ Si} - 0,000043 \text{ Si}^2$	0,9463 **	118,314	1,222
V ₁₇	$y = 0,535000 + 0,011062 \text{ Si} - 0,000057 \text{ Si}^2$	0,9447 **	97,035	1,071
V ₂₈	$y = 0,437500 + 0,006512 \text{ Si} - 0,000030 \text{ Si}^2$	0,9572 **	108,533	0,791
V ₃₄	$y = 0,425000 + 0,008137 \text{ Si} - 0,000043 \text{ Si}^2$	0,9668 **	94,616	0,810
V ₁₃	$y = 0,350000 + 0,008750 \text{ Si} - 0,000040 \text{ Si}^2$	0,9388 **	109,375	0,828
V ₂₂	$y = 0,445000 + 0,018875 \text{ Si} - 0,000091 \text{ Si}^2$	0,9590 **	103,708	1,423

** Significativo a 1%

TABELA 46 - Teores médios de quatro repetições de manganês, silício, cobre, ferro, fósforo da parte aérea das variedades selecionadas em relação aos níveis de manganês e silício usados.

		ppm								%					
		Mn	Si	Cu	Fe	P	kg			Mn	Si	Cu	Fe	P	kg
Mn ₀ Si ₀ 0 : 0 ppm	V ₁₆	82	222	22	418	3,000	1,740	Mn ₁ Si ₀ 60 : 0 ppm	V ₁₆	152	193	11	257	1,350	1,620
	V ₂₀	96	222	16	331	2,090	1,520		V ₂₀	200	167	14	418	1,440	1,350
	V ₂₆	100	178	15	276	2,100	1,480		V ₂₆	302	167	14	506	1,340	1,030
	V ₃₃	129	211	17	324	2,660	1,740		V ₃₃	202	211	14	343	1,880	1,560
	V ₁₇	100	178	14	263	2,100	1,540		V ₁₇	273	211	14	235	1,900	1,530
	V ₂₈	115	222	20	443	2,350	1,640		V ₂₈	255	212	14	408	1,320	1,600
	V ₃₄	90	222	17	349	2,140	1,640		V ₃₄	164	215	11	437	1,330	1,350
	V ₁₃	84	222	19	388	3,090	1,620		V ₁₃	118	222	11	349	1,460	1,000
	V ₂₂	176	211	14	300	1,810	1,480		V ₂₂	200	220	14	343	1,750	1,040
	$\bar{x}$	108	210	17	344	2,371	1,600		$\bar{x}$	207	202	13	375	1,530	1,342
Mn ₀ Si ₁ 0 : 100 ppm	V ₁₆	50	289	22	206	2,080	1,460	Mn ₁ Si ₁ 60 : 100 ppm	V ₁₆	2040	444	14	263	2,200	1,540
	V ₂₀	69	378	17	343	2,280	1,660		V ₂₀	2040	307	12	212	1,490	1,700
	V ₂₆	62	387	18	316	2,650	1,700		V ₂₆	1780	436	12	212	2,330	1,720
	V ₃₃	69	400	15	257	2,620	1,720		V ₃₃	1460	422	10	165	1,960	1,740
	V ₁₇	64	289	15	312	2,310	1,640		V ₁₇	1560	440	13	337	1,960	1,650
	V ₂₈	56	378	21	182	1,690	1,500		V ₂₈	1640	427	12	212	1,930	1,510
	V ₃₄	60	422	16	224	1,690	1,400		V ₃₄	1780	436	14	206	1,410	1,430
	V ₁₃	78	355	19	257	1,800	1,600		V ₁₃	1500	378	11	337	1,620	1,650
	V ₂₂	66	302	15	263	2,060	1,740		V ₂₂	2100	342	13	369	1,870	1,790
	$\bar{x}$	66	356	17	262	2,131	1,602		$\bar{x}$	1820	404	12	257	1,863	1,636
Mn ₀ Si ₂ 0 : 200 ppm	V ₁₆	55	800	14	235	1,760	1,370	Mn ₁ Si ₂ 60 : 200 ppm	V ₁₆	2040	342	14	176	2,920	1,520
	V ₂₀	44	862	14	257	1,690	1,250		V ₂₀	2220	311	15	210	1,690	1,430
	V ₂₆	56	578	14	147	1,450	1,390		V ₂₆	2280	378	18	153	2,240	1,020
	V ₃₃	64	516	13	206	2,090	1,390		V ₃₃	1920	391	14	124	1,720	0,850
	V ₁₇	46	800	14	212	2,130	1,560		V ₁₇	2600	400	15	176	2,230	1,500
	V ₂₈	58	507	13	171	0,930	1,020		V ₂₈	1920	444	14	235	2,090	1,020
	V ₃₄	43	844	13	206	1,400	1,290		V ₃₄	1780	400	14	141	1,640	1,480
	V ₁₃	67	889	14	255	1,470	1,480		V ₁₃	1640	311	14	235	2,320	1,020
	V ₂₂	54	899	14	171	2,210	1,560		V ₂₂	2280	342	16	257	2,280	1,520
	$\bar{x}$	54	752	14	207	1,681	1,372		$\bar{x}$	2076	369	15	190	2,125	1,262

TABELA 47 - Resultados médios dos componentes de crescimento de quatro repetições das variedades selecionadas em relação aos tratamentos de boro: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros ; peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

Tratamento		H	CR	PSPA	PSR	PST
B ₀ 0 ppm	V ₁₆	21,750	20,250	0,765	0,105	0,870
	V ₂₀	21,500	20,500	0,905	0,135	1,040
	V ₂₆	31,750	17,250	0,667	0,097	0,765
	V ₃₃	27,500	23,500	0,882	0,117	1,000
	V ₁₇	31,000	26,000	1,142	0,115	1,257
	V ₂₈	22,250	18,250	0,557	0,065	0,622
	V ₃₄	17,500	13,250	0,462	0,040	0,500
	V ₁₃	12,750	10,250	0,517	0,075	0,592
	V ₂₂	31,500	14,000	0,957	0,097	1,055
	$\bar{x}$	24,166	18,138	0,761	0,094	0,855
B ₁ 0,5 ppm	V ₁₆	40,500	34,500	0,957	0,155	1,112
	V ₂₀	49,500	34,500	0,935	0,150	1,085
	V ₂₆	48,250	35,250	1,620	0,200	1,817
	V ₃₃	43,000	43,750	1,737	0,322	2,060
	V ₁₇	59,500	42,000	1,187	0,270	1,457
	V ₂₈	28,250	31,500	0,757	0,112	0,870
	V ₃₄	35,750	32,250	0,892	0,172	1,065
	V ₁₃	20,500	20,750	0,350	0,052	0,402
	V ₂₂	60,000	33,000	1,260	0,232	1,492
	$\bar{x}$	42,805	34,166	1,077	0,185	1,262
B ₂ 50 ppm	V ₁₆	15,000	13,750	0,227	0,042	0,270
	V ₂₀	12,250	15,250	0,145	0,010	0,155
	V ₂₆	14,500	15,000	0,135	0,027	0,162
	V ₃₃	13,500	16,000	0,200	0,060	0,260
	V ₁₇	15,000	15,000	0,130	0,017	0,147
	V ₂₈	11,500	13,250	0,097	0,012	0,110
	V ₃₄	13,250	9,500	0,112	0,015	0,127
	V ₁₃	12,750	11,250	0,122	0,018	0,140
	V ₂₂	13,000	14,000	0,157	0,015	0,172
	$\bar{x}$	13,416	13,666	0,147	0,023	0,171

TABELA 48 - Análise de variância dos componentes de crescimento das variedades selecionadas, em relação aos tratamentos de boro: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros ; peso seco da parte aérea (PSPA) , peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

Quadrados médios						
F.V.	G.L.	H	CR	PSPA	PSR	PST
Bloco	3	5,432098	1,762345	0,003660	0,000044	0,004954
Boro(B)	2	7854,342593 **	4330,287037**	8,052103**	0,235719 **	10,890449 **
Variedade(V)	8	513,738426 **	212,391203**	0,475522**	0,015874 **	0,652950 **
B x V	16	177,540509 **	39,526620**	0,239284**	0,007789 **	0,311566 **
V x B ₀	8	180,250000 **	102,319444**	0,209104 **	0,003468 **	0,257281 **
V x B _{0,5}	8	662,631944 **	171,625000**	0,737949 **	0,026852 **	1,006215 **
V x B ₅₀	8	5,937500	17,500000**	0,007037	0,001131 **	0,012587 **
B x V ₁₆	2	698,250000 **	450,563333**	0,572574 **	0,012708 **	0,752408 **
B x V ₂₀	2	1504,750000 **	396,083333**	0,801733 **	0,023633 **	1,100099 **
B x V ₂₆	2	1135,250000 **	492,750000**	2,264024 *	0,030108 **	2,806524 **
B x V ₃₃	2	871,000000 **	824,250000**	2,373624 **	0,076158 **	3,274132 **
B x V ₁₇	2	1889,333333 **	737,333333**	1,430324 **	0,064858 **	1,942633 **
B x V ₂₈	2	288,083333 **	355,750000**	0,458133 **	0,010008 **	0,601008 **
B x V ₃₄	2	571,583333 **	774,083333**	0,510533 **	0,028650 **	0,891258 **
B x V ₁₃	2	80,083333 **	134,333333**	0,157224 **	0,003674 **	0,206508 **
B x V ₂₂	2	2242,333333 **	481,333333**	1,298008 **	0,048224 **	1,808408 **
Erro	78	3,092355	2,570037	0,004184	0,000175	0,004437
$\bar{x}$		26,740	22,101	0,662	0,101	0,762
C.V. %		6,580	7,250	9,770	13,090	8,740
D.M.S _B	1%	1,248	1,138	0,045	0,009	0,047
	5%	0,993	0,905	0,035	0,007	0,037
D.M.S _V	1%	2,700	2,461	0,099	0,020	0,102
	5%	2,299	2,096	0,084	0,017	0,087
D.M.S _{B x V}	1%	3,745	3,414	0,137	0,028	0,141
	5%	2,980	2,716	0,109	0,022	0,112
D.M.S _{V x B}	1%	4,677	4,263	0,171	0,035	0,177
	5%	3,982	3,630	0,146	0,030	0,150

** Significativo ao nível de 1%

TABELA 49 - Relação das equações de regressão dos dados de produção de matéria seca, parte aérea e raiz, das variedades selecionadas e submetidas aos tratamentos de boro.

Variedade	Equações de regressão	R ²	B em ppm (x) para produção máxima(y)	Produção máxima(y)
V ₁₆	$y = 0,869999 + 0,490020 B - 0,010040 B^2$	0,9886 **	24,403	6,849
V ₂₀	$y = 1,066922 - 0,018233 B$	0,9812 **	-	-
V ₂₆	$y = 0,764999 + 2,126383 B - 0,042768 B^2$	0,9856 **	24,859	27,195
V ₃₃	$y = 0,999999 + 2,141563 B - 0,043127 B^2$	0,9893 **	24,828	27,586
V ₁₇	$y = 1,350540 - 0,024042 B$	0,9642 **	-	-
V ₂₈	$y = 0,622499 + 0,500103 B - 0,010207 B^2$	0,9907 **	24,490	5,631
V ₃₄	$y = 0,499999 + 1,141489 B - 0,022978 B^2$	0,9903 **	24,838	14,676
V ₁₃	$y = 0,499771 - 0,007214 B$	0,8091 **	-	-
V ₂₂	$y = 1,045995 + 0,920375 B - 0,018756 B^2$	0,9867 **	24,435	12,336

** Significativo a 1%

TABELA 50 - Teores médios de quatro repetições de fósforo, cálcio, magnésio, potássio, boro e ferro da parte aérea das variedades selecionadas, em relação aos níveis de boro usados.

		%				ppm	
Tratamentos		P	Ca	Mg	K	B	Fe
B ₀ 0 ppm	V ₁₆	1,880	1,330	1,080	0,660	92	18
	V ₂₀	2,010	2,100	1,030	1,070	92	42
	V ₂₆	1,840	2,000	0,700	1,160	88	32
	V ₃₃	1,970	2,390	0,800	1,200	72	51
	V ₁₇	1,890	2,340	1,150	1,070	100	24
	V ₂₈	1,910	1,970	0,750	0,900	92	26
	V ₃₄	1,880	1,980	0,750	0,910	100	25
	V ₁₃	1,860	1,130	1,070	0,790	84	28
	V ₂₂	1,860	1,780	1,050	0,810	56	38
	$\bar{x}$	1,900	1,891	0,931	0,952	86	32
B ₁ 0,5 ppm	V ₁₆	2,660	2,360	0,950	1,030	136	235
	V ₂₀	2,140	2,160	1,380	1,350	124	224
	V ₂₆	2,010	1,980	1,140	1,350	100	176
	V ₃₃	2,160	2,100	1,330	1,300	100	194
	V ₁₇	2,160	2,700	1,300	1,090	110	235
	V ₂₈	2,140	2,160	1,200	1,230	110	260
	V ₃₄	2,270	1,560	1,250	1,060	110	153
	V ₁₃	2,010	1,440	0,940	0,940	100	400
	V ₂₂	1,870	2,130	1,260	0,970	84	194
	$\bar{x}$	2,160	2,065	1,194	1,147	108	230
B ₂ 50 ppm	V ₁₆	3,500	1,360	2,110	0,840	400	1140
	V ₂₀	3,210	1,290	2,220	1,000	400	1335
	V ₂₆	3,250	1,190	2,200	0,970	352	1390
	V ₃₃	3,010	1,320	2,100	1,100	400	945
	V ₁₇	3,070	1,020	2,020	0,800	400	1025
	V ₂₈	3,260	1,280	1,890	0,850	400	926
	V ₃₄	3,240	1,170	2,040	0,920	400	876
	V ₁₃	3,070	0,850	1,670	0,860	352	1250
	V ₂₂	3,520	1,130	2,120	0,930	400	890
	$\bar{x}$	3,237	1,179	2,041	0,919	289	1086

TABELA 51 - Resultados médios dos componentes de crescimento de quatro repetições das variedades selecionadas em relação aos tratamentos de molibdênio: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros ; peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

Tratamento		H	CR	PSPA	PSR	PST
Mo 0 ppm	V ₁₆	38,250	37,750	0,410	0,080	0,450
	V ₂₀	51,000	37,250	0,602	0,117	0,720
	V ₂₆	57,000	44,250	1,077	0,197	1,275
	V ₃₃	51,000	39,500	0,750	0,250	1,000
	V ₁₇	52,500	50,750	0,765	0,232	0,997
	V ₂₈	34,750	36,500	0,542	0,110	0,652
	V ₃₄	33,500	38,500	0,460	0,105	0,565
	V ₁₃	16,500	25,250	0,455	0,050	0,505
	V ₂₂	59,000	33,250	0,622	0,085	0,707
	$\bar{x}$	43,722	38,111	0,631	0,136	0,767
Mo ₁ 0,01 ppm	V ₁₆	42,000	38,000	0,712	0,180	0,892
	V ₂₀	54,500	43,250	0,747	0,185	0,932
	V ₂₆	47,000	45,500	1,227	0,222	1,450
	V ₃₃	43,750	44,250	1,292	0,357	1,647
	V ₁₇	66,000	56,250	1,085	0,255	1,340
	V ₂₈	30,250	41,000	0,780	0,120	0,900
	V ₃₄	29,500	39,250	0,550	0,165	0,715
	V ₁₃	18,750	25,500	0,720	0,132	0,852
	V ₂₂	56,750	30,000	1,180	0,182	1,362
	$\bar{x}$	43,166	40,333	0,921	0,199	1,121
Mo ₂ 1 ppm	V ₁₆	44,500	42,000	0,490	0,150	0,640
	V ₂₀	53,500	47,750	0,670	0,135	0,805
	V ₂₆	57,250	49,000	1,120	0,195	1,315
	V ₃₃	45,750	47,250	0,905	0,287	1,192
	V ₁₇	59,750	39,500	0,985	0,172	1,157
	V ₂₈	36,000	42,000	0,542	0,100	0,642
	V ₃₄	39,500	41,500	0,470	0,130	0,597
	V ₁₃	27,750	32,000	0,462	0,052	0,515
	V ₂₂	66,250	55,000	0,337	0,035	0,372
	$\bar{x}$	47,805	44,000	0,664	0,139	0,803

TABELA 52 - Análise de variância dos componentes de crescimento das variedades selecionadas, em relação aos tratamentos de molibdênio: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros; peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

Quadrados médios						
F.V.	G.L.	H	CR	PSPA	PSR	PST
Bloco	3	10,774679	2,222220	0,003324	0,000043	0,003092
Molibdênio(Mo)	2	231,009216 **	318,370354 **	0,607781 **	0,046145 **	1,360670 **
Variedade(V)	8	2145,890837 **	430,932851 **	0,632921 **	0,056308 **	0,987877 **
Mo x V	16	71,905059 **	129,255757 **	0,071351 **	0,003094 **	0,000585 **
V x Mo ₀	2	774,434015 **	196,006943 **	0,173762 **	0,026006 **	0,285254 **
V x Mo _{0,01}	2	900,249839 **	318,874933 **	0,302377 **	0,020724 **	0,432619 **
V x Mo ₁	2	615,110963 **	174,562409 **	0,299464 **	0,023171 **	0,451174 **
Mo x V ₁₆	2	39,583333 **	22,750000 *	0,098274 **	0,010533 **	0,165508 **
Mo x V ₂₀	2	13,000007	111,000025 **	0,021058 **	0,004500 **	0,048758 **
Mo x V ₂₆	2	135,749882 **	24,243998 **	0,023900 **	0,000925	0,033633 **
Mo x V ₃₃	2	56,083340 **	61,063325 **	0,319374 **	0,011508 **	0,442224 **
Mo x V ₁₇	2	162,583205 **	291,583184 **	0,107260 **	0,007274 **	0,117474 **
Mo x V ₂₈	2	36,583341 **	34,333333 **	0,075208 **	0,000400	0,085108 **
Mo x V ₃₄	2	101,333322 **	0,750000	0,009733	0,003633 **	0,024508 **
Mo x V ₁₃	2	141,749974 **	58,563317 **	0,079274 **	0,008808 **	0,156508 **
Mo x V ₂₂	2	98,583261 **	739,083225 **	0,734558 **	0,022508 **	0,101423 **
Erro	78	7,075967	5,863246	0,005373	0,000413	0,005479
$\bar{x}$		44,900	40,810	0,738	0,153	0,897
C.V. %		5,920	5,930	9,930	12,810	8,240
D.M.S. _{Mo}	1%	1,897	1,716	0,052	0,014	0,052
	5%	1,509	1,366	0,041	0,011	0,041
D.M.S. _V	1%	4,099	3,723	0,112	0,031	0,113
	5%	3,490	3,170	0,095	0,026	0,096
D.M.S. _{Mo x V}	1%	5,662	5,150	0,156	0,043	0,157
	5%	4,505	4,098	0,124	0,034	0,125
D.M.S. _{V x Mo}	1%	7,071	6,431	0,194	0,054	0,196
	5%	6,021	5,476	0,165	0,046	0,167

**Significativo ao nível de 1%

* Significativo ao nível de 5%

TABELA 53 - Relação das equações de regressão dos dados de produção de matéria seca, parte aérea e raiz, das variedades selecionadas e submetidas aos tratamentos de molibdênio.

Variedade	Equações de regressão	R ²	Mo em ppm (x) para produção máxima(y)	Produção máxima(y)
V ₁₆	y = 0,490000 + 40,655050 Mo - 40,505050 Mo ²	0,8958 **	0,502	10,691
V ₂₀	y = 0,720000 + 21,463788 Mo - 21,378788 Mo ²	0,6171 **	0,502	6,107
V ₂₆	-	-	-	-
V ₃₃	y = 1,017500 + 63,634596 Mo - 63,459596 Mo ²	0,9374 **	0,501	15,928
V ₁₇	y = 0,997500 + 34,594343 Mo - 34,434343 Mo ²	0,8660 **	0,502	9,686
V ₂₈	y = 0,652500 + 25,000101 Mo - 25,010101 Mo ²	0,8739 **	0,499	6,900
V ₃₄	y = 0,565000 + 15,151187 Mo - 15,118687 Mo ²	0,8181 **	0,501	4,361
V ₁₃	y = 0,505000 + 35,100909 Mo - 35,090909 Mo ²	0,9482 **	0,500	9,282
V ₂₂	y = 0,707500 + 66,165000 Mo - 66,500000 Mo ²	0,9775 **	0,497	17,165

** Significativo a 1%

TABELA 54 - Teores médios de quatro repetições de fósforo, cálcio, magnésio, molibdênio, cobre e ferro da parte aérea das variedades selecionadas, em relação aos níveis de molibdênio usados.

Tratamentos		%			ppm		
		P	Ca	Mg	Mo	Cu	Fe
Mo ₀	V ₁₆	3,690	3,040	1,560	0,530	14	442
	V ₂₀	1,280	1,480	0,880	0,300	9	330
	V ₂₆	2,250	2,520	1,360	0,180	18	258
	V ₃₃	2,320	2,100	1,440	0,170	14	300
	V ₁₇	2,740	3,410	1,640	0,200	15	382
	V ₂₈	1,930	2,470	1,400	0,250	13	247
	V ₃₄	2,130	2,550	1,320	0,230	13	217
	V ₁₃	2,820	2,140	1,600	0,200	14	613
	V ₂₂	2,100	2,370	1,400	0,270	18	218
	$\bar{x}$	2,362	2,453	1,400	0,259	14	334
Mo ₁	V ₁₆	3,010	2,820	1,600	6,600	15	294
	V ₂₀	2,230	2,520	1,460	6,530	14	370
	V ₂₆	2,630	2,990	1,440	4,270	12	264
	V ₃₃	2,610	2,710	1,480	5,870	12	258
	V ₁₇	2,410	3,110	1,680	5,530	14	264
	V ₂₈	2,290	2,790	1,440	6,330	16	282
	V ₃₄	2,650	3,080	1,640	6,600	15	300
	V ₁₃	3,520	2,430	1,800	5,200	15	469
	V ₂₂	2,130	2,530	1,560	5,800	15	258
	$\bar{x}$	2,609	2,775	1,567	5,858	14	307
Mo ₂	V ₁₆	2,950	2,800	1,460	8,540	12	276
	V ₂₀	2,290	2,500	1,600	7,600	12	294
	V ₂₆	2,200	2,530	1,520	10,940	11	258
	V ₃₃	2,710	2,650	1,440	11,340	11	189
	V ₁₇	2,410	3,010	1,730	9,470	14	330
	V ₂₈	2,630	2,050	1,760	7,730	12	270
	V ₃₄	2,590	2,870	1,720	8,530	14	300
	V ₁₃	2,890	2,120	1,840	6,930	14	312
	V ₂₂	2,290	2,490	1,720	11,340	14	276
	$\bar{x}$	2,551	2,558	1,643	9,158	13	278

TABELA 55 - Resultados médios dos componentes de crescimento de quatro repetições das variedades selecionadas em relação aos tratamentos de zinco: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros; peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

Tratamento		H	CR	PSPA	PSR	PST
Zn ₀ 0 ppm	V ₁₆	35,000	33,500	0,642	0,112	0,755
	V ₂₀	43,250	33,750	0,785	0,147	0,932
	V ₂₆	40,250	35,500	1,145	0,182	1,327
	V ₃₃	43,250	44,750	1,305	0,272	1,577
	V ₁₇	47,750	49,750	0,947	0,157	1,105
	V ₂₈	29,250	36,250	0,505	0,090	0,595
	V ₃₄	29,250	38,500	0,722	0,170	0,892
	V ₁₃	17,750	24,750	0,437	0,050	0,487
	V ₂₂	45,000	38,250	0,785	0,110	0,895
	$\bar{x}$	37,194	37,222	0,808	0,143	0,951
Zn ₁ 0,05 ppm	V ₁₆	40,000	38,750	0,832	0,172	1,005
	V ₂₀	48,250	40,000	1,240	0,172	1,412
	V ₂₆	43,500	45,500	1,482	0,192	1,675
	V ₃₃	49,000	46,000	1,630	0,407	2,037
	V ₁₇	54,500	52,000	1,287	0,222	1,510
	V ₂₈	31,000	38,000	0,665	0,102	0,767
	V ₃₄	34,000	38,500	0,942	0,252	1,195
	V ₁₃	22,750	27,500	0,495	0,087	0,582
	V ₂₂	60,000	42,500	1,660	0,175	1,835
	$\bar{x}$	42,555	40,972	1,137	0,197	1,335
Zn ₂ 5 ppm	V ₁₆	19,250	28,000	0,620	0,160	0,780
	V ₂₀	12,250	33,500	0,407	0,135	0,542
	V ₂₆	15,250	24,500	0,260	0,075	0,335
	V ₃₃	15,000	25,500	0,560	0,147	0,707
	V ₁₇	16,750	25,500	0,592	0,092	0,685
	V ₂₈	14,000	25,750	0,212	0,047	0,260
	V ₃₄	15,250	28,500	0,400	0,107	0,507
	V ₁₃	15,750	27,000	0,417	0,085	0,502
	V ₂₂	16,750	27,750	0,542	0,127	0,670
	$\bar{x}$	15,583	27,333	0,445	0,108	0,554

TABELA 56 - Análise de variância dos componentes de crescimento das variedades selecionadas, em relação aos tratamentos de zinco: altura da planta (H) e comprimento da raiz (CR) em centímetros ; peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSR) e peso seco total (PST) em gramas.

Quadrados médios						
F.V.	G.L.	H	CR	PSPA	PSR	PST
Bloco	3	1,839509	7,070989	0,012440	0,000595	0,013951
Zinco(Zn)	2	7307,342128**	1757,231510**	4,305335**	0,075070**	5,491581**
Variedade(V)	8	663,377283**	224,592598**	0,716170**	0,041114**	1,026711**
Zn x V	16	163,300916**	95,481474**	0,202467**	0,007933**	0,257404**
V x Zn ₀	8	421,298609**	200,840270**	0,319965**	0,016381**	0,462948**
V x Zn _{0,05}	8	563,673552**	185,027786**	0,717352**	0,035156**	0,956273**
V x Zn ₅	8	15,006944*	28,667491**	0,063787**	0,005444**	0,122298**
Zn x V ₁₆	2	469,083295**	115,583353**	0,054508**	0,004808**	0,075833**
Zn x V ₂₀	2	1521,333295**	54,250000**	0,695058**	0,001458**	0,759599**
Zn x V ₂₆	2	555,749956**	441,333320**	1,594424**	0,016974**	1,940799**
Zn x V ₃₃	2	1283,583282**	525,250001**	1,200533**	0,067633**	1,814533**
Zn x V ₁₇	2	1621,083249**	663,583281**	0,483099**	0,016900**	0,680699**
Zn x V ₂₃	2	349,749954**	175,583331**	0,210508**	0,003324**	0,266358**
Zn x V ₃₄	2	380,083294**	133,333337**	0,297808**	0,021158**	0,474924**
Zn x V ₁₃	2	52,000000**	8,583321	0,006474	0,001758**	0,010433**
Zn x V ₂₂	2	2021,083109**	230,583358**	1,382158**	0,004525**	1,527633**
Erro	78	4,018938	4,122267	0,006200	0,000321	0,006942
$\bar{x}$		31,600	35,180	0,796	0,150	0,946
C.V. %		6,300	5,770	9,880	11,920	8,800
D.M.S. _{Zn}	1%	1,415	1,445	0,056	0,012	0,059
	5%	1,126	1,150	0,044	0,010	0,046
D.M.S. _V	1%	3,084	3,121	0,120	0,027	0,127
	5%	2,626	2,658	0,102	0,023	0,108
D.M.S. _{Zn x V}	1%	4,276	4,337	0,167	0,038	0,177
	5%	3,403	3,451	0,133	0,030	0,141
D.M.S. _{V x Zn}	1%	5,340	5,416	0,209	0,047	0,221
	5%	4,547	4,611	0,176	0,040	0,188

** Significativo ao nível de 1%

* Significativo ao nível de 5%

TABELA 57 - Relação das equações de regressão dos dados de produção de matéria seca, parte aérea e raiz, das variedades selecionadas e submetidas aos tratamentos de zinco.

Variedade	Equações de regressão	R ²	Zn em ppm (x) para produção máxima(y)	Produção máxima(y)
V ₁₆	y = 0,754999 + 5,050454 Zn - 1,009090 Zn ²	0,9278 **	2,502	7,040
V ₂₀	y = 0,932499 + 9,697979 Zn - 1,959605 Zn ²	0,8987 **	2,474	12,931
V ₂₆	y = 1,334999 + 6,870706 Zn - 1,414141 Zn ²	0,9785 **	2,429	9,680
V ₃₃	y = 1,557499 + 9,698686 Zn - 1,973737 Zn ²	0,9449 **	2,456	13,472
V ₁₇	y = 1,104999 + 8,182666 Zn - 1,653333 Zn ²	0,9268 **	2,474	11,229
V ₂₈	y = 0,594999 + 3,485524 Zn - 0,710504 Zn ²	0,9659 **	2,452	4,869
V ₃₄	y = 0,892499 + 6,111888 Zn - 1,237777 Zn ²	0,9723 **	2,468	8,437
V ₁₃	y = 0,487499 + 1,919161 Zn - 0,383232 Zn ²	0,6798 **	2,503	4,332
V ₂₂	y = 0,894999 + 18,990351 Zn - 3,807070 Zn ²	0,9721 **	2,494	24,577

* Significativo a 1%

TABELA 58 - Teores médios de quatro repetições de fósforo, cálcio, magnésio, potássio, zinco, boro, cobre e ferro da parte aérea das variedades selecionadas, em relação aos níveis de zinco usados.

Tratamentos		%				ppm			
		P	Ca	Mg	K	Zn	B	Cu	Fe
Zn ₀	V ₁₆	3,750	2,590	1,620	1,190	20	20	8	240
	V ₂₀	2,300	2,100	1,370	1,240	36	36	8	183
	V ₂₆	2,630	2,450	1,480	1,530	28	28	8	177
	V ₃₃	2,390	2,150	1,460	1,210	42	55	8	294
	V ₁₇	2,930	2,880	1,620	1,060	28	28	9	270
	V ₂₈	2,200	1,980	1,380	1,140	24	24	7	258
	V ₃₄	2,710	2,380	1,420	1,250	24	24	8	142
	V ₁₃	2,800	1,890	1,580	1,220	22	22	8	330
	V ₂₂	2,180	2,140	1,500	1,250	28	27	6	206
	$\bar{x}$	2,654	2,284	1,492	1,232	28	29	8	233
Zn ₁	V ₁₆	1,850	1,660	0,960	0,760	40	20	8	276
	V ₂₀	2,320	2,630	1,740	1,320	46	46	9	294
	V ₂₆	2,700	2,950	1,640	1,220	34	34	9	258
	V ₃₃	2,740	2,910	1,720	1,380	55	71	9	288
	V ₁₇	2,200	2,770	1,680	1,300	42	42	10	330
	V ₂₈	2,100	2,150	1,540	1,360	34	34	8	270
	V ₃₄	2,270	2,650	1,520	1,320	42	42	9	211
	V ₁₃	3,400	1,890	1,620	1,140	34	24	10	312
	V ₂₂	2,210	2,380	1,600	0,970	54	28	8	276
	$\bar{x}$	2,421	2,443	1,558	1,196	42	37	9	279
Zn ₂	V ₁₆	1,800	1,460	0,910	0,730	660	66	17	126
	V ₂₀	2,220	2,520	1,510	0,870	760	176	18	270
	V ₂₆	1,800	2,130	1,370	1,190	760	176	18	171
	V ₃₃	2,100	2,880	1,660	1,060	420	142	20	189
	V ₁₇	0,950	1,420	0,780	0,590	600	60	18	194
	V ₂₈	2,090	1,970	1,420	0,730	550	110	11	166
	V ₃₄	1,870	2,390	1,540	0,950	520	152	11	200
	V ₁₃	2,350	1,600	1,400	1,080	460	46	19	228
	V ₂₂	1,370	1,540	0,910	0,860	520	104	17	132
	$\bar{x}$	1,838	1,990	1,278	0,890	528	115	17	186