ERRATA

TERRA, F.S. **Espectroscopia de reflectância do visível ao infravermelho médio aplicada aos estudos qualitativos e quantitativos de solo**. Piracicaba, 2011. 374p. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se
49	23 a 26	Sendo removida a matéria orgânica (H ₂ O ₂ a 30 %), cada amostra da fração argila foi dividida em duas subamostras, sendo uma tratada com ditionito-citrato-bicarbonato (DCB) de sódio para a remoção dos óxidos de ferro e outra tratada com NaOH 5 mol L ⁻¹ (a quente) para a remoção dos silicatos e gibsita visando a concentração dos óxidos.	Sendo removida a matéria orgânica (H ₂ O ₂ a 30 %), as amostras da fração argila foram tratadas com ditionito-citrato-bicarbonato (DCB) de sódio para a remoção dos óxidos de ferro.
181	25	- Item inserido	Como aspectos negativos da aplicação da espectroscopia de reflectância nas avaliações de solos destacam-se, principalmente, a necessidade constante de incrementar a base de dados espectrais, para aplicação em áreas diferentes das quais os espectros foram adquiridos; e a falta de padronização no que se refere à obtenção das leituras, com relação à geometria de aquisição dos dados e equipamentos utilizados.