ESTRUTURA E MANEJO DE UMA FLORESTA DE VÁRZEA DO
ESTUÁRIO AMAZÔNICO

DOMINGOS SÁVIO MOREIRA DOS SANTOS MACEDO
Engenheiro Florestal

Orientador: Prof. Dr. Virgílio Mauricio Viana

Dissertação apresentada à Escola
Superior de Agricultura " Luiz
de Queiroz ", da Universidade de
São Paulo, para obtenção de
título de Mestre em Ciências -
Área de Concentração : Ciências
Florestais.

P I R A C I C A B A
Estado de São Paulo - Brasil
Março - 1996

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - Campus "Luiz de Queiroz"/USP

Macedo, Domingos Sávio Moreira dos Santos

Estrutura e manejo de uma floresta de várzea do estuário amzônico / Domingos Sávio
Moreira dos Santos Macedo. - - Piracicaba, 1996.

117 p. : il.

Dissertação (mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1996.
Bibliografia.

1. Ecossistema florestal 2. Floresta - Manejo I. Título

CDD 634.9

**ESTRUTURA E MANEJO DE UMA FLORESTA DE VÁRZEA DO
ESTUÁRIO AMAZÔNICO**

DOMINGOS SÁVIO MOREIRA DOS SANTOS MACEDO

Aprovada em: 05.09.96

Comissão julgadora:

**Prof. Dr. Virgílio M. Viana
Dr. Anthony B. Anderson
Dr. Garo Batmanian**

**ESALQ/USP
Banco Mundial
WWF - Brasil**

**Prof. Dr. VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA
Orientador**

À memória de
Élio Moreira dos Santos Pena,
um pioneiro...

Agradecimentos

A realização deste trabalho contou com o apoio institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi, Departamento de Botânica, em Belém-PA e Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, Piracicaba-SP. Foram obtidos junto ao World Wildlife Fund-US financiamentos para a condução das viagens de campo, análise dos dados e material de consumo (grants #9569 e #OA48). Foram recebidas bolsas de estudo pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (proc. #92/1559-3) e CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

O local para a realização deste estudo foi cedido pelas Industrias TREVO da Amazônia com sede em Belém-PA.

O apoio das comunidades vizinhas localizadas no furo do Cacau, no município de Gurupá-PA, foi de grande importância no sentido de busca de informações e seleção das melhores áreas para a execução dos trabalhos de campo. Gostaria de expressar o meu agradecimento à família de Coarací Nunes que durante todo o período da minha ausência em campo a 3.500 km de distância, foi o responsável pela manutenção do experimento, e que soube como ninguém entender qual a verdadeira finalidade do trabalho e que considero neste momento uma pessoa perfeitamente capacitada para a difusão das técnicas de manejo empregadas neste trabalho. Aos demais parceiros de trabalho de campo, especialmente "Tia Velha" e "Paxiúba" também estendo os agradecimentos.

Me considero como uma pessoa de muita sorte na minha carreira profissional por ter sido orientado por pesquisadores de extrema capacidade de trabalho e visão científica, e talvez de mais sorte ainda por tê-los como grandes amigos que são os Drs. Anthony B. Anderson e Virgílio M. Viana.

Me dedico já sete anos de pesquisas na Amazônia, e devo a este grande prazer aos meus queridos amigos Anna Fanzeres e Igor Mousastichvily Jr.

Aos colegas de curso, professores e funcionários da universidade que me apoiaram na realização do trabalho, especialmente Edson Higashi, Nadja Lepsch, André Dias e Vitor.

À minha família, que à distância, sempre torceu para o sucesso do meu trabalho na Amazônia.

À minha querida Laurinha por toda sua dedicação e paciência durante as fases da sua e da minha dissertação.

ÍNDICE

	página
LISTA DE FIGURAS	x
LISTA DE TABELAS	xiii
RESUMO	xiv
SUMMARY	xvi

Capítulo I

**Estrutura e funcionamento de uma floresta de várzea
do estuário amazônico**

1. Introdução	1
2. O local de estudo	3
3. Fatores que afetam a estrutura e funcionamento das florestas de várzea do estuário	5
3.1. As florestas de várzea e os períodos de inundação ...	5
3.2. Estrutura física e química dos solos das várzeas	6
3.3. A luz e os processos regenerativos nas florestas	8
4. Objetivos da pesquisa	9
5. Material e métodos	9
5.1. Solo	9
5.2. Monitoramento do lençol freático	10
5.3. Maregramas	10
5.4. Caracterização de regime de luz	11
6. Resultados e discussão	11
6.1. Estrutura física e química do solo	11
6.2. Lençol freático: Oscilações entre períodos de menor e maior drenagem do solo	12
6.3. O regime das marés: As diferenças entre as épocas de inundação para inverno e verão	15
6.4. O regime de luz em uma floresta de várzea	16
7. Conclusão	18
8. Bibliografia	19

Capítulo II

Plantio de enriquecimento de *Virola surinamensis* (Rol.) Warb. numa floresta de várzea sob diferentes intensidades de luz situações topográficas

1. Introdução	23
1.1. O Problema	23
1.1.1. Baixa produtividade em função das técnicas de manejo utilizadas	24
1.1.2. Aspectos legais e operacionais	25
1.2. Hipóteses	25
1.2.1. Luminosidade	25
1.2.2. Drenagem	25
1.3. Predições	28
1.4. Objetivos	29
2. Material e métodos	29
2.1. O local de estudo	29
2.2. Intensidades de exploração: Tratamentos de abertura das copas	29
2.3. O sistema de enriquecimento	31
2.4. Medições: Classes de porcentagens de luz	33
2.5. Levantamento topográfico	34
3. Resultados e discussão	34
3.1. Crescimento	34
3.1.1. Em diferentes regimes de luz	34
3.1.2. Em diferentes situações topográficas	38
3.1.3. Interação: Luz x Topografia	39
3.2. Sobrevivência	40
3.2.1. Em diferentes regimes de luz	40
3.2.2. Em diferentes situações topográficas	42
3.2.3. Interação: Luz x Topografia	42
4. Conclusão	43
5. Bibliografia	45

Capítulo III

Comportamento inicial da regeneração natural numa floresta de várzea sob diferentes intensidades de exploração

1. Introdução	48
1.1. Regeneração e sucessão	48
1.2. O problema	49
1.2.1. A exploração seletiva: Técnica não sustentável ..	49
1.3. Hipóteses e predições	50
1.4. Objetivos	51
2. Material e métodos	51
2.1. O local de estudo	51
2.2. Intensidades de exploração: Tratamentos	51
2.3. Amostragem	52
2.4. Identificação das espécies	53
2.5. Estrutura da regeneração	54
3. Resultados e discussão	55
3.1. Relação entre o número de espécies e o número de parcelas	55
3.2. Estrutura da regeneração	56
3.2.1. Composição florística	56
3.2.2. Grupos de espécies: padrões de recrutamento em função da abundância e frequência relativas	59
3.2.3. Índices de diversidade	62
3.3. Influência das intensidades de exploração na composição das espécies	64
3.3.1. Baixa intensidade de corte	64
3.3.2. Média intensidade de corte	65
3.3.3. Alta intensidade de corte	65
4. Conclusão	69
5. Bibliografia	72
Anexo	76

Capítulo IV

Estudo do Impacto de diferentes intensidades de exploração numa floresta de várzea do estuário amazônico

1. Introdução	80
1.2. O problema do manejo em florestas tropicais	80
1.3. Hipóteses e predições	81
1.4. Objetivos	82
2. Material e métodos	82
2.1. O local de estudo	82
2.2. Amostragem	82
2.2.1. Tamanho e forma da amostragem	82
2.2.2. Relação entre o número de espécies e o número de parcelas	83
2.3. Inventário: Coleta e identificação das espécies	84
2.4. Tratos silviculturais	84
2.4.1. Seleção e marcação das árvores	84
2.4.2. Espécies selecionadas	84
2.4.3. Exploração	86
2.4.4. Tratamentos	86
2.5. Estrutura da floresta	87
2.5.1. Composição florística	87
2.5.2. Índices de diversidade	87
2.5.3. Perfis idealizados	87
2.6. Avaliação econômica	87
3. Resultados e discussão	88
3.1. Inventário	88
3.1.1. Amostragem	88
3.1.2. Estrutura da floresta	90
3.1.3. Diversidade de espécies em florestas de várzea amazônica: futuras fontes de comparação	91
3.2. Tratos silviculturais	94
3.2.1. Exploração	94
3.2.1.1. Distribuição diamétrica	94
3.1.2.2. Área basal	96
3.1.2.3. Volume	96
3.3. Danos em função da exploração	97
3.4. Levantamento dos custos dos tratamentos	108
4. Conclusão	110
5. Bibliografia	111
Anexo	115

LISTA DE FIGURAS

Capítulo I

	página
Figura 1: Localização da área de estudo em relação à região do estuário amazônico.....	4
Figura 2-A: Representação do transecto 1 (200m ao longo da floresta) em relação às características físicas e químicas do solo e oscilação do nível do lençol freático (médias anuais).	14
Figura 2-B: Representação do transecto 2 (200m ao longo da floresta) em relação às características físicas e químicas do solo e oscilação do nível do lençol freático (médias anuais).	15
Figura 3: Série temporal da oscilação do nível da maré de 1982 a 1988 coletadas pela CIA DOCAS do Pará e fornecidos pelo Projeto "Programa Estuário", Depto. de Botânica, Museu Goeldi, Belém-PA	18

Capítulo II

	página
Figura 1 : Comparação do desempenho de virola aos 8 e 10 anos, sob sombra, manejada à pleno sol em relação aos incrementos de (A) diâmetro, (B) altura e o volume por ha.....	26
Figura 2: Representação idealizada da predição quanto ao crescimento da virola a uma maior ou menor incidência de luz. O ponto intermediário representa o crescimento ótimo	27
Figura 3: Representação idealizada da predição do crescimento da virola em função de cada local. O ponto de maior crescimento representa a drenagem ótima para a espécie. ...	28
Figura 4: Distribuição das parcelas na área de estudo.....	30
Figura 5: Níveis de luminosidade para os diferentes tratamentos (%)	35
Figura 6: Altura(m) das mudas por tratamento, por classes de luz (média e desvio).....	37
Figura 7: Altura (m) das 100 maiores mudas por tratamento (média e desvio).....	37
Figura 8: Número de mudas com incremento por tratamento.....	38
Figura 9: Representação do nível topográfico estabelecido para todas as parcelas.....	38
Figura 10: Altura(m) das mudas em função da interação entre luz e topografia.....	40
Figura 11: Mortalidade de mudas por tratamento.....	41
Figura 12: Relação entre a porcentagem de luz de mudas mortas e o aumento na intensidade luz.....	41
Figura 13: Porcentagem de mudas mortas para topografia alta e baixa	42

Capítulo III

	página
Figura 1: Desenho esquemático do tamanho e forma das parcelas em campo	53
Figura 2: Médias por tratamento da porcentagem de entrada de luz, resultante das aberturas das copas durante a exploração florestal (média e desvio)	55
Figura 3: Número de espécies em função do aumento de parcelas (4m ²), calculadas para os tratamentos I,II,III e IV	57
Figura 4: Distribuição das famílias botânicas identificadas no local de estudo e sua distribuição para cada tratamento.....	58
Figura 5: Proporção do número de famílias, gêneros e espécies em relação a cada tratamento.....	59
Figura 6: A - Abundância e frequência de: árvores, arbustos e cipós, nos quatro tratamento.....	60
Figura 6: B - Abundância e frequência de: ervas, palmeiras e gramíneas, nos quatro tratamento.....	61
Figura 7: Comportamento da regeneração natural de algumas espécies por tratamento: bases para uma classificação preliminar quanto a grupos de sucessão.....	68
Figura 8: Comportamento da regeneração natural de algumas espécies por tratamento: bases para uma classificação preliminar quanto a grupos de sucessão.....	68
Figura 9: Comportamento da regeneração natural de algumas espécies por tratamento: bases para uma classificação preliminar quanto a grupos de sucessão.....	68

Capítulo IV

	página
Figura 1: Relação espécie/área de todas as parcelas inventariadas para DAP ≥ 10 cm.....	90
Figura 2: Relação do número de espécies e números de indivíduos para a floresta em estudo.....	92
Figura 3: A - Número de indivíduos (n/ha) por classe de DAP, antes da exploração; B - Número de indivíduos (n/ha) por classe de DAP, após a exploração	95
Figura 4: Análise de variância da área basal (m ² /ha), antes e depois da aplicação dos tratamentos	96
Figura 5.1: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 1, parcela 12, como exemplo de área não explorada.....	98

Figura 5.2: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 2, parcela 8, como exemplo de retirada de 25% de área basal.....	99
Figura 5.3: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 3, parcela 9, como exemplo de retirada de 50% de área basal.....	100
Figura 5.4: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 4, parcela 10, como exemplo de retirada de 75% de área basal.....	101
Figura 6.1: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 1, parcela 12, como exemplo de área não explorada.....	102
Figura 6.2: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 2, parcela 8, como exemplo de retirada de 25% de área basal.....	103
Figura 6.3: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 3, parcela 9, como exemplo de retirada de 50% de área basal.....	104
Figura 6.4: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 4, parcela 10, como exemplo de retirada de 75% de área basal.....	105
Figura 7: Médias em porcentagem dos danos e árvores exploradas para cada tratamento.....	107
Figura 8: Relação dos todos os itens e seus respectivos gastos para cada tratamento envolvendo a derrubada, limpeza e plantio de enriquecimento.....	108

LISTA DE TABELAS

página

Capítulo II

página

Tabela 1: Distribuição do total das mudas em função das cinco classes de luz para todos os tratamentos.....	36
---	----

Capítulo III

página

Tabela 1: Médias de área basal, abundância e número de espécies por tratamento para avaliar a homogeneidade da área experimental. Valores calculados pelo programa SAS (Ronald & Smith, 1984)	52
Tabela 2: Relação dos índices de riqueza e heterogeneidade de espécies calculados para os vários tratamentos.....	63
Tabela 3.1: Valores do coeficiente de similaridade de Jaccard, obtidos pelo pelo procedimento SIMQUAL (Rohlf, 1990), utilizando-se matriz de presença (1) e ausência (0), de famílias nos quatro tratamentos.....	64
Tabela 3.2: Valores do coeficiente similaridade de Jaccard, obtidos pelo pelo procedimento SIMQUAL (Rohlf, 1990), utilizando-se matriz de presença (1) e ausência (0), de gêneros nos quatro tratamentos.....	64

Capítulo IV

página

Tabela 1: Relação das espécies selecionadas para o monitoramento da regeneração natural.	85
Tabela 2: Relação da área basal (m ² /parcela de 0.49) e resultados do do número suficiente de parcelas.....	89
Tabela 3: Valores mínimos para amostragem em cada parcela de 0.49 ha, levando-se em consideração o aumento da área a cada 100 m ² (sub-parcelas de 10 x 10 m)	89
Tabela 4: Valores do coeficiente de similaridade de Jaccard, obtidos pelo procedimento SIMQUAL (Rohlf, 1990), para as parcelas dos tratamentos 1, 2, 3 4, respectivamente.....	93
Tabela 5: Médias da área basal (m ² /ha); número de indivíduos (n/ha); e número de espécies, antes da execução dos tratamentos	94
Tabela 6: Médias do volume de madeira extraído por tratamento.	97
Tabela 7: Cálculo de índices de heterogeneidade e de riqueza para a caracterização do efeito da exploração em relação a diversidade de espécies na floresta.....	108

ESTRUTURA E MANEJO DE UMA FLORESTA DE VÁRZEA DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO

Autor: DOMINGOS SÁVIO MACEDO

Orientador: Prof. Dr. VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA

RESUMO

O estudo está dividido em quatro capítulos. O Capítulo I fornece algumas informações ecológicas básicas sobre a estrutura e funcionamento de florestas de várzea do estuário amazônico, principalmente em relação aos regimes periódicos de inundação das várzeas de maré e suas influências sobre o meio biofísico. Nos capítulos seguintes são apresentados resultados que poderão servir como base ecológica para o manejo deste ecossistema. Sob várias intensidades de manejo florestal, o estudo enfoca o impacto sobre a vegetação arbórea (Capítulo IV) e regeneração natural de plântulas (Capítulo III); e o crescimento de mudas de *Virola surinamensis* que foram plantadas na floresta (Capítulo II).

A área de estudo está localizada na foz do rio Amazonas, no Município de Gurupá, Estado do Pará (latitude 1°29'S e longitude 51°38'W).

Existem dois níveis de oscilação da maré na região do estuário: i) nível baixo de água abaixo do solo compreendendo os meses de julho a janeiro, o que praticamente coincide com o período menos intenso de chuva; e ii) nível alto de água nos meses de fevereiro a junho, coincidindo com os períodos de maior intensidade de chuva. O regime de inundações periódicas é o grande catalizador dos processos bióticos e abióticos das várzeas, acelerando os processos de renovação dos seus recursos.

Na metodologia adotada, foram instaladas 16 parcelas de 70 x 70 metros (0.49 ha), de forma quadrada, onde foi realizado um inventário de todos os indivíduos acima de 10 cm de DAP. Foram realizados 4 tratamentos com 4 repetições cada: i) testemunha (sem exploração: tratamento 1 - T1); ii) retirada de 25% da

área basal a partir dos maiores diâmetros (tratamento 2 - T2); iii) retirada de 50% da área basal (tratamento 3 - T3); e iv) retirada de 75% da área basal (tratamento 4 - T4). Após a exploração foram instaladas sub-parcelas de 40 x 40 metros (0.16 ha) dentro das parcelas de 0.49 ha, ou seja, foi deixada uma bordadura de 15 metros para cada lado. Em seguida foi realizado um plantio de enriquecimento de *Virola surinamensis* (Rol.) Warb., perfazendo um total de 144 mudas por sub-parcela. Na mesma área das sub-parcelas foram instaladas microparcelas de 2 x 2 metros (4 m²), cruzando o centro das subparcelas.

As porcentagens médias de luz obtidas para os tratamentos foram: 5.6% para o T1; 13.5% para o T2; 24.8% para o T3; e 40.1% para o T4. Da mesma forma, a interação entre luz e topografia não exerceu efeitos significativos sobre o crescimento das mudas de *Virola surinamensis*. A variação topográfica e a interação entre luz e topografia não teve efeito sobre a sobrevivência das mudas.

Houve um aumento do número de espécies e do número de indivíduos à medida que aumentou o regime de luz. Tanto o índice de heterogeneidade de Shannon, como de riqueza de espécies (Margalef), evidenciaram estas mudanças, principalmente com relação aos extremos (tratamentos 1 e 4).

O volume comercial por ha foi: 58.88 m³ (T2); 93.13 m³ (T3); e 136.86 m³ (T4). Os custos médios por metro cúbico/ha foram: US\$6.37 (T2); US\$5.80 (T3) e US\$5.46 (T2). Com relação às árvores danificadas foram observadas diferenças significativas entre T2 e T3 e T4.

STRUCTURE AND MANAGEMENT OF A FLOODPLAIN FOREST IN THE AMAZON ESTUARY

Author: DOMINGOS S. MACEDO

Adviser: Prof. Dr. VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA

SUMMARY

This study is divided into four chapters. Chapter I provides ecological information about the structure and function of floodplain forests in the Amazon estuary, mainly in relation to periodic regimes of flooding and their influence on the biophysical environment.

The next chapters provide on ecological basis for management of this ecosystem. Under various forest management intensities, the study focuses on the impact on the structure of adult trees (Chapter IV); on the natural regeneration of seedlings (Chapter III); and on the growth of seedlings of *Virola surinamensis* that were planted within the forest (Chapter II).

The study site is located at the mouth of the Amazon river, in the municipality of Gurupá, Pará State, Brazil (latitude 0°47'S and longitude 51°37'W).

Two levels of oscilation were found: i) low water level during July through January, at the same time as low levels of rainfall; and ii) high water level during February through June, at the same time as high levels of rainfall. The tidal regime is the great catalyst of biotic and abiotic activities in the floodplain forests, accelerating the renovation processes of its resources.

As part of the methodology utilized, 16 square plots measuring 70 x 70 meters (0.49 ha) were defined, where a forest inventory was conducted in which all trees DBH $\geq$ 10 cm were measured. Four treatments were applied with four replications each: i) without logging (control: treatment 1 - T1); 25%

removal of the basal area, beginning with the highest diameters (treatment 2 - T2), iii) removal of 50% of the basal area (treatment 3 - T3), and iv) removal of 75% of the basal area (treatment 4 - T4).

After the forest logging, subplots of 40 x 40 meters (0.16 ha) were placed inside the main plots of 0.49 ha, with a border of 15 m on each side. Then an enrichment planting was done using seedlings of *Virola surinamensis* (Rol.) Warb., with a total of 144 seedlings per subplot, within the subplots, microplots of 2 x 2 meters (4 m²) were placed crossing the center of the subplots.

The mean percentages of light (luminosity) obtained under the treatments were: 5.6% (T1); 13.5% (T2); 24.8% (T3); and 40.1% (T4). Likewise, the interaction between light and topography exerted no significant effect on seedling growth. Topographic variation, as well as the interaction between light and topography, exerted no effect on seedling mortality.

The number of species and individuals increased significantly as light (luminosity) increased. In addition, the heterogeneity index of Shannon and the species richness index of Margalef reflected these changes, especially at the extremes (T1 and T4).

The commercial volume per ha: 58.88 m³ (T2); 93.13 m³ (T3); and 136.86 m³ (T4).

The mean costs per cubic meter per ha were: US\$6.37 (T2); US\$5.80 (T3) and US\$5.46 (T4). In relation to trees damaged, statistical differences were found between T2 and T3 and T4.

Capítulo I

Estrutura e funcionamento de uma floresta de várzea do estuário amazônico

1. Introdução

As várzeas ocorrem ao longo de toda a extensão do Rio Amazonas e ocupam cerca de 2 a 3% de toda a área da Bacia Amazônica (Sombroek, 1984; Prance, 1980). Entretanto, existem diversas classificações com relação aos diferentes tipos de várzea, seja pela sua localização; pela composição química e cor da água dos rios e afluentes; pela flora e fauna; e pelos solos e biomassa (Prance, 1980; Pires, 1984; Morán, 1990; Ayres, 1993). As áreas de várzea compartilham, no entanto, características em comum, incluindo o ciclo de enchente e esvaziamento dos rios que, por sua vez, influi na flora, na fauna e nas estratégias das populações humanas (Morán, 1990). Para efeito de simplificação e melhor entendimento, este estudo considera pelo menos três tipos de vegetação bem distintos, em relação a sua posição ao longo do curso do Rio Amazonas, assim distribuídos (Sioli, 1984):

Várzeas do alto Amazonas: Correspondem às áreas inundáveis mais altas situadas na região do alto Amazonas, acima da cidade de Manaus.

Várzeas do médio e baixo Amazonas: Localizam-se na região do baixo Amazonas entre as cidades de Manaus e Santarém.

Várzeas do estuário ou várzea de maré: Sujeitas às inundações diárias, resultantes de rio com influência das marés, que podem ser notadas até 1.000 km da foz do rio Amazonas. Na região do estuário observa-se grande irregularidade nas oscilações do nível da maré, sendo que a amplitude média das marés mais altas (fevereiro a abril) varia de 3,5 a 4 metros (Diegues, 1990). Neste estudo serão tratados aspectos referentes apenas a estrutura e funcionamento das florestas de várzea do estuário amazônico.

Em função de complexos processos de adaptação ao regime de inundações, existem grandes diferenças na composição do número de espécies, na estrutura diamétrica e na altura dos indivíduos, comparado com as florestas de terra firme (Pires, 1972; Daly & Hammond, 1989). Apesar de ser o tipo florestal com a maior concentração de população humana, as matas de várzea vêm se sustentando (resistindo) ao longo de séculos a contínuos ciclos extrativistas (Meggers, 1984), e são sem dúvida a grande base de sustentação econômica para as populações ribeirinhas tradicionais da Amazônia (Anderson & Ioris, 1992).

Apesar do reconhecimento do seu potencial, pouco se sabe sobre as relações entre as espécies ali presentes com solos ricos em nutrientes e matéria orgânica, porém muito pobres em oxigênio devido a grande parte do tempo em que permanecem submersos (Jordan et al., 1978). As causas da dinâmica desta floresta permanecem incógnitas, como também, as razões que permitem as populações ribeirinhas sobreviverem ali a centenas de anos utilizando, sempre na dependência dos seus recursos naturais.

Este capítulo pretende fornecer informações ecológicas básicas que continuam pouco esclarecidas, com relação a estrutura e funcionamento de florestas de várzea do estuário amazônico. Nos capítulos seguintes pretende-se mostrar alguns resultados que poderão servir como base ecológica para recomendações sobre manejo das Várzeas inundáveis. Sob várias intensidades de manejo florestal, o estudo enfoca o impacto sobre a vegetação arbórea (Capítulo IV), a regeneração natural de plântulas (Capítulo III), o crescimento de mudas de *Virola surinamensis* que foram plantadas (Capítulo II).

2. O local de estudo

A área de estudo está localizada na foz do rio Amazonas (Figura 1), no Município de Gurupá, Estado do Pará ($0^{\circ}47'S$ e longitude $51^{\circ}37'W$).

A escolha do local foi feita principalmente em função da existência naquela região (Gurupá e municípios vizinhos) da maior área de plantios de enriquecimento com *Virola surinamensis* na Amazônia brasileira, cerca de 4.800 ha (Anderson et al., 1992). Pode-se dizer também que é uma das áreas mais expressivas de reflorestamentos -- cerca de 17.650 ha -- em diferentes regimes de manejo com espécies nativas da Amazônia brasileira como andiroba (*Carapa guianensis* Aubl.), jutaí (*Hymenaea oblongifolia* Hub.), anoerá (*Licania macrophylla* Bth.) e pracuúba (*Mora paraensis* Ducke). Os plantios variam de mistos a puros, em situações a pleno sol e à sombra, com diferentes tipos de espaçamentos (Kanashiro & Yared, 1991). É também uma região estratégica em termos sócio-econômicos, pois o local de estudo está situado a aproximadamente 175 km do projeto Jarí, 80 km da reserva extrativista do Cajari, 101 km do porto de Macapá e 128 km de sede do Município de Gurupá, onde nos últimos anos vem servindo de palco de importantes iniciativas de desenvolvimento sustentável, envolvendo prefeituras, sindicatos rurais e ONGs.

A pluviosidade na região apresenta um índice anual de 3.000 mm. As chuvas se concentram de janeiro a julho (cerca de 80% da precipitação anual). A região possui clima tropical úmido, segundo a classificação de Köppen, entre os tipos Ami e Afi (Tancredi et al., 1986). A pedologia da região apresenta em sua maior extensão dois grandes grupos: solos hidromórficos gleizados e laterita hidromórfica.

Nas várzeas do estuário predomina uma floresta alta de várzea, recortada por pequenos igarapés, que no período das chuvas lançam suas águas no interior da mata. A região é ocupada por uma população que habita geralmente nas margens dos rios, onde é praticada agricultura (mandioca, arroz, cana, etc.), e extração de produtos como látex, cacau, frutas, e madeira, bem como caça e pesca (Morán, 1990).

3. Fatores que afetam a estrutura e funcionamento das florestas de várzea do estuário

3.1. As florestas de várzea e os períodos de inundação

A dinâmica da interação entre a água e solo é o principal processo que governa os sistemas de rios e as terras inundadas adjacentes. A alternância de períodos de avanço e retração da água em áreas inundadas é o principal fator que controla as adaptações da maioria dos componentes bióticos ali existentes (Bayley, 1995). Este regime é o responsável pelo aumento da produtividade biológica e pela manutenção da diversidade no sistema. Os principais componentes associados com este processo contínuo (anual e/ou diário) são as plantas, nutrientes, detritos e sedimentos (Sioli, 1984).

Um gradiente da composição biótica, nutrientes, e luz existentes ao longo desta zona de transição (aquática e terrestre) é denominada de várzea. As várzeas fazem parte do ecossistema de rios e terras alagadas que são inundadas e drenadas sucessivamente. Um acúmulo de matéria orgânica e nutrientes ocorre como resultado deste movimento (Furch, 1984).

Durante o período de alagamento, os nutrientes previamente mineralizados são dissolvidos. Mais nutrientes são dissolvidos nas águas ou associados com sedimentos suspensos são também adicionados oriundos do rio principal. Altas taxas de produção primária e decomposição também ocorrem durante a época de

inundação, acelerando a produção da decomposição (Junk, 1984; Kozlowski, 1984).

3.2. Estrutura física e química dos solos das várzeas

Quando um solo é inundado, as trocas de gases entre o solo e o ar são drasticamente reduzidas. Logo após a ocorrência de uma inundação, microorganismos consomem praticamente todo o oxigênio na água e no solo (Ponnamperuma, 1984).

A pouca aeração do solo associada com inundações induz a um grande número de mudanças no solo e nas plantas que adversamente influem no seu crescimento. Conseqüentemente, algumas mudanças morfológicas podem aparecer, tais como a hipertrofia das lenticelas como também o aparecimento de tecidos aerenquimáticos, raízes adventícias, e pneumatóforos (Jackson & Drew, 1984).

A inundação de um solo desencadeia uma série de processos físicos, químicos e biológicos que influenciam profundamente a qualidade do solo e o crescimento das plantas. A natureza, os padrões e a extensão desses processos dependem das propriedades físicas e químicas do solo e da duração do período de alagamento (Kozlowski, 1984).

A inundação ou retenção da água em um solo virtualmente elimina o ar dos seus poros e limita a troca de gases para a difusão molecular no solo submerso. Este solo, entretanto, não é uniformemente desprovido de oxigênio. As concentrações de O_2 podem ser altas na superfície numa pequeníssima camada em contato com a água de superfície. Reduções drásticas de trocas gasosas entre o solo inundado e a atmosfera leva ao acúmulo de nitrogênio, dióxido de carbono, metano e hidrogênio na sua superfície (Ponnamperuma, 1984).

A temperatura em solos inundados afeta sobremaneira a velocidade e o padrão das mudanças químicas e eletroquímicas iniciadas pela inundação, além da liberação de nutrientes, produção de toxinas e o crescimento das plantas (Kozlowski, 1984).

Quando um solo drenado é inundado, os seus colóides absorvem água e o solo incha. A taxa de aumento da "sorção" e do volume nos solos minerais dependem da quantidade e do tipo de mineral de argila, e da natureza dos cátions trocáveis. Quanto maior a quantidade de argila, maior será o inchamento do solo (Ponnamperuma, 1984).

À medida que a umidade aumenta, a coesão das lâminas de água ao redor das partículas do solo fazem elas se aderirem, tornando-o plástico. Quanto maior a quantidade de água, a coesão diminui drasticamente. Solos inundados têm pouca resistência ao deslizamento entre as partículas e também uma baixa compressão (Falesi, 1972; Sanchez, 1976).

A inundaço modifica a estrutura do solo pela ruptura dos agregados. Esta ruptura reflete uma reduo na coeso com o aumento da quantidade de gua e desfloculao da argila, causados pelo inchamento irregular das partculas e a destruio dos agentes cimentantes (Gentry & Lopez-Parodi, 1980).

Os valores de pH da maioria dos solos inundados das vrzeas amaznicas est entre 6.7 e 7.2 (Sioli, 1984). Entretanto, se a quantidade de ferro reduzvel baixa, o pH pode no atingir valores acima de 5.0, principalmente depois de meses de inundao. Se a quantidade de matria orgnica de um solo de pH alto pequena, os valores podem chegar a valores de pH bem alcalinos (Furch, 1984).

Os ctions so encontrados nos colides do solo com cargas negativas permanentes, residentes nas partculas e pelo pH dependente destas cargas negativas. Perodos de inundao podem aumentar a capacidade de troca de ctions de solos cidos e diminuir em solos alcalinos. Da mesma maneira, as propriedades de troca de nions so afetadas pelo aumento de pH em solos cidos e pelo decrscimo de pH em solos alcalinos (Furch, 1984).

A decomposio de matria orgnica mais lenta em solos inundados do que em solos bem drenados, principalmente em locais permanentemente inundados (Piedade et al., 1991).

Com relao fertilidade, a restrio de entrada de oxignio no solo, o inchamento dos colides e a destruio da

estrutura, reduzem drasticamente a taxa de respiração e a absorção de nutrientes pelas plantas, não havendo transferência interna de oxigênio para as raízes (Sanchez, 1976).

Solos inundáveis possuem basicamente três horizontes principais: um horizonte "A" parcialmente oxigenado, na qual a matéria orgânica se acumula; um próximo horizonte em que há uma alternância de condições entre oxidação e redução; e um horizonte que sempre prevalece a redução. Quando o solo fica saturado por água, a oxidação da matéria orgânica é lenta e se acumula no horizonte "A". No horizonte seguinte, ferro e manganês são alternadamente reduzidos e oxidados. Durante a oxidação, o Fe e Mg são depositados em camadas denominadas de "mosqueado", em tons de ferrugem. O horizonte permanentemente inundado possui uma tonalidade azul-esverdeada devido a presença de compostos de ferro (Vieira, 1975).

3.3. A luz e os processos regenerativos nas florestas

Clareiras constituem um complexo recurso para o estabelecimento e manutenção dos diversos tipos de florestas tropicais. Estas podem variar em tamanho e em freqüências de ocorrência temporal e espacial (Denslow, 1980; Ewel, 1983). O sucesso de estratégias de regeneração é dependente dos padrões de distribuição e tamanho de clareiras (Baur, 1964; Whitmore, 1978).

Existem duas classes principais de regeneração: (i) espécies tolerantes à sombra, que persistem na forma de mudas suprimidas no sub-bosque até a abertura do dossel, quando ocorre um acelerado crescimento das mesmas; e (ii) espécies pioneiras, intolerantes à sombra, que germinam nas clareiras e crescem rapidamente (Brokaw, 1987).

O tamanho de clareiras tem vital importância para a sucessão florestal. Pequenas clareiras formadas por quedas de galhos, por exemplo, podem não proporcionar condições para o estabelecimento de espécies pioneiras. Ao contrário, se a clareira é grande o suficiente, é colonizada principalmente por estas espécies (Hartshorn, 1980).

O ambiente criado pela radiação durante o dia em uma clareira é tipicamente caracterizado por um período de radiação solar direta interrompido por períodos de radiação difusa (Ackerly & Bazzaz, 1995). A forma da abertura do dossel abaixo de uma única planta gera uma marcada heterogeneidade espacial na distribuição angular da radiação incidente. A localização e tamanho da abertura do dossel dependem do tamanho da clareira, altura e distribuição da vegetação circundante. Uma planta colonizando uma localização periférica de uma clareira recebe muito mais luz de uma única direção do que de outra, devido a uma assimetria da abertura do dossel acima (Chazdon & Pearcy, 1991).

A regeneração pode ocorrer de sementes que germinam depois da queda de árvores ou de mudas que estavam presentes no sub-bosque antes da queda (Newell et al., 1993). As espécies que melhor exploram a luz disponível depois da queda de uma árvore são aquelas que persistem mais tempo no sub-bosque até a abertura do dossel (Newell et al., 1993).

4. Objetivos da pesquisa

- I. Acompanhar a oscilação do nível do lençol freático ao longo dos períodos de maior e menor precipitação no local de estudo;
- II. Descrição do tipo de solo que compõem uma floresta de várzea periodicamente inundada;
- III. Caracterização do regime de luz no interior da floresta.

5. Material e métodos

5.1. Solo

Para a caracterização do solo da área de estudo foram estabelecidos transectos de 200 metros ao longo da floresta a partir de dois pontos distintos: (i) um curso d'água (igarapé), e (ii) um paraná ou furo. Foram abertas trincheiras (1,5 x 1,5 x 1,5

metros) a cada 50 metros ao longo de cada transecto, perfazendo um total de 10 trincheiras abertas (5 em cada linha).

Procedeu-se a descrição do perfil do solo de cada trincheira, obtendo-se as características morfológicas dos horizontes (Lemos & Santos, 1984). As amostras foram secas ao ar livre no mesmo local de coleta para posterior análise química e física em laboratório. As amostras foram retiradas no período de menor precipitação anual da região (setembro e outubro), época em que apenas as áreas mais baixas da floresta são inundadas pelas marés.

5.2. Monitoramento do lençol freático

Para acompanhar a oscilação do nível do lençol freático no local de estudo, foram utilizadas as mesmas 10 trincheiras para a coleta de solo nos dois transectos, no sentido curso d'água-floresta. Em cada trincheira foi colocada uma régua graduada em centímetros, possuindo altura superior ao da profundidade da trincheira (1,5 m).

Para a retirada dos dados foi estabelecida a seguinte frequência de medições: a cada mês foram marcadas todas as épocas de mudança de lua, ou seja, lua cheia, minguante, nova e crescente. No dia de cada mudança, fornecido por um calendário, foram retiradas duas medições: a primeira referente ao horário de maré cheia (pré-a-mar), e a segunda referente a maré seca (baixa-mar). O período de medição foi de 12 meses (julho/93 a junho/94).

5.3. Maregramas

Os dados referentes ao monitoramento do nível das marés no porto de Belém, coletados diariamente pela Companhia Docas do Pará, foram obtidos pelo projeto "Usos Tradicionais da Terra como Base para Desenvolvimento Sustentável no Estuário Amazônico" (Departamento de Botânica do Museu Goeldi, Belém-PA). Os dados são referentes a um período de 7 anos (1982 a 1988), que, apesar de serem coletados em anos anteriores a este trabalho, são de

importância fundamental para ilustrar o esquema de oscilação do regime anual de marés na região do estuário amazônico.

5.4. Caracterização de regime de luz

Dentro das parcelas testemunhas, utilizadas para o estudo de diferentes intensidades de manejo que serão referidas nos capítulos seguintes, foi estabelecida uma malha de pontos para obtenção da quantidade média de luz que incide naturalmente em uma floresta de várzea não perturbada. Em cada uma de 4 parcelas de 0,49, foram obtidos 144 pontos. Em cada um destes pontos, foram tomadas duas leituras (a um metro uma da outra), utilizando-se de um luxímetro eletrônico de escala variável em lux/Fc.

As medições foram feitas em dias de céu aberto com ausência de nuvens sempre no período de 12 às 14 horas de cada dia, na época de menor precipitação anual na região (agosto a outubro). No início e no fim da medição de cada parcela foi retirada a intensidade máxima de luz em local aberto (clareira) para referência no cálculo dos valores relativos de luz.

6. Resultados e discussão

6.1. Estrutura física e química do solo

As áreas de várzea localizadas na região do estuário são caracterizadas por dois tipos de solos: (i) hidromórficos gleyzados eutróficos e distróficos, e (ii) hidromórficos indiscriminados eutróficos e distróficos (BRASIL, DNPM - PROJETO RADAM, 1974).

A classificação encontrada no local de estudo, segundo as análises de laboratório, foi de um solo do tipo gley pouco húmico e eutrófico. Podemos encontrar várias características típicas neste solo, tais como a presença de camadas de deposição recente, mal drenadas (altura média do lençol: 39.8 cm acima do nível do mar, $sd = 15.69$), fortemente ácidas (média do pH: 4.52, $sd =$

0.22), pouco profundas (profundidade média: 57.5 cm, sd = 11.99) e de textura argilosa dominante (55.1%, sd = 3.94). Em todos os locais onde procedeu-se a coleta, foi encontrada a presença de mosqueados amarelos, avermelhados dentro do perfil, consequência da redução dos compostos férricos a ferrosos, ou da oxidação a férricos conforme a oscilação do lençol freático (Vieira, 1988).

Foram encontrados nos perfis a presença de três horizontes: A: 20.1 cm de profundidade média (sd = 6.3) e 1.81% de teor de matéria orgânica (sd = 1.53); C_{1g} com 37.1 cm de profundidade média (sd = 10.26) e 0.25% de teor de matéria orgânica (sd = 0.10); e C_{2g} com 0.22% de teor de matéria orgânica (sd = 0.06).

Com relação à presença de raízes, foi observada uma maior concentração no horizonte superficial, com a densidade de raízes grossas e finas decrescendo abruptamente nos horizontes subseqüentes. Em média, existe maior concentração do sistema radicular nos primeiros 50 cm do solo.

Foi observada diferença estatística entre os diversos pontos de coleta de solo (50, 100, 150 e 200 m) somente em relação a quantidade de argila. Para as quantidades de areia e silte, matéria orgânica, capacidade de troca de cátions, e % de saturação de bases (V%) nos três horizontes, não houveram diferenças estatísticas (Figuras 2-A e 2-B).

6.2. Lençol freático: Oscilações entre períodos de menor e maior drenagem do solo

Nos 12 meses quando foi medida a oscilação do nível do lençol freático (julho/93 a junho/94), foi feita uma comparação das médias entre os níveis mínimo e máximo (Prob > 0.001). Ficou evidente que existem dois níveis de oscilação: nível baixo de água (99.8 cm abaixo do solo, sd = 30.76), compreendendo os meses de julho a janeiro, o que praticamente coincide com o período menos intenso de chuva; e nível alto de água (20.3 cm acima do solo, sd = 3.1), compreendendo os meses de fevereiro a junho, coincidindo com os períodos de maior intensidade de chuva (Figuras 2-A e 2-B).

Figura 2-A: Representação do transecto 1 em relação às características físicas e químicas do solo e oscilação do nível do lençol freático (médias anuais).

Figura 2-B: Representação do transecto 2 em relação às características físicas e químicas do solo e oscilação do nível do lençol freático (médias anuais).

A preocupação de obter dados para caracterizar mudanças do nível do lençol ao longo do ano, como também para saber o período de maior permanência do nível da água próxima à superfície do solo dentro da floresta, poderia esclarecer alguns pontos-chaves de como proceder no manejo florestal das várzeas. Estes resultados serviram também para enumerar alguns pontos que ainda levantam muita discussão, tais como: (i) De que forma as enchentes influenciam os processos de ocorrência, germinação e crescimento das espécies componentes das várzeas? (ii) Como ocorre a adaptação das espécies às condições adversas como a baixa taxa de oxigenação dos solos?

Obter respostas a essas questões é de grande interesse para a silvicultura das espécies de importância econômica das várzeas do estuário, principalmente em locais onde pretende-se conduzir plantios de enriquecimento com estas espécies.

Na área de estudo, com relação às diferenças do nível do lençol freático ao longo do ano, podemos afirmar que nas épocas onde há maior concentração das chuvas, a permanência de água acima do nível do solo é quase constante e o escoamento é menor, principalmente nas épocas de lua cheia (denominadas de "lançantes" pelos habitantes da região).

Nesta época, o nível da água acima do solo permanece praticamente inalterado, mesmo com as interferências diárias das marés baixas. Entretanto, nas épocas de lua nova, ainda dentro dos períodos mais chuvosos, há um período de regularização da vazão de água dentro da mata. Ou seja, apesar do nível da água ser grande devido ao período concentrado das chuvas, existe um escoamento de água temporário (dois períodos de 6 horas por dia) durante a lua nova (denominada de "pacuema").

6.3. O regime das marés: As diferenças entre as épocas de inundação para inverno e verão

Como já foi citado anteriormente, existem na região dois períodos bem diferentes em relação ao nível da água no interior do solo. O estudo da série de dados referente à oscilação dos níveis de maré observados no porto de Belém, também localizado no

estuário, confirma a tendência de encontrarmos dois períodos distintos ao longo do ano (Figura 3). Na base desses dados, podemos fazer algumas afirmações sobre a relação entre estas oscilações freqüentes do nível da água e a ecologia das espécies das várzeas do estuário. A primeira é com relação às estratégias de dispersão de sementes. Quase que na sua totalidade as espécies vegetais utilizam a água como principal agente de dispersão de suas sementes, que são levadas a grande distância pela extensa rede de rios, paranás e igarapés que ocorrem na região. As marés são o elemento chave neste processo, em função da alternância diária no nível da água, principalmente nos períodos mais concentrados das chuvas (fevereiro a maio). A segunda, é a estabilidade dos processos de renovação da floresta. O movimento das marés é sem dúvida o combustível para a manutenção do contínuo processo de exploração que as várzeas vêm sofrendo até os dias de hoje, devido ao constante intercâmbio de nutrientes e material genético, o que normalmente não ocorre tão intensivamente nas florestas altas de terra firme.

6.4. O regime de luz em uma floresta de várzea

A intensidade média de luz que incide dentro da floresta de várzea fechada é de 6.55%, $sd = 2.96$. O valor encontrado não difere muito se comparado com outros levantamentos em florestas tropicais (Chazdon & Pearcy, 1991).

O sub-bosque é bem limpo, podendo-se observar processos de sucessão apenas nas clareiras mais recentes, causadas principalmente pela ação dos ventos e tempestades que causam a derrubada das árvores maiores. Apesar de apresentarem raízes tabulares (sapopemas), estas árvores são extremamente susceptíveis a queda devido ao seu sistema radicular ser superficial. No Capítulo III, uma atenção especial será dada ao comportamento desta floresta, quando sujeita a diferentes intensidades de exploração e a um conseqüente aumento na quantidade de luz em relação aos processos de regeneração natural.

Figura 3: Série temporal da oscilação do nível da maré de 1982 a 1988 coletadas pela CIA DOCAS do Pará e fornecidos pelo Projeto "Programa Estuário", Departamento de Botânica Museu Goeldi, Belém-PA.

7. Conclusão

As várzeas do estuário amazônico possuem características marcantes quanto ao seu meio biofísico. Este estudo identificou que os solos permanecem três meses do ano com a altura do lençol freático acima e nove meses em média 0.4 m abaixo do nível do solo. Os solos são diretamente influenciados pelas alterações dos níveis das máres que alternam dois períodos diários de vazante e enchente durante todo o ano, e pelo regime das chuvas na região (fevereiro a abril). Estas mudanças evidenciam dois períodos bem nítidos com relação ao nível de água no curso dos rios e conseqüentemente no interior das várzeas do estuário amazônico.

Existem dois níveis de oscilação do lençol freático: (i) nível baixo de água abaixo do solo compreendendo os meses de julho a janeiro, o que praticamente coincide com o período menos intenso de chuva; (ii) nível alto de água compreendendo os meses de fevereiro a junho, coincidindo com os períodos de maior intensidade de chuva.

O pH do solo se caracterizou como fortemente ácido com uma média de 4,52, com sua profundidade média não passando de 57,5 cm e possui textura argilosa dominante em todos os horizontes com valores médios de 55,1%. Possui um elevado teor de matéria orgânica no seu horizonte superficial, com valores médios de 1,81%, e com maior concentração de raízes nos primeiros 25 cm de profundidade. A classificação encontrada foi de um solo do tipo gley pouco húmico eutrófico, não diferindo da classificação de solo para locais de várzea do estuário amazônico (RADAM, 1974; Vieira, 1988). A intensidade média de luz que incide dentro da floresta em estudo foi de 6.55%. Este valor representa uma floresta pouco perturbada.

Para as várzeas do estuário, o regime de inundações periódicas tem um papel chave na composição química e física dos solos que com outros fatores como a luz influi nas estratégias de sobrevivência da flora, fauna e das populações humanas dependentes dos seus recursos naturais.

8. Bibliografia

- Ackerly, D.D. & F.A. Bazzaz. 1995. Seedling crown orientation and interception of diffuse radiation in tropical forest gaps. **Ecology**, 76(4): 1134-46.
- Anderson, A.B.; Mousasticoshvily, I. & Macedo, D.S. 1992. **Impactos ecológicos e sócio-econômicos da extração seletiva de virola no estuário amazônico: Implicações para políticas florestais brasileiras**. Relatório final a WWF-US. Rio de Janeiro. 52p.
- Anderson, A.B. & Ioris E.M. 1992. Valuing the rain forest: Economic strategies by small-scale forest extractivists in the Amazon estuary. **Human Ecology**, 20(3):337-69.
- Ayres, J.M. 1993. **As Matas de Várzea do Mamirauá**. CNPq/Sociedade Civil Mamirauá. Brasília, DF. Vol. 1. 123 p.
- Baur, G.N. 1964. **The ecological basis of rain forest management**. New South Wales, Australia: Forestry Commission.
- Bayley, P.B. 1995. Understanding large river-floodplain ecosystems. **Bioscience**, 45(3):153-58.
- BRASIL. DNPM - PROJETO RADAM. **Folha SA, 22 Belém**, Rio de Janeiro. 1974. vol (5). (Levantamento de recursos Naturais).
- Brokaw, N.V.L. 1987. Gap-phase regeneration of three pioneer tree species in a tropical forest. **Journal of Ecology**, 75:9-19.
- Chazdon, L.R & Robert W. Pearcy. 1991. The importance of sunflecks for forest understory plants. **BioScience**, 41(11):760-66.
- Daly, D.C. & Ghilleen T. Prance. 1989. Brazilian Amazon. In: **Floristic inventory of tropical countries**. Campbell, D.G. & Hammond, D. Editors. N. York. NYBG/WWF. 401-26.
- Denslow, J.S. 1980. Gap partitioning among tropical rain forest. **Biotropica**, suppl. 47-55.
- Diegues, A.C.S. 1990. Inventário de áreas úmidas no Brasil. Versão preliminar. In: **Programa de pesquisa e conservação de áreas úmidas no Brasil**. USP/UICA/F. Ford. p. 145-64.
- Ewel, J. 1983. Succession. In: **Tropical rain forest ecosystems: Structure and function**. Edited by Golley, F.B. Elsevier. Amsterdam. p. 217-23.
- Falesi, I.C. 1972. Estudo atual dos conhecimentos sobre os solos da Amazônia brasileira. IPEAN, Minist. Agricultura. **Bol. Técnico 54**.
- Furch, K. 1984. Water chemistry of the Amazon basin: The distribution of chemical elements and freshwaters. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p.167-200.

- Gentry, A.H. & Lopez-Parodi, J. 1980. Deforestation and increasead flooding of the upper Amazon. **Science**, **210**: 1354-56.
- Hartshorn, G.S. 1980. Neotropical forest dynamics. **Biotropica**, suppl. **23-30**.499p.
- Jackson, M.B. & Malcolm C. Drew. 1984. Effects of flooding on growth and metabolism of herbarius plants. In: **Flooding and Plant Growth**. T.T. Koslowski, editor. Academic Press, Florida. p. 1-5.
- Jordan, C.F.; Medina, E. & H. Klinge. 1978. Amazon escosystems. Their structure and functioning with particular emphasis on nutrients. **Interciencia**, **3**(4):223-32.
- Junk, W.J. 1984. Ecology of the várzea, floodplain of Amazonian whitewater rivers. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p.214-43.
- Kanashiro, M. & J.A.G. Yared. 1991. Experiências com plantios florestais na Bacia Amazônica. In: **O Desafio das florestas tropicais**. Curitiba, PR. UFPR/GTZ. p. 117-37.
- Koslowski, T.T. 1984. Extend, Causes, and Impacts of flooding. In: **Flooding and Plant Growth**. T.T. Koslowski, editor. Academic Press, Florida. p. 1-5.
- Koslowski, T.T. 1984. Responses of Woody Plants on Flooding. In: **Flooding and plant growth**. T.T. Koslowski, editor. Academic Press, Florida. p. 10-42.
- Lemos, R.C. & Dos Santos, R.D. 1984. **Manual de descrição e coleta de solo no campo**. SBCS/SNLCS. Campinas, SP. 45 p.
- Meggers, B.J. 1984. The indigenous peoples of Amazonia, their cultures, land use and patterns and effects on landscape and biota. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p. 627-48.
- Morán, E.F. 1990. **A Ecologia humana das populações da Amazônia**. Vozes, Petrópolis, RJ. 367 p.
- Newell, E.A.; McDonald, E.P.; Strain, B.R. & Julie S. Denslow. 1993. Photosynthetic responses of *Miconia* species to canopy openings in a lowland tropical forest. **Oecologia**, **94**:49-56
- Piedade, M.T.F.; Junk, W.J. & S.P. Long. 1991. The productivity of C₄ grass *Echinochloa polystachya* on the Amazon floodplain. **Ecology**, **72**: 1456-63.
- Pires, J. M. 1972. Estudo dos principais tipos de vegetação do estuário do Amazonas. **Tese de Doutorado**. ESALQ/USP. Piracicaba. 183 p.

- Pires, J.M. 1984. The Amazonian forest. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p. 581-602.
- Ponnamperuna, F.N. 1984. Effects of Flooding on Soils. In: **Flooding and Plant Growth**. T.T. Koslowski, editor. Academic Press, Florida. p. 10-42.
- Prance G.T. 1980. A terminologia dos tipos de florestas amazônicas sujeitas a inundaço. **Acta Amazonica**, 10(3): 495-504.
- Sanchez, P. 1976. **Properties and Managements of Soils in the Tropics**. New York: Wiley-Interscience. 356 p.
- Sioli, H. 1984. The Amazon and its main affluents: Hydrography, morphology of the river courses, and river types. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p.127-66.
- Sombroek, W.G. 1984. Soils of the Amazon region. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p.521-36.
- Tancredi, A.C. & Serra, V.H. 1986. Hidrogeografia da regio oriental da Ilha de Maraj. **Relatrios de pesquisa**, 11, IDESP. Belm, PA. 97 p.
- Vieira, L. S. 1975. **Manual da cincia do solo**. Ed. Ceres. So Paulo, SP. 464 p.
- Vieira, L.S.; Dos Santos, P.C.T & M. N. Vieira. 1988. **Solos: propriedades, classificao e manejo**. MEC/ABEAS, Braslia, DF. 154 p.
- Whitmore, T.C. 1978. Gaps in the forest canopy. In: **P.B. Tomlinson & M.H. Zimmermann, ed. Tropical trees as living systems**. Cambridge University Press. New York. p. 639-55.

Capítulo II

Plantio de enriquecimento de *Virola surinamensis* (Rol.) Warb. numa floresta de várzea sob diferentes intensidades de luz e situações topográficas

1. Introdução

1.1. O Problema

As florestas alagadas ocupam cerca de $3,3 \times 10^6$ km² em todo o mundo, e encontram-se distribuídas desde latitudes mais altas até os trópicos, oscilando entre áreas costeiras até locais montanhosos. Estas florestas contribuem significativamente para a produtividade de áreas pesqueiras da costa litorânea e ao longo de estuários; regulam a qualidade de 'runoff' e influenciam nas reservas de água das bacias hidrográficas (Lugo et al., 1988). Na Amazônia brasileira, as várzeas ocupam cerca de 2 a 3% da área total, acompanhando a hidrografia do rio Amazonas (Sombroek, 1984; Prance, 1980). A existência de uma topografia plana e uma distribuição sazonal das chuvas contribui para a grande extensão de áreas alagadas. Estas áreas alagadas podem se estender até dezenas de quilômetros em cada um dos lados dos grandes rios (Sioli, 1984; Kubitzky, 1994).

Na região do estuário amazônico, a pressão sobre os recursos florestais vem esgotando algumas espécies de grande importância na economia local, e ameaça a própria sobrevivência das populações ribeirinhas da região (Uhl, 1990; Barros & Uhl, 1995). A exploração seletiva de *Virola surinamensis* (Rol.) Warb. se intensificou nas últimas três décadas, fazendo com que a virola se tornasse a segunda espécie mais exportada pela indústria madeireira até meados de 1990 na Amazônia (Mousasticoshvily, 1992). A floresta de várzea do estuário amazônico -- o habitat natural da virola -- vem sofrendo constantes intervenções através dos anos, e a dimensão de suas árvores e o seu potencial regenerativo vem decrescendo num ritmo acelerado (Macedo & Anderson, 1994). Desta forma, os sistemas silviculturais de regeneração natural, empregados

atualmente nas florestas tropicais (Evans, 1982; Baur, 1968), não terão muito sentido de utilização.

O esgotamento local de virola é uma consequência (i) do corte das árvores abaixo do limite permitido por lei, (ii) falta de fiscalização pelo órgão competente, (iii) do baixo aproveitamento das toras pelas serrarias da região, e (iv) da não reposição do seu estoque natural (Anderson et al., 1992). As experiências atuais com reflorestamento não estão refletindo o rápido crescimento que é característico da espécie (Schulz & Rodrigues, 1966; Macedo & Pina-Rodrigues, 1992). Como consequência, a baixa produtividade atual da virola em plantios de enriquecimento no estuário amazônico e a baixa rentabilidade das florestas de várzea já exploradas, devido à pequena abundância atual das espécies comerciais, se constituem no grande problema para o estabelecimento de uma política florestal para a região.

O avanço das fronteiras de exploração da virola, que praticamente se estendeu por toda a bacia do rio Amazônas (Mousastichosviliy, 1992; Barros, 1995), fez com que o parque industrial concentrado no estuário fosse desativado, gerando uma crise de mão-de-obra. Para a silvicultura da virola, houve um desestímulo de novos investimentos na região por parte das grandes indústrias, pois a reposição florestal¹ teria que ser feita nas áreas onde as espécies estariam sendo exploradas, ou seja, no alto e médio Amazônas e alto Solimões.

1.1.1. Baixa produtividade em função das técnicas de exploração utilizadas

Os projetos de reflorestamento na região somam aproximadamente 17.7×10^3 ha (Kanashiro & Yared, 1991). Estão incluídos neste total plantios de enriquecimento, homogêneos e plantios mistos, que têm como objetivo principal a produção de madeira serrada. *Virola surinamensis* representa 26.3% deste total, mas a produtividade dos plantios é baixa, principalmente em função

¹ Portaria nº 441 de 09 de agosto de 1989.

do desconhecimento da dinâmica da espécie. Na Figura 1 é feita uma comparação do desempenho da espécie em três situações diferentes de plantio aos 8 e 10 anos. Os plantios a pleno sol e à sombra foram realizados no estuário (Anderson et al., 1992) e o plantio sob manejo silvicultural foram obtidos de Schulz & Rodriguez (1966).

1.1.2. Aspectos legais e operacionais

A extração seletiva não se embasa no manejo para uma produção contínua de madeira, onde os indivíduos com características desejáveis são extraídos na sua totalidade. Consequentemente, esta extração está acarretando uma perda irrecuperável de grande parte do patrimônio genético das espécies de interesse comercial atual (Olfield, 1988). As florestas de várzea, apesar de menos representativas em comparação com as florestas de terra firme, têm ainda grande participação e competitividade no mercado da região, principalmente devido ao custo de transporte ser muito baixo e ao mercado já tradicional das espécies mais conhecidas (Cruz, 1991; Barrros & Uhl, 1995). O desperdício de matéria-prima bruta que ocorre, seja na área de extração, transporte fluvial (jangada) ou na indústria, tem sido uma grande barreira à utilização ordenada e integral do potencial madeireiro (Mousasticoshvily, 1992).

1.2. Hipóteses

Os principais fatores ambientais que governam os processos de crescimento das espécies em mata de várzea são (a) luz e (b) drenagem de solos. Através de sua influência sobre a regeneração natural e crescimento, estes fatores têm grande importância na estrutura e funcionamento, bem como na produtividade deste ecossistema, especialmente no caso da virola (Fanzeres, 1989).

1.2.1. Luminosidade

Em todas as florestas tropicais, a estrutura e a dinâmica da vegetação arbórea exercem forte influência sobre as

Figura 1: Comparação do desempenho de virola aos 8 e 10 anos, sob sombra, manejada à pleno sol em relação aos incrementos de (A) diâmetro, (B) altura e (C) volume por ha.

variações espaciais e temporais de luz, que têm um papel chave na determinação da regeneração (Hartshorn, 1980; Viana, 1990; Molofsky & Augspurger, 1992). Existem evidências que a inter-relação entre as variações de luz e vegetação são especialmente importantes em matas de várzea (Schubart, 1983). Neste contexto, a virola é uma espécie típica de colonização de áreas perturbadas, onde a luminosidade é alta (Howe, 1990). As mudas desta espécie se desenvolvem preferencialmente nestes locais, devido à facilidade de dispersão de suas sementes e ao rápido crescimento (Howe & Shupp, 1985).

A dispersão é influenciada pelas marés, que fazem oscilar o nível da água no interior das florestas de várzea, principalmente nos períodos mais chuvosos, quando os processos de regeneração e crescimento são altamente dinâmicos (Macedo & Pina-Rodrigues, 1992). O crescimento da virola é maior em locais onde a ocorrência de luz é intensa no início e mais moderada na fase adulta (Fischer *et. al.*, 1991). Desta forma, havendo maior incidência de luz, haverá maior crescimento em altura, diâmetro, e poda natural, até a espécie atingir níveis de dominância no interior da floresta (Figura 2).

Figura 2: Representação idealizada da predição quanto ao crescimento da virola a uma maior ou menor incidência de luz. O ponto intermediário representa um crescimento ótimo.

1.2.2. Drenagem

Na várzea do estuário amazônico, as inundações representam outro fator ecológico importante na determinação da natureza dos ecossistemas locais (Morán, 1990; Prance, 1980). Pequenas variações topográficas provocam grandes modificações na hidrologia e exercem um grande efeito no comportamento das espécies componentes das várzeas (Figura 3).

Figura 3: Representação idealizada da predição do crescimento da virola em função de cada local. O ponto de maior crescimento representa drenagem ótima para a espécie.

1.3. Predições

Havendo maior incidência de luz, haverá maior crescimento. Portanto, a liberação de luz dentro da floresta ao longo dos anos -- via técnicas de manejo silvicultural -- deve criar condições mais adequadas para o estabelecimento de plantios em florestas onde já sofreram algum tipo de exploração. A drenagem também influencia no crescimento da virola. Nos locais onde os solos são bem drenados o desenvolvimento da virola deve ser maior.

Serão consideradas nesta pesquisa as seguintes predições:

Principais Fatores		Crescimento Muda (≤ 5 cm)
Luz	Pouca luz Muita luz Luz intermediária	Baixo Médio Alto
Drenagem	Solo pouco drenado Solo bem drenado	Baixo Alto

1.4. Objetivos

Testar os efeitos das variações de luz, em conjunto com variações de drenagem dos solos de várzea associadas à mudanças na topografia, sobre o estabelecimento de mudas de virola.

2. Material e métodos

2.1. O local de estudo.

Vide descrição na seção 2 do Capítulo I (pág. 3) e Figura 1 (pág. 4).

2.2. Intensidades de exploração: Tratamentos de abertura das copas

Dentro de uma área explorada de 7,84 ha, foi implantado um sistema de enriquecimento utilizando mudas de *Virola surinamensis* (Figura 4). Foram criadas quatro situações de abertura do dossel, partindo-se de uma condição inicial oriunda de uma floresta não explorada (tratamento 1); seguida pela retirada de 25%, 50% e 75% da área basal das árvores adultas (tratamentos 2, 3 e 4, respectivamente). O corte das árvores foi feito a partir das classes diamétricas superiores, levando-se em consideração a densidade por espécie. Levou-se também em consideração a distribuição espacial das árvores para a obtenção de uma liberação das copas o mais regular possível.

Figura 4: Distribuição das parcelas na área de estudo.

2.3. O sistema de enriquecimento

Para cada nível de retirada de área basal foram utilizadas quatro parcelas quadradas de 0,49 ha (70 x 70 metros), totalizando 1,96 ha de área explorada. A área plantada dentro de cada parcela foi de 0,16 ha totalizando 0,64 ha de área plantada, por tratamento. O esquema abaixo mostra o croqui das parcelas:

Foi utilizado o sistema de raiz nua para a produção das mudas de virola no plantio de enriquecimento dentro das parcelas. Este método foi o mais utilizado nos últimos anos em projetos de reflorestamento com *Virola surinamensis* no estuário (Lemos, 1974; Kanashiro & Yared, 1991), e mostrou eficiência de operação e racionalização de custos (Macedo & Pina-Rodriguez, 1992).

As sementes foram obtidas da maneira mais tradicional, ou seja, flutuando nos igarapés ao longo da floresta, da mesma maneira que eram coletadas pelas populações tradicionais, quando as sementes de virola possuíam valor econômico para a produção de saponina (cêra de ucuúba) entre 1930 e 1960 (Rodrigues, 1972).

As sementes foram germinadas em sementeira suspensa, utilizando como substrato pó de serragem. Após o período de germinação (aproximadamente 15 dias), as plântulas com aproximadamente 10 cm foram classificadas, e foram eliminadas aquelas que não apresentavam boa forma da radícula.

A preparação do viveiro exigiu pouca mão-de-obra e material. Em um local situado a beira de um igarapé, retirou-se apenas as palmeiras e a vegetação rasteira, incluindo as raízes, gerando um nível de sombreamento de aproximadamente 50%. Com a permanência da vegetação arbórea, foram feitos os canteiros no próprio solo dentro da floresta, com largura aproximada de um metro e comprimento de no máximo 20 metros.

A marcação do plantio nos canteiros foi feita com o auxílio de uma placa de compensado de aproximadamente 1 m² perfurado a cada 10 cm, totalizando uma densidade de 100 mudas/m² nos canteiros.

Após a perfuração do solo, foi feito o plantio das mudas repicadas da sementeira. Após três meses, as mudas já estavam aptas ao plantio. Nesta fase houve nova seleção de mudas com altura variando de 25 a 50 cm, que foram retiradas dos canteiros com auxílio de uma pá. As mudas receberam ainda um pequeno desbaste do sistema radicular antes de seguir para o plantio.

O plantio das mudas ocorreu no período das chuvas (fevereiro a março). O espaçamento utilizado foi a metodologia desenvolvida por Nelder (1973). Este método consiste de um desenho de espaçamento sistemático composto por um gride de pontos, baseado na propriedade, em que a área ocupada por cada planta muda numa forma consistente sobre as diferentes partes deste gride, conforme o esquema abaixo.

Este método de plantio possui vantagens como a diminuição da área experimental e redução dos custos de implantação, manutenção e tempo de medição das parcelas (Briscoe, 1990).

2.4. Medições: Classes de porcentagem de luz

Medições exatas da intensidade de luz que penetram no interior da floresta são difíceis de serem executadas. Haverá sempre diferenças em qualquer ponto, dependendo da hora do dia, da quantidade de nuvens e mesmo da época do ano (Pitt, 1969; Cersósimo, 1993). Para determinar a intensidade de luz solar, foi utilizado um luxímetro. Nas parcelas de 40 x 40 metros deste estudo, foram alocados 144 pontos de medição, coincidindo com a posição de cada muda no interior das parcelas. Foram tomadas duas medições para cada ponto, com altura do aparelho situada sempre a 1 metro acima do solo. Antes e após à medição de cada parcela, foram retirados valores a pleno sol para obtenção dos valores máximos de luz. Estas medições foram feitas sempre no horário das 11:00 às 14:00 em dias de sol e céu limpo durante o período de verão amazônico (de agosto a setembro).

2.5. Levantamento topográfico

As várzeas são terrenos alagados diariamente pelas marés normais. Nos locais mais baixos, a inundação pelas marés é constante, o que não acontece com as várzeas altas, que são atingidas apenas pelas marés de maior amplitude (Dubois, 1970). A virola tem mostrado melhor desempenho em solos com boa drenagem (Cruz, 1991). Para testar este fator, em cada parcela inventariada foi feito um levantamento taqueométrico², estabelecendo-se uma malha de pontos a cada 10 metros, de onde retirou-se as quotas topográficas do terreno. Após a confecção dos mapas planialtimétricos, foram plotadas nestes mapas a posição de cada muda plantada no campo.

3. Resultados e discussão

3.1. Crescimento

3.1.1. Em diferentes regimes de luz

A intensidade de luz após a exploração em cada um dos tratamentos se caracterizou de maneira bem distinta. Foi observado um gradiente bem suave à medida que se intensificaram as aberturas na floresta (Figura 5). Em ordem crescente de porcentagem de luz foram obtidas as seguintes médias: 5.6% para o tratamento 1, 13.5% para tratamento 2, 24.8% para o tratamento 3 e 40.1% para o tratamento 4. Foram encontradas diferenças significativas pelo teste F entre os tratamentos ($F = 24.11$, $\text{prob} < 0.0001$). Feita a comparação de médias dos tratamentos pelo teste de Duncan ($\alpha = 0.05$), foram obtidas quatro intensidades luminosas distintas, sendo confirmada desta maneira a caracterização dos diferentes regimes de luz em relação aos diferentes níveis de exploração (Figura 5).

² Técnica utilizada para a confecção de mapas topográficos utilizando-se um teodolito, aparelho dotado de um binóculo que faz vizadas a grandes distâncias, de onde se retira os ângulos para o cálculo de área e nivelamento do terreno.

Figura 5: Níveis de luminosidade (%) para os diferentes tratamentos.

Com relação à frequência por classes de luz, no tratamento 1, 33.9% de todas as mudas pertenceram à classe I e apenas 3.3% das mudas à classe V, enquanto no tratamento 4, 13.7% pertenceram à classe I e 55.4% à classe V (Tabela 1). No tratamento onde foram observadas o maior número de clareiras (tratamento 4), a distribuição das mudas em relação às classes de luz foi bem mais uniforme. Após 24 meses de observações ($n = 419$), foram observados 43% para classe I, 12.7% para a classe II, 13.8% para a classe III, 10.7% para a classe IV e 19.8% para a classe V (Figura 6).

Tabela 1: Distribuição do total das mudas em cinco classes de luz para todos os tratamentos.

Classes de Luz	% de Luz	Total de Mudas
I	0 - 19.9	1.316
II	20 - 39.9	183
III	40 - 59.9	1499
IV	60 - 79.9	88
V	> 80	150

Com relação ao crescimento das mudas, na classe V como era esperado, foi observada a maior média de crescimento (0.4 m) e o maior valor máximo 1.6 m (Figura 6). Para evidenciar melhor o desempenho das mudas em cada tratamento, utilizou-se os valores de crescimento das 100 mudas com maior altura (altura dominante). Foram obtidos os seguintes valores médios para cada tratamento após 24 meses: 0.21 m para T1, 0.44 m para T2, 0.66 para T3 e 0.72 para T4 (Figura 7).

Foram realizadas quatro medições ao longo de todo o experimento, compreendendo 24 meses de observações. Durante as medições da altura de crescimento foram observados alguns comportamentos em relação à arquitetura das mudas. O fato que chamou a atenção foi a queda do ponteiro. No tratamento sem abertura (testemunha) foi observado a maior ocorrência deste fenômeno, o que acarretou em crescimento negativo de algumas mudas. Na Figura 8 observa-se um decréscimo no número de mudas com crescimento negativo a medida em que há um aumento na incidência de luz (tratamentos 2 e 3). Entretanto, no tratamento 4 (de maior abertura), houve um pequeno acréscimo no número de mudas com incremento negativo se comparado com o tratamento 3.

Figura 6: Altura (m) das mudas por tratamento (média e desvio padrão), por classes de luz.

Figura 7: Altura das (m) das 100 maiores mudas por tratamento (média e desvio padrão).

Figura 8: Número de mudas com incremento negativo por tratamento.

3.1.2. Em diferentes situações topográficas

Para a análise dos dados foram estabelecidas duas condições topográficas: (i) topografia alta e (ii) topografia baixa. O critério utilizado para esta diferenciação foi o cálculo da mediana (1.63 m), em função da cota topográfica mais alta (2.43 m) e a cota mais baixa (1.11 m), observada em todas as parcelas (Figura 9).

Figura 9: Representação do nível topográfico estabelecido para todas as parcelas.

Utilizando-se as médias por parcela das cotas alta e baixa, foi realizado um teste t, onde obteve-se diferença significativa para a classificação sugerida acima ($\text{Prob} < 0.0001$). Definidas então a existência entre áreas baixas e altas, pode-se avaliar o crescimento das mudas por classe topográfica e por tratamento, após 24 meses de experimento. Não foram observadas diferenças significativas no crescimento das mudas em relação às variáveis topográficas alta (média = 0.20 m) e baixa (média = 0.23 m) ($\text{Prob} > 0.863$). Comparadas as médias dos tratamentos pelo teste de Duncan ($\alpha = 0.05$), não foram encontradas diferenças significativas para os tratamentos 1 e 2, onde foram encontradas os seguintes valores médios de crescimento: 0.18 m e 0.07 m, respectivamente. Já para os tratamentos 3 e 4, foram encontradas diferenças significativas com as seguintes médias: 0.34 m e 0.29 m, respectivamente.

3.1.3. Interação: Luz x topografia

Para as variáveis luz e topografia, não foram obtidas diferenças significativas no crescimento das mudas ($\text{Prob} > 0.4353$). Apesar de ser esperada esta interação, o efeito das aberturas realizadas em função da exploração causou um maior crescimento das mudas à medida que aumentou a porcentagem de entrada de luz.

Analisando-se a Figura 10, pode-se observar duas situações distintas. Primeiro, para os tratamentos 1 e 2 houve maior crescimento das mudas nas áreas de topografia baixa. Este fato pode ser explicado pela pouca mudança no microclima no interior destas parcelas, pois não ocorreram muitas modificações na evapotranspiração. Segundo, para os tratamentos 3 e 4 foi observado um maior crescimento das mudas nas áreas mais altas (Figura 10).

Figura 10: Altura (m) das mudas em função da interação entre luz e topografia.

3.2. Sobrevivência

3.2.1. Em diferentes regimes de luz

Foram obtidos os seguintes valores médios para a mortalidade das mudas: 16.4%, sd = 6.32 (T1); 15.8%, sd = 2.36 (T2); 19.5%, sd = 5.08 (T3); e 27.3%, sd = 3.56 (T4).

Foram observadas diferenças significativas entre tratamentos, num nível crescente de mortalidade em função do aumento de luz, respeitando a ordem dos tratamentos (Prob < 0.0146). Entretanto, apenas o tratamento 4 diferiu em relação as médias dos outros tratamentos pelo teste Duncan ($\alpha = 0.05$) (Figura 11). Como foi observada uma tendência dos dados, foi efetuada uma análise de regressão linear simples, onde procurou-se correlacionar a porcentagem de entrada de luz com a porcentagem de mudas mortas. Na Figura 12, observa-se uma correlação positiva entre as variáveis anteriormente citadas. Obteve-se um coeficiente de correlação de 0.39 e significância na análise de variância (Prob < 0.009).

Figura 11: Mortalidade de mudas por tratamento (média e desvio padrão).

Figura 12: Relação entre a porcentagem de mudas mortas e o aumento na intensidade luz.

3.2.2. Em diferentes situações topográficas

A variação topográfica não gerou diferenças significativas no número de mudas mortas ($\text{Prob} > 0.5713$). Portanto, a hipótese que longos períodos de alagamento poderiam afetar principalmente a fase inicial do plantio (pegamento das mudas) não foi sustentada. Cabe lembrar que o plantio foi efetuado na época mais chuvosa na região (fevereiro e março).

3.2.3. Interação: Luz x topografia

Considerando-se estes dois fatores, também não foram observadas diferenças significativas para a variável mortalidade das mudas ($\text{Prob} > 0.7616$). Entretanto, como foi observado para a variável crescimento, houve um aumento do número de mudas mortas à medida que aumentava a intensidade de luz (Figura 13). Exceto no tratamento 2, se observa que a mortalidade das mudas foi sempre maior nas áreas mais altas, o que nos leva a concluir que o efeito topográfico atua no desenvolvimento das mudas. Entretanto, os dados apresentados não demonstram que existe uma influência de um fator sobre o outro, após 24 meses de plantio.

Figura 13: Porcentagem de mudas mortas para topografia alta e baixa.

4. Conclusão

A intensidade de luz após a exploração em cada um dos tratamentos foi bem distinta. Observou-se um aumento da luminosidade à medida que se intensificaram as aberturas na floresta. Confirmou-se a hipótese inicial de que haveria maior crescimento das mudas nas áreas mais abertas.

Houve maior tendência de ocorrência de quebra de ponteiros nos locais mais fechados, acarretando incremento negativo de algumas mudas, o que pode indicar que a virola é uma espécie típica colonizadora de clareiras, como observado por Howe (1990) e Fisher *et. al.* (1991).

Comparados os efeitos do crescimento das mudas em relação a interação entre luz e topografia, não foram obtidas diferenças significativas, apesar de existir uma tendência de haver maior crescimento das mudas à medida que aumentou a porcentagem de entrada de luz. Não foi confirmada a hipótese inicial de que nos locais mais altos e com maior intensidade de luz haveria maior crescimento das mudas.

Com relação à sobrevivência das mudas, após 24 meses de observações, foi obtido uma maior porcentagem de mortalidade a medida que aumentou a intensidade de luz.

O efeito esperado de que longos períodos de alagamento afetariam a fase inicial do plantio (pegamento das mudas) não foi observado. A porcentagem de mortalidade das mudas foi abaixo de 25%, o que para a silvicultura da espécie é um dado muito importante para o planejamento de projetos de enriquecimento neste tipo de floresta, implicando no dimensionamento dos viveiros, contratação de pessoal e planejamento de replantio que são atividades que oneram muito tais projetos. Os tratamentos silviculturais mais adequados para a espécie implicam na prescrição de cortes de liberação na floresta. Esta técnica pode tornar disponível para o mercado regional uma grande variedade de produtos madeireiros e não madeireiros e incrementar o retorno econômico para as comunidades ribeirinhas.

5. Bibliografia

- Anderson, A.B.; Mousasticoshvily, I. & Macedo, D.S. 1992. **Impactos ecológicos e sócio-econômicos extração seletiva de virola no estuário amazônico: Implicações para políticas florestais brasileiras.** Relatório final a WWF-US. Rio de Janeiro. 52p.
- Barros A.C. & C. Uhl. 1995. Logging along the Amazon River and Estuary: Patterns, problems and potencial. **Forest Ecol. and Management**, 77: 87-105.
- Baur, G.N. 1968. **The ecological basis of rain forest management.** Forestry Commission of New South Wales, Sidney. 499 p.
- Briscoe, C.B. 1990. Manual de ensayos de campo con arboles de usos múltiples. Winrock International, Arlington, VA. **Manual no. 3.** 143 p.
- Cersósimo, L.F. 1993. Variações espaciais e temporais no estabelecimento de plântulas em trecho de floresta secundária em São Paulo, SP. **Dissertação de Mestrado.** Instituto de Biociências/USP. 195 p.
- Cruz, E. C. da, 1991. Situação atual da silvicultura e do manejo florestal sustentado em áreas de várzea rivular. In: **O desafio das florestas neotropicais.** Curitiba. UFPr. Anais. p. 59-76.
- Dubois, J., 1970. Características e distribuição geográfica das florestas naturais de folhosas no Brasil reflorestamento para produção de madeira de serraria: tendências e possibilidades. **Silvicultura em São Paulo**, 7:111-126.
- Evans, J. 1982. **Plantation forestry in the tropics.** Oxford University Press. London. 472 p.
- Fanzeres, A. 1989. **Germinação e crescimento de Virola surinamensis (Rol.) Warb. em um ecossistema de várzea: base ecológica para recomendações técnicas.** Relatório. 24 p.
- Fisher, B.L.; Howe, F.H. & Wright, J.S. 1991. Survival and growth of *Virola surinamensis* yearlings: Water augmentation in gap and understory. **Oecologia**, 86:292-297.
- Hartshorn, G. S. 1980. Neotropical forest dynamics. **Biotropica** 12 (supl.):23-30
- Howe H.F.; Shupp, E.W. & L.C. Westley. 1985. Early consequences of seed dispersal for a neotropical tree (*Virola surinamensis*). **Ecology**, 66(3):781-791
- Howe, F. H. 1990. Survival and growth of juvenile *Virola surinamensis* in Panama: effects of herbivory and canopy closure. **J. of Tropical Ecology**, 6:259-280.

- Kanashiro, M. & J.A.G. Yared. 1991. Experiências com plantios florestais na Bacia Amazônica. In: **O Desafio das florestas tropicais**. Curitiba, PR. UFPR/GTZ. p. 117-37.
- Kubstky, K & A. Zibursky. 1994. Seed dispersal in flood plain forests of Amazonia. **Biotropica**, 26(1): 30-43.
- Lemos, J.M. 1974. Reflorestamento com *Virola surinamensis* (Ucuúba da várzea) na Ilha de Marajó. In: **II CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO**. FIEP. Curitiba, PR. p. 110-113.
- Lugo, A.E.; Brown S. & M.M. Brinson. 1988. Forested wetlands in freshwater and salt-water environments. **Limnol. Oceanogr.**, 33(4, part 2): 894-904.
- Macedo, D. S. & A. B. Anderson. 1993. Ecological impacts and policy implications of selective logging in the Amazon Estuary. **Biotropica**, 25(2): 151-163.
- Macedo, D. S. & Pina-Rodriguez, F.M. 1992. **Manejo e conservação genética de *Virola surinamensis* no estuário amazônico**. Relatório técnico submetido a WWF-US. 70 p.
- Molofsky, J. & C. K. Augspurger. 1992. The effect of leaf litter on early seedling establishment in a tropical forest. **Ecology**, 73(1): 68-77.
- Morán, E.F. 1990. **A Ecologia Humana das Populações da Amazônia**. Vozes, Petrópolis, RJ. 367 p.
- Mousasticoshvily Jr., I., 1992. Comercialização e industrialização da virola no estuário amazônico. **Dissertação de Mestrado**, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 140 p.
- Nelder, J. A. 1973. New kinds of systematic designs for spacing experiments. **Biometrics**, September.
- Oldfield, S. 1988. **Rare tropical timbers**. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 48 p.
- Pitt, J. 1969. **Relatório ao Governo do Brasil sobre a aplicação de métodos silviculturais a algumas florestas da Amazônia**. Belém. SUDAM. 1969. 245p.
- Prance, G.T. 1980. A terminologia dos tipos de florestas sujeitas a inundação. **Acta Amazonica**, 10(3):495-504.
- Rodriguez, W. A. A Ucuúba da várzea e suas aplicações. **Acta Amazonica**, 2(2):29-47. 1972.
- Schubart, H.O.R. 1983. Ecologia e utilização das florestas. In: Salati et al. **Amazônia: Desenvolvimento, integração e ecologia**. São Paulo. Brasiliense/CNPq. 101-143.
- Schulz, P.P.e P.L. Rodrigues, 1966. Forest plantation in Suriname. **Revista Forestal Venezuelana**, 9(14): 5-36.

- Sioli, H. 1984. The Amazon and its main affluents: Hydrography, morphology of the river courses, and river types. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p.127-66.
- Sombroek, W.G. 1984. Soils of the Amazon region. In: **The Amazon: limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin**. H. Sioli Editor. W. Junk Publishers. Boston. p.521-36.
- Uhl, C. 1990. Wood as an Economic catalyst to ecological change in Amazônia. In: **Economic Catalysts to ecological change**. 39th Annual conference. Center for Latin American Studies. Univ. of Florida. 177p.
- Viana, M. V. 1990. Seed and seedling availability as a basis for management of natural forest regeneration. In: **Alternatives to reforestation**. Anderson, A.B. editor. Columbia Univ. Press. New York. 97-115p.

Capítulo III

Comportamento inicial da regeneração natural numa floresta de várzea sob diferentes intensidades de exploração

1. Introdução

1.1. Regeneração e sucessão

Nas florestas tropicais o aumento na quantidade de luz associada à queda de árvores e consequente formação de clareiras é importante para a sobrevivência e crescimento das plantas, especialmente no sub-bosque com pouca incidência de luz (Denslow & Diaz, 1990). Esta maior incidência de luz é comumente associada com o maior crescimento e decréscimo da mortalidade de muitas espécies típicas de pequenas clareiras (Forget, 1994).

A regeneração, sobrevivência e crescimento de plântulas de espécies arbóreas dependem da interação de fatores bióticos e abióticos do meio ambiente do interior da floresta, como intensidade luminosa, temperatura, umidade e fertilidade do solo, bem como de patógenos (Whitmore, 1978; Ewel, 1983; Khan et al., 1986; Vásquez-Yanes & Orozco-Segovia, 1990).

A ocupação do espaço no interior da floresta em virtude da abertura da dossel é determinada pela presença de plântulas e arvoretas no local quando a clareira é formada e é, a princípio, uma função da abundância relativa e distribuição da regeneração pré-existente (Denslow, 1987).

A adaptação entre as espécies é variável a cada estágio de sucessão, como é o caso das espécies que se adaptam melhor durante as fases iniciais de sucessão, bem como, outras que dominam as fases mais adiantadas (Botkin & Talbot, 1991). O desenvolvimento das florestas tropicais ocorre em longos períodos, e proporciona desta maneira, vários tipos de habitats, aumentando as chances para espécies cuja sobrevivência só ocorre em alguns estágios de sucessão (Brokaw, 1987).

1.2. O problema

1.2.1. A exploração seletiva: Técnica não sustentável

De maneira geral, o impacto ecológico causado sobre a floresta, como um todo, depende da sua composição florística, da natureza e intensidade de exploração, e de espécies ou tipo de recurso que é explorado (Hutchinson, 1986; Uhl & Vieira, 1989; Peters, 1994). A ocorrência de mortalidade excessiva da regeneração natural pode gerar um estoque inadequado de espécies desejáveis para o futuro (Martini *et al.*, 1994). Outro aspecto negativo é que estes métodos reduzem as taxas de crescimento da floresta remanescente, fazendo com que os períodos entre os cortes sejam cada vez mais longos (Panayotou & Ashton, 1992). Cada passo da exploração atual, incluindo a derrubada, arraste e extração, é uma fonte em potencial de dano que pode diminuir seriamente o valor da floresta explorada (Verríssimo *et al.*, 1992 e 1995).

A alta diversidade de espécies madeireiras impõe restrições ecológicas no manejo das florestas tropicais (Hartshorn, 1989), como a baixa quantidade de volume obtida por unidade de área (Alder, 1992). Várias técnicas silviculturais tem sido testadas, como para enriquecer a regeneração natural e liberar as árvores suprimidas e/ou o plantio na forma de mudas (Baur, 1968; Evans, 1982). Entretanto, a devida atenção não é dada ao manejo das florestas tropicais, na base do conceito da dinâmica de clareiras (Oldeman, 1978; Hartshorn, 1980). O fato de que as espécies tradicionais e mais valiosas estão cada vez mais escassas, está fazendo com que o mercado atual de madeira se volte para as espécies dependentes deste tipo de manejo (light hardwoods), e que também possuem madeira de boa qualidade (De Camino, 1993).

A abundância e diversidade da regeneração de espécies arbóreas obtidas em virtude de aberturas artificiais simulando clareiras, estão demonstrando ótimas possibilidades de capacidade regenerativa em florestas tropicais (Bushbacher, 1990; Synnott, 1992; Korning & Balslev, 1994).

1.3. Hipóteses e predições

Para a implantação de técnicas do "bom manejo" mais adequadas às florestas tropicais, são necessárias bases ecológicas sólidas, especialmente com relação às fases sucessionais das espécies de maior interesse econômico. Portanto, a hipótese deste estudo se baseia em que havendo este conhecimento, serão assegurados os processos de decisão dos tratamentos silviculturais mais adequados para o tipo de floresta a ser explorada, em função das espécies que dominam o seu estágio atual, e de espécies que podem ter sua importância em termos ecológicos e econômicos num futuro próximo.

1.4. Objetivos

Foram criadas quatro situações de manejo, desde a floresta sem nenhuma intervenção até abertura das copas das árvores adultas na forma de um ambiente bastante perturbado por uma exploração seletiva. Desta maneira, o gradiente que foi criado reflete uma floresta em diferentes estágios de sucessão e/ou recuperação. Espera-se que a resposta da regeneração natural das espécies componentes possa dar indicativos de como e em qual estágio de sucessão as espécies se estabelecem ou competem, principalmente pelo fator luminosidade. Com este experimento pretendeu-se conhecer melhor o esquema de sucessão deste tipo de floresta e fornecer informações para o manejo das suas espécies.

2. Material e métodos

2.1. O local de estudo

Vide descrição na seção 2 (pág. 3) e Figura 1 (pág. 4) do Capítulo I e Figura 4 do Capítulo II (pág. 29).

2.2. Intensidades de exploração: Tratamentos

Foram estabelecidas parcelas de 4 m² (2 x 2 metros) para avaliar o comportamento da regeneração natural de três intensidades de manejo pré-existentes (após 24 meses), envolvendo a exploração seletiva de árvores acima de 30 cm de DAP (diâmetro acima do peito). Foram estabelecidas também parcelas em locais de floresta não explorada (Tratamento 1 ou T1), para efeito de comparação. As três intensidades de manejo são descritas abaixo:

(I): retirada de 25% da área basal da floresta (Tratamento 2 ou T2);

(II): retirada de 50% da área basal da floresta (Tratamento 3 ou T3); e

(III): retirada de 75% da área basal da floresta (Tratamento 4 ou T4).

Os tratamentos foram comparados estatisticamente (Tabela 1), utilizando uma amostragem da população adulta, ou seja, árvores com diâmetro maior ou igual a 10 cm. Antes da exploração todos os locais amostrados não diferiram estatisticamente em relação a área basal, abundância, número de espécies e incidência de luz. Após a retirada das árvores -- respeitando os diferentes níveis de manejo -- as áreas foram consideradas estatisticamente distintas em relação as mesmas variáveis. Não houve redução no número de espécies após a aplicação dos tratamentos (Tabela 1).

Tabela 1: Médias da área basal, abundância e número de espécies por tratamento para avaliar a homogeneidade da área experimental. Valores calculados pelo programa SAS (Ronald & Smith, 1984).

Tratamentos	Área Basal (m ² /ha)	Abundância (n/ha)	Número de Espécies
T1	26,918	438,25	32
T2	25,031	422,75	31
T3	27,938	423,75	35
T4	25,919	418,5	34
Valor F	0,89 ns	0,16 ns	0,70 ns
C.V. (%)	10,07	10,22	14,7
Média	26,4515	425,81	33

2.3. Amostragem

O processo de amostragem obedeceu a seguinte sequência. Foram instaladas parcelas principais de forma quadrada e tamanho de 0,49 ha (70 x 70 metros) para a abordagem da população adulta referentes às árvores com DAP ≥ 10 cm. Dentro da parcela principal foram deixados 15 metros de bordadura em cada lado. A partir do centro da parcela principal foram estabelecidas 4 sub-parcelas de 40 m² (2 x 20 metros) que foram sub-divididas em 10 microparcelas de 4 m² (2 x 2 m), totalizando 37 microparcelas (148 m²) para medição da regeneração natural em cada parcela principal. Para cada tratamento foram instaladas 4 parcelas principais, 16 subparcelas e 148 microparcelas. No total foram inventariadas 16 parcelas principais, 64 subparcelas e 592 microparcelas (Figura 1).

Figura 1: Desenho esquemático do tamanho e forma das parcelas em campo

2.4. Identificação das espécies

Foram caracterizados todos os indivíduos entre 10 cm a 1,50 m de altura. No campo, os indivíduos foram classificados segundo as suas formas de vida: árvores, arbustos, cipós, ervas, palmeiras e gramíneas (Ewel, 1982; Lopez, 1993), como primeiro passo para interpretação do gradiente de luz e seus efeitos na composição da regeneração natural das espécies após 2 anos de exploração. A coleta e posterior identificação botânica foi feita por técnicos do Departamento de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.

2.5. Estrutura da regeneração

Foram calculadas a abundância e frequência (Hosokawa, 1986; Lamprecht, 1990) de todas as espécies identificadas. Com os resultados obtidos do cálculo da abundância e frequência relativas, foram somadas todas as porcentagens referentes à estas duas variáveis para todas as espécies em função dos seus grupos, por tratamento. Para o cálculo da diversidade foram obtidos os seguintes índices:

- Índice de Margalef (D_{Mg}): É definido como um índice de riqueza de espécies, combinando o número de espécies identificadas (S) e o número de indivíduos somados de todas as espécies (N) (Magurran, 1987).

$$D_{Mg} = \frac{(S-1)}{\ln N}$$

- Índice de Shannon (H'): índice de heterogeneidade, onde, P_i é a relação entre o número de indivíduos da espécie (n_i) e o número total de indivíduos (N) ou seja $P_i = n_i/N$. Este índice se baseia na abundância proporcional de espécies (Southwood, 1978; Dias, 1993):

$$H' = -\sum P_i \cdot \ln P_i$$

- Índice de similaridade de Jacquard: Este índice é a proporção do número de unidades amostrais onde duas espécies

ocorrem em relação ao número total de unidades amostrais onde no mínimo uma das espécies é encontrada (Ludwig & Reynolds, 1988):

$$IJ = \frac{j}{(a + b - j)}$$

Para o cálculo utiliza-se um determinado número de amostras (a, b, c, ..., n) de uma população de espécies com as suas frequências conhecidas. O índice é calculado dividindo-se o número de espécies comuns entre duas parcelas (J) pelo número de espécies em cada parcela descontado o número de espécies comuns entre ambas.

3. Resultados e discussão

3.1. Relação entre o número de espécies e o número de parcelas

Em função dos diferentes níveis de exploração e consequente abertura da floresta, foi criado um gradiente de intensidades de luz (Figura 2), que desencadeou processos de recrutamento mais ou menos avançados em função do tamanho das clareiras que foram abertas. Os níveis médios de entrada de luz para os tratamentos 1, 2, 3 e 4 foram respectivamente: 5.6%, 13.5%, 24.8% e 40.1%, onde encontraram-se diferenças significativas entre os mesmos ($P < 0.0001$).

Figura 2: Médias por tratamento da porcentagem de entrada de luz, resultante da abertura das copas durante a exploração florestal (média e desvio padrão).

O número de indivíduos variou entre parcelas e tratamentos. As curvas de espécie/área mostraram uma tendência de estabilidade com o aumento da área amostrada, indicando suficiência de amostragem para todos os tratamentos (Figura 3). Para os quatro tratamentos, o número mínimo necessário de parcelas de 4 m² para cada tratamento foi de 102 (408 m²) no T1, 124 (496 m²) no T2, 130 (520 m²) no T3 e 93 (372 m²) no T4. Em cada curva (Figura 3) é destacado o ponto em que um aumento de área equivalente a 10% da área amostrada corresponde a um aumento no número de espécies equivalente a 10% do total de espécies da amostra (Oosting, 1951; Barros, 1986). Entretanto, houve um ligeiro acréscimo do número de espécies após a obtenção destes pontos, mostrando que existe um aumento contínuo de espécies novas à medida que a amostragem é aumentada.

3.2. Estrutura da regeneração

3.2.1. Composição florística

As famílias Leguminosae e Arecaceae (palmeiras) tiveram o maior número de espécies em todos os tratamentos. Além destas duas famílias foram também representativas as famílias Polypodiaceae (tratamentos 1, 2 e 3), Bignoniaceae (tratamento 1), Maranthaceae (tratamentos 2 e 3), Euphorbiaceae (tratamentos 2 e 4) e Rubiaceae (tratamentos 2, 3 e 4) (Figura 4). As palmeiras contribuíram com 10.8%, 6.4%, 7.1% e 6.3% do total de espécies para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. O tratamento 3 contribuiu com o maior número de famílias (n = 38), gêneros (n = 83) e espécies (n = 99). Os tratamentos 1 e 2 obtiveram valores próximos, caracterizando-se por possuírem um número menor de espécies, ficando o tratamento 4 como intermediário (Figura 5).

Figura 3: Número de espécies em função do aumento de parcelas (4 m²) para os tratamentos 1, 2, 3 e 4.

Figura 4: Distribuição das famílias botânicas identificadas no local de estudo e sua distribuição para cada tratamento.

Figura 5: Proporção do número de famílias, gêneros e espécies em relação a cada tratamento.

3.2.2. Grupos de espécies: padrões de recrutamento em função da abundância e frequência relativas

Para as árvores, abundância e frequência foram maiores no tratamento 1, diminuindo nos outros tratamentos (Figura 6-A). Entretanto, é evidente uma tendência de recrutamento pelas espécies arbóreas mais exigentes em luz. A mesma tendência é observada para os arbustos (Figura 6-A).

Um fato interessante é que a frequência e abundância de cipós se manteve constante, embora a composição das espécies variou em função da variação de luz para cada ambiente (Denslow, 1980; Putz, 1984) (Figura 6-A).

As palmeiras tiveram os valores de abundância e frequência diminuídos a medida que aumentou a entrada de luz, chegando no tratamento 4, a ter menos da metade dos valores em relação ao tratamento 1 (Figura 6-B). Os valores para o grupos de espécies de ervas e gramíneas obtiveram resultados esperados em relação às observações de campo, ou seja, houve um aumento nos locais mais abertos. As espécies de ervas apresentaram uma elevada porcentagem de abundância e frequência em todos os tratamentos, bem como, em relação ao demais grupos (Figura 6-B).

Figura 6: A - Abundância e frequência de: árvores, arbustos e cipós, nos quatro tratamentos.

Figura 6: B - Abundância e frequência de: ervas, palmeiras e gramíneas, nos quatro tratamentos.

3.2.3. Índices de diversidade

Os índices de riqueza (Margalef), de heterogeneidade (Shannon), e de similaridade (Jacquard), foram calculados com o objetivo de visualizar a dinâmica da regeneração natural entre os tratamentos. Não foi possível a comparação destes índices com florestas de várzea em semelhantes condições, por não haver disponibilidade na literatura de estudos deste tipo para várzeas na região amazônica.

Os índices de heterogeneidade levam em consideração tanto a regularidade como a riqueza de espécies, e se baseiam na abundância proporcional das espécies. O índice de Shannon (Magurran, 1987) assume que os indivíduos são aleatoriamente amostrados de uma população infinitamente grande, e que todas as espécies estão representadas na amostra. Este índice atribui um peso maior às espécies raras.

Com relação aos tratamentos, o índice de Shannon caracterizou os extremos (tratamentos 1 e 4). Nestes tratamentos, existem condições propícias para a ocorrência de espécies típicas (especialistas) de ambientes com bastante sombra (tratamento 1), ou de clareiras grandes (tratamento 4). Consequentemente, o número de indivíduos por espécie é proporcionalmente menor, devido às condições ecofisiológicas definidas, aumentando desta maneira, a sensibilidade do índice em questão (Tabela 2).

Tabela 2: Relação dos índices de riqueza e heterogeneidade de espécies calculados para os vários tratamentos.

Trat	Nº Esp	Indiv./ha	Índice de Heterogeneidade	Índice de Riqueza
			Shannon	Margalef
1	65	25.064	2.76	6.32
2	63	37.804	2.17	5.88
3	99	50.609	2.68	9.05
4	79	31.218	2.87	7.54

Índices de riqueza tentam caracterizar a relação entre o número de espécies por um número determinado de indivíduos. No caso dos tratamentos, o índice de Margalef (Magurran, 1987) atribuiu um maior valor ao tratamento 3, que possui um maior número de espécies, mas que ao mesmo tempo, possui o maior número de indivíduos por área amostrada. Este se mostrou bem confiável, pois não atribui pesos muito altos às espécies mais comuns, e sim à comunidade como um todo, principalmente para as espécies com valores intermediários (Tabela 2).

Os índices de similaridade se baseiam no quanto duas comunidades são próximas com relação ao número de espécies. O índice de Jaccard (Magurran, 1987) utiliza dados qualitativos (presença/ausência de espécies). Foram avaliados duas situações: (i) com a presença das famílias e (ii) com a ocorrência dos gêneros em relação a cada tratamento. Este coeficiente também se mostrou sensível tanto para as famílias (Tabela 3.1), como para os gêneros (Tabela 3.2), quando comparados os extremos (tratamentos 1 e 4). Este fato vem confirmar a existência de uma relação entre um gradiente crescente de entrada de luz na floresta e a sua composição de espécies.

Tabela 3.1: Valores do coeficiente de similaridade de Jaccard, obtidos pelo procedimento SIMQUAL (Rohlf, 1990), utilizando-se matriz de presença (1) e ausência (0) de famílias nos quatro tratamentos.

	Trat 1			
Trat 1	1.00	Trat 2		
Trat 2	0.62	1.00	Trat 3	
Trat 3	0.71	0.73	1.00	Trat4
trat 4	0.68	0.74	0.83	1.00

Tabela 3.2: Valores do coeficiente similaridade de Jaccard, obtidos pelo procedimento SIMQUAL (Rohlf, 1990), utilizando-se matriz de presença (1) e ausência (0) de gêneros nos quatro tratamentos.

	Trat 1			
Trat 1	1.00	Trat 2		
Trat 2	0.49	1.00	Trat 3	
Trat 3	0.55	0.55	1.00	Trat4
Trat 4	0.47	0.56	0.68	1.00

3.3. Influência das intensidades de exploração na composição das espécies

3.3.1. Baixa intensidade de corte

A abundância de cada espécie constitui um fator importante que deve ser considerado em uma análise da vegetação, através da relação espécie/abundância (Whittaker, 1965; Peet, 1974; Hubbell, 1979). Foi obtida uma curva de abundância relativa (diversidade versus dominância) através da plotagem em escala logarítmica do número de indivíduos por espécie, contra as espécies ordenadas em classes sequenciais de abundância.

Para os tratamentos 1 (sem exploração) e 2 (com baixa intensidade de corte) foram relacionadas as espécies consideradas mais comuns: (i) 3 espécies arbóreas *Licania heteromorpha*, *Mora paraensis* e *Heisteria acuminata*; (ii) 1 palmeira (*Euterpe*

oleracea) e (iii) 6 espécies de ervas, sendo que 2 se destacaram *Aphelandra acutifolia* e *Calathea cf. legrelleana*.

Entre as espécies consideradas menos abundantes estão incluídas 11 espécies arbóreas, 2 cipós, 3 ervas e uma palmeira, para o tratamento 1. Para o tratamento 2 relacionam-se 12 árvores, 1 arbusto, 3 cipós e 1 erva. Dentre as árvores destacam-se *Spondias mombin*, *Calycophyllum spruceanum*, *Carapa guianensis* e *Symphonia globulifera*.

3.3.2. Média intensidade de corte

Para o tratamento 3, considerado de média intensidade, foram encontradas 5 espécies mais abundantes. Neste caso, novamente as herbáceas *Aphelandra acutifolia* e *Calathea cf. legrelleana*, e como espécies arbóreas encontram-se *Mora paraensis* e *Calycophyllum spruceanum*, que nos tratamentos citados anteriormente, apareceu como uma das espécies menos comuns. Entre as espécies com abundância intermediária destacaram-se: *Euterpe oleracea*, *Spondias mombin*, *Virola surinamensis*, *Symphonia globulifera*, *Carapa guianensis* e *Licania heteromorpha*.

Dentre as espécies menos abundantes estão relacionadas 15 espécies arbóreas, 1 arbusto, 4 cipós, 2 espécies herbáceas e 2 palmeiras: *Iriartea exorrhiza* e urucurí *Scheelea martiana*.

3.3.3. Alta intensidade de corte

No tratamento de maior intensidade de corte, foram observadas 5 espécies arbóreas dominantes: *Mora paraensis*, *Calycophyllum spruceanum*, *Spondias mombin*, *Sickingia trinctoria* e embaúba (*Cecropia latiloba*). Foram encontradas 2 espécies de cipós e 4 espécies herbáceas, entre elas novamente *Aphelandra acutifolia* e *Calathea cf. legrelleana*. Com relação às palmeiras foram identificadas 2 espécies: *Euterpe oleraceae* e *Astrocaryum murumuru*. Na relação de espécies mais abundantes encontrou-se ainda uma gramínea: *Lasiacis ligulata*.

Na lista de espécies menos abundantes estão incluídas 12 espécies arbóreas, destacando-se *Carapa guianensis*, *Ceiba pentandra* e seringueira *Hevea brasiliensis*. Para arbustos e ervas apenas uma espécie, cipós com 2 espécies, e palmeiras com 2 espécies: *Geonome laxiflora* e *Schelea martiana*.

Plotando-se a abundância e frequência relativas na sequência dos tratamentos para algumas espécies (Figuras 7, 8 e 9), observou-se que é possível fazer uma classificação quanto ao estágio sucessional de algumas delas. Espécies como limãozinho (*Zanthoxylon rhoifolia*), olho de pomba (*Heisteria acuminata*) e um tipo de tajá (*Philodendron muricatum*) são típicas de sombra.

Espécies como guarumã (*Calathea ondulata*), embaúba (*Cecropia latiloba*), pau mulato (*Calycophyllum spruceanum*), e taperebá (*Spondias mombin*) são típicas de grandes clareiras.

Já espécies como pracuúba (*Mora paraensis*) e ucuúba (*Virola surinamensis*) apresentaram um equilíbrio quanto a sua ocorrência em toda a sequência dos tratamentos, apesar de apresentarem maiores valores para os locais com menos incidência de luz.

As palmeiras como açaí (*Euterpe oleracea*) e buçú (*Manicaria saccifera*) também mostraram regularidade na sequência, mas também tendem ser espécies mais tolerantes à sombra (Figuras 7, 8 e 9). Nos exemplos de espécies citados, procurou-se representar todos os grupos (árvores, arbustos, cipós, ervas, gramíneas e palmeiras). As tendências de espécies e sua classificação quanto a grupos sucessionais, são de caráter preliminar. Pretende-se analisar mais a fundo os dados e futuramente sugerir com mais precisão uma classificação da fase inicial da regeneração das espécies de várzea quanto a sucessão.

Figura 7: Comportamento da regeneração natural de algumas espécies por tratamento. Valores apresentados em abundância relativa (A. rel.) e frequência relativa (F. rel.).

Figura 8: Comportamento da regeneração natural de algumas espécies por tratamento. Valores apresentados em abundância relativa (A. rel.) e frequência relativa (F. rel.).

Figura 9: Comportamento da regeneração natural de algumas espécies por tratamento. Valores apresentados em abundância relativa (A. rel.) e frequência relativa (F. rel.).

4. Conclusão

As curvas de espécie/área mostraram uma tendência de estabilidade com o aumento da área amostrada, havendo suficiência de amostragem para todos os tratamentos.

As famílias Leguminosae e Arecaceae contribuíram com o maior número de espécies em todos os tratamentos.

As espécies coletadas nas parcelas de regeneração natural foram identificadas e posteriormente agrupadas em 6 grupos: árvores, arbustos, cipós, ervas, palmeiras e gramíneas, e calculadas a abundância e frequência relativas.

Houve um aumento do número de espécies e do número de indivíduos a medida que aumentou a luz. Tanto o índice de heterogeneidade (Shannon) como de riqueza de espécies (Margalef), foram sensíveis a estas mudanças, principalmente com relação aos extremos (tratamentos 1 e 4). O mesmo fato foi observado para o índice de similaridade de Jaccard.

As curvas de abundância relativa foram extremamente úteis para verificar a nível de tratamento, o comportamento das espécies em relação a características sucessionais.

Espécies como limãozinho (*Zanthoxylon rhoifolia*), olho de pomba (*Heisteria acuminata*), um tipo de tajá (*Philodendron muricatum*) são típicas de sombra.

Espécies como guarumã (*Calathea ondulata*), embaúba (*Cecropia latiloba*), pau mulato (*Calycophyllum spruceanum*), e taperebá (*Spondias mombin*) são espécies típicas de grandes clareiras. Já espécies como pracuúba (*Mora paraensis*) e ucuúba (*Virola surinamensis*), apresentaram um equilíbrio quanto a sua ocorrência em toda a sequência dos tratamentos, apesar de apresentarem maiores valores para os locais com menos incidência de luz. As palmeiras, como açaí (*Euterpe oleracea*) e buçú (*Manicaria saccifera*), também mostraram regularidade na sequência, mas também tendem ser espécies mais tolerantes à sombra.

5. Bibliografia

- Alder, D. 1992. Simple methods for calculating minimum diameter and sustainable yield in mixed tropical forest. In: **Wise management of tropical forests**. Ed. F.R. Muller & K.L. Adam. Oxford For. Institute. Oxford. p. 189-209.
- Barros, P.L.C. 1986. Estudo fitossociológico de uma floresta tropical úmida no planalto de Curuá-Una. Amazônia Brasileira. **Tese Doutorado**. UFPR. Curitiba, PR. 147 p.
- Baur, G.N. 1968. **The ecological basis of rain forest management**. Forestry Commission of New South Wales, Sidney. 499 p.
- Botkin, D.B. & Lee M. Talbot. 1991. **Biological diversity and forests**. World Bank Forest Policy Issues Paper. (Mimeo). 35 p.
- Brokaw, N.V.L. 1987. Gap-phase regeneration of three pioneer tree species in a tropical forest. **Journal of Ecology**, 75:9-19.
- Buschbacher, R.J. 1990. Natural forest management in the humid tropics: ecological, social, and economic considerations. **Ambio**, 19(5):253-258.
- De Camino, R. & Sabine Muller. 1993. Sostenibilidad de la agricultura y los recursos naturales: bases para establecer indicadores. IICA-GTZ. **Serie de Programas: 38**. 133 p.
- Denslow, J.L. & Diaz, A.E.G. 1990. Seed rain to tree-fall gaps in the neotropical rain forest. **Can. J. F. Res.**, 20:642-648.
- Denslow, J.L. 1980. Gap partitioning among tropical rainforest trees. **Biotropica (Suppl.)**:47-55.
- Denslow, J.L. 1987. Tropical rainforest gaps and tree species diversity. **Ann. Rev. Syst.**, 18:431-51.
- Dias, A.C. 1993. Estrutura e diversidade do componente arbóreo e a regeneração do Palmito (*Euterpe edulis*) em trecho de mata secundária, no parque estadual de Carlos Botelho, SP. **Dissertação de Mestrado**. ESALQ/USP. Piracicaba, SP. 126 p.
- Evans, J. 1982. **Plantation forestry in the tropics**. Oxford University Press. London. 472 p.
- Ewel, J. 1983. Succession. In: **Tropical rain forest ecosystems, a structure and function**. Ed. by F.B. Golley. Elsevier Scient. Publ. Co. Amsterdam. p. 217-23.
- Ewel, J.; S. Gliessmann; M. Amador; F. Benedict; C. Berish; R. Bermudez; B. Brown; R. Miranda & N. Price. 1982. Leaf area, light transmission, roots and leaf damage in nine tropical plant communities. **Agro-Ecosystems**, 7: 305-326.

- Forget, P-M. 1994. Recuitment pattern of *Vouacapoua americana* (Caesalpiniaaceae), a rodent-dispersed tree species in French Guiana. **Biotropica**, 24(4):408-419.
- Hartshorn, G. 1980. Neotropical forest dynamics. **Biotropica (suppl.)**:23-30.
- Hartshorn, G. 1989. Application of gap theory to tropical forest management: natural regeneration on strip clear-cuts in the Peruvian Amazon. **Ecology**, 70(3):567-69.
- Hosokawa, R.T. 1986. **Manejo e economia de florestas**. FAO. Roma. 125 p.
- Hubbell, S.P. 1979. Tree dispersion, abundance, and diversity in a tropical dry forest. **Science**, 203:1299-1309.
- Hutchinson, I.D. 1986. The management of humid tropical forests to produce wood. In: **Management of the forests of tropical america: prospects and technologies**. Proceedings of a conference. Inst. of Tropical Forestry. Puerto Rico. 121-156 p.
- Khan, M.L.; J.P.N. Rai & R.S. Tripathi. 1986. Regeneration and survival of the tree seedlings and sprouts in tropical deciduous and sub-tropical forests of Meghalaya, India. **Forest Ecol. and Management**, 14:293-304.
- Korning, J. & Henrik Balslev. 1994. Growth rates and mortality patterns of tropical lowland tree species and the relation to forest structure in Amazonian Ecuador. **J. of Tropical Ecology**, 10:151-166.
- Lamprecht, H. 1990. **Silvicultura nos trópicos**. GTZ. Eschborn. 342 p.
- Lopes, J.M.A. 1993. Demografia e flutuações temporais da regeneração natural após uma exploração florestal: Flona Tapajós, PA. **Dissertação de Mestrado**. ESALQ/USP. Piracicaba, SP. 133 p.
- Ludwig, J.A. & Reynolds, J.F. 1988. **Statistical Ecology. A primer on methods and computing**. J. Willey & Sons, New York. 337 p.
- Magurran, E. A. 1987. **Ecological diversity and its measurement**. Princeton Univ. Press. 179 p.
- Martini, A.; Rosa N. & C. Uhl. 1994. An attempt to predict which amazonian tree species may be threatened by logging activities. **Enviromental Conservation**, 21(2):152-162.
- Morán, E.F. 1990. **A Ecologia Humana das Populações da Amazônia**. Vozes, Petrópolis, RJ. 367 p.
- Oldeman, R.A.A. 1978. Architecture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. In: P.B. Tomlinson & M.H. Zimmermann, ed. **Tropical trees as living systems**. Cambridge University Press. New York. p. 535-60.
- Oosting, H.J. 1951. **Ecologia vegetal**. Aguilar. Madrid. 416 p.

- Panayotou, T. & Peter S. Ashton. 1992. **Not by timber alone: economics and ecology for sustaining tropical forests.** Island Press. Whashington. 235 p.
- Peet, R.K. 1974. The measurement of species diversity. **Ann. Rev. Ecol. System.**, 5:285-307.
- Peters, M.P. 1994. **Sustainable harvest and non-timber plant resources in tropical mois forest: an ecological primer.** WWF/The Nature Conservancy. New York. 45 p.
- Putz, F.E. 1984. The natural history of lianas on Barro Colorado Island, Panama. **Ecology**, 65:1713-24
- Rohlf, F.J. 1990. **NTSYS-PC. Numerical taxonomy and multivariate analysis system, version 1.7.** State Univ. New York. Stony Brook. 156 p.
- Ronald P.C. & Jeffrey K. Smith. 1984. **Applied statistics and SAS programming language.** Elsevier Ed. Amsterdam. 187 p.
- Southwood, T.R.E. 1978. **Ecological methods.** Chapman & Hall. London. 232 p.
- Synnott, T.J. 1992. The introduction of basic management into tropical forests. In: **Wise management of tropical forests.** Ed. F.R. Muller & K.L. Adam. Oxford For. Institute. Oxford. p. 91-96.
- Uhl, C & I.C.G. Vieira. 1989. Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon: A case study from the Paragominas region of the state of Pará. **Biotropica**, 21(2):98-106.
- Vásquez-Yanes, C. & A. Orozco-Segovia. 1990. Ecological significance of light controlled seed germination in two contrasting tropical habitats. **Oecologia**, 83:171-75.
- Veríssimo, A.; Barreto, P.; Mattos, M.; Tarifa, R. & C. Uhl. 1992. Logging impacts and prospects for sustainable forest management in an old Amazonian frontier: the case of Paragominas. **Forest Ecol. and Management**, 55:169-199.
- Veríssimo, A.; Barreto, P.; Tarifa, R. & C. Uhl. 1995. Extraction of a high-value natural resource from Amazonia: the case of Mahogany. **Forest Ecol. and Management**, 72:39-60.
- Weber, A.W. 1982. Minemonic three-letter acronyms for the families of vascular plants: a device for more effective herbarium curation. **Taxon**, 3(1):74-78/
- Whitmore, T.C. 1978. Gaps in the forest canopy. In: P.B. Tomlinson & M.H. Zimmermann, ed. **Tropical trees as living systems.** Cambridge University Press. New York. p. 639-55.
- Whittaker, R.W. 1965. Dominance and diversity in land plant communities. **Science**, 147:250-60.

Anexo 1: Relação das espécies identificadas na área de estudo, e respectivos cálculos de frequência e dominância fornecidos em porcentagem. Para as famílias foram adotadas as abreviaturas sugeridas por Weber (1982).

No.	Nome Comum	Nome Científico	Fam.	Cat.	Abundância (%)				Frequência (%)			
					Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4	Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4
1	?	<i>Zygia juruanum</i> Harms.	LEG	1	0,06				0,19			
2	Abiurana	<i>Pouteria hispida</i> Eyma.	SAP	1	0,06		0,06		0,19		0,13	
4	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	ARE	5	5,88	6,27	2,56	2,1	5,34	5,24	3,18	2,15
8	Açaí tucano	<i>Stylogyne longifolia</i> (Mart. ex Miq.) Mez.	MRS	2	0,58		0,22	0,46	1,53		0,8	1,15
11	Anani	<i>Symphonia globulifera</i> L.F.	GUT	1	0,06		0,32	0,1	0,19		0,66	0,29
14	Andiroba	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	MEL	1	0,06		0,25	0,05	0,19		0,8	0,14
17	Aninga	<i>Montrichardia linifera</i> (Arruda) Schott.	ARA	4	0,06	0,25	0,32		0,19	1,05	1,19	
20	Anoeirá	<i>Licania macrophylla</i> Benth.	MOR	1		0,04	0,03			0,17	0,13	
22	Apuí	<i>Ficus maximo</i> P. Miller	MOR	1		0,04	0,03	0,05		0,17	0,13	0,14
25	Arbusto I	<i>Amphirahox</i> cf. <i>surinemensis</i> Eighl.	VIO	2	0,26				0,57			
26	Arbusto II	<i>Cassipourea guianensis</i> Aubl.	RHZ	2	0,26		0,09		0,38		0,4	
28	Bacuri	<i>Rheedia acuminata</i> (Ruiz. et Etp.) Pl.	GUT	1			0,19				0,4	
29	Bacuri pari	<i>Rheedia gardneriana</i> Tr. et Pl.	GUT	1			0,03				0,13	
30	Bananeira grande	<i>Phenakospermum guianensis</i> End.	MUS	2		0,04				0,17		
31	Barba de bode	<i>Cyperus luzlae</i> Retz. Rottb.	CYP	4			0,06	1,08			0,27	2,15
33	Bariri	<i>Calathea</i> cf. <i>legrelleana</i> Regel.	MRN	4	4,35	4,24	14,8	4,21	4,58	6,28	5,17	3,44
37	Bariri grande	<i>Calathea peruviana</i> Koern.	MRN	4			0,13				0,13	
38	Barri grande	<i>Ischnosiphon</i> sp.	MRN	4		0,3					0,7	
39	Buçú	<i>Manicaria saccifera</i> Gaert.	ARE	5	1,15	0,72	0,19	0,82	2,1	2,27	0,66	1,58
43	Buiussú	<i>Ormosia coutinhoi</i> Ducke	FAB	1				0,1				0,14
44	Burití	<i>Mauritia flexuosa</i> L.	ARE	5			0,06				0,27	
45	Cacau jacaré	<i>Herrania mariae</i> (Mart.) Schum.	STR	1			0,03	0,21			0,13	0,43
47	Cachuá	<i>Trichilia quadrijuga</i> H.B.K.	MEL	1		0,04	0,06	0,05		0,17	0,27	0,14
50	Cajuacú	<i>Anacardium giganteum</i> Hanc. ex Engl.	ANA	1			0,03				0,13	
51	Camutim	<i>Cynometra hostmaniana</i> Tul.	LEG	1	0,13		0,06	0,05	0,19		0,27	0,14
54	Canela de Velha	<i>Manihot brachyloba</i> Muell. Arg.	EUP	1		0,13		0,36		0,35		1,0
56	Capeba	<i>Potomorpha peltata</i> (L.) Miq.	PIP	4			0,16	0,36			0,53	0,43
58	Capim arroz	<i>Panicum pilosum</i> Sw.	GRM	4			0,03	0,46			0,13	0,15
60	Caxinguba	<i>Ficus pertusa</i> L.F.	MOR	1		0,04				0,17		
61	Cerú	<i>Allantoma lineata</i> (Mart. ex Berg) Miers.	LCY	1				0,05				0,14
62	Cinzeira	<i>Terminalia dichotoma</i> G. Meyer	CMB	1	0,06	0,55	0,03		0,19	0,7	0,13	

No.	Nome Comum	Nome Científico	Fam.	Cat.	Abundância (%)				Frequência (%)			
					Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4	Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4
65	Cipó comprido	<i>Odontodenia macrantha</i> (R-I-S) Markgr.	APO	3	2,05	1,19	0,38	0,87	4,2	3,49	1,06	2,29
69	Cipó espinho	<i>Machaerium macrophyllum</i> Benth.	LEG	3		0,17	0,82	2,62		0,52	1,86	3,87
72	Cipó ferro	<i>Dodecastigma</i> sp.	LEG	3			0,28	0,05			1,06	0,14
74	Cipó folha miúda	<i>Memora flavida</i> (DC.) Bur. et Kisch.	BIG	3	1,47	0,81	0,66	0,72	3,05	2,27	2,39	1,72
78	Cipó folhã	<i>Fosteronea riedelina</i> M. Arg.	APO	3			0,13				0,13	
79	Cipó gogó guariba	Não identificada 1	NI	3			0,03	0,05			0,13	0,14
81	Cipó graxamã	<i>Memora schomburgkii</i> (DC.) Miers.	BIG	3	2,56	1,99	1,04	2,72	4,58	4,19	2,65	3,01
85	Cipó I	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers.	BIG	3	0,64				0,95			
86	Cipó ingá	<i>Paullinia densiflora</i> SW.	SAP	3	0,32	0,47	0,35	0,46	0,95	1,57	1,33	1,29
90	Cipó IV	<i>Combretum laxum</i> Aubl.	CMB	3	0,32		0,03		0,95		0,13	
92	Cipó marí	<i>Parinarium exelsa</i> Sabine	CHB	3			0,06				0,27	
93	Cipó Morcego	<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A. Gentry	BIG	3	0,13		0,03	0,1	0,38		0,13	0,29
96	Cipó peludo	<i>Hirtella burchellii</i> Britton.	CHB	3	0,26		0,03	0,05	0,76		0,13	0,14
99	Cipó pretinho	<i>Mandevilla symphytocarpa</i> (G.F.W. Mey.) Wood.	APO	3		0,08				0,17		
100	Comadre de azeite	<i>Amphalea diandra</i> L.	EUP	3	0,19	0,21	0,06	0,41	0,57	0,87	0,27	0,86
104	Coração de nego	<i>Mouriri</i> sp.	MLS	1		0,04				0,17		
105	Cuaçú	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) Meyer	MRN	4		0,04	2,94	1,23		0,17	3,71	2,15
108	Cutiti	<i>Ocotea cf. costata</i> (Ness.) Mez.	LAU	1			0,03				0,13	
109	Embaúba	<i>Cecropia latiloba</i> Miq.	MOR	1	0,06	0,3	0,47	2,1	0,19	1,05	1,33	3,15
113	Envira preta	<i>Unonopsis guatteriodes</i> (A. DC.) R.E. Fries.	ANN	1	0,06		0,06	0,05	0,19		0,27	0,14
116	Faveira	<i>Swartzia</i> sp.	LEG	1			0,06				0,27	
117	Fêu de paca	<i>Pithecellobium inaequale</i> (H. & B.) Benth.	LEG	1		0,04				0,17		
118	Folha peluda	<i>Aegiphilla arborecens</i> Vahls.	VRB	1			0,03				0,13	
119	Folha serrilhada	<i>Sorocea guillieniana</i> Gand.	MOR	1			0,03				0,13	
120	Fruta preta	Não identificada 2	NI	2		0,08				0,17		
121	Gaurea	<i>Solanum leucocarpum</i> (C. Rich.) Dun.	SOL	2		0,13				0,52		
122	Geniparana	<i>Gustavia augusta</i> L.	LCY	1	0,77	0,13	0,41	1,28	1,34	0,52	1,06	2,58
126	Goiabinha	<i>Vismia cayennensis</i> (Jacq.) Pers.	GUT	1	0,45		0,54	0,62	0,95		1,72	1,72
129	Guarea	<i>Solanum leucocarpum</i> (C. Rich.) Dun.	SOL	2				0,62				0,72
130	Guarumã	<i>Calathea undulata</i> Regel.	MRN	4	0,32	2,59	6,71	6,93	0,76	4,19	5,04	4,87
134	Guarumã canela	<i>Ischnosiphon polyphyllus</i> (P. & E.) Voer.	MRN	4	0,13	0,08	0,38		0,19	0,17	0,27	
137	Inajarana	<i>Quararibea guianensis</i>	BOM	1			0,09	0,05			0,4	0,14
139	Ingá	<i>Inga auristellae</i> Harms.	LEG	1			0,19				0,53	
140	Ingá cipó	<i>Inga edulis</i> Mart.	LEG	1	0,13	0,04	0,13	0,05	0,38	0,17	0,4	0,14

No.	Nome Comum	Nome Científico	Fam.	Cat	Abundância (%)				Frequência (%)			
					Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4	Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4
144	Ingá cipó II	Rourea amazonica (Baker) Radlk.	CNN	3			0,19				0,8	
145	Ingá III	Inga Marginata Willd.	LEG	1			0,03				0,13	
146	Ioloca	Eugenia sp.	MYR	1	0,26				0,76			
147	Jacitara	Desmoncus orthacanthos Mart.	ARE	3	0,06				0,19			
148	Jarai	Sarcaulus brasiliensis Eyma.	SPT	1	0,7		0,22	0,05	1,15		0,66	0,14
151	Jarandea	Pithecellobium latifolium (L.) Benth.	LEG	1	0,26		0,25	0,26	0,76		0,8	0,57
154	Jupindá	Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel.	RUB	3			0,41	1,03			0,53	0,72
156	Jurubeba	Solanum crinitum Lam.	SOL	2				0,1				0,29
157	Lacre	Sickingia trinctoria Schum.	RUB	1		0,17	0,35	2,21		0,35	0,8	3,72
160	Lacre grande	Vismia macrophylla H.B.K.	GUT	1			0,06	0,21			0,27	0,29
162	Limãozinho	Zanthoxylon rhoifolia	RUT	1	1,92	0,38	0,35	0,21	3,24	1,22	1,33	0,57
166	Lírio	Ludwigia latifolia (Benthom) Hara.	ONA	2				0,31				0,43
167	Louro	Nectandra amazonicum Ness.	LAU	1				0,1				0,29
168	Louro bosta	Ocotea cf. laxiflora (Meissn.) Mez.	LAU	1		0,04	0,06			0,17	0,27	
170	Louro cheiroso	Aniba megaphylla Mez.	LAU	1			0,03				0,13	
171	Macacaúba	Platymiscium trinitatis Bth.	LEG	1				0,15				0,43
172	Macucú	Licania heteromorpha Benth.	CHB	1	10,1	0,3	0,09		4,39	0,87	0,4	
175	Maniva de viado	Não identificado	NI	3	0,06	0,04	0,06	0,1	0,19	0,17	0,27	0,29
179	Maracujá	Passiflora fortida L.	PAS	3		0,04	0,35	0,05		0,17	1,33	0,14
182	Marajá	Bactris setosa Rodr.	ARE	5	0,13				0,38			
183	Matuba	Mezilaurus mahuba (Samp.) Khulm. & Samp.	LAU	1			0,03				0,13	
184	Molongó	Aphelandra acutifolia Nees.	ACA	4	31,0	54,6	37,6	38,71	7,44	6,81	5,17	5,59
188	Murumurú	Astrocaryum murumuru Mart.	ARE	5	1,92	2,42	1,58	2	2,86	4,54	3,58	2,87
192	Murupita	Sapium lanceolatum Hum.	EUP	1		0,04	0,19	0,51		0,17	0,66	1,15
195	Mututí	Pterocarpus officinalis Jacq.	LEG	1	0,06		0,06		0,19		0,27	
197	Olho de pomba	Heisteria acuminata (C.H.L.B.) Engl.	OLC	1	6,84	1,19	1,68	0,46	5,92	2,79	2,25	0,86
201	Olho de tucano	Hebepetalum humirifolium (Pl.) Benth.	LIN	1	0,13	0,59	0,03	0,87	0,38	1,75	0,13	1,43
205	Pacapeuá	Swartzia racemosa Benth.	LEG	1	1,6	1,44	0,28	0,31	3,05	2,27	1,06	0,72
209	Pau brasil	Cordia ecalyculata Vel.	BOR	1	0,26				0,57			
210	Pau mulato	Calycophyllum spruceanum Hook.	RUB	1	0,06	0,04	4,46	2,52	0,19	0,17	3,58	3,15
214	Pau peludo	Allophylus occidentalis (SW.) Radlk.	SAP	1	0,06				0,19			
215	Paxiúba	Triarteia exorrhiza Mart.	ARE	5	0,13		0,03		0,38		0,13	
217	Pé de galinha	Não identificado	NI	2				0,1				0,29
218	Piper	Piper hispidum Wartz.	PIP	3		0,04	0,19	0,21		0,17	0,8	0,57
221	Pitaica	Swartzia polyphylla A.P. DC.	LEG	1	0,06		0,06		0,19		0,27	
223	Pracaxi	Penthlacletia macroloba (Willd.) Kuntze.	LEG	1	1,02	0,13	0,28	0,36	2,67	0,52	1,06	0,72

No.	Nome Comum	Nome Científico	Fam. Cat.	Abundância (%)				Frequência (%)			
				Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4	Trat 1	Trat 2	Trat 3	Trat 4
227	Pracuiba	<i>Mora paraensis</i> Hub.	LEG 1	8,18	2,08	3,29	3,34	4,77	4,19	4,77	3,58
231	Pterid. folha serrilhada	<i>Thelypteris serrata</i> (Cav.) Proctor.	PLP 4			0,06	0,05			0,27	0,14
233	Pteridófito	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	PLP 4	0,13	0,08	0,13	1,64	0,38	0,35	0,4	3,01
237	Pteridófito I	<i>Adiantum intermedium</i> Sw.	PLP 4	0,45	0,47	0,13	0,46	1,34	1,92	0,53	1,29
241	Pteridófito II	<i>Tectaria martinicensis</i> (Spr.) Copel.	PLP 4	0,06	0,21			0,19	0,87		
243	Pteridófito III	<i>Stenoclaena marginata</i> (Schard.) C. Cha.	PLP 4	0,06	0,21	0,03		0,19	0,87	0,13	
246	Rim de Paca	<i>Crudia oblonga</i> Benth.	LEG 1	0,7	0,25	0,03	0,21	1,91	0,87	0,13	0,57
250	Rosa brava	<i>Byttneria coriacea</i> Britt.	STR 3		0,21	0,22	0,05		0,35	0,66	0,14
253	Seringa	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) M. Arg.	EUP 1		0,04	0,03	0,05		0,17	0,13	0,14
256	Solanum	<i>Solanum quinquefoliatum</i> Brtt.	SOL 2			0,03				0,13	
257	Sumaúma	<i>Ceiba pentandra</i> Gaertn.	BOM 1			0,06	0,05			0,27	0,14
259	Taboquinha	<i>Pariana campestre</i> Aubl.	GRM 6	1,02	2,29	2,85	1,49	2,48	4,71	2,79	2,58
263	Taboquinha I	<i>Lasiacis ligulata</i> Hirsch. & Chase.	GRM 6	0,51	1,14	0,57	2,21	1,53	4,19	2,39	4,44
267	Tajá beleza	<i>Costus arabicus</i> (Loes.) Maas.	ZIN 4	0,45	1,4	0,32	0,41	1,15	2,79	1,33	1,15
271	Tajá folhona	<i>Echinodorus macrophyllus</i> (Kunth.) Mich.	ALI 4			0,06				0,27	
272	Tajá I	<i>Philodendron muricatum</i> Schott.	ARA 4	4,54	3,31	1,68	1,03	6,11	5,06	3,71	1,86
276	Tajá II	<i>Psychotris barbiflora</i> DC.	RUB 4	1,53	3,22	0,82	0,1	2,1	4,71	1,33	0,29
280	Tajá rajado	<i>Philodendron platypodum</i>	ARA 4	0,83	0,93	0,66	0,31	1,53	2,97	1,59	0,86
284	Taperabá	<i>Spondias mombin</i> Jacq.	ANA 1	0,13	0,08	0,89	2,41	0,38	0,35	2,12	3,3
288	Tiririca	<i>Scleria pterota</i> Presl.	CYP 4		0,47	0,92	2,31		1,75	2,79	3,72
291	Tiririca grande	<i>Scleria macrophylla</i> Presl.	CYP 4			0,06	0,31			0,27	0,57
293	Trema	<i>Trema micrantha</i> Blume.	ULM 2				0,05				0,14
294	Tres talos	<i>Ixora pubescens</i> Willd.	RUB 1		0,04		0,05		0,17		0,05
296	Ubim	<i>Geonome laxiflora</i> Mart.	ARE 5	0,26	0,34	1,8	0,05	0,57	1,22	1,86	0,14
300	Urucuri	<i>Scheelia martidiana</i> Burn.	ARE 5	0,06		0,03	0,05	0,19		0,13	0,14
303	Virola	<i>Virola surinamensis</i> (Rol.) Warb.	MYR 1	1,6	0,72	0,57	1,03	3,82	2,44	2,25	2,44

Capítulo IV

Impacto de diferentes intensidades de exploração numa floresta de várzea do estuário amazônico

1. Introdução

1.2. O problema do manejo em florestas tropicais

O manejo de florestas tropicais pode ser definido como o manejo da floresta natural para a obtenção de produtos florestais, principalmente madeira (Baur, 1968; Lehmann, 1991). O termo floresta natural pode ser definido incluindo-se florestas altamente conservadas, florestas secundárias e fragmentos florestais (Goodland et al., 1991).

O manejo de florestas tropicais pode ter a forma de uma variedade de sistemas silviculturais. Estes envolvem o manejo em áreas remanescentes de florestas, ou em áreas de florestas bem conservadas (Evans, 1982; Hutchinson, 1987).

Outras formas envolvem técnicas através das quais faixas inteiras de floresta são extraídas, deixando clareiras abertas na floresta, ou utilizam uma determinada área onde são exploradas seletivamente poucas espécies. Há ainda métodos que integram plantios de enriquecimento dentro do seu regime de manejo, enquanto outros implementam tratamentos silviculturais que auxiliam na regeneração natural de espécies desejadas (De Graaf, 1986; Hartshorn, 1987; Jonkers, 1987).

A forma tradicional de exploração de florestas tropicais implica que a floresta não é manejada sob bases sustentáveis, mas pelo contrário, é utilizada para maximizar um volume de madeira de alto valor num primeiro corte (Synnot, 1992; Verríssimo et al., 1995). Isto não significa que sucessivos cortes não podem ser feitos na mesma floresta no futuro, através da regeneração natural, possibilitando assim uma nova exploração no local previamente explorado. Entretanto, a composição das espécies e suas respectivas densidades são inevitavelmente alteradas, e este fato afeta sem dúvida o valor do segundo corte (Vanclay, 1992;

Peters, 1989). A aplicação de tratamentos silviculturais não se justifica unicamente com base na resposta a curto prazo dos incrementos diamétricos. Mas também, o tratamento deve aumentar a rentabilidade do manejo através da produção mais rápida de madeira comercializável. Sendo assim, o tratamento silvicultural deve ser parte integral do manejo (Quirós & Finegan, 1994).

1.3. Hipóteses e predições

O impacto provocado pela exploração intensiva de florestas tropicais pode provocar uma escala crescente de danos à medida que a retirada de árvores se intensifica (Johns, 1988). O dano causado através da queda das árvores selecionadas para a exploração, quando muito intenso, provoca a diminuição do número de espécies, e pode causar uma redução do incremento em volume e comprometer a qualidade da madeira das árvores remanescentes, prejudicando a continuidade de programas de manejo (Uhl & Vieira, 1989; Kasenene & Murphy, 1991; Wilcox, 1995). Serão consideradas as seguintes predições neste estudo:

1.4. Objetivos

- I. Procurar identificar as espécies arbóreas componentes da floresta de várzea em estudo, para caracterizar várias intensidades de exploração através do número de indivíduos, área basal e volume antes e depois da exploração.
- II. Procurar obter dados referentes ao impacto causado pela exploração realizando um mapeamento das árvores que sofreram algum tipo de dano, como a ocorrência de árvores quebradas e tombadas e árvores mortas. Este cenário também será mostrado através da confecção de perfis idealizados da vegetação remanescente em cada tratamento.
- III. Calcular índices de diversidade florística para verificar se a ocorrência de espécies após uma exploração foi afetada.
- IV. Obter os custos de todas as fases envolvendo a exploração e observada a sua variação a medida que aumentou a intensidade de retirada das árvores. Será observado também qual o principal centro de custo de todas as operações.

2. Material e métodos

2.1. O local de estudo.

Vide descrição na seção 2 (pág. 3) e Figura 1 (pág. 4) do Capítulo I e Figura 4 do Capítulo II (pág. 29).

2.2. Amostragem

2.2.1. Tamanho e forma da amostragem

Foram utilizadas parcelas quadradas de 70 x 70 metros (0,49 ha). Os critérios utilizados para o ajuste do tamanho das parcelas em campo obedeceram a seguinte ordem de prioridade:

(i) Área útil do experimento: as florestas de várzea do estuário amazônico são tipicamente recortadas por pequenos igarapés, que juntos formam uma extensa malha ao longo da floresta. Em função desta característica, as parcelas foram instaladas ao acaso (Figura II-4.2). A utilização de uma

extensa área sem a ocorrência de igarapés foi inviabilizada, pois acarretaria uma grande perda de área experimental e comprometeria as análises estatísticas.

(ii) Eficiência dos tratamentos em relação aos fatores a serem estudados: Este trabalho visa o acompanhamento de um experimento de manejo buscando obter dados de produtividade (o que viabiliza o uso de parcelas quadradas), e ao mesmo tempo acompanhar o efeito de cada intensidade de exploração ao longo do tempo. Portanto, as parcelas foram de caráter permanente e de forma quadrada.

(iii) Operacionalidade do trabalho: A distância entre as parcelas foi entre 100-1000 m, para criar uma borda mínima de 100 m entre as parcelas, evitar a perda de tempo com o deslocamento de pessoal e equipamentos, e para facilitar a retirada de madeira.

2.2.2. Relação entre o número de espécies e o número de parcelas

Inventários florestais feitos em florestas de várzea são limitados, quando comparados com estudos deste tipo em áreas de terra firme (Pires, 1973). Sendo assim, é importante caracterizar bem a parte amostral, em virtude da pouca quantidade de trabalhos disponíveis para comparação. Para a análise de suficiência da amostragem neste trabalho, foi utilizada a metodologia da curva espécie/área (Finol, 1971; Oosting, 1951) como também o cálculo da intensidade de amostragem¹ (Péllico Neto, 1982).

¹ A intensidade de amostragem é obtida pela fórmula:

$$n = \frac{t^2 (CV)^2}{(LE\%)^2}, \text{ onde } n = \text{Número de unidades de amostra, } t = \text{Valor da tabela de Student a 95\% de probabilidade, } CV = \text{Coeficiente de variação, e } LE = \text{Limite de erro.}$$

2.3. Inventário: Coleta e identificação das espécies

A área total de cada parcela (0.49 ha) foi inventariada levando-se em consideração todos os indivíduos com DAP ≥ 10 cm. Foram medidos o diâmetro e altura total de todas as árvores e altura comercial das árvores ≥ 40 cm de DAP. Nas árvores com sapopema, o diâmetro foi retirado logo acima da mesma (entre 2.5 a 3.5 m de altura). Cada árvore foi identificada, plaqueada e mapeada, para ajudar no planejamento de execução dos trabalhos de abertura da floresta, bem como para mapear os danos oriundos da exploração dentro das parcelas. Todo o material botânico foi coletado e identificado por técnicos do Departamento de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, PA.

2.4. Tratos silviculturais

2.4.1. Seleção e marcação das árvores

Esta operação necessitou de alguns critérios, priorizando-se os indivíduos à permanecer, principalmente os que estavam na sua fase pré-reprodutiva. Árvores jovens das espécies selecionadas foram conservadas na faixa entre 5 a 20 cm de DAP. Árvores porta-sementes ficaram distribuídas a uma distância razoável para garantir a dispersão de sementes (Viana, 1990). Obedeceu-se tais critérios para estabelecer este primeiro tratamento silvicultural, ou primeiro refinamento, iniciando-se desta maneira um sistema policíclico de cortes ao longo dos anos, também conhecido como corte seletivo com limites de diâmetros (Bushbacher, 1990)².

2.4.2. Espécies selecionadas

O sistema de manejo florestal baseado na regeneração natural deve ser relacionado com três variáveis ecológicas

² Estima-se que este ciclo de corte poderá acompanhar futuros desbastes seletivos do plantio com virola. A prescrição destes cortes não será objetivo deste trabalho, mas poderá servir de base para o prosseguimento do futuro acompanhamento do mesmo.

básicas: a) potencial para regeneração (determinado pela abundância de sementes e mudas); b) potencial para crescimento (determinado pelo aumento de luz e nutrientes); e c) potencial econômico (determinado pelo valor dos produtos produzidos como madeira para serraria, lenha, carvão e produtos não-madeireiros (Peters, 1994). Quando se refere à viabilidade de sementes, estas variam no tempo (dependentes da fenologia das espécies, potencial de germinação e predação), e no espaço (dependendo da quantidade e distribuição de matrizes, distância e forma da curva de dispersão, e sobrevivência das sementes em função da distância de dispersão) (Viana, 1990). A Tabela 1 mostra a relação das espécies de interesse econômico em florestas de várzea, que foram priorizadas nos critérios citados anteriormente.

Tabela 1: Relação das espécies selecionadas para o monitoramento da regeneração natural (Fonte: Rombold, 1991³, dados não publicados).

Nome comum	Fenologia Floração - Frutificação	Uso local
Andiroba	jul/ago - dez/mar	madeira, óleo
Seringa	jul/ago - dez/fev	látex
Açaí	abr/set - out/jan	palmito, vinho
Breu	nov/jan - mar/mai	madeira, resina
Assacú	set/abr - dez/mai	madeira
Sumaúma	jul/ago - ago/set	madeira
Taperebá	ago/out - jan/mai	fruto comestível
Mututi	dez/jan - fev/abr	lenha
Ananí	mar/abr - jun-nov	madeira, látex
Ventosa	jan/mar - mai/jun	madeira
Pau Mulato	jun/jul - out/nov	madeira

A escolha das demais espécies para a seleção e refinamento foi baseada em: i) disponibilidade de sementes na época do trabalho, ii) importância econômica regional, iii) índice de valor de importância de cada espécie, iv) taxa de crescimento, e v) práticas locais.

³ Dados obtidos do projeto "Programa Estuário"/Depto. de Botânica, Museu Goeldi, Belém, PA.

2.4.3. Exploração

A prática de exploração em florestas de várzea não permite o uso de maquinaria pesada principalmente nas operações de arraste e transporte (Macedo & Anderson, 1993). O processo é quase todo manual, utilizando-se apenas de um machado, sendo que em alguns casos, os madeireiros extrativistas utilizam uma motosserra apenas para as operações de derrubada e traçamento para a obtenção de toras (Silva, 1989; Mousasticoshvily Jr., 1992; Barros, 1995).

As árvores selecionadas foram derrubadas utilizando-se uma equipe de 5 homens: 1 engenheiro, 1 motosserrista, 2 auxiliares com machado e 1 ajudante. Após a decisão do direcionamento da queda, cada árvore foi derrubada, medida a sua altura total, altura comercial, e diâmetro da copa. Logo em seguida foi cubada rigorosamente utilizando-se o método de Smalian (Husch et al., 1972). Na ficha de campo também foi anotada a espécie, o número de toras e os indivíduos que sofreram algum tipo de dano com a sua queda dentro da parcela.

2.4.4. Tratamentos

Foram instalados 3 tratamentos com diferentes níveis de exploração.

Tratamento 1 (T1): Foram instaladas 4 parcelas de 0,49 ha na floresta original, sem nenhuma intervenção (testemunha).

Tratamentos 2 (T2), 3 (T3) e 4 (T4): Foram instaladas 4 parcelas de 0,49 ha na floresta original e logo após foi efetuado um corte de liberação, retirando aproximadamente 25% (T2), 50% (T3) e 75% (T4) da área basal das espécies pré-selecionadas existentes nas parcelas. Não foi efetuado um tratamento de corte raso, pois é um tipo de intervenção muito drástica, e não está de acordo com a legislação florestal em vigor.

2.5. Estrutura da floresta

2.5.1. Composição florística

Para a avaliação da estrutura horizontal foram calculados os valores absolutos e relativos para abundância, dominância, frequência, índice de valor de importância e distribuição diamétrica de toda a comunidade inventariada (Jardim, 1984; Hosokawa, 1986).

2.5.2. Índices de diversidade

Foram selecionados para o cálculo da diversidade o índice de riqueza de Margalef, o índice de heterogeneidade de Shannon. Foi também calculado o índice de similaridade florística de Jacquard. Vide seção 2.5, Capítulo III (pág. 51).

O uso de índices de diversidade neste estudo tem como objetivo principal a avaliação do efeito dos tratamentos em relação ao número de espécies, bem como selecionar qual dos índices é mais eficiente.

2.5.3. Perfis idealizados

Para cada tratamento, foi selecionada uma parcela para a confecção de perfil e projeção das copas das árvores acima de 10 cm de DAP. Foi utilizada uma faixa de 70 x 10 metros, seguindo a metodologia de Oosting (1951) e Hallé et al. (1978).

2.6. Avaliação econômica

Em todas as fases do estudo foram feitas observações com relação a mão-de-obra, pessoal e infra-estrutura utilizada. Foram tomados os custos das seguintes operações: (i) seleção e marcação das parcelas, (ii) levantamento topográfico, (iii) inventário, (iv) seleção das árvores para exploração, (v) exploração (derrubada, traçamento, e cubagem), (vi) limpeza, (vii) plantio e replantio, e (viii) conservação nos dois anos de acompanhamento

das parcelas. Todos estes custos são fornecidos por tratamento e por hectare.

3. Resultados e discussão

3.1. Inventário

3.1.1. Amostragem

Para avaliar a suficiência de amostragem, foram utilizados dois procedimentos. Primeiro, o cálculo da intensidade amostral (n), utilizando-se os valores de área basal das 16 amostras inventariadas. Foram considerados um limite de erro de 10% e probabilidade de 95% (t tabelado = 2,131). Obteve-se um valor calculado de 4,37 amostras (2,14 ha), que seriam necessárias para quantificar os valores de área basal neste tipo de floresta, e que corresponde a 27,3% do total da área amostrada (7,84 ha). O coeficiente de variação observado foi de 9,8% (Tabela 2).

Segundo, com relação a ocorrência de espécies a partir de 10 cm de DAP, foram obtidas curvas espécie/área, levando-se em consideração um incremento de subparcelas de 100 m² em função da área de cada parcela amostrada. A Tabela 3 mostra os valores mínimos encontrados para cada parcela. Houve uma estabilização do aparecimento de novas espécies entre 34 (mínimo, parcela 5) e 46 sub-parcelas de 100 m² (máximo, parcela 13). Considerando-se a área amostrada como um todo (7,84 ha), a incidência de novas espécies foi diminuindo até estabilizar a uma área amostrada de 6,37 ha, ou seja, 81,3% da área total, o que corresponde a um número de 13 parcelas onde apareceram 80 espécies. Com o aumento de uma área de 1,47 ha, apenas duas novas espécies apareceram (Figura 1).

Tabela 2: Relação da área basal (m^2 /parcelas de 0.49 ha) e resultados do número suficiente de parcelas.

Parcela	A. Basal ($\text{m}^2/0.49$ ha)	Resultados
1	13.584	média: 12.87 s: 1.26 s^2 : 1.60 CV%: 9.82 t(95%, 15 g.l.: 2.131 LE: 10% n_{calc} : 4.37
2	14.747	
3	13.683	
4	13.430	
5	12.901	
6	13.569	
7	11.648	
8	12.534	
9	15.505	
10	11.994	
11	12.573	
12	10.555	
13	13.595	
14	11.597	
15	11.974	
16	12.024	

Tabela 3: Valores mínimos para amostragem em cada parcela de 0.49 ha, levando-se em consideração o aumento da área a cada 100 m^2 (sub-parcelas de 10 x 10 m).

Parcela principal	Nº Sub-parcelas	Nº Espécies
1	38	35
2	42	35
3	45	37
4	37	34
5	34	29
6	39	30
7	38	29
8	45	27
9	45	27
10	45	36
11	32	28
12	40	26
13	46	35
14	37	22
15	39	27
16	42	30

Figura 1: Relação espécie/área de todas as parcelas inventariadas para DAP ≥ 10 cm.

3.1.2. Estrutura da floresta

No Anexo I são apresentados todas as espécies que ocorreram na área de estudo, constando a identificação dos nomes vulgares, nomes botânicos e famílias. A família mais predominante foi Leguminosae, com 19 espécies em 11 gêneros, destacando-se o gênero *Inga*. Foram totalizadas 30 famílias, 65 gêneros, e 80 espécies de plantas. Deste total, 3 espécies são palmeiras.

Também no Anexo I são apresentados os valores absolutos e relativos, respectivamente, de dominância, frequência, abundância, e índice de valor de importância (I.V.I). As espécies foram listadas em ordem decrescente de valores de I.V.I.

As 3 espécies mais abundantes no levantamento (*Mora paranensis*, *Euterpe oleracea* e *Pentaclethra macroloba*) somam 53,36%, mais da metade do total da floresta. As palmeiras representam 34,96%, mais de 1/3 de toda a abundância nesta floresta de várzea, sendo que açai (*Euterpe oleracea*) representa 56% deste valor. De todas as espécies inventariadas, *Mora paraensis* (pracuúba), *E. oleracea* (açai), *Pentaclethra macroloba* (pracaxi), *Manicaria saccifera* (buçú), *Astrocaryum murumuru* (murumuru), *Swartzia racemosa* (pacapeuá), *Trichilia quadrijuga* (cachuá), e *Carapa guianensis* (andiroba) foram as

únicas espécies a ocorrer em todas as 16 amostras inventariadas (7,84 ha).

Com relação à dominância, 48.43% de toda a área basal estimada para esta floresta pertence a uma única espécie, *M. paraensis* (pracuúba). A pracuuba é dominante em todas as classes diamétricas, e é a espécie que no momento ocupa a maioria do dossel da floresta. Esta espécie parece estar associada também com a grande ocorrência de pracaxi no sub-bosque. É muito comum a ocorrência deste tipo de dominância de uma única espécie nas floresta de várzea, visto que é um tipo de vegetação que vem sendo explorada a mais de 300 anos (Dr. Murça Pires, 1993⁴, comunicação pessoal).

Em ordem de I.V.I., das 10 espécies ecologicamente mais importantes na estrutura e fisionomia da floresta, 2 palmeiras são de grande procura para economia local: açaí (produção de palmito), e buçú (palha para a cobertura das casas). Das 10 espécies mais importantes, pracuúba e andiroba têm grande procura pelas serrarias da região.

3.1.3. Diversidade de espécies em florestas de várzea amazônica: Futuras fontes de comparação

A floresta em estudo identifica-se muito com outras já estudadas em relação ao número de espécies, número de indivíduos e valores de área basal (Black et al., 1950; Pires & Koury, 1958; Pires, 1972 e 1973). Entretanto, a grande maioria das comparações é feita utilizando-se resultados de áreas de terra-firme (Cruz, 1991). Com relação a estudos de diversidade de espécies na várzea, faltam dados para comparação (Ayres, 1993). Neste trabalho foram calculados índices de diversidade que poderão contribuir para futuras comparações com outros estudos. Utilizando-se todas as parcelas, obteve-se o cálculo para o índice de heterogeneidade de Shannon = 2,78 (Magurran, 1987 & Pielou, 1975). Para caracterizar a riqueza de espécies foi utilizado o índice de Margalef = 14,21.

⁴ Pesquisador do Departamento de Botânica, Museu Goeldi, falecido em 1995.

Para a comparação entre parcelas, foi calculado o índice de similaridade florística de Jaccard (Rohlf, 1990), utilizando-se uma matriz de presença (1) e ausência (0) em relação ao número de espécies. As parcelas apresentaram bastante semelhança independente dos tratamentos, visto que a grande maioria dos coeficientes estão entre 0,7 e 0,9 (Tabela 4).

A utilização de índices de diversidade foi importante na comparação do efeito dos diferentes níveis de exploração realizados neste trabalho (Seção 3.3).

Com relação a distribuição do número de espécies com o número de indivíduos (Magurran, 1987), foi observado um grande número de espécies mais raras, ou seja, para 53 espécies foi encontrado apenas um indivíduo. Observou-se também um grupo intermediário, com o número de indivíduos por espécie variando de 4 a 29, e finalmente, um grupo de espécies mais comuns, variando de 37 a 100 indivíduos por espécie (Figura 2). Pracuúba (*Mora paraensis*), pracaxí (*Pentaclethra macroloba*) e açai (*Euterpe oleracea*) fazem parte deste último grupo. Esta relação é muito útil para caracterizar a estrutura da floresta em relação à distribuição das suas espécies (Legendre & Legendre, 1983; Pielou, 1984).

Figura 2: Relação do número de espécies e número de indivíduos para a floresta em estudo. O número de indivíduos por espécie tende a aumentar da esquerda para a direita.

Tabela 4: Valores do coeficiente de similaridade de Jaccard, obtidos pelo procedimento SIMQUAL (Rohlf, 1990), para as parcelas dos tratamentos 1, 2, 3 4, respectivamente.

	P 2			
P 2	1.00	P 4		
P 4	0.81	1.00	P 12	
P 12	0.69	0.54	1.00	P 16
P 16	0.48	0.51	0.73	1.00

	P 5			
P 5	1.0	P 7		
P 7	0.88	1.0	P 8	
P 8	0.74	0.76	1.0	P11
P 11	0.68	0.81	0.75	1.0

	P 1			
P 1	1.00	P 3		
P 3	0.51	1.00	P 9	
P 9	0.81	0.68	1.00	P 16
P 15	0.81	0.55	0.91	1.00

	P 6			
P 6	1.0	P 10		
P 10	0.70	1.0	P 13	
P 13	0.68	0.81	1.0	P 14
P 14	0.92	0.64	0.80	1.0

3.2. Tratos silviculturais

3.2.1. Exploração

3.2.1.1. Distribuição diamétrica

Com os dados coletados no inventário florestal, a Tabela 5 contém os valores médios de número de indivíduos (n/ha), área basal (m^2/ha) e número de espécies, antes da aplicação dos tratamentos. Não foram observadas diferenças significativas entre as médias à 95% de probabilidade pelo teste de Tukey (Ronald & Smith, 1984), o que mostra homogeneidade entre todas as parcelas.

A seleção das árvores a serem retiradas para o desbaste foi feita na ordem decrescente das classes diamétricas (Figuras 3-A; 3-B). Houve um decréscimo acentuado na densidade dos indivíduos pertencentes as classes diamétricas superiores, principalmente nos tratamentos 3 e 4. Para que houvesse precisão em relação à retirada da área basal, alguns indivíduos das classes mais inferiores (30 - 40 cm, centro de classe 35) foram selecionados para complementar a somatória (Figuras 3-A; 3-B).

Tabela 5: Médias da área basal (m^2/ha); número de indivíduos (n/ha); e número de espécies, antes da execução dos tratamentos.

Tratamento	A. Basal (m^2/ha)	Frequência (n/ha)	Número de espécies
T01	26.918	438.25	32
T02	25.031	422.75	31
T03	27.938	423.75	35
T04	25.919	418.5	34
valor de F	0,89 ns	0,16 ns	0,70 ns
C.V. (%)	10.07	10.22	14.7
Média	26.4515	425.81	33

Figura 3: A - Número de indivíduos (n/ha) por classe de DAP, antes da exploração; B - Número de indivíduos (n/ha) por classe de DAP, após a exploração.

3.1.2.2. Área basal

A situação descrita acima refletiu na diferenciação entre os tratamentos, com relação ao efeito da retirada de área basal. Após a retirada das árvores selecionadas, foram detectadas diferenças significativas pelo teste de Tukey (95% prob.), entre as médias dos tratamentos. Desta maneira, três condições distintas foram criadas com relação a abertura do dossel para a entrada de luz (Figura 4).

Figura 4: Análise de variância da área basal (m^2/ha), antes e depois da aplicação dos tratamentos. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si (Tukey lines, a 95% de probabilidade).

3.1.2.3. Volume

Após a derrubada, foi efetuada uma cubagem rigorosa para o cálculo do volume comercial de cada árvore. Como era de se esperar, foram detectadas diferenças significativas entre as médias do volume comercial por hectare nos tratamentos, exceto para o tratamento 1 (testemunha), onde não ocorreu a exploração (Tabela 6). Foram encontradas árvores ocas em todos os tratamentos, inviabilizando a sua cubagem para aquelas árvores. Entretanto, este fato não influenciou no resultado final.

Tabela 6: Médias do volume de madeira extraído por tratamento.

	Repetição 1	Repetição 2	Repetição 3	Repetição 4	Médias
Tratamento	Volume (m3/ha)	Volume (m3/ha)	Volume (m3/ha)	Volume (m3/ha)	Volume (m3/ha)
T2	64.00	58.24	68.86	44.30	58.88
T3	113.78	105.55	69.60	83.60	93.13
T4	136.26	124.49	152.69	134.01	136.86
F value					27,81**
C.V. (%)					15.39

3.3. Danos em função da exploração

A exploração de florestas tropicais tem-se constituído um problema com relação a racionalização dos impactos sobre as árvores remanescentes e regeneração natural, como também o barateamento dos custos envolvidos em todo o processo (Uhl & Vieira, 1989).

A redução deste impacto está diretamente relacionado com a intensidade e porte das árvores a serem retiradas do local. Em florestas de várzea, apesar da impossibilidade da retirada de árvores com o auxílio de veículos de qualquer porte, e apesar do tamanho das árvores ser menor do que áreas de terra firme, o impacto está presente e representa também um problema para o seu manejo (Macedo & Anderson, 1993).

Neste estudo de caso, as espécies a serem derrubadas foram selecionadas seguindo-se os critérios da Seção 2.4.1.

Para a avaliação dos danos observados em cada tratamento, foi efetuado o mapeamento de cada árvore no campo (Figuras 5.1, 5.2, 5.3, e 5.4) observando-se os seguintes critérios: (i) mortas, (ii) danificadas (fuste e copa quebrados e árvores tombadas), e (iii) sem danos. Para melhor visualização dos impactos sobre a vegetação remanescente, também foram confeccionados perfis da vegetação para cada um dos tratamentos (Figuras 6.1, 6.2, 6.3, e 6.4).

Figura 5.1: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 1 (controle), parcela 12, como exemplo de área não explorada.

Figura 5.2: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 2, parcela 8, como exemplo de retirada de 25% de área basal.

LEGENDA:	<u>Classes de DAP</u>
◦	- 10 cm a 20 cm
○	- 21 cm a 39 cm
◯	- ≥ 40 cm
⊙	- Touceira de Açaí
	<u>Exploração</u>
●	- Selecionada para exploração
⊙	- Morta
⊕	- Danificada

Figura 5.3: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 3, parcela 9, como exemplo de retirada de 50% de área basal.

Figura 5.4: Mapa da distribuição espacial de todas as árvores inventariadas para o tratamento 4, parcela 10, como exemplo de retirada de 75% de área basal.

Figura 6.1: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 1, parcela 12, como exemplo de área não explorada. 3 = *Euterpe oleracea* Mart.; 4 = *Carapa guianensis* Aubl.; 5 = *Licania macrophylla* Benth.; 6 = *Manicaria sacifera* Mart.; 8 = *Trichilia quadrijugata*; 14 = *Pithecellobium* cf. *juruanum* Harms.; 19 = *Maquira coriacea* Arg. (Kaist.) CC Berg.; 21 = *Pterocarpus officinalis* Jacq.; 22 = *Swartzia racemosa* Bth.; 23 = *Pentaclethra macroloba* (Willd.) Kuntze; 24 = *Mora paraensis* Ducke.

Figura 6.2: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 2, parcela 8, como exemplo de retirada de 25% de área basal. 2 = NI; 3 = *Euterpe oleracea* Mart.; 4 = *Carapa guianensis* Aubl.; 5 = *Licania macrophylla* Benth.; 6 = *Manicaria sacifera* Mart.; 7 = *Ormosia coutinhoi*; 10 = *Allantona lineata* (Mart. ex Berg.) Miers.; 11 = *Gustavia augusta* L.; 15 = *Macrolobium pendulum* Willd.; 20 = *Astrocaryum murumuru* Mart.; 22 = *Swartzia racemosa* Bth.; 23 = *Pentaclethra macroloba* (Willd.) Kuntze; 24 = *Mora paraensis* Ducke; 25 = *Crudia oblonga* Bth..

Figura 6.3: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 3, parcela 9, como exemplo de retirada de 50% de área basal. 1 = *Labatia macrocarpa* Mart.; 3 = *Euterpe oleracea* Mart.; 4 = *Carapa guianensis* Aubl.; 6 = *Manicaria sacifera* Mart.; 8 = *Trichilia quadrijug*a; 9 = *Anacardium giganteum* Hanc. ex Berg.) Miers.; 12 = *Inga tarapotensis* Benth.; 16 = *Zanthoxylon rhoifolia*; 17 = *Licaria mahuba* (Sambi.) Kostern; 20 = *Astrocaryum murumuru* Mart.; 23 = *Pentaclethra macroloba* (Willd.) Kuntze; 24 = *Mora paraensis* Ducke; 26 = *Hevea brasiliensis* M. Arg.

Figura 6.4: Perfil da vegetação, referente ao tratamento 4, parcela 10, como exemplo de retirada de 75% de área basal. 3 = *Euterpe oleracea* Mart.; 5 = *Licania macrophylla* Benth.; 6 = *Manicaria sacifera* Mart.; 14 = *Pithecellobium cf. juruanum* Harms.; 16 = *Zanthoxylon rhoifolia*; 18 = NI; 20 = *Astrocaryum murumuru* Mart.; 22 = *Swartzia racemosa* Bth.; 23 = *Pentaclethra macroloba* (Willd.) Kuntze; 24 = *Mora paraensis* Ducke; 25 = *Crudia oblonga* Bth.

Houve um aumento crescente no número de árvores exploradas entre os tratamentos, sendo observadas diferenças significativas ($P < 0.0001$) entre o número de árvores exploradas (Figura 7).

Com relação às árvores danificadas, foram observadas diferenças significativas ($P < 0.0009$) para o tratamento 2 em relação aos tratamentos 3 e 4, que não tiveram suas médias estatisticamente diferenciadas. Caso fossem consideradas todas as árvores danificadas --inclusive as exploradas -- foram encontradas diferenças significativas ($P < 0.0001$), caracterizando ainda mais o impacto a medida que há um aumento no número de árvores retiradas.

Com relação às médias para as árvores que não foram danificadas, foram observadas diferenças significativas ($P < 0.002$) para o tratamento 4 em relação aos tratamentos 2 e 3, que não diferiram entre si (Figura 7).

Outro procedimento utilizado para avaliar o impacto em função do aumento de árvores exploradas, e consequentemente árvores danificadas e mortas, foi o cálculo de índices de diversidade. Houve a diferenciação com relação aos valores calculados entre os extremos, ou seja, tratamentos 1 e 4 para todos os índices (Tabela 7). Estes resultados mostram que alguns índices de diversidade podem ser sensíveis quanto à mudanças drásticas na composição de espécies em áreas exploradas, podendo se tornar indicadores de empobrecimento das florestas que foram intensamente exploradas em áreas tropicais.

Entretanto, muito cuidado deve ser tomado quando na interpretação dos mesmos. Com relação a este fato, duas considerações devem ser feitas. Primeiro, a espécie prauúba (*Mora paraensis*), por ser a mais abundante e consequentemente a mais explorada, pois possui as árvores de maior porte, praticamente não foi afetada em relação a sua posição de espécie dominante. Segundo, a espécie açai (*Euterpe oleracea*), por ser a segunda espécie mais abundante, e por ter sido uma das mais afetadas na exploração, não mudou seus valores de dominância.

Ao afirmar que uma floresta é seriamente afetada na sua composição original de espécies, em função de altas intensidades de exploração -- sem o conhecimento profundo da sua estrutura -- pode-se estar cometendo erros. É o caso de diagnosticar a vocação de certas florestas para a produção madeireira.

A utilização de índices de diversidade pode ser útil também para a classificação de sítios florestais com relação a uma maior ou menor capacidade produtiva, podendo suportar intensidades mais altas de exploração, enquanto que outros locais podem ser mais sensíveis para a produção de madeira, podendo ser utilizados como áreas aptas a extração de produtos não-madeireiros que causam menos impacto na vegetação.

Figura 7: Médias em porcentagem de árvores exploradas, com danos e sem danos para cada tratamento. Médias com a mesma letra não diferem entre si a 95% de probabilidade. AB refere-se à área basal.

Tabela 7: Cálculo de índices de heterogeneidade e de riqueza para a caracterização do efeito da exploração em relação à diversidade de espécies na floresta (foram considerados para o cálculo apenas as árvores que não sofreram danos na exploração).

Trat	Nº Esp	Indiv./ha	Índice de Heterogeneidade	Índice de Riqueza
			Shannon	Margalef
1	61	438	1.21	9.70
2	54	378	1.14	8.93
3	53	310	1.21	9.06
4	47	252	1.11	8.32

3.4. Levantamento dos custos dos tratamentos

A exploração com máquinas em florestas de várzea é bastante dificultada pela condição de ter solos inundados em grande parte do ano. Por causa deste fato, a utilização de mão-de-obra é mais intensa, conforme observado na tomada de custos de todas as operações que se sucederam neste trabalho. Este fator foi o que pesou mais em todos os tratamentos, exceto para o tratamento 1, onde não foi realizada nenhuma operação de exploração. Para os tratamentos 2, 3 e 4, os custos com mão-de-obra representaram 53.1%, 54.6% e 58.4%, respectivamente, em relação ao total com todas as operações realizadas (Figura 8).

Com relação ao item infra-estrutura, onde estão incluídos os gastos com material, praticamente não houve acréscimo à medida que aumentou a intensidade de exploração. Os gastos com equipamentos, como aquisição de machado e outros instrumentos manuais de trabalho e aluguel de motosserra, não influenciaram muito na somatória total, mas foi um dos itens que mais pesou em termos de gastos.

O custos médios por metro cúbico por hectare para os tratamentos 2, 3 e 4 foram respectivamente: US\$6.37, US\$5.8 e US\$5.46. Vale lembrar que para o cálculo destes valores, não

estão incluídos os gastos com o arraste e retirada das toras do interior da floresta até a serraria, ou seja, apenas para a o planejamento dos trabalhos de inventário, seleção e derrubada.

No total para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, foram gastos por hectare para a derrubada, limpeza e plantio, respectivamente: US\$1,298.69; US\$1,665.28; US\$1,836.60; e US\$1,958.86 (Figura 8).

Figura 8: Relação de todos os itens e seus respectivos gastos para cada tratamento envolvendo o inventário, planejamento e derrubada.

4. Conclusão

As espécies mais abundantes no local de estudo foram *Mora paraensis* (pracuúba), *Euterpe oleracea* (açaí) e *Pentaclethra macroloba* (pracaxí), que representaram 53,36% da abundância de toda a floresta. Pracuúba e açaí são importantes economicamente na região como madeira serrada e para o corte de palmito, respectivamente.

Foi proposto um sistema policíclico de cortes seletivos a partir dos maiores diâmetros. Este sistema gerou grande impacto na floresta quando os tratamentos silviculturais foram muito intensos. Numa retirada de 75% área basal com uma seleção prévia das árvores e direcionando da queda das copas, 24% das árvores foram mortas e danificadas. Na operação de desbaste foram incluídas as árvores ocas para melhorar a qualidade da floresta remanescente.

Neste estudo, onde houve dominância de poucas espécies no extrato superior da floresta, o número de árvores mortas e danificadas não afetou a composição florística da mesma.

Foram retirados os seguintes valores de volume comercial por ha: (i) tratamento 2: 58.88 m³, (ii) tratamento 3: 93.13 m³, e (iii) tratamento 4: 136.86 m³.

Na avaliação dos custos, o item mão-de-obra foi o que pesou mais em todos os tratamentos, exceto para o tratamento 1, onde não foi realizada nenhuma operação de exploração. Para os tratamentos 2, 3 e 4, os custos com mão-de-obra representaram 53.1%, 54.6% e 58.4%, respectivamente, em relação ao total com todas as operações realizadas. Os custos médios por metro cúbico por hectare para os tratamentos 2, 3 e 4 foram respectivamente: US\$6.37, US\$5.80 e US\$5.46. No total para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, foram gastos por hectare desde o inventário até a derrubada, respectivamente: US\$375.00; US\$540.00; US\$644.00; e US\$747.00.

5. Bibliografia

- Ayres, J.M. 1993. **As Matas de Várzea do Mamirauá.** CNPq/Sociedade Civil Mamirauá. Brasília, DF. Vol. 1. 123p.
- Barros A.C. & C. Uhl. 1995. Logging along the Amazon River and Estuary: Patterns, problems and potencial. **Forest Ecol. and Management**, 77: 87-105.
- Baur, G.N. 1968. **The ecological basis of rain forest management.** Forestry Commission of New South Wales, Sidney. 499 p.
- Black, G.A.; Dobzhansky, T.H. & C. Pavan. 1950. Some attempts to estimate species diversity and population density of trees in amazonian forests. **Botanical Gaz.**, 114:413-425.
- Buschbacher, R.J. 1990. Natural forest management in the humid tropics: ecological, social, and economic considerations. **Ambio**, 19(5):253-258.
- Cruz, E.C. 1991. Situação atual da silvicultura e do manejo florestal sustentado em áreas de várzeas rivular. In: **O desafio das florestas tropicais.** Simpósio. IUFRO/GTZ. Curitiba. p. 59-76
- De Graaf, N.R. 1986; **A silvicultural system for natural regeneration of tropical rain forest in Suriname.** Wageningen, Agricultural University. 250 p.
- Evans, J. 1982. **Plantation forestry in the tropics.** Oxford University Press. London. 472 p.
- Finol, U.H. 1971. Nuevos parametros a considerarse en el analisis estructural de las selvas virgenes tropicales. **Rev. For. venezolana**, 18(25):37-114.
- Goodland R.J.A.; Asibey, E.O.A.; Post, J.C. & M.B. Dyson. 1991. Tropical Moist Forest Management: The urgency of transition to sustainability. In: **Ecological Economics: The science and management of sustainability.** Edited by R. Constanza. Columbia University Press. New York. p. 487-525.
- Hallé, F.; R.A.A., Oldeman & P.B. Tomlinson. 1978. **Tropical trees and forests: An architectural analisis.** New York. Springer-Ferlag.
- Hartshorn, G.S.; Simeoni, R. & J.A. Tosi. 1987. Manejo para rendimiento sostenido de bosques naturales. In: **Management of the forests of tropical america: prospects and technologies.** Proceedings of a conference. Inst. of Tropical Forestry. Puerto Rico. 121-156 p.
- Hosokawa, R.T. 1986. **Manejo e economia de florestas.** FAO. Roma. 125 p.

- Husch, B.C.; Miller, C.J. & T.W. Beers. 1983. **Forest mensuration**. J. Wiley & Sons., New York.
- Hutchinson, I.D. 1987. The management of humid tropical forests to produce wood. In: **Management of the forests of tropical america: prospects and technologies**. Proceedings of a conference. Inst. of Tropical Forestry. Puerto Rico. 121-156 p.
- Jardim, F.C.S. 1984. Estrutura da floresta equatorial úmida da Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA. **Dissertação de Mestrado**. Universidade federal do Paraná. Curitiba. 202 p.
- Johns, A.D. 1988. Effects of "selective" timber extration on rain forest composition and some consequences for frugivores and folivores. **Biotropica**, 20(1): 31-37.
- Jonkers, W.B.J. 1987. **Vegetation structure, logging damage and silviculture in a rain forest in Suriname**. Wageningen, Agricultural University. 172 p.
- Kasenene J.M. & P.G. Murphy 1991. Post-logging tree mortality and major branch losses in Kibale forest, Uganda. **Forest Ecol. and management**, 46: 295-307.
- Legendre L. & Legendre, P. 1983. **Numerical Ecology**. Elsevier. Amsterdam. 419 p.
- Lehmann, M.P.G. 1991. Managing tropical forest in Costa Rica: The Portico Project. **Master dissertation**. University of Florida, Gainesville. 98 p.
- Macedo, D.S. & A.B. Anderson, 1993. Early ecological changes associated with logging in an amazonian floodplain. **Biotropica**, 25(2):151-163.
- Magurran, E. A. 1987. **Ecological diversity and its measurement**. Princeton Univ. Press. 179 p.
- Mousasticoshvilly Jr., I. 1992. Comercialização e industrialização de virola no estuário amazônico. **Dissertação de Mestrado**. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 140 p.
- Oosting, H.J. 1951. **Ecologia vegetal**. Aguilar. Madrid. 416 p.
- Pellico Neto, S. 1982. **Inventário florestal**. CAEF, UFPR. Mimeografado. 110 p.
- Peters, C.M.; Gentry, A.H. & R. Mendelsohn. 1989. Valuation of an Amazonian rainforest. **Nature**, 339: 655-666.
- Peters, M.P. 1994. **Sustainable harvest and non-timber plant resources in tropical mois forest: an ecological primer**. WWF/The Nature Conservancy. New York. 45 p.
- Pielou, E.C. 1975. **Ecological diversity**. John Willey & Sons. New York. 156 p.

- Pielou, E.C. 1984. **The interpretation of ecological data. A primer on classification and ordination.** J. Wiley & Sons. New York. 263 p.
- Pires, J.M. & Koury, H.M. 1958. Estudo de trecho de mata de várzea próximo a Belém. Inst. Agrônômico do Norte. **Bol. Téc., 36:** 3-44.
- Pires, J.M. 1972. Estudo dos principais tipos de vegetação do estuário amazônico. **Tese de Doutorado.** ESALQ/USP. Piracicaba. 183 p.
- Pires, J.M. 1973. Tipos de vegetação da Amazônia. In: **Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA. O Museu Goeldi nos anos do sesquicentenário.** Publicação avulsa, 20: 179-202.
- Quirós D. & B. Finegan. 1994. Manejo sustentable de un bosque natural tropical en Costa Rica. CATIE. **Serie Técnica, 225(9):**25 p.
- Rohlf, F.J. 1990. **NTSYS-PC. Numerical taxonomy and multivariate analysis system, version 1.7.** State Univ. New York. Stony Brook. 156 p.
- Ronald P.C. & Jeffrey K. Smith. 1984. **Applied statistics and SAS programming language.** Elsevier Ed. Amsterdam. 187 p.
- Silva, J.N.M. 1989. The behavior of the tropical rain forest of the Brazilian Amazon after logging. **Doctoral Dissertation.** Oxford. 303 p.
- Synnott, T.J. 1992. The introduction of basic management into tropical forests. In: **Wise management of tropical forests.** Ed. F.R. Muller & K.L. Adam. Oxford For. Institute. Oxford. p. 91-96.
- Uhl, C & I.C.G. Vieira. 1989. Ecological impacts of selective logging in the Brazilian Amazon: A case study from the Paragominas region of the state of Pará. **Biotropica, 21(2):**98-106.
- Vanclay, J. 1992. Species richness and productive forest management. In: **Wise management of tropical forests.** Edited by F.R. Miller & K.L. Adam. Oxford forest Institute. Oxford. p. 1-10.
- Veríssimo, A.; Barreto, P.; Tarifa, R. & C. Uhl. 1995. Extraction of a high-value natural resource from Amazonia: the case of Mahogany. **Forest Ecol. and Management, 72:**39-60.
- Viana, V.M. 1990. Seed and seedling availability as a basis for management of natural forest regeneration. In: **Alternatives to deforestation: Steps toward to sustainable use of the Amazon rain forest.** A.B. Anderson, Editor. Columbia University Press. New York. p. 97-115.
- Wilcox, B.A. 1995. Bosques tropicales y diversidad biológica: los riegos de la pérdida y degradación de los bosques. **Unasylva, 181(46):**43-49.

ANEXO I: Relação das espécies inventariadas, constando a família botânica, gênero, espécie, dominância, abundância, frequência e importância. Todos os cálculos estão em valores absolutos e relativos.

Nome Comum	Nome Científico	FAM	Dabs	Drel	ABabs	ABrel	FRabs	FRrel	I.V.I
Abiu-C. Macaco	Labatia macrocarpa Mart.	SPT	0.3897	1.48	6.12	1.44	118.8	3.6	2.18
Abiurana	NI	SAP	0.5192	1.96	2.55	0.6	75	2.27	1.61
Abiurana-branca	NI	SAP	0.1306	0.49	0.38	0.09	12.5	0.38	0.32
Açaí	Euterpe oleracea Mart.	PAL	0.001	0	83.29	19.56	100	3.03	7.53
Acapurana	Campsiandra laurifolia Benth.	LEG	0.0276	0.1	0.26	0.06	12.5	0.38	0.18
Ananí	Symphonia globurifera L. F.	GUT	0.0255	0.1	0.26	0.06	12.5	0.38	0.18
Andiroba	Carapa guianensis Aubl.	MEL	0.4045	1.53	10.46	2.46	100	3.03	2.34
Anoerá	Licania macrophylla Benth.	CHB	0.4576	1.73	7.53	1.77	93.75	2.84	2.11
Apuí	Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbraid	MOR	0.1412	0.53	0.26	0.06	12.5	0.38	0.32
Aracanga	Aspidosperma sp.	APQ	0.0053	0.02	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Arapari	Macrolobium acaciaefolium Bth.	LEG	0.0023	0.01	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Assacú	Hura creptans L.	EUP	0.0017	0.01	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Bacuri	Platonia insignis Mart.	GUT	0.0155	0.06	0.51	0.12	25	0.76	0.31
Bacuri-Parí	Rheedia macrophylla (Mart.) P. & T.	GUT	0.0068	0.03	0.51	0.12	18.75	0.57	0.24
Buçú	Manicaria sacifera Mart.	PAL	1.6728	6.32	36.61	8.6	100	3.03	5.98
Breu	Protium cf. krukoffii Swart.	BRS	0.0026	0.01	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Buiussú	Ormosia coutinhoi	LEG	0.4019	1.52	2.93	0.69	62.5	1.89	1.37
Cachuá	Trichilia quadrijuga	MEL	0.4418	1.67	11.1	2.61	100	3.03	2.44
Cajuaçu	Anacardium giganteum Hanc. ex Engl.	ANA	0.165	0.62	0.89	0.21	37.5	1.14	0.66
Canela-Jacamí	Rinorea sp.	VIO	0.0084	0.03	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Capoteiro	Sterculia speciosa Schum.	STR	0.017	0.06	0.64	0.15	25	0.76	0.32
Cariperana	Licania longistyla (Hook. F.)	CHB	0.0465	0.18	0.38	0.09	18.75	0.57	0.28
Cerú	Allantona lineata (M. ex Berg.) Miers.	LCY	0.1613	0.61	2.81	0.66	75	2.27	1.18
Cupuacurana	Matisia paraensis Huber.	BOM	0.0133	0.05	0.26	0.06	12.5	0.38	0.16
Embaúba	Cecropia concolor Willd.	MOR	0.0124	0.05	0.77	0.18	18.75	0.57	0.26
Envira-Preta	Guatteria poeppigiana Mart.	ANN	0.0124	0.05	1.02	0.24	43.75	1.33	0.54
Faveira	Vatairea guianensis Aubl.	LEG	0.1134	0.43	0.39	0.09	18.75	0.57	0.37
Gameleira	NI	NI	0.0024	0.01	0.26	0.06	12.5	0.38	0.15
Geniparana	Gustavia augusta L.	LCY	0.0243	0.09	1.79	0.42	56.25	1.7	0.74
Inajarana	Quararibea guianensis Aubl.	BOM	0.0727	0.27	2.93	0.69	62.5	1.89	0.95
Inga-Chato	Inga tarapotensis Benth.	LEG	0.0466	0.18	2.42	0.57	50	1.52	0.75
Inga-Cipó	Inga edulis Mart.	LEG	0.0027	0.01	0.26	0.06	12.5	0.38	0.15
Inga-Ferro	Inga gracilifolia Ducke	LEG	0.1208	0.46	1.02	0.24	37.5	1.14	0.61
Ingarana Amarela	NI	NI	0.0058	0.02	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08

Nome Comum	Nome Científico	FAM	Dabs	Drel	ABabs	ABrel	FRabs	FRrel	I.V.I
Inga-Sapo	Pithecellobium cf. juruanum Harms.	LEG	0.1086	0.41	7.14	1.68	93.75	2.84	1.64
Inga-Xixica	Inga nobilis Willd.	LEG	0.009	0.03	0.26	0.06	12.5	0.38	0.16
Ioloca	NI	NI	0.0077	0.03	0.51	0.12	18.75	0.57	0.24
Iperana	Macrolobium pendulum Willd.	LEG	0.4715	1.78	5.99	1.41	87.5	2.65	1.95
Janaú	NI	RUB	0.0036	0.01	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Jaraí	Sarcocaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma.	SPT	0.1607	0.61	3.95	0.93	75	2.27	1.27
Jarandeua	Pithecellobium latifolium (L.) Benth.	LEG	0.0253	0.1	2.04	0.48	37.5	1.14	0.57
Jatuba	Guarea kunthiana A. Juss.	MEL	0.0129	0.05	0.77	0.18	31.25	0.95	0.39
Jão-Mole	Neea sp.	NYC	0.0127	0.05	0.77	0.18	31.25	0.95	0.39
Jutai	Hymenaea oblongifolia Huber.	LEG	0.072	0.27	0.38	0.09	12.5	0.38	0.25
Lacre	Vismia macrophylla H. B. K.	GUT	0.0024	0.01	0.26	0.06	12.5	0.38	0.15
Linãozinho	Zanthoxylon rhoifolia	RUT	0.0425	0.16	2.3	0.54	56.25	1.7	0.8
Louro-Abacate	Ocotea douradensis Vattimo-Gil n. sp.	IAU	0.0086	0.03	0.38	0.09	18.75	0.57	0.23
Louro B. D.	NI	IAU	0.0221	0.08	0.13	0.03	6.25	0.19	0.1
Louro P.	Licaria guianensis Aubl.	IAU	0.0154	0.06	0.38	0.09	18.75	0.57	0.24
Macacaúba	Platymiscium trinitatis Hub.	LEG	0.0289	0.11	0.77	0.18	31.25	0.95	0.41
Macucú	Licania guianensis (Aubl.) Griseb.	CHB	0.8105	3.06	5.1	1.2	68.75	2.08	2.12
Macucú-Branco	Licania heteromorpha Bth.	CHB	0.0108	0.04	0.64	0.15	31.25	0.95	0.38
Mamorana	Pachira aquatica Aubl.	BOM	0.0692	0.26	0.28	0.09	18.75	0.57	0.31
Marachibé	NI	NI	0.001	0	0.13	0.03	6.25	0.19	0.07
Maúba	Licaria mahuba (Sampi.) Kostern.	IAU	0.2259	0.85	4.85	1.14	81.25	2.46	1.48
Mouriri	NI	NI	0.0133	0.05	0.64	0.15	25	0.76	0.32
Muiratinga	Maquira coriacea Arg. (Kaist.) CC Berg.	MOR	0.1026	0.39	1.53	0.36	50	1.52	0.75
Munguba	Pseudobombax munguba Mart. & Zucc.	BOM	0.004	0.02	0.13	0.03	6.25	0.19	0.08
Murumuru	Astrocaryum murumuru Mart.	PAL	0.594	2.25	28.44	6.68	100	3.03	3.99
Mutamba	Guazuma ulmifolia Lam.	STR	0.0141	0.05	0.26	0.06	12.5	0.38	0.16
Mututí	Pterocarpus officinalis Jacq.	LEG	0.2954	1.12	2.3	0.54	75	2.27	1.31
Pacapeuá	Swartzia racemosa Bth.	LEG	0.653	2.47	12.12	2.85	100	3.03	2.78
Pajurá	Licania minutiflora (Sagot.) Fritsch.	CHB	0.001	0	0.13	0.03	6.25	0.19	0.07
Pará-Pará	Jacaranda sp.	BIG	0.0039	0.01	0.26	0.06	12.5	0.38	0.15
Pau-Mulato	Calycophyllum spruceanum Bth.	RUB	0.6876	2.6	1.15	0.27	50	1.52	1.46
Paxiúba	Socratea exorhyza Mart.	PAL	0.0058	0.02	0.51	0.12	25	0.76	0.3
Pitaíca	Swartzia polyphylla A. DC.	LEG	0.2256	0.85	1.53	0.36	50	1.52	0.91
Pracaxi	Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze	LEG	1.7842	6.74	43.49	10.22	100	3.03	6.66
Pracuúba	Mora paraensis Ducke	LEG	12.8126	48.43	100.4	23.58	100	3.03	25.01
Puruí	Alibertia edulis	APO	0.0692	0.26	2.04	0.48	50	1.52	0.75
Quariquara	Minquartia guianensis	RUB	0.0135	0.05	0.38	0.09	12.5	0.38	0.17

Nome Comum	Nome Científico	FAM	Dabs	Drel.	ABabs	ABrel	FRabs	FRrel	I.V.I
Rim-de-Paca	Crudia oblonga Bth.	LEG	0.1746	0.66	3.44	0.81	81.25	2.46	1.31
Seringueira	Hevea brasiliensis M. Arg.	BOM	0.2036	0.77	3.32	0.78	93.75	2.84	1.46
Tamaquaré	Caraipa grandifolia Mart.	GUT	0.0145	0.05	0.51	0.12	18.75	0.57	0.25
Tanambuca	Terminalia sp.	CMB	0.4523	1.71	1.02	0.24	37.5	1.14	1.03
Taperebá	Spondias mombin Jacq.	ANA	0.4309	1.63	1.4	0.33	62.5	1.89	1.28
Tento	Ormosia sp.	LEG	0.0045	0.02	0.26	0.06	6.25	0.19	0.09
Urucurí	Conceveiba guianensis Aubl.	EUP	0.2582	0.98	1.91	0.45	43.75	1.33	0.92
Ucuúba	Virola surinamensis (Rol.) Warb.	MYS	0.0486	0.18	2.04	0.48	62.5	1.89	0.85
	TOTALS		26.461	100.0	425.8	100	3,300	100	100.0