DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO
GRANULADA DE *Bacillus sphaericus*

LUIS FRANCISCO ANGELI ALVES

Biólogo

ORIENTADOR: PROF. DR. SÉRGIO BATISTA ALVES

Tese apresentada à Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Universidade de São Paulo, para obtenção
do título de Doutor em Ciências, Área de
Concentração: Entomologia.

PIRACICABA

Estado de São Paulo

Fevereiro - 1999

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - Campus "Luiz de Queiroz"/USP

Alves, Luis Francisco Angeli

Desenvolvimento de formulação granulada de *Bacillus sphaericus* / Luis Francisco Angeli Alves. - - Piracicaba, 1999.
88 p. : il.

Tese (doutorado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1999.
Bibliografia.

1. Bactéria entomopatogênica 2. Bactéria produtora de inseticida 3. Controle biológico 4. Inseticida biológico 5. Inseticida granulado 6. Inseto-nocivo 7. Pernilongo
1. Título

CDD 632.951

"Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte - O Autor"

Dedico este trabalho à minha esposa Sandra,
pela atenção, força e compreensão
em todos os momentos.

HOMENAGEM

Ao amigo Antonio Batista por nunca ter se
preocupado em apenas me ensinar, mas
principalmente por ter se dedicado à minha
formação, muito obrigado.

AGRADECIMENTOS

A Deus pela minha existência e pela força que me permitiu realizar este trabalho.

Ao Prof. Sérgio Batista Alves, pela orientação, incentivo e amizade.

Ao Departamento de Entomologia, pelas instalações, recursos e equipamentos indispensáveis.

Aos Professores do curso de Pós-graduação em Entomologia da ESALQ, pelos ensinamentos recebidos, colaboração e dedicação.

Ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) pela bolsa de estudos.

À Bióloga Solange Aparecida Vieira, funcionários do Depto. de Entomologia pela amizade, colaboração.

Aos meus pais Dario e Margarida pela minha formação e ao meu irmão André pela amizade e consideração.

Aos amigos do curso de Pós-graduação em Entomologia, especialmente a Alcides Moino Júnior, José Eduardo M. de Almeida, Marco Tamai, Pedro M. O. J. Neves e Rogério B. Lopes pelos momentos compartilhados de trabalho e convivência.

À Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em especial ao Departamento de Ciências Biológicas, por colaborar com a realização de parte deste trabalho e também ao técnico de laboratório de Zoologia José Ricardo Marques pelo auxílio na condução dos experimentos.

Ao Prof. José Lopes (CCB/UEL), pelo apoio técnico e colaboração na realização dos experimentos de campo.

SUMÁRIO

	Página
RESUMO	vi
SUMMARY	vii
1 INTRODUÇÃO.....	1
2 REVISÃO DE LITERATURA	4
3 SELEÇÃO DE ISOLADOS DE <i>Bacillus sphaericus</i> NEIDE PARA O CONTROLE DE <i>Culex</i> spp. (DIPTERA; CULICIDAE)	27
3.1 Introdução	27
3.2 Material e métodos.....	28
3.2.1 Inseto teste	28
3.2.2 Seleção de isolados	30
3.3 Resultados e discussão	33
4 SELEÇÃO DE INERTES E ADJUVANTE VISANDO A ELABORAÇÃO DE UMA FORMULAÇÃO GRANULADA DE <i>Bacillus sphaericus</i> NEIDE	39
4.1 Introdução	39
4.2 Material e métodos.....	39
4.2.1 Teste de fluuabilidade	40
4.2.2 Testes de compatibilidade em meio sólido.....	42
4.3 Resultados e discussão	42
4.3.1 Teste de fluuabilidade	42
4.3.2 Testes de compatibilidade em meio sólido.....	44
5 ESTABILIDADE DA FORMULAÇÃO DE <i>Bacillus sphaericus</i> ARMAZENADA SOB DIFERENTES CONDIÇÕES.....	47
5.1 Introdução	47
5.2 Material e métodos.....	48
5.2.1 Preparo da formulação	48
5.2.2 Armazenamento em condições ambiente.....	50

5.2.3 Armazenamento em temperatura elevada	52
5.3 Resultados e discussão	52
5.3.1 Armazenamento em condições ambiente	52
5.3.2 Armazenamento em temperatura elevada	58
6 EFICIÊNCIA DA FORMULAÇÃO GRANULADA G4 EM CRIADOUROS NATURAIS E ARTIFICIAIS DE <i>Culex</i> spp.....	48
6.1 Introdução	65
6.2 Material e métodos.....	66
6.2.1 Experimentos em criadouros artificiais.....	66
6.2.1.1 Estimativa da concentração de campo para a formulação granulada de <i>Bacillus sphaericus</i> (G4).....	66
6.2.2 Experimento em criadouros naturais.....	68
6.3 Resultados e discussão	69
6.3.1 Experimento em criadouros artificiais	69
6.3.1.1 Eficiência da formulação em diferentes tipos de água e estimativa da concentração de campo para a formulação G4.....	69
6.3.2 Experimento em criadouros naturais.....	71
7 CONCLUSÕES	75
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	79

DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO

GRANULADA DE *Bacillus sphaericus*

Autor: LUIS FRANCISCO ANGELI ALVES

Orientador: Prof. SÉRGIO BATISTA ALVES

RESUMO

A formulação foi preparada impregnando-se o inerte com uma suspensão de esporos e cristais de *Bacillus sphaericus*, em conjunto com o adjuvante. O isolado utilizado foi o MS6 por ser o mais virulento e mais produtivo em meio de cultura CNY. O inerte empregado na formulação foi o sabugo de milho selecionado em função de suas propriedades físicas e do baixo custo de produção. Houve redução significativa da viabilidade dos esporos quando armazenados em temperatura elevada, principalmente quando não formulados. Os cristais também foram alterados pela alta temperatura, com redução de cerca de 50% na atividade larvicida do caldo não formulado. Em condições ambiente a viabilidade do formulado foi maior, porém, não houve relação com a atividade larvicida que não se alterou no caldo e foi reduzida em 60% na formulação, decorridos 12 meses de armazenamento. Nos criadouros artificiais a eficiência do produto formulado oscilou ao longo do período, havendo relação direta com a concentração utilizada, alcançando 95% de mortalidade após 18 dias da aplicação. Em condições naturais, embora o controle inicial tenha sido baixo (21% de redução larval após 24 horas da aplicação) obteve-se 94% de redução larval, 15 dias após a aplicação.

**DEVELOPMENT OF GRANULATED
FORMULATION OF *Bacillus sphaericus***

Author: LUIS FRANCISCO ANGELI ALVES

Adviser: Prof. SÉRGIO BATISTA ALVES

SUMMARY

The formulation was prepared using the impregnation of the inert with a suspension of spores and crystals of *Bacillus sphaericus* and the adjuvant. The MS6 isolate was the most virulent and productive in NBY culture media. The inert for the formulation was the corn cob, selected based on its physical properties and the low production cost. There was a significant reduction in the viability of the spores when stored at high temperature, mainly when they were not formulated. The crystals were also altered by the high temperature, with 50% reduction in the larvicidal activity of the broth. Under environmental conditions, the viability of the formulated material was higher; however, there was no reduction in the larvicidal activity for the broth and 60% of reduction in the activity was observed in the formulated material after 12 months of storage. In the artificial breeding sites the efficacy of the formulated product varied throughout the time reaching 95% of mortality after 18 days of the application. Under natural conditions, although the initial control was low (21% of larval reduction after 24 hours of the application), 94% of larval reduction was obtained 15 days after the application.

1 INTRODUÇÃO

Os insetos constituem-se, há muito tempo, um dos maiores problemas encontrados pelo homem, pois a competição por recursos tem levado à uma série de prejuízos causados às atividades agropecuárias, devendo ser ainda incluídas as doenças que esses artrópodes transmitem ao homem e outros animais.

Dentre os vetores, os dípteros da família Culicidae, destacam-se pela importância na transmissão da dengue, e outras doenças típicas das regiões tropicais, como malária, febre amarela e filariose.

A dimensão dos danos provocados é muito grande, sendo, por exemplo, relatados no Brasil mais de 500 mil casos de malária e mais de 100 mil casos de dengue, somente no de 1996 (SUS, 1996). Da mesma forma, Regis et al. (1996) referem-se à ocorrência de filariose bancroftiana, em áreas de favelas na cidade de Recife, chegando a 15% de incidência.

A ocupação descontrolada das cidades, provocando acúmulo de matéria orgânica carregada para os rios e córregos (efluentes domi-sanitários, dejetos e lixo), alterações do relevo e cursos d'água e contaminação química do ambiente têm favorecido à multiplicação desses insetos, principalmente pela rápida eliminação dos seus inimigos naturais.

Como resultado desta situação de desequilíbrio e pelo descaso da saúde pública, as epidemias urbanas tornaram-se novamente cada vez mais comuns. Como exemplo, apenas no Brasil, foram constatados mais de 550 mil casos de malária (cerca de 80% na região Norte) e mais de 120 mil casos de dengue (60% nas regiões Nordeste e Sudeste) (SUS, 1996), sendo também conhecidos relatos sobre a ocorrência filariose bancroftiana

em determinadas regiões da cidade de Recife, alcançando cerca de 15% dos indivíduos analisados (Regis et al., 1995).

O problema torna-se ainda mais relevante porque eles apresentam uma elevada capacidade de adaptação, multiplicação e disseminação, que assim, proliferam em grande intensidade, causando incômodo pelas picadas, necessárias para a ingestão de sangue. O maior agravante está no fato de que esses artrópodes, em contato com microrganismos patogênicos passam a transmiti-los durante sua alimentação, exigindo um controle eficiente para que epidemias sejam evitadas.

O controle dos pernilongos (mosquitos), vem sendo feito com base na aplicação de produtos químicos, principalmente após a década de 50. Os problemas decorrentes da utilização de tais produtos são conhecidos (desenvolvimento de populações resistentes, intoxicações e resíduos no ambiente) e a partir da década de 70 foi introduzido o conceito de Manejo Integrado de Vetores.

Os entomopatógenos, como fungos, nematóides e bactérias podem ser empregados juntamente com métodos físicos e químicos, de forma integrada aos conhecimentos bioecológicos dos insetos. Entretanto, sua utilização, em grande escala, depende da produção massal e, principalmente, do armazenamento de forma racional, dispensando o uso de condições especiais.

O desenvolvimento de formulações pode atender a este último aspecto, além de ser importante para a eficiência do produto no campo, pois sendo desenvolvidas de acordo com os hábitos do inseto e as características do ambiente, garantem a boa distribuição do material, favorecem o contato com o inseto-alvo e aumentam a persistência do entomopatógeno no campo, protegendo-o, principalmente, da degradação decorrente da exposição à radiação ultravioleta emitida pelo sol.

Sendo assim, o uso de *Bacillus sphaericus* Neide como agente de controle microbiano de culicídeos, está igualmente sujeito ao desenvolvimento de formulações adequadas e compatíveis com a realidade do consumidor, seja do ponto de vista técnico como econômico. Existem no mercado alguns produtos à base desta bactéria, desenvolvidos e comercializados pelos países do Hemisfério Norte. No Brasil, existem

estudos realizados por órgãos públicos e privados de pesquisa, visando-se formulações líquidas. No entanto, devido às características peculiares dos locais explorados pelos insetos, torna-se necessário o desenvolvimento de formulações sólidas flutuantes, que podem ser aplicadas em locais protegidos pela vegetação (que não seriam atingidos adequadamente nas aplicações de preparações líquidas), além de permitir a liberação contínua dos esporos e cristais da bactéria próximo à superfície. O uso destas formulações garante que ao longo do tempo, mesmo após a aplicação, novos indivíduos que surjam nos criadouros sejam atingidos, reduzindo-se a frequência das aplicações e, conseqüentemente, os custos de controle dos vetores.

Assim, este trabalho tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de formulações sólidas de *Bacillus sphaericus* visando o controle de pernilongos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Culicídeos e sua importância

São conhecidas mais de 3000 espécies de culicídeos, distribuídas por todo o mundo. Sua principal característica é o hábito hematófago apresentado pelas fêmeas de quase todas as espécies, o que os torna um grande incômodo. Além disso, durante as picadas por ocasião da alimentação das fêmeas, muitas doenças são transmitidas, como malária, febre amarela, encefalite, filariose, dengue e outras viroses. Do ponto de vista da entomologia médica, destacam-se os gêneros: *Culex*, *Aedes* e *Anopheles*. Popularmente, recebem denominações variadas, como mosquito, carapanã, muriçoca e pernilongo. Tais insetos estão associados a quaisquer tipos de coleções d'água, nas quais os ovos são depositados para o desenvolvimento das fases larvais e pupa. A qualidade da água e a presença humana exercem influência na ocorrência dos insetos, sendo mais comum em águas poluídas e estagnadas a presença de larvas de *Culex*, em água limpa e parada freqüente o desenvolvimento de *Aedes*, enquanto *Anopheles* se desenvolve em cursos de água limpa.

A interferência humana nos diferentes ambientes (agrícolas ou urbanos) resulta, quase sempre, em alterações nos equilíbrios populacionais das espécies que neles coabitam. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo experimentou uma grande ocupação das áreas urbanas. Como decorrência, o acúmulo de matéria orgânica, destino incorreto de efluentes domi-sanitários (esgotos não tratados ou canalizados), mudanças no relevo e cursos de rios e presença cada vez maior de substâncias químicas no ambiente favoreceram certas espécies antropofílicas, que pela grande capacidade de adaptação aos

ambientes alterados pelo homem e pelo desaparecimento de inimigos naturais como peixes, pássaros e outros animais, atingiram níveis populacionais muito elevados, infestando as cidades e aglomerações habitacionais.

Pelo fato das espécies vetoras estarem naturalmente associadas a certos microrganismos patogênicos ao homem, quando um hospedeiro infectado ou o vetor infectivo atinge locais habitados pelo homem, prolifera-se e assume grande importância, pois desta forma uma epidemia torna-se um perigo eminente.

Deve-se, no entanto, mencionar que como qualquer animal, os culicídeos também possuem um papel de importância nos ecossistemas naturais, pois são organismos aquáticos e elementos básicos na cadeia trófica destes ambientes. Isto porque são um dos primeiros a converter a produção fotossintética das algas em alimento para os peixes.

2.2 Controle

Pode-se, de maneira didática, dividir as estratégias de controle desses insetos, em procedimentos pessoais e ambientais.

2.2.1 Pessoal e Ambiental

Os procedimentos pessoais consistem na utilização de barreiras físicas (vestimentas e telas em janelas, portas e sobre as camas) e químicas (aplicação de repelentes à base de DEET - dietiltoluamida, sobre a pele, inseticidas piretróides em impregnação de roupas ou contidos em tabletes, vaporizados em dispositivos elétricos). Todas as medidas visam minimizar a presença do inseto adulto próximo das pessoas ou evitam apenas o contato entre o vetor e o hospedeiro (Burgess & Cowan, 1993). Esta estratégia é a menos adequada porque não elimina a causa do problema (condições ou fatores que favorecem à multiplicação dos insetos). Assim, de forma emergencial, eliminam-se através de aplicações (pulverização, termonebulização, etc.), os focos de

adultos, em vôo noturno ou abrigados junto a residências que são atingidas pelos produtos químicos.

Os procedimentos ambientais são utilizados desde a década de 40, quando surgiram os primeiros programas organizados para o controle de pernilongos, a premissa básica era a redução dos recursos disponíveis para os insetos (água, alimento e abrigo) e o uso de produtos químicos inorgânicos e óleo na superfície da água. Ao longo dos anos 40, o advento dos inseticidas organo-sintéticos provocaram grande impacto nos procedimentos da época, pois surgiram como alternativas eficientes e rápidas que se difundiram amplamente, deixando para segundo plano os métodos mais tradicionais (Garcia, 1983).

Toda a problemática vivida a partir da década de 70 no controle de pragas agrícolas (populações de insetos resistentes aos produtos utilizados, uso de produtos mais potentes e em concentrações mais elevadas, eliminação dos inimigos naturais e intoxicações diretas e indiretas) também é válida para o controle de vetores. Assim sendo, a forma mais eficaz de controle de pernilongos deve estar baseada em um Programa de Manejo Integrado, planejado com adoção de diferentes estratégias, que além de proteger o ser humano das picadas, interferem no ciclo de desenvolvimento do inseto, alterando sua dinâmica populacional (Subra, 1981).

A idéia do Manejo Integrado é também possível para a área da Saúde Pública. Como exemplo, Andrade (1995) citou que em determinadas regiões da Ásia e América a redução da população de *Anopheles* em 5 vezes foi suficiente para interromper o ciclo da malária. É importante salientar que os níveis populacionais aceitáveis são indicados com base nos estudos populacionais (à semelhança do MIP).

A implantação do MIP deve ser orientada de forma a se alterar a população dos vetores a níveis aceitáveis, utilizando-se para isso de conhecimentos biológicos e ecológicos para que a interferência no ciclo do inseto seja, além de eficiente, adequada à realidade sócio-econômica, compatível com a tecnologia disponível e envolvida com a questão ambiental.

De forma geral, isto se consegue quando se eliminam algumas condições favoráveis aos vetores. Como exemplo, podem ser adotadas a drenagem periódica dos locais de reprodução, canalização de córregos e dutos de esgoto, limpeza das margens dos córregos para aumentar a vazão (capinas mecânica ou química) e cobertura das fossas e canais pluviais que assim, impedem ou dificultam a formação de criadouros, devendo-se incluir a proteção pessoal, principalmente telas e repelentes (Reiter, 1985; Burgess & Cowan, 1993).

Muitas vezes tais medidas físicas podem não ser suficientes ou não são possíveis de serem aplicadas e para se reduzir a população de vetores a níveis aceitáveis devem ser incluídos o controle químico e/ou biológico. Atualmente existem produtos químicos bastante seguros e que oferecem baixo risco de intoxicações, devido ao tipo de formulação que diminui a exposição excessiva do ingrediente ativo no ambiente ou pelo modo de ação mais específico. Nesse sentido, destacam-se os reguladores de crescimento (como metoprene) que aplicados na água alteram a fisiologia da larva impedindo-a de atingir a fase adulta. A utilização de microrganismos entomopatogênicos constitui-se numa prática segura e, em muitos casos, eficiente para o controle de culicídeos. Ainda neste contexto, Legner (1995), descreve um breve histórico sobre o controle biológico de culicídeos, envolvendo, não somente entomopatógenos, como predadores, incluindo peixes e crustáceos, hidras e planárias.

A possibilidade de se implantar um programa de manejo baseado no uso de controle biológico pode ser demonstrada pelo exemplo ocorrido no Brasil. Durante 4 anos em um programa piloto de manejo, foram implantadas medidas físicas e biológicas (*Bacillus sphaericus*) visando diminuir os níveis populacionais de *C. quinquefasciatus* em determinadas regiões da cidade de Recife, contando com o apoio das comunidades locais. Os resultados mostraram a eficiência do programa, uma vez que a população de insetos foi mantida em níveis baixos daqueles verificados previamente ao início dos trabalhos (Regis et al., 1995).

2.2.2 Controle microbiano

Os microrganismos desempenham um papel importante no controle natural dos vetores. É comum o isolamento de diferentes fungos Entomophthorales, Oomycetes e Deuteromycetes, protozoários ciliados e microsporídeos, alguns vírus e bactérias. Muitas pesquisas realizadas mostraram que determinados entomopatógenos apresentam características que permitem sua exploração em diferentes estratégias do controle microbiano; outros, porém, não passam de inimigos naturais e atuam de acordo com as regras da natureza.

Embora o controle microbiano de culicídeos seja baseado no uso de bactérias, é importante salientar conforme ressaltaram Lacey & Undeen (1986) & Legner (1995) em suas revisões, o potencial apresentado por outros entomopatógenos.

De modo geral o gênero *Bacillus* vem sendo estudado para o controle de pragas desde a década de 50 e desde então os estudos conduzidos que levaram ao domínio das técnicas de produção *in vitro*, somado à rápida ação inseticida e a possibilidade de serem formulados permitiu que fossem desenvolvidos produtos comerciais lançados no mercado mundial.

A característica básica de *B. thuringiensis* var. *israelensis* e *B. sphaericus* é a síntese de esporo de resistência acompanhada pela formação de um corpo cristalino de natureza protéica, responsável pela patogenicidade do microrganismo. A ação de *B. thuringiensis* var. *israelensis* é mais rápida que *B. sphaericus*, envolvendo apenas as toxinas do cristal, porém, *B. sphaericus* é capaz de se multiplicar nos cadáveres e persistir por mais tempo no ambiente, pois é menos afetado pela poluição das águas (Davidson et al., 1984).

Além destes, tem sido relatada a obtenção de novas variedades de *B. thuringiensis*, bem como outros gêneros de bactérias que poderão, futuramente, serem incorporadas ao grupo de agentes microbianos de controle. Dentre eles, Vilarinhos et al. (1997) citaram trabalhos com *B. thuringiensis* var. *morrisoni* (H-8a:8b), *B. thuringiensis*

var. *darmstadiensis* (H-10) e *B. thuringiensis*. var. *kyushuensis* (H-11a:11c), *B. thuringiensis* var. *medellin* (H-30), *B. laterosporus* e *Clostridium bifermentans*.

Alguns fungos entomopatogênicos têm sido isolados de larvas de culicídeos, mostrando-se eficazes no controle destes insetos, como é o caso de *Lagenidium giganteum*, *Coelomomyces* spp, *Culicinomyces clavisporus*. Outros, porém, como *Metarhizium anisopliae* e *Beauveria bassiana*, embora sejam raros em ocorrências naturais, em testes de laboratório mostraram-se altamente patogênicos (Garcia, 1983; Legner, 1995).

Embora pouco tolerante com relação às características da água, *L. giganteum* tem sido explorado comercialmente. Existe a possibilidade de ser produzido e armazenado, bem como de persistir no ambiente, pois multiplica-se nos cadáveres. Além disso sua ação não exige que seja ingerido (Lacey & Undeen, 1986).

Alguns estudos mais detalhados com *M. anisopliae*, em condições de laboratório, elucidaram o modo de ação, variabilidade entre os isolados e a possibilidade de se formular os conídios (Daoust & Roberts, 1983; Daoust et al. 1982; Lacey et al., 1988). Trabalhos desenvolvidos recentemente no Departamento de Entomologia da ESALQ/USP demonstraram potencial de um isolado, chegando a causar 100% de mortalidade em 24 horas, sendo mais patogênico e mais produtivo que o isolado E9, considerado padrão (Alves et al., 1997).

Nematóides da família Rhabditidae (*Romanomermes culicivora*) chegaram a ser produzidos e comercializados com o nome de Skeeter Doom®. São organismos muito eficientes, com capacidade de se multiplicar no ambiente bem como de resistir às condições adversas de temperatura e dessecação. Foram, em certos locais, aplicados extensivamente, porém, o custo elevado da sua produção massal, dificuldades de armazenamento, estreita tolerância à poluição orgânica e inorgânica da água desencorajaram sua ampla utilização, mas em programas regionais podem atender a demanda, sendo integrados em um programa de manejo (Legner, 1995). Segundo Andrade (1995), em Cuba foram produzidos, em larga escala para o controle de *C. quinquefasciatus*.

Os protozoários são naturalmente encontrados infectando as populações de insetos, sendo alguns deles isolados e estudados como certos microsporídeos. O ciclo de vida complexo e a dificuldade na produção têm servido de barreira para sua utilização em maior escala, embora seja unânime o potencial que apresentam para o controle de vetores, podendo, segundo Lacey & Undeen (1986) serem utilizados em certos habitats, em estratégias de liberação inoculativa e aumentativa.

Para ambientes isolados nos quais os pernilongos proliferam-se, Washburn & Anderson (1990) pesquisaram o uso de *Lambornella clarki* (em cujo ciclo são formados cistos de resistência à dessecação) bem como a viabilidade de sua produção massal. De modo geral, estes entomopatógenos demonstram possuir poucas chances de serem aproveitados no controle microbiano de pernilongos, pois existem dificuldades para serem produzidos e é baixa a atividade residual, embora já se tenha relatado a ocorrência de epizootias de VPN em condições naturais (Legner, 1995).

Mais recentemente, com a contribuição da engenharia genética, vem sendo pesquisada a utilização de algas transgênicas, como agentes de controle. Baseando-se no princípio de que larvas de culicídeos alimentam-se de cianofíceas, Murphy & Stevens (1995) testaram, por meio de vetor plasmidial, a introdução de genes de *B. thuringiensis* var. *israelensis*, conseguindo a expressão genética, ou seja, a síntese das toxinas da bactéria na cianofíceia. Larvas de *Culex*, *Aedes* e *Anopheles* ingeriram as células modificadas e em dois dias cessaram sua alimentação, vindo a morrer em 6 dias, mostrando o potencial desta técnica.

Embora a contribuição da engenharia genética para a evolução da ciência seja incontestável, certos cuidados com a liberação de organismos geneticamente modificados (OGM) devem ser tomados. Isto porque envolvem-se ambientes que apresentam uma riqueza muito grande de diversidade de vida e tão pouco se sabe sobre os prováveis efeitos que os OGM poderão causar ao longo do tempo e uma vez liberados no ambiente é impossível de serem recolhidos (Sosa-Gómez et al., 1998).

2.2.3 Situação atual e perspectivas

O uso dos entomopatógenos no controle de vetores está limitado pelo interesse econômico e pelo domínio de grandes empresas que detêm as técnicas de produção de *Bacillus* há cerca de 40 anos, tendo investido milhões dólares em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (Vilarinhos et al., 1998).

Segundo Habib & Andrade (1998), o interesse comercial está baseado em certas características destes organismos que permitem sua produção em grande escala (milhares de litros) e também lhes confere maior estabilidade no armazenamento em condições ambiente quando se compara à estabilidade de fungos e nematóides. Isto, de certa forma, inibiu a expansão do uso de outros entomopatógenos, mesmo considerando todo o seu potencial como agente de controle biológico, que podem ser úteis, conforme salientou Andrade (1995), em programas regionais.

Embora, a nível mundial, sejam consumidas toneladas de produtos, no Brasil infelizmente são pouco utilizados e até mesmo pouco conhecidos. O grande problema é que os compradores potenciais são os órgãos públicos tidos como maus compradores. Assim, o mercado ainda dominado pelo *marketing* dos produtos químicos movimenta quantias irrisórias de produtos biológicos, o que justifica o pequeno interesse das empresas em lançar e investir em seus produtos no Brasil. Entretanto, Alves et al. (1998) consideraram o mercado brasileiro de inseticidas microbianos promissor, uma vez que há grandes possibilidades dos produtos químicos serem substituídos, ampliando o consumo atual.

Com isso, no mundo todo e, principalmente no Brasil, as pesquisas com outros agentes de controle dificilmente conseguirá lançar no mercado novos produtos que venham a concorrer em igualdade. Como exemplo do direcionamento das pesquisas, tem-se o nematóide *R. culicivora* que era produzido e comercializado e fungos como *M. anisopliae*, *L. giganteum*, *Culicinomyces clavisporus* e *Coelomomyces* spp. que, como visto anteriormente, apresentam-se patogênicos e interessantes para o controle de vetores e são igualmente pouco explorados. Entretanto, o potencial representado pelos diferentes

agentes microbianos poderia ser aproveitado em programas regionais, elaborados por prefeituras e certas comunidades.

O controle efetivo de culicídeos vetores, mantendo-os em níveis populacionais aceitáveis, somente será conseguido à medida em que surgirem políticas adequadas à realidade e que explorem ao máximo os conceitos de manejo, envolvendo, sempre que possível a própria comunidade, voltando-se para a implementação de programas regionalizados.

***Bacillus sphaericus* Neide**

Segundo Singer (1990), o primeiro registro de *B. sphaericus* data de 1964, sendo originalmente obtido por Keller na Califórnia, a partir de larvas de *Culiseta incidens*. Em função da baixa atividade entomopatogênica, houve desinteresse no prosseguimento dos estudos visando explorar o potencial do microrganismo como agente de controle.

A partir da década de 70, com o envolvimento da Organização Mundial de Saúde, houve um impulso na busca por novos isolados mais virulentos que o original. Além disso, diversas pesquisas foram conduzidas para se conhecer as causas de patogenicidade, a segurança ambiental e também realizados testes de campo, principalmente com o isolado SSII-1 (Habib & Andrade, 1998).

Os primeiros produtos comerciais foram desenvolvidos na forma de pó após a obtenção do isolado 1593, cuja virulência era superior aos isolados conhecidos àquela época. Embora apresentassem problemas de estabilidade e uniformidade, representavam a primeira tentativa de se explorar comercialmente o patógeno.

Paradoxalmente, o grande salto do ponto de vista comercial deu-se em função da descoberta da variedade *israelensis* de *B. thuringiensis*. Tal variedade, diferente das demais, era patogênica a dípteros e com maior espectro de ação que *B. sphaericus*. Isso despertou o interesse das companhias que já produziam *B. thuringiensis* var. *kurstaki* (para o controle de lepidópteros) que motivou a pesquisa de técnicas de produção, formulação e também a continuidade por isolados mais virulentos.

São registrados mais de 350 isolados de *B. sphaericus* depositados na principal coleção deste entomopatógeno, sediada no Instituto Pasteur, agrupados em 48 serotipos, sendo que a maioria deles está restrita a apenas seis deles: H-1a, H-2a:2b; H-5a:5b; H-6, H-25 e H-26a:26b. Entretanto, ressalta-se também, que no serotipo H-5a:5b estão os isolados mais tóxicos para *Culex* spp.. A virulência dos isolados torna-se de difícil interpretação na medida em que os trabalhos são feitos usando-se metodologias não padronizadas (meio de cultura, inseto-teste, apresentação do produto, etc.), o que torna questionável as comparações feitas, mas independentemente, é consenso a diferença apresentada pelos isolados de *B. sphaericus* em relação aos hospedeiros suscetíveis (de Barjac, 1990).

Entretanto, estudos em desenvolvimento sugerem alguma relação entre a toxidade dos isolados e a seqüência gênica envolvida na síntese das toxinas (Yousten, 1996).

Schenkel *et al.* (1992) relataram a caracterização de novos isolados obtidos em solos do Brasil, demonstrando que pertencem ao serotipo H-5a:5b, com virulência semelhante ao isolado 2362, porém, com menor produção de esporos/ ml de meio de cultura.

Atualmente, o isolado 2362, obtido de larvas de *Simulium pertinax* (Diptera, Simuliidae) é o mais utilizado nos produtos comerciais e em aplicações de não formulados, embora ainda sejam necessários e justificáveis os constantes esforços da pesquisa de formulações e isolados, visando a obtenção de produtos mais eficientes (Vilarinhos *et al.*, 1998).

Morfologicamente, é caracterizado pela presença de um esporo de resistência, ao qual está associado um corpo paraesporal cristalino e de natureza protéica. Envolvendo ambos há o exosporium que os torna fortemente unidos, dificultando a sua separação. Tal como em *B. thuringiensis*, o cristal apresenta-se como um aglomerado protéico, abrigando moléculas de diferentes pesos moleculares, ao qual atribuiu-se participação na atividade patogênica do microrganismo (Davidson, 1981). Na forma em que se apresentam, algumas destas moléculas são consideradas pró-toxinas (moléculas de 41,9 e 51,4 kDa). As linhagens mais virulentas produzem também mais um tipo de toxina,

denominadas toxinas Mtx (mtx1 e mtx2). Estas proteínas são produzidas durante a fase vegetativa e são consideradas produtos do metabolismo das células, e embora sejam relativamente bem estudadas, pouco se conhece exatamente sobre sua importância no ciclo de infecção, bem como seu modo de ação (Charles et al., 1996; Yousten, 1996).

Davidson (1984) descreveu o ciclo de infecção de *B. sphaericus*, inoculando suspensão de esporos e cristais na água com larvas de *C. quinquefasciatus*. Após a ingestão, os sintomas da infecção surgiram entre 30 e 60 minutos. Por transparência do tegumento foi possível verificar as alterações de mesêntero, com expansão da membrana peritrófica, que descreveu um traçado em ziguezague. As larvas passaram a apresentar tremores, inchaço e morte após 4 a 48 horas, dependendo da concentração aplicada.

Estudos de ultraestrutura do sistema digestivo de larvas de *C. quinquefasciatus* infectadas demonstraram alterações citológicas e fisiológicas que não evoluíram para outros órgãos ou sistemas. A infecção inicia-se após a ingestão das toxinas e esporos. Pelas condições alcalinas do mesêntero, os cristais são solubilizados e as proteínas digeridas pelas enzimas presentes e tornam-se ativas, ou toxinas, propriamente dito (moléculas de 39 e 43 kDa). Essas atravessam a membrana peritrófica, ligam-se a receptores glicoprotéicos específicos localizados na membrana das células do epitélio do mesêntero, penetrando nas mesmas, por meio de endocitose. No interior, foram verificados hipertrofia das mitocôndrias e surgimento de grandes lisossomos. As células incharam e separaram-se uma das outras e da membrana basal. A membrana peritrófica tornou-se irregular (ziguezague) com passagem dos esporos para seu conteúdo. Desta forma, encontram nutrientes e pH adequados para sua germinação e multiplicação intensas, podendo ser produzidos até 10^5 esporos/ cadáver (Davidson 1981, 1988; Davidson et al. 1984, 1987).

Além do efeito direto na mortalidade dos indivíduos, tem sido verificado também que a aplicação em concentrações subletais, em condições de laboratório, tem levado a efeitos degenerativos nos insetos, semelhantes aos observados pela exposição a inseticidas reguladores de crescimento. Nos tratamentos com o patógeno em CL₁₀ e CL₂₅ houve, respectivamente, após 7 dias, morte de 31 e 64%. Assim, além de mais lenta, a

mortalidade foi maior que nos testes preliminares com avaliações de até 48 horas. Nestas mesmas condições, houve redução de 70 a 80% na emergência de adultos, principalmente pela morte dos insetos na fase pupal, havendo também, emergência de adultos defeituosos. Nos indivíduos mortos, verificaram a ocorrência de anomalias como albinismo, projeção da base da cabeça, não endurecimento e melanização da cutícula das pupas, ecdise incompleta, emergência parcial dos adultos (parte posterior dos tarsos presos ao tegumento pupal) e emergência de adultos envoltos pelas asas. Entretanto, não foi verificado qualquer efeito nos adultos sobreviventes, no tocante à fecundidade e longevidade, bem como na geração seguinte (Mulla et al., 1991).

***B. sphaericus* como agente de controle**

Embora seja um patógeno de ação lenta, quando comparado a *B. thuringiensis* var. *israelensis*, sua grande vantagem está no fato de persistir no ambiente, mesmo quando este apresenta elevada quantidade de poluentes.

É um microrganismo seguro para vertebrados e outros seres aquáticos, não sendo relatados efeitos negativos (Lacey & Mulla, 1990; Siegel & Shaddock, 1990).

As técnicas de produção são amplamente conhecidas e dominadas, de forma que é possível, dentro de certos limites, sua obtenção em grandes quantidades, princípio básico para se considerar um entomopatógeno como um agente de controle (inseticida microbiano). No entanto, como já referido anteriormente, os programas de controle de vetores são ainda fortemente baseados na utilização de produtos organo-sintéticos, tanto para o controle de adultos como o de larvas.

Existem alguns casos de sucesso, onde *B. sphaericus* desempenhou excelente controle, principalmente em alguns países da África e Ásia. No Brasil, foi desenvolvido um trabalho entre 1991 e 1994, em duas áreas da cidade de Recife. Durante o período, foram tratados 5.000 criadouros com produto não formulado (caldo fermentado), contando com a participação da comunidade local. Como parâmetro de avaliação da eficiência do controle, acompanhou-se a incidência de adultos em armadilhas e de larvas e

pupas nos criadouros. Nos locais tratados, houve drástica redução das formas imaturas e, conseqüentemente, no número de adultos, que na região são transmissores da filariose. No entanto, verificou-se uma certa diferença na eficiência do controle entre as duas áreas, atribuídas pelos autores, como decorrência da maior exposição à radiação solar e fluidez das coleções de água em uma das áreas, menor redução nos índices populacionais (Regis et al. 1996).

Segundo Cônsoли (1996), embora existam diversos produtos comerciais à base de *B. sphaericus* no Brasil, estes são produzidos e desenvolvidos em outros países, sendo importados para utilização nas nossas condições.

Tais informações seguem a linha apresentada no início da década de 80 e que foi apresentada por Bhumiratana (1990). Nela, discute-se, principalmente para os países em desenvolvimento (África, Ásia e América Latina), a necessidade urgente da implantação do conceito de produção local de *B. sphaericus* e de outras bactérias entomopatogênicas.

O conceito exposto é amplo e não se restringe ao sentido da palavra, mas sim ao desenvolvimento de um processo de produção que envolva a fermentação e formulação, em contraste aos que já ocorre nos países industrializados.

Ainda segundo o autor, este conceito é baseado em duas grandes vantagens. A produção próxima do local de aplicação tende a diminuir o impacto causado pelo transporte do produto por longas distâncias, principalmente no caso das importações via marítima. Muitas vezes a umidade ou calor excessivo podem afetar a estabilidade e aumentar a degradação biológica. É destacado também, que a possibilidade de se desenvolver a formulação de forma mais adequada ao ambiente onde será utilizada, ou seja, os resultados obtidos no campo tornam-se mais próximos da realidade, pois ao contrário, ocorre normalmente o desenvolvimento do produto em países de clima frio ou temperado, onde provavelmente pouco se conhece das áreas de clima tropical. Um exemplo disso, é a quantidade de testes de campo que se concentram em áreas de ocorrência de *Culex* e os poucos relatos de testes com *Anopheles* que quando efetuados o são com os produtos importados.

Dada a necessidade de se desenvolver produtos industrializados utilizando tecnologia nacional, foi firmado, em 1993, um acordo de cooperação técnico-científico entre a Fiocruz e Inpal S.A. - Indústrias Químicas para a produção de formulações de *B. sphaericus*, mais próximas da realidade econômica brasileira. A partir de 1994, após uma série de experimentos em laboratório, foram realizados testes em campo, na lagoa da Pampulha (Belo Horizonte). Respeitando-se certas limitações do produto, os autores consideraram animadores os resultados de controle de *C. quinquefasciatus* (Consoli et al., 1997; Vilarinhos et al., 1998).

Por existirem interesses comerciais, a pesquisa de formulações de *B. sphaericus*, assim como ocorre com qualquer produto químico ou biológico, constitui-se um segredo industrial, restrito aos fabricantes e, portanto, pouco divulgado na literatura, o que acaba por desencorajar grupos de pesquisadores, principalmente nos países menos desenvolvidos. Assim, a forma mais usual para se utilizar *B. sphaericus* no Brasil, é o caldo fermentado concentrado. Como exemplo, Vilarinhos et al. (1992) demonstraram a possibilidade de se substituir os produtos químicos normalmente utilizados no controle de larvas de *Culex* em galerias pluviais em Brasília (Asa Norte), alcançando, com o patógeno, 100% de controle após 7 dias da aplicação.

Lopes et al. (1996) também vêm utilizando suspensão concentrada não formulada de esporos e cristais de *B. thuringiensis* var. *israelensis* extraídos do meio, para controle de *Culex* em lagoas de tratamento de esgotos e de resíduos industriais, em Londrina (PR).

Os concentrados fermentados apresentam vantagens do ponto de vista econômico e operacional, pois são fáceis de serem preparados e aplicados (centrifugação do meio de cultura, diluição e pulverização nas áreas desejadas) e, principalmente, dispersam-se facilmente na água (Bhumiratana, 1990). No entanto, esta dispersão dilui os agentes na água e ocorre, como se sabe, sedimentação rápida do complexo esporo-cristal, em 24 a 48 horas, ficando estes fora da zona de alimentação dos insetos (Mulligan et al., 1978, Davidson et al., 1984; Matanmi et al., 1990).

Além disso, Bhumiratana (1990) destacou, como maiores empecilhos desta forma de utilização, a dificuldade no transporte de grandes volumes para áreas distantes e a viabilidade, afetada pelas condições ambiente, que na região tropical, por exemplo, devem ser controladas, podendo assim inviabilizar economicamente o produto, ou ainda ser necessário o uso de conservantes, exigindo o desenvolvimento de estudos prévios.

Neste sentido, Lacey (1984) e Amonkar et al. (1988) sugeriram, como forma de se contornar tal problema, a repetição nas aplicações do patógeno ou o uso de produtos formulados flutuantes que estejam constantemente liberando estruturas do patógeno na zona de alimentação das larvas e durante um período mais prolongado.

2.3 Formulação

Formular um microrganismo é o procedimento mais importante para se obter um inseticida microbiano. Isto porque, embora os entomopatógenos possam ser, ao contrário dos produtos organo-sintéticos, aplicados na forma de produto técnico (puro), a distribuição e cobertura homogêneas nem sempre são conseguidas. Além disso, a formulação permite que, ao serem acrescentados adjuvantes e inertes, sejam melhoradas características como, persistência (pela proteção contra os efeitos dos fatores climáticos), manuseio, aplicação e, principalmente, o armazenamento sob condições ambiente e com menores perdas da qualidade do produto (Batista Filho et al., 1998).

Ainda segundo os autores, a pesquisa de formulações envolve diferentes áreas da ciência e dele depende o sucesso do inseticida microbiano. Vários fatores devem ser considerados durante seu desenvolvimento, sejam eles referentes às características do microrganismo e sua relação com adjuvantes, ambiente onde será utilizado e, principalmente, com a biologia e comportamento do inseto visado. Não obstante, o estudo de viabilidade econômica deve ser realizado, de forma que sejam utilizados processos e produtos de baixo custo quer na produção como na formulação do entomopatógeno, no sentido de tornar o custo final compatível com o mercado e

competitivo com os produtos existentes, já que o preço ainda é um dos principais fatores que determinam a compra do produto.

O desenvolvimento de novos produtos está diretamente vinculado ao interesse comercial e assim, até meados da década de 80, para utilização de *B. sphaericus*, predominava a aplicação do caldo precipitado e havia poucos estudos com formulações. No entanto, após a segunda metade da década e início da década 90, a quantidade de estudos nesta linha vem crescendo o que justifica a existência de produtos comerciais à base desta bactéria à disposição no mercado mundial e no Brasil, sendo ainda verificado o desenvolvimento de produtos por indústrias nacionais com tecnologia própria (Alves et al., 1998).

2.3.1 Fatores que afetam as formulações de *B. sphaericus*

Batista Filho et al. (1998) desenvolveram uma extensa revisão sobre formulação de entomopatógenos e, segundo os autores, o desenvolvimento da formulação deve seguir o binômio: armazenamento e campo. Embora sejam separados, para efeito didático, devem ser considerados em conjunto, pois por exemplo, um fotoprotetor incorporado à formulação não poderá afetar o microrganismo pelo contato prolongado durante o armazenamento.

Geralmente os esporos de *B. sphaericus* são mais suscetíveis que os cristais às condições ambientais. Isto porque, embora possuam uma sucessão de camadas protéicas, o material genético em seu interior é altamente suscetível à temperatura e radiação ultravioleta. O cristal, por sua vez, é um aglomerado protéico que sofre menos influências da radiação ultravioleta e suporta maiores amplitudes térmicas. Por isso, ao longo do tempo, ainda que a viabilidade dos esporos diminua, a atividade larvicida pode não ser alterada (Karch, 1987). Entretanto, a presença do esporo viável no ambiente é importante para garantir a persistência prolongada do patógeno na água (multiplica-se em cadáveres) (Davidson, 1984; Yousten et al., 1992).

2.3.2 Armazenamento

Aspectos ligados à compatibilidade entre o entomopatógeno e os inertes e adjuvantes, e temperatura e umidade, são importantes e devem ser analisados durante o desenvolvimento da formulação.

O sucesso da formulação no campo, depende, em grande parte, das qualidades dos inertes, de acordo com as necessidades da formulação em estudo. Isto porque, os inertes são importantes na determinação do tipo de formulação, devendo ser de fácil manuseio nas etapas de preparo (moagens, impregnação e secagem) e aplicação. Contudo, sua principal característica é que, juntamente com adjuvantes acrescentados em certas ocasiões para melhorar as qualidades do formulado e otimizar sua atividade (fotoprotetores, anti-evaporantes, umectante, adesivos etc.), devem ser compatíveis com o microrganismo (Batista Filho et al., 1998).

Segundo Ward (1984), pode ocorrer uma interação negativa entre a membrana do entomopatógeno e as moléculas das surfactantes. Este é um fator básico muito importante, porém pouco divulgado na literatura, sendo encontrada uma compilação de resultados de diferentes produtos (inertes e adjuvantes) e *B. thuringiensis* Couch & Ignoffo (1981).

No Brasil, algumas observações foram realizadas no desenvolvimento de formulações de *Baculovirus anticarsia* (Augusto et al., 1992; 1995; 1996) e dos fungos *B. bassiana* e *M. anisopliae* (Marques, 1993). Os resultados encontrados foram variados, havendo produtos compatíveis e incompatíveis, demonstrando assim, a importância desse tipo de estudo.

Além dos inertes e adjuvantes, há que se considerar o efeito da temperatura sobre a viabilidade do patógeno. Isto porque temperaturas acima de 40°C em determinados períodos de exposição, geralmente provocam efeitos negativos sobre proteínas, desnaturando-as e afetando as funções do microrganismo.

Normalmente, quando armazenados em baixa temperatura (10°C e abaixo desta) a viabilidade é preservada (Bourgoin et al., 1984). Entretanto, a manutenção do produto

nestas condições leva a um custo adicional que pode ser amenizado pela possibilidade de se formular o patógeno e assim, manter o produto em condições ambiente e, eventualmente, em condições extremas.

Nos estudos de armazenamento, avalia-se o efeito da temperatura, normalmente mantendo-se os produtos por um certo tempo em condições ambiente, geladeira e em temperatura elevada (40 a 50°C), sendo desta forma verificado o comportamento do produto em condições possíveis de ocorrer no armazenamento ou no transporte, analisando-se a viabilidade dos esporos e a atividade larvica do microrganismo.

A resposta comportamental de *B. sphaericus* à temperatura de armazenamento não pode ser generalizada, pois é condicionada à preparação e isolado utilizados. Com relação a este último, Karch (1987) verificou que armazenando-se duas preparações idênticas de diferentes isolados de *B. sphaericus* a 50°C, houve maior sensibilidade do isolado 2297, demonstrada pela redução da viabilidade e atividade larvica do complexo esporo-cristal.

Ainda considerando o comportamento diferenciado dos isolados em relação à temperatura, vale ressaltar que a maioria dos produtos comercializados atualmente é baseada no isolado 2362, que tem respondido uniformemente em relação a este fator. Os poucos relatos demonstraram que as formulações sólidas experimentais à base de microcápsulas de alginato, de caragenina e de carbóxi-metil-celulose, foram mais estáveis que suspensões não formuladas, quando armazenadas a 50°C, após 60 dias, sendo preservadas a atividade larvica e a viabilidade dos esporos (Elçyn, 1995; Elçyn & Öktemer, 1995; Elçyn et al., 1995).

Durante o preparo das formulações sólidas tipo briquetes, granulada, *spray on*, peletizada ou pó molhável, a água é utilizada como veículo para impregnação e solução de certos adjuvantes. Entretanto, após esta fase, sua presença é extremamente prejudicial, porque pode potencializar o efeito da temperatura, inviabilizando o patógeno e dificultando a aplicação, devido à formação de grumos (Tanada & Kaya, 1993).

Tem sido verificado também o aparecimento de fungos contaminantes dos gêneros *Penicillium* e *Aspergillus*, presentes nos inertes vegetais utilizados em formulações granuladas de *B. sphaericus* com teor de umidade maior que 5%, armazenadas a 25°C (Alves)¹.

2.3.3 Campo

Podem ser incluídos aqui, fatores bióticos, ligados aos hábitos dos insetos-alvo, como vegetação nas proximidades dos criadouros e disponibilidade de alimento na água (matéria orgânica) e abióticos, como as condições climáticas, radiação ultravioleta, características da água: físicas (movimentação e profundidade) e químicas (pH, matéria orgânica em suspensão, sais).

O tipo de formulação a ser desenvolvido deve estar em acordo com o hábito do inseto visado e com as características do ambiente, sendo estes os princípios básicos da pesquisa. As larvas de culicídeos ingerem como alimento, partículas em suspensão na água em que se desenvolvem, de forma que *Culex* e *Aedes* filtram a água em diferentes profundidades, enquanto que as larvas de *Anopheles* freqüentemente associam-se à interface ar-água. Assim, são mais indicadas para os primeiros gêneros, as formulações sólidas (granuladas e pó seco ou molhável) e para o último, formulações líquidas e sólidas flutuantes (Lacey, 1984; 1990; Batista Filho et al., 1998).

Especificamente para *Culex*, Mullen & Hinkle (1988) verificaram que as larvas de 4º instar passam cerca de 90% do tempo próximas à superfície da água e assim, como demonstraram Lacey (1984) e Lord (1991) uma formulação flutuante e que libere gradativamente os esporos e cristais neste local seria muito conveniente, evitando a rápida decantação dos mesmos após a aplicação, quer na forma de suspensão concentrada ou pó molhável.

¹ Alves, L.F.A. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Depto. de Ciências Biológicas. Observação pessoal, 1995.

Os ambientes onde são encontradas larvas de culicídeos apresentam-se muito variados e sendo *B. thuringiensis* var. *israelensis* o agente microbiano mais utilizado para seu controle, são encontradas no mercado formulações líquidas e sólidas adequadas para cada situação. Algumas já foram testadas para *B. sphaericus*, tornando o controle ainda mais eficiente (Lacey, 1990).

No caso de áreas livres de vegetação, as formulações líquidas ou pó molhável, que são veiculadas em água, são facilmente distribuídas, usando-se pulverizadores convencionais aéreos (grandes áreas) ou terrestres (manuais ou motorizados). Entretanto, a cobertura vegetal adensada nas margens de criadouros em córregos, valas, fossas, lagoas de decantação, arrozais, mangues, etc. dificulta a distribuição das gotas na superfície da água. Assim, Lacey (1984) introduziu um novo conceito, adequando o patógeno a esta dificuldade de distribuição utilizando formulações granuladas. Tais formulações são versáteis e apresentam uma grande plasticidade e podem ser mais facilmente modificadas para se adequarem aos hábitos dos insetos.

Existem, em função do interesse comercial, poucos relatos sobre o desenvolvimento de formulações. Mulla et al. (1987) testaram grânulos de sabugo de milho de diferentes tamanhos (1 a 3 mm), sendo verificado que após 1 ou 2 dias o patógeno decantou-se nos recipientes onde foram aplicados, embora permanecesse viável na água. Além disso, constataram que os grânulos de maior tamanho afundaram mais rapidamente que os menores.

Kuppuasamy et al. (1987) elaboraram duas formulações granuladas (briquete e grânulos de alginato), que foram testadas em condições de laboratório. Os briquetes liberaram o patógeno mais rápido que os grânulos, sendo que também afundaram mais rapidamente. Os briquetes, embora flutuassem, desintegraram-se a partir do 15º dia até que decorridos 28 dias na água desapareceram. Entretanto, a presença do patógeno ativo na água em que estavam as formulações permaneceu elevada por um período semelhante (mais de 60 dias).

Amonkar et al. (1988) testaram formulações granuladas baseadas em três agentes flutuantes: *thermocol*, vermiculita e “miolo” de sabugo de milho fatiado. A formulação

com o milho mostrou-se mais leve, mas decompôs-se rapidamente. *Thermocol* permitiu flutuação e liberação por mais tempo. Entretanto, devido à extrema leveza foram carregados para um lado do recipiente em que foram aplicados. A vermiculita mostrou-se a mais adequada, liberando os esporos por mais de 45 dias. Foram sugeridos estudos de novas proporções de agregante e veículo para melhorar ainda mais a qualidade da formulação de vermiculita, que sedimentou após 6 dias.

Existe também a possibilidade de ser utilizada a técnica de encapsulação para formulações de *B. sphaericus*, tal como ressaltaram Elçyn et al. (1995). Segundo os autores, tais preparados são vantajosos, pois as matrizes que se formam envolvem os esporos, protegendo-os contra variações de pH e temperatura e também da radiação ultravioleta. Além disso, tem efeito comprovado na liberação gradativa do patógeno na água.

Trabalhos anteriores, no entanto, já demonstravam a possibilidade de se utilizar o alginato de sódio na elaboração da matriz. A avaliação em campo demonstrou a persistência da atividade patogênica por mais de 40 dias (liberação contínua), que refletiu em 85% de mortalidade larval. Segundo os autores, a cortiça é um veículo ideal por manter o ingrediente ativo no local onde os insetos concentram a maior parte do seu tempo (próximo à superfície) (Desai & Shethna, 1991).

Lord (1991) comparou uma formulação granulada baseada em caragenina, óleo de milho e cortiça como agente flutuante, com uma outra peletizada, preparada à base de óleo de algodão parcialmente hidrogenado, talco e um agregante. A formulação granulada, ao contrário do que foi citado no trabalho anterior, apresentou menor atividade que a peletizada, principalmente, pela demora na liberação do complexo esporo-cristal no ambiente. A persistência do peletizado atingiu mais de 40 dias de atividade residual, sendo verificado cerca de 20 vezes menos insetos nos tanques tratados com esta preparação, em relação à testemunha.

Mais recentemente, introduziu-se o uso de carbóxi-metil-celulose como base para a matriz de encapsulação de uma formulação granulada. Em testes realizados em laboratório, verificou-se o aumento gradativo na liberação dos esporos na água, cuja

concentração manteve-se em níveis elevados e constantes por mais de 30 dias (Elçyn, 1995).

De forma a substituir as formulações líquidas ou em pó, Skovmand & Eriksen (1993) desenvolveram uma formulação efervescente. A formulação apresentou um baixo período residual. Os autores ressaltaram que os tabletes, por serem leves, foram barrados pela vegetação densa e não se espalharam adequadamente, sendo recomendada para tanques abertos, piscinas e represas.

Além do hábito do inseto, outros fatores ambientais devem ser considerados no desenvolvimento de uma formulação, sendo estes com influência direta na persistência do microrganismo no campo.

A radiação solar de comprimento de onda na faixa ultravioleta (UV) é considerado o fator mais importante na degradação dos entomopatógenos. Isto porque tem sido demonstrada a ação deletéria desta radiação luminosa sobre os ácidos nucleicos, que se tornam inativos, impedindo o desenvolvimento e multiplicação do microrganismo (Jaques, 1985). Testes em condições de laboratório, usando-se lâmpada germicida podem também auxiliar nos estudos dos efeitos da radiação UV e, principalmente, na seleção de adjuvantes fotoprotetores, ainda que nessas condições o microrganismo seja exposto de forma diferente e muito mais drástica que na natureza. Neste sentido, trabalhos desenvolvidos por Elçyn (1995), Elçyn & Öktemer (1995) e Elçyn et al. (1995) comprovaram a proteção da formulação aos esporos e cristais de *B. sphaericus* expostos à radiação de lâmpada UV. Pode-se assim, afirmar que a estrutura dos grânulos, sendo irregular, permite que grande quantidade de esporos e cristais fiquem alojados e abrigados da radiação, embora, segundo os autores, a incorporação de fotoprotetores contribuiria ainda mais para a redução das perdas observadas na formulação.

A água, sendo o local de aplicação, interfere diretamente na persistência do microrganismo. Muitas vezes os locais de aplicação apresentam elevada concentração de matéria orgânica que afeta a atividade do patógeno. Lacey et al. (1988), Yap et al. (1991), Karch et al. (1991) demonstraram que a oferta contínua de uma concentração de esporos e cristais na zona de alimentação das larvas pode favorecer a atividade do

entomopatígeno, pois assim, juntamente com o alimento que é abundante em águas poluídas, sejam ingeridos esporos e cristais do microrganismo. Desta forma, evita-se também que o mesmo se disperse excessivamente pelo ambiente e se decante rapidamente.

Nestes locais pode-se também realizar aplicações em maiores dosagens e com produtos mais concentrados que assim podem prolongar a atividade residual por algumas semanas (Mulligan et al., 1978; Mulla et al., 1984; Lacey et al., 1988, Jones et al., 1990).

Jones et al. (1990) e Regis et al. (1996) verificaram também que a movimentação da água deve ser considerada na avaliação das formulações, pois em fossas, onde a movimentação da água é praticamente ausente (não há fluxo corrente), a persistência tende a ser maior que em valas. Entretanto, existem autores que consideram benéfica a entrada de água nos criadouros, pois promove o revolvimento do fundo e os esporos e cristais decantados podem subir próximo à superfície e se tornarem disponíveis por algum tempo às larvas que sobreviveram à aplicação inicial (Bowles et al., 1990; Matanmi et al., 1990).

3 SELEÇÃO DE ISOLADOS DE *Bacillus sphaericus* NEIDE PARA O CONTROLE DE *Culex* spp. (DIPTERA; CULICIDAE)

3.1 Introdução

A variabilidade natural dos seres vivos é uma característica fundamental e deve ser explorada em um programa de Controle Biológico. Isto porque nesta variabilidade encerram-se características como produção de toxinas ou enzimas, crescimento em meio de cultura, resistência às condições ambiente (temperatura, radiação ultravioleta, pH, etc.) (Alves, 1986; Azevedo, 1998; Paccola-Meireles, 1998).

Neste sentido, a variabilidade de *Bacillus sphaericus* tem sido constatada sendo relatados diversos casos. O primeiro isolado obtido da bactéria apresentava, segundo Vilarinhos et al. (1998) baixa atividade larvicida, sendo, em seguida, obtidos novos isolados mais virulentos que chegaram a superar a atividade original em mais de 10 000 vezes, sendo por consequência, contínua a busca de novos isolados.

Barjac (1990) afirmou que até aquela data eram registrados no Instituto Pasteur, 300 isolados de *B. sphaericus*, sendo que cerca da metade apresentava ação larvicida.

Atualmente, o isolado 2362, obtido de adultos de *Simulium* sp. (Diptera, Simuliidae) é o mais utilizado nos produtos comerciais e considerado padrão e superior aos demais previamente obtidos (Vilarinhos et al., 1998).

A busca contínua tem levado a sucessos como é o caso do Cenargen (Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia)/ Embrapa, onde a partir de amostras de solo de diferentes regiões do Brasil, foi obtido o isolado S2, que segundo

Schenkel et al. (1992), caracteriza-se por ser diferente do isolado 2362 com maior toxicidade por ser tão ou mais tóxico para larvas de *Culex quinquefasciatus*.

No Brasil, além do Cenargen, pesquisadores da ESALQ, Instituto Biológico e Fiocruz se dedicam ao isolamento de *B. sphaericus*, sendo mantidas coleções deste patógeno que se constituem em fonte de matéria prima para os trabalhos de seleção em programas de Controle Biológico.

A atividade larvicida é decorrente da presença de toxinas binárias constituintes do cristal e toxinas Mtx (Davidson, 1995; Charles et al., 1996). Neste sentido, é possível explicar as diferenças na virulência com base na produção de tais toxinas, uma vez que existem isolados que expressam melhor as toxinas ou as produzem em maior quantidade.

Apesar da fase de seleção ser muito importante para o desenvolvimento de produtos microbianos, existem poucas informações recentes sobre a seleção de isolados de *B. sphaericus* visando a obtenção de formulações comerciais, sendo encontradas compilações sobre a classificação e caracterização (Barjac, 1990) e algumas informações sobre seleção, como Schenkel *et al.*, 1992), com isolados do Brasil ou Yap *et al.* (1988), visando o controle de pernilongos na Malásia.

Com o objetivo de desenvolver uma formulação, foi realizada uma avaliação preliminar da virulência e multiplicação dos isolados de *B. sphaericus* armazenados no Banco de Entomopatógenos do Laboratório de Controle Microbiano e Patologia de Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP, visando a seleção de isolados adequados para serem utilizados em formulações comerciais.

3.2 Material e métodos

3.2.1 Inseto teste

A fim de que se manter a continuidade dos experimentos ao longo do ano e garantir a padronização dos insetos em todos os testes foi necessária a manutenção de

uma população do inseto-teste: *Culex quinquefasciatus* Say em laboratório, como vem a seguir.

Para o início da criação, as larvas foram obtidas no Departamento de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), sendo identificadas pelo Prof. José Lopes do Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná.

Os insetos coletados eram mantidos em recipientes plásticos contendo água destilada e alimentados com ração moída para roedores + gérmen de trigo, até que atingissem a fase pupal. Nesta fase, eram transferido para gaiolas de madeira e tela de náilon, mantidos em potes plásticos para a emergência dos adultos. O acasalamento ocorria no interior desta gaiola, na qual era colocado o alimento para os adultos: chumaços de algodão hidrófilo estéril (rolo dental) imerso em solução de mel 10% e, como fonte de sangue para as fêmeas era mantido durante quatro noites por semana, um rato branco (*Mus* sp.) proveniente do biotério do Departamento de Economia Doméstica da ESALQ/USP, preso em uma gaiola de contenção, alimentado com água e ração.

As fêmeas fecundadas e alimentadas com sangue ovipositavam em recipientes plásticos pretos de 10 cm de diâmetro usados para suporte de vasos, contendo água destilada e 0,5 g de fezes de rato, como atrativo para oviposição. Diariamente eram coletadas as posturas (jangadas) que eram mantidas em outros recipientes fora das gaiolas dos adultos para eclosão e desenvolvimento larval. Eventualmente, os ovos eram mantidos em temperatura mais baixa (15-18°C) durante 24 ou 48 horas para retardar o desenvolvimento embrionário ou larval visando acumular uma grande quantidade de indivíduos no tamanho adequado para a realização dos bioensaios, segundo orientações do Instituto Pasteur (1996).

3.2.2 Seleção de isolados

Os isolados utilizados foram provenientes do banco de entomopatógenos do Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP. Na coleção estão depositados 20 isolados da bactéria, sendo 19 de origem brasileira e um de origem estrangeira (isolado 2362), considerado padrão (Tabela 3.1). Foram obtidos a partir de amostras de solo de diferentes regiões do Brasil, submetidas ao processo de isolamento descrito por Travers *et al.* (1987), seguido de confirmação por bioensaios de patogenicidade e observação morfológica das colônias e células sob microscópio de contraste de fase, sendo em seguida, encaminhados ao Cenargen/Embrapa a fim de que fossem caracterizados por meio da serotipagem.

As colônias estoque eram mantidas em tubos de cultura em meio ágar nutriente + extrato de levedura 0,1% (ANY) (ambos da marca Difco) e cobertas com óleo mineral estéril (Nujol) e mantidos a 10°C, em geladeira e sempre que necessário era feita a multiplicação dos isolados, conforme segue.

reviamente à execução dos bioensaios de seleção, uma amostra da cultura estoque dos respectivos isolados era retirada com uma alça de platina e transferida para erlenmeyers de 250 ml de capacidade, contendo 50 ml do meio caldo nutriente + extrato de levedura 0,1% (CNY), ambos da marca Difco, sendo incubados a 30°C e 200 rpm, durante 24 horas, sendo este considerado o pré-fermentado.

m seguida, 1 ml do caldo pré-fermentado foi inoculado tal como anteriormente em erlenmeyers com o mesmo meio e incubados nas mesmas condições, porém, durante 48 horas quando então o meio fermentado foi centrifugado e o material precipitado foi coletado e transferido para o ependorff e armazenado em freezer sob -10°C, a fim de preservar o microrganismo até que fosse utilizado nos bioensaios com os insetos. Ressalta-se que esta é a condição mais adequada para a preservação de microrganismos nas coleções.

Tabela 3.1. Isolados de *Bacillus sphaericus* provenientes da coleção de entomopatógenos do Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos, Depto. de Entomologia, Esalq/USP.

Isolado	Data de coleta	Procedência	Serótipo ¹
AM1	04/08/94	Manaus - AM (solo do Rio Preto)	H5a5b
MG2	09/09/92	Lavras – MG (solo não cultivado)	?
MS1	18/08/93	Angélica - MS (solo de pastagem)	H5a5b
MS2	15/05/96	Corumbá - MS (ninho de formiga)	H5a5b
MS3	15/05/96	Corumbá - MS (solo da beira de rio)	H5a5b
MS5	15/05/96	Corumbá - MS (solo de beira de rio)	?
MS6	15/05/96	Corumbá - MS (solo de beira de rio)	H5a5b
MS7	15/05/96	Corumbá - MS (solo de beira de rio)	H5a5b
MS8	15/05/96	Corumbá - MS (solo de beira de rio)	H5a5b
PI1	20/08/92	Paraíba – PI (solo de cultura de feijão)	H5a5b
PR9	15/10/95	Arapongas - PR (lama de riacho)	H5a5b
PR10	15/10/95	Arapongas - PR (solo de borda de mata)	?
PR12	15/10/95	Arapongas - PR (solo de área em reflorestamento)	H5a5b
SC1	23/07/92	Chapecó - SC (solo - EPAGRI)	H5a5b
SP10	18/08/93	Alfredo Marcondes - SP (solo de lavoura)	H5a5b
SP11	18/08/93	Presidente Bernardes - SP (solo de lavoura)	H5a5b
SP12	18/08/93	Anhumas - SP	H5a5b
SP13	08/04/93	Capivari - SP (solo de canteiro - residência)	?
SP16	-	São Pedro - SP (solo)	H5a5b
2362	-	Nigéria (liofilizado - Instituto Pasteur)	H5a5b

¹caracterização serológica realizada pela Embrapa/Cenargen

? não houve reação com nenhum dos soros conhecidos

Os bioensaio de seleção foram realizados semanalmente, tomando-se ao acaso um isolado por vez. O ependorff era mantido em condições ambiente durante uma hora a fim de ocorrer o descongelamento. Em seguida, fazia-se a homogeneização do material usando-se uma espátula de metal e então, 0,01 g do precipitado era suspenso em 10 ml de água destilada + espalhante adesivo 0,1% (Tween 80), em frascos de vidro fechados com filme de PVC.

Após uma vigorosa agitação, os frascos foram submetidos ao choque térmico (80°C durante 12 minutos), ultra-som por 5 minutos e agitação por mais 1 minuto. Em seguida, usando-se uma câmara de Petroff-Hauser foram feitas 5 contagens de esporos na suspensão para cada isolado, sob microscópio óptico de contraste de fase, a fim de se determinar a concentração total de esporos nas suspensões. Feito isso, as suspensões foram padronizadas, acrescentando-se água destilada esterilizada, de forma a se obter quatro suspensões de concentrações diferentes, para todos os isolados, a saber: 5×10^3 , 2×10^3 , 1×10^3 e 7×10^2 esporos/ml.

A inoculação do patógeno foi feita seguindo-se sempre os mesmos procedimentos, quais sejam: alíquotas de 1 ml das suspensões, nas diferentes concentrações, além da água destilada (testemunha) foram inoculadas em copos plásticos contendo 99 ml de água destilada e 15 larvas de *C. quinquefasciatus* no terceiro ínstar, sendo utilizadas 4 repetições para cada tratamento. Os copos foram mantidos em câmara climatizada tipo B.O.D. (26°C e 14 horas de fotofase), sendo realizadas avaliações diárias, visando-se determinar o número de insetos mortos após 24 e 48 horas.

Nesta fase inicial (“screening”) foram selecionados para a fase seguinte isolados que causaram no mínimo 80% de mortalidade. Visando-se avaliar outros parâmetros, os mesmos foram submetidos a outros bioensaios.

Os isolados selecionados previamente foram multiplicados a partir das respectivas culturas-estoque (conforme detalhado anteriormente) para a obtenção do caldo pré-fermentado. Em seguida, 2 ml do caldo pré-fermentado de cada um dos isolados foram inoculados em frascos erlenmeyer de 250 ml de capacidade contendo 50 ml de caldo

nutriente + extrato de levedura 1%, sendo preparados 3 frascos (repetições) para cada um dos isolados. Os frascos foram incubados a 200 rpm e 30°C em um incubador-agitador, durante 48 horas.

Ao final do período, uma amostra de 2 ml de cada uma das repetições dos diferentes tratamentos foram submetidas ao choque térmico e ultra-som e então diluídas para 10^{-5} e 10^{-6} e inoculadas na superfície do meio de cultura (ágar nutriente + extrato de levedura 1%), segundo uma adaptação da técnica descrita por Rios¹, citada por Alves et al. (1998). Desta forma, foram aplicados em 6 a 8 pontos na superfície do meio 5 µl de cada uma das diluições, sendo preparadas 3 placas para cada repetição. As placas, após secagem na câmara de fluxo laminar, foram incubadas a 30°C por 16 horas, quando então foram feitas contagens do número colônias em cada um dos pontos (UFC) usando-se um contador de colônias.

Os dados obtidos da produção foram submetidos à análise de variância, usando-se o teste F e também à comparação das médias de produção pelo teste de Tukey, com 5% de significância, pelo programa estatístico SANEST. Para a comparação das médias foi necessária a transformação dos dados em $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

3.3.3 Resultados e discussão

Dentre os isolados testados observou-se uma grande variação nos resultados, com valores que oscilaram entre 10 e 100%, em todas as concentrações utilizadas (Tabela 3.2).

Os isolados MS1, MS2, MS3, PI1, PR7 e SP16 mostraram baixa atividade, não causando mais que 10% de mortalidade, e ainda na maior concentração. O isolado PR10 foi pouco virulento, pois na maior concentração alcançou-se cerca de 30% de

¹ Rios, E.M. Universidade Federal de Pernambuco, Depto. de Antibióticos. Comunicação pessoal, 1993.

mortalidade, não havendo contudo qualquer relação com o serótipo dos isolados, uma vez que a maioria pertence ao serótipo H5 (Figura 3.1)

Figura 3.1 - Mortalidade média de larvas de 3^o ínstar de *Culex quinquefasciatus*, 48 horas após serem submetidas à diferentes isolados de *Bacillus sphaericus*, em diferentes concentrações de esporos/ml, em condições de laboratório (Temperatura = 30°C; fotofase = 14 horas).

Vilarinhos et al. (1998) citaram pesquisas sobre a comparação da atividade patogênica de isolados de *B. sphaericus*, realizadas pela Fiocruz, Cenargen e INPA. Dentre os isolados testados somente 30% deles mostraram-se patogênicos o que demonstra haver uma grande variabilidade genética natural, embora a maioria deles fosse pertencente ao serótipo H5a5b. Este fato reforça a necessidade de se estabelecer um programa de seleção prévia de isolados antes de se iniciar qualquer trabalho nesta área.

A diferença na atividade larvicida é aceitável e foi demonstrada por Schenkel et al. (1992), em um trabalho de caracterização e análise da toxicidade de isolados de *B.*

sphaericus obtidos no Brasil. Segundo os autores, embora os isolados estudados e o padrão (2362) fossem pertencentes ao serótipo H5, houve diferença na atividade para larvas de *Culex pipiens*. No que se refere às toxinas, estas foram também diferentes do padrão.

Considerando um mesmo serótipo (neste caso todos pertencem ao H5a5b) podem existir diferenças na toxicidade dos isolados pelo fato de expressarem melhor a toxina ou produzirem-na em maior quantidade que outros (Schenkel²).

O fato do isolado padrão ter sido menos eficiente que muitos outros testados, concorda com Vilarinhos et al. (1998), os quais citaram isolados com atividade superior a 70% em relação ao isolado 2362 (isolado S442, obtido em Montes Claros/MG), sendo que a atividade discriminativa (mínimo de 80%) foi obtida, neste experimento, na concentração de $2,0 \times 10^3$ esporos/ml, na qual os demais selecionados levaram a valores entre 90 e 100% de mortalidade (Tabela 3.2).

Em se tratando de um trabalho inicial de seleção, optou-se apenas pela contagem de esporos totais no preparo (padronização) das suspensões e apenas por escolher aqueles isolados que causassem cerca de 80% de mortalidade nas concentrações mais baixas o que indicaria o potencial larvicida elevado. Isto para agilizar o processo e obter-se assim parâmetros indicativos da virulência dos isolados e que servissem de base para a seleção e estudos mais aprimorados. Assim, na menor concentração (7×10^2 esporos/ml) os isolados que apresentavam atividade neste percentual foram: AM1, MG2, MS6, MS7, PR9, SP10, SP13. Considerou-se também o isolado 2362 por ser um padrão de comparação.

² Schnkel, R.M. Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia. Comunicação Pessoal, 1997.

Tabela 3.2. Mortalidade média de larvas de 3^o instar de *Culex quinquefasciatus* 48 horas após serem submetidas a diferentes isolados de *Bacillus sphaericus* em diferentes concentrações (Temperatura = 30°C; fotofase = 14 horas).

Isolado	Concentração (esporos/ml)			
	5×10^5	2×10^5	1×10^5	7×10^2
AM1	100,00	100,00	100,00	80,00
MG2	100,00	100,00	100,00	88,33
MS1	10,00	0,00	0,00	0,00
MS2	10,00	0,00	0,00	0,00
MS3	0,00	0,00	0,00	0,00
MS5	100,00	100,00	93,33	48,33
MS6	93,33	93,33	98,33	80,00
MS7	92,00	93,33	98,33	91,67
MS8	100,00	91,67	100,00	73,33
PI1	3,33	0,00	0,00	0,00
PR7	3,33	0,00	0,00	0,00
PR9	100,00	100,00	95,00	95,00
PR10	31,67	0,00	0,00	0,00
PR12	83,33	75,00	55,00	35,00
SP10	100,00	100,00	95,00	90,00
SP11	100,00	95,00	70,00	45,00
SP12	76,70	0,00	0,00	0,00
SP13	98,33	100,00	100,00	100,00
SP16	5,00	0,00	0,00	0,00
2362	100,00	86,25	50,00	0,00

Com relação à produção de esporos, verifica-se que o isolado MS6 foi o que mais produziu em relação ao padrão 2362 (cerca de 23 vezes mais), diferindo significativamente deste, sendo que para os demais não houve diferença quanto a esse parâmetro (Tabela 3.3).

Tabela 3.3 - Produção de UFC/ml de meio pelos diferentes isolados de *B. sphaericus*, em caldo nutriente + extrato de levedura 1% (Temperatura = 30°C, agitação = 200 rpm, 48 horas).

Isolado	Repetição			Média ^{1,2}	UFC/ml ³
	1	2	3		
2362	5,42	6,00	8,00	6,47	1,30 X 10 ⁸ b
AM1	5,71	8,42	7,80	7,31	1,50 X 10 ⁹ ab
MG2	11,57	10,40	9,20	10,39	2,00 X 10 ⁹ ab
MS6	12,00	18,20	15,14	15,11	3,00 X 10 ⁹ a
MS7	8,57	11,86	7,33	9,25	1,85 X 10 ⁹ ab
PR9	20,13	11,40	7,00	12,84	2,57 X 10 ⁹ ab
SP10	10,86	10,50	17,57	12,98	2,60 X 10 ⁹ ab
SP13	12,80	17,50	7,00	12,43	2,49 X 10 ⁹ ab

¹ Valores originais de UFC/ ponto de inoculação

² Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância, pelo teste de Tukey, submetidas à transformação de $\frac{1}{\sqrt{x}}$

³ Valores obtidos pela fórmula: $x \div (5 \times 10^{-3}) \times d$, onde x = média de UFC/ponto e d = diluição

Kalfon et al. (1983) desenvolveram uma série de combinações de ingredientes orgânicos e minerais para a elaboração de meios de cultura visando a produção em grande escala de *B. sphaericus*. Na maioria dos casos houve uma semelhança na

esporulação, porém, quando foram comparados os meios MBS e Poly para o isolado 2297, houve superioridade do primeiro na produção de esporos totais e UFC/ml de meio (cerca de 100 vezes).

Yousten et al. (1985) realizaram uma série de testes com 41 isolados de *B. sphaericus* em caldo nutriente, avaliando a ocorrência de esporulação no meio. Houve, para a maioria dos isolados, condições adequadas para crescimento e esporulação, sendo que apenas 6 não produziram esporos.

Schenkel et al. (1992) também utilizaram como parâmetro para caracterizar os isolados de *B. sphaericus* a produção de esporos totais e UFC, porém realizaram os experimentos com o meio MBS (triptose + extrato de levedura). Houve diferenças entre os 5 isolados, sendo que 4 deles foram obtidos em amostras de solo do Brasil e produziram menos esporos/ml de meio que o isolado 2362, considerado padrão (cerca de 4 vezes menos).

Desta forma, a combinação entre os parâmetros produção e virulência levou a optar-se pelo isolado MS6 para compor a formulação em desenvolvimento.

4 SELEÇÃO DE INERTES E ADJUVANTE VISANDO A ELABORAÇÃO DE UMA FORMULAÇÃO GRANULADA DE *Bacillus sphaericus* NEIDE

4.1 Introdução

Bacillus sphaericus tem sido utilizado como agente de controle de pernilongos por mais de 20 anos. O desenvolvimento de formulações granuladas aumentou a eficiência do patógeno, pois a liberação contínua do complexo esporo-cristal na superfície da água torna os propágulos mais disponíveis durante a alimentação (Lacey, 1984, 1990). Entretanto, na elaboração da formulação, uma série de produtos são incorporados ao microrganismo, os quais podem afetá-lo durante o armazenamento. Neste sentido, Ward (1984) salienta a possibilidade de uma interação negativa entre a membrana do microrganismo e as moléculas dos surfactantes (adjuvantes).

A seleção de substratos inertes adequados é de extrema importância para o sucesso de uma formulação. Os ingredientes inertes devem ser analisados do ponto de vista biológico e também operacional, pois podem interagir com as condições do ambiente causando a morte do microrganismo ou então afetar os equipamentos durante sua elaboração e/ou aplicação. Os inertes têm como principal função atuar como diluente e, dependendo das características, podem exercer a função de atração sobre as pragas-alvo (Batista Filho et al., 1998).

Os adjuvantes podem ser incorporados à formulação visando aumentar o contato do inseto com o patógeno, por um efeito atrativo; outros produtos podem proteger o microrganismo formulado contra o pH do meio e radiação ultravioleta e, desta maneira prolongam a persistência da formulação no campo (Rhodes, 1993).

Deve-se ainda considerar que os adjuvantes também podem melhorar as características físico-químicas do produto formulado, tornando-o também adequado aos hábitos do inseto a ser controlado (Batista Filho et al., 1998).

Considerando a importância dos inertes e adjuvantes no processo de formulação, constata-se que existem poucos trabalhos relacionados ao assunto, principalmente com relação aos efeitos adversos que estes produtos podem causar sobre o microrganismo.

De modo geral, devido aos interesses econômicos envolvidos no processo de desenvolvimento de formulações, poucos trabalhos foram publicados sobre o assunto, sendo encontrados no Brasil estudos sobre inertes em formulações de Vírus de Poliedrose Nuclear de *Anticarsia gemmatilis* (Augusto et al., 1992; 1995; 1996) e de fungos *Beauveria bassiana* e *Metarhiizum anisopliae* (Marques, 1993).

Assim, no presente trabalho estudou-se a compatibilidade física e biológica de diferentes materiais (inerte e adjuvante) a serem incorporados à uma formulação granulada de *Bacillus sphaericus* visando ao controle de *Culex quinquefasciatus* (Diptera, Culicidae).

4.2 Material e métodos

4.2.1 Teste de flutuabilidade

Foram conduzidos ensaios de seleção de inertes, constando de testes de compatibilidade entre o patógeno (isolado padrão) e os inertes e adjuvantes a serem incorporados à formulação sólida e capacidade de flutuação. Os testes foram feitos em laboratório, testando-se os materiais (veículos e adjuvantes) individualmente e em combinações, que pelas suas características físicas garantam a flutuabilidade (Tabela 4.1).

Tabela 4.1 - Inertes e adjuvante utilizados no processo de seleção de matéria-prima para a elaboração da formulação sólida de *Bacillus sphaericus*.

Origem	
Vegetal	Mineral
sabugo de milho	argila
polpa cítrica	vermiculita
cortiça	flito
agregante (adjuvante)	diatomita
	sílica

Foram feitas preparações preliminares das formulações, contendo os diferentes materiais e o adjuvante necessários, excetuando-se o patógeno, que foram avaliadas quanto à sua capacidade de flutuar, determinando-se o tempo de permanência sobre a superfície da água e a porcentagem de decantação nos intervalos de avaliação.

Para elaboração dos testes, os materiais foram previamente preparados no Laboratório de Formulações do Centro Experimental do Instituto Biológico, a fim de serem moídos e peneirados segundo as especificações técnicas para o tipo de formulação a que se destinavam (granulada do tipo *spray on*).

Em seguida, amostras de 0,01 g de todos os inertes foram distribuídas na superfície da água destilada em aquário de vidro (30 x 14 x 18 cm) contendo 2 litros de água destilada, sendo usados 3 recipientes para cada um dos produtos. Nas avaliações, em intervalos regulares de tempo (horas e dias), foram feitas observações e, visualmente, foi estimada a porcentagem de flutuabilidade contando-se, no caso dos grânulos, o número de partículas na superfície (comparando-se com o número inicial aplicado) ou atribuindo-se notas em uma escala previamente determinada. Os materiais que se mostraram mais adequados prosseguiram nos testes de seleção de inertes.

4.2.2 Testes de compatibilidade em meio sólido

Os materiais citados anteriormente foram também submetidos a uma bateria de testes em meio de cultura (exposição de curta duração), visando-se determinar sua compatibilidade com *Bacillus sphaericus* e substâncias hidro-solúveis difundidas no meio de cultura.

Foram preparadas placas de Petri com meio sólido ANY (Nutriente Ágar + 1% de extrato de levedura) da marca Difco, sendo 3 placas para cada produto, constituindo cada uma delas uma repetição. Na superfície do meio de cultura inoculou-se 0,1 ml de uma suspensão concentrada do caldo recém-fermentado (sem diluição) que foi distribuída com uma alça de Drigalsky. Em seguida, uma porção dos materiais foi colocada sobre a superfície do meio previamente inoculado e as placas incubadas a 30°C durante 24 horas, em uma câmara tipo B.O.D. regulada para as condições citadas e com fotofase de 14 horas. Para comparação, foram preparadas placas inoculadas com esporos e células da bactéria.

Após o período de incubação, as placas foram observadas e com auxílio de uma lupa e iluminação verificou-se o crescimento das células no meio, identificando-se eventual halo de inibição de crescimento ao redor da porção de inerte aplicada no meio de cultura.

4.3 Resultados

4.3.1 Teste de flutuabilidade

Dentre os inertes testados, os minerais argila, filito, sílica e o vegetal polpa cítrica foram reprovados, pois após uma hora praticamente apresentavam sedimentação completa. A vermiculita, embora com boa flutuabilidade, sedimentou-se totalmente após 24 horas (Tabela 4.2).

Verificou-se também, que as preparações elaboradas com a cortiça isolada ou em combinação com o agregante não sedimentaram durante as primeiras 8 horas e, assim permaneceram por 20 dias. Intermediariamente, o sabugo de milho moído e selecionado (malha 6) mostrou-se altamente flutuante durante 7 horas com sedimentação gradativa no decorrer de 10 dias. Observou-se que em relação ao milho e a vermiculita, a cortiça por ser pouco densa foi facilmente carregada para os bordos do recipiente o que no campo poderia se constituir em um problema no momento da aplicação pela elevada deriva pelo vento que poderia ter efeito também na distribuição na superfície da água.

Tabela 4.2. Comportamento dos materiais aplicados em aquários, na superfície de água destilada, em condições de laboratório (Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos, Departamento de Entomologia, ESALQ/USP).

Material	Horas											
	1	2	3	4	5	6	7	24	48	72	240	
Argila	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cortiça*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cortiça + agregante*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diatomita	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Filito	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sabugo de milho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Sabugo de milho + agregante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Polpa cítrica	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vermiculita	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
Vermiculita + agregante	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	

1 = Flutuação total; 2 = Flutuação parcial; 3 = Sedimentação total

* 100% de flutuabilidade aos 20 dias de exposição

Observou-se também que o agregante não interfereu na flutuabilidade dos inertes, pois tanto a cortiça, vermiculita e o sabugo isoladamente ou em mistura com o agregante

tiveram o mesmo comportamento na água, ou seja, o adjuvante não alterou a tensão superficial das partículas.

4.3.2 Testes de compatibilidade em meio sólido

Através da ausência de halo de inibição no crescimento da bactéria, foi constatado que todos os materiais não liberaram substâncias tóxicas no meio de cultura, sendo considerados igualmente compatíveis nas condições deste experimento, não causando qualquer efeito sobre a germinação dos esporos e crescimento da bactéria (Tabela 4.3).

Tabela 4.3. Compatibilidade de *Bacillus sphaericus* com diferentes materiais (Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos, Departamento de Entomologia, ESALQ/USP).

	Relação		
	Compatível	Inibidor	Letal
Argila	+	—	—
Cortiça*	+	—	—
Cortiça + agregante*	+	—	—
Diatomita	+	—	—
Filito	+	—	—
Sabugo de milho	+	—	—
Sabugo de milho + agregante	+	—	—
Polpa cítrica	+	—	—
Vermiculita	+	—	—
Vermiculita + agregante	+	—	—

+ = efeito verificado; — = efeito não verificado

* 100% de flutuabilidade aos 20 dias de exposição

Este tipo de teste, embora revele apenas os efeitos imediatos sobre os patógenos, tem sua importância pois Marques (1993) conseguiu detectar a existência de molhantes e emulsificantes dos grupos alquil sulfato de sódio e alquil sulfonossuccinato de sódio e álcool graxo poliglicol-éter com efeito negativo sobre isolados de *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae* e que assim podem ser descartados do processo de formulação destes fungos entomopatogênicos.

Da mesma forma, a compatibilidade entre adjuvantes usados em formulações em pó (dispersantes e umectantes) ou líquidos (emulsificantes) e *B. thuringiensis* foi avaliada e constatou-se que nas concentrações normalmente empregadas (1 a 3%) a grande maioria dos dispersantes e umectantes aniônicos foi incompatível (bactericidas ou bacteriostáticos) e que emulsificantes não iônicos e catiônicos foram compatíveis e passíveis de serem empregados em formulações oleosas (Alves)³.

A fim de selecionar um inerte que pudesse ser efetivamente incorporado ao processo em desenvolvimento, foram considerados, além da compatibilidade e fluatibilidade, outros aspectos como custo/disponibilidade da matéria-prima, facilidade no manuseio (moagem e peneiramento) e teor de resíduos sólidos na embalagem.

No caso específico da vermiculita, embora seja disponível comercialmente em granulometria pré-determinada, o que pode favorecer o preparo da formulação economizando etapas de moagem e peneiramento, além da baixa fluatibilidade, seus grânulos quebram-se facilmente desintegrando o produto e alterando suas características e provavelmente seu desempenho (Augusto)⁴. A cortiça, embora seja altamente fluatante, devido à sua baixa densidade, é facilmente dispersada e acumula-se na superfície da água sem distribuir-se igualmente na área (fato observado nos aquários).

Assim, o sabugo de milho além de possuir características mais adequadas, constitui-se em um sub-produto agroindustrial (resíduo do beneficiamento do milho) que lhe confere um custo muito baixo pois seu destino normal é incorporação à ração animal.

³ ALVES, L.F.A. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Depto. de Ciências Biológicas. Observação pessoal, 1995.

⁴ AUGUSTO, N.T. Centro Experimental do , Instituto Biológico. Comunicação pessoal, 1996.

Além disso, a elevada resistência dos grânulos após a moagem e peneiramento (baixo teor de resíduo e quebra dos grânulos) e facilidade para preparo preliminar (moagens sucessivas) sugerem a sua escolha dentre os demais, visando a elaboração da formulação. Da mesma forma, o agregante testado mostrou-se compatível e adequado para compor a formulação em desenvolvimento.

5 ESTABILIDADE DA FORMULAÇÃO DE *Bacillus sphaericus* ARMAZENADA SOB DIFERENTES CONDIÇÕES

5.1 Introdução

Um dos objetivos finais do processo de formulação é permitir que o entomopatógeno possa ser armazenado em condições ambiente com mínimas perdas das suas propriedades inseticidas.

Geralmente, as baixas temperaturas são utilizadas como formas de preservação de microrganismos, garantindo a manutenção do metabolismo em baixa atividade e evitando que organismos contaminantes venham a se desenvolver e degradar o entomopatógeno. No entanto, o uso de tais condições constitui-se em um ponto crítico no processo de desenvolvimento, pois se necessária para o armazenamento do produto até seu consumo, o custo final do mesmo pode se tornar elevado. Há também o risco de perda, em função de eventuais problemas no fornecimento de energia elétrica.

Além disso, deve-se considerar também a questão do transporte do produto formulado, que pode afetar o microrganismo quando o sistema adotado não dispõe de refrigeração e, neste caso, a temperatura do ambiente pode ultrapassar 40°C e se tornar um risco em potencial para a viabilidade do patógeno (Bhumiratana, 1986).

No caso específico de *B. sphaericus*, a temperatura pode afetar o complexo esporo-cristal, sendo relatada a necessidade do esporo viável como forma de se aumentar a persistência no campo.

Assim, foram conduzidos alguns experimentos com o objetivo de se avaliar o efeito da formulação na manutenção da viabilidade de *B. sphaericus* armazenado em temperatura ambiente e a 50°C.

5.2 Material e métodos

5.2.1 Preparo da formulação

A formulação preparada foi do tipo *spray on*, que segundo Batista Filho et al. (1998) é uma das mais simples na confecção e envolve equipamentos de baixo custo.

O mosto fermentado foi concentrado através de uma centrífuga refrigerada Sorvall-RT 6000, a 6000 rpm, durante 20 minutos e, em seguida, encaminhado ao Laboratório de Formulações do Instituto Biológico de São Paulo, a fim de que fosse submetido ao processo específico para o tipo citado.

O inerte foi previamente moído em moinho de martelo e, selecionado e padronizado quanto ao tamanho das partículas em peneira vibratória (6 mesh). A biomassa de *B. sphaericus* foi suspendida em água destilada na proporção suficiente para o preparo da formulação e foi incorporada aos grânulos, juntamente com um adjuvante, por meio de um impregnador. Após a impregnação, procedeu-se a secagem em estufa ventilada até que se atingisse a umidade abaixo de 5%, conforme as recomendações da ABNT.

Os grânulos, após o preparo, foram observados em microscópio estereoscópico e fotografados, no sentido de se conhecer, com maior detalhe, a superfície dos mesmos e poder estabelecer alguma relação com os parâmetros analisados (Figura 5.1)

Figura 5.1 Grânulos de sabugo de milho utilizados na formulação (aumento 10 vezes, em microscópio estereoscópico).

5.2.2 Armazenamento em condições ambiente

Amostras de 3 g da formulação granulada e 3 ml do caldo fermentado foram acondicionados, respectivamente, em sacos plásticos de polietileno e frascos de vidro, hermeticamente fechados. Foi também preparado um lote com água destilada estéril, considerado testemunha. O material foi mantido durante todo período experimental (12 meses) em um armário de madeira, na ausência de luz. As condições internas foram monitoradas, mensalmente, através de um termohigrógrafo durante uma semana, junto aos recipientes. As avaliações foram feitas após o preparo e 7, 15 e 30 dias e a partir de então, mensalmente, durante um ano (período mínimo). Para isso, foram retiradas 3 amostras de cada tratamento, sendo cada uma delas destinadas a 1 repetição, e foi determinado o número de esporos viáveis e a atividade larvicida.

a) Viabilidade de esporos

As três amostras (repetições) de cada tratamento, foram subamostradas, tomando-se 0,1 g da formulação granulada e 0,1 ml do caldo fermentado e da testemunha, que foram adicionadas a 9,9 ml de água destilada + espalhante adesivo 0,1% (suspensão estoque). Após serem submetidas ao choque térmico em banho-maria regulado para 80°C por 12 minutos (para eliminar bactérias não formadoras de esporos e outros contaminantes termolábeis), ultra-som por 10 minutos e agitação durante 2 minutos, foram preparadas diluições seriadas de 10^{-1} a 10^{-8} a partir da suspensão estoque que foram inoculadas na superfície do meio ANY + sulfato de estreptomicina 0,1%, usando-se um pipetador automático. Para cada diluição foram preparadas duas placas e em cada uma delas foram feitos 8 pontos de inoculação de 5 μ l das diluições. Foram preparadas 2 placas para cada diluição das amostras. As placas permaneceram incubadas a 30°C durante 24 horas, após o que determinou-se o número de colônias (UFC) por ponto de inoculação, usando-se um contador de colônias.

Utilizou-se o delineamento experimental fatorial e o experimento inteiramente casualizado, sendo as médias e a interação dos tratamentos x épocas submetidos à análise de variância (teste F) e comparação entre médias pelo teste de Tukey com 5% de significância, usando-se o programa estatístico Sanest.

b) Atividade larvícida

Previamente ao início dos experimentos, foi estimada para a formulação e para o caldo fermentado, a concentração letal próxima de 90% dos indivíduos. Esta foi denominada **concentração indicativa**. A mortalidade obtida com a concentração indicativa nas avaliações subseqüentes foi comparada com o valor inicial, visando acompanhar a estabilidade das amostras ao longo do tempo.

Para sua estimativa, 0,1 g da formulação granulada e 0,1 ml do caldo fermentado e da testemunha, foram adicionadas a 10 ml de água destilada + espalhante adesivo, sendo esta a suspensão-estoque. Em seguida, 5 diluições foram preparadas a partir da suspensão-estoque e cada uma delas foi considerada um tratamento. Aliquotas de 1 ml destas foram inoculadas em copos plásticos de 200 ml de capacidade, contendo 100 ml de água destilada e 20 larvas de 3º ínstar de *C. quinquefasciatus* provenientes de criação de laboratório (segundo item 2.2.1) com 3 repetições para cada tratamento (diluição). As larvas foram alimentadas com ração moída para roedor e mantidas a 30°C e 12 horas de fotofase, observadas após 24 e 48 horas, retirando-se os indivíduos mortos. A análise dos dados foi a mesma adotada e descrita no item **a**.

Eventualmente foram realizados experimentos em condições de laboratório, utilizando-se como ambiente de experimentação, baldes plásticos contendo 10 litros de água destilada. Nestes foram aplicadas amostras das preparações armazenadas, na concentração proporcional a de campo, juntamente com 20 larvas de 3º ínstar de *Culex quinquefasciatus* provenientes da criação de laboratório, sendo preparados 3 baldes para cada um dos produtos e para a testemunha.

A avaliação da mortalidade foi realizada após 24 e 48 horas da inoculação, contando-se o número de insetos mortos.

5.2.3 Armazenamento em temperatura elevada

Foram adotados os mesmos procedimentos do experimento para condições ambiente e seus respectivos subitens, porém, as preparações foram armazenadas em estufa regulada para 50°C e em armário protegidos da luz (condição ambiente) para comparação. As avaliações foram realizadas logo após o preparo e 7, 15, 30 e 60 dias de armazenamento. Nestas, tanto a viabilidade dos esporos como a atividade larvicida foram analisados, como descrito anteriormente.

5.3 Resultados e discussão

5.3.1 Armazenamento em condições ambiente

O efeito da formulação sobre a viabilidade dos esporos pode ser evidenciada na primeira avaliação após o armazenamento (7 dias). Houve uma redução de cerca de 65% no número de UFC na formulação, enquanto que para o patógeno não formulado a redução foi de 93% (Tabela 5.1).

Observou-se, ainda, que ao longo do período de armazenamento ocorreram oscilações na concentração de UFC nas amostras, com valores maiores e menores se alternando, principalmente a partir do segundo mês de avaliação. Por outro lado, na formulação, a redução foi relativamente gradativa, com exceções de valores mais elevados (2º, 3º e 8º meses) ou menores (1º e 5º meses) que ocorreram fora da tendência esperada e que se diferenciaram significativamente entre si (Figura 5.2).

Tabela 5.1. Viabilidade de esporos de *Bacillus sphaericus* em duas preparações armazenadas em armário de madeira ($25 \pm 1^\circ\text{C}$ e 100% de escotofase)¹.

Período de armazenamento ³	Tratamento ²		
	Formulação	Caldo	Testemunha
0 D	149,3 A a	149,3 A a	0,00 C
7 D	97,6 A b	11,1 B c	0,00 C
15 D	88,6 A bc	8,7 B cd	0,00 C a
1 M	50,8 A cd	8,1 B d	0,00 C a
2 M	91,7 A b	14,2 B b	0,00 C a
3 M	70,7 A c	9,2 B cd	0,00 C a
4 M	58,0 A cd	11,2 B c	0,00 C a
5 M	44,8 A d	12,3 B bc	0,00 C a
6 M	48,9 A cd	11,0 B c	0,00 C a
7 M	50,2 A cd	8,5 B cd	0,00 C a
8 M	64,8 A c	8,0 B d	0,00 C a
9 M	38,8 A d	10,0 B c	0,00 C a
10 M	41,2 A d	8,9 B cd	0,00 C a
11 M	45,5 A d	7,1 B de	0,00 C a
12 M	45,3 A d	6,6 B e	0,00 C a

¹ valor $\times 10^6$ UFC/g ou ml de produto

² Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ($\alpha = 5\%$)

³ D = dias; M = meses

Figura 5.2. Viabilidade de esporos de *Bacillus sphaericus* em duas preparações, armazenadas em condições ambiente (armário de madeira, temperatura de $25 \pm 1^\circ\text{C}$ e 100% de escotofase).

Ressalta-se que tal oscilação não foi verificada em trabalhos sobre a viabilidade de esporos da bactéria, armazenados em temperatura elevada, durante 60 dias (como será discutido no próximo experimento).

A maior estabilidade de esporos de bactérias do gênero *Bacillus* sp. líquida foi também discutida por Couch & Ignoffo (1981) e, segundo os autores, a baixa umidade é essencial para a preservação do patógeno, pois esta pode, quando elevada, favorecer à germinação dos esporos ou ainda permitir o crescimento de microrganismos

contaminantes, os quais podem contribuir para a redução do número de UFC viáveis no produto.

A ausência de informações na literatura sobre o efeito do período de armazenamento sobre a viabilidade de esporos de *Bacillus* sp. dificulta a análise pormenorizada dos resultados obtidos, havendo, contudo, alguns trabalhos realizados, com o objetivo de determinar os efeitos da temperatura elevada sobre o patógeno e que serão mencionados no item 5.3.2.

Ressalta-se ainda que apesar da redução em cerca de 70% na concentração de esporos, esta ainda encontrou-se em valores elevados ao final do experimento, com cerca de 7 vezes mais esporos viáveis que no caldo não formulado.

Acompanhando-se de forma paralela a eficiência dos produtos armazenados, verificou-se que este parâmetro para o caldo, não foi afetado. Foram observadas variações, com reduções significativas (cerca de 30 e 20%, respectivamente aos 6 e 7 meses de armazenamento), porém, ao final do período, a atividade final foi estatisticamente semelhante à original (Tabela 5.2, Figura 5.3). Além disso, a eficiência da formulação, de forma diferente, foi reduzida com o armazenamento de 12 meses no ambiente, em 35% do valor original, sendo concomitantemente 29% menos ativa que o caldo concentrado no mesmo período de avaliação.

De acordo com Elçyn et al. (1995), pode-se explicar a menor atividade larvicida da formulação, principalmente a partir do 5º mês, pelo fato dos grânulos apresentarem uma superfície com depressões que podem abrigar os esporos e cristais do patógeno de forma a garantir sua proteção contra as condições adversas do ambiente.

Entretanto, tais esporos podem ter se aderido aos interstícios dos grãos sob influência do agregante, o que pode ter dificultado sua remoção e liberação durante o preparo das suspensões e ao se realizem os bioensaios, a concentração dos propágulos, tendo sido menor, interferiu negativamente nos resultados. Este efeito pode ter sido eliminado ao se realizar o teste com o produto formulado aplicado nos baldes, em maior concentração.

Esses resultados sugerem que este parâmetro (viabilidade de esporos) possa não ser adequado para se avaliar a qualidade do produto armazenado, sendo necessário acompanhar-se outros parâmetros biológicos.

Tabela 5.2. Porcentagem média de mortalidade de larvas de *Culex quinquefascistus* causada por *Bacillus sphaericus* em duas diferentes preparações armazenadas em armário de madeira ($25 \pm 1^\circ\text{C}$ e 100% de escotofase).

Período de armazenamento ¹	Tratamento ²		
	Formulação	Caldo	Testemunha
0 D	91,67 A a	85,00 A a	0,00 C
7 D	85,00 A a	85,00 A a	0,00 C
15 D	100,00 A a	100,00 A a	0,00 C
1 M	73,33 B ab	93,33 A a	0,00 C
2 M	91,67 A a	96,67 A a	0,00 C
3 M	83,33 A a	95,00 A a	0,00 C
4 M	68,33 A b	70,00 A ab	0,00 C
5 M	43,33 B c	98,33 A a	0,00 C
6 M	40,00 B c	53,33 A bc	0,00 C
7 M	71,67 A ab	65,00 A b	0,00 C
8 M	56,67 B bc	73,33 B ab	0,00 C
9 M	41,67 B c	96,67 A a	0,00 C
10 M	38,33 B c	83,33 A a	0,00 C
11 M	53,33 B bc	93,33 A a	0,00 C
12 M	56,67 B bc	85,00 A a	0,00 C

¹ D = dias; M = meses

² Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ($\alpha = 5\%$)

Figura 5.3. Mortalidade de larvas de 3º instar de *Culex quinquefasciatus* por duas preparações de esporos e cristais de *Bacillus sphaericus* armazenadas em condições ambiente (armário de madeira, $25 \pm 1^\circ\text{C}$ e 100% de escotofase).

Na confirmação, os testes realizados em condições de laboratório, na concentração proporcional a 2 kg ou 2 l/ha (respectivamente para os grânulos e caldo), verificou-se que a eficiência não foi afetada, uma vez que a concentração utilizada neste experimento (concentração indicativa) resultou da diluição seriada dos produtos com o objetivo de detectar pequenas alterações nos produtos, e como já era esperado, não reflete diretamente o desempenho do produto no campo (Tabela 5.3)

Tabela 5.3. Atividade larvícida de duas preparações de *Bacillus sphaericus* armazenadas em armário de madeira, avaliada em baldes, em condições de laboratório (temperatura = $25 \pm 1^\circ\text{C}$ e fotoperíodo natural).

Tratamento	Período de armazenamento (meses)		
	4	6	10
Formulação	95,00	90,00	100,00
Caldo fermentado	100,00	90,00	95,00
Testemunha	0,00	0,00	0,00

Ressalta-se ainda, que o uso de uma concentração mínima para se detectar a redução da viabilidade do patógeno formulado foi também testada por Batista Filho (1997) para acompanhar a estabilidade de formulações de Vírus de Poliedrose Nuclear de *Anticarsia gemmatalis* (Lepidoptera, Noctuidae) e os resultados seguiram a mesma tendência aqui constatada.

5.3.2 Armazenamento em temperatura elevada

Normalmente, as baixas temperaturas de armazenamento são condições ideais para a preservação de um produto microbiano. A exposição do mesmo em temperaturas mais elevadas pode levar a ocorrência de distúrbios fisiológicos do patógeno com reflexos na redução da sua viabilidade, tal como foi constatado nesta pesquisa, independente do patógeno ser ou não formulado (Tabelas 5.4 e 5.5).

Tabela 5.4 - Efeito do período de armazenamento e da formulação sobre a viabilidade de esporos de *Bacillus sphaericus* determinada pela contagem UFC em meio de cultura, em diferentes ambientes de armazenamento¹.

Preparação/ ambiente	Período de armazenamento (dias) ²				
	0	7	15	30	60
<u>Armário</u>					
Testemunha	0,00 Ba	0,00 Ca	0,00 Ca	0,00 Ba	0,00 Ba
Caldo fermentado	15,0 Aa	4,32 Bb	0,92 Bc	0,82 Bd	0,05 Bd
Grânulo	15,0 Aa	9,76 Ab	9,00 Ab	5,08 Ac	9,18 Ab
<u>Estufa</u>					
Testemunha	0,00 Ba	0,00 Ca	0,00 Ba	0,00 Ba	0,00 Ca
Caldo fermentado	15,0 Aa	1,11 Bb	0,16 Bb	0,02 Bb	1,46 Bb
Grânulo	15,0 Aa	9,80 Ab	7,78 Ac	4,30 Ad	4,37 Ad
CV (%)	14,116				

¹ valores expressos $\times 10^8$ UFC/ml ou g

² Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

Assim, o caldo fermentado (patógeno não formulado) demonstrou ser mais suscetível aos efeitos da temperatura, pois mesmo em condições ambiente houve, após 7 dias do início das observações, uma significativa redução da viabilidade dos esporos em cerca de 13,5 vezes, em relação ao valor original ($1,5 \times 10^9$ UFC/ml). Esta redução continuou sendo observada nas avaliações subsequentes, alcançando a marca de 300 vezes menos esporos aos 60 dias de armazenamento. Na estufa, o caldo fermentado teve sua viabilidade reduzida ainda mais drasticamente na primeira avaliação, com 10 vezes menos UFC/ml, em relação ao original, mantendo-se com essa viabilidade pelo período de 60 dias.

Por outro lado, a formulação, ainda com redução na viabilidade dos esporos, mostrou-se mais estável em condições ambiente. A viabilidade foi mantida em níveis constantes e semelhantes aos observados na primeira avaliação. Ressalta-se apenas que na quarta avaliação, provavelmente, em função de problemas associados à experimentação

(erros durante o preparo da formulação ou na amostragem e diluição), constatou-se a diminuição da viabilidade, porém, aos 60 dias novamente obteve-se um valor semelhante às outras avaliações prévias (Tabela 5.4).

Quando a formulação foi armazenada a 50°C sua viabilidade dos esporos reduziu-se gradativamente ao longo do período, alcançando cerca de 3 vezes menos esporos viáveis/g em relação ao seu estado original. No entanto, deve-se salientar que ainda que tenha sido reduzida, a viabilidade permaneceu superior ao caldo no mesmo período de armazenamento (3 vezes mais que o patógeno não formulado) demonstrando assim uma acentuada ação protetora da formulação aos esporos de *B. sphaericus*, evitando que a temperatura causasse efeitos danosos sobre as proteínas dos esporos da bactéria, tornando-as inviáveis.

Tabela 5.5 - Comparação do efeito do ambiente sobre a viabilidade de esporos *Bacillus sphaericus* em diferentes épocas de armazenamento¹.

Preparação	Período de avaliação (dias) ²									
	0		7		15		30		60	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Caldo	15,00 A	15,00 A	1,11 B	4,32 A	0,16 B	0,92 A	0,02 A	0,82 A	0,05 B	1,46 A
Grânulo	15,00 A	15,00 A	9,80 A	9,76 A	7,78 B	9,00 A	4,30 A	5,08 A	4,37 B	9,18 A
Testemunha	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A	0,00 A

¹Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha, para cada um dos dias de avaliação, não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey

²valores expressos $\times 10^8$ UFC/ml ou g

Na análise da atividade larvicida, verifica-se que ambos os tratamentos armazenados em condições ambiente não demonstraram haver qualquer relação entre a viabilidade dos esporos e a atividade larvicida, embora seja evidente o fato dos esporos serem mais suscetíveis que os cristais à temperatura elevada. Assim, independente da viabilidade dos esporos ser alta ou baixa, a mortalidade larval causada tanto pelo produto

formulado como não formulado foi elevada, variando entre 70 e 100%. Por outro lado, quando armazenados na estufa, verificou-se uma certa relação pois a queda na viabilidade dos esporos foi acompanhada da redução da atividade larvicida, principalmente decorridos trinta dias de armazenamento (Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6). Além disso, observa-se que em relação à mortalidade original, ao final do experimento, as diferenças foram significativas para os produtos armazenados a 50°C, sendo que no caldo fermentado não apresentou toxicidade sobre as larvas testadas. Isto corrobora as observações anteriores sobre o efeito protetor da formulação sobre o complexo esporo-cristal do patógeno.

Tabela 5.6 - Efeito do período e tipo de preparação sobre a viabilidade de *Bacillus sphaericus* determinado pela porcentagem de mortalidade de larvas de *Culex quinquefasciatus*¹

Formulação	Período de armazenamento (dias)				
	0	7	15	30	60
<u>Armário</u>					
Testemunha	0,00 B a	0,00 B a	0,00 B a	0,00 C a	0,00 B a
Caldo fermentado	85,00 A b	85,00 A b	98,00 A a	94,00 A ab	95,67 A ab
Grânulo	93,00 A ab	85,00 A bc	100,00 A a	73,00 B c	93,33 A ab
<u>Estufa</u>					
Testemunha	0,00 B a	0,00 C a	0,00 B a	0,00 B a	0,00 B a
Caldo fermentado	85,00 A a	76,83 A a	87,33 A a	8,00 B b	0,00 B b
Grânulo	93,00 A a	56,00 B b	89,33 A a	28,00 A c	48,00 A b
CV (%)	10,909				

¹Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

Confrontando-se diretamente os ambientes de armazenamento e a atividade larvicida, verifica-se que o formulado demonstrou inicialmente ser mais suscetível à temperatura, pois na primeira avaliação sua atividade foi significativamente menor que a obtida para o produto armazenado no armário. Fato observado para o caldo fermentado

apenas na avaliação seguinte, o qual a partir de então sofreu uma redução de cerca de 80 e 100% da sua atividade, estabelecendo assim, um padrão de comportamento da redução da atividade larvívora para o formulado e para o caldo com a mesma tendência observada para a viabilidade dos esporos, ou seja, redução drástica e rápida para o caldo e gradativa para o formulado (Tabela 5.7).

Tabela 5.7 - Comparação das condições de armazenamento sobre a atividade patogênica das diferentes preparações de *Bacillus sphaericus*¹

Preparado	Período de avaliação (dias)/ambiente de armazenamento									
	0		7		15		30		60	
	E ²	A ³	E	A	E	A	E	A	E	A
Caldo	85,00A	85,00A	76,83A	85,00A	87,33B	98,00A	8,00B	94,00A	0,00B	95,67A
Grânulo	93,00A	93,00A	56,00B	85,00A	89,33B	100,00A	28,00B	73,00A	48,00B	93,33A
Testemunha	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A	0,00A

¹Médias seguidas pela letra maiúscula na linha, para cada um dos tratamentos nos respectivos dias de avaliação, não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

²E = estufa;

³A = ambiente

Trabalhos desenvolvidos por Elçyn et al. (1995 a,b) com formulação encapsuladas à base de caragenina e alginato de cálcio demonstraram os efeitos da temperatura apenas sobre a viabilidade dos esporos. Em ambos, tal como aqui constatado, a formulação garantiu maior estabilidade no armazenamento durante 90 dias a 50°C, de forma que as perdas no caldo sempre foram maiores (da ordem de 10000 vezes menor em relação ao original). A viabilidade dos esporos da formulação apresentou, ao longo do período, redução de 10 a 100 vezes, variando diretamente com a concentração dos produtos constituintes da matriz de encapsulação. Ressalta-se que nos dois trabalhos não foram feitas quaisquer referências sobre a atividade larvívora.

Existem poucas informações na literatura que demonstrem tais efeitos, no entanto, as pesquisas realizadas por Elçin et al. (1995c) com uma formulação encapsulada de *B. sphaericus* à base de Carboxi Metil Celulose, armazenada em altas temperaturas (50°C) e em condições ambiente, levaram a observações semelhantes, com redução na viabilidade dos esporos, principalmente para o caldo fermentado (cerca de 10000 vezes menos esporos viáveis ao final de 90 dias de exposição). O produto formulado, contudo, sofreu reduções de no máximo 100 vezes o número de esporos viáveis. Entretanto, com relação à atividade larvívora os autores obtiveram a total preservação do patógeno quando formulado após o período de armazenamento de 60 dias em condições de temperatura elevada, o que garantiu 100% de mortalidade das larvas de 3º instar de *Culex* spp.

Embora a temperatura seja um fator importante na viabilidade dos entomopatógenos, deve-se salientar que as respostas em relação a este fator ambiental não podem ser generalizadas, pois a variabilidade genética pode interferir conferindo a um isolado maior capacidade de resistir às condições adversas. Isto foi demonstrado por Karch (1987) que acompanhou a viabilidade e a atividade larvívora dos isolados 2297 e 1593-4 armazenados a 50°C e verificou que o último foi mais estável, perdendo apenas 10 vezes o número de UFC/ml enquanto que o outro isolado sofreu perdas da ordem de 10^6 UFC/ml. O mesmo foi observado para a atividade larvívora que foi drasticamente reduzida para o isolado 2297 e mantida para o isolado 1593-4.

A importância da preservação, não somente do cristal, mas também os esporos no produto armazenado ou no campo pode levar ao prolongamento da persistência, com multiplicação do patógeno nas larvas infectadas (Burke et al. 1983; Yousten et al., 1992). Além disso, embora não sejam obrigatoriamente necessários para a atividade larvívora, os esporos participam secundariamente do ciclo de desenvolvimento da doença, multiplicando a bactéria nas larvas mortas e liberando novos esporos e cristais (reciclagem) infectando novos indivíduos por maior tempo, aumentando-se a atividade residual (Davidson et al., 1975; Myers et al., 1979; Des Rochers & Garcia, 1984; Lacey et al., 1988; Lacey, 1990; Yousten et al., 1992).

A termoestabilidade a ser alcançada para *B. sphaericus* justifica-se pelo fato desta formulação ser um produto comercializável e portanto passível de ser transportado, podendo ser exposto a condições impróprias e assim, a integridade biológica do produto pode ser preservada mesmo quando transportado em condições não adequadas e por longas distâncias, sem afetar a sua qualidade.

Além disso, a formulação em questão trata-se de um grânulo flutuante e pelo fato de permanecer junto à superfície onde, pela incidência de luz solar a temperatura da água é maior, o complexo esporo-cristal pode ser inativado.

Verificou-se que os grânulos apresentavam uma superfície com aparência esponjosa e com cavidades e depressões, criando, desta maneira, um microambiente onde provavelmente os esporos se alojaram garantindo, no armazenamento ou no campo, o prolongamento da atividade larvicida. Este fenômeno foi também relatado por Elçyn et al. (1995), com relação às observações feitas de grânulos de uma formulação encapsulada de *B. sphaericus*, à base de caragenina, em microscópio eletrônico de varredura, às quais revelaram uma superfície semelhante a aqui relatada e com reflexos direto na estabilidade do patógeno.

Ainda sobre o armazenamento, Tanada & Kaya (1990) ressaltaram a necessidade em se manter o produto formulado com baixa umidade. Seguindo esta recomendação, o produto em teste foi armazenado com cerca de 3%, o que pode ter colaborado para a sua manutenção em tais condições, garantido maior atividade em relação ao caldo no qual os efeitos foram mais severos pela presença da água ao redor do complexo esporo-cristal.

Entretanto, torna-se difícil a comparação dos resultados aqui obtidos com os demais estudos, em função do tipo de formulação desenvolvida. A formulação encapsulada pode ser efetiva na proteção, uma vez que o patógeno é envolvido totalmente por uma matriz enquanto que na do tipo “spray-on”, o ingrediente ativo e adjuvantes são aplicados sobre a matriz (inerte) penetrando em seus interstícios. A vantagem desta última está no seu baixo custo de produção (matéria-prima residual de origem agroindustrial) e na simplicidade da sua manufatura. Além disso, os ingredientes (inerte e adjuvante) utilizados são biodegradáveis e atóxicos.

6 EFICIÊNCIA DA FORMULAÇÃO GRANULADA G4 EM CRIADOUROS NATURAIS E ARTIFICIAIS DE *Culex* spp.

6.1 Introdução

Embora a atividade patogênica de *Bacillus sphaericus* permaneça no ambiente devido à resistência natural dos esporos às condições ambientais, verificou-se que após a aplicação na água, os esporos tendem a se sedimentar, ficando fora da zona de alimentação das larvas e com isso a população poderá voltar a crescer (Lacey, 1984).

A eficiência do produto pode ser afetada também pela ação da radiação ultravioleta do espectro solar, embora Lacey (1990) considere-a mais prejudicial aos esporos que aos cristais tendo pouco efeito sobre as toxinas e à atividade larvicida, porém, conduz à diminuição da persistência.

A formulação visa prolongar a persistência, uma vez que a impregnação do complexo esporo-cristal acrescido de adjuvante em uma matriz flutuante, possibilita a lenta dispersão do patógeno tanto na superfície como ao longo da coluna d'água, aumentando a concentração de propágulos nas áreas de alimentação das larvas pequenas de *Culex* spp. (que se concentram na superfície) e maiores (que se distribuem em diferentes profundidades)

Segundo Lacey (1984) também considera o efeito da formulação na melhor distribuição do material no campo, sendo que as preparações líquidas de *B. sphaericus*, embora sejam de fácil manipulação e aplicação, também apresentem rápida dispersão, são pouco flutuantes e assim esporos e cristais tendem à sedimentação. As formulações

sólidas granuladas, também contribuem no momento da aplicação, facilitando a penetração da vegetação que comumente recobre as margens dos criadouros.

Assim, este trabalho teve por objetivos avaliar a eficiência de uma formulação sólida de *B. sphaericus*, em diferentes condições, comparando-a com uma formulação comercial da mesma bactéria.

6.2 Material e métodos

6.2.1 Experimentos em criadouros artificiais

6.2.1.1 Estimativa da concentração de campo para a formulação granulada de *B. sphaericus* (G4)

Com o objetivo de se avaliar o desempenho da formulação G4, bem como estimar um intervalo de concentrações de uma formulação granulada de *B. sphaericus* para aplicação em campo, foi realizado um experimento no Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”/USP e Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Foram utilizados como criadouros artificiais de *Culex quinquefasciatus*, baldes plásticos contendo 10 litros de água limpa e água + 1% de esterco fresco de coelho como fonte de matéria orgânica em suspensão, sendo utilizados 3 baldes para cada tratamento (concentração) além de um conjunto para a testemunha.

Inicialmente foi realizado o ensaio com água poluída, com a incorporação de esterco na água nos baldes. Em seguida, foram transferidos para uma casa-de-vegetação regulada para 25°C e sob fotoperíodo natural, aguardando-se 10 dias antes de se iniciar o experimento propriamente dito.

Em seguida, os baldes foram inoculados com a formulação nas concentrações de 0,06; 0,12 e 0,24 g/balde, correspondentes a 1; 2 e 4 kg/ ha, por serem estas as

concentrações mais utilizadas nos trabalhos de avaliação de formulações de *B. sphaericus* (Figura 6.1).

Figura 6.1. Disposição dos baldes (criadouros artificiais) na casa-de-vegetação (Temperatura = $28 \pm 1^\circ\text{C}$; fotoperíodo natural; dezembro de 1997).

Após a aplicação, os recipientes foram infestados com 20 larvas de *C. quinquefasciatus* no 3º instar, provenientes da criação do laboratório descrita no item 3.2.1.

No dia seguinte, foi feita a avaliação verificando-se o número de larvas mortas e, em seguida, foi realizada nova liberação. O procedimento foi repetido no segundo, sétimo e décimo oitavo dias após a aplicação.

Posteriormente, foi realizado o mesmo bioensaio em água limpa, quando foram repetidos todos os procedimentos. Para este experimento, utilizou-se água mineral e as concentrações foram proporcionais a 2 e 4 kg/ha, sendo ainda incluído mais um

tratamento, representado pela formulação comercial Vectolex® (Abott Labs. Ltda.) na concentração de 4 kg/ha.

Para todos os experimentos, os dados obtidos foram comparados entre si, pela análise da variância com aplicação do teste F e teste de Tukey, ambos com nível $\alpha = 5\%$ de significância.

6.2.2 Experimento em criadouros naturais

O experimento foi realizado na cidade de Londrina, durante o período de 5 a 20 de maio de 1998, contando com o apoio do Departamento de Biologia Animal e Vegetal/Universidade Estadual de Londrina.

O local escolhido foi uma lagoa de tratamento de cortume de couro bovino, retangular e com área de 800 m², constituindo-se em um local apropriado para o desenvolvimento do pernilongo, cuja espécie predominante era *C. saltanensis* Dyar, 1928.

Antes da aplicação foram feitas amostragens da população, coletando-se as larvas com uma rede de náilon, nos vértices da lagoa, sendo os insetos levados ao laboratório do citado Departamento a fim de que fosse feita a contagem e a identificação dos mesmos. Em seguida, realizou-se a aplicação manual do produto (formulação G4), ao longo de toda a margem, na concentração equivalente a 2 kg/ha, baseando-se nos resultados do experimento em criadouros artificiais.

Os resultados obtidos durante as avaliações foram comparados com os dados preliminares à aplicação, visando-se estabelecer a redução percentual da população ao longo do tempo.

6.3 Resultados e discussão

6.3.1 Experimento em criadouros artificiais

6.3.1.1 Eficiência da formulação em diferentes tipos de água e estimativa da concentração de campo para a formulação G4

A atividade do patógeno foi constatada durante todo o período de experimentação, sendo que nas duas primeiras avaliações não houve diferença significativa entre as concentrações. A partir do terceiro dia começaram a ocorrer diferenças, visto que a redução da atividade na concentração de 1 kg/ha foi brusca, sendo o mesmo observado na concentração intermediária. Embora significativa, a redução na maior concentração foi menos intensa e apresentou a maior atividade nesta avaliação (Tabela 6.2).

Tabela 6.2. Persistência da formulação G4 em diferentes concentrações nos criadouros artificiais com água + esterco (Temperatura = $28 \pm 1^\circ\text{C}$; fotoperíodo natural: maio de 1997).

Dias	Testemunha ²	Concentração aplicada (kg/ ha) ¹		
		1	2	4
1	0,00 A b	100,0 A a	100,0 A a	100,0 A a
2	0,00 A b	80,0 B a	90,0 A a	100,0 A a
3	0,00 A d	17,5 D c	42,5 C b	75,0 B a
7	0,00 A d	37,5 C c	72,5 B b	82,5 AB a
18	0,00 A b	95,0 A a	97,5 A a	95,0 A a
C.V. = 2,37%				

¹ Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha e dentro de cada tipo de água, não diferem entre si pelo teste de Tukey, com 5% de significância

² Aplicação de água destilada

Após 7 dias a mortalidade larval elevou-se significativamente em todas as concentrações, provavelmente pela multiplicação da bactéria nas larvas mortas que não foram retiradas dos baldes. Finalmente, na última avaliação, a mortalidade larval igualou-se entre as concentrações, permanecendo nos mesmos níveis da atividade original, ou seja, próxima de 100%.

Skovmand & Bauduin (1997) realizaram um ensaio similar com uma formulação granulada em criadouros artificiais (baldes plásticos de 75 l de capacidade) mantidos em casa-de-vegetação e obtiveram em água poluída, com a concentração de 3 kg/ha, 100% de mortalidade larval durante 7 dias, porém, na avaliação de 11 dias a atividade decresceu para 86%. Contudo, verificaram que com água limpa a persistência foi maior, ou seja, aos 18 dias a mortalidade larval foi de 66%, porém, 30% menos eficiente que a G4, utilizada na concentração de 2 kg/ha.

Ainda neste sentido, e confirmando tal observação, Mulla et al. (1984) acompanharam a persistência de *B. sphaericus* não formulado, em criadouros artificiais contendo diferentes níveis de poluição e verificaram a existência de uma relação inversa entre a poluição e a persistência do patógeno. Por outro lado, foi observado que a concentração de esporos nos criadouros aumentou ao longo do período experimental. Assim, fica assegurada a multiplicação do patógeno e demonstra-se a influência desta multiplicação na manutenção da sua persistência, tal como Davidson et al. (1984), Becker et al. (1995) e Correa & Yousten (1995) concluíram em seus estudos.

Na comparação da atividade de G4 com o produto Vectolex® nos criadouros artificiais, verificou-se que ambos apresentam semelhança na atividade, contudo a permanência dos grânulos na superfície foi diferenciada. A formulação G4 repetindo o padrão de comportamento em observações preliminares, visto que por mais de 7 dias foi possível se observar grande parte dos grânulos aplicados, enquanto que o produto Vectolex® decantou-se totalmente em menos de 24 horas (Tabela 6.3).

Tabela 6.3. Persistência das formulações G4 e Vectolex®, em condições de laboratório (Temperatura = $25 \pm 1^\circ\text{C}$; fotoperíodo natural: dezembro de 1998)¹.

Dias	Concentração aplicada (kg/ha)			
	Testemunha	G4 - 2 kg/ha	G4 - 4 kg/ha	Vectolex - 4 kg/ha
1	0,00 A c	60,0 B b	95,0 A a	100,0 A a
2	0,00 A c	65,0 B b	100,0 A a	100,0 A a
3	0,00 A c	75,0 AB b	86,7 A a	100,0 A a
7	0,00 A c	75,0 AB b	93,3 A a	95,0 A a
18	0,00 A b	95,0 A a	95,0 A a	100,0 A a

¹ Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha e dentro de cada tipo de água, não diferem entre si pelo teste de Tukey, com 5% de significância

² Aplicação de água destilada

Embora as condições em que foi realizado o experimento sejam diferentes das encontradas nos criadouros naturais, o fato de se ter eliminado muitos dos fatores de interferência na atividade do patógeno, evidencia a atividade de ambos produtos. Assim, em termos percentuais de controle constata-se a semelhança entre eles, quando aplicados na mesma concentração (4 kg/ha), seja no controle inicial ou ao longo de 18 dias de observação.

6.3.2 Experimento em criadouros naturais

Verificou-se uma ação eficaz do produto sobre a população de insetos a partir de 24 horas com mortalidade de 21% das larvas. A mortalidade acentuou-se ainda mais ao longo do período de observação, alcançando 85% de redução larval após uma semana e 94% ao final do período (cerca de 2 semanas após a aplicação) (Tabela 6.4).

Ainda que de forma preliminar, a eficiência foi demonstrada, não havendo interrupção na atividade da bactéria sendo a mortalidade crescente durante o período de observação. Além disso, era comum observar-se durante as avaliações, a presença de

ovos e larvas pequenas, indicando a reposição natural dos insetos sem nenhuma correspondente elevação da população. Ressalta-se que durante o período de experimentação não foi registrada a ocorrência de chuva.

Tabela 6.4 - Eficiência da formulação granulada G4 de *Bacillus sphaericus* sobre a população de *Culex saltanensis* Dyar, em lagoa de tratamento de resíduo orgânico de cortume de couros. Londrina/PR, maio de 1998

Dias após a aplicação	Número médio de larvas ¹	Redução populacional (%) ²
0	1049	-
1	826	21
3	556	47
7	157	85
15	62	94

¹ Referente a quatro pontos de coleta

² Em relação ao número médio de larvas na primeira avaliação

Embora tenha se alcançado ao final do período de avaliação um nível elevado de controle, inicialmente este índice foi pequeno (21 e 47%, respectivamente para 24 e 48 horas após a aplicação), principalmente se comparado com o que foi obtido em outros trabalhos.

Um dos primeiros testes com formulações granuladas de *B. sphaericus* foi realizado por Mulla et al. (1987) em diferentes localidades da Califórnia. As aplicações foram feitas manualmente na concentração de 2,5 kg/ha e durante 14 dias foi acompanhada a flutuação populacional de *Culex* spp, em 3 avaliações (2, 7 e 14 dias após a aplicação). A redução de larvas (em termos percentuais) foi elevada no início (100%) mantendo-se assim até a segunda avaliação (95% aos 7 dias). Contudo, a eficiência foi reduzida em 30% em relação à original na última avaliação.

Mulla et al. (1988) realizaram um ensaio de persistência de uma formulação granulada de *B. sphaericus* em tanques de depuração de currais utilizando concentrações mais elevadas (variando entre 3,13 e 25 kg/ha) e obtiveram, na menor concentração, um controle inicial de larvas de *C. peus* próximo de 67% (3 dias após a aplicação) contudo, esta atividade cessou prontamente, de modo que após uma semana a população era apenas 6% menor e aos 14 dias a população voltou aos valores originais. Um valor próximo de controle para esta mesma época de avaliação foi obtido pelos autores somente com cerca de 10 kg do produto, ou seja, 5 vezes a concentração utilizada da formulação G4.

Em um trabalho semelhante, Karch et al. (1991), avaliaram também uma formulação comercial (Vectolex®), aplicada em lagoas de decantação de esgoto na concentração de 2,5 kg/ha e verificaram que após 24 e 48 horas a população de larvas de *Culex* sp foi reduzida em 84%, contra apenas 21% (Tabela 6.4). Entretanto, a persistência da formulação G4 esteve acima da observada pelos autores, pois após 7 dias a formulação deixou de atuar e a população voltou a crescer, enquanto que a formulação G4 ainda causava neste mesmo período 85% de redução.

Karch et al. (1992) também compararam a persistência da formulação Vectolex® de *B. sphaericus* em uma em áreas pantanosas e plantações de arroz no Zaire e constataram a rápida redução populacional em 48 horas (96%), contudo, foi necessária a reaplicação do patógeno a cada 15 dias para a manutenção do controle.

Deve-se ressaltar, porém, que a diversidade de ambientes dificulta a comparação dos resultados, pois no trabalho acima, o experimento foi realizado em uma valeta de condução de esgotos, suscetível à variação diária no fluxo de dejetos despejados, ao passo que no experimento com a formulação G4 o ambiente apresentava um lento fluxo de água, daí a necessidade de se utilizar concentrações bem maiores do produto Vectolex®.

Demonstrando tal possibilidade, a mesma formulação comercial Vectolex® foi testada em pântanos, para o controle de *Mansonia uniformis*. Neste caso, houve semelhança com os resultados obtidos com G4, ou seja, um controle inicial não tão

semelhança com os resultados obtidos com G4, ou seja, um controle inicial não tão elevado que resultou após 4 dias da aplicação, em 39% de redução larval, sendo ainda verificado pelos autores 87,5% de redução na população de insetos 14 dias após a aplicação do produto (Yap et al., 1991).

O baixo nível de controle inicial provavelmente esteja associado à concentração aplicada do produto. Por ser pequena e por estar o patógeno agregado às partículas e se liberar gradativamente, somente com o passar de alguns dias é que a concentração de esporos e cristais alcançou um valor adequado que, mantendo-se constante levou a índices elevados de mortalidade, sendo também possível que as larvas mortas tenham propiciado a multiplicação do patógeno.

Tal observação foi também feita por Lacey et al. (1988) com uma formulação granulada (peletizada) de *B. sphaericus* aplicada para controle de larvas de *Anopheles quadrimaculatus* em ambientes poluídos. Segundo os autores, o aumento na concentração do produto para 5 kg/ha elevou em 4 vezes a redução larval ao segundo dias após a aplicação. Novamente, observa-se que após 7 dias, a redução populacional observada pelos autores esteve abaixo da alcançada pela formulação G4, sendo respectivamente 53 e 85%.

7 CONCLUSÕES

1. Os isolados mais virulentos que o padrão 2362 foram AM1, MG2, MS6, MS7, PR9, SP10 E SP13.
2. O isolado MS6 é um dos mais virulentos e o mais produtivo em termos de esporos/ml de meio de cultura.
3. Os inertes milho, cortiça e vermiculita são os que apresentam maior flutuabilidade, porém, o sabugo de milho é o mais adequado para compor a formulação.
4. A formulação garante a maior viabilidade dos esporos armazenados em condições ambiente.
5. A temperatura elevada afeta os esporos e cristais de ambas preparações, com maiores efeitos sobre o caldo não formulado.
6. A formulação desenvolvida é eficiente em diferentes condições e pode ser comparada com a formulação comercial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, S.B. **Controle microbiano de insetos**. São Paulo: Editora Manole, 1998.

ALVES, S.B.; MOINO Jr., A.; ALMEIDA, J.E.M. Desenvolvimento, potencial de uso e comercialização de produtos microbianos. In: ALVES, S.B. (Coord.) **Controle microbiano de insetos**. Piracicaba: FEALQ, 1998. p.1143-1163.

ALVES, S.B.; ALVES, L.F.A.; LOPES, R.B.; VIEIRA, S.A. Isolado 1037 de *Metarhizium anisopliae* promissor para o controle microbiano de insetos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 16., Salvador, 1997. **Resumos**. Cruz das Almas: EMBRAPA, CNPMF, 1997. p.107.

AMONKAR, S.A.; VIJAYALAKSHMI, N.; RAO, S.A.; GOPINATHAN, C. Sustained release formulations of *Bacillus sphaericus* (ISPC-5 = WHO - 2173) for the control of mosquito larvae of *Culex fatigans*. **Current Science**, v.57, n.10, p.530-532, 1988.

ANDRADE, C.F.S. Manejo integrado de mosquitos. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PRAGAS URBANAS E SAÚDE PÚBLICA, 1, Passo Fundo, 1995. **Resumo de palestras**. Passo Fundo: Faculdade de Agronomia de Passo Fundo, 1995. p.12-23.

AUGUSTO, N.T.; BATISTA FILHO, A.; ALVES, L.F.A. *Baculovirus anticarsia*: efeito de agentes tensoativos. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 3., Águas de Lindóia, 1992. **Anais**. Águas de Lindóia: EMBRAPA, CNPMA, 1992. p.145.

AUGUSTO, N.T.; BATISTA FILHO, A.; SILVA, E.M. Formulação oleosa de *Baculovirus anticarsia*: compatibilidade de emulsificantes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 15., Caxambu, 1995. **Resumos**. Lavras: UFLA, 1995. p.353.

AUGUSTO, N.T.; BATISTA FILHO, A.; ALVES, L.F.A. Efeito de inertes do grupo do talco sobre *Baculovirus anticarsia*. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5., Foz do Iguaçu, 1996. **Anais**: sessão de posters. Londrina: EMBRAPA, CNPSo, 1996. p.341.

AZEVEDO, J.L. Controle microbiano de insetos-pragas e seu melhoramento genético. In: MELO, I.S. de; AZEVEDO, J.L. (Ed.) **Controle biológico**. Jaguariúna: Embrapa, 1998. p.69-96.

BATISTA FILHO, A.; ALVES, S.B.; ALVES, L.F.A.; PEREIRA, R.M.; AUGUSTO, N.T. Formulação de entomopatógenos. In: ALVES, S.B. (Coord.) **Controle microbiano de insetos**. Piracicaba: FEALQ, 1998. p.917-967.

BARJAC, H. de. Classification of *Bacillus sphaericus* strains and comparative toxicity to mosquito larvae. In: BARJAC, H. de; SUTHERLAND, D.J. (Ed.). **Microbial control of mosquitoes and blackflies**. New Brunswick: Rutgers University Press, 1990. p. 228-236.

- BECKER, N.; ZGOMBA, M.; PETRIC, D., BECK, M.; LUDWIG, M. Role of larval cadavers in recycling process of *Bacillus sphaericus*. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.11, p.329-334, 1995.
- BHUMIRATANA, A. Local production of *Bacillus sphaericus*. In: de BARJAC, H. ; SUTHERLAND, D.J. (Ed.) **Bacterial control of mosquitoes and blackflies**. New Brunswick: Rutgers University Press, 1990. p.272-283.
- BOURGOIN, C.; LARGET-THIERY, I.; de BARJAC, H. Efficacy of dry powders from *Bacillus sphaericus*: RB-80, a potent reference preparation for biological trititation. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.44, n.2, p.146-150, 1984.
- BOWLES, D.E.; MEISCH, M.V.; WEATHERSBEE, A.A.; JONES, J.W.; EFIRD, P.; BASSI, D. Efficacy of *Bacillus sphaericus* formulations against *Psorophora columbiae* larvae in small rice plots. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.6, n.4, p.631-634, 1990.
- BURGESS, N.R.H.; COWAN, G.O. **A colour atlas of medical entomology**. London: Chapman & Hall Medical, 1993, 180p.
- CHARLES, J.F.; NIELSEN-Le-ROUX, C.; DELÉCLUSE, A. *Bacillus sphaericus* toxins: molecular biology and mode of action. **Annual Review of Entomology**, v.41, p.451-472, 1996.

CÔNSOLI, R.A.G.B.; SANTOS, B.S.; LAMOUNIER, M.A.; SECUNDINO, N.F.C.; L. RABINOVITCH; SILVA, C.M.B.; ALVES, R.A.S.; CAPISTRANO, C.M.B. ; AVENDANHA, J.S. Observações preliminares quanto à eficácia de formulação de inseticida à base de *Bacillus sphaericus* 2362 produzido localmente e utilizado no controle de larvas de mosquitos em criadouros naturais. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5., Foz do Iguaçu, 1996. **Anais: Conferências e Palestras**. Londrina: EMBRAPA, CNPSo, 1996. p.438-448.

CÔNSOLI, R.A.G.B.; SANTOS, B.S.; LAMOUNIER, M.A.; SECUNDINO, N.F.C.; L. RABINOVITCH; SILVA, C.M.B.; ALVES, R.A.S.; CARNEIRO, N.F.F. Efficacy of a new formulation of *Bacillus sphaericus* 2362 against *Culex quinquefasciatus* (Diptera: Culicidae) in Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**. V.92, n.4, p.571-573, 1997.

CORREA, M.; YOUSTEN, A.A. *Bacillus sphaericus* spore germination and recycling in mosquito larval cadavers. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.66, p.76-81, 1995.

COUCH, T.L.; IGNOFFO, C.M. Formulation of insect pathogens. In: BURGESS, H.D. (Ed.) **Microbial control of pests and plant diseases 1970-1980**. New York: Academic Press, 1981. p.621-634.

DAOUST, R.A.; ROBERTS, D.W. Virulence of natural and insect-passaged strains of *Metarhizium anisopliae* to mosquito larvae. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.40, n.1, p.107-117, 1983.

DAOUST, R.A.; WARD, M.G; ROBERTS, D.W. Effect of formulation on the viability of *Metarhizium anisopliae* conidia. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.41, n.2, p.151-160, 1982.

- DAVIDSON, E.W. A review of the pathology of bacilli infecting mosquitoes, including an ultrastructural study of larvae fed *Bacillus sphaericus* 1593 spores. **Developing Industrial Microbiology**, v.22, p.69-81, 1981.
- DAVIDSON, E.W. Biding of the *Bacillus sphaericus* (Eubacteriales: Bacillaceae) toxin to midgut cells of mosquito (Diptera: Culicidae) larvae: relationship to host range. **Journal of Medical Entomology**, v.25, p.151-57, 1988.
- DAVIDSON, E.W. Biochemistry and mode of action of the *Bacillus sphaericus* toxins. **Memórias do Insituto Oswaldo Cruz**, v.90, n.1, p.81-86, 1995.
- DAVIDSON, E.W.; URBINA, M.; PAYNE, J.; MULLA, M.S.; DARWAZEH, H.; DULMAGE, H.T.; CORREA J.A. Fate of *Bacillus sphaericus* 1593 and 2362 spores used as larvicides in the aquatic environment. **Applied Environmental Entomology**, v.47, p.125-129, 1984.
- DAVIDSON, E.W.; SINGER, S.; BRIGGS, J.D. Pathogenesis of *Bacillus sphaericus* strain SSII-1 infection in *Culex pipiens quinquefasciatus* (= *C. pipiens fatigans*) larvae. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.25, p.179-184, 1975.
- DAVIDSON, E.W.; BIEGER, A.L.; MEYER, M. ; SHELLABARGE, R.C. Enzymatic activation of the *Bacillus sphaericus* mosquito larvicidal toxin. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.50, n.1, p.40-44, 1987.
- DESAI, S.Y. ; SHETNA, Y.I. Production and formulation of *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* and *Bacillus sphaericus* 1593. **Indian Journal of Medical Research**, v.93, p.318-323, 1991.

- ELÇYN, Y.M. *Bacillus sphaericus* 2362-calcium alginate microcapsules for mosquito control. **Enzyme and Microbial Technology**, v17, p.587-591, 1995.
- ELÇYN, Y.M. ; ÖKTEMER, A. Larvicidal and spore behaviour of *Bacillus sphaericus* 2362 in carrageenan microcapsules. **Journal of Controlled Release**, v.33, p.245-251, 1995.
- ELÇYN, Y.M.; COKMUS, C.; SACILIK, S.C. Aluminium carboxymethylcellulose encapsulation of *Bacillus sphaericus* for control of *Culex* spp. (Diptera: Culicidae) larvae. **Journal of Economic Entomology**, v.88, n.4, p.830-834, 1995.
- GARCIA, R. Mosquito management: Ecological approaches. **Environmental Management**, v.7, n.1, p.73-78, 1983.
- HABIB, M.E.M; ANDRADE, C.F.S. Bactérias entomopatogênicas. In: ALVES, S.B. (Coord.) **Controle microbiano de insetos**. Piracicaba: FEALQ, 1998. p.383-446.
- INSTITUTO PASTEUR. Collection of *Bacillus thuringiensis* and *Bacillus sphaericus*. (Classified by H Serotypes). Paris, 1996. (Catalogue no. 1).
- JAQUES, R.A. Stability of insect viruses in the environment. In: MARAMOROSCH, K.; SHERMAN, K.E. (Ed.) **Viral insecticides for biological control**. New York: Academic Press, 1985. p. 285-360.
- JONES, J.W.; WEATHERSBEE, A.A.; EFIRD, P.; MEISCH, M.V. Evaluation of *Bacillus sphaericus* 2362 against *Culex quinquefasciatus* in septic ditches. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.6, n.3, p.496-499, 1990.

- KALFON, A.; THIÉRY, I.L.; CHARLES, J.F.; BARJAC, H. de. Growth, sporulation and larvicidal activity of *Bacillus sphaericus*. **European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology**, v.18, p.168-173, 1983.
- KARCH, S. Effcet des conditions de stockage sur la relation viabilité des spores-toxicité des pouders primaries de *Bacillus sphaericus* et de *Bacillus thuringiensis* H-14. Cah. Orstom, sér. Ent. med. et Parasitol., numéro spécial, p.11-15, 1987.
- KARCH, S.; MANZAMBI, Z.A.; SALAUN, J.J. Field trials with Vectolex® (*Bacillus sphaericus*) and Vectobac® (*Bacillus thuringiensis* (H-14)) against *Anopheles gambiae* and *Culex quinquefasciatus* breeding in Zaire. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.7, n.2, p.176-179, 1991.
- KARCH, S.; ASIDI, N.; MANZAMBI, Z.A.; SALAUN, J.J. Efficacy of *Bacillus sphaericus* against *Anopheles gambiae* and other mosquitoes in swamps and rice fields in Zaire. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.8, n.4, p.376-380, 1992.
- KUPPUASAMY, M.; HOTI, S.L.; BALAMARAN, K. Residual activity of briquette & alginate formulations of *Bacillus sphaericus* against mosquito larvae. **Indian Journal of Medical Research**, v.86, p.591-596, 1987.
- LACEY, L.A. Production and formulation of *Bacillus sphaericus*. **Mosquito News**, v.44, n.2, p.153-159, 1984.
- LACEY, L.A. Persistence and formulation of *Bacillus sphaericus*. In: BARJAC, H. de; SUTHERLAND, D.J. (Ed.). **Microbial control of mosquitoes and blackflies**. New Brunswick: Rutgers University Press, 1990. p. 284-294.

- LACEY, L.A.; UNDEEN, A.H. Microbial control of blackflies and mosquitoes. **Annual Review of Entomology**, v.31, p.265-296, 1986.
- LACEY, L.A.; MULLA, M. Safety of *Bacillus thuringiensis* ssp. *israelensis* and *Bacillus sphaericus* to nontarget organisms in the aquatic environment. In: LAIRD, M.; LACEY, M.A.; DEVIDSON, E. (Ed.) **Safety of microbial insecticides**. Boca Raton: CRC Press, 1990. p.169-188.
- LACEY, L.A. ; ROSS, D.H.; LACEY, C.M.; INMAN, A.; DULMAGE, H.T. Experimental formulations of *Bacillus sphaericus* for the control of anopheline and culicinae larvae. **Journal of Industrial Microbiology**, v.3, p.39-47, 1988.
- LEGNER, E.F. Biological control of Diptera of medical and veterinary importance. **Journal of Vector Ecology**, v.20, n.1, p.59-120, 1995.
- LOPES, J.; ARANTES, O.M.N.; TRINDADE, G.F.L. ; VILAS BÔAS, L.A. Controle biológico de culicidae (Diptera) por *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* em lagoas de tratamento de esgoto. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5., Foz do Iguaçu, 1996. **Anais**: sessão de posters. Londrina: EMBRAPA, CNPSo, 1996. p.207.
- LORD, J.C. Sustained release pellets for control of *Culex* larvae with *Bacillus sphaericus*. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.7, n.4, p.560-564, 1991.
- MARQUES, E.J. Efeitos de formulações na preservação de *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. e *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorok. sob diferentes condições de armazenamento. Piracicaba, 1993. 146p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.

- MATANMI, B.A.; FEDERICI, B.A.; MULLA, F.S. Fate and persistence of *Bacillus sphaericus* used as mosquito larvicide in dairy wastewater lagoons. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.6, p.384-389, 1990.
- MULLA, M.S; DARWAZEH, H.A.; DAVIDSON, E.; DULMAGE, HT. Efficacy and persistence of the microbial agent *Bacillus sphaericus* against mosquito larvae in organically enriched habitats. **Mosquito News**, v.44, n.2, p.166-173, 1984.
- MULLA, M.S; DARWAZEH, H.A.; YOUSTEN, A. *Bacillus sphaericus* 2362 formulations for initial and persistent control of stagnant water mosquitoes. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE CALIFORNIA MOSQUITO AND VECTOR CONTROL ASSOCIATION, 5., 1987. **Proceedings**. 1987. p.50-56.
- MULLA, M.S.; AXELROD, H.; DARWAZEH, H.A.; MATANMI, B.A. Efficacy and longevity of *Bacillus sphaericus* 2362 formulations from control of mosquito larvae in dairy wastewater lagoons. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.4, n.4, p.448-452, 1988.
- MULLA, M.S.; SINGH, N. ; DARWAZEH, H.A. Delayed mortality and morphogenetic anomalies induced in *Culex quinquefasciatus* by the microbial control agent *Bacillus sphaericus*. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.7, n.3, p.412-419, 1991.
- MULLEN, G.R. ; HINKLE, N.C. Method for determining settling rates of *Bacillus thuringiensis* serotype H-14 formulations. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.25, p.132, 1988.

- MULLIGAN, F.S.; SHAEFFER, C.H. ; MIURA, T. Laboratory and field evaluation of *Bacillus sphaericus* as a mosquito control agent. **Journal of Economic Entomology**, v.71, p.774-777, 1978.
- MURPHY, R.C.; STEVENS Jr., S.E. Development of a cyanobacterial biolarvicide. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.90, n.1, p.109-113, 1995.
- PACCOLA-MEIRELES, L.D. Genética e mltioramento de fungos agentes de controle biológico. In: MELO, I.S. de; AZEVEDO, J.L. (Ed.) **Controle biológico**. Jaguariúna: Embrapa, 1998. p.171-200.
- REGIS, L.; SILVA-FILHA, M.H.N.L.; OLIVEIRA, C.M.F. de, RIOS, E.M.; SILVA, S.B. da; FURTADO, A.F. Integrated control measures agaisnt *Culex quinquefasciatus*, the vector of filariosis in Recife. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.90, n.1, p.115-119, 1995.
- REGIS, L.; SILVA-FILHA, M.H.N.L.; C.M.F. de, OLIVEIRA, MELO, M.A.V.; FURTADO, A.F. Vantagens e limitações do uso do *Bacillus sphaericus* no controle de *Culex quinquefasciatus* em áreas urbanas. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5., Foz do Iguaçu, 1996. **Anais: Conferências e Palestras**. Londrina: EMBRAPA, CNPSo, 1996. p.432-437.
- REITER, P. A field trial of expanded polystyrene balls for the control of *Culex* mosquitoes in pit latrine. **Journal of American Mosquito Control Association**, v.1, p.519-524, 1985.
- RHODES, D.J. Formulation of biological control agents. In: JONES, D.G. (Ed.) **Exploitation of microorganisms**. New York, 1993. P.411-439.

- SCHENKEL, R.M.; NICOLAS, L.; FRACHON, E.; HAMON, S. Characterization and toxicity to mosquito larvae of four *Bacillus sphaericus* strains isolated from Brazilian soils. **Journal of Invertebrate Pathology**, v.60, p.10-14, 1992.
- SIEGEL, J.; SHADDUCK, J. Safety of microbial insecticides to vertebrate-humans. In: LAIRD, M.; LACEY, M.A.; DEVIDSON, E. (Ed.) **Safety of microbial insecticides**. Boca Raton: CRC Press, 1990. p.101-113.
- SINGER, S. Introduction to the study of *Bacillus sphaericus* as a mosquito control agent. In: de BARJAC, H.; SUTHERLAND, D.J. (Ed.) **Bacterial control of mosquito and blackflies**. NewBrunswick: Rutgers University Press, 1990. p.221-227.
- SKOVMAND, O.; ERIKSEN, A.G. Field trials of a fizzy tablet with *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* in forest spring ponds in Denmark. **Bulletin of Society for Vector Ecology**, v.18, n.2, p.160-163, 1993.
- SKOVMAND, O.; BAUDUIN, S. Efficacy of a granular formulation a *Bacillus sphaericus* and *Anopheles gambiae* in West African countries. **Journal of Vector Ecology**, v.22, n.1, p.43-51, 1997.
- SOSA-GÓMEZ, D.R.; PEREIRA, R.M.; ALVES, S.B. Impacto ambiental de entomopatógenos. In: ALVES, S.B. (Coord.) **Controle microbiano de insetos**. Piracicaba: FEALQ, 1998. p.1075-1095.
- SUBRA, R. Biology and control of *Culex pipiens quinquefasciatus* say, 1823 (Diptera, Culicidae) with special reference to Africa. **Insect Science Application**, n.4, p.319-336, 1981.

SUS. **Boletim epidemiológico**, Brasília: Ministério da Saúde, 1996.

TANADA, Y.; KAYA, H.K. 1993. **Insect Pathology**. San Diego: Academic Press, 1993. 666p.

TRAVERS, R.S.; MARTIN, P.A.W.; REICHELDERFER, C.F. Selective process for efficient isolation of soil *Bacillus* spp. **Applied and Environmental Microbiology**, v.53, n.6, p.1263-1266, 1987.

VILARINHOS, P.T.R.; HONDA, C.S.; SCHENKEL, R.G.M.; DIAS, J.M.C.S. Avaliação da eficiência de *Bacillus sphaericus* no controle de foco de *Culex* spp. na asa Norte de Brasília- DF. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 3., Águas de Lindóia, 1992. **Anais**. Jaguariúna: EMBRAPA, CPNDA, 1992. p.285.

VILARINHOS, P.T.R.; DIAS, J.M.C.S.; ANDRADE, C.F.S.; ARAÚJO-COUTINHO, C.J.P.C. Uso de bactérias para o controle de culicídeos e simulídeos. In: ALVES, S.B. (Coord.) **Controle microbiano de insetos**. São Paulo: FEALQ, 1998.

WARD, M.G. Formulation of biological insecticides surfactant and diluent selection. In SCHER, M.B. (Ed.) **Advances in pesticide formulation technology**. Washington: American Chemical Society, 1984. p. 175-184.

WASHBURN, J.O.; ANDERSON, J.R. Insect ciliates: control potential for container-breeding mosquitoes. In: INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF INVERTEBRATE PATHOLOGY, 5., 1990. **Proceedings**. 1990. p.507-511.

- YAP, H.H.; TAN, H.T.; YAHAYA, A.M.; BABA, R.; CHONG, N.L. Small scale field trials of *Bacillus sphaericus* (strain 2362) formulations against *Mansonia* mosquitoes in Malaysia. **Journal of Mosquito Control Association**, v.7, n.1, p.24-29, 1991.
- YOUSTEN, A.A. Mosquitocidal toxins from bacteria of the genus *Bacillus*. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 5., Foz do Iguaçu, 1996. **Anais: Conferências e Palestras**. Londrina: EMBRAPA, CNPSo, 1996. p.304-316.
- YOUSTEN, A.A.; FRETZ, S.B.; JELLEY, S.A. Selective medium for mosquito-pathogenic strains of *Bacillus sphaericus*. **Applied and Environmental Microbiology**, v.94, n.6, p.1532-1533, 1985.
- YOUSTEN, A.A.; GENTHNER, F.J.; BENFIELD, E.F. Fate of *Bacillus sphaericus* and *Bacillus thuringiensis* serovar israelensis in the aquatic environment. **Journal of Mosquito Control Association**, v.8, n.2, p.143-148, 1992.