**BIOLOGIA DE *Euophrys sutrix*
HOLMBERG, 1874 (ARANEAE, SALTICIDAE) E
SUSCETIBILIDADE DA ESPÉCIE A
ACARICIDAS UTILIZADOS NA CITRICULTURA**

LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA MELO
engenheiro agrônomo

Orientador: Prof. Dr. OCTÁVIO NAKANO

Tese apresentada à Escola Superior
de Agricultura "Luiz de Queiroz",
da Universidade de São Paulo, para
obtenção do título de Doutor em
Ciências, Área de Concentração:
Entomologia

PIRACICABA
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL
MAIO - 1994

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Livros da
Divisão de Biblioteca e Documentação - FCLQ/USP

Melo, Luiz Antonio da Silveira

M528b -- Biologia de *Euophrys sutrix* Holmberg, 1874
(Araneae, salticidae) e suscetibilidade da
espécie a acaricidas utilizados na citricul-
tura. Piracicaba, 1994.
111p.

Tese - ESALQ

Bibliografia

1. Acaricida - Toxidez 2. Aranha predadora -
Biologia 3. Aranha predadora - Efeito de acari-
cida 4. Aranha para controle biológico 5. Fruta
citrica - Praga - Controle biológico I. Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piraci-
caba.

CDD 595.44

**BIOLOGIA DE *Euophrys sutrix*
HOLMBERG, 1874 (ARANEAE, SALTICIDAE) E
SUSCETIBILIDADE DA ESPÉCIE A
ACARICIDAS UTILIZADOS NA CITRICULTURA**

LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA MELO

Aprovada em: 20/06/1994

Comissão Julgadora:

Prof. Dr. Octávio Nakano	ESALQ/USP
Prof. Dr. Francisco de Assis Menezes Mariconi	ESALQ/USP
Prof. Dr. José Djair Vendramin	ESALQ/USP
Dr. Clayton Campanhola	CNPMA/EMBRAPA
Dr. Néelson Suplicy Filho	IB/SP

Prof. Dr. Octávio Nakano

Orientador

À minha esposa Maria Helena,
pelo apoio e compreensão nos
momentos difíceis,

DEDICO.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece às seguintes pessoas e instituições:

- Prof. Dr. Octávio Nakano, pela inestimável orientação;
- EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pela oportunidade e bolsa de estudos concedida;
- CNPMA - Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental, da EMBRAPA, e particularmente à sua Chefia, pelo apoio e cessão de suas dependências físicas para a realização da pesquisa;
- Laboratório de criação de moscas do Deptº de Entomologia da ESALQ e Laboratório de Entomologia do CENA, pelo fornecimento de pupas de moscas e aos respectivos funcionários, pela específica orientação e gentileza;
- Pesquisadora Maria Elena Galiano, do Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina, pela receptividade, identificação da espécie e preciosas informações fornecidas;
- Profª Isabella Maria Piovezani Rinaldi, do Deptº de Zoologia do Instituto de Biociências da UNESP, Botucatu, SP, pela atenção, apoio e informações prestadas;

- Pesquisadores e colegas do CNPMA, Claudio Martin Jonsson e Aldemir Chaim, pelas manifestações de apoio;
- Bibliotecárias e colegas do CNPMA, Maria Amélia Toledo Leme e Nilce Chaves Gattaz, a primeira pela revisão das Referências Bibliográficas e a segunda pelas sugestões apresentadas;
- Pesquisador e colega do CNPMA, Dr. Gilberto José de Moares, pela elaboração do Summary;
- Secretárias da Área Técnica e colegas do CNPMA, Edislene Ap. Bueno Ruza e Marilza Ap. Stefanuto, pelos serviços de datilografia e digitação;
- Demais colegas e amigos do CNPMA que, de alguma forma, contribuíram na realização desta pesquisa.

SUMÁRIO

	Página
RESUMO.....	viii
SUMMARY.....	x
1. INTRODUÇÃO.....	1
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	4
2.1. Ocorrência e importância das aranhas em culturas...	4
2.2. Biologia de aranhas.....	9
2.3. Bioecologia de aranhas.....	11
2.4. Toxicidade/seletividade de defensivos a aranhas...	12
3. MATERIAL E MÉTODO.....	15
3.1. Determinação da família de aranha mais freqüente..	15
3.2. Biologia.....	16
3.2.1. Ambiente de criação.....	17
3.2.2. Alimentação (Presas).....	20
3.2.2.1. Teste de consumo.....	21
3.2.3. Acasalamento.....	23
3.2.4. Estruturas-de-postura, Postura e Descendência.....	24
3.3. Bioensaios.....	26
3.3.1. Caminhamento sobre filme-seco.....	27
3.3.2. Imersão.....	29
3.3.3. Exposição a filme-seco.....	33

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	35
4.1. Aranhas predominantes em citros.....	35
4.2. Desenvolvimento pós-embrionário de <i>Euophrys</i> <i>sutrix</i>	36
4.2.1. Fase larval.....	37
4.2.2. Fase ninfal.....	38
4.2.2.1. Características e Comportamento geral das ninfas.....	39
4.2.2.1.1. Coloração (caracteres).....	39
4.2.2.1.2. Casulos-de-abrigo.....	40
4.2.2.2. Presas e Predação (Alimentação).....	41
4.2.2.3. Atividade.....	46
4.2.2.3.1. Período inativo.....	47
4.2.2.3.1.1. Inatividade pré-ecdise.....	47
4.2.2.3.1.2. Ecdise.....	49
4.2.2.3.1.3. Inatividade pós-ecdise e Período inativo total.....	55
4.2.2.3.2. Período ativo.....	56
4.2.2.3.2.1. Tamanho e Crescimento.....	58
4.2.2.4. Mortalidade.....	61
4.2.2.5. Período de vida das ninfas.....	65
4.2.3. Fase adulta.....	67
4.2.3.1. Comprimento do corpo.....	69
4.2.3.2. Dimorfismo sexual.....	70
4.2.3.3. Consumo de presas.....	71

Página

4.2.3.4. Reprodução.....	74
4.2.3.4.1. Acasalamento e Corte.....	74
4.2.3.4.2. Cópula.....	77
4.2.3.4.3. Casulos-de-postura.....	80
4.2.3.4.4. Ovissacos.....	82
4.2.3.4.5. Oviposição.....	85
4.2.4. Longevidade.....	88
4.2.5. Emergência e Dispersão das ninfas.....	90
4.3. Bioensaios.....	93
4.3.1. Caminhamento sobre filme-seco.....	93
4.3.2. Imersão.....	94
4.3.2.1. Imersão I (dosagens recomendadas).....	94
4.3.2.2. Imersão II (dosagens duplas).....	95
4.3.3. Exposição a filme-seco.....	96
4.3.4. Considerações gerais dos resultados dos bioensaios.....	97
5. CONCLUSÕES.....	101
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	103

**BIOLOGIA DE *Euophrys sutrix*
HOLMBERG, 1874 (ARANEAE, SALTICIDAE) E
SUSCETIBILIDADE DA ESPÉCIE A
ACARICIDAS UTILIZADOS NA CITRICULTURA**

Autor: LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA MELO

Orientador: Prof. Dr. OCTÁVIO NAKANO

RESUMO

As aranhas são consideradas importantes predadores de insetos e seus níveis populacionais são utilizados como parâmetros na determinação da seletividade de defensivos aos inimigos naturais das pragas. Entretanto, não tem sido dada atenção às espécies de aranhas envolvidas e às suas características biológicas, que podem influenciar a ação dos pesticidas.

A biologia e a etologia de *Euophrys sutrix* Holmberg, 1874 foi estudada, após a determinação da família Salticidae com a mais abundante em pomares cítricos do Estado de São Paulo. O estudo consistiu de observações do desenvolvimento pós-embrionário da espécie e de sua capacidade reprodutiva. Em adição, conduziram-se testes para determinar a toxicidade de acaricidas a *E. sutrix*.

Estabeleceu-se a criação da espécie a partir de ovos coletados em Jaguariúna, SP. Posteriormente incluíram-se na criação, ninfas capturadas na mesma região.

Ocorreram as fases de pré-larva, larva e ninfa, constatando-se, para esta, um total de 8 ecdises. As aranhas permaneceram inativas durante cerca da metade da fase ninfal que durou 208 dias. A mortalidade ninfal foi 87%, causada principalmente por deficiência nutricional que afetou a ecdise. A fertilidade e longevidade dos adultos também foram afetadas. Cada fêmea fértil depositou 287 ovos, que tiveram 33% de viabilidade. A primeira postura foi a mais viável, originando 66% dos descendentes. O ciclo de vida, desde a emergência até a morte dos adultos, durou 368 dias, enquanto que o período de ovo a ovo, durou 287 dias.

Entre os acaricidas testados, dicofol, óxido de fembutatina e propargite foram inócuos a *E. sutrix*; bifentrim foi o mais tóxico à espécie.

BIOLOGY OF *Euophrys sutrix* (ARANEAE, SALTICIDAE) AND ITS SUSCEPTIBILITY TO ACARICIDES USED IN CITRUS ORCHARDS

Author: LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA MELO

Adviser: Prof. Dr. OCTÁVIO NAKANO

SUMMARY

Spiders are considered important predators of insects, and their population levels constitute important parameters in the determination of the selectivity of pesticides to natural enemies of pests.

The biology and the ethology of *Euophrys sutrix* Holmberg, 1874 was studied in this work. This species belongs to the family Salticidae, the most abundant group of spiders in citrus orchards in the State of São Paulo. The study consisted of observations on the development of the immatures and the reproduction capacity of the selected species. In addition, some tests were also conducted to determine the toxicity of different pesticides to *E. sutrix*.

A colony of *E. sutrix* was initially established with eggs collected in Jaguariuna, State of São Paulo. Later, nymphs were collected in the same region and added to the stock colony.

The first post-embrionic stage was the pre-larva, which was followed by the larva and the nymphal stage which underwent 8 molts. Nymphs passed through quiescent periods which lasted about half the combined duration of the nymphal stage of 208 days. Nymphal mortality was 87%, caused mainly by nutritional deficiency that affected molting. Adult fertility and longevity were also affected. Each fertile female laid 287 eggs, which had a viability of 33%. The first batch of eggs laid was the most viable, producing 66% of the total progeny. The life cycle from egg hatching to death of the adults lasted 368 days, whereas the period from egg to egg lasted 287 days.

Among the pesticides tested, dicofol, fembutatine oxide and propargite showed no detrimental effect to *E. sutrix*; bifenthrin showed the highest toxicity to that species.

1. INTRODUÇÃO

As plantas cítricas dão abrigo a numerosas espécies de artrópodos e, considerando a extensão das plantações, os predadores de pragas existentes na cultura devem exercer papel preponderante na manutenção do equilíbrio populacional de vários dos organismos presentes no agroecossistema.

Os artrópodos predadores de insetos têm sido mais intensivamente estudados nas últimas décadas, tendo WHITCOMB (1981) destacado sua importância como reguladores das populações de insetos.

As aranhas são importantes predadores de insetos, sendo estas suas principais presas (FOELIX, 1982; RIECHERT & LOCKLEY, 1984). Contudo, esses autores consideraram que pequena atenção tem sido dada às aranhas em sua possível utilização no controle de pragas, devido principalmente aos poucos conhecimentos que se tem à respeito da bio-ecologia e etologia desse grupo de predadores.

Em geral, nos trabalhos sobre predadores de pragas, os espécimes de aranhas encontrados são agrupados de acordo com o hábito (p.ex. caçadoras, construtoras de

teias etc.), em famílias e, em alguns casos, os membros da Ordem são considerados sem discriminação (WHITCOMB, 1981).

As aranhas das diversas famílias têm, como os insetos, hábitos e comportamentos muito diferenciados e, segundo WHITCOMB (1981), duas espécies congêneres podem ter até hábitos alimentares diferentes, o que dificulta a investigação quando não se tem um mínimo de informações básicas dessas espécies, como ciclo de vida, habitat, comportamento ou dinâmica populacional.

Em outros países há um relativo conhecimento da toxicidade de defensivos a agrupamentos, a famílias e mesmo a algumas espécies de aranhas (SPECHT & DONDALE, 1960; BOSTANIAN *et alii*, 1984; WHITFORD *et alii*, 1987), que são consideradas de elevada importância na manutenção do baixo nível populacional de pragas nas culturas, quando nestas são utilizados defensivos seletivos (RIECHERT & LOCKLEY, 1984). Mas, mesmo em países desenvolvidos, ainda faltam muitas informações sobre a seletividade específica, tendo WHITFORD *et alii* (1987) considerado que os efeitos de inseticidas sobre espécies ou famílias de aranhas, podem ser completamente diferentes.

A seletividade de inseticidas e de acaricidas a inimigos naturais de pragas vem sendo bastante estudada, tendo sido determinados alguns defensivos que apresentam baixa toxicidade a espécies mais comuns de insetos predadores. Contudo, para aranhas, no Brasil, não há trabalhos sobre toxicidade específica e nem sequer ao nível

de família, sendo que todos os trabalhos conhecidos citam somente toxicidade a aranhas em geral (GUILLEN, 1977; SANTOS et alii, 1978; SALVADORI & GOMEZ, 1978; BELARMINO et alii, 1991; BERTOLDO & CAETANO, 1991; LEONEL JR. et alii, 1991; PAPA et alii, 1991; JOSÉ, 1992, entre outros).

Como os pomares paulistas têm requerido, mais freqüentemente, aplicações de acaricidas para controle principalmente do ácaro-da-falsa-ferrugem e do ácaro-da-leprose (CAETANO, 1980; MOREIRA, 1983), torna-se importante conhecer a atuação desses produtos sobre os artrópodos benéficos, entre eles as aranhas, porém, de maneira menos generalizada.

Desta forma, este trabalho objetivou conhecer a biologia, a partir do desenvolvimento pós-embrionário, e aspectos de comportamento da espécie *Euophrys sutrix* Holmberg, 1874, aranha pertencente à família Salticidae, comumente encontrada em citros. Além disso, procurou-se determinar a toxicidade a esta espécie de aranha, dos acaricidas mais aplicados na cultura, visando a redução do impacto desses produtos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

O gênero *Euophrys* Koch, 1834 é de distribuição mundial, existindo perto de 50 espécies neotropicais descritas e havendo citação de ocorrência de 12 espécies para a Argentina e Chile (GALIANO, 1962). De acordo com a mesma autora¹, o gênero *Euophrys* é o mesmo que *Evophrys*, encontrando-se, na literatura, espécies com as duas designações de gênero.

2.1. Ocorrência e importância das aranhas em culturas

As aranhas são de ocorrência generalizada, destacando-se, no agroecossistema, pela predação de insetos, estes muitas vezes pragas de plantas de interesse econômico.

Nas culturas cujos ambientes são relativamente instáveis pela contínua ação do homem, levantamentos das aranhas têm sido realizados desde 1938, segundo WHITFORD et alii (1987).

¹GALIANO, M.E. (Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia") Correspondência pessoal, 1992.

Em culturas mais estáveis e perenes, como pomares, onde populações de aranhas podem se refugiar mais seguramente, poucos foram os trabalhos encontrados, tendo sido mais estudados pomares de macieiras dos Estados Unidos e Canadá. Em New Jersey, EUA, encontraram-se 34 espécies de aranhas pertencentes a 13 famílias, sendo 6 espécies de Salticidae (SPECHT & DONDALE, 1960); na Virgínia, EUA, de 68 espécies de 15 famílias, 15 foram Salticidae (McCAFFREY & HORSBURGH, 1980) e em Quebec, Canadá, DONDALE et alii (1979) e BOSTANIAN et alii (1984) encontraram, no mínimo, 51 espécies de 11 famílias, sendo 7 espécies de Salticidae.

A espécie estudada, *Euophrys sutrix* Holmberg, 1874 é uma das mais abundantes na Argentina, sendo comum sua ocorrência nas plantas cítricas; em Buenos Aires e seus arredores é também encontrada nos jardins e parques; em regiões agrestes, somente ocorre em refúgios construídos entre os ramos de ninhos de aves (GALIANO¹).

Entre os estudiosos do assunto é indubitável que o complexo de aranhas contribui na manutenção do equilíbrio populacional da entomofauna no ecossistema. Porém, não há um consenso sobre sua eficiência na predação de insetos-pragas, embora alguns autores tenham tentado determinar sua importância, pela qualificação ou quantificação das presas.

WHITFORD et alii (1987) citaram que as aranhas foram observadas alimentando-se de diversas pragas, tais como *Heliothis virescens* (F.), adultos de *Anthonomus*

grandis Boh., *Lygus hesperus* Knight, pulgões, larvas de *Chilo partillus* (Swinhoe) e larvas e adultos de *Ostrinia nubilalis* (Hüb.).

Em cultura de citros em Israel, MANSOUR & WHITCOMB (1986) observaram que em pomares "não perturbados" a população de *Ceroplastes floridensis* Comst. não se desenvolveu suficientemente para causar dano econômico e que as aranhas foram responsáveis pela predação da praga; depois, durante três anos em que as aranhas foram eliminadas, o número de cochonilhas aumentou grandemente. Esses autores levantaram a hipótese de que espécies da família Clubionidae (caçadoras) foram os mais efetivos inimigos naturais da praga; informaram ainda, que na Arábia Saudita duas espécies dessa família foram determinadas como sendo ativas predadoras de ovos e larvas de *Papilio demodeus* L. Na mesma cultura, na Califórnia, CARROL (1980) considerou que os clubionídeos foram provavelmente os mais promissores inimigos naturais das pragas.

A utilização de aranhas como inimigos naturais obteve sucesso na África do Sul, no combate às moscas domésticas em residências; na China, algumas espécies de aranhas foram introduzidas em campos de arroz para controlarem as pragas (NYFFELER & BENZ, 1987).

A predação por salticídeos foi estudada por alguns pesquisadores: WHITCOMB & TADIC (1963) observaram *Phidippus audax* (Hentz), *P. carolinensis* (Peck. & Peck.), *Metaphidippus galathea* (Walck.) e *M. protervus*

(Walck.) alimentando-se de larvas de *Hypantria cunea* (Druri); HORNER (1972) considerou *M. galathea* um agente de controle de *Schizaphis graminum* (Rondani) em sorgo, onde sua ação causou redução na população da praga; Mc DANIEL & STERLING (1982) citaram que *P. audax* a única espécie de Salticidae que se alimentou de ovos de *H. virescens*, obtendo que um indivíduo dessa aranha consumiu, no campo, em média 5,9 ovos da praga, por dia. Uma outra espécie de Salticidae, *Platycryptus undatus* (De Geer), foi detectada por JENNINGS & PASE (1986), predando adultos de *Dendroctomus frontalis* (Zimm.), que é um escolitídeo praga de pinheiros no Texas.

CARROL (1980), observando a preferência alimentar do salticídeo *Thiodina* cf. *T. sylvana* (Hentz), verificou que os primeiros ínstaes alimentaram-se de pequenos dípteros, muito raramente de pequenas vespas, ácaros e tripes, rejeitando pulgões e cochonilhas, e fugindo de formigas; os ínstaes mais superiores alimentaram-se de moscas e pequenas mariposas.

BAILEY & CHADA (1968) em estudo sobre aranhas na cultura de sorgo, realizaram testes alimentares com as espécies mais comuns, obtendo que os salticídeos *Habronatus coronatus* (Hentz), *M. galathea* e *P. audax*, alimentaram-se de larvas e adultos de *Helicoverpa zea* (Bod.) e de adultos de *Contarinia sorghicola* (Coq.) e que, mesmo alimentando-se dos inimigos naturais *Hippodamia convergens* (Guer-Menev.) e *Chrysopa* sp., o complexo de aranhas foi importante no controle das pragas da cultura.

Em relação à predação de insetos inimigos naturais, HOWELL & PIENKOWSKY (1971) determinaram, em teste de alimentação, que o salticídeo *Zygoballus sexpunctatus* (Hentz) não se alimentou de adultos de *Crysopa sp.* ou de *Nabis sp.* e nem de larvas e adultos de *Hippodamia sp.*, enquanto que *P. audax* alimentou-se de todos.

A importância das aranhas na predação de insetos em pastagens, campos de cereais, pomares e florestas, foi discutida por NYFFELER & BENZ (1987), concluindo que, à despeito de vários trabalhos sobre a ação desses artrópodos, a significância das aranhas como agentes de controle natural ainda é bastante desconhecida, não havendo resultado preciso que confirme seu valor no controle biológico de pragas. Acrescentaram ainda, que os testes de preferência alimentar são falhos, pois no laboratório, certas aranhas caçadoras além de consumirem maior número de presas, a composição destas não corresponde à do campo.

Pode-se observar que, apesar do relativo desconhecimento da ação das aranhas no controle biológico, várias pragas de importância econômica são por elas predadas, ocorrendo, contudo, a predação indesejável de insetos que também são inimigos naturais de pragas. Entretanto, como foi visto, pode ocorrer acentuada diferença de predação (ou de preferência alimentar) entre as espécies, podendo inclusive haver algumas espécies em cujo balanço alimentar predominem os insetos pragas.

2.2. Biologia de aranhas

HORNER & STARKS (1972) citaram que o 1º estágio pós-embrionário é subdividido em duas fases: a 1ª que vai da eclosão (saída do córion) até o início do rompimento da membrana vitelina e a 2ª que vai do rompimento da membrana até a 1ª ecdise real.

De acordo com FOELIX (1982), para muitas aranhas, uma pré-larva é que emerge do ovo, sendo que esse "estágio de eclosão" pode diferir em diferentes espécies. Assim, esse autor citou que Vachon² classificou os diferentes estágios, sem considerar quando realmente a aranha eclode: o período larval inicia com a pré-larva (caracterizada principalmente pela imobilidade), que após o rompimento da membrana, passa para outra pré-larva ou para uma larva mais avançada; após a ecdise da larva, surge o 1º estágio completo o qual chamou de ninfa I. Os próximos estágios ninfais (juvenis) diferenciam-se principalmente pelo aumento de tamanho.

No Brasil, as aranhas foram pouco estudadas, não havendo artigos publicados sobre biologia de salticídeos.

Na Venezuela, CRANE (1948) estudou três espécies de salticídeos do gênero *Corythalia*, verificando

²VACHON, M. Contribution à l'étude du développement postembryonnaire des araignées. Première note. Généralités et nomenclature des stades. Bull. Soc. Zool. France, 82: 337, 1957.

que o 1º e 2º ínstaes permaneceram no interior do casulo, não se alimentando. A autora obteve a duração de cada ínstar e observou que as fêmeas tiveram um ínstar a mais, sendo o último ninfal o mais longo; a duração do período ninfal chegou até a 6 meses. Em relação à reprodução, observou que a fêmea não aceitou mais de um macho e que este acasalou-se com várias fêmeas, 2 a 3 dias após sua última ecdise. Observou ainda, terem ocorrido três posturas com 13 a 28 ovos, sendo a primeira a maior delas.

HORNER & STARKS (1972) estudaram *M. galathea* no laboratório a partir de adultos e imaturos coletados no campo, que foram criados à temperatura média de 28°C, UR de 60 a 80% e fotofase de 12 horas, sendo alimentados com larvas e adultos de *Drosophila* e larvas de *H. zea*, de acordo com o ínstar. Obtiveram que o tempo para os indivíduos atingirem a maturidade foi de aproximadamente 180 dias para os machos e 193 dias para as fêmeas, tendo os adultos machos longevidade média de 184 ± 77 dias e as fêmeas de 222 ± 72 dias; as fêmeas foram monógamas e os machos polígamos e o número de ovos colocados por fêmea, por ano, foi em média de 158 em 8,3 ovissacos; o período de incubação foi de 5 a 9 dias e a mortalidade de jovens foi alta (86%) e maior no segundo ínstar.

O período reprodutivo de exemplares de nove espécies de *Phidippus*, mantidos em laboratório sob temperatura de $27 \pm 2^\circ\text{C}$, UR $50 \pm 10\%$ e fotofase de 14 horas, foi estudado por ROACH (1988) na Carolina do Sul (EUA). O autor

observou que a espécie mais comum, *P. audax*, produziu, em média 2,75 ovissacos por fêmea e 64 ovos por ovissaco, com variação de 15 a 164 ovos por ovissaco.

2.3. Bioecologia de aranhas

Os trabalhos que tratam da bioecologia de espécies de aranhas aparecem em outros países e são restritos a poucas espécies de salticídeos.

MERRET (1967), em estudo fenológico de aranhas, utilizando armadilhas-de-solo em área de reserva natural, verificou que fêmeas do salticídeo *Euophrys frontalis* (Walck.) foram mais capturadas; isto provavelmente foi ocasionado pela inversão dos papéis sexuais da espécie, isto é, as fêmeas procuravam pelos machos sedentários. Neste caso, a atividade dos machos desenvolveu-se predominantemente na vegetação, sendo pouco capturados, e a das fêmeas na superfície do solo durante a fase reprodutiva.

O tempo de desenvolvimento de aranhas é mais longo do que da maioria dos insetos. DONDALE (1977) verificou que o salticídeo *M. protervus* e outras espécies de caçadoras, em área de reserva natural, demoraram aproximadamente um ano para atingirem a maturidade e reprodução, havendo bastante influência da temperatura.

A abundância de caçadores é predominantemente de *P. audax*, em cultura de algodão, foi influenciada pela temperatura e umidade, sendo mais

numerosas em ano quente e seco (DEAN et alii, 1982).

A temperatura exerceu papel predominante no comportamento de *Phidippus coccineus*, observando-se que essa espécie, no Estado de Nevada (EUA), permaneceu, durante o inverno, no penúltimo ínstar, no interior de um casulo de hibernação sob pedras, tendo a corte e a cópula ocorrido no final da primavera e início de verão (GARDNER, 1967).

2.4. Toxicidade/seletividade de defensivos a aranhas

De acordo com RIECHERT & LOCKLEY (1984), a colheita, aliada aos tratos culturais e aplicações de defensivos, constituíram-se na maior causa de mortalidade de aranhas. NYFFELER & BENZ (1987) concluíram que esses artrópodos têm grande importância ecológica em pastagens e florestas que não sofrem distúrbios e que, em pomares não tratados, as aranhas foram predadores abundantes.

A toxicidade e seletividade de inseticidas e acaricidas a aranhas têm sido, geralmente, estudadas em relação ao seu complexo (Ordem Araneae). WHITFORD et alii (1987) comentaram que os efeitos sobre espécies ou mesmo famílias podem diferir completamente, como foi o caso de carbaril e fenvalerato, que não afetaram os salticídeos mas sim os espécimes de outra família.

Em pomares de maçã, o manejo de pragas e o uso de inseticidas de largo espectro, foram responsáveis pelo declínio da população de aranhas (DONDALE et alii,

1979; BOSTANIAN et alii, 1984). Esses artrópodos foram os inimigos naturais mais suscetíveis a defensivos, pois em três pomares não tratados havia maior número deles do que em sete tratados, tendo as aranhas caçadoras se constituído no grupo mais afetado (SPECHT & DONDALE, 1960).

Resultados de pesquisas no campo mostraram que as aranhas não foram afetadas por malatim, mas sim por formotim e carbaril (MANSOUR & WHITCOMB, 1986) e provavelmente o endossulfam não teve efeito sobre elas (REICHERT & LOCKLEY, 1984). No Brasil, PAPA et alii (1991) relataram que a população de aranhas em citros não se recompôs após 64 dias das aplicações de fempropatrina e bifentrim, ocorrendo menor efeito tóxico do carbosulfam e dicofol.

A ação específica foi determinada por ROACH (1983) para o salticídeo *P. audax*, obtendo que paratim metil foi de baixa toxicidade, azinfós metil moderadamente tóxico e fenvalerato altamente tóxico. Este último resultado contrariou a afirmação de WHITFORD et alii (1987) para a mesma família.

Os efeitos dos defensivos podem variar para uma mesma espécie, cujas populações habitam diferentes culturas da mesma região ou as mesmas culturas em diferentes regiões, devido à diversificação do manejo de pragas e dos produtos ou ingredientes ativos que são freqüentemente aplicados em cada uma. Em Israel, MANSOUR (1984) testou, em laboratório, populações de uma espécie de clubionídeo

procedente de citros e de algodão, observando que a população originária de citros foi suscetível a clorpirifós sendo porém mais tolerante a malatim (com fator de resistência de 3,3 vezes) do que a procedente de algodão. A seletividade apresentada pelo malatim à população habitante em citros provavelmente ocorreu porque, de acordo com o autor, esse inseticida é muito utilizado na citricultura de seu país.

Uma das táticas para contornar o problema de redução da população de inimigos naturais em culturas é a utilização de defensivos seletivos, tendo Kiritani et alii³, citados por RIECHERT & LOCKLEY (1984), demonstrado que seu uso, aliado à aplicação moderada, controlou cigarrinha-verde em arroz, porque a população de aranhas não foi dizimada pelos defensivos, tendo LASTER & BRAZZEL (1968) observado o mesmo em algodão.

O uso racional de defensivos visando a proteção das aranhas também foi defendido por RIECHERT & LOCKLEY (1984), para que fossem mantidas sua diversidade e densidade, responsáveis pelo efeito benéfico desse predador.

³KIRITANI, K.; KAWAHARA, S.; SASABA, T.; NAKASUJI, F. Quantitative evaluation of predation by spiders on the green rice leafhopper, *Nephotettix cinctipes* Uhler, by a sight-count method. Res. Popul. Ecol. Kyoto Univ., Kyoto, 13: 187-200, 1972.

3. MATERIAL E MÉTODO

Os trabalhos foram divididos em três etapas. Inicialmente determinou-se a família da aranha cujos exemplares eram mais abundantes em cultura citrícola, após o que realizou-se a criação, para o estudo biológico da espécie *Euophrys sutrix*. Posteriormente, com as ninfas originárias da criação, realizaram-se bioensaios para testar sua suscetibilidade a alguns acaricidas, recomendados para a cultura de citros.

3.1. Determinação da família de aranha mais freqüente

A determinação foi feita por intermédio de aranhas conservadas em álcool 70% e provenientes de dois pomares citrícolas do município de Limeira e um de Artur Nogueira, SP, onde realizaram-se levantamentos de inimigos naturais de pragas através de tratamento de choque químico, respectivamente em maio e dezembro de 1990 e em maio de 1991. Esse material foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Octávio Nakano, do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP.

As aranhas coletadas em cada pomar foram agrupadas de acordo com suas principais características,

classificando-se a família mais numerosa, e portanto predominante, sendo esta a escolhida para o estudo.

3.2. Biologia

O estudo biológico da espécie foi realizado a partir de casulo-de-postura (casulo-mãe) coletado em laranjeiras (*Citrus sinensis* Osbeck cv. Valência) de pomar comercial em propriedade localizada no município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, em 16/08/91. O casulo foi levado ao laboratório de Entomologia do Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental (CNPMA) da EMBRAPA, no mesmo município, para o desenvolvimento da criação.

Em outras quatro ocasiões (em 30/12/91; 06, 15 e 28/01/92) foram acrescentados à criação, indivíduos jovens coletados na mesma localidade anterior.

Foram observados: alimentação; comportamento durante o desenvolvimento; tamanho e comprimento do corpo em cada ínstar; crescimento; número de ínstaes e sua duração; ecdises (idade, intervalo, duração); atividade; mortalidade; duração das fases jovens e adulta; acasalamento, corte e cópula; comportamento pré e pós-cópula; reprodução (época de construção de casulos de postura e suas características, duração da oviposição, número de casulos, de ovissacos e de ovos produzidos, tamanhos de casulos-de-postura, de ovissacos e de posturas);

fecundidade e descendência (número de descendentes; época e duração da dispersão).

As designações das formas jovens foram de acordo com a classificação de Vachon², citado por FOELIX (1982), preferindo-se utilizar o termo "jovem" ao invés de "juvenil".

3.2.1. Ambiente de Criação

As aranhas (ninfas) emersas do casulo foram mantidas em recipientes plásticos incolores, confeccionados a partir de garrafas plásticas PET (tereftalato de polietileno) de 2 litros.

Dois tipos de recipientes foram utilizados: um com a metade superior da garrafa (recipiente PET com gargalo) e outro com a metade inferior, sem o fundo (recipiente PET tubular). A influência desses recipientes, na criação, foi observada a partir da fase reprodutiva.

Os recipientes do tipo gargalo tinham cerca de 17 cm de altura, incluindo o gargalo, e diâmetros de 10 cm na base e de 2 cm na "boca" do gargalo. Nos do tipo tubular a altura era de 12 a 13 cm e diâmetro de 10 cm. Ambos os tipos continham um orifício de 13 mm de diâmetro, localizado aproximadamente na metade da altura nos do tipo gargalo e a 2/3 da altura nos do tipo tubular. Na parte de cima, foram vedados com tela de "polyester" e, inferiormente, com placa circular de uma espuma

plastificada, de cor branca, maleável e lavável. O orifício foi vedado com chumaço de algodão hidrófilo, constantemente molhado com água destilada (Figura 1).

Pela base, retirando-se a placa circular, foram realizadas atividades diárias (limpeza das paredes internas, remoção de presas mortas e de excesso de fios de seda, sendo a placa periodicamente trocada para limpeza das excreções impregnadas), de acasalamento e de manipulação dos descendentes.

Pelo orifício foram introduzidas as aranhas e suas presas e o algodão molhado proporcionava água, principalmente para as presas, e uma certa umidade interior, mesmo porque algumas espécies de aranhas são sensíveis à falta de umidade (KASTON & KASTON, 1953).

Das aranhas emergidas, 104 foram utilizadas no estudo. Estas foram distribuídas, inicialmente, em número variável por recipiente PET, ou seja: 19 recipientes contendo uma aranha, 21 contendo duas, 3 contendo três, 6 contendo quatro e 2 recipientes contendo 5 aranhas. Posteriormente, quando as observações se tornaram difíceis, devido à diferenciação no desenvolvimento, as aranhas foram gradativamente separadas, até serem totalmente individualizadas.

As aranhas emergidas permaneceram durante cerca de 3 meses (94 dias) em sala com fotofase de 13 horas, temperatura de $24 \pm 4^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $70 \pm 10\%$. Após esse período, foram passadas para sala climatizada, com

temperatura de $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $70 \pm 10\%$ e fotofase variável, de 11 a 14 horas, conforme a estação do ano que atravessaram. Estes últimos dados foram considerados como predominantes na criação, em decorrência do comprimento do ciclo das aranhas.

Figura 1. Recipientes de criação (recipientes PET) de *Euophrys sutrix* estando à esquerda os tubulares e à direita os "com gargalo".

As aranhas incluídas na criação, em número de 27, foram coletadas em média 148 dias (136 a 164 dias) após a coleta do casulo-mãe e permaneceram individualizadas, no mesmo ambiente já descrito.

3.2.2. Alimentação (Presas)

O alimento constituiu-se de presas vivas, observando-se a preferência alimentar dos instares iniciais, fornecendo-se diversos insetos de pequeno porte, coletados com rede de varredura, ou seja, vaquinhas, dípteros, ortópteros, lepidópteros, cigarrinhas, formigas, *Chrysopa sp.* e *Cycloneda sanguinea* (L.).

As ninfas de 1º e 2º instares, forneceram-se pequenos insetos, notadamente dípteros e cigarrinhas, coletados com rede de varredura. A partir do 3º instar, a alimentação foi exclusivamente de adultos de *Drosophyla sp.*, criados em banana-nanica, oferecendo-se, a cada vez, de 3 a 4 indivíduos por aranha. Esta dieta permaneceu até quando a maioria das aranhas encontrava-se no 7º instar. Depois disso, gradativamente introduziram-se adultos de *Musca domestica* L. (pupas originárias de criação no Departamento de Entomologia da ESALQ) em número de duas por aranha, a cada dois dias. Após cerca de 40 dias (perto do 8º instar), ofereceram-se, juntamente com *Musca*, adultos de *Ceratitis capitata* (Wied.) (pupas originárias de criação no Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA), em número de duas *Ceratitis* e uma *Musca*, por aranha, durante aproximadamente 30 dias, a fim de diversificar a dieta. Após esse período, voltou-se a fornecer somente *Musca*.

Aos descendentes, originários da criação, foram fornecidos somente adultos de *Drosophyla*.

3.2.2.1. Teste de Consumo

Para estabelecer o consumo diário de presas (*Drosophyla* para aranhas de 2^o ínstar e *Musca* para as demais) foram realizados sete testes com aranhas originárias da criação, de diferentes idades ou fases: ninfas de 2^o e de último ínstar; adultos virgens, machos e fêmeas; machos acasalados; fêmeas em fase de pré-oviposição e fêmeas em final de ciclo.

As presas foram fornecidas de forma a manter constante o número de insetos vivos.

a) Ninfas do 2^o ínstar (descendentes)

Esse teste foi realizado em duas etapas, com duração de 8 dias, encerrando-se quando 44,07% e 23,40% das aranhas encontravam-se ativas, respectivamente na 1^a e 2^a etapas.

Na 1^a etapa utilizaram-se 59 aranhas e na segunda 47, sendo divididas em grupos que variavam de 8 a 11 aranhas por recipiente PET.

b) Ninfas do último ínstar

Somente 3 aranhas, individualizadas, foram utilizadas, encerrando-se o teste após 18 dias.

c) Machos e fêmeas virgens

Os dois destes duraram 18 dias, sendo utilizados 4 machos com idade em média de 70 dias (61 a 75 dias) e 3 fêmeas com idade em média de 2 dias (1 a 3 dias).

d) Machos acasalados

Utilizaram-se 11 machos com idade, em média, de 77 dias (19 a 111 dias), após cerca de 50 dias (8 a 86 dias) do acasalamento. Foram realizadas observações durante 18 dias e os dados obtidos foram, em adição, agrupados por faixa etária dos indivíduos e por faixa de período decorrido desde o acasalamento.

e) Fêmeas em fase de pré-ovoposição

Foram testadas 13 fêmeas, com idade, em média, de 51 dias (7 a 92 dias), após cerca de 43 dias (1 a 86 dias) do acasalamento. O teste teve duração de 18 dias, observando-se as mesmas faixas etárias descritas anteriormente.

f) Fêmeas em final de ciclo

Observaram-se 9 fêmeas, cuja média de idade foi de 206 dias (170 a 232 dias), durante 14 dias.

3.2.3. Acasalamento

Para a formação do casal, os recipientes do macho e da fêmea foram abertos pelos fundos, acoplando-os verticalmente, de forma que o recipiente da fêmea ficou superiormente, na posição normal, e do macho inferiormente, na posição invertida, para que este, quando atraído, subisse pelas paredes, encontrando a fêmea.

Os acasalamientos foram realizados procurando-se parrear primeiramente os adultos de mais idade. Não ocorrendo reação favorável de ambos os sexos, foi feita a separação e outro macho foi colocado em contato com a mesma fêmea; persistindo a não ocorrência, a fêmea foi reservada para futuro acasalamento.

Quando ocorreu reação favorável e o macho encaminhou-se para a fêmea, os recipientes foram desacoplados e observou-se todo ritual e corte, até a ocorrência (ou aparente ocorrência) da cópula, cronometrando-se a duração do evento.

Após a aparente cópula (não foi possível observar todas as cópulas), o macho foi separado: fez-se o reacoplamento dos recipientes, de maneira inversa ao acoplamento, ou seja, o recipiente da fêmea ficando inferiormente, para que o macho retornasse, subindo, por si ou forçosamente, para seu recipiente.

Nos casos em que houve dúvida quanto à deposição do esperma, observou-se o poro genital da fêmea e,

confirmando-se a não efetivação, novo acasalamento foi realizado.

Algumas das fêmeas copuladas foram colocadas novamente em contato com machos (com o primeiro e com outros), para verificar a aceitação de nova cópula.

Após a fase de acasalamento, os machos e as fêmeas não fertilizadas continuaram sendo normalmente alimentados até a morte, para determinar sua duração; as fêmeas fertilizadas foram observadas principalmente no tocante à construção das estruturas de postura (casulos-de-postura e ovissacos) e ao comportamento na oviposição e na dispersão dos descendentes. Após isto, as observações prosseguiram até a morte de cada indivíduo.

3.2.4. Estruturas-de-postura, Postura e Descendência

As estruturas de postura, ou sejam, casulos de postura e ovissacos, foram contados e observados internamente, após o encerramento das dispersões e morte da fêmea.

As camadas de seda que envolviam os casulos de postura foram removidas, retirando-os com pinça e colocando-os em placas de Petri contendo álcool 70% (o álcool reduziu a pegajosidade da seda, facilitando o manuseio e, ao mesmo tempo, ocasionou transparência das suas camadas, permitindo visualização do interior). A seguir, os casulos foram classificados quanto à forma plana e seus

tamanhos foram obtidos tomando-se as medidas do comprimento e da maior largura.

Abrindo-se o casulo, por intermédio de pinça e tesoura, retiraram-se de seu interior os ovissacos e/ou os "restos" (exúvias de aranhas, aranhas mortas, restos de ovos, ovos soltos). As aranhas mortas e os ovos foram contados e os ovissacos, distendidos em álcool, foram medidos como anteriormente descrito, medindo-se, também, a área ocupada pelo bloco de ovos (postura inviável).

Os ovissacos foram abertos, puxando-se, ao mesmo tempo, dois de seus lados e expondo a postura (inviável) ou os restos da postura viável, contando-se o número de ovos, de formas larvais (pré-larva e larva) e de ninfas mortas.

Os ovos foram classificados de acordo com o estágio em que se encontravam, caracterizado por coloração diferente e pela presença de uma forma pós-embrionária (pré-larva).

O número de ovos por postura e o total por aranha, foi obtido pelo somatório do número de aranhas emersas, de aranhas mortas e de ovos, presentes nos ovissacos e à sua volta.

Durante todo esse processo, utilizou-se microscópio estereoscópico, com luz incidente sobre fundo preto.

As ninfas descendentes foram observadas quanto ao comportamento de emergência dos casulos e

dispersões, contadas e passadas, em grupo de até 10 indivíduos, para novos recipientes PET. Foram alimentadas com adultos de *Drosophyla sp.*, até o 3º instar e utilizadas em bioensaios ou liberadas no ambiente.

3.3. Bioensaios

Ninfas de 2º e 3º ínstaes foram submetidas ao contato direto ou indireto de alguns acaricidas, comercialmente formulados, registrados e recomendados pela CATI (1991) para aplicação em citricultura, contra ácaro-da-falsa-ferrugem (*Phyllocoptruta oleivora* (Ash.) e ácaro-da-leprose (*Brevipalpus phoenicis* (Geij.)). As dosagens utilizadas basearam-se naquelas indicadas para controle da primeira espécie.

Os ingredientes ativos e respectivos produtos comerciais testados foram: abamectim (Vertimec 18 CE), bifentrim (Talstar 100 CE), cihexatim (Sipcatim 500 SC), dicofol (Kelthane CE), óxido de fembutatina (Partner) e propargite (Omite 720 CE BR).

As testemunhas continham água destilada e as diluições também, adicionando-se ou não, de acordo com o teste, o espalhante-adesivo "Agral" (nonil fenoxi poli(etilenoxi) etanol 200 g/l), na dosagem de 0,1 g i.a por litro de água (0,5 ml p.c./l).

Três tipos de testes foram realizados: (1) caminhamento sobre filme-seco, (2) imersão em emulsão e (3)

exposição a filme-seco, tendo cada um, objetivo específico. No primeiro, procurou-se determinar a toxicidade a ninfas de 2^o e 3^o ínstaes, que simplesmente caminhassem por uma superfície ou área tratada; no segundo, procurou-se verificar se uma rápida imersão na calda, simulando um banho ocorrido durante pulverizações a alto volume, afetaria ninfas de 2^o ínstar e, no terceiro, procurou-se determinar a toxicidade a ninfas de 2^o ínstar mantidas sobre superfície tratada.

Os dados das avaliações de toxicidade aguda (até 24 h) obtidos no segundo e terceiro testes, foram transformados para $\ln x + 0,5$ e submetidos à análise de variância com aplicação de teste F ao nível de 1% de probabilidade. A comparação das médias foi feita pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Os acaricidas testados foram classificados quanto à toxicidade, segundo as recomendações de HASSAN et alii (1987): (1) inócuo, para mortalidade menor que 50%; (2) levemente tóxico, de 50 a 79% de mortalidade; (3) moderadamente tóxico, de 80 a 99% e (4) tóxico, para mortalidade maior que 99%.

3.3.1. Caminhamento sobre filme-seco

Para esse efeito, utilizaram-se tubos de PVC rígido, de cor preta, com diâmetro de 1,9 cm e comprimento de 50 cm, tratados internamente, sendo o método

de aplicação definido por prévios testes de molhamento das paredes internas dos tubos.

A aplicação foi realizada com "pelota" de algodão hidrófilo, molhada na respectiva calda e passada ao longo do tubo.

Realizaram-se sete tratamentos, cada um constituído de um tubo tratado, tendo-se adicionado espalhante-adesivo às caldas. Os tratamentos e respectivas dosagens em g i.a./l e ml de p.c./l de água, foram: (1) abamectim (0,0036; 0,2), (2) bifentrim (0,02;0,2), (3) cihexatim (0,25;0,5), (4) dicofol (0,1424;0,77), (5) óxido de fembutatina (0,4;0,8); (6) propargite (0,72; 1,0) e (7) testemunha (H_2O + espalhante).

Após as aplicações, os tubos foram fixados em um suporte, que foi mantido em posição oblíqua (cerca de 45°), com um dos lados voltado para uma fonte de ventilação em temperatura ambiente de $25^\circ C$, por 30 minutos, para secagem. Isto feito, o suporte foi instalado de modo que os tubos permanecessem na posição vertical e encaixaram-se, em suas extremidades superiores, pequenos recipientes de plástico incolor, com 10 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro, fechados superiormente com tela de "polyester". Estes recipientes tiveram a função de recepção das ninfas que chegaram ao topo dos tubos.

O ensaio foi realizado em duas etapas, sendo a primeira com ninfas de 2^o ínstar e a segunda com ninfas de 3^o ínstar, utilizando 5 ninfas de cada ínstar por

tratamento. As aranhas foram colocadas em frascos de vidro incolor (envoltos com papel alumínio para escurecimento interior), cujas "bocas" foram introduzidas nas extremidades inferiores dos tubos. Após a chegada da maioria das ninfas nos recipientes coletores, estes foram retirados. Verificando-se a não permanência de qualquer ninfa no interior dos tubos, passou-se à segunda etapa.

As ninfas dos recipientes coletores foram passadas para recipientes PET tubulares e mantidas em sala com temperatura de $24 \pm 2^\circ\text{C}$, procedendo-se as avaliações 24, 44 e 50 horas após o início da liberação nos tubos.

3.3.2. Imersão

Dois ensaios foram realizados, constituindo-se o primeiro (Imersão I) de sete tratamentos (os mesmos produtos e dosagens de teste de "Caminhamento") e quatro repetições (Tabela 1), distribuídos inteiramente ao acaso. No segundo ensaio (Imersão II), realizado com seis tratamentos e quatro repetições e método semelhante ao I, excluiu-se o bifentrim e repetiram-se os demais ingredientes ativos testados no primeiro ensaio, mas em dosagens duplas (Tabela 1). O objetivo, foi o de verificar se o grau de toxicidade observado foi devido à dosagem do produto ou, possivelmente, ao seu ingrediente ativo.

Tabela 1. Tratamentos (ingredientes ativos) e dosagens, utilizadas nos bioensaios Imersão I e II.

Tratamentos (i.a.)	Imersão I		Imersão II	
	g i.a./l	ml p.c./l	g i.a./l	ml p.c./l
1. abamectim	0,00360	0,20	0,00720	0,40
2. bifentrim	0,00200	0,20	-	-
3. cihexatim	0,25000	0,50	0,50000	1,00
4. dicofol	0,14245	0,77	0,28490	1,54
5. ox. fembutatina	0,40000	0,80	0,80000	1,60
6. propargite	0,72000	1,00	1,44000	2,00
7. testemunha	-	-	-	-

As caldas, sem espalhante-adesivo, foram colocadas em copos plásticos, onde mergulharam-se gaiolinhas (uma por parcela) confeccionadas a partir de pedaços de tela de "nylon" "mesh" 22 (Figura 2) contendo 2 ninfas de 2º ínstar. Após 5 segundos de imersão, as gaiolinhas foram retiradas das caldas e as ninfas, depois de serem "enxugadas" com fita de papel de filtro, foram passadas para pequenos tubos plásticos de 6 cm de comprimento e 1,9 cm de diâmetro, contendo tela de "polyester" nas duas aberturas.

Figura 2. Gaiolinhas de tela de "nylon" utilizadas no teste de Imersão: (a) com uma face aberta para inserção das ninfas; (b) fechada, pronta para a imersão e (c) recortada em duas laterais para a retirada das aranhas tratadas.

Os tubos plásticos contendo as ninfas tratadas foram colocados em posição horizontal, em um suporte confeccionado para tal fim, de modo a receberem ventilação direta proveniente de fonte externa. O suporte

com os tubos (Figura 3) foi mantido em sala com temperatura de $24\pm 2^{\circ}\text{C}$ por 24 horas, após o que realizou-se a 1ª avaliação de mortalidade.

Os efeitos sub-letais dos tratamentos foram avaliados nas ninfas sobreviventes, sendo estas agrupadas por tratamento, transferidas para recipientes PET tubulares e mantidas em sala climatizada (Temp. $25\pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70\pm 10\%$ e Fotofase 11 h) quando então foram alimentadas com adultos de *Drosophyla sp.*. No primeiro ensaio, as avaliações foram feitas após 24 horas e 4, 6, 10, 13 e 15 dias dos tratamentos e no segundo ensaio, 24, 48, 72 horas; 5, 10, 15 e 18 dias após.

Figura 3. Vista geral do suporte de madeira contendo os tubos plásticos ou de vidro, utilizados nos testes de Imersão e Exposição a filme-seco.

3.3.3. Exposição a filme-seco

Os acaricidas e dosagens do primeiro ensaio foram os mesmos dos testes de "Caminhamento sobre filme-seco" e "Imersão I" e o delineamento foi o de distribuição inteiramente casualizada, com sete tratamentos e cinco repetições.

Cada parcela constituiu-se de tubo de vidro de 7 cm de comprimento e aproximadamente 2,2 cm de diâmetro, fechado em ambas as extremidades com tela de "polyester", com as superfícies internas tratadas e contendo 2 ninfas de 2^o ínstar.

Os tratamentos foram inicialmente feitos nos pedaços de "polyester", pela sua mergulhia nas respectivas caldas, após o que foram colocados a secar, à temperatura ambiente (25°C), sobre armação de tela de "nylon", com ventilação. A seguir, trataram-se as paredes internas dos tubos de vidro: uma das extremidades foi vedada com filme de PVC preso com elástico, entornando-se a calda até 4/5 do volume do tubo; a outra extremidade foi tapada com a palma da mão protegida por filme de PVC e então, revirando-se o tubo, molhou-se sua superfície. Após isto, o tubo foi esvaziado, colocado a escorrer e a secar sob ventilação à temperatura ambiente.

Após a secagem dos tubos, prenderam-se as telas nas extremidades e inseriram-se as aranhas, passando-os para suporte idêntico ao utilizado no teste de Imersão

(Figura 3) e mantidos sob ventilação à temperatura de $24\pm 2^{\circ}\text{C}$.

As avaliações foram realizadas 24, 48, 72 horas; 5, 10 e 15 dias após a introdução das ninfas nos tubos. Após a primeira avaliação (24 horas) as aranhas sobreviventes foram agrupadas por tratamento, transferidas para recipientes PET e mantidas em sala climatizada, recebendo alimentação.

Conhecidos os resultados iniciais desse bioensaio, observou-se a ação residual do bifentrim, utilizando método semelhante ao descrito e realizando dois tratamentos (bifentrim e testemunha) e cinco repetições. Os tubos tratados foram colocados em duas vasilhas plásticas que foram vedadas e mantidas em sala climatizada (nas mesmas condições anteriormente descritas) por período de 13 dias. Transcorrido esse tempo, duas ninfas por parcela foram introduzidas nos tubos e estes colocados em suporte sob ventilação. A avaliação foi feita 20 horas após a introdução das aranhas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Aranhas predominantes em citros

Em Limeira foram coletados, em maio de 1990 (Limeira 1), 375 exemplares de aranha, dos quais 186 eram da família Salticidae e, em dezembro do mesmo ano (Limeira 2), 159 exemplares, sendo 79 salticídeos. Isto correspondeu, respectivamente, à ocorrência de 49,60 e 49,68% de salticídeos (Tabela 2).

Em Artur Nogueira, 160 exemplares foram coletados, sendo 53 salticídeos, determinando uma ocorrência de 33,12% destes. (Tabela 2).

Tabela 2. Ocorrência de salticídeos em Limeira e Artur Nogueira (SP) em 1990 e 1991.

Locais	Nº de exemplares de aranhas		Porcentagem de Salticídeos
	Total	Salticidae	
Limeira 1	375	186	49,60
Limeira 2	159	79	49,68
Artur Nogueira	160	53	33,12
Total	694	318	45,82

Aranhas da família Salticidae foram mais abundantes em Limeira e no total dos dois municípios, cuja ocorrência foi de 45,82% dos exemplares coletados.

Desta forma, a família Salticidae foi a escolhida para o estudo, utilizando-se de uma de suas espécies.

4.2. Desenvolvimento pós-embrionário de *Euophrys sutrix*

Do casulo de postura coletado no campo, ocorreram duas emergências de ninfas durante 17 dias. Na primeira emergência, que durou 11 dias, surgiram 73 ninfas (61 no primeiro dia, 9 do quarto ao sexto dia e 3 no décimo primeiro dia); na segunda, que ocorreu 14 dias após o início da primeira ou três dias após o final desta, emergiram 41 ninfas num período de três dias, sendo 12 no primeiro dia e 29 no terceiro dia, totalizando 114 ninfas.

Observando-se o interior do casulo após a retirada das ninfas emergidas, constatou-se a presença de dois tipos de formas larvais, a maioria morta, designadas como pré-larva e larva por Vachon², citado por FOELIX (1982).

Conseqüentemente, seguindo a classificação de Vachon² e as observações de HORNER & STARKS (1972) para outra espécie de Salticidae, o início do desenvolvimento pós-embrionário de *E. sutrix* pode ser assim esquematizado:

4.2.1. Fase larval

A fase larval iniciou-se com a pré-larva que era uma forma fixa, envolta por uma membrana, não apresentando semelhança com a larva ou a ninfa.

Essa fase desenvolveu-se no interior do casulo, o que impossibilitou a observação do seu desenvolvimento. Contudo, através do material encontrado, presumiu-se ter ocorrido somente uma pré-larva que, após o rompimento da membrana, originou a larva. FOELIX (1982) citou que para algumas espécies de aranhas podem ocorrer duas etapas de pré-larva antes de surgirem as larvas. Entretanto, as características observadas por HORNER & STARKS (1972) para *Metaphidippus galathea* (Walck.) foram bastante semelhantes às observadas para a espécie estudada, isto é, ocorrência de uma pré-larva confinada pela membrana

vitelina, distinguindo-se o cefalotórax com pernas, quelíceras e palpos.

As larvas de *E. sutrix* apresentaram coloração geral clara, com cefalotórax esbranquiçado, olhos frontais pouco definidos e abdome amarelo-claro. Tiveram pernas funcionais e, com raras exceções, permaneceram no interior do casulo. Podem ser consideradas como o primeiro ínstar do estágio jovem, diferenciando-se das ninfas I, principalmente pela pequena mobilidade, por não se alimentarem de presas e por não tecerem. Essas características também foram observadas por CRANE (1948) para *Corythalia* spp.. HORNER & STARKS (1972) obtiveram que as larvas de *M. galathea* moviam-se no interior do ovissaco.

4.2.2. Fase ninfal

Após a ecdise das larvas, no interior do casulo, teve início a fase ninfal. A seguir, ocorreu a emergência das ninfas, não se obtendo dados do tempo decorrido entre esses eventos.

A fase ninfal iniciou-se no 2º ínstar ou 1º ínstar ninfal, designando-se as ninfas desse ínstar como "ninfas I", após o que ocorreu a 2ª ecdise ou 1ª ecdise ninfal originando as "ninfas II" (na descrição dos eventos, utilizaram-se os termos "ínstar ninfal" e "ecdise ninfal").

4.2.2.1. Características e Comportamento geral das ninfas

Na natureza, os salticídeos, ao emergirem do casulo, iniciam a dispersão pelo ambiente. Contudo, no laboratório isto raramente ocorreu, havendo um acúmulo de indivíduos em volta e nas proximidades do casulo.

4.2.2.1.1. Coloração (caracteres)

As ninfas emergentes (ninfas I) apresentaram coloração geral creme-clara, não se distinguindo caracteres no corpo; posteriormente, no mesmo ínstar, o abdome tornou-se ligeiramente esverdeado em alguns indivíduos enquanto que outros apresentavam-no castanho e mais volumoso. Esta última característica foi bastante evidenciada no 2º ínstar ninfal (ninfa II), quando começaram a surgir os caracteres típicos da espécie, na face dorsal do corpo. Nesta época, o abdome esverdeado de algumas das ninfas, passou para alaranjado, nada se concluindo a respeito dessas diferenças.

No 3º ínstar ninfal (ninfa III) os caracteres corpóreos dorsais se ampliaram e sua coloração tornou-se mais acentuada, surgindo, na face dorsal do abdome de muitos dos indivíduos, pequena risca preta-pálida, centro-longitudinal que, nos ínstaes seguintes escureceu e se ampliou para uma faixa que tomou cerca de 1/3 da área do

abdome.

4.2.2.1.2. Casulos-de-abrigo

Logo após a passagem das ninfas emergentes para os recipientes de criação, o que se destacou foi sua agilidade, desde logo caçando as presas, produzindo fios de seda e confeccionando seus casulinhos-de-abrigo.

Pelo fato das ninfas apresentarem a tendência de permanecerem nos pontos mais altos, os abrigos foram construídos nas beiradas do topo dos recipientes. O ângulo formado pelas paredes laterais e pela tela foi utilizado para fixação dos fios, de maneira que os casulinhos localizaram-se na circunferência superior dos recipientes. Entretanto, em instares posteriores algumas das ninfas construíram-no na circunferência inferior, junto ao tampão, constatando-se, porém, que essas ninfas encontravam-se com problemas de locomoção, não conseguindo galgar as paredes dos recipientes para chegarem ao topo. Estes abrigos foram sempre prejudicados, devido à necessidade de se retirar o tampão para realizar limpeza do recipiente.

Nos recipientes tubulares que continham várias ninfas, os abrigos foram, no início, construídos muito próximos, quase juntos e, algumas vezes, sobrepostos, mesmo havendo espaço suficiente para que fossem construídos mais separadamente. Mesmo com essa proximidade, houve convivência harmoniosa, não ocorrendo luta entre os

indivíduos e nem canibalismo (*Corythalia* spp. também não apresentaram canibalismo, segundo CRANE, 1948); quando alguma das ninfas "errava" de abrigo e entrava em outro, a "proprietária" a expulsava e, em não encontrando o seu abrigo, passava a construir outro.

Todos os casulos-de-abrigo tiveram formato tubular até o quinto ou sexto ínstar ninfal, tendo duas aberturas nas extremidades opostas. Porém, algumas das ninfas, a partir do sexto ou sétimo ínstar ninfal, os modificaram, passando a terem formato triangular, com mais uma abertura, afunilada para baixo. Esta nova abertura passou a ser a mais utilizada nas atividades diárias, ficando as duas superiores como "portas de fuga", isto é, quando perturbada, a ninfa escapava por uma das aberturas superiores.

Nos recipientes com gargalo, os abrigos foram construídos no tubo do gargalo que, com o tempo, foi totalmente preenchido com fios de seda, impossibilitando as observações interiores.

4.2.2.2. Presas e Predação (Alimentação)

As ninfas, assim como os adultos, somente atacaram presas móveis, observando-se que, quando a presa fornecida tinha pequena mobilidade, a aranha tardava a detectá-la, dirigindo-se a ela apenas ao perceber algum movimento. KASTON & KASTON (1953) citaram que a aranha é

atraída pelo movimento da presa.

Nos recipientes de criação não ocorreu a atividade de caça, tal qual na natureza, pois as presas encontravam-se confinadas e as aranhas somente esperavam o melhor momento para saltarem sobre as mesmas. O ataque geralmente ocorreu pela retaguarda e, para isto, a aranha circundava vagarosamente a presa até encontrar a posição ideal. Quando a aranha encontrava-se com muita fome, saltava de imediato logo ao perceber a presa, em qualquer posição e por isso, muitas vezes, não conseguia capturá-la. Ao saltar, emitia um fio-de-seda, fixado ao local onde se encontrava, ficando, às vezes, por ele suspensa, impedindo sua queda.

A presa capturada era imediatamente imobilizada e "sugada" no próprio local de captura ou transportada para o abrigo ou proximidades. KASTON & KASTON (1953) citaram que as aranhas ingerem o alimento ou através de perfuração do corpo e injeção de líquido digestivo ou amassando o corpo e regurgitando sobre ele os fluidos digestivos, succionando os tecidos liqüefeitos, deixando somente os elementos quitinosos, não digeríveis. Para a espécie *E. sutrix*, a alimentação ocorreu, notadamente, da primeira forma, pois os cadáveres encontravam-se inteiros após serem abandonados pelas aranhas. Entretanto, foram encontrados alguns totalmente amassados ou destroçados, indicando que não foi uma constante a forma de alimentação da espécie. Esta última maneira de se alimentar, ocorreu, eventualmente, para as ninfas coletadas no campo, quando

encontravam-se com muita fome.

Das presas fornecidas inicialmente, houve boa aceitação de dípteros, cigarrinhas e pequenos ortópteros e lepidópteros, não aceitação de adultos de *Cycloneda sanguinea* e repelência a formigas. Adultos de *Chrysopa sp.* e de *Diabrotica speciosa* (Germar) foram aceitos somente da primeira vez, após o que foram recusados, indicando que reconheciam as presas desfavoráveis.

Os insetos saltadores (cigarrinhas e ortópteros) e os lepidópteros foram descartados para a alimentação das aranhas. Os primeiros por causarem danos nos abrigos e perturbação das ninfas e os segundos por deixarem os recipientes impregnados de escamas.

Ceratitis capitata, apesar de ser bem aceita para alimentação, foi pouco fornecida devido à sua pequena mobilidade e à dificuldade encontrada para sua introdução nos recipientes.

Devido à importância da movimentação da presa na sua captura, sempre que possível manteve-se mais de um inseto nos recipientes, mesmo que o consumo médio diário das aranhas (Tabelas 3 e 4) fosse menor. No caso da introdução de *C. capitata*, a sua predação foi aumentada quando se introduziu, juntamente, um adulto de *M. domestica*, fazendo com que a mosca-do-mediterrâneo se tornasse mais ativa. Quando isto foi realizado, observou-se que as ninfas "criadas no laboratório", deram preferência à mosca-doméstica, enquanto que as ninfas "coletadas no campo"

predaram igualmente as duas espécies. Porém, 25 dias após o início dessa dieta, as "ninfas de campo" passaram a preferir *M. domestica*.

Drosophyla sp. foi muito bem aceita pelas ninfas. HORNER & STARKS (1972) e GONZÁLEZ & ESTÉVEZ (1988) também utilizaram essa dieta em seus estudos com aranhas.

O consumo de *Drosophyla* sp. por ninfas I de *E. sutrix* é apresentada na Tabela 3, onde nota-se que, a cada dia, a predação não foi constante e sim alternada, havendo ninfas que se alimentaram n'um dia, não se alimentando n'outro e ninfas que agiram ao contrário, resultando em coeficiente de variação alto. O consumo médio em seis observações durante período de oito dias, foi de 0,55 mosca/ninfa I/dia, ocorrendo, em média, predação mínima de 0,15 mosca/ninfa I e máxima de 1,15 mosca/ninfa I, em um dos dias do período observado, não se evidenciando aumento de consumo no transcorrer do ínstar.

Por sua vez, *M. domestica*, além de ser muito bem aceita por *E. sutrix*, foi de fácil manipulação. Esta presa também foi utilizada para alimentação de aranhas, por GONZÁLEZ E ESTÉVEZ (1988).

Tabela 3. Consumo médio diário de *Drosophyla* sp., em seis observações durante oito dias, por ninfas I de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Dias Observados	Número de moscas consumidas, por dia, por ninfa		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
1º	$0,31 \pm 0,10$	0,00-0,60	73,21
3º	$0,61 \pm 0,11$	0,30-1,20	60,38
4º	$0,45 \pm 0,11$	0,00-1,10	81,26
6º	$0,61 \pm 0,12$	0,00-1,36	65,01
7º	$0,15 \pm 0,05$	0,00-0,33	85,79
8º	$1,15 \pm 0,30$	0,25-2,00	58,74
1º ao 8º	$0,55 \pm 0,14$	0,15-1,15	63,14

O consumo de mosca-doméstica por aranhas de último instar ninfal, em sete observações durante um período de 18 dias (Tabela 4), foi em média de 0,90 mosca/ninfa/dia, que, guardando-se a proporcionalidade de tamanhos de ninfas e de presas, quase atingiu o dobro de consumo das ninfas I. Tal como para estas, o consumo médio diário flutuou e variou de 0,33 a 1,33 moscas/ninfa, mas o coeficiente de variação foi menor, devido à menor diferença de predação entre os indivíduos, em cada dia. Também neste caso, não ocorreu aumento de consumo no transcorrer do instar.

Tabela 4. Consumo médio diário de *Musca domestica*, em sete observações durante 18 dias, por ninfas de último instar de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Dias Observados	Número de moscas consumidas, por dia, por ninfa		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
1º	$0,33 \pm 0,33$	0,00-1,00	-
3º	$1,17 \pm 0,17$	1,00-1,50	24,74
5º	$1,33 \pm 0,33$	1,00-2,00	43,30
8º	$0,56 \pm 0,11$	0,33-0,67	35,26
11º	$1,00 \pm 0,39$	0,33-1,00	67,00
14º	$0,89 \pm 0,29$	0,33-1,33	57,47
18º	$1,00 \pm 0,25$	0,75-1,25	35,36
1º ao 18º	$0,90 \pm 0,13$	0,33-1,33	38,58

4.2.2.3. Atividade

No desenvolvimento, ocorreram etapas em que, geralmente, as ninfas permaneceram em repouso total nos abrigos, não se alimentando e aguardando a ocorrência da ecdise. Após esta, ficaram ainda algum tempo abrigadas, quando então, saíram do casulo de abrigo para as atividades normais de busca de alimento. Estas etapas foram, respectivamente, designadas como "período inativo" ou "inatividade", "reinício de atividade" e "período ativo" ou "atividade". O período inativo foi subdividido em "inatividade pré" e "inatividade pós" - ecdise e o período ativo correspondeu ao "instar ativo". Desta forma, os

períodos inativo pós-ecdise, ativo e inativo pré-ecdise, nessa ordem, definiram o ínstar propriamente dito. Neste caso, entretanto, como os períodos inativos, no geral, desenvolveram-se no interior do abrigo, considerou-se como de maior importância o ínstar ativo. Isto porque, seria nesta época, na natureza, que as ninfas se encontrariam em atividade predatória e também mais expostas às adversidades do ambiente.

4.2.2.3.1. Período inativo

O primeiro período inativo ninfal provavelmente ocorreu após a ecdise das larvas, no interior do casulo-mãe.

Após a emergência das ninfas (início da atividade) estas tiveram, no máximo, oito períodos inativos ou seja, oito ecdises.

4.2.2.3.1.1. Inatividade pré-ecdise

O período de inatividade que precedeu a ecdise ficou bem definido para todas as ninfas até o 3º ínstar. Após este, algumas não permaneceram totalmente inativas, observando-se que saíam dos abrigos em busca de alimento, retornando em seguida. Supôs-se que isto aconteceu, por não se encontrarem suficientemente nutridas para permanecerem em repouso por período mais longo, até a

ocorrência da ecdise.

O período médio de inatividade pré-ecdise em cada ínstar (Tabela 5) foi aumentando gradualmente, em patamares, tendo sido, do 1º ao 3º ínstar, próximo a 7 dias; no 4º e 5º instares, próximo a 9 dias e, do 6º ao 8º ínstar, cerca de 12 dias, resultando numa média geral de 9,4 dias inativos. Este período superou ao da espécie *M. galathea*, cujas ninfas ficaram inativas por 1 a 2 dias antes da ecdise (HORNER & STARKS, 1972).

Tabela 5. Período médio de inatividade pré-ecdise nos instares ninfais de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^\circ$ C, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

ínstar	Número de dias inativos pré-ecdise		
	Ninfal	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação Coefic.Variação
1º		6,80 $\pm$ 0,29	2-13 36,96
2º		7,30 $\pm$ 0,24	3-17 32,17
3º		6,83 $\pm$ 0,30	1-17 42,84
4º		8,92 $\pm$ 0,48	1-21 46,24
5º		8,90 $\pm$ 0,39	2-16 33,30
6º		11,33 $\pm$ 0,41	7-19 20,26
7º		12,94 $\pm$ 0,61	8-17 19,91
8º		11,83 $\pm$ 1,25	6-18 25,86

Pelo intervalo de variação (Tabela 5), pode-se observar que, até o 5º ínstar, os indivíduos apresentaram, no mínimo, de 1 a 3 dias de inatividade, passando para 6 a 8 dias nos três últimos instares. O

período máximo individual foi menor no 1º ínstar, não existindo grandes variações entre os demais ínstaes.

4.2.2.3.1.2. Ecdise

A ecdise iniciou-se pela separação do cefalotórax e posteriormente houve a liberação das pernas e do abdome. HORNER & STARKS (1972) descreveram o processo da troca-de-pele de *M. galathea*, registrando que o tempo necessário para isto foi de 10 minutos nos primeiros ínstaes e de 20 a 30 min nos últimos.

A primeira ecdise de *E. sutrix* ocorreu, em média, cerca de 18 dias após a emergência das ninfas e a última, 205 dias ou quase 7 meses após (Tabela 6), observando-se que os intervalos das ecdises, em média, foram crescentes, com duração aproximada de 19, 23, 24, 27, 29, 33 e 38 dias, sucessivamente, da primeira para a última ecdise (Tabela 7). Essa característica diferiu da espécie *M. galathea*, estudada por HORNER & STARKS (1972), cujos intervalos de ecdise tiveram duração decrescente.

Tabela 6. Idade média, em dias, desde a emergência das ninfas do casulo-mãe, para ocorrência das ecdises de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11- 14 horas.

Ecdise Ninfal	Idade (dias)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
1a	$18,22 \pm 0,29$	14- 31	15,65
2a	$37,33 \pm 0,44$	24- 55	11,42
3a	$61,35 \pm 0,58$	51- 74	9,44
4a	$86,00 \pm 1,02$	69-123	11,13
5a	$113,76 \pm 1,65$	96-148	11,02
6a	$142,03 \pm 2,06$	123-181	8,59
7a	$176,44 \pm 4,29$	154-216	10,33
8a	$205,14 \pm 5,28$	187-223	6,81

Tabela 7. Duração média, em dias, dos intervalos das ecdises de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Intervalo de Ecdises	Duração (dias)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
1a $\rightarrow$ 2a	$19,53 \pm 0,34$	12-26	14,66
2a $\rightarrow$ 3a	$23,01 \pm 0,53$	14-38	21,92
3a $\rightarrow$ 4a	$24,11 \pm 0,68$	8-47	25,74
4a $\rightarrow$ 5a	$26,64 \pm 0,76$	11-38	21,66
5a $\rightarrow$ 6a	$29,35 \pm 1,20$	21-51	23,84
6a $\rightarrow$ 7a	$33,47 \pm 2,00$	22-49	24,68
7a $\rightarrow$ 8a	$38,14 \pm 4,39$	27-56	30,48

Ocorreram algumas variações, que não foram consideradas nas médias, tanto nas idades para ecdise como

nos seus intervalos, havendo, por exemplo, uma ninfa que teve a 6ª ecdise aos 261 dias, com intervalo de 119 dias da 5ª para 6ª ecdise e outra cuja 7ª ecdise ocorreu aos 260 dias, num intervalo de 79 dias de duração da 6ª para a 7ª ecdise. Nesses dois casos, estas foram as últimas ecdises, quando então os indivíduos tornaram-se adultos machos.

Considerando-se somente as ninfas que chegaram à fase adulta, as médias de idade para ocorrência das ecdises de machos e fêmeas criadas no laboratório (Tabela 8) tiveram pequena diferença entre os sexos, tendo os machos trocado de pele cerca de 4 dias antes das fêmeas, até a 2ª ecdise; da 3ª à 6ª ecdise e, notadamente, da 4ª à 6ª, houve inversão, as fêmeas trocando até 7 dias antes dos machos. Porém, nas duas últimas ecdises as idades praticamente se igualaram. Em relação à duração dos intervalos de ecdise dos sexos ninfais (Tabela 9), observou-se que, no geral, houve diferença para machos e fêmeas, exceto da 1ª para a 2ª e da 4ª para a 5ª ecdise. Entretanto, tal como nas idades para ecdises (Tabela 8), as diferenças médias dos intervalos, observadas para um dos sexos, não foram constantemente maiores ou menores que para o outro, visto que os machos apresentaram maior intervalo de tempo da 2ª à 4ª ecdise e da 5ª para a 6ª ecdise, invertendo-se da 6ª a 8ª ecdise, quando as fêmeas tiveram intervalos de maior duração.

Tabela 8. Idades médias, em dias, para ocorrência das ecdises de ninfas machos (M) e fêmeas (F) de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Ecdise Ninfal	Idade (dias)					
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$		Interv.Variação		Coefic.Variação	
	M	F	M	F	M	F
1ª	17,14 $\pm$ 0,70	21,33 $\pm$ 4,84	15- 20	16- 31	10,88	39,31
2ª	37,37 $\pm$ 0,96	41,00 $\pm$ 4,78	34- 42	34- 55	7,28	23,31
3ª	63,22 $\pm$ 1,98	61,00 $\pm$ 4,81	54- 74	51- 73	9,42	15,78
4ª	90,67 $\pm$ 4,10	83,25 $\pm$ 12,97	76-111	69- 97	13,58	15,58
5ª	119,75 $\pm$ 5,66	113,75 $\pm$ 6,90	101-142	99-126	13,37	12,13
6ª	146,37 $\pm$ 5,53	141,00 $\pm$ 5,45	133-181	126-150	10,68	7,73
7ª	173,14 $\pm$ 4,72	175,00 $\pm$ 10,16	159-191	154-197	12,48	11,61
8ª	205,60 $\pm$ 7,40	204,00 $\pm$ 6,00	187-223	198-223	4,16	6,81

Tabela 9. Duração média, em dias, dos intervalos das ecdises de ninfas machos (M) e fêmeas (F) de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Intervalo de Ecdises	Duração (dias)					
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$		Interv.Variação		Coefic.Variação	
	M	F	M	F	M	F
1ª $\rightarrow$ 2ª	19,57 $\pm$ 1,04	20,33 $\pm$ 1,86	14-22	18-24	14,10	15,81
2ª $\rightarrow$ 3ª	26,25 $\pm$ 2,26	20,00 $\pm$ 2,68	20-38	17-28	24,33	26,77
3ª $\rightarrow$ 4ª	27,44 $\pm$ 2,91	22,25 $\pm$ 2,02	19-44	18-27	31,82	18,12
4ª $\rightarrow$ 5ª	30,37 $\pm$ 2,21	30,50 $\pm$ 1,19	21-38	29-34	20,59	7,80
5ª $\rightarrow$ 6ª	29,14 $\pm$ 2,22	26,50 $\pm$ 2,90	23-40	22-35	20,15	21,90
6ª $\rightarrow$ 7ª	31,71 $\pm$ 2,35	34,75 $\pm$ 5,66	27-39	22-49	19,58	32,59
7ª $\rightarrow$ 8ª	35,00 $\pm$ 4,68	46,00 $\pm$ 10,00	30-53	36-56	29,90	30,74

As durações dos intervalos das últimas ecdises das ninfas coletadas no campo que chegaram à fase adulta (Tabela 10) diferiram daquelas obtidas para as ninfas criadas em laboratório. Em relação a estas, as ninfas de campo apresentaram, da antepenúltima para a penúltima ecdise, intervalo de tempo em média cerca de 8 dias menor e, da penúltima para a última ecdise, perto de 8 dias maior. Entre os sexos das ninfas coletadas no campo, os machos tiveram, em média, da penúltima para a última ecdise, intervalo de duração cerca de 20 dias menor que das fêmeas. As ninfas-macho de laboratório também apresentaram menor tempo que as fêmeas nesse intervalo de ecdises, que foi aproximadamente de 10 dias.

A ecdise constituiu-se de uma etapa crítica na vida de *E. sutrix*, pois foi quando ocorreu a maior mortalidade. Muitas das mortes foram, indiretamente, causadas pela dificuldade ou mesmo impossibilidade de liberação da exúvia e/ou das pernas (isso é discutido com detalhes no item 4.2.2.4).

HORNER & STARKS (1972) também observaram alta mortalidade de *M. galathea* nessa época, citando que esses problemas poderiam advir da liberação prematura de ecdisônio. Contudo, para *E. sutrix* supôs-se que a origem dos problemas foi de ordem nutricional, causada pela dieta (presas) não diversificada. Isto, porque nenhuma das ninfas coletadas no campo morreu, pois elas puderam se alimentar de variadas espécies de presas, até a sua captura.

Tabela 10. Duração média, em dias, dos intervalos das últimas ecdises das ninfas machos e fêmeas de *Euophrys sutrix* coletadas no campo. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Intervalo de Ecdises ^(a)	Duração (dias)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
Antep.→Pen.			
- Macho	$23,67 \pm 4,41$	17-32	32,27
- Fêmea	$25,37 \pm 0,94$	23-31	10,52
- M + F	$24,91 \pm 1,25$	17-32	16,69
Pen.→Últ.			
- Macho	$33,89 \pm 2,72$	25-50	24,08
- Fêmea	$54,20 \pm 3,99$	38-96	28,51
- M + F	$46,58 \pm 3,35$	25-96	35,23

(a) Antep. = antepenúltima
 Pen. = penúltima
 Últ. = última

A morte de ninfas de *E. sutrix* nas ecdises teve início na 3ª, prolongando-se até a 6ª, tendo ocorrido morte de um adulto durante a 8ª ecdise. Do total de ninfas mortas 72,84% ocorreram nas ecdises, sendo 1,23% na 3ª, 22,22% na 4ª, 33,33% na 5ª e 14,81% na 6ª ecdise.

4.2.2.3.1.3. Inatividade pós-ecdise e Período inativo total

Após a ecdise se completar, geralmente as ninfas permaneceram por algum tempo abrigadas, porém durante período mais curto que o observado na inatividade pré-ecdise. Algumas das ninfas emergiram dos abrigos logo após a ecdise e outras ainda neles permaneceram por até 18 dias. Mas, em média, o período inativo pós-ecdise variou de 3,10 a 5,24 dias, resultando numa média geral de 4,01 dias, observando-se também que esse período reduziu-se um pouco após o 6º ínstar (Tabela 11).

Espécies do gênero *Corythalia*, estudadas por CRANE (1948), passaram somente de 1 a pouco mais de 3 dias abrigadas, após as ecdises.

Tabela 11. Período médio de inatividade pós-ecdise nos instares ninfais de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Ínstar	Número de dias inativos pós-ecdise		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coefic. Variação
Ninfal			
2º	$4,34 \pm 0,30$	0-11	51,69
3º	$5,24 \pm 0,32$	1-17	53,32
4º	$4,06 \pm 0,26$	1-17	59,55
5º	$4,94 \pm 0,42$	0-18	71,52
6º	$3,10 \pm 0,27$	1- 7	55,23
7º	$3,14 \pm 0,63$	1-13	91,27
8º	$3,25 \pm 0,46$	1- 7	49,31

O período inativo total, que englobou inatividade pré-ecdise, ecdise e inatividade pós-ecdise, foi levemente maior a partir do entre-ínstares 6º e 7º (Tabela 12), em consequência do aumento do período inativo pré-ecdise nessa época. Em média, o período inativo mínimo foi de 10,73 dias, no entre-ínstares 1º e 2º e o máximo de 15,33 dias, no entre ínstares 7º e 8º, o que resultou em uma média de 12,72 dias inativos entre os ínstares ninfais.

Tabela 12. Período médio de inatividade entre os ínstares de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Entre ínstares	Número de dias inativos		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
1º e 2º	10,73 $\pm$ 0,32	4-18	23,34
2º e 3º	12,51 $\pm$ 0,37	6-22	25,98
3º e 4º	10,93 $\pm$ 0,37	3-23	31,84
4º e 5º	14,00 $\pm$ 0,59	7-27	33,45
5º e 6º	11,85 $\pm$ 0,47	6-18	24,61
6º e 7º	14,81 $\pm$ 0,62	11-23	19,05
7º e 8º	15,33 $\pm$ 1,02	10-23	22,99
8º e 9º ^(a)	15,00 $\pm$ 0,71	13-17	10,54

(a) O 9º ínstar correspondeu ao início da fase adulta.

4.2.2.3.2. Período ativo

As ninfas de *E. sutrix* tiveram, no máximo, 8 ínstares, tendo os machos de 6 a 8 (7 a 8, mais

freqüentemente) e as fêmeas 7 ou 8. CRANE (1948) obteve, através de medição das carapaças, que, em três espécies do gênero *Corythalia*, as ninfas machos apresentaram 6 ínstaes e as fêmeas 7 ínstaes. Na espécie *M. galathea*, as ninfas tiveram até 6 ínstaes, sendo 3 a 6 para machos e 5 ou 6 para fêmeas (HORNER & STARKS, 1972).

Durante o período ativo, as ninfas criadas no laboratório permaneceram quase todo o tempo diurno fora do abrigo. Aquelas coletadas no campo, talvez por não se encontrarem adaptadas às condições laboratoriais, saíam à caça e logo retornavam ao abrigo, geralmente permanecendo próximas à sua saída.

O período ativo médio aumentou gradativamente a partir do 2º instar, passando de 7,53 dias para 19,17 dias no último instar ninfal (Tabela 13). O 1º instar foi exceção, provavelmente devido às manipulações sofridas pelas ninfas na etapa inicial do estudo.

Pela Tabela 13, pode-se ainda observar que do 2º ao 5º instar ocorreram os menores números de dias ativos, que foram 2, 3 e 4 dias, enquanto que do 6º ao 8º instar o período mínimo de atividade foi maior e variou de 7 a 14 dias. O período máximo de dias ativos, foi de 31 dias, no 6º instar, havendo, contudo, algumas exceções, que não foram computadas nas médias, ou seja, uma ninfa com 36 dias ativos no 4º e 6º ínstaes, uma com 53 dias e outra com 70 dias no 7º instar e duas com 37 e 38 dias ativos no 8º instar.

Tabela 13. Período ativo médio dos ínstaras ninfais de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

ínstar Ninfal	Período ativo (dias)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
1 ^o	11,70 $\pm$ 0,26	6-18	23,33
2 ^o	7,53 $\pm$ 0,36	2-15	40,85
3 ^o	10,83 $\pm$ 0,43	2-24	36,84
4 ^o	11,88 $\pm$ 0,53	4-27	37,86
5 ^o	13,10 $\pm$ 0,56	3-23	35,44
6 ^o	13,97 $\pm$ 0,87	7-26	34,80
7 ^o	16,53 $\pm$ 1,67	8-31	41,70
8 ^o	19,17 $\pm$ 1,45	14-25	18,50

Em média, o ínstar ativo (período ativo dos ínstaras ninfais) durou 13,09 dias, totalizando 104,71 dias ativos na fase ninfal.

Considerando os períodos inativos pré e pós-ecdise, a duração total do ínstar foi de 26,5 dias, em média.

4.2.2.3.2.1. Tamanho e Crescimento

No início do 1^o ínstar ativo, as ninfas apresentaram, em média, $1,91 \pm 0,05$ mm de comprimento corporal.

O comprimento médio do corpo ao final de cada ínstar ativo é apresentado na Tabela 14, observando-se

que houve um crescimento de aproximadamente 0,7 mm do 1º ao 2º e do 2º ao 3º ínstar; 1,0 mm do 3º ao 4º e do 4º ao 5º ínstar e de 1,3 mm em média, entre os demais instares, resultando em crescimento médio próximo de 1,1 mm por ínstar ativo. Desde o início do 1º ínstar até o final do último ativo, as ninfas tiveram o comprimento do corpo aumentado de aproximadamente 8,2 mm.

Tabela 14. Comprimento médio do corpo ao final dos instares ativos das ninfas de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Final do ínstar	Comprimento do corpo das ninfas (mm)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coefic. Variação
1º	$2,59 \pm 0,05$	2,1- 3,0	10,07
2º	$3,33 \pm 0,05$	2,6- 4,0	11,35
3º	$4,12 \pm 0,04$	3,0- 5,0	9,76
4º	$5,19 \pm 0,06$	3,7- 6,7	10,87
5º	$6,23 \pm 0,07$	4,8- 7,2	9,51
6º	$7,44 \pm 0,17$	5,6- 9,0	10,81
7º	$8,83 \pm 0,19$	7,5-10,2	9,47
8º	$10,15 \pm 0,19$	9,5-11,0	5,34

Entre os sexos, constatou-se que, em média, as ninfas machos tiveram comprimento do corpo 0,5 mm maior que as ninfas fêmeas (Tabela 15) podendo-se, por isso, considerar que praticamente não houve diferença de tamanho entre os sexos ninfais.

Tabela 15. Comprimento médio do corpo, ao final dos ínstaes ativos de ninfas machos (M) e fêmeas (M) de *Euophrys. sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Final do instar	Comprimento do corpo das ninfas (mm)					
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$		Interv.Variação		Coefic.Variação	
	M	F	M	F	M	F
2º	3,30 $\pm$ 0,20	2,93 $\pm$ 0,28	2,9- 3,8	2,6- 3,5	13,89	16,82
3º	4,31 $\pm$ 0,14	3,87 $\pm$ 0,15	4,0- 5,0	3,5- 4,2	9,52	7,71
4º	5,56 $\pm$ 0,27	5,10 $\pm$ 0,21	4,5- 6,5	4,8- 5,5	13,96	7,07
5º	6,42 $\pm$ 0,15	5,57 $\pm$ 0,30	6,0- 7,2	5,0- 6,0	7,00	9,22
6º	7,70 $\pm$ 0,21	7,50 $\pm$ 0,20	7,0- 9,0	7,0- 8,0	8,29	5,44
7º	9,44 $\pm$ 0,22	8,67 $\pm$ 0,51	8,5-10,2	7,5-10,0	6,70	11,84
8º	10,34 $\pm$ 0,27	9,75 $\pm$ 0,25	9,5-11,0	9,5-10,0	5,75	3,63

O tamanho de ninfas macho e fêmea, coletadas no campo, nos dois últimos ínstaes (Tabela 16), também diferiu muito pouco entre si. Contudo, em geral essas ninfas foram um pouco menores que aquelas criadas no laboratório tendo, em média, respectivamente no penúltimo e último instar ativo, 1,6 e 0,7 mm a menos.

Tabela 16. Comprimento médio do corpo nos últimos instares de ninfas machos e fêmeas de *Euophrys sutrix*, coletadas no campo. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Ínstares	Comprimento do corpo das ninfas (mm)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv.Variação	Coefic.Variação
Penúltimo			
- Macho	$7,30 \pm 0,17$	7,0- 7,6	4,11
- Fêmea	$7,76 \pm 0,19$	7,0- 8,5	6,61
- M + F	$7,62 \pm 0,16$	7,0- 8,5	6,48
Último			
- Macho	$9,23 \pm 0,33$	8,0-10,5	8,74
- Fêmea	$9,43 \pm 0,43$	8,0-11,0	11,23
- M + F	$9,33 \pm 0,26$	8,0-11,0	9,68

4.2.2.4. Mortalidade

Ocorreram problemas na troca de pele que consistiram da não liberação da exúvia e aprisionamento de pernas podendo ter como consequência sua perda total, designada como autotomia das pernas. Segundo FOELIX (1982), a autotomia pode ser praticada não somente durante a ecdise, quando uma extremidade não é liberada, mas também como defesa contra um agressor, sob condições naturais.

Nas ecdises iniciais de *E. sutrix*, a cápsula cefalotorácica se desprende independentemente da liberação do restante da exúvia. Em alguns casos, as ninfas saíram do abrigo com esse resto de exúvia preso ou no

terminal do abdome ou na região das pernas. Neste caso, o esforço para a liberação das pernas, muitas vezes causou a morte da ninfa. Isto também foi observado para *M. galathea* por HORNER & STARKS (1972).

A exúvia presa no terminal do abdome, acabou por se soltar durante o ínstar mas, antes disso, dificultou a alimentação e estressou as ninfas, que geralmente morreram no ínstar seguinte.

Quando o resto de exúvia ficou preso na região das pernas, dificilmente desprende-se sem causar a perda parcial (com dano e não funcional) ou total (amputação) de uma ou mais pernas, ocasionando, no mesmo ínstar, dificuldade de alimentação (captura de presas) e de locomoção.

As pernas perdidas podem ser regeneradas. FOELIX (1982) relatou que a reposição pode ocorrer na próxima ecdise, dependendo da época da amputação, sendo a perna regenerada mais curta que a original e com menor número de pêlos sensoriais, que são lentamente suplementados no decorrer das ecdises.

Para *E. sutrix* a perda de pernas, parcial ou total, foi observada da 4ª ecdise ao 7º ínstar, com regeneração de somente 1 perna amputada ou 3 danificadas, quando os problemas ocorreram até o 5º ínstar, em cerca de 33% dos casos. Os demais casos resultaram, com raras exceções, em morte na ecdise ou no ínstar seguinte. Uma das ninfas, após ter perdido uma perna no 5º ínstar, sobreviveu

até a 8ª ecdise, quando morreu entrando na fase adulta; outra, que teve uma perna amputada no 7º instar, tornou-se adulto com 7 pernas, com vida normal e produzindo descendentes (Tabela 17).

As pernas regeneradas foram mais curtas que as originais e de coloração mais clara, isto devido provavelmente à presença de menor número de pêlos sensoriais, conforme relato de FOELIX (1982).

Tabela 17. Perda de pernas de ninfas de *Euophrys sutrix* nos instares e suas conseqüências. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Número de Ninfas	Número de Pernas Perdidas e Tipo de Perda	Instar da Observação	Conseqüências
1	3; parcial	5º	Regeneração na 5ª ecdise
1	1; total	5º	Regeneração na 5ª ecdise e morte 10 dias após tornar-se adulto ♂
1	3; total	5º	Morte na 5ª ecdise
1	1; total	5º	Morte no 5º instar
1	1; total	5º	Morte na 5ª ecdise
1	2; total	5º	Morte no 6º instar
1	1; total	5º	Morte no 7º instar
1	1; total	5º	Morte na 8ª ecdise (adulto ♂)
1	1; total	6º	Morte na 6ª ecdise
1	1+1; total	6º e 7º	Morte no 8º instar
1	1; total	7º	Morte no 7º instar, após 42 dias
1	3; total	7º	Morte na 7ª ecdise
1	1; total	7º	Morte no 8º instar
1	1; total	7º	Morte na 8ª ecdise (adulto ♂)
1	1; total	7º	(sobreviveu e gerou descendentes)

O restabelecimento das condições gerais das ninfas afetadas foi aparente, pois os problemas por que passaram refletiram na maioria daquelas que chegou à fase adulta. Assim, de 6 sobreviventes (3 machos e 3 fêmeas) que chegaram à fase adulta, 4 foram anormais: um dos machos teve

tamanho muito inferior ao normal, pois tornou-se adulto precocemente (6 ecdises) e outro durou apenas 10 dias; uma das fêmeas foi estéril, tendo inclusive realizado pequena oviposição em local aberto e a outra fêmea não aceitou a corte de diferentes machos em várias tentativas de acasalamento.

A mortalidade de ninfas em relação aos ínstarres (Tabela 18) iniciou-se no 4º, sendo crescente até o 7º ínstar, quando observou-se maior mortalidade (cerca de 47%). A mortalidade acumulada atingiu aproximadamente 87%, ou seja, cerca de 13% das ninfas sobreviveram até o último ínstar.

Tabela 18. Mortalidade e sobrevivência de ninfas de *Euophrys sutrix*, nos ínstarres. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Ínstar	Mortalidade (%)		Sobrevivência (%)
	Por ínstar	Acumulada	
1º	0,00	0,00	100,00
2º	0,00	0,00	100,00
3º	0,00	0,00	100,00
4º	3,12	3,12	96,87
5º	26,09	28,42	71,58
6º	44,12	60,00	40,00
7º	47,37 ^(b)	78,95	21,05 ^(a)
8º	36,84 ^(b)	87,37	12,63 ^(a)

(a) Incluíram-se os adultos

(b) Incluiu-se um adulto que morreu na ecdise.

Para as ninfas de *M. galathea*, espécie estudada por HORNER & STARKS (1972), diferentemente de *E. sutrix*, a mortalidade iniciou-se já a partir do 1º ínstar, quando atingiu o maior índice. Contudo, tanto a maior mortalidade de *M. galathea* como o seu índice final de sobrevivência, foram bastante próximas àsquelas observadas para a espécie em estudo.

4.2.2.5. Período de vida das ninfas

O tempo médio de vida das ninfas de *E. sutrix* que chegaram à fase adulta foi de aproximadamente 208 dias (ou quase 7 meses), sendo que as ninfas machos duraram 14 dias mais que as fêmeas. O tempo mínimo de duração foi de 168 dias e o máximo de 261 dias, ambos para ninfas machos (Tabela 19). As ninfas de *Corythalia* spp. viveram de 5 a 6 meses, tendo os machos menor duração que as fêmeas (CRANE, 1948).

As ninfas que morreram durante a fase, em média viveram 117 dias, com variação de 54 a 216 dias (Tabela 19).

Tabela 19. Duração da fase ninfal de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Parâmetros ^(a)	Tempo de vida das Ninfas (dias)			
	Que Morreram Antes da Fase Adulta	Que Chegaram à Fase Adulta		
		Macho	Fêmea	M + F
$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	117,00 $\pm$ 3,84	212,00 $\pm$ 10,79	198,00 $\pm$ 4,71	207,69 $\pm$ 7,68
IV	54-216	168-261	187-210	168-261
CV	29,32	15,27	4,76	13,32

(a) IV = Intervalo de variação
CV = Coeficiente de variação

Os principais dados biológicos do desenvolvimento ninfal de *E. sutrix* são sumarizados no esquema apresentado a seguir, onde:

Interv. Ecdises = intervalos de tempo, em dias, de cada ecdise;

$E_1 \dots E_8$ = ecdises de 1 a 8;

Números abaixo de E = período inativo, em dias, para cada ecdise;

$I_1 \dots I_8$ = ínstaes ativos 1 a 8;

Números abaixo de I = período ativo, em dias, em cada ínstar;

Dur. Fase = duração, em dias, da fase ninfal.

Tabela 20. Emergência acumulada dos adultos machos e fêmeas de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Dias para Emergência	Número de Adultos (Acumulado)	
	Macho	Fêmea
0	1	0
21	1	1
24	2	1
27	4	1
44	4	2
49	4	3
50	5	3
62	5	4
70	6	4
91	7	4
98	8	4

Das ninfas criadas em laboratório, obtiveram-se 8 machos e 4 fêmeas adultas, enquanto que daquelas que foram coletadas no campo, 9 machos e 15 fêmeas. Isto totalizou 17 machos e 19 fêmeas adultas, resultando em razão sexual e proporção sexual, respectivamente para laboratório, campo e total, de 0,33 ($1\sigma:0,5\varphi$); 0,63 ($1\sigma:1,7\varphi$) e 0,52 ($1\sigma:1,1\varphi$). A espécie *M. galathea*, estudada por HORNER & STARKS (1972), apresentou razão sexual de 0,41 e proporção sexual de $1\sigma:0,7\varphi$. Em consequência desses dados divergentes aliados ao fato de que poucos exemplares adultos foram obtidos, não foi possível determinar a verdadeira razão sexual de *E. sutrix*.

4.2.3.1. Comprimento do corpo

O comprimento do corpo dos adultos "da criação" (Tabela 21), em média foi pouco menor (ca. 0,5 mm) que a média do último instar ninfal, tendo os machos apresentado redução de aproximadamente 0,8 mm e as fêmeas aumento de 0,5 mm. Entre os adultos, as fêmeas foram cerca de 0,7 mm maiores que os machos.

Tabela 21. Comprimento médio do corpo de adultos, machos e fêmeas, originários de ninfas de *Euophrys sutrix*, criadas em laboratório e coletadas no campo. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Adultos Originários de Ninfas	Comprimento (mm)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
De Laboratório			
- Macho	$9,51 \pm 1,44$	8,0-11,1	12,31
- Fêmea	$10,23 \pm 0,03$	10,2-10,3	0,00
- M + F	$9,67 \pm 0,35$	8,0-11,1	10,99
De Campo			
- Macho	$10,68 \pm 0,32$	9,5-11,8	7,36
- Fêmea	$11,62 \pm 0,49$	10,7-13,0	8,41
- M + F	$11,06 \pm 0,30$	9,5-13,0	8,57

Os adultos originários de ninfas coletadas no campo, em média foram 1,7 mm maiores que suas ninfas de último instar, sendo os machos 1,4 mm e as fêmeas 2,3 mm

maiores que os respectivos sexos ninfais. As fêmeas adultas foram 1 mm maiores que os machos e ambos tiveram comprimentos maiores que os adultos "da criação" (Tabela 21). Isto demonstrou que, no laboratório, houve produção de indivíduos subdesenvolvidos, provavelmente devido a problemas nutricionais, como foi anteriormente comentado.

4.2.3.2. Dimorfismo sexual

No último ínstar ninfal pode-se separar os sexos de *E. sutrix*: as ninfas que originaram machos adultos apresentaram as extremidades dos palpos em formato de pequena clava, que foi chamada de "quase-clava" por COMSTOCK (1948).

As principais diferenças entre os sexos surgiram, porém, somente na fase adulta, quando os machos apresentaram coloração geral mais escura e maior pilosidade nas pernas I e II, que as fêmeas. Entretanto, o que mais diferenciou os sexos foi a extremidade do palpo, que se apresentou expandida nos machos (Figura 4). Esta é uma característica generalizada para as aranhas e COMSTOCK (1948) a descreveu e figurou com detalhes para diversas famílias e espécies. O autor citou-a como "bulbo genital", sendo uma estrutura extremamente complexa, utilizada para transferência de sêmen para o poro genital ou epigino da fêmea.

Ventralmente, no abdome, o que se destacou foi a presença do epigino, caracterizando as fêmeas.

Figura 4. Adulto macho de *Euophrys sutrix*, tendo, à frente do cefalotórax, os palpos distendidos e expandidos nos ápices. Aumento de 1,5 x.

4.2.3.3. Consumo de presas

O consumo médio diário de *M. domestica* em diferentes etapas biológicas dos adultos de *E. sutrix*, é apresentado na Tabela 22, juntamente com os dados de consumo médio das ninfas de último ínstar.

Observou-se que o consumo dos machos virgens e dos acasalados foi muito próximo entre si e também das ninfas de último ínstar, sendo inferior ao das fêmeas

virgens e das fêmeas em pré-oviposição.

Tabela 22. Consumo médio diário de *Musca doméstica* por ninfas de último instar e por adultos de *Euophrys sutrix*, em diferentes etapas biológicas. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Parâmetros ^(a)	Número Médio de Moscas Consumidas por dia, por Aranha					
	Ninfa de Último Instar	Adulto				
		Virgem		Acasalado		
		Macho	Fêmea	Macho	Fêmea pré ^(b)	Fêmea pós ^(c)
$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	$0,90 \pm 0,13$	$1,08 \pm 0,10$	$1,70 \pm 0,20$	$0,96 \pm 0,15$	$2,84 \pm 0,43$	$0,43 \pm 0,06$
IV	0,33-1,33	0,50-1,33	1,00-2,56	0,27-1,45	1,42-5,33	0,33-0,67
CV	38,58	25,41	33,10	42,72	43,32	31,16

(a) IV = Intervalo de variação

CV = Coeficiente de variação

(b) Fêmea copulada, em período de pré-oviposição.

(c) Fêmea ao final do ciclo, em período de pós-oviposição.

As fêmeas virgens e as em período de pré-oviposição consumiram, cada uma, por dia, respectivamente cerca de 0,8 e 1,9 moscas a mais que as ninfas, 0,6 e 1,8 a mais que os machos virgens e 0,7 e 1,9 moscas a mais que os machos acasalados. A média de consumo dos adultos totais, excluindo fêmeas em pós-oviposição, foi de 1,65 moscas por aranha por dia.

A idade dos adultos ou o tempo decorrido

da cópula, não teve influência no consumo de presas (Tabelas 23 e 24).

Tabela 23. Consumo médio diário de *Musca domestica* por adultos acasalados de *Euophrys sutrix*, de diferentes faixas etárias. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Macho Acasalado		Fêmea em Pré-oviposição		Fêmea Final do Ciclo	
Faixa Etária (dias)	Consumo (mosca/dia)	Faixa Etária (dias)	Consumo (mosca/dia)	Faixa Etária (dias)	Consumo (mosca/dia)
20-41	0,92	7-12	2,55	170-179	0,31
73-81	1,01	45-52	2,66	203-219	0,49
88-111	1,01	64-92	2,34	232	0,30

Tabela 24. Consumo médio diário de *Musca domestica* por adultos acasalados de *Euophrys sutrix*, em relação à faixa de tempo decorrido da cópula.

Macho Acasalado		Fêmea em Pré-oviposição	
Faixa (dias)	Consumo (mosca/dia)	Faixa (dias)	Consumo (mosca/dia)
8-17	0,97	1-19	2,76
37-48	0,85	37-48	2,50
58-86	1,07	58-86	2,34

4.2.3.4. Reprodução

4.2.3.4.1. Acasalamento e Corte

Os acasalamentos foram realizados, em média, 19 dias após o início da fase adulta. Foram considerados bem sucedidos quando o macho foi atraído e deslocou-se para onde a fêmea se encontrava, seguindo-se a corte.

FOELIX (1982) e ROBINSON (1982) descreveram detalhadamente todo o processo de corte de várias aranhas, inclusive de salticídeos. Embora o primeiro autor tenha incluído a ocorrência de estímulos químicos, ambos deram maior importância aos sinais visuais para início da corte, estes envolvendo movimentos e vibração de corpo, de pernas e de palpos. O segundo autor citou que os "repertórios" de corte podem diferir para cada espécie, podendo estar envolvidos também elementos olfatórios e acústicos.

Para *E. sutrix* observou-se que, provavelmente, estímulos químicos, liberados pelas fêmeas, foram os responsáveis pela atração dos machos. Isto, porque a maioria destes encaminhou-se para o local da fêmea, quando esta se encontrava no interior do abrigo, não havendo, portanto, sua visualização. Entretanto, em alguns poucos casos, o macho não se manifestou, até que a fêmea, saindo do abrigo e movimentando-se, causou o seu interesse,

demonstrando que, para estes casos, a visão foi o elemento mais importante na atração do macho (aqui, fica a indagação do motivo pelo qual a fêmea deixou o seu abrigo, exibindo-se para o macho: haveria também o envolvimento de odores do macho?).

Após a detecção da fêmea, o macho encaminhou-se para ela. FOELIX (1982) citou a ocorrência de movimentos em ziguezague (a que designou de "dança do ziguezague") e balanço do abdome, para cima e para baixo, podendo a fêmea, conforme a espécie, permanecer passiva vigiando o macho, responder a ele vibrando os palpos ou até mesmo imitar o seus movimentos de corte.

Em *E. sutrix* cerca de metade dos machos realizou algo semelhante à "dança do ziguezague", quando o caminhamento foi bastante lento. Os restantes encaminharam-se rapidamente para onde a fêmea se encontrava, não realizando os característicos movimentos de corte, passando logo para a cópula, após o "toque-de-pernas".

O "toque-de-pernas" foi o primeiro contato entre os sexos, quando macho e fêmea tocaram-se simultaneamente pelos tarsos das duas pernas anteriores (pernas I). Contudo, isto aconteceu quando as fêmeas foram receptivas; quando não, a fêmea, além de não corresponder ao toque, permaneceu batendo suas pernas anteriores nas paredes, como que tamborilando, talvez para intimidar o macho.

Após o toque-de-pernas, iniciou-se realmente a corte, ocorrendo geralmente todos os movimentos

anteriormente citados. Entretanto, FOELIX (1982) relatou que o toque de pernas é o último elemento da corte, passando-se, então, para a cópula.

O tempo médio necessário para o macho dar início à escalada das paredes dos recipientes, chegar próximo à fêmea e realizar o toque de pernas é mostrado na Tabela 25. Observou-se que houve grande variabilidade, tendo esses antecedentes da cópula durado de 4 a 33 minutos e em média cerca de 16 minutos. A corte propriamente dita (ocorrência após o toque-de-pernas), durou, em média, cerca de 4 minutos. HORNER & STARKS (1972) obtiveram que a corte de *M. galathea* durou de 2 a 10 minutos.

Tabela 25. Tempo decorrido para os eventos de cópula, desde o acasalamento de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Parâmetros ^(a)	Tempo (min) para:				
	Início do deslocamento do macho	Chegada do macho próximo à fêmea	Ocorrência do Toque de Pernas	Ocorrência da 1ª Cópula	Finalização
$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	$2,83 \pm 0,70$	$6,17 \pm 2,12$	$7,37 \pm 1,43$	$11,87 \pm 2,47$	$23,11 \pm 3,27$
IV	1-5	1-15	2-13	3-24	10-42
CV	60,79	84,21	54,69	58,94	42,42

(a) IV = Intervalo da variação
CV = Coeficiente de variação

4.2.3.4.2. Cópula

A cópula ocorreu externamente ao casulo em cerca de 60% dos casos. O macho subiu pelo cefalotórax da fêmea, ficando com a parte do abdome sobre ele, enquanto que a fêmea girou seu abdome em 90°, para que a região dos palpos do macho atingisse a região de epigino, formando posição próxima à um ípsilon (Y).

Em aranhas, a transferência do esperma é indireta e ocorre por intermédio dos palpos. Montgomery⁴, citado por ROBINSON (1982), descreveu que isso acontece em dois atos: no primeiro, o macho ejeta o sêmen para uma "teia-de-esperma" e em seguida coleta-o com os palpos; mais tarde, durante a cópula, o esperma é novamente "ejaculado", dos palpos para o orifício genital da fêmea. A "teia-de-esperma", de acordo com ROBINSON (1982), pode ser construída, entre outros locais, próxima ao abrigo da fêmea. Entretanto, CRANE (1948) observou que em *Corythalia* spp. não ocorreu "teia-de-esperma".

Para *E. sutrix*, em nenhuma ocasião foi vista a deposição ou a coleta do sêmen. Observou-se que alguns machos, antes de galgarem as fêmeas, e mesmo durante a cópula, movimentaram repetidamente o abdome contra a parede do recipiente ou contra a teia do abrigo da fêmea.

⁴MONTGOMERY, T.H. Studies on the habits of spiders, particularly those of the mating period. *Proc. Acad. Nat. Sci.*, Philadelphia, 55: 59-149, 1903.

Esse movimento abdominal, segundo ROBINSON (1982), pode estimular a ejaculação.

FOELIX (1982) citou que a inserção do palpo na abertura genital da fêmea é consecutiva, isto é, o macho insere um dos palpos, ficando posicionado num dos lados do abdome da fêmea e, depois, troca de lado para inserir o outro palpo. Em *E. sutrix* observou-se esse mesmo comportamento, com exceção de um macho que copulou por três vezes, com duas trocas de lado, e de outro que não trocou de lado. Este último macho, provavelmente utilizou os dois palpos ao mesmo tempo (FOELIX, 1982 citou esta possibilidade) ou um após o outro, considerando-se como tendo ocorrido somente uma cópula.

A primeira cópula (primeiro lado) ocorreu, em média, cerca de 12 minutos após o acasalamento e 4 minutos depois do toque de pernas (Tabela 25), demonstrando que após o toque de pernas houve prosseguimento da corte. Ao todo, isto é, desde a colocação do macho próximo à fêmea até a finalização da última cópula, os eventos duraram de 10 a 42 minutos, e em média 23 minutos (Tabela 25).

O tempo de duração das cópulas foi de 8,5 minutos, sendo que a primeira teve 0,69 min (41 seg) a mais que a segunda (Tabela 26). Essa diferença para maior na 1ª cópula, deveu-se ao longo tempo (11 min) dispendido pelo macho que copulou somente uma vez, tendo os demais machos requerido de 2 a 6 minutos para a 1ª cópula.

Tabela 26. Tempo de duração das cópulas de *Euophrys sutrix*.Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Parâmetros ^(a)	Tempo (min) para as cópulas		
	1a	2a	Total
$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	$4,86 \pm 1,14$	$4,17 \pm 0,48$	$8,50 \pm 0,53$
IV	2-11 ^(b)	3-6	7-11
CV	62,25	28,06	17,79

(a) IV = Intervalo da variação

CV = Coeficiente de variação

(b) O limite superior (11 min) pertenceu ao macho que realizou apenas uma cópula.

Após as cópulas, os machos retiraram-se do local ou foram "enxotados" pelas fêmeas e estas encaminharam-se para o interior de seus abrigos.

As fêmeas copuladas apresentaram o epigino coberto por um tampão, tendo ROBINSON (1982) citado que esse tampão ocorre para diversas espécies de aranhas, não havendo um consenso sobre quem o produz. A função do tampão, segundo o mesmo autor, é de impedir nova cópula. Porém, as fêmeas de *E. sutrix*, já copuladas, não aceitaram a corte de novos machos, repelindo-os "veementemente", não sendo a presença do tampão que impediu nova cópula. Assim, considerou-se que, provavelmente, o tampão tenha a função de impedir que o sêmen depositado no duto espermático escorra para o exterior, visto que a posição da abertura genital da fêmea (na face ventral do abdome) é propícia a isto. As fêmeas

copuladas das espécies *Corythalia* spp. e *M. galathea*, sob hipótese alguma aceitaram nova cópula, mostrando hostilidade aos machos (CRANE, 1948; HORNER & STARKS, 1972). Esses autores observaram que os machos copularam com várias fêmeas virgens, o mesmo tendo-se obtido para a espécie em estudo.

As fêmeas, após a cópula, passaram alguns dias abrigadas, retornando à atividade externa geralmente para se alimentarem, quando então consumiram exagerado número de presas. As fêmeas férteis permaneceram abrigadas, em média, durante 5,2 dias (de 1 a 8 dias), enquanto que as estéreis comportaram-se diferentemente: uma delas permaneceu por 10 dias abrigada, enquanto que outra continuou ativa após a cópula, por 6 dias, passando à inatividade, no abrigo, durante 16 dias.

Decorridos em média 18 dias (7 a 28 dias) da cópula, as fêmeas férteis iniciaram a construção do primeiro casulo-de-postura.

4.2.3.4.3. Casulos-de-postura

Os casulos-de-postura abrigaram não somente ovissacos e ovos, mas também a aranha-mãe. Foram construídos em quatro formatos básicos: ovais, semi-ovais, circulares ou triangulares, predominando o tipo oval. Os três primeiros tipos citados tiveram duas aberturas e os triangulares, duas ou três.

Nos recipientes tubulares, os casulos

foram construídos nas bordas da circunferência superior, junto à tela; naqueles com gargalo, no próprio gargalo.

As dimensões dos casulos (comprimento x maior largura) variaram, tendo de 25 a 50 mm de comprimento (25x24; 50x28) e de 18 a 32 mm de largura (31x18; 40x32), resultando em média de 36x24 mm. CRANE (1948) observou que o casulo de *Corythalia* spp. teve 25x18 mm. O tamanho do casulo de postura é proporcional ao tamanho da fêmea (FOELIX, 1982) e assim, os casulos de *E. sutrix* foram maiores que os de *Corythalia* spp. porque as fêmeas da primeira espécie tiveram comprimento médio de 10,9 mm e as das espécies de *Corythalia*, 6,1 mm, em média.

Os tamanhos (obtidos pela multiplicação das dimensões) dos casulos viáveis (casulos com postura viável) foram maiores que os dos não viáveis, o que reduziu a média total (Tabela 27). Essa diferença provavelmente ocorreu devido a alguma alteração fisiológica sofrida pelas fêmeas estéreis ou não fertilizadas.

Os tipos de recipientes de criação influenciaram os tamanhos dos casulos viáveis e totais, sendo maiores nos recipientes tubulares (Tabela 28). Isto é facilmente explicável, pela maior área disponível para sua construção, nesse tipo de recipiente.

Foram construídos até 5 casulos por fêmea, resultando numa média de aproximadamente 2,7 casulos por fêmea (Tabela 29). As fêmeas férteis elaboraram maior número de casulos nos recipientes com gargalo (Tabela 30), este

fato talvez para compensar o menor tamanho dos casulos, construídos nesses recipientes.

4.2.3.4.4. Ovissacos

O ovissaco ou saco-de-ovos constituiu-se de um invólucro dos ovos, de formato oval ou circular, confeccionado no interior do casulo de postura.

As dimensões dos ovissacos variaram de 9,5 a 29,0 mm de comprimento (9,5x9,5; 29,0x21,0) e de 8,0 a 21,0 mm de largura (13,0x8,0; 29,0x21,0) e tiveram em média perto de 14,0x12,0 mm. Espécies de *Corythalia* spp., de acordo com CRANE (1948), apresentaram ovissacos com 7x9 mm, em média.

Os ovissacos viáveis, que foram da ordem de 29% do total de ovissacos, em média tiveram maior tamanho que os inviáveis (Tabela 27), acompanhando o observado para os casulos-de-postura.

Entre os tipos de recipientes, houve pouca diferença nos tamanhos dos ovissacos viáveis ou totais, percebendo-se que o tamanho do ovissaco não dependeu do tamanho do casulo (Tabela 28), relacionando-se mais com o tamanho da postura.

Cada fêmea produziu, em média, cerca de 6,5 ovissacos, sendo 2,4 em cada casulo-de-postura. Entretanto, a média de ovissacos viáveis foi de 2,1 por fêmea (Tabela 29). Para *M. galathea*, HORNER & STARKS (1972)

observaram a produção de 8,3 ovissacos por fêmea e ROACH (1988) obteve para *P. audax* 2,75 ovissacos por fêmea. Esses autores não relataram o tipo de ovissaco (viável ou não).

Nos recipientes com gargalo foram produzidos um pouco mais de ovissacos que nos tubulares (Tabela 30), não havendo relação entre tamanho e número de ovissacos produzidos ou sejam, ovissacos maiores não implicaram na redução de seu número (Tabelas 28 e 30).

Tabela 27. Tamanho médio das estruturas de postura e das posturas, produzidas por fêmeas viáveis e pelo total de fêmeas de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Estrutura de postura e Postura	Tamanho (mm^2)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
Casulo			
- viável	$950,97 \pm 106,23$	628,8-1400,0	31,60
- total	$896,68 \pm 86,28$	628,8-1401,2	30,43
Ovissaco			
- viável	$230,80 \pm 30,86$	117,0-388,5	37,82
- total	$166,32 \pm 10,49$	117,0-255,6	21,86
Postura			
- total	$41,12 \pm 3,68$	25,7-61,4	28,28

Tabela 28. Tamanho médio das estruturas de postura e das posturas, produzidas por fêmeas viáveis e totais de *Euophrys sutrix* em relação ao tipo do recipiente utilizado, sendo T = tubular e G = com gargalo. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Estrutura de		Tamanho (mm^2)		
postura e				
Postura		$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
Casulo viável	T	1030,80 $\pm$ 148,24	670,0-1400,0	32,20
	G	817,93 $\pm$ 133,21	628,8-1075,0	28,21
Casulo total	T	1021,18 $\pm$ 117,38	696,0-1401,2	28,16
	G	709,92 $\pm$ 44,80	628,8- 834,9	12,62
Ovissaco viável	T	233,47 $\pm$ 51,79	172,0- 388,5	44,37
	G	228,12 $\pm$ 41,92	117,0- 311,7	36,75
Ovissaco total	T	177,70 $\pm$ 16,20	147,8- 255,6	22,33
	G	154,93 $\pm$ 13,05	117,0- 200,2	20,64
Postura total	T	43,26 $\pm$ 5,20	30,8- 61,4	26,89
	G	38,98 $\pm$ 5,61	25,7- 54,1	32,20

Tabela 29. Número de estruturas de postura produzidas por fêmea, número de ovissacos contidos no casulo de postura e número de ovos depositados em cada ovissaco de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Parâmetros	Número de Estruturas por Fêmea			Número de Ovissaco por Casulo Postura	Número de Ovos por Ovissaco
	Casulo de Postura	Ovissaco			
		Viável	Total		
$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	2,69±0,33	2,10±0,28	6,46±0,73	2,40±0,15	49,79±4,97
IV	1-5	1-4	1-9	1-4	25-93
CV	43,91	41,69	40,76	37,32	36,01

Tabela 30. Produção de estruturas de postura e de ovos, por fêmeas viáveis de *Euophrys sutrix*, segundo o tipo do recipiente utilizado, (T = tubular e G = com gargalo. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Estruturas de Postura e Ovos por Recipiente		Número		
		$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
Casulos	T	$2,17 \pm 0,31$	1-3	34,74
	G	$3,00 \pm 0,71$	1-4	47,14
Ovissacos	T	$5,67 \pm 0,95$	2-8	41,26
	G	$6,25 \pm 1,80$	1-9	57,50
Ovos	T	$284,83 \pm 58,32$	50-424	50,15
	G	$291,25 \pm 75,35$	93-459	51,74

4.2.3.4.5. Oviposição

A oviposição, aparentemente, foi realizada aos poucos, pois a fêmea, eventualmente, saía do casulo para se alimentar, retornando pouco depois.

Foi possível determinar a época do início da oviposição para cerca da metade das fêmeas, tendo a primeira postura sido realizada de 14 a 97 dias após a cópula e em média 42 dias após. Como cada ovissaco conteve uma postura, o número de posturas foi equivalente ao número de ovissacos. Contudo, algumas fêmeas, ao final do período reprodutivo, apresentaram ovissacos sem ovos e contendo apenas uma substância amorfa e endurecida.

A postura foi composta de duas ou três camadas de ovos, colados uns aos outros, formando um bloco circular ou levemente oval. As dimensões médias das posturas totais foram de aproximadamente 7,0x6,0 mm, variando de 3,0x2,5 a 11,0x9,0 mm, ocupando cerca de 1/4 da área do ovissaco (Tabela 27). O tamanho da postura não foi influenciado pelo tipo de recipiente utilizado (Tabela 28).

Em cada ovissaco ou postura, havia cerca de 50 ovos (Tabela 29). Na espécie *M. galathea*, a fêmea ovipositou em média 19 ovos por ovissaco, variando de 9 a 31 ovos (HORNER & STARKS, 1972); para *P. audax* a média foi de 64 ovos por ovissaco, com variação de 15 a 164 ovos (ROACH, 1988).

Os tipos de recipientes utilizados não tiveram influência no número de ovos depositados (Tabela 30).

No interior e ao redor dos ovissacos, que foram abertos após a emergência das ninfas, encontraram-se ovos inviáveis, de coloração amarela ou castanha, pré-larvas, larvas e ninfas I, mortas, tanto originários de fêmeas férteis como de "estéreis" (fêmeas que não originaram ninfas I, vivas). Pela contagem desses elementos e adicionando-se o número de ninfas emergentes, obteve-se o total de ovos depositados por fêmea (Tabela 31).

Tabela 31. Número de ovos inviáveis, de jovens mortas no interior do casulo, de larvas emergentes e total de ovos, originários de fêmeas férteis, "estéreis" e totais de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Fêmeas	Parâmetros	Número por Fêmea			
		Ovos Inviáveis	Jovens Mortas	Larvas Emersas	Ovos ⁽¹⁾ Totais
Férteis	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	103,10 $\pm$ 20,18	89,20 $\pm$ 19,88	1,20 $\pm$ 0,55	287,40 $\pm$ 43,48
	IV	3-171	0-166	0-4	50-459
	CV	61,91	70,48	-	47,86
Estéreis	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	310,33 $\pm$ 49,54	56,67 $\pm$ 56,67	2,67 $\pm$ 2,67	369,67 $\pm$ 74,03
	IV	229-400	0-170	0-8	229-480
	CV	27,65	-	-	34,38
Totais	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	150,92 $\pm$ 31,06	81,69 $\pm$ 19,16	1,54 $\pm$ 0,69	306,38 $\pm$ 37,44
	IV	3-400	0-170	0-8	50-480
	CV	74,20	80,57	-	44,07

(1) Total de ovos = ovos inviáveis + jovens mortas + larvas e ninfas emersas.

As fêmeas férteis depositaram, cada uma, uma média de aproximadamente 287 ovos, dos quais 103 (35,87%) foram totalmente inviáveis, 89 (31,04%) originaram jovens que morreram antes da emergência e 1 (0,42%) originou larva emergente, resultando em viabilidade de ovos de 32,67%.

Cada fêmea "estéril" depositou cerca de 369 ovos, número este, maior que o das férteis, sendo que 310 (83,95%) foram totalmente inviáveis e os demais originaram jovens que morreram precocemente. Como consequência, do total de ovos postos por fêmea (ca.306), 76,25% foram inviáveis, ou seja, a viabilidade do total de

ovos foi de 23,57%, esta 9,10% menor que a de fêmeas férteis (Tabela 31).

O número de ovos depositados por fêmea de *E. sutrix*, superou o das espécies *M. galathea* e *P. audax*, cujas oviposições, por fêmea, foram, respectivamente, de 158 e 192 ovos (HORNER & STARKS, 1972; ROACH, 1988), não tendo os autores informado sobre o percentual de viabilidade dos ovos. Entretanto, HORNER & STARKS (1972) observaram haver inviabilidade de ovos na espécie estudada e a discutiram, citando possíveis causas, relatadas por outros autores.

4.2.4. Longevidade

Os adultos provenientes de ninfas criadas em laboratório, apresentaram longevidade média de aproximadamente 161 dias, havendo sobrevivência até o máximo de 182 dias. Os machos foram, em média, cerca de 8 dias mais longevos que as fêmeas e o período máximo de vida adulta (282 dias) foi observado para machos. Todavia houve macho que morreu mais precocemente que a fêmea (Tabela 32).

A longevidade média de adultos originários de ninfas coletadas no campo, foi também pouco maior para machos, porém a máxima longevidade pertenceu a fêmeas. Esses adultos, em média viveram por cerca de 245 dias, período esse bem mais elevado (quase 3 meses a mais) que os adultos provenientes de ninfas criadas em laboratório. As fêmeas mais longevas apresentaram uma diferença, em relação àquelas

de laboratório, de 144 dias a mais (Tabela 32).

Tabela 32. Longevidade dos adultos de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Longevidade dos Adultos, originários	Tempo (dias)		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
Da criação:			
Macho	163,00 $\pm$ 34,21	10-282	55,52
Fêmea	155,33 $\pm$ 33,28	90-199	37,11
M + F	160,70 $\pm$ 24,92	10-282	49,05
De jovens de campo:			
Macho	251,50 $\pm$ 20,09	174-304	19,57
Fêmea	242,50 $\pm$ 22,66	111-343	29,55
M + F	245,50 $\pm$ 15,92	111-343	25,94

Como o alimento fornecido foi o mesmo para todas as aranhas adultas, conclui-se que a dieta (presas) das ninfas criadas em laboratório desde sua emergência, foi nutricionalmente deficiente, influenciando até na longevidade dos adultos.

O ciclo de vida das aranhas, desde a emergência das ninfas até a morte dos adultos, foi de 374,29 $\pm$ 23,74 dias para machos, com variação de 270 a 450 dias; 353,67 $\pm$ 28,47 dias para fêmeas, variando de 300 a 397 dias e, no geral, de 368,10 $\pm$ 18,08 dias e variação de 270 a 450 dias.

4.2.5. Emergência e Dispersão das ninfas

Durante as emergências e dispersões das ninfas descendentes, as fêmeas permaneceram no interior dos casulos, provavelmente cuidando da(s) postura(s).

No geral, ocorreram até quatro dispersões por fêmea, contudo duas foram mais comuns e apenas para uma fêmea houve quatro dispersões.

A primeira dispersão iniciou-se, em média, aos 60 dias da cópula; a segunda 20 dias após a primeira dispersão e a terceira, 12 dias após a segunda (Tabela 33).

Entre o final de uma dispersão e o início de outra, decorreram em média cerca de 7 dias, sendo que cada dispersão durou de 12 a 17 dias (Tabela 33). Entretanto, cerca de 47% das ninfas dispersaram-se num período de 3 dias e 90% estavam dispersas em até 11 dias.

A primeira emergência originou a maioria das ninfas (Tabela 34), ou seja, 65,60% do total, indicando que a primeira postura foi a mais viável. As demais, originaram, respectivamente, 27,37; 6,92 e 0,11% das ninfas.

Tabela 33. Época do início, intervalo e duração das dispersões das ninfas de *Euophrys sutrix*. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Dispersões		Tempo (dias)		
		$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
Início, após as cópulas	1ª	60,00 $\pm$ 2,63	42- 69	13,18
	2ª	80,29 $\pm$ 3,45	63- 91	11,36
	3ª	92,50 $\pm$ 10,50	82-103	16,05
	4ª (a)	92,00	-	-
Intervalo	1ª a 2ª	6,29 $\pm$ 1,15	2- 12	48,35
	2ª a 3ª	8,50 $\pm$ 2,72	1- 13	64,08
Duração	1ª	14,70 $\pm$ 1,32	8- 20	28,33
	2ª	16,86 $\pm$ 2,20	11- 28	34,49
	3ª	12,00 $\pm$ 5,00	7- 17	58,93
	4ª (a)	24,00	-	-

(a) A 4ª dispersão ocorreu somente para uma fêmea.

Cada fêmea fértil produziu de 41 a 179 ninfas, com média de 94, o que resultou em 15 ninfas por ovissaco. Contudo, muitas das posturas não foram viáveis e esse número passou para 45 ninfas por ovissaco viável. Mas, considerando todos os ovissacos produzidos pelo total de fêmeas, teve-se que 11 ninfas emergiram de cada um (Tabela 34). Por isto, pode-se notar que as fêmeas produziram poucos descendentes, em relação ao total de posturas realizadas, mesmo porque, a viabilidade de ovos em relação ao total depositado foi de 23,57% e, em relação ao número depositado pelas fêmeas férteis, foi de 32,68%.

De cada casulo de postura emergiram ao redor de 26 ninfas, havendo casulos que não continham posturas viáveis. Daqueles que as continham, cerca de 37

ninfas emergiram, com uma variação de 17 a 89 ninfas por casulo (Tabela 34).

Os tipos de recipientes utilizados na criação, praticamente não influenciaram o número de descendentes (Tabela 34).

Tabela 34. Número de ninfas emersas de *Euophrys sutrix*, em relação às fêmeas, às emergências, às estruturas de postura e aos tipos de recipientes utilizados. Temp. $25 \pm 1,5^\circ\text{C}$, UR $70 \pm 10\%$ e Fotofase 11-14 horas.

Ninfas Emersas	Número		
	$\bar{x} \pm s(\bar{x})$	Interv. Variação	Coef. Variação
Em relação:			
- ao total de fêmeas	72,23 $\pm$ 16,61	0-179	82,93
- às fêmeas férteis	93,90 $\pm$ 15,88	41-179	53,50
Por emergência:			
- 1ª	61,60 $\pm$ 6,37	38-107	32,68
- 2ª	25,70 $\pm$ 7,88	0- 65	97,01
- 3ª	6,50 $\pm$ 4,91	0- 48	-
- 4ª ^(a)	0,10 $\pm$ 0,10	0- 1	-
Por ovissaco:			
- total	11,18 $\pm$ 1,27	0,0-59,7	-
- de fêmea fértil	15,91 $\pm$ 1,41	0,0-59,7	68,29
- viável de fêmea fértil	44,74 $\pm$ 2,84	20,5-59,7	29,12
Por casulo-de-postura:			
- total	26,38 $\pm$ 4,17	0,0-89,5	91,87
- com ovissaco viável	37,56 $\pm$ 4,20	17,5-89,5	55,90
Por tipo de recipiente:			
- tubular	93,17 $\pm$ 21,77	41-179	57,23
- gargalo	95,00 $\pm$ 26,59	59-174	55,98

(a) A 4ª dispersão ocorreu somente para uma fêmea.

4.3. Bioensaios

4.3.1. Caminhamento sobre filme-seco

O número de ninfas (de 20 e 30 ínstaes) que chegaram ao topo dos tubos tratados, encontra-se na Tabela 35, tendo-se observado que as ninfas restantes não deixaram os recipientes de liberação. O tempo necessário para que as ninfas caminhassem até o topo de cada tubo, não foi influenciado pelos acaricidas (Tabela 35). Por esses resultados, observou-se ainda, que os produtos testados provavelmente não causaram efeito repelente às ninfas.

Nenhum dos acaricidas ocasionou mortalidade às ninfas (Tabela 35) até 50 horas após o início das liberações.

Tabela 35. Número de ninfas de *Euophrys sutrix*, que galgaram os tubos tratados, tempo médio de caminhamento e número de ninfas mortas nos tratamentos. Jaguariúna, SP, 20-22/06/1992.

Tratamentos (i.a.)	Chegada ao Topo dos Tubos		Número de Ninfas Mortas
	Nº de Ninfas	Tempo Médio (min)	
1. abamectim	7	30,0	0
2. bifentrim	8	31,5	0
3. cihexatim	9	54,5	1
4. dicofof	10	39,5	0
5. ox. fembutatina	9	49,5	0
6. propargite	10	49,5	0
7. testemunha	8	54,5	1

4.3.2. Imersão

4.3.2.1. Imersão I (dosagens recomendadas)

Na Tabela 36 encontram-se os resultados do bioensaio, tendo-se obtido que na avaliação de toxicidade aguda (24 h) houve significativa diferença na mortalidade apenas para bifentrim. Este acaricida causou 100% de mortalidade, sendo portanto tóxico ou não seletivo. JOSÉ (1992) considerou esse produto como não seletivo para aranhas e ALINIAZEE & CRANHAM (1980) relataram que os piretróides foram incompatíveis para o manejo de pragas de macieiras.

Abamectim, que foi inócuo na avaliação de 24 horas, passou a levemente tóxico no 6º dia, moderadamente tóxico no 10º dia e tóxico no 13º dia, quando causou mortalidade de 100% das ninfas de 2º ínstar.

Cihexatim permaneceu inócuo até o final das avaliações mesmo tendo, nesta época, ocasionado 25% de mortalidade. Dicofol, óxido de fembutatina e propargite não causaram mortalidade de ninfas, sendo também inócuos. JOSÉ (1992) obteve que dicofol e óxido de fembutatina foram seletivos a aranhas e JEPPSON et alii (1975) obtiveram que propargite foi o produto menos tóxico para o ácaro predador *Amblyseius hibisci* (Chant.). HASSAN et alii (1983) consideraram óxido de fembutatina inofensivo a inimigos naturais, recomendando-o em programas de manejo integrado.

Tabela 36. Mortalidade de ninfas de 2º instar de *Euophrys sutrix*, tratadas por imersão, com acaricidas em dosagens recomendadas para controle de ácaros em citros. Jaguariúna, SP, 09-24/07/1992.

Tratamentos (i.a.)	Mortalidade Acumulada (%), nas Avaliações					
	24 horas ⁽¹⁾	4 dias	6 dias	10 dias	13 dias	15 dias
1. abamectim	25,00 b	25,00	75,00	87,50	100,00	100,00
2. bifentrim	100,00 a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. cihexatim	12,50 b	12,50	12,50	12,50	12,50	25,00
4. dicofol	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ox. fembutatina	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. propargite	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. testemunha	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Porcentagens seguidas pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si (Tukey 5%).

4.3.2.2. Imersão II (dosagens duplas)

Nesse ensaio, a toxicidade aguda de abamectim e cihexatim não diferiram estatisticamente entre si, diferindo dos demais tratamentos. Contudo, em relação às suas toxicidades (escala de HASSAN et alii, 1987), abamectim foi levemente tóxico e cihexatim moderadamente tóxico (Tabela 37).

Ao longo das avaliações, abamectim apresentou mortalidade crescente, atingindo 100%, 72 horas após a mergulhia das ninfas, passando a ser classificado como tóxico ou não seletivo. Para cihexatim a mortalidade ocorrida inicialmente se manteve até o 18º dia, permanecendo como moderadamente tóxico.

Dicofol e óxido de fembutatina foram

inócuos, mesmo em dosagens duplas, apesar de terem causado, respectivamente, 12,5% e 25,0% de mortalidade de ninfas, 48 horas após a mergulhia. Propargite também foi inócuo, não causando a morte de ninfas, até 18 dias.

Tabela 37. Mortalidade de ninfas de 2^o ínstar de *Euophrys sutrix*, tratadas por imersão, com acaricidas em dosagens duas vezes maiores que as recomendadas para controle de ácaros em citros. Jaguariúna, SP, 16/07 - 03/08/1992.

Tratamentos (i.a.)	Mortalidade Acumulada (%), nas Avaliações				
	24 horas ⁽¹⁾	48 horas	72 horas	...	18 dias
1. abamectim	62,50 a	75,00	100,00		100,00
2. cihexatim	87,50 a	87,50	87,50		87,50
3. dicofol	0,00 b	12,50	12,50		12,50
4. ox. fembutatina	12,50 b	25,00	25,00		25,00
5. propargite	0,00 b	0,00	0,00		0,00
6. testemunha	0,00 b	0,00	0,00		0,00

(1) Porcentagens seguidas das mesmas letras não diferem significativamente entre si (Tukey 5%).

4.3.3. Exposição a filme-Seco

O bifentrim diferiu estatisticamente dos demais tratamentos na primeira avaliação, quando ocasionou 100% de mortalidade de ninfas, sendo portanto considerado tóxico. Os demais tratamentos foram inócuos, sendo que abamectim e óxido de fembutatina não causaram mortalidade

até 15 dias após o contato inicial (Tabela 38).

Bifentrim continuou tóxico 13 dias após aplicado, ocorrendo 100% de mortalidade de ninfas, 20 horas depois de sua introdução nos tubos tratados.

Tabela 38. Mortalidade de ninfas de 2º ínstar de *Euophrys sutrix*, submetidas à exposição a filme seco de acaricidas recomendados para controle de ácaros em citros. Jaguariúna, SP, 13-28/08/1992.

Tratamentos (i.a.)	Mortalidade Acumulada(%), nas Avaliações					
	24 horas ⁽¹⁾	48 horas	72 horas	5 dias	10 dias	15 dias
1. abamectim	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. bifentrim	100,00 a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. cihexatim	20,00 b	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4. dicofol	0,00 b	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5. ox. fembutatina	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. propargite	0,00 b	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
7. testemunha	0,00 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Porcentagens seguidas pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si (Tukey 5%).

4.3.4. Considerações gerais dos resultados dos bioensaios

Pelos resultados alcançados com bifentrim no teste de Exposição a Filme-Seco, concluiu-se que não ocorreu mortalidade no teste de Caminhamento sobre Filme-Seco, porque o rápido contato tarsal com a área tratada e seca, não foi suficiente para penetração e conseqüente intoxicação das ninfas.

A seguir, são feitas algumas considerações para cada um dos ingredientes ativos testados.

Abamectim

Considerando-se somente a toxicidade aguda do abamectim para ninfas de *E. sutrix*, esse acaricida seria seletivo por dosagem e por ingrediente ativo, levando em conta os resultados obtidos nos ensaios de Imersão. Da mesma forma esse ingrediente ativo seria considerado como seletivo, se testado somente pelo método de Exposição a Filme-Seco quando, além de ter sido inócuo às ninfas, não apresentou efeito subletal.

Porém, nos ensaios de Imersão, observou-se que as ninfas sobreviventes apresentaram comportamento que diferia da Testemunha: mostravam-se relativamente lentas, não se alimentando e permanecendo por longos períodos na base do recipiente, não subindo pelas paredes, indicando intoxicação. Tanto que, no primeiro ensaio de Imersão, houve aumento da mortalidade após quatro dias, atingindo 100% aos 13 dias.

Por esse efeito retardado, o abamectim foi considerado tóxico e portanto não seletivo a aranhas de 2º ínstar, que tivessem seus corpos diretamente atingidos pelas gotas pulverizadas, contendo o ingrediente ativo. Essa ação do abamectim ficou clara, quando, no teste de Exposição a Filme-Seco, não ocorreu morte e nem intoxicação das ninfas.

Supoz-se que aquela intoxicação, observada no teste de Imersão, ocorreu via espiráculo ou via ingestão, esta possivelmente através das peças bucais, que se contaminaram durante o processo de limpeza das pernas anteriores das ninfas. ROACH & MOORE (1988) discutiram a ação de ingestão do abamectim, quando obtiveram que 83% das aranhas da espécie *P. audax*, alimentadas com larvas de *Helicoverpa zea* (Boddie) criadas em dietas contendo 10 ppm de abamectim, ficaram entorpecidas ou moribundas num período de 48 horas.

Bifentrim

O bifentrim foi tóxico, tanto por via direta como indireta, podendo-se considerá-lo como não seletivo a ninfas de 2^o ínstar de *E. sutrix*. Além disso, sua atividade tóxica prolongou-se, em laboratório, por no mínimo 13 dias após aplicado.

Cihexatim

Haja visto os resultados de mortalidade de ninfas nos ensaios de Imersão I e Exposição a Filme-Seco, esse acaricida poderia se considerado como inócuo e portanto seletivo por dosagem. Porém, as aranhas que receberam esse tratamento, apresentaram alteração de comportamento, ficando mais vagarosas durante o espaço de 24 horas após o contato. Embora as ninfas tenham se recuperado posteriormente, esse

efeito poderia, no campo, resultar em fracasso tanto na captura de presas como na fuga de hostilidades, já que a espécie, por ser caçadora e saltadora, depende extremamente de sua agilidade para a sobrevivência. Levando isso em conta, desconsiderou-se a seletividade do cihexatim a ninfas de 2º ínstar de *E. sutrix*.

Dicofol, Óxido de Fembutatina e Propargite

Esses ingredientes ativos foram inócuos às ninfas de *E. sutrix* em todos os testes, não apresentando efeitos colaterais, sendo portanto considerados seletivos.

5. CONCLUSÕES

- As ninfas apresentam no máximo 8 instares, durante 208 dias, passando metade desse tempo em atividade; os adultos têm longevidade de 161 dias e o ciclo biológico é de 287 dias;

- A viabilidade de ovos das fêmeas férteis é de 33%, originando 94 ninfas I, por fêmea;

- A mortalidade ninfal é de 87%, causada principalmente por insucessos nas ecdises;

- A dieta das ninfas, predominantemente de *Drosophyla* sp., não é nutricionalmente adequada, influenciando a sua sobrevivência e o tamanho, a fertilidade e a longevidade dos adultos;

- Bifentrim é o mais tóxico dos produtos testados para ninfas de segundo instar, tanto por contato direto, como indireto;

- Abamectim é tóxico por contato direto e inócuo por contato indireto;

- Cihexatim é tóxico, porque causa alteração no comportamento das ninfas;

- Dicofol, óxido de fembutatina e propargite são inócuos;

- O longo ciclo de vida da espécie torna-a mais suscetível à ação dos acaricidas não seletivos utilizados em citricultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALINIAZZE, N.T. & CRANHAM, J.E. Effect of four synthetic pyrethroids on a predatory mite, *Typhlodromus pyri* and its prey, *Panonychus ulmi* on apples in Southeast England. *Environ. Entomol.* Lanham, 9(4): 436-9, 1980.
- BAILEY, C.L. & CHADA. H.L. Spider population in grains sorghums. *Ann. Entomol. Soc. Am.*, College Park, 61(3): 567-71, 1968.
- BELARMINO, L.C.; MORAES, R.R.; LEONEL Jr., F.L. Reduções nas populações naturais de predadores e trichogramatídeos em soja por inseticidas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13., Recife, 1991. **Resumos.** Recife, SEB, 1991. v.1, p.321.
- BERTOLDO, N.G. & CAETANO, W. Impacto de diferentes inseticidas sobre a entomofauna benéfica em soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13., Recife, 1991. **Resumos.** Recife, SEB, 1991. v.1, p.304.

- BOSTANIAN, N.J.; DONDALE, C.D.; BINNS, M.R.; PITRE, D.
Effects of pesticide use on spiders (Araneae) in Quebec apple orchards. *Can. Entomol.*, Ottawa, 116(5): 663-75, 1984.
- CAETANO, A.A. Tratamento fitossanitário do pomar cítrico.
In: RODRIGUEZ, O. & VIÉGAS, F. *Citricultura brasileira*.
Campinas, Fundação Cargill, 1980. v.2, p.623-41.
- CARROL, D.P. Biological notes on the spiders of some citrus groves in central and southern California. *Entomol. News*, Philadelphia, 91(5): 147-54, 1980.
- CATI. Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.
Comissão de Avaliação de Defensivos para uso em citricultura. *Citros: Recomendações para o controle das principais pragas e doenças em pomares do Estado de São Paulo*. 4.ed. Campinas, 1991. 55p. (Boletim Técnico, 165).
- COMSTOCK, J.H. *The spider book*. Ithaca, Comstock Publishing Company, 1948. 729p.
- CRANE, J. Comparative biology os salticid spiders at Rancho Grande, Venezuela. Pt.1. Systematics and life histories in *Corythalia*. *Zoologica*, Stuttgart, 33: 1-38, 1948.

- DEAN, D.A.; STERLING, W.L.; HORNER, N.V. Spiders in eastern Texas cotton fields. *J. Arachnol.*, New York, **10**: 251-60, 1982.
- DONDALE, C.D. Life histories and distribution patterns of hunting spiders (Araneida) in an Ontario meadow. *J. Arachnol.*, New York, **4**: 73-93, 1977.
- DONDALE, C.D.; PARENT, B.; PITRE, D. A 6-year study of spiders (Araneae) in a Quebec apple orchard. *Can. Entomol.*, Ottawa, **111**(3): 377-80, 1979.
- FOELIX, R.F. **Biology of spiders.** Cambridge, Harvard University Press, 1982. 306p.
- GALIANO, M.E. Nota sobre el género *Evophrys* Koch, 1834 (Araneae, Salticidae). *Physis*, Buenos Aires, **23**(65): 169-83, 1962.
- GARDNER, B.T. The life cycle of the spider, *Phidippus coccineus* (Salticidae) under laboratory conditions. *Psyche*, Cambridge, **74**: 104-6, 1967.
- GONZÁLEZ, A. & ESTÉVEZ, A.L. Estudio del desarrollo postembrionario y estadísticos vitales de *Theridion rufipes* Lucas, 1846 (Araneae, Theridiidae). *Rev. Bras. Ent.*, São Paulo, **32**(3/4): 499-506, 1988.

- GUILLEN, E.E.A. Efeito de inseticidas sobre as pragas da soja e seus predadores. Curitiba, 1977. 133p. (Mestrado - Universidade Federal do Paraná).
- HASSAN, S.A.; BIGLER, F.; BOGENSCHÜTZ, H.; BROWN, J.U.; FIRTH, S.I.; HUAND, P.; LEDIEU, M.S.; NATON, E.; OOMEN, P.A.; OVERMEER, W.P.J.; RIECHMANN, W.; SAMSOE PETERSEN, L.; VIGGIANI, G.; VANZON, A.Q. Results of the second joint pesticide testing programme by the IOBC/WPRS - Working Group "Pesticides and Beneficial Arthropods". *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, Hamburg, **95**: 151-8, 1983.
- HASSAN, S.A.; ALBERT, R.; BIGLER, F.; BLAISINGER, P.; BOGENSCHÜTZ, H.; BOLLER, E.; BRUN, J.; CHIVERTON, P.; EDWARDS, P.; ENGLERT, W.D.; HUANG, P.; INGLESFIELD, C.; NATON, E.; OOMEN, P.A.; OVERMEER, W.P.J.; RIECKMANN, W.; SAMSOE-PETERSEN, L.; STAUBLI, A.; TUSET, J.J.; VIGGIANI, G.; VANWETSWINKEL, G. Results of the third joint pesticide testing programme by the IOBC/WPRS - working Group "Pesticides and Beneficial Organisms". *J. Appl. Entomol.*, Hamburg, **103**: 92-107, 1987.
- HORNER, N.V. *Metaphidippus galathea* as a possible biological control agent. *J. Kansas Entomol. Soc.*, Lawrence, **45**(3): 324-7, 1972.

- HORNER, N.V. & STARKS, K.J. Bionomics of the jumping spider *Metaphidippus galathea*. *Ann. Entomol. Soc. Am.*, College Park, 65(3): 602-7, 1972.
- HOWELL, J.O. & PIENKOWSKI, R.L. Spider populations in alfafa, with notes on spider prey and effect of harvest. *J. Econon. Entom.*, College Park, 64(1): 163-8, 1971.
- JENNINGS, D.T. & PASE, H.A. Spiders preying on *Dendroctonus frontalis* (Coleoptera: Scolytidae). *Entomol. News*, Philadelphia, 97(5): 227-9, 1986.
- JEPPSON, L.R.; McMURTHY, J.A.; MEAD, D.W.; JESSER, M.J.; JOHNSON, H.G. Toxicity of citrus pesticides to some predaceous phytoseiid mites. *J. Econ. Entomol.*, Lanhan, 68(5): 707-10, 1975.
- JOSÉ, L.A.A. Seletividade de piretróides acaricidas a inimigos naturais de pragas de citros. Piracicaba, 1992. 104p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP).
- KASTON, B.J. & KASTON, E. How to know the spiders. s.l., H.E. Jaques, 1953. 219p.

LASTER, M.L. & BRAZZEL, J.R. A comparison of predator populations in cotton under different control programs in Mississippi. *J. Econ. Entomol.*, College Park, 61(3): 714-9, 1968.

LEONEL Jr., F.L.; ALMEIDA, T.O.M. de; SCHROTER, R.A.; PEREZ, C.A. Resultados de experimentos visando estudar o impacto do inseticida Tifon 250 SC sobre o complexo de predadores da soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13., Recife, 1991. *Resumos*. Recife, SEB, 1991. v.1, p.320.

MANSOUR, F. A malathion-tolerant strain of the spider *Chiracanthium mildei* and its response to chlorpyrifos. *Phitoparasitica*, Bet Dagan, 12 (3-4): 163-6, 1984.

MANSOUR, F. & WHITCOMB, W.H. The spiders of a citrus grove in Israel and their role as biocontrol agents of *Ceroplastes floridensis* (Homoptera : Coccidae) *Entomophaga*, Paris, 31(3): 269-76, 1986.

McCAFFREY, J.P. & HORSBURGH, R.L. The spider fauna of apple trees in central Virginia. *Environ. Entomol.*, College Park, 9(2): 247-52, 1980.

- McDANIEL, S.G. & STERLING, W.L. Predation of *Heliothis virescens* (F.) eggs on cotton in east Texas. *Environ. Entomol.*, College Park, 11 (1): 60-6, 1982.
- MERRET, P. The phenology of spiders on heathland in Dorset. I. Families Atypidae, Dysderidae, Gnaphosidae, Clubionidae, Thomisidae and Salticidae. *J. Anim. Ecol.*, Oxford, 36: 363-74, 1967.
- MOREIRA, C.S. Panorama geral da citricultura no Brasil, In: MOREIRA, C.S.; MALAVOLTA, E.; RODRIGUEZ, O.; SANCHES, A.C.; KOO, R.C.J. **Nutrição mineral e adubação dos citros**. 4.ed. Piracicaba, Instituto da Potassa, 1983. p.1-12 (Boletim Técnico, 5).
- NYFFELER, M. & BENZ, G. Spiders in natural pest control: a review. *J. Appl. Entomol.*, Hamburg, 103: 331-9, 1987.
- PAPA, G.; SANTOS, M.C.; NAKANO, O. Ação de alguns acaricidas sobre os inimigos naturais presentes em pomar de citros. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13., Recife, 1991. **Resumos**. Recife, SEB. 1991. v.1, p.306.
- RIECHERT, S.E. & LOCKLEY, T. Spiders as biological control agents. *Ann. Rev. Entomol.*, Palo Alto, 29: 299-320, 1984.

- ROACH, S.H. Susceptibility of *Oxyopes salticus* Hentz and *Phidippus audax* Hentz (Araneae : Oxyopidae, Salticidae) to fenvalerate, azinphos methyl, and methyl parathion. *J. Georgia Entomol. Soc.*, Tifton, 18(3): 326., 1983.
- ROACH, S.H. Reproductive periods of *Phidippus* species (Araneae, Salticidae) in South Carolina. *J. Arachnol.*, 16: 95-101, 1988.
- ROACH, S.H. & MOORE, R.F. Effects of abamectin on *Phidippus audax* (Hentz) (Araneae : Salticidae) when ingested from prey. *J. Entomol. Sci.*, 23(2): 112-6, 1988.
- ROBINSON, M.H. Courtship and mating behavior in spiders. *Ann. Rev. Entomol.*, 27: 1-20, 1982.
- SALVADORI, J.R. & GOMEZ, S.A. Abundância estacional de insetos pragas da soja e seus inimigos naturais em Dourados, MS. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 1., Londrina, 1978. *Anais.* Londrina, EMBRAPA-CNPSO, 1978. p.17-50.
- SANTOS, B.B.; FOERSTER, L.A.; SMITH, J.G. Ocorrência estacional de insetos-pragas da soja e seus predadores no centro sul do Paraná. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 1., Londrina, 1978. *Anais.* Londrina, EMBRAPA-CNPSO, 1978. p.29-38.

SPECHT, H.B. & DONDALE, C.D. Spider population in New Jersey apple orchards. *J. Econ. Entomol.*, College Park, 53(5): 810-7, 1960.

WHITCOMB, W.H. & TADIC, M. Araneida as predators of the fall webworm. *J. Kansas Entomol. Soc.*, Lawrence, 36(3): 186-90, 1963.

WHITCOMB, W.H. The use of predators in insect control. In: PIMENTEL, D. **Handbook of pest management in agriculture**. Boca Raton, CRC Press, 1981. v.2, p.105-23.

WHITFORD, F.; SHOWERS, W.B.; EDWARDS, G.B. Insecticide tolerance of ground-and-foliage-dwelling spiders (Araneae) in european corn borer (Lepidoptera : Pyralidae) action sites. *Environ. Entomol.*, College Park, 16(3): 779-85, 1987.