**Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”**

Marcelo Machado Leão

Características do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum (cambuci) obtido em duas microrregiões da Mata Atlântica

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Ciências, Programa: Recursos Florestais. Opção em: Tecnologia de Produtos Florestais

**Piracicaba
2012**

Marcelo Machado Leão
Engenheiro agrônomo

**Características do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (O. Berg.)
Landrum (cambuci) obtido em duas microrregiões da Mata Atlântica**

versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011

Orientador:
Prof. Dr. **JOSÉ OTÁVIO BRITO**

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em
Ciências, Programa: Recursos Florestais. Opção em:
Tecnologia de Produtos Florestais

Piracicaba
2012

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - ESALQ/USP**

Leão, Marcelo Machado

Características do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum (cambuci) obtido em duas microrregiões da Mata Atlântica / Marcelo Machado Leão. -- versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011. -- Piracicaba, 2012.
123 p. : il.

Tese (Doutorado) -- Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 2012.

1. Ativos florestais não madeireiros 2. Cambuci 3. Mata Atlântica 4. Mirtaceae 5. Óleo essencial I. Título

CDD 665.33
L437c

"Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor"

*Dedico esse trabalho à presença de Deus na minha
vida, na forma da minha família e meus amigos*

AGRADECIMENTOS

Agradeço, do fundo do meu coração, aos meus pais José Flávio e Regina por estarem sempre juntos comigo.

À minha querida irmã Maria e ao meu cunhado Marcelo Gomes de Moraes por fazerem parte dessa conquista.

A todos os amigos, professores e funcionários do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Esalq/USP e do Instituto Agronômico de Campinas – IAC, que me ajudaram e contribuíram para a realização desse trabalho em especial:

Ao Professor Doutor José Otávio Brito por me acolher e pela prova de confiança, amizade e orientação ao longo do trabalho.

À Professora Doutora Márcia Ortiz Mayo Marques, do Instituto Agronômico/IAC, pela extrema atenção e comprometimento indispensáveis à realização deste projeto.

À Professora Doutora Marta Helena Fillet Spoto, pelo apoio à execução das análises sensoriais.

À pesquisadora Doutora Lenita Haber, pelas sugestões, colaborações e atenção dispensada, essencial ao desenvolvimento do projeto.

À pesquisadora Doutora Roselaine Facanalli, pelas sugestões, colaborações e atenção dispensada, essencial ao desenvolvimento do projeto.

Ao Professor Geraldo Bortolletto por todo apoio e entendimento que muito contribuiu para a realização dessa importante conquista.

À minha querida avó Maria Machado César Leão, por todos os ensinamentos e pensamentos positivos.

Aos estagiários Felipe Oriani e Bia Acosta por me apoiarem nos trabalhos de laboratório.

Aos senhores Douglas (Sítio do Belo) e Ronaldo (Sítio Recanto da Natureza) por fornecerem o acesso aos materiais de estudo indispensáveis para a realização do trabalho.

A todos os meus amigos que sempre me acompanharam nos momentos fáceis e difíceis de minha vida.

E, por fim, a todos que colaboraram direta, ou indiretamente, para a realização desse trabalho.

RESUMO

Características do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum (cambuci) obtido em duas microrregiões da Mata Atlântica

A bioprospecção de moléculas da flora nativa brasileira tem permitido a descoberta de princípios ativos e a elaboração de novos produtos, contribuindo para que as indústrias se posicionem melhor no competitivo mercado de fármaco e cosméticos. Nesse contexto, o presente trabalho contemplou o estudo da composição química do óleo essencial e de extratos orgânicos obtidos a partir das folhas da espécie *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum (cambuci), em duas regiões do estado de São Paulo, com distintas características ambientais. As áreas estudadas situaram-se no domínio da Floresta Ombrófila Densa (FOD), na microrregião de Paraibuna-SP, e no domínio da Floresta Estacional Semidecidual (FES), microrregião de Limeira-SP, ambas pertencentes ao bioma da Mata Atlântica. Procurou-se avaliar a possibilidade da eventual utilização dos materiais como matéria-prima para a produção de óleos essenciais a serem empregados na indústria cosmética e perfumaria. O rendimento médio do óleo essencial obtido a partir das folhas de *Campomanesia phaea* coletadas na microrregião de Limeira-SP (FES) apresentou valores superiores, quando comparados com o rendimento obtido a partir do material coletado na microrregião de Paraibuna-SP (FOD). As análises da composição química dos óleos essenciais extraídos das folhas de *Campomanesia phaea* realizadas durante o período experimental permitiram detectar a presença de 29 (vinte e nove) substâncias químicas. Os principais compostos encontrados foram *trans*- β -ocimeno, *linalol*, *trans*-cariofileno, *biciclogermacreno*, *trans*-nerolidol e *óxido de cariofileno*. Em relação às análises sensoriais das fragrâncias elaboradas a partir do óleo essencial extraído das folhas de cambuci, pôde-se verificar que, para as condições dos testes desenvolvidos, não foram detectadas diferenças significativas nas amostras provenientes das duas localidades.

Palavras-chaves: Cambuci; *Campomanesia phaea*; Óleo essencial; Mata Atlântica; *Mirtaceae*; Ativos florestais não madeireiros

ABSTRACT

Characteristics of essential oil extracted from the leaves of *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum (cambuci) obtained in two microregions of the Atlantic forest

The bioprospecting of molecules of Brazilian native flora has allowed the discovery of active principles and the development of new products, helping the industries best position themselves in the competitive pharmaceutical and cosmetics market. In this context, this work included the study of the chemical composition of the essential oil and organic extracts obtained from the leaves of the species *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum (cambuci) in two regions in the State of São Paulo, in different environmental characteristics. The areas studied were located in Ombrophilous dense forest (ODF), in the microregion of Paraibuna-SP, and in the area of Seasonal Semideciduous Forest (SSF), in the microregion of Limeira-SP, both belonging to the Atlantic forest biome. It was sought to evaluate the possibility of eventual use of materials such as raw material for the production of essential oils to be employed in cosmetics and Perfumery. The average yield of essential oil obtained from the leaves of *Campomanesia phaea* collected in Limeira-SP (SSF) showed higher values, when compared with the income derived from the material collected in Paraibuna-SP (ODF). The analysis of the chemical composition of the essential oils extracted from the leaves of *Campomanesia phaea* which were carried out during the experimental period have allowed to detect the presence of 29 (twenty-nine) chemicals. The main compounds found were *trans*- β -ocimene, linalool, *trans*-caryophyllene, bicyclogermacren, *trans*-nerolidol and caryophyllene oxide. Regarding sensory analysis of fragrances elaborated from the essential oil extracted from the leaves of cambuci, it was observed that for the test conditions developed, no significant differences were detected in samples from two locations.

Keywords: Cambuci; *Campomanesia phaea*; Essential oil; Atlantic Forest; Mirtaceae; Non-timber forest assets

SUMÁRIO

RESUMO.....	7
ABSTRACT.....	9
1 INTRODUÇÃO.....	13
2 DESENVOLVIMENTO.....	15
2.1 Revisão bibliográfica.....	15
2.1.1 O perfume das plantas.....	15
2.1.2 Óleos essenciais.....	16
2.1.3 O bioma da Mata Atlântica.....	19
2.1.4 Tipos de vegetação do domínio da Mata Atlântica.....	22
2.1.5 A família <i>Myrtaceae</i>	25
2.1.6 O cambuci (<i>Campomanesia phaea</i>).....	30
2.1.7 A importância dos produtos florestais não madeireiros.....	35
2.1.8 Análise sensorial.....	39
2.1.9 Caracterização edafo-climática das áreas objeto de amostragem no estado de São Paulo.....	40
2.2 Materiais e métodos.....	40
2.2.1 Coleta do material vegetal.....	40
2.2.2 Avaliação da fertilidade do solo nos sítios de coleta.....	46
2.2.3 Avaliação do clima regional nos compartimentos ambientais.....	46
2.2.4 Estudo do óleo essencial obtido a partir das folhas de <i>Campomanesia phaea</i> ..	46
2.2.4.1 Rendimento médio de óleo essencial.....	46
2.2.4.2 Composição química do óleo essencial.....	48
2.2.5 Preparo dos extratos.....	48
2.2.6 Avaliação do teor de polifenóis totais.....	49
2.2.7 Avaliação da atividade antioxidante.....	50
2.3 Obtenção do óleo essencial em planta-piloto.....	51
2.4 Análises sensoriais do óleo essencial de <i>Campomanesia phaea</i>	52
2.4.1 Preparo das amostras para a análise sensorial do óleo essencial.....	52
2.5 Modelagem e análise exploratória dos dados.....	57
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	59

3.1	Avaliação da fertilidade do solo nos dois locais de coleta das amostras de folhas de <i>Campomanesia phaea</i> (cambuci).....	59
3.2	Avaliação do clima nas microrregiões objeto de estudo (Paraibuna-SP e Limeira-SP).....	63
3.3	Avaliação do óleo essencial extraído das folhas de <i>Campomanesia phaea</i>	64
3.3.1	Rendimento do óleo essencial.....	64
3.3.2	Composição química do óleo essencial extraído das folhas de <i>Campomanesia phaea</i> (cambuci).....	73
3.3.2.1	Análise dos principais compostos de óleo essencial.....	80
3.4	Avaliação dos extratos etanólicos extraídos das folhas de <i>Campomanesia phaea</i> (cambuci).....	81
3.4.1	Fenóis totais.....	83
3.5	Atividade antioxidante dos extratos de <i>Campomanesia phaea</i>	84
3.6	Avaliação do óleo essencial extraído das folhas de <i>Campomanesia phaea</i> em planta-piloto.....	86
3.6.1	Rendimento de óleo essencial extraído em planta-piloto.....	86
3.6.2	Avaliação química do óleo essencial extraído em planta-piloto.....	86
3.7	Análises sensoriais da fragrância obtida a partir do óleo essencial de <i>Campomanesia phaea</i>	89
3.7.1	Teste olfativo triangular de diferença.....	90
3.7.2	Teste de preferência – comparação pareada.....	90
3.7.3	Teste olfativo de aceitação com utilização da escala hedônica	90
4	CONCLUSÕES.....	93
	REFERÊNCIAS.....	95
	APÊNDICES.....	105

1 INTRODUÇÃO

Os aromas têm feito parte da vida do homem há vários séculos. Ao longo da história, muitos povos, primitivos ou civilizados, fizeram uso das essências de plantas aromáticas na medicina, culinária e em cerimônias religiosas. Os egípcios, por exemplo, utilizaram material aromático no processo de mumificação dos corpos, e também na cosmética e na medicina. Além deles, também os chineses, indianos, hebreus, árabes, gregos e romanos empregaram substâncias aromáticas para diversas finalidades.

No mundo moderno, com o desenvolvimento tecnológico, os aromas adquiriram nova e importante função: melhorar a qualidade sensorial de inúmeros artigos oferecidos no mercado – desde produtos de limpeza e higiene, passando pelos alimentos e medicamentos, e, principalmente, os cosméticos e perfumes. Estes últimos resultam de uma mistura especial de vários aromas, solventes, fixadores e óleos.

Os chamados óleos essenciais podem ser definidos como um grupo de substâncias naturais quimicamente complexas e de composição variável, com propriedades aromatizantes, extraídas de diferentes partes das plantas (raízes, flores, frutos, sementes, madeira e cascas), por meio de processos específicos, principalmente, pela hidrodestilação.

Atualmente, o emprego dos óleos essenciais na indústria cosmética mundial reflete uma tendência cada vez mais acentuada no sentido de “vegetalizar” seus produtos, por meio do uso de fontes renováveis, que apresentem baixo impacto ambiental, substituindo matérias-primas sintéticas e de origem animal ou fóssil. Como exemplos dessa situação, em nosso país, podem ser citados: a utilização, com sucesso, do óleo essencial extraído de diversas espécies vegetais da rica flora brasileira, no processo de fabricação de cosméticos, como é o caso da pitanga (*Eugenia uniflora* L.), da candeia – *Eremanthus erythropappus* (DC.) Macleish – e da palmarosa (*Cymbopogon martinii* var. *motia*), entre muitas outras plantas.

Assim, a descoberta de novas matérias-primas e princípios ativos, com a bioprospecção de moléculas provenientes de exemplares da flora, permite a elaboração de novos produtos, possibilitando que as empresas se posicionem melhor nesse competitivo mercado, sempre carente de inovações.

Nesse contexto, o presente trabalho contempla o estudo da composição química do óleo essencial obtido a partir das folhas da *Campomanesia phaea* (cambuci), na região (Mata Atlântica), visando sua eventual utilização como matéria-prima na produção de óleos essenciais para emprego na indústria cosmética e de perfumaria.

É fato comprovado que o sucesso empresarial na fabricação e na comercialização de óleos essenciais depende da eficácia intrínseca do produto, no caso, da aceitação sensorial, e também, de outros fatores que influenciam o mercado, como produtividade, padronização, preço competitivo e grau de diferenciação em relação à concorrência. Para avaliar o potencial de aproveitamento comercial do óleo eventualmente produzido a partir da *Campomanesia phaea* (cambuci), o trabalho em questão foi complementado com a sua avaliação sensorial.

Considerando, ainda que a identificação e o desenvolvimento de novos produtos obtidos a partir das plantas poderão trazer impactos econômicos e ambientais altamente positivos, influenciando toda uma cadeia de negócios, o trabalho proposto se reveste de maior importância, à medida que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade.

Essas cadeias produtivas, bastante significativas para o Brasil e o mundo, que se apresentam com grande potencial de crescimento, iniciam-se no cultivo das plantas, passando pela extração e a produção de ativos naturais. Envolvem, ainda, as empresas fabricantes de produtos químicos utilizados em conjunto para a elaboração dos perfumes e cosméticos.

Dessa forma, o principal objetivo do trabalho realizado foi qualificar, quantificar e comparar os componentes químicos existentes no óleo essencial e extratos obtidos a partir do processamento das folhas provenientes da espécie *Campomanesia phaea* (O. Berg.) (cambuci), em diferentes épocas do ano, em duas microrregiões fitogeográficas diferentes, pertencentes ao domínio da Mata Atlântica, sendo elas: uma cultivada em sua região de ocorrência natural (Paraibuna-SP: Floresta Ombrófila Densa) e outra cultivada fora de sua área de dispersão natural (Limeira-SP: Floresta Estacional Semidecidual). O trabalho contemplou também, a realização de análises sensoriais dos produtos obtidos, para avaliar e indicar as possibilidades de seu emprego na indústria de perfumes e cosméticos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão bibliográfica

2.1.1 O perfume das plantas

As plantas oferecem um mundo variado de cores e odores e, muitas vezes, passam despercebidos, mas podem oferecer experiências sensoriais bastante gratificantes; e, também, surpreender pelos seus inesperados contrastes. São doces ou acres, fortes ou suaves, agradáveis ou extremamente agressivos.

Considerados úteis, indispensáveis, fúteis ou hedônicos, de acordo com as diferentes culturas e pessoas, essenciais para algumas economias, ou causas de conflitos armados, utilizados frescos, após a colheita na natureza, ou resultado de sábias operações de maceração ou destilação, os vegetais aromáticos vêm fascinando os homens desde os tempos mais remotos (JAUBERT, 1998).

Certos vegetais são aromáticos ou simples odorantes pela sua aptidão de fabricar moléculas complexas que a indústria química se esforça para reproduzir, muitas vezes sem sucesso. As essências (ou óleos essenciais) sintetizadas pelas plantas são misturas, em proporção muito variável, de diversas moléculas, sendo que aquelas mais importantes do ponto de vista aromático nem sempre são as mais abundantes. A grande diversidade é um belo exemplo da extraordinária capacidade de síntese do mundo vegetal (PERRIN; COLSON, 1988).

Para esses autores, em algumas plantas, a síntese e a estocagem das essências se efetuam pela existência de cavidades, bolsas ou canais secretores, nos tecidos profundos das raízes, pelos, caules, hastes ou pelas folhas; em outras, são formações muito superficiais (pelos ou tricomas glandulares) que asseguram essas mesmas funções.

Segundo Raynal e Aubaile-Sallenave (1988), cada família vegetal oferece uma gama variada de aromas, das quais apenas uma parte ínfima é utilizada pelo homem: as famílias das labiadas e as umbelíferas, por exemplo, possuem perfumes quentes e claros, os das anacardiáceas são corrosivos e escaldantes, os das apocináceas, inebriantes e pesados. As piperáceas, nas horas quentes do dia, exalam aromas ativos, que lembram o cheiro de fumaça, e as ninféáceas, no início da noite, expelem odores amargos e úmidos. Por outro lado, os odores das crucíferas e brasicáceas são picantes, escaldantes e irritantes, como é o caso da mostarda, repolho e rabanete.

Para essas autoras, no mundo das plantas algumas famílias são reconhecidas por um aroma característico, como é o caso das mirtáceas, que vegetam nas zonas tropicais e subtropicais, na forma de árvores e arbustos, cujas folhas e frutos são fortemente aromáticos.

E citam alguns exemplos dessas mirtáceas: na zona mediterrânea, na Córsega, extrai-se um aroma delicioso, de uma planta com propriedades condimentares, a mirta (*Myrtus communis*). Buquês dessa planta eram utilizados nas urnas mortuárias do antigo Egito para homenagear os mortos. *Eugenia caryophyllata*, das ilhas Molucas, fornece o cravo-da-índia (botão seco) e outras espécies de *Eugenia* fornecem frutos perfumados. Da Austrália, vem o cajepute (*Melaleuca lecaudendron*), uma pequena árvore, cujas folhas fornecem um óleo muito odorante, usado na fabricação de perfumes e cosméticos. Também são da família mirtácea os eucaliptos (*Eucalyptus*), hoje cultivados em todo o mundo, gênero que compreende mais de 500 espécies, algumas delas odoríferas. Da Jamaica, vem a *Pimenta officinalis*, cujos frutos são colhidos secos e possuem um sabor análogo ao do cravo-da-índia (RAYNAL; AUBAILE-SALLENAVE, 1988).

Jaubert (1988) informa que os perfumes das plantas têm fascinado os químicos desde o século XIX, que tentaram extrair em laboratório algumas substâncias; a primeira essência foi amêndoa amarga, na qual Vogel isolou o benzaldeído, em 1818. O desenvolvimento da química, no século seguinte, foi propício às sínteses de várias moléculas odorantes, como cumarina, vanilina, alfa-terpineol, mentol, entre outras.

Este autor ressalta, no entanto, que os progressos da química foram incontestavelmente mais rápidos, a partir de 1952, com o desenvolvimento, por James & Martin, da técnica de separação e análise pela cromatografia em fase gasosa. Esse procedimento permite análises de quantidades muito pequenas de materiais e aplica-se a todas as substâncias voláteis com resultados de grande precisão. Outros progressos consideráveis nesse campo foram obtidos com o aparecimento da espectrometria de massa, seguida da ressonância magnética nuclear. Essas novas técnicas permitiram denominar atualmente de 25.000 a 30.000 moléculas odorantes.

2.1.2 Óleos essenciais

As plantas apresentam, além do metabolismo primário, responsável pela produção de celulose, lignina, proteínas, lipídios, açúcares e outras substâncias relacionadas com suas principais funções vitais, o chamado metabolismo secundário, do qual resultam substâncias de baixo peso molecular, que, geralmente, são produzidas em pequenas quantidades e conhecidas como metabólitos secundários.

Essas substâncias químicas estão associadas a várias funções necessárias à sobrevivência do vegetal em seu ecossistema, exercendo papel fundamental na defesa contra micro-organismos patogênicos, na proteção contra predadores, insetos e animais herbívoros, bem como na atração e orientação de insetos e outros agentes fecundadores, favorecendo a sua polinização.

Além dessas funções, Holzke et al. (2006) mostraram ação dos compostos voláteis na regulação da perda de água pela planta e no controle da variação da temperatura das suas folhas e dos meristemas, ressaltando que tais substâncias exercem importante papel na ecologia vegetal, além de funções fisiológicas importantes.

Dentre essas substâncias de baixo peso molecular, os óleos essenciais são definidos como compostos voláteis, produzidos pelas plantas, formados por uma mistura de componentes químicos, que possuem como principal característica as propriedades aromáticas. (WOLFFENBÜTTEL, 2007).

A estrutura desses compostos voláteis constitui-se pelos elementos carbono, oxigênio e hidrogênio. A sua classificação química, no entanto, é mais complexa, por serem formados por uma mistura de diversas moléculas orgânicas, tais como hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, acetatos, alcoóis, ésteres, aldeídos, cetonas, fenóis, entre outras. Os óleos essenciais normalmente são produzidos por estruturas secretoras especializadas, que podem estar localizadas em uma parte específica da planta, ou, até mesmo, em toda planta.

Esses compostos podem estar presentes em diversos órgãos do vegetal (flores, folhas, cascas, rizomas e frutos) e, geralmente, são extraídos pela técnica de arraste a vapor, hidrodestilação, prensagem ou extração com solventes orgânicos (WOLFFENBÜTTEL, 2007).

Segundo Simões (1999), a composição química do óleo volátil extraído do mesmo órgão de uma mesma espécie vegetal pode variar significativamente, de acordo com a época de coleta, do clima e do tipo de solo, onde a planta se desenvolve.

Dessa forma, as características quali-quantitativas dos óleos essenciais são determinadas por fatores genéticos (SIMÕES et al., 2004) e fatores ambientais, como sazonalidade, temperatura, disponibilidade hídrica, radiação, nutrientes, altitude, entre outros, que podem causar variações significativas na sua composição química (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Tais compostos apresentam grande variabilidade estrutural, em diversas situações, por causa de estresses bióticos e abióticos, que acarretam novas rotas biossintéticas de transformação, a partir dos metabólitos primários.

Os óleos essenciais, que constituem os elementos voláteis contidos em muitos órgãos vegetais, estão relacionados com diversas funções necessárias à sobrevivência vegetal, e exercem papel fundamental na defesa contra micro-organismos (SIQUI et al., citado por OLIVEIRA et al., 2006). Estabeleceu-se cientificamente que aproximadamente 60% dos óleos essenciais possuem propriedades antifúngicas e 35% exibem propriedades antibacterianas (BHAVANANI; BALLOW, 1992, citados por OLIVEIRA et al., 2006), por isso apresentam grande interesse econômico.

Os óleos essenciais são produzidos e armazenados pelas plantas em estruturas anatômicas altamente especializadas, como tricomas glandulares, células oleíferas, cavidades secretoras, ductos e laticíferos (BUCHANAN et al., 2000). Podem ser misturas complexas, chegando a conter cem ou mais compostos orgânicos, normalmente voláteis aromáticos, que conferem odor característico à planta (WATERMAN, 1993).

Por apresentarem misturas de diferentes concentrações, a classificação química dos óleos essenciais é difícil, mas geralmente, possuem um composto majoritário. A grande maioria é constituída de derivados fenilpropanóides, ou de terpenóides, de acordo com a sua origem biossintética. O primeiro grupo caracteriza-se por compostos com uma cadeia lateral de três átomos de carbono derivados de ácidos aminados aromáticos. Por outro lado, os terpenóides constituem uma grande variedade de substâncias vegetais, sendo esse termo empregado para designar todas as substâncias, cuja origem biossintética deriva de unidades do isopreno. Os compostos terpênicos mais frequentes nos óleos voláteis são os monoterpenos e os sesquiterpenos (CARDOSO et al., 2000).

Para Simões e Spitzer (2004), os óleos essenciais possuem viscosidade semelhante à de outros óleos, e sua composição envolve uma ampla gama de compostos, como hidrocarbonetos terpênicos, alcoóis simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos orgânicos, lactonas, cumarinas, e até compostos que podem conter enxofre.

As indústrias de perfumaria, de cosméticos e de aromatizantes alimentares absorvem quase a totalidade das essências naturais e dos respectivos derivados, o que justifica o alto nível técnico atingido na sua preparação e o elevado valor econômico que representam; as indústrias de tintas e vernizes consomem quantidades importantes de algumas essências, utilizando-as na flotação de minérios e na preparação de agentes molhantes; na medicina, tais substâncias entram na formulação de antissépticos, antiespasmódicos, inalantes e analgésicos, segundo Costa (1994) e Agrônomo (1957), citados por Rissato et al. (2004). Dessa forma, o estudo de compostos voláteis produzidos pelas plantas se reveste de grande importância, uma

vez que apresentam importantes funções fisiológicas, ecológicas e, ainda, grande interesse econômico.

2.1.3 O bioma da Mata Atlântica

No passado, a Mata Atlântica estendia-se ao longo de quase todo o litoral brasileiro, chegando até o Leste do Paraguai e o Nordeste da Argentina. Abrangia mais de 1,5 milhões de km², sendo que 92% dessa área localizavam-se no Brasil, cobrindo quase 15% do território nacional (SOUZA, 2009). Essas florestas foram as que mais sofreram degradação, pois nelas se iniciou a colonização do Brasil e hoje os fragmentos florestais remanescentes representam apenas 9% da cobertura original (FUJIHARA et al., 2009).

De acordo com Souza (2009), a Mata Atlântica é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano, situando-se entre as latitudes 4° a 32° S. Essa formação cobre uma ampla faixa de diferentes zonas climáticas e formações vegetais, de tropicais a subtropicais. Sua elevação vai do nível do mar a 2.900 m, com mudanças abruptas no tipo profundidade dos solos e na temperatura média do ar (MANTOVANI, 2003, citado por SOUZA, 2009).

A evolução da Mata Atlântica é marcada por períodos de intercâmbio biológico, por meio da conexão com outras florestas sul-americanas (como a Amazônia e as florestas andinas), seguidos por períodos de isolamento, que levaram à especiação geográfica. Dessa forma, sua biota é composta tanto por espécies antigas (pré-Pleistoceno), como por espécies novas (Pleistoceno), segundo Silva e Casteleti, 2003 (citados por SOUZA, 2009) e várias áreas de endemismo têm sido nelas identificadas (SILVA et al., 2004, citados por SOUZA, 2009).

A Floresta Atlântica é um dos biomas mais ricos em diversidade biológica, e, também, um dos mais ameaçados do planeta. Por isso, figura entre os cinco primeiros biomas no *ranking* dos 25 *hotspots* elencados pelos cientistas. O conceito foi formulado pela primeira vez por Norman Myers, em 1988, identificando pontos, em florestas tropicais, caracterizados tanto por níveis excepcionais de endemismo de plantas, como por taxas notáveis de destruição de habitats.

Esse conceito foi aperfeiçoado ao longo do tempo, introduzindo patamares quantitativos para a designação das áreas de preservação ambiental. Para qualificar-se como *hotspot*, uma região deve preencher pelo menos dois critérios: abrigar no mínimo 1.500 espécies de plantas vasculares endêmicas e possuir 30% ou menos da sua vegetação original (extensão da cobertura do habitat histórico) mantida.

Essa análise identificou, em 1999, 25 *hotspots* que abrigavam em conjunto, como endêmicas, 44% das plantas do planeta e 35% dos vertebrados terrestres (mamíferos, aves, répteis e anfíbios) em uma área que cobria anteriormente 11,8% da superfície terrestre e, que atualmente foi reduzida a apenas 1,4% da superfície terrestre (CONSERVATION INTERNATIONAL, 2005). Posteriormente, em 2004, a análise foi ampliada, e, atualmente, estão elencadas 34 regiões consideradas *hotspots*.

No domínio da Mata Atlântica, pelo menos cinco áreas de endemismo podem ser reconhecidas, com base na distribuição de vertebrados terrestres e plantas: Brejos Nordestinos, Pernambuco, Bahia Central, Costa da Bahia e Serra do Mar, todas situadas no território brasileiro (SILVA; CASTELETTI, 2003; SILVA et al., 2004, citados por SOUZA, 2009). Apesar de ter sido muito devastada, ela ainda abriga mais de 8.000 espécies endêmicas de plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (MYERS et al., 2000, citados por SOUZA, 2009).

Segundo Souza (2009), a degradação da Mata Atlântica vem ocorrendo desde o início da colonização europeia, com a ocupação humana nos primeiros espaços territoriais próximos à região costeira e a extração do pau-brasil. A essa atividade, seguiram-se os impactos dos diferentes ciclos de exploração, como o do ouro, o da cana-de-açúcar e, posteriormente, o do café. Ao longo do tempo, o desenvolvimento de outras atividades econômicas, com o advento do processo de industrialização e a consequente urbanização, também contribuiu para a redução drástica da exuberante vegetação natural.

A destruição da Mata Atlântica acentuou-se a partir de 1970, provocando alterações severas dos ecossistemas, com grande fragmentação dos habitats e perda de sua biodiversidade. É preciso lembrar que as principais cidades e metrópoles brasileiras situam-se nas áreas originalmente ocupadas pela Mata Atlântica (FUJIHARA et al., 2009).

Atualmente, mais de 67% da população brasileira vivem na área da Mata Atlântica. São mais de 120 milhões de habitantes em mais de 3.400 municípios, que correspondem a 61% dos existentes no Brasil. Destes, 2.528 municípios possuem a totalidade dos seus territórios no bioma (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE, 2001, citados por SOUZA, 2009).

O resultado atual é a perda quase total das florestas originais intactas e a contínua devastação dos remanescentes florestais existentes, colocando a Mata Atlântica em péssima posição de destaque no mundo: é um dos conjuntos de ecossistemas mais ameaçados de extinção (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2001).

A devastação da Mata Atlântica ocorre por várias causas, sendo a mais impactante o avanço da urbanização, muitas vezes, sem planejamento prévio, estimulada pela especulação imobiliária. O desmatamento é causado também pelas atividades agropecuárias e pela mineração, bem como para a instalação e a expansão das obras de infraestrutura destinadas a atender a grande faixa da população que vive em antigas áreas de domínio das matas (FUJIHARA et al., 2009).

Segundo Souza (2009), muitos estudiosos propõem uma série de medidas a fim de se garantir a conservação da biodiversidade dos remanescentes de Mata Atlântica. Para Tabarelli et al. (2005), por exemplo, são fundamentais o controle e fiscalização da legislação vigente e, principalmente, a integração dos diversos instrumentos regulatórios, políticas públicas e programas independentes desenvolvidos por organizações não-governamentais em uma estratégia abrangente para o estabelecimento de redes de paisagens sustentáveis na região, os chamados corredores de biodiversidade.

Pesquisadores como Joly et al. (2008), por sua vez, também citados por Souza (2009) apontam a necessidade de criação de um sistema de informação ambiental que permita, concomitantemente, aumentar o conhecimento acadêmico sobre a biodiversidade e estabelecer mecanismos e estratégias para utilizar este patrimônio de forma sustentável.

Segundo Souza (2009), uma das grandes barreiras para a conservação de florestas tropicais é a falta de conhecimentos sobre essas regiões. A cada ano, são descritas inúmeras novas espécies, porém, ainda existem áreas pouco conhecidas, e os recursos humanos e investimentos para esses trabalhos são limitados.

Além disso, faltam políticas claras que definam prioridades das ações destinadas à aplicação dos recursos humanos e financeiros, de forma que eles atendam à urgência de reverter o processo de degradação (CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL et al., 2000).

Na grande diversidade de espécies vegetais existentes na Mata Atlântica, muitas delas são mencionadas na literatura, devido a sua capacidade de produzir óleos essenciais. Dessa forma, a avaliação dos teores e composição do óleo essencial de espécies nas condições ambientais da Mata Atlântica poderá representar um potencial de aproveitamento para o uso aromático e/ou farmacêutico.

Em pesquisas realizadas em compêndios botânicos da Floresta Atlântica sobre espécies que apresentam potencial de uso cosmético e farmacêutico, Biavatti et al. (2007) relacionam 245 espécies vegetais pertencentes a 98 famílias. As famílias com maior número

de espécies com esse potencial foram: *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Annonaceae*, *Clusiaceae*, *Anacardaceae*, *Apiaceae*, *Bignoniaceae*, *Solanaceae* e *Myrtaceae*.

2.1.4 Tipos de vegetação do domínio da Mata Atlântica

A metodologia fitogeográfica proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais varia de acordo com a classificação fisionômico-ecológica, compreendida dentro de uma hierarquia de formações, segundo Ellemberg e Miller-Dombis (1966), delimitando, assim, a *região ecológica florística*, que corresponde a um tipo de vegetação, a ser inicialmente separada pela *classe de formação*, que corresponde à estrutura fisionômica determinada pelas formas de vida dominantes, podendo ser *florestal* e *não-florestal*.

Para cada classe de formação segue-se a *subclasse*, caracterizada por dois parâmetros de clima – o Ombrófilo e o Estacional –, ambos distinguidos pela correlação das médias mensais da precipitação, com o dobro da temperatura (Índice de BAGNOULS; GAUSSEN, 1957), checada pela adaptação dos órgãos de crescimento das plantas, com o sistema de proteção ao déficit hídrico nos solos. Após a definição da subclasse, o grupo de formação é determinado pelo tipo de transpiração estomática foliar e pela fertilidade dos solos.

Em seguida, o subgrupo de formação, que indica o comportamento das plantas segundo seus hábitos, e, finalmente, a formação propriamente dita, determinada pelo ambiente (forma de relevo). Assim, o que se assinala nas formações florestais é o comportamento do dossel florestal dado pelas espécies dominantes e por outras espécies particulares mais ou menos casuais (IBGE, 1992a).

Tabela 1 - Esquema de classificação da vegetação brasileira (classificação fitogeográfica)

Império Florístico			
Zona	Região	Classe de Formação	Subclasse de Formação
Neotropical	Mata Atlântica	Floresta	Ombrófila: 0 a 4 meses secos
		Floresta	Estacional: 4 a 6 meses secos ou com 03 meses abaixo de 15°C

Fonte: IBGE (1992b) - Modificado

As formações pioneiras consistem de ecossistemas associados à Mata Atlântica: o mangue (vegetação com influência marinha e fluvial, que estabelece estreita relação com a Floresta Pluvial Tropical Atlântica, por meio das drenagens), as dunas (cordões arenosos), a floresta de várzea (que é periodicamente inundada, apresentando espécies com 20 m a 30 m de altura), e a restinga (vegetação arbóreo-arbustiva existente nas encostas baixas ou morros baixos da Serra do Mar).

Os campos de altitude, por sua vez, consistem na vegetação característica dos planaltos de cadeia montanhosa marítima, acima de 2000 metros, assentando-se sobre rochas cristalinas (RIZZINI, 1979; VELOSO; GOES-FILHO, 1982).

O bioma da Mata Atlântica caracteriza-se por diferentes fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa, Aberta e Mista, Floresta Estacional Decidual e Semidecidual, Formações Pioneiras e Campos de Altitude (SOUZA, 2009; FUJIHARA et al., 2009).

Floresta Ombrófila Densa ou Pluvial Tropical: situa-se em elevações montanhosas, com variações fisionômicas e riqueza e diversidade de espécies elevadas e é perenifólia. O dossel é formado por árvores com 20 m a 30 m de altura, apresentando abundância de lianas, epífitas e palmeiras. Essa fisionomia pode ser subdividida de acordo como a hierarquia topográfica, como: Floresta Pluvial Baixo Montana (ou Submontana), que ocorre à base e nos contrafortes da cadeia de montanhas ao longo do litoral, entre cerca de 300-800 m, e Floresta Pluvial Montana, localizada na parte mediana (Montana) e superior (Alto-montana) da cadeia de montanhas, revestindo as serras entre 800 m e 1500-1700 m de altitude. Os solos dominantes nessas formações florestais são os latossolos e podzólicos, ambos de baixa fertilidade.

Floresta Ombrófila Mista: ocorre principalmente nos planaltos dos estados da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e nos maciços descontínuos de São Paulo e Rio de Janeiro (Serras de Paranapiacaba, Mantiqueira e Bocaina). As árvores possuem 25 m a 30 m de altura e um grande número de epífitas (IBGE, 1992a; RIZZINI, 1979; VELOSO; GOES-FILHO, 1982).

Floresta Estacional Semidecidual: São áreas mais abertas e relativamente pobres em diversidade. O conceito ecológico desse tipo de vegetação está condicionado pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada, e outra subtropical, sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15°C.

Na Floresta Estacional Semidecidual, a percentagem de espécies caducifólias do conjunto florestal varia de 20% a 50%. A designação de floresta mesófila semidecídua, adaptada de Rizzini (1963), foi também muito usada por expressar as características

climáticas dominantes na sua região de ocorrência. Segundo Font Quer (1953), mesófilo é o vegetal que se desenvolve em valores de temperatura e umidade médios. A denominação também faz menção à deciduidade observada em algumas espécies típicas dessa formação, na estação seca.

Atualmente, a designação mais aceita para essa formação é Florestal Estacional Semidecidual (IBGE, 1992a), pois o termo estacional expressa exatamente as transformações de aspecto ou comportamento da comunidade, conforme as estações do ano (ACADEMIA DE CIÊNCIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ACIESP, 1997).

A floresta estacional semidecidual foi a formação dominante das terras delimitadas na região de Campinas. Nessa área, essa formação teve sua distribuição concentrada principalmente nos domínios da Depressão Periférica Paulista, dando lugar em algumas partes mais elevadas da Depressão, com características próprias, para pequenas manchas de cerrado. Foi nessa condição que a floresta estacional semidecidual mais sofreu com as intervenções antrópicas, estando restritas hoje a pequenos fragmentos remanescentes, encravados em áreas de difícil acesso, considerados inaptos para práticas agrícolas, ou protegidos na forma de reservas ou parques ecológicos por ação institucional, e até por alguns proprietários rurais.

Essa formação caracteriza-se por apresentar um dossel não perfeitamente contínuo (irregular), entre 15 m e 20 m de altura, com a presença de árvores emergentes de até 25-30 m de altura. Nesses extratos superiores, observa-se a predominância de algumas famílias, como *Anacardiaceae*, *Bombacaceae*, *Caesalpiniaceae*, *Mimosaceae*, *Apocynaceae*, *Fabaceae*, *Lecythidaceae*, *Lauraceae*, entre outras.

Fonte: Siqueira e Durigan (2007)

Figura – 1 Mapa da vegetação do estado de São Paulo

2.1.5 A família *Myrtaceae*

A família *Myrtaceae* Jussieu leva esse nome por causa do botânico francês Antoine-Laurent Jussieu (1748-1836), autor de um sistema pioneiro de classificação de plantas, que serviu de base para trabalhos posteriores. É uma das famílias de maior riqueza específica, nas mais diversas formações vegetais brasileiras. Pertence à divisão *Magnoliophyta*, classe *Magnoliopsida*, subclasse *Rosidae* e à ordem *Myrtales*, que consiste em doze famílias (CONQUIST, 1981, citado por ROMAGNOLLO, 2009).

De acordo com Jorge (1992), a família *Myrtaceae* é constituída de plantas arbustivas ou arbóreas, com folhas geralmente opostas, simples, inteiras e de nervação penínervia. É frequente a presença de nervura marginal, sendo que as folhas deixam ver por transparência, quando observadas frente a fontes luminosas, pontos translúcidos, indicativas de glândulas no mesófilo.

Não se sabe ao certo o número de gêneros e de espécies pertencentes à família *Myrtaceae*, pois novas espécies estão sendo ainda identificadas. Recentemente, a pesquisadora Maria Lúcia Kawasaki, do Instituto de Botânica de São Paulo, informou que, durante a preparação de mirtáceas para o trabalho “A Flora do Estado de São Paulo”, uma nova espécie dessa família foi reconhecida: a *Campomanesia simulans*. Caracteriza-se pelo indumento ferrugíneo, as lâminas da folha fortemente rugosas, flores subsésseis (desprovidas

de pecíolos ou pedúnculos) e cálice aberto com cinco lobos agudos, distintos (KAWASAKI, 2000).

De acordo com Barroso (1984), existem em torno de 3.500 espécies de mirtáceas, subordinadas a cem gêneros. Seus representantes apresentam porte arbustivo ou arbóreo. Segundo Judd et al. (1999), citados por Romagnolo (2009), o número de gêneros é de aproximadamente 144, com 3.100 espécies. Para Mabberley (1997), também citado por Romagnolo (2009), a família reúne 129 gêneros e 4.629 espécies, que correspondem a 1,32% do total de espécies das *Magnoliophyta* conhecidas.

Representada no Brasil por aproximadamente 1.000 espécies, a família *Myrtaceae* é uma das importantes do país (LANDRUM; KAWASAKI, 1997) destacando-se, com mais de uma centena de espécies, os gêneros *Eugenia* L., *Myrcia* DC. ex Guill. E. *Calyptranthes* Sw., enquanto o restante dos gêneros possui menos de 60 espécies brasileiras (BARROSO; PERÓN, 1994; LANDRUM; KAWASAKI, 1997).

A família *Myrtaceae* é uma das 14 lenhosas dominantes em várias formações vegetais do Brasil, especialmente na Floresta Atlântica, onde mais de 50 espécies podem ocorrer sintopicamente, ou seja, com espécies idênticas em termos de morfologia e comportamento (PEIXOTO; GENTRY, 1990; LANDRUM; KAWASAKI, 1997; TABARELLI; MANTOVANI, 1999; OLIVEIRA FILHO; FONTES, 2000; GUILHERME et al., 2004).

Em muitos dos remanescentes desse ecossistema, ela é a família com maior número de espécies e indivíduos e com maior área basal total (MORI; BOOM, 1983; TABARELLI; MANTOVANI, 1999). Assim, o conhecimento das *Myrtaceae* é indispensável para o entendimento da ecologia e da história natural do Domínio do bioma da Mata Atlântica (GRESSLER et al., 2006).

No levantamento florístico realizado na Mata Atlântica, Ivanauskas (1997) reconheceu, no levantamento fitossociológico efetuado, 1.956 indivíduos vivos e 156 mortos, em uma amostragem de 2.112 indivíduos. Os indivíduos vivos apresentaram-se distribuídos em 53 famílias, 113 gêneros e 183 espécies. A família de maior riqueza florística foi *Myrtaceae*, seguida de *Lauraceae* e *Leguminosae*.

Na Mata Atlântica, a família *Myrtaceae* destaca-se entre aquelas com grande potencial econômico a ser explorado. As espécies brasileiras dessa família geralmente não produzem madeiras valiosas, restringindo-se ao fornecimento de lenha, à utilização em pequenas peças ou objetos e outras formas de uso local (MARCHIORI; SOBRAL, 1997).

Segundo Gemtchüjnicov (1976) e Legrand & Klein (1977), a família *Myrtaceae* é dividida em duas subfamílias, a saber:

Leptospermoideae, cujos representantes apresentam frutos secos do tipo cápsula, aquênio e pixídio. Sua maior dispersão se dá na Austrália e na Polinésia;

Myrtoideae, que fornecem frutos carnosos, geralmente baciformes. Inclui todas as espécies americanas, exceto o gênero monotípico *Tepualia Griseb* (MARCHIORI; SOBRAL, 1997).

A primeira ocorre predominantemente na Austrália e Polinésia e reúne espécies com fruto seco, geralmente cápsulas loculicidas e folhas alternas. A outra, *Myrtoideae*, predomina na América tropical e subtropical e compreende espécies com frutos carnosos baciformes e folhas opostas (CRONQUIST, 1981; VALLILO et. al., 2005). Esta última, com aproximadamente 70 gêneros e 2.400 espécies (segundo McVAUGH, 1968, citado por ROMAGNOLO, 2009) possui apenas a tribo *Myrteae*, que compreende as subtribos *Eugeniinae*, *Myrciinae* e *Myrtinae*. Essas subtribos foram definidas por Berg (1857-1859) e se diferenciam, principalmente, quanto à morfologia externa do embrião. O tipo eugenóide apresenta cotilédones bastante desenvolvidos, carnosos e condescidos ou distintos entre si, com eixo-hipocótilo-radícula inconspícuo e, às vezes, com radícula exerta. O tipo mircióide apresenta cotilédones desenvolvidos, foliáceos e dobrados, com eixo-hipocótilo-radícula longo e, às vezes, circundando os cotilédones. O terceiro tipo, mirtóide, apresenta cotilédones reduzidos e membranáceos, com eixo-hipocótilo-radícula bastante desenvolvido e espiralado ou curvo (ROMAGNOLO, 2009).

Atualmente, a nova classificação infra-família proposta por Wilson et al. (2005), citado por Gressler et al. (2006) reconhece duas subfamílias, *Myrtoideae* e *Psiloxylloideae*, e dezessete tribos. Segundo esses autores, todas as espécies brasileiras estão incluídas na tribo *Myrteae*.

Entre as generalidades morfológicas da família, podemos destacar folhas inteiras, opostas ou alternas, com glândulas oleíferas no limbo, nervura submarginal, com estípulas muito pequenas. As flores geralmente são hermafroditas, polistêmones, brancas e de simetria radial.

A tribo *Myrteae* compreende plantas lenhosas, arbustivas ou arbóreas, de folhas inteiras, opostas, venação camptódroma e, frequentemente, com nervura marginal. Apresenta numerosas glândulas, na forma de pequenos pontos translúcidos nas folhas, flores, frutos e sementes, que dão à família o típico aroma “mirtáceo” (de goiaba, pitanga etc.). O tronco e os ramos quase sempre desprendem abundante ritidoma, que pode ser do tipo laminado, ou escamoso, cuja troca ocorre durante todo o ano (ROMAGNOLO, 2009).

Essa autora explica que as flores são hermafroditas, com cálice e corola geralmente tetrâmeros ou pentâmeros; os estames são numerosos; o ovário é ínfero, de bi a multilocular e com dois a muitos óvulos por lóculo. Os frutos são do tipo baga que, quando madura, apresenta coloração que vai desde a amarela até a preta (LAWRENCE, 1951; CRONQUIST, 1981; BARROSO, 1984, JOLY, 1998, citados por ROMAGNOLO, 2009).

Segundo Jorge (1992), as flores são actinomorfas, hemafróditas, mono ou diclamídeas, geralmente pentâmeras e com receptáculo bem desenvolvido. A coloração, na maioria das vezes, é branca, podendo ser amarelada ou vermelha. Cauliflória é frequente na família. A corola falta algumas vezes, mas, constantemente, é do tipo dialipétala. O cálice geralmente é formado por quatro ou cinco pétalas pouco evidentes. O androceu é polistêmone com estames livres providos de anteras basefixas, biloculares, introrsas com deiscência longitudinal. A região do conectivo costuma ser bem evidente e terminada em glândula.

O ovário é geralmente ínfero, podendo ser semi ínfero ou súpero. O número de lóculos ovarianos varia entre dois a cinco. O número de óvulos por lóculos também é variável. Os frutos são baciformes ou capsulares loculicidas. Nas espécies americanas, os frutos são carnosos e do tipo baga, frequentemente édulos. O tamanho é variável, a forma globosa, elíptica, piriforme turbinada ou angulosa. A cor, quando maduros, pode ser vermelha; amarela ou coccínea; antropurpúrea ou esverdeada. O mesocarpo é carnosos, suculento de sabor adocicado ou ácido e geralmente perfumado (JORGE, 1992).

A maioria de suas espécies apresentam estratégia reprodutiva do tipo “bang bang”, ou seja, floração massiva, sendo que as flores duram em média 48 horas e são bastante visitadas por insetos, que atraídos pelo perfume adocicado, encontram e coletam o pólen (PROENÇA, 1991; NIC LUGHADHA; PROENÇA, 1996; RIBEIRO et al., 1999, citados por ROMAGNOLO, 2009).

Recentemente, 38 espécies de *Myrtaceae*, predominantemente dos gêneros *Eugenia* Mich. Ex L., *Myrceugenia* O. Berg e *Myrcia* DC. ex Guill. foram incluídas em uma lista de espécies-alvo para a conservação e restauração da biodiversidade do estado de São Paulo (RODRIGUES, 2008, citado por SOUZA, 2009).

Todas as espécies de mirtáceas brasileiras possuem frutos carnosos (LANDRUM; KAWASAKI, 1997), cujas sementes são potencialmente dispersas por vertebrados frugívoros. As informações sobre quais vertebrados consumiriam frutos de mirtáceas ainda não foram confirmadas, uma vez que apenas observações eventuais estão disponíveis para poucas espécies (PIZO, 2002).

Citando Landrum e Kawasaki (1997), Romagnolo (2009) explica que a sub-tribo *Eugeniinae* compreende oito gêneros: *Calycorectes*, *Eugenia*, *Hexachlamys*, *Myrcianthes*, *Myrciaria*, *Neomitranthes*, *Plinia* e *Siphoneurena*; a sub-tribo *Myrciinae* engloba *Calypttranthes*, *Gomidesia*, *Marlierea*, *Myrceugenia* e *Myrcia*, enquanto que a sub-tribo *Myrtinae* reúne *Acca*, *Accara*, *Blepharocalyx*, *Calycolpus*, *Campomanesia*, *Mosiera*, *Myrrhynium*, *Myrteola*, *Pimenta* e *Psidium*.

As espécies nativas da família *Myrtaceae* possuem importância econômica diversificada. Seus frutos comestíveis são ricos em vitaminas e consumidos por humanos e várias espécies de pássaros e de mamíferos; são também usados na produção de fármacos-cosméticos, doces caseiros, sorvetes, aguardente, licores e refrescos entre outras aplicações. Segundo Barroso et al. (1999), deveriam ser melhor estudados para maior aproveitamento comercial.

Romagnolo (2009) afirma que entre as espécies frutíferas nativas, destacam-se os de gênero *Campomanesia* (guabiroba, sete-capotes, cambuci); *Eugenia* (pitanga, uvaia, cabeludinha, cereja-nacional, cambucá e grumixama); *Plinia* (jabuticabas), *Psidium* (goiaba e araçá).

Dessa forma, há numerosas espécies frutíferas, algumas já comercialmente importantes, como a goiabeira, *Psidium guajava* L., a jabuticabeira, *Plinia cauliflora* (Mart.) O. Berg, e a pitangueira, *Eugenia uniflora* L. Essas espécies representam apenas uma pequena fração do grande potencial econômico da família, tendo em vista o grande número de frutos comestíveis produzidos por espécies não comerciais. Algumas delas estão desaparecendo da natureza antes mesmo que se tenha conhecimento básico de sua biologia (KAWASAKI; LANDRUM, 1997, VALLILO et al., 2005).

Segundo Romagnolo (2009), dentre as espécies exóticas de mirtáceas, destacam-se as do gênero *Eucalyptus*, amplamente cultivadas e utilizadas, com muitas espécies produtoras de madeira e de óleos essenciais; *Callistemon* e *Mellaleuca* são utilizadas como plantas ornamentais; as espécies *Syzygium aromaticum* (cravo-da-índia) e *Pimenta dioica* (pimenta-da-jamaica), são usadas na culinária, como especiarias, além de espécies frutíferas, como o jambolão, *Syzygium cumini* e o jambo, *S. jambos* (LAWRENCE, 1951; JOLY, 1998; LORENZI, 1992; POTT; POTT, 1994, BACKES; IRGANG, 2002, citados por ROMAGNOLO, 2009).

Algumas espécies de mirtáceas também são utilizadas amplamente como medicinais, especialmente aquelas pertencentes aos gêneros *Psidium* e *Eugenia*. São também consideradas de grande importância ecológica, uma vez que muitas delas apresentam

características apícolas e produzem frutos apreciados pela fauna silvestre (aves, roedores, macacos, morcegos e peixes), conforme informam Mabberley, 1997 e Barroso et al. 1999, citados por Romagnolo (2009). Têm sido também muito indicadas para a revegetação de áreas perturbadas, conforme explicam Lorenzi (1992, 1998); Pott e Pott (1994); Backes e Irgang (2002), também citados por Romagnolo (2009).

Uma das características importantes de *Myrtaceae* é a produção de óleos voláteis, que se constituem em uma mistura complexa de substâncias voláteis, lipofílicas e geralmente odoríferas e de que, de acordo com a definição da *International Standard Organization*, são extraídas de partes vegetais por hidrodestilação (GOTTSLIEB et al., 1996).

2.1.6 O cambuci (*Campomanesia phaea*)

O gênero *Campomanesia*, a que pertence a espécie objeto desse estudo, está incluído na subfamília *Myrtoideae* e é representado por árvores e arbustos, podendo ser encontrado do Norte da Argentina até Trindade, e das costas brasileiras até os Andes ou Peru, Equador e Colômbia (CRONQUIST, 1968, 1984; LANDRUM, 1986).

Campomanesia tem sua mais alta concentração de espécies no Nordeste e Sudeste do Brasil, mas também com poucas e distantes na Colômbia e Venezuela. No Brasil, são geralmente conhecidas como “guabiroba” e, no Paraguai, como “guavira” (LANDRUM, 1986, citado por KAWASAKI; LANDRUM, 1997).

A espécie *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum é popularmente conhecida como “cambuci”, ou “cambucizeiro”, tendo como sinonímia botânica a designação de *Paivaea langsdorffii* Berg. Apresenta altura de 3-5 m e tronco com diâmetro de 20 a 30 cm com aspecto de escamas. Ocorre nos estados de São Paulo (principalmente na Serra do Mar) e em Minas Gerais (LORENZI, 1992).

Fonte: Flora Neotropica (Landrum, 1986).

Figura 2 – Mapa de dispersão da espécie *Campomanesia phaea* no domínio da Mata Atlântica

A espécie apresenta floração branca e vistosa nos meses de agosto a novembro, e frutificação abundante, com frutos arredondados, durante os meses de janeiro e fevereiro. Quando maduros, são amarelados a alaranjados, dando à árvore aspecto de grande beleza que, somado ao seu pequeno porte, a indicam para a arborização de ruas estreitas e sob as redes elétricas, bem como para compor praças e jardins. É recomendada para reflorestamentos heterogêneos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação permanente (LORENZI, 1992).

Os frutos medem, geralmente, de 5 a 6 cm de diâmetro na região mediana, por 3 a 4,5 cm de espessura; são carnosos, suculentos e comestíveis, utilizados principalmente na forma de sucos, sendo também muito apreciados pela avifauna silvestre (LORENZI, 1992; CENTRO DE PESQUISAS ECO-NATURAIS - CEPEN, 2003; JORGE, 1992).

Estudos morfo-histológicos dos frutos, realizados por Jorge (1992), mostraram a existência de células pétreas no mesocarpo, cujo formato e dimensões apresentam interesse para a diagnose específica. Os estômatos e os tricomas da polpa são diferenciados daqueles observados nas folhas.

Fonte: Jorge (1992)

Figura 3 – Partes da espécie *Campomanesia phaea* - A: Ramo da espécie, B: Folha; C, D e E: Fruto

De acordo com Jorge (1992), o cambucizeiro é uma árvore relativamente pequena, que pode alcançar de 4 a 5 metros de altura, muito ramificada e bem copada. Apresenta casca fina e lisa que se renova todos os anos. Os ramos são fusco-pubescentes, enquanto jovens. As folhas são opostas, pecioladas verde-brilhantes, em sua face ventral, e um pouco mais claras na face dorsal. O ápice foliar é acuminado, a base cuneiforme, e a margem é lisa. Possuem consistência membranácea; são pubérulas, quando jovens, passando a glabras, quando alcançam pleno desenvolvimento. Medem de 5 a 8 cm de comprimento por 2 a 3 cm de diâmetro. As flores são axilares solitárias, com 2,5 cm de diâmetro, em média, e a coloração é alvinitente. Possuem cinco sépalas e cinco pétalas e numerosos estames exclusivos.

Fonte: Jorge (1992)

Figura 4 – Detalhe de glândulas secretoras de óleo, em secção transversal, periferia da folha de *Campomanesia phaea*

As epidermes foliares de *Campomanesia phaea* apresentam células de contorno poligonal para epiderme superior e ligeiramente sinuoso para a epiderme inferior, quando observadas de face. Os estômatos restritos à epiderme inferior são do tipo anomocítico, pouco frequente nas folhas da maioria das mirtáceas, segundo Metcalfe e Chalk (1979), citados por Jorge (1992).

Os pelos tectores cônicos são relativamente abundantes sobre ambas as epidermes. O mesófilo apresenta a estrutura heterogênea e assimétrica. A hipoderme é constituída por uma única fileira de células, e pode-se notar também a presença de glândulas secretoras sub-epidérmicas. Drusas e grãos de amido pequenos e arredondados ocorrem no mesófilo. Na região floemática, podem ser observados cristais prismáticos de oxalato de cálcio (JORGE, 1992).

No seu Dicionário das plantas úteis do Brasil (1926-1978), Manuel Pio Corrêa (1874-1934) assim descreve o cambuci: árvore pequena, ramos fusco-pubescentes, enquanto jovens; folhas pecioladas, ovadas ou ovado-oblongas, acuminadas, rígidas, granduloso-puntuadas, luzidias na página superior e mais pálidas e saliente-nervadas na inferior; flores brancas, de cinco sépalas e cinco pétalas, com numerosos estames, dispostas na axila dos ramos novos; fruto baga orbicular, contendo poucas sementes (CORRÊA, 1978).

Esse autor afirma que o cambuci pode fornecer madeira ótima para a marcenaria e carpintaria; suas dimensões, porém, só permitem o seu emprego em cabos de ferramentas e de instrumentos agrícolas; a casca, adstringente, é útil para curtume; os frutos, também adstringentes, são comestíveis e nos tempos coloniais tiveram muita voga, infusos em aguardente de cana, sós, ou juntamente com os de uvaia, dando a essa infusão um aroma e

paladar particulares e agradáveis. Destaca também a limitada distribuição geográfica do cambuci, encontrada apenas na vertente da Serra do Mar, que dá para o planalto da capital do estado de São Paulo e em todo o planalto, assim como em determinada área de Minas Gerais, sendo, porém, sempre bastante rara.

Outro proeminente botânico F.C. Hoehne (1941) e seus assistentes, Moyses Kuhlmann e Oswaldo Handro, também descreveram o cambuci, cultivado em campo experimental no Jardim Botânico de São Paulo, da seguinte forma: árvore bonita, ramos abertos, basto-foliosos; folhas opostas, curto-pecioladas, verde-brilhantes, ovaladas ou oboval-alongadas, acuminadas, mas obtusas no ápice, membranáceas, pubérulas, quando novas, depois glabras, de 5-8 cm de comprimento e 2-3 cm de largura; flores axilares, solitárias, de 2,5 cm de diâmetro, alvas; frutos verde-amarelados, maduros, moles, deprimidos de cima para baixo, com forma de panela de pedra indígena, muito suculentos, adstringentes e bons para refrescos. As flores brotam entre outubro e dezembro e os frutos aparecem entre abril e junho (HOEHNE et al., 1941).

De acordo com Jorge (1992), as folhas e as cascas do vegetal são adstringentes e aromáticas. Normalmente, empregam-se as folhas na elaboração de xaropes destinados ao tratamento de tosse e de infusões indicadas em caso de disenteria. Os frutos, muito suculentos e aromáticos, apresentam coloração verde-amarelada, quando maduros e são achatados de cima para baixo. Segundo Kawasaki e Landrum (1997), da sua forma vem o nome cambuci: deriva da palavra tupi-guarani, que designa “pote de barro”, (algumas vezes, pronunciada *cambuchi*) por causa da forma romboide de seu fruto, semelhante às panelas feitas no passado pelos indígenas.

As espécies desse gênero possuem importância econômica diversificada. Seus frutos comestíveis são consumidos por várias espécies de pássaros e mamíferos, sendo também usados na produção de doces caseiros, sorvetes, aguardente, licores e refrescos. Os estudos de Theodoluz et al. (1988), Schmeda-Hirschmann (1995), Markman et al. (2000) verificaram a presença de flavonóides em várias espécies de *Campomanesia*.

Osório et al. (2006) realizaram estudos com *Campomanesia lineatifolia*, fazendo a caracterização por cromatografia gasosa das substâncias voláteis nas folhas dessa espécie. Foram encontrados terpenóides, alcoóis, ácidos carboxílicos, ésteres, C13-norisoprenóides, compostos furânicos e β -tricetonas, sendo, essas últimas, os compostos majoritários.

Segundo Adati (2001), os frutos de *C. phaea* são considerados exóticos, possuindo interessantes propriedades aromáticas que os favorecem como agentes flavorizantes em alimentos e bebidas. Quanto à composição química, tem-se conhecimento de estudos

fitoquímicos e farmacológicos realizados por Adati (2001) nas folhas dessa espécie, detectando-se grande quantidade de óleo essencial, rico em linalol (11,11%), óxido de cariofileno (11,77%), β -cariofileno (6,33%), β -selineno (6,33%) e α -cadinol (1,94%), constituintes que apresentam grande valor comercial para as indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Kawasaki e Landrum (1997) consideraram o cambuci como uma frutífera rara e com alto valor econômico potencial.

2.1.7 A importância dos produtos florestais não madeireiros

O aproveitamento de vários produtos das florestas, além da madeira, é considerado hoje uma boa alternativa do ponto de vista social, à medida que fornece emprego e renda para as populações tradicionais que nelas vivem, inclusive, para os povos indígenas. É também ecologicamente correto, porque esse tipo de exploração pode assumir importância econômica, de forma sustentável, sem destruir os recursos naturais.

São considerados produtos florestais não madeireiros os recursos biológicos provenientes de matas nativas, de sistemas agroflorestais e de plantações florestais. Incluem uma ampla variedade de raízes, cascas, ramos, exsudatos, folhas, frutas, flores, sementes, castanhas, resinas, látex, óleos essenciais, fibras, forragem, fungos, bem como, as mais variadas plantas medicinais e comestíveis. Englobam também fungos, invertebrados, aves, animais, além da madeira para a fabricação de artesanato (Shanley et al., 2006).

Em muitas regiões temperadas e tropicais, tais produtos são extremamente importantes para a subsistência e para manter os estilos de vida e as culturas tradicionais no meio rural, representando, ao mesmo tempo, alimentos, remédios e abrigos. Podem se tornar também importantes fontes de renda. Durante séculos, esses bens – especiarias, plantas medicinais, fragrâncias, resinas e corantes – estimularam as viagens de exploração e sustentaram as rotas comerciais em todo o mundo.

A diversificação dos produtos florestais não madeireiros é bastante grande, assim como o potencial para a inclusão de novos produtos, principalmente na região dos trópicos, onde ocorre maior diversidade de espécies.

Segundo a Sociedade Brasileira de Silvicultura (2008), pelo menos 150 itens não madeireiros são referenciados no mercado internacional. A maior parte é comercializada em pequenas quantidades. Alguns desses itens possuem alto valor econômico, cujas cotações são, muitas vezes, cíclicas ou voláteis, enquanto outros podem ter preços razoavelmente estáveis.

No caso brasileiro, os que possuem maior significado econômico são: a resina extraída do *Pinus* sp., os óleos essenciais do *Eucalyptus* sp., a borracha natural extraída da

seringueira (*Hevea brasiliensis*), o tanino, a erva-mate (*Ilex paraguariensis*), a castanha-de-caju, obtida do cajueiro (*Anacardium occidentale*) e o mel, entre outros. O tanino é extraído da casca da árvore de *Acacia* sp., sendo utilizado na indústria de curtume, e também no tratamento de água.

A maior unidade de produção de extratos vegetais tanantes do mundo está localizada no Brasil. A composição química das folhas da erva-mate, por sua vez, proporciona inúmeras aplicações industriais, como a produção de remédios, bebidas, produtos de higiene, além de servir como insumo para a fabricação de alimentos. A castanha-de-caju representa uma boa alternativa de produção, principalmente para a população do Nordeste brasileiro, proporcionando renda e emprego, contribuindo, ao mesmo tempo, para a fixação do homem no campo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA, 2008).

De acordo com recentes estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dezessete produtos do extrativismo vegetal apresentaram queda de produção entre os anos de 2006 e 2007. Com exceção da castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa*) e fruto do açaí (*Euterpe oleracea*), houve redução na produção de castanha-de-caju, de erva-mate e de palmito, principalmente. Para os técnicos do IBGE, esse resultado ocorreu porque muitos bens de origem florestal passaram a ser manejados de forma sustentável, ou cultivados, em vez de simplesmente extraídos da natureza, o que seria um avanço significativo (IBGE, 2008).

Segundo o Centro de Pesquisa Florestal Internacional (Cifor), citado por Shanley et al. (2005), nos países em desenvolvimento, a demanda pelos produtos florestais não madeireiros apresenta grande crescimento. Esse fato se deve ao aumento da renda média da população, que passou a se interessar mais por alimentos, fibras, plantas medicinais, e, principalmente, por ativos vegetais, que entram na composição de cosméticos. Por sua vez, nas nações mais adiantadas, também se observa a tendência de expansão desse mercado, mesmo com a maior facilidade de acesso a seus substitutos sintéticos.

No caso específico dos óleos essenciais, existem vários grupos organizados em muitos pontos do Brasil que os produzem, extraindo-os de diversas espécies vegetais, para atender à demanda da indústria cosmética. É o caso, por exemplo, de um grupo de mulheres das comunidades de São Domingos, Nazaré e Pedreira, na Floresta Nacional de Tapajós (Amazônia), que produzem o óleo de andiroba (*Carapa guianensis*), usado na fabricação de sabonetes, cremes, pomadas e velas. Elas herdaram de seus antepassados o domínio da técnica da extração e conseguiram estabelecer um negócio rentável, a partir da elaboração de um

plano de manejo e da obtenção da licença do Ibama para o transporte do produto (SHANLEY; MEDINA, 2005).

Outro óleo de grande valor econômico para a indústria cosmética – o da castanha-do-brasil, ou castanha-do-pará (*Bertholletia excelsa*) – está sendo produzido, com bons resultados econômicos, por uma comunidade indígena, os caiapós. O projeto, iniciado em 2005, pelo Instituto Raoni, tem o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do governo da Bélgica. Estão engajados no projeto cerca de mil índios de três aldeias (Kubenkokre, Pukanu e Bau) no Alto Xingu, que trocaram a exploração ilegal da madeira do mogno por essa atividade sustentável. Após vários cursos de capacitação, os indígenas conseguiram se preparar para o beneficiamento do recurso florestal e se adaptar ao processo de padronização, necessário à sua comercialização. As três aldeias estão em uma região com grande potencial para a exploração de recursos naturais. A intenção é criar novas cadeias de negócios também para o babaçu (*Orbignya speciosa*), o pequi (*Caryocar brasiliense*), o buriti (*Mauritia vinifera*) e o cumaru (*Dipteryx odorata*), além de utilizar o farelo da castanha-do-brasil para a produção de bolos e de tortas (BESSELER, 2008).

A produção de bens da biodiversidade amazônica dirigida para a indústria cosmética não é novidade para os caiapós. Em 1984, durante a sua primeira viagem ao Brasil, a empresária britânica Anita Roddick (1943-2007), criadora da renomada marca *Body Shop* (rede de origem inglesa de cosméticos naturais, atualmente de propriedade da companhia francesa *L'Óreal*) visitou uma reserva florestal em Altamira, no estado do Pará, e decidiu criar alternativas econômicas para que os índios não precisassem viver da extração da madeira, transformando-os em fornecedores de matérias-primas utilizadas na fabricação de produtos da rede. Esse trabalho de forte apelo social e ambiental expandiu-se, transformando-se, em 1987, no programa *Trade non Aid*, voltado para o comércio justo de ativos vegetais com as populações tradicionais. A iniciativa chegou a ter parcerias com quase quarenta comunidades em todo o mundo, estimulando, por exemplo, a utilização do óleo de gergelim da Nicarágua, a manteiga de cacau de Gana, a juta de Bangladesh, e as castanhas dos caiapós brasileiros.¹ Segundo essa fonte, existe, também, atualmente, um intenso esforço para exportar o óleo de castanha-do-pará para a Itália e a Inglaterra. Trata-se de um produto de alta qualidade, que

¹ Fonte: mundodasmarcas.blogspot.com. Acesso: 29-4-2009, às 10h.

² (Fonte: <http://www.preciouswoods.com>. Acesso: 11-04-2012, às 11h.)

³ VIALLI, A. Cadeia produtiva é nova prioridade das empresas. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo. 29-4-2009.

apresenta baixa acidez, já certificado pelo *Forest Stewardship Council* e com a classificação de produto orgânico, fornecida pela Associação de Certificação “Instituto Biodinâmico”.

Considera-se, cada vez mais desejável, o manejo integrado de florestas para a extração de madeira e de produtos não madeireiros, em termos econômicos e sociais. No Brasil, algumas empresas exportadoras, certificadas pelo FSC, como a *Mil Madeireira* (Itacoara, Amazonas), subsidiária da companhia suíça *Precious Woods*, estabeleceu, há alguns anos, parcerias para manejar tais produtos de forma sustentável, visando principalmente a fabricação de produtos florestais diferenciados.²

Dessa forma, a cada dia, surgem novas alternativas de exploração de produtos não madeireiros, que abastecem diversos setores da indústria nacional e estrangeira, com matérias-primas destinadas às indústrias farmacêuticas, alimentícias ou de cosméticos. Embora as estatísticas oficiais sejam falhas e imprecisas em muitos países, a *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) estimou que o valor da sua utilização global foi de US\$ 4,7 bilhões, em 2005 (FAO, 2007).

O uso sustentável de insumos provenientes da biodiversidade brasileira é a principal plataforma tecnológica da companhia *Natura*, a maior fabricante nacional de cosméticos. O acesso a esse patrimônio genético ocorre pelo estabelecimento de contratos de fornecimento com comunidades extrativistas, grupos de agricultores familiares e de produtores rurais. Em geral, seus produtos seguem para empresas beneficiadoras, que, por sua vez, fornecem matérias-primas industrializadas para a *Natura*. Calcula-se que o valor do ingrediente natural é de, no máximo, 10% do total do produto. Mesmo não sendo seus parceiros diretos, a companhia realiza um trabalho específico com todas as comunidades associadas, visando a produção sustentável, que inclui também a elaboração de plano de manejo e a certificação de determinados ativos (INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA, 2007).

O fornecimento de produtos não madeireiros pelas comunidades tradicionais, destinado ao aproveitamento pela indústria cosmética é considerado ideal, porque pode se iniciar com o abastecimento de pequenas quantidades, de acordo com a capacidade de produção das comunidades.

Atualmente, as grandes companhias que operam no Brasil estão mudando sua concepção de sustentabilidade. Isto significa que estão praticando menos filantropia e reforçando mais as suas cadeias produtivas. Em pesquisa recente, grande parte dos representantes de uma centena de empresas do país declarou que está procurando adequar sua

² (Fonte: <http://www.preciouswoods.com>. Acesso: 11-04-2012, às 11h.)

rede de fornecedores e mudando processos e produtos, com o objetivo de atender os princípios sócio-ambientais, por pressão dos consumidores.³

Essa tendência parece irreversível, e no caso brasileiro, deve contribuir para a expansão das atividades geradoras de renda e emprego, ligadas à exploração de ativos naturais, de forma sustentável, privilegiando as boas práticas de manejo e a melhoria dos produtos por meio da certificação.

2.1.8 Análise sensorial

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993) a análise sensorial é a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos alimentos e materiais, como são percebidos pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição.

Para Spoto (anotações de aula, s/d)⁴, os métodos de avaliação sensorial podem ser divididos em:

- a) Métodos discriminativos ou métodos de diferença: servem para determinar se as amostras que sofreram diferentes tratamentos diferem sensorialmente entre si;
- b) Métodos descritivos ou métodos analíticos: envolvem tanto a discriminação como a descrição dos atributos sensoriais de um produto. Usualmente, os vários métodos analíticos são descritivos (porque descrevem as amostras em termos sensoriais) e quantitativos (porque avaliam numericamente a intensidade de cada atributo);
- c) Métodos afetivos: avaliam a preferência ou aceitação de um produto junto ao mercado consumido.

As provas discriminativas mais comumente empregadas são as seguintes: prova de comparação apareada simples; triangular; duo-trio; de comparações apareadas de Scheffé; e de comparações múltiplas e de ordenamento (ANZALDÚA-MORALES, 1994).

Para a avaliação organoléptica de um óleo volátil isolado, recomenda-se aplicar o óleo em um papel de filtro e cheirá-lo várias vezes durante a sua evaporação. Como cada componente de um óleo tem volatilidade diferente, é possível, com treino, distinguir diferentes frações desse óleo (SIMÕES, 1999).

³ VIALLI, A. Cadeia produtiva é nova prioridade das empresas. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo. 29-4-2009. p.B-14.

⁴ SPOTO, M.H.F. Métodos sensoriais de diferença: teste triangular, teste pareado e teste duo-trio. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”/Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. Anotações de aula. Disciplina: Análise sensorial (LAN 0166). s/d. 10p.

2.1.9 Caracterização edafo-climática das microrregiões objeto de amostragem no estado de São Paulo

Apresentam-se, a seguir, as características gerais das duas áreas de coleta de amostras para as análises laboratoriais em Paraibuna e Limeira, ambas situadas no estado de São Paulo.

Tabela 2 – Resumo das características gerais dos dois locais de coleta de amostras

Característica	Locais de amostragem	
	Paraibuna	Limeira
Localização	Região do Alto do Paraíba na escarpa da Serra do Mar, a 124 quilômetros da cidade de São Paulo	Região de Campinas, Noroeste de São Paulo, a 145 quilômetros da capital
Latitude	23° 23' 10" Sul	22° 33' 54" Sul
Longitude	45° 39' 44" Oeste	47° 24' 09" Oeste
Altitude	Altitudes próximas a 650 m	Altitudes entre 500 m a 800 m
Relevo	Irregular, por ser formado por uma fração da Serra do Mar. O embasamento rochoso é constituído preferencialmente por granitóides. A cobertura pedológica é pouco profunda	Levemente ondulado/plano, depressão periférica do estado de São Paulo. Embasamentos formam solos de altas fertilidades e relativamente profundos
Clima (Köppen)	Clima tropical de altitude Cwa, mesotérmico, com verões chuvosos e inverno seco, com precipitação média variando de 1300 mm a 1500 mm/ano, e com a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C	Clima tropical chuvoso Aw, temperatura média de 22°C e pluviosidade média anual entre 1.100 mm e 1.400 mm/ano, com inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18°C
Solo	- LVA9 = Latossolo Vermelho Amarelo, PVA39 = Argissolo Vermelho Amarelo, CX = Cambissolo Háplico	+LVA5 = Latossolo Vermelho Amarelo, OY2 Organossolo Mésico, PVA80 = Argissolo Vermelho Amarelo, LV19 = Latossolo Vermelho
Vegetação	Domínio da Mata Atlântica, sendo a Floresta Ombrófila Densa. É uma mata perenifólia, com dossel de até 50 m, com densa vegetação arbustiva	Domínio da Mata Atlântica, sendo a Floresta Estacional Semidecidual com transição para o “cerradão”

Fonte: EMBRAPA (2011); IBGE (1992); CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS (2011).

2.2 Material e métodos

2.2.1 Coleta do material vegetal

O material vegetal utilizado para o desenvolvimento desse trabalho foi obtido por meio de cinco coletas, efetuadas durante os anos de 2010 e de 2011, nas duas regiões objeto de pesquisa. A primeira amostragem, realizada na primavera de 2010 (mês de outubro), visou a prospecção e a demarcação dos indivíduos da espécie de *Campomanesia phaea* no campo, bem como desenvolver a padronização da metodologia a ser empregada nas demais coletas, realizadas ao longo do ano 2011.

Figura 5 – Material depositado no herbário da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Piracicaba-SP) para a identificação e confirmação da espécie estudada

As plantas amostradas foram coletadas em povoamentos cultivados (pomares) nas duas diferentes regiões propostas para o presente estudo: Paraibuna (SP) e Limeira (SP). Após a identificação e a demarcação das plantas no campo, as amostras coletadas foram herborizadas e depositadas no herbário ESA, do Departamento de Botânica, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP – em Piracicaba (SP).

As excisas foram cadastradas e registradas sob número ESA 114-275 para a planta que representava os indivíduos de Paraibuna (SP), coletados no dia 20 de fevereiro de 2011, e ESA 114-276 para o exemplar coletado em Limeira (SP), no dia 22 de fevereiro de 2011.

A coleta do material destinado ao estudo foi efetuada em dois pomares comerciais, a saber:

- Sítio do Belo (Área A): situado a aproximadamente vinte e cinco quilômetros do centro urbano de Paraibuna (SP), com acesso pelo quilômetro 30 da rodovia dos Tamoios (SP-99).
- Sítio Recanto da Natureza (Área B): situado a aproximadamente dez quilômetros do centro urbano de Limeira (SP), às margens da rodovia dos Bandeirantes (SP-348), à altura do quilômetro 155.

Tabela 3 – Caracterização geográfica das áreas de coleta do material botânico

Local de coleta	Município	Latitude	Longitude	Altitude (m)
Sítio do Belo	Paraibuna (SP)	23°27'50.77"S	45°42'37.37"O	728 a 755
Sítio Recanto da Natureza	Limeira (SP)	22°34'33.71"S	47°27'41.04"O	592 a 600

Durante as coletas foram levantadas informações sobre a localização geográfica das populações (latitude, longitude e altitude), por meio do *Global Positioning System*, com receptor portátil de sinal de satélite - GPS, modelo Garmim GPSII 40068128. Verificou-se também que nos dois locais de coleta, os povoamentos amostrados apresentavam árvores com alturas médias de 4 a 5 metros, e com idade aproximada de oito anos, que conferiu uma similaridade aos indivíduos amostrados nas duas áreas objeto da pesquisa.

<p>Localização das áreas de coleta em território nacional, no domínio da Mata Atlântica</p>	<p>Vista aproximada dos locais de coleta de material para estudo em laboratório: A: Paraibuna-SP; B: Limeira-SP</p>

<p>Vista aérea da propriedade onde foi coletado o material de estudo em Paraibuna –SP</p>	<p>Localização das árvores amostradas em campo em Paraibuna-SP</p>

<p>Vista aérea da propriedade onde foi coletado o material de estudo em Limeira-SP</p>	<p>Localização das árvores amostradas em campo em Limeira-SP</p>

Figura 6 – Caracterização dos locais de amostragens dos diferentes povoamentos de *Campomanesia phaea*

Foram realizadas cinco coletas em cada um dos dois locais selecionados (Paraibuna e Limeira, ambos no estado de São Paulo), em diferentes estações do ano, sempre no período matutino.

Tabela 4 – Descrição das coletas realizadas durante a execução do projeto

Coleta	Local	Data de coleta	Horário de coleta	Estação do ano	Observações de campo
001	Paraibuna	19-10-2010	10h15	Primavera1	Material utilizado para a padronização da metodologia. Presença de flores apenas em Limeira
	Limeira	17-10-2010	10h00		
002	Paraibuna	20-02-2011	9h20	Verão	Presença de frutos jovens em Paraibuna e frutos maduros em Limeira
	Limeira	23-02-2011	8h30		
003	Paraibuna	11-05-2011	10h00	Outono	Presença de frutos maduros em Paraibuna, ausência de frutos em Limeira
	Limeira	09-05-2011	9h00		
004	Paraibuna	27-07-2011	9h45	Inverno	Árvores sem flores e sem frutos, maior presença de ferrugem nos dois ambientes. As folhas foram selecionadas durante amostragem
	Limeira	25-07-2011	8h30		
005	Paraibuna	15-10-2011	10h30	Primavera2	Presença de flores nos dois povoamentos amostrados
	Limeira	12-10-2011	8h45		

Para a realização das análises propostas foi coletado aproximadamente de 1 (um) kg de ramos e folhas frescas de cada indivíduo das duas diferentes populações de plantas objeto de estudo, nos diversos períodos amostrados durante o ano. O total de indivíduos amostrados foi 9 (nove) para cada localidade (número de indivíduos determinados com base no planejamento estatístico preliminar), sendo, o material retirado do terço médio de cada planta escolhida, devidamente demarcada no campo, conforme esquema abaixo:

Figura 7 – Esquema indicativo da zona de retirada dos ramos e folhas dos indivíduos amostrados

<p>Equipamentos e utensílios utilizados na coleta das folhas</p>	<p>Aspecto da altura média das plantas (quatro metros) amostradas no campo (<i>Campomanesia phaea</i>)</p>

<p>Demarcação efetuada nos indivíduos selecionados para a pesquisa com as coordenadas geográficas registradas</p>	<p>Material botânico (ramos e folhas) coletado para a extração do óleo essencial</p>

<p>Detalhe da flor da espécie <i>Campomanesia phaea</i></p>	<p>Fruto típico da planta também utilizado na identificação da espécie</p>

Figura 8 – Caracterização das plantas objeto de estudo

2.2.2 Avaliação da fertilidade do solo nos sítios de coleta

Foram coletadas amostras compostas de solo (dez pontos de coleta em cada povoamento), retirando-se aproximadamente 500 g de solo, com o emprego de trado, em uma profundidade de 20-50 cm e posteriormente encaminhadas ao Laboratório de Fertilidade do Solo, do Departamento de Ciências do Solo e Nutrição Mineral das Plantas, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, para a realização de análises laboratoriais e determinação da sua fertilidade, em relação aos macronutrientes nas duas localidades, conforme apresentado no Apêndice 1.

2.2.3 Avaliação do clima regional nos compartimentos ambientais

Os dados climáticos das duas regiões objeto de estudo (Limeira-SP e Paraibuna-SP), foram obtidos com base nas informações disponibilizadas por estações meteorológicas existentes nas proximidades das áreas onde foram coletados os indivíduos (estações meteorológicas de Taubaté-SP e Limeira-SP), componentes do banco de dados do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do Instituto Agrônomo de Campinas – IAC.

As informações sobre o clima foram analisadas em função de cada estação do ano, levando-se em conta os valores médios dos três meses que antecederam a data da coleta. As séries históricas podem ser observadas no Apêndice 2.

2.2.4 Estudo do óleo essencial obtido a partir das folhas de *Campomanesia phaea*

O material vegetal coletado (ramos e folhas) nas duas áreas de amostragem foi selecionado, superficialmente limpo e picado com tesoura, de forma a aumentar a sua superfície de contato, para maior eficiência do processo de extração. A técnica empregada para a obtenção do óleo essencial foi a hidrodestilação em aparelho de *Clevenger* modificado. Essa operação foi realizada, em triplicata, segundo a metodologia estabelecida pelo Laboratório do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Genéticos Vegetais, Fitoquímica, do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC). A destilação durou duas horas. O óleo essencial obtido foi armazenado em recipientes de vidro, mantidos sob refrigeração a 4°C, até a realização das análises e ensaios.

2.2.4.1 Rendimento médio de óleo essencial

Os rendimentos aproximados do óleo essencial foram calculados por meio da diferença de massas e acordo com a seguinte fórmula:

$\text{Rendimento aproximado de óleo essencial (\%)} = \text{Massa de Óleo Essencial (g)} \times 100 / \text{Massa das folhas (g)}$

<p>Material coletado, aguardando o encaminhamento ao laboratório</p>	<p>Folhas processadas em até vinte quatro horas, a contar do momento da colheita</p>

<p>Aspecto das folhas a serem destiladas</p>	<p>Aparelhos utilizados para extração do óleo essencial no laboratório do Instituto Agrônomo de Campinas (SP)</p>

<p>Detalhe de aparelhagem de hidrodestilação empregado na extração do óleo em escala laboratorial</p>	<p>Óleo essencial obtido no processo</p>

Figura 9 – Sequência de operações para obtenção do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea*

2.2.4.2 Composição química do óleo essencial

A análise quantitativa das substâncias existentes no óleo extraídos das folhas da *C. phaea* foi efetuada em cromatógrafo gasoso com detector de ionização em chama (CG-DIC, Shimadzu, GC-2010/AOC-20i), dotado de coluna capilar de sílica fundida DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μ m), utilizando hélio como gás de arraste (1,0 mL/min), *split* 1/20 e o seguinte programa de temperaturas: 60°C – 180°C, 3°C/min.; 180°C – 240°C, 10°C/min.

A análise qualitativa da composição química dos óleos essenciais foi realizada em cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massas (CG-EM, Shimadzu, QP-5000), dotado de coluna capilar de sílica fundida OV-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μ m Ohio Valley Specialty Chemical, Inc.), operando por impacto de elétrons (70 eV.), hélio com gás de arraste (1,0 mL/min.), injetor a 240°C, detector a 230°C, *split* 1/20 e o seguinte programa de temperaturas: 60°C – 240°C, 3°C/min.

Os óleos essenciais foram solubilizados em acetato de etila (1 mg de óleo essencial/1 mL de solvente) e injetados no volume de 1 μ L, para as duas análises (CG-DIC e CG-EM).

A identificação das substâncias foi efetuada por meio da comparação dos seus espectros de massas com o banco de dados do sistema CG-EM (Nist. 62 lib.), literatura especializada (MCLAFFERTY; STAUFFER, 1989) e índices de retenção (ADAMS, 1995). Os índices de retenção (IR) das substâncias foram obtidos por meio da injeção de uma mistura padrão de hidrocarbonetos (C₉-C₂₄), aplicando-se a equação de Van den Dool e Kratz (VAN DEN DOOL; KRATZ, 1963).

2.2.5 Preparo dos extratos

Após a extração do óleo essencial por hidrodestilação, foram preparados extratos etanólicos dos resíduos das folhas para posterior realização das análises de atividade antioxidante e determinação do teor de fenóis totais.

O material proveniente, das quatro coletas de *C. phaea*, nas duas localidades (Paraibuna-SP e Limeira-SP) foi submetido ao processo de secagem em estufa de circulação de ar forçada a 40°C, sendo, posteriormente, moído em moinho de facas tipo Willey. Em seguida, foram pesadas 20 g de cada uma das nove amostras de cada coleta e feito um “pool”, do qual, em triplicata, foram pesados 30 g e adicionados 300 mL de etanol comercial, mantendo-se a solução sob agitação, em sistema orbital shaker a 37°C e a 120 rpm, por quatro horas. Após esse período, os extratos foram filtrados a vácuo. A solução foi transferida para balão de fundo redondo e o solvente eliminado em evaporador rotativo a 60°C para a obtenção do extrato seco. O extrato foi armazenado em frasco de vidro âmbar e, em seguida,

calculado o rendimento. As tabelas a seguir mostram os rendimentos obtidos para as amostras de Paraibuna-SP (tabela 5) e para as de Limeira-SP (tabela 6).

Tabela 5 – Rendimento médio dos extratos etanólicos das amostras coletadas em Paraibuna (SP)

Coleta	Massa do extrato (g)	Rendimento médio (%)
Verão	1,5040	5,0133
Outono	1,2510	4,1701
Inverno	1,3273	4,4244
Primavera	0,4371	1,4569

Tabela 6 – Rendimento médio dos extratos etanólicos das amostras coletadas em Limeira (SP)

Coleta	Massa do extrato (g)	Rendimento médio (%)
Verão	1,3726	4,5753
Outono	1,4552	4,8506
Inverno	1,0029	3,3431
Primavera	0,6095	2,0317

2.2.6 Avaliação do teor de fenóis totais

O teor de fenóis totais dos extratos etanólicos foi determinado com base na literatura, pelo método Folin-Ciocalteu (WATERMAN; MOLE, 1994; RUDNICK et al., 2007). Dessa forma, preparou-se uma solução-estoque, na concentração de 5 mg/mL, com 50 mg de extrato bruto diluído em 10 mL de álcool etílico. A partir da solução-estoque, preparou-se a solução a ser testada, na concentração de 0,5 mg/mL, a partir de 500 µL da solução estoque e completando-se o volume para 5 mL com a adição de água destilada, em um balão volumétrico.

Uma alíquota de 200 µL da amostra, na concentração de 0,5 mg/mL, foi adicionada a 200 µL do reagente Folin-Ciocalteu e 400 µL de solução saturada de carbonato de sódio (35%) e 3,2 mL de água destilada. A solução foi transferida para cubetas de quartzo (4 mL) e lida em espectrofotômetro UV-VISÍVEL, à absorvância de 760nm.

Para a quantificação do teor de fenóis totais, foi empregada uma curva-padrão, com uma solução de ácido gálico, nas concentrações de 0,1 a 0,7 mg/mL. Foi calculado um coeficiente de correlação (R^2), resultando $R^2 = 0,9955$, ao nível de significância de 5%. O teor de fenóis totais foi expresso em equivalente de ácido gálico (EAG) por grama de extrato.

Os testes foram realizados em triplicata e o teor de polifenóis totais foi expresso em mg de ácido gálico/g de amostra sendo que os resultados foram submetidos ao teste de Tukey ($P \leq 0,05$).

Figura 10 – Curva-padrão de ácido gálico

2.2.7 Avaliação da atividade antioxidante

A avaliação da atividade antioxidante dos extratos etanólicos obtidos a partir das folhas de *Campomanesia phaea*, foi efetuada por meio do método de sequestro de radicais livres DPPH (2,2-diifenil-1-picrilhidrazila), na concentração de 0,04% (4 mg de DPPH em 100 mL de etanol), de acordo com metodologia descrita na literatura (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). Como controle negativo dos testes, foi utilizado o DPPH (400 µL de etanol em 3600 µL de DPPH), e, como controle positivo, a solução de Trolox® (0,005% em 3600 µL de DPPH), pesados em balança analítica (BEL ENGINEERING – 200 g) e diluídos em balão volumétrico.

As amostras foram diluídas nas seguintes concentrações: 1,0 mg/mL; 0,5 mg/mL; 0,05 mg/mL e 0,005 mg/mL. A uma alíquota de 400 µL de cada amostra, adicionou-se 3600 µL da solução de DPPH. Depois de preparadas, as soluções foram incubadas por trinta minutos no escuro, sendo, posteriormente, transferidas para cubetas de quartzo, onde tiveram suas leituras de absorbância efetuadas em espectrofotômetro UV-VISÍVEL (Hitachi, U-2000, Japão), a 517 nm.

A atividade antioxidante foi calculada em função da porcentagem de redução, de acordo com a equação (A):

$$\text{Equação (A): \% redução} = [(A_B - A_A) / A_B] \times 100$$

onde:

A_B = absorbância média do controle negativo

A_A = absorbância média da amostra

Os resultados da atividade antioxidante dos extratos etanólicos foram submetidos à análise de regressão linear e expressos em concentração inibitória mínima (IC₅₀). Os valores do IC₅₀ foram calculados por meio do programa Microsoft Office (Excel), a partir da curva exponencial de primeira ordem.

2.3 Obtenção do óleo essencial em planta-piloto

O remanescente do material obtido na última coleta (Primavera 2; 2011) foi utilizado para a extração de óleo essencial, em planta semi-piloto, com capacidade de carga de aproximadamente 1 (um) kg de folhas. Essa extração buscou uma melhor avaliação do rendimento, com o material submetido a condições de pressão e temperatura controladas, para indicar seu possível aproveitamento comercial, em escala industrial.

Para tanto, as destilações das folhas foram realizadas com a mistura homogênea das nove amostras coletadas em campo, nas duas localidades (Paraibuna-SP e Limeira-SP). As extrações foram efetuadas com o emprego de material fresco (recém-colhido, armazenado e mantido refrigerado) e seco em estufa (40°C), até que atingisse peso constante.

A metodologia aplicada foi estabelecida pelo Laboratório do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Genéticos Vegetais, Fitoquímica, do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), utilizando-se a temperatura constante de 110°C e pressão de 0,5 kgf/cm² (8 psi). O tempo de destilação foi de quatro horas e a massa vegetal usada na avaliação foi de 900 g para as folhas frescas e 200 g para o material seco em estufa.

Figura 10 – Aspecto da planta semi-piloto empregada no experimento para a extração do óleo essencial de *Campomanesia phaea*

2.4 Análises sensoriais do óleo essencial de *Campomanesia phaea*

As amostras obtidas de óleo essencial, a partir das destilações em planta-piloto das folhas coletadas nas duas regiões objeto do presente estudo (Limeira-SP e Paraibuna-SP), foram avaliadas em relação a sua fragrância.

O desenvolvimento da avaliação foi efetuado no Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas, situado no Departamento Agroindústria, Alimentos e Nutrição (ESALQ/USP). As provas foram realizadas no dia vinte e oito de fevereiro de 2012, em dois períodos distintos: entre 9h00 e 11h00 e entre às 14h00 e 17h00.

Os testes sensoriais das fragrâncias foram realizados com uma equipe de sessenta provadores não treinados, de ambos os sexos, com idades variadas. A equipe de colaboradores foi formada por funcionários, estudantes, além de interessados na pesquisa, levando-se em conta a sua disponibilidade, e a capacidade discriminativa para avaliar a diferença sensorial entre as duas amostras apresentadas.

2.4.1 Preparo das amostras para a análise sensorial do óleo essencial

Os óleos essenciais obtidos a partir da destilação em planta-piloto foram diluídos na concentração de dez por cento (10%) em volume, com álcool etílico anidro neutro (Cerva 100% v/v).

As soluções foram aplicadas em tiras de papel de filtro qualitativo 80 g, cortados em fitas de aproximadamente 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, para a avaliação olfativa pelos provadores.

Em conjunto com as amostras, foram servidos grãos torrados de café para a remoção do odor residual, água mineral e a ficha de avaliação, com as respectivas orientações para a realização do teste.

Foram aplicados os seguintes testes sensoriais:

a) Teste triangular

O Teste Triangular teve como objetivo determinar a existência de diferença olfativa significativa, identificada pelos provadores, em relação à fragrância das amostras apresentadas, sendo uma elaborada com o óleo essencial proveniente de plantas da região de Limeira-SP (Amostra A) e a outra com o óleo proveniente de indivíduos da região de Paraibuna-SP (Amostra B).

As amostras devidamente codificadas, com algarismos de três dígitos, foram apresentadas simultaneamente à equipe dos provadores em cabines individuais. Em seguida, solicitou-se a cada provador que indicasse qual das três amostras era diferente das outras duas, descrevendo sua avaliação em ficha específica, conforme modelo apresentado a seguir (MEILGAARD et al., 2007).

Análise Sensorial de Fragrância – Óleo essencial		
Nome: _____	Sexo: _____	Idade: _____
Data: ____ / ____ / ____	Horário do Teste: _____	
<p>1. Você está recebendo 03 amostras de um novo produto que está sendo desenvolvido, para a eventual aplicação em cosméticos. Por favor, avalie as fragrâncias codificadas da esquerda para a direita. Duas amostras são iguais e uma é diferente. Identifique com um círculo a amostra diferente.</p> <p style="text-align: center;">_____ _____ _____</p>		
Comentários:		

Figura 11 – Modelo da ficha apresentada aos provadores para a realização da análise sensorial de fragrância do óleo essencial extraído de *Campomanesia phaea*

As apresentações das amostras nas bandejas seguiram o delineamento experimental em Quadrado Latino (4x4), com o objetivo de se eliminar eventual efeito de provador, de acordo com Cochran e Cox (1957). Os frascos, contendo as diferentes fragrâncias foram

colocados em bandejas plásticas e servidos aos provadores, observando a seguinte ordem de casualização (Tabela 7):

Tabela 7 – Delineamento experimental em Quadrado Latino (4x4) para o Teste Triangular de fragrâncias de óleo essencial de *Campomanesia phaea*

Provador	Amostras		
1	A	A	B
2	A	B	A
3	B	A	A
4	B	B	A
5	B	A	B
6	A	B	B
...			
60			

Legenda: Fragrância A: Limeira (SP) Fragrância B: Paraibuna (SP)

Para a avaliação estatística do teste triangular, foi empregada a hipótese e a distribuição do χ^2 (chi-quadrado) para verificar se havia diferença significativa entre as amostras testadas.

b) Teste de preferência

O teste de preferência foi aplicado com o objetivo de avaliar a preferência em relação às duas amostras de fragrâncias obtidas a partir dos óleos provenientes de extração em planta-piloto, provenientes das duas regiões objeto do presente trabalho (A: Limeira-SP e B: Paraibuna-SP). Para o desenvolvimento dos testes, as amostras foram apresentadas da mesma forma que as descritas no teste triangular, sendo solicitado ao provador que citasse a sua preferida, e, também, determinasse uma possível peculiaridade de cada amostra, de acordo com a ficha de análise sensorial, apresentada na Figura 12 (MEILGAARD, 2007).

Para a avaliação estatística do teste de comparação pareada, foi empregada a tabela de hipótese e distribuição do χ^2 (chi-quadrado) monocaudal, a fim de verificar se havia diferença significativa entre as amostras testadas (ASTM INTERNATIONAL, 2002).

c) Teste olfativo de aceitação com a utilização da escala hedônica

Para a avaliação da aceitação do óleo essencial como possível fragrância para o aproveitamento na indústria de cosméticos, as amostras foram apresentadas nas mesmas condições dos demais testes. Em seguida, solicitou-se que o avaliador realizasse uma classificação da aceitação de cada amostra, de acordo com uma escala hedônica, que variou de 1 (desgostei muitíssimo) a 7 (gostei muitíssimo), segundo Meilgaard (2007).

O conjunto de dados obtidos nas avaliações sensoriais foi submetido à análise de variância (ANOVA). Para a comparação das médias, no nível de significância de 5% ($p < 0,05$), foi aplicado o Teste de Tukey. A seguir, apresenta-se o modelo utilizado na análise sensorial de fragrância do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea*.

Análise Sensorial de Fragrância – Óleo essencial									
Nome: _____	Sexo: _____ Idade: _____								
Data: ____ / ____ / ____	Horário do Teste: _____								
<p>1. Você está recebendo duas amostras de diferentes fragrâncias, para o desenvolvimento de um eventual produto para aplicação cosmética. Por favor, sinta o aroma de cada uma das amostras e ordene-as de acordo com a sua preferência.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">_____</div> <div style="text-align: center;">_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> + preferida - preferida </div> <p>Comentários:</p> <p>Por favor, indique o que em particular você mais gostou ou menos gostou neste produto (use palavras ou frases):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Mais gostei:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Menos gostei:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> </div>									
<p>2. Represente o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra, de acordo com a seguinte escala:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">7 – Gostei muitíssimo</td> <td style="padding: 2px 5px;">3 – Desgostei</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">6 – Gostei muito</td> <td style="padding: 2px 5px;">2 – Desgostei muito</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">5 – Gostei</td> <td style="padding: 2px 5px;">1 – Desgostei muitíssimo</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">4 – Não gostei/nem desgostei</td> <td style="padding: 2px 5px;"></td> </tr> </table>		7 – Gostei muitíssimo	3 – Desgostei	6 – Gostei muito	2 – Desgostei muito	5 – Gostei	1 – Desgostei muitíssimo	4 – Não gostei/nem desgostei	
7 – Gostei muitíssimo	3 – Desgostei								
6 – Gostei muito	2 – Desgostei muito								
5 – Gostei	1 – Desgostei muitíssimo								
4 – Não gostei/nem desgostei									
Código da Amostra	Aroma								
Comentários:									

Figura 12 – Modelo de ficha utilizado nos testes de preferência e de aceitação com escala hedônica

Figura 13 – Aplicação dos testes de análise sensorial

2.5 Modelagem e análise exploratória dos dados

No estudo desenvolvido, adotou-se o nível de significância $\alpha = 0,05$. Assim, foram considerados significativos os parâmetros e/ou funções lineares de seus níveis, tais que $p \leq 0,05$.

Todos os procedimentos inferenciais, isto é, os testes de hipóteses e as estimativas por intervalo, foram precedidos por testes de homogeneidade de variâncias (Levene) e de normalidade (Shapiro-Wilk).

O modelo utilizado sobre o qual foram constatadas as pressuposições foi o de dois fatores cruzados com interação: $y_{ijk} = \mu + L_i + E_j + LE_{ij} + \varepsilon_{ijk}$, onde para $i = 1, 2$ locais (1 = Paraibuna e 2 = Limeira); $j = 1, 2, \dots, 5$ estações (1 = Primavera 1; 2 = Verão; 3 = Outono 4 = Inverno e 5 = Primavera 2); $k = 1, 2, \dots, 9$ árvores (cada árvore descreveu a média de três análises laboratoriais por estação), sendo: y_{ijk} é o rendimento do óleo essencial observado no local i , na estação j e na árvore k ; μ é uma constante inerente a todas as observações; L_i é o efeito do local i ; E_j é o efeito da estação j ; LE_{ij} é o efeito da interação entre o local i e a estação j ; ε_{ijk} é o erro aleatório atribuído ao rendimento y_{ijk} , com as condições de normalidade e homogeneidade de variâncias para os componentes da interação.

Nesse contexto, o rendimento do óleo essencial foi avaliado por meio da análise de variância paramétrica de um modelo fatorial completo com dois fatores (locais e estações), com comparações múltiplas obtidas pelo método de Tukey HSD. A estimativa dos intervalos de confiança foi feita pelo procedimento padrão adotado para as estimativas por intervalo.

Para testar as porcentagens dos componentes químicos, segundo a estação do ano e o local, bem como para a atividade antioxidante, utilizou-se a análise de variância não-paramétrica de Friedman e o teste não paramétrico de comparações múltiplas de Tukey.

A escolha dos componentes químicos mais importantes para o rendimento do óleo essencial foi feita por meio da técnica de redução de variáveis, dita análise de fatores, com a extração por componentes principais e rotação varimax normalizada. Nesse item, foram calculados, também, os coeficientes não paramétricos de correlação de Spearman entre os componentes de cada substância e o rendimento do óleo essencial. A seguir, apresenta-se o fluxograma contendo as etapas de execução do trabalho proposto.

Figura 14 - Fluxograma das etapas de execução do projeto

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Avaliação da fertilidade do solo nos dois locais de coleta das amostras de folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci)

Considerando que a fertilidade do solo influencia significativamente o desenvolvimento das espécies vegetais e a sua produção, apresentam-se, a seguir, as análises de solo, e suas respectivas interpretações, para as duas áreas objeto desse estudo, o Sítio do Belo, em Paraibuna (SP) e o Sítio Recanto da Natureza, em Limeira (SP).

Tabela 8 – Análise de solo das duas glebas objeto de estudo (Sítio do Belo em Paraibuna-SP e Sítio Recanto da Natureza em Limeira-SP)

Amostra	pH	M.O.	P	S	K	Ca	Mg	Al	H+Al	SB	T	V	M
	CaCl ₂	g dm ⁻³	mg dm ⁻³										%
Paraibuna	4,1	18	04	26	0,8	13	7	10	58	20,8	78,7	26	33
Limeira	5,3	30	104	37	1,2	70	32	1	34	103,2	137,4	75	1

a) Potencial hidrogeniônico (pH)

O potencial hidrogeniônico (pH) expressa a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade de um meio, medidas em uma escala de 0 a 14. Os meios ácidos possuem pH menor que 7; os meios neutros possuem pH em torno de 7; e os meios alcalinos, pH maior que 7.

Na maioria das plantas, a faixa de pH (extraído em H₂O) ideal situa-se entre 6 a 6,5, proporcionando o equilíbrio necessário para que grande parte dos nutrientes permaneça disponível à absorção pelas plantas. Nesse intervalo de pH, ocorre também a maior decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos do solo, tornando os nutrientes contidos nela mais disponíveis aos vegetais.

Com base nos valores apresentados, infere-se que o solo da área objeto de estudo localizada em Paraibuna (SP) apresenta um pH abaixo do adequado, podendo ser a causa da indisponibilidade às plantas de alguns nutrientes, como cálcio, potássio e magnésio. O solo da área situada em Limeira (SP), por sua vez, apresenta um pH próximo da faixa adequada, favorecendo, portanto, o desenvolvimento de culturas agroflorestais, como a espécie objeto desse estudo (*Campomanesia phaea*).

b) Matéria orgânica do solo

A matéria orgânica do solo representa o remanescente de resíduos animais e vegetais incorporados ao solo, ou dispostos sob sua superfície, na forma viva, ou, ainda, nos vários estágios de decomposição, excluindo-se a parte aérea das plantas.

Quando o teor de matéria orgânica é alto, verifica-se a melhoria das condições químicas e físicas do solo, com aumento da capacidade de troca de cátions (CTC), do fornecimento de nutrientes, melhor aeração, retenção de umidade e melhor desenvolvimento de raízes. Na análise efetuada (Tabela 8), observa-se que a propriedade localizada na região de Limeira-SP apresenta um teor maior de matéria orgânica no solo do que a situada em Paraibuna-SP, refletindo a maior capacidade de troca de cátions (CTC) deste solo.

c) Capacidade de troca de cátions (CTC)

Uma importante propriedade apresentada pelos solos é a denominada capacidade de troca de cátions (CTC), que expressa a quantidade total de cátions adsorvidos por unidade de peso ou volume de solo, representando indiretamente a quantidade de cargas negativas do solo.

A CTC verificada no solo de Limeira é maior do que a encontrada no solo de Paraibuna, e, portanto, sua capacidade de reter nutrientes também é maior.

d) Saturação por bases (V%)

A saturação em bases expressa, em porcentagem, a quantidade de bases trocáveis disponíveis no solo do total de cátions adsorvidos ao pH igual a sete. A saturação em bases e o pH estão correlacionados à acidez dos solos, e a interpretação dos valores é apresentada, a seguir, na tabela 9.

Tabela 9 – Correlação entre acidez, pH e saturação em bases no solo

Acidez	pH em CaCl ₂	Saturação por Bases	V %
Muito alta	Até 4,3	Muito baixa	0-25
Alta	4,4-5,0	Baixa	26-50
Média	5,1-5,5	Média	51-70
Baixa	5,6-6,0	Alta	71-90
Muito baixa	>6,0	Muito alta	>90

Fonte: Boletim Técnico IAC, n. 100, 1996.

O cálculo para estimar a saturação por bases é dado pela seguinte fórmula:

$$V\% = \frac{SB \times 100}{CTC}$$

onde:

(V%): valor da saturação em bases expresso em porcentagem;

(SB): refere-se a soma de bases cálcio, magnésio e potássio (Ca + Mg + K);

(CTC): é a capacidade de troca de cátions total.

Verificou-se que, na área objeto de estudo situada em Limeira-SP, o solo apresenta maior saturação por bases do que na gleba localizada em Paraibuna-SP.

e) Saturação por alumínio (m%)

A saturação por alumínio é o índice utilizado para estimar o nível de toxidez por alumínio nos solos. É dada pela seguinte equação:

$$m(\%) = \frac{Al \times 100}{CTC}$$

Quanto mais próximo de zero estiver esse valor, mais adequado é o solo para o cultivo agroflorestal. Na área objeto de estudo localizada em Paraibuna-SP, verificou-se que o solo apresenta a saturação por alumínio de 33%, e, portanto, as plantas ali existentes podem ser prejudicadas pelo alto teor desse elemento ($10 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$).

f) Teores de nutrientes no solo

Fósforo: O teor de fósforo médio do solo situa-se na faixa de 16 a 40 $\text{mg}.\text{dm}^{-3}$. Nas áreas objeto de estudo, o solo de Paraibuna-SP apresenta 4 $\text{mg}.\text{dm}^{-3}$, ou seja, abaixo do teor mínimo, e o de Limeira-SP é 104 $\text{mg}.\text{dm}^{-3}$, considerado teor alto.

Enxofre: O teor médio de enxofre no solo situa-se entre 10,1 e 15 $\text{mg}.\text{dm}^{-3}$. Nas áreas objeto de estudo, os solos de Limeira-SP e Paraibuna-SP apresentaram, respectivamente, 37 e 26 $\text{mg}.\text{dm}^{-3}$, ou seja, teores considerados altos.

Potássio: De acordo com o gráfico apresentado na Figura 16, que relaciona a produção relativa com o teor de potássio, observa-se que a faixa de teores médios de potássio no solo varia de 1,5 a 3,0 $\text{mmol}_c.\text{dm}^{-3}$, ou 3 a 5 % da CTC, para a produção relativa acima de 90%.

Figura 16 – Relação entre a produção relativa com o teor de potássio no solo

Verificou-se que nas áreas objeto de estudo, o solo de Limeira-SP apresentou $1,2 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$ de potássio (ou seja, 0,87% da CTC ocupada por este nutriente), enquanto que o solo de Paraibuna-SP apresentou $0,8 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$ (ou seja, 1% da CTC ocupada pelo nutriente). Dessa forma, observou-se que ambos os solos analisados apresentaram baixo teor de potássio.

Cálcio: Atua na rigidez das paredes celulares, no crescimento e funcionamento dos meristemas, incluindo no ápice radicular. É um macronutriente secundário e sua deficiência causa o atrofiamento das raízes e maior susceptibilidade às doenças. O teor médio deste nutriente no solo é de 4 a $7 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$. Os dois solos analisados (Limeira-SP e Paraibuna-SP) possuem alto teor de cálcio, apresentando, respectivamente, 70 e $13 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$. Em relação à CTC, o solo de Paraibuna-SP apresenta baixa porcentagem de cálcio (16,52%) enquanto que o solo de Limeira-SP apresenta alta porcentagem da CTC ocupada pelo cálcio (50,9%).

Magnésio: Faz parte da molécula da clorofila, atua na ativação enzimática, como cofator de várias reações, auxiliando também na absorção de fósforo pela célula. O teor médio desse nutriente no solo é de 5 a $8 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$, sendo, que o solo de Paraibuna-SP apresentou teor médio ($7 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$), e o solo de Limeira-SP teor alto ($32 \text{ mmol}_c.\text{dm}^{-3}$) de magnésio.

Em uma avaliação resumida dos resultados das análises de solo efetuadas para as áreas objeto de estudo, pôde-se inferir que o solo existente na propriedade localizada na região de Limeira-SP (Sítio Recanto da Natureza), apresenta características químicas mais apropriadas ao cultivo agroflorestal do que o solo encontrado na propriedade situada em Paraibuna-SP (Sítio do Belo).

3.2 Avaliação do clima nas microrregiões objeto de estudo (Paraibuna-SP e Limeira-SP)

Segundo a classificação climática de Köppen, baseada em dados mensais pluviométricos e termométricos, o estado de São Paulo abrange sete tipos climáticos distintos, a maioria deles considerados climas úmidos. De acordo com informações obtidas pelo site <http://orion.cpa.unicamp.br/imagens/classkoeppensp2.gif> (Acesso: 16-4-2012), do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), a microrregião estudada onde se insere a gleba localizada em Paraibuna-SP enquadra-se na classificação climática tipo CWa, ou seja, clima tropical de altitude, com chuvas no verão e período seco no inverno, sendo a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C.

A área onde se encontra o Sítio Recanto da Natureza, na região de Limeira-SP, por sua vez, classifica-se no domínio climático Aw, ou seja, tropical chuvoso com inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18°C. O mês mais seco tem precipitação inferior a 60 mm e o período chuvoso se atrasa para o outono.

Tabela 10 – Classificação climática resumida das duas microrregiões (Paraibuna-SP e Limeira-SP) onde se inserem as áreas objeto de estudo (Sítio do Belo e Sítio Recanto da Natureza, respectivamente)

Paraibuna – SP	Limeira – SP
Clima Cwa: temperado úmido com inverno seco e verão quente	Clima Aw: clima tropical com estação seca de inverno
Tipo - Clima tropical	Tipo - Clima temperado quente
Clima megatérmico	Clima mesotérmico
Temperatura média do mês mais frio do ano maior que 18°C	Temperatura média dos três meses mais frios compreendidas entre -3°C e 18°C. Temperatura média do mês mais quente maior que 10 °C
Estação invernal ausente	Estações de verão e inverno bem definidas
Forte precipitação anual (superior à evapotranspiração potencial anual)	Precipitações equilibradas
Chuvas ocorrentes no verão	Chuvas ocorrentes no verão

Fonte: Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), 2012. Disponível em: <http://orion.cpa.unicamp.br/imagens/classkoeppensp2.gif>. Acesso: 16-4-2012.

Considerando que o trabalho realizado avaliou as amostras coletadas em diferentes estações do ano, apresentam-se, a seguir, na tabela 11, as características climáticas de cada uma delas, com base nas informações pesquisadas junto ao banco de dados das estações meteorológicas de cada uma das regiões (Paraibuna-SP e Limeira-SP).

Tabela 11 – Características climáticas das duas regiões objeto de estudo, segundo o local e o período de coleta. Valores médios de leituras efetuadas durante as estações do ano, em que foram coletadas as folhas

VARIÁVEIS		ESTAÇÕES DO ANO				
		Primavera (1)	Verão	Outono	Inverno	Primavera (2)
Paraibuna-SP	Temperaturas máximas (°C)	27.5	31.9	29.4	25.0	28.1
	Temperaturas mínimas (°C)	12.9	19.9	18.0	11.2	13.5
	Temperatura média (°C)	20.3	25.9	23.7	18.1	20.8
	Precipitação (mm)	2.3	14.5	15.2	1.8	3.3
	Evapotranspiração (mm)	9.0	17.7	12.1	6.2	9.3
Limeira-SP	Temperaturas máximas (°C)	27.6	30.1	28.1	24.7	28.3
	Temperaturas mínimas (°C)	12.3	18.3	16.8	9.4	12.7
	Temperatura média (°C)	19.9	25.2	22.4	17.0	20.5
	Precipitação (mm)	2.6	23.7	15.3	2.6	6.5
	Evapotranspiração (mm)	9.0	15.1	11.0	5.9	9.2

Por meio da avaliação dos dados climatológicos obtidos, pôde-se notar que os valores médios (tabela 11) das variáveis estudadas (Temperatura máxima, média, mínima, precipitação e evapotranspiração) foram próximos para os dois microclimas das regiões objetos de estudo, e pela análise das séries históricas (Apêndice 2), os valores não apresentaram resultados discrepantes para nenhuma das duas microrregiões.

Dessa forma, pôde-se inferir que essas variáveis climáticas não foram preponderantes sobre os rendimentos de óleo essencial, ou causadoras de grandes estresses que pudessem transformar significativamente as avaliações quali-quantitativas dos óleos ou extratos em questão.

3.3 Avaliação do óleo essencial extraído das folhas da espécie *Campomanesia phaea*

3.3.1 Rendimento de óleo essencial

A tabela 12, a seguir, apresenta o resumo dos resultados gerais obtidos neste experimento para o rendimento do óleo essencial extraído das folhas da espécie *Campomanesia phaea* (cambuci).

Tabela 12 – Síntese dos resultados em termos do rendimento percentual médio do óleo essencial, segundo o local e a estação do ano em que se efetuou a coleta de folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci)

Fatores		Número de casos (**)	Estimativa do desvio-padrão	Estimativa do rendimento médio		
				por ponto (*)	por intervalo (95%)	
					LI	LS
Geral		270	0.0351	0.1237	0.1195	0.1279
Local	Paraibuna	135	0.0253	0.1100 ^b	0.1057	0.1143
	Limeira	135	0.0382	0.1374 ^a	0.1309	0.1439
Estação	Primavera 1	54	0.0533	0.1434 ^a	0.1289	0.1580
	Verão	54	0.0208	0.1329 ^{a,b}	0.1273	0.1386
	Outono	54	0.0300	0.1119 ^c	0.1037	0.1201
	Inverno	54	0.0166	0.1088 ^c	0.1043	0.1134
	Primavera 2	54	0.0309	0.1215 ^b	0.1131	0.1300
Estações em Paraibuna	Primavera 1	27	0.0217	0.1092 ^b	0.1006	0.1178
	Verão	27	0.0120	0.1291 ^a	0.1244	0.1339
	Outono	27	0.0322	0.1021 ^b	0.0893	0.1148
	Inverno	27	0.0186	0.1034 ^b	0.0960	0.1107
	Primavera 2	27	0.0282	0.1063 ^b	0.0952	0.1175
Estações em Limeira	Primavera 1	27	0.0538	0.1777 ^a	0.1564	0.1990
	Verão	27	0.0265	0.1368 ^b	0.1263	0.1473
	Outono	27	0.0244	0.1217 ^{bc}	0.1120	0.1314
	Inverno	27	0.0124	0.1143 ^c	0.1094	0.1192
	Primavera 2	27	0.0260	0.1367 ^b	0.1265	0.1470
Locais na Primavera 1	Paraibuna	27	0.0217	0.1092 ^b	0.1006	0.1178
	Limeira	27	0.0538	0.1777 ^a	0.1564	0.1990
Locais no Verão	Paraibuna	27	0.0120	0.1291 ^a	0.1244	0.1339
	Limeira	27	0.0265	0.1368 ^a	0.1263	0.1473
Locais no Outono	Paraibuna	27	0.0322	0.1021 ^b	0.0893	0.1148
	Limeira	27	0.0244	0.1217 ^a	0.1120	0.1314
Locais no Inverno	Paraibuna	27	0.0186	0.1034 ^b	0.0960	0.1107
	Limeira	27	0.0124	0.1143 ^a	0.1094	0.1192
Locais na Primavera 2	Paraibuna	27	0.0282	0.1063 ^b	0.0952	0.1175
	Limeira	27	0.0260	0.1367 ^a	0.1265	0.1470

Observações:

(*) Em cada estrato, letras diferentes indicam diferença significativa entre rendimentos médios.

(**) Cada observação é média dos resultados de três extrações laboratoriais.

a) Efeitos do local e da estação em que foi realizada a coleta

Conforme apresentado no item 2.5 “Modelagem e análise exploratória dos dados”, o modelo adotado sobre o qual foram constatadas as pressuposições foi o de dois fatores cruzados com interação.

A análise de variância está descrita na tabela 13, a seguir. Observa-se que, além dos efeitos principais do local e da estação do ano da coleta do material, a interação também apresentou efeitos altamente significativos ($p < 0.0001$).

Nesse contexto, não foi possível concluir os efeitos principais e o modelo foi reparametrizado, de modo a permitir as análises de estações “dentro” de locais (item b) e de locais “dentro” de estações (item c).

Tabela 13 – Análise de variância da variável rendimento do óleo essencial extraído de *Campomanesia phaea*

Variações consideradas	GL	SQ Tipo III	QM	F_{Calculado}	P valor
Local	1	0.0508	0.0508	64.99	< 0.0001
Estação	4	0.0453	0.0113	14.51	< 0.0001
Local <i>versus</i> Estação	4	0.0327	0.0082	10.45	< 0.0001
Modelo	9	0.1288	0.0143	18.31	< 0.0001
Resíduo	260	0.2032	0.0008		
Total	269	0.3320			

b) Efeitos das estações do ano em cada local amostrado

Por meio da tabela 14, constatou-se que a diferença entre locais foi altamente significativa ($p < 0.0001$) e, como pode ser verificado nas tabelas 12 e tabela 15, bem como na figura 17, as coletas realizadas no município de Limeira-SP (0.1374%) apresentaram rendimento médio superior ($p < 0.0001$) às realizadas no município de Paraibuna-SP (0.1100%).

Tabela 14 – Análise de variância da variável rendimento do óleo essencial extraído de *Campomanesia phaea* para contrastes das estações do ano em cada local

Variações consideradas	GL	SQ Tipo III	QM	F_{Calculado}	P valor
Local	1	0.0508	0.0508	64.99	< 0.0001
Estação dentro de local	8	0.0780	0.0098	12.48	< 0.0001
Modelo	9	0.1288	0.0143	18.31	< 0.0001
Resíduo	260	0.2032	0.0008		
Total	269	0.3320			

Tabela 15 – Resultados do teste de Tukey – Valores-p observados entre os dois locais de coleta

Locais	0.1100%	0.1374%
	Paraibuna	Limeira
Paraibuna		< 0.0001
Limeira	< 0.0001

Figura 17 – Rendimento do óleo essencial, segundo o local da coleta das folhas

De modo análogo, observou-se que as diversas estações do ano apresentaram comportamento diferenciado em cada local ($p < 0.0001$), como pode ser visualizado na figura 18 e constatado na tabela 12, e nas tabelas 16 e 17, que descrevem os resultados dos testes de Tukey HSD.

Figura 18 – Rendimento do óleo essencial segundo as estações do ano, em cada local da coleta das folhas

Em Paraibuna (tabela 16) o rendimento médio observado no verão (0.1291%) foi superior ao observado nas demais estações: primavera 1 (0.1092% com $p = 0.0168$); outono (0.1021% com $p = 0.0003$); inverno (0.1034%, com $p = 0.0006$) e primavera 2 (0.1063% com $p = 0.0037$). Por outro lado, não foram constatadas diferenças significativas ($p > 0.05$) entre os rendimentos médios observados na primavera 1, no outono, no inverno e na primavera 2.

Tabela 16 – Resultados do teste de Tukey – Valores-p observados entre estações em Paraibuna (SP)

Estações	0.1092%	0.1291%	0.1021%	0.1034%	0.1063%
	Primavera 1	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2
Primavera 1		0.0168	0.8037	0.8953	0.9919
Verão	0.0168		0.0003	0.0006	0.0037
Outono	0.8037	0.0003		0.9996	0.9647
Inverno	0.8953	0.0006	0.9996		0.9908
Primavera 2	0.9919	0.0037	0.9647	0.9908	

Em Limeira, o rendimento observado na primavera 1 (0.1777%) foi superior ($p < 0.0001$) ao observado nas demais estações, conforme tabela 17. Em segundo lugar, sem diferença significativa entre si ($p = 0.6679$), ficaram os rendimentos médios observados no verão (0.1368%) e na primavera 2 (0.1367%). O menor rendimento médio foi observado no inverno (0.1143%), embora sem diferença significativa com o outono ($p = 0.9123$). Este, por sua vez, apresentou um rendimento médio intermediário (0.1217%), sem apresentar diferenças significativas com os observados no verão ($p = 0.4057$), no inverno ($p = 0.9123$) e na primavera 2 ($p = 0.4071$).

Tabela 17 – Resultados do teste de Tukey – Valores-p observados entre estações em Limeira (SP)

Estações	0.1777%	0.1368%	0.1217%	0.1143%	0.1367%
	Primavera 1	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2
Primavera 1		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
Verão	< 0.0001		0.4057	0.0497	0.6679
Outono	< 0.0001	0.4057		0.9123	0.4071
Inverno	< 0.0001	0.0497	0.9123		0.0302
Primavera 2	< 0.0001	0.6679	0.4071	0.0302	

c) Efeitos dos locais em cada estação

Por meio da tabela 18, constatou-se que a diferença entre estações foi altamente significativa ($p < 0.0001$) e, como pode ser verificado nas tabelas 12 e 19 e visualizado na figura 19, o maior rendimento médio foi observado na primavera 1 (0.1434%), embora sem diferença significativa ($p = 0.4596$) com o observado no verão (0.1329%).

Em contrapartida, os menores rendimentos médios foram verificados, sem diferença significativa entre si ($p = 0.9890$), no outono (0.1119%) e no inverno (0.1088%). A primavera 2 apresentou um rendimento médio intermediário (0.1215%), sem apresentar diferença significativa ($p = 0.3724$) com o obtido no verão.

Tabela 18 – Análise de variância da variável rendimento do óleo essencial para contrastes de locais em cada estação

Variações consideradas	GL	SQ Tipo III	QM	F _{Calculado}	P valor
Estação	4	0.0453	0.0113	14.51	<.0001
Local dentro de estação	5	0.0835	0.0167	21.36	<.0001
Modelo	9	0.1288	0.0143	18.31	<.0001
Resíduo	260	0.2032	0.0008		
Total	269	0.3320			

Tabela 19 – Resultados do teste de Tukey – Valores-p observados entre estações

Estações	0.1434%	0.1329%	0.1119%	0.1088%	0.1215%
	Primavera 1	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2
Primavera 1		0.4596	< 0.0001	< 0.0001	0.0049
Verão	0.4596		0.0079	0.0013	0.3724
Outono	< 0.0001	0.0079		0.9890	0.0351
Inverno	< 0.0001	0.0013	0.9890		0.0336
Primavera 2	0.0049	0.3724	0.0351	0.0336

Figura 19 – Rendimento do óleo essencial segundo a estação da coleta das folhas

Como pode ser observado na tabela 18, constatado na tabela 20 e visualizado na figura 20, exceto no verão, os rendimentos médios apresentaram comportamento diferenciado entre locais, em cada estação considerada.

Assim, com exceção do verão, que não apontou diferença significativa ($p = 0.1785$) entre os rendimentos médios observados em Paraibuna-SP (0.1291%) e Limeira-SP (0.1368%), em todas as demais estações o rendimento médio observado em Limeira-SP foi superior ao observado em Paraibuna-SP.

Verifica-se que apenas no verão as coletas realizadas em Limeira-SP não apresentaram rendimentos superiores ($p = 0.1714$) às realizadas em Paraibuna-SP.

Tabela 20 – Resultados do teste de Tukey – Valores-p observados entre locais, em cada estação de coleta

Primavera 1		
Locais	0.1092%	0.1777%
	Paraibuna	Limeira
Paraibuna		< 0.0001
Limeira	< 0.0001	
Verão		
Locais	0.1291%	0.1368%
	Paraibuna	Limeira
Paraibuna		0.1785
Limeira	0.1785	
Outono		
Locais	0.1021%	0.1217%
	Paraibuna	Limeira
Paraibuna		0.0148
Limeira	0.0148	
Inverno		
Locais	0.1034%	0.1143%
	Paraibuna	Limeira
Paraibuna		0.0142
Limeira	0.0142	
Primavera 2		
Locais	0.1063%	0.1367%
	Paraibuna	Limeira
Paraibuna		0.0002
Limeira	0.0002

Figura 20 – Rendimento do óleo essencial segundo o local, em cada estação de coleta das folhas

d) Correlações entre variáveis climáticas estudadas e rendimento de óleo essencial

Tabela 21 – Coeficientes de correlação de Pearson entre variáveis climáticas e rendimento do óleo essencial

Locais	Estatísticas	Variáveis climáticas				
		Temperatura Máxima	Temperatura Mínima	Temperatura Média	Precipitação	Evapotranspiração
Paraibuna	Correlação	0.75	0.63	0.69	0.43	0.83
	P - Valor	0.0034	0.0098	0.0081	0.0363	0.0022
Limeira	Correlação	0.30	-0.02	0.08	-0.24	0.11
	P - Valor	0.0445	0.8735	0.7112	0.0498	0.0770

Figura 21 – Coeficientes de correlação de Pearson entre variáveis climáticas e rendimento do óleo essencial, segundo o local

Pôde-se observar por meio da figura 21 que o rendimento obtido em Paraibuna-SP esteve mais correlacionado com as variáveis climáticas (Temperatura máxima, mínima, média precipitação e evapotranspiração) que os obtidos em Limeira-SP. Os valores obtidos para as correlações foram evapotranspiração (0,83) sendo essa a que mais se correlacionou com os rendimentos médios das amostras, seguida da temperatura máxima (0,75), média (0,69) e mínima, sendo precipitação a variável que menos se correlacionou com o rendimento das amostras para Paraibuna-SP. Analogamente em Limeira-SP os resultados apresentaram coeficientes de correlação abaixo dos observados em Paraibuna-SP, sendo em alguns casos até mesmo negativos.

3.3.2 Composição química do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci)

As análises da composição química dos óleos essenciais realizadas durante o período experimental permitiram detectar a presença de 29 (vinte nove) substâncias químicas presentes no óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea*. A média geral dos compostos identificados foi de 92,61%, sendo que desse total de compostos, 7 (sete) eram da classe dos monoterpenos e 22 (vinte dois), pertenciam ao grupo dos sesquiterpenos conforme demonstra a tabela 22.

Tabela 22 – Classificação dos compostos químicos detectados no óleo essencial de *C. phaea*

Classe	Substância	
monoterpenos	α -pineno	
	β -pineno	
	limoneno	
	1,8-cineol	
	<i>trans</i> - β -ocimeno	
	linalol	
	α -terpineol	
sesquiterpenos	α -copaeno	biciclogermacreno
	β -elemeno	germacreno A
	<i>trans</i> -cariofileno	γ -cadineno
	β -copaeno	δ -cadineno
	aromadendreno	germacreno B
	α -humuleno	<i>trans</i> -nerolidol
	<i>allo</i> -aromadendreno	espatulenol
	γ -muuroleno	óxido de cariofileno
	germacreno D	10- <i>epi</i> - γ -eudesmol
	β -selineno	1- <i>epi</i> -cubenol

Figura 21 – Distribuição dos compostos químicos de acordo com a sua classificação química

Em face da heterogeneidade de variâncias apresentadas entre as diversas estações do ano e cada substância encontrada, optou-se por adotar procedimentos não paramétricos.

Assim, para testar a igualdade entre as estações para cada substância, adotou-se a análise de variância não-paramétrica de Kruskal-Wallis e o teste não paramétrico de comparações múltiplas de Tukey. Tais resultados podem ser observados na tabela 21.

De modo análogo, as correlações das substâncias com o rendimento foram calculadas por meio do coeficiente de correlação linear não paramétrico de Spearman, cujos resultados podem ser observados na tabela 22.

Os teores dos compostos encontrados no óleo essencial de *C. phaea*, expressos em porcentagens, permitiram verificar que houve grande variação em relação à interação dos diferentes tratamentos.

As possíveis causas dessa variação foram as diferenças entre os indivíduos estudados, a estação do ano de coleta, a localidade de amostragem (Paraibuna-SP e Limeira-SP), entre outras variáveis que pudessem vir a ocorrer dentro do processo de obtenção e análise do óleo, tais como: condições e procedimentos de coleta (ex: folhas jovens e folhas maduras), alterações devido à armazenagem e ao transporte das amostras, variações de extração do óleo, condições de armazenagem após extração do óleo e análise, entre outras.

De qualquer forma, para as condições do presente estudo, os resultados possibilitaram caracterizar um quimiotipo único para a espécie *C. phaea* com a verificação de 29 compostos para cada local, na média das porcentagens relativa da composição química.

Tabela 21 – Composição química do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci), em porcentagens médias, segundo o local e a estação do ano em que foi efetuada a coleta (continua)

SUBSTÂNCIA	PARAIBUNA						LIMEIRA					
	Primavera 1 (*)	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2	Geral (**)	Primavera 1	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2	Geral
α -pineno	4.93 ^a	3.05 ^{ab}	4.45 ^a	2.71 ^b	4.71 ^a	3.97 ^A	4.59 ^a	1.64 ^b	4.45 ^a	1.07 ^b	3.84 ^a	3.12 ^B
β -pineno	3.99 ^a	2.66 ^{ab}	3.69 ^a	1.96 ^b	3.64 ^a	3.19 ^A	3.76 ^a	1.62 ^b	3.69 ^a	1.27 ^b	3.32 ^a	2.73 ^A
limoneno	1.79 ^a	1.08 ^{ab}	1.42 ^a	1.33 ^a	2.16 ^a	1.56 ^A	1.46 ^a	1.16 ^{ab}	2.33 ^a	1.00 ^b	2.12 ^a	1.61 ^A
1,8-cineol	2.10 ^{ab}	1.62 ^b	2.01 ^{ab}	1.77 ^b	3.27 ^a	2.15 ^A	1.78 ^b	0.84 ^b	1.45 ^b	0.88 ^b	1.28 ^b	1.24 ^A
<i>trans</i> - β -ocimeno	4.76 ^b	7.29 ^a	7.85 ^a	4.18 ^{bc}	8.24 ^a	6.47 ^A	8.45 ^a	3.09 ^c	7.01 ^a	4.57 ^b	5.72 ^b	5.77 ^A
linalol	16.81 ^a	11.81 ^b	10.96 ^b	14.09 ^a	17.91 ^a	14.32 ^A	15.22 ^a	10.89 ^b	11.84 ^b	9.63 ^b	15.74 ^a	12.67 ^A
α -terpineol	0.95 ^a	0.61 ^b	0.79 ^b	0.74 ^b	1.02 ^a	0.82 ^A	0.57 ^b	0.74 ^b	0.65 ^b	0.59 ^b	0.65 ^b	0.64 ^B
α -copaeno	1.29 ^b	2.22 ^a	1.83 ^a	1.40 ^b	1.66 ^a	1.68 ^A	1.21 ^b	1.29 ^b	1.05 ^b	1.18 ^b	1.06 ^b	1.16 ^B
β -elemeno	0.59 ^c	0.68 ^c	0.44 ^c	1.14 ^b	0.56 ^c	0.68 ^B	1.75 ^a	1.36 ^b	1.32 ^b	1.43 ^b	2.05 ^a	1.58 ^A
<i>trans</i> -cariofileno	11.46 ^{ab}	13.85 ^a	11.55 ^{ab}	11.52 ^{ab}	9.96 ^b	11.67 ^A	9.65 ^b	13.18 ^a	9.85 ^b	10.38 ^b	9.82 ^b	10.58 ^A
β -copaeno	0.48 ^a	0.84 ^a	0.58 ^a	0.50 ^a	0.60 ^a	0.60 ^A	0.47 ^a	0.59 ^a	0.56 ^a	0.65 ^a	0.57 ^a	0.57 ^A
aromadendreno	0.66 ^b	0.91 ^a	0.64 ^b	0.58 ^b	0.71 ^{ab}	0.70 ^B	0.68 ^b	0.97 ^a	0.90 ^a	1.17 ^a	1.04 ^a	0.95 ^A
α -humuleno	2.30 ^b	3.25 ^a	2.75 ^b	2.56 ^b	2.54 ^b	2.68 ^A	2.49 ^b	3.19 ^a	2.66 ^b	2.83 ^a	2.52 ^b	2.74 ^A
<i>allo</i> -aromadendreno	0.71 ^c	1.35 ^{ab}	1.05 ^b	1.02 ^b	1.04 ^b	1.03 ^B	1.07 ^b	1.30 ^{ab}	1.18 ^b	1.62 ^a	1.53 ^a	1.34 ^A

Tabela 21– Composição química média (%) do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci), em porcentagens médias, segundo o local e a estação do ano em que foi efetuada a coleta (continuação)

SUBSTÂNCIA	PARAIBUNA						LIMEIRA					
	Primavera 1 (*)	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2	Geral (**)	Primavera 1	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2	Geral
γ -muuroleno	1.55 ^b	2.44 ^a	1.77 ^b	1.77 ^b	1.89 ^b	1.88 ^A	1.73 ^b	2.31 ^a	1.90 ^b	2.55 ^a	2.03 ^b	2.10 ^A
germacreno D	1.01 ^b	2.23 ^a	1.67 ^a	1.59 ^{ab}	1.24 ^b	1.55 ^A	1.80 ^a	1.47 ^b	1.66 ^a	1.23 ^b	1.46 ^b	1.52 ^A
β -selineno	2.21 ^b	2.28 ^b	1.69 ^b	2.45 ^b	1.68 ^b	2.06 ^B	2.61 ^b	4.24 ^a	3.37 ^a	4.59 ^a	3.32 ^a	3.63 ^A
biciclogermacreno	2.95 ^b	5.45 ^a	3.99 ^b	4.26 ^b	3.41 ^b	4.01 ^B	5.75 ^a	6.80 ^a	6.26 ^a	6.88 ^a	6.18 ^a	6.37 ^A
germacreno A	0.48 ^a	0.91 ^a	0.73 ^a	0.80 ^a	0.68 ^a	0.72 ^A	0.83 ^a	0.74 ^a	0.79 ^a	0.73 ^a	0.93 ^a	0.80 ^A
γ -cadineno	0.72 ^b	1.28 ^a	1.00 ^a	0.88 ^b	0.88 ^b	0.95 ^A	0.76 ^b	0.93 ^{ab}	0.81 ^b	1.06 ^a	0.73 ^b	0.86 ^A
δ -cadineno	2.45 ^b	4.29 ^a	3.65 ^a	3.19 ^{ab}	3.14 ^{ab}	3.34 ^A	2.72 ^b	3.01 ^{ab}	2.72 ^b	3.08 ^{ab}	2.44 ^b	2.79 ^A
germacreno B	1.40 ^b	2.07 ^{ab}	1.36 ^b	1.98 ^{ab}	1.68 ^b	1.70 ^B	3.07 ^a	2.95 ^a	2.58 ^a	2.68 ^a	2.79 ^a	2.81 ^A
<i>trans</i> -nerolidol	9.99 ^{ab}	8.95 ^b	12.87 ^a	14.58 ^a	7.66 ^c	10.81 ^A	5.93 ^c	9.74 ^b	8.04 ^b	9.27 ^b	7.11 ^c	8.02 ^B
espatulenol	2.26 ^{ab}	1.60 ^b	1.89 ^b	2.53 ^{ab}	1.97 ^b	2.05 ^A	1.96 ^b	2.95 ^a	2.44 ^{ab}	3.68 ^a	1.94 ^b	2.59 ^A
óxido de cariofileno	6.43 ^a	4.23 ^b	4.71 ^b	5.53 ^a	3.69 ^b	4.92 ^A	5.43 ^a	6.56 ^a	5.01 ^{ab}	6.97 ^a	4.63 ^b	5.72 ^A
10- <i>epi</i> - γ -eudesmol	0.63 ^b	0.61 ^b	0.68 ^b	0.61 ^b	1.29 ^a	0.76 ^A	0.72 ^b	0.89 ^a	0.82 ^{ab}	0.94 ^a	0.81 ^{ab}	0.84 ^A
1- <i>epi</i> -cubenol	2.34 ^a	1.28 ^b	1.69 ^{ab}	2.19 ^a	1.17 ^b	1.74 ^A	1.25 ^b	1.54 ^{ab}	1.39 ^b	1.80 ^a	0.99 ^b	1.39 ^A
cubenol	1.98 ^{ab}	1.63 ^b	1.82 ^{ab}	2.43 ^a	2.39 ^a	2.05 ^A	1.54 ^b	1.59 ^b	1.39 ^b	2.04 ^a	1.87 ^{ab}	1.68 ^B

Tabela 21 – Composição química média (%) do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci), em porcentagens médias, segundo o local e a estação do ano em que foi efetuada a coleta (conclusão)

SUBSTÂNCIA	PARAIBUNA						LIMEIRA					
	Primavera 1 (*)	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2	Geral (**)	Primavera 1	Verão	Outono	Inverno	Primavera 2	Geral
α -muurolol	1.16 ^a	0.60 ^b	0.74 ^b	1.22 ^a	0.79 ^b	0.90 ^A	0.85 ^b	0.87 ^b	0.66 ^b	1.43 ^a	0.67 ^b	0.90 ^A
nd	3.40	2.90	3.43	5.77	3.40	3.78	4.12	5.42	4.74	7.18	5.07	5.30
Total Identificado	90.01	93.98	92.51	95.79	93.70	93.20	92.68	91.98	92.30	90.11	93.07	92.03

Observações:

(*) Cada valor representa a média de 27 extrações.

(**) Cada valor representa a média de 135 extrações.

(***) Para cada substância, letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa (5%) entre médias de estações em cada local, pelo teste não paramétrico de comparações múltiplas de Tukey. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença significativa (5%) entre médias de locais.

Na tabela 22, apresentada a seguir, podem ser observadas as correlações entre os rendimentos de óleo essencial para as duas localidades (tabela 12) e as porcentagens dos 29 compostos identificados nas amostras dos óleos essenciais analisados. Sinais positivos para a correlação significam que, com o aumento dos rendimentos, aumentaram, também, a porcentagem dos compostos no óleo essencial. Por outro lado, sinais negativos indicam o inverso, ou seja, com o aumento do rendimento, diminuiu a porcentagem dos compostos no óleo essencial.

Tabela 22 – Correlações das substâncias químicas com o rendimento do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci)

SUBSTÂNCIAS	PARAIBUNA			LIMEIRA		
	Média	Desvio-padrão	Correlação	Média	Desvio-padrão	Correlação
α -pineno	3.97	1.02	-0.37	3.12	1.65	0.53
β -pineno	3.19	0.85	-0.22	2.73	1.19	0.52
Limoneno	1.56	0.42	-0.48	1.61	0.59	-0.06
1,8-cineol	2.15	0.65	-0.37	1.25	0.40	0.70
<i>trans</i> - β -ocimeno	6.46	1.86	0.18	5.77	2.08	0.58
Linalol	14.32	3.03	-0.26	12.66	2.69	0.70
α -terpineol	0.82	0.16	-0.56	0.64	0.07	-0.29
α -copaeno	1.68	0.37	0.70	1.16	0.10	0.33
β -elemeno	0.68	0.27	-0.05	1.58	0.31	0.46
<i>trans</i> -cariofileno	11.67	1.39	0.82	10.58	1.48	-0.15
β -copaeno	0.60	0.14	0.87	0.57	0.06	-0.90
Aromadendreno	0.70	0.13	0.95	0.95	0.18	-0.86
α -humuleno	2.68	0.36	0.76	2.74	0.29	-0.39
<i>allo</i> -aromadendreno	1.03	0.23	0.63	1.34	0.23	-0.66
γ -muuroleno	1.88	0.33	0.85	2.10	0.33	-0.69
germacreno D	1.55	0.47	0.65	1.52	0.22	0.75
β -selineno	2.06	0.36	0.37	3.63	0.79	-0.77
Biciclogermacreno	4.01	0.95	0.69	6.37	0.47	-0.77
germacreno A	0.72	0.16	0.48	0.80	0.08	0.37
γ -cadineno	0.95	0.21	0.74	0.86	0.14	-0.58
δ -cadineno	3.34	0.68	0.60	2.79	0.26	-0.33
germacreno B	1.70	0.32	0.57	2.81	0.20	0.88
<i>trans</i> -nerolidol	10.81	2.85	-0.51	8.02	1.56	-0.74
Espatulanol	2.05	0.36	-0.66	2.59	0.73	-0.67
óxido de cariofileno	4.92	1.08	-0.26	5.72	1.01	-0.30
10- <i>epi</i> - γ -eudesmol	0.76	0.30	-0.24	0.84	0.08	-0.83
1- <i>epi</i> -cubenol	1.73	0.52	-0.42	1.39	0.30	-0.50
Cubenol	2.05	0.35	-0.64	1.69	0.26	-0.37
α -muurolol	0.90	0.27	-0.53	0.90	0.31	-0.33

3.3.2.1 Análise dos principais compostos do óleo essencial

Para a avaliação dos componentes majoritários do óleo essencial de *C. phaea*, foram utilizados compostos, cujos valores, em porcentagem relativa, das médias gerais das nove amostras estudadas em cada localidade, durante as cinco estações de coleta, apresentassem valores superiores a cinco por cento na composição química relativa do óleo essencial. Foram eles: *trans*- β -ocimeno, *linalol*, *trans*-cariofileno, *biciclogermacreno*, *trans*-nerolidol, *óxido de cariofileno*, sendo dois desses compostos monoterpenos oxigenados (*trans*- β -ocimeno, *linalol*) e quatro deles pertencentes ao grupo dos sesquiterpenos (*trans*-cariofileno, *biciclogermacreno*, *trans*-nerolidol, *óxido de cariofileno*).

Esses compostos conferem com os encontrados por Adati (2001), que obteve como principais componentes de seu estudo do óleo essencial de *C. phaea*, o *linalol* (11,11%) e *óxido de cariofileno* (11,77%), β -cariofileno (6,33%), β -selieno (6,33%) e α -cadinol (1,94%).

A composição do óleo essencial demonstrou a presença de importantes compostos de aplicação fármaco-cosmética como, por exemplo, o *linalol*, que é um monoterpeno alcoólico terciário de cadeia aberta. Pode ser encontrado normalmente sob a forma de uma mistura de isômeros de posição da primeira ligação dupla. Tem sido largamente usado como composto de partida para várias sínteses importantes, como a do acetato de linalila, e testado como acaricida, bactericida e fungicida. Na medicina, tem sido utilizado com sucesso como sedativo e, atualmente, estão sendo analisadas suas propriedades anticonvulsivas. Assim, o *linalol* possui uma larga aplicação em várias áreas do conhecimento humano, sendo necessária sua produção em quantidades sempre crescentes (SILVA, 2003), ou, segundo The Merck Index (1996), citado por Garlet (2007), o *linalol* é empregado em perfumaria, em substituição aos óleos de bergamota (mexerica) e de lavanda.

Da mesma forma, foram identificados outros compostos com importantes funções como β -cariofileno que pode ser um importante agente bactericida, antitumoral e anti-inflamatório (SILVA, 2010). Estudos realizados por Silva et al. (2007) mostraram a atividade antimicrobiana do *biciclogermacreno*. Martin et al. (1993) investigaram o efeito anti-inflamatório do óleo essencial da espécie exótica *Bupleurum frutescens* em edema de pata de rato. Neste estudo, sugeriram que a ação anti-inflamatória foi devida à inibição da síntese e à liberação de prostaglandinas (PGs). Esse efeito foi atribuído aos seus principais constituintes, *trans*-cariofileno e α -pineno.

Figura 22 – Desempenho dos principais compostos químicos encontrados em Paraibuna-SP, segundo a estação do ano

Figura 23 – Desempenho dos principais compostos químicos encontrados em Limeira-SP, segundo a estação do ano

3.4 Avaliação dos extratos etanólicos extraídos das folhas de *Campomanesia phaea* (cambuci)

Os extratos etanólicos obtidos a partir das folhas de *C. phaea* (cambuci), processadas em laboratório, por hidrodestilação, apresentaram rendimentos médios, conforme pode ser observado na tabela 28, e visualizado nas figuras 25 e 26, apresentadas a seguir.

Tabela 28 – Rendimento dos extratos etanólicos das amostras coletadas da espécie *Campomanesia phaea* (cambuci) para os dois locais de coleta

Coleta	Massa das folhas (g)		Média do rendimento médio (%)	
	Paraibuna	Limeira	Paraibuna	Limeira
Verão	15.04	13.73	50.13	45.75
Outono	12.51	14.55	41.70	48.51
Inverno	13.27	10.03	44.24	33.43
Primavera	0.44	0.61	14.57	20.32

Figura 24 – Massa das amostras (em gramas) de folhas

Conforme se pôde observar nos resultados apresentados, os valores obtidos para o rendimento médio dos extratos apresentaram uma variação significativa na estação do inverno, em relação às demais estações. Em Paraibuna-SP, os valores decresceram em 48% da estação invernal para a primavera. Essa variação pôde ser observada também em Limeira-SP, onde o rendimento médio diminuiu em aproximadamente 39%, durante o mesmo período.

Figura 25 – Rendimento dos extratos etanólicos das amostras (médias dos rendimentos)

3.4.1 Fenóis totais

O método de Folin-Ciocalteu permite quantificar flavonóides, antocianinas e compostos fenólicos presentes nas amostras (ROESLER, 2007).

O teor de fenóis totais presentes nas amostras dos extratos está apresentado na tabela 29, a seguir, e visualizado na figura 26. Os resultados foram expressos em mg de ácido gálico/g de amostra.

Tabela 29 - Teor de fenóis totais das amostras coletadas

Coleta	Teor de Fenóis Totais (mg de Ac Gálico/g de amostra)	
	Paraibuna-SP	Limeira-SP
Verão	0.214 ^b	0.257 ^a
Outono	0.281 ^a	0.242 ^a
Inverno	0.253 ^{ab}	0.173 ^b
Primavera	0.233 ^b	0.234 ^a
Teor médio	0.25^A	0.22^A

Os resultados estão expressos na forma de médias das análises realizadas em triplicata. Médias com letras diferentes nas colunas são significativamente diferentes (Teste de Tukey $p \leq 0,05$). Letras maiúsculas significam que não ocorreram diferenças significativas entre linhas (Diferentes localidades)

O maior valor obtido foi atingido na coleta efetuada no outono para Paraibuna-SP, em que se encontrou 0,28 mg de EAG/g de amostra, sendo que, para Limeira-SP, o maior teor de fenóis totais pode ser verificado na estação do verão (0,25 mg de Ac Gálico/g de amostra), sem diferença significativa para a estação do outono (0,24 mg de Ac Gálico/g de amostra).

Figura 26 – Teor de fenóis totais observados nas amostras

3.5 Atividade antioxidante dos extratos de *Campomanesia phaea* (cambuci)

As substâncias antioxidantes presentes nos extratos reagem com o DPPH, que é um radical estável, e converte-o em 2,2-difenil-1-picril hidrazina. O grau de descoloração indica o potencial antioxidante do extrato. Um extrato que apresenta alto potencial em sequestrar radicais livres possui baixo valor de IC50, ou seja, a concentração mínima necessária para o antioxidante reduzir em 50% a concentração inicial do DPPH.

Desta forma, uma pequena quantidade de extrato é capaz de decrescer a concentração inicial do radical DPPH em 50%, ou seja, inibir a oxidação do radical em 50% (ROESLER, 2007).

Na Tabela 30, apresentada a seguir, estão os resultados da atividade antioxidante dos extratos de *Campomanesia phaea* obtidos a partir das folhas coletadas em Paraibuna-SP e Limeira-SP, em quatro diferentes estações do ano, expressos em termos de IC50.

Tabela 30 – Atividade antioxidante dos extratos de *Campomanesia phaea* em amostras coletadas em Paraibuna-SP e Limeira-SP

Local	Primavera	Verão	Outono	Inverno
Paraibuna	87.6	17.7	91.0	116.6
	71.9	16.3	76.5	69.9
	89.9	15.6	74.6	70.6
Média Paraibuna	83.1 ^{a,A}	16.5 ^{b,B}	80.7 ^{a,A}	85.7 ^{a,B}
Limeira	55.9	46.7	83.2	131.8
	17.2	45.3	81.8	141.2
	67.4	54.1	91.6	121.0
Média Limeira	46.8 ^{c,B}	48.7 ^{c,A}	85.5 ^{b,A}	131.3 ^{a,A}

Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença significativa entre estações. Letras maiúsculas diferentes nas colunas indicam diferença significativa entre locais (Tukey em nível de significância de 5%).

Os menores valores de IC50 foram obtidos pelos extratos foram referentes a coletas de verão em Paraibuna-SP, 16,50 mg/mL, sendo que para Limeira-SP ocorreram durante a primavera, sem apresentar diferença significativa para o verão.

Figura 27 – Atividade antioxidante dos extratos de *C. phaea*: distribuição das estações do ano por local estudado

3.6 Avaliação do óleo essencial extraído das folhas de *Campomanesia phaea* em planta-piloto

3.6.1 Rendimento de óleo essencial extraído em planta-piloto

A extração do óleo essencial em planta-piloto foi realizada com o intuito de avaliar o rendimento de óleo de *C. phaea*, quando essa operação estivesse submetida a condições de pressão e temperatura controladas. Pôde-se observar, por meio dos resultados obtidos, que não ocorreram diferenças expressivas nos rendimentos em porcentagens, em relação à condição de hidro-destilação sem o uso de pressão em laboratório (Aparelho Clevenger modificado).

Dessa forma, a média dos dois resultados obtidos em planta-piloto foi de 0,09%, enquanto a média geral dos rendimentos obtidos em hidrodestilação aparelho Clevenger foi de 0,1237%. O rendimento médio em Limeira-SP foi mais expressivo do que o observado em Paraibuna-SP, tanto para as condições com folhas frescas como para folhas secas em estufa. Foi possível verificar, ainda, conforme esperado, que o rendimento obtido aumentou quando as folhas foram submetidas à secagem em estufa.

Tabela 31 – Rendimento do óleo essencial obtido nas extrações em planta-piloto

Amostra	Rendimento (%)
Paraibuna - Folha Fresca	0,06
Paraibuna - Folha Seca	0,09
Limeira - Folha Fresca	0,12
Limeira - Folha Seca	0,14

3.6.2 Avaliação química do óleo essencial extraído em planta-piloto

Em relação à composição química do óleo essencial obtido em planta-piloto, pôde-se observar que foram identificados, em média, 91,52% dos compostos anteriormente encontrados para as quatro observações. O perfil cromatográfico foi o mesmo observado para as condições de extração em aparelho Clevenger. Por outro lado, essa composição variou expressivamente, quando as extrações foram realizadas com as folhas secas em estufa, observando-se o decréscimo de grande parte dos compostos. Essa variação pode ser explicada pela volatilização dos compostos de baixo peso molecular, ao longo do processo de secagem do material vegetal.

Tabela 32 – Composição química (% relativa) dos óleos essenciais de *Campomanesia phaea* extraídos em escala piloto, provenientes de Paraibuna-SP e Limeira-SP, coletados na primavera

Substância	Paraibuna		Limeira	
	Folha fresca	Folha seca	Folha fresca	Folha seca
α -pineno	3.48	tr	5.30	2.59
β -pineno	3.12	tr	4.36	1.94
Limoneno	1.63	tr	2.36	1.43
1,8-cineol	0.47	tr	0.69	TR
<i>trans</i> - β -ocimeno	16.18	1.51	11.18	8.09
Linalol	3.03	tr	7.69	0.54
α -terpineol	tr	tr	tr	TR
α -copaeno	3.24	5.27	2.16	3.39
β -elemeno	0.92	tr	2.39	1.51
<i>trans</i> -cariofileno	17.03	16.03	13.84	16.92
β -copaeno	1.12	1.24	0.80	0.91
Aromadendreno	1.53	1.45	1.68	2.50
α -humuleno	3.87	3.98	3.12	3.54
allo-aromadendreno	2.24	2.27	2.47	2.58
g-muuroleno	2.99	4.77	3.47	4.38
germacreno D	2.69	1.62	1.80	1.20
β -selineno	2.34	4.72	4.72	6.42
Biciclogermacreno	6.29	6.80	9.22	9.77
germacreno A	1.29	1.30	1.42	1.45
γ -cadineno	1.48	2.42	1.03	1.73
δ -cadineno	5.68	8.16	3.92	5.55
germacreno B	1.49	1.49	3.44	1.12
<i>trans</i> -nerolidol	4.64	12.12	3.10	6.18
Espatuleno	0.97	1.15	0.56	0.99
óxido de cariofileno	2.09	2.19	1.30	2.71
10- <i>epi</i> - γ -eudesmol	tr	tr	tr	0.62
1- <i>epi</i> -cubenol	0.85	1.65	tr	0.78
Cubenol	1.34	2.36	0.57	1.40
α -muurolol	Tr	0.68	tr	TR
Nd	1.41	3.09	1.24	2.36
Total identificado	93.41	86.27	93.83	92.60

Figura 28 – Porcentagem relativa dos compostos encontrados nos óleos essenciais de *Campomanesia phaea* por componente, segundo as condições das folhas e da localização de cada sítio de coleta

3.7 Análises sensoriais da fragrância obtida a partir do óleo essencial de *Campomanesia phaea*

Os sessenta provadores que participaram dos testes sensoriais para a avaliação olfativa da fragrância obtida a partir do óleo essencial de *Campomanesia phaea*, foram compostos por 46 pessoas do sexo feminino e 14 do sexo masculino, conforme se verifica na figura 29.

Figura 29 – Perfil dos provadores da análise sensorial, com referência ao seu sexo

A idade dos provadores variou entre 18 e 62 anos, sendo que a maior concentração de pessoas apresentou idade inferior a 30 anos, conforme se pode verificar no gráfico abaixo (figura 30).

Figura 30 – Perfil dos provadores da análise sensorial, em relação à sua idade

3.7.1 Teste olfativo triangular de diferença

Para o teste de diferença das duas amostras objeto de estudo (A - Limeira-SP e B - Paraibuna-SP), efetuados por meio do julgamento de sessenta provadores, avaliou-se o número de respostas certas e o número de erros. A seguir, esse resultado foi comparado com a tabela de teste triangular para verificar a existência de diferença significativa entre as amostras em um nível de significância de 5%. O número de acertos da tabela para os sessenta provadores deveria ser maior que 27. Considerando que o número de acertos foi de 25 (tabela 33), concluiu-se que não houve diferença significativa entre as amostras, indicando a mesma sensação olfativa de ambas.

Tabela 33 – Respostas obtidas no teste olfativo de diferença realizado para a fragrância de óleo essencial de *Campomanesia phaea*

Respostas obtidas no Teste de Diferença	
Número de acertos	25
Número de erros	35

3.7.2 Teste de preferência – comparação pareada

Para o teste de preferência (comparação pareada) da fragrância em estudo, os resultados obtidos indicaram que a amostra A (Limeira-SP) atingiu a somatória de 93 pontos, enquanto que a amostra B (Paraibuna-SP) obteve o total de 87 pontos, conforme demonstra a tabela 34. A análise estatística dessa situação indicou que as duas amostras não diferem entre si em relação à preferência dos provadores, em nível de 5% de probabilidade.

Tabela 34 – Somatória das preferências para as fragrâncias obtidas a partir de óleo essencial de *Campomanesia phaea* (cambuci)

Amostras	Fragrância
A	93 ^a
B	87 ^a

Nota: Mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si em nível de 5% de probabilidade.

3.7.3 Teste olfativo de aceitação com utilização de escala hedônica

Para as condições do teste de aceitação com escala hedônica, verificou-se que a média geral das notas atribuídas pelos provadores situou-se próximo de cinco, para as duas

amostras apresentadas que correspondem aos locais de Limeira-SP e Paraibuna-SP, conforme se pode verificar na tabela 35.

Essa situação indica que a média dos provadores “gostou” da fragrância apresentada pelas amostras e que elas não apresentaram diferença significativa entre si, em nível de 5% de probabilidade.

Tabela 35 – Significâncias da análise sensorial (teste com escala hedônica)

Amostra	Atributo (Fragrância)
A	4,98 (1,17) ^a
B	4,78 (1,19) ^a

Nota: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, em nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. Coeficiente de Variação = 24,23%

4 CONCLUSÕES

Tendo como referência os resultados encontrados, especificamente para os materiais e os procedimentos adotados no presente estudo, pôde-se concluir que:

- a) A média geral dos rendimentos do óleo essencial obtido a partir das folhas de *Campomanesia phaea* coletadas na microrregião de Limeira-SP apresentou-se significativamente superior à média do rendimento do óleo obtido a partir do material coletado microrregião de Paraibuna-SP. Esses rendimentos médios, provavelmente, estão relacionados com a maior fertilidade do solo verificada na gleba localizada em Limeira-SP. Os rendimentos expressos em porcentagem foram mais expressivos para as coletas efetuadas nas duas localidades, quando as árvores se encontravam em fase reprodutiva (apresentando flores e frutos), o que pode ser talvez explicado pela diferenciação do metabolismo vegetal que produziu mais composto secundário nesse período.
- b) A composição química do óleo essencial variou sem apresentar tendência de normalidade na distribuição dos teores expressos em porcentagem, sendo que, dos vinte nove compostos encontrados no óleo essencial, poucos apresentaram correlações com a variação de rendimento.
- c) Os principais compostos encontrados foram: *trans- β -ocimeno*, *linalol*, *trans-cariofileno*, *biciclogermacreno*, *trans-nerolidol*, e *óxido de cariofileno*. É importante ressaltar que a composição química principal do óleo essencial foi a mesma para as duas localidades pesquisadas, sugerindo uma possível quimiotipagem para a espécie *Campomanesia phaea*.
- d) Os resultados obtidos para os polifenóis totais para atividades antioxidantes dos extratos variaram de acordo com as estações do ano e, também, para as duas localidades objeto de coleta. Considera-se que são necessários estudos mais aprofundados, utilizando-se outras técnicas de avaliação mais específicas, para determinar com maior precisão a viabilidade de aproveitamento dos extratos como agentes antioxidantes, bem como descrever outros compostos de cadeias moleculares mais complexas (taninos, cumarinas, antocianinas etc.).

- e) Para a extração em planta-piloto, os rendimentos médios de óleo obtidos foram inferiores aos observados para a extração por meio de hidrodestilação, indicando que as condições de pressão e temperatura controladas aplicadas ao processo em escala piloto não se traduziram em maior obtenção de óleo essencial. Os componentes principais do óleo essencial foram os mesmos encontrados nos dois métodos de extração (escala piloto e hidrodestilação). Para a extração que utilizou folhas secas em estufas, as porcentagens dos compostos químicos dos óleos essenciais obtidos apresentaram valores menores do que quando foram empregadas folhas frescas.

- f) Em relação às análises sensoriais das fragrâncias elaboradas a partir do óleo essencial, pôde-se verificar que, para as condições dos testes desenvolvidos, os provadores não encontraram diferenças significativas nas amostras provenientes das duas localidades objeto de estudo (Paraibuna-SP e Limeira-SP). O teste de afetividade aplicado com escala hedônica indicou que a maioria dos provadores gostou da fragrância apresentada, não identificando diferenças entre as fragrâncias obtidas a partir do óleo essencial extraído das folhas provenientes das duas localidades objeto de pesquisa (Paraibuna-SP e Limeira-SP).

REFERÊNCIAS

- ACADEMIA DE CIÊNCIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Glossário de ecologia**. 2. ed. São Paulo: ACIESP. 1997. 352 p.
- ADAMS, R.P. **Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectroscopy**. Illinois: Allured Publishing Corporation, 1995. 69p.
- ADATI, R.T. **Estudo biofarmagnóstico de *Campomanesia phaea* (O. Berg.) Landrum**. Myrtaceae. 2001. 128 p. Dissertação (Mestrado em Farmacognosia) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
- ANZALDÚA-MORALES, A. **La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica**. Zaragoza: Acribia, 1994. 198 p.
- ARAÚJO, V.C.; CORRÊA, G. C.; MAIA, J. M. S.; MARX, M.C.; MAGALHÃES, M. T.; SILVA, M. L.; GOTTLIEB, O. R. Óleos essenciais da Amazônia contendo linalol. **Acta Amazonica**, Manaus, v. 1, p. 7-44, 1971.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Análise sensorial dos alimentos e bebidas**. Terminologia – NBR 12806. São Paulo, 1993. 8p.
- ASTM INTERNATIONAL. ASTM Standard test method for sensory analysis – triangle test, E1885-04 (2011) In: _____. **Annual book of ASTM standards**. 15.08., 160165. West Conshohocken, 2002. 8p.
- AUBAILE-SALLENAVE, F. Les parfums et les hommes. In: EXPOSITION PARFUMS DE PLANTES, 1988, Paris. Paris: Muséum National d'Histoire Naturelle, 1988. p.26-31.
- BARROSO, G.M. **Sistemática de angiospermas do Brasil**. Viçosa: UFV, 1984. v. 2, 377 p.
- BARROSO, G.M.; PERÓN, V. Myrtaceae. In: LIMA, M.P.M.; GUEDES-BRUNI, R.R. **Aspectos florísticos das espécies vasculares**. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 1994. v. 1, p. 261-302.
- BESSELER, A. **Envolverde**: óleo de castanha é alternativa de renda para Kayapó. Disponível em: <<http://www.ethos.org>>. Acesso em: 05 mar. 2012.
- BIAVATTI, M.W.; MARENSI, V.; LEITE, S.N.; REIS, A. Ethnopharmacognostic survey on botanical compendia for potential cosmeceutic species from Atlantic Forest. **Revista Brasileira de Farmacognosia**. Curitiba, v. 17, p. 640-653, 2007.
- BRITO, J.O. Estudo do efeito da temperatura na composição do óleo essencial de *Eucalyptus citriodora* durante a secagem em leito fixo. In: XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 2001, São João Del Rey. **Anais...** Edição eletrônica.
- _____. Análise do potencial de espécies de eucalipto para produção de óleos essenciais. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ÓLEOS ESSENCIAIS: DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS, 2003, Campinas, 2003. **Anais...** Campinas: Instituto Agrônomo/IAC, 2003.

_____. Caracterização química dos óleos essenciais de duas populações de *Ocimum selloi* Benth. In: SEMINÁRIO PIBIC - IAC, 1.; SEMINÁRIO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRICULTURA TROPICAL E SUBTROPICAL DO IAC, 2004, Campinas. Campinas: Instituto Agrônomo, 2004. p. 4.

BRITO, J.O.; SILVEIRA, A.M. Melhoramento de *Eucalyptus spp* na produção de óleo essencial. In: Simpósio IPEF, 6., 1996, Piracicaba. **Anais...** Piracicaba: IPEF, 1996. v. 3, p. 21-28.

BUCHANAN, B.B.; GRUISEN, W.; JONES, R.L. **Biochemistry and molecular biology of plants**. Rockville: American Society of Plant Physiologists, 2000. 1367 p.

BUSILLOS, O.V. Identificação de terpenos no óleo dos frutos de *Campomanesia adamantium* (Cambessedes) O. Berg. Landrum – Myrtaceae. **Arquivo do Instituto Biológico**, São Paulo, v. 71, p. 115-116, 2004. Suplemento.

BUSTILLOS, O.V.; AGUIAR, O.T. Identificação de terpenos no óleo essencial dos frutos de *Campomanesia adamantium* (Cambessedes) O. Berg- Myrtaceae. **Revista Instituto Florestal**, São Paulo, v. 18, p. 15-22, 2006.

CARDOSO, C.A.L.; POPPI, N.R. Identification of the volatile compounds of flower oil of *Campomanesia pubescens* (Myrtaceae). **Journal of Essential Oil Research**, Carol Stream, v. 21, n. 5, p. 433-434, 2009.

CARDOSO, C.A.L.; KATAOKA, V.M.F.; RE-POPPI, N. Identification of the volatile compounds of flowers of *Campomanesia sessiliflora* O. Berg and *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg. **Journal of Essential Oil Research**, Carol Stream, v. 22, p. 303-304, 2010.

CARDOSO, C.A.L.; LIMA, A. S. V.; POPPI, N. R.; VIEIRA, M. do C. Fruit oil of *Campomanesia xanthocarpa* O. Berg and *Campomanesia adamantium* O. Berg. **Journal of Essential Oil Research**, Carol Stream, v. 21, n. 6, p.481-483, 2009.

CARDOSO, M.G.; GAVILANES, M.L.; MARQUES M.C.S.; SHAN, A.Y.K.V.; SANTOS, B.R.; OLIVEIRA, A.C.B.; BERTOLUCCI, S.K.V.; PINTO, A.P.S. Óleos essenciais. **Boletim Técnico – Série Extensão**, Lavras, v. 8, n. 58, p. 1-42, 2000.

CARRARA, M.R. **Espécies de *Campomanesia* Ruiz & Pavon (Myrtinae, Myrtaceae) ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro**. 1997. 222 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas – Botânica) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.

CENTRO DE PESQUISAS ECO-NATURAIS. **Cambuci, *Campomanesia phaea***. 2003. Disponível em: <http://www.cepen.com.br/arv_nat_Myrtaceae.htm>. Acesso em: 20 out. 2011.

CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS. **Dados do clima**. Disponível em: <<http://www.ciiagro.sp.gov.br/ciiagroonline/Listagens/MonClim/LMClimLocal.asp>>. Acesso em: 12 maio 2011.

CLEVENGER, J.F. Apparatus for volatile oil determination. **Journal of the American Pharmaceutical Association**, Washington, v. 17, n. 4, p. 345-349, Apr.1928.

COCHRAN, W.G.; COX, G.M. **Experimental designs**. 2nd ed. London: John Wiley, 1957.611 p.

CONSERVATION INTERNATIONAL **Hotspots revisitados**: as regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta. 2005. 16 p. Disponível em: <<http://www.conservation.org.br/publicacoes/files/HotspotsRevisitados.pdf>>. Acesso em: 27 fev. 2012.

CORRÊA, M.P. **Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1926-1978. v. 1, 747 p.

COUTINHO, I.D.; POPPI, N.R.; CARDOSO, C.A.L. Identification of the volatile compounds of leaves and flowers in guavira (*Campomanesia adamantim* O. Berg). **Journal of Essential Oil Research**, Carol Stream, v. 20, n. 5, p. 405-407, 2008.

CRONQUIST, A. **The evolution and classification of flowering plants**. Boston: Houghton Mifflin, 1968. 396 p.

_____. **An integrated system of classification of flowering plants**. New York: Columbia University, 1981. 1262p.

_____. A commentary of the definition of order Myrtales. **Annals of the Missouri Botanical Garden**, Missouri, v. 71, p. 780-782, 1984.

DIAS DE CERQUEIRA, M.; MARQUES, E.J.; MARTINS, D.; ROQUE, N.F.; CRUZ, F.G. Variação sazonal da composição do óleo essencial de *Myrcia salzmannii* Berg. (Myrtaceae). **Química Nova**, São Paulo, v. 32, n. 6, p. 1544-1548, 2009.

DUARTE-ALMEIDA, E.M.; SANTOS, R.J.; GENOVESE, M.I.; LAJOLO, F.M. Avaliação da atividade antioxidante utilizando sistema caroteno/ácido linoléico e método de sequestro de radicais DPPH. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 26, p. 1-13, 2006.

DUQUE, C.J. Characterization of odor-active volatiles in Champa (*Campomanesia lineatifolia* R. & P.). **Journal of Agriculture and Food Chemistry**, Washington, v. 54, p. 509-516, 2006.

ELLEMBERG, H.; MUELLER-DOMBOIS, D.A. **Tentative physiognomic-ecological classification of plant formations of the earth**. Disponível em: <<http://biblioteca.ibge.gov.br>>. Acesso em: 11 maio 2011.

EMBRAPA. **Mata mesófila**. Disponível em: <<http://www.apadescalvado.cnpm.embrapa.br/mesof.html>>. Acesso em: 14 maio 2011.

FAO. **State of the world's forests 2007**. Rome, 2007. Disponível em: <<http://www.fao.org/docrep/009/a0773e/a0773e00.htm>>. Acesso em: 05 mar. 2012.

FIDALGO, O.; BONONI, V.L.R. (COORD.) **Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico**. São Paulo: Instituto de Botânica, 1984. 62 p.

FUJIHARA, M.A.; CAVALCANTI, R.; GUIMARÃES, A.; GARLIPP, R. **O valor das florestas**. São Paulo: Terra das Artes Editora, 2009. 347 p.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica e ecossistemas associados no período de 1995–2000**. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 2001.

GALDINO, A.P.P.; BRITO, J.O.; GARCIA, R.F.; SCOLFORO, J.R. Estudo sobre o rendimento e qualidade do óleo de candeia (*Eremanthus* spp.) e a influência das diferentes origens comerciais da sua madeira. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, Botucatu, v. 8, n. 4, p. 44-46, 2006.

GARLET T.M.B. **Produtividade, teor e composição do óleo essencial de espécies de Mentha L. (Lamiaceae) cultivadas em hidroponia com variação de potássio**. 2007. 112 p. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007.

GEMTCHÚJNICOV, I.D. **Manual de taxonomia vegetal**: plantas de interesse econômico - agrícolas, ornamentais e medicinais. São Paulo: Agronômica Ceres, 1976. 368p.

GOBBO-NETO, L.; LOPES, N.P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos secundários. **Química Nova**, São Paulo, v. 30, p. 374-381, 2007.

GOTTLIEB, O.R.; KAPLAN, M.A.C.; BORIN, M.R.M.B. **Biodiversidade**: um enfoque químico-biológico. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 267p.

GRESSLER, E.; PIZO, M.A.; MORELLATO, P.C. Polinização e dispersão de sementes em Myrtaceae do Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 29, n. 4, p. 509-530, 2006.

GUILHERME, F.A.G.; OLIVEIRA FILHO, A.T.; APPOLINÁRIO, V.; BEARZOTI, E. Effects of flooding regime and woody bamboos on tree community dynamics in a section of tropical semideciduous forest in South-Eastern Brazil. **Plant Ecology**, New York, v. 174, p. 19-36, 2004.

HOEHNE, F.C.; KUHLMANN; HANDRO, O. **O jardim botânico de São Paulo**. São Paulo: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Departamento de Botânica do Estado de São Paulo. 1941. 656 p.

HOLZKE, C.; HOFFMANN, T; JAEGER, L.; KOPPMANN, R.; ZIMMER, W. Diurnal and seasonal variation of monoterpene and sesquiterpene emissions from Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) **Atmospheric Environment**, Amsterdã, v. 40, jun, 2006. p. 3174-3185.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. **Relatório anual**. Cajamar, 2007. 94 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Manual técnico de vegetação brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 1992a. 92 p.

_____. **Mapa de vegetação do Brasil**. Rio de Janeiro, 1992b.

_____. **Informativo Ambiente Brasil**. 28-11-2008. Disponível em: <<http://www.ambientebrasil.com.br>>. Acesso em: 27 abr. 2009.

_____. **Mapas do tipo de solo**. Disponível em: <<http://mapas.ibge.gov.br>>. Acesso em: 11 maio 2011.

IVANAUSKAS, N.M. **Caracterização florística e fisionômica da Floresta Atlântica sobre a Formação Pariquera-Açu, na Zona da Morraria Costeira do Estado de São Paulo**. 1997. 232p. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.

JAUBERT, J. Chimie: parfums et arômes végétaux. In: EXPOSITION PARFUMS DE PLANTES, 1988, Paris: Muséum National d'Histoire Naturelle, 1988. p. 18-20.

JOLY, C.A., LEITÃO FILHO, H.F.; SILVA, S.M. O patrimônio florístico - The floristic heritage. In: CÂMARA, G.I. (Coord.). **Mata Atlântica - atlantic rain Forest**. São Paulo: Ed. Índex; Fundação S.O.S. Mata Atlântica, 1991. 188p.

JORGE, L.I.F. **Caracterização farmacobotânica e microscopia alimentar de seis espécies brasileiras de Myrtaceae Jussieu**. 1992. 140 p. Dissertação (Mestrado em Farmacognosia) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.

KAWASAKI, M.L. A new species of *Campomanesia* (Myrtaceae) from southeastern Brazil. **Brittonia**, New York, v. 52, n. 2, p. 188-190, 2000.

KAWASAKI, M.L.; LANDRUM, L.R. A rare and potentially economic fruit of Brazil. cambuci, *Campomanesia phaea* (Myrtaceae). **Economic Botany**, Lancaster, v. 51. p. 403-407, 1997.

LANDRUM, L.R. *Campomanesia*. **Flora Neotropica**, New York, v. 45, p. 1-178, Nov. 1986.

LANDRUM, L.R.; KAWASAKI, M.L. The genera of Myrtaceae in Brazil: an illustrated synoptic treatment and identification keys. **Brittonia**, New York, v. 49, n. 4, p. 508-536, 1997.

LEGRAND, C.D.; KLEIN, R.M. Myrtaceas. **Flora Ilustrada Catarinense**, Itajaí, supl. 1, p. 573-730, 1977.

LIMA, H.R.P.; KAPLAN, M.A.C.; CRUZ, A.V.M. Influência dos fatores abióticos na produção e variabilidade de terpenóides em plantas. **Floresta Ambiente**, Seropédica, v.10, p.71-77, 2003.

LIMBERGER, R.P.; APEL, M.A.; SOBRAL, M.; MORENO, P.R.H.; HENRIQUES, A.T.; MENUT, C. Aromatic plant from Brazil: chemical composition of essential oils from some *Campomanesia* species (Myrtaceae). **Journal of Essential Oil Research**, Carol Stream, v. 13, p. 113-115, 2001.

LIMBERGER, R.P.; SOBRAL, M.; HENRIQUES, A.T.; MENUT, C.; BESSIÈRE, J.-M. Óleos voláteis de espécies de *Myrcia* nativas do Rio Grande do Sul. **Química Nova**, São Paulo, v. 27, p. 916-919, 2004.

LOMBARDI, J.A.; GONÇALVES, M. Composição florística de remanescentes de Mata Atlântica do Sudeste de Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 23, n. 3, p. 255-282, 2000.

LORENZI, H. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 1992. 252 p.

_____. **Árvores brasileiras**: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa: Plantarum, 2002. v. 2, 368p.

MARCHIORI, J.N.C.; SOBRAL, M. **Dendrologia das angiospermas**: Myrtales. Santa Maria: Ed. UFSM. 1997. 304p.

MARIN, R.; APEL, M.A.; LIMBERGER, R.P.; RASEIRA, M.C.B.; PEREIRA, J.F.M.; ZUANAZZI, J.A.S.; HENRIQUES, A.T. Volatile components and antioxidant activity from some Myrtaceous fruits cultivated in southern Brazil. **Latin American Journal of Pharmacy**, Buenos Aires v. 27 n. 2, p. 172-177, 2008.

MARKMAN, B.E.O.; BUGNO, A.; OHARA, M.T.; KATO, E.T.M. Atividade antimicrobiana do estrato hidroalcoólico de *Campomanesia xanthocarpa* (Martius) Berg. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, São Paulo, v.36.n.1, p.55, 2000.

MARTIN, S.; PADILLA, E.; OCETE, M.A.; GALVEZ, J.; JIMÉNEZ, J.; ZARZUELO, A. Anti-inflammatory activity of the essential oil of *Bupleurum fruticosens*. **Planta Medica**, Stuttgart/New York, v. 59 p.533-56, 1993.

MCLAFFERTY, F.W.; STAUFFER, D.B. **The Wiley/NBS registry of mass spectral data**. New York: John Wiley, 1989. 2 v.

MEILGAARD, M.; CIVILLE, G.V.; CARR, B.T. **Sensory evaluation techniques**. Boca Raton: Taylor & Francis, 2007. 448p.

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B.; KENT, J. Biodiversity *hotspots* for conservation priorities. **Nature**. London, v. 403, p. 845-853, 2000.

OLIVEIRA, R.A.G.; LIMA, E.O.; VIEIRA, W.L.; FREIRE, K.R.L.; TRAJANO, V.N.; LIMA, I.O.; SOUZA, E.L.; TOLEDO, M.S.; SILVA-FILHO, R.N. Estudo da interferência de óleos essenciais sobre a atividade de alguns antibióticos usados na clínica. **Revista Brasileira de Farmacognosia. Brazilian Journal of Pharmacognosy**, Curitiba, v. 16, n. 1, p. 77-82, jan./mar. 2006.

- OLIVEIRA FILHO A.T.; FONTES, M.A.L. Patterns of floristic differentiation among Atlantic Forests in Southeastern Brazil and the influence of climate. **Biotropica**, Washington, v. 32, p. 793-810, 2000.
- OSORIO, C.; ALARCON, M.; MORENO, C.; BONILLA, A.; BARRIOS, J.; GARZON, C.; DUQUE, C. J. Characterization of odor-active volatiles in Champa (*Campomanesia lineatifolia* R. & P.). **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, Washington, v. 54, p. 509-516, 2006.
- PEIXOTO, A.L.; GENTRY, A. Diversidade e composição florística da mata de tabuleiro na Reserva Florestal de Linhares (Espírito Santo, Brasil). **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 13, p. 19-25, 1990.
- PERRIN, A.; COLSON, M. Sites d'accumulation des essences chez quelques plantes aromatiques. In: Les parfums et les hommes. In: EXPOSITION PARFUMS DE PLANTES, 1988, Paris. Paris: Muséum National d'Histoire Naturelle, 1988.
- PIZO, M.A. The seed dispersers and fruit syndromes of Myrtaceae in Brazilian Atlantic forest Paris: Muséum National d'Histoire Naturelle, 1988. p. 16-17. In: LEVEY, D.J.; SILVA, W.R.; GALETTI, M. (Ed.). **Frugivores and seed dispersers. biodiversity and conservation perspectives**. Wallingford: CABI Publ., 2002. p. 129-143.
- RAYNAL, A.; AUBAILE-SALLENAVE, F. Le monde de plantes, un monde d'odeurs. In: EXPOSITION PARFUMS DE PLANTES, 1988, Paris. Paris: Muséum National d'Histoire Naturelle, 1988. p. 11-15
- RISSATO, S.R.; ALMEIDA, M.V.; SILVA, L.C. Estudo do óleo essencial de *Eugenia uniflora* como subsídio para aplicação como fitofármaco. **Salusvita**. Bauru, v. 23, n. 2, p. 209-222, 2004.
- RIZZINI, C.T. Nota prévia sobre a divisão fitogeográfica (florístico-sociológica) do Brasil. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro v. 25, n. 1, p. 3-64, 1963.
- _____. **Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos sociológicos e florísticos**. São Paulo: Hucitec-EDUSP, 1979. 374p.
- RODRIGUES R.R. A vegetação de Piracicaba e municípios do seu entorno. **Circular Técnica IPEF**, Piracicaba, n. 189, ago.1999. 20p.
- ROESLER, R.; MALTA, L.G.; CARRASCO, L.C.; HOLANDA, R.B.; SOUSA, C. A.S.; PASTORE, G.M. Atividade antioxidante de frutas do cerrado. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 27, n. 1, p. 53-60, 2007.
- ROMAGNOLO, M.B. **A família Myrtaceae na Estação Ecológica do Caiuá, Diamante do Norte, PR: projeto de pesquisa**. Maringá: Universidade Federal de Maringá, Centro de Ciências Biológicas, 2009. 11p.
- RUDNICK, M.; OLIVEIRA, M.R.; PEREIRA, V.T.; REGINATTO, F.H.; DAL-PIZZOL, F.; MOREIRA, J.C.F. Antioxidant and antiglycation properties of *Passiflora alata* and *Passiflora edulis* extracts. **Food Chemistry**, Chicago, v. 100, p. 719-724, 2007.

- SCHMEDA-HIRSCHMANN, G. Flavonoids from *Calycorectes*, *Campomanesia*, *Eugenia* and *Hexachlamys* species. **Fitoterapia**, Amsterdam, v. 66, n. 4, p. 373-374, 1995.
- SHANLEY, P.; MEDINA, G. (Ed.). **Frutíferas e plantas úteis na vida amazônica**. Belém: Setor; Imazon, 2005. 300 p.
- SHANLEY, P.; PIERCE A.; LAIRD, S. **Além da madeira**: a certificação de produtos florestais não madeireiros. Bogor: Centro de Pesquisa Florestal Internacional, 2005. 153 p.
- SILVA, C.M.; BOLZAN, A.A.; MALLMANN, C.A.; POZZATTI, P.; ALVES, S.H.; HEINZMANN, B. M. Sesquiterpenoids of *Senecio bonariensis* Hook. & Arn., Asteraceae. **Revista Brasileira de Farmacognosia**. Curitiba, v. 20, n. 1, p. 87-92, 2010.
- SILVA, D.D.; CHIERICE, G.O.; GALHIANE, M.S.; CHAAR, J.S.; MOUCHREK-FILHO, V.E. Quantificação do linalol no óleo essencial da *Aniba duckei* Korstermans utilizando uma nova coluna capilar POLYH4-MD em Cromatografia Gasosa. **Química Nova**, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 461-465, 2003.
- SILVA, J.R.M.; POPPI, N.R.; CARDOSO, C.A.L. Fruit oil of *Campomanesia pubescens* (Myrtaceae). **Journal of Essential Oil Research**, Carol Stream, v. 21, p. 315-316, 2009.
- SILVA, L.; ONIKI, G.H.; AGRIPINO, D.G.; MORENO, P. R.H.; YOUNG, M.C.A. M.; MAYWORM, M.A.S.; LADEIRA, A.M. Bicyclogermacrene, resveratrol e atividade antifúngica em extratos de folhas de *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & Jarvis (Vitaceae). **Revista Brasileira de Farmacognosia**, Curitiba, v. 17, n. 3, p. 361-367, 2007.
- SIMÕES, C.M.; SPITZER, V. **Farmacognosia** – da planta ao medicamento. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999. 821 p.
- SIMÕES, C.M.O.; SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, L.A.; PETROVICK, P.R. (Org.). **Farmacognosia**: da planta ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre: UFRGS; Florianópolis: UFSC, 2004. 1102 p.
- SIQUEIRA, M.; DURIGAN, G.I. Modelagem da distribuição geográfica de espécies lenhosas de cerrado no Estado de São Paulo, **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 30, n. 2, p.233-243, abr./jun. 2007.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA. **Fatos e números do Brasil florestal**. São Paulo, 2008. 92 p.
- SOUZA, A. Myrtaceae do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (São Paulo). **Publicação Especial Instituto Oceanográfico**, São Paulo, n. 9, p. 1-33, 1992.
- _____. **Variabilidade dos óleos voláteis de espécies de Myrtaceae nativas da Mata Atlântica**. 2009. 351 p. Tese (Doutorado em Botânica) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

TABARELLI, M.; MANTOVANI, W. A riqueza de espécies arbóreas na floresta atlântica de encosta no estado de São Paulo (Brasil). **Revista Brasileira de Botânica**, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 217-223, ago. 1999.

TABARELLI, M.; MANTOVANI, W.; PERES, C.A. Effects of habitat fragmentation on plant guild structure in the montane Atlantic forest of southeastern Brazil. **Biological Conservation**, Amsterdã, v. 91, n. 2/3, p. 119-127, Dec. 1999.

TABARELLI, M.; PINTO, L.P.; SILVA, J.; HIROTA, M.; BEDE, L. Challenges and opportunities for biodiversity conservation in the Brazilian Atlantic Forest. **Conservation Biology**, Hoboken, v. 19, n. 3, p. 695-700, June 2005.

TEIXEIRA, M.B.; COURA NETO, A.B.; PASTORE, U.; RANGEL FILHO, A.L.R. Vegetação. As regiões fitoecológicas, sua natureza e seus recursos econômicos. Estudo fitogeográfico. In: **Levantamento de recursos naturais**. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. v. 33, p. 541-632.

VALLILO M.I.; GARBELOTTI, M.L.; OLIVEIRA, E.; LAMARDO, L.C.A. Características físicas e químicas dos frutos do cambucizeiro (*Campomanesia phaea*). **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v. 27, n. 2, p. 241-244, ago. 2005.

VALLILO, M.I.; AGUIAR, O.T.; FIUMARELLI, J.; MARTINS JUNIOR, H.A.; SASSINE, A.; BUSTILLOS, O.V.; AGUIAR, O.T. Identificação de terpenos no óleo essencial dos frutos de *Campomanesia adamantium* (Cambessedes) O. Berg- Myrtaceae. **Revista Instituto Florestal**, São Paulo, v. 18, p. 15-22, 2006.

VAN DEN DOOL, H.; KRATZ, D.J. A generalization of the retention index system including liner temperature programmed gas-liquid partition chromatography. **Journal of Chromatography**, Amsterdã, v. 11, p. 463-467, 1963.

VELOSO, H.P.; GOES FILHO, L. **Fitogeografia brasileira, classificação fisionômica ecológica da vegetação neotropical**: Projeto RADAMBRASIL, Série Vegetação. Salvador: Boletim Técnico, 1. 1982. 80 p.

VELOSO, H.P.; RANGEL FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. **Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1991. 123 p.

WASICKY, R. Uma modificação do aparelho de Clevenger para extração de óleos essenciais. **Revista da Faculdade de Farmácia e Bioquímica**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 77-81, 1963.

WATERMAN, P.G. The chemistry of volatile oils. In: HAY, R.K.M.; WATERMAN, P.G. **Volatile oil crops: their biology, biochemistry and production**. Harlow: Longman Scientific, 1993. p.47-61.

WATERMAN, P.; MOLE, S. **Analysis of phenolic plant metabolites**. Oxford: Blackwell Scientific, 1994. 238p.

WOLFFENBUTTEL, A.N. Óleos essenciais. **Informativo CRQ-V**, Porto Alegre, ano 11, n. 105, p. 6-7, nov./dez. 2007.

APÊNDICES

Apêndice A – Amostras de solo

Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Departamento de Ciência do Solo

Interessado: 2641 Marcelo Machado Leao
Município: Piracicaba
Propriedade: SITIO DO BELO
Município: PARAIBUNA-SP
Talhão/Quadra:

Tipo de Análise: SQ4
Requisição: 1732
Data de Emissão: 30/6/2011
Material analisado:
Análises concluídas em: 21/3/2011

RESULTADO DE ANÁLISE

Amostra	pH	MO	P	S	K	Ca	Mg	Al	H+Al	SB	CTC	V	m
20-50	4,1	18	9	26	0,8	13	7	10	58	20,8	78,7	26	33

Interessado:	2641 Marcelo Machado Leao	Tipo de Análise:	SQ4
Município:	Piracicaba	Requisição:	1733
Propriedade:	SITIO RECANTO DA NATUREZA	Data de Emissão:	30/6/2011
Município:	LIMEIRA -SP	Material analisado:	
Talhão/Quadra:		Análises concluídas em:	21/3/2011

RESULTADO DE ANÁLISE													
Amostra	pH	MO	P	S	K	Ca	Mg	Al	H+Al	SB	CTC	V	m
20-50	5,3	30	104	37	1,2	70	32	1	34	103,2	137,4	75	1

Apêndice B – Séries históricas do clima

a) Primavera 1

Monitoramento Climatológico: Taubaté no período de 19/07/2010 até 19/10/2010									
Período	Temperatura Máxima	Temperatura Mínima	Média das Temperaturas	Média das Temperaturas	Temperatura Média	Evapo-transpiração Potencial (mm)	Chuva	Chuva Acumulada Mensal	Dias Com Chuva no Mês
	Absoluta (°C)	Absoluta	Máximas	Mínimas					
19/07/2010 a 21/07/2010	28,4	11,2	27,4	12,4	19,9	6	0	0	0
22/07/2010 a 25/07/2010	31,4	11,2	28,8	13	20,9	8	0	0	0
26/07/2010 a 28/07/2010	28,2	8,6	26,3	10,5	18,4	5	0	0	0
29/07/2010 a 01/08/2010	31,2	9,6	28,9	11,9	20,4	8	0	0	0
02/08/2010 a 04/08/2010	25,6	14,2	21,3	15	18,1	6	0	0	0
05/08/2010 a 08/08/2010	28	5,6	24,5	9,8	17,1	8	0	0	0
09/08/2010 a 11/08/2010	25,4	8,4	24,5	12,4	18,5	6	0	0	0
12/08/2010 a 15/08/2010	29,6	9,8	23,5	11,6	17,6	8	0	0	0
16/08/2010 a 18/08/2010	23,1	4,6	23	5,7	14,4	5	0	0	0
19/08/2010 a 22/08/2010	30,6	4,2	28,3	6	17,2	8	0	0	0
23/08/2010 a 25/08/2010	33,2	7,6	32,5	8,3	20,4	7	0	0	0
26/08/2010 a 29/08/2010	33,6	9	33,1	10,5	21,8	10	0	0	0
30/08/2010 a 01/09/2010	30,4	11	30,3	11,9	21,1	7	0	0	0
02/09/2010 a 05/09/2010	36,8	8	32,2	10,8	21,5	12	0	0	0
06/09/2010 a 08/09/2010	25,6	14,4	23,3	15,4	19,3	8	6	6	1
09/09/2010 a 12/09/2010	31,8	10,8	28,7	12,1	20,4	11	0	0	0
13/09/2010 a 15/09/2010	33,7	13,6	32	15,4	23,7	10	0	0	0
16/09/2010 a 19/09/2010	29,8	14,2	29,3	15,1	22,2	12	0	0	0
20/09/2010 a 22/09/2010	32	15	29,8	18,1	24	10	0	0	0
23/09/2010 a 26/09/2010	34,6	15,6	27,2	16,2	21,7	12	10,8	7,8	1
27/09/2010 a 29/09/2010	26,8	14	25,4	16,1	20,8	8	14,2	6,6	1
30/09/2010 a 03/10/2010	27	15,6	24,6	16,9	20,7	11	5	2	1
04/10/2010 a 06/10/2010	31	14,4	28	15	21,5	10	0,6	0	0
07/10/2010 a 10/10/2010	30	12,8	26,2	16,3	21,2	13	5	0	0
11/10/2010 a 13/10/2010	25,6	10,4	23,3	12,4	17,9	8	0	0	0
14/10/2010 a 17/10/2010	33,8	11,6	31,3	16	23,6	15	2,6	0	0
18/10/2010 a 20/10/2010	32,4	13,6	29,9	15,3	22,6	11	16,8	0	0

Monitoramento Climatológico: Limeira no período de 19/07/2010 até 19/10/2010									
Período	Temperatura Máxima	Temperatura Mínima	Média das Temperaturas	Média das Temperaturas	Temperatura Média	Evapo-transpiração Potencial (mm)	Chuva	Chuva Acumulada Mensal	Dias Com Chuva no Mês
	Absoluta (°C)	Absoluta	Máximas	Mínimas					
19/07/2010 a 21/07/2010	28,5	11,5	27,3	12,5	19,9	6	0	0	0
22/07/2010 a 25/07/2010	29,8	12,4	29,2	13,8	21,5	8	0	0	0
26/07/2010 a 28/07/2010	27,5	9,8	26,4	10,9	18,6	5	0	0	0
29/07/2010 a 01/08/2010	28,6	12	27,7	13,3	20,5	8	0	0	0
02/08/2010 a 04/08/2010	30,5	10,5	26,6	12	19,3	7	0	0	0
05/08/2010 a 08/08/2010	26,2	2,5	23,7	5,3	14,5	7	0	0	0
09/08/2010 a 11/08/2010	28,7	5,8	27,8	6,8	17,3	6	0	0	0
12/08/2010 a 15/08/2010	28,6	7,2	26,7	9,6	18,2	8	0	0	0
16/08/2010 a 18/08/2010	22,8	3,5	21,1	4,1	12,6	4	0	0	0
19/08/2010 a 22/08/2010	28,7	7	26,5	7,7	17,1	8	0	0	0
23/08/2010 a 25/08/2010	31,3	13,3	30,5	13,9	22,2	8	0	0	0
26/08/2010 a 29/08/2010	32,2	10,3	31,9	12,3	22,1	10	0	0	0
30/08/2010 a 01/09/2010	32,5	10,1	31,2	11,3	21,3	7	0	0	0
02/09/2010 a 05/09/2010	33	14,1	31,2	14,9	23,1	13	0	0	0
06/09/2010 a 08/09/2010	28,1	12,3	24	13	18,5	8	4,4	3	1
09/09/2010 a 12/09/2010	30,7	11	27,8	11,9	19,8	11	0	0	0
13/09/2010 a 15/09/2010	32,1	14,2	31,8	14,7	23,3	10	0	0	0
16/09/2010 a 19/09/2010	34,2	12,2	30,1	13,5	21,8	12	0	0	0
20/09/2010 a 22/09/2010	31,3	13,4	30,2	15,6	22,9	9	0,4	0,4	1
23/09/2010 a 26/09/2010	35,3	15,1	31,3	17,1	24,2	14	6	4,8	1
27/09/2010 a 29/09/2010	23,7	15,1	21,1	16,2	18,6	8	26,2	0	0
30/09/2010 a 03/10/2010	26,8	15,6	23,7	16,9	20,3	11	14,2	4,6	1
04/10/2010 a 06/10/2010	30,9	12,4	26,8	13,8	20,3	9	0,2	0	0
07/10/2010 a 10/10/2010	31,9	10,3	27	13,5	20,3	13	11,2	0	0
11/10/2010 a 13/10/2010	25,1	9,6	23,9	9,8	16,9	8	0	0	0
14/10/2010 a 17/10/2010	33,5	10,8	31,6	15,3	23,5	15	0,4	0	0
18/10/2010 a 20/10/2010	31,1	9,5	28,2	13	20,6	10	8	0	0

b) Verão

Monitoramento Climatológico: Taubaté no período de 23/11/2010 até 23/02/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acu	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
25/11/2010 a 28/11/2010	34,4	16,8	32,3	18	25,1	19	25	0	0
29/11/2010 a 01/12/2010	34,4	17,8	32,7	19,5	26,1	15	4	2,8	1
02/12/2010 a 05/12/2010	34,4	20,4	33,4	20,9	27,2	23	28,6	0	0
06/12/2010 a 08/12/2010	33,8	21	31,8	21,2	26,5	16	22,4	2,6	1
09/12/2010 a 12/12/2010	34,4	20	32,7	20,6	26,6	22	3,6	0	0
13/12/2010 a 15/12/2010	33,6	19	28,5	19,5	24	13	30,8	12,6	1
16/12/2010 a 19/12/2010	33,6	19,6	30,1	20	25	19	5,6	0	0
20/12/2010 a 22/12/2010	35,2	20	34,1	20,4	27,3	17	5,2	5,2	1
23/12/2010 a 26/12/2010	33,6	18,8	31,2	20,3	25,7	21	12	0	0
27/12/2010 a 29/12/2010	32	15,8	29,6	18,5	24,1	13	2,7	0	0
30/12/2010 a 02/01/2011	29,8	17,6	26,5	19,3	22,9	16	0,6	0	0
03/01/2011 a 05/01/2011	36,6	18,4	29,2	20	24,6	14	32	0	0
06/01/2011 a 09/01/2011	32,2	20,4	31,3	20,8	26,1	21	30,6	0	0
10/01/2011 a 12/01/2011	32,1	21,1	29,4	21,7	25,5	15	15	14,8	1
13/01/2011 a 16/01/2011	32,1	19,9	30,2	20,9	25,5	20	60,6	21,5	1
17/01/2011 a 19/01/2011	33,4	20,8	31,3	21,1	26,2	16	25,4	10,6	1
20/01/2011 a 23/01/2011	34,5	20,2	33,3	20,5	26,9	22	0	0	0
24/01/2011 a 26/01/2011	33,5	19,4	33,2	19,7	26,5	16	0	0	0
27/01/2011 a 30/01/2011	35,6	18,8	34,8	19,7	27,3	22	17	0	0
31/01/2011 a 02/02/2011	32,8	20,2	31,6	20,2	25,9	15	1	0	0
03/02/2011 a 06/02/2011	36,2	19	33,1	19,6	26,3	20	1	0	0
07/02/2011 a 09/02/2011	34,6	18,8	34,5	19,7	27,1	16	0,8	0	0
10/02/2011 a 13/02/2011	35,2	18,2	34,7	19,3	27	21	29,2	6,8	1
14/02/2011 a 16/02/2011	35	19,8	32,8	20,5	26,7	16	21,8	6	1
17/02/2011 a 20/02/2011	34,2	18	32,6	18,4	25,5	18	2,5	0	0
21/02/2011 a 23/02/2011	33,8	17,6	33,3	18,7	26	15	0	0	0

Monitoramento Climatológico: Limeira no período de 23/11/2010 até 23/02/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
25/11/2010 a 28/11/2010	31,9	14	30,6	15,8	23,2	16	12,6	0	0
29/11/2010 a 01/12/2010	32,9	18,8	31,5	19,7	25,6	15	11	8,8	1
02/12/2010 a 05/12/2010	32,5	19,1	32	19,6	25,8	20	8,2	0,2	1
06/12/2010 a 08/12/2010	32,3	17,2	31,3	18,6	25	14	8,2	0	0
09/12/2010 a 12/12/2010	34,1	16,5	32,4	18,2	25,3	19	23	23	1
13/12/2010 a 15/12/2010	33	17	28,5	18	23,2	12	32,6	1,6	1
16/12/2010 a 19/12/2010	30,4	18,3	26,9	18,8	22,9	16	11,8	2,6	1
20/12/2010 a 22/12/2010	33	17,5	32,2	18,7	25,4	15	14,2	5	1
23/12/2010 a 26/12/2010	30	17,8	28,7	19	23,8	17	26,2	0	0
27/12/2010 a 29/12/2010	29,5	15,4	28,9	17,1	23	12	16,2	0	0
30/12/2010 a 02/01/2011	29,2	15,8	28,8	17,3	23	16	11,8	11,8	1
03/01/2011 a 05/01/2011	27	18,4	26,6	18,7	22,7	12	108,8	2,2	1
06/01/2011 a 09/01/2011	31	18,2	28,6	18,9	23,8	17	43,4	8,8	1
10/01/2011 a 12/01/2011	30,8	18,3	29,4	19,1	24,2	13	41	21	1
13/01/2011 a 16/01/2011	30,1	17	28	18,6	23,3	16	18,4	0,2	1
17/01/2011 a 19/01/2011	31,4	17,8	29,9	18,9	24,4	13	60,6	4,4	1
20/01/2011 a 23/01/2011	32,5	17,6	29,9	18,3	24,1	17	16,4	1,8	1
24/01/2011 a 26/01/2011	32,9	17,8	32,3	18,1	25,2	14	8,4	2	1
27/01/2011 a 30/01/2011	32,6	17,5	32,2	18,4	25,3	19	0,8	0,8	1
31/01/2011 a 02/02/2011	32,1	18,2	30,1	18,7	24,4	13	37,4	0,2	1
03/02/2011 a 06/02/2011	32	17,4	28,4	17,9	23,2	15	19,4	0	0
07/02/2011 a 09/02/2011	31,9	16,7	31,7	17,8	24,7	13	8	0,2	1
10/02/2011 a 13/02/2011	32,3	17,5	31,4	17,9	24,7	18	3,2	2,6	1
14/02/2011 a 16/02/2011	30,2	18,3	29,6	18,5	24,1	12	26,6	0,4	1
17/02/2011 a 20/02/2011	31,8	15,8	30,8	16,8	23,8	16	44	0	0
21/02/2011 a 23/02/2011	32,9	17,2	32,3	17,9	25,1	13	3,4	2,8	1

c) Outono

Monitoramento Climatológico: Taubaté no período de 11/02/2011 até 11/05/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
14/02/2011 a 16/02/2011	35	19,8	32,8	20,5	26,7	16	21,8	6	1
17/02/2011 a 20/02/2011	34,2	18	32,6	18,4	25,5	18	2,5	0	0
21/02/2011 a 23/02/2011	33,8	17,6	33,3	18,7	26	15	0	0	0
24/02/2011 a 27/02/2011	34,4	20,2	33,6	20,9	27,2	21	1,6	0,6	1
28/02/2011 a 02/03/2011	29	18,8	28,9	19,7	24,3	12	68,6	12	1
03/03/2011 a 06/03/2011	27	17,4	24,2	18,3	21,2	12	82,2	22,6	1
07/03/2011 a 09/03/2011	30,8	17,6	26,9	17,9	22,4	10	15,6	5	1
10/03/2011 a 13/03/2011	31	16,2	29,7	18,8	24,3	15	0	0	0
14/03/2011 a 16/03/2011	32	19,8	30,3	20,3	25,3	12	14,6	8,8	1
17/03/2011 a 20/03/2011	32,6	18,4	29,1	19,5	24,3	15	13,4	0	0
21/03/2011 a 23/03/2011	30,2	18,6	27,5	19,1	23,3	10	0	0	0
24/03/2011 a 27/03/2011	32,4	18	32	19,1	25,5	17	5,8	0	0
28/03/2011 a 30/03/2011	34	19,4	30,7	20,1	25,4	12	27,8	14	1
31/03/2011 a 03/04/2011	31,4	18,6	30,9	19,1	25	16	26,4	19	1
04/04/2011 a 06/04/2011	29,2	16,4	27,8	18,6	23,2	8	10,2	3	1
07/04/2011 a 10/04/2011	29	15,6	27,3	16,9	22,1	11	34,2	5,4	1
11/04/2011 a 13/04/2011	31,6	16,4	31,1	17,3	24,2	9	16	3	1
14/04/2011 a 17/04/2011	32,6	17	31,6	19,4	25,5	14	0	0	0
18/04/2011 a 20/04/2011	32	17,2	30,9	17,6	24,2	9	1,6	1,6	1
21/04/2011 a 24/04/2011	31,6	15,2	30,4	16	23,2	11	0	0	0
25/04/2011 a 27/04/2011	28,6	16	25,3	16,8	21	8	33,6	0	0
28/04/2011 a 01/05/2011	30,2	13	27,6	14,7	21,2	10	2	0	0
02/05/2011 a 04/05/2011	26	13,4	25,7	14,1	19,9	6	2,6	0	0
05/05/2011 a 08/05/2011	29,6	12,6	28,7	14	21,4	9	0	0	0
09/05/2011 a 11/05/2011	28,6	13,6	27,2	15,1	21,2	6	0,5	0	0

Monitoramento Climatológico: Limeira no período de 11/02/2011 até 11/05/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
14/02/2011 a 16/02/2011	30,2	18,3	29,6	18,5	24,1	12	26,6	0,4	1
17/02/2011 a 20/02/2011	31,8	15,8	30,8	16,8	23,8	16	44	0	0
21/02/2011 a 23/02/2011	32,9	17,2	32,3	17,9	25,1	13	3,4	2,8	1
24/02/2011 a 27/02/2011	32,1	18,4	31,2	19,1	25,1	18	12	0,4	1
28/02/2011 a 02/03/2011	30,3	18,4	26,2	19,1	22,6	11	28,8	3	1
03/03/2011 a 06/03/2011	30,6	16,6	23	17,3	20,1	12	51,8	7,8	1
07/03/2011 a 09/03/2011	25,8	17,2	24,7	17,8	21,3	9	33,6	15,4	1
10/03/2011 a 13/03/2011	30,4	17,5	28,7	18,9	23,8	15	42,6	19,8	1
14/03/2011 a 16/03/2011	29,4	19,8	28,6	20,6	24,6	12	0	0	0
17/03/2011 a 20/03/2011	30,2	19,8	28,1	20,4	24,2	15	17,4	0,6	1
21/03/2011 a 23/03/2011	29,1	18,8	26,6	19,3	22,9	10	1,4	0,4	1
24/03/2011 a 27/03/2011	31,4	18,2	30,9	19,6	25,3	16	0	0	0
28/03/2011 a 30/03/2011	31,3	21,2	29,3	21,6	25,5	12	0	0	0
31/03/2011 a 03/04/2011	31,4	15,4	29,4	16,9	23,1	13	9,9	9,4	1
04/04/2011 a 06/04/2011	27,6	12,3	26	16,1	21,1	8	5,2	1,4	1
07/04/2011 a 10/04/2011	29,2	12,8	28,7	13,6	21,1	10	9,4	9,4	1
11/04/2011 a 13/04/2011	30,4	13,8	29,1	15,3	22,2	8	63,6	39,2	1
14/04/2011 a 17/04/2011	31,1	14,2	29	16,4	22,7	11	0	0	0
18/04/2011 a 20/04/2011	30,8	14,2	29,9	15,8	22,9	8	0	0	0
21/04/2011 a 24/04/2011	30,6	15,4	30,3	16,2	23,2	11	0	0	0
25/04/2011 a 27/04/2011	28	14,4	26,9	15,9	21,4	8	0	0	0
28/04/2011 a 01/05/2011	28,5	11,9	24	13,2	18,6	9	18,6	0	0
02/05/2011 a 04/05/2011	25,7	7,2	23,8	10	16,9	5	14,4	0	0
05/05/2011 a 08/05/2011	28,8	8,4	27,5	10,3	18,9	8	0	0	0
09/05/2011 a 11/05/2011	27,6	11,4	27,3	12,4	19,8	6	0	0	0

d) Inverno

Monitoramento Climatológico: Taubaté no período de 27/04/2011 até 27/07/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
28/04/2011 a 01/05/2011	30,2	13	27,6	14,7	21,2	10	2	0	0
02/05/2011 a 04/05/2011	26	13,4	25,7	14,1	19,9	6	2,6	0	0
05/05/2011 a 08/05/2011	29,6	12,6	28,7	14	21,4	9	0	0	0
09/05/2011 a 11/05/2011	28,6	13,6	27,2	15,1	21,2	6	0,5	0	0
12/05/2011 a 15/05/2011	27,4	12,6	25,7	15,6	20,7	8	0	0	0
16/05/2011 a 18/05/2011	32,1	13,8	29,2	14,6	21,9	7	17	0	0
19/05/2011 a 22/05/2011	27,1	11,6	25	13,2	19,1	8	0,8	0,8	1
23/05/2011 a 25/05/2011	27,2	8,6	27	9,7	18,4	6	0	0	0
26/05/2011 a 29/05/2011	26,8	9,2	23,7	12	17,8	7	1,8	0	0
30/05/2011 a 01/06/2011	25	7,6	23,9	8,9	16,4	5	0	0	0
02/06/2011 a 05/06/2011	24,4	5,4	23,3	10,6	16,9	6	0	0	0
06/06/2011 a 08/06/2011	25,8	6,2	23,8	8,9	16,3	4	13,8	13,8	1
09/06/2011 a 12/06/2011	22,3	6,4	19,5	8,6	14	5	9	0	0
13/06/2011 a 15/06/2011	24,6	7,8	23,5	8,3	15,9	4	0	0	0
16/06/2011 a 19/06/2011	26,2	6,4	25,3	7,4	16,4	6	0	0	0
20/06/2011 a 22/06/2011	29,4	8,8	27,3	9,9	18,6	5	0	0	0
23/06/2011 a 26/06/2011	27	12,8	25,5	14,5	20	7	0	0	0
27/06/2011 a 29/06/2011	24,6	2,8	21,9	6,9	14,4	4	0	0	0
30/06/2011 a 03/07/2011	27,8	10,2	25,6	12	18,8	7	0	0	0
04/07/2011 a 06/07/2011	20,1	10	18,8	11	14,9	4	0	0	0
07/07/2011 a 10/07/2011	26	6,2	21,7	8,3	15	6	0	0	0
11/07/2011 a 13/07/2011	28,4	8,4	28,1	8,9	18,5	5	0	0	0
14/07/2011 a 17/07/2011	29	8,6	28,8	9,3	19	7	0	0	0
18/07/2011 a 20/07/2011	28	10,2	26,6	12,7	19,7	6	0	0	0
21/07/2011 a 24/07/2011	30,6	11	24,5	13,1	18,8	7	0	0	0
25/07/2011 a 27/07/2011	27,4	8	23,3	8,9	16,1	5	0	0	0

Monitoramento Climatológico: Limeira no período de 27/04/2011 até 27/07/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
28/04/2011 a 01/05/2011	28,5	11,9	24	13,2	18,6	9	18,6	0	0
02/05/2011 a 04/05/2011	25,7	7,2	23,8	10	16,9	5	14,4	0	0
05/05/2011 a 08/05/2011	28,8	8,4	27,5	10,3	18,9	8	0	0	0
09/05/2011 a 11/05/2011	27,6	11,4	27,3	12,4	19,8	6	0	0	0
12/05/2011 a 15/05/2011	26,8	9,8	25,6	12	18,8	8	0	0	0
16/05/2011 a 18/05/2011	26,5	7,6	23	10,2	16,6	5	0	0	0
19/05/2011 a 22/05/2011	25,2	7,1	24	8,8	16,4	7	0	0	0
23/05/2011 a 25/05/2011	25,4	9,5	25	10	17,5	5	0	0	0
26/05/2011 a 29/05/2011	26,7	5,9	24,4	10,6	17,5	7	0	0	0
30/05/2011 a 01/06/2011	24,8	4,8	22,3	5	13,7	4	0,2	0	0
02/06/2011 a 05/06/2011	27,2	5,2	25	6,5	15,7	6	0	0	0
06/06/2011 a 08/06/2011	27,8	1,8	24	4,7	14,3	4	9,2	9,2	1
09/06/2011 a 12/06/2011	23,3	5,6	16,7	7,2	11,9	4	20,4	0	0
13/06/2011 a 15/06/2011	25,3	5	23,2	6,9	15,1	4	0	0	0
16/06/2011 a 19/06/2011	25,8	6	24,3	8,7	16,5	6	0,2	0	0
20/06/2011 a 22/06/2011	28,5	9,2	27	11,1	19	5	0	0	0
23/06/2011 a 26/06/2011	27,1	8,8	26,6	9,9	18,2	7	0,2	0,2	1
27/06/2011 a 29/06/2011	19,1	0,7	18,4	4,1	11,3	3	0,2	0	0
30/06/2011 a 03/07/2011	29	2,6	27,8	10	18,9	7	0	0	0
04/07/2011 a 06/07/2011	27,7	7,6	24,2	9,4	16,8	5	0	0	0
07/07/2011 a 10/07/2011	28	0,1	22,9	3,6	13,2	5	0,2	0	0
11/07/2011 a 13/07/2011	29,3	11,2	28,9	12	20,5	6	0	0	0
14/07/2011 a 17/07/2011	29	11,5	28	12,2	20,1	8	0	0	0
18/07/2011 a 20/07/2011	29,2	12,2	27,5	12,6	20,1	6	0	0	0
21/07/2011 a 24/07/2011	30,5	10	26,2	13,5	19,8	8	1,6	0	0

e) Primavera 2

Monitoramento Climatológico: Taubaté no período de 15/07/2011 até 15/10/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
18/07/2011 a 20/07/2011	28	10,2	26,6	12,7	19,7	6	0	0	0
21/07/2011 a 24/07/2011	30,6	11	24,5	13,1	18,8	7	0	0	0
25/07/2011 a 27/07/2011	27,4	8	23,3	8,9	16,1	5	0	0	0
28/07/2011 a 31/07/2011	28,8	9,2	27,9	11,6	19,7	7	1,2	1,2	1
01/08/2011 a 03/08/2011	26,2	14,6	25,9	15,1	20,5	7	0	0	0
04/08/2011 a 07/08/2011	33	8	26,6	11	18,8	8	0	0	0
08/08/2011 a 10/08/2011	32,6	12,8	27,1	14,7	20,9	7	1,4	1,4	1
11/08/2011 a 14/08/2011	31,6	9,6	28,1	11,7	19,9	9	0	0	0
15/08/2011 a 17/08/2011	32,8	9,4	30,6	12,3	21,4	7	0	0	0
18/08/2011 a 21/08/2011	31	11,6	25,7	13,4	19,6	9	1,2	1,2	1
22/08/2011 a 24/08/2011	27,2	12,4	23	13,9	18,5	6	1,8	0	0
25/08/2011 a 28/08/2011	32	12,2	29,2	15,1	22,1	10	0	0	0
29/08/2011 a 31/08/2011	35,4	12,8	30	14,1	22	7	0	0	0
01/09/2011 a 04/09/2011	30,6	5,8	25,1	7,7	16,4	9	15	0	0
05/09/2011 a 07/09/2011	33,8	7,6	31,4	11,3	21,3	9	0	0	0
08/09/2011 a 11/09/2011	33,6	12,6	29,2	14,3	21,8	12	0	0	0
12/09/2011 a 14/09/2011	32	14,4	25,8	15,2	20,5	8	0	0	0
15/09/2011 a 18/09/2011	28	9,6	26,7	13,7	20,2	11	0	0	0
19/09/2011 a 21/09/2011	32	9,6	31	10,9	20,9	8	0	0	0
22/09/2011 a 25/09/2011	35,4	13,8	28,8	16	22,4	12	1,3	0	0
26/09/2011 a 28/09/2011	31,2	9,8	29,2	11,5	20,3	8	0	0	0
29/09/2011 a 02/10/2011	37,4	13,6	34,9	15,2	25	15	0	0	0
03/10/2011 a 05/10/2011	30,2	12,6	28,9	14,1	21,5	10	30,6	0	0
06/10/2011 a 09/10/2011	34	13,4	33,1	16	24,5	17	0	0	0
10/10/2011 a 12/10/2011	33	16,6	31,5	18,3	24,9	13	13,8	0	0
13/10/2011 a 16/10/2011	26,6	16,6	25,3	19,1	22,2	14	19	15,2	1

Monitoramento Climatológico: Limeira no período de 15/07/2011 até 15/10/2011									
Período	Temperatura	Temperatura	Média das	Média das	Temperatura	Evapo-	Chuva	Chuva Acumulada	Dias
	Máxima	Mínima	Temperaturas	Temperaturas	Média	transpiração		Mensal	Com Chuva
	Absoluta	Absoluta	Máximas	Mínimas		Potencial			no Mês
	(°C)					(mm)			
18/07/2011 a 20/07/2011	29,2	12,2	27,5	12,6	20,1	6	0	0	0
21/07/2011 a 24/07/2011	30,5	10	26,2	13,5	19,8	8	1,6	0	0
25/07/2011 a 27/07/2011	26,8	10,4	25,9	11	18,4	5	0	0	0
28/07/2011 a 31/07/2011	29,3	10,4	27,9	12,3	20,1	8	0,2	0,2	1
01/08/2011 a 03/08/2011	27,8	11,5	25,3	12,2	18,7	6	0,4	0,2	1
04/08/2011 a 07/08/2011	31,3	0,6	22,9	5,1	14	6	3,2	0	0
08/08/2011 a 10/08/2011	32,4	10,4	28,9	12,8	20,9	7	0	0	0
11/08/2011 a 14/08/2011	31,3	7,1	28	10,2	19,1	9	0,2	0	0
15/08/2011 a 17/08/2011	30,8	12,2	30,3	13,5	21,9	7	0	0	0
18/08/2011 a 21/08/2011	31,8	11,6	28,8	13,7	21,2	10	4	4	1
22/08/2011 a 24/08/2011	28,1	9,5	22,5	10,3	16,4	6	3	0	0
25/08/2011 a 28/08/2011	32,8	12,6	29,6	13,4	21,5	10	0	0	0
29/08/2011 a 31/08/2011	34,2	15,8	28,9	17,4	23,2	8	0	0	0
01/09/2011 a 04/09/2011	27,9	5,4	23,4	6,4	14,9	8	12,8	0	0
05/09/2011 a 07/09/2011	33,4	11,2	33,1	12,1	22,6	9	0	0	0
08/09/2011 a 11/09/2011	34	11,8	31,3	13,9	22,6	12	0,4	0,4	1
12/09/2011 a 14/09/2011	31,5	10,6	27,7	11,7	19,7	8	0,2	0	0
15/09/2011 a 18/09/2011	29,9	8,8	27,8	11,5	19,6	11	0	0	0
19/09/2011 a 21/09/2011	30,3	9,1	29,7	13,5	21,6	9	0	0	0
22/09/2011 a 25/09/2011	35	11,6	30,1	12,7	21,4	12	0,4	0	0
26/09/2011 a 28/09/2011	30,1	8,8	28,8	10,6	19,7	8	0	0	0
29/09/2011 a 02/10/2011	35,6	10,4	33,9	14,7	24,3	14	0	0	0
03/10/2011 a 05/10/2011	30,4	13	29,8	13,7	21,8	10	2,8	0	0
06/10/2011 a 09/10/2011	33,5	13,5	31,9	16,6	24,2	16	0	0	0
10/10/2011 a 12/10/2011	30,1	16,5	29,5	17,2	23,4	11	13,6	0	0
13/10/2011 a 16/10/2011	31,5	17,6	26,1	18,1	22,1	14	125	21,6	1

Apêndice – C

Coleta: 20/02/2011
Local: Paraibuna (SP) - Sítio do Belo Contato: Douglas
Espécie vegetal: Campomanesia phaea
Horário: 17:00
Data do processamento do material: 21/02/2011
Data da extração do óleo: 22/02/2011
Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,40	5,4725	5,5776	0,1269
1B	100,29	5,6691	5,7843	0,1316
1C	100,83	5,6596	5,7438	0,1308
2A	100,36	5,6405	5,7521	0,1318
2B	100,22	5,5738	5,7103	0,1487
2C	100,68	5,6172	5,7180	0,1387
3A	100,55	5,6194	5,7100	0,1213
3B	100,62	5,6385	5,7207	0,1169
3C	100,58	5,6699	5,7581	0,1209
4A	100,77	5,6423	5,7532	0,1540
4B	100,93	5,5544	5,6515	0,1483
4C	100,54	5,6764	5,7878	0,1419
5A	100,76	5,4938	5,5829	0,1305
5B	100,54	5,5823	5,6874	0,1351
5C	100,28	5,6510	5,7725	0,1373
6A	100,46	5,6690	5,7625	0,1195
6B	100,77	5,5556	5,6343	0,1212
6C	100,71	5,5811	5,6535	0,1117
7A	100,56	5,6409	5,7392	0,1297
7B	100,31	5,6404	5,7324	0,1094
7C	100,77	5,5756	5,6438	0,1108
8A	100,83	5,6486	5,7349	0,1328
8B	100,29	5,6602	5,7837	0,1399
8C	100,52	5,6831	5,7920	0,1383
9A	100,54	5,6526	5,7405	0,1183
9B	100,32	5,5866	5,6846	0,1158
9C	100,56	5,5730	5,6659	0,1239
				0,1291

Coleta: 23/02/2011
Local: Limeira (SP) - Sítio Recanto da Natureza Contato: Rodrigo/Rogério
Espécie vegetal: Campomanesia phaea
Horário: 11:00
Data do processamento do material: 23/02/2011
Data da extração do óleo: 24/02/2011
Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,23	5,5332	5,6289	0,1084
1B	100,63	5,6170	5,6910	0,1092
1C	100,20	5,5956	5,6878	0,1034
2A	100,22	5,5754	5,6896	0,1264
2B	100,38	5,6283	5,7290	0,1220
2C	100,47	5,5681	5,6691	0,1270
3A	100,52	5,6037	5,6950	0,1203
3B	100,09	5,5404	5,6561	0,1207
3C	100,09	5,5750	5,6953	0,1253
4A	100,62	5,5468	5,6943	0,1817
4B	100,89	5,5490	5,6594	0,1594
4C	100,32	5,5734	5,6986	0,1430
5A	100,63	5,5568	5,6326	0,1106
5B	100,61	5,5853	5,6732	0,1218
5C	100,45	5,5530	5,6489	0,1208
6A	100,29	5,4749	5,6568	0,1977
6B	100,60	5,5726	5,7209	0,1815
6C	100,08	5,5944	5,7837	0,1938
7A	100,82	5,6276	5,7031	0,1213
7B	100,72	5,6251	5,7161	0,1312
7C	100,88	5,5822	5,6644	0,1309
8A	100,45	5,6697	5,7842	0,1399
8B	100,63	5,5861	5,6732	0,1221
8C	100,26	5,5026	5,6222	0,1339
9A	100,81	5,5687	5,6747	0,1507
9B	100,90	5,5507	5,6681	0,1669
9C	100,92	5,6278	5,6993	0,1228
				0,1368

Coleta: 11/05/2011
Local: Paraibuna (SP) - Sítio do Belo Contato: Douglas
Espécie vegetal: Campomanesia phaea
Horário: 9:00
Data do processamento do material: 11/05/2011
Data da extração do óleo: 12/05/2011
Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,32	5,5560	5,6164	0,0781
1B	100,40	5,5454	5,6032	0,0799
1C	100,90	5,5997	5,6504	0,1006
2A	100,39	5,6535	5,7073	0,0758
2B	100,19	5,5679	5,6206	0,0633
2C	100,40	5,5889	5,6576	0,0910
3A	100,10	5,5666	5,6657	0,1047
3B	100,21	5,6298	5,7296	0,1116
3C	100,61	5,5776	5,6818	0,1380
4A	100,25	5,5716	5,6027	0,0450
4B	100,37	5,6650	5,6961	0,0520
4C	100,30	5,5691	5,6271	0,0747
5A	100,78	5,5240	5,6047	0,1235
5B	100,48	5,5899	5,6849	0,1217
5C	100,05	5,6169	5,7371	0,1230
6A	100,73	5,5928	5,7383	0,1621
6B	100,64	5,5755	5,7266	0,1694
6C	100,56	5,5937	5,7174	0,1729
7A	100,40	5,5721	5,6554	0,0840
7B	100,40	5,5185	5,6393	0,0894
7C	100,40	5,5759	5,5887	0,0922
8A	100,34	5,6062	5,6660	0,1090
8B	100,89	5,5892	5,6659	0,1092
8C	100,85	5,5566	5,6224	0,0803
9A	100,34	5,5561	5,6323	0,0945
9B	100,80	5,5639	5,6191	0,1071
9C	100,45	5,5439	5,6422	0,1032
				0,1021

Coleta: 09/05/2011
Local: Limeira (SP) - Sítio Recanto da Natureza Contato: Rodrigo/Rogério
Espécie vegetal: Campomanesia phaea
Horário: 9:00
Data do processamento do material: 09/02/2011
Data da extração do óleo: 10/02/2011
Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,35	5,4828	5,5826	0,1189
1B	100,64	5,5846	5,6854	0,1363
1C	100,66	5,6436	5,7460	0,1394
2A	100,60	5,5530	5,6209	0,1010
2B	100,20	5,5960	5,6751	0,0903
2C	100,03	5,5493	5,6379	0,0903
3A	100,66	5,5706	5,6575	0,1234
3B	100,60	5,5799	5,6607	0,1141
3C	100,35	5,4119	5,5326	0,1396
4A	100,44	5,6093	5,6548	0,0701
4B	100,61	5,4961	5,5490	0,0862
4C	100,88	5,5393	5,5819	0,0909
5A	100,50	5,5708	5,6770	0,1339
5B	100,09	5,4304	5,5820	0,1565
5C	100,09	5,6202	5,7555	0,1404
6A	100,01	5,6005	5,7336	0,1337
6B	100,89	5,5138	5,6146	0,1494
6C	100,22	5,5883	5,6987	0,1227
7A	100,80	5,5599	5,6710	0,1552
7B	100,30	5,5357	5,6842	0,1651
7C	100,44	5,5642	5,6938	0,1540
8A	100,78	5,5349	5,6062	0,1141
8B	100,87	5,5586	5,6142	0,1035
8C	100,37	5,5392	5,6320	0,1132
9A	100,62	5,5545	5,6407	0,1204
9B	100,56	5,4280	5,5097	0,1119
9C	100,67	5,5773	5,6517	0,1115
				0,1217

Coleta: 25/07/2011

Local: Paraibuna (SP) - Sítio do Belo Contato: Douglas

Espécie vegetal: Campomanesia phaea

Horário: 9:30

Data do processamento do material: 25/07/2011

Data da extração do óleo: 26/07/2011

Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,15	5,1337	5,2424	0,1164
1B	100,80	5,0081	5,0981	0,1297
1C	100,83	5,2024	5,2836	0,1240
2A	100,93	5,1407	5,2054	0,1121
2B	100,80	5,2914	5,3573	0,1079
2C	100,23	5,2125	5,3032	0,1027
3A	100,09	5,2537	5,3033	0,0543
3B	100,26	5,1821	5,2274	0,0587
3C	100,97	5,7114	5,7322	0,0757
4A	100,29	5,4805	5,5721	0,1074
4B	100,57	5,3050	5,3764	0,1015
4C	100,25	5,3316	5,4285	0,1102
5A	100,28	5,1125	5,2010	0,1028
5B	100,27	5,1062	5,2052	0,1127
5C	100,94	5,4927	5,5616	0,1201
6A	100,20	5,3397	5,4394	0,1104
6B	100,85	5,3264	5,3943	0,1128
6C	100,55	5,1721	5,2391	0,0953
7A	100,04	5,4558	5,5434	0,0898
7B	100,77	5,4658	5,5509	0,1269
7C	100,85	5,4283	5,5068	0,1243
8A	100,24	5,3331	5,4206	0,1003
8B	100,45	5,0598	5,1531	0,1160
8C	100,47	5,0463	5,1266	0,1039
9A	100,66	5,4630	5,5237	0,0965
9B	100,38	5,4174	5,4819	0,0850
9C	100,87	5,1987	5,2476	0,0937
				0,1034

Coleta: 27/07/2011

Local: Limeira (SP) - Sítio Recanto da Natureza Contato: Rodrigo/Rogério

Espécie vegetal: Campomanesia phaea

Horário: 8:15

Data do processamento do material: 27/07/2011

Data da extração do óleo: 28/07/2011

Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,28	5,5475	5,6429	0,1109
1B	100,46	5,1632	5,2473	0,1077
1C	100,53	5,1858	5,2676	0,1091
2A	100,25	5,3585	5,4529	0,1078
2B	100,36	5,3309	5,4219	0,1101
2C	100,81	5,1302	5,2124	0,1234
3A	100,04	5,0333	5,1366	0,1053
3B	100,09	5,0912	5,1977	0,1111
3C	100,01	5,4745	5,6018	0,1278
4A	100,08	5,3075	5,4240	0,1207
4B	100,88	5,1379	5,1974	0,1043
4C	100,15	5,2517	5,3557	0,1119
5A	100,14	5,1709	5,2933	0,1296
5B	100,26	5,6677	5,7737	0,1207
5C	100,34	5,1805	5,2739	0,1110
6A	100,51	5,2187	5,2927	0,1005
6B	100,80	5,4413	5,5137	0,1156
6C	100,71	5,4400	5,5160	0,1144
7A	100,07	5,0857	5,1870	0,1049
7B	100,13	5,1556	5,2778	0,1289
7C	100,53	5,5337	5,6622	0,1577
8A	100,47	5,3053	5,3974	0,1169
8B	100,19	5,4121	5,5070	0,1052
8C	100,32	5,1507	5,2256	0,0913
9A	100,67	5,6216	5,6905	0,1063
9B	100,75	5,2125	5,2892	0,1155
9C	100,35	5,1398	5,2397	0,1178
				0,1143

Coleta: 15/10/2012

Local: Paraibuna (SP) - Sítio do Belo Contato: Douglas

Espécie vegetal: Campomanesia phaea

Horário:

Data do processamento do material:

Data da extração do óleo:

Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,85	5,6905	5,7812	0,1387
1B	100,92	5,6887	5,7784	0,1416
1C	100,65	5,6342	5,7539	0,1561
2A	100,57	5,6463	5,6953	0,0810
2B	100,45	5,7102	5,7648	0,0802
2C	100,60	5,6902	5,7443	0,0880
3A	100,19	5,7183	5,8032	0,0957
3B	100,62	5,7144	5,7904	0,1112
3C	100,58	5,7133	5,8013	0,1209
4A	100,89	5,7131	5,8014	0,1387
4B	100,05	5,7126	5,8417	0,1320
4C	100,03	5,6942	5,7762	0,0837
5A	100,80	5,615	5,7010	0,1306
5B	100,08	5,6774	5,8006	0,1277
5C	100,98	5,693	5,7563	0,1185
6A	100,50	5,6798	5,7569	0,0922
6B	100,15	5,6167	5,6824	0,0111
6C	100,20	5,6398	5,7188	0,1133
7A	100,68	5,6626	5,7167	0,1150
7B	100,22	5,6488	5,7602	0,1100
7C	100,38	5,6937	5,7411	0,1137
8A	100,80	5,6319	5,7459	0,0974
8B	100,42	5,7007	5,7040	0,0957
8C	100,02	5,66	5,7906	0,0910
9A	100,90	5,7165	5,7167	0,1072
9B	100,45	5,6906	5,7862	0,0953
9C	100,88	5,6635	5,7252	0,0842
				0,1063

Coleta: 15/10/2012

Local: Limeira (SP) - Sítio Recanto da Natureza Contato: Rodrigo/Rogério

Espécie vegetal: Campomanesia phaea

Horário:

Data do processamento do material:

Data da extração do óleo:

Tempo de extração: 2 horas

Amostra	Massa amostra (g)	Peso do frasco vazio (g)	Peso frasco + óleo (g)	Rendimento (%)
1A	100,86	5,7059	5,7857	0,1285
1B	100,75	5,6586	5,7344	0,1179
1C	100,74	5,6991	5,7914	0,1342
2A	100,68	5,6808	5,7629	0,1205
2B	100,44	5,6693	5,7764	0,1319
2C	100,93	5,6327	5,7302	0,1494
3A	100,58	5,6494	5,6973	0,0805
3B	100,73	5,6788	5,7470	0,1094
3C	100,94	5,6495	5,7320	0,1351
4A	100,36	5,7089	5,7914	0,1030
4B	100,49	5,6783	5,7843	0,1337
4C	100,30	5,6810	5,7776	0,1136
5A	100,73	5,6272	5,7587	0,1723
5B	100,76	5,7007	5,8508	0,1931
5C	100,70	5,6780	5,8212	0,1827
6A	100,90	5,6949	5,8043	0,1602
6B	100,32	5,6848	5,7873	0,1206
6C	100,74	5,7175	5,8399	0,1644
7A	100,61	5,6164	5,7252	0,1429
7B	100,76	5,6441	5,7423	0,1408
7C	100,53	5,7240	5,8647	0,1709
8A	100,35	5,7216	5,8088	0,1072
8B	100,14	5,6417	5,7680	0,1342
8C	100,63	5,6865	5,7922	0,1413
9A	100,51	5,6914	5,7744	0,1119
9B	100,49	5,6578	5,7777	0,1475
9C	100,41	5,6786	5,8001	0,1447
				0,1367

Apêndice D – Resultados analíticos da composição química do óleo essencial de *C. phaea*

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Paraibuna-SP, coletados na primavera (2010).

	IK*	IK**	Pa-13P-1*	Pa-13P-2*	Pa-13P-3*	Media	Pa-20P-1*	Pa-20P-2*	Pa-20P-3*	Media	Pa-27P-1*	Pa-27P-2*	Pa-27P-3*	Media	Pa-40P-1*	Pa-40P-2*	Pa-40P-3*	Media	Pa-50P-1*	Pa-50P-2*	Pa-50P-3*	Media	Pa-60P-1*	Pa-60P-2*	Pa-60P-3*	Media	Pa-77P-1*	Pa-77P-2*	Pa-77P-3*	Media	Pa-100P-1*	Pa-100P-2*	Pa-100P-3*	Media	Pa-130P-1*	Pa-130P-2*	Pa-130P-3*	Media			
monoperóxido	α-pirreno	929	939	8,45	8,88	8,94	8,73	7,21	7,68	0,43	5,14	8,73	9,74	tr	9,24	6,47	6,54	6,18	6,40	4,85	6,12	4,39	5,12	tr	0,71	0,76	0,74	0,72	2,77	2,71	2,78	2,68	2,99	5,07	4,47	4,44	4,66	1,32	1,07	1,80	1,40
	β-pirreno	971	979	6,66	6,55	7,40	6,77	5,74	5,71	0,84	4,10	6,74	7,21	0,34	4,76	5,52	5,21	5,05	5,26	4,04	4,67	3,66	4,12	tr	2,19	2,17	2,56	2,31	2,17	2,57	2,31	2,57	3,08	3,59	3,61	3,81	0,87	1,34	1,01		
	α-pirreno	1020	1029	2,11	2,16	2,13	2,13	2,19	2,19	0,19	1,59	2,41	2,41	0,78	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,86	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	
	13-cis-retinol	1025	1031	3,63	3,61	3,05	3,43	3,58	3,22	1,73	2,84	3,19	3,08	2,41	3,34	3,09	2,63	3,02	0,77	0,84	1,14	0,92	1,19	1,61	1,55	1,45	tr	0,46	0,87	0,67	0,71	1,77	1,88	1,82	1,82	2,26	2,17	1,19	2,21		
	trans-β-odimeno	1041	1050	5,34	4,62	4,02	4,66	5,69	5,85	4,13	5,22	6,05	6,55	2,71	5,10	6,54	6,27	5,35	6,72	1,00	2,21	tr	1,61	2,97	3,94	4,47	3,79	2,91	3,92	6,01	4,28	8,04	10,77	9,60	1,85	tr	1,89	1,87			
	linfali	1094	1096	21,25	20,36	19,48	20,36	10,61	9,60	10,20	10,14	19,43	18,06	20,16	19,22	19,01	20,05	18,31	19,12	21,09	18,94	20,09	20,04	10,54	9,72	9,75	10,00	7,17	8,68	10,36	8,74	19,99	18,49	18,16	28,18	24,79	28,17	21,42	24,79		
	α-terpinol	1193	1199	1,29	1,39	1,28	1,32	1,42	1,12	1,28	1,27	1,37	1,27	1,44	1,36	1,25	1,23	0,99	1,16	0,64	0,53	0,72	0,63	0,52	0,52	0,52	0,40	0,49	0,45	1,30	0,78	0,83	0,97	0,97	0,88	0,84	0,90				
	α-copáleno	1270	1275	0,51	0,59	0,52	0,58	1,18	1,49	tr	1,71	1,46	1,28	1,50	2,02	1,60	1,12	1,01	1,15	1,20	1,12	1,01	1,29	1,26	1,29	1,26	1,49	1,35	0,93	1,11	1,42	1,15	2,78	1,59	1,79	1,72	1,20	1,86	1,42		
	β-ilemeno	1391	1399	0,49	0,48	0,41	0,46	tr	tr	tr	tr	0,36	0,36	tr	tr	0,41	0,41	0,55	tr	0,65	0,60	0,70	0,73	0,74	0,72	1,26	1,29	1,31	1,29	tr	0,40	0,40	0,40	tr	0,42	0,54	0,48				
	trans-α-copáleno	1412	1419	11,93	11,26	11,69	12,29	5,37	6,38	7,73	6,49	9,64	10,50	14,60	11,58	8,27	9,00	10,41	9,43	12,31	6,21	8,90	7,85	7,65	15,55	14,84	15,02	15,14	11,74	13,11	14,18	13,01	16,56	15,55	16,45	16,19	10,61	10,09	14,08	11,59	
	β-copáleno	1428	1432	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,37	0,51	0,4	0,39	0,42	0,47	0,43	tr	tr	tr	tr	tr	0,32	tr	tr	0,32	tr	0,32	tr	0,32	tr	0,32	tr	0,32	tr	0,32	tr	0,32	tr	0,32	tr
sesquiterpeno	α-amanodieno	1438	1449	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
	α-humuleno	1446	1454	1,77	1,89	1,75	1,80	1,37	1,50	1,89	1,59	2,06	2,14	3,19	2,46	1,73	1,82	2,12	1,89	1,65	2,16	1,90	2,60	2,51	2,52	2,54	2,58	2,79	2,88	2,75	3,07	3,03	3,14	3,08	2,38	2,43	3,06	2,62			
	allo-amanodieno	1459	1461	tr	tr	tr	tr	0,40	0,48	0,78	0,55	tr	0,46	0,46	0,44	0,49	0,64	0,52	1,20	1,73	1,08	1,34	0,57	0,74	0,84	0,72	1,06	0,92	1,05	1,01	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,37	0,37		
	γ-muroleno	1475	1477	1,19	1,26	1,08	1,18	0,94	1,06	1,22	1,07	0,80	1,04	1,21	1,02	1,13	1,26	1,28	1,20	1,27	1,74	1,80	1,59	1,64	2,01	1,75	1,86	2,02	2,14	2,01	1,80	1,63	1,83	1,75	1,82	1,98	2,57	2,12			
	α-copáleno	1478	1480	0,34	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39		
	β-selineno	1485	1485	2,65	3,19	2,79	2,88	1,09	1,22	1,33	1,21	0,51	0,56	0,71	0,59	0,86	0,94	1,02	0,94	1,28	3,23	2,97	3,15	3,54	3,48	3,69	3,57	3,32	3,69	3,89	3,63	1,29	1,21	1,32	1,27	1,25	1,05	2,05	2,73	2,24	
	bicidigermacreno	1490	1493	2,96	3,39	2,96	3,04	1,55	1,76	2,30	1,87	1,22	1,30	2,17	1,56	1,61	1,72	2,37	1,90	3,74	5,71	2,98	4,14	3,71	3,96	4,32	4,00	4,63	5,36	5,62	5,20	2,10	2,24	2,30	2,21	2,38	2,16	3,45	2,66		
	germacreno A	1495	1494	tr	tr	tr	0,41	0,41	0,38	tr	tr	0,38	tr	tr	tr	tr	0,58	tr	tr	0,58	tr	tr	tr	0,53	0,53	tr	tr	0,78	0,85	0,82	0,99	0,94	1,04	0,99	0,83	0,85	1,17	0,95			
	γ-cadineno	1499	1500	0,42	0,50	0,41	0,44	0,49	0,57	0,67	0,58	0,55	0,58	0,85	0,66	0,67	0,72	0,74	0,71	0,57	0,78	0,69	0,63	0,69	0,69	0,67	tr	0,78	0,85	0,82	0,99	0,94	1,04	0,99	0,83	0,85	1,17	0,95			
	β-cadineno	1503	1513	2,30	1,35	2,41	0,84	0,49	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	0,40	0,28	0,29	
	germacreno B	1555	1561	tr	tr	tr	tr	0,78	0,90	1,53	1,07	tr	tr	tr	tr	1,34	1,91	0,94	1,40	1,75	1,74	1,58	1,69	2,10	2,17	2,15	2,14	0,36	0,45	0,44	0,42	1,49	1,53	1,08	1,70	1,53	2,08	1,70			
ε-nerolidol	1556	1563	tr	tr	tr	tr	26,60	25,71	31,77	28,03	10,47	9,54	15,56	11,86	11,10	10,92	10,25	10,74	8,48	7,10	7,07	7,55	8,43	8,24	7,44	8,04	2,34	3,38	4,40	3,24	2,62	2,92	2,67	2,74	8,45	7,70	7,70	7,75			
espátnol	1575	1578	1,62	1,59	1,89	1,73	2,17	2,06	2,28	2,17	1,07	0,97	1,16	1,07	2,50	2,34	2,13	2,29	4,24	3,17	3,77	3,73	2,68	2,47	2,23	2,46	4,36	3,45	3,47	4,26	0,89	0,89	0,90	1,74	1,87	1,78	1,80				
ácido de cariofileno	1582	1583	6,32	6,31	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48	6,32	6,48		
1-epi-γ-eudesmol	1620	1619	0,48	0,43	0,52	0,48	0,43	0,40	0,46	0,43	tr	tr	tr	0,39	0,39	tr	tr	0,72	0,61	0,75	0,69	0,64	0,79	0,61	0,68	1,26	1,19	0,59	1,01	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr		
isopulegón	1627	1627	1,97	1,90	2,25	1,97	2,30	2,48	2,27	2,52	2,47	2,26	2,85	2,53	2,61	2,64	2,12	2,46	1,37	1,08	2,39	1,61	3,38	3,30	2,79	3,16	2,96	2,63	1,48	2,36	2,13	2,16	2,10	2,13	2,03	2,81	2,28	2,37			
cupérol	1642	1645	1,55	1,48	1,76	1,63	0,83	0,83	1,10	0,92	2,46	2,32	3,55	2,78	2,13	2,09	2,11	2,11	1,81	tr	2,09	1,95	1,90	2,10	2,10	2,09	1,80	1,34	1,82	1,59	2,29	2,76	2,91	2,81	2,84	1,65	1,43	1,55	1,53		
α-murolol	1646	1645	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			
ibofol	1653	1654	tr	tr	0,73	3,19	0,79	0,84	0,96	0,86	0,82	0,57	0,50	tr	0,54	0,77	0,67	0,72	1,69	1,05	1,56	1,43	8,39	7,31	7,08	7,59	9,13	6,94	5,79	7,29	1,85	3,32	5,55	5,60	6,12	4,66	5,46				
Total identificado			90,23	85,12	84,51	88,39	89,64	90,35	87,92	89,76	89,13	90,11	87,53	89,13	88,48	89,23	90,01	89,51	85,28	86,65	84,05	88,20	85,35	87,80	87,40	88,31	83,59	85,96	90,05	88,54	92,60	93,05	93,08	93,04	86,80	88,80	92,43	91,25			
tr = trapa da substância (tr< 0,31)																																									
IK* = Índice de Kovats calculado																																									
IK** = Índice de Kovats Literature																																									

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Limeira-SP, coletados na primavera (2010).

Substâncias		População Uppåkra																																						
IK*	IK**	IK-1P-1R-1	IK-1P-1R-2	IK-1P-1R-3	Media	IK-2P-1R-1	IK-2P-1R-2	IK-2P-1R-3	Media	IK-3P-1R-1	IK-3P-1R-2	IK-3P-1R-3	Media	IK-4P-1R-1	IK-4P-1R-2	IK-4P-1R-3	Media	IK-5P-1R-1	IK-5P-1R-2	IK-5P-1R-3	Media	IK-6P-1R-1	IK-6P-1R-2	IK-6P-1R-3	Media	IK-7P-1R-1	IK-7P-1R-2	IK-7P-1R-3	Media	IK-8P-1R-1	IK-8P-1R-2	IK-8P-1R-3	Media	IK-9P-1R-1	IK-9P-1R-2	IK-9P-1R-3	Media			
o-pinen	932	939	5,83	4,95	5,03	5,27	6,32	5,45	5,22	5,86	5,42	3,64	4,43	4,19	3,82	3,72	3,91	2,99	3,05	3,13	3,06	2,49	1,18	3,08	2,20	5,75	5,30	6,63	5,89	6,32	4,99	5,84	5,72	5,32	4,55	5,12	5,00			
o-pinen	975	979	5,13	4,61	4,39	4,71	4,50	4,14	4,87	4,30	4,53	3,66	3,02	3,74	3,50	3,31	3,20	3,94	2,99	2,38	2,40	2,36	2,43	1,04	3,08	2,21	4,25	3,77	4,65	4,22	5,63	4,46	5,23	5,10	4,10	3,50	3,91	3,84		
o-pinen	1020	1020	0,60	0,60	0,70	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
1,8-cineol	1029	1031	0,99	1,08	1,07	1,05	1,05	1,00	1,02	1,02	0,84	0,63	0,83	1,06	0,99	1,04	1,03	2,93	3,00	2,83	2,92	1,64	1,50	1,35	1,50	5,88	5,14	5,92	5,65	1,00	1,02	1,15	1,16	0,97	0,80	0,74	0,84	0,84		
trans-β-cimeno	1045	1050	7,41	7,11	7,64	7,39	14,58	16,65	9,32	12,82	12,64	9,92	9,04	10,53	7,70	12,53	11,50	10,58	2,08	5,43	4,80	4,10	5,63	5,11	5,34	5,16	7,90	8,79	7,89	8,19	5,59	5,76	5,15	5,50	10,79	10,44	11,06	10,75		
linalol	1098	1096	7,75	8,04	9,48	8,42	14,86	15,37	14,87	15,03	15,04	16,45	14,31	15,27	18,86	17,39	15,88	17,38	12,39	12,17	11,62	12,60	24,38	18,38	19,25	20,67	9,09	7,36	7,96	8,14	20,86	16,21	17,81	18,29	22,96	20,25	22,05	21,75		
α-terpineol	1183	1189	tr	tr	tr	tr	0,53	0,55	0,62	0,57	0,51	0,49	0,39	0,46	0,47	0,44	0,45	0,48	0,76	0,80	0,74	0,77	0,92	0,75	0,51	0,73	0,52	0,46	0,65	0,57	0,59	0,64	0,65	0,57	0,48	0,53	0,53			
α-copaeno	1375	1376	1,44	1,38	1,32	1,37	1,44	1,38	1,36	1,39	1,25	1,19	1,23	1,22	1,27	0,77	0,79	0,78	0,69	0,71	0,73	0,71	0,25	1,82	1,68	1,58	1,38	0,99	1,28	1,01	1,04	1,05	1,14	1,33	1,41	1,29	1,41			
β-elemeno	1391	1390	0,72	0,77	0,70	0,73	0,59	0,52	0,74	0,62	1,28	1,64	1,51	1,48	1,69	1,95	2,24	1,96	3,12	3,24	3,28	3,21	0,77	1,35	1,43	1,18	2,20	2,19	1,89	2,09	2,30	2,71	2,41	2,47	1,94	2,43	1,67	2,01		
trans-carfotileno	1418	1419	7,93	8,75	8,92	8,53	4,75	4,59	5,91	5,08	9,55	10,67	11,47	10,56	10,10	10,08	9,54	9,91	6,10	6,38	6,53	6,34	13,33	16,12	15,14	14,86	13,17	15,27	13,65	14,03	8,23	9,88	9,20	9,10	8,06	9,51	7,69	8,42		
β-copaeno	1428	1432	tr	tr	0,69	0,73	0,71	0,54	0,52	0,49	0,52	0,46	0,41	0,48	0,45	0,33	0,33	0,32	0,33	tr	tr	0,40	0,54	0,51	0,48	tr	tr	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			
α-romadendreno	1438	1449	0,96	0,92	0,98	0,95	0,88	0,88	0,72	0,83	0,58	0,46	0,55	0,53	0,50	0,44	0,55	0,50	1,03	0,91	0,95	0,96	0,34	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37			
α-humuleno	1452	1454	2,25	2,15	2,25	2,25	2,15	2,05	1,87	2,11	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,49	1,74	1,79	2,49	2,49	2,49	2,49	3,09	3,16	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49		
α-romo-andrendreno	1459	1461	1,16	1,24	1,31	1,24	0,75	0,76	0,72	0,74	0,84	0,84	0,86	0,85	1,00	1,09	1,06	1,15	2,08	1,63	2,02	1,91	0,83	1,22	1,05	1,03	1,02	1,22	0,94	1,06	0,64	0,84	0,73	0,74	0,79	0,96	0,86	0,87		
α-muroleono	1475	1477	2,28	2,18	2,25	2,24	1,99	1,99	2,08	2,02	1,82	1,82	1,92	1,85	1,67	1,61	1,67	1,65	1,50	1,42	1,48	1,47	1,47	1,86	1,65	1,66	1,53	1,78	1,54	1,62	1,70	1,55	1,54	1,47	1,62	1,61	1,57			
β-selineno	1480	1480	2,30	2,53	2,25	2,36	1,32	1,14	1,16	2,21	2,19	2,15	2,01	2,12	1,38	1,74	1,75	1,62	0,69	0,72	0,60	0,67	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
α-germacreno	1485	1485	2,16	2,15	2,26	2,19	2,36	2,62	2,84	2,61	2,61	2,96	3,16	2,91	2,91	2,74	2,83	2,63	3,41	3,24	3,40	3,35	2,09	2,60	2,22	2,30	2,08	2,44	2,15	2,22	2,24	2,11	2,27	2,24	2,25	2,61	2,04	2,29		
β-ciclogermacreno	1490	1491	5,16	5,78	5,92	5,64	4,80	4,34	4,58	5,48	5,84	5,84	5,84	5,99	6,03	6,43	7,02	6,49	8,36	8,71	8,78	8,62	4,07	6,00	5,33	5,13	5,27	6,23	5,57	4,17	5,53	4,68	4,79	4,75	4,93	4,75	4,93			
α-germacreno A	1495	1494	0,89	tr	tr	tr	0,89	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,83	0,86	0,96	0,92	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,83	0,57	tr	0,70	0,68	0,84	0,73	0,75	0,83	0,95	tr	0,89	
α-cadineno	1499	1500	1,19	1,18	1,25	1,17	0,94	0,92	0,91	0,92	0,89	0,82	0,89	0,87	0,63	0,61	0,63	0,62	0,45	0,43	0,45	0,44	0,71	0,99	0,83	0,84	0,64	0,80	0,67	0,70	0,50	0,67	0,56	0,58	0,64	0,69	0,78	0,70		
β-cadineno	1512	1513	3,78	4,30	4,35	4,14	3,06	2,97	2,93	2,99	2,94	2,76	2,85	2,85	2,10	2,20	2,26	2,19	1,59	1,74	1,78	1,70	2,50	3,53	2,93	2,99	2,41	3,01	2,51	2,64	2,02	2,56	2,26	2,28	2,47	2,68	2,98	2,71		
α-germacreno B	1555	1561	2,91	3,27	3,33	3,17	4,21	4,12	4,20	4,18	4,14	1,53	0,45	1,14	2,20	2,40	2,59	2,40	2,70	2,96	2,59	2,88	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,43	0,55	0,51	0,50	0,69	0,74	0,61	0,92	3,90	4,28	4,12	4,10
β-germacreno	1561	1562	3,49	4,48	3,37	3,45	3,66	3,77	4,05	4,09	3,13	3,88	3,55	3,52	7,07	5,09	6,57	6,53	1,47	1,53	1,47	1,53	6,50	6,50	7,02	6,79	7,25	6,50	7,13	6,99	6,61	6,63	6,72	6,56	6,56	6,53	5,55	5,01		
α-eptaleno	1576	1578	2,50	2,40	2,46	2,48	3,06	3,36	3,50	3,31	1,93	1,99	1,94	1,95	1,75	1,36	1,37	1,49	3,63	2,70	2,81	3,07	2,90	1,79	1,37	2,02	1,48	1,20	1,39	1,36	1,22	1,24	1,28	1,25	0,79	0,72	0,70	0,74		
óxido de carfotileno	1583	1583	6,92	7,11	6,91	6,98	4,40	5,36	5,53	5,19	6,26	6,08	6,07	6,14	5,25	4,82	5,31	5,13	7,81	7,25	7,31	7,46	7,19	6,95	5,86	6,67	5,25	4,76	5,12	5,04	3,26	3,41	3,38	3,35	2,84	2,97	2,81	2,87		
10-epi-α-eudesmol	1621	1619	1,36	1,05	1,27	1,23	0,90	0,57	0,93	0,80	0,58	0,51	0,95	1,06	0,90	0,85	0,79	0,85	1,05	1,02	1,05	1,04	0,53	0,67	0,45	0,53	0,43	0,69	0,66	0,33	0,31	0,42	0,38	0,50	0,38	0,44	0,38			
1-epi-cubebol	1627	1624	2,54	2,54	2,30	2,26	1,95	1,34	2,32	1,87	1,05	1,01	1,65	1,28	0,95	0,86	1,23	1,01	0,40	0,53	0,53	0,49	1,45	1,27	1,33	1,38	0,96	0,90	1,04	0,97	1,05	0,75	1,10	0,97	0,69	0,88	0,92	0,83		
α-15-acetol	1642	1642	1,30	1,02	1,84	1,06	1,03	1,05	0,81	1,06	1,70	0,92	2,14	1,15	1,12	1,38	1,18	1,02	0,85	0,90	0,98	0,90	0,98	0,90	0,98	0,90	0,98	1,15	1,61	1,57	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07			
α-muroiol	1645	1645	1,33	1,13	tr	1,23	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	
nd	1653	-	4,96	4,32	4,23	4,50	3,84	4,12	6,28	4,75	3,87	4,50	4,32	4,23	3,00	3,50	3,76	3,72	5,57	4,71	4,85	5,04	3,00	4,00	3,11	3,38	4,25	4,13	4,32	4,23	3,61	4,25	3,92	3,80	3,29	2,81	3,30			
Total identificado			89,41	89,03	88,63	90,73	92,31	91,59	91,93	91,94	93,13	93,02	92,22	92,62	92,29	93,48	93,58	93,12	89,69	91,28	91,17	90,71	93,73	92,79	92,56	93,36	91,25	92,32	90,90	91,87	93,89	94,58	93,70	94,86	95,08	94,33	94,36	94,89		
tr = traço da substância (tr < 0,29)																																								
IK* = índice de Kovats calculado																																								
IK** = índice de Kovats Literatura																																								

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Paraibuna-SP, coletados no verão (2011).

Substância	R ¹	R ²	População de Paraíba																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Pa-19e-R1										Pa-19e-R2										Pa-19e-R3										Pa-19e-R4										Pa-19e-R5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média	Pa-19e-R1	Pa-19e-R2	Pa-19e-R3	Média																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
α-pineno	932	939	943	946	949	952	955	958	961	964	967	970	973	976	979	982	985	988	991	994	997	1000	1003	1006	1009	1012	1015	1018	1021	1024	1027	1030	1033	1036	1039	1042	1045	1048	1051	1054	1057	1060	1063	1066	1069	1072	1075	1078	1081	1084	1087	1090	1093	1096	1099	1102	1105	1108	1111	1114	1117	1120	1123	1126	1129	1132	1135	1138	1141	1144	1147	1150	1153	1156	1159	1162	1165	1168	1171	1174	1177	1180	1183	1186	1189	1192	1195	1198	1201	1204	1207	1210	1213	1216	1219	1222	1225	1228	1231	1234	1237	1240	1243	1246	1249	1252	1255	1258	1261	1264	1267	1270	1273	1276	1279	1282	1285	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	1318	1321	1324	1327	1330	1333	1336	1339	1342	1345	1348	1351	1354	1357	1360	1363	1366	1369	1372	1375	1378	1381	1384	1387	1390	1393	1396	1399	1402	1405	1408	1411	1414	1417	1420	1423	1426	1429	1432	1435	1438	1441	1444	1447	1450	1453	1456	1459	1462	1465	1468	1471	1474	1477	1480	1483	1486	1489	1492	1495	1498	1501	1504	1507	1510	1513	1516	1519	1522	1525	1528	1531	1534	1537	1540	1543	1546	1549	1552	1555	1558	1561	1564	1567	1570	1573	1576	1579	1582	1585	1588	1591	1594	1597	1600	1603	1606	1609	1612	1615	1618	1621	1624	1627	1630	1633	1636	1639	1642	1645	1648	1651	1654	1657	1660	1663	1666	1669	1672	1675	1678	1681	1684	1687	1690	1693	1696	1699	1702	1705	1708	1711	1714	1717	1720	1723	1726	1729	1732	1735	1738	1741	1744	1747	1750	1753	1756	1759	1762	1765	1768	1771	1774	1777	1780	1783	1786	1789	1792	1795	1798	1801	1804	1807	1810	1813	1816	1819	1822	1825	1828	1831	1834	1837	1840	1843	1846	1849	1852	1855	1858	1861	1864	1867	1870	1873	1876	1879	1882	1885	1888	1891	1894	1897	1900	1903	1906	1909	1912	1915	1918	1921	1924	1927	1930	1933	1936	1939	1942	1945	1948	1951	1954	1957	1960	1963	1966	1969	1972	1975	1978	1981	1984	1987	1990	1993	1996	1999	2002	2005	2008	2011	2014	2017	2020	2023	2026	2029	2032	2035	2038	2041	2044	2047	2050	2053	2056	2059	2062	2065	2068	2071	2074	2077	2080	2083	2086	2089	2092	2095	2098	2101	2104	2107	2110	2113	2116	2119	2122	2125	2128	2131	2134	2137	2140	2143	2146	2149	2152	2155	2158	2161	2164	2167	2170	2173	2176	2179	2182	2185	2188	2191	2194	2197	2200	2203	2206	2209	2212	2215	2218	2221	2224	2227	2230	2233	2236	2239	2242	2245	2248	2251	2254	2257	2260	2263	2266	2269	2272	2275	2278	2281	2284	2287	2290	2293	2296	2299	2302	2305	2308	2311	2314	2317	2320	2323	2326	2329	2332	2335	2338	2341	2344	2347	2350	2353	2356	2359	2362	2365	2368	2371	2374	2377	2380	2383	2386	2389	2392	2395	2398	2401	2404	2407	2410	2413	2416	2419	2422	2425	2428	2431	2434	2437	2440	2443	2446	2449	2452	2455	2458	2461	2464	2467	2470	2473	2476	2479	2482	2485	2488	2491	2494	2497	2500	2503	2506	2509	2512	2515	2518	2521	2524	2527	2530	2533	2536	2539	2542	2545	2548	2551	2554	2557	2560	2563	2566	2569	2572	2575	2578	2581	2584	2587	2590	2593	2596	2599	2602	2605	2608	2611	2614	2617	2620	2623	2626	2629	2632	2635	2638	2641	2644	2647	2650	2653	2656	2659	2662	2665	2668	2671	2674	2677	2680	2683	2686	2689	2692	2695	2698	2701	2704	2707	2710	2713	2716	2719	2722	2725	2728	2731	2734	2737	2740	2743	2746	2749	2752	2755	2758	2761	2764	2767	2770	2773	2776	2779	2782	2785	2788	2791	2794	2797	2800	2803	2806	2809	2812	2815	2818	2821	2824	2827	2830	2833	2836	2839	2842	2845	2848	2851	2854	2857	2860	2863	2866	2869	2872	2875	2878	2881	2884	2887	2890	2893	2896	2899	2902	2905	2908	2911	2914	2917	2920	2923	2926	2929	2932	2935	2938	2941	2944	2947	2950	2953	2956	2959	2962	2965	2968	2971	2974	2977	2980	2983	2986	2989	2992	2995	2998	3001	3004	3007	3010	3013	3016	3019	3022	3025	3028	3031	3034	3037	3040	3043	3046	3049	3052	3055	3058	3061	3064	3067	3070	3073	3076	3079	3082	3085	3088	3091	3094	3097	3100	3103	3106	3109	3112	3115	3118	3121	3124	3127	3130	3133	3136	3139	3142	3145	3148	3151	3154	3157	3160	3163	3166	3169	3172	3175	3178	3181	3184	3187	3190	3193	3196	3199	3202	3205	3208	3211	3214	3217	3220	3223	3226	3229	3232	3235	3238	3241	3244	3247	3250	3253	3256	3259	3262	3265	3268	3271	3274	3277	3280	3283	3286	3289	3292	3295	3298	3301	3304	3307	3310	3313	3316	3319	3322	3325	3328	3331	3334	3337	3340	3343	3346	3349	3352	3355	3358	3361	3364	3367	3370	3373	3376	3379	3382	3385	3388	3391	3394	3397	3400	3403	3406	3409	3412	3415	3418	3421	3424	3427	3430	3433	3436	3439	3442	3445	3448	3451	3454	3457	3460	3463	3466	3469	3472	3475	3478	3481	3484	3487	3490	3493	3496	3499	3502	3505	3508	3511	3514	3517	3520	3523	3526	3529	3532	3535	3538	3541	3544	3547	3550	3553	3556	3559	3562	3565	3568	3571	3574	3577	3580	3583	3586	3589	3592	3595	3598	3601	3604	3607	3610	3613	3616	3619	3622	3625	3628	3631	3634	3637	3640	3643	3646	3649	3652	3655	3658	3661	3664	3667	3670	3673	3676	3679	3682	3685	3688	3691	3694	3697	3700	3703	3706	3709	3712	3715	3718	3721	3724	3727	3730	3733	3736	3739	3742	3745	3748	3751	3754	3757	3760	3763	3766	3769	3772	3775	3778	3781	3784	3787	3790	3793	3796	3799	3802	3805	3808	3811	3814	3817	3820	3823	3826	3829	3832	3835	3838	3841	3844	3847	3850	3853	3856	3859	3862	3865	3868	3871	3874	3877	3880	3883	3886	3889	3892	3895	3898	3901	3904	3907	3910	3913	3916	3919	3922	3925	3928	3931	3934	3937	3940	3943	3946	3949	3952	3955	3958	3961	3964	3967	3970	3973	3976	3979	3982	3985	3988	3991	3994	3997	4000	4003	4006	4009	4012	4015	4018	4021	4024	4027	4030	4033	4036	4039	4042	4045	4048	4051	4054	4057	4060	4063	4066	4069	4072	4075	4078	4081	4084	4087	4090	4093	4096	4099	4102	4105	4108	4111	4114	4117	4120	4123	4126	4129	4132	4135	4138	4141	4144	4147	4150	4153	4156	4159	4162	4165	4168	4171	4174	4177	4180	4183	4186	4189	4192	4195	4198	4201	4204	4207	4210	4213	4216	4219	4222	4225	4228	4231	4234	4237	4240	4243	4246	4249	4252	4255	4258	4261	4264	4267	4270	4273	4276	4279	4282	4285	4288	4291	4294	4297	4300	4303	4306	4309	4312	4315	4318	4321	4324	4327	4330	4333	4336	4339	4342	4345	4348	4351	4354	4357	4360	4363	4366	4369	4372	4375	4378	4381	4384	4387	4390	4393	4396	4399	4402	4405	4408	4411	4414	4417	4420	4423	4426	4429	4432	4435	4438	4441	4444	4447	4450	4453	4456	4459	4462	4465	4468	4471	4474	4477	4480	4483	4486	4489	4492	4495	4498	4501	4504	4507	4510	4513	4516	4519	4522	4525	4528	4531	4534	4537	4540	4543	4546	4549	4552	4555	4558	4561	4564	4567	4570	4573	4576	4579	4582	4585	4588	4591	4594	4597	4600	4603	4606	4609	4612	4615	4618	4621	4624	4627	4630	4633	4636	4639	4642	4645	4648	4651	4654	4657	4660	4663	4666	4669	4672	4675	4678	4681	4684	4687	4690	4693	4696	4699	4702	4705	4708	4711	4714	4717	4720	4723	4726	4729	4732	4735	4738	4741	4744	4747	4750	4753	4756	4759	4762	4765	4768	4771	4774	4777	4780	4783	4786	4789	4792	4795	4798	4801	4804	4807	4810	4813	4816	4819	4822	4825	4828	4831	4834	4837	4840	4843	4846	4849	4852	4855	4858	4861	4864	4867	4870	4873	4876	4879	4882	4885	4888

| tr - traço da substância ($tr \leq 0,24$) |

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Limeira-SP, coletados no verão (2011).

Substância	IC*	IC**	População Limiteira																																					
			IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média	IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média	IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média	IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média	IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média	IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média	IC-Ve-R1	IC-Ve-R2	IC-Ve-R3	Média										
o-pireno	902	939	3,71	2,65	2,46	2,94	0,53	0,43	0,92	0,63	0,75	1,61	tr	1,18	1,79	0,81	1,57	1,39	1,04	1,18	0,81	1,18	4,52	1,90	2,53	1,31	1,40	1,63	1,45	1,63	0,98	1,14	1,35	1,30	3,76	2,71				
o-pireno	972	979	2,87	2,87	2,87	2,87	0,53	0,43	0,92	0,63	0,75	1,61	tr	1,18	1,79	0,81	1,57	1,39	1,04	1,18	0,81	1,18	4,52	1,90	2,53	1,31	1,40	1,63	1,45	1,63	0,98	1,14	1,35	1,30	3,76	2,71				
limoneno	1027	1029	1,36	1,19	1,21	1,25	0,71	0,55	0,84	0,70	0,40	0,40	tr	0,40	1,61	0,91	1,08	1,20	0,81	tr	tr	0,81	1,41	2,45	1,75	1,87	1,07	1,13	1,04	1,05	1,38	0,96	0,66	2,20	0,50	1,24	1,27	1,70		
1,8-cineol	1029	1031	1,36	1,28	0,52	0,72	1,88	0,61	0,42	0,97	0,47	tr	tr	tr	0,47	0,91	0,39	tr	0,65	0,72	tr	0,12	1,08	1,42	1,13	1,21	2,40	0,69	0,53	1,21	1,32	0,91	tr	1,12	tr	0,27	0,71	0,41		
terpinoleno	1029	1050	3,03	3,03	3,03	3,02	1,14	1,47	4,32	2,31	3,46	2,89	0,82	2,39	2,71	1,69	2,76	2,79	3,60	0,74	tr	2,17	4,81	7,68	6,63	6,37	1,39	3,36	4,38	1,31	2,21	2,67	tr	2,44	0,97	7,45	2,45	3,62		
linalol	1098	1096	0,10	0,10	0,10	0,10	0,64	0,24	0,38	0,12	0,29	0,89	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40	0,57	0,48	0,40			
o-terpineol	1183	1189	0,68	0,68	0,50	0,62	1,14	0,90	0,57	0,87	0,81	tr	tr	0,81	0,88	0,70	0,71	0,76	0,80	tr	tr	0,48	0,64	0,86	0,65	0,74	1,06	0,51	0,53	0,70	1,03	0,91	0,96	0,97	0,51	tr	0,64	0,58		
o-copano	1375	1376	0,89	1,03	1,12	1,10	0,78	1,03	2,14	1,32	1,83	2,67	2,20	2,23	1,37	1,67	1,81	1,62	1,40	2,35	1,07	1,63	0,72	1,05	0,75	0,84	1,23	1,59	1,32	1,38	0,88	1,00	0,81	0,90	0,70	0,93	0,49	0,71		
o-terpineol	1380	1210	2,17	2,53	2,39	2,26	2,32	2,49	1,01	1,94	0,77	1,04	1,00	0,94	1,19	1,19	1,48	1,29	0,97	1,06	2,13	1,39	0,70	0,76	0,73	0,71	0,93	1,28	1,15	1,12	1,20	1,42	1,32	1,31	1,34	0,54	0,60	1,16		
terpinoleno	1419	1429	12,88	12,88	12,88	12,88	1,14	1,35	8,72	8,72	14,68	10,19	1,28	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88	14,68	1,27	12,88
o-copano	1428	1432	4,40	0,35	0,38	0,38	tr	tr	0,81	0,81	0,63	0,93	0,80	0,79	0,46	0,55	0,59	0,53	0,58	0,91	tr	0,75	tr	tr	tr	tr	tr	0,53	0,73	0,61	0,62	0,41	0,49	0,45	tr	0,41	0,	0,41	0,39	0,39
aromadendeno	1438	1449	0,84	1,06	1,51	1,14	1,52	1,20	1,71	1,66	0,63	0,96	1,08	0,89	tr	0,41	tr	0,41	tr	0,91	2,00	1,46	tr	0,54	0,49	0,52	0,73	1,21	0,98	0,97	tr	tr	0,65	0,65	0,92	1,31	0,77	1,00		
o-humuleno	1452	1454	3,07	3,23	3,27	3,19	2,41	2,75	3,71	2,96	3,77	4,55	4,34	4,19	3,26	3,57	3,92	3,38	2,98	4,08	2,66	3,24	2,52	2,81	2,58	2,74	3,65	3,44	3,28	3,30	3,70	3,19	3,46	2,37	2,53	1,71	2,20			
alpha-terpineol	1459	1461	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29		
g-muroleno	1475	1477	2,06	2,17	2,45	2,23	1,91	2,21	2,73	2,28	2,32	3,16	3,33	2,94	2,40	2,74	2,85	2,66	1,93	3,21	2,65	2,60	1,48	1,77	1,50	1,58	2,41	2,94	2,65	2,67	1,89	2,05	1,99	2,22	1,46	1,89				
germacreno D	1480	1480	0,28	0,79	0,87	0,91	tr	tr	2,21	2,21	1,25	1,61	1,68	1,51	0,98	0,97	1,27	1,07	1,23	2,51	tr	2,32	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	
germacreno A	1485	1485	4,10	4,54	5,36	4,67	5,01	5,72	3,44	4,72	3,42	4,89	4,11	3,97	5,08	5,70	5,86	5,55	2,44	3,90	5,87	4,07	4,02	4,08	4,06	4,25	3,78	4,94	4,59	4,44	2,92	3,21	3,24	3,02	3,65	3,95	3,79	3,46		
gamma-termacreno	1490	1492	7,54	7,09	8,88	8,03	8,88	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82	7,48	5,82		
selineno	1495	1494	0,67	tr	tr	tr	0,67	tr	tr	0,76	0,76	tr	tr	tr	0,69	0,69	tr	tr	0,88	0,76	0,82	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	
o-cadineno	1500	1500	0,73	0,78	0,84	0,78	0,61	0,74	1,36	0,90	1,17	1,58	1,37	0,89	1,04	1,07	1,00	0,96	1,16	0,75	1,12	0,47	0,49	0,52	0,95	1,15	1,07	1,05	1,05	1,05	0,79	0,89	0,88	0,85	0,78	0,89	0,52	0,73		
o-cadineno	1512	1513	2,28	2,55	2,72	2,52	1,97	2,48	4,88	3,11	3,77	5,54	4,83	4,71	2,93	3,86	5,30	3,26	3,20	5,88	2,71	3,93	1,82	2,49	1,80	1,94	2,40	3,35	3,25	3,00	2,30	2,70	2,75	2,40	1,99	2,64	1,49	2,01		
gamma-termacreno B	1516	1516	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66		
o-nerolidol	1563	1563	9,53	10,20	10,10	10,52	12,22	10,97	14,55	10,21	7,56	6,28	7,73	7,19	6,83	7,34	7,40	7,16	8,09	8,00	10,00	8,70	6,08	4,42	5,72	5,41	6,28	11,28	11,91	11,06	9,64	9,36	10,67	8,99	18,28	11,92	16,32	1,51		
espantalol	1576	1578	2,89	3,36	3,51	3,25	4,38	3,77	2,21	4,35	2,58	1,72	2,21	2,17	2,90	3,21	3,17	3,09	3,13	2,54	4,07	2,91	3,19	2,14	2,59	2,64	3,22	2,51	2,97	2,97	3,35	3,16	3,92	3,48	2,89	1,89	2,87	2,55		
beta-de careofileno	1583	1583	6,65	7,82	7,86	7,86	7,86	7,97	4,12	6,91	7,54	5,52	6,17	6,41	4,53	5,81	5,05	4,83	3,99	4,73	8,40	5,71	6,36	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57		
1-epi-eudesmol	1601	1601	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66			
g-epi-cubebol	1627	1627	0,66	0,73	0,71	0,70	0,68	0,64	2,57	1,30	2,19	1,73	2,19	2,04	1,29	1,54	1,63	1,49	2,54	1,30	1,17	2,24	1,33	0,99	1,05	1,13	0,92	1,00	1,66	1,49	2,17	1,97	2,27	2,14	1,88	1,39	1,31	1,31		
cubebol	1642	1642	1,02	1,42	1,22	1,23	1,20	1,20	1,57	1,32	1,68	2,48	2,72	2,48	tr	0,93	0,93	1,54	1,80	tr	1,67	tr	0,89	0,98	0,94	1,07	1,04	1,23	1,11	2,72	2,78	2,29	2,81	2,62	1,18	1,55	1,78			
o-murolol	1645	1645	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02		
nd	1650	1650	4,59	6,17	5,05	5,40	5,22	5,04	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61			
Total identificado	92,97	90,99	91,69	92,33	89,56	89,90	92,39	92,69	92,31	92,07	91,87	92,46	90,96	91,93	90,61	91,33	91,24	83,18	92,99	89,38	92,83	91,19	91,62	91,02	93,12	91,51	92,29	89,34	90,87	85,93	90,58	87,08	90,58	89,18	91,02					

| tr - traço da substância ($tr \leq 0,26$) |

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Paribuna-SP, coletados no outono (2011).

Sublinha	H*	93	94	População de Paranhos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Pa-150u1	Pa-150u2	Pa-150u3	Md1a	Pa-150u4	Pa-150u5	Md1b	Pa-150u6	Pa-150u7	Md1c	Pa-150u8	Pa-150u9	Md1d	Pa-150u10	Pa-150u11	Md1e	Pa-150u12	Pa-150u13	Md1f	Pa-150u14	Pa-150u15	Md1g	Pa-150u16	Pa-150u17	Md1h	Pa-150u18	Pa-150u19	Md1i	Pa-150u20	Pa-150u21	Md1j	Pa-150u22	Pa-150u23	Md1k	Pa-150u24	Pa-150u25	Md1l	Pa-150u26	Pa-150u27	Md1m	Pa-150u28	Pa-150u29	Md1n	Pa-150u30	Pa-150u31	Md1o	Pa-150u32	Pa-150u33	Md1p	Pa-150u34	Pa-150u35	Md1q	Pa-150u36	Pa-150u37	Md1r	Pa-150u38	Pa-150u39	Md1s	Pa-150u40	Pa-150u41	Md1t	Pa-150u42	Pa-150u43	Md1u	Pa-150u44	Pa-150u45	Md1v	Pa-150u46	Pa-150u47	Md1w	Pa-150u48	Pa-150u49	Md1x	Pa-150u50	Pa-150u51	Md1y	Pa-150u52	Pa-150u53	Md1z	Pa-150u54	Pa-150u55	Md1aa	Pa-150u56	Pa-150u57	Md1ab	Pa-150u58	Pa-150u59	Md1ac	Pa-150u60	Pa-150u61	Md1ad	Pa-150u62	Pa-150u63	Md1ae	Pa-150u64	Pa-150u65	Md1af	Pa-150u66	Pa-150u67	Md1ag	Pa-150u68	Pa-150u69	Md1ah	Pa-150u70	Pa-150u71	Md1ai	Pa-150u72	Pa-150u73	Md1aj	Pa-150u74	Pa-150u75	Md1ak	Pa-150u76	Pa-150u77	Md1al	Pa-150u78	Pa-150u79	Md1am	Pa-150u80	Pa-150u81	Md1an	Pa-150u82	Pa-150u83	Md1ao	Pa-150u84	Pa-150u85	Md1ap	Pa-150u86	Pa-150u87	Md1aq	Pa-150u88	Pa-150u89	Md1ar	Pa-150u90	Pa-150u91	Md1as	Pa-150u92	Pa-150u93	Md1at	Pa-150u94	Pa-150u95	Md1au	Pa-150u96	Pa-150u97	Md1av	Pa-150u98	Pa-150u99	Md1aw	Pa-150u100	Pa-150u101	Md1ax	Pa-150u102	Pa-150u103	Md1ay	Pa-150u104	Pa-150u105	Md1az	Pa-150u106	Pa-150u107	Md1ba	Pa-150u108	Pa-150u109	Md1bb	Pa-150u110	Pa-150u111	Md1bc	Pa-150u112	Pa-150u113	Md1bd	Pa-150u114	Pa-150u115	Md1be	Pa-150u116	Pa-150u117	Md1bf	Pa-150u118	Pa-150u119	Md1bg	Pa-150u120	Pa-150u121	Md1bh	Pa-150u122	Pa-150u123	Md1bi	Pa-150u124	Pa-150u125	Md1bj	Pa-150u126	Pa-150u127	Md1bk	Pa-150u128	Pa-150u129	Md1bl	Pa-150u130	Pa-150u131	Md1bm	Pa-150u132	Pa-150u133	Md1bn	Pa-150u134	Pa-150u135	Md1bo	Pa-150u136	Pa-150u137	Md1bp	Pa-150u138	Pa-150u139	Md1bq	Pa-150u140	Pa-150u141	Md1br	Pa-150u142	Pa-150u143	Md1bs	Pa-150u144	Pa-150u145	Md1bt	Pa-150u146	Pa-150u147	Md1bu	Pa-150u148	Pa-150u149	Md1bv	Pa-150u150	Pa-150u151	Md1bw	Pa-150u152	Pa-150u153	Md1bx	Pa-150u154	Pa-150u155	Md1by	Pa-150u156	Pa-150u157	Md1bz	Pa-150u158	Pa-150u159	Md1ca	Pa-150u160	Pa-150u161	Md1cb	Pa-150u162	Pa-150u163	Md1cc	Pa-150u164	Pa-150u165	Md1cd	Pa-150u166	Pa-150u167	Md1ce	Pa-150u168	Pa-150u169	Md1cf	Pa-150u170	Pa-150u171	Md1cg	Pa-150u172	Pa-150u173	Md1ch	Pa-150u174	Pa-150u175	Md1ci	Pa-150u176	Pa-150u177	Md1cj	Pa-150u178	Pa-150u179	Md1ck	Pa-150u180	Pa-150u181	Md1cl	Pa-150u182	Pa-150u183	Md1cm	Pa-150u184	Pa-150u185	Md1cn	Pa-150u186	Pa-150u187	Md1co	Pa-150u188	Pa-150u189	Md1cp	Pa-150u190	Pa-150u191	Md1cq	Pa-150u192	Pa-150u193	Md1cr	Pa-150u194	Pa-150u195	Md1cs	Pa-150u196	Pa-150u197	Md1ct	Pa-150u198	Pa-150u199	Md1cu	Pa-150u200	Pa-150u201	Md1cv	Pa-150u202	Pa-150u203	Md1cw	Pa-150u204	Pa-150u205	Md1cx	Pa-150u206	Pa-150u207	Md1cy	Pa-150u208	Pa-150u209	Md1cz	Pa-150u210	Pa-150u211	Md1da	Pa-150u212	Pa-150u213	Md1db	Pa-150u214	Pa-150u215	Md1dc	Pa-150u216	Pa-150u217	Md1dd	Pa-150u218	Pa-150u219	Md1de	Pa-150u220	Pa-150u221	Md1df	Pa-150u222	Pa-150u223	Md1dg	Pa-150u224	Pa-150u225	Md1dh	Pa-150u226	Pa-150u227	Md1di	Pa-150u228	Pa-150u229	Md1dj	Pa-150u230	Pa-150u231	Md1dk	Pa-150u232	Pa-150u233	Md1dl	Pa-150u234	Pa-150u235	Md1dm	Pa-150u236	Pa-150u237	Md1dn	Pa-150u238	Pa-150u239	Md1do	Pa-150u240	Pa-150u241	Md1dp	Pa-150u242	Pa-150u243	Md1dq	Pa-150u244	Pa-150u245	Md1dr	Pa-150u246	Pa-150u247	Md1ds	Pa-150u248	Pa-150u249	Md1dt	Pa-150u250	Pa-150u251	Md1du	Pa-150u252	Pa-150u253	Md1dv	Pa-150u254	Pa-150u255	Md1dw	Pa-150u256	Pa-150u257	Md1dx	Pa-150u258	Pa-150u259	Md1dy	Pa-150u260	Pa-150u261	Md1dz	Pa-150u262	Pa-150u263	Md1ea	Pa-150u264	Pa-150u265	Md1eb	Pa-150u266	Pa-150u267	Md1ec	Pa-150u268	Pa-150u269	Md1ed	Pa-150u270	Pa-150u271	Md1ee	Pa-150u272	Pa-150u273	Md1ef	Pa-150u274	Pa-150u275	Md1eg	Pa-150u276	Pa-150u277	Md1eh	Pa-150u278	Pa-150u279	Md1ei	Pa-150u280	Pa-150u281	Md1ej	Pa-150u282	Pa-150u283	Md1ek	Pa-150u284	Pa-150u285	Md1el	Pa-150u286	Pa-150u287	Md1em	Pa-150u288	Pa-150u289	Md1en	Pa-150u290	Pa-150u291	Md1eo	Pa-150u292	Pa-150u293	Md1ep	Pa-150u294	Pa-150u295	Md1eq	Pa-150u296	Pa-150u297	Md1er	Pa-150u298	Pa-150u299	Md1es	Pa-150u300	Pa-150u301	Md1et	Pa-150u302	Pa-150u303	Md1eu	Pa-150u304	Pa-150u305	Md1ev	Pa-150u306	Pa-150u307	Md1ew	Pa-150u308	Pa-150u309	Md1ex	Pa-150u310	Pa-150u311	Md1ey	Pa-150u312	Pa-150u313	Md1ez	Pa-150u314	Pa-150u315	Md1fa	Pa-150u316	Pa-150u317	Md1fb	Pa-150u318	Pa-150u319	Md1fc	Pa-150u320	Pa-150u321	Md1fd	Pa-150u322	Pa-150u323	Md1fe	Pa-150u324	Pa-150u325	Md1ff	Pa-150u326	Pa-150u327	Md1fg	Pa-150u328	Pa-150u329	Md1fh	Pa-150u330	Pa-150u331	Md1fi	Pa-150u332	Pa-150u333	Md1fj	Pa-150u334	Pa-150u335	Md1fk	Pa-150u336	Pa-150u337	Md1fl	Pa-150u338	Pa-150u339	Md1fm	Pa-150u340	Pa-150u341	Md1fn	Pa-150u342	Pa-150u343	Md1fo	Pa-150u344	Pa-150u345	Md1fp	Pa-150u346	Pa-150u347	Md1fq	Pa-150u348	Pa-150u349	Md1fr	Pa-150u350	Pa-150u351	Md1fs	Pa-150u352	Pa-150u353	Md1ft	Pa-150u354	Pa-150u355	Md1fu	Pa-150u356	Pa-150u357	Md1fv	Pa-150u358	Pa-150u359	Md1fw	Pa-150u360	Pa-150u361	Md1fx	Pa-150u362	Pa-150u363	Md1fy	Pa-150u364	Pa-150u365	Md1fz	Pa-150u366	Pa-150u367	Md1ga	Pa-150u368	Pa-150u369	Md1gb	Pa-150u370	Pa-150u371	Md1gc	Pa-150u372	Pa-150u373	Md1gd	Pa-150u374	Pa-150u375	Md1ge	Pa-150u376	Pa-150u377	Md1gf	Pa-150u378	Pa-150u379	Md1gg	Pa-150u380	Pa-150u381	Md1gh	Pa-150u382	Pa-150u383	Md1gi	Pa-150u384	Pa-150u385	Md1gj	Pa-150u386	Pa-150u387	Md1gk	Pa-150u388	Pa-150u389	Md1gl	Pa-150u390	Pa-150u391	Md1gm	Pa-150u392	Pa-150u393	Md1gn	Pa-150u394	Pa-150u395	Md1go	Pa-150u396	Pa-150u397	Md1gp	Pa-150u398	Pa-150u399	Md1gq	Pa-150u400	Pa-150u401	Md1gr	Pa-150u402	Pa-150u403	Md1gs	Pa-150u404	Pa-150u405	Md1gt	Pa-150u406	Pa-150u407	Md1gu	Pa-150u408	Pa-150u409	Md1gv	Pa-150u410	Pa-150u411	Md1gw	Pa-150u412	Pa-150u413	Md1gx	Pa-150u414	Pa-150u415	Md1gy	Pa-150u416	Pa-150u417	Md1gz	Pa-150u418	Pa-150u419	Md1ha	Pa-150u420	Pa-150u421	Md1hb	Pa-150u422	Pa-150u423	Md1hc	Pa-150u424	Pa-150u425	Md1hd	Pa-150u426	Pa-150u427	Md1he	Pa-150u428	Pa-150u429	Md1hf	Pa-150u430	Pa-150u431	Md1hg	Pa-150u432	Pa-150u433	Md1hi	Pa-150u434	Pa-150u435	Md1hj	Pa-150u436	Pa-150u437	Md1hk	Pa-150u438	Pa-150u439	Md1hl	Pa-150u440	Pa-150u441	Md1hm	Pa-150u442	Pa-150u443	Md1hn	Pa-150u444	Pa-150u445	Md1ho	Pa-150u446	Pa-150u447	Md1hp	Pa-150u448	Pa-150u449	Md1hq	Pa-150u450	Pa-150u451	Md1hr	Pa-150u452	Pa-150u453	Md1hs	Pa-150u454	Pa-150u455	Md1ht	Pa-150u456	Pa-150u457	Md1hu	Pa-150u458	Pa-150u459	Md1hv	Pa-150u460	Pa-150u461	Md1hw	Pa-150u462	Pa-150u463	Md1hx	Pa-150u464	Pa-150u465	Md1hy	Pa-150u466	Pa-150u467	Md1hz	Pa-150u468	Pa-150u469	Md1ia	Pa-150u470	Pa-150u471	Md1ib	Pa-150u472	Pa-150u473	Md1ic	Pa-150u474	Pa-150u475	Md1id	Pa-150u476	Pa-150u477	Md1ie	Pa-150u478	Pa-150u479	Md1if	Pa-150u480	Pa-150u481	Md1ig	Pa-150u482	Pa-150u483	Md1ih	Pa-150u484	Pa-150u485	Md1ii	Pa-150u486	Pa-150u487	Md1ij	Pa-150u488	Pa-150u489	Md1ik	Pa-150u490	Pa-150u491	Md1il	Pa-150u492	Pa-150u493	Md1im	Pa-150u494	Pa-150u495	Md1in	Pa-150u496	Pa-150u497	Md1io	Pa-150u498	Pa-150u499	Md1ip	Pa-150u500	Pa-150u501	Md1iq	Pa-150u502	Pa-150u503	Md1ir	Pa-150u504	Pa-150u505	Md1is	Pa-150u506	Pa-150u507	Md1it	Pa-150u508	Pa-150u509	Md1iu	Pa-150u510	Pa-150u511	Md1iv	Pa-150u512	Pa-150u513	Md1iw	Pa-150u514	Pa-150u515	Md1ix	Pa-150u516	Pa-150u517	Md1iy	Pa-150u518	Pa-150u519	Md1iz	Pa-150u520	Pa-150u521	Md1ja	Pa-150u522	Pa-150u523	Md1jb	Pa-150u524	Pa-150u525	Md1jc	Pa-150u526	Pa-150u527	Md1jd	Pa-150u528	Pa-150u529	Md1je	Pa-150u530	Pa-150u531	Md1jf	Pa-150u532	Pa-150u533	Md1jg	Pa-150u534	Pa-150u535	Md1jh	Pa-150u536	Pa-150u537	Md1ji	Pa-150u538	Pa-150u539	Md1jj	Pa-150u540	Pa-150u541	Md1jk	Pa-150u542	Pa-150u543	Md1jl	Pa-150u544	Pa-150u545	Md1jm	Pa-150u546	Pa-150u547	Md1jn	Pa-150u548	Pa-150u549	Md1jo	Pa-150u550	Pa-150u551	Md1jp	Pa-150u552	Pa-150u553	Md1jq	Pa-150u554	Pa-150u555	Md1jr	Pa-150u556	Pa-150u557	Md1js	Pa-150u558	Pa-150u559	Md1jt	Pa-150u560	Pa-150u561	Md1ju	Pa-150u562	Pa-150u563	Md1jv	Pa-150u564	Pa-150u565	Md1jw	Pa-150u566	Pa-150u567	Md1jx	Pa-150u568	Pa-150u569	Md1jy	Pa-150u570	Pa-150u571	Md1jz	Pa-150u572	Pa-150u573	Md1ka	Pa-150u574	Pa-150u575	Md1kb	Pa-150u576	Pa-150u577	Md1kc	Pa-150u578	Pa-150u579	Md1kd	Pa-150u580	Pa-150u581	Md1ke	Pa-150u582	Pa-150u583	Md1kf	Pa-150u584	Pa-150u585	Md1kg	Pa-150u586	Pa-150u587	Md1kh	Pa-150u588	Pa-150u589	Md1ki	Pa-150u590	Pa-150u591	Md1kj	Pa-150u592	Pa-150u593	Md1kl	Pa-150u594	Pa-150u595	Md1km	Pa-150u596	Pa-150u597	Md1kn	Pa-150u598	Pa-150u599	Md1ko	Pa-150u600	Pa-150u601	Md1kp	Pa-150u602	Pa-150u603	Md1kq	Pa-150u604	Pa-150u605	Md1kr	Pa-150u606	Pa-150u607	Md1ks	Pa-150u608	Pa-150u609	Md1kt	Pa-150u610	Pa-150u611	Md1ku	Pa-150u612	Pa-150u613	Md1kv	Pa-150u614	Pa-150u615	Md1kw	Pa-150u616	Pa-150u617	Md1kx	Pa-150u618	Pa-150u619	Md1ky	Pa-150u620	Pa-150u621	Md1kz	Pa-150u622	Pa-150u623	Md1la	Pa-150u624	Pa-150u625	Md1lb	Pa-150u626	Pa-150u627	Md1lc	Pa-150u628	Pa-150u629	Md1ld	Pa-150u630	Pa-150u631	Md1le	Pa-150u632	Pa-150u633	Md1lf	Pa-150u634	Pa-150u635	Md1lg	Pa-150u636	Pa-150u637	Md1lh	Pa-150u638	Pa-150u639	Md1li	Pa-150u640	Pa-150u641	Md1lj	Pa-150u642	Pa-150u643	Md1lk	Pa-150u644	Pa-150u645	Md1ll	Pa-150u646	Pa-150u647	Md1lm	Pa-150u648	Pa-150u649	Md1ln	Pa-150u650	Pa-150u651	Md1lo	Pa-150u652	Pa-150u653	Md1lp	Pa-150u654	Pa-150u655	Md1lq	Pa-150u656	Pa-150u657	Md1lr	Pa-150u658	Pa-150u659	Md1ls	Pa-150u660	Pa-150u661	Md1lt	Pa-150u662	Pa-150u663	Md1lu	Pa-150u664	Pa-150u665	Md1lv	Pa-150u666	Pa-150u667	Md1lw	Pa-150u668	Pa-150u669	Md1lx	Pa-150u670	Pa-150u671	Md1ly	Pa-150u672	Pa-150u673	Md1lz	Pa-150u674	Pa-150u675	Md1ma	Pa-150u676	Pa-150u677	Md1mb	Pa-150u678	Pa-150u679	Md1mc	Pa-150u680	Pa-150u681	Md1md	Pa-150u682	Pa-150u683	Md1me	Pa-150u684	Pa-150u685	Md1mf	Pa-150u686	Pa-150u687	Md1mg	Pa-150u688

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Limeira-SP, coletados no outono (2011).

Substância	População de Limite																																					
	It*	It**	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda	U-10uR-1	U-10uR-2	U-10uR-3	MeGda								
u-pi-neno	912	939	1,12	3,68	4,14	2,98	2,20	3,41	3,54	3,06	6,71	6,90	12,30	8,64	2,35	6,19	5,28	4,61	5,09	9,13	9,39	7,87	9,31	2,36	2,61	2,96	5,30	4,30	4,80	4,63	1,24	1,43	1,82	1,50	1,83	4,53	5,94	3,77
u-pi-neno	975	979	0,79	3,22	3,88	2,62	1,94	2,42	2,85	2,40	5,82	4,92	8,80	6,51	2,44	4,75	4,46	3,88	4,78	5,54	7,66	6,63	3,21	2,27	2,75	2,78	4,13	3,29	4,09	3,86	1,25	1,25	1,79	1,43	1,09	4,06	5,14	3,43
u-pi-neno	1029	1,12	0,29	1,17	1,38	2,13	1,77	2,10	2,17	2,24	4,24	4,21	7,12	5,18	1,71	3,09	4,91	3,88	4,12	4,17	5,88	5,18	2,40	2,13	2,18	2,28	3,75	2,78	3,12	2,85	0,87	0,79	0,71	0,24	0,87	2,79	3,71	4,24
L-8-eneol	1029	1031	0,56	0,40	0,59	0,52	3,15	2,82	3,27	1,11	1,38	0,41	1,08	0,96	0,99	1,10	1,28	1,12	1,06	1,07	0,57	0,59	1,35	1,06	1,38	1,20	1,38	1,01	1,13	1,24	1,07	2,17	2,22	2,14	1,73	2,00	1,87	2,25
trans-pi-ocimeno	1045	1050	1,42	6,54	7,84	5,59	3,39	2,83	3,99	1,40	1,11	10,21	10,94	10,09	7,84	7,80	8,05	6,56	6,09	7,51	7,52	7,04	8,08	8,22	7,79	10,11	9,57	11,13	10,34	10,37	4,07	5,29	4,65	4,37	4,89	9,04	8,31	7,25
trans-pi-ocimeno	1098	1098	1,18	10,18	10,60	10,64	10,12	10,51	10,49	1,86	4,35	9,35	1,12	8,19	6,84	8,28	7,90	13,76	10,98	15,06	11,30	17,54	10,11	21,74	20,28	20,29	18,27	24,06	20,87	9,42	6,60	20,20	21,21	2,88	11,11	2,28	11,51	9,95
u-terpineno	1183	1189	1,7	1,7	1,7	1,7	1,01	0,91	0,74	0,89	0,74	0,47	0,43	0,55	0,72	0,47	0,57	0,59	0,84	0,51	0,52	0,62	0,53	0,42	0,40	0,47	0,76	0,67	0,72	0,72	0,87	0,7	0,83	0,85	0,54	0,7	0,42	0,48
u-cisopreno	1375	1376	1,45	0,83	0,65	0,98	0,85	0,75	0,57	0,72	1,54	1,74	1,13	1,47	1,16	1,05	0,87	0,99	1,17	1,22	1,06	1,73	1,98	1,48	1,64	0,63	1,48	1,79	0,69	1,32	1,03	0,62	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
u-cisopreno	1376	1376	1,45	0,83	0,65	0,98	0,85	0,75	0,57	0,72	1,54	1,74	1,13	1,47	1,16	1,05	0,87	0,99	1,17	1,22	1,06	1,73	1,98	1,48	1,64	0,63	1,48	1,79	0,69	1,32	1,03	0,62	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
trans-carfiole	1418	1419	17,57	10,26	10,17	10,27	6,53	7,64	6,67	7,63	9,76	11,38	7,42	9,52	15,66	15,71	13,76	15,04	8,89	8,70	6,73	7,97	7,00	7,81	5,73	6,85	9,93	10,76	9,33	10,72	5,92	8,52	10,43	14,92	6,34	10,56		
u-cisopreno	1428	1432	0,66	0,48	0,7	0,57	1,7	1,7	1,7	0,55	0,62	0,42	0,53	0,52	0,51	0,43	0,40	0,45	0,7	0,43	0,66	0,75	0,47	0,63	0,7	0,7	0,7	0,54	0,69	0,7	0,62	0,46	0,82	0,7	0,64	0,64		
alpha-rodaneno	1468	1468	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-humano	1468	1468	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
alpha-rodaneno	1468	1468	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	0,7	0,83	
u-musculino	1469	1469	1,62	0,72	0,55	0,96	1,75	2,02	1,79	0,9	1,7	2,07	0,83																									

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Paraibuna-SP, coletados no inverno (2011).

Substância	IK*	IK1	População Paraibuna																													
			Pa-3in-R1	Pa-3in-R2	Pa-3in-R3	Média	Pa-2in-R1	Pa-2in-R2	Pa-2in-R3	Média	Pa-3in-R1	Pa-3in-R2	Pa-3in-R3	Média	Pa-4in-R1	Pa-4in-R2	Pa-4in-R3	Média	Pa-5in-R1	Pa-5in-R2	Pa-5in-R3	Média	Pa-6in-R1	Pa-6in-R2	Pa-6in-R3	Média	Pa-7in-R1	Pa-7in-R2	Pa-7in-R3	Média		
α-pineno	932	939	tr	tr	3,93	3,93	tr	tr	2,74	2,74	tr	tr	2,05	2,05	tr	tr	4,15	4,15	tr	tr	2,55	2,55	tr	tr	2,39	2,39	tr	1,20	1,20	tr	1,86	
β-pineno	975	979	tr	tr	0,15	3,90	2,03	tr	tr	2,76	2,76	tr	tr	1,41	1,41	tr	tr	3,21	3,21	tr	tr	2,15	2,15	tr	tr	1,03	0,23	tr	1,62	0,83	3,54	2,94
limoneno	1027	1029	tr	tr	1,88	1,88	tr	tr	1,06	1,06	tr	tr	2,39	2,39	tr	tr	1,94	1,94	tr	tr	1,19	1,19	0,54	0,32	tr	0,43	tr	1,35	1,35	tr	0,64	
1,8-dineol	1029	1031	tr	tr	2,88	2,88	tr	tr	2,32	2,32	tr	tr	1,22	1,22	tr	tr	3,03	3,03	tr	tr	1,75	1,75	0,58	0,44	0,51	0,78	0,49	1,67	0,98	1,48	1,33	
trans-β-cimeno	1045	1050	0,34	0,92	7,01	2,76	tr	0,46	8,34	4,40	tr	tr	8,18	8,18	1,09	0,56	8,82	3,49	0,97	0,99	9,47	3,81	0,64	2,91	tr	1,78	1,06	1,63	6,17	2,95	3,44	
linalol	1096	1096	3,32	1,20	8,11	4,21	0,44	1,04	17,21	6,23	4,87	tr	7,03	5,95	4,21	tr	18,23	11,22	9,38	9,00	16,80	11,73	31,53	28,63	33,12	31,09	11,43	10,29	13,23	11,65	21,58	
α-terpineol	1183	1189	0,71	tr	1,08	0,90	tr	tr	0,85	0,85	tr	tr	tr	tr	0,97	0,97	tr	tr	0,48	0,48	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,64	tr	tr	tr	0,66	
α-copaeno	1375	1376	1,59	1,12	1,15	1,29	0,30	1,40	1,61	1,10	1,54	1,39	2,10	1,68	1,75	1,48	1,55	2,49	1,80	1,58	1,69	1,69	1,34	0,91	1,06	1,10	1,56	1,34	1,51	1,47		
β-elemeno	1391	1390	0,31	0,28	tr	0,30	0,30	0,64	0,51	0,48	1,06	0,91	1,06	1,01	1,25	1,04	tr	1,15	1,98	1,98	1,55	1,94	1,30	1,30	0,74	1,11	1,81	2,62	2,22	2,22	tr	
trans-carofileno	1418	1419	10,01	7,18	5,63	7,61	4,58	13,20	13,05	10,28	37,96	15,29	20,26	17,94	12,52	38,23	9,24	13,33	13,54	13,35	11,97	12,95	11,76	30,45	8,46	10,22	14,62	16,83	16,64	16,03		
β-copaeno	1428	1432	0,38	0,28	tr	0,33	tr	0,55	0,53	0,54	0,56	0,42	0,58	0,52	0,65	1,01	0,63	0,76	0,63	0,50	0,51	0,55	tr	0,54	tr	0,54	0,58	0,51	0,52	0,54	0,34	
aromadendreno	1438	1449	0,36	tr	tr	0,36	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,30	1,62	0,48	1,10	0,90	tr	0,30	0,60	0,63	tr	tr	0,63	0,57	tr	tr	0,57	0,29	
α-humuleno	1452	1454	0,86	1,89	1,68	1,48	1,33	2,89	2,67	2,30	2,75	3,06	3,54	1,12	3,40	3,62	2,03	3,02	3,48	3,27	2,70	3,15	2,95	2,56	2,01	2,51	3,40	3,55	3,20	3,38		
allo-aromadendreno	1459	1461	1,47	0,61	0,55	0,88	0,36	0,91	0,79	0,69	1,22	0,97	0,96	1,05	2,17	2,52	0,97	1,89	1,71	1,25	1,11	1,36	1,09	0,54	0,50	0,71	1,30	1,09	1,07	1,15	0,39	
γ-muroleno	1475	1477	1,47	1,08	0,93	1,16	0,94	2,02	1,57	1,51	2,80	2,23	2,08	2,37	2,72	4,18	1,57	2,82	2,71	1,89	1,63	2,08	1,63	1,11	1,24	1,33	2,09	1,94	1,94	1,99	1,41	
germacreno D	1480	1480	1,01	0,77	tr	0,89	1,13	2,03	1,66	1,61	1,39	1,19	1,16	1,25	1,71	1,76	0,84	1,44	2,50	2,63	2,21	2,45	1,31	1,76	0,78	1,28	1,90	3,14	2,36	2,47	0,75	
β-selineno	1485	1485	1,78	1,88	1,05	1,40	0,95	1,83	1,89	1,39	4,88	3,64	3,70	3,91	3,59	4,28	2,18	3,35	3,48	3,03	2,53	3,01	2,40	1,78	1,61	1,93	3,50	3,88	3,71	3,70		
bicidogermacreno	1490	1493	3,56	2,85	1,46	2,62	2,10	4,02	2,96	3,03	5,94	4,98	4,63	5,18	7,36	7,53	1,64	6,11	6,55	6,66	4,66	5,76	3,84	3,97	2,25	3,35	5,10	6,31	3,77	5,06		
germacreno A	1495	1494	tr	tr	tr	tr	0,49	0,91	0,59	0,66	0,85	0,57	tr	0,71	1,11	tr	1,11	1,17	tr	0,81	0,99	0,72	tr	0,35	0,54	0,88	1,26	1,08	1,07	tr	0,55	
γ-cadineno	1499	1500	0,79	0,65	0,43	0,62	0,73	1,27	0,89	0,96	1,12	1,16	0,98	1,09	1,24	2,06	0,81	1,37	1,10	1,01	0,96	1,02	0,76	0,50	0,58	0,61	0,95	0,92	0,86	0,91		
δ-cadineno	1512	1513	3,10	2,59	1,97	2,55	2,83	4,88	3,40	3,70	4,15	3,90	3,91	3,99	4,34	7,29	2,61	4,75	4,15	4,20	3,40	3,80	2,26	2,50	1,62	2,13	3,35	3,16	3,29	2,17		
germacreno B	1555	1561	2,54	2,08	1,12	1,91	0,77	1,10	0,60	0,82	2,19	2,59	1,98	2,25	1,58	1,42	0,85	1,38	2,78	3,26	2,21	2,25	3,15	3,75	2,00	2,97	2,68	3,86	3,15	3,23		
(E)-nerolidol	1563	1563	37,52	39,14	26,70	34,45	23,83	18,00	9,94	17,26	8,58	10,62	6,37	8,52	12,09	8,24	8,34	9,56	11,00	13,97	8,89	11,29	16,28	18,29	16,81	17,03	15,03	9,15	6,02	10,07	17,01	
espátuleno	1576	1578	2,47	2,86	2,67	2,67	3,66	2,62	1,54	2,61	2,42	2,92	1,51	2,28	5,08	1,74	2,99	3,27	2,59	2,83	1,89	2,44	1,60	1,19	1,01	1,27	2,90	2,11	1,61	2,21		
óxido de cariofileno	1583	1583	5,73	7,90	5,64	6,29	8,37	6,82	3,62	6,27	6,28	8,30	4,61	6,40	6,07	7,71	5,08	5,76	4,52	5,78	4,03	4,78	3,17	3,91	4,22	3,77	4,83	5,40	4,32	4,85		
1D-epi-γ-eudesmol	1621	1619	0,48	0,57	0,59	0,55	0,83	0,63	0,33	0,60	0,73	0,54	0,60	0,61	0,63	0,52	0,59	0,84	0,80	0,61	0,75	tr	0,46	0,75	tr	0,46	0,79	0,92	0,81	0,73		
1-epi-cubeno	1627	1627	2,76	2,90	2,71	2,79	4,29	3,30	1,79	3,13	3,04	3,70	2,27	3,30	1,77	1,46	0,43	1,22	1,27	2,30	1,79	1,79	0,68	0,80	1,16	0,88	2,27	2,31	1,81	2,18		
cubeno	1640	1642	1,36	2,69	0,89	1,65	5,94	4,17	1,13	4,08	3,83	4,04	1,48	3,12	2,82	3,07	1,36	2,42	3,59	1,81	1,38	2,26	1,49	1,18	2,07	1,58	2,25	1,45	1,26	1,99		
α-murolol	1645	1645	tr	tr	1,34	tr	1,34	2,31	1,28	0,78	1,46	1,36	1,55	tr	1,36	1,22	0,58	tr	1,10	tr	tr	tr	0,56	0,56	tr	tr	tr	2,06	1,78	1,92	0,83	
nd	1653	-	4,29	5,08	7,60	5,66	11,27	7,56	6,45	8,43	7,14	10,19	5,62	7,65	7,06	4,74	4,10	5,30	7,55	6,68	3,95	6,06	4,54	3,56	4,14	4,08	3,36	5,87	4,98	4,74		
Total Identificado			88,21	87,11	91,56	97,37	77,75	83,53	94,08	93,25	85,23	84,35	91,62	99,90	90,05	87,24	91,19	99,90	90,19	88,17	94,81	97,00	96,19	93,48	91,10	97,79	89,84	89,56	90,34	93,24	84,78	
tr = traço da substância (tr=0,14)																																

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Limeira-SP, coletados no inverno (2011).

Substância	IK*	IK**	População Limeira																																					
			Li-3in-R1	Li-3in-R2	Li-3in-R3	Média	Li-2in-R1	Li-2in-R2	Li-2in-R3	Média	Li-3in-R1	Li-3in-R2	Li-3in-R3	Média	Li-4in-R1	Li-4in-R2	Li-4in-R3	Média	Li-5in-R1	Li-5in-R2	Li-5in-R3	Média	Li-6in-R1	Li-6in-R2	Li-6in-R3	Média	Li-7in-R1	Li-7in-R2	Li-7in-R3	Média	Li-8in-R1	Li-8in-R2	Li-8in-R3	Média						
α-pineno	932	939	0,69	0,66	tr	0,68	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,62	tr	tr	tr	0,62	0,34	1,03	tr	0,54	1,35	0,50	0,49	0,78	0,45	tr	tr	tr	tr					
β-pineno	975	979	0,81	0,81	tr	0,81	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	1,05	0,69	0,40	0,71	0,32	1,34	tr	0,83	1,58	0,74	0,70	1,01	0,62	tr	0,58	0,60	0,47	3,11	3,51	3,66					
limoneno	1027	1029	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	1,31	0,98	0,73	1,01	0,36	1,16	tr	0,76	1,49	0,97	0,93	1,13	0,44	tr	0,44	1,34	tr	2,01	1,68						
1,8-dineol	1029	1031	0,71	0,64	tr	0,68	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,48	0,44	tr	0,46	tr	1,37	1,37	tr	0,60	0,73	0,67	0,66	0,46	0,48	0,53	2,29	0,44	2,36	1,70	1,29	0,65	0,78				
trans-β-cimeno	1045	1050	4,59	4,37	tr	4,48	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	1,08	1,31	tr	1,20	1,95	4,36	2,39	2,90	6,72	5,12	6,60	6,15	3,38	1,71	3,96	3,02	10,09	12,12	9,46						
linalol	1096	1096	4,00	3,76	5,03	4,35	2,62	2,18	2,58	2,46	2,91	1,44	tr	2,18	1,09	3,56	tr	3,33	16,97	16,07	15,81	16,38	21,10	24,27	19,03	21,47	20,81	18,21	16,54	18,52	18,07	21,47	21,07	21,37						
α-terpineol	1183	1189	tr	tr	tr	tr	0,66	0,59	0,53	0,59	tr	tr	tr	tr	0,47	0,77	0,71	0,69	0,72	tr	0,61	tr	tr	0,48	1,02	tr	0,69	0,86	0,39	tr	0,41	0,40	tr	tr	tr					
α-copaeno	1375	1376	0,91	0,64	0,75	0,77	0,48	0,46	0,44	0,46	1,91	2,24	0,55	1,57	1,18	1,16	2,83	1,72	1,12	1,23	1,04	1,13	1,82	1,68	1,73	1,74	0,84	1,04	0,97	1,15	2,49	1,22	1,62	0,47	0,93	0,61	0,67			
β-elemeno	1391	1390	1,50	1,51	9,13	4,05	1,21	1,09	1,50	1,27	0,78	0,92	0,37	0,69	1,42	1,58	1,69	1,56	1,31	1,46	1,48	1,42	0,56	0,54	tr	0,55	1,53	1,55	1,53	1,54	0,57	1,14	0,61	0,77	1,15	1,36	0,67	1,06		
trans-cariofileno	1418	1419	12,33	12,36	11,28	11,28	4,12	3,24	4,68	4,01	20,52	22,08	7,17	16,59	14,49	16,75	24,04	18,56	9,12	10,17	9,21	9,50	6,94	6,18	6,14	6,46	10,20	11,56	7,04	13,55	7,26	5,95	6,83	6,06	6,76					
β-copaeno	1428	1432	0,54	0,53	0,54	0,54	tr	tr	tr	tr	0,82	0,91	0,28	0,67	0,7	0,73	1,00	0,85	tr	tr	tr	tr	0,73	0,65	0,74	0,70	tr	tr	0,46	1,20	0,49	0,72	tr	0,46	tr	0,46				
aromadendreno	1438	1449	1,02	0,93	1,37	1,11	1,96	2,08	1,76	1,93	1,19	1,30	0,96	1,30	1,19	2,18	1,56	0,58	0,68	tr	0,63	0,56	0,46	1,23	0,75	0,70	0,88	0,94	0,84	0,81	2,30	0,96	1,36	0,93	1,97	1,30	1,40			
α-humuleno	1452	1454	3,31	3,33	3,02	3,22	1,50	1,32	1,66	1,49	3,89	4,18	1,85	3,31	3,98	4,18	4,49	4,22	2,75	3,01	2,81	2,86	2,98	2,63	2,73	2,78	2,24	2,45	2,44	2,38	2,44	4,40	2,57	3,14	1,72	2,67	1,87	2,09		
allo-aromadendreno	1459	1463	1,58	1,50	1,98	1,72	2,27	2,19	2,24	2,23	1,98	2,28	0,82	1,69	1,86	1,95	1,83	1,25	1,42	1,14	1,12	1,20	0,94	1,09	1,11	0,97	1,63	1,24	1,11	1,29	1,27	1,22	0,74	2,33	1,04	1,37	1,49	2,58	1,52	1,86
α-terpineno	1477	1477	2,46	2,49	2,30	2,48	2,13	2,30	1,93	2,12	3,46	2,69	1,77	2,63	2,63	2,42	2,18	2,27	2,81	2,45	2,06	2,75	1,78	2,63	1,99	1,92	2,18	2,14	2,14	3,11	3,38	2,61	1,46	1,75	1,78	1,78	1,78			
germacreno D	1480	1480	1,41	1,42	0,94	1,26	tr	tr	tr	tr	1,61	1,69	0,89	1,40	0,93	1,25	1,45	1,22	1,00	1,19	tr	1,10	1,47	1,31	1,47	1,42	tr	tr	0,80	0,80	tr	2,26	0,96	1,61	0,93	1,21	tr	1,07		
β-selineno	1485	1485	5,01	5,03	5,92	5,32	5,54	5,87	5,19	5,53	4,62	4,83	2,88	4,11	4,99	4,38	5,63	5,25	4,48	4,70	4,54	4,57	3,66	3,14	3,34	3,38	4,76	5,49	5,32	5,19	3,32	6,63	3,32	4,42	2,78	4,69	3,23	3,57		
biciclogermacreno	1490	1493	8,82	8,83	5,75	7,80	4,81	3,97	6,48	5,09	8,20	8,74	5,51	7,35	5,25	6,28	10,57	7,36	5,51	6,16	6,00	5,89	5,83	5,10	5,75	5,56	6,67	7,77	7,71	7,38	5,85	12,63	6,17	8,22	6,39	10,31	5,21	7,30		
germacreno A	1495	1495	0,84	0,81	tr	tr	0,49	0,49	tr	tr	0,51	0,51	0,68	0,7	tr	0,72	0,55	0,67	1,48	0,5	0,61	0,61	tr	tr	0,65	0,65	tr	tr	1,15	1,15	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,77	tr		
α-cadineno	1500	1500	0,94	0,94	1,02	0,99	0,70	1,01	1,61	1,03	1,38	1,22	1,17	1,52	0,83	1,63	1,38	1,22	1,17	1,52	0,83	1,63	1,38	1,22	1,17	1,52	0,83	1,63	1,38	1,22	1,17	1,52	0,83	1,63	1,38	1,22	1,17			
α-cadineno	1508	1508	2,90	1,48	1,02	0,69	0,56	1,19	0,81	0,89	5,73	4,65	1,82	1,35	2,96	7,98	4,10	2,63	2,93	2,57	2,71	4,15	3,62	4,11	3,96	2,05	2,40	2,35	2,27	3,07	7,28	3,00	4,45	1,70	2,96	1,95	2,96			
germacreno B	1555	1561	2,78	2,82	1,80	2,47	0,42	0,89	4,45	1,68	1,01	1,10	tr	tr	tr	0,43	0,39	0,41	3,67	4,29	4,76	4,24	2,27	2,02	1,95	2,08	3,17	3,23	2,93	3,11	4,71	9,22	4,65	6,19	1,91	2,58	1,29	1,93		
(E)-nerolidol	1563	1563	8,45	8,58	10,03	9,02	13,11	13,38	12,58	13,02	7,01	6,40	11,80	8,40	10,94	10,70	8,21	6,32	6,27	7,13	6,57	7,35	6,67	6,02	6,68	5,09	5,39	5,66	5,38	18,78	8,17	17,35	14,77	10,08	11,00	12,93	11,34			
nerolidol	1576	1576	3,34	3,50	8,04	4,00	8,76	7,48	7,59	8,53	2,95	2,68	4,10	3,24	4,91	4,06	4,06	4,28	4,39	3,13	2,74	2,94	2,94	2,29	2,54	2,29	2,27	2,33	2,30	3,12	2,30	3,12	2,30	3,12	2,30	3,12	2,30			
dióxido de cariofileno	1583	1583	7,42	7,17	9,33	7,97	13,88	15,41	12,35	13,88	7,16	6,76	11,04	8,32	9,98	8,21	4,32	7,50	5,28	4,96	5,47	5,24	5,46	4,95	4,95	5,11	5,15	5,42	2,68	4,42	5,51	1,54	5,27	4,11	6,10	5,03	7,39	1,67		
10-epi-γ-eudesmol	1621	1619	1,42	1,44	0,86	1,34	1,05	0,56	1,71	1,11	0,54	0,51	1,00	0,98	0,72	0,50	0,58	0,60	0,55	tr	0,95	0,75	0,68	0,66	0,81	0,72	0,61	0,64	0,65	0,63	1,03	tr	1,06	1,05	1,17	1,27	1,59	1,34		
1-epi-cubebol	1627	1627	1,78	1,87	1,58	1,74	0,81	0,98	1,44	0,94	2,46	2,21	4,29	2,99	1,75	1,68	0,51	3,11	1,58	2,38	2,82	2,26	3,67	3,17	3,19	3,34	0,90	0,97	0,98	0,95	2,11	0,43	1,96	1,50	1,10	1,01	1,34	1,15		
cubebol	1642	171	1,72	1,72	1,32	2,25	2,50	1,92	3,71	3,94	2,06	2,63	4,43	3,18	2,91	1,85	2,65	1,64	1,58	1,14	1,54	1,41	2,53	1,83	0,99	1,00	1,06	1,02	1,23	tr	1,27	1,25	1,08	1,13	1,17	1,13				
α-terpineno	1645	1645	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51			
nd	1653	-	6,57	6,71	11,33	8,20	11,21	11,61	10,36	11,03	6,27	5,68	9,98	7,31	9,38	8,48	11,48	7,28	8,61	8,55	8,30	9,49	6,33	5,40	7,22	6,32	7,37	8,50	8,47	8,11	5,25	4,08	5,93	3,89	4,43	2,80	4,72	3,98		
Total identificado			87,22	86,43	94,66	92,76	82,45	81,62	82,95	85,95	89,29	88,98	76,85	86,21	93,18	88,14	89,76	90,30	88,94	90,69	85,28	91,49	88,44	90,25	87,37	95,84	91,10	87,93	90,71	88,68	87,52	87,52	91,05	91,17	91,00	88,46	92,08			
tr = traço da substância (menor 0,23)																																								

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Paraibuna-SP, coletados na primavera (2011)

Substância	M*	M**	População Paranaíba												População Paranaíba																								
			Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média	Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média	Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média	Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média	Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média	Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média	Pa-19P-81	Pa-19P-82	Pa-19P-83	Média									
g-pineiro	992	999	5,36	4,88	5,05	5,10	7,21	5,85	7,00	1,09	6,89	8,17	4,86	7,66	5,95	6,78	1,80	1,45	1,42	1,60	1,49	1,48	1,25	1,64	1,40	1,49	4,91	2,33	3,78	3,12	9,22	9,56	8,97	1,02	1,45	2,07	1,51		
g-pineiro	979	979	4,49	4,88	5,05	5,10	6,43	5,88	6,49	2,59	5,51	6,83	5,82	6,78	5,95	6,78	1,80	1,45	1,42	1,60	1,49	1,48	1,25	1,64	1,40	1,49	4,91	2,33	3,78	3,12	9,22	9,56	8,97	1,02	1,45	2,07	1,51		
limoneno	1027	1029	3,74	3,70	3,90	3,78	1,63	2,13	2,21	1,99	1,69	2,31	1,63	1,88	2,12	1,56	1,80	1,83	2,04	2,53	2,77	2,45	2,51	2,69	2,55	2,48	0,84	0,56	1,05	1,68	1,05	1,26	1,62	1,28	1,80	1,39	1,80		
linalol	1029	1031	8,83	2,57	7,06	6,15	3,24	3,84	4,50	3,86	2,09	4,80	2,96	2,40	3,07	3,25	1,39	2,42	3,06	3,47	2,98	2,45	1,09	2,86	2,7	tr	tr	2,80	1,39	2,91	2,97	1,86	1,43	1,77	1,60	1,43	1,77	1,60	
trans-β-citronel	1045	1045	0,83	0,83	0,83	0,83	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97			
linalil	1098	1098	17,87	7,15	16,68	13,96	9,32	9,62	9,37	15,07	16,80	17,56	16,48	18,35	23,03	24,43	21,94	24,49	22,21	24,38	26,69	11,74	13,52	12,09	12,45	17,56	13,90	19,57	16,94	28,87	27,59	23,23	25,56	23,72	19,17	16,94	20,84		
α-terpinol	1183	1189	1,64	1,30	1,56	1,45	1,02	2,01	1,37	1,47	1,21	1,51	1,21	1,19	0,96	0,80	0,69	0,82	0,60	0,82	0,90	0,77	0,52	0,79	0,78	0,70	tr	tr	tr	1,30	1,28	tr	1,19	0,53	0,59	0,63	0,58		
α-capene	1375	1375	1,85	2,28	2,00	1,94	1,01	1,46	1,47	2,88	2,26	2,43	2,52	2,17	1,39	0,99	1,52	2,34	1,61	1,51	1,82	1,76	1,46	1,20	1,51	1,46	1,27	1,44	1,42	1,09	1,08	1,25	1,09	1,92	1,57	1,30	1,60		
β-piemen	1391	1390	tr	tr	tr	tr	0,44	tr	tr	0,44	tr	tr	tr	0,37	0,38	0,32	0,36	0,67	0,54	0,51	0,57	1,01	0,91	0,92	0,95	0,63	0,55	0,52	0,57	tr	tr	tr	tr	tr	0,49	tr	0,49		
trans-canifoleno	1418	1419	7,54	10,23	8,00	8,59	4,57	4,71	6,22	5,50	15,95	13,28	14,47	14,65	13,68	11,98	10,02	11,89	16,27	12,37	13,37	19,16	8,95	8,95	8,92	9,34	9,94	9,10	9,42	9,49	7,30	6,60	8,25	7,38	7,88	8,42	7,68	7,99	
γ-cadineno	1428	1432	0,63	0,63	0,63	0,63	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77			
γ-cadineno	1449	1449	0,14	0,53	0,59	0,60	tr	tr	0,60	0,53	0,59	0,60	tr	tr	0,60	0,53	0,59	0,60	tr	tr	0,60	0,53	0,59	0,60	tr	tr	0,60	0,53	0,59	0,60	tr	tr	0,60	0,53	0,59	0,60	tr	tr	
α-humuleno	1452	1454	2,22	2,29	2,28	2,28	2,41	1,45	1,83	1,83	3,36	3,05	3,87	3,36	2,68	2,52	3,34	2,51	3,40	2,94	2,73	2,74	2,73	2,84	2,71	2,38	2,61	2,57	2,07	1,76	2,06	1,96	2,42	2,37	2,26	2,35			
α-αromadendreno	1459	1463	0,91	1,62	1,05	1,19	0,93	0,81	0,90	0,88	0,74	0,66	0,84	0,75	0,63	0,63	0,64	0,57	0,71	0,60	0,61	0,64	1,32	1,21	1,18	1,24	1,07	1,01	1,05	1,04	1,13	1,26	1,30	1,92	1,73	1,63	1,76		
γ-murolideno	1475	1477	1,22	1,14	1,46	1,36	1,13	1,47	1,22	1,57	1,78	1,86	1,79	1,54	1,36	1,53	1,87	2,44	2,36	2,56	2,53	2,17	2,35	2,99	2,60	2,97	2,80	1,21	1,21	1,21	1,71	1,67	1,68	1,88	1,71	1,67	1,88		
g-murolideno	1480	1480	0,91	1,24	0,98	1,04	1,78	0,50	0,52	0,62	1,54	1,48	1,28	0,69	1,55	1,46	1,23	1,52	1,76	0,73	1,00	2,03	2,11	2,05	2,06	1,52	1,65	1,69	1,62	1,42	1,95	1,16	1,09	1,17	1,31	1,32	1,27		
β-pielleno	1485	1485	1,10	1,77	1,44	1,56	1,41	1,26	0,94	1,02	1,07	1,12	1,09	1,00	1,07	1,00	1,07	2,81	2,38	2,30	2,50	2,45	2,27	2,32	2,35	2,05	2,02	2,86	0,63	0,73	0,95	0,77	2,20	1,47	1,28	1,65			
β-bisaboleno	1490	1492	2,24	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27		
g-murolideno	1495	1495	0,64	0,62	0,58	0,55	0,50	tr	0,47	0,49	0,71	0,56	0,74	0,67	0,43	0,52	0,50	0,48	0,59	0,44	0,64	0,66	0,63	0,88	0,93	0,87	0,89	0,60	1,00	0,97	0,88	0,95	0,54	0,57	0,76	0,83	0,76	0,80	
γ-cadineno	1499	1500	0,61	0,80	0,65	0,69	0,69	0,46	0,61	0,59	1,21	0,88	1,01	1,03	0,96	1,07	0,66	1,08	1,24	1,06	0,98	1,09	1,06	0,99	0,94	1,00	1,27	1,11	0,98	0,48	0,96	0,88	0,96	0,88	0,79	0,88			
γ-cadineno	1500	1500	2,70	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49		
g-murolideno	1505	1505	1,56	1,37	2,14	1,56	1,60	1,18	0,62	0,66	0,82	tr	tr	0,40	0,37	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
β-nerolidol	1563	1563	8,82	11,14	9,19	9,32	19,80	20,13	19,52	20,12	9,46	8,88	9,17	9,17	3,59	2,65	2,37	2,87	3,61	3,46	3,38	3,48	3,07	3,63	3,74	3,48	2,70	2,25	2,53	2,49	5,28	5,42	5,56	5,42	10,65	12,29	13,04	11,99	
ε-pantaleno	1576	1578	2,72	2,27	2,41	2,65	2,08	2,05	1,01	0,80	0,86	tr	0,92	0,71	0,82	0,89	1,06	1,11	1,02	1,29	2,78	2,84	2,40	2,80	2,84	2,80	1,88	1,88	3,41	3,61	3,22	2,60	2,63	2,82	2,63	2,82	2,63		
α-divino-cadinoleno	1600	1600	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46		
β-nerolidol	1621	1619	1,91	2,56	2,21	2,23	1,65	3,25	2,29	2,40	0,53	0,46	0,50	0,50	1,53	1,81	1,67	2,23	2,86	2,54	2,21	0,53	0,60	0,65	0,59	0,81	0,64	0,75	tr	0,34	0,37	0,79	0,93	0,94	0,79	0,93	0,94		
1-Epi cubenol	1627	1627	0,83	0,97	0,85	0,88	0,69	1,19	0,86	0,91	0,55	0,99	1,35	1,34	1,32	1,34	0,82	1,47	1,23	1,17	1,09	1,12	1,49	1,12	1,49	1,12	1,49	1,12	1,49	1,12	1,49	1,12	1,49	1,12	1,49	1,12	1,49		
β-nerolidol	1636	1636	2,76	2,12	2,25	2,25	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75	2,12	1,75		
α-murolidol	1645	1645	tr	tr	tr	tr	0,89	1,30	1,16	1,12	0,90	0,75	0,82	0,82	0,71	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr
ndi			2,82	3,62	2,97	3,14	2,71	1,07	2,37	2,05	2,88	2,31	3,49	2,90	3,12	4,05	3,31	3,49	3,88	5,46	4,16	4,50	4,46	4,15	4,72	4,61	5,25	3,37	4,95	4,52	4,88	2,18	2,53	3,20	3,19	3,19			
Total identificado			94,87	94,15	94,22	94,96	94,99	89,76	93,95	95,15	92,13	92,95	92,63	92,60	92,12	96,54	95,93	94,39	94,34	92,77	94,00	93,16	92,56	93,15	93,18	93,18	92,65	93,51	93,29	93,28	93,24	94,08	92,93	92,49	92,89	93,43			
tr: traço da substância (tr=0.03)																																							

Composição química (expressa em %) dos óleos essenciais dos acessos de *Campomanesia phaea* provenientes de Limeira-SP, coletados na primavera (2011).

Substância	População Lúpera																																						
	IK*	IK**	LI-1P-R1	LI-1P-R2	LI-1P-R3	Média	LI-2P-R1	LI-2P-R2	LI-2P-R3	Média	LI-3P-R1	LI-3P-R2	LI-3P-R3	Média	LI-4P-R1	LI-4P-R2	LI-4P-R3	Média	LI-5P-R1	LI-5P-R2	LI-5P-R3	Média	LI-6P-R1	LI-6P-R2	LI-6P-R3	Média	LI-7P-R1	LI-7P-R2	LI-7P-R3	Média	LI-8P-R1	LI-8P-R2	LI-8P-R3	Média	LI-9P-R1	LI-9P-R2	LI-9P-R3	Média	
α-pineno	939	939	5,96	5,82	6,37	6,05	tr	2,28	2,45	2,37	tr	1,31	2,65	2,88	3,22	4,12	5,47	4,00	3,41	6,37	5,99	5,26	4,34	4,91	2,89	4,05	1,88	5,02	1,70	2,86	1,61	2,45	2,94	1,73	1,57	1,75	1,68	1,67	
β-pineno	979	979	5,95	5,86	5,65	5,82	0,40	0,59	0,96	0,46	tr	0,54	0,58	0,56	2,63	2,63	2,70	2,64	0,39	5,89	5,25	5,02	4,33	4,93	2,28	2,46	2,29	3,22	3,38	3,28	3,32	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38		
limoneno	1027	1029	2,19	1,96	1,66	1,90	2,34	0,66	1,50	1,25	tr	0,54	0,58	0,56	1,48	4,83	4,51	4,33	2,27	2,88	2,59	2,70	2,15	4,91	2,89	4,05	1,88	5,02	1,70	2,86	1,61	2,45	2,94	1,73	1,57	1,75	1,68	1,67	
1,8-cineol	1029	1031	10,4	10,4	13,4	10,7	1,66	3,00	2,94	2,56	0,65	1,80	1,52	1,32	tr	0,85	0,62	0,74	1,29	1,63	1,45	1,46	0,86	0,80	0,64	0,77	1,03	1,38	0,86	0,99	3,89	1,30	2,80	0,71	tr	0,84	0,78	0,84	
trans-β-pineno	1045	1050	67,0	19,4	15,48	10,34	tr	2,72	2,90	2,81	0,66	8,12	8,40	6,06	1,67	6,34	6,71	4,91	2,18	4,27	4,08	3,71	5,33	6,48	5,54	5,78	3,64	8,46	5,92	5,95	1,53	6,31	6,61	4,82	0,04	7,77	6,44	6,08	
indol	1086	1096	16,35	16,35	18,30	18,30	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	
α-terpinoleno	1183	1189	0,62	0,67	tr	0,65	0,88	0,86	0,79	0,84	0,86	0,67	0,74	tr	tr	tr	0,89	0,79	0,75	0,82	0,50	tr	tr	0,50	0,62	0,52	0,55	0,56	0,58	tr	0,97	0,65	0,81	tr	0,43	0,49	0,49	0,49	
α-copaeno	1376	1376	0,65	0,86	0,77	0,76	0,48	0,59	0,65	0,57	2,06	1,46	1,55	1,69	1,18	0,99	1,01	1,06	0,96	0,99	0,89	0,95	1,35	1,38	1,64	1,46	1,14	0,90	0,96	1,00	0,87	1,09	1,10	0,92	1,10	1,03	1,02		
β-terpineno	1398	1398	1,14	0,90	1,09	1,04	2,92	2,67	2,57	2,72	1,31	1,07	1,21	1,20	2,51	2,37	2,49	2,46	1,88	1,82	1,96	1,89	1,19	1,23	1,34	1,25	3,11	2,53	2,90	2,85	1,46	2,52	2,17	2,05	2,13	2,15	2,25	2,18	
trans-γ-terpineno	1418	1419	7,41	7,42	7,42	7,42	4,67	4,67	4,93	4,76	17,66	14,45	14,51	15,67	12,83	12,83	8,99	8,95	7,97	8,60	5,95	6,11	7,04	7,38	8,28	11,98	13,20	13,23	4,15	9,26	8,15	7,19	7,24	7,26	7,31	7,77	7,77		
β-copaeno	1428	1432	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	0,64	0,53	0,59	0,59	0,55	tr	0,55	tr	tr	tr	tr	tr	0,64	0,64	0,72	0,67	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr
aromadendreno	1438	1449	0,96	0,95	0,85	0,92	1,84	1,88	1,88	1,88	1,87	0,92	0,88	1,35	1,17	1,27	1,26	tr	0,53	0,53	0,67	0,76	1,00	0,81	0,75	0,65	0,71	0,70	1,04	1,06	1,14	1,20	1,34	1,71	1,37	1,64			
α-humuleno	1454	1464	1,99	1,96	1,92	1,94	1,72	1,69	1,71	1,71	3,49	2,78	2,80	3,02	3,42	3,12	3,17	3,25	2,54	2,44	2,32	2,68	2,69	3,05	2,81	2,70	2,42	2,70	2,61	2,26	2,54	2,44	2,41	2,37	2,33	2,35	2,35		
β-humuleno	1459	1462	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21		
γ-muroleno	1477	1469	1,89	1,89	1,82	1,71	1,64	1,72	1,69	2,16	2,08	1,94	2,06	2,26	2,07	2,14	2,16	2,02	1,99	1,86	1,96	2,31	2,23	2,67	2,40	1,87	1,88	2,11	1,95	1,98	2,14	2,08	2,07	2,30	2,19	2,29	2,26		
germaneno D	1480	1480	0,74	0,83	0,92	0,83	tr	tr	tr	1,55	1,57	1,72	1,61	1,05	1,12	0,94	1,04	1,42	1,58	1,73	1,58	2,33	2,23	2,57	2,34	1,50	1,28	1,73	1,58	1,19	1,03	1,11	1,81	1,25	1,30	1,12	1,30		
β-stilbeno	1485	1485	3,20	3,25	2,93	3,13	2,87	3,86	4,09	3,90	2,50	2,53	2,46	2,63	3,01	2,75	2,87	3,01	3,25	3,26	3,28	2,62	2,42	4,00	3,60	4,03	3,88	2,48	3,44	3,12	3,01	3,89	3,66	3,76	3,77	3,77			
β-bisaboleno	1493	1493	4,15	4,45	4,85	4,74	4,83	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06		
germaneno A	1495	1494	0,45	0,56	0,52	0,51	1,12	1,05	1,07	0,71	0,85	0,91	0,82	1,07	1,10	1,13	1,05	0,82	0,85	0,77	0,90	0,80	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98		
γ-cadineno	1500	1500	0,62	0,63	0,60	0,50	0,46	0,50	0,49	1,15	0,87	0,88	0,97	0,87	0,72	0,78	0,79	0,69	0,65	0,59	0,64	0,98	0,92	1,10	1,00	0,77	0,55	0,60	0,64	0,77	0,67	0,75	0,73	0,84	0,82	0,74	0,80		
δ-cadineno	1512	1513	1,58	1,17	1,82	1,18	1,77	1,56	1,29	1,73	1,59	3,34	3,08	3,25	3,22	2,40	2,86	2,67	2,23	2,31	2,18	2,24	2,99	3,13	3,82	3,31	2,20	2,34	2,09	2,63	2,72	2,48	2,60	2,77	2,59	2,65	2,65		
trans-β-cadineno B	1515	1515	1,21	1,17	1,25	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22		
ε-nerolidol	1563	1563	5,79	5,74	4,84	5,31	14,42	11,21	11,23	12,29	8,62	6,07	6,01	6,90	10,97	8,17	8,08	5,31	5,07	6,64	5,38	5,42	5,81	6,20	6,60	6,42	6,41	5,00	3,83	4,79	5,55	19,75	7,51	11,94	10,67	3,61	7,43	9,24	
espátuleno	1576	1578	2,81	2,54	2,92	2,62	2,72	2,67	3,00	2,54	1,47	1,28	1,76	2,59	1,80	1,76	2,75	2,03	1,91	2,23	1,47	1,53	1,27	1,42	1,39	0,92	1,20	1,17	3,34	1,29	1,46	2,03	1,93	1,63	1,34	1,63	1,63		
óxido de γ-arifoleno	1583	1583	1,59	1,46	1,62	1,54	1,72	1,71	1,79	1,69	1,74	4,37	4,54	4,24	3,58	7,55	5,11	5,04	5,90	3,75	3,05	3,01	3,27	2,79	2,96	3,07	2,94	3,76	2,63	3,00	3,23	6,84	4,04	4,28	5,05	5,62	5,03	4,12	
α-epi-γ-eudesmol	1627	1627	0,61	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59			
1-epi-bisaboleno	1627	1627	1,30	1,16	1,09	1,19	0,70	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59			
cubebol	1640	1642	1,98	1,62	1,68	1,80	2,16	1,73	1,71	1,87	2,94	1,98	1,89	1,87	2,72	2,72	2,72	2,72	1,92	1,97	2,23	1,92	1,67	2,07	1,89	2,04	2,19	2,27	1,82	0,45	1,90	1,39	2,68	1,90	2,14	1,92	1,88		
α-murolol	1645	1645	tr	0,48	0,51	0,50	0,61	0,55	0,44	0,53	0,81	0,49	0,55	0,62	0,90	0,66	0,62	0,73	1,33	0,98	tr	1,16	0,64	0,64	0,75	0,68	0,63	tr	0,57	0,60	0,83	0,61	tr	0,72	0,61	0,67	0,56		
indol	1653	1653	4,50	4,49	4,50	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49			
Total Identificado	93,93	94,23	94,19	93,97	96,36	93,91	96,36	94,20	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	94,19	96,36	
tr - traço da substância (tr < 0,43)																																							

Apêndice E – Cromatogramas obtidos durante a avaliação do óleo essência de *C. phaea*, em planta piloto

Analysis Date & Time : 12/1/2012 15:11:41
 User Name : Roselaine Facanali
 Sample Name : OE de Campomanesia phaea
 Sample ID : Li_Prb_FS_TP
 Injection Volume : 1.00
 Data Name : C:\GCsolution\Data\Roselaine\Marcelo Leão\marcelo270.gcd
 Method Name : C:\GCsolution\Data\Roselaine\Marcelo Leão\C. phae.gcm
 OE de Campomanesia phaea
 Doutorado Marcelo Leão
 Coleta Paraibuna
 Coleta Primavera/2011
 Amostra: Li_Prb_FS_Teste Piloto
 Injeção: 1ul óleo + 1ml AcoEt
 Prog.: 60°C - 180°C, 3°C/min, 180°C - 240°C, 10°C/min; Split: 1/20; Fluxo: 1ml/min

Sample Information

Peak#	Ret.Time	Height	Area	Area%
1	7.186	8159	23564	2.59
2	8.538	5775	17650	1.94
3	10.338	3896	13018	1.43
4	11.022	22841	73639	8.09
5	13.094	1139	4936	0.54
6	25.019	1121	5237	0.58
7	25.207	7081	30874	3.39
8	25.867	3303	13775	1.51
9	27.070	36650	154041	16.92
10	27.450	1910	8249	0.91
11	27.874	4190	22755	2.50
12	28.469	7559	32260	3.54
13	28.775	5348	23491	2.58
14	29.269	1334	4878	0.54
15	29.378	7106	39865	4.38
16	29.534	2432	10956	1.20
17	29.814	12252	58446	6.42
18	29.979	1161	5210	0.57
19	30.176	16077	88972	9.77
20	30.346	2628	12722	1.40
21	30.631	2130	13182	1.45
22	30.906	3762	15739	1.73
23	31.260	11844	50555	5.55
24	31.362	1405	4859	0.53
25	31.837	1358	6055	0.67
26	32.027	1738	7413	0.81
27	32.636	2502	10180	1.12
28	32.761	11534	56232	6.18
29	33.416	1722	8987	0.99
30	33.681	4144	24692	2.71
31	33.999	1078	4621	0.51
32	34.070	1123	4585	0.50
33	34.432	756	5843	0.64
34	34.800	903	5887	0.65
35	35.168	1121	5655	0.62
36	35.352	1303	7075	0.78
37	35.853	1563	12743	1.40
38	36.344	3545	21521	2.36
Total		205493	910362	100.00

Analysis Date & Time : 12/1/2012 12:31:44
 User Name : Roselaine Facanali
 Sample Name : OE de Campomanesia phaea
 Sample ID : Pa_Prb_FF_TP
 Injection Volume : 1,00
 Data Name : C:\GCsolution\Data\Roselaine\Marcelo Leão\marcelo267.gcd
 Method Name : C:\GCsolution\Data\Roselaine\Marcelo Leão\C. phae.gcm
 OE de Campomanesia phaea
 Doutorado Marcelo Leão
 Coleta Paraíba
 Coleta Primavera/2011
 Amostra: Pa_Prb_FF_Teste Piloto
 Injeção: 1ul óleo + 1ml AcoEt
 Prog.: 60°C - 180°C, 3°C/min, 180°C - 240°C, 10°C/min; Split: 1/20; Fluxo: 1ml/min

Chromatogram

Chromatogram

Peak#	Ret.Time	Height	Area	Area%
1	7.183	12777	35300	3.48
2	8.535	10517	31598	3.12
3	10.337	4653	16575	1.63
4	10.434	1283	4724	0.47
5	11.022	51499	164060	16.18
6	13.082	7480	30769	3.03
7	24.054	1185	4677	0.46
8	25.205	7840	32849	3.24
9	25.864	1926	9347	0.92
10	27.068	41148	172743	17.03
11	27.449	2436	11353	1.12
12	27.869	2592	15543	1.53
13	28.319	857	4620	0.46
14	28.467	8936	39227	3.87
15	28.771	4686	22744	2.24
16	29.266	1322	5694	0.56
17	29.380	6205	30317	2.99
18	29.583	4167	27289	2.69
19	29.807	4800	23783	2.34
20	29.979	1122	7808	0.77
21	30.176	8031	63771	6.29
22	30.341	2668	12115	1.19
23	30.623	2000	13084	1.29
24	30.902	3602	15014	1.48
25	31.258	13322	57600	5.68
26	31.357	1520	5339	0.53
27	31.834	1049	4777	0.47
28	32.024	1429	6101	0.60
29	32.633	3591	15162	1.49
30	32.756	9648	47060	4.64
31	33.412	1831	9826	0.97
32	33.679	3154	21242	2.09
33	33.995	1292	6088	0.60
34	34.435	682	4960	0.49
35	35.349	1565	8601	0.85
36	35.499	914	4613	0.45
37	35.857	1647	13564	1.34
38	36.338	2188	14335	1.41
Total		237564	1014272	100.00

Analysis Date & Time : 12/1/2012 13:25:04
 User Name : Roselaine Facanali
 Sample Name : OE de Campomanesia phaea
 Sample ID : Pa_Prb_FS_TP
 Injection Volume : 1.00
 Data Name : C:\GCsolution\Data\Roselaine\Marcelo Leão\marcelo268.gcd
 Method Name : C:\GCsolution\Data\Roselaine\Marcelo Leão\C. phae.gcm
 OE de Campomanesia phaea
 Doutorado Marcelo Leão
 Coleta Paraíba
 Coleta Primavera/2011
 Amostra: Pa_Prb_FS_Teste Piloto
 Injeção: 1ul óleo + 1ml AcoEt
 Prog.: 60°C - 180°C, 3°C/min, 180°C - 240°C, 10°C/min; Split: 1/20; Fluxo: 1ml/min

Peak#	Ret.Time	Height	Area	Area%
1	11.021	3363	11215	1.51
2	25.015	1166	4854	0.65
3	25.206	9473	39186	5.27
4	27.065	29633	124179	16.70
5	27.450	2148	9244	1.24
6	27.869	1853	10819	1.45
7	28.321	749	3957	0.53
8	28.467	6740	29567	3.98
9	28.772	3102	16904	2.27
10	29.266	1212	4854	0.65
11	29.381	7082	35502	4.77
12	29.533	2383	12261	1.65
13	29.810	7343	35110	4.72
14	29.974	901	5602	0.75
15	30.170	8629	50569	6.80
16	30.343	2910	14318	1.93
17	30.627	1504	9654	1.30
18	30.904	4318	18010	2.42
19	31.258	13783	60701	8.16
20	31.359	1699	6198	0.83
21	31.622	1105	4653	0.63
22	31.757	1390	5882	0.79
23	31.840	1679	7240	0.97
24	32.023	2737	11116	1.49
25	32.635	2704	11056	1.49
26	32.761	19901	90115	12.12
27	33.415	1726	8552	1.15
28	33.527	811	3510	0.47
29	33.679	2378	16311	2.19
30	34.439	495	3562	0.48
31	34.810	484	3671	0.49
32	34.950	911	4466	0.60
33	35.347	2194	12281	1.65
34	35.501	1217	7027	0.94
35	35.856	1853	17580	2.36
36	36.013	837	5055	0.68
37	36.245	1136	5904	0.79
38	36.337	2954	22986	3.09
Total			156503	743671
				100.00