ERRATA

OLIVEIRA, M.P. Qualidade de vida relacionada à saúde de adultos e idosos em diálise peritoneal. 2010.124 p. Dissertação de Mestrado, apresentada à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Ribeirão Preto, 2010.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
41	33	Inserir:	Foi considerada significância estatística para $p < 0,05$, na hipótese de que o grupo estudado constituísse uma amostra probabilística de uma população com características semelhantes.
45	15	41 (50%)	51 (62,2%)
46	1	(14,8%)	(14,6%)
46	13	36	38
61	6	Encontrou-se correlação moderada entre o número de comorbidades e as dimensões: funcionamento físico, saúde geral, energia/fadiga, lista de problemas/sintomas, situação de trabalho, função cognitiva. Enquanto nas dimensões: dor, sobrecarga da doença renal, função cognitiva, sono e saúde global houve correlação fraca.	Encontrou-se correlação moderada entre o número de comorbidades e as dimensões: funcionamento físico, saúde geral, energia/fadiga, situação de trabalho e sono. Enquanto nas dimensões: dor, lista de problemas/sintomas, sobrecarga da doença renal, função cognitiva e saúde global houve correlação fraca.
61	11	A variável número de complicações apresentou o maior número de correlações sendo elas, moderada para as dimensões: funcionamento físico, função física, saúde geral, bem-estar emocional, função emocional, lista de problemas/sintomas, efeitos da doença renal, função cognitiva, qualidade de interação social, e fraca para as dimensões: dor, função social e sobrecarga da doença renal.	A variável número de complicações apresentou o maior número de correlações sendo elas, moderada para as dimensões: funcionamento físico, saúde geral, bem-estar emocional, energia/fadiga, lista de problemas/sintomas, efeitos da doença renal, função cognitiva e qualidade de interação social, e correlação fraca para as dimensões: função física, dor, função emocional, função social, sobrecarga da doença renal e sono.