LUIZ ALBERTO DIB CANONICO

**DETECÇÃO DE PERIODONTOPATÓGENOS DO COMPLEXO
VERMELHO EM ATEROMAS DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS DE
PACIENTES COM DOENÇA CARDIOVASCULAR
E PERIODONTITE CRÔNICA**

São Paulo

2009

Luiz Alberto Dib Canonico

**Deteccção de periodontopatógenos do complexo vermelho em
ateromas de artérias coronárias de pacientes com doença
cardiovascular e periodontite crônica**

Tese apresentada à Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo, para obter o
título de Doutor, pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências Odontológicas.

Área de Concentração: Periodontia

Orientador: Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito

São Paulo

2009

Catálogo-na-Publicação
Serviço de Documentação Odontológica
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Canonico, Luiz Alberto Dib

Detecção de periodontopatógenos do complexo vermelho em ateromas de artérias coronárias de pacientes com doença cardiovascular e periodontite crônica / Luiz Alberto Dib Canonico; orientador Giuseppe Alexandre Romito. -- São Paulo, 2009.

56p. : tab., graf.; 30 cm.

Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas. Área de Concentração: Periodontia) -- Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.

1. Vasos coronários – Placas de ateroma – Doenças periodontais 2. Doenças cardiovasculares – Complicações 3. Arteriosclerose – Periodontite crônica

CDD 617.632

BLACK D64

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES TRABALHOS, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE E COMUNICADA AO AUTOR A REFERÊNCIA DA CITAÇÃO.

São Paulo, ____/____/____

Assinatura:

E-mail:

FOLHA DE APROVAÇÃO

Canonico LAD. Detecção de periodontopatógenos do complexo vermelho em aterosomas de artérias coronárias de pacientes com doença cardiovascular e periodontite crônica [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2009.

São Paulo, / /2009

Banca Examinadora

1)Prof.(a) Dr.(a)_____

Titulação:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

2)Prof.(a) Dr.(a)_____

Titulação:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

3)Prof.(a) Dr.(a)_____

Titulação:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

4)Prof.(a) Dr.(a)_____

Titulação:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

5)Prof.(a) Dr.(a)_____

Titulação:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

DEDICATÓRIA

“EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA” Jesus Cristo

A **DEUS** todo poderoso e **JESUS CRISTO**, amigos e protetores de todas as horas.

Aos meus pais **ALBERTO** e **NORMA**, batalhadores que me deram amor, educação, carinho, incentivo e um porto seguro.

Aos meus irmãos **ROSA MARIA** e **LUIZ GUSTAVO**

A minha filha **MICHELE** minha neta **MARIA LUIZA**, presentes de **DEUS**

A minha querida avó **NEFA** que com 95 anos, sempre com palavras sinceras.

AGRADECIMENTOS

“Aquele que perde dinheiro, perde muito; aquele que perde um amigo, perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo”

Eleanor Roosevelt

À **Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo** – São Paulo na pessoa do seu diretor, Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo, pela estrutura oferecida para esta etapa da minha formação profissional e aos seus funcionários.

Ao meu orientador, mestre e amigo, **Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito**, obrigado por tudo, pelos ensinamentos e conselhos nesses anos de convívio. Meus sinceros agradecimentos.

A

o **Prof. Dr. Francisco Emílio Pustiglioni**, grande nome da Periodontia Mundial, obrigado por ter aberto as portas da disciplina de Periodontia e acreditar neste trabalho, minha admiração e eterna amizade.

A

os professores da Disciplina de Periodontia da FOU SP, **Prof. Dr. Roberto Fraga Moreira Lotufo** (*in memoriam*), **Prof. Dr. Giorgio de Micheli**, **Prof. Dr. Luiz Antônio Pugliesi Alves de Lima**, **Prof. Dr. Marco Antonio P. Georgetti**,

Prof. Dr. Cláudio Mendes Pannuti, pela dedicação no ensinamento da Periodontia.

A

os meus colegas de pós graduação em especial a **MESTRE** em Periodontia, **SILVIA LINARD MARCELINO**, parceira que me ajudou demais na conclusão deste trabalho.

A

o **Prof. Dr. Francisco Gregori Júnior e equipe**, Chefe da Disciplina e do Serviço de Cirurgia Cardíaca da Universidade Estadual de Londrina – UEL, professor e médico competente, homem de sucesso e acima de tudo amigo, humilde, caráter invejável e o melhor adora um rock and roll.

A

os **Professores Doutores Fábio Daumas Nunes e Mario Julio Ávila-Campo e equipe** pela ajuda e eficiência quando da utilização dos laboratórios.

À

secretária **Márcia Maria dos Santos**, pelo profissionalismo e amizade.

À **FAPESP**, pelo auxílio na pesquisa (protocolo n° 04/03199-3)

Agradeço a todos

Canonico LAD. Detecção de periodontopatógenos do complexo vermelho em ateromas de artérias coronárias de pacientes com doença cardiovascular e periodontite crônica [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2009.

RESUMO

Existe a hipótese, dentro da medicina periodontal, de uma possível relação entre doença periodontal e doenças cardíacas. Talvez a doença periodontal possa agir como um fator desencadeante para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Vinte e oito pacientes portadores de aterosclerose e periodontite crônica, submetidos à intervenção cirúrgica de revascularização cardíaca e endarterectomia coronariana, participaram do estudo, cujo objetivo foi avaliar nas placas de ateroma de artérias coronárias a presença dos periodontopatógenos do complexo vermelho: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*. O DNA genômico foi extraído das amostras de ateromas e se constatou a presença das bactérias através da reação em cadeia da polimerase (PCR). Detectou-se nas 28 amostras de ateroma: *P. gingivalis* em 50%, *T. forsythia* em 7,1% e *T. denticola* em 3,6% respectivamente. Estes resultados ajudam a defender a hipótese de que a doença periodontal pode ser um dos muitos fatores envolvidos com o desenvolvimento da doença cardiovascular, sendo mais um motivo para ser precocemente diagnosticada, prevenida e tratada.

Palavras-Chaves: Doença Periodontal, Doença Cardiovascular, Aterosclerose, Periodontopatógenos, PCR

Canonico LAD. Detección of periodontopathogens of the red complex in the atheroma of the coronary arteries from patients with cardiovascular disease and chronic periodontitis [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2009.

ABSTRACT

In the field of periodontal medicine there is the hypothesis of a possible connection between periodontal diseases and heart diseases. Maybe the periodontal disease may work as a triggering factor in the development of periodontal of cardiovascular diseases. Twenty-eight patients of atherosclerosis and cronical periodontitis patients were subjected to surgical intervention for cardiac revascularization and coronary endarterectomy, have made part of the study, whose objective was to evaluate the presence of periodontopathogens of the red complex in the atheroma platelets: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* and *Treponema denticola*. Genomic DNA was extracted from atheroma samples, and the presence of bacteria was stated through polymerase chain reaction (PCR). In the 28 samples of atheroma were detected: *P. gingivalis* at 50%, *T. forsythia* at 7.1% and *T. denticola* at 3.6% respectively. These results help to sponsor the hypothesis that the periodontal disease can be one of several factors involved in the development of cardiovascular disease, being this another reason for its early diagnosis, prevention and treatment.

Keywords: Periodontal Disease, Cardiovascular Disease, Atherosclerosis, Periodontopathogens, PCR

LISTA DE FIGURAS

Gráfico 5.1 - Prevalência de bactérias presentes em ateroma	39
Quadro 4.1 -Bactéria alvo, seqüência dos iniciadores temperatura de anelamento, pares de base e referência	37

LISTA DE TABELA

Tabela 5.1 - Prevalência de bactérias presentes em ateroma	39
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

µg	micrograma
µl	microlitro
µM	micromolar
ATCC	American Type Culture Collection
DNA	ácido desoxirribonucleico
dNTP	solução de 2' – deoxinucleotídeos 5 –trifosfato: dATP, dTTP, dCTP e dGTP deoxinucleotideo trifosfato.
M	molar ou molaridade
mg	miligrama
ml	mililitro
mM	milimolar
MgCl ₂	cloreto de magnésio
pb	pares de bases
PCR	polymerase chain reaction (reação em cadeia da polimerase)
t A°C	temperatura de associação
SUS	Sistema Único de Saúde

SUMÁRIO

	p.
1 INTRODUÇÃO	12
2 REVISÃO DA LITERATURA.....	16
3 PROPOSIÇÃO	31
4 MATERIAL E MÉTODOS.....	32
4.1 Pacientes.....	32
4.2 Coleta do ateroma	34
4.3 Extração do DNA	35
4.4 Detecção bacteriana.....	36
5 RESULTADOS.....	38
6 DISCUSSÃO	40
7 CONCLUSÃO	45
REFERÊNCIAS.....	46
ANEXO	56

1 INTRODUÇÃO

A Medicina Periodontal destaca-se como um importante ramo das Ciências da Saúde (FISCHER, 2005). A doença periodontal pode ter influência na saúde sistêmica de um indivíduo ou o inverso, por isso, a Medicina e a Odontologia devem estar sempre inter relacionadas.

Desde o final da década de 80, estudos têm demonstrado uma forte relação entre a doença periodontal e diversas doenças sistêmicas (FOX, 1992; HAYNES; STANDFORD, 2003).

As doenças periodontais são multifatoriais, iniciadas por biofilme bacteriano específico, constituído predominantemente por bactérias gram-negativas anaeróbias (HAFFAJEE; SOCRANSKY, 2000), as quais ativam mecanismos teciduais que levam à produção de uma série de eventos inflamatórios e imunológicos ocasionando a destruição dos tecidos periodontais, além disso, representam a infecção mais comum no ser humano e podem afetar de 5 a 30% da população adulta entre 25 a 75 anos de idade (BROWN; LÖE, 1993).

Socransky et al. (1998) descreveram as principais bactérias relacionadas com a doença periodontal do adulto como sendo as do complexo vermelho: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*. Uma alta detecção de patógenos periodontais do complexo vermelho têm sido associada com um aumento no risco ou na severidade de certas alterações sistêmicas, como lesões cardiovasculares (DESVARIEUX et al., 2005; DOGAN et al., 2005), pré-eclampsia (BARAK et al., 2007; CONTRERAS et al., 2006), partos prematuros (HASEGAWA et al., 2003; LIN et al., 2007),

nascimento de bebês de baixo peso (DASANAYAKE et al., 2001) e diabetes (LALLA et al., 2006; SIMS et al., 2002).

Dentre as doenças cardiovasculares (DCV), a aterosclerose é uma doença das artérias que possui a maior incidência de morbidade e mortalidade. Inicia-se na pré-adolescência, e mesmo na infância, e caracteriza-se pelo desenvolvimento de lesões gordurosas, denominadas placas ateromatosas ou ateroscleróticas, na parede arterial interna (GUYTON, 1992).

As doenças ateroscleróticas aparecem entre as principais causas de mortalidade na maioria dos países desenvolvidos (KINANE; LOWE, 2000). Elas representam uma série de respostas celulares e moleculares altamente específicas, que podem ser descritas como uma doença inflamatória (ROSS, 1999). Mais de 50% dos pacientes portadores de aterosclerose não apresentam os conhecidos fatores de risco (hipertensão, fumo, hipercolesterolemia e diabetes) e alguns fatores adicionais que predispõem à aterosclerose ainda não foram identificados. A importância da descoberta de mais fatores e de seus mecanismos de ação levaria ao desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que poderiam reduzir a prevalência dessa doença (DIAS, 2002).

A influência negativa das infecções bucais na saúde sistêmica tem sua origem na disseminação dos microorganismos, ou de seus produtos, na corrente sanguínea, o que é chamado de bacteremia. Este fenômeno pode ocorrer após procedimento simples de higiene bucal, procedimentos profissionais de tratamento, que induzem sangramento, ou até mesmo durante a mastigação. Estes freqüentes surtos de bacteremia transitória podem representar riscos no estabelecimento de doenças cardiovasculares em

determinados pacientes (CONNER et al., 1967; GENCO, 2000; TOLEDO; ROSSA JUNIOR, 1999).

Vários pesquisadores concordam com o fato de que a maioria dos casos de endocardite bacteriana desencadeados por patógenos bucais não tem início nos procedimentos odontológicos, mas nas bacteremias transitórias espontâneas, como as decorrentes da higiene bucal e da mastigação (BAYLISS et al., 1984; CARMONA; DIZ DIOS; SCULLY, 2002).

Lafaurie et al. (2007) avaliou a frequência de bactérias periodontopatogênicas e outras subgengivais, anaeróbias facultativas ou não, presentes no fluxo sanguíneo de pacientes submetidos a raspagem e alisamento radicular e concluíram que a terapia periodontal por meio da raspagem e alisamento radicular induz bacteremia associada a bactérias anaeróbias, principalmente em pacientes com doença periodontal.

Herzberg e Meyer (1996) mostraram que, na presença da doença periodontal, os microorganismos do biofilme dental podem disseminar-se através da circulação causando infecção do endotélio vascular, contribuindo para a ocorrência da aterosclerose, o que aumenta o risco de isquemia do miocárdio e infarto.

Clínicos e pacientes estão cada vez mais cientes de uma possível associação entre a doença periodontal e doenças cardiovasculares, e do potencial da intervenção periodontal preventiva frente à redução dos riscos para o infarto do miocárdio ou acidentes vasculares cerebrais (PAQUETTE; BRODALA; NICHOLS, 2007).

Uma projeção feita para o ano de 2020 indica que as doenças cardiovasculares serão responsáveis por cerca de 36% de todas as mortes no mundo (BRAUNWALD, 1997).

O conhecimento atual ainda é insuficiente para explicar o mecanismo biológico da suposta associação entre doença cardiovascular e doença periodontal, entretanto parece existir certa plausibilidade biológica.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Os estudos das inter-relações entre algumas doenças e condições sistêmicas e as doenças periodontais, tem assumido um papel importante e dão evidências de que a doença periodontal pode ser também, um dos fatores de risco para o aparecimento de complicações cardiovascular.

De acordo com os Indicadores de Dados Básicos do Ministério da Saúde (IDB - ministério da saúde) no Brasil, em 2005, a porcentagem de óbitos por doenças cardiovasculares chegou a 46,12%, computando um total de aproximadamente 85 mil óbitos para todas as faixas etárias e sexo (BRASIL, 2005). Dentre as alterações cardiovasculares, a Aterosclerose é a responsável pela maioria dos casos de infarto do miocárdio e de infarto cerebral, representando a principal causa de óbito nos EUA e Europa Ocidental.

Em uma análise de estudos epidemiológicos que avaliaram a doença periodontal como causa de doenças cardiovasculares feito por Cruz e Nadanovsky (2003), foram identificados 35 estudos por meio de busca manual nos volumes especiais de resumos do periódico *Journal of Dental Research*; de busca nos bancos de dados eletrônicos MEDLINE, LILACS e ISI; e da inspeção de bibliografias dos artigos identificados. Os critérios de inclusão foram: artigos em qualquer idioma publicados entre 1989 e 2000, que relataram a ausência ou presença de associação entre doenças periodontais e doenças cardiovasculares. As evidências disponíveis ainda são esparsas e suas interpretações são limitadas por potenciais vieses e situação de confusão. Os estudos analisados, tanto separadamente quanto juntos, não fornecem

evidência epidemiológica convincente para uma associação causal entre doenças periodontais e doenças cardiovasculares. Entretanto, a possibilidade das doenças bucais causarem doenças cardiovasculares ainda não pode ser descartada.

Hujoel et al. (2000), avaliaram o risco de doenças ateroscleróticas coronarianas em pessoas com periodontite, com gengivite e sem doença periodontal. Participação deste estudo 8.032 adultos dentados com idade média de 50 anos, sendo 1.859 indivíduos com doença periodontal, 2.421 com gengivite e 3.752 com saúde periodontal. Durante o período estudado (1982, 1984, 1986, 1987 e 1992) foram medidas as mortes por doença aterosclerótica coronariana, hospitalização por causa idêntica, ou procedimentos de revascularização coronária. Como conclusão, os resultados do estudo não mostraram evidências convincentes de que a periodontite e a gengivite estão associadas à doença cardiovascular.

A luz dos vasos sangüíneos deve ser lisa, permitindo a livre circulação de sangue do coração para todas as partes do corpo. No entanto, com o passar dos anos e associado a vários fatores de risco, pode-se formar, no interior das artérias, placas duras e gordurosas que tornam mais difícil a passagem do sangue para os diferentes órgãos. A progressão da formação e o desenvolvimento dessas placas constituem o processo denominado aterosclerose (GARCIA; HENSHAW; KRALL, 2001).

Aterosclerose é o principal tipo de Arteriosclerose, em função das complicações isquêmicas que podem ocorrer no coração, cérebro, rins, intestino e nas extremidades inferiores (ROSS; GLOMSET, 1976).

A Aterosclerose humana é um processo crônico, progressivo e sistêmico, caracterizado por respostas inflamatórias e fibroproliferativa da parede arterial, causada por agressões na camada íntima das artérias. Como processo sistêmico, freqüentemente, acomete todos os leitos arteriais incluindo a aorta e seus ramos principais: carótidas, renais, ilíacas e femorais. A hipercolesterolemia, a hipertensão arterial (HA), o diabetes, o tabagismo, as reações imunológicas e inflamatórias, e a suscetibilidade genética individual, figuram entre os fatores de risco para o aparecimento das lesões arteriais (ROSS, 1986; VALLE; BAPTISTA, 1996).

A doença aterosclerótica possuindo períodos de quiescência, alternados com fenômenos agudos, que incluem o infarto do miocárdio, angina (desconforto torácico tipicamente provocado por esforço ou ansiedade, aliviado pelo repouso e não resultando em necrose do miocárdio), insuficiência cardíaca e a morte (SOUZA; STAICO; SOUZA, 2001).

As placas ateroscleróticas são também denominadas Ateromas, são consideradas estáveis quando a espessura da capa fibrosa é espessa com um núcleo lipídico pequeno. Esta placa provavelmente não se romperá facilmente. Já as placas instáveis apresentam um núcleo lipídico grande e uma capa fibrosa fina, sendo as mais propensas a se romperem e, dessa forma, causarem os acidentes tromboembólicos. A ruptura da capa fibrosa, das placas ateromatosas, é provavelmente provocada por metaloproteinases liberadas por macrófagos ativados por linfócitos T (KAI et al., 1998). Neutrófilos e mastócitos (ativados em pacientes com angina instável) também podem ser importantes para desestabilizar as placas ateromatosas, por meio da liberação de elastases e radicais livres de oxigênio (BIASUCCI et al., 1996; DE SERVI et al., 1991). A

liberação de elastase e radicais livres, com a hiperativação dos neutrófilos, já foi demonstrado, também, em pacientes com periodontite crônica (FIGUEREDO et al., 1999; GUSTAFSSON; ASMAN, 1996).

O centro das placas de ateroma está associado com um infiltrado celular, no qual estão presentes células musculares lisas e hipertróficas, macrófagos e alguns linfócitos (GARCIA; HENSHAW; KRALL, 2001). Cada vez mais, evidências sugerem que a inflamação na parede do vaso sanguíneo tem um papel essencial no desenvolvimento da aterosclerose (ROSS, 1999). No entanto, o gatilho que inicia e sustenta o processo inflamatório ainda não foi definitivamente identificado. Entre os candidatos ao estímulo das respostas inflamatórias e auto-imunes estão as infecções (EPSTEIN et al., 1999).

Vários trabalhos tem reforçado a relação entre indivíduos com doença periodontal e o aumento do risco para desenvolver aterosclerose (BECK; OFFENBACHER, 2005; KOLLVEIT; ERIKSEN, 2001).

Mackenzie e Millard (1963) investigaram a relação entre diabetes e aterosclerose com a presença de cálculos e perda óssea alveolar. Como resultado deste estudo, 62% dos pacientes com aterosclerose apresentaram mais perda óssea do que os pacientes saudáveis.

Vários estudos têm sugerido uma possível associação entre as doenças periodontais e a extensão e severidade das doenças cardiovasculares (BECK et al., 1996; DESTEFANO et al., 1993; MATTILA et al., 1989; MATTILA et al., 1993; MATTILA et al., 1995).

Segundo Slots (1998) a busca de informações microbiológicas para determinar a relação entre as doenças periodontais e doenças cardiovasculares, dependeria da capacidade de se evidenciar as mesmas

bactérias orais no processo aterosclerótico. Dentre as bactérias orais deveriam ser incluídas no grupo de patógenos periodontais as espécies de *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (Aa), *Porphyromonas gingivalis* (Pg), *Prevotella intermédia* (Pi), *Tannerella forsythensis* (Tf) e *Treponema denticola* (Td).

A doença periodontal apresenta-se como uma das mais destacadas formas de reservatório bacteriano e de disseminação das bacteremias. Em dois trabalhos realizado por Overholser, Moreillon e Glauser (1987, 1988) com extração de dentes em camundongos com e sem doença periodontal, foi possível observar maior incidência de “surto de bacteremias” no grupo com doença periodontal (95%) contra 75% do grupo com saúde.

O grau de inflamação periodontal é suficiente para desencadear uma resposta inflamatória sistêmica que é evidente com o aumento dos níveis dos marcadores inflamatórios, principalmente a Proteína C-reativa (PCR) (CHEN et al., 2006; PUPIM et al., 2004; RAHMATI et al., 2002).

Uma recente revisão realizada por Paraskevas, Huizinga e Loos (2008) explorou os estudos que mostram um nível elevado da proteína C-reativa (PCR) em pacientes com periodontite. Os critérios de eleição das publicações foram: estudos de caso-controle em humanos (avaliação dos níveis de PCR em pacientes com doença periodontal), estudos longitudinais (avaliando nível da PCR após pelo menos 1 mês de tratamento), avaliação de alta sensibilidade para PCR e pacientes com nenhuma desordem sistêmica (incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e/ou aterosclerose). Foram identificados inicialmente 448 estudos e, após checagem das referências, resultou em 18 artigos. A maioria dos estudos mostrou níveis mais elevados da PCR em pacientes com

periodontite, quando comparados aos controles (sem doença). Os estudos também mostraram níveis de PCR superiores a 2,1mg/L, em pacientes periodontalmente comprometidos. Seis estudos mostraram a redução significativa dos níveis de PCR após terapia periodontal. E como conclusão, os autores reafirmam a interrelação da doença periodontal com os níveis elevados da proteína C-reativa e apresentam modesta evidência do efeito da terapia periodontal na redução dos níveis sistêmicos da proteína.

Outro marcador inflamatório importante é a Interleucina-6 (IL-6). A elevação do nível sistêmico deste marcador está associada a episódios de angina instável e com quadro clínico de doença cardiovascular. Por alguns autores, esta interleucina é considerada como fator de risco cardiovascular (BIASUCCI et al., 1996; MENDALL et al., 1997).

Loos et al. (2000) realizaram um estudo com o objetivo de mensurar os níveis sistêmicos dos principais marcadores inflamatórios para as doenças cardiovasculares (PCR, IL-6 e contagem de leucócitos), em pacientes com e sem doença periodontal crônica. O estudo contou com 150 pacientes, destes 54 tinham periodontite generalizada, 53 periodontite localizada, e um grupo controle com 43 pacientes com saúde bucal. Foram excluídos do estudo os pacientes que possuíam alguma alteração sistêmica, grávidas e que tivesse sido submetido a extrações dentárias recentemente. Os resultados mostraram uma diferença estatisticamente significativa dos níveis de PCR, IL-6 e leucócitos para os pacientes com doença periodontal, quando comparados ao controle. Os autores concluíram que essa elevação dos níveis dos marcadores inflamatórios pode aumentar a atividade inflamatória nas lesões

ateroscleróticas, com aumento do risco de eventos cardíacos e cerebrovasculares.

Chiu (1999) verificou a presença de periodontopatógenos em carótidas humanas. Neste estudo o autor investigou a presença de múltiplos agentes infecciosos em 33 espécies de carótidas, por meio de imunocorantes com anticorpos específicos. Ao final do estudo foram detectados 63,6% de *Chlamydia pneumoniae* (*C pneumoniae*), 42% de citomegalovírus, 9% de vírus do Herpes simples, 42% de *Porphyromonas gingivalis* e 12% de *Streptococcus sanguis*.

Estudos em animais mostraram que a *Porphyromonas gingivalis* pode induzir agregação plaquetária, aumentar as lesões ateroscleróticas e acelerar o processo aterosclerótico inicial em ratos, geneticamente modificados (HERZBERG; MEYER, 1996; LALLA et al., 2003; LI et al., 2002). Também foi observado que a *Porphyromonas gingivalis* pode invadir células endoteliais de artérias coronárias e estar envolvida na imunoregulação do processo aterosclerótico, segundo Choi et al. (2002) e Dorn, Dunn Jr e Progluske-Fox (1999).

Haraszthy et al. (2000) identificaram a presença de periodontopatógenos em placas de ateromas, os autores selecionaram 50 pacientes, com idade média de 69 anos, com estenose na carótida e necessidade de endarterectomia. As amostras das placas, obtidas cirurgicamente, foram acondicionadas em frascos com 10ml de solução salina, para posterior análise microbiológica. No laboratório foi realizada a técnica de amplificação do DNA bacteriano e a reação em cadeia de polimerase (PCR), para identificação das espécies. O resultado da análise microbiológica mostrou que 80% das placas

foram positivas para uma ou mais espécie bacteriana. 38% foram positivas para *Cytomegalovírus humano* e 18% para *Chlamydia pneumoniae*, 30% foram positivas para *Tannerella forsythensis*, 26% para *Porphyromonas gingivalis*, 18% para *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* e 14% para *Prevotella intermédia*. Ao final deste estudo, os autores concluíram que a presença de periodontopatógenos, bem como, outros microorganismos infecciosos, nas placas ateroscleróticas, pode ter um papel importante no desenvolvimento e progressão de aterosclerose, levando a uma doença vascular coronariana e outras seqüelas clínicas.

Em outra pesquisa, Haraszthy (2001) examinaram 93 ateromas de carótida obtidos durante endarterectomia em 66 indivíduos (18 mulheres e 48 homens) da população alemã, com idade variando de 43 a 89 anos. Seguindo a mesma metodologia do estudo anterior, as amostras de carótida foram analisadas pela reação em cadeia de polimerase (PCR) para alguns agentes infecciosos e alguns patógenos periodontais. Como resultado, os autores observaram que 93% dos ateromas foram positivos para um ou mais microorganismos, sendo que 30% foram positivos para *citomegalovírus*, 25% para *vírus Herpes simples* e 23% para *Chlamidia pneumoniae*. Analisando os patógenos periodontais foi possível observar positividade em 39% dos ateromas para pelo menos um patógeno, sendo 26% positivos para *Tannerella forsythensis*, 25% para o *Porphyromonas gingivalis*, 13% para *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, 16% para *Prevotella intermedia* e 2% para o *Campylobacter rectus*. Os autores concluíram que a infecção periodontal pode ter papel na aterogênese.

Stelzel et al. (2002) investigaram biópsias de tecido aórtico quanto à detecção do DNA de periodontopatógenos (*Porphyromonas gingivalis* e *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*) pela técnica da reação em cadeia de polimerase. Neste estudo foram selecionadas 26 amostras de aorta, durante os procedimentos de cirurgias cardíacas. O material coletado foi analisado, por meio de PCR, quanto à presença dos periodontopatógenos. Vinte e três das vinte e seis amostras apresentaram DNA bacteriano, sendo encontrado, neste estudo, somente DNA de *Porphyromonas gingivalis*. Para os autores o resultado indicou uma ligação entre a entrada de patógenos periodontais no sistema vascular e a doença periodontal, apesar de só ter sido encontrado uma das bactérias analisadas.

Dias (2002), analisou microbiologicamente pela técnica da reação em cadeia de polimerase os balões retirados de pacientes submetidos a angioplastias coronarianas e que apresentavam quadro clínico de doença periodontal crônica. Também foram analisadas amostras do biofilme dos sítios periodontalmente comprometidos. O objetivo foi correlacionar os microorganismos bucais presentes nos balões de angioplastias, à presença destes nas amostras intra-orais dos mesmos pacientes. Em relação aos patógenos periodontais, 37,7% dos 61 balões foram positivos para pelo menos 1 patógeno periodontal. 28,6% foram positivos para *Porphyromonas gingivalis*, 8,2% foram positivos para *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, 20,4% foram positivos para *Tannerella forsythensis*, 22,4% foram positivos para *Prevotella intermedia* e 24,5% foram positivos para *Campylobacter rectus*. Dos 61 pacientes, apenas 20 tiveram amostras intra-orais analisadas quanto à presença dos microorganismos periodontopatogênicos. Após analisar a

presença de patógenos periodontais nos balões e associar a sua presença nas amostras de biofilme intra-orais, os autores chegaram aos seguintes resultados: o patógeno *Porphyromonas gingivalis* esteve presente tanto nos balões quanto no biofilme, no mesmo paciente, em 45% (9) dos casos; para o patógeno *Tannerella forsythensis* esta associação esteve presente em 40% (8); os patógenos *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* e *Prevotella intermedia* não tiveram associação estatisticamente significativa e para *Campylobacter rectus* a associação esteve presente em 30% (6) dos casos. O estudo conclui que a presença dos patógenos periodontais nas placas ateroscleróticas exerce um papel importante no início e/ou no desenvolvimento das lesões ateroscleróticas e, por conseguinte, na etiologia de algumas doenças cardiovasculares.

Cairo et al. (2004) avaliou a presença de periodontopatógenos em placas ateromatosas e a presença do DNA das bactérias em bolsas periodontais, nos mesmos pacientes. Foram selecionados um total de 52 pacientes, para a realização de endarterectomia de carótida, sendo divididos em 2 grupos: um grupo teste com 26 pacientes dentados e um grupo controle com 26 pacientes edêntulos. Um completo exame periodontal foi realizado, incluindo exame radiográfico panorâmico, e amostras subgengivais foram coletadas no grupo teste. As amostras subgengivais e as placas ateromatosas, coletadas durante o procedimento cirúrgico, foram analisadas utilizando a técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR), com primers específicos para cada espécie bacteriana. Os resultados mostraram que nas 52 amostras coletadas durante a endarterectomia, 12 (7 dentados e 5 edêntulos) foram excluídos por apresentar amplificação negativa de DNA. Nas amostras

subgengivais de 19 pacientes do grupo teste, *Tannerella forsythensis* foi encontrado em 79%, *Fusobacterium nucleatum* em 63%, *Prevotella intermédia* em 53%, *Porphyromonas gingivalis* em 37% e *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* em 5% dos casos. Nenhum DNA bacteriano foi encontrado, pela técnica de PCR, nas amostras das placas ateromatosas da carótida, em nenhum grupo de pacientes. Os autores concluíram que a presença de DNA dos periodontopatógenos nas placas ateromatosas não puderam ser confirmadas neste estudo e que nenhuma correlação pôde ser estabelecida entre as espécies bacterianas associadas à doença periodontal e a contribuição destas na formação de placas ateromatosas.

Fiehn et al. (2005) coletaram 79 amostras de placa ateromatosa, removidas da carótida ou da artéria femoral, durante procedimentos cirúrgicos de reconstrução vascular, em pacientes com idade variando de 51 a 89 anos, de ambos os sexos. O material coletado de 52 placas ateromatosas da bifurcação de carótida e 27 da artéria femoral foi meticulosamente preparado para cultivo de *Pg*, *Pi*, *Cr*, *Aa*, *Tf*, *Streptococos orais* e *Prevotella nigrescens* (*Pn*). Apenas 11 amostras de carótida e 13 de artéria femoral foram utilizadas para a extração de DNA e detecção das espécies bacterianas por meio de PCR. Ao final do estudo, nenhuma bactéria investigada cresceu em meio de cultura. Nas 24 amostras submetidas ao PCR foram detectados DNAs bacterianos de *Pi* em 100%, *Pn* em 8,3% e *Pg* em 4,17%. Com o estudo concluiu-se que não foi possível isolar as bactérias orais viáveis da placa ateromatosa, mas os dados confirmam que o DNA dos patógenos periodontais pôde ser encontrado nas placas ateromatosas.

Padilla et al. (2006) selecionaram 12 pacientes com periodontite crônica e diagnóstico clínico de obliteração das extremidades inferiores ou estenose da artéria carótida. Todos os pacientes foram submetidos ao procedimento cirúrgico de endarterectomia, uma semana após o exame periodontal que consistia da verificação da profundidade de sondagem, índice de placa, nível clínico de inserção, sangramento à sondagem e evidência de perda óssea radiográfica. As placas de ateroma foram coletadas e levadas para análise microbiológica, bem como as amostras de biofilme subgengival, das bolsas periodontais, coletadas por meio de cones de papel absorvente estéreis. A análise microbiológica do biofilme subgengival mostrou que em 9 amostras foram observadas associações de duas ou três espécies bacterianas e a *Pg* foi a espécie mais comum. *Tf* foi isolada em apenas 2 casos e *Aa* em 7 casos. Já na análise microbiológica das placas ateromatosas foi observado *Aa* em duas amostras. As demais bactérias não foram identificadas. Apesar da pequena porcentagem de identificação dos periodontopatógenos nas placas ateromatosas, os autores concluíram que a identificação de *Aa* no biofilme e nas placas dos mesmos pacientes pode indicar o papel dos patógenos periodontais na doença aterosclerótica.

Romano, Barbui e Aimetti (2007), fez um estudo semelhante foi realizado com o objetivo de identificar 5 periodontopatógenos (*Aa*, *Pi*, *Pg*, *Td* e *Tf*) em bolsas periodontais e em ateromas de carótida, nos mesmos pacientes. O estudo incluiu 21 pacientes com idade variando de 56 a 77 anos (8 mulheres e 13 homens), com pelo menos 12 dentes na boca e diagnóstico de doença periodontal crônica (caracterizada por bolsas periodontais com profundidade de sondagem maior e igual a 5mm). As amostras subgengivais foram coletadas

com cone de papel absorvente estéril e as placas ateromatosas foram adquiridas após procedimento cirúrgico de endarterectomia. Dos 21 pacientes, 3 foram excluídos por apresentarem resultado negativo após amplificação do DNA dos ateromas. As amostras de biofilme restantes foram positivas para pelo menos um patógeno periodontal. A prevalência de *Tf*, *Pg*, *Pi*, *Td* e *Aa*, nas amostras de biofilme, foram: 72,22%, 61,11%, 55,56%, 50% e 33%, respectivamente e nenhum DNA bacteriano foi encontrado nas placas ateromatosas analisadas. Como conclusão, a presença de periodontopatógenos nas placas de ateroma não foi confirmada neste estudo, portanto, nenhuma correlação pode ser feita entre as bactérias periodontais e os microorganismos envolvidos nas lesões ateroscleróticas.

Aimetti, Romano e Nessi (2007) analisou em 33 pacientes a presença de cinco periodontopatógenos (*Aa*, *Pi*, *Pg*, *Tf* e *Td*), tanto nos sítios com doença periodontal como nas placas ateroscleróticas coletadas por endarterectomia, nos mesmos pacientes. Os resultados deste estudo mostraram a presença de pelo menos uma das bactérias em todas as amostras periodontais. DNA bacteriano foi encontrado em 31 das 33 amostras de placa aterosclerótica. Entretanto, nenhuma das amostras foi positiva, para a presença de DNA bacteriano dos patógenos periodontais testados.

Em outro estudo Pucar et al. (2007) identificaram bactérias periodontais em amostras de artéria coronária de pacientes com aterosclerose através da PCR. Os resultados demonstraram que nas 15 amostras foram detectadas: *P. gingivalis*, *P. intermedia*, *T. forsythia* e *A. actinomycetemcomitans*. Os autores concluíram que microorganismos

periodontais podem ter uma associação no desenvolvimento e progressão da aterosclerose.

Elkaïm et al. (2008) investigaram a presença de 20 patógenos periodontais nas lesões ateroscleróticas e em vasos sanguíneos saudáveis, e associaram esta condição aos aspectos clínicos e microbiológicos. Vinte e dois pacientes foram incluídos neste estudo, respeitando os seguintes critérios de inclusão: pelo menos 14 dentes naturais, o paciente não poderia ter sido submetido a tratamento periodontal nos 6 meses prévios ao estudo, não ter feito uso de antibióticos 6 meses antes e não apresentar nenhuma outra alteração sistêmica. Antes do procedimento cirúrgico, foram avaliados os parâmetros clínicos periodontais índice de placa (IP), índice gengival (IG), sangramento sulcular à sondagem (SS), profundidade de sondagem (PS), retração gengival (RG) e perda de inserção (PI). Todos os pacientes com doença periodontal foram divididos em 2 grupos baseados em 3 critérios: média de PS, média de PI e porcentagem dos sítios com PS $\geq$ 4mm. 11 pacientes com média de PS das bolsas < 3 mm, PI < 4 mm e porcentagem de sítios com PS $\geq$ 4mm menor que 20%, foram incluídos no grupo periodontite crônica moderada generalizada. Os 11 pacientes restantes que apresentaram média de PS > 3 mm, média de PI > 4 mm e porcentagem de sítios com PS $\geq$ 4mm maior que 20%, foram incluídos no grupo periodontite crônica severa generalizada. As amostras bacterianas subgengivais foram coletadas das 4 bolsas mais profundas de cada paciente, utilizando cones de papel absorvente para posterior extração de DNA. Durante a cirurgia de ponte de safena, realizada um dia após o exame periodontal, foram coletadas placas de ateromas, amostras da camada interna das artérias mamárias saudáveis e

amostras das veias safenadas, para em seguida ser feita a análise microbiológica. Com relação às amostras periodontais, os resultados mostraram que 16 das 20 espécies bacterianas analisadas foram mais prevalentes no grupo com periodontite severa. *Porphyromonas gingivalis* e *Fusobacterium nucleatum* foram as bactérias detectadas em maiores níveis em ambos os grupos. Com relação às amostras vasculares, comparando os grupos, não houve diferença estatística significativa em relação a prevalência de alguma das 20 espécies nas artérias mamárias. Diferenças significantes apareceram em 9 das 20 bactérias nas veias safenadas e para a prevalência de *Campylobacter rectus* e *Eikenella corrodens* nas placas de ateromas. Foi nítida a maior prevalência de bactérias no grupo com periodontite severa quando comparada ao grupo com periodontite moderada. Os autores concluíram que a presença dos patógenos periodontais nas placas ateroscleróticas e nos vasos aparentemente saudáveis, reflete o alto nível de bacteremia, levando a infecção das células endoteliais.

Mesmo diante da vasta literatura apresentada mostrando a presença do DNA bacteriano em placas ateromatosas, a sua contribuição para o início e progressão da doença aterosclerótica ainda precisa ser comprovada.

3 PROPOSIÇÃO

Este estudo teve como proposição avaliar a presença de bactérias do complexo vermelho: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*, nas amostras de ateroma provenientes da artéria coronária através de endarterectomia coronariana de pacientes com doença cardiovascular e periodontite crônica.

4 MATERIAL E MÉTODOS

O protocolo de pesquisa e o termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo A). O paciente ou responsável autorizou sua participação ao assinar o termo de Consentimento.

4.1 Seleção da amostra

Foram selecionados do SUS, 28 pacientes (22 homens e seis mulheres), diagnosticados após o exame de cateterismo e diagnóstico de Doença Aterosclerótica Coronariana Obstrutiva (DACO), tal doença é caracterizada por um quadro clínico de estenose arterial maior ou igual a 70% de obstrução da luz do canal e isquemia evidenciada e periodontite crônica, com média de idade de 61 anos, que seriam submetidos à cirurgia de endartectomia e revascularização coronariana no Hospital Evangélico da Cidade de Londrina, Paraná, no período de março de 2005 a março de 2007. Antes da cirurgia cardíaca, os pacientes foram submetidos a anamnese, exame clínico periodontal, com a realização de um periograma, de acordo com a disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.

Foram considerados critérios de inclusão: não deveriam ter sido submetidos à antibioticoterapia, nem a tratamento periodontal nos três últimos

meses prévios à realização da cirurgia. Possuírem, no mínimo, seis dentes na cavidade bucal, e não serem diabéticos. Os pacientes portadores de periodontite crônica apresentavam pela perda de inserção ≥ 5 mm em 30% dos dentes presentes (TONETTI; CLAFFEY, 2005).

Um único examinador treinado e experiente, através do coeficiente de correlação intra-classe, realizou todos os exames clínicos no centro de Hemodinâmica do Hospital, em uma sala de preparação pré-operatória, sob a condição de iluminação (Luz branca ambiente) e posição (cama de repouso reclinável) adequadas para o exame. Um auxiliar odontológico foi responsável pela anotação dos dados na ficha.

Utilizando um espelho clínico plano¹, e uma sonda milimetrada manual², os sulcos/bolsas foram examinados em seis sítios por dente (faces méso-lingual, lingual, distolingual, méso-vestibular, vestibular e disto-vestibular) em todos os dentes permanentes.

Os seguintes parâmetros clínicos foram registrados:

1. Profundidade clínica de sondagem (PCS): distância (mm) compreendida entre a margem gengival e o fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal.
2. Distância da linha esmalte-cimento à margem gengival (LEC-MG): distância (mm) que vai da linha esmalte-cimento à margem gengival. Se a LEC estivesse localizada apicalmente à margem gengival, o parâmetro receberia um valor negativo.

¹ Espelho nº #5, Hu Friedy, Chicago, IL, USA

² PCPUNC – 15, Hu Friedy, Chicago, IL, USA

3. Nível clínico de inserção (NCI): é o valor correspondente à soma dos valores de PCS e LEC-MG³.

Após todos os procedimentos iniciais, os pacientes ou responsáveis autorizarão sua participação ao assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

4.2 Coleta do ateroma

As placas de ateroma das artérias coronárias foram coletadas através de um procedimento denominado endarterectomia coronariana. A endarterectomia é realizada nos casos em que o leito distal coronariano é totalmente comprometido pela arteriosclerose, o cirurgião ira remover toda a placa arteriosclerotica (incluindo alguns ramos) na sua totalidade através da incisão inicialmente praticada na artéria coronária a ser revascularizada. Geralmente obtem-se um fragmento único que nada mais é que o interior do vaso coronariano, contendo intima e parte média juntamente, evidentemente com toda a placa arteriosclerotica. Em seguida é realizada a revascularização do miocárdio.

O procedimento cirúrgico de endarterectomia coronariana foi realizada pelo cirurgião cardíaco Prof. Dr. Francisco Gregori Júnior e equipe da Universidade Estadual de Londrina - Paraná. Essas amostras foram armazenadas imediatamente em tubos estéreis com 5 ml de RNAlater⁴,

³ NCI = PCS + (LEC-MG)

⁴ Ambion, Applied Biosystem, Foster CT, USA

acondicionados em um congelador a -20°C e transferidos ao Laboratório de Patologia Molecular da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, para o processamento.

4.3 Extração do DNA

Método de extração com digestão enzimática:

Aproximadamente 100 mg de tecido foram utilizados para a extração do DNA que foi obtido através do Kit de Extração para Tecido ChargeSwitch⁵ gDNA Mini Tissue Kit de acordo com as instruções do fabricante.

O protocolo para este método de extração de DNA foi baseado no método descrito por Isola et al. (1994).

Serão adicionados aos tubos 400µl de tampão de lise (NaCl 1M; Tris-HCl pH 8,0 1M; EDTA 0,5M pH8, 0; SDS 10%) estéril e proteinase K na concentração final de 500µg/ml. Os tubos serão mantidos a 55°C em banho maria por 3 dias até a completa dissolução do tecido. Serão adicionados 30µl de proteinase K a 250µg/ml em intervalos de 24 horas, e os tubos serão invertidos uma vez ao dia. A enzima será inativada por aquecimento a 95°C durante 10 minutos. O DNA será purificado utilizando-se 1ml de solução de fenol saturado e tamponado (pH8,0) e os tubos homogeneizados e em seguida centrifugados a 850 xg por 20 minutos, à TA, quando o sobrenadante será transferido para outro tubo semelhante. Será então acrescentado 1ml de solução de fenol: clorofórmio: álcool isoamílico (25:24:1) repetindo-se então o

⁵ Invitrogen do Brasil, LTDA, São Paulo, São Paulo, Brazil.

mesmo processo de homogeneização e centrifugação e por fim 1ml de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1). O sobrenadante final será transferido para outro tubo onde será feita a precipitação do DNA adicionando-se etanol absoluto gelado (2 a 3x o volume do sobrenadante) e acetato da amônia 7M (1/10 do volume do sobrenadante) que permanecera a -20°C por 18 horas. Será realizada centrifugação a 18.300 xg por 20 minutos, a 4°C, e o precipitado obtido será lavado com etanol a 70%. Após evaporação do etanol a temperatura ambiente o precipitado será dissolvido em 50µl de TE (Tris-HCL 10mM pH7,4 e EDTA 1mM pH8,0) e mantido a 4°C até a quantificação.

4.4 Detecção Bacteriana por PCR

As amostras de DNA foram amplificadas pela técnica da PCR utilizando-se iniciadores específicos baseados na seqüência do gene 16S rRNA, sintetizadas para *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Treponema denticola*, pela Invitrogen⁵ conforme Ashimoto et al. (1996). As amplificações foram realizadas em volume final de 25 µL contendo 2,5 µl de 10 X PCR buffer,⁵ 1,0 µl of MgCl₂ (50 mM),⁵ 1,0 µl de dNTP mix (0,2 mM),⁵ 1,0 µl de cada iniciador específico (0,4 M),⁵ 0,25 µl *Taq* Platinum DNA polymerase (0,5U),⁵ e 2 µl de DNA das amostras. A reação de amplificação foi realizada em um termociclador⁶ programado para 94°C por cinco minutos, 30 ciclos de 94°C

⁵ Invitrogen do Brasil, LTDA, São Paulo, São Paulo, Brazil.

por 30 segundos, temperatura de anelamento adequada para cada par de iniciadores (Quadro 4.1) por 30 segundos; 72°C por 30 segundos e 72°C por 5 minutos para a extensão final do DNA.

Os controles positivos foram DNA de cultura pura de bactérias: *Porphyromonas gingivalis* ATCC 33277, *Tannerella forsythia* ATCC 43037, *Treponema denticola* ATCC 33520. O controle negativo foi composto por todos os reagentes presentes na reação e isento do DNA genômico.

O produto de amplificação (10 µl) foi observado por eletroforese (70 V por 2,5 horas) em gel de agarose 2%, e corado com brometo de etídio a 0,5 µg/ml e fotografado sob um transluminador de luz ultravioleta⁷. Como marcador molecular foi usado 1-kb plus DNA ladder⁵.

Bactéria alvo	Sequência dos Iniciadores (5' --- 3')	Temperatura de anelamento	Amplificação (pb)	Referência
Universal Primers 16S rRNA	AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG CAA TAC TCG TAT CGC CCG TTA TTC	60 °C	1500	Amano et al. (1999)
<i>P. gingivalis</i>	AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT	60 °C	404	Ashimoto et al. (1996)
<i>T. forsythia</i>	GCC TAT GTA ACC TGC CCG CA TGC TTC AGT GTC AGT TAT ACC T	60 °C	641	Ashimoto et al. (1996)
<i>T. denticola</i>	TAA TAC CGA ATG TGC TCA TTT ACA T TCAAAG AAG CAT TCC CTC TTC TTC TTA	55 °C	316	Ashimoto et al. (1996)

Quadro 4.1 - Bactéria alvo, sequência dos primers, temperatura de anelamento, pares de base e referência

⁶ Perkin Elmer, Gene Amp PCR System 9700, Norwalk, CT, USA

⁷ Fotodyne, Inc Hartland, WI

5 RESULTADOS

Participaram deste estudo 28 pacientes sendo 22 homens (77%) e 6 mulheres (23%) com idade média de 61 anos, portadores de doença cardiovascular e periodontite crônica. O DNA das amostras de ateroma foi amplificado com primers universais. Todos os controles positivos apresentaram a amplificação esperada para os iniciadores específicos.

A detecção das taxas de espécies bacterianas nas placas de ateromas foi realizada por PCR e descritas na tabela 5.1 e gráfico 5.1. A prevalência de periodontopatógenos do complexo vermelho no ateroma foi de 50% para *P. gingivalis* (14 placas), 7,1% para *T. forsythia* (duas placas) e apenas 3,6% para *T. denticola* (uma placa).

Tabela 5.1 – Prevalência de bactérias presentes em ateroma

BACTÉRIA	PACIENTES	
	Nº	%
<i>P. gingivalis</i>	14	50,0
<i>T. forsythia</i>	2	7,1
<i>T. denticola</i>	1	3,6

Gráfico 5.1 – Prevalência de bactérias presentes em ateroma

6 DISCUSSÃO

Várias pesquisas têm sugerido uma possível associação entre as doenças periodontais e a extensão e severidade das doenças cardiovasculares (BECK et al., 1996; DESTEFANO et al., 1993; MATTILA et al., 1989; MATTILA et al., 1993; MATTILA et al., 1995). Entretanto, uma completa evidência ainda não foi estabelecida neste campo, principalmente, porque outros estudos que questionam esta associação têm sido publicados nos últimos anos (HUJOEL et al., 2000, 2001, 2002; ROMANO; BARBUI; AIMETTI, 2007).

O que se observa é que a ligação entre os dois processos imunoinflamatórios, a doença periodontal e aterosclerose, permanece como um tópico controverso, tendo a relação de causalidade como ponto principal, destacando qual o real significado sistêmico da infecção periodontal. Recentemente, alguns estudos não dão suporte a esta associação, afirmando que são necessários estudos longitudinais mais bem controlados, que envolvam populações mais homogêneas e com análises microbiológicas mais específicas para os patógenos periodontais (KHADER; ALBASHAIREH; ALOMARI, 2004; NAKIB et al., 2004).

Mecanismos biológicos plausíveis para explicar esta relação foram desenvolvidos. Mediadores da doença inflamatória bucal poderiam entrar na circulação sanguínea por meio do tecido gengival altamente vascularizado, aderindo na placa ateromatosa e desencadeando uma inflamação com ruptura desta placa, formando um coágulo que impede a circulação sanguínea e causa um infarto (BECK et al., 1998).

A etiologia da doença cardiovascular e da doença periodontal é multifatorial e, na literatura, encontramos os chamados fatores de risco clássicos que em muitos casos são os mesmos como: idade avançada, gênero masculino, tabagismo, diabetes e baixa condição socioeconômica. Mas, alguns trabalhos epidemiológicos mostraram pacientes com doença cardiovascular que não apresentavam nenhum destes fatores considerados de risco (HARASZTHY et al., 2000). A Academia Americana de Periodontologia considera a doença periodontal um fator que pode contribuir na etiopatogenia da doença cardiovascular, sendo comparável a fatores de risco como tabagismo, diabetes, hipertensão e alto teor de triglicérides (SCANNAPIECO, 1998).

Estudos de Joshipura et al. (2003), Kozarov et al. (2006), Lindsberg e Grau (2003), Page (1998) e Pussinen e Mattila (2004) têm mostrado a doença periodontal como um fator de risco para o desenvolvimento de outras condições sistêmicas e interferindo no curso da doença periodontal como fatores modificadores.

Quanto à identificação de patógenos periodontais como, *P. gingivalis*, *T. forsythia* e *T. denticola* em placas de ateromas pela PCR, neste estudo é importante considerar que, a detecção ocorre somente pela presença do DNA bacteriano e não pelas células bacterianas viáveis, representativas de uma espécie patogênica periodontal. Portanto, é possível que apenas algumas seqüências de ácidos nucleicos de uma célula bacteriana degradada estejam acumuladas em ateromas que ocluem as artérias, sem produzir injúrias no endotélio (HARASZTHY et al., 2000).

Socransky, Smith e Haffajee (2002) descreveram que os principais agentes etiológicos considerados da periodontite crônica são os microrganismos do complexo vermelho: *P. gingivalis*, *T. forsythia* e *T. denticola*. Em nosso estudo, a prevalência destes microrganismos, apresentou uma alta taxa (*P. gingivalis* 50,0% - 14 pacientes, *T. forsythia* 7,1% - 02 pacientes e *T. denticola* 3,6% - 01 paciente). A presença de *P. gingivalis* em ateromas de pacientes com periodontite em 50% dos casos está de acordo com dados mostrados de Ishihara et al. (2004) e Pucar et al. (2007) que demonstraram ser estatisticamente significativa a presença de *P. gingivalis* em amostras de placa de artérias coronárias. Esta bactéria é capaz de invadir células endoteliais, podendo levar ao acúmulo de plaquetas e fibrina dentro dos vasos cardíacos (DESHPANDE; KHAN; GENCO, 1998), sendo este, um achado importante.

As placas mais profundas do ateroma, que possuem uma baixa tensão de oxigênio, proporcionam o crescimento de anaeróbios. Estas considerações conduzem a hipótese de que os patógenos periodontais anaeróbios podem ser importantes na patogenia do ateroma, não somente durante a sua iniciação, como também, durante a progressão da doença cardíaca. (FIEHN et al., 2005).

A grande dificuldade nos estudos que relacionam periodontopatógenos com aterosclerose é estabelecer se as bactérias são residentes ou transitórias, o que poderia determinar as diferenças nas taxas de detecção em vários estudos (ISHIHARA et al., 2004; TAYLOR-ROBINSON et al., 2002).

Nossos resultados estão de acordo com Ishihara et al. (2004) e Padilla et al. (2006) que detectaram a presença de *P. gingivalis* e *T. forsythia* em diferentes taxas. A presença *T. denticola* em 3,6% das amostras é inferior aos dados de Ishihara et al. (2004) e Okuda et al. (2001) que detectaram este

microrganismo em 23,1% e 29,4% dos ateromas avaliados. Esta diferença na taxa de detecção poderia estar associada à existência bactérias residentes ou transitórias, ocorrência impossível de ser estabelecida.

Em complemento, nossos resultados são consistentes com aqueles previamente relatados por Pucar et al. (2007) que detectaram a presença de *P. gingivalis* em 53,3% e *T. forsythia* em 13,3% das placas de ateroma. Similarmente, Haraszthy et al. (2000) detectaram *T. forsythia* em 30% e *P. gingivalis* em 26% das placas de ateroma estudadas. Esses achados representam certa evidência de que patógenos periodontais podem entrar na circulação, causando uma bacteriemia transitória, e podem se alojar nas paredes das artérias.

O estudo de Beck et al. (1996) enfatiza que a periodontite é uma infecção crônica onde se geram níveis sistêmicos elevados de fatores de risco, tais como a proteína C-reativa, fibrinogênio e citocinas (IL-1 β , IL-6, TNF- α). Esses fatores quando elevados podem aumentar a atividade inflamatória nas lesões ateroscleróticas, aumentando potencialmente o risco dos eventos cardíacos. Embora na literatura mencionem-se diferenças na ocorrência de bactérias periodontopatogênicas em ateromas, certamente estas diferenças podem ser explicadas pelas diferentes populações estudadas, espécies microbianas subgengivais e a resposta imunológica (AIMETTI; ROMANO; NESSI, 2007).

O método de análise microbiológica por meio de amplificação do DNA, pela reação em cadeia de polimerase, foi escolhido devido ao fato deste teste ser o mais sensível de todos, além de ser mais simples e com resultados mais rápidos, quando comparado aos métodos de microscopia, cultura e sondas de

DNA (LOESCHE, 1992; WAHLFORS et al.,1995; ZAMBOR; HARASZTHY, 1995).

Os nossos resultados podem ajudar a reforçar a tese, de que a doença periodontal através dos agentes bacterianos, pode sim ser considerada um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular.

É importante ressaltar, como mostrado por D'Aiuto et al. (2004) o efeito sistêmico da terapia periodontal básica (raspagem e alisamento radicular) é suficiente para reduzir de forma significativa os níveis sistêmicos da proteína C-reativa (PCR) e da Interleucina-6 (IL-6), principais marcadores inflamatórios das doenças cardiovasculares.

Portanto, os pacientes devem ser orientados sobre os riscos da doença periodontal, que além de poder levar à perda do elemento dental, pode contribuir para o aparecimento ou agravamento de doenças sistêmicas, como é o caso da doença cardiovascular.

7 CONCLUSÃO

Dentro dos limites deste estudo, pôde-se concluir que:

Foram encontrados, nas amostras de ateroma analisadas, através da técnica da PCR, periodontopatógenos do complexo vermelho. Em 50% das amostras encontrou-se a presença de *P. gingivalis*, em 7.1% a presença de *T. forsythia* e em 3.6% das amostras, a presença de *T. denticola*.

REFERÊNCIAS¹

Aimetti M, Romano F, Nessi F. Microbiologic analysis of periodontal pockets and carotid atheromatous plaques in advanced chronic periodontitis patients. *J Periodontol* 2007;78(9):1718-23.

Amano A, Nakagawa I, Kataoka K, Morisaki I, Hamada S. Distribution of *Porphyromonas gingivalis* strains with *fimA* genotypes in periodontitis patients. *J Clin Microbiol* 1999;37(5):1426-30.

Ashimoto A, Chen C, Bakker I, Slots J. Polymerase chain reaction detection of 8 putative periodontal pathogens in subgingival plaque of gingivitis and advanced periodontitis lesions. *Oral Microbiol Immunol.* 1996;11(4):266-73.

Bayliss R, Clarke C, Oakley C, Somerville W, Whitfield AG. The teeth and infective endocarditis. *Brit Heart J* 1984;50(6):506-12.

Barak S, Oettinger-Barak O, Machtei EE, Sprecher H, Ohel G. Evidence of periopathogenic microorganisms in placentas of women with preeclampsia. *J Periodontol* 2007;78(4):670-6.

Beck J, Garcia R, Heiss G, Vokonas PS, Offenbacher S. Periodontal disease and cardiovascular disease. *J Periodontol* 1996; 67(10 Suppl):1123-37.

Beck JD, Offenbacher S. Systemic effects of periodontitis: Epidemiology of periodontal disease and cardiovascular disease. *J Periodontol* 2005;76(11 Suppl):2089-100.

Biasucci LM, D'Onofrio G, Liuzzo G, Zini G, Monaco C, Caligiuri G, et al. Intracellular neutrophil myeloperoxidase is reduced in unstable angina and acute myocardial infarction, but its reduction is not related to ischemia. *J Am Coll Cardiol* 1996;27(3):611-6.

Brasil. Ministério da Saúde. Indicadores e dados básicos – Brasil. 2005. Disponível em: URL: <http://www.datasus.gov.br/idb> [2008 09 08].

¹ De acordo com Estilo Vancouver. Abreviatura de periódicos segundo base de dados MEDLINE.

Braunwald E. Shattuck lecture – cardiovascular medicine at the turn of the millennium: Triumphs, concerns, and opportunities. *N Engl J Med* 1997;337(19):1360-9.

Brown JL, Loe H. Prevalence, extent, severity and progression of periodontal disease. *Periodontol 2000* 1993;2:57-71.

Cairo F, Gaeta C, Dorigo W, Oggioni MR, Pratesi C, Pini Prato GP, et al. Periodontal pathogens in atheromatous plaque. A controlled clinical and laboratory trial. *J Periodontal Res*. 2004;39(6):442-6.

Carmona IT, Diz Dios P, Scully C. An update on the controversies in bacterial endocarditis of oral origin. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2002;93(6):660-70.

Chen LP, Chiang CK, Chan CP, Hung KY, Huang CS. Does periodontitis reflect inflammation and malnutrition status in hemodialysis patients? *Am J Kidney Dis* 2006;47(5):815-22.

Chiu B. Multiple infections in carotid atherosclerotic plaques. *Am Heart J* 1999;138(5):534-6.

Choi JI, Chung SW, Kang HS, Rhim BY, Kim SJ, Kim SJ. Establishment of porphyromonas gingivalis heat-shock-protein-especific T-cell lines from atherosclerosis patients. *J Dent Res* 2002;81(5):344-8.

Conner HD, Haberman S, Collings CK, Winford TE. Bacteremias following periodontal scaling in patients with healthy appearing gingiva. *J Periodontol* 1967;38(6):466-72.

Contreras A, Herrera JA, Soto JE, Arce RM, Jaramillo A, Botero JE. Periodontitis is associated with preeclampsia in pregnant women. *J Periodontol* 2006;77(2):182-8.

Cruz JC, Nadanovsky P. Doenças periodontais causam doenças cardiovasculares? Análise das evidências epidemiológicas. *Cad Saúde Pública* 2003;19(2):357-68.

D'Aiuto F, Pakar M, Andreou G, Brett PM, Ready D, Tonetti MS. Periodontitis and atherogenesis: causal association or simple coincidence? *J Clin Periodontol* 2004;31(5):402-11.

Dasanayake AP, Boyd D, Madianos PN, Offenbacher S, Hills E. The association between *Porphyromonas gingivalis*-specific maternal serum IgG and low birth weight. *J Periodontol* 2001;72(11):1491-7.

De Servi S, Ricevuti G, Mazzone A, Ghio S, Zito A, Raffaghello S, et al. Granulocyte function in coronary artery disease. *Am J Cardiol* 1991;68(7):64B-68B.

Deshpande RG, Khan MB, Genco CA. Invasion of aortic and heart endothelial cells by *Porphyromonas gingivalis*. *Infect Immun* 1998;66(11):5337-43.

DeStefano F, Anda RF, Kahn HS, Williamson DF, Russell CM. Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality. *BMJ* 1993;306(6879):688-91.

Desvarieux M, Demmer RT, Rundek T, Boden-Albala B, Jacobs DR Jr, Sacco RL, et al. Periodontal Microbiota and Carotid Intima-Media thickness: The Oral Infections and Vascular Disease Epidemiology Study (INVEST). *Circulation* 2005;111(5):576-82.

Dias LZS. Doença periodontal como fator de risco para a doença cardiovascular. [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da UFRJ; 2002.

Dogan B, Buduneli E, Emingil G, Atilla G, Akilli A, Antinheimo J, et al. Characteristics of periodontal microflora in acute myocardial infarction. *J Periodontol* 2005;76(5):740-8.

Dorn BR, Dunn WA Jr, Progluske-Fox A. Invasion of human coronary artery cells by periodontal pathogens. *Infect Immun* 1999;67(11):5792-8.

Elkaïm R, Dahan M, Kocgozlu L, Werner S, Kanter D, Kretz JG, et al. Prevalence of periodontal pathogens in subgingival lesions, atherosclerotic plaques and healthy blood vessels: a preliminary study. *J Periodont Res* 2008;43(2):224-31.

Epstein SE, Zhou YF, Zhu J. Infections and atherosclerosis: emerging mechanistic paradigms. *Circulation* 1999;100(4):20-8.

Fiehn NE, Larsen T, Christiansen N, Holmstrup P, Schroeder TV. Identification of periodontal pathogens in atherosclerotic vessels. *J Periodontol* 2005;76(5):731-6.

Figueredo CM, Gustafsson A, Asman B, Bergtrom K. Increased release of elastase from in vitro activated peripheral neutrophils in patients with adult periodontitis. *J Clin Periodontol* 1999;26(4):206-11.

Fischer RG. Doença Periodontal e Doenças Cardiovasculares? In: Paiva JS, Almeida RV. *Periodontia: a atuação clínica baseada em evidências científicas*. 1ª. São Paulo: Artes Médicas; 2005. cap. 18, p. 285-94.

Fox CH. New considerations in the prevalence of periodontal disease. *Curr Opin Dent* 1992;2:5-11.

Garcia RI, Henshaw MM, Krall EA. Relationship between periodontal disease and systemic health. *Periodontol* 2000 2001;25:21-36.

Genco RJ. Cardiovascular disease and oral infections. In: AUTOR DO LIVRO. *Periodontal medicine*. Ontário: BC Decker; 2000. p. 63-82.

Gustafsson A, Asman B. Increased release of free oxygen radicals from peripheral neutrophils in adult periodontitis after Fc delta-receptor stimulation. *J Clin Periodontol* 1996;23(1):38-44.

Guyton AC. O músculo cardíaco: o coração como bomba. In: Guyton AC. *Tratado de fisiologia médica*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1992. p. 99-104.

Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. *Periodontol* 2000 1994;5:78-111.

Haynes WG, Stanford C. Periodontal disease and atherosclerosis: From dental to arterial plaque. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2003;23(8):1309-11.

Haraszthy VI, Zambon JJ, Trevisan M, Zeid M, Genco RJ. Identification of periodontal pathogens in atheromatous plaques. *J Periodontol* 2000;71:1554-60.

Haraszthy VI. Periodontal pathogens in atheromas from german population. *Ann Periodontol* 2001; 6(1):64.

Hasegawa K, Furuichi Y, Shimotsu A, Nakamura M, Yoshinaga M, Kamitomo M, et al. Associations between systemic status, periodontal status, serum cytokine levels, and delivery outcomes in pregnant women with a diagnosis of threatened premature labor. *J Periodontol* 2003;74(12):1764-70.

Herzberg MC, Meyer MW. Effects of oral flora on platelets: Possible consequences in cardiovascular disease. *J Periodontol* 1996;67(10 Suppl):1138-42.

Hujoel PP, Drangsholt M, Spiekerman C, DeRouen TA. Examining the link between coronary heart disease and the elimination of chronic dental infections. *J Am Dent Assoc* 2001;132(7):883-9.

Hujoel PP, Drangsholt M, Spiekerman C, DeRouen TA. Periodontal disease and coronary heart disease risk. *J Am Med Assoc* 2000; 284(11):1406-10.

Hujoel PP, Drangsholt M, Spiekerman C, DeRouen TA. Pre-existing cardiovascular disease and periodontitis: a follow-up study. *J Dent Res* 2002;81(3):186-91.

Isola J, DeVries S, Chu L, Ghazvini S, Waldman F. Analysis of changes in DNA sequence copy number by comparative genomic hybridization in archival paraffin-embedded tumor samples. *Am J Pathol* 1994;145(6):1301-8.

Ishihara K, Nabuchi A, Ito R, Miyachi K, Kuramitsu HK, Okuda K. Correlation between detection rates of periodontopathic bacterial DNA in coronary stenotic artery plaque and in dental plaque samples. *J Clin Microbiol* 2004;42(3):1313-5.

Joshiyura KJ, Hung HC, Rimm EB, Willett WC, Ascherio A. Periodontal disease, tooth loss, and incidence of ischemic stroke. *Stroke* 2003;34(1):47-52.

Kai H, Ikeda H, Yasukawa A, Kai M, Seki Y, Kuwahara F, et al. Peripheral blood levels of matrix metalloproteinases-2 and 9 are elevated in patients with acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol* 1998;32(2):368-72.

Khader YS, Albashaireh ZSM, Alomari MA. Periodontal diseases and risk of coronary hearth and cerebrovascular diseases: a meta-analysis. *J Periodontol* 2004;75(8):1046-53.

Kinane DF, Lowe GD. How periodontal disease may contribute to cardiovascular disease. *Periodontol* 2000 2000;23:121-6.

Kollveit KM, Eriksen HM. Is the observed association between periodontitis and atherosclerosis causal? *Eur J Oral Sci* 2001;109(1):2-7

Kozarov E, Sweier D, Shelburne C, Progulske-Fox A, Lopatin D. Detection of bacterial DNA in atheromathous plaques by quantitative PCR. *Microbes Infect* 2006;8(3):687-93.

Lafaurie GI, Mayorga-Fayad I, Torres MF, Castillo DM, Aya MR, Barón A, et al. Periodontopathic microorganisms in peripheric blood after scaling and root planning. *J Clin Periodontol* 2007;34(10):873-9.

Lalla E, Kaplan S, Chang SJ, Roth GA, Celenti R, Hinckley K, et al. Periodontal infection profiles in type 1 diabetes. *J Clin Periodontol* 2006;33(12):855-62.

Lalla E, Lamster IB, Hofmann MA, Bucciarelli L, Jerud AP, Tucker S, et al. Oral infection with a periodontal pathogen accelerates early atherosclerosis in apolipoprotein E-null mice. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2003;23(8):1405-11.

Li L, Messas E, Batista EL Jr, Levine RA, Amar S. Porphyromonas gingivalis infection accelerates the progression of atherosclerosis in a heterozygous apolipoprotein E-deficient murine model. *Circulation* 2002; 105(7):861-7.

Lindsberg PJ, Grau AJ. Inflammation and infections as risk factors for ischemic stroke. *Stroke* 2003;34:2518-32.

Lin D, Moss K, Beck JD, Hefti A, Offenbacher S. Persistently high levels of periodontal pathogens associated with preterm pregnancy outcome. *J Periodontol* 2007;78(5):833-41.

Loesche WJ. DNA probe and enzyme analysis in periodontal diagnostics. *J Periodontol* 1992;63(12):1102-9.

Loos BG, Craandijk J, Hoek FJ, Wertheim-van Dillen PM, van der Velden U. Elevation of systemic markers related to cardiovascular diseases in the peripheral blood of periodontitis patients. *J Periodontol* 2000;71(10):1528-34.

Mackenzie RS, Millard HD. Interrelated effects of diabetes, arteriosclerosis and calculus on alveolar bone loss. *JADA* 1963; 66:191-9.

Mattila KJ, Nieminen MS, Valtonen VV, Rasi VP, Kesäniemi YA, Syrjälä SL, et al. Association between dental health and acute myocardial infarction. *BMJ* 1989;298(6676):779-82.

Mattila KJ, Valle MS, Nieminen MS, Valtonen VV, Hietaniemi KL. Dental infections and coronary atherosclerosis. *Atherosclerosis* 1993;103(2):205-11.

Mattila KJ, Valtonen VV, Nieminen MS, Huttunen JK. Dental infections and the risk of new coronary events: prospective study of patients with documented coronary heart disease. *Clin Infect Dis* 1995;20(3):588-92.

Mendall MA, Patel P, Asante M, Ballam L, Morris J, Strachan DP, et al. Relation of serum cytokine concentrations to cardiovascular risk factors and coronary heart disease. *Heart* 1997;78(3):273-7.

Nakib SA, Pankow JS, Beck JD, Offenbacher S, Evans GW, Desvarieux M, et al. Periodontitis and coronary artery calcification: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. *J Periodontol* 2004;75(4):505-10.

Okuda K, Ishihara K, Nakagawa T, Hirayama A, Inayama Y. Detection of *Treponema denticola* in atherosclerotic lesions. *J Clin Microbiol* 2001;39(3):1114-7.

Overholser CD, Moreillon P, Glauser MP. Experimental bacterial endocarditis after dental extractions in rats with periodontitis. *J Infect Dis*. 1987;155(1):107-12.

Overholser CD, Moreillon P, Glauser MP. Experimental endocarditis following dental extractions in rats with periodontitis. *J Oral Maxillofac Surg* 1988;46(10):857-61.

Padilla C, Lobos O, Hubert E, Gonzalez C, Matus S, Pereira M, et al. Periodontal pathogens in atheromatous plaque isolated from patients with chronic periodontitis. *J Periodontol Res* 2006;41(4):350-3.

Page RC. The pathobiology of periodontal diseases may affect systemic diseases: inversion of a paradigm. *Ann Periodontol* 1998;3(1):108-20.

Paquette DW, Brodala N, Nichols TC. Cardiovascular disease, inflammation, and periodontal infection. *Periodontol* 2000 2007;44:113-26.

Paraskevas S, Huizinga JD, Loos BG. A systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in relation to periodontitis. *J Clin Periodontol* 2008;35(4):277-90.

Pucar A, Milasin J, Lekovic V, Vukadinovic M, Ristic M, Putnik S, et al. Correlation between atherosclerosis and periodontal putative pathogenic bacterial infections in coronary and internal mammary arteries. *J Periodontol* 2007;78(4):677-82.

Pupim LB, Caglar K, Hakim RM, Shyr Y, Ikizler TA. Uremic malnutrition is a predictor of death independent of inflammatory status. *Kidney Int* 2004;66(5):2054-60.

Pussinen PJ, Mattila K. Periodontal infections and atherosclerosis: mere associations? *Curr Opin Lipidol* 2004;15(5):583-8.

Rahmati MA, Craig RG, Homel P, Kaysen GA, Levin NW. Serum markers of periodontal disease status and inflammation in hemodialysis patients. *Am J Kidney Dis* 2002;40(5):983-9.

Romano F, Barbui A, Aimetti M. Periodontal pathogens in periodontal pockets and in carotid atheromatous plaque. *Minerva Stomatol* 2007;56(4):169-79.

Ross R. Atherosclerosis: an inflammatory disease. *N Engl J Med* 1999;340(2):115-26.

Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis. An update. *N Engl J Med* 1986;314:488-500.

Ross R, Glomset JA. The pathogenesis of atherosclerosis. *N Engl J Med* 1976;295:369.

Scannapieco FA. Position paper of The American Academy of Periodontology: periodontal disease as a potential risk factor for systemic diseases. *J Periodontol* 1998;69(7):841-50.

Sims TJ, Lernmark A, Mancl LA, Schifferle RE, Page RC, Persson GR. Serum IgG to heat shock proteins and *Porphyromonas gingivalis* antigens in diabetic patients with periodontitis. *J Clin Periodontol* 2002;29(6):551-62.

Slots J. Casual or causal relationship between periodontal infection and non-oral disease? *J Dent Res* 1998;77(10):1764-5.

Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. *J Clin Periodontol* 1998;25(2):134-44.

Socransky SS, Smith C, Haffajee AD. Subgingival microbial profiles in refractory periodontal disease. *J Clin Periodontol* 2002;29(3):260-8.

Souza AGMR, Staico R, Souza JEMR. Revascularização miocárdica percutânea: dos balões ao stents farmacológicos. *Stent Coronário: aplicações clínicas*. São Paulo: Atheneu; 2001. p. 1-10.

Stelzel M, Stelzel M, Conrads G, Pankuweit S, Maisch B, Vogt S, et al. Detection of *porphyromonas gingivalis* DNA in aortic tissue by PCR. *J Periodontol* 2002;73(8):868-70.

Taylor-Robinson D, Aduse-Opoku J, Sayer P, Thomas BJ, Curtis MA. Oro-dental bacteria in various atherosclerotic arteries. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2002;21(10):755-7.

Toledo BEC, Rossa Junior C. Influência das condições sistêmicas sobre as doenças periodontais e das doenças periodontais sobre as condições sistêmicas. In: Tunes UR, Rapp GE, coordenador. *Atualização em periodontia e implantodontia*. 3ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 1999. p. 30-60.

Tonetti MS, Claffey N. Advances in the progression of periodontitis and proposal of definitions of a periodontitis case and disease progression for use in risk factor research. *J Clin Periodontol* 2005;32 Suppl 6:210-3.

Valle PV, Baptista EM. Doenças da aorta. In: Valle PV, Baptista EM. Hemodinâmica e angiografia. São Paulo: Atheneu; 1996. p. 585-614.

Wahlfors J, Meurman JH, Väisänen P, Alakuijala P, Korhonen A, Torkko H, Jänne J. Simultaneous detection of *Actinobacillus actinomycetemcomitans* and *Porphyromonas gingivalis* by a rapid PCR method. J Dent Res 1995;74(11):1796-801.

Zambor JJ, Haraszthy VI. The laboratory diagnosis of periodontal infections. Periodontol 2000 1995;7(1):69-82.

Faculdade de Odontologia
Universidade de São Paulo

CEP/OF.270/02

São Paulo, 11 de outubro de 2002

Senhor Pesquisador

Informamos a Vossa Senhoria, que diante do Parecer de Aprovação do Comitê de Ética do Hospital Evangélico da Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina, estamos cientes da aprovação do projeto de pesquisa intitulado *"Avaliação microbiológica da presença do periodontopatógenos em arterioma de pacientes submetidos a endarterectomia coronariana e sua relação com a condição clínica periodontal"* de sua autoria, não havendo nenhuma oposição por parte deste CEP, com relação a sua realização.

Sendo o que se nos apresentava, valemo-nos da oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Profa.Dra. Célia Regina Martins Dolgado Rodrigues
Coordenadora do CEP-FOUSP

Ilustríssimo Senhor
Professor Doutor Giuseppe Alexandre Romito
Disciplina de Periodontia