Diego Pulzatto Cury

**Influência da sutura-U e de Kessler-Tajima associadas à
proteína F1 sobre o reparo do tendão calcâneo. Estudo
ultraestrutural, bioquímico e funcional.**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências Morfofuncionais do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo,
para obtenção do Título de Doutor em Ciências.

São Paulo

2018

Diego Pulzatto Cury

**Influência da sutura-U e de Kessler-Tajima associadas à
proteína F1 sobre o reparo do tendão calcâneo. Estudo
ultraestrutural, bioquímico e funcional.**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Morfofuncionais do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo, para
obtenção do Título de Doutor em Ciências.

Área de concentração: Ciências Morfofuncionais

Orientador: Prof. Dr. Ii-sei Watanabe

Versão corrigida

São Paulo

2018

CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Serviço de Biblioteca e informação Biomédica
do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

Ficha Catalográfica elaborada pelo(a) autor(a)

Cury, Diego Pulzatto
Influência da sutura-U e de Kessler-Tajima
associadas à proteína F1 sobre o reparo do tendão
calcâneo. Estudo ultraestrutural, bioquímico e
funcional. / Diego Pulzatto Cury; orientador Ii-sei
Watanabe. -- São Paulo, 2018.
144 p.

Tese (Doutorado) -- Universidade de São Paulo,
Instituto de Ciências Biomédicas.

1. Tendão. 2. Proteína F1. 3. Colágeno. 4.
Ultraestrutura. 5. Murf1, Atrogin1. I. Watanabe, Ii-
sei, orientador. II. Título.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Candidato(a): Diego Pulzatto Cury

Título da Tese: Influência da sutura-U e de Kessler-Tajima associadas à proteína F1 sobre o reparo do tendão calcâneo. Estudo ultraestrutural, bioquímico e funcional.

Orientador: Prof. Dr. Ii-sei Watanabe

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão pública realizada a ____/____/____, considerou o(a) candidato(a):

() **Aprovado(a)** () **Reprovado(a)**

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Presidente: Assinatura:
Nome:
Instituição:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"
Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 – CEP. 05508-000 São Paulo, SP Brasil
Telefone : (55) (011) 3091.7733 – e-mail: cep@icb.usp.br

CERTIFICADO

Certificamos que o protocolo registrado sob nº **16** nas fls. **16** do livro **03** para uso de animais em experimentação, sob a responsabilidade do Prof(a) Dr(a)) **li-sei Watanabe**, Coordenador (a) da Linha de pesquisa "*Influência da técnica de sutura de Kessler-Tajima e técnica modificada associada a proteína F1 sobre a regeneração do tendão calcâneo. Estudo ultraestrutural, bioquímico e funcional*" do qual participam o(s) aluno(s) **Diego Pulzatto Cury**, está de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e foi aprovado pela **COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA)** em **14.03.2014, com validade de 4 anos**.

São Paulo, 17 de março de 2014.

Prof. Dr. WOTHAN TAVARES DE LIMA
Coordenador-CEUA- ICB/USP

Profa. Dra. ANA PAULA LEPIQUE
Secretária- CEUA - ICB/USP

À minha avó Conceição Alves Pulzatto *in memoriam*
Aos meus pais José Mariano Cury Junior e Ivanda Pulzatto Cury.
Vocês são minha base para a realização de um grande sonho.
Amo vocês!

AGRADECIMENTOS

Não existem palavras que possam expressar meus sinceros agradecimentos aos meus pais, por todo o apoio e carinho na construção de meus sonhos. À minha irmã Nathália Pulzatto Cury e à minha tia Roseli Ap. Pulzatto de Oliveira que ao longo de toda essa jornada, desde o mestrado sempre apoiou e incentivou.

Ao Prof. Dr. Ii-sei Watanabe que abriu as portas do mundo científico para mim, agradeço por toda a confiança e pelos ensinamentos, me mostrou que ser ousado é bom, mas que também é preciso saber manter os pés no chão. Espero ter atingido as expectativas depositadas em mim, e pedir desculpas caso isso não tenha acontecido. Foi e continuará sendo um enorme prazer trabalhar com o senhor, fico honrado em poder carregar em meu currículo seu nome como mestre e orientador.

À Profa. Dra. Maria Luiza Moraes Barreto de Chaves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais, o qual estendo meus agradecimentos. Agradeço por toda a ajuda na execução dessa pesquisa, pelos conselhos profissionais e pessoais, pela confiança e amizade. A senhora é uma pessoa admirável.

As professoras Dra. Maria Inês Nogueira e Dra. Elen Haruka Miyabara e ao Prof. Dr. Anselmo Sigari Moriscot por permitirem que eu usasse seus laboratórios.

À Profa. Dra. Renata Frazão pela confiança e oportunidade de ser seu monitor nas aulas de anatomia para o curso de Odontologia, contribuindo imensuravelmente na minha formação docente.

Aos técnicos do Departamento de Anatomia do ICB/USP e amigos Sonia Regina Yokomizo de Almeida, Marta Maria da Silva Righetti, Kelly Patrícia Nery Borges, Sebastião Aparecido Boleta e Renivaldo de Souza que sempre ajudaram, facilitaram e muitas vezes executaram por mim, tarefas essenciais para este trabalho ser concluído.

À Rosana Duarte Prisco por toda assistência estatística, a Roberto Cabado, técnico do microscópio eletrônico de transmissão do Centro de Microscopia do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do ICB/USP.

Aos técnicos da Central Analítica do Instituto de Química da USP, Alfredo Duarte que além das ajudas, me deu o treinamento técnico de operação do microscópio eletrônico de varredura Jeol Neoscope JCM-5000, ao Victor Basile Astuto e Adriana Yamaguti Matsukuma.

Não poderia deixar de agradecer também a amiga e companheira de laboratório Bárbara Tavares Schäfer, pelas conversas, discussão de resultados, na ajuda com os experimentos, pelos cafés feitos na hora, conte comigo sempre.

Aos eternos amigos e companheiros de laboratório: Fernando José Dias e Carlos Alexandre dos Santos Haemmerle.

Aos amigos que acabaram se tornando irmãos: Miguel Antônio Xavier de Lima e João Guilherme de Oliveira Silvestre, serei eternamente grato por toda a ajuda, pela amizade muito além do departamento, eu sei que no decorrer dessa jornada me afastei e voltei. Agradeço por nunca terem desistido de mim, vocês foram o apoio essencial para modular tudo isso.

À amiga Tábata Leal Nascimento por toda a ajuda, pela amizade, pelas conversas divertidas, por sempre me ouvir pacientemente. Tenho certeza que você será uma profissional de excelência.

E aos amigos que tornaram as coisas mais fáceis e alegres: Luciano C. P. Campos Leonel (você é a melhor pessoa que existe, não deixe que a vida mude você), Manuela Miranda Rodrigues, Lucas Ariel Fernandes da Rocha, William José da Silva, André Cruz de Oliveira e Ismael Cabral Costa.

À Liz Anne Gonçalves Vaičiulis, ao longo desses anos foram tantos encontros e desencontros que no final dessa jornada um impensável reencontro aconteceu, agradeço por estar fazendo parte disso e por toda a compreensão e carinho.

Agradeço também o indispensável apoio das agências de fomento à pesquisa, CAPES e Fapesp (processo número: 2015/24087-3).

“A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez.”

George Bernard Shaw

“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.”

Isaac Newton

RESUMO

CURY, D.P. Influência da sutura-U e de Kessler-Tajima associadas à proteína F1 sobre o reparo do tendão calcâneo. Estudo ultraestrutural, bioquímico e funcional. [Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2018.

Tendões são descritos como tecido conjuntivo denso modelado que inserem os músculos aos ossos. Sua principal função é servir como tecido de transição das forças contráteis geradas pelos músculos aos ossos, podendo assim gerar movimentos. Entre todos os tendões, o calcâneo é um dos mais frequentemente lesados. As lesões ocorrem principalmente em homens e são mais frequentes entre a terceira e quarta década de vida. Dentre os vários métodos de sutura existentes, do ponto de vista clínico, a de Kessler-Tajima com os nós entre os cotos é muito utilizada por evitar o estrangulamento da microcirculação. Após a cirurgia o paciente retorna ao trabalho após 85 dias, em média, podendo atingir até 270 dias. O objetivo do presente estudo foi testar a eficiência da aplicação da proteína biocompatível F1, uma proteína extraída a partir do látex natural da *Hevea brasiliensis*, sobre tendões lesados, buscando uma melhora no reparo, assim como, a influência da sutura-U e de Kessler-Tajima. Alterações musculares decorrentes da lesão no tendão também foram avaliadas. Para isso, utilizamos ratos Sprague Dawley machos de 3 meses, que foram submetidos a tenotomia completa, a lesão foi corrigida com ambas as suturas, seguido da aplicação da proteína F1 e avaliados após duas e quatro semanas. As técnicas utilizadas para análises no tendão foram as de microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e transmissão, bem como, a síntese de colágeno tipos I e III, TIMP-1 e 2, MMP-2 e 9 por western blot. Para analisar as alterações musculares, a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 foram quantificadas por RT-qPCR, seguido de análises de contração muscular máxima e teste de fadiga. Os resultados sugerem uma melhora no reparo do tendão no grupo que utilizamos a sutura-U associada à proteína F1 após quatro semanas, devido ao aumento na síntese de colágeno tipo I e a diminuição de MMP-9, assim como, a capacidade de contração muscular máxima retorna aos níveis do grupo controle. A sutura-U também influencia menos na fadiga muscular.

Palavras-chave: Tendão, proteína F1, colágeno, ultraestrutura, MuRF1, Atrogin1.

ABSTRACT

CURY DP. Influence of the suture-U and Kessler-Tajima associated with F1 protein on the calcaneal tendon repair. Ultrastructural, biochemical and functional study. [Ph.D. Thesis (Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo; 2018.

Tendons are described as dense modeled connective tissue which insert the muscles to the bones. Its main function is to serve as transition tissue of the contractile forces generated by muscles to the bones, and thus generate movements. Among all the tendons, the calcaneal is the most frequently injured one. The lesions occur mainly in men and are more frequent between the third and fourth decade of life. Among the several existing suture methods, from a clinical point of view, the Kessler-Tajima with the nodes between the stumps is used to a great extent in order to avoid the microcirculations strangling. After surgery, the patient returns to work after 85 days, on average, and can reach up to 270 days. The objective of this study was to test the efficiency of the application of biocompatible F1 protein, a protein extracted from natural latex from the *Hevea brasiliensis*, on injured tendons, seeking an improvement in the repair, as well as the influence of the suture-U and Kessler-Tajima. Muscle changes arising from the tendon injury were also evaluated. For this reason, Sprague Dawley male rats at 3 months-old were used, which underwent complete tenotomy, the lesion was corrected with both sutures, followed by the application of protein and evaluated after two and four weeks. The techniques used for analyzes in the tendon were the light microscopy, scanning electron microscopy and transmission, as well as the synthesis of collagen types I and III, TIMP-1, -2, MMP-2, and -9 by Western blot. In order to analyze the muscular alterations, the expression of genes MuRF1 and Atrogin1 were quantified by RT-qPCR, followed by analysis of maximum muscle contraction and fatigue testing. The results suggest an improvement in the tendon repair in the group that the suture-U was used associated with protein after four weeks, due to the increase in the synthesis of collagen type I and the decrease of MMP-9, as well as the ability of maximum muscle contraction to return to the levels of the control group. The suture-U also influences on less muscle fatigue.

Keywords: Tendon, F1 protein, collagen, ultrastructure, MuRF1, Atrogin1

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

µm – Micrômetro

CO₂ – Dióxido de Carbono

Fig. – Figura

Figs. – Figuras

g – Grama

h – Hora

Hz – Hertz

IL - Interleucina

K2s – Grupo com a sutura de Kessler-Tajima analisado com duas semanas

K4s – Grupo com a sutura de Kessler-Tajima analisado com quatro semanas

kg – Quilograma

KP2s – Grupo com a sutura de Kessler-Tajima tratado com a proteína F1 analisado após duas semanas

KP4s – Grupo com a sutura de Kessler-Tajima tratado com a proteína F1 analisado após quatro semanas

kV – Quilovolt

M – Molar

MEC – Matriz extracelular

MET – Microscopia eletrônica de transmissão

MEV – Microscopia eletrônica de varredura

mg – Miligrama

min – Minuto

miR-29a – Micro RNA 29a

ML – Microscopia de luz

mL – Mililitro

mm – Milímetro

mN – Milinewton

N m – Newton-metro

NFκB – Fator Nuclear Kappa B

nm – Nanômetro

°C – Grau Celsius

RNA_m – Ácido ribonucleico mensageiro

seg – segundos

U2s – Grupo com a sutura-U analisado após duas semanas

U4s – Grupo com a sutura-U analisado após quatro semanas

UP2s – Grupo com a sutura-U tratado com a proteína F1 analisado após duas semanas

UP4s – Grupo com a sutura-U tratado com a proteína F1 analisado após quatro semanas

V – Volt

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Esquema da estrutura hierárquica do tendão.	20
Figura 2: Esquema da técnica de sutura de Kessler-Tajima.....	29
Figura 3: Esquema da técnica de sutura-U.....	29
Figura 4: Procedimento cirúrgico.....	31
Figura 5: Imagens estereoscópicas.....	39
Figura 6: Microscopia de luz do grupo controle. Corte longitudinal. Hematoxilina-Eosina.	40
Figura 7: Microscopia de luz do grupo controle. Corte transversal. Hematoxilina-Eosina.	40
Figura 8: Microscopia de luz dos grupos lesados U2s e UP2s. Cortes longitudinais. Hematoxilina-Eosina.	42
Figura 9: Microscopia de luz dos grupos lesados U2s e UP2s. Cortes transversais. Hematoxilina-Eosina.	44
Figura 10: Microscopia de luz dos grupos lesados K2s e KP2s. Cortes longitudinais. Hematoxilina-Eosina.	46
Figura 11: Microscopia de luz dos grupos lesados K2s e KP2s. Cortes transversais. Hematoxilina-Eosina.	47
Figura 12: Microscopia de luz dos grupos lesados U4s e UP4s. Cortes longitudinais. Hematoxilina-Eosina.	49
Figura 13: Microscopia de luz dos grupos lesados U4s e UP4s. Cortes transversais. Hematoxilina-Eosina.	50
Figura 14: Microscopia de luz dos grupos lesados K4s e KP4s. Cortes longitudinais. Hematoxilina-Eosina.	52
Figura 15: Microscopia de luz dos grupos lesados K4s e KP4s. Cortes transversais. Hematoxilina-Eosina.	53
Figura 16: Microscopia de luz de campo claro e sob polarização. Corte longitudinal.	56
Figura 17: Microscopia de luz de campo claro e sob polarização do grupo controle. Corte transversal.....	57
Figura 18: Microscopia de luz convencional e sob polarização dos grupos U2s e UP2s. Corte transversal.....	59
Figura 19: Microscopia de luz convencional e sob polarização dos grupos K2s e KP2s. Corte transversal.....	61
Figura 20: Microscopia de luz convencional e sob polarização dos grupos U4s e UP4s. Corte transversal.....	63

Figura 21: Microscopia de luz convencional e sob polarização dos grupos K4s e KP4s. Corte transversal.....	65
Figura 22: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal do grupo control	66
Figura 23: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal do grupo controle.	67
Figura 24: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal dos grupos U2s e UP2s	68
Figura 25: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal dos grupos U2s e UP2s	70
Figura 26: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal dos grupos K2s e KP2s	72
Figura 27: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal dos grupos K2s e KP2s	74
Figura 28: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal dos grupos U4s e UP4s	76
Figura 29: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal dos grupos U4s e UP4s	78
Figura 30: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal dos grupos K4s e KP4s	80
Figura 31: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal dos grupos K4s e KP4s	82
Figura 32: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais do grupo controle ..	83
Figura 33: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais do grupo controle	84
Figura 34: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais dos grupos U2s e UP2s	86
Figura 35: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais dos grupos U2s e UP2s	88
Figura 36: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais dos grupos K2s e KP2s	90
Figura 37: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais dos grupos U2s e UP2s	92
Figura 38: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais dos grupos U4s e UP4s	94
Figura 39: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais dos grupos U4s e UP4s	96

Figura 40: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais dos grupos K4s e KP4s	98
Figura 41: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais dos grupos K4s e KP4s	100
Gráfico 1: Peso dos tendões (g).....	102
Gráfico 2: Diâmetro dos tendões.....	104
Gráfico 3: Diâmetro das fibrilas colágenas (nm)	105
Gráficos 4: Frequência de distribuição das fibrilas colágenas (%)	107
Gráfico 5: Densidade de fibrilas colágenas (No/ μm^2).....	109
Gráficos 6: Quantificação de colágenos tipo I e III.....	111
Gráfico 7: Quantificação de TIMP-1, -2, MMP-2, -9	113
Gráfico 8: Peso dos músculos sóleos (g).....	115
Gráfico 9: Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 (fold)	117
Gráfico 10: Contração Muscular Máxima (mN/g)	118
Gráfico 11: Teste de fadiga muscular do grupo controle (mN).....	119
Gráfico 12: Teste de fadiga muscular dos grupos lesados e controle.....	120
Gráfico 13: Teste de fadiga muscular das suturas de Kessler-Tajima e Sutura-U independente do período e do tratamento.	121

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Organização dos grupos experimentais	28
Tabela 2: Peso médio dos tendões (g)	102
Tabela 3: Diâmetro médio dos tendões (mm)	103
Tabela 4: Diâmetro médio das fibrilas colágenas (nm).....	105
Tabela 5: Frequência de distribuição das fibrilas colágenas (%)	106
Tabela 6: Densidade das fibrilas colágenas (No/ μm^2)	108
Tabela 7: Colágenos Tipo I e III / Proteínas Totais (a.u)	110
Tabela 8: Timp-1, -2, MMP-2, -9 / Proteínas Totais (a.u)	112
Tabela 9: Peso dos Músculos Sóleos (g)	114
Tabela 10: Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 (fold).....	116
Tabela 11: Contração muscular máxima (mN/g)	118
Tabela 12: Contrações do teste de fadiga muscular (mN).....	120

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	Estrutura do tendão	20
1.2	Função e composição	21
1.3	Vascularização e inervação	21
1.4	Proteína do látex natural	22
1.5	Lesão e tratamento	23
2	JUSTIFICATIVA	26
3	OBJETIVOS GERAIS	27
3.1	Objetivos específicos	27
4	MATERIAIS E MÉTODOS	28
4.1	Suturas para as cirurgias	28
4.2	Técnica cirúrgica	30
4.3	Microscopia estereoscópica	32
4.4	Microscopia de luz	32
4.5	Microscopia eletrônica de varredura	32
4.6	Microscopia eletrônica de transmissão	33
4.7	Western blot	34
4.8	Teste de contração muscular	35
4.9	PCR quantitativo em tempo real	35
4.9.1	Extração de RNA total e quantificação	35
4.9.2	Reação de transcrição reversa	36
4.9.3	Reação em cadeia de polimerase em tempo real	36
4.10	Análises estatística	36
5	RESULTADOS	38
5.1	Análise estereoscópica	38
5.2	Microscopia de luz	39
5.2.1	Coloração de hematoxilina-eosina	39
5.2.1.1	Grupo controle	39
5.2.1.2	Grupos lesados U2s e UP2s	41
5.2.1.3	Grupos lesados K2s e KP2s	44
5.2.1.4	Grupos lesados U4s e UP4s	48
5.2.2	Coloração de picrosirius red	54

5.2.2.1	Grupos controle e lesados, corte longitudinal.....	54
5.2.3	<i>Cortes transversais</i>	57
5.2.3.1	Grupo controle	57
5.2.3.2	Grupos lesados U2s e UP2s	57
5.3	Microscopia eletrônica de varredura	66
5.3.1	<i>Grupo controle</i>	66
5.3.2	<i>Grupos lesados U2s e UP2s</i>	67
5.3.3	<i>Grupos lesados K2s e KP2s</i>	71
5.3.4	<i>Grupos lesados U4s e UP4s</i>	75
5.3.5	<i>Grupos lesados K4s e KP4s</i>	79
5.4	Microscopia eletrônica de transmissão	83
5.4.1	<i>Grupo controle</i>	83
5.4.2	<i>Grupos lesados U2s e UP2s</i>	84
5.4.3	<i>Grupos lesados K2s e KP2s</i>	89
5.4.4	<i>Grupos lesados U4s e UP4s</i>	93
5.4.5	<i>Grupos lesados K4s e KP4s</i>	97
5.5	Análise estatística	101
5.5.1	<i>Alterações no tendão</i>	101
5.5.1.1	Peso dos tendões	101
5.5.1.2	Diâmetro dos tendões.....	102
5.5.1.3	Diâmetro, densidade e frequência das fibrilas colágenas	104
5.5.1.4	Colágenos tipo I e III	109
5.5.1.5	Timp-1, -2, MMP-2, -9	111
5.5.2	<i>Alterações musculares</i>	114
5.5.2.1	Peso do músculo sóleo	114
5.5.2.2	Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 por RT-qPCR.....	115
5.5.2.3	Contração muscular máxima	117
5.5.2.4	Teste de fadiga muscular	118
6	DISCUSSÃO	122
7	CONCLUSÃO	133
	REFERÊNCIAS	134

1 INTRODUÇÃO

1.1 Estrutura do tendão

A estrutura do tendão é constituída por tecido conjuntivo fibroso modelado que inserem as fibras musculares a superfície óssea, possuem poucas células, porém apresentam um grande número de fibras colágenas que dão a eles forças tensíveis extremamente altas (BENJAMIN; RALPHS, 2000).

Externamente os tendões são revestidos por tecido conjuntivo areolar frouxo denominado paratendão, que é revestido em sua superfície interior por células sinoviais. Adjacentes ao paratendão, existe um delgado tecido conjuntivo denominado epitendão, formando assim a unidade tendínea. Juntos, essas duas membranas de revestimento são chamadas de peritendão, com a função de reduzir a fricção aos tecidos adjacentes (KANNUS, 2000; MAZZONE; MCCUE, 2002; WANG, 2006).

O subtendão e os fascículos são envoltos pelo endotendão, uma delgada rede reticular com espessura variada e que atua como importante conduíte para vasos sanguíneos, ductos linfáticos e nervos, permitindo aos fascículos alguma independência de movimento (WANG, 2006; YANG, ROTHRAUFF; TUAN, 2013). Essa estruturação pode ser observada na figura 1.

Figura 1: Esquema da estrutura hierárquica do tendão (HANDSFIELD; SLANE; SCREEN, 2016).

1.2 Função e composição

A principal função do tendão é servir como tecido de transição das forças contráteis geradas pelos músculos e as transferir para os ossos podendo assim gerar movimentos (BENJAMIN; RALPHS, 1998; VOLETI; BUCKLEY; SOSLOWSKY, 2012; THORPE et al., 2015).

O tendão calcâneo é constituído pela adjeção dos músculos gastrocnêmio e sóleo, sendo o mais espesso e forte do corpo humano (DEL SOL; JUNG; VÁSQUEZ, 2011), composto por 55-70% água.

Parte substancial deste líquido encontra-se associado a proteoglicanos na matriz extracelular (MEC). Já em relação ao seu peso seco, este corresponde a 60-85% de colágenos, sendo 60% a 95% do tipo I, composto por uma cadeia $\alpha 1$ e uma $\alpha 2$, organizadas em fibrilas agrupadas paralelamente, formando feixes de fibras resistentes à tração (KJAER, 2004; RICARD-BLUM, 2011; THORPE et al., 2013). Menos de 10% corresponde a colágeno tipo III, constituído apenas por cadeia $\alpha 1$, sendo quase completamente restrito ao endotendão e ao redor dos feixes. Estes dois tipos de colágeno pertencem à subfamília fibrilar (AMIEL et al., 1991; BRINCKMANN, 2005; YANAGISAWA et al., 2012). No entanto, uma quantidade ínfima dos colágenos V (subfamília fibrilar), XII, XIV e XIX (subfamília FACIT (*Fibril-Associated Collagens with Interrupted Triple Helices*)) são encontrados no tecido tendíneo (GELSE; PÖSCHL; AIGNER, 2003; KJAER, 2004; BRINCKMANN, 2005).

1.3 Vascularização e inervação

A vascularização do tendão calcâneo ocorre lateralmente pela artéria fibular e medialmente pela artéria tibial posterior (CHEN et al., 2009), além destas duas, os ramos terminais da artéria poplítea também são responsáveis pela vascularização (WOLFF et al., 2012). Além disso, Chen et al. (2009) sugerem que o paratendão é uma bainha tendinosa vascular que envolve o tendão de tal maneira que sua remoção acarretaria a falta de suprimento vascular no tecido tendíneo.

Já a inervação é realizada por nervos dos músculos anexos e por pequenos fascículos de nervos cutâneos, em particular o nervo sural. Que é um nervo puramente sensorial, formado pela confluência do ramo cutâneo medial do nervo tibial e o ramo comunicante fibular (NUNLEY, 2009).

1.4 Proteína do látex natural

A proteína do látex natural é um material biocompatível extraída da árvore *Hevea brasiliensis* (seringueira) que pode ser utilizada em pesquisas experimentais. Esta, foi desenvolvida na década de 90 pelo Laboratório de Neuroquímica do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (MRUÉ, 1996). Inicialmente esse material foi utilizado na forma de uma biomembrana, a biomembrana de látex natural (BLN), a qual, por sua vez, apresentava estrutura similar à membrana celular, sendo quimicamente produzida pela indução da polimerização do poliisopreno endógeno, em que se preserva a conformação nativa das proteínas, permitindo uma reorganização dos fosfolípidos e proteínas contidas no látex (ALVES DE SOUSA et al., 2007).

Balabanian et al., (2006) apresentaram resultados promissores com o uso da BLN, tais como: estímulo à angiogênese, adesão celular e formação de matriz extracelular, promoção da substituição e reparo do tecido, aceleração da cicatrização de lesões em tecido cutâneo, pericárdio, esôfago, parede abdominal, tímpano, vasos sanguíneos e no conjuntivo dos olhos, sem produzir sinais de hipersensibilidade.

Resultados prévios obtidos em camundongos mostraram que a utilização da biomembrana de látex natural estimulou os diferentes estágios da cicatrização, especialmente a fase inflamatória, recrutando leucócitos para a região lesada e estimulando o estresse oxidativo. Estes fatores parecem se relacionar a forte angiogênese e fibroplasia, estimulados pela BLN na fase de proliferação e formação tecidual (ANDRADE et al., 2011). Também em experimentos realizados em coelhos, o látex da *Hevea brasiliensis* tem demonstrado importante propriedade de cicatrização e grande atividade angiogênica, sendo eficaz no aumento da permeabilidade vascular, o que permite que uma variedade de citocinas e fatores de crescimento alcancem o tecido lesado. Este resultado é particularmente relevante na medida em que a angiogênese supre os tecidos com uma ampla variedade de nutrientes importantes na liberação dos metabólitos (MENDONÇA et al., 2010).

Diante dos estudos encontrados na literatura, os resultados clínicos e histopatológicos sugerem que a BLN atua como um fator indutor da cicatrização, especialmente na fase inflamatória, confirmada pela presença abundante de exsudato nas lesões, promovendo a transformação do microambiente das úlceras venosas crônicas e estimulando a angiogênese e a posterior reepitelização (FRADE et al., 2012). Entretanto, para a reparo de nervos periféricos, por exemplo, estudo demonstrou que a BLN apresenta a desvantagem de não ser biodegradável,

mesmo que biocompatível (IJKEMA-PAASSEN et al., 2004). Dessa forma, a partir desses estudos, para alguns tecidos e tipos de lesões, passou a ser utilizada a proteína extraída do soro do látex natural, a proteína F1 (princípio ativo da BLN) possibilitando assim a sua possível reabsorção pelo organismo (DIAS et al., 2015; MUNIZ et al., 2015).

1.5 Lesão e tratamento

Lesões no tendão calcâneo são conhecidas desde a época de Hipócrates, estudos que abordam esta condição foram primeiramente escritos por Ambroise Paré em 1633 (CETTI et al., 1993). Dentre todos os tendões, o calcâneo é um dos mais frequentemente lesados (COSTA; HUNGRIA NETO, 2007). A incidência de lesões neste tendão é uma das que mais tem aumentado desde a década de 80 (GULATI et al., 2015) devido à busca por uma melhor condição física, pelo aumento da prática esportiva e devido ao envelhecimento (MAFFULLI et al., 2000; MAZZONE; MCCUE, 2002). Estas lesões foram classificadas por Arner e Lindholm (1959) em 3 categorias: a primeira é quando o peso está sobre o antepé enquanto o joelho se estende, este movimento é responsável por 53% das rupturas. A segunda categoria é súbita e ocorre com uma inesperada dorsiflexão do tornozelo, este caso corresponde a 17% das lesões. A terceira é uma dorsiflexão violenta de uma flexão plantar e ocorre em 10% dos pacientes (MAFFULLI, 1999).

A incidência de ruptura na América do Norte é de 5,5 a 9,9/100.000 habitantes (SUCHAK et al., 2005) e de 6 a 18/100.000 na Europa (LEPPILAHTI; PURANEN; ORAVA, 1996). Na Escócia a taxa de ruptura em 1981 era de 4,7/100.000, em 1994 de 6/100.000. Na Dinamarca o índice era de 22,1/100.000 em 1991 e de 32,6/100.000 em 2002 (GULATI et al., 2015).

Estas lesões podem ocorrer em qualquer idade, porém são mais frequentes na terceira ou na quarta década de vida e demonstram uma forte prevalência em homens (MANDELBAUM; MYERSON; FORSTER, 1995; COSTA; HUNGRIA NETO, 2007). A proporção de homens:mulheres diverge de acordo com o estudo e pode variar de 2,9-5,7:1 (GANESTAM et al., 2016) até 20:1 (GULATI et al., 2015).

O tratamento pode ser realizado na forma conservadora ou por cirurgia através de reparo aberto ou percutâneo (HENRIQUEZ et al., 2012), porém vários estudos sugerem que o tratamento conservador está associado a altas taxas de re-ruptura (9,8 - 12,6%) (KOCHER et al., 2002; WONG; BARRASS; MAFFULLI, 2002). Já o reparo cirúrgico possui uma menor taxa de re-ruptura, em torno de 3 a 10% (HENRIQUEZ et al., 2012), sendo considerado até o

momento o “padrão-ouro” para o tratamento (INNOCENTI et al., 2015). Contudo, algumas complicações podem ocorrer, sendo elas: deiscência, que pode ser seguida por infecção, necrose da pele, exposição e eventualmente necrose do tendão (BRUGGEMAN et al., 2004). Ainda, o reparo cirúrgico diminui a capacidade do tendão em resistir a forças de tensão, quando comparados com o tecido tendíneo não lesado (YALCIN et al., 2011). O tempo de imobilização gessada não é um consenso na literatura e no caso do tratamento conservador deve ser mantido por 12 semanas, ou por 10 em caso de tratamento cirúrgico (COSTA; HUNGRIA NETO, 2007).

Para o tratamento cirúrgico existem vários tipos de sutura que podem ser utilizados com 2, 4 ou 6 fios, como as técnicas de Kessler-Tajima, Kessler modificada com nó periférico e sem nó periférico, Krackow e Tsuge com 2 fios, Krackow, Kessler modificada dupla, Lee e Becker possuindo 4 fios e Savage com 6 fios (SINGER et al., 1998; THURMAN et al., 1998; MCKEON et al., 2006). A sutura de Kessler-Tajima com os nós dentro do local de reparo é muito utilizada e evita o estrangulamento da microcirculação do tecido tendíneo (BERNBACH, 1988; SINGER et al., 1998; VOLETI; BUCKLEY; SOSLOWSKY, 2012).

O processo de reparo do tendão ocorre em três fases: inflamação, reparo, remodelamento (MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002; JAMES et al., 2008). A fase inflamatória ocorre de três a sete dias após a lesão, a ruptura de vasos sanguíneos presentes na bainha tendínea causam a formação de hematoma, o coágulo resultante ativa a liberação de diversos fatores quimiotáticos, tais como, moléculas vasodilatadoras e pró-inflamatórias que atraem células inflamatórias de tecidos adjacentes (MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002; JAMES et al., 2008). Além disso, os eritrócitos, plaquetas, neutrófilos, monócitos e macrófagos migram para o local da lesão, onde o coágulo, os restos celulares e corpos estranhos são fagocitados (JAMES et al., 2008).

O segundo estágio de reparo/proliferação celular inicia-se por volta do quinto dia, momento no qual os tenoblastos que migraram para o local da lesão iniciam a síntese de colágeno e de vários componentes da matriz extracelular (LINDSAY; BIRCH, 1964; MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002). Ainda nesta fase, fatores angiogênicos são liberados e iniciam a formação de uma rede vascular (MYERS; WOLF, 1974). Em seguida, na fase de proliferação/reparo, continua o recrutamento fibroblástico, sua rápida proliferação no local da lesão e a síntese de colágeno (essencialmente o tipo III) e de componentes da matriz extracelular como proteoglicanos, os quais são inicialmente organizados de maneira aleatória (GARNER et al., 1989). Ainda nessa fase, uma extensa rede de vasos sanguíneos está presente e a lesão apresenta uma aparência de cicatriz (FENWICK; HAZLEMAN; RILEY, 2002). No final deste estágio o tecido reparado está altamente celularizado e contém relativamente uma grande

quantidade de água e componentes da matriz extracelular (JAMES et al., 2008). O último estágio de remodelamento/organização inicia-se de seis a oito semanas após a lesão. Essa fase é caracterizada por uma celularidade diminuída, reduzida síntese da matriz, diminuição do colágeno tipo III e aumento da síntese de colágeno tipo I, o qual é organizado longitudinalmente ao longo do eixo tendíneo e é responsável pela força mecânica do tecido reparado (LIU et al., 1995; RUNESSON et al., 2015). Durante as fases posteriores de remodelamento as interações entre as unidades estruturais do colágeno levam a uma maior rigidez e, conseqüentemente, a uma maior resistência à tração. No entanto, o tecido reparado não atinge as características do tendão normal (JAMES et al., 2008).

Considera-se que após a cirurgia o paciente retorna ao trabalho em média após 85 dias, podendo variar de 15 a 270 dias; porém, para a volta da prática esportiva a liberação ocorre com 150 dias em média, variando de 3 a 12 meses (ROUVILLAIN et al., 2010).

2 JUSTIFICATIVA

Embora existam várias técnicas de sutura disponíveis para o cirurgião, todas diminuem a resistência e a função mecânica do tecido tendíneo devido à alta modificação do colágeno. Além do elevado tempo de reparo fazendo com que o paciente fique por um longo período impedido de realizar suas atividades normais.

Atualmente na literatura clínica ainda não existe um método eficaz de tratamento para acelerar e melhorar a reparo do tendão no intuito de restabelecer sua perfeita atividade funcional.

Uma vez que a proteína F1 extraída da árvore *Hevea brasiliensis* vem sendo utilizada em pesquisas com outros tecidos obtendo resultados satisfatórios, justifica-se sua utilização no tecido tendíneo a fim de buscar uma alternativa que possa auxiliar no tratamento, acelerando o processo de reparo e restabelecendo os padrões normais do colágeno.

Além de analisar a influência do tipo de sutura no processo de reparo, as análises morfológicas, ultraestruturais, bioquímicas e funcionais podem elucidar e certificar as características, efeitos e a qualidade do processo de reparo com a utilização da proteína F1.

3 OBJETIVOS GERAIS

Avaliar se a proteína F1 melhora a cicatrização do tendão, qual a influência do tipo de sutura nesse processo e se o tendão em processo de reparo interfere nas condições normais de contração muscular.

3.1 Objetivos específicos

- a) Analisar as alterações morfológicas e ultraestruturais utilizando microscopia estereoscópica, microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e de transmissão;
- b) Avaliar a distribuição dos colágenos tipo I e III pelo tecido por microscopia de luz polarizada;
- c) Quantificar os tipos de colágenos, assim como as proteínas TIMP-1, -2, MMP-2, -9;
- d) Avaliar a organização, distribuição e densidade das fibrilas colágenas;
- e) Avaliar se o tendão lesado e em processo de reparo interfere na capacidade contrátil muscular;
- f) Analisar a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 no músculo sóleo.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados 243 animais da linhagem Sprague Dawley, provenientes do biotério do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do ICB/USP com protocolo n. 16/2014.

Todos foram alojados em gaiolas de contenção de polipropileno, agrupados em números de cinco, com água e ração “*ad libitum*”, mantidos em períodos claro/escuro de 12 horas, à temperatura média de $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$, todos machos com idade de 3 meses organizados em 5 grupos:

Tabela 1: Organização dos grupos experimentais

Nome do Grupo	Tipo de Sutura	Tratamento	Tempo de Análise
Controle (C)	Nenhuma	Nenhum	Ao completar 3 meses de vida.
U2s	Sutura-U	Nenhum	Duas semanas
UP2s	Sutura-U	Proteína F1	Duas semanas
K2s	Kessler-Tajima	Nenhum	Duas semanas
KP2s	Kessler-Tajima	Proteína F1	Duas semanas
U4s	Sutura-U	Nenhum	Quatro semanas
UP4s	Sutura-U	Proteína F1	Quatro semanas
K4s	Kessler-Tajima	Nenhum	Quatro semanas
KP4s	Kessler-Tajima	Proteína F1	Quatro semanas

Todos os experimentos foram previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, protocolo 016/2014.

4.1 Suturas para as cirurgias

Na técnica de Kessler-Tajima o fio de sutura foi introduzido na face de contato de um coto ao outro, externalizado e introduzido novamente no tecido tendíneo transversalmente até a porção oposta, em que mais uma vez foi exposto e por fim inserido ao tendão pela última vez em direção ao coto, o procedimento foi realizado em ambos os lados e os fios unidos por nó como demonstra a figura 2.

Figura 2: Esquema da técnica de Kessler-Tajima com dois nós entre os cotos. Mostra o tendão com uma ruptura completa e o percurso dos fios de sutura internamente (linha tracejada) e externamente (linha contínua). Os números indicam o passo a passo da técnica. Fonte: Próprio autor da tese.

Para a técnica de sutura-U o fio foi inserido na superfície do tecido tendíneo aproximadamente a 2mm da secção em direção ao coto, o mesmo fio foi introduzido no coto oposto e externalizado a 2mm.

As extremidades foram unidas e os nós ficaram posicionados externamente ao tendão como mostra a figura 3.

Figura 3: Esquema da técnica de sutura-U com dois nós externos ao tendão. Mostra o tendão com uma ruptura completa e o percurso dos fios de sutura internamente (linha tracejada) e externamente (linha contínua). Os números indicam o passo a passo da técnica. Fonte: Próprio autor da tese.

4.2 Técnica cirúrgica

Para a realização das cirurgias no tendão calcâneo os animais foram anestesiados com Cetamina (75mg/kg) e Xilazina (10mg/kg) (DIAS et al., 2013) e uma incisão com lâmina de bisturi número 15 foi realizada lateralmente ao membro posterior dos animais para não ocorrer um corte no tendão calcâneo. Para padronização as cirurgias foram realizadas apenas no membro posterior esquerdo de todos os animais.

Uma completa secção do tendão foi realizada utilizando uma tesoura íris de 12cm a 7mm do osso calcâneo (OKAMOTO et al., 2010). O tendão e a pele foram suturados utilizando fio cirúrgico CATGUT simples 5-0, tipo A – classe IV, estéril (Technofio).

A aplicação da proteína F1 ocorreu durante o ato cirúrgico aplicando sobre o tendão uma quantidade de 100 µL, diluída em ácido hialurônico (HAH) na concentração final de 1% HAH e 0,1% de proteína F1 (DIAS et al., 2015).

Após a cirurgia foi administrado 0,1ml/100g de anti-inflamatório (Flunixinina meglumina, Banamine – MSD Saúde Animal) e 0,1ml/100g de anti-infeccioso de amplo-espectro (Pentabiótico® Veterinário – Fort Dodge Saúde Animal Ltda.) e ainda a aplicação tópica de Timeolate (cloridrato de lidocaína 21,0mg/mL e cloreto de benzetônio 1,33mg/mL - Lifar) (ISSA et al., 2010). Todo o procedimento é demonstrado na figura 4.

Figura 4: Procedimento cirúrgico. Sequência demonstrando a lesão, as suturas dos tendões e da pele. **(A)** Mostra a tesoura íris de 12cm sendo introduzida para realizar a secção completa no tendão. **(B)** Uma régua demonstrando que a lesão foi realizada a 7cm do osso calcâneo. **(C)** Mostra a sutura-U finalizada e os nós do fio CATGUT 5-0 (setas). **(D)** A sutura de Kessler-Tajima finalizada com os fios de sutura saindo pelo local da lesão (setas). **(E)** Mostra a cirurgia finalizada com 3 pontos (seta) fechando a pele do animal.

4.3 Microscopia estereoscópica

Para obtenção das imagens macroscópicas os mesmos tendões utilizados para microscopia de luz foram fotografados utilizando Microscópio Estereoscópico Zeiss Stemi SV6, equipado com câmera Canon Power Shot A640.

Os tecidos foram retirados da solução fixadora de formaldeído 4% após 48h e fotografados para a visualização dos aspectos macroscópicos, com o intuito de analisar a coloração, brilho e a estrutura da amostra.

4.4 Microscopia de luz

Foram utilizados 5 animais de cada grupo, eutanasiados em câmara de CO₂, o tendão calcâneo foi removido e fixado em paraformaldeído 4% durante 48 horas em temperatura ambiente.

As amostras foram desidratadas em série de álcoois do 70% ao 100% por 30 min cada, em seguida foram diafanizadas em Xilol. Blocos de parafina foram montados para que pudesse ser efetuado cortes de 7 µm de espessura, montados em lâminas histológicas, e corados com Hematoxilina-Eosina para examinar a disposição do colágeno e os núcleos celulares (TOLOSA et al., 2003) e com picrosirius red para analisar sob luz polarizada a distribuição dos colágenos tipos I e III (JUNQUEIRA; BIGNOLAS; BRENTANI, 1979; LATTOUF et al., 2014).

4.5 Microscopia eletrônica de varredura

Para a análise de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução foram utilizados 5 animais de cada grupo, anestesiados com Xilazina (10mg/kg) e Cetamina (75mg/kg), sendo perfundidos com a solução fixadora de Karnovsky modificada (glutaraldeído 2,5% e paraformaldeído 2% em solução tampão fosfato de sódio a 0,1M e pH 7,4) (WATANABE; YAMADA, 1983) injetando 100 mL de solução pelo ventrículo esquerdo do coração.

O tendão calcâneo foi removido entre a junção miotendínea e osteotendínea, imerso na mesma solução durante 24 horas à 4°C. Em seguida as amostras foram lavadas em solução tampão fosfato de sódio a 0,1M e pH 7,4 e crio-fraturadas de acordo com a técnica de congelamento em nitrogênio líquido empregando o método descrito por Watanabe (1998).

Seguidamente foram lavadas em solução tampão fosfato de sódio e pós-fixadas em solução de tetróxido de ósmio a 1%, durante 2 horas à 4°C, lavadas em água destilada e

desidratadas em série crescente de alcoóis (70% ao 95% durante 15 min cada, e quatro vezes no absoluto pelo mesmo tempo), a secagem das amostras foi realizada em aparelho ponto crítico Balzers CPD-030 utilizando CO₂ líquido.

As amostras secas foram montadas em bases metálicas (*stubs*) e cobertas com íons de ouro em aparelho Balzers Union SCD-040 e analisadas ao microscópio eletrônico de varredura Neoscope JCM-5000 com tensões de aceleração fixas de 10 e 15kV e no microscópio de alta resolução Jeol JSM-7401F, ambos pertencentes à Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo.

4.6 Microscopia eletrônica de transmissão

Para a microscopia eletrônica de transmissão 5 animais de cada grupo foram utilizados, sendo perfundidos conforme previamente descrito na metodologia de microscopia eletrônica de varredura.

O tendão calcâneo foi dissecado e fixado na mesma solução durante 3 horas em temperatura ambiente, em seguida foi realizada a lavagem com tampão fosfato de sódio e a pós-fixação com a solução de tetróxido de ósmio a 1% durante 2 horas a 4°C, e em acetato de uranila 0,5% *overnight*.

Os tecidos foram então desidratados em série crescente de álcoois do 70-95% durante 15 min cada, 4 vezes no 100% pelo mesmo tempo e duas vezes em óxido de propileno também por 15 min. Em seguida foi realizada a embebição em resina Spurr[®], sendo que foram utilizadas as seguintes proporções e tempos: 1:1 resina:óxido de propileno por 3 horas, 3:1 por 3 horas e por último em resina pura *overnight*.

As amostras foram emblocadas em resina pura e a polimerização foi realizada em estufa a 60°C durante 72 horas. Cortes semi-finos de 350 nm de espessura corados com a solução de azul de toluidina foram realizados para delimitação da área para em seguida realizar os cortes ultrafinos de 60 nm de espessura, os quais foram coletados em telas de 200 mesh.

Em seguida os cortes foram contrastados com solução saturada de acetato de uranila por 5 min (WATSON, 1958) e citrato de chumbo por 3 min (REYNOLDS, 1963), lavadas em seguida com água destilada (WATANABE; YAMADA, 1983).

As análises foram realizadas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 1010 com tensão de 80 kV no Centro de Microscopia do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas.

4.7 Western blot

Para a extração de proteínas, os tendões foram macerados em nitrogênio líquido, um volume de vinte vezes do peso do tendão foi colocado de tampão de extração constituído de 4M de Cloridrato de Guanidina, 0,05M de Tampão Acetato de Sódio pH 5,8, 0,05M de EDTA *Ethylenediaminetetracetic Acid*, 1mM de PMSF *Phenylmethanesulfonyl fluoride*, as amostras foram então mantidas em agitação por 24 horas à 4°C, em seguida foram homogeneizadas com sonificador na frequência de 75% e centrifugadas a 11.000 rpm por 10 min à 4°C.

O sobrenadante foi retirado para a precipitação das proteínas totais, então 9 volumes de etanol mais 1 volume de 1M de Tampão Acetato de Sódio pH 7,4 mais amostra foram pipetados nessa proporção e mantidos à 4°C por 24 horas.

Então as amostras foram centrifugadas novamente a 11.000 rpm por 10 min à 4°C, o pellet foi coletado e homogeneizado usando Tris-HCl pH 6,8 sob agitação à 95°C por 5 min. As proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976).

Após a quantificação 30µg de proteínas foram pipetadas com 4x de Tampão de Amostra Laemmli Bio-Rad #1610747 e 10% de β-Mercaptoetanol, agitadas por 5 min à 95°C e então submetidas a eletroforese em gel de gradiente de 6-20% SDS-Poliacrilamida. As proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose utilizando o equipamento Trans-Blot® Turbo™, com o kit de transferência Trans-Blot® Turbo™ RTA Transfer Kit, Nitrocellulose Bio-Rad #170-4270.

Foram utilizados os seguintes anticorpos para marcação das proteínas de interesse: anti-COL1A1 (Rhea Imuny IM-0283) para o colágeno tipo I, anti-COL3A1 (Cusabio CSB-MA000282) para o colágeno tipo III, anti-TIMP-1 (Cusabio CSB-PA004293), anti-TIMP-2 (CSB-PA004294), anti-MMP-2 (CSB-PA003258) e anti-MMP-9 (Rhea Imuny IM-0671), todos na diluição de 1:500 com exceção ao anticorpo de colágeno tipo III que foi utilizada a diluição de 1:1.000, todos incubados *overnight* à 4°C, seguida por lavagem e incubação com anticorpos secundários por 1 hora em temperatura ambiente.

A revelação das membranas foi realizada utilizando o reagente Luminata™ Forte Western HRP Substrate (Millipore #WBLUF0500) que foi pipetado sobre a membrana por 2 min, em seguida foram fotografadas no equipamento Fusion Fx (Vilber Lourmat Byosystems), e o *software* Image Studio Lite Ver 5.2 foi utilizado para a densitometria das bandas. Para esse experimento foram utilizados 4 animais por grupo.

4.8 Teste de contração muscular

Para o teste de contração muscular, 8 animais de cada grupo foram utilizados, anestesiados com tribromoetanol (20 mg/100 g peso corporal, i.p.), seguido da exposição do nervo isquiático através de uma incisão lateral na coxa, a qual foi conectado a um eletrodo de platina.

O músculo sóleo foi cirurgicamente separado do músculo gastrocnêmico, evitando lesão na inervação do músculo de interesse. O tendão distal do músculo sóleo foi cuidadosamente isolado e separado do tendão distal lateral e medial do músculo gastrocnêmico. Os ratos foram colocados em uma plataforma de acrílico de forma que a pata do animal ficasse em posição fixa. O tendão do músculo sóleo foi amarrado a uma linha de seda (3-0) e conectado a um transdutor de força (BIOPAC) acoplado ao computador.

Inicialmente foi estabelecido o comprimento muscular inicial, em que se obtém a tensão máxima do músculo resultando no valor máximo da contração isolada obtida. Todas as medidas subsequentes foram realizadas em tensão máxima. Os músculos foram eletricamente estimulados (Estimulador AVS Projetos) através do nervo isquiático. Para a realização do protocolo foi utilizado os seguintes parâmetros: Contração isolada com frequência de 2 Hz por 2 min em 20 V, para a contração tetânica máxima foi utilizada a frequência de 350 Hz por 2 seg em 20 V, e para o protocolo de fadiga foram realizadas 10 contrações com a frequência de 200 Hz por 2 segundos em 20 V e com intervalo de 4 segundos entre as contrações. As contrações foram obtidas através do *software* (AQCAD; Versão 2.4.4.0, AVS Projetos) em grama-força e convertidas a miliNewton (mN). A força específica foi obtida através da razão mN/g do peso muscular.

4.9 PCR quantitativo em tempo real

4.9.1 Extração de RNA total e quantificação

Foram utilizados 4 animais por grupo para o isolamento do RNA total do tendão calcâneo utilizando o reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA), seguindo as recomendações do fabricante. A quantificação foi realizada por espectrofotometria (Eppendorf Spectrophotometer), mensurando-se a absorbância a 260nm. A pureza do RNA foi determinada fazendo a relação entre 260 e 280 nM. Em seguida as amostras foram colocadas em gel desnaturante para análise qualitativa.

4.9.2 *Reação de transcrição reversa*

Para a reação de transcrição reversa, 1 µg de RNA extraído foi utilizado contendo Oligo dT (500 µg/ml), 10 nM de dNTP Mix, 5x *First Strand Buffer*, 0,1M de DTT e 200U de transcriptase reversa (MMLV Reverse Transcriptase - Promega Corporation).

A transcrição reversa foi efetuada à 70°C por 10 min. Adicionada a enzima, o ciclo foi continuado à 42°C por 1 hora e à 95°C por 10 min.

4.9.3 *Reação em cadeia de polimerase em tempo real*

A expressão gênica foi analisada através da utilização de *primers* específicos elaborados através no site NCBI. A reação foi feita com cDNA (DNA complementar), diluído em mix contendo Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), água MiliQ e respectivos *primers* senso e anti-senso.

As condições de ciclagem utilizadas foram 60°C por 1 min, 50°C por 2 min e 95°C por 10 min. A amplificação ocorreu em 40 ciclos de desnaturação à 95°C por 15 seg e anelamento e extensão à 60°C por 60 seg.

A análise da amplificação foi realizada com auxílio do *software* do aparelho Rotor Gene. O Ct, limiar de ciclagem em que pôde ser notado um aumento na fluorescência indicou a quantidade de cDNA presente nas amostras, e consequentemente os níveis de RNA mensageiro (RNAm) que estavam presentes na reação.

A expressão gênica foi medida através da fórmula: $2^{-\Delta\Delta Ct}$, descrito por K. Livak no Manual do Usuário do Biosystem Sequence Detector Bulletin 2, onde $\Delta\Delta Ct = [Ct \text{ amostra} - Ct \text{ controle interno da mesma amostra}] - [Ct \text{ controle} - Ct \text{ do controle interno com a mesma amostra controle}]$. A fórmula é baseada na suposição que a taxa com que o Ct muda *versus* a taxa que a cópia alvo muda seja idêntica para o gene de interesse e o controle interno (para controle interno foi utilizado o gene da Ciclofilina).

4.10 **Análises estatística**

Para avaliar o peso e diâmetro. dos tendões, diâmetro e densidade das fibrilas colágenas, assim como as proteínas colágeno tipo I e III, TIMP-1, -2, MMP-2 e 9, o peso dos músculos sóleos, e a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 os dados foram analisados estatisticamente pelo teste ANOVA sem considerar os fatores, uma vez que o grupo controle não possui

tratamento, com pós-teste de Dunnett com o objetivo de comparar todos os grupos com o controle.

Em seguida foi empregada a análise de variância ANOVA levando em consideração os três fatores: tipos de suturas, sutura-U e Kessler-Tajima; tratado ou não tratado com a proteína F1 e tempo após a lesão, 2 e 4 semanas, com o objetivo de verificar o efeito desses fatores e suas interações com pós-teste de Tukey.

A quantificação do diâmetro das fibrilas colágenas foi realizada de acordo com o protocolo descrito por Starborg et al. (2013) utilizando o *software* ImageJ v. 1.51s, os autores também afirmam que deve sempre ser considerado o diâmetro mínimo para análise estatística.

Para as análises de frequência de distribuição das fibrilas colágenas, todos os dados dos diâmetros foram colocados no *software* Statgraphics Centurion XVI o qual analisou qual a porcentagem do diâmetro fibrilar a cada 10 nm.

Para analisar a força máxima específica os dados foram inicialmente normalizados pelo peso corporal de cada animal. Objetivando verificar se os grupos submetidos aos dois tipos de sutura, tratados ou não com a proteína F1, após 2 e 4 semanas de lesão apresentaram diferença de força máxima específica em relação ao controle foi empregado ANOVA um fator com pós-teste de Dunnett. Em seguida, empregou-se ANOVA três fatores com o objetivo de verificar o efeito do Tipo de Sutura, da Proteína F1, o tempo após a lesão e suas interações na força máxima específica, com pós teste de Tukey.

Para o teste de fadiga muscular os valores são apresentados pela força bruta, expressos em mN. No grupo controle foi empregado a análise de variância com medidas repetidas para verificar o efeito das contrações C1, C4, C7 e C10, seguida por pós-teste de Bonferroni.

Posteriormente, foi empregado nos grupos lesados ANOVA quatro fatores; tipo de sutura, tratamento com a proteína F1, tempo de tratamento e contração (C1, C4, C7 e C10) como fator de medida repetida, seguida por pós teste de Bonferroni.

Todos os dados estão representados por média $\pm$ erro padrão. Para diferença estatística foi adotado em todos os testes $p < 0,05$.

Todos os testes foram realizados com auxílio dos *softwares* Statgraphics Centurion XVI e IBM SPSS Statistics v.22 no setor de estatística do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

5 RESULTADOS

5.1 Análise estereoscópica

A morfologia do tendão calcâneo foi analisada macroscopicamente e demonstra em todos os grupos sua coloração normal branco brilhante, no entanto todos os grupos lesados apresentam regiões de coloração amarelada sendo resultado do fio de sutura ainda em reabsorção.

No grupo controle nota-se uma região próxima ao ventre muscular mais extensa que estreita-se em direção a região distal que insere-se ao osso calcâneo (Fig. 5A).

O grupo em que foi utilizada a técnica de sutura-U não tratado com a proteína F1 analisado após 2 semanas (U2s) apresentou um acentuado abaulamento na região distal, estreitando-se no centro do tendão com maior largura na região de inserção no tecido muscular (Fig. 5B). Já o grupo em que foi utilizada a mesma sutura com tratamento (UP2s) apresentou certo abaulamento na mesma região, porém, não acentuado como o grupo não tratado, a característica de centro mais estreito que as extremidades também foi notada (Fig. 5C).

Entretanto ao analisar os grupos com esta técnica de sutura sem tratamento após 4 semanas (U4s) observa-se que este apresenta as mesmas características morfológicas que o grupo UP2s (Fig. 5D), no entanto este mesmo grupo com a aplicação da proteína F1 (UP4s), demonstra um aspecto cilíndrico com a presença de um abaulamento na região distal (Fig. 5E).

Os grupos os quais foi utilizada a técnica de sutura de Kessler-Tajima com exceção ao grupo tratado e analisado após 2 semanas (KP2s) apresentaram suas extremidades maiores que a região central (Figs. 5F, H, I), um aspecto cilíndrico foi notado no grupo KP2s ao longo de todo o seu eixo (Fig. 5G), tal característica é similar à do grupo UP4s (Fig. 5E).

Entre todos os grupos da sutura de Kessler-Tajima, o K2s apresentou o maior estreitamento da região central em comparação a todos os outros grupos independente da sutura utilizada (Fig. 5F).

Quando analisados 4 semanas após a lesão o grupo não tratado K4s apresentou uma grande região próxima ao músculo (Fig. 5H), já o grupo tratado KP4s demonstrou extremidades com larguras similares e um tênue estreitamento central (Fig. 5I).

Figura 5: Imagens estereoscópicas. (A) Grupo Controle. (B) Grupo U2s. (C) Grupo UP2s. (D) Grupo K2s. (E) Grupo KP2s. (F) Grupo U4s. (G) Grupo UP4s. (H) Grupo K4s. (I) Grupo KP4s. Barras: 2 mm.

5.2 Microscopia de luz

5.2.1 Coloração de hematoxilina-eosina

5.2.1.1 Grupo controle

As análises de microscopia de luz do grupo controle, com cortes corados por Hematoxilina-Eosina mostraram o padrão clássico de um tecido conjuntivo denso modelado que constitui o tendão. Notou-se a pequena quantidade de células e o predomínio da matriz colágena.

Tenócitos organizados em fileiras foram revelados na periferia dos feixes de fibras colágenas (Fig. 6A). Em maior aumento evidencia-se as fibras colágenas coradas em tom de rosa (Fig. 6B).

Localizado adjacente à fibra colágena, com núcleo delgado e alongado foram notados a presença de tenócitos como se observa na figura 6C.

Figura 6: Microscopia de luz do grupo controle. Corte longitudinal. (A) Mostra fileiras de tenócitos (setas) Aumento 100x, barra: 100 μm . (B) Feixes de fibras colágenas (setas). Aumento 200x, barra: 100 μm . (C) Tenócitos (setas). Aumento 400x, barra: 50 μm . Coloração: Hematoxilina-Eosina.

Os cortes transversais do grupo controle evidenciaram o tendão calcâneo, sendo que em sua adjacência um conjunto vásculo-nervoso foi claramente observado. Entre ambos, ficou evidente um tecido conjuntivo frouxo com função de mantê-los aderido (Fig. 7A).

Assim como nos cortes longitudinais, os cortes transversais evidenciaram o aspecto normal do tecido, com uma densa matriz colágena e uma quantidade pequena de células (Fig. 7B).

Figura 7: Microscopia de luz do grupo controle. Corte transversal. (A) Mostra o tendão calcâneo (T), vasos sanguíneos (setas) e nervos (cabeças de seta) Aumento: 40x, barra: 500 μm . (B) Tendão calcâneo (T). Aumento: 100x, barra: 100 μm . Coloração: Hematoxilina-Eosina.

5.2.1.2 Grupos lesados U2s e UP2s

As imagens histológicas de todos os grupos de animais experimentais lesados mostraram exatamente o local em que houve a lesão, e a subsequente reparação foi realizada.

Em todos os grupos em que foram utilizados a sutura-U, tratados ou não com a proteína F1 e avaliados com duas semanas pós-operatória, mostraram uma alta celularização em todo o tecido, bem como os núcleos celulares ficaram evidentes devido à intensa coloração azul-arroxado do corante hematoxilina.

Em detalhes notou-se no grupo U2s, o epitendão bem aderido revestindo externamente o tendão, a presença de grupamentos de adipócitos entre as fibras colágenas e adjacentes ao epitendão puderam ser observadas, assim como, fio de sutura em estágio avançado de reabsorção (Figs. 8A, A'). Análises das fibras colágenas demonstraram uma organização paralela, sendo que entre elas a presença de diminutos capilares foram cuidadosamente observada (Fig. 8A").

No entanto, quando tratado com a proteína F1 e analisado com o mesmo tempo, no grupo UP2s é possível notar uma similaridade morfológica com o grupo não tratado, que mostrou uma maior quantidade de adipócitos ao longo do tecido agrupados em fileiras. O epitendão ficou evidente apenas do lado lateral esquerdo do tecido (Fig. 8B), entretanto destaca-se uma maior quantidade de vasos sanguíneos com diâmetros maiores tanto na periferia quanto no interior do tendão quando comparados com o grupo não tratado. Com relação às fibras colágenas, estas apresentam em alguns lugares do tecido um inicial estágio de alinhamento (Figs. 8B', B'').

Figura 8: Microscopia de luz dos grupos lesados U2s e UP2s. Cortes longitudinais. **(A)** Grupo U2s. Imagem geral da área lesada. Epitendão (setas). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(A')** Mostra detalhes da região lesada. Epitendão (seta larga), adipócitos (setas finas), resquício de fio de sutura (cabeça de seta). Aumento 40x, barra 500 µm. **(A'')** Fibras colágenas (setas), capilares (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. **(B)** Grupo UP2s. Imagem da região lesada e tratada. Epitendão (seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. **(B')** Fileira de adipócitos (cabeça de seta), vasos sanguíneos (setas). Aumento 40x, barra 500 µm. **(B'')** Fibras colágenas (setas), adipócitos (cabeça de seta), vasos sanguíneos (*). Aumento 100x, barra 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

Cortes transversais da região lesada demonstraram a presença de fio de sutura no grupo U2s, na região periférica o conjunto vâsculo-nervoso foi observado, entretanto, diferentemente do grupo controle, não existe o tecido conjuntivo frouxo que une tais estruturas ao tendão. O tecido lesado evidenciou um aumento de tamanho a ponto de unir-se aos vasos e nervos adjacentes, estes acabam sendo envolvidos e tornam-se partes diretas do tendão (Fig. 9A)

Um maior aumento da região central do tendão lesado, revela discretamente a presença de delgados vasos sanguíneos envolvidos entre as fibras colágenas que compõem o tecido (Fig. 9A').

Em animais do grupo tratado com a proteína F1 UP2s, os fios de sutura também ficaram evidentes, porém, um volumoso fio de sutura foi observado na região periférica, o que nos leva a acreditar que é muito provavelmente o nó dado nos fios, que fica sob o tendão, mas que no processo de reparo acaba sendo envolvido pelo tecido conjuntivo (Fig. 9B).

Em maior aumento foi evidenciado o tecido conjuntivo em contato com o fio e um espaço ausente de tecido ao seu redor, suportando a ideia de que o tecido envolveu este aglomerado de fios (Fig. 9B').

Figura 9: Microscopia de luz dos grupos lesados U2s e UP2s. Cortes transversais. **(A)** Grupo U2s. Imagem da área lesada. Fio de sutura (cabeça de seta), vasos sanguíneos (setas finas) e nervo (seta larga). Aumento 40x, barra: 500 μ m. **(A')** Mostra detalhes da região lesada com delgados vasos sanguíneos (setas). Aumento 100x, barra 100 μ m. **(B)** Grupo UP2s. Imagem da região lesada e tratada. Fios de sutura (cabeças de seta). Aumento: 40x, barra: 500 μ m. **(B')** Tecido conjuntivo em contato com o fio de sutura (*) e um espaço ausente de tecido rodeando-o (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 μ m. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

5.2.1.3 Grupos lesados K2s e KP2s

O grupo K analisado no mesmo período evidenciou dois grandes vasos contíguos intimamente adjacentes ao epitendão, a presença de adipócitos por todo o tecido puderam ser observados e estão distribuídos por toda área analisada (Figs. 10A, A'). As fibras colágenas analisadas em maior aumento demonstram os detalhes de sua organização, as quais apresentaram-se em um inicial processo de alinhamento. Nesse mesmo aumento ainda ficaram evidentes a presença de vasos sanguíneos com diâmetros muito pequenos, na maioria dos casos menores até do que alguns adipócitos (Fig. 10A'').

Entretanto o grupo KP após 2 semanas de cirurgia não demonstrou um epitendão aderido diretamente ao tendão, com grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo e adiposo confinante a si. Este grupo apresentou uma maior desorganização do tecido que o compõem em comparação aos outros grupos, a presença de um vaso de espessura mediana, bem como, fio de sutura ficaram evidentes em seu interior (Figs. 10B, B'). Ao longo de toda a extensão do tendão deste grupo, foram notados adipócitos de tamanhos variados, as fibras colágenas não apresentaram organização e podem ser notadas distribuídas pelo tecido coradas intensamente pela eosina em um tom mais forte de rosa (Fig. 10B'').

Figura 10: Microscopia de luz dos grupos lesados K2s e KP2s. Cortes longitudinais. **(A)** Grupo K2s. Aspecto geral da área lesada. Epitendão (setas). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(A')** Detalhe da região lesada. Vasos sanguíneos (*), adipócitos (setas). Aumento 40x, barra 500 µm. **(A'')** Fibras colágenas (setas finas), capilar (seta larga), adipócito (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. **(B)** Grupo KP2s. Imagem geral da área lesada. Vaso sanguíneo (seta menor), fio de sutura (cabeça de seta), epitendão (seta maior). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(B')** Adipócitos (seta), fio de sutura (*). Aumento 40x, barra 500 µm. **(B'')** Fibras colágenas (setas), adipócitos (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

Os cortes transversais do grupo K2s revelaram vasos sanguíneos localizados periféricamente com diâmetros variados, entretanto quando observados em maior aumento, foi possível notar a presença de diversos vasos sanguíneos delgados espalhados por todo o tecido. É possível perceber também, uma separação tecidual transversal, disposta da porção lateral em direção ao centro do tendão (Figs. 11A, A').

Já o grupo tratado KP2s revelou fios de sutura e seu conjunto vâsculo-nervoso periférico, semelhante ao grupo não tratado K2s, porém, uma menor separação tecidual foi observada (Fig. 11B).

Em maior aumento, similar ao grupo não tratado, foram observados delgados vasos sanguíneos, porém, em menor quantidade espalhados pelo tecido. Algumas regiões contendo aglomerados celulares junto com adipócitos também puderam ser notadas (Fig. 11 B').

Figura 11: Microscopia de luz dos grupos lesados K2s e KP2s. Cortes transversais. (A) Grupo K2s. Imagem da área lesada. Vasos sanguíneos (seta), separação tecidual (cabeça de seta). Aumento 40x, barra: 500 μ m. (A') Mostra detalhes da região lesada com delgados vasos sanguíneos (setas). Aumento 100x, barra 100 μ m. (B) Grupo KP2s. Imagem da região lesada e tratada. Fio de sutura (cabeças de seta), vasos sanguíneos (setas menores), nervo (setas maiores), separação tecidual (seta menor branca). Aumento: 40x, barra: 500 μ m. (B') Vaso sanguíneo (seta maior), adipócito (seta menor), aglomerado celular (cabeça de seta). Aumento 100x, barra 100 μ m. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

5.2.1.4 Grupos lesados U4s e UP4s

As mesmas análises histológicas coradas com Hematoxilina-Eosina realizadas após 4 semanas de lesão e tratamento demonstraram no grupo U4s o epitendão no lado lateral do tecido e uma grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo do lado oposto (Fig. 12A). Diminutos vasos sanguíneos foram observados nas regiões periféricas do tendão, as fibras colágenas por sua vez apresentaram-se na região central do tecido organizadas paralelamente (Fig. 12A', A''), entretanto, o grupo tratado UP4s apresentou um integro epitendão aderido ao tendão, em sua adjacência nota-se a presença de vasos sanguíneos e um grande espaço ausente de tecido. Na região central o local pelo qual o fio de sutura ocupava ainda não está preenchido com tecido (Fig. 12B).

Um maior aumento desta região evidencia resquícios de fio de sutura e pequenos espaços ausentes de tecido, as fibras colágenas próximas ao fio de sutura apresentam-se organizadas paralelamente, no entanto ao redor, esse aspecto organizacional não é evidente, distribuído entre estas fibras pequenos capilares puderam ser evidenciados (Figs. 12B', B'').

Figura 12: Microscopia de luz dos grupos lesados U4s e UP4s. Cortes longitudinais. **(A)** Grupo U4s. Imagem em menor aumento da região de lesão, mostra epitendão (seta), acúmulo de tecido conjuntivo frouxo (cabeça de seta). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(A')** Vasos sanguíneos (setas). Aumento 40x, barra: 500 µm. **(A'')** Fibras colágenas (setas). Aumento 100x, barra: 100 µm. **(B)** Grupo UP4s. Espaço ocupado pelo fio de sutura (*), epitendão (cabeça de seta), vasos sanguíneos (setas), espaço ausente de tecido (#). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(B')** Fio de sutura (*), espaço ausente de tecido (setas). Aumento 40x, barra: 500 µm. **(B'')** Fibras colágenas (setas), capilar (cabeça de seta). Aumento 100x, barra: 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

Análises transversais dos mesmos grupos evidenciaram tanto no grupo não tratado quanto no tratado com a proteína F1 o nó dos fios de sutura, e assim como foi visto previamente nos mesmos grupos analisados em duas semanas, ao redor do nó há um espaço ausente de tecido, entretanto, a diferença em relação aos grupos de duas semanas é que tal espaço torna-se menor com o avanço do tempo (Figs. 13A, B).

O grupo U4s em maior aumento demonstra uma maior densidade e proximidade das fibras colágenas, com a presença de pequenos vasos sanguíneos ao longo do tecido (Fig. 13A'), porém, o grupo tratado apresenta um maior espaçamento entre as fibras colágenas que compõem o tendão, mas a presença de vasos sanguíneos também foi percebida, a diferença é que os vasos são maiores e em menor quantidade (Fig. 13 B').

Figura 13: Microscopia de luz dos grupos lesados U4s e UP4s. Cortes transversais. (A) Grupo U4s. Fio de sutura (cabeça de seta), espaço ausente de tecido (setas). Aumento 40x, barra: 500 µm. (A') Vasos sanguíneos (setas). Aumento 100x, barra 100 µm. (B) Grupo UP4s. Fio de sutura (cabeça de seta), espaço ausente de tecido (*). Aumento 40x, barra: 500 µm. (B') Vasos sanguíneos (cabeça de seta), espaço ausente de tecido (*). Aumento 100x, barra 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

Assim como nos grupos em que foi utilizada a técnica de sutura-U o grupo K4s apresentou o epitendão envolvendo o tecido, entre ele e o tendão um grande vaso sanguíneo e alguns de pequenos diâmetros puderam ser notados, bem como fio de sutura em diferentes estágios de reabsorção (Figs. 14A,A').

As fibras colágenas que compõem o tecido apresentaram-se com uma certa organização paralela entre si, o que nos leva a acreditar que o tecido se apresenta no estágio de remodelamento (Fig. 14A'').

Tal como o grupo não tratado, o KP4s demonstrou o epitendão ao redor do tecido tendíneo, porém, ficou evidente uma melhor integridade deste tecido de revestimento e sua aderência junto ao tendão. Na região lesada diversos locais com o fio de sutura ainda integro puderam ser notados. Rodeando os fios, uma abundante celularização ficou evidente, quando observamos em maior aumento os detalhes destas regiões de alta quantidade celular, foi perceptível a presença de diminutos vasos sanguíneos. Algumas fibras colágenas apresentaram-se organizadas, mas não tanto quanto o grupo não tratado K4s (Figs. 14B, B', B'').

Figura 14: Microscopia de luz dos grupos lesados K4s e KP4s. Cortes longitudinais. **(A)** Grupo K4s. Epitendão (seta maior), vaso sanguíneo de grande calibre (*), vaso sanguíneo de pequeno calibre (seta menor), resquício de fio de sutura (cabeça de seta). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(A')** Fio de sutura (seta), resquício de fio de sutura (cabeça de seta). Aumento 40x, barra: 500 µm. **(A'')** Fibras colágenas (setas). Aumento 100x, barra: 100 µm. **(B)** Grupo KP4s. Epitendão (cabeças de seta), fios de sutura (setas). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. **(B')** Aglomerado celular (*). Aumento 40x, barra: 500 µm. **(B'')** Fibras colágenas (setas), vasos sanguíneos (cabeças de setas). Aumento 100x, barra: 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

Os resultados obtidos nos cortes transversais dos grupos em que foram utilizada a técnica de sutura de Kessler-Tajima e analisado após quatro semanas, apresentaram semelhanças com os grupos da sutura-U analisados ao mesmo tempo.

Ambos os grupos K4s e KP4s mostraram um pequeno espaçamento ao redor do fio de sutura, sendo que o grupo K4s demonstra seu tecido conjuntivo denso mais unido, o tratado KP4s, possui um maior espaçamento ao longo do tecido (Figs. 15A, B).

Analises em maior aumento revelaram nos dois grupos a presença de delgados vasos sanguíneos distribuídos ao longo do tecido, um fio de sutura na região central do grupo KP4s pode ser analisado com uma densa celularização ao seu redor. Nenhum dos grupos nessas analises transversais apresentam um certo grau de alinhamento e organização das fibras colágenas (Figs. 15A', B').

Figura 15: Microscopia de luz dos grupos lesados K4s e KP4s. Cortes transversais. (A) Grupo K4s. Fio de sutura (cabeça de seta), espaço ausente de tecido (seta). Aumento 40x, barra: 500 μ m. (A') Vasos sanguíneos (setas). Aumento 100x, barra: 100 μ m. (B) Grupo KP4s. Fio de sutura (cabeças de seta), espaço ausente de tecido (setas). Aumento 40x, barra: 500 μ m. (B') Vasos sanguíneos (cabeças de seta), aglomerado celular (seta). Aumento 100x, barra: 100 μ m. Coloração: Hematoxilina-Eosina.

5.2.2 Coloração de picrosirius red

5.2.2.1 Grupos controle e lesados, corte longitudinal

Análises realizadas utilizando o corante picrosirius red em microscópio de luz convencional evidenciou todo o colágeno que compõem o tecido corado em tom de vermelho alaranjado, estruturas não-colágenas apareceriam na cor amarela, tal fato não foi notado, o que demonstra que apenas o tendão foi analisado.

Podemos afirmar que todo o tecido independente de grupo, técnica de sutura e tempo de análise é composto por colágeno, desta forma, não é possível distinguir o tipo de colágeno em campo claro (Figs. 16A até 16I).

Sendo assim, analisamos os mesmos cortes em microscópio de luz polarizada onde as fibras colágenas emitem sua birrefringência natural sendo possível distinguir dois tipos: O colágeno tipo I em tons de amarelo ao vermelho e o tipo III em tons de verde.

O grupo controle sendo composto quase que totalmente por colágeno tipo I aparece quase todo em amarelo, alguns pequenos pontos verdes de colágeno tipo III foram notados na região proximal ao músculo (Fig. 16A').

Diferente do que pode ser visto no controle, os grupos lesados apresentaram uma variada distribuição do colágeno, no grupo U2s o tipo III está localizado em sua maior totalidade nas extremidades do tecido em lados opostos, enquanto que o tipo I está ao longo do tendão transversalmente (Fig. 16B'). Quando tratamos com a proteína F1, o colágeno tipo III apresentou-se no grupo UP2s em sua maior totalidade na região distal do tecido e aparentemente a quantidade do tipo I é maior quando comparado com o grupo não tratado (Fig. 16C').

Ao contrário do observado no grupo UP2s, o grupo K2s demonstrou a maior concentração de colágeno tipo III na região proximal e o tipo I no restante do tecido. Na região distal um ponto de alta birrefringência com predomínio do tipo I foi nitidamente notado (Fig. 16D'). Oposto também ao visualizado no grupo UP2s, o grupo KP2s apresentou uma aparente maior quantidade de colágeno tipo III ao longo de todo o tecido, um similar local de alta birrefringência como visto no grupo K2s na região distal foi observada (Fig. 16E').

Quando os grupos foram analisados após 4 semanas, a distribuição dos colágenos apresentou-se menos concentradas nas extremidades como visto nos grupos de 2 semanas, com exceção do grupo K4s. O grupo U4s demonstrou ambos colágenos ao longo de todo o tecido com proporções aparentemente similares (Fig. 16F'), já o grupo UP4s mostrou um predomínio do colágeno tipo III ao longo de todo o tecido (Fig. 16G').

Um resultado similar entre os grupos em que foi utilizada a técnica de sutura de Kessler-Tajima foi observada, o grupo sem tratamento K4s apresentou um predomínio do colágeno tipo I ao longo do tecido, o tipo III mais concentrado na região distal, mas com uma pequena quantidade na região proximal ao ventre muscular (Fig. 16H'), entretanto o grupo tratado KP4s apresenta ambos os colágenos distribuídos pelo tecido com uma certa concentração do tipo III na região central (Fig. 16I').

Figura 16: Microscopia de luz de campo claro dos grupos: **(A)** Controle. **(B)** U2s. **(C)** UP2s. **(D)** K2s. **(E)** KP2s. **(F)** U4s. **(G)** UP4s. **(H)** K4s. **(I)** KP4s. Microscopia de luz polarizada. Colágeno tipo I em tons de amarelo ao vermelho e colágeno tipo III em tons de verde. Grupo: **(A')** Controle. **(B')** U2s. **(C')** UP2s. **(D')** K2s. **(E')** KP2s. **(F')** U4s. **(G')** UP4s. **(H')** K4s. **(I')** KP4s. Aumento 20x, barra: 1.000 µm. Coloração: Picrosirius red.

5.2.3 Cortes transversais

5.2.3.1 Grupo controle

Assim como visto anteriormente nas análises histológicas do grupo controle, corada com Hematoxilina-Eosina, as análises utilizando a coloração de picrosirius red evidenciam o tecido conjuntivo que envolve o conjunto vâsculo-nervoso periférico, bem como o que está intimamente aderido ao tendão calcâneo (Fig. 17A).

Em maior aumento podemos observar sob luz polarizada o predomínio do colágeno tipo I em tons de amarelo e vermelho que compõem o tendão em condições normais (Fig. 17B) e sem polarização a intensa coloração vermelho alaranjado se dá devido à composição do tendão, sendo ela basicamente constituída por colágenos (Fig. 17C).

Figura 17: Microscopia de luz do grupo controle. Corte transversal. (A) Tecido conjuntivo que envolve o conjunto vâsculo-nervoso (cabeças de seta), ao redor do tendão (setas), tendão (T). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B, B') Tendão calcâneo (T). Aumento: 100x, barra: 100 µm.. Coloração: Picrosirius red. (A, B) Análise por luz polarizada. (B') Análise por luz convencional.

5.2.3.2 Grupos lesados U2s e UP2s

Análises de cortes transversais utilizando a coloração de picrosirius red nos grupos lesados revelam no grupo U2s o predomínio de colágeno tipo I ao redor do tendão e o colágeno tipo III localizado centralmente em sua grande maioria. Dois conjuntos vâsculo-nervosos localizados um em cada lateral do tendão puderam ser claramente observados (Fig. 18A).

Maior aumento com de um desses conjuntos em luz polarizada evidenciou o tecido conjuntivo constituído basicamente de colágeno tipo I, revestindo e sustentando todos os vasos sanguíneos e nervos, nota-se ainda a divisão o limite entre o tendão e tal rede vâsculo-nervosa (Fig. 18A').

Entretanto, a mesma região analisada sob luz convencional, ajuda a diferenciar os vasos sanguíneos dos nervos e ainda revela um fio de sutura localizado mais ao centro do tendão (Fig. 18A").

Já o grupo tratado UP2s, diferente do que foi observado no não tratado, apresentou os dois tipos de colágeno entremeados com destaque para o predomínio do tipo I, a rede vâsculo-nervosa não ficou tão evidente quanto no grupo não tratado, porém, os vasos sanguíneos foram observados nas periferias do tecido. A inervação só foi possível de ser detectada em maior aumento e estava separada do vasos periféricos, localizada mais ao centro do tendão. Em maior aumento também foi mostrado que o tecido de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão é composto primordialmente por colágeno tipo III (Figs. 18B, B').

Sob luz convencional notamos a presença de outros vasos sanguíneos próximos ao nervo e todos os fios de sutura, sendo dois no centro e o nó dos fios mais lateral (Fig. 18B").

Figura 18: Microscopia de luz dos grupos U2s e UP2s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (A) Conjunto vâsculo-nervoso (setas). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (A') Detalhe do tecido conjuntivo que reveste o conjunto vâsculo-nervoso (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (A'') Vasos sanguíneos (setas finas), nervos (cabeças de seta), fio de sutura (seta larga). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B) Vasos sanguíneos periféricos (setas). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (B') Nervo (seta), tecido conjuntivo entre o tendão e o fio de sutura (*). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B'') Vasos sanguíneos (setas finas), nervo (cabeças de seta), fio de sutura (setas largas). Aumento: 40x, barra: 500 µm. Coloração: Picrosirius red. (A, A', B, B') Análise por luz polarizada. (A'', B'') Análise por luz convencional.

Diferente ao que foi observado nos grupos da sutura-U descritos anteriormente, ambos os grupos da sutura de Kessler-Tajima analisados transversalmente com duas semanas, apresentam um maior predomínio do colágeno tipo III.

O grupo K2s revelou uma morfologia desconforme em relação a todos os demais grupos, sendo que os grupos apresentaram um padrão ovalado/arredondado e este alongado e estreito. Houve uma concentração de colágeno tipo I na lateral direita, bem como um conjunto vascular na lateral oposta também pode ser notada (Fig. 19A).

Análise ao microscópio de luz polarizada, evidenciou o conjunto vascular, sendo que o tecido conjuntivo ao redor dos vasos demonstrou ser constituído essencialmente por colágeno tipo I, já sob luz convencional, os vasos sanguíneos que compõem este conjunto tornam-se claros (Figs. 19A', 19A").

O grupo tratado KP2s apresentou novamente o padrão morfológico visto nos outros grupos analisados, com exceção ao K2s, entretanto, não é perceptível nenhum acúmulo de colágeno tipo I como visto no grupo não tratado, mas um conjunto vículo-nervoso localizado na periferia do tendão assemelha-se com os grupos U2s e K2s (Fig. 19B).

Em maior aumento o colágeno tipo I torna-se evidente ao redor dos vasos sanguíneos e do nervo que compõem tal conjunto (Figs. 19B', B").

Figura 19: Microscopia de luz dos grupos K2s e KP2s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (**A**) Conjunto vascular (seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 μm . (**A'**) Detalhe do tecido conjuntivo que reveste o conjunto vascular (seta). Aumento: 40x, barra: 500 μm . (**A''**) Vasos sanguíneos (setas). Aumento: 40x, barra: 500 μm . (**B**) Conjunto vículo-nervoso (seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 μm . (**B'**) Detalhe do tecido conjuntivo que reveste o conjunto vículo-nervoso (setas). Aumento: 40x, barra: 500 μm . (**B''**) Vasos sanguíneos (setas), nervo (cabeça de seta). Aumento: 40x, barra: 500 μm . Coloração: Picrosirius red. (**A**, **A'**, **B**, **B'**) Análise por luz polarizada. (**A''**, **B''**) Análise por luz convencional.

O grupo U4s apresentou uma morfologia arredondada e um predomínio de colágeno tipo I, quando comparado ao grupo U2s, assim como seu grupo de relação, o conjunto vâsculo-nervoso encontra-se localizado na periferia do tendão. Ao redor do nó do fio de sutura, não ficou evidente o tecido de transição entre com o tendão. Um maior aumento nos mostra que o colágeno tipo III está entremeado entre o tipo I, mas não foi detectado pontos de acúmulo de nenhum dos dois tipo, nota-se também alguns vasos sanguíneos distribuídos ao redor do tendão (Figs. 20A, A', A'').

O grupo tratado UP4s apresentou características semelhantes ao mesmo grupo avaliado com duas semanas, ou seja, ambos os colágenos avaliados encontram-se mesclados no tecido com predomínio do tipo I, porém, estas fibras aparentemente apresentam um padrão menos organizado quando comparados aos demais grupos (Fig. 20B).

A vascularização e a inervação mostraram aspectos semelhantes ao grupo UP2s, um conjunto vascular foi detectado na periferia do tendão e um nervo foi localizado mais ao centro. Ao redor dessas estruturas, como já visto em todos os outros grupos há um tecido conjuntivo constituído predominantemente por colágeno tipo I (Figs. 20B, B', B'').

Figura 20: Microscopia de luz dos grupos U4s e UP4s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde **(A)** Vaso sanguíneo (seta), nervo (cabeça de seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. **(A')** Tecido conjuntivo entre o tendão e o fio de sutura (*), vaso sanguíneo (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. **(A'')** Fio de sutura (cabeça de seta), vaso sanguíneo (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. **(B)** Vaso sanguíneo (seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. **(B')** Tecido conjuntivo ao redor do vaso sanguíneo e do nervo. Aumento: 40x, barra: 500 µm. **(B'')** Vasos sanguíneos (setas), nervo (cabeça de seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. Coloração: Picrosirius red. **(A, A', B, B')** Análise por luz polarizada. **(A'', B'')** Análise por luz convencional.

O grupo K4s passa a apresentar uma morfologia semelhante aos demais grupos, uma vez que com duas semanas ele demonstrou um padrão alongado quanto à forma, assim como no grupo K2s, vasos sanguíneos periféricos também foram visualizados e um nervo foi evidente localizado próximo a estes vasos (Fig. 21A).

Em maior aumento é possível observar cuidadosamente uma rede de pequenos vasos sanguíneos rodeando o tendão. O tecido de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão é uma mescla de colágeno tipo I e III, outro ponto em que destaca-se é o tecido conjuntivo ao redor dos fios de sutura isolados na periferia, diferente dos vasos sanguíneos que são rodeados por colágeno tipo I, os fios são envolvidos por colágeno tipo III (Fig. 21A', A'').

Já o grupo tratado KP4s torna-se mais arredondado do que o grupo de duas semanas KP2s e também apresenta o conjunto vículo-nervoso localizado na periferia do tecido, mas o tecido de transição entre o nó dos fio e o tendão é predominantemente constituído por colágeno tipo I (Fig. 21B, B').

Neste grupo, em maior aumento, ficou ainda mais evidente a diferença dos tecidos que circundam vasos e nervos composto por colágeno tipo I, e ao redor do fio de sutura isolado constituído por colágeno tipo III (Figs. 21B', B'').

Figura 21: Microscopia de luz dos grupos K4s e KP4s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (**A**) Conjunto vascular (seta), nervo (cabeça de seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (**A'**) Tecido de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão (*), vasos sanguíneos (cabeças de seta), tecido conjuntivo ao redor de fios de sutura (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (**A''**) Nó dos fios de sutura (seta), vasos sanguíneos (cabeças de seta), fio de sutura (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (**B**) Conjunto vâsculo-nervoso (seta), tecido de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão (cabeça de seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (**B'**) Tecido conjuntivo ao redor do conjunto vâsculo-nervoso (cabeça de seta) e do fio de sutura (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (**B''**) Vasos sanguíneos (setas finas), nervo (cabeça de seta), fio de sutura (seta larga). Aumento: 40x, barra: 500 µm. Coloração: Picrosirius red. (**A**, **A'**, **B**, **B'**) Análise por luz polarizada. (**A''**, **B''**) Análise por luz convencional.

5.3 Microscopia eletrônica de varredura

5.3.1 Grupo controle

Cortes longitudinais por crio-fratura foram realizados com o intuito de analisar a disposição das fibras colágenas que compõe o tecido, desta maneira, aumentos de 100, 500 e 2.000 vezes foram utilizados para comparar um grupo ao outro.

O grupo controle apresentou de forma bem definida o epitendão revestindo todo o tendão perifericamente, os fascículos de fibras colágenas ficaram nitidamente evidentes possuindo um pequeno espaço entre eles, maiores aumentos evidenciam feixes colágenos e algumas fibras isoladas (Figs. 22A, B, C).

Figura 22: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal do grupo controle. **(A)** Epitendão (*). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. **(B)** Fascículo de fibras colágenas (*). Aumento: 500 x, barra: 50 µm. **(C)** Feixe de fibras colágenas (seta), fibras colágenas (cabeças de seta). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm.

As amostras também foram crio-fraturadas transversalmente para evidenciar o diâmetro total do tendão, bem como a superfície das fibras colágenas, para isso utilizamos aumentos de 34, 5.000 e 20.000 vezes.

Observamos que a elevada densidade colágena acarreta a ausência de espaços entre as fibras, que mantêm-se intimamente unidas (Figs. 23A, B, C).

Figura 23: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal do grupo controle. **(A)** Mostra o aspecto geral do tendão. Aumento: 34x, barra: 500 µm. **(B)** Superfície evidenciando a alta densidade das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barra: 1 µm. **(C)** Maior aumento das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barra: 1 µm.

5.3.2 Grupos lesados U2s e UP2s

O grupo U2s apresentou fios de sutura em suas extremidades, próximo a eles, uma elevada vascularização foi observada, nesta região as fibras colágenas não apresentaram um padrão de organização (Fig. 24A). A região lesada observada em um campo amplo demonstra uma alta densidade de fibras (Fig. 24B). Ao analisar em maior aumento fica nítido que estas fibras não possuem uma organização definida em feixes, e muito menos em fascículos (Fig. 24B').

No grupo U2s, bem como, no UP2s foram observados fios de sutura, entretanto neste grupo as fibras que os circundam apresentaram uma melhor disposição (Fig. 24C), em aumento geral nota-se uma melhor organização das fibras, destaca-se aqui o aspecto ondulado destas fibras (Fig. 24D), a mesma área sob maior aumento evidencia grupamentos de fibras aparentemente de menor diâmetro, não organizadas sobre as fibras colágenas onduladas (Fig. 24D').

Figura 24: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. (A, B, B') Grupo U2s. (A) Mostra fio de sutura (f), vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100x, barra: 200 μm. (B) Região da lesão mostrando as fibras colágenas. Aumento: 500x, barra: 50 μm. (B') Mostra as fibras colágenas em maior aumento. Aumento: 2.000 x, barra: 10 μm. (C, D, D') Grupo UP2s. (C) Fio de sutura (f). Aumento: 100 x, barra: 200 μm. (D) Área de lesão. Aumento: 500 x, barra: 50 μm. (D') Fibras colágenas onduladas (*), agrupamento de delgadas fibras (seta). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μm.

Amostras obtidas por fraturas transversais, examinadas ao microscópio eletrônico de varredura nos grupos da sutura-U de duas semanas mostraram um aumento no diâmetro de todos os grupos lesados, independente do tratamento e do tempo em relação ao grupo controle (Figs. 25A, C).

Em todos os grupos também foram detectados fios de sutura, assim como, demonstrou o aspecto estrutural dos conjuntos vâsculo-nervosos previamente vistos pela microscopia de luz (Figs. 25A, C).

Análises em maiores aumentos foram padronizadas na região central do tendão, sendo assim, no grupo U2s observamos espaços entre as fibras colágenas e uma desorganização do tecido (Fig. 25B). Em maior aumento da mesma região, foi evidenciada o início de uma organização em feixes das fibras colágenas, entretanto pode ser notado um espaçamento entre eles (Fig. 25B').

No grupo tratado com a proteína F1 por duas semanas e utilizando a sutura-U, UP2s, notou-se também um certo grau de espaçamento entre os feixes de fibras, porém, qualitativamente este grupo demonstrou possuir as fibras mais próximas umas das outras (Fig. 25D).

Pequenos feixes de fibras colágenas podem ser observados em maior aumento, no entanto algumas dessas fibras apresentaram-se desorganizados e assim como no grupo sem tratamento a presença dos espaços entre elas (Fig. 25D').

Figura 25: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B') Grupo U2s. (C, D, D') Grupo UP2s. Na primeira fileira, imagens A e C, mostram o aspecto geral dos tendões com fios de sutura (setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 μm. Na segunda fileira, imagens B e D mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 1 μm. Na terceira fileira, imagens B' e D' são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1 μm.

5.3.3 Grupos lesados K2s e KP2s

A presença de fio de sutura no grupo K2s também foi notado, contíguo a este observou-se a presença de vaso sanguíneo, contudo, as fibras colágenas que o circundam não demonstraram um padrão de alinhamento (Fig. 26A).

Tal fato pode ser notado em todo o tecido, entretanto, detalhes obtidos em maiores aumentos revelaram um inicial padrão de agrupamento em feixes, a presença de hemácia foi constatada por entre delgadas fibras dispostas em diversas direções (Figs. 26B, B').

Com esta técnica, não foi detectado no grupo tratado KP2s a presença de fio de sutura, entretanto vários vasos sanguíneos foram notados na mesma região a qual observamos fio de sutura nos demais grupos (Fig. 26C).

As fibras colágenas demonstraram um alinhamento paralelo entre si no local de lesão com a presença de algumas fibras onduladas (Fig. 26D, D'). Ambos os grupos com e sem tratamento com a proteína F1 apresentaram uma similaridade na disposição e na proximidade das fibras colágenas (Figs. 26B, B', D, D').

Figura 26: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. **(A, B, B')** Grupo K2s. **(A)** Fio de sutura (f), vaso sanguíneo (seta). Aumento: 100 x, barra: 200 μ m. **(B)** Região de lesão. Aumento: 500 x, barra: 50 μ m. **(B')** Pequeno feixe de fibras colágena (cabeça de seta), hemácia (seta). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(C, D, D')** Grupo KP2s. **(C)** Vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100 x, barra: 200 μ m. **(D)** Local de lesão. Aumento: 500 x, barra: 50 μ m. **(D')** Fibras colágenas onduladas (*), delgadas fibras (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m.

A análise dos tecidos fraturados transversalmente referente ao grupo tratado com a técnica de sutura de Kessler-Tajima sem tratamento K2s, mostrou o conjunto vículo-nervoso periférico, assim como, um vaso sanguíneo de diâmetro maior e dois nervos logo abaixo próximos a um pequeno fio de sutura (Fig. 27A).

Este aspecto foi semelhantemente encontrado no grupo tratado KP2s, contudo, três espessos fios de sutura foram notados na região central do tendão (Fig. 27C).

Ambos os grupos apresentaram características muito similares quanto à organização das fibras colágenas, que apresentam uma grande proximidade entre si e ausência de espaços interfibrilares encontrados nos grupos da sutura-U (Figs. 27B, B', D, D').

Destaca-se que no grupo tratado, mesmo possuindo as fibras próximas como no grupo não tratado, difere pelo fato de que as fibras estão em um melhor padrão organizacional dispostas em pequenos feixes (Fig. 27D')

Figura 27: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B') Grupo K2s. (C, D, D') Grupo KP2s. Na primeira fileira, imagens A e C mostram o aspecto geral dos tendões, fios de sutura (setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 µm. Na segunda fileira, imagens B e D mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 1 µm. Na terceira fileira, imagens B'e D' são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1µm.

5.3.4 Grupos lesados U4s e UP4s

Após 4 semanas de lesão não foi observado no grupo U4s a presença do fio de sutura, entretanto, vários vasos sanguíneos foram observados na região em que o fio foi colocado, ambas características são idênticas as notadas no grupo KP2s (Fig. 28A).

As fibras colágenas analisadas em maior aumento na região de lesão mostraram uma organização paralela entre si e um aparente início de formação de feixes de fibras (Figs. 28B, B').

Já o grupo UP4s, que foi tratado com a proteína F1, a presença de fio de sutura em reabsorção foi notado, ao seu redor as fibras colágenas apresentaram uma melhor organização em comparação ao mesmo grupo analisado com duas semanas (Fig. 28C).

Entre estas fibras foram constatadas na região lesada, a presença de vênulas, sendo uma delas cheia de hemácias em seu interior e uma arteríola (Fig. 28D), ao redor deste conjunto arteriovenoso, em maior aumento revela, um padrão de organização das fibras colágenas sendo que algumas apresentam ondulações e estão entremeadas por conjuntos de delgadas fibras (Fig. 28D'), resultados similares foram observados nos grupos tratados e analisados com duas semanas, UP2s e KP2s (Figs. 24D' e 26D').

Figura 28: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. **(A, B, B')** Grupo U4s. **(A)** Vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100 x, barra: 200 μ m. **(B)** Área de lesão mostrando a disposição das fibras colágenas. Aumento: 500 x, barra: 50 μ m. **(B')** Feixes de fibras colágenas (setas). Aumento: 2.000 x barra: 10 μ m. **(C, D, D')** Grupo UP4s. **(C)** Fio de sutura (f). Aumento: 100 x, barra: 200 μ m. **(D)** Vênula com hemácias (seta fina), vênulas (setas largas), arteríola (cabeça de seta). Aumento: 500 x, barra: 50 μ m. **(D')** Fibras colágenas com aspecto ondulado (setas), fibras de menor diâmetro (cabeças de seta). Aumento: 2000 x, barra: 10 μ m.

As crio-fraturas transversais dos grupos analisados após quatro semanas não apresentaram fio de sutura isolado no grupo U4s, porém, identificou-se no grupo tratado. O grupo não tratado apresenta um discreto conjunto vâsculo-nervoso na periferia, enquanto o grupo UP4s revela dois grandes vasos periféricos com paredes espessas e um nervo quase ao centro do tendão (Figs. 29A, C).

Ambos os grupos apresentaram características muito semelhantes quanto à disposição das fibras colágenas, nos dois grupos existem espaços, porém, existe uma discreta tendência desses espaços serem menores no grupo não tratado U4s (Figs. 29B, D).

Em maior aumento, nota-se que o grupo não tratado possui as fibras mais unificadas com um padrão de feixe (Fig. 29B’).

Característica levemente desigual é observada no grupo tratado UP4s, em que as fibras possuem um certo grau de proximidade, mas não a ponto de demonstrar uma organização em feixes (Fig. 29D’).

Figura 29: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B') Grupo U4s. (C, D, D') Grupo UP4s. Na primeira fileira, imagens A e C, mostram o aspecto geral dos tendões com fios de sutura (setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 μ m. Na segunda fileira, imagens B e D mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 1 μ m. Na terceira fileira, imagens B' e D' são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1 μ m.

5.3.5 Grupos lesados K4s e KP4s

No grupo K4s e no KP4s, fios de sutura puderam ser observados, ao redor deles, ficou evidente a presença de pequenos vasos sanguíneos (Fig. 30A, C).

Com relação às fibras colágenas, estas apresentaram características muito semelhantes nos dois grupos, sendo que ficou evidente pela técnica de crio-fratura longitudinal a aproximação entre elas, denotando uma grande quantidade de tecido (Figs. 30B, D).

Tal aspecto tornou-se mais perceptível em maior aumento, em que é possível notar a formação de alguns feixes, entre delgadas fibras que estão presentes ao longo de todo o tecido (Fig. 30B', D').

Figura 30: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. **(A, B, B')** Grupo K4s. **(A)** Fio de sutura (f), vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100 x, barra: 200 μ m. **(B)** Região lesada demonstrando as fibras do tecido conjuntivo. Aumento: 500 x, barra: 50 μ m. **(B')** Feixes de fibras colágenas (setas), fibras colágenas (cabeça de seta). Aumento: 2000 x, barra: 10 μ m. **(C, D, D')** Grupo KP4s. **(C)** Fio de sutura (f), vasos sanguíneos (seta). Aumento: 100 x, barra: 200 μ m. **(D)** Área de lesão demonstrando as fibras de tecido conjuntivo. Aumento: 500 x, barra: 50 μ m. **(D')** Feixes de fibras colágenas (setas), fibras colágenas (cabeça de seta). Aumento: 2000 x, barra: 10 μ m.

Crio-fratura dos grupos da sutura de Kessler-Tajima analisados transversalmente após quatro semanas apresentam resultados semelhantes, ou seja, os dois demonstram fios de sutura, conjuntos vâsculo-nervosos periféricos, porém, o grupo tratado KP4s em uma visão geral do tecido aparenta possuir mais espaços ausentes de tecido (Figs. 31A, C).

Quando observados em maior aumento, ficou claro também a semelhança nas características de organização e disposição das fibras colágenas que apresentam um perfil de inicial formação de feixes com um arranjo em camadas. Foi possível notar ainda os pequenos espaços que formam esse padrão de camadas (Figs. 31B, B', D, D').

Figura 31: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B') Grupo K4s. (C, D, D') Grupo KP4s. Na primeira fileira, imagens A e C, mostram o aspecto geral dos tendões com fios de sutura (setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 μm. Na segunda fileira, imagens B e D mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 1 μm. Na terceira fileira, imagens B' e D' são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1 μm.

5.4 Microscopia eletrônica de transmissão

5.4.1 Grupo controle

Análises realizadas em microscópio eletrônico de transmissão revelaram as características ultraestruturais das estruturas que compõem o tendão.

O grupo controle apresentou pouca quantidade de células e uma alta densidade de fibrilas colágenas, nestas condições demonstramos um tenócito rodeado por uma densa matriz colágena (Fig. 32A). Quando examinado em maior aumento, foi evidenciado no citoplasma desta célula as mitocôndrias, assim como, externamente foi mostrada a disposição/organização paralela das fibrilas que compõem a MEC (Fig. 32B), uma vista detalhada destas fibrilas revela suas estriações, sendo que, as escuras são conhecidas e denominadas na literatura de *overlap* e as claras como *gap* (Fig. 32C).

Figura 32: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais do grupo controle. (A) Mostra um tenócito (seta) entre uma densa rede de fibrilas colágenas. Aumento: 2.000 x. (B) Maior aumento do tenócito evidenciando as mitocôndrias (setas) e as fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000 x. (C) Fibrilas colágenas mostrando as bandas escuras (seta) e as claras (cabeça de seta). Aumento: 50.000 x.

Cortes transversais foram realizados e analisados na técnica de microscopia eletrônica de transmissão com o intuito principal de avaliar a disposição, organização, densidade e diâmetro das fibrilas colágenas, os dados são descritos qualitativamente por esta técnica, mas também foram quantificados e estão apresentados nos resultados estatísticos.

Assim como nos cortes longitudinais, os cortes transversais demonstraram no grupo controle uma pequena celularização e elevada matriz colágena (Fig. 33A). Em maior aumento destas fibrilas foram mostrados os prolongamentos citoplasmáticos de um tenócito, responsáveis pela comunicação entre uma célula e outra entremeados entre as fibrilas (Fig. 33B).

Ao analisarmos em um grande aumento com o intuito de observar a disposição transversal, é possível notar uma homogeneidade no diâmetro fibrilar assim como uma organização a qual as fibrilas colágenas apresentam um elevado grau de proximidade entre elas e pouco espaço de matriz circundando-as (Fig. 33C).

Figura 33: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais do grupo controle. (A) Mostra o aspecto geral do tecido e dois tenócitos (setas). Aumento: 2.000x, barra: 10 µm. (B) Maior aumento evidenciando projeções citoplasmáticas (setas) de tenócitos entre fibrilas colágenas. Aumento: 20.000x, barra: 500 nm. (C) Aumento demonstrando a organização das fibrilas colágenas. Aumento: 50.000x, barra: 500 nm.

5.4.2 Grupos lesados U2s e UP2s

Ao analisarmos os grupos lesados observamos no U2s uma elevada celularização ao longo de todo o tecido e uma menor densidade de matriz colágena (Fig. 34A), podemos notar que as fibrilas presentes no meio extracelular não possuem uma organização e estão dispostas em diversas orientações (Fig. 34B), a presença de adipócitos de tamanhos variados foi constatada entre uma esparsa matriz colágena (Fig. 34C).

Assim como o grupo U2s, o grupo UP2s apresentou uma quantidade maior de células em relação ao grupo controle, as fibrilas colágenas também apresentam uma menor densidade e não possuem uma organização definida (Fig. 34D).

Nesse grupo ainda constatamos a presença de mastócitos que exibem um contorno irregular com filopódios, tal morfologia representa o aspecto característico desta célula, no citoplasma grânulos elétron-densos podem ser observados, bem como um grande núcleo, propinquamente nota-se a presença de um tenoblasto o qual também possui um vasto núcleo eucromático com áreas periféricas de heterocromatina, muito similar ao núcleo do mastócito visto ao lado (Fig. 34E).

Em maior aumento evidenciou-se delgadas fibrilas colágenas, como elas não apresentam um alinhamento paralelo, apenas partes podem ser constatadas, assim como suas estriações. No entanto, destacamos o espaço entre cada uma delas demonstrando a esparsa MEC (Fig. 34F).

Figura 34: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. (A, B, C) Grupo U2s. (A) Mostra tenócitos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (B) Fibrilas colágenas (*), núcleo de tenócito (n). Aumento: 7.500 x, barra: 500 nm. (C) Adipócitos (a), tenócito (seta), fibrilas colágenas (cabeça de seta). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (D, E, F) Grupo UP2s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (E) Mastócito (seta larga), seu núcleo (n), grânulos citoplasmáticos (cabeças de seta), filopódio (seta fina), núcleo de tenoblasto (nt). Aumento: 4.000 x, barra: 500 nm. (F) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 20.000 x, barra: 100 nm.

Assim como observado nos corte longitudinais, os transversais apresentaram uma elevada celularização em todos os grupos com as células espalhadas por todo o tecido. É possível notar que no grupo tratado UP2s as células apresentam um tamanho relativamente maior e em menor quantidade do que as presentes no seu respectivo grupo não tratado, outro aspecto que difere entre esses dois grupos é a presença de capilares entre a matriz colágena (Figs. 35A, D).

O grupo não tratado U2s apresentou fibrilas colágenas de tamanhos variados, sendo que a maioria delas possuem diâmetros bem pequenos, entretanto esse tamanho pequeno é suprido pelo maior número delas dispostas ao longo do tecido, ainda assim, encontra-se em determinados pontos espaços sem fibrilas colágenas (Figs. 35B, C).

Analizando o grupo tratado UP2s, nota-se que as fibrilas possuem um tamanho mais homogêneo e são maiores do que as presentes no grupo não tratado U2s. O maior diâmetro fibrilar diminui conseqüentemente diminui a densidade, mas mesmo assim não preenche todos os espaços do tecido e assim como no grupo não tratado, podemos observar alguns pontos com ausência de fibrilas colágenas (Figs.35E, F).

Figura 35: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo U2s. (A) Mostra tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (B) Espaço com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrila colágeno de maior tamanho (seta) e de menor tamanho (cabeça de seta). Aumento: 50.000x, barras: 500 nm. (D, E, F) Grupo UP2s. (D) Tenoblastos (seta), capilar (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (E) Espaços com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500nm.

5.4.3 Grupos lesados K2s e KP2s

O grupo K2s apresentou no local da lesão hemácias dispostas no meio extracelular e uma grande quantidade de tenoblastos com formatos variados e amplos núcleos que ocupam quase todo o meio intracelular (Fig. 36A).

Entre essas células são notadas fibrilas colágenas dispostas tanto longitudinalmente quanto transversalmente, observa-se que assim como nos grupos em que utilizamos a sutura-U esse grupo com a sutura de Kessler-Tajima também não apresenta um padrão de organização das fibrilas neste estágio inicial de reparo do tecido (Fig. 36B).

Ainda nesse grupo constatamos a presença de capilares, com evidente célula endotelial que forma a parede do vaso, em proximidade alguns axônios mielínicos e amielínicos estão presentes, estas últimas por sua vez estão sendo envolvidos por célula de Schwann (Fig. 36C).

Quando tratamos com a proteína F1 o grupo KP2s apresentou uma menor quantidade de células, contudo, evidenciam nos tenoblastos grandes núcleos eucromáticos e um nucléolo em cada célula, a matriz colágena não demonstrou nenhum aspecto de organização das fibrilas e não foram constatadas a presença de hemácias como no grupo não tratado K2s (Fig. 36D).

Destacamos nesse grupo o extenso retículo endoplasmático granular presente nos tenoblastos, ao redor dessas células as fibrilas colágenas apresentaram-se paralelas umas às outras (Fig. 36E).

Outro ponto que se destaca é a vascularização, diferente do grupo K2s, os vasos sanguíneos dispostos entre a matriz colágena encontrados nesse grupo tratado KP2s, possuíam diâmetros maiores o que evidencia o maior número de células endoteliais necessárias para compor toda a parede do vaso (Fig. 36F).

Figura 36: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. **(A, B, C)** Grupo K2s. **(A)** Tenoblastos (setas) e seus núcleos (n), hemácias (h). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(B)** Núcleo de tenoblasto (n), fibrilas colágenas horizontais (setas) e transversais (*). Aumento: 5.000 x, barra: 500 nm. **(C)** Capilar (*), núcleo da célula endotelial (seta fina), axônios mielínicos (setas largas) e amielínicos (cabeça de seta), núcleo da célula de Schwann (S). Aumento: 5.000 x, barra: 500 nm. **(D, E, F)** Grupo KP2s. **(D)** Núcleo (n) e nucléolos (setas) de tenoblastos. Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(E)** Núcleo de tenoblasto (n), retículo endoplasmático granular (seta), fibrilas colágenas (*). Aumento: 10.000 x, barra: 500 nm. **(F)** Núcleos das células endoteliais que compõem a parede de um vaso sanguíneo (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m.

Como já observado nos grupos da sutura-U, ambos os da sutura de Kessler-Tajima, possuem uma alta celularização, sendo que os dois grupos quando analisados transversalmente apresentam mais células do que os da sutura-U. Os tenoblastos dos grupos K2s e KP2s distribuídos ao longo de todo o tecido apresentam tamanhos e morfologia variada (Figs. 37A, D).

As observações das fibrilas colágenas revelam uma homogeneidade no diâmetro, porém, é possível notar que no grupo não tratado K2s estas fibrilas são relativamente menores em relação ao seu respectivo grupo tratado, sendo assim, as fibrilas no grupo K2s apresentam-se mais reunidas fazendo com que a soma destes dois fatores, menor diâmetro e maior proximidade aumenta a densidade por área, mesmo possuindo um espaço de matriz não colágena maior do que o visto no grupo tratado (Figs. 37B,C, F).

As fibrilas do grupo KP2s são um pouco maiores e conseqüentemente ocupam mais espaço na matriz, ocorrendo assim uma diminuição nos espaços ausentes de tecido, porém, causam uma diminuição na densidade fibrilar (Fig. 37E).

Figura 37: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo K2s. (A) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μm. (B) Espaço com ausência de fibrilas colágenas (setas). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm. (D, E, F) Grupo KP2s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μm. (E) Espaço com ausência de fibrilas colágenas (setas). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm.

5.4.4 Grupos lesados U4s e UP4s

Após 4 semanas de lesão/tratamento os grupos continuaram apresentando uma maior quantidade de células em relação ao controle. O grupo U4s exibiu células alongadas e muito grandes (Fig. 38A).

A matriz colágena que rodeia estas células, aparentemente é mais densa do que foi visualizado nos grupos analisados com 2 semanas (Fig. 38A). Vasos sanguíneos de diversos tamanhos distribuídos pelo tendão puderam ser observados, assim como o núcleo das células endoteliais formando suas paredes, uma ou várias hemácias em seus interiores claramente foram notadas demonstrando o aumento da vascularização nos grupos lesados (Figs. 38B, C).

Entretanto o grupo UP4s manteve o padrão de distribuição e a diversidade quanto ao formato e tamanho das células encontradas em todos os grupos analisados com duas semanas, porém, uma matriz colágena mais densa do que as observadas nos grupos de duas semanas também foi observada, sendo semelhante a encontrada no grupo U4s (Fig. 38D).

Como no grupo não tratado, o UP4s apresentou alguns vasos sanguíneos de diversos tamanhos distribuídos pelo tecido, no entanto, foi detectado nesse grupo a presença de alguns mastócitos, até então, apenas o grupo tratado UP2s havia demonstrado a presença destas células (Fig. 38E).

Outro aspecto que destaca-se no grupo SP4s foi a junção das microfibrilas colágenas para formar uma fibra, foi observado também uma fibra entre diversas microfibrilas (Fig. 38F).

Figura 38: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. **(A, B, C)** Grupo U4s. **(A)** Mostra tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(B)** Vasos sanguíneos (setas largas), núcleo da célula endotelial (seta fina), hemácia (h). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(C)** Vaso sanguíneo com diversas hemácias (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(D, E, F)** Grupo UP4s. **(D)** Núcleo de tenoblasto (n), fibrilas colágenas (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(E)** Núcleos de mastócitos (*), núcleos das células endoteliais (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. **(F)** Fibrila colágena (cabeça de seta), microfibrilas (setas). Aumento: 25.000 x, barra: 100 nm.

Tal como as análises dos cortes longitudinais, os cortes transversais apresentaram alta celularização, um ponto que destaca-se no grupo U4s é a elevada vascularização, sendo que ambos os seguimentos de corte do tecido revelam os vasos sanguíneos de diversos tamanhos distribuídos pelo tecido, (Fig. 39A).

Análises em maior aumento das fibrilas colágenas revelam uma similaridade dos diâmetros nos grupos tratados e não tratados, ou seja, é possível observar delgadas fibrilas com um certo espaçamento entre elas (Figs. 39B, E).

Fica evidente em maior aumento que o grupo não tratado U4s, possui uma maior densidade fibrilar em comparação ao grupo tratado com a proteína F1 UP4s, pois as fibrilas estão mais próximas umas das outras dando mais volume tecidual (Fig. 39C).

Já no grupo tratado, notamos uma maior distribuição das fibrilas colágenas ao longo do tecido, porém, um consequente espaçamento entre as fibrilas fazendo com que a densidade fibrilar seja menor, o que influencia até mesmo na diminuição do diâmetro do tendão (Fig. 39F).

Figura 39: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. **(A, B, C)** Grupo U4s. **(A)** Tenoblastos (setas), vasos sanguíneos (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. **(B)** Espaço com ausência de fibrilas colágenas (setas). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. **(C)** Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500nm. **(D, E, F)** Grupo UP4s. **(D)** Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. **(E)** Espaço com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. **(F)** Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm.

5.4.5 Grupos lesados K4s e KP4s

No grupo K4s destaca uma grande quantidade de células enfileiradas, entre elas as fibrilas colágenas acompanham o alinhamento celular (Fig. 40A).

Um ponto que destaca-se nesse grupo, foi a presença de mastócitos que até o momento só haviam sido encontrados nos grupos UP2s e UP4s, ou seja, que foram utilizados a sutura-U com o tratamento com a proteína F1, tal achado nos leva a acreditar que a presença deles não é devido ao tratamento. Ficou evidente no citoplasma os grânulos elétron-densos, assim como, alguns elétron-lúcidos em menor quantidade, seu núcleo eucromático apresentou pontos de condensação de heterocromatina na periferia. (Fig. 40B)

Ainda ao lado, pôde ser observado um alongado fibroblasto com um extenso retículo endoplasmático granular apresenta-se com o núcleo localizado em sua lateral direita (Fig. 40B).

Ainda no grupo K4s, foi encontrado macrófagos em que podemos notar seu núcleo irregular, no citoplasma claramente pode ser observado a presença de hemácias dentro de fagossomos (Fig. 40C).

No grupo tratado KP4s, delgados tenócitos muito alongados próximos a tenoblastos com fibrilas colágenas paralelas a eles puderam ser constatados (Fig. 40D).

Assim como nos outros grupos a presença de vasos sanguíneos foi demonstrada ao lado de um delgado tenócito (Fig. 40E).

Em maior aumento destacamos em um tenoblasto a presença de centríolos, as fibrilas colágenas ao redor da célula podem ser observadas tanto longitudinalmente quanto transversalmente, sugerindo que não existe ainda nessa região um completo alinhamento fibrilar (Fig. 40F).

Figura 40: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. (A, B, C) Grupo K4s. (A) Núcleo de tenoblastos (n), fibrilas colágenas (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (B) Núcleo de mastócito (n), grânulos elétron-densos (seta fina) e elétron-lúcidos (cabeça de seta), núcleo (nf) e retículo endoplasmático granular (seta larga) de tenoblasto. Aumento: 6.000 x, barra: 500 nm. (C) Núcleo de macrófago (n), hemácia (h). Aumento: 5.000 x, barra: 500 nm. (D, E, F) Grupo KP4s. (D) Tenócitos (setas finas), tenoblasto (setas largas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 μ m. (E) Vaso sanguíneo (*), núcleo da célula endotelial (seta), núcleo de tenócito (n). Aumento: 4.000 x, barra: 500 nm. (F) Núcleo de tenoblasto (n), centríolos (cabeças de seta), fibrilas colágenas longitudinais (setas) e transversais (*). Aumento: 20.000 x, barra: 100 nm.

O grupo K4s em análises transversais apresentaram, assim como nos demais grupos uma elevada celularização com uma variada morfologia (Fig. 41A).

As fibrilas colágenas quando analisadas em maior aumento exibiram um diâmetro pequeno, porém, um grande número de fibrilas foi detectado, fazendo com que a densidade fibrilar por área tenha sido elevada, entretanto, alguns espaços de matriz não colágena pode ser observada com facilidade (Figs. 41B, C).

Quando observa-se o grupo tratado KP4s, nota-se a alta celularização do grupo, mas ressalta a organização celular, que demonstra estarem organizadas com certo grau de alinhamento e em camadas (Fig. 41D).

Entretanto, o maior destaque desse grupo é o diâmetro das fibrilas colágenas, podemos notar a presença de fibrilas de diâmetros grandes, sendo comparáveis com o grupo controle, o que difere é a presença de delgadas fibrilas, uma vez que todas elas estão distribuídas e organizadas em proximidade umas das outras. Devido ao tamanho das fibrilas, a densidade por área analisada é menor do que a do grupo não tratado, mas mantêm alguns pontos de matriz não colágena, se não fosse por isso, o grupo KP4s, ficaria com características ultraestruturais das fibrilas colágenas muito similares ao controle (Figs. 41E, F).

Figura 41: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo K4s. (A) Tenoblastos (setas), vasos sanguíneos (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Espaço com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500nm. (D, E, F) Grupo KP4s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) Espaço com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrila colágena de diâmetro grande (seta) e de diâmetro pequeno (cabeça de seta). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm.

5.5 Análise estatística

5.5.1 Alterações no tendão

5.5.1.1 Peso dos tendões

A análise estatística do peso dos tendões levando em consideração os três parâmetros avaliados, sendo eles: tipo de sutura, tratamento com a proteína F1 e o tempo após a lesão, obteve um peso médio no grupo controle de $0,04\text{g} \pm 0,001$, utilizando a sutura-U o grupo U2s apresentou um peso de $0,28\text{g} \pm 0,016$, já o grupo UP2s um peso médio $0,29\text{g} \pm 0,014$, no entanto quando foi utilizada a sutura de Kessler-Tajima o peso médio do grupo K2s foi de $0,27\text{g} \pm 0,021$ e o grupo tratado KP2s de $0,25\text{g} \pm 0,018$. Desta maneira, notou-se que os grupos em que foram utilizados a sutura-U independentemente de ter ou não o tratamento com a proteína F1 apresentaram um peso médio 7,1 vezes maior que o controle, já os grupos em que foram utilizados a técnica de Kessler-Tajima o peso médio foi de 6,5 vezes maior em relação ao controle.

Entretanto quando analisamos os grupos após 4 semanas, observamos que o grupo U4s diminuiu o peso médio, sendo de $0,22\text{g} \pm 0,014$, assim como o grupo tratado UP4s com peso de $0,21 \pm 0,012$. Entretanto o grupo K4s foi o que mais diminuiu de peso, sendo de $0,20 \pm 0,011$ e o grupo tratado KP4s, diminuiu ficando com o mesmo peso do grupo UP4s de $0,21 \pm 0,011$. Desta maneira os grupos das duas suturas analisadas diminuíram 1,6 vez o peso em relação aos seus respectivos grupos analisados com duas semanas.

Estatisticamente todos os grupos são diferentes do controle $p < 0,001$, e os dados demonstraram que só houve interação e diferença estatística entre os tempos de reparo $p < 0,001$.

Estes dados estão representados e podem ser observados na tabela 2 e no gráfico 1.

Gráfico 1: Peso dos tendões (g)

ANOVA, Dunnett: Todos os grupos são diferentes do controle. $p < 0,001$.

* ANOVA, Tukey: Semana 4 $\neq$ Semana 2, independente da Sutura e da Proteína F1, $p < 0,001$.

5.5.1.2 Diâmetro dos tendões

Além das análises do peso dos tendões, utilizamos as imagens transversais de histologia e de microscopia eletrônica de varredura para avaliar o diâmetro tendíneo e constatamos no controle um valor de $1,04 \text{ mm} \pm 0,01$. Todos os grupos lesados obtiveram um considerável aumento, sendo que o grupo U2s apresentou um diâmetro médio de $2,15 \text{ mm} \pm 0,23$ e o grupo UP2s $2,56 \text{ mm} \pm 0,20$, o que corresponde a um aumento médio destes dois grupos de 2,3 vezes em relação ao controle.

Os grupos em que foram utilizada a sutura de Kessler-Tajima apresentaram os seguintes diâmetros médios: K2s $1,74 \text{ mm} \pm 0,10$ e o KP2s $2,18 \text{ mm} \pm 0,22$, o que corresponde a 1,9 vezes o diâmetro médio do grupo controle.

Podemos notar que os grupos tratados com a proteína F1 apresentaram um diâmetro médio de 0,4 veze maior que seus respectivos grupos não tratados, no entanto, ao analisar os grupos com quatro semanas, observamos que todos aumentaram ainda mais o diâmetro médio, porém os tratados apresentam um diâmetro 0,2 veze menor em relação aos seus respectivos grupos não tratados. De tal forma o grupo U4s apresentou um diâmetro médio de $2,97 \text{ mm} \pm 0,19$, o tratado UP4s $2,73 \text{ mm} \pm 0,10$, K4s $2,99 \text{ mm} \pm 0,29$ e o grupo KP4s $2,76 \text{ mm} \pm 0,12$. Todos os grupos analisados com quatro semanas possuem um diâmetro médio 2,8 vezes maior em relação ao controle.

Desta maneira, nota-se que todos os grupos são diferentes do controle, exceto o grupo K2s $p = 0,08$, os grupos de duas semanas diferem dos de quatro semanas, independente do tratamento e do tipo de sutura $p = 0,0001$. Entre os grupos de duas semanas, apenas o K2s difere de todos os grupos de quatro semanas $p < 0,05$.

Todos os dados estão representados e podem ser observados na tabela 3 e no gráfico 2.

Diâmetro médio dos Tendões (mm)	
Controle: $1,04 \pm 0,01$	
U2s: $2,15 \pm 0,23$	U4s: $2,97 \pm 0,19$
UP2s: $2,56 \pm 0,20$	UP4s: $2,73 \pm 0,10$
K2s: $1,74 \pm 0,10$	K4s: $2,99 \pm 0,29$
KP2s: $2,18 \pm 0,22$	KP4s: $2,76 \pm 0,12$

Gráfico 2: Diâmetro dos tendões.

* ANOVA, Dunnett: Todos os grupos são diferentes do controle com exceção do K2s. $p < 0,0001$.

ANOVA, Tukey: Grupos de duas semanas são $\neq$ dos grupos de quatro semanas independente da sutura e tratamento. $p = 0,0001$.

& ANOVA, Tukey: O grupo K2s é $\neq$ de todos os grupos de 4 semanas. $p < 0,05$.

5.5.1.3 Diâmetro, densidade e frequência das fibrilas colágenas

Ao examinar os cortes transversais em microscopia eletrônica de transmissão, estas análises foram utilizadas para avaliar o diâmetro das fibrilas e sua frequência, ou seja, a distribuição pelo tecido, bem como a densidade por μm^2 .

As análises demonstraram que o diâmetro médio das fibrilas no grupo controle foi de $83,8\text{nm} \pm 1,3$, sendo que ocorre uma diminuição no diâmetro em todos os grupos sendo estatisticamente diferente $p < 0,05$, com exceção do grupo KP4s que retorna aos padrões do controle com um valor médio de $80,7\text{nm} \pm 2,2$.

O grupo UP2s obteve um valor próximo ao controle $74,3\text{nm} \pm 3,6$, porém, mesmo assim foi detectada diferença estatística entre eles $p < 0,05$, sendo que também foi diferente dos grupos U2s, KP2s, U4s e UP4s $p < 0,05$.

O grupo U2s apresentou um diâmetro 1,4 vez menor que o controle, o tratado UP2s 1,1 vez menor, já os grupos com a sutura de Kessler-Tajima analisados com duas semanas possuíram valores próximos, sendo o não tratado K2s 1,5 vez e o tratado KP2s 1,6 vez menor em relação ao controle.

Com quatro semanas ambos os grupos da sutura-U apresentaram valores 1,6 vez menor que o controle, o K4s manteve o tamanho médio, com 1,5 vez menor. Contudo o grupo tratado KP4s atingiu um valor similar ao controle.

Todos os valores estão representados na tabela 4 e no gráfico 3.

Tabela 2: Diâmetro médio das fibrilas colágenas (nm)	
Controle: $83,8 \pm 1,3$	
U2s: $59,5 \pm 1,3$	U4s: $52,8 \pm 3,7$
UP2s: $74,3 \pm 3,6$	UP4s: $51,4 \pm 1,2$
K2s: $54,5 \pm 2,0$	K4s: $55,5 \pm 1,3$
KP2s: $52,0 \pm 1,8$	KP4s: $80,7 \pm 2,2$

Gráfico 3: Diâmetro das fibrilas colágenas (nm)

*ANOVA, Dunnett: Controle é $\neq$ dos grupos, com exceção do KP4s, $p < 0,05$.

ANOVA, Tukey $p < 0,05$:

UP2s $\neq$ U2s, KP2s, U4s, UP4s.

& KP4s $\neq$ K2s, KP2s, UP4s, K4s.

Com os dados de diâmetro das fibrilas colágenas, foi avaliado também a frequência de distribuição, e constatamos uma homogeneidade no controle com uma concentração 27,79% das fibrilas do grupo controle com diâmetro de aproximadamente 80nm.

Gráficos 4: Frequência de distribuição das fibrilas colágenas (%). (A, A') Grupos controle e de duas semanas. (B, B') Grupos controle e de quatro semanas.

Juntando os valores dos diâmetros com a frequência de distribuição das fibrilas, foi avaliado a densidade pela área, ou seja, quanto de fibrilas existe por μm^2 .

Observamos que o grupo controle por possuir fibrilas de diâmetro maior, a quantidade por área torna-se menor, então uma média de $77,0 \pm 2,1$ fibrilas/ μm^2 foi encontrada e só apresentou diferença estatística com o grupo U4s que demonstrou uma densidade de $134,6 \pm 26,2$, ou seja, 1,7 vez maior densidade.

O grupo U2s que apresentou diâmetro de fibrilas menor, obteve uma maior densidade de fibrilas, ou seja, mesmo as fibrilas sendo menores, uma maior quantidade delas por área foi encontrada, sendo $100,9 \pm 6,3$ fibrilas/ μm^2 , um valor 1,3 vez maior em relação ao controle, porém, este grupo só foi diferente estatisticamente com o U4s.

Já o grupo de duas semanas tratado UP2s, demonstrou um maior diâmetro fibrilar, o que representou uma menor densidade, sendo $54,8 \pm 7,3$ fibrilas/ μm^2 , um valor quase metade do grupo não tratado.

Os grupos com a sutura de Kessler-Tajima não tratados e tratados com a proteína F1 obtiveram valores semelhantes, sendo $84,9 \pm 20,4$ e $69,6 \pm 9,8$ fibrilas/ μm^2 respectivamente,

ambos possuíram um diâmetro médio de 53,2nm e foram diferentes apenas dos seus respectivos grupos de quatro semanas.

Com relação aos grupos avaliados com quatro semanas, destaca-se o U4s que obteve a maior densidade entre todos, $134,6 \pm 26,2$ fibrilas/ μm^2 , um valor 1,7 vez maior que o controle. Quando tratado o grupo com a mesma sutura UP4s apresentou uma menor densidade, sendo $105,4 \pm 5,7$ fibrilas/ μm^2 com diâmetro similar ao grupo não tratado.

Contudo o grupo com a sutura de Kessler-Tajima tratado e avaliado com quatro semanas KP4s, foi o que apresentou a melhor relação densidade/diâmetro, com uma densidade baixa de $75,5 \pm 5,6$ fibrilas/ μm^2 e diâmetro de $80,7 \pm 2,2\text{nm}$, valores muito similares ao controle.

Todos os grupos tratados são diferentes dos não tratados, UP2s e UP4s são diferentes dos U2s e U4s, assim como KP2s e KP4s são diferentes dos K2s e K4s, assim como, todos os grupos de duas semanas, independentemente da sutura e do tratamento são diferentes dos de quatro semanas.

Os valores podem ser observados na tabela 6, assim como no gráfico 5.

Tabela 4: Densidade das fibrilas colágenas (No/ μm^2)

Controle: $77,0 \pm 2,1$

U2s: $100,9 \pm 6,3$

U4s: $134,6 \pm 26,2$

UP2s: $54,8 \pm 7,3$

UP4s: $105,4 \pm 5,7$

K2s: $84,9 \pm 20,4$

K4s: $111,7 \pm 7,4$

KP2s: $69,6 \pm 9,8$

KP 4s: $75,5 \pm 5,6$

Gráfico 5: Densidade de fibrilas colágenas (No/μm²)

*ANOVA, Dunnett: Controle é ≠ do grupo U4s, p<0,05.

ANOVA, Tukey p<0,05:

** Grupos de 2 semanas são ≠ dos de 4 semanas independente do tratamento e sutura.

U4s ≠ U2s.

& UP2s ≠ UP4s.

\$ K2s ≠ K4s.

@ KP2s ≠ KP4s.

5.5.1.4 Colágenos tipo I e III

Utilizando a técnica de western blot quantificamos os colágenos tipo I e III, de tal modo podemos notar que o tipo I apresenta uma maior quantidade no grupo controle, os grupos U2s e UP2s, assim como os U4s, UP4s e K4s apresentaram uma quantidade similar ao controle, entretanto, demonstraram um elevado desvio entre eles.

Os grupos da sutura de Kessler-Tajima são mais homogêneos quanto a variação, porém, foram os que apresentaram uma menor quantidade de colágeno tipo I, sendo que os tratados KP2s e KP4s apresentaram valores semelhantes de $0,59 \pm 0,19$ e $0,47 \pm 0,17$ respectivamente, o que corresponde a 1,9 vez menos que o controle. De todos os grupos o que apresentou a menor quantidade de colágeno tipo I foi o grupo K2s, com valor de $0,26 \pm 0,10$, o que corresponde a 3,8 vezes menos em relação ao controle. Entretanto, mesmo com relevante redução do colágeno tipo I em alguns grupos, não foi constatada diferença estatística em nenhum grupo.

Os dados podem ser observados na tabela 7 e no gráfico 6A.

O colágeno tipo III também apresentou uma elevada redução em todos os grupos, contudo, notamos uma maior quantidade em todos os grupos tratados em relação aos seus respectivos grupos não tratados.

Na sutura-U houve um aumento da síntese de colágeno tipo III com quatro semanas em todos os grupos, já os grupos não tratados K2s e K4s mantiveram uma similar quantidade de colágeno tipo III mesmo com o maior tempo de reparo, porém os grupos tratados KP2s e KP4s demonstraram um aumento de aproximadamente 2,0 vezes na síntese deste colágeno.

No geral os grupos da sutura de Kessler-Tajima apresentaram uma quantidade maior em relação aos grupos da sutura-U e o grupo KP4s obteve valores próximos ao controle, com média de $0,79 \pm 0,36$.

Assim como no colágeno tipo I, o tipo III mesmo com grandes diminuições na síntese, não apresentou nenhuma diferença estatística entre eles.

Os dados também podem ser analisados na tabela 7, assim como no gráfico 6B.

Tabela 5: Colágenos Tipo I e III / Proteínas Totais (a.u)		
Grupos	Colágeno Tipo I	Colágeno Tipo III
Controle	$1,0 \pm 0,15$	$1,0 \pm 0,28$
U2s	$0,88 \pm 0,32$	$0,15 \pm 0,10$
UP2s	$0,98 \pm 0,35$	$0,19 \pm 0,11$
K2s	$0,26 \pm 0,10$	$0,27 \pm 0,21$
KP2s	$0,59 \pm 0,19$	$0,40 \pm 0,34$
U4s	$0,75 \pm 0,66$	$0,19 \pm 0,13$
UP4s	$0,86 \pm 0,48$	$0,41 \pm 0,32$
K4s	$0,98 \pm 0,46$	$0,23 \pm 0,10$
KP4s	$0,47 \pm 0,17$	$0,79 \pm 0,36$

Gráficos 6: Quantificação de colágenos tipo I e III

(A) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle $p=0,8686$.

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos $p>0,05$.

(B) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle $p=0,5276$.

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos $p>0,05$.

5.5.1.5 Timp-1, -2, MMP-2, -9

Análises de western blot também foram utilizadas para quantificar Timp-1 e 2, MMP-2 e 9, proteínas de inibição e degradação de colágeno. Todos os grupos apresentaram valores maiores que o controle, sendo que o grupo K2s demonstrou o valor mais elevado, com aproximadamente 13 vezes a mais que o controle, seguido do grupo K4s com valor médio 11 vezes maior em relação ao controle.

O grupo de menor valor foi o U2s sendo $5,96 \pm 3,30$, entretanto, observando todos os valores é possível notar que no geral os grupos de quatro semanas são maiores que os de duas semanas com média de $9,48 \pm 1,05$ e $8,65 \pm 3,14$ respectivamente. Porém não foi detectada nenhuma diferença estatística entre eles. Os dados estão expressos na tabela 8 e no gráfico 7A.

Assim como Timp-1, todos os grupos apresentaram valores de Timp-2 maiores que o grupo controle. Os grupos de duas semanas tratados com a proteína F1 apresentaram valores menores que os não tratados com a média de todos sendo $2,84 \pm 0,62$, e os grupos de quatro semanas possuíam valores similares entre eles e maiores que os de duas semanas, sendo $4,99 \pm 0,65$. Os dados também não apresentaram diferença estatística e podem ser visualizados na tabela 8 e no gráfico 7B.

As análises das metaloproteinases mostraram que a MMP-2 aumenta em todos os grupos, no entanto a maior alteração ocorre no grupo U2s, sendo $2,58 \pm 1,48$, o que corresponde a aproximadamente 258 vezes mais que o grupo controle, em contrapartida o grupo tratado UP2s foi o que apresentou o menor valor $2,38 \pm 1,25$.

Os mesmos grupos avaliados com quatro semanas U4s e UP4s apresentaram valores médios idênticos, sendo 1,94 com variação de 1,50 e 1,68 respectivamente.

Os grupos da sutura de Kessler-Tajima possuíram valores similares com duas semanas, $1,59 \pm 1,41$ e $1,61 \pm 1,43$ e aumentaram com quatro semanas, porém, ainda mantiveram os valores próximos, $2,23 \pm 1,95$ e $2,29 \pm 2,11$.

É possível notar que em geral há um aumento de MMP-2 com quatro semanas, e que há uma drástica diferença em relação ao controle. Os dados estão expressos na tabela 8, assim como no gráfico 7C.

Diferente da MMP-2, a MMP-9 foi alterada em apenas 3 de 8 grupos experimentais, sendo que o grupo U2s foi o que teve uma maior síntese dessa proteína, com um valor médio de $3,26 \pm 1,33$, seguido do grupo K4s $1,94 \pm 0,81$ e do U4s $1,31 \pm 0,71$. Destaca-se que esses grupos são os não tratados com a proteína F1 e que apenas o grupo K2s dos não tratados não aumentou seu valor, ficando próximo ao controle.

É possível observar analisando os pares de grupos não tratados e tratados, que o grupo U2s o qual obteve o maior aumento de MMP-9 quando tratado com a proteína F1, UP2s mantém valores semelhantes ao controle, isso se repete aos grupos U4s e UP4s, K4s e KP4s.

Deste modo foi encontrada diferença estatística apenas entre os grupos não tratados em relação aos tratados, independentemente da sutura e tempo e nenhum foi diferente do controle.

Os valores podem ser observados na tabela 8 e no gráfico 7D.

Grupos	Timp-1	Timp-2	MMP-2	MMP-9
Controle	$1,0 \pm 0,57$	$1,0 \pm 0,26$	$0,01 \pm 0,004$	$1,0 \pm 0,50$
U2s	$5,96 \pm 3,30$	$3,54 \pm 1,61$	$2,58 \pm 1,48$	$3,26 \pm 1,33$
UP2s	$7,96 \pm 4,42$	$2,38 \pm 1,25$	$1,13 \pm 1,05$	$0,90 \pm 0,27$
K2s	$13,19 \pm 7,21$	$3,19 \pm 1,67$	$1,59 \pm 1,41$	$0,72 \pm 0,28$
KP2s	$7,50 \pm 4,03$	$2,26 \pm 1,33$	$1,61 \pm 1,43$	$0,77 \pm 0,11$
U4s	$9,04 \pm 5,01$	$4,13 \pm 1,68$	$1,94 \pm 1,50$	$1,31 \pm 0,71$
UP4s	$8,78 \pm 4,94$	$5,69 \pm 2,38$	$1,94 \pm 1,68$	$0,57 \pm 0,06$
K4s	$11,05 \pm 6,24$	$5,16 \pm 2,94$	$2,23 \pm 1,95$	$1,94 \pm 0,81$
KP4s	$9,06 \pm 5,22$	$5,00 \pm 3,00$	$2,29 \pm 2,11$	$0,65 \pm 0,08$

Gráfico 7: Quantificação de TIMP-1, -2, MMP-2, -9.

(A) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle $p=0,8522$.

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos $p>0,05$.

(B) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle $p=0,3038$.

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos $p>0,05$.

(C) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle $p=0,9722$.

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos $p>0,05$.

(D) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle $p=0,1012$.

*# ANOVA, Tukey: Os grupos não tratados com a proteína F1 são $\neq$ dos tratados, independentemente da sutura e do tempo. $p=0,0252$.

5.5.2 Alterações musculares

5.5.2.1 Peso do músculo sóleo

Com o intuito de avaliar se as lesões tendíneas influenciam diretamente nos músculos esqueléticos, foi coletado o sóleo por ser o músculo que é inserido ao osso calcâneo através do tendão calcâneo, o qual causamos a lesão e o fato de possuir apenas um ventre, diferente do gastrocnêmio, o que tornou possível uma análise com maior exatidão.

Inicialmente foi observado o peso dos músculos, o grupo controle apresentou um peso médio de $0,182g \pm 0,009$ e foi diferente estatisticamente de todos os outros grupos $p < 0,05$, pelo fato de que ocorreu uma redução média de 1,4 vez o peso nos grupos experimentais.

O grupo UP2s foi o que apresentou a maior redução de peso com média de $0,111 \pm 0,004$, porém o mesmo grupo com quatro semanas UP4s foi o que apresentou o maior peso entre os lesados com média de $0,140 \pm 0,004$, entre esses dois grupos foi detectada diferença estatística $p = 0,0238$ o que nos leva a acreditar que de alguma forma o tratamento com a proteína no tendão, associada ao tempo de reparo, reflete em uma melhora na capacidade do músculo voltar a suas funções normais, visto que olhando para os outros grupos tratados, comparando aos seus respectivos grupos não tratados ocorre uma pequena melhora de ganho de peso.

Estatisticamente os grupos de duas semanas, sem levar em consideração o tipo de sutura e o tratamento foram diferentes dos de quatro semanas $p = 0,004$.

Os valores estão demonstrados na tabela 9 e representados no gráfico 8.

Tabela 7: Peso dos Músculos Sóleos (g)

Controle: $0,182 \pm 0,009$	
U2s: $0,133 \pm 0,006$	U4s: $0,125 \pm 0,004$
UP2s: $0,111 \pm 0,004$	UP4s: $0,140 \pm 0,004$
K2s: $0,120 \pm 0,007$	K4s: $0,132 \pm 0,006$
KP2s: $0,119 \pm 0,009$	KP 4s: $0,137 \pm 0,004$

Gráfico 8: Peso dos músculos sóleos (g).

ANOVA, Dunnett: Grupo controle é $\neq$ de todos os outros grupos $p < 0,05$

* ANOVA, Tukey: Grupos de duas semanas são $\neq$ dos grupos de quatro semanas independentemente da sutura e tratamento $p = 0,004$.

& ANOVA, TUKEY: Grupo UP2s $\neq$ UP4s $p = 0,0238$.

5.5.2.2 Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 por RT-qPCR

Continuando investigando a diminuição do peso dos músculos sóleos, foi quantificado por RT-qPCR a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 os quais fazem parte da via de degradação proteica.

Apenas os grupos U2s e KP2s apresentaram níveis de MuRF1 maiores que o controle, todos os outros grupos demonstraram níveis abaixo da expressão encontrada no controle, entretanto tal variação é tão pequena que não foi detectada diferença estatística entre eles. Dados expressos na tabela 10 e no gráfico 9A.

Porém, a expressão de atrogin1 mostrou-se diferente, ocorreu uma alta variação em todos os grupos.

Os grupos que utilizamos a sutura-U analisados com duas semanas apresentaram valores semelhantes, sendo eles $0,71 \text{ fold} \pm 0,13$ no grupo U2s e $0,79 \text{ fold} \pm 0,25$ para o UP2s. Valores bem abaixo dos encontrados nos grupos da sutura de Kessler-Tajima, analisados no mesmo período. O grupo não tratado K2s obteve um valor 1,3 vez maior do que seu respectivo grupo tratado KP2s.

Enquanto no período de duas semanas foi encontrado um valor baixo e similar entre os grupos da sutura-U, os mesmos avaliados após quatro semanas demonstraram uma elevada expressão. O grupo não tratado U4s aumentou em aproximadamente 2,4 vezes a expressão em

comparação ao mesmo grupo de duas semanas U2s e o grupo tratado UP4s atingiu o valor de $2,11 \pm 1,00$, o que corresponde a quase 2,7 vezes em relação ao grupo UP2s.

No entanto, um resultado oposto foi encontrado nos grupos da sutura de Kessler-Tajima, os grupos tratados e avaliados com duas e quatro semanas foram possuíram valores de expressão gênica menores que seus grupos não tratados, com destaque para os grupos de quatro semanas que obtiveram o maior índice de expressão no não tratado K4s, sendo $2,25 \text{ fold} \pm 1,01$ e o menor para o grupo tratado KP4s com valor de $0,70 \text{ fold} \pm 0,20$.

Contudo, independentemente de toda a variação encontrada nos grupos, não foi detectada diferença estatística entre nenhum deles.

Todos os valores podem ser consultados na tabela 10, assim como no gráfico 9B.

Tabela 8: Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 (fold)		
Grupos	MuRF1	Atrogin1
Controle	$1,03 \pm 0,16$	$1,48 \pm 0,57$
U2s	$1,24 \pm 0,63$	$0,71 \pm 0,13$
UP2s	$0,81 \pm 0,11$	$0,79 \pm 0,25$
K2s	$0,55 \pm 0,12$	$1,98 \pm 0,47$
KP2s	$1,10 \pm 0,34$	$1,50 \pm 0,47$
U4s	$0,58 \pm 0,05$	$1,69 \pm 0,42$
UP4s	$0,74 \pm 0,16$	$2,11 \pm 1,00$
K4s	$0,74 \pm 0,21$	$2,25 \pm 1,01$
KP4s	$0,64 \pm 0,27$	$0,70 \pm 0,20$

Gráfico 9: Níveis de RNAm de MuRF1 (A) e Atrogin1 (B) (fold):

(A) ANOVA: Não foi detectado diferença estatística entre os grupos. $p=0,575$.

(B) ANOVA: Não foi detectado diferença estatística entre os grupos. $p=0,495$.

5.5.2.3 Contração muscular máxima

Após as análises referente ao peso e a expressão de genes relacionados à degradação muscular, foi realizada uma avaliação da capacidade de contração muscular máxima.

O grupo controle apresentou uma capacidade de contração máxima de $0,67\text{mN/g} \pm 0,03$. Porém o grupo U2s foi o que apresentou a maior diminuição, sendo $0,29\text{mN/g} \pm 0,09$, entretanto, tal capacidade aumenta quando foi tratado com a proteína F1, o grupo UP2s obteve o valor de $0,53\text{mN/g} \pm 0,05$, ou seja, uma melhora de 1,8 vez em relação ao não tratado.

Quando analisamos a sutura de Kessler-Tajima a diferença entre o grupo não tratado do tratado não alterou-se tanto quanto a sutura-U com e sem tratamento. O grupo K2s apresentou uma capacidade máxima de contração de $0,43\text{mN/g} \pm 0,08$ e o grupo KP2s $0,48\text{mN/g} \pm 0,05$, uma melhora de apenas 1,1 vez.

Contudo, ao observar os grupos com quatro semanas, nota-se um ligeiro aumento na capacidade de contração do grupo U4s, com $0,36\text{mN/g} \pm 0,10$, o que corresponde a uma melhora de 1,2 vez em relação ao grupo de duas semanas U2s, mas, o que realmente destaca é a capacidade do grupo UP4s em reestabelecer a capacidade de contração máxima, atingindo valores similares ao controle, sendo eles $0,68\text{mN/g} \pm 0,03$, uma melhora de 1,9 vez em relação ao grupo não tratado de quatro semanas U4s e de 2,3 vezes em relação ao grupo U2s.

Entretanto, utilizando a sutura de Kessler-Tajima os valores quase não se alteram com o tratamento e durante as semanas, tanto é que os grupos tratados KP2s e KP4s atingiram a mesma capacidade de contração máxima, com valores de $0,48\text{mN/g}$ e os não tratados, obtiveram valores similares, sendo eles $0,43\text{mN/g} \pm 0,08$ para o K2s e $0,46\text{mN/g} \pm 0,07$ para o K4s, ou seja, uma melhora de apenas 1,07 vez.

Os dados estatísticos demonstraram uma diferença entre os grupos sem tratamento U2s e U4s em relação ao controle $p < 0,05$ e os grupos da sutura-U tratados com a proteína F1 são diferentes dos não tratados nos dois tempos analisados $p < 0,05$.

Todos os dados estão representados na tabela 11 e no gráfico 10.

Tabela 9: Contração muscular máxima (mN/g)

Controle: $0,67 \pm 0,03$

U2s: $0,29 \pm 0,09$

U4s: $0,36 \pm 0,10$

UP2s: $0,53 \pm 0,05$

UP4s: $0,68 \pm 0,03$

K2s: $0,43 \pm 0,08$

K4s: $0,46 \pm 0,07$

KP2s: $0,48 \pm 0,05$

KP4s: $0,48 \pm 0,03$

Gráfico 10: Contração Muscular Máxima (mN/g)

* ANOVA, Dunnett, Sutura-U sem tratamento semana 2 e 4 $\neq$ controle, $p < 0,05$

ANOVA, Tukey, Sutura-U com proteína F1 $\neq$ Sutura-U sem proteína F1, independentemente da semana, $p < 0,05$.

5.5.2.4 Teste de fadiga muscular

Para analisarmos a estatística do teste de fadiga muscular apenas as contrações 1, 4, 7 e 10 de um total de 10 foram utilizadas conforme Pereira et al. (2014). Como todos os grupos lesados diferiram do controle o teste de Bonferroni foi utilizado para avaliar a interação das contrações.

No grupo controle a primeira contração C1 foi de $863,4\text{mN} \pm 44,1$ a C4 de $734,6\text{mN} \pm 57,4$, a C7 $724,6\text{mN} \pm 48,7$ e a última C10 de $713,9\text{mN} \pm 39,1$, demonstrando assim, uma pequena diminuição na capacidade de contração muscular e uma consequente leve fadiga. Neste caso houve diferença significativa de C7 e C10 em relação à C1 $p < 0,05$. Os dados estão representados no gráfico 11.

Gráfico 11: Teste de fadiga muscular do grupo controle (mN)
Bonferroni, C7 e C10 $\neq$ C1, $p < 0,05$.

Com relação a estatística dos grupos lesados observamos um padrão homogêneo de queda na capacidade de contração em todos os grupos sendo que o grupo UP2s é o que menos fadigou e o grupo K2s o que mais fadigou, no entanto não houveram diferenças estatísticas entre eles.

Os demais grupos comportaram-se semelhantemente, no entanto, o grupo KP2s destaca-se, pois apresenta um valor elevado na primeira contração $385,2\text{mN} \pm 59,6$ e possui um forte queda na capacidade contrátil a partir da quarta contração $286,6\text{mN} \pm 72,1$, porém fica estável da sétima até o final do teste.

Outro grupo que podemos citar algumas considerações é o K4s que apresenta uma pequena queda entre as contrações 1 e 4, mantém-se estável e na última contração do teste apresenta o segundo pior resultado $241,9\text{mN} \pm 26,7$.

Diante desses dados não houve diferença estatística entre os grupos experimentais, porém, todos foram diferentes do controle.

Todos os dados das contrações podem ser observados na tabela 12, assim como nos gráficos 12 A-B.

Tabela 10: Contrações do teste de fadiga muscular (mN)

Grupos	Contrações			
	C1	C4	C7	C10
Controle	863,4 ± 44,1	734,6 ± 57,4	724,6 ± 48,7	713,9 ± 39,1
U2s	312,7 ± 47,0	261,5 ± 46,2	270,8 ± 47,5	270,4 ± 49,9
UP2s	390,9 ± 26,2	351,2 ± 19,0	349,3 ± 30,3	351,4 ± 23,6
K2s	292,1 ± 39,6	217,5 ± 28,9	200,1 ± 30,2	183,4 ± 27,4
KP2s	385,2 ± 59,6	286,6 ± 72,1	277,7 ± 61,3	270,8 ± 49,0
U4s	347,6 ± 37,9	313,6 ± 22,8	301,7 ± 23,2	303,8 ± 21,9
UP4s	312,6 ± 23,3	283,3 ± 19,5	273,7 ± 17,8	298,4 ± 8,7
K4s	329,3 ± 67,1	276,0 ± 66,6	269,7 ± 45,1	241,9 ± 26,7
KP4s	391,8 ± 30,3	321,7 ± 26,1	321,9 ± 29,5	307,2 ± 25,3

Gráfico 12: Teste de fadiga muscular dos grupos lesados (A), lesados e controle (B).

(A) Representação dos dados dos grupos lesados.

(B) Dados dos grupos lesados mais o controle. Houve diferença estatística em relação ao controle, $p < 0,05$.

No entanto foi detectado efeito de interação entre as suturas e contrações, independentemente do tratamento com a proteína F1 e as semanas. Nos grupos utilizando a sutura de Kessler-Tajima as contrações C4, C7 e C10 foram estatisticamente diferentes da C1 e a Kessler-Tajima C10 foi diferente da sutura-U C10, $p < 0,05$.

Não houveram diferenças entre as contrações da sutura-U. Dados expressos no gráfico

Gráfico 13: Teste de fadiga muscular das suturas de Kessler-Tajima e Sutura-U independente do período e do tratamento.

Bonferroni: * Kessler C4, C7 e C10 $\neq$ Kessler C1, $p < 0,05$.

Kessler C10 $\neq$ sutura-U C10, $p < 0,05$.

6 DISCUSSÃO

Lesões de tendões vem crescendo a cada ano devido a maior expectativa de vida e pelo aumento da prática esportiva, no entanto, não existe ainda um consenso na literatura sobre qual o melhor método para reparar este tecido quando lesado (YUKSEL et al., 2016).

Nesse estudo a lesão completa simulando uma ruptura aguda do tendão foi realizada seguida por um procedimento cirúrgico, uma vez que é altamente difundido na literatura internacional que o tratamento não cirúrgico possui uma maior taxa de re-ruptura (KOCHER et al., 2002; WONG; BARRASS; MAFFULLI, 2002).

Wilkins e Bisson (2012) analisaram 677 casos de ruptura do tendão calcâneo em humanos e observaram que a taxa de re-ruptura em pacientes submetidos à cirurgia foi de 3,6%, no entanto àqueles em que foram realizados procedimentos não cirúrgicos a taxa foi de 8,8%.

Os autores explicam que existem dois tipos de reparo: Intrínseca em que a cicatrização depende de células inflamatórias e fibroblastos provenientes do epitendão e do endotendão e a extrínseca em que a cicatrização depende da migração de células da periferia do local de lesão incluindo as membranas de revestimento e a sinóvia. Além do mais, ainda afirmam que tais processos de cicatrização ocorrem em ambos os procedimentos, sendo que, no não cirúrgico há um predomínio do processo extrínseco, assim como, um maior espaço entre as duas partes rompidas do tendão. Como na cirurgia este espaço é corrigido com as suturas, ocorre uma menor formação de tecido cicatricial e de adesão, estes podem ser um dos motivos para explicar a diminuição nos riscos de re-ruptura.

Inicialmente utilizamos análises estereoscópicas para avaliar a morfologia macroscópica de todos os grupos independentemente do tipo de sutura e do tratamento com a proteína F1, tal metodologia revelou que os aspectos de coloração natural não se alteram diante da lesão em todos os grupos, apresentando uma cor branca brilhante idêntica à do grupo controle, tal característica condiz com a observada por Sharma e Maffulli (2006).

Macroscopicamente ficou evidente o aumento do comprimento e consequentemente o diâmetro de todos os tendões dos grupos experimentais. Kangas et al. (2006) em seu estudo com 50 pacientes entre 21-55 anos explicam que durante o processo de reparo ocorre um alongamento do tecido tendíneo, independentemente de estarem imobilizados ou não e do tempo de imobilização, e que este fenômeno se dá nas seis primeiras semanas após a cirurgia, vindo a diminuir bem pouco ou estabilizar, mas que o encurtamento mesmo ocorre entre 24-60 semanas. Enfatizam ainda, que as fibras colágenas que compõem o tendão rotacionam 90°,

sendo que as provenientes do músculo gastrocnêmio rodam no sentido anteroposterior e as pertencentes ao músculo sóleo posterolateralmente.

As observações em nossos resultados confirmam que o alongamento se dá no início da síntese de novas fibras colágenas, que com o passar do tempo vão se alinhando e girando novamente, desta forma o tendão volta a diminuir de tamanho.

Quanto a utilização de microscopia de luz de campo claro para elucidar os aspectos microscópicos do reparo, pode-se identificar que o grupo controle apresentou uma pequena quantidade de tenócitos com núcleos delgados e alongados e uma alta densidade de fibras colágenas que apresentam uma ondulação pouco evidente. Maffulli, Barrass e Ewen (2000) relatam características idênticas as nossas observações e acrescentaram enfatizando que a estrutura das fibras colágenas nos grupos controles podem ser examinadas próximas e dispostas paralelamente umas às outras.

Outra característica muito notória em todos os grupos nos dois períodos de análises é a alta celularização do tecido. Na fase inflamatória, entre o terceiro e sétimo dia após a lesão, células começam a migrar para a área lesionada, inicialmente as células possuem um papel fagocítico, após o quinto dia de migração os tenócitos começam a sintetizar colágeno, principalmente o tipo III, proteoglicanos e outros componentes da MEC, esses componentes são inicialmente organizados de forma aleatória (MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002; JAMES et al., 2008).

No final do estágio de proliferação o tecido está altamente celularizado e contendo uma relativa quantidade de água (JAMES et al., 2008). Isso pode explicar o aumento do diâmetro dos tendões observados em nossos resultados.

Esse aumento de massa consequentemente altera o comprimento e o diâmetro de forma continua após lesão e tratamento, acarretando um aumento também no peso como demonstrado em nossos resultados.

Sharma e Maffulli (2006) explicam que o aumento da massa e da área de secção transversa do tendão sempre ocorre durante o processo de remodelamento, e que durante esse estágio o tecido é redimensionado e reformulado, conseguinte a isto ocorre uma diminuição na celularização. Esse estágio continua até a décima semana, e nesse período o tecido muda seu aspecto de celular para fibroso, o metabolismo dos tenócitos continua elevado, no entanto, inicia-se um alinhamento celular e das fibras colágenas (HOOLEY; COHEN, 1979).

Com relação ao metabolismo, podemos enfatizar os dados de Eliasson et al. (2016) que relataram em um estudo com 23 pacientes com ruptura completa de tendão, notaram que o

metabolismo celular permanece elevado por até um ano após a cirurgia e que o reparo ocorre do centro para a periferia do tecido.

Nos grupos em que ainda existia uma remanescência de fio de sutura observamos ao redor deles um grande aglomerado celular, de Carvalho et al. (2006) explicam que tais células são predominantemente macrófagos.

Com relação ao tempo de tratamento uma característica observada nos grupos analisados após duas semanas foi a proliferação de adipócitos entre as fibras colágenas, comparativamente aos grupos tratados que revelaram uma maior quantidade dessas células, as quais não se tornaram tão presentes nos grupos de quatro semanas.

Tal achado pode ser explicado inicialmente com o estudo de Bi et al. (2007) em que os autores descobriram células-tronco derivadas do tendão (CTDT), essa descoberta é considerada a mais importante nos últimos anos nas pesquisas relacionadas a este tipo de tecido. Os autores explicam que essas CTDT possuem características clonogênicas, multipotentes e capacidade de auto-renovação tanto em humanos como em camundongos.

Recentes estudos sugerem que estas CTDT desenvolvem um importante papel no reparo de tendinopatias e lesões (NI et al., 2012; SHEN et al., 2012). No entanto Zhang e Wang (2010a) em um estudo *in vitro* mostram que cargas mecânicas a níveis fisiológicos promovem uma proliferação e diferenciação das CTDT em tenócitos, enquanto que cargas excessivas levam a diferenciação em células não-tenócitos, tais como adipócitos, condrócitos e osteócitos.

Zhang e Wang (2010b) em outro estudo, porém, *in vivo* submeteram os animais à corridas em esteira com o intuito de submetê-los a altos níveis de cargas mecânicas e confirmar os achados *in vitro*, os autores observaram desta forma uma diferenciação das CTDT em adipócitos.

Em relação ao colágeno, utilizamos a coloração de picrosirius red para demonstrar sua disposição ao longo de todo o tecido. Como a composição do tendão é praticamente toda de colágeno, sob campo claro observamos o tecido inteiro em tons de vermelho, coloração do colágeno, mas sob luz polarizada pudemos diferenciar os tipos I e III.

Diferente do grupo controle que apareceu todo em tons de amarelo-alaranjado típico do colágeno tipo I sob luz polarizada, os outros grupos demonstram uma mistura do tipo I com o tipo III, sendo que, análises de cortes transversais após duas semanas de lesão e tratamento demonstram nos grupos em que utilizamos a sutura de Kessler-Tajima, um predomínio do colágeno tipo III independentemente do tratamento com a proteína F1. Contudo, quando analisados após quatro semanas nota-se uma maior quantidade de colágeno tipo I, sendo que o grupo tratado com a proteína F1 apresenta ainda mais do que o não tratado.

É interessante notar que os grupos em que utilizamos a sutura-U, apresentam uma mistura dos dois tipos de colágeno em todos os períodos avaliados, com e sem tratamento com a proteína F1.

Maffulli et al. (2000) mencionam que a resposta proliferativa dos tenócitos ao trauma induz a produção de ambos os tipos de colágeno, no entanto, diante de uma ruptura a maior síntese é do tipo III. Além disso, Kumagai et al. (1992) também explicam que a síntese de colágeno tipo III é um processo fisiológico normal na cicatrização do tecido tendíneo, mas sua síntese começa a diminuir com um paralelo aumento da síntese de colágeno tipo I entre a sexta e décima semana de reparo (ABRAHAMSSON, 1991).

Em um estudo utilizando a coloração de picrosirius red, examinando sob luz polarizada, Kim et al. (2014) avaliaram a aplicação de um hidrogel desenvolvido por eles, contendo colágeno tipo I e outras proteínas presentes no tendão. Verificaram no início do tratamento um aumento na síntese de colágeno tipo III, e identificaram um pico de colágeno tipo I a partir da quarta semana, período máximo de nossas análises.

Salienta-se que o mecanismo responsável pelo aumento da síntese de colágeno tipo III, era desconhecido por muito tempo, contudo, um recente estudo realizado por Millar et al. (2015) descobriram o mecanismo de ação responsável pelo aumento na síntese de colágeno tipo III durante o processo de reparo do tendão. Os autores revelaram que durante a lesão ocorre a liberação de interleucinas (IL), em especial a IL-33 pelos tenócitos ou células imunes, consequentemente ocorre uma fosforilação *downstream* de NFκB, o qual inibe o miR-29a causando um aumento na síntese de colágeno tipo III.

Baseados em nossos resultados de Western blot de colágeno tipo I e III, demonstramos que todos os grupos tratados com a proteína F1 possuem uma maior quantidade de ambos os tipos de colágeno quando comparados com seus respectivos grupos não tratados, com exceção do grupo KP4s que apresentou apenas um aumento na síntese de colágeno tipo III, porém, foi o grupo com a maior expressão desse tipo. Além disso, nossos dados demonstram que a proteína F1 aumenta a síntese desses dois tipos de colágeno.

Em um estudo de Guerra et al. (2013), em que os autores utilizaram laser de baixa potência como tratamento de rupturas no tendão calcâneo de ratos, eles observaram nos grupos tratados com laser um aumento na síntese dos colágenos tipos I e III e afirmam que o colágeno tipo III serve como suporte para a formação do tipo I.

Oshiro et al. (2003) avaliaram a expressão desses dois tipos de colágeno no dia da lesão até o vigésimo oitavo (28º) dia pós-lesão, e demonstram que a síntese do tipo I inicia-se no terceiro (3º) dia e continua aumentando até o período analisado por eles, contudo, o tipo III

também inicia-se no 3º dia, atingindo seu pico de síntese no décimo quarto (14º) dia, a partir daí começa a diminuir sua expressão.

Por outro lado, a metodologia de microscopia eletrônica de varredura evidenciou o aspecto morfológico destas fibras, sendo que nos grupos tratados com a proteína F1 após duas semanas, independente do tipo de sutura empregada, revelou uma certa ondulação dos feixes de fibras colágenas, que apareceram discretamente nos grupos não tratados.

Maffulli, Barrass e Ewen (2000) explicam que esta ondulação é normal em tendões lesados e com tendinopatia, sendo acompanhada de uma hipervascularização.

Sasaki et al. (2012), causaram uma ruptura no tendão calcâneo de ratos de forma similar a realizada em nosso estudo, no entanto, avaliaram o reparo em períodos de 4, 7, 14, 28, 56 e 180 dias. Quando comparamos nossos resultados com os dos autores no mesmo período, notamos resultados muito semelhantes. Os autores afirmam que os grupos analisados com 14 dias (assim como os nossos de duas semanas), apresentam fibras colágenas com um inicial arranjo axial e ondulações, e que esta disposição axial se completa com 28 dias (quatro semanas), também explicam que as análises de cortes transversais por MEV demonstram um aumento da densidade fibrilar com o avanço dos dias.

Entretanto, devido aos diferentes diâmetros das fibrilas colágenas presentes no tecido em reparação, é difícil distinguir com o uso desta técnica fibras não colágenas, assim como em nosso estudo, Sasaki et al. (2012) relatam que diversas estruturas fibrosas, tais como elastina, podem estar presentes, porém, os autores não as distingue e chamam todas de fibras colágenas devido ao volume das fibras não colágenas serem muito pequenas e consideradas insignificantes.

Confrontando os resultados obtidos de análises realizadas pela técnica de microscopia eletrônica de transmissão, verificou-se nitidamente os aspectos ultraestruturais tanto das células quanto das fibrilas colágenas que compõe o tendão.

No grupo controle apenas a identificação de tenócitos foi observada entre uma densa matriz colágena, Pingel et al. (2014) acrescentam que tais células apresentam longos processos celulares que projetam-se profundamente em uma MEC com fibrilas colágenas bem organizadas, mas que tais projeções são ausentes em tendões lesados ou com qualquer tipo de tendinopatia.

Essa MEC é constituída predominantemente por fibrilas colágenas do tipo I, mas fibrilas tipo III, assim como proteoglicanos, elastina e fibronectina também são componentes dessa específica MEC, que dão ao tendão propriedades de resiliência e estabilidade biomecânica (SCHULZE-TANZIL et al., 2004).

Morfológicamente os tenócitos são células muito alongadas com diâmetro médio de 80 μm , seu núcleo preenche e ocupa quase toda a célula e a cromatina se condensa nas margens da membrana nuclear (KANNUS, 2000).

Entretanto, nos grupos lesados uma predominante presença de tenoblastos na maioria das vezes organizados em fileiras foi observada, Ippolito et al. (1980) afirmam que o tamanho dessas células variam, no seu comprimento entre 20-70 μm e largura de 08-20 μm .

Kannus (2000) e Franchi et al. (2007) ainda completam explicando que estas células possuem diferenças morfológicas, podendo ser arredondados ou alongados, seus núcleos acompanham a forma celular, podendo ser ovoides ou em forma de fuso, apresentam também retículo endoplasmático granular e aparato de Golgi bem desenvolvidos, essas características suportam o conceito de alta atividade metabólica, como por exemplo uma intensa síntese de componentes da MEC.

Tais aspectos citados pelos autores acima condizem com todas as características ultraestruturais observadas em nosso estudo, e assim como visto nas técnicas de ML e de MEV, a MET demonstra uma alta vascularização nos grupos lesados. Kraushaar e Nirschl (1999) evidenciaram esta característica e relatam que alguns vasos apresentam lâmina basal mais espessa com espaços entre os pericitos, enquanto outros possuem paredes internas delgadas e regulares, bem como demonstrado em nossos resultados.

Esse aumento da vascularização é normal em processos de reparo tecidual e se inicia pela liberação de fatores angiogênicos durante o estágio inflamatório de reparo, sendo este, o primeiro a ocorrer após a lesão. Tais fatores iniciam a formação de uma nova e maior rede vascular, esse processo inclui um aumento da MEC que estabelece uma estabilidade parcial e continua no local da lesão (FENWICK; HAZLEMAN; RILEY, 2002; JAMES et al., 2008).

Essa extensa rede vascular continua durante o segundo estágio de reparo tecidual, conhecido como estágio proliferativo (JAMES et al., 2008). Fenwick, Hazleman e Riley (2002) explicam que o aumento da vascularização entre as duas partes rompidas do tendão em caso de lesão aguda, permite a ressecção do tecido e completam explanando que a resposta vascular inicial é profusa e aleatória.

Com relação ao aspecto ultraestrutural do colágeno destacamos a organização paralela das fibrilas com uma organização bem definida e um padrão homogêneo de diâmetro, no entanto, os grupos lesados em geral apresentam fibrilas desorganizadas e de diâmetros menores, apenas os grupo tratados UP2s e KP4s possuem diâmetros semelhantes ao grupo controle.

Tanto os cortes longitudinais quanto os transversais demonstram nos grupos lesados espaços entre as fibrilas colágenas e ao redor das células, de acordo com os achados em nosso

estudo, Pingel et al. (2014) explicam que esses espaços são vistos pela MET como regiões elétron-lúcidas.

Resultados semelhantes de alinhamento e organização das fibrilas colágenas foram notados por Komatsu et al. (2016) em uma pesquisa em que os autores realizaram o mesmo tipo de lesão de nosso estudo e analisaram também pelo mesmo período, mas como tratamento empregaram uma biomembrana com células-tronco derivadas do tendão, notaram, uma desorganização das fibrilas colágenas nos grupos de duas semanas, com uma inicial organização nos grupos analisados com quatro semanas. Nossas análises das fibrilas colágenas contaram também com análises da densidade, ou seja, a distribuição pelo tecido e a frequência, que foi representada pela porcentagem do diâmetro de cada fibrila analisada.

A densidade fibrilar demonstrou no geral possuir uma correlação com o diâmetro das fibrilas colágenas, ou seja, se o diâmetro é maior uma menor quantidade de fibrilas ocupam uma determinada área e vice-versa. Apenas os grupos K2s e KP2s revelaram densidade e diâmetros baixos, o que demonstra um maior espaçamento entre as fibrilas colágenas.

O grupo controle de nosso estudo apresentou a maior concentração de fibrilas com diâmetro de 80 nm, com uma distribuição entre 10-140 nm, todos os grupos lesados apresentaram uma diminuição no diâmetro das fibrilas, principalmente entre 80-140 nm, com exceção do grupo KP4s.

Józsa, Réffy e Bálint (1984) já haviam estudado a distribuição das fibrilas colágenas em humanos e relatam que o diâmetro consiste em tendões normais de 30-80 nm, entretanto, tendões rompidos e degenerados apresentam valores entre 40-60 nm e 10-20 nm respectivamente.

Outro estudo mais recente realizado em humanos por Magnusson et al. (2002) apresenta a maior concentração de fibrilas colágenas entre 30-70 nm e uma redução nas fibrilas de 60-150 nm, resultados estes, condizentes com os nossos.

Desde o estudo de Parry, Barnes e Craig (1978) em que os autores afirmam que um aumento no diâmetro das fibrilas aumenta a força mecânica do tecido, associado aos estudos de Nakagawa et al. (1989) e Nakagawa, Majima e Nagashima (1994) em que os trabalhos revelam que o tamanho das fibrilas colágenas diminui com o desuso e com o envelhecimento, indicam também, que o tamanho fibrilar é influenciado pela carga mecânica sofrida pela tecido.

Deste modo, o desuso do tendão foi estudado por Magnusson et al. (2002), e descobriram que 60% dos indivíduos participantes do estudo que possuíam ruptura aguda no tendão, relataram estarem em um período de relativa inatividade física por um certo tempo.

Alguns moduladores de cicatrização como matriz metaloproteinases (MMP), pertencentes a uma ampla família de enzimas proteolíticas com função de degradar componentes da MEC (MINKWITZ et al., 2017) foram analisadas em nosso estudo, as MMPs também são importantes reguladores no processo de remodelamento da MEC, sendo que seus níveis são alterados durante o processo de reparo do tendão (RILEY et al., 2002).

Oshiro et al. (2003) explicam que os níveis de MMP-2 aumentam a partir do 3º dia de lesão e mantem-se elevados até o 28º dia (período do estudo), entretanto, MMP-9 atinge seu pico de expressão entre o 7º e 14º dias, sendo que, logo em seguida reduz a quase zero.

Esses resultados são condizentes com os nossos, os quais demonstramos que a MMP-2 quase não está presente no grupo controle, e que nos grupos lesados aumentam com o avanço dos dias, diferente da MMP-9 que possui uma expressão semelhante no decorrer das semanas.

Sharma e Maffulli (2006) explicam que a MMP-2 participa tanto da degradação quanto do remodelamento do colágeno, já a MMP-9 participa apenas da degradação, os autores ainda completam dizendo que para a manutenção da homeostase tecidual é necessário um balanço entre as MMPs e seus inibidores, conhecidos como TIMPs.

Pasternak et al. (2010) também explicam que MMP-2 quebra fragmentos de colágeno gerados pela atividade de collagenase, sendo capaz de clivar fibrilas colágenas tipos I e III intactas.

O balanço entre a atividade das MMPs e TIMPs também regulam o remodelamento do tendão, sendo que, um desequilíbrio entre eles produzem distúrbios no tecido (CORPS et al., 2004).

Por esses motivos, em nosso estudo também foram quantificados a expressão de TIMP-1 e 2 por western blot, Demonstramos que ambas as TIMPs possuem valores maiores do que o grupo controle, principalmente TIMP-1.

Nossos resultados são semelhantes aos apresentados por Choi et al. (2002), onde os autores explicam que a alta expressão de TIMPs pode ser considerado como uma reação do tecido em resposta a um aumento na síntese de MMPs, como um esforço para reduzir a atividade catalítica na matriz tendínea, e que após seis semanas não é mais notada a expressão de TIMP-1, sugerindo uma função de inibir a degradação excessiva da MEC causada por MMP-2.

Contudo, em um estudo realizado em humanos por Pasternak et al. (2010), os autores observaram níveis elevados de TIMP-2 em pacientes após 3 anos de ruptura do tendão calcâneo.

Desta maneira, nota-se que TIMP-1 possui uma ação aguda enquanto que TIMP-2 tem uma ação de longo prazo.

Nosso estudo também avaliou as alterações no músculo sóleo decorrentes da ruptura do tendão calcâneo e observamos inicialmente uma redução no peso muscular em todos os grupos, independentemente do tratamento e do tipo de sutura, esta redução no peso manteve-se igual nos dois períodos de tempo avaliados.

Alguns estudos realizados em humanos por Leppilahti et al. (2000) e por Rosso et al. (2013) utilizando exames de ressonância magnética computadorizada, mostram que os músculos que compõem o tríceps sural (sóleo e gastrocnêmio) sofrem uma consequente atrofia devido à ruptura do tendão calcâneo.

Uma possível explicação para a diminuição do volume muscular, que se reflete a uma diminuição na função, pode ser pelo alongamento que o tendão sofre durante o processo de reparo (SILBERNAGEL; STEELE; MANAL, 2012).

Em um estudo também realizado em humanos, Heikkinen et al. (2017) explicam que o tratamento não cirúrgico de reparo do tendão calcâneo resulta em uma maior atrofia do músculo sóleo, quando comparado ao tratamento cirúrgico, mantendo o mesmo protocolo de reabilitação para os dois tipos de tratamento.

Para investigar um pouco mais a fundo a diminuição do peso muscular observada em nosso estudo, decorrente de uma possível atrofia muscular, avaliamos a expressão gênica de MuRF1 e Atrogin1.

Observamos que todos os grupos apresentaram valores de MuRF1 semelhantes ao grupo controle, já a expressão de Atrogin1 variou entre os grupos, sendo que os grupos U2s, UP2s e KP4s apresentaram valores semelhantes entre si e menores que o controle, contudo, um aumento na expressão foi observado em todos os outros grupos.

Para elucidar as funções de MuRF1 e Atrogin1 no músculo esquelético ainda há a necessidade de mais estudos, entretanto, sabe-se que esses genes estão envolvidos na ligação de substratos seletivos por ubiquitinação e subsequente degradação pelo proteassoma 26S, assim, a expressão aumentada desses genes seguida de um fator estressante de indução à atrofia é responsável pela alteração no balanço proteico de síntese e degradação, induzindo assim a perda de massa muscular. Desde a inicial descoberta de MuRF1 e Atrogin1, suas expressões tem sido relatadas por estarem elevadas em uma ampla variedade de condições atróficas, desta maneira, os dois genes se tornaram um marcador chave de atrofia muscular (BODINE; BAEHR, 2014).

Em um estudo realizado por Bodine et al. (2001) os autores causaram atrofia muscular com o tratamento com interleucina-1 (IL-1) e com dexametasona, com o objetivo de avaliar a expressão desses dois genes. Ambos os tratamentos apresentaram uma maior expressão de

MuRF1 e Atrogin1. Gomes et al. (2001) completam a explicação, dizendo que a expressão desses genes ocorre antes de ser detectada a perda de massa muscular.

Outro aspecto importante a ser considerado é que a diminuição da massa muscular resultante consequentemente causa uma diminuição na capacidade de contração do músculo. Desta forma, para avaliar esse fator e verificar quanto a ruptura do tendão calcâneo influencia na função muscular, realizamos testes de contração máxima e de fadiga.

Todos os nossos grupos apresentam uma capacidade de contração máxima menor do que a observada no grupo controle, os grupos tratados com a proteína F1 demonstram uma maior força contrátil em relação aos seus respectivos grupos não tratados, sendo que o grupo UP4s apresentou valores iguais ao controle e os grupos em que utilizamos a sutura de Kessler-Tajima mantiveram os mesmos valores nos dois tempos analisados, demonstrando assim, que não melhoram suas capacidades com o avanço das semanas, diferentemente do observado no grupo da sutura-U.

Os grupos tratados que apresentam uma maior capacidade contrátil, são os mesmos que apresentam em nosso estudo uma maior presença de adipócitos.

Esse resultado reforça a teoria de que excessivas cargas mecânicas nos tendões lesados faz com que as CTDT diferenciem-se em adipócitos.

Tais dados nos levam a crer que a carga mecânica sobre os tendões de nossos animais experimentais durante as primeiras duas semanas possa ter sido superior ao necessário, principalmente nos grupos tratados com a proteína F1, que de alguma forma deve estar auxiliando no reparo fazendo com que os animais se movimentem mais.

Um teste de contração muscular realizado por Don et al. (2007) em humanos submetidos à cirurgia de lesão do tendão calcâneo, utilizando a sutura de Kessler, também demonstrou uma perda da capacidade de contração dos músculos da panturrilha após 3 meses de cirurgia, sendo que o resultado obtido por eles foi de 58,2 N m contra 84,3 N m nos músculos da perna contralateral não lesada. Após 6 meses de cirurgia a capacidade de contração muscular aumentou para 81,8 N m e se manteve até a última avaliação realizada com 24 meses de cirurgia, a média nesse tempo de análise da perna não lesada foi de 85,3 N m.

Entretanto, os autores Don et al. (2007) concluem que a recuperação das propriedades biomecânicas dos músculos da panturrilha não determinam a recuperação da função devido à rigidez tendínea e um persistente padrão anormal de co-contração muscular.

Com relação ao teste de fadiga, uma acentuada queda ocorre em todos os grupos lesados, mantendo uma homogeneidade dos dados, a sutura de Kessler-Tajima demonstra uma maior fadiga, independente do tratamento com a proteína F1. Rawson, Cartmell e Wong (2013)

explicam que o nó entre as duas partes do tendão diminui a resistência ao deslizamento das fibras e talvez por isso o fato do músculo fadigar mais e não melhorar nos tempos analisados.

7 CONCLUSÃO

Diante de todos os resultados obtidos no presente estudo, podemos afirmar que o tratamento com a proteína F1 mostra-se eficaz na diminuição do diâmetro do tendão e a diminuição do peso se dá com o avanço dos dias.

A expressão dos colágenos tipos I e III aumentam, seguido de uma diminuição na expressão de MMP-9 que atua na degradação dos colágenos. Concomitantemente, o avanço das semanas dos experimentos, demonstra um aumento na densidade de fibrilas, sendo condizente com o aumento da síntese de colágeno.

Tais resultados sugerem uma melhora no reparo do tecido devido à aplicação da proteína F1, bem como, a sutura-U apresentou resultados melhores do que a de Kessler-Tajima.

No músculo sóleo, a sutura-U associada à proteína F1 após quatro semanas recuperou a capacidade de contração máxima e demonstrou uma menor fadiga em relação aos grupos que foram utilizada a sutura de Kessler-Tajima.

Sugere-se assim, que a sutura-U associada à proteína F1 após quatro semanas é o melhor método de tratamento, causando menores alterações musculares e melhores resultados no reparo do tendão.

REFERÊNCIAS

- ABRAHAMSSON, S. O. Matrix Metabolism and Healing in the Flexor Tendon. Experimental Studies on Rabbit Tendon. **Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery. Supplementum**, v. 23, p. 1–51, 1991.
- ALVES DE SOUSA, L. C.; RIBEIRO DE TOLEDO PIZA, M.; COUTINHO-NETTO, J.; RUIZ, D. B.; SCHMIDT, V. B. Latex Biomembrane: A New Method to Coat the Open Cavity in Tympanomastoidectomies. **Brazilian journal of otorhinolaryngology**, v. 73, n. 3, p. 331–336, 2007.
- AMIEL, D.; KUIPER, S. D.; WALLACE, C. D.; HARWOOD, F. L.; VANDEBERG, J. S. Age-Related Properties of Medial Collateral Ligament and Anterior Cruciate Ligament: A Morphologic and Collagen Maturation Study in the Rabbit. **Journal of gerontology**, v. 46, n. 4, p. B159-65, jul. 1991.
- ANDRADE, T. A. M.; IYER, A.; DAS, P. K.; FOSS, N. T.; GARCIA, S. B.; COUTINHO-NETTO, J.; JORDAO-JR, A. A.; FRADE, M. A. C. The Inflammatory Stimulus of a Natural Latex Biomembrane Improves Healing in Mice. **Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas / Sociedade Brasileira de Biofisica ... [et al.]**, v. 44, n. 10, p. 1036–1047, out. 2011.
- ARNER, O.; LINDHOLM, A. Subcutaneous Rupture of the Achilles Tendon; a Study of 92 Cases. **Acta chirurgica Scandinavica. Supplementum**, v. 116, n. Supp 239, p. 1–51, 1959.
- BALABANIAN, C. a C. a; COUTINHO-NETTO, J.; LAMANO-CARVALHO, T. L.; LACERDA, S. a; BRENTGANI, L. G. Biocompatibility of natural latex implanted into dental alveolus of rats. **Journal of oral science**, v. 48, n. 4, p. 201–205, 2006.
- BENJAMIN, M.; RALPHS, J. R. Fibrocartilage in tendons and ligaments - An adaptation to compressive load. **Journal of Anatomy**, v. 193, n. 4, p. 481–494, 1998.
- BERNBACH, M. Tendon Surgery ; Principles and Techniques. **The Podiatry Institute**, v. 2, p. 7–13, 1988.
- BI, Y.; EHIRCHIOU, D.; KILTS, T. M.; INKSON, C. A.; EMBREE, M. C.; SONOYAMA, W.; LI, L.; LEET, A. I.; SEO, B. M.; ZHANG, L.; SHI, S.; YOUNG, M. F. Identification of tendon stem/progenitor cells and the role of the extracellular matrix in their niche. **Nat Med**, v. 13, n. 10, p. 1219–1227, 2007.
- BODINE, S. C.; BAEHR, L. M. Skeletal muscle atrophy and the E3 ubiquitin ligases MuRF1 and MAFbx/atrogen-1. **AJP: Endocrinology and Metabolism**, v. 307, n. 6, p. E469–E484,

2014.

BODINE, S. C.; LATRES, E.; BAUMHUETER, S.; LAI, V. K.; NUNEZ, L.; CLARKE, B. A.; POUEYMIROU, W. T.; PANARO, F. J.; NA, E.; DHARMARAJAN, K.; PAN, Z. Q.; VALENZUELA, D. M.; DECHIARA, T. M.; STITT, T. N.; YANCOPOULOS, G. D.; GLASS, D. J. Identification of Ubiquitin Ligases Required for Skeletal Muscle Atrophy.

Science (New York, N.Y.), v. 294, n. 5547, p. 1704–1708, nov. 2001.

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Biochemistry**, v. 72, n. 1–2, p. 248–254, 1976.

BRINCKMANN, J. Collagens at a glance. **Topics in Current Chemistry**, v. 247, p. 1–6, 2005.

BRUGGEMAN, N. B.; TURNER, N. S.; DAHM, D. L.; VOLL, A. E.; HOSKIN, T. L.; JACOFISKY, D. J.; HAIDUKEWYCH, G. J. Wound Complications after Open Achilles Tendon Repair: An Analysis of Risk Factors. **Clinical Orthopaedics and Related Research**, v. 427, 2004.

CETTI, R.; CHRISTENSEN, S. E.; EJSTED, R.; JENSEN, N. M.; JORGENSEN, U. Operative versus Nonoperative Treatment of Achilles Tendon Rupture. A Prospective Randomized Study and Review of the Literature. **The American journal of sports medicine**, v. 21, n. 6, p. 791–799, 1993.

CHEN, T. M.; ROZEN, W. M.; PAN, W.-R.; ASHTON, M. W.; RICHARDSON, M. D.; TAYLOR, G. I. The Arterial Anatomy of the Achilles Tendon: Anatomical Study and Clinical Implications. **Clinical anatomy (New York, N.Y.)**, v. 22, n. 3, p. 377–385, abr. 2009.

CHOI, H.-R.; KONDO, S.; HIROSE, K.; ISHIGURO, N.; HASEGAWA, Y.; IWATA, H. Expression and enzymatic activity of MMP-2 during healing process of the acute supraspinatus tendon tear in rabbits. **Journal of Orthopaedic Research**, v. 20, n. 5, p. 927–933, set. 2002.

CORPS, A. N.; ROBINSON, A. H. N.; MOVIN, T.; COSTA, M. L.; IRELAND, D. C.; HAZLEMAN, B. L.; RILEY, G. P. Versican Splice Variant Messenger RNA Expression in Normal Human Achilles Tendon and Tendinopathies. **Rheumatology (Oxford, England)**, v. 43, n. 8, p. 969–972, ago. 2004.

COSTA, M. T.; HUNGRIA NETO, J. S. Comparative Study of Conservative and Surgical Methods for the Treatment of Acute Calcaneus Tendon Injuries. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 15, n. 1, p. 50–54, 2007.

- DE CARVALHO, P. D. T. C.; SILVA, I. S.; DOS REIS, F. A.; BELCHIOR, A. C. G.; AYDOS, R. D.; FACCO, G. G.; DOURADO, D. M. Histological study of tendon healing in malnourished Wistar rats treated with ultrasound therapy. **Acta Cirurgica Brasileira**, v. 21, n. SUPPL. 4, p. 13–17, 2006.
- DEL SOL, M.; JUNGE, C.; VÁSQUEZ, B. Insertion of the calcaneus tendon . **International Journal of Morphology**, v. 29, n. 3, p. 918–921, 2011.
- DIAS, F. J.; ISSA, J. P. M.; COUTINHO-NETTO, J.; FAZAN, V. P. S.; SOUSA, L. G.; IYOMASA, M. M.; PAPA, P. C.; WATANABE, I. Morphometric and high resolution scanning electron microscopy analysis of low-level laser therapy and latex protein (*Hevea brasiliensis*) administration following a crush injury of the sciatic nerve in rats. **Journal of the Neurological Sciences**, v. 349, n. 1–2, p. 129–137, 2015.
- DIAS, F. J.; PAULO, J.; ISSA, M.; IYOMASA, M. M.; COUTINHO-NETTO, J.; ALEXANDRE, R.; CALZZANI, J.; IYOMASA, D. M.; SOUSA, L. G.; REGINA, S.; ALMEIDA, Y. De; CURY, D. P.; WATANABE, I. Application of a Low-Level Laser Therapy and the Purified Protein from Natural Latex (*Hevea brasiliensis*) in the Controlled Crush Injury of the Sciatic Nerve of Rats : A Morphological , Quantitative , and Ultrastructural Study. **BioMed Research International**, v. 2013, p. 1–11, 2013.
- DON, R.; RANAVOLO, A.; CACCHIO, A.; SERRAO, M.; COSTABILE, F.; IACHELLI, M.; CAMEROTA, F.; FRASCARELLI, M.; SANTILLI, V. Relationship between recovery of calf-muscle biomechanical properties and gait pattern following surgery for achilles tendon rupture. **Clinical Biomechanics**, v. 22, n. 2, p. 211–220, 2007.
- ELIASSON, P.; COUPPÉ, C.; LONSDALE, M.; SVENSSON, R. B.; NEERGAARD, C.; KJÆR, M.; FRIBERG, L.; MAGNUSSON, S. P. Ruptured human Achilles tendon has elevated metabolic activity up to 1 year after repair. **European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging**, v. 43, n. 10, p. 1868–1877, 2016.
- FENWICK, S. A.; HAZLEMAN, B. L.; RILEY, G. P. The Vasculature and Its Role in the Damaged and Healing Tendon. **Arthritis research**, v. 4, n. 4, p. 252–260, 2002.
- FRADE, M. A. C.; ASSIS, R. V. C. de; COUTINHO NETTO, J.; ANDRADE, T. A. M. de; FOSS, N. T. The Vegetal Biomembrane in the Healing of Chronic Venous Ulcers. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 87, n. 1, p. 45–51, 2012.
- FRANCHI, M.; TRIRÈ, A.; QUARANTA, M.; ORSINI, E.; OTTANI, V. Collagen structure of tendon relates to function. **TheScientificWorldJournal**, v. 7, p. 404–420, 2007.
- GANESTAM, A.; KALLEMOSE, T.; TROELSEN, A.; BARFOD, K. W. Increasing Incidence of Acute Achilles Tendon Rupture and a Noticeable Decline in Surgical Treatment

from 1994 to 2013. A Nationwide Registry Study of 33,160 Patients. **Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA**, v. 24, n. 12, p. 3730–3737, dez. 2016.

GARNER, W. L.; MCDONALD, J. A.; KOO, M.; KUHN, C. 3rd; WEEKS, P. M.

Identification of the Collagen-Producing Cells in Healing Flexor Tendons. **Plastic and reconstructive surgery**, v. 83, n. 5, p. 875–879, maio 1989.

GELSE, K.; PÖSCHL, E.; AIGNER, T. Collagens - Structure, function, and biosynthesis. **Advanced Drug Delivery Reviews**, v. 55, n. 12, p. 1531–1546, 2003.

GOMES, M. D.; LECKER, S. H.; JAGOE, R. T.; NAVON, A.; GOLDBERG, A. L. Atrogin-1, a muscle-specific F-box protein highly expressed during muscle atrophy. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 98, n. 25, p. 14440–5, 2001.

GUERRA, F. D. R.; VIEIRA, C. P.; ALMEIDA, M. S.; OLIVEIRA, L. P.; DE ARO, A. A.; PIMENTEL, E. R. LLLT improves tendon healing through increase of MMP activity and collagen synthesis. **Lasers in Medical Science**, v. 28, n. 5, p. 1281–1288, 21 set. 2013.

GULATI, V.; JAGGARD, M.; AL-NAMMARI, S. S.; UZOIGWE, C.; GULATI, P.; ISMAIL, N.; GIBBONS, C.; GUPTE, C. Management of Achilles Tendon Injury: A Current Concepts Systematic Review. **World journal of orthopedics**, v. 6, n. 4, p. 380–386, maio 2015.

HANDSFIELD, G. G.; SLANE, L. C.; SCREEN, H. R. C. Nomenclature of the Tendon Hierarchy: An Overview of Inconsistent Terminology and a Proposed Size-Based Naming Scheme with Terminology for Multi-Muscle Tendons. **Journal of biomechanics**, v. 49, n. 13, p. 3122–3124, jun. 2016.

HEIKKINEN, J.; LANTTO, I.; FLINKKILA, T.; OHTONEN, P.; NIINIMAKI, J.; SIIRA, P.; LAINE, V.; LEPPILAHTI, J. Soleus Atrophy Is Common After the Nonsurgical Treatment of Acute Achilles Tendon Ruptures: A Randomized Clinical Trial Comparing Surgical and Nonsurgical Functional Treatments. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 45, n. 6, p. 1395–1404, 2017.

HENRIQUEZ, H.; MUNOZ, R.; CARCURO, G.; BASTIAS, C. Is Percutaneous Repair Better than Open Repair in Acute Achilles Tendon Rupture? **Clinical orthopaedics and related research**, v. 470, n. 4, p. 998–1003, abr. 2012.

HOOLEY, C. J.; COHEN, R. E. A model for the creep behaviour of tendon. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 1, n. 3, p. 123–132, ago. 1979.

IJKEMA-PAASSEN, J.; JANSEN, K.; GRAMSBERGEN, A.; MEEK, M. F. Transection of

- Peripheral Nerves, Bridging Strategies and Effect Evaluation. **Biomaterials**, v. 25, n. 9, p. 1583–1592, abr. 2004.
- INNOCENTI, M.; TANI, M.; CARULLI, C.; GHEZZI, S.; RASPANTI, A.; MENICHINI, G. Radial forearm flap plus Flexor Carpi Radialis tendon in Achilles tendon reconstruction: Surgical technique, functional results, and gait analysis. **Microsurgery**, 2 set. 2015.
- IPPOLITO, E.; NATALI, P. G.; POSTACCHINI, F.; ACCINNI, L.; DE MARTINO, C. Morphological, immunochemical, and biochemical study of rabbit Achilles tendon at various ages. **Journal of Bone and Joint Surgery - Series A**, v. 62, n. 4, p. 583–598, 1980.
- ISSA, J. P. M.; DEFINO, H. L. A.; NETTO, J. C.; VOLPON, J. B.; REGALO, S. C. H.; IYOMASA, M. M.; SIESSERE, S.; TIOSSI, R. Evaluation of rhBMP-2 and Natural Latex as Potential Osteogenic Proteins in Critical Size Defects by Histomorphometric Methods. **Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007)**, v. 293, n. 5, p. 794–801, maio 2010.
- JAMES, R.; KESTURU, G.; BALIAN, G.; CHHABRA, A. B. Tendon: Biology, Biomechanics, Repair, Growth Factors, and Evolving Treatment Options. **The Journal of hand surgery**, v. 33, n. 1, p. 102–112, jan. 2008.
- JÓZSA, L.; RÉFFY, A.; BÁLINT, J. B. Polarization and electron microscopic studies on the collagen of intact and ruptured human tendons. **Acta Histochemica**, v. 74, n. 2, p. 209–215, jan. 1984.
- JUNQUEIRA, L. C. U.; BIGNOLAS, G.; BRENTANI, R. R. Picrosirius staining plus polarization microscopy, a specific method for collagen detection in tissue sections. **The Histochemical Journal**, v. 11, n. 4, p. 447–455, 1979.
- KANGAS, J.; PAJALA, A.; OHTONEN, P.; LEPPILAHTI, J. Achilles Tendon Elongation After Rupture Repair: A Randomized Comparison of 2 Postoperative Regimens. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 35, n. 1, p. 59–64, 2006.
- KANNUS, P. Structure of the tendon connective tissue. **Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports**, v. 10, n. 6, p. 312–320, 2000.
- KIM, M. Y.; FARNEBO, S.; WOON, C. Y. L.; SCHMITT, T.; PHAM, H.; CHANG, J. Augmentation of Tendon Healing with an Injectable Tendon Hydrogel in a Rat Achilles Tendon Model. **Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 133, n. 5, p. 645e–653e, maio 2014.
- KJAER, M. Role of extracellular matrix in adaptation of tendon and skeletal muscle to mechanical loading. **Physiological reviews**, v. 84, n. 2, p. 649–698, 2004.
- KOCHER, M. S.; BISHOP, J.; MARSHALL, R.; BRIGGS, K. K.; HAWKINS, R. J. Operative versus Nonoperative Management of Acute Achilles Tendon Rupture: Expected-Value Decision Analysis. **The American journal of sports medicine**, v. 30, n. 6, p. 783–790,

2002.

KOMATSU, I.; WANG, J. H. C.; IWASAKI, K.; SHIMIZU, T.; OKANO, T. The effect of tendon stem/progenitor cell (TSC) sheet on the early tendon healing in a rat Achilles tendon injury model. **Acta Biomaterialia**, v. 42, p. 136–146, 2016.

KRAUSHAAR, B. S.; NIRSCHL, R. P. Tendinosis of the Elbow (Tennis Elbow). Clinical Features and Findings of Histological, Immunohistochemical, and Electron Microscopy Studies. **The Journal of bone and joint surgery. American volume**, v. 81, n. 2, p. 259–78, 1 fev. 1999.

KUMAGAI, J.; UHTHOFF, H. K.; SARKAR, K.; MURNAGHAN, J. P. Collagen Type III in Rotator Cuff Tears: An Immunohistochemical Study. **Journal of shoulder and elbow surgery**, v. 1, n. 4, p. 187–192, jul. 1992.

LATTOUF, R.; YOUNES, R.; LUTOMSKI, D.; NAAMAN, N.; GODEAU, G.; SENNI, K.; CHANGOTADE, S. Picrosirius Red Staining: A Useful Tool to Appraise Collagen Networks in Normal and Pathological Tissues. **Journal of Histochemistry & Cytochemistry**, v. 62, n. 10, p. 751–758, 2014.

LEPPILAHTI, J.; LAHDE, S.; FORSMAN, K.; KANGAS, J.; KAURANEN, K.; ORAVA, S. Relationship between Calf Muscle Size and Strength after Achilles Rupture Repair. **Foot & ankle international**, v. 21, n. 4, p. 330–335, abr. 2000.

LEPPILAHTI, J.; PURANEN, J.; ORAVA, S. Incidence of Achilles Tendon Rupture. **Acta orthopaedica Scandinavica**, v. 67, n. 3, p. 277–279, jun. 1996.

LINDSAY, W. K.; BIRCH, J. R. THE FIBROBLAST IN FLEXOR TENDON HEALING. **Plastic and reconstructive surgery**, v. 34, p. 223–232, set. 1964.

LIU, S. H.; YANG, R. S.; AL-SHAikh, R.; LANE, J. M. Collagen in Tendon, Ligament, and Bone Healing. A Current Review. **Clinical orthopaedics and related research**, n. 318, p. 265–278, set. 1995.

MAFFULLI, N. Rupture of the Achilles Tendon. **The Journal of bone and joint surgery. American volume**, v. 81, n. 7, p. 1019–1036, jul. 1999.

MAFFULLI, N.; BARRASS, V.; EWEN, S. W. Light microscopic histology of achilles tendon ruptures. A comparison with unruptured tendons. **The American journal of sports medicine**, v. 28, n. 6, p. 857–863, 2000.

MAFFULLI, N.; EWEN, S. W. B.; WATERSTON, S. W.; REAPER, J.; BARRASS, V. Tenocytes from ruptured and tendinopathic achilles tendons produce greater quantities of type III collagen than tenocytes from normal achilles tendons: An in vitro model of human tendon healing. **American Journal of Sports Medicine**, v. 28, n. 4, p. 499–505, 2000.

- MAFFULLI, N.; MOLLER, H. D.; EVANS, C. H. Tendon Healing: Can It Be Optimised? **British journal of sports medicine**, v. 36, n. 5, p. 315–316, out. 2002.
- MAGNUSSON, S. P.; QVORTRUP, K.; LARSEN, J. O.; ROSAGER, S.; HANSON, P.; AAGAARD, P.; KROGSGAARD, M.; KJAER, M. Collagen fibril size and crimp morphology in ruptured and intact Achilles tendons. **Matrix Biology**, v. 21, n. 4, p. 369–377, 2002.
- MANDELBAUM, B. R.; MYERSON, M. S.; FORSTER, R. Achilles Tendon Ruptures. A New Method of Repair, Early Range of Motion, and Functional Rehabilitation. **The American journal of sports medicine**, v. 23, n. 4, p. 392–395, 1995.
- MAZZONE, M. F.; MCCUE, T. Common conditions of the Achilles tendon. **American Family Physician**, v. 65, n. 9, p. 1805–1810, 2002.
- MCKEON, B. P.; HEMING, J. F.; FULKERSON, J.; LANGELAND, R. The Krackow Stitch: A Biomechanical Evaluation of Changing the Number of Loops versus the Number of Sutures. **Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association**, v. 22, n. 1, p. 33–37, jan. 2006.
- MENDONÇA, R. J.; MAURICIO, V. B.; TEIXEIRA, L. de B.; LACHAT, J. J.; COUTINHO-NETTO, J. Increased Vascular Permeability, Angiogenesis and Wound Healing Induced by the Serum of Natural Latex of the Rubber Tree *Hevea Brasiliensis*. **Phytotherapy research : PTR**, v. 24, n. 5, p. 764–768, maio 2010.
- MILLAR, N. L.; GILCHRIST, D. S.; AKBAR, M.; REILLY, J. H.; KERR, S. C.; CAMPBELL, A. L.; MURRELL, G. a C.; LIEW, F. Y.; KUROWSKA-STOLARSKA, M.; MCINNES, I. B. MicroRNA29a regulates IL-33-mediated tissue remodelling in tendon disease. **Nature communications**, v. 6, p. 6774, 2015.
- MINKWITZ, S.; SCHMOCK, A.; KURTOGLU, A.; TSITSILONIS, S.; MANEGOLD, S.; WILDEMAN, B.; KLATTE-SCHULZ, F. Time-dependent alterations of MMPs, TIMPs and tendon structure in human achilles tendons after acute rupture. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 18, n. 10, 2017.
- MUNIZ, K. L.; DIAS, F. J.; COUTINHO-NETTO, J.; CALZZANI, R. A. J.; IYOMASA, M. M.; SOUSA, L. G. De; SANTOS, T. T. Dos; TELES, V. D. O.; WATANABE, I.-S.; FAZAN, V. P. S.; ISSA, J. P. M. Properties of the Tibialis Anterior Muscle after Treatment with Laser Therapy and Natural Latex Protein Following Sciatic Nerve Crush. **Muscle & nerve**, v. 52, n. 5, p. 869–875, nov. 2015.
- MYERS, B.; WOLF, M. Vascularization of the Healing Wound. **The American surgeon**, v.

40, n. 12, p. 716–722, dez. 1974.

NAKAGAWA, Y.; MAJIMA, T.; NAGASHIMA, K. Effect of ageing on ultrastructure of slow and fast skeletal muscle tendon in rabbit Achilles tendons. **Acta Physiologica Scandinavica**, v. 152, n. 3, p. 307–313, nov. 1994.

NAKAGAWA, Y.; TOTSUKA, M.; SATO, T.; FUKUDA, Y.; HIROTA, K. Effect of Disuse on the Ultrastructure of the Achilles Tendon in Rats. **European journal of applied physiology and occupational physiology**, v. 59, n. 3, p. 239–242, 1989.

NI, M.; LUI, P. P. Y.; RUI, Y. F.; LEE, Y. W.; LEE, Y. W.; TAN, Q.; WONG, Y. M.; KONG, S. K.; LAU, P. M.; LI, G.; CHAN, K. M. Tendon-derived stem cells (TDSCs) promote tendon repair in a rat patellar tendon window defect model. **Journal of Orthopaedic Research**, v. 30, n. 4, p. 613–619, 2012.

NUNLEY, J. A. **The Achilles Tendon - Treatment and Rehabilitation**. 1. ed. New York, NY: Springer New York, 2009.

OKAMOTO, N.; KUSHIDA, T.; OE, K.; UMEDA, M.; IKEHARA, S.; IIDA, H. Treating Achilles Tendon Rupture in Rats with Bone-Marrow-Cell Transplantation Therapy. **The Journal of bone and joint surgery. American volume**, v. 92, n. 17, p. 2776–2784, dez. 2010.

OSHIRO, W.; LOU, J.; XING, X.; TU, Y.; MANSKE, P. R. Flexor tendon healing in the rat: a histologic and gene expression study. **The Journal of hand surgery**, v. 28, n. 5, p. 814–823, 2003.

PARRY, D. A. D.; BARNES, G. R. G.; CRAIG, A. S. A Comparison of the Size Distribution of Collagen Fibrils in Connective Tissues as a Function of Age and a Possible Relation between Fibril Size Distribution and Mechanical Properties. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 203, n. 1152, p. 305–321, 18 dez. 1978.

PASTERNAK, B.; SCHEPULL, T.; ELIASSON, P.; ASPENBERG, P. Elevation of systemic matrix metalloproteinases 2 and 7 and tissue inhibitor of metalloproteinase 2 in patients with a history of Achilles tendon rupture: Pilot study. **British Journal of Sports Medicine**, v. 44, n. 9, p. 669–672, 2010.

PEREIRA, M. G.; BAPTISTA, I. L.; CARLASSARA, E. O. C.; MORISCOT, A. S.; AOKI, M. S.; MIYABARA, E. H. Leucine supplementation improves skeletal muscle regeneration after cryolesion in rats. **PLoS ONE**, v. 9, n. 1, 2014.

PINGEL, J.; LU, Y.; STARBORG, T.; FREDBERG, U.; LANGBERG, H.; NEDERGAARD, A.; WEIS, M.; EYRE, D.; KJAER, M.; KADLER, K. E. 3-D ultrastructure and collagen composition of healthy and overloaded human tendon: Evidence of tenocyte and matrix

- buckling. **Journal of Anatomy**, v. 224, n. 5, p. 548–555, 2014.
- RAWSON, S.; CARTMELL, S.; WONG, J. Suture techniques for tendon repair; a comparative review. **Muscles, Ligaments and Tendons Journal**, v. 3, n. 3, p. 220–228, 2013.
- REYNOLDS, E. S. The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy. **The Journal of cell biology**, v. 17, p. 208–212, 1963.
- RICARD-BLUM, S. The collagen family. **Cold Spring Harbor perspectives in biology**, v. 3, n. 1, p. a004978, 2011.
- RILEY, G. P.; CURRY, V.; DEGROOT, J.; VAN EL, B.; VERZIIL, N.; HAZLEMAN, B. L.; BANK, R. A. Matrix metalloproteinase activities and their relationship with collagen remodelling in tendon pathology. **Matrix Biology**, v. 21, n. 2, p. 185–195, 2002.
- ROSSO, C.; VAVKEN, P.; POLZER, C.; BUCKLAND, D. M.; STUDLER, U.; WEISSKOPF, L.; LOTTENBACH, M.; MULLER, A. M.; VALDERRABANO, V. Long-Term Outcomes of Muscle Volume and Achilles Tendon Length after Achilles Tendon Ruptures. **Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA**, v. 21, n. 6, p. 1369–1377, jun. 2013.
- ROUVILLAIN, J.-L.; NAVARRE, T.; LABRADA-BLANCO, O.; GARRON, E.; DAOUD, W. Percutaneous Suture of Acute Achilles Tendon Rupture. A Study of 60 Cases. **Acta orthopaedica Belgica**, v. 76, n. 2, p. 237–242, abr. 2010.
- RUNESSON, E.; ACKERMANN, P.; KARLSSON, J.; ERIKSSON, B. I. Nucleostemin- and Oct 3/4-positive stem/progenitor cells exhibit disparate anatomical and temporal expression during rat Achilles tendon healing. **BMC Musculoskeletal Disorders**, v. 16, n. 1, p. 212, 2015.
- SASAKI, K.; YAMAMOTO, N.; KIYOSAWA, T.; SEKIDO, M. The role of collagen arrangement change during tendon healing demonstrated by scanning electron microscopy. **Journal of Electron Microscopy**, v. 61, n. 5, p. 327–334, 2012.
- SCHULZE-TANZIL, G.; MOBASHERI, A.; CLEGG, P. D.; SENDZIK, J.; JOHN, T.; SHAKIBAEI, M. Cultivation of human tenocytes in high-density culture. **Histochemistry and Cell Biology**, v. 122, n. 3, p. 219–228, 2004.
- SHARMA, P.; MAFFULLI, N. Biology of tendon injury: Healing, modeling and remodeling. **Journal of Musculoskeletal Neuronal Interactions**, v. 6, n. 2, p. 181–190, 2006.
- SHEN, W.; CHEN, J.; YIN, Z.; CHEN, X.; LIU, H.; HENG, B. C.; CHEN, W.; OUYANG, H. W. Allogeneous tendon stem/progenitor cells in silk scaffold for functional shoulder repair. **Cell Transplantation**, v. 21, n. 5, p. 943–958, 2012.

- SILBERNAGEL, K. G.; STEELE, R.; MANAL, K. Deficits in heel-rise height and Achilles tendon elongation occur in patients recovering from an Achilles tendon rupture. **American Journal of Sports Medicine**, v. 40, n. 7, p. 1564–1571, 2012.
- SINGER, G.; EBRAMZADEH, E.; JONES, N. F.; MEALS, R. Use of the Taguchi Method for Biomechanical Comparison of Flexor-Tendon-Repair Techniques to Allow Immediate Active Flexion. A New Method of Analysis and Optimization of Technique to Improve the Quality of the Repair. **The Journal of bone and joint surgery. American volume**, v. 80, n. 10, p. 1498–1506, out. 1998.
- STARBORG, T.; KALSON, N. S.; LU, Y.; MIRONOV, A.; COOTES, T. F.; HOLMES, D. F.; KADLER, K. E. Using transmission electron microscopy and 3View to determine collagen fibril size and three-dimensional organization. **Nature Protocols**, v. 8, n. 7, p. 1433–1448, 27 jun. 2013.
- SUCHAK, A. A.; BOSTICK, G.; REID, D.; BLITZ, S.; JOMHA, N. The Incidence of Achilles Tendon Ruptures in Edmonton, Canada. **Foot & ankle international**, v. 26, n. 11, p. 932–936, nov. 2005.
- THORPE, C. T.; BIRCH, H. L.; CLEGG, P. D.; SCREEN, H. R. C. The role of the non-collagenous matrix in tendon function. **International Journal of Experimental Pathology**, v. 94, n. 4, p. 248–259, 2013.
- THORPE, C. T.; GODINHO, M. S. C.; RILEY, G. P.; BIRCH, H. L.; CLEGG, P. D.; SCREEN, H. R. C. The interfascicular matrix enables fascicle sliding and recovery in tendon, and behaves more elastically in energy storing tendons. **Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials**, p. 1–10, 2015.
- THURMAN, R. T.; TRUMBLE, T. E.; HANEL, D. P.; TENCER, A. F.; KISER, P. K. Two-, Four-, and Six-Strand Zone II Flexor Tendon Repairs: An in Situ Biomechanical Comparison Using a Cadaver Model. **The Journal of hand surgery**, v. 23, n. 2, p. 261–265, mar. 1998.
- TOLOSA, E. M. C.; RODRIGUES, C. J.; BEHMER, O. A.; FREITAS NETO, A. G. **Manual de técnicas para histologia normal e patológica**. 2. ed. Barueri-SP: Manole, 2003.
- VOLETI, P. B.; BUCKLEY, M. R.; SOSLOWSKY, L. J. Tendon Healing: Repair and Regeneration. **Annual Review of Biomedical Engineering**, v. 14, n. 1, p. 47–71, 2012.
- WANG, J. H.-C. Mechanobiology of Tendon. **Journal of biomechanics**, v. 39, n. 9, p. 1563–1582, 2006.
- WATANABE, I.-S. **Scanning electron microscopy atlas of cells and tissues of the oral cavity**. 1. ed. São Paulo-SP: ICB/SBIB, FAPESP and CNPq, 1998.
- WATANABE, I.; YAMADA, E. The fine structure of lamellated nerve endings found in the

- rat gingiva. **Archivum Histologicum Japonicum**, v. 46, n. 2, p. 173–182, 1983.
- WATSON, M. L. Staining of tissue sections for electron microscopy with heavy metals. II. Application of solutions containing lead and barium. **The Journal of biophysical and biochemical cytology**, v. 4, n. 6, p. 727–730, 1958.
- WILKINS, R.; BISSON, L. J. Operative Versus Nonoperative Management of Acute Achilles Tendon Ruptures: A Quantitative Systematic Review of Randomized Controlled Trials. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 40, n. 9, p. 2154–2160, 2012.
- WOLFF, K. S.; WIBMER, A. G.; BINDER, H.; GRISSMANN, T.; HEINRICH, K.; SCHAUER, S.; NEPP, R.; ROIS, S.; RITSCHL, H.; TEUFELSBAUER, H.; PRETTERKLIEBER, M. L. The avascular plane of the Achilles tendon: A quantitative anatomic and angiographic approach and a base for a possible new treatment option after rupture. **European Journal of Radiology**, v. 81, n. 6, p. 1211–1215, 2012.
- WONG, J.; BARRASS, V.; MAFFULLI, N. Quantitative Review of Operative and Nonoperative Management of Achilles Tendon Ruptures. **The American journal of sports medicine**, v. 30, n. 4, p. 565–575, 2002.
- YALCIN, L.; DEMIRCI, M. S.; ALP, M.; AKKIN, S. M.; SENER, B.; KOEBKE, J. Biomechanical Assessment of Suture Techniques Used for Tendon Repair. **Acta orthopaedica et traumatologica turcica**, v. 45, n. 6, p. 453–457, 2011.
- YANAGISAWA, H.; HOSHI, K.; ASAWA, Y.; EJIRI, S.; SATO, K.; OZAWA, H. Matrix remodeling and cytological changes during spontaneous cartilage repair. **Journal of Electron Microscopy**, v. 61, n. 4, p. 237–248, 2012.
- YUKSEL, S.; GULEÇ, M. A.; GULTEKIN, M. Z.; ADANIR, O.; CAGLAR, A.; BEYTEMUR, O.; ONUR KÜÇÜKYILDIRIM, B.; AVCI, A.; SUBAŞI, C.; İNCİ, Ç.; KARAOZ, E. Comparison of the early period effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma on the Achilles tendon ruptures in rats. **Connective tissue research**, v. 57, n. 5, p. 360–73, 2016.
- ZHANG, J.; WANG, J. H. C. Mechanobiological response of tendon stem cells: Implications of tendon homeostasis and pathogenesis of tendinopathy. **Journal of Orthopaedic Research**, v. 28, n. 5, p. 639–643, 2010a.
- ZHANG, J.; WANG, J. H. C. Production of PGE2 increases in tendons subjected to repetitive mechanical loading and induces differentiation of tendon stem cells into non-tenocytes. **Journal of Orthopaedic Research**, v. 28, n. 2, p. 198–203, 2010b.