STEFANIE KLAVER FLORES

**ESTUDO DE NOVOS DEFEITOS GENÉTICO-
MOLECULARES EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO
CLÍNICO DE IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para obtenção do Título de Doutor em Ciências.

São Paulo
2016

STEFANIE KLAVER FLORES

**ESTUDO DE NOVOS DEFEITOS GENÉTICO-
MOLECULARES EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO
CLÍNICO DE IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para obtenção do Título de Doutor em Ciências.

Área de concentração: Imunologia

Orientador: Prof. Dr. Antonio Condino Neto

Versão original

São Paulo
2016

DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

© reprodução total

Flores, Stefanie Klaver.

Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária / Stefanie Klaver Flores. -- São Paulo, 2016.

Orientador: Prof. Dr. Antonio Condino Neto.

Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Departamento de Imunologia. Área de concentração: Imunologia. Linha de pesquisa: Imunologia Clínica.

Versão do título para o inglês: Study of new molecular genetic defects in patients with clinical diagnosis of primary immunodeficiency.

1. Imunodeficiência primária 2. Novos genes 3. Infecções recorrentes
4. NGS 5. Análise genética 6. Diagnóstico I. Condino Neto, Prof. Dr. Antonio II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa de Pós-Graduação em Imunologia III. Título.

ICB/SBIB053/2016

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Candidato(a): Stefanie Klaver Flores.

Título da Tese: Estudo de novos defeitos genético-moleculares em
pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária.

Orientador(a): Prof. Dr. Antonio Condino Neto.

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão
pública realizada a/...../....., considerou

☐ **Aprovado(a)**

☐ **Reprovado(a)**

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Presidente: Assinatura:
Nome:
Instituição:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"
Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 - cep. 05508-000 São Paulo, SP - Brasil
Telefone : (55) (11) 3091.7733 telefax : (55) (11) 3091-8405
e-mail: cep@icb.usp.br

São Paulo, 26 de setembro de 2012.

PARECER 1066/CEP

A Comissão de *Ética em Pesquisas com Seres Humanos* do ICB, nesta data **APROVOU** o projeto intitulado: " *Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária*" sob responsabilidade de execução dos autores Prof. Dr. **ANTONIO CONDINO NETO** e a aluna **STEFANIE KLAVER FLORES**.

Cabe os pesquisadores executantes elabora e apresentar a este Comitê, relatórios anuais (parciais ou final), de acordo com a resolução 196/06 do Conselho Nacional da Saúde, item IX. 2 letra c.

O primeiro relatório deverá ser encaminhado à Secretaria deste CEP em **05.09.2013**.

Atenciosamente,

Prof. Dr. **PAOLO M.A. ZANOTTO**
Coordenador da Comissão de Ética em
Pesquisas com Seres Humanos - ICB/USP

Dedico este trabalho...

... Aos meus queridos pais, Nanne e Luzinete, que com irreverência, carinho e compreensão, consolidaram a escadaria que elevou-me ao longo de minha trajetória pessoal e profissional.

... Ao meu amado esposo, Eduardo, pelo amor e compreensão, compartilhando com dedicação e paciência o final de mais uma etapa importante de minha vida. Pelo conforto e carinho nos momentos de angústia. Pela companhia que me completa e me presenteia nos momentos mais alegres da minha vida.

... Ao meu amado filho, Arthur, pelo sorriso carinhoso, que tira a minha dor e cura qualquer cansaço. Por me tornar uma pessoa plena e completa. Por me proporcionar o maior amor que eu poderia sentir.

... A minha irmã Letícia, com quem constantemente aprendo e valorizo a importância do amor em família.

Meu eterno agradecimento. Amo vocês!

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Antonio Condino Neto, meu muito obrigada pela orientação, conselhos e paciência ao longo de todos esses anos.

Ao Dr. Kaan Boztug por abrir as portas do seu laboratório e por me apresentar a imunologia de uma forma encantadora.

Aos meus queridos amigos...

... Christina Arslanian, não só pelo indispensável auxílio técnico, mas pelo carinho e cuidados constantes.

... Silvana Luchinni pela ajuda, sempre eficiente em todos os momentos que precisei. Uma pessoa indispensável para todos do laboratório.

... Elisangela e Ricardo, com quem tive o privilégio de conviver no período que estive na Áustria. Meu muito obrigada pela amizade sincera, pelo suporte, pelos conselhos, pelas viagens, pelos jantares... Vocês sempre estarão no meu coração.

... Albert Garncarz, Elisangela Valente, Tatjana Hirschmugl, Elisabeth Salzer, Katharina Willmann, Cecília Dominguez, Sola Ban, Stavroula Serafin, Aysenur Ozturk, Nina Serwas por serem companheiros e por alegrarem os meus dias, tornando-os melhores.

... LIH (Laboratório de Imunologia Humana) pela companhia, brincadeiras e pelos momentos maravilhosos que passamos juntos.

Aos funcionários da secretaria do Departamento de Imunologia: Jotelma, Amarildo (*in memorian*), Amanda, Eni e João pelo desempenho e dedicação em todos os momentos em que precisei.

Aos funcionários da Biblioteca que contribuíram na revisão textual e suporte para confecção dessa tese.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pelo apoio financeiro, sem o qual não haveria possibilidade da realização dessa tese.

E a todos, aqui não citados, que de forma direta ou indireta contribuíram para concretização deste trabalho.

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos.”

(Isaac Newton)

RESUMO

Klaver S. Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária. [Tese (Doutorado em Imunologia)] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.

As imunodeficiências primárias são um grupo heterogêneo de doenças hereditárias do sistema imunológico que levam a suscetibilidade aumentada a infecções e que acometem principalmente crianças. Isoladamente, as imunodeficiências são classificadas como raras. A prevalência desses transtornos variam de 1:10.000 a 1:100.000 na Europa e América Latina, respectivamente (1-3). Segundo a União Internacional de Sociedades Imunológicas, existem torno de 300 tipos de imunodeficiências primárias já foram molecularmente definidas (4) Mingyan Fang 2016 next generation sequencing., e este número está aumentando rapidamente com a ajuda de técnicas de genéticas mais elaboradas, como o sequenciamento de ultima geração (5-8). Aqui nós descrevemos 5 pacientes pertencentes a 4 famílias (2 Turcas e 2 Brasileiras), todas com história de consanguinidade, onde os pacientes apresentaram infecções recorrentes desde os primeiros dias de vida. Após uma análise clínica bem detalhada, combinamos as técnicas de mapeamento homozigótico combinado com o sequenciamento do exoma. Finalizamos com a identificação e caracterização de três imunodeficiências primárias, sendo que duas delas ainda não haviam sido descrita na literatura (9, 10). A primeira nova imunodeficiência identificada (Paciente 1) foi causada por uma mutação bialélica no sítio de *splice* do gene *PRKCD* (protein kinase C delta; c.1352+1G>A), causando ausência do produto proteico correspondente e consequentemente ausência na fosforilação da cascata de ativação. A segunda foi identificada em dois pacientes (Paciente 2 e 3), primos de primeiro grau, e foi causada por uma mutação bialélica no gene que codifica NIK (*MAP3K14*; c.C1694G; p.Pro565Arg), levando a uma perda da função cinase da proteína, visto tanto nos ensaios *in silico* quanto *in vitro*. Esses pacientes apresentaram uma sinalização das vias canônicas e não-canônicas do NF- κ B prejudicadas, apresentaram linfopenia de célula B, defeito no *Switch* de classes, defeito na sobrevivência da célula B e expressão do ICOSL prejudicada. Além do fenótipo de célula B, os pacientes também apresentaram um fenótipo de células T e NK, onde as células T CD3⁺CD4⁺ e T de memória não estão exercendo suas funções. O número de células NK também apresentou-se diminuídas, além de apresentar um defeito na sua ativação e na formação de sinapse imunológica. A terceira que descrevemos aqui (Paciente 4), já é conhecida na literatura. A paciente apresentou desde sua primeira infância uma característica clínica compatível com SCID, porém o teste para detectar apresentou-se normal. Após a análise genética detalhada, identificamos uma nova mutação no gene *IL7R α* (cadeia α do receptor da IL-7; c.G353A), que é uma dos genes causadores de uma das formas mais comuns de SCID. Após a análise genética detalhada da paciente 5, finalizamos com 8 genes candidatos, mas dentre esses genes, nenhum é responsável por causar o fenótipo de IDP que a paciente apresenta. Os avanços dos conhecimentos sobre imunologia e genética facilitaram a descoberta de novos defeitos genético-moleculares envolvendo pacientes com característica clínica de PID, no entanto ainda há muito o que ser estudado. A análise genética e a identificação do defeito genético, permite que nossos pacientes possam ter uma melhor sobrevida, podendo realizar um tratamento correto e permite o aconselhamento genético na família.

Palavras-chave: Imunodeficiências primárias. Novos genes. Infecções recorrentes. NGS. Análise genética. Diagnóstico. Hipogamaglobulinemia.

ABSTRACT

Klaver S. Study of new molecular genetic defects in patients with clinical diagnosis of primary immunodeficiency. [PhD. Thesis (Immunology)] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.

Primary immunodeficiencies are a heterogeneous group of inherited diseases of the immune system leading to increased susceptibility to infections and affecting mainly children. Immune deficiencies are classified as rare, but when we form a set of immunodeficiency, it becomes more often than we realize. The prevalence of these disorders range from 1:10,000 to 1:100,000 in Europe and Latin America, respectively (1-3). According to the International Union of Immunological Societies, there are around 300 types of primary immunodeficiencies that have been molecularly defined (4), and this number is expected to increase rapidly with the help of techniques more genetically elaborate (5-8). Here we describe 5 patients from 4 families (2 Turks and 2 Brazilian), all with a consanguinity history, where the patients had recurrent infections since the firsts days of life. After a very detailed clinical analysis, we applied the homozygous mapping techniques combined with exoma sequencing. We had finish this project with the identification and characterization of 3 primary immunodeficiencies, where 2 are new immunodeficiencies caused by mutations in different genes (9, 10). The first new PID identified (Patient 1) was caused by a mutation in the splice site of the gene *PRKCD* (protein kinase C delta; c.1352+1G>A) that causes an absence of the corresponding protein product and therefore no phosphorylation of the activation cascade. The second new PID (Patient 2 and 3) was identified in two first-degree causins, was caused by a biallelic mutation in the gene encoding NIK (*MAP3K14*; c. C1694G), leading to a loss of kinase function of the protein, since both in trials *in silico* and *in vitro*. These patients had a signal of canonical and non-canonical NF- κ B pathway affected showed lymphopenia of B cell, defect in the switch classes, defect in B cell survival and expression of impaired ICOSL. In the B cell phenotype, patients also had a phenotype of T and NK cells, where the CD3⁺CD4⁺ cells and memory T are not performing their functions. The number of NK cells are decreased, in addition to having a defect in their activation and the formation of the immune synapse. The third gene we describe here (patient 4), is already known in the literature. The patient had clinical characteristics compatible with SCID since his early childhood. After the detailed genetic analysis, we identified a novel mutation in the gene *IL7R α* (α chain of the IL-7 receptor; c.G353A), which is one of the causative genes of the most common forms of SCID. With the patient 5, after a detailed clinical characterization and genetic analysis, we end with 8 genes that could be the disease causing, but after some validations, all genes was excluded to be the disease causing symptoms. Advances of knowledge on immunology and genetics facilitated the discovery of new molecular-genetic defects involving patients with a clinical feature of PID, however there is still much to be studied. Genetic analysis and identification of the genetic defect allows our patients may have a better survival and can perform a proper treatment and genetic counseling allows the family.

Keywords: Primary immunodeficiencies. New genes. Recurrent infections. NGS. Genetic analysis. Diagnosis. Hypogammaglobulinemia.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Distribuição fenotípica em percentagem do registro do LASID, de acordo com a classificação do IUIS.....	27
Figura 2 - Bloqueio no desenvolvimento das células T e B, associadas com as imunodeficiências já descritas	36
Figura 3 - Algoritmo para avaliação de Imunodeficiência Primária	41
Figura 4 - Heredograma da P1.....	68
Figura 5 - Níveis séricos das imunoglobulinas IgG, IgA e IgM.....	69
Figura 6 - Exame morfológico das biópsias renais.....	70
Figura 7 . Confirmação da hepatoesplenomegalia.....	71
Figura 8 - Análise histopatológica do linfonodo.....	72
Figura 9 - Avaliação das células B por citometria de fluxo.....	73
Figura 10 - Análise longitudinal das células B.....	74
Figura 11 - Análise do TCR V β <i>Spectratyping</i>	77
Figura 12 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico.....	78
Figura 13 - Processo de filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do exoma.....	81
Figura 14 - Mutação no gene do <i>PRKCD</i>	82
Figura 15 - Análise via Western Blot da proteína PRKCD.....	84
Figura 16 - Análise via Western Blot da proteína MARCKS.....	85
Figura 17 - Análise quantitativa via Real Time PCR.....	85
Figura 18 - Heredograma do P2 e P3.....	87
Figura 19 - Lesões gastrointestinais no P3.....	88
Figura 20 - Mutante NIK ^{Pro565Arg} causa defeito de células B.....	91
Figura 21 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico.....	92
Figura 22 - Processo de filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do exoma.....	92
Figura 23 - Análise genética dos pacientes deficientes de NIK.....	93
Figura 24 - Estudo da estrutura da proteína NIK.....	94
Figura 25 - NIK ^{Pro565Arg} é estruturalmente alterado e tem a região catalítica não funciona.....	97
Figura 26 - Análise da atividade cinase da proteína NIK expressas em células HEK293.....	98

Figura 27 - Defeito na via canônica e não canônica do NF-κB.....	103
Figura 28 - Defeito na translocação para o núcleo de componentes chave das vias canônicas e não canônicas do NF-κB.....	104
Figura 29 - Fenótipo das células B.....	106
Figura 30 - Imunofenotipagem das células B.....	107
Figura 31 - Estimulação <i>in vitro</i> de células mononucleares.....	109
Figura 32 - Western Blot para avaliar a expressão de IL21 nas células B.....	110
Figura 33 - Análise da sobrevivência das células B.....	111
Figura 34 - Análise das subpopulações de células B.....	112
Figura 35 - Imunofenotipagem das células T.....	115
Figura 36 - Análise da técnica de <i>Spectratyping</i> do TCR Vβ.....	116
Figura 37 - Efeito de NIK ^{Pro565Arg} nas células T.....	117
Figura 38 - Completa imunofenotipagem das células NK.....	119
Figura 39 - Deficiência de NIK causa um mal funcionamento das células NK.....	120
Figura 40 - Heredograma do P4.....	124
Figura 41 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico.....	128
Figura 42 - Análise genética do gene <i>IL7RA</i>	128
Figura 43 - Localização da mutação c.G353A do gene <i>IL7RA</i>	129
Figura 44 - Heredograma do P5.....	131
Figura 45 - Manifestação de dermatite grave na P5.....	133
Figura 46 - Manifestação clínica grave da P5.....	134
Figura 47 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico.....	135

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 - Classificação das principais imunodeficiências combinadas que acometem tanto as células T quanto as células B.....	22
Tabela 1.2 - Classificação das principais imunodeficiência de anticorpos.....	24
Tabela 1.3 - Classificação das principais imunodeficiência que acometem os fagócitos.....	25
Tabela 1.4 - Classificação das principais imunodeficiências dos componentes do Sistema Complemento.	26
Tabela 2 - Anticorpos utilizados na imunofenotipagem das famílias pertencentes ao estudo.....	53
Tabela 3 - Tabela contendo todos os anticorpos primários utilizados no estudo para detecção dos níveis proteicos.....	59
Tabela 4 - Primers para avaliação e quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real.....	62
Tabela 5 - Sequência dos primers utilizados na amplificação das famílias V β do TCR.....	63
Tabela 6 - Valores das populações e subpopulações de linfócitos.....	74
Tabela 7 - Análise da proliferação de células T.....	75
Tabela 8 - Intervalos homozigóticos obtidos pelo software <i>Homozygosity Mapper</i> e <i>PLINK</i>	79
Tabela 9 - Infecções recorrentes que os P2 e P3 apresentaram durante sua vida...88	
Tabela 10 - Valores dos níveis de imunoglobulinas dos P2 e P3.....	88
Tabela 11 - Análise das subpopulações de linfócitos.....	94
Tabela 12 - Mapeamento homozigótico.....	95
Tabela 13 - Ferramenta de predição da estabilidade proteica (CUPSAT).....	98
Tabela 14 - Manifestações clínicas mais graves da P4 durante seus 2 primeiros anos de vida.....	124
Tabela 15 - Valores dos níveis de imunoglobulinas do P4.....	125
Tabela 16 - Valores das principais populações de linfócitos do P4.....	125
Tabela 17 - Valores das principais subpopulações de linfócitos T.....	126
Tabela 18 - Patógenos isolados na P5 durante seus 6 meses até seus 4 anos de idade.....	131

Tabela 19 - Valores dos níveis de imunoglobulinas do P5. Em parênteses estão os valores de referência.....	131
Tabela 21 - Valores das principais subpopulações de linfócitos T.....	132
Tabela 22 - Intervalos homozigóticos obtidos pelo software <i>Homozygosity Mapper</i> e <i>PLINK</i>	135
Tabela 23 - Abaixo está a lista dos possíveis candidatos a ser o gene mutado, causador do fenótipo de imunodeficiência primária no P5.....	136

LISTA DE ABREVIações E SÍMBOLOS

ACN	Acetronila
AD	Autossômico Dominante
ADA	Adenosina-desaminase
AID	Do inglês <i>Activation-Induced (Cytidine) Deaminase</i>
AIRE	Do inglês <i>Autoimmune regulator</i>
ALPS	Síndrome linfoproliferativa autoimune
APECED	Síndrome da poliendocrinopatia auto-imune-candidíase-distrofia ectodérmica
APS	Síndrome Poliglandular Auto-imune
AR	Autossômico recessivo
AT	Ataxia Telangiectasia
BB-EBV	Epstein-Barr Vírus
BCG	Bacilo de Calmette e Guérin
BCR	Receptor de célula
BTK	Do inglês <i>Bruton's tyrosine kinase</i>
BWA	Burrows-Wheeler Aligner
cDNA	DNA complementar
Ce-M-M-	Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences
Células NK	Células <i>Natural Killer</i>
Células Th1	Células T helper 1
Chr	Cromossomo
CID	Imunodeficiência combinada
CMC	Candidíase Mucocutânea Crônica
CMV	Citomegalovírus
Cpm	Contagem por minuto
CVID	Imunodeficiência Comum Variável
DCs	Células dendríticas
DEPC	Dietilpirocarbonato
DGC	Doença granulomatosa crônica
DGS	Síndrome de DiGeorge
DIVs	Deleções/inserções
DNA	Do inglês: <i>deoxyribonucleic acid</i>
DNAg	DNA genômico
FOXP1	Do inglês <i>Forkhead box protein N1</i>
FOXP3	Do inglês <i>Forkhead box P3</i>
HCT	Células hemotopoiéticas
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HYD	Detector de gallidium híbrido
ICOS	Do inglês <i>Inducible T-cell COStimulator</i>
ICV	Imunodeficiência comum variável

IDP	Imunodeficiência Primária
IFN- γ	Interferon – gama
IgAD	Doença seletiva de IgA
IL2RG	Receptor IL-2 cadeia γ
IL7R	Cadeia α do receptor de IL-7
IPEX	Síndrome de desregulação imune, poliendocrinopatia, enteropatia autoimune ligada ao X
IUIS	União Internacional de Sociedades Imunológicas
IVIg	Do inglês <i>Intravenous immunoglobulin</i>
LAD	Do inglês <i>Leukocyte Adhesion Deficiency</i>
LASID	Grupo Latino Americano de Imunodeficiências Primárias
LES	Lúpus eritematoso sistêmico
LFA-1	Do inglês <i>Lymphocyte function-associated antigen-1</i>
MAP3K14	Do inglês <i>Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14</i>
MBL	Manose ligadora de lectina
MFI	Do inglês <i>median fluorescence intensity</i>
MHC	Complexo principal de histocompatibilidade
MZ	Zona marginal
NGS	Do inglês <i>Next-Generation Sequencing</i>
OKT3	Anticorpo anti-CD3 clone OKT3
PBMC	Células mononucleares de sangue periférico
PHA	Fitohemaglutinina
PMA	Forbol-12-Miristato-13-Acetato
PPD	Proteína purificada derivada do <i>M. Tuberculosis</i>
PRKCD	Do inglês <i>Protein kinase C delta</i>
RAG	Gene de ativação da recombinase
RAGID	Grupo Brasileiro de Imunodeficiência
RD	Disgenesia reticular
RNA	Do inglês <i>Ribonucleic acid</i>
RSE	<i>Switch</i> de classes de imunoglobulina
SCID	Imunodeficiência Severa Combinada
SCIDX1	SCID ligada ao cromossomo X
SEA	Enterotoxina estafilocócica B
SHM	Hipermutação somática
SNP	Polimorfismo de nucleotídeo único
SNVs	Variantes individuais de nucleotídeos
STIM1	Do inglês <i>Stromal interaction molecule 1</i>
TACI	Do inglês <i>Transmembrane activator and CAML interactor</i>
TCHT	Transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas
TCLE	Termo de consentimento livre e esclarecido
TCR	Receptor de célula T
TEM	Microscopia eletrônica de transmissão
THI	Hipogamaglobulinemia transitória da infância
TLR	Receptor de Toll-like

TREC	Do inglês <i>T-cell receptor excision circles</i>
TT	Toxina tetânica
UNG	Do inglês <i>Uracil DNA glycosilase</i>
UTI	Infecção do trato urinário
WAS	Síndrome de Wiskott-Aldrich
WES	Do inglês <i>Whole-exome sequencing</i>
WGS	Do inglês <i>Whole-genome sequencing</i>
XL	Ligada do X
XLA	Agamaglobulinemia ligada ao X
ZAP70	Do inglês <i>Zeta-chain-associated protein kinase 70</i>

AMINOÁCIDO

Ácido aspártico	D
Ácido glutâmico	E
Arginina	R
Asparagina	N
Glutamina	Q
Histidina	H
Lisina	K
Serina	S
Tirosina	Y
Treonina	T

BASES NITROGENADAS DOS NUCLEOTÍDEOS

Adenina	A
Citosina	C
Guanina	G
Timina	T

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	Introdução às Imunodeficiências Primárias	20
1.2	Descoberta das Imunodeficiências Primárias (IDPs)	20
1.3	Classificação das Imunodeficiências primárias	21
1.4	Principais Imunodeficiências Primárias	28
1.4.1	<i>Imunodeficiência Combinada</i>	28
1.4.2	<i>Imunodeficiência causada por defeitos tímicos</i>	32
1.4.3	<i>Deficiência de anticorpos</i>	32
1.4.4	<i>Imunodeficiência com desregulação do sistema imune</i>	35
1.4.5	<i>Defeitos da imunidade inata</i>	36
1.4.5.1	<i>Defeito das células fagocíticas</i>	36
1.4.5.2	<i>Defeitos de TLRs</i>	37
1.4.5.3	<i>Defeitos do complemento</i>	38
1.5	Estudo genético-molecular das IDPs	41
2	OBJETIVOS	48
2.1	Objetivo geral	48
2.2	Objetivos específicos	48
3	PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS	50
3.1	Pacientes do estudo	50
3.2	Histologia, imuno-histoquímica e microscopia eletrônica da biópsia do rim e linfonodo	51
3.3	Protocolo para cultura celular	51
3.3.1	<i>Obtenção das células mononucleares de sangue periférico (PBMC)</i>	51
3.3.2	<i>Estabelecimento de linhagens celulares B-EBV dos pacientes</i>	52
3.3.3	<i>Condições de estimulação</i>	52
3.4	Imunofenotipagem por citometria de fluxo	53
3.5	Análise genético-molecular	54
3.5.1	<i>Extração de DNA</i>	54
3.5.1.1	<i>Amplificação do DNAg pela técnica de PCR (Reação em cadeia da polimerase)</i>	55
3.5.2	<i>Sequenciamento pelo método de Sanger</i>	56
3.5.3	<i>Genotipagem de alta densidade "Affymetrix 6.0 chip"</i>	56
3.5.4	<i>Sequenciamento do Exoma</i>	57
3.5.5	<i>Validação das possíveis variantes gerados pelo sequenciamento do exoma</i>	58
3.6	Protocolo para análise funcional	58
3.6.1	<i>Análises "in silico" e modelagem da estrutura da proteína NIK</i>	58
3.6.2	<i>Análise da expressão proteica por "Western Blot"</i>	59
3.6.3	<i>Extração de RNA total</i>	60
3.6.4	<i>Reação de transcrição reversa</i>	61
3.6.5	<i>Análise da expressão gênica por PCR em tempo real</i>	61
3.6.6	<i>Método de TCRBV CDR3 Spectratyping</i>	62
3.6.6.1	<i>Reação de PCR (Vβ-Cβ) para determinação das famílias Vβ do TCR</i>	63
3.6.6.2	<i>Reação de elongação/run-off</i>	64
3.6.6.3	<i>Preparo das amostras e aplicação no sequenciador automático</i>	65
3.6.7	<i>Teste da enzima cinase</i>	65
3.6.8	<i>A amplificação e análise dos transcritos dos genes IGH</i>	66
3.6.9	<i>Imunofluorescência</i>	66
3.6.10	<i>Ensaio de reconstituição</i>	66
3.6.11	<i>Microscopia confocal das sinapses imunológicas</i>	67
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	68
4.1	História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 1 (P1)	68
4.1.1	<i>Caracterização clínica e laboratorial</i>	68

4.1.2	<i>Análise genética do P1</i> -----	77
4.1.2.1	<i>Sequenciamento via Sanger Sequencing</i> -----	77
4.1.2.2	<i>Identificação da mutação no gene do PRKCD</i> -----	77
4.1.2.3	<i>Análise funcional do PRKCD</i> -----	82
4.2	História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 2 e Paciente 3 (P2 e P3)	85
4.2.1	<i>Caracterização clínica dos P2 e P3</i> -----	85
4.2.2	<i>Identificação da mutação no gene MAP3K14</i> -----	88
4.2.3	<i>Efeito do NIK^{pro565Arg} na função cinase da proteína.</i> -----	95
4.2.4	<i>Vias de sinalização canônica e não-canônica do NF-κB</i> -----	98
4.2.5	<i>Redução da sobrevivência de células B maduras</i> -----	99
4.2.6	<i>Aberrante fenótipo das células T</i> -----	111
4.2.7	<i>Comprometimento das células NK</i> -----	115
4.3	História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 4 (P4) -----	119
4.3.1	<i>Caracterização clínica e laboratorial do P4</i> -----	119
4.3.2	<i>Análise genético-molecular do P4</i> -----	123
4.4	História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 5 (P5) -----	127
4.4.1	<i>Caracterização clínica e laboratorial do P5</i> -----	127
4.4.2	<i>Análise genético-molecular da P5.</i> -----	131
5	CONCLUSÃO -----	134
	REFERÊNCIAS* -----	135
	ANEXOS -----	154
	ANEXO A – Estudo de Pacientes com Suspeita de Imunodeficiência Primária -----	154
	ANEXO B.1 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (maiores de 18 anos) -----	157
	ANEXO B.2 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (menores de 18 anos) -----	160
	ANEXO C - B-cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of protein kinase C δ -----	163
	ANEXO D - Biallelic loss-of-function mutation in NIK causes a primary immunodeficiency with multifaceted aberrant lymphoid immunity. -----	169

1 INTRODUÇÃO

1.1 Introdução às Imunodeficiências Primárias

O sistema imunológico é uma complexa rede de células e moléculas dispersas por todo o organismo que cooperam para nos proteger contra microrganismos infecciosos e outras ameaças internas como, por exemplo, as células cancerígenas. O sistema imunológico é especializado na identificação, erradicação do “perigo” e é composto por células altamente especializadas, proteínas, tecidos e órgãos. O linfócito T, linfócito B, células NK, fagócitos e fatores solúveis, tais como as do sistema complemento, são alguns dos componentes principais do sistema imunológico e apresentam funções específicas responsáveis pela defesa do organismo. Quando há ausência e/ou deficiência nas moléculas e/ou células que compõem o sistema imune, há então uma imunodeficiência, que pode ser classificada como congênita/primária ou adquirida/secundária (11), podendo levar ao surgimento de infecções e, com menos frequência, desenvolvimento de tumores, enfermidades autoimunes, alergias e alterações endócrinas e neuropsiquiátricas (12).

As imunodeficiências adquiridas/secundária são causadas por fatores exógenos, tais como, infecções, quimioterapia, irradiação e desnutrição. As imunodeficiências primárias (IDPs) são um grupo de doenças raras e com expressão heterogênea, que geralmente se manifestam até os sete anos de idade, embora algumas vezes possa ser detectada somente na vida adulta, sendo geralmente consequência de defeitos genéticos do sistema imunológico e do seu desenvolvimento (13). Estas doenças apresentam um amplo espectro de manifestações clínicas e achados laboratoriais. Há um vasto número de casos que resultam também em doenças autoimunes e câncer (11, 14-19).

1.2 Descoberta das Imunodeficiências Primárias (IDPs)

A descoberta das imunodeficiências primárias foi atribuída ao Dr. Ogden Bruton em 1952, que documentou o caso de uma criança de oito anos, do sexo masculino, que apresentava infecções recorrentes e ausência da fração gamaglobulina na eletroforese de proteínas, mas que tinha uma boa resposta à terapia com imunoglobulina (20). Mais tarde soube-se que esta criança apresentava agamaglobulinemia ligada ao X (XLA) (21). Além da descrição deste paciente, antes de 1950, houveram relato de outros pacientes com características clínicas compatíveis com IDP. A Ataxia Telangiectasia (AT) foi relatada no ano de 1926 (22),

Candidíase Mucocutânea Crônica (CMC) em 1929 (23), e a Síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) em 1937 (24). O primeiro paciente com deficiência celular foi descrita em 1950 (25), o primeiro caso de um defeito fagocítico (Neutropenia Congênita Severa) foi relatada em 1956 (26), o primeiro caso de Doença granulomatosa crônica (DGC) foi descrita em 1957 (27) e o primeiro caso de deficiência do complemento (deficiência de C2) foi relatado em 1966 (28).

Entre as décadas de 1950 e 1960, a descoberta da agamaglobulinemia ligada ao X, da síndrome de DiGeorge e da imunodeficiência combinada grave gerou um marco para a divisão da imunidade específica, entre a resposta mediada por anticorpos (humoral) e a resposta mediada por células (celular), 15 anos antes da descoberta dos linfócitos B e T (29). De forma semelhante, a importância dos defeitos da função das células *natural killer* (30) e da sinalização dos denominados *toll-like receptors* (TLRs) (31, 32) vem se tornando foco de atenção dentro das IDPs.

No passado, imaginava-se que as imunodeficiências primárias eram causadas por um ou mais defeitos do sistema imunológico, que levava ao aumento na susceptibilidade de infecções. Hoje, sabe-se que as IDP são um grupo heterogêneo de desordens do sistema imunológico, caracterizado por combinações de infecções recorrentes, autoimunidade, linfoproliferação, processos granulomatosos, atopias e malignidade (33-54).

A descoberta e caracterização da IDP foi crucial para o entendimento e organização funcional da biologia molecular do sistema imunológico. Com isto, abriu-se a possibilidade do reconhecimento, caracterização e identificação dos quase 300 diferentes tipos de IDPs (1, 16, 55-58).

1.3 Classificação das Imunodeficiências primárias

A classificação antiga das IDPs era baseada em quatro categorias (linfócito T, linfócito B, fagócitos e deficiência do complemento), onde acreditava-se que pacientes com deficiências no linfócito B e complemento tinham propensão a ter infecções por bactérias extracelulares, pacientes com defeitos no linfócito T tinham propensão a desenvolver infecções por bactérias intracelulares, por vírus, parasitas e fungos, e que pacientes com defeitos no sistema fagocitário tinham propensão a infecções por bactérias e fungos, em área de barreira (59).

A complexidade da genética dos defeitos imunológicos, e as características clínicas das IDPs, levou à necessidade de uma classificação mais completa, com o

objetivo final de facilitar seu diagnóstico e tratamento. À partir desta necessidade, desde 1970, um comitê internacional de especialistas em IDP se reúne regularmente, a cada dois anos, com o objetivo de atualizar a classificação desse grande grupo de doenças (**Tabelas 1.1 – 1.4**) (4, 16, 30-32, 60).

Hoje a classificação é dividida em nove grupos, de acordo com o defeito imunológico que o paciente apresenta. São elas: 1 – Deficiência predominantemente de anticorpos; 2 – Imunodeficiência de células T ou Imunodeficiência combinada; 3 - Imunodeficiência sindrômica; 4 - Defeito do complemento; 5 - Defeitos fagocitários; 6 - Defeito da imunidade inata; 7 - Doenças de desregulação imune; 8 - Desordens autoinflamatórias; 9 – Desordens fenocópias de IDP.

Tabela 1.1 - Classificação das principais imunodeficiências combinadas que acometem tanto as células T quanto as células B.

Imunodeficiências		Herança	Defeitos Genéticos
T⁺B⁺ Imunodeficiência Severa Combinada	Deficiência de γc	XL	<i>IL2RG</i>
	Deficiência de JACK3	AR	<i>JAK3</i>
	Deficiência de IL7-R α	AR	<i>IL7RA</i>
	Deficiência de CD45	AR	<i>PTPRC</i>
	Deficiência de Coronina	AR	<i>CORO1A</i>
	Deficiência de CD3 δ	AR	<i>CD3D</i>
	Deficiência de CD3 ϵ	AR	<i>CD3E</i>
	Deficiência de CD3 ξ	AR	<i>CD3Z</i> ou <i>CD247</i>
T⁺B⁻ Imunodeficiência Severa Combinada	Deficiência de RAG1	AR	<i>RAG1</i>
	Deficiência de RAG2	AR	<i>RAG2</i>
	Deficiência de Artemis	AR	<i>ARTEMIS</i>
	Deficiência de ADA	AR	<i>ADA</i>
	Deficiência de Disgenesia Reticular AK2	AR	<i>AK2</i>
	Deficiência de PKcs	AR	<i>PRKCD</i>
	Deficiência de XLF	AR	<i>CERMUNNOS</i>
	Deficiência da DNA ligase IV	AR	<i>LIG4</i>
Imunodeficiências combinadas	Deficiência de DOCK2	AR	<i>DOCK2</i>
	Deficiência de CD40 ligante	XL	<i>CD40LG</i>

Deficiência de CD40	AR	<i>CD40</i>
Deficiência de ICOS	AR	<i>ICOS</i>
Deficiência de CD3 γ	AR	<i>CD3G</i>
Deficiência de CD8	AR	<i>CD8</i>
Deficiência de ZAP-70	AR	<i>ZAP70</i>
Deficiência de MHC de classe I	AR	<i>TAP1, TAP2, TAPBP ou B2M</i>
Deficiência de MHC de classe II do grupo A	AR	<i>CIITA</i>
Deficiência de MHC de classe II do grupo B	AR	<i>RFXANK</i>
Deficiência de MHC de classe II do grupo C	AR	<i>RFX5</i>
Deficiência de MHC de classe II do grupo D	AR	<i>RFXAP</i>
Deficiência de ITK	AR	<i>ITK</i>
Deficiência de MAGT1	XL	<i>MAGT1</i>
Deficiência de DOCK8	AR	<i>DOCK8</i>
Deficiência de RhoH	AR	<i>RHOH</i>
Deficiência de MST1	AR	<i>STK4</i>
Deficiência de TCR α	AR	<i>TRAC</i>
Deficiência de LCK	AR	<i>LCK</i>
Deficiência de MALT1	AR	<i>MALT1</i>
Deficiência de CARD11	AR	<i>CARD11</i>
Deficiência de BCL10	AR	<i>BCL10</i>
Deficiência de IL21	AR	<i>IL21</i>
Deficiência de IL21R	AR	<i>IL21R</i>
Deficiência de OX40	AR	<i>TNFRSF4</i>
Deficiência de IKBKB	AR	<i>IKBKB</i>
Deficiência de LRBA	AR	<i>LRBA</i>
Deficiência de CD27	AR	<i>TNFRSF7</i>
Deficiência de NIK	AR	<i>MAP3K14</i>
Deficiência de CTPS1	AR	<i>CTPS1</i>
Síndrome de Omenn	AR	<i>RAG1/2, Artemis, IL7-RA, RMRP, ADA, DNA ligase, RV, IL2RG, AK2</i>

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X.

Fonte: Extraído e modificado do (61).

Tabela 1.2 - Classificação das principais imunodeficiência de anticorpos.

Imunodeficiências		Herança	Defeitos Genéticos
Agamaglobulinemia com células B ausentes	Deficiência de BTK	XL	<i>BTK</i>
	Deficiência de Igα	AR	<i>CD79A</i>
	Deficiência de Igβ	AR	<i>CD79B</i>
	Deficiência de BLNK	AR	<i>BLNK</i>
	Deficiência de LRRC8	AD	<i>LRRC8</i>
	Deficiência da cadeia μ pesada	AR	<i>IGHM</i>
	Deficiência de λ5	AR	<i>IGLL1</i>
	Deficiência de Igα	AR	<i>CD79A</i>
	Deficiência de Igβ	AR	<i>CD79B</i>
	Deficiência de P13KR1	AR	<i>PIK3R1</i>
	Deficiência de E47	AD	<i>TCF3</i>
Diminuição de pelo menos dois tipos de imunoglobulinas com um número normal ou baixo de células B	Imunodeficiência Comum Variável	Variável	Desconhecida
	Deficiência de CD81	AR	<i>CD81</i>
	Deficiência de CD20	AR	<i>CD20</i>
	Deficiência de CD21	AR	<i>CD21</i>
	Deficiência do receptor de BAFF	AR	<i>BAFF-R</i>
	Deficiência de TWEAK	AD	<i>TWEAK</i>
	Deficiência de NFKB2	AD	<i>NFKB2</i>
	Deficiência de MOGS	AR	<i>MOGS</i>
	Deficiência de TRNT1	AR	<i>TRNT1</i>
	Deficiência de TTC37	AR	<i>TTC37</i>
Defeitos com redução das IgG e IgA, e normal ou elevado IgM com número normal de células B	Deficiência da AID	AR	<i>AICDA</i>
	Deficiência da UNG	AR	<i>UNG</i>
	Deficiência do INO80	AR	<i>INO80</i>
	Deficiência de MSH6	AR	<i>MSH6</i>
Defeitos na cadeia leve com normal número de células B	Deficiência de PI3K-δ	AD	<i>PIK3CD</i>
	Deficiência de PI3KR1	AD e AR	<i>PI3KR1</i>
	Deficiência de IGKC	AR	<i>IGKC</i>
	Deficiência de CARD 11	AD	<i>CARD11</i>
	Deficiência de subclasses de IgG	Variável	Desconhecida
	Deficiência de subclasses de IgA e IgG	Variável	Desconhecida
	Deficiência de anticorpos	Variável	Desconhecida

	específicos com níveis normais de imunoglobulinas
Hipogamaglobulinemia transitória de infância	Variável Desconhecido

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X.

Fonte: Extraído e modificado do (61).

Tabela 1.3 - Classificação das principais imunodeficiência que acometem os fagócitos.

Imunodeficiências		Herança	Defeitos Genéticos
Neutropenia Severa Congênita (SCN)	Deficiência de ELA1	AD	<i>Elastase 2</i>
	Deficiência de GFI1	AD	<i>GFI1</i>
	Deficiência de HAX1	AR	<i>HAXX1</i>
	Deficiência de GCSFR	AD	<i>GCSFR ou CSF3R</i>
	Neutropenia com mielodisplasia	XL	<i>WASP</i>
	Deficiência de JAGN1	AR	<i>JAGN1</i>
	Deficiência do CLPB	AR	<i>CLPB</i>
	Deficiência do receptor G-CSF	AR	<i>CSF3R</i>
Deficiência na adesão leucocitária (LAD)	LAD tipo 1	AR	<i>Integrina beta 2</i>
	LAD tipo 2	AR	<i>SLC35C1 ou FUCT1</i>
	LAD tipo 3	AR	<i>CalDAG-GEFI</i>
Deficiência na RAC-2	-	AD	<i>RAC2</i>
Deficiência na beta actina	-	AD	<i>ACTB</i>
Doença Granulomatosa Crônica (DGC)	Gp91 ^{phox}	XL	<i>CYBB</i>
	P22 ^{phox}	AR	<i>CYBA</i>
	P47 ^{phox}	AR	<i>NCF1</i>
	P67 ^{phox}	AR	<i>NCF2</i>
Deficiência no G-6PD	-	XL	<i>G6PD</i>
Deficiência na mieloperoxidase	-	AR	<i>MPO</i>
Deficiência do granulo específico	-	AR	<i>CEBPE</i>
Síndrome de Shwachman-Diamond	-	AR	<i>SBDs</i>
Periodontite localizada juvenil	-	AR	<i>FRP1</i>

Síndrome Papillon-Lefevre	-	AR	<i>Catepsina C</i>
----------------------------------	---	----	--------------------

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X.

Fonte: Extraído e modificado do (61).

Tabela 1.4 - Classificação das principais imunodeficiências dos componentes do Sistema Complemento.

Imunodeficiências			Herança	Defeitos Genéticos
Deficiência dos componentes da Via Alternativa	Deficiência do Fator D	AR	AR	<i>Fator D do complemento</i>
				<i>Properdina da fator P do complemento (PFC)</i>
Deficiência do componente C3 do complemento	-	AR	AR	<i>Componente C3</i>
Deficiência da via final do complemento	Deficiência do C5	AR	AR	<i>Componente C5</i>
	Deficiência de C6	AR	AR	<i>Componente C6</i>
	Deficiência do C7	AR	AR	<i>Componente C7</i>
	Deficiência do C8a	AR	AR	<i>Componente C8 alpha</i>
	Deficiência do C8b	AR	AR	<i>Componente C8 beta</i>
	Deficiência do C9	AR	AR	<i>Componente C9</i>
Deficiência das proteínas regulatórias	Deficiência do Inibidor de C1	AD	AD	<i>Inibidor de C1</i>
	Deficiência do Fator I	AR	AR	<i>Fator I</i>
	Deficiência do Fator H	AR	AR	<i>Fator H</i>
	Deficiência do CD46	AD	AD	<i>Proteína co-fatora de membrana ou CD46</i>
	Deficiência do CD55	AR	AR	<i>DAF ou CD55 antígeno</i>
	Deficiência do CD59	AR	AR	<i>CD59- antígeno p18-20</i>
	Deficiência do CD18	AR	AR	<i>Integrina beta-2</i>

AR, Autossômico recessivo; AD, Autossômico Dominante; XL, ligada do X.

Fonte: Extraído e modificado do (61).

A prevalência da IDP dentro da população geral ainda é desconhecida, mas baseada em estudos feitos com coortes de pacientes em diferentes países, acredita-se que a prevalência é em torno de 1:10.000 dentro da população geral (62, 63). Se pensarmos em IDP específicas, a prevalência pode variar consideravelmente de 1:250 para as formas mais comuns, até 1:1.000.000 para as formas mais raras. A doença seletiva de IgA pode variar de 1:223 até 1:1000 (64), já outros grupos de

imunodeficiências, como SCID que são consideradas raras, a frequência é de 1:58.000 (65).

Dentro da classificação das IDP, a forma mais comum é a deficiência de anticorpos, seguido da deficiência celular, deficiência combinada, e fagocítica (66-68). Em 2015, o relatório do Grupo Latino Americano de Imunodeficiências Primárias (LASID) descreveu 4900 casos de pacientes com diagnóstico clínico de IDP registrados na América Latina, provindos de 93 centros em 13 países. Dos 4900 casos, 52% apresentaram uma imunodeficiência associada à deficiência de anticorpos, seguido pelos 19% que apresentaram outras imunodeficiências primárias bem definidas, 9% apresentaram imunodeficiência combinada, 9% apresentaram distúrbio de fagócitos, 6,2% apresentaram desordem auto-inflamatória, 2,5% apresentaram defeito no sistema complemento, 1,3% apresentaram defeito no sistema imune inato e 1% apresentou desregulação imune (69) **(Figura 1)**.

Já um estudo realizado pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Brasil), mostrou que, num período de 15 anos (1981-1996), 166 casos de doença de imunodeficiência primária (IDP) foram registrados. As IDP foram diagnosticadas de acordo com critérios da Organização Mundial da Saúde, e as crianças que foram incluídas no presente estudo passaram por um diagnóstico rigoroso de imunodeficiência primária. As seguintes frequências foram observadas: defeitos predominantemente humorais (60,8%), defeitos de células T (4,9%), imunodeficiência combinada (9,6%), distúrbios de fagócitos (18,7%) e deficiências do complemento (6%). Deficiência de IgA foi o distúrbio mais frequente (60 casos), seguido por hipogamaglobulinemia transitória (14 casos), doença granulomatosa crônica (14 casos), e agamaglobulinemia ligada ao X (9 casos). Sintomas alérgicos ocorreram em 41% dos casos. Durante o período de observação, 23 crianças (13,8%) morreram, principalmente devido a infecções de repetição (70).

Como dito anteriormente, as IDPs são classificadas de acordo com o componente do sistema imune que está primariamente envolvido. Defeitos na resposta do sistema imune adaptativo, incluindo as deficiências de anticorpo, imunodeficiências combinadas, deficiência na sinalização envolvendo TLR e a deficiência do sistema complemento, são caracterizadas pelo aumento na susceptibilidade a desenvolver infecções recorrentes severas, causadas por diferentes patógenos, dependendo da natureza do defeito no sistema imune (16).

Figura 1 - Distribuição fenotípica em porcentagem do registro do LASID, de acordo com a classificação do IUIS. Distribuição das doenças de acordo com as classes. Imunodeficiência associada à deficiência de anticorpos (azul); Imunodeficiências primárias bem definidas (vermelho); Imunodeficiência combinada (verde); Distúrbio de fagócitos (roxo); Desordem auto-inflamatória (azul claro); Defeito no sistema complemento (laranja); Defeito no sistema imune inato (lilás) e Desregulação imune (rosa).

Fonte: Extraído de (69)

1.4 Principais Imunodeficiências Primárias

As IDPs eram consideradas como doenças muito pouco frequentes, caracterizadas por uma expressão clínica grave (15), entretanto tem se tornado claro que essas doenças não são tão raras como originalmente se suspeitava e que sua expressão clínica pode, algumas vezes, ser relativamente branda. Apesar de a maioria destas doenças se manifestar precocemente, há casos, como na imunodeficiência comum variável (ICV), que seu início se dá na segunda ou terceira década de vida (15).

Doenças nas quais as funções dos linfócitos estão afetadas são comumente divididas em três grandes grupos: as deficiências de anticorpos, as deficiências celulares e as deficiências combinadas. Existem ainda, as deficiências de função de fagócitos e as deficiências de complemento (71).

1.4.1 Imunodeficiência Combinada

As imunodeficiências combinadas (CID) são um grupo heterogêneo de desordens, caracterizada pela falha da proteção mediada pelas células T, B e as

vezes pela falha da célula NK. Como resultado, pacientes afetados nascem com suscetibilidade a infecções por patógenos oportunistas. A morte relacionada com as infecções oportunistas ocorre normalmente quando o paciente atinge 1 ou 2 anos, na ausência de tratamento. Esses transtornos são graves e são consideradas emergências pediátricas (72).

Pacientes com SCID apresentam, logo no início da vida, infecções causadas por bactéria, vírus ou fungo. Pneumonia causada pelo *Pneumocystis jiroveci* é comum, no entanto, doença intersticial pulmonar também pode ser causada por infecção pelo citomegalovírus (CMV), adenovírus, vírus sincicial respiratório, ou vírus parainfluenza do tipo 3. Muitos bebês com SCID apresentam diarreia crônica, levando ao déficit de crescimento (73).

Os defeitos que levam a um SCID são classificados de acordo com o fenótipo imunológico e são classificados em: 1 - SCID com ausência de linfócitos T, mas a presença de linfócitos B (T^-B^+ SCID); 2 - SCID com ausência de linfócitos T e B (T^-B^- SCID). Esses são os dois principais grupos de SCID, que pode ou não incluir a ausência de células *natural killer* (NK). Independentemente do fenótipo imunológico (T^-B^- ou T^-B^+), os pacientes com SCID apresentam características clínicas semelhantes, incluindo as manifestações respiratórias severas que aparecem poucos dias após o nascimento do paciente, diarreia crônica e déficit de crescimento. SCIDs têm uma prevalência de cerca de 1:50.000 nascidos vivos e é mais comum em indivíduos do sexo masculino, refletindo a representação de SCID ligada ao cromossomo X (*SCIDX1*), a forma mais comum de SCID em seres humanos (73).

A patogênese do SCID reflete mecanismos distintos que afetam várias etapas no desenvolvimento de células T (**Figura 12**) (73). A sobrevivência prejudicada dos linfócitos é observada na disgenesia reticular (RD) e na deficiência da adenosina-desaminase (ADA). Ambas as formas tem o caráter genético autossômico recessivo e são caracterizadas pela extrema linfopenia. Além disso, os pacientes com RD também apresentam neutropenia grave e surdez neurossensorial. RD é uma forma muito rara de SCID e é causada por mutações do gene *AK2* (Adeny-late cinase 2) (74, 75). A ADA é uma enzima mitocondrial que regula os níveis de adenosina difosfato. Trata-se de uma enzima da via de salvamento da purina, que é mediada pela conversão de uma adenosina para uma inosina. Na ausência de ADA, há um alto nível de metabólitos intracelulares que são tóxicos para a célula, causando

apoptose na medula e no timo (76, 77). A deficiência de ADA acomete cerca de 10% a 15% de todas as formas de SCID. As manifestações clínicas se estendem além do defeito no sistema imunológico, como por exemplo a surdez, problemas de comportamento, alterações costocodrais, e toxicidade do fígado (76).

Os defeitos de componentes da sinalização mediada por citocinas são responsáveis pela maioria das formas de SCIDs. SCIDX1 acomete cerca de 40% de todos os casos de SCID e é causada por mutações no gene do receptor IL-2 cadeia γ (*IL2RG*), que codifica para a cadeia comum γ (γ_c) compartilhada por outros receptores de citocinas, como a IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21. Em particular, a IL-7 medeia a expansão de células progenitoras de timócitos, enquanto que a IL-15 desempenha um papel no desenvolvimento das células NK (78). Assim, pacientes com SCIDX1 apresentam uma ausência tanto das células T quanto das células NK, enquanto o número de linfócitos B continuam normais (79). A cadeia γ_c é física e funcionalmente acoplada à tirosina cinase Janus (JAK) intracelular, que medeia a sinalização intracelular da cadeia γ_c (80).

Defeitos no *JAK3* resulta em uma forma autossômica recessiva de SCID com um fenótipo imunológico indistinguível da SCIDX1 (81). Mutações no gene *IL7R* (cadeia α do receptor de IL-7) anula o desenvolvimento dos linfócitos T, mas deixam o desenvolvimento das células B e NK intacto (82).

A expressão do receptor de células T (TCR) é um marco importante durante o desenvolvimento dos timócitos. Mecanismos moleculares lideram a expressão de células T e B (BCR) de forma semelhante durante o desenvolvimento das células T e B (83). O gene de ativação da recombinase (*RAG1* e *RAG2*) medeiam a clivagem do DNA durante a formação do TCR e da cadeia pesada e leve da imunoglobulina, pela recombinação V(D)J. Várias proteínas de reparo do DNA completam esse processo, permitindo a montagem dos membros das cadeias variáveis (V), diversidade (D) e junção (J). Defeitos na expressão do TCR e BCR levam a uma SCID com herança autossômica recessiva. Essa é uma forma de SCID T⁻B⁻, e pode ser causada por defeitos nos genes *RAG1* e *RAG2* (representam 4% a 20% de todos os casos de SCID) ou em genes que codificam proteínas envolvidas no reparo da fita de DNA, em particular a *Artemis*, subunidade catalítica da proteína cinase, XLF, e a DNA ligase IV. Em todas essas doenças, o desenvolvimento das células

NK continua normal, mas a geração das células T e B estão severamente comprometidas (73, 83-85).

Mutações nos componentes *CD3 δ* , *CD3 ϵ* e *CD3 ζ* do complexo CD3 afeta a sinalização através do TCR e, conseqüentemente, causam SCID. Mutações na proteína associada a cadeia ζ de 70kDa (*ZAP-70*), compromete a seleção positiva dos timócitos CD8⁺, causando uma imunodeficiência severa envolvendo os linfócitos T CD8⁺ circulantes. As células T CD4⁺ ainda conseguem ser geradas e ir para a periferia, no entanto, sua resposta proliferativa a estimulação através do TCR é drasticamente danificada (86).

Recentemente, novos defeitos genéticos foram identificados em pacientes com uma forma rara de SCID. O fluxo de cálcio é essencial para a mediação da resposta de vários tipos de células, incluindo linfócitos a estímulos de ativação. Dois defeitos hereditários causam essa forma rara de SCID, são o defeito da *STIM1* (sensor de liberação de cálcio do retículo endoplasmático) e *ORAI1* (componente dos canais de liberação de cálcio ativados), que causa incapacidade dos linfócitos T para responder via TCR. As células musculares também são afetadas por miopatia (87, 88).

O transdutor de sinal e ativador de transcrição (*STAT*) é um fator de transcrição que é ativado em resposta à IL-2, além de outras citocinas e fatores de crescimento, incluindo o hormônio do crescimento. Mutações no gene *STAT5B* resultam em uma forma rara de imunodeficiência relacionada à baixa estatura. Uma vez que a IL-2 desempenha um papel crítico na homeostase dos complexos do sistema imune, a deficiência de *STAT5B* é frequentemente associada a manifestações autoimunes (89).

A deficiência do ligante do CD40 (CD40L) é uma imunodeficiência ligada ao cromossomo X. A molécula CD40L é expressa em células T CD4⁺ ativadas. Esses linfócitos reagem com a molécula CD40 que é expressa nas células B, e essa interação CD40/CD40L origina um sinal fundamental para a ativação das células B, e juntamente com a sinalização mediada pelas interleucinas, promove o *Switch* de classes de imunoglobulina. Assim, os pacientes do sexo masculino que apresentam deficiência do CD40L, apresentam um defeito grave em quase todos os isotipos das imunoglobulinas (IgA, IgE e IgG) menos a IgM que se mantém normal ou aumentada. Além disso, a interação CD40/CD40L também promove a maturação de células dendríticas (DCs) e promove a indução da secreção da IL-12, que favorece a

ativação das células T e a produção de IFN- γ de classes de imunoglobulina. Assim, os pacientes do sexo masculino e pacientes com defeito no gene *CD40L* também são propensos a infecções oportunistas, principalmente pelo *P. jiroveci* e pelo *Cryptosporidium parvum*, tornando a deficiência do CD40L uma forma de CID (90).

1.4.2 Imunodeficiência causada por defeitos tímicos

A Síndrome de DiGeorge (DGS) é um defeito no desenvolvimento da terceira e quarta bolsas faríngeas e arcos, resultando em comprometimento do desenvolvimento do timo e das glândulas paratireóides, anormalidades cardíacas conotruncais, dimorfismos faciais, dificuldade de alimentação, e aumento da frequência de transtornos psiquiátricos na infância e na idade adulta (91). Uma deleção heterozigótica no cromossomo *22q11* foi observada em 35% a 90% dos pacientes, enquanto uma menor porcentagem dos pacientes apresenta deleção na região *10p13-14*. Na maioria dos casos (DGS), há de uma leve a uma moderada deficiência de células T, refletindo no desenvolvimento do timo.

FOXP1 (do inglês, *Forkhead box N1*) é um fator de transcrição necessário para o desenvolvimento das células epiteliais do timo. Uma deficiência do *FOXP1* com herança autossômica recessiva tem sido relatada, e se caracteriza pelo fenótipo clínico de SCID associado com alopecia e distrofia das unhas (92).

A Síndrome de Good é caracterizada pela hipogamaglobulinemia junto com timoma. São comuns nessa síndrome, infecções oportunistas como candidíase, CMV e herpes simples, e citopenias autoimune (93).

1.4.3 Deficiência de anticorpos

Defeitos na produção de anticorpos causam um aumento na susceptibilidade a infecções por bactérias que geralmente envolvem os tratos respiratórios superior e inferior, como otite, sinusite e pneumonia, mas que também pode causar abscessos na pele ou em outros órgãos, meningite, e infecções do trato urinário. Infecções por vírus também são comuns, assim como infecção intestinal causada pelo parasita *Giardia*. A deficiência de anticorpos pode depender de uma variedade de defeitos que interferem o desenvolvimento, maturação e/ou função das células B (**Figura 2**) (94).

A sinalização através do BCR é um passo essencial para o desenvolvimento das células B. O BCR é composto pelas cadeias μ e δ de imunoglobulinas pesada e

pelas cadeias leves (V-pré B e $\lambda 5$). O sinal é transmitido pelas subunidades $Ig\alpha$ (CD79 α) e $Ig\beta$ (CD79b). Este complexo recruta um certo número de proteínas intracitoplasmáticas, incluindo a proteína adaptadora ligante da célula B (BLNK) e a tirosina-cinase de Bruton (BTK). Defeitos no BTK leva a uma forma de agamaglobulinemia ligada ao X (ALX). Essa é a causa mais comum de imunodeficiência com fenótipo de deficiência de anticorpos, acometendo 85% dos pacientes. Mutações no gene da cadeia pesada da imunoglobulina M (*CIGHM*) é a segunda forma mais comum (5%), enquanto somente alguns pacientes foram identificados com defeitos no $\lambda 5$, $Ig\alpha$, $Ig\beta$, e BLNK (94, 95). Em todos estes casos, existe um bloqueio na fase de diferenciação do pro-B e pré-B na medula óssea, resultando em ausência dos linfócitos B circulantes.

A maturação da resposta dos anticorpos é marcada por dois processos principais: o *Switch* de classes (CSR) e a hipermutação somática (SHM) (96). Durante o CSR, a cadeia μ é trocada pelas outras cadeias pesadas de imunoglobulina, após o estímulo específico, tendo como resultado a troca da cadeia de imunoglobulina que leva a produção das imunoglobulinas G, A ou E, que têm propriedades físico-químicas e biológicas distintas. A SHM é o processo pelo qual são introduzidas mutações pontuais na região variável dos genes de imunoglobulina, o que conduz a um aumento da afinidade de ligação como antígeno (maturação de afinidade). Embora o CSR e a SHM sejam processos independentes e distintos, eles ocorrem nos centros germinativos e são ativados após o sinal via interação do complexo CD40/CD40L. O CSR envolve a ativação de componentes responsáveis pela transcrição de genes da região constante da cadeia pesada, com formação dos híbridos DNA/RNA, deixando uma fita de DNA acessível para a clivagem e mudança. A indução do *Switch* de classes promove a transcrição da enzima de ativação da citidina deaminase (AID) que tem a função de editar essa única fita de DNA, substituindo os resíduos de citidina (C) por uracilas (U). A incompatibilidade da fita resultante dessa substituição é então reconhecida pela enzima *uracil N-glicosilase* (UNG), que vai remover o excesso das uracilas deixando os sítios abásicos, onde as enzimas pertencentes aos mecanismos de reparação do DNA vão entrar em ação (96).

Mutações nos genes *AICDA* e *UNG* levam a um defeito intrínseco do CSR da célula B, resultando em níveis muito baixos ou até mesmo ausentes das IgG, IgA e

IgE, enquanto os níveis de IgM estão muitas vezes aumentados, levando a um fenótipo de Hiper IgM (96).

Existem poucos pacientes com defeito na AID e menos ainda com deficiência no UNG relatados até o momento. A herança dessas mutações são autossômicas recessivas, no entanto, existe um único caso reportado até o momento, onde a paciente apresenta uma mutação no gene *AICDA* com herança autossômica dominante (94, 96).

A imunodeficiência comum variável (CVID) é a forma mais comum de IDPs clinicamente significativas e acomete principalmente adultos, embora também possa ser observada em crianças. A característica principal da CVID são os níveis reduzidos de um ou mais isotipos de imunoglobulina, e apresentam uma resposta a vacina diminuída (97). Além de infecções recorrentes do trato respiratório superior e inferior (sinusite, otite, bronquite e pneumonia) causadas por bactérias comuns (por exemplo, *Haemophilus influenzae* e *Streptococcus pneumoniae*) alguns pacientes com CVID são altamente propensos a manifestações autoimunes (citopenias e doença inflamatória intestinal), lesões granulomatosas, hiperplasia linfóide e tumores (especialmente linfomas) (97-99).

IgAD é a imunodeficiência primária mais comum, com uma frequência de 1:700 indivíduos afetados em todo o mundo. A fisiopatologia da IgAD permanece pouco compreendida. Aproximadamente dois terços dos adultos com IgAD são assintomáticos, mas o restante pode apresentar infecções de repetição, autoimunidade, ou alergia (100). Pacientes adultos com a IgAD, e com história de infecções, são frequentemente associados a defeitos nas subclasses da IgG, geralmente a subclasse IgG2. A deficiência de subclasses de IgG também pode ocorrer sem que haja anormalidades em outros isótipos de imunoglobulinas. A fisiopatologia da deficiência de subclasses de IgG também permanece desconhecida.

Pacientes com hipogamaglobulinemia transitória da infância (THI) apresentam baixos níveis de imunoglobulina que retornam espontaneamente ao normal, geralmente após os 2 anos de idade, embora estudos tenham mostrado que isso seja muito variável (101, 102). Muitos indivíduos com THI permanecem de forma assintomática, esta condição está associada a uma maior taxa de infecções recorrentes, especialmente do trato respiratório superiores.

As células T reguladoras (Treg) medeiam a supressão das respostas imunes a auto-antígenos. A geração de células Treg no timo é controlada pelo fator de transcrição FOXP3. Mutações no gene *FOXP3* causa a Síndrome de desregulação imune, poliendocrinopatia, enteropatia autoimune ligada ao X (IPEX) (106), que é uma doença grave e que evolui rapidamente. O tratamento se dá pelo transplante de células hemotopoiéticas (HCT).

A interação entre o Fas ligante (Fas L), expresso em linfócitos ativados, e Fas (CD95) ativa as vias de sinalização intracelular que têm como função a ativação de caspases e consequente, morte celular. Mutações no Fas são a causa da Síndrome linfoproliferativa autoimune (ALPS). Pacientes com ALPS apresentam linfadenopatia, hepatoesplenomegalia e citopenia autoimune (107). Estes pacientes também apresentam um risco aumentado de desenvolver doenças malignas (especialmente linfomas de células B), que ocorrem em 10% dos pacientes com mutação no Fas (108). ALPS tem o caráter genético autossômico dominante, mas mutações somáticas no gene *Fas* têm sido reportadas em alguns pacientes.

1.4.5 Defeitos da imunidade inata

1.4.5.1 Defeito das células fagocíticas

Os fagócitos desempenham um papel chave na defesa contra bactérias e fungos. Assim, pacientes com defeitos no número ou na função das células fagocíticas, apresentam infecções graves e recorrentes contra fungos (especialmente as espécies de *Candida* e *Aspergillus*) e bactérias. As manifestações mais comuns são as infecções do trato respiratório, infecções cutâneas, abscessos profundos, e estomatite oral.

A doença granulomatosa crônica (DGC) representa o protótipo de defeitos na função dos fagócitos e é causada por defeitos no complexo do fosfato de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADPH) oxidase (109). Em 75% dos casos, a DGC é herdada como um traço ligado ao X, causada por mutações no gene *CYBB* ligada ao X, que codifica o componente gp91^{phox} da NADPH-oxidase. Existe também a forma autossômica recessiva que é causada por defeitos das p22^{phox}, p47^{phox} e componentes p67^{phox}. As proteínas gp91^{phox} e p22^{phox} estão localizadas na membrana do fagossomo, onde p47^{phox} e p67^{phox} citosólicas são translocadas após a ativação da célula fagocítica. O complexo NADPH é regulado por duas glutatonas trifosfatases, Rac2 e Rap1. Defeitos na Rac2 foram identificados em um único

paciente com fenótipo clínico compatível com DGC. Após a fagocitose, o complexo NADPH-oxidase é induzido e tem como resultado a produção de compostos microbicidas (radicais superóxido e peróxido de hidrogênio), a ativação de enzimas líticas (catepsina G, elastase e mieloperoxidase), levando à morte intracelular de bactérias e fungos. Pacientes com DGC apresentam infecções recorrentes e muitas vezes infecções de pele grave, abscessos no fígado, pneumonia e linfadenite. *Staphylococcus aureus*, *Serratia marcescens*, *Burkholderia cepacia*, e as espécies de *Nocardia* são responsáveis pela maior parte das infecções bacterianas. As espécies de *Candida* e *Aspergillus* causam a maioria das infecções fúngicas. Pacientes com DGC também estão em maior risco de infecções por micobactéria (109).

Deficiência de adesão de leucócitos (LAD) inclui uma série de síndromes caracterizadas por anomalias do tráfico de leucócitos (110). LAD1 é causada por mutações no gene *ITGB2*, que codifica o componente $\beta 2$ da integrina (também conhecido como CD18). Estas integrinas $\beta 2$ medeiam a adesão estável entre leucócitos e células endoteliais, permitindo a passagem trans-endotelial dos leucócitos, a fim de alcançar os locais de infecção/inflamação. LAD2 é causada por mutações em um transportador da GDP-fucose. Nesta doença as proteínas de fucosilação apresentam-se danificadas e resultam numa falta de expressão do Sialyl-Lewis-X que é o ligante da E-selectina. Esse defeito causa uma má função no rolamento dos leucócitos dentro do endotélio (110). Finalmente, LAD3 é causada por mutações do kindlin-3, que envolve uma interação da sinalização interna e externa ao endotélio. Todas as 3 formas de LAD são herdadas de forma autossômica recessiva, e todos apresentam infecções graves no início da vida do paciente (111).

1.4.5.2 Defeitos de TLRs

TLRs são uma série de moléculas que são expressas na superfície da célula ou na membrana endossomal e medeiam o reconhecimento de padrões moleculares associados a agentes patogênicos, tais como LPS, glicolípidos, e RNA simples ou de cadeia dupla.

A via clássica de ativação do TLR envolve o adaptador MyD88 e os receptores intracelulares de IL-1 associado a cinase 4 e 1 (IRAK-4 e IRAK-1), que finalmente resulta na indução do NF- κ B e na produção de citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF- α e IL-12). TLR-3, TLR-7, TLR-8, e TLR-9 podem ativar uma via alternativa que

envolve a molécula adaptadora TRIF e a proteína UNC-93B, resultando na indução do IFN do tipo 1 (IFN- α/β). Surpreendentemente, mutações nos genes que envolvem a sinalização mediada por TLR resultam em uma seletiva susceptibilidade a patógenos. Em particular, mutações no gene *IRAK4* e *MyD88* (ambos com herança autossômica recessiva) têm um fenótipo semelhante, com infecções piogênicas graves e invasivas no início da vida (111, 112). Mutações heterozigóticas no gene *TLR3* e mutações bialélicas no gene *UNC93B* foram identificados em pacientes com sensibilidade seletiva para encefalite causada pelo vírus herpes simples, e com uma diminuição na produção do IFN do tipo 1 (85, 113).

1.4.5.3 Defeitos do complemento.

Uma variedade de defeitos hereditários dos componentes do sistema complemento foi reportada (114). A deficiência dos primeiros componentes da via clássica do complemento (C1q, C1r, C1s, C4, C2 e C3) tem como principal característica clínica as manifestações autoimunes que se assemelham ao lúpus eritematoso sistêmico. A deficiência dos componente C2 e C3 levam a um aumento do risco de infecções provocadas por bactérias capsuladas. Defeitos de componentes tardios (C5-C9) estão associadas a infecções recorrentes a bactérias gram-negativas (principalmente pela *Neisseria meningitidis*).

Deficiências dos componentes reguladores como o Fator H e Fator I causam glomerulonefrite e síndrome hemolítica atípica recorrente. A deficiência de manose ligante de lectina (MBL), um componente da via dependente de MBL do complemento, tem sido associada a um risco aumentado de infecções bacterianas recorrentes, principalmente durante os primeiros anos de vida.

Todas essas imunodeficiências representam constantes desafios para os médicos que atuam em serviços de atenção primária, onde infecções recorrentes são causas muito frequentes de procura por atendimento médico. Isso reforça a observação de que o diagnóstico das IDPs tem sido tardio, provavelmente pelo pouco conhecimento dos médicos em relação a essas doenças, o que aumenta o risco de complicações, de morte secundárias às infecções, e de outras comorbidades que possam surgir durante a vida do paciente (115). Além disso, muitos casos têm sido diagnosticados de forma incorreta, resultando na adoção de medidas terapêuticas inapropriadas (60).

Os pacientes podem apresentar alguns sinais que podem ser criticamente importantes para um diagnóstico precoce de imunodeficiência primária, como por exemplo: dificuldade de crescimento e desenvolvimento, ausência de linfonodos e amígdalas palatinas, lesões cutâneas (exantema, seborreia, piodermites, abscessos, alopecia, eczemas, telangectasias, petéquias, dermatomiosite, rash “lupus-like” e úlceras orais) (116).

Diante de várias causas de infecções de repetição na criança, é necessário definir quais que devem ser submetidas a uma investigação mais detalhada dos componentes do sistema imunológico. Assim sendo, o estabelecimento de um roteiro (**Figura 3**) que ajuda na determinação de casos suspeitos, tornou-se uma arma poderosa para um diagnóstico precoce de imunodeficiência primária.

Figura 3 - Algoritmo para avaliação de Imunodeficiência Primária

Fonte: Adaptado de (15).

1.5 Estudo genético-molecular das IDPs

O estudo genético-molecular começou com a descoberta do modelo estrutural do DNA pelos estudiosos Watson e Crick (117), que observaram duas fitas complementares que formavam uma dupla hélice. Com base neste modelo, o código genético foi elucidado cuidadosamente nos laboratórios do Marshall Nirenberg, Gorbind Khorana e Robert Holley. Pelo grande achado, os três dividiram o prêmio Nobel de 1968 em Medicina. O mecanismo de replicação do DNA foi explorado na década de 1950 por Arthur Kornberg, que recebeu o prêmio Nobel em 1959 pela descoberta da enzima DNA polimerase. Em 1977 Fredrick Sanger (118) desenvolveu um método para sequenciar o DNA com base em um reagente que misturava oligonucleotídeos, primers e a enzima DNA polimerase. O método sanger de sequenciamento de DNA tornou-se amplamente aceito e, em 1980, ganhou seu segundo prêmio Nobel de Química, depois de ter recebido seu primeiro em 1958 pela descoberta da sequência de aminoácidos da insulina.

Em resposta a estes sucessos, o departamento de energia do NIH lançou o projeto genoma humano em 1990 (119) e coordenou o projeto multicêntrico que foi concluído em 2003, com contribuições da Austrália, Israel e Catalunha. Através de todos esses achados, o custo do sequenciamento do genoma inteiro tem diminuído e a análise dos dados tem sido simplificado.

Nos últimos anos, um número substancial de genes envolvidos com a imunidade e suas funções foram identificados por meio do estudo genético de pacientes com IDPs. Essas doenças são consideradas como predisponentes para infecções causadas por um grande número de diferentes patógenos, e às vezes por patógenos específicos (16).

Desde o primeiro relato de IDP (21), quase 300 defeitos genéticos causadores de um fenótipo clínico de IDPs foram descobertos, através do avanço do conhecimento do sistema imunológico e do avanço da genética (61, 120, 121). No entanto, cerca de 3110 genes podem ser potencialmente causadores de IDP, com base nas suas funções biológicas e análise do conectoma do gene humano (122), sugerindo a existência de um grande número de doenças desconhecidas até o momento. Algumas destas doenças são monogênicas, mas uma proporção crescente são causadas por um mecanismo digênico ou poligênico (123, 124).

Desde a descoberta das tecnologias de nova geração NGS, a descoberta de variantes genéticas de origem mendeliana (MDS) tem avançado muito.

O sequenciamento do exoma (Whole-exome sequencing; WES) ou o sequenciamento de todo o genoma (Whole-genome sequencing; WGS), estão tornando abordagens cada vez mais difundidas para a identificação de genes associados ao MDS, através do sequenciamento de várias pessoas que fazem parte de uma mesma família (125, 126), ou através do sequenciamento de uma pequena coorte de pacientes (127), ou pelo sequenciamento de um único indivíduo (128).

A descoberta do gene e a compreensão da base molecular da doença, são pontos de partida essenciais para fazer o diagnóstico molecular, proporcionar um aconselhamento genético (129), e fornecer pistas para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para diversas doenças.

O desenvolvimento de novas técnicas que permitem a definição estrutural do DNA, o elucidamento do código genético e o sequenciamento do genoma humano permitiram esse avanço no descobrimento das novas IDPs (127, 130, 131).

Quando um paciente apresenta um fenótipo clínico compatível com IDPs, devemos analisar a história familiar do paciente. A abordagem mais eficiente neste caso, é o estudo genético de genes conhecidos. As doenças autossômicas foram inicialmente descobertas como doenças ligadas ao X. Um exemplo clássico foi a descoberta dos defeitos genéticos que fazem parte da Síndrome de hiper IgM. A identificação do CD40L como um molécula essencial para o acontecimento do *Switch* de classes foi a chave para a descoberta dos pacientes com Síndrome de hiper IgM ligada ao X (deficientes da molécula CD40L) (132-137).

Logo em seguida, descobriu-se que os deficientes de CD40 tinham a HIGM com caráter genético autossômico recessivo. Esse entendimento só veio após a descoberta de que as moléculas CD40/CD40L são importantes para a diferenciação de células B e para o *Switch* de classes (138, 139). Similar a este, temos o caso do gene *IL2RG* que codifica o receptor de cadeia γ da IL-2, que é importante para o desenvolvimento das células T e que causa a Imunodeficiência Combinada Severa (SCID) (79). Essa informação permitiu a posterior descoberta de outros dois defeitos com caráter autossômico recessivo que também causa SCID. A cinase Janus 3 foi identificada como parte integrante da sinalização via IL2R γ (81, 140, 141), e o receptor de IL-7 foi identificado como um parceiro da IL2R γ na ligação da citocina IL-7, que é essencial para o desenvolvimento do tímócito (79, 82). Mais recentemente, foi descoberta que a imunodeficiência de displasia ectodérmica (ED-IS), uma

imunodeficiência com característica genética ligada ao X que acomete pacientes do sexo masculino com mutações no gene *NEMO*, essencial para a ativação nuclear do NF- κ B (142). O entendimento das vias de sinalização do NF- κ B foi extremamente essencial para o encontro de mutações no gene *I κ B α* , inibidor da família do NF- κ B, como um novo gene que causa ED-ID com característica autossômica dominante em pacientes do sexo feminino (143, 144).

Vias de sinalização já conhecidas também podem orientar a abordagem da análise genética para pacientes com fenótipos clínicos específicos, como por exemplo a Candidíase Mucocutânea Crônica (CMC). CMC é uma característica clínica de pacientes com defeitos na via da IL-17, onde os pacientes apresentam ausência das células TH17 com neutralização dos auto-anticorpos contra IL-17A e IL-17F (145). Esse conhecimento levou à descoberta dos primeiros pacientes com mutações no gene *IL17R* (8).

A identificação de defeitos moleculares baseados em vias previamente conhecidas do sistema imunológico é uma das maneiras de encontrar novos genes, mas a probabilidade de encontrar um novo gene causador de uma IDP é baixa. Além de que muitas mutações podem levar a um fenótipo clínico inesperado. Por exemplo, uma mutação no gene *CORO1A*, que codifica a proteína coronina-1A, foi inicialmente descrita como um defeito que causa um fenótipo clínico compatível com SCID (146), mas posteriormente foi associada com linfopenia de células T e linfoproliferação associada ao EBV, descartando assim a possibilidade de ser um gene causador de SCID (147).

Modelos em camundongos têm sido usados e são indispensáveis para um melhor entendimento de como o sistema imune funciona. Mesmo havendo uma notável diferença entre as espécies humana e murina, sem essa ferramenta nós não teríamos o conhecimento suficiente para a descoberta de novas imunodeficiências.

Quando o conhecimento das vias de sinalização obtido através de estudos animais não sugere genes candidatos, técnicas genéticas têm sido fundamentais para a identificação de novas mutações patogênicas. Marcadores polimórficos são usados para mapear o defeito genético específico numa região cromossômica específica. Esses marcadores incluem, por exemplo, a restrição de fragmentos de polimorfismo, microssatélites e polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs). SNPs são mudanças de uma única base no genoma humano que ocorrem com uma frequência populacional de pelo menos 1%. Eles são frequentemente utilizados em estudos

genéticos porque são onipresentes no genoma humano (148) e podem ser acessados através de banco de dados (149). Esses marcadores também podem ser usados para identificar uma mutação patogênica em regiões compartilhadas por pacientes afetados com o mesmo fenótipo clínico. Essas regiões compartilhada entre os pacientes geralmente contém vários genes que podem ser subsequentemente sequenciados, e então identificado o gene causador da doença em questão (150).

Esse tipo de análise foi utilizada para a identificação da mutação em homozigose no gene *LRBA*, que codifica a proteína LRBA em paciente com hipogamaglobulinemia, diminuição do número de células B de memória e diminuição da autoimunidade (151). O estudo reuniu 5 indivíduos com o mesmo fenótipo clínico, onde 4 deles vinham de família com algum histórico de consanguinidade. Após a análise, descobriu-se uma região com 81 genes em comum nos pacientes. Após o sequenciamento, foram identificadas mutações em heterozigose no gene *LRBA* de cada paciente. Essa abordagem requer grandes famílias, com vários membros afetados, onde podem ser identificadas regiões candidatas.

Nos anos 2000, as técnicas de sequenciamento de última geração (NGS) revolucionaram a genética, tornando possível o sequenciamento de genomas humanos inteiros em questão de dias. NGS engloba uma variedade de métodos que simultaneamente podem ampliar milhões de sequências de DNA (152). Embora essa tecnologia possa oferecer grandes dados do sequenciamento, é um grande desafio distinguir variantes patogênicas dentro dos 3,2 bilhões de bases presente no sequenciamento do genoma humano (153), além de ser extremamente caro. Embora o sequenciamento do exoma constitui cerca de 1% do genoma, 85% das mutações encontradas podem ser deletérias (154). WES identifica uma média de 20 a 35 mil variantes de nucleotídeo simples (SNPs) dentro do sequenciamento do exoma (155).

A eliminação das variantes sinônimas, que alteram a sequência de DNA mas não a sequência de aminoácidos diminui a lista de genes candidatos. Para as doenças raras, as variantes comuns com uma frequência na população de mais de 1% podem ser eliminadas (125, 127, 152, 156). Os algoritmos de bioinformática, tais como Polyphen-2, SIFT, Mutation Taster e MAPP podem ser utilizados para identificar se as mutações missenses resultam uma função proteica alterada (157-160). Além disso, os programas GERP e Phylo-P SCORE podem ser usados para

avaliar a conservação da sequência entre espécies. Finalmente, após todo esses métodos, os genes podem ser filtrados com base na sua função dentro do sistema imunológico. Os genes essenciais para a função do sistema imune, tais como os responsáveis pelo desenvolvimento dos linfócitos, são selecionados. Essa abordagem foi utilizada para identificar as mutações em heterozigose nos genes *IL10*, *IL10RA* e *IL10RB*, responsáveis pela doença de Crohn (161).

Um filtro adicional pode ser aplicado aos dados do WES em famílias consanguíneas, que é a avaliação via mapeamento homozigótico. Tal mapeamento identifica as regiões genômicas que têm uma probabilidade maior de abrigar a mutação causadora do fenótipo clínico no paciente, presumindo que esta seja uma doença com herança autossômica recessiva, onde as regiões em homozigose estarão cheias de SNP herdados dos pais (162, 163). A combinação do mapeamento das regiões em homozigose, combinada com WES, é uma abordagem genética cada vez mais comum. A identificação da deficiência de LRBA, descrita anteriormente, foi identificada não só através da análise de todos os pacientes consanguíneos, mas foi descrita também por meio de análise por mapeamento das regiões em homozigose, combinada com WES, nessas famílias com história de consanguinidade (164).

Outro estudo feito com a combinação dessas técnicas foi realizado com dois irmãos de uma família consanguínea, onde os pacientes apresentavam linfopenia das células T naíve e defeito na ativação das células T (165). O mapeamento homozigótico, combinado com WES, dos dois pacientes, identificou 2 novas mutações no gene *RHOH*. Uma dessas mutações resultou em um códon de parada no gene *RHOH* que é importante para o desenvolvimento e ativação das células T (165, 166).

Esses exemplos mostram que a combinação das técnicas WES/WGS com mapeamento em homozigose pode gerar uma menor e mais precisa lista de genes candidatos. Apesar da junção dessas técnicas estar acelerando o encontro de novas mutações em novos genes, ainda existem muitas limitações envolvendo as técnicas WES/WGS.

As doenças com caráter genético autossômico dominantes representam um desafio maior na descoberta das IDPs, porque há aproximadamente 69% de variantes em heterozigose do que em homozigose em todo o genoma (167). Consequentemente, um mapeamento efetivo dos genes autossômicos dominantes

requer um estudo envolvendo grandes famílias para obter uma lista um pouco menor de candidatos. Uma família contendo múltiplas gerações com 6 a 12 afetados não é fácil de encontrar (150). Para contornar essa dificuldade, os pesquisadores tem sequenciado sujeitos afetados de famílias não relacionadas, como foi feito no estudo da identificação da mutação de *GATA2*, que causa monocitopenia, diminuição das células B e NK, além de infecções severas (168). Assumindo que a doença é causada por mutações em um único gene, os autores hipotetizaram que a técnica WES realizada em 4 pacientes não relacionados poderia identificar o gene contendo as variantes causadora da doença, eliminando a maioria das mutações não patogênicas. Somente um gene, *GATA2*, que codifica um fator de transcrição responsável pela manutenção das células tronco, foi encontrado mutado nos 4 pacientes (168, 169).

Mutações localizadas nas regiões não codificantes não podem ser detectadas usando o WES, que capta principalmente as regiões exônicas do genoma. As regiões não codificantes compreendem cerca de 99% do genoma, e mutações nessas regiões não são frequentemente determinadas. Portanto, a identificação de mutações deletérias nessas regiões só acontece depois que um gene candidato for identificado. Mutações exônicas no gene *UNC13D*, que codifica Munc são conhecidas por causar linfoma hemofagocítico do tipo 3. Através dessa informação, um grupo conseguiu identificar mutações intrônicas responsáveis por abolir a expressão da proteína resultando em um fenótipo de linfoma hemofagocítico do tipo 3 (170, 171). Outros exemplos incluem mutações intrônicas, como por exemplo, mutações intrônicas que abolem a função de *GATA2* (172), ou mutações intrônicas no *SH2D1A* que codifica o SAP e resultam em uma desordem linfoproliferativa ligada ao X (173).

Em todos estes exemplos, a identificação de uma mutação intrônica só foi possível porque um gene candidato foi identificado com base no fenótipo clínico e a mutação afeta severamente a expressão da proteína.

Identificar grandes variações estruturais, tais como deleções, inversões e translocações, usando WES/WGS pode ser problemático por várias razões. Pode ser difícil diferenciar uma grande deleção dentro de um intervalo genômico, por conta de um sequenciamento que teve uma cobertura pequena. Por causa de seu tamanho, o genoma humano é fragmentado antes da aplicação da técnica de NGS. Sondas de oligonucleotídeos biotinilados, complementares aos fragmentos de DNA,

se ligam e são coletados com ajuda de sondas magnéticas de estreptavidina. Os fragmentos são amplificados e sequenciados em paralelo. Embora o sequenciamento seja projetado para ter uma cobertura completa do genoma, a cobertura geralmente é de 30X a 150X, onde uma sequência deve ser sequenciada de 1 a 200 vezes, por conta das variações genômicas, como por exemplo, as regiões repetitivas ou com alto número de G-C. Como resultado, a técnica de WES pode não sequenciar adequadamente cerca de 10% dos genes (155). Essas sequências são alinhadas com a referência no genoma humano. Os fragmentos contendo uma grande deleção ou inversão não podem ser alinhados propriamente. Para esse alinhamento ser correto, o fragmento deve ser analisado com uma série de subunidades para identificar a melhor forma de alinhamento para cada subunidade, um processo que requer recursos de bioinformática (174).

Os avanços dos conhecimentos sobre imunologia e genética facilitaram a descoberta de novos defeitos genético-moleculares envolvendo pacientes com característica clínica de IDPs. No entanto, ainda há muito progresso a ser feito. É importante ressaltar que a análise genética e identificação dos defeitos causadores do fenótipo de imunodeficiência primária permite que os nossos pacientes possam ter uma melhor sobrevida, podendo realizar um tratamento correto ou até o transplante de medula óssea, além de permitir o aconselhamento genético da família.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral:

Identificar e caracterizar novos defeitos genético-moleculares e/ou novos genes que levam a descoberta de novas imunodeficiências primárias.

2.2 Objetivos específicos:

Seleção dos pacientes do estudo:

- Selecionar, utilizando os critérios de seleção utilizados neste trabalho, pacientes com história clínica e laboratorial de Imunodeficiência Primária, de preferência, com algum histórico de consanguinidade na família.
- Após a seleção, recrutar os pacientes para realização da coleta de amostra biológica, após a leitura e concordância do termo de consentimento livre e esclarecido.

Investigação de novas mutações:

- Comparar os sinais clínicos e laboratoriais do paciente com de outros pacientes ou modelos já descritos na literatura;
- Exclusão dos genes já descritos na literatura, com ajuda do *sanger sequencing*.

Investigação de novos genes:

- Após a exclusão dos genes já descritos na literatura, aplicar a técnica de genotipagem de alta densidade através de microarray "Affymetrix 6.0 chip" destacando regiões do genoma co-segregadas dentro da família;
- Analisar todas as regiões codantes do genoma do paciente através do sequenciamento do exoma ("*Exome sequencing*") identificando genes com variações genéticas e selecionando genes candidatos;
- Finalizar a análise com poucos genes candidatos.

Confirmação se o gene candidato é resonsável pelo fenótipo clínico do paciente:

- Após finalizarmos a análise genética com um único gene candidato, inciamos a caracterização imunológica do paciente;
- Análise da expressão proteica utilizando o Western Blot;
- Análise da estrutura da proteína utilizando a simulação molecular FREADY;
- Análise da expressão gênica por PCR em tempo real;

- Análise do repertório do TCR via *Spectratyping*;
- Teste da atividade da enzima cinase;
- Imunofluorescência para visualizar a translocação de proteínas para o núcleo;
- Análise das sinapses imunológicas por microscopia.

3 PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Pacientes do estudo

Para este estudo, aplicamos um sistema de recrutamento de pacientes com história clínica de Imunodeficiência Primária (IDP). Nossa casuística inclui 4 famílias, com um total de 5 pacientes, dentre eles, somente 1 é do sexo masculino e 4 são do sexo feminino. Todas as 4 famílias tem algum grau de consanguinidade, de primeiro ou segundo grau.

Dentre as 4 famílias estudadas, duas são de origem Turca e duas são de origem Brasileira. Este estudo foi realizado com a colaboração de dois grupos muito importantes, Grupo Brasileiro de Imunodeficiência¹ e do Centro de pesquisa em Medicina Molecular² (Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences - Ce-M-M-), Viena, Áustria. Parte dos pacientes foram estudados no Laboratório de Imunologia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas da USP sob supervisão do Prof. Dr. Antonio Condino Neto e outra parte dos casos foram estudados no Ce-M-M- sob supervisão do Dr. Kaan Boztug, em um regime de colaboração.

A amostra de sangue dos pacientes que estiveram em condições clínicas estáveis de saúde foram coletadas e destinadas ao desenvolvimento do protocolo experimental desde projeto. Os pacientes menores de idade estiveram sempre acompanhados dos pais ou responsável no momento da coleta e a retirada do sangue ocorreu após o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido (**TCLE; ANEXO B.1 e B.2**) de acordo com o parecer **1066/CEP**. O protocolo experimental e o termo de consentimento contemplam os aspectos éticos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e não ultrapassam os limites descritos de risco mínimo de acordo com as normas para pesquisa envolvendo seres humanos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, 2003).

¹ (BRAGID - www.bragid.org.br)

² (Ce-M-M - www.cemm.oeaw.ac.at)

3.2 Histologia, imuno-histoquímica e microscopia eletrônica da biópsia do rim e linfonodo

Para a realização da biópsia, a amostra retirada dos rins do paciente foram fixados em formol tamponado a 7% de formaldeído, envoltos em parafina para que fosse possível o corte histológico. Após o corte, a amostra foi corada com hematoxilina e eosina, ácido fuchsin-orange G, ácido periódico Schiff, prata de metenamina e vermelho congo. A ligação de anticorpos anti IgG, IgM, IgA, C3 e C1q foi visualizado usando substrato cromogênico para detectar possíveis depósitos de imunocomplexos. Os cortes da biópsia renal que foram analisadas via Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) não continham glomérulos. A preparação para o TEM foi realizada da seguinte forma: Uma pequena porção de tecido renal foram embebidos em parafina para microscopia, fixado com glutaraldeído 0,5%, fixado em formaldeído 4%, processados com resina epoxy, cortadas e visualizadas com o equipamento de microscopia Jeol JEM-1010. Análises histopatológicas do linfonodo foram coradas com hemotoxilina e eosina, foram marcadas para CD95/FAS, CD20, CD3 e Ki67 foram realizadas de acordo com os protocolos padrão do Departamento de Patologia Clínica da Universidade Médica de Viena.

3.3 Protocolo para cultura celular

3.3.1 Obtenção das células mononucleares de sangue periférico (PBMC)

A coleta de sangue foi realizada sempre em condições clínicas estáveis. A amostra de sangue periférico dos pacientes, familiares e voluntários sadios foi coletado em frascos de polipropileno estéreis contendo heparina.

A seguir, o sangue coletado foi diluído volume/volume em solução salina tamponada (PBS) (NaCl 0,14 M; Na₂PO₄ 0,01 M; pH 7,2) estéril, sendo 20 mL do sangue já diluído, adicionados vagarosamente em tubo de polipropileno estéril contendo 10 mL de Ficoll-Hypaque. Esta mistura então foi centrifugada a 600 x g por 30 minutos a 25 °C, e a interface contendo a camada de células PBMC foi coletada e transferida para novos frascos de 50 mL de polipropileno estéreis. Os frascos foram completados com PBS até atingir 50 mL para lavagem da suspensão celular e as amostras foram centrifugadas a 300 x g por 10 minutos a 25 °C. Este procedimento foi repetido novamente e as células mononucleares foram quantificadas com ajuda de uma câmara de Neubauer, e a viabilidade celular verificada pela utilização de Trypan blue na concentração de 0,4% (Sigma Chemical Co.).

3.3.2 *Estabelecimento de linhagens celulares B-EBV dos pacientes*

Para iniciar as culturas de células B, amostras de sangue periférico dos pacientes e sua família, foram fracionadas por meio de centrifugação em Ficoll-Hypaque (175). A fração de células mononucleares foi cultivada com sobrenadantes da linhagem B95-8, produtora de EBV (176-179). Após a transformação com ajuda do vírus Epstein-Bar, as células B foram cultivados em meio RPMI-1640, suplementado com soro bovino fetal (10%) inativado pelo calor, 2 mM L-glutamina, 100 U / mL penicilina, e 100 µg / mL de estreptomicina, a 37°C em atmosfera úmida saturada com 5% de CO₂. A viabilidade celular foi monitorizada diariamente e a cultura mantida indefinidamente durante os estudos.

3.3.3 *Condições de estimulação*

Estimulamos as células PBMCs com CD40L humano, BAFF-Fc humano e a recombinante IL-21 humana, todos usados na concentração de 20 ng / mL. Já as células B imortalizadas (B-LCL) foram estimuladas com hBAFF (R&D Systems; 2149-BF-010) na concentração de 50 ng / mL por 6 e 12 horas, e os fibroblastos foram estimulados com linfotóxina $\alpha 1/\beta 2$ (R&D Systems, 678-LY-010) na concentração de 50 ng / mL e 100 ng / mL por 15 minutos e 4 horas, e com TNF α (e-Bioscience; 14-8329-62) foram usados na concentração de 10 ng / mL por 15 minutos e 4 horas.

Os fibroblastos e as células HEK293T foram cultivadas com o meio de cultura DMEM rico em glicose e suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 50 unidades / mL de penicilina (Gibco), 50 mg / mL de estreptomicina (Gibco) e 292 mg / mL de L-glutamina (Gibco) e cultivadas em um meio a 37 °C com 5% de CO₂.

Os ensaios de ativação das células B foram realizados de duas formas, estimulando as células PBMCs com CD40L e IL-21 como previamente descrito, ou estimulando com CD40L e IL-4 (100 ng / mL), cultivadas com meio DMEM modificado (IMDM, Invitrogen), suplementado com 10% de soro fetal bovino previamente inativado (FCS, Biowest), 100 U / mL de penicilina (Invitrogen), 100 mg / mL de estreptomicina (Invitrogen), 1 mg / mL de insulina (Sigma-Aldrich), 1 mg / mL de glutatona reduzida (Sigma-Aldrich), 2,5 mg / mL de apo-transferrina (Sigma-Aldrich), 2 mM de glutamina (Life Technologies, Gibco), e 1% de aminoácidos não essenciais (Gibco). A cultura foi realizada com o mesmo número de células em cada poço e as amostras foram analisadas nos dias 3, 6 e 9 por citometria de fluxo.

3.4 Imunofenotipagem por citometria de fluxo

Os experimentos de citometria de fluxo foram realizados utilizando os citômetros de fluxo LSR Fortessa, FACS Canto ou FACS Calibur (BD Biosciences, Austria). Para analisar cada população celular, iniciamos a aquisição dos dados através de *gates* baseados no tamanho (FSC, do inglês *forward scatter*) e granulosidade (SSC, do inglês *side scatter*) correspondentes as células de interesse. Quando necessário, marcadores celulares específicos foram utilizados para distinguir as populações celulares.

Os dados obtidos foram analisados usando o software FlowJo versão 9.3.1 (Tree Star Inc., EUA). Para cada ensaio foi calculada a mediana da intensidade de fluorescência (MFI, do inglês *median fluorescence intensity*).

Para a realização dos experimentos, células mononucleares de sangue periférico (PBMC), obtidas a partir da amostra de sangue dos pacientes, membros da família e controles foram isoladas como descrito acima (*item 3.2.1.*) e foram marcadas com os anticorpos descritos na **Tabela 2**.

Para fixação intracelular, as células PBMCs foram ativadas por 3 horas com 50 mg / mL de ionomicina e 5 mg / mL de PMA na presença de Brefeldin A e os anticorpos CD107a e os marcadores de superfície celular. As células foram fixadas e permeabilizadas com a solução Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences).

Para o estudo dos pacientes P2 e P3, as células precisaram ser selecionadas. Essa seleção foi realizada através do citômetro baseado em *sorting*. A população de células B foram marcadas com os anticorpos CD19-PerCP-Cy5.5, anti-CD27_BV421, anti-CD3-APC-H7 e anti-IgD-FITC e então selecionadas.

Tabela 2 - Anticorpos utilizados na imunofenotipagem das famílias pertencentes ao estudo.

Anticorpos	Fluorocromo	Outras especificações
CD3	APCH7	SK7, BD-Biosciences
CD3	BV711	OKT3, BioLegend
CD3	APC	SK7, BD- Biosciences
CD4	APC	RPA-T4, BD- Biosciences
CD4	BV510	OKT4, BioLegend
CD4	PerCPCy5.5	RPA-T4, BD- Biosciences
CD8	V500	RPA-T8, BD-Biosciences

CD8	APC-H7	SK1, BD-Biosciences
CD19	PerCPCy5.5	HIB19, eBioscience
CD21	PE	B-ly4, BD- Biosciences
CD25	PE	M-A251, BioLegend
CD27	Brilliant violet	M-T271, BD-Biosciences
CD27	FITC	L128, BioLegend
CD38	PECy7	HIT2, BD-Biosciences
CD45RA	BV605	H1100, BioLegend
CD56	PE	N901, Beckman-Coulter
CD56	PE	N901, Beckman-Coulter
CD69	APC	FN50, BD- Biosciences
CD86	FITC	FUN-1, BD-Biosciences
CD95	PECy7	DX2, BD-Biosciences,
CD127	BV421	A019D5, BioLegend
IgD	FITC	IA6-2, BD-Biosciences
IgM	APC	G20-127, BD-Biosciences
CCR7	PR-CF594	BD-Biosciences
ICOSL	PE	B7-H2, BD- Biosciences
FOXP3	FITC	PCH101, BD-Biosciences
CXCR5	APC	R&D systems

PE, ficoeritrina; *FITC*, isicianato de fluoresceína; *PE-Cy5* ficoeritrina-Cy5; *APC*, Allophycocyanin.

3.5 Análise genético-molecular

3.5.1 Extração de DNA

Para detectarmos os defeitos genéticos de cada paciente, amostras de DNA genômico (DNAg) foram extraídas da amostra de sangue total dos pacientes, parentes e controles. O DNAg de cada paciente foi extraído utilizando o kit Wizard™ Genomic DNA Purification. Em microtubos de 1,5 mL contendo 300 µL de sangue, foram adicionados 900 µL de solução de lise celular misturando-se o conteúdo do tubo por inversão e a seguir as amostras foram incubadas em temperatura ambiente durante 10 minutos. Subsequentemente, as amostras foram centrifugadas a 15000 x g durante 30 segundos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e foram adicionados 300 µL de solução de lise nucléica

e 100 µL de solução para precipitação proteica. O conteúdo do tubo foi homogeneizado durante 20 segundos no vórtex. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 15000 x g durante 3 minutos. O sobrenadante foi transferido para um microtubo de 1,5 mL. O DNAg foi precipitado em 300µL de isopropanol absoluto e a amostra centrifugada a 15000 x g durante 1 minuto. Após descartar o sobrenadante, o DNAg foi lavado com 300 µL de etanol 70% centrifugando as amostras a 15000 x g por 5 minutos. A seguir o sobrenadante foi descartado e os tubos contendo o DNAg foram mantidos em temperatura ambiente durante 10 minutos para a evaporação do etanol residual. Após este período, o DNA foi reidratado em 30 a 150 µL de solução de reidratação e incubado em banho maria durante uma hora a 65 °C. Após esta etapa, o DNA foi armazenado a -20 °C até a sua utilização.

A quantidade e qualidade do DNAg foram aferidas espectrofotometricamente no comprimento de onda de 280 nm e 260 nm, utilizando-se o espectrofotômetro Nanodrop® ND-1000. Após a leitura no espectrofotômetro a integridade do DNAg foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão Tris-Acetato-EDTA corados com brometo de etídio, sendo comparada com um padrão de massa molecular conhecido.

3.5.1.1 Amplificação do DNAg pela técnica de PCR (Reação em cadeia da polimerase)

O PCR para os fragmentos de DNA fornecidas foram realizadas em um volume total de 50 µL contendo 50 ng de DNA genômico, 0,3 µM de cada oligo, 250 de µM dNTPs, 0,5 unidades de enzima recombinante Taq DNA polimerase e 2,5 µL do buffer de x 10 PCR (10mM tris-HCl, pH = 8. 3, 50 mM KCl), em 2 mM Cl₂, fornecidas pelo fabricante (Invitrogen®). Amplificação foi executada em um sistema de “multiblock thermocycler” (Applied Biosystems - GeneAmp® PCR sistema 9100).

Amplificação do PCR foi realizada com uma etapa de desnaturação inicial a 95 °C durante 3 minutos, seguido por 30 ciclos consistindo de desnaturação em 95 °C durante 30 segundos, anelamento a 56 °C - 60 °C (conforme o oligo) durante 45 segundos e extensão em 72 °C durante 1 min e, em seguida, um passo de extensão final em 72 °C durante 10 min.

3.5.2 Sequenciamento pelo método de Sanger

Após as amplificações dos exons (pacientes, familiares e controle), investigamos as mutações subjacentes pela análise do DNAg através da técnica de sequenciamento genético para identificarmos as alterações genético-moleculares responsáveis pelo fenótipo de IDP dos pacientes.

As reações de sequenciamento foram realizadas a partir de produtos de PCR utilizando o ABI 3730 DNA Analyser, um sistema de análise de DNA de 48 capilares com a tecnologia Applied Biosystems. As reações de sequenciamento foram feitas utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (código 4337456). As corridas foram feitas em capilares de 36 cm utilizando o polímero POP7. As sequências foram analisadas pelo software Sequencing Analysis 5.3.1 utilizando o Base Caller KB.

As sequências obtidas foram comparadas com as sequências depositadas no banco de dados de registros de mutações já descritas na literatura e a descrição das mudanças de sequências dos genes estudados seguiu a nomenclatura do banco de dados.

3.5.3 Genotipagem de alta densidade “Affymetrix 6.0 chip”

Selecionamos 4 famílias cujo os pacientes apresentam um fenótipo clínico sugestivo de IDP com perfil genético autossômico recessivo e com história de consanguinidade de primeiro ou segundo grau na família. Após a seleção, iniciamos o ensaio usando um painel de genotipagem capaz de caracterizar 906.000 SNPs distribuídos ao longo dos 22 cromossomos autossômicos e cromossomos X e Y (Affymetrix Genome-Wide Human SNP 6.0 Array). Para a este ensaio foram utilizados 10 ml de DNA na concentração de 50 ng/ml extraídos de sangue periférico dos pacientes e seus familiares. As enzimas Nsp I e Sty I foram utilizadas para o processo de digestão do DNA. Os fragmentos de DNA resultantes foram ligados a adaptadores reconhecidos por primers genéricos para amplificação dos respectivos fragmentos por reação de PCR. Os produtos amplificados foram combinados e purificados com “beads” para posterior hibridização ao chip correspondente ao “Genome-Wide Human SNP 6.0 Array”. Os dados obtidos foram analisados utilizando o mapa de homozigosidade (180), um método eficaz para a identificação de doenças genéticas recessivas em famílias consanguíneas.

Todos os ensaios de genotipagem foram realizados no Ce-M-M- em Viena,

sob a supervisão do Prof. Kaan Boztug, onde o Centro de estudos em genômica dispõe de pessoal treinado e todo equipamento necessário. Os resultados foram analisados usando o software Affimetrix Genotyping ConsoleTM e a ferramenta de análise de todo o genoma PLINK³. Os genes localizados nas regiões codantes inseridas nas áreas detectadas no mapeamento de homozigose foram avaliados através de estudo da expressão gênica e avaliação funcional.

3.5.4 Sequenciamento do Exoma

Outra abordagem para a identificação de novos genes consistiu no sequenciamento de todos os exons do genoma humano. Esta metodologia foi particularmente importante para casos esporádicos em famílias não consanguíneas, que não se beneficiam dos estudos de análise de ligação para identificação de região de áreas de homozigose no método anterior. O Sequenciamento do Exoma, técnica nova e promissora, oferece a possibilidade de identificar as variações genéticas encontradas em regiões codantes (127). Inicialmente, eliminaremos a variação relatada previamente em bancos de dados como não-patológicos, selecionando genes com base numa abordagem de genes candidatos potencialmente relacionados à resposta imunológica geral.

Para este ensaio foram utilizados 10 µg de DNA, extraídos de sangue periférico ou de células B-EBV imortalizadas dos pacientes e seus familiares. O kit “*Paired-End Sample Prep Kit V1*” (Illumina Inc. USA) foi utilizado para a ligação de adaptadores que contem sequências únicas de primers aos fragmentos de DNA obtidos. Em seguida foi realizada a hibridização dos produtos com base no kit “*SureSelect Human All Exon*” (Agilent Technologies) que contem marcadores para 165.648 intervalos gênicos correspondentes a 17.236 genes. O sequenciamento dos produtos obtidos foi realizado com o equipamento Genome Analyzer IIx (Illumina Inc.).

Para a análise dos produtos resultantes do sequenciamento foram utilizados os seguintes softwares: Burrows-Wheeler Aligner⁴ para alinhamento; Samtools⁵ e Genome Analysis Toolkit⁶ para a detecção de variações; e SeattleSeq SNP Annotation⁷ para o reconhecimento de SNPs. Os genes localizados nas regiões codantes foram avaliados através de estudo da expressão gênica e avaliação funcional.

³ (PLINK - <http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/>)

3.5.5 Validação das possíveis variantes gerados pelo sequenciamento do exoma

Após a realização da técnica e da análise dos produtos resultantes do sequenciamento do exoma, uma lista de possíveis variações foi gerada. Dentro desta lista existem centenas de variações que podem ser verdadeiras ou podem ser somente um artefato do sequenciamento.

A validação das variantes encontradas na lista final do sequenciamento do exoma, foi realizada pelo método de Sanger (descrita no *item 3.4.3*) usando DNAG do paciente. Os primers para cada posição das variantes foram desenhadas através do programa PrimerZ⁸ excluindo 60 pb antes da posição da variante, e com um produto que variavam de 100 a 500 pb. Todos os primers foram sintetizados pela empresa Sigma Aldrich, Austria.

A amplificação de todas as variantes foram realizadas como descritas no *item 3.4.2.*, pelo método de PCR. Todas as variantes foram sequenciadas como descrito no *item 3.4.3*, pelo método de Sanger. As sequências obtidas pelo método de Sanger foram analisadas através do programa Sequencher DNA Software 4.10.1 (Gene Codes Corporation, USA). A análise de segregação foi realizada utilizando o DNAG dos pais e irmãos de todos os pacientes.

3.6 Protocolo para análise funcional

3.6.1 Análises “*in silico*” e modelagem da estrutura da proteína NIK

Foram utilizadas ferramentas para prever o efeito que a mutação, previamente identificada nos pacientes, tem na proteína, usando os algoritmos SIFT (158), PolyPhen2 (181) e CUPSAT (182).

Para obter uma hipótese sobre a mudança na estrutura da proteína e na dinâmica da variante, comparamos a proteína NIK^{wild-type} e NIK^{Pro565Arg}, usando a dinâmica de simulação molecular FREADY (183) implementada no pacote de modelagem molecular MOIL (184).

⁴ (BWA; <http://bio-bwa.sourceforge.net/>)

⁵ (Samtools - <http://samtools.sourceforge.net/>)

⁶ (Genome Analysis Toolkit - <http://www.broadinstitute.org/>)

⁷ (SeattleSeq SNP Annotation - <http://gvs.gs.washington.edu/SeattleSeqAnnotation/>)

⁸ (PrimerZ - <http://genepipe.ngc.sinica.edu.tw/primerz/>)

Iniciamos as simulações da modelagem molecular da estrutura cristalina do NIK (PDB ID 4G3D, cadeia A) e deixamos funcionar por 50 nanossegundos a 300 K. Nas simulações, os resíduos mais compridos que 9 Å do resíduo mutado foram fixados a estrutura experimental. As estruturas proteicas foram alinhados e visualizados utilizando MacPyMol (The Graphics System PyMOL Molecular, Versão 1.3 Schrödinger, LLC).

3.6.2 Análise da expressão proteica por “Western Blot”

Este ensaio qualitativo, ou quantitativo/relativo, permite detectar o componente defeituoso que causa a IDP (185, 186). Baseia-se na corrida eletroforética de amostras de extrato celular com posterior transferência para membrana de nitrocelulose. A membrana foi incubada com anticorpos monoclonais específicos (Santa Cruz) para as proteínas de interesse. Em seguida, recebeu o segundo anticorpo conjugado e o substrato revelador (reação imunoenzimática). Após lavagem, foi realizada a densitometria das bandas, por meio de análise computadorizada em equipamento fotodocumentador (ImageQuant 300, General Electric - GE), disponível em nosso laboratório.

As proteínas foram isoladas usando um buffer de lise celular contendo 20 mM Tris (pH7.5), 150 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% TritonX-100 (pH7.1) e um coquetel contendo inibidor de protease (Sigma Aldrich). As membranas usadas foram PVDF ou de nitrocelulose. Os anticorpos utilizados estão descritos na **Tabela 3**.

Tabela 3 - Tabela contendo todos os anticorpos primários utilizados no estudo para detecção dos níveis proteicos.

Anticorpos		Outras especificações
PKCδ	Rabbit anti-human	Cell Signaling
MARCKS	Rabbit anti-human	D88D11, Cell Signaling
Fosfo-MARCKS	Rabbit anti-human	Ser167/170, D13E4, Cell Signaling
IKKα	Rabbit anti-human	Cell Signaling
fosfo-IKKα/β	Rabbit anti-human	Cell Signaling
p100/p52	Rabbit anti-human	Cell Signaling
NIK	Rabbit anti-human	Cell Signaling
RelB	Rabbit anti-human	C1E4, Cell Signaling

TRAF3	Rabbit anti-human	Cell Signaling
p65	Rabbit anti-human	D14E12, Cell Signaling
p105/p50	Rabbit anti-human	Cell Signaling
IκBα	Mouse anti-human	Cell Signaling
RCC1	Mouse anti-human	E-6, Santa Cruz Biotechnology
HA	Rabbit anti-human	H6533, Sigma-Aldrich
c-Myc	Rabbit anti-human	BD Biosciences
GAPDH	Mouse anti-human	Clone 6C5, Santa Cruz biotechnology

3.6.3 *Extração de RNA total*

O RNA total das células foi preparado utilizando-se o kit TRIzol Reagent. Esta técnica baseia-se num procedimento que mantém a integridade do RNA, enquanto ocorre a lise celular que, combinada com a adição de clorofórmio, permite a separação do RNA na fase aquosa. O RNA é recuperado após precipitação com álcool isopropílico (187).

Após a extração de células PBMC, a solução de TRIzol, no volume de 1 mL, foi adicionada ao “pellet” e homogeneizado para provocar a lise das células e foi incubada por 5 minutos na temperatura de 30 °C e receberá 0,2 mL de clorofórmio para cada mL de TRIzol. Após nova homogeneização vigorosa por 15 segundos e incubação por 3 minutos a 30 °C, a amostra foi centrifugada durante 15 minutos a 12000 g e 4 °C. No término da centrifugação se formou 3 fases na solução. A fase aquosa (superior) que foi cuidadosamente retirada e transferida para um novo tubo eppendorf livre de RNase e foi adicionado 0,5 mL de álcool isopropílico para cada 1 mL de TRIzol previamente adicionado no início do experimento. Em seguida, a solução foi incubada por 10 minutos a temperatura de 30 °C e, após centrifugada por 10 minutos em 12000 g na temperatura de 4 °C, o RNA ficou então precipitado no fundo do tubo. O sobrenadante foi removido e ao “pellet” de RNA foi adicionado 1 mL de etanol 75%, sendo a solução novamente centrifugada durante 5 minutos a 7500 x g. Após a retirada cuidadosa do etanol por aspiração, os tubos contendo o RNA total foram armazenados durante 5 a 10 minutos em temperatura ambiente, dentro do fluxo laminar, para a evaporação do etanol residual. O RNA foi

ressuspendido em 15-50 µL de água MilliQ ultrapura, tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) 1:10.000.

A quantidade e qualidade do RNA extraído foram aferidas espectrofotometricamente no comprimento de onda de 280 nm e 260 nm, utilizando-se o espectrofotômetro Nanodrop® ND-1000. Após a leitura no espectrofotômetro a integridade do RNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão Tris-Acetato-EDTA, corado com brometo de etídio, comparando-se o padrão de corrida eletroforética do RNA extraído com um padrão de massa molecular conhecido. As amostras de RNA foram armazenadas a – 80 °C para posterior utilização.

3.6.4 *Reação de transcrição reversa*

O RNA total extraído das células foi submetido à transcrição reversa para obtenção do DNA complementar (cDNA) utilizando-se o kit Superscript™ III Reverse Transcriptase (Invitrogen). Dois microgramas da amostra de RNA total foram adicionados a um microtubo eppendorf livre de RNase com capacidade de 0,2 mL numa solução contendo 50 µM de oligo (dT) primer e a solução foi completada para um total de 12 µL com água DEPC 1:10.000. O oligo (dT) hibridiza na cauda 3' poli (A) presente no RNA mensageiro maduro em que o processo de *splicing* já foi realizado. Assim utilizamos para as análises apenas RNAm já processados.

A seguir, este primeiro microtubo foi incubado durante 5 minutos a 65 °C. Após a incubação com as amostras no termociclador a 4 °C, acrescentou-se a cada microtubo contendo o RNA total, oligo (dT) e água DEPC, uma solução total de 8 µL contendo 2 µL de dNTP (2,5 mM de dATP, dCTP, dTTP, dGTP cada), 4 µL de tampão RT (Tris-HCl 10 mM [pH 8,3], KCl 50 mM, MgCl₂ 1 mM) e 1 µL (5U) da enzima transcriptase reversa. A seguir, no termociclador as amostras foram incubadas durante 60 minutos numa temperatura de 42 °C. Após o término, as amostras foram aquecidas por 10 minutos a 92 °C para inativar a enzima transcriptase reversa e o cDNA produzido foi congelado a –20 °C para uso posterior.

3.6.5 *Análise da expressão gênica por PCR em tempo real*

Após a separação das células PBMC's, extração do RNA, o cDNA dos pacientes, familiares e controles foram amplificados por meio de PCR em tempo real, através do sistema SYBR Green Real Time (Applied Biosystems). A reação de

PCR em tempo real levou a identificação e quantificação através de um sinal fluorescente, o qual incrementa em proporção direta à quantidade de produto de PCR em uma reação. Usamos o SYBR® Green, que se une especificamente a DNA de dupla fita e em estado de excitação emite luz. Deste modo, quanto mais se acumula o produto do PCR, maior será a fluorescência. Isto nos permitiu correlacionar à intensidade de sinal coletado com a quantidade de produto amplificado.

Cada 10 µL de mix de PCR continha 3 µL do cDNA da amostra, 5 µL de Sybr® Green Master Mix (1 X Sybr® Green Buffer, 3 mM de MgCl₂, 200 nM de dNTP blend, 0.63 U de Amplitaq Gold®, 0.25 U de AmpErase®), 2 µL de primers específicos para o gene de interesse e gene constitutivo (188). O gene escolhido para controle interno da reação foi o gene da GAPDH (NM 001101). Os primers específicos pertencentes ao nosso estudo estão descritos na tabela abaixo (**Tabela 4**)

Tabela 4 - Primers para avaliação e quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real.

Nome do primer	Sequência
NF-IL6_cDNA_3F	AGCCCCGCTGACGCCAA
NF-IL6_cDNA_3R	GGCAGCTGCTTGAACAAGT
IL6_cDNA_3F	TTCGGTCCAGTTGCCTTCTC
IL6_cDNA_3R	TACATGTCTCCTTTCTCAGGGC
BCL2_F	CCGGGAGATGTCGCCCCTGGTGA
BCL2_R	AGGCCGCATGCTGGGGCCGTA
MCL1_F	TCGTAAGGACAAAACGGGAC
MCL1_R	ACCAGCTCCTACTCCAGCAA
BCL2L1_F	GAATGACCACCTAGAGCCTTGG
BCL2L1_R	TGTTCCCATAGAGTTCCACAAAAG
GAPDH_F	TGATGGCATGGACTGTGGTC
GAPDH_R	TTCACCACCATGGAGAAGGC

3.6.6 Método de TCRBV CDR3 Spectratyping

Esse método permite analisar a diversidade do repertório de linfócitos T e detectar populações celulares em expansões clonais (189, 190). Essa técnica inicia-

se pela amplificação por PCR dos segmentos C β -C β do TCR utilizando primers específicos para cada uma das 24 famílias V β que foram estudadas. O produto desta reação é submetido à outra amplificação por PCR que inclui um primer adicional marcado com fluorocromo. Nessa segunda reação, amplifica-se o segmento gênico que contém a região CDR3 do TCR, uma vez que esta região está localizada entre os segmentos V-D-J. Em seguida, estes segmentos amplificados por PCR são separados em gel de sequenciamento e, com o auxílio de um sequenciador automático e do software *Gene Mapper*TM (Applied biosystem), foi possível calcular o tamanho (em pares de bases) dos diferentes segmentos (picos) de CDR3, o número de picos de CDR3, estimar a frequência de cada família V β no repertório do TCR e analisar a clonalidade e distribuição dos picos na região CDR3.

3.6.6.1 Reação de PCR (V β -C β) para determinação das famílias V β do TCR

Esta reação possibilita a amplificação do segmento gênico V β -C β do TCR. Para um volume final de reação de 25 ml, foram utilizados 2 ml de cDNA (descrito no item 3.5.3), 2,5 ml de tampão 10X (500 mM KCl e 100 mM Tris-HCl), 2,5 ml de MgCl₂ (25 mM), 2,5 ml de dNTP (2 mM), 1,25 ml do primer V β específico (20 mM) e 1,25 ml do primer TCR_BC1+C β C1 (20 mM), 0,2 ml da Taq polimerase (5 U/ml) e água em quantidade suficiente para 25 mL. Esta reação foi processada em um termociclador nas seguintes condições: 5 minutos 95 °C, seguidos de 40 ciclos de 45 segundos a 95 °C, 45 segundos a 60 °C, 60 segundos a 72 °C, completados com uma extensão final de 5 minutos a 72 °C. Após a amplificação, o produto gerado foi conferido em um gel de eletroforese onde 15 mL de cada produto foi adicionado a 3 ml de tampão de corrida (*loading dye*) e então adicionados no gel de agarose na concentração de 1%.

Os primers utilizados nesta técnica estão descritos na **Tabela 5** (189, 190).

Tabela 5 - Sequência dos primers utilizados na amplificação das famílias V β do TCR.

Nome do primer	Sequência
Primers que amplificam as regiões variáveis	
TCR Vβ1	CCGCACAACAGTTCCCTGACTTGC
TCR Vβ2	ACATACGAGCAAGGCGTCTGA

TCR V β 3	CGCTTCTCCCTGATTCTGGAGTCC
TCR V β 4	CATCAGCCGCCCAAACCTAA
TCR V β 5	GATCAAAACGAGAGGACAGC
TCR V β 6-A	GATCCAATTTTCAGGTCATACTG
TCR V β 6B/C	CAGGGCTCAGAGGTTCTGAC
TCR V β 7	CAAGTCGCTTCTCACCTGAATGC
TCR V β 8	GGTACAGACAGACCATGATGC
TCR V β 9	TTCCCTGGAGCTTGGTGACTCTGC
TCR V β 11	GTCAACAGTCTCCAGAATAAGG
TCR V β 12	TCCYCCTCACTCTGGAGTC
TCR V β 13-A	GGTATCGACAAGACCCAGGCA
TCR V β 13-B	AGGCTCATCCATTATTCAAATAC
TCR V β 14	GGGCTGGGCTTAAGGCAGATCTAC
TCR V β 15	CAGGCACAGGCTAAATTCTCCCTG
TCR V β 16	GCCTGCAGAACTGGAGGATTCTGG
TCR V β 17	TGTGACATCGGCCCAAAGAA
TCR V β 18	CTGCTGAATTTCCCAAAGAGGGCC
TCR V β 20	TGCCCCAGAATCTCTCAGCCTCCA
TCR V β 21	GGAGTAGACTCCACTCTAAG
TCR V β 22	GATCCGGTCCACAAAGCTGG
TCR V β 23	ATTCTGAACTGAACATGAGCTCCT
TCR V β 24	CCCAGTTTGGAAGCCAGTGACCC
Primers que amplificam as regiões constantes	
C β B1 (<i>reverse primer</i>)	CGGGCTGCTCCTTGAGGGGCTGCG
TCR C β 1	GGGTGTGGGAGATCTCTGC
FAM-Marcador das regiões constantes	
TCR C β 2RO	ACACAGCGACCTCGGGTGGG

3.6.6.2 Reação de alongação/*run-off*

Após a reação de PCR descrita acima (*item 3.5.5.1*), o produto desta reação foi submetido a outra amplificação por PCR (reação de alongação ou *run-off*) que inclui um primer C β interno marcado com um fluorocromo (FAM) (**Tabela 5**).

Para esta reação, foi utilizado 1 mL de tampão para PCR 10X (500 mM KCl e 100 mM Tris-HCl), 0,4 mL de MgCl₂ (25 mM), 1 mL de dNTP (2 mM), 0,1 mL de primer C β marcado (10 mM), 0,06 mL de Pfu DNA polimerase (3 U/mL) e o quanto basta de água DEPC para completar 8 mL, seguindo a adição separadamente de 2 mL do produto de PCR de cada uma das 24 famílias V β . Esta reação foi processada em um termociclador por 2 minutos a 94 °C, seguidos de 4 ciclos de 25 segundos a 94 °C, 45 segundos a 60 °C, 45 segundos a 72 °C, completados com uma extensão final de 5 minutos a 72 °C.

Após a reação, testamos o produto aplicando 5 mL de cada reação em um gel de agarose. Após a corrida do gel de eletroforese, verificamos então se houve a marcação pelo FAM (fluorescência).

3.6.6.3 Preparo das amostras e aplicação no sequenciador automático

Para completa desnaturação do DNA, 2 mL das amostras da reação de *run-off* foram misturadas com 0,5 mL de marcador de peso molecular (Gene ScanTM – 500 LIZ standard, Applied Biosystem) e 10,5 mL de tampão para carregar a amostra (*loading buffer* – formamida, acrescida de *blue dextran*). Essa solução então teve sua desnaturação finalizada no termociclador a 95 °C por 2 minutos. Após a desnaturação, as amostras foram submetidas a corrida eletroforética em um sequenciador automático de DNA (ABI 3130 Sequencer; ABI Applied Biosystems, Germany).

Após a corrida eletroforética, as sequências foram analisadas pelo software *Gene MapperTM* AB 3130XL-1 versão 4.0 e foram então gerados gráficos de distribuição dos segmentos da região CDR3. Os gráficos representam a intensidade da fluorescência em unidades arbitrárias de acordo com o tamanho da região CDR3, em pares de bases. As informações geradas a partir da análise incluem o tamanho do pico, bem como a altura e área de cada pico.

3.6.7 Teste da enzima cinase

As células HEK293T foram transferidas para uma placa de 6 poços e transfectadas com os vetores expressando NIK e/ou IKK α gerados por recombinação, utilizando os vetores PTO (C-terminal tag-estreptavidina-hemaglutinina) ou pCS2 (N-terminal 6x myc) (191), foram lisadas 24 horas após a transfecção através do tampão de lise contendo 20 mM HEPES (pH 7,9), 20%

glicerol, 50 mM KCl, 400 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 5 mM β -glicerofosfato, 1 mM de PMSF, 5 mg / mL Apronitin, 10mM NaF , 5 mg / mL leupeptina, 5 mM de Na_3VO_4 , e em seguida foram analisadas via SDS-PAGE e Western Blot .

3.6.8 A amplificação e análise dos transcritos dos genes *IGH*

Os transcritos da IgA e IgG foram amplificados a partir do cDNA extraídos das células PBMCs previamente congeladas, utilizando os primers *forward* que amplificam as sequências dos genes IGHV3 e IGHV4, combinados com os primers *reverse* C α ou C γ (192). Todos os produtos de PCR foram clonados dentro do vetor pGEM-T easy (Promega) e preparados para o sequenciamento (modelo ABIPRISM 3130XL; Applied Biosystem). As sequências obtidas foram analisadas de acordo com o banco de dados IMGT⁹ para os genes *IGHV*, *IGHD* e *IGHJ* (193).

3.6.9 Imunofluorescência

Os fibroblastos do paciente (P2) e controle saudável foram estimuladas com linfotóxina $\alpha 1/\beta 2$ em uma concentração de 100 ng / mL (R&D Systems, 678-LY-010) por 4 horas. Após a estimulação, as células foram fixadas com formaldeído à 4% em PBS por 30 min e, em seguida, bloqueadas e permeabilizadas com uma solução contendo 10% de soro fetal bovino, com 0,1% de Triton X-100. As células foram marcadas com anticorpos anti-DAPI e anti-NF- κ B2 (p100/p52) (Cell Signaling, #3017) e NF- κ B (p105/p50) (Cell Signaling, #3035), diluído na concentração de 1:100. Após, utilizamos o anticorpo secundário conjugado com Alexa Fluor 546, diluído na concentração de 1: 500 (Life Technologies, A10040). As imagens foram obtidas em um microscópio de fluorescência Leica AF6000 usando o software Leica LASAF para aquisição. As imagens foram tiradas a com uma ampliação de 64x.

3.6.10 Ensaio de reconstituição

Para provar que o mutante NIK^{Pro565Arg} é realmente o causador do fenótipo apresentado pelo paciente, decidimos realizar o ensaio de reconstituição da proteína mutada nos P2 e P3.

⁹ (IMGT - <http://www.imgt.org/>)

O cDNA que codifica a versão original do gene *MAP3K14* humano foi clonado em um vetor retroviral pMMP expressando a fluorescência GFP (eGFP) como marcador. Partículas retrovirais RD-114 pseudotipado foram geradas por transfecção em células HEK293T pelo método de transfecção via cloreto de cálcio (8 mg do vetor retroviral, 12 mg do DNA gag/pol , 5 mg de DNA RD114) na presença de 25 mM de cloroquina (Sigma-Aldrich, C6628) durante 12 h. Sobrenadantes contendo partículas virais foram coletadas após 24 h, 36 h e 48 h. A titulação viral foi testada em células HT-1080. Os fibroblastos dos pacientes e controles foram transduzidas com partículas retrovirais na presença de 8 mg / mL de polibrene (Santa Cruz, SC-134220) por 12 h. Eficiência da transdução foi determinada pela expressão do marcador eGFP, por citometria de fluxo. A expressão do marcador eGFP nos fibroblastos dos pacientes e controle ficou entre 45% e 70%. Após a transdução, os estudos de imunofluorescência foram realizadas como descrito no *item 3.6.9*. Os dados foram representados graficamente usando o software Prisma 6.0 (GraphPad Software).

3.6.11 Microscopia confocal das sinapses imunológicas

As células conjugadas do paciente e controles foram submetidas a avaliação da sinapse imunológica via microscopia confocal, como previamente descrito (194). A seguir as células foram fixadas e permeabilizadas. Os conjugados foram incubados com o anticorpo anti-perforina Alexa Fluor 488 (Biolegend) diluídos na proporção de 1:50 e com faloidina Alexa Fluor 568 diluídos na proporção de 1:100. As imagens foram adquiridas em um microscópio confocal de varredura Leica SP8. A excitação foi sintonizável com um laser de luz branca e a detecção foi obtida pelo detector de gallidium híbrido (HYD). A aquisição foi realizada com ajuda do software Leica LASAF e as imagens foram exportadas para o software Volocity (PerkinElmer) para posterior análise. Os dados foram representados graficamente usando Prism 6.0 (GraphPad Software).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 1 (P1)

4.1.1 Caracterização clínica e laboratorial

Paciente do sexo masculino, hoje com 12 anos de idade, vem de família de pais consanguíneos (primos de primeiro grau), de origem Turca (**Figura 4**).

Figura 4 - Heredograma da P1. Completo heredograma mostrando as quatro gerações da família do paciente 1. Importante observar que se trata de uma família com história de consanguinidade em primeiro grau.

O paciente apresentou os primeiros sintomas antes dos 6 meses de idade, incluindo episódios de infecções do trato respiratório superior e inferior, infecção do trato urinário (UTI) e gastroenterite. Foi submetido a uma amigdalectomia e adenoidectomia nos primeiros 4 anos de vida. A investigação dos valores relativos das imunoglobulinas revelou valores normais de IgG e IgA e altos níveis de IgM no soro (**Figura 5**). A frequência e severidade das infecções diminuiu após o início da administração de gama globulina (IVIg), quando o paciente tinha 4 anos.

Figura 5 - Níveis séricos das imunoglobulinas IgG, IgA e IgM. Gráficos mostrando os níveis das imunoglobulinas G, A e M do paciente, dos 5 aos 12 anos de idade. Pode-se observar um aumento nos níveis de IgA e IgG com uma progressiva redução ao longo dos anos. Níveis de IgG estão dentro do valor normal, exceto quando o paciente apresentou episódios de síndrome nefrótica (*) e quando iniciou tratamento com anti-CD20 (**).

Foi relatado história de autoimunidade na família. O pai do paciente apresentou a doença de Beçets e uma moderada tireoidite autoimune aos 40 anos

de idade. A mãe relata não ter apresentado autoimunidade. A primeira manifestação de autoimunidade do paciente ocorreu aos 15 meses de idade, quando o paciente apresentou síndrome nefrótica. Biópsia renal mostrou glomerulonefrite membranosa (**Figura 6A-H**). Além da autoimunidade, aos 3 anos de idade o paciente apresentou hepatoesplenomegalia (**Figura 7**) e linfadenopatia generalizada, levando a uma infecção pelo vírus herpes humano subtipos 6 e 7. Enquanto o paciente apresentava um quadro de linfadenopatia, a viremia pelo herpes humano persistiu. Várias biópsias de linfonodo revelou hiperplasia folicular reativa não específica (**Figura 8**). A aspiração da medula óssea não revelou qualquer sinal de malignidade.

Figura 6 - Exame morfológico das biópsias renais. A biópsia renal na apresentação inicial revela esclerose segmentar mesangial (seta) após coloração

com AFOG (Acid Fichsin Orange G) (**A**). Ao longo dos anéis capilares, todos os glomérulos apresentam depósito de IgG (**B**). Na nefropatia membranosa (MGN) o depósito de IgM (**C**) e fatores de complemento C3 e C1q (dados não mostrados) puderam ser observados ao longo dos capilares periféricos e campos mesangiais. A deposição de complexos imunes foi confirmada por microscopia eletrônica de transmissão (TEM), bem como os depósitos parcialmente incorporados na membrana basal (**D**), consistente com a fase I a III da nefropatia membranosa. Quando o paciente completou 8 anos, foi realizada uma segunda biópsia renal. Após a coloração com PAS (ácido periódico de Schiff), a biópsia revelou uma ligeira expansão mesangial (**E**). A imuno-histoquímica mostrou uma marcação não específica de IgM, contudo o depósito de IgG (**F**; setas), IgM (**G**), C3 (dados não mostrados) e C1q (**H**) foi observado ao longo das membranas basais glomerulares e nos campos mesangiais, dados consistentes com o imuno-complexo mediador da doença, mais provavelmente mediada por uma desordem imunológica sistêmica, tais como o LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico). Todas as imagens foram tiradas com o zoom de 200X.

Figura 7 - Confirmação da hepatoesplenomegalia. A esquerda, ultrassom evidenciando uma maciça esplenomegalia, e a direita, tomografia computacional do abdômen evidência a linfadenopatia (seta).

Figura 8 - Análise histopatológica do linfonodo. A análise histopatológica da biópsia do linfonodo mostra uma inespecífica, mas reativa hiperplasia folicular (setas). As características do linfonodo não estão alteradas, descartando a possibilidade de ser ALPS (mutações no FAS/CD95).

Detalhadas avaliações laboratoriais foram realizadas após a primeira manifestação de glomerulonefrite, aos 15 meses de idade. Foi observado baixos

níveis de IgG, enquanto os níveis de IgA e IgM estavam acima dos valores normais (**Figura 5**). O estudo das células B mostrou uma redução das células CD19⁺, com diminuição da proporção relativa das células de memória “*non class-switched*” (CD19⁺CD27⁺IgD⁺) e “*class-switched*” (CD19⁺CD27⁺IgD⁻), como também números aumentados de células B CD21^{low} (**Figura 9** e **Tabela 6**). Análises longitudinais mostraram um declínio progressivo das células B CD19⁺ (**Figura 10A**), aumento relativo das células B CD21^{low} (**Figura 10B**) e diminuição das células B de memória (**Figura 10C e D**).

Tabela 6 - Valores das populações e subpopulações de linfócitos. Abaixo estão apresentadas os valores das populações e subpopulações dos linfócitos do paciente, obtidos dos 3 aos 12 anos de idade. Em parênteses estão os valores de referência (195).

Idade (anos)	3-4	6-7*	8*	9-10*	11-12*
T CD3⁺	2410 (900-4500)	2140 (700-4200)	1830 (700-4200)	960 (700-4200)	1290 (800-3500)
T CD4⁺ (/μL)	1220 (500-2400)	980 (300-2000)	780 (300-2000)	450 (300-2000)	490 (400-2100)
TCD8⁺ (/μL)	880 (300-1600)	1010 (300-1800)	850 (300-1800)	570 (300-1800)	650 (200-1200)
B CD19⁺ (/μL)	340 (670-1619)	370 (228-516)	230 (228-516)	60 [#] (228-516)	60 (226-370)
CD19⁺/IgD⁺/CD27⁺	0.9% (4.2-6.9%)	0.012% (7.5-12.4%)	2.89% (7.5-12.4%)	1.9% [#] (7.5-12.4%)	2.47% (4.6-10.2%)
CD19⁺/IgD⁻/CD27⁺	0.5% (1.5-4.1%)	0.016% (5.2-12.1%)	7.37% (5.2-12.1%)	3.4% [#] (5.2-12.1%)	4.73% (3.3-9.6%)
CD19⁺/CD21^{low}	19.2% (1.8-3.6%)	17% (0.9-3.5%)	42.5% (0.9-3.5%)	36,6% [#] (0.9-3.5%)	56.8% (0.9-3.3%)
CD19⁺/CD38^{high}/IgM^{hig}				14.4% (0.7-3.5%)	11.2% (0.3-1.7%)

*Em tratamento com IVIg; #Valores medidos 17 meses após o tratamento com Rituximab.

Figura 9 - Avaliação das células B por citometria de fluxo. Análise por das células B CD19⁺ do paciente mostram um linfopenia de células B, diminuição das células B IgM e IgG de memória, e aumento do número de células CD21^{low}.

Figura 10 - Análise longitudinal das células B. A análise longitudinal mostra uma diminuição progressiva das células CD19⁺ (A), persistente e aberrante diminuição das subpopulações de células B (B-D). * simboliza o primeiro episódio da síndrome nefrótica. # indica o tratamento com anti-CD20. As linhas tracejadas indicam o percentil 25 e 75 de acordo com a idade do paciente.

Nos anos seguintes, o paciente apresentou outros quadros de autoimunidade, incluindo policondrite recidivante e hipotireoidismo autoimune. Com 8 anos, o paciente apresentou endocardite asséptica e embolia pulmonar. Dados laboratoriais sugeriram que o paciente estava em um quadro de síndrome anti-fosfolípido (Tabela 7).

Tabela 7 - Análise da proliferação de células T, resposta as vacinas e autoanticorpos na idade de 10 anos e 4 meses. O paciente estava em tratamento com IVIg.

Idade (anos)	10 anos 4 meses
Lifoproliferação (Paciente/Controle)	
PHA (x10³cpm)	125/160
CD3 Ab (x10³cpm)	21/74

SEA (x10³cpm)	87/110
SEB (x10³cpm)	57/104
PMA (x10³cpm)	32/104
Resposta a vacina*	
Anticorpo anti-tétano (IU / mL)	0.6
Anticorpo anti-difteria (IU / mL)	0.1
IgG anti-<i>Haemophilus influenza</i> β (μg / L)	0.8
IgG Encefalite por vírus transmitida por carrapatos	Limítrofe
IgM Encefalite por vírus transmitida por carrapatos	Negativo
Autoanticorpos	
ANA	1:320 (<1:40)
dsDNA	Positivo
Colágeno 1	Positivo
Colágeno 2	Negativo
Colágeno 3	Negativo

PHA, fitohemaglutinina; cpm, contagem por minuto; SEA and SEB, *S. aureus* enteroxina A ou enteroxina B – superantígeno; PMA, Forbol-12-Miristato-13-Acetato.

Devido às manifestações autoimunes, quando o paciente atingiu 9 anos de idade, foi tratado com anticorpo monoclonal contra CD20 (Rituximab, 375 mg/m²). Após 3 anos, o tratamento foi interrompido devido a reações anafiláticas a medicação. Após o rompimento do tratamento, o número de células CD19⁺ B do paciente voltou ao normal após algumas semanas (**Figura 10A**).

A análise das células T mostraram uma ligeira diminuição das respostas proliferativas das células T (**Tabela 7**), sem restrições do repertório das células T - TCR V β (**Figura 11**). A ausência das isohemaglutininas sugere uma diminuição da função das células B.

A expressão dos genes CD40 e CD40L também foi avaliado por citometria de fluxo, e os valores mostraram-se normais em comparação com o controle (dado não mostrado).

Por conta das infecções recorrentes do trato respiratório, incluindo pneumonia, a reposição com Gama Globulina G (IVIg) foi iniciada quando o paciente

tinha 4 anos de idade, melhorando assim os episódios de infecções recorrentes. Como dito anteriormente, o paciente foi tratado com anti-CD20 (Rituximab, 375 mg/m²), com a função de diminuir a produção de auto-anticorpos. Apesar da normalização transitória dos níveis séricos de IgM (**Figura 5**), auto-anticorpos persistiram. Desde os 8 anos de idade, que o paciente vem sendo tratado com continuamente com Mofetil Micofenolato e baixas doses de esteroides. Além de Enalapril (inibidor da enzima conversora de angiotensina), anticoagulantes, reposição hormonal da tireóide e de substituição com imunoglobulina. Após o início do tratamento com esses fármacos, o paciente adquiriu uma qualidade de vida razoável, sem necessidade de internação ou administração de antibióticos pelos últimos três anos.

Figura 11 - Análise do TCR Vβ Spectratyping. A do repertório do TCR Vb do paciente se mostrou normal em comparação com um controle saudável.

4.1.2 Análise genética do P1

Como todos os dados clínicos e laboratoriais do paciente indicavam um fenótipo de Imunodeficiência Comum Variável (CVID), a análise genética foi a etapa seguinte a ser seguida.

4.1.2.1 Sequenciamento via *Sanger Sequencing*

Sequenciamos via *Sanger Sequencing* todos os exons referentes aos genes *ICOS*, *BAFFR*, *TACI*, *FOXP3* e *MEFV*, respectivamente.

Uma variante conhecida no gene *CTLA-4* (rs231775) foi descoberta tanto no paciente quanto no pai do paciente. Sabe-se que esta variante (c.49A>G; p.Thr17Ala) tem sido associado com várias doenças auto-imunes, tais como a doença de Graves, a artrite reumatóide e lúpus eritematoso sistêmico (LES) (196). Tanto as combinações dos genótipos G/G e A/G, quanto só o alelo G, foi associado a doença de Graves (197). No entanto, para LES, a literatura revela resultados contraditórios com uma clara associação descrita apenas para os portadores do alelo G e do genótipo G/G, enquanto o genótipo A/G não apresentam risco aumentado de desenvolvimento de LES (198).

A apresentação clínica do paciente com várias características de alteração dos sistema imunológico e de desregulação autoimune, incluindo glomerulonefrite, linfadenopatia, policondrite recidivante e síndrome fosfolipídica, não pode ser explicada só com o achado da variante no gene *CTLA4*. Após essa conclusão, iniciou-se então as investigações genéticas para detectar a base molecular da doença do paciente.

4.1.2.2 Identificação da mutação no gene do *PRKCD*

Dada a consanguinidade da família, supomos que o nosso paciente apresentava um defeito monogênico com característica autossômica recessiva. Para descobrir a causa genética que levava ao fenótipo do paciente, realizamos a técnica de SNP *array* baseada em mapeamento homozigótico (**Figura 12 e Tabela 8**) e o sequenciamento do exoma (ES). Após realização da técnica, a análise dos dados de mapeamento combinando os softwares *Homozygosity Mapper* e *PLINK* revelou um total de 43 intervalos homozigóticos no paciente. Os intervalos encontrados usando cada um ou ambos os softwares estão descritos na **Tabela 8**.

Figura 12 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico. SNP-array baseado em mapeamento homozigótico foi realizado e mostrou vários intervalos homozigóticos no paciente, incluindo o intervalo no cromossomo 3p21.31.

Tabela 8 - Intervalos homozigóticos obtidos pelo software *Homozygosity Mapper* e *PLINK*.

<i>Homozygosity Mapper</i>				
Chr	SNP 1	SNP 2	Posição (Mb)	Tamanho (Mb)
1	rs2764664	rs7531541	57.74-59.76	2.02
2	rs11687159	rs6757763	113.34-118.48	5.14
2	rs7567579	rs16831684	122.58-136.21	13.63
2	rs12466487	rs1447194	136.41-143.24	6.83
2	rs13004364	rs6430291	143.24-148.87	5.63
2	rs6729378	rs6431249	231.41-235.22	3.81
3	rs6445959	rs6445860	51.77-57.21	5.44
3	rs1513471	rs11705999	57.22-60.58	3.36
3	rs1158425	rs11713857	60.59-65.55	4.96
3	rs6549282	rs3886342	70.20-74.65	4.44
3	rs9849947	rs17375496	74.70-78.75	4.06
3	rs11928868	rs2639219	78.76-81.06	2.30
4	rs6820873	rs6531370	31.08-35.52	4.45
4	rs4832736	rs2660346	37.77-41.99	4.23

4	rs2612519	rs225165	42.65-52.89	10.24
4	rs999634	rs7683187	52.93-55.82	2.89
5	rs7717315	rs11957757	145.90-148.22	2.32
5	rs11745375	rs1298854	170.91-180.69	9.78
6	rs1524738	rs2350386	71.32-73.89	2.56
6	rs10498891	rs6915022	73.89-77.58	3.69
6	rs4708296	rs6938070	77.59-83.75	6.16
6	rs9356405	rs6931065	166.34-170.92	4.57
7	rs4729106	rs2382694	93.61-103.07	9.46
11	rs4758405	rs10769948	6.32-8.76	2.44
11	rs10769165	rs12361256	45.71-47.91	2.20
11	rs17145500	rs4102214	56.52-63.21	6.70
11	rs10501393	rs10501435	63.22-78.92	15.70
11	rs17123506	rs11218575	119.84-122.15	2.31
12	rs2702217	rs7952982	129.41-131.73	2.32
13	rs1575803	rs12861225	101.68-105.12	3.44
13	rs5012124	rs9583190	105.12-108.33	3.21
14	rs797378	rs8014740	34.53-40.73	6.19
14	rs17180977	rs17212596	40.74-44.29	3.55
14	rs17117849	rs4900981	47.43-50.52	3.09
14	rs8007035	rs17125074	50.53-52.56	2.03
16	rs244783	rs4843898	84.36-86.10	1.74
19	rs2033494	rs10405814	22.60-29.22	6.62
PLINK				
Chr	SNP 1	SNP 2	Posição (Mb)	Tamanho (Mb)
2	rs6710114	rs12185756	120.24-121.59	1.34
2	rs13013829	rs17014033	126.35-127.36	1.01
2	rs3109275	rs7591230	130.43-131.94	1.51
3	rs2535619	rs2581795	52.85-53.04	0.19
3	rs7625247	rs3773598	53.85-54.91	1.06
3	rs472631	rs6445829	55.51-56.89	1.38
3	rs9827976	rs9830198	60.92-61.94	1.02
3	rs6772010	rs9879369	68.58-69.62	1.04

3	rs11716788	rs17009311	70.93-72.09	1.16
4	rs13117332	rs4645195	45.92-47.09	1.17
4	rs13133059	rs346899	53.13-53.39	0.26
4	rs4864466	rs1402742	54.40-54.78	0.37
5	rs10035180	rs2647700	176.60-177.89	1.30
5	rs3111532	rs1298854	179.64-180.69	1.05
6	rs436992	rs6931065	169.82-170.92	1.09
7	rs13242458	rs425964	99.70-101.60	1.91
8	rs1349247	rs7817645	83.97-85.05	1.08
11	rs4442567	rs517679	56.99-58.45	1.46
11	rs384124	rs12290156	61.84-62.84	1.00
11	rs489161	rs949150	75.00-76.12	1.12
12	rs7485834	rs2062162	132.18-133.43	1.25
20	rs4010686	rs6061095	29.47-30.60	1.13
22	rs181391	rs807429	18.22-19.24	1.02

Chr, Cromossomo; SNP, Polimorfismo de nucleotídeo único.

Após a filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do exome, selecionamos todas as variações missenses, deleções, inserções, variações nonsense e as variações que estavam localizadas na região de *splice*. Todas essas variações selecionadas, estavam localizadas dentro das regiões em homozigose do paciente. O número total dessas variações, foram: 57 variantes individuais de nucleotídeos (SNVs) e 15 deleções/inserções (DIVs). Após o sequenciamento das 57 variantes SNVs e das 15 DIVs, foram variantes verdadeiras somente 22 SNVs. Após o sequenciamento dos pais e membros da família, conseguimos excluir 20 SNVs, sobrando somente 2 SNVs que tiveram uma segregação perfeita (**Figura 13**).

Figura 13 - Processo de filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do exoma. Após a realização do sequenciamento do exoma, foram selecionados os hits que estavam dentro dos intervalos homozigóticos do paciente. Após várias filtrações e validações, sobraram somente 2 SNVs que segregaram perfeitamente. SNVs, variantes e um único nucleotídeo. DIVs, deleções e inserções.

Duas variantes foram encontradas, uma encontrada no gene *UBXN1* (domínio 1 da proteína do UBX; c. G686A, p. Thr229Met). A *UBXN1* é um receptor celular para a auto-ubiquitinação do câncer de mama do tipo 1 (*BRCA1*), que é um supressor de tumor associado ao câncer de mama e ovário, com caráter hereditário. Uma das funções do *BRCA1* é a inibição da atividade da enzima ligase *BRCA1 E3*. Recentemente foi descoberto que a *UBXN1* pode diminuir a degradação da proteína endoplasmática associada ao retículo. Em contraste com a outra variante (*PRKCD*), não existe nenhum papel óbvio da variante em *UBXN1* na patogênese do paciente.

A segunda variante é uma mutação na região de *Splice* do gene *PRKCD* (protein kinase C delta; c.1352+1G>A; **Figura 14**). A partir desses dados, o candidato *PRKCD* foi considerado o único candidato plausível, uma vez que tem um papel bem definido na sinalização das células B (199, 200), além de que um estudo com ratos *knockout Prkcd*^{-/-} apresentam várias manifestações auto-imunes e

quadros de linfadenopatia generalizada (201). O modelo com camundongo também mostrou hiperproliferação dos linfócitos no baço, que se assemelha a síndrome linfoproliferativa autoimune (ALPS) (202).

Figura 14 - Mutação no gene do *PRKCD*. Após o sequenciamento do gene do *PRKCD*, a mutação no sítio de Splice foi confirmada a qual é homozigótica no paciente e heterozigótica no pai, em comparação com o controle saudável.

4.1.2.3 Análise funcional do *PRKCD*

Após a finalização da análise genética, com um gene candidato em potencial, iniciamos o estudo para descobrir as possíveis consequências que a deficiência do *PRKCD* pode estar trazendo para o paciente.

O *PRKCD* é um membro da família da Proteína Cinase C (PKC), tem a função crítica na regulação da sobrevivência celular, proliferação e apoptose (203). No contexto das células B, o *PRKCD* está envolvido na sinalização via BCR mediada por BTK e PLC γ 2 (199). Além dessas funções, o *PRKCD* também tem um papel importante na tolerância das células B. Camundongos *knockout Prkcd^{-/-}* apresentam um quadro de glomerulonefrite, esplenomegalia e linfadenopatia associada com a função defeituosa da autotolerância das células B aos auto-antígenos (203). A autoimunidade em camundongos *Prkcd^{-/-}* tem sido associada a defeitos na sinalização pró-apoptótica via ERK em células B durante seu desenvolvimento (204). Recentemente, mutações no PLC γ 2 foram associadas a imunodeficiência comum variável (CVID) com autoimunidade, destacando a importância desta via para a homeostase das células B (205, 206).

A análise por Western blot revelou ausência da proteína do *PRKCD* no paciente, e revelou também uma expressão diminuída no pai, que é heterozigoto para a mutação, quando comparado a um controle saudável (**Figura 15**). A baixa

expressão da proteína apresentada na amostra do pai, não parece ser suficiente para causar a doença, como os pais não apresentam características clínicas observadas no paciente.

Para avaliar as consequências funcionais da deficiência do PRKCD, a expressão do MARCKS (Substrato Miristoilada C-cinase rico em Alanina) foi estudada (207). A análise por Western Blot usando células B imortalizadas do paciente mostrou uma redução total dos níveis de MARCKS. Sabe-se que a fosforilação do MARCKS via aminoácido Ser167/170 é crítico para a translocação de MARCKS da membrana plasmática para o citoplasma, mediando a redução da proliferação celular (208). Assim a deficiência do phospho MARCKS pode estar relacionada com a proliferação dos linfócitos no paciente (208) (**Figura 16**).

A fosforilação da NF-IL6 em Ser240 é mediada pelo PRKCD, contudo a capacidade de ligação do DNA ao NF-IL6 é reduzida, reduzindo drasticamente assim a produção da IL6 (209). Deste modo, verificamos que o aumento dos níveis do RNAm dos genes *NF-IL6* e *IL6* no paciente após a estimulação com PMA (**Figura 17**), semelhante a hiperativação da sinalização de NF-IL6, observada nos camundongos *Prkcd*^{-/-} (201).

Aqui, nós descrevemos um paciente com deficiência no gene *PRKCD*, como uma nova imunodeficiência semelhante ao CVID. O paciente deste estudo apresenta características de alteração do sistema imunológico, incluindo linfoproliferação (esplenomegalia, linfadenopatia) e auto-imunidade (glomerulonefrite, síndrome antifosfolípida, policondrite recidivante) semelhante ao modelo murinho *knockout*. No entanto, a linfopenia de células B periféricas ou o defeito no *switch* de classes observadas no nosso paciente, não foram observados no modelo murinho.

Não pode ser excluída a possibilidade de a variante heterozigótica no gene *CTLA4* poder atuar como um fator de modificação da doença. Estudos futuros poderão caracterizar de forma mais abrangente o fenótipo clínico e imunológico em um coorte de pacientes com defeito no PRKCD e ainda poder descobrir mais sobre a fisiopatologia molecular da sinalização do PRKCD envolvendo a homeostase das células B e autoimunidade.

Figura 15 - Análise via Western Blot da proteína PRKCD. A análise da proteína revelou uma expressão ausente do produto proteico no paciente, em contraste o pai (heterozigótico) obteve uma quantidade menor do produto, em comparação com o controle saudável

Figura 16 - Análise via Western Blot da proteína MARCKS. A análise revelou uma diminuição drástica na fosforilação do pMARCKS, consequentemente uma diminuição do MARCKS no paciente, em comparação com o controle.

Figura 17 - Análise quantitativa via Real Time PCR. Análise quantitativa mostrou hiperativação da sinalização da NF-IL6 após 12 horas de estimulação com PMA, indicado pelo aumento dos níveis de RNAm de NF-IL6 e IL-6, respectivamente.

4.2 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 2 e Paciente 3 (P2 e P3)

4.2.1 Caracterização clínica dos P2 e P3

Neste estudo, apresentamos dois pacientes (P2 e P3), primos de primeiro grau, de origem turca, onde apresentam característica clínica de imunodeficiência combinada com infecções recorrentes, infecções bacterianas e virais severas, e infecção por *Cryptosporidium* (**Tabela 9**).

A paciente 2 (P2) é uma menina de 9 anos de idade, filho de pais consanguíneos saudáveis (**Figura 18**). A paciente tinha um irmão mais novo que morreu com 2 anos de idade, após os médicos suspeitarem de que o paciente se tratava de um paciente com imunodeficiência combinada. A paciente apresentou diminuição dos níveis de IgG e IgA, e níveis elevados de IgM (**Tabela 10**). Infecção pelo vírus citomegalovírus (CMV) foi detectada por PCR e *Cryptosporidium* foi detectada nas fezes (**Tabela 9**) da paciente. Essas infecções indicariam que a paciente apresenta um defeito no *Switch* de classes, no entanto, não foram encontradas mutações em nos genes *CD40*, *CD40L* ou *IL21R*. Apesar de todos os tratamentos, incluindo o tratamento intravenoso com IVIg e ganciclovir, a paciente continuou a sofrer com episódios repetidos de infecções virais e bacterianas, inclusive apresentou um episódio de hepatite granulomatosa e tuberculose osteomielite, devido à disseminação após a vacinação com BCG (Bacillus Calmette Guérin). Um transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas (TCTH) foi realizada aos quando a paciente tinha 9 anos de idade. Ela permanece clinicamente bem (Ikincioğulları, Küpesiz, dados não publicados).

A paciente 3 (P3) é prima de primeiro grau da P2 também nascida de pais com origem consanguínea, saudáveis (**Figura 18**). Ela apresentava infecções recorrentes do trato respiratório inferior, candidíase oral e esofágica e severa diarreia crônica resistente a budesonida-mesalazine (**Figura 19**). Essa paciente também era positiva para *Cryptosporidium* (**Tabela 9**). Mais tarde, ela também desenvolveu colestase com deterioração da função hepática. Sua mãe apresentava o HLA idêntico ao da paciente e foi selecionada para ser a doadora de medula óssea, aos 3 anos de idade. Como esta paciente não sofreu o condicionamento que é realizado antes do transplante, nenhum enxerto foi observado 50 dias após o primeiro transplante. Um segundo transplante então foi realizado a partir do mesmo doador, mas a paciente faleceu 6 dias após o segundo transplante, devido a choque

séptico e falência de múltiplos órgãos (İkinciogulları, Küpesiz, dados não publicados).

Figura 18 - Heredograma do P2 e P3. Completo pedigree da família estudada mostrando as 5 gerações que antecedem os pacientes. Importante observar que ambos os pacientes vem de uma família com história de consanguinidade em primeiro grau.

Figura 19 - Lesões gastrointestinais no P3. Endoscopia revelou lesões gastrointestinais no P3. As duas figuras superiores e a inferior do lado esquerdo

mostra uma lesão aftosa no estômago e duodeno (seta amarela). A figura inferior do lado direito mostra lesões hemorrágicas (seta vermelha).

Tabela 9 - Infecções recorrentes que os P2 e P3 apresentaram durante sua vida.

Idade	Paciente 2				Paciente 3			
	7a	9a	1a3m	1a9m	2a5m	2a9m	3a	3a8m
Cryptosporidium (fezes)	Pos.	Pos.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Pos.	Neg.
Giardia	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Rotavírus	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Adenovírus	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
CMV	Pos.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Pos.	Neg.
HIV	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Neg.	ND
Anti HB	ND	ND	Neg.	ND	ND	ND	ND	ND
Isohemagglutini na Anti B	Grupo sanguíneo: AB	ND	ND	ND	ND	Anti A: 1/32+, Anti B: 1/16+	ND	ND

CMV, Citomegalovirus; HIV, Vírus da Imunodeficiência Humana; Pos., Positivo; Neg., Negativo.

Tabela 10 - Valores dos níveis de imunoglobulinas dos P2 e P3. Os valores de referência estão representados entre parênteses.

Referência: todos representados entre parênteses:						
Níveis das Imunoglobulinas		Paciente 2			Paciente 3	
Idade	10m	7a	9a	1a3m	1a9m	2a5m
IgG (mg/dL)	120	914*	1200	714	1130	1300
	(300-1000)	(600–1300)	(600–1300)	(350–1000)	(350–1000)	(500-1300)
IgM (mg/dL)	72.8	205	20.4	46.9	23.8	20.4
	(30-100)	(40–160)	(40–160)	(40–140)	(40–140)	(40–180)
IgA (mg/dL)	13.5	24.9	<0.05	23.6	6.3	16.7
	(30-140)	(60–220)	(60–220)	(30–120)	(30–120)	(40–180)

*, Em tratamento com IVIg.

4.2.2 Identificação da mutação no gene *MAP3K14*

Investigamos P2 e P3 para possíveis mutações nos genes que acarretam um defeito no *Switch* de classes (CSR), incluindo os genes *CD40*, *CD40L* e *PIK3CD* (210, 211) e nenhuma mutação foi encontrada.

Avaliação imunológica em ambos os pacientes afetados revelou diminuição dos níveis de imunoglobulina (**Tabela 10**) e diminuição do número de células B e células NK, enquanto os números de células T estavam dentro dos limites normais em comparação com o valor de referência por idade (**Tabela 11**).

Com a diminuição dos níveis de imunoglobulina e os números de células B, suspeitamos de que os pacientes apresentavam um comprometimento da função e desenvolvimento de células B. Analisamos então, via citometria de fluxo, a frequência relativa das populações de células B de memória $CD27^+$. Ambos os pacientes apresentaram uma redução relativa de células B $CD19^+$ totais no sangue periférico (**Figura 20**). Contagem de células revelou uma diminuição das células B no P3, enquanto o número de células B no P2 estavam normais, em comparação com o valor de referência por idade (**Tabela 11**).

Ambos os pacientes apresentaram uma diminuição das células B da zona marginal $CD19^+CD27^+IgD^+$, e das células B de memória que sofreram o *Switch* de classes $CD19^+CD27^+IgD^-$, quando comparado com o controle (195), sugerindo defeito nos estágios finais de desenvolvimento e ativação das células B (**Figura 20**).

Por conta da consanguinidade dos pacientes, estávamos esperando um defeito genético que tivesse uma herança autossômica recessiva. Para descobrirmos o defeito genético, aplicamos a técnica de mapeamento homozigótico em ambos os pacientes (**Figura 21 e Tabela 12**), combinado com o sequenciamento do exoma (ES) do P2 (**Figura 22**).

Variantes de nucleotídeo único (SNVs) e variantes de inserção/deleção (DIVs) resultantes do ES foram filtrados. Selecionamos somente as variações que estivessem dentro das regiões em homozigose, combinada em ambos os pacientes afetados. Após o sequenciamento e a validação dos possíveis candidatos, finalizamos com uma única variante homozigótica no gene *MAP3K14* (c.C1694G, p.Pro565Arg) localizado no cromossomo 17q21, presente em ambos os pacientes (**Figura 23**). É importante ressaltar, que essa é uma variante nova, ainda não descrita na literatura, portanto não foi encontrada no bancos de dados do dbSNPbuild137, 1000Genomes, ENSEMBL, UCSC, NCBI ou SVE.

O aminoácido Pro565 da NIK está localizado no domínio cinase da proteína (**Figura 24A**) e é altamente conservada ao longo da evolução (**Figura 24B**). A troca dos aminoácidos Prolina para Arginina nessa posição foi prevista como altamente deletéria, usando os algoritmos de previsão funcionais, Polyphen-2 e SIFT.

O receptor da família do $\text{TNF}\alpha$ é essencial para o funcionamento das células B em humanos e pode ser ilustrada por exemplo com pacientes deficientes de CD40L, CD40 e BAFFR (212). O gene *MAP3K14* é o gene codificador da proteína NIK, que é um componente integral na sinalização da via não canônica do NF- κ B (213). Estudos feitos em camundongos mutantes *aly* (214, 215) e em camundongos *Nik Knockout* (216) apresentam uma deficiência de células B levando a uma desorganização dos linfonodos, placas de Peyer e da arquitetura esplênica, acompanhada de linfopenia e baixos níveis de imunoglobulinas. Isso acontece, porque mecanismo de *Switch* de classes (CSR) e de hipermutação somática (SHM) estão comprometidas nesses pacientes (215).

Aqui nós identificamos uma mutação no gene *MAP3K14* que leva a uma perda de função da proteína NIK. Nós mostramos que a deficiência funcional de NIK em humanos recapitula fenótipos descritos nos estudos feitos em camundongos, incluindo linfopenia de células B, perda do funcionamento do CSR e SHM, diminuição das células B da zona marginal (MZ), das células B de memória, e hipogamaglobulinemia.

Figura 20 - Mutante NIK^{Pro565Arg} causa defeito de células B. A análise feita via citometria de fluxo mostra uma diminuição de células B CD19⁺, diminuição de células de memória que sofreram o Switch de classe IgD⁺CD27⁺ em ambos os pacientes (P2 e P3). Os experimentos foram feitos em triplicata realizadas de forma independente.

Figura 21 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico . SNP-array baseado em mapeamento homozigótico revelou vários intervalos candidatos entre os dois pacientes, incluindo um intervalo no cromossomo 17q21.

Figura 22 - Processo de filtragem dos dados obtidos pelo sequenciamento do exoma. Após a realização do sequenciamento do exoma, foram selecionados os hits que estavam dentro dos intervalos homozigóticos do paciente. Após várias filtragens e validações, sobraram somente 1 SNV que segregou perfeitamente. SNVs, variantes e um único nucleotídeo. DIVs, deleções e inserções.

Figura 23 - Análise genética dos pacientes deficientes de NIK. Sequenciamento via *Sanger Sequencing* revelou uma mutação no gene *MAP3K14* (c. C1694G; p. Pro565Arg), em dois pacientes (P2 e P3), primos de primeiro grau. A segregação da variante demonstra que se trata de uma herança autossômica recessiva.

Figura 24 - Estudo da estrutura da proteína NIK. (A) Representação esquemática da proteína NIK com seus respectivos domínios. NRD, domínio de regulação negativa (em azul), domínio da cinase (em verde), NCR, região não catalítica (em cinza). O aminoácido mutado nos P2 e P3 está representado em vermelho. Em preto, estão representados as mutantes NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} e a mutante NIK^{Gly860Arg} (camundongo *aly/aly*). **(B)** O aminoácido Pro565 mutado nos nossos pacientes faz parte de regiões extremamente conservadas entre espécies e entre cinases. A marcação em vermelho representa o aminoácido Pro565 mutado nos P2 e P3.

Tabela 11 - Análise das subpopulações de linfócitos. Os valores de referencia obtidos por idade em números absolutos e relativos estão dentro dos parênteses.

Linfócitos	Paciente 2		Paciente 3					
	1000 / ul							
	%							
Idade	7a	9a	1a3m	1a9m	2a5m	2a9m	3a	3a8m
Células T CD3 ⁺	10.6	6.7	4.4	3.6	6.9	4.7	6.8	4.5
	(0.7-4.2) ¹	(0.7-4.2) ¹	(1.6-6.7) ¹	(1.4-8.0) ¹	(0.9-4.5) ¹	(0.9-4.5) ¹	(0.9-4.5) ¹	(0.9-4.5) ¹
	93	89	93	80	91	95	96	94
	(55-78) ¹	(55-78) ¹	(54-76) ¹	(39-73) ¹	(43-76) ¹	(43-76) ¹	(43-76) ¹	(43-76) ¹
Células Naive (CD45RA ⁺) CD3 ⁺	8.55	5.47	4.32	4.00	6.84	4.95	6.10	3.02
	(1.0-6.7) ²	(1.0-6.7) ²	(1.8-4.2) ²	(1.8-4.2) ²	(0.8-4.4) ²	(0.8-4.4) ²	(0.8-4.4) ²	(0.8-4.4) ²
	75	72	90	87	90	99	86	63
	(61-87) ²	(61-87) ²	(82-94) ²	(82-94) ²	(72-97) ²	(72-97) ²	(72-97) ²	(72-97) ²

Células de Memória (CD45RO⁺) CD3⁺ T cells	2.96 (0.5-2.0) ² 26 (14-44) ²	2.20 (0.5-2.0) ² 29 (14-44) ²	0.480 (0.4-3.3) ² 10 (9-45) ²	0.644 (0.4-3.3) ² 14 (9-45) ²	0.760 (0.4-1.6) ² 10 (16-38) ²	1.35 (0.4-1.6) ² 27 (16-38) ²	0.994 (0.4-1.6) ² 14 (16-38) ²	1.48 (0.4-1.6) ² 31 (16-38) ²
Células CD3⁺HLA⁺DR⁺	0.684 (0.05-0.7) ¹ 6 (3-14) ¹	0.988 (0.05-0.7) ¹ 13 (3-14) ¹	0.192 (0.1-0.6) ¹ 4 (2-8) ¹	0.506 (0.1-0.7) ¹ 11 (3-12) ¹	7.140 (0.08-0.4) ¹ 94 (3-13) ¹	0.350 (0.08-0.4) ¹ 7 (3-13) ¹	0.284 (0.08-0.4) ¹ 4 (3-13) ¹	0.336 (0.08-0.4) ¹ 7 (3-13) ¹
Células T CD3⁺CD4⁺	8.6 (0.5-2.7) ² 76 (24-47) ²	5.0 (0.5-2.7) ² 66 (24-47) ²	3.0 (0.7-4.5) ² 63 (29-55) ²	2.3 (0.7-4.5) ² 52 (29-55) ²	4.7 (0.6-2.0) ² 63 (26-49) ²	3.8 (0.6-2.0) ² 76 (26-49) ²	4.4 (0.6-2.0) ² 63 (26-49) ²	3.0 (0.6-2.0) ² 63 (26-49) ²
Células Naive (CD45RA⁺) T CD4⁺	6.2 (0.3-2.4) ² 55 (17-40) ²	3.8 (0.3-2.4) ² 50 (17-40) ²	1.48 (0.5-4.2) ² 55 (19-49) ²	1.93 (0.5-4.2) ² 42 (19-49) ²	4.25 (0.5-6.6) ² 56 (20-41) ²	2.4 (0.5-6.6) ² 48 (20-41) ²	3.69 (0.5-6.6) ² 52 (20-41) ²	ND
Células de Memória (CD45RO⁺) T CD4⁺	2.7 (0.2-1.0) ² 24 (9-23) ²	1.2 (0.2-1.0) ² 16 (9-23) ²	0.568 (0.2-1.4) ² 8 (5-18) ²	0.552 (0.2-1.4) ² 12 (5-18) ²	0.76 (0.2-0.8) ² 10 (8-42) ²	1.3 (0.2-0.8) ² 26 (8-42) ²	0.923 (0.2-0.8) ² 13 (8-42) ²	ND
Células T CD3⁺CD8⁺	2.1 (0.3-1.8) ¹ 19 (19-34) ¹	2.0 (0.3-1.8) ¹ 27 (19-34) ¹	1.5 (0.4-2.1) ¹ 31 (12-28) ¹	1.2 (0.4-2.3) ¹ 28 (11-32) ¹	1.9 (0.3-1.6) ¹ 25 (14-33) ¹	1.00 (0.3-1.6) ¹ 20 (14-33) ¹	2.6 (0.3-1.6) ¹ 29 (14-33) ¹	1.4 (0.3-1.6) ¹ 29 (14-33) ¹
TCR$\gamma\delta$	114 1	152 2	48 1	46 1	76 1	ND	ND	ND
Células B CD19⁺	0.342 (10-27) ² 3 (0.2-2.2) ²	0.228 (10-27) ² 3 (0.2-2.2) ²	0.096 (0.5-3.6) ² 2 (17-41) ²	0.322 (0.5-3.6) ² 7 (17-41) ²	0.228 (0.3-1.2) ² 1 (11-31) ²	0.100 (0.3-1.2) ² 2 (11-31) ²	0.099 (0.3-1.2) ² 1,4 (11-31) ²	0.01 (0.3-1.2) ² 0,2 (11-31) ²
Células B CD20⁺	0.456 (0.2-2.0) ² 4 (11-25) ²	3 (11-25) ²	0.096 (0.5-3.3) ² 2 (16-41) ²	0.368 (0.5-3.3) ² 8 (16-41) ²	0.228 (0.0-1.1) ² 1 (11-29) ²	0.100 (0.0-1.1) ² 2 (11-29) ²	0.078 (0.0-1.1) ² 1,1 (11-29) ²	0.0048 (0.0-1.1) ² 0,1 (11-29) ²
Células NK CD3⁻ CD16⁺CD56⁺	0.114 (0.2-0.9) ² 1 (8-28) ²	0.076 (0.2-0.9) ² 1 (8-28) ²	0.144 (0.2-1.3) ² 3 (4-15) ²	0.460 (0.2-1.3) ² 10 (4-15) ²	0.304 (0.2-1.2) ² 4 (5-28) ²	0.075 (0.2-1.2) ² 1,5 (5-28) ²	0.142 (0.2-1.2) ² 2 (5-28) ²	0.096 (0.2-1.2) ² 2 (5-28) ²

¹ (217)² (218)

Tabela 12 - Mapeamento homozigótico. Apresentamos os intervalos homozigóticos em comum nos P2 e P3. Em cinza evidenciamos a região em que se localiza o gene *MAP3K14*.

Cromossomo	Posição	Posição	Posição
------------	---------	---------	---------

15	44.38-44.59	rs17583428	rs12594645
15	72.45-73.12	rs2959944	rs2053854
17	43.05-43.28	rs17547180	rs17686001
17	43.83-44.85	rs6503447	rs199515
17	46.58-47.19	rs4793882	rs11653468
17	50.01-51.77	rs203090	rs9899373

4.2.3 Efeito do NIK^{Pro565Arg} na função cinase da proteína.

O aminoácido Pro565 faz parte do motivo APE dentro de uma hélice no segmento de ativação da cinase (219). Este motivo do NIK é super conservado em vários filos vertebrados (**Figura 24B**). A mudança do aminoácido conformacionalmente rígido, não polar, como aconteceu com a nossa proteína NIK^{Pro565Arg} pode impactar na conformação e função da proteína. A ferramenta de análise de estabilidade da proteína CUPSAT previu que a estabilidade global da NIK^{Pro565Arg} pode estar comprometida (**Tabela 13**). A simulação dos modelos NIK^{wild-type} e NIK^{Pro565Arg} revelou mudanças conformacionais no domínio cinase. Notavelmente, foi possível observar que o resíduo Thr559 é responsável pela formação de uma ligação de hidrogênio com o resíduo Lys517 no laço catalítico da proteína (**Figura 24A**) mas uma mutação no aminoácido Thr559 pode reduzir a ativação da cinase (220, 221). Na simulação do modelo NIK^{wild-type}, o aminoácido Pro565 permanece no interior da proteína, o que permite a formação das ligações de hidrogênio entre os aminoácidos Lys517 e Thr559 (**Figura 25A**). Na simulação do modelo NIK^{Pro565Arg}, o resíduo de arginina mutado sofre transições em direção a superfície da proteína, aumentando o contato e a reposição das hélices adjacentes. Na simulação, o aminoácido Arg565 impede que o aminoácido Thr559 forme uma ponte de hidrogênio com o aminoácido Lys517, emperrando na atividade do domínio cinase do NIK (**Figura 25B-C**). Para avaliar experimentalmente o efeito da mutação e para testar a fosforilação dependente do NIK-IKKa, analisamos a atividade da cinase de NIK^{Pro565Arg} em comparação com o NIK^{wild-type} e o mutante com a porção catalítica inativa NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} (222). NIK^{wild-type}, mas não NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} ou NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg}, expressas de forma recombinante em células HEK293T, puderam fosforilar e co-espressar IKK α endogenamente em células (**Figura 26A-B**).

Esses dados demonstram que NIK^{Pro565Arg} representa uma mutação com perda de função da atividade cinase da proteína.

Figura 25 - NIK^{Pro565Arg} é estruturalmente alterado e tem a região catalítica não funciona. (A) Predição da estrutura de NIK^{wild-type} via simulação da dinâmica molecular. Os resíduos Pro565, Thr559 e Lys517 estão apresentados como barras e esferas moleculares transparentes. A linha tracejada representa a ligação de hidrogênio entre os resíduos Lys517 e Thr559. (B) Predição da estrutura de NIK^{Pro565Arg} via simulação da dinâmica molecular. O resíduo Arg565 é apresentado como barras e esferas moleculares (violeta). (C) Simulação da dinâmica molecular de NIK^{wild-type} e NIK^{Pro565Arg}. O ângulo dos resíduos Thr559-CA, Th559-CM e Lys517-CM inicialmente se mantém constante próxima dos 150° (próximos do valor observado na estrutura de NIK^{wild-type}), mas após 10 minutos rapidamente faz a transição para 90° (por conta de uma ligação de hidrogênio desfavorável) na simulação de NIK^{Pro565Arg}. CA, alfa de carbono; CM, centro de massa da cadeia lateral.

Figura 26 - Análise da atividade cinase da proteína NIK expressas em células HEK293. O inserto NIK^{wild-type}, NIK^{Pro565Arg} ou NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} marcados com MYC foram transfectadas em células HEK293 marcados com HA-IKKα. O western blot foi revelado com os anticorpos primários anti-MYC (para detectar MYC-NIK), anti-HA (para detectar IKKα-HA), anti-IKKα, anti-fosfo-IKKα e anti-GAPDH (controle). As barras em cinza representam as recombinantes NIK e IKKα.

Tabela 13 - Ferramenta de predição da estabilidade proteica (CUPSAT). Análise do algoritmo via CUPSAT (<http://cupsat.tubs.de/jsp/nmrpredict.jsp>) usando como base a estrutura da proteína NIK (4G3D.PDB). A predição da mutação presente nos P2 e P3 estão marcadas em cinza (Pro565Arg).

Predição dos aminoácidos			
Aminoácidos	Estabilidade global	Torsão	Predição $\Delta\Delta G$ (kcal/mol)
GLY	Estabilizando	Não favorável	0.65
ALA	Estabilizando	Favorável	2.59
VAL	Estabilizando	Não favorável	2.59
LEU	Estabilizando	Favorável	3.84
ILE	Estabilizando	Não favorável	3.01
MET	Estabilizando	Favorável	3.44
TRP	Estabilizando	Não favorável	1.53
SER	Estabilizando	Não favorável	0.29

THR	Desestabilizando	Não favorável	0.42
PHE	Estabilizando	Não favorável	3.94
GLN	Desestabilizando	Favorável	0.46
LYS	Desestabilizando	Favorável	4.59
TYR	Estabilizando	Não favorável	1.16
ASN	Desestabilizando	Não favorável	0.94
CYS	Estabilizando	Não favorável	1.86
GLU	Desestabilizando	Favorável	0.56
ASP	Desestabilizando	Não favorável	2.08
ARG	Desestabilizando	Favorável	2.07
HIS	Desestabilizando	Não favorável	2.88

4.2.4 Vias de sinalização canônica e não-canônica do NF- κ B

O processamento do p100 em p52 e a translocação do complexo p52/RelB para o núcleo é um passo essencial, dependente da ativação do NIK (223). Decidimos então estudar a atividade das vias canônicas e não canônicas do NF- κ B em resposta a ativação com BAFF e LT β , respectivamente. Utilizamos uma linha celular derivada das células B do paciente imortalizada com o vírus Epstein-Barr (B-LCL). O nível total de proteína do NIK em células B-LCL não foi afetada, no entanto os níveis da IKK α estavam elevados e os níveis de p100 estavam acumuladas antes mesmo da estimulação mediada pela ligação do nosso estímulo BAFF e o receptor de BAFF (BAFFR), possivelmente refletindo a pré-ativação da via do NF- κ B nas células B-LCL pelas proteínas virais (224). Apesar da proteína p100 estar acumulada, os níveis de p52 estavam reduzidos (**Figura 27A**), resultando em menos translocação de p52/RelB para o núcleo nas células B-LCL do paciente, o que demonstra a insuficiência funcional da via não canônica do NF- κ B (**Figura 27B**). Em seguida, testamos o efeito de NIK^{Pro565Arg} na ativação a via do NF- κ B usando LT β como estímulo. A LT β é estritamente dependente de NIK (225) e pode ativar a sinalização da via não canônica do NF- κ B, bem como o complexo IKK α -IKK β -NEMO que media a translocação nuclear da via canônica do NF- κ B (226). A estimulação

dos fibroblastos derivados do paciente realizada com $\text{TNF}\alpha$, ativador da via canônica do NF- κ B independente de NIK levou a uma rápida degradação do $\text{I}\kappa\text{B}\alpha$, marcando assim a ativação e consequente sinalização da via canônica do NF- κ B (**Figura 27C**). Em contraste, as células do paciente, após estimulação com $\text{LT}\beta$, falhou ao induzir a degradação do $\text{I}\kappa\text{B}\alpha$ (**Figura 27D**). Para confirmar esses dados, realizamos um ensaio de imunofluorescência que confirma o defeito na translocação nuclear do p52 e p50, após estimulação com $\text{LT}\beta$ (**Figura 28A e B**).

Para demonstrar que a variante $\text{NIK}^{\text{Pro565Arg}}$ é mesmo causadora da deficiência da sinalização via não canônica do NF- κ B, realizamos um ensaio de transferência do gene *MAP3K14* via retrovírus para o fibroblasto dos pacientes. A expressão do $\text{NIK}^{\text{wild-type}}$ reativou a sinalização via não canônica do NF- κ B, mostrando como produto final a translocação do p52 para o núcleo (**Figura 28C e D**), demonstrando que a presença da proteína NIK é um fator limitante para a ativação do p100. Embora NIK possa ter uma função independente do $\text{IKK}\alpha$ (227), a função principal da proteína compreende na atividade catalítica como uma cinase e ativando a sinalização da cascata que leva a uma translocação do NF- κ B para o núcleo. Como a mutante $\text{NIK}^{\text{Pro565Arg}}$ tem sua função catalítica inativa, consequentemente, tem suas funções prejudicadas. Dessa forma confirmamos o fenótipo que o paciente apresenta.

4.2.5 Redução da sobrevivência de células B maduras

Sabe-se que camundongos *knockout* para *MAP3K14* (216) e o *aly* mouse (214, 215) apresentam uma redução no número de células B maduras e uma redução das imunoglobulinas séricas, resultado em um defeito na resposta humoral e celular. Em adição, a sinalização via não canônica do NF- κ B medida por NIK controla o mecanismo de *Switch* de classes (CSR), em particular, controla o *Switch* para o isotipo IgA (228). Assim, nossos pacientes, portadores da variante $\text{NIK}^{\text{Pro565Arg}}$ apresentam uma severa redução no número total de células B e uma geração defeituosa de células B de memória que sofreram o *Switch* de classes ($\text{IgD}^-\text{CD27}^+$) (**Figura 20**), levando a uma redução crônica dos níveis de IgA em ambos os paciente e uma redução dos níveis de IgG no P2 (**Tabela 10**), levando-o a administrar IVIg. Essas informações nos levou a investigar se NIK está envolvido

com CSR e SHM, processos essenciais para a geração de anticorpos de alta afinidade.

Para entender melhor o processo de SHM nas células B, nós analisamos a frequência de mutações nos genes das nas regiões variáveis da cadeia pesada da imunoglobulina (*IGHV*), por clonagem e sequenciamento do *IGHV3* e *IGHV4*, reorganizados em famílias de genes, ambos são cadeias g- e a- dos transcritos das imunoglobulinas ($C\gamma$ e $C\alpha$). A porcentagem das mutações analisadas dentro das regiões *IGHV* foram significativamente reduzidas nos pacientes NIK^{Pro565Arg} em comparação com os controles saudáveis da mesma idade, mas não foi tão grave quando comparado com pacientes deficientes do CD40L, que mostraram completa ausência de mutações no *IGHV* $C\alpha$ e $C\gamma$ (**Figura 29A**) (229).

Em seguida, nós investigamos a capacidade de ativação e hipermutação somática das células B dos pacientes, estimulando as células PBMC com uma variedade de estímulos. As células B dos pacientes foram capazes de responder a estimulação via CD40L e IL-4 por conta da regulação via CD95, CD69 e CD86 (**Figura 29B**). Notavelmente, as células B dos pacientes foram capazes de se auto-regular positivamente via CD25, sugerindo assim uma sobrevivência e proliferação emperrada, mediada por IL-2. Como as células B dos pacientes foram amplamente capazes de regular positivamente os marcadores acima citados, testamos ainda mais sua capacidade de proliferação e de sofrer CSR em resposta ao estímulos CD40L e IL4. De fato, nós observamos o crescimento progressivo da porcentagem negativa de DAPI nas células do paciente (**Figura 31A e B**) ao longo dos 9 dias, de acordo com a ativação e proliferação de células após estimulação com CD40L e IL-4 (230). Além disso, as células B dos pacientes sofreram o *Switch* para IgG *in vitro*, mesmo com uma redução no dia 6 em comparação com o controle (**Figura 29C**), provavelmente devido a proliferação tardia dos linfócitos (**Figura 31A e B**). Concomitante a consequência proliferativa dos linfócitos no dia 9, o *Switch* para IgG foi restaurando para níveis comparáveis com as células do controle (**Figura 31C**). As células B dos pacientes não proliferaram *in vitro* após estimulação com CD40L e IL-21 (**Figura 30 A e B; Figura 31**), apesar da expressão intacta do receptor da IL-21 nas células B dos pacientes, nem após estimulação *in vitro* com anti-IgM/CpG ou anti-IgM/CpG/BAFF-Fc (**Figura 31C e D**). Esses dados mostram a inabilidade das células B dos pacientes em responder quando estimulamos BCR, TLR9, IL-21 e/ou BAFFR. Somente a estimulação usando CD40L e IL-4, conhecida por mediar a

sobrevivência e proliferação das células B (231, 232), poderia induzir a proliferação dessas células, o que sugere que NIK intacto é necessário para transmitir os sinais essenciais para a sobrevivência e proliferação das células B maduras ativadas.

Dada a sobreposição parcial do fenótipo de pacientes com defeito no NIK e defeito no receptor do CD21 (233, 234) (colite, susceptibilidade a infecção pelo *Cryptosporidium*, hipogamaglobulinemia e diminuição no número de células B que sofreram o *Switch* de classes, defeito na proliferação de células T antígeno específico e danificada citotoxicidade das células NK), nós fomos verificar o envolvimento de NIK na sinalização das células B mediada por IL21. De fato, enquanto a sinalização clássica via fosforilação do STAT3 foi facilmente observada após estimulação de células B com IL21, nenhuma ativação do processamento de p100 foi detectado (**Figura 32**).

Como NIK é um componente integral da via não canônica do NF- κ B, dependente da estimulação via BAFFR, que desempenha um papel chave na sobrevivência de células B maduras (235), nós fomos investigar se a deficiência funcional de NIK se assemelha com fenótipos encontrados nos pacientes deficientes de BAFFR (236, 237). Semelhante ao achado no camundongo *BAFFR*^{-/-} (237), as células B de ambos os pacientes mostraram uma diminuição da expressão do CD21 na superfície das células, envolvido na sinalização da sobrevivência das células B (238) (**Figura 33A**). Essa observação nos levou a investigar se a mutação do paciente afeta a expressão de genes anti-apoptóticos como *BCL2*, *BCL2L1*, *MCL1* via Real Time PCR em células B maduras previamente selecionadas para os marcadores CD19⁺IgD⁺CD27⁻. De todos os genes testados, a expressão de *BCL2* foi diminuída nos linfócitos B *naïve* quando comparado com a expressão do pai heterozigoto para a mutação e com um controle saudável (**Figura 33B e C**). Para excluir que NIK diminui a expressão do BAFFR, nós analisamos os níveis de BAFFR na superfície das células PBMCs por citometria de fluxo, após estimulada com CD40L e IL-4 por 9 dias. A expressão de BAFFR nas células do P2 foi comparável com as células B do controle parental e do controle saudável (**Figura 33D**).

Pacientes deficientes de BAFFR mostram um bloqueio parcial no estágio do desenvolvimento das células B transitórias CD19⁺CD21^{low/intermediate} (236). Porque os nossos pacientes também apresentaram uma diminuição das células CD19⁺CD21^{low/intermediate}, nós decidimos testar a expressão das células transitórias usando os marcadores IgM, CD10, CD38 e CD5. As células B transitórias

(definidas como $CD19^+IgM^{hi}IgD^+$ e $CD19^+CD23^-CD27^-CD5^+IgM^{hi}$, respectivamente) estavam aumentadas, em particular a população de células transicionais T2 ($CD19^+CD38^+CD10^-$), indicando um bloqueio parcial na maturação das células B (**Figura 34A e B**). Resumindo, a mutante $NIK^{Pro565Arg}$ causa um bloqueio parcial no desenvolvimento das células B entre os estágios das células B transicionais e as células B *naïve*, acompanhado pela diminuição da sobrevivência das células B maduras.

Figura 27 - Defeito na via canônica e não canônica do NF-κB. (A) Western Blot realizado com células B-LCL estimuladas com hBAFF. Células B-LCL dos P2, P3 e controle saudável foram usadas. As membranas foram marcadas com os anticorpos anti-NIK, anti-IKKα, anti-p100/p52 e o controle anti-GAPDH. **(B)** Western Blot realizado com células B-LCL estimuladas com hBAFF. Extrato nuclear extraído das células B-LCL dos P2, P3 e controle saudável foram usadas. As membranas foram marcadas com os anticorpos anti-p100/p52 e anti-RCC1 como controle de proteína nuclear. **(C)** Western Blot realizados com o extrato da proteína total dos fibroblastos do P2 e do controle saudável após a estimulação com TNFα. As membranas foram marcadas com anti-IKKβ, anti-IκBα, anti-p105/p50 e anti-GAPDH. **(D)** Western Blot realizado com o lisado dos fibroblastos, extraído do P2 e do controle saudável, após estimulação com LTβ. As membranas foram marcadas com anti-IKKβ, anti-IκBα, anti-p105/p50 e o controle anti-GAPDH.

Figura 28 - Defeito na translocação para o núcleo de componentes chave das vias canônicas e não canônicas do NF-κB. (A, B) Análise da imunofluorescência realizada com fibroblastos do P3 e do controle saudável após estimulação com LTβ e marcação com DAPI, **(A)** anti-p100/p52 e **(B)** anti-p105/p50. **(C)** Análise da imunofluorescência do fibroblasto do P2 e do controle saudável após transdução de um vetor retroviral contendo *MAP3K14* ou um vetor vazio, ambos expressando GFP. As células foram marcadas com DAPI, anti-GFP e anti-p100/p52. **(D)** Quantificação translocação do componente p52 para o núcleo, do experimento realizado na letra C. Selecionamos somente as células GFP positivas (representam as células transduzidas com *MAP3K14* ou com o vetor vazio) para a quantificação.

Figura 29 - Fenótipo das células B. (A) A análise da frequência de mutações nos genes das nas regiões variáveis da cadeia pesada da imunoglobulina (*IGHV*) G e A nos pacientes e controles saudáveis. As sequências analisadas de ambos os pacientes estão representadas no mesmo gráfico. O número de sequências

analisadas estão representados em parênteses. **(B)** Análise da expressão por citometria de fluxo dos marcadores CD86, CD95, CD25 e CD69 um dia após estimulação com CD40L e IL-4 *in vitro*. Representativo de três independente experimentos. **(C)** Análise da expressão do *Switch* de classes, com os marcadores IgG e IgA nos dias 6 e 9 após estimulação *in vitro* com CD40L e IL-4.

Figura 30 - Imunofenotipagem das células B. (A) Proliferação dos linfócitos *in vitro* após estimulação com CD40L e IL-12 ou CD40 e IL-4. **(B)** Expressão do IL21R em células B CD19⁺ extraído de sangue total dos controles, parentes (II-3 e II-4) e paciente (I-3).

A

B

Figura 31. Estimulação *in vitro* de células mononucleares. (A) Análise via citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com CD40L e IL-4. Painel superior: porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P3 após 3, 6 e 9 dias de cultura. Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas células marcadas com DAPI. (B) Análise via citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com CD40L e IL-21. Painel superior: porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P2 após 3, 6 e 9 dias de cultura. Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas células marcadas com DAPI. (C) Análise via citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com anti-IgM e CpG. Painel superior: porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P2 após 3, 6 e 9 dias de cultura. Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas células marcadas com DAPI. (D) Análise via citometria de fluxo dos linfócitos pós estimulação com anti-IgM, CpG e BAFF-Fc. Painel superior: porcentagem de DAPI nas células dos parentes e P2 após 3, 6 e 9 dias de cultura. Painel inferior: Gate indica porcentagem da proliferação nas células marcadas com DAPI.

Figura 32 - Western Blot para avaliar a expressão de IL21 nas células B. Western Blot foi realizado com o extrato celular de células B de controle saudável, selecionadas por citometria de fluxo após estimulação com IL-21 e CD40L ou BAFF e CD40L. As membranas foram marcadas com anti-STAT3 e anti-fosfo-STAT3, e com o anti-p100/p52, componente da via não canônica do NF- κ B e com o controle endógeno anti-GAPDH.

Figura 33 - Análise da sobrevivência das células B. **(A)** Análise via citometria de fluxo da expressão do CD21 nas células B CD19⁺ nos controles (cinza preenchido), P2 (linha cinza) e P3 (linha preta). **(B)** Análise da expressão do BCL2 via Real Time-PCR, em cDNA extraído de células B selecionadas via citometria de fluxo. A expressão dos transcritos de BCL2 foi normalizada com a comparação da expressão do controle GAPDH. **(C)** Análise da expressão dos genes MCL1 e BCL2L1 via Real Time-PCR em células B naïve. A expressão dos transcritos foi normalizada de acordo com a expressão do controle GAPDH. **(D)** Análise bi-dimensional da expressão de BAFF-R e CD19 em linfócitos após estimulação com CD40L e IL-4 por 9 dias. MFI, intensidade de fluorescência da expressão de BAFF-R em células B CD19⁺.

Figura 34 - Análise das subpopulações de células B. (A) Análise via citometria de fluxo das células B CD19⁺ transitórias. Porcentagem relativa da população das células B transitórias definidas como células B transitórias totais (IgM^{hi}IgD^{hi}), células B transitórias T1 (CD38⁺CD10⁺) e células B transitórias T2 (CD38⁺CD10⁻) no controle saudável, mãe (II-4) e pacientes (I-2 e I-3). **(B)** Análise via citometria de fluxo das células B CD19⁺ transitórias, mostram uma diminuição de células CD27⁺CD23⁻ no P2 em comparação com o controle saudável, e aumento das células CD19⁺CD23⁻CD27⁻CD5⁺IgM^{hi} no P2 em comparação com o controle saudável.

4.2.6 Aberrante fenótipo das células T

Por se tratar de uma nova imunodeficiência, decidimos estudar todos os tipos celulares do sistema imunológico. Vimos que o efeito da mutante NIK^{Pro565Arg} não afeta as células T CD3⁺CD4⁺ e as T CD3⁺CD8⁺ (**Figura 35A**), não afeta o repertório do TCR V β (**Figura 36**) e não afeta as células Treg (**Figura 35B**). Para a realização da avaliação proliferativa das células T, estimulamos células PBMCs com os estímulos OKT3, PMA, SEA, SEB ou PHA conforme protocolo, nenhuma alteração na resposta proliferativa das células T foram observadas (**Figura 37A**). Em contraste, quando estimulamos com os antígenos específicos anti toxina tetânica (TT) ou derivado proteico purificado (PPD) de *M. Tuberculosis*, observamos que a resposta a proliferação das células T contra esses antígenos específicos estava severamente reduzida (**Figura 37B**), apesar dos pacientes já terem sido vacinados contra tétano e BCG. Essas observações nos levaram a avaliar a presença de subpopulações de células T *naïve* e T de memória em ambos os pacientes.

A proporção relativa das células T CD4⁺ efetora de memória (T_{EM}) (marcadores CD4⁺CD45RA⁻CDR7⁻ ou CD4⁺CD45RA⁻CD27⁻) foram comparáveis entre os pacientes e os controles, de acordo com o valor de referência por idade (239) (**Figura 35C e D; Tabela 11**). Os números relativos das células T CD8⁺ de memória em ambos os pacientes também foram normais quando comparados com o valor de referência por idade (239). No entanto, P2 exibiu uma expansão extraordinária das células T CD8⁺ T_{EM} e células T efetora de memória terminalmente diferenciadas (T_{EMRA}, identificadas como T CD8⁺CD45RA⁺CCR7⁻ ou CD8⁺CD45RA⁺CD27⁻) (**Figura 35C e D**), possivelmente atribuída pela viremia persistente pelo *citomegalovírus* (CMV) em P2 (**Tabela 9**). Aumento da expressão da IL7R/CD127 em células T CD8⁺ mostra células de memória de longa vida (240). Similar com o comundongo deficiente de NIK (241), encontramos uma redução drástica na expressão do CD127 em células de memória T CD8⁺ T_{CM} de T CD8⁺ T_{EM} tanto no P2 quanto no P3 (**Figura 37C**), respondendo então o porque o P2 apresenta uma função das células de memória defeituosa e consequentemente a infecções virais mais frequentes (**Figura 35D e Tabela 9**).

A interação do co-receptor ICOS com ICOS ligante (ICOSL) é importante para a diferenciação das células T helper folicular (T_{HF}) e para respostas de memória tanto das células B quanto das células T (242). As células T_{HF} estão localizadas no

centro germinativo (CG) dos órgãos linfoides secundários onde interagem com as células B, ajudando na maturação e produção de anticorpos (230). O número de células T_{HF} estão reduzidas nos pacientes com deficiência de ICOS, nos com CVID e com defeitos do CD40 ou CD40L (230). Nós encontramos uma diminuição nas proporções das células T_{HF} (identificadas como $CXCR5^+CD45RA^-$) em ambos os pacientes comparado com um controle da mesma idade (**Figura 37D**). O desenvolvimento das células T_{HF} é dependente da expressão de ICOSL, controlando a expressão das células B via sinalização não canônica do NF- κ B (243). Nós hipotetizamos que o mutante $NIK^{Pro565Arg}$ causa uma redução da expressão do ICOSL, levando a uma geração de células T_{HF} prejudicada. Estimulamos PBMCs dos pacientes com CD40L por 36 horas e monitoramos a expressão do ICOSL por citometria de fluxo. As células B do paciente, controle parental e controle saudável responderam a estimulação feita com CD40L após a indução da expressão do CD69, contudo, enquanto as células dos dois controles puderam regular a expressão do ICOSL, as células do paciente falharam na regulação. Resumindo, o mutante $NIK^{Pro565Arg}$ apresentam um defeito na diferenciação das células T_{HF} e uma função dos subtipos de células T defeituoso.

Figura 35 - Imunofenotipagem das células T. (A) Células T helper ($CD3^+CD4^+$) e T citotóxico ($CD3^+CD8^+$) do P2 e do controle saudável. **(B)** Células T reg analisadas via expressão do Foxp3 selecionados nas células $CD3^+$ dos P2 e P3. **(C)** Células T de memória representadas pelas células T_{naive} $CD45RA^+CD27^+$ e $CD45RA^+CD45RO^-$, T_{CM} $CD45RA^-CD27^+$, T_{CM} $CD45RA^-CD27^-$, foram selecionadas através das células T helper (esquerda) e T citotóxica (direita). **(D)** Análise das células de memórias usando os marcadores CD45RA e CCR7 nas

células do controle e do P2 e P3. As células T_{naive} são definidas como $CD45RA^{+}CC7^{+}$, T_{CM} como $CD45RA^{-}CCR7^{+}$, T_{EM} definida como $CD45RA^{-}CCR7^{-}$, selecionada através das células T helper (superior) e T citotóxica (inferior).

Figura 36 - Análise da técnica de Spectratyping do TCR Vβ. Os pacientes (P2 e P3) mostram um repertório do TCR Vβ normal quando comparado com o controle. Cada segmento do gene Vβ analisado está sendo mostrado em seu respectivo histograma.

Figura 37 - Efeito de $\text{NIK}^{\text{Pro565Arg}}$ nas células T. (A) Resposta proliferativa das células T determinada pela incorporação da ^3H -timidina após estimulação com vários estímulos após 3 dias (OKT3 – anticorpo anti-CD3 clone OKT3, PMA – forbol 12-miristato 13-acetato, SEA – enterotoxina estafilocócica A, SEB - enterotoxina estafilocócica B, PHA - filoemaflutina) e (B) após 7 dias de estimulação com antígenos específicos da toxina tetânica (TT) e proteína purificada derivada do M. Tuberculosis (PPD). (C) Análise via citometria de fluxo da expressão do CD127 na população de células T_{naive} ($\text{CD8}^+ \text{CD45RA}^+ \text{CCR7}^+$), T_{CM} ($\text{CD8}^+ \text{CD45RA}^- \text{CCR7}^+$), T_{EM} ($\text{CD8}^+ \text{CD45RA}^- \text{CCR7}^-$), do controle (vermelho), P2 (laranjado) e P3 (azul). (D) Análise via citometria de fluxo das células T_{FH} ($\text{CD4}^+ \text{CXCR5}^+ \text{CD45RA}^-$). (E) Análise via citometria de fluxo dos marcadores CD69 e ICOSL são regulados após estimulação com CD40L nas células B. Células PBMCs do controle, pai ou P2 não estimuladas (cinza) ou estimuladas in vitro com CD40L por 36 h (preto).

4.2.7 Comprometimento das células NK

Além dos nossos pacientes apresentarem um defeito de células B e T, o número de células NK estão consistentemente baixas em ambos os pacientes (Tabela 11). Isso explica a infecção persistente pelo vírus CMV, na qual a defesa via células NK são essenciais. Essas informações nos levou a analisar detalhadamente a função de comportamento das células NK.

Ambos os pacientes, portadores da variantes NIK^{Pro565Arg}, tiveram um número baixo de células NK no sangue periférico, em particular P2 (**Figura 39A**). Apesar do número baixo, as células NK apresentam uma expressão normal dos marcadores de superfície como CD16, CD69, CD57 e NKG2C, essenciais para a função citotóxica da célula (**Figura 38**). Ambos, CD56^{bright} e CD56^{dim}, representam estágios subsequentes de desenvolvimento das células NK, estavam presentes (**Figura 38**). Além disso, os pacientes expressaram os marcadores associados com as fases pré-terminal de desenvolvimento das células NK, incluindo CD117, CD27, CD11a, KIR2DL4 e CD94, em comparação com o controle saudável (**Figura 38**). O marcador CD62L foi a única exceção, que teve sua expressão em menor proporção nas células NK dos pacientes (**Figura 39B**).

Pra determinar se as células NK presentes eram capazes de exercer sua função citolítica e a função de secreção de citocinas, foi realizada a ativação dessas células com PMA e ionomicina. Notavelmente, a produção de IFN γ e TNF foi diminuída nas células NK dos pacientes, comparação com as células do controle saudável (**Figura 39A**). Embora as células NK dos pacientes expressarem níveis comparáveis de perforina em comparação com células de controles saudáveis (**Figura 39**), essas células desgranulam com uma frequência significativamente menor, conforme medido pela expressão de CD107 α (LAMP1) na superfície da célula após estimulação (**Figura 39C**).

Para definir o potencial citolítico dessas células, avaliamos os componentes chave da citotoxicidade usando microscopia confocal. Células NK derivadas do paciente falharam ao acumular F-actina na fenda da sinapse imunológica (**Figura 39D e E**). Além disso, os grânulos líticos falharam ao polarizar a sinapse lítica (**Figura 39E**). Confirmando então os dados obtidos inicialmente por citometria, esses dados sugerem uma incapacidade acentuada das células NK do paciente na ativação e na função citolítica.

Em suma, identificamos dois pacientes com deficiência no NIK, uma nova imunodeficiência primária combinada. Nossos dados revelaram uma inesperada e grande variedade de fenótipos que afetaram os complexos de células B, T e NK. Descobrimos que NIK é essencial para uma função adequada da sinalização da via não canônica do NF- κ B e para a geração e funcionamento do sistema imune.

Figura 38 - Completa imunofenotipagem das células NK. Porcentagem dos subtipos das células NK em ambos os P2 e P3 (quadrado preto), pai (quadrado metade branco e metade preto) e controle saudável (triângulos). Todas as células NK foram marcadas usando anti-CD16, anti-CD27, anti-CD34, anti-CD57, anti-CD94, anti-CD117, anti-CD122, anti-CD127, anti-perforina, anti-CD8, anti-CD11a, anti-CD69, anti-KIR2DL4, anti-NKG2C, anti-NKG2C e anti-NKp46.

Figura 39 - Deficiência de NIK causa um mal funcionamento das células NK. (A) Análise por citometria de fluxo das células NK (CD56⁺CD3⁻) dos pacientes e do controle saudável. **(B)** Histograma da expressão do marcador CD62L nas células NK dos pacientes e controle (células marcadas para CD56⁺CD3⁻). **(C)** Resposta das células NK dos pacientes e controles ao estímulo usando PMA e ionomicina. Células PBMCs do controle (esquerda) ou do paciente 2 (direita) foram incubadas com PMA e ionomicina e então fixadas, permeabilizadas e analisadas por citometria de fluxo, para a avaliação intracelular da expressão do IFN γ , TNF α e CD107 α . **(D)** Análise do ensaio de imunofluorescência para verificar a formação da sinapse imunológica pelas células NK. Pode-se observar a perforina em verde e a faloidina em vermelha tanto nas células NK do paciente (P2) quanto no controle saudável. Células K562 foram usadas como células alvo da NK. DIC, diferencial da interferência do contraste. As barras brancas indica 5mm. A imagem é a representação de um experimento. **(E)** Quantificação da formação da sinapse imunológica. N=16 (controle) e n=27 (P2) para quantificação da sinapse via actina, n=17 (controle) e n=23 (P2) para quantificação da distância da sinapse do centrosossoma. A diferença foi significativa, de acordo com a análise t-test (p=0.0073 e p=0.0190).

4.3 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 4 (P4)

4.3.1 Caracterização clínica e laboratorial do P4

Paciente do sexo feminino, brasileira e filha de pais consanguíneos em primeiro grau (primos de primeiro grau) (**Figura 40**).

Este caso é um caso grave, em que a paciente apresenta manifestações clínicas graves desde o nascimento. Após o nascimento a paciente se manteve estável até os 15 dias de idade, quando apresentou episódios de eczema generalizada e monilíase oral (*Candida albicans*), acarretando em uma estomatite grave. Com 1 mês de idade, apresentou infecções de vias aéreas, incluindo sinusite. Passou um tempo estável e com 5 meses apresentou herpes e amigdalite. Foi tratada com antibióticos mensalmente. Com 1 ano de idade, foi internada com episódio de varicela e pneumonia com fusão pleural. Quatro meses depois, a paciente apresentou uma segunda pneumonia severa. Também apresentou diarreia, otite e candidíase oral. Após o recebimento da vacina BCG, não relatou efeito relevante. A paciente apresentou e foi tratada para alergia a leite de vaca. Aos 5 anos de idade, uma broncoscopia revelou uma lesão fúngica suspeita e o tratamento com itraconazol foi iniciado, com boa resposta. Aos 7 anos e 4 meses de idade, a biópsia de gânglio cervical revelou uma hiperplasia linfoide reacional com lesão proliferativa. Análise para ver se há resposta aos antígenos vacinais foi realizada no paciente, mas foi negativo. A paciente não responde aos antígenos vacinais. A tabela com as manifestações clínicas do P4 está descrita abaixo (**Tabela 14**).

Os exames laboratoriais mostra um quadro de eosinofilia (dados não mostrados), baixos níveis séricos de IgG, IgA e IgM (**Tabela 15**), linfócitos T CD4⁺ enquanto o linfócitos T CD8⁺ mantem-se dentro do esperado de acordo com o valor de referência (**Tabela 16**). Uma análise mais detalhada das subpopulações de linfócito T CD4⁺ e CD8⁺ do paciente foi realizada (**Tabela 17**). Podemos observar que as células T CD4⁺ naive (**CD45RA⁺CCR7⁺**) e de memória central e periférica (**CD45RA⁻CCR7⁺** e **CD45RA⁻CCR7⁻**, respectivamente) estão reduzidas, enquanto as células T CD4⁺ de diferenciação terminal estão aumentadas. As células T CD8⁺ naive (**CD45RA⁺CCR7⁺**), de memória periférica (**CD45RA⁻CCR7⁻**) estão normais. As células T CD8⁺ de memória central (**CD45RA⁻CCR7⁺**) estão aumentadas e as células T CD8⁺ de diferenciação terminal (**CD45RA⁺CCR7⁻**) estão diminuídas. Esses dados indicam que há um mecanismo de compensação, onde não há ativação e

maturação para geração das células de memória T CD4⁺, mas há uma super ativação das células T CD8⁺ de memória.

Após uma análise clínica bem detalhada, a primeira suspeita que surgiu era de que a paciente apresentava uma clínica compatível com Imunodeficiência Combinada Severa (SCID).

SCID é uma desordem genética caracterizada pela diminuição e/ou perda da função das células T (T⁺B⁺), que pode vir acompanhada da perda de função das células B (T⁻B⁻), onde a resposta das células NK podem também apresentar-se prejudicadas (244-246). É conhecido como uma emergência pediátrica porque leva a infecções recorrentes graves e muitas vezes fatais, durante os dois primeiros anos de vida (244-246). A sua sobrevivência a longo prazo requer reconstituição imunológica, tal como por transplante de células-tronco hemotopoéticas de sucesso (HSCT) ou terapia de enzima-substituição (no caso de deficiência de ADA).

Dezenas de genes já foram descritos como responsáveis por causar SCID, e o perfil biológico do efeito dessas mutações pode ser dividida em quatro categorias: defeitos nos receptores de citocinas (defeito na cadeia comum γ [γ c], Jak3 e IL7R α), defeitos que resultam na acumulação de metabólitos tóxicos (ADA e PNP), defeitos na sinalização do receptor das células T (CD45 e CD3 γ , ϵ , δ e ζ), e defeitos na recombinação do DNA (RAG1/2, Artemis, Cernunnos e DNA ligase 4) (247, 248).

Um estudo recente, realizado pela Primary Immune Deficiency Treatment Consortium (PIDTC), mostra que pacientes diagnosticados com SCID, quando submetidos ao transplante nos primeiros 3,5 meses de vida, apresentam uma sobrevida de 94%. Já os pacientes que não apresentavam infecções no momento em que o transplante ocorreu, e que o transplante foi realizado mais tardiamente, a taxa de sobrevida vai para 90%. Pacientes que apresentavam infecções controladas, mas que o transplante também foi realizado mais tardiamente, a taxa de sobrevida cai para 82%. Em contraste, crianças que foram submetidas ao transplante com 3,5 meses e que apresentavam infecções ativas no momento do transplante, tiveram uma sobrevida de 50%, indicando que o diagnóstico precoce de SCID aumenta a sobrevida do paciente (46).

SCID pode ser detectada ainda no início da vida do paciente, através da quantificação dos círculos de excisão das células T (TREC, T-cell receptor excision circles) (249). TRECs são um subproduto de recombinação de DNA para formar o receptor de células T (250). Assim, os níveis de TRECs pode detectar qualquer

alteração na formação das células T e consequentemente, detectar a presença de SCID. O TREC foi quantificado na paciente, e o valor apresentou-se normal (TREC=126 / UL). Como o valor apresentou-se normal, a hipótese era que essa paciente apresentava outro tipo de imunodeficiência primária.

Figura 40 - Heredograma do P4. Completo predigree revela consanguinidade na história familiar, consanguinidade de primeiro grau.

Tabela 14 - Manifestações clínicas mais graves da P4 durante seus 2 primeiros anos de vida.

Manifestações clínicas	Idade
Estomatite	15d
Monilíase	15d
Eczema generalizado	15d
Infecções de vias aéreas	1m
Sinusite	1m
Herpes	5m
Amigdalite	6m
Otite média aguda	1a4m
Pneumonia	1a4m
Infecção bacteriana cutânea	1a4m
Infecção do trato urinário	1a4m

Diarreia crônica	1a6m
Sepsis	-

Tabela 15 - Valores dos níveis de imunoglobulinas do P4. Em parênteses estão os valores de referência.

Níveis das Imunoglobulinas Paciente 4							
Idade	3m	10m	2a5m	3a4m	5a6m*	9a2m*	13a*
IgG (mg/dL)	nd	nd	223,1 (500-1300)	455 (500-1300)	768 (600-1300)	964 (600-1400)	1366 (600-1600)
IgA (mg/dL)	nd	nd	28,7 (40-120)	5 (40-180)	<5 (60-220)	<10 (60-220)	<10 (100-300)
IgM (mg/dL)	nd	nd	34 (40-180)	12 (40-180)	10 (40-180)	51 (50-180)	58 (60-150)
IgE (mg/dL)	25,3	16	161,2	nd	nd	-	-

*, Em tratamento com IVIg.

Tabela 16 - Valores das principais populações de linfócitos do P4. Abaixo estão apresentadas os valores das populações dos linfócitos do paciente 4, obtidos dos 10 meses aos 9 anos de idade. Em parênteses estão os valores de referência (195).

Idade (anos)	10m	3a	4a5m	5a6m	7a	9a7m	13a
T CD3⁺	2074 (900-4500)	1230 (900-4500)	-	853 (700-4200)	1267 (700-4200)	880 (800-3500)	1541 (800-4000)
T CD4⁺ (/μL)	165 (500-2400)	178 (500-2400)	258 (500-2400)	231 (300-2000)	305 (300-2000)	379 (400-2100)	616 (500-2200)
T CD8⁺ (/μL)	37 (300-1600)	973 (300-1600)	667 (300-1600)	575 (300-1800)	836 (300-1800)	453 (200-1200)	843 (200-1000)
B CD19⁺ (/μL)	nd	1041 (670-1619)	nd	nd	Nd	nd	-
NK CD3⁺ CD16⁺CD56⁺ (/μL)	nd	734	nd	300 (130-720)	nd	Nd	-

Tabela 17 - Valores das principais subpopulações de linfócitos T. Abaixo estão apresentadas os valores das subpopulações dos linfócitos T do paciente 4, obtidos aos 8 anos de idade. Em parênteses estão as medianas (p10 até p90) dos valores de crianças brasileiras saudáveis, entre 6 e 12 anos de idade.

	%	Valores de referência	células/m ³	Valores de referência
T CD3⁺	51	(61-78)	3200	(2300-5400)
T CD4⁺	8,01	(28-47)	258,2	(619-1348)
CD45RA⁺CCR7⁺ (naive)	7,8	(16-59)	20,3	(121-721)
CD45RA⁺CCR7⁺ (memória central)	1,6	(12-26)	4,2	(100-296)
CD45RA⁺CCR7⁺ (memória periférica)	18,5	(21-34)	47,7	(106-298)
CD45RA⁺CCR7⁻ (diferenciação terminal)	72,1	(04-38)	186,1	(43-323)
T CD4⁺CD8⁺	48,7	(74-94)	125,8	(590-2000)
T CD8⁺	29,9	(16-30)	667,8	(490-1300)
CD45RA⁺CCR7⁺ (naive)	8,2	(06-40)	54,8	(155-1146)
CD45RA⁺CCR7⁺ (memória central)	27,8	(01-04)	185,4	(30-78)
CD45RA⁺CCR7⁻ (memória periférica)	43,4	(20-45)	292,3	(495-1145)
CD45RA⁺CCR7⁻ (diferenciação terminal)	20,3	(21-61)	135,4	(584-1686)
T CD4⁺CD8⁺	49,6	(52,93)	331,1	(390-100)

4.3.2 Análise genético-molecular do P4

Até o momento, com os dados clínicos e laboratoriais obtidos, a hipótese era de que a paciente apresentava uma imunodeficiência combinada severa (SCID) com o caráter autossômico recessivo, por conta da consanguinidade da família.

Para iniciar a análise genética da paciente, iniciamos com a técnica de *SNP-array* baseado em mapeamento homozigótico (**Figura 41**). Após a análise dos dados via os softwares PLINK e *Homozigosity mapper* finalizamos com algumas regiões em homozigose no paciente. Pelo paciente ser de uma família com história de consanguinidade, existe uma probabilidade maior de a mutação causadora do fenótipo no paciente estar nessas regiões. Para encontrar o gene mutado, aplicamos a técnica de sequenciamento do exoma (ES). Dentre todas as variações que o sequenciamento do exoma nos trouxe, selecionamos somente aquelas que estavam dentro das regiões em homozigose no paciente. Aplicamos várias filtragens

envolvendo as variantes de nucleotídeo único (SNVs) e variantes de inserção/deleção (DIVs), finalizando com somente 22 variantes (SNVs e DIVs). Sequenciamos os familiares para que houvesse a exclusão das variantes falsas. Finalizamos então com uma variante que casou perfeitamente com a clínica da paciente.

O diagnóstico genético-molecular revelou uma mutação missense na cadeia alfa do receptor da IL-7 (c.G353A; **Figura 42**). O receptor da citocina IL-7 pertence é do tipo 1 da família de receptores de citocinas. Ele é dividido em alguns domínios (**Figura 43**). Dentro do domínio extracelular, existem 4 cisteínas emparelhadas que são importantes para a funcionalidade do receptor (251). A mutação do paciente é localizada no exon 3, que codifica o domínio extracelular do receptor.

Essa mutação afeta a função da proteína (p.C118Y) e confirma então o diagnóstico de SCID. Essa mutação já foi reportada anteriormente, e foi descoberta em dois irmãos espanhóis com SCID (252), posteriormente foi reportado em um paciente brasileiro do sexo masculino onde os autores associaram a mutação com os sinais clínicos da síndrome de Omenn (253), e por ultimo, em um paciente (254).

Para confirmar se a mutação causava a disfunção da proteína, nós realizamos a dosagem da citocina IL-7 no plasma da paciente, e como resultado, o valor estava aumentado, em comparação com o valor de referência ($> 16,79$ pg / mL; valor de referência = 0,66-9,2). Confirmando que a mutação no gene *IL7RA* causa disfunção da proteína, onde a citocina IL-7 não consegue se ligar ao receptor IL-7R e como consequência, acontece o acúmulo da proteína no plasma.

Aqui nós descrevemos uma paciente com características clínicas de Imunodeficiência Combinada Severa (SCID), onde a paciente apresenta um número baixo de células T $CD4^+$ e um quadro de agamaglobulinemia, precisando então receber reposição de gama globulina. Mesmo com a história sugestiva de SCID, o resultado dos TRECs foi normal, ficando um diagnóstico clínico inserto. Após a análise genético-molecular pudemos confirmar que a paciente apresentava SCID e pudemos trata-la com a correta metodologia, além de adiciona-la na lista de transplantes de medula óssea, aumentando e melhorando assim sua sobrevivência.

Figura 41 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico. Análise da técnica de SNP-array revela regiões em homozigose no paciente 4. As barras vermelhas são as regiões que apresentam homozigose dentro de cada cromossomo (verde superior).

Figura 42 - Análise genética do gene *IL7RA*. Sequenciamento via *Sanger Sequencing* revelou no P4 uma mutação missense em heterozigose, onde há a substituição do nucleotídeo G por A na posição 353 do cDNA, levando a troca dos aminoácidos cisteína (C) por tirosina (Y) na posição 118 (c.G353A p.C118Y). A segregação da variante demonstra que se trata de uma herança autossômica recessiva.

Figura 43 - Localização da mutação c.G353A do gene *IL7RA*. DNA complementar do gene *IL7RA* mostrando os exons e os domínios proteicos. A mutação da P4 está localizada no exon 3, dentro do domínio extracelular.

4.4 História clínica, análise genética e análise funcional do Paciente 5 (P5)

4.4.1 Caracterização clínica e laboratorial do P5

Paciente do sexo feminino, filha de pais com história de consanguinidade de primeiro grau (primos de primeiro grau) (**Figura 44**). É a única afetada na família e tem um irmão do sexo masculino saudável.

Desde os 6 meses de idade relata ter infecções recorrentes severas, como otite media aguda (3 episódios), asma, pneumonias (2 episódios), candidíase oral persistente, reação a vacina de BCG, septicemia (3 episódios). Um dos episódios de septicemia, foi constatado infecção pelo *Staphylococcus aureus*. Dos 6 meses aos 4 anos de idade a paciente apresentou severa dermatite atópica seborreica (**Figura 45**). A paciente apresentou uma persistente e crônica infecção pela *Candida albicans* (**Figura 46**), resistente até mesmo ao tratamento com fluconazol e itraconazol. Análise por endoscopia mostrou atrofia da mucosa e presença da *Candida albicans*. Com 16 anos a paciente perdeu muito peso e teve uma grande perda de cabelo, foi então submetida a uma gastrostomia. Os patógenos oportunistas que puderam ser isolados ao longo do acompanhamento deste paciente, estão listados na **Tabela 18**.

Dados laboratoriais revelam uma diminuição grave nos níveis de imunoglobulinas da paciente (**Tabela 19**). Desde os 2 anos e 6 meses de idade, a paciente faz tratamento e administração com gama globulina (IVIg), tendo melhorado um pouco sua condição de vida. Além de apresentar os níveis de imunoglobulina baixos, a paciente apresentou um alto número de linfócitos T CD4⁺ e de normal a baixo número de linfócitos T CD8⁺, baixo número de linfócitos B e baixo número de células NK (**Tabela 20**). Uma análise mais detalhada das subpopulações dos linfócitos T foi realizada (**Tabela 21**) quando o paciente tinha 8 anos. Pode-se observar que o paciente apresenta um leve aumento das células T CD4⁺ naive (**CD45RA⁺CCR7⁺**), valor normal das células T CD4⁺ de memória central e periférica (**CD45RA⁻CCR7⁺**, **CD45RA⁻CCR7⁻**, respectivamente) e um leve aumento no número de células T CD4⁺ de diferenciação terminal (**CD45RA⁺CCR7⁻**). Já em contra partida as células T CD8⁺ de memória central e periférica (**CD45RA⁻CCR7⁺**, **CD45RA⁻CCR7⁻**, respectivamente), e as células T CD8⁺ de diferenciação terminal (**CD45RA⁺CCR7⁻**) estão com um número bem reduzido quando comparado com o valor de referência. Isso indica um bloqueio na transição dentre célula T CD8⁺ naive e de memória, e consequentemente um defeito de células T CD8⁺.

Esses dados são compatíveis com a história clínica da paciente. As células que são responsáveis pela atividade citolítica do sistema imunológico estão com a função prejudicada na P5, explicando o fenótipo de infecções pelos patógenos oportunistas (**Tabela 18**).

Figura 44 - Heredograma do P5. Completo pedigree revela consanguinidade na história familiar, consanguinidade de primeiro grau.

Tabela 18 - Patógenos isolados na P5 durante seus 6 meses até seus 4 anos de idade.

Patógeno isolado	Idade
<i>Candida albicans</i>	6m
<i>P jirovecci</i>	2a
<i>S. aureus</i>	3a2m
<i>P. aeruginosa</i>	4a

Tabela 19 - Valores dos níveis de imunoglobulinas do P5. Em parênteses estão os valores de referência.

Níveis das Imunoglobulinas	Paciente 5		
Idade	2a	2a6m*	3a6m*
IgG (mg/dL)	423 (350–1000)	920 (500-1300)	833 (500-1300)
IgA (mg/dL)	<7 (30–120)	<6 (40–180)	<6 (40-180)
IgM (mg/dL)	34 (40–140)	32 (40–180)	26 (40-180)

IgE (mg/dL)	<5	Nd	3,3
--------------------	----	----	-----

*, Em tratamento com IVIg.

Tabela 20 - Valores das principais populações de linfócitos do P5. Abaixo estão apresentadas os valores das populações dos linfócitos do paciente 5, obtidos dos 1 aos 16 anos de idade. Em parênteses estão os valores de referência (195).

Idade (anos)	1a	3a5m	4a	5a	16a
T CD3⁺	8297 (900-4500)	1648 (900-4500)	7582 (900-4500)	3916 (700-4200)	2168 (800-3500)
T CD4⁺ (μL)	6272 (500-2400)	1207 (500-2400)	5688 (500-2400)	2794 (300-2000)	1257 (400-2100)
T CD8⁺ (μL)	1736 (300-1600)	400 (300-1600)	1652 (300-1600)	1029 (300-1800)	205 (200-1200)
B CD19⁺ (μL)	nd	nd	295 (335-628)	nd	nd
NK CD3⁺	nd	nd	34 (127-515)	nd	nd
CD16⁺CD56⁺ (μL)					

Tabela 21 - Valores das principais subpopulações de linfócitos T. Abaixo estão apresentadas os valores das subpopulações dos linfócitos T do paciente 5, obtidos aos 8 anos de idade. Em parênteses estão as medianas (p10 até p90) dos valores de crianças brasileiras saudáveis, entre 6 e 12 anos de idade.

	%	Valores de referência	células/m³	Valores de referência
Linfócito total	44,9		3200	(1930-3480)
T CD3⁺	82	(61-78)	2623,4	(1280-2413)
T CD4⁺	53,1	(28-44)	1698,2	(619-1348)
CD45RA⁺CCR7⁺ (naive)	49,7	(16-59)	844,0	(121-721)
CD45RA⁺CCR7⁺ (memória central)	17,8	(12-26)	301,6	(100-296)
CD45RA⁺CCR7⁺ (memória periférica)	12,6	(11-34)	214,3	(106-298)
CD45RA⁺CCR7⁺ (diferenciação terminal)	19,9	(04-38)	338,3	(43-323)
T CD8⁺	17,5	(17-32)	558,4	(391-1024)
CD45RA⁺CCR7⁺ (naive)	51,6	(06-40)	288,	(155-1146)
CD45RA⁺CCR7⁺ (memória)	0,8	(01-04)	4,2	(30-78)

central)				
CD45RA ⁻ CCR7 ⁻ (memória periférica)	6,07	(20-45)	33,9	(495-1145)
CD45RA ⁺ CCR7 ⁻ (diferenciação terminal)	41,5	(21-61)	231,9	(584-1686)

Figura 45 - Manifestação de dermatite grave na P5. Severa dermatite atópica seborreica presente na paciente 5, dos 6 meses aos 4 anos de idade, antes e depois da administração de esteroide.

Figura 46 - Manifestação clínica grave da P5. Persistente e infecção crônica causada pela *Candida albicans* antes e após tratamento estão apresentados no painel a esquerda. Perda progressiva e grave de peso e cabelo, aos 16 anos de idade estão apresentados a direita.

4.4.2 Análise genético-molecular da P5.

Até o momento, com os dados clínicos e laboratoriais obtidos, supomos que esta paciente tem uma imunodeficiência combinada grave com caráter autossômico recessivo. Para iniciar a investigar a genética do paciente, decidimos sequenciar via *Sanger Sequencing* os genes que acarretam em um defeito de *Switch* de classes, como os genes *AICDA*, *UNG* e *CD40*. Nenhuma mutação foi encontrada nesses genes. Como o paciente é do sexo feminino, excluimos a possibilidade de ser um defeito no gene do *CD40L*.

Após não encontrarmos mutações nos genes citados acima, decidimos aplicar a técnica de mapeamento homozigótico no P5 (**Figura 47**). Analisamos as regiões em homozigose (**Tabela 22**) do paciente para ver se encontrávamos algum gene com mutação conhecida na literatura. Nenhum gene conhecido foi encontrado, neste caso, aplicamos então o sequenciamento do exoma (ES) no P5.

Selecionamos somente as variações que estivessem dentro das regiões em homozigose da paciente. Várias filtragens envolvendo as variantes de nucleotídeo único (SNVs) e variantes de inserção/deleção (DIVs) foram necessárias. Após o sequenciamento dos pais e familiares, validação e exclusão dos possíveis

candidatos, finalizamos com uma lista de 8 possíveis candidatos a ser o causador da doença, 6 SNVs e 2 DIVs (**Tabela 23**).

Aqui nós descrevemos um paciente com característica clínica de imunodeficiência primária, com característica autossômica recessiva. As infecções e dados laboratoriais sugerem um defeito das células B e células NK. Sugerem também que o *Switch* de classes está danificado nessa paciente. Até o momento, temos alguns genes candidatos que possam ser o causador da doença. Com um pouco mais de tempo, vamos poder finalizar a análise genética e descobrir qual mutação é a real causadora do fenótipo do paciente.

Figura 47 - SNP-array baseado em mapeamento homozigótico. Análise da técnica de SNP-array revela regiões em homozigose no paciente 5. As barras vermelhas são as regiões que apresentam homozigose dentro de cada cromossomo (verde superior).

Tabela 22 - Intervalos homozigóticos obtidos pelo software *Homozygosity Mapper* e *PLINK*.

<i>Homozygosity Mapper</i>		
Chr	Posição 1	Posição 2
2	58012833	87789028
2	224243441	234954619
5	161635853	165820029
6	14665517	17327485
6	125683815	139921958
7	67098945	70465729
9	24431783	38638230

10	55492604	60110335
13	108705739	115106996
15	26905021	33757840
15	33757867	43542232
15	43543258	59692974
18	55440759	78015057
19	47308666	54142851
PLINK		
5	146600210	148819291
20	61795	1886493

Chr, Cromossomo.

Tabela 23 - Abaixo está a lista dos possíveis candidatos a ser o gene mutado, causador do fenótipo de imunodeficiência primária no P5.

Gene	Chr	Aminoácido mutado	Ref.	Obs.
DYSF	chr2	NM_001130455:c.G386A:p.G129E	G	A
GIGYF2	chr2	NM_001103148:c.3612_3614del:p.1204_1205del	ACA	-
ADRB2	chr5	NM_000024:c.C491T:p.T164I	C	T
ITPKA	chr15	NM_002220:c.G1358A:p.G453D	G	A
ZSCAN29	chr15	NM_152455:c.1112_1114del:p.371_372del	CCT	-
SEMA6D	chr15	NM_020858:c.C2252T:p.P751L	C	T
ADNP2	chr18	NM_014913:c.A1174G:p.I392V	A	G
ZNF665	chr19	NM_024733:c.A1675G:p.I559V	T	C

Chr, Cromossomo; *Ref.*, Referência; *Obs.*, Observado no paciente.

5 CONCLUSÃO

Podemos concluir que:

- Além do fenótipo clínico, é de extrema importância que o paciente tenha uma análise genética concluída, para que haja uma melhor qualidade de vida, um melhor tratamento clínico, além de favorecer que esse paciente possa entrar na fila de transplante de medula.
- As aplicações de NGS, combinadas ou não com a técnica de mapeamento homozigótico, se tornam importantes e fundamentais para a descoberta de novas imunodeficiências.
- O descobrimento e caracterização de novas imunodeficiências geram uma melhor correlação entre genótipo e fenótipo dentre os diferentes tipos de imunodeficiências.
- A descoberta e caracterização de novas IDP são cruciais para que haja um entendimento e organização da funcionalidade da biologia molecular do sistema imunológico.

REFERÊNCIAS*

1. Conley ME, Notarangelo LD, Etzioni A. Diagnostic criteria for primary immunodeficiencies. Representing PAGID (Pan-American Group for Immunodeficiency) and ESID (European Society for Immunodeficiencies). *Clin Immunol*. 1999;93(3):190-7.
2. Gathmann B, Grimbacher B, Beaute J, Dudoit Y, Mahlaoui N, Fischer A, et al. The European internet-based patient and research database for primary immunodeficiencies: results 2006-2008. *Clin Exp Immunol*. 2009;157 Suppl 1:3-11.
3. Joshi AY, Iyer VN, Hagan JB, St Sauver JL, Boyce TG. Incidence and temporal trends of primary immunodeficiency: a population-based cohort study. *Mayo Clin Proc*. 2009;84(1):16-22.
4. Notarangelo L, Casanova JL, Conley ME, Chapel H, Fischer A, Puck J, et al. Primary immunodeficiency diseases: an update from the International Union of Immunological Societies Primary Immunodeficiency Diseases Classification Committee Meeting in Budapest, 2005. *J Allergy Clin Immunol*. 2006;117(4):883-96.
5. Boztug K, Klein C. Novel genetic etiologies of severe congenital neutropenia. *Curr Opin Immunol*. 2009;21(5):472-80.
6. Byun M, Abhyankar A, Lelarge V, Plancoulaine S, Palanduz A, Telhan L, et al. Whole-exome sequencing-based discovery of STIM1 deficiency in a child with fatal classic Kaposi sarcoma. *J Exp Med*. 2010;207(11):2307-12.
7. de Greef JC, Wang J, Balog J, den Dunnen JT, Frants RR, Straasheijm KR, et al. Mutations in ZBTB24 are associated with immunodeficiency, centromeric instability, and facial anomalies syndrome type 2. *Am J Hum Genet*. 2011;88(6):796-804.
8. Puel A, Cypowyj S, Bustamante J, Wright JF, Liu L, Lim HK, et al. Chronic mucocutaneous candidiasis in humans with inborn errors of interleukin-17 immunity. *Science*. 2011;332(6025):65-8.
9. Salzer E, Santos-Valente E, Klaver S, Ban SA, Emminger W, Prengemann NK, et al. B-cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of protein kinase C delta. *Blood*. 2013;121(16):3112-6.
10. Willmann KL, Klaver S, Dogu F, Santos-Valente E, Garncarz W, Bilic I, et al. Biallelic loss-of-function mutation in NIK causes a primary immunodeficiency with multifaceted aberrant lymphoid immunity. *Nat Commun*. 2014;5:5360.
11. Rosen FS, Cooper MD, Wedgwood RJ. The primary immunodeficiencies. *N Engl J Med*. 1995;333(7):431-40.
12. Mueller BU, Pizzo PA. Cancer in children with primary or secondary immunodeficiencies. *J Pediatr*. 1995;126(1):1-10.

*De acordo com: Internacional Committee of Medical Journal Editors. [Internet]. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. [2011 July 15]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

13. Guzman D, Veit D, Knerr V, Kindle G, Gathmann B, Eades-Perner AM, et al. The ESID Online Database network. *Bioinformatics*. 2007;23(5):654-5.
14. Bonilla FA, Geha RS. 12. Primary immunodeficiency diseases. *J Allergy Clin Immunol*. 2003;111(2 Suppl):S571-81.
15. Cooper MA, Pommering TL, Koranyi K. Primary immunodeficiencies. *Am Fam Physician*. 2003;68(10):2001-8.
16. Geha RS, Notarangelo LD, Casanova JL, Chapel H, Conley ME, Fischer A, et al. Primary immunodeficiency diseases: an update from the International Union of Immunological Societies Primary Immunodeficiency Diseases Classification Committee. *J Allergy Clin Immunol*. 2007;120(4):776-94.
17. Notarangelo LD, Gambineri E, Badolato R. Immunodeficiencies with autoimmune consequences. *Adv Immunol*. 2006;89:321-70.
18. Ochs HD, Smith CIE, Puck J. Primary immunodeficiency diseases : a molecular and genetic approach. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2007. xvii, 726 p., 32 p. of plates p.
19. Stiehm ER, Johnston RB, Jr. A history of pediatric immunology. *Pediatr Res*. 2005;57(3):458-67.
20. Bruton OC, Apt L, Gitlin D, Janeway CA. Absence of serum gamma globulins. *AMA Am J Dis Child*. 1952;84(5):632-6.
21. Bruton OC. Agammaglobulinemia. *Pediatrics*. 1952;9(6):722-8.
22. Syllaba L. HK. Contribution Al'indépendance De L'athetose Double Idiopathique Etcongenitale: Atteinte Familiale, Syndrome Dystrophique,Signe Du Réseau Vasculaire Conjonctival, Integrite Psy-Chique. *Rev Neurol*. 1926;1:541-562.
23. Thorpe ESH, H.E. Chronic Tetany Andchronic Mycelial Stomatitis In A Child Aged Four Andone-Half Years. *Am J Dis Child* 1929;38:328–338.
24. Wiskott A. Familiärer, angeborener Morbus Werlhofii? *Monatsschr Kinder- heilkd*. 1937;68:212-6.
25. Glanzmann E, Riniker P. [Essential lymphocytophthisis; new clinical aspect of infant pathology]. *Ann Paediatr*. 1950;175(1-2):1-32.
26. Kostmann R. Infantile genetic agranulocytosis; agranulocytosis infantilis hereditaria. *Acta Paediatr Suppl*. 1956;45(Suppl 105):1-78.
27. Landing BH, Shirkey HS. A syndrome of recurrent infection and infiltration of viscera by pigmented lipid histiocytes. *Pediatrics*. 1957;20(3):431-8.
28. Klemperer MR, Woodworth HC, Rosen FS, Austen KF. Hereditary deficiency of the second component of complement (C'2) in man. *J Clin Invest*. 1966;45(6):880-90.

29. Notarangelo LD, Mori L. Wiskott-Aldrich syndrome: another piece in the puzzle. *Clin Exp Immunol*. 2005;139(2):173-5.
30. Orange JS. Human natural killer cell deficiencies and susceptibility to infection. *Microbes Infect*. 2002;4(15):1545-58.
31. Orange JS, Levy O, Brodeur SR, Krzewski K, Roy RM, Niemela JE, et al. Human nuclear factor kappa B essential modulator mutation can result in immunodeficiency without ectodermal dysplasia. *J Allergy Clin Immunol*. 2004;114(3):650-6.
32. Picard C, Casanova JL. [New hereditary immunodeficiencies and genetic predisposition to infective diseases in children]. *Arch Pediatr*. 2003;10 Suppl 4:513s-6s.
33. Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chatila T, Conley ME, Cunningham-Rundles C, et al. Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the international union of immunological societies expert committee for primary immunodeficiency. *Front Immunol*. 2014;5:162.
34. Berger M. Choices in IgG replacement therapy for primary immune deficiency diseases: subcutaneous IgG vs. intravenous IgG and selecting an optimal dose. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2011;11(6):532-8.
35. Charbonnier LM, Janssen E, Chou J, Ohsumi TK, Keles S, Hsu JT, et al. Regulatory T-cell deficiency and immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked-like disorder caused by loss-of-function mutations in LRBA. *J Allergy Clin Immunol*. 2015;135(1):217-27.
36. de la Morena MT, Nelson RP, Jr. Recent advances in transplantation for primary immune deficiency diseases: a comprehensive review. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2014;46(2):131-44.
37. Faitelson Y, Grunebaum E. Hemophagocytic lymphohistiocytosis and primary immune deficiency disorders. *Clin Immunol*. 2014;155(1):118-25.
38. Farinelli G, Capo V, Scaramuzza S, Aiuti A. Lentiviral vectors for the treatment of primary immunodeficiencies. *J Inherit Metab Dis*. 2014;37(4):525-33.
39. Frazao JB, Errante PR, Condino-Neto A. Toll-like receptors' pathway disturbances are associated with increased susceptibility to infections in humans. *Arch Immunol Ther Exp (Warsz)*. 2013;61(6):427-43.
40. Gennery AR. Immunological aspects of 22q11.2 deletion syndrome. *Cell Mol Life Sci*. 2012;69(1):17-27.
41. Grumach AS, Kirschfink M. Are complement deficiencies really rare? Overview on prevalence, clinical importance and modern diagnostic approach. *Mol Immunol*. 2014;61(2):110-7.

42. Lohr NJ, Molleston JP, Strauss KA, Torres-Martinez W, Sherman EA, Squires RH, et al. Human ITCH E3 ubiquitin ligase deficiency causes syndromic multisystem autoimmune disease. *Am J Hum Genet.* 2010;86(3):447-53.
43. Ochs HD, Hitzig WH. History of primary immunodeficiency diseases. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2012;12(6):577-87.
44. Oliveira JB, Bleesing JJ, Dianzani U, Fleisher TA, Jaffe ES, Lenardo MJ, et al. Revised diagnostic criteria and classification for the autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS): report from the 2009 NIH International Workshop. *Blood.* 2010;116(14):e35-40.
45. Orange JS. Natural killer cell deficiency. *J Allergy Clin Immunol.* 2013;132(3):515-25; quiz 26.
46. Pai SY, Logan BR, Griffith LM, Buckley RH, Parrott RE, Dvorak CC, et al. Transplantation outcomes for severe combined immunodeficiency, 2000-2009. *N Engl J Med.* 2014;371(5):434-46.
47. Pannicke U, Baumann B, Fuchs S, Henneke P, Rensing-Ehl A, Rizzi M, et al. Deficiency of innate and acquired immunity caused by an IKBKB mutation. *N Engl J Med.* 2013;369(26):2504-14.
48. Picard C, Casanova JL, Puel A. Infectious diseases in patients with IRAK-4, MyD88, NEMO, or IkappaBalpha deficiency. *Clin Microbiol Rev.* 2011;24(3):490-7.
49. Rigante D, Vitale A, Lucherini OM, Cantarini L. The hereditary autoinflammatory disorders uncovered. *Autoimmun Rev.* 2014;13(9):892-900.
50. Routes J, Abinun M, Al-Herz W, Bustamante J, Condino-Neto A, De La Morena MT, et al. ICON: the early diagnosis of congenital immunodeficiencies. *J Clin Immunol.* 2014;34(4):398-424.
51. Veillette A, Perez-Quintero LA, Latour S. X-linked lymphoproliferative syndromes and related autosomal recessive disorders. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2013;13(6):614-22.
52. Verbsky JW, Chatila TA. Immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked (IPEX) and IPEX-related disorders: an evolving web of heritable autoimmune diseases. *Curr Opin Pediatr.* 2013;25(6):708-14.
53. Verbsky JW, Routes JM. Sarcoidosis and common variable immunodeficiency: similarities and differences. *Semin Respir Crit Care Med.* 2014;35(3):330-5.
54. Wehr C, Gennery AR, Lindemans C, Schulz A, Hoenig M, Marks R, et al. Multicenter experience in hematopoietic stem cell transplantation for serious complications of common variable immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol.* 2015;135(4):988-97 e6.
55. Buckley RH. Immunodeficiency diseases. *JAMA.* 1992;268(20):2797-806.

56. Cunningham-Rundles C, Ponda PP. Molecular defects in T- and B-cell primary immunodeficiency diseases. *Nat Rev Immunol*. 2005;5(11):880-92.
57. Hong R. Update on the immunodeficiency diseases. *Am J Dis Child*. 1990;144(9):983-92.
58. Iseki M, Heiner DC. Immunodeficiency disorders. *Pediatr Rev*. 1993;14(6):226-36.
59. Fischer A. Human primary immunodeficiency diseases. *Immunity*. 2007;27(6):835-45.
60. Buckley RH. Variable phenotypic expression of mutations in genes of the immune system. *J Clin Invest*. 2005;115(11):2974-6.
61. Picard C, Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chatila T, Conley ME, et al. Primary Immunodeficiency Diseases: an Update on the Classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee for Primary Immunodeficiency 2015. *J Clin Immunol*. 2015;35(8):696-726.
62. Modell V, Gee B, Lewis DB, Orange JS, Roifman CM, Routes JM, et al. Global study of primary immunodeficiency diseases (PI)--diagnosis, treatment, and economic impact: an updated report from the Jeffrey Modell Foundation. *Immunol Res*. 2011;51(1):61-70.
63. Eades-Perner AM, Gathmann B, Knerr V, Guzman D, Veit D, Kindle G, et al. The European internet-based patient and research database for primary immunodeficiencies: results 2004-06. *Clin Exp Immunol*. 2007;147(2):306-12.
64. Yel L. Selective IgA deficiency. *J Clin Immunol*. 2010;30(1):10-6.
65. Kwan A, Abraham RS, Currier R, Brower A, Andruszewski K, Abbott JK, et al. Newborn screening for severe combined immunodeficiency in 11 screening programs in the United States. *JAMA*. 2014;312(7):729-38.
66. Bonilla FA, Geha RS. Are you immunodeficient? *J Allergy Clin Immunol*. 2005;116(2):423-5.
67. Boyle JM, Buckley RH. Population prevalence of diagnosed primary immunodeficiency diseases in the United States. *J Clin Immunol*. 2007;27(5):497-502.
68. Lee PP, Lau YL. Primary immunodeficiencies: "new" disease in an old country. *Cell Mol Immunol*. 2009;6(6):397-406.
69. Condino-Neto A, Sorensen RU, Gomez Raccio AC, King A, Espinosa-Rosales FJ, Franco JL. Current state and future perspectives of the Latin American Society for Immunodeficiencies (LASID). *Allergol Immunopathol (Madr)*. 2015;43(5):493-7.
70. Grumach AS, Duarte AJ, Bellinati-Pires R, Pastorino AC, Jacob CM, Diogo CL, et al. Brazilian report on primary immunodeficiencies in children: 166 cases studied over a follow-up time of 15 years. *J Clin Immunol*. 1997;17(4):340-5.

71. Chapel H, Geha R, Rosen F, committee IPC. Primary immunodeficiency diseases: an update. *Clin Exp Immunol*. 2003;132(1):9-15.
72. Chinn IK, Shearer WT. Severe Combined Immunodeficiency Disorders. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2015;35(4):671-94.
73. Fischer A, Le Deist F, Hacein-Bey-Abina S, Andre-Schmutz I, Basile Gde S, de Villartay JP, et al. Severe combined immunodeficiency. A model disease for molecular immunology and therapy. *Immunol Rev*. 2005;203:98-109.
74. Lagresle-Peyrou C, Six EM, Picard C, Rieux-Laucat F, Michel V, Ditadi A, et al. Human adenylate kinase 2 deficiency causes a profound hematopoietic defect associated with sensorineural deafness. *Nat Genet*. 2009;41(1):106-11.
75. Pannicke U, Honig M, Hess I, Friesen C, Holzmann K, Rump EM, et al. Reticular dysgenesis (aleukocytosis) is caused by mutations in the gene encoding mitochondrial adenylate kinase 2. *Nat Genet*. 2009;41(1):101-5.
76. Malacarne F, Benicchi T, Notarangelo LD, Mori L, Parolini S, Caimi L, et al. Reduced thymic output, increased spontaneous apoptosis and oligoclonal B cells in polyethylene glycol-adenosine deaminase-treated patients. *Eur J Immunol*. 2005;35(11):3376-86.
77. Nyhan WL. Disorders of purine and pyrimidine metabolism. *Mol Genet Metab*. 2005;86(1-2):25-33.
78. Kovanen PE, Leonard WJ. Cytokines and immunodeficiency diseases: critical roles of the gamma(c)-dependent cytokines interleukins 2, 4, 7, 9, 15, and 21, and their signaling pathways. *Immunol Rev*. 2004;202:67-83.
79. Noguchi M, Yi H, Rosenblatt HM, Filipovich AH, Adelstein S, Modi WS, et al. Interleukin-2 receptor gamma chain mutation results in X-linked severe combined immunodeficiency in humans. *Cell*. 1993;73(1):147-57.
80. Palmer K, Green TD, Roberts JL, Sajaroff E, Cooney M, Parrott R, et al. Unusual clinical and immunologic manifestations of transplacentally acquired maternal T cells in severe combined immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol*. 2007;120(2):423-8.
81. Macchi P, Villa A, Giliani S, Sacco MG, Frattini A, Porta F, et al. Mutations of Jak-3 gene in patients with autosomal severe combined immune deficiency (SCID). *Nature*. 1995;377(6544):65-8.
82. Puel A, Ziegler SF, Buckley RH, Leonard WJ. Defective IL7R expression in T(-)B(+)NK(+) severe combined immunodeficiency. *Nat Genet*. 1998;20(4):394-7.
83. Revy P, Buck D, le Deist F, de Villartay JP. The repair of DNA damages/modifications during the maturation of the immune system: lessons from human primary immunodeficiency disorders and animal models. *Adv Immunol*. 2005;87:237-95.

84. Buck D, Moshous D, de Chasseval R, Ma Y, le Deist F, Cavazzana-Calvo M, et al. Severe combined immunodeficiency and microcephaly in siblings with hypomorphic mutations in DNA ligase IV. *Eur J Immunol*. 2006;36(1):224-35.
85. van der Burg M, Ijspeert H, Verkaik NS, Turul T, Wiegant WW, Morotomi-Yano K, et al. A DNA-PKcs mutation in a radiosensitive T-B- SCID patient inhibits Artemis activation and nonhomologous end-joining. *J Clin Invest*. 2009;119(1):91-8.
86. Grunebaum E, Sharfe N, Roifman CM. Human T cell immunodeficiency: when signal transduction goes wrong. *Immunol Res*. 2006;35(1-2):117-26.
87. Feske S, Gwack Y, Prakriya M, Srikanth S, Puppel SH, Tanasa B, et al. A mutation in *Orai1* causes immune deficiency by abrogating CRAC channel function. *Nature*. 2006;441(7090):179-85.
88. Picard C, McCarl CA, Papolos A, Khalil S, Luthy K, Hivroz C, et al. STIM1 mutation associated with a syndrome of immunodeficiency and autoimmunity. *N Engl J Med*. 2009;360(19):1971-80.
89. Torgerson TR. Immune dysregulation in primary immunodeficiency disorders. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2008;28(2):315-27, viii-ix.
90. Walker UA, Warnatz K. Idiopathic CD4 lymphocytopenia. *Curr Opin Rheumatol*. 2006;18(4):389-95.
91. Kobrynski LJ, Sullivan KE. Velocardiofacial syndrome, DiGeorge syndrome: the chromosome 22q11.2 deletion syndromes. *Lancet*. 2007;370(9596):1443-52.
92. Frank J, Pignata C, Panteleyev AA, Prowse DM, Baden H, Weiner L, et al. Exposing the human nude phenotype. *Nature*. 1999;398(6727):473-4.
93. Agarwal S, Cunningham-Rundles C. Thymoma and immunodeficiency (Good syndrome): a report of 2 unusual cases and review of the literature. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2007;98(2):185-90.
94. Conley ME. Genetics of hypogammaglobulinemia: what do we really know? *Curr Opin Immunol*. 2009;21(5):466-71.
95. Conley ME, Broides A, Hernandez-Trujillo V, Howard V, Kanegane H, Miyawaki T, et al. Genetic analysis of patients with defects in early B-cell development. *Immunol Rev*. 2005;203:216-34.
96. Durandy A, Taubenheim N, Peron S, Fischer A. Pathophysiology of B-cell intrinsic immunoglobulin class switch recombination deficiencies. *Adv Immunol*. 2007;94:275-306.
97. Chapel H, Lucas M, Lee M, Bjorkander J, Webster D, Grimbacher B, et al. Common variable immunodeficiency disorders: division into distinct clinical phenotypes. *Blood*. 2008;112(2):277-86.

98. Chapel H, Cunningham-Rundles C. Update in understanding common variable immunodeficiency disorders (CVIDs) and the management of patients with these conditions. *Br J Haematol*. 2009;145(6):709-27.
99. Park MA, Li JT, Hagan JB, Maddox DE, Abraham RS. Common variable immunodeficiency: a new look at an old disease. *Lancet*. 2008;372(9637):489-502.
100. Janzi M, Kull I, Sjoberg R, Wan J, Melen E, Bayat N, et al. Selective IgA deficiency in early life: association to infections and allergic diseases during childhood. *Clin Immunol*. 2009;133(1):78-85.
101. Dorsey MJ, Orange JS. Impaired specific antibody response and increased B-cell population in transient hypogammaglobulinemia of infancy. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2006;97(5):590-5.
102. Moschese V, Graziani S, Avanzini MA, Carsetti R, Marconi M, La Rocca M, et al. A prospective study on children with initial diagnosis of transient hypogammaglobulinemia of infancy: results from the Italian Primary Immunodeficiency Network. *Int J Immunopathol Pharmacol*. 2008;21(2):343-52.
103. Notarangelo LD. Primary immunodeficiencies. *J Allergy Clin Immunol*. 2010;125(2 Suppl 2):S182-94.
104. Coutinho A, Carneiro-Sampaio M. Primary immunodeficiencies unravel critical aspects of the pathophysiology of autoimmunity and of the genetics of autoimmune disease. *J Clin Immunol*. 2008;28 Suppl 1:S4-10.
105. Shikama N, Nusspaumer G, Hollander GA. Clearing the AIRE: on the pathophysiological basis of the autoimmune polyendocrinopathy syndrome type-1. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2009;38(2):273-88, vii.
106. Moraes-Vasconcelos D, Costa-Carvalho BT, Torgerson TR, Ochs HD. Primary immune deficiency disorders presenting as autoimmune diseases: IPEX and APECED. *J Clin Immunol*. 2008;28 Suppl 1:S11-9.
107. Rieux-Laucat F. Inherited and acquired death receptor defects in human Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome. *Curr Dir Autoimmun*. 2006;9:18-36.
108. Rieux-Laucat F, Le Deist F, Fischer A. Autoimmune lymphoproliferative syndromes: genetic defects of apoptosis pathways. *Cell Death Differ*. 2003;10(1):124-33.
109. Holland SM, Vinh DC. Yeast infections--human genetics on the rise. *N Engl J Med*. 2009;361(18):1798-801.
110. Etzioni A. Genetic etiologies of leukocyte adhesion defects. *Curr Opin Immunol*. 2009;21(5):481-6.
111. Svensson L, Howarth K, McDowall A, Patzak I, Evans R, Ussar S, et al. Leukocyte adhesion deficiency-III is caused by mutations in *KINDLIN3* affecting integrin activation. *Nat Med*. 2009;15(3):306-12.

112. Ku CL, Picard C, Erdos M, Jeurissen A, Bustamante J, Puel A, et al. IRAK4 and NEMO mutations in otherwise healthy children with recurrent invasive pneumococcal disease. *J Med Genet*. 2007;44(1):16-23.
113. Casrouge A, Zhang SY, Eidenschenk C, Jouanguy E, Puel A, Yang K, et al. Herpes simplex virus encephalitis in human UNC-93B deficiency. *Science*. 2006;314(5797):308-12.
114. Unsworth DJ. Complement deficiency and disease. *J Clin Pathol*. 2008;61(9):1013-7.
115. Morimoto Y, Routes JM. Immunodeficiency overview. *Prim Care*. 2008;35(1):159-73, viii.
116. Baehner R, Magrane G, Balassanian R, Chang C, Millward C, Wakil AE, et al. Donor origin of neuroendocrine carcinoma in 2 transplant patients determined by molecular cytogenetics. *Hum Pathol*. 2000;31(11):1425-9.
117. Watson JD, Crick FH. Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature*. 1953;171(4356):737-8.
118. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1977;74(12):5463-7.
119. Venter JC, Adams MD, Myers EW, Li PW, Mural RJ, Sutton GG, et al. The sequence of the human genome. *Science*. 2001;291(5507):1304-51.
120. Bousfiha A, Jeddane L, Al-Herz W, Ailal F, Casanova JL, Chatila T, et al. The 2015 IUIS Phenotypic Classification for Primary Immunodeficiencies. *J Clin Immunol*. 2015;35(8):727-38.
121. Fang M, Abolhassani H, Lim CK, Zhang J, Hammarstrom L. Next Generation Sequencing Data Analysis in Primary Immunodeficiency Disorders - Future Directions. *J Clin Immunol*. 2016.
122. Itan Y, Casanova JL. Novel primary immunodeficiency candidate genes predicted by the human gene connectome. *Front Immunol*. 2015;6:142.
123. Germeshausen M, Zeidler C, Stuhmann M, Lanciotti M, Ballmaier M, Welte K. Digenic mutations in severe congenital neutropenia. *Haematologica*. 2010;95(7):1207-10.
124. Zhang K, Chandrakasan S, Chapman H, Valencia CA, Husami A, Kissell D, et al. Synergistic defects of different molecules in the cytotoxic pathway lead to clinical familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Blood*. 2014;124(8):1331-4.
125. Ng SB, Turner EH, Robertson PD, Flygare SD, Bigham AW, Lee C, et al. Targeted capture and massively parallel sequencing of 12 human exomes. *Nature*. 2009;461(7261):272-6.

126. Roach JC, Glusman G, Smit AF, Huff CD, Hubley R, Shannon PT, et al. Analysis of genetic inheritance in a family quartet by whole-genome sequencing. *Science*. 2010;328(5978):636-9.
127. Ng SB, Buckingham KJ, Lee C, Bigham AW, Tabor HK, Dent KM, et al. Exome sequencing identifies the cause of a mendelian disorder. *Nat Genet*. 2010;42(1):30-5.
128. Lupski JR, Reid JG, Gonzaga-Jauregui C, Rio Deiros D, Chen DC, Nazareth L, et al. Whole-genome sequencing in a patient with Charcot-Marie-Tooth neuropathy. *N Engl J Med*. 2010;362(13):1181-91.
129. Bonnefond A, Durand E, Sand O, De Graeve F, Gallina S, Busiah K, et al. Molecular diagnosis of neonatal diabetes mellitus using next-generation sequencing of the whole exome. *PLoS One*. 2010;5(10):e13630.
130. Bolze A, Byun M, McDonald D, Morgan NV, Abhyankar A, Premkumar L, et al. Whole-exome-sequencing-based discovery of human FADD deficiency. *Am J Hum Genet*. 2010;87(6):873-81.
131. Worthey EA, Mayer AN, Syverson GD, Helbling D, Bonacci BB, Decker B, et al. Making a definitive diagnosis: successful clinical application of whole exome sequencing in a child with intractable inflammatory bowel disease. *Genet Med*. 2011;13(3):255-62.
132. Allen RC, Armitage RJ, Conley ME, Rosenblatt H, Jenkins NA, Copeland NG, et al. CD40 ligand gene defects responsible for X-linked hyper-IgM syndrome. *Science*. 1993;259(5097):990-3.
133. Aruffo A, Farrington M, Hollenbaugh D, Li X, Milatovich A, Nonoyama S, et al. The CD40 ligand, gp39, is defective in activated T cells from patients with X-linked hyper-IgM syndrome. *Cell*. 1993;72(2):291-300.
134. DiSanto JP, Bonnefoy JY, Gauchat JF, Fischer A, de Saint Basile G. CD40 ligand mutations in x-linked immunodeficiency with hyper-IgM. *Nature*. 1993;361(6412):541-3.
135. Fuleihan R, Ramesh N, Rosen FS, Geha RS. Localization of the genetic defect in X-linked immunoglobulin deficiency with normal or elevated IgM (HIGMX-1) to the CD40 ligand gene. *Trans Assoc Am Physicians*. 1993;106:91-5.
136. Korthauer U, Graf D, Mages HW, Briere F, Padayachee M, Malcolm S, et al. Defective expression of T-cell CD40 ligand causes X-linked immunodeficiency with hyper-IgM. *Nature*. 1993;361(6412):539-41.
137. Noelle RJ, Ledbetter JA, Aruffo A. CD40 and its ligand, an essential ligand-receptor pair for thymus-dependent B-cell activation. *Immunol Today*. 1992;13(11):431-3.
138. Ferrari S, Giliani S, Insalaco A, Al-Ghonaum A, Soresina AR, Loubser M, et al. Mutations of CD40 gene cause an autosomal recessive form of immunodeficiency with hyper IgM. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2001;98(22):12614-9.

139. Kutukculer N, Moratto D, Aydinok Y, Lougaris V, Aksoylar S, Plebani A, et al. Disseminated cryptosporidium infection in an infant with hyper-IgM syndrome caused by CD40 deficiency. *J Pediatr*. 2003;142(2):194-6.
140. Miyazaki T, Kawahara A, Fujii H, Nakagawa Y, Minami Y, Liu ZJ, et al. Functional activation of Jak1 and Jak3 by selective association with IL-2 receptor subunits. *Science*. 1994;266(5187):1045-7.
141. Russell SM, Johnston JA, Noguchi M, Kawamura M, Bacon CM, Friedmann M, et al. Interaction of IL-2R beta and gamma c chains with Jak1 and Jak3: implications for XSCID and XCID. *Science*. 1994;266(5187):1042-5.
142. Puel A, Picard C, Ku CL, Smahi A, Casanova JL. Inherited disorders of NF-kappaB-mediated immunity in man. *Curr Opin Immunol*. 2004;16(1):34-41.
143. Courtois G, Smahi A, Reichenbach J, Doffinger R, Cancrini C, Bonnet M, et al. A hypermorphic IkappaBalpha mutation is associated with autosomal dominant anhidrotic ectodermal dysplasia and T cell immunodeficiency. *J Clin Invest*. 2003;112(7):1108-15.
144. McDonald DR, Mooster JL, Reddy M, Bawle E, Secord E, Geha RS. Heterozygous N-terminal deletion of IkappaBalpha results in functional nuclear factor kappaB haploinsufficiency, ectodermal dysplasia, and immune deficiency. *J Allergy Clin Immunol*. 2007;120(4):900-7.
145. Hanna S, Etzioni A. New host defense mechanisms against *Candida* species clarify the basis of clinical phenotypes. *J Allergy Clin Immunol*. 2011;127(6):1433-7.
146. Shiow LR, Roadcap DW, Paris K, Watson SR, Grigorova IL, Lebet T, et al. The actin regulator coronin 1A is mutant in a thymic egress-deficient mouse strain and in a patient with severe combined immunodeficiency. *Nat Immunol*. 2008;9(11):1307-15.
147. Moshous D, Martin E, Carpentier W, Lim A, Callebaut I, Canioni D, et al. Whole-exome sequencing identifies Coronin-1A deficiency in 3 siblings with immunodeficiency and EBV-associated B-cell lymphoproliferation. *J Allergy Clin Immunol*. 2013;131(6):1594-603.
148. Fu W, O'Connor TD, Jun G, Kang HM, Abecasis G, Leal SM, et al. Analysis of 6,515 exomes reveals the recent origin of most human protein-coding variants. *Nature*. 2013;493(7431):216-20.
149. Gonzaga-Jauregui C, Lupski JR, Gibbs RA. Human genome sequencing in health and disease. *Annu Rev Med*. 2012;63:35-61.
150. Kuhlénbaumer G, Hullmann J, Appenzeller S. Novel genomic techniques open new avenues in the analysis of monogenic disorders. *Hum Mutat*. 2011;32(2):144-51.
151. Lopez-Herrera G, Tampella G, Pan-Hammarstrom Q, Herholz P, Trujillo-Vargas CM, Phadwal K, et al. Deleterious mutations in LRBA are associated with a syndrome of immune deficiency and autoimmunity. *Am J Hum Genet*. 2012;90(6):986-1001.

152. Bamshad MJ, Ng SB, Bigham AW, Tabor HK, Emond MJ, Nickerson DA, et al. Exome sequencing as a tool for Mendelian disease gene discovery. *Nat Rev Genet.* 2011;12(11):745-55.
153. Chou J, Ohsumi TK, Geha RS. Use of whole exome and genome sequencing in the identification of genetic causes of primary immunodeficiencies. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2012;12(6):623-8.
154. Botstein D, Risch N. Discovering genotypes underlying human phenotypes: past successes for mendelian disease, future approaches for complex disease. *Nat Genet.* 2003;33 Suppl:228-37.
155. Clark MJ, Chen R, Lam HY, Karczewski KJ, Chen R, Euskirchen G, et al. Performance comparison of exome DNA sequencing technologies. *Nat Biotechnol.* 2011;29(10):908-14.
156. Lupski JR. Retrotransposition and structural variation in the human genome. *Cell.* 2010;141(7):1110-2.
157. Adzhubei IA, Schmidt S, Peshkin L, Ramensky VE, Gerasimova A, Bork P, et al. A method and server for predicting damaging missense mutations. *Nat Methods.* 2010;7(4):248-9.
158. Ng PC, Henikoff S. SIFT: Predicting amino acid changes that affect protein function. *Nucleic Acids Res.* 2003;31(13):3812-4.
159. Schwarz JM, Rodelsperger C, Schuelke M, Seelow D. MutationTaster evaluates disease-causing potential of sequence alterations. *Nat Methods.* 2010;7(8):575-6.
160. Stone EA, Cooper GM, Sidow A. Trade-offs in detecting evolutionarily constrained sequence by comparative genomics. *Annu Rev Genomics Hum Genet.* 2005;6:143-64.
161. Mao H, Yang W, Lee PP, Ho MH, Yang J, Zeng S, et al. Exome sequencing identifies novel compound heterozygous mutations of IL-10 receptor 1 in neonatal-onset Crohn's disease. *Genes Immun.* 2012;13(5):437-42.
162. Alkuraya FS. Homozygosity mapping: one more tool in the clinical geneticist's toolbox. *Genet Med.* 2010;12(4):236-9.
163. Gibbs JR, Singleton A. Application of genome-wide single nucleotide polymorphism typing: simple association and beyond. *PLoS Genet.* 2006;2(10):e150.
164. Alangari A, Alsultan A, Adly N, Massaad MJ, Kiani IS, Aljebreen A, et al. LPS-responsive beige-like anchor (LRBA) gene mutation in a family with inflammatory bowel disease and combined immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol.* 2012;130(2):481-8 e2.
165. Crequer A, Troeger A, Patin E, Ma CS, Picard C, Pedergrnana V, et al. Human RHOH deficiency causes T cell defects and susceptibility to EV-HPV infections. *J Clin Invest.* 2012;122(9):3239-47.

166. Gu Y, Chae HD, Siefring JE, Jasti AC, Hildeman DA, Williams DA. RhoH GTPase recruits and activates Zap70 required for T cell receptor signaling and thymocyte development. *Nat Immunol.* 2006;7(11):1182-90.
167. Pelak K, Shianna KV, Ge D, Maia JM, Zhu M, Smith JP, et al. The characterization of twenty sequenced human genomes. *PLoS Genet.* 2010;6(9):e1001111.
168. Hahn CN, Chong CE, Carmichael CL, Wilkins EJ, Brautigan PJ, Li XC, et al. Heritable GATA2 mutations associated with familial myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia. *Nat Genet.* 2011;43(10):1012-7.
169. Hsu AP, Sampaio EP, Khan J, Calvo KR, Lemieux JE, Patel SY, et al. Mutations in GATA2 are associated with the autosomal dominant and sporadic monocytopenia and mycobacterial infection (MonoMAC) syndrome. *Blood.* 2011;118(10):2653-5.
170. Feldmann J, Callebaut I, Raposo G, Certain S, Bacq D, Dumont C, et al. Munc13-4 is essential for cytolytic granules fusion and is mutated in a form of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis (FHL3). *Cell.* 2003;115(4):461-73.
171. Meeths M, Chiang SC, Wood SM, Entesarian M, Schlums H, Bang B, et al. Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 3 (FHL3) caused by deep intronic mutation and inversion in UNC13D. *Blood.* 2011;118(22):5783-93.
172. Hsu AP, Johnson KD, Falcone EL, Sanalkumar R, Sanchez L, Hickstein DD, et al. GATA2 haploinsufficiency caused by mutations in a conserved intronic element leads to MonoMAC syndrome. *Blood.* 2013;121(19):3830-7, S1-7.
173. Recher M, Fried AJ, Massaad MJ, Kim HY, Rizzini M, Frugoni F, et al. Intronic SH2D1A mutation with impaired SAP expression and agammaglobulinemia. *Clin Immunol.* 2013;146(2):84-9.
174. Talkowski ME, Ernst C, Heilbut A, Chiang C, Hanscom C, Lindgren A, et al. Next-generation sequencing strategies enable routine detection of balanced chromosome rearrangements for clinical diagnostics and genetic research. *Am J Hum Genet.* 2011;88(4):469-81.
175. Boyum A. Isolation of leucocytes from human blood. Further observations. Methylcellulose, dextran, and ficoll as erythrocyteaggregating agents. *Scand J Clin Lab Invest Suppl.* 1968;97:31-50.
176. Condino-Neto A, Newburger PE. NADPH oxidase activity and cytochrome b558 content of human Epstein-Barr-virus-transformed B lymphocytes correlate with expression of genes encoding components of the oxidase system. *Arch Biochem Biophys.* 1998;360(2):158-64.
177. Condino-Neto A, Newburger PE. Interferon-gamma improves splicing efficiency of CYBB gene transcripts in an interferon-responsive variant of chronic granulomatous disease due to a splice site consensus region mutation. *Blood.* 2000;95(11):3548-54.

178. Nilsson K, Klein G, Henle W, Henle G. The establishment of lymphoblastoid lines from adult and fetal human lymphoid tissue and its dependence on EBV. *Int J Cancer*. 1971;8(3):443-50.
179. Volkman DJ, Buescher ES, Gallin JI, Fauci AS. B cell lines as models for inherited phagocytic diseases: abnormal superoxide generation in chronic granulomatous disease and giant granules in Chediak-Higashi syndrome. *J Immunol*. 1984;133(6):3006-9.
180. Lander ES, Botstein D. Homozygosity mapping: a way to map human recessive traits with the DNA of inbred children. *Science*. 1987;236(4808):1567-70.
181. Adzhubei I, Jordan DM, Sunyaev SR. Predicting functional effect of human missense mutations using PolyPhen-2. *Curr Protoc Hum Genet*. 2013;Chapter 7:Unit7 20.
182. Parthiban V, Gromiha MM, Schomburg D. CUPSAT: prediction of protein stability upon point mutations. *Nucleic Acids Res*. 2006;34(Web Server issue):W239-42.
183. Majek P, Elber R. A coarse-grained potential for fold recognition and molecular dynamics simulations of proteins. *Proteins*. 2009;76(4):822-36.
184. Elber R, Chen DP, Rojewska D, Eisenberg R. Sodium in gramicidin: an example of a permion. *Biophys J*. 1995;68(3):906-24.
185. Newburger PE, Skalnik DG, Hopkins PJ, Eklund EA, Curnutte JT. Mutations in the promoter region of the gene for gp91-phox in X-linked chronic granulomatous disease with decreased expression of cytochrome b558. *J Clin Invest*. 1994;94(3):1205-11.
186. Patino PJ, Perez JE, Lopez JA, Condino-Neto A, Grumach AS, Botero JH, et al. Molecular analysis of chronic granulomatous disease caused by defects in gp91-phox. *Hum Mutat*. 1999;13(1):29-37.
187. Chomczynski P, Sacchi N. Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. *Anal Biochem*. 1987;162(1):156-9.
188. Luengo-Blanco M, Prando C, Bustamante J, Aragao-Filho WC, Pereira PV, Rehder J, et al. Essential role of nuclear factor-kappaB for NADPH oxidase activity in normal and anhidrotic ectodermal dysplasia leukocytes. *Blood*. 2008;112(4):1453-60.
189. Pannetier C, Cochet M, Darche S, Casrouge A, Zoller M, Kourilsky P. The sizes of the CDR3 hypervariable regions of the murine T-cell receptor beta chains vary as a function of the recombined germ-line segments. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1993;90(9):4319-23.
190. Pannetier C, Even J, Kourilsky P. T-cell repertoire diversity and clonal expansions in normal and clinical samples. *Immunol Today*. 1995;16(4):176-81.
191. Pichlmair A, Kandasamy K, Alvisi G, Mulhern O, Sacco R, Habjan M, et al. Viral immune modulators perturb the human molecular network by common and unique strategies. *Nature*. 2012;487(7408):486-90.

192. Berkowska MA, van der Burg M, van Dongen JJ, van Zelm MC. Checkpoints of B cell differentiation: visualizing Ig-centric processes. *Ann N Y Acad Sci.* 2011;1246:11-25.
193. Alamyar E, Duroux P, Lefranc MP, Giudicelli V. IMGT((R)) tools for the nucleotide analysis of immunoglobulin (IG) and T cell receptor (TR) V-(D)-J repertoires, polymorphisms, and IG mutations: IMGT/V-QUEST and IMGT/HighV-QUEST for NGS. *Methods Mol Biol.* 2012;882:569-604.
194. Orange JS, Harris KE, Andzelm MM, Valter MM, Geha RS, Strominger JL. The mature activating natural killer cell immunologic synapse is formed in distinct stages. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2003;100(24):14151-6.
195. Morbach H, Eichhorn EM, Liese JG, Girschick HJ. Reference values for B cell subpopulations from infancy to adulthood. *Clin Exp Immunol.* 2010;162(2):271-9.
196. Gough SC, Walker LS, Sansom DM. CTLA4 gene polymorphism and autoimmunity. *Immunol Rev.* 2005;204:102-15.
197. Kimura H, Kato Y, Shimizu S, Takano K, Sato K. Association of polymorphism at position 49 in exon 1 of the cytotoxic T-lymphocyte-associated factor 4 gene with Graves' disease refractory to medical treatment, but not with amiodarone-associated thyroid dysfunction. *Thyroid.* 2009;19(9):975-81.
198. Barreto M, Santos E, Ferreira R, Fesel C, Fontes MF, Pereira C, et al. Evidence for CTLA4 as a susceptibility gene for systemic lupus erythematosus. *Eur J Hum Genet.* 2004;12(8):620-6.
199. Guo B, Su TT, Rawlings DJ. Protein kinase C family functions in B-cell activation. *Curr Opin Immunol.* 2004;16(3):367-73.
200. Zouali M, Sarmay G. B lymphocyte signaling pathways in systemic autoimmunity: implications for pathogenesis and treatment. *Arthritis Rheum.* 2004;50(9):2730-41.
201. Miyamoto A, Nakayama K, Imaki H, Hirose S, Jiang Y, Abe M, et al. Increased proliferation of B cells and auto-immunity in mice lacking protein kinase Cdelta. *Nature.* 2002;416(6883):865-9.
202. Teachey DT. New advances in the diagnosis and treatment of autoimmune lymphoproliferative syndrome. *Curr Opin Pediatr.* 2012;24(1):1-8.
203. Griner EM, Kazanietz MG. Protein kinase C and other diacylglycerol effectors in cancer. *Nat Rev Cancer.* 2007;7(4):281-94.
204. Limnander A, Depeille P, Freedman TS, Liou J, Leitges M, Kurosaki T, et al. STIM1, PKC-delta and RasGRP set a threshold for proapoptotic Erk signaling during B cell development. *Nat Immunol.* 2011;12(5):425-33.
205. Ombrello MJ, Remmers EF, Sun G, Freeman AF, Datta S, Torabi-Parizi P, et al. Cold urticaria, immunodeficiency, and autoimmunity related to PLCG2 deletions. *N Engl J Med.* 2012;366(4):330-8.

206. Zhou Q, Lee GS, Brady J, Datta S, Katan M, Sheikh A, et al. A hypermorphic missense mutation in PLCG2, encoding phospholipase Cgamma2, causes a dominantly inherited autoinflammatory disease with immunodeficiency. *Am J Hum Genet.* 2012;91(4):713-20.
207. Hartwig JH, Thelen M, Rosen A, Janmey PA, Nairn AC, Aderem A. MARCKS is an actin filament crosslinking protein regulated by protein kinase C and calcium-calmodulin. *Nature.* 1992;356(6370):618-22.
208. Ramsden JJ. MARCKS: a case of molecular exaptation? *Int J Biochem Cell Biol.* 2000;32(5):475-9.
209. Trautwein C, van der Geer P, Karin M, Hunter T, Chojkier M. Protein kinase A and C site-specific phosphorylations of LAP (NF-IL6) modulate its binding affinity to DNA recognition elements. *J Clin Invest.* 1994;93(6):2554-61.
210. Angulo I, Vadas O, Garcon F, Banham-Hall E, Plagnol V, Leahy TR, et al. Phosphoinositide 3-kinase delta gene mutation predisposes to respiratory infection and airway damage. *Science.* 2013;342(6160):866-71.
211. Lucas CL, Zhang Y, Venida A, Wang Y, Hughes J, McElwee J, et al. Heterozygous splice mutation in PIK3R1 causes human immunodeficiency with lymphoproliferation due to dominant activation of PI3K. *J Exp Med.* 2014;211(13):2537-47.
212. Durandy A, Kracker S, Fischer A. Primary antibody deficiencies. *Nature reviews Immunology.* 2013;13(7):519-33.
213. Sun SC. The noncanonical NF-kappaB pathway. *Immunol Rev.* 2012;246(1):125-40.
214. Miyawaki S, Nakamura Y, Suzuka H, Koba M, Yasumizu R, Ikehara S, et al. A new mutation, *aly*, that induces a generalized lack of lymph nodes accompanied by immunodeficiency in mice. *European journal of immunology.* 1994;24(2):429-34.
215. Shinkura R, Kitada K, Matsuda F, Tashiro K, Ikuta K, Suzuki M, et al. *A*lymphoplasia is caused by a point mutation in the mouse gene encoding *Nf-kappa b*-inducing kinase. *Nature genetics.* 1999;22(1):74-7.
216. Yin L, Wu L, Wesche H, Arthur CD, White JM, Goeddel DV, et al. Defective lymphotoxin-beta receptor-induced NF-kappaB transcriptional activity in NIK-deficient mice. *Science.* 2001;291(5511):2162-5.
217. Comans-Bitter WM, de Groot R, van den Beemd R, Neijens HJ, Hop WC, Groeneveld K, et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood. Reference values for lymphocyte subpopulations. *J Pediatr.* 1997;130(3):388-93.
218. Ikinciogullari A, Kendirli T, Dogu F, Egin Y, Reisli I, Cin S, et al. Peripheral blood lymphocyte subsets in healthy Turkish children. *Turk J Pediatr.* 2004;46(2):125-30.

219. Nolen B, Taylor S, Ghosh G. Regulation of protein kinases; controlling activity through activation segment conformation. *Mol Cell*. 2004;15(5):661-75.
220. de Leon-Boenig G, Bowman KK, Feng JA, Crawford T, Everett C, Franke Y, et al. The crystal structure of the catalytic domain of the NF-kappaB inducing kinase reveals a narrow but flexible active site. *Structure*. 2012;20(10):1704-14.
221. Lin SC, Stavnezer J. Activation of NF-kappaB/Rel by CD40 engagement induces the mouse germ line immunoglobulin Cgamma1 promoter. *Mol Cell Biol*. 1996;16(9):4591-603.
222. Song HY, Regnier CH, Kirschning CJ, Goeddel DV, Rothe M. Tumor necrosis factor (TNF)-mediated kinase cascades: bifurcation of nuclear factor-kappaB and c-jun N-terminal kinase (JNK/SAPK) pathways at TNF receptor-associated factor 2. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(18):9792-6.
223. Xiao G, Harhaj EW, Sun SC. NF-kappaB-inducing kinase regulates the processing of NF-kappaB2 p100. *Mol Cell*. 2001;7(2):401-9.
224. Song YJ, Kang MS. Roles of TRAF2 and TRAF3 in Epstein-Barr virus latent membrane protein 1-induced alternative NF-kappaB activation. *Virus Genes*. 2010;41(2):174-80.
225. Matsushima A, Kaisho T, Rennert PD, Nakano H, Kurosawa K, Uchida D, et al. Essential role of nuclear factor (NF)-kappaB-inducing kinase and inhibitor of kappaB (IkappaB) kinase alpha in NF-kappaB activation through lymphotoxin beta receptor, but not through tumor necrosis factor receptor I. *J Exp Med*. 2001;193(5):631-6.
226. Yilmaz ZB, Weih DS, Sivakumar V, Weih F. RelB is required for Peyer's patch development: differential regulation of p52-RelB by lymphotoxin and TNF. *Embo J*. 2003;22(1):121-30.
227. Hacker H, Chi L, Rehg JE, Redecke V. NIK prevents the development of hypereosinophilic syndrome-like disease in mice independent of IKKalpha activation. *J Immunol*. 2012;188(9):4602-10.
228. Jin W, Zhou XF, Yu J, Cheng X, Sun SC. Regulation of Th17 cell differentiation and EAE induction by MAP3K NIK. *Blood*. 2009;113(26):6603-10.
229. van Zelm MC, Bartol SJ, Driessen GJ, Mascart F, Reisli I, Franco JL, et al. Human CD19 and CD40L deficiencies impair antibody selection and differentially affect somatic hypermutation. *The Journal of allergy and clinical immunology*. 2014.
230. Tangye SG, Ma CS, Brink R, Deenick EK. The good, the bad and the ugly - TFH cells in human health and disease. *Nature reviews Immunology*. 2013;13(6):412-26.
231. Tsubata T, Wu J, Honjo T. B-cell apoptosis induced by antigen receptor crosslinking is blocked by a T-cell signal through CD40. *Nature*. 1993;364(6438):645-8.

232. Wurster AL, Withers DJ, Uchida T, White MF, Grusby MJ. Stat6 and IRS-2 cooperate in interleukin 4 (IL-4)-induced proliferation and differentiation but are dispensable for IL-4-dependent rescue from apoptosis. *Mol Cell Biol*. 2002;22(1):117-26.
233. Kotlarz D, Beier R, Murugan D, Diestelhorst J, Jensen O, Boztug K, et al. Loss of interleukin-10 signaling and infantile inflammatory bowel disease: implications for diagnosis and therapy. *Gastroenterology*. 2012;143(2):347-55.
234. Salzer E, Kansu A, Sic H, Majek P, Ikinciogullari A, Dogu FE, et al. Early-onset inflammatory bowel disease and common variable immunodeficiency-like disease caused by IL-21 deficiency. *J Allergy Clin Immunol*. 2014;133(6):1651-9 e12.
235. Gardam S, Sierro F, Basten A, Mackay F, Brink R. TRAF2 and TRAF3 signal adapters act cooperatively to control the maturation and survival signals delivered to B cells by the BAFF receptor. *Immunity*. 2008;28(3):391-401.
236. Warnatz K, Salzer U, Rizzi M, Fischer B, Gutenberger S, Bohm J, et al. B-cell activating factor receptor deficiency is associated with an adult-onset antibody deficiency syndrome in humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2009;106(33):13945-50.
237. Sasaki Y, Casola S, Kutok JL, Rajewsky K, Schmidt-Supprian M. TNF family member B cell-activating factor (BAFF) receptor-dependent and -independent roles for BAFF in B cell physiology. *Journal of immunology*. 2004;173(4):2245-52.
238. Roberts T, Snow EC. Cutting edge: recruitment of the CD19/CD21 coreceptor to B cell antigen receptor is required for antigen-mediated expression of Bcl-2 by resting and cycling hen egg lysozyme transgenic B cells. *J Immunol*. 1999;162(8):4377-80.
239. Huenecke S, Behl M, Fadler C, Zimmermann SY, Bochennek K, Tramsen L, et al. Age-matched lymphocyte subpopulation reference values in childhood and adolescence: application of exponential regression analysis. *Eur J Haematol*. 2008;80(6):532-9.
240. Kaech SM, Tan JT, Wherry EJ, Konieczny BT, Surh CD, Ahmed R. Selective expression of the interleukin 7 receptor identifies effector CD8 T cells that give rise to long-lived memory cells. *Nat Immunol*. 2003;4(12):1191-8.
241. Rowe AM, Murray SE, Raue HP, Koguchi Y, Slifka MK, Parker DC. A Cell-Intrinsic Requirement for NF-kappaB-Inducing Kinase in CD4 and CD8 T Cell Memory. *Journal of immunology*. 2013;191(7):3663-72.
242. Mahajan S, Cervera A, MacLeod M, Fillatreau S, Perona-Wright G, Meek S, et al. The role of ICOS in the development of CD4 T cell help and the reactivation of memory T cells. *European journal of immunology*. 2007;37(7):1796-808.
243. Hu H, Wu X, Jin W, Chang M, Cheng X, Sun SC. Noncanonical NF-kappaB regulates inducible costimulator (ICOS) ligand expression and T follicular helper cell development. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2011;108(31):12827-32.

244. Buckley RH, Schiff RI, Schiff SE, Markert ML, Williams LW, Harville TO, et al. Human severe combined immunodeficiency: genetic, phenotypic, and functional diversity in one hundred eight infants. *J Pediatr*. 1997;130(3):378-87.
245. Dvorak CC, Cowan MJ, Logan BR, Notarangelo LD, Griffith LM, Puck JM, et al. The natural history of children with severe combined immunodeficiency: baseline features of the first fifty patients of the primary immune deficiency treatment consortium prospective study 6901. *J Clin Immunol*. 2013;33(7):1156-64.
246. Yao CM, Han XH, Zhang YD, Zhang H, Jin YY, Cao RM, et al. Clinical characteristics and genetic profiles of 44 patients with severe combined immunodeficiency (SCID): report from Shanghai, China (2004-2011). *J Clin Immunol*. 2013;33(3):526-39.
247. Buckley RH. Molecular defects in human severe combined immunodeficiency and approaches to immune reconstitution. *Annu Rev Immunol*. 2004;22:625-55.
248. Recio MJ, Moreno-Pelayo MA, Kilic SS, Guardo AC, Sanal O, Allende LM, et al. Differential biological role of CD3 chains revealed by human immunodeficiencies. *J Immunol*. 2007;178(4):2556-64.
249. Chan K, Puck JM. Development of population-based newborn screening for severe combined immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol*. 2005;115(2):391-8.
250. Serana F, Chiarini M, Zanotti C, Sottini A, Bertoli D, Bosio A, et al. Use of V(D)J recombination excision circles to identify T- and B-cell defects and to monitor the treatment in primary and acquired immunodeficiencies. *J Transl Med*. 2013;11:119.
251. Venkitaraman AR, Cowling RJ. Interleukin-7 induces the association of phosphatidylinositol 3-kinase with the alpha chain of the interleukin-7 receptor. *Eur J Immunol*. 1994;24(9):2168-74.
252. Giliani S, Mori L, de Saint Basile G, Le Deist F, Rodriguez-Perez C, Forino C, et al. Interleukin-7 receptor alpha (IL-7Ralpha) deficiency: cellular and molecular bases. Analysis of clinical, immunological, and molecular features in 16 novel patients. *Immunol Rev*. 2005;203:110-26.
253. Giliani S, Bonfim C, de Saint Basile G, Lanzi G, Brousse N, Koliski A, et al. Omenn syndrome in an infant with IL7RA gene mutation. *J Pediatr*. 2006;148(2):272-4.
254. Butte MJ, Haines C, Bonilla FA, Puck J. IL-7 receptor deficient SCID with a unique intronic mutation and post-transplant autoimmunity due to chronic GVHD. *Clin Immunol*. 2007;125(2):159-64.

ANEXOS

ANEXO A – Estudo de Pacientes com Suspeita de Imunodeficiência Primária

Paciente encaminhado por:					
Nome	H.C.	Ano Nascimento _____	Sexo M F	Idade _____ Diagnóstico Anos _____ Meses _____	
	Tel:				
Consangüinidade Sim () Não () Tipo _____		Nº. Gesta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NE*	No. filhos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NE*	Sadios: Sim () Não () Infec.repet. Sim () Não ()	
Antecedentes Familiares				Heredograma	
Falecimentos precoces Sim () Não ()		Parentesco _____	Idade de óbito _____	Dx IDP Sim () Não () DGC Sim () Não () Outra _____	
Vacinas BCG Idade de Reação Adenomegalias Sim () Não () aplicação adversa BCG disseminada Não especificado _____ meses Sim () Não () Outra _____ ()					
Hep B – S () N () NE*	DPT/dT– S () N () NE*	Tríplice – S () N () NE*	Hib – S () N () NE*	Varicela – S () N () NE*	VTV – S () N () NE*
Sabin – S () N () NE*	Salk – S () N () NE*	Sarampo – S () N () NE*	Mening – S () N () NE*	Pneumo S () N () NE*	Pólio – S () N () NE*
Reação adversa? () sim () não.			Especificar: vacina _____ Manifestação _____		
DNPM	BDNPM S () N () NE*			RDNPM S () N () NE*. Detalhar:	
DPE	>p90% S () N ()	<p10% S () N (0)		>p10% e <p90% S () N (0)	
1ª manifestação			Motivo de Estudo		
Idade _____ ano _____ meses		Local		Infec. Repetição Sim () Não () Manifest. Grave Sim () Não () História Familiar Sim () Não () Outro Sim () Não (0). Especificar: _____	

Manifestações	No. de episódios	Microorg. isolado Sim () Não ()	Microorganismo Isolado	Localização	
1 Otite					
2 Pneumonia					
3 Pneumonia / DP					
3 Amigdalite					
4 Linfonodo					
5 ITU					
6 Meningite					
7 Artrite					
8 Osteomielite					
9 Diarréia					
10 Infecções de Pele Especificar:					
11 Artrite					
12 Seps					
13 Colangite esclerosante					
14 Outras					
Granulomas Sim ()Não (0)	Nº episódios	Localização 1 TGI 2 Urinário	3 Cardíaco Outra: _____	Microorg. Isolado	No. Hospitalizações
Exames Laboratoriais – início investigação					
HMG	Hb	Leuco	NT	LT	PLQ
Imunoglobulinas (antes da reposição de Gama)	IgG	IgM	IgA	IgE	
Complemento	C3	C4	CH50		
Quimiotaxia		Mono	PMN		
Mono	Mig.Espontânea				
PMN	Mig estim. soro nl				
	Mig. estim. soro pcte				

Superóxido	Mono	PMN	NBT	
Espontâneo			Repous	Estimulad
Estimulado			o	o
Tratamento	Administração	Tratamento atual	Óbito	Causa
1 IFN γ	Sim () Não (0)	Sim () Não (0)	Sim () Não (0)	1 Conhecida
2 ITRA	Data de início		Idade	2 Desconhecida
3 FLUCO	_____		_____	
4 SMX +TMP	—		Autópsia	Laudó
5 Prednisona			Sim () Não ()	
6 TMO 7 Outros				

= não especificado

OUTRAS MANIFESTAÇÕES – LIVRE RELATO DE OCORRÊNCIAS

ANEXO B.1 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (maiores de 18 anos)

ESTUDO: ESTUDO DE NOVOS DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA.

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.

Eu (nome e profissão), _____, residente e domiciliado a _____, portador da cédula de identidade, RG _____, e inscrito no CPF/MF..... nascido(a) em ____ / ____ / ____ , abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a) do projeto intitulado “**Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária.**”, declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.

O principal objetivo deste estudo é analisar o espectro clínico, imunológicos, epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo correlação genótipo x fenótipo de pacientes brasileiros com Imunodeficiência Primária.

Estou ciente que:

O estudo se faz necessário para que se possa analisar o espectro clínico, imunológicos, epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo correlação genótipo x fenótipo de pacientes com Imunodeficiência Primária;

Serão realizados:

Exame de sangue consistirá de não mais de 20 mL de sangue a serem extraídos em um período de um mês, sendo que cada amostra será de não mais de 20 mL. Os riscos da retirada de sangue são hematoma local (rouxidão), algum desconforto e, raramente, tontura.

Essa(s) coleta(s) será (ao) feita(s) apenas para este estudo e, com indivíduos portadores de Imunodeficiência Primária, em nada influenciará (influenciarão) o meu tratamento; não vai (vão) me curar; não vai (vão) me causar nenhum problema, exceto o pequeno incômodo de dor no momento da coleta (introdução da agulha para retirada do sangue);

A participação neste projeto não tem objetivo de me submeter a um tratamento, bem como não me acarretará qualquer ônus pecuniário com relação aos procedimentos médico-clínico-terapêuticos efetuados com o estudo;

Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;

A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não virá interferir no atendimento ou tratamento médico;

Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados;

Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final desta pesquisa:

- ☐ Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.
- ☐ Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.

Estes estudos podem melhorar o entendimento da doença levando a formas mais eficazes de diagnóstico e tratamento no futuro. É provável que o voluntário em questão não seja beneficiário direto destes avanços.

Quaisquer dúvidas, que possam ocorrer com relação a esse estudo, poderão ser contatados:

Dr. Antonio Condino Neto na Universidade de São Paulo, Laboratório de Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo –SP 05508-900, telefone (11) 3091-7435.

MSc Stefanie Klaver Flores na Universidade de São Paulo, Laboratório de Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo-SP 05508-900, Telefone (11) 8038-1035 ou (11) 3091-7435.

São Paulo, _____ de _____ de 20 ____.

() Paciente

Testemunha 1 : _____

Nome / RG / Telefone

Testemunha 2 : _____

Nome / RG / Telefone

Responsável pelo Projeto: _____

MSc. Stefanie Klaver Flores

Telefone (11) 3091-7435

ANEXO B.2 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (menores de 18 anos)

ESTUDO: ESTUDO DE NOVOS DEFEITOS GENÉTICO-MOLECULARES EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA.

Seu filho está sendo convidado a participar do presente estudo. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos (ou estaremos) fazendo. Leia atentamente. Caso tenha dúvidas, teremos prazer em esclarecê-las. Se concordar, o documento será assinado e só então daremos início ao estudo. Sua colaboração será muito importante para nós. Mas, se quiser desistir a qualquer momento, isto não causará nenhum prejuízo, nem a você, nem ao(à) seu (sua) filho(a).

Eu....., RG, abaixo assinado (a), concordo de livre e espontânea vontade que meu(minha) filho(a) nascido(a) em ____ / ____ /_____, seja voluntário do projeto **“Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com diagnóstico clínico de imunodeficiência primária”**. Declaro que obtive todas as informações necessárias e que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas.

O principal objetivo deste estudo é analisar o espectro clínico, imunológicos, epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo correlação genótipo x fenótipo de pacientes com Imunodeficiência Primária.

Estou ciente de que:

O estudo se faz necessário para que se possa analisar o espectro clínico, imunológicos, epidemiológicos e defeitos genético-moleculares estabelecendo correlação genótipo x fenótipo de pacientes com Imunodeficiência Primária;

Serão feitas do(a) meu(minha) filho(a): coleta de sangue consistirá de não mais de 20 mL de sangue a serem extraídos em um período de 1 meses, sendo que cada amostra será de não mais de 20 mL. Os riscos da retirada de sangue são hematoma local (rouxidão), algum desconforto e, raramente, tontura;

Estas coletas serão feitas apenas para este estudo e em nada influenciarão o tratamento de meu (minha) filho(a); e não vai (vão) me causar nenhum problema, exceto o pequeno incômodo de dor no momento da coleta (introdução da agulha para retirada do sangue);

A participação neste estudo não tem fins terapêuticos e será sem custo algum para mim;

Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no momento em que desejar, sem necessidade de dar qualquer explicação;

A desistência não causará nenhum prejuízo a mim, nem (a) meu (minha) filho(a), nem interferirá no atendimento ou tratamento médicos a que ele(ela) estiver sendo submetido;

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo em que sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o meu nome, nem o de meu filho sejam mencionados;

Caso eu deseje, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final deste estudo; Poderei contatar a Secretaria da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – ICB/USP - no Fone 3091-7733 para recursos ou reclamações em relação ao presente estudo.

Nós como pais, concordamos em passar o telefone e endereço para o pesquisador.

Contatos dos pais:

Nome pai: _____

Nome mãe: _____

Telefone residencial: _____ Telefone celular: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Quaisquer dúvidas, que possam ocorrer com relação a esse estudo, poderão ser contatadas:

Dr. Antonio Condino Neto na Universidade de São Paulo, Laboratório de Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo –SP 05508-900, telefone (11) 3091 7435.

MSc Stefanie Klaver Flores na Universidade de São Paulo, Laboratório de Imunodeficiência, Av. Prof. Lineu Prestes 1730, São Paulo-SP 05508-900, Telefone (11) 8038-1035 ou (11) 3091-7435.

OBS: Assinalar abaixo com (x):

() Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.

() Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.

São Paulo, _____ de _____ de 20 ____.

() Paciente / () Responsável

Testemunha 1 : _____

Nome / RG / Telefone

Testemunha 2 : _____

Nome / RG / Telefone

Responsável pelo Projeto: _____

MSc Stefanie Klaver Flores

Telefone: (11) 3091-7435

ANEXO C - B-cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of protein kinase C δ

From bloodjournal.hematologylibrary.org by guest on April 26, 2013. For personal use only.

blood

2013 121: 3112-3116
Prepublished online January 14, 2013;
doi:10.1182/blood-2012-10-460741

B-cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of protein kinase C δ

Elisabeth Salzer, Elisangela Santos-Valente, Stefanie Klaver, Sol A. Ban, Wolfgang Emminger, Nina Kathrin Prengemann, Wojciech Garncarz, Leonhard Müllauer, Renate Kain, Heidrun Boztug, Andreas Heitger, Klaus Arbeiter, Franz Eitelberger, Markus G. Seidel, Wolfgang Holter, Arnold Pollak, Winfried F. Pickl, Elisabeth Förster-Waldl and Kaan Boztug

Updated information and services can be found at:

<http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/121/16/3112.full.html>

Articles on similar topics can be found in the following Blood collections

[Free Research Articles](#) (1682 articles)

[Immunobiology](#) (4998 articles)

[Pediatric Hematology](#) (234 articles)

Information about reproducing this article in parts or in its entirety may be found online at:

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/site/misc/rights.xhtml#repub_requests

Information about ordering reprints may be found online at:

<http://bloodjournal.hematologylibrary.org/site/misc/rights.xhtml#reprints>

Information about subscriptions and ASH membership may be found online at:

<http://bloodjournal.hematologylibrary.org/site/subscriptions/index.xhtml>

Blood (print ISSN 0006-4971, online ISSN 1528-0020), is published weekly by the American Society of Hematology, 2021 L St, NW, Suite 900, Washington DC 20036.

Copyright 2011 by The American Society of Hematology; all rights reserved.

IMMUNOBIOLOGY

B-cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of protein kinase C δ

Elisabeth Salzer,¹ Elisangela Santos-Valente,¹ Stefanie Klaver,^{1,2} Sol A. Ban,¹ Wolfgang Emminger,³ Nina Kathrin Prengemann,¹ Wojciech Garncarz,¹ Leonhard Müllauer,⁴ Renate Kain,⁴ Heidrun Boztug,⁵ Andreas Heitger,⁵ Klaus Arbeiter,³ Franz Eitelberger,⁶ Markus G. Seidel,⁵ Wolfgang Holter,⁵ Arnold Pollak,³ Winfried F. Pickl,⁷ Elisabeth Förster-Waldl,³ and Kaan Boztug^{1,3}

¹CeMM Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria; ²Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil; ³Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, ⁴Clinical Institute of Pathology, and ⁵Department of Pediatrics, St. Anna Kinderspital and Children's Cancer Research Institute, Medical University of Vienna, Vienna, Austria; ⁶Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Klinikum Wels-Grieskirchen Wels, Austria; and ⁷Christian Doppler Laboratory for Immunomodulation and Institute of Immunology, Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

Key Points

- PRKCD deficiency causes a novel primary immunodeficiency with B-cell deficiency and severe autoimmunity.
- Protein kinase C δ may represent a key factor controlling immune homeostasis and autoimmunity.

Primary B-cell disorders comprise a heterogeneous group of inherited immunodeficiencies, often associated with autoimmunity causing significant morbidity. The underlying genetic etiology remains elusive in the majority of patients. In this study, we investigated a patient from a consanguineous family suffering from recurrent infections and severe lupuslike autoimmunity. Immunophenotyping revealed progressive decrease of CD19⁺ B cells, a defective class switch indicated by low numbers of IgM- and IgG-memory B cells, as well as increased numbers of CD21^{low} B cells. Combined homozygosity mapping and exome sequencing identified a biallelic splice-site mutation in *protein C kinase δ* (*PRKCD*), causing the absence of the corresponding protein product. Consequently, phosphorylation of myristoylated alanine-rich C kinase substrate was decreased, and mRNA levels of nuclear factor interleukin (IL)-6 and IL-6 were increased. Our study uncovers human PRKCD deficiency as a novel cause of common variable immunodeficiency-like B-cell deficiency with severe autoimmunity. (*Blood*. 2013;121(16):3112-3116)

Introduction

Primary B-cell immunodeficiencies (B-PID) constitute a heterogeneous group of immunodeficiencies characterized by defective production of antigen-specific antibodies and predisposition to recurrent and severe infections.¹ A high proportion of patients display autoimmune features.²

Fine-tuned B-cell receptor (BCR) signaling is crucial for controlling immune homeostasis, as aberrant BCR signaling predisposes patients to autoimmunity.³

In the last decade, several Mendelian defects causing B-PID have been identified.^{3,4} Nonetheless, the molecular etiology of these disorders remains elusive in the majority of patients. The advent of high-throughput genomic technologies will be instrumental in defining the spectrum of molecular aberrations underlying primary B-cell deficiencies.

Here we investigated the molecular cause of a common variable immunodeficiency (CVID)-like B-PID with progressive B-cell lymphopenia, an immunoglobulin class switch defect, aberrant

immunoglobulin levels, and severe autoimmunity. Combined homozygosity mapping and exome sequencing identified a biallelic mutation in *protein C kinase δ* (*PRKCD*) encoding protein kinase C δ as the molecular cause of this novel PID.

Methods

A detailed description of all experimental methods can be found in the supplemental Methods on the *Blood* website.

Subjects

This study has been approved by the ethics committee of the Medical University of Vienna, Austria. Biological material was obtained on informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki. The patient was followed up and treated at the Klinikum Wels-Grieskirchen,

Submitted October 9, 2012; accepted December 28, 2012. Prepublished online as *Blood* First Edition paper, January 14, 2013; DOI 10.1182/blood-2012-10-460741.

E.S. and E.S.-V. contributed equally to this study.

The online version of this article contains a data supplement.

The publication costs of this article were defrayed in part by page charge payment. Therefore, and solely to indicate this fact, this article is hereby marked "advertisement" in accordance with 18 USC section 1734.

© 2013 by The American Society of Hematology

Figure 1. Clinical and immunological characterization of the index patient. (A) First renal biopsy was performed at the age of 15 months. Granular deposition of IgG along the periphery of the capillary loops (left) as seen in membranous nephropathy (MGN) was confirmed by transmission electron microscopy (TEM) (right), which showed electron dense deposits between basement membrane and podocytes (P), as well as deposits partially in resolution and incorporated by basement membrane material (arrows), consistent with MGN stage I to III (CL, capillary loop). (B) Histopathological analysis of a lymph node biopsy revealed unspecific, reactive follicular hyperplasia (arrow) but not the characteristic lymph node changes of autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) associated with *CD95/FAS* mutations (ALPS type 0/1a). The left and middle panels show hematoxylin and eosin stains, and the right panel shows anti-CD20 staining. (C) Representative FACS plots illustrating the aberrant B-cell phenotype including B-cell lymphopenia, decreased IgM- and IgG memory B cells, and increased numbers of CD21^{low} B cells. (D) Longitudinal analysis illustrates progressive decrease of CD19⁺ B cells and (E-G) persistence of the aberrant distribution of B-cell subsets. *First episode of nephrotic syndrome. #Treatment with anti-CD20. The dotted lines indicate the age-related 25th and 75th percentiles of the corresponding cells.²³

St. Anna Kinderspital Vienna, and the Department of Pediatrics and Adolescent Medicine of the Medical University, Vienna, Austria.

Flow cytometry–based immunophenotyping

Flow cytometry analysis of peripheral blood mononuclear cells was performed on a Beckton-Dickinson LSR Fortessa or FACS Calibur.

Genetic analysis

Sanger sequencing was performed according to standard methods; single nucleotide polymorphism–based homozygosity mapping and exome sequencing were performed as described previously with minor modifications.⁵

Immunoblot analysis

Immunoblot analyses were performed with the following antibodies: anti-human PRKCD (Cell Signaling, Frankfurt am Main, Germany), anti-phospho (clone D13E4) and total myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) (clone D88D11; both from Cell Signaling), and anti-GAPDH (clone 6C5; Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg, Germany).

Quantitative polymerase chain reaction analysis

mRNA levels of interleukin (*IL*)-6 and nuclear factor (*NF*)-*IL6* in Epstein-Barr virus–transformed B cells from the patient and his father, upon stimulation with phorbol myristate acetate, were measured by quantitative polymerase chain reaction analysis.

T-cell V β spectratyping

T-cell receptor V β spectratyping was performed according to Pannetier et al⁶ with minor modifications.

Results and discussion

Clinical and laboratory characterization

The index patient (now 12 years of age) was born to consanguineous parents (first-degree cousins) of Turkish origin (supplemental Figure 1). His father was diagnosed with Behçet's disease and mild autoimmune thyroiditis at 40 years of age. The mother is asymptomatic. The patient's medical history is characterized by multifaceted manifestations of recurrent severe infections and autoimmunity as specified below.

Infections. From the first year of life onward, the patient experienced repeated episodes of infections, including urinary tract infections, gastroenteritis, upper and lower respiratory tract infections, and otitis media, prompting tonsillectomy and adenoidectomy within the first 4 years of life. Frequency and severity of infections decreased after commencement of immunoglobulin substitution at the age of 4 years.

Autoimmunity and immune dysregulation. The first manifestation of autoimmunity occurred at 15 months of age, when the patient presented with nephrotic syndrome. Renal biopsy revealed membranous glomerulonephritis (Figure 1A; supplemental Figure 2). Partial remission was achieved with steroid treatment with remaining mildly impaired renal function (low-grade proteinuria, hematuria; supplemental Table 1). By 3 years of age, hepatosplenomegaly (supplemental Figure 3) and generalized lymphadenopathy became apparent, prompting an in-depth diagnostic workup, which revealed low-grade viremia of human herpes virus subtypes 6 and 7. Herpes viremia was transient, whereas lymphadenopathy persisted. Several lymph node biopsies revealed nonspecific reactive follicular hyperplasia (Figure 1B). Bone marrow aspiration did

not reveal any signs of malignancy (not shown). In the following years, additional manifestations of autoimmunity including relapsing polychondritis developed. Latent hypothyroidism was detected; organ-specific autoantibodies were absent. At the age of 8 years, aseptic endocarditis and pulmonary embolism were diagnosed, and laboratory investigations suggested the diagnosis of antiphospholipid syndrome (positivity of anti-nuclear antibodies, anti-dsDNA, and anti-cardiolipin IgG antibodies; supplemental Table 2), prompting anticoagulation therapy and low-dose steroid therapy.

Immunological workup. Detailed laboratory evaluations were first performed after manifestation of glomerulonephritis at 15 months of age and revealed low IgG levels, whereas levels of IgA and IgM were above the normal range (supplemental Figure 4). B-cell studies showed a reduction of CD19⁺ B cells, decreased relative proportions of non-class-switched (CD19⁺CD27⁺IgD⁺) and class-switched (CD19⁺CD27⁺IgD⁺) memory B cells, and increased numbers of CD21^{low} B cells (Figure 1C; supplemental Table 3). Longitudinal analyses showed progressive decline of total CD19⁺ B cells (Figure 1D), increased relative proportion of CD21^{low} B cells (Figure 1E), and decreased frequencies of memory B cells (Figure 1F-G). T-cell studies showed mildly decreased T-cell proliferative responses (supplemental Table 2) in the absence of obvious immunophenotypic aberrations (supplemental Table 3) or skewing of the T-cell receptor V β repertoire (supplemental Figure 5). Impaired B-cell function was suggested by the absence of isohemagglutinins. Overall, findings were compatible with a CVID-like phenotype, although the formal criteria including decreased levels of at least 2 classes immunoglobulins⁷ were not fulfilled.

Treatment. Because of recurrent respiratory tract infections including pneumonia, immunoglobulin G replacement was initiated at 4 years of age, leading to a decrease of infection frequency. At the age of 9 years, anti-CD20 therapy (2 courses of 375 mg/m² each) was performed to alleviate autoantibody production. Despite transient normalization of the previously increased IgM levels (supplemental Figure 4), autoantibodies persisted. Since the age of 8 years, the patient has been under continuous treatment with mycophenolate-mofetil and low-dose steroids. Other treatment includes enalapril (angiotensin-converting enzyme inhibitor), anticoagulants, thyroid hormone replacement, and immunoglobulin replacement. With this treatment, the boy has a reasonably good quality of life, without the need for hospitalization or intravenous antibiotics during the last 3 years.

Routine genetic investigation. A genetic workup revealed no mutations in the *ICOS*, *BAFFR*, *TACI*, or *FOXP3* genes, respectively. Surface expression of CD40/CD40 ligand was normal (data not shown). A heterozygous variant in *CTLA4* was discovered in both the index patient and his father (rs231775). Homozygosity for this variant has been associated with Graves's disease, rheumatoid arthritis, and systemic lupus erythematosus,⁸ whereas heterozygosity is associated with autoimmune thyroiditis⁹ but not systemic lupus erythematosus.¹⁰ The clinical presentation of this patient with multiple features of immune dysregulation including glomerulonephritis, lymphadenopathy, relapsing polychondritis, and antiphospholipid syndrome in the context of a CVID-like immune phenotype could thus not be reconciled with the heterozygous *CTLA4* variant alone. Hence, we initiated further genetic investigations to detect the molecular background of the patient's disease.

Mutation identification in the *PRKCD* gene

Given the consanguinity in the family, a monogenetic defect with autosomal recessive inheritance was assumed. To uncover the

underlying genetic cause, we performed single nucleotide polymorphism array-based homozygosity mapping (Figure 2A; supplemental Table 4) and exome sequencing. Hits from exome sequencing were filtered for homozygous intervals present exclusively in the patient and validated by Sanger sequencing (supplemental Figure 6; supplemental Table 4). Only 2 of these hits showed perfect segregation with the disease: *UBXN1* (c. G686A, p. Thr229Met) and *PRKCD* (c.1352+1G>A) (Figure 2B and supplemental Figure 1, respectively).

While no obvious role for *UBXN1* in the patient's disease pathogenesis could be recognized (Supplemental Materials), *PRKCD* was considered a plausible candidate, because it has a well-established role in B-cell signaling^{11,12} and the corresponding *Prkcd*^{-/-} knockout mouse exhibits various autoimmune manifestations together with generalized lymphadenopathy.¹³ The murine model also shows splenic lymphocyte hyperproliferation,¹³ reminiscent of human autoimmune lymphoproliferative syndrome.¹⁴ Western blot analysis revealed the absence of *PRKCD* in the patient, whereas expression was decreased in a heterozygous parent compared with a healthy control (Figure 2C). Lower expression in the heterozygous carrier does not seem to be sufficient to cause disease, because the parents do not present with the characteristic clinical features seen in the patient.

Functional consequences of *PRKCD* deficiency

PRKCD is a member of the protein kinase C family critical for regulation of cell survival, proliferation, and apoptosis.¹⁵ In B lymphocytes, *PRKCD* is involved in BCR-mediated signaling downstream of Bruton's tyrosine kinase and phospholipase C γ 2.¹¹ *PRKCD* is expected to have an essential function in B-cell tolerance, because the corresponding knockout mouse shows immune-complex glomerulonephritis, splenomegaly, and lymphadenopathy associated with B-cell expansion and defective B-cell tolerance to self-antigen.¹³ Autoimmunity in *Prkcd*^{-/-} mice has been linked to defective proapoptotic extracellular signal-regulated kinase signaling during B-cell development.¹⁶ Recently, *PLC* γ 2 mutations have been identified in CVID(-like) B-cell deficiency with autoimmunity, highlighting the importance of this pathway for B-cell homeostasis.^{17,18}

To assess functional consequences of *PRKCD* deficiency, expression of MARCKS, a major PKC target,¹⁹ was evaluated. Immunoblot analysis in Epstein-Barr virus-immortalized patient B-cell lines showed reduced total levels of MARCKS, despite contrary literature findings.²⁰ Importantly, MARCKS phosphorylation at Ser167/170, which is critical for translocation of MARCKS from the plasma membrane to the cytoplasm mediating reduction of cell proliferation,²¹ was abrogated in the patient (Figure 2D). Thus, deficiency of pMARCKS may be related to the lymphoproliferation in the patient.²¹

On phosphorylation of NF-IL6 at Ser240 by *PRKCD*, the DNA binding capability of NF-IL6, and consequently IL6 production, is markedly reduced.²² Accordingly, we observed increased mRNA levels of *NF-IL6* and *IL6* in the *PRKCD*-deficient patient after phorbol myristate acetate stimulation (Figure 2E), similar to hyperactive NF-IL6 signaling observed in *Prkcd*^{-/-} mice.¹³

In summary, we describe *PRKCD* deficiency as a novel primary CVID-like B-cell deficiency. The index patient of this study exhibited features of immune dysregulation including lymphoproliferation (splenomegaly and lymphadenopathy) and autoimmunity (glomerulonephritis, antiphospholipid syndrome, and relapsing polychondritis) similar to the murine knockout model.

Figure 2. Identification of human PRKCD deficiency as a monogenic B-cell deficiency associated with autoimmunity. (A) Single nucleotide polymorphism array-based homozygosity mapping was performed and revealed several homozygous candidate intervals, including an interval on chromosome 3p21.31. (B) Sanger sequencing validated a splice site mutation in *PRKCD*, encoding for protein kinase C δ which was homozygous in the patient. (C) Western blot analysis showed absent expression of the corresponding protein product in the patient compared with decreased expression in the heterozygous father and normal expression in a healthy control. (D) Western blot analysis showed defective phosphorylation of MARCKS, a downstream target of PRKCD. (E) Quantitative polymerase chain reaction analysis showed hyperactive NF-IL6 signaling on stimulation using phorbol myristate acetate, as indicated by increased mRNA levels of *NF-IL6* and *IL6*.

However, neither peripheral B-cell lymphopenia nor defective class switch observed in our patient was assessed in the mouse. It cannot be excluded that the known heterozygous variant in *CTLA4* in the patient may act as a disease-modifying factor. Future studies will need to comprehensively characterize the clinical and immunological phenotype in a cohort of PRKCD-deficient patients and further dissect the molecular pathophysiology of aberrant PRKCD-signaling in B-cell homeostasis and autoimmunity.

Acknowledgments

The authors thank the family for their participation in this study; Georg Ebetsberger-Dachs, Ulrike Habeler, and Christoph Male for clinical care; Karoly Lakatos for providing CT scan pictures; Linda Stöger for help with quantitative polymerase chain reaction analyses; Raphael Ott for technical assistance with library preparation for exome sequencing; Ulrike Koermoezi and Arno Rottal for expert technical assistance with flow cytometric analyses; and Ciara Cleary for proofreading the manuscript.

This work was supported by an intramural grant from the CeMM Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (K.B.) and START Programme of the Austrian Science Fund (FWF) grant Y595B13 (K.B.).

Authorship

Contribution: E.S., E.S.-V., S.K., S.A.B., N.K.P., and W.G. performed all experimental work except serial routine immunological characterization performed by W.F.P. W.E., H.B., A.H., K.A., F.E., M.G.S., W.H., A.P., and E.F.-W. provided clinical care and critically reviewed clinical and immunological patient data. L.M. and R.K. performed histopathological analyses. K.B. conceived this study with help from E.F.-W.; planned, designed, and interpreted experiments; provided laboratory resources; guided E.S., E.S.-V., S.K., S.A.B., N.K.P., and W.G.; and wrote the initial draft of the manuscript with assistance from E.S., E.S.-V., S.K., S.A.B., N.K.P., and E.F.-W. All authors critically reviewed the manuscript and agreed to its publication.

Conflict-of-interest disclosure: The authors declare no competing financial interests.

The current affiliation for M.G.S. is Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Medical University of Graz, Graz, Austria.

Correspondence: Kaan Boztug, CeMM Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vienna, and Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Medical University of Vienna, Lazarettgasse 14, AKH BT 25.3, A-1090 Vienna, Austria; e-mail: kboztug@cemm.oew.ac.at; and Elisabeth Förster-Waldl, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Medical University of Vienna, Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Vienna, Austria; e-mail: elisabeth.foerster-waldl@meduniwien.ac.at.

References

- Conley ME, Dobbs AK, Farmer DM, et al. Primary B cell immunodeficiencies: comparisons and contrasts. *Annu Rev Immunol*. 2009;27:199-227.
- Yong PF, Thaventhiran JE, Grimbacher B. "A rose is a rose is a rose," but CVID is Not CVID common variable immune deficiency (CVID), what do we know in 2011? *Adv Immunol*. 2011;111:47-107.
- van der Burg M, van Zelm MC, Driessen GJ, et al. New frontiers of primary antibody deficiencies. *Cell Mol Life Sci*. 2012;69(1):59-73.
- Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, et al. Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the international union of immunological societies expert committee for primary immunodeficiency. *Front Immunol*. 2011;2:54.
- Salzer E, Daschkey S, Choo S, et al. Combined immunodeficiency with life-threatening EBV-associated lymphoproliferative disorder in patients lacking functional CD27 [published online ahead of print July 16, 2012]. *Haematologica*.
- Pannetier C, Even J, Kourilsky P. T-cell repertoire diversity and clonal expansions in normal and clinical samples. *Immunol Today*. 1995;16(4):176-181.
- Conley ME, Notarangelo LD, Etzioni A; Representing PAGID (Pan-American Group for Immunodeficiency) and ESID (European Society for Immunodeficiencies). Diagnostic criteria for primary immunodeficiencies. *Clin Immunol*. 1999;93(3):190-197.
- Gough SC, Walker LS, Sansom DM. CTLA4 gene polymorphism and autoimmunity. *Immunol Rev*. 2005;204:102-115.
- Kimura H, Kato Y, Shimizu S, et al. Association of polymorphism at position 49 in exon 1 of the cytotoxic T-lymphocyte-associated factor 4 gene with Graves' disease refractory to medical treatment, but not with amiodarone-associated thyroid dysfunction. *Thyroid*. 2009;19(9):975-981.
- Barreto M, Santos E, Ferreira R, et al. Evidence for CTLA4 as a susceptibility gene for systemic lupus erythematosus. *Eur J Hum Genet*. 2004;12(8):620-626.
- Guo B, Su TT, Rawlings DJ. Protein kinase C family functions in B-cell activation. *Curr Opin Immunol*. 2004;16(3):367-373.
- Zouali M, Sarmay G. B lymphocyte signaling pathways in systemic autoimmunity: implications for pathogenesis and treatment. *Arthritis Rheum*. 2004;50(9):2730-2741.
- Miyamoto A, Nakayama K, Imaki H, et al. Increased proliferation of B cells and autoimmunity in mice lacking protein kinase C δ . *Nature*. 2002;416(6883):865-869.
- Teachey DT. New advances in the diagnosis and treatment of autoimmune lymphoproliferative syndrome. *Curr Opin Pediatr*. 2012;24(1):1-8.
- Griner EM, Kazanietz MG. Protein kinase C and other diacylglycerol effectors in cancer. *Nat Rev Cancer*. 2007;7(4):281-294.
- Linnander A, Depelle P, Freedman TS, et al. STIM1, PKC- δ and RasGRP set a threshold for proapoptotic Erk signaling during B cell development. *Nat Immunol*. 2011;12(5):425-433.
- Ombrello MJ, Remmers EF, Sun G, et al. Cold urticaria, immunodeficiency, and autoimmunity related to PLCG2 deletions. *N Engl J Med*. 2012;366(4):330-338.
- Zhou Q, Lee GS, Brady J, et al. A hypermorphic missense mutation in PLCG2, encoding phospholipase C γ 2, causes a dominantly inherited autoinflammatory disease with immunodeficiency. *Am J Hum Genet*. 2012;91(4):713-720.
- Hartwig JH, Thelen M, Rosen A, et al. MARCKS is an actin filament crosslinking protein regulated by protein kinase C and calcium-calmodulin. *Nature*. 1992;356(6370):618-622.
- Gallant C, You JY, Sasaki Y, et al. MARCKS is a major PKC-dependent regulator of calmodulin targeting in smooth muscle. *J Cell Sci*. 2005;118(Pt 16):3595-3605.
- Ramsden JJ. MARCKS: a case of molecular exaptation? *Int J Biochem Cell Biol*. 2000;32(5):475-479.
- Trautwein C, van der Geer P, Karin M, et al. Protein kinase A and C site-specific phosphorylations of LAP (NF-IL6) modulate its binding affinity to DNA recognition elements. *J Clin Invest*. 1994;93(6):2554-2561.
- Morbach H, Eichhorn EM, Liese JG, et al. Reference values for B cell subpopulations from infancy to adulthood. *Clin Exp Immunol*. 2010;162(2):271-279.

ANEXO D - Biallelic loss-of-function mutation in *NIK* causes a primary immunodeficiency with multifaceted aberrant lymphoid immunity.

Biallelic loss-of-function mutation in *NIK* causes a primary immunodeficiency with multifaceted aberrant lymphoid immunity

Katharina L. Willmann^{1*}, Stefanie Klaver^{1,2*}, Figen Doğu³, Elisangela Santos-Valente¹, Wojciech Garncarz¹, Ivan Bilic¹, Emily Mace⁴, Elisabeth Salzer¹, Cecilia Domínguez Conde¹, Heiko Sic⁵, Peter Májek¹, Pinaki P. Banerjee⁴, Gregory I. Vladimer¹, Sule Haskoloğlu³, Musa Gökulp Bolken³, Alphan Küpesiz⁶, Antonio Condino-Neto², Jacques Colinge¹, Giulio Superti-Furga¹, Winfried F. Pickl⁷, Menno C. van Zelm⁸, Hermann Eibel⁵, Jordan S. Orange⁴, Aydan İkinçioğulları³ and Kaan Boztuğ^{1,9#}

* contributed equally and should be considered *aequo loco*

¹CeMM Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria; ²Department of Immunology, Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil; ³Ankara University Medical School, Department of Pediatric Immunology and Allergy, Ankara, Turkey; ⁴Center for Human Immunobiology, Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Houston, Texas, USA; ⁵Centre of Chronic Immunodeficiency, University Medical Centre Freiburg, Freiburg, Germany; ⁶Department of Pediatric Hematology, Akdeniz University Medical School, Antalya, Turkey; ⁷Christian Doppler Laboratory for Immunomodulation and Institute of Immunology, Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria; ⁸Department of Immunology, Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; ⁹Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Medical University of Vienna, Vienna, Austria.

Running title: Human *NIK* deficiency

Format: Article; **Scientific Category:** Immunodeficiency Syndromes

Word count: abstract 148; main text 4107; Methods 2196; **Figures:** 7; **References:** 79;

Supplementary Files: Supplementary Notes: 1; Supplementary Figures: 9; Supplementary Tables: 5

Keywords: non-canonical NF-κB signaling, primary immunodeficiency, combined immunodeficiency, cryptosporidium, mycobacterium, exome sequencing

#Correspondence:

Kaan Boztuğ MD

CeMM Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vienna & Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Medical University of Vienna, Lazarettgasse 14, AKH BT 25.3, A-1090 Vienna

E-mail: kboztug@cemm.oeaw.ac.at; Telephone number: +43 1 40160 70069; Fax number: +43 1 40160 970000

Abstract

Primary immunodeficiency disorders enable identification of genes with crucial roles in the human immune system. Here, we study patients suffering from recurrent bacterial, viral and *Cryptosporidium* infections, and identify a biallelic mutation in the *MAP3K14* gene encoding NIK (NF- κ B-inducing kinase). Loss of kinase activity of mutant NIK, predicted by in silico analysis and confirmed by functional assays, leads to defective activation of both canonical and non-canonical NF- κ B signaling.

Patients with mutated *NIK* exhibit B-cell lymphopenia, decreased frequencies of class-switched memory B-cells and hypogammaglobulinemia due to impaired B-cell survival, and impaired ICOSL expression. While overall T-cell numbers are normal, both follicular helper and memory T-cells are perturbed. Natural killer (NK)-cells are decreased and exhibit defective activation, leading to impaired formation of NK-cell immunological synapses. Collectively, our data illustrate the non-redundant role for NIK in human immune responses, demonstrating that loss-of-function mutations in *NIK* cause multiple aberrations of lymphoid immunity.

INTRODUCTION

Primary immunodeficiency disorders represent unique models to identify factors essential for host defense and immune homeostasis. In humans, development of mature B-cells from immature precursor cells is critically dependent on signaling pathways downstream of B-cell receptor (BCR) and from TNF α receptor superfamily members including BAFF-Receptor (BAFFR), TACI, and CD40 (reviewed in¹). BAFFR signals are needed to mature beyond the transitional B-cell stage², while lymphotoxin- α 1/ β 2 (LT β) and CD40 ligand (CD40L) are required for thymic and secondary lymphoid organ structure, respectively³. CD40-mediated signaling additionally orchestrates processes dependent on CD4⁺ T helper cells such as class-switch recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM) in the germinal center (GC) reaction, and CD8⁺ cytotoxic T-cell memory⁴.

BAFFR, CD40 and LT β -receptor transmit signals through the non-canonical NF- κ B (NF- κ B) pathway (reviewed in⁵) which induces proteolytic processing of p100 to p52⁶. Together with RelB, p52 forms a heterodimer that upon nuclear translocation functions as transcriptional activator of a subset of NF- κ B target genes⁵. Processing of p100 depends on the phosphorylation of the serine residues 866 and 870, which is controlled by the MAP3 kinase-kinase-kinase NIK (NF- κ B inducing kinase, MAP3K14)⁶ through NIK's substrate I κ B kinase α (IKK α)⁷. Non-canonical NF- κ B signaling is controlled by TRAF proteins TRAF2 and NIK's negative regulator TRAF3, whereby a TRAF3-containing complex continuously targets NIK for degradation under steady state conditions⁵. Upon receptor activation, TRAF3 is degraded and NIK protein levels can accumulate, allowing NIK to phosphorylate and activate downstream effectors.

To date, human patients carrying mutations in *MAP3K14* have not yet been described. In *Nik* mutant mice (*aly*; alymphoplasia)^{8,9} and knock-out animals³, lymph nodes, Peyer's patches, as well as splenic and thymic structures are severely disorganized. Additionally, B-cell numbers

are reduced and immunoglobulin (Ig) serum levels are decreased leading to humoral immunodeficiency. Although the function of NIK in B-lymphocytes has been well established, the role of NIK-dependent signaling for T and natural killer (NK)-lymphocytes is less well understood.

Here, we report a combined immunodeficiency syndrome caused by biallelic mutations in the gene encoding NIK, encompassing B-cell lymphopenia and impaired memory B-cell differentiation. We also identify abnormal NK-cell development and function as well as aberrant T-cell responses, indicating that biallelic loss-of-function mutations in *NIK* cause a hitherto unrecognized, pervasive combined immunodeficiency syndrome.

RESULTS

Identification of a homozygous mutation in *MAP3K14*

We studied a large consanguineous pedigree with two patients (termed P1 and P2) who both showed signs of combined immunodeficiency including recurrent, severe bacterial and viral infections and *Cryptosporidium* infection (**Supplementary Fig. 1a** and **b**; **Supplementary Tables 1** and **2**; see **Supplementary Note** for further clinical course details). Investigation for known genetic etiologies of defective CSR including CD40 and CD40L deficiencies and gain-of-function *PIK3CD* mutations^{10,11} was performed, however no mutation was identified.

Immunological assessment in both affected patients revealed decreased immunoglobulin levels (**Supplementary Table 1**) and decreased numbers of both B and NK-cells, while T-cell numbers were within normal age-adjusted ranges (**Supplementary Table 3**). As decreased immunoglobulin levels and B-cell numbers suggested impaired B-cell development and function, we performed flow cytometry-based immunophenotyping to assess the relative frequencies of CD27⁺ memory B-cell populations. Both patients showed a relative reduction of total CD19⁺ B-cells in peripheral blood (**Fig. 1a**). Absolute blood cell counts revealed B lymphopenia in P2, while B-cell numbers in P1 were in the age-matched lower normal range

(**Supplementary Table 3**). Patients had decreased CD19⁺CD27⁺IgD⁺ marginal zone-like/innate B-cells and CD19⁺CD27⁺IgD⁻ class-switched memory B-cells compared to controls¹², suggesting defects in late stages of B-cell development and activation (**Fig. 1a**).

Given the consanguineous background, an autosomal-recessive inheritance mode was assumed. To unveil the presumed monogenetic cause of disease, SNP array-based homozygosity mapping of P1 and P2 (**Fig. 1b** and **Supplementary Table 4**) was combined with exome sequencing (ES) (**Fig. 1c**) of P1. Single nucleotide variants (SNVs) and insertion/deletion variants (DIVs) resulting from ES were filtered for those present inside homozygous candidate intervals shared between both affected patients. Synonymous and non-coding variants were excluded. We identified a single homozygous variant on chromosome 17q21 in *MAP3K14* (c. C1694G, p. Pro565Arg) present in both patients (**Fig. 1d** and **Supplementary Fig. 1**) that was not detected in dbSNPbuild137, 1000Genomes, ENSEMBL, UCSC, NCBI or EVS public single nucleotide polymorphism databases. The Pro565 residue of NIK is located within the kinase domain of the protein (**Fig. 1e**) and is highly conserved throughout evolution (**Fig. 1f**). The exchange from proline to arginine at this position was predicted as highly deleterious using the functional prediction algorithms Polyphen-2 and SIFT with maximum scores (1.0 and 0.0), respectively.

Effects of NIK^{Pro565Arg} on kinase function

Pro565 forms part of the APE motif within a helix in the activation segment of the kinase¹³. This motif is conserved in NIK from various vertebrate phyla as well as in orthologous serine/threonine kinases (**Fig. 1f**). An exchange of a non-polar, conformationally rigid amino acid as in NIK^{Pro565Arg} may impact protein folding and function. The protein stability analysis tool CUPSAT predicted that the overall stability of NIK^{Pro565Arg} may be compromised (**Supplementary Table 5**). Coarse-grained molecular dynamics simulation of NIK^{wild-type} and NIK^{Pro565Arg} showed conformational changes within the kinase domain. Notably, the nearby

Thr559 residue has been reported to form a hydrogen bond with Lys517 in the catalytic loop (**Fig. 2a**), and mutation of Thr559 has been found to reduce kinase activity^{14,15}. In the NIK^{wild-type} simulation, Pro565 remains buried within the protein in the vicinity of the ATP-coordinating center, allowing hydrogen bond formation between Lys517 and Thr559 (**Fig. 2a**). In the NIK^{Pro565Arg} simulation, the mutated arginine residue transitions towards the protein surface, thereby increasingly contacting the surrounding solvent and repositioning adjacent helices. In the simulation, Arg565 prevents Thr559 from forming a hydrogen bond with Lys517 in the ATP-coordinating center, thereby impairing the kinase activity of NIK (**Fig. 2b and c**).

To experimentally assess the effect of the mutation, we analyzed the kinase activity of NIK^{Pro565Arg} compared to NIK^{wild-type} and the catalytically inactive mutant NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg}¹⁶ by testing NIK-dependent phosphorylation of IKK α . Recombinantly expressed NIK^{wild-type}, but not NIK^{Pro565Arg} or NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg}, could phosphorylate both endogenous (**Fig. 2d**) and co-expressed IKK α (**Supplementary Fig. 2**) in HEK293 cells. These data demonstrate that NIK^{Pro565Arg} represents a loss-of-function mutation with respect to abolished kinase activity towards its direct target IKK α .

Defective non-canonical and canonical NF- κ B signaling

Processing of p100 into p52 and nuclear translocation of the p52/RelB complex is an essential step following NIK activation⁶. Therefore, we studied activity of the non-canonical NF- κ B pathway in response to activation with BAFF and LT β , respectively. In patient-derived Epstein-Barr-Virus-immortalized lymphoblastoid cell lines (B-LCL), total NIK protein levels (which are tightly controlled via proteolysis⁵) were unaffected. However, levels of its immediate downstream target IKK α were elevated and p100 accumulated already prior to BAFF-mediated BAFFR ligation (**Fig. 3a**), possibly reflecting pre-activation of the NF- κ B

pathway in B-LCL by viral proteins¹⁷. Despite p100 accumulation, p52 protein levels were decreased (**Fig. 3a**), resulting in a severely reduced nuclear content of p52 and a lower nuclear content of RelB in patient derived cells, demonstrating functional insufficiency of the non-canonical NF- κ B pathway in patient-derived cells (**Fig. 3b**).

Next, we tested the effect of NIK^{Pro565Arg} in NF- κ B activation upon LT β stimulation, which is strictly dependent on NIK¹⁸. LT β can activate non-canonical NF- κ B signaling as well as the IKK α -IKK β -NEMO complex mediating nuclear translocation of canonical NF- κ B complexes¹⁹. Stimulation of patient fibroblasts with the NIK-independent canonical NF- κ B activator TNF α led to a rapid decay of I κ B α , a hallmark event of canonical NF- κ B signaling (**Fig. 3c**). In contrast, patient cells failed to induce I κ B α decay after LT β stimulation (**Fig. 3d**). Consistent with these findings, immunofluorescent staining showed defective nuclear translocation of both p52 and p50 in patient primary fibroblasts upon LT β stimulation (**Fig. 4a and b**).

To demonstrate the causative role of NIK^{Pro565Arg} for deficient non-canonical NF- κ B signaling, we performed retroviral-mediated gene transfer of *MAP3K14* into patient fibroblasts. Expression of NIK^{wild-type} reactivated non-canonical NF- κ B signaling manifesting in nuclear translocation of p52 (**Fig. 4c and d**), demonstrating that the presence of functional NIK protein is the limiting factor for p100 activation.

Although NIK may have IKK α independent functions²⁰, the main function of the protein comprises the catalytic activity as a kinase and activation of the signaling cascade leading to NF- κ B translocation. As the NIK^{Pro565Arg} mutant is catalytically inactive and therefore deleterious to these functions, the phenotype caused by NIK^{Pro565Arg} is hereafter also referred to as functional NIK deficiency.

Reduced survival of mature B-cells

The spontaneous *Map3k14* mouse *aly* mutant^{8,9} and *Map3k14* knockout mice³ show reduced mature B-cell numbers and decreased Ig serum levels resulting in defects in both antibody and cellular immune responses. In addition, non-canonical NF- κ B signaling mediated by NIK controls CSR, in particular to IgA isotype²¹. Accordingly, patients bearing NIK^{Pro565Arg} had severely reduced total B-cell counts and impaired generation of IgD⁺CD27⁺ class-switched memory B-cells in peripheral blood (**Fig. 1a**), leading to chronically reduced IgA titers in both patients and to reduced IgG levels in P1 at the age of 10 months (**Supplementary Table 1**) prompting IVIg substitution. This led us to test whether NIK is involved in CSR and SHM, processes essential for the generation of high-affinity antibodies.

To study the occurrence of SHM in B-cells, we analyzed the mutation frequency in rearranged variable regions of the Ig heavy chain (*IGHV*) genes by cloning and sequencing the *IGHV3* and *IGHV4* rearranged gene families of both γ - and α -chain immunoglobulin transcripts (C γ and C α). The percentage of mutations within the analyzed *IGHV* regions was significantly reduced in NIK^{Pro565Arg}-bearing patients compared to age-matched healthy donors, although not as severely as in CD40L-deficient patients who showed near-complete absence of mutations in *IGHV* C α and completely lacked C γ transcripts (**Fig. 5a**)²².

Next, we investigated activation and CSR capacity of NIK^{Pro565Arg} B-cells by stimulating PBMCs with a range of stimuli. Patient B-cells were able to respond to stimulation with CD40L and IL4 by upregulating the activation markers CD95 and CD69, as well as the costimulatory molecule CD86, although to a lesser extent than B-cells from a healthy donor (**Fig. 5b**). Notably, patient B-cells were only partially able to upregulate the activation marker CD25 suggesting impaired IL2-mediated survival and proliferation²³. Since NIK^{Pro565Arg} B-cells were largely able to upregulate the aforementioned activation markers, we further tested their proliferation capacity and ability to undergo CSR in response to CD40L and IL4 stimulation. Indeed, we observed a progressive increase in the percentage of DAPI-negative blasts in NIK^{Pro565Arg} mutant cells (**Supplementary Fig. 3a**) over a course of 9 days,

consistent with activation and proliferation of cells upon stimulation with CD40L and IL4²⁴. Furthermore, B-cells with mutated NIK underwent CSR to IgG *in vitro*, albeit with reduced frequency at day 6 when compared to controls (**Fig. 5c**), likely due to delayed lymphocyte proliferation (**Supplementary Fig. 3a**). Concomitant to proliferative outgrowth of lymphocytes at day 9, CSR to IgG was restored to levels comparable to control cells (**Fig. 5c**). NIK^{Pro565Arg} mutant B-cells did not proliferate after *in vitro* stimulation with CD40L/IL21 (**Fig. 5d and Supplementary Fig. 3b**) despite intact expression of IL21 receptor on patient B-cells (**Supplementary Fig. 4a**), nor after *in vitro* stimulation with anti-IgM/CpG or anti-IgM/CpG/BAFF-Fc (**Supplementary Fig. 3c and d**). These data demonstrated the inability of NIK^{Pro565Arg} B-cells to respond to BCR, TLR9, IL21R and/or BAFFR stimulation. Only CD40L/IL4 stimulation, known to mediate survival and proliferation of primary B-cells^{25,26}, could induce cell proliferation (**Fig. 5d and Supplementary Fig. 3a**), suggesting that intact NIK is required to relay signals essential for survival and proliferation of activated mature B-cell populations.

Given the partial phenotypic overlap of functional NIK deficiency and IL21 (receptor) deficiency^{27,28} (e.g., colitis, susceptibility to *Cryptosporidium* infection, hypogammaglobulinemia and decreased frequencies of class-switched B-cells, defective antigen-specific T-cell proliferation, impaired NK-cell cytotoxicity), we sought to exclude an involvement of NIK in IL21-mediated signaling in B-cells. Indeed, while classical signaling via STAT3 phosphorylation was readily observed after stimulating sorted B-cells with IL21, no activation of p100 processing could be detected (**Supplementary Fig. 5**).

As NIK is an integral component of the non-canonical NF-κB pathway downstream of the BAFFR, which plays a key role in mature B-cell survival²⁹, we investigated whether functional NIK deficiency resembles phenotypes found in BAFFR deficiency^{2,30}. Similar to findings in *Baffr*^{-/-} mice³⁰, B-cells of both patients showed lower cell surface expression of CD21, involved in pro-survival signaling on B-cells³¹ (**Fig. 5e**). This observation prompted us

to investigate whether the NIK^{Pro565Arg} mutant affects the expression of anti-apoptotic genes *BCL2*, *BCL2L1*, *MCL1* by qRT-PCR in sorted naïve mature CD19⁺IgD⁺CD27⁻ B-cells. From the transcripts tested, *BCL2* expression was markedly downregulated in patient naïve B-cells compared to heterozygous parent and healthy donor controls (**Fig. 5f**, **Supplementary Fig. 4b**). To exclude that functional NIK deficiency ablated BAFFR expression, we analyzed surface BAFFR levels by flow cytometry on PBMCs stimulated *in vitro* with CD40L and IL4 for 9 days. BAFFR expression on B-cells from P1 was comparable to B-cells from control parent or healthy donor (**Supplementary Fig. 4c**).

BAFFR-deficient patients display a partial block in development beyond the transitional CD19⁺CD21^{low/intermediate} B-cell stage². Because patient peripheral B-cells had overall a CD19⁺CD21^{low/intermediate} phenotype, we tested the expression of the alternative transitional B-cell markers IgM, CD10, CD38 and CD5. Transitional B-cells (defined as CD19⁺IgM^{hi}IgD⁺ and CD19⁺CD23⁻CD27⁺CD5⁺IgM^{hi}, respectively) were increased, in particular the CD19⁺CD38⁺CD10⁻ transitional T2 population, indicating a partial block in B-cell maturation (**Supplementary Fig. 4d** and **e**). Taken together, the NIK^{Pro565Arg} loss-of-function mutant causes a partial block of B-cell development between transitional and naïve mature B-cell stages accompanied by impaired survival of mature peripheral B-cells.

Aberrant T-cell phenotype and antigen-specific proliferation

Next, we assessed the effect of NIK^{Pro565Arg} on T-cells. Overall CD3⁺CD4⁺ helper T-cell and CD3⁺CD8⁺ cytotoxic T-cell subset distribution was unaffected (**Supplementary Fig. 6a**), T-cell receptor V β repertoires were polyclonal (**Supplementary Fig. 7**), and regulatory T-cells were unaltered (**Supplementary Fig. 6b**). Upon stimulation of PBMCs with T-cell proliferation stimuli OKT3, PMA, SEA, SEB or PHA, normal proliferative responses were observed (**Fig. 6a**). In contrast, when the antigen-specific stimuli tetanus toxoid (TT) or purified protein derivatives (PPD) of *M. tuberculosis* were used, proliferative responses were

severely reduced (**Fig. 6b**) despite prior tetanus and BCG vaccination. These observations prompted us to assess the presence of naïve and memory T-cell subsets in both patients. The relative proportions of CD4⁺ T effector memory cells (T_{EM}) (markers CD4⁺CD45RA⁻CCR7⁻ or CD4⁺CD45RA⁻CD27⁻) were comparable between patients and healthy controls and were within the normal age-matched range³² (**Supplementary Fig. 6c** and **6d**; **Supplementary Table 3**). Relative numbers of CD8⁺ memory T-cells from both patients were also within the highly variable normal range³². However, P1 exhibited a remarkable expansion of CD8⁺ T_{EM} cells and terminally differentiated effector memory T-cells (T_{EMRA}, identified as CD8⁺CD45RA⁺CCR7⁻ or CD8⁺CD45RA⁺CD27⁻; **Supplementary Fig. 6c** and **6d**), possibly attributable to the persistent cytomegalovirus (CMV) viremia in P1 (**Supplementary Table 2**). Increased IL7R/CD127 expression on CD8⁺ T-cells identifies long-lived memory cells^{33,34}. Similar to NIK-deficient mice³⁵, we found dramatically reduced CD127 expression on CD8⁺ memory T-cells on CD8⁺ T_{CM} and CD8⁺ T_{EM} in both P1 and P2 (**Fig. 6c**), pointing towards impaired memory responses to viral infections observed in P1 (**Fig. 6b** and **Supplementary Table 2**).

Interaction of inducible co-receptor ICOS with ICOS ligand (ICOSL) is important for the differentiation of follicular helper T_{FH} cells and for memory responses of both T and B-cells³⁶. T_{FH} cells localize to GC reactions within secondary lymphoid organs where they interact with B-cells to aid antibody production and maturation³⁷. T_{FH} cell numbers are reduced in ICOS-deficient CVID and in CD40L or CD40 deficiency³⁷. Indeed we found decreased proportions of T_{FH} cells (identified as CXCR5⁺CD45RA⁻) in both patients compared to an age-matched healthy donor (**Fig. 6d**) and to previously reported healthy donors³⁸. As T_{FH} cell development is dependent on ICOSL expression on B-cells controlled by non-canonical NF-κB signaling³⁹, we hypothesized that NIK^{Pro565Arg} causes reduced ICOSL expression leading to impaired T_{FH} generation. Thus, we stimulated PBMCs with CD40L for 36 hours and monitored ICOSL expression by flow cytometry. Patient, control parent and healthy donor B-cells responded to

CD40L stimulation by inducing CD69 expression, however, while control cells were able to upregulate ICOSL, the patient cells failed to do so (**Fig. 6e**). In summary, NIK^{Pro565Arg} patients exhibit defective differentiation into T_{FH} and impaired function of memory T-cell subsets.

Decreased numbers and functional impairment of NK-cells

Consistently low NK-cell numbers in both patients (**Supplementary Table 3**) along with the susceptibility to CMV for which NK-cell-mediated defense is relevant, prompted a detailed phenotypic analysis of NK-cells. Both patients bearing the NIK^{Pro565Arg} mutant had low numbers of NK-cells in peripheral blood, particularly P1 (**Fig. 7a**). Despite their low frequency, NK-cells showed normal expression of the cell-surface markers perforin, CD16, CD69, CD57 and NKG2C, hallmarks of acquisition of cytotoxic function (**Supplementary Fig. 8**). Both CD56^{bright} and CD56^{dim} NK-cells, representing subsequent stages of NK-cell development, were present (**Fig. 7a and Supplementary Fig. 8**). In addition, patients expressed markers associated with pre-terminal NK-cell developmental stages, including CD117, CD27, CD11a, KIR2DL4 and CD94, at levels comparable to healthy donors (**Supplementary Fig. 8**). The notable exception was CD62L, which was expressed by a markedly lower proportion of NK-cells with NIK^{Pro565Arg} (**Fig. 7b**).

To determine whether the NK-cells present were able to exert cytolytic function and cytokine secretion, we performed activation with PMA and ionomycin. Notably, production of IFN γ and TNF α were markedly reduced in patient NK-cells, in comparison to stimulated healthy donor cells (**Fig. 7c**). Although patient NK-cells expressed comparable levels of perforin compared to healthy donor cells (**Supplementary Fig. 8**), they degranulated at a significantly lower frequency as measured by the expression of CD107a (LAMP1) on the cell surface after stimulation (**Fig. 7c**).

To further define the cytolytic potential of these cells, we evaluated key components of cytotoxicity by quantitative confocal microscopy. Patient-derived NK-cells failed to

accumulate F-actin at the immunological synapse following incubation with susceptible targets (**Fig. 7d and e**). In addition, lytic granules failed to polarize to the lytic synapse (**Fig. 7e**). In concert with the flow cytometric analyses these data suggest a marked inability of NIK^{Pro565Arg} NK-cells to become activated and exert cytolytic function.

DISCUSSION

TNF α receptor family signaling is essential for B-cell immunity in humans as illustrated by deficiencies in CD40L, CD40 and BAFFR⁴⁰. NIK is an integral component of the non-canonical NF- κ B pathway downstream of these receptors⁵.

Studies in the mouse *aly* mutant^{8,9} and *Nik* knockout mice³ described B-cell deficiency due to disorganized lymph nodes, Peyer's patches and splenic architecture, accompanied by B-cell lymphopenia and low serum Ig levels due to compromised CSR and SHM⁴¹. We here identify patients with biallelic mutation in NIK leading to loss-of-function of the kinase function of NIK. We show that human functional NIK deficiency recapitulates phenotypes described in the mouse studies including B-cell lymphopenia, impaired CSR and SHM, decreased MZ and memory B-cells and hypogammaglobulinemia. Although ethic considerations prevented us from obtaining patient biopsies to further investigate secondary lymphoid organ structures, the absence of lymph nodes on repeated clinical examinations suggests that secondary lymphoid organs may be disturbed upon loss-of-function of NIK, similar to the observations in mouse models^{3,8,41}.

To extend the murine studies on NIK function in B-cells, we investigated the survival properties of patient peripheral blood B-cells. *In vitro* stimulation of BAFFR together with BCR and TLR9 resulted in absence of B-cells, suggesting a profound survival defect. This is supported by earlier studies showing that *Nik* overexpression or expression of the *Nik* Δ T3 mutant in mice (resistant to Traf3-mediated degradation) leads to increased survival of B-

cells⁴². Here, we find significantly decreased expression of the anti-apoptotic gene *BCL2* in peripheral NIK^{Pro565Arg} B-cells leading to reduced survival. This is most likely the result of impaired BAFF signaling, since NIK is an integral molecule downstream of BAFFR required for B-cell survival^{2,29,30}. Recently, a common variant in *BAFFR* has been shown to modulate NF-κB signaling albeit without effects on survival and subset composition of B-cells⁴³. Although we identified this variant in our patients, its presence could not explain the B-cell defects described in this study. BAFFR signaling also activates the expression of the B-cell maturation marker CD21 on transitional B-cells^{2,30,44}. CD21-deficient mice display severely impaired GC B-cell development and T-cell-dependent B-cell responses⁴⁵ due to reduced GC B-cell survival⁴⁶. CD21 deficiency in humans leads to reduced class-switched memory B-cells and hypogammaglobulinemia⁴⁷. Therefore, the reduced CD21 expression on peripheral patient B-cells we observed may provide an additional explanation for B-cell survival defects in NIK^{Pro565Arg} patients.

Stimulation with CD40L and IL4, a cytokine with potent anti-apoptotic activity mediated by Stat6-dependent upregulation of Bcl-xL²⁶ led to CSR with nearly normal frequency, but delayed kinetics, indicating that at least a proportion of patient B-cells was responsive to these stimuli, and that the CSR process itself is largely functional. Since CD40 stimulation can signal both via canonical and non-canonical NF-κB pathways leading to AID expression and Igγ germline transcription⁴⁸, our findings indicate that CD40L-mediated, NIK-independent NF-κB signaling contributes to CSR. Delayed CSR kinetics might also be explained by an increased proportion of transitional B-cells in patient PBMCs, which reacted more slowly to the B-cell activation stimuli, similar to BAFF deficient B-cells².

As the clinical phenotype suggested a combined immunodeficiency, and because recent studies have focused on the role of NIK in T-cells^{35,49,50}, we aimed at investigating T-cell functions and T-cell interplay with B-cells in patients carrying NIK^{Pro565Arg}. Previous studies indicate that NIK-dependent NF-κB signaling is required for ICOSL expression on activated

B-cells, directing T_{FH} differentiation via interaction with ICOS³⁹. T_{FH} -cells in turn stimulate B-cell differentiation by expressing CD40 and IL21³⁷. This intimate cell-cell communication leads to the formation of GCs, structures essential for generation of high-affinity antibody responses. Abrogated ICOSL upregulation on B-cells and reduced T_{FH} -cells in patients likely contribute to impaired GC formation, however *in situ* analysis of GCs were precluded by ethical constraints.

Another lymphocyte communication process dependent on CD40 signaling via $CD4^+$ T-cell help is $CD8^+$ T-cell memory maintenance. Subsequent stimulation of IL7R expression is characteristic and essential for $CD8^+$ memory T-cell survival⁴. Therefore, lack of IL7R expression on both NIK-deficient mouse³⁵ and human (this study) $CD8^+$ memory T-cells may contribute to the inability of T-cells with NIK^{Pro565Arg} to respond to tetanus toxoid and tuberculin despite prior vaccination. Recently, data from ICOSL-deficient patients has implicated ICOSL costimulation in maintenance of memory populations⁵¹, possibly providing an additional explanation for memory defects in patients carrying NIK^{Pro565Arg}.

Patients exhibiting defects in canonical NF- κ B signaling such as NEMO^{52,53} or IKK β deficiency⁵⁴ and I κ B α hypermorphism⁵⁵ also show antibody deficiencies. Consistent with multiple roles of canonical NF- κ B signaling, they show pleiotropic defects throughout the adaptive and innate immune system and developmental defects. Patients with heterozygous mutations in *NFKB2/p100* have recently been described with B-cell deficiency and autoimmunity⁵⁶. Although showing similar manifestations, functional NIK deficiency is more severe than the heterozygous *NFKB2* mutation in humans (this study) and mice⁵. This may be due to the increased p100 levels in NIK^{Pro565Arg} B-LCL that we detected, potentially caused by compensatory increase of NIK-independent canonical NF- κ B signaling, which can upregulate p100 expression¹⁹. In line with this, unprocessed p100 is known to specifically sequester and inhibit RelB⁵, leading to a severe signaling defect.

CD40-dependent IL12 secretion by monocytes is crucial in the defense against mycobacteria. The disseminated BCG infection observed in P1 illustrates mycobacterial susceptibility similar to NEMO⁵⁷ and IKK β -deficient patients⁵⁴. Since NIK can signal via both non-canonical and canonical pathway, NF- κ B response to mycobacteria may depend on NIK, suggesting that functional NIK deficiency causes defective CD40 signaling in monocytes as well.

Recently, impaired NK-cell function has been recognized for several PIDs (reviewed in⁵⁸) most often manifesting in susceptibility to infection by herpesviruses (e.g., CMV). NK-cells were persistently decreased in patients carrying NIK^{Pro565Arg}. Interestingly, CD62L expression, a marker linked to mature NK-cell subsets with stronger cytolytic functions⁵⁹, was downregulated on patient NK-cells. Indeed, although they acquired appropriate developmental and maturity markers, including perforin, patient cells failed to become activated as shown by impaired cytokine secretion, degranulation and polarization of lytic granules towards targets. NIK has not been linked to NK-cell function so far. As canonical NF- κ B signaling has been implicated in NK-cell activation⁶⁰, these signals may depend on NIK and therefore mirror NK-cell phenotypes such as found in CD40L or NEMO deficiencies.

Interestingly, despite the potential defects in secondary lymphoid organ organization discussed above, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT) improved the overall condition of patient P1, suggesting that functional NIK deficiency is amenable to aHSCT to at least partially correct the disease. The fatal outcome for P2 (who had received aHSCT without prior conditioning and succumbed shortly after a second aHSCT including conditioning) suggests that at least reduced-intensity conditioning is indicated for successful treatment using aHSCT.

In sum, we identify functional NIK deficiency as a novel, pervasive combined primary immunodeficiency syndrome. Our data revealed an unexpectedly broad range of phenotypic

aberrations affecting B-, T- and NK-lineages and thus highlight essential roles for NIK and adequate control of non-canonical NF- κ B signaling for generation and maintenance of the human immune system.

METHODS

Patient and Ethics

This study has been approved by the ethics committee at the Medical University of Vienna, Austria. Biological material was obtained upon informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki. Clinical data from the patients was provided in anonymized form by the responsible physician(s). The patients were evaluated, followed up and treated at the Department of Immunology at Ankara University in Turkey covered by the local ethics agreement.

Homozygosity mapping

Affymetrix 6.0 single nucleotide polymorphism (SNP)-based homozygosity mapping was performed in both patients and in both parents of P1 to map homozygous intervals common to both patients but not present in the parents.

10 μ l of 50 ng per μ l DNA from the patients were used. The protocol was carried out according to the Affymetrix® Genome-Wide Human SNP Nsp/Sty 6.0 protocol. The results were analyzed using the Affymetrix® Genotyping Console™ software and PLINK whole genome data analysis toolset (<http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/>) as previously described⁶¹.

Exome sequencing

A multiplexed 50 bp paired-end-read exome sequencing (ES) was carried out for P1 on Illumina HiSeq2000 Sequencer running on HiSeq Control Software (HCS) 1.4.8, Real Time Analysis Software (RTA) 1.12.4.2. The sample preparation used 1µg of genomic DNA fragmented using Illumina TruSeq DNA Sample Preparation Guide and the Illumina TruSeq Exome Enrichment Guide version 3. The DNA fragment clusters generated ran in a multiplexed pool with five other samples distributed on 3 lanes of the flow cell.

The data analysis was carried out as previously described⁶² using BWA (Burrows-Wheeler Aligner) to align the reads to the human genome 19 (hg19). Insertion/deletion realignment was performed as well as GATK (Genome Analysis Toolkit) base quality score recalibration. For single nucleotide variant (SNV) and Insertion/Deletion calling, Unified Genotyper and GATK Variant quality score recalibration was performed. SNV and insertion/deletion lists were uploaded to SeattleSeq Annotation database. Known variants (present in 1000Genomes or dbSNP build 137, date of accession: 2 January 2012) were excluded and the lists were filtered for nonsense, missense and splice-site variants present within the homozygous regions detected in both patients and absent in the parents. Additionally, ENSEMBL, UCSC, NCBI and Exome Variant Server (EVS) public single nucleotide polymorphism databases (date of accession: 20 February 2012) were interrogated for presence of the variant.

The validation and segregation of the variants found in the final hit-list from ES were performed using capillary sequencing on genomic DNA from both patients and family members as described below.

Variant validation by capillary sequencing

Primers for the variants detected with whole exome sequencing were designed using ExonPrimer software from the Helmholtz Center Munich (<http://ihg.gsf.de/ihg/ExonPrimer.html>) and PrimerZ⁶³, respectively, and ordered from Sigma

Aldrich, Austria. PCR amplification of the detected variants was performed using Expand High Fidelity PCR System (Roche, Basel, Switzerland).

Capillary sequencing of amplicons was performed on the Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer capillary sequencer running 3130xl Genetic Analyzer Data Collection Software v3.0, using Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Germany). Sequence Analysis Software Version 5.2 was used for analysis of the sequences, and heterozygous signals with ambiguity code were indicated when 25% of the signal intensity was exceeded. Reads were aligned to reference sequences using the Sequencher software, version 4.10.1.

***In silico* analyses and modeling of NIK protein structure**

The algorithms SIFT⁶⁴, PolyPhen2⁶⁵ (website accessed 27 March 2012), and CUPSAT⁶⁶ (website accessed 9 December 2013) tools were used to predict the effect of the identified mutation on protein function.

To obtain a hypothesis about the change in protein structure and dynamics of the NIK variant compared to the wild-type, molecular dynamics (MD) simulations of NIK^{wild-type} and NIK^{Pro565Arg} were performed using the coarse-grained model FREADY⁶⁷ implemented in MOIL⁶⁸ molecular modeling package. We initiated the MD simulations from the crystal structure of NIK (PDB ID 4G3D, chain A¹⁴) and let it run for 50 nanoseconds at 300 K. In the MD simulations, residues farther than 9 Å from the mutated residue were fixed to the experimental structure. Protein structures were aligned and visualized using MacPyMol (The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.3 Schrödinger, LLC)

Flow cytometry-based immunophenotyping and cell sorting

Immunophenotyping characterization was performed on a BD LSR Fortessa, BC FACS Canto or BD FACS Calibur. In brief, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from the

patients, parents and healthy donors were isolated using Ficoll density gradient centrifugation and either stored frozen in liquid nitrogen and thawed at a later timepoint or immediately stained for 20 minutes at 4°C with mouse anti-human antibodies using the following volumes for 1 million cells in 100µl: 2 µl CD3-APC-H7 (SK7), 3 µl CD4-APC (RPA-T4), 5 µl CD8-V500 (RPA-T8), 5 µl CD8-APC-H7 (SK1), 3 µl CD21-PE (B-ly4), 10 µl CD25-PE (M-A251), 1 µl CD27-BV421 (M-T271), 10 µl CD27-FITC (L128), 2.5 µl CCR7-PE-CF594 (150503), 3 µl IgD-FITC (IA6-2), 10 µl CD86-FITC (2331, FUN-1), 5 µl CD95-PECy7 (DX2), 20 µl IL21R-PE (17A12); (all from BD Biosciences), 3 µl CD56-PE (N901), (all from Beckman-Coulter), 2 µl CD3-BV711 (OKT3;), 1.5 µl CD4-BV510 (OKT4), 0.2 µl CD45RA-BV605 (HI100), 5 µl CD127-BV421 (A019D5); (all from BioLegend), 2 µl CD3-APC (SK7), 3 µl CD4-PerCP-Cy5.5 (RPA-T4), 3 µl CD19-PerCPCy5.5 (HIB19), 5 µl CD69-APC (FN50), 3 µl ICOSL-PE (B7-H2; clone MIH12), 2.5 µl Foxp3-FITC (PCH101); (all from e-Bioscience), and 10 µl CXCR5-APC (51505; R&D systems).

T and natural killer (NK)-cells were evaluated using around 1×10^6 PBMCs and the analysis of the B-lymphocyte compartment was performed using around 4×10^6 cells as previously described^{2,69,70}. NK-cells were stained as described previously⁷¹. For intracellular staining, PBMCs were activated for 3 hours with 50 mg per ml ionomycin and 5 mg per ml phorbol myristate acetate in the presence of Brefeldin A and antibodies to CD107a and cell surface markers⁷². Cells were then fixed and permeabilized with Cytofix/Cytoperm solution (BD Biosciences).

All analyses were performed using FlowJo X (TreeStar Inc.) and data was graphed with Prism 6.0 (GraphPad Software).

Flow cytometry-based sorting of peripheral B-cell populations stained with anti-CD19-PerCP-Cy5.5, anti-CD27-BV421, anti-CD3-APC-H7 and anti-IgD-FITC as described above was performed on ultra-high-speed 6-way digital cell sorter from Beckmann Coulter.

Magnetic microbeads based sorting of peripheral B-cells was performed using anti-CD20 paramagnetic labeling according to the manufacturer's instructions (130-091-104, Miltenyi Biotec, Bergisch-Gladbach, Germany).

Quantitative real-time PCR analysis

Extraction of RNA from sorted B-cells was performed using RNeasy kit from Qiagen, first strand cDNA synthesis was done using Expand Reverse Transcriptase from Roche using both oligo-dT and random hexamer primers, and gene expression was analyzed by qPCR using Kappa Sybr Fast qPCR MasterMix ABI Bioprism from Kappa Biosystems on 7900HT Fast Real-Time PCR System from Applied Biosciences according to manufacturers' instructions.

Intron-spanning primers were used for the gene expression analysis. The primer sequences are as follows: *BCL2*-forward 5' CCGGGAGATGTCGCCCCTGGTGGA 3', *BCL2*-reverse 5' AGGCCGCATGCTGGGGCCGTA 3'; *MCL1*-forward 5' TCGTAAGGACAAAACGGGAC 3', *MCL1*-reverse 5' ACCAGCTCCTACTCCAGCAA 3'; *BCL2L1*-forward 5' GAATGACCACCTAGAGCCTTGG 3', *BCL2L1*-reverse 5' TGTTCCTCATAGAGTTCCACAAAAG 3'; *GAPDH*-forward 5' TGATGGCATGGACTGTGGTC 3', *GAPDH*-reverse 5' TTCACCACCATGGAGAAGGC 3'.

Cell culture and stimulation conditions

Healthy donor, patient and family members PBMCs (isolation as above) and Epstein-Barr virus (EBV) transformed B-cell line were maintained in RPMI-1640 medium supplemented with 10% of inactivated fetal calf-serum (FCS, Life Technologies, Gibco), 50 units per ml penicillin, 50 µg per ml streptomycin and 292 µg per ml L-Glutamin (all from Gibco) at 37°C in a humidified atmosphere with 5% CO₂. PBMC stimulation conditions and reagents were: trimeric human CD40L and human BAFF-Fc, both produced as described² and human

recombinant IL21 (ebiosciences) used at 20ng per ml; B-LCL stimulation conditions were: hBAFF (R&D Systems; 2149-BF-010) used at 50ng per ml for 6 to 12 hours; and primary fibroblast stimulation conditions were: Lymphotoxin $\alpha 1/\beta 2$ (R&D Systems, 678-LY-010) used at 50 ng per ml and 100ng per ml from 15 minutes to 4 hours; TNF α (14-8329-62; eBioscience) used at 20ng per ml from 15 minutes to 4 hours.

Primary fibroblasts and HEK293 cells were cultured in glucose-rich DMEM (Dulbecco's modified Eagle's medium, PAA), supplemented and cultured as above.

B-cell activation assays were performed by stimulating PBMCs with CD40L and IL21 as described² or using CD40L and IL4 (100 ng per ml, ImmunoTools) in Iscoves's modified DMEM medium (IMDM, Invitrogen), supplemented with 10% heat-inactivated fetal calf serum (FCS, Biowest), 100 U per ml penicillin (Invitrogen), 100 μ g per ml streptomycin (Invitrogen), 1 μ g per ml insulin (Sigma-Aldrich), 1 μ g per ml reduced glutathione (Sigma-Aldrich), 2.5 μ g per ml apo-transferrin (Sigma-Aldrich), 2 mM glutamine (Life Technologies, Gibco), and 1% nonessential amino acids (Gibco). Culture was started with equal number of cells and samples were analyzed at days 3, 6 and 9 by flow cytometry.

Immunoblot analysis

Protein was isolated using cell lysis buffer containing 20 mM Tris (pH7.5), 150 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% TritonX-100 (pH7.1) and complete protease inhibitor cocktail (Sigma Aldrich). PVDF or nitrocellulose membranes were prepared according to standard methods. Primary antibodies used for immunoblot analysis of NF- κ B pathways were: rabbit anti-human IKK α (#2682), phospho-IKK α/β (#2697), p100/p52 (#4882), NIK (#4994), RelB (clone C1E4), TRAF3 (#4729), p65 (clone D14E12), p105/p50 (#3035) and mouse anti-human I κ B α (clone L35A5), all purchased from Cell Signaling and used at 1:1000 dilution. For detection of tagged recombinant proteins, anti-human c-Myc (#551101, BD Biosciences) was used at 1:1000 dilution and HRP coupled anti-HA (H6533, Sigma-Aldrich) was used at 1:3000

dilution. For loading controls, mouse anti-human GAPDH (clone 6C5; Santa Cruz Biotechnology) and anti-human RCC1 (clone E-6; Santa Cruz Biotechnology) were used at 1:1000 dilution. Horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat anti-rabbit (Bio-rad) and goat anti-mouse (BD-Biosciences) secondary antibodies were used at 1:10000 or 1:50000 and detected using a chemiluminescent substrate (Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent, GE Life Sciences) together with Hyperfilm ECL (Fischer Scientific).

Kinase assay

HEK293 cells were transfected in 6-well-plates with NIK and/or IKK α tagged expression vectors generated by gateway recombination using the pTO (C-terminal Streptavidin-Hemagglutinin tag) or pCS2 (N-terminal 6x myc tag) destination vectors⁷³, lysed 24h post transfection in lysis buffer containing 20mM HEPES (ph7.9), 20% Glycerol, 50mM KCl, 400mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 5mM β -glycerophosphate, 1mM PMSF, 5mg per ml Apronitin, 10mM NaF, 5mg per ml Leupeptin, 5mM Na₃VO₄, and subsequently subjected to SDS-PAGE and immunoblot analysis.

Amplification and sequence analysis of *IGH* transcripts

IgA and IgG transcripts were amplified from cDNA of thawed PBMCs using subgroup-specific forward primers in the leader sequence of *IGHV3* and *IGHV4* in combination with a C α or C γ consensus reverse primer^{22,74}. All PCR products were cloned into the pGEM-T easy vector (Promega) and prepared for sequencing on an ABIPRISM 3130XL (Applied Biosystems). Obtained sequences were analyzed with the IMGT database (<http://www.imgt.org/>) for *IGHV*, *IGHD* and *IGHJ* use, and mutation analysis⁷⁵.

T-cell Proliferation Analysis

T-cell proliferation assays were carried out as described previously^{62,76}.

T-cell CDR3 V β spectratyping

TCR V β spectratyping was performed as previously described⁷⁷ with minor modifications. The primers used were as before with the following exceptions: Primers for variable regions, BV02-ACATACGAGCAAGGCGTCGA, BV04-CATCAGCCGCCCAAACCTAA, BV07-CAAGTCGCTTCTCACCTGAATGC, BV17-TGTGACATCGGCCCAAAGAA, BV21-GGAGTAGACTCCACTCTAAG, BV24-CCCAGTTTGAAAGCCAGTGACCC; primers for constant regions (used for BV05, BV06BC, BV20), C β B1-CGGGCTGCTCCTTGAGGGGCTGCG; FAM-marked constant primer-ACACAGCGACCTCGGGTGGG.

Sequences were acquired using an ABI 3130 Sequencer (ABI Applied Biosystems, Germany) and analyzed using GeneMapper software version 4.0.

Immunostaining of Lymphotoxin-stimulated fibroblasts

Fibroblasts of patient (P2) and healthy donor were stimulated with 100 ng per ml of lymphotoxin α 1/ β 2 (R&D Systems, 678-LY-010) for 4 hours. After stimulation, cells were fixed with 4% formaldehyde in phosphate-buffered saline (PBS) for 30 min and then blocked and permeabilized with solution containing 10% FCS plus 0.1% Triton X-100. Cells were immunostained with DAPI and rabbit antibodies against NF κ B2 (p100/p52) (Cell Signaling, #3017) and NF κ B (p105/p50) (Cell Signaling, #3035) at a dilution of 1:100, respectively and afterwards with anti-rabbit Alexa Fluor 546 conjugated antibody at a dilution of 1:500 (Life Technologies, A10040). Images were acquired on a Leica AF6000 fluorescent microscope using Leica LASAF software for acquisition. Images were taken at 64x magnification.

Reconstitution assay

cDNA encoding for wild-type human *MAP3K14* was cloned into a bicistronic retroviral pMMP vector coexpressing *MAP3K14* and enhanced GFP (eGFP) marker gene via IRES sequence. RD114-pseudotyped retroviral particles were generated by transfection into HEK293 cells using the calcium chloride transfection method (8 µg retroviral vector DNA, 12 µg gag/pol DNA, 5 µg RD114 DNA) in the presence of 25 µM chloroquin (Sigma-Aldrich, C6628) for 12h. Supernatants containing viral particles were collected after 24h, 36h and 48h. Viral titration was performed on HT-1080 cells. Patient and normal donors fibroblast cells were transduced with retroviral particles in presence of 8 µg per ml polybrene (Santa Cruz, sc-134220) for 12h. Transduction efficiency was determined by eGFP expression by FACS and was between 45% and 70%. After transduction, immunofluorescence studies were performed as above with additional staining against GFP used at a dilution of 1:100 (antibody sc-69779, Santa Cruz). Slides were visualized as above. Data was graphed using Prism 6.0 (GraphPad Software).

Confocal microscopy of immunological synapses

Cell conjugates were formed for the evaluation of the immunological synapse by confocal microscopy as previously described⁷⁸. Following fixation and permeabilization, conjugates were incubated with anti-perforin Alexa Fluor 488 (Biolegend) at a dilution of 1:50 and Phalloidin Alexa Fluor 568 at a dilution of 1:100. Images were acquired on a Leica SP8 laser scanning confocal microscope. Excitation was by tunable white light laser and detection of emission by hybrid gallidium (HyD) detectors. Acquisition was controlled by Leica LASAF software and images were subsequently exported to Volocity software (PerkinElmer) for analysis. Data was graphed using Prism 6.0 (GraphPad Software).

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors thank the patients and their families for participation in the study. The help of all contributing medical, technical and administrative staff is greatly acknowledged. The authors thank Nina Prengemann, Tatjana Hirschmugl and Ayşenur Öztürk for help with experimental procedures and critical scientific discussions.

This study was supported by grants from the European Research Council (ERC StG to K.B.) and the Austrian Science Fund START programme (to K.B.), the Deutsche Forschungsgemeinschaft (TRR130, P06) and the German Cancer Research Fund (both to H.E. and H.S.). S.K. is supported by CAPES-PDSE doctoral fellowship (process number 6911/12-9).

AUTHOR CONTRIBUTIONS

K.L.W., S.K., E.S-V., W.G., E.M., I.B., E.S., C.D-C., H.S., and P.P.B. performed experiments. F.D., S.H., M.G.B., and A.I. provided clinical care of the patients, provided clinical data and were involved in clinical care including allogeneic HSCT of both patients. A.K. performed HSCT of P1. E.M., P.P.B., and J.S.O performed NK-cell analyses. M.C.vZ. performed T-cell phenotyping and Ig sequence analysis. P.M. performed computational modeling and *in silico* prediction algorithms. W.F.P. performed T-cell proliferation assays. G.V. assisted with imaging. G.S-F, A.C-N. and J.C. were involved in critical scientific discussions. K.B. conceived this study, provided laboratory resources and together with K.L.W and S.K. planned, designed and interpreted experiments. K.L.W, S.K., I.B. and K.B. wrote the manuscript with input from H.E., M.C.vZ., J.S.O, G.S-F, E.M., C.D-C, E.S-V., A.I. All authors critically reviewed the manuscript and agreed to its publication.

Competing interests statement

The authors declare that they have no relevant conflict of interest to disclose.

Figure Legends

Figure 1. Identification of *MAP3K14*/*NIK* mutation in patients with defective B-cells

(a) Flow cytometry plots illustrating decreased CD19⁺ B-cells and decreased IgD⁺CD27⁺ class-switched memory B-cells in P1 and P2. Plots representative of three independent experiments. (b) SNP-array based homozygosity mapping revealed several homozygous candidate intervals between both patients and parents, including an interval on Chromosome 17q21, described in the box. (c) Schematic of exome sequencing workflow. SNVs, single nucleotide variants; DIVs, deletions and insertions variants. (d) Capillary DNA sequencing of the regions adjacent to the nonsense mutation in *MAP3K14* in P2 and core family members. Chromatograms shown for a healthy sister of P2, the mother of P2, and P2. The mutated residue is indicated by a grey box. (e) Schematic representation of the NIK protein domain structure. NRD - negative regulatory domain (blue), kinase domain (green), NCR - non-catalytic region (grey)⁷⁹. Red label indicates the amino acid change in P1 and P2. Black labels indicate the catalytic inactive mutant NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} and the murine *aly/aly* mutant (Gly860Arg). (f) Amino acid sequence conservation of the region adjacent to Pro565 across species as well as a panel of human serine/threonine kinases. Red arrow indicates Pro565 mutated in P1 and P2; Thr559 printed in green.

Figure 2. NIK^{Pro565Arg} is structurally altered and catalytically impaired

(a) Structure prediction of NIK^{wild-type} catalytic domain from coarse-grained molecular dynamics simulation. Pro565, Thr559, and Lys517 residues are displayed as sticks and transparent molecular spheres. Dashed line represents hydrogen bond between Lys517 and Thr559. (b) Structure prediction of NIK^{Pro565Arg} from coarse-grained molecular dynamics simulation. Arg565 residue is displayed as sticks and transparent molecular spheres (violet). (c) Molecular dynamics simulation of wild-type NIK and NIK^{Pro565Arg}. Profile of the angle of

Thr559-CA, Thr559-CM, and Lys517-CM. The angle of Thr559-CA, Thr559-CM, and Lys517-CM constantly approaches 150 degrees (close to the value observed in the NIK^{wildtype} experimental X-ray structure), while it rapidly transitions to 90 degrees (hydrogen bonding unfavorable) in the simulation of NIK^{Pro565Arg}. CA - alpha carbon; CM - center of side chain mass. **(d)** Analysis of kinase activity of NIK variants expressed in HEK293 cells. HA-tagged NIK variants NIK^{wild-type}, NIK^{Pro565Arg} and the catalytically inactive mutant NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} were transfected into HEK293 cells and levels of total and phosphorylated IKK α were detected by immunoblot. Anti-HA and anti-GAPDH blots were used as loading controls for NIK and total protein, respectively. Blots are representative of three independent experiments. All uncropped blots can be seen in Supplementary Fig. 9.

Figure 3. Defective canonical and non-canonical NF- κ B pathway function.

(a) Immunoblot analysis of whole cell lysates of B-LCL stimulated with hBAFF. Healthy donor, P1 and P2 derived B-LCL were used. Blots were probed for non-canonical NF- κ B pathway components NIK, IKK α , p100/p52 and sample processing control GAPDH. **(b)** Immunoblot analysis of nuclear extracts of B-LCL stimulated with hBAFF in healthy donor, P1 and P2 derived B-LCL. RCC1 was used as nuclear sample processing control. **(a, b)** Blots are representative of two independent experiments. All uncropped blots can be seen in Supplementary Fig. 9. **(c)** Immunoblot analysis of whole cell lysates of healthy donor- and P2-derived fibroblasts after TNF α stimulation. Blots were probed for canonical NF- κ B pathway components IKK β , I κ B α , p105/p50 and GAPDH as loading control. **(d)** Immunoblot analysis of whole cell lysates of healthy donor- and P2-derived fibroblasts after LT β stimulation. Blots were probed for canonical NF- κ B pathway components IKK β , I κ B α , p105/p50 and loading control GAPDH. **(c, d)** Blots represent one experiments. All uncropped blots can be seen in Supplementary Fig. 9.

Figure 4. Defective nuclear translocation of canonical and non-canonical NF- κ B rescued by ectopic expression of NIK^{wild-type}.

(a, b) Immunofluorescence analysis of healthy donor and P2 fibroblasts stimulated with LTB β and stained with DAPI, (a) anti-p100/p52 and (b) anti-p105/p50 antibodies, respectively. White bar indicates 25 μ m. (c) Immunofluorescence analysis of P2 fibroblasts after retroviral transduction with *MAP3K14* or empty vector, both coexpressing GFP. Cells were stained with DAPI, anti-GFP and anti-p100/p52 antibody. White bar indicates 25 μ m. (d) Quantification of reconstitution experiment in P2 fibroblasts shown in (c). GFP-positive cells (representing cells transduced with *MAP3K14* or empty vector, respectively) were scored for p52 nuclear translocation events, indicated as mean percentage of total ($\pm$ s.e.m.). 86 (*MAP3K14*) and 97 (empty vector) cells were scored, respectively. (c, d) Images and quantification are representative of two independent experiments.

Figure 5. Aberrant B-cell phenotype

(a) Analysis of mutation frequency in percent mutated bases in rearranged variable regions of switched Ig heavy chains (*IGHV*) of IgG and IgA isotypes in healthy donors and patients. Analyzed sequences from both patients are represented combined. The number of sequences analyzed is indicated in brackets. (b) Flow cytometric analysis of the expression of activation markers CD86, CD95, CD25 and CD69 one day after *in vitro* stimulation with CD40L and IL4. Plots are representative of three independent experiments. (c) Flow cytometry analysis of the expression of class-switch markers IgG and IgA at day 6 and 9 after *in vitro* stimulation with CD40L and IL4. (d) *In vitro* proliferation of primary lymphocytes after stimulation with CD40L and IL12 or CD40 and IL4. The forward scatter gate indicates percentages of proliferating blasts after 9 days in cultures from parents or patient P1. (e) Flow cytometry analysis of the CD21 expression on CD19⁺ B-cells of a healthy donor (filled grey), P1 (grey

line) and P2 (black line). (d, e) Plots represent one experiment. (f) qRT-PCR analysis of *BCL2* expression in sorted peripheral blood naïve B-cells. *BCL2* transcript expression was normalized to *GAPDH* expression. Mean fold enrichment from one experiment is shown. Error bars denote $\pm$ s.d. from three technical replicates.

Figure 6. Effects of NIK^{Pro565Arg} on T-cells

(a) Proliferative response of T-cells determined by [³H]-thymidine incorporation assay after stimulation with various stimuli after 3 days (OKT3 – Anti-CD3 antibody (clone OKT3), PMA - Phorbol 12-myristate 13-acetate, SEA - Staphylococcal enterotoxin A, SEB - Staphylococcal Enterotoxin B, PHA – phytohaemagglutinin) and (b) after 7 days stimulation with specific antigens tetanus toxoid (TT) and purified protein derivatives of *M. tuberculosis* (PPD). Mean fold enrichment from one experiment is shown. Error bars denote $\pm$ s.d. from three technical replicates. (c) Flow cytometric analysis of the CD127 expression in healthy donor (red), P1 (orange) and P2 (blue) in T_{naïve} (CD8⁺CD45RA⁺CCR7⁺), T_{CM} (CD8⁺CD45RA⁻CCR7⁺) and T_{EM} (CD8⁺CD45RA⁻CCR7⁻) cell populations. (d) Flow cytometric analysis of the T_{FH} cell subset in patient and age matched (9 yr) healthy donor. T_{FH} cells defined as CD4⁺CXCR5⁺CD45RA⁻. (d, e) Plots represent one experiment. (e) Flow cytometry analysis of CD69 and ICOSL upregulation upon CD40 stimulation on peripheral B-cells. PBMCs from healthy donor, parent or P1 were kept unstimulated (grey) or *in vitro* stimulated for 36 h with CD40L (black line). Plots are representative of two independent experiments.

Figure 7. Functional impairment of NIK-deficient NK-cells.

(a) Flow cytometric analysis of NK-cells in patients and healthy donor. NK-cells defined as CD56⁺CD3⁻. (b) Histogram of expression of CD62L on NK-cells of patients and healthy donor (gated on CD56⁺CD3⁻ cells). (c) Functional response to PMA and ionomycin of NK-

cells from NIK-deficient patients and healthy donor. PBMCs from healthy donor (HD, left) or patient 1 (P1, right) were incubated with vehicle control (black) or PMA and ionomycin (white) then fixed, permeabilized and analyzed by flow cytometry for intracellular expression of IFN γ , TNF α and CD107a. **(a-c)** Data represent one experiment. **(d)** Immunofluorescence analysis of mature immunological synapse formation by NK-cells. Immunofluorescence detection of perforin (green) and phalloidin (red) in an NK-cell conjugate from Patient 1 (P1, top panel) or healthy donor (HD, bottom panel). K562 cells were used as target cells. DIC, Differential interference contrast. White bar indicates 5 μ m. Image is representative of one experiment. **(e)** Quantification of immunological synapse formation. n = 16 (healthy donor) and n = 27 (P1) for actin synapse quantification, n = 17 (healthy donor) and n = 23 (P1) for centrosome to synapse distance quantification; mean $\pm$ s.d. shown. Differences are significant as determined by student's two-sided t-test (p = 0.0073 and p = 0.0190, respectively).

References

- 1 Pieper, K., Grimbacher, B. & Eibel, H. B-cell biology and development. *J Allergy Clin Immunol* 131, 959-971, doi:10.1016/j.jaci.2013.01.046 (2013).
- 2 Warnatz, K. *et al.* B-cell activating factor receptor deficiency is associated with an adult-onset antibody deficiency syndrome in humans. *Proc Natl Acad Sci U S A* 106, 13945-13950, doi:10.1073/pnas.0903543106 (2009).
- 3 Yin, L. *et al.* Defective lymphotoxin-beta receptor-induced NF-kappaB transcriptional activity in NIK-deficient mice. *Science* 291, 2162-2165, doi:10.1126/science.1058453 (2001).
- 4 Huster, K. M. *et al.* Selective expression of IL-7 receptor on memory T cells identifies early CD40L-dependent generation of distinct CD8+ memory T cell subsets. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101, 5610-5615, doi:10.1073/pnas.0308054101 (2004).
- 5 Sun, S. C. The noncanonical NF-kappaB pathway. *Immunol Rev* 246, 125-140, doi:10.1111/j.1600-065X.2011.01088.x (2012).
- 6 Xiao, G., Harhaj, E. W. & Sun, S. C. NF-kappaB-inducing kinase regulates the processing of NF-kappaB2 p100. *Mol Cell* 7, 401-409 (2001).
- 7 Senftleben, U. *et al.* Activation by IKKalpha of a second, evolutionary conserved, NF-kappa B signaling pathway. *Science* 293, 1495-1499, doi:10.1126/science.1062677 (2001).
- 8 Miyawaki, S. *et al.* A new mutation, aly, that induces a generalized lack of lymph nodes accompanied by immunodeficiency in mice. *Eur J Immunol* 24, 429-434, doi:10.1002/eji.1830240224 (1994).
- 9 Shinkura, R. *et al.* Alymphoplasia is caused by a point mutation in the mouse gene encoding NF-kappa b-inducing kinase. *Nature genetics* 22, 74-77, doi:10.1038/8780 (1999).
- 10 Angulo, I. *et al.* Phosphoinositide 3-kinase delta gene mutation predisposes to respiratory infection and airway damage. *Science* 342, 866-871, doi:10.1126/science.1243292 (2013).
- 11 Lucas, C. L. *et al.* Dominant-activating germline mutations in the gene encoding the PI(3)K catalytic subunit p110delta result in T cell senescence and human immunodeficiency. *Nat Immunol* 15, 88-97, doi:10.1038/ni.2771 (2014).
- 12 Morbach, H., Eichhorn, E. M., Liese, J. G. & Girschick, H. J. Reference values for B cell subpopulations from infancy to adulthood. *Clin Exp Immunol* 162, 271-279, doi:10.1111/j.1365-2249.2010.04206.x (2010).
- 13 Nolen, B., Taylor, S. & Ghosh, G. Regulation of protein kinases; controlling activity through activation segment conformation. *Mol Cell* 15, 661-675, doi:10.1016/j.molcel.2004.08.024 (2004).
- 14 de Leon-Boenig, G. *et al.* The crystal structure of the catalytic domain of the NF-kappaB inducing kinase reveals a narrow but flexible active site. *Structure* 20, 1704-1714, doi:10.1016/j.str.2012.07.013 (2012).
- 15 Lin, S. C. & Stavnezer, J. Activation of NF-kappaB/Rel by CD40 engagement induces the mouse germ line immunoglobulin Cgamma1 promoter. *Mol Cell Biol* 16, 4591-4603 (1996).
- 16 Song, H. Y., Regnier, C. H., Kirschning, C. J., Goeddel, D. V. & Rothe, M. Tumor necrosis factor (TNF)-mediated kinase cascades: bifurcation of nuclear factor-kappaB and c-jun N-terminal kinase (JNK/SAPK) pathways at TNF receptor-associated factor 2. *Proc Natl Acad Sci U S A* 94, 9792-9796 (1997).

- 17 Song, Y. J. & Kang, M. S. Roles of TRAF2 and TRAF3 in Epstein-Barr virus latent membrane protein 1-induced alternative NF-kappaB activation. *Virus Genes* 41, 174-180, doi:10.1007/s11262-010-0505-4 (2010).
- 18 Matsushima, A. *et al.* Essential role of nuclear factor (NF)-kappaB-inducing kinase and inhibitor of kappaB (IkappaB) kinase alpha in NF-kappaB activation through lymphotoxin beta receptor, but not through tumor necrosis factor receptor I. *J Exp Med* 193, 631-636 (2001).
- 19 Yilmaz, Z. B., Weih, D. S., Sivakumar, V. & Weih, F. RelB is required for Peyer's patch development: differential regulation of p52-RelB by lymphotoxin and TNF. *Embo J* 22, 121-130, doi:10.1093/emboj/cdg004 (2003).
- 20 Hacker, H., Chi, L., Rehg, J. E. & Redecke, V. NIK prevents the development of hypereosinophilic syndrome-like disease in mice independent of IKKalpha activation. *J Immunol* 188, 4602-4610, doi:10.4049/jimmunol.1200021 (2012).
- 21 Jin, J. *et al.* The kinase TBK1 controls IgA class switching by negatively regulating noncanonical NF-kappaB signaling. *Nat Immunol* 13, 1101-1109, doi:10.1038/ni.2423 (2012).
- 22 van Zelm, M. C. *et al.* Human CD19 and CD40L deficiencies impair antibody selection and differentially affect somatic hypermutation. *J Allergy Clin Immunol*, doi:10.1016/j.jaci.2013.11.015 (2014).
- 23 Mingari, M. C. *et al.* Human interleukin-2 promotes proliferation of activated B cells via surface receptors similar to those of activated T cells. *Nature* 312, 641-643 (1984).
- 24 Tangye, S. G., Ferguson, A., Avery, D. T., Ma, C. S. & Hodgkin, P. D. Isotype switching by human B cells is division-associated and regulated by cytokines. *J Immunol* 169, 4298-4306 (2002).
- 25 Tsubata, T., Wu, J. & Honjo, T. B-cell apoptosis induced by antigen receptor crosslinking is blocked by a T-cell signal through CD40. *Nature* 364, 645-648, doi:10.1038/364645a0 (1993).
- 26 Wurster, A. L., Rodgers, V. L., White, M. F., Rothstein, T. L. & Grusby, M. J. Interleukin-4-mediated protection of primary B cells from apoptosis through Stat6-dependent up-regulation of Bcl-xL. *J Biol Chem* 277, 27169-27175, doi:10.1074/jbc.M201207200 (2002).
- 27 Kotlarz, D. *et al.* Loss-of-function mutations in the IL-21 receptor gene cause a primary immunodeficiency syndrome. *J Exp Med* 210, 433-443, doi:10.1084/jem.20111229 (2013).
- 28 Salzer, E. *et al.* Early-onset inflammatory bowel disease and common variable immunodeficiency-like disease caused by IL-21 deficiency. *J Allergy Clin Immunol* 133, 1651-1659 e1612, doi:10.1016/j.jaci.2014.02.034 (2014).
- 29 Gardam, S., Sierro, F., Basten, A., Mackay, F. & Brink, R. TRAF2 and TRAF3 signal adapters act cooperatively to control the maturation and survival signals delivered to B cells by the BAFF receptor. *Immunity* 28, 391-401, doi:10.1016/j.immuni.2008.01.009 (2008).
- 30 Sasaki, Y., Casola, S., Kutok, J. L., Rajewsky, K. & Schmidt-Suppran, M. TNF family member B cell-activating factor (BAFF) receptor-dependent and -independent roles for BAFF in B cell physiology. *J Immunol* 173, 2245-2252 (2004).
- 31 Roberts, T. & Snow, E. C. Cutting edge: recruitment of the CD19/CD21 coreceptor to B cell antigen receptor is required for antigen-mediated expression of Bcl-2 by resting and cycling hen egg lysozyme transgenic B cells. *J Immunol* 162, 4377-4380 (1999).
- 32 Huenecke, S. *et al.* Age-matched lymphocyte subpopulation reference values in childhood and adolescence: application of exponential regression analysis. *Eur J Haematol* 80, 532-539, doi:10.1111/j.1600-0609.2008.01052.x (2008).

- 33 Schluns, K. S., Kieper, W. C., Jameson, S. C. & Lefrancois, L. Interleukin-7 mediates the homeostasis of naive and memory CD8 T cells in vivo. *Nat Immunol* 1, 426-432, doi:10.1038/80868 (2000).
- 34 Kaech, S. M. *et al.* Selective expression of the interleukin 7 receptor identifies effector CD8 T cells that give rise to long-lived memory cells. *Nat Immunol* 4, 1191-1198, doi:10.1038/ni1009 (2003).
- 35 Rowe, A. M. *et al.* A Cell-Intrinsic Requirement for NF-kappaB-Inducing Kinase in CD4 and CD8 T Cell Memory. *J Immunol* 191, 3663-3672, doi:10.4049/jimmunol.1301328 (2013).
- 36 Mahajan, S. *et al.* The role of ICOS in the development of CD4 T cell help and the reactivation of memory T cells. *Eur J Immunol* 37, 1796-1808, doi:10.1002/eji.200636661 (2007).
- 37 Tangye, S. G., Ma, C. S., Brink, R. & Deenick, E. K. The good, the bad and the ugly - TFH cells in human health and disease. *Nat Rev Immunol* 13, 412-426, doi:10.1038/nri3447 (2013).
- 38 Ma, C. S. *et al.* Functional STAT3 deficiency compromises the generation of human T follicular helper cells. *Blood* 119, 3997-4008, doi:10.1182/blood-2011-11-392985 (2012).
- 39 Hu, H. *et al.* Noncanonical NF-kappaB regulates inducible costimulator (ICOS) ligand expression and T follicular helper cell development. *Proc Natl Acad Sci U S A* 108, 12827-12832, doi:10.1073/pnas.1105774108 (2011).
- 40 Durandy, A., Kracker, S. & Fischer, A. Primary antibody deficiencies. *Nat Rev Immunol* 13, 519-533, doi:10.1038/nri3466 (2013).
- 41 Shinkura, R. *et al.* Defects of somatic hypermutation and class switching in alymphoplasia (aly) mutant mice. *Int Immunol* 8, 1067-1075 (1996).
- 42 Sasaki, Y. *et al.* NIK overexpression amplifies, whereas ablation of its TRAF3-binding domain replaces BAFF:BAFF-R-mediated survival signals in B cells. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105, 10883-10888, doi:10.1073/pnas.0805186105 (2008).
- 43 Pieper, K. *et al.* A common single nucleotide polymorphism impairs B-cell activating factor receptor's multimerization, contributing to common variable immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol*, doi:10.1016/j.jaci.2013.11.021 (2014).
- 44 Gorelik, L. *et al.* Cutting edge: BAFF regulates CD21/35 and CD23 expression independent of its B cell survival function. *J Immunol* 172, 762-766 (2004).
- 45 Ahearn, J. M. *et al.* Disruption of the Cr2 locus results in a reduction in B-1a cells and in an impaired B cell response to T-dependent antigen. *Immunity* 4, 251-262 (1996).
- 46 Fischer, M. B. *et al.* Dependence of germinal center B cells on expression of CD21/CD35 for survival. *Science* 280, 582-585 (1998).
- 47 Thiel, J. *et al.* Genetic CD21 deficiency is associated with hypogammaglobulinemia. *J Allergy Clin Immunol* 129, 801-810 e806, doi:10.1016/j.jaci.2011.09.027 (2012).
- 48 Pone, E. J. *et al.* BCR-signalling synergizes with TLR-signalling for induction of AID and immunoglobulin class-switching through the non-canonical NF-kappaB pathway. *Nat Commun* 3, 767, doi:10.1038/ncomms1769 (2012).
- 49 Jin, W., Zhou, X. F., Yu, J., Cheng, X. & Sun, S. C. Regulation of Th17 cell differentiation and EAE induction by MAP3K NIK. *Blood* 113, 6603-6610, doi:10.1182/blood-2008-12-192914 (2009).
- 50 Murray, S. E. Cell-Intrinsic Role for NF-kappa B-Inducing Kinase in Peripheral Maintenance but Not Thymic Development of Foxp3(+) Regulatory T Cells in Mice. *PLoS One* 8, e76216, doi:10.1371/journal.pone.0076216 (2013).

- 51 Takahashi, N. *et al.* Impaired CD4 and CD8 effector function and decreased memory T cell populations in ICOS-deficient patients. *J Immunol* 182, 5515-5527, doi:10.4049/jimmunol.0803256 (2009).
- 52 Doffinger, R. *et al.* X-linked anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency is caused by impaired NF-kappaB signaling. *Nat Genet* 27, 277-285, doi:10.1038/85837 (2001).
- 53 Jain, A. *et al.* Specific missense mutations in NEMO result in hyper-IgM syndrome with hypohydrotic ectodermal dysplasia. *Nat Immunol* 2, 223-228, doi:10.1038/85277 (2001).
- 54 Pannicke, U. *et al.* Deficiency of innate and acquired immunity caused by an IKBKB mutation. *N Engl J Med* 369, 2504-2514, doi:10.1056/NEJMoa1309199 (2013).
- 55 Courtois, G. *et al.* A hypermorphic IkappaBalpha mutation is associated with autosomal dominant anhidrotic ectodermal dysplasia and T cell immunodeficiency. *J Clin Invest* 112, 1108-1115, doi:10.1172/JCI18714 (2003).
- 56 Chen, K. *et al.* Germline mutations in NFKB2 implicate the noncanonical NF-kappaB pathway in the pathogenesis of common variable immunodeficiency. *Am J Hum Genet* 93, 812-824, doi:10.1016/j.ajhg.2013.09.009 (2013).
- 57 Filipe-Santos, O. *et al.* X-linked susceptibility to mycobacteria is caused by mutations in NEMO impairing CD40-dependent IL-12 production. *J Exp Med* 203, 1745-1759, doi:10.1084/jem.20060085 (2006).
- 58 Orange, J. S. Natural killer cell deficiency. *J Allergy Clin Immunol* 132, 515-525; quiz 526, doi:10.1016/j.jaci.2013.07.020 (2013).
- 59 Peng, H., Sun, R., Tang, L., Wei, H. & Tian, Z. CD62L is critical for maturation and accumulation of murine hepatic NK cells in response to viral infection. *J Immunol* 190, 4255-4262, doi:10.4049/jimmunol.1202395 (2013).
- 60 Pandey, R., DeStephan, C. M., Madge, L. A., May, M. J. & Orange, J. S. NKp30 ligation induces rapid activation of the canonical NF-kappaB pathway in NK cells. *J Immunol* 179, 7385-7396 (2007).
- 61 Salzer, E. *et al.* Combined immunodeficiency with life-threatening EBV-associated lymphoproliferative disorder in patients lacking functional CD27. *Haematologica*, doi:haematol.2012.068791 [pii] 10.3324/haematol.2012.068791 (2012).
- 62 Salzer, E. *et al.* B cell deficiency and severe autoimmunity caused by deficiency of protein kinase C delta. *Blood*, doi:10.1182/blood-2012-10-460741 (2013).
- 63 Tsai, M. F. *et al.* Primer3: streamlined primer design for promoters, exons and human SNPs. *Nucleic Acids Res* 35, W63-65, doi:10.1093/nar/gkm383 (2007).
- 64 Ng, P. C. & Henikoff, S. SIFT: Predicting amino acid changes that affect protein function. *Nucleic Acids Res* 31, 3812-3814 (2003).
- 65 Adzhubei, I., Jordan, D. M. & Sunyaev, S. R. Predicting functional effect of human missense mutations using PolyPhen-2. *Curr Protoc Hum Genet* Chapter 7, Unit7 20, doi:10.1002/0471142905.hg0720s76 (2013).
- 66 Parthiban, V., Gromiha, M. M. & Schomburg, D. CUPSAT: prediction of protein stability upon point mutations. *Nucleic Acids Res* 34, W239-242, doi:10.1093/nar/gkl190 (2006).
- 67 Majek, P. & Elber, R. A coarse-grained potential for fold recognition and molecular dynamics simulations of proteins. *Proteins* 76, 822-836, doi:10.1002/prot.22388 (2009).
- 68 Elber, R. *et al.* MOIL: A program for simulations of macromolecules. *Computer Physics Communications* 91, 159-189, doi:[http://dx.doi.org/10.1016/0010-4655\(95\)00047-J](http://dx.doi.org/10.1016/0010-4655(95)00047-J) (1995).

- 69 Kienzler, A. K., Rizzi, M., Reith, M., Nutt, S. L. & Eibel, H. Inhibition of human B-cell development into plasmablasts by histone deacetylase inhibitor valproic acid. *J Allergy Clin Immunol* 131, 1695-1699, doi:10.1016/j.jaci.2013.01.018 (2013).
- 70 Warnatz, K. & Schlesier, M. Flowcytometric phenotyping of common variable immunodeficiency. *Cytometry B Clin Cytom* 74, 261-271, doi:10.1002/cyto.b.20432 (2008).
- 71 Shaw, R. K. *et al.* Bilateral adrenal EBV-associated smooth muscle tumors in a child with a natural killer cell deficiency. *Blood* 119, 4009-4012, doi:10.1182/blood-2011-10-385377 (2012).
- 72 Betts, M. R. *et al.* Sensitive and viable identification of antigen-specific CD8⁺ T cells by a flow cytometric assay for degranulation. *J Immunol Methods* 281, 65-78 (2003).
- 73 Pichlmair, A. *et al.* Viral immune modulators perturb the human molecular network by common and unique strategies. *Nature* 487, 486-490, doi:10.1038/nature11289 (2012).
- 74 Berkowska, M. A. *et al.* Human memory B cells originate from three distinct germinal center-dependent and -independent maturation pathways. *Blood* 118, 2150-2158, doi:10.1182/blood-2011-04-345579 (2011).
- 75 Alamyar, E., Duroux, P., Lefranc, M. P. & Giudicelli, V. IMGT((R)) tools for the nucleotide analysis of immunoglobulin (IG) and T cell receptor (TR) V-(D)-J repertoires, polymorphisms, and IG mutations: IMGT/V-QUEST and IMGT/HighV-QUEST for NGS. *Methods Mol Biol* 882, 569-604, doi:10.1007/978-1-61779-842-9_32 (2012).
- 76 Schmetterer, K. G. *et al.* Two newly diagnosed HLA class II-deficient patients identified by rapid vector-based complementation analysis reveal discoordinate invariant chain expression levels. *Int Arch Allergy Immunol* 152, 390-400, doi:10.1159/000288292 (2010).
- 77 Pannetier, C., Even, J. & Kourilsky, P. T-cell repertoire diversity and clonal expansions in normal and clinical samples. *Immunol Today* 16, 176-181 (1995).
- 78 Orange, J. S. *et al.* The mature activating natural killer cell immunologic synapse is formed in distinct stages. *Proc Natl Acad Sci U S A* 100, 14151-14156, doi:10.1073/pnas.1835830100 (2003).
- 79 Liu, J. *et al.* Structure of the nuclear factor kappaB-inducing kinase (NIK) kinase domain reveals a constitutively active conformation. *J Biol Chem* 287, 27326-27334, doi:10.1074/jbc.M112.366658 (2012).

Main Figure 01

Main Figure 02

Main Figure 05

Main Figure 06

Supplementary Fig. 1. Genetic and clinical analysis of index patients. (a) Full pedigree of the index family showing five generations. Squares denote male family members, circles female family members, and slashes deceased family members. (b) Endoscopic pictures of gastrointestinal lesions in P2. Upper panels and lower left panel, aphthous lesions in stomach and duodenum (yellow arrowhead). Lower right panel, hemorrhagic lesions in antrum (red arrowhead). (c) Pedigree of the index families with chromatograms from capillary sequencing displaying the missense mutation detected in *MAP3K14* (c. C1694G; p. Pro565Arg) in P1 and P2, demonstrating perfect segregation of the variant under the assumption of autosomal recessive inheritance.

Supplementary Fig. 2. Analysis of kinase activity of NIK variants expressed in HEK293 cells. MYC-tagged NIK^{wildtype}, NIK^{Pro565Arg} or the catalytically inactive mutant NIK^{Lys429Arg/Lys430Arg} were transfected into HEK293 cells along with HA-tagged IKKα. Immunoblots were probed with anti-MYC (detecting MYC-NIK), anti-HA (detecting IKKα-HA), anti-IKKα, anti-phospho-IKKα and anti-GAPDH (loading control) antibodies, respectively. Grey bars represent recombinant NIK and IKKα constructs. All uncropped blots can be seen in Supplementary Fig. 9.

Continued on next page

Supplementary Fig. 3. *In vitro* stimulation of peripheral blood mononuclear cells. (a) Flow cytometry analysis of primary lymphocytes after stimulation with CD40L and IL4. Upper panel: Percentage of DAPI⁺ cells from parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, gated on DAPI⁺ cells. (b) Flow cytometry analysis of primary lymphocytes after stimulation with CD40L and IL21. Upper panel: Percentage of DAPI⁺ cells from parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, gated on DAPI⁺ cells. (c) Flow cytometry analysis of primary lymphocytes after stimulation with anti-IgM and CpG. Upper panel: Percentage of DAPI⁺ cells from parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, gated on DAPI⁺ cells. (d) Flow cytometry analysis of primary lymphocytes after stimulation with anti-IgM, CpG and BAFF-Fc. Upper panel: Percentage of DAPI⁺ cells from parents or patient P1 after 3, 6 and 9 days in culture. Lower panel: Forward scatter gate indicating percentages of proliferating blasts, gated on DAPI⁺ cells.

Supplementary Fig. 4. Extended B-cell immunophenotype. (a) Expression of IL21R in peripheral blood CD19⁺ cells of a healthy donor (HD), parents (II-4 and II-3) and patient (I-3) (b) Real-time qPCR analysis of *MCL1* and *BCL2L1* expression in sorted peripheral blood naïve B-cells. Transcript expression was normalized to *GAPDH* expression. Mean fold enrichment from one experiment is shown. Error bars denote $\pm$ s.d. from three technical replicates. (c) Two-dimensional analysis of BAFF-R and CD19 expression on primary lymphocytes after *in vitro* stimulation with CD40L and IL4 for 9 days. MFI – mean fluorescence intensity of BAFF-R expression on CD19⁺ B-cells. (d) Flow cytometric analysis of transitional B-cells gated on CD19⁺ cells. Relative percentages of transitional B-cell populations defined as total transitional B-cells (IgM^{hi} IgD^{hi}), T1 transitional B-cells (CD38⁺ CD10⁺), and T2 transitional B-cells (CD38⁺ CD10⁺) in peripheral blood of a healthy donor (HD), parent (II-4) and patients (I-2 and I-3) (e) Flow cytometric analysis of transitional B-cells gated on CD19⁺ cells, displaying decreased CD27⁺CD23⁺ cells in P1 cells compared to a healthy donor and increase in transitional CD19⁺CD23⁺CD27⁺CD5^{hi}IgM^{hi} cells in the patient compared to controls.

Supplementary Fig. 5. Immunoblot analysis of IL21 stimulated B-cells. Immunoblot analysis of whole cell lysates from healthy donor B-cells sorted from PBMCs after stimulation with IL21 or BAFF and CD40L. Blots were probed for STAT3 and phospho-STAT3 as well as non-canonical NF- κ B pathway component p100/p52 and GAPDH as loading control. All uncropped blots can be seen in Supplementary Fig. 9.

Supplementary Fig. 6. Extended T-cell immunophenotype. (a) T helper (CD3⁺CD4⁺) and T cytotoxic (CD3⁺CD8⁺) cell subsets shown for P1 and healthy donor (b) P1 and P2 Foxp3 expression (gated on CD3⁺ cells), indicating regulatory T-cells. (c) T-cell memory populations represented as T_{naïve} CD45RA⁺CD27⁺ and CD45RA⁺CD45RO⁺, T_{CM} (T central memory) CD45RA⁺CD27⁺, T_{EM} (T effector memory) CD45RA⁺CD27⁺, gated on T helper CD3⁺CD4⁺ cells (left) and T cytotoxic CD3⁺CD8⁺ cells (right). (d) P1, P2 and healthy donor T cell memory populations using the markers CD45RA and CCR7. T_{naïve} defined as CD45RA⁺CCR7⁺, T_{CM} defined as CD45RA⁺CCR7⁺, T_{EM} defined as CD45RA⁺CCR7⁺, gated on T helper CD3⁺CD4⁺ cells (upper) and T cytotoxic CD3⁺CD8⁺ cells (lower).

Supplementary Fig. 7. TCR Vβ spectratyping analysis. The analysis of P1 and P2 shows a normal, pseudo-Gaussian usage of the TCR Vβ repertoire comparable to a healthy control. Each Vβ gene segment analyzed is indicated below the respective histogram.

Supplementary Fig. 8. Extended NK immunophenotype. Plots of percentages of NK-cell subsets (all gated on CD3⁺CD56⁺ subsets) in both patients, P1 and P2 (filled squares), parent (half filled squares) and healthy donor control (triangles). NK-cell markers used were CD16, CD27, CD34, CD57, CD94, CD117, CD122, CD127, Perforin, CD8 α , CD11a, CD69, KIR2DL4, NKG2C, NKG2D and Nkp46 (all in normal range).

Supplementary Fig. 9. Uncropped immunoblots. Figures corresponding to the blots are indicated above each panel. Red boxes indicate the part of the blot used for cropped presentation.

Supplementary Tables

Immunoglobulin levels	Patient 1 (I-3)			Patient 2 (I-2)		
Age	10m	7y	9y	1y3m	1y9m	2y5m
IgG (mg/dL)	120 (300-1000)	914* (600-1300)	1200* (600-1300)	714 [?] (350-1000)	1130* (350-1000)	1300* (500-1300)
IgM (mg/dL)	72.8 (30-100)	205 (40-160)	20.4 (40-160)	46.9 (40-140)	23.8 (40-140)	20.4 (40-180)
IgA (mg/dL)	13.5 (30-140)	24.9 (60-220)	<0.05 (60-220)	23.6 (30-120)	6.3 (30-120)	16.7 (40-180)

Supplementary table 1. Evaluation of immunoglobulin levels in P1 and P2. Reference values of relative cell counts are given in brackets¹.

*Under IgG replacement

[?]Possibly under IgG replacement

	Patient 1 (I-3)		Patient 2 (I-2)					
Age	7y	9y	1y3m	1y9m	2y5m	2y9m	3y	3y8m
Cryptosporidium (stool)	Pos.	Pos.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Pos.	Neg.
Giardia	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Rotavirus	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Adenovirus	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
CMV	Pos.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Pos.	Neg.
HIV	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Neg.	ND
Anti HB	ND	ND	Neg.	ND	ND	ND	ND	ND
Isohemagglutinin Anti B	Blood group: AB	ND	ND	ND	ND	Anti A: 1/32+, Anti B: 1/16+	ND	ND

Supplementary table 2. Infection occurrence in P1 and P2. CMV, Cytomegalovirus; HIV, Human immunodeficiency virus; Pos., Positive; Neg., Negative.

Lymphocytes		Patient 1 (I-3)		Patient 2 (I-2)					
Age		7y	9y	1y3m	1y9m	2y5m	2y9m	3y	3y8m
CD3 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	10.6 (1.0-4.9)	6.7 (1.0-4.9)	4.4 (1.3-6.5)	3.6 (1.3-6.5)	6.9 (1.9-3.6)	4.7 (1.9-3.6)	6.8 (1.9-3.6)	4.5 (1.9-3.6)
	% of total	93 (57-81)	89 (57-81)	93 (51-77)	80 (51-77)	91 (55-79)	95 (55-79)	96 (55-79)	94 (55-79)
Naive (CD45RA ⁺) CD3 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	8.55 (1.0-6.7)	5.47 (1.0-6.7)	4.32 (1.8-4.2)	4.00 (1.8-4.2)	6.84 (0.8-4.4)	4.95 (0.8-4.4)	6.10 (0.8-4.4)	3.02 (0.8-4.4)
	% of total	75 (61-87)	72 (61-87)	90 (82-94)	87 (82-94)	90 (72-97)	99 (72-97)	86 (72-97)	63 (72-97)
Memory (CD45RO ⁺) CD3 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	2.96 (0.5-2.0)	2.20 (0.5-2.0)	0.480 (0.4-3.3)	0.644 (0.4-3.3)	0.760 (0.4-1.6)	1.35 (0.4-1.6)	0.994 (0.4-1.6)	1.48 (0.4-1.6)
	% of total	26 (22-53)	29 (22-53)	10 (9-45)	14 (9-45)	10 (16-38)	27 (16-38)	14 (16-38)	31 (16-38)
CD3 ⁺ HLA-DR ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	0.684 (0.05-0.7)	0.988 (0.05-0.7)	0.192 (0.1-0.6)	0.506 (0.1-0.7)	7.140 (0.08-0.4)	0.350 (0.08-0.4)	0.284 (0.08-0.4)	0.336 (0.08-0.4)
	% of total	6 (3-14)	13 (3-14)	4 (2-8)	11 (3-12)	94 (3-13)	7 (3-13)	4 (3-13)	7 (3-13)
CD3 ⁺ CD4 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	8.6 (0.5-2.7)	5.0 (0.5-2.7)	3.0 (0.7-4.5)	2.3 (0.7-4.5)	4.7 (0.6-2.0)	3.8 (0.6-2.0)	4.4 (0.6-2.0)	3.0 (0.6-2.0)
	% of total	76 (24-47)	66 (24-47)	63 (29-55)	52 (29-55)	63 (26-49)	76 (26-49)	63 (26-49)	63 (26-49)
Naive (CD45RA ⁺) CD4 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	6.2 (0.3-2.4)	3.8 (0.3-2.4)	1.48 (0.5-4.2)	1.93 (0.5-4.2)	4.25 (0.5-6.6)	2.4 (0.5-6.6)	3.69 (0.5-6.6)	ND
	% of total	55 (17-40)	50 (17-40)	55 (19-49)	42 (19-49)	56 (20-41)	48 (20-41)	52 (20-41)	ND
Memory (CD45RO ⁺) CD4 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	2.7 (0.2-1.0)	1.2 (0.2-1.0)	0.568 (0.2-1.4)	0.552 (0.2-1.4)	0.76 (0.2-0.8)	1.3 (0.2-0.8)	0.923 (0.2-0.8)	ND
	% of total	24 (9-23)	16 (9-23)	8 (5-18)	12 (5-18)	10 (8-42)	26 (8-42)	13 (8-42)	ND
CD3 ⁺ CD8 ⁺ T-cells ³	10 ³ cells/μl	2.1 (0.3-2.1)	2.0 (0.3-2.1)	1.5 (0.4-3.2)	1.2 (0.4-3.2)	1.9 (0.3-1.3)	1.00 (0.3-1.3)	2.6 (0.3-1.3)	1.4 (0.3-1.3)
	% of total	19 (17-37)	27 (17-37)	31 (15-33)	28 (15-33)	25 (9-35)	20 (9-35)	29 (9-35)	29 (9-35)
TCRγδ	10 ³ cells/μl	114	152	48	46	76	ND	ND	ND
	% of total	1	2	1	1	1	ND	ND	ND
CD19 ⁺ B-cells ³	10 ³ cells/μl	0.342 (0.2-2.2)	0.228 (0.2-2.2)	0.096 (0.5-3.6)	0.322 (0.5-3.6)	0.228 (0.3-1.2)	0.100 (0.3-1.2)	0.099 (0.3-1.2)	0.01 (0.3-1.2)
	% of total	3 (10-27)	3 (10-27)	2 (17-41)	7 (17-41)	1 (11-31)	2 (11-31)	1.4 (11-31)	0.2 (11-31)
CD20 ⁺ B-cells ³	10 ³ cells/μl	0.456 (0.2-2.0)	ND	0.096 (0.5-3.3)	0.368 (0.5-3.3)	0.228 (0.3-1.2)	0.100 (0.3-1.2)	0.078 (0.3-1.2)	0.0048 (0.3-1.2)
	% of total	4 (11-25)	3 (11-25)	2 (16-41)	8 (16-41)	1 (11-29)	2 (11-29)	1.1 (11-29)	0.1 (11-29)
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺ NK-cells ³	10 ³ cells/μl	0.114 (0.2-0.9)	0.076 (0.2-0.9)	0.144 (0.2-1.3)	0.460 (0.2-1.3)	0.304 (0.2-1.2)	0.075 (0.2-1.2)	0.142 (0.2-1.2)	0.096 (0.2-1.2)
	% of total	1 (8-28)	1 (8-28)	3 (4-15)	10 (4-15)	4 (5-28)	1.5 (5-28)	2 (5-28)	2 (5-28)

Supplementary table 3. Evaluation of lymphocyte subpopulations. Age-matched reference values to absolute and relative cell counts are given in brackets^{2,3}, specified in leftmost column. Values deviating from the reference ranges are printed in bold.

Chromosome	Position	Position	Position
15	44.38-44.59	rs17583428	rs12594645
15	72.45-73.12	rs2959944	rs2053854
17	43.05-43.38	rs17547180	rs17686001
17	43.83-44.85	rs6503447	rs199515
17	46.58-47.19	rs4793882	rs11653468
17	50.01-51.77	rs203090	rs9899373

Homozygous intervals detected in P1		Homozygous intervals detected in P2	
Chromosome	Position	Chromosome	Position
1	2.4 - 3.81	1	109.82 - 111.63
2	161.61 - 162.67	1	113.09 - 114.81
2	203.47 - 204.48	1	117.55 - 118.87
3	119.89 - 121.63	1	120.05 - 121.29
3	137 - 138.7	1	149.89 - 151.67
3	138.91 - 139.98	2	131.11 - 132.16
3	144.15 - 146.52	4	0.05 - 1.25
3	175.46 - 176.7	5	133.08 - 134.63
3	191.82 - 193.06	5	136.44 - 140.09
3	194.56 - 195.67	5	140.44 - 141.45
4	32.79 - 34.35	5	143.34 - 145.78
4	93.15 - 94.57	5	158.68 - 160.07
4	96.53 - 97.69	7	26.16 - 28.05
4	98.96 - 100.64	8	99.38 - 100.59
4	103.96 - 109.08	8	144.6 - 145.76
4	111.26 - 112.76	9	134.09 - 135.42
4	114.8 - 116.09	9	138.32 - 139.51
4	116.91 - 118.64	10	35.22 - 36.33
4	177.98 - 179.36	10	112.61 - 113.63
4	180.55 - 182.06	10	117.49 - 119.04
5	36.36 - 37.41	12	56.12 - 57.98
5	38.76 - 39.84	15	43.53 - 44.59
5	40.95 - 42.07	15	63.71 - 66.25
5	42.78 - 44.98	15	72.46 - 74.15
5	49.56 - 52.1	15	74.17 - 76.49
5	53.84 - 56.01	15	76.67 - 77.81
5	56.04 - 57.64	15	79.97 - 81.08
5	58.18 - 59.39	15	81.82 - 83.25
5	60.53 - 62.07	15	87.64 - 88.69

Table continued

Chromosome	Position	Chromosome	Position
5	58.18 - 59.39	15	89.72 - 90.89
5	60.53 - 62.07	16	47 - 48.23
5	70.67 - 71.76	16	67.08 - 68.43
5	71.92 - 73.52	17	37.04 - 38.1
6	95.33 - 96.38	17	39.3 - 41.94
6	98.75 - 100.29	17	42.05 - 43.39
6	100.29 - 101.69	17	43.83 - 47.19
6	102.79 - 104.15	17	50.01 - 51.78
7	102.1 - 103.22	17	55.9 - 57.47
7	118.51 - 120.2	17	71.43 - 72.48
11	58.04 - 59.06	23	51.29 - 53.03
11	59.53 - 61.71	23	55.62 - 58.23
11	101.35 - 102.36	23	71.56 - 73.47
13	91.01 - 92.63	23	73.86 - 75.31
13	93.43 - 94.78	23	80.17 - 81.37
14	66.46 - 67.92	23	105.3 - 106.92
15	20.07 - 23.04	23	107.49 - 108.63
15	44.38 - 45.38	23	109.4 - 111.32
15	72.04 - 73.12		
17	43.05 - 44.86		
17	46.59 - 48.29		
17	49.51 - 52.77		
23	53.92 - 54.99		
23	63.19 - 65.38		
23	73.76 - 75.3		
23	107.3 - 108.68		
23	126.32 - 128.1		

Supplementary table 4. Homozygosity mapping of both patients showing homozygous intervals (analysed by PLINK algorithm⁴ version 1.07). Upper part: Intersection of homozygous intervals shared by both patients P1 and P2. The interval containing *MAP3K14* is highlighted in dark grey. Lower part: Full list of homozygous intervals in both patients.

Amino Acid Mutations			
Amino acid	Overall stability	Torsion	Predicted $\Delta\Delta G$ (kcal/mol)
GLY	Stabilising	Unfavourable	0.65
ALA	Stabilising	Favourable	2.59
VAL	Stabilising	Unfavourable	2.59
LEU	Stabilising	Favourable	3.84
ILE	Stabilising	Unfavourable	3.01
MET	Stabilising	Favourable	3.44
TRP	Stabilising	Unfavourable	1.53
SER	Stabilising	Unfavourable	0.29
THR	Destabilising	Unfavourable	0.42
PHE	Stabilising	Unfavourable	3.94
GLN	Destabilising	Favourable	0.46
LYS	Destabilising	Favourable	4.59
TYR	Stabilising	Unfavourable	1.16
ASN	Destabilising	Unfavourable	0.94
CYS	Stabilising	Unfavourable	1.86
GLU	Destabilising	Favourable	0.56
ASP	Destabilising	Unfavourable	2.08
ARG	Destabilising	Favourable	2.07
HIS	Destabilising	Unfavourable	2.88

Supplementary table 5. NIK^{Pro565Arg} protein stability prediction calculated by the CUPSAT tool. This tool predicts change in the folding stability upon an amino acid point mutation in a protein of known structure⁵. Algorithm was run on <http://cupsat.tubs.de/jsp/nmrpredict.jsp>. using pdb protein entry 4G3D.PDB (NIK catalytic domain). Proline 565 to Arginine mutation prediction marked in dark grey.

Supplementary Note: Patient Case Reports

Patient 1 (P1) is a 9-year-old girl born to consanguineous healthy parents (**Supplementary Fig. 1a**).

The patient had a younger brother who died at the age of 2 years from suspected combined immunodeficiency. Decreased IgG (pre-intravenous immunoglobulin (Ig) substitution treatment) and IgA levels as well as elevated levels of IgM were identified on a single occasion (**Supplementary Table 1**). Cytomegalovirus (CMV) detected by PCR and *Cryptosporidium* present in the stool (**Supplementary Table 2**) were reminiscent of a class switch recombination defect, however no mutations in *CD40*, *CD40L* or *IL21R* were found. Despite supportive treatment including regular intravenous Ig substitution treatment and ganciclovir, she continued to suffer from repeated episodes of viral and bacterial infections as well as from an episode of granulomatous hepatitis and tuberculosis osteomyelitis due to dissemination after Bacillus Calmette Guérin (BCG) vaccination. An allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) after reduced toxicity conditioning was performed at 9 years of age. She remains clinically well. (A. Ikinciogullari and A. Küpesiz, unpublished).

Patient 2 (P2) is a first-degree cousin of P1 also born to consanguineous healthy parents (**Supplementary Fig. 1a**). She presented with recurrent lower respiratory tract infections, oral and oesophageal candidiasis and severe chronic diarrhea resistant to budesonide-mesalazine (**Supplementary Fig. 1b**). She was tested positive for *Cryptosporidium* on one occasion (**Supplementary Table 2**), later on she also developed cholestasis with deterioration of liver function. Her mother was HLA-identical and used as a donor for an allogeneic HSCT performed without conditioning at the age of 3. As no engraftment was observed after 50 days, a second transplant from the same donor was performed. However, the patient deceased on day 6 following the second HSCT due to rapidly accelerated septic shock and multi-organ failure (A. Ikinciogullari and A. Küpesiz, unpublished).

Supplementary References

- 1 Center for chronic immunodeficiency, F., Germany. <http://www.uniklinik-freiburg.de/ccil/live/diagnostik/immunologische/NormwerteCCILaborDiagnostik.pdf>. (January 2014).
- 2 Comans-Bitter, W. M. *et al.* Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood. Reference values for lymphocyte subpopulations. *J Pediatr* **130**, 388-393 (1997).
- 3 Ikinçiogullari, A. *et al.* Peripheral blood lymphocyte subsets in healthy Turkish children. *Turk J Pediatr* **46**, 125-130 (2004).
- 4 Purcell, S. *et al.* PLINK: a tool set for whole-genome association and population-based linkage analyses. *Am J Hum Genet* **81**, 559-575, doi:10.1086/519795 (2007).
- 5 Parthiban, V., Gromiha, M. M. & Schomburg, D. CUPSAT: prediction of protein stability upon point mutations. *Nucleic Acids Res* **34**, W239-242, doi:10.1093/nar/gkl190 (2006).