POLLYANA BULGARELLI STEVANATTO

ANÁLISE DO PAPEL DAS CICLOOXIGENASES 1 E 2 NA MIGRAÇÃO DA
LINHAGEM CELULAR DE GLIOMA HUMANO U251-MG

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Biologia Celular e
Tecidual do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo,
para obtenção do Título de Mestre em
Ciências.

São Paulo
2012

POLLYANA BULGARELLI STEVANATTO

ANÁLISE DO PAPEL DAS CICLOOXIGENASES 1 E 2 NA MIGRAÇÃO DA
LINHAGEM CELULAR DE GLIOMA HUMANO U251-MG

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Tecidual do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para obtenção do Título de Mestre em Ciências.

Área de concentração: Biologia Celular e Tecidual.

Orientador: Profa. Dra. Alison Colquhoun.

Versão original

São Paulo
2012

DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

© reprodução total

Stevanatto, Pollyana Bulgarelli.

Análise do papel das ciclooxigenases 1 e 2 na migração da linhagem celular de glioma humano U251-MG / Pollyana Bulgarelli Stevanatto. -- São Paulo, 2012.

Orientador: Prof. Dr. Alison Colquhoun.

Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento. Área de concentração: Biologia Celular e Tecidual. Linha de pesquisa: Metabolismo de Células Tumoriais.

Versão do título para o inglês: The role of cyclooxygenases 1 and 2 in the migration of human glioma cell line U251MG.

1. Câncer 2. Glioblastoma multiforme 3. Migração 4. Eicosanóides
5. Prostaglandina 6. Ibuprofeno I. Colquhoun, Prof. Dr. Alison II.
Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa
de Pós-Graduação em Biologia Celular e Tecidual III. Título.

ICB/SBIB0193/2012

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Candidato(a): Pollyana Bulgarelli Stevanatto.

Título da Dissertação: Análise do papel das ciclooxygenases 1 e 2 na migração da linhagem celular de glioma humano U251-MG.

Orientador(a): Prof. Dr. Alison Colquhoun.

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da **Dissertação de Mestrado**,
em sessão pública realizada a/...../....., considerou

() **Aprovado(a)**

() **Reprovado(a)**

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Presidente: Assinatura:
Nome:
Instituição:

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS**

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"
Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 – CEP. 05508-000 São Paulo, SP – Brasil
Telefone : (55) (11) 3091-7733 - telefax : (55) (11) 3091-8405
e-mail: cep@icb.usp.br

Comissão de Ética em Pesquisa

CERTIFICADO DE ISENÇÃO

Certificamos que o Protocolo CEP-ICB Nº 503/12 referente ao projeto intitulado: “*Análise do papel das ciclooxygenases 1 e 2 na migração da linhagem de glioma humano U251*” sob a responsabilidade de **Pollyana Bulgarelli Stevanatto**, foi analisado na presente data pela CEUA - COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS e pela CEPSh - COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS, tendo sido deliberado que o referido projeto não utilizará animais que estejam sob a égide da lei 11.794 de 8 de outubro de 2008, nem envolverá procedimentos regulados pela Resolução CONEP nº196 de 1996.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.

PROF. DR. WOTHAN TAVARES DE LIMA
Coordenador da CEUA - ICB/USP

PROF. DR. PAULO M.A. ZANOTTO
Coordenador da CEPsh - ICB/USP

Dedico este trabalho aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado me apoiando em todas as minhas escolhas! E aos pacientes, que este trabalho de pesquisa básica possa lhes trazer uma ponta de esperança para futuros tratamentos.

AGRADECIMENTOS

À Deus, por sempre iluminar meu caminho.

À minha orientadora, Dra. Alison Colquhoun, uma chefe ímpar, um exemplo para mim. Chefa muito obrigada por ter acreditado em mim, por ter embarcado comigo nesse desafio, por todos os ensinamentos e apoio. E por muita paciência! Esse mestrado só está sendo concluído, graças ao seu apoio e incentivo, muito obrigada!

À profa. Marilce dos Santos por todo apoio! Mari é por causa de pessoas como você e como a chefe que acredito que existem pesquisadores e educadores justos, honestos e apaixonados pelo que fazem! Muito obrigada!

Aos membros da coordenação da pós-graduação do Programa de Biologia Celular e Tecidual por todo apoio e compreensão.

Ao Tio Bauer, por todos ensinamentos, conversas e cafés, o senhor é um exemplo para mim!

Às secretárias, Celi, Ana, Regina e Elo por toda atenção, conversas e ajuda.

Aos profs. do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento por todos ensinamentos, pelas disciplinas, pela pronta ajuda sempre.

Aos meus colegas e amigos de bancada: Andrews, Andrinho, Aline, Chris, Diogo, Elo, Fábio, Fêzinha, Felipe, Keké, Lú, Marloca, Mineiro, Paola, Rê (Zé), Rê (lab) e Tati. Obrigada por serem minha família em vários momentos, pelas risadas, pelas inúmeras ajudas, pela ajuda nos experimentos, pelas comemorações, por todo apoio sempre!!!

Aos meus amigos de vida: Arthur, Dani, Dê, Fer, Jú, Lê (Famous), Romers, Sis, Tiçolina e Vitinho. Amo vocês, obrigada por sempre estarem ao meu lado!

À minha família, à minha mãe e ao meu pai, por todo amor e carinho, por me incentivarem e me darem oportunidade de realizar meu sonho! Sem dúvidas, esse mestrado é fruto do incentivo e apoio de vocês. Amo vocês, obrigada por tudo, vocês são os melhores pais e exemplo que alguém pode ter! Agradeço à minha irmã, pelo colo nas horas de aperto, pelas comemorações a cada conquista, pela casa sempre aberta a me receber, por todo amor e ajuda! Ao meu cunhado, por me receber como sua irmã, sempre pronto para me ajudar, obrigada pelas inúmeras caronas, obrigada por tudo! À minha vó, tia Cristiane e os demais pelas orações e apoio.

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e ao CNPq, pelo suporte financeiro.

*“Você nunca sabe a força que tem. Até
que a sua única alternativa é ser forte.”*

RESUMO

Stevanatto PB. Análise do papel das ciclooxygenases 1 e 2 na migração da linhagem celular de glioma humano U251-MG. [dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.

O glioblastoma multiforme (GBM) é um dos gliomas mais comuns, classificado como um glioma de grau IV (Organização Mundial da Saúde - OMS) e notoriamente difícil de ser tratado. O tratamento recomendado consiste na ressecção cirúrgica seguida de radio e quimioterapia, e a sobrevida média dos pacientes é de apenas 12 meses após o diagnóstico. Portanto, novas terapias que focam a redução do volume do tumor e o aumento da morte das células tumorais são urgentemente necessárias. Estudos pré-clínicos sugerem que a inibição de COX-1 e 2 com Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), como o Ibuprofeno (IBP), inibiram significativamente a proliferação e a migração celular em diferentes tumores. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar *in vitro* o efeito da inibição de COX-1 e COX-2 através do tratamento com IBP, e também com inibidores específicos como SC-560 e NS-398 respectivamente, na migração e na proliferação da linhagem celular de glioma humano U251-MG. O presente estudo demonstrou através de diversos ensaios que a inibição de COX-1 e COX-2 através do IBP, do SC-560 e do NS-398 inibiu significativamente a migração e a proliferação celular da linhagem celular U251-MG. Dessa maneira, concluímos que a PGE2 está envolvida na migração e proliferação das células desta linhagem.

Palavras-chave: Glioma. U251-MG. Ibuprofeno. NS-398. SC-560. Migração. Proliferação.

ABSTRACT

Stevanatto PB. The role of cyclooxygenases 1 and 2 in the migration of human glioma cell line U251MG. [Masters thesis (Tissue and Celular Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.

Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most common glioma, classified as grade IV (World Health Organization – WHO) and is notoriously difficult to treat. The recommended treatment consists of surgery followed by radiotherapy and chemotherapy, and the median survival is ten to twelve months. Preclinical studies suggest that inhibition of cyclooxygenase-2 by treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs, such as ibuprofen, significantly blocked the proliferation of different tumors including gliomas. Thus this study aimed to evaluate the migration of glioma cell line U251-MG after inhibition of cyclooxygenases 1 and 2 by treatment with ibuprofen (IBP), and specific inhibitors such as SC-560 for COX-1 and NS-398 for COX-2. The present study demonstrated by various assays that inhibition of COX-1 and COX-2 by IBP, SC-560 and NS-398, significantly inhibited migration and cell proliferation of the U251-MG cell line. Thus, we conclude that PGE2 is involved in this cell line's migration and proliferation.

Keywords: Glioma. U251-MG. Ibuprofen. NS-398. SC-560. Migration. Proliferation.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AA – Ácido araquidônico

AINEs – Antiinflamatórios não esteroidais

AMPC – Monofosfato de adenosina cíclico

AKT – Proteína quinase B

AS – Antisense (*primer*)

Bad – Proteína antagonista da Bcl-2

Bcl-2 – Célula de linfoma – 2

°C – Graus Celsius

cDNA – DNA complementar

cm - centímetros

CO₂- Gás carbônico

COX- Ciclooxygenase

DMEM - *Dulbecco's modified eagle medium*

DEPC – Dietilpirocarbonato

DMSO – Dimetilsulfóxido

DNA – Ácido desoxirribonucleico

EDTA - Ácido etilenodiamino tetra-acético

EGF – Fator de crescimento epidermal

EP1 – Receptor 1 de PGE₂

EP2 – Receptor 2 de PGE₂

EP3 – Receptor 3 de PGE₂

EP4 – Receptor 4 de PGE₂

GAPDH - Gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase

GBM – Glioblastoma multiforme

HETEs – Ácidos hidroxi-eicosatetraenóicos

IBP - Ibuprofeno

INCA – Instituto nacional do câncer

IP3 – Trifosfato de inositol

KDa – Kilodalton

LOX – Lipooxygenase

LPS – Lipopolissacarídeo

M – Molar

Mcl-1 – Proteína de diferenciação celular de leucemia mielóide crônica

mL – Mililitros

mM – Milimolar

MMPs – Metaloproteinases de matriz

RNA_m – RNA mensageiro

μM – Micromolar

NF-κB – Fator nuclear kappa B

OMS – Organização mundial da saúde

P.A. – Para análise

pb – Pares de bases

PBS – Tampão fosfato salino

PCR – Reação em cadeia da polimerase

PI3-AKT – Fosfatidilinositol 3 quinase - proteína quinase B

PKC – Proteína quinase C

PGs – Prostaglandinas

PGE₂ – Prostaglandina E₂

PGG₂ – Prostaglandina G₂

PUFAs – Ácidos graxos poliinsaturados

RNA – Ácido ribonucleico

ROS – Espécies reativas de oxigênio

RPM – Rotações por minuto

RT-PCR – Reação em cadeia da polimerase pela transcriptase reversa

SDS – Dodecil sulfato de sódio

SFB – Soro fetal bovino

TBS – Tampão tris salino

TXA₂ – Tromboxano A₂

VEGF – Fator de crescimento vascular endotelial

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Esquema de evolução de malignidade dos gliomas.....	20
Figura 2 - Cascata de metabolização do ácido araquidônico pela via de COX.....	23
Figura 3 - Curva de dose-resposta do tratamento com IBP.....	36
Figura 4 - Imagens da curva de dose-resposta do tratamento com IBP em 48 horas.....	37
Figura 5 - Curva de dose-resposta do tratamento com SC-560.....	38
Figura 6 - Imagens da curva de dose-resposta do tratamento com SC-560 em 48 horas.....	39
Figura 7 - Curva de dose-resposta do tratamento com NS-398.....	40
Figura 8 - Imagens da curva de dose-resposta do NS-398 em 48 horas.....	41
Figura 9 - Cura de dose-resposta do tratamento com AH6809.....	42
Figura 10 - Curva de dose-resposta do tratamento com L161.982.....	43
Figura 11 - Expressão gênica de COX-1.....	44
Figura 12 - Expressão gênica de COX-2.....	45
Figura 13 - Expressão gênica de GAPDH.....	45
Figura 14 - Expressão gênica dos receptores EPs na linhagem U251-MG.....	46
Figura 15 - Expressão gênica de GAPDH.....	46
Figura 16 - Expressão gênica de EP2.....	47
Figura 17 - Expressão gênica de EP4.....	48
Figura 18 - Expressão proteica de COX-1 e COX-2 no tratamento com IBP.....	49
Figura 19 - Expressão proteica de COX-1 e COX-2 no tratamento com SC-560.....	50
Figura 20 - Expressão proteica de COX-1 e COX-2 no tratamento com NS-398.....	51

Figura 21 - Expressão proteica dos EPs na linhagem celular U251-MG.....	51
Figura 22 - Expressão de EP2 no tratamento com AH6809, SC-560, NS-398 e IBP.....	52
Figura 23 - Expressão de EP4 no tratamento com AH6809, SC-560, NS-398 e IBP.....	53
Figura 24 - Gráfico da migração celular após o tratamento com IBP, SC560 e NS-398.....	54
Figura 25 - Imagens da migração celular após o tratamento com IBP, SC-560 e NS-398.....	54
Figura 26 - Gráfico da migração celular pelo período de 12 horas.....	55
Figura 27 - Imagens da migração celular pelo período de 12 horas.....	56
Figura 28 - Gráficos de análise do ciclo celular dos tratamentos com IBP, SC-560 e NS-398.....	57
Figura 29 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular.....	58
Figura 30 - Gráficos de análise do ciclo celular dos tratamentos com L161.982 e AH6809.....	59
Figura 31 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular.....	60
Figura 32 - Ilustração demonstrando os principais resultados deste estudo.....	66

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Sequência dos <i>primers</i> utilizados para análise da expressão gênica.....	30
Tabela 2 - Ensaios de Migração por <i>Transwell</i>	55
Tabela 3 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular.....	57
Tabela 4 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular.....	59

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	19
1.1 Gliomas.....	19
1.2 Metabolização do ácido araquidônico e as ciclooxigenases.....	21
1.3 Prostaglandinas e receptores EPs.....	22
1.4 Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) e o câncer.....	25
2 OBJETIVOS.....	27
3 MATERIAIS E MÉTODOS.....	28
3.1 Cultivo de células.....	28
3.2 Curva de dose-resposta de IBP.....	28
3.3 Curva de dose-resposta de SC-560, inibidor específico de COX-1; e NS-398, inibidor específico de COX-2.....	28
3.4 Curva de dose-resposta de AH6809, antagonista de EP2; e de L161.982, antagonistas de EP4.....	29
3.5 Análise da expressão gênica através de RT-PCR semi-quantitativo.....	29
<i>3.5.1 Desenho dos primers.....</i>	<i>29</i>
<i>3.5.2 Tratamento das células.....</i>	<i>30</i>
<i>3.5.3 Extração do RNA total.....</i>	<i>31</i>
<i>3.5.4 Síntese do DNA complementar (cDNA).....</i>	<i>31</i>
<i>3.5.5 Reação em cadeia da polimerase (PCR).....</i>	<i>31</i>
3.6. Western blot.....	32
3.7 Ensaio de migração por transwell.....	33
3.8 Análise do ciclo celular por FACS-PI (fluorescent activated cell sorting com iodeto de propídeo).....	34

3.9 Análise estatística	34
4 RESULTADOS	36
4.1 Curva de dose-resposta de Ibuprofeno	36
4.2 Curva de dose-resposta de SC-560	37
4.3 Curva de dose-resposta do NS-398	39
4.4 Curva de dose-resposta do AH6809	41
4.5 Curva de dose-resposta do L161.982	42
4.6 Análise da expressão gênica através de RT-PCR semi-quantitativo	43
<i>4.6.1 Análise da expressão gênica de COX-1 e COX-2 na linhagem celular U251-MG</i>	43
<i>4.6.2 Análise da expressão gênica de EP1, EP2, EP3 e EP4 na linhagem celular U251-MG</i>	46
4.7 Western blot	48
<i>4.7.1 Expressão proteica de COX-1 e COX-2</i>	48
<i>4.7.2 Expressão proteica de EP1, EP2, EP3 e EP4</i>	51
<i>4.7.3 Expressão proteica de EP2</i>	51
<i>4.7.4 Expressão proteica de EP4</i>	52
4.8 Ensaio de migração	53
4.9 Ciclo celular	56
<i>4.9.1 Análise do ciclo celular para os tratamentos com IBP, SC-560 e NS-398</i>	56
<i>4.9.2 Análise do ciclo celular para os tratamentos com AH6809 e L161.982</i>	58
5 DISCUSSÃO	61

6 CONCLUSÃO.....	67
REFERÊNCIAS.....	68

1 INTRODUÇÃO

1.1 Gliomas

Os gliomas são os tumores mais comuns do sistema nervoso central, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) representam cerca de 2% dos tumores que acometem a população brasileira (INCA, 2009). Apesar de serem considerados uma neoplasia maligna rara, com pouca incidência em relação aos demais tipos de câncer, os gliomas se destacam por apresentarem altos índices de mortalidade.

Dentre os gliomas, os tumores derivados dos astrócitos são os mais prevalentes, denominados de astrocitomas, os quais apresentam uma significativa heterogeneidade histopatológica. Devido a essa característica a Organização Mundial da Saúde (OMS) os classifica de acordo com os diferentes graus de malignidade, de I a IV (Lima et al., 2012). O astrocitoma pilocítico (grau I), é caracterizado pela presença de astrócitos bipolares com longos prolongamentos. Os astrocitomas difusos (grau II) apresentam atipia nuclear, e o astrocitoma anaplásico (grau III) é caracterizado por altas taxas de mitose (Louis et al., 2007). Já o Glioblastoma Multiforme (GBM) é classificado como um astrocitoma de grau IV, e se destaca entre os demais pela sua rápida proliferação celular, agressiva invasão do tecido cerebral e a formação de focos de necrose (Chiu et al., 2010).

Figura 1 – Esquema de evolução de malignidade dos gliomas

O GBM é derivado de transformações malignas de células maduras da glia ou de células-tronco neurais (Helseth et al., 2010; Kleihues et al., 1993). É altamente angiogênico, pois a neo-formação dos vasos que o nutrem é decorrente da população de células-tronco do próprio tumor (Ricci-Vitiani et al., 2010). Ele pode ser classificado em dois subtipos diferentes, glioblastoma primário e secundário, de acordo com a sua origem histológica. Os GBMs primários representam cerca de 90% dos casos, se desenvolvem rapidamente sem evidências clínicas ou histopatológicas e acometem principalmente indivíduos acima de 60 anos. Já os GBMs secundários desenvolvem-se através da progressão de um glioma de baixo grau, como astrocitoma difuso ou anaplásico, e acometem indivíduos mais jovens, na faixa etária dos 45 anos (Ohgaki, Kleihues, 2007).

Em ambos os casos, a sobrevida dos pacientes é muito pequena, apenas de doze a quinze meses após o diagnóstico, embora existam alguns casos, que representam cerca de 3 a 5%, de sobrevida maior que três anos (Das et al., 2011).

O tratamento recomendado consiste na combinação da ressecção cirúrgica do tumor cerebral, visando ampla remoção da massa tumoral e preservação das

funções neurológicas; seguida de radioterapia e, em alguns casos, concomitante e adjuvante quimioterapia com temozolomida (Buonerba et al., 2010; Clarke et al., 2010). Porém, a total recessão cirúrgica nem sempre é possível, já que o tumor pode estar localizado em uma área vital ou de funções neurológicas fundamentais, portanto nesse caso é realizado apenas a cito-redução do tumor ou biópsia da lesão (Rich, Bigner, 2004).

Apesar dos avanços da neurocirurgia, quimio e radioterapia, não foi observado melhora na terrível estatística clínica do GBM. Essas terapias convencionais são inerentes às propriedades intrínsecas das células deste tumor, que são altamente infiltrativas, o que evita a sua recessão total, além de serem resistentes à quimioterapia e radioterapia.

Portanto, novas terapias que focam na redução do volume do tumor e no aumento da morte das células tumorais são urgentemente necessárias (Barzon et al., 2006).

1.2 Metabolização do ácido araquidônico e as ciclooxigenases

Os ácidos graxos essenciais são os ácidos graxos que não são sintetizados pelo organismo, e portanto são obtidos através da dieta. São poliinsaturados (PUFAs), ou seja, possuem mais que duas duplas ligações de carbono em sua estrutura (Benadiba, 2008); e são conhecidos por inibirem a proliferação celular de muitos tipos de tumores tanto *in vitro* quanto *in vivo*. Sua capacidade de interferir na proliferação celular está associada a sua indução de produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) nas células tumorais resultando em morte celular por apoptose (Colquhoun, 2010).

O ácido araquidônico (AA) é um dos PUFAs mais encontrado na gordura animal, estudos apontam que a sua metabolização tem um papel crucial na inflamação crônica e no câncer. O AA pode ser metabolizado por três vias enzimáticas distintas, podendo ser substrato para a ciclooxigenase (COX), lipoxigenase (LOX) e pela via P450 da epoxigenase, resultando na produção dos eicosanóides, que incluem os prostanóides, os leucotrienos e os ácidos hidroieicosatetraenóicos (HETEs), respectivamente (Carneiro et al., 2004; Wang, DuBois, 2010).

Os eicosanóides são lipídeos biologicamente ativos que apresentam implicações em diversos processos patológicos, como a inflamação e o câncer. São capazes de promover a sobrevivência, a proliferação e a motilidade celular através da modulação da angiogênese, da adesão celular, da permeabilidade vascular e da inflamação (Miyake, 2009; Nathoo et al., 2004). Estudos têm mostrado que a ativação de COX e LOX durante a inflamação crônica e a carcinogênese resulta em um metabolismo anormal do AA, que pode ser relacionado com a transformação celular e a promoção tumoral (Wang, DuBois, 2010).

As COXs possuem três isoformas, incluindo a isoforma constitutiva, COX-1, e as isoformas induzidas, COX-2 e COX-3. COX-1 é constitutivamente expressa na maioria dos tecidos, é o catalisador da síntese da prostaglandina, a qual é necessária para o desempenho normal de algumas funções fisiológicas, como a agregação plaquetária e a citoproteção. Por outro lado, COX-2 é expressa constitutivamente em neurônios e no rim, contudo também pode ser rapidamente induzida por vários fatores como lipopolisacarídeos (LPS), fator de crescimento epidérmico (EGF) e ácido lipoteicoico (Chen et al., 2001; Xu et al., 2009).

Na presença de gliomas, a expressão de COX-2 foi identificada tanto nas células tumorais, quanto nos vasos que nutrem o tumor (Müller-Decker, Fürstenberger, 2007). Sua expressão também foi detectada em tecidos pré-malignos e malignos, portanto sugere-se que as COXs, particularmente COX-2, estão relacionadas com a progressão tumoral (Marshall et al., 2007).

A alta expressão e atividade de COX, principalmente COX-2, é responsável pela excessiva síntese de prostaglandina E_2 (PGE_2) e pode estar relacionada com a promoção da neoplasia, já que o aumento da expressão gênica de COX-2 foi detectada em uma variedade de tumores malignos associados com a elevada produção de PGE_2 .

1.3 Prostaglandinas e receptores EPs

As prostaglandinas (PGs) são sintetizadas a partir da hidrólise de fosfolipídeos da membrana plasmática para produção de araquidonato livre, em uma reação catalisada pela fosfolipase A_2 . O araquidonato livre é oxigenado pela COX, produzindo a PGG_2 , que é altamente instável. Esta serve como substrato para

diversas enzimas, as PG sintases, responsáveis pela produção das PGs (D_2 , E_2 , $F_{2\alpha}$ e I_2) e tromboxano sintase (TXA_2) (Hinz, Brune, 2002; Wang et al., 2007).

Na Figura 2, abaixo, é possível observar o esquema da cascata de metabolização do ácido araquidônico pela via de COX.

Figura 2 - Cascata de metabolização do ácido araquidônico pela via de COX

As prostaglandinas estão envolvidas em diversos processos fisiológicos e patológicos, como a inflamação, dor, funções renais, pressão sanguínea e função plaquetária, e também na progressão tumoral (Smyth et al., 2009).

Dentre as prostaglandinas, a prostaglandina E_2 (PGE₂) é a mais abundante e está envolvida na promoção tumoral, sendo encontrada em altos níveis em vários tipos de tumores, como o de cólon, pulmão, mama e próstata (Badawi et al., 1999; Wang, DuBois, 2012). A PGE₂ auxilia na progressão tumoral através de diversos mecanismos, como a estimulação da proliferação, sobrevivência, migração, invasão e angiogênese, e também modula a ação da resposta imune anti-tumoral (Greenhough et al., 2009).

A PGE₂ está presente em diversos tumores e está relacionada com o aumento de produção de VEGF (Fator de Crescimento Vascular do Endotélio),

proporcionando a angiogênese, aumento da migração de células endoteliais através de maior adesão à matriz extracelular, e aumento da ativação de MMPs (Matriz Metaloproteinases) que são capazes de digerir a membrana basal, proporcionando assim maior capacidade de invasão, resultando na promoção tumoral (Telliez et al., 2006). Não obstante, a PGE_2 é capaz de modular a expressão de NF-KB e Mcl-1, via PI13/AKT, ocasionando a diminuição de proteínas como as da família Bad e Bcl-2 que inibem a apoptose e promovem a sobrevivência celular (Larkins et al., 2006).

O efeito de PGE_2 é mediado através de quatro distintos receptores, EP1-EP4, os quais pertencem a família de receptores acoplados a proteína G, todos possuem caracteristicamente sete domínios transmembranas, embora cada um deles seja codificado por um gene distinto e promovam respostas celulares através da ativação de diferentes tipos de proteína G (Coleman et al., 1994; Miao et al., 2012).

O receptor EP1 acoplado à proteína $G_{\alpha q}$ induz a formação de trifosfatidilinositol e um subsequente aumento nos níveis de cálcio intracelular, e promove também a ativação da proteína quinase C (PKC), envolvida na transdução de sinais (Miao et al., 2012). Nas células tumorais, este receptor está associado ao aumento de estímulo à proliferação e invasão destas células (Kamei et al., 2009).

Os receptores EP2 e EP4 ligam-se à proteína $G_{\alpha q}$ e regulam o aumento dos níveis de adenosina monofosfato cíclico – AMPc (Hata, Breyer, 2004). Estudos apontam que EP2 quando ativado por PGE_2 pode estar associado à processos de proliferação celular e diminuição de apoptose em tumores. Esta interação de PGE_2 e EP2 em câncer de mama sugere que estão envolvidos com mecanismos de angiogênese e carcinogênese (Fujino et al., 2002; Sung et al., 2005).

Contudo, o receptor EP4 também pode ativar a via de PI3K/Akt, através da sua ligação com a proteína $G_{\alpha i}$. Esta via de sinalização está relacionada com a tumorigênese, já que a proteína Akt modula a função de vários substratos envolvidos na regulação da sobrevivência, progressão e crescimento celular (Vara et al., 2004). Estudos em câncer de mama sugerem que a via PGE_2 -EP4 tem efeitos metastáticos, porém com a adição de antagonistas para este receptor, este efeito foi inibido (Kundo et al., 2008).

O receptor EP3 possui três diferentes isoformas na região c-terminal, EP3 α , EP3 β e EP3 γ . As três isoformas ligam-se à proteína $G_{\alpha i}$, e reduzem os níveis de AMPc e atuam sobre inositol trifosfato (IP3), aumentando os níveis de cálcio. Já as duas primeiras isoformas (EP3 α , EP3 β) podem ligar-se também à proteína $G_{\alpha s}$, mas

nesse caso, aumentando os níveis de AMPc (Dorsm, Gutkind, 2007; Sugimoto, Narumiya, 2007). Estudos em células tumorais de sarcoma apontam que o envolvimento de PGE₂-EP3 parece influenciar a proliferação e a angiogênese nessas células (Amano et al., 2003).

1.4 Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) e o câncer

Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) constituem um grupo de variados fármacos de amplo espectro terapêuticos, são antiinflamatórios, analgésicos e antipiréticos (Kummer, Coelho, 2002).

A relação entre o uso dos AINEs e o câncer se deu a partir de diversos estudos epidemiológicos que apontaram o uso prolongado desses medicamentos e a redução de diversos tipos de tumores como câncer gástrico, de colorretal, de mama, de pulmão e de próstata (Baron, Sandle, 2000; Johnson et al., 2010; Ulrich et al., 2006). Os mecanismos envolvidos nesse processo ainda não estão completamente elucidados, mas estudos mostram que os AINEs inibem inespecificamente as COXs, suprimindo assim a síntese das prostaglandinas, e dessa forma afetam a proliferação celular, migração, angiogênese e apoptose (Gallo et al., 2002).

Dentre os AINEs, se destaca o ibuprofeno (IBP), um fármaco derivado do ácido propiônico, um dos grupos mais importantes de antiinflamatórios não esteróides. É um dos pioneiros desse grupo a ser administrado e até os dias de hoje é amplamente utilizado. Seu mecanismo de ação, assim como os demais AINEs, está atribuído à inibição não seletiva de COXs, conforme descrito anteriormente (Newa et al., 2008).

Estudos apontam o uso de IBP na redução do risco de câncer de próstata e em mecanismos relacionado com a morte de células deste tipo de tumor (Andrew et al., 2002; Mahmud et al., 2010). Estudos utilizando o IBP em células C6 de gliomas de ratos *in vivo*, demonstraram que essa droga é capaz de reduzir o peso do tumor alterando o seu padrão angiogênico, além da supressão de vasos peritumorais (Altinoz et al., 2001; Farrel et al., 1988).

Não obstante, estudos pré-clínicos sugeriram que a inibição de COX-2 e a diminuição da PGE₂ com uso de AINEs bloquearam significativamente a proliferação de diferentes tumores, incluindo câncer gástrico e em algumas linhagens de

glioblastoma multiforme, promoveram invasão menos eficiente e migração celular reduzida (Lim et al., 2001; Wakimoto et al., 2008).

2 OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo analisar o efeito da inibição de COX-1 e COX-2 na migração e proliferação da linhagem celular de glioma humano U251-MG.

- 1) Determinar os efeitos da adição de IBP, inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, na migração e proliferação das células U251-MG;
- 2) determinar os efeitos da adição de SC-560, inibidor seletivo de COX-1, na migração e proliferação das células U251-MG;
- 3) determinar os efeitos da adição de NS-398, inibidor seletivo de COX-2, na migração e proliferação das células U251-MG;
- 4) determinar os efeitos da adição de AH6809, antagonista do receptor EP2, na proliferação e expressão gênica e proteica das células U251-MG;
- 5) determinar os efeitos da adição de L161.982, antagonista do receptor EP4, na proliferação das células U251-MG;
- 6) determinar a influência dos tratamentos mencionados acima da expressão gênica e proteica de COX-1, COX-2, EP2 e EP4.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Cultivo de células

As células da linhagem U251-MG de glioma humano, gentilmente cedidas pela Dra. Eugenia Costanzi-Strauss do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; foram cultivadas em garrafas plásticas estéreis, contendo meio DMEM, *Dulbecco's Modified Eagle Medium*, (Invitrogen, CA – EUA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos, penicilina 50 ug/ml e estreptomicina 50 µg/ml. Foram mantidas em estufa em atmosfera com 5% de CO₂ e temperatura de 37 °C.

3.2 Curva de dose-resposta de IBP

Foi realizada a curva de dose-resposta para verificar a influência do tratamento com Ibuprofeno (IBP) em diferentes concentrações e períodos de tratamentos sobre a linhagem celular U251-MG.

Foram plaqueadas 2×10^4 células por poço, em placas de 24 poços, e tratadas por 24 e 48 horas com as seguintes concentrações de IBP: 25 µM, 50 µM, 75 µM e 100 µM.

Utilizou-se como controle o veículo da droga, etanol P.A., no mesmo volume utilizado na concentração máxima do tratamento, cuja concentração foi de 1% no volume total de meio de cultivo utilizado. Além disso, também se utilizou um controle que não recebeu nenhum tratamento. Após cada período de tratamento, as células foram tripsinizadas (Tripsina 0,025% em ácido etilenodiamino tetra-acético – EDTA, 0,02%) e contadas em câmara de Neubauer. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.

3.3 Curva de Dose-Resposta de SC-560, inibidor específico de COX-1; e NS-398, inibidor específico de COX-2

Para verificar a influência do tratamento com os inibidores específicos de COX-1 e COX-2, SC-560 e NS-398 respectivamente, sobre a linhagem celular U251-

MG foram realizadas curvas de dose-resposta das drogas em diferentes concentrações e períodos de tratamentos.

Foram plaqueadas 2×10^4 células por poço, em placas de 24 poços e tratadas por 24 e 48 horas com as seguintes concentrações de SC-560 e NS-398: 50 μM , 100 μM e 150 μM . Utilizou-se como controle o veículo da droga, dimetilsulfóxido (DMSO) no mesmo volume utilizado na concentração máxima do tratamento, cuja concentração foi de 0,27% no volume total de meio de cultivo utilizado. Além disso, também se utilizou um controle que não recebeu nenhum tratamento.

Em cada período, as células foram tripsinizadas (Trypsina 0,025% em EDTA 0,02%) e contadas em câmara de Neubauer. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.

3.4 Curva de Dose-Resposta de AH6809, antagonista de EP2; e de L161.982, antagonista de EP4

Para verificar a influência do tratamento com os antagonistas dos receptores EP2 e EP4, AH6809 e L161.982 respectivamente, sobre a linhagem celular U251-MG foram realizadas curvas de dose-resposta das drogas em diferentes concentrações e períodos de tratamentos.

Foram plaqueadas 2×10^4 células por poço, em placas de 24 poços e tratadas por 24 e 48 horas com as seguintes concentrações de AH6809 e L161.982: 0,1 μM , 1 μM e 10 μM . Utilizou-se como controle o veículo da droga, DMSO no mesmo volume utilizado na concentração máxima do tratamento, cuja concentração foi de 0,6% no volume total de meio de cultivo utilizado. Além disso, também se utilizou um controle que não recebeu nenhum tratamento.

Em cada período, as células foram tripsinizadas (Trypsina 0,025% em EDTA 0,02%) e contadas em câmara de Neubauer. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.

3.5 Análise da expressão gênica através de RT-PCR semi-quantitativo

3.5.1 Desenho dos primers

Os *primers* utilizados para a reação de RT-PCR seguem na tabela 1, e foram desenhados com base em sequências disponíveis no *GenBank* (www.ncbi.nlm.nih.gov) e com o auxílio do programa *Primer 3* (www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi), suas especificidades foram analisadas por *BLAST* (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>). Todos os *primers* utilizados neste trabalho foram sintetizados pela *Invitrogen*, CA – EUA.

Tabela 1 - Sequência dos *Primers* Utilizados para Análise da Expressão Gênica

Genes	Sequências (5'-3')	Tamanho do Produto (pb)	Temperatura de Anelamento (°C)
COX-1	S: CCTCATGTTTGCCTTCTTTGC	168	63
	AS: GCGGGGTACATTTCTCCATC		
COX-2	S: ATCTACCCTCCTCAAGTCCC	670	69
	AS: TACCAGAAGGGCAGGATACGA		
GAPDH	S: GAGTCAACGGATTTGGTCGT	250	52
	AS: TTGATTTTGGAGGGATCTCG		
EP1	S: AGCATCTGGCTGTCTAGAATGT	121	61
	AS: CAAGGATGCCAGCAGAAAGTC		
EP2	S: GCACCGAGACAATGAGAAGCA	110	59
	AS: GCAGTCCCTGCTCTTCTGC		
EP3	S: TCATGATAGAGAACCCTGCAGT	332	51
	AS: ATCCCAGGGTTAGGCAGATTTA		
EP4	S: GCTTTCACCTTGTCCTGCTC	171	59
	AS: AAGCTGGGACTCGTCTTTGA		

3.5.2 Tratamento das células

Foram plaqueadas 2×10^5 células em garrafas plásticas de 25 cm², em triplicatas para cada tratamento, e foram tratadas com 50 µM de IBP, SC-560 e NS-398 e com 10 µM de AH6809 e L161.982 por 48 horas. Foram utilizados como controles, amostras que não recebeu nenhum tratamento, amostras tratadas com etanol P.A., veículo do IBP; e amostras tratadas com DMSO, veículo dos inibidores específicos.

3.5.3 Extração do RNA total

Ao término do tratamento as células foram coletadas, mantidas em gelo e homogeneizadas em equipamento Politron PT – 3100 (*Kinematica Dispersing and Mixing Technology, Luzern - Suíça*) com 1 mL de Trizol[®] (*Invitrogen, CA – EUA*); e foram mantidas em temperatura ambiente por 5 minutos. Foram adicionados 200 uL de clorofórmio, e centrifugadas a 10600 RPM por 15' à 4 °C. A fase aquosa, o sobrenadante, foi retirado e transferido para um novo tubo, ao qual foi adicionado 500 uL de isopropanol gelado, as amostras foram centrifugadas a 10600 RPM por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado com 1 mL de etanol 75% livre de RNase, e centrifugado a 7500 RPM por 5 minutos a 4 °C. Essa etapa de lavagem foi realizada duas vezes. Por fim, o sobrenadante foi removido, o precipitado de RNA foi ressuspensionado em 50 uL de água DEPC (dimetil pirocarbonato).

O RNA foi quantificado em equipamento Nano-Drop, utilizando a relação A260/A280 $\geq 1,8$. O RNA foi mantido a -80 °C. E a integridade do RNA foi verificada por eletroforese em gel de agarose a 1% contendo brometo de etídio.

3.5.4 Síntese do DNA complementar (cDNA)

A síntese do cDNA foi realizada por RT-PCR utilizando a enzima MMLV-transcriptase reversa (*Invitrogen, CA – EUA*), utilizando 3ug do RNA de interesse e de acordo com as instruções do fabricante. A integridade do cDNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1% contendo brometo de etídio.

3.5.5 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Cada reação de PCR foi preparada para um volume final de 30 uL, contendo: 16 uL de H₂O MilliQ autoclavada, 3 uL de 10x PCR Rxn Buffer –MgCl₂ (*Invitrogen, CA - EUA*), 1 uL dNTP mix (10 mM), 1,5 uL MgCl₂ (50 mM, *Invitrogen, CA-EUA*), 3 uL *primer sense* (10 µM), 3 uL *primer antisense* (10 µM), 2 uL cDNA e 0,5 uL *Platinum Taq DNA Polymerase* (*Invitrogen, CA – EUA*).

As condições da reação foram: 94 °C por 1 minuto, temperatura específica de cada *primer de interesse* por 1 minuto e 72 °C por 1 minuto, por 40 ciclos. A

amplificação da reação foi confirmada por eletroforese em gel de agarose 1% contendo brometo de etídeo. O gene GAPDH foi utilizado como controle endógeno de expressão constitutiva. Todas as análises foram realizadas em triplicatas.

A análise semi-quantitativa do produto da reação foi realizada utilizando o programa *Image J*.

3.6 Western blot

Foram plaqueadas 2×10^5 células em garrafas plásticas de 25 cm², em triplicatas para cada tratamento, o tratamento foi realizado com 50 µM de IBP, SC-560 e NS-398 e com 10 µM de AH6809 e L161.982 por 48 horas. Foram utilizados como controles, amostras que não receberam nenhum tratamento, amostras tratadas com etanol P.A., veículo do IBP; e amostras tratadas com DMSO, veículo dos inibidores específicos e dos antagonistas.

As células foram tripsinizadas (Tripsina 0,025% em EDTA 0,02%), centrifugadas a 1500 RPM (rotação por minuto) por dois minutos, e lavadas com PBS 1X. A proteína foi extraída com tampão de lise (10 mM Tris, 100 mM NaCl; 1 mM EDTA e 1% Triton X-100 - pH 7.6), inibidor de protease e inibidor de fosfatase utilizando um pilão de vidro de 1 mL. A concentração proteica foi determinada através do método de Lowry. Os extratos proteicos foram diluídos em tampão de amostra (1,51g de Tris-HCl - pH6,8, 40 mL de SDS 10%, 10 mL de mercaptoetanol, 20 mL de glicerol, 0,004 g de azul de bromofenol em 100 mL de H₂O destilada) e incubados a 100 °C por 3 minutos.

O processo de separação foi realizado por eletroforese em gel *stacking* SDS-PAGE com 4% de acrilamida, acompanhado de um segundo gel de separação, com acrilamida a 7,5%. Em cada poço foram colocados 40 µg de extrato proteico total diluído no tampão da amostra, conforme mencionado anteriormente. A corrida eletroforética foi realizada a 70 volts por 30 minutos, para separar as amostras no gel *stacking* (4% de acrilamida) e a 100 volts por 1 hora, para o gel de separação (7,5% de acrilamida).

O *blotting* foi realizado em membrana de nitrocelulose, previamente incubada no tampão de transferência (50 mL de tampão *blotting* 10x*, 125 mL metanol e 450 mL de H₂O destilada; *Tampão *blotting* 10x: 85,5g de glicina, 18g de Tris-Base e 480 mL de H₂O destilada) em 200 mA, por 2 horas em banho de gelo. Após o término do

blotting a membrana foi lavada 1x com TBS 1x por 5 minutos, em agitação; e 3x com TBS Tween 0,1% por 5 minutos.

Para bloquear as possíveis ligações não específicas, as membranas foram incubadas em solução de PBS 1X com 1% de albumina por 1 hora, em temperatura ambiente, sob agitação. Os anticorpos primários utilizados foram para COX-1 (1:2000; COX-1 antibody (H-62), SC-7950; Santa Cruz Biotechnology[®], inc., CA - EUA) e COX-2 (1:2000; COX-2 antibody (H-62), SC-7951; Santa Cruz Biotechnology[®], inc., CA - EUA), EP1 (1:100; EP1 Receptor Polyclonal; Cayman Chemical, Michigan - EUA), EP2 (1:100; EP2 Receptor Polyclonal; Cayman Chemical, Michigan - EUA), EP3 (1:100; EP3 Receptor Polyclonal; Cayman Chemical, Michigan - EUA), EP4 (1:100; EP4 Receptor Polyclonal; Cayman Chemical, Michigan - EUA) e β -Actina (1:200; Actin antibody (H-300), SC-10731; Santa Cruz Biotechnology[®], inc., CA - EUA). Todos foram incubados *overnight*, em temperatura ambiente e sob agitação. Em seguida, foram incubados com anticorpo secundário conjugado com peroxidase (1:1000 donkey anti-habbit IgG HRP; Santa Cruz Biotechnology[®], inc., CA - EUA). A visualização foi realizada por detecção quimioluminescente utilizando ECL[™] Western Blotting Detection Reagents (GE Healthcare) no equipamento G:Box (Syngene, MD - EUA).

A análise das bandas foi realizada utilizando o programa *Image J*.

3.7 Ensaio de migração por *transwell*

O ensaio de *transwell* foi realizado para analisar o efeito do tratamento do IBP e dos inibidores específicos SC-560 e NS-398 na migração da linhagem celular U251-MG.

Foram plaqueadas 2×10^4 células/poço no compartimento superior do *transwell* com meio de cultivo DMEM, suplementado com 10% de SFB. O tratamento foi realizado após 12 horas do plaqueamento, período de aderência das células, e na concentração de 50 μ M de cada droga por 48 horas. A cada 24 horas foram trocados os meios de cultivo com os respectivos tratamentos.

Também foram plaqueadas 10^5 células/poço em placas de 6 poços. O tratamento foi realizado após 12 horas do plaqueamento, período de aderência das células. Foram tratadas com 50 μ M de cada droga por 36 horas em meio de cultivo DMEM, suplementado com 10% de SFB, sendo que após 24 horas de tratamento

foram trocados os meios de cultivo com os respectivos tratamentos. Após as 36 horas de tratamento, as células foram tripsinizadas, contadas em Câmara de Neubauer, e foram plaqueadas 2×10^4 células/poço no compartimento superior do *transwell* com meio de cultivo DMEM, suplementado com 10% de SFB e com os respectivos tratamentos. As células foram incubadas no *transwell* por 12 horas, completando 48 horas de tratamento, mas apenas 12 horas de ensaio de migração.

O meio de cultivo foi descartado, as células foram lavadas três vezes com tampão fosfato salino (PBS) 1X, pH 7.2. As células da porção superior da membrana do *transwell*, células que não migraram, foram removidas com hastes flexíveis. As células foram coradas com cristal violeta (0,05% de cristal violeta e 70% de etanol) por 30 minutos, lavadas com PBS 1X, pH 7.2. As membranas contendo as células coradas que migraram tiveram as imagens capturadas aleatoriamente em 5 campos diferentes no microscópio *NiKon Optipht-II*, equipado com câmera *Coolsnap Pro* (*Media Cybernetics, Bethesda, MD - EUA*).

3.8 Análise do ciclo celular por FACS-PI (*fluorescent activated cell sorting* com iodeto de propídeo)

Pela análise do ciclo celular através da marcação do DNA com o iodeto de propídeo foi possível identificar as fases do ciclo celular, e assim analisar os efeitos da inibição de proliferação e do aumento de morte celular após os tratamentos com os inibidores de COX.

Foram plaqueadas 5×10^4 células/poço em placas de 12 poços, em triplicatas para cada tratamento, e foram tratadas com 50 μ M de IBP, SC-560 e NS-398 e com 10 μ M de AH6809 e L161.982 por 48 horas. Foram utilizados como controles, amostras que não recebeu nenhum tratamento, amostras tratadas com etanol P.A., veículo do IBP, e amostras tratadas com DMSO, veículo dos inibidores específicos e dos antagonistas dos EPs 2 e 4. Os meios de cultivo contendo os respectivos tratamentos foram trocados a cada 24 horas até completar as 48 horas de tratamento.

Os meios de cultivo de cada amostra foram coletados em tubo de polipropileno de 15 mL, as células foram lavadas com PBS 1X, o qual também foi adicionado ao mesmo tubo contendo o meio coletado. Tripsinizou-se as células e foram adicionadas ao mesmo tubo contendo o meio coletado e o PBS da lavagem

das células. Centrifugou-se à 1000 RPM por 5 minutos; foi descartado o sobrenadante, o precipitado de células foi ressuspendido delicadamente em 1 ml de PBS 1X e novamente foi centrifugado a 1000RPM por 5 minutos. Descartou-se o sobrenadante, ressuspendeu-se o precipitado delicadamente em 2 mL de etanol 70% gelado (preparado em PBS 1X) e as amostras foram incubadas por no mínimo 24 horas a 4 °C.

Centrifugou-se a 1000 RPM por 5 minutos, ressuspendeu-se o pellet em 0,5mL de solução de iodeto de propídeo (20 ug/mL de RNase, 0,1% de Triton X100, 20 ug/mL de iodeto de propídeo, em PBS 1X), foi incubado a 37°C por 30 minutos. Centrifugou-se a 1000 RPM por 5 minutos, descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se o pellet delicadamente em 1 mL de PBS 1X.

Foram contados 10.000 eventos para cada amostra em FACScalibur (*fluorescent activated cell sorting* - *Becton Dickison*) e analisados por meio do *software Cell Quest – FACScalibur (Becton Dickison)* – gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Rui Curi do Departamento de Fisiologia e Biofísica, ICB-USP.

3.9 Análise estatística

Todos os dados obtidos estão apresentados como média $\pm$ erro padrão (SE). As análises foram realizadas utilizando o programa *Graph Pad Instat* e *Graph Pad Prism*, por ANOVA e Test-t para comparação das amostras. As diferenças foram consideradas significantes com $p < 0,05$.

4 RESULTADOS

4.1 Curva de dose-resposta de Ibuprofeno

Observou-se que o efeito do tratamento com IBP, inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, após 24 e 48 horas seguiu um padrão inversamente proporcional entre as concentrações utilizadas e a proliferação celular. Após 24 horas de tratamento não foi observado nenhum valor significativo, tanto em relação aos controles quanto entre as concentrações ($p=0.2193$). Enquanto que, após 48 horas de tratamento as concentrações de 50 μM , 75 μM e 100 μM foram consideradas significantes ($p < 0.05$ nas duas primeiras e $p < 0.01$ na última concentração). Os controles não apresentaram diferença significativa (Figura 3), $n=3$.

Figura 3 - Curva de dose-resposta do tratamento com IBP

A concentração de 50 μM foi a melhor concentração observada e escolhida para os ensaios; ela reduziu o número de células em 55,4% no período de 48 horas, sendo que não foi observado alteração na morfologia das células em relação aos controles, conforme observado nas concentrações maiores nesse mesmo período de tratamento (Figura 4).

Figura 4 - Imagens da curva de dose-resposta do tratamento com IBP em 48 horas

CN: controle sem nenhum tratamento. **25 μ M:** tratamento por 48 horas com 25 μ M de IBP. **50 μ M:** tratamento por 48 horas com 50 μ M de IBP. **75 μ M:** tratamento por 48 horas com 75 μ M de IBP. **100 μ M:** tratamento por 48 horas com 100 μ M de SC-560.

4.2 Curva de dose-resposta do tratamento com SC-560

O tratamento com o inibidor seletivo para COX-1, SC-560, após 24 e 48 horas seguiu um padrão inversamente proporcional entre as concentrações utilizadas e o número de células contadas. A redução do número de células em todas as concentrações e em ambos os períodos de tratamentos, 24 e 48 horas, foi extremamente significativo ($p < 0,001$) em relação aos controles (Figura 5). Os controles não apresentaram diferença significativa, $n=3$.

Figura 5 - Curva de dose-resposta do tratamento com SC-560

A concentração adotada para os experimentos foi a mesma concentração adotada para o tratamento com IBP, 50 μ M. Assim, nos permitiu comparar o efeito de ambos sob a mesma concentração de tratamento, e ainda essa concentração reduziu significativamente o número de células, 45% em 48 horas, $p < 0,001$ (Figura 5) sem agredir drasticamente a morfologia das mesmas (Figura 6).

Figura 6 - Imagens da curva de dose-resposta do tratamento com SC-560 em 48 horas

CN: controle sem nenhum tratamento. **50 μ M:** tratamento por 48 horas com 50 μ M de SC-560. **100 μ M:** tratamento por 48 horas com 100 μ M de SC-560. **150 μ M:** tratamento por 48 horas com 150 μ M de SC-560.

4.3 Curva de dose-resposta do NS-398

O tratamento com o inibidor seletivo para COX-2, NS-398, após 24 e 48 horas também seguiu o padrão inversamente proporcional entre as concentrações utilizadas e o número de células contadas. Nenhuma das concentrações tratadas em 24 horas foi significativa ($p=0,1641$) em relação ao controle. No período de 48 horas, a concentração de 50 μ M também não apresentou significância em relação ao controle, enquanto que as concentrações de 100 μ M e 150 μ M foram consideradas significantes ($p<0,01$ e $p<0,001$, respectivamente) – Figura 7. Os controles não apresentaram diferença significativa, $n=3$ em todos os controles e tratamentos.

Figura 7 - Curva de dose-resposta do tratamento com NS-398

A concentração adotada para os experimentos foi a mesma concentração adotada para os tratamentos com IBP e SC-560, 50 μ M. Apesar dessa concentração não ter apresentado redução significativa do número de células, 35% em 48 horas de tratamento (Figura 7), nos permite comparar o efeito de todas as drogas sob a mesma concentração de tratamento. Observou-se que essa concentração não agrediu drasticamente a morfologia das células (Figura 8) em relação aos controles.

Figura 8 - Imagens da curva de dose-resposta do NS-398 em 48 horas

CN: controle sem nenhum tratamento. **50 μ M:** tratamento por 48 horas com 50 μ M de NS-398. **100 μ M:** tratamento por 48 horas com 100 μ M de NS-398. **150 μ M:** tratamento por 48 horas com 150 μ M de NS-398.

4.4 Curva de Dose-Resposta do tratamento com AH6809

O tratamento com 10 μ M do antagonista do EP2, AH6809, em 48 horas foi a única concentração que reduziu significativamente o número de células, 28,72%, em relação aos controles (Figura 9). Dessa forma, essa concentração foi adotada para os ensaios com essa droga. Os controles não apresentaram diferença significativa, $n=3$ em todos os controles e tratamentos.

Figura 9 - Curva de dose-resposta do tratamento com AH6809

4.5 Curva de dose-resposta do tratamento com L161.982

O tratamento com 10 μ M do antagonista do EP4, L161.982, em 48 horas foi a única concentração que reduziu significativamente o número de células, 45,96%, em relação aos controles (Figura 10). Portanto, essa concentração foi adotada para os ensaios com essa droga. Os controles não apresentaram diferença significativa, $n=3$ em todos os controles e tratamentos.

Figura 10 - Curva de dose-resposta do tratamento com L161.982

4.6 Análise da expressão gênica através de RT-PCR semi-quantitativo

4.6.1 Análise da expressão gênica de COX-1 e COX-2 na linhagem celular U251-MG

Foi observado que a linhagem celular U251-MG expressa tanto COX-1 (Figura 11) quanto COX-2 (Figura 12). Houve aumento significativo de 129% da expressão gênica de COX-1 no tratamento com IBP em relação ao controle ($p < 0,001$). Não obstante, também foi observada diminuição significativa de 50,8% na expressão gênica de COX-1 no tratamento com SC-560 ($p < 0,001$); e diminuição não significativa de 30% da expressão deste gene no tratamento com NS-398. Não houve diferença significativa de expressão entre os controles.

Figura 11 - Expressão Gênica de COX-1

CN: controle. **IBP:** amostras tratadas com IBP. **NS-398:** amostras tratadas com NS-398. **SC-560:** amostras tratadas com SC-560. **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **M:** marcador de peso molecular *100bp DNA Ladder* (Invitrogen – CA, EUA).

Não houve diferença significativa na expressão gênica de COX-2 (Figura 12) e do gene constitutivo GAPDH (Figura 13) entre nenhum dos tratamentos (IBP, SC-560 e NS-398) e controles.

Figura 12 - Expressão Gênica de COX-2

CN: controle. **IBP:** amostras tratadas com IBP. **NS-398:** amostras tratadas com NS-398. **SC-560:** amostras tratadas com SC-560. **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **M:** marcador de peso molecular *100bp DNA Ladder* (Invitrogen – CA, EUA).

Figura 13 - Expressão Gênica de GAPDH

CN: controle. **IBP:** amostras tratadas com IBP. **NS-398:** amostras tratadas com NS-398. **SC-560:** amostras tratadas com SC-560. **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **M:** marcador de peso molecular *100bp DNA Ladder* (Invitrogen – CA, EUA).

4.6.2 Análise da expressão gênica de EP1, EP2, EP3 e EP4 na linhagem celular U251-MG

A linhagem U251-MG expressa todos os receptores de PGE₂, EP1, EP2, EP3 e EP4 (Figura 14).

Figura 14 - Expressão gênica dos receptores EPs na linhagem U251-MG

EP1: expressão gênica do receptor EP1, **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **EP2:** expressão gênica do receptor EP2. **M:** marcador de peso molecular *100bp DNA Ladder (Invitrogen – CA, EUA)*. **EP3:** expressão gênica do receptor EP3. **EP4:** expressão gênica do receptor EP4.

Foi realizada a análise de expressão gênica do gene constitutivo GAPDH, o qual esteve expresso tanto no controle, quanto nas amostras tratadas com os antagonistas de EP2 e EP4, AH6809 e L161.982, respectivamente (Figura 15).

Figura 15 – Expressão Gênica de GAPDH

CN: expressão gênica de GAPDH no controle normal, sem nenhum tratamento. **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **AH6809:** expressão gênica de GAPDH na amostra tratada com AH6809. **M:** marcador de peso molecular *100bp DNA Ladder (Invitrogen – CA, EUA)*. **L161.982:** expressão gênica de GAPDH na amostra tratada com L161.982.

Na análise da expressão gênica do receptor EP2 foi observado aumento significativo de 123% da expressão deste gene ($p < 0.05$) no tratamento com o antagonista de EP2, AH6809, em relação ao controle. Contudo, não foi observada diferença significativa na expressão deste gene entre nenhum dos demais tratamentos em relação aos seus respectivos controles, apesar de ter sido observado aumento de 58% da expressão deste gene para o tratamento com L161.982 (antagonista de EP4), pequeno aumento de 5% com IBP e NS-398 (inibidor não específico de COX1 e COX-2; e inibidor específico de COX-2,

respectivamente) e diminuição de 10% com SC-560 (inibidor específico de COX-1) - Figura 16.

Figura 16 - Expressão Gênica de EP2

CN: controle. **AH6809:** amostras tratadas com AH6809, antagonista do EP2. **L161.982:** amostras tratadas com L161.982, antagonista do EP4. **IBP:** amostras tratadas com IBP. **SC-560:** amostras tratadas com SC-560. **NS-398:** amostras tratadas com NS-398. **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **M:** marcador de peso molecular 100bp DNA Ladder (Invitrogen – CA, EUA).

A expressão gênica do receptor EP4 apresentou diferença significativa entre os controles (veículo das drogas: DMSO e etanol), portanto os antagonistas de EP2 (AH6809) e de EP4 (L161.982); e os inibidores específicos de COX-1 (SC-560) e de COX-2 (NS-398) foram comparados com o controle do veículo destas drogas (DMSO). Enquanto que o tratamento com IBP foi comparado com controle do veículo desta droga (etanol). Ambos foram normalizados para 100% e chamados de CN.

Foi observado aumento significativo de 85,5% da expressão gênica de EP4 entre o tratamento com IBP e seu respectivo controle ($p < 0.05$). Para os demais tratamentos, não foi observada diferença significativa da expressão deste gene em relação aos respectivos controles. Apesar de ter sido observado aumento da expressão de 63%, 37% e 18% nos tratamentos com AH6809 (antagonista de EP2),

L161.982 (antagonista de EP4) e NS-398, respectivamente. Já o tratamento com SC-560, apresentou diminuição não significativa da expressão de 22% (Figura 17).

Figura 17 - Expressão gênica de EP4

CN: controle. **AH6809:** amostras tratadas com AH6809, antagonista do EP2. **L161.982:** amostras tratadas com L161.982, antagonista do EP4. **IBP:** amostras tratadas com IBP. **SC-560:** amostras tratadas com SC-560. **NS-398:** amostras tratadas com NS-398. **B:** branco de cada reação corresponde ao controle da reação. **M:** marcador de peso molecular 100bp DNA Ladder (Invitrogen – CA, EUA).

4.7 Western blot

4.7.1 Expressão proteica de COX-1 e COX-2

Ambas as proteínas, tanto COX-1 quanto COX-2, são expressas na linhagem celular U251-MG. Não houve diferença significativa na expressão proteica entre o controle e o tratamento com IBP, apesar de ter sido observado aumento de 16,7% na expressão de COX-1 e de 6,8% na expressão de COX-2 neste tratamento (Figura 18).

Figura 18 - Expressão proteica de COX-1 e COX-2 no tratamento com IBP

Em relação ao tratamento com o inibidor específico de COX-1, SC-560, também não foi observada diferença significativa na expressão proteica entre o controle e o tratado, apesar de ter sido observado aumento de 24,4% na expressão de COX-2 (Figura 19).

Figura 19 - Expressão proteica de COX-1 e COX-2 no tratamento com SC-560

Em relação ao tratamento com o inibidor específico de COX-2, NS-398, também não foi observada diferença significativa na expressão proteica entre o controle e o tratado, apesar de ter sido observado aumento de 30,5% na expressão de COX-2 (Figura 20).

Figura 20 - Expressão proteica de COX-1 e COX-2 no tratamento com NS-398

4.7.2 Expressão proteica de EP1, EP2, EP3 e EP4

A linhagem celular U251-MG apresentou expressão proteica para EP1, EP2, EP3 e EP4 (Figura 21).

Figura 21 – Expressão proteica dos EPs na linhagem celular U251-MG

4.7.3 Expressão proteica de EP2

O tratamento com o antagonista de EP2, AH6809 apresentou ligeiro aumento não significativo de 8% na expressão deste gene. Porém os tratamentos com o inibidor específico de COX-1, SC-560; inibidor específico de COX-2, NS-398; e com

inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, IBP; não apresentaram expressão para este receptor (Figura 22).

Figura 22 – Expressão de EP2 no tratamento com AH6809, SC-560, NS-398 e IBP

4.7.4 Expressão proteica de EP4

A expressão proteica para o receptor EP4 apresentou aumento significativo de 100% ($p < 0,5$) no tratamento com o antagonista deste receptor, L161.982. Entretanto, não foi observada diferença significativa da expressão deste gene para os tratamentos com o inibidor específico de COX-1, SC-560; e com o IBP, inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, em relação ao controle. Apesar de ter sido observada redução da expressão gênica de 42% no tratamento com IBP. Contudo, não foi observada expressão deste receptor para o tratamento com NS-398, inibidor específico de COX-2 (Figura 23).

Figura 23 – Expressão de EP4 no tratamento com L161.982, SC-560, NS-398 e IBP

4.8 Ensaio de migração

O tratamento por 48 horas com 50 μ M de IBP, inibidor não seletivo de COX-1 e 2, inibiu significativamente a migração celular em 48% em relação ao controle, $p < 0,05$ (Figura 24 e 25) - no ensaio de 48 horas em *transwell*. A mesma concentração do inibidor específico para COX-1, SC-560, inibiu a migração celular em 42,5%, em relação ao controle - também considerado significativo $p < 0,05$ (Figuras 24 e 25). Enquanto que a mesma concentração do inibidor específico para COX-2, NS-398, inibiu a migração celular em 24,84% em relação ao controle e não foi considerado significativo (Figuras 24 e 25).

Todos os controles, tanto os que receberam os veículos dos tratamentos, etanol para IBP e DMSO para inibidores específicos, quanto os controles que não receberam nenhum tratamento não apresentam diferença significativa, foram somados e a média foi denominada de CN.

Figura 24 - Gráfico da migração celular após o tratamento com IBP, SC560 e NS398

Figura 25 - Imagens da migração celular após o tratamento com IBP, SC-560 e NS-398

A. Controle que não recebeu tratamento; **B.** controle tratado com etanol P.A., veículo do IBP; **C.** controle tratado com DMSO, veículo do tratamento com NS-398 e SC-560; **D.** tratamento com 50 μM de IBP; **E.** tratamento com 50 μM de NS-398 e **F.** tratamento com 50 μM de SC-560.

Já no ensaio de *transwell* por 12 horas, foi observado que o tratamento com SC-560 foi o que apresentou maior inibição da migração, 71,05%; em seguida o tratamento com IBP inibiu a migração em 61%; e o tratamento com NS-398 foi o que

menos inibiu a migração, 59,5% (Figura 26 e 27). Todos os tratamentos foram realizados com 50 μ M de cada droga por 48 horas e todos foram considerados significativos. Na tabela abaixo (Tabela 2) segue a comparação entre o *transwell* por 48 horas e o *transwell* por 12 horas.

Tabela 2 – Porcentagens de inibição da migração por *Transwell*

Tratamentos	<i>Transwell</i> por 48 horas	<i>Transwell</i> por 12 horas
IBP	48% ($\pm 4,9$)	61% ($\pm 3,7$)
SC-560	42.5% ($\pm 15,3$)	71% ($\pm 3,9$)
NS-398	24,8% ($\pm 28,9$)	59,5% ($\pm 8,8$)

Figura 26 - Gráfico da migração celular pelo período de 12 horas

Figura 27 - Imagens da migração celular pelo período de 12 horas

A. Controle que não recebeu tratamento; **B.** controle tratado com etanol P.A., veículo do IBP; **C.** controle tratado com DMSO, veículo do tratamento com NS-398 e SC-560; **D.** tratamento com 50 μ M de IBP; **E.** tratamento com 50 μ M de NS-398 e **F.** tratamento com 50 μ M de SC-560.

4.9 Ciclo celular

4.9.1 Análise do ciclo celular para os tratamentos com IBP, SC-560 e NS-398

Os resultados das análises do ciclo celular do tratamento com IBP, SC-560 e NS-398 encontram-se na Figura 28 e na Tabela 3. A análise do ciclo celular apresentou diferença significativa na fase Sub-G1, indicando que os tratamentos tanto com IBP quanto com SC-560 e NS-398 resultaram em aumento de morte celular de 31%, 64% e 49%, respectivamente e em relação aos controles (Figura 29). Não obstante, também foi observada diferença significativa na fase S, indicando inibição da proliferação de 59,65% no tratamento com IBP, 54,65% com SC-560 e 58,02% com NS-398 em relação aos controles (Figura 29).

Figura 28 - Gráficos de análise do ciclo celular do tratamento com IBP, SC-560 e NS-398

Tabela 3 - Porcentagem de células tratadas com IBP, SC-560 e NS-398 em cada fase do ciclo celular

Fases do Ciclo	CN	IBP	SC-560	NS-398
Celular				
Sub G1	1,45% ($\pm 0,095$)	1,9% ($\pm 0,33$)	2,37% ($\pm 0,23$)	2,16% ($\pm 0,25$)
G1	50,49% ($\pm 1,05$)	50,21% ($\pm 1,27$)	49,71% ($\pm 3,02$)	47,77% ($\pm 1,49$)
S	9,79% ($\pm 0,013$)	5,83% ($\pm 1,07$)	5,35% ($\pm 0,35$)	5,68% ($\pm 0,89$)
G2/M	18,71% ($\pm 1,30$)	19,64% ($\pm 2,07$)	17,91% ($\pm 0,89$)	19,48% ($\pm 1,52$)

Figura 29 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular

As análises de cada fase do ciclo celular para todos os tratamentos foram realizadas em relação ao controle normal (CN).

4.9.2 Análise do ciclo celular para os tratamentos com AH6809 e L161.982

Os resultados das análises do ciclo celular do tratamento com os antagonistas de EP2 e EP4, AH6809 e L161.982, respectivamente; encontram-se na Figura 30 e na Tabela 4. A análise do ciclo celular não apresentou diferença significativa em nenhuma fase do ciclo em relação ao controle, apesar de ter sido observado aumento de 20% na fase Sub-G1 do tratamento com AH6809. Também foi observado aumento na fase G1 de 30% e 52% e diminuição na fase G2/M de 38% e 23%, para os tratamentos com AH6809 e L161.982 respectivamente. Esses achados sugerem uma tendência de aumento de células em G1 e G2/M o que pode indicar parada do ciclo celular (Figura 31).

Figura 30 - Gráficos de análise do ciclo celular das células tratadas com L161.982 e AH6809

Tabela 4 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular

Fases do Ciclo				
Celular		CN	L161.982	AH6809
Sub G1		5,72 ($\pm 0,56$)	5,36 ($\pm 0,66$)	6,82 ($\pm 0,36$)
G1		20,70 ($\pm 1,44$)	31,43 ($\pm 4,77$)	27,06 ($\pm 1,62$)
S		7,23 ($\pm 0,58$)	6,70 ($\pm 1,23$)	6,79 ($\pm 0,70$)
G2/M		17,19 ($\pm 2,99$)	13,30 ($\pm 1,60$)	10,75 ($\pm 1,73$)

Figura 31 - Porcentagem de células em cada fase do ciclo celular

As análises de cada fase do ciclo celular para todos os tratamentos foram realizadas em relação ao controle normal (CN).

5 DISCUSSÃO

O glioblastoma multiforme é um dos tumores com piores prognósticos devido a sua alta mortalidade. A sobrevida média dos pacientes após o diagnóstico é de doze a quinze meses. Apesar dos avanços da neurocirurgia, da radio e da quimioterapia, não houve mudança na sobrevida desses pacientes. Portanto, novas terapias fazem-se necessárias (Wen, Kesari, 2008).

A migração celular é um evento crucial no desenvolvimento embrionário, na homeostase celular, na cicatrização de feridas, e em outros estados patológicos, como o processo de invasão celular e formação de metástase em câncer (Hurd et al., 2011). A agressividade dos gliomas está associada à rápida proliferação celular e alta capacidade de invasão de suas células, processo no qual a migração é crucial (Huse et al., 2013).

Estudos clínicos apontam que o uso de AINEs, inibidores não seletivos de COX-1 e COX-2, podem diminuir os riscos de tumores em gerais, incluindo os gliomas (Scheurer et al., 2008; Sivak-Sears et al., 2004). A isoforma induzida, COX-2, desempenha um papel na resposta inflamatória através da síntese de prostaglandinas, as quais são super expressas em gliomas (Buccoliero et al., 2006; Deininger, Schluesener, 1999). Em níveis elevados, as prostaglandinas, particularmente PGE₂, estão associadas ao avanço do grau de malignidade do tumor e a pobre taxa de sobrevivência dos pacientes (Perdiki et al., 2007; Shono et al., 2001). Estudos *in vitro* mostram que o tratamento com acetaminofeno, um EINE; e com o inibidor específico de COX-2, NS-398; inibiram o crescimento de células tumorais, incluindo gliomas, através de mecanismos dependentes e independentes de COX-2 (Daugherty et al., 2011; Joki et al., 2000).

Wynne e Djakiem (2010) demonstraram que o tratamento com IBP foi capaz de inibir significativamente a migração celular em linhagens de câncer de próstata. Assim como, o tratamento com IBP também foi capaz de reduzir a migração celular em células de melanoma (Redpath et al., 2009). Em gliomas o uso do AINE indometacina, também inibiu o processo de migração nas linhagens celulares de glioma humano A172, U87MG, U251MG e U373MG (Wang et al., 2005).

Tais estudos dão suporte aos achados deste trabalho, cujos tratamentos na linhagem de glioblastoma multiforme U251-MG inibiram a migração celular em 48% quando tratadas em *transwell* por 48 horas com IBP, inibidor não específico de COX;

42,5% quando tratadas com SC-560, inibidor específico de COX-1; e 24,8% quando tratadas com NS-398, inibidor específico de COX-2. Contudo, quando tratadas por 48 horas, mas incubadas por apenas 12 horas em *transwell*, a inibição da migração foi maior, o tratamento com IBP inibiu 61%; o tratamento com SC-560 inibiu 71% e o tratamento com NS-398 inibiu 59,5%.

Esses dados corroboram com os estudos apresentados acima, e apontam que a inibição das enzimas COX-1 e COX-2, responsáveis pela síntese das prostaglandinas, inibem significativamente a migração celular na linhagem de glioma humano U251-MG. O estudo de migração em *transwell* por apenas 12 horas nos permitiu analisar que esse resultado de inibição é decorrente apenas do processo de inibição da migração celular, e não da inibição de outros processos como a proliferação, o que poderia estar envolvido quando o estudo foi realizado por um período maior, como por 48 horas.

Além disso, foi possível observar que o inibidor seletivo de COX-1, SC-560, foi o tratamento mais eficiente, inibindo cerca de 60% da migração celular quando somados os ensaios realizados, de 48 horas e de 12 horas. Isso se deve pelo fato da enzima COX-1 ser a isoforma constitutiva das células, assim sua inibição tem um efeito bastante expressivo. Através da análise da expressão gênica de COX-1 para este tratamento foi possível observar que houve uma diminuição significativa da expressão desta enzima, de 50,8% ($p < 0.001$). Apesar de não ter sido observada diferença significativa na expressão proteica, sugere-se que essa redução da expressão gênica está associada ao efeito de maior inibição da migração celular apresentada por este tratamento.

Esses dados apontam que a inibição com o inibidor seletivo de COX-1 inibiu além da atividade desta enzima, inibindo a síntese da mesma, e com a sua síntese reduzida, sua atividade fica comprometida. Dessa maneira, a promoção da migração celular, um dos mecanismos onde COX está associada, também foi comprometida, por isso foi observado o efeito de maior inibição da migração celular.

Ishibashi et al. (2005) também observaram redução na migração celular nas células das linhagens celulares de glioma humano U87MG, A172, T98G, 138MG, U373MG, Hs683 e SW1088 quando tratadas com este mesmo inibidor seletivo de COX-1, o SC-560.

O segundo tratamento mais eficiente foi com IBP, inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2, que inibiu 55% da migração celular quando somados os ensaios de

48 e de 12 horas. Este achado corrobora com os estudos prévios do nosso grupo, onde o IBP foi capaz de reduzir significativamente a migração celular da linhagem de glioma humano T98G (Gomes, 2011). Possivelmente isso se dá devido a inibição de ambas as isoformas pelo IBP, e dessa maneira foi observado um efeito expressivo com este tratamento.

Através da análise da expressão gênica de COX-1 para este tratamento foi observado aumento significativo de 130% da expressão do gene desta enzima. Contudo, na análise da expressão proteica observamos um ligeiro aumento não significativo de 17%. Esses achados podem ter ocorrido como resposta à inibição desta enzima, um processo de reposição natural da célula, quando a ação da enzima foi inibida a célula iniciou uma maior síntese da mesma para suprir essa inibição; e possivelmente foi devido a este aumento da síntese de COX-1 que não pudemos observar um efeito ainda mais expressivo do que o observado para este tratamento.

Entretanto quando analisada a expressão gênica de COX-2 para o tratamento com IBP, não foi observada diferença significativa na expressão do gene desta enzima; ocorrendo o mesmo para a análise da expressão proteica. Entende-se que o efeito do IBP sobre COX-2, inibiu apenas a ação desta enzima, e não a síntese da mesma.

O tratamento com o inibidor específico de COX-2, NS-398, ao contrário do esperado, foi o tratamento que menos inibiu a migração celular, 42%, somando os ensaios de migração. Pelo fato desta isoforma ser altamente expressa nesta linhagem celular, e em gliomas em geral, esperava-se que a sua inibição acarretasse uma redução mais expressiva da migração celular. Kuipers et al. (2007) demonstraram que a inibição de COX-2 com os inibidores seletivos celecoxib e NS-398 culminaram em diminuição de PGE₂; promoveram invasão menos eficiente e migração celular reduzida nas linhagens celulares de gliomas D384, U251MG e U87MG.

Ao analisar a expressão gênica de COX-2 para este tratamento, não foi observado diferença significativa em relação ao controle. Porém, em relação à análise de expressão proteica, foi observado aumento não significativo de 30,5% desta enzima.

Relaciona-se o aumento desta enzima à reduzida inibição da migração celular neste tratamento comparado aos demais. O inibidor seletivo NS-398 inibiu a

atividade de COX-2 promovendo aumento dos níveis desta enzima na célula, como resposta ao mecanismo compensatório da enzima. Possivelmente, este aumento de COX-2 não permitiu sua maior ação inibitória na migração celular.

As prostaglandinas, incluindo PGE₂, estão envolvidas em mecanismos de promoção da proliferação celular, o que em gliomas é um dos principais mecanismos que culminam na agressividade deste tumor, como citado anteriormente. Nossos estudos apontam que o tratamento com IBP, SC-560 e NS-398 inibiu significativamente a proliferação celular em 60%, 55% e 58%, respectivamente. Além disso, estes tratamentos foram capazes de aumentar a morte celular em 31%, 64% e 49%, respectivamente. Estes achados corroboram com estudos da literatura onde demonstraram que COX-1 e COX-2 estão super expressas em diversos tumores, acarretando uma maior síntese de prostanóides e assim aumento da proliferação celular e de resistência à apoptose (Gupta et al., 2003; Méric et al., 2006). Sendo assim, a super expressão de COX-2 em tumores está diretamente relacionada ao aumento de PGE₂ (Wang et al., 2007).

A elevada expressão de COX-2 resulta em uma elevada produção de PGE₂, promovendo o crescimento do tumor através dos receptores acoplados à proteína G, denominados EP1, EP2, EP3 e EP4. A via de sinalização destes receptores controlam a proliferação celular, invasão, apoptose e angiogênese (Kambe et al., 2008). Pioneiramente, demonstramos em nosso estudo que a linhagem celular de glioma humano U251-MG expressa todos os receptores de PGE₂: EP1, EP2, EP3 e EP4.

A expressão gênica de EP2 apresentou aumento significativo de 123% para o tratamento com o antagonista deste receptor, AH6809, em relação ao controle. Porém os demais tratamentos não apresentaram diferença significativa na análise da expressão gênica. Em relação à análise de expressão proteica não foi observada diferença significativa entre o tratamento com AH6809 em relação ao controle. Já os demais tratamentos, IBP (inibidor não específico de COX-1 e COX-2), SC-560 (inibidor específico de COX-1) e NS-398 (inibidor específico de COX-2) não apresentaram expressão proteica para este receptor.

Sugere-se que a elevada expressão gênica observada no tratamento com o antagonista de EP2, AH6809, pode ser resultante do mecanismo de compensação celular, pois como o receptor EP2 foi inibido pelo seu antagonista, a célula aumentou a síntese deste receptor a fim de manter a homeostase celular. Talvez devido a este

mecanismo compensatório a inibição de EP2 não teve o efeito esperado, como a inibição significativa da proliferação celular.

Não obstante, a expressão gênica de EP4 apresentou aumento significativo de 85,5% para o tratamento com IBP (inibidor não seletivo de COX-1 e COX-2). Entretanto, não foi observada diferença significativa na expressão deste gene para os demais tratamentos em relação ao controle. Na análise de expressão proteica foi observado aumento significativo de 100% para o tratamento com antagonista deste receptor, L161.982. Não houve diferença significativa na expressão proteica dos tratamentos com IBP e SC-560, apesar do último apresentar aumento não significativo de 60%. Porém o tratamento com NS-398 (inibidor específico de COX-2) não apresentou expressão proteica para este receptor.

O aumento da expressão gênica de EP4 no tratamento com IBP e a tendência de aumento da expressão proteica observada no tratamento com SC-560, sugerem que este receptor pode estar associado na modulação não apenas de COX-2 como apontado por Kambe et al. (2008). Mas também na modulação de COX-1, pelo fato do IBP ser um inibidor não específico de COX, inibindo ambas as isoformas; e pelo SC-560 inibir apenas COX-1. Estes achados apontam que em resposta à inibição destas enzimas, a célula realizou um mecanismo compensatório, com aumento de síntese do receptor EP4, para assim aumentar a produção de PGE₂, e manter a homeostase celular.

A expressão de EP2 e EP4 é encontrada altamente regulada em tecidos tumorais, como em câncer de colo retal e de mama (Chang et al., 2004; Sonoshita et al., 2001). Estudos apontaram que EP4 está super regulado em astrocitomas e em GBM (Fiebich et al., 2001; Raza et al., 2004). E que a elevada concentração de COX-2, através da ativação de EP2 e EP4, é um potencial modulador da progressão do GBM. Estes estudos corroboram com nossos achados, onde a expressão proteica de EP2 não foi observada para nenhum dos tratamentos com os inibidores de COX. Não obstante, não foi observada expressão proteica de EP2 e EP4 para o tratamento com o inibidor específico de COX-2, NS-398.

Portanto EP2 e EP4 estão associados na modulação de COX-1 e COX-2 na linhagem de glioma humano U251-MG. Além disso, também se conclui que a inibição de COX-1 e COX-2 inibem a migração celular, a proliferação e aumentam a morte celular na linhagem U251-MG (Figura 32).

Figura 32 – Ilustração demonstrando os principais resultados deste estudo

Estes achados *in vitro* são muito positivos para futuras perspectivas de terapias deste tumor tão agressivo. O IBP é um anti-inflamatório de fácil acesso e de baixo custo em relação às terapias convencionais existentes para este tumor. Porém, o tumor é multigênico, com diversos genes bloqueados, mutados ou super expressos, o que dificulta a eficácia do tratamento. Sendo assim, acredita-se que os experimentos realizados neste trabalho devem ser expandidos para outras linhagens celulares com diferentes genótipos a fim de verificar se a ação inibitória da migração e proliferação celular com este tratamento (IBP) também é eficaz. Contudo, sugere-se em outra etapa do trabalho, realizar estes testes *in vivo*, para dessa maneira conseguir analisar sistemicamente os efeitos desse tratamento.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que a inibição de COX-1 e COX-2 através do anti-inflamatório não esteroide IBP, e dos inibidores seletivos SC-560 e NS-398, respectivamente; inibiram a migração, a proliferação e aumentaram a morte celular na linhagem U251-MG. Além disso, todos os tratamentos inibiram a expressão proteica do receptor de PGE_2 , EP2. Não obstante, o tratamento com o inibidor seletivo de COX-2, NS-398 inibiu a expressão do receptor EP4. Portanto, concluímos que COX-1 e principalmente COX-2 estão associadas à PGE_2 , a qual está envolvida na migração, proliferação e morte celular na linhagem U251-MG.

Estes achados são muito positivos em relação às futuras terapias, já que o IBP é um anti-inflamatório de fácil acesso e de baixo custo. Além disso, este estudo demonstrou o potencial de COX, o que abre novas opções de tratamentos para este tumor tendo como alvo mecanismos de inibição de COX e de PGE_2 .

REFERÊNCIAS*

- Altinoz MA, Ozar E, Taskin M, Bozcali E, Bilir A, Altug T, Aydiner A, Sav A, Vascularization pattern of C6 glioma is modified with medroxyprogesterone acetate and ibuprofen in Wistar rat brain. *Pathol Oncol Res.* 2001;7:185-9.
- Amano H, Hayashi I, Endo H, Kitasato H, Yamashina S, Maruyama T, Kobayashi M, Satoh K, Narita M, Sugimoto Y, Murata T, Yoshimura H, Narumiya S, Majima M. Host prostaglandin E (2)- EP3 signaling regulates tumor-associated angiogenesis and tumor growth. *J Exp Med.* 2003;197(2):221-32.
- Andrew JD, Jakiew D, Krygier S, Andrews P. Superior effectiveness of ibuprofen compared with others for reducing the survival of human prostate cancer cells. *Chemother Pharmacol.* 2002;50(4):277-84.
- Badawi AF, El Sohemy A, Stephen LL, Ghoshal AK, Archer MC. Modulation of the expression of the cyclooxygenase 1 and 2 genes in rat mammary glands: role of hormonal status and dietary fat. *Adv Exp Med Biol.* 1999;469:119–24.
- Baron JA, Sandle RS. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cancer prevention. *Annu Rev Med.* 2000;51:511-23.
- Barzon L, Zanusso M, Colombo F, Palu G. Clinical trials of gene therapy, virotherapy, and immunotherapy for malignant gliomas. *Cancer Gene Ther.* 2006;13:539–54.
- Benadiba M. Análise da Expressão de Proteínas Envolvidas no Controle do Ciclo Celular, Apoptose, Angiogênese, Invasão e Migração das Células C6, In Vitro e In Vivo, Após o Tratamento Com o Ácido Gama Linolênico (GLA) E Com Um Novo Complexo Dirutênico Contendo Ibuprofeno (Ru-Ibp). [tese (Doutorado em Ciências, Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2008.
- Buccoliero AM, Caldarella A, Gheri CF, Taddei A, Paglierani M, Pepi M, et al. Inducible cyclooxygenase (COX-2) in glioblastoma—clinical and immunohistochemical (COX-2-VEGF) correlations. *Clin Neuropathol.* 2006;25:59–66.
- Buonerba C, Di Lorenzo G, Marinelli A, Federico P, Palmieri G, Pio CM, Peluso G, De Plácido S, Sampson JH. A comprehensive outlook on intracerebral therapy of malignant gliomas. *Oncology Hematology.* 2010;80(1):54-68.
- Carneiro SLA, Távora FRF, Souza MHLP, Ribeiro RA. Ciclooxygenase e Câncer Uma Breve Revisão. *Pesquisa Médica.* 2004;2(7):39-45.

*De acordo com: International Committee of Medical Journal Editors. [Internet]. Uniform requirements for manuscripts submitted to Biomedical Journal: sample references. [updated 2011 Jul 15]. Available from: <http://www.icmje.org>.

Clarke J, Butowski N, Chang S. Recent Advances in Therapy for Glioblastoma. *Arch Neurol*. 2010;67(3):279-83.

Chang SH, Liu CH, Conway R, Han DK, Nithipatikom K, Trifan OC, Lane TF, Hla F. Role of prostaglandin E2-dependent angiogenic switch in cyclooxygenase 2-induced breast cancer progression. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2004;101:591–6.

Chen YC, Shen SC, Lee WR, Hou WC, Yang LL, Lee TJ. Inhibition of nitric oxide synthase inhibitors and lipopolysaccharide induced inducible NOS and cyclooxygenase-2 gene expressions by rutin, quercetin, and quercetin pentaacetate in RAW 264.7 macrophages. *J Cell Biochem*. 2001;82:537–48.

Chiu WT, Shen SC, Chow JM, Lin CW, Shia LT, Chen YT. Contribution of reactive oxygen species to migration/invasion of human glioblastoma cells U87 via ERK-dependent COX-2/PGE2 activation. *Neurobiology Dis*. 2010;37:118-29.

Coleman RA, Smith WL, Narumiya S. International Union of Pharmacology Classification of Prostanoid Receptors: properties, distribution, and Structure of the receptors and their subtypes. *Pharmacol Rev*. 1994;46(2):205-29.

Colquhoun A. Lipids, Mitochondria and Cell Death: Implications in Neuro-oncology. *Mol Neurobiology*. 2010;42:76-88.

Das P, Puri T, Jha P, Pathak P, Joshi N, Suri V, Sharma MC, Sharma BS, Mahapatra AK, Suri A, Sarkar C. A clinicopathological and molecular analysis of glioblastoma multiforme with long-term survival. *Neuroscience Clin J*. 2011;18(1):66-70.

Daugherty SE, Moore SC, Pfeiffer RM et al. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Glioma in the NIH-AARP Diet and Health Study Cohort. *Cancer Prev Res*. 2011;4:2027-34.

Deininger MH, Schluesener HJ. Cyclooxygenases-1 and -2 are differentially localized to microglia and endothelium in rat EAE and glioma. *J Neuroimmunol*. 1999;95:202–8.

Dorsm RT, Gutkind JS. G-protein-coupled receptors and cancer. *Nat Ver Cancer*. 2007;(2):79-94.

Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2010: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro: INCA; 2009.

Farrel CL, Megyesi J, Del Maestro RF. Effect of ibuprofen on tumor growth in the C6 spheroid implantation glioma model. *J Neurosurg*. 1988;68:925-30.

Fiebich BL, Schleicher S, Spleiss O, Czygan M, Hull M, Mechanisms of prostaglandin E2-induced interleukin-6 release in astrocytes: possible involvement of EP4-like receptors, p38 mitogen-activated protein kinase and protein kinase. *J Neurochem*. 2001;79:950–8.

Fujino H, Chen XB, Regan JW, Murayama T. Indomethacin decreases Ep2 prostanoid receptor expression in colon cancer cells. *Biochem Biophys Res Commun.* 2007;359(3):568-73.

Gallo O, Masini E, Bianchi B, Bruschini S, Paglierani M, Franchi A. Prognostic significance of cyclooxygenase-2 pathway and angiogenesis in head and neck squamous cell carcinoma. *Hum Pathol.* 2002;33(7):708-14.

Gomes NR. Análise do papel da prostaglandina E2 na proliferação, migração e apoptose na linhagem de glioma humano T98Ge o efeito do Ácido Gama Linolênico e Ibuprofeno sobre este prostanóide. [dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2011.

Greenhough A, Smartt HJ, Moore AE, Robertes HR, Williams AC, Paraskeva C. The COX-2/PGE2 pathway: key roles in the hallmarks of cancer and adaptation to the tumour microenvironment. *Carcinogenesis.* 2009;30(3):377-86.

Gupta RA, Tejada LV, Tong BJ, Das SK, Morrow JD, Dey SK, et al. Cyclooxygenase-1 is overexpressed and promotes angiogenic growth factor production in ovarian cancer. *Cancer Res.* 2003;63:906–11.

Ishibashi M, Bottone JGF, Taniura S, Kamitani H, Waranable T, Eling ET. The cyclooxygenase inhibitor indomethacin modulates gene expression and represses the extracellular matrix protein laminin γ 1 in human glioblastoma cells. 2005;302(2):244-52.

Johnson CC, Hayes RB, Schoen RE, Gunter MJ, Huang WY. Non-Steroidal anti-inflammatory drugs use and colorectal polyps in the prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial. *AMJ Gastroenterol.* 2010;105(12):2646-55.

Joki T, Heese O, Nikas DC, Bello L, Zhang J, Kraeft SK, et al. Expression of cyclooxygenase 2 (COX-2) in human glioma and in vitro inhibition by a specific COX-2 inhibitor, NS-398. *Cancer Res.* 2000;60:4926–31.

Hata AN, Breyer RM. Pharmacology and signaling of prostaglandin receptors: multiple roles in inflammation and immune modulation. *Pharmacol Ther.* 2004;103(2):147-66.

Helseth R, Helseth E, Johannesen TB, Langberg CW, Lote K, Ronning P, Scheie D, Vik A, Meling TR. Overall survival, prognostic factors, and repeated surgery in a consecutive series of 516 patients with glioblastoma multiforme. *Acta Neurol Scand.* 2010;122:159–67.

Hinz B, Brune K. Cyclooxygenase-2 – 10 years later. *J Pharmacol Exp Ther.* 2002;300(2):367-75.

Hurd TR, Degennaro M, Lehmann R. Redox regulation of cell migration and adhesion. *Trends Cell Biol.* 2011;22:107-15.

Huse JT, Holland E, DeAngelis ML. Glioblastoma: Molecular Analysis and Clinical Implications. *Annu Rev Med*. 2013;64:17.1–12.

Kambe A, Iguchi G, Moon Y, Kamitani H, Watanabe T, Eling TE. Regulation of EP4 expression via the Sp-1 transcription factor: Inhibition of expression by anti-cancer agents. *Biochimica et Biophysica Acta*. 2008;1211–19.

Kamei D, Murakami M, Nakatani Y, Ishikawa Y, Ishii T, Kudo I. Potential role of microsomal prostaglandin E synthase-1 in tumorigenesis. *J Bio Chem*. 2009; 278(21):19396-405.

Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. The new WHO classification of brain tumours. *Brain Pathol*. 1993;3(3):255-68.

Kuipers GK, Slotman BJ, Wedekind LE, Stoter TR, Van Den Berg J, Sminia P, Lafleur MVM. Radiosensitization of human glioma cells by cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibition: Independent on COX-2 expression and dependent on the COX-2 inhibitor and sequence of administration. *Int J Radiat Biol*. 2007;83(10):677–85.

Kummer CL e Coelho TC, Antiinflamatórios Não Esteróides Inibidores da Ciclooxygenase-2 (COX-2): Aspectos Atuais. 2002;52:4:498–512.

Kundo I, Murakami M. Prostaglandin and synthase, a terminal enzyme for prostaglandin E2 biosynthesis. *J. Biochem Mol Biol*. 2008;38(6):633-8.

Larkins TL, Nowell M, Singh S, Sanford GL. Inhibiton of cicloxygenase-2 decreases breast cancer cell motility, invasion and matrix metalloproteinase expression. *BMC Cancer*. 2006;10(6):181.

Lim JW, Kim H, Kim KH. Nuclear factor-kappaB regulates cyclooxygenase-2 expression and cell proliferation in human gastric cancer cells. *Lab Invest*. 2001;81: 349-60.

Lima RSF, Kahn AS, Soletti RC, Biasoli D, Alves T, Fonseca ACC, Garcia C, Romão L, Brito J, Holanda-Afonso R, Faria J, Borges H, Moura-Neto V. Glioblastoma: Therapeutic challenges, what lies ahead. *Biochimica et Biophysica Acta*. 2012;1826:338–49.

Louis DN, Ohgaki H, Wiestler DO, Cavanee KW, Burger CP, Jouvett A, Scheithauer BW, Kleihues P. The 2007 WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. *Acta Neuropathol*. 2007;114:97–109.

Mahmud SM, Franco EL, Turner D, Platt RW, Beck P, Skarsgard D, Tonita J, Sharpe C, Aprikian AG. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and prostate cancer risk: a population-based nested case-control study. *PLoS One*. 2010;6(1):16412.

Marshall JC, Fernandes BF, Di Cesare S, Maloney SC, Logan PT, Anteckka E, Burnier MN. The use of a cyclooxygenase-2 inhibitor (Nepafenac) in an ocular and metastatic animal model of uveal melanoma. *Carcinogenesis*. 2007;28:2053–8.

Méric JB, Rottey S, Olausson K, Soria JC, Khayat D. Cyclooxygenase-2 as a target for anticancer drug development critical reviews in oncology. *Hematology*. 2006;59:51-64.

Miao L, Grebhardt S, Shi J, Peipe I, Zhang J, Mayer D. Prostaglandin E2 stimulates S100A8 expression by activating protein kinase A and CCAAT/enhancer-binding-protein-beta in prostate cancer cells. *Int J Biochem Cell Biol*. 2012;44:1919–28.

Miyake JA. Estudo Morfológico e Molecular de Proteínas Envolvidas no Processo de Invasão, Migração e Angiogênese em Gliomas Tratados Com Ácido Gama-Linolênico. [tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual). São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2009.

Müller-Decker K, Fürstenberger G. The cyclooxygenase-2-mediated prostaglandin signaling is causally related to epithelial carcinogenesis. *Mol Carcinog*. 2007;46:705–10.

Nathoo N, Barnett GH, Golubic M, The eicosanoids cascade: possible role in gliomas and meningiomas. *J Clin Pathol*. 2004;57(1):6-13.

Newa M, Bhandari KH, Kim JO, Im JS, Kim JA, Yoo BK, Woo JS, Choi HG, Yong CS. Enhancement of solubility, dissolution and bioavailability of ibuprofen in solid dispersion systems. *Chem Pharm Bull*. 2008;56(4):568-74.

Ohgaki H, Kleihues P. Genetic Pathways to Primary and Secondary Glioblastoma. *The Amer Jour of Pathol*. 2007;1445-53.

Perdiki M, Korkolopoulou P, Thymara I, Agrogiannis G, Piperi C, Boviatsis E, et al. Cyclooxygenase-2 expression in astrocytomas. Relationship with microvascular parameters, angiogenic factors expression and survival. *Mol Cell Biochem*. 2007;295:75–83.

Raza SM, Fuller GN, Rhee CH, Huang S, Hess K, Zhang W, Sawaya R. Identification of necrosis-associated genes in glioblastoma by cDNA microarray analysis. *Clin Cancer Res*. 2004;10:212–21.

Redpath M, Marques CM, Dibden C, Waddon A, Lalla R, Macneil S. Ibuprofen and hydrogel-released ibuprofen in the reduction of inflammation-induced migration in melanoma cells. *Br J Dermatol*. 2009;161(1):25-33.

Ricci-Vitiani L, Pallini R, Biffoni M, Todaro M, Invernici G, Cenci T, Maira G, Parati EA, Stassi G, Larocca LM, De Maria R. Tumour vascularization via endothelial differentiation of glioblastoma stem-like cells. *Nature*. 2010;468:824-8.

Rich JN, Bigner DD. Development of Novel Targeted Therapies in the Treatment of Malignant Glioma. *Nature*. 2004;3:430-46.

Sarah E. Daugherty, Steven C. Moore, Ruth M. Pfeiffer, et al. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Glioma in the NIH-AARP Diet and Health Study Cohort. *Cancer Prev Res*. 2011;4:2027-34.

Scheurer ME, El-Zein R, Thompson PA, Aldape KD, Levin VA, Gilbert MR, et al. Long-term anti-inflammatory and antihistamine medication use and adult glioma risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2008;17:1277–81.

Shono T, Tofilon PJ, Bruner JM, Owolabi O, Lang FF. Cyclooxygenase-2 expression in human gliomas: prognostic significance and molecular correlations. *Cancer Res.* 2001;61:4375–81.

Sivak-Sears NR, Schwartzbaum JA, Miike R, Moghadassi M, Wrensch M. Case-control study of use of nonsteroidal antiinflammatory drugs and glioblastoma multiforme. *Am J Epidemiol.* 2004;159:1131–9.

Smyth EM, Grosser T, Wang M, Yu Y, FitzGerald GA. Prostanoids in health and disease. *J Lipid Res.* 2009;50:423-8.

Sonoshita M, Takaku K, Sasaki N, Sugimoto Y, Ushikubi F, Narumiya S, Oshima M, Taketo MM. Acceleration of intestinal polyposis through prostaglandin receptor EP2 in Apc(Delta 716) knockout mice. *Nat Med.* 2001;7:1048–51.

Sugimoto Y, Narumiya S: Prostaglandin E receptor. *J Biol Chem.* 2007;282(16):1613-7.

Sung YM, He G, Fischer SM. Lack of expression of the EP2 but not EP3 receptor for prostaglandin E2 results in suppression of skin tumor development. *Cancer Res.* 2005;65(20):9304-11.

Telliez A, Furman C, Pommery N, Henichart JP. Mechanisms leading to COX-2 expression and COX-2 induced tumorigenesis: topical therapeutic strategies targeting COX-2 expression and activity. *Anticancer Agents Med Chem.* 2006;6(3):187-208.

Ulrich CM, Bigler J, Potter JD. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for cancer prevention: promise, perils and pharmacogenetics. *Nat Rev Cancer.* 2006;6(2):130-40.

Vara JAK, Casado E, Castro J, Cejas P, Belda-Iniesta C, González-Barín M. PI3K/Akt signalling pathway and cancer. *Cancer Treat Ver.* 2004;30:193-204.

Wakimoto, N, Wolf I, Yin D, O'Kelly J, Akagi T, Abramovitz L, Black KL, Tai HH, Koeffler HP. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs suppress glioma via 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase. *Cancer Res.* 2008;68:6978–86.

Wang M, Yoshida D, Liu S, Teramoto A. Inhibition of cell invasion by indomethacin in gliomas cell lines: in vitro study. *J Neurooncol.* 2005;72(1):1-9.

Wang D, DuBois R. Eicosanoids and cancer. *Nat Rev Cancer.* 2010;10(3):181–93.

Wang D, DuBois R. The Role of Anti-inflammatory Drugs in Colorectal Cancer. *Annu. Rev Med.* 2012;17.

Wang MT, Honn KV, Nie D. Cyclooxygenases, prostanoids, and tumor progression. *Cancer Metastasis Rev.* 2007;26(3-4):525-34.

Wen PY, Kesari S. Malignant gliomas in adults. *N Engl J Med.* 2008;359:492–507.

Wynne S, Djakiew D. NSAID Inhibition of Prostate Cancer Cell Migration Is Mediated by Nag-1 Induction via the p38 MAPK-p75NTR Pathway p38 MAPK-p75NTR Pathway. *Molecular Cancer Research.* 2010;8:1656-64.

Xu K, Chang CM, Gao H, Shu HK. Epidermal growth factor-dependent cyclooxygenase-2 induction in gliomas requires protein kinase C-delta. *Oncogene.* 2009;28:1410–20.