Rafael Paolo Rossi

**Avaliação do processo de reparo tecidual em tendão de Aquiles
de ratos após indução de tendinopatia por collagenase: efeito
do laser de baixa intensidade e de drogas anti-inflamatórias**

Dissertação apresentada ao Departamento
de Farmacologia do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo,
para obtenção do Título de Mestre em
Ciências.

São Paulo
2011

Rafael Paolo Rossi

**Avaliação do processo de reparo tecidual em tendão de Aquiles
de ratos após indução de tendinopatia por collagenase: efeito
do laser de baixa intensidade e de drogas anti-inflamatórias**

Dissertação apresentada ao Departamento
de Farmacologia do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo,
para obtenção do Título de Mestre em
Ciências.

Área de concentração: Farmacologia

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Alvaro Brandão
Lopes Martins

Versão Original

São Paulo
2011

DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

© reprodução total

Rossi, Rafael Paolo.

Avaliação do processo de reparo tecidual em tendão de Aquiles de ratos após indução de tendinopatia por collagenase: efeito do laser de baixa intensidade e de drogas anti-inflamatórias / Rafael Paolo Rossi. -- São Paulo, 2011.

Orientador: Rodrigo Alvaro Brandão Lopes Martins.

Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Departamento de Farmacologia. Área de concentração: Farmacologia. Linha de pesquisa: Laser em sistemas biológicos.

Versão do título para o inglês: Evaluation of tissue repair process in rats Achilles tendon after tendinopathy induced by collagenase: effect of low-level laser and anti-inflammatory drugs.

Descritores: 1. Tendão de aquiles 2. Colágeno 3. Tendinite 4. Inflamação 5. Laser 6. Anti-inflamatórios I. Martins, Rodrigo Alvaro Brandão Lopes II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa de Pós-Graduação em Farmacologia III. Título.

ICB/SBIB096/2011

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

Candidato(a): Rafael Paolo Rossi.

Título da Dissertação: Avaliação do processo de reparo tecidual em tendão de Aquiles de ratos após indução de tendinopatia por colagenase: efeito do laser de baixa intensidade e de drogas anti-inflamatórias.

Orientador(a): Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins.

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da **Dissertação de Mestrado**,
em sessão pública realizada a/...../.....,

☐ **Aprovado(a)**

☐ **Reprovado(a)**

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Examinador(a): Assinatura:
Nome:
Instituição:

Presidente: Assinatura:
Nome:
Instituição:

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS**

Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira"
Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 - CEP. 05508-000 São Paulo, SP - Brasil
Telefone : (55) (011) 3091.7733 - telefax : (55) (011) 3091.7438
e-mail: cep@icb.usp.br

CERTIFICADO

Certificamos que o protocolo registrado sob nº **144** nas fls. **78** do livro **02** para uso de animais em experimentação, sob a responsabilidade do Prof(a) Dr(a) Rodrigo Álvaro Brandão Lopes Martins, Coordenador(a) da Linha de pesquisa **Avaliação do processo de reparação tecidual após indução de tendinite por colagenase em tendão de aquiles de ratos** do qual participou(aram) o(s) alunos **Rafael Paolo Rossi, Vanessa de Godoi, Luciano Ramos, Rodney Capp Pallota e o pesquisador Lúcio Frigo**, está de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e foi aprovado pela **COMISSÃO DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CEEA)** em **20.10.09**, com validade de 3 anos.

São Paulo, 21 de outubro de 2009.

Prof. Dr. WOTHAN TAVARES DE LIMA
Coordenador
CEEA - ICB/USP

Profa. Dra. PATRÍCIA GAMA
Secretária
CEEA - ICB/USP

Prof.^o Dr. Ariel M. Silber
Dpto. de Parasitologia
ICB - USP
asilber@usp.br

À minha família:

Especialmente ao meu pai Rubens e à minha mãe Marion, meus ídolos, que não mediram esforços para tornar possível a realização de mais um sonho em minha vida.

Ao meu irmão Lucas, pela amizade e companheirismo.

Ao meu avô Olmiro Onzi (*in memoriam*), pela dedicação e carinho a mim prestados durante toda a sua vida.

À minha companheira Vanessa, pelo amor, amizade e apoio nos momentos difíceis que juntos passamos.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela permanente companhia.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Rodrigo Alvaro Brandão Lopes Martins, pela oportunidade e confiança depositada em minha pessoa, além dos conhecimentos científicos repassados.

Ao meu mentor e amigo, Prof. Dr. Ernesto Cesar Pinto Leal Junior, pelos ensinamentos profissionais e auxílio prestado em mais uma etapa da minha carreira acadêmica.

Ao Prof. Dr. Lucio Frigo, pela amizade e pelo apoio incondicional prestado, tornando possível a realização deste trabalho.

Ao Prof. Dr. Nivaldo Antonio Parizotto, por ter possibilitado a realização de análises histomorfológicas junto a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Aos companheiros de laboratório que de alguma forma participaram desta jornada: Luciano Ramos, Maria Carla Petrellis, Patrícia de Almeida Silva, Rodney Capp Pallotta, Rodrigo Carvalho, Rodrigo Labat Marcos, Shaiane Tomazoni e Vanessa de Godoi.

Às secretárias do departamento de Farmacologia, Selma Regina Malagueta Rigonati, Julieta Aparecida Gomes dos Santos e Camila Gonçalves Trindade pelo auxílio com os assuntos burocráticos.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro.

Enfim, a todos que ao longo desta jornada estiveram ao meu lado e me deram forças para que eu atingisse meu objetivo.

“Mantenha-se faminto por coisas novas, mantenha-se certo de sua ignorância.

Continue ávido por aprender, continue ingênuo e humilde para procurar.

Tenha fome de vida, sede de descobrir.”

Autor Desconhecido

RESUMO

ROSSI, R. P. **Avaliação do processo de reparo tecidual em tendão de Aquiles de ratos após indução de tendinopatia por collagenase:** efeito do laser de baixa intensidade e de drogas anti-inflamatórias. 2011. 101 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Introdução: A tendinopatia de Aquiles caracteriza-se pela presença de sinais clássicos da resposta inflamatória, como o edema e a dor, além de alterações estruturais no tecido. Neste estudo avaliamos o processo de reparação e reorganização tecidual de tendões de ratos submetidos a tendinopatia por collagenase, sendo posteriormente tratados com laserterapia de baixa intensidade, anti-inflamatório esteroidal e anti-inflamatório não-esteroidal. **Materiais e Método:** Ratas Wistar fêmeas foram submetidas a injeção transcutânea de collagenase (100 µg/tendão) na região peritendínea das patas e posteriormente divididas e tratadas nos seguintes grupos: laser (3 J), diclofenaco potássico (1,1 mg/kg) e dexametasona (0,02 mg/kg). Foram realizadas análises histomorfológicas, incluindo o *score* de achados, quantidade de colágeno presente no tecido e nível de agregação/organização das fibras colágenas. **Resultados e Discussão:** A collagenase produziu o aumento de células inflamatórias, extravasamento plasmático e hemorragia. Entre os tratamentos testados, o laser mostrou-se a melhor opção, atenuando a resposta inflamatória, aumentando a concentração de colágeno e mantendo a organização das fibras colágenas.

Palavras-chave: Tendão de Aquiles. Colágeno. Tendinite. Inflamação. Laser. Antiinflamatórios.

ABSTRACT

ROSSI, R. P. **Evaluation of tissue repair process in rats Achilles tendon after tendinopathy induced by collagenase:** effect of low-level laser and anti-inflammatory drugs. 2011. 101 p. Masters thesis (Pharmacology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Introduction: Achilles tendinopathy is characterized by presence of classical signs of inflammatory response such as edema, pain, and structural changes in tissue. In this study we evaluated the repair process and tissue reorganization of rats' tendons submitted to collagenase induced tendinopathy, being posteriorly treated with low-level laser therapy, steroidal anti-inflammatory and non-steroidal anti-inflammatory.

Materials and Methods: Female Wistar rats were submitted to transcutaneous collagenase injection (100 µg/tendon) at paws' peritendinous site and posteriorly divided and treated in following groups: laser (3 J), potassium diclofenac (1.1 mg/kg), and dexamethason (0.02 mg/kg). Histomorphological analyses were made including findings' score, tissue collagen amount and collagen fibers' aggregation/organization levels. **Results and Discussion:** Collagenase produced enhancement of inflammatory cells, edema and hemorrhage. Laser therapy showed be the better option between tested treatments, decreasing inflammatory response, increasing collagen concentration and mantaining collagen fibers' organization.

Keywords: Achilles Tendon. Collagen. Tendinitis. Inflammation. Laser. Anti-inflammatory.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Estrutura interna do tendão. Fonte: Jozsa e Kannus (1997)	22
Figura 2. Aspecto macroscópico do tendão de Aquiles de rato	33
Figura 3. Tendão de Aquiles de rato	33
Figura 4. Irradiação com laser de baixa intensidade.....	34
Figura 5. Equipamento e parâmetros utilizados no estudo	35
Figura 6. Desenho experimental	36
Figura 7. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato do grupo hígido. Em foco, grande quantidade de fibroblastos (seta branca) alinhados paralelamente as fibras colágenas (seta preta). Hematoxilina-Eosina (A:100x, B:400x).....	41
Figura 8. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 12 horas após injeção de colagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, neutrófilo (setas azuis), extravasamento plasmático (seta verde), hemorragia (seta vermelha). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x)	42
Figura 9. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 12 horas após injeção de colagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, extravasamento plasmático (seta verde), hemorragia (seta vermelha). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).....	43
Figura 10. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 24 horas após injeção de colagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, neutrófilo (seta azul), linfócito (seta amarela), extravasamento plasmático (seta verde). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x)	44
Figura 11. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 24 horas após injeção de colagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, linfócito (seta amarela), hemorragia (seta vermelha). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).....	44
Figura 12. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 48 horas após injeção de colagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, linfócitos (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x)	46
Figura 13. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 48 horas após injeção de colagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, linfócito (seta amarela), extravasamento plasmático (seta verde). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).....	47

Figura 14. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 72 horas após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, neutrófilo (seta azul), linfócito (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x)	48
Figura 15. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 72 horas após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, neutrófilo (seta azul). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).....	49
Figura 16. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 5 dias após injeção de collagenase nos grupos Lesão (A e B) e 3J (C e D). Em foco, linfócitos (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x)	50
Figura 17. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 5 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, linfócitos (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x)	51
Figura 18. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 7 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).....	52
Figura 19. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 7 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x)	53
Figura 20. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 14 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).....	54
Figura 21. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 14 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).....	55
Figura 22. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 21 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).....	56
Figura 23. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 21 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x)	57
Figura 24. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 28 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).....	58

Figura 25. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 28 dias após injeção de colagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x)	59
Figura 26. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 60 dias após injeção de colagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x)	60
Figura 27. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 60 dias após injeção de colagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x)	61
Figura 28. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 12 horas após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido do teste Tukey, ***p<0,001 vs. hígido, ##p<0,01 vs. Dexa)	62
Figura 29. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 24 horas após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido do teste Tukey, ***p<0,001 vs. hígido, ##p<0,01 vs. Dexa)	63
Figura 30. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 48 horas após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey *p<0,05 vs. hígido e **p<0,01 vs. hígido)	64
Figura 31. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 72 horas após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	65
Figura 32. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 5 dias após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	66
Figura 33. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 7 dias após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	67
Figura 34. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 14 dias após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	68
Figura 35. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 21 dias após a injeção de colagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	69

Figura 36. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 28 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	70
Figura 37. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 60 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	71
Figura 38. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 12 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, ***p<0,001 vs. NT, ####p<0,001 vs. 3J)	72
Figura 39. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 24 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, ***p<0,001 vs. NT, ##p<0,01 e ####p<0,001 vs. 3J).....	73
Figura 40. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 48 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, **p<0,01 e ***p<0,001 vs. NT, #p<0,05 e ####p<0,001 vs. 3J).....	74
Figura 41. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 72 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, *p<0,05 e ***p<0,001 vs. NT, ####p<0,001 vs. 3J).....	75
Figura 42. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 5 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, ***p<0,001 vs. NT, ##p<0,01 e ####p<0,001 vs. 3J).....	76
Figura 43. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 7 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, ***p<0,001 vs. NT, ##p<0,01 e ####p<0,001 vs. 3J).....	77
Figura 44. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 14 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, *p<0,05 e ***p<0,001 vs. NT, ####p<0,001 vs. 3J).....	78

Figura 45. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 21 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey, $###p<0,01$ vs. 3J).....	79
Figura 46. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 28 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	80
Figura 47. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 60 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey)	81

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação dos achados através do Score	38
Tabela 2 - Achados histológicos no tempo experimental de 12 horas.....	43
Tabela 3 - Achados histológicos no tempo experimental de 24 horas.....	45
Tabela 4 - Achados histológicos no tempo experimental de 48 horas.....	47
Tabela 5 - Achados histológicos no tempo experimental de 72 horas.....	49
Tabela 6 - Achados histológicos no tempo experimental de 5 dias	51
Tabela 7 - Achados histológicos no tempo experimental de 7 dias	53
Tabela 8 - Achados histológicos no tempo experimental de 14 dias	55
Tabela 9 - Achados histológicos no tempo experimental de 21 dias	57
Tabela 10 - Achados histológicos no tempo experimental de 28 dias	59
Tabela 11 - Achados histológicos no tempo experimental de 60 dias	61

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	17
1.1 Tecido Conjuntivo Denso Modelado	17
1.2 Colágeno	19
1.3 Tendão.....	20
1.4 Tendinopatia de Aquiles	22
1.5 Modelo Experimental de Tendinite por Colagenase	26
1.6 Terapias Utilizadas no Tratamento da Tendinopatia	27
1.6.1 Drogas Anti-Inflamatórias	27
1.6.2 Laserterapia de Baixa Intensidade	29
2 OBJETIVO	31
3 MATERIAIS E MÉTODO	32
3.1 Animais	32
3.2 Procedimento Experimental.....	32
3.3 Grupos Experimentais	34
3.4 Preparação das Lâminas Histológicas.....	36
3.5 Análises.....	37
3.5.1 Lâminas Coradas com Hematoxilina e Eosina.....	37
3.5.2 Lâminas Coradas com Picrosirius Red	38
3.5.3 Lâminas Não Coradas – Birrefringência	39
3.6 Análise Estatística.....	40
4 RESULTADOS.....	41
4.1 Score de Achados Histológicos	41
4.2 Análise Semi-Quantitativa de Colágeno	62
4.3 Medidas de Birrefringência	72
5 DISCUSSÃO	82
6 CONCLUSÃO	90
REFERÊNCIAS.....	91

1 INTRODUÇÃO

Tendinopatias, osteoartrite e afecções envolvendo a coluna vertebral, são as desordens musculoesqueléticas mais comuns na sociedade atual (FELSON et al., 2000; CARMONA et al., 2001; CHERRY et al., 2001; MÄNTYSELKÄ et al., 2001). Dentre os acometimentos citados, podemos destacar a tendinopatia do tendão do calcâneo, mundialmente conhecido como tendão de Aquiles. A tendinopatia é uma alteração clínica caracterizada pela dor e edema na região do tendão e em torno do mesmo, afetando a funcionalidade e a realização dos movimentos. Nas últimas três décadas a incidência deste estado clínico cresceu consideravelmente, resultado da grande participação da população em atividades físicas recreativas e competitivas (MAFFULLI; KHAN; PUDDU, 1998).

Tendo em vista a alta incidência desta lesão, diversas terapias e tratamentos são utilizados para inibir a evolução dos sinais e sintomas. Entre as várias opções descritas atualmente, temos: drogas anti-inflamatórias aplicadas localmente ou por via oral, eletroterapia, técnicas de mobilização articular, cinesioterapia, terapias comportamentais, entre outras (JOHANSSON; ADOLFSSON; FOLDEVI, 1999; DEEKS; SMITH; BRADLEY, 2002; JORDAN et al., 2004). Nota-se a grande variedade de tratamentos colocados a disposição da população, porém, a utilização de drogas anti-inflamatórias (não-esteroidais e corticosteróides) obtém destaque através de sua ação analgésica a curto prazo (PILIGIAN et al., 2000). Apesar dos mecanismos e efeitos destas drogas serem compreendidos, estudos analisando seus efeitos a longo prazo representam uma pequena parcela das pesquisas.

Buscando novas alternativas no tratamento, a laserterapia de baixa intensidade vem sendo amplamente estudada e utilizada na atualidade, tendo um número razoável de publicações de caráter científico comprovando o seu efeito anti-inflamatório e reparador em diferentes afecções, incluindo a tendinopatia de Aquiles (BJORDAL; LOPES-MARTINS; IVERSEN, 2006; STERGIOULAS et al., 2008).

1.1 Tecido Conjuntivo Denso Modelado

Os tecidos conjuntivos são responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo. Diante da grande variedade de classes descritas, focaremos no tecido conjuntivo denso modelado, exemplo típico do tendão. Ao

contrário de outros tipos de tecidos, como epitelial, muscular e nervoso, o tecido conjuntivo não tem como principal constituinte as células. Esse título é dado a matriz extracelular (MEC), que possui um importante papel mecânico. Ela atua conectando células e órgãos além de promover resistência às forças de tração e compressão, dando assim suporte ao corpo (KJAER, 2004; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008). Entretanto, em casos de traumas ou doenças específicas, pode haver alteração das propriedades biomecânicas da MEC, comprometendo o tecido (CULAV; CLARK; MERRILEES, 1999).

Em seu arranjo, a MEC é composta por proteínas fibrosas, destacando-se o colágeno (sistema colágeno) e a elastina (sistema elástico); substância fundamental e componentes inorgânicos (KANNUS, 2000).

O sistema elástico é composto pelas fibras oxitalânica, elaunínica e elástica, destacando-se esta última devido a riqueza em elastina, uma proteína pouco presente em tendões humanos (CARLSTED, 1987) ao contrário de tendões de ratos (GREENLEE e PIKE, 1971). Sua função sugerida por Butler et al. (1978), é de restabelecer a configuração ondulada das fibras de colágeno após uma força tensional, desempenhando um importante papel biomecânico.

Dando sequência a composição da MEC, temos a substância fundamental, um gel hidrofílico de consistência variável que se localiza entre as células e as fibras do tecido conjuntivo. Ela é composta por glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas, que promovem a manutenção da elasticidade, a homeostase iônica e a síntese de colágeno (KANNUS, 2000).

As células, mesmo não sendo o principal constituinte do tecido tendíneo, desempenham importante papel na homeostase do tecido. Neste sentido devemos citar os fibroblastos e fibrócitos, os quais compreendem cerca de 90-95% das células do tendão (JOZSA e KANNUS, 1997), plasmócitos, linfócitos, neutrófilos, macrófagos, mastócitos, e células adiposas. Algumas destas células são produzidas localmente e permanecem no tecido conjuntivo, porém outras, como por exemplo os leucócitos, migram de outros territórios podendo habitar temporariamente os tecidos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008).

Outras estruturas que desempenham um importante papel na manutenção da MEC são as metaloproteinases de matriz (MMP), uma família de enzimas (endopeptidases) dependentes de zinco e cálcio, responsáveis pela degradação dos componentes da MEC, principalmente o colágeno (SHARMA e MAFFULLI, 2005a,b).

Até o momento 23 famílias já foram identificadas, sendo estas divididas em quatro principais grupos: collagenases, gelatinases, estromelisinases e tipo-membrana. Dentre as principais famílias podemos destacar a MMP-2, MMP-3, MMP-14, que desempenham papel na degradação e remodelamento da MEC, além da MMP-9 e MMP-13 que atuam somente na degradação (LONGO; RONGA; MAFFULLI, 2009).

1.2 Colágeno

As fibras colágenas, constituintes do sistema colágeno, são as fibras mais abundantes do tecido conjuntivo, sendo o principal componente da MEC. Estas, são constituídas por uma glicoproteína estrutural denominada colágeno, que é a proteína mais abundante no corpo humano, representando 30% do total de proteínas existentes no organismo (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008). Atualmente, cerca de 19 tipos distintos de colágeno foram encontrados no organismo humano, todos com características individuais que determinam funções específicas nos diferentes tecidos (CULAV; CLARK; MERRILEES, 1999).

Da mesma forma que outros tecidos conjuntivos com característica fibrosa, os tendões são constituídos basicamente por colágeno tipo I (TIPTON et al., 1975; HESS et al., 1989; JOZSA et al., 1989; KIRKENDALL e GARRETT, 1997; O'BRIEN, 1997). Este tipo de colágeno é sintetizado principalmente pelos fibroblastos, porém outras células como macrófagos, mastócitos e algumas células indiferenciadas originadas do tendão, epitendão e paratendão podem sintetizá-lo (CHAN et al., 1997). Além do colágeno tipo I, outros tipos como III, IV, V e VI também podem estar presentes na composição do tecido conjuntivo. (HYMAN e RODEO, 2000).

Para a formação do colágeno, ocorre a polimerização de uma molécula chamada tropocolágeno. Esta molécula que mede 280 nm de comprimento e 1,5 nm de espessura é composta por três cadeias polipeptídicas dispostas em espiral, formando uma tripla hélice. Cada cadeia longa de polipeptídeo é sintetizada com dois peptídeos de registro em cada extremidade, os quais terminam o alinhamento das cadeias proteicas para formar a molécula de colágeno (CULAV; CLARK; MERRILEES, 1999). Após a formação, as moléculas se agregam progressivamente dentro de microfibrilas, formando as fibrilas de colágeno. Este feixe de fibrilas dará origem a fibra de colágeno, que é a unidade básica do tendão. A união destas fibras leva a formação de um fascículo primário de fibras, seguido de um fascículo

secundário. Este por sua vez formará o fascículo terciário que finalmente resultará no tendão propriamente dito (KANNUS, 2000).

A concentração de colágeno em cada fibra de seu sistema é relacionada ao diâmetro da fibra, que por sua vez depende do número e não do tamanho das fibrilas (ELLIOTT, 1965). Tanto as fibrilas quanto as fibras estão orientadas longitudinalmente, transversalmente e horizontalmente, cruzando-se entre si formando um espiral, promovendo assim grande resistência mecânica para a realização dos movimentos (CHANSKY e IANNOTTI, 1991; JOZSA et al., 1991).

Em repouso, as fibras apresentam-se onduladas ao serem vistas sob a luz de um microscópio, porém quando submetidas a tensão perdem essa característica, tornando-se estiradas. Com relação a resistência, Jozsa e Kannus (1997), em estudos *in vitro* descreveram que as fibras podem suportar um alongamento de até 8%. Se estiradas além de sua capacidade, pode ter início um processo de ruptura, favorecendo o início da lesão.

1.3 Tendão

Conceitualmente, tendões são estruturas anatômicas localizadas entre músculos e ossos, tendo como função transmitir a força criada por determinado músculo a um osso, tornando possível a realização de um movimento. (KANNUS, 2000).

Basicamente, cada músculo possui dois tendões, um proximal e um distal. O ponto de união com o músculo é chamado junção miotendínea (JMT), já o ponto de união com o osso é chamado junção osteotendínea (JOT). Os tendões podem variar de forma estrutural, passando de lisos e longos à cilíndricos e também podem variar na maneira como se inserem nos ossos, tendo a forma de um leque ou de feixes. Os músculos que desempenham um papel importante na geração de forças, como o quadríceps, por exemplo, possuem um tendão curto e espesso, enquanto aqueles designados a gestos sutis e delicados, como os flexores dos dedos, possuem tendões longos e finos (KANNUS, 2000).

O tendão de Aquiles é descrito como o tendão mais espesso e mais resistente do corpo humano (MAFFULI, 1999). Ele origina-se das fibras dos músculos gastrocnêmio e sóleo. (DORAL et al., 2010). Segundo Cumins et al. (1946), a contribuição destes músculos para a formação do tendão varia entre os

indivíduos, podendo ter proporções iguais (50% de cada músculo) ou até mesmo com predominância do gastrocnêmio (> 60%). Distalmente, o tendão insere-se no calcâneo, formando a JOT, que desempenha um papel importante na dissipação do estresse em que o tendão é submetido durante a realização de movimentos (BENJAMIN e MCGONAGLE, 2001). O fornecimento de sangue ao tendão é feito predominantemente pelo ramo posterior da artéria tibial, através de três diferentes locais: na JMT, nos vasos que revestem o tecido conjuntivo e na JOT (AHMED et al., 1998). Neste sentido, é importante destacar que a vascularização no tendão não é uniforme, apresentando zonas pouco vascularizadas, como a região intratendínea medial e zonas altamente vascularizadas, como o paratendão (DORAL et al., 2010). Já com relação a inervação, ela é derivada principalmente do nervo sural (O'BRIEN, 1992).

Macroscopicamente, o tendão é envolto de cinco estruturas distintas (KANNUS, 2000). O retináculo, que são os canais onde os tendões deslizam; as polias que são estruturas reforçadas do retináculo presentes onde há curvas ao longo do trajeto que o tendão percorre, tendo a função de manter o tendão no eixo; a bainha sinovial que permite o acesso dos tendões até as superfícies ósseas ou outras estruturas anatômicas que possam causar fricção; o paratendão que está presente em tendões que não possuem a bainha sinovial, sendo composto por um tecido frouxo que atua como uma luva elástica permitindo o movimento do tendão contra os tecidos ao seu redor (JOZSA e KANNUS, 1997); e finalmente a bursa tendínea, uma estrutura que se localiza em áreas com proeminências ósseas, reduzindo assim o atrito, compressão e desgaste do tendão (KANNUS, 2000).

Similarmente a nomenclatura das camadas musculares, o tendão também apresenta divisões internas. O epitendão é uma fina rede de tecido conjuntivo, localizado entre o paratendão e o endotendão (JOZSA et al., 1991). Já o endotendão é uma densa rede de fibras colágenas localizado no interior do tendão. Ele une cada fascículo de fibras, formando grandes feixes de fibras tendíneas. Esta detalhada arquitetura pode ser compreendida analisando a imagem abaixo.

Figura 1. Estrutura interna do tendão.
Fonte: Jozsa e Kannus (1997).

1.4 Tendinopatia de Aquiles

A incidência de lesões tendíneas tem aumentado significativamente nas últimas décadas (MAFFULLI e KADER, 2002; PAAVOLA et al., 2002), resultado da maior participação da população em atividades físicas recreativas e competitivas (MAFFULLI; KHAN; PUDDU, 1998). Estima-se que essas lesões englobem de 30% a 50% de todas as lesões relacionadas ao esporte (JÄRVINEN et al., 2005). Especificamente entre as lesões envolvendo o tendão de Aquiles, o diagnóstico clínico mais frequente é o de tendinopatia, envolvendo de 55% a 65% dos casos (JÄRVINEN et al., 2001). A incidência desta lesão é de 50% em atletas de elite (principalmente corredores), 7% a 40% na população que realiza atividades físicas regularmente e 5,9% em indivíduos sedentários (KUJALA; SARNA; KAPRIO, 2005; LIAN; ENGEBRETSEN; BAHR, 2005).

A tendinopatia de Aquiles é uma alteração clínica caracterizada pela presença de dor e edema na região tendínea e em torno desta, afetando desta forma a biomecânica corporal (MAFFULLI; KHAN; PUDDU, 1998). É importante salientar que a dor é o principal sintoma, porém, o mecanismo causador ainda não é completamente entendido. É possível que exista uma relação com a inflamação, que seja decorrente de rupturas nas fibras de colágeno (MAFFULLI; SHARMA;

LUSCOMBE, 2004), ou que possa originar-se de uma combinação de causas mecânicas e bioquímicas (MAFFULLI e BENAZZO, 2000).

El Hawary, Stanish e Curwin (1997), sugerem uma possível classificação das fases da lesão. Segundo os autores, a tendinopatia pode ser classificada em aguda, se os sintomas tiveram início a menos de duas semanas; subaguda, no período de duas a seis semanas; e crônica, se os sintomas perdurarem por mais de seis semanas. Essa classificação, entretanto, não é baseada em achados histopatológicos e deve ser utilizada com cautela.

Dentre os diversos fatores de risco que podem predispor a tendinopatia de Aquiles está o sexo, sendo mais frequente em homens (COOK; KHAN; PURDAM, 2002), envelhecimento (MAFFULLI; BARRASS; EWEN, 2000), sobrepeso (AMES et al., 2008), flexibilidade reduzida, discrepância no tamanho dos membros, frouxidão articular e alterações posturais (JÄRVINEN et al., 2001). Outros fatores de risco descritos, especialmente nos casos de ruptura do tendão de Aquiles são o uso de antibióticos como as quinolonas (MCGARVEY; SINGH; TREVINO, 1996) e a utilização de corticosteróides locais ou sistêmicos (van der LINDEN et al., 2003).

No que diz respeito a sua etiologia, a tendinopatia de Aquiles apresenta grandes lacunas, sendo considerada por diversos autores como uma lesão pouco compreendida (ROLF e MOVIN, 1997; PAAVOLA et al., 2002; MAHIEU et al., 2006). Segundo Järvinen et al. (2001), a lesão é classificada como multifatorial, pelo fato de que fatores extrínsecos e intrínsecos são responsáveis pelo seu surgimento. Um grande número de fatores são descritos na literatura, porém alguns recebem maior atenção. Na tentativa de elucidar as causas da lesão, algumas teorias foram criadas. Segundo a teoria mecânica, o excesso de atividades que envolvam os tendões, popularmente conhecido como *overuse/overload*, tem sido creditado como o processo chave para o desenvolvimento da lesão. Sob repouso, as fibras do tendão apresentam uma estrutura ondulada, porém quando submetidas a tensões superiores a 6-8%, suas fibras tornam-se demasiadamente estiradas e incapazes de suportar tal carga. Esta sobrecarga é absorvida pelas fibras de colágeno, estabelecendo uma relação linear entre carga e tensão (CURWIN, 1998). Quanto maior a carga submetida ao tendão, mais micro-rupturas são geradas, afetando a resistência do tecido, culminando para o aparecimento de alguns sintomas, como a dor (MURAMATSU et al., 2001; MAGNUSSON et al., 2003). Estas micro-lesões levam ao início do processo lesivo no tendão, resultando em alterações estruturais

como redução no diâmetro das fibras de colágeno, desorganização da MEC e deformação dos núcleos celulares (COOK; KHAN; PURDAM, 2002).

Através do estímulo lesivo descrito acima, um processo de reparo composto por três fases distintas é iniciado. Primeiramente ocorre a fase inflamatória onde há o recrutamento de células inflamatórias, fagocitose de material necrosado, liberação de fatores vasoativos, angiogênese e proliferação de fibrócitos. Após alguns dias tem início a fase proliferativa, onde ocorre alta síntese de colágeno tipo III, por um período de até seis semanas. Logo após inicia-se a fase de remodelamento, com significativa redução da celularidade, da síntese de colágeno e de glicosaminoglicanos, onde finalmente haverá a formação de um tecido de reparação fibroso, através da grande produção de colágeno tipo I. Após dez semanas a etapa de maturação é iniciada, promovendo uma mudança gradual no tecido cicatricial, a fim de torná-lo melhor organizado e mais resistente. Esta é uma longa etapa, podendo ultrapassar o período de um ano (ZAFAR; MAHMOOD; MAFFULLI, 2009).

Entretanto, nem todos os casos evoluem para a resolução da lesão. É comum ocorrer uma falha no processo de reparação da MEC, possivelmente levando a um estágio de degeneração do tecido em questão, também chamado de tendinose (LEADBETTER, 1992). Neste quadro, a lesão ocasiona basicamente as mesmas alterações histopatológicas encontradas na tendinite. Entretanto, existem evidências de que nesse estágio não há presença de inflamação no tecido (KHAN et al., 2000).

Infelizmente a literatura não apresenta um consenso à respeito da terminologia das lesões tendíneas, causando uma certa confusão. O termo tendinopatia, que é utilizado genericamente para descrever um estado clínico, é muitas vezes confundido com outras denominações dadas para acometimentos do tecido tendíneo. Entretanto, para facilitar o entendimento, alguns autores propuseram definições que são utilizadas atualmente. O termo tendinite, segundo Gabel (1999), deve ser usado para descrever a presença de um processo inflamatório no tendão; enquanto o termo tendinose, descrito por Puddu, Ippolito e Postacchini (1976), deve ser utilizado quando há um estado de degeneração do tendão, sem sinais clínicos ou histológicos de inflamação intratendínea. De um ponto de vista conceitual, essa diferenciação é útil, porém na clínica, é comum vermos diagnósticos de tendinite em pacientes que na verdade já desenvolveram uma tendinose. Para evitar isso, alguns autores como Astrom e Rausing (1995),

recomendam evitar o termo tendinite na prática clínica, com a intenção de não “subestimar” a condição do tendão afetado, ou até mesmo utilizar estas terminologias somente após confirmação histopatológica (GABEL, 1999).

Além da teoria mecânica descrita anteriormente, outras também são propostas na literatura. A teoria vascular relaciona o surgimento da lesão com a existência de uma região pobremente vascularizada no tendão, entre 2-6 cm da inserção (AHMED et al., 1998); já a teoria neural descreve que a lesão pode originar-se da presença de glutamato, substância P e outros neurotransmissores nos tecidos (HART; FRANK; BRAY, 1995). Segundo Rees, Wilson e Wolman (2006), a etiologia da tendinopatia é resultante da união destas três teorias citadas, embora futuras possibilidades possam ser exploradas.

Para o diagnóstico, o histórico detalhado do paciente é imprescindível. Os seguintes dados devem ser analisados: data de início dos sintomas, características e duração dos mesmos, realização de atividades físicas, possíveis lesões pregressas e quais os tratamentos foram realizados (SCHEPSIS; JONES; HAAS, 2002). A dor, apesar de não estar sempre presente, é o principal sintoma que faz o paciente buscar auxílio, sendo assim, útil para o diagnóstico. Segundo Jozsa e Kannus (1997), através dela é possível classificar a severidade da lesão. É descrito que pacientes na fase inicial da lesão relatam dor somente após a realização de atividade física intensa, enquanto pacientes em fase crônica apresentam dor durante qualquer tipo de atividade e em alguns casos até mesmo durante o repouso (SCHEPSIS; JONES; HAAS, 2002). Não menos importante, um minucioso exame clínico deve ser realizado a fim de fornecer informações da região musculotendínea, como possíveis áreas de edema, crepitação, eritema, calor local ou nódulos (JOZSA e KANNUS, 1997). Exames de imagem também são de grande valia para o diagnóstico, destacando-se a ultrassonografia e a ressonância magnética. Com a utilização destes recursos, pode-se encontrar um aumento na espessura do tendão, edema, descontinuidade nas fibras, redução na organização dos fascículos, calcificação intratendínea, ruptura parcial ou total das fibras e aderências entre o epitendão e o paratendão (FORNAGE, 2003).

1.5 Modelo Experimental de Tendinite por Colagenase

A colagenase é uma enzima produzida por fibroblastos e células inflamatórias e constitui uma família de metaloproteinases de matriz altamente específica, sendo capaz de induzir degradação de colágeno (MARSOLAIS; COTE; FRENETTE, 2001). A partir deste efeito, modelos experimentais de tendinopatia através da injeção peritendínea de colagenase, tem sido amplamente utilizados em estudos terapêuticos com diferentes tendões, inclusive o de Aquiles, em diversos animais (HSU et al., 2004; DAHLGREN; MOHAMMED; NIXON, 2006; LUI et al., 2009). As alterações bioquímicas e histológicas promovidas por sua ação estão bem descritas, dentre as quais estão o edema, aumento da celularidade, destruição da MEC, desorganização das fibras de colágeno, entre outras (DAHLGREN et al., 2002).

A utilização de um modelo animal validado permite estudos mais aprofundados sobre a etiologia, patogênese e os possíveis tratamentos para tendinopatias. Isso tudo pelo fato dos animais apresentarem características mais homogêneas se comparado aos humanos. Outro ponto que merece ser descrito é que através da utilização de animais, o tecido pode ser obtido em fases iniciais da lesão e até mesmo antes do início dos sintomas (LUI et al., 2011). Isto é de extrema importância pois existe um grande debate sobre a participação da inflamação na tendinopatia. Conforme mencionado anteriormente, há evidências que relatam a ausência de um processo inflamatório nas tendinopatias, porém estas evidências estão baseadas em estudos em que a lesão já se encontrava em uma fase avançada (REES; WILSON; WOLMAN, 2006). Em contrapartida à esses relatos, Marsolais, Cote e Frenette (2001, 2003), reportaram a presença de leucócitos nos três primeiros dias após injeção de colagenase, demonstrando sucesso na produção de uma lesão aguda. Independente da diversidade de resultados apresentados na literatura, Rees, Wilson e Wolman (2006), relatam que modelos animais de tendinopatia produzem uma lesão similar aos achados histopatológicos em tecidos de humanos, sendo assim indispensáveis para elucidar questões ainda obscuras envolvendo esta afecção.

1.6 Terapias Utilizadas no Tratamento da Tendinopatia

Diversas terapias são utilizadas com o objetivo de amenizar a dor, o desconforto e promover a melhora da função do tecido acometido (KHAN e COOK, 2000), porém o primeiro passo logo após o diagnóstico, é identificar o motivo da lesão e os fatores que possam estar envolvidos, para assim evitar o risco de reincidência (REES; MAFFULLI; COOK, 2009). Entre as duas linhas de tratamento, o conservador é o de escolha na maioria dos casos. Inclui uma ampla variedade de condutas como: terapia farmacológica, fototerapia, crioterapia, exercícios excêntricos, entre outros.

Apesar de encontrarmos na literatura diversos tratamentos para tendinopatias, muitos destes estudos apresentam baixa qualidade metodológica, como por exemplo, pela ausência de grupos placebo e controle. De acordo com Rompe, Furia e Maffulli (2008), a ausência de estudos de boa qualidade leva a incertezas, dificultando a escolha do melhor tratamento a ser empregado.

1.6.1 Drogas Anti-Inflamatórias

Estudos em animais avaliando os efeitos de drogas anti-inflamatórias no reparo tendíneo vem sendo realizados desde os anos 70. Ao longo desses anos, diversos estudos foram realizados, porém os resultados encontrados na literatura são conflitantes. É possível que essas diferenças estejam ligadas a ampla variedade de drogas utilizadas, dosagem, tempo de tratamento, espécie animal utilizada, local da lesão, entre outros (FERRY et al., 2007).

Em uma revisão na literatura feita por Andres e Murrell (2008), cujo foco era avaliar a eficácia dos diversos tratamentos utilizados na clínica, os autores concluíram que o uso de anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) por um curto período e sessões de fisioterapia, são a primeira linha no tratamento para tendinopatia de Aquiles. Alguns autores relatam achados positivos utilizando AINEs em tecido tendíneo, confirmando sua popularidade clínica (FORSLUND; BYLANDER; ASPENBERG, 2003). Teoricamente, a utilização de AINEs beneficiaria pacientes com tendinopatias devido ao aumento da resistência tênsil das fibras tendíneas, através de uma formação acelerada das ligações cruzadas nas fibras de colágeno (VOGEL, 1977; WEILER, 1992).

Contrariando esta hipótese, Virchenko, Skoglund e Aspenberg (2004), relataram através de um modelo animal de tendinopatia, uma redução significativa na resistência do tendão após o tratamento com AINE, produzindo assim um efeito negativo. Neste caso, os autores destacaram que a resposta inflamatória inicial pode ser necessária para o reparo e não deve ser inibida. Já durante a fase de remodelamento, a inflamação teria uma influência negativa no reparo tecidual, sendo a utilização de AINEs uma opção de tratamento.

Rees, Maffulli e Cook (2009), descrevem que apesar de serem muito utilizados, são escassas as evidências científicas que avaliaram a eficácia desta classe de anti-inflamatórios no reparo da lesão de Aquiles, em específico. Alguns estudos em humanos com diferentes tendinopatias, apontam para a produção de um efeito analgésico quando tratados com este tipo de droga (ALMEKINDERS e TEMPLE, 1998). Segundo Rees, Maffulli e Cook (2009), esse efeito analgésico proporcionado pelos AINEs pode ser o fator chave para explicar sua popularidade.

Devido a disparidade de evidências encontradas na literatura científica, torna-se complexo justificar o uso de AINEs nestes tipos de acometimentos (LONGO et al., 2009).

Os anti-inflamatórios esteroidais ou corticosteróides também representam uma classe de drogas com ampla aplicação no tratamento de lesões musculoesqueléticas dolorosas, pelo fato de promoverem o alívio temporário da dor.

Sua utilização parece não apresentar benefícios a longo prazo, podendo levar a redução na resistência do tecido tratado (ANDRES e MURRELL, 2008). Segundo Magra e Maffulli (2008), a ação anti-inflamatória destes fármacos pode interferir na reparação das fibras e reduzir a resistência tênsil, causando assim efeitos negativos ao tendão. Alguns efeitos deletérios foram demonstrados por Wong et al. (2004), em um estudo com cultura de fibroblastos tendíneos de humanos, em que a aplicação de anti-inflamatórios esteroidais afetou a proliferação de fibroblastos e a síntese de MEC. Apesar dos riscos já relatados, a utilização de corticosteróides é feita de forma indiscriminada na atualidade. De acordo com Chan e Fu (2009), não há dúvida de que os efeitos adversos dos corticosteróides sobre as células do tendão possam afetar as respostas de reparo em lesões degenerativas, devendo por este motivo serem utilizados como último recurso no tratamento de tendinopatias.

1.6.2 Laserterapia de Baixa Intensidade

A terapia com laser de baixa intensidade (LLLT) tem sido usada no tratamento de lesões teciduais e em processos inflamatórios desde a década de 60, entretanto, foi na década de 80 que surgiram os primeiros relatos dos efeitos benéficos em lesões tendíneas e em outros acometimentos desencadeados por atividades físicas (EMMANOULIDIS e DIAMANTOPOULOS, 1986). Desta época até a atualidade, uma grande variedade de estudos clínicos foram realizados, envolvendo condições musculoesqueléticas, neurogênicas e dolorosas.

Como possíveis responsáveis pelos efeitos benéficos da LLLT em lesões tendíneas, duas importantes respostas biológicas tem sido descritas em estudos clínicos (BJORDAL; COUPPE; LJUNGGREEN, 2001). A primeira hipótese é um efeito modulatório dose-dependente sobre o metabolismo dos fibroblastos e sobre a deposição de colágeno. Esta resposta tem sido observada em uma grande variedade de estudos controlados em cultura de células e em animais (REDDY; STEHNO-BITTEL; ENWEMEKA, 1998; PEREIRA et al., 2002). Já o segundo mecanismo seria similar a ação dos AINEs e dos anti-inflamatórios esteroidais, através da atenuação da inflamação pela inibição da enzima ciclooxigenase-2 e consequente redução na concentração de prostaglandina E_2 (PGE_2) (HONMURA et al., 1993; SAKURAI; YAMAGUCHI; ABIKO, 2000). Além destes efeitos, Enwemeka et al. (1990), relatam que a irradiação de laser em certas doses, estimula a proliferação de fibroblastos e a liberação de fator de crescimento fibroblástico (FGF). Com isso, este efeito pode atuar promovendo o equilíbrio entre produção-degradação da MEC, culminado para a cicatrização do tendão lesado.

Mais recentemente, em uma revisão sistemática na literatura, Tumilty et al. (2010), avaliaram a eficácia da irradiação com laser de baixa intensidade em tendinopatias, através de estudos clínicos. Especificamente sobre as afecções que acometem o tendão de Aquiles, os autores avaliaram três estudos classificados como de alta qualidade científica. Bjordal, Lopes-Martins e Iversen (2006), em um estudo clínico randomizado placebo controlado, concluíram que a irradiação com laser de baixa intensidade com dose de 5,4 Joules por ponto reduziu a concentração de PGE_2 e aumentou o limiar de dor em tendões de indivíduos com tendinopatia de Aquiles. Já Stergioulas et al. (2008), reportaram que associação da LLLT com um programa de exercícios excêntricos durante de 12 semanas, reduziu a dor e a

crepitação durante a palpação, além de aumentar a dorsiflexão da articulação do tornozelo. Os autores concluíram que a combinação destas terapias acelerou a recuperação dos pacientes. Finalmente, em outro estudo de Tumilty et al. (2008), os autores relataram não chegar a uma conclusão a respeito da eficácia da LLLT no tratamento da tendinopatia de Aquiles.

Em uma análise geral, os estudos que obtiveram resultados favoráveis à laserterapia utilizaram doses recomendadas pela *World Association for Laser Therapy* (WALT). Já em relatos que mostram resultados inexpressivos, é comum observar a utilização de parâmetros incorretos, fato este que segundo Tumilty et al. (2010), é o ponto determinante para atingir o êxito nas pesquisas.

Segundo Paavola et al. (2000), os indivíduos com tendinopatia de Aquiles geralmente apresentam um prognóstico favorável a longo prazo. Em um estudo de acompanhamento com duração de oito anos, os autores relataram que a maioria dos pacientes tornaram-se assintomáticos e mais de 80% destes retornaram as atividades físicas que anteriormente desencadeavam dor e desconforto.

2 OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo avaliar o processo de reparação e reorganização tecidual em tendões de Aquiles de ratos submetidos a tendinopatia por injeção de collagenase, sendo estes tratados unicamente com laserterapia de baixa intensidade, anti-inflamatório esteroidal ou anti-inflamatório não-esteroidal. A avaliação foi realizada através de análises histomorfológicas do tecido em questão, buscando assim comparar os diferentes tratamentos.

3 MATERIAS E MÉTODO

3.1 Animais

Foram utilizados ratos *Wistar* fêmeas, pesando em torno de 200-250 g, com oito a dez semanas de vida, provenientes do biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo – USP. Os animais foram mantidos em condições padrão de temperatura (22-24 °C), umidade relativa (40-60%), ciclo de 12 horas claro-escuro com água e ração *ad libitum*. Todos os protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP), recebendo o registro de número 144, folha 78 do livro 02.

3.2 Procedimento Experimental

Os animais foram anestesiados com uma mistura de Cetamina e Xilazina (90 mg/kg e 10 mg/kg respectivamente; König, Avellaneda, Argentina) por via intraperitoneal e posteriormente receberam 100 µg de collagenase (Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri, USA) diluída em 100 µl de solução salina estéril (0,9%). A collagenase foi injetada na região posterior de ambas as patas, na área do tendão de Aquiles, pela via transcutânea. Já os animais do grupo hígido receberam como veículo, 100 µl de salina estéril (0,9%). A seguir, os animais foram mantidos aquecidos até o encerramento do efeito anestésico, evitando desta forma a morte acidental decorrente da hipotermia causada pelo anestésico.

Após a injeção de collagenase, os animais foram tratados de acordo os grupos descritos logo abaixo e sacrificados nos períodos de 12, 24, 48, 72 horas e 5, 7, 14, 21, 28 e 60 dias. Estes tempos foram definidos de acordo com Marsolais; Cote; Frenette (2001), pois englobam as etapas de acúmulo de células inflamatórias, degradação de colágeno e início do processo de reparação. Para o sacrifício os animais receberam overdose de anestésico (halotano). Ao final, os tendões de Aquiles foram extraídos (figuras 2 e 3) e armazenados adequadamente, para então dar início ao preparo das lâminas, descrito posteriormente.

Figura 2. Aspecto macroscópico do tendão de Aquiles de rato.

Figura 3. Tendão de Aquiles de rato.

3.3 Grupos Experimentais

Os animais foram divididos nos seguintes grupos:

- **Grupo Hígido:** Tendões de animais que receberam como veículo 100 µl de solução salina estéril (0,9%) na região peritendínea de ambas as patas e não foram submetidos a nenhum outro procedimento.

- **Grupo Lesão Não Tratado (NT):** Tendões de animais que receberam injeção com 100 µg de collagenase diluída em 100 µl de solução salina estéril (0,9%) na região peritendínea de ambas as patas.

- **Grupo Lesão + Laser (3J):** Tendões de animais que receberam injeção com 100 µg de collagenase diluída em 100 µl de solução salina estéril (0,9%) na região peritendínea de ambas as patas, tendo os dois tendões irradiados na região da injeção, em um único ponto e por contato. A aplicação foi realizada uma vez ao dia conforme os tempos pré-estabelecidos, tendo como prazo máximo de tratamento sete dias. A figura 4 ilustra a maneira em que a irradiação foi realizada.

Figura 4. Irradiação com laser de baixa intensidade.

As características do equipamento e os parâmetros utilizados são descrito na figura 5. A energia do equipamento utilizada neste trabalho (3 J), foi baseada em um estudo prévio realizado em nosso laboratório (LABAT, 2010).

Figura 5. Equipamento e parâmetros utilizados no estudo.

- **Grupo Lesão + Diclofenaco (Diclo):** Tendões de animais que receberam injeção com 100 µg de collagenase diluída em 100 µl de solução salina (0,9%) na região peritendínea de ambas as patas, tratados com Diclofenaco Potássico (Novartis Biociências S.A., Campinas, S.P., Brasil) na dose de 1,1 mg/kg via oral, uma hora após a indução, administrado duas vezes ao dia conforme os tempos pré-estabelecidos, tendo como prazo máximo de tratamento sete dias.

- **Grupo Lesão + Dexametasona (Dexa):** Tendões de animais que receberam injeção com 100µg de collagenase diluída em 100 µl de solução salina (0,9%) na região peritendínea de ambas as patas, tratados com Fosfato Dissódico de Dexametasona (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., Taboão da Serra, S.P., Brasil) na dose de 0,02 mg/kg via intramuscular, uma hora após a indução, administrada uma vez ao dia conforme os tempos pré-estabelecidos, tendo como prazo máximo de tratamento sete dias.

No intuito de facilitar o entendimento do desenho experimental, apresentamos na figura 6 o fluxograma do estudo.

Figura 6. Desenho experimental.

3.4 Preparação das Lâminas Histológicas

Para a realização das análises qualitativa e quantitativa, as amostras do tecido foram fixadas em formol a 10% por um período de 72 horas. Posteriormente, as amostras foram desidratadas e submetidas a uma série gradativa de banhos de álcool, começando com 50% e progredindo até o álcool absoluto 100%. Em seguida, os tendões foram diafanizados com Xilol (Labsynth, Diadema, S.P., Brasil) por quatro horas para impregnação (embebição) e inclusão em Paraplast® (Leica Microsystems Wetzlar Gmb H, Nussloch, Alemanha) das amostras. Em seguida, estas foram colocadas em recipientes de alumínio adequados, com Paraplast® fundido por quatro horas. Após a impregnação, as amostras foram colocadas em um pequeno recipiente coberto com parafina fundida e deixadas para endurecer, formando um bloco contendo o tecido. Para a microtomia foram realizados cortes

longitudinais com 5 µm de espessura em micrótomo Leica® (Leica Microsystems Wetzlar Gmb H, Nussloch, Alemanha) modelo RM2125 RT, e levados e colocados em banho-maria. Uma vez precedido o preparo das amostras, cada lâmina foi montada com cinco cortes de tendões de animais diferentes (n=5), de acordo com o grupo (Hígido, Lesão NT, 3J, Diclo e Dexa). Cada tendão, deu origem a três cortes, um para cada coloração: Hematoxilina e Eosina, *Picrosirius Red* e não coradas.

Finalmente, realizou-se as análises das lâminas, descritas separadamente logo abaixo.

3.5 Análises

3.5.1 Lâminas Coradas com Hematoxilina e Eosina

Entre as diversas colorações utilizadas no meio histológico, os corantes mais utilizados são a hematoxilina (corante básico) e a eosina (corante ácido). Em contato com o tecido, o corante básico reage com os componentes ácidos do núcleo, corando-o em azul-púrpura; enquanto o corante ácido reage com os componentes básicos do citoplasma, corando-os em vermelho a rosa.

As lâminas coradas com hematoxilina e eosina foram analisadas através de um microscópio óptico Nikon® (Nikon Corporation, Japão) modelo Eclipse E-200, sendo posteriormente fotografadas através de uma câmera de microfotografia Dino-Lite Digital Microscope® (AnMo Electronics Corp., Hsinchu, Taiwan) modelo DinoEye AM423X, conectada a um computador Apple MacBook® Pro (Apple Inc., Cupertino, California, USA) modelo MB990BZ/A. Foram obtidas fotos de todos os grupos utilizando os aumentos de 100x e 400x. As imagens serão apresentadas com um padrão fotográfico similar, tendo como foco a região peritendínea. Após a análise das lâminas, foi elaborada uma tabela de *score* (tabela 1) baseada nos achados histológicos da região peritendínea (área correspondente ao epitendão+paratendão), com o intuito de analisar qualitativamente as características do tecido tendíneo. Este *score* representa a média dos achados em três campos de observação de cada tendão (total de 15 campos observados por grupo), através do aumento de 400x. Os aspectos avaliados foram: neutrófilos, linfócitos, extravasamento plasmático e hemorragia (TATARI et al., 2001; FILLIPIN et al., 2005). O processo de análise do material foi realizado de forma cega, sendo que a identificação da lâmina (grupo) foi

revelada somente após a elaboração do *score*. O *score* dos achados foi classificado em quatro níveis diferentes conforme a tabela abaixo:

Tabela 1 - Classificação dos achados através do *Score*.

Símbolo Representativo	Quantidade do Achado
-	Ausente
+	Leve
++	Moderado
+++	Intenso

3.5.2 Lâminas Coradas com *Picrosirius Red*

A coloração por *Picrosirius Red* torna possível que grande parte de suas moléculas, de caráter ácido e alongado, fixem-se paralelamente às moléculas de colágeno. Desta forma, associada a microscopia, resulta em um método de análise específico para detecção de estruturas compostas por moléculas de colágeno. Entretanto, através desta análise, não é possível diferenciar os tipos de colágeno presentes no tecido. Uma análise específica para esta diferenciação, principalmente dos tipos I e III, é uma ferramenta importante para observar o processo de reestruturação do tecido tendíneo.

A coloração *Picrosirius Red* foi utilizada para obtermos dados semi-quantitativos de colágeno presente no tecido, de acordo com o protocolo adaptado de Cohen et al. (2006). As lâminas foram analisadas através de um microscópio óptico Nikon® modelo Eclipse E-200, sendo posteriormente fotografadas através de uma câmera de microfotografia Dino-Lite Digital Microscope® modelo DinoEye AM423X, conectada a um computador Apple MacBook® Pro modelo MB990BZ/A. Nesta análise utilizou-se o aumento de 100x. A área fotografada teve como foco a região intratendínea do tendão. Para a obtenção dos dados, foram capturadas cinco fotos de cada grupo (uma de cada tendão). Posteriormente, as fotos foram transferidas para o computador e analisadas através do *software* ImageJ versão 1.43u. Através do *software* as imagens foram transformadas em 8 *bits*, convertidas

para o padrão de tonalidade cinza e finalmente mensuradas. Cada foto forneceu um valor médio de *pixels* em uma escala de brilho que vai de 0 a 255 (*gray scale*). Nesta escala o valor 0 representa ausência de colágeno, enquanto o valor máximo de 255 representa maior quantidade de colágeno. Dessa maneira, quanto maior o valor apresentado pela escala, maior a quantidade de colágeno no tecido.

3.5.3 Lâminas Não Coradas - Birrefringência

A análise das fibras de colágeno foi realizada através de uma das suas propriedades anisotrópicas ópticas: a birrefringência total, medida por meio da microscopia de polarização (VIDAL, 2003). Esta propriedade refere-se ao fato de um objeto possuir dois índices de refração distintos, fazendo com que a luz, ao penetrar em determinado material, propague-se em velocidades e caminhos diferentes. Um destes caminhos é conhecido como raio ordinário (no), enquanto o outro, recebe o nome de raio extraordinário (ne). Através da diferença entre estes dois raios, temos uma variável denominada retardo óptico (VIDAL, 1987).

Para a realização da análise de birrefringência do tecido tendíneo, as lâminas histológicas não coradas de cada grupo foram imersas por 30 minutos em água destilada (índice de refração 1,333), antes da análise no microscópio de polarização, seguindo as especificações propostas por Vidal (1987). Após este período, as lâminas foram cobertas por lamínulas, contendo água destilada em entre as superfícies (lâmina e lamínula). As medidas dos retardos ópticos foram obtidos através da microscopia de luz polarizada no microscópio Leica® modelo DMRX, com uma objetiva Pol 10x/0,22, condensador 0,9 compensador de Sénarmont $\lambda/4$, luz monocromática $\lambda=546$ nm, obtida por meio de um filtro de interferência Leica®, no Departamento de Engenharia de Materiais (LAMAV) da Universidade Federal de São Carlos, sob a orientação do Prof. Dr. Nivaldo Antonio Parisotto.

As medidas foram realizadas com o eixo do tendão a 45° em relação aos filtros (polarizador e analisador) do microscópio, pelo fato de que nesta angulação as fibras de colágeno exibem o maior brilho de birrefringência e conseqüentemente um alto valor dos retardos ópticos. Isso ocorre pois a maioria das fibras de colágeno se orientam no eixo longo do tendão (VIDAL, 2003). De acordo com Vidal et al. (1975), o aumento da birrefringência total está relacionado ao aumento das ligações cruzadas entre as fibrilas de colágeno, aumentando a cristalinidade e a agregação

ordenada do colágeno tipo I. Dessa forma, quanto maior o valor apresentado, melhor será a organização estrutural das fibras de colágeno no tendão. Segundo o autor, esta é a melhor forma de avaliar a organização e a agregação das fibrilas de colágeno.

Foram realizadas dez medidas da birrefringência (duas para cada tendão) nos grupos Hígido, Lesão NT, 3J, Diclo e Dexa em todos os tempos experimentais. As medidas foram feitas em pontos aleatórios da região tendínea e peritendínea. Nesta análise, replicamos a metodologia utilizada no estudo de Carrinho (2004).

3.6 Análise Estatística

Os resultados foram expressos como médias $\pm$ erro padrão (EPM) e submetidos a análise de variância (ANOVA) seguido de pós-teste de Tukey para múltiplas comparações. Valores de $p < 0,05$ foram considerados estatisticamente significantes.

4 RESULTADOS

4.1 Score de Achados Histológicos

Inicialmente apresentamos as fotos do grupo hígido e posteriormente as fotos e o score dos grupos restantes (NT, 3J, Diclo e Dexa). Os resultados dos achados histológicos são descritos de acordo com o tempo do protocolo experimental.

Nas imagens do grupo hígido (figura 7), nota-se um aspecto tecidual bem organizado, sem áreas de extravasamento plasmático e/ou hemorragia. Observa-se as fibras colágenas com um aspecto ondulado característico, massiva celularidade de fibroblastos orientados longitudinalmente as fibras de colágeno e finalmente pequenos espaços no tecido, possivelmente ocupados por substância fundamental amorfa.

Figura 7. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato do grupo hígido. Em foco, grande quantidade de fibroblastos (seta branca) alinhados paralelamente as fibras colágenas (seta preta). Hematoxilina-Eosina (A:100x, B:400x).

Na figura 8 são apresentadas as imagens do tendão 12 horas após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 9 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Notamos em todos os grupos, um aumento na quantidade de células polimorfonucleares (neutrófilos) na região peritendínea, extensas áreas de extravasamento plasmático, além de sítios com hemorragia. Evidencia-se também, uma desorganização estrutural das fibras colágenas, com um aumento dos espaços fibrilares.

Figura 8. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 12 horas após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, neutrófilo (setas azuis), extravasamento plasmático (seta verde), hemorragia (seta vermelha). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 9. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 12 horas após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, extravasamento plasmático (seta verde), hemorragia (seta vermelha). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o score final dos achados no protocolo de 12 horas.

Tabela 2 - Achados histológicos no tempo experimental de 12 horas

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	+++	+	+++	+++
3J	++	-	++	+
Diclo	++	-	++	++
Dexa	+++	+	+++	++

Na figura 10 são apresentadas as imagens do tendão 24 horas após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 11 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Observamos em todos os grupos a presença contínua de infiltrado polimorfonuclear, uma pequena quantidade de linfócitos, além de áreas com moderado extravasamento plasmático. Notou-se também, focos de hemorragia localizados na região peritendínea dos grupos NT e Dexa. Percebe-se claramente a desorganização das fibras de colágeno na região peritendínea em todos os grupos, achado característico deste tipo de lesão.

Figura 10. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 24 horas após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, neutrófilo (seta azul), linfócito (seta amarela), extravasamento plasmático (seta verde). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 11. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 24 horas após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, linfócito (seta amarela), hemorragia (seta vermelha). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o *score* final dos achados no protocolo de 24 horas.

Tabela 3 - Achados histológicos no tempo experimental de 24 horas.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	+++	++	++	+
3J	++	+	+	-
Diclo	++	+	+	-
Dexa	++	+	++	++

Na figura 12 são apresentadas as imagens do tendão 48 horas após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 13 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Em comparação aos tempos experimentais anteriores, notamos uma redução na quantidade de células polimorfonucleares nos grupos Diclo e Dexa. Em contrapartida, a quantidade de linfócitos em todos os grupos foi elevada. Observou-se ainda áreas de extravasamento plasmático e de hemorragia em todos os grupos, principalmente no grupo Dexa.

Figura 12. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 48 horas após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, linfócitos (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 13. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 48 horas após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, linfócito (seta amarela), extravasamento plasmático (seta verde). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o score final dos achados no protocolo de 48 horas.

Tabela 4 - Achados histológicos no tempo experimental de 48 horas.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	++	+++	+	+
3J	++	+++	+	-
Diclo	+	+++	+	-
Dexa	+	++	++	++

Na figura 14 são apresentadas as imagens do tendão 72 horas após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 15 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Quando comparado ao tempo experimental de 48 horas, observou-se uma redução na quantidade de linfócitos nos grupos NT, 3J e Diclo. Já a quantidade de neutrófilos se manteve proporcional ao tempo experimental anterior, com os grupos NT e Dexa apresentando uma quantidade moderada. Evidencia-se a desorganização do tecido na região peritendínea em todos os grupos.

Figura 14. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 72 horas após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Em foco, neutrófilo (seta azul), linfócito (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 15. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 72 horas após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, neutrófilo (seta azul). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o score final dos achados no protocolo de 72 horas.

Tabela 5 - Achados histológicos no tempo experimental de 72 horas.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	++	++	+	+
3J	+	++	+	-
Diclo	+	++	+	-
Dexa	++	++	+	+

Na figura 16 são apresentadas as imagens do tendão 5 dias após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 17 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Com 5 dias após a lesão, não foram encontradas áreas com hemorragia e/ou extravasamento plasmático. Com relação a celularidade do tecido, não houveram grandes alterações se comparado com o tempo experimental anterior, salvo a grande quantidade de linfócitos observado no grupo 3J.

Figura 16. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 5 dias após injeção de collagenase nos grupos Lesão (A e B) e 3J (C e D). Em foco, linfócitos (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 17. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 5 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Em foco, linfócitos (seta amarela). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o score final dos achados no protocolo de 5 dias.

Tabela 6 - Achados histológicos no tempo experimental de 5 dias.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	+	++	-	-
3J	+	+++	-	-
Diclo	+	++	-	-
Dexa	++	+	-	-

Na figura 18 são apresentadas as imagens do tendão 7 dias após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 19 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Da mesma forma que no tempo anterior, não foram observadas áreas com hemorragia e/ou extravasamento plasmático. Já o nível de polimorfonucleados do grupo NT apresentou um aumento com relação ao tempo experimental anterior. Por fim, os linfócitos foram observados em níveis equiparados em todos os grupos experimentais.

Figura 18. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 7 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 19. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 7 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o *score* final dos achados no protocolo de 7 dias.

Tabela 7 - Achados histológicos no tempo experimental de 7 dias.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	++	++	-	-
3J	+	++	-	-
Diclo	+	++	-	-
Dexa	+	++	-	-

Na figura 20 são apresentadas as imagens do tendão 14 dias após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 21 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Observou-se níveis muito próximos de células polimorfonucleares em todos os grupos. Já a quantidade de linfócitos nos grupos 3J e Diclo foi menor do que nos grupos NT e Dexa, neste mesmo tempo experimental. Novamente, não foram notadas áreas de hemorragia e/ou extravasamento plasmático.

Figura 20. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 14 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 21. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 14 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexta (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o *score* final dos achados no protocolo de 14 dias.

Tabela 8 - Achados histológicos no tempo experimental de 14 dias.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	+	++	-	-
3J	+	+	-	-
Diclo	+	+	-	-
Dexta	+	++	-	-

Na figura 22 são apresentadas as imagens do tendão 21 dias após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 23 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Neste tempo experimental foi observado um avanço na reorganização tecidual da região tendínea e peritendínea. Com relação a celularidade, foi observada uma pequena quantidade de polimorfonucleados apenas no grupo Dexa. Finalmente, nas áreas observadas, não foram encontrados linfócitos em nenhum dos grupos experimentais.

Figura 22. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 21 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 23. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 21 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexametasona (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o *score* final dos achados no protocolo de 21 dias.

Tabela 9 - Achados histológicos no tempo experimental de 21 dias.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	-	-	-	-
3J	-	-	-	-
Diclo	-	-	-	-
Dexa	+	-	-	-

Na figura 24 são apresentadas as imagens do tendão 28 dias após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 25 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Não foram observados linfócitos e/ou células polimorfonucleares em nenhum dos grupos experimentais. No quesito organização tecidual, notou-se uma desorganização na região peritendínea do grupo NT, se comparado com o tempo anterior. Por fim, observou-se uma pequena área de extravasamento plasmático no grupo Dexa.

Figura 24. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 28 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 25. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 28 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexa (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o *score* final dos achados no protocolo de 28 dias.

Tabela 10 - Achados histológicos no tempo experimental de 28 dias.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	-	-	-	-
3J	-	-	-	-
Diclo	-	-	-	-
Dexa	-	-	+	-

Na figura 26 são apresentadas as imagens do tendão 60 dias após a indução da tendinopatia de Aquiles dos grupos **NT (A e B)** e **3J (C e D)**. Já na figura 27 são apresentadas as imagens dos grupos **Diclo (E e F)** e **Dexa (G e H)**, no mesmo tempo experimental. Neste último tempo experimental, não foram encontrados linfócitos e/ou células polimorfonucleares, bem como hemorragia e extravasamento plasmático em nenhum dos grupos experimentais.

Figura 26. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 60 dias após injeção de collagenase nos grupos NT (A e B) e 3J (C e D). Hematoxilina-Eosina (A e C:100x, B e D:400x).

Figura 27. Aspecto histológico do tendão de Aquiles de rato 60 dias após injeção de collagenase nos grupos Diclo (E e F) e Dexta (G e H). Hematoxilina-Eosina (E e G:100x, F e H:400x).

Apresentamos a seguir, o *score* final dos achados no protocolo de 60 dias.

Tabela 11 - Achados histológicos no tempo experimental de 60 dias.

Grupos	Polimorfonucleados	Linfócitos	E. Plasm.	Hemorragia
Hígido	-	-	-	-
NT	-	-	-	-
3J	-	-	-	-
Diclo	-	-	-	-
Dexta	-	-	-	-

4.2 Análise Semi-Quantitativa de Colágeno

A figura 28 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos 12 horas após a injeção de collagenase. Observamos uma redução significativa da quantidade de colágeno nos grupos **NT** ($86 \pm 2,8$), **3J** ($95 \pm 3,9$), **Diclo** ($88 \pm 6,1$) e **Dexa** ($71 \pm 2,6$) comparados ao grupo **Hígido** ($132 \pm 5,8$) com $***p < 0,001$ e também do grupo **3J** ($95 \pm 3,9$) comparado ao grupo **Dexa** ($71 \pm 2,6$) com $##p < 0,01$.

Figura 28. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 12 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido do teste Tukey, $***p < 0,001$ vs. hígido, $##p < 0,01$ vs. Dexa).

A figura 29 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos 24 horas após a injeção de collagenase. Observamos uma redução significativa da quantidade de colágeno nos grupos **NT** ($82 \pm 3,1$), **3J** ($94 \pm 4,2$), **Diclo** ($78 \pm 8,4$) e **Dexa** ($64 \pm 2,2$) comparados ao grupo **Hígido** ($132 \pm 5,8$) com $***p < 0,001$ e também do grupo **3J** ($94 \pm 4,2$) comparado ao grupo **Dexa** ($64 \pm 2,2$) com $##p < 0,01$.

Figura 29. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 24 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido do teste Tukey, $***p < 0,001$ vs. hígido, $##p < 0,01$ vs. Dexa).

A figura 30 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 48 horas após a injeção de collagenase. Observamos uma redução significativa na quantidade de colágeno nos grupos **NT** ($106 \pm 7,5$) e **3J** (104 ± 6) comparado ao grupo **Hígido** ($132 \pm 5,8$) com $*p < 0,05$ e também do grupo **Dexa** ($95 \pm 4,2$) comparado ao grupo **Hígido** ($132 \pm 5,8$) com $**p < 0,01$.

Figura 30. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 48 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey $*p < 0,05$ vs. hígido e $**p < 0,01$ vs. hígido).

A figura 31 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 72 horas após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 31. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 72 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 32 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 5 dias após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 32. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 5 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 33 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 7 dias após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 33. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 7 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, n=5 (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 34 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 14 dias após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 34. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 14 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 35 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 21 dias após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 35. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 21 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 36 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 28 dias após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 36. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 28 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 37 demonstra a média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles 60 dias após a injeção de collagenase. Não se observou diferença estatisticamente significativa na quantidade de colágeno entre os grupos.

Figura 37. Média da quantidade de colágeno no tendão de Aquiles de ratos Wistar 60 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

4.3 Medidas de Birrefringência

A figura 38 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 12 horas após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores nos grupos **3J** ($69 \pm 1,4$), **Diclo** ($61 \pm 1,1$) e **Dexa** ($50 \pm 1,4$) comparados ao grupo **NT** ($38 \pm 1,2$) com $***p < 0,001$; e também do grupo **3J** ($69 \pm 1,4$) comparado aos grupos **Diclo** ($61 \pm 1,1$) e **Dexa** ($50 \pm 1,4$) com $###p < 0,001$.

Figura 38. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 12 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $***p < 0,001$ vs. NT, $###p < 0,001$ vs. 3J).

A figura 39 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 24 horas após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores nos grupo **3J** ($67 \pm 1,3$), **Diclo** ($58 \pm 1,5$) e **Dexa** ($56 \pm 1,4$) comparados ao grupo **NT** ($40 \pm 2,5$) com $***p<0,001$; do grupo **3J** ($67 \pm 1,3$) comparado ao grupo **Diclo** ($58 \pm 1,5$) com $##p<0,01$; e também do grupo **3J** ($67 \pm 1,3$) comparado ao grupo **Dexa** ($56 \pm 1,4$) com $###p<0,001$.

Figura 39. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 24 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $***p<0,001$ vs. NT, $##p<0,01$ e $###p<0,001$ vs. 3J).

A figura 40 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 48 horas após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores nos grupo **3J** ($66 \pm 1,1$) e **Diclo** ($61 \pm 1,2$) comparados ao grupo **NT** ($54 \pm 1,4$) com $***p<0,001$ e $**p<0,01$ respectivamente; do grupo **3J** ($66 \pm 1,1$) comparado ao grupo **Diclo** ($61 \pm 1,2$) com $\#p<0,05$; e também do grupo **3J** ($66 \pm 1,1$) comparado ao grupo **Dexa** ($56 \pm 1,1$) com $###p<0,001$.

Figura 40. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 48 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $**p<0,01$ e $***p<0,001$ vs. NT, $\#p<0,05$ e $###p<0,001$ vs. 3J).

A figura 41 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 72 horas após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores nos grupo **3J** ($65 \pm 1,3$) e **Diclo** ($60 \pm 1,2$) comparados ao grupo **NT** ($54 \pm 1,4$) com $***p<0,001$ e $*p<0,05$ respectivamente; e do grupo **3J** ($65 \pm 1,3$) comparado ao grupo **Dexa** ($53 \pm 1,0$) com $###p<0,001$.

Figura 41. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 72 horas após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $*p<0,05$ e $***p<0,001$ vs. NT, $###p<0,001$ vs. 3J).

A figura 42 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 5 dias após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores no grupo **3J** ($63 \pm 1,2$) comparado ao grupo **NT** ($52 \pm 1,6$) com $***p<0,001$; e do grupo **3J** ($63 \pm 1,2$) comparado aos grupos **Diclo** ($57 \pm 1,2$) e **Dexa** ($52 \pm 1,0$) com $##p<0,01$ e $###p<0,001$ respectivamente.

Figura 42. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 5 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $***p<0,001$ vs. NT, $##p<0,01$ e $###p<0,001$ vs. 3J).

A figura 43 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 7 dias após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores no grupo **3J** ($64 \pm 1,0$) comparado ao grupo **NT** ($52 \pm 1,7$) com $***p<0,001$; e do grupo **3J** ($64 \pm 1,0$) comparado aos grupos **Diclo** ($57 \pm 1,4$) e **Dexa** ($52 \pm 1,6$) com $##p<0,01$ e $###p<0,001$ respectivamente.

Figura 43. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 7 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $***p<0,001$ vs. NT, $##p<0,01$ e $###p<0,001$ vs. 3J).

A figura 44 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 14 dias após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores nos grupo **3J** ($66 \pm 1,2$) e **Diclo** ($63 \pm 1,7$) comparados ao grupo **NT** ($56 \pm 1,1$) com $***p<0,001$ e $*p<0,05$ respectivamente; e do grupo **3J** ($66 \pm 1,2$) comparado ao grupo **Dexa** ($57 \pm 1,2$) com $###p<0,001$.

Figura 44. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 14 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $*p<0,05$ e $***p<0,001$ vs. NT, $###p<0,001$ vs. 3J).

A figura 45 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 21 dias após a injeção de collagenase. Observamos um aumento significativo destes valores no grupo **3J** ($66 \pm 1,4$) comparado ao grupo **Dexa** ($59 \pm 0,7$) com $##p<0,01$.

Figura 45. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 21 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey, $##p<0,01$ vs. 3J).

A figura 46 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 28 dias após a injeção de collagenase. Não observamos diferença estatisticamente significativa nos valores de retardo óptico entre os grupos.

Figura 46. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 28 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

A figura 47 demonstra os valores do retardo óptico no tendão de Aquiles 60 dias após a injeção de collagenase. Não observamos diferença estatisticamente significativa nos valores de retardo óptico entre os grupos.

Figura 47. Valores do retardo óptico nas fibras de colágeno do tendão de Aquiles de ratos Wistar 60 dias após a injeção de collagenase. Os dados representam a média $\pm$ EPM, $n=5$ (ANOVA seguido de teste Tukey).

5 DISCUSSÃO

Como mencionado anteriormente, a tendinopatia é uma das desordens musculoesqueléticas mais comuns na atualidade, envolvendo tanto indivíduos sedentários como atletas de elite. Apesar do grande interesse da comunidade científica sobre o assunto, até o momento não há um consenso a respeito de sua etiologia. Além disso, a compreensão evolutiva deste tipo de lesão torna-se ainda mais difícil devido ao fato de que a maioria dos estudos utilizem amostras de tendões sintomáticos/crônicos, não avaliando a tendinopatia em seu estágio inicial. Por este fato, a utilização de um modelo experimental utilizando animais juntamente com a indução do processo inflamatório, é de grande valia para o entendimento da lesão no tendão de Aquiles, pois permite que o tecido tendíneo seja estudado na fase inicial da lesão.

No que diz respeito ao tratamento deste tipo de lesão, até o momento não existe o chamado padrão-ouro, embora conheçamos uma gama de opções. Com o intuito avaliar algumas opções utilizadas na clínica, estudamos neste trabalho o processo de reparo e organização tecidual em um modelo de tendinopatia de Aquiles induzida por collagenase. Como terapias, utilizamos a laserterapia de baixa intensidade, um anti-inflamatório esteroidal e um anti-inflamatório não-esteroidal. Foram realizadas análises histomorfológicas do tecido tendíneo, para então comparar os achados promovidos pelos diferentes tratamentos.

Analisando os tempos experimentais iniciais de 12, 24 e 48 horas após a lesão, podemos notar que houve um aumento na quantidade de células polimorfonucleares em todos os grupos. Corroborando com nosso achado, os autores Gillitzer e Goebeler (2001), relatam que os neutrófilos são frequentemente as primeiras células a chegar no local da lesão, acumulam-se rapidamente e liberando citocinas que podem atrair macrófagos (AL-MOKDAD; SHIBATA; NAKAGAWA, 1997), além de uma variedade de agentes destrutivos, como espécies reativas de oxigênio (LEY, 1996) e proteases (HENSON e JOHNSTON, 1987). Ao mesmo tempo que estes agentes podem ser danosos à MEC pela destruição e retardo do processo de regeneração tecidual (PALMGREN et al., 1992), podem também desempenhar um importante papel de defesa no tecido lesado, através da ação fagocítica dos neutrófilos. Finalmente, acredita-se que o recrutamento inicial destas células inflamatórias ao sítio da lesão ocorra através da quimiotaxia, sendo

este o principal mecanismo pelo qual as células migram para o tecido lesado (LANGBERG et al., 1999; MARSOLAIS; COTE; FRENETTE, 2001).

Em contrapartida, a quantidade de linfócitos apresentou característica inversa nestes mesmos tempos experimentais, ou seja, identificamos uma pequena quantidade de células no tempo 12 horas (grupos NT e Dexta), enquanto no tempo 48 horas o achado foi elevado em todos os grupos. Segundo Zafar, Mahmood e Maffulli (2009), os linfócitos são encontrados ocasionalmente no tecido lesado, atuando no processo de reparo, além de estarem associados com a proliferação de capilares e arteríolas. Fishel et al. (1987), acrescentam que a presença de linfócitos se dá na fase de remodelamento do tecido, englobando principalmente os 14 primeiros dias após a lesão.

De acordo com diversos autores que descrevem a tendinopatia como uma combinação de sinais como dor local, edema na região em torno do tendão e redução da funcionalidade do membro, resolvemos averiguar um destes sinais, através da presença ou não de extravasamento plasmático em nossas amostras. Como visto na sessão de resultados, todos os grupos exceto hígido, nos tempos experimentais de 12, 24, 48 e 72 horas apresentaram áreas de extravasamento plasmático em diferentes intensidades. Esta alteração na permeabilidade vascular ocorre devido à liberação de substâncias como histamina, serotonina e bradicinina que além de causarem dilatação arteriolar, tem como ação principal promover um aumento na permeabilidade vascular, permitindo o extravasamento de macromoléculas proteicas do plasma para o interstício (RÁKOS et al., 2007).

Estabelecendo uma relação entre os principais componentes da inflamação aguda (vasodilatação local de pequenos vasos, aumento da permeabilidade vascular e emigração de leucócitos da microcirculação) com os nossos achados, podemos dizer que o modelo de tendinopatia de Aquiles induzida por colagenase, resultou em um quadro de inflamação aguda, corroborando com os estudos de Marsolais, Cote e Frenette (2001) e Dahlgren et al. (2002).

Analisando os resultados dos três diferentes tratamentos sobre os achados histológicos, observamos de uma forma geral que o grupo tratado com laser de baixa intensidade e o grupo tratado com diclofenaco apresentaram níveis de células inflamatórias, extravasamento plasmático e hemorragia menores em comparação ao grupo tratado com dexametasona.

Quando confrontados com a literatura, nossos resultados se mostram semelhantes a diversos estudos. Elwakil (2007), em um estudo com laser de baixa intensidade em tendões seccionados de coelhos, observou melhora na organização do tecido e no alinhamento das fibras de colágeno, além de uma reação inflamatória menos intensa. Já no grupo controle as amostras revelaram bandas de colágeno mal alinhadas, além de intenso infiltrado celular e reação granulomatosa.

Bertolini et al. (2008), relatam que a aplicação do laser terapêutico em tendões de ratos lesados mecanicamente (por impacto), promoveu a redução da dor e do edema na área acometida, melhorando assim a função do membro. Utilizando este mesmo modelo de lesão, Fillipin et al. (2005), mostraram que após 14 dias de tratamento com laser, não foram observadas anormalidades no tecido tendíneo de ratos. Em contrapartida, alterações na arquitetura do tecido, reação inflamatória e vasodilatação foram encontradas no grupo lesado que não recebeu tratamento.

Já em um estudo com humanos, Bjordal, Lopes-Martins e Iversen (2006), observaram que após a irradiação do tendão de Aquiles de pacientes sintomáticos, houve redução na concentração de PGE_2 , importante mediador inflamatório. Este estudo de caráter bioquímico complementa os relatos histomorfológicos anteriores, fornecendo evidências positivas sobre laserterapia de baixa intensidade no tratamento de processos inflamatórios agudos.

Como mencionado na introdução, a diversidade de resultados e conclusões a respeito do uso de AINEs em lesões teciduais é grande. Em nossa busca de estudos que avaliaram o reparo, nos deparamos com resultados negativos (ELDER; DAHNERS; WEINHOLD, 2001), positivos (OBREMSKY et al., 1994) e resultados que não promoveram nenhuma alteração (THOMAS et al., 1991), tornando amplo o debate sobre a utilização desta classe de drogas anti-inflamatórias.

Em um destes trabalhos, Marsolais, Cote e Frenette (2003), relatam que a concentração de neutrófilos na região peritendínea foi reduzida em 59% quando comparada ao grupo placebo, um dia após a lesão. Já com relação ao edema, no terceiro dia após a lesão foi observado uma redução de aproximadamente 35%. Entretanto, entre o terceiro e décimo quarto dia, não houve redução no volume de líquido extravasado.

Parte dos achados supracitados vão de encontro aos nossos resultados, que mostram que o fármaco utilizado (diclofenaco) reduziu a quantidade de células inflamatórias e o volume de extravasamento plasmático. Esta ação pode envolver

diferentes mecanismos como a inibição da agregação de células polimorfonucleares (CRONSTEIN et al., 1994), redução na síntese de prostaglandinas (VANE, 1996) e queda na quantidade de moléculas de adesão, inibindo assim a locomoção das células (DIAZ-GONZALEZ et al., 1995).

Entre as três opções de tratamento avaliadas, a aplicação intramuscular de dexametasona foi a que apresentou o resultado menos satisfatório. Este fato pode ser notado se observarmos os tempos experimentais de 72 horas e 14 dias, nos quais o *score* de achados foi semelhante ao grupo que não recebeu tratamento.

As evidências científicas existentes que dizem respeito ao uso de corticosteróides em tendinopatias, analisam parâmetros diferentes dos avaliados por nós neste estudo, como por exemplo, a resistência do tendão em ratos e o nível da dor em humanos. Da mesma forma que em pesquisas com AINEs, os estudos existentes apresentam alguns resultados conflitantes, embora na maioria dos estudos, os autores tenham observado efeitos deletérios após o uso (TSAI et al., 2002; WONG et al., 2004; WONG et al., 2005).

No presente estudo notou-se que a partir do 21º dia todos os grupos apresentaram uma significativa evolução nos parâmetros avaliados, não sendo observado sinais de inflamação. Ao final de 60 dias, o tecido aparenta ter evoluído de forma satisfatória para a resolução do processo inflamatório, entretanto não é possível afirmar que o mesmo recuperou toda a sua característica estrutural e capacidade mecânica, pois não foram realizadas análises específicas para tais.

Em nossa análise referente a quantidade de colágeno presente no tecido, observamos que nos tempos experimentais de 12, 24 e 48 horas houve uma redução estatisticamente significativa em todos os grupos (exceto para o grupo diclofenaco, no tempo de 48 horas) quando comparados ao grupo hígido. Baseado no mecanismo de ação da collagenase, este achado pode ser explicado através de sua ação lesiva na área aplicada, promovendo a degradação do material composto por colágeno.

Se compararmos a quantidade de colágeno entre os grupos tratados, foi notado um aumento estatisticamente significativo no grupo 3J quando comparado ao grupo Dexa, nos tempos experimentais de 12 e 24 horas.

O mecanismo pelo qual o laser estimula a produção de colágeno durante o processo regenerativo em lesões tendíneas ainda não é claro. Entre os possíveis mecanismos estão a alteração na regulação do gene e/ou uma modulação nas

enzimas que estão envolvidas no metabolismo do colágeno (OZKAN et al., 2004). Alguns autores descrevem também que a combinação dos parâmetros utilizados no laser é capaz de interferir nas respostas celulares. Incluem-se nestes, o comprimento de onda, densidade de energia e tempo de irradiação. Embora ainda não compreendido, o aumento na produção de colágeno através da laserterapia é fortemente sustentado pela literatura. Diversos estudos a descrevem como um recurso eficaz na indução da síntese de colágeno (ELWAKIL, 2007; ENWEMEKA et al., 1990; PEREIRA et al., 2002; WOOD et al., 2010).

Enwemeka et al. (2004), concluíram através de uma metanálise, que este recurso fototerápico pode produzir respostas benéficas em áreas lesadas, através da proliferação de fibroblastos, aumento da síntese de colágeno e aumento da resistência tênsil. Este fato parece justificar a grande quantidade de estudos com laser e a popularidade que este recurso tem obtido nos últimos anos no tratamento de lesões musculotendíneas.

Em nosso estudo, nenhum dos anti-inflamatórios utilizados alterou significativamente a deposição de colágeno na área da lesada, fato notado quando comparamos os resultados dos grupos Diclo e Dexa com o grupo NT. Baseado nestes dados, podemos dizer que tais achados não influenciaram o processo de deposição de colágeno na área lesada.

Quando confrontados com a literatura, nossos resultados diferem de boa parte, visto que o volume de evidências negativas é considerável. Em uma delas, Cohen et al. (2006), avaliaram o efeito de dois inibidores da ciclooxigenase na lesão de manguito rotador de ratos. Após 60 dias, as análises revelaram que os tendões dos grupos tratados com indometacina e celecoxib apresentaram redução na resistência tênsil quando submetidos ao teste de tração. Além disso, os autores relataram que a administração dos anti-inflamatórios inibiu a formação e maturação de colágeno na região distal do tendão.

Diante da discordância vista, podemos inferir que alguns detalhes metodológicos e experimentais possam ter provocado tais diferenças. Entre eles podemos citar a concentração de collagenase utilizada, duração do tratamento, drogas utilizadas e/ou método de análise.

A partir do tempo experimental 72 horas, não encontramos variações estatisticamente significantes na quantidade de colágeno em nenhum dos grupos experimentais. Estes achados a partir deste tempo experimental, podem ser

dependente de diversos fatores, como a liberação de fatores de crescimento (TGF- β , IGF-I), proliferação de fibroblastos, além da própria evolução temporal do processo de regeneração. Com isso, essas alterações locais podem ter atuado promovendo o equilíbrio na quantidade de colágeno, fato que pode ser observado nos tempos posteriores (ENWEMEKA et al., 1990; CHEN et al., 2004; ELWAKIL et al., 2007).

Com relação a birrefringência das fibrilas/fibras de colágeno, esta análise é de extrema importância em estudos de reparação tendínea, pois o alinhamento das fibras colágenas fornece resistência tênsil ao tendão, permitindo que o mesmo resista as atividades de vida diária (WOOD et al., 2010).

Através desta análise, verificamos que o grupo tratado com laser de baixa intensidade mostrou um efeito estimulante e/ou protetor nas fibras de colágeno em diversos tempos experimentais, visto os elevados valores nos retardos ópticos apresentados.

Wood et al. (2010), observaram um incremento significativo nos valores dos retardos ópticos após seis dias de irradiação com laser, quando comparado a um grupo controle que não recebeu tratamento. Oliveira et al. (2009), também relataram a obtenção de valores nos retardos ópticos superiores aos encontrados no grupo lesão não tratado, após sete dias de irradiação com laser. Segundo Carrinho et al. (2006), que também relatam resultados positivos semelhantes aos citados neste parágrafo, é provável que o laser seja capaz de favorecer a agregação e o alinhamento das fibras colágenas no tecido irradiado.

Se observarmos detalhadamente, percebemos que nos resultados vistos na literatura, o aumento nos valores dos retardos ópticos ocorreu após alguns dias de tratamento com laser, enquanto que em nosso estudo sequer houve redução significativa destes valores, no grupo irradiado. Por esta razão, especulamos que além do efeito reparador, a laserterapia também possa atuar de forma protetora, impedindo a desorganização das fibras colágenas.

Segundo alguns autores, o laser atua sobre fotorreceptores da molécula citocromo c oxidase, também chamados de cromóforos. Conhecido também como complexo IV, o citocromo c oxidase é um complexo proteico transmembranar encontrado na mitocôndria, que desempenha um importante papel no metabolismo energético. Dessa forma, é postulado que a laserterapia atue na cadeia respiratória estimulando a atividade do citocromo c oxidase, levando a um aumento no consumo

de oxigênio e conseqüentemente elevando a produção de ATP. Com isso, diversos processos biológicos podem ser alterados (KARU, 1999; ROJAS et al., 2008; WONG-RILEY et al., 2001; YU et al., 1997).

Hayworth et al. (2010), confirmaram esta hipótese em um estudo utilizando o músculo temporal de ratos saudáveis. Os autores relatam que 24 horas após uma única irradiação, houve um aumento de 30% na atividade do citocromo c oxidase, quando comparado com o grupo controle. É importante frisar que o grupo controle utilizado no estudo não sofreu nenhum acometimento prévio, ou seja, a irradiação ocorreu em um tecido saudável. Dessa forma os valores encontrados após a irradiação foram maiores do que os próprios níveis basais.

Embora o efeito relatado acima tenha sido observado em músculo, é possível que o mecanismo responsável pela proteção das fibras colágenas seja o mesmo. Pelo fato do estudo supracitado ser o primeiro relato da ação dose-dependente do laser sob o citocromo c oxidase *in vivo*, são necessários novos estudos em outros tecidos, para assim confirmar nossa hipótese.

Além do possível mecanismo anterior, os achados positivos podem ocorrer por uma estimulação na liberação do fator de crescimento fibroblástico (FGF), contribuindo para uma maior deposição de colágeno e um possível favorecimento na reorganização das fibras lesadas (ENWEMEKA et al., 1990).

Com relação a terapia farmacológica, os valores do retardo óptico observados nos grupos tratados com anti-inflamatórios, apresentaram uma moderada variação entre si. Porém, quando comparados com o grupo não tratado, o grupo diclofenaco apresentou os melhores resultados. Se observado nos gráficos, em alguns tempos experimentais agudos, o grupo que recebeu diclofenaco mostrou uma melhor organização das fibras colágenas em comparação ao grupo que não recebeu tratamento. Sendo assim, embora em níveis inferiores que a laserterapia, o tratamento com diclofenaco nas primeiras horas após a lesão, mostrou-se efetivo na manutenção da estrutura tecidual do tendão.

Na tentativa de explicar tal achado, encontramos um único estudo que fez uso de drogas anti-inflamatórias e avaliou a organização das fibras colágenas através da birrefringência do tecido (COHEN et al., 2006). Neste relato, os autores observaram que a administração de drogas anti-inflamatórias (indometacina e celecoxib) retardou a reorganização das fibras colágenas, visto que o grupo que não

recebeu tratamento após a lesão, apresentou valores nas medidas de birrefringência estatisticamente maiores.

Diante deste resultado, contrário ao que observamos em nosso estudo, juntamente com a escassez de relatos que utilizem métodos semelhantes aos utilizados por nós, torna-se difícil entender de que forma a terapia farmacológica atua nos casos de lesões tendíneas. Por este motivo não se faz possível postular um possível mecanismo que leve a alterações na arquitetura das fibras colágenas.

Finalmente, o grupo não tratado apresentou os menores valores nos retardos ópticos até o 14º dia, indicando uma desorganização estrutural em todos os tempos experimentais anteriores. Entretanto, a partir do 21º dia, observamos um grande avanço na organização das fibras colágenas no grupo não tratado, visto que não encontramos diferenças significantes quando comparado aos grupos que receberam tratamento. Baseado nesta análise, visualizamos que foram necessários 28 dias para que as fibras colágenas de tendões não tratados atingissem níveis próximos aos do grupo hígido, ou seja, recuperando totalmente sua arquitetura estrutural.

Após a busca de estudos que, assim como o nosso, tenham realizado a análise da agregação/organização tecidual em estágios tardios (tempos experimentais acima de 14 dias), concluímos que este é o primeiro trabalho existente utilizando tais tempos. Deste modo, não sabemos se o período necessário para que as fibras colágenas do grupo não tratado se reorganize, seja o mesmo encontrado em nosso estudo, 28 dias. Por este fato, é necessário o desenvolvimento de novas pesquisas que utilizem uma metodologia similar e os mesmos tempos experimentais, para que assim possamos compreender de forma mais clara a evolução deste quadro denominado tendinopatia.

6 CONCLUSÃO

Baseado nas análises realizadas, concluímos que o modelo de indução de tendinopatia por collagenase apresentou-se como uma alternativa confiável, reproduzindo diversas alterações teciduais encontradas em estudos clínicos, como extravasamento plasmático, produção de células inflamatórias e desorganização tecidual.

Podemos dizer que a terapia com laser de baixa intensidade e a aplicação de diclofenaco potássico, apresentaram resultados positivos sobre a lesão em tendão de Aquiles de ratos. Estes dois recursos modularam o quadro inflamatório agudo desencadeado pela collagenase, através da redução da quantidade de leucócitos, edema e hemorragia.

Entretanto, se relacionarmos todas as nossas análises, a laserterapia parece ser a melhor opção de tratamento. Juntamente com a modulação da resposta inflamatória, o laser promoveu um incremento na quantidade de colágeno nos primeiros dois tempos experimentais, além de revelar um efeito protetor sobre organização das fibras de colágeno na área lesada. É importante ressaltar ainda, que a laserterapia de baixa intensidade é uma terapia com relativo baixo custo, não-invasiva e sem efeitos colaterais.

REFERÊNCIAS*

- AHMED, I. M.; LAGOPOULOS, M.; MCCONNELL, P.; SOAMES, R. W.; SEFTON, G. K. Blood supply of the Achilles tendon. **J. Orthop. Res.**, v. 16, n. 5, p. 591-596, 1998.
- AL-MOKDAD, M.; SHIBATA, F.; NAKAGAWA, H. Effects of cytokine-induced neutrophil chemoattractants (CINCs) on shape change, adhesiveness and phagocytosis of rat neutrophils. **Biol. Pharm. Bull.**, v. 20, n. 8, p. 920-923, 1997.
- ALMEKINDERS, L. C.; TEMPLE, J. D. Etiology, diagnosis, and treatment of tendonitis: an analysis of the literature. **Med. Sci. Sports. Exerc.**, v. 30, n. 8, p. 1183-1190, 1998.
- AMES, P. R.; LONGO, U. G.; DENARO, V.; MAFFULLI, N. Achilles tendon problems: not just an orthopaedic issue. **Disabil. Rehabil.**, v. 30, n. 20-22, p. 1646-1650, 2008.
- ANDRES, B. M.; MURRELL, G. A. Treatment of tendinopathy: what works, what does not, and what is on the horizon. **Clin. Orthop. Relat. Res.**, v. 466, n. 7, p. 1539-1554, 2008.
- ASTROM, M.; RAUSING, A. Chronic Achilles tendinopathy: A survey of surgical and histopathologic findings. **Clin. Orthop.**, n. 316, p. 151-164, 1995.
- BENJAMIN, M.; MCGONAGLE, D. The anatomical basis for disease localisation in seronegative spondyloarthropathy at enthesis and related sites. **J. Anat.**, v. 199, n. 5, p. 503-526, 2001.
- BERTOLINI, G. R. F.; SILVA, T.C.; CIENA, A. P.; TRINDADE, D. L. Efeitos do laser de baixa potência sobre a dor e edema no trauma tendíneo de ratos. **Rev. Bras. Med. Esporte**, v. 14, n. 4, p. 362-366, 2008.
- BJORDAL, J.; COUPPE, C.; LJUNGGREEN, A. Low level laser therapy for tendinopathy: Evidence of a dose-response pattern. **Phys. Ther. Rev.**, v. 6, p. 91-99, 2001.
- BJORDAL, J. M.; LOPES-MARTINS, R. A. B.; IVERSEN, V. V. A Randomised Placebo Controlled Trial of Low Level Laser Therapy for Activated Achilles Tendonitis with Microdialysis Measurement of Peritendinous Prostaglandin E2 Concentrations. **Br. J. Sports Med.**, v. 40, n. 1, p. 76-80, 2006.
- BUTLER, D. L.; GROOM, E. S.; NOYES, F. R.; ZERNICKE, R. F. Biomechanics of ligaments and tendons. **Exerc. Sport. Sci. Rev.**, v. 6, p. 125-181, 1978.

*De acordo com:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.

CARLSTEDT, C. A. Mechanical and chemical factors in tendon healing. Effects of indomethacin and surgery in the rabbit. **Acta Orthop. Scand.**, v. 224, p. 1-75, 1987. Suppl.

CARMONA, L.; BALLINA, J.; GABRIEL, R.; LAFFON, A.; EPISER Study Group. The burden of musculoskeletal diseases in the general population of Spain: results from a national survey. **Ann. Rheum. Dis.**, v. 60, n. 11, p. 1040-1045, 2001.

CARRINHO, P. M. **Estudo comparativo utilizando lasers de 685nm e 830nm no processo de reparo tecidual em tendões tenotomizados de ratos**. 2004. 143 f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.

CARRINHO, P. M.; RENNO, A. C.; KOEKE, P.; SALATE, A. C.; PARIZOTTO, N. A.; VIDAL, B. C. Comparative study using 685-nm and 830-nm lasers in the tissue repair of tenotomized tendons in the mouse. **Photomed. Laser Surg.**, v. 24, n. 6, p. 754-758, 2006.

CHAN, B. P.; CHAN, K. M.; MAFFULLI, N.; WEBB, S.; LEE, K. K. Effect of basic fibroblast growth factor. An in vitro study of tendon healing. **Clin. Orthop. Relat. Res.**, n. 342, p. 239-247, 1997.

CHAN, K. M.; FU, S. C. Anti-inflammatory management for tendon injuries - friends or foes? **Sports Med. Arthrosc. Rehabil. Ther. Technol.**, v. 1, n. 1, p. 23, 2009.

CHANSKY, H. A.; IANNOTTI, I. P. The vascularity of the rotator cuff. **Clin Sports Med.**, v. 10, n. 4, p. 807-822, 1991.

CHEN, Y. J.; WANG, C. J.; YANG, K. D.; KUO, Y. R.; HUANG, H. C.; HUANG, Y. T.; SUN, Y. C.; WANG, F. S. Extracorporeal shock waves promote healing of collagenase-induced Achilles tendinitis and increase TGF- β 1 and IGF-I expression. **J. Orthop. Res.**, v. 22, n. 4, p. 854-861, 2004.

CHERRY, N. M.; MEYER, J. D.; CHEN, Y.; HOLT, D. L.; McDONALD, J. C. The reported incidence of work-related musculoskeletal disease in the UK: MOSS 1997-2000. **Occup. Med. (Lond)**, v. 51, n. 7, p. 450-455, 2001.

COHEN, D. B.; KAWAMURA, S.; EHTESHAMI, J. R.; RODEO, S. A. Indomethacin and celecoxib impair rotator cuff tendon-to-bone healing. **Am. J. Sports Med.**, v. 34, n. 3, p. 362-369, 2006.

COOK, J. L.; KHAN, K. M.; PURDAM, C. Achilles tendinopathy. **Manual Therapy**, v. 7, n. 3, p. 121-130, 2002.

CRONSTEIN, B. N.; VAN DE STOUWE, M.; DRUSKA, L.; LEVIN, R. I.; WEISSMANN, G. Nonsteroidal anti-inflammatory agents inhibit stimulated neutrophil adhesion to endothelium: Adenosine dependent and independent mechanisms. **Inflammation**, v. 18, n. 3, p. 323-335, 1994.

CULAV, E. M.; CLARK, C. H.; MERRILEES, M. J. Connective tissues: matrix composition and its relevance to physical therapy. **Phys. Ther.**, v. 79, n. 3, p. 308-319, 1999.

CUMINS, E. J.; ANSON, B. J.; CARR, B. W.; WRIGHT, R. R.; HAUSER, E. D. The structure of the calcaneal (Achilles) tendon in relation to orthopaedic surgery. **Surg. Gynecol. Obst.**, v. 83, p. 107-116, 1946.

CURWIN, S. L. The aetiology and treatment of tendinitis. In: HARRIES, M.; WILLIAMS, C.; STANISH, W. D.; MICHELI, L. J.; eds. **Oxford Textbook of Sports Medicine**. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.

DAHLGREN, L. A.; MOHAMMED, H. O.; NIXON, A. J. Expression of insulin-like growth factor binding proteins in healing tendon lesions. **J. Orthop. Res.**, v. 24, n. 2, p. 183-192, 2006.

DAHLGREN, L. A.; van der MEULEN, M. C.; BERTRAM, J. E.; STARRAK, G. S.; NIXON, A. J. Insulin-like growth factor-I improves cellular and molecular aspects of healing in a collagenase-induced model of flexor tendinitis. **J. Orthop. Res.**, v. 20, n. 5, p. 910-919, 2002.

DEEKS, J. J.; SMITH, L. A.; BRADLEY, M. D. Efficacy, tolerability, and upper gastrointestinal safety of celecoxib for treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic review of randomised controlled trials. **BMJ**, v. 325, n. 7365, p. 619, 2002.

DIAZ-GONZALEZ, F.; GONZALEZ-ALVARO, I.; CAMPANERO, M. R.; MOLLINEDO, F.; DEL POZO, M. A.; MUNOZ, C.; PIVEL, J. P.; SANCHEZ-MADRID, F. Prevention of in vitro neutrophil-endothelial attachment through shedding of L-selectin by nonsteroidal antiinflammatory drugs. **J. Clin. Invest.**, v. 95, n. 4, p. 1756-1765, 1995.

DORAL, M. N.; ALAM, M.; BOZKURT, M.; TURHAN, E.; ATAY, O. A.; DÖNMEZ, G.; MAFFULLI, N. Functional anatomy of the Achilles tendon. **Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc.**, v. 18, n. 5, p. 638-643, 2010.

el HAWARY, R.; STANISH, W. D.; CURWIN, S. L. Rehabilitation of tendon injuries in sport. **Sports Med.**, v. 24, n. 5, p. 347-358, 1997.

ELDER, C. L.; DAHNERS, L. E.; WEINHOLD, P. S. A cyclooxygenase-2 inhibitor impairs ligament healing in the rat. **Am. J. Sports Med.**, v. 29, n. 6, p. 801-805, 2001.

ELLIOTT, D. H. Structure and function of mammalian tendon. **Biol. Rev.**, v. 40, p. 392-421, 1965.

ELWAKIL, T. F. An in-vivo experimental evaluation of He-Ne laser photostimulation in healing Achilles tendons. **Lasers Med. Sci.**, v. 22, n. 1, p. 53-59, 2007.

EMMANOULIDIS, O.; DIAMANTOPOULOS, C. IR Low-Power Laser Application Significantly Accelerates Chronic Pain Relief Rehabilitation of Professional Athletes - A Double Blind Study. **Lasers Surg. Med.**, v. 6, p. 173, 1986.

ENWEMEKA, C. S.; PARKER, J. C.; DOWDY, D. S.; HARKNESS, E. E.; SANFORD, L. E.; WOODRUFF, L. D. The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study. **Photomed. Laser Surg.**, v. 22, n. 4, p. 323-329, 2004.

ENWEMEKA, C. S.; RODRIGUEZ, O.; GALL, N. G.; WALSH, N. E. Morphometric of collagen fibril population in He-Ne laser photostimulated tendons. **J. Clin. Laser Med. Surg.**, v. 8, p. 151-156, 1990.

FELSON, D. T.; LAWRENCE, R. C.; DIEPPE, P. A.; HIRSCH, R.; HELMICK, C. G.; JORDAN, J. M.; KINGTON, R. S.; LANE, N. E.; NEVITT, M. C.; ZHANG, Y.; SOWERS, M.; MCALINDON, T.; SPECTOR, T. D.; POOLE, A. R.; YANOVSKI, S. Z.; ATESHIAN, G.; SHARMA, L.; BUCKWALTER, J. A.; BRANDT, K. D.; FRIES, J. F. Osteoarthritis: new insights. Part 1: the disease and its risk factors. **Ann. Intern. Med.**, v. 133, n. 8, p. 635-646, 2000.

FERRY, S. T.; DAHNERS, L. E.; AFSHARI, H. M.; WEINHOLD, P. S. The effects of common anti-inflammatory drugs on the healing rat patellar tendon. **Am. J. Sports Med.**, v. 35, n. 8, p. 1326-1333, 2007.

FILLIPIN, L. I.; MAURIZ, J. L.; VEDOVELLI, K.; MOREIRA, A. J.; ZETTLER, C. G.; LECH, O.; MARRONI, N. P.; GONZÁLEZ-GALLEGO, J. Low-level laser therapy (LLLT) prevents oxidative stress and reduces fibrosis in rat traumatized Achilles tendon. **Lasers Surg. Med.**, v. 37, n. 4, p. 293-300, 2005.

FISHEL, R. S.; BARBUL, A.; BESCHORNER, W. E.; WASSERKRUG, H. L.; EFRON, G. Lymphocyte participation in wound healing. Morphologic assessment using monoclonal antibodies. **Ann. Surg.**, v. 206, n. 1, p. 25-29, 1987.

FORNAGE, B. D. Achilles tendon: US examination. **Radiology**, v. 159, n. 3, p. 759-764, 2003.

FORSLUND, C.; BYLANDER, B.; ASPENBERG, P. Indomethacin and celecoxib improve tendon healing in rats. **Acta Orthop. Scand.**, v. 74, n. 4, p. 465-469, 2003.

GABEL, G. T. Acute and chronic tendinopathies at the elbow. **Curr. Opin. Rheumatol.**, v. 11, n. 2, p. 138-143, 1999.

GILLITZER, R.; GOEBELER, M. Chemokines in cutaneous wound healing. **J. Leukoc. Biol.**, v. 69, n. 4, p. 513-521, 2001.

GREELEE, T. K.; PIKE, D. Studies of tendon healing in the rat. **Plast. Reconstr. Surg.**, v. 48, n. 3, p. 260-270, 1971.

HART, D. A.; FRANK, C. B.; BRAY, R. C. Inflammatory processes in repetitive motion and overuse syndromes; potential role of neurogenic mechanisms in tendons

and ligaments. In: GORDON, S. L.; BLAIR, S. J.; FINE, L. J. (Ed.) **Repetitive motion disorders of the upper extremity**. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1995. p. 247-262.

HAYWORTH, C. R.; ROJAS, J. C.; PADILLA, E.; HOLMES, G. M.; SHERIDAN, E. C.; GONZALEZ-LIMA, F. In vivo low-level light therapy increases cytochrome oxidase in skeletal muscle. **Photochem. Photobiol.**, v. 86, n. 3, p. 673-680, 2010.

HENSON, P. M.; JOHNSTON, R. B. Tissue injury in inflammation. Oxidants, proteinases, and cationic proteins. **J. Clin. Invest.**, v. 79, n. 3, p. 669-674, 1987.

HESS, G. P.; CAPPIELLO, W. L.; POOLE, R. M.; HUNTER, S. C. Prevention and treatment of overuse tendon injuries. **Sports Med.**, v. 8, n. 6, p. 371-384, 1989.

HONMURA, A.; ISHII, A.; YANASE, M.; OBATA, J.; HARUKI, E. Analgesic effect of Ga-Al-As diode laser irradiation on hyperalgesia in carrageenin-induced inflammation. **Lasers Surg. Med.**, v. 13, n. 4, p. 463-469, 1993.

HSU, R. W.; HSU, W. H.; TAI, C. L.; LEE, K. F. Effect of hyperbaric oxygen therapy on patellar tendinopathy in a rabbit model. **J. Trauma**, v. 57, n. 5, p. 1060-1064, 2004.

HYMAN, J.; RODEO, S. A. Injury and repair of tendons and ligaments. **Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am.**, v. 11, n. 2, p. 267-288, 2000.

JÄRVINEN, T. A.; KANNUS, P.; MAFFULLI, N.; KHAN, K. M. Achilles tendon disorders: etiology and epidemiology. **Foot Ankle Clin.**, v. 10, n. 2, p. 255-266, 2005.

JÄRVINEN, T. A.; KANNUS, P.; PAAVOLA, M.; JÄRVINEN, T. L.; JÓZSA, L.; JÄRVINEN, M. Achilles tendon injuries. **Curr. Opin. Rheumatol.**, v. 13, n. 2, p. 150-155, 2001.

JOHANSSON, K.; ADOLFSSON, L.; FOLDEVI, M. Attitudes toward management of patients with subacromial pain in Swedish primary care. **Fam. Pract.**, v. 16, n. 3, p. 233-237, 1999.

JORDAN, K. M.; SAWYER, S.; COAKLEY, P.; SMITH, H. E.; COOPER, C.; ARDEN, N. K. The use of conventional and complementary treatments for knee osteoarthritis in the community. **Rheumatology (Oxford)**, v. 43, n. 3, p. 381-384, 2004.

JOZSA, L.; KANNUS, P.; BALINT, B. J.; REFFY, A. Three-dimensional ultrastructure of human tendons. **Acta Anat.**, v. 142, n. 4, p. 306-312, 1991.

JOZSA, L.; KANNUS, P. **Human Tendons. Anatomy, Physiology, and Pathology**. Champaign, IL: Human Kinetics, 1997.

JOZSA, L.; LEHTO, M.; KVIST, M.; BALINT, B. J.; REFFY, A. Alterations in dry mass content of collagen fibers in degenerative tendinopathy and tendon rupture. **Matrix**, v. 9, n. 2, p. 140-146, 1989.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. S. F. **Histologia Básica**. 11th ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2008.

KANNUS, P. Structure of the tendon connective tissue. **Scand. J. Med. Sci. Sports**, v. 10, n. 6, p. 312-320, 2000.

KARU, T. Primary and secondary mechanisms of action of visible to near-IR radiation on cells. **J. Photochem. Photobiol.**, v. 49, n. 1, p. 1-17, 1999.

KHAN, K. M.; COOK, J. L. Overuse tendon injuries: where does the pain come from? **Sports Med. Arthrosc. Rev.**, v. 8, n. 1, p. 17-31, 2000.

KHAN, K. M.; COOK, J. L.; TAUNTON, J. E.; BONAR, F. Overuse tendinosis, not tendinitis part 1: a new paradigm for a difficult clinical problem. **Phys. Sportsmed.**, v. 28, n. 5, p. 38-48, 2000.

KIRKENDALL, D. T.; GARRETT, W. E. Function and biomechanics of tendons. **Scand. J. Med. Sci. Sports**, v. 7, n. 2, p. 62-66, 1997.

KJAER, M. Role of extracellular matrix in adaptation of tendon and skeletal muscle to mechanical loading. **Physiol. Rev.**, v. 84, n. 2, p. 649-698, 2004.

KUJALA, U. M.; SARNA, S.; KAPRIO, J. Cumulative incidence of achilles tendon rupture and tendinopathy in male former elite athletes. **Clin. J. Sport. Med.**, v. 15, n. 3, p. 133-135, 2005.

LABAT, R. M. **Efeito do laser de baixa potência (810 nm) na tendinite induzida por colagenase em tendão calcâneo de ratos**. 2010. 112 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

LANGBERG, H.; SKOVGAARD, D.; KARAMOUZIS, M.; BÜLOW, J.; KJAER, M. Metabolism and inflammatory mediators in the peritendinous space measured by microdialysis during intermittent isometric exercise in humans. **J. Physiol.**, v. 515, pt. 3, p. 919-927, 1999.

LEY, K. Molecular mechanisms of leukocyte recruitment in the inflammatory process. **Cardiovasc. Res.**, v. 32, n. 4, p. 733-742, 1996.

LEADBETTER, W. Cell matrix response in tendon injury. **Clin. Sports Med.**, v. 11, n. 3, p. 533-578, 1992.

LIAN, O.; ENGBRETSSEN, L.; BAHR, R. Prevalence of jumper's knee among elite athletes from different sports: a cross-sectional study. **Am. J. Sports Med.**, v. 33, n. 4, p. 561-567, 2005.

LONGO, U. G.; RONGA, M.; MAFFULLI, N. Achilles tendinopathy. **Sports Med. Arthrosc.**, v. 17, n. 2, p. 112-126, 2009.

LUI, P. P. Y.; FU, S. C.; CHAN, L. S.; HUNG, L. K.; CHAN, K. M. Chondrocyte phenotype and ectopic ossification in collagenase-induced tendon degeneration. **J. Histochem. Cytochem.**, v. 57, n. 2, p. 91-100, 2009.

LUI, P. P.; MAFFULLI, N.; ROLF, C.; SMITH, R. K. What are the validated animal models for tendinopathy? **Scand. J. Med. Sci. Sports**, v. 21, n. 1, p. 3-17, 2011.

MAFFULLI, N. Rupture of the Achilles tendon. **J. Bone Joint. Surg. Am.**, v. 81, n. 7, p. 1019-1036, 1999.

MAFFULLI, N.; BARRASS, V.; EWEN, S. W. Light microscopic histology of achilles tendon ruptures. A comparison with unruptured tendons. **Am. J. Sports Med.**, v. 28, n. 6, p. 857-863, 2000.

MAFFULLI, N.; BENAZZO, F. Basic sciences of tendons. **Sports Med. Arthrosc. Rev.**, v. 8, n. 1, p. 1-5, 2000.

MAFFULLI, N.; KADER, D. Tendinopathy of tendo Achillis. **J. Bone. Joint. Surg.**, v. 84, n. 1, p. 1-8, 2002.

MAFFULLI, N.; KHAN, K. M.; PUDDU, G. Overuse tendon conditions: time to change a confusing terminology. **Arthroscopy**, v. 14, n. 8, p. 840-843, 1998.

MAFFULLI, N.; SHARMA, P.; LUSCOMBE, K. L. Achilles tendinopathy: aetiology and management. **J. R. Soc. Med.**, v. 97, n. 10, p. 472-476, 2004.

MAGNUSSON, S. P.; HANSEN, P.; AAGAARD, P.; BRØND, J.; DYHRE-POULSEN, P.; BOJSEN-MOLLER, J.; KJAER, M. Differential strain patterns of the human gastrocnemius aponeurosis and free tendon, in vivo. **Acta Physiol. Scand.**, v. 177, n. 2, p. 185-195, 2003.

MAGRA, M.; MAFFULLI, N. Genetic aspects of tendinopathy. **J. Sci. Med. Sport.**, v. 11, n. 3, p. 243-247, 2008.

MAHIEU, N. N.; WITVROUW, E.; STEVENS, V.; VAN TIGGELEN, D.; ROGET, P. Intrinsic risk factors for the development of achilles tendon overuse injury: a prospective study. **Am. J. Sports Med.**, v. 34, n. 2, p. 226-235, 2006.

MARSOLAIS, D.; COTE, C. H.; FRENETTE, J. Neutrophils and macrophages accumulate sequentially following Achilles tendon injury. **J. Orthop. Res.**, v. 19, n. 6, p. 1203-1209, 2001.

MARSOLAIS, D.; COTE, C. H.; FRENETTE, J. Nonsteroidal anti-inflammatory drug reduces neutrophil and macrophage accumulation but does not improve tendon regeneration. **Lab. Invest.**, v. 83, n. 7, p. 991-999, 2003.

MÄNTYSELKÄ, P.; KUMPUSALO, E.; AHONEN, R.; KUMPUSALO, A.; KAUHANEN, J.; VIINAMÄKI, H.; HALONEN, P.; TAKALA, J. Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care. **Pain**, v. 89, n. 2-3, p. 175-180, 2001.

MCGARVEY, W. C.; SINGH, D.; TREVINO, S. G. Partial Achilles tendon ruptures associated with fluoroquinolone antibiotics: a case report and literature review. **Foot Ankle Int.**, v. 17, n. 8, p. 496-498, 1996.

MURAMATSU, T.; MURAOKA, T.; TAKESHITA, D.; KAWAKAMI, Y.; HIRANO, Y.; FUKUNAGA, T. Mechanical properties of tendon and aponeurosis of human gastrocnemius muscle in vivo. **J. Appl. Physiol.**, v. 90, n. 5, p. 1671-1678, 2001.

O'BRIEN, M. Functional anatomy and physiology of tendons. **Clin. Sports Med.**, v. 11, n. 3, p. 505-520, 1992.

O'BRIEN, M. Structure and metabolism of tendons. **Scand. J. Med. Sci. Sports**, v. 7, n. 2, p. 55-61, 1997.

OBREMSKY, W. T.; SEABER, A. V.; RIBBECK, B. M.; GARRETT, W. E. Biomechanical and histologic assessment of a controlled muscle strain injury treated with piroxicam. **Am. J. Sports**, v. 22, n. 4, p. 558-561, 1994.

OLIVEIRA, F. S.; PINFILDI, C. E.; PARIZOTO, N. A.; LIEBANO, R. E.; BOSSINI, P. S.; GARCIA, E. B.; FERREIRA, L. M. Effect of low level laser therapy (830 nm) with different therapy regimes on the process of tissue repair in partial lesion calcaneus tendon. **Lasers Surg. Med.**, v. 41, n. 4, p. 271-276, 2009.

OZKAN, N.; ALTAN, L.; BINGOL, U.; AKLN, S.; YURTKURAN, M. Investigation of the supplementary effect of GaAs laser therapy on the rehabilitation of human digital flexor tendons. **J. Clin. Laser Med. Surg.**, v. 22, n. 2, p. 105-110, 2004.

PAAVOLA, M.; KANNUS, P.; JÄRVINEN, T. A.; KHAN, K.; JÓZSA, L.; JÄRVINEN, M. Achilles tendinopathy. **J. Bone. Joint. Surg. Am.**, v. 84-A, n. 11, p. 2062-2076, 2002.

PAAVOLA, M.; KANNUS, P.; PAAKKALA, T.; PASANEN, M.; JÄRVINEN, M. Long-term prognosis of patients with achilles tendinopathy. An observational 8-year follow-up study. **Am. J. Sports Med.**, v. 28, n. 5, p. 634-642, 2000.

PALMGREN, M. S.; DESHAZO, R. D.; CARTER, R. M.; ZIMNY, M. L.; SHAH, S. V. Mechanisms of neutrophil damage to human alveolar extracellular matrix: the role of serine and metallo-proteases. **J. Allergy. Clin. Immunol.**, v. 89, n. 4, p. 905-915, 1992.

PEREIRA, A. N.; EDUARDO, C. D. E. P.; MATSON, E.; MARQUES, M. M. Effect of low-power laser irradiation on cell growth and procollagen synthesis of cultured fibroblasts. **Lasers Surg. Med.**, v. 31, n. 4, p. 263-267, 2002.

PILIGIAN, G.; HERBERT, R.; HEARNS, M.; DROPKIN, J.; LANDSBERGIS, P.; CHERNIACK, M. Evaluation and management of chronic work-related musculoskeletal disorders of the distal upper extremity. **Am. J. Ind. Med.**, v. 37, n. 1, p. 75-93, 2000.

PUDDU, G.; IPPOLITO, E.; POSTACCHINI, F. A classification of Achilles tendon disease. **Am. J. Sports Med.**, v. 4, n. 4, p. 145-150, 1976.

RÁKOS, G.; KIS, Z.; NAGY, D.; LÜR, G.; FARKAS, T.; HORTOBÁGYI, T.; VÉCSEI, L.; TOLDI, J. Evans Blue fluorescence permits the rapid visualization of non-intact cells in the perilesional rim of cold-injured rat brain. **Acta Neurobiol. Exp. (Wars)**, v. 67, n. 2, p. 149-154, 2007.

REDDY, G. K.; STEHNO-BITTEL, L.; ENWEMEKA, C. S. Laser photostimulation of collagen production in healing rabbit achilles tendon. **Lasers Surg. Med.**, v. 22, n. 5, p. 281-287, 1998.

REES, J. D.; MAFFULLI, N.; COOK, J. Management of tendinopathy. **Am. J. Sports Med.**, v. 37, n. 9, p. 1855-1867, 2009.

REES, J. D.; WILSON, A. M.; WOLMAN, R. L. Current concepts in the management of tendon disorders. **Rheumatology (Oxford)**, v. 45, n. 5, p. 508-521, 2006.

ROJAS, J. C.; LEE, J.; JOHN, J. M.; GONZALEZ-LIMA, F. Neuroprotective effects of near-infrared light in an in vivo model of mitochondrial optic neuropathy. **J. Neurosci.**, v. 28, n. 50, p. 13511-13521, 2008.

ROLF, C.; MOVIN, T. Etiology, histopathology, and outcome of surgery in achillodynia. **Foot Ankle Int.**, v. 18, n. 9, p. 565-569, 1997.

ROMPE, J. D.; FURIA, J. P.; MAFFULLI, N. Mid-portion Achilles tendinopathy - current options for treatment. **Disabil. Rehabil.**, v. 30, n. 20-22, p. 1666-1676, 2008.

SAKURAI, Y.; YAMAGUCHI, M.; ABIKO, Y. Inhibitory effect of low-level laser irradiation on LPS-stimulated prostaglandin E2 production and cyclooxygenase-2 in human gingival fibroblasts. **Eur. J. Oral. Sci.**, v. 108, n. 1, p. 29-34, 2000.

SCHEPSIS, A. A.; JONES, H.; HAAS, A. L. Achilles tendon disorders in athletes. **Am. J. Sports Med.**, v. 30, n. 2, p. 287-305, 2002.

SHARMA, P.; MAFFULLI, N. Basic biology of tendon injury and healing. **Surgeon.**, v. 3, n. 5, p. 309-316, 2005a.

SHARMA, P.; MAFFULLI, N. The future: rehabilitation, gene therapy, optimization of healing. **Foot Ankle Clin.**, v. 10, n. 2, p. 383-397, 2005b.

STERGIOULAS, A.; STERGIOULAS, M.; AARSKOG, R.; LOPES-MARTINS, R. A. B.; BJORDAL, J. M. Effects of Low Level Laser Therapy and Eccentric Exercises in the Treatment of Recreational Athletes with Chronic Achilles Tendinopathy. **Am. J. Sports Med.**, v. 36, n. 5, p. 881-887, 2008.

TATARI, H.; KOSAY, C.; BARAN, O.; OZCAN, O.; OZER, E. Deleterious effects of local corticosteroid injections on the Achilles tendon of rats. **Arch. Orthop. Trauma Surg.**, v. 121, n. 6, p. 333-337, 2001.

TIPTON, C. M.; MATTHES, R. D.; MAYNARD, J. A.; CAREY, R. A. The influence of physical activity on ligaments and tendons. **Med. Sci. Sports Exerc.**, v. 7, n. 3, p. 165-175, 1975.

THOMAS, J.; TAYLOR, D.; CROWELL, R.; ASSOR, D. The effect of indomethacin on Achilles tendon healing in rabbits. **Clin. Orthop.**, n. 272, p. 308-311, 1991.

TSAI, W. C.; TANG, F. T.; WONG, M. K.; YEN, H. C.; PANG, J. H. Decreased expression of proliferating cell nuclear antigen is associated with dexamethasone inhibition of the proliferation of rat tendon fibroblasts. **J. Rheumatol.**, v. 29, n. 11, p. 2397-2401, 2002.

TUMILTY, S.; MUNN, J.; ABBOTT, J. H.; MCDONOUGH, S.; HURLEY, D. A.; BAXTER, G. D. Laser Therapy in the Treatment of Achilles Tendinopathy: A Pilot Study. **Photomed. Laser. Surg.**, v. 26, n. 1, p. 25-30, 2008.

TUMILTY, S.; MUNN, J.; MCDONOUGH, S.; HURLEY, D. A.; BASFORD, J. R.; BAXTER, G. D. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. **Photomed. Laser. Surg.**, v. 28, n. 1, p. 3-16, 2010.

van der LINDEN, P. D.; STURKENBOOM, M. C.; HERINGS, R. M.; LEUFKENS, H. M.; ROWLANDS, S.; STRICKER, B. H. Increased risk of Achilles tendon rupture with quinolone antibacterial use, especially in elderly patients taking oral corticosteroids. **Arch. Intern. Med.**, v. 163, n. 15, 1801-1807, 2003.

VANE, J. R. Introduction: Mechanism of action of NSAIDs. **Br. J. Rheumatol.**, v. 35, p. 1-3, 1996. Suppl 1.

VIDAL, B. C. Image analysis of tendon helical superstructure using interference and polarized light microscopy. **Micron**, v. 34, n. 8, p. 423-432, 2003.

VIDAL, B. C. Métodos em Biologia Celular. In: VIDAL, B. C.; MELLO, M. L. S. **Biologia Celular**. Rio de Janeiro: Atheneu, 1987. cap. 2, p. 5-40.

VIDAL, B. C.; MELLO, M. L. S.; GODO, C.; CASEIRO, A. C.; ABUJADI, J. M. Anisotropic properties of silver plus food - impregnated collagen bundles ADB and form birefringence curves. **Ann. Histochem.**, v. 20, p. 15-26, 1975.

VIRCHENKO, O.; SKOGLUND, B.; ASPENBERG, P. Parecoxib Impairs early tendon repair but improves later remodeling. **Am. J. Sports. Med.**, v. 32, n. 7, p. 1743-1747, 2004.

VOGEL, H. G. Mechanical and chemical properties of various connective tissue organs in rats as influenced by non-steroidal antirheumatic drugs. **Connect. Tissue Res.**, v. 5, n. 2, p. 91-95, 1977.

WEILER, J. M. Medical modifiers of sports injury. The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in sports soft-tissue injury. **Clin. Sports. Med.**, v. 11, n. 3, p. 625-644, 1992.

WONG-RILEY, M. T.; BAI, X.; BUCHMANN, E.; WHELAN, H. T. Light-emitting diode treatment reverses the effect of TTX on cytochrome oxidase in neurons. **Neuroreport.**, v. 12, n. 14, p. 3033-3037, 2001.

WONG, M. W. N.; TANG, Y. N.; FU, S. C.; LEE, K. M.; CHAN, K. M. Triamcinolone Suppresses Human Tenocyte Cellular Activity and Collagen Synthesis. **Clin. Orthop. Rel. Res.**, n. 421, p. 277-281, 2004.

WONG, M. W.; TANG, Y. Y.; LEE, S. K.; FU, B. S. Glucocorticoids suppress proteoglycanproduction by human tenocytes. **Acta. Orthop.**, v. 76, n. 6, p. 927-931, 2005.

WOOD, V. T.; PINFILDI, C. E.; NEVES, M. A.; PARIZOTO, N. A.; HOCHMAN, B.; FERREIRA, L. M. Collagen changes and realignment induced by low-level laser therapy and low-intensity ultrasound in the calcaneal tendon. **Lasers Surg. Med.**, v. 42, n. 6, p. 559-565, 2010.

YU, W.; NAIM, J. O.; MCGOWAN, M.; IPPOLITO, K.; LANZAFAME, R. J. Photomodulation of oxidative metabolism and electron chain enzymes in rat liver mitochondria. **Photochem. Photobiol.**, v. 66, n. 6, p. 866-871, 1997.

ZAFAR, M. S.; MAHMOOD, A.; MAFFULLI, N. Basic science and clinical aspects of achilles tendinopathy. **Sports. Med. Arthrosc.**, v. 17, n. 3, p. 190-197, 2009.