CONTEM 08 MAPAS

MOYSÉS GONSALEZ TESSLER

SEDIMENTAÇÃO ATUAL NA REGIÃO LAGUNAR DE
CANANÉIAS - IGUAPE, ESTADO DE SÃO PAULO.

TEXTO
ILUSTRAÇÕES E TABELAS
MAPAS

Tese de Mestrado apresentada ao Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.

SÃO PAULO
1982

MAPA DA REGIÃO LAGUNAR DE CANANÉIA-IGUAPE.

CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL DOS SEDIMENTOS DE FUNDO - SEGUNDO SHEPARD (1954).
ESCALA APROXIMADA 1:80.000

CONVENÇÃO

AREIA	ARGILA SÍLTICA
AREIA SILTOSA	AREIA SÍLTICO-ARGILOSA
AREIA ARGILOSA	ARGILA SÍLTICO-ARENOSA
SILTE ARGILOSO	SILTE ARENOSO
SILTE ARGILO ARENOSO	ARGILA ARENOSA

MAPA ②

FONTE:

- * MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL IBGE SUPERINTENDÊNCIA DE CARTOGRAFIA
- ** MINISTÉRIO DO EXÉRCITO DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
- *** GOVERNO DO ESTADO DE S. PAULO SECRETARIA DE OBRAS E DO MEIO AMBIENTE DAAE / FAPESP

LEGENDA

- MANGUE
- PÂNTANO

MOYSES G. TESSLER

MAPA DA REGIÃO LAGUNAR DE CANANÉIA-IGUAPE

DISTRIBUIÇÃO DA FRAÇÃO PELÍTICA

ESCALA APROXIMADA 1:80 000

CONVENÇÃO			
	< 10%		50% a 70%
	10% a 30%		70% a 90%
	30% a 50%		> 90%

1981

MAPA ③

MAPA ⑧