UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS - Acervo - IGC

30900005900

SISTEMAS DEPOSICIONAIS E EVOLUÇÃO TECTONO-
SEDIMENTAR DA BACIA DE TAUBATÉ, SP.

Juracy Bento de Oliveira Vespucci

Orientador: Prof. Dr. Kenitiro Suguio

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

COMISSÃO EXAMINADORA

	nome
Presidente:	Dr. K. Suguio
Examinadores:	Dr. S. Petri
	Dr. V. J. Fulfaro

ass.

São Paulo
1984

À minha Mãe Juracy
e aos meus pais de coração
Cezar, Nair e Celina,
grandes responsáveis
pela realização deste trabalho.

ÍNDICE

RESUMO	i
--------------	---

ABSTRACT	ii
----------------	----

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO	1
1.1. ÁREA DE ESTUDO	2
1.2. TRAÇOS FISIOGRAFICOS E CLIMÁTICOS	2
1.3. AGRADECIMENTOS	5

CAPÍTULO II

GEOLOGIA GERAL	8
2.1. ESTRATIGRAFIA	8
2.2. IDADE	10
2.3. ARCABOUÇO TECTÔNICO	12

CAPÍTULO III

TRABALHOS DE CAMPO	14
3.1. SEÇÕES COLUNARES	14
3.1.1. Seção colunar SCN-1	15
3.1.2. Seção Colunar SCN-2	19
3.1.3. Seção Colunar SCN-3	23
3.1.4. Seção Colunar SCN-4	26
3.1.5. Seção Colunar SCN-5	28
3.1.6. Seção Colunar SCN-6	30
3.1.7. Seção Colunar SCN-7	32
3.1.8. Seção Colunar SCN-8	32
3.1.9. Seção Colunar SCN-9	34
3.1.10. Seção Colunar SCN-10	34

3.2. PERFIS ESQUEMÁTICOS	38
3.2.1. Perfil Esquemático PE-1	39
3.2.2. Perfil Esquemático PE-2	41
3.2.3. Perfil Esquemático PE-3	45
3.2.4. Perfil Esquemático PE-4	47
3.2.5. Perfil Esquemático PE-5	49
3.2.6. Perfil Esquemático PE-6	49
3.2.7. Perfil Esquemático PE-7	52
3.2.8. Perfil Esquemático PE-8	54
3.3. AMOSTRAGEM DOS SEDIMENTOS	54

CAPÍTULO IV

SISTEMAS DEPOSICIONAIS	60
4.1. O CONCEITO DE SISTEMA DEPOSICIONAL	60
4.2. SISTEMÁTICA DE INTERPRETAÇÃO	61
4.3. SISTEMAS LEQUES ALUVIAIS JACAREÍ E QUIRIRIM ...	62
4.4. SISTEMA FLUVIAL ENTRELAÇADO (BRAIDED) JACAREÍ .	65
4.5. SISTEMA FLUVIAL MEANDRANTE CAÇAPAVA	66
4.6. SISTEMA LACUSTRE TREMEMBÉ	67

CAPÍTULO V

ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS	70
5.1. FINALIDADES E MÉTODO	70
5.2. CARACTERIZAÇÃO TEXTURAL DOS SEDIMENTOS	73
5.2.1. Parâmetros estatísticos das distribui- ções	73
5.2.2. Análise de frequência dos parâmetros es- tatísticos	74
5.2.2.1. Fácies de leques aluviais	74
5.2.2.2. Fácies fluviais	82
5.2.2.3. Fácies turbidíticas	82
5.2.2.4. Conclusões gerais	83
5.3. DIAGRAMA DE SAHU	84

CAPÍTULO VI

MODELO DE EVOLUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR	86
---	----

CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES	88
------------------	----

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91
----------------------------------	----

RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de integrar os conhecimentos acerca do preenchimento sedimentar terciário da Bacia de Taubaté com aqueles sobre o seu arcabouço tectônico, já bem conhecidos e dispersos em volumosa bibliografia.

Utilizou-se o conceito de sistema deposicional como método de análise para esta bacia. Foram identificados cinco sistemas deposicionais interrelacionados, designados informalmente com termos geográficos da região mais representativa: Sistema Leque Aluvial Jacareí, Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí, Sistema Fluvial Meandrante Caçapava, Sistema Leque Aluvial Quiririm e Sistema Lacustre Tremembé.

Com base nestes sistemas deposicionais e nos conhecimentos estruturais prévios, elaborou-se um modelo de evolução tectono-sedimentar para a Bacia de Taubaté.

Durante a realização dos trabalhos de campo foram, pela primeira vez, identificados e descritos aluviões antigos do Rio Paraíba do Sul, além de fácies turbidíticas lacustres, que permitiram esclarecer o significado real das intercalações arenosas no espesso pacote pelítico da Formação Tremembé.

ABSTRACT

This dissertation integrates knowledge on the tertiary sedimentary filling and tectonic framework of the Taubaté Basin, eastern São Paulo, Brazil. To this end, the concept of depositional system have been used, and five interrelated depositional systems have been identified. These are designated here informally as the Jacareí Alluvial Fan System, Jacareí Braided Fluvial System, Caçapava Meandering Fluvial System, Quiririm Alluvial Fan System, and Tremembé Lacustrine System. These strictly continental systems, together with available structural data, serve as the basis for a model of tectono-sedimentary evolution of the Taubaté Basin.

During field work, ancient alluvial deposits of the Rio Paraíba do Sul and turbiditic facies within the Tremembé Lacustrine System were identified for the first time in the basin. The latter were very important in interpreting the sandy intercalations within the predominantly pelitic Tremembé Formation.

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

A Bacia de Taubaté é uma importante bacia continental cenozóica do sudeste brasileiro, que tem sido objeto de estudo de vários autores devido às suas características geológicas e estruturais peculiares, abundante e diversificado conteúdo fossilífero, presença de alguns recursos minerais e sua localização no eixo São Paulo - Rio, que abriga um complexo industrial e populacional em crescente expansão.

Desde os trabalhos pioneiros de PISSIS (1842) e DERBY (1895), acumulou-se acervo bibliográfico considerável versando sobre a origem da depressão, a tectônica regional, os sedimentos, os ambientes de deposição, a paleontologia e a idade, a topografia do embasamento, a geomorfologia, a hidrogeologia e o aproveitamento de folhelhos pirobetuminosos, turfas e argilas bentoníticas.

O trabalho de HASUI *et al.* (1978) introduziu um considerável avanço no entendimento do arcabouço tectônico da Bacia de Taubaté, estabelecendo uma certa defasagem em relação ao que se conhece da natureza do seu preenchimento sedimentar.

Assim sendo, dando continuidade aos estudos de SUGUIO (1969), reestudou-se o problema em confronto com os novos conhecimentos estruturais, objetivando uma melhor compreensão das relações entre a tectônica e a sedimentação no preenchimento desta bacia.

Com base em análises de afloramentos e uti-

lizando-se o conceito de sistemas deposicionais foi elaborado um modelo de evolução tectono-sedimentar para a bacia.

1.1. ÁREA DE ESTUDO

A Bacia de Taubaté, objeto do presente estudo, situa-se no nordeste da capital paulista, tendo como extremos as cidades de Jacareí e Cruzeiro (Figura 1). Tem 170 km de comprimento, largura variável entre 10 e 20 km e ocupa uma área de aproximadamente 2400 km². Encontra-se embutida no complexo cristalino pré-cambriano entre a Serra da Mantiqueira, a norte, e o Planalto da Bocaina, a sul; e entre as serranias das regiões de Arujá, a oeste, e de Queluz, a leste.

Os principais acessos da área são a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a Estrada de Ferro Central do Brasil (RFFSA) e as vias transversais que, do Vale do Paraíba, demandam Campinas, Caraguatatuba, Ubatuba, Campos do Jordão, Cunha, Itajubá, Passa Quatro e São José do Barreiro.

1.2. TRAÇOS FISIOGRAFICOS E CLIMÁTICOS

A Bacia de Taubaté faz parte da área das Colinas Sedimentares, subzona do Médio Vale do Paraíba, zona do Planalto Atlântico, uma província geomorfológica situada na região leste do Estado de São Paulo (ALMEIDA, 1964, e PONÇANO *et al.*, 1981).

A bacia é, em sua maior parte, emoldurada pela subzona Morros Cristalinos, com altitude média de 700 m, que representa o relevo de transição da bacia para o Planalto da Bo-

caina (denominação local da Serra do Mar) e para a Serra da Mantiqueira.

O Rio Paraíba do Sul entra na bacia na região de Jacareí e apresenta marcada tendência a se encostar na sua borda norte até a região de Pindamonhangaba, fato apontado por SUGUIO (1969) como prova de adernamento do embasamento para NW. Entre Pindamonhangaba e Cruzeiro, a tendência se inverte e o rio passa a flanquear a borda sul da bacia.

O curso do Rio Paraíba do Sul é meandrante, em meio a áreas alagadiças, com uma planície de inundação de largura variável entre 2,5 a 4 km (PONÇANO *et al.*, *op cit*). Bordenhando descontinuamente as várzeas dispõem-se terraços modernos, 3 a 8 m acima do nível da planície de inundação, que são comumente mantidos por cascalhos e areias.

As colinas sedimentares são, em geral, amplas, de encostas suavemente inclinadas e de topo chato, com altitudes variáveis de 560 a 600m.

AB'SABER & BERNARDES (1958) distinguiram três domínios de formas de relevo na Bacia de Taubaté: o primeiro se estende da extremidade sudoeste da bacia (km 187 da Rodovia Presidente Dutra) até Jacareí, com as mais elevadas colinas sedimentares que, se não fossem os cortes da rodovia, seria impossível distingui-las das elevações do cristalino; o segundo, desde pouco antes de São José dos Campos até Pindamonhangaba, com colinas mais extensas e suaves, cujos altos correspondem a um platô que caracterizaria, segundo estes autores, o nível superior de sedimentação da área (Foto 1); e o último, situado entre Pindamonhangaba e Cruzeiro, com colinas muito suavizadas e de pequena amplitude topográfica, dando um aspecto de tabuleiros.

O clima atual do Médio Vale do Paraíba é do tipo C_{wa} (mesotérmico com inverno seco e verão quente), com tem-

FOTO 1 - Colinas sedimentares da região de Jacareí (em primeiro plano) contrastando com o platô da região de São José dos Campos (ao fundo).

peratura média anual de 20°C e pluviosidade anual entre 1200 e 1300 mm (PONÇANO *et al.*, *op cit*).

Os campos e os cerrados constituíam a vegetação original nos domínios da Bacia de Taubaté. Nas planícies aluviais predominam hoje as culturas, principalmente hortifruticultura, arroz e pastagens.

1.3. AGRADECIMENTOS

A autora deseja expressar os mais sinceros agradecimentos e reconhecimento às seguintes entidades e pessoas:

- Professor Doutor Kenitiro Suguio, pela amizade, estímulo, treinamento profissional e incansável orientação científica.

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo auxílio de pesquisa de campo (Processo nº 40.3521/82-GC).

- Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, pelas excelentes condições de trabalho, em especial aos Professores Murilo Rodolfo de Lima, Paulo Roberto dos Santos, Ronaldo Gama de Carvalho e José Roberto Canuto, pelas discussões e incentivos diários e à Sra. Elaine Aparecida da Silva Sinfrônio, funcionária do laboratório de sedimentologia, pela colaboração nas análises granulométricas.

- Professor Doutor José Humberto Barcelos pelo apoio e auxílio nos cálculos granulométricos.

- Geóloga Marcia Maria Nogueira Pressinotti, por parte das análises granulométricas.

- Sra. Rosi Carvalho Lemos, pela amizade e trabalhos de datilografia.

- Colega e amigo Henrique Izumi, pela paciência e capricho no acabamento dos desenhos.

- Sr. Nilo Cottini e família, pelo apoio na impressão dos desenhos.

- Colegas do curso de Pós - Graduação, pelo salutar convívio, em especial às amigas Ana Maria Castillo Clerici, por ter estado ao lado da autora nas boas e nas más horas, sempre com palavras de incentivo e carinho, e Maria Cristina Toledo Groke, pelo apoio, calor humano e estímulo.

- Familiares e amigos, em especial às tias Zizi, Léo e Alice pelo apoio moral e financeiro, sem os quais este trabalho jamais teria sido concluído.

- Sra. Juracy Bento de Oliveira, Mãe, pelo amor e estímulo infinitos que dedica à autora, tendo como única recompensa as muitas horas de sono que lhe foram roubadas.

- Renato Monteiro de Barros, irmão querido,
in memorian.

CAPÍTULO II

GEOLOGIA GERAL

2.1. ESTRATIGRAFIA

A Bacia de Taubaté foi descoberta por PIS-SIS (1842), que mencionou a existência de sedimentos pliocênicos no Vale do Paraíba, mais tarde descritos e mapeados por DERBY (1895).

FLORENCE & PACHECO (1929) foram os primeiros a denominar de Taubaté os sedimentos terciários do Vale do Paraíba.

Em 1930 WASHBURNE já reconhecia a existência de dois pacotes sedimentares na bacia, um inferior de origem lacustre e um superior de origem fluvial, ao referir-se aos *estratos terciários do Paraíba*: "Ela é constituída principalmente de areias inconsolidadas, seixos e argila de origem fluvial. A parte inferior da formação é em sua maior parte argila não consolidada de coloração variegada, com camadas locais de linhito e folhelho petrolífero". Mais adiante, na discussão sobre *falhas*, disse: "O vale, ao sopé da escarpa, está cheio de uma espessura desconhecida de argilas do Terciário Superior, evidentemente depósitos lacustres, capeados por areias grosseiras e seixos". Evidentemente o termo *formação* não foi empregado com o seu significado formal. Mais tarde, MORAES REGO (1937-41) chamou o pacote inferior de *camadas do Paraíba*, as quais passariam gradualmente para as *camadas de São Paulo*, que se estenderiam até São Paulo.

ALMEIDA (1955) distinguiu duas formações na

Bacia de Taubaté, separadas por uma discordância: "Verificamos na região de Caçapava, em cortes da via Presidente Dutra, terem em sua base, as camadas de areia e argila correlacionáveis às de São Paulo, seixos rolados de folhelho piro-oleífero que se lhes subpõem. Isso indica uma discordância cronológica equivalente a intervalo de tempo suficiente para que esses sedimentos pelíticos fossem litificados e erodidos. Portanto, no vale do Paraíba há duas formações, a inferior contendo os fósseis, a superior sendo a única correlacionável, a base precária da litologia, às camadas de São Paulo". Praticamente ao mesmo tempo, SETZER (1955, 1956) também distinguiu duas formações na bacia, datando a inferior de terciária e a superior de quaternária, sem maiores discussões geocronológicas. Mais tarde, AB'SABER (1958) propôs para o pacote superior a designação Formação Taubaté, enquanto ALMEIDA (1958) propôs Formação Tremembé para o pacote inferior.

A partir daí, muitos autores (TRICART & SILVA, 1958; MEZZALIRA, 1961-62; FRANGIPANI & PANNUTI, 1965; SUGUIO, 1969; CARNEIRO *et al.*, 1976; HASUI & PONÇANO, 1978; HASUI *et al.*, 1978; RAGONHA, 1982) reconheceram a existência de duas formações na Bacia de Taubaté, mas surgiram controvérsias sobre a sua nomenclatura.

MEZZALIRA (*op cit*) propôs a designação Formação São Paulo para o pacote superior, nome usado pela primeira vez por MORAES REGO (*op cit*), e manteve a denominação Formação Tremembé, conforme proposição de ALMEIDA (1958), para o pacote inferior, reunindo-as em uma série com o nome Série Taubaté (mais corretamente Grupo Taubaté), de acordo com FLORENCE & PACHECO (*op cit*).

Mais tarde, AB'SABER (1969) observou uma discordância no vale do Rio Parateí e em função dela propôs o desmembramento do pacote superior nas formações São José dos Campos e Parateí-do-Meio, as quais, com a Formação Tremembé, comporiam o Grupo Paraíba do Sul. Segundo HASUI & PONÇANO (*op cit*), essa terminologia não ganhou repercussão porque a discordância

presumida poderia ser um diastema e o nome Paraíba do Sul achasse comprometido com o da unidade pré-cambriana.

CARNEIRO *et al.* (*op cit*) sugeriram a substituição da Formação São Paulo por Formação Caçapava baseados em que a Formação São Paulo deveria ser restrita à bacia homônima, já que esta evoluiu independentemente da Bacia de Taubaté, se bem que possam ser parcialmente sincrônicas. HASUI & PONÇANO (*op cit*) concordaram com a idéia de CARNEIRO *et al.* (*op cit*) e propuseram a manutenção do Grupo Taubaté, incluindo as formações Tremembé e Caçapava. Esta nomenclatura ganhou grande aceitação e será adotada no presente trabalho.

2.2. IDADE

Desde o trabalho de PISSIS (1842) verificou-se certa tendência de se atribuir idade terciária aos sedimentos da Bacia de Taubaté.

O rico conteúdo fossilífero da Formação Tremembé (mamíferos, aves, répteis, peixes, crustáceos, moluscos, espongiários, insetos e vegetais) logo despertou o interesse dos pesquisadores preocupados em definir sua idade e paleoambiente deposicional.

Até 1971, a maioria dos estudiosos da sua paleoictiofauna (MORAES REGO, 1932; TRAVASSOS & SANTOS, 1955; PAULA COUTO, 1958; SANTOS, 1970) atribuía idade quaternária ou terciária superior a estes sedimentos. MEZZALIRA & PAULA COUTO (1971) identificaram mamíferos pertencentes à família Leontiniidae, gênero *Leontinia*, concluindo pela idade oligocênica ou, no mínimo, miocênica inferior para a Formação Tremembé. Esse trabalho dividiu as opiniões dos pesquisadores: uma ala passou a concordar com a idade oligocênica, enquanto outra conservou a idéia

de que estes sedimentos teriam sido depositados em tempo bem mais recente.

WICKERT (1974) estudou o conteúdo palinológico de quarenta e seis amostras da Formação Tremembé e concluiu por uma idade terciária inferior ou até cretácea. De acordo com BRITO (1979) a bacia ter-se-ia formado no final do Cretáceo e recebido sedimentos, com ou sem interrupções, durante todo o Terciário, as camadas mais superficiais tendo sido depositadas durante o Pleistoceno ou Holoceno.

ALVARENGA (1982) descreveu uma ave gigantesca (*Physornis brasiliensis* sp. n.) encontrada na argila bentonítica de Tremembé e, embora não tenha entrado em maiores discussões sobre a idade, lembrou que o gênero *Physornis* viveu no Oligoceno Inferior da Patagônia.

Recentemente, LIMA *et al.* (1983) analisaram o conteúdo palinológico de doze amostras da sondagem 42 do Conselho Nacional do Petróleo, descrita detalhadamente por SUGUIO (1969), e obtiveram, para a porção fértil da seção estudada (100 m superiores), idade oligocênica. Contudo, estes autores não descartam a possibilidade de uma idade mais antiga para a porção basal da Formação Tremembé, já que sua espessura nesta região atinge 400 m.

Pelo exposto, pode-se atribuir à Formação Tremembé uma idade mínima oligocênica.

A idade da Formação Caçapava tem gerado muito mais controvérsias. Ela pode ser considerada praticamente afossilífera, pois a única descrição que se conhece é de peixes em precário estado de conservação e sem valor estratigráfico (VICALVI, 1982). Alguns autores acreditam numa discordância erosiva entre as duas formações (CAMPOS, 1952; ALMEIDA, 1952, 1955, 1958, 1964, 1976; TRICART & SILVA, 1958; FRANGIPANI & PANNUTI, 1965; SUGUIO, 1969), enquanto outros são adeptos da continuida-

de entre elas (HASUI & PONÇANO, 1978; HASUI *et al.*, 1978), afirmando que as discordâncias observadas são de caráter local (dias temas). Estas duas versões conduzem a idades muito distintas para a Formação Caçapava: pliocênica, no primeiro caso, e miocênica ou mesmo oligocênica superior, no segundo.

Assim, a questão da idade da Formação Caçapava permanece em aberto.

2.3. ARCABOUÇO TECTÔNICO

A origem tectônica da Bacia de Taubaté foi aventada por WASHBURN (1930) e, na mesma época, MAULL (1930) levantou a possibilidade de se tratar de um *graben*, com falhas conjugadas nas bordas NW e SE.

MORAES REGO (1932) foi o único a discordar da idéia, argumentando que, na ausência de vestígios claros de falhas, talvez fosse preferível considerar o vale tão somente como resultado da erosão.

Posteriormente, todos os autores que consideraram os aspectos tectônicos na gênese dessa bacia aceitaram a origem por falhas (DEFFONTAINES, 1939; DE MARTONE, 1943, 1944; RUELLAN, 1943, 1953; ALMEIDA, 1946, 1964, 1967; RICH, 1953; FREITAS, 1956; TRICART & SILVA, 1958; FRANGIPANI, 1963; FRANGIPANI & PANNUTI, 1965; BJORNBERG *et al.*, 1965; SUGUIO, 1969; CORDANI *et al.*, 1974). Contudo, a identificação precisa das falhas só aconteceu na década de 70, com os trabalhos de CAVALCANTE & KAEFER (1974), CARNEIRO *et al.* (1976), CARNEIRO (1977), HASUI & PONÇANO (1978) e HASUI *et al.* (1978).

Hoje, a grande maioria dos autores é adepta de que a Bacia de Taubaté está implantada num *graben*, que faz par

te do sistema de fossas tectônicas (rifts) continentais que bordejam a Bacia de Santos (ALMEIDA, 1976).

O Graben do Paraíba, como é conhecido, é dirigido para E - NE, por uma distância de 220 km, onde corre o curso médio do Rio Paraíba e possui largura média de 20 km. O desnível entre a base dos sedimentos que preenchem o vale e os picos das Serras da Mantiqueira e Bocaina (denominação local da Serra do Mar) é de 1900 m (ALMEIDA, 1976).

O *graben* é assimétrico, com subsidência mais acentuada junto à Serra da Mantiqueira (borda norte da Bacia de Taubaté), e complexo, com três altos estruturais transversais: O Alto do Rio Putins, que chega a expor o embasamento no vale do Rio Putins, no meio da bacia; o de Caçapava, que também expõe o embasamento a norte da cidade; e o de Aparecida, mais amplo, que parece estar associado ao granito, que foi delimitado nas proximidades de Aparecida do Norte (HASUI & PONÇANO, *op cit*).

As bordas escarpadas que margeiam o Graben do Paraíba são resultado de um sistema de pequenas falhas normais, subparalelas, algumas das quais seriam reativações com rejeitos normais de antigas falhas transcorrentes do Pré-cambriano (HASUI *et al.*, *op cit*).

A Figura 1 mostra o contorno da Bacia de Taubaté e as falhas que o delimitam. Além destas, falhas transversais cortam inclusive os sedimentos mais novos da Formação Caçapava, como será visto no capítulo subsequente.

Cabe ainda ressaltar que a borda sul da bacia é essencialmente erosiva e do tipo transgressivo, enquanto a do norte é caracterizada por falhas normais (HASUI, GIMENEZ & MELO, 1978).

CAPÍTULO III

TRABALHOS DE CAMPO

Os trabalhos de campo compreenderam levantamentos de seções colunares e perfis esquemáticos, amostragem de sedimentos e observações geológicas gerais, onde se procurou dar ênfase à tectônica, fácies sedimentares e suas interrelações, ambientes e processos deposicionais.

Para a realização deste estudo foram despendidos vinte dias de campo.

3.1. SEÇÕES COLUNARES

Foram levantadas dez seções colunares em superfície, principalmente em cortes de rodovias, sendo seis em afloramentos da Formação Capaçava, três da Formação Tremembé (mais rara em superfície) e uma em afloramento de aluviões antigos do Rio Paraíba do Sul.

Usou-se um altímetro "Terra" para determinar as altitudes das bases das seções, sempre medidas em relação à estação ferroviária mais próxima da seção em estudo. As espessuras das diversas unidades foram medidas com trena. Procurou-se, sempre que possível, amarrar a localização das seções aos marcos quilométricos das rodovias.

A classificação textural dos sedimentos no campo foi feita com uma escala de Wentworth comparativa, que per

mite confrontar visualmente, com auxílio de uma lupa de mão, o sedimento em questão com as diferentes granulações da fração areia embutidas em um plástico transparente. As cores dos sedimentos foram descritas de acordo com a tabela de cores das rochas (rock color chart) da Sociedade Geológica da América (G.S. A., reimpressão de 1963).

As seções colunares foram levantadas em detalhe, procurando-se caracterizar as variações texturais dentro das camadas, as relações de contato entre as diversas unidades e as estruturas sedimentares presentes, além de situar estratigraficamente as amostras coletadas.

As representações gráficas das seções foram acrescentadas duas colunas, referentes ao mecanismo de transporte predominante e interpretação ambiental, que facilitarão o desenvolvimento do capítulo subsequente, relacionado aos sistemas deposicionais.

3.1.1. SEÇÃO COLUNAR SCN-1

Localização: Rodovia Presidente Dutra, saída 170.

A seção tem aproximadamente 34 m de espessura (Figura 2) de sedimentos pertencentes à Formação Caçapava, em contato brusco e irregular com embasamento gnáissico. A litologia é bastante variável, ocorrendo conglomerados finos, arenitos grossos, médios e finos e lamitos, com leve predominância dos clásticos finos, que perfazem cerca de 60% da seção. É interessante notar a presença de dois intervalos, na base da seção, constituídos de brecha lamítica com fragmentos milimétricos a decimétricos de quartzo, feldspato e raros de afrisa, que aparecem imersos em matriz lamítica, sem contato entre si, sugerindo transporte por movimentos de massa, do tipo fluxo de detritos ou corridas de lama (Foto 2). Bolas de argila (clay balls) aparecem em dois níveis arenosos superpostos a camadas de lamito. Vários

FIGURA 2:

Seção Colunar SCN-1

Rodovia Presidente Dutra, saída 170 (margem direita, rumo Rio de Janeiro)

Altitude da base : 591m

LEGENDA PARA CORES

N9 : branco

10Y6/2: verde-oliva pálido

FOTO 2 - Brecha lamítica contendo fragmentos milimétricos a decimétricos de quartzo, feldspato e raros de afrisita.

níveis apresentam fragmentos angulosos de quartzo e feldspato, a testando, além da imaturidade mineralógica, o curto transporte sofrido pelos sedimentos.

Observam-se sete tipos de estruturas sedimentares: estruturas maciças (conglomeráticas, areníticas e lamíticas); estratificações horizontais incipientes (nas brechas, aonde aparecem níveis com concentrações de fragmentos, e num nível de arenito fino) e evidentes (em lentes de arenito médio a grosso); estratificações gradacionais (nas brechas, por diminuição de tamanho dos fragmentos da base para o topo, e num nível de conglomerado fino, por diminuição de frequência dos seixos da base para o topo); estratificações cruzadas de pequeno porte em arenito médio a grosso; pequenos diques clásticos (injeção?) de material arenoso em lamito; diques clásticos de arenito em lami

to, com arranjo poligonal sugerindo gretas de contração preenchidas (Foto 3); escavação e preenchimento em lamito.

A cor dos sedimentos em toda a seção é 10 Y 6/2 (verde-oliva pálido), com exceção de um nível de arenito de cor branca. ARAI (1982) estudou as relações existentes entre a cor e a potencialidade palinológica dos sedimentos em mais de 200 amostras de várias litologias e idades, provenientes principalmente da Bacia do Paraná. Concluiu que a concentração de amostras férteis é máxima na matiz neutra (N), decrescendo nas matizes com pigmento amarelo (5Y, 10Y e 5GY), e tornando-se quase nula nas matizes com pigmento vermelho (5YR e 10YR). Estes dados levaram a autora a coletar diversas amostras, além daquelas destinadas a granulometria, para estudos palinológicos, já que a matiz 10Y, que caracteriza toda esta seção, é potencialmente fértil. Lamentavelmente, as amostras analisadas mostraram-se completamente estéreis para pólenes e esporos.

FOTO 3 - Diques clásticos de arenito em lamito, com arranjo poligonal sugerindo gretas de contração preenchidas.

3.1.2. SEÇÃO COLUNAR SCN-2

Localização: Rodovia D. Pedro I, a 2,5 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra.

Esta seção (Figura 3) dista 2,5 km da seção anterior em direção à Serra da Mantiqueira e está topograficamente sobreposta a ela. O conteúdo litológico das duas seções é semelhante, e a razão clásticos grossos/clásticos finos é aproximadamente a mesma (2/3).

Aqui, as estruturas sedimentares e as relações de contato entre as camadas diferem um pouco daquelas observadas na seção anterior. Enquanto na seção SCN-1 raramente observam-se contatos bruscos entre as diversas unidades litológicas, na presente seção são comuns camadas de arenito e conglomerado com contato inferior brusco, muitas vezes irregular, com estruturas de sobrecarga (Foto 4) e/ou escavação e preenchimento, marcando o início de ciclos de gradação granulométrica. Além destes ciclos maiores de gradação, aparecem gradações dentro de uma mesma unidade litológica como, por exemplo, camadas de arenito grosso com freqüentes níveis conglomeráticos definindo estratificações cruzadas de pequeno e médio porte com gradações nas camadas frontais (Fotos 5 e 6), e de conglomerado com seixos dispostos em níveis horizontais ou cruzados com freqüentes gradações (Foto 7). Destacam-se ainda estruturas de escorregamento e de *boudinage*.

As cores dos sedimentos são a 10 Y 6/2 (verde-oliva pálido) e 10 Y 8/2 (amarelo esverdeado pálido). É notável a mudança na coloração dos sedimentos da Formação Caçapava quando se vai da região de Jacareí para São José dos Campos. Enquanto em Jacareí predominam os sedimentos esverdeados, alguns quilômetros antes de São José dos Campos esta coloração desaparece completamente para dar lugar a diversas tonalidades de púrpura, vermelho, marrom e laranja. Esta mudança de coloração dos

FOTO 4 - Estruturas de sobrecarga de arenito em lamito.

sedimentos coincide com mudanças na conformação da bacia, que sofre um estrangulamento na região de Jacareí (Figura 1); no percurso do Rio Paraíba, quando entra na bacia, na altura de Jacareí; no padrão de drenagem, essencialmente dendrítico na parte da Bacia de Taubaté situada antes da entrada do Rio Paraíba no vale sedimentar, desde o km 187 da Rodovia Presidente Dutra, em contraste com os percursos mais longos, retilíneos e com poucos afluentes do resto da bacia (SUGUIO, 1969); e no cenário geomorfológico (já discutido no Capítulo 1). Estes dados sugerem, conforme já observou SUGUIO (1969), um levantamento pós-deposicional da área entre o km 187 da Rodovia Presidente Dutra e a cidade de Jacareí; os sedimentos esverdeados de Jacareí representariam, provavelmente, a porção basal da Formação Caçapava. Daí a importância de tentar-se datar palinologicamente estes sedimentos (que são os únicos representantes da Formação Caçapava potencialmente férteis para pólenes e esporos) pois, como foi discutido no

FOTOS 5 e 6 - Estratificações cruzadas com gradações nas camadas frontais em arenito grosso, conglomeratico.

FOTO 7 - Conglomerado com seixos dispostos em níveis horizontais ou cruzados com freqüentes gradações.

capítulo precedente, a idade desta formação é ainda bastante controvertida. Infelizmente, as amostras da presente seção também se mostraram palinologicamente estéreis. Talvez uma amostragem em subsuperfície possa trazer resultados positivos.

Os dois níveis intermediários de solo que a parecem na seção são resultantes da construção de bermas (patamares) quando da abertura da rodovia, não devendo ser confundidos com paleossolos intercalados entre sedimentos não intemperizados.

3.1.3. SEÇÃO COLUNAR SCN-3

Localização: Rodovia SP-123, km 12,8.

É uma seqüência peculiar de sedimentos da

Formação Tremembé, apresentando brechas sedimentares de matriz arenosa e arenitos, intercalados com os siltitos e argilitos esverdeados e acinzentados, típicos desta formação (Figura 4).

As brechas e os arenitos são ricos em estruturas sedimentares, listadas a seguir: estruturas de sobrecarga e gradação normal nas brechas, marcas onduladas com estruturas de chama (flame structures) locais e laminações paralelas (Foto 8).

Os siltitos e argilitos apresentam laminações paralelas, perfurações por organismos (tubos preenchidos) e moldes de ostracodes.

A característica diagnóstica do mecanismo de transporte atuante na deposição destes sedimentos é a seqüência das seguintes estruturas: sobrecarga e gradação normal no

FOTO 8 - Brecha arenosa com estrutura de sobrecarga e gradação normal sobreposta por arenito com marcas onduladas e laminações paralelas e por argilito laminado.

FIGURA 4:

Seção Colunar SCN-3

Rodovia SP-123, km 12,8 (margem direita, rumo Campos do Jordão)

Altitude da base: 562 m

LEGENDA PARA CORES

10R3/4 : marrom avermelhado escuro
 10R4/2 : vermelho acinzentado
 10YR6/6 : laranja amarelado escuro
 10YR8/6 : laranja amarelado pálido
 10Y6/2 : verde-oliva pálido
 10R4/6 : marrom avermelhado moderado
 10R7/4 : rosa alaranjado moderado
 5Y5/2 : cinza-oliva claro

primeiro nível de brecha, laminações paralelas, laminações onduladas e, novamente, laminações paralelas, acompanhadas por decréscimo na granulometria da base para o topo da seqüência, até o início de um novo ciclo com a superposição de um nível de brecha idêntico ao anterior. Tal seqüência de estruturas sedimentares caracteriza a seqüência de BOUMA (1962) e identifica as correntes de turbidez como agentes de transporte e deposição destes sedimentos. Observa-se a superposição de, pelo menos, três seqüências distintas.

O depósito é contínuo e pode ser seguido por algumas centenas de metros.

3.1.4. SEÇÃO COLUNAR SCN-4

Localização: Rodovia Presidente Dutra, km 122,5.

Trata-se de uma seqüência de cerca de 15 m de sedimentos da Formação Caçapava (Figura 5), de litologia variável de arenito muito grosso até argilito, com predominância dos clásticos finos (cerca de 75%). É uma seção pobre em estruturas sedimentares, sobressaindo as camadas maciças. Na base observa-se um nível de arenito grosso com estratificações cruzadas de médio porte, com pelotas de argila (clay galls) acompanhando as camadas frontais, superposto por um nível de arenito médio com estratificações cruzadas incipientes. Ocorrem dois ciclos de gradação granulométrica.

Os sedimentos possuem coloração bastante variada, com tonalidades de laranja, púrpura e marrom. Deve-se ressaltar que as diversas tonalidades de púrpura, vermelho, laranja e marrom na Formação Caçapava são muito provavelmente de origem primária, já que se apresentam homogêneas, seguindo ininterruptamente as camadas, em perfeita concordância com as estruturas sedimentares singenéticas.

FIGURA 5:

Seção Colunar SCN-4

Rodovia Presidente Dutra, km 124,5 (margem direita, rumo Rio de Janeiro)

Altitude da base: 592 m

LEGENDA PARA CORES

- 10R5/4: marrom avermelhado pálido
- 5RP4/2: púrpura vermelho-acinzentado
- 5RP6/2: púrpura avermelhado pálido
- 10YR8/2: laranja muito pálido
- 10YR7/2: laranja acinzentado

3.1.5. SEÇÃO COLUNAR SCN-5

Localização: Argila Virgílio, bairro Estiva, Taubaté.

Neste local são exploradas as argilas esmecíticas da Formação Tremembé, tipicamente verdes e conhecidas comercialmente como bentonitas, muito eficientes como agente tixotrópico para perfuração rotativa de poços, como aglomerante de areias de moldagem para fundição e como impermeabilizante para barragens e canais, dentre outras aplicações.

No estágio atual de exploração, estão expostos 8 m de sedimentos da Formação Tremembé, superpostos por 2 m de sedimentos que se acredita serem aluviões antigos do Rio Paraíba do Sul, dada a grande semelhança com os sedimentos da seção SCN-7 (descrita mais adiante) e a proximidade do leito atual deste rio (Figura 6).

A litologia presente é essencialmente constituída de clásticos muito finos, argilitos e ritmito de lâminas argilosas, ora mais sílticas ora menos sílticas, com intercalações de camadas lenticulares de calcário fino, microcristalino, e de um nível de folhelho pirobetuminoso.

São distinguidos três tipos de estruturas sedimentares: estruturas maciças dos argilitos, laminações do ritmito e do folhelho, e bioturbações constituídas de tubos preenchidos de material arenoso, acompanhando a laminação do folhelho.

As cores presentes são a 5 GY 2/1 (preto esverdeado), 10 Y 6/2 (verde-oliva pálido) e 5 Y 3/2 (cinza-oliva).

Segundo informação verbal do Sr. Herculano Alvarenga, têm sido encontrados freqüentemente neste local restos de mamíferos, répteis, aves, peixes e vegetais.

FIGURA 6:

Seção Colunar SCN-5

Argila Virgílio, bairro Estiva, Taubaté, 4km a partir do trevo da Estrada Quiririm- Taubaté

Altitude da base: 556 m

LEGENDA PARA CORES

5Y8/4: amarelo acinzentado

5Y3/2: cinza-oliva

10Y6/2: verde-oliva pálido

5GY2/1: preto esverdeado

3.1.6. SEÇÃO COLUNAR SCN-6

Localização: Rodovia SP-99, km 7,0.

A seção é constituída de aproximadamente 31 m de sedimentos da Formação Caçapava (Figura 7), caracterizados pela diversidade litológica, ocorrendo desde conglomerados até lamitos. A razão clásticos grossos/clásticos finos está em torno de 1. Observa-se quantidade razoável de sedimentos grossos e finos misturados (arenitos argilosos), sugerindo um baixo grau de seleção. Nota-se que cerca de 50% das unidades descritas contêm feldspatos, caulinizados ou não, sob a forma de seixos e grã-nulos. Este fato já foi assinalado nas seções SCN-1 e SCN-2.

KRYNINE (1935) demonstrou que o relevo, mais que o clima, é o fator determinante do conteúdo feldspático de areias e arenitos. PETTIJOHN (1975) enfatizou que a velocidade de erosão é uma função do relevo. Relevos acentuados são respon-sáveis por erosão rápida de materiais ainda não totalmente intem-perizados, promovendo a formação de sedimentos muito feldspático-cos e outros igualmente imaturos. Como o relevo é um produto do tectonismo, a maturidade dos seus resíduos superficiais é um índice da atividade tectônica. Assim, os arenitos e conglomerados ricos em feldspatos da Formação Caçapava são indicadores do relevo abrupto existente na área durante a deposição desta formação, ou seja, da atividade tectônica sinsedimentar.

Observam-se nesta seção as seguintes estruturas sedimentares: estruturas maciças, estratificações horizontais incipientes, estratificações onduladas, laminações onduladas, vários ciclos de gradação normal e inversa, estratificações cruzadas de escala moderada (locais, num único nível de arenito grosso) e bioturbações (numa pequena camada de arenito fino).

As cores dos sedimentos são variegadas, predominando as diversas tonalidades de púrpura e vermelho.

FIGURA 7:

Seção Colunar SCN-6

Rodovia SP-99, km 7 (margem esquerda, rumo Paraibuna)

Altitude da base: 633 m

LEGENDA PARA CORES

5R4/6 : vermelho moderado

5RP8/2 : rosa pálido

10R6/2 : vermelho pálido

5RP4/2 : púrpura vermelho-acinzentado

10R6/6 : laranja avermelhado moderado

10YR8/2 : laranja muito pálido

3.1.7. SEÇÃO COLUNAR SCN-7

Localização: Rodovia SP-66, km 164,5.

Esta seção aflora em um pequeno "porto de a reia", próximo ao leito atual do Rio Paraíba, constituído de a-proximadamente 7 m de sedimentos extremamente inconsolidados superpostos, em contato brusco e irregular, a pelitos da Formação Tremembé (Figura 8).

A seqüência inicia-se com 2 m de cascalho de matriz arenosa grosseira, intercalado por camadas e lentes de areia grossa com abundantes estratificações cruzadas acanaladas de pequena escala, superposto por 3,5 m de areia média, argilosa, de aspecto mosqueado devido à intensa bioturbação, intercalada por 1 m de areia média, feldspática, rica em estratificações cruzadas de médio porte.

As características litológicas e as situações estratigráfica e geográfica levam a concluir que estes sedimentos representam os aluviões antigos do Rio Paraíba do Sul, provavelmente correlacionáveis, em termos litológicos e em idade, aos aluviões antigos dos rios Pinheiros e Tietê, reconhecidos e estudados pela primeira vez por SUGUIO & TAKAHASHI (1970) e hoje denominados formalmente de Formação Itaquaquetuba por COIMBRA *et al.* (1983).

3.1.8. SEÇÃO COLUNAR SCN-8

Localização: Estrada Guaratinguetá - Colô
nia Piauí, 300 m antes de Pia
uí.

É uma seção com cerca de 9 m de sedimentos da Formação Tremembé, muito parecida quanto à litologia e geometria dos litossomas com a seqüência descrita na seção SCN-3.

FIGURA 8:

Seção Colunar SCN-7

Rodovia SP-66, km 164,5 (margem direita, rumo Roseira)

Altitude da base: 536 m

LEGENDA PARA CORES

5Y5/2 : cinza-oliva claro

10YR5/4 : marrom amarelado moderado

5Y7/2 : cinza amarelado

N9 : branco

Trata-se de uma alternância de arenitos e siltitos, pobres em estruturas sedimentares quando comparados com os sedimentos da seção SCN-3 (Figura 9). O arenito da base da seção apresenta raras e incipientes estratificações horizontais e cruzadas, e marcas onduladas de interferência; o arenito superior contém laminações horizontais incipientes. Entre esses dois níveis de arenito, encontra-se uma camada de siltito contendo lentes de extremidades lobadas de arenito, com pelotas de argila na base e estratificações cruzadas, mostrando vários ciclos de gradação granulométrica; localmente o siltito apresenta inúmeras camadas deformadas de arenito fino. O siltito do topo da sequência é maciço.

A semelhança com a sequência da seção SCN-3 e a presença das lentes e camadas contorcidas de arenito dentro do siltito, sugerem a atuação de três diferentes mecanismos de transporte e deposição para estes sedimentos: suspensão, fluxos gravitacionais subaquosos (escorregamentos) e provavelmente correntes de turbidez.

3.1.9. SEÇÃO COLUNAR SCN-9

Localização: Estrada Guaratinguetá - Colônia Piagui, 3 km antes de Piagui.

Trata-se de uma sequência pouco espessa (~4 m) de sedimentos finos, maciços, da Formação Caçapava (Figura 10). Provavelmente representam depósitos de transbordamento.

3.1.10. SEÇÃO COLUNAR SCN-10

Localização: Estrada Lorena-Piquete, Fazenda São José.

Trata-se de uma exposição de cerca de 14 m de sedimentos da Formação Caçapava (Figura 11), constituídos es-

FIGURA 9:

Seção Colunar SCN-8

Estrada Guaratinguetá-Colônia Piagui (margem esquerda, 300m antes de Piagui)
Altitude da base: 544 m

LEGENDA PARA CORES

5Y7/2 : cinza amarelado

5YR5/6 : marrom claro

10Y6/2 : verde-oliva pálido

FIGURA 10:

Seção Colunar SCN-9

Estrada Guaratinguetá - Colônia Piagui (margem direita, 3 km antes de Piagui)
Altitude da base: 577m

LEGENDA PARA CORES

IOR8/2: rosa laranja-acinzentado

IOR6/6: laranja avermelhado moderado

5RP4/2: púrpura vermelho-acinzentado

FIGURA 11:

Seção Colunar SCN-10

Estrada Lorena-Piquete, Fazenda São José (2km após o cruzamento com a estrada de ferro)

Altitude da base: 544 m

LEGENDA PARA CORES

5R6/2 : vermelho pálido
 5R6/6 : vermelho claro
 5RP4/2 : púrpura vermelho-acinzentado
 5Y5/2 : cinza-oliva claro
 5Y8/1 : cinza amarelado
 10Y6/2 : verde-oliva pálido

sencialmente de arenitos médios e finos, ora mais ora menos argilosos.

A seção é pobre em estruturas sedimentares, predominando os níveis maciços e aqueles que mostram leves gradacões por aumento ou diminuição do conteúdo argiloso da base para o topo. Na parte média da seção observa-se uma camada de arenito médio com contato inferior brusco marcando o início de um ciclo de gradação granulométrica, contendo, na base, intercalações de níveis argilosos definindo tênues marcas onduladas e, no topo, estratificações cruzadas de escala moderada.

Este é o único afloramento da Formação Caçapava que se conhece fora da região de Jacareí, com sedimentos de cor 10 Y 6/2 (verde-oliva pálido) superpostos por sedimentos com tonalidades de púrpura e vermelho. Esta observação, aliada ao fato de este afloramento estar praticamente no mesmo nível topográfico dos afloramentos da Formação Tremembé na região, constitui mais um argumento a favor da idéia de que os sedimentos esverdeados da Formação Caçapava representam a sua porção basal.

3.2. PERFIS ESQUEMÁTICOS

Os perfis esquemáticos foram muito importantes para mostrar o comportamento lateral das camadas no que diz respeito à sua geometria, interrelações entre as diversas unidades, variações texturais e de estruturas sedimentares, bem como obter informações de caráter estrutural e tectônico.

Foram elaborados oito perfis, por vezes complexos e extensos, razão pela qual empregou-se a seguinte técnica na sua confecção: numa primeira etapa os afloramentos foram fotografados em toda sua extensão; as fotos foram montadas sob plástico transparente (ultraphan), e as principais unidades sedi

mentares reconhecidas e delimitadas; a etapa final consistiu no detalhamento dos perfis no campo, com descrição das diversas unidades presentes, acompanhada de eventual amostragem.

3.2.1. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-1

Localização: Rodovia D. Pedro I, a 3,7 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra.

Este perfil dista 1,2 km da seção colunar SCN-2 (e do perfil esquemático PE-2, que será discutido no próximo item) rumo a Serra da Mantiqueira, e topograficamente superpõe-se com a metade superior daquela seção.

Trata-se de uma exposição, em corte de rodovia, de sedimentos fluviais da Formação Caçapava (Figura 12), com mais de 150 m de extensão por 3-5 m de altura, onde se acham presentes fácies de preenchimento de canal, fácies de barra de canal e possíveis fácies residuais de canal.

Observam-se diversos paleocanais truncando seqüências de barras de canal e paleocanais mais antigos. Os dois paleocanais mais evidentes, 17 e 20, encontram-se preenchidos por arenito grosso, feldspático, o primeiro, maciço e conglomerático na base, e o segundo, conglomerático com incipientes estratificações horizontais e cruzadas. O paleocanal 20 possui uma das margens truncada por falha normal, evidenciando tectonismo pós-sedimentar.

As raras estruturas sedimentares presentes (estratificações horizontais quase sempre incipientes, estratificações cruzadas com bolas e pelotas de argila e seixos de quartz definindo os estratos cruzados, estratificações cruzadas aca-naladas, estratificações cruzadas incipientes e diques de arenito grosso injetados em arenito fino) e a geometria dos corpos su gerem deposição por rios entrelaçados (braided).

FIGURA 12:
 Perfil Esquemático PE-1
 Rodovia D. Pedro I, a 3,7 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra (margem direita, rumo Campinas)
 Altitude da base: 635 m

JACAREÍ

CAMPINAS

1 Arenito grosso, feldspático, cor 10YR8/6 (laranja amarelado pálido)	7 Arenito médio, feldspático, cor 10R 7/4 (rosa moderado)	13 Argilito, arenoso na base e puro no topo, cor 5 R 4/6 (vermelho moderado)	19 Argilito, arenoso na base e puro no topo, cor 5 R 4/6 (vermelho moderado)	25 Arenito fino, argiloso, micáceo, cor 10 Y 8/2 (amarelo esverdeado pálido)
2 Argilito arenoso, cores variegadas (avermelhadas, arroxeadas, amareladas)	8 Arenito grosso, com grânulos de quartzo e feldspato, cor 10 R 5/4 (vermelho moderado)	14 Arenito grosso, conglomerático, com seixos cm de quartzo, cor 10 R 4/6 (marrom avermelhado moderado)	20 Arenito grosso, feldspático, conglomerático, com seixos cm de quartzo, cor 10 R 6/2 (vermelho pálido)	26 Arenito médio, mal selecionado, cor 10 R 4/6 (marrom avermelhado moderado)
3 Arenito grosso, argiloso, mal selecionado, cor 10R5/4 (marrom avermelhado pálido)	9 Arenito fino, micáceo, cor 5 R 5/4 (vermelho moderado), alternado com argilito, cor 5 R 6/2 (vermelho pálido)	15 Arenito grosso, conglomerático, cor 10 R 4/6 (marrom avermelhado moderado)	21 Arenito grosso, feldspático, conglomerático, com seixos cm de quartzo, cor 5 R 6/2 (vermelho pálido)	27 Arenito grosso, apresentando graduação inversa, com grânulos e seixos mm de quartzo e feldspato no topo, cor 10R5/4 (marrom avermelhado pálido)
4 Arenito médio, feldspático, cor 10R 7/4 (rosa alaranjado moderado)	10 Arenito médio, muito feldspático, cor 5 R 6/6 (vermelho claro)	16 Argilito, arenoso na base e puro no topo, cor 5 R 4/6 (vermelho moderado)	22 Arenito fino, bastante micáceo, cor 10 R 6/2 (vermelho pálido)	28 Arenito fino, argiloso, feldspático, cor 10 R 5/4 (marrom avermelhado pálido)
5 Arenito médio, feldspático, cor 10R 7/4 (rosa alaranjado moderado)	11 Arenito fino, micáceo, cor 5 R 5/4 (vermelho moderado), alternado com argilito, cor 5 R 6/2 (vermelho pálido)	17 Arenito grosso, feldspático, conglomerático na base, com seixos cm de quartzo, cor 5 R 8/2 (rosa acinzentado)	23 Arenito médio, cor 10 Y 8/2 (amarelo esverdeado pálido)	29 Argilito, cores variegadas (avermelhadas, arroxeadas, amareladas)
6 Arenito fino, micáceo, cor 5 R 5/4 (vermelho moderado), alternado com argilito, cor 5 R 6/2 (vermelho pálido)	12 Arenito fino, argiloso, cor 5 R 6/2 (vermelho pálido)	18 Arenito grosso, feldspático, localmente conglomerático, cor 10 R 6/2 (vermelho pálido)	24 Lamito, com fragmentos mm de quartzo e feldspato, cor 10 Y 6/2 (verde-oliva pálido)	

3.2.2. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-2

Localização: Rodovia D. Pedro I, a 2,5 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra.

Este perfil retrata o afloramento aonde foi levantada a seção colunar SCN-2 e visa mostrar as variações laterais e interrelações entre as diversas unidades litológicas (Figuras 13a, b, c). Conforme foi ressaltado na descrição da seção SCN-2, a presença de bermas (patamares) causou a subdivisão do afloramento, para efeito descritivo, em três níveis.

Destacam-se diversos corpos de arenito e conglomerado com caráter marcadamente lenticular e de dimensões variadas. Os maiores apresentam contato inferior geralmente brusco, muitas vezes irregular, truncando camadas de brecha lamítica, lamitos e argilitos. Contêm as seguintes estruturas sedimentares: estratificações cruzadas de pequeno e médio porte, ora incipientes, ora evidentes, com gradações nos estratos frontais (5 e 11 - nível inferior); estratificações cruzadas acanaladas de pequeno e médio porte, também apresentando gradações (11 - nível inferior; 1, 3 e 5 - nível intermediário); convoluções (11 - nível inferior); e estrutura maciça (3 - nível inferior; 6 - nível intermediário). As lentes menores de arenito são maciças e com contatos quase sempre transicionais.

O nível basal de brecha lamítica com fragmentos do embasamento (Foto 9), os diversos níveis de lamito contendo grânulos de quartzo e feldspato, a geometria e relações de contato dos corpos arenosos e as estruturas sedimentares presentes caracterizam transporte por movimentos de massa (corridas de lama, fluxos de detritos, fluxos de grãos e fluxos de sedimentos fluidizados) associados a fluxos aquosos, mecanismos típicos de ambiente de leque aluvial. Esta idéia é reforçada pela associação desta seqüência com aquela descrita no perfil PE-1, sugestiva de deposição por rios entrelaçados (braided).

FIGURA 13a.
Perfil Esquemático PE-2
Nível inferior
Rodovia D. Pedro I, a 2,5 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra (margem direita, rumo Campinas)
Altitude da base: 620 m

- 1 Brecha lamítica, com fragmentos mm. a cm. de pedras do embasamento, quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 2 Arenito grosso, argiloso, feldspático, mal selecionado, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 3 Arenito grosso, argiloso, feldspático, mal selecionado, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 4 Lamito, com grânulos e pequenos seixos de quartzo e feldspato, mais arenoso na base e mais argiloso no topo, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 5 Arenito grosso, conglomerático, com seixos mm. a cm. de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 6 Lamito, com grânulos de quartzo e feldspato, mais arenoso na base e mais argiloso no topo, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 7 Arenito fino, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 8 Argilito, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 9 Arenito médio, muito micáceo, com grânulos de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 10 Argilito, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 11 Arenito fino alternado com argilito, passando lateralmente para arenito grosso, conglomerático, com seixos mm. a cm. de quartzo e feldspato e, a seguir, para conglomerado de matriz arenosa grossa, com seixos mm. a cm. de quartzo e feldspato, todos de cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 12 Lamito, com grânulos de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 13 Arenito médio, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 14 Arenito fino a médio, cores variadas, contendo localmente uma alternância de arenito e argilito, cores variadas

FIGURA 13b:
Perfil Esquemático PE-2
Nível Intermediário

- 1 Conglomerado de matriz arenosa grossa, com seixos mm a 3 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado), passando a arenito conglomerático, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).
- 2 Lamito, mais arenoso na base e mais argiloso no topo, com grânulos esparsos de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido).
- 3 Arenito médio a muito grosso, frequentemente conglomerático, com seixos de 1-2 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).

- 4 Lamito, mais arenoso na base e mais argiloso no topo, com grânulos esparsos de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido), com lentes de arenito grosso, argiloso, feldspático, mal selecionado, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).
- 5 Conglomerado de matriz arenosa grossa, com seixos mm a 3 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).
- 6 Arenito grosso, feldspático, conglomerático, com seixos mm a 1 cm de quartzo e feldspato (raros), cor 5Y7/2 (cinza amarelado).

- 7 Arenito fino a médio, micáceo, localmente conglomerático, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).
- 8 Conglomerado de matriz lamítica, com seixos mm a 3 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado), passando a lamito conglomerático com seixos mm a 1 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).
- 9 Conglomerado de matriz lamítica, com seixos mm a 2 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado).

- 10 Lamito, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido), com lentes de arenito fino, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido).
- 11 Lamito, com grânulos esparsos de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido).
- 12 Arenito grosso, feldspático, conglomerático, com seixos mm de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido).

- 13 Solo

0 1 2 3 4 5 m
Escala

FIGURA 13c:
Perfil Esquemático PE-2
Nível Superior

- 1 Arenito grosso, argiloso, feldspático, conglomerático, com seixos mm. a 2 cm de quartzo e feldspato, cor 5Y7/2 (cinza amarelado)
- 2 Lamito, com grânulos de quartzo e feldspato, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido), com lentes de arenito, ora médio a grosso, ora fino, feldspático
- 3 Arenito médio, feldspático, micáceo, mal selecionado, cores variegadas, tornando-se argiloso em direção ao topo e passando a argilito micáceo próximo ao topo
- 4 Arenito grosso, feldspático, conglomerático, com seixos mm. a 3 cm de quartzo e feldspato, cor 5R4/6 (vermelho moderado)
- 5 Argilito, cor 10Y6/2 (verde-oliva pálido)
- 6 Solo

0 1 2 3 4 5m
Escala

FOTO 9 - Brecha lamítica contendo fragmentos de rochas do embasamento.

3.2.3. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-3

Localização: Rodovia SP-99, km 9,4.

Trata-se de um afloramento da Formação Caçapava (Figura 14), muito semelhante quanto à constituição faciológica àquele descrito no perfil PE-1.

Observa-se uma série de paleocanais (1 a 9) preenchidos principalmente por arenitos e conglomerados, em contato através de falha normal (lado direito da figura) com depósitos de transbordamento (10 a 13), provavelmente fácies de dique marginal e talvez, a porção superior de fácies de barra de canal.

O preenchimento dos canais por material gros

FIGURA 14:
Perfil Esquemático PE-3
Rodovia SP-99, km 9,4 (margem direita, rumo Paraíba)
Altitude da base: 668 m

- 1 Arenito grosso, feldspático, mal selecionado, localmente conglomerático, com seixos mm a 2cm de quartzo, cor 10R4/6 (marrom avermelhado moderado)
- 2 Arenito grosso, muito argiloso, localmente conglomerático, com seixos mm a 2cm de quartzo, cor 5R4/6 (vermelho moderado)
- 3 Argilito arenoso na base e mais puro no topo, feldspático, cores 10R4/6 (marrom avermelhado moderado) e 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), apresentando intercalações arenosas

- 4 Arenito muito grosso, conglomerático, com seixos mm a 3-4 cm de quartzo (principalmente) e feldspato, cor 10R7/6 (rosa amarelado moderado)
- 5 Arenito médio, argiloso, cor 5R5/4 (vermelho moderado)
- 6 Argilito arenoso na base e mais puro no topo, feldspático, cores 10R4/6 (marrom avermelhado moderado) e 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), apresentando intercalações arenosas

- 7 Arenito médio, argiloso, localmente conglomerático, com seixos mm a 1-2 cm de quartzo, cor 5R5/4 (vermelho moderado)
- 8 Argilito arenoso na base e mais puro no topo, feldspático, cores 10R4/6 (marrom avermelhado moderado) e 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), apresentando intercalações arenosas
- 9 Conglomerado de matriz arenosa grosseira, com seixos mm a 3-4 cm de quartzo (principalmente) e feldspato, cor 5R6/6 (vermelho claro)

- 10 Arenito médio, argiloso, feldspático, com grânulos espessos de quartzo e feldspato, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), gradando para arenito fino em direção ao topo
- 11 Arenito médio a fino, feldspático, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido)
- 12 Argilito arenoso, cor 5R4/6 (vermelho moderado)

- 13 Arenito médio a fino, feldspático, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido)
- 14 Colúvia

3 m
Escala

seiro ocorreu provavelmente sob condições de fluxos torrenciais, comuns em rios entrelaçados (braided).

A seqüência de eventos de escavação e preenchimento, do mais antigo para o mais novo, é a seguinte: 1+2, 3, 4+5, 6=8 e 9.

As únicas estruturas sedimentares presentes são incipientes estratificações horizontais (1) e cruzadas (9), e bioturbações (12). As cores são variegadas, com tonalidades de marrom, púrpura, vermelho e rosa.

3.2.4. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-4

Localização: Rodovia Presidente Dutra, km 124,5.

Este perfil retrata parte do afloramento onde foi levantada a seção colunar SCN-4, localizada cerca de 20 m mais adiante, num ponto onde as camadas não estão perturbadas por falhas. Aqui, a Formação Caçapava está representada principalmente por depósitos de transbordamento, constituídos de arenitos finos, siltitos, argilitos e lamitos (Figura 15).

Observam-se as seguintes estruturas sedimentares: estruturas maciças, incipientes estratificações horizontais, laminações horizontais, laminações onduladas e bioturbações constituídas de tubos preenchidos por material arenoso.

A litologia, as estruturas sedimentares e a atitude das camadas, quase sempre horizontal, são sugestivas de fácies de planície de inundação associada à fácies de preenchimento de canal (4, 8 e 11) e, talvez, à porção superior de fácies de barra de meandro (12 e 16).

No lado esquerdo da figura observa-se um pequeno *graben* originado por falhas normais pós-deposicionais.

FIGURA 15:
 Perfil Esquemático PE-4
 Rodovia Presidente Dutra, km 124,5 (margem direita, rumo Rio de Janeiro)
 Altitude da base: 592 m

1 Arenito fino, argiloso, micáceo, gradando para arenito médio, menos argiloso, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhada pálida)	6 Arenito fino, argiloso, micáceo, cores variegadas	11 Arenito grosso, micáceo, conglomerático, cor 10R7/4 (rosa alaranjado moderado), com intercalações de siltito argiloso, micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhada pálida)	16 Arenito fino, feldspático, cor 5Y8/4 (amarelo acinzentado), com intercalações de siltito argiloso, micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhada pálida)
2 Argilito siltico, micáceo, cor 5R4/6 (vermelho moderado)	7 Lamito, com fragmentos mm a subcm. de quartzo, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)	12 Arenito fino, feldspático, cor 5Y8/4 (amarelo acinzentado), gradando para siltito argiloso, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhada pálida)	17 Colúvio areno-argiloso, cores variegadas, com manchas esbranquiçadas de lixiviação
3 Siltito argiloso, micáceo, intercalado com delgadas camadas de arenito fino, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhada pálida)	8 Arenito grosso, feldspático, localmente conglomerático, com seixos mm. a 5-6 cm (predominam os de 3-4 cm) principalmente de quartzito, cores variegadas	13 Lamito arenoso, com fragmentos mm. a subcm. de quartzo, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)	
4 Arenito fino, micáceo, gradando lateralmente para arenito grosso, conglomerático, com fragmentos amarratados do siltito anterior na base, cor 5R7/4 (rosa moderado)	9 Arenito fino, argiloso, micáceo, cores variegadas	14 Siltito argiloso, micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhada pálida)	
5 Argilito arenoso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)	10 Lamito, com fragmentos mm. a subcm. de quartzo, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)	15 Arenito fino, argiloso, cor 10R7/4 (rosa alaranjado moderado)	

0 1 2 3 4 5 6 m
 Escala

Uma feição que chama muita atenção no afloramento é um trecho com quase 20 m de largura de material areno-argiloso (17), isento de estruturas sedimentares, cortando a sequência sedimentar. Observando-se cuidadosamente o material e suas relações de contato com os sedimentos, verificou-se que se trata de colúvio, assim posicionado por falhas normais mais ou menos paralelas. As linhas de seixos (stone lines), situadas no interior do colúvio, acham-se fortemente inclinadas acompanhando os planos de falhas. Esta situação constitui uma importante evidência de tectonismo pós-sedimentar bastante recente na Bacia de Taubaté, pois até o colúvio foi afetado pelas falhas.

3.2.5. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-5

Localização: Rodovia Presidente Dutra, km 122,1.

Trata-se de um afloramento da Formação Caçapava onde se observam fácies de preenchimento de canal, constituídas principalmente de arenitos, desde muito grossos até finos, e siltitos (Figura 16).

A única estrutura sedimentar que se observa, além da maciça, é a estratificação horizontal incipiente (13).

Acham-se presentes dois pequenos *grabens* originados por falhas normais e uma zona de brecha com cerca de 15 m de largura, de provável origem tectônica.

3.2.6. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-6

Localização: Rodovia Presidente Dutra, km 120.

Neste local a Formação Caçapava está representada por sedimentos de litologia variada, ocorrendo desde conglomerados até lamitos (Figura 17), apresentando as seguintes es-

FIGURA 16:

Perfil Esquemático PE - 5

Rodovia Presidente Dutra, km 122,1 (margem direita, rumo Rio de Janeiro)

Altitude da base: 582 m

0 2 4 6 8 10m
Escala

1 Arenito médio, conglomerático, com seixos mm. de quartzo e feldspato, cores variegadas

2 Siltito argiloso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

3 Arenito muito grosso, localmente passando a conglomerado fino, com seixos mm. a subcm. de quartzo e feldspato, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

4 Arenito fino, cor 10R6/6 (laranja avermelhado moderado), intercalado com siltito arenoso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

5 Lamito arenoso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

6 Siltito argiloso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

7 Siltito argiloso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

8 Arenito muito grosso, localmente passando a conglomerado fino, com seixos mm. a subcm. de quartzo e feldspato, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

9 Siltito arenoso, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho-acinzentado)

10 Brecha de matriz areno-argilosa, com fragmentos de até 20 cm de siltito, arenito, lamito, etc. e seixos mm. a 2-3 cm de quartzito (principalmente), cores variegadas

11 Brecha anterior intemperizada

12 Arenito grosso, feldspático, cor 5R7/4 (rosa moderado), com crosta limonítica (< 1cm) no topo

13 Arenito fino, argiloso, feldspático, cor 5R7/4 (rosa moderado), com intercalações de siltito, cor 5R7/4 (rosa moderado)

14 Colúvio

FIGURA 17:
Perfil Esquemático PE-6

Rodovia Presidente Dutra, km 120,0 (margem direita, rumo Rio de Janeiro)
Altitude da base: 572 m

1 Arenito fino, micáceo, cor 10R8/2 (rosa laranja-acinzentado)

2 Siltito micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido)

3 Arenito fino, micáceo, cor 5R5/4 (vermelho moderado)

4 Siltito micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido)

5 Siltito micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), com lentes de arenito médio, cor 10R4/6 (marrom avermelhado moderado)

6 Lamito arenoso, cor 5R4/6 (vermelho moderado)

7 Siltito micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), alternado com arenito médio, feldspático, cor 10YR8/6 (laranja amarelado pálido)

8 Arenito grosso, micáceo, conglomerático, com grânulos de quartzo, cor 10YR8/6 (laranja amarelado pálido)

9 Siltito micáceo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido), intercalado com arenito fino, micáceo, cor 5R4/6 (vermelho moderado)

10 Arenito fino, argiloso, feldspático, micáceo, cor 5RP4/2 (púrpura vermelho acinzentado)

11 Arenito grosso, feldspático, cor 10R6/6 (laranja avermelhado moderado)

12 Arenito médio, argiloso, conglomerático, com seixos mm. a 1 cm de quartzo, cor 5R4/6 (vermelho moderado)

13 Lamito arenoso, cor 5R4/6 (vermelho moderado), com lentes de arenito médio, feldspático, micáceo, cor 10YR8/6 (laranja amarelado pálido)

14 Conglomerado de matriz arenosa grosseira, com seixos mm. a 3-4 cm de quartzo, subarredondados, cor 10YR6/6 (laranja amarelado escuro)

15 Arenito fino, argiloso, cor 5R6/6 (vermelho claro)

16 Colúvio

0 2 4 6 8 10 m
Escala

estruturas sedimentares: estruturas maciças; estratificações horizontais (8); estratificações cruzadas de pequeno porte, tangenciais na base (1); marcas onduladas com 3-4 cm de comprimento de onda e 1 cm de amplitude (1); laminações cruzadas (1, 3 e 7); laminações horizontais incipientes (4 e 5); e bioturbações (3).

A litologia, as estruturas sedimentares e as interrelações entre as diversas unidades permitiram a identificação de depósitos de acrescência principalmente vertical (1 a 6) e de acrescência principalmente lateral (7 a 15). Os primeiros representam fácies de planície de inundação, possivelmente associadas a fácies de dique marginal e talvez fácies de rompimento de dique marginal (5); os últimos representam fácies de barra de meandro (7 a 13) e fácies residual de canal (14).

3.2.7. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-7

Localização: Rodovia Presidente Dutra, km 107,5.

Trata-se de uma alternância de siltito bioturbado e arenito fino, argiloso, feldspático, incipientemente laminados, pertencentes à Formação Caçapava (Figura 18).

A litologia e as estruturas sedimentares são sugestivas de depósitos de transbordamento, provavelmente a porção superior de fácies de barras de meandro associadas a fácies de diques marginais.

As camadas apresentam-se falhadas e fortemente basculadas. As falhas são do tipo normal e afetam não só todo o pacote de sedimentos da Formação Caçapava como também o colúvio, deslocando quase 3 m a linha de seixos (stone line) (lado esquerdo da figura). Esta é mais uma evidência muito clara de tectonismo recente na Bacia de Taubaté, que vem somar-se àquela observada no km 124,5 desta mesma rodovia (perfil PE-4).

FIGURA 18:

Perfil Esquemático PE-7

Rodovia Presidente Dutra, km 107,5 (margem direita, rumo Rio de Janeiro)

Altitude da base: 595m

- Alternância de camadas de siltito, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido) e de arenito fino, argiloso, feldspático, cor 10YR6/6 (laranja amarelado escuro)

Cabe ainda ressaltar que a porção abaixo da linha de seixos falhada, representada na figura como colúvio, trata-se provavelmente dos sedimentos da Formação Caçapava intemperizados, cujas incipientes laminações devem ter sido obliteradas pelos processos pedogenéticos, impedindo sua diferenciação do colúvio sobrejacente. Outra possibilidade, menos provável, seria a de considerar-se duas fases de colúviação.

3.2.8. PERFIL ESQUEMÁTICO PE-8

Localização: Estrada Taubaté-Tabuão, a 2,2 km da saída 109 da Rodovia Presidente Dutra.

Neste local afloram sedimentos finos da Formação Caçapava, constituídos de uma alternância de arenitos finos e siltitos argilosos, mostrando vários ciclos de gradação inversa (Figura 19).

Excetuando-se o depósito 4, que deve representar uma fácies de preenchimento de canal, o resto da sequência representa depósitos de acrescência vertical (transbordamento), provavelmente fácies de planície de inundação de rio meandrante.

A alternância de camadas mais argilosas e mais arenosas deve estar ligada a flutuações climáticas cíclicas sem que, contudo, se possa precisar a duração de cada ciclo.

A sequência mostra-se intensamente perturbada por falhas normais, que atestam o tectonismo pós-sedimentar.

3.3. AMOSTRAGEM DOS SEDIMENTOS

Foram coletadas 68 amostras do tipo pontual,

FIGURA 19:
Perfil Esquemático PE - 8

Estrada Taubaté-Tabuão, a 2,2 km da saída 109 da Rodovia Presidente Dutra (margem direita, rumo Tabuão)
Altitude da base : 625 m

1 Arenito fino, feldspático, cor 10YR8/6 (laranja amarelado pálido)

2 Siltito argiloso, tornando-se arenoso em direção ao topo, cor 5RP6/2 (púrpura avermelhado pálido)

3 Siltito argiloso, tornando-se arenoso em direção ao topo, cor 5R5/4 (vermelho moderado)

4 Arenito médio, feldspático, localmente conglomerático, com seixos mm. a 1-2 cm de quartzo, cor 10YR7/4 (laranja acinzentado)

5 Zona brechada

6 Solo

0 1 2 3 4 5m
Escala

nas principais unidades litológicas das seções colunares (Tabela 1 e Figuras 2 a 11) e perfis esquemáticos (Tabela 1 e Figuras 12 e 14), além de 13 amostras esparsas em pontos com o prefixo EST (estação) (Tabela 1), para serem submetidas a análises granulométricas. O peso de cada amostra foi de aproximadamente 500 gramas.

TABELA 1 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS COLETADAS

SEÇÃO COLUNAR	LOCALIZAÇÃO	AMOSTRA	FORMAÇÃO
SCN-1	Rodovia Presidente Dutra, saída 170 margem direita, rumo Rio de Janeiro	BT-1 a BT-7	Caçapava
SCN-2	Rodovia D. Pedro I, a 2,5 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra margem direita, rumo Campinas	BT-8 a BT-12	Caçapava
SCN-3	Rodovia SR-123, km 12,8 margem direita, rumo Campos do Jordão	BT-13 a BT-15	Tremembé
SCN-4	Rodovia Presidente Dutra, km 124,5 margem direita, rumo Rio de Janeiro	BT-24 a BT-27	Caçapava
SCN-5	Argila Virgílio, bairro Estiva, Taubaté, 4 km a partir do trevo da estrada Quiri- rim - Taubaté	BT-28	Tremembé
SCN-6	Rodovia SP-99, km 7,0 margem esquerda, rumo Paraibuna	BT-38 a BT-49	Caçapava
SCN-7	Rodovia SP-66, km 164,5 margem direita, rumo Roseira	BT-61 a BT-65	Contato Tremembé- Aluviões Antigos
SCN-8	Estrada Guaratinguetã-Colônia Piagui margem esquerda, 300m antes de Piagui	BT-66 a BT-71	Tremembé

TABELA 1 - continuação

SEÇÃO COLUNAR	LOCALIZAÇÃO	AMOSTRA	FORMAÇÃO
SCN - 9	Estrada Guraratinguetã-Colônia Piagui margem direita, 3 km antes de Piagui	BT-74 e BT-75	Caçapava
SCN-10	Estrada Lorena-Piquete, Fazenda São José, 2 km após o cruzamento com a estrada de ferro	BT-76 a BT-81	Caçapava
PERFIL ESQUEMÁTICO			
PE-1	Rodovia D.Pedro I, a 3,7 km da saída 170 da Rodovia Presidente Dutra margem direita, rumo Campinas	BT-29 a BT-37	Caçapava
PE-3	Rodovia SP-99, km 9,4 margem direita, rumo Paraibuna	BT-53 a BT-60	Caçapava
ESTAÇÕES			
EST-1	Rodovia SP-123, km 18,3 margem direita, rumo Campos do Jordão	BT-16 a BT-18	Tremembé
EST-2	Rodovia SP-123, km 18,5 margem direita, rumo Campos do Jordão	BT-19	Tremembé
EST-3	Rodovia SP-123, km 19,3 margem esquerda, rumo Campos do Jordão	BT-20	Tremembé

TABELA 1 - conclusão

SEÇÃO COLUNAR	LOCALIZAÇÃO	AMOSTRA	FORMAÇÃO
EST-4	Rodovia SP-123, km 19,7 margem direita, rumo Campos do Jordão	BT-21 a BT-23	Tremembé
EST-5	Fazenda Santa Fê, bairro Padre Eterno, Taubaté	BT-50	Tremembé
EST-6	Argila Menegaldo (desativada), bairro Estiva, Taubaté, 3,5 km a partir do trevo da estrada Quiririm-Taubaté	BT-51 a BT-52	Tremembé
EST-7	Estrada Guaratinguetã-Colônia Piagui margem esquerda, 1,5 km antes de Piagui	BT-72 e BT-73	Tremembé

CAPÍTULO IV

SISTEMAS DEPOSICIONAIS

Dentre os vários métodos que têm sido propostos para a análise de bacias sedimentares e reconstrução de ambientes antigos de sedimentação, o conceito de sistema deposicional atraiu a atenção dos pesquisadores, dada a alta resolução revelada pelo método.

Entre os trabalhos desenvolvidos no Brasil, com a aplicação deste conceito, pode-se citar os de FISHER, GAMA JR. & OJEDA (1973) na Bacia de Sergipe-Alagoas, FISHER *et al.* (1974) nas Bacias de Mucuri, Cumuruxatiba e Jequitinhonha, GAMA JR. (1977) na Bacia de Campos, GAMA JR. (1979) na Bacia do Paraná, PONTE & MEDEIROS (1981) na Bacia do Recôncavo e CARVALHO *et al.* (1982) na Plataforma de São Mateus.

Este capítulo dedica-se à apresentação do referido conceito e sua aplicação na Bacia de Taubaté, a partir de observações de campo.

4.1. O CONCEITO DE SISTEMA DEPOSICIONAL

O conceito de sistema deposicional começou a ser utilizado por diversos autores, dentre eles, HAYES & SCOTT (1964), BOYD & DYER (1964) e FISHER & MCGOWEN (1967) na análise dos depósitos recentes e terciários da Bacia Costeira do Golfo, E.U.A.

Este conceito foi criado no intuito de ordenar as informações sobre os ambientes de sedimentação e suas associações faciológicas, facilitando as suas interpretações. Sua aplicação traduz-se num método de análise de depósitos sedimentares, que utiliza uma sistemática própria e que conduz, em última instância, à elaboração de modelos deposicionais.

Sistema deposicional é um conjunto de rochas sedimentares, relacionadas por suas fácies, ambientes e processos associados, objetivando sua melhor compreensão e facilidade de análise (MEDEIROS, 1980). Assim, este termo é aplicado na análise de uma unidade tridimensional de rochas, reconhecida por critérios litológicos e por um termo genético como, por exemplo, *sistema fluvial meandrante*. Seu uso permite analisar grupos de fácies componentes, em geral complexos, mas geneticamente relacionados, como se fossem unidades deposicionais simples.

A aplicação do conceito de sistemas deposicionais em análises regionais de depósitos sedimentares modernos, implica em se dar maior ênfase às dimensões e geometria, distribuição e interrelações das fácies componentes, composições litológica e fossilífera e estruturas sedimentares do que à correlação e persistência de unidades estratigráficas localmente estabelecidas (SUGUIO & BIGARELLA, 1979).

O reconhecimento de sistemas deposicionais em sedimentos antigos é feito por comparação com os sistemas deposicionais atuais, facilmente identificados pelas suas características fisiográficas.

4.2. SISTEMÁTICA DE INTERPRETAÇÃO

Inicialmente foi feito o reconhecimento das fácies através da análise das seções colunares, perfis esquemáti

cos e observações complementares de campo, não considerando a divisão estratigráfica formal, mas tão-somente a similaridade de propriedades litológicas, paleontológicas (quando possível) e geométricas, e de estruturas sedimentares.

Seguiu-se a identificação dos mecanismos de transporte atuantes na deposição dos sedimentos, e dos processos sedimentares responsáveis pelo desenvolvimento das diferentes fácies.

A última etapa consistiu na identificação dos sistemas deposicionais, considerando-se os seguintes atributos: processos sedimentares básicos, ambientes e suas associações, fácies principais, geometria interna e externa, dimensões e relações espaciais entre as fácies.

Foram identificados cinco sistemas deposicionais na Bacia de Taubaté, designados informalmente com termos geográficos da região de ocorrência mais representativa: Sistema Leque Aluvial Jacareí, Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí, Sistema Fluvial Meandrante Caçapava, Sistema Leque Aluvial Quiririm e Sistema Lacustre Tremembé.

4.3. SISTEMAS LEQUES ALUVIAIS JACAREÍ E QUIRIRIM

Os Sistemas Leques Aluviais Jacareí e Quiririm ocorrem na borda norte da Bacia de Taubaté e provavelmente fazem parte de um sistema maior de leques aluviais coalescentes.

As feições que diagnosticam a origem postulada incluem:

a) Litologia: a presença de brechas sedimentares contendo fragmentos de diversas litologias imersos, sem contato entre si, em matriz lamítica, areno-argilosa ou arenosa,

de lamitos maciços com grânulos de quartzo e feldspato, e de bancos de arenito maciço, indica transporte por movimentos de massa, do tipo fluxos de detritos, corridas de lama e fluxos de grãos, e caracteriza o ambiente de leque aluvial.

b) Maturidade: sedimentos textural e mineralogicamente imaturos, contendo fragmentos de tamanho variável de argila a matacões imersos em grande quantidade de matriz, e feldspatos detríticos em quantidade significativa, evidenciam de posição e soterramento relativamente rápidos, típicos de leques aluviais.

c) Textura: o decréscimo na granulometria com o aumento da distância da Serra da Mantiqueira é mais uma evidência da origem postulada.

d) Associação com outros sistemas: os Sistemas Leques Aluviais Jacareí e Quiririm estão associados, respectivamente, com o Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí e com o Sistema Lacustre Tremembé, associações estas perfeitamente compatíveis com as dos sistemas deposicionais atuais.

A estas feições soma-se a existência de uma área fonte com relevo acidentado, a Serra da Mantiqueira, contrastando com o sítio deposicional em forma de *graben*. Sabe-se que o contraste no relevo é fundamental para a formação de leques aluviais.

Os leques aluviais são constituídos normalmente pela fácies proximal, originada principalmente por movimentos de massa e pela fácies distal, desenvolvida predominantemente por fluxos aquosos. No Sistema Leque Aluvial Jacareí foi possível identificar a fácies distal, cujas características correspondem às descritas nas seções colunares SCN-1 e SCN-2 e no perfil esquemático PE-2. No Sistema Leque Aluvial Quiririm foi reconhecida a fácies proximal, constituída de brechas polimícticas e bancos de arenito maciço. As brechas possuem matriz areno-argilosa ou arenosa grosseira, feldspática, micácea, cores 10 R 6/2 (vermelho pálido) e 10 R 4/2 (vermelho acinzentado), e fragmentos angulosos de gnaiss, quartzo-mica-xisto, quartzito,

quartzo, feldspato e pegmatito, caoticamente arranjados, de diâmetro variável de mm a 1,5 m (Foto 10), mostrando granodecrescência ascendente (fining upward). Intercalados nas brechas aparecem bancos de alguns metros de espessura de arenito fino, argiloso, muito micáceo, cores 10 Y 6/2 (verde-oliva pálido) e 10 R 6/2 (vermelho pálido), contendo, às vezes, níveis de conglomerado fino apresentando granodecrescência ascendente. Ocorrem também bancos espessos (>10 m) de arenito médio ou fino, muito feldspático, maciço, cor 10 R 6/2 (vermelho pálido), intercalado por níveis de algumas dezenas de cm até 1 m de arenito muito fino, argiloso, muito micáceo, laminado, freqüentemente bioturbado, com tubos preenchidos por areia mais grossa cortando perpendicularmente a laminação. Exposições típicas desta fácies podem ser vistas na Rodovia SP-123, entre os quilômetros 18 e 20.

FOTO 10 - Brecha polimíctica de matriz areno-argilosa, muito micácea, com fragmentos milimétricos até quase 1 m de gnaiss, pegmatito, quartzo-mica-xisto, quartzito, quartzo e feldspato.

4.4. SISTEMA FLUVIAL ENTRELAÇADO (BRAIDED) JACAREÍ

O Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí foi identificado nas proximidades de Jacareí, associado ao Sistema Leque Aluvial Jacareí, e nas proximidades de São José dos Campos. Admitindo-se a existência de dois grandes sistemas de leques aluviais coalescentes nas bordas norte e sul da Bacia de Taubaté, relacionados com as Serras da Mantiqueira e do Mar, não é difícil imaginar a existência de diversos sistemas fluviais entrelaçados (braided) associados aos vários leques aluviais.

As características que, somadas, indicaram a origem fluvial do tipo entrelaçado (braided), podem ser visualizadas nos perfis esquemáticos PE-1 e PE-3 e na seção colunar SCN-6, e incluem:

- a) Unidades deposicionais com limitada continuidade lateral.
- b) Alto conteúdo arenoso.
- c) Sequência vertical sem tendência definida de variação na textura.
- d) Contatos abruptos entre muitas das unidades.
- e) Geometria multilateral.
- f) Fácies de planície de inundação e de diques marginais raras ou ausentes.
- g) Raras estruturas sedimentares.

As características supracitadas somam-se o relevo acidentado da região durante a sedimentação e a associação com o Sistema Leque Aluvial Jacareí.

As principais fácies de um sistema fluvial entrelaçado (braided) são: fácies arenosas de preenchimento de canal, fácies de barras longitudinais e fácies de barras transversais. A distinção entre elas é feita somente pela análise das estruturas internas. SMITH (1970, in SUGUIO & BIGARELLA,

1979) em estudos de sedimentos recentes do Rio Platte, Estados Unidos, mostrou que as barras longitudinais predominam nas partes superiores dos rios entrelaçados (braided) e caracterizam-se por estratificações horizontais; as barras transversais ocorrem principalmente nas partes inferiores deste sistema e são portadoras de camadas frontais de estratificações cruzadas. Acanalamentos podem ocorrer secundariamente.

No Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí foram reconhecidas as três fácies supracitadas, embora com certa precaução, pois não é uma tarefa fácil distinguir barras longitudinais e barras transversais em afloramentos. Mesmo assim, a unidade 5 do perfil esquemático PE-1 pode ser interpretada como uma barra longitudinal, enquanto a unidade 14 deste mesmo perfil possui características sugestivas de barra transversal. As fácies de preenchimento de canal estão bem caracterizadas nas descrições dos perfis PE-1 e PE-3.

4.5. SISTEMA FLUVIAL MEANDRANTE CAÇAPAVA

O Sistema Fluvial Meandrante Caçapava é o sistema deposicional predominante ao longo do eixo longitudinal da Bacia de Taubaté, e está associado aos Sistemas Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí e Lacustre Tremembé. Sua ocorrência em superfície é registrada principalmente entre São José dos Campos e Pindamonhangaba, além de ocorrências esparsas a partir desta localidade até a borda leste da bacia.

Este sistema parece tender ao tipo meandrante pelítico, isto é, aquele onde há predominância das fácies de transbordamento sobre as fácies de canal. Contudo, não se deve esquecer que pelítico e psamítico são termos aplicados aos membros extremos de um espectro contínuo onde, em geral, predominam os termos intermediários.

A associação faciológica foi a feição definitiva no reconhecimento deste sistema. Fácies de planície de inundação bem desenvolvida associada às fácies de dique marginal, rompimento de dique marginal, barra de meandro e preenchimento de canal são típicas de rios meandantes.

Estas fácies estão bem caracterizadas nas descrições dos perfis esquemáticos PE-4, PE-5, PE-6, PE-7 e PE-8 e da seção colunar SCN-4.

4.6. SISTEMA LACUSTRE TREMEMBÉ

O Sistema Lacustre Tremembé é o sistema deposicional dominante na região central da Bacia de Taubaté. Sua ocorrência em superfície é registrada principalmente nas proximidades de Quiririm, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, além de ocorrências esparsas entre Guaratinguetá e Lorena e entre Caçapava e Monteiro Lobato.

PICARD & HIGH JR. (1972) enfatizam que não existem critérios que, sozinhos, sejam suficientes para reconhecer depósitos lacustres antigos, já que não existe seqüência ou padrão faciológico, biota, assembléia mineral ou estruturas sedimentares caracteristicamente lacustres e nem textura, evidências geoquímicas, padrões de paleocorrentes ou litologia que sejam exclusivas deste ambiente. Assim, as características que, combinadas, indicaram a origem lacustre desses depósitos, compreendem:

a) Litologia e estruturas sedimentares: a predominância de sedimentos pelíticos finamente laminados, as vezes com aspecto mosqueado devido à intensa bioturbação, e a presença de calcários microcristalinos são indicativas de deposição em águas calmas.

b) Continuidade lateral e vertical: a persistência lateral das unidades sedimentares e a espessura dos de

pósitos, que ultrapassa 200 m (SUGUIO, 1969) entre Tremembé e Pindamonhangaba, é sugestiva de origem lacustre.

c) Conteúdo fossilífero: a abundante e diversificada biota fossilizada contida nestes sedimentos, representada por mamíferos, aves, répteis, peixes de água doce, crustáceos e vegetais, entre outros, sustenta a origem aventada.

d) Composição faciológica: a associação de fácies com as características acima descritas com fácies turbidíticas é compatível com o ambiente lacustre.

No Sistema Lacustre Tremembé foram reconhecidas duas fácies: fácies lacustre propriamente dita e fácies turbidítica.

A fácies lacustre é constituída de siltitos, argilitos, folhelhos pirobetuminosos e sub-betuminosos e calcários. A cor predominante é a verde-oliva, com tonalidades variáveis segundo o teor de umidade. Quando aumenta a concentração de matéria orgânica, a cor torna-se mais escura, aproximando-se do preto. As principais estruturas sedimentares são a maciça, a laminação, em geral, fina e as bioturbações, que muitas vezes chegam a destruir quase que completamente a laminação, conferindo à rocha um aspecto mosqueado. O conteúdo fossilífero, já mencionado, é rico, diversificado e caracteristicamente continental. As maiores e mais típicas exposições desta fácies podem ser vistas no bairro Estiva em Taubaté, onde se encontram as minerações de bentonita "Argila Menegaldo" (desativada) e "Argila Virgílio" (seção colunar SCN-5), e no bairro Padre Eterno em Tremembé, onde se acha a mineração de bentonita da Fazenda Santa Fé.

A fácies turbidítica merece destaque especial, já que está sendo reconhecida pela primeira vez na Bacia de Taubaté. Deve ser entendida como uma fácies depositada por correntes de turbidez, ou seja, correntes de densidade produzidas pela suspensão de sedimentos na água, tornando-a mais densa do que o meio envolvente com a mesma temperatura ou salinidade (MEDEIROS, SCHALLER & FRIEDMAN, 1971). Esta fácies foi identifi

cada num afloramento existente no km 12,8 da rodovia SP-123 (seção colunar SCN-3), onde pode ser vista uma seqüência de Bouma completa Ta-e: a-intervalo gradacional, b-intervalo inferior de laminações paralelas, c-intervalo de laminações onduladas, d-intervalo superior de laminações paralelas, e-intervalo pelítico (Foto 8). Além dessa seqüência completa, ocorrem mais duas seqüências de Bouma incompletas, indicando a superposição de, pelo menos, três ciclos distintos. Apenas mais um afloramento, situado na estrada Guaratinguetá - Colônia Piagui (seção colunar SCN-8), parece mostrar novamente a fácies turbidítica, com duas seqüências de Bouma incompletas, associada a depósitos originados por escorregamentos, que serão discutidos a seguir.

Os depósitos supracitados são constituídos de siltitos argilosos, verdes, contendo pequenas camadas deformadas de arenito, diques de arenito irregulares e contorcidos, e lentes de extremidades lobadas de arenito com estratificações cruzadas e gradações. Estes corpos de arenito que aparecem imersos nos siltitos são aqui interpretados como resultado de escorregamentos sub-aquosos, gerados por condições de instabilidade no lago. Fenômenos de fluidização dos arenitos originaram os diques, que ocorrem contorcidos devido à compactação posterior. Estes depósitos foram observados em dois afloramentos da Estrada Guaratinguetá - Colônia Piagui, 1,5 km e 0,3 km antes daquela localidade.

O reconhecimento da fácies turbidítica no Sistema Lacustre Tremembé vem modificar sobremaneira a interpretação das ditas intercalações arenosas nos sedimentos da Formação Tremembé que, segundo HASUI & PONÇANO (1978), seriam de origem fluvial e resultantes da passagem gradativa de predominância de condições lacustrinas a predominância de condições fluviais. As camadas de sedimentos arenosos, que aparecem intercaladas em vários níveis do pacote sedimentar pelítico atravessado pelo furo 42 do Conselho Nacional do Petróleo, estudado em detalhe por SUGUIO (1969), são aqui interpretadas também como fácies turbidíticas lacustres.

CAPÍTULO V

ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS

5.1. FINALIDADES E MÉTODO

Essas análises objetivaram principalmente a classificação textural e a caracterização granulométrica dos sedimentos da bacia. Os prováveis processos de transporte e de deposição também foram estudados a partir dos resultados de análises granulométricas.

Foram estudadas, além das amostras da autora, setenta e oito amostras coletadas por SUGUIO (1969) quando da realização da sua tese de doutoramento (Tabela 2). Um rápido exame das Tabelas 1 e 2 mostra que a amostragem realizada pela autora teve o intuito de completar a amostragem anterior de SUGUIO (*op cit*).

Inicialmente, as amostras, secas previamente em estufa, foram quarteadas para se chegar a porções adequadas, conforme a litologia, sendo cerca de 50 gramas para os materiais argilosos e silticos e 100 gramas para os materiais arenosos e conglomeráticos. A seguir, procedeu-se a desagregação das amostras, manualmente ou com auxílio de um martelo de borracha.

Após o quarteamento e a desagregação, as amostras foram colocadas em suspensão e homogeneizadas por meio de agitador rotativo, utilizando-se pirofosfato de sódio ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$) como defloculante.

O método seguido nas análises granulométricas foi o do peneiramento para as partículas entre 4,000 e

TABELA 2 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS COLETADAS POR SUGUIO (1969)

SEÇÃO COLUNAR	LOCALIZAÇÃO	AMOSTRA	FORMAÇÃO
SC - 1	Rodovia Presidente Dutra, km 187,1 margem direita, rumo Rio de Janeiro	J - 6 a J - 8	Caçapava
SC-3A	E.F.C.B., Viaduto dos Remédios (km 177,6 da Rodovia Presidente Dutra) margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	J-20 a J-26	Caçapava
SC - 4	Rodovia Presidente Dutra, km 175,2 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	J-31 a J-36	Caçapava
SC - 6	Rodovia Presidente Dutra, km 173,2 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	J-41 a J-43	Caçapava
SC - 7	Rodovia Presidente Dutra, km 172,3 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	J-44 a J-50	Caçapava
SC - 9	Rodovia Presidente Dutra, km 168,7 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	J-54 a J-60	Caçapava
SC-11	Rodovia Presidente Dutra, km 123,2 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	T - 9 a T-15	Caçapava
SC-12	Rodovia Presidente Dutra, km 136,2 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	T-17 a T-24	Caçapava
SC-16	Rodovia Presidente Dutra, km 127,5 margem direita, rumo Rio de Janeiro	T-40 a T-46	Caçapava

TABELA 2 - conclusão

SEÇÃO COLUNAR	LOCALIZAÇÃO	AMOSTRA	FORMAÇÃO
SC-17	Estrada Taubaté-Tabuão, a 2,2 km da saída 109 da Rodovia Presidente Dutra margem direita, rumo Tabuão	T-51 a T-53, T-55 a T-57	Caçapava
SC-18	E.F.C.B., km 333,0	G-8 a G-10	Contato Tremembé-Aluviões Antigos?
SC-19	Rodovia Presidente Dutra, km 103,0 margem esquerda, rumo Rio de Janeiro	G-12 a G-15	Caçapava
SC-20	Guaratinguetã, bairro Nova Guarã, próximo ao Estádio Municipal	G-17, G-20 a G-23	Caçapava
SC-21	Rodovia Presidente Dutra, 1 km após a entrada para Guaratinguetã margem direita, rumo Rio de Janeiro	G-28, G-30 e G-31	Caçapava
PONTO			
ST-18	Estrada Guaratinguetã-Colônia Piagui, 5,5 km após a ponte velha sobre o Rio Paraíba em Guaratinguetã	G-24	Tremembé
ST-19	Estrada Guaratinguetã-Colônia Piagui-Lorena, 2,6 km após o cruzamento na Colônia Piagui	G-27	Tremembé (?)

OBS.: 1- A localização estratigráfica exata das amostras pode ser vista em SUGUIO (1969).

2- As quilometragens aqui citadas para a Rodovia Presidente Dutra foram atualizadas a partir das de SUGUIO (1969), com base em tabela fornecida pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

0,062 mm de diâmetro, enquanto que aquelas entre 0,062 e 0,004 mm foram dimensionadas por pipetagem, processo baseado na lei de STOKES (1851, in SUGUIO, 1973). O valor 0,062 mm, limite entre os dois processos, corresponde ao diâmetro inferior da areia muito fina na classificação de WENTWORTH (1922) e está próximo ao limite de aplicabilidade da lei de Stokes. Os seixos maiores que 4,000 mm foram todos enquadrados numa única classe, o mesmo acontecendo para as partículas menores que 0,004 mm de diâmetro.

Na fase de peneiramento utilizou-se uma bateria de peneiras com aberturas de 4,000; 2,830; 2,000; 1,410; 1,000; 0,707; 0,500; 0,354; 0,250; 0,177; 0,125; 0,088 e 0,062 mm e a escala granulométrica adotada foi a de WENTWORTH (*op cit*). Detalhes sobre o processo de pipetagem podem ser encontrados em SUGUIO (1973).

5.2. CARACTERIZAÇÃO TEXTURAL DOS SEDIMENTOS

5.2.1. PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DAS DISTRIBUIÇÕES

Os parâmetros estatísticos foram calculados utilizando-se as fórmulas propostas por FOLK & WARD (1957). Os cálculos foram efetuados no computador HEWLETT PACKARD 9825 B do Instituto de Geociências da UNESP, Campus de Rio Claro, a partir de programa desenvolvido pelo Prof. Dr. Paulo Milton Barbosa Landim, em linguagem BASIC.

Os dados usados neste programa são o peso inicial da amostra e os pesos de cada fração granulométrica, obtendo-se então: as porcentagens de cada classe granulométrica; as porcentagens acumuladas; os percentis ($\phi 5$, $\phi 16$, $\phi 25$, $\phi 50$, $\phi 75$, $\phi 84$ e $\phi 95$) interpolados em curva acumulativa sobre papel de probabilidade aritmética; os parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (*op cit*) para distribuição total (intervalos areia, silte e

argila) e, se necessário, para distribuição areia. Pode-se obter ainda, a partir deste programa, as coordenadas do diagrama de SAHU (1964), calculadas a partir dos parâmetros estatísticos de FOLK & WARD (*op cit*) para a distribuição areia.

Os resultados dos parâmetros estatísticos (diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e curtose) para as distribuições total e areia encontram-se na Tabela 3. Os parâmetros para a distribuição areia foram calculados para amostras com mais de 35% de areia. Esta cifra foi escolhida arbitrariamente, objetivando enquadrar o maior número de amostras possível nestes cálculos.

5.2.2. ANÁLISE DE FREQUÊNCIA DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS

A análise de frequência dos parâmetros de FOLK & WARD (*op cit*) foi efetuada no intuito de se verificar o comportamento conjunto desses parâmetros nas fácies de leques aluviais, fluviais e turbidíticas (Tabela 4).

5.2.2.1. Fácies de leques aluviais

São sedimentos heterogêneos do ponto de vista granulométrico, variando de areia fina até silte muito fino, com leve predominância de silte grosso (35%) e areia muito fina (25%). A seleção varia de muito pobre (80%) a pobre (20%), com assimetria predominantemente muito positiva (85%), ou seja, com seleção mais pobre para o lado dos clásticos finos. As curvas variam desde muito platicúrticas até extremamente leptocúrticas, com frequências progressivamente decrescentes do primeiro ao último tipo.

Considerando-se apenas a distribuição areia das amostras, verifica-se que predominam as areias finas (38,9%) e médias (33,3%), moderadamente selecionadas (61,1%). A melhoria de seleção na distribuição areia em relação à distribuição total já era esperada, devido à eliminação das frações silte e

TABELA 3 - RESULTADOS DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DE FOLK & WARD (1957)
PARA AS DISTRIBUIÇÕES TOTAL E AREIA DAS AMOSTRAS DA BACIA DE TAUBATÉ

Amostra nº	DISTRIBUIÇÃO TOTAL					DISTRIBUIÇÃO AREIA				
	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose
BT - 1	5,192	0,027	2,246	0,598	0,530	3,305	0,101	0,430	-0,061	1,045
BT - 2	6,870	0,009	2,356	-0,716	1,375	1,870	0,274	1,374	-0,072	0,789
BT - 3	4,242	0,053	1,872	0,620	1,344	3,110	0,116	0,512	-0,122	1,007
BT - 4	4,737	0,037	2,747	0,456	0,535	2,520	0,174	0,847	-0,068	0,938
BT - 5	3,921	0,066	2,508	0,619	0,839	2,293	0,204	0,734	0,071	0,995
BT - 6	2,461	0,182	1,409	0,538	3,684	2,183	0,220	0,483	-0,065	1,249
BT - 7	3,087	0,118	3,351	0,725	0,763	0,821	0,566	0,892	0,283	1,096
BT - 8	3,467	0,090	3,336	0,553	0,879	1,302	0,406	1,168	0,084	0,898
BT - 9	2,630	0,162	2,239	0,553	1,948	1,649	0,319	0,881	-0,084	1,194
BT-10	2,451	0,183	2,397	0,728	2,756	1,190	0,438	0,606	0,036	1,183
BT-11	3,681	0,078	3,116	0,540	0,964	1,684	0,311	1,114	-0,060	0,987
BT-12	4,128	0,057	3,117	0,464	0,553	1,917	0,265	1,130	-0,115	0,953
BT-13	4,278	0,052	2,346	0,665	0,724	2,661	0,158	0,585	0,103	0,977
BT-14	4,239	0,053	2,258	0,594	0,908	2,745	0,149	0,638	0,033	0,885
BT-16	4,075	0,059	2,285	0,578	0,855	2,538	0,172	0,669	0,218	0,937
BT-17	3,756	0,074	2,282	0,472	1,081	2,424	0,186	0,866	-0,078	0,895
BT-18	4,583	0,042	1,996	0,559	1,023	3,214	0,108	0,576	-0,246	0,978
BT-19	5,217	0,027	2,390	0,369	0,555	3,021	0,123	0,590	-0,177	0,957
BT-20	4,725	0,038	2,856	0,215	0,530	2,240	0,212	0,999	0,311	0,658
BT-21	3,297	0,102	2,744	0,852	0,837	1,404	0,378	0,484	0,324	1,604
BT-22	7,066	0,007	1,857	-0,688	0,619					
BT-23	4,169	0,056	2,521	0,376	0,856	2,575	0,168	0,952	-0,117	0,693
→ BT-24	2,465	0,181	3,312	0,692	1,550	0,482	0,716	1,036	0,227	1,023
→ BT-25	3,886	0,068	2,881	0,687	1,020	1,872	0,273	0,671	-0,106	0,963
→ BT-26	6,309	0,013	2,696	-0,743	0,552					
→ BT-27	4,496	0,044	2,771	0,403	0,897	2,639	0,161	1,078	-0,331	1,153

TABELA 3 - continuação

Amostra nº	DISTRIBUIÇÃO TOTAL					DISTRIBUIÇÃO AREIA				
	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose
BT-29	3,424	0,093	2,534	0,227	1,489	2,106	0,232	1,256	-0,087	0,821
BT-30	5,586	0,021	2,358	0,180	0,561	3,090	0,117	0,652	-0,420	2,156
BT-31	3,433	0,093	3,442	0,543	0,531	0,828	0,563	1,157	0,357	1,174
BT-32	3,509	0,088	3,328	0,584	0,707	1,305	0,405	1,098	-0,225	1,199
BT-33	2,876	0,136	3,645	0,707	0,780	0,353	0,783	1,005	0,168	1,220
BT-34	3,729	0,075	3,171	0,684	0,548	1,282	0,411	0,772	-0,520	1,263
BT-35	4,878	0,034	3,225	-0,049	0,523	1,659	0,317	1,506	0,243	1,202
BT-36	3,862	0,069	2,772	0,813	1,335	1,915	0,265	0,577	0,267	1,636
BT-37	3,325	0,100	3,243	0,654	1,383	1,102	0,466	0,933	0,059	1,135
BT-38	4,313	0,050	2,497	0,558	1,569	2,767	0,147	0,672	-0,576	0,653
BT-39	2,270	0,207	3,386	0,743	2,230	0,121	0,920	0,883	0,071	1,254
BT-41	3,006	0,124	3,573	0,682	0,691	0,584	0,667	1,095	0,228	1,175
BT-42	4,314	0,050	3,241	0,294	0,537	1,806	0,286	1,259	-0,009	0,733
BT-43	2,731	0,151	3,612	0,708	1,017	0,225	0,856	0,920	0,035	1,106
BT-44	2,807	0,143	2,984	0,534	1,121	1,343	0,394	1,388	0,333	0,980
BT-45	3,010	0,124	2,927	0,501	1,348	1,842	0,279	1,486	0,041	0,981
BT-46	4,326	0,050	1,798	0,461	1,008	2,440	0,184	0,900	-0,085	0,767
BT-47	5,432	0,023	2,390	0,287	0,520	3,084	0,118	0,543	-0,181	1,131
BT-48	3,328	0,100	3,716	0,433	0,525	0,836	0,560	1,517	0,009	0,940
BT-49	4,743	0,037	2,713	0,548	0,495	2,561	0,169	0,667	0,079	0,653
BT-53	3,646	0,080	3,351	0,465	0,740	1,713	0,305	1,461	-0,064	0,944
BT-54	5,964	0,016	2,819	-0,611	0,477	2,364	0,194	1,002	0,332	1,028
BT-55	2,886	0,135	3,707	0,712	0,487	0,160	0,895	0,856	0,047	1,092
BT-56	4,501	0,044	2,923	2,477	0,484	2,145	0,226	0,834	0,366	1,265
BT-57	4,357	0,049	3,019	0,406	0,544	1,983	0,253	1,112	0,058	0,842
BT-58	2,784	0,145	3,830	0,612	0,543	0,265	0,832	1,286	0,173	0,991
BT-59	4,590	0,042	2,988	0,263	0,576	2,167	0,223	1,232	0,147	1,124
BT-60	4,499	0,044	2,910	0,443	0,519	2,276	0,206	0,938	0,127	0,768
→ BT-61	1,449	0,366	1,567	-0,031	1,796	1,340	0,395	1,161	-0,289	1,188

TABELA 3 - continuação

Amostra nº	DISTRIBUIÇÃO TOTAL					DISTRIBUIÇÃO AREIA				
	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose
→ BT-62	6,729	0,009	2,101	-0,551	0,728					
→ BT-63	5,200	0,027	2,143	0,620	1,480	3,280	0,103	0,730	-0,726	2,684
→ BT-64	1,661	0,316	1,011	-0,060	2,621	1,611	0,327	0,965	-0,115	2,898
→ BT-65	4,709	0,038	1,895	0,611	1,118	3,385	0,096	0,442	-0,102	1,312
BT-66	4,515	0,044	1,905	0,613	1,359	3,319	0,100	0,483	-0,137	2,151
BT-67	4,224	0,054	1,797	0,612	1,840	3,071	0,119	0,677	-0,424	2,016
BT-68	4,217	0,054	2,035	0,407	1,591	3,168	0,111	0,745	-0,553	0,715
BT-69	2,359	0,195	2,299	0,414	1,022	1,411	0,376	1,164	-0,141	1,221
BT-70	2,156	0,224	2,177	0,419	1,290	1,477	0,359	1,097	-0,147	1,364
BT-71	4,890	0,034	1,585	0,398	1,262					
BT-72	4,237	0,053	2,687	0,672	0,671	2,459	0,182	0,825	0,492	0,746
BT-73	4,531	0,043	2,636	0,626	0,598	2,578	0,167	0,749	-0,206	1,265
BT-74	3,912	0,066	2,566	0,693	0,870	2,384	0,192	0,905	0,439	0,943
BT-75	4,231	0,053	2,862	0,643	0,517	2,141	0,227	0,693	0,043	1,042
BT-76	3,387	0,096	1,959	0,164	1,272	2,589	0,166	1,058	-0,244	0,909
BT-77	5,102	0,029	2,473	0,144	1,170					
BT-78	4,538	0,043	2,678	0,273	0,717	2,393	0,190	0,983	0,262	0,948
BT-79	4,678	0,039	1,461	0,527	1,459	3,567	0,084	0,472	-0,517	1,930
BT-80	4,324	0,050	2,275	0,336	0,928	3,072	0,119	0,848	-0,642	0,569
BT-81	5,017	0,031	1,667	0,369	1,355					
J - 6	8,231	0,003	0,395	-0,327	2,822					
J - 7	1,651	0,319	2,108	0,278	1,748	1,372	0,386	1,147	-0,010	1,023
J - 8	2,771	0,147	3,085	0,253	0,834	1,421	0,373	1,429	-0,059	0,837
J-20	5,168	0,028	2,962	-0,400	0,514	1,649	0,319	1,082	0,219	0,909
J-21	5,223	0,027	1,985	0,572	0,968					
J-22	2,315	0,201	2,882	0,782	2,375	0,540	0,688	0,686	0,256	1,351
J-23	4,942	0,033	2,345	0,424	0,507	2,898	0,134	0,603	-0,131	0,764
J-24	2,918	0,132	3,454	0,676	1,637	0,622	0,650	0,859	0,084	1,122
J-25	5,337	0,025	3,060	-0,532	0,590	1,823	0,283	1,292	-0,186	0,818

TABELA 3 - continuação

Amostra nº	DISTRIBUIÇÃO TOTAL					DISTRIBUIÇÃO AREIA				
	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose
J-26	3,187	0,110	3,170	0,755	1,598	1,147	0,452	0,946	0,350	1,135
J-31	2,984	0,126	2,649	0,412	1,244	1,699	0,308	1,175	-0,023	0,895
J-32	7,486	0,006	1,428	-0,836	2,955					
J-33	4,901	0,034	2,326	0,453	0,513	2,909	0,133	0,627	-0,209	0,909
J-34	4,870	0,034	2,255	0,508	0,601	2,992	0,126	0,549	-0,212	0,827
J-35	2,789	0,145	3,580	0,637	1,404	0,521	0,697	0,949	0,058	1,020
J-36	4,330	0,050	3,133	0,093	0,515	1,581	0,334	1,256	0,131	0,782
J-41	8,201	0,003	0,518	-0,399	3,815					
J-42	4,692	0,039	2,203	0,621	0,639	2,963	0,128	0,474	0,092	0,805
J-43	4,786	0,036	2,236	0,534	0,600	2,992	0,126	0,537	-0,165	0,726
J-44	6,209	0,014	2,650	-0,899	0,660					
J-45	3,084	0,118	3,226	0,617	1,132	0,975	0,509	0,966	0,047	1,008
J-46	6,427	0,012	2,342	-0,848	0,941					
J-47	7,957	0,004	0,597	-0,601	2,128					
J-48	3,404	0,095	3,145	0,638	1,860	1,318	0,401	0,889	-0,033	0,907
J-49	5,704	0,019	2,122	-0,014	0,528					
J-50	3,431	0,093	3,062	0,707	2,366	1,273	0,414	0,692	-0,110	1,087
J-54	5,089	0,029	2,317	0,335	0,507	2,928	0,131	0,588	-0,137	0,766
J-55	1,677	0,313	1,655	0,445	2,544	1,423	0,373	0,715	0,044	0,947
J-56	3,862	0,069	1,687	0,591	2,168	3,017	0,124	0,496	-0,128	0,794
J-57	8,073	0,004	0,365	-0,368	1,564					
J-58	1,750	0,297	2,180	0,515	2,614	1,007	0,498	0,786	-0,108	0,965
J-59	7,863	0,004	0,794	-0,696	2,455					
J-60	2,617	0,163	3,586	0,736	0,650	0,179	0,883	0,911	0,242	1,496
T - 9	7,911	0,004	0,730	-0,692	3,786					
T-10	3,901	0,067	2,724	0,744	1,141	1,903	0,267	0,568	0,041	1,164
T-11	4,447	0,046	2,394	0,743	0,599	2,625	0,162	0,450	0,082	1,152
T-12	7,992	0,004	0,738	-0,678	4,400					
T-13	3,958	0,064	2,630	0,792	1,095	1,989	0,252	0,484	0,184	1,241

TABELA 3 - continuação

Amostra nº	DISTRIBUIÇÃO TOTAL					DISTRIBUIÇÃO AREIA				
	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose
→ T-14	7,585	0,005	1,057	-0,777	1,133					
→ T-15	2,760	0,148	2,661	0,669	1,965	1,220	0,429	0,776	0,057	0,928
→ T-17	6,709	0,010	2,151	-0,890	2,661					
→ T-18	3,728	0,076	2,945	0,635	0,658	1,647	0,319	0,842	0,053	1,026
→ T-19	2,776	0,146	3,767	0,482	0,576	0,754	0,593	1,358	0,108	0,823
→ T-20	4,524	0,044	2,244	0,394	0,765	2,775	0,146	0,731	-0,168	1,008
→ T-21	7,533	0,005	1,065	-0,766	1,051					
→ T-22	5,369	0,024	2,015	0,452	0,514					
→ T-23	7,232	0,007	1,462	-0,828	1,075					
→ T-24	8,299	0,003	0,232	-0,164	1,467					
→ T-40	6,391	0,012	2,300	-0,793	0,617					
→ T-41	1,399	0,379	1,965	0,330	2,204	1,160	0,448	0,964	-0,036	0,984
→ T-42	2,826	0,141	3,638	0,577	0,473	0,482	0,716	1,182	0,108	0,988
→ T-43	6,368	0,012	2,572	-0,902	1,124					
→ T-44	3,171	0,111	3,011	0,708	1,806	1,140	0,454	0,752	0,064	0,988
→ T-45	2,575	0,168	2,917	0,588	1,663	1,046	0,484	1,081	0,125	0,916
→ T-46	4,431	0,046	2,932	0,210	0,511	1,821	0,283	1,051	0,064	0,931
→ T-51	3,962	0,064	2,358	0,625	1,179	2,452	0,183	0,705	0,060	0,922
→ T-52	7,827	0,004	0,802	-0,722	3,876					
→ T-53	4,164	0,056	3,151	0,195	0,522	1,604	0,329	1,291	0,038	0,845
→ T-55	4,967	0,032	2,533	0,163	0,511	2,542	0,172	0,769	-0,009	0,845
→ T-56	3,372	0,097	2,197	0,645	1,925	2,180	0,221	0,705	0,065	1,067
→ T-57	5,430	0,023	2,107	0,184	0,617					
→ G - 8	5,471	0,023	3,052	-0,618	0,633					
→ G - 9	2,436	0,185	2,197	0,669	1,221					
→ G-10	6,801	0,009	1,748	-0,627	0,917					
→ G-12	3,753	0,074	3,006	0,525	0,729	1,690	0,310	1,014	-0,069	0,976
→ G-13	2,077	0,237	2,288	0,088	2,202	1,726	0,302	1,084	-0,487	1,107
→ G-14	4,134	0,057	3,048	0,297	0,538	1,938	0,261	1,191	-0,060	0,817

TABELA 3 - conclusão

Amostra nº	DISTRIBUIÇÃO TOTAL					DISTRIBUIÇÃO AREIA				
	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose	Diâmetro médio(Ø)	Diâmetro médio(mm)	Desvio Padrão	Assime- tria	Curtose
→ G-15	6,153	0,014	2,682	-0,901	0,590					
G-17	3,369	0,097	3,054	0,250	0,820	1,643	0,320	1,318	-0,031	0,824
G-20	4,493	0,044	2,529	0,489	0,592	2,499	0,177	0,727	-0,013	0,876
G-21	7,398	0,006	1,295	-0,813	1,163					
G-22	2,924	0,132	2,753	0,334	1,131	1,654	0,318	1,337	0,004	0,750
G-23	4,875	0,034	3,302	-0,438	0,525	1,138	0,454	1,245	0,175	1,081
G-24	3,966	0,064	3,091	0,380	0,768	1,893	0,269	1,176	-0,217	1,148
G-27	4,138	0,057	2,797	0,538	0,484	1,969	0,255	0,827	0,141	1,041
G-28	3,647	0,080	3,071	0,562	1,006	1,606	0,329	1,061	0,008	1,013
G-30	2,380	0,192	3,069	0,404	1,169	1,241	0,423	1,324	0,152	0,946
G-31	1,327	0,399	0,769	-0,113	0,885	1,331	0,397	0,765	-0,110	0,882

TABELA 4 - FREQUÊNCIA PORCENTUAL DOS PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DE FOLK & WARD (1957)

PARA AS DISTRIBUIÇÕES TOTAL E AREIA

	DISTRIBUIÇÃO TOTAL			DISTRIBUIÇÃO AREIA		
	Fácies de le- ques aluviais	Fácies fluviais	Fácies turbidíticas	Fácies de le- ques aluviais	Fácies fluviais	Fácies turbidíticas
Diâmetro Médio (mm)						
1,000-0,500 (areia grossa)	-	-	-	5,6	17,9	-
0,500-0,250 (areia média)	-	5,0	-	33,3	46,2	36,4
0,250-0,125 (areia fina)	15,0	18,0	16,7	38,9	29,5	36,4
0,125-0,062 (areia muito fina)	25,0	24,0	8,3	22,2	6,4	27,2
0,062-0,031 (silte grosso)	35,0	26,0	75,0	-	-	-
0,031-0,016 (silte médio)	10,0	10,0	-	-	-	-
0,016-0,008 (silte fino)	10,0	5,0	-	-	-	-
0,008-0,004 (silte muito fino)	5,0	9,0	-	-	-	-
<0,004 (argila)	-	3,0	-	-	-	-
Seleção (Desvio Padrão)						
<0,35 (muito bem selecionado)	-	1,0	-	-	-	-
0,35-0,50 (bem selecionado)	-	2,0	-	16,7	6,4	9,1
0,50-1,00 (moderadamente selecionado)	-	6,0	-	61,1	48,7	63,6
1,00-2,00 (pobremente selecionado)	20,0	11,0	25,0	22,2	44,9	27,3
2,00-4,00 (muito pobremente selecionado)	80,0	80,0	75,0	-	-	-
>4,00 (extremamente mal selecionado)	-	-	-	-	-	-
Assimetria						
-1,00 - -0,30 (assimetria muito negativa)	10,0	20,0	-	-	9,0	18,2
-0,30 - -0,10 (assimetria negativa)	-	2,0	-	27,8	15,4	45,4
-0,10 - 0,10 (aproximadamente simétrica)	-	2,0	-	50,0	44,8	9,1
0,10 - 0,30 (assimetria positiva)	5,0	16,0	-	11,1	23,1	18,2
0,30 - 1,00 (assimetria muito positiva)	85,0	60,0	100,0	11,1	7,7	9,1
Curtose						
<0,67 (muito platicúrtica)	30,0	38,0	25,0	5,6	3,8	-
0,67-0,90 (platicúrtica)	30,0	12,0	16,7	16,6	25,7	27,2
0,90-1,11 (mesocúrtica)	15,0	9,0	16,7	55,6	42,3	18,2
1,11-1,50 (leptocúrtica)	10,0	17,0	25,0	16,6	24,4	36,4
1,50-3,00 (muito leptocúrtica)	10,0	20,0	16,6	5,6	3,8	18,2
>3,00 (extremamente leptocúrtica)	5,0	4,0	-	-	-	-
Número de amostras	20	100	12	18	78	11

argila. As distribuições são aproximadamente simétricas em 50% das amostras e com assimetria negativa em 27,8% delas. As curvas variam desde muito platicúrticas até muito leptocúrticas, com predominância das mesocúrticas (55,6%).

5.2.2.2. Fácies fluviais

O diâmetro médio nestas fácies varia de areia média a argila, evidenciando heterogeneidade granulométrica, com certa predominância de silte grosso (26%) e areia muito fina (24%). A seleção é muito pobre em 80% das amostras, que apresentam assimetria muito positiva (60%), indicando seleção mais pobre nas frações mais finas. Quanto à curtose, as curvas apresentam-se desde muito platicúrticas até extremamente leptocúrticas, com ligeira predominância das muito platicúrticas (38%).

Analisando-se somente a distribuição areia, observa-se que predominam as areias médias (46,2%) e finas (29,5%), ora moderadamente selecionadas (48,7%), ora pobremente selecionadas (44,9%). As distribuições são aproximadamente simétricas em 44,8% das amostras e as curvas variam de muito platicúrticas a muito leptocúrticas, com certo predomínio das mesocúrticas (42,3%).

5.2.2.3. Fácies turbidíticas

As amostras pertencentes a estas fácies apresentam diâmetro médio variando de areia fina a silte grosso, sendo este último predominante (75%). A seleção varia de muito pobre (75%) a pobre (25%) e a assimetria é muito positiva em 100% das amostras, evidenciando maior espalhamento nas frações mais finas. Quanto à curtose, as curvas apresentam-se desde muito platicúrticas até muito leptocúrticas.

Considerando-se somente a distribuição areia, verifica-se que as areias variam de médias a muito finas, com frequências aproximadamente iguais para os três tipos, mode-

radamente selecionadas (63,6%). A assimetria é variável, sendo negativa em 45,4% das amostras. As curvas variam de platicúrticas a muito leptocúrticas.

5.2.2.4. Conclusões gerais

Comparando-se os resultados obtidos para as fácies supracitadas nota-se a grande heterogeneidade granulométrica dos sedimentos dos leques aluviais e fluviais, em contraste com os turbidíticos, mais homogêneos. Na bacia como um todo predominam os sedimentos finos, mais especificamente, silte grosso e areia muito fina.

Os graus de seleção dos sedimentos exibem uma marcante homogeneidade em todas as fácies estudadas, atestada pelo fato de cerca de 80% dos sedimentos de quaisquer das fácies serem muito pobremente selecionados e os 20% restantes, pobremente selecionados. Apenas uma pequena parcela (9%) dos sedimentos das fácies fluviais mostram uma melhor seleção. Esta imaturidade textural generalizada na bacia é possivelmente devida ao curto transporte sofrido pelos sedimentos, provenientes, em sua maioria, das bordas laterais.

A assimetria também se mostra muito homogênea, pois aproximadamente 80% dos sedimentos analisados apresentam assimetria muito positiva, indicando seleção mais pobre nas frações mais finas.

Os valores de curtose são bastante variáveis em todas as fácies, com ligeira predominância das curvas muito platicúrticas (cerca de 30% dos sedimentos analisados), de onde se conclui que existe mistura de sedimentos finos e grosseiros em quantidade considerável, fato que já foi observado durante as descrições das seções colunares.

5.3. DIAGRAMA DE SAHU

SAHU (*op cit*), utilizando-se dos parâmetros estatísticos granulométricos de FOLK & WARD (*op cit*) e da análise estatística chamada análise discriminatória multivariável, construiu, empiricamente, a partir de características encontradas em ambientes atuais, um diagrama que distingue os vários mecanismos e os ambientes de deposição dos sedimentos. Cabe ressaltar que o autor restringiu-se à distribuição areia devido à variabilidade das propriedades das partículas mais finas.

Embora cerca de 95% das amostras coletadas pela autora e por SUGUIO (1969) pertençam à Formação Caçapava, devendo, portanto, situar-se no campo dos sedimentos fluviais deste diagrama, tentou-se verificar possíveis variações da energia deposicional em diferentes partes ao longo da bacia. Para isso, foram selecionados e plotados no diagrama de Sahu (Figura 20) catorze grupos de amostras da Formação Caçapava que receberam os prefixos GJ, GSJ, GC, GT, GP, GG e GL conforme sua localização nas proximidades das cidades de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, respectivamente.

Os resultados obtidos evidenciam um decréscimo de energia, ao longo do eixo longitudinal da bacia, de Jacareí para Lorena, ou seja, de SW para NE. Assim, esse decréscimo de energia coincide com o sentido de transporte dos sedimentos determinado por SUGUIO (1969) através de medidas de estratificações cruzadas.

FIGURA 20: Amostras da Formação Caçapava plotadas no diagrama de SAHU (1964)

CAPÍTULO VI

MODELO DE EVOLUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR

A evolução da Bacia de Taubaté, no contexto regional, está diretamente relacionada com a evolução da Bacia de Santos (ALMEIDA, 1976). Neste quadro amplo, a Bacia de Taubaté faz parte do sistema de fossas tectônicas (rifts) da Serra do Mar, que evoluiu, a partir do Oligoceno, pela subsidência da Bacia de Santos e levantamento da região costeira emersa adjacente.

Os cinco sistemas deposicionais identificados nesta bacia definem um modelo de sedimentação estritamente continental, com fácies lacustres e fluviais, por sua vez, associadas a fácies de leques aluviais. Durante a evolução da bacia, os sistemas deposicionais controlados, principalmente, pela tectônica, assumiram importâncias variáveis, a intervalos de tempo distintos, caracterizando três fases contínuas de desenvolvimento da sedimentação: uma fase inicial predominantemente lacustrina, uma fase transicional e uma fase final predominantemente fluvial.

A primeira fase tem início no Terciário Inferior, em época não posterior ao Oligoceno, com subsidência lenta, sincrônica à sedimentação, criando-se condições fisiográficas favoráveis à deposição de sedimentos lacustres, essencialmente pelíticos. Por vezes, ocorriam pulsações tectônicas mais intensas, responsáveis pela formação de leques aluviais e deposição de turbiditos lacustres, relacionados à Serra da Mantiqueira em ascensão. Na sondagem 42 do CNP, SUGUIO (1969) descreveu 9 intercalações arenosas nos 200 m de sedimentos do Lago Tremembé, que são aqui interpretadas também como depósitos turbidíticos as

sociados a pulsos tectônicos distintos, sincrônicos à sedimentação.

A fase transicional tem lugar desde a cessação da subsidência do Lago Tremembé, com migração da atividade tectônica para NE e SW, isto é, para os dois extremos deste lago alongado (HASUI & PONÇANO, 1978), e implantação, na borda sudoeste da bacia, do Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí, correspondente ao primitivo Rio Paraíba do Sul. Enquanto isso, desenvolveram-se diversos sistemas entrelaçados (braided) secundários associados a leques aluviais coalescentes nas bordas norte (principalmente) e sul da bacia.

A fase final de sedimentação pode ter começado no Oligoceno Superior ou no Mioceno, com o assoreamento do Lago Tremembé e implantação do Sistema Fluvial Meandrante Caçapava, com sentido geral SW-NE conforme mostram as medidas de estratificações cruzadas (SUGUIO, 1969) e os resultados granulométricos discutidos no capítulo precedente.

A atividade tectônica persistiu por muito tempo após a deposição dos últimos sedimentos fluviais, como atestam as falhas que afetam a Formação Caçapava e também os colúvios superpostos.

CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

A. Fica mais uma vez patenteada a inequívoca origem tectônica da Bacia de Taubaté, refletida nas relações mútuas entre as características textural e mineralógica do seu preenchimento sedimentar sintectônico e o embasamento pré-cambriano.

B. Segundo HASUI *et al.* (1978) e HASUI & PONÇANO (1978), as bordas escarpadas que margeiam o Graben do Paraíba resultam de um sistema de pequenas falhas normais, subparalelas, algumas das quais reativações com rejeitos normais de antigas falhas transcorrentes do Pré-cambriano. Além disto, estes estudos mostraram também que o *graben* é assimétrico, com subsidência mais acentuada junto à Serra da Mantiqueira (borda norte da Bacia de Taubaté), fato já observado por SUGUIO (1969), e complexo, com três altos estruturais transversais.

C. Pelas características descritas nos capítulos precedentes, torna-se evidente que todo o preenchimento sedimentar da bacia foi influenciado pelo tectonismo, que prosseguiu muito tempo após a sedimentação, achando-se não só as últimas camadas como também o colúvio afetados por falhas normais.

D. A extremidade sudoeste da bacia parece ter sofrido um levantamento pós-deposicional, fato já sugerido por SUGUIO (1969), evidenciado por mudanças no contorno da bacia, no cenário geomorfológico, no padrão de drenagem e nas características dos sedimentos, conforme foi discutido no Capítulo III. Assim, os sedimentos expostos na região de Jacareí devem representar a porção basal da Formação Caçapava, depositada

na época em que cessou a subsidência do Lago Tremembé e teve início a sedimentação fluvial.

E, Durante a realização dos trabalhos de campo foram identificados, e pela primeira vez descritos, os aluviões antigos do Rio Paraíba do Sul, provavelmente correlacionáveis, em termos litológicos e em idade, aos aluviões antigos dos Rios Pinheiros e Tietê, reconhecidos e estudados pela primeira vez por SUGUIO & TAKAHASHI (1970), hoje denominados formalmente de Formação Itaquaquetuba por COIMBRA *et al.* (1983).

F, Foram reconhecidos cinco sistemas deposicionais na Bacia de Taubaté, a partir de estudos de afloramentos: Sistema Leque Aluvial Jacareí, Sistema Fluvial Entrelaçado (braided) Jacareí, Sistema Fluvial Meandrante Caçapava, Sistema Leque Aluvial Quiririm e Sistema Lacustre Tremembé.

A aplicação do conceito de sistemas deposicionais ao estudo desses depósitos permitiu uma melhor compreensão do preenchimento sedimentar da bacia e a elaboração de um modelo de evolução tectono-sedimentar.

Além disso, durante a análise do Sistema Lacustre Tremembé foram pela primeira vez identificadas e descritas fácies turbidíticas lacustres, que vêm esclarecer o significado real das freqüentes intercalações arenosas no espesso pacote pelítico da Formação Tremembé.

G, As análises granulométricas dos sedimentos das fácies dos leques aluviais, fluviais e turbidíticas mostraram uma forte homogeneidade nas características texturais, atestada por uma imaturidade generalizada, possivelmente, devida ao curto transporte sofrido pelos sedimentos provenientes em sua maioria das bordas laterais. As amostras das fácies fluviais plotadas no diagrama de SAHU (1964) evidenciaram um decréscimo de energia ao longo do eixo longitudinal da bacia, de SW para NE, confirmando o transporte dos sedimentos neste sentido,

conforme sugeriram os dados de estratificações cruzadas de SUGUIO (1969).

H. O ambiente climático durante a deposição do Sistema Lacustre Tremembé foi recentemente definido por LIMA *et al.* (1983) através de estudos palinológicos, resultando em muito frio e seco, portanto diferente do atual, que é quente e úmido, e compatível com a presença de montmorillonita na Formação Tremembé. No caso do Sistema Fluvial Meandrante Caçapava o clima ainda não foi definido, mas também deve ter sido diferente do atual, conforme enfatizou SUGUIO (1969). Fica a esperança de que, contrariamente ao que ocorreu com as amostras de superfície, as de subsuperfície sejam férteis em palinomorfos, o que viria subsidiar as informações não somente sobre o paleoclima mas também sobre a sua idade.

I. A subdivisão da Bacia de Taubaté nas Formações Tremembé e Caçapava é aceitável, embora se possa aventar a hipótese da definição de uma nova unidade litoestratigráfica talvez Formação Jacareí, para representar os sistemas de leques aluviais presentes em todo o pacote sedimentar da bacia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01. AB'SABER, A.N. (1958) Novos conhecimentos sobre os depósitos da Bacia de Taubaté. *Notícias Geomorfológicas*, 1(1): 13.
02. AB'SABER, A.N. (1969) O Quaternário na Bacia de Taubaté: estado atual dos conhecimentos. *Geomorfologia*, 7, 22p.
03. AB'SABER, A.N. & BERNARDES, N. (1958) Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e arredores de São Paulo. XVIII Congr. Intern. Geogr., Rio de Janeiro, RJ, *Guia de Excursões*, 4: 1-303.
04. ALMEIDA, F.F.M. (1946) Ocorrências de camadas supostas pliocênicas no Rio Paraíba, Estado de São Paulo. *Geologia e Metalurgia*, 2:71-74.
05. ALMEIDA, F.F.M. (1952) Novas ocorrências de camadas supostas pliocênicas nos Estados de São Paulo e Paraná. *Bol. SBG-SP*, 1(1):53-58.
06. ALMEIDA, F.F.M. (1955) As camadas de São Paulo e a tectônica da Serra da Cantareira. *Bol. SBG-SP*, 4(2):23-40.
07. ALMEIDA, F.F.M. (1958) Vale do Paraíba. Div. Geol. Miner. DNPM-RJ, p.90-91. [Relatório Anual do Diretor]
08. ALMEIDA, F.F.M. (1964) Geologia do Estado de São Paulo - Fundamentos geológicos do relevo paulista. *Bol. IGG-SP*, 41:167-274.
09. ALMEIDA, F.F.M. (1967) Origem e evolução da Plataforma Brasileira. *Bol. DGM, DNPM-RJ*, 241, 36p.

10. ALMEIDA, F.F.M. (1976) The system of continental bordering the Santos Basin, Brazil. *An.Acad.brasil.Ciênc.*, 48: 15-26. [Suplemento]
11. ALVARENGA. H.M.F. (1982) Uma gigantesca ave fôssil do Cenozóico brasileiro: *Physornis brasiliensis* sp. n. *An. Acad.brasil.Ciênc* , 54(4):697-712.
12. ARAI, M. (1982) Relações existentes entre a cor e a potencialidade palinológica do sedimento. *Bol. IG-USP*, 13: 75-80.
13. BJORNBERG, A.J.S.; GANDOLFI, N.; PARAGUASSU, A.B. (1965) Novas observações sobre a tectônica moderna do leste de São Paulo. *Eng.Min.Metal.*, 41(244):137-140.
14. BOUMA, A.H. (1962) *Sedimentology of some flysch deposits*. Amsterdam, Elsevier Publ.Co., 168p.
15. BOYD, D.R. & DYER, B.V. (1964) Frio barrier system of South Texas. *Trans.Gulf Coast Assoc.Geol.Soc.*, 14:309-322.
16. BRITO, I.M. (1979) *Bacias sedimentares e formações pós-paleozóicas do Brasil*. Rio de Janeiro, RJ., Ed.Interciência Ltda., 179p.
17. CAMPOS, J.M. (1952) A jazida pirobetuminosa do Vale do Paraíba. *Eng.Min.Metal.*, XVI(96):417-21.
18. CARNEIRO, C.D.R. (1977) *Geologia e evolução geológica da Folha de São José dos Campos, SP*. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 106p. [Dissertação de Mestrado]
19. CARNEIRO, C.D.R.; HASUI, Y.; GIANCURSI, F.D. (1976) Estrutura da Bacia de Taubaté na região de São José dos Campos. XXIX Congr.Bras.Geol., Belo Horizonte, MG, *Anais*, 4: 247-256.

20. CARVALHO, M.D.; PAUMER, L.M.; LIMA, C.C.; BABINSKI, N.A.; FANHA, A.B.; CAROZZI, A.V. (1982) Sistemas deposicionais e evolução diagenética dos carbonatos e evaporitos da Plataforma de São Mateus (ES). XXXII Congr.Bras.Geol., Salvador, BA, *Anais*, 5:2328-2335.
21. CAVALCANTE, J.C. & KAEFER, L.Q. (1974) Geologia da Folha de Santos (parcial). XXVIII Congr.Bras.Geol., Porto Alegre, RS, *Anais*, 4:227-245.
22. COIMBRA, A.M.; RICCOMINI, C.; MELO, M.S. (1983) A Formação Itaquaquacetuba: evidências de tectonismo no Quaternário paulista. IV Simp.Reg.Geol., São Paulo, SP, *Atas*. [no prelo]
23. CORDANI, U.G.; COIMBRA, A.M.; BOTTURA, J.A.; RODRIGUES, E.L.M. (1974) Geologia da região de Cruzeiro e Cachoeira Paulista e sua importância na interpretação tectônica do Vale do Paraíba. *Geol.Ciênc.Téc.*, CEPEGE, 6:9-30.
24. DEFFONTAINES, P. (1939) A geografia humana no Brasil. *Rev. Bras.Geogr.*, 1(1):19-67.
25. DE MARTONE, E. (1943) Problemas geomorfológicos do Brasil tropical Atlântico. *Rev.Bras.Geogr.*, 4:523-550.
26. DE MARTONE, E. (1944) Problemas geomorfológicos do Brasil tropical Atlântico. *Rev.Bras.Geogr.*, 2:155-178.
27. DERBY, O.A. (1895) A denominação "Serra da Mantiqueira". *Rev.Inst.Hist.Geogr.*, 1:3-15.
28. FISHER, W.L. & MCGOWEN, J.H. (1967) Depositional systems in the Wilcox Group of Texas and their relationship to occurrence to oil and gas. *Trans.Gulf Coast Assoc. Geol. Soc.*, 17:105-125.

29. FISHER, W.L.; GAMA Jr., E.G.; OJEDA, H.A. (1973) Estratigrafia sísmica e sistemas deposicionais da Formação Piaçubuçu. XXVII Congr.Bras.Geol., Aracajú, SE, *Anais*, 3: 123-133.
30. FISHER, W.L.; MORALES, R.G.; DELLA PIAZZA, H.; BROWN Jr., L.F. (1974) Sistemas deposicionais das Bacias de Mucuri, Cumuruxatiba e Jequitinhonha. XXVIII Congr.Bras.Geol., Porto Alegre, RS, *Anais*, 1:13-26.
31. FLORENCE, G. & PACHECO, J. (1929) *Carta geológica do Estado de São Paulo*. Comis.Geogr.Geol., São Paulo, SP,
32. FOLK, R.L. & WARD, W.C. (1957) Brazos river bar. A study in the significance of grain size parameters. *Jour.Sed. Petrol.*, 27:3-26.
33. FRANGIPANI, A. (1963) Idéias sobre a gênese do Vale do Paraíba. *O IGG*, XVI:31-39.
34. FRANGIPANI, A. & PANNUTI, E.L. (1965) Estudos hidrogeológicos na Bacia de Taubaté, entre Jacareí e Quiririm. *Bol. IGG*, 42, 126p.
35. FREITAS, R.O. (1956) Considerações sobre a tectônica e geologia do Vale do Paraíba. *Eng.Min.Metal.*, XXIV(143): 276-283.
36. GAMA Jr., E.G. (1977) *Sistemas deposicionais e o modelo de sedimentação das Formações Campos e Emborê, Bacia de Campos, Rio de Janeiro, Brasil*. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 104p. [Tese de Doutorado]
37. GAMA Jr., E.G. (1979) A sedimentação do Grupo Passa Dois (exclusive Formação Irati): um modelo geomórfico. *Rev. Bras.Geociênc.*, 9(1):1-16.

38. HASUI, Y. & PONÇANO, W.L. (1978) Organização estrutural e evolução da Bacia de Taubaté. XXX Congr.Bras.Geol., Recife, PE, *Anais*, 1:368-381.
39. HASUI, Y.; GIMENEZ, A.F.; MELO, M.S. (1978) Sobre as bacias tafrogênicas continentais do sudeste brasileiro. XXX Congr.Bras.Geol., Recife, PE, *Anais*, 1:382-392.
40. HASUI, Y.; PONCANO, W.L.; BISTRICHI, C.A.; STEIN, D.P.; GALVÃO, C.A.C.F.; GIMENEZ, A.F.; ALMEIDA, M.A.; PIRES NETO, A.G.; MELO, M.S.; SANTOS, M.C.S.R. (1978) *Geologia da Região Administrativa 3 (Vale do Paraíba) e parte da Região Administrativa 2 (Litoral) do Estado de São Paulo*. DMGA-IPT, Sér.Mon. 1, 78p.
41. HAYES, M.O. & SCOTT, A.J. (1964) Environmental complexes, South Texas Coast. *Trans.Gulf Coast Assoc.Geol.Soc.*, 14: 237-240.
42. KRYNINE, P.D. (1935) Arkose deposits in the humid tropics - A study of sedimentation in Southern Mexico. *Amer. Jour.Sci.*, 29(10):353-363.
43. LIMA, M.R.; SALARD-CHEBOLDIAEFF, M.; SUGUIO, K. (1983) Étude palynologique de la Formation Tremembé, Tertiaire du Bassin de Taubaté (État de São Paulo, Brésil), d'après les échantillons du sondage n° 42 du CNP. VIII Congr.Bras. Paleont., Rio de Janeiro, RJ, *Anais*. [no prelo]
44. MAULL, O. (1930) *Von Itatiaya zum Paraguay ergebnisse eine Forschungreise dursch Mittel-Brasilien*. Leipzig.
45. MEDEIROS, R.A. (1980) Sistemas deposicionais. XXXI Congr. Bras.Geol., Camboriú, SC, *Bol.*, 5, 31p.

46. MEDEIROS, R.A.; SCHALLER, H.; FRIEDMAN, G.M. (1971) Fácies sedimentares - análises e critérios para o reconhecimento de ambientes deposicionais. *Ciência-Técnica-Petróleo*, Petrobrás, 123p.
47. MEZZALIRA, S. (1961-1962) Novas ocorrências de vegetais fósseis cenozóicos no Estado de São Paulo. *O IGG*, XV: 73-94.
48. MEZZALIRA, S. & PAULA COUTO, C. (1971) Nova conceituação geocronológica de Tremembé, Estado de São Paulo, Brasil. *An.Acad.brasil.Ciênc.*, 43:473-488. [suplemento]
49. MORAES REGO, L.F. (1932) *Notas sobre a geomorphologia de S.Paulo e sua genesis*. São Paulo Ed. Ltda., 28p.
50. MORAES REGO, L.F. (1937-1941) A geologia do Estado de São Paulo. *Bol. DER*, 138p.
51. PAULA COUTO, C. (1958) Idade geológica das bacias cenozóicas do Vale do Paraíba e de Itaboraí. *Bol.Mus.Nac.Sér. Geol.*, 25:1-17.
52. PETTIJOHN, F.J. (1975) *Sedimentary rocks*. 3rd ed., New York, Harper & Row, 628p.
53. PICARD, M.D. & HIGH Jr., L.R. (1972) Criteria for recognizing lacustrine rocks. In: *Recognition of Ancient Sedimentary Environments* (edited by J.K.Rigby & W.K.Hamblin). Soc. Econ.Paleont.Mineral., Spec.Publ., 16:108-145.
54. PISSIS, A. (1842) Memoire sur la position géologique des terrains de la partie australe du Brésil et sur les soulèvements qui, a divers époques on changé le relief de cette contrés. *Acad.Sci.Paris*, 10:353-413.

55. PONÇANO, W.L.; CARNEIRO, C.D.R.; BISTRICHI, C.A.; ALMEIDA, F.F.M.; PRANDINI, F.L. (1981) *Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo*. DMGA-IPT, Sér.Mon. 5, 1, 94p.
56. PONTE, F.C. & MEDEIROS, R.A. (1981) Sistemas deposicionais na Bacia do Recôncavo, Estado da Bahia. *Ciências da Terra*, 1:14-18.
57. RAGONHA, E.W. (1982) Evolução tecto-sedimentar da Bacia de Taubaté com fundamento na sua ictiofauna. *An.Acad.brasil.Ciênc.*, 54(4):679-689.
58. RICH, J.L. (1953) Problems in Brazilian geology and geomorphology suggested by reconnaissance in summer of 1951. *Bol.Fac.Fil.Ciênc.Letr.- USP*, 146, Geol. 9, 80p.
59. RUELLAN, F. (1943) A região meridional de Minas Gerais e a evolução do Vale do Paraíba. *Bol.Geogr.*, 1(8):95-102.
60. RUELLAN, F. (1953) *O Escudo brasileiro e os dobramentos de fundo*. [Curso de especialização em geomorfologia] Fac. Nac.Fil., Dep.Geogr., Rio de Janeiro, RJ, p.39-59.
61. SAHU, B.K. (1964) Depositional mechanisms from the size analysis of clastic sediments. *Jour.Sed.Petrol.*, 34:73-83.
62. SANTOS, R.S. (1970) Nova evidência paleontológica da idade pleistocênica dos estratos da Bacia do Paraíba. *Eng.Min.Metal.*, 51(301):10.
63. SETZER, J. (1955) Os solos do Município de São Paulo (primeira parte). *Bol.Paul.Geogr.*, 20:3-30.
64. SETZER, J. (1956) Aspectos hidrogeológicos do Estado de São Paulo. *Plano de eletrificação do Estado de São Paulo*, DAEE, p.323-443.

65. SUGUIO, K. (1969) Contribuição à geologia da Bacia de Taubaté, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. *Fac.Fil. Ciênc.Letr.- USP*, 106p. [Boletim Especial]
66. SUGUIO, K. (1973) *Introdução à sedimentologia*. São Paulo, SP, Ed.Edgard Blücher Ltda., Ed.USP, 317p.
67. SUGUIO, K. & BIGARELLA, J.J. (1979) Ambiente Fluvial. *Ambientes de sedimentação, sua interpretação e importância*. Curitiba, PR, Ed.UFP, Assoc.Def.Educ.Amb., 183p.
68. SUGUIO, K. & TAKAHASHI, L.I. (1970) Estudo dos aluviões antigos dos Rios Pinheiros e Tietê, São Paulo, SP. *An. Acad.brasil.Ciênc.*, 42(3):555-570.
69. TRAVASSOS, H. & SANTOS, R.S. (1955) Caracídeos fósseis da Bacia do Paraíba. *An.Acad.brasil.Ciênc.*, 27(3):297-322.
70. TRICART, J. & SILVA, T.C. (1958) Aspectos gerais da sedimentação da Bacia de Taubaté, São Paulo, Brasil. *Notíc. Geomorf.*, 1(1):6-13.
71. VICALVI, M.A. (1982) O primeiro registro de peixes fósseis na Formação Caçapava do Estado de São Paulo. *An. Acad.brasil.Ciênc.*, 54(2):351-354.
72. WASHBURNE, C.W. (1930) Petroleum geology of the State of São Paulo - Brazil. *Bol.Comiss.Geogr.Geol.*, 22, 282p.
73. WENTWORTH, C.K. (1922) A scale of grade and class terms for clastic sediments. *Jour.Geol.*, 30:377-392.
74. WICKERT, W.Q. (1974) *Contribuição ao estudo da paleontologia da Bacia de Taubaté, Estado de São Paulo*. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 69p. [Dissertação de Mestrado]