UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS - Acervo - IGC

30900017630

**EVOLUÇÃO E DINÂMICA ATUAL DO SISTEMA
CÁRSTICO DO ALTO VALE DO RIO RIBEIRA DE
IGUAPE, SUDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Ivo Karmann

Orientador: Prof. Dr. Georg Robert Sadowski

TESE DE DOUTORAMENTO

COMISSÃO JULGADORA

	nome	ass.
Presidente :	Dr. G.R.Sadowski	
Examinadores:	Dr ^a M.Szikszay	
	Dr. R.Hypólito	
	Dr. W.L.Ponçano	
	Dr. C.L.Maciel Filho	

SÃO PAULO
1994

"Cavernous limestone karst ... is the terrain type whose geomorphological understanding becomes an art, matured only through experience, and then applied sensitively and individually at each new site assessment."
(Waltham, 1981)

**Evolução e dinâmica atual do Sistema Cárstico do Alto Vale do Rio Ribeira de Iguape,
sudeste do Estado de São Paulo**

SUMÁRIO

	página
Índice de figuras	iv
Índice de tabelas	xi
Índice de fotografias	xiii
Lista de anexos	xiv
Resumo	xv
<i>Abstract</i>	xviii
Agradecimentos	xx
 CAPÍTULO 1 -	
Introdução	
1.1 Apresentação do tema de trabalho	1
1.2 Seleção da área estudada	2
1.3 Objetivos da pesquisa e organização da tese	5
1.4 Métodos e técnicas	5
 CAPÍTULO 2 -	
Fisiografia e geologia da região de estudo	
2.1 Contexto geológico regional e local da área estudada	7
2.2 Situação geomorfológica da área de estudo	13
2.3 Hidrografia e ambiente atual	14
2.4 As rochas carbonáticas do Alto Ribeira	15
 CAPÍTULO 3 -	
Drenagem superficial e formas de relevo do Carste do Alto Ribeira	
3.1 Arcabouço geológico e aspectos gerais da morfologia cárstica	17
Área carbonática Furnas Santana	17
Área carbonática Lageado Bombas	21
3.2 Zoneamento morfológico das áreas de amostragem	24
3.2.1 Zona fluvial	25
3.2.2 Zona de contato	28
3.2.3 Zona fluviocárstica	30
3.2.4 Zona de depressões poligonais e a transição de fluviocarste para carste poligonal	33
3.2.4.1 Depressões poligonais e a paleodrenagem fluvial	45
3.3 Morfometria das áreas de amostragem	50
Densidade de depressões	53
Índice de dolinamento	53
Razão de dolinamento	54
Densidade de sumidouros autogênicos	54
Índice de sumidouros autogênicos	55
Profundidade das depressões	55
Área e perímetro de depressões	57
3.4 Condicionamento estrutural e hidrológico do relevo	60
3.4.1 Geologia estrutural das áreas de estudo	61
Definição da superfície dobrada	61
Sistema de fraturamento. Medidas de juntas e falhas	62
3.4.2 Expressão fisiográfica de estruturas planares	70

3.4.3 Fatores condicionantes do relevo cárstico nas áreas estudadas	73
3.5 Conclusões	78

CAPÍTULO 4 -

A drenagem subterrânea e a evolução de sistemas de cavernas

4.1 Introdução	80
4.2 Distribuição e características físicas gerais dos sistemas de cavernas nas áreas investigadas	81
4.2.1 Distribuição de sistemas de cavernas	81
4.2.2 Áreas de captação dos sistemas de cavernas	85
4.2.3 Gradiente hidráulico dos sistemas de cavernas	86
4.2.4 Extensão de cavernas acessíveis ao longo dos sistemas	86
4.3 Modelo espeleogenético para o carste do Alto Ribeira	87
4.3.1 Aspectos teóricos da espeleogênese	87
4.3.2 Morfologia e características lito-estruturais das cavernas estudadas	90
4.3.2.1 Geometria planimétrica	90
Cavernas curvilíneas e sinuosas	90
Cavernas retilíneas e angulosas	92
Galerias e salões de abatimento	92
Relação entre sinuosidade e largura de fluxo	93
4.3.2.2 Geometria em seções longitudinais e transversais	94
Entalhamentos vadosos	94
Alargamento freático	103
Formas geradas pela incisão	103
Níveis de cavernas	104
4.3.2.3 Condicionamento estrutural e hidráulico da morfologia subterrânea	107
4.3.3 Espeleogênese na área de estudo	119
4.3.3.1 Fase de pré-iniciação	119
4.3.3.2 Fase de iniciação	119
4.3.3.3 Fase de desenvolvimento	128
4.3.3.4 Rebaixamento do nível de base e desenvolvimento da espeleogênese	136
4.4 Cronologia da evolução de condutos	137
4.4.1 Introdução	137
4.4.2 Taxas de entalhamento subterrâneo e a idade do sistema cárstico estudado	138
4.4.2.1 Localização e descrição dos pontos amostrados	139
4.4.2.2 Resultados obtidos	145
Taxas de entalhamento fluvial subterrâneo	148
Estimativa da idade de condutos e dos vales adjacentes ao sistema de cavernas Pérolas-Santana	150
4.5 Evolução do sistema cárstico num quadro geomorfológico regional	152
4.7 Conclusões	157

CAPÍTULO 5 -

Dinâmica moderna do sistema cárstico do Alto Ribeira

5.1 Introdução	160
5.2 Hidrologia cárstica do sistema Pérolas-Santana	160
5.2.1 Medição de vazão	160
Métodos utilizados	160
Resultados obtidos	163
5.2.2 Análise do fluviograma da ressurgência do sistema Pérolas-Santana	165
5.2.3 Balanço hídrico e área de captação do sistema Pérolas-Santana	171
Volume de precipitação	172
Volume de água escoada pelo sistema e sua área de captação	172

Evapotranspiração	173
Balanço hídrico da bacia do sistema Pérolas-Santana	173
Área de captação e recarga do sistema	174
5.3 Hidroquímica do carste do Alto Ribeira	175
5.3.1 Amostragem e parâmetros hidroquímicos medidos	176
5.3.2 Parâmetros hidroquímicos derivados	177
Dureza total	177
Condutividade específica corrigida para 20°C	177
Condutividade específica e dureza total	178
Razão molar cálcio/magnésio	179
Índices de saturação em calcita (SI_c) e dolomita (SI_d)	179
Pressão parcial de CO_2	179
Erro de balanço iônico (IBE)	180
5.3.3 Fácies hidroquímicas do carste estudado	180
Escoamento superficial alogênico	181
Escoamento superficial autogênico	182
Escoamento superficial fluviocárstico	182
Percolação autogênica vadosa em fissuras	183
Percolação autogênica vadosa em condutos	183
Circulação freática em condutos profundos	183
Ressurgências cársticas	185
5.3.4 Evolução geoquímica das águas do sistema cárstico estudado	186
5.4 Dinâmica corrosiva do sistema cárstico Pérolas-Santana	195
5.4.1 Taxa de saturação de águas alogênicas	195
5.4.2 Variação sazonal dos índices de saturação em calcita e dolomita de águas cársticas	196
5.4.3 Taxa de denudação química da bacia do sistema Pérolas-Santana	200
5.5 Conclusões	208
CAPÍTULO 6 -	
Considerações finais	212
REFERÊNCIAS	215

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1.1 - Localização, acesso e demarcação da área estudada. Os terrenos cársticos delimitam-se pelos sumidouros.	4
Figura 2.1 - Contexto geológico regional da área estudada, ressaltando a ocorrência de rochas carbonáticas.	8
Figura 2.2 - Contexto geológico local das áreas carbonáticas estudadas.	9
Figura 2.3 - Seção geológica simplificada do Subgrupo Lageado na região estudada. Adaptada de Campanha (1991). Legenda das unidades litológicas e localização da seção indicadas na figura 2.2.	10
Figura 2.4 - Classificação química das rochas carbonáticas do sudeste paulista, com base no diagrama de Martinet e Sougy (1961). Análises químicas de CaO e MgO obtidas em: Souza (1990), faixa carbonática Itaiacoca; Barbieri (1993), faixa carbonática Lajeado e MMAJ/JICA (1983), faixa carbonática André Lopes.	17
Figura 3.1 - Delimitação e denominação das áreas carbonáticas estudadas. *1- Bairro Furnas, *2- Caverna Santana, *3- Bairro Lajeado, *4- Bairro Bombas.	19
Figura 3.2 - Seções da área Furnas-Santana. 1-1', seção longitudinal, sem exagero vertical. 2-2' e 3-3', seções transversais, com exagero vertical de 2×. Localização indicada na fig 3.1	20
Figura 3.3 - Seções da área Lajeado-Bombas. 4-4'- seção longitudinal, sem exagero vertical. 5-5'- seção transversal com 2× de exagero vertical. Localização das seções indicada na fig 3.1	22
Figura 3.4 - O abismo Ponta de Flecha no contexto da inversão de relevo causada pela retração das encostas do vale do rio Betari, bairro da Serra, área Lajeado-Bombas.	27
Figura 3.5 - Perfis compostos de vales cegos. Gradiente médio indicado à esquerda	29
Figura 3.6 - Seção da caverna Lage dos Macaquinhos, representando um salão de desmoronamento associado a um paleo-sumidouro. Borda NE da área Lageado Bombas.	29
Figura 3.7 - Evolução esquemática de <i>poljes</i> de contato. A- Fase inicial de exposição dos calcários, escoamento superficial (R) predominante. B- Desenvolvimento de condutos subterrâneos e infiltração (I) crescente. C- Condutos integrados, rebaixamento do N.A. e absorção total de R através de sumidouros, com instalação de vales cegos. D- Incisão mais profunda de vales cegos, entalhamento vadoso sobre condutos subterrâneos e retração da encosta calcária por colapso de cavernas. E- Desenvolvimento de planície aluvial-coluvial sobre os calcários, caracterizando o <i>polje</i> de contato	31
Figura 3.8 - Exemplo de <i>polje</i> de contato, junto ao sumidouro principal do sistema de cavernas Água Suja. Topografia extraída da carta U12, 1:10.000, DAEE, 1957.	32
Figura 3.9 - Exemplo do padrão planimétrico de depressões poligonais simples da região Furnas-Santana. P- profundidade da depressão. Contornos extraídos da folha V12, 1:10.000, DAEE, 1957.	36

- Figura 3.10** - Depressão composta (uvala) das Areias, região do Lajeado. A ressurgência e sumidouro marcados no centro, correspondem ao fundo da dolina de abatimento que dá acesso ao sistema de cavernas Areias. Extraído da folha W12, 1:10.000, DAEE, 1957. 37
- Figura 3.11** - Representação esquemática dos tipos fundamentais de formas de absorção do escoamento superficial em fundos de depressões poligonais na região estudada. A- infiltração difusa ao longo de fraturas alargadas por dissolução e colmatadas com material residual. B- infiltração concentrada ao longo de condutos verticais abertos (abismos). C- absorção direta do escoamento por condutos de sistemas de cavernas. 38
- Figura 3.12** - Seção esquemática representando a associação de formas de absorção do escoamento superficial em depressões poligonais. 1- Dolina de dissolução associada a rota de drenagem subterrânea eficiente. 2- Atual caverna vertical (abismo) representando antigo fundo de depressão com taxa de ampliação menor. 3- Fendas de dissolução na zona epicárstica. 4- Rota de infiltração vertical concentrada sobre descontinuidades. 5- Linhas de fluxo geradas pelo cone de rebaixamento do lençol freático. 6- Condutos associados à rede de drenagem subterrânea. 7- Superfície da rocha entalhada por sulcos de dissolução (*karren* cobertos). 8- Infiltração vadosa difusa na zona epicárstica. 9- Solo 40
- Figura 3.13** - Representação esquemática da evolução de um conjunto de depressões poligonais, através do modelo de competição e coalescência, gerando depressões compostas a as associações de dolinas de dissolução e abismos, com inversão de relevo. A a E, seções e A' a E', vista em planta.
A- Situação pré-carstificação.
B- Início de carstificação e aumento de permeabilidade secundária.
C- Instalação de um cone maior de rebaixamento do lençol freático sobre a rota preferencial de drenagem subterrânea. X marca a depressão com taxa de ampliação maior, devido a sua conexão com a drenagem subterrânea.
D- Englobamento de depressões menores pela depressão com taxa de ampliação maior (formação de depressões compostas).
E- Erosão de solo e detritos acumulados ao longo das rotas de infiltração de depressões menores inseridas no raio do cone de rebaixamento do lençol associado à depressão maior. Iniciação de dolinas secundárias (S) devido ao rebaixamento do lençol e conexão de rotas de infiltração com condutos subterrâneos. Inversão de relevo (I), com a localização de antigos fundos de dolinas nas encostas de depressões maiores. 42
- Figura 3.14** - Seções longitudinais dos abismos do Fóssil (A) e dos Caramujos (B), localizados na área carbonática Lajeado-Bombas. Adaptados de Gusso, et. al. (1979) e Collet et. al. (1970). As entradas destas cavernas verticais representam antigos fundos de depressões. 42
- Figura 3.15** - Fluxograma do processo de desenvolvimento e ampliação de depressões poligonais através do fenômeno de realimentação. 1, 2, 3 = linhas de realimentação positiva. Adaptado de Williams (1985). 43
- Figura 3.16** - Depressões secundárias (linha tracejada) contornando a depressão principal. Exemplo extraído do mapa morfológico da área Lajeado Bombas 44

Figura 3.17	- Sequência evolutiva de depressões poligonais a partir da drenagem fluvial. A- Fase inicial de exposição dos metacalcários. Drenagem superficial ativa e lençol freático raso. B- Drenagem superficial parcialmente ativa. Instalação de pontos de absorção do escoamento superficial. Rebaixamento do lençol freático sobre estes pontos. C- Drenagem superficial segmentada. Instalação de dolinas de dissolução. Desenvolvimento de divisores entre sumidouros. D- Ampliação dos divisores entre sumidouros e estabelecimento de bacias poligonais fechadas.	46
Figura 3.18	- Interpretação do traçado da paleodrenagem fluvial da área Furnas-Santana. 1- Ressurgência do córrego Grande. 2- Ressurgência do córrego do Grilo. 3- Ressurgência do córrego Roncador (caverna Santana). 4- Ressurgência do córrego Água Suja. 5- Ressurgência do córrego do Couto.	48
Figura 3.19	- Interpretação do traçado da paleodrenagem da área carbonática Lajeado-Bombas. 1- Ressurgência da córrego seco. 2- Ressurgência do córrego Ouro Grosso. 3- Ressurgência do córrego Alambari. 4- Ressurgência do Lago do Bairro da Serra. 5- Ressurgência do córrego das Águas Quentes (sistema Areias).	49
Figura 3.20	- Variação do gradiente médio (G) em função do comprimento de vales cegos (ΔL). 21 medidas.	51
Figura 3.21	- Distribuição das profundidades de depressões poligonais do carste do Alto Ribeira. A- área Lajeado-Bombas, 83 medidas. B- área Furnas-Santana, 23 medidas. C- total das medidas de ambas as áreas. Curvas de distribuição exponencial e normal obtidas através do programa Statgraphics.	56
Figura 3.22	- Histogramas de frequência e curvas de distribuição da área (A) e perímetro (B) das depressões poligonais da área carbonática Lajeado-Bombas.	58
Figura 3.23	- Área versus perímetro das depressões poligonais da região Lajeado-Bombas, 351 pontos, obtidos na escala 1:25.000.	60
Figura 3.24	- Projeção estereográfica das medidas de descontinuidades da área carbonática Furnas-Santana. Os círculos máximos em B a F indicam as atitudes predominantes.	63
Figura 3.25	- Projeção estereográfica das medidas de descontinuidades da área carbonática Lajeado-Bombas. Os círculos máximos em B a F indicam as atitudes predominantes.	64
Figura 3.26	- Representação esquemática da geometria em planta do sistema de fraturamento das áreas carbonáticas estudadas, com interpretação da posição do esforço de compressão máxima (σ_1) em relação ao dobramento.	66
Figura 3.27	- Histogramas do comprimento de fotolineamentos acumulados em função da direção.	71
Figura 3.28	- Interpretação do condicionamento estrutural dos principais alinhamentos de sumidouros autogênicos nas áreas Furnas Santana e Lajeado Bombas. Alinhamentos extraídos dos mapas morfológicos. AC- acamamento, FR- junta simples longa, FL- falha, DP- contorno aproximado de depressão poligonal. D- dique básico.	75
Figura 3.29	- Localização da zona de concentração de condutos cársticos com relação à topografia. Corte transversal a área Furnas-Santana, setor sul. A- Zona de carste poligonal B- Zona de transição de fluvio-carste para carste poligonal.	77

Figura 4.1	- Interpretação do condicionamento hidrológico da distribuição preferencial de sistemas de cavernas ao longo do contato SE dos metacalcários.	84
Figura 4.2	- Padrões em planta das rotas fluviais subterrâneas das cavernas da área estudada. As setas indicam o sentido do fluxo principal de água e (S) a sinuosidade destas rotas.	91
Figura 4.3	- Definição dos parâmetros planimétricos extensão e largura da faixa de fluxo.	92
Figura 4.4	- Sinuosidade em função da largura de fluxo das cavernas estudadas. Coeficiente de correlação 0,97 e R^2 de 95%, com modelo linear de correlação, sem considerar a caverna Santana.	93
Figura 4.5	- Classificação geométrica de seções transversais no plano vertical. L, largura; H, altura e F, traço de fratura.	95
Figura 4.6	- Seções transversais da caverna Santana. Traços contornando seções indicam o acamamento. <i>Canyon</i> vadoso, CV; conduto freático, CF, salão de abatimento, SA; conduto retangular, CR e conduto triangular, CT.	97
Figura 4.7	- Seções transversais da caverna Laje Branca. <i>Canyon</i> vadoso, CV; conduto freático, CF e salão de abatimento, SA; traço de falha, f.	98
Figura 4.8	- Seções transversais da caverna Areias. <i>Canyon</i> vadoso, CV; conduto freático, CF e salão de abatimento, SA, traço de fratura, F.	99
Figura 4.9	- Perfil longitudinal simplificado da caverna Santana, indicando a variação do topo do entalhamento vadoso.	100
Figura 4.10	- Exemplos de condutos verticais. A- Caverna Água Suja. B- Caverna Ouro Grosso. C- Caverna Santana.	102
Figura 4.11	- Formas geradas pela incisão na caverna Água Suja.	105
Figura 4.12	- Características de sistemas multifásicos observadas no sistema Pérolas Santana.	106
Figura 4.13	- Controle da sinuosidade de rotas de condutos pela relação angular (α) entre a direção do padrão de descontinuidades (fraturas e/ou planos de estratificação) e o gradiente hidráulico. Para simplificação da análise, utilizou-se um padrão ortogonal de descontinuidades verticais. Conceito adaptado de Worthington (1991).	108
Figura 4.14	- Geologia estrutural da caverna Santana. A- Planta da caverna. B- Histograma de direções do desenvolvimento da caverna. C e D- Projeção estereográfica de estruturas planares.	110
Figura 4.15	- Esquema interpretativo do condicionamento estrutural-hidráulico do padrão anguloso de ramos tributários da caverna Santana.	111
Figura 4.16	- Inflexões agudas na rota de fluxo condicionadas pela intersecção acamamento-falhas, observadas na caverna Santana. Esquemas A e B em planta.	112
Figura 4.17	- Geologia estrutural da caverna Lage Branca. A- Planta da caverna. B e C- Diagramas de projeção estereográfica. D- Histograma de direções do desenvolvimento total da caverna.	114

- Figura 4.18** - Geologia estrutural da caverna Areias. A- Planta da caverna. B e D- Projeção estereográfica de estruturas planares. C- Histograma de direções do desenvolvimento total da caverna. 116
- Figura 4.19** - Caráter meandrante da caverna Areias em torno do gradiente hidráulico, seguindo falhas e fraturas longas medidas. Segmento a-b indicado na figura 4.18A. Vide comentário no texto. 118
- Figura 4.20** - Características morfológicas e estruturais de proto-cavernas observadas na caverna Santana.
A- seção transversal indicando os pontos de observação, localizada a cerca de 300m a montante da ressurgência.
B- vista em planta da geometria de condutos de iniciação e canalículos de anastomose, observados no teto de conduto freático parcialmente preservado.
C- esquema tridimensional da relação entre proto-caverna, canalículos de anastomose e cone de dissolução, preservados no teto do ponto observado. As setas indicam o fluxo de água de percolação ao longo de discontinuidades. 121
- Figura 4.21** - Profundidade de condutos da caverna Santana em relação à superfície. (Seções localizadas na planta da caverna no lado inferior direito) 122
- Figura 4.22** - Diagrama da corrosão de mistura aplicado às águas do sistema Pérolas Santana. Acompanhar explicação no texto. Adaptado de Dreybrodt (1981b). 123
- Figura 4.23** - Linhas de fluxo condicionadas pelo mergulho da superfície de acamamento (adaptado de Worthington, 1991).
A- Iniciação de condutos condicionada somente pelo plano de acamamento.
B- Iniciação de condutos condicionada pelas intersecções acamamento - fraturas, gerando rotas côncavas escalonadas de condutos.
Dx- profundidade máxima de condutos.
Lx- extensão da área de captação
I- pontos de injeção. R- ponto de ressurgência.
Lf- largura da rota de fluxo.
L- linha de fluxo da água subterrânea
θ- mergulho do plano de acamamento 126
- Figura 4.24** - Profundidade média de fluxo (Dm) em função da extensão da área de captação do aquífero (Lx) e mergulho da estratificação (θ). * medidas da caverna Santana. Demais pontos extraídos de Worthington (1991). 127
- Figura 4.25** - Representação esquemática da morfologia em seção transversal resultante da fase de desenvolvimento. (1) abaixo do lençol freático, gerando tubos freáticos e (2), com rebaixamento do lençol, acompanhando a ampliação do conduto, gerando a seção típica, popularmente denominada de "buraco de fechadura". 129

- Figura 4.26** - Esquema simplificado da evolução de condutos associados ao sistema de cavernas Pérolas Santana, em perfil longitudinal. Escala aproximada.
A- Fase de Iniciação. Implantação de proto-condutos ao longo de uma rota de fluxo côncava escalonada, a uma profundidade média de 200m, na zona freática (ZF).
B- Fase de desenvolvimento. Conexão de uma rota preferencial de condutos freáticos entre a insurgência (I) e ressurgência (R), com cosequente ampliação da zona vadosa (ZV).
C- Ampliação de condutos freáticos e progressivo rebaixamento do NA. Entalhamento vadoso (EV) nos segmentos convexos (ascendentes) de condutos freáticos expostos acima do N.A.. Desenvolvimento de invasões vadosas (IV). Iniciação de proto-condutos em níveis freáticos abaixo do conduto principal.
D- Fase avançada de desenvolvimento da espeleogênese. Conexão das invasões vadosas com o sistema de cavernas desenvolvido. Ampliação das invasões vadosas, gerando condutos verticais (CV). Instabilização mecânica no maciço carbonático, causando modificação dos condutos acima do N.A., através de incisão (IN). Implantação de novas rotas de condutos profundos. Paleo-ressurgência (PR) localizada em cotas acima da ressurgência ativa. 130
- Figura 4.27** - Esquema da interpretação da variação vertical (sinuosidade vertical) de condutos freáticos em função da variação de altura do *canyon* vadoso ao longo do conduto principal da caverna Santana. No ponto B ocorre a transição de *canyon* vadoso para conduto freático ativo. 131
- Figura 4.28** - Tipos de ampliações freáticas observadas nas cavernas estudadas.
a- alargamento freático preferencial sobre plano de fratura ou falha
b- alargamento freático preferencial sobre plano de acamamento
c- alargamento homogêneo
d- alargamento freático com dissolução preferencial de estratos mais solúveis, produzindo seção irregular
e- seção freática irregular produzida pela corrosão de mistura gerando cones de dissolução. 132
- Figura 4.29** - Interpretação do rebaixamento do nível de água associado ao desenvolvimento de redes afluentes ao conduto principal da caverna Santana. No sistema tributário de condutos, a morfologia freática foi parcialmente preservada, enquanto que no conduto principal, ocorreu o entalhamento vadoso do *canyon*. 135
- Figura 4.30** - Seções transversais da caverna Pescaria indicando os pontos amostrados para geocronologia de calcita secundária. 140
- Figura 4.31** - Seção transversal à galeria do rio, junto ao ponto de amostragem C1, na caverna Santana, cerca de 200m da entrada. 142
- Figura 4.32** - Seção transversal mostrando a situação morfológica do ponto de amostragem C2, caverna Santana, entroncamento dos caminhos para o salão São Paulo e galeria dos "Vulcões". 143
- Figura 4.33** - Seção transversal no ponto de coleta CA3, caverna Alambari de Baixo. 144
- Figura 4.34** - Seção morfológica da caverna Morro Preto, junto ao ponto de coleta C11. 145
- Figura 4.35** - Altura sobre o leito fluvial atual versus a idade das amostras datadas, com indicação das barras de erro. A inclinação das retas ajustadas fornece as taxas de entalhamento fluvial para as cavernas estudadas. 148

Figura 4.36	- Quadro demonstrativo da cronologia de eventos geomórficos cenozóicos na região do Alto Ribeira. Subdivisão do Cenozóico adaptada de Van Eysinga (1975). 1- Entalhamento vadoso de sistemas de cavernas. 2- Fase de iniciação de condutos freáticos. 3- Dissecção da superfície de aplainamento Japi (entalhamento do vale do rio Betari). 4- Desenvolvimento da superfície Japi, segundo proposta deste trabalho. 5- Desenvolvimento da superfície Japi, segundo Almeida (1976). 6- Desenvolvimento da superfície Japi, segundo Almeida (1964). ~ Indicação da idade máxima e mínima em relação à média.	154
Figura 4.37	- Representação esquemática da aggradação do vale do rio Betari (no Bairro da Serra) e re-dissolução de estalagmites formadas sobre o leito fluvial de afluentes subterrâneos do rio Betari, interpretados como sendo produto da variação eustática do nível de base na área, durante a última fase glacial.	156
Figura 5.1	- Demarcação pelos divisores topográficos das áreas de captação referentes às bacias hidrográficas dos sistemas cársticos Pérolas-Santana e Grilo, com localização dos pontos de amostragem hidroquímica e de instalação dos limnógrafos.	161
Figura 5.2	- Relação entre altura do rio e vazão para a ressurgência do sistema Pérolas-Santana e sumidouro principal do sistema, caverna Pérolas.	164
Figura 5.3	- Hidrograma da ressurgência do sistema de cavernas Pérolas-Santana para o período de 11 de junho de 1990 a 16 de março de 1992.	166
Figura 5.4	- Hidrogramas de deflúvio com indicação dos coeficientes de recessão (α) da ressurgência da caverna Santana para os períodos de março a junho de 1991 e junho a agosto de 1991.	169
Figura 5.5	- Totais mensais de chuva medidos no posto pluviométrico Serra dos Motas (bairro da Serra, Iporanga).	172
Figura 5.6	- Geometria da conexão subterrânea entre os sistemas Pérolas-Santana e Grilo interpretada em função do balanço hídrico da bacia Pérolas-Santana e o padrão de condutos da área.	175
Figura 5.7	- Condutividade específica em função da dureza total das águas coletadas.	178
Figura 5.8	- Representação gráfica da variação dos principais parâmetros hidroquímicos das fácies hidroquímicas identificadas.	184
Figura 5.9	- Perfil esquemático de um sistema cárstico com a localização das fácies hidroquímicas identificadas na área de estudo.	185
Figura 5.10	- Variação do índice de saturação em calcita em relação à pressão parcial de CO ₂ nas fácies hidroquímicas identificadas. 1- Fácies de escoamento alogênico, 2-Fácies de escoamento fluvio-cárstico, 3- Fácies de escoamento autogênico, 4- Fácies de percolação vadosa em fissuras, 5- Fácies de percolação vadosa em condutos, 6- Fácies de circulação freática profunda e 7- Fácies de ressurgência cárstica.	188
Figura 5.11	- Variação da dureza total em relação à pressão parcial de CO ₂ nas fácies hidroquímicas identificadas.	188
Figura 5.12	- Variação da alcalinidade em relação ao pH nas fácies hidroquímicas identificadas na área de estudo.	189

Figura 5.13	- Alcalinidade em função do pH das amostras do rio Roncador na caverna Pérolas (A), do escoamento fluviocárstico na planície do polje junto ao sumidouro da cav. Pérolas (B) e da ressurgência na cav. Santana.	190
Figura 5.14	- Seção esquemática da superfície dos metacalcários nas encostas de bacias poligonais fechadas mostrando a morfologia da zona epicárstica (segundo definição de Williams, 1985). R1- escoamento superficial direto, R2- escoamento lateral na porosidade do solo, R3- escoamento lateral na zona epicárstica. Velocidade de $R1 > R2 > R3$. I- infiltração vertical, I>i, condicionando lençol freático temporário.	191
Figura 5.15	- Alcalinidade em função do pH das águas de percolação vadosa em fissuras.	192
Figura 5.16	- Variação dos índices de saturação em calcita e dolomita ao longo da drenagem do sistema Pérolas-Santana, entre o contato com metapelitos e a ressurgência do sistema. P1- sobre o contato, P2 e P3 - sobre a planície do polje de contato, P4- no início da caverna Pérolas e P5- na ressurgência do sistema, proximidades da entrada da caverna Santana.	196
Figura 5.17	- Variação sazonal do índice de saturação em calcita das águas da ressurgência da caverna de Santana e de percolação vadosa em fissuras em função da vazão do sistema de cavernas Pérolas-Santana.	198
Figura 5.18	- Relação entre dureza total e vazão da ressurgência do sistema Pérolas-Santana. Coeficiente de correlação -0,83. Envoltórias de 90 e 95 % de probabilidade.	199
Figura 5.19	- Distribuição de frequência das análises de dureza total (mg/l equivalentes a CaCO_3) da ressurgência da caverna Santana para o período de junho de 1990 a julho de 1991. Total de 23 amostras, média = 97,34 mg/l, coeficiente de variação = 8,8%. Os três grupos de frequência correspondem aos regimes de vazão alta, média e baixa, respectivamente, da esquerda para direita.	201
Figura 5.20	- Taxas de denudação cárstica (D) em função da precipitação efetiva ou escoamento da bacia ($P-E_v$), segundo White (1984). Os pontos plotados foram extraídos de 1- Ártico canadense, Smith (1962); 2 e 3- Polônia, Glazek e Markovicz-Lohinovicz (1973); 4- West Virginia, EUA, Ogden (1982); 5- Irlanda, Williams (1963); 6- Bulgária, Markovicz, et. al. (1972); 7- Montanhas Tatra, Polônia, Glazek e Markovicz-Lohinovicz (1973); 8- Nova Zelândia, Williams e Dowling (1979); 9- Nova Zelândia, Gunn (1981b); 10- Belize, Miller (1982); 11-Gunung Mulu, Malásia, Sweeting (1979) e R- Alto Ribeira, Brasil, ponto calculado no presente trabalho.	203
Figura 5.21	- Variação da dureza total em função da vazão na ressurgência da caverna Santana para o período de 29/6/90 a 18/6/91. Coeficiente de correlação de -0,88 e $R^2 = 76,8\%$.	207
Figura 5.22	- Fluxo de massa equivalente a g/s de CaCO_3 em função da vazão na ressurgência da caverna Santana. Coeficiente de correlação de 0,99 e $R^2 = 98,9\%$.	207

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 3.1	- Distribuição quantitativa das zonas morfológicas nas áreas estudadas. FS, área Furnas-Santana; LB, área Lajeado-Bombas.	50
Tabela 3.2	- Parâmetros morfométricos dos vales cegos	51
Tabela 3.3	- Índices morfométricos de sumidouros alogênicos e ressurgências das áreas estudadas.	52

Tabela 3.4	- Parâmetros morfométricos do carste poligonal do Alto Ribeira num quadro comparativo com outras áreas cársticas. * valores calculados com os dados publicados pelos autores citados.	54
Tabela 3.5	- Atitudes médias dos principais conjuntos de descontinuidades das áreas de estudo. Medidas extraídas dos estereogramas correspondentes das figuras 3.24 e 3.25. Número de medidas em parênteses	62
Tabela 4.1	- Características morfométricas dos principais sistemas de cavernas das áreas Furnas Santana (A) e Lajeado Bombas (B). * parte do desenvolvimento de cavernas extraídos de Martim, Chrysostomo e Rodrigues, 1989. Altitude em metros sobre o nível do mar. Extensão é a distância horizontal em linha reta entre sumidouro e ressurgência. Desnível é a distância vertical entre sumidouro e ressurgência. Comprimento de condutos é a somatória do desenvolvimento de cavernas mapeadas. Desenvolvimento é a somatória do comprimento de galerias e eixos maiores de salões, medidos em planta. C/ Δ L é o grau de cavernamento do sistema, ou seja, a razão entre o comprimento de condutos acessíveis e a extensão. a, b, c são índices referentes à diferentes tributários do sistema.	83
Tabela 4.2	- Áreas de captação de escoamento superficial na região investigada. * Áreas aflorantes de metacalcário menos as zonas fluviais.	86
Tabela 4.3	- Fração de condutos acessíveis ao longo da extensão (Δ L) dos sistemas nas áreas estudadas.	87
Tabela 4.4	- Parâmetros morfométricos planimétricos das principais cavernas da área estudada. Medidas obtidas sobre mapas 1:500 a 1:1000 das cavernas.	92
Tabela 4.5	- Variação do acamamento nas cavernas de Santana e Areias (de cima e de baixo). Entre parênteses são indicados os números de medidas.	109
Tabela 4.6	- Profundidades de condutos de iniciação e extensões de rotas completas sistemas de cavernas. Medidas 1 a 16 foram extraídas de Worthington (1991).	127
Tabela 4.7	- Resultados das análises de datação Th/U, realizadas no laboratório de geocronologia dos Departamentos de Geografia e Geologia da McMaster University, Hamilton, Canadá. () * Porcentagem de erro indicada entre parênteses.	147
Tabela 4.8	- Taxas de entalhamento vadoso vertical para as carvernas amostradas no Alto Ribeira.	149
Tabela 4.9	- Quadro comparativo entre taxas de entalhamento fluvial subterrâneo de diferentes regiões cársticas.	150
Tabela 5.1	- Vazões medidas na ressurgência da caverna Santana e na caverna Pérolas (respectivamente, ressurgência e sumidouro principal do sistema de cavernas Pérolas - Santana). * vazões medidas somente com o método de diluição de sal. Altura do rio medida sobre a régua de referência instalada para cada limnógrafo.	165
Tabela 5.2	- Parâmetros hidrológicos de vazão do sistema Pérolas-Santana. As vazões e volumes calculados envolvem um erro de até 12% devido à incerteza desta ordem de grandeza nas medições de vazão.	167

Tabela 5.3	- Classificação de nascentes cársticas em função das características da vazão (adaptado de Worthington, 1991).	167
Tabela 5.4	- Coeficientes de recessão calculados para a ressurgência da caverna Santana.	170
Tabela 5.5	- Parâmetros físico-químicos medidos e calculados para as fácies hidroquímica identificadas no sistema cárstico estudado. * - valores do coeficiente de variação não calculados	181
Tabela 5.6	- Classificação química das rochas carbonáticas da área carbonática Furna Santana. Análises químicas extraída de Barbieri (1993). * Composição média de 3 análises. $\bar{X}$ = valor médio, CV = coeficiente de variação, Δ = variação. () número de análises. CaO e MgO em % em peso na rocha.	186
Tabela 5.7	- Relação do fluxo de sólidos dissolvidos (g/s equivalente a CaCO_3) em função do regime de vazão da ressurgência do sistema Pérolas-Santana.	206
Tabela 5.8	- Relação dos períodos com vazão alta, média e baixa e os totais correspondentes em volume escoado (V) e massa equivalente a CaCO_3 removida em solução (V.T) pelo sistema Pérolas-Santana durante o período monitorado.	206
Tabela 5.9	- Quadro resumido das taxas de denudação química calculadas segundo métodos diferentes para a bacia do sistema Pérolas-Santana	208

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS

Foto 3.1	- Estratificação rítmica de camadas carbonáticas, pelítico-carbonáticas e pelíticas, típicas da área Furnas-Santana. Vista da parede lateral da galeria principal da caverna Laje Branca.	19
Foto 3.2	- Paredões calcários associados a vales cegos, característicos do contato entre metapelitos e metacalcários. Vale cego da caverna Laje Branca, contato SE da área Furnas-Santana.	23
Foto 3.3	- Exemplo de cone cárstico. Área Furnas-Santana, vista da estrada Apiaí - Iporanga, do mirante da serra da Boa Vista.	23
Foto 3.4	- Dolinas de subsidência em fundos de depressões poligonais. Sudeste da área Lajeado-Bombas.	34
Foto 3.5	- Vista típica de cones cársticos que delimitam depressões poligonais. Área Lajeado-Bombas, local denominado Sítio Novo.	34
Foto 4.1	- Espeleotema tipo "pata de elefante", ponto P3 da caverna Pescaria.	140
Foto 4.2	- Ponto de amostragem C1, caverna Santana, local conhecido como Pata de Elefante	142
Foto 4.3	- Bloco abatido de escorrimento calcítico de onde se extraiu a amostra C2.	143
Foto 4.4	- Vista do escorrimento calcítico suspenso, ponto CA3, indicado pela seta, caverna Alambari de Baixo.	144
Foto 4.5	- Aspecto do nivelamento de cristas na área estudada, correlacionado à superfície Japi. Vista do vale do rio Betari do mirante da Serra da Boa Vista, estrada Apiaí - Iporanga.	153

- Foto 5.1** - Vista do limnógrafo instalado na ressurgência do sistema Pérolas-Santana, a cerca de 100m da entrada da caverna Santana. A esquerda do limnógrafo observa-se a régua de referência.

161

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 3.1** - Mapa estrutural da área Furnas-Santana.
- Anexo 3.2** - Mapa estrutural da área Lajeado-Bombas.
- Anexo 3.3** - Mapa morfológico da área carbonática Furnas-Santana.
- Anexo 3.4** - Mapa morfológico da área carbonática Lajeado-Bombas.
- Anexo 3.5** - Zoneamento morfológico das áreas carbonáticas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas.
- Anexo 3.6** - Perfil longitudinal composto do rio Betari.
- Anexo 4.1** - Mapa geoespeleológico da caverna Laje Branca
- Anexo 4.2** - Distribuição de sistemas de cavernas nas áreas carbonáticas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas.
- Anexo 5.1** - Registro de variação do nível do rio na ressurgência da caverna Santana.
- Anexo 5.2** - Exemplo de cálculo de vazão pelo método de diluição de sal através do programa elaborado por Karmann (1989) em Turbo Pascal 6.0 (profissional).
- Anexo 5.3** - Listagem das análises químicas das amostras de água coletadas e de seus principais parâmetros calculados. SI_C = índice de saturação em calcita, SI_D = índice de saturação em dolomita, SAT_C e SAT_D = porcentagem de saturação em calcita e dolomita, IBE = erro de balanço iônico.
- Anexo 5.4** - Listagem da dureza total (mg/l equivalentes a $CaCO_3$), condutividade corrigida para 20°C e razão molar Ca/Mg das amostras de água coletadas.

RESUMO

Estudou-se do ponto de vista geomorfológico, geoespeleológico, hidrológico e hidrogeológico, uma área com terrenos cársticos desenvolvidos sobre metacalcários, metacalcários dolomíticos e magnesianos, de idade proterozóica média, pertencentes ao Grupo Açungui. A área localiza-se no alto vale do rio Ribeira de Iguape, entre os municípios de Apiaí e Iporanga, sudeste do Estado de São Paulo.

O mapeamento geomorfológico permitiu identificar uma sequência evolutiva da paisagem cárstica, a qual inicia-se com um sistema fluvial, onde os vales da drenagem superficial são gradativamente segmentados com o tempo, através da implantação de bacias de drenagem fechada, cujo desenvolvimento levou à formação de carste poligonal. Esta transição da paisagem fluvial para a cárstica levou à definição das zonas morfológicas fluviocárstica, de transição (com bacias poligonais compostas) e a de carste poligonal (com bacias poligonais simples).

O relevo cárstico é estruturalmente condicionado, onde os sumidouros (fundos de depressões poligonais) instalaram-se preferencialmente na intersecção entre planos de estratificação, juntas e falhas. Estes pontos de absorção do escoamento autogênico alinham-se preferencialmente sobre traços de acamamento, em situações de mergulho alto deste e, predominantemente sobre traços de fraturas longas e falhas, no caso de mergulho moderado a baixo do acamamento.

Propõe-se a evolução do conjunto de depressões poligonais através do processo de competição e coalescência entre estas (taxas de ampliação diferenciadas), o qual gera inversões de relevo, onde antigos fundos de depressões fechadas hoje localizam-se em cristas. Este processo é acompanhado pelo mecanismo de geração múltipla, onde depressões maiores com drenagem subterrânea mais eficiente, deflagram a instalação de depressões menores, vizinhas e sobre a maior.

A morfometria do relevo levou à conclusão de que o carste estudado é semelhante ao carste poligonal da Nova Guiné e Jamaica, com zonas de alto grau de carstificação, apesar das condições climáticas distintas do Alto Ribeira, em comparação com aquelas áreas.

Na área carbonática encaixante do sistema de cavernas Pérolas-Santana, a zona de carste poligonal mais desenvolvida é associada à concentração de condutos em profundidade nas proximidades da linha de contato SE da faixa carbonática.

O mapeamento geológico de cavernas evidenciou que entre o grande número e variedade de discontinuidades presentes na rocha metacarbonática, as estruturas mais favoráveis para instalação de condutos são os planos de estratificação, fraturas simples longas e falhas.

A morfologia planimétrica dos sistemas de cavernas reflete o estilo estrutural do metacalcário encaixante. Cavernas com padrão planimétrico retilíneo e anguloso (p. ex, cav. Santana), associam-se à mergulhos altos do acamamento, enquanto que o padrão sinuoso e curvilíneo (p. ex., cav. Areias) refletem mergulhos moderados a baixos da estratificação. O

grau de sinuosidade de condutos subterrâneos é controlado pelo ângulo agudo entre a direção do gradiente hidráulico e a descontinuidade favorável para instalação do conduto. Quanto maior for este ângulo, tanto mais sinuosa será a rota de condutos da água subterrânea.

A iniciação de proto-cavernas acompanha linhas de intersecção entre o acamamento e fraturas simples longas e falhas. O sistema de cavernas Pérolas-Santana segue o modelo de Worthington (1991), o qual prevê que a profundidade média (Dm) de iniciação de condutos freáticos (abaixo do N.A.) segue uma função exponencial, onde a base desta função é o produto entre o seno do ângulo de mergulho da estratificação ($\sin\theta$) e a distância (Lx) entre o ponto de insurgência e ressurgência da rota de condutos em iniciação (obteve-se a função $Dm = (Lx \sin \theta)^{0.82}$).

A fase de desenvolvimento da espeleogênese na área estudada produziu canyons vadosos com até 50m de entalhamento vertical. Este entalhamento é interpretado como produto de uma taxa moderada de rebaixamento do nível de base dos sistemas de cavernas, o que por sua vez, seria reflexo de um soerguimento tectônico moderado da área. Com base nas idades preliminares Th/U de calcita secundária sobre depósitos fluviais subterrâneos, estimou-se uma taxa máxima média de entalhamento vadoso subterrâneo de 0,0042cm/ano (42mm/ka). Aplicando esta taxa de entalhamento vadoso aos canyons subterrâneos observados na área, concluiu-se que os sistemas de cavernas da região encontram-se na fase de desenvolvimento por aproximadamente 1,7 Ma. A idade mínima do sistema Pérolas-Santana, incluindo a estimativa teórica de duração da fase de iniciação, é em torno de 2 Ma. A correlação deste entalhamento fluvial subterrâneo com o rebaixamento do canal fluvial externo do rio Betari, sobre metacalcários, permitiu estimar uma idade mínima de $6,4^{+7,4}_{-3,1}$ Ma. para o entalhamento do vale do rio Betari na área de estudo.

A ressurgência do sistema de cavernas Pérolas-Santana é do tipo fluxo total permanente (classificação de Worthington, 1991), com razão entre vazão máxima e mínima de 19,7 para o ano hidrológico de 1990-1991. Os coeficientes de recessão do deflúvio do escoamento básico desta ressurgência refletem um aquífero cárstico com alto grau de fissuramento interconectado, segundo classificação de Milanovic (1976).

Com base no cálculo do balanço hídrico do sistema Pérolas-Santana, comprovou-se que a área de captação da bacia associada ao sistema, definida inicialmente pelo traçado dos divisores topográficos (14,8 km²) é insuficiente para alimentar o volume de água escoado pela ressurgência, por um ano hidrológico. Ajustando o balanço hídrico, definiu-se uma área de captação de 25,4 km² para esta bacia. Comprovou-se assim, uma conexão subterrânea entre sistemas vizinhos de drenagem subterrânea, os quais, através de uma análise convencional da rede de drenagem superficial, seriam independentes.

Definiu-se as seguintes fácies hidroquímicas para o sistema cárstico estudado: escoamento superficial alogênico, escoamento superficial fluviocárstico, percolação autogênica vadosa em fissuras, percolação autogênica vadosa em condutos, circulação freática em condutos profundos e escoamento de ressurgências cársticas. A evolução geoquímica das águas no sistema cárstico é controlada principalmente pela ação de água

meteórica enriquecida em ácido carbônico. Ao longo de rotas de circulação profunda e localmente na zona vadosa, a carstificação pelo ácido carbônico é provavelmente somada à ação de ácido sulfúrico produzido pela oxidação de sulfetos.

A dinâmica erosiva atual do terreno cárstico estudado é expressa pela taxa de saturação em calcita e dolomita de águas alogênicas que invadem o sistema cárstico, pela sazonalidade dos índices de saturação em calcita e dolomita das principais fácies hidroquímicas que circulam pelo sistema e pela taxa de rebaixamento da superfície epicárstica por dissolução (denudação química). Para esta última, obteve-se uma média de $31,1 \pm 6$ mm/ka.

ABSTRACT

The geomorphology and the conduit aquifer, and associated cave systems, of a karst area (74 km²) in dolomitic and calcitic metalimestones of the Middle Proterozoic Açungui Group have been studied in the Upper Ribeira river valley, between Apiaí and Iporanga, southeastern São Paulo, Brazil.

The transition between fluvial and karst landforms was recognized through detailed aerial photointerpretation and field observations. The fluvial system has been gradually disrupted by the growth of closed drainage basins with a polygonal pattern. Based on this transition, a morphological zonation has been defined over the limestones. Three main landform categories are recognized in the limestone: the fluviokarst zone (with dominant surface runoff), the transitional zone (characterized by large composite closed depressions) and the polygonal karst zone (with simple closed depressions).

The karst topography exhibits strong structural control. Autogenic swallets occur mainly at the intersections of bedding planes, fractures and faults. These inlet points for autogenic recharge are preferentially aligned on bedding traces where dip is high. In areas where the dip is low to moderate, swallets preferentially follow long fracture and fault traces of steep dip.

The observed population of closed depressions is interpreted as resulting from competition and coalescence processes between depressions in response to different rates of depression enlargement, as well as by the multiple generation process described by Kemmerly. In this model, larger depressions, connected by efficient underground drainage routes, trigger the initiation of other depressions over and in the vicinity of the larger depressions. The competition between depression enlargement rates leads to topographic inversions, where ancient depression bottoms now occupy hill crests.

Morphometric analysis of the karst topography of the Upper Ribeira polygonal karst shows similarities to New Guinean and Jamaican polygonal karst landscapes.

Within the limestone area above the Perolas-Santana cave system, the best developed polygonal karst is related to conduits in depth, close to the southeastern contact of limestone with metapelites.

Among the variety and large number of discontinuities present in the metamorphic limestone, the most favorable structures for cave development are bedding planes, long simple fractures and faults.

The planimetric patterns of cave systems are controlled by the structural style of the limestone. Rectilinear and angular cave map patterns are related to steeply dipping strata, whereas sinuous and curvilinear patterns reflect low-dipping, folded limestone. The sinuosity of conduits is mainly controlled by the angle between the direction of the general hydraulic gradient and the strike of the favorable subvertical discontinuities for conduit development. The greater this angle is, the higher the sinuosity, confirming Worthington's (1991) model.

The initiation of proto-conduits mainly follows the intersections between bedding planes and simple long fractures and faults. Worthington's model for prediction of mean conduit depth is confirmed by the Pérolas-Santana cave system. The mean depth of 200 to 300 m beneath the watertable for the initiation conduits of this system agrees well with the prediction of the exponential equation which is based on the stratal dip and the horizontal length (catchment length) between the main insurgence and the ressurgence of the cave system.

Vadose canyons with up to 50m of vertical entrenchment were produced during the speleogenetic development phase, as the result of moderate rates of base level lowering, which itself was due to moderate rates of regional tectonic uplift. Based on preliminary Th/U ages of secondary calcite covering ancient fluvial deposits in vadose cave canyons, an average maximum rate of 0.0042 cm/year (42 mm/ky) is proposed for the vadose entrenchment within the studied caves. This rate gives a minimum age of 1.7 My for the development phase in the Santana cave. Including the theoretical time span of the initiation phase, the total age of the Pérolas-Santana cave system is around 2 My.

The correlation between the cave river entrenchment rate and the external river channel lowering over the limestone, close to the cave system, allows an age estimation of $16.4^{+7.4}_{-3.1}$ My for the Betari valley in the studied area.

The calculated baseflow recession coefficients, suggest that the karst aquifer of the Pérolas-Santana system has a high degree of interconnected fissures.

The initial analysis of the surface drainage systems, using concepts of topographic divides, indicates the presence of two separate drainage basins over the Furnas-Santana limestone area, each related to a cave system. The hydrological balance of the Perolas-Santana cave system suggests, however, that the catchment area must be larger (25,4 km²) than indicated by this initial interpretation. It is therefore suggested that two adjacent cave systems (Perolas-Santana and Grilo systems) are connected at depth, in order to balance the annual discharge measured at the Santana cave ressurgence.

The following hydrochemical facies have been defined: allogenic surface runoff, fluviokarstic runoff, vadose autogenic fissure seepage, vadose autogenic conduit flow, deep phreatic conduit flow and karst ressurgence flow. The hydrochemistry indicates that the carstification is basically controlled by meteoric water enriched in carbonic acid. Minor dissolution of carbonate by sulphuric acid produced by oxidation of pyrite disseminated in impure limestone is thought to occur in deep flow routes.

The modern erosive dynamics of the studied karst has been quantified according to the following parameters: saturation rate in calcite and dolomite of allogenic rivers entering the limestone surface, the seasonality of the saturation index of the main hydrochemical facies and the rate of limestone surface lowering through dissolution (chemical denudation). The calculated mean chemical denudation rate for the Pérolas-Santana basin is 31.1 ± 6 mm/ky.

AGRADECIMENTOS

A realização desta tese não teria sido possível sem a colaboração de um grande número de pessoas e de várias instituições.

Entre as instituições ressaltaram-se o Department of Geology e o Department of Geography, ambos da McMaster University (Hamilton, Canadá), o Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e o Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

O desenvolvimento desta pesquisa, assim como seu sucesso, são atribuídos principalmente ao grande incentivo e aos valiosos ensinamentos recebidos do Prof. Dr. Derek Ford. Agradeço especialmente ao Prof. Derek Ford, pela sua dedicação e atenção dispensados a mim e ao projeto de pesquisa, durante a minha estadia como aluno de pós-graduação junto ao Departamento de Geologia da McMaster University, onde me foi proporcionada a oportunidade de tomar conhecimento das diversas técnicas e pesquisas atuais desenvolvidas em terrenos cársticos.

Ao Prof. Dr. Georg Robert Sadowski agradeço pelo apoio e encorajamento, desde a concepção desta tese, até os preparativos finais desta e as muitas discussões sobre a abordagem geológica do fenômeno cárstico.

À Steve Worthington, Marcus Buck, Joyce Lundberg, Jane Mulkevitch, Karen Gooder, Nicky Keizer, Sue Vajoczki, Wang Xing Lee e Fereydown Shazbhan, agradeço pelas valiosas contribuições na minha formação teórica e prática em geoespeleologia e hidrologia cárstica, obtidas através de discussões acadêmicas, trabalhos de laboratório e de viagens a campo nas cavernas e áreas cársticas do sudeste do Canadá e nordeste dos Estados Unidos.

Ao Prof. Dr. Henry Schwarcz, na época chefe do Department of Geology da McMaster University, e à todo corpo docente deste departamento, agradeço a agradável acolhida, amizade e prestatividade durante minha estadia em Hamilton.

Ao Professor e amigo Dr. Aldo da Cunha Rebouças, expresso minha gratidão, pela confiança em meu trabalho, o que possibilitou a obtenção de recursos junto à FAPESP e CNPq para execução dos trabalhos de campo.

Os quase 30km de mapeamento topográfico e geológico de cavernas, produto de exaustivos trabalhos de campo e de gabinete, assim como as fases de coleta de água e medições de vazão na região do Alto Vale do Ribeira, foram desenvolvidos em grupo, onde no período de 1987 a 1993, estiveram envolvidos os seguintes colegas e amigos: Alex Barbieri, Nelson Luis Nogueira Batisttuci, Paulo César Boggiani, Marcos Philadelphi, Maurício de Alcântara Marinho, Rinaldo Ademir Campanha, José Carlos Sicoli Sedane, Richard Lepine, Martim Afonso de Souza, Arnaldo Alcover Neto, Anderson Moraes, Andrea Yida de Matos, Edilson Pissato, Alberto Carlos Kaminsky, Armando Torquato, Adriano Gambarini, Ana Lúcia Dezensi Gesicky, Maria Cândida Barbosa do Nascimento,

Eduardo Shinohara, Mauro Carrari Chamani, William Salum Filho, Oduvaldo Viana Jr., Ricardo Fraga Teixeira e Luís Guilherme Teixeira. Agradeço à todos pela valiosa colaboração.

Aos colegas do Departamento de Geologia Geral, Coriolano de Marins e Dias Neto (que em muito contribuiu nesta tese através de longas e férteis discussões), Rômulo Machado (o qual pacientemente revisou a primeira versão deste trabalho), Maria Cristina Motta de Toledo, Ian McReath, Marcos Egydio da Silva e Joel Barbugiani Sígolo, agradeço pela colaboração durante a redação deste trabalho. Ao Professor Thomas Rich Fairchild sou grato pela revisão de textos em inglês.

Especiais agradecimentos devo à Química Sandra Andrade e ao Prof. Dr. Raphael Hypólito, pelo apoio na parte analítica desta pesquisa.

Grande parte das ilustrações deste trabalho devo à equipe de desenho do IGc-USP, Sr. Francisco José Pinheiro de Almeida Filho, Srtã. Itacy Krohne e Rodrigo Vascon, aos quais agradeço muito. Agradeço também, ao setor gráfico deste Instituto, chefiado pelo Sr. Dalton.

Sou profundamente grato à Boris Karmann e Monique Therese da Graça Carreiro, cujo apoio e incansável prestatividade na área de informática, foram essenciais, no tratamento estatístico de dados e na elaboração de figuras. Na área de informática, agradeço, também, ao Sr. Geraldo Carlos Lino Freitas.

À Srta. Maria Aparecida Bezerra agradeço pela detalhada revisão da listagem de referências.

À população do Bairro da Serra e funcionários do PETAR em geral e, em especial, à Vandir de Andrade e Joaquim Justino, agradeço a hospitalidade e cooperação durante os trabalhos de campo.

À Maria Cândida Barbosa do Nascimento, agradeço o incentivo moral e carinho, que foram essenciais, para cumprir esta etapa de trabalho.

À Heinz Karmann e Valerie Karmann, meus pais, agradeço toda formação e inesgotável apoio até hoje recebidos.

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do tema de trabalho

Rochas carbonáticas, principais hospedeiras das paisagens cársticas e sistemas de cavernas, ocupam cerca de 12% das áreas continentais sem cobertura glacial. A fração deste total de terrenos carbonáticos, com significativa circulação de água subterrânea através de aquíferos cársticos, é estimada, entre 7 a 10%. Áreas cársticas, tornam-se ainda mais relevantes, quando se considera a estimativa, de que no mínimo, 25% da população mundial é abastecida através ou depende, em grande parte, de recursos hídricos extraídos de aquíferos cársticos (Ford e Williams, 1989).

Entende-se por terrenos cársticos, as regiões sobre rochas, as quais sofreram importantes processos de dissolução, tanto por águas superficiais, como também, pelas águas subterrâneas. Estes processos de dissolução, são responsáveis, pela geração de feições características, como solos típicos (às vezes escassos), depressões fechadas, dolinas, sistemas de cavernas associados à drenagem subterrânea e, ausência quase total, de sistemas fluviais de superfície. Terrenos cársticos podem ser apropriados para implantação de projetos de mineração, geração de energia e de abastecimento de água, levando-se em consideração, as devidas precauções técnicas, devido ao fato destes terrenos, representarem ambientes extremamente frágeis e que, freqüentemente, respondem às pressões ambientais de uma forma mais rápida e mais dramática do que outros tipos de terrenos (Back e Arenas, 1989).

Devido aos fatos acima apontados, o estudo da dinâmica atual e evolução de paisagens cársticas, incluindo o entendimento da origem e desenvolvimento de sistemas de cavernas, deixou de ser somente uma curiosidade científica de alguns naturalistas abnegados, tornando-se um fator cada vez mais importante, no planejamento de uso e ocupação de terrenos carbonáticos, e na exploração e conservação de recursos hídricos destas áreas (Waltham, 1981).

Estima-se atualmente, que há no mínimo 8.000 km de condutos subterrâneos mapeados no mundo (Waltham, op cit.), definidos como cavidades naturais, com dimensões suficientes para permitir a passagem do homem. O sistema Flint - Mammoth (EUA), com até 530km de desenvolvimento em planta, representa o sistema de cavernas mais longo da atualidade, enquanto o sistema Jean Bernard (França), com 1535m de desnível, é o mais profundo explorado até o presente (Courbon, et. al., 1989). Constantemente, o mundo recebe notícias de novas descobertas de grandes sistemas de cavernas, em regiões sub-árticas até tropicais. A exploração e mapeamento sistemático de cavernas, tem sido a fonte de um enorme conjunto de dados, os quais fundamentaram a formulação de vários modelos espeleogenéticos durante as últimas cinco décadas (Watson e White, 1985 e Lowe, 1992).

O Brasil, com seus 8.500.000 km² de território, conta com extensas áreas cársticas, as quais, numa estimativa preliminar, representam cerca de 5 a 7% do total de sua área. A

regionalização preliminar de terrenos cársticos do Brasil (Karmann e Sánchez, 1986), evidenciou o enorme potencial espeleológico destas áreas. Entre as mais extensas e contínuas, ressaltam-se os terrenos cársticos associados à cobertura carbonática plataformar do Grupo Bambuí, na região central do País; aos metacalcários e dolomitos do Grupo Corumbá, na serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul e à sequência carbonática do Grupo Araras, na bacia do alto rio Paraguai, Mato Grosso. Na região sudeste, apesar de possuírem expressão em área muito inferior às regiões carbonáticas acima citadas, os terrenos cársticos concentram-se sobre os metacalcários e metadolomitos do Grupo Açungui e correlatos.

A atuação de grupos de exploração de cavernas, durante as últimas três décadas, vem reunindo, um grande conjunto de dados, sobre a localização e características físicas de sistemas de drenagem subterrânea no Brasil, o qual, conta atualmente, com no mínimo 411 km de condutos subterrâneos topografados em seus traços gerais (Martim, Chrysostomo e Rodrigues, 1989). Neste quadro, ressaltam-se a Toca da Boa Vista (município de Campo Formoso, BA), com 50,2 km de passagens topografadas até o momento, representando a mais longa caverna conhecida na América do Sul (Auler e Rubbioli, 1993).

A descoberta e exploração de cavernas cársticas, em território brasileiro, alcançou um adiantado estágio de desenvolvimento, enquanto a pesquisa científica, sob o ponto de vista dos processos geológicos, hidrológicos e geomórficos, envolvidos na evolução e dinâmica destas cavernas e seus terrenos cársticos associados, encontra-se ainda em fase incipiente. Este fato é evidenciado pela restrita bibliografia técnico-científica nacional disponível sobre este tema, conforme ressaltado em Sánchez (1986) e confirmado pela pesquisa bibliográfica realizada para o presente trabalho. Entre os estudos acadêmicos, que enfocam o sistema cárstico, na área das geociências, ressaltam-se os trabalhos de Coutard, Kohler e Journaux (1978) e Kohler (1989), sobre o relevo da região de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa (MG); as análises morfoestruturais e hidrogeológicas de regiões cársticas sobre o Grupo Bambuí no norte de Minas Gerais (Silva, 1984) e Bahia (Silva, 1973 e Guerra, 1986) e, mais recentemente, o estudo realizado por Barbieri (1993), sobre a variedade de formas de calcita secundária, apresentando um esboço preliminar dos controles físico-químicos e mecanismos de deposição de espeleotemas nas cavernas do alto vale do rio Ribeira de Iguape (SP).

Neste quadro, de grande potencial científico e com pouca pesquisa específica realizada, o presente trabalho pretende contribuir na abertura e estabelecimento de uma linha de pesquisa geocientífica sobre terrenos cársticos brasileiros, a partir do estudo geomorfológico, geológico e hidrológico, de uma área de amostragem da região cárstica do alto vale do rio Ribeira de Iguape (sudeste do Estado de São Paulo).

1.2 Seleção da área estudada

As cavernas da região cárstica do alto vale do Ribeira de Iguape vem despertando a atenção de naturalistas e exploradores, desde o início deste século, época em que foram realizados os primeiros levantamentos geográficos da região. Como exemplos, citam-se o

relato antropológico de Krone (1914) e o primeiro levantamento de cavernas da área entre Apiaí e Iporanga, realizado por Krone em 1909 e posteriormente publicado em 1950. Com o objetivo de localizar sítios paleontológicos e arqueológicos, Krone procurou as cavernas, onde encontrou restos da megafauna pleistocênica e apresentou a primeira descrição das cavernas e de seu relevo associado. Neste relato, ressalta a presença de importantes cavernas com rios subterrâneos, como o rio Roncador, na época impenetrável para o pesquisador, mas estimada por este, como sendo uma caverna com cerca de 15km de extensão.

A partir de 1962, até o presente, a região iniciou a ser constantemente visitada por grupos de exploração espeleológica. Um histórico desta atividade pode ser encontrada em Marinho (1989). Estas explorações confirmaram as expectativas de Krone, revelando a existência de mais de uma centena de cavernas. A caverna do rio Roncador, atualmente denominada de caverna Santana, mostrou ser um dos trechos acessíveis mais extensos dos sistemas de drenagem subterrânea da região. Os resultados iniciais desta exploração sistemática de cavernas, foram publicados por Le Bret (1966), constituindo-se ainda hoje, uma das mais detalhadas e completas descrições de cavernas desta região.

Uma grande quantidade de dados relativos à localização e topografia de cavernas tem sido acumulada sobre a região. Este acervo está parcialmente disponível nos arquivos da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Segundo o cadastro de cavernas desta sociedade (Martim, Chrysotomo e Rodrigues, 1989), os terrenos cársticos delimitados pelos municípios de Apiaí, Iporanga e Guapiara (fig 1.1), abrigam cerca de 80km de cavernas, parcialmente exploradas e topografadas.

Segundo a regionalização de áreas cársticas apresentada por Karmann e Sánchez (1986), o alto vale do Ribeira, apresenta um dos maiores graus de conhecimento disponível, quanto à presença e distribuição de cavernas, em comparação com as demais regiões carbonáticas do Brasil.

Como estratégia do presente estudo, selecionou-se portanto, o Alto Ribeira, dentre as várias regiões cársticas do Brasil, pois desta se dispunha de um conhecimento prévio maior, a respeito da distribuição e das características físicas principais de sistemas de drenagem subterrânea, associados a um relevo característico e variado de terrenos cársticos, até o presente, não estudados, do ponto de vista geológico.

Como um dos objetivos desta tese era o monitoramento hidrológico de um sistema de cavernas, o que exigiu visitas a campo, no mínimo mensais, durante 18 meses, a facilidade de acesso associada a uma situação apropriada para monitoramento, foram fatores fundamentais na demarcação da área de estudo, indicada na figura 1.1.

Outro fator importante na escolha da área de estudo foi o fato da bacia hidrográfica monitorada se encontrar numa área de preservação ambiental (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira), pois desta maneira, teve-se a oportunidade, de analisar a dinâmica hidroquímica original desta bacia, sem efeitos antrópicos superpostos.

Selecionou-se, portanto, a bacia hidrográfica do rio Roncador para o monitoramento hidrológico e hidroquímico, pois a mesma, possui somente uma ressurgência (fator

Figura 1.1 - Localização, acesso e demarcação da área estudada. Os terrenos cársticos delimitam-se pelos sumidouros.

essencial para o estudo), sendo de fácil acesso (fig 1.1). Para a análise de relevo e de sistemas de cavernas, optou-se pelo corpo calcário associado à bacia do rio Roncador e a sinforma calcária encaixante do sistema de cavernas Areias. Estas duas áreas calcárias, constituem uma amostra representativa, da diversidade morfológica do carste superficial e subterrâneo do Alto Ribeira.

1.3 Objetivos da pesquisa e organização da tese

Os objetivos deste trabalho, consistiram em pesquisar os aspectos abaixo, sobre uma área tipo, de carste subtropical úmido:

- Identificar, descrever, estabelecer parâmetros morfométricos e determinar os fatores condicionantes (estruturais e hidráulicos) das formas de relevo cárstico. Com estas informações, esboçar a gênese destas formas (tema do capítulo 3).

- Obter um quadro da distribuição, identificar os padrões morfológicos e determinar os fatores condicionantes desta distribuição e morfologia de sistemas de cavernas. Integrar estes dados num modelo espeleogenético da área, obtendo uma história evolutiva do desenvolvimento de sistemas de circulação cárstica, da área estudada, propondo uma cronologia deste processo. Através da elaboração do modelo espeleogenético, contribuir na previsibilidade da ocorrência de sistemas de cavernas, tornando estes estudos aplicáveis em planos de uso e ocupação de áreas cársticas.

- Associar a evolução de sistemas de cavernas com o desenvolvimento da paisagem superficial e, através da obtenção da taxa de entalhamento fluvial subterrâneo, estimar a idade do relevo associado ao sistema cárstico.

- Determinar os parâmetros hidrológicos e hidroquímicos atuais de uma bacia hidrográfica cárstica, representativa da região do Alto Ribeira. Com estas informações, esboçar o mecanismo de corrosão atuante no sistema e estimar a taxa de denudação química desta bacia.

Como objetivo geral deste trabalho, pretendeu-se adaptar e desenvolver, os métodos atuais utilizados em estudos geológicos e hidrológicos de sistemas cársticos, prática ainda pouco usual no campo geocientífico nacional.

1.4 Métodos e técnicas

Os métodos e técnicas utilizados neste trabalho são detalhados nos itens pertinentes. Apresenta-se, em seguida, uma listagem resumida destes.

1. Fotointerpretação de detalhe, em escala 1:25.000, das áreas demarcadas para este estudo, traçando os divisores de água e a rede de drenagem, identificando sumidouros e ressurgências, o que resultou nos mapas morfológicos destas áreas (anexos 3.3 e 3.4), base para os estudos morfométricos.

2. Medição de parâmetros morfométricos seguindo as recomendações de Williams (1972a e 1972b).

3. Identificação, em campo, das características de relevo reconhecidas na fotointerpretação.

4. Mapeamento topográfico e geológico das principais cavernas da área de estudo. Mapeou-se cerca de 15km de condutos subterrâneos. Foram utilizados os métodos de topografia subterrânea e mapeamento geoespeleológico desenvolvidos com este trabalho, detalhados em Battistucci (1988), assim como, as recomendações de Thompson e Taylor (1991), para medição do espaço subterrâneo.

5. A obtenção de parâmetros hidrológicos envolveu os seguintes procedimentos: instalação de limnógrafos na ressurgência e no sumidouro principal do sistema de cavernas monitorado; medição de vazão nestes pontos, em diferentes alturas do nível do rio subterrâneo. Para medição da vazão, utilizou-se tanto um molinete fluviométrico, assim como, adaptou-se a técnica de diluição de sal, conforme a recomendação de Church e Kellerhals (1970). Executou-se o monitoramento do sistema de cavernas Santana-Pérolas pelo período de um ano hidrológico.

6. A obtenção de dados hidroquímicos, exigiu a coleta sistemática de amostras de água nos diferentes pontos do sistema de circulação cárstica monitorado. A coleta seguiu as recomendações expressas em Ford e Williams (1989). Os teores dos principais cátions, presentes nestas amostras, foram obtidos através de análises por absorção atômica, seguindo-se os cuidados necessários para conservação das amostras até sua análise. Os principais ânions foram analisados através de um cromatógrafo de íons.

7. Para determinar taxas de entalhamento fluvial subterrâneo, foram coletadas amostras apropriadas de calcita secundária nas cavernas, em pontos favoráveis, após o mapeamento destas. Durante a amostragem, foram tomados cuidados especiais, para não afetar a estética dos depósitos de calcita nestas cavernas. Estas amostras, foram datadas pelo método Th/U, utilizando contagem alfa. Com o objetivo de familiarizar-se com esta técnica, as amostras foram processadas pelo autor, sob orientação do Prof. Dr. Derek Ford, junto ao laboratório de geocronologia dos Departamentos de Geografia e Geologia da McMaster University.

CAPÍTULO 2

FISIOGRAFIA E GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 Contexto geológico regional e local da área estudada

O sudeste paulista está inserido na Faixa Dobrada Apiaí (Hasui e Oliveira, 1984), a qual, compõe o segmento sudoeste do Cinturão Ribeira (Cordani e Brito Neves, 1982). A Faixa Apiaí caracteriza-se por um conjunto de rochas supracrustais vulcano-sedimentares, de grau metamórfico fraco a médio, denominadas genericamente de Grupo Açungui, cujo embasamento, é formado por rochas gnássico-migmatíticas, localmente charnockíticas e com intercalações metassedimentares com grau metamórfico médio a alto. Este embasamento, de posição estratigráfica ainda controvertida, domina o leste paranaense, enquanto as supracrustais, ocupam predominantemente, o sudeste paulista (Campanha, 1991).

A estrutura regional é constituída por uma série de intrusões granitóides, do Proterozóico Médio a Superior, as quais, afetam tanto a seqüência supracrustal, como também o embasamento. Sobre este quadro, ressalta-se um sistema anastomosado de zonas de cisalhamento transcorrentes, verticalizadas a subhorizontais, de caráter dúctil a dúctil-rúptil, de movimentação na direção NE-SW, e rejeitos quilométricos. Este sistema de cisalhamento imprime uma compartimentação da região em blocos tectônicos, cujas formas são lenticularizadas, com alongamentos maiores na direção genérica NE-SW. Esta fragmentação tectônica dificulta as correlações lito-estratigráficas entre blocos crustais distintos (Campanha, Bistrichi e Almeida, 1987 e Campanha, 1991).

Os terrenos cársticos estudados inserem-se no Bloco Lajeado, definido por Campanha (1991). Delimita-se a sul pelo Lineamento da Figueira, e a norte pelo Lineamento Quarenta Oitavas, localmente definido pela falha do Espírito Santo (figuras 2.1 e 2.2).

Seguindo Campanha (1991), a norte do Lineamento Quarenta Oitavas ocorre o Bloco Apiaí, composto por xistos (granada micaxistos, quartzo micaxistos e micaxistos) e mármore calcíticos, localmente sulfetados. O autor acima propõe que estas rochas são uma extensão da Seqüência do Lajeado, em condições de metamorfismo e deformação mais intensos. A sul do Lineamento da Figueira, encontra-se o Bloco Ribeira, composto principalmente por filitos e metassiltitos laminados e rochas metabásicas, com intercalações de metaconglomerados, metarenitos e mármore.

O Bloco Lajeado é constituído pela seqüência metassedimentar de grau metamórfico baixo (zona da clorita) do Subgrupo Lajeado, incluindo no topo o Gabro de Apiaí (fig 2.2). Este subgrupo foi originalmente definido por Hasui, Cremonini e Born (1985) e redefinido por Campanha et. al. (1985).

Sua estrutura geral é formada por sinclinais e anticlinais, localmente falhados, com eixos de direção NE-SW e planos axiais subverticais a fortemente inclinados para NW (fig 2.3), indicando vergência para SE. De acordo com Campanha (1991), o grau de deformação na zona central do Bloco, sobre o Anticlinal do Sem Fim, Sinclinal do Bairro

Figura 2.1 - Contexto geológico regional da área estudada, ressaltando a ocorrência de rochas carbonáticas.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

(Depósitos de cobertura não representados)

JURÁSSICO - CRETÁCEO

JKB Diques básicos

PROTEROZOICO SUPERIOR A EOPALEOZOICO

PSEo_v Granitóides pós-tectônicos i:Itaóca v:Vargem Grande

PROTEROZOICO SUPERIOR

PSaG Gabro de Apiaí

PROTEROZOICO MÉDIO A SUPERIOR

PMSa Xistos (X) e Mármore (M) Apiaí

FORMAÇÕES LITOLOGIA

PMSgS	Gorutuba-Metarritmitos pelito-carbonáticos
PMSpM	Passa Vinte - Metacalcários dolomíticos e calcíticos
PMSvA	Serra da Boa Vista-Metarenitos
PMSfM	Mina de Fornos-Metacalcários calcíticos bandados
PMSjF	Água Suja- Filitos e metassiltitos
PMSsM	Bairro da Serra - Metacalcários calcíticos
PMSbS	Betari- Metassiltitos e filitos
PMSi	Iporanga- Metassiltitos, metargilitos e metarenitos
PMSp	Perau-Filitos, xistos verdes, metassiltitos
PMSst	Setuva- Xistos, filitos e quartzitos

CONVENÇÕES

- Anticlinal
- Sinclinal
- Anticlinal com mergulho do plano axial
- Anticlinal com flanco invertido
- Atitude de acamamento
- Zona de cisalhamento definida e provável
- Falha com movimento inverso predominante
- Contato litológico definido e aproximado
- Contato transicional
- Intercalações a: metarenito cg: metaconglomerado m: mármore mb: metabásica
- * Localidades

Adaptado de Campanha, 1991

Figura 2.2 -

Contexto geológico local das áreas carbonáticas estudadas.

Figura 2.3 - Seção geológica simplificada do Subgrupo Lageado na região estudada. Adaptada de Campanha (1991). Legenda das unidades litológicas e localização da seção indicadas na figura 2.2.

da Serra e Anticlinal da Biquinha, é baixo, onde estruturas primárias, como gradações normais, estratificações cruzadas e onduladas, foram perfeitamente preservadas. Na faixa de influência da Zona de Cisalhamento da Figueira, a deformação é intensa, afetando parte do flanco invertido SE do Anticlinal do Sem Fim. Esta falha exhibe comportamento dúctil e movimento inverso. O flanco sul do Sinclinal do Calabouço, ou flanco norte do Anticlinal da Biquinha (fig 2.2 e 2.3), caracteriza-se por deformação moderada, e uma série de cisalhamentos com movimento inverso, responsáveis por repetições tectônicas da litologia. O Sinclinal do Calabouço, no limite norte deste bloco tectônico, exhibe deformação fraca, semelhante à zona central. Por último, a zona de contorno do Granito Itaóca, caracteriza-se por deformação e metamorfismo mais intensos, relacionados àquela intrusão.

Fora das zonas de influência dos cisalhamentos, o estilo de dobramento é de dobras abertas a fechadas, nos metapelitos, e abertas nos metacarbonatos e metabásicas. Predominam dobras simétricas nas zonas de charneira dos grandes anticlinais e dobras fortemente assimétricas nos flancos.

Associado ao metamorfismo fraco destas rochas, predomina a foliação plano axial do tipo clivagem ardosiária (com sericita e moscovita), freqüentemente com clivagem de crenulação superimposta, nos filitos e metassiltitos, e clivagem de fratura nos metacalcários.

A litoestratigrafia do Subgrupo Lajeado, apresentada abaixo, da base para o topo, segue a proposição e descrição de Campanha (1991):

Formação Betari - Esta unidade basal do Subgrupo Lajeado é constituída por dois membros. O membro basal é formado por metarenitos arcoseanos e micáceos, com níveis e lentes de metaconglomerados oligomíticos micáceos, com espessuras decimétricas. Estes metapsamitos passam gradativamente para o membro superior, composto por metarritmitos siltico-arenosos e metapelitos laminados, onde se ressalta o caráter gradacional da estratificação. O contato desta formação com a unidade sobrejacente é brusco e concordante no flanco norte do Anticlinal do Sem Fim e transicional no flanco norte do Anticlinal da Biquinha. No flanco sul do Anticlinal do Sem Fim, o contato provavelmente é discordante (fig 2.2).

Formação Bairro da Serra - Esta é a unidade carbonática do Subgrupo Lajeado, com maior expressão em área, sendo formada por dois corpos distintos: a faixa carbonática homoclinal da caverna Santana, que representa o flanco norte do Anticlinal da Biquinha, e outro, de forma irregular, estruturado pelo sinclinal do Bairro da Serra, Anticlinal do Sem Fim e o flanco invertido do anticlinal do Bairro Betari (fig 2.2).

É composta por metacalcarenitos e metacalcilutitos impuros e margosos, predominantemente calcíticos e localmente dolomíticos, de coloração cinza escuro. Sua estratificação caracteriza-se pela alternância de estratos mais ou menos impuros, com freqüentes intercalações de metassiltitos carbonáticos e filitos. São marcados por pirita disseminada, assim como, concentrada em alguns dos leitos mais impuros. Estratificações cruzadas, onduladas e gradacionais são freqüentes, com textura clástica dos grãos parcialmente preservada.

Formação Água Suja - Constitui uma faixa metapelítica, intercalada provavelmente tectonicamente sobre os metacalcários da Formação Bairro da Serra (fig 2.2) e, em contato normal sob a Formação Mina de Furnas. Sua espessura varia muito, sendo provavelmente interrompida na parte central, devido à adelgaçamento tectônico. É formada por filitos cinza escuros, com lâminas de metassilito e filito carbonático.

Formação Mina de Furnas - É formada por metacalcarenitos cinza escuros, semelhantes à Formação Bairro da Serra. Distingue-se da faixa carbonática da caverna Santana, pela ritmicidade menor da alternância de estratos puros e impuros e camadas pelito-carbonáticas. Nas proximidades da vila residencial da Mina de Furnas, ocorre uma intercalação de filitos e metassilitos laminados, cuja continuidade ao longo de todo pacote carbonático é controvertida.

Encontra-se sotoposta aos metarenitos da serra da Boa Vista, através de contato tectônico (fig 2.2).

Formação Serra da Boa Vista - Esta formação marca o contorno estrutural do sinclínio do Calabouço (fig 2.2). É formada por metarenitos mal selecionados, de granulação desde muito fina até grossa, localmente com níveis conglomeráticos, arenitos micáceos e arcoseanos, metassilitos e filitos. O grau de deformação desta unidade é crescente no sentido NW, com metarenitos quase indeformados no flanco sudeste do sinclinal, enquanto no flanco noroeste, ocorrem quartzo xistos e quartzo milonitos. Junto ao Granito Itaóca, quartzo-mica hornfels, com biotita, moscovita e andaluzita, atestam o metamorfismo de contato.

Formação Passa Vinte - Representa outra unidade carbonática, formada por metacalcários de coloração cinza escuro, cinza claro e branco, bandados. As camadas cinza escuro a claro, são predominantemente calcíticas e os estratos brancos, dolomíticos, conforme reconhecido neste trabalho.

O contato com os metarenitos Boa Vista, sotopostos, admite duas interpretações, pelo fato de apresentar intercalações decimétricas de metarenito boudinado dentro dos metacalcários. A primeira, é que este contato é concordante e gradativo, com interdigitação sinsedimentar de arenito e calcário. A segunda admite contato por cisalhamento, onde a interdigitação acima é de origem tectônica. O contato superior, com a Formação Gorutuba é através de uma zona de cisalhamento de baixo ângulo, denominado por Campanha (1991), de Falha do Palmital.

Formação Gorutuba - Caracteriza-se por metarritmitos laminados, com alternância de metassilitos e metargilitos, além de rochas calcissilicáticas e mármores, sempre exibindo ritmicidade da estratificação. As rochas calcissilicáticas (conhecidas informalmente como gorutubitos), segundo Campanha (op. cit.), correspondem a hornfels metassomático, gerado pela intrusão do Gabro de Apiaí e do Granito Itaóca.

Gabro de Apiaí - Trata-se de uma rocha escura, isotropa, de granulação média e textura ofítica a subofítica. Sua mineralogia principal é composta de plagioclásio, augita e hiperstênio. Campanha (1991) observou um local, onde estas exibem relação de contato discordante com a Formação Gorutuba, além do generalizado metamorfismo de contato

causado pelo gabro sobre esta formação. Segundo este mesmo autor, os gabros distinguem-se dos diques de diabásio mesozóicos, somente pela presença de hiperstênio, nos primeiros.

Finalmente, convém ressaltar a opinião de Campanha (op. cit.), de que várias das unidades acima da Formação Bairro da Serra podem representar repetições tectônicas de um número menor de formações, mas que, devido à falta de critérios precisos de correlação lateral entre estas, é preferível manter as denominações litoestratigráficas formalizadas anteriormente.

Ambiente deposicional - Os metassedimentos do Subgrupo Lajeado, devido ao seu caráter rítmico da recorrência litológica e presença de estruturas primárias, como estratificação gradacional, foram interpretados por Pires (1988 e 1989), como representantes de uma sucessão de sistemas turbidíticos, com leques submarinos, depositados na transição entre uma plataforma continental e talude, sob condições de tectônica ativa, durante o Proterozóico Médio a Superior.

Eventos Mesozóicos e Cenozóicos - A região de estudo encontra-se sobre o flanco nordeste do Arco de Ponta Grossa, o qual representa uma estrutura crustal positiva, em ascensão tectônica desde o Triássico (Asmus, 1981), ou talvez, desde o Devoniano, conforme a interpretação de Ferreira et. al. (1981). Neste processo de domeamento e sob esforços trativos, sofreu a intrusão de um grande número de diques básicos, datados do Jurássico-Cretáceo, orientados segundo a direção NW-SE (fig 2.1 e 2.2).

Durante o Cenozóico, até a atualidade, a região continuou sendo dominada pelo soerguimento e denudação, com exceção de algumas zonas, as quais sofreram subsidência e acúmulo de sedimentos, através da instalação de prováveis bacias tectônicas. Estas foram interpretadas por Melo et. al. (1990), no baixo vale do Ribeira, sobre o Alinhamento Tectônico de Guapiara, como é o caso do Gráben de Sete Barras, com sedimentos fluviais, cuja base foi atribuída preliminarmente ao Terciário Inferior.

2.2 Situação geomorfológica da área de estudo

1º A região estudada encontra-se sobre o flanco sudoeste da serra de Paranapiacaba, a qual, representa um relevo montanhoso, com amplitudes topográficas de até 700m, entre fundos de vales e topos de cristas. Esta área serrana constitui a zona de transição entre o Planalto Atlântico, a noroeste da área de estudo, e a Baixada Costeira, a leste-sudeste, caracterizada por vastas planícies aluviais entre agrupamentos de morros arredondados.

Na classificação geomorfológica do relevo paulista de Almeida (1964), adotada com pequenas modificações e algumas complementações no mapa geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981a), esta faixa de transição entre o Planalto Atlântico e a Baixada Litorânea, constitui a Sub-Zona da Serrania do Ribeira, da Zona da Serrania Costeira da Província Geomorfológica Costeira. 2º Neste quadro, a serra de Paranapiacaba, constitui o ramo sul da Zona da Serrania Costeira (genericamente conhecida como Serra do Mar), recuado para o interior, abrindo espaço para a vasta planície costeira, a leste da serra.

Embutidos na Serrania do Ribeira, ocorrem planaltos parcialmente dissecados, adjacentes a vales profundamente entalhados. Estas superfícies foram classificadas como

Planaltos Interiores (IPT, 1981a). As áreas carbonáticas estudadas fazem parte de um destes planaltos, denominado de Planalto do Lajeado (IPT, op. cit.). Este é cortado transversalmente pelo rio Betari, o qual representa o nível de base local deste planalto.

A Serrania do Ribeira, nos arredores da área de estudo, apresenta cristas niveladas entre 900 e 1.100 metros, alinhadas segundo a direção geral NE-SW, com encostas de declividade alta a média. As cotas mais elevadas correspondem a metarenitos e as intermediárias a metapelitos. O Planalto do Lajeado, constituído essencialmente por metacalcários, exhibe topos nivelados em torno de 700m, tendo seus limites demarcados por sumidouros. A amplitude de relevo, entre as cristas das serras alongadas e os fundos de vales, encaixados no planalto, varia entre 690 e 450m.

No quadro de serras alongadas da Serrania Costeira e do Ribeira, ressalta-se o sub-nivelamento dos topos de cristas de rochas mais resistentes à degradação (foto 4.6), o qual foi correlacionado por Almeida (1964) à superfície Japi, definida pelo mesmo autor, como sendo um testemunho de uma antiga superfície de aplainamento, pós-cretácea, característica do sudeste paulista.

2.3 Hidrografia e ambiente atual

A região estudada é drenada pela bacia hidrográfica do rio Betari, afluente da margem esquerda do rio Ribeira de Iguape, o qual, neste trecho, apresenta-se na transição entre seu alto e médio curso.

O rio Betari possui suas nascentes na borda do Planalto Atlântico (localmente denominado de Planalto de Guapiara), nas cotas entre 900 e 1100m, atingindo o rio Ribeira na cota de 80m, próximo à cidade de Iporanga. Pelo fato desta bacia drenar a Serrania do Ribeira, o rio Betari e seus principais afluentes, apresentam vales encaixados e perfis longitudinais de alto a médio gradiente, localmente encachoeirados. Com exceção de trechos sobre o Planalto do Lajeado, este rio possui característica fortemente erosiva, com intenso entalhamento vertical. Nas áreas carbonáticas deste planalto, o rio assume baixos gradientes, com feições de agradação, evidenciadas pelos vales alargados, de fundo plano a suavemente ondulado, preenchidos por alúvios e colúvios.

O segmento principal do rio Betari apresenta um padrão retilíneo, segundo a direção NW-SE, com seus afluentes principais ortogonais a esta direção, formando um padrão de drenagem geral do tipo treliça.

A bacia do rio Ribeira de Iguape, localiza-se inteiramente no domínio do sistema climático sub-tropical, mais precisamente, na zona de transição entre os domínios do ar tropical e das invasões dos fluxos polares, com variações anuais de temperaturas médias mínimas e máximas, controladas principalmente pela altitude e, secundariamente, pela latitude (Monteiro, 1969 e Gutjahr, 1993).

De uma forma genérica, o clima do vale do Ribeira é classificado como sub-tropical úmido (Gutjahr, op. cit.).

A região de Apiaí, borda do Planalto de Guapiara, apresenta pluviosidade média anual de 1480mm (média dos últimos 32 anos), com máxima anual de 2200mm e mínima de 980mm, neste período. A temperatura média é de 18°C (DAEE, 1991).

O Bairro da Serra (área de estudo), inserido na Serrania do Ribeira, transição Planalto-Baixada Costeira, apresenta pluviosidade média dos últimos 19 anos de 1604mm, com máxima anual de 1860 e mínima de 1069mm, registradas neste período. O trimestre menos chuvoso concentra-se nos meses de junho, julho e agosto e o mais úmido em janeiro, fevereiro, março. A temperatura média anual é de 20°C, com média mínima de 14°C e máxima de 27°C (DAEE, 1992).

A região do baixo vale do Ribeira, em contraste com as áreas serranas interioranas, possui pluviosidade média entre 2000 e 3000 mm/ano, conforme a altitude (zona da Baixada Costeira ou altos da Serra do Mar), com temperaturas médias mínimas e máximas de 20 e 27°C.

A pluviosidade e umidade elevadas são bem distribuídas durante o ano, mantendo uma cobertura vegetal densa, popularmente conhecida como Mata Atlântica, típica ao longo de toda bacia do Ribeira, e ainda parcialmente preservada nas áreas serranas. A região estudada encontra-se no domínio da Floresta Sub-Tropical Úmida, característica da Serrania do Ribeira e Baixada Costeira. Esta mata perenifolia higrófila, é substituída em direção ao planalto Atlântico, a partir da Serrania Costeira, pelo domínio da Floresta Subtropical Subcaducifolia, marcada pela presença do Pinheiro do Paraná (*Araucaria angustifolia*).

Os terrenos cársticos estudados, assim como grande parte das áreas de captação dos sistemas de cavernas investigados, encontram-se nos limites do Parque Estadual do Alto Ribeira (PETAR), unidade de conservação criada por Decreto Estadual em 1958, com o objetivo de preservar uma amostra significativa do meio biótico e físico da Serrania do Ribeira (Karmann, 1983 e Sánchez, 1984).

2.4 As rochas carbonáticas do Alto Ribeira

A região sudeste do Estado de São Paulo, apresenta três faixas de rochas carbonáticas, inseridas na seqüência metassedimentar supracrustal da Faixa de Dobramento Apiaí, esboçada no item 2.1.

Cruzando a Faixa Apiaí (fig 2.1), partindo do noroeste em direção sudeste, identifica-se as faixas carbonáticas associadas ao Grupo Itaiacoca (Souza, 1990), ao Subgrupo Lajeado e à Seqüência Serra das Andorinhas (Campanha, et. al., 1985).

A **faixa carbonática Itaiacoca** limita-se a noroeste pela cobertura sedimentar da Bacia do Paraná e a sudeste pelo Lineamento Itapirapuã (fig 2.1). As rochas carbonáticas do Grupo Itaiacoca são predominantemente metadolomitos maciços e secundariamente metadolomitos calcários laminados (fig 2.4), Souza (1990), com intercalações locais de metacalcários magnesianos. Nas proximidades da zona de cisalhamento Itapirapuã, exibem intensa recristalização, com texturas de mármore. Nas porções internas, esta recristalização

é fraca, o que possibilitou a preservação de um variado conjunto de estruturas sedimentares primárias.

A superfície cárstica é predominantemente rebaixada em relação às rochas menos solúveis adjacentes, caracterizando um carste alogênico. Numa classificação preliminar, a paisagem desta área carbonática enquadra-se na categoria de carste alogênico, em grande parte coberto com "ilhas" de carste poligonal e cones cársticos desenvolvidos, e zonas de fluviocarste. A cobertura é formada tanto por restos de arenitos devonianos, como por sedimentos detríticos, colúvio-aluvionares, provavelmente terciários (Souza, 1990). A presença da cobertura devoniana, sobre uma superfície previamente carstificada, indica um caráter paleocárstico desta paisagem. Apesar do escasso sistema de drenagem superficial, e importantes sumidouros, o aquífero cárstico apresenta sistemas de cavernas acessíveis pouco desenvolvidos (ou talvez desconhecidos), ponto interessante a ser esclarecido através de pesquisas futuras.

A **faixa carbonática Lajeado**, da qual uma área de amostragem é tema do presente trabalho, representa o alinhamento NE-SW de rochas carbonáticas situadas na parte central da Faixa Dobrada Apiaí (fig 2.1). Limita-se, a noroeste, pelo Lineamento Quarenta Oitavas e, à sudeste, pelo Lineamento da Figueira. Esta faixa carbonática é composta por metacalcários dolomíticos, metacalcários magnesianos e metacalcários (fig 2.4). Caracterizam-se por fraca recristalização, estruturas primárias de fluxo turbidítico preservadas e estratificação plano-paralela rítmica, marcada pela alternância de estratos carbonato-pelíticos e puramente carbonáticos, além de freqüentes intercalações pelítico-carbonáticas, de espessura decimétrica.

A superfície carbonática é rebaixada em relação às rochas não carbonáticas, condicionando importante injeção alogênica no sistema cárstico. A paisagem cárstica apresenta-se bem desenvolvida, com variadas formas de carste poligonal e trechos fluviocársticos. O aquífero cárstico possui importante entalhamento subterrâneo, com sistemas integrados de cavernas acessíveis, conforme será detalhado ao longo deste trabalho.

A **faixa carbonática André Lopes**, localizada na região sudeste da Faixa Apiaí (fig 2.1), pertence à Sequência metassedimentar Serra das Andorinhas, do Complexo Setuva (Campanha et. al., 1985). Estas rochas carbonáticas foram denominadas de André Lopes devido ao fato destas formarem a serra homônima, importante acidente topográfico da área. Predominam metadolomitos calcários e secundariamente metacalcários dolomíticos (fig 2.4), com recristalização moderada a intensa, devido ao metamorfismo de grau médio (Campanha, op. cit.). São principalmente maciços, sem estruturas reliquias preservadas.

Distingue-se das demais faixas carbonáticas descritas, justamente pelo fato de constituir um relevo positivo em relação às rochas metapelíticas encaixantes, o que torna o sistema cárstico, desta faixa, de natureza principalmente autogênica, o que é uma exceção na região descrita. Pouco se conhece da distribuição de sistemas de cavernas e das características morfológicas e geológicas do aquífero associado, apesar, desta área abrigar

uma das cavernas turísticas mais conhecidas do Estado de São Paulo (cav. da Tapagem, ou do Diabo, denominação turística da mesma).

Figura 2.4 - Classificação química das rochas carbonáticas do sudeste paulista, com base no diagrama de Martinet e Sougy (1961). Análises químicas de CaO e MgO obtidas em: Souza (1990), faixa carbonática Itaiacoca; Barbieri (1993), faixa carbonática Lajeado e MMAJ/JICA (1983), faixa carbonática André Lopes.

CAPÍTULO 3

DRENAGEM SUPERFICIAL E FORMAS DE RELEVO DO CARSTE DO ALTO RIBEIRA

3.1 Arcabouço geológico e aspectos gerais da morfologia cárstica

Duas áreas carbonáticas foram selecionadas na região do Alto Ribeira, sobre as quais, procedeu-se um estudo morfológico da rede de drenagem e das formas de relevo. Esta seleção baseou-se na área exposta de rochas carbonáticas, sua estrutura geológica (estilo e grau de deformação e fraturamento), presença de sistemas de cavernas mapeados e a variedade de feições cársticas, tanto em superfície como em subsuperfície. Com isto em mente, considera-se que as áreas carbonáticas, denominadas aqui de Furnas-Santana e Lajeado-Bombas (fig 3.1), compreendem uma amostra representativa da morfologia do carste do Alto Ribeira.

Área carbonática Furnas-Santana

Esta área carbonática forma uma faixa metassedimentar de direção NE-SW, representando uma estrutura geral homoclinal, com direção NE do acamamento e mergulhos moderados a altos para NW. Dobras menores, métricas a decamétricas, assimétricas, caracterizam esta estrutura com vergência para sudeste. Estes metacalcários exibem uma alternância rítmica de estratos carbonáticos e pelíticos, onde os primeiros possuem espessura entre alguns centímetros até 2 a 3 metros (foto 3.1).

Estruturas primárias, como estratificações cruzadas, gradacionais e onduladas, estão preservadas em função da fraca recristalização dos grãos carbonáticos, associada a um metamorfismo incipiente. Estas rochas são classificadas como calcilitos impuros e calcarenitos finos a médios. A fração insolúvel, formada por argilo-minerais e micas finas (sericita e moscovita) atinge até 20% em alguns estratos carbonáticos. Os estratos pelíticos possuem espessura bastante variável, entre alguns milímetros a 30cm, contendo até 20% de grãos calcíticos. Constituem metassiltitos e filitos carbonáticos, com níveis arenosos. A espessura total desta unidade, incluindo a intercalação metapelítica maior, atinge 600m.

Ao longo do contato noroeste, uma importante falha inversa proterozóica colocou os metarenitos da Serra da Boa Vista sobre os metacalcários (Campanha, 1991). O limite sudeste da faixa carbonática é um contato normal com rochas metapelíticas e psamíticas, as quais mergulham sob os calcários. Na direção sudoeste, os carbonatos são limitados por uma intrusão granítica de idade proterozóica superior (fig 2.2).

Três expressivos conjuntos de fraturas, com direções gerais N, NE e NW foram mapeados ao longo dos metacalcários, como também observados em fotografias aéreas (anexo 3.1). As fraturas NE e N são atribuídas ao evento compressivo proterozóico responsável pelo dobramento e falhamento inverso, acima citado. O conjunto NW é associado ao soerguimento e arqueamento crustal jurássico-cretácico, responsável pela intrusão de diques basálticos (Campanha, 1991 e Melo, 1990).

As rochas metacarbonáticas Furnas-Santana formam uma faixa topograficamente deprimida, com área de exposição em planta de 27,5 km², sendo cortada pelo rio Betari, o qual representa a única saída do escoamento superficial desta área. Com uma vazão média

Figura 3.1 - Delimitação e denominação das áreas carbonáticas estudadas. *1- Bairro Furnas, *2- Caverna Santana, *3- Bairro Lajeado, *4- Bairro Bombas.

Foto 3.1 - Estratificação rítmica de camadas carbonáticas, pelítico-carbonáticas e pelíticas, típicas da área Furnas-Santana. Vista da parede lateral da galeria principal da caverna Laje Branca.

de cerca de $2 \text{ m}^3/\text{s}$, o vale do Betari foi entalhado principalmente sobre fraturas NW, correndo ortogonalmente à estratificação, sem desenvolvimento de cavernas ou condutos. Ao contrário, o intenso entalhamento fluvial interceptou os carbonatos e seus condutos subterrâneos orientados a NE-SW, formando uma série de nascentes cársticas alinhadas, que representam os principais tributários do rio Betari, ao longo dos calcários. O entalhamento da direção NW produziu um vale com escarpas escalonadas e encostas de alto ângulo, que chegam a somar desníveis totais de até 80 m.

Figura 3.2 - Seções da área Furnas-Santana. 1-1', seção longitudinal, sem exagero vertical. 2-2' e 3-3', seções transversais, com exagero vertical de 2×. Localização indicada na fig 3.1

A partir de uma altitude de 600 a 630 m s.n.m. no contato sudoeste, junto aos granitos, e de 650 m ao longo da borda nordeste, a superfície geral dos topos de cristas dos calcários mergulha centripetamente para o vale do Betari, para a cota de 260 a 280 m. Esta superfície geral de cristas possui inclinação paralela ao traço do acamamento, mergulhando de 3° a 4° no setor sudoeste (seção 1-1', fig 3.2) e 5° a 6° no trecho nordeste, em direção ao Betari. As cristas e picos carbonáticos atingem entre 650 e 750 m de altitude, contrastando com os altos de 900 e 1000 m das rochas insolúveis adjacentes (fig 3.2).

Devido à presença de vales fluviais ativos sobre o calcário e injeção significativa de rios alogênicos, esta paisagem pode ser classificada como sendo um fluviocarste, parcialmente segmentado, seguindo a definição de Jennings (1985) e White (1988). Esta segmentação parcial da rede de drenagem superficial, resultando num alinhamento de depressões fechadas compostas (segundo a definição de Day, 1976) ocorre na faixa noroeste da área Furnas-Santana, assim como, ao longo da faixa sudeste, mas com uma segmentação mais avançada, vales fluviais pouco preservados, depressões fechadas menores e um grande número de dolinas de colapso e sumidouros. Ao longo do contato litológico, praticamente toda drenagem alogênica é absorvida por vales cegos, às vezes com grandes pórticos de cavernas e paredões rochosos (foto 3.2). Planícies cársticas e *poljes* de contato caracterizam tanto as extremidades nordeste e sudoeste desta área. Sistemas de drenagem subterrânea, com cavernas verticais e horizontais estão bem desenvolvidos, conforme será mostrado no capítulo 4.

A morfologia geral dos morros e morrotes é de cones cársticos assimétricos, estruturalmente condicionados, alinhados pela direção do acamamento e truncados por juntas transversais (foto 3.3). Corredores cársticos são frequentes entre estes cones, assim como, às vezes, sobre estes, refletindo um alargamento e entalhamento de fraturas por dissolução.

Finalmente, uma característica importante desta área, é a superfície extremamente irregular dos calcários, os quais afloram pouco, devido à exuberante cobertura vegetal associada a um manto espesso de solo residual.

Área carbonática Lajeado-Bombas

Com no mínimo 47 km² (em mapa) de rochas carbonáticas continuamente expostas, esta é uma das maiores áreas carbonáticas do carste do alto Ribeira (fig 2.1). Esta região consiste predominantemente de metacalcarenitos cinza escuros, de granulação fina a grossa, com estratos maciços, de espessura entre alguns decímetros a 5 m. Intercalações de metacalcarenitos impuros, argilosos e micáceos, assim como de metassiltitos puros e carbonáticos, além de filitos carbonáticos são frequentes. A espessura destas intercalações é da ordem de 10 a 40 cm. A litologia predominante desta área, com exceção da característica maciça e espessura maior dos estratos calcários, é muito semelhante à seqüência carbonática da região Furnas-Santana.

Dois domínios estruturais são identificados nesta área (anexo 3.2). O primeiro é representado por um sinclinal, ligeiramente assimétrico, com direção geral NE-SW do acamamento e mergulhos entre 10 e 50° para SE e NW. Seus flancos possuem dobras

Figura 3.3 - Seções da área Lajeado-Bombas. 4-4'- seção longitudinal, sem exagero vertical. 5-5'- seção transversal com 2× de exagero vertical. Localização das seções indicada na fig 3.1

Foto 3.2 - Paredões calcários associados a vales cegos, característicos do contato entre metapelitos e metacalcários. Vale cego da caverna Laje Branca, contato SE da área Furnas-Santana.

Foto 3.3 - Exemplo de cone cárstico. Área Furnas-Santana, vista da estrada Apiaí - Iporanga, do mirante da serra da Boa Vista.

menores abertas, que ondulam a superfície do acamamento. O flanco sudeste deste sinclinal passa para uma estrutura homoclinal, com direções paralelas, porém com mergulhos altos, de até 80°, predominantemente para NW. Este setor homoclinal perfaz o segundo domínio estrutural, interpretado por Campanha (1991) como sendo um anticlinal com flanco SE invertido junto a um importante falhamento reverso (falha da Figueira). Juntas e falhas subverticais são freqüentes, com direções predominantes N20-30E, N50-70E e N60-70W (anexo 3.2).

Esta área carbonática, quando comparada com a região Furnas-Santana, distingue-se desta, por exibir um relevo mais homogêneo e um padrão de depressões poligonais mais desenvolvido, conforme será detalhado adiante. Circundada por metapelitos e metapsamitos finos, a água de injeção alogênica nasce em cotas de 800 a 900 m, atingindo os calcários entre 450 a 500 m.s.n.m. (fig 3.3). Com exceção do rio Betari, toda água coletada sobre 37,14 km² de rochas insolúveis é injetada nos metacarbonatos, o que condiciona formas de absorção de água alogênica, como *poljes* de contato, grandes vales cegos e sumidouros, ao longo do contato litológico. O rio Betari, ao contrário, cruza os carbonatos formando um vale tipicamente fluvial, representando o nível de base local relativo à drenagem subterrânea. De modo similar à área Furnas Santana, a drenagem superficial sobre os calcários denota uma paleodrenagem fluviocárstica, mas com um grau de segmentação mais alto. Vales secos, hoje pouco ativos, mas com testemunhos de depósitos fluviais, encontram-se interrompidos por sumidouros. A paleodrenagem pode ser parcialmente traçada, seguindo o alinhamento de depressões fechadas. Muito pouco escoamento superficial ocorre presentemente. Pequenos córregos autogênicos seguem somente algumas dezenas de metros em superfície, pois são rapidamente absorvidos por sumidouros. Alguns destes dão acesso à cavernas verticais com desníveis de até 80m.

A morfologia geral da superfície carbonática é de morros arredondados, com encostas suavemente convexas e fortemente inclinadas. Apresentam freqüente alongamento maior em direções preferenciais (NE e NW) paralelas à juntas ou traços de acamamento, formando cristas. Entre estes altos ocorrem vales, de contorno muito irregular, representando o fundo de depressões fechadas poligonais. Estes vales, quando colmatados por depósitos residuais (colúvios), possuem fundos planos ou ondulados com dolinas de subsidência (foto 3.4). Exposições da rocha limitam-se à encostas subverticais, onde formam escarpas rochosas. Estas ocorrem principalmente ao longo das bordas de *poljes* de contato, vales cegos e corredores cársticos. Quando exposta, a superfície calcária é entalhada com caneluras de dissolução (*rillenkarren*), abertas ao longo de fraturas e planos de acamamento.

Ainda em contraste com a região anterior, esta possui menor incidência de estruturas de colapso.

3.2 Zoneamento morfológico das áreas de amostragem

Com o objetivo de avaliar a distribuição espacial das formas de relevo, suas propriedades planimétricas e relação com o sistema de drenagem, foi realizada a

fotointerpretação detalhada em escala 1:25.000 da região em estudo. Atenção especial foi dada, sob magnificação, ao traçado dos divisores topográficos, sumidouros e canais de drenagem ativos e inativos. O método de Williams (1972a e 1972b) foi parcialmente seguido.

Com base nos mapas morfológicos obtidos (anexos 3.3 e 3.4), observações de campo e cartas topográficas 1:10.000, as seguintes zonas morfológicas foram individualizadas (anexo 3.5):

3.2.1 Zona fluvial

A paisagem sobre calcários, modelada principalmente pela água de escoamento superficial e processos fluviais normais, é classificada aqui, como sendo uma zona fluvial, o que sobre rochas carbonáticas extensivas, constitui exceção. O vale do Betari, cruzando as áreas carbonáticas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas, como também, parte do vale do rio Furnas, são os principais exemplos (anexos 3.3, 3.4 e 3.5).

Nos carbonatos Furnas-Santana o rio Betari formou um vale fluvial entrincheirado, com encostas fortemente inclinadas, do tipo *through valley*, segundo a classificação de Ford e Williams (1989). Com uma vazão média de aproximadamente 1,2 a 2 m³/s junto à borda do calcário, o Betari nunca foi absorvido por condutos subterrâneos. Isto é interpretado, como sendo consequência de um favorecimento ao entalhamento superficial em competição com a taxa de abertura de condutos subterrâneos. A causa deste favorecimento é a combinação dos seguintes fatores: alta descarga fluvial (2 m³/s), situação estrutural desfavorável para injeção de água, (sentido do gradiente hidráulico contrário ao do mergulho da estratificação, anexo 3.6) e a presença de fraturas extensivas subverticais, com traço NW, paralelas à direção regional de entrincheiramento do rio Betari. A combinação dos controles hidrológico e estrutural acima e suas consequências morfológicas, é muito semelhante à situação descrita por Mills (1981), para o carste do norte de Vancouver, Canadá.

Deve-se lembrar também, a implicação geomórfica do transporte de sedimento fluvial. O Betari nasce no planalto, em torno da cota de 1000m, atingindo o calcário a 285m (anexo 3.6). Este rio, e seus principais tributários, apresentam um gradiente hidráulico (variação de altitude, Δh , sobre a distância horizontal correspondente, Δl) médio de 0.208 (20,8%), à montante do calcário. A declividade relativamente alta, aliada à morfologia entalhada, indicam alta capacidade erosiva e de transporte desta drenagem. Após a transição entre o planalto e a borda da planície do rio Ribeira, o gradiente do rio Betari decresce para 0.03-0.04 (3 a 4%). Esta brusca redução de inclinação ocorre a cerca de 1,5 km antes do rio atingir os carbonatos Furnas-Santana. Isto implica numa importante redução de velocidade e capacidade de transporte da carga detrítica pelo rio, o que causa a deposição de cascalho e areia grossa. Estes depósitos fluviais, isolam parcialmente o leito fluvial carbonático, protegendo-o da abrasão e corrosão. Durante eventos de alta vazão, a carga de fundo, previamente depositada, é arrastada ao longo do canal, erodindo e rebaixando o talvegue. Muito pouco sedimento é observado no leito do setor de alto gradiente. Com

exceção de armadilhas locais preenchidas com cascalho e areia, predominam seixos, calhaus e matacões. A quantidade de sedimento depositado aumenta à jusante, atingindo o máximo, quando o rio Betari intercepta os calcários Lajeado-Bombas, junto ao Bairro da Serra. Neste trecho, o rio exibe a paisagem fluvial mais desenvolvida, sobre carbonatos, atingindo o gradiente mais baixo, com 0.0092 (0.9%) de declividade. Em contraste com os calcários Furnas-Santana, onde o vale possui encostas fortemente inclinadas e talvegue estreito, a zona fluvial Lajeado-Bombas é caracterizada por um talvegue largo, aliado a uma cobertura aluvial mais expressiva, onde o rio apresenta padrão meandrante (sinuosidade = 1,49) com uma planície de inundação bem desenvolvida.

Devido à abertura do vale e a redução brusca de gradiente, instalou-se uma situação de leque aluvial (segundo a definição de Rust, 1979), na chegada do rio na planície do Bairro da Serra. Os depósitos fluviais, com espessura muito variável, atingem cerca de 12m no máximo, sendo compostos por cascalheiras sustentadas por clastos, grossas a finas, com calhaus e blocos; cascalheiras mal selecionadas sustentadas por matriz arenosa, assim como cordões de areia e depósitos síltico-argilosos. Ocorre uma importante contribuição de partículas finas nestes aluviões. Esta fração fina, em grande parte, é proveniente da lavagem das encostas íngremes e intensamente intemperizadas que circundam o vale.

Embora com situação estrutural favorável (mergulho da estratificação concordante com a direção do gradiente hidráulico), o rio Betari não foi capaz de ser absorvido por condutos nesta área carbonática. Isto é explicado, através da ação protetora da cobertura sedimentar contra o processo de injeção de água nas discontinuidades do calcário. Principalmente as partículas finas, que colmatam parte dos proto-condutos em iniciação, reduzindo o fluxo de água e corrosão ao longo destes, o que, por sua vez, causa redução na taxa de abertura de condutos e, conseqüentemente, um aumento relativo da taxa de entalhamento superficial.

Comparando a morfologia dos vales fluviais das rochas psamíticas e pelíticas, com a de rochas carbonáticas, ao longo do rio Betari (anexo 3.6), nota-se que nestas últimas os talvegues são da ordem de 5 a 30 vezes mais largos que nos primeiros. Este fato também está relacionado à dinâmica fluvial. Sobre os calcários, o gradiente fluvial é sistematicamente inferior do que nas seções não carbonáticas, o que condiciona acumulação maior de sedimentos sobre os primeiros, conforme foi observado. Graças a esta cobertura, o talvegue carbonático é mais protegido da incisão vertical, o que causa uma eficiência relativa maior da erosão e corrosão lateral, alargando mais os vales carbonáticos, em relação aos não carbonáticos.

O rio Betari representa, atualmente, o nível de base local dos sistemas de drenagem das áreas carbonáticas em estudo. O entalhamento e alargamento do vale do Betari nestas áreas, interceptou a drenagem subterrânea, formando ressurgências, as quais formam os principais tributários deste rio ao longo dos carbonatos. Estas nascentes cársticas dão acesso à sistemas de cavernas e rios subterrâneos, com exceção de ressurgências mais profundas, como o lago do Bairro da Serra e o córrego Seco. O desenvolvimento desta circulação cárstica será discutida no capítulo 4.

A retração das encostas do vale do Betari na área Lajeado-Bombas, em função da erosão remontante causada pelo escoamento superficial ao longo destas, invadiu a superfície de depressões poligonais, iniciando a remoção de cristas adjacentes a fundos de depressões. A evolução deste entalhamento remontante está causando uma inversão de relevo, onde os fundos de antigas depressões fechadas localizam-se atualmente em cristas. Um exemplo deste processo é o abismo Ponta de Flecha (fig 3.4), cuja entrada hoje está sobre uma crista, mas que no passado, representou o fundo de uma depressão poligonal, conforme é evidenciado também, pelos depósitos clásticos, ricos em ossadas da fauna pleistocênica, preservados em patamares desta caverna vertical (Karmann, 1982 e Barros Barreto, et. al., 1982). Esta inversão de relevo é, portanto, consequência da concorrência entre a evolução da superfície de depressões poligonais e o entalhamento e alargamento fluvial do vale do Betari, onde este último processo, tem ocorrido com taxas superiores.

Figura 3.4 - O abismo Ponta de Flecha no contexto da inversão de relevo causada pela retração das encostas do vale do rio Betari, bairro da Serra, área Lajeado-Bombas.

O segundo domínio fluvial sobre calcários da área de estudo é parte da bacia do rio Furnas, entre a vila homônima e sua junção ao rio Betari (anexos 3.3 3.5 e 3.6). Três segmentos morfológicos constituem a bacia do rio Furnas. O primeiro setor, com direção NE-SW, acompanhando a borda nordeste dos calcários, forma um alinhamento de depressões fechadas, compostas, com sumidouros e um canal segmentado, ao longo do qual

pouca água corre atualmente, com uma inclinação média de 0.14 (14%) e desvio padrão de 0.21 (anexos 3.3 e 3.6). Esta paisagem é uma transição entre a morfologia fluvial e a morfologia cárstica superimposta. O segmento verdadeiramente fluvial, inicia-se onde o rio inflete para a direção NW-SE. Neste trecho, o gradiente do talvegue aumenta para 0.17 (desvio padrão de 0.23), sendo escalonado com cachoeiras. O vale torna-se fechado com encostas abruptas. A vazão atual do rio Furnas é decorrente quase que exclusivamente ($\sim 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$) da caverna do Grilo, que é uma nascente cárstica localizada no início deste trecho do rio Furnas. Seguindo com características puramente fluviais, o terceiro segmento inicia-se quando o rio atinge o contato SE do calcário. O canal assume declividade média uniforme de 0.11 (desvio padrão de 0.03). O vale abre-se bruscamente e a quantidade de sedimentos aumenta em função da redução brusca de gradiente. O talvegue alargado está coberto por depósitos aluviais e coluviais interdigitados.

Uma feição interessante, a ser discutida adiante, é a caverna Santana, a qual cruza por baixo do segundo setor do rio Furnas e ainda não foi interceptada pela incisão deste.

Resta ainda a questão do não desenvolvimento de condutos ao longo do segmento NW-SE do rio Furnas. Similar ao rio Betari, a situação estrutural é desfavorável à injeção de água nos planos de acamamento. Outro fator notado, é a natureza principalmente autogênica da água do rio Furnas (índice médio de saturação em $\text{CaCO}_3 = 0,28$), o que a torna pouquíssimo agressiva, favorecendo portanto, a capacidade de abrasão mecânica deste escoamento superficial em detrimento da abertura de condutos.

3.2.2 Zona de contato

Esta é a unidade morfológica dominada por feições de injeção de água alogênica, formando uma faixa ao longo do contato dos metacalcários (anexos 3.3, 3.4 e 3.5). Caracteriza-se por vales cegos, *poljes* de contato e sumidouros, os quais absorvem o escoamento superficial das rochas insolúveis que contornam os metacalcários. A nomenclatura destes termos segue Gams (1978), Jennings (1985) e Ford e Williams (1989).

De modo geral, o contato entre metapelitos-psamitos e metacalcários é marcado por um vale assimétrico, cujo flanco sobre os calcários é formado por uma superfície suavemente ondulada, de largura variável, parcialmente coberta por depósitos aluvio-coluviais e marcada com sumidouros e afundamentos de terreno. Esta superfície termina junto a encostas íngremes de calcário (fig 3.5).

Vales cegos são melhor representados ao longo do contato sudeste da área Furnas-Santana (anexo 3.3) e contornando grande parte do contato dos calcários Lajeado-Bombas (anexo 3.4). Estes vales possuem morfologia fluvial normal, com gradientes entre 0.12 e 0.33 sobre os metapelitos (fig 3.5). Esta drenagem adentra-se sobre os carbonatos entre 50 a 400m, com uma inclinação média de 0,04. Os vales cegos com maior penetração nos calcários, ocorrem na borda sudeste da área do Lajeado, associando-se às maiores bacias de captação alogênica e aos mais desenvolvidos sistemas de cavernas. Estas incisões no calcário formam anfiteatros, que em mapa apresentam padrão semi-circular a triangular com encostas fortemente inclinadas e paredões rochosos. O fundo destes anfiteatros é coberto

Figura 3.5 - Perfis compostos de vales cegos. Gradiente médio indicado à esquerda.

Figura 3.6 - Seção da caverna Laje dos Macaquinhos, representando um salão de desmoronamento associado a um paleo-sumidouro. Borda NE da área Lajeado-Bombas.

por depósitos residuais e de tálus dos calcários, com blocos e matações, além de cascalheiras e calhaus fluviais. A maioria destes vales cegos apresenta salões de abatimento, cujas entradas localizam-se cerca de 40m, em desnível, acima dos sumidouros atuais, como por exemplo, a caverna Lage dos Macaquinhos (fig 3.6), que ocorre no contato NW da área Lajeado-Bombas. Estas cavernas de abatimento, são interpretadas como sendo testemunhos de um antigo nível superior de sumidouros.

Poljes de contato foram identificados no setor sudeste e nordeste da região Furnas-Santana (anexo 3.5) e na extremidade nordeste e sul-sudoeste do corpo carbonático Lajeado-Bombas (anexo 3.5). Similar aos vales cegos mais entalhados, estes *poljes* associam-se aos rios alogênicos que desenvolveram importantes sistemas de drenagem subterrânea, com cavernas. De fato, os poljes de contato diferem dos vales cegos, somente pela maior área da superfície plana colúvio-aluvial presente nos primeiros. Isto sugere uma transição entre vales cegos e poljes, onde certos vales cegos, dada uma drenagem subterrânea eficiente, por um período de tempo maior, podem evoluir para *poljes*, conforme interpretação esquematizada na fig 3.7.

Os *poljes* de contato são caracterizados por córregos de baixo gradiente associados a uma superfície suavemente ondulada e coberta por material aluvial e colúvio (fig 3.8). Esta cobertura detrítica possui espessura irregular, atingindo vários metros. É composta por material terrígeno siltico-arenoso com cascalheiras e blocos, refletindo a composição dos metassedimentos vizinhos. O fundo calcário aparece somente em raros pontos, na forma de elevações arredondadas cobertas por solo residual. Grandes blocos basculados de calcário são freqüentes, às vezes, com restos de cavidades e espeleotemas, sugerindo remanescentes de cavernas em escarpas colapsadas. Esta planície é delimitada por encostas calcárias abruptas ou pelo próprio contato litológico, com quebra na declividade. Salões de abatimento ou abrigos rochosos ocorrem ao longo destas escarpas e o sumidouro principal é normalmente entre blocos na base ou próximo da escarpa calcária.

Onde não ocorrem *poljes*, nem vales cegos, a zona de contato é caracterizada por uma estreita planície ondulada por depressões rasas, desenvolvidas sobre material residual insolúvel dos carbonatos, que grada lateralmente para depósitos de encosta e aluviões dos metapelitos adjacentes. Algumas destas depressões encontram-se conectadas por córregos intermitentes, ativos somente durante épocas de alta pluviosidade. Afloramentos calcários são escassos, restringindo-se à matações e blocos imersos em solo residual. As bacias de captação destes setores são relativamente pequenas, quando comparadas às dos vales cegos. A descrição de **semi-vale cego** de Jennings (1985) é similar a esta feição, a qual é bem representada na borda centro-sul da região do Lajeado (anexos 3.4 e 3.5).

3.2.3 Zona fluviocárstica

Setores das áreas carbonáticas estudadas, onde a drenagem superficial ainda é predominante, apesar de importante infiltração, juntamente com feições cársticas conspicuas, são classificadas aqui como zonas fluviocársticas (figuras 3.4 e 3.5). A seguinte morfologia caracteriza esta paisagem :

Figura 3.7 - Evolução esquemática de *poljes* de contato. A- Fase inicial de exposição dos calcários, escoamento superficial (R) predominante. B- Desenvolvimento de condutos subterrâneos e infiltração (I) crescente. C- Condutos integrados, rebaixamento do N.A. e absorção total de R através de sumidouros, com instalação de vales cegos. D- Incisão mais profunda de vales cegos, entalhamento vadoso sobre condutos subterrâneos e retração da encosta calcária por colapso de cavernas. E- Desenvolvimento de planície aluvial-coluvial sobre os calcários, caracterizando o *polje* de contato

- Drenagem superficial parcialmente ativa com escoamento superficial reduzido. Córregos alogênicos seguem seu curso sobre o calcário, mas, perdem gradativamente sua vazão. Às vezes exibem vales entalhados, hoje praticamente inativos, como por exemplo, na área de captação do sistema Água Suja, noroeste da região Furnas-Santana.

- Vales secos podem ser traçados facilmente sobre fotos aéreas 1:25.000. Quando observados em campo, apresentam canais com sedimentos fluviais alóctones, interrompidos por depressões rasas.

- Divisores de água entre sumidouros, ao longo dos vales, são pouco desenvolvidos, sendo dificilmente reconhecíveis em escala 1:25.000.

Zonas fluviocársticas foram delimitadas no sudoeste e nordeste da área carbonática Furnas-Santana e ao longo da faixa sudeste e extremidade nordeste da área Lajeado-Bombas (anexo 3.5).

Figura 3.8 - Exemplo de *polje* de contato, junto ao sumidouro principal do sistema de cavernas Água Suja. Topografia extraída da carta U12, 1:10.000, DAEE, 1957.

A presença de sedimentos fluviais alóctones por longas distâncias adentro dos calcários, indica que um importante sistema fluvial precedeu os vales atualmente quase secos. Isto pode ser observado no setor sudoeste da área Furnas-Santana, onde a bacia de drenagem reliquiar do rio Furnas exibe canais com cascalho e areias, incompatíveis com as descargas máximas atuais. A diminuição gradativa da vazão à jusante, não somente concentrada em sumidouros pontuais, indica uma infiltração dispersa, que por sua vez, sugere condutos cársticos (permeabilidade secundária) pouco desenvolvidos, em grande parte desta zona.

A topografia geral da zona fluviocástica é de morrotes suaves e arredondados, com cones cársticos isolados entre vales fluviais parcialmente inativos.

3.2.4 Zona de depressões poligonais e a transição de fluviocarste para carste poligonal

Esta é a paisagem sobre rochas carbonáticas, onde o escoamento superficial, de natureza essencialmente autogênica, é totalmente absorvido por sumidouros (insurgências) localizados nos fundos de depressões, as quais são delimitadas por divisores de água, formando um padrão planimétrico celular de polígonos irregulares (anexos 3.3 e 3.4). O termo depressão poligonal, ou fechada, utilizado aqui, segue a definição de Williams (1972b) e Day (1976), como sendo uma depressão de dissolução, a qual é drenada para um ou vários sumidouros internos, através de uma rede de drenagem incipiente e centrípeta.

Estas depressões foram demarcadas sobre fotografias aéreas 1:25.000. Devido à presença de mata densa sobre grande parte dos calcários, a localização exata de alguns sumidouros e divisores foi dificultada, induzindo um certo erro e distorção neste traçado, somente detectável após sua demarcação em campo. Mas, o padrão geral dos polígonos, compatível com a escala 1:25.000, está bem expresso nos mapas morfológicos, conforme verificação realizada em campo.

Na área carbonática Furnas Santana, as depressões poligonais concentram-se em faixas de direção NE-SW, principalmente entre o contato sudeste dos calcários e a intercalação pelítica central, acompanhando o alinhamento geral da estratificação (anexo 3.5). No corpo carbonático Lajeado-Bombas (anexo 3.5), a zona poligonal é mais expressiva em área, formando manchas irregulares, principalmente ao sul do vale do Betari. De modo geral, esta unidade morfológica é caracterizada por uma superfície intensamente ondulada, com cristas nas cotas de 600 a 700m e fundos de vales fechados entre 420 e 550m, produzindo uma variação altimétrica (relevo relativo) de até 130m (fig 3.3).

Depressões fechadas, com dimensões moderadas (entre algumas dezenas à centenas de metros de diâmetro), são consideradas como sendo a unidade essencial do relevo cárstico (Sweeting, 1972 apud Gunn, 1981a). Segundo Gunn (1981a), a similaridade entre a função hidrológica de depressões fechadas na paisagem cárstica e a de vales fluviais normais, foi primeiramente reconhecida por Grund (1914) e quantificada pelos estudos morfométricos de Williams (1971, 1972b) e Day (1976), os quais demonstraram que muitas depressões fechadas exibem características muito semelhantes às de pequenas bacias de drenagem superficial. Considerando que a bacia hidrográfica é a unidade básica para

Foto 3.4 - Dolinas de subsidência em fundos de depressões poligonais. Sudeste da área Lajeado-Bombas.

Foto 3.5 - Vista típica de cones cársticos que delimitam depressões poligonais. Área Lajeado-Bombas, local denominado Sítio Novo.

investigações geomórficas e hidrológicas do relevo, Gunn (1981a) confere às depressões fechadas a mesma posição na hidrologia de sistemas cársticos autogênicos, ou seja, para caracterizar o escoamento superficial de terrenos cársticos e os mecanismos de recarga dos aquíferos associados, é fundamental a demarcação e caracterização morfológica destas bacias poligonais.

Com o objetivo de integrar o processo de desenvolvimento das formas de relevo com a evolução do aquífero cárstico (tema do cap.4), procedeu-se a identificação dos tipos de depressões fechadas presentes nas áreas de estudo. Dois tipos fundamentais foram reconhecidos, em função de seu tamanho (área em planta) e padrão de drenagem interna, observados em fotografias aéreas 1:25.000, mapas topográficos 1:10.000 e, quando possível, em campo. A área das depressões foi medida sobre os mapas morfológicos, utilizando o programa Autocad 11 (detalhes são apresentados no item 3.3). O padrão de drenagem, foto-restituído, foi classificado conforme as ordens de Strahler (1964) para redes de drenagem superficial.

Depressões simples são aquelas com área planimétrica menor (entre 0,003 e 0,05 km²) e somente um sumidouro principal. A drenagem interna é pouco desenvolvida, sendo formada por ravinas e canais incipientes, predominantemente de segunda ordem. Suas profundidades (desnível entre o sumidouro e a crista de divisor mais próximo, em cota, fig. 3.9) variam entre 5 e 30m. O contorno destas depressões é bastante irregular, tendendo a formas planimétricas poligonais (triangulares a hexagonais) ou, às vezes, subcirculares a elípticas, conforme se nota nos mapas morfológicos e no exemplo da fig 3.9. O eixo maior destas figuras varia de 50 a 600m, com alguns casos extremos, de até 900m. As encostas e fundo apresentam-se cobertas por solo residual argiloso escuro (rico em matéria orgânica). Exposições rochosas são raras, limitando-se à pequenas escarpas, ao longo das encostas, ou lajedos próximos aos sumidouros. A água coletada pela superfície destas bacias é transmitida para subsuperfície através de infiltração difusa ou concentrada ao longo de um conduto vertical (*shaft*), conforme será discutido adiante.

Depressões compostas caracterizam-se pela área maior (aproximadamente entre 0,05 e 0,8 km²), contorno mais irregular, quando comparadas com as depressões simples e uma rede de drenagem interna mais complexa, com múltiplos sumidouros (fig.3.10). A rede de drenagem interna é formada por canais desenvolvidos, freqüentemente de terceira ordem, apresentando-se interrompidos por sumidouros. A superfície interna é ondulada, possuindo vários pontos baixos, os quais podem, ou não, estar associados à sumidouros. Na escala 1:25.000 não é possível individualizar os divisores destes pontos baixos. Sua profundidade é muito variável, oscilando entre 10 e 80m, com um valor excepcional de 130m. O eixo maior destas figuras atinge máximos de até 2,7 km. Detalhes morfométricos são apresentados no item 3.3. O padrão geral destas depressões é de uma superfície ondulada, com inclinação geral centrípeta, demarcada por divisores topográficos bem desenvolvidos.

Tanto as depressões simples, como as compostas, são delimitadas por morros agudos, às vezes triangulares, e cristas com encostas suavemente concavas e fortemente

Figura 3.9 - Exemplo do padrão planimétrico de depressões poligonais simples da região Furnas-Santana. P- profundidade da depressão. Contornos extraídos da folha V12, 1:10.000, DAEE, 1957.

Figura 3.10 - Depressão composta (uvala) das Areias, região do Lajeado. A ressurgência e sumidouro marcados no centro, correspondem ao fundo da dolina de abatimento que dá acesso ao sistema de cavernas Areias. Extraído da folha W12, 1:10.000, DAEE, 1957.

inclinadas, as quais convergem internamente para uma zona rebaixada (figuras 3.2 e 3.3 e foto 3.5).

As depressões simples identificam-se com *cockpits*, definidos por Sweeting (1958) para o carste da Jamaica, enquanto que as compostas enquadram-se na categoria de *uvalas*, pelo fato de possuírem múltiplos pontos de infiltração (Terzaghi, 1958, apud White, 1988), apesar das uvalas originalmente descritas, não apresentarem uma amplitude de relevo, tal qual, as depressões compostas aqui descritas.

Figura 3.11 - Representação esquemática dos tipos fundamentais de formas de absorção do escoamento superficial em fundos de depressões poligonais na região estudada. A- infiltração difusa ao longo de fraturas alargadas por dissolução e colmatadas com material residual. B- infiltração concentrada ao longo de condutos verticais abertos (abismos). C- absorção direta do escoamento por condutos de sistemas de cavernas.

Nos pontos mais baixos destas depressões, foram identificados três tipos fundamentais de formas de absorção do escoamento superficial (fig 3.11). O mais frequente é representado por uma zona deprimida, com forma planimétrica circular a elíptica e bordas de inclinação forte a suave (fig 3.11a e foto 3.4). Sua superfície é coberta por solo residual de calcários, às vezes com blocos e matações disseminados. Não se observa um sumidouro pontual, mas sim, uma área que absorve a água. Estes fundos, durante períodos de chuva

intensa, formam alagamentos, que na época seca transformam-se em zonas de solo argiloso escuro e úmido. Esta morfologia é típica de dolinas de dissolução, associadas à infiltração vertical difusa da água meteórica ao longo de fraturas e juntas alargadas, conforme os modelos de Gunn (1983) e Williams (1985). O segundo tipo, menos freqüente que o acima descrito, é constituído pelos sumidouros pontuais e abertos, muitas vezes associados à cavernas verticais (fig 3.11a). A entrada destes condutos verticais localiza-se no vértice de depressões cônicas, com encostas mais íngremes que no caso das dolinas de dissolução. Estas feições são denominadas de poços ou chaminés de dissolução (White, 1988), sendo associados à infiltração vadosa concentrada ao longo das paredes de condutos verticais. Grande parte dos abismos, denominação espeleológica de cavernas verticais, comuns nas áreas em estudo, são exemplos destas feições. O terceiro tipo, e menos comum, são as depressões com paredes rochosas e fundo coberto por blocos, matacões e depósitos finos de encosta, os quais formam um talus que vai de encontro à salões subterrâneos ou condutos associados a rios subterrâneos (fig 3.11c). Estas feições ocorrem, tanto em fundos de depressões compostas, como simples, resultando do colapso de cavernas, devido à intersecção do rebaixamento da superfície com o nível de condutos e salões subterrâneos.

As formas acima descritas, representam os três tipos extremos (*end members*) de absorção do escoamento superficial para subsuperfície, devendo-se ressaltar aqui, que ocorrem diversas formas de transição entre elas e, também, associação destas numa mesma depressão poligonal, principalmente nas compostas. O exemplo mais freqüente de associação é a ocorrência de pontos de absorção na forma de condutos vadosos verticais (feições do 2º tipo) ao longo das encostas de uma depressão poligonal maior, enquanto que, nos pontos mais baixos desta mesma depressão, incidem, mais freqüentemente, dolinas de dissolução (formas do 1º tipo), conforme esquema da fig. 3.12.

A origem desta associação é interpretada como sendo consequência do mecanismo de evolução de um conjunto de depressões de dissolução, onde, com o passar do tempo, ocorre uma taxa de evolução diferenciada e competição entre as mesmas (fig.3.13). Numa primeira fase, considera-se que uma série de pontos de infiltração iniciam seu desenvolvimento, ao mesmo tempo, sobre uma superfície calcária, em função do aumento gradativo de permeabilidade secundária no interior da rocha carbonática. Num certo momento, algumas destas rotas subterrâneas de fluxo vadoso vertical tornam-se mais eficientes, o que causa a remoção de um volume maior de material em solução e suspensão, coletados por estas, nos pontos correspondentes em superfície. A partir deste estágio, as depressões associadas às rotas mais eficientes de escoamento subterrâneo, terão uma taxa de abertura e subsidência maior em comparação com as depressões vizinhas, com drenagem subterrânea menos eficiente. Desta maneira, inicia-se uma competição entre as diferentes taxas de desenvolvimento de depressões, o que pode culminar com o englobamento de várias depressões menores por uma maior, a qual possui velocidade de crescimento maior. Neste processo de coalescência de várias depressões, a erosão remontante das encostas da depressão maior e mais profunda, pode invadir e, eventualmente, remover os divisores de depressões menores adjacentes, produzindo a associação acima descrita, onde feições de

absorção de água superficial, típicas de fundos de dolinas, ocorrem, ao contrário, nas encostas e até cristas de depressões maiores, resultando em inversões de relevo.

Figura 3.12 - Seção esquemática representando a associação de formas de absorção do escoamento superficial em depressões poligonais. 1- Dolina de dissolução associada a rota de drenagem subterrânea eficiente. 2- Atual caverna vertical (abismo) representando antigo fundo de depressão com taxa de ampliação menor. 3- Fendas de dissolução na zona epicárstica. 4- Rota de infiltração vertical concentrada sobre descontinuidades. 5- Linhas de fluxo geradas pelo cone de rebaixamento do lençol freático. 6- Conduitos associados à rede de drenagem subterrânea. 7- Superfície da rocha entalhada por sulcos de dissolução (*karren* cobertos). 8- Infiltração vadosa difusa na zona epicárstica. 9- Solo

Tanto na área Furnas-Santana como Lajeado-Bombas, observa-se a predominância de condutos vadosos verticais (abismos) nesta situação de encosta ou crista e não a de dolinas de dissolução, com infiltração difusa (impenetráveis ao homem). Como exemplos, citam-se os Abismos do Fóssil, Juvenal e dos Caramujos (fig 3.14). A interpretação deste fato, num quadro geral de evolução do carste poligonal, é a de que estas rotas de infiltração concentrada, teriam passado uma fase inicial, onde as fraturas alargadas estariam colmatadas por material residual, como ocorre nos fundos atuais da maioria das depressões observadas. Mas, em função do desenvolvimento lateral de uma zona profunda de permeabilidade maior (abertura de condutos freáticos), responsável pela implantação da depressão maior, ocorre o rebaixamento do lençol freático, formando um cone de rebaixamento do lençol, o que causa o aumento do gradiente hidráulico e a instalação de linhas de fluxo, de forma centripeta, com isopotenciais contornando a zona de maior permeabilidade. Se as depressões menores estiverem inseridas no perímetro deste cone de rebaixamento do lençol, haverá um incremento do gradiente hidráulico e consequentemente,

PERFIL

PLANTA

Figura 3.13 (ao lado esquerdo)- Representação esquemática da evolução de um conjunto de depressões poligonais, através do modelo de competição e coalescência, gerando depressões compostas a as associações de dolinas de dissolução e abismos, com inversão de relevo. A a E, seções e A' a E', vista em planta.

A- Situação pré-carstificação.

B- Início de carstificação e aumento de permeabilidade secundária.

C- Instalação de um cone maior de rebaixamento do lençol freático sobre a rota preferencial de drenagem subterrânea. X marca a depressão com taxa de ampliação maior, devido a sua conexão com a drenagem subterrânea.

D- Englobamento de depressões menores pela depressão com taxa de ampliação maior (formação de depressões compostas).

E- Erosão de solo e detritos acumulados ao longo das rotas de infiltração de depressões menores inseridas no raio do cone de rebaixamento do lençol associado à depressão maior. Iniciação de dolinas secundárias (S) devido ao rebaixamento do lençol e conexão de rotas de infiltração com condutos subterrâneos. Inversão de relevo (I), com a localização de antigos fundos de dolinas nas encostas de depressões maiores.

Figura 3.14 - Seções longitudinais dos abismos do Fóssil (A) e dos Caramujos (B), localizados na área carbonática Lajeado-Bombas. Adaptados de Gusso, et. al. (1979) e Collet et. al. (1970). As entradas destas cavernas verticais representam antigos fundos de depressões.

da energia de transporte da água de infiltração no fundo da depressão menor lateral. Com o aumento da capacidade erosiva da água de infiltração, aliada à ampliação da zona vadosa ao longo da rota de infiltração, o material residual que colmatava as fraturas alargadas, acaba sendo erodido e as paredes das fraturas corroídas pelo escoamento do filme de água meteórica sobre a rocha exposta (fig 3.13E). Deve ainda ser salientado, que o volume de material residual coletado por esta depressão, diminui com o tempo, pois sua área de captação é reduzida drasticamente com a remoção de suas encostas devido à ampliação da depressão maior.

Um fenômeno importante, que realça as diferenças entre taxas de ampliação de bacias poligonais, é o processo de realimentação (*feedback*) hidrológica positiva, definido por Williams (1985). Este processo resulta no aumento da taxa de expansão de dolinas de dissolução, associadas a rotas eficientes de drenagem subterrânea, pois com uma ampliação inicial da área de captação de uma depressão, um volume maior de água meteórica será coletado, o que, por sua vez, reforça o fluxo de água e corrosão ao longo da zona de infiltração, alargando-a, o que acaba voltando a ampliar a superfície de captação da depressão (fig 3.15).

Figura 3.15 - Fluxograma do processo de desenvolvimento e ampliação de depressões poligonais através do fenômeno de realimentação. 1, 2, 3 = linhas de realimentação positiva. Adaptado de Williams (1985).

Nesta morfologia geral de depressões simples e compostas, há ainda, pequenas depressões, somente notáveis em campo. Suas dimensões, variam desde suaves concavidades, com alguns metros de diâmetro, até 1m de profundidade, à depressões mais pronunciadas, que atingem no máximo 15m de diâmetro, por 2 a 3m de profundidade. Estas pequenas dolinas de dissolução ocorrem tanto ao longo de encostas, como também, sobre os divisores de depressões poligonais. Estas feições são interpretadas como dolinas em início de desenvolvimento, cujo surgimento foi disparado pela evolução das depressões maiores e mais profundas, conforme o modelo de geração múltipla e competitiva (*Multigenerational diffusion and competition process model*), proposto por Kemmerly (1982), baseado nos trabalhos de LaValle (1967), Ford (1964), Drake e Ford (1972), Williams (1972a) e Palmquist (1979), para explicar a origem e evolução de grandes populações de dolinas. Este modelo prevê que o desenvolvimento e ampliação de uma depressão primária (depressão maior), aumenta, em muito, a probabilidade de surgimento de outras dolinas secundárias nas vizinhanças da primeira, durante o episódio de rebaixamento do lençol freático, criado pela ampliação da dolina primária. O passo fundamental para o sucesso desta iniciação secundária, segundo Kemmerly (op. cit.), é a conexão de micro-canalículos abertos por dissolução, ao longo de planos de acamamento e fraturas, com os condutos maiores responsáveis pelo cone de rebaixamento do lençol.

Com o modelo acima descrito, muitas depressões simples, identificáveis na escala 1:25.000 e que contornam depressões maiores, podem ser interpretadas como sendo dolinas secundárias, ou seja, iniciadas em função da implantação das maiores. Como exemplo, cita-se a região centro leste da área do Lajeado, conforme é representado na fig 3.16, extraída do mapa morfológico (anexo 3.4).

Figura 3.16 - Depressões secundárias (linha tracejada) contornando a depressão principal. Exemplo extraído do mapa morfológico da área Lajeado Bombas

3.2.4.1 Depressões poligonais e a paleodrenagem fluvial

A ocorrência de uma fase fluvial, anterior ao desenvolvimento do relevo cárstico, é considerada na literatura, desde os trabalhos de Penck (1900) e Lehmann (1936) e Roglic (1960). Com esta idéia em mente, Monroe (1974), Gunn (1978 e 1981a) e Miller (1982), apud Ford e Williams (1989), evidenciaram o processo de transformação da paisagem fluvial para a de bacias poligonais fechadas, através da reconstrução da paleodrenagem superficial sobre o carste de Porto Rico, Nova Zelândia e Belize. Esta transformação é consequência do aumento gradativo da capacidade de drenagem subterrânea em rochas carbonáticas (desenvolvimento de permeabilidade secundária) e a evolução de dolinas de dissolução, com respectivas bacias poligonais, sobre os canais e vales fluviais.

Nas áreas carbonáticas em estudo, o alinhamento de sumidouros e respectivas bacias poligonais, assim como, dos talwegues remanescentes entre alguns sumidouros, no interior destes polígonos, sugerem o traço de uma drenagem fluvial anterior, onde um grande número das insurgências observadas, desenvolveram-se sobre estes canais, segmentando-os.

A zona morfológica de transição (anexo 3.5), constituída principalmente por depressões compostas, ilustra o estágio intermediário de desmembramento da rede de drenagem superficial em bacias poligonais fechadas. Estas depressões compostas, freqüentemente exibem vestígios de talwegues, inclusive com testemunhos de sedimentos fluviais, como cascalheiras em pontos isolados. A forma alongada destas depressões, notável principalmente na área Furnas Santana, com divisores em cristas bem realçadas, paralelas ao alinhamento de insurgências sobre uma linha de fundo (antigo talvegue), a qual é segmentada ortogonalmente por divisores menos marcantes, ainda assemelha-se, em muito, à morfologia de vales fluviais encaixados.

Na figura 3.17 apresenta-se um modelo da seqüência de transformação de vales fluviais em bacias poligonais fechadas. Numa fase inicial, em função do soerguimento regional e erosão da cobertura metapelítica dos calcários, cresce a interação entre água meteórica e calcário, o qual, neste período inicial, possui reduzida permeabilidade secundária. Pouca água é, portanto, absorvida pela superfície carbonática, condicionando um lençol freático raso e desenvolvimento de canais de escoamento superficial. Assim, instala-se uma rede fluvial sobre os calcários, concomitantemente à erosão dos metapelitos sobrejacentes. Com o aumento gradativo da permeabilidade secundária no pacote calcário e exposição total da sua superfície, surgem rotas de drenagem freática, e o maciço carbonático aumenta sua capacidade de absorção e transmissão de água superficial. Desenvolvem-se, nesta fase, pontos de concentração de infiltração vertical, os quais, instalam-se preferencialmente ao longo dos talwegues fluviais, pois estes, concentram o escoamento superficial. Desta maneira, diminui o volume de escoamento superficial e feições cársticas, como dolinas de dissolução, iniciam a se implantar, imprimindo características fluviocársticas sobre a paisagem. Através do contínuo aumento de drenagem subterrânea e ampliação das rotas preferenciais de percolação vertical, ampliam-se as dolinas de dissolução, o que resulta no desenvolvimento de drenagens centrípetas e início de segmentação das linhas de escoamento superficial, através da instalação de divisores

Figura 3.17 - Seqüência evolutiva de depressões poligonais a partir da drenagem fluvial.
 A- Fase inicial de exposição dos metacalcários. Drenagem superficial ativa e lençol freático raso.
 B- Drenagem superficial parcialmente ativa. Instalação de pontos de absorção do escoamento superficial. Rebaixamento do lençol freático sobre estes pontos.
 C- Drenagem superficial segmentada. Instalação de dolinas de dissolução. Desenvolvimento de divisores entre sumidouros.
 D- Ampliação dos divisores entre sumidouros e estabelecimento de bacias poligonais fechadas.

topográficos entre estas bacias. Neste estágio, o desmembramento da rede fluvial torna-se evidente, e a paisagem fluvial gradativamente dá lugar a de depressões compostas. Com a evolução destas depressões, cresce o grau de segmentação da rede fluvial, através da instalação de novos pontos de absorção vertical (dolinas secundárias), rebaixamento dos fundos de dolinas e desenvolvimento de divisores topográficos entre estas, atingindo a morfologia atualmente observada, com depressões simples e compostas. A tendência evolutiva desta paisagem é a total obliteração de sua história fluvial passada, pois com a dissecação dos antigos interflúvios, pela implantação de dolinas sobre estes, além do processo de inversão de relevo, através da competição entre depressões, as antigas rotas de escoamento superficial acabam sendo substituídas pelo reticulado de bacias poligonais fechadas, conforme é exemplificado por Williams (1972b), sobre o carste da Nova Guiné.

Uma vez reconhecida a herança fluvial, parcialmente preservada, na zona poligonal, é possível obter o traçado aproximado da antiga rede de drenagem superficial sobre os calcários. Nas figuras 3.18 e 3.19 é apresentada a reconstrução dos antigos padrões de drenagem sobre as áreas carbonáticas Lajeado-Bombas e Furnas-Santana. O critério essencial utilizado para este traçado foi a disposição sub-paralela entre os alinhamentos de cumes de cones cársticos e os fundos de depressões maiores, sobre os mapas morfológicos. Os cones cársticos representam testemunhos dos interflúvios, hoje dissecados. Os fundos de dolinas, correspondem, aproximadamente, à superfície rebaixada dos paleo-talvegues do sistema fluvial.

A reconstrução da paleo-drenagem sobre a área carbonática Furnas-Santana (fig. 3.18), exhibe um padrão geral em treliça, fortemente guiado pela direção estrutural NE-SW, com o rio Betari sendo o nível de base local. Na margem direita do rio Betari, a paleo-bacia hidrográfica do rio Furnas era responsável pelo escoamento superficial da área carbonática. Esta bacia subdividia-se em três sub-bacias principais: a do rio Pérolas, rio do Grilo e a do próprio rio Furnas. Com o desenvolvimento de bacias poligonais e drenagem subterrânea, estas rotas fluviais acabaram sendo capturadas, respectivamente, pelos sistemas de drenagem subterrânea Santana-Pérolas, do Grilo e do Córrego Grande, que hoje formam nascentes cársticas ao longo da margem direita do rio Betari. Na margem esquerda deste rio, a paleo-drenagem era constituída pelas bacias dos rios Água Suja e Morro Preto-Couto, ambas associadas atualmente à sistemas de drenagem subterrânea, afluentes do Betari. Neste setor nordeste, predomina a paisagem fluvio-cárstica, com vales secos. A zona poligonal é pouco expressiva.

Sobre os carbonatos da área Lajeado-Bombas, a paleo-drenagem exhibe um padrão predominantemente dendrítico, no setor sudoeste, e dendrítico a retangular, no setor nordeste (fig. 3.19). É possível individualizar quatro sistemas de drenagem maiores, que eram responsáveis pelo escoamento superficial dos carbonatos: as sub-bacias associadas ao rio Betari, a bacia do córrego Sem Fim, a drenagem do córrego Bombas e o sistema do córrego Cotia de Cima. Na margem esquerda do rio Betari, as paleo-bacias do córrego Ouro Grosso e Alambari drenavam os fluxos alogênicos, que cruzavam os carbonatos, desaguando no Betari. Hoje representam importantes sistemas de circulação subterrânea, com ressurgências cársticas na borda da planície aluvial do rio Betari. Na sua margem direita, ocorria a paleo-bacia do córrego Macaquinhos, atualmente com suas águas ressurgindo, em parte, no córrego Seco (ressurgência intermitente) e ao longo de nascentes menores junto à borda sul da planície do Betari. O traçado da paleo-drenagem na região sudoeste do Lajeado, sugere que o escoamento superficial, desta área, era coletado pelo córrego Sem Fim, ou um antigo canal, que acompanhava a zona de contato com os metapelitos, até o rio Betari. Com a implantação da drenagem subterrânea associada aos sistemas de cavernas Areias e Córrego Fundo (fig.3.19), esta bacia hidrográfica superficial deixou de existir.

O desenvolvimento da drenagem subterrânea é tema do capítulo 4, onde sua relação com a drenagem superficial será retomada.

Figura 3.18 - Interpretação do traçado da paleodrenagem fluvial da área Furnas-Santana. 1- Ressurgência do córrego Grande. 2- Ressurgência do córrego do Grilo. 3- Ressurgência do córrego Roncador (caverna Santana). 4- Ressurgência do córrego Água Suja. 5- Ressurgência do córrego do Couto.

Figura 3.19 - Interpretação do traçado da paleodrenagem da área carbonática Lajeado-Bombas 1- Ressurgência da córrego seco. 2- Ressurgência do córrego Ouro Grosso. 3- Ressurgência do córrego Alambari. 4- Ressurgência do Lago do Bairro da Serra. 5- Ressurgência do córrego das Águas Quentes (sistema Areias).

3.3 Morfometria das áreas de amostragem

Com o objetivo de produzir uma descrição quantitativa do relevo cárstico do Alto Rincão e abstrair o aspecto subjetivo da classificação qualitativa e genética (Trudgill, 1985), procedeu-se à medição de algumas características morfométricas, que expressam valores numéricos de fatores de relevo, drenagem, tamanho e forma da paisagem cárstica. Foram seguidas, em grande parte, as recomendações expressas nos trabalhos clássicos de Williams (1971, 1972b), White e White (1979 e 1987) e Troester et. al. (1984), sobre morfometria de terrenos cársticos. Este conjunto de medidas, fornece também, uma base mais precisa para realizar estudos comparativos entre diferentes áreas, com distintos condicionantes litoc-estruturais e climáticos do relevo (Williams, 1971).

Na tabela 3.1 é apresentada a proporção ocupada por cada unidade morfológica, em relação ao total da área carbonática investigada. As medidas foram obtidas sobre os mapas morfológicos, o que implica em erro estimado de até 5%.

Zona Morfológica	Área total de cada zona (Km ²)		Porcentagem de cada zona	
	FS	LB	FS	LB
Fluvial	3.64	6.1	13.2	13
Fluviocárstica	9.11	5.68	33.1	12.1
Contato	4.34	8.39	16	17.9
Transição	4.97	8.81	18.1	18.7
Poligonal	5.39	18.02	19.6	38.3
Área total de rocha carbonática	27.5	47.1		

Tabela 3.1- Distribuição quantitativa das zonas morfológicas nas áreas estudadas. FS, área Furnas-Santana; LB, área Lajeado-Bombas.

A zona fluvial é caracterizada morfometricamente pelo gradiente ($\Delta H/\Delta L$) de seus canais principais e a amplitude dos talwegues associados. Enquanto os rios Betari e Furnas, sobre metapelitos e metapsamitos, possuem inclinação entre 0,2 e 0,03, com desvio padrão de 1,1, sobre os metacalcários este valor é de 0,018 e 0,009, com desvio padrão de 0,0047, mostrando canais mais uniformes e menos inclinados. Quanto aos talwegues, suas amplitudes variam de 60 a 1100 metros, sobre os carbonatos, e de 20 a 40m nos pelitos.

A zona fluviocárstica, em contraste com a fluvial, possui gradientes médios de 0,012 a 0,005 com desvio padrão de 0,0025, mostrando pequena variabilidade, característica típica de sistemas fluviais senis, associados à planícies.

A zona de contato caracteriza a passagem de rochas insolúveis para solúveis, a qual é marcada por um importante desnível topográfico, que condiciona uma série de drenagens associadas aos vales cegos. Com base em 21 medidas de comprimento e desnível de vales cegos (parte destes representados na fig 3.5), contornando tanto a área Furnas Santana como Lajeado Bombas, obtiveram-se valores morfométricos dos canais principais deste vales, conforme é apresentado na tabela 3.2.

Parâmetro	Valor Mín.	Valor Máx.	Variação	Média	Desvio Padrão
Comprimento (ΔL)	890	5090	4200	1557.6	1003.3
Desnível (ΔH)	265	575	310	357.7	90.4
Gradiente ($\Delta H/\Delta L$)	0.113	0.348	0.235	0.26	0.058

Tabela 3.2- Parâmetros morfométricos dos vales cegos

Relacionando o gradiente médio com o comprimento destes canais, foi obtida uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o comprimento do canal, menor é sua inclinação média. Esta observação coincide com a generalização de que a maioria dos rios possui perfis longitudinais, que seguem uma função exponencial definida (Shulits, 1941 e Hack, 1973, apud White e White, 1983). Para os vales cegos em questão, a melhor curva de regressão obtida do gradiente médio em relação ao comprimento dos canais é a função logarítmica $\ln G = 2,574 - 0,546 \ln \Delta L$ (fig 3.22), com coeficiente de correlação $-0,92$ e R^2 de 84%.

Figura 3.20 - Variação do gradiente médio (G) em função do comprimento de vales cegos (ΔL). 21 medidas.

A dispersão dos pontos neste modelo exponencial, pode ser relacionada à características estruturais dos metapelitos adjacentes a calcários. Se o substrato rochoso fosse homogêneo e isotrópico, a direção e inclinação dos canais fluviais seria unicamente controlada pela direção do gradiente hidráulico, o que produziria perfis longitudinais mais constantes, com um ajuste perfeito sobre a curva de gradiente versus comprimento. Mas, como as rochas da área são intensamente estruturadas, com planos de acamamento, foliação

metamórfica e conjuntos de fraturas, o desenvolvimento dos canais fluviais acaba sendo parcialmente desviado da direção principal do gradiente hidráulico, através de direções secundárias, guiadas por estruturas mais favoráveis ao intemperismo e entalhamento fluvial. Desta maneira, geram-se perfis, cujos comprimentos são maiores do que o esperado teoricamente, em função de seu desnível, o que reflete uma variação na assinatura exponencial dos vales cegos observados.

Um aspecto importante, para relacionar a morfometria do sistema de circulação fluvial com o cárstico, é o número de sumidouros de córregos alogênicos e o de ressurgências cársticas, conforme Smith e Atkinson (1976). Com a medida destes índices, calculou-se a densidade de sumidouros alogênicos e de ressurgências, para ambas as áreas (tab 3.3). A razão entre sumidouros alogênicos e ressurgências (R_{sr}) expressa o grau de ramificação subterrânea da circulação cárstica (Trudgill, 1985). Sistemas distributivos, como aqueles com baixo gradiente hidráulico ou grandes volumes de água subterrânea, terão razões baixas, próximas ou menores que um. Sistemas integrados, com rotas de drenagem subterrânea pouco ramificadas, assemelhando-se à rios superficiais, terão razões altas, como é o caso das áreas estudadas ($R_{sr} = 8,6$ e $12,5$), onde um grande número de sumidouros é drenado para poucas ressurgências.

Índice morfométrico	Área Furnas Santana	Área Lajeado Bombas
Área aflorante de calcário (A_c), Km^2	27.5	47.1
No.de sumidouros alogênicos (S_a)	43	111
No.de ressurgências (R)	5	9
Densidade de sumidouros ($D_s = S_a/A_c$)	1.56 no./ km^2	2.35
Densidade de ressurgências ($D_r = R/A_c$)	0.18 no./ km^2	0.19
Razão sumidouro : ressurgência ($R_{sr} = S_a/R$)	8.6	12.3

Tabela 3.3- Índices morfométricos de sumidouros alogênicos e ressurgências das áreas estudadas.

Nota-se uma grande semelhança entre as densidades de ressurgências das duas áreas estudadas, apesar destas apresentarem áreas aflorantes e demais índices bastante contrastantes. Este fato é interpretado como sendo reflexo de um padrão geral da drenagem subterrânea, o qual, também deve ser semelhante nas duas áreas carbonáticas, ou seja, os sistemas integrados de ambas as áreas devem apresentar um grau de ramificação semelhante.

Sobre as zonas poligonal e de transição, ocupadas por depressões simples e compostas, foram medidos os seguintes índices morfométricos: número de depressões poligonais (N_d), número de sumidouros autogênicos associados à depressões (N_s), área ocupada por depressões (A_d), área e perímetro de cada depressão e profundidade de uma amostra de depressões, sobre mapas topográficos 1:10.000.

Com estes resultados, foram obtidos os parâmetros resumidos na tabela 3.4, discutidos em seguida.

Densidade de depressões. Expressa a frequência de ocorrência de depressões por unidade de área. Segundo Day (1976), este parâmetro, aliado à dimensões plani-altimétricas, indica o grau de desenvolvimento e intensidade do relevo cárstico.

Propõem-se distinguir a densidade de depressões sobre o total de rocha carbonática aflorante (Ddt), utilizada pela maioria dos trabalhos morfométricos consultados, da densidade de depressões interna a zona poligonal (Ddp). Esta distinção, tem por objetivo, possibilitar a comparação entre densidades de depressões em zonas poligonais diferentes, as quais estão, cada uma, associadas à variadas proporções de unidades morfológicas não poligonais, como é o caso do Alto Ribeira.

As áreas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas, com superfícies de 27,5 e 47,1 km², possuem densidades de depressões sobre o total da área calcária (Ddt) de 2,91 e 7,45/km², respectivamente. Por outro lado, as densidades de depressões internas às zonas poligonais destas áreas (Ddp) correspondem a 7,72 e 13,08/km².

Deve-se ressaltar a forte dependência destes valores da escala de observação, neste caso de 1:25.000, pois, conforme a escala é ampliada, depressões menores tornam-se demarcáveis, obviamente alterando o valor de sua densidade.

O resultado de Ddp obtido para o Alto Ribeira enquadra-se na faixa de valores típicos para áreas tropicais, quando comparado às densidades obtidas para a Jamaica e Porto Rico, nas escalas de 1:24.000, por Day (1976) e Troester et. al. (1984) e na Nova Guiné, na escala 1:28.000 (Williams, 1972b), conforme a tabela 3.4. Os valores de Ddp do carste da Nova Guiné, obtidos por Williams (1972b), são praticamente iguais à densidade de depressões obtida para a área Lajeado-Bombas, apesar destas áreas apresentarem condições climáticas contrastantes. Os dois locais da Nova Guiné, localizados em latitudes de 5°30', experimentam médias pluviométricas anuais de 3698 e 5761 mm, respectivamente, onde o primeiro (Darai Hills) apresenta um clima tropical sub-alpino, com temperaturas médias anuais de 10 a 13°C e o segundo (Mt. Kaijende), possui clima tropical úmido, com média anual de 22 a 27°C. O carste do Alto Ribeira, numa latitude de 24°35', em contraste, apresenta média pluviométrica de 1690 mm e clima sub-tropical úmido, com média anual de 19°C. Isto confirma que um certo padrão morfológico pode ocorrer com o mesmo grau de desenvolvimento, em condições climáticas variadas, reforçando a hipótese de Smith e Atkinson (1976). Portanto, o significado deste parâmetro morfométrico é puramente geométrico, sendo útil para comparar o grau de desenvolvimento de áreas diferentes, mas sem conotações climáticas bem definidas (Troester et. al., 1984).

Índice de dolinamento (ID). Englobando depressões simples e compostas (zona de transição e poligonal), a área total ocupada por depressões, nos calcários Furnas Santana e Lajeado Bombas, é de 10,36 e 26,83 km², respectivamente, resultando em índices de dolinamento de 2,65 e 1,75, conforme a definição de Williams (1972b), deste índice. Embora estes números possam apresentar uma certa flutuação, em função do refinamento da fotointerpretação e da escala da base utilizada, eles expressam, numericamente, um importante aspecto visual qualitativo do relevo. Observando os mapas morfológicos, ou as

Parâmetro	Alto Ribeira Furnas Lajeado Santana Bombas		Nova Guiné Williams, 1972 Darai Hills M. Kaijende		Jamaica Day, 1976	EUA Apalaches Porto Rico Troester, et.al, 1984	
Área de calcário A_c , Km^2	27.45	47.1	13.84	13.18	13.0	4134	-799
No. de depressões poligonais, Nd	80	351	188	172	37	5160	4308
No. de sumidouros autogênicos, Ns	173	699	188*	172*	37*	-	-
Área ocupada por depressões, Ad (dep. simples + compostas) Km^2	10.36	26.83	13.84	13.18	5.41	-	-
Profundidade média das depressões, metros	20.1	15.2	-	-	18.4	7.8	19.0
Perímetro médio das depressões		1.22	-	-	-	-	-
Densidade de depressões sobre a área total $Ddt = Nd/A_c$, No./ Km^2	2.9	7.45	13.6	13.1	2.85	1.25	5.4
Densidade de depressões sobre a zona poligonal $Ddp = Nd/Ad$	7.72	13.08	13.6	13.1	6.8		
Densidade de sumidouros autogênicos $Da = Ns/A_c$, No./ Km^2	6.3	14.8	13.6*	13.1*	2.85*	-	-
Índice de dolinamento $ID = Ac/Ad$	2.65	1.75	1.0	1.0	2.40	-	-
Razão de dolinamento $Rd = Ad/Ac$	0.376	0.57	1.0	1.0	0.416	-	-
Índice de sumidouros autogênicos $IS = Ns/Nd$	2.2	2.0	1.0	1.0	1.0	-	-
Área média por depressão $Adm = Ad/Nd$ $Km^2/dep.$	0.13	0.076	0.07	0.08	0.15	-	-

Tabela 3.4 - Parâmetros morfométricos do carste poligonal do Alto Ribeira num quadro comparativo com outras áreas cársticas. * valores calculados com os dados publicados pelos autores citados.

fotos aéreas correspondentes, de ambas as áreas, nota-se que a área Lajeado-Bombas exibe um padrão mais desenvolvido de depressões e uma drenagem superficial mais desorganizada em relação aos carbonatos Furnas-Santana, ou seja, qualitativamente, afirma-se que o relevo cárstico poligonal é mais desenvolvido sobre a primeira área. Esta conclusão qualitativa, é confirmada de forma mais concisa, através dos índices de dolinamento, pois, segundo Williams, op. cit., quanto mais próximo a 1 é o valor do índice de dolinamento, tanto mais desenvolvido será o relevo poligonal de uma região cárstica. No caso em estudo, a área Lajeado Bombas, com $ID = 1,75$, possui relevo poligonal, cerca de 30% mais desenvolvido, em relação a área Furnas Santana, com $ID = 2,65$.

Razão de dolinamento (Rd). É o inverso do índice de dolinamento. Expressa a fração da área total do carste ocupada por depressões poligonais. No caso da área Furnas-Santana, este parâmetro é 0,376, o que equivale também a 37,6% da área total da área carbonática. Nos calcários Lajeado-Bombas, 57% da área total é ocupada por depressões poligonais, o que resulta na razão de dolinamento de 0,57. Sua interpretação é semelhante ao índice de dolinamento.

Densidade de sumidouros autogênicos (Da). Indica a frequência de pontos de absorção do escoamento superficial coletado sobre a superfície carbonática. Este número é relacionado ao grau de desmembramento da rede de drenagem superficial, isto é, quanto maior a densidade de sumidouros, tanto menor é a continuidade dos canais fúviais e, portanto, maior será o grau de segmentação destes. Este parâmetro confirma a segmentação mais avançada da rede de drenagem fluvial da área Lajeado-Bombas ($Da = 14,8/km^2$), em comparação com a área Furnas-Santana ($Da = 6,3/km^2$).

Índice de sumidouros autogênicos (IS). Observando os mapas morfológicos das áreas estudadas, nota-se que muitas depressões poligonais possuem mais de um sumidouro. O índice de sumidouros expressa a proporção geral de sumidouros autogênicos em relação ao total de depressões. Obteve-se valores de 2,2 e 2,0, respectivamente, para as áreas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas. Assim como a densidade de sumidouros, relaciona-se este índice ao grau de segmentação da drenagem superficial. A situação de máxima segmentação corresponde ao $IS = 1$ (como é o caso do carste da Nova Guiné, tab.3), isto é, um ponto de insurgência para cada depressão. O fato de haver mais de um ponto por depressão, é resultado, principalmente, da presença de depressões compostas com remanescentes de talwegues fluviais, em processo de segmentação através da instalação de dolinas, como também, do processo de competição e coalescência de depressões.

Profundidade das depressões. Segundo Day (1976), esta é definida pela distância vertical entre o ponto mais baixo do fundo da depressão, normalmente representado por um dos sumidouros, e o ponto de menor cota de seu perímetro, delimitado por uma curva de nível, neste caso, sobre mapas topográficos 1:10.000 da área.

Foram medidas as profundidades de 105 depressões poligonais. Este número reduzido de medidas deve-se ao pouco detalhe expresso nas cartas topográficas da área, o que levou a seleção apenas das depressões bem definidas sobre as cartas.

Obtiveram-se 82 medidas sobre a área Lajeado-Bombas, as quais apresentam valor médio de 15,2m, desvio padrão de 10,1m e valor máximo de 66m e mínimo de 3m. A depressão composta das Areias (fig 3.10), com 130 m, é considerada uma exceção. Para a área Furnas-Santana, mediu-se 23 profundidades, com valor médio de 20,2 m, desvio padrão de 13,1m e valores máximo e mínimo de 53 e 3m, respectivamente (tab 3.4).

Segundo White e White (1979) e Troester et. al. (1984), a distribuição de frequência das profundidades de depressões, segue preferencialmente uma distribuição exponencial. Este comportamento matemático da profundidade de depressões é característico de diversas áreas de carste poligonal, em diferentes situações lito-estruturais e climáticas, sendo utilizada pelos autores acima para expressar numericamente a intensidade de relevo de cada área.

Para a área Lajeado-Bombas, obteve-se uma distribuição exponencial da frequência de profundidades (fig 3.21a), com valores predominantes entre 3 e 10m. Nota-se o caráter excepcional da medida de 130m.

A distribuição de frequência para a área Furnas-Santana, ajusta-se melhor a uma curva normal com tendência bimodal (fig 3.21b), bastante irregular, com praticamente 3 subpopulações de medidas, entre 5 e 16m, 20 e 30m, predominante, e outra em torno de 50m. O ajuste não exponencial destas medidas, é interpretado como sendo consequência de uma falha de amostragem, pois, nesta área, conforme observado qualitativamente em campo e nas fotos aéreas, ocorre um número maior de profundidades rasas, as quais não foram detectadas sobre os mapas topográficos 1:10.000.

Reunindo as medidas de ambas as áreas, foi obtida uma típica distribuição de frequência exponencial (fig 3.21c), considerada como representativa do carste estudado.

Figura 3.21 - Distribuição das profundidades de depressões poligonais do carste do Alto Ribeira. A- área Lajeado-Bombas, 83 medidas. B- área Furnas-Santana, 23 medidas. C- total das medidas de ambas as áreas. Curvas de distribuição exponencial e normal obtidas através do programa Statgraphics.

para a população geral de depressões do Alto Ribeira, com profundidades variadas, predominando entre 5 e 10m, e com casos esporádicos acima de 60m. Estas depressões mais profundas encontram-se próximas aos alinhamentos de importantes rotas de drenagem subterrânea, sendo que no caso da de 130m, esta interceptou o nível do rio subterrâneo.

Os resultados obtidos acima, concordam com a generalização proposta por Cramer (1941) e Troester et. al. (1984) de que há uma diferença na intensidade de relevo entre regiões cársticas temperadas e tropicais, expressa pela profundidade de depressões poligonais. A profundidade média em regiões temperadas varia entre 5,4 e 8,3 m, enquanto que em zonas tropicais, estes valores são praticamente triplicados, com médias entre 15 e 23m (Troester, op. cit.).

A definição exata deste parâmetro, depende da qualidade (resolução) dos mapas topográficos da área cárstica, ou de um exaustivo levantamento de campo, para obtenção de um número de medidas estatisticamente representativo. No caso estudado, a única base disponível em escala maior, é o levantamento 1:10.000 (DAEE, 1957), deficiente em detalhes. Deverá ser executado, numa etapa futura de trabalho, levantamento de campo para refinar o resultado aqui obtido.

Área e perímetro de depressões. Williams (1972b), demonstrou sobre o carste da Nova Guiné, que a área de depressões poligonais cresce geometricamente com o aumento da ordem de Strahler da drenagem interna às depressões, através da regressão do logaritmo da área em relação a ordem da drenagem interna. Esta relação é similar àquela que expressa a área de bacias de drenagem na morfometria fluvial, o que suporta a idéia de que depressões poligonais cársticas são pequenas bacias de drenagem fluvial. O mesmo autor, considera que esta similaridade, evidencia que as depressões poligonais são geradas principalmente por corrosão superficial pela drenagem e não por colapso de vazios subterrâneos.

White e White (1987) obtiveram para o carste do planalto dos Apalaches uma relação exponencial crescente entre a área de bacias fechadas, drenadas internamente por dolinas, e o número de dolinas no interior destas bacias.

Reams (1992) utilizou a plotagem log versus log, entre área e perímetro de grandes populações de depressões do centro leste dos EUA, para testar o caráter fractal do perímetro destas. Comprovou este comportamento matemático para depressões com áreas superiores a 10.000m^2 ($0,01\text{km}^2$), medidas sobre mapas topográficos 1:24.000.

Com o objetivo de testar o comportamento matemático da rede poligonal planimétrica das depressões do Alto Ribeira e obter uma expressão numérica deste, mediu-se a área e perímetro da população de depressões da zona poligonal da área Lajeado Bombas. Estas medidas foram digitalizadas sobre o mapa morfológico 1:25.000 (anexo 3.4).

A média aritmética da área de 350 depressões é de $0,072\text{km}^2$, com desvio padrão de 0,078 e valores mínimo e máximo de 0,00359 e $0,788\text{km}^2$, respectivamente. O perímetro deste conjunto possui média de 1,22km, desvio padrão de 0,672km e valores mínimo e máximo de 0,279 e 5,562km. Novamente aparece a depressão das Areias como exceção,

pois sua área de $2,05\text{km}^2$ e perímetro de $8,29\text{km}$ são muito destoantes do resto da população, além de estar, em parte sobre metapelitos.

Figura 3.22 - Histogramas de frequência e curvas de distribuição da área (A) e perímetro (B) das depressões poligonais da área carbonática Lajeado-Bombas.

A área média por depressão (Adm) resultante do cálculo de Ad/Nd (tabela 3.4) para a área Lajeado-Bombas é de $0,076\text{km}^2$, semelhante à média aritmética das 350 medidas. Já para a área Furnas-Santana, o valor de Adm é $0,13\text{km}^2$, quase o dobro da área média por depressão da região Lajeado Bombas, reflete a predominância de depressões compostas maiores nesta área. Um fato interessante observado com estas medidas, é a grande semelhança entre as dimensões planimétricas do Alto Ribeira e os valores de outras regiões cársticas (tabela 3.4), o que confirma que há um padrão geral de relevo cárstico, independente de pequenas variações locais.

Testando a distribuição de frequência das áreas de depressões para a região Lajeado Bombas, obteve-se um ajuste exponencial decrescente da frequência em função do aumento da área, com predominância de áreas entre $0,0036$ e $0,05\text{km}^2$ (fig 3.22a). Nota-se uma pequena subpopulação, com áreas em torno de $0,2$ e $0,25\text{km}^2$, a qual corresponde às depressões compostas.

O perímetro destas depressões obedece uma distribuição de frequência lognormal (fig 3.22b), onde o número de ocorrências cresce rapidamente com perímetros entre $0,25$ e $0,6\text{km}$, atingindo o máximo entre $0,6$ e $0,9\text{km}$, decrescendo regularmente até perímetros de 3km . Notam-se alguns valores de exceção, assim como das áreas correspondentes, que representam depressões compostas ou testemunhos de vales fluviais em início de segmentação por dolinamento.

Conforme esperado, o gráfico das áreas versus seus perímetros, ajusta-se melhor a uma função exponencial. A equação obtida para a área Lajeado-Bombas é $Per. = 5,264 \times \text{Área}^{0,519}$, com 351 medidas, incluindo a grande depressão das Areias (fig 3.23). O coeficiente de correlação desta relação exponencial é $0,97$, com $R^2 = 94,74\%$.

A inclinação desta reta logarítmica reflete a taxa de variação do perímetro com o aumento da área das depressões. Ou seja, quanto mais rugoso, ou irregular é o perímetro, maior será seu comprimento, com uma pequena variação na área correspondente. Desta maneira, poderia-se relacionar o coeficiente angular ou a inclinação desta reta com o grau de rugosidade planimétrica das depressões, isto é, quanto mais inclinada a reta, tanto mais rugoso será o padrão poligonal, o que por sua vez, refletiria o número de vértices positivos presentes nos divisores do relevo. Estes vértices correspondem ao número de cones cársticos ou segmentos de cristas, o que é uma característica do relevo condicionada pela densidade de discontinuidades favoráveis ao entalhamento da superfície carbonática.

Gráficos logarítmicos da área versus perímetro de populações poligonais, representam portanto, uma assinatura quantitativa das características físicas planimétricas do padrão poligonal de uma determinada região cárstica, sendo úteis como uma referência na comparação entre diferentes regiões cársticas e seu condicionamento lito-estrutural, considerando a mesma escala de observação.

Devido à falta de cartas topográficas e fotos aéreas em escalas variadas, não se verificou o caráter fractal destes polígonos, conforme a recomendação de Reams (1992), pois para tal, seria obrigatória a obtenção de distribuições de frequência em diferentes

escalas, para se verificar como varia o número de polígonos em função da escala

Figura 3.23- Área versus perímetro das depressões poligonais da região Lajeado-Bombas, 351 pontos, obtidos na escala 1:25.000.

de observação, seguindo a definição de Mandelbrot (1983), da dimensão fractal de figuras geométricas. Aliás, a natureza fractal ou euclidiana do carste poligonal ainda não está definida, pois, conforme as referências consultadas (White e White, 1987 e Reams, 1992), a análise em variadas escalas não foi totalmente explorada.

Não é objetivo deste trabalho discutir e testar todas possibilidades morfométricas do relevo e interpretar seu significado geológico-geomórfico, mas sim, pretende-se somente iniciar o estudo de parâmetros morfométricos, devendo aprofundar-se estas análises em trabalhos futuros.

3.4 Condicionamento estrutural e hidrológico do relevo

A evolução da paisagem cárstica, sobre rochas carbonáticas sem porosidade primária, é consequência da disponibilidade de água em movimento e o desenvolvimento progressivo de permeabilidade secundária ao longo do maciço carbonático (Smith e Atkinson, 1976 e Gunn, 1986). O desenvolvimento de permeabilidade secundária concentra-se sobre descontinuidades presentes na rocha carbonática, através da dissolução e lixiviação de minerais carbonáticos pela água de percolação ao longo destas descontinuidades. Portanto, para estabelecer os fatores condicionantes da permeabilidade secundária e, conseqüentemente, do desenvolvimento da paisagem cárstica, é fundamental conhecer os tipos de descontinuidades presentes, assim como, sua distribuição espacial na rocha solúvel.

No sentido de identificar as descontinuidades e obter um quadro geométrico destas, procedeu-se o levantamento da geologia estrutural dos corpos carbonáticos em estudo.

3.4.1 Geologia estrutural das áreas de estudo

A região carbonática do Alto Ribeira foi alvo de diversos levantamentos geológicos, com ênfase na evolução tectônica, estratigrafia e análise estrutural de sua seqüência metassedimentar, conforme é apresentado no capítulo 2. Pouco detalhamento tem sido feito sobre as estruturas disruptivas, como juntas e falhas desta área.

Neste trabalho, utilizou-se como base geológica, a Folha Iporanga, 1:50.000, da carta geológica do Estado de São Paulo (Campanha, et. al., 1985) e o mapa geológico, na mesma escala, apresentado por Campanha (1991). Deste último, extraíram-se medidas de acamamento de setores das áreas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas, não visitados durante esta pesquisa, mas importantes para caracterização da estrutura geral dos metacalcários.

As principais estruturas levantadas no presente estudo, resumem-se às superfícies primárias (planos de acamamento) e, secundárias (juntas e falhas) seguindo a nomenclatura de Ramsay e Huber (1987) para estruturas disruptivas em rochas deformadas.

A ênfase dada às juntas, falhas e ao acamamento, deve-se ao fato de que estas estruturas constituem os principais guias da rede de condutos de dissolução do sistema cárstico (Deike, 1969; Ford, 1971b, Milanovic, 1981 e Lauritzen, 1989), rede esta, responsável pela permeabilidade de regiões carbonáticas.

O conjunto de medidas apresentado em seguida (figuras 3.24, 3.25 e tabela 3.5) foi obtido durante o mapeamento geoespeleológico de cavernas da área, o mapeamento morfológico externo e a prospecção de cavernas.

Definição da superfície dobrada. Medidas de acamamento.

Os planos de estratificação das rochas carbonáticas constituem as descontinuidades mais longas e contínuas em ambas as áreas investigadas. Devido à característica rítmica da interestratificação de leitos carbonáticos, pelítico-carbonáticos e pelíticos, com espessuras centimétricas a decimétricas, pouco variáveis ao longo do estrato, o acamamento é uma superfície muito notável, sendo possível de ser seguido por dezenas de metros.

As medidas obtidas na área Furnas-Santana distribuem-se ao longo de uma guirlanda de superfície cilíndrica (fig. 3.24a), com concentração máxima de pólos no quadrante SE, refletindo a estrutura geral homoclinal com dobras parasitas métricas a decamétricas, assimétricas, de flanco NW longo e flanco SE curto, o que é expresso pelo número menor de medidas com mergulho para SE. A direção geral do acamamento é N45-70E, com mergulhos de 40 a 80° para NW. As dobras parasitas possuem plano axial em torno de N65E 75NW e eixos S65W/10-20°. Nota-se uma tendência incipiente de espalhamento das medidas de acamamento ao longo de um círculo máximo de direção geral NE-SW, o que reflete um dobramento superposto incipiente, com início de formação de superfícies cônicas, fato mais evidente na área Lajeado Bombas.

O acamamento medido na área Lajeado Bombas reflete uma estrutura geral sinformal cilíndrica (fig 3.25a), com eixo em torno de N50E/10-20°, direções predominantes entre N30-65E e mergulhos de 60SE a 40NW. Esta estrutura sinclinal é ondulada por um dobramento superposto aberto, com eixo determinado no estereograma,

Tipo de descontinuidade	Atitudes Predominantes					
	Área Furnas Santana			Área Lajeado Bombas		
Juntas Preenchidas	N8E N50E N16W N70W N50E	85NW 80SE 75NE 70SW 5	a 85NE a 80NW a 75NW a 75NE a 20SE	N14E N50E N10W N60W (51)	70NW 70SE 70NE 76NE	a 60SE a 80NW a 70NW a 80SW
Juntas Simples	N55E N55W N60E N18W	75NW 75NE 0 80NE	a 70SE a 80SW a 20SE a SW	N45E N70E N60W N20-50E N20E	84NW 85NW 70SW 0 80NW	a 84SE a 85SE a 80NE a 15SE a 80SE
Falhas Inversas	N30E N54E N75E N75W	40 - 60NW 60 - 80SE 60 - 80SE 40 - 55SW		N20E N55E N20W	40 - 70NW 75SE 60NE	
Falhamentos direcionais e com movimento indeterminado.	NS N40E N75E N30W N55W	65 - 85W 80SE 65 - 85SE 70NE 80NE	a 80NW a 80SW	N15-20E N50-60E N40-50W	45 - 80SE 60 - 70NW 50 - 85 SW	a verticais (32)
Juntas de Cisalhamento	N10-15E N50-65E EW N40 - 45W	80NW 60 - 80NW e SE 70 - 80S 60 - 70SW		N15 - 20E N10 - 20W N50W	verticais a 60NW 70 - 80NE 70-80 NE e SW	
Falhas Normais	N35E N75E N55W	50SE 80NW 50SW		N65W	50SW	
Acamamento	N45 - 70E	40 - 70NW		N30 - 65E N50 - 70W	60SE 70NE	a 40NW e 60SW

Tabela 3.5 - Atitudes médias dos principais conjuntos de descontinuidades das áreas de estudo. Medidas extraídas dos estereogramas correspondentes das figuras 3.24 e 3.25. Número de medidas em parênteses

em torno de S50E/20°, produzindo direções do acamamento entre N50-70W e N25-40W, com caimentos entre 30 a 60° para SW e NE (fig 3.25a). Este padrão de ondulações em domos e bacias ocorre principalmente no setor sudoeste da grande sinforma do Lajeado, onde é nitidamente expresso por camadas argilosas ressaltadas por dissolução diferencial ao longo da caverna das Areias. Nos setores central e nordeste esta superposição de dobramento é pouco notável, predominando a estrutura sinclinal simples. A estrutura homoclinal, junto ao flanco sudeste deste sinclinal, não foi detalhada neste trabalho.

Sistema de fraturamento. Medidas de juntas e falhas.

As juntas foram descritas em campo quanto a sua dimensão (comprimento), espaçamento, preenchimento e movimento relativo dos blocos adjacentes, seguindo as recomendações de Badgley (1965) e Blés e Feuga (1986). Com esta descrição qualitativa foi possível classificar o conjunto de medidas em juntas simples ou diáclases, preenchidas ou fendas e de cisalhamento. Esta classificação teve como objetivo permitir uma análise

Figura 3.24 - Projeção estereográfica das medidas de descontinuidades da área carbonática Furnas-Santana. Os círculos máximos em B a F indicam as atitudes predominantes.

Figura 3.25 - Projeção estereográfica das medidas de descontinuidades da área carbonática Lajeado-Bombas. Os círculos máximos em B a F indicam as atitudes predominantes.

preliminar da origem destas fraturas, relacioná-las ao sistema de esforços responsável pela deformação dos metacalcários em estudo e posteriormente analisar sua função hidrológica no condicionamento do carste.

As **juntas preenchidas** são aquelas que ao se formarem sofreram afastamento milimétrico a centimétrico dos seus blocos adjacentes, sem que houvesse deslizamento significativo entre estes, o que criou espaço disponível para a precipitação de minerais a partir de soluções percolantes, durante o metamorfismo e deformação da seqüência carbonática. Devido ao fato de que nem sempre foi possível observar se houve deslizamento relativo entre os blocos adjacentes à junta preenchida, é provável que entre os conjuntos de juntas preenchidas obtidos aqui (tabela 3.5 e figs. 3.24B e 3.25B), ocorram algumas juntas de cisalhamento, pois estas, freqüentemente apresentam-se preenchidas. Tanto na área Furnas-Santana como Lajeado-Bombas, as juntas preenchidas apresentam comprimento predominante decimétrico a métrico, com espessura máxima de preenchimento entre alguns milímetros até 3 centímetros, principalmente com calcita e menos freqüentemente com quartzo. Os conjuntos com direção N8E, N16W e N70W, da área Furnas-Santana e os conjuntos N14E, N10W e N60W, da área Lajeado-Bombas (tab. 3.5), formam veios de comprimento decimétrico a métrico, com espaçamento de 5 a 50cm, concentrando-se ao longo de faixas com larguras métricas a decamétricas. Estas faixas representam zonas de fratura destes conjuntos. As medidas predominantes de ambas as áreas de estudo são semelhantes, levando em consideração a variação de direção de 10 a 20° destes veios, conforme é visualizado nos estereogramas das figuras 3.24B e 3.25B.

Na área Furnas-Santana, os conjuntos ao redor do alinhamento NS e N60W, freqüentemente estão subparalelos à falhamentos, tanto direcionais como inversos, assim como, oblíquos, respectivamente às falhas N50W e NS, em relação as quais, constituem juntas sigmoidais. As juntas preenchidas N50E, com alto mergulho, são desde decamétricas, com espaçamentos métricos e preenchimento de até 5cm, até centimétricas a decimétricas, formando veios com espessura milimétrica e espaçamento centimétrico, às vezes na forma de juntas sigmoidais oblíquas às falhas NS. A geometria geral destes conjuntos é representada na figura 3.26, onde é sugerida uma orientação aproximada da direção de compressão máxima (σ_1), em função da superfície dobrada e orientação de juntas e falhas. Neste esquema de esforços para a área Furnas Santana, os veios mais compridos e subverticais, em torno de N16W e N50E, excluindo as juntas sigmoidais, são interpretados como juntas de tração, onde o primeiro conjunto é subparalelo à direção σ_1 e o segundo, perpendicular, representando juntas de tração alinhadas segundo as charneiras NE-SW das dobras parasitas. Os conjuntos em torno de NS e N60-70W, neste regime de tensão, podem ser atribuídos à juntas preenchidas, com tendência à cisalhamento e falhamento, associadas ao sistema conjugado de juntas de cisalhamento em relação à σ_1 , conforme o modelo de Riedel (1929 apud Badgley, 1965) para geração de juntas em função da direção de compressão máxima.

Na caverna de Santana notou-se um conjunto de juntas preenchidas e simples, de ocorrência pouco freqüente, às vezes com falhamentos associados, gerando zonas

brechadas, de atitude geral sub-horizontal a N50E 20SE, comprimento decamétrico e preenchimento de até 5cm de espessura. Quando estas ocorrem, seu espaçamento é decimétrico a métrico. Estas são interpretadas, segundo o modelo de Blés e Feuga (1986), como juntas de tração, com componentes de cisalhamento, paralelas ao plano σ_1 - σ_2 e associadas ao movimento reverso, com vergência SE, que gerou a falha inversa do contato NW dos metacalcários.

Figura 3.26 - Representação esquemática da geometria em planta do sistema de fraturamento das áreas carbonáticas estudadas, com interpretação da posição do esforço de compressão máxima (σ_1) em relação ao dobramento.

Na área Lajeado-Bombas, a estrutura sinclinal principal indica um esforço de compressão máxima (σ_1) também orientado segundo NW-SE. Os conjuntos em torno de N14E e N60W sugerem um sistema conjugado, com cerca de 70° entre si, como se fosse um sistema de juntas de cisalhamento com relação à σ_1 a N30W. Em função desta geometria (fig 3.26), estes conjuntos identificados como juntas preenchidas devem incluir juntas de cisalhamento, o que é reforçado pela ocorrência de falhas com atitudes próximas a N50-60W, assim como, de juntas de cisalhamento a N15E (tab 3.5). Neste quadro de

esforços, as juntas N10-20W são atribuídas ao conjunto de tração, subparalelo a σ_1 , e o conjunto N50E, ortogonal à compressão máxima, corresponde às juntas de dilatação geradas nas charneiras das ondulações menores do sinclinal, de forma semelhante ao descrito para o homoclinal Furnas-Santana. Estas últimas possuem dimensões maiores, até decamétricas, quando comparadas aos demais conjuntos. Deve-se frizar ainda, que o regime de esforços foi mais complexo, pois a região deve ter passado por um período de compressão, menos intensa, orientada grosseiramente segundo NE-SW, evidenciada pelas ondulações dômicas detectadas na região centro e sudoeste da área do Lajeado, esforço este, que também deve ter gerado estruturas disruptivas superpostas às produzidas com o evento de dobramento principal. Este segundo evento de compressão, pode estar relacionado, com a intrusão do batólito granitóide localizado a SW dos metacalcários, o que também foi proposto por Campanha (1991). Por último, não se deve esquecer, o evento de reativação tectônica do Mesozóico, responsável pela intrusão dos diques básicos e arqueamento crustal, o que sem dúvida contribuiu para a geração de estruturas disruptivas na área, conforme Melo (1990). Com relação a este último evento, é provável que parte dos veios métricos orientados a NW-SE, preenchidos com quartzo e calcita, possam ser atribuídos a este, pois dispõem-se paralelamente ao dique básico NW-SE, que secciona os metacalcários.

Juntas simples ou diáclases, são aquelas, ao longo das quais não houve deslizamento nem afastamento significativo dos blocos adjacentes durante sua formação, produzindo rupturas planares limpas e de grande superfície. Estas juntas são identificadas em campo através de traços com largura milimétrica a sub-milimétrica. Após o soerguimento e exposição do maciço carbonático a níveis próximos à superfície, estas juntas, inicialmente seladas, normalmente sofrem um pequeno afastamento dos seus blocos adjacentes, através da expansão geral da rocha em resposta ao alívio de carga litostática (Badgley, 1965). A abertura sub-milimétrica destas juntas acaba permitindo a infiltração e circulação de água meteórica, em regime capilar, por níveis rasos no maciço rochoso. Isto pode ser observado ao longo das cavernas, onde principalmente este tipo de junta, representa importante rota de percolação de água meteórica, o que é evidenciado pela precipitação de espeleotemas ao longo do traço de intersecção destas juntas com a cavidade.

Devido ao fenômeno de alívio de carga litostática, nem todas as discontinuidades sem preenchimento, são de origem tectônica, ou seja, produzidas durante o evento de deformação das rochas. Por exemplo, é comum ocorrer a expansão do maciço rochoso, formando juntas sub-paralelas ao entalhamento de vales profundos, assim como, juntas sub-paralelas à superfície geral exposta do maciço rochoso (Davis, 1984 e Ford e Williams, 1989). No caso das áreas estudadas, parte das juntas subverticais orientadas a NW-SE, assim como o conjunto sub-horizontal (figuras 3.24D, 3.25D e tabela 3.5) são atribuídas a este fenômeno. Por outro lado, nota-se uma tendência de concordância da orientação dos conjuntos de juntas preenchidas com as atitudes de diáclases, em ambas as áreas estudadas (figura 3.26). Isto sugere que pelo menos parte destas diáclases é de origem tectônica,

sendo que sua gênese, é relacionada ao mesmo processo compressivo que gerou as juntas preenchidas e falhamentos associados. Desta forma, interpreta-se as juntas simples subverticais com direção N60-70E, de ambas as áreas, como sendo juntas plano axiais, geradas tanto por tração em charneiras parasitas, como por alívio de tensão, após a cessação dos esforços tectônicos compressivos. É importante notar que estas juntas possuem comprimentos maiores, decamétricos, quando comparadas com os veios paralelos. O conjunto N50-60W, além da origem atectônica citada acima, é relacionado também, ao evento de tração responsável pela injeção dos diques mesozóicos na direção N50-60W. Este é muito notável na área Furnas Santana, onde possui espaçamento decimétrico e comprimento métrico, formando uma clivagem de fratura ao longo de certas faixas, com atitude geral N50W subvertical. Com a mesma atitude, ocorrem também, juntas simples decamétricas, com espaçamento muito variável, desde métrico a decamétrico, tanto na área Furnas-Santana, como Lajeado-Bombas. Por último, há ainda, as diáclases com atitude N20E subvertical, observadas na área do Lajeado, paralelas ao conjunto de falhas inversas de mesma direção, e portanto, provavelmente associadas a estas.

O comprimento das juntas simples, de modo geral, é predominantemente métrico a decamétrico, com espaçamentos métricos. A densidade destas juntas é bem inferior à das juntas preenchidas, mas seus comprimentos são superiores, fato importante a ser lembrado na discussão do condicionamento estrutural do relevo.

Falhas inversas representam importantes descontinuidades nas áreas estudadas, já notáveis em mapas regionais, onde formam contatos tectônicos. Foram reconhecidas principalmente durante o mapeamento de cavernas, onde foi possível segui-las por até centenas de metros, como nas cavernas Lage Branca (centro-sul da área Furnas-Santana, anexo 4.2) e Ouro Grosso (noroeste da área Lajeado-Bombas, anexo 4.2). Caracterizam-se por comprimentos longos (dezenas a centenas de metros) e zonas de cisalhamento com espessuras entre 10 e 40cm. Este cisalhamento produziu tanto zonas transpostas, finamente laminadas (milonitos), como também, cataclasitos e microbrechas, o que comprova regime de cisalhamento predominantemente dúctil nas primeiras e rúptil (friável) nas segundas. O movimento reverso foi observado através de dobras de arrasto associadas às faixas de cisalhamento assim como pelo rejeito, de até 2m, em falhas inversas menores.

Sua geometria é representada nas figuras 3.24C e 3.25C. As falhas com direção N55-75E e vergência para NW, da área Furnas Santana, são interpretadas como sendo rupturas de flancos e charneiras de dobras paralelas, tendo sido geradas durante e na fase final do desenvolvimento da estrutura geral homoclinal com dobras parasitas e caimento para NW (fig 3.24C). As falhas N30-40E, com vergência para SE, são interpretadas como sendo um conjunto de falhas conjugado ao anterior, decorrente da compressão NW-SE. Estas falhas possuem comprimentos observados de dezenas a centenas de metros. As falhas inversas com atitude geral N75W 50SW indicam esforços alinhados à NNE-SSW, o que permite associá-las tanto ao arqueamento crustal associado aos diques mesozóicos como também aos esforços gerados pela intrusão dos granitóides a SW dos metacalcários. Na área Lajeado-Bombas, apesar do número menor de falhas inversas observadas, nota-se uma

geometria semelhante à discutida acima, onde as direções N20E e N55E devem corresponder à falhamentos de flancos de dobras menores associadas à sinforma.

Falhas direcionais são freqüentes em ambas as áreas, sendo caracterizadas por uma zona de cisalhamento tabular, com brechamento da rocha carbonática em diferentes graus de moagem, com espessuras entre alguns centímetros a 0,5m. Nem sempre foi possível detectar o sentido de movimentação dos blocos adjacentes à zona de cisalhamento, ou até, às vezes, notou-se evidências de movimentos tanto reversos como direcionais ao longo da mesma estrutura de cisalhamento. Como o objetivo principal deste mapeamento não foi o de elucidar a evolução tectônica rúptil da área, mas sim, obter um quadro geométrico e da distribuição de juntas e falhas presentes nas rochas carbonáticas, incluiu-se estas estruturas dúbias, na categoria de **falhas com movimento indeterminado**, sem perder sua localização e orientação, importantes para testar sua função de condicionante morfológico ou hidrológico.

Na área Furnas Santana foram identificadas falhas direcionais de alto mergulho com várias direções, conforme listado na tabela 3.5 e representado na figura 3.24E, tanto destrais como sinistrais. Nas direções gerais NS e N30-60W, ocorrem falhas transcorrentes, além de indeterminadas, com comprimento mínimo decamétrico (observação limitada à galerias e salões subterrâneos) e zonas brechadas de até 30cm, as quais devem estar associadas ao sistema conjugado de cisalhamento, em relação à compressão máxima responsável pelo dobramento (fig 3.26). Conforme já citado, é comum ocorrerem juntas preenchidas paralelas a estas, assim como pequenas falhas ou juntas de cisalhamento e juntas sigmoidais transversais. As falhas N40E a N75E, em grande parte são de movimento indeterminado, de grande comprimento e zona de cisalhamento com brechas e milonitos de até 50cm de espessura. Classifica-se estas, como falhas secundárias associadas aos falhamentos maiores, predominantemente reversos.

De maneira semelhante, na área Lajeado-Bombas, atribui-se as falhas direcionais, incluindo as indeterminadas, nas direções médias N20E e N40-50W ao sistema de cisalhamento conjugado gerado durante o processo de formação da sinforma. A direção N50W, além da relação acima, também pode estar associada à falhamentos gerados na ocasião do arqueamento e intrusão do dique básico a NW-SE, em ambas as áreas. Deve-se lembrar aqui, que o contato SE dos carbonatos Lajeado-Bombas ocorre através de uma importante falha regional, principalmente inversa (Falha da Figueira, Campanha, 1991), e que em função desta, é possível que parte das falhas a N20E e principalmente aquelas segundo N50-60E, possam representar falhas menores e ramos associados a Falha da Figueira.

Juntas de cisalhamento são aquelas com pequeno movimento relativo paralelo aos blocos adjacentes, de comprimento decimétrico a métrico, quase sempre preenchidas com calcita, microbrechas milimétricas e, às vezes, quartzo. A espessura deste preenchimento não ultrapassa 2cm. Em função de sua pequena extensão e rejeito de no máximo alguns centímetros, não caracterizam falhas, podendo ser consideradas microfalhas. A sua definição em campo é dificultada quando não há estratos de referência para detectar o

rejeito ou exposição do plano da junta para exibir estriamento. Desta maneira, como citado anteriormente, é provável que entre as demais categorias de juntas definidas, possam ocorrer juntas de cisalhamento.

Apesar das poucas medidas obtidas (figs 3.24F e 3.25F) em ambas as áreas, é possível notar-se tendências de orientação preferencial. Na área Furnas-Santana, os conjuntos N10E e N40-45W, aproximam-se ao sistema conjugado de cisalhamento com a direção de σ_1 em torno de N20-30W, conforme já sugerido pelas juntas preenchidas (fig 3.26). Estes conjuntos, ocorrem em zonas, onde chegam a ter espaçamento decimétrico, muito semelhante às juntas preenchidas descritas anteriormente. O conjunto N50-60E, de porte maior que as anteriores e paralelo às juntas plano axiais de tração, é associado aqui, tanto às falhas inversas com vergência SE, como também, às rupturas de flancos e charneiras de dobras paralelas e assimétricas parasitas ao homoclinal Furnas-Santana.

Na área Lajeado-Bombas, ressaltam-se os conjuntos alinhados a N10-20E e N50W, com juntas métricas, freqüentemente paralelas à falhas com zonas de cisalhamento desenvolvidas.

As **falhas normais** são as estruturas disruptivas menos freqüentes nas áreas estudadas (tabela 3.5 e figs 3.24E e 3.2C). Caracterizam-se por zonas de falhas com preenchimento, brechamento e pequenas fissuras preenchidas oblíquas. Estas zonas possuem comprimentos decimétricos a métricos, terminando em juntas simples e/ou preenchidas ou dobras. Associa-se as falhas normais N35E e N75E à fraturas de tração, geradas em charneiras de dobras parasitas. A direção N50-60W pode estar associada ao evento de tração e intrusão do dique básico, sub-paralelo a estas falhas.

3.4.2 Expressão fisiográfica de estruturas planares. Levantamento de fotolineamentos.

É senso comum, no estudo de fraturas a nível regional, que as discontinuidades de alto mergulho sejam expressas sobre fotografias aéreas verticais, através de alinhamentos topográficos, principalmente de vales e zonas deprimidas (Wadge e Dixon, 1984). Com o objetivo de verificar a correlação entre as estruturas disruptivas mapeadas em campo e feições de relevo lineares sobre os calcários (vales fluviais e alinhamentos de depressões poligonais e dolinas), confeccionou-se os mapas de fotolineamentos das áreas estudadas (anexos 3.1 e 3.2), assim como, os histogramas dos comprimentos acumulados destes lineamentos, em função de sua direção (fig 3.27). Desta maneira, é possível comparar as direções predominantes obtidas em campo, com aquelas observadas em fotografias aéreas, e assim, sugerir quais estruturas condicionam alinhamentos de feições cársticas.

O histograma do total de fotolineamentos (fig 3.27D) traçados em escala 1:25.000, da área Furnas-Santana, indica predominância das direções N40-80E, com máximo neste quadrante, entre N50-60E, e outro conjunto concentrado entre N30-70W, com máximo em N50-60W. Comparando este resultado com os conjuntos de fraturas obtidos em campo (tab. 3.5), nota-se que na direção N50-60E há concentrações de juntas simples, preenchidas, de cisalhamento, falhas inversas e direcionais, estas últimas, mais importantes nas direções N40E e N75E. Sobre estas estruturas disruptivas, soma-se ainda, a direção dos

Área Furnas - Santana

Área Lajeado Bombas

Figura 3.27 - Histogramas do comprimento de fotolineamentos acumulados em função da direção.

planos de acamamento com alto mergulho, também muito freqüentes e dispersos nas direções N50-70E. No quadrante NW, correlaciona-se o máximo de lineamentos entre N50-60W, com os conjuntos dominantes, nesta direção, de juntas simples e falhas direcionais a indeterminadas, e a N70W com falhas inversas e juntas preenchidas. A dispersão de lineamentos, tanto nas direções NE como NW, é interpretada como sendo consequência da alta freqüência e grande variedade de descontinuidades presentes nas rochas carbonáticas.

Construindo histogramas de lineamentos referentes à setores desta área, obteve-se concentrações de lineamentos menos dispersas (figuras 3.27 A, B, C). No setor SW (fig. 3.27C), os conjuntos de falhas direcionais a N40-50E e N50-60W, assim como, as falhas inversas a N75E e N75W, além das juntas preenchidas a N50E e juntas de cisalhamento a N45W, coincidem com os picos de freqüência máxima de lineamentos. Passando para a região central da área Furnas-Santana (fig 3.27B), além das correlações já observadas, é realçada uma ocorrência de lineamentos ao redor de NS e outra em torno de EW. A primeira é atribuída aos falhamentos direcionais, juntas preenchidas e de cisalhamento, com direções NS e N10E e a segunda, corresponde aos lineamentos próximos a EW, produzidos pela falha inversa N75-80E 60-70SE, de comprimento quilométrico, observada ao longo da câmara Lage Branca. Por último, deve-se considerar que a concentração de lineamentos na direção NE é reforçada por traços do acamamento com alto mergulho e grande comprimento.

Na área Lajeado-Bombas, ocorre também, nítida correlação entre as direções predominantes de fotolineamentos e o sistema de juntas e falhas identificadas em campo. No setor sudoeste da área (fig. 3.27F), a concentração máxima de lineamentos entre N40-60E sobrepõe-se às direções preferenciais de juntas simples, preenchidas, falhas inversas e direcionais e em parte aos planos de acamamento. A concentração EW deste setor é correlacionada, pela falta de importantes fraturas nesta direção, aos planos de acamamento, que neste setor ocorrem próximos a EW, em função do fechamento do sinclinal e também, devido à estrutura em domos e bacias nesta área. Os máximos no quadrante NW, menos expressos no setor SW, ressaltam-se na região central e nordeste da área Lajeado Bombas (fig 3.27E). Neste setor, a predominância de lineamentos entre N40-60W e N20-30E, coincide com dois conjuntos preferenciais de juntas simples, preenchidas, de cisalhamento e falhas. Concentrações menos freqüentes de lineamentos, em torno de NS e N20-30W sobrepõe-se aos demais conjuntos de falhas inversas, juntas de cisalhamento e preenchidas, identificados na área.

Uma vez demonstrado que os fotolineamentos são a expressão morfológica de juntas (incluindo as juntas de estratificação) e falhas presentes nos metacalcários, pode-se utilizar estes lineamentos para calcular a **densidade de fraturamento** destas áreas, parâmetro proposto em Davis (1984), como sendo a razão entre o comprimento total de fotolineamentos e a área em que estão contidos, neste caso, a área aflorante de metacalcários. No caso de metassedimentos estratificados, propõe-se utilizar o termo **densidade de descontinuidades**, ao invés de fraturamento, pois traços de planos de acamamento são incluídos no levantamento de fotolineamentos. Este parâmetro, constitui

um valor quantitativo, para exprimir de forma simplificada e preliminar, o grau de segmentação por descontinuidades de uma área, a partir de fotografias aéreas. Os metacalcários Furnas-Santana, com 27,5Km² de área e 65,2km de lineamentos (subtraindo os lineamentos contidos sobre a intercalação pelítica central), possui densidade de descontinuidades de 2,4km⁻¹. A área Lajeado Bombas, com 47,5km² de calcários expostos e 85,4km de lineamentos (subtraindo os trechos de lineamentos que cruzam o contato litológico), apresenta densidade de descontinuidades de 1,8km⁻¹. Estes valores indicam, respectivamente para as áreas acima, que em 1km² de rocha carbonática exposta, ocorrem 2,4 e 1,8 km de lineamentos topográficos estruturalmente guiados, o que leva à conclusão, de que o relevo cárstico destas áreas é fortemente condicionado por estruturas planares, entre as quais, ressaltam-se aquelas alinhadas segundo NE e NW. A densidade maior de descontinuidades na área Furnas-Santana, pode ser interpretada como sendo reflexo da estruturação mais intensa do relevo nesta, em relação a área Lajeado-Bombas. Esta estruturação maior da paisagem sobre a área Furnas-Santana, é atribuída ao fato de que os metacalcários desta área apresentam uma densidade maior de planos de estratificação, em função do caráter fortemente rítmico da alternância de camadas puras e impuras, além dos altos ângulos de mergulho destas.

A identificação de quais estruturas são mais favoráveis ao entalhamento e desenvolvimento de feições cársticas superficiais é apresentada a seguir.

3.4.3 Fatores condicionantes do relevo cárstico das áreas estudadas

As bacias poligonais fechadas, células fundamentais do relevo cárstico atual, seguem de modo geral, um padrão de orientação imposto pela paleodrenagem fluvial que antecedeu o carste poligonal nas áreas investigadas. A implantação de uma rede fluvial sobre rochas maciças, é condicionada pela associação entre zonas mais favoráveis ao intemperismo e o gradiente hidráulico (Thornbury, 1969). As zonas mais propícias à desagregação química das rochas são as descontinuidades permeáveis do maciço rochoso solúvel e os estratos carbonáticos mais solúveis em relação àqueles impuros, ricos em pelitos.

Na área Furnas-Santana, as rotas gerais da paleodrenagem, assim como, grande parte dos eixos maiores de depressões poligonais, seguem a direção N50-70E (anexo 3.1). Esta direção corresponde ao alinhamento dos planos de estratificação, de importantes conjuntos de juntas simples (ou longitudinais em relação ao eixo do dobramento), preenchidas e falhas, todos coincidentes com a direção do gradiente hidráulico sobre os carbonatos. Conclui-se, portanto, que o entalhamento da paleodrenagem seguiu estas estruturas, sendo que, entre estas, mais intensamente os planos de estratificação, falhas e juntas simples (em ordem decrescente), devido à permeabilidade maior destas, em relação às juntas preenchidas. Sugere-se também, que a instalação das linhas preferenciais de drenagem, seguiu a intersecção entre a estratificação N50-70E 40-70NW e os planos de juntas simples e falhas com direções semelhantes e altos mergulhos, pois esta intersecção, produzindo linhas sub-horizontais de concentração de fluxo da água subterrânea, aumentou

a remoção de material em solução ao longo destas rotas, favorecendo assim o entalhamento de vales sobre estas.

Na área Lajeado-Bombas o condicionamento estrutural da paleodrenagem também é evidente, mas, seguindo predominantemente o conjunto de juntas e falhas NW-SE, N20-30E, N50-60E e localmente planos de estratificação.

Inserido no contexto de que a permeabilidade secundária aumenta com o tempo, causando gradativo incremento na condutividade hidráulica do corpo calcário e rebaixamento do lençol freático sobre as linhas de percolação subterrânea, deve-se discutir, o condicionamento estrutural da instalação de pontos de absorção do escoamento superficial, associados à linhas sub-verticais de maior condutividade hidráulica ao longo da intersecção de descontinuidades de alto mergulho, conforme é ressaltado por Lattman e Parizek (1964), Kiraly et. al. (1971), Parizek (1976) e Williams (1985). Estas rotas verticais de infiltração vão deflagrar o desenvolvimento de dolinas associadas à depressões poligonais. Estes pontos iniciais de absorção, localizam-se, conforme observado nos mapas morfológicos e de reconstrução da paleodrenagem, preferencialmente sobre os canais fluviais, em função da concentração do escoamento superficial sobre estes. Além disto, confirmou-se durante o traçado de fotolineamentos, que a maioria dos fundos de depressões ocorrem na intersecção de lineamentos. Como exemplo, na área Furnas-Santana, os sumidouros autogênicos ocorrem preferencialmente na intersecção de lineamentos de direção geral N50-70W, com o traço do acamamento de mergulho moderado a alto, de direção N40-60E e juntas e falhas paralelas a este, formando alinhamentos preferenciais sobre o acamamento (fig 3.28). Os lineamentos NW-SE representam as juntas de tração paralelas aos diques, assim como, aquelas transversais ao eixo geral do dobramento, todas de alto mergulho a subverticais. Na área Lajeado-Bombas, nota-se também, o alinhamento de sumidouros. Neste caso o alinhamento predomina sobre traços de fraturas longas e falhas, onde os pontos de infiltração ora correspondem à intersecções destas fraturas proeminentes com traços menores do acamamento ou com outras fraturas (fig 3.28). Conforme observado em campo, as fraturas longas traçadas em fotos aéreas correspondem principalmente aos conjuntos de juntas simples decamétricas e falhas com zonas brechadas associadas.

O alinhamento preferencial ora sobre traços de acamamento, como na área Furnas-Santana e, ora sobre linhas de fraturas, como predomina na área Lajeado-Bombas, é atribuído ao ângulo maior de mergulho do plano mais permeável. Isto é, os pontos de infiltração instalam-se nas intersecções, alinhando-se preferencialmente, sobre os planos mais permeáveis e mais inclinados. Na área Furnas-Santana, esta associação corresponderia aos planos de acamamento e, na área Lajeado Bombas, devido ao baixo mergulho predominante da estratificação, os planos mais inclinados e permeáveis correspondem às juntas simples longas e falhas.

De modo geral, a identificação no terreno do tipo de descontinuidade responsável pelo alinhamento de sumidouros é muito difícil, devido ao espesso solo que cobre a superfície.

Figura 3.28 - Interpretação do condicionamento estrutural dos principais alinhamentos de sumidouros autogênicos nas áreas Furnas Santana e Lajeado Bombas. Alinhamentos extraídos dos mapas morfológicos. AC- acamamento, FR- junta simples longa, FL- falha, DP- contorno aproximado de depressão poligonal. D- dique básico.

Associado ao alinhamento de sumidouros sobre planos de estratificação e fraturas, muitas depressões poligonais também exibem seu eixo maior, em planta, paralelo a estes lineamentos estruturais. Conforme citado anteriormente, esta é uma herança do condicionamento estrutural da paleodrenagem superficial que posteriormente foi segmentada pela instalação de depressões de drenagem centrípeta. Na área Furnas-Santana, o eixo maior destas é predominantemente paralelo ao traço da estratificação e de falhas

inversas como, por exemplo, a falha inversa da Lage Branca (fig 3.28). Já na área Lajeado-Bombas, o eixo maior de depressões e o alinhamento preferencial de sumidouros, segue principalmente estruturas disruptivas.

Observando a incidência de *poljes* de contato na área Furnas-Santana, assim como, o entalhamento maior de vales cegos (anexo 3.5), nota-se que ambos estão mais desenvolvidos ao longo do contato SE dos metacalcários. No contato NW, ao contrário, os córregos alogênicos formam trechos fluviais sobre o calcário, antes de atingirem sumidouros. O número maior de cavernas penetráveis, com pórticos de abatimento junto à sumidouros, também caracteriza a faixa de contato SE desta área. Estes fatos são associados à estrutura geral do homoclinal com mergulho da estratificação para NW, isto é, na situação estrutural onde o mergulho dos planos de acamamento está a favor da direção de injeção de água alogênica, a capacidade de absorção de água pela rocha será maior do que na situação inversa, onde o gradiente hidráulico local é contrário ao sentido de mergulho das camadas (fig 3.29). Havendo capacidade maior de absorção de água, o volume de rocha dissolvida será maior, condicionando assim, um entalhamento mais intenso a favor do mergulho das camadas, produzindo as feições de relevo citadas. Isto evidencia, mais uma vez, o importante papel da estratificação como descontinuidade favorável para percolação de água nos metacarbonatos, condição também observada no carste das montanhas Rochosas por Ford (1971a) e Mills (1981) e no carste da região de Irecê (BA) por Guerra (1986). Este é um exemplo de condicionamento hidrológico e estrutural da paisagem cárstica.

Esta condição de permeabilidade maior de certos planos de estratificação é atribuída ao processo de deslizamento flexural desenvolvido durante o dobramento da sequência carbonática. Sobre diversas superfícies expostas do acamamento foram observadas estrias de atrito e uma fina película de material moído, às vezes cimentado por calcita e quartzo. Estas feições, além de evidenciarem o deslizamento entre camadas, mostram que houve uma pequena abertura entre os estratos, preenchida por material finamente granulado, o que é interpretado como sendo a causa da permeabilidade maior destas superfícies, que também possuem grande extensão e continuidade, fator fundamental para condicionarem proto-condutos para percolação de água.

A paisagem fluvial dos vales dos rios Furnas e Betari, descrita no item 3.2, também exhibe controle estrutural. Com a identificação de lineamentos acima obtida, relaciona-se a direção NW-SE destes vales ao conjunto de juntas simples, de tração, paralelas ao dique basáltico que corta as áreas na mesma direção. Este é outro exemplo de condicionamento hidrológico e estrutural de relevo, pois a implantação da paisagem fluvial e persistência desta sobre metacarbonatos, é consequência da soma entre a estrutura favorável ao entalhamento superficial e a vazão alta destes rios desde a época de exposição dos metacalcários.

O zoneamento morfológico da área Furnas-Santana (anexo 3.5), mostrou que a zona de carste poligonal, incluindo a concentração de estruturas de colapso em fundos de depressões poligonais, é mais expressiva ao longo de uma faixa NW-SE no setor sudeste da

área. Isto indica um grau de segmentação maior da paleodrenagem superficial nesta faixa, em relação a zona morfológica de transição, predominante na faixa NW desta área. Conforme Gunn (1986), apesar da aparência de que as formas de relevo do endocarste e exocarste possuem desenvolvimento independente, este cita, que há fortes razões de se considerar, *a priori*, a evolução mútua e dependente destas formas. Nesta linha, Bull (1980) mostrou que depressões poligonais e dolinas do carste do sul de Gales (Inglaterra) estão relacionadas com condutos subterrâneos localizados até 180m abaixo destas dolinas e que o desenvolvimento destas, está envolvido desde as fases primordiais da implantação do sistema de cavernas. Em relação ao carste do Ribeira, esta área maior de zona poligonal, encontra-se exatamente sobre o setor da área Furnas-Santana, onde ocorre, numa profundidade média de 200m abaixo da superfície, o maior e mais desenvolvido sistema de cavernas desta área (fig 3.29), conforme detalhes apresentados no capítulo 4. Isto comprova a evolução dependente entre sistemas de drenagem subterrânea e as feições de relevo superficiais, onde estas últimas, acabam sendo condicionadas, pelo desenvolvimento de sistemas de cavernas.

Figura 3.29 - Localização da zona de concentração de condutos cársticos com relação à topografia. Corte transversal a área Furnas-Santana, setor sul. A- Zona de carste poligonal B- Zona de transição de fluviocarste para carste poligonal.

Outro exemplo de condicionamento de formas superficiais por sistemas eficientes de drenagem subterrânea é a grande depressão composta associada à caverna Areias (fig 3.10). Citou-se que esta possui área e profundidade anômalas em relação à população de depressões poligonais das áreas estudadas (item 3.3). Relaciona-se, isto, ao fato desta depressão ter sofrido uma taxa de ampliação maior que as demais, após a conexão direta do seu sistema de drenagem interna à rede de condutos subterrâneos do sistema de cavernas Areias. Como consequência, após a intersecção da superfície do relevo com o nível de condutos subterrâneos, a capacidade de absorção e transmissão do escoamento superficial

aumentou em muito, o que resultou na realimentação positiva do processo de ampliação desta depressão, conforme modelo da figura 3.15.

3.5 Conclusões

O mapeamento morfológico, a medição e cálculo de índices morfométricos sobre as áreas de amostragem, mostraram que, ao contrário da primeira impressão, de que a superfície cárstica exibe um relevo caótico e desorganizado de dolinas, depressões fechadas e sumidouros, o carste do Alto Ribeira possui um padrão de relevo organizado e estruturalmente condicionado.

As unidades morfológicas definidas (zona fluvial, fluvio cárstica, de transição e poligonal), permitiram estabelecer diferentes estágios evolutivos do relevo cárstico, partindo de uma paisagem fluvial, a qual é gradativamente segmentada pela implantação de bacias de drenagem fechada, cujo desenvolvimento levou à formação de carste poligonal.

A iniciação de depressões poligonais ocorreu sobre uma paleodrenagem fluvial estruturalmente condicionada, onde os pontos de absorção vertical do escoamento superficial instalaram-se preferencialmente na intersecção entre planos de estratificação e juntas simples longas e falhas. Sobre o denso reticulado de descontinuidades observadas em ambas as áreas investigadas, na área Furnas-Santana, as depressões alinham-se principalmente sobre traços do acamamento, tendo seus sumidouros definidos pela intersecção de juntas simples e falhas oblíquas aos mesmos. A área Lajeado-Bombas, ao contrário, exibe alinhamento preferencial de sumidouros sobre juntas longas NW-SE, com sumidouros definidos pelas intersecções destas, com traços do acamamento, juntas e falhas. Atribui-se esta diferença ao mergulho mais alto da estratificação na área Furnas-Santana, aliado ao fato, desta apresentar também, densidade maior de planos de estratificação, devido à ritmicidade maior na alternância de estratos carbonato-pelíticos e carbonáticos.

Os *poljes* de contato estão associados à condição estrutural favorável para injeção de água alogênica (sentido de mergulho da estratificação coincidente com o gradiente hidráulico), assim como filiam-se as maiores bacias de captação de escoamento alogênico.

A evolução da população de depressões ocorreu, e ocorre, através do processo de competição e coalescência entre estas (taxas de abertura diferenciadas), gerando inversões de relevo, assim como pelo mecanismo de geração múltipla, onde a instalação de depressões com drenagem mais eficiente, deflagra a instalação de depressões menores, vizinhas à primeira. Gera-se, desta maneira, uma superfície dinâmica de rebaixamento do relevo, onde se observam feições mais antigas, de fundos de depressões, hoje em cristas, associadas ao lado, ou acima em cota, à pequenas dolinas em iniciação. Neste processo de competição entre taxas de entalhamento do relevo, ressalta-se, na área Lajeado-Bombas, a invasão da superfície de carste poligonal, pelo alargamento do vale do rio Betari adjacente, contribuindo com a inversão de relevo.

As zonas poligonais mais desenvolvidas refletem a presença de condutos subterrâneos e sistemas de cavernas com drenagem eficiente do escoamento superficial, como foi comprovado na área Furnas Santana. Na área Lajeado-Bombas, esta relação é

menos evidente, apesar da presença de vários sistemas de cavernas, embora, a maior depressão composta desta área, seja decorrente da conexão direta desta, com um sistema eficiente de drenagem subterrânea.

Pela densidade de depressões, concluiu-se que as zonas poligonais do carste do Alto Ribeira encontram-se em avançado estágio de desenvolvimento, com densidades semelhantes ao carste poligonal da Nova Guiné e Jamaica, considerados altamente desenvolvidos (Williams, 1972b e Troester et. al. 1984). Por outro lado, o carste de forma geral, incluindo as demais zonas morfológicas, possui grau de desenvolvimento menor que as áreas típicas de carste poligonal acima citadas, pelo fato do índice de dolinamento das áreas amostradas estar entre 2,6 e 1,7. Neste contexto, concluiu-se que a área Lajeado-Bombas, possui relevo poligonal mais desenvolvido que a área Furnas-Santana, sendo que nesta última, predominam características fluviocársticas.

Devido à predominância de fluviocarste sobre a faixa carbonática junto ao contato NE da área Furnas-Santana, interpreta-se baixa permeabilidade secundária nesta faixa, em comparação com a faixa carbonática próxima do contato SE, com alta permeabilidade secundária, evidenciada pelo importante sistema de cavernas neste setor.

A intensidade do relevo poligonal é expressa pelas medidas de profundidade das depressões poligonais. O carste do Alto Ribeira apresenta profundidades típicas de carste tropical.

Com as medidas de área de depressões poligonais, confirmou-se também a grande semelhança entre o relevo poligonal do Alto Ribeira e aquele da Nova Guiné e Jamaica, apesar das condições climáticas distintas reinantes na Nova Guiné. Isto confirma a conclusão de Smith e Atkinson (1976), de que a ocorrência de carste poligonal é possível numa grande amplitude climática.

Os valores morfométricos semelhantes entre diferentes regiões cársticas (com litologia e história climática diferentes), sugerem que há um padrão geral de relevo poligonal, o qual difere somente em pequenos detalhes, entre áreas distintas.

CAPÍTULO 4

A DRENAGEM SUBTERRÂNEA E A EVOLUÇÃO DE SISTEMAS DE CAVERNAS

4.1 Introdução

Rochas carbonáticas caracterizam-se por abrigarem aquíferos heterogêneos (Yuan, 1985), compostos por redes contínuas de condutos e aberturas menores, ambos alargados por dissolução da rocha. Estes padrões de condutos interconectados constituem os sistemas de cavernas e proto-cavernas, responsáveis pela drenagem subterrânea de áreas cársticas (Ford e Williams, 1989).

Com o entalhamento da paisagem, níveis de condutos freáticos são progressivamente drenados, tornando-se preenchidos com ar, além de água. Entre estes condutos com ar, alguns são bloqueados por sedimentos, outros possuem dimensões impossíveis de serem penetradas pelo ser humano e a maioria destes condutos, continua inacessível, simplesmente por não terem uma conexão que possa ser percorrida pelo homem. Na grande maioria das áreas cársticas, as cavernas acessíveis representam somente uma pequena fração do total de condutos presentes (White, 1988 e Worthington, 1991). Estas cavernas são definidas, por uma convenção antropomórfica (White, op cit.) reconhecida pela União Internacional de Espeleologia, como sendo cavidades subterrâneas naturais, em rocha, e que possuem dimensões suficientes para permitir a passagem de um ser humano. Desta definição surge uma questão polêmica entre exploradores e topógrafos de cavernas naturais, quanto as dimensões mínimas de uma cavidade para ser registrada como caverna num cadastro ou levantamento de cavernas de uma região cárstica. A maioria das associações espeleológicas convencionam um comprimento mínimo entre 150 e 50m em planta, ou 20m na vertical e diâmetro mínimo que permite a passagem do explorador. Esta definição de caverna, vai depender, portanto, de quem a convencionar. Mas, independentemente destas convenções, deve-se ressaltar que as cavernas constituem as únicas frações diretamente acessíveis para observação do aquífero cárstico, o que as torna especialmente importantes no estudo da circulação atual e pretérita de água em rochas solúveis.

Neste sentido, necessita-se definir e classificar os condutos cársticos do ponto de vista geomorfológico e hidrológico, independentemente de sua acessibilidade. Ford e Ewers (1978) definiram **cavernas cársticas** como sendo condutos de dissolução, ou qualquer abertura na rocha solúvel, que tenham dimensões suficientes para permitir fluxo de água em regime turbulento, apesar de que, este fluxo não necessariamente sempre é turbulento neste estágio. A dimensão mínima para esta condição é de 5 a 15 milímetros de diâmetro ou largura deste conduto ou abertura na rocha (Howard, 1964, apud Ford e Ewers, 1978), sob ação de variados gradientes hidráulicos. Para que ocorra este fluxo, a caverna cárstica necessariamente deve estar conectada a uma rota de injeção e saída da água subterrânea. Por outro lado, cavidades integradas numa rota de circulação subterrânea, mas que possuem dimensões abaixo do limite de fluxo turbulento, são classificadas como cavernas

em início de formação, ou seja, **proto-cavernas**. Quando ocorre a situação de um ou vários condutos conectados, continuamente na condição de caverna cárstica, ao longo de todo trajeto entre injeção e ressurgência da água subterrânea, caracteriza-se um sistema integrado de cavernas, ou simplesmente, **sistema de cavernas cársticas**. A maioria das cavernas acessíveis ao homem, são fragmentos destes sistemas de circulação subterrânea, onde estes últimos, além de constituírem o aquífero cárstico, possuem também, equivalência funcional às redes de drenagem superficial na geomorfologia fluvial.

Neste contexto de sistemas de cavernas cársticas, este capítulo tem como objetivo essencial, esboçar uma seqüência evolutiva do aquífero cárstico e suas feições subterrâneas associadas, através da investigação morfológica e geológica dos principais segmentos acessíveis de alguns dos sistemas de cavernas presentes nas áreas carbonáticas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas (definidas no cap. 3).

4.2 Distribuição e características físicas gerais dos sistemas de cavernas nas áreas investigadas

Para delimitar os sistemas de cavernas e suas bacias de captação de água, foram executadas as seguintes etapas de trabalho: mapeamento geoespeleológico das principais cavernas da área; implantação destes mapas e perfis em cartas topográficas 1:10.000 e no traçado morfológico 1:25.000 da superfície e, verificação em campo e localização em cartas topográficas dos principais sumidouros e ressurgências associadas a cada sistema de cavernas. Estas informações são fundamentais para esboçar a geometria do fluxo de água subterrânea nos metacalcários.

O mapeamento geoespeleológico consiste em obter a representação bidimensional, tanto em planta, como em projeção no plano vertical, do conjunto tridimensional de condutos e salões que compõem a caverna, assim como da estrutura da rocha encaixante. A visualização do espaço subterrâneo é auxiliada através da confecção de seções transversais e longitudinais, nas quais, são enfatizados detalhes morfológicos de trechos da caverna. Sobre estas plantas e seções morfológicas são lançadas as atitudes de estruturas, como planos de acamamento, juntas e falhas. Como exemplo do produto deste mapeamento apresenta-se o mapa da caverna Lage Branca, anexo 4.1. A metodologia de mapeamento geológico de cavernas foi desenvolvida em conjunto com grupos de exploração de cavernas, onde ressaltaram-se o Grupo Pierre Martin de Espeleologia e o Grupo de Espeleologia do IG-USP, este último, com vários trabalhos de iniciação científica (Battistucci, 1988; Marinho, 1989; Philadelphi, 1990; Lepine, 1992 e Afonso de Souza, 1993). Como base metodológica utilizou-se também os estudos geológicos de cavernas nos Apalaches (Jameson, 1985) e as orientações de mapeamento espeleológico de White (1966), Chabert e Watson (1981) e Thomson e Taylor (1991).

4.2.1 Distribuição de sistemas de cavernas

Através da inserção, na base topográfica e geológica, dos mapas de cavernas obtidos neste trabalho e aqueles disponíveis no cadastro de cavernas da Sociedade Brasileira de Espeleologia, foi obtida a distribuição de cavernas nas áreas carbonáticas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas, conforme o anexo 4.3. As bacias de captação referentes a cada sistema

foram demarcadas em fotografias aéreas 1:25.000, durante a confecção dos mapas morfológicos das áreas carbonáticas em estudo.

Associando estas cavernas aos respectivos sumidouros e ressurgências, foram identificados os sistemas de drenagem subterrânea presentes nos metacalcários (anexo 4.2). Os principais estão listados na tabela 4.1, juntamente com suas características morfométricas. Sua denominação segue os nomes das principais cavernas associadas.

A demarcação das bacias de drenagem subterrânea, conforme apresentada no anexo 4.2, possui caráter preliminar e qualitativo. Sua definição exata depende da aplicação futura de traçadores (p.ex., corantes), através dos quais, poderá se confirmar, ou readaptar, o quadro aqui proposto, para as linhas de fluxo da água subterrânea, as quais, até o momento, são interpretadas em função da posição de condutos mapeados, sumidouros e ressurgências.

Foram identificados onze sistemas principais de drenagem subterrânea, cinco na área Furnas-Santana e seis na área Lajeado-Bombas (anexo 4.2). Num contexto geral, as cavernas associadas acompanham, em grande parte, a direção dos planos de estratificação, com poucas exceções (caverna Laje Branca), concentrando-se ao longo de faixas, com largura variável, próximas aos traços dos contatos sudeste dos metacalcários. A título de exemplo, na área Furnas-Santana, onde esta característica é mais marcante, foram mapeados cerca de 8700m de condutos subterrâneos do sistema de cavernas Pérolas-Santana (cavernas Pérolas, Tobias e Santana), 2985m do sistema Água Suja e 530m do sistema do Grilo, os quais (80,9% do total de condutos mapeados) estão todos alinhados nas proximidades do contato SE. Em contrapartida, na faixa ao longo do contato NW, apesar da intensa prospecção de cavernas, realizada neste trabalho e anteriormente, por moradores locais e grupos de exploração de cavernas, foram mapeados somente cerca de 1000m de cavernas integradas à sistemas de drenagem subterrânea (caverna do Zezo, Abismo Furnas). O mesmo ocorre ao longo da faixa central dos metacalcários, onde ocorrem pequenas cavidades isoladas e várias cavernas verticais, sem conexão transponível com sistemas integrados de drenagem subterrânea. Na área Lajeado-Bombas, do total de 11860m de condutos mapeados, cerca de 5660m (47,7%) desenvolvem-se nas proximidades do contato SE (cavernas Areias de Baixo, 1600m; Alambari de Cima e de Baixo, 1600 e 890m; Gurutuva, 100m e Jeremias, 1270m), enquanto que, junto ao contato NW ocorrem 1750m (14,7%) de cavernas mapeadas (caverna Passoca, 546m e Ouro Grosso, 1200m). O restante das cavernas nesta área desenvolve-se a partir da margem sudoeste em direção ao centro-leste da sinforma do Lajeado, não exibindo a distribuição preferencial em discussão.

Os sistemas são convergentes ou integrados (Trudgill, 1985), isto é, apresentam seus principais sumidouros associados à córregos alogênicos, os quais são coletados por condutos para uma ressurgência por sistema. Estas ressurgências seguem a tendência de distribuição de cavernas, localizando-se preferencialmente junto aos contatos sudeste dos metacalcários (anexo 4.2).

Considerando que as cavernas acessíveis são consequência do desenvolvimento de permeabilidade secundária e sistemas eficientes de drenagem subterrânea (Ford e Ewers, 1978), associa-se a concentração preferencial de cavernas, acima descrita, a um

desenvolvimento de condutos subterrâneos, relativamente mais intenso, junto ao contato SE, quando comparado às zonas mais internas do metacalcário e ao longo do contato NW.

	Sistema de Cavernas	Altitude do Sumidouro	Altitude da Ressurgência	Extensão ΔL , metros	Desnível ΔH , metros	Gradiente $\Delta H/\Delta L$	Área de Captação alogênica km^2	Comprimento mapeado de condutos, C (m)	
A	Onça Parda-Morro Preto	460	240	3090	220	0.071	3.62	C 1612	C/ ΔL 0.52
	Água Suja	562	265	2300	297	0.129	2.96	2985	1.30
	Pérolas - Santana	555	251	5970	304	0.051	7.02	9525	1.60
	a Grilo	700	440	7820	260	0.033	7.41	530*	0.067
	b	670		7150	230	0.032			0.074
B	a Areias	305	160	5540	145	0.026	8.08	4800*	0.86
	b	315		6330	155	0.024			0.76
	Córrego Fundo	449	160	8100	289	0.036	8.75	2000*	0.25
	a Ouro Grosso	400	190	950	210	0.221	2.63	1200	1.26
	b	440		2070	250	0.121			0.58
	a Alambari	407	165	3800	242	0.063	9.53	2590*	0.68
	b	383		4420	218	0.049			0.58
	c	370		3920	205	0.052			0.66

Tabela 4.1 Características morfométricas dos principais sistemas de cavernas das áreas Furnas Santana (A) e Lajeado Bombas (B).

* parte do desenvolvimento de cavernas extraídos de Martim, Chrysostomo e Rodrigues, 1989.

Altitude em metros sobre o nível do mar.

Extensão é a distância horizontal em linha reta entre sumidouro e ressurgência.

Desnível é a distância vertical entre sumidouro e ressurgência.

Comprimento de condutos é a somatória do desenvolvimento de cavernas mapeadas. Desenvolvimento é a somatória do comprimento de galerias e eixos maiores de salões, medidos em planta.

C/ ΔL é o grau de cavernamento do sistema, ou seja, a razão entre o comprimento de condutos acessíveis e a extensão.

a, b, c são índices referentes à diferentes tributários do sistema.

Propõe-se o seguinte modelo interpretativo para explicar esta geometria de distribuição de cavernas (fig 4.1). O rio Betari representa o nível de base local para os sistemas de drenagem subterrânea, condicionando um gradiente hidráulico local com caimento de SW para NE e vice versa, em relação ao rio Betari. Por outro lado, o rio Ribeira de Iguape constitui o nível de base regional para toda drenagem da serra de Paranapiacaba, onde se inclui o rio Betari, o que causa um gradiente hidráulico regional, sobre os calcários, dirigido genericamente para SE. Estas duas componentes geram um gradiente hidráulico resultante, com sentido E-SE, de forma oblíqua ao traço geral do acamamento. Em função deste gradiente resultante, a água de infiltração, assim como, as linhas de fluxo da água subterrânea, tendem a fluir para E-SE, seguindo as discontinuidades presentes nos metacalcários. Devido ao contraste de permeabilidade entre o calcário com condutos (condutividade hidráulica alta) e os metapelitos subjacentes (condutividade hidráulica baixa), associado à tendência de fluxo, acima citada, ocorre um efeito de represamento

Figura 4.1 - Interpretação do condicionamento hidrológico da distribuição preferencial de sistemas de cavernas ao longo do contato SE dos metacalcários

sobre o contato SE (convergência das linhas de fluxo da água subterrânea sobre a interface de permeabilidade menor), o que resulta num volume maior de água subterrânea neste setor. Isto, por sua vez, implica no fluxo mais intenso (velocidade maior de fluxo) e, conseqüentemente, na taxa maior de dissolução e abertura de condutos ao longo da faixa de concentração das linhas de fluxo da água subterrânea, conforme o princípio teórico das redes de fluxo e abertura de condutos elaborado por Rhoades e Sinacori (1941).

A partir deste padrão de distribuição de cavernas nas áreas estudadas, seria de se esperar, um importante sistema de cavernas (semelhante ao Pérolas-Santana), acompanhando o contato NW da intercalação pelítica central da área Furnas-Santana. A ressurgência da caverna do Grilo (anexo 4.2) confirma a presença de um sistema de condutos nesta localização. Sua vazão é de cerca da metade daquela do sistema Pérolas Santana, mas, seu grau de cavernamento ($C/\Delta L = 0.067$, tabela 4.1) é muito inferior, conforme foi observado pelas dimensões da caverna do Grilo e pela falta de continuidade subaérea de condutos no fundo desta. Conclui-se, portanto, que o sistema do Grilo, apesar de se encontrar, hipoteticamente, em situação geológica e hidrológica favorável para um intenso desenvolvimento de condutos, não apresenta um volume de cavernas acessíveis, compatível com os demais sistemas em condições semelhantes.

Levantou-se a seguinte hipótese para explicar esta ausência de cavernas volumosas. Existe a possibilidade da intercalação pelítica central não ser contínua conforme é apresentada pelo mapa geológico de Campanha (1991), adotado neste trabalho. O adelgaçamento e boudinagem, com rompimento de camadas, é observado em pequenos estratos metapelíticos dispersos nos metacalcários em questão. O mapa geológico apresentado por Pires (1989), para a mesma área, exhibe megascopicamente esta característica descontínua das intercalações pelíticas. Neste mapa, a camada pelítica central está interrompida na altura do sumidouro associado à caverna Pérolas, reaparecendo somente nas proximidades do rio Betari, a partir de onde é contínua e mais espessa. O grau de cavernamento incipiente do sistema do Grilo, acima questionado, seria conseqüência desta interrupção da camada pelítica, pois desta forma, grande parte da água coletada ao longo da faixa a NW do alinhamento desta intercalação, teria condição livre de percolar pelos metacarbonatos, seguindo o gradiente hidráulico dirigido para E-SE, concentrando-se na linha do sistema Pérolas-Santana. No presente trabalho, não foi possível detalhar a cartografia geológica da área em estudo. A hipótese acima deverá ser testada com trabalhos futuros na área.

4.2.2 Áreas de captação dos sistemas de cavernas

A região estudada apresenta sistemas do tipo misto (conforme a classificação de Jakucs, 1977), ou seja, as respectivas bacias de captação do escoamento superficial, estendem-se, tanto sobre rochas não carbonáticas (captação alogênica), como sobre carbonáticas (captação autogênica), (tabela 4.2). As áreas Furnas-Santana e Lajeado-Bombas, apresentam respectivamente, 46,8% e 47,5% de alimentação alogênica, a qual é absorvida, atualmente, por sumidouros pontuais (vales cegos) próximos ao contato entre os metacarbonatos e os metapelitos. Estas águas alogênicas formam segmentos de rios

subterrâneos, associados aos sistemas de cavernas, nas proximidades dos sumidouros. A alimentação autogênica é absorvida por fundos de depressões poligonais, através de infiltração difusa ao longo de juntas alargadas por dissolução ou por infiltração concentrada em condutos verticais (invasões vadosas), conforme será detalhado nos ítem 4.3.

Origem da captação	Área Furnas Santana	Área Lajeado Bombas
Alogênia	21.01 Km ² , 46.8 %	37.14 Km ² , 47.5 %
Autogênica	* 23.86 Km ² , 53.2 %	* 41.0 Km ² , 52.5 %

Tabela 4.2 - Áreas de captação de escoamento superficial na região investigada.

* Áreas aflorantes de metacalcário menos as zonas fluviais.

4.2.3 Gradiente hidráulico dos sistemas de cavernas

O gradiente hidráulico é um dos requisitos fundamentais no processo de abertura de condutos em rochas carbonáticas, pois é responsável pela movimentação da água subterrânea que carrega o produto de lixiviação da rocha, resultando na ampliação da permeabilidade inicial desta, gerando sistemas de cavernas (Thraillkill, 1968 e Huntoon, 1985). Nas áreas estudadas, o gradiente hidráulico dos sistemas de cavernas é bastante variável, com um valor médio de 65,5m/km e coeficiente de variação de 86,4%. Os gradientes mais elevados ocorrem em sistemas cujos sumidouros localizam-se ao longo do contato NW dos metacalcários (sistemas Água Suja, 129m/km e Ouro Grosso, 221m/km, tabela 4.1 e anexo 4.2). Por outro lado, os sistemas com pontos de injeção alogênica localizados ao longo do contato SE, exibem os gradientes mais baixos (p. ex., sistemas Pérolas-Santana, 51m/km e Areias, 25m/km). Este fato é interpretado como sendo consequência do grau de cavernamento e entalhamento subterrâneo maior ao longo de uma faixa nas proximidades do contato SE, conforme comentado anteriormente, o que teria refletido em superfície um rebaixamento relativamente mais intenso dos vales cegos, poljes de contato e sumidouros associados, através do colapso de condutos vadosos. A variação e o papel do gradiente hidráulico no desenvolvimento de cavernas serão especificados adiante, na discussão do modelo espeleogenético.

4.2.4 Extensão de cavernas acessíveis ao longo dos sistemas

Outra característica física importante dos sistemas de circulação cárstica é a continuidade de condutos acessíveis, atualmente acima da zona saturada, ao longo da extensão entre os pontos de insurgência e ressurgência. Esta continuidade não deve ser confundida com o grau de cavernamento dos sistemas, pois este, inclui níveis superiores de salões e galerias, não integrados na rota atual de circulação de água na zona saturada. Observando a distribuição de cavernas no anexo 4.2, nota-se que, com exceção do sistema Ouro Grosso, nenhum outro apresenta conexão acessível ao explorador, entre, pelo menos um dos pontos de injeção e a saída da água. As medidas de extensão de cavernas acessíveis em relação à extensão total dos sistemas são apresentados na tabela 4.3. A maioria das cavernas associadas a estes sistemas, terminam em sifonamentos, tanto no sentido de caminhamento à montante das ressurgências, como à jusante dos sumidouros, ou seja, os

condutos principais iniciam, a partir destes sifonamentos, um percurso abaixo da zona saturada. Tentativas de exploração por mergulhadores do nível freático, nos fundos das cavernas Santana e Ressurgência das Águas Quentes, mostraram a continuidade de condutos penetráveis na zona freática. A perfuração de um poço para Sabesp, no bairro da Serra (vale do Betari, área Furnas Santana, anexo 4.2), atingiu condutos em diversas profundidades, até 150m. Este poço, com uma vazão de $41\text{m}^3/\text{h}$ (dados do poço fornecidos pela Politi, S.A.), evidencia a presença de uma importante rede de condutos freáticos, abaixo do nível geral dos rios subterrâneos presentes nas cavernas acessíveis.

Sistema	Extensão de condutos acessíveis, Ec, metros	Fração de condutos acessíveis, Ec / ΔL , %
Onça Parda-Morro Preto	320	10.4
Água Suja	1092	47.5
Pérolas-Santana	2516	42.1
Grilo	240	3.4 a 3.1
Areias	3140	49.6
Córrego Fundo	1300	16.1
Ouro Grosso	950	100 - 45.9
Alambari	1020	26.8 - 23.1

Tabela 4.3 - Fração de condutos acessíveis ao longo da extensão (ΔL) dos sistemas nas áreas estudadas.

Este hiato de continuidade de condutos acima do nível de água nos fundos de cavernas é associado à transição de cavernas vadasas para freáticas, desenvolvidas ao longo das linhas côncavas do fluxo da água subterrânea. Esta concavidade e profundidade das linhas de fluxo é função do gradiente hidráulico, estrutura da rocha carbonática e extensão da linha de captação do sistema (Worthington, 1991), assunto que será explorado no item 4.3, sobre a espeleogênese

4.3 Modelo espeleogenético para o carste do Alto Ribeira

4.3.1 Aspectos teóricos da espeleogênese

Espeleogênese é o conjunto de processos que afetam a origem e desenvolvimento de cavidades subterrâneas naturais (Bögli, 1978). Os processos fundamentais envolvidos na espeleogênese de sistemas de cavernas, em rochas carbonáticas, são a corrosão (remoção química da rocha), erosão (remoção mecânica) e abatimento (alteração física e movimentos de massa da rocha devido à instabilidades mecânicas do maciço rochoso).

A corrosão de rochas carbonáticas, pela ação de águas meteóricas, é função direta da cinética química do sistema $\text{H}_2\text{O} - \text{CO}_2 - \text{CaCO}_3$ (Dreybrodt, 1987, 1988, 1990). A abertura, por dissolução, de condutos profundos no interior de seqüências carbonáticas, é atribuída à três mecanismos químicos principais. O primeiro baseia-se em reações lentas de dissolução de calcita, com cinética de terceira a quarta ordem do sistema acima. Desta maneira, soluções próximas do equilíbrio, são capazes de percolar a rocha por grandes distâncias sem atingir a saturação total em carbonato (Dreybrodt, 1981a e 1990). O segundo mecanismo é o fenômeno da corrosão de mistura, onde duas soluções saturadas em calcita, com concentrações de saturação e pressões parciais de CO_2 muito contrastantes,

ao se misturar, formam uma solução agressiva (Bögli, 1964, 1978 e Dreybrodt, 1981b). Por último, modelos atuais de geração de condutos em profundidade, consideram que, a agressividade da água de percolação, causada somente pelo CO_2 , não seria suficiente para gerar grandes vazios, no tempo disponível para tal. Atualmente é proposto que a abertura inicial de condutos seja principalmente devida à corrosão da rocha carbonática pelo ácido sulfúrico, gerado pela oxidação de sulfetos, muito frequentemente disseminados pela rocha calcária (Forti, 1989, Ball e Jones, 1990; Worthington, 1991 e Lowe, 1992).

Alguns aspectos do quimismo atuante no carst do Alto Ribeira serão tratados no capítulo 5, assim como, na discussão da iniciação de condutos.

A erosão mecânica é um importante processo de denudação em fases avançadas da espeleogênese, quando condições fluviais são estabelecidas, principalmente em cavernas cruzadas por rios alogênicos. Newson (1971) determinou que no caso de rios subterrâneos, tabletes de calcário expostos à ação dos rios perdem praticamente a mesma massa, tanto por abrasão mecânica, como por química. O efeito abrasivo do transporte de sedimento clástico alóctone torna-se importante, principalmente durante vazões catastróficas associadas a tempestades.

O abatimento de blocos, desmoronamento ou incasão (do termo *incasion*, de Bögli, 1969) é o descolamento, ao longo de descontinuidades, e movimentação de fragmentos da rocha encaixante da caverna, resultando, principalmente, na modificação e, às vezes, na ampliação de salões e condutos subterrâneos. Com o desenvolvimento de vazios por dissolução, e rebaixamento do lençol freático, o campo de tensões no maciço rochoso tende a um novo estado de equilíbrio, o qual é atingido através da redistribuição de massa no maciço, por meio de abatimentos e movimentação de blocos (Ford e Williams, 1989). Conforme ressaltado por Waltham (1981), o processo de colapso de cavidades não forma cavernas, mas sim, ao contrário, devido ao aumento de volume de uma pilha de fragmentos em relação à rocha não fragmentada, este processo tende a preencher o espaço vazio previamente formado, e portanto, deve ser relacionado, somente a um fator de modificação ou rearranjo do espaço, durante o desenvolvimento de cavernas.

Segundo Lowe (1992), a espeleogênese ocorre em três etapas principais. A primeira corresponde ao período, durante o qual, uma certa rocha carbonática não possui cavernas, mas apresenta um conjunto de descontinuidades planares, potencialmente favorável à penetração e percolação de solventes (permeabilidade primária). É denominada, pelo autor acima de *inception phase*, aqui traduzido como fase de pré-iniciação. Nesta fase, a superfície da zona freática, quando presente, é rasa e a zona vadosa quase inexistente. O fluxo de água é muito lento, através do sistema de finos capilares ao longo de descontinuidades com aberturas em torno de 0.1mm. Esta fase de pré-iniciação passa gradativamente à fase de iniciação, a qual caracteriza-se pela instalação de uma rede de condutos freáticos interconectados, ao longo das descontinuidades. A dimensão e distribuição destes condutos será condicionada pelos padrões estruturais, características litológicas e composicionais, gradiente hidráulico e disponibilidade de água (Kastning, 1984, apud Lowe, op cit.). Esta fase é marcada pelo início e incremento, com o tempo, da

permeabilidade secundária. A terceira fase inicia-se com a instalação de fluxo turbulento ao longo de parte do sistema de condutos, queda rápida do lençol freático e ampliação da zona vadosa. Relaciona-se esta fase à conexão de condutos freáticos com a superfície, ou seja, à intersecção de condutos pelo entalhamento da topografia externa. É denominada de fase de desenvolvimento ou avanço (*breakthrough*) do sistema de cavernas.

Nas fases de pré-iniciação e iniciação domina o processo de corrosão. Na fase de desenvolvimento, além da dissolução, inicia-se a abrasão mecânica, através da captura de rios alogênicos pelo sistema subterrâneo de drenagem e, no estágio mais avançado de desenvolvimento, com a queda do lençol freático e abandono de níveis superiores de condutos, a incisão inicia um papel importante na modificação do padrão primário de condutos.

Tendo em mente os processos envolvidos e a evolução sequencial da espeleogênese, devem ser ainda considerados, os pré-requisitos e controles fundamentais, para que uma região carbonática sofra carstificação e espeleogênese. Ford (1980), McConnell e Horn (1972), Thornbury (1969) e Dreybrodt (1988) apresentam discussão detalhada a respeito. A primeira condição é a presença de rocha carbonática, em superfície ou próxima desta, a qual, após dissolução, deixe o mínimo de resíduos insolúveis, o que manterá os interstícios de dissolução abertos, ponto importante para a iniciação da espeleogênese. Ford (op cit) estabelece uma pureza mínima de 70 a 80% de $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$, em peso, para esta condição. O segundo requisito refere-se à concentração da dissolução ao longo de rotas pré-estabelecidas por juntas, fraturas e falhas. Em rochas carbonáticas com alta porosidade primária (intergranular), a dissolução será altamente difusa, condicionando um aquífero de fluxo difuso, numa escala de centímetros, ou menos. Por outro lado, rochas com alta porosidade secundária, terão o ataque corrosivo concentrado ao longo de discontinuidades, gerando um aquífero de condutos. O terceiro controle da espeleogênese é a energia necessária para movimentar a infiltração através dos capilares na fase de iniciação. Para que ocorra este fluxo, num ambiente freático inicial, a água necessita uma alta energia potencial, o que implica, nesta fase, num lençol freático fortemente inclinado, considerando que neste estágio inicial há um lençol freático definido. Portanto, em áreas carbonáticas com altos gradientes hidráulicos, a iniciação de cavernas será favorecida. O último requisito para o pleno desenvolvimento da espeleogênese é uma condição climática úmida. A cinética de dissolução de carbonato de cálcio mostra que a taxa de dissolução é diretamente proporcional à quantidade de água e gás carbônico no sistema. A pressão parcial de CO_2 , na água de infiltração, também é influenciada pelo clima. Em climas quentes e úmidos, as condições ideais para corrosão de rochas carbonáticas são atingidas, pois nestes, combinam-se a disponibilidade de água com alta produção de CO_2 biogênico no solo (Ford e Williams, 1989).

A área de amostragem em estudo, representativa do carste do Alto Ribeira, satisfaz plenamente os requisitos acima esboçados, apresentando um variado conjunto de cavernas, conforme será descrito abaixo.

4.3.2 Morfologia e características lito-estruturais das cavernas estudadas

Com o objetivo de recuperar a história de abertura e evolução das cavernas, executou-se o levantamento da morfologia dos condutos e das características lito-estruturais da rocha encaixante (a forma do vazio é um testemunho do processo de entalhamento subterrâneo), para um conjunto de cavernas, as quais representam uma amostragem dos diferentes padrões de cavernas da área estudada.

Os sistemas de circulação subterrânea, da área de estudo, apresentam dois tipos básicos de cavernas associadas. Um com desenvolvimento horizontal predominante, e outro, principalmente vertical, denominado genericamente de conduto vertical (*vertical shaft*) ou abismo. Formas de transição entre cavernas horizontais e verticais ocorrem, assim como, freqüentemente condutos verticais estão associados aos condutos sub-horizontais, conforme será apresentado adiante.

Selecionou-se as principais cavernas dos sistemas Pérolas-Santana, Água Suja, Areias e Ouro Grosso, das quais, confeccionou-se os respectivos mapas geoespeleológicos, em escalas de 1:400 ou 1:600. Os condutos verticais associados a estes sistemas também serão analisados.

4.3.2.1 Geometria planimétrica

Na figura 4.2 apresenta-se a projeção horizontal reduzida das cavernas estudadas. Nota-se diferentes hábitos morfológicos (geometria) dos condutos e salões que as compõem. Para quantificar estes hábitos e permitir a comparação não subjetiva entre estes, mediu-se os seguintes parâmetros morfométricos (seguindo recomendações de Worthington, 1991): sinuosidade do conduto principal, largura da faixa de fluxo e largura relativa de fluxo.

Sinuosidade (S) de uma rota de fluxo ao longo de cavernas, é uma propriedade planimétrica, definida como sendo a relação entre o desenvolvimento da caverna percorrido por um rio subterrâneo ativo (D_a) e a extensão (E_c), linha reta entre o início e fim, desta rota de fluxo (fig 4.3).

Largura da faixa de fluxo (L_f) é a distância mínima entre as duas retas paralelas à extensão e que envolvem, tangenciando o desenvolvimento do rio subterrâneo (D_a). A largura relativa de fluxo (L_r) é a distância L_f sobre a extensão, E_c , (fig 4.3). As medidas estão listadas na tabela 4.4.

Com estas medidas e a forma em planta do conduto principal do rio subterrâneo, distingue-se os seguintes estilos de cavernas:

Cavernas curvilíneas e sinuosas

Este é o padrão morfológico dominante na caverna Areias e no segmento à jusante do grande salão de abatimento da caverna Água Suja. Caracteriza-se pelos valores observados mais altos de sinuosidade e largura de fluxo (S entre 1,20 e 1,40, L_r entre 0,19 e 0,25) e segmentos retilíneos curtos, entre inflexões de direção do conduto principal, as

Figura 4.2 - Padrões em planta das rotas fluviais subterrâneas das cavernas da área estudada. As setas indicam o sentido do fluxo principal de água e (S) a sinuosidade destas rotas

quais são curvilíneas e arredondadas. Estas cavernas enquadram-se no segundo tipo de não-linearidade, proposto por Deike e White (1969), dominante nos longos sistemas de cavernas Mammoth e Flint Ridge (EUA), onde o condicionamento de galerias por juntas e fraturas é pouco notável.

Figura 4.3 - Definição dos parâmetros planimétricos extensão e largura da faixa de fluxo.

Nome da Caverna	Extensão E_c , m	Desenvolvimento de condutos ativos, D_a , m	Sinuosidade $S = D_a / E_c$	Largura da faixa de fluxo, L_f , m	Largura relativa de fluxo $L_r = L_f / E_c$
Laje Branca	606	612	1.01	64	0,106
Santana	1746	1880	1.08	232	0,133
Água Suja	1092	1312	1.20	209	0,191
Areias de Cima	1764	2280	1.29	258	0,146
Areias de Baixo	1227	1722	1.40	308	0,251
Ouro Grosso	952	1040	1.09	71	0,074

Tabela 4.4 - Parâmetros morfométricos planimétricos das principais cavernas da área estudada. Medidas obtidas sobre mapas 1:500 a 1:1000 das cavernas.

Cavernas retilíneas e angulosas

As cavernas Santana e Ouro Grosso são os exemplos onde este padrão predomina. Apresentam sinuosidade e largura de fluxo contrastantemente inferiores ao padrão anterior (S entre 1,08 e 1,09, L_r entre 0,07 e 1,33). Caracterizam-se por segmentos retilíneos longos entre inflexões angulosas e agudas. Passagens sinuosas arredondadas são raras. Segundo Deike e White (1969), esta morfologia reflete intenso controle estrutural, típico de áreas dobradas com alto ângulo de mergulho, conforme será detalhado adiante.

Galerias e salões de abatimento (incasão)

Grande parte das cavernas Laje Branca, Pérolas e o ramo direito da caverna Areias de Baixo são ocupadas por esta morfologia. Trechos isolados de abatimento são frequentes ao longo de todas cavernas amostradas. Na caverna Água Suja, por exemplo, ressalta-se um

grande salão de abatimento, notado em planta pelo alargamento anômalo no setor central da caverna. O salão corresponde ao espaço onde a largura é semelhante ao comprimento do segmento da caverna e a galeria de abatimento, ao trecho onde o comprimento suplanta em muito a largura.

Quando a caverna é dominada por este padrão, sua sinuosidade tende a ser reduzida ao máximo, como no caso das cavernas Laje Branca e Pérolas, com S entre 1,01 e 1,03. A largura de fluxo também tende a ser pequena neste caso, pois, o rio subterrâneo principal concentra-se numa das laterais do conduto de abatimento, seguindo o gradiente local.

Planimetricamente caracterizam-se por áreas maiores, em função da largura maior da passagem, quando comparadas às cavernas com condutos originais (sem abatimento).

Relação entre sinuosidade e largura de fluxo

Apesar das poucas medidas efetuadas, devido à escassez de mapas completos de cavernas da área, obteve-se uma tendência, diretamente proporcional, da sinuosidade em função da largura de fluxo, com exceção da caverna Santana, a qual, nesta relação, exibe uma sinuosidade inferior à esperada, em função de sua largura de fluxo total (fig 4.4). Esta anomalia é devida ao fato da caverna Santana ser constituída por dois segmentos, onde cada segmento possui largura de fluxo baixa (72 e 84m), compatível com a sinuosidade destes ($\sim 1,08$), mas os dois segmentos em conjunto, aumentam muito a largura total de fluxo, sem incrementar a sinuosidade final da caverna.

Figura 4.4 - Sinuosidade em função da largura de fluxo das cavernas estudadas. Coeficiente de correlação 0,97 e R^2 de 95%, com modelo linear de correlação, sem considerar a caverna Santana.

4.3.2.2 Geometria em seções longitudinais e transversais

Associadas à geometria em planta, as seções transversais e o perfil longitudinal, fornecem a visualização da terceira dimensão das cavernas, elemento essencial para analisar o entalhamento subterrâneo.

O perfil longitudinal é obtido através da projeção do desenvolvimento da caverna e suas respectivas medidas de altura (desnível entre o piso e teto da passagem), sobre o plano vertical, paralelo à extensão desta. Fornece parâmetros morfométricos como o desnível do rio subterrâneo, a altura média do entalhamento deste, e a altura relativa entre níveis de passagens. Com o desnível e a extensão, obtém-se o gradiente médio do rio subterrâneo.

Seções transversais são produzidas a partir de uma série de medidas de altura e largura sobre planos de corte perpendiculares ao desenvolvimento em planta da caverna.

O controle hidráulico (regime de fluxo) tende a gerar duas formas principais de passagens: o entalhamento vadoso (fluxo turbulento com abrasão mecânica, além da dissolução), produzindo entrincheiramentos (*canyons*) e o alargamento freático (fluxo predominantemente laminar e dissolução), gerando condutos com seções elípticas a circulares (Bögli, 1969, White, 1988 e Palmer, 1991). Formas de transição ocorrem em função da superposição de regimes de fluxo, assim como, formas originais podem ser totalmente obliteradas pelo controle mecânico de rearranjo do vazio subterrâneo através da incisão.

Na área estudada foram identificadas as seguintes geometrias de passagens subterrâneas no plano vertical:

Entalhamento vadoso

Entende-se por entalhamento vadoso a abertura ou ampliação de condutos subterrâneos na zona insaturada ou junto da interface zona saturada e insaturada, através da ação de fluxo de água turbulento, onde a corrosão da rocha carbonática alia-se à erosão mecânica devido ao transporte fluvial de detritos abrasivos. As seguintes formas associadas ao entalhamento vadoso foram reconhecidas: *canyons*, condutos triangulares e retangulares e condutos verticais.

Os *canyons* representam passagens subterrâneas, com seções transversais, onde a altura é da ordem de 4 a 10 vezes maior que a largura (fig 4.5 e 4.6). Sua base é marcada pelo rio subterrâneo (ou testemunhos deste, em passagens acima do nível de base atual), o qual corre sobre leito rochoso ou depósitos fluviais (areias e cascalheiras). Blocos abatidos ocorrem isoladamente. A terminação superior foi pouco observada, devido à dificuldade de acesso. Na caverna Laje Branca é possível percorrer o topo de um *canyon* subterrâneo por um trecho de 150 metros. Este é formado por um alargamento, onde a seção transversal assume um contorno lenticular a circular, com paredes lisas e eixo maior de 2 a 6m (fig 4.7 e anexo 4.1). Segundo Davis (1930), Bretz (1942) e Bögli (1978) estas terminações elípticas no topo de *canyons* representam a seção de um conduto freático inicial, o qual posteriormente teve seu fundo entrincheirado em ambiente vadoso, através de entalhamento fluvial, originando um *canyon vadoso*. Na caverna Santana, onde a morfologia de *canyon* é

predominante ao longo do rio atual, o acesso ao topo deste requer escaladas. Num dos pontos atingidos (fig 4.6), a terminação do *canyon* é através de um afunilamento brusco que dá lugar a uma fenda com abertura decimétrica. Interpreta-se esta fenda como sendo um conduto freático inicial, semelhante ao caso da terminação de passagens vadosas menores, descritas adiante. Quando presente, esta iniciação freática imprime um caráter misto a estas seções, onde predomina largamente a feição vadosa, associada, neste caso, somente à ampliação da passagem.

Quanto à forma das seções transversais de *canyons*, distinguem-se quatro padrões principais, denominados de *canyons* retilíneos, escalonados, meandantes e irregulares (fig 4.5).

Os *canyons* retilíneos possuem paredes paralelas retas, com inclinação geral constante. O padrão escalonado é formado por vários segmentos superpostos menores de paredes paralelas e retas, os quais migram lateralmente. Os patamares assim formados correspondem à terraços fluviais subterrâneos. Ambos ocorrem associados à passagens predominantemente retilíneas em planta, como por exemplo, nas cavernas Santana (fig 4.6) e Ouro Grosso, onde o entalhamento fluvial é fortemente guiado pelo acamamento de alto mergulho. O primeiro corresponde ao entalhamento preferencial ao longo de um plano de estratificação e o segundo reflete o entalhamento sucessivo lateral de vários planos de acamamento.

Os *canyons* meandantes possuem seção com paredes paralelas e fortemente sinuosas (fig 4.5). Desenvolvem-se em cavernas curvilíneas e com alta sinuosidade, como na caverna Areias (fig 4.8), em função do caráter meandrante do entalhamento fluvial vertical. As seções associadas a estas passagens tomam formas complexas, pois com o avanço à juzante dos meandros, simultaneamente ao entalhamento vertical, o meandro rebaixado estará deslocado em relação ao corte superior, na direção do fluxo fluvial. Estes *canyons* não evidenciam controle estrutural importante. Conforme Ewers (1972), apud Bögli (1978), *canyons* meandantes caracterizam entalhamentos vadosos com mais de 10m de profundidade, associados à cavernas de baixo gradiente.

Canyons irregulares são aqueles cujas paredes apresentam contorno em seção transversal com padrão serrilhado e intensamente ondulado, com grande variação da largura ao longo da seção transversal (fig 4.5). O caráter serrilhado ou ondulado corresponde à camadas ressaltadas junto à outras mais entalhadas, devido à dissolução diferencial entre estratos carbonáticos puros e impuros, ricos em partículas insolúveis de silte e argila. Esta forma é freqüente nas cavernas estudadas (fig 4.6 e 4.8), onde a estratificação dos metacalcários é marcada por ritmicidade de camadas mais ou menos argilosas.

As alturas de *canyons* vadosos indicam a profundidade de entalhamento do rio subterrâneo. Nas cavernas estudadas, as alturas variam entre 10 e 50 metros. Estas medidas incluem uma margem de erro, estimada em até 10%, principalmente nos valores altos, devido à imprecisão nas medidas.

Uma característica notável dos *canyons* vadosos, principalmente observada nas cavernas Areias e Santana, é a grande variação de altura na direção do desenvolvimento da

Figura 4.6 - Seções transversais da caverna Santana. Traços contornando seções indicam o acamamento. Canyon vadoso, CV; conduto freático, CF, salão de abatimento, SA; conduto retangular, CR e conduto triangular, CT.

Figura 4.7 - Seções transversais da caverna Laje Branca. Canyon vadoso, CV; conduto freático, CF e salão de abatimento, SA; traço de falha, f.

Figura 4.8 - Seções transversais da caverna Areias. Canyon vadoso, CV; conduto freático, CF e salão de abatimento, SA, traço de fratura, F.

caverna. Como exemplo, acompanhando o perfil longitudinal do rio principal da caverna Santana (fig 4.9), no sentido a jusante, partindo do sifão do fundo da caverna, observou-se que o teto da galeria rapidamente se eleva, de alturas entre 5 e 8m para 20 e 30, atingindo um máximo de 50m ao longo do *canyon* central da caverna. Nas proximidades da entrada, a altura da galeria retorna para 4 a 8m. A interpretação desta feição é discutida no item referente a fase de desenvolvimento da espeleogênese (página 129).

Figura 4.9 - Perfil longitudinal simplificado da caverna Santana, indicando a variação do topo do entalhamento vadoso.

As passagens triangulares e retangulares representam entalhamentos vadosos menos profundos, em comparação com os canyons (fig 4.5). A diminuição de altura em canyons, acima comentada, frequentemente representa a transição destes para passagens do tipo triangular ou retangular (fig 4.9).

As passagens com seção transversal aproximadamente triangular caracterizam-se pela largura igual ou maior que a altura (fig 4.5 e 4.6). Suas paredes divergem a partir de uma linha de intersecção entre um plano de fratura ou falha com a estratificação, ambos com mergulhos moderados. O entalhamento fluvial segue grosseiramente estes planos, o que imprime a tendência triangular a estas seções. A iniciação deste tipo de conduto é marcada na intersecção fratura camada, através de um pequeno alargamento (fig 4.5), o qual é atribuído a uma iniciação em ambiente freático, segundo o modelo de Bögli (1969).

As passagens retangulares exibem altura semelhante à largura. Denotam nítido controle estrutural, pois o entalhamento é sempre paralelo ao acamamento, ou à fraturas, ambos de alto mergulho (fig 4.6 e 4.8).

Os condutos verticais caracterizam-se pela geometria geral cilíndrica a cônica com eixo vertical (fig 4.5). No plano vertical apresentam seções de paredes divergentes, convergentes ou paralelas, em relação ao ponto superior. Sua projeção em planta é circular a elíptica. Suas dimensões variam de alguns centímetros a dezenas de metros em diâmetro e de alguns metros a centenas de metros em altura. Os exploradores de cavernas denominam estas estruturas genericamente de abismos. Deve-se salientar, que muitas cavernas com desníveis importantes e classificadas pelos exploradores como abismos, não são condutos verticais, mas sim, trechos de canyons vadosos.

A associação de vários condutos verticais superpostos e separados por patamares horizontais ou inclinados, formando um padrão escalonado de poços, constitui as cavernas com o maior desnível da região estudada. Como exemplo, cita-se o abismo do Juvenal

(localizado sobre a rota de fluxo do sistema Pérolas-Santana), com cerca de 250m de desnível total e vários condutos verticais superpostos, com alturas entre 15 e 40m e diâmetros entre 0.5 e 10m.

A ocorrência de condutos verticais é vinculada à sistemas eficientes de drenagem subterrânea. Segundo Brucker, Hess e White (1972), os condutos verticais exercem a função de transmitir a água de escoamento superficial ou de aquíferos suspensos, através da seqüência carbonática em direção ao nível de base do lençol freático. Sua ampliação se dá por meio do fluxo livre de água vadosa, insaturada em carbonato, concentrada sobre as paredes dos condutos.

Ford e Williams (1989) classificam estas cavernas de invasões vadosas, pois, na maioria dos casos, estas se formam pela absorção de rios superficiais pela rocha carbonática previamente drenada por fases anteriores de espeleogênese.

Como exemplos mapeados de condutos verticais citam-se os abismos das cavernas Ouro Grosso, Santana e Água Suja (fig 4.10). Todos representam córregos associados a um nível superior de cavernas, o qual foi conectado à rota mais profunda de circulação cárstica, através do desenvolvimento de condutos verticalizados que interceptaram os condutos profundos.

Na caverna de Santana, trata-se de um paleo-afluente que corria no nível do salão São Paulo, a cerca de 30m acima do rio atual, que interceptou o rio subterrâneo principal, através do popularmente chamado poço São Jorge (fig 4.10c), o qual representa a terminação deste antigo afluente superior, através de um conduto vertical.

No sistema Água Suja, os condutos verticais representam a conexão entre o nível superior de condutos da caverna Vargem Grande e o ramo principal do rio subterrâneo da caverna Água Suja (fig 4.10a). Neste caso, formou-se um conduto vertical com 90m de altura.

No sistema Ouro Grosso identificaram-se três condutos verticais principais alinhados sobre o conduto inferior do rio (fig 4.10b). Destes, o abismo localizado na extremidade mais à montante da caverna, ainda apresenta um córrego ativo, o qual forma uma cachoeira junto ao abismo. Este alinhamento de abismos coincide com um vale seco em superfície, onde os dois poços mais à jusante representam antigos pontos de absorção deste paleo-rio, hoje restrito a um trecho ativo curto, com o sumidouro principal conectado ao terceiro abismo com cachoeira.

Os condutos verticais acima descritos possuem seção típica de paredes divergentes em direção à base, em forma de garrações. Atribui-se esta forma à característica de fluxo livre em regime supercrítico da lâmina de água agressiva, a qual em queda livre, gera turbilhonamento próximo à base, causando assim, alargamento maior na base.

Outra categoria de condutos verticais é aquela cuja seção no plano vertical exhibe paredes convergentes em direção à base. O fundo é normalmente afunilado e intransponível. Caracterizam fundos, e às vezes, encostas de depressões poligonais. Frequentemente apresentam-se parcialmente revestidos ou preenchidos por material siltico-argiloso,

Figura 4.10 - Exemplos de condutos verticais. A- Caverna Água Suja. B- Caverna Ouro Grosso. C- Caverna Santana.

interpretado como sendo o acúmulo do resíduo insolúvel da dissolução do metacalcário. A presença deste acúmulo de material residual evidencia uma eficiência menor destas rotas de drenagem vadosa, quando comparadas aos condutos verticais anteriormente descritos. Associa-se, portanto, estes condutos verticais afunilados, a rotas de drenagem vadosa conectadas indiretamente (tributários laterais) aos condutos principais de drenagem cárstica.

Alargamento freático

Entende-se por alargamento freático a geração de condutos por dissolução na zona saturada. Segundo Bretz (1942), Bögli (1964) e White e Deike (1989), a geometria característica produzida por fluxo de água em condutos de pressão (*pipe flow*) é de tubos com seções transversais geralmente elípticas e paredes lisas, suavemente onduladas. As dimensões destes condutos freáticos são muito variadas, com diâmetros desde alguns milímetros até 15 metros e comprimentos quilométricos, conforme é descrito por White e Deike (1989).

Nas cavernas estudadas, as formas freáticas estão restritas ao topo de entalhamentos vadosos e a trechos isolados onde condutos freáticos foram preservados do entrincheiramento e da incasão.

Na caverna Santana, ao longo da galeria do Ronco (antigo afluente do flanco direito da caverna) observa-se um trecho parcialmente preservado de conduto freático, por cerca de 80m de comprimento (seções 13 e 14, fig 4.6). Possui seção transversal elíptica com eixo maior paralelo ao acamamento. Ao longo do rio atual nota-se condutos elípticos somente onde a altura do teto diminui para 2 a 3 metros, como nas seções 11a e 12 (fig 4.6). Durante níveis altos do rio, estes trechos ainda hoje passam por períodos freáticos.

Na caverna Laje Branca nota-se um testemunho de conduto freático ao longo do teto de quase todo trecho de abatimento (seção 2, fig 4.7). Acompanhando o brusco estreitamento, logo após o salão de abatimento, observa-se o testemunho mais didático de conduto freático das cavernas estudadas (seções 4 a 7, fig 4.7). Possui seção elíptica com eixo maior predominantemente paralelo a um falhamento inverso.

De modo geral, a morfologia freática é pouco observada nos sistemas de cavernas do Alto Ribeira, devido à predominância de entalhamentos vadosos e abatimentos.

Formas geradas pela incasão

Incasão é o processo de modificação ou substituição de formas freáticas ou vadosas pela paisagem de colapso subterrâneo (Ford e Williams, 1989). A causa do abatimento de blocos é a ruptura mecânica da rocha, principalmente ao longo de discontinuidades. As formas geradas são salões e galerias com paredes e tetos escalonados e pilhas de blocos angulosos na base (fig 4.5). O caráter escalonado resulta das faces de descolamento dos blocos, ora predominando ao longo de fraturas com os planos de acamamento oblíquos ou vice versa. Os maiores vãos livres e volumes subterrâneos são decorrentes da incasão (Gilli, 1986).

Nas cavernas estudadas, a paisagem de colapso é bastante frequente. Observou-se que a frequência de trechos dominados pela incasão é crescente no sentido à montante ao longo dos sistemas de cavernas, ou seja, nas proximidades dos sumidouros, o volume de cavernamento é maior e preponderantemente com formas de abatimento, como por exemplo, na caverna Pérolas. O colapso junto aos sumidouros chega a ser tão intenso, que impede a travessia do explorador entre o final dos condutos preservados e o sumidouro do rio externo.

Notou-se também, que salões de abatimento ocorrem preferencialmente na seguinte geometria de condutos: junção entre tributários (tanto lateralmente como também na invasão de afluentes superiores), presença de condutos superpostos, entalhamento vadoso lateral ou condutos meandantes.

Os maiores volumes criados por abatimento subterrâneo foram observados nas cavernas Água Suja e Laje Branca, respectivamente com cerca de 280×10^3 e 170×10^3 m³ (medidas obtidas através da integração de seções transversais sobre a planta em escala 1:400). No primeiro exemplo, o salão de abatimento está associado a um afluente superior (fig 4.11). A geração do salão é interpretada como sendo consequência do desmoronamento das paredes de condutos verticais sobre o canyon vadoso entalhado pelo rio principal. Na caverna Laje Branca, a ampla galeria de abatimento (seções 1 a 3, fig 4.7) é interpretada como sendo produto da instabilização mecânica gerada no calcário em função do intenso entalhamento vadoso lateral.

Como exemplo de incasão associada à superposição de condutos cita-se o salão Takeopa, na caverna Santana (seção 15, fig 4.6).

Níveis de cavernas

Em função de um rebaixamento rápido do nível de base, com o tempo, normalmente ocorre a relocação, para cotas inferiores, dos pontos de insurgência e (ou) ressurgência de sistemas de cavernas. Os condutos primários associados a estes sistemas, sofrem entalhamento vadoso ou são abandonados pela circulação de água freática, quando são substituídos por condutos gerados junto ou abaixo do nível de base rebaixado (Kastning, 1983 e 1984 e Palmer, 1987). Formam-se, portanto, níveis de cavernas superpostos, os quais evidenciam fases diferentes de abertura de condutos. Sistemas de cavernas com níveis de condutos inativos (drenados) sobre condutos ativos, são classificados de multifásicos, segundo Ford e Ewers (1978).

Na área estudada, identificaram-se as seguintes evidências de sistemas multifásicos:

- Paleo-sumidouros e paleo-ressurgências em cotas entre 20 e 40 metros acima dos pontos atuais. Como exemplo, cita-se o sistema Pérolas Santana (fig 4.12).

- Condutos inativos a cerca de 20 a 40 metros acima dos condutos associados ao nível de base atual das cavernas. Esta característica é observada em trechos isolados ao longo dos sistemas investigados (fig 4.11, seção A), pois o entalhamento vadoso predomina sobre condutos superpostos preservados

Figura 4.11 - Formas geradas pela incisão na caverna Água Suja.

Figura 4.12 - Características de sistemas multifásicos observadas no sistema Pérolas-Santana.

4.3.2.3 Condicionamento estrutural e hidráulico da morfologia subterrânea

Estudos detalhados sobre as rotas de fluxo em calcários maciços, estratificados e intensamente carstificados, mostraram que, praticamente todos condutos observados desenvolveram-se ao longo de estruturas como planos de estratificação, fraturas ou falhas (Worthington, 1991). Os primeiros estudos geológicos de cavernas consideraram cada conduto cárstico como sendo guiado somente por uma única descontinuidade (p.ex., Ford, 1965 e 1971b; Ewers, 1972 e Powell, 1976), mas, posteriormente, a análise estrutural meticulosa sobre sistemas de cavernas, como os trabalhos de Jameson (1981 e 1985), Lauritzen et. al. (1985) e Deike (1989), evidenciaram que os condutos freqüentemente formam-se ao longo da intersecção de descontinuidades.

Deike e White (1969) e Worthington (1991) relacionam a não linearidade e os graus de sinuosidade de passagens fluviais subterrâneas ao padrão estrutural (fraturamento e mergulho da estratificação) da rocha encaixante da caverna. Worthington (1991), examinando o padrão de 53 rotas de fluxo subterrâneo, de diferentes áreas cársticas, mostrou que o grau de sinuosidade é resultante da combinação entre a direção do gradiente hidráulico e a orientação do sistema de fraturamento da rocha. A coincidência entre as direções do padrão de fraturamento e o gradiente hidráulico produz cavernas retilíneas entre os pontos de insurgência e ressurgência da água subterrânea. Quanto maior o ângulo entre as direções do fraturamento e o gradiente hidráulico, maior será a sinuosidade e a largura da rota de fluxo, pois os condutos tenderão a seguir o gradiente hidráulico, meandrando ao longo deste, aproveitando as descontinuidades disponíveis (fig 4.13). Num modelo teórico simplificado de fraturas verticais e ortogonais entre si, sendo cortadas por um gradiente hidráulico diagonal, Worthington (op cit.), mostrou que a sinuosidade (S) da rota de fluxo é expressa pela equação $S = \cos\alpha + \sin\alpha$, onde α é o ângulo agudo entre a direção do gradiente e as fraturas (fig 4.13).

Nas cavernas estudadas, identificou-se uma nítida correlação entre o estilo planimétrico destas e a estrutura do metacarbonato encaixante. Como exemplos da influência dos padrões de dobramento e fraturamento sobre a geometria de condutos, selecionou-se as cavernas Santana, Laje Branca e Areias, as quais representam uma amostragem da variedade de cavernas da área e das quais obteve-se um levantamento estrutural detalhado.

As cavernas Santana e Laje Branca, componentes do sistema Pérolas-Santana (anexo 4.3), desenvolvem-se na área carbonática Furnas-Santana, caracterizada por um homoclinal de mergulhos altos a moderados para NW, enquanto o sistema Areias insere-se no flanco sudeste da sinforma do Lajeado, área carbonática Lajeado-Bombas (as áreas carbonáticas são descritas no capítulo 3).

O metacarbonato encaixante da **caverna Santana** possui estratificação com intensa ritmicidade, marcada pela alternância de estratos carbonáticos, carbonato-pelíticos e pelíticos. As espessuras entre camadas diferentes variam de alguns centímetros a decímetros. A espessura de uma mesma camada é pouco variável, formando estratos com comprimentos decamétricos. A atitude do acamamento ao longo da caverna possui direção

Figura 4.13 - Controle da sinuosidade de rotas de condutos pela relação angular (α) entre a direção do padrão de descontinuidades (fraturas e/ou planos de estratificação) e o gradiente hidráulico. Para simplificação da análise, utilizou-se um padrão ortogonal de descontinuidades verticais. Conceito adaptado de Worthington (1991).

e mergulho predominante em torno de N60E 60NW. Mergulhos para SE são locais, em função da presença de dobras menores abertas a fechadas, genericamente coaxiais à direção do homoclinal (fig 4.14a). A variação de atitude é baixa, expressa pelos coeficientes de variação desta (tab 4.5). O fraturamento ao longo da caverna é intenso, com diversos conjuntos de juntas e falhas, tanto subverticais, como de baixo mergulho, transversais e subparalelos ao acamamento, conforme foi descrito na caracterização estrutural da área Furnas-Santana, item 3.4.1, e anexo 3.1.

As direções preferenciais de desenvolvimento da caverna Santana variam entre N40-80E, com concentração máxima de 24% dos cerca de 6km de passagens, entre N50-60E, segundo o histograma de direções de condutos (fig 4.14B). A partir deste histograma, do mapa estrutural da caverna (fig 4.14A) e das medidas de estatificação (fig 4.14C), nota-se que esta possui desenvolvimento preferencial grosseiramente concordante ao traço do

acamamento, com segmentos menores sistematicamente oblíquos a este, orientados a N10-20E e N50-70W.

Caverna	Atitude média do acamamento		Coeficiente de variação	
	Direção	Mergulho	Direção	Mergulho
Santana	N58E (124)	60 NW	23%	26%
Areias	N41E (77)	38 NE ou SW	53%	49%
	N50W (34)	33 NE ou SW	45%	53%

Tabela 4.5 - Variação do acamamento nas cavernas de Santana e Areias (de cima e de baixo). Entre parênteses são indicados os números de medidas.

Observando a caverna em maior detalhe, nota-se que os condutos principais são subdivididos em segmentos retilíneos, onde trechos mais longos são paralelos à direção do acamamento e outros, mais curtos, são levemente oblíquos a este, interceptando as camadas contra o sentido de mergulho destas. Esta característica é mais marcante nos condutos tributários, onde os trechos longos, subparalelos ao acamamento, são alternados por segmentos fortemente oblíquos às camadas, inclusive com direções de fluxo contrárias ao gradiente hidráulico geral do sistema de drenagem subterrânea (fig 4.14A). O mapeamento estrutural mostrou que estes segmentos menores, fortemente oblíquos ao acamamento, coincidem com falhas direcionais, juntas de cisalhamento e preenchidas, com direções entre N5-20E e N50-70W e altos mergulhos.

Conclui-se, portanto, que entre o grande número e variedade de descontinuidades presentes (conforme descrito no item 3.4.1 e visualizado na fig 4.14D), as estruturas mais favoráveis ao desenvolvimento de permeabilidade secundária, ao longo da rocha encaixante da caverna Santana, são os planos de estratificação com alto mergulho e os conjuntos de juntas de cisalhamento transversais ao acamamento. Estas juntas, incluindo falhas, correspondem ao sistema de juntas de cisalhamento em relação ao esforço máximo de compressão, responsável pelo dobramento da seqüência carbonática-pelítica. A permeabilidade maior do acamamento, é atribuída também, ao fenômeno de deslizamento flexural entre bancos, associado ao dobramento. As evidências deste processo observadas na área, são o estriamento dos planos de acamamento e a formação de um filme submilimétrico de material moído entre certos estratos, o que acaba aumentando a permeabilidade inicial sobre estas superfícies.

Para explicar a baixa sinuosidade e o padrão retilíneo desta caverna, recorreu-se à combinação entre as descontinuidades mais permeáveis e o gradiente hidráulico. Considerando que este foi praticamente constante durante a evolução dos condutos, com sentido geral entre N60-70E, em relação ao nível de base do rio Betari, o ângulo agudo médio (α) entre este e a direção geral do acamamento de alto mergulho é de 5 a 10°, com trechos isolados de até 20°. Utilizando o modelo de condicionamento hidráulico e estrutural de condutos (seg. Worthington, 1991), a sinuosidade calculada por $\cos\alpha + \sin\alpha$ é de

Figura 4.14 - Geologia estrutural da caverna Santana. A- Planta da caverna. B- Histograma de direções do desenvolvimento da caverna. C e D- Projeção estereográfica de estruturas planares.

1,08 (5°), 1,15 (10°) e 1,28 (20°). Com α entre 5 e 10° , os valores calculados são semelhantes à sinuosidade medida, mostrando que a tendência teórica em grande parte é seguida pelo conduto principal da caverna, considerando somente o acamamento como descontinuidade principal no condicionamento da caverna. Examinando testemunhos do topo de *canyons* vadosos, confirmou-se que a abertura inicial de condutos freáticos é condicionada pela intersecção entre o acamamento e juntas simples longas e falhamentos, com direções entre N50-70E e mergulhos moderados a altos para NW e SE. Define-se portanto, que o padrão retilíneo do conduto principal é condicionado pelo baixo ângulo entre estas linhas de intersecção e o sentido do gradiente hidráulico.

O padrão anguloso, notável principalmente nos condutos tributários, também é uma consequência da combinação entre gradiente e estrutura, mas em arranjo diferente. Considerando que os condutos tributários foram gerados após a instalação de um conduto central principal, estes tributários são associados a um gradiente hidráulico local, dirigido diagonalmente e com sentido para o conduto principal, em função do vale de rebaixamento do lençol freático, desenvolvido sobre o conduto principal devido à vazão maior do aquífero sobre a linha de permeabilidade maior, que é o próprio conduto principal (fig 4.15). Com este gradiente local, orientado a NW-SE, a tendência da rota de fluxo será a de sair do acamamento e seguir outras estruturas permeáveis sobre esta direção. Mas, o padrão planimétrico destes afluentes (fig 4.14a e 4.15), mostra que, grande parte dos condutos tributários continua sendo guiada pelo acamamento, e que somente alguns segmentos destes sofrem brusco desvio, entrando em juntas e falhas. Nestes desvios, freqüentemente são estabelecidos padrões de condutos em Z e S, onde trechos desenvolvem-se à montante do sistema, contrários ao gradiente hidráulico geral (fig 4.15).

Figura 4.15 - Esquema interpretativo do condicionamento estrutural-hidráulico do padrão anguloso de ramos tributários da caverna Santana.

Figura 4.16 - Inflexões agudas na rota de fluxo condicionadas pela intersecção acamamento-falhas, observadas na caverna Santana. Esquemas A e B em planta.

Propõe-se a seguinte interpretação para a geometria acima descrita. Apesar do gradiente local quase ortogonal ao acamamento, parte dos condutos tributários continuam seguindo-o, devido à presença de estratos pelíticos, os quais represam a água de percolação, forçando a abertura de condutos ao longo da interface camada solúvel e insolúvel. Assim que este segmento de represamento é seccionado por uma estrutura permeável (falhamento), a rota de fluxo inicia ou volta à tendência de meandrar pelo gradiente local NW-SE, acompanhando as estruturas disponíveis em estratos solúveis, até atingir uma nova frente impermeável e insolúvel ao longo do acamamento. Desta maneira, geram-se trechos altamente sinuosos e angulosos, onde os condutos alternadamente acompanham falhas e segmentos de acamamento.

A intersecção das falhas e juntas de cisalhamento a N10-20E e N60-70W (observadas na caverna) com o acamamento, gera lineações coincidentes com os segmentos anômalos da caverna, contrários ao sentido geral do fluxo de água (fig 4.16). Interpreta-se

estes, como sendo condutos, levemente ascendentes, gerados ao longo de linhas de maior permeabilidade inicial (relativamente às descontinuidades vizinhas) devido à intersecção entre falhas e planos de estratificação.

A **caverna Laje Branca** representa um tributário do sistema Pérolas-Santana, localizado a sudoeste da caverna Santana (anexo 4.3). Com desenvolvimento de cerca de 900m, apresenta alinhamento preferencial na direção N70-80E (fig. 4.17A e D). No contexto das direções predominantes entre N40-60E do sistema Pérolas Santana, a caverna Laje Branca representa um alinhamento de condutos extensos em direção anômala. O mapeamento geológico, mostrou que, ao contrário da maioria dos demais condutos deste sistema, a caverna Laje Branca não acompanha a direção do acamamento, mas sim, é paralela a uma falha inversa de atitude geral N75E 70-80SE (fig 4.17A). Detectou-se esta falha em vários pontos do teto da ampla galeria de abatimento e ao longo de quase todo conduto freático sobre a fenda vadosa no final da caverna. Caracteriza-se por uma zona de cisalhamento, com até 1m de espessura, onde observa-se um bandamento composicional milimétrico (foliação cataclástica). O movimento é expresso por dobras de arrasto do acamamento nas paredes adjacentes a falha.

A intersecção desta zona de cisalhamento com a atitude geral da estratificação, ao longo do conduto freático, preservado sobre o *canyon* vadoso do final da caverna, produz uma lineação, a qual é coincidente com o eixo longitudinal deste conduto elíptico, conforme é representado na figura 4.17C. Coincide, também, com o alinhamento geral da caverna.

Interpreta-se, portanto, que o padrão retilíneo e a baixa sinuosidade (1.01) desta caverna, sejam um produto, do forte condicionamento estrutural da rota de fluxo da água subterrânea, pela intersecção da zona de cisalhamento com o acamamento.

Com relação ao gradiente hidráulico, esta caverna é totalmente contrária ao gradiente geral da área. Mas, por outro lado, há que se considerar, que em função da linha de alta permeabilidade inicial, desenvolveu-se um vale de rebaixamento do lençol freático sobre esta linha, criando um gradiente local, necessariamente, sub-paralelo à direção da intersecção.

A **caverna Areias** (englobando as cavernas Areias de Cima e de Baixo, separadas por uma dolina de colapso, anexo 4.3) representa o padrão planimétrico mais sinuoso (S entre 1.29 e 1.40) e curvilíneo da área estudada. Está encaixada em metacalcários com estratos carbonáticos de espessura decimétrica a métrica. Localmente ocorrem intercalações, onde a espessura diminui e a quantidade de estratos pelito-carbonáticos aumenta. De forma geral, contrasta com os metacarbonatos Furnas-Santana pela menor frequência de alternância entre estratos pelíticos e carbonáticos e pela espessura maior dos estratos carbonáticos. A continuidade lateral das camadas também é marcante, podendo ser observada por dezenas de metros.

A atitude do acamamento, ao longo da caverna, possui direções predominantes no quadrante NE, com valor médio de N41E e secundariamente no quadrante NW, com valor médio de N50W. Tanto as direções como os mergulhos da estratificação são bastante variáveis, conforme os altos coeficientes de variação destas medidas, expressos na tabela

Figura 4.17 - Geologia estrutural da caverna Lagoa Branca. A- Planta da caverna. B e C- Diagramas de projeção estereográfica. D- Histograma de direções do desenvolvimento total da caverna.

4.5. Em contraste com a caverna Santana, o mergulho da rocha encaixante da caverna Areias é moderado (média de 33 a 38°, variando de quadrante). Identificou-se dois domínios estruturais de dobramento do acamamento ao longo da caverna. No setor entre a extremidade a montante da caverna (ponto a, fig 4.18A) e a junção com o ramo direito da caverna Areias de Cima (ponto b), o acamamento apresenta uma série de anticlinais e sinclinais abertos, com eixos de direção aproximada N20W. Do ponto b até a extremidade à jusante, o padrão de dobramento é de um homoclinal com mergulhos moderados e variados para NW e direções suavemente onduladas, indicando um dobramento superposto com eixo genérico a NW.

O fraturamento é intenso e variado, semelhante aos calcários Furnas-Santana, conforme descrição do padrão de fraturamento da área Lajeado-Bombas no item 3.4.1 e o estereograma de juntas e falhas medidas na caverna (fig 4.18D).

A alta sinuosidade desta caverna, é refletida também, pela variedade de direções de condutos ao longo dos seus 4.5km de desenvolvimento (fig 4.18C). Conforme o histograma de direções da caverna, 13,5% dos condutos alinham-se entre N30-40E, seguidos por 11,9% entre N70-80E, 9% em N10-20E e 7,5% a N60-70W. Concentrações menores distribuem-se tanto no quadrante NE como NW.

Percorrendo a caverna e observando seu mapa estrutural (fig 4.18A), nota-se que ela pouco acompanha a direção do acamamento. Quantitativamente, cerca de 25% dos condutos seguem a direção do acamamento. O restante dos condutos é formado por segmentos oblíquos. O mapeamento geológico evidenciou que os segmentos transversais ao acamamento, na sua grande maioria, são subparalelos à traços de falhamentos e juntas simples longas, de alto mergulho. Em vários trechos isolados, onde se teve acesso à condutos freáticos preservados, notou-se que estes acompanham linhas de intersecção entre fraturas e planos de acamamento. O entalhamento vadoso posterior, segue tanto os planos de fratura, como de acamamento, formando *canyons* escalonados, onde pouca informação é obtida sobre o início de abertura da caverna.

O alinhamento de condutos a N30-50E é controlado pelos conjuntos de juntas simples N40-45E (subverticais), falhas direcionais a indeterminadas, com atitude N50E, de alto mergulho e, subordinadamente, por planos de acamamento. Um dos segmentos mais longos, em torno desta direção, é observado no trecho mediano da caverna Areias de Cima (entre os pontos c e d, fig 4.18A). É constituído por *canyons* levemente meandantes. Nota-se no mapa que possui tendência retilínea e oblíqua aos traços da estratificação. O mapeamento mostrou que é paralelo à juntas simples longas, falhamentos com zonas de cisalhamento centrimétricas e juntas preenchidas. Atribui-se este alinhamento à rotas de maior permeabilidade inicial, com ângulos de 20 a 30° com a direção geral do gradiente hidráulico do sistema (orientado a N60-70E), condicionadas pela intersecção de juntas simples longas e falhas com o acamamento. Estas intersecções geraram condutos iniciais, grosseiramente retilíneos e subparalelos ao sentido de mergulho das camadas. O segundo maior trecho com direção predominante entre N30-40E, localiza-se no início da caverna Areias de Baixo (b-g, fig 4.18A). Neste setor, os condutos assumem direções subparalelas

Figura 4.18 - Geologia estrutural da caverna Areias. A- Planta da caverna. B e D- Projeção estereográfica de estruturas planares. C- Histograma de direções do desenvolvimento total da caverna.

ao traço do acamamento. Interpreta-se que este setor é condicionado por linhas de maior permeabilidade inicial acompanhando traços de intersecção entre o acamamento de baixo mergulho a as juntas longas e falhas subparalelas à direção do acamamento, mas de alto mergulho.

A segunda orientação preferencial de condutos a N70-80E é predominante no segmento final da caverna, junto à extremidade mais a jusante desta (e-f, fig 4.18A). O mapeamento mostrou que este setor é principalmente controlado por juntas simples longas a N70E e falhas indeterminadas entre N60-70E. O padrão morfológico dominante é de *canyons* meandantes, onde segmentos curtos acompanham grosseiramente a direção da estratificação e fraturas a N50-60W, alternados por trechos mais longos controlados pelas juntas e falhas a N60-70E. Este é um segmento da caverna, com cerca de 20° em relação ao gradiente hidráulico geral (N60-70E), onde os condutos tendem a acompanhar as juntas e falhas acima citadas, de baixo ângulo com o gradiente, sendo localmente desviados por rotas de acamamento e juntas do conjunto N50-60W.

A concentração de condutos a N60-70W é associada aos conjuntos de juntas simples N60W e falhas indeterminadas em torno de N50-70W, ambos com mergulhos de 70 a 85°, para NE e SW. Um exemplo de segmento da caverna nesta direção, é observado junto à extremidade mais a montante da caverna Areias de Cima (trecho a-h, fig 4.18a). Neste segmento o desenvolvimento de condutos acompanhou estas juntas e falhas, em posição quase ortogonal ao alinhamento geral do gradiente hidráulico, apesar da disponibilidade de planos de acamamento em posição de baixo ângulo com este. Isto vem evidenciar a alta permeabilidade inicial destas juntas e falhas, a ponto de causar desvios importantes da rota de fluxo, cuja tendência teórica seria de seguir discontinuidades em baixo ângulo com a direção do gradiente hidráulico, como por exemplo, neste caso, os planos de estratificação.

A direção de condutos a N10-20E acompanha falhas inversas e direcionais, assim como, fraturas simples, condicionando rotas oblíquas ao gradiente hidráulico geral, em situação semelhante à descrição e interpretação acima.

Conclui-se, portanto, que a caverna Areias é principalmente guiada pela intersecção entre estruturas disruptivas longas (juntas simples e falhas) e superfícies de acamamento. Localmente a rota de fluxo instalou-se em falhas ou planos de acamamento, não havendo evidências claras do condicionamento inicial destas rotas menores por linhas de intersecção

Devido ao baixo mergulho da estratificação e à alta variabilidade das atitudes desta, em comparação com a caverna Santana, as linhas de intersecção de juntas e falhas sobre os planos de acamamento, estabeleceram rotas de fluxo, as quais predominantemente são muito discordantes das direções do acamamento. Na caverna Santana, ao contrário, devido ao alto mergulho do acamamento, as linhas de intersecção de juntas e falhas subverticais sobre o acamamento, produziram rotas de fluxo não muito discordantes da direção do acamamento, imprimindo um padrão planimétrico final dos condutos principais da caverna, subparalelos a levemente oblíquos aos traços do acamamento.

Analisando a sinuosidade da rota de fluxo principal da caverna Areias, em função da combinação entre a orientação do padrão estrutural dos metacalcários e a direção geral do gradiente hidráulico, obteve-se o seguinte resultado. Considerando que os conjuntos de juntas simples e falhas orientadas a N60-70W, N10-20E, N30-50E e N60-80E são as discontinuidades mais favoráveis ao desenvolvimento de permeabilidade secundária, conforme representado no esquema da fig. 4.19, obtém-se ângulos agudos entre estas linhas e o gradiente hidráulico de 20°, 40° e 60°. As sinuosidades teóricas calculadas com estes ângulos (segundo modelo de Worthington, 1991) são de 1,28, 1,40 e 1,36, respectivamente. Estes valores são muito semelhantes à sinuosidade medida entre 1.29 e 1.40. O padrão planimétrico sinuoso da caverna Areias, é portanto, condicionado pelo caráter meandrante da rota de fluxo, acompanhando principalmente as juntas e falhas, acima citadas, e tendendo a seguir o sentido N60-70E, estabelecido pelo gradiente hidráulico ao longo deste sistema de cavernas.

Tanto na caverna Santana como Areias, o baixo índice de condutos desenvolvidos a NW-SE, apesar da alta frequência de juntas neste alinhamento (conforme os estereogramas das figs 3.24 e 3.25 e os histogramas de fotolineamentos, fig 3.27) é atribuído à posição ortogonal destas discontinuidades em relação ao gradiente hidráulico geral destas áreas.

Figura 4.19 - Caráter meandrante da caverna Areias em torno do gradiente hidráulico, seguindo falhas e fraturas longas medidas. Segmento a-b indicado na figura 4.18A. Vide comentário no texto.

4.3.3 Espeleogênese na área de estudo

Conforme esboçado no item 4.3.1, a espeleogênese consiste das fases de pré-iniciação, iniciação e desenvolvimento.

4.3.3.1 Fase de pré-iniciação

Na região estudada, esta fase corresponde à implantação do sistema de fraturamento e falhamento, associado à deformação e metamorfismo da seqüência pelítico-carbonática do Subgrupo Lajeado, durante o ciclo termo-tectônico Brasileiro, do final do Proterozóico Superior (Campanha, 1991). Um segundo evento importante de geração e reativação de descontinuidades corresponde ao arqueamento crustal e injeção de diques de diabásio, durante a reativação tectônica do Mesozóico, conforme detalhado no capítulo 2.

Com o soerguimento da seqüência metassedimentar e gradativa erosão da pilha de rochas sobrejacente aos metacalcários, estes passam por um processo de expansão em resposta ao alívio de carga litostática. Neste processo, as descontinuidades anteriormente seladas, sofrem uma pequena abertura. Esta abertura inicial é estimada entre 10 μ m a 0.2mm (Dreybrodt, 1981a e Palmer, 1991). Motyka e Wilk (1984), apud Dreybrodt (1981a), mediram aberturas iniciais de fraturas em calcários Triássicos da Polônia até profundidades de 150m. A abertura mais freqüente encontrada foi de 0.2mm, com ocorrências raras de até 0.5mm.

A fase de pré-iniciação culmina com a instalação de um aquífero fraturado na rocha carbonática, com lençol freático (quando existente) ou nível piezométrico raso. Com a exposição parcial ou total da rocha carbonática, é freqüente o desenvolvimento de sistemas fluviais na superfície, em função da baixa permeabilidade inicial e conseqüente baixa capacidade de absorção e transmissão de água meteórica. A paleodrenagem fluvial, interpretada a partir do alinhamento de depressões poligonais e testemunhos de talwegues, representa este estágio na área estudada.

4.3.3.2 Fase de iniciação

A fase de iniciação instala-se gradativamente com o início da carstificação, expressa subterraneamente pela iniciação de proto-cavernas em ambiente freático (Lowe, 1992). O motor deste processo é o estabelecimento de um potencial hidráulico entre pontos de injeção e saída da água de percolação ao longo de rotas pré-estabelecidas pela trama de descontinuidades (Ford e Ewers, 1978). O potencial hidráulico, por sua vez, é conseqüência de desníveis formados pelo entalhamento da superfície pela drenagem fluvial. Na área estudada, o potencial hidráulico foi estabelecido pelo entalhamento do rio Betari, o qual representa, até o presente, o nível de base principal em relação à circulação de água pelos metacalcários, conforme ilustrado pela figura 4.1 e anexo 4.2.

A fase de iniciação é evidenciada através dos testemunhos de proto-condutos preservados no topo de entalhamentos vadosos. Quando é possível acessar estes pontos como, por exemplo na caverna Santana, conforme é representado na figura 4.20, observou-se que os proto-condutos alinham-se segundo intersecções entre juntas simples ou falhas e planos de acamamento. Estes condutos iniciais possuem seções grosseiramente elípticas, com diâmetro mínimo entre 1 a 5cm e máximo de 10cm. O eixo maior das seções

transversais destes condutos, normalmente é sub-paralelo à superfície de acamamento. Na caverna Santana, os proto-condutos ocorrem preferencialmente na intersecção do acamamento com juntas simples longas de atitude N50-60E, subverticais e falhas N60-80E 50-70SE (fig 4.20). Frequentemente estes proto-condutos são ramificados, onde os segmentos principais ocorrem ao longo das intersecções acima citadas e os ramos secundários, acompanham em parte, a intersecção com juntas oblíquas a ortogonais à direção do acamamento, interconectando os condutos principais, no caso observado, em número de dois, subparalelos (fig 4.20). Os ramos secundários, com diâmetro variável em torno de alguns centímetros, orientam-se aproximadamente segundo a direção de mergulho das camadas. Formam um padrão de canaliculos sinuosos e entrelaçados, sobre o plano de acamamento. São classificados como condutos de anastomose, os quais, segundo Ford (1971b) e Ewers (1982), caracterizam condutos subsidiários aos principais, contemporâneos a estes e formados em ambiente freático. Porções dos condutos iniciais principais, também apresentam canaliculos anastomosados, paralelos as suas laterais.

Outra feição característica, observada ao longo dos condutos iniciais, é representada por condutos cônicos, com eixo vertical coincidente à intersecção das fraturas subverticais e de alto ângulo, altura entre alguns decímetros até 1m e base sobre o conduto inicial principal (fig 4.20). Estas formas, denominadas aqui de cones de dissolução, correspondem à aberturas freáticas do tipo *blind pockets* de Bretz (1942), *Mischungskorrosionkolke*, de Bögli (1978) ou *solution pockets* de Ford e Williams (1989). Cones de dissolução semelhantes a estes, ocorrem também, nas paredes e tetos de condutos freáticos maiores, conforme será descrito na fase de desenvolvimento.

A profundidade das proto-cavernas, acima descritas, em relação à superfície atual dos metacalcários, varia entre 350 e 50m. As distâncias horizontais, em relação aos pontos de injeção de águas alogênicas, variam entre 500 e 2000m (fig 4.21).

Os primeiros estudos quantitativos sobre o mecanismo de dissolução de calcários maciços e fraturados, realizados por Weyl (1958), mostraram que, águas meteóricas, ao percolarem juntas com abertura inicial de 100µm, atingem a saturação após alguns centímetros de penetração na rocha. Como explicar então a presença de condutos de dissolução com centenas de metros de profundidade no maciço carbonático?

White (1977) e Dreybrodt (1981a), apud Dreybrodt (1981b), recalcularam a distância de saturação de águas de percolação para tentar explicar os primeiros estágios de carstificação subterrânea, com base em dados experimentais de Plummer e Wigley (1976) e Plummer et. al. (1978 e 1979) da cinética de dissolução de CaCO_3 em sistemas com CO_2 e H_2O . Obtiveram distâncias de somente alguns metros de percolação até a saturação da solução, o que não satisfaz a questão acima.

Esta questão clássica da carstificação foi abordada engenhosamente por Bögli (1964 e 1978), Wigley e Plummer (1976) e Dreybrodt (1981b), através do conceito de corrosão de mistura. Segundo Bögli (op. cit.), a geometria de proto-cavernas, acima descrita (fig 4.20), seria uma evidência do fenômeno de corrosão de mistura, pois, além das linhas capilares, formadas pelas intersecções fraturas-acamamento proporcionarem rotas de maior

Figura 4.20 - Características morfológicas e estruturais de proto-cavernas observadas na caverna Santana.

A- seção transversal indicando os pontos de observação, localizada a cerca de 300m a montante da ressurgência.

B- vista em planta da geometria de condutos de iniciação e canalículos de anastomose, observados no teto de conduto freático parcialmente preservado.

C- esquema tridimensional da relação entre proto-caverna, canalículos de anastomose e cone de dissolução, preservados no teto do ponto observado. As setas indicam o fluxo de água de percolação ao longo de discontinuidades.

eficiência hidráulica (Palmer, 1991), estas também, podem representar linhas de mistura de soluções percolantes com diferentes estados de saturação em calcita.

No exemplo em discussão, como o conduto principal de iniciação desenvolveu-se sobre o acamamento, há que se considerar, que as fraturas subverticais conduziram águas de percolação de natureza diferente da água conduzida pelo acamamento. No encontro

Figura 4.21 - Profundidade de condutos da caverna Santana em relação à superfície. (Seções localizadas na planta da caverna no lado inferior direito)

destas águas, a mistura teria proporcionada uma solução agressiva, a qual alargou o capilar, no sentido de escoamento da água. Os cones de dissolução seriam condicionados pela intersecção de duas fraturas subverticais sobre o plano de acamamento, onde, devido ao encontro de três descontinuidades, haverá um volume maior de águas em mistura e portanto maior chance de corrosão da rocha, formando o cone sobre esta junção tríplice de planos.

Para testar se as condições hidroquímicas atuais no carste do Alto Ribeira permitem a atuação da corrosão de mistura, utilizou-se o diagrama de equilíbrio de soluções carbonáticas (fig 4.22), elaborado por Dreybrodt (1981b), onde plotou-se um exemplo de águas contrastantes quanto à saturação em CaCO_3 , coletadas na caverna Santana.

Como exemplo de água com alta concentração de saturação em calcita, utilizou-se a percolação lenta, coletada em gotejamentos de juntas e estalactites (amostras 20, 81, 102, 149 e 166, anexo 5.3). Estas amostras apresentam uma predominância de 75mg/l ($1.87 \times 10^{-6} \text{ mol/cm}^3$) de Ca^{++} em equilíbrio com uma média de $0.0065 \text{ atm. de CO}_2$, representadas pelo ponto S2 no diagrama (fig 4.22).

Como exemplo de água com baixa concentração de saturação em calcita, selecionou-se o fluxo de condutos do rio subterrâneo da caverna Santana (amostras 1, 2, 3 e 32, anexo 5.3). Esta água possui em média 32 mg/l ($0.80 \times 10^{-6} \text{ mol/cm}^3$) de Ca^{++} com $0.0009 \text{ atm. de CO}_2$, ponto S1 no diagrama.

A área sobre o lado côncavo da curva de equilíbrio de soluções carbonatadas (fig 4.22) representa o campo de soluções insaturadas. Sob o lado convexo estão as soluções saturadas em calcita. As retas que unem pontos sobre a curva, representam as misturas de diferentes proporções em volume, de duas soluções distintas de Ca^{++} e CO_2 , inicialmente

Figura 4.22 - Diagrama da corrosão de mistura aplicado às águas do sistema Pérolas Santana. Acompanhar explicação no texto. Adaptado de Dreybrodt (1981b).

em equilíbrio. Conforme o diagrama, estas misturas necessariamente caem no campo insaturado. Os segmentos de retas transversais às retas de mistura indicam a trajetória das concentrações de Ca^{++} e CO_2 , de soluções resultantes da mistura de duas soluções com concentrações iniciais diferentes. O ângulo α de inclinação destas linhas é determinado pela reação de decomposição do CaCO_3 pelo H_2CO_3 . Nesta reação, 1 mol de CaCO_3 é dissociado por 1 mol de CO_2 , o que determina um ângulo de 45° sobre o gráfico com escalas iguais nos eixos x e y (fig 4.22). O excesso de CO_2 gerado pela mistura de soluções saturadas em equilíbrio pode ser determinado graficamente com a ajuda da curva de equilíbrio (Bögli, 1978), conforme o exemplo a seguir.

A mistura hipotética das soluções S1 e S2, numa proporção volumétrica de 1:1, produz uma solução resultante com concentração de $1,34 \times 10^{-6} \text{ mol}/\text{cm}^3$ de Ca^{++} e 0,0037 atm. de CO_2 (ponto A, mediano entre S1 e S2 devido à proporção 1:1 de volumes misturados). Esta solução resultante, insaturada em calcita, somente requer 0,0019 atm. de CO_2 para manter $1,34 \times 10^{-6} \text{ mol}/\text{cm}^3$ de Ca^{++} em solução (determinado graficamente pela reta AC no diagrama, seguindo método de Bögli, 1978). Há, portanto, um excesso de 0,0018 atm. de CO_2 em solução. A solução no ponto A, para atingir a saturação, irá percorrer a trajetória AD, consumindo 0,0011 atm de CO_2 do excedente de 0,0018, dissolvendo um adicional de cerca de $0,038 \times 10^{-6} \text{ mol}/\text{cm}^3$ de calcita.

Com o resultado obtido acima, comprova-se que atualmente há condições químicas no sistema cárstico do Alto Ribeira, que possibilitam a ocorrência da corrosão de mistura.

Para considerar que a corrosão de mistura operou na fase de iniciação de condutos, a região em estudo deve satisfazer duas premissas fundamentais. A primeira é quanto as

condições climáticas reinantes durante a iniciação. Isto é, durante a iniciação, o clima deve ter sido semelhante ao atual, ou suficientemente úmido, para sustentar densa vegetação e permitir alta produção de CO_2 no solo, fator essencial para gerar água de infiltração autogênica com alta concentração em carbonato. A segunda, refere-se à presença no sistema cárstico de águas com concentrações contrastantes, ou seja, injeções alogênicas com baixa concentração em carbonato e injeções autogênicas com alta concentração. Esta premissa é plenamente satisfeita, pois, devido à origem fluviocárstica da região em estudo, pode-se afirmar, que desde o início da exposição dos metacalcários, houve uma importante área de captação alogênica adjacente a estes. Quanto às condições climáticas, é razoável, considerar que a região apresentou clima úmido e quente, no mínimo durante o último milhão de anos, com períodos intercalados de alguns milhares de anos, com provável menor umidade (clima semelhante ao cerrado atual), correspondentes às fases glaciais pleistocênicas do hemisfério norte (Ab'Sáber, 1977 e Brown e Ab'Sáber, 1979).

Conclui-se, portanto, que a corrosão de mistura teve condições geológicas e hidroquímicas para contribuir no processo de iniciação de proto-cavernas na área investigada.

Mas, de acordo com os modelos atuais de espeleogênese, como os apresentados por Dreybrodt (1990), Worthington (1991), Palmer (1991) e Lowe (1992), a corrosão de mistura é considerada um processo complementar na espeleogênese e não suficiente para explicar a origem de longas redes contínuas de cavernas (da ordem de dezenas de quilômetros), associadas às rotas de fluxo subterrâneo de águas meteóricas em terrenos calcários. Principalmente devido ao fato, de que a solução agressiva resultante da mistura, também atingirá rapidamente (em alguns metros) a saturação em calcita, o que limita a capacidade corrosiva renovada, à regiões próximas do encontro de discontinuidades conduzindo soluções contrastantes. Desta maneira, a geração de cavidades por corrosão de mistura é restrita a pontos isolados no corpo carbonático.

É necessário portanto, invocar outros mecanismos, para explicar a presença de água meteórica agressiva a grandes distâncias no interior do maciço carbonático.

Conforme citado no item 4.3.1, o princípio físico-químico, além da corrosão de mistura, utilizado para explicar tal fato, é a variação da cinética da reação de dissolução do CaCO_3 , conforme as soluções infiltrantes se aproximam da saturação. White (1977, 1984), Palmer (1981, 1984 e 1991) e Dreybrodt (1990), desenvolveram uma exaustiva análise teórica sobre a cinética de dissolução de calcita, aplicada à espeleogênese. Uma abordagem qualitativa e simplificada desta questão, pode ser obtida com a análise da equação geral da cinética de dissolução de calcita, seguindo Ford, Palmer e White (1988):

$$dC/dt = k (1 - C/C_s)^n$$

onde dC/dt é a variação de concentração de soluto com o tempo, C é a concentração de soluto na água de percolação, C_s é a concentração de saturação de carbonato dissolvido, k é uma constante empírica dependente do comprimento de percolação e sua vazão e n corresponde à ordem de reação. Dados experimentais obtidos por Palmer e Dreybrodt (op. cit.), demonstraram que com o aumento da distância de percolação, a concentração (C)

tende à saturação e a taxa de dissolução (dC/dt) decresce. Demonstraram também, que com valores baixos de C/C_s (soluções fortemente insaturadas), a ordem de reação (n), inicialmente varia entre 1 e 2.2. Com valores altos de C/C_s , ou seja, soluções muito próximas da saturação, a ordem de reação aumenta abruptamente para 4 a 5. Esta transição ocorre entre 60 a 90% de saturação (C_s entre 0.6 e 0.9), dependendo da pressão parcial de CO_2 e temperatura. Este incremento na ordem de reação, representa uma importante redução na taxa de dissolução de calcita, antes que a solução se torna saturada.

Com este comportamento cinético da dissolução de calcita, as taxas de dissolução na zona epicárstica ou nas proximidades dos pontos de injeção de fluxos alogênicos, são altas, da ordem de 0.1cm/ano (Ford, Palmer e White, 1988), mas, diminuem rapidamente com a progressiva saturação e infiltração. Desta maneira, água subterrânea é capaz de penetrar por longas distâncias na rocha carbonática, antes de atingir a saturação e, portanto, dissolve a rocha ao longo das linhas de fluxo da água subterrânea, com taxas muito lentas e uniformes.

A próxima questão sobre a iniciação da espeleogênese, refere-se à profundidade dos condutos de iniciação, em relação ao lençol freático. Isto é, as proto-cavernas desenvolvem-se sobre, logo abaixo ou muito abaixo da superfície piezométrica, questão esta, ponto de debate histórico no desenvolvimento das teorias e modelos espeleogenéticos, conforme é sintetizado em Watson e White (1985) e Lowe (1992).

A modelagem mais recente e uma das primeiras com abordagem quantitativa, da evolução de aquíferos cársticos, foi apresentada por Worthington (1991). Com base no estudo da geometria de 16 rotas completas do fluxo de água subterrânea de sistemas cársticos de cavernas, em variadas condições de mergulho da estratificação e fraturamento, o autor acima concluiu, que a profundidade máxima de fluxo de condutos (D_x) é principalmente controlada pelo mergulho da estratificação (θ) e a extensão da área de captação (L_x), entre o ponto principal de insurgência e a ressurgência da água subterrânea, conforme é esquematizado na fig 4.23. Nesta geometria, considerando que a rede de fluxo desenvolve-se sobre um ou vários planos de maior transmissividade de água, no caso o acamamento, seguindo os traços das intersecções do sistema de fraturas com o acamamento (o que imprime o caráter escalonado às rotas de fluxo), o fluxo mais profundo seria encontrado nas situações de maior mergulho do acamamento, seguindo a expressão abaixo (conforme Worthington, op cit):

$$D_x = K L_x \text{sen}\theta,$$

onde K é uma constante de proporcionalidade.

Através da regressão das medidas de profundidade média (D_m) de condutos de iniciação, abaixo do lençol freático, contra $L_x \text{sen}\theta$, Worthington obteve o melhor ajuste com a equação:

$$D_m = 0.11(L_x \text{sen}\theta)^{0.81}, \text{ com } R^2 = 0.95\%$$

Inserindo o sistema de cavernas Pérolas-Santana neste conjunto de medidas (tabela 4.6), obteve-se a relação exponencial

$$D_m' = 0.103(L_x \text{sen}\theta)^{0.82}, \text{ com } R^2 = 95\% \text{ e coef. correlação } 0.97,$$

muito semelhante ao resultado de Worthington, conforme é ilustrado pela figura 4.24.

Figura 4.23 - Linhas de fluxo condicionadas pelo mergulho da superfície de acamamento (adaptado de Worthington, 1991).

A- Iniciação de condutos condicionada somente pelo plano de acamamento.

B- Iniciação de condutos condicionada pelas intersecções acamamento - fraturas, gerando rotas côncavas escalonadas de condutos.

Dx- profundidade máxima de condutos.

Lx- extensão da área de captação

I- pontos de injeção. R- ponto de ressurgência.

Lf- largura da rota de fluxo.

L- linha de fluxo da água subterrânea

θ - mergulho do plano de acamamento

Considerou-se uma profundidade média de 200m (com mínimo de 50 e máximo de 350m) abaixo do lençol freático para os condutos de iniciação observados no topo do entalhamento vadoso da caverna Santana. Esta profundidade foi medida em relação à superfície atual, o que a torna sub-estimada, pois não considera o rebaixamento do relevo, devido à denudação superficial, ocorrido desde a iniciação dos condutos. Esta medida, inclui também, a premissa de que o lençol freático estava próximo da superfície, em função da baixa permeabilidade inicial da rocha nesta fase. Provavelmente, a profundidade máxima

de condutos pode ter chegado a cerca de 400m abaixo do NA, conforme a estimativa de um rebaixamento da superfície, de no mínimo 50m, em função da profundidade de depressões poligonais.

Caverna	Profundidade Média (Dm)	Profundidade Máxima (Dx)	Extensão (Lx) Km	Mergulho do acamamento, θ °
1. Horseshoe Bay, EUA	6	20	3	2
2. West Kingsdale, Inglaterra	8	30	2.7	3
3. Jordtulla, Noruega	9	23	0.52	25
4. Otter Hole, Inglaterra	10	23	3.5	6
5. Sistema Friars Hole, EUA	17	25	11	2.2
6. Rio Encantado, Porto Rico	15	25	9.5	4
7. Guanyan, China	25	100	6.5	7
8. Swildons-Wookey, Inglaterra	40	90	6	15
9. Demanova, Checoslovaquia	23	90	3.2	35
10. Doux de Coly, França	46	56	13.7	6
11. Hölloch, Suíça	100	190	10	16
12. Lubang Benarat, Malásia	105	220	7	45
13. Nettlebed, Nova Zelândia	120	150	7	50
14. Peña Colorada, México	120	200	12	40
15. Nelfastla de Nieva, México	240	290	7.4	70
16. El Abra, México	800	1500	150	20
17. Sistema Pérolas-Santana, Brasil	200	400	6	60

Tabela 4.6 - Profundidades de condutos de iniciação e extensões de rotas completas sistemas de cavernas. Medidas 1 a 16 foram extraídas de Worthington (1991).

Figura 4.24- Profundidade média de fluxo (Dm) em função da extensão da área de captação do aquífero (Lx) e mergulho da estratificação (θ). * medidas da caverna Santana. Demais pontos extraídos de Worthington (1991).

O alinhamento da caverna Santana com os dados de Worthington (fig 4.24), comprova a hipótese sobre a relação existente entre profundidade de condutos de iniciação e o mergulho do acamamento, assim como, confirma também, a forte influência do acamamento sobre a iniciação do sistema Pérolas-Santana.

A fase de iniciação, culmina portanto, com a instalação de um sistema interconectado de proto-cavernas, somente observadas diretamente, em testemunhos desta fase, conforme descritos na caverna Santana. Estas proto-cavernas formam-se abaixo do lençol freático, acompanhando as linhas côncavas escalonadas (fig 4.23) da rede de fluxo da água subterrânea, em profundidades conforme o modelo acima apresentado.

Entre os inúmeros canalículos iniciais, somente alguns poucos, evoluem para condutos freáticos maiores. Ocorre um processo de competição entre as taxas de abertura de proto-cavernas. As rotas com maior eficiência hidráulica inicial (maior transmissividade), e portanto, com maior dissolução, terão taxas maiores de alargamento, relativamente aos canalículos vizinhos. Estas proto-cavernas com vazão maior, acabam convergindo para si, o fluxo de canalículos vizinhos, parализando o desenvolvimento destes. Este processo de abertura diferencial entre proto-cavernas atinge o máximo quando uma das rotas com ampliação favorecida conecta diretamente as regiões de injeção e saída de água subterrânea (Ford e Williams, 1989). Este momento no processo espeleognético é denominado de *breakthrough* (Ewers, 1972; Ford e Williams, 1989 e Dreybrodt, 1990), traduzido aqui, como ponto de avanço da espeleogênese.

4.3.3.3 Fase de desenvolvimento

O ponto de avanço marca o início da fase de desenvolvimento do sistema cárstico subterrâneo. Caracteriza-se por um incremento repentino na vazão do conduto vencedor, transição de fluxo laminar para turbulento ao longo deste ("salto" hidráulico, segundo White e Longyear, 1962, apud Worthington, 1991) e pelo aumento de várias ordens de grandeza da taxa de dissolução (até 70 vezes, segundo White e Longyear, op cit). A partir desta transição no regime hidráulico, a dissolução de calcita ao longo do conduto vencedor, procede com cinética de 1ª ordem, envolvendo taxas calculadas de retração das paredes, da ordem de 0.003 a 0.1cm/ano (Dreybrodt, 1990).

O início da fase de desenvolvimento, implica também, na aceleração do rebaixamento do lençol freático, o que amplia a zona vadosa acima dos condutos principais.

A morfologia inicial, associada a este estágio de carstificação, vai depender da posição do lençol freático em relação ao conduto vencedor. Se o ambiente freático perdurar, o conduto com dimensões de proto-caverna será ampliado, dando origem a condutos freáticos maiores, com seções sub-circulares a elípticas (conforme descrição no item 4.3.2.2), de diâmetro decimétrico a métrico, raramente decamétricos. No caso da proto-caverna sofrer exposição acima do nível piezométrico, sua base será marcada por entalhamento vadoso (Palmer, 1984 e White e Deike, 1989), figura 4.25.

Com o rebaixamento do nível de base, os primeiros condutos a serem expostos acima do lençol freático, serão as terminações do sistema, junto aos pontos de insurgência

Figura 4.25 - Representação esquemática da morfologia em seção transversal resultante da fase de desenvolvimento. (1) abaixo do lençol freático, gerando tubos freáticos e (2), com rebaixamento do lençol, acompanhando a ampliação do conduto, gerando a seção típica, popularmente denominada de "buraco de fechadura".

e/ou ressurgência do aquífero (fig 4.26). A partir deste momento, ocorre o desenvolvimento contemporâneo da rede de condutos, tanto em ambiente vadoso como em freático (Palmer, 1991). Devido a este mecanismo, predominam formas vadosas nas proximidades dos sumidouros e ressurgências dos sistemas de cavernas estudados.

A transição de *canyon* vadoso para conduto freático, muito comum nos sistemas estudados e descrita no item 4.3.2.2 (entalhamentos vadosos, fig 4.9), é interpretada como sendo condicionada pelo padrão escalonado da rota côncava de condutos freáticos. Durante a fase de desenvolvimento, alguns dos segmentos convexos desta rota, serão expostos à condições vadosas, em quanto que, grande parte dos trechos côncavos, continuam no domínio freático (fig 4.26). Nas cristas dos segmentos convexos expostos acima do lençol freático, a água subterrânea inicia a fluir livremente, com fluxo turbulento, causando o entalhamento vadoso destas, segundo o modelo de Ford (1965), apud Ford e Ewers (1978). São gerados, desta forma, canyons vadosos laterais e sincrônicos à ampliações freáticas (Ford, 1965).

Na caverna Santana, o entalhamento vadoso aumenta gradativamente em altura, a partir do sifão no final do ramo principal, atingindo um máximo de 50m (fig 4.9). Interpreta-se, portanto, que a amplitude vertical do escalonamento de condutos ascendentes e descendentes da rota de condutos freáticos, previamente à fase de desenvolvimento, atingia, no mínimo 50m (fig 4.27). Esta estimativa é mínima, porque a exploração do trecho freático, ainda não avançou o suficiente, para demonstrar, até qual profundidade abaixo do nível piezométrico atual, chega o conduto principal do sistema Perolas-Santana. Na caverna

Figura 4.26 - Esquema simplificado da evolução de condutos associados ao sistema de cavernas Pérolas Santana, em perfil longitudinal. Escala aproximada.

A- Fase de Iniciação. Implantação de proto-condutos ao longo de uma rota de fluxo côncava escalonada, a uma profundidade média de 200m, na zona freática (ZF).

B- Fase de desenvolvimento. Conexão de uma rota preferencial de condutos freáticos entre a insurgência (I) e ressurgência (R), com conseqüente ampliação da zona vadosa (ZV).

C- Ampliação de condutos freáticos e progressivo rebaixamento do NA. Entalhamento vadoso (EV) nos segmentos convexos (ascendentes) de condutos freáticos expostos acima do N.A. Desenvolvimento de invasões vadosas (IV). Iniciação de proto-condutos em níveis freáticos abaixo do conduto principal.

D- Fase avançada de desenvolvimento da espeleogênese. Conexão das invasões vadosas com o sistema de cavernas desenvolvido. Ampliação das invasões vadosas, gerando condutos verticais (CV). Instabilização mecânica no maciço carbonático, causando modificação dos condutos acima do N.A., através de incisão (IN). Implantação de novas rotas de condutos profundos. Paleo-ressurgência (PR) localizada em cotas acima da ressurgência ativa.

Figura 4.27 - Esquema da interpretação da variação vertical (sinuosidade vertical) de condutos freáticos em função da variação de altura do *canyon* vadoso ao longo do conduto principal da caverna Santana. No ponto B ocorre a transição de *canyon* vadoso para conduto freático ativo.

Pérolas, o entalhamento vadoso com cerca de 50m nas proximidades da entrada principal, decresce gradativamente em altura até 5m, ao longo de aproximadamente 400m de galeria de abatimento.

Worthington (1991) reconheceu amplitudes de variação vertical de segmentos ascendentes e descendentes entre 5m (sistema Friars Hole, EUA) e 100m (Hölloch, Suíça). Relacionou esta variação ao mergulho da estratificação, ou seja, quanto maior o mergulho, tanto maior a variação vertical do escalonamento de condutos freáticos, nos casos de condutos condicionados pelo acamamento.

A ampliação freática durante a fase de desenvolvimento, nas cavernas estudadas, produziu seções regulares (circulares a elípticas) e irregulares, conforme descrito no item 4.3.2.2 (alargamento freático). As seções elípticas a circulares evidenciam alargamento por dissolução relativamente constante ao longo do perímetro do conduto (fig 4.28), acompanhando preferencialmente a estratificação, falhas ou fraturas. As seções irregulares evidenciam taxas de dissolução diferenciadas ao longo do perímetro, em consequência da anisotropia da rocha carbonática (Susteric, 1979), deposição de sedimento e consequente isolamento de parte do perímetro do conduto da corrosão (Palmer, 1984) ou corrosão de mistura (Bogli, 1978). Nas cavernas estudadas, atribui-se a irregularidade de seções

freáticas principalmente à presença de estratos mais e menos solúveis (fig 4.28), devido à intercalação alternada de calcários puros e impuros e à corrosão de mistura, responsável pela formação e ampliação de cones de dissolução (fig 4.28) sobre condutos freáticos.

Figura 4.28 - Tipos de ampliações freáticas observadas nas cavernas estudadas.

- a- alargamento freático preferencial sobre plano de fratura ou falha
- b- alargamento freático preferencial sobre plano de acamamento
- c- alargamento homogêneo
- d- alargamento freático com dissolução preferencial de estratos mais solúveis, produzindo seção irregular
- e- seção freática irregular produzida pela corrosão de mistura gerando cones de dissolução.

No estágio avançado da fase de desenvolvimento dos condutos principais, expresso na área através do intenso entalhamento vadoso destes, o volume de vazios expostos acima do nível de água aumenta, causando a instabilização mecânica do maciço carbonático. Inicia-se, portanto, o processo de incasão, alterando gradativamente a morfologia de entalhamento por dissolução, conforme foi descrito no item 4.3.2.2 (formas geradas pela incasão).

O volume maior de abatimento junto aos sumidouros é interpretado como consequência destes trechos terem sido os primeiros a serem expostos acima do nível de água, e que portanto, sofreram entalhamento vadoso maior, em relação aos trechos mais internos da rota de condutos.

Com a ampliação da zona vadosa sobre a rota principal de condutos, inicia-se a instalação de invasões vadosas, muito frequentes na área estudada e representadas pelos condutos verticais (descritos no item 4.3.2.2). Estes constituem cavernas sem uma fase freática inicial (Ford e Williams, 1989). Formaram-se ao longo de rotas subverticais ou escalonadas de maior permeabilidade inicial, como cruzamentos de fraturas longas subverticais e falhas, entre si e com o acamamento. Estas rotas de infiltração, ao se

ampliarem, acabaram absorvendo o escoamento superficial, num primeiro estágio com contribuição alogênica importante (fase fluvial do exocarst) e posteriormente, escoamento principalmente autogênico, devido à implantação de depressões poligonais. As invasões vadosas conectadas diretamente às rotas principais de condutos da água subterrânea, por possuírem drenagem mais eficiente, sofreram taxas de alargamento maiores que as conectadas indiretamente. Desta forma, os condutos verticais acessíveis à exploração por longas distâncias (até 250m na vertical, p. ex., abismo Juvenal), sempre estão associadas diretamente a sistemas de cavernas, fato observado na área estudada.

Outro fenômeno, associado ao rebaixamento do lençol freático sobre o sistema de cavernas, é a captura de cavernas desenvolvidas nas proximidades da rota principal de condutos, formando ramos tributários. Como exemplos, cita-se a rede Takeopa e a galeria entre o salão dos Vulcões e o poço São Jorge, na caverna Santana (fig 4.6). A rede Takeopa, constitui um afluente ativo. Atualmente sua área de captação é interpretada como sendo autogênica (depressão poligonal), devido a alta dureza da água. Mas, devido à presença de cascalheiras alóctones aos calcários, parte de sua fase de desenvolvimento é atribuída à injeção alogênica, a qual iniciou o desenvolvimento de um sistema independente de cavernas. Já o ramo entre o salão dos Vulcões e o poço São Jorge, hoje é um paleo-afluente, também de origem alogênica, em função de importantes cascalheiras alóctones, hoje cobertas em grande parte por crostas calcíticas. A junção deste ramo com o conduto principal da caverna Santana se deu através de uma invasão vadosa.

Interpreta-se a captura destes afluentes, como sendo condicionada pelo vale de rebaixamento do lençol freático, que se desenvolveu sobre o conduto principal, desde o ponto de avanço da espeleogênese. Com este processo, formou-se um gradiente hidráulico convergente ao conduto principal, responsável pela instalação de condutos neste sentido, os quais acabaram conectando rotas de fluxo e condutos, inicialmente independentes da rota principal.

A partir do ponto de avanço na espeleogênese, inicia-se também, o transporte de um volume significativo de sedimentos detríticos através do sistema de cavernas. Na fase de iniciação, o material detrítico transportado limita-se a partículas na fração silte e argila (Ford e Worley, 1977), principalmente formados por resíduos insolúveis da rocha carbonática. Após a conexão direta de condutos entre a área de captação e a ressurgência, a velocidade de fluxo aumenta em várias ordens de grandeza (Dreybrodt, 1990), o que aumenta a capacidade de transporte deste fluxo. Gale (1984) descreveu o transporte de areia alóctone, com grãos entre 0.1 e 1mm, através de condutos freáticos com 6.7cm de diâmetro. Ford e Williams (1989) descrevem evidências de calhaus de calcário denso transportados por redes de condutos freáticos, sendo ejetados no topo de condutos verticais de até 7m, o que mostra a alta capacidade de transporte de fluxos associados a grandes enchentes.

No caso do Alto Ribeira, um grande volume de sedimentos é transmitido pelos sistemas de cavernas. Estes sedimentos possuem uma importante contribuição alóctone devido às grandes áreas de captação alogênicas associadas aos vales cegos que alimentam

os sistemas de cavernas. Ao longo dos condutos hoje acessíveis, observam-se depósitos fluviais, desde cascalheiras com calhaus e blocos (compostos principalmente por clastos de filito, metarenito e quartzo), bancos de areia e depósitos finos de silte e argila. A característica de gradação normal (de cascalho na base a argila no topo), muito frequente em testemunhos de depósitos acima do nível de fluxo atual e nos depósitos atuais, indica movimentos episódicos de alta vazão no transporte da carga de fundo. Deve-se considerar, portanto, um duplo papel dos depósitos fluviais na espeleogênese, segundo Newson (1971) e Smith e Newson (1974). Durante períodos de vazão normal, esta carga de sedimento age como inibidora da ampliação por corrosão do leito dos condutos. Por outro lado, em eventos esporádicos de alta vazão, a movimentação desta massa detrítica, contribui na ampliação através da abrasão mecânica do leito dos condutos. Esta abrasão é evidenciada através da geração de marmitas de diâmetro decimétrico no canal fluvial. Estes sedimentos agem também como niveladores do leito fluvial, pois preenchem as irregularidades do leito rochoso, tornando os fundos dos entalhamentos vadosos e condutos freáticos planos.

Um último fenômeno, importante na fase de desenvolvimento da espeleogênese, é a geração de uma nova rota de condutos, abaixo do nível de condutos em fase avançada de desenvolvimento, conforme o modelo espeleogenético de Worthington (1991). A profundidade de iniciação desta nova linha de condutos segue os mesmos princípios que condicionaram a rota superior, em função do campo de linhas de fluxo desenvolvido abaixo dos condutos existentes. Isto é, seguem a profundidade D_x e D_m , abaixo do lençol freático, anteriormente discutida.

Na área estudada, as zonas de vazios detectadas pela perfuração do poço no Bairro da Serra (Politi, relatório de perfuração, 1988), em profundidades entre 60 e 150m abaixo do N.A., são interpretadas, como sendo condutos no início da fase de desenvolvimento, contemporâneos ao estágio avançado de desenvolvimento da rota de cavernas superior.

Com o contínuo soerguimento da área e rebaixamento do nível de base, a rota superior de cavernas em desenvolvimento, poderá ser abandonada pelo lençol freático, e o fluxo deste, começa a predominar pela rota inferior de condutos. O momento em que a rota inferior captura o fluxo do nível superior, vai decidir se este é abandonado como um conduto freático ou como entalhamento vadoso (Worthington, 1991), conforme será discutido no item seguinte.

No sistema cárstico estudado, a rota inferior de condutos, não atingiu dimensões suficientes, em tempo hábil, para absorver o volume de água injetado no sistema. Isto associado ao rebaixamento do nível de base (soerguimento tectônico da área), condicionou o intenso entalhamento vadoso do nível superior de condutos freáticos, produzindo o quadro atual de morfologia subterrânea. Linhas de condutos freáticos superpostos e preservados do entalhamento vadoso, somente são observados em alguns ramos tributários aos condutos principais, como por exemplo, na rede Takeopa, caverna Santana (fig 4.29).

Atribui-se esta preservação da forma freática em ramos tributários, ao volume menor de água injetado nestes condutos. Isto permitiu ao conduto inferior, ampliar em

tempo hábil e capturar o fluxo do conduto superior, antes que este seja entalhado em ambiente vadoso.

Figura 4.29 - Interpretação do rebaixamento do nível de água associado ao desenvolvimento de redes afluentes ao conduto principal da caverna Santana. No sistema tributário de condutos, a morfologia freática foi parcialmente preservada, enquanto que no conduto principal, ocorreu o entalhamento vadoso do *canyon*.

Devido à evolução contemporânea do relevo e dos sistemas de cavernas epigênicas, a tendência final será da denudação superficial interceptar o nível de cavernas superior, enquanto o nível inferior entra em fase avançada de desenvolvimento, e um terceiro nível de condutos entra em iniciação. Desta maneira, rotas de cavernas mais antigas são consumidas pela denudação, enquanto novas rotas inferiores são geradas (Palmer, 1991), até a remoção total das rochas carbonáticas, estágio final da evolução do sistema cárstico.

No Alto Ribeira, foi possível detectar dois níveis principais de cavernas. Um superior, em adiantado estado de desenvolvimento e outro, em fase inicial de desenvolvimento, atualmente em ambiente freático, a profundidades observadas entre 50 e 150m e máximas estimadas de 400m.

O estágio atual da denudação superficial interceptou as zonas de insurgência e ressurgência dos principais sistemas, assim como, os fundos de algumas depressões poligonais (p. ex. a depressão composta das Areias), atingiram o topo de entalhamentos vadosos subterrâneos. Neste quadro de conexão entre a dinâmica de entalhamento superficial e desenvolvimento de condutos, citam-se também, as invasões vadosas, que em alguns casos, interceptaram os condutos, inclusive gerando grandes volumes de abatimento subterrâneo.

4.3.3.4 Rebaixamento do nível de base e desenvolvimento da espeleogênese

A gradativa ampliação do sistema de cavernas na fase de desenvolvimento, implica no aumento da permeabilidade secundária, o que por sua vez, causa a drenagem do aquífero no maciço carbonático. Neste quadro de dinâmica hidráulica, é fundamental inserir o papel do rebaixamento do nível de base da área durante a espeleogênese.

Conforme citado anteriormente, a iniciação da espeleogênese é consequência direta do soerguimento tectônico e entalhamento do relevo, responsáveis pelo estabelecimento do gradiente hidráulico entre a zona de insurgência e ressurgência do aquífero.

A morfologia subterrânea gerada na fase de desenvolvimento, ou seja, *canyons* vadosos de pequena ou grande profundidade, ou diferentes graus de ampliação de condutos freáticos, é essencialmente, uma resposta da rede de cavernas ao rebaixamento do nível de base relativo ao aquífero (Palmer, 1987). Este processo de queda do lençol freático no maciço carbonático, por outro lado, é basicamente controlado pela combinação entre a taxa de soerguimento tectônico da área, variação glacio-eustática do nível de base, velocidade de ampliação dos condutos e volume de água meteórica injetada no aquífero.

Considerando pequena variação com o tempo, da taxa de ampliação de proto-cavernas e do volume de água meteórica coletada pela área de captação do aquífero, deve-se analisar, como taxas variáveis de queda do nível de base influenciam o produto da espeleogênese.

Rebaixamento muito rápido do nível de base

O rebaixamento rápido do nível de base será acompanhado por entalhamento vertical intenso de vales, o que gera elevados gradientes no aquífero cárstico, entre pontos de insurgência e ressurgência. Esta queda rápida do lençol freático implica em pouco tempo disponível para ampliação de condutos freáticos, os quais acabam sendo expostos acima do NA no início de sua fase de desenvolvimento. Com a sucessiva iniciação de rotas de condutos em ambiente freático e exposição destes acima do lençol, o produto final, numa análise simplificada e qualitativa, serão vários níveis de condutos freáticos pouco desenvolvidos, preservados acima do NA, em rebaixamento.

Associa-se a queda acelerada do nível de base e entalhamento profundo do relevo a um ambiente tectônico com altas taxas de soerguimento, ou, no caso de regiões próximas ao mar, à quedas eustáticas do nível dos oceanos.

Rebaixamento lento do nível de base

Taxas lentas de rebaixamento do nível de base refletem entalhamento vertical reduzido da topografia, o que induz baixos gradientes entre zonas de insurgência e ressurgência do aquífero cárstico. Havendo condições mínimas de gradiente hidráulico ($\approx 0,003$, segundo Worthington, 1991) para iniciação da espeleogênese, haverá tempo suficiente para ampliação de condutos freáticos, antes que estes sofram exposição na zona vadosa. Nestas condições, geram-se sistemas freáticos de cavernas, com seções transversais de condutos freáticos com eixos maiores métricos a decamétricos. Com a gradativa

exposição destes acima do NA e abertura contemporânea de rotas de condutos mais profundos, o nível superior de condutos acaba sendo abandonado pelo lençol freático antes de sofrer importante entalhamento vadoso. O produto final serão amplos condutos freáticos com reduzido entalhamento vadoso na base.

Um exemplo desta situação espeleogenética são os amplos condutos freáticos preservados nos calcários proterozóicos de cobertura cratônica (Grupos Bambuí e Una) do Brasil Central, os quais sofreram carstificação com taxas de sorgimento tectônico lento durante o Cenozóico (Braun, 1971).

Taxas moderadas de rebaixamento do nível de base

É a situação intermediária entre o rebaixamento lento e o muito rápido do nível de base relativo ao aquífero cárstico. O entalhamento vertical da topografia é expressivo, relativamente menos intenso que no rebaixamento rápido, gerando gradientes hidráulicos moderados, entre a insurgência e ressurgência de sistemas cársticos, onde se desenvolvem condutos freáticos. Mas, o rebaixamento do lençol freático não chega a abandonar totalmente o nível de condutos em ampliação, ou seja, a ampliação da rota inferior de condutos não é suficiente, para absorver o fluxo de água dos condutos anteriores, e ao mesmo tempo, o rebaixamento do NA não é rápido o suficiente, para abandonar o nível superior de condutos. Ocorre, portanto, uma fase de equilíbrio entre o rebaixamento do NA e o entalhamento vadoso de condutos freáticos. Neste caso, a morfologia resultante é de condutos freáticos de médio a pequeno porte, os quais apresentam sua base entrincheirada por entalhamentos vadosos, característica típica dos sistemas de cavernas da área estudada, conforme descrito anteriormente.

Baseado nestas três situações hipotéticas analisadas acima, interpreta-se portanto, em função da morfologia subterrânea observada, que a espeleogênese na região estudada, ocorreu num regime de rebaixamento do nível de base com taxas moderadas.

4.4 Cronologia da evolução de condutos

4.4.1 Introdução

Uma das questões críticas no estudo da espelogênese, refere-se às idades de condutos de dissolução e ao tempo envolvido na evolução de aquíferos cársticos.

Por se tratar de um ambiente predominantemente erosivo, a idade de condutos subterrâneos e da paisagem cárstica superficial, como de qualquer outra feição de relevo, somente é possível de ser estimada, através de métodos indiretos ou correlativos, obtendo-se idades máximas ou mínimas.

Estudos teóricos da cinética de dissolução do carbonato de cálcio, associados à ensaios de laboratório, envolvendo a simulação de condições reais de dissolução de rochas carbonáticas, como os trabalhos desenvolvidos por Palmer (1984 e 1991), White (1977 e 1984), Dreybrodt (1981a, 1987, 1988 e 1990), produziram equações, as quais demonstram, que sob condições favoráveis, a fase de iniciação da espeleogênese requer no mínimo cerca

de 10.000 anos. Ford (1980 e 1988), em concordância com White (1984) estabeleceram taxas de desenvolvimento longitudinal (propagação horizontal) de sistemas de proto-cavernas entre 10^4 e 10^5 anos/km, com base em estudos cinéticos de laboratório (White, op cit) e de cavernas pós-glaciais, em regiões peri-glaciais (Ford, op. cit).

Myroie e Carew (1986) obtiveram um período máximo de 36.000 anos para o desenvolvimento de um sistema amplo de cavernas, encaixado em calcarenitos eólicos, próximos ao nível do mar, nas ilhas Bahamas. Neste período, sugerem que a ampliação de condutos freáticos com diâmetro de 1m ocorreu em cerca de 10.000 anos.

Enquanto a duração da fase de iniciação é bastante especulativa e apoiada fortemente em modelos teóricos de denudação química de rochas carbonáticas, idades relacionadas à fase de desenvolvimento, especialmente ao entalhamento vadoso, são possíveis de serem obtidas, através da geocronologia de calcita secundária depositada no ambiente subterrâneo (Harmon, et. al., 1975, Gascoyne, Schwarcz e Ford, 1978 e Schwarcz e Blackwell, 1985).

Gascoyne et. al. (1983), com base em idades obtidas através da série de desequilíbrio do urânio e paleomagnetismo em espeleotemas, estabeleceram a evolução cronológica da caverna Castleguard, nas Montanhas Rochosas canadenses. Em função da presença de espeleotemas magneticamente reversos, concluíram que parte da caverna estava sofrendo entalhamento vadoso entre 10^6 e 700.000 anos, e que a maioria dos condutos freáticos iniciaram a ser entalhados por fluxos vadosos há 350.000 anos.

O sistema de cavernas Flint Ridge - Mammoth (Kentucky, EUA), um dos mais longos atualmente conhecidos, foi datado através de correlações geomorfológicas (Miotke e Palmer, 1972), determinações radiométricas de espeleotemas (Hess e Harmon, 1981) e paleomagnetismo de sedimentos finos detríticos (Schmidt, 1982). Estes autores concluíram, que desde a última fase magnética reversa (~730.000 anos), três níveis superpostos de condutos foram gerados, com condutos freáticos de até 10m de diâmetro em cada nível. O nível superior possui entre 700.000 e 350.000 anos, e o intermediário entre 220 e 180 mil anos.

Utilizando idades radiométricas $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ de calcita secundária, Gascoyne (1981) determinou taxas de entalhamento fluvial subterrâneo em quatro cavernas do norte da Inglaterra. Obteve valores entre 0,002 e 0,008 cm/ano, os quais correlacionou ao rebaixamento de vales fluviais externos. Goede e Harmon (1983), com método semelhante ao de Gascoyne, obtiveram taxas entre 0.0106 e 0.0212 cm/ano para o entalhamento vertical de rios subterrâneos da Tasmânia.

4.4.2 Taxas de entalhamento subterrâneo e a idade do sistema cárstico estudado

Com o objetivo de obter uma estimativa quantitativa da taxa de entalhamento fluvial subterrâneo do carste do Alto Ribeira, aplicou-se o método $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, da série de desequilíbrio do urânio, para datar depósitos de calcita secundária das cavernas estudadas.

Para abordar esta questão, os pontos ideais para amostragem, correspondem às bases de depósitos calcíticos (escorrimentos calcíticos ou bases de estalagmites), os quais

cobrem depósitos fluviais. A datação destes pontos, fornece idades mínimas para a posição do nível do rio na época de deposição do sedimento fluvial. Havendo situações deste tipo em diferentes alturas ao longo de um *canyon* subterrâneo, estas permitem a obtenção de idades mínimas do processo de entalhamento subterrâneo, numa interpretação análoga à de terraços fluviais, em sistemas de drenagem superficiais (Ford, 1973).

Durante o mapeamento das cavernas investigadas, encontraram-se diversos pontos com as características acima descritas. Realizou-se uma primeira etapa de amostragem, para testar a aplicabilidade do método $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ em espeleotemas da área.

A amostragem seguiu a norma ética de coleta em cavernas, evitando a depredação dos espeleotemas amostrados. Sempre que possível, selecionaram-se pontos pouco notáveis ao visitante, não afetando o aspecto visual da formação. A maioria dos escorrimentos calcíticos e estalagmites foram amostrados com uma sonda portátil, com a qual, extraiu-se testemunhos de zonas mais internas. Os pontos de perfuração foram fotografados e posteriormente selados, restaurando-se a superfície do espeleotema.

4.4.2.1 Localização e descrição dos pontos amostrados

Na caverna Pescaria encontrou-se uma situação ideal de testemunhos fluviais cobertos por depósitos calcíticos. Esta caverna localiza-se a cerca de 20km ao norte da área detalhada neste trabalho, inserindo-se nas mesmas características fisiográficas gerais esboçadas para a área de estudo. Representa a ressurgência de uma bacia de captação alogênica, com cerca da metade da vazão do sistema Pérolas-Santana.

Os pontos amostrados nesta caverna são uma série de escorrimentos calcíticos, em forma de cones, os quais possuem um nível de cascalho fluvial incrustado em sua base (fig 4.30 e foto 4.1). Localizam-se em torno de 300m da entrada da caverna. Este tipo de estrutura, popularmente denominado de "pata de elefante", representa uma estalagmite com base mais larga em relação à altura. Com o crescimento vertical, acabou sendo soldada ao teto ou parede lateral do conduto, próximo às margens do leito fluvial subterrâneo.

Através do rebaixamento do canal fluvial, com o tempo, estes cones calcíticos acabaram sendo suspensos, sendo que suas bases, marcam a cota, em que se encontrava o nível de deposição do cascalho pelo rio subterrâneo, o que corresponde ao nível de base local do rio, nesta época. A base destes cones deverá fornecer, portanto, a idade mínima de deposição do cascalho, pois a precipitação de calcita sobre o depósito fluvial, pode ter sido iniciada num intervalo de tempo incógnito após a deposição do cascalho e abandono deste pelo fluxo do rio.

Na caverna Pescaria teve-se acesso para amostragem aproximadamente central da base de três destes cones (amostras P1, P2 e P3). As alturas entre estes pontos e o leito atual do rio subterrâneo foram medidas com trena, obtendo-se, respectivamente 5,8, 4,6 e 2,6m. A espessura atual de cascalho sobre a base rochosa do entalhamento vadoso varia entre alguns centímetros a 40cm.

Figura 4.30 - Seções transversais da caverna Pescaria indicando os pontos amostrados para geocronologia de calcita secundária.

Foto 4.1 - Espeleotema tipo "pata de elefante", ponto P3 da caverna Pescaria.

Na caverna Santana, amostrou-se o conduto do rio atual e a galeria superior de acesso ao salão São Paulo, interpretada neste trabalho, como sendo um paleo-afluente do rio principal (fig 4.6).

A amostra C1 foi obtida na lateral da base de um espeleotema tipo pata de elefante (foto 4.2, fig 4.31), localizado a cerca de 200m da entrada da caverna Santana, na margem direita do rio. A base da deposição de calcita sobre cascalho soldado na parte inferior do cone, encontra-se a 1,20m de altura em relação ao leito rochoso atual do rio subterrâneo.

Na galeria de acesso ao salão São Paulo, encontrou-se um bloco abatido de escorrimento calcítico cobrindo seixos fluviais, cuja posição original foi relacionada a um testemunho de cascalheira preservado numa reentrância da parede lateral do conduto (fig 4.32). Devido à dificuldade de acesso deste ponto na parede lateral, amostrou-se a calcita no bloco abatido (amostra C2) imediatamente acima da linha de seixos soldados na base do escorrimento calcítico (foto 4.3), hoje em posição invertida. O desnível entre o topo do testemunho de cascalheira e o antigo leito do canal fluvial, na base do conduto, é de 8m, com um erro estimado em até 1m, em função da cobertura parcial da rocha por concrecionamentos calcíticos.

Para obter uma noção da idade de espeleotemas grandes, amostrou-se a parte mais antiga de uma estalactite composta (várias estalactites soldadas entre si), com cerca de 4m de comprimento e 1,5m de diâmetro maior (amostra C5), localizada no caminho para o salão São Paulo.

Na caverna Alambari de Baixo, cuja ressurgência se localiza na extremidade sudeste do bairro da Serra (anexo 4.3), ocorrem vários pontos favoráveis para amostragem de testemunhos do entalhamento subterrâneo. Para este trabalho preliminar, coletou-se um fragmento de crosta calcítica suspensa na parede lateral esquerda (sentido jusante), a cerca de 90m da ressurgência (amostra CA3, figura 4.33, foto 4.4). Na parte inferior da crosta há seixos alóctones arredondados incrustados, evidenciando que a calcita cobria uma cascalheira fluvial. O desnível entre a base da crosta e o leito rochoso do rio atual é de 8,5m (fig 4.33).

Na caverna Morro Preto, paleo-ressurgência do sistema de drenagem subterrânea Onça Parda - Morro Preto, afluente da margem esquerda do rio Betari, na borda SE da faixa carbonática Furnas-Santana (anexo 4.3), também se constatou pontos favoráveis para a geocronologia do rebaixamento do nível de base local. Selecionou-se um escorrimento calcítico que cobria um testemunho de cascalheira preservado na parede lateral esquerda (olhando para a entrada) do grande salão central de abatimento (fig 4.34). Através de sondagem extraiu-se uma amostra de calcita logo acima do cascalho (amostra C11). A altura deste ponto em relação ao nível atual do rio subterrâneo é de 42m.

Por último, investigou-se a caverna Chapéu, localizada no bairro Caboclos, a norte da área estudada. Representa uma pequena bacia de drenagem subterrânea, com área de captação sobre granitos. Com o objetivo de avaliar o potencial geocronológico de calcita secundária nesta área, coletou-se a extremidade inferior de uma estalactite inativa, em posição original de crescimento, com 40cm de comprimento e 15 a 3cm de diâmetro. Sua

Figura 4.31 - Seção transversal à galeria do rio, junto ao ponto de amostragem C1, na caverna Santana, cerca de 200m da entrada.

Foto 4.2 - Ponto de amostragem C1, caverna Santana, local conhecido como Pata de Elefante

Figura 4.32 - Seção transversal mostrando a situação morfológica do ponto de amostragem C2, caverna Santana, entroncamento dos caminhos para o salão São Paulo e galeria dos "Vulcões".

Foto 4.3 - Bloco abatido de escoamento calcítico de onde se extraiu a amostra C2.

Figura 4.33 - Seção transversal no ponto de coleta CA3, caverna Alambari de Baixo.

Foto 4.4 - Vista do escoamento calcítico suspenso, ponto CA3, indicado pela seta, caverna Alambari de Baixo.

Figura 4.34 - Seção morfológica da caverna Morro Preto, junto ao ponto de coleta C11.

seção transversal é de uma elipse fortemente achatada. Possui linhas de crescimento aflorantes e marcas de entalhamento onduladas do tipo *scallops*. Estas características morfológicas são típicas de re-dissolução (erosão) desta estalactite por um fluxo dirigido de água agressiva (Gascoyne, et. al., 1983). O córrego subterrâneo está atualmente a 2,5m abaixo desta estalactite (em vazão normal), e o leito rochoso a cerca de 3m. A identificação da amostra é CC2.

Um fato interessante é que nas proximidades e na mesma altura desta estalactite erodida, ocorrem várias outras, sem marcas de erosão, ou seja, posteriores à erosão da primeira. Atribui-se a re-dissolução desta estalactite a um período de subida do nível de base, fase esta, responsável também, pelo assoreamento da caverna com sedimentos arenosos fluviais a uma altura de no mínimo 6m em relação ao nível atual do rio, conforme foi observado através de testemunhos deste preenchimento, distribuídos pela caverna.

A datação desta estalactite erodida, poderia fornecer portanto, uma idade mínima desta fase de nível de base alto, responsável pela sua erosão.

4.4.2.2 Resultados obtidos

Os resultados analíticos referentes ao método Th/U das amostras coletadas estão resumidos na tabela 4.7. O método desenvolvido por Thompson (1974) e Gascoyne (1977) para extração de urânio e tório de espeleotemas foi utilizado, seguindo o procedimento de rotina utilizado no laboratório de geocronologia dos Departamentos de Geologia e Geografia da McMaster University, Hamilton, Canadá. As razões isotópicas $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$, $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ e $^{230}\text{Th}/^{232}\text{Th}$ foram obtidas através da contagem de partículas alfa, por períodos entre 3 e 7 dias.

Para avaliar a qualidade das idades Th/U de espeleotemas, deve-se considerar os requisitos necessários para obtenção de resultados com precisão aceitável.

O primeiro requisito é a quantidade de urânio presente na amostra. Harmon et. al. (1975) estabeleceram que 0,03 ppm é a concentração mínima necessária para determinação de idades com precisão aceitável, através de contagem alfa. A amostra C5 da caverna Santana está próxima deste limite, o que é um dos fatores no incremento do erro de sua idade calculada. As demais amostras apresentaram teores de U satisfatórios (tab 4.7).

O segundo requisito fundamental é a ausência de contaminação por tório detrítico. Este é freqüentemente incluído na calcita em crescimento através de fragmentos detríticos depositados por enchentes sobre espeleotemas em desenvolvimento na zona de oscilação do nível do rio. Para detectar a presença de ^{230}Th detrítico, utiliza-se o fato do tório detrítico sempre possuir uma fração de ^{232}Th , o que não acontece com o tório radiogênico acumulado na calcita a partir do decaimento de ^{234}U e ^{238}U . Devido a este comportamento geoquímico do tório, a razão $^{230}\text{Th}/^{232}\text{Th}$ é utilizada como um índice de contaminação (Gascoyne, 1980 apud Gascoyne, et. al., 1983). Quando esta razão for menor que 20, a idade calculada deve sofrer uma correção, assumindo razão inicial (tempo zero) de 1,5, para transformá-la na idade corrigida (Gascoyne, op cit).

Localização e código de coleta	U ppm	$\frac{^{230}\text{Th}}{^{234}\text{U}}$	$\frac{^{234}\text{U}}{^{238}\text{U}}$	$\frac{^{230}\text{Th}}{^{232}\text{Th}}$	Idade calculada X 10 ³ anos	Idade corrigida X 10 ³ anos	Descrição da amostra
Caverna Pescaria P1	0,304	0,935 ± 0,47	1,1 ± 0,046	3,0 ± 0,14	+ 69,6 262,7 - 43,0	+ 77,4 200,8 (38%)* - 50,2	Calcita de granulação grossa, marrom claro, laminada
Caverna Pescaria P2	0,306	0,582 ± 0,026	1,4 ± 0,033	16,3 ± 2	+ 6,2 90,2 - 5,9	+ 6,9 84,7 (8%) - 6,6	Idem a anterior
Caverna Santana (Pata do elefante) C1	0,06	0,651 ± 0,087	1,3 ± 0,187	1,32 ± 0,81	+ 25,7 107,2 - 21,2	+ 6,6 33,1 - 10,7	Calcita granulação média a fina, marrom escuro, lâminas siltosas
Caverna Santana Gal. de acesso Salão São Paulo C2	0,085	0,913 ± 0,085	1,12 ± 0,11	48,5 ± 31	+ 121,3 238,2 (50%) - 57,9	-	Calcita granulação média, branco amarelada, finamente laminada
Caverna Santana (Salão São Paulo) C5	0,04	0,716 ± 0,128	1,586 ± 0,286	23,3 ± 15,6	+ 44,2 122,6 - 32,7	+ 47,6 118,3 (39%) - 36,3	Granulação grossa a fina, maciça, marrom claro a branca
Caverna Chapéu CC2	1,374	0,808 ± 0,27	2,436 ± 0,031	211,2 ± 27,6	+ 8,7 142,7 - 8,2	-	Granulação fina branca
Caverna Alambari de Baixo CA3	0,092	0,863 ± 0,079	1,555 ± 0,158	11,6 ± 2,1	+ 41,3 175,8 - 31,1	+ 43,7 165,5 (26%) - 33,8	Granulação média a fina, marrom claro, bandada
Caverna Morro Preto C11	0,07	1,148 ± 0,144	1,576 ± 0,208	35 ± 16,6	> 350,0	-	Granulação grossa marrom escuro maciça

Tabela 4.7 - Resultados das análises de datação Th/U, realizadas no laboratório de geocronologia dos Departamentos de Geografia e Geologia da McMaster University, Hamilton, Canadá. (*) *Porcentagem de erro indicada entre parênteses.*

Nas amostras analisadas (tab 4.7), o índice de contaminação com tório detrítico, de modo geral é alto, forçando a obtenção de idades corrigidas, o que as torna imprecisas. A contaminação destas amostras já era prevista, em função da coloração marrom da calcita, presença freqüente de pequenas palhetas de mica, dificilmente visíveis a olho nú, e argilo-minerais, notados através do resíduo insolúvel formado após a dissolução das amostras durante a extração do U e Th. Somente as amostras C2 e CC2 apresentaram ausência de contaminação, refletida também, pela sua coloração branca.

Por se tratar de calcita depositada sobre depósitos fluviais, sob influência de enchentes esporádicas no início de seu crescimento, o problema da contaminação sempre será enfrentado nestas amostras. Pretende-se aprimorar no futuro, as datações preliminares obtidas nesta fase, aplicando a técnica recentemente desenvolvida e testada, conforme Przybylowicz, Schwarcz e Latham (1991), para a datação Th/U de calcita contaminada com tório detrítico.

O terceiro pré-requisito é a conservação de um sistema fechado para migração ou adição de núclídeos após a precipitação da calcita. Deve-se selecionar amostras que não apresentam evidências de lixiviação ou re-dissolução interna. Calcita friável ou com poros internos e canaliculos de dissolução devem ser descartadas, pois nestas, a lixiviação de U e Th, ou até a adição destes, pode ter ocorrida. Pelo fato do U sofrer lixiviação preferencial em relação ao Th, modificações pós-deposicionais da composição isotópica da calcita são avaliadas por razões $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ anômalas, significativamente maiores que 1.0 (Gascoyne, Schwarcz e Ford, 1978).

Durante a coleta de amostras, foram selecionados pontos sem características visíveis de lixiviação. As razões $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ obtidas (tab 4.7) confirmam que este pré-requisito foi cumprido, com exceção da amostra C11, que pode ter sofrido uma leve mobilização de urânio (razão $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ maior que 1), o que torna sua idade superestimada.

Considerando os aspectos acima apresentados, as datações mais confiáveis foram obtidas com as amostras C2 e CC2 (tab 4.7), pois apresentam índices de contaminação maiores que 20, por outro lado, a amostra C2 apresenta uma grande margem de erro (cerca de 50%) induzida pela imprecisão da razão $^{230}\text{Th}/^{232}\text{Th}$, o que a torna pouco significativa.

Entre as demais análises, as amostras P2, C5, CA3 e C11, apresentaram resultados aceitáveis, com consideráveis margens de erro (entre 8 e 39%), em função das razões de contaminação entre 10 e 20. A amostra C11, devido ao excesso de tório, ultrapassou o limite de datação pelo método Th/U com contagem alfa.

As idades obtidas com as amostras P1 e C1, são pouco confiáveis, e provavelmente superestimadas, devido à alta contaminação com tório detrítico.

Os resultados geocronológicos de espeleotemas obtidos neste trabalho possuem um caráter preliminar, confirmando um grande potencial deste tipo de análise para contribuir na quantificação das taxas de evolução do sistema cárstico do Alto Ribeira.

Para tornar estes resultados mais representativos para a região, existe a necessidade de trabalhos específicos de geocronologia de calcita secundária de cavernas, inclusive com a utilização de espectrometria de massa (ao invés da contagem alfa), com o objetivo de

aumentar a precisão nas determinações de razões isotópicas de Th e U, o que não foi possível realizar neste trabalho. Pretende-se aplicar esta técnica em etapas futuras de pesquisa.

Taxas de entalhamento fluvial subterrâneo

A altura entre a base de escorrimentos calcínicos ou estalagmites (cobrindo depósitos fluviais) e o leito rochoso do rio subterrâneo, dividida pela idade basal destes espeleotemas, fornece a taxa de erosão ou de entalhamento vertical deste rio.

Na tabela 4.8 apresenta-se as taxas máximas de entalhamento vertical calculadas para as cavernas amostradas. As taxas são máximas, pois as idades basais obtidas para as alturas dos depósitos fluviais são mínimas.

Plotando as idades contra suas alturas relativas ao leito do rio, obteve-se o gráfico da figura 4.35. A inclinação dos alinhamentos destes pontos representa as taxas de entalhamento. Obteve-se dois alinhamentos extremos. O primeiro segue os pontos C1, P2 e CA3. Neste alinhamento, a amostra C1, apesar da pequena margem de erro, é pouco confiável, conforme comentado acima. Já as idades P2 e CA3 são bastante aceitáveis. A inclinação do alinhamento destes 3 pontos forneceu uma taxa de entalhamento fluvial de 0,0050 cm/ano, o que representa também, o valor médio superior (0,0052 cm/ano) das taxas de entalhamento obtidas (tab 4.8). A envoltória inferior, considerando os pontos P1, C2 e a idade máxima do ponto C1, fornece uma taxa de 0,0029 cm/ano, valor um pouco abaixo da média das taxas de entalhamento mínimas obtidas (0,0032 cm/ano). Neste caso, as amostras P1 e C2, além de uma grande margem de erro, provavelmente são exageradas, o que torna a taxa de entalhamento desta reta subestimada.

Figura 4.35 - Altura sobre o leito fluvial atual versus a idade das amostras datadas, com indicação das barras de erro. A inclinação das retas ajustadas fornece as taxas de entalhamento fluvial para as cavernas estudadas.

Amostra	Altura sobre o leito fluvial rochoso (metros)	Idade mínima (X 10 ³ anos)	Taxa de entalhamento vertical máxima (cm / ano)
P1 Caverna Pescaria	5,8	+ 77,4 200,8 - 50,2	0,0017 0,0029 0,0039
P2 Caverna Pescaria	4,6	+ 6,9 84,7 - 6,6	0,0051 0,0054 0,0059
C1 Caverna Santana	1,20	+ 6,6 33,1 - 10,7	0,0030 0,0036 0,0054
C2 Caverna Santana	8,0	+ 121,3 238,2 - 57,9	0,0022 0,0034 0,0044
CA3 Caverna Alambarí de Baixo	8,5	+ 43,7 165,5 - 33,8	0,0041 0,0051 0,0065

Tabela 4.8 - Taxas de entalhamento vadoso vertical para as cavernas amostradas no Alto Ribeira.

Conclui-se, portanto, de uma forma preliminar, que a taxa de entalhamento vadoso vertical nas cavernas estudadas, durante os últimos 240 mil anos, foi entre 0,0029 e 0,0052 cm/ano. Neste intervalo, considera-se que uma taxa mais próxima à 0,005 cm/ano deve ser mais real, devido ao alinhamento melhor e erro menor destes pontos. Como se trata de uma estimativa preliminar, propõe-se adotar a média entre estes extremos, 0,0042cm/ano, com um erro de +0,001 e -0,0013cm/ano, aguardando refinamento deste resultado, com pesquisas futuras.

Comparando o resultado obtido neste trabalho com os de outros autores, nota-se que a taxa de entalhamento proposta para o Alto Ribeira, enquadra-se na faixa de variação das taxas obtidas para diversas regiões cársticas, em diferentes condições geomórficas e tectônicas, conforme é apresentado na tabela 4.9.

O entalhamento fluvial de *canyons* subterrâneos é consequência do rebaixamento do nível de base, que por sua vez, em períodos de centenas de milhares de anos, é controlado principalmente pelo soerguimento tectônico da área.

Com a estimativa quantitativa da taxa máxima de entalhamento na região estudada, observa-se que o valor médio de 0,004 cm/ano é semelhante ao entalhamento medido na região centro norte da Inglaterra (tab 4.9), região tectonicamente estável durante o Pleistoceno, tendo sofrido movimentos verticais neste período, principalmente devido à compensações isostáticas, controladas pelas fases glaciais. Em contraste, a taxa de entalhamento máximo medida para a ilha sul da Nova Zelândia e Montanhas Rochosas do Canadá (Crowsnest Pass), chega a suplantiar o dobro do entalhamento proposto para o Alto Ribeira (tab 4.9). Estas taxas superiores de entalhamento subterrâneo são correlacionadas a um regime mais intenso de soerguimento da região, em função do ambiente tectônico ativo (zonas próximas ou sobre cadeias de montanhas em desenvolvimento) destas áreas (Williams, 1982 e Ford, et al., 1981).

Local	Taxas máximas de entalhamento subterrâneo cm / ano	Tempo envolvido (antes do presente) X 10 ³ anos	Fonte
Yorkshire Dales, centro-norte da Inglaterra	0,002 a 0,005	350	Gascoyne, 1981 Gascoyne, Ford e Schwarcz, 1983
Bearjaw Valley, Rochosas, Canadá	0,005 a 0,013	350 a 700	Ford, et. al., 1981
Crowsnest Pass, Rochosas, Canadá	0,011 a 0,013	700 a 100	Ford, et. al., 1981
Nova Zelândia, noroeste da Ilha Sul	0,014 a 0,027	400	Williams, 1982
Jamaica	0,013 a 0,020	200	Gascoyne, 1981
Sul da Tasmânia	0,0106 a 0,0212 e 0,0063	190	Goede e Harmon, 1983
Alto Ribeira Iporanga, São Paulo	0,0029 a 0,0052	240	Este trabalho

Tabela 4.9 - Quadro comparativo entre taxas de entalhamento fluvial subterrâneo de diferentes regiões cársticas.

Baseado neste quadro comparativo de taxas de entalhamento fluvial subterrâneo, conclui-se que o Alto Ribeira enquadra-se num regime de taxas médias de entalhamento, interpretado como sendo consequência de um regime de soerguimento tectônico moderado durante o período datado (~ 240.000 anos), o que coincide também, com a interpretação morfológica do padrão vertical de condutos, apresentada anteriormente.

Finalmente deve-se frisar ainda, que a taxa de entalhamento vertical determinada acima, representa uma média das taxas correspondentes a um longo prazo, ou seja, é o resultado final de um processo de soerguimento, que não necessariamente foi constante durante o intervalo temporal considerado. Este período, provavelmente inclui fases de maior e menor soerguimento, ou até, pulsos de subsidência (ou subidas glácio-eustáticas do nível de base) acompanhadas de agradacão dos canais fluviais subterrâneos e externos.

A detecção de registros desta variação do processo de rabaixamento do nível de base, depende de um estudo específico, para obtenção de um número maior de idades radiométricas de depósitos calcíticos, relacionados ao entalhamento fluvial subterrâneo.

Estimativa da idade de condutos e dos vales externos adjacentes ao sistema de cavernas Pérolas-Santana

Considerando que o entalhamento fluvial vertical ao longo do sistema de cavernas Pérolas-Santana foi aproximadamente constante ao longo do tempo, ou seja, períodos de entalhamento vadoso mais intenso, sendo compensados, por fases de rebaixamento mais lento do leito fluvial, propõe-se utilizar a taxa de entalhamento obtida no item anterior, para calcular uma estimativa da idade deste sistema de cavernas.

A profundidade máxima de canyons vadosos observada nas cavernas Pérolas e Santana varia entre 40 e 50m. Com a taxa de entalhamento vadoso entre 0,0029 e 0,0052 cm/ano aplicada sobre 50m de profundidade, obtém-se 961,5 Ka (Ka = 1000 anos) como uma idade mínima, 1724,1 Ka como máxima e 1190,5 Ka como uma idade média. Deve-se

lembrar aqui, que estas idades são mínimas, pois a velocidade de entalhamento determinada acima corresponde à valores máximos.

Conclui-se, portanto, que no mínimo por aproximadamente 1,2 a 1,7 milhões de anos, até o presente, o sistema cárstico subterrâneo, em questão, se encontra em fase de desenvolvimento, com entalhamento vadoso.

Esta idade mínima proposta para o sistema Pérolas-Santana, é compatível com idades determinadas para outros sistemas cársticos. Rowe (1985), com base em taxas de entalhamento subterrâneo, datadas pelo método $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ e paleomagnetismo em espeleotemas, reconheceu que desde 1,5 Ma o entalhamento subterrâneo e a dissecação do platô do sul das montanhas Pennines (centro sul da Inglaterra) está em franco desenvolvimento. Villinger (1987) e Vogelsang e Villinger (1987), utilizando a taxa de erosão química e o volume de cavernamento, estimaram a idade do sistema cárstico Donau-Aach (Alemanha) entre 500 Ka e 1 Ma. Este mesmo sistema de cavernas, foi reavaliado por Dreybrodt (1990), com base no cálculo da idade através de seu modelo cinético de dissolução de calcita, como tendo em torno de 1,3 Ma. Conforme já citado na introdução (4.4.1), Gascoyne, et. al. (1983), obtiveram uma idade mínima entre 700Ka e 1 Ma para a fase de desenvolvimento do sistema de cavernas Castleguard, Canadá.

A taxa de entalhamento subterrâneo obtida para a região estudada, também pode ser utilizada, para avaliar uma idade mínima dos vales fluviais externos, sobre metacalcários e adjacentes aos sistemas de cavernas, seguindo a metodologia de Ford et. al. (1981).

O princípio desta avaliação de idade da paisagem externa, é a correlação entre o entalhamento vertical subterrâneo e a velocidade de rebaixamento dos fundos de vales fluviais, sobre a rocha encaixante da caverna. No exemplo em análise, correlaciona-se o entalhamento vadoso da caverna Santana com o rebaixamento do vale do rio Betari. O vale do rio Betari é transversal ao alinhamento do sistema de cavernas Pérolas Santana, interceptando este, representando o nível de base local, em relação ao entalhamento da drenagem subterrânea.

Esta correlação segue a premissa de que o entalhamento subterrâneo possui praticamente a mesma velocidade do rebaixamento do canal fluvial externo. Considerando esta premissa, aplica-se a taxa de entalhamento do *canyon* subterrâneo ao entalhamento do desnível entre as cristas e fundos de vales do calcário.

Para o vale do Betari, junto à ressurgência da caverna Santana, obteve-se um desnível de 460m, entre a crista sobre os calcários (cota 700 m.s.n.m) e o leito do rio (cota 240), medido sobre a carta topográfica 1:10.000 (folha U-12, DAEE, 1957). Este é o entalhamento fluvial mais profundo adjacente ao sistema Pérolas-Santana, sobre metacalcários.

A taxa média de entalhamento subterrâneo (0,0042 cm/ano) aplicada neste desnível, resulta numa idade aproximada de 10,9 Ma para este entalhamento fluvial. Transferindo o erro da taxa de entalhamento para este cálculo, obtêm-se a idade mínima de 8,9 Ma, e máxima de 15,8 Ma, para o vale do rio Betari, transversal ao calcário encaixante da caverna Santana.

Este cálculo da idade mínima do relevo, deve sofrer uma correção em decorrência do fato das cristas calcárias não permanecerem estáticas em relação ao rebaixamento erosivo dos talvegues fluviais. Na realidade estas também são rebaixadas com o tempo, mas com taxas muito inferiores que o talvegue. Este rebaixamento das cristas calcárias é evidenciado pelo desnível de 150 a 230m dos topos calcários em relação às cristas quartzíticas e metapelíticas adjacentes.

No caso da medida de desnível utilizada no cálculo da idade, a diferença de cota entre a crista de calcário e o cume quartzítico (crista da Serra da Boa Vista) mais próximo é de 230m. Isto significa que o desnível total entalhado pelo rio Betari, sobre os metacalcários Furnas Santana, foi de no mínimo 690m.

Considerando este desnível total entalhado pelo rio Betari, com uma taxa máxima média de 0,0042 cm/ano, extrapola-se a idade mínima média deste vale para 16,4 Ma (ou entre 23,8 e 13,3 Ma, utilizando-se a faixa de variação da taxa de entalhamento).

Finalmente, convém frisar mais uma vez, o caráter preliminar desta idade, ressaltando tratem-se de idades mínimas, devido à utilização de taxas máximas de entalhamento subterrâneo.

4.5 Evolução do sistema cárstico no quadro geomorfológico regional

Seguindo a compartimentação geomorfológica do Estado de São Paulo de Almeida (1964), a região do Alto Ribeira, insere-se na sub-zona de Paranapiacaba, a qual "constitui o setor recuado para o interior, da zona da Serrania Costeira" (Serra do Mar). Esta pertence ao "rebordo do Planalto Atlântico, diretamente drenado para o mar", e denominado por Almeida (op. cit.), de Província Geomorfológica Costeira, denominação esta, mantida posteriormente no zoneamento geomorfológico de São Paulo, apresentado em IPT (1981a), conforme foi detalhado no capítulo 2.

A paisagem serrana do Alto Ribeira, é uma herança da movimentação tectônica da crosta, principalmente no sentido vertical, do Arco de Ponta Grossa, após a consolidação da faixa de dobramentos Ribeira (Hasui e Oliveira, 1984) no Proterozóico Superior.

Asmus (1981), com base nos trabalhos de Fúlfaro (1971), Gama Jr. (1979) e Barberena, Correia e Aumond (1980), concluiu que o Arco de Ponta Grossa não existia até o final do Permiano, sendo que sua formação iniciou-se no Triássico - Jurássico, com o soerguimento da crosta e subdivisão da Bacia do Paraná em duas sub-bacias. Até então, esta região era coberta pelos sedimentos permianos da Bacia do Paraná.

Com o contínuo soerguimento do arco, em paralelo ao início da fragmentação do paleo-continente Gondwana no sudeste do Brasil, a cobertura sedimentar do arco foi totalmente erodida, e a partir do Turoniano, iniciou a constituir um importante alto estrutural em relação à bacia do Paraná (Zalán, et. al., 1990).

Conclui-se, portanto, que no contexto regional, a área de estudo iniciou sua história de soerguimento tectônico no Cretáceo Médio. Este processo envolveu a remoção da cobertura da Bacia do Paraná e parte das rochas supracrustais do Grupo Açungui, atingindo o quadro atual da Serra de Paranapiacaba. Na área estudada (anticlinal da Biquinha e

sinclinal do Lageado), foram removidos, no mínimo, 3300m de metassedimentos supracrustais, conforme medida obtida sobre o perfil estrutural apresentado por Campanha (1991).

Na paisagem serrana atual da região estudada, observa-se o nivelamento aproximado dos topos de cristas quartzíticas e metapelíticas, formando uma superfície que oscila nas cotas de 900 a 1100m (foto 4.6). Neste quadro, ressalta-se a crista de quartzito da serra da Boa Vista, com cotas máximas entre 940 e 1000m.

Foto 4.5 - Aspecto do nivelamento de cristas na área estudada, correlacionado à superfície Japi. Vista do vale do rio Betari do mirante da Serra da Boa Vista, estrada Apiaí - Iporanga.

Este nivelamento característico de cristas observado na área, foi correlacionado por Almeida (1964) à superfície de aplainamento Japi, por ele definida como sendo um sub-nivelamento de testemunhos de uma superfície erosiva, embutida no Planalto Atlântico, hoje na cota em torno de 1000m. Almeida (1964) ressalta a dificuldade de datação desta superfície de aplainamento, sugerindo idade mínima pliocênica. Posteriormente, com o reconhecimento desta superfície erosiva cortando intrusões alcalinas senonianas (Cretáceo Superior) situando-se antes do início da subsidência do gráben do Paraíba do Sul, Almeida (1976) redifiniu sua idade, atribuindo seu desenvolvimento principal ao Eoceno. Melo, et. al. (1985) propuseram idade mínima eocênica superior ao preenchimento sedimentar da bacia do Paraíba do Sul.

A idade mínima do vale do Betari, obtida neste trabalho, contribui no refinamento da datação da superfície de aplainamento Japi, no conceito de Almeida (1964). Propõe-se, que o entalhamento desta superfície, na área da sub-zona serrana Paranapiacaba, iniciou-se no mínimo, durante o Mioceno Inferior (~24 Ma.) a Médio (13,3 Ma.), com base no tempo envolvido no esculpimento do vale do Betari.

Portanto, o aplainamento da superfície Japi, deve ter ocorrido no período máximo entre o Eoceno (idade máxima atribuída por Almeida, 1976) e o Mioceno Inferior a Médio, idade mínima obtida para a superfície Japi neste trabalho (fig 4.36).

Figura 4.36 - Quadro demonstrativo da cronologia de eventos geomórficos cenozóicos na região do Alto Ribeira. Subdivisão do Cenozóico adaptada de Van Eysinga (1975).

1- Entalhamento vadoso de sistemas de cavernas.

2- Fase de iniciação de condutos freáticos.

3- Dissecção da superfície de aplainamento Japi (entalhamento do vale do rio Betari).

4- Desenvolvimento da superfície Japi, segundo proposta deste trabalho.

5- Desenvolvimento da superfície Japi, segundo Almeida (1976).

6- Desenvolvimento da superfície Japi, segundo Almeida (1964).

~ Indicação da idade máxima e mínima em relação à média.

A fase de desenvolvimento de sistemas de cavernas envolveu no mínimo os últimos 1,2 a 1,7 Ma., conforme estimativa da idade do entalhamento vadoso obtida para a caverna

Santana. Isto implica que, durante este período, os metacalcários já possuíam permeabilidade secundária avançada, capaz de absorver grande parte do escoamento superficial. Isto, por sua vez, significa que neste intervalo de tempo, o sistema de drenagem superficial estava em fase adiantada de segmentação, com insurgências e ressurgências estabelecidas, ou seja, a paisagem cárstica superficial (com bacias poligonais) estava em desenvolvimento e, provavelmente, em grande parte já implantada.

Desta maneira interpreta-se que, no processo de dissecação do relevo na área de estudo, a paisagem fluvial sobre os metacalcários, deu lugar à topografia de bacias poligonais, no mínimo, em torno de 2 Ma. antes do presente. Inclui-se nestes 2Ma., cerca de 300 Ka para a fase de iniciação da espeleogênese, baseado na taxa média de abertura longitudinal de condutos freáticos de 5×10^4 anos/km, de Ford (1980, 1988), conforme comentado no início do item 4.4.1.

Por último, deve-se comentar ainda, que a história geomórfica mais recente da região estudada provavelmente foi influenciada pelas variações do nível de base, controladas pelas oscilações do nível médio do mar durante as fases glaciais pleistocênicas, como também, por variações nas taxas e sentido de movimentos tectônicos verticais. Estes últimos, foram identificados na região do baixo vale do Ribeira, por Melo (1990) e Melo, Fernandes e Coimbra (1990), através de falhamentos em sedimentos de terraços fluviais suspensos, da Formação Sete Barras e Pariquera Açu, atribuídas ao Terciário Superior a Pleistoceno.

A hipótese de influência eustática na dinâmica de entalhamento e agração de vales fluviais e condutos subterrâneos, é levantada aqui, devido ao fato, de que durante o último máximo glacial (em torno de 15ka), o nível do mar recuou, atingindo a cota batimétrica atual de 130m, conforme Kowsmann e Ataíde Costa (1979).

Desta observação, surge a questão, de qual teria sido o impacto geomórfico de um incremento do potencial hidráulico na área cárstica, em função da oscilação de até 130m do nível de base marinho, durante um período de cerca de 10ka, duração mínima do nível marinho recuado, segundo Kowsmann e Ataíde Costa (op. cit.).

Um dos efeitos deste incremento do potencial hidráulico sobre a área cárstica, poderia ter sido, um período de aumento na capacidade erosiva do sistema fluvial e rebaixamento dos fundos de vales, aliado ao incremento do gradiente hidráulico de sistemas de circulação cársticos e conseqüente aceleração no entalhamento subterrâneo. Após o término da fase glacial e volta às condições normais de nível de base, com redução do potencial hidráulico na área, a capacidade de erosão e transporte do sistema de drenagem diminuiu, condicionando o assoreamento de fundos de vales e segmentos de condutos subterrâneos, previamente entalhados.

Na planície aluvial do rio Betari, junto ao bairro da Serra (trecho do rio sobre a área carbonática Lageado-Bombas), observou-se que abaixo do nível atual do rio, existe um preenchimento de sedimentos grosseiros gradando para finos no topo, com uma espessura mínima de 3 a 5m, observados em poços caseiros para abastecimento de água. Isto

evidência que o rio Betari, atualmente está entalhando seus próprios sedimentos, depositados anteriormente.

Em várias cavernas como, por exemplo, Areias e Ouro Grosso (localizadas na área carbonática Lageado-Bombas), notou-se a ocorrência de estalagmites e escorrimentos calcíticos sobre depósitos fluviais ou sobre o fundo rochoso do canal subterrâneo, nas proximidades do leito fluvial atual, cerca de 0,5m acima do nível normal do rio atual e com evidências de intensa re-dissolução. Esta re-dissolução é causada pela exposição do espeleotema ao fluxo de água corrosivo, o qual erode a calcita, entalhando-a ou afinando a estalagmite, expondo suas linhas de crescimento. Estas estalagmites observadas tiveram, portanto, uma fase de crescimento acima do nível de variação do rio, seguida de uma fase de erosão intensa, ou seja, abaixo do nível de variação do rio e, uma fase atual, cerca de 0,5m acima do nível do rio (fig 4.37), sendo atingidas por este, somente com vazões altas de enchentes. Deve-se frisar aqui, que estalagmites bem formadas, como é o caso das observadas, somente se desenvolvem, sem a ação de fluxos frequentes de enchentes.

Figura 4.37 - Representação esquemática da agradação do vale do rio Betari (no Bairro da Serra) e re-dissolução de estalagmites formadas sobre o leito fluvial de afluentes subterrâneos do rio Betari, interpretados como sendo produto da variação eustática do nível de base na área, durante a última fase glacial.

Estes canais fluviais subterrâneos e a planície aluvial do bairro da Serra, estão atualmente, respectivamente, a 200 e 170m acima do nível do mar, distando deste em linha reta cerca de 90km.

Retomando a discussão hipotética acima iniciada, duas hipóteses poderiam ser consideradas, para explicar, tanto o re-entalhamento de sedimentos do próprio rio Betari, como também, a fase de re-dissolução de espeleotemas próximos ao leito dos rios

subterrâneos. Ambas requerem uma fase de rebaixamento do nível de base local, seguida da subida do mesmo.

A primeira hipótese baseia-se na variação eustática do nível de base. Nesta, associa-se o entalhamento da planície do rio Betari, no bairro da Serra, abaixo do nível atual, assim como, a deposição de calcita secundária sobre o leito exposto acima do nível de água de canais subterrâneos, ao período de nível de base local rebaixado em função da queda do nível do mar durante a última fase glacial (~entre 20 e 10ka atrás). Com a retração da glaciação e subida do nível médio do mar, o nível de base local teria retornado aos níveis anteriores, diminuindo o gradiente hidráulico do sistema de drenagem, causando a agradação da planície aluvial do rio Betari, assim como, o afogamento e re-dissolução de espeleotemas formados sobre os leitos fluviais subterrâneos.

A segunda hipótese, mais ousada, é baseada em movimentos isostáticos na região, em função de tectônica vertical de blocos crustais, através da reativação de falhamentos antigos, refletindo a atividade tectônica pleistocênica, definida por Melo (1990) no baixo vale do Ribeira, ao longo do lineamento Guapiara. Nesta hipótese, o entalhamento do rio Betari, assim como, a deposição de espeleotemas em trechos do leito fluvial, estariam relacionados ao soerguimento tectônico da área, seguido por um período de subsidência da mesma, responsável pela agradação do vale fluvial e erosão dos espeleotemas, novamente substituído por uma retomada do soerguimento, atuante até o presente, re-entalhando os sedimentos de agradação e os canais subterrâneos, expondo os espeleotemas erodidos acima do nível do rio.

De uma forma preliminar, favorece-se a primeira hipótese, devido à dificuldade de demonstrar, qual o mecanismo geodinâmico atuante na área, responsável pela oscilação vertical de blocos crustais, considerando o nível de base praticamente estável durante o Pleistoceno, o que também, incorre numa simplificação, provavelmente incorreta.

Para verificar qual dos mecanismos hipotéticos acima esboçados é mais provável, para explicar a oscilação pleistocênica do nível de base na área cárstica estudada, existe a necessidade de um estudo específico da distribuição e cronologia dos espeleotemas com re-dissolução, assim como, dos depósitos fluviais ao longo do rio Betari e seus afluentes subterrâneos. Em paralelo, necessita-se investigar qual foi a real variação de gradiente hidráulico e incremento da capacidade de erosão fluvial na área, em resposta ao recuo do nível do mar sobre a plataforma continental, até a cota de -130m.

O estudo deste problema foge do escopo desta tese, tendo sido reconhecido durante o desenvolvimento dos trabalhos relativos a esta tese, e discutidos aqui preliminarmente, com o objetivo de evidenciar o potencial de contribuição do estudo geológico e paleo-hidrológico de sistemas cársticos no entendimento da evolução geomórfica cenozóica do alto vale do Ribeira.

4.7 Conclusões

Nas áreas carbonáticas Furnas-Santana e Lageado-Bombas, os sistemas de cavernas são do tipo misto e ocorrem preferencialmente nas proximidades dos contatos SE, em

função da concentração das linhas de fluxo da água subterrânea nesta zona de permeabilidade contrastante, representada pelo contato entre metapelitos e metacalcários. Esta concentração de linhas de fluxo, é condicionada pela resultante entre o gradiente hidráulico dirigido para o nível de base local (rio Betari) e aquele com sentido geral para o rio Ribeira, nível de base regional relativo aos metacalcários.

A morfologia planimétrica dos sistemas de cavernas, reflete o estilo estrutural do metacalcário encaixante. O padrão planimétrico retilíneo e anguloso ($S \sim 1,01$ a $1,09$), típico do sistema Pérolas-Santana, está associado a mergulhos altos do acamamento, enquanto que o padrão sinuoso e curvilíneo ($S \sim 1,24$ a $1,49$) desenvolve-se sobre mergulhos moderados a baixos da estratificação, como é o caso da caverna Areias.

O grau de sinuosidade dos condutos subterrâneos depende do ângulo agudo entre o gradiente hidráulico e a rede de descontinuidades presente na rocha encaixante. Quanto maior for este ângulo, tanto mais sinuosa será a rota de condutos da água subterrânea. Entre as descontinuidades presentes, os planos de estratificação, fraturas simples longas e falhas constituem as estruturas mais favoráveis para instalação de condutos.

A iniciação de proto-cavernas, acompanha linhas de intersecção, entre o acamamento e fraturas simples longas e falhas (incluindo fraturas de cisalhamento). A profundidade de iniciação de condutos freáticos, abaixo do lençol freático, segue uma função exponencial, onde a base da função é o produto entre o seno do ângulo de mergulho da estratificação e a distância entre o ponto de insurgência e ressurgência da rota de condutos em iniciação, seguindo o modelo espeleogenético de Worthington (1991), conforme testado para o sistema Pérolas-Santana. Com a confirmação deste modelo, é possível prever estimativas da profundidade de condutos cársticos inacessíveis, com base no conhecimento da estrutura da rocha carbonática e da localização de sumidouros e ressurgências.

A fase de desenvolvimento da espeleogênese, na área estudada, caracteriza-se principalmente pelo entalhamento vadoso ao longo dos condutos principais dos sistemas de cavernas, produzindo *canyons* subterrâneos com até 50m de entalhamento vertical, sob condições de rebaixamento moderado do nível de base destes sistemas, interpretado como sendo produto de soerguimento tectônico moderado da área.

As idades $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$ de calcita secundária depositada diretamente sobre testemunhos de sedimentos fluviais subterrâneos, permitiu estimar a taxa média máxima de entalhamento vadoso subterrâneo, atuante na área, durante os últimos 240.000 anos. Obteve-se um valor entre 0,0029 e 0,0052 cm/ano, sendo que a taxa máxima de entalhamento subterrâneo, mais provável, é em torno de 0,0042 cm/ano (42mm/ka).

Aplicando o resultado acima, sobre o entalhamento vadoso observado na área, concluiu-se que o sistema cárstico do Alto Ribeira, encontra-se na fase de desenvolvimento, por aproximadamente 1,7 milhões de anos e que a idade mínima do sistema de cavernas Pérolas-Santana, é muito próxima de 2 milhões de anos.

Correlacionando o entalhamento fluvial subterrâneo ao rebaixamento do vale do rio Betari sobre metacalcários, propõe-se idade mínima de $16,4^{+7,4}_{-3,1}$ milhões de anos para o esculpimento deste vale.

Num contexto regional de evolução do relevo, concluiu-se que a superfície de aplainamento Japi (Almeida, 1964), instalou-se na região do Alto Ribeira, entre o Eoceno Superior e o Mioceno Inferior a Médio, e que a dissecação desta iniciou-se no mínimo a cerca de 23,8 Ma. (Mioceno Inf.). Neste quadro cronológico de evolução do relevo, os sistemas fluviais sobre os metacarbonatos foram substituídos pela topografia de bacias poligonais de drenagem centrípeta, em torno de 2 milhões de anos.

As idades obtidas neste trabalho são preliminares, devendo sofrer detalhamento com pesquisas futuras.

CAPÍTULO 5

DINÂMICA MODERNA DO SISTEMA CÁRSTICO DO ALTO RIBEIRA

5.1 Introdução

A água subterrânea constitui o agente geomórfico primário em terrenos cársticos. Devido ao fato da interação água - rocha representar o processo fundamental da dinâmica de sistemas cársticos, o impacto geomórfico da água subterrânea sobre áreas carbonáticas, tem sido um dos temas centrais das pesquisas mais detalhadas e abrangentes desenvolvidas sobre paisagens cársticas do nosso planeta (Drake, 1984), com o objetivo de quantificar taxas de erosão sobre rochas carbonáticas.

Para estabelecer parâmetros quantitativos do processo de erosão química atuante num sistema cárstico, necessita-se medir o volume de solvente (água) transmitido pelo sistema durante um ano hidrológico ou mais (monitoramento hidrológico), assim como, avaliar o impacto deste solvente sobre a rocha carbonática encaixante do mesmo (monitoramento hidroquímico), segundo Smith e Newson (1974).

Neste trabalho selecionou-se o sistema de drenagem cárstica Pérolas-Santana (anexo 4.2) para a análise do seu balanço hídrico e de sua dinâmica erosiva atual. O critério norteador desta escolha foi o fato deste sistema apresentar, a princípio, somente uma ressurgência da água coletada sobre sua área de captação (o que se mostrou mais complexo após a realização do estudo), assim como, pelo maior grau de conhecimento disponível, em relação à distribuição de cavernas cartografadas e das rotas de fluxo da água subterrânea deste sistema.

5.2 Hidrologia do sistema de cavernas Pérolas-Santana

5.2.1 Medição de vazão

Métodos utilizados

Com o objetivo de medir o volume de água escoado pelo sistema Pérolas Santana durante um ano hidrológico, monitorou-se a vazão do córrego Roncador na ressurgência da caverna Santana (anexo 4.3). Para se obter uma estimativa do volume de água injetada na área do sumidouro principal deste sistema, executou-se o monitoramento da vazão nas proximidades do sumidouro da caverna Pérolas (anexo 4.3).

Este monitoramento hidrológico envolveu a instalação de limnógrafos. Na caverna Santana o limnógrafo foi instalado a cerca de 100m da entrada da caverna (foto 5.1). Outro limnógrafo foi instalado na margem do rio subterrâneo na caverna Pérolas, cerca de 300m a jusante do sumidouro principal do rio Roncador. Este ponto representa a água coletada pela planície cárstica do *polje* de contato junto ao sumidouro desta caverna, assim como, o escoamento superficial coletado sobre metapelitos e granitos na área de captação alogênica deste rio (anexo 3.3 e fig 5.1), antes de atingir o sumidouro.

Utilizou-se limnógrafos da marca Stevens (modelo 68-F), de tambor registrador horizontal e registro mensal na escala 1:1. Este equipamento é de propriedade do

Figura 5.1 - Demarcação pelos divisores topográficos das áreas de captação referentes às bacias hidrográficas dos sistemas cársticos Pérolas-Santana e Grilo, com localização dos pontos de amostragem hidroquímica e de instalação dos limnógrafos.

Foto 5.1 - Vista do limnógrafo instalado na ressurgência do sistema Pérolas-Santana, a cerca de 100m da entrada da caverna Santana. A esquerda do limnógrafo observa-se a régua de referência.

Departamento de Geografia da McMaster University, obtido para este trabalho por empréstimo, através do Prof. Derek Ford.

Os limnógrafos foram colocados sobre tubos de PVC de 2m de altura e 30cm de diâmetro. A base destes tubos estabilizadores foi perfurada e revestida com uma tela de malha fina (filtro) e enterrada nas margens dos rios monitorados, a uma profundidade de 40cm abaixo do nível de água da época de estiagem (foto 5.1), seguindo as recomendações de Church e Kellerhals (1970). Como referência para o registro da variação de altura da lâmina de água nos pontos monitorados instalou-se no leito do rio junto a cada limnógrafo uma régua vertical graduada em milímetros.

O registro da variação do nível do rio na ressurgência do sistema para o período entre junho de 1990 e fevereiro de 1992 foi obtido através da montagem e digitalização das folhas de registro mensais, conforme o exemplo do anexo 5.1.

A transformação da curva de variação do nível do rio na curva de vazão instantânea requer a construção de uma curva chave, a qual relaciona a altura do rio com a descarga fluvial correspondente (Gupta, 1989). Para tal, mediu-se a vazão nos pontos monitorados em diferentes alturas do rio.

Dois métodos foram utilizados para medir vazões: o método **área-velocidade** e o de **diluição de sal** (NaCl).

Para aplicação do método área - velocidade selecionou-se uma seção transversal ao rio Roncador, o menos irregular possível, de baixa energia e o mais próxima da ressurgência, no caso da caverna Santana. Este método baseia-se na medição da velocidade do fluxo de água com molinete fluviométrico em vários pontos ao longo da seção transversal do rio e nas profundidades de 1/3 e 2/3 em cada um destes pontos. Estas velocidades são posteriormente multiplicadas pelas áreas de influência dos pontos de medição de fluxo (Gupta, 1989). A vazão total corresponde à somatória das vazões obtidas nos vários setores ao longo da seção transversal, a qual foi medida minuciosamente com trena. Na caverna Santana, a título de exemplo, subdividiu-se a seção com 3,5m de comprimento em 15 setores, nos quais mediu-se a velocidade do fluxo nas profundidades de 1/3 e 2/3, quando a lâmina de água do setor era superior a 30cm (a profundidade máxima em vazões baixas era de 75cm, chegando a 1,4m em vazões elevadas).

Este método é indicado para fluxos fluviais de comportamento quase laminar (pouco turbulento). No caso da caverna Santana, o trecho escolhido para medição de vazão apresentava leve turbulência em níveis baixos de descarga. Durante vazões altas, notou-se alta turbulência e turbidez da água, o que praticamente impediu a aplicação desta técnica. No segmento monitorado do córrego Roncador na caverna Pérolas, a pequena espessura da lâmina de água (entre 10 a 20cm) e a forma altamente irregular do leito fluvial, tornaram a aplicação do método área-velocidade pouco viável.

Em função dos problemas acima apontados, aplicou-se o método de diluição de sal para medir a vazão na caverna Pérolas e nas alturas altas do rio na caverna Santana, pois esta técnica é especialmente apropriada para fluxos altamente turbulentos (Church e Kellerhals, 1970). Baseia-se na injeção instantânea no rio de um volume previamente

medido (S) de solução de sal (NaCl), sendo que num ponto a jusante da injeção, após sua completa homogeneização, mede-se a variação de concentração, $c(t)$, do sal, conforme a passagem da "onda" de solução de sal. Esta concentração $c(t)$ varia de zero até um máximo, caindo novamente a zero, após a passagem da solução (S). A cada instante (t), durante a passagem da onda de sal, a água do rio irá conter uma fração (s) do volume (S) inicialmente injetado. Portanto, a concentração média da solução no rio será dada pela expressão:

$$c(t) = \frac{S}{Q}, \text{ ou } S = Qc(t)$$

onde Q é a vazão do rio a ser determinada.

Após a passagem da onda de solução de sal pelo ponto de medição, teremos:

$$S = Q \int_{t_i}^{t_f} c(t) dt$$

onde S equivale ao volume de solução de sal injetada no rio e t_i e t_f são os tempos de início e fim da passagem da "onda de sal". Através de um rearranjo desta equação, obtém-se a vazão Q do rio:

$$Q = \frac{S}{\int_{t_i}^{t_f} c(t) dt}$$

Os valores de concentração de sal no rio durante o intervalo t_i e t_f são lidos através de medidas de condutividade elétrica no rio. Estas leituras de condutividade são posteriormente transformadas em concentrações relativas ao volume (S) inicialmente conhecido, com concentração padrão 1, através de uma curva de calibração, a qual deve ser obtida no local, logo após a injeção.

Para efetuar o cálculo das concentrações de diluição (calibração entre condutividade e concentração), assim como a integral da curva de concentração de sal no rio versus tempo, o que fornece a vazão (Q), utilizou-se uma rotina de computador desenvolvida por Karmann (1989), conforme exemplo do anexo 5.2.

Resultados obtidos

Os resultados das medidas de vazão são apresentados na tabela 5.1. A precisão destas medidas foi testada através da medição da mesma vazão pelos dois métodos diferentes em várias alturas. Os resultados obtidos mostraram diferenças de até 12% entre vazões obtidas com os dois métodos, sendo que a diferença maior foi observada com vazões maiores. Repetindo a mesma medida por três vezes com o método de diluição de sal, obteve-se erros entre 6 e 10% em relação ao valor médio das três medidas. Considera-se, portanto, que as vazões medidas no sistema Pérolas-Santana envolvem um erro máximo de 12%, o que é bastante aceitável em medidas de vazão executadas em canais irregulares (Gupta, 1989). No total realizou-se 58 medidas de vazão para este trabalho.

As curvas-chave (fig 5.2) foram determinadas para os dois pontos monitorados considerando que a relação entre a altura do rio e a vazão correspondente segue uma função exponencial do tipo $Q = aA^b$, onde Q é a vazão em m^3/s e A a altura em metros da lâmina d'água do rio em relação a um datum arbitrário marcado na régua graduada de referência instalada junto aos limnógrafos.

Figura 5.2 - Relação entre altura do rio e vazão para a ressurgência do sistema Pérolas-Santana e sumidouro principal do sistema, caverna Pérolas.

Ressurgência da Caverna Santana		Caverna Pérolas	
Altura do rio (metros)	Vazão (m^3/s)	Altura do rio (metros)	Vazão (m^3/s)
0,17	0,277	0,025	0,01
0,173	0,300	0,04	0,0275
0,18	0,296	0,05	0,052
0,19	0,384	0,055	0,054
0,215	0,375	0,06	0,065
0,240	0,452	0,07	0,076
0,245	0,520	0,09	0,122
0,26	0,480 *	0,10	0,215 *
0,32	0,670 *	0,11	0,222 *
0,38	0,840 *	0,112	0,225 *
0,40	0,920 *	0,14	0,410 *
0,56	1,390 *	0,15	0,435 *
0,595	1,500 *	0,18	0,695 *
0,69	1,860 *		
0,70	1,940 *		
0,74	2,202 *		

Tabela 5.1 - Vazões medidas na ressurgência da caverna Santana e na caverna Pérolas (respectivamente, ressurgência e sumidouro principal do sistema de cavernas Pérolas - Santana). * vazões medidas somente com o método de diluição de sal. Altura do rio medida sobre a régua de referência instalada para cada limnógrafo.

Para a ressurgência do sistema Pérolas-Santana (cav. Santana) obteve-se a equação:

$$Q = 1.135 A^{1.34}, \text{ ou } \ln Q = \ln 1,135 + 1,34 \ln A,$$

com coeficiente de correlação de 0,99 e R^2 igual a 99,43%.

Para o sumidouro principal do sistema (cav. Pérolas) a equação chave equivale a:

$$Q = 3,177 A^{2,109}, \text{ ou } \ln Q = \ln 3,177 + 2,109 \ln A,$$

com coeficiente de correlação de 0,99 e $R^2 = 99,14\%$.

Com base na equação chave para a ressurgência do sistema de cavernas Pérolas-Santana, transformou-se a curva de variação do nível do rio versus tempo (anexo 5.1) na curva de vazão instantânea em função do tempo (fluviograma), representada na figura 5.3.

5.2.2 Análise do fluviograma da ressurgência do sistema Pérolas-Santana

O fluviograma de nascentes cársticas representa uma espécie de "assinatura" das características físicas do aquífero associado ao sistema de cavernas e sua área de captação, fornecendo uma série de parâmetros hidrológicos fundamentais para uma análise quantitativa deste aquífero (Milanovic, 1981 e Mangin, 1984).

Na tabela 5.2 apresenta-se alguns destes parâmetros obtidos para a ressurgência da caverna Santana. As vazões máxima (Q_x), mínima (Q_n) e média (Q_m) correspondem ao período total monitorado (22 meses, junho de 90 a fevereiro de 92), incluindo duas épocas chuvosas. Os volumes de escoamento total (V_t), escoamento direto (V_d) e de escoamento básico (V_b) correspondem a um ano hidrológico (entre dois períodos de estiagem, conforme a definição de Linsley e Franzini, 1978), compreendido de junho de 90 a setembro

Figura 5.3 - Hidrograma da ressurgência do sistema de cavernas Pérolas-Santana para o período de 11 de junho de 1990 a 16 de março de 1992.

de 91. O volume de escoamento total foi obtido através do cálculo da área sob os fluviogramas mensais deste período. Sobre os hidrogramas mensais ampliados separou-se graficamente o escoamento direto do básico, utilizando o método de Gupta (1989). O escoamento básico representa a diferença entre V_t e V_d .

Vazão máxima anual (Q_x)	3,876 m ³ / s
Vazão mínima anual (Q_n)	0,196 m ³ / s
Vazão média anual (Q_m)	0,504 m ³ / s
Razão entre vazão máxima e vazão mínima (Q_x / Q_n)	19,7
Volume total escoado (16 meses), V_t	20.032.197,24 m ³
Volume de escoamento direto, V_d	3.575.696,9 m ³ (17,9%)
Volume de escoamento básico, V_b	16.456.500,34 m ³ (82,1%)

Tabela 5.2 - Parâmetros hidrológicos de vazão do sistema Pérolas-Santana. As vazões e volumes calculados envolvem um erro de até 12% devido à incerteza desta ordem de grandeza nas medições de vazão.

Segundo Worthington (1991), a razão Q_x/Q_n aliada ao tempo em que $Q > 0$ constitui um dos critérios mais simples e úteis para diferenciar o regime de fluxo de nascentes cársticas, conforme é sintetizado na tabela 5.3. Worthington (op. cit) diferencia os seguintes tipos de nascentes:

- nascente do tipo **fluxo total permanente** (*full flow*) possui Q_x/Q_n alto, é perene e representa o escoamento total de uma área e seu aquífero associado.
- nascente tipo **fluxo básico** (*underflow*) ocorre em sistemas de drenagem subterrânea com três ou mais nascentes em diferentes cotas representando ramos distributários do sistema. A nascente na cota mais baixa irá drenar principalmente o escoamento básico do sistema, constituindo a nascente do tipo fluxo basal. Caracteriza-se por Q_x/Q_n muito inferior ao tipo anterior.
- nascente tipo **fluxo de transbordamento** (*overflow*) representa a nascente em cota mais alta em sistemas distributários acima descritos. Irá drenar principalmente o escoamento direto associado à enchentes do sistema, sendo portanto, intermitente.
- nascente tipo **fluxo básico e transbordante** (*underflow-overflow*) é aquela situada em cotas intermediárias entre a nascente mais baixa e a mais alta em sistemas distributários. Pode apresentar fluxo tanto perene como intermitente ($Q_n = 0$).

Tipo de nascente	Q_x / Q_n	dias com $Q > 0$
Fluxo total permanente (<i>full flow</i>)	alta	todos
Fluxo Básico (<i>underflow</i>)	baixa	todos
Fluxo de transbordamento (<i>overflow</i>)	$\infty (Q_n = 0)$	alguns a todos
Fluxo básico e transbordante (<i>underflow - overflow</i>)	baixa a ∞	alguns a todos

Tabela 5.3 - Classificação de nascentes cársticas em função das características da vazão (adaptado de Worthington, 1991).

Conforme a classificação acima, a nascente do sistema Pérolas - Santana é do tipo fluxo total permanente (*full flow*), pois apresenta valor alto de Q_x/Q_n com fluxo formado tanto por escoamento básico (82% da vazão total anual) como por direto (17,9%), não apresentando nascentes em cotas superiores (sistema convergente em uma ressurgência).

Ainda segundo Worthington (1991), a caracterização hidrológica de nascentes cársticas pode ser refinada com base na análise da forma do hidrograma de deflúvio e seu coeficiente de recessão (α), o que permite inferir características sobre a geometria e estrutura do aquífero associado à nascente.

As curvas de recessão são subdivididas em dois ou três segmentos, um ou dois superiores relacionados ao escoamento direto, onde a vazão diminui rapidamente com o tempo, seguidos de uma recessão lenta da vazão, equivalente ao escoamento essencialmente básico (Milanovic, 1981). Conforme definido por Barnes (1939, apud Anderson e Burt, 1980) as curvas de recessão seguem uma função exponencial do tipo:

$$Q_t = Q_0 e^{-\alpha t}, \text{ ou } Q_t = Q_0 e^{-\alpha(t-t_0)}$$

onde Q_t é a vazão total em m^3/s durante o intervalo de tempo considerado ($t - t_0$, em dias), Q_0 a vazão no início da recessão (t_0), e α o coeficiente de recessão. As recessões do escoamento básico normalmente se ajustam a um único valor de α , embora com variações sazonais (Worthington, op cit).

Os hidrogramas de recessão dos principais eventos de subida do nível do rio na ressurgência da caverna Santana foram obtidos através da ampliação dos trechos correspondentes do fluviograma geral da figura 5.3, conforme é exemplificado pela figura 5.4. Plotando a vazão média diária destes hidrogramas em escala logarítmica contra o tempo em dias, nota-se que a curva geral de cada hidrograma se ajusta a segmentos aproximadamente retilíneos (fig 5.4). Cada segmento destes corresponde a um período com α constante. Este é calculado pela expressão:

$$\alpha = \frac{\ln Q_1 - \ln Q_2}{t_1 - t_2}$$

(segundo Mangin, 1984) onde Q_1 é a vazão no início da recessão retilínea (em t_1) e Q_2 a vazão no final desta, em t_2 . Os valores de α obtidos desta maneira para a caverna Santana são apresentados na tabela 5.4. O coeficiente α da vazão reflete a capacidade do aquífero em suprir água. É uma função da porosidade efetiva e da transmissividade do meio permeável que contém água.

No conjunto de coeficientes de recessão calculados distingue-se valores de três ordens de grandeza distintas, refletindo sazonalidade de α . Os coeficientes entre 0,0026 e 0,007 caracterizam o período de baixa recarga do aquífero (período de estiagem). A época do ano com alta recarga do aquífero (entre os meses de outubro a abril) é marcada por recessões do escoamento básico com α entre 0,014 e 0,010. O deflúvio rápido do escoamento direto é caracterizado por coeficientes de recessão em torno de 0,24.

Figura 5.4 - Hidrogramas de deflúvio com indicação dos coeficientes de recessão (α) da ressurgência da caverna Santana para os períodos de março a junho de 1991 e junho a agosto de 1991.

Período do ano	Tempo (dias)	$\frac{Q_1}{Q_2} \text{ m}^3/\text{s}$	$\alpha \text{ (dia}^{-1}\text{)}$
22/06 a 03/07/90	12	0.31786 0.30158	0.00438
07/08 a 13/08/90	8	0.348675 0.328628	0.00702
28/09 a 10/10/90	13	0.3987 0.34867	0.0103
06/03 a 11/03/91	5	2.97167 0.895404	0.239
25/03 a 18/04/91	25	0.675154 0.4788296	0.0137
22/05 a 20/06/91	29	0.41744 0.34668	0.00640
06/07 a 07/08/91	32	0.35830 0.3296	0.00258

Tabela 5.4 - Coeficientes de recessão calculados para a ressurgência da caverna Santana.

Os valores de α determinados para o sistema Pérolas-Santana enquadram-se nas ordens de grandeza típicas de curvas de recessão de aquíferos cársticos bem desenvolvidos, como é o caso do sistema Ombla, na Jugoslávia, cuja hidrologia foi detalhadamente estudada por Milanovic (1976), o qual interpreta as tres ordens de grandeza detectadas para α da seguinte maneira:

- O valor alto de α (0,24 para o sistema Pérolas-Santana) corresponde ao deflúvio rápido de água de escoamento direto acumulada em cavernas freáticas amplas e condutos vadosos. No caso do sistema Pérolas-Santana, este escoamento direto perdura entre 2 (período de nível baixo do rio) a 5 dias (época de nível alto do rio subterrâneo). No sistema Ombla, com vazão máxima e mínima respectivamente de 165 e 4,1 m³/s, o esvaziamento do escoamento direto em níveis altos do rio perdura no máximo por 7 dias, com α em torno de 0,13.
 - O coeficiente de recessão em torno de 0,01 caracteriza o escoamento básico alimentado por água acumulada no sistema interconectado de juntas localmente carstificadas e fissuras maiores. No sistema Ombla este escoamento ocorre por até 13 dias, enquanto que no sistema Pérolas-Santana o fluviograma indicou períodos de até 25 dias para este escoamento, o que é interpretado como sendo causado por um alto grau de fissuramento cárstico interconectado presente no aquífero.
 - O índice α da ordem de 0,003 a 0,007 (em períodos de baixa ou nenhuma recarga do aquífero) caracteriza o escoamento básico proveniente da drenagem lenta da água subterrânea acumulada na porosidade de fraturas pouco alargadas por dissolução e distribuídas ao longo de todo maciço carbonático, assim como, da água retida na porosidade do solo de cobertura do carst e nos depósitos arenosos e argilosos acumulados em segmentos de cavernas. O tempo medido deste escoamento básico sem recarga significativa do aquífero foi de 32 dias para o sistema Pérolas-Santana.
- Em síntese, numa interpretação qualitativa seguindo Milanovic (1976), os valores baixos de α das recessões do escoamento básico indicam que o aquífero associado ao

sistema Pérolas-Santana possui extensiva rede de fissuramento, possibilitando uma grande capacidade de armazenamento de água subterrânea, a qual é drenada por períodos longos (~30 dias) com vazão lentamente decrescente nas épocas de estiagem.

Uma interpretação alternativa do comportamento de α do sistema Pérolas-Santana pode ser obtida com base nos padrões de fluviogramas definidos por Worthington (1991) para nascentes cársticas. Segundo estes padrões, o fluviograma do sistema em questão reflete uma nascente do tipo fluxo total permanente com adição de fluxo basal (*gaining underflow*). Esta caracteriza-se pela subdivisão do fluviograma do escoamento básico (plotado em escala log-normal) em segmentos retilíneos de α decrescente, em contraste com o fluviograma de nascentes estritamente do tipo fluxo total permanente, onde α é constante após o escoamento direto. O decréscimo gradativo de α nas nascentes do tipo *gaining underflow* é atribuído por Worthington (op. cit.) a uma suplementação de água ao escoamento do tipo fluxo total permanente. Esta suplementação pode ser de origem externa ou interna. Como exemplo de contribuição externa, o autor acima cita um rio superficial que perde vazão para o sistema subterrâneo. A suplementação interna é exemplificada através do vazamento de um sistema de drenagem subterrânea vizinho ao primeiro.

No caso do sistema Pérolas-Santana, as duas hipóteses de suplementação de água podem estar ocorrendo. Conforme será demonstrado no item seguinte, o balanço hídrico mostrou que há um excesso de água na ressurgência em relação ao volume coletado pela área de captação do sistema delimitada pelos divisores topográficos. Este fato sugere que há uma contribuição de água no sistema Pérolas-Santana proveniente do sistema cárstico vizinho (sistema Grilo, anexo 4.3), ou por perda de água superficial do córrego Furnas, o qual cruza o sistema Pérolas-Santana em superfície.

Com base na interpretação acima conclui-se que a nascente do sistema Pérolas-Santana é do tipo fluxo total permanente com adição de fluxo basal, com características gerais de uma nascente tipo fluxo total permanente, refletindo um aquífero altamente carstificado.

5.2.3 Balanço hídrico e área de captação do sistema Pérolas-Santana

Com o objetivo de testar a validade da área de captação definida pelos divisores topográficos da bacia do sistema Pérolas-Santana, obteve-se abaixo a estimativa do balanço hídrico da bacia associada ao sistema cárstico. Segundo Atkinson e Drew (1974), o cálculo do balanço hídrico de bacias cársticas constitui um dos métodos mais seguros em avaliar a validade de suas áreas de captação de água.

O balanço hídrico de bacias hidrográficas e aquíferos é calculado pela expressão

$$P = Q + E \pm \Delta S$$

onde P é o volume de precipitação sobre a bacia (recarga do aquífero), Q é o volume total escoado pela bacia, E é o volume retornado à atmosfera por evapotranspiração e ΔS o volume de água retirado ou renovado ao estoque de água armazenada pelo aquífero. No cálculo do balanço hídrico para períodos longos ΔS tende a se autocompensar o que elimina este termo da expressão acima (Gupta, 1989). No presente estudo considerou-se um ano

hidrológico (junho de 1990 a setembro de 1991) para o cálculo do balanço hídrico, tempo suficiente para tornar ΔS pouco expressivo.

Volume de precipitação (P)

Os dados pluviométricos utilizados (fig 5.5) foram obtidos pelo posto pluviométrico Serra dos Motas (DAEE, 1992), localizado no Bairro da Serra, a cerca de 3km da ressurgência da caverna Santana (fig 5.1).

Figura 5.5 - Totais mensais de chuva medidos no posto pluviométrico Serra dos Motas (bairro da Serra, Iporanga).

Considera-se estas medidas aceitáveis, mas não ideais, visto que em função da distância do posto pluviométrico em relação à bacia monitorada, parte da chuva medida no Bairro da Serra não necessariamente ocorreu sobre a bacia e vice-versa, principalmente devido à topografia acidentada e chuvas de verão localizadas.

O total de precipitação para o período de 11 de junho de 90 a 28 de setembro de 1991 (ano hidrológico considerado) foi de 1789,6 mm.

Volume de água escoada (Q) pelo sistema e sua área de captação

O volume total de água escoada pelo sistema Pérolas-Santana durante o ano hidrológico de 1990-91 (16 meses) foi de 20.032.187,24 m³. Esta medida foi obtida através da integração do fluviograma da ressurgência do sistema para o período considerado. Este volume inclui um erro de cerca de 12%, conforme comentado anteriormente.

A área de captação do sistema foi demarcada pelos divisores topográficos sobre fotografias aéreas 1:25.000 (mapa morfológico da área Furnas-Santana, anexo 3.3) e base topográfica 1:50.000 (Folha Iporanga, IBGE, 1987). Excluiu-se desta área o trecho da

bacia de escoamento superficial do rio Furnas o qual cruza o sistema Pérolas-Santana em superfície nas proximidades da ressurgência do sistema (fig 5.1). A área de captação total (área alogênica e autogênica) perfaz 14,5805 km² sobre a base 1:25.000 e 14,9907 km² em escala 1:50.000. Adotou-se a média destas medidas, 14,7856 km². A superfície de captação autogênica deste sistema é de 7,349km² (49,7% do total).

O volume total escoado sobre a área total de captação fornece o escoamento total em milímetros de 1354,84mm ($\approx$ 1355mm).

Evapotranspiração (*E*)

Devido à presença de Mata Atlântica preservada e temperatura média anual alta ($\sim$ 20°C) a evapotranspiração é um importante fator no balanço hídrico da região, podendo ser estimada entre 50 a 60% da precipitação total da área (Uehara, 1994), o que resulta em 895 a 1074mm para o período monitorado.

Segundo o levantamento hidrológico da bacia do rio Ribeira (DAEE, 1990), a evapotranspiração anual média da bacia do Ribeira é de 844mm/ano, o que para o período de 16 meses corresponde a cerca de 1125mm.

Considerando as medidas de evapotranspiração obtidas pelo método de Thornthwaite e apresentadas no relatório CBA/CNEC (1983), a bacia monitorada encontra-se entre as curvas de 830 e 1000mm/ano de evapotranspiração potencial.

No presente estudo adotou-se 1000mm de evapotranspiração para o ano hidrológico 90/91, o que representa uma média aproximada dos valores acima apresentados.

Balanço hídrico da bacia do sistema Pérolas-Santana

Aplicando a expressão $P = Q + E$ para um ano hidrológico com os valores acima expostos, obtém-se:

$$1790\text{mm} < (1355 + 1000)\text{mm} \text{ ou } 1790\text{mm} = (2355 - 565)\text{mm}$$

o que evidencia um forte desbalanceamento hídrico, ou seja, há um excesso de 565mm (31,6%) de água escoada pelo sistema de cavernas em relação à recarga pluviométrica coletada somente pela área de captação da bacia demarcada pelos seus divisores topográficos (fig 5.1).

O desbalanceamento hídrico obtido acima leva a concluir que a área de recarga admitida inicialmente (14,79km²) é insuficiente para coletar o volume escoado durante o período considerado. No sentido de compensar o excesso de 565 mm do escoamento total (1355), a área de captação inicialmente admitida deve ser incrementada em 10,57km², para resultar no escoamento sobre a área (*Q*) de 790mm, balanceando a expressão $P = Q + E$.

Em função deste balanceamento deve-se admitir uma área mínima de captação de recarga superficial do sistema Pérolas-Santana de 25,4 km², sendo que a área de captação definida somente pelos divisores topográficos não é válida para este sistema. Convém ressaltar que este valor de área possui uma incerteza mínima de 12% propagada a partir do erro detectado nas medidas de vazão.

Área de captação e recarga do aquífero

A conclusão obtida acima permite redefinir a área de captação e discutir o mecanismo de recarga do aquífero associado ao sistema Pérolas-Santana.

Observando a distribuição de sistemas de cavernas (anexo 4.3), a drenagem superficial (anexo 3.3) e as nascentes cársticas no setor a SW do rio Betari na área carbonática Furnas-Santana, surgem duas possibilidades em aumentar a área de captação do referido sistema. A primeira baseia-se na contribuição da bacia do córrego Furnas na vazão da caverna Santana. A segunda requer a bacia do sistema cárstico do Grilo fornecendo parte do excesso de vazão detectada na ressurgência do sistema Pérolas-Santana.

A bacia do córrego Furnas, conforme descrito no capítulo 3, não é puramente fluvial. Praticamente toda água deste córrego origina-se do sistema de drenagem subterrânea do Grilo, cuja nascente é o principal tributário do córrego Furnas (fig 5.1 e anexo 4.3). A partir da ressurgência da caverna do Grilo, a bacia do Furnas apresenta características fluviais, com seu talvegue encaixado cruzando a caverna Santana, a qual está a cerca de 150m de profundidade abaixo do canal fluvial (fig 4.21). Na caverna Santana, nas proximidades do córrego em superfície, nota-se gotejamentos rápidos no topo do *canyon* subterrâneo, os quais provavelmente representam infiltrações do córrego em superfície. Além disto, parte do trecho final do córrego Furnas desenvolve-se sobre o contato litológico, onde há situação favorável para infiltração. É provável, portanto, que haja perda de água do leito do córrego Furnas alimentando a nascente da caverna Santana, mas não em volume suficiente para explicar o excesso de vazão nesta.

A segunda possibilidade fundamenta-se no fato de que a vazão da nascente da caverna do Grilo representa somente cerca de 2/3 da vazão medida na caverna Santana, apesar da área de captação do sistema do Grilo, demarcada pelos divisores topográficos ser superior à do sistema Pérolas-Santana (fig 5.1). Isto mostra que a vazão do sistema do Grilo é insuficiente em relação a sua área de captação superficial. Esta fração de água que deixa de ressurgir na caverna do Grilo, somente pode estar sendo desviada para o sistema Pérolas-Santana, contribuindo no excesso de vazão deste. Confirma-se, portanto, a hipótese de conexão entre as rotas de fluxo dos sistemas de drenagem subterrânea do Grilo e Pérolas-Santana (fig 5.6).

Embora seja possível afirmar que a área total de captação superficial do sistema Pérolas-Santana é de 25,4km², a demarcação exata desta área somente poderá ser definida com a futura aplicação de traçadores do fluxo de água subterrânea sobre a porção da área carbonática Furnas Santana a SW do rio Betari. Sem esta definição, a delimitação da área de recarga é apenas aproximada.

A área de captação total do sistema Pérolas-Santana demarcada pelos divisores topográficos foi de 14,8Km², onde 7,4Km² compõem a superfície de recarga autogênica (fig 5.1) e os 7,4Km² restantes coletam escoamento alogênico injetado nos metacalcários na zona de contato através de sumidouros em vales cegos. Além deste total inicial, faltam 9,6Km² para completar os 25,4Km² necessários para alimentar a vazão deste sistema.

Figura 5.6 - Geometria da conexão subterrânea entre os sistemas Pérolas-Santana e Grilo interpretada em função do balanço hídrico da bacia Pérolas-Santana e o padrão de condutos da área.

O sistema do Grilo possui área de recarga autogênica demarcada por divisores topográficos de $10,7\text{Km}^2$ e $7,6\text{Km}^2$ de coleta de escoamento superficial alogênico, perfazendo um total de $18,3\text{Km}^2$.

Desconsiderando a bacia do córrego Furnas e em função da provável alimentação parcial do aquífero associado ao sistema Pérolas-Santana pelo sistema do Grilo, admite-se que cerca de 50% ($9,6\text{Km}^2$) da área de captação e recarga do sistema do Grilo são necessários para completar a vazão do sistema Pérolas-Santana.

O caminho exato do fluxo subterrâneo e a delimitação desta área, conforme citado acima, deverão ser definidos em trabalhos futuros com aplicação de traçadores como corantes fluorescentes.

5.3 Hidroquímica do carste do Alto Ribeira

Com o objetivo de caracterizar a interação entre água meteórica e rocha carbonática em ambiente sub-tropical úmido e assim comparar esta interação com aquela atuante em outras situações geográficas sob regimes climáticos distintos, executou-se um conjunto de análises físicas e químicas da água superficial e subterrânea do carste estudado. Estes resultados também permitem estabelecer a relação entre a vazão de uma bacia de drenagem e a quantidade de soluto no volume escoado, dado essencial para o cálculo da denudação química do sistema cárstico monitorado.

5.3.1 Amostragem e parâmetros hidroquímicos medidos

A caracterização química do fluxo de água através do sistema Pérolas-Santana exigiu a amostragem das diferentes classes hidroquímicas deste sistema, seguindo o método de Drake e Harmon (1973).

O escoamento superficial foi amostrado em vários pontos antes e após este atingir o corpo carbonático encaixante do sistema (água alogênica), como também, coletaram-se amostras do escoamento superficial captado diretamente sobre calcários (água autogênica).

A água subterrânea do aquífero cárstico foi amostrada em nascentes cársticas (ressurgências de sistemas de cavernas), nos pontos de gotejamento ao longo de cavernas e no poço de abastecimento de água do bairro da Serra (ver localização no anexo 4.2), perfurado em metacalcários.

A localização dos pontos amostrados na área carbonática Furnas-Santana é apresentada na figura 5.1. No sentido de obter um conjunto de amostras representativo da faixa carbonática do Lageado (descrita na introdução), amostrou-se também o sistema de drenagem cárstica Temimina-Pescaria, localizado a nordeste da área Furnas-Santana.

Um dos objetivos destas coletas foi o de possibilitar o cálculo de variáveis geoquímicas como o índice de saturação em calcita e dolomita e a pressão parcial de CO_2 em equilíbrio na solução. O cálculo destas variáveis, segundo Langmuir (1971), exige a determinação da concentração dos principais cátions e ânions dissolvidos, assim como, da temperatura e do pH da água amostrada.

Para posterior determinação em laboratório dos principais cátions e ânions, coletou-se três amostras em cada ponto amostrado, utilizando frascos de polietileno com 100 ml de volume, respeitando as normas de coleta recomendadas por Ford e Williams (1989).

As amostras para análise de Ca^{++} e Mg^{++} foram acidificadas no ato da coleta (três gotas de ácido nítrico concentrado) e acondicionadas sob refrigeração até a chegada ao laboratório para análise através de absorção atômica. Os trabalhos de campo para amostragem sempre foram organizados no sentido de não ultrapassar o máximo de quatro dias entre a coleta e a análise por absorção atômica. Utilizou-se o equipamento de absorção atômica da Divisão de Engenharia de Materiais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).

Os frascos para análise de alcalinidade (HCO_3^-) também foram transportados sob refrigeração até a base de campo, onde após algumas horas da coleta realizou-se sua análise através de titulação acidimétrica (indicador misto de verde de bromocresol e vermelho de metila titulados com ácido sulfúrico 0,05N). Como as águas analisadas apresentaram pH entre 7,5 e 8,3 o ânion predominante do sistema H_2CO_3 , HCO_3^- e CO_3^{--} é o segundo (Freeze e Cherry, 1979), o que foi testado através da titulação do ânion CO_3^{--} , o qual não se mostrou presente.

O terceiro frasco de cada coleta destinou-se para a análise dos ânions sulfato, cloreto e nitrato, realizada através de cromatografia de íons (cromatógrafo Dionex, do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, CEPAS - IGcUSP) e dos cátions sódio e

potássio, efetuada através de espectrofotometria de chama, junto ao laboratório de química do Departamento de Mineralogia e Petrologia do Instituto de Geociências da USP.

Especial atenção foi prestada nas medidas de pH, pois este é um dos parâmetros mais sensíveis para medição e fundamental para o cálculo dos índices de saturação em cálcio e magnésio (Ford e Williams, 1989). As medidas foram realizadas nos pontos de coleta, utilizando-se um medidor de pH digital portátil (Digisense modelo 5985-80) com precisão de 0,05. Antes de cada etapa de campo e quando necessário, antes de cada coleta, calibrou-se o medidor de pH com soluções padrão de pH 7 e 10. Estas medidas de pH são automaticamente compensadas para a temperatura da amostra através de um sensor térmico imerso juntamente com o eletrôdo para pH no frasco de medida em equilíbrio com a temperatura da água amostrada. Desta maneira obteve-se a temperatura da amostra em paralelo à leitura de pH.

Por último, em cada estação de coleta mediu-se também a condutividade elétrica da água com um condutivímetro portátil YSI (Yellow Springs Instruments) modelo 33M. Este parâmetro mostrou-se útil devido à relação linear obtida entre a condutividade específica e a dureza total da água, o que permite estimar o conteúdo em cálcio e magnésio de águas da área somente através de uma leitura de condutividade.

As coletas e medidas dos parâmetros acima especificados foram sistematicamente distribuídas ao longo de um ano hidrológico no sentido de obter, além da diferenciação de classes hidroquímicas, a sazonalidade composicional destas classes.

Os resultados analíticos e parâmetros medidos da amostragem hidroquímica realizada são apresentados na listagem do anexo 5.3.

5.3.2 Parâmetros hidroquímicos derivados

Dureza total (DT)

A dureza total de águas naturais é definida pela soma das suas concentrações de Ca^{++} e Mg^{++} . A maioria dos estudos geoquímicos de águas cársticas expressa a dureza total em mg/l equivalentes a $CaCO_3$, ou seja, a quantos mg/l de calcita corresponde a soma das concentrações de cálcio e magnésio medidas na amostra (White, 1988). A dureza total é obtida pela expressão

$$DT = [Ca^{++}]2,49 + [Mg^{++}]4,12$$

onde $[Ca^{++}]$ e $[Mg^{++}]$ são as concentrações em mg/l medidas nas amostras e os coeficientes 2,49 e 4,12 correspondem aos fatores de conversão das concentrações em equivalentes de $CaCO_3$ em mg/l.

Os valores de dureza total das amostras coletadas estão listados no anexo 5.4.

Condutividade específica corrigida para 20°C

Devido ao fato da condutividade elétrica de águas naturais ser fortemente dependente da temperatura (Albutt, 1977 e Calles e Calles, 1990), as medidas obtidas em campo, a diferentes temperaturas, foram corrigidas para uma referência comum. Somente

após esta correção as medidas são passíveis de comparação entre si, podendo ser utilizadas para testar sua dependência da dureza total da água.

Utilizou-se a equação empírica desenvolvida por Albutt (1977) para correção da condutividade de águas ricas em carbonatos para o datum de 20°C, conforme segue abaixo:

$$C_{20} = C_T \left(\frac{1,7728}{1 + \alpha T + \beta T^2} \right)$$

onde C_{20} corresponde à condutividade, em $\mu\text{mhos/cm}$, corrigida para 20°C, C_T é a condutividade medida na temperatura T e α e β são constantes determinadas empiricamente para a temperatura de 20°C, valendo 0,0361 e 0,000127, respectivamente.

Os valores de condutividade corrigida para 20°C estão listados no anexo 5.4.

Condutividade específica e dureza total

Plotando a condutividade corrigida (C_{20} em $\mu\text{mhos/cm}$) em função da dureza total (DT em mg/l equivalente a CaCO_3) do conjunto de águas analisadas (fig 5.7) obteve-se a função linear

$$C_{20} = 21,248 + 1,501DT$$

com coeficiente de correlação de 0,97 e R^2 de 93,1%.

Esta relação mostrou-se muito útil em avaliar o teor de carbonato dissolvido e conseqüentemente o grau de saturação de águas em pontos remotos, principalmente nos trechos de difícil acesso em cavernas.

Figura 5.7 - Condutividade específica em função da dureza total das águas coletadas.

Razão molar Cálcio/Magnésio

Seguindo a convenção adotada na maioria das publicações sobre geoquímica de águas cársticas (Langmuir, 1971), converteu-se as concentrações em mg/l de Ca^{++} e Mg^{++} no número de moles correspondentes, para calcular a razão $\text{Ca}^{++}/\text{Mg}^{++}$ molar.

A razão $\text{Ca}^{++}/\text{Mg}^{++}$ em peso das amostras analisadas é listada no anexo 5.3 enquanto a razão correspondente em moles é apresentada no anexo 5.4.

Índice de saturação em calcita (SI_c) e dolomita (SI_d)

O índice de saturação expressa o quanto uma água natural desvia do estado de equilíbrio (White, 1988). O índice de saturação em calcita (SI_c), segundo Langmuir (1971), é definido pela relação

$$SI_c = \log \frac{IAP_c}{K_c}$$

onde IAP_c é o produto de atividade iônica $[\text{Ca}^{++}][\text{CO}_3^{--}]$ em solução. De forma similar, o índice de saturação em dolomita (SI_d) é obtido pela equação

$$SI_d = \log \left(\frac{IAP_d}{K_d} \right)^2$$

onde IAP_d é o produto de atividade iônica $[\text{Ca}^{++}][\text{Mg}^{++}][\text{CO}_3^{--}]^2$ em solução. Os índices K_c e K_d correspondem aos produtos de solubilidade da calcita e dolomita (atividade iônica padrão de calcita e dolomita em solução em equilíbrio), respectivamente.

Nestas expressões, quando $IAP = K$, $SI = 0$, significando que a água está em perfeito equilíbrio com o mineral carbonático em solução, ou seja, a solução está saturada e não ocorre dissolução nem precipitação deste carbonato. Valores positivos de SI indicam soluções supersaturadas e valores negativos representam águas insaturadas (agressivas) em relação aos minerais carbonáticos.

Um aspecto importante no cálculo do índice de saturação é a influência do pH medido em campo, pois este valor é usado no cálculo da atividade iônica $[\text{CO}_3^{--}]$. Este fato torna a precisão do índice de saturação totalmente dependente da qualidade da determinação do pH. Ótimas medidas de pH normalmente possuem uma incerteza de no mínimo $\pm 0,05$ o que induz um erro de 0,1 no índice de saturação (Langmuir, 1971).

No presente trabalho utilizou-se o programa WCHEM3, desenvolvido pelo Departamento de Geologia da McMaster University, para calcular os índices de saturação em calcita e dolomita das águas amostradas, conforme expresso no anexo 5.3.

Pressão parcial de CO_2

A pressão parcial de CO_2 é um importante parâmetro hidroquímico pois reflete a proveniência e história de águas cársticas (Ford e Williams, 1989). Representa a pressão de

uma fase gasosa de CO_2 coexistente e em perfeito equilíbrio com a água analisada (White, 1988). Este parâmetro é obtido pela expressão

$$PCO_2 = \frac{[HCO_3^-][H^+]}{K_1 K_{CO_2}}$$

onde $[HCO_3^-]$ é a atividade iônica da concentração do ânion HCO_3^- obtida por titulação da amostra de água, $[H^+]$ o valor negativo do pH, K_1 a constante de dissociação do ácido carbônico e K_{CO_2} a constante de hidratação do CO_2 . (valores obtidos em tabelas de constantes termodinâmicas).

A pressão parcial de CO_2 é expressa em atmosferas ou porcentagem. É usual na literatura específica apresentar os valores de PCO_2 na forma de seu logaritmo negativo. O símbolo para tal é $pPCO_2$, onde p representa o sinal negativo do logaritmo de PCO_2 . Por exemplo, com $PCO_2 = 0,0025 \text{ atm}$, $pPCO_2 = 2,60$ ou seja, $10^{-2,60} = 0,0025$.

Os valores de $pPCO_2$ obtidos neste estudo foram calculados através do programa WCHEM3 (acima citado), conforme listagem no anexo 5.3.

Erro de balanço iônico (IBE)

Erros nas determinações de concentração de cátions e ânions e a eventual falta de alguma espécie iônica não analisada numa análise química de água, a princípio completa, podem ser estimados através do cálculo do balanço iônico (Ford e Williams, 1989), dado pela expressão

$$IBE = \frac{\sum m_i z_i_{\text{cátions}} - \sum m_i z_i_{\text{ânions}}}{\sum m_i z_i_{\text{cátions}} + \sum m_i z_i_{\text{ânions}}} \times 100$$

onde m_i é a molaridade dos íons analisados e z_i a valência destes. O erro de balanço iônico é expresso em porcentagem.

No caso de análises de água envolvendo determinações de campo, como no presente estudo, aceita-se um erro de até 5% (Ford e Williams, op cit).

No conjunto de análises apresentado no anexo 5.3, nota-se que o IBE varia em torno de 2 a 5%, com algumas análises atingindo 14% de erro. Estas últimas foram descartadas. Atribui-se este erro à determinação imprecisa de ânions, principalmente de SO_4^{--} , devido a falhas no equipamento utilizado, as quais não puderam ser eliminadas até o fechamento dos trabalhos.

5.3.3 Fácies hidroquímicas do carste estudado

O conjunto de parâmetros hidroquímicos medidos e derivados permitiram relacionar as características físico-químicas das águas do sistema cárstico estudado com a origem destas águas (águas alogênicas, autogênicas ou mistas) e seu ambiente de fluxo (fluvial ou subterrâneo ao longo de fissuras ou condutos maiores). Desta união entre uma classificação hidrológica e química de águas surge a definição da fácies hidroquímica como sendo um tipo de recarga ou fluxo de água no sistema cárstico o qual possui um conjunto de parâmetros químicos característicos, conforme proposto previamente por Back (1960), Harmon et al. (1972), Drake e Harmon (1973) e Gunn (1983).

PARAMETROS	Fácies Hidroquímicas						
	Escoamento Superficial			Percolação Autogênica		Circulação Freática profunda	Ressurgências Cársticas
	Alogênico	Autogênico	Fluviocárstico	Percolação vadosa em fissuras	Percolação vadosa em condutos		
máx. $\bar{X}$ min. CV% Δ							
Nº de Amostras	8	12	26	18	18	4	43
Temperatura °C	20 18,2 15 9,8% 5	19,9 19,4 18,7 3,3% 1,2	20,2 18,1 13,4 9,9% 6,8	19,6 18,9 18,1 2,6% 1,5	22 17,6 13,5 13,2% 8,5	21,2 20,8 20,1 0,3% 1,1	20 18,9 17,9 3,1% 2,1
Ca++ mg/l	7 3,1 1 68% 6	58,6 43,7 32 32% 27	29,4 14,1 5,5 47% 23,9	90 76,8 68 7,5% 22	47,2 37,8 27,6 15% 19,6	43 38,7 36 1% 7	48 32,1 21 19% 27
Mg++ mg/l	2,1 1,3 0,8 39% 1,3	8,2 7,3 6,5 12% 1,7	5,7 3,4 1,4 35% 4,3	6,3 4,9 3,6 14% 2,7	18,5 6,6 2,4 63% 16,1	11,4 10 8,3 16% 3,1	8,2 5,3 3,5 21% 4,7
Ca/Mg (molar)	3,8 1,7 0,6 82% 3,2	4,3 3,6 3,0 20% 1,3	5,1 2,6 1,0 35% 4,1	13,5 9,6 7,2 17% 6,3	9,9 4,4 1,3 49% 8,5	3,2 2,4 2,0 26% 1,2	5,3 3,8 2,7 17% 2,6
Alcalinidade mg/l, HCO_3^-	30 22,3 15 23% 15	195 151 118 26% 77	110 60 28 35% 82	261 240 201 6% 60	200 143 114 18% 86	155 148 135 0,8% 20	152 116 88 14% 64
Dureza Total mg/l equivalente a CaCO_3	22,4 13 6,2 40% 16,2	180 139 107 27% 73	93,4 49 20,8 41% 72,6	244,7 212 192 7% 52,7	177 122 96,2 18% 80,8	141,6 139 135 2% 6,6	152,1 102 69 18% 83,1
pH	7,25 6,97 6,53 4% 0,72	8,13 8,09 8,06 0,4% 0,07	8,05 7,54 7,00 3% 1,05	7,80 7,49 7,30 2% 1,50	8,28 8,02 7,54 3% 0,74	8,04 7,87 7,76 2% 0,28	8,29 7,92 7,48 3% 0,81
p PCO_2 atm..	2,9 2,65 2,2 9% 0,7	3,09 2,96 2,83 4% 0,26	3,24 2,82 2,26 8% 0,98	2,44 2,15 1,94 6% 0,5	3,25 2,92 2,35 9% 0,9	2,87 2,7 2,6 0,6% 0,27	3,33 2,89 2,49 7% 0,84
Índice de saturação em calcita, SIc	-2,14 -2,76 -3,65 19% 1,51	0,55 +0,33 0,18 60% 0,37	-0,31 -1,10 -1,94 45% 1,63	0,5 -0,19 -0,01 * 0,51	0,51 +0,18 -0,37 * 0,88	0,34 +0,08 -0,14 * 0,48	0,43 -0,06 -0,61 * 1,04
Índice de saturação em dolomita, SI _d	-4,59 -5,52 -7,0 * 2,41	0,57 +0,23 0,01 * 0,56	-1,05 -2,49 -4,18 * 3,13	0,2 -0,51 -0,92 * 1,12	-0,84 -0,18 -1,2 * 2,04	0,31 -0,09 -0,49 * 0,80	0,39 -0,57 -1,77 * 2,16
Condutividade $\mu\text{mhos/cm}$	70 43 15 37% 55	295 252 211 17% 84	155 90 29 39% 126	420 342 308 8% 112	250 189 142 17% 108	436 320 231 33% 205	260 170 100 17% 160

Tabela 5.5 - Parâmetros físico-químicos medidos e calculados para as fácies hidroquímica identificadas no sistema cárstico estudado. * - valores do coeficiente de variação não calculados

Separando as análises químicas (anexo 5.3) de acordo com seu ambiente hidráulico (tabela 5.5), diferenciou-se as seguintes fácies hidroquímicas para o carste estudado:

Escoamento superficial alogênico

Esta fácies hidroquímica é representada pela água de escoamento em regime fluvial sobre metapelitos e rochas graníticas que contornam os metacalcários, constituindo a

recarga alogênica do aquífero cárstico. Suas características físico-químicas apresentadas na tabela 5.5 correspondem ao estado da água antes de atingir a faixa carbonática. Com índice médio de saturação em calcita e dolomita respectivamente de -2,76 e -5,52 (0,17 e 0,0006% de saturação), pH médio de 6,97 e dureza total de 13 mg/l equiv. a CaCO_3 , exprime-se a alta agressividade desta fácies aquática em relação aos metacalcários da área. Na figura 5.8 nota-se visualmente o contraste dos parâmetros físico-químicos desta fácies hidroquímica em relação às demais.

Escoamento superficial autogênico

Corresponde a água captada diretamente pela superfície metacarbonática alimentando a recarga autogênica do aquífero cárstico (fig 5.9). Em quase sua totalidade este escoamento superficial é injetado no maciço carbonático através de sumidouros em fundos de bacias poligonais fechadas com drenagem centrípeta, formando pontos concentrados de recarga. A fração de água restante nesta superfície é absorvida pelo maciço carbonático através de percolação difusa ao longo de discontinuidades como juntas e planos de acamamento.

Coletou-se amostras desta fácies hidroquímica ao longo de pequenos córregos perenes (raros sobre a superfície calcária da área) e filetes de água nas proximidades de fundos de depressões poligonais.

Caracteriza-se por uma alto teor de sólidos dissolvidos, com dureza total e alcalinidade entre os valores mais altos do conjunto amostrado (DT = 139 mg/l de CaCO_3 e Alcalinidade = 151 mg/l), somente suplantados pelos teores da percolação vadosa em fissuras. Este alto teor de sólidos dissolvidos é acompanhado pelo pH mais alcalino (8,09) e maior índice de saturação em calcita (0,33 o que equivale a 210% de saturação em calcita) entre as demais fácies hidroquímicas evidenciadas.

Escoamento superficial fluviocárstico

A água superficial de origem alogênica e que continua sobre os metacalcários em canais fluviais representa esta fácies hidroquímica (fig 5.9). Amostrou-se esta em vários pontos no *polje* de contato adjacente ao sumidouro principal do sistema de cavernas Pérolas-Santana (anexo 4.3) e na zona morfológica fluviocárstica circundante a este *polje*. Os pontos de coleta situam-se em canais fluviais sobre metacalcários entre 300 e 800m de distância do contato com metapelitos.

Quimicamente esta água é marcada por uma gradativa atenuação da sua agressividade em relação aos metacarbonatos, conforme aumenta sua distância de escoamento sobre estes, até ser absorvida em sumidouros, o que é evidenciado pelos altos valores do CV dos seus parâmetros medidos e derivados (tab 5.5 e fig 5.8). A amostragem mostrou uma transição do índice de saturação em calcita de -2 nos primeiros metros de percolação sobre carbonato até -0,3 após cerca de 800m sobre este, o que representa uma água praticamente 50% saturada em calcita após este percurso superficial. Na figura 5.8

visualiza-se como os parâmetros físico-químicos desta fácies representam uma transição entre aqueles das águas alogênicas e os da fácies de escoamento autogênico.

Percolação autogênica vadosa em fissuras

O ambiente de fluxo desta fácies hidroquímica é formado por capilares e proto-condutos desenvolvidos sobre planos de acamamento, fraturas e na intersecção destes. Corresponde a água de origem autogênica e de percolação difusa no maciço carbonático entre a superfície e o nível de condutos do rio subterrâneo (fig 5.9) onde foi coletada em pontos de gotejamento. Estes apresentam vazão desde gotejamentos lentos até filetes de vazão contínua, quase sempre associados à precipitação de carbonato de cálcio secundário (espeleotemas).

Apresenta os valores médios de dureza total (212 mg/l de CaCO_3) e alcalinidade (239 mg/l) mais elevados entre as águas amostradas, com pequena variabilidade (CV 5,9 e 6,6 tab 5.5), associados a um índice de saturação médio em calcita e dolomita de +0,19 e -0,51 com pH médio de 7,49. Um fato que se ressalta neste quadro químico é o alto teor em sólidos dissolvidos (212mg/l com 155% de saturação em calcita e 31% de saturação em dolomita) com um pH de somente 7,5, ponto a ser discutido na evolução das águas cársticas. Caracteriza-se também por uma baixa variabilidade dos parâmetros químicos (CV baixo), somente superior à fácies de circulação freática profunda (tab 5.5 e fig 5.8).

Percolação autogênica vadosa em condutos

Esta é a fácies aquática que circula em condutos vadosos menores (ramos da caverna principal, freqüentemente impenetráveis devido as suas seções decimétricas), ou cavernas vadosas conectadas à fundos de depressões poligonais, representando pequenos afluentes (fig 5.9), quase sempre associados à deposição de calcita secundária na forma de escorrimentos calcíticos com represas de travertino.

Atribui-se origem autogênica a esta fácies hidroquímica devido ao seu alto conteúdo médio em sólidos dissolvidos (DT = 122mg/l de CaCO_3 e alcalinidade = 143mg/l de HCO_3^-), além do pH (8,02) semelhante ao da água superficial autogênica (tab 5.5 e fig 5.8), apesar de existir a possibilidade de parte desta água representar contribuições de origem alogênica, as quais penetram no maciço calcário após um percurso considerável sobre a superfície carbonática.

Circulação freática em condutos profundos

Esta é a água de circulação mais profunda no sistema cárstico (fig 5.9). Seu fluxo ocorre principalmente através da rede de proto-cavernas e condutos freáticos em fase inicial de desenvolvimento localizados abaixo da rota principal de condutos em fase avançada de desenvolvimento. Na área estudada estes condutos profundos foram evidenciados através da perfuração do poço para abastecimento de água do Bairro da Serra. Este poço atingiu condutos na profundidade entre 77 e 147 metros abaixo do lençol freático (Politi, 1988). A amostragem hidroquímica foi obtida diretamente deste poço.

Figura 5.8 - Representação gráfica da variação dos principais parâmetros hidroquímicos das fácies hidroquímicas identificadas.

Esta fácies hidroquímica possui como assinatura físico-química uma temperatura média anual mais elevada ($20,8^{\circ}\text{C}$), associada a uma variabilidade sazonal (CV) muito inferior dos principais parâmetros físico-químicos, em relação às demais fácies hidroquímicas da área (tab 5.5 e fig 5.8). Oscila em torno da saturação em calcita e dolomita (considerando um erro de 0,1 nos índices de saturação), com $\text{SIc} = +0,08$ e $\text{SI}_{\text{d}} = -0,09$. Sua dureza total média de 139 mg/l de CaCO_3 e alcalinidade de 148 mg/l de HCO_3^- são muito semelhantes às do escoamento superficial autogênico (tab 5.5), distinguindo-se deste pelo valor inferior do pH (7,87) e pressão parcial de CO_2 superior ($10^{-2,7}$ atm), não considerando o teor de magnésio.

Figura 5.9 - Perfil esquemático de um sistema cárstico com a localização das fácies hidroquímicas identificadas na área de estudo.

Ressurgências cársticas

Esta fácies hidroquímica corresponde à mistura das demais classes de água identificadas, pois representa o escoamento de praticamente todo volume de água coletado e transmitido pelo sistema cárstico e sua bacia de captação, incluindo a água freática de circulação profunda abaixo do nível principal de condutos do rio subterrâneo do sistema (fig 5.9).

Amostrou-se as ressurgências dos sistemas Pérolas-Santana, Grilo e Córrego Fundo (lagoa do Bairro da Serra, anexo 4.3).

Na média dos diferentes regimes de vazão das ressurgências, estas águas apresentam-se levemente saturadas em calcita ($\text{SIc} = -0,06$, 87% de saturação) e insaturadas em dolomita ($\text{SI}_{\text{d}} = -0,57$, 27% de saturação).

Sua dureza total média de 102 mg/l equivalentes a CaCO_3 e alcalinidade de 116 mg/l de HCO_3^- apresentam valores distintos das demais fácies hidroquímicas, aproximando-se mais das águas de percolação vadosa em condutos (tab 5.5 e fig 5.8). São semelhantes também à media dos valores médios de DT (112mg/l equiv. a CaCO_3) e alcalinidade (126 mg/l de HCO_3^-) das demais fácies hidroquímicas, refletindo a mistura destas. O pequeno desvio é atribuído à mistura de diferentes volumes de cada fácies, conforme o regime de vazão e recarga do sistema.

5.3.4 Evolução geoquímica das águas do sistema cárstico estudado

O fluxo de água através de terrenos cársticos e seu aquífero possui dois tipos de recarga: injeções alogênicas coletadas nas áreas de captação não carbonáticas que circundam o terreno carbonático e recarga autogênica derivada somente da precipitação captada diretamente pela superfície cárstica.

A análise da evolução química das águas no sistema cárstico, deve partir portanto, da interação entre o tipo de recarga (precipitação ou recarga alogênica) e a rocha carbonática.

Tipo de rocha	$\bar{X}$ máx. min. CV% Δ	CaO	MgO	CaO/MgO	Mineralogia
Metacalcário Calcítico (6)	54,4 49,6 43,1 10% 11,3	0,9 0,6 0,4 44% 0,5	123,3 90,4 58,6 36% 64,7	Calcita, quartzo, moscovita, clorita	
Metacalcário Magnesiano (6)	55,5 44,9 31,2 23% 24,3	2,0 1,2 0,5 42% 1,5	62,4 41,4 24,5 33% 37,9	Calcita, quartzo, dolomita, moscovita	
Metacalcário Dolomítico (10)	32,6 43,4 52,2 14% 19,6	8,0 3,9 2,6 41% 5,4	17,5 12,2 5,1 29% 12,4	Calcita, dolomita, quartzo, moscovita (clorita)	
Metadolomito Calcítico (1)	- 34,7 -	- 13 -	- 2,7 -	Calcita, dolomita, quartzo, moscovita, clorita	
Filito Carbonático *	- 20,4 -	- 5,2 -	- 3,9 -	Quartzo, moscovita, calcita, clorita, dolomita	
Filito Carbonático Dolomítico *	- 19,2 -	- 6,7 -	- 2,9 -	Quartzo, moscovita, dolomita, clorita	

Tabela 5.6 - Classificação química das rochas carbonáticas da área carbonática Furna-Santana. Análises químicas extraída de Barbieri (1993). * Composição média de 3 análises. $\bar{X}$ = valor médio, CV = coeficiente de variação, Δ = variação. () número de análises. CaO e MgO em % em peso na rocha.

Na área de estudo predominam metacalcários dolomíticos, seguidos de metacalcários magnesianos e calcíticos (tabela 5.6 e figura 2.4), classificados em função do seu teor em CaO e MgO (porcentagem em peso), seguindo a classificação de Martinet e

Sougy (1961). Localmente ocorrem níveis de metadolomito calcítico (com até 60% em dolomita e cerca de 25% em calcita, segundo Barbieri, 1993). Intercalações de filito carbonático e dolomítico são muito frequentes. Nestes, a dolomita constitui o principal mineral carbonático (Barbieri, op. cit.).

A chuva na região de estudo apresenta pH medido entre 6,2 e 6,64 com teor em Ca^{++} e Mg^{++} de 0,5 e 0,3 mg/l, respectivamente ($\text{DT} = 2,5$ mg/l equiv. a CaCO_3) e PCO_2 de $10^{-3,5}$ ou 0,000318 atm. (atmosfera global média, segundo Drake e Harmon, 1973).

Esta água pluvial, coletada pela superfície de rochas metapelíticas (metassiltitos e filitos) e graníticas que circundam a área carbonática Furnas Santana, passa para um pH médio de 6,97, com 3,1 e 1,3 mg/l de Ca^{++} e Mg^{++} ($\text{DT} = 13$ mg/l equiv. CaCO_3) e PCO_2 médio de $10^{-2,65}$ atm. Este aumento da ordem de 7 vezes a pressão parcial de CO_2 da atmosfera, evidencia que esta água alogênica percolou o horizonte superior do solo, tendendo a equilibrar-se com a atmosfera deste, rica em CO_2 devido à grande quantidade de matéria orgânica em decomposição e respiração de raízes. A pressão parcial de CO_2 no solo pode ser estimada através da equação de Brook et. al. (1983):

$$\log \text{PCO}_2 = -3,47 + 2,09(1 - e^{-0,00172E})$$

onde E corresponde à evapotranspiração média anual da área. Considerando 1000mm como sendo a evapotranspiração média anual da área (conforme concluído no item 5.2.3), obtém-se uma pressão parcial de CO_2 de $10^{-1,754}$ atm. para o solo da área estudada, o que corresponde a cerca de 55 vezes a pressão parcial de CO_2 da atmosfera global média.

O aumento do teor em cálcio e magnésio na água alogênica, em relação à pluvial, é atribuído ao contato deste escoamento superficial com filitos e metassiltitos carbonáticos, os quais formam intercalações de espessura métrica na sequência metapelítica da Formação Bairro da Serra.

A transição da fácies hidroquímica de escoamento alogênico para a de escoamento fluvio cárstico é marcada pelo aumento brusco dos índices de saturação em calcita e dolomita (fig 5.10), os quais saltam de -2,76 e -5,72 para -1,10 e -2,49, com dureza total média de 49 mg/l equiv. a CaCO_3 . Este incremento na saturação em minerais carbonáticos é acompanhado pela diminuição da pressão parcial de CO_2 e aumento do pH desta fácies em relação às águas alogênicas (fig 5.10, 5.11 e 5.12). O incremento do pH é consequência da diminuição da concentração de íons H^+ , os quais são consumidos pela formação de íons bicarbonato ($\text{H}^+ + \text{CO}_3^{--} \rightarrow \text{HCO}_3^-$). Os íons carbonato, por sua vez, são produzidos pela solubilização de CaCO_3 e $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ presentes nos metacalcários. Esta dissolução consome CO_2 na produção de H_2CO_3 tendendo a repor H^+ ($\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$), o que é refletido pela queda da pressão parcial de CO_2 nesta fácies hidroquímica.

A água de precipitação com pH médio de 6,42 dá origem a fácies de escoamento autogênico, com pH médio de 8,09 e alto índice de saturação em carbonatos, após sua interação com a superfície carbonática de bacias poligonais fechadas. O aumento do pH

Figura 5.10 - Variação do índice de saturação em calcita em relação à pressão parcial de CO₂ nas fácies hidroquímicas identificadas. 1- Fácies de escoamento alogênico, 2- Fácies de escoamento fluviocárstico, 3- Fácies de escoamento autogênico, 4- Fácies de percolação vadosa em fissuras, 5- Fácies de percolação vadosa em condutos, 6- Fácies de circulação freática profunda e 7- Fácies de ressurgência cárstica.

Figura 5.11 - Variação da dureza total em relação à pressão parcial de CO₂ nas fácies hidroquímicas identificadas.

Figura 5.12 - Variação da alcalinidade em relação ao pH nas fácies hidroquímicas identificadas na área de estudo.

desta fácies, assim como do escoamento fluvicárstico e de ressurgências cársticas, mostra uma tendência diretamente proporcional ao incremento do teor em HCO_3^- (fig 5.12), apesar da grande dispersão dos pontos nesta relação (fig 5.13). Enquanto o índice de saturação em carbonato da água de escoamento autogênico é alto, a pressão parcial de CO_2 nesta fácies é quase a metade de PCO_2 da água alogênica e também inferior em relação a fácies fluvicárstica (fig 5.11). Esta evolução química da água é decorrente do ambiente de dissolução da rocha carbonática e do tempo de residência da água na zona enriquecida em gás carbônico.

A correlação positiva entre pH e HCO_3^- indica que conforme progride o consumo de CO_2 pela dissolução de calcita e dolomita, este é continuamente suprido pela atmosfera do solo, e a reação geral de dissolução de calcita:

(similar à de dissolução de dolomita), tende a atingir o equilíbrio, tornando a água saturada a supersaturada em calcita, situação típica de sistemas abertos de dissolução (sistemas coincidentes), conforme os modelos de dissolução de calcita e dolomita de Langmuir (1971), Harmon (1973) e Drake (1983).

Fig 5.13 - Alcalinidade em função do pH das amostras do rio Roncador na caverna Pérolas (A), do escoamento fluviocárstico na planície do polje junto ao sumidouro da cav. Pérolas (B) e da ressurgência na cav. Santana.

A variação da pressão parcial de CO_2 entre fácies hidroquímicas é atribuída principalmente a tempos diferentes de residência da água na zona do solo enriquecida em CO_2 e à presença ou não de calcita e/ou dolomita. A fácies alogênica, além de percolar em ambiente quase que desprovido de calcita e dolomita (o que anula o processo de consumo de CO_2 , conforme comentado acima), representa água coletada em redes de drenagem superficiais contínuas e muito maiores em área do que as bacias poligonais de captação autogênica. Esta área maior de coleta do escoamento superficial condiciona um contato mais prolongado da água de percolação com o horizonte superior do solo e conseqüentemente uma PCO_2 mais elevada nesta água de escoamento alogênico em relação a água de escoamento superficial autogênico, a qual com PCO_2 inferior, reflete tempo de residência menor no solo, em função das bacias de captação menores.

Figura 5.14 - Seção esquemática da superfície dos metacalcários nas encostas de bacias poligonais fechadas mostrando a morfologia da zona epicárstica (segundo definição de Williams, 1985). R1- escoamento superficial direto, R2-escoamento lateral na porosidade do solo, R3- escoamento lateral na zona epicárstica. Velocidade de $R1 > R2 > R3$. I- infiltração vertical, $I > i$, condicionando lençol freático temporário.

Parte do escoamento superficial autogênico alimenta a fácies de percolação vadosa em fissuras, onde atinge os valores máximos de dureza total, alcalinidade e PCO_2 em relação as demais fácies hidroquímicas (fig 5.11 e 5.12). A água de percolação vadosa em fissuras corresponde à fração da recarga autogênica coletada por bacias poligonais fechadas e concentrada na zona epicárstica (seg. Williams, 1985) ou subcutânea (seg. Gunn, 1983), a

qual corresponde ao nível superior da rocha carbonática parcialmente intemperizada, predominantemente coberta por solo e entalhada por sulcos e fendas (karren ou lapiás cobertos) de dissolução (figura 5.14). Devido a alta rugosidade da superfície epicárstica, o fluxo lateral de água do escoamento subcutâneo (nas encostas de depressões poligonais e abaixo do solo) será lento, o que condiciona um tempo maior de interação, tanto entre água e rocha carbonática, como também, entre água e o ambiente do solo com alta PCO_2 , o que resulta no mais elevado teor em sólidos dissolvidos e maior PCO_2 desta fácies hidroquímica (figs 5.10 e 5.11).

Plotando a alcalinidade em função do pH da fácies hidroquímica de percolação vadosa em fissuras, obtém-se uma relação onde o teor em HCO_3^- é inversamente proporcional ao pH (fig 5.15). Esta relação corresponde à evolução do sistema $CaCO_3 + H_2O + CO_2$ em condições fechadas em relação ao CO_2 (sistema sequencial, Langmuir, 1971), onde a água com alta PCO_2 inicial continua seu caminho de percolação pelo maciço carbonático através de juntas alargadas, mas isolada da fonte de CO_2 . Desta forma, a diminuição de CO_2 na solução, será acompanhada, com o tempo, de um incremento de HCO_3^- . A diminuição do pH com o aumento da concentração do íon hidrogenocarbonato é reflexo do aumento da concentração de H^+ na solução, onde o CO_2 é gradativamente consumido (diminuindo a PCO_2 da solução) para gerar H_2CO_3 e este, por sua vez, consumido para formar H^+ e HCO_3^- , segundo o equilíbrio:

tornando a solução saturada a supersaturada em calcita, com índices de saturação em calcita de até 0,5 (tabela 5.5).

Figura 5.15 - Alcalinidade em função do pH das águas de percolação vadosa em fissuras.

Esta fácies hidroquímica de percolação vadosa em fissuras é a principal fonte de calcita secundária precipitada em cavidades no interior do maciço carbonático (Bull, 1983). A precipitação de carbonatos (principalmente calcita e/ou aragonita) é condicionada pelo caráter saturado destas águas, as quais, em equilíbrio com elevada PCO_2 , ao atingirem cavernas, sofrem uma degaseificação, pois a solução tendendo a equilibrar-se com a pressão de CO_2 da cavidade (normalmente próxima da PCO_2 da atmosfera), perde CO_2 para a atmosfera da cavidade, tornando-se supersaturada em relação aos carbonatos citados, o que causa a precipitação destes.

Um aspecto importante na evolução geoquímica das águas de percolação vadosa em fissuras é o controle da precipitação de calcita ou aragonita pelo teor em Mg^{++} nestas águas. Notou-se que os pontos de gotejamento com razão molar $\text{Ca}^{++}/\text{Mg}^{++}$ entre 1,6 e 0,6 (amostras 170 a 172, anexo 5.4) em contraste com aqueles de relação alta entre 11 e 1,8, precipitam aragonita no lugar de calcita, comprovando o controle da precipitação de aragonita por soluções ricas em magnésio, conforme proposto por Lippman (1960), evidenciado por Gonzales e Lohmann (1988) nas cavernas do Novo México (EUA) e por Barbieri (1993) nas cavernas da região estudada. A produção de soluções percolantes com razões baixas de cálcio e magnésio está associada à lixiviação de estratos de filito carbonático, onde dolomita perfaz quase que 100% dos minerais carbonáticos e dolomitos calcíticos, os quais formam intercalações centimétricas a métricas nos metacalcários calcíticos dominantes (Barbieri, 1993).

A percolação vadosa em condutos pode ser sub-classificada em dois tipos de águas com agressividades distintas em relação aos minerais carbonáticos. Aquela saturada em calcita é alimentada principalmente pela somatória de infiltrações lentas ao longo de fissuras, apresentando volumes reduzidos e dando origem à depósitos calcíticos secundários em cavernas, através da exsolução de CO_2 . O segundo tipo representa a água de captação superficial autogênica, de escoamento rápido em superfície e que é absorvida por fundos de depressões diretamente conectados a condutos vadosos (invasões vadosas). Sua insaturação em calcita e dolomita é consequência do escoamento inicial em superfície sobre o solo residual argiloso que cobre o metacalcário, absorção rápida por condutos e, portanto, pouco tempo de interação com a rocha carbonática.

A fácies de percolação freática profunda representa a mistura de todas as fácies hidroquímicas acima caracterizadas, o que é evidenciado pela posição mediana de sua dureza total (fig 5.11), índice de saturação em calcita (fig 5.10) e alcalinidade desta fácies em relação às demais. O baixo coeficiente de variação dos seus principais parâmetros físico-químicos (tabela 5.5) reflete o tempo maior de residência desta fácies no maciço carbonático, em relação às demais, o que acaba reduzindo ao máximo a influência sazonal sobre o quimismo desta fácies aquática. Apesar da alta dureza total e alcalinidade, semelhantes às da água de escoamento epicárstico subcutâneo, seu pH é bem inferior, sugerindo evolução do sistema CaCO_3 , H_2O e CO_2 em ambiente sequencial com relação ao CO_2 .

A temperatura média superior da fácies freática profunda (tab 5.5) é interpretada como sendo influência do grau geotérmico sobre esta água (associado ao tempo maior de residência desta no maciço carbonático) em função da elevada profundidade de circulação desta, a qual deve atingir entre 200 a 350 m abaixo do N.A., segundo o modelo de profundidades de condutos e proto-condutos esboçado no item 4.3.3.2.

Observando as análises químicas da fácies de circulação freática profunda (amostras 90, 98, 104, 105 e 167, anexo 5.3), nota-se que estas, em comparação com as demais fácies hidroquímicas, possuem teores mais elevados (entre 4 e 8 mg/l) de sulfato. Associa-se a origem do ânion SO_4^{--} à oxidação do enxôfre reduzido de sulfetos, principalmente pirita, no ambiente freático com oxigênio dissolvido, segundo a reação (Bottrell et. al., 1991):

A pirita ocorre na forma de cristais milimétricos disseminados em alguns estratos de metacalcário e mais freqüentemente em camadas carbonático-pelíticas intercaladas na sequência metacarbonática.

A presença de sulfato também nas águas cársticas vadasas da área de estudo, apesar de quase não detectada pela amostragem realizada, é evidenciada pela presença de gipsita secundária depositada pelas águas de percolação vadosa em fissuras ao atingir certos trechos de cavernas na zona vadosa.

O ânion SO_4^{--} detectado nas águas freáticas profundas possui uma importante implicação espeleogenética, conforme Ball e Jones (1990), pois além de constituir uma fonte de íons H^+ para aumentar a dissolução no sistema CaCO_3 , H_2O e CO_2 , o ácido sulfúrico gerado na oxidação de pirita pode representar uma reativação da agressividade da água em ambientes profundos do aquífero carbonático, onde a água de percolação ao longo de descontinuidades após um tempo de residência maior e isolado de fontes de CO_2 , a princípio, já estaria saturada em calcita, considerando-se somente a corrosão pelo ácido carbônico.

A fácies hidroquímica de ressurgências cársticas, conforme citado anteriormente, representa o retorno para a superfície, de praticamente todo volume de água absorvido e transmitido pelo maciço carbonático. A grande variabilidade com o tempo do índice de saturação em calcita e dolomita desta fácies ($\Delta\text{SI}_c = 1,04$ e $\Delta\text{SI}_d = 2,16$) expressa a influência do regime de recarga do aquífero sobre o quimismo do sistema cárstico. Períodos de alta recarga (recorrência de eventos de chuva) estão associados a níveis maiores de vazão da ressurgência com água insaturada em calcita e dolomita (SI_c e SI_d negativos). Ao contrário, períodos de baixa recarga, com níveis menores de vazão associam-se a água saturada em calcita e dolomita (índices de saturação positivos, fig 5.10 e tab 5.5). O índice de saturação dos períodos de baixa vazão é semelhante ao da água de circulação freática profunda e ligeiramente inferior ao da fácies de percolação vadosa em fissuras, o que indica que o escoamento basal da ressurgência é alimentado principalmente por estas fácies hidroquímicas, com mistura de uma fração pequena de água insaturada, provavelmente de origem fluviocárstica ou até de contribuições alogênicas injetadas ao longo do contato litológico e transmitidas diretamente para a rede principal de condutos. Por outro lado, o

escoamento direto, responsável por eventos de vazões elevadas, apresenta índice de saturação em calcita semelhante ao da fácies fluviocárstica com níveis de saturação mais altos (fig 5.10). Isto é interpretado como sendo reflexo do curto tempo de residência no maciço carbonático da água de escoamento direto, cuja fonte principal de sólidos dissolvidos é a parte da água armazenada em condutos e fissuras (tanto freáticos como vadosos), a qual gradativamente é expulsa e substituída nos eventos de recarga do aquífero, somando-se ao escoamento direto.

A sazonalidade química de ressurgências cársticas será detalhada no próximo item.

5.4 Dinâmica corrosiva do sistema cárstico Pérolas-Santana

A dinâmica corrosiva de sistemas cársticos pode ser expressada quantitativamente pelos seguintes parâmetros derivados: taxa de saturação em calcita e dolomita de águas alogênicas ao invadirem o terreno cárstico, variação sazonal do índice de saturação em calcita e dolomita das águas que circulam pelo sistema (principalmente da sua ressurgência e a relação entre a descarga desta e a dureza total da água) e a taxa de denudação química da bacia hidrográfica associada ao sistema.

5.4.1 Taxa de saturação de águas alogênicas (TS)

A taxa de saturação em calcita e dolomita de córregos alogênicos, ao adentrarem terrenos cársticos, revela a distância necessária para que o escoamento superficial sobre rochas carbonáticas atinja a saturação nestes minerais. É definida aqui pela razão entre a variação do índice de saturação (ΔSI_c ou ΔSI_d , expressos em unidades de saturação, US) e a distância (d em km) percorrida pela água sobre o terreno cárstico, até atingir o estado saturado:

$$TS = \frac{\Delta SI_c}{d}$$

Para o córrego Pérolas localizado sobre o *polje* de contato da extremidade SW da área carbonática Furnas-Santana obteve-se uma taxa de saturação em calcita entre 1,4 e 1,5 unidades de saturação/km. Isto significa que o córrego alogênico aumenta 1,4 a 1,5 unidades de saturação em calcita por quilômetro de fluxo sobre o terreno carbonático, desde o contato litológico (P1), até atingir a saturação em calcita (fig 5.16). Entre o contato e o sumidouro, o córrego Pérolas meandra na planície associada ao *polje*, coberta em grande parte por aluviões alóctones que contornam colinas de substrato calcário. A taxa de 1,4 US/km corresponde a uma vazão aproximada de 0,01 m³/s do córrego, enquanto a taxa de 1,5 US/km associa-se a 0,03 m³/s. Após cerca de 2,34 km de escoamento sobre o terreno cárstico, o córrego Pérolas atinge o estado saturado em calcita, o qual é mantido praticamente constante até a ressurgência do sistema (fig 5.16), no regime de vazão entre eventos de chuva. A taxa acima calculada não é válida para períodos de chuvas.

Com relação à dolomita, apesar do rápido incremento da saturação da água neste mineral desde o contato litológico (fig 5.16), não se obteve TS_d pelo fato desta drenagem não atingir o estado saturado em dolomita ao longo de todo seu percurso sobre rochas carbonáticas.

Troester e White (1986) obtiveram taxas de saturação em calcita entre 0,2 e 0,5 US/km para rios allogênicos que circulam sobre terrenos cársticos (com vazões médias entre 0,4 e 3,3 m³/s) na região nordeste da ilha de Porto Rico.

A interpretação deste parâmetro e sua comparação com o de outras áreas cársticas, deve considerar os seguintes aspectos, dos quais depende diretamente: regime de vazão da drenagem fluvio-cárstica, tipo de alimentação desta drenagem sobre o terreno cárstico (escoamento da zona epicárstica e/ou superficial), tipo de cobertura associada ao vale e planície do rio (cobertura não carbonática, alóctone ou autóctone), natureza do leito fluvial (com depósitos aluvionares e/ou rocha exposta), tipo de rocha carbonática e gradiente hidráulico da drenagem.

Figura 5.16 - Variação dos índices de saturação em calcita e dolomita ao longo da drenagem do sistema Pérolas-Santana, entre o contato com metapelitos e a ressurgência do sistema. P1- sobre o contato, P2 e P3 - sobre a planície do *polje* de contato, P4- no início da caverna Pérolas e P5- na ressurgência do sistema, proximidades da entrada da caverna Santana.

No presente estágio deste trabalho, não se dispõe de medidas do parâmetro acima, para um conjunto de drenagens allogênicas sobre metacalcários, em situações geológicas e geomórficas variadas, o que impede uma análise interpretativa da taxa de saturação obtida para o córrego Pérolas. Este dado deverá ser aliado à futuras medidas, permitindo então, uma interpretação significativa.

5.4.2 Variação sazonal do índice de saturação em calcita e dolomita de águas cársticas

Com base na variação do índice de saturação em calcita e dolomita de um conjunto de análises de água distribuídas regularmente ao longo de um ano, define-se a amplitude de variação sazonal da saturação, parâmetro útil para quantificar a duração da agressividade de águas cársticas em relação a calcita e dolomita. Como exemplos deste parâmetro selecionou-se a variação sazonal do índice de saturação das águas da ressurgência em contraste com as de percolação vadosa em fissuras do sistema Pérolas-Santana (fig 5.17a e 5.17c).

A ressurgência do sistema Pérolas-Santana apresentou índice máximo de saturação em calcita de +0,25 e mínimo de -0,61, o que resulta numa variação de 0,86 para o período de junho de 1990 a fevereiro de 1991 (20 meses, fig 5.17a). Com relação ao período de junho de 90 a maio de 91, a ressurgência apresentou vazão insaturada por cerca de 9 meses (setembro de 90 a maio de 91) e saturada por 3 meses (junho a agosto). Com este resultado, afirma-se que por aproximadamente 9 meses, por ano hidrológico, o fluxo de água subterrânea deste sistema se comporta, de modo geral, agressivo em relação à calcita, causando portanto, abrasão química dos metacalcários ao longo da rota de fluxo da água subterrânea deste sistema neste período, o qual é alternado por períodos de cerca de 3 meses de fluxo quimicamente inerte em relação à calcita dos metacalcários.

Com relação à dolomita, o escoamento da ressurgência do sistema Pérolas-Santana apresenta índice de saturação entre -1,77 e -0,11, o que resulta numa variação sazonal de 1,66, permanecendo agressiva ao longo de todo ano hidrológico monitorado (fig 5.17a).

A variação do índice de saturação em calcita e dolomita do escoamento da ressurgência do sistema Pérolas-Santana e, conseqüentemente, da concentração em sólidos dissolvidos, é inversamente proporcional a vazão do sistema cárstico, conforme é visualizado pela combinação das curvas das figuras 5.17a e 5.17b e pela relação obtida entre a dureza total deste escoamento e sua vazão (fig 5.18).

A vazão, por sua vez, é controlada pela recarga do aquífero com precipitação de água meteórica. Períodos com chuvas intensas freqüentes determinam elevação dos níveis de vazão do sistema. Portanto, quanto mais prolongado for o período de chuvas, tanto maior será o período de vazões altas, causando períodos mais longos de escoamento corrosivo (insaturado) em relação aos minerais carbonáticos. A diminuição da concentração de sólidos dissolvidos (aumento da agressividade) com o aumento da vazão é resposta direta do tempo menor de residência das águas de vazões altas, devido ao aumento da velocidade de fluxo destas, ao longo dos condutos subterrâneos ($Q = v \times A$, v = velocidade, A = seção média dos condutos).

Devido a recorrência de anos mais úmidos entre períodos mais secos, como o ano de 1990, com um total anual de 1792 mm de chuva, seguidos por 1320 mm no ano de 91, o período de agressividade do fluxo de água subterrânea para o ano de 91 foi menor que 9 meses. Mas, por outro lado, anos muito úmidos, como foi o de 1983, com 2400 mm de chuva anuais (DAEE, 1992), devem refletir períodos anuais mais prolongados de agressividade do fluxo. O período de 9 meses de agressividade em relação à calcita por ano

A - Ressurgência do Sistema Pérolas-Santana

B - Ressurgência do Sistema Pérolas-Santana

C - Percolação vadosa em fissuras

Figura 5.17 - Variação sazonal do índice de saturação em calcita das águas da ressurgência da caverna de Santana e de percolação vadosa em fissuras em função da vazão do sistema de cavernas Pérolas-Santana.

Figura 5.18 - Relação entre dureza total e vazão da ressurgência do sistema Pérolas-Santana. Coeficiente de correlação -0,83. Envoltórias de 90 e 95 % de probabilidade.

hidrológico, é portanto, uma primeira aproximação da duração do caráter corrosivo da água associada à ressurgência do sistema Pérolas-Santana. A representatividade estatística desta duração somente poderá ser testada através de vários anos seguidos de monitoramento da ressurgência.

A fácies de percolação vadosa lenta ao longo de fissuras (descontinuidades em parte alargadas por dissolução) do maciço carbonático encaixante da caverna Santana apresenta variação sazonal dos índices de saturação em calcita e dolomita respectivamente de 0,34 e 0,66. Estes valores são praticamente a metade da amplitude sazonal de SIC e SID da percolação rápida em condutos acima descrita.

A percolação vadosa lenta em fissuras apresentou-se saturada a super-saturada em relação a calcita durante todo período monitorado e, insaturada em relação a dolomita (fig 5.17c), o que evidencia o potencial constante desta água em precipitar calcita, sendo que sua capacidade corrosiva está limitada aos horizontes superiores do maciço carbonático. Na curva de variação dos índices de saturação com o tempo, nota-se que no período compreendido entre agosto de 90 e fevereiro de 91 esta água apresentou saturação inferior ao período de maio de 91 a janeiro de 92 (fig 5.17c). Estes dois períodos de saturação contrastante correspondem também a fases com distintas intensidades de recarga pluviométrica (fig 5.5). O primeiro período corresponde à pluviosidade maior e saturação menor, enquanto o segundo, reflete pluviosidade menor e saturação maior.

Comparando a curva de variação com o tempo do índice de saturação da água de percolação vadosa em fissuras com aquela da vazão da ressurgência versus tempo (figs 5.17b e 5.17c), nota-se que a partir do dia 3/2/91 iniciou-se uma fase de intensa recarga do aquífero (aumento da vazão) que perdurou até meados de março (fig 5.17b), caindo

rapidamente em seguida até 19/5/91. Esta fase de recarga do sistema foi acompanhada pelo incremento constante da saturação em calcita e dolomita da água de percolação lenta que ressurge em gotejamentos na caverna, até o ponto de amostragem do dia 19/5/91 (fig 5.17c), a partir do qual, ocorreu o decréscimo da concentração de sólidos dissolvidos nestes gotejamentos até julho de 91.

A variação acima descrita representa um exemplo didático de como o mecanismo de recarga do aquífero condiciona a variação do quimismo da água de percolação lenta no maciço rochoso carbonático. Interpreta-se que o crescimento da vazão do sistema (fase de chuvas intensas) em paralelo à concentração em Ca e Mg do gotejamento na caverna é causado pela expulsão da água de percolação vadosa lenta que tinha sido acumulada na rede de fissuras e capilares durante a fase de recarga anterior. Com o início das chuvas intensas, uma nova frente de água é injetada no maciço rochoso, aumentando a pressão sobre a água retida no fissuramento menor, o que causa a expulsão desta água mais antiga e a substituição desta pela nova frente de infiltração. Esta água em expulsão possui alta concentração (saturação em carbonatos) de sólidos dissolvidos devido ao tempo maior de residência no maciço carbonático. A substituição da água acumulada anteriormente perdura por cerca de 2 meses (3/2 a 19/5/91, fig 5.17c). Logo após o escoamento desta água mais saturada, o índice de saturação do gotejamento decresce rapidamente. Atribui-se esta queda da concentração em Ca e Mg à chegada no nível da caverna da frente do novo pulso de água injetada pelo último evento de recarga do maciço fissurado. Com a interrupção da recarga pluviométrica (em 7/3/91) e escoamento da parte inicial do pulso de recarga através do fissuramento mais aberto e bem interconectado (fase de queda do índice de saturação entre 19/5 e 20/7/91, fig 5.17c), os gotejamentos começam a ser alimentados pelo escoamento relativamente mais lento a partir das fissuras menores e capilares, nos quais, a água tem residência mais prolongada, causando uma nova fase ascendente da saturação em calcita e dolomita do gotejamento na caverna (a partir do dia 20/7/91, fig 5.17c).

Conforme citado anteriormente, a infiltração vadosa em fissuras perde sua capacidade corrosiva de minerais carbonáticos no horizonte superior do maciço calcário (alguns metros abaixo da zona epicárstica onde evolui em sistema fechado com relação ao CO_2 , segundo Williams, 1985). Esta água de infiltração é responsável pelo rebaixamento geral da superfície de bacias poligonais fechadas através da dissolução de calcita e dolomita principalmente na zona epicárstica. Após percolar na vertical pelo maciço rochoso (no caso da cav. Santana, entre 100 e 250m) com quase desprezível e localizada atividade de dissolução (p. ex. reativação da agressividade da água em relação a calcita através da corrosão de mistura), esta fácies hidroquímica é responsável pela atividade construtiva de depósitos secundários de calcita (e secundariamente de aragonita) em espaços vazios no interior do maciço, principalmente ao atingir a rede de condutos de origem freática ou vadosa, expostos acima do nível d'água.

Esta infiltração supersaturada em equilíbrio com alta PCO_2 , ao encontrar a fácies de percolação profunda em condutos, também saturada, mas com PCO_2 inferior, fornece

condições localizadas para o fenômeno da corrosão de mistura (conforme analisado no item 4.3.3.2), contribuindo assim na iniciação e ampliação de condutos freáticos.

5.4.3 Taxa de denudação química da bacia do sistema Pérolas-Santana

A taxa de denudação de terrenos cársticos por dissolução (ou simplesmente taxa de denudação cárstica) é definida como a perda média de massa em solução de bacias de drenagem sobre rochas carbonáticas (White, 1984), representando a taxa de rebaixamento da superfície do relevo cárstico em função do intemperismo e erosão.

Embora a erosão química de terrenos carbonáticos ocorre tanto em superfície como em subsuperfície, as taxas de denudação são expressas, por convenção, pelo equivalente em espessura de rocha removida por unidade de tempo ao longo de uma superfície horizontal. As unidades mais freqüentemente utilizadas são milímetros removidos por mil anos (mm/ka, onde ka = 1000anos), o que equivale também a $\text{m}^3/\text{km}^2 \times \text{ano}$ (Ford e Williams, 1989).

As primeiras estimativas quantitativas da denudação química de terrenos cársticos foram obtidas por Corbel (1959), através de sua clássica expressão:

$$X = \frac{4ET}{100}$$

onde X é a taxa de erosão química (mm/ka), E é a pluviosidade anual em decímetros na área cárstica (dm/ano) e T corresponde a média anual da dureza total (em mg/l equivalentes a CaCO_3) do escoamento da bacia.

Figura 5.19 - Distribuição de frequência das análises de dureza total (mg/l equivalentes a CaCO_3) da ressurgência da caverna Santana para o período de junho de 1990 a julho de 1991. Total de 23 amostras, média = 97,34 mg/l, coeficiente de variação = 8,8%. Os três grupos de frequência correspondem aos regimes de vazão alta, média e baixa, respectivamente, da esquerda para direita.

Considerando uma pluviosidade de 1600 mm (16 dm) sobre a bacia do sistema Pérolas-Santana (média dos últimos 17 anos da pluviosidade medida no pluviômetro do bairro da Serra, DAEE, 1992) e dureza total média anual da ressurgência do sistema de 97,34 mg/l equiv. a CaCO_3 (fig 5.19), obtém-se uma taxa de denudação $X = 62,3 \text{ mm/ka}$, através da equação de Corbel (1959).

Trabalhos posteriores, como os de Williams (1963), Pulina (1972) e Drake e Ford (1973), consideraram a equação de Corbel demasiadamente simplificada, sendo que as taxas de denudação cárstica obtidas através desta, seriam superestimadas. O caráter simplificado seria decorrente do fato da equação de Corbel não considerar a fração da dureza total gerada pela porção da bacia sobre rochas não carbonáticas e, introduzida no escoamento final da bacia, além da perda de parte da precipitação sobre a bacia, através da evapotranspiração, o que acaba reduzindo o volume escoado pela bacia, em relação ao volume total de precipitação (White, 1984).

Examinando os fatores acima apontados, Pulina (1972) propôs a equação:

$$Dm = 12,6 \frac{(T - Ta)Q}{P}$$

onde Dm é a taxa de denudação média da bacia cárstica (mm/ka), T é a média anual da dureza total do escoamento da bacia (mg/l equiv. a CaCO_3), Ta é a dureza total do escoamento alogênico introduzido no sistema cárstico mas captado sobre a porção não carbonática da bacia, Q é a vazão média anual do sistema (m^3/s) e P a área total da bacia de captação do sistema (km^2).

Através da equação de Pulina (1972) obteve-se uma taxa de denudação média $Dm = 21,1 \text{ mm/ka}$ para a bacia do sistema Pérolas-Santana, com $T = 97,34 \text{ mg/l equiv. a } \text{CaCO}_3$, $Ta = 13 \text{ mg/l equiv. a } \text{CaCO}_3$ (valor médio da dureza total de córregos alogênicos, tabela 5.5), $Q = 0,504 \text{ m}^3/\text{s}$ (tabela 5.2) e $P = 25,4 \text{ km}^2$ (área total de captação da bacia obtida pelo balanço hídrico do sistema, item 5.2.3).

Smith e Atkinson (1976) apresentaram uma análise crítica dos resultados publicados até 1975 sobre a relação entre as taxas de denudação química de terrenos cársticos em diferentes condições climáticas. Concluíram que o volume de escoamento (ou precipitação) é o fator que mais influencia as taxas de denudação, em detrimento da temperatura, conforme postulado anteriormente por Corbel (1959) e outros. Com relação ao clima, mostraram que a denudação cárstica de zonas árticas a sub-árticas é inferior e facilmente distinguível da taxa de denudação de áreas cársticas temperadas e tropicais, enquanto que entre estas duas últimas zonas climáticas, as taxas de denudação química são dificilmente diferenciadas.

Smith e Atkinson (1976) propuseram calcular a taxa de denudação cárstica (X) através da expressão:

$$X = \frac{\bar{Q}}{A} \cdot \frac{T}{10^6 r} \cdot \frac{1}{n}$$

onde $\bar{Q}$ é o volume médio anual de água escoada pela bacia, em m^3/ano , T é a dureza total média deste escoamento (mg/l equiv. a CaCO_3), r é a densidade média da rocha carbonática

em g/cm^3 , A é área total em km^2 da bacia e n a fração desta área ocupada por rochas carbonáticas.

Aplicando a equação de Smith e Atkinson (1976) aos dados da bacia Pérolas-Santana, obteve-se uma taxa de denudação de 35,3 mm/ka ou $\text{m}^3/\text{km}^2 \times \text{ano}$, através dos valores de $\bar{Q} = 16.997.796,02 \text{ m}^3/\text{ano}$, volume escoado pela ressurgência do sistema para o período de jun. de 90 a jun. de 91 (tabela 5.8), $T = 97,34 \text{ mg/l equiv. a CaCO}_3$, $r = 2,60 \text{ g/cm}^3$, densidade média adotada para os metacalcários da área de estudo, $A = 25,4 \text{ km}^2$ e $n = 0,71$, considerando que do total da área de captação da bacia, no mínimo $7,4 \text{ km}^2$ são de captação alogênica, o que resulta em no máximo 18 km^2 de captação autogênica e portanto, $n = 18/25,4$.

White (1984) confirma a dependência direta da taxa de denudação cárstica do volume de precipitação e, conseqüentemente, do escoamento transmitido pelo sistema. Plotando as taxas de denudação de diversas áreas do mundo versus o escoamento efetivo ($P - Ev$) destas bacias cársticas (fig 5.20), obteve um melhor ajuste dos pontos através de uma regressão linear com $r^2 = 0,92$, cuja expressão é:

$$D = 0,049(P - Ev) + 6,3$$

Figura 5.20 - Taxas de denudação cárstica (D) em função da precipitação efetiva ou escoamento da bacia ($P - Ev$), segundo White (1984). Os pontos plotados foram extraídos de 1- Ártico canadense, Smith (1962); 2 e 3- Polônia, Glazek e Markovicz-Lohinovicz (1973); 4- West Virginia, EUA, Ogden (1982); 5- Irlanda, Williams (1963); 6- Bulgária, Markovicz, et. al. (1972); 7- Montanhas Tatra, Polônia, Glazek e Markovicz-Lohinovicz (1973); 8- Nova Zelândia, Williams e Dowling (1979); 9- Nova Zelândia, Gunn (1981b); 10- Belize, Miller (1982); 11-Gunung Mulu, Malásia, Sweeting (1979) e R- Alto Ribeira, Brasil, ponto calculado no presente trabalho.

A bacia Pérolas-Santana, com ($P - Ev$) anual médio de 700 mm, insere-se perfeitamente neste alinhamento, com uma taxa de denudação $D = 40,6 \text{ mm/ka}$ (fig 5.20). A

pluviosidade (P) baseia-se na média dos últimos 17 anos (1600 mm) medida no pluviômetro do bairro da Serra (DAEE, 1992). A evapotranspiração (Ev) utilizada no cálculo acima (900 mm) corresponde à média dos valores da área de estudo, que variam entre 800 e 1000 mm.

White (op. cit.), aprofundou a análise da questão clássica sobre a dependência climática da taxa de evolução de relevos cársticos. Partindo da premissa de que a água injetada no maciço carbonático, tanto através de infiltração difusa após percolar o solo, como por infiltração concentrada em fundos de dolinas ou, através de sumidouros em vales cegos, atinge o equilíbrio com a rocha carbonática, White propôs o cálculo de uma taxa de denudação teórica, através de uma equação que envolve as três variáveis climáticas fundamentais: temperatura, pressão de CO_2 no solo e precipitação, conforme segue abaixo:

$$D_{máx} = \frac{100}{\rho^{3/4}} \left(\frac{K_c K_1 K_{CO_2}}{K_2} \right)^{1/3} P_{CO_2}^{1/3} (P - Ev)$$

Esta taxa de denudação teórica é máxima ($D_{máx}$) pois representa o limite superior do equilíbrio químico entre minerais carbonáticos e a água, onde o escoamento total da bacia ($P - Ev$) está saturado e equilibrado com a temperatura local e a pressão de CO_2 do ambiente de dissolução. A influência da temperatura sobre a denudação está embutida na dependência das constantes de equilíbrio da temperatura.

Com a equação acima obteve-se uma previsão teórica de $D_{máx} = 49,1$ mm/ka para a bacia Pérolas-Santana. Para tal, adotaram-se as constantes de equilíbrio das reações principais envolvidas na dissolução de calcita, tabeladas por Plummer e Busenberg (1982) para 20°C, conforme especificado abaixo:

Como densidade do metacalcário (ρ) utilizou-se 2,6 g/cm³. Quanto à pressão parcial de CO_2 do solo seguiu-se o valor calculado de $10^{-1,754}$ atm. pela expressão de Brook et. al. (1983), conforme descrito no item 5.3.4.

Por último, determinou-se um valor da taxa de denudação da bacia do sistema Pérolas-Santana através do cálculo do total de massa equivalente a $CaCO_3$ removida pelo sistema de drenagem em um ano hidrológico, ao longo do qual, monitorou-se o volume escoado e sua dureza total. O método proposto aqui fundamenta-se nos trabalhos de Drake e Ford (1973) e Ogden (1982). Diferencia-se destes, pelo fato de ser aplicável a bacias com captação mista alogênica e autogênica, devido à inclusão de um termo na fórmula de cálculo da taxa, que subtrai a contribuição em massa de carbonatos de origem alogênica.

Propõe-se a seguinte equação para calcular a taxa de denudação química (Dq) da bacia de drenagem do sistema Pérolas-Santana:

$$Dq = \frac{\left(\sum_{n=1}^n V_n \cdot T \right) - (P \cdot T_a)}{d} \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{A} \cdot \frac{1}{C}, \text{ onde } n = \int_t^t \frac{dQ}{dt} \text{ e } P = \bar{p} \cdot A_a$$

Devido ao fato da dureza total (T em mg/l equiv. a CaCO_3) do escoamento da bacia na ressurgência do sistema variar na razão exponencial inversamente proporcional à vazão (Q em m^3/s), conforme é visualizado pela tabela 5.7 e figura 5.20, mas, por outro lado, o fluxo instantâneo de sólidos dissolvidos ($Q \cdot T$ em g/s, tabela 5.7) variar na razão linear diretamente proporcional à vazão (Q) deste sistema (fig 5.21), subdividiu-se a curva geral da vazão do sistema versus o tempo em períodos de vazão alta, média e baixa, nos quais se dispunha de análises de dureza total. Esta subdivisão teve como objetivo relacionar cada período de regime de vazão com sua dureza total média (T), em função da variação acima apontada (tabela 5.8). Cada um destes segmentos da curva de vazão instantânea (Q versus tempo, fig 5.3) foi integrado graficamente para obter o volume (V_n , m^3) total de água escoada em cada período n (tabela 5.8). Através do produto entre V_n e T de cada período e a somatória destes, obteve-se a massa total equivalente a CaCO_3 removida em solução da bacia (termo $\sum V_n \cdot T$ da equação acima, em g/ano). Deste total de sólidos dissolvidos escoados pela ressurgência deve-se subtrair a massa equivalente a CaCO_3 de origem alogênica e introduzida no sistema cárstico através do volume de água coletada sobre a área de captação alogênica do sistema (termo $P \cdot T_a$ da equação acima). A quantificação exata deste termo depende da demarcação precisa da área de captação alogênica, pois a variável P da equação acima é obtida pelo produto entre a pluviosidade (p) e a área de captação alogênica (A_a) do sistema. No caso da bacia do sistema estudado, a demarcação exata de A_a não foi possível, sabendo-se até o estágio atual deste trabalho, que esta área corresponde no mínimo a $7,4 \text{ km}^2$ (ver discussão do balanço hídrico e área de captação do sistema, item 5.2.3). A precipitação (p) na área durante o período considerado (11/6/90 a 18/6/91) foi de $1583,9 \text{ mm}$, o que sobre a área de $7,4 \text{ km}^2$ perfaz $11.721.600 \text{ m}^3$. A dureza total média deste escoamento alogênico (T_a) injetado no sistema cárstico é de 13 mg/l equiv. a CaCO_3 (tabela 5.5), o que resulta em $152.380.800 \text{ g}$ equivalentes a CaCO_3 , os quais foram subtraídos do total de sólidos dissolvidos escoados (tabela 5.8) para obtenção do fluxo de massa ($1.455.858.331 \text{ g}$ equivalentes a CaCO_3) efetivamente originado no maciço carbonático. Devido à impossibilidade de demarcação total da área alogênica, este valor do fluxo de massa no período considerado deve ser ligeiramente inferior ao utilizado no presente cálculo da denudação. A massa total equivalente a CaCO_3 escoada pela bacia sobre a densidade (d) de $2,6 \text{ g/cm}^3$ considerada para os metacalcários da área, resulta no volume de $559.946 \text{ m}^3/\text{ano}$ de rocha carbonática removida em solução. Distribuindo este volume sobre a área total de captação da bacia ($A = 25,4 \text{ km}^2$) obteve-se a taxa de denudação aparente do sistema cárstico ($D = 22,1 \text{ mm/ka}$), pois esta representa a remoção de carbonatos por dissolução inclusive sobre a área alogênica. Esta taxa aparente deve ser corrigida pelo fator $1/C$ (semelhante ao fator $1/n$ de Smith e Atkinson, 1976) para obtenção

da taxa real de denudação química (Dq). C é a razão entre a área de captação autogênica (no caso 18 km^2) e a área total da bacia (A). Desta maneira restringe-se a denudação química à fração da bacia ocupada por rochas carbonáticas. Obteve-se assim, um valor final de $Dq = 31,1 \text{ mm/ka}$ para o sistema cárstico Pérolas-Santana.

Data de amostragem	Dureza total T , mg/l	Vazão, $Q \text{ m}^3/\text{s}$	Fluxo de sólidos dissolvidos, $T \cdot Q \text{ g/s}$
29/06/90	106,1	0,305	32,36
13/08/90	99,3	0,337	33,46
08/09/90	97,2	0,510	49,6
06/10/90	96,2	0,373	35,9
04/11/90	101,8	0,389	39,6
05/12/90	88,9	0,506	45,0
04/01/91	89,8	0,597	53,6
03/02/91	97,5	0,429	41,8
07/03/91	80,5	1,581	127,3
19/05/91	100,5	0,430	43,24
18/06/91	109,9	0,354	38,9

Tabela 5.7 - Relação do fluxo de sólidos dissolvidos (g/s equivalente a CaCO_3) em função do regime de vazão da ressurgência do sistema Pérolas-Santana.

Período	Volume escoado V_n , m^3	Dureza total média T , mg/l equivalente a CaCO_3	CaCO_3 removido em solução, $V \cdot T$, g
11/06/90 a 16/07/90	948219,51	106,1	100606090
16/07/90 a 19/08/90	1421540,78	99,3	141158999,5
19/08/90 a 12/09/90	989003,7	97,2	96131159,64
12/09/90 a 13/10/90	1462625,43	96,2	140704566,4
13/10/90 a 17/11/90	1675014,84	101,8	170516510,7
17/11/90 a 27/12/90	2043012,77	88,95	181725985,9
27/12/90 a 29/01/91	1252906,23	89,8	112510979,5
29/01/91 a 02/03/91	1538578,56	97,5	150011409,6
02/03/91 a 03/04/91	2657230,28	80,5	213907037,5
03/04/91 a 05/05/91	1003221,31	90	90289917,59
05/05/91 a 15/05/91	1003221,31	100	100322130,7
15/05/91 a 18/06/91	1003221,31	110	110354343,7
$\Sigma = 16997796,02 \text{ m}^3/\text{ano}$			$\Sigma = 1608239131 \text{ g/ano}$

Tabela 5.8 - Relação dos períodos com vazão alta, média e baixa e os totais correspondentes em volume escoado (V) e massa equivalente a CaCO_3 removida em solução ($V \cdot T$) pelo sistema Pérolas-Santana durante o período monitorado.

Após calcular a taxa de denudação cárstica por diferentes métodos, obtendo resultados que oscilam entre 21 e 62 mm/ka (tabela 5.9), surge a questão, de qual resultado é mais significativo.

Figura 5.21 - Variação da dureza total em função da vazão na ressurgência da caverna Santana para o período de 29/6/90 a 18/6/91. Coeficiente de correlação de -0,88 e $R^2 = 76,8\%$.

Figura 5.22 - Fluxo de massa equivalente a g/s de CaCO₃ em função da vazão na ressurgência da caverna Santana. Coeficiente de correlação de 0,99 e $R^2 = 98,9\%$.

A equação de Corbel (1959) não considera a perda de água por evapotranspiração, o que resulta num excesso do volume de escoada pela ressurgência, induzindo assim, uma taxa de denudação super-estimada em relação à realidade. Este exagero é reforçado pelo

fato deste cálculo não subtrair o volume equivalente a CaCO_3 introduzido no sistema no caso de bacias com parte da captação alogênica.

No cálculo segundo Pulina (1972), onde a dureza total média do escoamento alogênico é deduzida da concentração média equivalente a CaCO_3 da ressurgência, a taxa de denudação cárstica é subestimada. Isto ocorre porque a subtração direta entre estas concentrações desconsidera a diminuição da concentração em CaCO_3 da água alogênica ao esta atravessar o sistema cárstico, devido à adição contínua de água ao sistema captada sobre o terreno cárstico. Por exemplo, a dureza total de 13 mg/l medida no escoamento alogênico do sistema Pérolas-Santana, será drasticamente diluída até a ressurgência, em função do aumento do volume de água nesta travessia. A subtração de 13 mg/l da concentração equivalente a CaCO_3 na ressurgência, acarreta portanto, uma correção excessiva, reduzindo a dureza total da ressurgência abaixo do valor real, subestimando assim, a taxa de denudação química.

Método de cálculo utilizado	Taxa de denudação cárstica, mm/Ka	Deficiência do método
Corbel (1959)	62,3	- Desconsidera a perda por Ev no escoamento da bacia - Desconsidera adição alogênica de CaCO_3 - Desconsidera variação de T com Q da ressurgência
Pulina (1972)	21,1	- Considera a adição alogênica de CaCO_3 mas não a diluição desta até a ressurgência
Smith e Atkinson (1976)	35,3	- Desconsidera variação de T com Q da ressurgência - Desconsidera, em parte, a adição alogênica de CaCO_3
White (1984) relação entre (P-Ev) e denudação	40,6	- Relação empírica entre o escoamento da bacia e a denudação. - Acaba superestimando a denudação
White (1984) Denudação máxima teórica	49,1	- Cálculo teórico que considera PCO_2 do solo constante - Desconsidera variação de T com Q - Considera o escoamento saturado em CaCO_3 durante o ano hidrológico
Este trabalho	31,1	- No presente cálculo não foi possível determinar a área total de captação alogênica

Tabela 5.9 - Quadro resumido das taxas de denudação química calculadas segundo métodos diferentes para a bacia do sistema Pérolas-Santana

O método de Smith e Atkinson (1976) representa um avanço no cálculo da denudação cárstica, pois no caso de bacias mistas (alogênicas e autogênicas), corrige a denudação, distribuindo o volume de CaCO_3 removido somente sobre a área carbonática da bacia, deduzindo a fração de área alogênica desta bacia. Por outro lado, este cálculo incorre em erro, pelo fato de não considerar a variação da dureza total nos diferentes regimes de vazão do sistema, simplificando esta variação ao utilizar somente o valor médio da dureza total em relação ao volume total de água escoada.

O cálculo da denudação máxima teórica segundo White (1984), conforme ressaltado pelo próprio autor, representa um valor relativamente superestimado da denudação, pelo fato de envolver a premissa de que o escoamento do sistema se mantém saturado em relação a calcita durante o ano de precipitação considerado, o que não ocorre na realidade, conforme foi demonstrado na análise da sazonalidade do SI_c da vazão do sistema Pérolas-Santana (item 5.4.2). Fato semelhante ocorre com a pressão de CO_2 , a qual também varia em função de períodos com maior e menor recarga de água no solo.

A denudação química obtida através do cálculo proposto neste trabalho (adaptando o método de Ogden, 1982), onde respeita-se a diminuição da dureza total do escoamento em função do aumento da vazão, subtrai-se o volume de carbonato de origem alogênica, além de abstrair-se a área de captação alogênica na distribuição do volume de carbonato lixiviado da bacia, deve representar o valor mais próximo da realidade, apesar de ser ligeiramente superestimado, no caso do sistema Pérolas-Santana, pelo fato do cálculo ter considerado somente a área mínima de captação alogênica da bacia.

Neste quadro geral de resultados obtidos para o sistema Pérolas-Santana (tabela 5.9), conclui-se que os valores de denudação entre 40 e 62 mm/ka são superestimados, enquanto que 21 mm/ka é subestimado. A denudação em torno de 30 mm/ka, além de representar a média dos extremos calculados, é considerada também, como a mais precisa, devido ao método de cálculo utilizado. Deve-se lembrar ainda, que o valor de $Dq = 31,1$ mm/ka insere um erro de até 20% ($Dq = 31,1 \pm 6$ mm/ka), em função dos erros acumulados nas medições de vazão (~10%), nas análises químicas (~5%) e na medição das áreas de captação da bacia (~5%).

Comparando a taxa de denudação cárstica obtida através do balanço de massa de rocha carbonática removida em solução (entre 21 e 62 mm/ka e média de 31,1 mm/ka) com a taxa máxima de entalhamento vertical de condutos vadosos calculada através da datação de níveis fluviais subterrâneos (entre 29 e 54 mm/ka, com o valor médio de 42 mm/ka, tabela 4.8), nota-se que ambos resultados variam na mesma ordem de grandeza.

Esta semelhança representa uma confirmação do resultado, pois o mesmo foi obtido através de métodos completamente distintos.

Suporta também, o ponto de vista expresso em Gascoyne, Ford e Schwarcz (1983) de que a região de máxima dissolução de rocha carbonática é a base do solo, sendo que a taxa de rebaixamento por dissolução da superfície epicárstica procede aproximadamente na mesma velocidade com que a dissolução entalha os condutos vadosos principais que drenam tanto a água de sumidouros alogênicos como a água coletada pela superfície epicárstica.

5.5 Conclusões

A ressurgência cárstica do sistema de drenagem subterrânea Pérolas-Santana é do tipo fluxo total permanente (*full flow*, classificação de Worthington, 1991), onde 82,1% da vazão total anual corresponde a escoamento básico e 17,9% ao escoamento direto, com $Q_x(\text{vazão máxima})/Q_n(\text{vazão mínima}) = 19,7$ para o ano hidrológico de 1990-1991.

A análise dos coeficientes de recessão do escoamento básico (sobre períodos de até 32 dias sem recarga) do sistema Pérolas-Santana, permitiu classificar sua ressurgência (classificação de Milanovic, 1976) como sendo associada a um aquífero cárstico com alto grau de fissuramento interconectado, responsável pelo acúmulo de um grande volume de água freática, a qual é lentamente drenada em épocas de estiagem.

Ainda segundo a classificação de Worthington (1991), o monitoramento hidrológico permitiu confirmar o caráter altamente carstificado do aquífero, classificando-se a ressurgência como do sub-tipo *gaining-underflow* (sistema com suplementação de água por um sistema vizinho de drenagem subterrânea), com base nas características de deflúvio do sistema.

Através do balanço hídrico do sistema Pérolas-Santana concluiu-se que a área de captação da bacia do sistema definida pelos divisores topográficos (14,8 km²) é insuficiente para alimentar a vazão medida na ressurgência. Estabeleceu-se uma área de captação de 25,4 km², dos quais 9,6 km² pertencem a área de captação do sistema vizinho (sistema Grilo). Comprovou-se assim, uma conexão subterrânea entre sistemas cársticos vizinhos, os quais, através de uma análise da drenagem superficial, seriam independentes.

Os resultados das análises químicas e dos parâmetros hidroquímicos calculados associados aos diferentes ambientes hidráulicos de circulação das águas coletadas ao longo dos sistemas cársticos Pérolas-Santana e Temimina-Pescaria, permitiram diferenciar as seguintes fácies hidroquímicas: escoamento superficial alogênico, escoamento superficial fluviocárstico, percolação autogênica vadosa em fissuras, percolação autogênica vadosa em condutos, circulação freática em condutos profundos e escoamento de ressurgências cársticas, cada uma caracterizada pela sua dureza total (em mg/l equivalentes a CaCO₃), alcalinidade (mg/l de HCO₃⁻), pH, pressão parcial de CO₂ e índices de saturação em calcita e dolomita.

Em função desta diferenciação de fácies hidroquímicas foi possível traçar uma evolução geoquímica das águas ao longo das rotas de fluxo da água no sistema cárstico em ambiente subtropical úmido.

Com base nas características hidroquímicas, concluiu-se que o sistema cárstico Pérolas-santana, amostra representativa do carste do Alto Ribeira, tem sua evolução controlada pela ação de água meteórica enriquecida em ácido carbônico no solo e horizonte epicárstico, onde as reações do sistema $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ controlam essencialmente a carstificação. Localmente na zona vadosa, e principalmente em rotas de circulação mais profundas, a carstificação pelo ácido carbônico é reduzida e provavelmente acompanhada por um incremento da capacidade corrosiva da água pela ação de ácido sulfúrico produzido pela oxidação de sulfetos (pirita) disseminados em certos estratos da rocha metacalcária. Esta ação é evidenciada pela presença de SO₄ na água profunda e sulfatos como gipsita em cavernas vadosas.

A identificação da fácies de circulação freática profunda, com temperatura média anual de 20,8°C em contraste com 18°C da água superficial, confirmou a previsão do modelo de profundidades de condutos, segundo o qual, estima-se que os condutos

associados à rota de fluxo da água subterrânea atingem máximos de 200 a 350 m de profundidade abaixo do nível d'água.

Com relação à dinâmica atual do sistema cárstico, concluiu-se que a fácies hidroquímica de ressurgência apresenta-se corrosiva em relação à calcita por cerca de 9 meses por ano hidrológico, confirmando um comportamento sazonal semelhante às nascentes cársticas importantes de outras áreas, em climas desde tropicais à subárticos, conforme Ford e Williams (1989). A percolação vadosa lenta em fissuras, por outro lado, apresenta-se saturada em calcita ao longo de todo ano hidrológico. A partir da sazonalidade química do gotejamento em cavernas vadosas, determinou-se que a substituição da infiltração lenta em fissuras na zona vadosa, em função de eventos de recarga do aquífero envolve cerca de 2 meses no sistema Pérolas-Santana.

A dinâmica atual do sistema cárstico Pérolas-Santana é expressa sinteticamente através da taxa de rebaixamento da superfície epicárstica em torno de $31,1 \pm 6$ mm/ka, a qual, é semelhante a taxa de entalhamento fluvial do leito de condutos vadosos, também determinada neste trabalho.

A taxa de denudação cárstica determinada para a bacia do sistema Pérolas-Santana, amostra representativa de um sistema cárstico de clima subtropical úmido, confirma as conclusões de Smith e Atkinson (1976), Ogden (1982) e White (1984), de que as taxas de evolução entre terrenos cársticos temperados e tropicais (com algumas exceções como o carste de Gunung Mulu, Malásia) são dificilmente distinguíveis, sendo consideradas semelhantes, dependendo essencialmente da taxa pluviométrica das áreas.

CAPÍTULO 6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos aqui desenvolvidos, sobre uma área de amostragem do alto vale do rio Ribeira de Iguape, permitiram ao autor, obter uma visão ampla sob o ponto de vista geocientífico, do carste como sistema de relevo e dos principais processos envolvidos na evolução geomórfica e hidrogeológica desta categoria de paisagem natural.

Através da cartografia e análise morfométrica das formas de relevo, foi possível distinguir diversas unidades morfológicas de relevo, cada qual, associada a um estágio evolutivo distinto da superfície cárstica. Esta evolução da paisagem cárstica é marcada pela transição entre a paisagem fluvial para a de carste poligonal, em função do aumento gradativo da permeabilidade secundária nas rochas carbonáticas, através da instalação de sistemas de cavernas.

A integração entre a análise de relevo e os estudos geoespeleológicos, mostrou que a zona de carste poligonal mais desenvolvida reflete a presença preferencial de condutos associados a sistemas de cavernas em profundidades de até 200m abaixo da superfície. Um dos resultados mais significativos obtido através da integração do estudo do relevo e da evolução de sistemas de cavernas é a estimativa da idade de vales fluviais adjacentes a *canyons* subterrâneos. Esta idade foi obtida através da geocronologia (pelo método Th/U) de calcita secundária depositada sobre níveis fluviais antigos ao longo de *canyons* vadosos subterrâneos e da posterior correlação entre a taxa de entalhamento fluvial subterrâneo e a taxa de rebaixamento erosivo de leitos fluviais externos. Desta maneira, propõe-se neste trabalho, uma idade mínima de $6^{+4}_{-3.4}$ Ma para o vale do rio Betari, junto a área carbonática encaixante do sistema de cavernas Pérolas-Santana. Este resultado, além de quantificar a velocidade de entalhamento do relevo, contribui para o esclarecimento da evolução geomorfológica regional, através da obtenção de uma idade mínima entre 24 e 13 Ma para o início do entalhamento da superfície de erosão Japi (definida originalmente por Almeida, 1964), caracterizada na área de estudo, pelo nivelamento das cristas entre as cotas de 900 a 1100 m.

O mapeamento morfológico e geológico de fragmentos acessíveis de sistemas de cavernas, revelou ser uma ferramenta valiosa para decifrar a história espeleogenética de aquíferos cársticos. Através deste mapeamento foi possível relacionar os padrões morfológicos definidos em planta, em seções longitudinais e transversais, com a estrutura (padrão de fraturamento superposto ao ângulo de mergulho do acamamento e variabilidade da direção deste) da rocha carbonática hospedeira das cavernas. Forneceu também, os elementos fundamentais para definir os fatores condicionantes da iniciação de proto-cavernas no carste estudado (proto-condutos guiados principalmente pela intersecção de fraturas longas sobre planos de estratificação do metacalcário).

Adaptando os modelos atuais de espeleogênese (sintetizados em Ford e Williams, 1989 e Worthington, 1991) aos dados obtidos neste trabalho, elaborou-se uma sequência evolutiva da espeleogênese do sistema de cavernas Pérolas-Santana, desde a fase de pré-

iniciação até a fase de desenvolvimento avançado, atualmente observada. Neste quadro evolutivo, foi possível apresentar idades (apesar de preliminares) das etapas do processo. Este procedimento poderá servir de base metodológica para ser aplicada em outros sistemas de cavernas do Alto Ribeira e, principalmente, em outras áreas cársticas brasileiras, com situações geomorfológicas e tectônicas diferentes, detalhando e/ou reformulando os conceitos e o modelo evolutivo de aquíferos cársticos, proposto neste trabalho. Especialmente com relação à geocronologia de calcita, método neste trabalho apenas iniciado de forma preliminar, muito campo de pesquisa é previsto, com o objetivo de integrar os dados de evolução de cavernas com estudos da dinâmica erosiva externa. Espera-se contribuir assim, na cronologia de eventos e processos tectônicos quaternários (e por extrapolação, até terciários) envolvidos na modelagem das paisagens cársticas e, por correlação, de terrenos não cársticos adjacentes.

Um dos produtos mais importantes obtidos com a análise morfológica dos condutos, aliada ao levantamento da geologia estrutural da rocha encaixante e da distância entre sumidouros e ressurgências, foi a confirmação e adaptação, para a área de estudo, do método de Worthington (1991), no sentido de contribuir na previsibilidade do local de ocorrência e da provável profundidade de condutos cársticos em rochas carbonáticas. Desta maneira, este trabalho representa o início do estudo geológico sistemático de sistemas de cavernas no Brasil, com o objetivo geral de contribuir na aplicação no Brasil, a médio prazo, da questão clássica da geoespeleologia e geomorfologia de terrenos cársticos, que é a de prever a ocorrência de fenômenos como cavernas (não evidentes através da observação da drenagem superficial) e zonas potenciais de subsidência catastrófica. Esta possibilidade de previsão deverá contribuir no planejamento do uso e ocupação de áreas cársticas, assim como, na orientação da exploração de aquíferos cársticos.

O monitoramento hidrológico e hidroquímico do sistema cárstico Pérolas-Santana, típico da região do alto vale do rio Ribeira de Iguape, teve como resultado principal, o cálculo da taxa de denudação química da bacia de drenagem cárstica associada ao sistema de cavernas. O valor obtido de $31,1 \pm 6$ mm/1000anos representa o primeiro exemplo quantitativo da dinâmica de rebaixamento da superfície carbonática em ambiente subtropical úmido da América do Sul. Este resultado é uma importante contribuição para o quadro comparativo da dinâmica erosiva de sistemas cársticos, em ambientes distintos, a nível mundial.

O presente trabalho representa apenas o primeiro passo para a abertura de um vasto campo de pesquisas, tanto acadêmicas, como com potencial de aplicação prática no manejo de áreas cársticas e seus aquíferos. Na área da geoespeleologia, por exemplo, pesquisas futuras deverão ser concentradas no tema relativo aos fatores geológicos, estruturais e hidrológicos, condicionantes de sistemas de cavernas, com o objetivo de refinar o modelo de previsão de ocorrência de condutos. No campo da hidrologia e hidrogeologia de aquíferos cársticos, um número mais significativo de bacias deverão ser monitoradas (tanto no carste do vale do Ribeira como em outras áreas cársticas brasileiras), no sentido de aprimorar as técnicas de demarcação dos sistemas de drenagem subterrânea e de avaliação

dos volumes de água armazenada e transmitida por aquíferos cársticos. O monitoramento hidrológico e hidroquímico de nascentes e ressurgências cársticas deverá ser aliado à ensaios com traçadores (por exemplo, corantes), o que desenvolverá a capacidade de interpretação hidrodinâmica e hidrogeológica dos aquíferos cársticos associados. Com relação à geoquímica dos processos de dissolução e precipitação de minerais carbonáticos em ambiente cárstico, investigações deverão ser dirigidas na definição dos controles físico-químicos da deposição de minerais secundários e de suas transformações diagenéticas em cavernas. Inclusive com estudos da sua composição isotópica (aspecto não abordado nesta tese) associados à geocronologia de calcita secundária, visando a aplicação destes resultados, no estudo de flutuações paleoclimáticas recentes e da geologia quaternária de terrenos cársticos, seguindo as tendências internacionais das pesquisas geológicas em áreas cársticas.

REFERÊNCIAS

- AB' SABER, A.N.-1977- Espaços ocupados pela expansão dos climas secos na América do Sul, por ocasião dos períodos glaciais quaternários. *Paleoclimas*, (3):1-19.
- AFONSO de SOUZA, M.-1993- Mapeamento geoespeleológico do sistema de cavernas Areias, Iporanga, SP. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 1., São Paulo, 1993. *Resumos*. São Paulo, USP/CNPQ. p. PB04.
- ALLBUT, M.-1977- An appraisal of the conductance method for the in situ measurement of total hardness and aggressivity. *Transactions British Cave Research Association*, 4(4): 431-439.
- ALMEIDA, F.F.M.-1964- Os fundamentos geológicos do relevo paulista. *Boletim I.G.G.*, (41):169-263, São Paulo.
- ALMEIDA, F.F.M.-1976- The system of continental rifts bordering the Santos basin, Brazil. *Anais da Academia brasileira de Ciências*, 48 (suplemento): 15-26.
- ANDERSON, M.G. & BURT, T.P.-1980- Interpretation of recession flow. *Journal of Hydrology*, 46(1-2): 89-101.
- ASMUS, H.E.-1981- Relacionamento genético de feições geológicas da margem continental sudeste brasileira e da área continental emersa adjacente. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 3., Curitiba, 1981. *Atas*, São Paulo, SBG. v.1, p. 262-273.
- ATKINSON, T.C. & DREW, D.P.-1974- Underground drainage of limestone catchments in the Mendip Hills. In: GREGORY, K.J. & WALLING, D.E. (eds.) *Fluvial Processes in Instrumented Watersheds*. London, Institute of British Geographers (Special Publication 6), p. 87-106.
- AULER, A. & RUBBIOLI, E.-1993- A toca da Boa Vista. In *Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas - Uma década revelando o Brasil subterrâneo*. Belo Horizonte, Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas (GBPE) e Laboratório de Pesquisas Históricas (LAPHIS), p. 14-15.
- BACK, W.-1960- Origin of hydrochemical facies of ground water in the Atlantic Coastal Plain. In: INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 21., Copenhagen, 1960. *Proceedings*. Copenhagen, Det Berlingske. p. 87-95.
- BACK, W. & ARENAS, A.D.-1989- Karst terrains: resources and problems. *Nature & Resources*, Special Issue, Unesco, p. 19-26.
- BADGLEY, P.C.-1965- *Structural and tectonic principles*. New York, Harper and Row, 521 p.
- BALL, T.K. & JONES, J.C.-1990- Speleogenesis in the limestone outcrop north of the South Wales Coalfield: the role of micro-organisms in the oxidation of sulphides and hydrocarbons. *Cave Science*, 17(1): 3-8.
- BARBERENA, M.C.; CORREIA, N.R. & AUMOUND, J.J.-1980- Contribuição à estratigrafia e bioestratigrafia do Grupo Passa Dois na Serra do Cadeado (NE do Paraná, Brasil). *Revista Brasileira de Geociências* 10(4): 268-275.
- BARBIERI, A.J.-1993- *Depósitos minerais secundários das cavernas Santana, Pérolas e Lage Branca, município de Iporanga*, São Paulo. São Paulo, 96 p. (Dissertação de Mestrado - Instituto de Geociências/USP).
- BARNES, B.S.-1939- The structure of discharge-recession curves. *Transactions American Geophysical Union*, 20: 721-725.

- BARROS BARRETO, C.N.G.; DE BLASIS, P.D.; DIAS NETO, C.M.; KARMANN, I.; LINO, C.F. & ROBRAHN, E.M.-1982- Abismo Ponta de Flecha: um projeto arqueológico, paleontológico e geológico no médio Ribeira de Iguape, São Paulo. *Revista de Pré-História*, 3(4): 195-215, São Paulo.
- BATISTUCCI, N.L.N.-1988- *Mapeamento geoespeleológico da caverna Água Suja: desenvolvimento de métodos*. FAPESP, 45 p. (Relatório de Iniciação Científica nº 87/2104-1).
- BLÉS, J.L. & FEUGA, B.-1986- *The fracture of rocks*. New York, Elsevier, 131 p.
- BÖGLI, A.-1964- Mischungskorrosion, ein Beitrag zum Verkarstungsproblem. *Erdkunde*, 18(2): 83-92.
- BÖGLI, A.-1969- Neue Anschauungen über die Rolle von Schichtfugen und Klüften in der karsthydrographischen Entwicklung. *Geologische Rundschau*, 58(2): 395-408.
- BÖGLI, A.-1978- *Karsthydrographie und physische Speläologie*. Berlin, Springer Verlag, 292 p.
- BOTTREL, S.H.; SMART, P.L.; WHITACKER, F. & RAISWELL, R.-1991- Geochemistry and isotope systematics of sulphur in the mixing zone of Bahamian blue holes. *Applied Geochemistry*, 6: 97-103.
- BRAUN, O.P.G.-1971- Contribuição à geomorfologia do Brasil Central. *Revista Brasileira de Geografia*, 32(3): 3-39.
- BRETZ, J.H.-1942- Vadose and phreatic features of limestone caverns. *Journal of Geology*, 50(6): 675-811.
- BROOK, G.A.; FOLKOFF, M.E. & BOX, E.O.-1983- A world model of soil carbon dioxide. *Earth-Surface Processes and Landforms*, 8(1): 79-88.
- BROWN, K.S. & AB' SABER, A.N.-1979- Ice age forest refuges and evolution in the neotropics: correlation of paleoclimatological, geomorphological and pedological data with modern biological endemism. *Paleoclimas*, (5): 1-30.
- BRUCKER, R.W.; HESS, J.W. & WHITE, W.B.-1972- Role of vertical shafts in the movement of ground water in carbonate aquifers. *Ground Water*, 10(6): 5-13.
- BULL, P.A.-1980- The antiquity of caves and dolines in the British Isles. *Zeitschrift für Geomorphologie*, Supplement Band 36: 217-232.
- BULL, P.A.-1983- Chemical sedimentation in caves. In: GOUDIE, A.S. & PYE, K. (eds) *Chemical sediments and geomorphology: precipitates and residua in the near-surface environment*. London, Academic Press, p. 301-319.
- CBA (COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO) e CNEC (CONSÓRCIO NACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES)-1983- *Aproveitamento hidrelétrico Descalvado- Pedido de Concessão*. São Paulo, CBA/CNEC, 116 p. (Relatório).
- CALLES, B. & CALLES, U.M.-1990- Temperature correction of electrical conductivity values. *Earth-Surface Processes and Landforms*, 15(7): 673-678.
- CAMPANHA, G.-1991- *Tectônica proterozóica no Alto e Médio Vale do Ribeira, Estados de São Paulo e Paraná*. São Paulo, 296p. (Tese de Doutorado - Instituto de Geociências/ USP).
- CAMPANHA, G.; BISTRICHI, C.A. & ALMEIDA, M.A.-1987- Considerações sobre a organização litoestratigráfica e evolução tectônica da faixa de dobramento Apiaí. In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 3., Curitiba, 1987. *Atas Curitiba, SBG v.2* p.725-742.

- CAMPANHA, G.A.; GIMENES FILHO, A.; VIEIRA CAETANO, S.L.; ALVES PIRES, F.; LUCAS DANTAS, A.S. TEIXEIRA, A.L. DEHIRA, L.K.; HACHIRO, J.; STEFANI, F.L.-1985- *Geologia das folhas Iporanga (SG.22-X-B-V-2) e Gruta do Diabo (SG.22-X-B-VI-1), Estado de São Paulo*. São Paulo, IPT/Pró-Minério. (Relatório nº 22.352).
- CHABERT, C. & WATSON, R.A.-1981- Mapping and measuring caves. A conceptual analysis. *National Speleological Society Bulletin*, 43(1): 3-11.
- CHURCH, M. & KELLERHALS, R.-1970- *Stream gauging techniques for remote areas using portable equipment*. Ottawa, 89 p. (Technical Bulletin, 25) Inland Waters Branch, Dep. of Energy, Mines and Resources.
- COLLET, G.C.; LeBRET, M.; MARTIM, P.; & GOUPHON, P.-1970- *Esboço topográfico do Abismo dos Caramujos*. São Paulo, Sociedade Brasileira de Espeleologia (mapa).
- CORDANI, U.G. & BRITO NEVES, B.B.-1982- The geologic evolution of South America during the Archean and Early Proterozoic. *Revista Brasileira de Geociências* 12(1-3): 78-88.
- CORBEL, J.-1959- Erosion en terrain calcaire. *Annales Geographie*, 68: 97-120.
- COURBON, P.; CHABERT, C.; BOSTED, P. & LINDSLEY, K.-1989- *Atlas of the great caves of the world*. St. Louis, Cave Books, 369 p.
- COUTARD, J.; KOHLER, H.C. & JOURNAUX, A.-1978- *Mapa do carst. Região de Pedro Leopoldo - Lagoa santa, Minas Gerais Brasil (esc. 1:50.000)*. Caen, Université de Caen e Centre de Geomorphologie/CNRS (mapa).
- CRAMER, H.-1941- Die Systematik der Karstdolinen. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, Beilage Band, Abt. B, 85(2): 293-382.
- DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-1990- *Plano Estadual de Recursos Hídricos: primeiro plano do Estado de São Paulo- Síntese*. São Paulo, CRH/DAEE, 120 p.
- DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS e ENERGIA ELÉTRICA-1991- Dados hidrometeorológicos - Posto Apiaí (Município de Apiaí), período de 1962 a 1991. São Paulo, Sistema Banco de Dados Hidrometeorológicos, DAEE.
- DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS e ENERGIA ELÉTRICA-1992- Dados hidrometeorológicos - Posto Serra dos Motas (Município de Iporanga), período de 1972 a 1992. São Paulo, Sistema Banco de Dados Hidrometeorológicos, DAEE.
- DAVIS, G.H.-1984- *Structural geology of rocks and regions*. Toronto, John Wiley & Sons, 492 p.
- DAVIS, W.M.-1930- Origin of limestone caverns. *Geological Society of America Bulletin*, 41: 475-628.
- DAY, M.-1976- The morphology and hydrology of some Jamaican karst depressions. *Earth-Surface Processes* 1(2): 111-129.
- DEIKE, R.G.-1969- Relations of jointing to orientation of solution cavities in limestones of central Pennsylvania. *American Journal of Science*, 267: 1230-1248.
- DEIKE, R.G.-1989- Fracture controls on conduit development. In: WHITE, W.B. & WHITE, E.L. (eds.) *Karst hydrology, concepts from the Mammoth Cave area*. New York, Van Nostrand Reinhold, p. 259-291.
- DEIKE, G.H. & WHITE, W.B.-1969- Sinuosity in limestone solution conduits. *American Journal of Science*, 267(2): 230-241.
- DRAKE, J.J.-1983- The effects of geomorphology and seasonality on the chemistry of carbonate groundwater. *Journal of Hydrology*, 61(1-3): 223-236.

- DRAKE, J.J.-1984- Theory and model for global carbonate solution by groundwater. In: LaFLEUR, R.G. (ed.) *Groundwater as a geomorphic agent*. Boston, Allen & Unwin, p. 211-226.
- DRAKE, J.J. & FORD, D.C.-1972- The analysis of growth patterns of two generation populations: The examples of karst sinkholes. *Canadian Geographer*, 16: 381-384.
- DRAKE, J.J. & FORD, D.C.-1973- The dissolved solids regime and hydrology of two mountain rivers. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 6., Oloumuc, 1973, *Proceedings Oloumuc*, v. 3 p. 53-61.
- DRAKE, J.J. & HARMON, R.S.-1973- Hydrochemical environments of carbonate terrains. *Water Resources Research*, 9(4): 949-957.
- DREYBRODT, W.-1981a- Kinetics of dissolution of calcite and its application to karstification. *Chemical Geology*, 31(3): 245-269.
- DREYBRODT, W.-1981b- Mixing corrosion in $\text{CaCO}_3\text{-CO}_2\text{-H}_2\text{O}$ systems and its role in the karstification of limestone areas. *Chemical Geology*, 32(3-4): 221-236.
- DREYBRODT, W.-1987- The kinetics of calcite dissolution and its consequences to karst evolution from the initial to the mature state. *National Speleological Society Bulletin*, 49(2): 31-49.
- DREYBRODT, W.-1988- *Processes in karst systems - Physics, Chemistry and Geology* (Springer series in physical environments 4). Berlin, Springer Verlag, 288 p.
- DREYBRODT, W.-1990- The role of dissolution kinetics in the development of karst aquifers in limestone: a model simulation of karst evolution. *Journal of Geology*, 98(5): 639-655.
- EWERS, R.O.-1972- *A model for the development of subsurface drainage routes along bedding planes*. Cincinnati, 230p. (M.sc. thesis, Department of Geology - University of Cincinnati).
- EWERS, R.O.-1982- *Cavern development in the dimensions of length and breadth*. Hamilton, 398p., (PhD thesis, Department of Geology - McMaster University).
- FERREIRA, F.J.F.; MORAES, R.A.V.; FERRARI, M.P. & VIANNA, R.B.-1981- Contribuição ao estudo do Alinhamento Estrutural de Guapiara. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 3., Curitiba, 1981. *Anais Curitiba, SBG.* v.1, p.226-240.
- FORD, D.C.-1964- Origin of closed depressions in the central Mendip Hills. In: 'INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONGRESS, 20., London, 1964, *Abstract Papers* London, p. 105-106.
- FORD, D.C.-1965- The origin of limestone caverns: a model from the central Mendip Hills, England. *Bulletin of the National Speleological Society*, 27(4): 109-132.
- FORD, D.C.-1971a- Characteristics of limestone solution in the southern Rocky Mountains and Selkirk Mountains, Alberta and British Columbia. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 8(6): 585-609.
- FORD, D.C.-1971b- Geologic structure and a new explanation of limestone cavern genesis. *Cave Research Group of great Britain Transactions*, 13(2): 81-94.
- FORD, D.C.-1973- Development of the canyons of the South Nahanni River, N. W. T. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 10(3): 366-378.
- FORD, D.C.-1980- Threshold and limit effects in karst geomorphology. In: COATES, D.L. & VITEK, J.D. (Eds.) *Thresholds in Geomorphology*, London, George Allen & Unwin, p. 345-362.

- FORD, D.C.-1988- Characteristics of dissolutional cave systems in carbonate rocks. In: JAMES, N.P. & CHOQUETTE, P.W. (eds) *Paleokarst*. New York, Springer Verlag, p. 25-57.
- FORD, D.C. & EWERS, R.O.-1978- The development of limestone cave systems in the dimensions of length and depth. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 15(11): 1783-1798.
- FORD, D.C.; PALMER, A.N. & WHITE, W.B.-1988- Landform development, Karst. In: BACK, W.; ROSENHEIN, J.S. & SEABER, P.R. (eds) *The Geology of North America*. Boulder, Geological Society of America, v. O-2 (Hydrogeology), p. 401-412.
- FORD, D.C.; SCHWARCZ, H.P.; DRAKE, J.J.; GASCOYNE, M. HARMON, R.S. & LATHAM, A.G.-1981- Estimates of the age of the existing relief within the southern Rocky Mountains of Canada. *Artic and Alpine Research*, 13(1): 1-10.
- FORD, D.C. & WILLIAMS, P.W.-1989- *Karst geomorphology and hydrology*. London, Unwin Hyman, 601p.
- FORD, T.D. & WORLEY, N.E.-1977- Phreatic caves and sediments at Mallock, Derbyshire. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 7., Sheffield, 1977. *Proceedings* Sheffield, IUS, 1977. p. 194-196.
- FORTI, P.-1989- The role of sulfide-sulfate reactions in speleogenesis. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 10., Budapest, 1989. *Proceedings* Budapest IUS, 1989. v.1 p. 71-73.
- FREEZE, R.A. & CHERRY, J.A.-1979- *Groundwater*. New Jersey, Prentice-Hall, 604 p.
- FULFARO, V.J.-1971- A evolução tectônica e paleogeográfica da bacia sedimentar do Paraná pelo trend surface analysis. *Geologia*, Escola de Engenharia de São Carlos, 14: 14-112.
- GALE, S.J.-1984- The hydraulics of conduit flow in carbonate aquifers. *Journal of Hydrology*, 70(1-4): 309-327.
- GAMA Jr., E.-1979- A sedimentação do grupo Passa Dois (exclusive Formação Irati): um modelo geomórfico. *Revista Brasileira de Geociências*, 9(1): 1-16.
- GAMS, I.-1978- The polje: The problem of definition. *Zeitschrift für Geomorphologie*, Neue Folge, 22(2): 170-181.
- GASCOYNE, M.-1977- *Uranium series dating of speleothems: an investigation of technique, data processing and precision*. Hamilton, 82 p., Department of Geology, McMaster University (Technical Memo. 77-4).
- GASCOYNE, M.-1980- *Pleistocene climates determined from stable isotope and geochronologic studies of speleothem*. Hamilton, 467 p., (PhD thesis, Department of Geology - McMaster University).
- GASCOYNE, M.-1981- Rates of cave passage entrenchment and valley lowering determined from speleothem age measurements. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 8., Bowling Green, 1981, *Proceedings* Bowling Green, 1981. v.1, p. 99-100.
- GASCOYNE, M.; FORD, D.C. & SCHWARCZ, H.P.-1983- Rates of cave and landform development in the Yorkshire Dales from speleothem age data. *Earth-Surface Processes and Landforms*, 8(6): 557-568.
- GASCOYNE, M.; LATHAM, A.G.; HARMON, R.S. & FORD, D.C.-1983- The antiquity of Castleguard cave, Columbia Icefields, Alberta, Canada. *Artic and Alpine Research*, 15(4): 463-470.

- GASCOYNE, M.; SCHWARCZ, H.P. & FORD, D.C.-1978- Uranium series dating and stable isotope studies of speleothems. Part I. Theory and techniques. *Transactions of the British Cave Research Association*, 5(2): 91-111.
- GILLI, E.-1986- Les grandes cavités souterraines: études et applications. *Karstologia*, 8: 3-11.
- GLAZEK, J. & MARKOWICZ-LOHINOWICZ, M.-1973- Remarks to the use of quantitative methods to karst denudation velocity. In: INTERNATIONAL CONGRESS OD SPELEOLOGY, 6., Oloumuc, 1973. *Proceedings Oloumuc*, 1973. v.3, p. 225-230.
- GOEDE, A. & HARMON, R.S.-1983- Radiometric dating of Tasmanian speleothems - evidence of cave evolution and climatic change. *Journal Geological Society of Australia*, 30(1-2): 89-100.
- GONZALES, L.A. & LOHMANN, K.C.-1988- Controls on mineralogy and composition of spelean carbonates: Carlsbad Caverns, New Mexico. In: JAMES, N.P. & CHOQUETTE, P.W. (eds) *Paleokarst*, Berlin, Springer Verlag, p. 81-101.
- GRUND, A.-1914- Der Geographische Zyklus im Karst. *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde*, 52: 621-640.
- GUERRA, A.M.-1986- *Processos de carstificação e hidrogeologia do Grupo Bambuí na região de Irecê, Bahia*. São Paulo, 132 p. (Tese de doutoramento - Instituto de Geociências/USP).
- GUNN, J.-1978- *Karst hydrology and solution in the Waitomo district, New Zeland*. Auckland, 240 p. (PhD thesis, Auckland University).
- GUNN, J.-1981a- Hydrological processes in karst depressions. *Zeitschrift für Geomorphologie Neue Folge* 25(3): 313-331.
- GUNN, J.-1981b- Limestone solution rates and processes in the Waitomo District, New Zealand. *Earth-Surface Processes and Landforms*, 6(5): 427-455.
- GUNN, J.-1983- Point-recharge of limestone aquifers- a model from New Zealand Karst. *Journal of Hydrology*, 61(1-3): 19-29.
- GUNN, J.-1986- Solute processes and karst landforms. In: TRUDGILL, S.T. (ed) *Solute Processes*. Chichester, John Wiley & Sons, p. 363-437.
- GUPTA, R.S.-1989- *Hydrology and hydraulic systems*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 739 p.
- GUSSO, G.L.N.; DIAS NETO, C.M.; TRAJANO, E.; KARMANN, I.; ROGRIGUES, R. & LINO, C.-1979- Paleontologia das cavernas do vale do Ribeira-exploração 1- Abismo do Fóssil (SP145). Resultados parciais. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 2., Rio Claro, 1979. *Atas SBG*, Rio Claro, 1979. v.1, p. 257-268.
- GUTJAHR, M.R.-1993- *Critérios relacionados à compartimentação climática de bacias hidrográficas: a bacia do Rio Ribeira de Iguape*. São Paulo, 90p. (Dissertação de Mestrado, Departamento de Geografia - FFLCH/USP).
- HACK, J. T.-1973- Stream profile analysis and stream gradient index. *Journal Research U. S. Geological Survey*, 1(4): 421-429.
- HARMON, R.S.-1973- The chemical history of some carbonate ground waters - central Appalachians. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 6., Oloumuc, 1973, *Proceedings Oloumuc*, 1973. v.1, p. 95-101.
- HARMON, R.S.; HESS, J.W.; JACOBSON, R.W.; SHUSTER, E.T.; HAYWOOD, C. & WHITE, W.B.-1972- Chemistry of carbonate denudation in North America. *Transactions Cave Research Group of Great Britain*, 14: 96-103.

- HARMON, R.S.; THOMPSON, P.; SCHWARCZ, H.P. & FORD, D.C.-1975- Uranium series dating of speleothems. *National Speleological Society Bulletin*, 37(2): 21-33.
- HASUI, Y.; CREMONINI, O.A. & BORN, H.-1984- O "Granito Três Córregos" revisado e o Maciço Catas Altas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33., Rio de Janeiro, 1984. *Anais Rio de Janeiro, SBG*, 1984. v.7, p. 3023-3031.
- HASUI, Y. & OLIVEIRA, M.A.F.-1984- Província Mantiqueira- setor central. In: ALMEIDA, F.F.M & HASUI, Y. (coords.) *O Pré-Cambriano do Brasil*. São Paulo, Editora Edgard Blücher, p. 308-344.
- HESS, J.W. & HARMON, R.S.-1981- Geochronology of speleothems from the Flint Ridge - Mammoth Cave system, Kentucky, USA. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 8., Bowling Green, 1981, *Proceedings Bowling Green*, 1981. v.1, p. 433-436.
- HUNTOON, P.W.-1985- Gradient controlled caves, Trapper-Medicine Lodge area, Bighorn basin, Wyoming. *Ground Water*, 23(4): 443-448.
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- IPT- 1981a- *Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:1.000.000*. São Paulo, Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e IPT (Publicação IPT nº 1183).
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- IPT- 1981b- *Mapa geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000*. São Paulo, Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e IPT (Publicação IPT nº 1184).
- JAKUCS, L.-1977- *Morphogenetics of karst regions*. New York, John Wiley & Sons, 129p.
- JAMESON, R.A.-1981- Development of flow paths and cave passages from fault segments in West Virginia caves. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 8., Bowling Green, 1981. *Proceedings Bowling Green*, 1981. v.2, p. 717-719.
- JAMESON, R.A.-1985- *Structural segments and the analysis of flow paths in the North Canyon of Snedegar cave, Friars Hole cave system, West Virginia*. 421p. (MSc. thesis, College of Arts and Sciences - West Virginia University).
- JENNINGS, J.N.-1985- *Karst Geomorphology*. Oxford, Basil Blackwell, 293p.
- KARMANN, B.-1989- Programa de cálculo de vazão pelo método de diluição de sal (Turbo Pascal 6.0), São Paulo, inédito.
- KARMANN, I.-1982- *Paleontologia do vale do Ribeira. Exploração II. Geologia, arqueologia e paleontologia do abismo Ponta de Flecha (SP-175)*. Iporanga, SP. FAPESP, 37 p. (Relatório de Iniciação Científica nº 81/1161-5).
- KARMANN, I.-1983- Província Espeleológica do Vale do Ribeira: aspectos físicos e necessidade de sua preservação. In: SIMPÓSIO SOBRE A OCUPAÇÃO DO VALE DO RIBEIRA, 1., São Paulo, 1983. *Atas São Paulo, ABGE/SBE*, 1983. p. 34-37.
- KARMANN, I. & SANCHEZ, L.E.-1986- Speleological Provinces in Brazil. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA, 9., Barcelona, 1986. *Anales Barcelona, IUS*, 1986. v.1, p. 151-153.
- KASTNING, E.H.-1983- Relict caves as evidence of landscape and aquifer evolution in a deeply dissected carbonate terrain: Southwest Edwards plateau, Texas, USA. *Journal of Hydrology*, 61(1-3): 89-112.

- KASTNING, E.H.-1984- Hydrogeomorphic evolution of karsted plateaus in response to regional tectonism. In: LaFLEUR, R.G. (ed.) *Groundwater as a geomorphic agent*. Boston, Allen & Unwin, p. 351-382.
- KEMMERLY, P.R.-1982- Spatial analysis of a karst depression population: Clues to genesis. *Geological Society of America Bulletin*, 93(11): 1078-1086.
- KIRALY, L.; MATHEY, B. & TRIPET, J.P.-1971- Fissuration et orientation des cavites souterraines. *Bulletin Societé Neuchatel de Sciences de la Nature*, 94: 99-114.
- KOHLER, H.C.-1989- *A geomorfologia cárstica na região de Lagoa Santa, MG*. São Paulo, 113 p. (Tese de doutoramento, Instituto de Geografia - FFLCH/USP).
- KOWSMANN, R.O. & ATAIDE COSTA, M.P.-1979- *Sedimentação quaternária da margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes*. Rio de Janeiro, Petrobrás, 55 p. (Projeto Remac, nº 8).
- KRONE, R.-1914- Informações ethnographicas do valle do rio Ribeira de Iguape. In: COMISSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ed.) *Exploração do Rio Ribeira de Iguape*. 2ª edição, São Paulo, p. 24-34.
- KRONE, R.-1950- As grutas calcárias do vale do rio Ribeira de Iguape. *O I.G.G.*, 8(3): 248-297 (transcrição do vol. VX, Arquivos do Museu Nacional, 1909, Rio de Janeiro).
- LANGMUIR, D.-1971- The geochemistry of some carbonate ground waters in central Pennsylvania. *Geochimica Cosmochimica Acta*, 35(10): 1023-1045.
- LATTMAN, L.H. & PARIZEK, R.R.-1964- Relationship between fracture traces and the occurrence of ground water in carbonate rocks. *Journal of Hydrology*, 2(2): 73-91.
- LAURITZEN, S.E.-1989- Shear, tension or both- a critical view on the prediction potential for caves. Proc. 10th International Congress of Speleology, vol. 1:118-120, Budapest.
- LAURITZEN, S.E.; ABBOT, J.; ARNESEN, R.; CROSSLEY, G.; GREPERRUD, D.; IVE, A. & JOHNSON, S.-1985- Morphology and hydraulics of an active phreatic conduit. *Cave Science*, 12(3): 139-146.
- LAVALLE, P.-1967- Some aspects of linear karst depression development in south-central Kentucky. *Assoc. American Geographers, Annals*, 57: 49-71.
- Le BRET, M.-1966- Estudos espeleológicos no vale do Alto Ribeira. *Boletim I.G.G.*, 47: 71-123, São Paulo.
- LEHMANN, H.-1936- Morphologische studien auf Java. *Geographische Abhandlungen*, 3(9): 114 p..
- LEPINE, R.D.-1993- *Mapeamento e estudo geoespeleológico da caverna de Santana, Iporanga, São Paulo*. FAPESP, 24p. (Relatório de Iniciação Científica nº 91/2314-1).
- LINSLEY, R.K. & FRANZINI, J.B.-1978- Engenharia de recursos hídricos. São Paulo, Edusp e McGrawHill, 798 p.
- LIPPMANN, F.-1960- Versuche zur Aufklärung der Bildungsbedingungen von Calcit und Aragonit. *Fortschritte in Mineralogie*, 38: 156-161.
- LOWE, D.J.-1992- A historical review of concepts of speleogenesis. *Cave Science*, 19(3): 63-90.
- MANDELBROT, B.B.-1983- *The fractal geometry of nature*. New York, Freeman, 468 p.
- MANGIN, A.-1984- Pour une meilleure connaissance des systemes hidrologiques à partir des analyses corrélatore et spectrale. *Journal of Hydrology*, 67(1-4): 25-43.

- MARINHO, M. de A.-1989- *Estudo morfológico preliminar do sistema cárstico Pérolas Santana, Iporanga, SP*. CNPQ, 38p. (Relatório de Iniciação Científica nº 804393/88-5).
- MARKOWICZ, M.V., POPOV, V. & PULINA, M.-1972- Comments on karst denudation in Bulgaria. *Geographica Polonica*, 23: 111-139.
- MARTIM, P.; CHRYSOSTOMO, R.S. & RODRIGUES, R.-1989- *Cadastro nacional de cavidades naturais: Índice de dados sobre as cavernas do Brasil*. São Paulo, Sociedade Brasileira de Espeleologia, 222 p.
- MARTINET, B. & SOUGY, J.-1961- Utilization pratique des classifications chimiques des roches carbonatées. *Annales de la Faculté des Sciences de L'Université de Dakar*, 6:81-92.
- McCONNELL, H. & HORN, J.M.-1972- Probabilities of surface karst. In: CHORLEY, R.J. (Ed.) *Spatial analysis in geomorphology*. New York, Harper and Row, p.111-133.
- MELO, M.S. de-1990- *A Formação Pariquera-Açu e depósitos relacionados: sedimentação, tectônica e geomorfogênese*. São Paulo, 211p. (Dissertação de Mestrado - Instituto de Geociências/USP).
- MELO, M.S.; FERNANDES, L.A. & COIMBRA, A.M.-1990- Evolução tectono-sedimentar cenozóica do baixo vale do rio Ribeira do Iguape. SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36., Natal 1990, *Anais SBG, Núcleo Nordeste 1990*, v.5, p. 2250-2260.
- MELO, M.S.; RICCOMINI, C.; HASUI, Y.; ALMEIDA, F.F.M. & COIMBRA, A.M.-1985- Geologia e evolução do sistema de bacias tafrogênicas continentais do Sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Geociências*, 15(3): 193-201.
- MILANOVIC, P.T.-1976- Water regime in deep karst. Case study of the Ombla spring drainage area. In: YEVJEVICH, V. (ed.) *Karst hydrology and water resources*, vol. 1. *Karst hydrology*. Fort Collins, Water Resources Publications, p.165-191.
- MILANOVIC, P.T.-1981- *Karst hydrogeology*. Littleton, Water Resources Publication, 434 p.
- MILLER, T.E.-1982- *Hydrochemistry, hydrology and morphology of the Caves Branch karst, Belize*. Hamilton, 281p. (PhD thesis - Department of Geology - McMaster University).
- MILLS, P.-1981- Karst drainage patterns in the Quatsino Limestone, Northern Vancouver Island, Canada. INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 8., Bowling Green, 1981. *Proceedings*, Bowling Green IUS, 1981. v.1, p. 117-119.
- MIOTKE, F.D. & PALMER, A.N.-1972- *Genetic relationship between caves and landforms in the Mammoth Cave National Park area*. Würzburg, Böhler Verlag, 69p.
- MMAJ/JICA - METAL MINING AGENCY OF JAPAN/JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY-1983- *Report on Geological Survey of Anta Gorda, phase 3*. São Paulo, Convênio DNPM/MMAJ/JICA, 220p.
- MONROE, W.H.-1974- Dendritic dry valleys in the cone karst of Puerto Rico. *Journal of Research U. S. Geological Survey*, 2(2): 159-163.
- MONTEIRO, C.A.-1969- A frente polar Atlântica e as chuvas de inverno na fachada sul oriental do Brasil. In: Instituto de Geografia (ed.) *A contribuição metodológica à análise rítmica dos tempos no Brasil*, Série de monografias, FFLCH/USP, 1: 1-62.

- MOTYKA, I. & WILK, Z.-1984- Hydraulic structure of karst-fissured Triassic rocks in the vicinity of Olkusz (Poland). *Kras i Speleologia*, 14(5): 11-24.
- MYLROIE, J.E. & CAREW, J.L.-1986- Minimum duration of speleogenesis. INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 9., Barcelona 1986, *Proceedings*, Barcelona IUS, 1986, v.1, p. 249-251.
- NEWSON, M.D.-1971- A model of subterranean erosion in the British Isles based on hydrology. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 54: 55-70.
- OGDEN, A.E.-1982- Karst denudation rates for selected spring basins in West Virginia. *National Speleological Society Bulletin*, 44: 6-10.
- PALMER, A.N.-1981- Hydrochemical factors in the origin of limestone caves. INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, 8., Bowling Green 1981, *Proceedings* Bowling Green IUS, 1981. v.1, p. 120-122.
- PALMER, A.N.-1984- Geomorphic interpretation of karst features. In: LaFLEUR, R.G (ed.) *Groundwater as a geomorphic agent*. Boston, Allen & Unwin, p. 174-209.
- PALMER, A.N.-1987- Cave levels and their interpretation. *National Speleological Society Bulletin*, 49(2): 50-66.
- PALMER, A.N.-1991- Origin and morphology of limestone caves. *Geological Society of America Bulletin*, 103: 1-21.
- PALMQUIST, R.-1979- Geologic controls on doline characteristics in mantled karst. *Zeitschrift für Geomorphologie*, Supplement Band, 32: 90-106.
- PARIZEK, R.P.-1976- On the nature and significance of fracture traces and lineaments in carbonate and other terranes. In: YEVJEVICH, V. (ed.) *Karst Hydrology*. Fort Collins, Water Research Publications, v. 1, p. 47-108.
- PENCK, A.-1900- Geomorphologische Studien aus der Hercegovina. *Zeitschrift Deut. Osterreich Alpenverein*, 31:25-41.
- PHILADELPHI, M.A. -1990- *Mapeamento e estudo geoespeleológico das cavernas do sistema Temimina Pescaria, Iporanga, SP*. FAPESP, 38 p. (Relatório de Iniciação Científica nº 89/1700-5).
- PIRES, F.A.-1988- Uma nova concepção para os ambientes do Grupo Açungui, na região de Iporanga e Apiaí, sul de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 35., Belém 1988, *Anais Belém*, SBG 1988. v.2, p. 606-616.
- PIRES, F.A.-1989- *Análise paleoambiental e estratigráfica de seqüências metassedimentares (Grupo Açungui) na região de Iporanga e Apiaí - São Paulo*. São Paulo, 151p. (Dissertação de Mestrado - Instituto de Geociências/USP).
- PLUMMER, L.N. & BUSENBERG, E.-1982- The solubilities of calcite, aragonite and vaterite in CO₂-H₂O solutions between 0 and 90°C and an evaluation of the aqueous model for the system CaCO₃-CO₂-H₂O. *Geochimica Cosmochimica Acta*, 46(6): 1011-1040.
- PLUMMER, L.N. & WIGLEY, T.M.L.-1976- The dissolution of calcite in CO₂ saturated solutions at 25°C and 1 atmosphere total pressure. *Geochimica Cosmochimica Acta*, 40(2): 191-202.
- PLUMMER, L.N.; WIGLEY, T.M.L. & PARKHURST, D.L.-1978- The kinetics of calcite dissolution in CO₂-water systems at 5 to 60°C and 0.0 to 1.0 atm. CO₂. *American Journal of Science*, 278: 179-216.
- PLUMMER, L.N.; WIGLEY, T.M.L. & PARKHURST, D.L.-1979- Critical review of the kinetics of calcite dissolution and precipitation. In: JENNE, E.A (ed) *Chemical*

modelling in aqueous systems. American Chemistry Society Symposium Series, 93: 537-573.

- POLITI ENGENHARIA e CONSTRUÇÕES LTDA-1988- Relatório de perfuração de poço, obra nº 611/88, Bairro da Serra, Iporanga, São Paulo.
- POWELL, R.L.-1976- *Some geomorphic and hydrologic implications of jointing in carbonate strata of Mississippian age in south-central Indiana*. Lafayette, 169 p. (PhD thesis - Purdue University).
- PRZYBYLOWICZ, W, SCHWARCZ, H.P. & LATHAM, A.-1991- Dirty calcites 2. Uranium series dating of artificial calcite-detritus mixtures. *Chemical Geology, Isotope Geoscience Section*, 86(2): 161-178.
- PULINA, M.-1972- A comment on present day chemical denudation in Poland. *Geographica Polonica*, 23: 45-62.
- RAMSAY, J.G. & HUBER, M.I.-1987- *The techniques of modern structural geology: Folds and Fractures*. London, Academic Press, 700 p.
- REAMS, M.W.-1992- Fractal dimensions of sinkholes. *Geomorphology*, 5: 159-165.
- RHOADES, R. & SINACORI, N.M.-1941- Patterns of groundwater flow and solution. *Journal of Geology*, 49: 785-794.
- RIEDEL, W.-1929- Zur Mechanik geologischer Brucherscheinungen. *Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, Abt. B: 354-368.
- ROGLIC, J.Z.-1960- Das verhältnis der Flusserosion zum Karstprozess. *Zeitschrift für Geomorphologie*, 4(2): 116-117.
- ROWE, P.-1985- Rates of valley incision in the carboniferous limestone of the southern Pennines. *Cave Science*, 12(3): 30-31.
- RUST, B.R.-1979- Coarse alluvial deposits. In: WALKER, R.G. (ed) *Facies Models*. Toronto, GAC (Geoscience Canada Reprint Series 1) p. 9-21.
- SÁNCHEZ, L.E.-1984- Cavernas e paisagem cárstica do Alto Vale do Ribeira/SP: uma proposta de tombamento. *Espeleo-Tema*, 14: 9-21.
- SÁNCHEZ, L.E.-1986- Bibliografia espeleológica brasileira - 1836/1980. *Ciência e Cultura*, 38(5): 927-932.
- SCHMIDT, V.A.-1982- Magnetostratigraphy of sediments in Mammoth Cave, Kentucky. *Science*, 271: 827-829.
- SCHWARCZ, H.P. & BLACKWELL, B.-1985- Dating methods of Pleistocene deposits and their problems: II Uranium-series disequilibrium dating. In: RUTTER, N.W. (ed) *Dating methods of Pleistocene deposits and their problems*. Toronto, GAC (Geoscience Canada Reprint Series 2) p. 9-18.
- SHULITS, S.-1941- Rational equation of river bed profile. *Transactions American Geophysical Union*, 22: 622-630.
- SILVA, A.B.-1973- Contribuição à hidrogeologia dos Carstes da região da Bahia. *Água Subterrânea*, 1(3): 11-16.
- SILVA, A.B.-1984- *Análise morfoestrutural, hidrogeológica e hidroquímica no estudo do aquífero cárstico do Jaíba, norte de Minas Gerais*. São Paulo, 189p. (Tese de Doutorado - Instituto de Geociências/USP).
- SMITH, D.I.-1962- *The solution of limestone in an Arctic environment*. London, Institute of British Geographers, Special Publication 4, p. 187-200.

- SMITH, D.I. & ATKINSON, T.C.-1976- Process, landforms and climate in limestone regions. In: DERYSHIRE, E. (ed.) *Geomorphology and Climate*. London, John Wiley, p. 369-409.
- SMITH, D.I. & NEWSON, M.D.-1974- The dynamics of solutional and mechanical erosion in limestone catchments on the Mendip Hills, Somerset. In: GREGORY, K.J. & WALLING, D.E. (eds.) *Fluvial Processes in Instrumented Watersheds*. London, Institute of British Geographers, Special Publication 6, p. 155-167.
- SOUZA, A.P.-1990- *Mapa geológico na escala 1:50.000 e esboço da evolução tectônica e sedimentar do Grupo Itaiacoca, nas folhas Barra do Chapéu e Ouro Verde - SP/PR*. São Paulo, 200 p. (Dissertação de Mestrado - Instituto de Geociências/USP).
- STRAHLER, A.N.-1964- Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks. In: CHOW, V.T. (ed) *Handbook of Applied Hydrology*. New York, McGraw Hill, section 4, p.39-76.
- SUSTERIC, F.-1979- Some principles of cave profile simulation. In: SYMPOSIUM INTERNACIONAL SUR L'EROSION KARST. Aix-en-Provence, *Actes* p. 125-131.
- SWEETING, M.M.-1958- The karstlands of Jamaica. *Geography Journal*, 124: 184-199.
- SWEETING, M.M.-1972- *Karst landforms*. New York, Mcmillan, 362p.
- SWEETING, M.M.-1979- Weathering and solution of the Melinau limestones in the Mulu National Park, Sarawak, Malaysia. *Annales Société Géologique Belgique*, 102: 53-57.
- TERZAGHI, K.-1958- Landforms and subsurface drainage in the Gacka region in Yugoslavia. *Zeitschrift für Geomorphologie*, 2(1-2): 76-100.
- THOMPSON, P.-1974- *Extraction and isotopic analysis of trace amounts of U and Th from speleothems*. Hamilton, 20 p. (Department of Geology, McMaster University (Technical Memo. 73-9).
- THOMSON, K.C. & TAYLOR, R.L.-1991- The art of cave mapping. *Quarterly Journal of the Missouri Speleological Survey*, 31(1-4): 1-183.
- THORNBURY, W.D.-1969- *Principles of geomorphology*. New York, John Wiley & Sons, second edition, 594 p.
- THRAILKILL, J.-1968- Chemical and hydrologic factors in the excavation of limestone caves. *Geological Society of America Bulletin*, 79: 19-46.
- TROESTER, J.W.; WHITE, E.I. & WHITE, W.B.-1984- A comparison of sinkhole depth frequency distributions in temperate and tropical karst regions. In: BECK, B.F. (ed) *Sinkholes: Their Geology, Engineering and Environmental Impact*. Rotterdam, Balkema, p. 65-74.
- TROESTER, J.W. & WHITE, W.B.-1986- Geochemical investigations of three tropical karst drainage basins in Puerto Rico. *Ground Water*, 24(4): 475-482.
- TRUDGILL, S.T.-1985- *Limestone geomorphology*. London, Longman, 210 p.
- UEHARA, K.-1994- Comunicação pessoal.
- VAN EYSINGA, F.W.B.-1975- *Geological time table*. 3th ed., Amsterdam, Elsevier.
- VILLINGER, E.-1987- Die Blautopfhöhlen bei Blaubeuren als Beispiel für die Entwicklung des Karstsystems im schwäbischen Malm. *Geologisches Jahrbuch*, C(49): 71-103.
- VOGELSANG, D. & VILLINGER, E.-1987- Elektromagnetische und hydrogeologische Erkundung des Donau-Aach-Karstsystems (Schwäbische Alb). *Geologisches Jahrbuch* C(49): 3-33.
- WADGE, G. & DIXON, T.H.-1984- A geological interpretation of Seasat-Sar imagery of Jamaica. *Journal of Geology*, 92(5): 561-581.

- WALTHAM, A.C.-1981- Origin and development of limestone caves. *Progress in Physical Geography*, 5(2): 242-256.
- WATSON, R.A. & WHITE, W.B.-1985- The history of American theories of cave origin. In: DRAKE, E.J. & JORDAN, W.M. (eds.) *Geologists and ideas; a history of North American Geology*. Boulder, Geological Society of America, v.1, p. 109-123.
- WEYL, P.K.-1958- Solution kinetics of calcite. *Journal of Geology*, 66: 163-176.
- WHITE, E.L., & WHITE, W.B.-1979- Quantitative morphology of landforms in carbonate rock basins in the Appalachian Highlands. *Geological Society of America Bulletin*, 90(4): 385-396.
- WHITE, E.L. & WHITE, W.B.-1983- Karst landforms and drainage basin evolution in the Obey River Basin, North-Central Tennessee, U.S.A. *Journal of Hydrology*, 61(1-3): 69-82.
- WHITE, W.B.-1966- The preparation of geographical cave reports. *National Speleological Society News*, 24: 85-92.
- WHITE, W.B.-1977- Role of solution kinetics in the development of karst aquifers. In: TOLSON, J.S. & DOYLE, F.L. (eds.) *Karst hydrogeology*. Huntsville, University of Alabama (International Association of Hydrogeologists, Mem. 12) p.120-132.
- WHITE, W.B.-1984- Rate processes: chemical kinetics and karst landform development. In: LaFLEUR, R.G. (ed) *Groundwater as a geomorphic agent*. Boston, Allen & Unwin, p. 227-248.
- WHITE, W.B.-1988- *Geomorphology and hydrology of karst terrains*. Oxford, Oxford University Press, 464p.
- WHITE, W.B. & DEIKE, G.H.-1989- Hydraulic geometry of cave passages. In: WHITE, W.B. & WHITE, E.L. (eds.) *Karst hydrology, concepts from the Mammoth Cave area*. New York, Van Nostrand Reinhold, p. 223-257.
- WHITE, W.B. & LONGYEAR, J.-1962- Some limitations on speleogenetic speculation imposed by the hydraulics of groundwater flow in limestone. *Nittany Grotto Newsletter*, 10: 155-167.
- WHITE, W.B. & WHITE, E.L.-1987- Ordered and stochastic arrangements within regional sinkhole populations. In: BECK, B.F. & WILSON, W.L. (eds.) *Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Environmental Impacts of Karst*, 2. Orlando, Florida Sinkhole Research Institute, University of Central Florida, p. 85-90.
- WIGLEY, T.M.L. & PLUMMER, L.N.-1976- Mixing of carbonate waters. *Geochimica Cosmochimica Acta*, 40(9): 989-995.
- WILLIAMS, P.W.-1963- An initial estimate of the speed of limestone solution in County Clare. *Irish Geographer*, 4: 432-441.
- WILLIAMS, P.W.-1971- Illustrating morphometric analysis of karst with examples from New Guinea. *Zeitschrift für Geomorphologie Neue Folge*, 15: 40-61.
- WILLIAMS, P.W.-1972a- The analysis of spatial characteristics of karst terrains. In: CHORLEY, R.J. (ed.) *Spatial analysis in geomorphology*. New York, Harper and Row, p.136-166.
- WILLIAMS, P.W.-1972b- Morphometric analysis of polygonal karst in New Guinea. *Geological Society of America Bulletin*, 83: 761-796.
- WILLIAMS, P.W.-1982- Speleothem dates, Quaternary terraces and uplift rates in New Zealand. *Nature*, 298: 257-260.
- WILLIAMS, P.W.-1985- Subcutaneous hydrology and the development of doline and cockpit karst. *Zeitschrift für Geomorphologie, Neue Folge*, 29(4): 463-482.

- WILLIAMS, P.W. & DOWLING, R.K.-1979- Solution of marble in the karst of the Pikikiruna range, northwest Nelson, New Zealand. *Earth-Surface Processes and Landforms*, 4: 15-36.
- WORTHINGTON, S.R.H.-1991- Karst hydrogeology of the Canadian Rocky Mountains. Hamilton, 227p. (PhD thesis, Department of Geography/McMaster University).
- YUAN, D.-1985- On the heterogeneity of karst water. In: *Karst Water Resources*, Proceedings of the Ankara-Antalya Symposium, I.A.H.S., publ. 161: 281-292.
- ZALÁN, P.V.; WOLF, S.; CONCEIÇÃO, J.C.; MARQUES, A; ASTOLFI, M.A.M., VIEIRA, I.S., APPI, V.T. & ZANOTTO, O.A.-1990- Bacia do Paraná. In RAJA GABAGLIA, G.P. & MILANI, E.J. (coords.) *Origem e evolução de bacias sedimentares*. Rio de Janeiro, Petróleo Brasileiro, p.135-168.

Anexo 5.2 - Exemplo de cálculo de vazão pelo método de diluição de sal através do programa elaborado por Karmann (1989) em Turbo Pascal 6.0 (profissional).

1:07:08p

Gráfico Concentração X Condutividade

Os dados de Entrada devem estar gravados em disco

13 pares de 2 elemento(s) no Arranjo. ...Ordenando os dados...

- Especificações do Eixo-X - Condutividades

Menor condutividade = 185

Maior condutividade = 251

Número de marcas primárias para o Eixo-X :

Título para o Eixo-X :

Mensagem :

A equacao linear vale - $Y = 0.000024633/4 X + -0.00430381007$

Original X	Original Yo	Estimado Ye	Residual Yo - Ye	Yo - Ym
185.00	0.00000000000	0.00005341712	-0.00005341712	-0.00066412448
186.95	0.00007984032	0.00010138809	-0.00002154777	-0.00058428416
188.89	0.00011964108	0.00014935906	-0.00002971798	-0.00054448340
189.87	0.00015936255	0.00017334455	-0.00001398200	-0.00050476193
193.76	0.00027805362	0.00026928649	0.00000876713	-0.00038607086
196.68	0.00039603960	0.00034124295	0.00005479665	-0.00026808488
202.53	0.00051332675	0.00048515586	0.00002817089	-0.00015079773
210.32	0.00070726916	0.00067703974	0.00003022942	0.00004314468
218.11	0.00089931574	0.00086892363	0.00003039211	0.00023519126
225.89	0.00108949416	0.00106080751	0.00002868665	0.00042536968
234.66	0.00127783156	0.00127667687	0.00000115469	0.00061370708
243.42	0.00146435453	0.00149254624	-0.00002819171	0.00080023005
251.21	0.00164908917	0.00168443013	-0.00003534096	0.00098496469

Original X	Original Yo	Estimado Ye	Residual Yo - Ye	Yo - Ym	1:12:26o
185.00	0.00000000000	0.00005341712	-0.00005341712	-0.00066412448	
186.95	0.00007984032	0.00010138809	-0.00002154777	-0.00058428416	
188.89	0.00011964108	0.00014935906	-0.00002971798	-0.00054448340	
189.87	0.00015936255	0.00017334455	-0.00001398200	-0.00050476193	
193.76	0.00027805362	0.00026928649	0.00000876713	-0.00038607086	
196.68	0.00039603960	0.00034124295	0.00005479665	-0.00026808488	
202.53	0.00051332675	0.00048515586	0.00002817089	-0.00015079773	
210.32	0.00070726916	0.00067703974	0.00003022942	0.00004314468	
218.11	0.00089931574	0.00086892363	0.00003039211	0.00023519126	
225.89	0.00108949416	0.00106080751	0.00002868665	0.00042536968	
234.66	0.00127783156	0.00127667687	0.00000115469	0.00061370708	
243.42	0.00146435453	0.00149254624	-0.00002819171	0.00080023005	
251.21	0.00164908917	0.00168443013	-0.00003534096	0.00098496469	

Ym = 0.00066412448
 Variação total = 0.00000380263
 Variação não-explicada .. = 0.00000001297
 Variação explicada = 0.00000378966
 Coeficiente de correlação = 0.99829248743

A equação linear vale $\rightarrow Y = 0.00002463374 X + -0.00450382509$

Tempo	CMR	Concentração calculada
0	185.0	0.00005341712
5	187.0	0.00010268461
10	188.0	0.00012731835
15	195.0	0.00029975454
20	200.0	0.00042292325
25	220.0	0.00091559808
30	215.0	0.00079242937
35	220.0	0.00091559808
40	230.0	0.00116193550
45	240.0	0.00140827292
50	230.0	0.00116193550
55	220.0	0.00091559808
60	210.0	0.00066926067

Mensagem : Digite <ENTER>

1:13:23p

A equação linear vale $\rightarrow Y = 0.00002463374 X + -0.00450382509$

Tempo	CMR	Concentração calculada
65	212.0	0.00071852815
70	205.0	0.00054609196
75	200.0	0.00042292325
80	199.0	0.00039828951
85	187.0	0.00010268461
90	186.5	0.00009036773
95	186.0	0.00007805086
100	186.0	0.00007805086
105	186.0	0.00007805086
110	185.5	0.00006573399
115	185.0	0.00005341712

Mensagem : Digite <ENTER>

Gráfico Tempo X Concentração

Os dados de Entrada devem estar gravados em disco

24 pares de 2 elemento(s) no Arranjo.

...Ordenando os dados...

- Especificações do Eixo-X - Tempo

Menor Tempo = 0

Maior Tempo = 115

Número de marcas primárias para o Eixo-X :

Título para o Eixo-X :

Mensagem :

Usando 22 Trapezoides. a area estimada vale 0.05723723493

Vazão para VS5 = 347.67577480059 Litros por segundo

Vazão para VS5 = 0.34767577480 Metros Cúbicos por segundo

Mensagem : Digite <ENTER>

USP / GEO - KARST WATER ANALYSIS REPORT - by IVO KARMANN
Listagem das amostras de agua ordenada pelo numero

Cations e anions em ppm ou mg/l
Cond. [-1 = $\mu\text{MHO}/\text{cm}$] [-2 : $\mu\text{S}/\text{cm}$]

PCO2 em atm.
SATc & SATd em %

Temp °C

Pag. : 1
Data : 12/09/94

No.	Local de coleta	Data	pH	Temp	Cond.	Ca++	Mg++	Ca/Mg	HCO3-	NO3-	SO4--	Na+ K+	Cl-	Slc	Sld	pPCO2	PCO2	SATc	SATd	IBE	Observacao		
1	CAV. SANTANA	29/06/90	8.06	18.2	164-1	31.5	5.7	5.5	114.0	1.4	1.3	1.5	0.5	1.7	0.07	-0.28	3.05	0.00089	117.49	52.48	3.79	ULTIMA ESCADA	
2	CAV. SANTANA	29/06/90	8.07	18.4	165-1	34.0	5.7	6.0	120.0	1.3	1.3	1.5	0.5	1.6	0.14	-0.19	3.03	0.00093	138.04	64.57	4.33	PATA ELEFANTE	
3	CAV. SANTANA	29/06/90	8.07	18.5	165-1	33.5	5.8	5.8	123.0	1.3	1.3	1.4	0.5	1.6	0.14	-0.16	3.02	0.00095	138.04	69.18	2.66	RESSURGENCIA	
4	CAV. PEROLAS	30/06/90	7.76	17.4	182-1	42.0	4.7	8.9	139.0	0.5	0.5	1.3	1.2	0.6	-0.03	-0.71	2.66	0.00219	93.33	19.50	5.29	STAGE RECORDER	
5	CAV. PEROLAS	30/06/90	7.81	14.2	110-1	14.0	4.0	3.5	76.0	0.3	0.3	1.6	0.8	0.7	-0.71	-1.71	2.99	0.00102	19.50	1.95	-6.43	OUTRA AGUA	
6	CORR. FURNAS	01/07/90	>>>>	>>>	>>>>	32.5	7.5	4.3	>>>>	>>>	>>>	1.6	0.7	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	CAMINHO P. SANTA
7	CAV. PEROLAS	30/06/90	8.23	13.8	142-1	30.5	6.1	5.0	114.0	0.7	1.5	1.3	0.1	1.2	0.17	-0.10	3.25	0.00056	147.91	79.43	3.49	TRAV. VERMELHO	
8	COR. PEROLAS	30/06/90	7.47	13.4	52-1	5.5	3.2	1.7	43.0	0.4	0.3	1.6	0.9	0.7	-1.69	-3.37	2.90	0.00126	2.04	0.04	-7.83	PLAN. SUMID.	
9	CAV. SANTANA	01/07/90	8.15	19.2	162-1	39.2	2.4	16.3	122.0	0.4	0.4	1.7	0.1	0.8	0.30	-0.30	3.10	0.00079	199.53	50.12	4.59	TRAV. FLORES	
10	SIS. TEM. DESM.	17/07/90	7.57	15.8	38-1	7.0	2.5	2.8	40.0	1.4	2.6	2.5	1.8	2.2	-1.49	-3.15	3.01	0.00098	3.24	0.07	-5.64	CHEG. NO RIO	
11	SIS. TEM. DESM.	17/07/90	8.28	17.0	190-1	40.8	10.9	3.7	163.0	2.5	1.0	3.3	0.5	1.7	0.51	0.74	3.13	0.00074	323.59	549.54	5.39	CHUV. NO TETO	
12	SIS. TEM. DESM.	17/07/90	7.20	17.0	48-1	2.5	1.6	1.6	28.0	0.6	0.7	4.4	1.4	2.7	-2.43	-4.76	2.78	0.00166	0.37	0.00	-7.26	CORR. NO GRANITO	
13	SIS. TEM. DESM.	17/07/90	7.25	17.0	45-1	2.3	1.8	1.3	30.0	0.6	0.2	5.8	1.4	0.9	-2.39	-4.59	2.80	0.00158	0.41	0.00	1.86	AGUA DO GRANITO	
14	SIST. PESCARIA	18/07/90	8.30	14.8	155-1	41.2	6.4	6.4	144.0	2.8	1.2	1.2	0.1	2.4	0.47	0.39	3.22	0.00060	295.12	245.47	2.77	S./GR./GOTU. TET	
15	SIST. PESCARIA	18/07/90	7.95	17.0	102-1	16.5	3.5	4.7	65.0	2.7	0.9	2.2	0.8	2.4	-0.54	-1.46	3.18	0.00066	28.84	3.47	1.34	300M DO SUMID.	
16	SIST. PESCARIA	18/07/90	8.05	17.2	100-1	18.4	4.2	4.4	72.0	0.8	0.9	3.1	1.2	2.4	-0.36	-1.05	3.24	0.00058	43.65	8.91	5.58	SUM. CAV. PESC.	
17	CAV. CHAPEU	18/07/90	7.64	17.0	71-1	12.0	3.7	3.2	60.0	0.8	0.5	5.0	1.3	2.7	-1.02	-2.24	2.90	0.00126	9.55	0.58	3.19	200M DA ENTRADA	
18	CAV. ARANHAS	18/07/90	7.34	15.5	26-1	2.0	1.3	1.5	21.0	0.7	0.6	3.3	1.2	2.7	-2.53	-4.96	3.06	0.00087	0.30	0.00	-7.65	RESSURGENCIA	
19	CAV. SANTANA	13/08/90	8.05	18.0	160-1	30.0	5.9	5.1	117.0	1.3	1.3	1.4	0.5	1.4	0.05	-0.29	3.02	0.00095	112.20	51.29	1.28	RESSURGENCIA	
20	CAV. SANTANA	09/08/90	7.30	18.2	320-1	75.0	6.0	12.5	246.0	0.9	0.8	2.0	0.1	2.0	-0.01	-0.81	1.95	0.01122	97.72	15.49	2.46	ESTALAC. MANG.	
21	CAV. SANTANA	09/08/90	7.45	18.1	315-1	72.0	6.1	11.8	250.0	4.4	1.8	1.6	0.2	2.6	0.12	-0.52	2.10	0.00794	131.83	30.20	-1.30	ESTALAC. RIO	
22	CAV. PEROLAS	11/08/90	7.85	17.0	120-1	20.0	4.0	5.0	75.0	0.7	0.6	1.6	0.6	1.6	-0.50	-1.40	3.02	0.00095	31.62	3.98	4.23	STAGE RECORDER	
23	CAV. PEROLAS	11/08/90	7.83	15.0	85-1	14.0	4.7	3.0	65.0	0.6	0.6	1.8	0.6	1.4	-0.75	-1.71	3.07	0.00085	17.78	1.95	2.27	OUTRA AGUA	
24	CORREGO FURNAS	13/08/90	8.36	16.8	162-1	33.0	6.5	5.1	120.0	1.5	5.4	1.6	0.8	2.0	0.38	0.34	3.34	0.00046	239.88	218.78	2.59	CAMINHO SANTANA	
25	CAV. SANTANA	08/09/90	7.98	18.0	161-1	29.0	6.0	4.8	118.0	1.2	1.1	1.5	0.6	0.7	-0.03	-0.43	2.95	0.00112	93.33	37.15	0.64	ULTIMA ESCADA	
26	CAV. SANTANA	08/09/90	7.98	18.0	161-1	29.0	6.0	4.8	118.0	1.5	1.5	1.5	0.6	0.7	-0.03	-0.43	2.95	0.00112	93.33	37.15	0.31	RESSURGENCIA	
27	CAV. SANTANA	08/09/90	7.39	18.2	308-1	68.0	5.3	12.8	261.0	1.1	1.4	1.6	0.1	1.5	0.06	-0.68	2.02	0.00955	114.82	20.89	-5.60	ESTALAC. MANG.	
28	CAV. PEROLAS	09/09/90	7.85	18.0	119-1	18.5	4.9	3.8	89.0	1.1	0.8	1.5	0.6	0.9	-0.45	-1.17	2.94	0.00115	35.48	6.76	-3.84	STAGE RECORDER	
29	CAV. PEROLAS	09/09/90	7.76	14.5	98-1	14.5	4.6	3.2	77.0	1.0	0.9	1.8	0.7	1.0	-0.74	-1.72	2.93	0.00117	18.20	1.91	-5.05	OUTRA AGUA	
30	CAV. PEROLAS	09/09/90	8.21	13.5	160-1	27.6	6.6	4.2	124.0	0.7	1.2	1.6	0.1	1.2	0.14	-0.09	3.20	0.00063	138.04	81.28	-2.73	TRAV. VERMELHO	
31	COR. PEROLAS	09/09/90	7.72	15.0	92-1	12.4	4.6	2.7	73.0	1.0	0.9	1.6	0.6	1.0	-0.86	-1.89	2.91	0.00123	13.80	1.29	-7.71	PLAN. SUMID.	
32	CAV. SANTANA	06/10/90	7.90	20.0	100-1	28.0	6.2	4.5	105.0	1.5	1.9	1.5	0.5	1.6	-0.15	-0.60	2.89	0.00129	70.79	25.12	4.54	ULTIMA ESCADA	
33	CAV. SANTANA	06/10/90	7.90	18.0	184-1	28.5	6.2	4.6	105.0	1.5	1.8	1.5	0.9	1.5	-0.16	-0.67	2.92	0.00120	69.18	21.38	5.14	RESSURGENCIA	
34	CAV. SANTANA	06/10/90	7.40	23.0	340-1	75.0	6.3	11.9	201.0	0.9	2.5	2.3	0.1	3.4	0.06	-0.58	2.11	0.00776	114.82	26.30	11.69	ESTALAC. MANG.	
35	CAV. PEROLAS	06/10/90	7.77	17.5	120-1	14.0	4.8	2.9	74.0	0.8	0.9	1.7	0.5	1.6	-0.73	-1.63	2.94	0.00115	18.62	2.34	4.10	STAGE RECORDER	
36	CAV. PEROLAS	06/10/90	7.68	17.8	98-1	12.5	5.0	2.5	63.0	0.8	0.9	1.8	0.6	1.7	-0.93	-1.95	2.91	0.00123	11.75	1.12	0.90	OUTRA AGUA	
37	CAV. PEROLAS	06/10/90	8.14	15.0	160-1	32.0	7.0	4.6	126.0	0.5	1.4	1.4	0.1	1.9	0.16	-0.07	3.11	0.00078	144.54	85.11	1.86	TRAV. VERMELHO	
38	COR. PEROLAS	06/10/90	7.70	18.0	100-1	12.5	4.9	2.6	54.0	0.8	0.9	1.7	0.6	1.7	-0.97	-2.04	3.00	0.00100	10.72	0.91	7.32	PLAN. SUMID.	

Anexo 5.3 - Listagem das análises químicas das amostras de água coletadas e de seus principais parâmetros calculados. Slc = índice de saturação em calcita, Sld = índice de saturação em dolomita, SATc e SATd = porcentagem de saturação em calcita e dolomita, IBE = erro de balanço iônico.

USP / GEO - KARST WATER ANALYSIS REPORT - by IVO KARMMANN
Listagem das amostras de agua ordenada pelo numero

Cations e anions em ppm ou mg/l
Cond. [-1 = $\mu\text{MHO/cm}$] [-2 : $\mu\text{S/cm}$]

PCO2 em atm.
SATc & SATd em %

Temp °C

Pag. : 2
Data : 12/09/94

No.	Local de coleta	Data	pH	Temp	Cond.	Ca++	Mg++	Ca/Mg	HCO3-	NO3-	SO4--	Na+	K+	Cl-	SiC	SiD	pPCO2	PCO2	SATc	SATd	IBE	Observacao
39	CAV. SANTANA	04/11/90	7.68	20.0	193-1	34.0	5.9	5.8	120.0	1.3	1.2	1.6	0.6	1.8	-0.23	-0.87	2.62	0.00240	58.88	13.49	4.74	ULTIMA ESCADA
40	CAV. SANTANA	04/11/90	7.88	18.5	166-1	30.0	4.7	6.4	110.0	1.1	1.1	1.5	0.5	1.6	-0.13	-0.75	2.87	0.00135	74.13	17.78	1.90	RESSURGENCIA
41	CAV. SANTANA	04/11/90	7.42	19.0	420-1	84.0	4.8	17.5	247.0	0.7	1.7	2.3	0.1	3.0	0.16	-0.60	2.07	0.00851	144.54	25.12	5.79	ESTALAC. MANG.
42	CAV. PEROLAS	03/11/90	7.90	18.8	92-1	19.0	4.0	4.8	90.0	1.0	0.8	1.5	0.5	2.0	-0.38	-1.11	2.97	0.00107	41.69	7.76	-7.21	STAGE RECORDER
43	CAV. PEROLAS	03/11/90	7.28	18.8	98-1	12.0	4.0	3.0	55.0	0.7	0.7	1.7	0.7	2.0	-1.39	-2.93	2.56	0.00275	4.07	0.12	1.80	OUTRA AGUA
44	CAV. PEROLAS	03/11/90	7.88	22.0	180-1	33.0	5.5	6.0	120.0	0.4	1.1	1.4	0.2	2.1	-0.02	-0.45	2.81	0.00155	95.50	35.48	2.63	TRAV. VERMELHO
45	COR. PEROLAS	03/11/90	7.42	19.0	108-1	13.0	3.5	3.7	55.0	0.6	0.6	1.7	0.7	2.3	-1.21	-2.67	2.70	0.00200	6.17	0.21	2.00	PLAN. SUMID.
46	CAV. SANTANA	03/12/90	7.48	20.0	142-1	28.0	4.2	6.7	103.0	2.6	1.4	1.5	0.9	1.9	-0.56	-1.61	2.49	0.00324	27.54	2.45	0.51	ULTIMA ESCADA
47	CAV. SANTANA	03/12/90	7.56	19.0	148-1	28.0	5.0	5.6	100.0	2.6	1.4	1.5	1.0	1.8	-0.51	-1.44	2.59	0.00257	30.90	3.63	3.81	RESSURGENCIA
48	CAV. SANTANA	03/12/90	7.38	18.8	348-1	73.0	4.5	16.2	242.0	1.0	1.8	2.5	0.2	3.4	0.06	-0.78	2.04	0.00912	114.82	16.60	0.14	ESTALAC. MANG.
49	CAV. PEROLAS	02/12/90	7.51	18.4	124-1	15.0	4.1	3.7	63.0	2.6	3.4	1.9	0.6	7.1	-1.02	-2.29	2.74	0.00182	9.55	0.51	-6.10	STAGE RECORDER
50	CAV. PEROLAS	02/12/90	7.27	18.8	90-1	17.0	3.5	4.9	63.0	0.9	0.8	1.8	0.5	2.2	-1.19	-2.75	2.49	0.00324	6.46	0.18	4.33	OUTRA AGUA
51	CAV. PEROLAS	02/12/90	8.05	15.8	168-1	37.0	5.8	6.4	132.0	0.2	0.4	1.5	0.1	2.5	0.16	-0.20	2.99	0.00102	144.54	63.10	3.20	TRAV. VERMELHO
52	COR. PEROLAS	02/12/90	7.50	19.0	99-1	12.5	4.0	3.1	60.0	0.7	0.6	1.8	0.5	2.0	-1.11	-2.39	2.74	0.00182	7.76	0.41	-0.93	PLAN. SUMID.
53	TORNEIRA/VANDIR	/ /	>>>>	>>>	>>>>	34.0	12.7	2.7	>>>>	1.1	3.7	4.0	0.9	5.0	>>>>	>>>>	>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>
54	CAV. SANTANA	04/01/91	7.55	18.5	160-1	29.0	5.0	5.8	113.1	0.5	1.0	0.5	1.6	0.5	-0.46	-1.36	2.53	0.00295	34.67	4.37	0.69	ULTIMA ESCADA
55	CAV. SANTANA	04/01/91	7.54	18.5	158-1	27.0	4.6	5.9	107.0	0.5	1.0	0.5	1.5	0.5	-0.52	-1.49	2.54	0.00288	30.20	3.24	-0.30	RESSURGENCIA
56	CAV. SANTANA	04/01/91	7.41	19.0	330-1	71.4	4.6	15.5	238.0	0.5	1.0	0.1	2.4	0.5	0.08	-0.73	2.07	0.00851	120.23	18.62	0.77	ESTALAC. MANG.
57	CAV. PEROLAS	05/01/91	7.39	18.0	90-1	13.0	3.6	3.6	60.0	0.2	1.0	0.5	1.7	0.5	-1.22	-2.68	2.64	0.00229	6.03	0.21	-0.80	PLAN. SUMID.
58	CAV. PEROLAS	05/01/91	7.04	18.5	170-1	32.5	6.3	5.2	143.0	0.5	1.0	0.1	1.4	0.5	-0.82	-2.04	1.92	0.01202	15.14	0.91	-4.53	TRAV. VERMELHO
59	CAV. PEROLAS	05/01/91	7.60	18.0	110-1	36.1	3.8	9.5	131.0	0.5	1.0	0.3	1.3	0.5	-0.26	-1.20	2.52	0.00302	54.95	6.31	-0.44	STAGE RECORDER
60	CAV. PEROLAS	05/01/91	7.48	18.0	90-1	14.0	4.0	3.5	60.0	0.5	1.0	0.5	1.7	0.5	-1.10	-2.42	2.73	0.00186	7.94	0.38	3.67	OUTRA AGUA
61	CAV. SANTANA	03/02/91	7.70	17.9	162-1	30.9	4.9	6.3	122.0	1.4	1.0	1.6	0.6	1.5	-0.26	-1.02	2.65	0.00224	54.95	9.55	-1.52	ULTIMA ESCADA
62	CAV. SANTANA	03/02/91	7.60	19.0	165-1	31.0	4.9	6.3	122.0	>>>>	1.0	1.5	0.5	1.4	-0.34	-1.16	2.54	0.00288	45.71	6.92	0.19	RESSURGENCIA
63	CAV. SANTANA	03/02/91	7.30	18.0	326-1	72.0	4.6	15.7	256.0	0.9	0.5	2.2	0.1	1.5	-0.01	-0.92	1.94	0.01148	97.72	12.02	-2.33	ESTALAC. MANG.
64	CAV. SANTANA	03/02/91	7.80	21.0	330-1	71.8	5.2	13.8	247.0	0.5	1.0	1.7	0.2	1.0	0.50	0.20	2.44	0.00363	316.23	158.49	0.38	ESTALAC. RIO
65	CAV. SANTANA	03/02/91	7.94	19.0	220-1	42.0	4.0	10.5	158.0	>>>>	0.5	1.7	0.1	>>>>	0.22	-0.26	2.78	0.00166	165.96	54.95	-1.95	TRAV. FLORES
66	CORR. FURNAS	03/02/91	8.24	20.0	160-1	29.0	6.2	4.7	102.0	1.0	2.5	1.7	1.4	1.5	0.19	0.04	3.26	0.00055	154.88	109.65	7.08	CAMI. SANTANA
67	CAV. PEROLAS	04/02/91	8.10	19.0	99-1	38.0	3.9	9.7	134.0	0.5	0.5	1.6	0.4	1.5	0.27	-0.13	3.01	0.00098	186.21	74.13	1.07	STAGE RECORDER
68	CAV. PEROLAS	04/02/91	7.10	21.0	100-1	21.0	3.8	5.5	74.0	0.5	1.2	1.8	0.6	2.0	-1.18	-2.76	2.24	0.00575	6.61	0.17	5.53	OUTRA AGUA
69	CAV. PEROLAS	04/02/91	7.60	16.0	160-1	32.1	5.7	5.6	122.0	0.5	1.0	1.3	0.1	0.6	-0.37	-1.20	2.57	0.00269	42.66	6.31	2.04	TRAV. VERMELHO
70	COR. PEROLAS	04/02/91	7.10	19.0	100-1	18.0	4.0	4.5	73.0	0.5	1.0	1.7	0.6	0.5	-1.28	-2.88	2.26	0.00550	5.25	0.13	2.71	PLAN. SUMIDOURO
71	CAV. SANTANA	07/03/91	7.50	19.0	150-1	26.4	3.5	7.5	96.0	1.2	1.0	1.6	0.6	1.2	-0.61	-1.77	2.54	0.00288	24.55	1.70	1.29	RESSURGENCIA
72	CAV. SANTANA	07/03/91	7.52	19.0	165-1	26.5	3.5	7.6	96.0	1.3	1.2	1.5	0.5	1.2	-0.58	-1.73	2.56	0.00275	26.30	1.86	1.06	ULTIMA ESCADA
73	CAV. SANTANA	07/03/91	7.84	19.0	225-1	42.8	3.8	11.3	147.0	0.5	0.5	1.7	0.1	0.8	0.10	-0.53	2.71	0.00195	125.89	29.51	1.51	TRAV. FLORES
74	CORREGO FURNAS	07/03/91	8.10	20.0	165-1	29.0	5.4	5.4	112.0	1.0	2.0	1.5	0.8	0.6	0.09	-0.21	3.08	0.00083	123.03	61.66	1.62	PONTE- SANTANA
75	CAV. PEROLAS	07/03/91	7.83	18.0	160-1	34.5	3.2	10.8	115.1	0.7	0.6	1.3	0.3	1.5	-0.11	-0.94	2.81	0.00155	77.62	11.48	2.43	STAGE RECORDER
76	CAV. PEROLAS	07/03/91	7.20	19.0	105-1	14.7	3.0	4.9	58.0	1.0	0.8	1.5	0.5	1.5	-1.35	-3.07	2.46	0.00347	4.47	0.09	1.58	OUTRA AGUA

USP / GEO - KARST WATER ANALYSIS REPORT - by IVO KARMMANN
Listagem das amostras de agua ordenada pelo numero

Cations e anions em ppm ou mg/l
Cond. [-1 = $\mu\text{MHO}/\text{cm}$] [-2 : $\mu\text{S}/\text{cm}$]

PCO2 em atm.
SATc & SATd em %

Temp °C

Pag. : 3
Data : 12/09/94

No.	Local de coleta	Data	pH	Temp	Cond.	Ca++	Mg++	Ca/Mg	HCO3-	NO3-	SO4--	Na+	K+	Cl-	SiC	SiD	pPCO2	PCO2	SATc	SATd	IBE	Observacao
77	CAV. PEROLAS	07/03/91	7.54	17.0	220-1	47.2	5.6	8.4	172.6	0.5	0.5	1.6	0.1	2.0	-0.12	-0.86	2.35	0.00447	75.86	13.80	-0.27	TRAV. VERMELHO
78	COR. PEROLAS	07/03/91	7.28	19.0	81-1	12.9	3.0	4.3	51.2	1.0	1.0	1.5	0.5	1.0	-1.38	-3.07	2.59	0.00257	4.17	0.09	3.44	PLAN. SUMID.
79	CAV. SANTANA	19/05/91	7.80	18.7	169-1	32.0	5.0	6.4	120.0	1.2	1.5	1.6	0.5	1.0	-0.15	-0.78	2.75	0.00178	70.79	16.60	1.10	ULTIMA ESCADA
80	CAV. SANTANA	19/05/91	7.80	18.7	170-1	32.0	5.0	6.4	115.0	0.5	1.5	1.6	0.5	1.0	-0.16	-0.81	2.77	0.00170	69.18	15.49	3.45	RESSURGENCIA
81	CAV. SANTANA	19/05/91	7.60	19.1	348-1	90.0	4.8	18.8	224.0	0.5	2.0	2.4	0.1	1.5	0.33	-0.28	2.29	0.00513	213.80	52.48	14.33	ESTALAC. MANG.
82	CAV. SANTANA	19/05/91	7.60	19.8	343-1	80.0	5.3	15.1	240.0	0.5	1.5	1.9	0.9	1.0	0.32	-0.21	2.26	0.00550	208.93	61.66	6.30	ESTALAC. RIO
83	CAV. SANTANA	19/05/91	8.28	19.2	210-1	43.0	4.0	10.8	140.0	0.5	1.0	1.8	0.1	1.5	0.51	0.31	3.18	0.00066	323.59	204.17	3.94	TRAV. FLORES
84	CORREGO FURNAS	19/05/91	8.44	19.0	210-0	30.5	6.7	4.6	104.0	1.5	4.0	1.7	0.7	2.0	0.39	0.44	3.47	0.00034	245.47	275.42	7.33	CAMINHO SANTANA
85	RIO BETARI	19/05/91	8.35	19.1	131-1	24.0	3.9	6.2	80.0	1.0	1.8	2.0	0.5	2.0	0.11	-0.24	3.49	0.00032	128.82	57.54	6.57	MONT. RONCADOR
86	CAV. PEROLAS	18/05/91	7.29	18.1	183-1	39.0	3.9	10.0	123.0	0.5	0.8	1.3	0.3	1.2	-0.55	-1.81	2.21	0.00617	28.18	1.55	2.62	STAGE RECORDER
87	CAV. PEROLAS	18/05/91	7.80	16.8	128-1	24.0	4.9	4.9	95.0	1.0	0.8	1.7	0.5	1.5	-0.38	-1.16	2.87	0.00135	41.69	6.92	1.68	OUTRA AGUA
88	CAV. PEROLAS	18/05/91	8.26	15.9	181-1	38.0	6.0	6.3	135.0	0.5	0.6	1.4	0.1	1.5	0.39	0.25	3.20	0.00063	245.47	177.83	3.84	TRAV. VERMELHO
89	COR. PEROLAS	18/05/91	7.64	17.1	130-1	24.0	4.6	5.2	90.0	0.5	1.0	1.6	0.5	0.6	-0.56	-1.52	2.73	0.00186	27.54	3.02	4.02	PLAN. SUMID.
90	BAIRRO DA SERRA	20/05/91	7.80	21.0	436-1	37.0	11.4	3.2	155.0	1.0	6.0	2.7	0.9	1.5	0.03	-0.10	2.63	0.00234	107.15	79.43	3.62	POCO SABESP
91	CORREGO FURNAS	16/06/91	8.29	17.7	190-1	37.0	6.6	5.6	140.0	1.0	2.0	1.7	0.5	0.6	0.44	0.42	3.20	0.00063	275.42	263.03	2.26	MONT. DA MINA
92	CAV. DO GRILLO	16/06/91	8.30	18.0	188-1	38.2	7.5	5.1	135.0	1.0	2.0	2.0	0.8	1.5	0.44	0.49	3.22	0.00060	275.42	309.03	6.40	RESSURGENCIA
93	CAV. PEROLAS	17/06/91	7.85	17.3	178-1	43.0	4.0	10.8	135.0	0.5	1.0	1.7	0.5	1.6	0.06	-0.62	2.77	0.00170	114.82	23.99	5.72	STAGE RECORDER
94	CAV. PEROLAS	17/06/91	8.04	15.0	132-1	28.0	5.2	5.4	105.0	0.3	0.5	1.6	0.8	0.7	-0.06	-0.59	3.08	0.00083	87.10	25.70	4.38	OUTRA AGUA
95	CAV. PEROLAS	17/06/91	8.00	16.0	155-1	34.1	4.8	7.1	115.0	0.5	1.0	1.5	0.6	1.0	0.03	-0.52	3.00	0.00100	107.15	30.20	5.66	JUZANTE-STGE.RC
96	COR. PEROLAS	17/06/91	7.50	14.3	29-1	6.2	2.1	3.0	30.0	0.4	0.3	1.5	0.8	0.7	-1.75	-3.70	3.08	0.00083	1.78	0.02	4.02	PLAN. SUMID.
97	COR. PEROLAS	17/06/91	7.00	14.9	15-1	3.6	0.8	4.5	18.0	0.4	0.3	1.5	0.8	0.7	-2.68	-5.75	2.79	0.00162	0.21	0.00	0.57	PLAN. SUMID. 2
98	BAIRRO DA SERRA	18/06/91	7.76	20.1	231-1	36.0	10.2	3.5	135.0	0.5	4.0	2.0	0.5	1.5	-0.14	-0.49	2.60	0.00251	72.44	32.36	7.76	POCO SABESP
99	BAIRRO DA SERRA	18/06/91	7.80	19.6	155-1	31.2	4.8	6.5	105.0	0.5	3.5	1.0	0.5	1.5	-0.20	-0.88	2.81	0.00155	63.10	13.18	4.30	LAGOA
100	CAV. SANTANA	18/06/91	8.16	19.6	205-1	44.5	4.2	10.6	140.0	0.4	0.5	1.7	0.1	0.8	0.41	0.13	3.05	0.00089	257.04	134.90	6.35	TRAV. FLORES
101	CAV. SANTANA	18/06/91	8.10	18.8	162-1	35.5	5.2	6.8	120.0	1.5	1.5	1.5	0.5	1.7	0.19	-0.14	3.06	0.00087	154.88	72.44	4.84	ULTIMA ESCADA
102	CAV. SANTANA	18/06/91	7.46	19.0	330-1	79.3	4.8	16.5	235.0	1.0	2.0	1.6	0.1	2.0	0.16	-0.58	2.13	0.00741	144.54	26.30	5.51	ESTALAC. MANG.
103	CAV. SANTANA	18/06/91	8.09	18.9	170-1	35.3	5.2	6.8	120.0	1.5	1.5	1.5	0.5	1.7	0.18	-0.15	3.05	0.00089	151.36	70.79	4.61	RESSURGENCIA
104	MINA DE FURNAS	18/06/91	8.03	18.4	200-1	38.0	8.7	4.4	140.0	1.5	6.0	2.0	0.5	2.0	0.20	0.07	2.93	0.00117	158.49	117.49	4.15	COND. FR.*AC.
105	MINA DE FURNAS	18/06/91	7.90	19.3	240-1	39.0	11.6	3.4	150.0	1.5	8.0	2.0	0.5	2.0	0.12	0.03	2.76	0.00174	131.83	107.15	5.27	AGUA DO MINERIO
106	CAV. PEROLAS	19/07/91	7.90	17.5	189-1	39.0	4.0	9.8	125.0	0.5	1.0	2.0	0.5	1.6	0.04	-0.61	2.85	0.00141	109.65	24.55	5.66	STAGE RECORDER
107	CAV. PEROLAS	19/07/91	8.03	15.6	140-1	25.0	5.2	4.8	95.0	1.0	1.5	1.5	0.5	1.2	-0.15	-0.71	3.11	0.00078	70.79	19.50	3.43	OUTRA AGUA
108	CAV. SANTANA	20/07/91	8.10	18.4	170-1	31.0	5.0	6.2	110.0	1.5	1.8	1.5	0.5	1.7	0.09	-0.29	3.10	0.00079	123.03	51.29	3.18	ULTIMA ESCADA
109	CAV. SANTANA	20/07/91	8.05	18.4	170-1	31.0	5.0	6.2	106.0	1.5	1.5	1.5	0.5	1.8	0.03	-0.42	3.06	0.00087	107.15	38.02	5.03	RESSURGENCIA
110	CAV. SANTANA	20/07/91	7.42	18.9	348-1	72.0	5.0	14.4	230.0	1.0	2.0	1.6	0.1	1.5	0.07	-0.70	2.10	0.00794	117.49	19.95	2.62	ESTALAC. MANG.
111	CAV. SANTANA	28/10/91	7.98	18.7	172-1	37.0	5.5	6.7	130.0	2.2	2.0	>>>>	>>>>	2.1	0.12	-0.26	2.90	0.00126	131.83	54.95	3.84	ULTIMA ESCADA
112	CAV. SANTANA	28/10/91	7.90	18.9	170-1	38.0	5.4	7.0	130.0	1.9	1.9	>>>>	>>>>	2.0	0.06	-0.41	2.82	0.00151	114.82	38.90	4.74	RESSURGENCIA
113	CAV. SANTANA	28/10/91	7.45	19.2	321-1	84.0	5.0	16.8	255.0	1.3	1.2	>>>>	>>>>	3.0	0.21	-0.49	2.08	0.00832	162.18	32.36	4.85	ESTALAC. MANG.
114	CAV. SANTANA	28/10/91	7.55	20.0	350-1	83.0	4.5	18.4	246.0	1.4	1.5	>>>>	>>>>	3.0	0.30	-0.34	2.19	0.00646	199.53	45.71	5.66	ESTALAC. DISCO

USP / GEO - KARST WATER ANALYSIS REPORT - by IVO KARMAN
Listagem das amostras de agua ordenada pelo numero

Cations e anions em ppm ou mg/l
Cond. [-1 = $\mu\text{MHO/cm}$] [-2 : $\mu\text{S/cm}$]

PCO2 em atm.
SATc & SATd em %

Temp °C

Pag. : 4
Data : 12/09/94

No.	Local de coleta	Data	pH	Temp	Cond.	Ca++	Mg++	Ca/Mg	HCO3-	NO3-	SO4--	Na+	K+	Cl-	SiC	SiD	pPCO2	PCO2	SATc	SATd	IBE	Observacao
115	CAV. SANTANA	28/10/91	8.11	18.7	170-1	40.0	5.0	8.0	140.0	2.0	1.0	>>>>	>>>>	2.2	0.31	-0.04	3.01	0.00098	204.17	91.20	2.44	TRAV. FLORES
116	CORREGO FURNAS	28/10/91	8.12	20.0	195-1	41.0	7.0	5.9	145.0	1.3	2.3	>>>>	>>>>	2.0	0.36	0.28	2.99	0.00102	229.09	190.55	4.99	MONT. DA MINA
117	CAV. DO GRILLO	28/10/91	8.18	18.0	199-1	40.0	8.2	4.9	148.0	2.6	5.0	>>>>	>>>>	2.0	0.39	0.39	3.06	0.00087	245.47	245.47	4.90	RESSURGENCIA
118	BAIRRO DA SERRA	28/10/91	7.80	19.7	182-1	41.0	5.5	7.5	140.0	2.6	2.0	>>>>	>>>>	2.0	0.03	-0.48	2.68	0.00209	107.15	33.11	4.29	LAGOA
119	CAV. PEROLAS	29/10/91	7.90	17.4	208-1	49.0	4.7	10.4	155.0	2.6	1.8	>>>>	>>>>	2.0	0.22	-0.29	2.76	0.00174	165.96	51.29	5.48	STAGE RECORDER
120	CAV. PEROLAS	29/10/91	8.00	18.5	160-1	30.0	6.0	5.0	120.0	1.1	1.3	>>>>	>>>>	2.6	0.02	-0.34	2.96	0.00110	104.71	45.71	0.61	OUTRA AGUA
121	CAV. PEROLAS	29/10/91	8.12	16.0	192-1	38.0	6.2	6.1	135.0	1.0	1.7	>>>>	>>>>	2.9	0.25	>>>>	3.05	0.00089	177.83	100.00	4.26	TRAV. VERMELHO
122	COR. PEROLAS	29/10/91	7.60	19.2	155-1	28.0	5.7	4.9	110.0	1.0	1.2	>>>>	>>>>	2.4	-0.43	-1.22	2.59	0.00257	37.15	6.03	1.73	PLAN. SUMID.
123	COR. PEROLAS	29/10/91	7.00	20.1	99-1	15.0	5.0	3.0	65.0	0.9	1.2	>>>>	>>>>	2.7	-1.39	-2.91	2.30	0.00501	4.07	0.12	4.26	PLAN. SUMID. 2
124	SIST. PESCARIA	31/10/90	7.80	19.3	110-1	19.0	4.0	4.8	84.0	0.4	0.6	3.2	1.1	2.1	-0.50	-1.34	2.90	0.00126	31.62	4.57	-0.36	SUM. SIS. PES.
125	SIST. PESCARIA	01/11/90	8.04	19.0	130-1	22.0	4.2	5.2	88.0	0.5	0.7	2.9	1.0	1.7	-0.19	-0.77	3.13	0.00074	64.57	16.98	2.67	RESSURG. I+II
126	SIST. PESCARIA	01/11/90	8.07	19.0	195-1	42.0	7.5	5.6	150.0	0.5	1.4	2.2	0.4	2.3	0.32	0.21	2.94	0.00115	208.93	162.18	4.88	RESSURGENCIA II
127	SIST. PESCARIA	01/11/90	8.09	20.0	235-1	43.0	16.8	2.6	198.0	1.5	0.6	1.1	0.2	1.4	0.46	0.84	2.83	0.00148	288.40	691.83	3.86	TRAV. PES.
128	SIST. PESCARIA	01/11/90	8.05	19.0	122-1	23.0	4.2	5.5	93.0	0.6	0.7	3.0	1.0	1.7	-0.14	-0.69	3.11	0.00078	72.44	20.42	1.65	RES. SIST. PES.
129	SIS. TEM. DESM.	31/10/90	6.53	19.5	35-1	2.0	2.1	1.0	21.0	0.4	0.4	2.5	1.1	1.6	-3.29	-6.22	2.22	0.00603	0.05	0.00	0.67	AGUA DO GRANIT.
130	SIS. TEM. DESM.	02/11/90	7.28	19.8	65-1	6.0	1.4	4.3	28.0	0.3	0.5	3.0	1.1	1.7	-1.94	-4.18	2.84	0.00145	1.15	0.01	4.68	ENTR. TEMIMINA
131	SIS. TEM. DESM.	02/11/90	7.97	17.0	230-1	35.0	13.0	2.7	171.0	0.8	0.8	3.8	1.5	1.5	0.17	0.20	2.79	0.00162	147.91	158.49	1.99	CHUV. TEMIMINA
132	SIS. TEM. DESM.	02/11/90	7.45	19.0	45-1	7.0	1.8	3.9	30.0	0.6	0.7	2.9	1.1	1.8	-1.69	-3.65	2.99	0.00102	2.04	0.02	7.00	SAIDA TEMIMINA
133	SIS. TEM. DESM.	01/11/90	7.82	19.8	76-1	9.0	3.0	3.0	48.0	0.7	0.7	3.0	1.0	1.7	-1.01	-2.17	3.15	0.00071	9.77	0.68	-0.50	SAIDA DESMORON.
134	SIST. PESCARIA	07/01/91	7.75	20.0	100-1	20.0	3.7	5.4	84.0	>>>>	>>>>	3.0	1.0	>>>>	-0.52	-1.43	2.84	0.00145	30.20	3.72	2.90	SUM. SIS. PES.
135	SIST. PESCARIA	08/01/91	7.95	19.0	127-1	21.0	4.3	4.9	95.0	>>>>	>>>>	2.9	0.8	>>>>	-0.26	-0.89	3.00	0.00100	54.95	12.88	-0.29	RESSURG. I+II
136	SIST. PESCARIA	08/01/91	8.00	19.0	202-1	48.0	7.8	6.2	152.0	>>>>	>>>>	2.2	0.4	>>>>	0.31	0.15	2.86	0.00138	204.17	141.25	11.73	RESSURGENCIA II
137	SIST. PESCARIA	08/01/91	7.90	19.0	127-1	21.0	4.0	5.3	90.0	>>>>	>>>>	3.0	1.0	>>>>	-0.33	-1.06	2.97	0.00107	46.77	8.71	1.94	RESSURGENCIA I
138	SIST. PESCARIA	08/01/91	7.91	19.0	250-1	38.0	18.5	2.1	200.0	>>>>	>>>>	1.1	0.1	>>>>	0.23	0.46	2.65	0.00224	169.82	288.40	2.88	TRAV. PES.
139	SIST. PESCARIA	08/01/91	7.90	19.1	130-1	22.0	4.1	5.4	96.0	>>>>	>>>>	2.9	1.0	>>>>	-0.28	-0.97	2.95	0.00112	52.48	10.72	0.43	RES. SIST. PES.
140	SIS. TEM. DESM.	07/01/91	6.60	20.0	40-1	1.0	0.9	1.1	15.0	>>>>	>>>>	2.4	0.8	>>>>	-3.65	-7.00	2.42	0.00380	0.02	0.00	0.60	AGUA DO GRANIT.
141	SIS. TEM. DESM.	06/01/91	6.97	18.0	40-1	1.0	1.0	1.0	24.0	>>>>	>>>>	5.7	1.2	>>>>	-3.11	-5.90	2.61	0.00245	0.08	0.00	2.17	AGUA DO GRANIT.
142	SIS. TEM. DESM.	06/01/91	7.40	19.0	41-1	6.0	1.5	4.0	34.0	>>>>	>>>>	2.5	1.0	>>>>	-1.75	-3.78	2.88	0.00132	1.78	0.02	-0.01	ENTR. TEMIMINA
143	SIS. TEM. DESM.	06/01/91	7.73	17.0	250-1	46.0	13.1	3.5	203.0	>>>>	>>>>	3.0	0.3	>>>>	0.12	-0.02	2.48	0.00331	131.83	95.50	2.72	CHUV. TEMIMINA
144	SIS. TEM. DESM.	06/01/91	7.60	19.0	40-1	10.0	1.6	6.3	38.0	>>>>	>>>>	2.5	0.9	>>>>	-1.29	-3.05	3.04	0.00091	5.13	0.09	10.10	SAIDA TEMIMINA
145	SIS. TEM. DESM.	08/01/91	7.20	19.0	70-1	8.0	2.0	4.0	47.0	>>>>	>>>>	2.8	0.8	>>>>	-1.69	-3.66	2.54	0.00288	2.04	0.02	-4.36	SAIDA DESMORON.
146	CAV. PEROLAS	17/01/92	7.30	18.5	185-1	36.0	4.8	7.5	118.0	1.6	1.1	1.0	0.3	2.2	-0.60	-1.76	2.26	0.00550	25.12	1.74	5.57	STAGE RECORDER
147	CAV. SANTANA	18/01/92	7.95	19.0	195-1	34.0	5.0	6.8	120.0	2.1	2.5	0.5	1.5	2.2	0.03	-0.45	2.90	0.00126	107.15	35.48	3.54	ULTIMA ESCADA
148	CAV. SANTANA	18/01/92	7.90	19.2	200-1	34.0	4.8	7.1	116.0	2.0	2.2	0.5	1.0	2.0	-0.03	-0.58	2.87	0.00135	93.33	26.30	4.82	RESSURGENCIA
149	CAV. SANTANA	18/01/92	7.65	19.0	340-1	77.0	4.4	17.5	232.0	1.4	1.1	0.5	1.0	2.9	0.33	-0.26	2.33	0.00468	213.80	54.95	5.06	ESTALAC. MANG.
150	CAV. SANTANA	18/01/92	7.60	19.2	340-1	80.0	3.6	22.2	240.0	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	0.31	-0.40	2.26	0.00550	204.17	39.81	4.35	ESTALAC. DISCO
151	CORREGO FURNAS	19/01/92	7.90	22.0	200-1	34.0	5.5	6.2	120.0	1.0	2.0	>>>>	>>>>	1.9	0.02	-0.39	2.83	0.00148	104.71	40.74	4.47	MONT. DA MINA
152	CAV. DO GRILLO	19/01/92	8.00	18.0	215-1	34.0	7.6	4.5	132.0	2.1	5.2	>>>>	>>>>	2.0	0.10	-0.14	2.92	0.00120	125.89	72.44	3.58	RESSURGENCIA

Pag. : 5
Data : 12/09/94

No.	Local de coleta	Data	pH	Temp	Cond.	Ca++	Mg++	Ca/Mg	HCO3-	NO3-	SO4--	Na+ K+	Cl-	Sic	Sid	pPCO2	PCO2	SATc	SATd	IBE	Observacao	
153	SIST. PESCARIA	05/02/92	7.13	19.8	40-1	5.0	0.8	6.3	18.0	0.2	0.8	1.5	0.5	2.2	-2.35	-5.18	2.88	0.00132	0.45	0.00	5.34	AGUA DO GRANITO
154	SIST. PESCARIA	05/02/92	7.77	19.3	145-1	29.4	3.5	8.4	91.0	0.4	1.0	>>>>	>>>>	1.7	-0.31	-1.22	2.84	0.00145	48.98	6.03	8.30	AG. GRAN.+CALC.
155	SIST. PESCARIA	05/02/92	8.06	19.7	211-1	40.0	7.2	5.6	139.0	0.3	1.5	>>>>	>>>>	1.5	0.27	0.12	2.95	0.00112	186.21	131.83	6.47	CORR. NO CALC.
156	SIST. PESCARIA	05/02/92	8.07	18.7	295-1	58.6	8.2	7.1	195.0	0.9	1.0	>>>>	>>>>	1.8	0.55	0.57	2.83	0.00148	354.81	371.54	6.04	COR. CALC. 2
157	SIST. PESCARIA	05/02/92	8.13	19.9	250-1	32.0	6.5	4.9	118.0	0.4	1.4	>>>>	>>>>	1.8	0.18	0.01	3.09	0.00081	151.36	102.33	4.93	COR. CALC. 3
158	SIST. PESCARIA	06/02/92	8.29	19.9	160-1	30.5	4.3	7.1	98.0	1.4	1.2	>>>>	>>>>	2.2	0.25	-0.03	3.33	0.00047	177.83	93.33	7.87	RES. SIS. PES.
159	SIST. PESCARIA	07/02/92	8.14	19.2	260-1	46.0	7.2	6.4	150.0	2.9	1.8	>>>>	>>>>	3.3	0.43	0.37	3.01	0.00098	269.15	234.42	6.65	RES. INT. CAV.1
160	SIST. PESCARIA	07/02/92	8.23	19.9	170-1	30.0	4.1	7.3	102.0	1.0	1.5	>>>>	>>>>	0.5	0.20	-0.14	3.25	0.00056	158.49	72.44	2.88	RES. INT. CAV.2
161	SIS. TEM. DESM.	07/02/92	7.10	19.5	70-1	7.0	1.2	5.8	23.0	0.6	0.7	>>>>	>>>>	1.5	-2.14	-4.72	2.75	0.00178	0.72	0.00	3.25	AGUA DO GRANIT.
162	SIST. PESCARIA	07/02/92	7.63	19.8	155-1	18.2	2.4	7.6	69.0	0.6	0.8	0.5	0.5	1.9	-0.75	-2.05	2.81	0.00155	17.78	0.89	0.41	R. PES/ESTRADA
163	CAV. CHAPEU	08/02/92	7.69	17.8	120-1	16.5	3.1	5.3	62.0	1.0	0.7	>>>>	>>>>	2.1	-0.80	-2.04	2.93	0.00117	15.85	0.91	2.60	200M DA ENTRADA
164	CAV. SANTANA	08/02/92	8.06	18.9	220-1	37.5	4.4	8.5	125.0	2.7	2.0	1.5	0.5	2.2	0.19	-0.23	3.00	0.00100	154.88	58.88	3.89	ULTIMA ESCADA
165	CAV. SANTANA	08/02/92	8.14	18.9	230-1	37.5	4.3	8.7	120.0	2.4	1.6	1.5	0.5	2.0	0.25	-0.11	3.10	0.00079	177.83	77.62	5.69	RESSURGENCIA
166	CAV. SANTANA	08/02/92	7.62	19.6	390-1	74.5	4.0	18.6	223.1	1.5	0.8	>>>>	>>>>	2.7	0.28	-0.38	2.31	0.00490	190.55	41.69	5.12	ESTALAC. MANG.
167	BAIRRO DA SERRA	09/02/92	8.04	21.2	295-1	43.0	8.3	5.2	155.0	3.9	3.6	>>>>	>>>>	2.9	0.34	0.31	2.87	0.00135	218.78	204.17	5.45	POCO SABESP
168	CAV. SANTANA	20/07/91	>>>>	>>>>	>>>>	90.0	6.0	15.0	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	GOT.CALC.FLORES
169	CAV. L. BRANCA	19/07/91	>>>>	>>>>	>>>>	85.0	6.0	14.2	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	GOT. CALCITA
170	CAV. L. BRANCA	19/07/91	>>>>	>>>>	>>>>	80.0	30.0	2.7	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	GOT. ARAGONITA
171	CAV. L. BRANCA	06/09/92	>>>>	>>>>	>>>>	81.5	35.5	2.3	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	GOT. ARAGONITA
172	CAV. L. BRANCA	06/09/92	>>>>	>>>>	>>>>	37.5	35.5	1.1	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	>>>>	GOT. ARAGONITA

Anexo 5.4 - Listagem da dureza total (mg/l equivalentes a CaCO_3), condutividade corrigida para 20°C e razão molar Ca/Mg das amostras de água coletadas.

Universidade de São Paulo. Inst. Geociências

Page : 1

Total Hardness, Conductivity at 20°C and Molar Ca/Mg Report

Date : 12/09/94

No.	Collecting Site	Total Hardness	Corrected Conductivity	Molar Ca/Mg
1	CAV. SANTANA	102.19	171.11	3.36
2	CAV. SANTANA	108.43	171.34	3.62
3	CAV. SANTANA	107.60	170.93	3.51
4	CAV. PEROLAS	124.31	193.60	5.43
5	CAV. PEROLAS	51.45	126.77	2.13
6	CORR. FURNAS	112.10	>>>>>>	2.63
7	CAV. PEROLAS	101.33	165.36	3.04
8	COR. PEROLAS	26.92	61.19	1.04
9	CAV. SANTANA	107.84	165.06	9.92
10	SIS. TEM. DESM.	27.79	42.05	1.70
11	SIS. TEM. DESM.	146.83	204.09	2.27
12	SIS. TEM. DESM.	12.83	51.56	0.95
13	SIS. TEM. DESM.	13.16	48.34	0.78
14	SIST. PESCARIA	129.31	175.91	3.91
15	SIST. PESCARIA	55.64	109.56	2.86
16	SIST. PESCARIA	63.27	106.89	2.66
17	CAV. CHAPEU	45.22	76.27	1.97
18	CAV. ARANHAS	10.35	28.99	0.93
19	CAV. SANTANA	99.26	167.74	3.09
20	CAV. SANTANA	212.13	333.88	7.59
21	CAV. SANTANA	205.04	329.46	7.17
22	CAV. PEROLAS	66.45	128.90	3.04
23	CAV. PEROLAS	54.34	95.98	1.81
24	CORREGO FURNAS	109.23	174.87	3.08
25	CAV. SANTANA	97.17	168.79	2.94
26	CAV. SANTANA	97.17	168.79	2.94
27	CAV. SANTANA	191.75	321.36	7.79
28	CAV. PEROLAS	66.40	124.76	2.29
29	CAV. PEROLAS	55.17	112.08	1.91
30	CAV. PEROLAS	96.14	187.78	2.54
31	COR. PEROLAS	49.93	103.88	1.64
32	CAV. SANTANA	95.50	100.00	2.74
33	CAV. SANTANA	96.75	192.91	2.79
34	CAV. SANTANA	213.36	317.66	7.23
35	CAV. PEROLAS	54.75	127.34	1.77
36	CAV. PEROLAS	51.82	103.24	1.52
37	CAV. PEROLAS	108.79	180.66	2.78
38	COR. PEROLAS	51.41	104.84	1.55
39	CAV. SANTANA	109.26	193.00	3.50
40	CAV. SANTANA	94.32	171.96	3.88
41	CAV. SANTANA	229.68	429.96	10.63
42	CAV. PEROLAS	63.95	94.63	2.88
43	CAV. PEROLAS	46.46	100.80	1.82
44	CAV. PEROLAS	105.11	171.96	3.64
45	COR. PEROLAS	46.90	110.56	2.26
46	CAV. SANTANA	87.26	142.00	4.05
47	CAV. SANTANA	90.56	151.51	3.40
48	CAV. SANTANA	200.95	357.94	9.85
49	CAV. PEROLAS	54.36	128.76	2.22
50	CAV. PEROLAS	56.89	92.57	2.95
51	CAV. PEROLAS	116.34	185.90	3.87
52	COR. PEROLAS	47.71	101.35	1.90
53	TORNEIRA/VANDIR	137.25	>>>>>>	1.63
54	CAV. SANTANA	93.06	165.75	3.52
55	CAV. SANTANA	86.41	163.68	3.56
56	CAV. SANTANA	197.37	337.82	9.42
57	CAV. PEROLAS	47.31	94.36	2.19
58	CAV. PEROLAS	107.15	176.11	3.13

No.	Collecting Site	Total Hardness	Corrected Conductivity	Molar Ca/Mg
59	CAV. PEROLAS	105.86	115.32	5.77
60	CAV. PEROLAS	51.45	94.36	2.13
61	CAV. SANTANA	97.39	170.25	3.83
62	CAV. SANTANA	97.64	168.91	3.84
63	CAV. SANTANA	198.87	341.78	9.50
64	CAV. SANTANA	200.84	322.49	8.38
65	CAV. SANTANA	121.43	225.22	6.38
66	CORR. FURNAS	98.00	160.00	2.84
67	CAV. PEROLAS	111.02	101.35	5.92
68	CAV. PEROLAS	68.12	97.72	3.36
69	CAV. PEROLAS	103.68	176.17	3.42
70	COR. PEROLAS	61.45	102.37	2.73
71	CAV. SANTANA	80.38	153.56	4.58
72	CAV. SANTANA	80.63	168.91	4.60
73	CAV. SANTANA	122.60	230.33	6.84
74	CORREGO FURNAS	94.70	165.00	3.26
75	CAV. PEROLAS	99.39	167.74	6.55
76	CAV. PEROLAS	49.09	107.49	2.98
77	CAV. PEROLAS	141.01	236.32	5.12
78	COR. PEROLAS	44.59	82.92	2.61
79	CAV. SANTANA	100.55	174.24	3.89
80	CAV. SANTANA	100.55	175.27	3.89
81	CAV. SANTANA	244.67	355.41	11.38
82	CAV. SANTANA	221.74	344.60	9.16
83	CAV. SANTANA	123.93	213.97	6.53
84	CORREGO FURNAS	103.80	214.98	2.76
85	RIO BETARI	76.03	133.79	3.74
86	CAV. PEROLAS	113.52	191.40	6.07
87	CAV. PEROLAS	80.15	138.17	2.97
88	CAV. PEROLAS	119.66	199.79	3.85
89	COR. PEROLAS	78.91	139.30	3.17
90	BAIRRO DA SERRA	139.40	426.07	1.97
91	CORREGO FURNAS	119.64	200.64	3.40
92	CAV. DO GRILO	126.34	197.10	3.09
93	CAV. PEROLAS	123.93	189.81	6.53
94	CAV. PEROLAS	91.38	149.04	3.27
95	CAV. PEROLAS	104.98	170.66	4.31
96	COR. PEROLAS	24.14	33.34	1.79
97	COR. PEROLAS	12.29	16.98	2.73
98	BAIRRO DA SERRA	131.96	230.46	2.14
99	BAIRRO DA SERRA	97.73	156.45	3.95
100	CAV. SANTANA	128.50	206.92	6.43
101	CAV. SANTANA	110.12	166.63	4.15
102	CAV. SANTANA	217.93	337.82	10.03
103	CAV. SANTANA	109.62	174.44	4.12
104	MINA DE FURNAS	130.78	207.68	2.65
105	MINA DE FURNAS	145.22	243.96	2.04
106	CAV. PEROLAS	113.93	200.56	5.92
107	CAV. PEROLAS	83.88	155.70	2.92
108	CAV. SANTANA	98.05	176.53	3.76
109	CAV. SANTANA	98.05	176.53	3.76
110	CAV. SANTANA	200.51	357.09	8.74
111	CAV. SANTANA	115.11	177.33	4.08
112	CAV. SANTANA	117.19	174.44	4.27
113	CAV. SANTANA	230.50	327.06	10.20
114	CAV. SANTANA	225.94	350.00	11.20
115	CAV. SANTANA	120.55	175.27	4.86
116	CORREGO FURNAS	131.28	195.00	3.56

No.	Collecting Site	Total Hardness	Corrected Conductivity	Molar Ca/Mg
117	CAV. DO GRILLO	133.72	208.63	2.96
118	BAIRRO DA SERRA	125.10	183.28	4.53
119	CAV. PEROLAS	141.80	221.26	6.33
120	CAV. PEROLAS	99.67	165.75	3.04
121	CAV. PEROLAS	120.49	211.40	3.72
122	COR. PEROLAS	93.44	157.93	2.98
123	COR. PEROLAS	58.07	98.77	1.82
124	SIST. PESCARIA	63.95	111.81	2.88
125	SIST. PESCARIA	72.27	133.08	3.18
126	SIST. PESCARIA	135.84	199.62	3.40
127	SIST. PESCARIA	176.62	235.00	1.55
128	SIST. PESCARIA	74.77	124.89	3.33
129	SIS. TEM. DESM.	13.64	35.41	0.58
130	SIS. TEM. DESM.	20.76	65.30	2.60
131	SIS. TEM. DESM.	140.99	247.06	1.64
132	SIS. TEM. DESM.	24.90	46.07	2.36
133	SIS. TEM. DESM.	34.84	76.35	1.82
134	SIST. PESCARIA	65.21	100.00	3.28
135	SIST. PESCARIA	70.18	130.01	2.97
136	SIST. PESCARIA	152.06	206.79	3.74
137	SIST. PESCARIA	68.95	130.01	3.19
138	SIST. PESCARIA	171.13	255.93	1.25
139	SIST. PESCARIA	71.86	132.77	3.26
140	SIS. TEM. DESM.	6.20	40.00	0.68
141	SIS. TEM. DESM.	6.62	41.94	0.61
142	SIS. TEM. DESM.	21.17	41.97	2.43
143	SIS. TEM. DESM.	168.89	268.54	2.13
144	SIS. TEM. DESM.	31.58	40.95	3.80
145	SIS. TEM. DESM.	28.23	71.66	2.43
146	CAV. PEROLAS	109.73	191.65	4.55
147	CAV. SANTANA	105.55	199.62	4.13
148	CAV. SANTANA	104.73	203.78	4.30
149	CAV. SANTANA	210.54	348.06	10.63
150	CAV. SANTANA	214.74	346.42	13.49
151	CORREGO FURNAS	107.61	191.07	3.75
152	CAV. DO GRILLO	116.26	225.41	2.72
153	SIST. PESCARIA	15.79	40.19	3.80
154	SIST. PESCARIA	87.88	147.39	5.10
155	SIST. PESCARIA	129.60	212.48	3.37
156	SIST. PESCARIA	180.20	304.15	4.34
157	SIST. PESCARIA	106.73	250.58	2.99
158	SIST. PESCARIA	93.92	160.37	4.31
159	SIST. PESCARIA	144.60	264.91	3.88
160	SIST. PESCARIA	91.85	170.40	4.44
161	SIS. TEM. DESM.	22.43	70.82	3.54
162	SIST. PESCARIA	55.36	155.72	4.60
163	CAV. CHAPEU	54.00	126.42	3.23
164	CAV. SANTANA	111.83	225.75	5.18
165	CAV. SANTANA	111.42	236.01	5.30
166	CAV. SANTANA	202.64	393.65	11.31
167	BAIRRO DA SERRA	141.63	286.97	3.15
168	CAV. SANTANA	249.61	>>>>>>	9.11
169	CAV. L. BRANCA	237.12	>>>>>>	8.60
170	CAV. L. BRANCA	323.43	>>>>>>	1.62
171	CAV. L. BRANCA	349.82	>>>>>>	1.39
172	CAV. L. BRANCA	239.87	>>>>>>	0.64

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS (Depósitos de cobertura não representados)

JURÁSSICO - CRETÁCEO

JKB Diques básicos

PROTEROZÓICO SUPERIOR A EOPALEOZÓICO

PSEo/v Granitóides pós-tectônicos i-Itaóca v-Vargem Grande

PROTEROZÓICO SUPERIOR

PSaG Gabro de Apiaí

PROTEROZÓICO MÉDIO A SUPERIOR

PMSa Xistos (X) e Mármore (M) Apiaí

FORMAÇÕES LITOLOGIA

PMSgS	Gorutuba - Metarritmitos pelito-carbonáticos
PMSpM	Passa Vinte - Metacalcários dolomíticos e calcíticos
PMSvA	Serra da Boa Vista - Metarenitos
PMSfM	Mina de Furnas - Metacalcários calcíticos bandados
PMSjF	Água Suja - Filitos e metassiltitos
PMSsM	Bairro da Serra - Metacalcários calcíticos
PMSbS	Betari - Metassiltitos e filitos
PMSi	Iporanga - Metassiltitos, metargilitos e metarenitos
PMSp	Perau - Filitos, xistos verdes, metassiltitos
PMSst	Setuva - Xistos, filitos e quartzitos

CONVENÇÕES

	Anticlinal	A - B seção da fig. 2.3
	Sinclinal	
	Anticlinal com mergulho do plano axial	
	Anticlinal com flanco invertido	
	Atitude de acamamento	
	Zona de cisalhamento definida e provável	
	Falha com movimento inverso predominante	
	Contato litológico definido e aproximado	
	Contato transicional	
	Intercalações a: metarenito cg: metaconglomerado m: mármore mb: metabásica	
	* Localidades	

Adaptado de Campanha, 1991

Figura 2.2 -
Contexto geológico local das áreas carbonáticas estudadas.

48° 46' W

48° 43' W

48° 42' W

ANEXO 3.1

MAPA ESTRUTURAL DA ÁREA CARBONÁTICA FURNAS-SANTANA

LEGENDA

- Lineamentos fotointerpretados
- Contato litológico
- Falha inversa (A-capa B-lapa)
- Direção e mergulho do acamamento
- A Metarenito
- M Metapelito
- C Metacalcário
- D Dique de diabásio
- G Granito

Tese de Doutorado, Karmann, 1994

48° 42' W

48° 40' W

ANEXO 3.2

MAPA ESTRUTURAL DA ÁREA CARBONÁTICA LAJEADO-BOMBAS

LEGENDA

- Lineamentos fotointerpretados
- Direção e mergulho do acamamento
- Eixo anticlinal
- Eixo sinclinal
- Contato litológico
- Falha inversa
- M Metapelitos
- C Metacalcário
- D Dique de diabásio

0 1500 metros
500

Tese de Doutorado, Karmann, 1994

24° 32' S

24° 35' S

24° 38' S

Desenho: R. Vascon e
I. Karmann

ANEXO 3.3
MAPA MORFOLÓGICO DA ÁREA CARBONÁTICA FURNAS-SANTANA

24° 30' S

48° 48' W

48° 46' W

48° 44' W

48° 42' W

48° 40' W

LEGENDA

- Divisor topográfico
- Escarpa rochosa
- Drenagem ativa e desativa (talvegue seco)
- Ressurgência
- Sumidouro associado à rede fluvial
- Sumidouro associado à depressão poligonal
- Contato litológico

- C Metacalcários
- M Metapelitos
- A Metarenitos
- G Granito

0 1000
500 1500 metros

Baseado nas fotografias aéreas 1:25000
No. 47600-47602, 47574-47572, 50271, 47584 Terrafoto, 1972
Fotointerpretação por I. Karmann, 1992

24° 32' S

24° 34' S

24° 36' S

Dique de diabásio

Rio Belari

Desenho: R. Vascon e
I. Karmann

48°43' W

48°40' W

48°37' W

ANEXO 3:4
MAPA MORFOLÓGICO DA ÁREA CARBONÁTICA
LAJEADO BOMBAS

LEGENDA

- Divisor topográfico
- Escarpa rochosa
- Vértice de cone carstico
- Drenagem ativa
- Drenagem desativada
- Ressurgência
- Sumidoro associado à rede fluvial
- Sumidouro autogênico
- Lago
- Contato litológico
- Mc Metacalcários
- Mp Metapelitos
- D Dique de diabásio
- Al Depósitos alúvio - coluviais

0 1000
500 metros

Baseado nas fotografias aéreas 1:25000
No. 47549, 47571-569, 47602-606,
47630-629, Terrafoto, 1972
Fotointerpretação por I. Karmann, 1992

24°32' S

GN

MN

Ø 16°40
1992

24°35' S

24°38' S

T2491

ANEXO 3.5

Zoneamento morfológico das áreas carbonáticas
Furnas Santana e Lageado Bombas

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- BIBLIOTECA -

T2491

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- BIBLIOTECA -

6

ANEXO 3.6

PERFIL LONGITUDINAL COMPOSTO DOS RIOS BETARI E FURNAS

SEÇÕES TRANSVERSAIS

Desenho: R. Vascon

ANEXO 4.2

Distribuição de sistemas de cavernas nas áreas carbonáticas Furnas Santana e Lajeado Bombas

Tese de Doutorado, IVO KARMANN, 1994

ÁREA FURNAS SANTANA

Desenvolvimento

1 - Pérolas	1700 m
2 - Tobias	1005
3 - Laje Branca	820
4 - Abismo Juvenil e 31 de Março	—
5 - Santana	6000
6 - Morro Preto e Cauto	832 e 470

CAVERNAS IMPLANTADAS

ÁREA LAJEADO BOMBAS

Desenvolvimento

7 - Abismo do Paredão	30 m	12 - Córrego Fundo	1360 m	18 - Ressurgência das Águas Quentes	300 m
8 - Água Suja	2985	13 - Passoca	546	19 - Alambari de Baixo	890
9 - Grilo	530	14 - Laje dos Macaquinhos	100	20 - Alambari de Cima	1600
10 - Abismo Furnas	570	15 - Córrego Seco	100	21 - Gurutuba	100
11 - Córrego Grande (zezo)	150	16 - Areias de Cima	2900	22 - Ouro Grosso	1200
		17 - Areias de Baixo	1600	23 - Jeremias	1270

ANEXO 5.1
VARIAÇÃO DO NÍVEL DO RIO RONCADOR "CAVERNA SANTANA"
(Junho de 1990 a Fevereiro de 1992)

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- BIBLIOTECA -
T2491

ALTURA DO RIO EM CENTÍMETROS