UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

ASPECTOS MINERALÓGICOS E PETROLÓGICOS DE
NEFELINA SIENITOS DO MACIÇO ALCALINO DE
POÇOS DE CALDAS, MG-SP

Mabel Norma Costas Ulbrich

Orientador: Prof. Dr. Celso de Barros Gomes

TESE DE DOUTORAMENTO

Área de Concentração: Mineralogia e Petrologia

São Paulo
1983

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS - Acervo - IGC

30900005881

ASPECTOS MINERALÓGICOS E PETROLÓGICOS DE
NEFELINA SIENITOS DO MACIÇO ALCALINO DE
POÇOS DE CALDAS, MG-SP

Mabel Norma Costas Ulbrich

Orientador: Prof. Dr. Celso de Barros Gomes

TESE DE DOUTORAMENTO

COMISSÃO EXAMINADORA

	nome
Presidente:	Dr. Celso de B. Gomes
Examinadores:	Dr. Joel G. Valença
	Dr. Helmut Born
	Dr. Reinhardt A. Fuck
	Dr. José M.V. Coutinho

ass.

São Paulo
1983

Í N D I C E

RESUMO

Pg.
xvii

ABSTRACT

xix

INTRODUÇÃO

1

CAPÍTULO 1 - O MACIÇO ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS

4

1.1. GEOLOGIA GERAL DO MACIÇO E DAS ÁREAS VIZINHAS

4

1.2. TRABALHOS ANTERIORES

8

1.3. PLANO DO PRESENTE TRABALHO

9

CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOLÓGICA DE
NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

12

2.1. CONCEITOS GERAIS

12

2.1.1. A definição de fácies petrográfico

12

Critérios utilizados para a identificação
dos fácies de nefelina sienitos em Poços
de Caldas

13

2.1.2. A definição de corpo ígneo

15

2.1.3. Nomenclatura de fácies petrográficos e
corpos ígneos em Poços de Caldas

17

2.1.4. Distribuição dos nefelina sienitos estuda
dos no presente trabalho

18

2.2. PETROGRAFIA DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CAL
DAS

21

2.2.1. Anel Norte (A, Fig.3)

21

Corpos lujauríticos ocidental e oriental

21

Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte

30

Chibinitos de Botelhos

32

Chibinitos orientais

34

	Pg
Nefelina sienitos finos do Anel Norte	35
Pseudoleucita nefelina sienitos	37
2.2.2. Região do interior do maciço (B, Fig.3)	39
Nefelina sienitos híbridos	39
2.2.3. Região do Morro do Serrote (C, Fig.3)	45
Nefelina sienitos com eudialita do Serrote	45
Nefelina sienitos cinzas do Serrote	46
Nefelina sienitos com biotita do Serrote	47
Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote	49
2.2.4. Região ocidental do Anel Norte (D, Fig.3)	51
Nefelina sienitos ocidentais com fluorita	51
Nefelina sienitos ocidentais com eudialita	52
Nefelina sienitos finos ocidentais	55
 CAPÍTULO 3 - FELDSPATOS ALCALINOS: QUIMISMO, ESTADO ESTRU TURAL E PETROLOGIA	 62
3.1. QUÍMICA E ESTRUTURA	62
3.2. QUIMISMO DE FELDSPATOS ALCALINOS DOS DIFERENTES FÁ CIES DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS	65
3.3. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	83
3.3.1. Geminção	83
3.3.2. Ângulos 2V	90
3.3.3. Micropertitas	91
3.4. ESTUDOS DE RAIOS X	93
3.4.1. Metodologia específica	93
Estimativa quantitativa da triclinicidade	93
Diagrama das 3 reflexões	94
Diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$	95
Anomalias nos parâmetros de cela	95
3.4.2. Difrátogramas de feldspatos potássicos dos nefelina sienitos	97

	iii
	Pg
Difratogramas de micropertitas	97
Estado estrutural da albita peritítica	101
Difratogramas de feldspato potássico	101
Estado estrutural do feldspato potássico	111
a) Diagrama das 3 reflexões	111
b) Diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$	114
Ordenamento estrutural dos feldspatos potássicos	118
3.5. ANÁLISE COMPARATIVA: CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS E DE RAIOS X	120
3.6. CONSIDERAÇÕES PETROLÓGICAS	124
3.6.1. Feldspatos alcalinos de nefelina sienitos de Poços de Caldas	128
3.6.2. Origem das micropertitas e da albita tabular	132
CAPÍTULO 4 - NEFELINAS: QUIMISMO E PETROLOGIA	134
4.1. QUÍMICA E ESTRUTURA	134
4.1.1. Relações entre a cristaloquímica das nefelinas e o excesso de sílica	135
4.2. QUIMISMO DE NEFELINAS DOS DIFERENTES FÁCIES DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS	137
4.3. RELAÇÕES Si-Al-Fe E ZONEAMENTO	160
4.4. CONSIDERAÇÕES PETROLÓGICAS	167
4.4.1. Nefelinas como geotermômetros	168
4.4.2. Temperaturas de cristalização de diversos magmas alcalinos	171
4.4.3. Quimismo resumido de nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas	171
4.4.4. Geotermometria das nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas	174
Geotermometria de fácies de borda ou de contato	175

Geotermometria de corpos com predomínio de rochas de granulação fina-média	181
Geotermometria dos fácies de granulação grossa	183
4.4.5. Fe^{3+} nas nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas	189
CAPÍTULO 5 - PIROXÊNIO: QUIMISMO E PETROLOGIA	192
5.1. ESTRUTURA E QUÍMICA	192
5.1.1. Moléculas de piroxênios	196
5.1.2. Possíveis componentes em piroxênios de séries sódicas	198
5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS PIROXÊNIO	201
5.3. DETERMINAÇÃO DE Fe^{3+} A PARTIR DE DADOS DE MICRO-SONDA	202
5.4. AS MOLÉCULAS DOS PIROXÊNIO DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS	209
5.4.1. Soda-augitas	209
5.4.2. Egirina-augitas e egirinas	212
5.4.3. Egirina-augitas e egirinas titaníferas, titânio egirina-augitas e titânio egirinas	216
5.4.4. Esquema de cálculo das moléculas de piroxênios adotado neste trabalho	218
5.5. QUIMISMO DE PIROXÊNIO DOS DIFERENTES FÁCIES DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS	222
5.6. RELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA E A COR DOS PIROXÊNIO SÓDICOS	262
5.7. CONSIDERAÇÕES PETROLÓGICAS	265
5.7.1. Quimismo dos piroxênios como indicador de tendências evolutivas dos nefelina sienitos	265
Tendências de evolução de piroxênios de séries sódicas	266

Tendências evolutivas gerais dos piroxênios de Poços de Caldas	268
Variações nos teores de Si, Al, Ti, Zr e Mn nos piroxênios de Poços de Caldas	268
X 5.7.2. Individualidade química dos magmas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas	273
X 5.7.3. Atividade da sílica (a_{SiO_2}) e atividade da alumina ($a_{\text{Al}_2\text{O}_3}$) nos magmas dos nefelina sienitos	274
5.7.4. Estimativas de fugacidade do oxigênio (f_{O_2}) dos magmas por meio de parâmetros químicos e mineralógicos	274
Atividade do Fe^{3+} nos magmas e relação com a f_{O_2}	275
Cristalização de egirina, o teor de Ti dos piroxênios, e a f_{O_2}	277
Estimativa da f_{O_2} a partir do geotermômetro e barômetro de oxigênio ilmenita-magnetita	278
Enigmatita e f_{O_2}	278
Arfvedsonita e f_{O_2}	278
Biotitas e f_{O_2}	279
5.7.5. F_{O_2} nos magmas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas	279
5.7.6. F_{O_2} como possível controlador de zoneamento de piroxênios: nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte	281
CAPÍTULO 6 - BIOTITAS E ANFIBÓLIOS: QUIMISMO E PETROLOGIA	285
6.1. BIOTITAS	285
6.1.1. Estrutura e química	286
6.1.2. Nomenclatura de biotitas	290

1 X 6.1.3. Quimismo de biotitas de nefelina sienitos de Poços de Caldas	291
6.1.4. Conteúdo de annita das biotitas de nefelina sienitos de Poços de Caldas	302
Relação entre o teor de annita, a cor e o pleocroísmo das biotitas	302
6.1.5. Considerações petrológicas	304
Seqüência de cristalização de biotitas de nefelina sienitos de Poços de Caldas	304
Variações nos conteúdos de Si, Al, Ti, Mn e F com respeito ao teor de annita das biotitas	305
Comparação do quimismo das micas das rochas de Poços de Caldas com o de biotitas de outros maciços alcalinos	307
Relação Fe:Mg nas biotitas e f_{O_2}	308
6.2. ANFIBÓLIOS	310
6.2.1. Estrutura	311
6.2.2. Química e nomenclatura	313
Cálculo da fórmula estrutural dos anfibólios	314
6.2.3. Quimismo de anfibólios de nefelina sienitos de Poços de Caldas	315
6.2.4. Considerações petrológicas	318
Comparação do quimismo das magnésio-arfvedsonitas das rochas de Poços de Caldas com o de arfvedsonitas de outros maciços alcalinos	321
Temperaturas de cristalização	321
CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	325

Feldspatos potássicos	325
Nefelinas	326
Piroxênios	327
Biotitas e anfibólios	328
Nefelina sienitos miasquíticos e agpaíticos	329
Ordem de cristalização dos minerais: agpaíticos versus miasquíticos	331
Idades relativas dos corpos de nefelina sienitos	332
Tipos evolutivos de magmas	333
Profundidade de cristalização dos nefelina sienitos	334
Temperaturas magmáticas de cristalização	335
f_{O_2} e a cristalização dos minerais máficos	336
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	338
AGRADECIMENTOS	361
APÊNDICE	363
Microsonda eletrônica	363
Difratometria de raios X	367

ÍNDICE DAS FIGURAS

Figura 1 - Mapa simplificado do maciço alcalino de Poços de Caldas.	6
Figura 2 - Localização geral dos corpos de nefelina sienitos estudados.	19
Figura 3 - Geologia dos corpos de nefelina sienitos.	20
Figura 4 - Geologia do corpo lujaurítico ocidental.	22
Figura 5 - Arcabouço tetraédrico dos feldspatos.	64
Figura 6 - Composição de feldspatos potássicos expressa em termos das moléculas de Or, Ab e An.	72
Figura 7 - Relação entre Sr e Ca nos feldspatos potássicos de nefelina sienitos híbridos.	79
Figura 8 - Relação entre o valor de $2V_{\alpha}$ e o teor de Or em feldspatos potássicos.	92
Figura 9 - Difractogramas de feldspatos potássicos pertínicos (ortoclásio e microclínio), no intervalo de $2\theta_{Cu} = 20^{\circ}$ a 31° .	99
Figura 10 - Detalhes dos difratogramas das Figuras 9a e 9b nos intervalos de $2\theta_{Cu} = 23^{\circ}$ a 25° e $2\theta_{Cu} = 29^{\circ}$ a 32° .	100
Figura 11 - Tipos de difratogramas de feldspatos potássicos no intervalo de $2\theta_{Cu} = 20^{\circ}$ a 36° .	104
Figura 12 - Tipos de difratogramas de feldspatos potássicos no intervalo de $2\theta_{Cu} = 20^{\circ}$ a 36° .	105
Figura 13 - Difractogramas de feldspatos potássicos no intervalo de $2\theta_{Cu} = 34^{\circ}$ a 36° .	106
Figura 14 - Valores de $2\theta_{Cu}$ das reflexões 060 e $\bar{2}04$ de feldspatos potássicos projetados no diagrama das três reflexões.	112
Figura 15 - Dados das constantes de cela de feldspatos potássicos projetados no diagrama $b-c$.	116
Figura 16 - Dados das constantes de cela de feldspatos potássicos projetados no diagrama $\alpha^* - \gamma^*$.	117
Figura 17 - Composição de nefelina de rochas dos corpos de nefelina sienitos expressa em termos das moléculas de Ne, Ks e Qz.	140

Figura 18 - Composição de nefelinas de nefelina sienitos traquitóides I e II expressa em termos de Ne, Ks e Qz, em porcentagem molecular.	145
Figura 19 - Composição de nefelinas de nefelina sienitos híbridos expressa em termos de Ne, Ks e Qz, em porcentagem molecular.	156
Figura 20 - Composição de nefelinas de nefelina sienitos ocidentais com eudialita expressa em termos de Ne, Ks e Qz, em porcentagem molecular.	161
Figura 21 - Diagramas $\text{Fe}^{3+} : \text{Al}$, $\text{Fe}^{3+} : \text{Si}$ e $\text{Al} : \text{Si} + \text{Fe}^{3+}$ de nefelinas de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte.	163
Figura 22 - Diagramas $\text{Fe}^{3+} : \text{Al}$, $\text{Fe}^{3+} : \text{Si}$ e $\text{Al} : \text{Si} + \text{Fe}^{3+}$ de nefelinas de nefelina sienitos ocidentais com eudialita.	164
Figura 23 - Diagramas $\text{Al} : \text{Si}$, $\text{Fe}^{3+} : \text{Si}$ e $\text{Fe}^{3+} : \text{Al}$ de nefelinas de nefelina sienitos híbridos.	165
Figura 24 - Geotermometria de nefelina sienitos híbridos.	177
Figura 25 - Composições de nefelinas e feldspatos potássicos coexistentes de nefelina sienitos híbridos projetados no diagrama Ne-Ks-Qz.	179
Figura 26 - Geotermometria de lujauritos II e de nefelina sienitos traquitóides I e II.	180
Figura 27 - Geotermometria de nefelina sienitos finos do Anel Norte e de nefelina sienitos finos ocidentais.	182
Figura 28 - Geotermometria de nefelina sienitos da região do Serrote.	184
Figura 29 - Geotermometria de chibinitos.	185
Figura 30 - Geotermometria de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte, nefelina sienitos ocidentais com fluorita e pseudoleucita nefelina sienitos.	186
Figura 31 - Estrutura cristalina de piroxênios do grupo <u>es</u> pacial C2/c.	193
Figura 32 - Erro na determinação de Fe_2O_3 em piroxênios, utilizando métodos de cálculo baseados na estequiometria do mineral.	206

Figura 33 - Erro na determinação de Fe_2O_3 em piroxênios, utilizando o método de cálculo "molecular" e comparação entre os métodos estequiométricos.	207
Figura 34 - Relação Na-Fe^{3+} com respeito a Si+Al (total) em soda-augitas.	210
Figura 35 - Relação entre os teores de Al^{IV} e Ti em soda-augitas.	211
Figura 36 - Relação Na-Fe^{3+} com respeito a Si+Al (total) em egirina-augitas e egirinas.	213
Figura 37 - Relação entre os teores de Al^{IV} e Ti em egirina-augitas e egirinas.	215
Figura 38 - Relação Na-Fe^{3+} com respeito a Si+Al (total) em egirina-augitas e egirinas ricas em Ti.	217
Figura 39 - Relação $\text{Na-Fe}^{3+}_{\text{c}}$ (Fe^{3+} corrigido) com respeito a Ti, em egirina-augitas e egirinas ricas em Ti e sem Al^{VI} .	219
Figura 40 - Relação $\text{Na}_{\text{c}}\text{-Fe}^{3+}$ (Na corrigido) com respeito a Ti, em egirina-augitas e egirinas ricas em Ti e com Al^{VI} .	220
Figura 41 - Diagrama $\text{Mg-(Fe}^{2+}+\text{Mn)-Na}$ de piroxênios dos vários fácies dos corpos lujauríticos.	227
Figura 42 - Diagrama $\text{Mg-(Fe}^{2+}+\text{Mn)-Na}$ de piroxênios de chibinitos de Botelhos e orientais.	235
Figura 43 - Diagramas $\text{Mg-(Fe}^{2+}+\text{Mn)-Na}$ e Di-Hd-Ac de piroxênios de chibinitos dos corpos lujauríticos, de Botelhos e orientais.	237
Figura 44 - Diagramas $\text{Mg-(Fe}^{2+}+\text{Mn)-Na}$ de piroxênios de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte, nefelina sienitos com eudialita do Serrote e nefelina sienitos ocidentais com eudialita.	239
Figura 45 - Diagramas $\text{Mg-(Fe}^{2+}+\text{Mn)-Na}$ de piroxênios de pseudoleucita nefelina sienitos, nefelina sienitos com biotita do Serrote e nefelina sienitos cinzas do Serrote.	245
Figura 46 - Diagramas $\text{Mg-(Fe}^{2+}+\text{Mn)-Na}$ de piroxênios de nefelina sienitos híbridos.	250

Figura 47 - Variação dos elementos químicos nos piroxênios de nefelina sienitos híbridos, em função do índice de diferenciação Na-Mg.	251
Figura 48 - Mudanças no quimismo de um monocristal de piroxênio de nefelina sienito híbrido.	254
Figura 49 - Variação dos elementos químicos no monocristal de piroxênio de nefelina sienito híbrido, em função do índice de diferenciação Na-Mg.	255
Figura 50 - Diagrama $Mg-(Fe^{2+}+Mn)-Na$ de piroxênios de nefelina sienitos finos do Anel Norte, nefelina sienitos porfiríticos do Serrote e nefelina sienitos finos ocidentais.	259
Figura 51 - Variação dos elementos químicos nos piroxênios de nefelina sienitos finos do Anel Norte, em função do índice de diferenciação Na-Mg.	260
Figura 52 - Mudanças na cor de piroxênios sódicos, em função dos teores de Na e Ti.	264
Figura 53 - Tendências de evolução de piroxênios de rochas alcalinas.	267
Figura 54 - Diagrama $-\log f_{O_2}:T$ para várias associações sintéticas utilizadas como " <i>buffers</i> " de oxigênio, a $P(\text{total}) = 2.000 \text{ b.}$	276
Figura 55 - Estrutura "ideal" das micas trioctaédricas.	287
Figura 56 - Diagrama $Mg-(Fe+Mn)-Al$ de biotitas de nefelina sienitos.	297
Figura 57 - Variação dos elementos químicos nas biotitas de nefelina sienitos, em função de $Fe+Mn/Fe+Mn+Mg$.	303
Figura 58 - Estrutura cristalina de anfibólios do grupo espacial $C2/m$.	312
Figura 59 - Classificação e nomenclatura dos anfibólios alcalinos.	320
Figura 60 - Diagrama $Mg-(Fe + Mn) - (Na + K)$ de arfvedsonitas de rochas de vários maciços alcalinos.	322

ÍNDICE DAS TABELAS

Tabela 1 - Principais características petrográficas dos vários nefelina sienitos de Poços de Caldas.	57
Tabela 2 - Análises modais de nefelina sienitos de Poços de Caldas.	60
Tabela 3 - Composição química de feldspatos de corpos lujauríticos - Lujauritos I e II.	69
Tabela 4 - Composição química de feldspatos potássicos de corpos lujauríticos: Nefelina sienitos traquitóides I e II.	70
Tabela 5 - Composição química de feldspatos potássicos de corpos lujauríticos: Chibinitos.	71
Tabela 6 - Composição química de feldspatos potássicos de nefelinas sienitos cinzas do Anel Norte.	73
Tabela 7 - Composição química de feldspatos potássicos de chibinitos.	74
Tabela 8 - Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos finos do Anel Norte.	75
Tabela 9 - Composição química de feldspatos potássicos de pseudoleucita nefelina sienitos.	77
Tabela 10 - Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos híbridos.	78
Tabela 11 - Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos do Serrote.	81
Tabela 12 - Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos ocidentais, finos e com fluorita.	82
Tabela 13 - Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos ocidentais com eudialita.	84
Tabela 14 - Composição química de albita tabular.	85
Tabela 15 - 2 θ Cu de reflexões de albita pertítica.	98
Tabela 16 - 2 θ Cu de algumas reflexões de feldspatos potássicos.	107

Tabela 17 - Amostras de feldspato potássico analisados com raios X (índices de triclinicidade Δ_{131} e Δ_{130} , tipos de difratogramas e outras informações adicionais).	110
Tabela 18 - Dados correspondentes ao diagrama das 3 reflexões (Figura 14).	113
Tabela 19 - Parâmetros da cela unitária de feldspatos potássicos.	115
Tabela 20 - Quadro comparativo das características ópticas, químicas e de raios X de feldspatos potássicos dos nefelina sienitos de Poços de Caldas.	121
Tabela 21 - Composição química de nefelinas de corpos lujauríticos: Lujauritos I e II.	139
Tabela 22 - Fórmula geral das nefelina dos lujauritos I e II dos corpos lujauríticos ocidental e oriental.	141
Tabela 23 - Composição de nefelinas de lujauritos I e II, em termos das moléculas de nefelina, nefelina de ferro, kalsilita e quartzo (% em peso).	142
Tabela 24 - Composição química de nefelinas de corpos lujauríticos: Chibinitos e nefelina sienitos traquitóides I e II.	143
Tabela 25 - Fórmula geral das nefelinas dos nefelina sienitos traquitóides I e II.	144
Tabela 26 - Composição química de nefelinas de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte.	147
Tabela 27 - Composição química de nefelinas de chibinitos.	148
Tabela 28 - Composição química de nefelinas de nefelina sienitos finos do Anel Norte.	149
Tabela 29 - Fórmula geral das nefelinas dos nefelina sienitos finos do Anel Norte.	150
Tabela 30 - Composição química de nefelinas de pseudoleucita nefelina sienitos e nefelina sienitos finos ocidentais.	152
Tabela 31 - Composição química de nefelinas de nefelina sienitos híbridos.	153

Tabela 32 - Fórmula geral das nefelinas dos nefelina sienitos híbridos.	154
Tabela 33 - Composição química de nefelinas de nefelina sienitos com eudialita do Serrote.	157
Tabela 34 - Composição química de nefelinas de vários corpos de nefelina sienitos.	158
Tabela 35 - Composição química de nefelinas de nefelina sienitos ocidentais com eudialita.	159
Tabela 36 - Estimativas de temperaturas de nefelina sienitos de Poços de Caldas.	176
Tabela 37 - Moléculas de piroxênios.	197
Tabela 38 - Critérios de classificação dos piroxênios de Poços de Caldas.	203
Tabela 39 - Características gerais dos piroxênios de nefelina sienitos.	224
Tabela 40 - Composição química de piroxênios de corpos lujauríticos: Lujauritos I e II.	225
Tabela 41 - Composição química de piroxênios dos corpos lujauríticos: Nefelina sienitos traquitóides I e II.	228
Tabela 42 - Composição química de piroxênios dos corpos lujauríticos: Chibinitos.	231
Tabela 43 - Composição química de piroxênios dos chibinitos de Botelhos.	233
Tabela 44 - Composição química de piroxênios dos chibinitos orientais.	234
Tabela 45 - Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte.	238
Tabela 46 - Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos com eudialita do Serrote.	240
Tabela 47 - Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos ocidentais com eudialita.	242
Tabela 48 - Composição química de piroxênios dos pseudoleucita nefelina sienitos.	244

Tabela 49 - Composição química de piroxênios de nefelina sienitos do Serrote.	247
Tabela 50 - Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos híbridos.	248
Tabela 51 - Variações químicas em monocristal de piroxênio de nefelina sienito híbrido.	252
Tabela 52 - Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos finos do Anel Norte.	258
Tabela 53 - Composição química de piroxênios de nefelina sienitos finos ocidentais e nefelina sienitos porfiríticos do Serrote.	261
Tabela 54 - Composição química de biotitas de nefelina sienitos do Serrote.	296
Tabela 55 - Composição química de biotitas de nefelina sienitos híbridos, nefelina sienitos ocidentais com fluorita e nefelina sienitos finos do Anel Norte.	298
Tabela 56 - Composição química de biotitas de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte.	299
Tabela 57 - Composição química de biotitas de pseudoleucitas nefelina sienitos.	301
Tabela 58 - Composição química de anfibólios de lujauros I e II.	316
Tabela 59 - Composição química de anfibólios de nefelina sienitos vários.	317
Tabela 60 - Distribuição dos cátions nas diferentes posições estruturais para uma análise de anfibólio de lujauro I.	319
Tabela 61 - Afinidade miasquítica ou agpaítica de nefelina sienitos de Poços de Caldas.	330
Tabela 62 - Idade relativa inferida para vários corpos de nefelina sienitos.	333

ÍNDICE DAS FOTOMICROGRAFIAS

Fotos 1 e 2	- Texturas de lujaauritos.	24
Fotos 3 e 4	- Texturas de lujaauritos e de nefelina sienitos traquitóides.	26
Fotos 5,6 e 7	- Piroxênios de nefelina sienitos.	40
Fotos 8 e 9	- Relações texturais entre feldspato potássico e nefelina em nefelina sienitos híbridos de granulação média.	42
Fotos 10 e 11	- Relações texturais entre feldspato potássico e nefelina em nefelina sienitos híbridos de granulação grossa e nefelina sienitos porfiríticos do Serrote.	44
Fotos 12 e 13	- Relações texturais entre feldspato potássico e albita tabular.	67
Fotos 14,15 e 16	- Geminação múltipla em feldspatos potássicos.	87
Fotos 17 e 18	- Geminação múltipla em feldspatos potássicos.	89
Fotos 19 e 20	- Zoneamento setorial em piroxênios poiquilíticos de chibinitos.	230
Fotos 21 e 22	- Zoneamento em biotitas.	293
Fotos 23 e 24	- Substituições em piroxênios.	295

RESUMO

Os nefelina sienitos do distrito alcalino de Poços de Caldas, MG-SP afloram principalmente na parte setentrional e central do maciço, onde constituem corpos discretos de colocação rasa. Mudanças na textura e mineralogia das rochas, como também na estrutura dos corpos, permitem a distinção de vários tipos faciológicos.

Os minerais mais abundantes dessas rochas são feldspato potássico e nefelina, acompanhados por quantidades variáveis de piroxênio sódico, e às vezes, por biotita ou anfibólio arfvedsonítico. Os minerais acessórios variam nos diferentes corpos; em alguns acha-se presente uma mineralogia de rochas agpaíticas, com silicatos de metais raros (principalmente eudialita), enquanto que outros são portadores de minerais típicos de rochas miasquíticas, tais como, titanita, biotita opacos e fluorita. A petrografia permite definir o caráter agpaítico ou miasquítico das rochas, cujas evoluções diferentes explicam algumas particularidades químicas dos minerais, especialmente dos máficos.

O estudo detalhado do quimismo dos minerais mais importantes fornece elementos para interpretações petrológicas mais abrangentes. Os feldspatos potássicos são geralmente ricos em Or e de estado estrutural variável nos diferentes fácies petrográficas. Na maioria dos casos coexistem microclínio de alta triclinicidade com estados menos ordenados nos mesmos cristais de feldspato, ou em diferentes cristais da mesma amostra. Esta feição, somada à presença de microclínio máximo como único estado estrutural em alguns fácies, sugere ordenamento estrutural submagmático controlado pela natureza peralcalina dos magmas e/ou soluções tardias. As nefelinas são "meio-potássicas"; nas rochas de granulação fina a média apresentam teores elevados de excesso de sílica, indicando temperaturas de cristalização superiores a 700°C ou mesmo 800°C nas rochas miasquíticas e de apro

ximadamente 600°C nas agpaíticas. As nefelinas de rochas de granulção grossa concentram-se quimicamente no "campo de convergência de Morozewicz-Buerger", correspondente a temperaturas menores de 500°C, sugerindo provável reequilíbrio submagmático. Os piroxênios variam de egirina-augitas a egirinas. Em alguns fácies miasquíticos nota-se a presença de zoneamento contínuo de soda-augitas → egirina-augitas → egirinas. As biotitas exibem variações químicas marcantes, passando de ricas em Mg (biotitas iniciais) a portadoras de teores elevados de annita; na maioria dos casos são manganésíferas. O único anfibólio presente corresponde a uma magnésio arfvedsonita manganésífera rica em F e cuja temperatura mínima de cristalização é estimada em 500-540°C.

No maciço alcalino distinguem-se vários fácies petrográficos, existindo, porém, poucos tipos de magma. Tentativamente, sugerem-se apenas dois, o miasquítico e o agpaítico. Estes magmas invadem rochas supracrustais de cobertura (em parte piroclásticas) e tinguaítos cogenéticos, cristalizando-se a profundidade de poucos quilômetros, e provavelmente em câmaras fechadas. A ausência de enigmatita e faialita entre os minerais máficos das rochas menos agpaíticas indica que em geral os magmas cristalizaram sob condições de f_{O_2} superiores às do "buffer" FMQ.

ABSTRACT

Nepheline syenites in the Poços de Caldas alkaline district crop out mainly in the northern half of the massif as discrete bodies that were emplaced at shallow depths. Several facies types can be identified in the field based on slight textural and mineralogical variations.

The main rock-forming minerals are potash feldspar and nepheline, with variable but usually subordinate amounts of sodic pyroxene and, occasionally, biotite or arfvedsonite as well. Accessory minerals vary according to rock type: agpaitic nepheline syenite are characterized by rare-metal silicates (mainly eudialite), while miaskitic varieties exhibit sphene, fluorite, and ores. Some variations in mineral chemistry, especially in pyroxenes, are best explained as differences inherited from the miaskitic or agpaitic parent magmas.

Trends in magmatic evolution can best be followed by detailed studies of mineral chemistry. Potash feldspars in these rocks are usually Or-rich, with variable structural states in the different petrographic facies. Highly ordered microcline coexists with less ordered feldspars, sometimes in the same grain, whereas in other facies only maximum microcline is found. These features suggest late-magmatic or submagmatic re-equilibration, directly controlled by the peralkaline character of the magma or its residual solutions. Nephelines are of the "mediopotassic" variety; large amounts of excess silica are exhibited by nephelines in fine-grained nepheline syenites, indicating true magmatic crystallization temperatures of about 700°C to more than 800°C in miaskitic types and about 600°C in agpaitic types. Compositions of nephelines from coarser rocks cluster within the "Morozewicz - Buerger convergence field" evidencing temperatures of 500°C or less, thus suggesting subsolidus re-equilibration. Pyroxenes vary from aegirine-augites to aegirines. In some miaskitic facies, continuous zoning from soda augite to aegirine-augite to aegirine is

observed. Biotites range from early Mg-rich varieties to late Fe-rich types with substantial Mn contents. Mn-rich Mg-arfvedsonite is the only amphibole found in some agpaitic rocks, a minimum estimate of crystallization temperature for this mineral is around 500-540°C.

Although several lithological facies have been mapped, only two principal magma types are tentatively recognized herein, the miaskitic and the agpaitic types. Nepheline syenites, which are intrusive into genetically related vulcanoclastic rocks, now mainly eroded, and tinguaite, probably crystallized in closed magma chambers at depths of only a few km. Lack of fayalite and aenigmatite in miaskitic varieties indicates that crystallization proceeded at f_{O_2} values higher than those of the FMQ buffer.

INTRODUÇÃO

Na maioria dos complexos alcalinos, que variam desde máfico-ultramáficos até graníticos, ocorrem proporções diversas de rochas em que o feldspato único ou predominante é o feldspato alcalino, aparecendo adicionalmente feldspatóides e/ou piroxênios e anfibólios sódicos. Do ponto de vista petrográfico, essas rochas constituem um grupo ou associação incluindo vários tipos de sienitos alcalinos e nefelina sienitos, com seus equivalentes vulcânicos (Sørensen, 1974a).

Os *nefelina sienitos típicos* são rochas onde os minerais mais importantes correspondem a feldspato alcalino e nefelina, acompanhados de minerais máficos diversos, presentes geralmente em quantidades subordinadas às dos félsicos. Uma distinção muito útil dos nefelina sienitos é a que destaca a maior ou menor peralcalinidade da rocha, enfatizando o conteúdo de álcalis relativamente ao de alumina. Estabelecem-se assim as divisões de nefelina sienitos "agpaíticos" e "miasquíticos" que, mais que meros denominadores de variações químicas, são indicadores que comumente se revestem de importância petrogenética e evolutiva. Nefelina sienitos agpaíticos são rochas contendo excesso de álcalis em relação à alumina e, paralelamente, teores incomuns de vários elementos em geral raros nas outras rochas (Zr, Th, U, terras raras, etc.); nefelina sienitos miasquíticos, ao contrário, apresentam excesso de alumina sobre álcalis, além de teores "normais" dos elementos acima (para definições e um histórico do conceito de agpaicidade, ver Sørensen, 1974a; discussões adicionais são fornecidas por Edgar, 1974). Essas diferenças químicas têm reflexos naturais na mineralogia das rochas. O excesso de álcalis junto aos teores anômalos dos elementos raros viabilizam, não somente a formação de piroxênios e anfibólios sódicos, como também o aparecimento de minerais acessórios típicos, tais como: eudialita, lamprofilita, rinquita, astrofilita e outros mais. O quimismo desses minerais é muito particular, já que em geral representam silicatos sem alumina e caracterizados pela

combinação de cátions alcalinos com metais pouco abundantes na crosta (Zr, Ti, Nb, Ta, Th, U, terras raras, etc.), e contendo às vezes teores relativamente elevados de Fe/ou Cl. Os nefelina sienitos agpaíticos e os termos vulcânicos equivalentes são, por consequência, rochas pouco comuns.

No mundo inteiro, conhecem-se poucos maciços alcalinos onde os nefelina sienitos agpaíticos estão presentes em proporções predominantes, ou que pelo menos sejam acompanhantes importantes de outros tipos litológicos. Citam-se comumente na literatura os maciços de Khibina (1500 km²) e Lovozero (650 km²) na Península de Kola, Rússia; o de Pilanesberg (aproximadamente 600 km²) na África do Sul, e o de Ilímaussaq (150 km²) na província petrográfica de Gardar, na Groenlândia Leste.

O maciço de Poços de Caldas é, dentre os do gênero, um dos maiores do mundo. Cobre uma superfície superior a 800 km², sendo portanto menor em tamanho apenas ao maciço de Khibina. Apresenta-se na forma de uma intrusão subcircular, com 35 km de diâmetro N-S e aproximadamente 30 km de diâmetro E-W. Petrograficamente, dominam quase por inteiro as rochas alcalinas feldspáticas do campo 11 da classificação modal proposta pelo IUGS (Streckeisen, 1973), ocorrendo seja como nefelina sienitos, seja como seus equivalentes subvulcânicos e vulcânicos. Dos complexos alcalinos aflorantes no Brasil meridional é o único, ou um dos poucos, onde se encontram apreciáveis massas de rochas agpaíticas (Ulbrich e Gomes, 1981).

As rochas faneríticas de Poços de Caldas possuem composição relativamente uniforme; as diferenças mineralógicas mais marcantes devem-se, por um lado, a variações no conteúdo de piroxênio, que pode estar acompanhado por biotita ou anfibólio sódico, e, por outro, à presença ou à ausência de minerais de metais raros. Essas peculiaridades mineralógicas permitem fazer-se inferências a respeito da composição dos líquidos magmáticos dos quais cristalizaram. Por outro lado, a caracterização dos vários nefelina sienitos, em particular no tocante às condi

ções de cristalização das rochas, relações genéticas entre os diversos corpos de nefelina sienitos, etc., requer o estudo detalhado dos seus minerais mais significativos.

Com essa preocupação em mente, o presente trabalho concentra-se no estudo dos minerais essenciais dos nefelina sienitos: feldspato potássico, nefelina e piroxênio, além de outros constituintes importantes como albita, biotita e anfibólio sódico.

CAPÍTULO 1

O MACIÇO ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS

1.1. GEOLOGIA GERAL DO MACIÇO E DAS ÁREAS VIZINHAS

O maciço alcalino de Poços de Caldas ocorre como uma intrusão no Bloco Pinhal (Wernick e Penalva, 1973; Fiori *et al.*, 1978; Wernick e Penalva, 1980; Wernick e Arthur, 1983). Trata-se de área mais ou menos quadrangular, que se estende desde São João da Boa Vista, a oeste, até aproximadamente Poço Fundo e Machado, a leste. Os limites norte e sul do Bloco Pinhal são de natureza tectônica; ao norte, tem-se a falha de Divinolândia e, ao sul, a de Jacutinga, separando-o dos gnaisses do Grupo Amparo. Estratigraficamente, dominam no Bloco Pinhal dois grandes conjuntos faciológicos; por um lado, as rochas granítico-gnâissicas do Grupo Pinhal e, por outro, os granulitos do Complexo Varginha-Guaxupé.

As várias datações geocronológicas existentes fornecem para as rochas do Grupo Pinhal idade Brasiliana, Precambriano Superior (Cordani e Bittencourt, 1967; Artur, 1980; Wernick *et al.*, 1981). O Complexo Varginha-Guaxupé, que se apresenta como um grupo estratigráfico dominante, sobretudo ao norte do Bloco Pinhal, constitui um conjunto de rochas granulíticas e gnâissicas (Ebert, 1971; Oliveira, 1973; Choudhuri *et al.*, 1978; Wernick e Artur, 1983). Essa unidade é considerada de idade Arqueana, rejuvenescida durante o ciclo Transamazônico (Wernick e Artur, 1983).

Na porção SE do maciço alcalino de Poços de Caldas, destaca-se o corpo sienítico de Pedra Branca, cuja forma é aproximadamente circular, com diâmetro ao redor de 15 km (Winters, 1981). O corpo sienítico caracteriza-se pela notável orientação dos feldspatos alcalinos e pela existência de zonalidade

petrográfica, uma vez que dominam na parte externa sienitos saturados a insaturados e, na parte interna, sienitos e quartzo sienitos. estes últimos em contato direto com o maciço alcalino de Poços de Caldas (Winters, 1981).

O maciço de Poços de Caldas destaca-se claramente na paisagem de rochas precambrianas por um marcado desnível topográfico nas suas bordas setentrional, ocidental e meridional. Esse relevo é de geometria subvertical, com o maciço petrograficamente constituído por *tinguaítos*, que na literatura são interpretados como remanescentes de diques anelares de notável expressão (Ellert, 1959). No interior do maciço a topografia é mais plana, com relevo ainda íngreme em algumas áreas; por exemplo, no setor ocidental, numa região de direção aproximada N-S, localizada a leste de Águas da Prata (Fig. 1), formando a borda oriental do denominado Vale do Quartel, como, também na parte SE do maciço, etc.

O maciço é composto predominantemente pelos seguintes tipos litológicos: nefelina sienitos vários (com *lujauritos* e *chibinitos*), *tinguaítos* e *fonólitos*, capeados em parte por material piroclástico cogenético e remanescentes de arenitos (Ellert, 1959). A distribuição dessas rochas acha-se resumida na Fig. 1, que representa uma reprodução simplificada do mapa de Ellert *et al.*, 1959.

Os *nefelina sienitos* cobrem aproximadamente 120 km², e estão distribuídos como corpos em geral de dimensões pequenas ou moderadas, principalmente na parte setentrional do maciço. Os *lujauritos* e *chibinitos* são variedades de nefelina sienitos, em parte de aspecto gnaissóide (*lujauritos*) e ricos em silicatos de metais raros, notadamente eudialita. Os *tinguaítos* correspondem a rochas de granulação fina, ou afanítica, comumente com poucos fenocristais de cor preto-esverdeada; constituem o tipo litológico mais importante. Algumas áreas apresentam *brecha de tinguaito* de origem magmática formada de fragmentos angulosos de tinguaito em matriz fina ou afanítica; sua localização

Lujauritos, chibinitos		Rochas piroclásticas
Nefelina sienitos		Diabásios
Tinguaitos e fonólitos		Rochas sedimentares
Brechas de tinguaito		Fenitos
Lavas fonolíticas		Embasamento cristalino

Figura 1 - Mapa simplificado do maciço alcalino de Poços de Caldas, segundo Ellert *et al.* (1959).

é indicada no mapa da Fig. 1. Os *fonólitos* diferenciam-se dos *tinguaítos* por exibirem coloração algo mais clara (violeta ou ar roxeada). São rochas em geral porfiríticas com matriz muito fina ou afanítica. Alguns *fonólitos* mostram evidências de colocação superficial, como derrames, etc., enquanto que os *tinguaítos* representam provavelmente modo de ocorrência subsuperficial. No setor ocidental, ao longo do Vale do Quartel, entre as localidades de Águas da Prata e Cascata (Fig. 1), e estendendo-se para nordeste, concentram-se os afloramentos mais importantes e contínuos de *material piroclástico*. Este consiste de tufitos finos e lapilli, além de brechas e aglomerados vulcânicos, com clastos de rochas vulcânicas (*ankaratritos*, etc.) em parte ricas em minerais máficos; citam-se também na literatura alguns derrames de *ankaratrito* de reduzidas dimensões (Ellert, 1959). Ainda presentes no distrito aparecem remanescentes de arenitos, atribuídos às Formações Botucatu ou Tubarão por Björnberg (1959); são ricos em quartzo e portadores de estratificação grosseira e, às vezes, contêm intercalações de siltitos laminados.

A seqüência magmática no distrito é interpretada por Ellert (1959), a partir dos dados geológicos, da seguinte maneira. O modelo adotado é o de erupção em caldeira com colapso. Os primeiros *tinguaítos* formam os diques anelares, que foram precedidos por atividade piroclástica intensa, da qual as rochas piroclásticas do distrito representam os remanescentes não erosionados. Segue-se o colapso da parte central, com sucessivas invasões de *tinguaítos* e nefelina sienitos, estes na sua maioria posteriores aos primeiros. As lavas fonolíticas são, em parte, posteriores aos *tinguaítos* e aos nefelina sienitos. Como evento final têm-se as erupções com atividade mais reduzida, testemunhas do qual seriam alguns diques e corpos menores, cortando também em parte os nefelina sienitos.

Os estudos geocronológicos (K/Ar, Amaral *et al.*, 1967; Bushee, 1974) levados a efeito confirmam em traços gerais essa história evolutiva. As rochas mais antigas correspondem aos *ankaratritos* e rochas piroclásticas associadas, com idades em

torno de 87 m.a.. As intrusões da quase totalidade dos tinguaitos e de alguns nefelina sienitos, localizados na periferia do maciço, processaram-se dentro do intervalo de 80 a 74 m.a.. A maior parte dos nefelina sienitos, incluindo os lujaunitos, formou-se entre 60 e 63 m.a., enquanto que alguns diques tardios de fonólitos possuem idade de 54 m.a..

1.2. TRABALHOS ANTERIORES

Existe hoje uma vasta bibliografia sobre o maciço alcalino de Poços de Caldas. Os primeiros estudos ali realizados foram de grande importância científica, e são vistos atualmente como clássicos na literatura; trata-se dos trabalhos de Derby em 1887 e de Machado em 1888. O primeiro indica a coexistência de nefelina sienitos e tinguaitos, e o segundo corresponde a um excelente ensaio de descrição de rochas e minerais, caracterizados através de estudos ópticos e químicos. As contribuições posteriores começaram a aparecer tão somente a partir da década de 1930. Destacam-se entre elas as de Barbosa (1934, 1936, 1948); Guimarães (1947, 1948); Guimarães *et al.* (1953, 1962) e Branco (1956). Entretanto, o primeiro mapa geológico do maciço só foi publicado em 1959. Refere-se à folha levantada por Ellert *et al.*, (1959), em escala 1:75000, onde pela primeira vez são claramente definidas as principais feições do maciço. Desse mapeamento resultam dois trabalhos de grande importância científica. O primeiro é o de Ellert (1959), enfocando a petrografia e a estrutura do maciço; o segundo é o de Björnberg (1959), que representa o mais abrangente estudo disponível até o momento sobre a petrografia dos arenitos e outras rochas clásticas que ocorrem principalmente no interior do maciço como remanescentes de erosão. Após vários trabalhos mais restritos surge, em 1967, o primeiro trabalho geocronológico (Amaral *et al.*, 1967), visando a determinação da idade radiométrica da maioria dos complexos alcalinos do sul do Brasil. Bushee (1974) é um dos coautores desse artigo, e volta a abordar o tema na sua tese de doutoramento, que contém uma discussão geral sobre a geocronologia das rochas alcalinas brasileiras, incluindo as de Poços de Caldas. Esse autor adiciona ainda um estu-

do geológico de detalhe dos afloramentos de lujauro, situados a norte da cidade de Poços de Caldas. Outras pesquisas petrográficas e geológicas são as de Ashry (1962), Utsumi *et al.* (1971) e Gorsky e Gorsky (1974). Entre os trabalhos mais específicos citam-se o de Moniz (1969) sobre a gênese dos argilominerais do maciço, e o de Fujimori (1974) sobre minerais radioativos do campo uranífero de Agostinho.

Atualmente, está em andamento um plano de pesquisa que visa estabelecer a evolução geológica e geoquímica do maciço. Esse plano, a ser desenvolvido em vários estágios, começa por definir geologicamente os nefelina sienitos que, pela sua granulação mais grossa, permitem a execução de mapeamento faciológico. Em segundo lugar, parte-se para a caracterização química das rochas, como também dos seus minerais formadores mais importantes. Em terceiro lugar, pretende-se definir os numerosos minerais acessórios. Alguns resultados sumários, relacionados com os tópicos acima assinalados, foram apresentados como notas em vários congressos geológicos. Citam-se, entre outros, os resumos enviados ao XXX Congresso Brasileiro de Geologia do Recife, ao XXXI Congresso de Camboriú, e ao XXXII Congresso de Salvador. Referências a esses trabalhos encontram-se nos boletins dedicados aos Resumos e Breves Comunicações. Algumas informações constam da comunicação preliminar apresentada por Ulbrich *et al.* (1979).

1.3. PLANO DO PRESENTE TRABALHO

A seguir, é feito um breve resumo dos tópicos discutidos na presente tese.

Na introdução mencionam-se as principais características petrográficas dos nefelina sienitos típicos e as suas ocorrências geológicas mais importantes.

A descrição sumária das feições geológicas gerais do maciço de Poços de Caldas e do embasamento circundante são o

tema deste capítulo, do qual consta também a citação dos trabalhos anteriores relacionados ao complexo.

No segundo capítulo, discutem-se os fundamentos que serviram de base para o mapeamento faciológico detalhado dos nefelina sienitos do distrito. Destacam-se os corpos investigados em detalhe, através da análise dos principais minerais formadores de rochas, e descrevem-se as feições petrográficas dos diversos fácies que os compõem; adicionam-se ainda dados modais.

O terceiro capítulo reúne os dados químicos dos feldspatos alcalinos; essencialmente feldspato potássico, acompanhado em alguns casos por quantidades subordinadas de albita. Os estudos de raios X mostram a complexidade estrutural dos feldspatos potássicos na maioria dos nefelina sienitos, indicada pela coexistência de cristais com grau diferente de ordenamento estrutural nas mesmas rochas. Abordam-se finalmente as implicações petrológicas resultantes das feições químicas, texturais e estruturais observadas nos feldspatos alcalinos.

O quarto capítulo é dedicado ao estudo das nefelinas, examinando em minúcias as variações químicas desses minerais nos vários nefelina sienitos. Segue-se uma avaliação crítica dos geotermômetros baseados na composição das nefelinas, e de nefelinas e feldspatos alcalinos coexistentes. Os dados químicos de nefelinas e feldspatos potássicos dos nefelina sienitos são assim empregados com vistas ao estabelecimento de possíveis temperaturas de cristalização magmática das rochas, ou de reequilíbrio dos seus minerais félsicos.

As características químicas dos piroxênios sódicos integram o capítulo quinto. Dada a sua grande importância petrológica, procura-se estabelecer a princípio um esquema de moléculas que expresse realmente as mudanças químicas registradas. Essas moléculas, já empregadas na literatura, são no entanto deduzidas utilizando-se os dados coligidos neste programa. Após a apresentação dos dados analíticos relativos a cada corpo de nefelina

lina sienitos, passa-se à sua discussão num contexto mais amplo, tentando-se caracterizar, por um lado, o quimismo das rochas de Poços de Caldas e as relações genéticas entre os diversos corpos e, por outro, as possíveis condições de formação das rochas. Em primeiro lugar, comparam-se os dados químicos e as tendências de evolução dos piroxênios em estudo com os de maciços congêneres. Posteriormente, resumem-se os resultados de trabalhos experimentais e petrográficos que relacionam a composição dos piroxênios e a paragênese dos minerais máficos nas rochas, com variações na fugacidade de oxigênio durante a sua cristalização. Os resultados da discussão precedente são aplicados às rochas de Poços de Caldas.

As características químicas das biotitas e dos anfibólios sódicos são apresentadas no sexto capítulo. Discorre-se sobre as possíveis implicações petrológicas advindas tanto da composição, como das feições texturais desses minerais, em parte já colocadas no capítulo anterior.

No capítulo final, resumem-se as conclusões petrológicas mais importantes, colocadas agora no contexto geral da cristalização de nefelina sienitos do maciço de Poços de Caldas.

No apêndice, fornece-se a metodologia empregada durante os trabalhos analíticos.

CAPÍTULO 2

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOLÓGICA DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

Os estudos mineralógicos e petrológicos apresentados na presente tese adotam, como trabalhos básicos e de identificação geológica, os realizados por H.H.Ulbrich (em preparação). Aqueles trabalhos procuram caracterizar principalmente os nefelina sienitos através de mapeamentos detalhados, visando a uma finalidade dupla:

- 1) definir os tipos faciológicos presentes no distrito, a partir de observações texturais e mineralógicas;
- 2) identificar os corpos ígneos, aqui definidos como "as unidades reológicas ou de movimentação magmática".

As possíveis interpretações petrológicas resultantes do estudo dos minerais félsicos e máficos das rochas de Poços de Caldas requerem a discussão dos conceitos de "fácies petrográfico" e "corpo ígneo" e da forma em que serão aqui tratados. Segue-se a discussão desses conceitos, com base sobretudo no trabalho daquele autor.

2.1. CONCEITOS GERAIS

2.1.1. A definição de fácies petrográfico

As rochas mapeadas em Poços de Caldas são petrograficamente muito monótonas. Correspondem todas a nefelina sienitos, onde os minerais essenciais são feldspato potássico, nefelina e egirina-augita ou egirina. Contudo, o que confere diversidade aos tipos litológicos reconhecidos são, por um lado, as va-

riações marcantes na textura e, por outro lado, as pequenas mudanças na mineralogia, advindas notadamente de concentrações de minerais menores e acessórios.

Essas características podem ser reconhecidas na maioria das vezes mesmo em amostras de mão. Existem portanto critérios objetivos para definir os vários tipos litológicos ou fácies petrográficas, a partir de características mineralógicas e texturais.

Uma vez aceitas as premissas, observa-se no campo a continuidade do fácies assim definido. Muitas vezes o fácies constitui uma unidade mapeável na escala adotada para o trabalho; são porém freqüentes os exemplos em que diferentes fácies petrográficas alternam-se até mesmo na escala de afloramento, sem que seja possível perceberem-se razões estruturais ou de outro tipo para essas mudanças. Neste caso, a unidade mapeável estará constituída pelo conjunto de tipos litológicos observados.

Critérios utilizados para a identificação dos fácies de nefelina sienitos em Poços de Caldas

Enumeram-se em seguida, em ordem decrescente de importância, os diversos critérios macroscópicos empregados na identificação dos fácies petrográficos.

Cor. Sem ser necessariamente diagnóstica, a cor geral das rochas converte-se freqüentemente em elemento importante para a rápida identificação do fácies. As cores dominantes, devidas principalmente à coloração do feldspato potássico, são a cinzenta, a esbranquiçada e a cinzento-esverdeada. Em alguns casos ocorrem combinações de cores, resultando em rochas "manchadas"; por exemplo, feldspato esbranquiçado alternando com feldspato e nefelina de coloração cinzenta.

Granulação. Vários fácies diferenciam-se pronta-

mente pela granulação.

Hábito e tamanho dos feldspatos potássicos. Os feldspatos potássicos são os minerais mais abundantes e seu hábito comumente define a textura das rochas. Assim, distingue-se a *textura foiaítica*, com feldspatos em geral subidiomórficos, tabulares a placóides, formando uma densa malha na qual se dispõem os demais minerais. A textura foiaítica aparece sem orientação; texturas foiaíticas orientadas são aqui referidas como *traquitóides* e caracterizam-se, pelo menos em parte, pela orientação planar dos feldspatos potássicos. São também comuns as *texturas hipidiomórficas* não foiaíticas, com feldspatos irregulares a equidimensionais, subidiomórficos. Algumas rochas são francamente *porfiríticas*, com feldspatos idiomórficos maiores distribuídos em matriz de granulação média.

Hábito e tamanho dos piroxênios. As egirina-augitas e egirinas ocorrem nos nefelina sienitos segundo três maneiras distintas:

- a) como cristais idiomórficos isolados de hábito prismático-acicular;
- b) como cristais agrupados, de contorno irregular, em geral associados a grãos opacos e outros minerais acessórios (textura em "*synneusis*");
- c) como cristais isolados placóides de bordas irregulares, via de regra poiquilíticos, com inclusões de nefelina, feldspato e acessórios.

Estrutura maciça versus orientada. A maioria dos nefelina sienitos exibem estrutura maciça. Em alguns fácies, as rochas apresentam forte orientação, sobretudo planar; por exemplo, os lujauritos, onde a textura traquitóide é enfatizada pela orientação fluidal de egirina acicular.

Presença de minerais menores ou acessórios. Dentre eles, mencionam-se especialmente a biotita, a fluorita e a eudialita.

Hábito da nefelina. A nefelina ocorre geralmente como cristais pequenos, dispostos ora intersticialmente aos feldspatos, ora como suas inclusões. Mais raramente distinguem-se alguns fâcies pelo tamanho considerável, centimétrico, de nefelinas subidiomórficas.

Presença de pseudoleucita. Agregados de pseudoleucita, irregulares a idiomórficos, são muito frequentes em tinguaiços, porém mais raros nos nefelina sienitos. Em Poços de Caldas, apenas um fâcies petrográfico fanerítico caracteriza-se pela presença de pseudoleucita.

2.1.2. A definição de corpo ígneo

Um corpo ígneo pode ser definido de maneira simples como o resultado da cristalização de massa magmática, de composição comumente homogênea. Essa massa magmática tem como característica fundamental a propriedade de se movimentar; sendo assim possível identificar-se o conceito de *corpo ígneo* com o de *unidade reológica (ou de movimentação)*. Esta unidade desloca-se e invade rochas encaixantes em diversos níveis crustais onde cristaliza de maneira complexa. Em princípio, a unidade reológica, uma vez cristalizada, pode estar representada por um só fâcies (cristalização homogênea) ou, mais provavelmente, por vários fâcies (por exemplo, variações de tipo borda-centro). Nos corpos maiores, e até em muitos corpos de pequenas dimensões, as variações faciológicas presentes sugerem que a situação é muito mais complexa que a do exemplo apresentado. Depreende-se das considerações anteriores que o mapeamento de tipos faciológicos constitui uma atividade objetiva; no entanto, definir o corpo ígneo é uma tarefa interpretativa não isenta de avaliações subjetivas.

O mapa que serve de base ao presente trabalho diferencia principalmente os nefelina sienitos, apresentando os limites de corpos ígneos individuais. Os critérios utilizados para delimitar esses corpos, a partir do mapeamento e agrupamento de fácies, são discutidos a seguir.

O caso mais simples é aquele no qual um corpo ígneo aparece constituído por um só fácies, ou onde as variações petrográficas são pouco marcadas. Neste caso, a limitação do corpo ígneo é facilitada, porém mesmo aqui surgem complicações. Exemplifica-se a discussão com duas variedades faciológicas de nefelina sienitos. A primeira delas aflora na área da localidade de Cascata (ver Fig. 1); trata-se dos assim denominados "nefelina sienitos porfiríticos", caracterizados por acentuada textura foiaítica e presença de cristais maiores tabulares de feldspato potássico em matriz de granulação fina a média. Essas rochas formam corpos muitos pequenos, de poucas centenas de metros de extensão, colocados em tinguaiços. Neste caso, torna-se muito fá cil identificar os limites do corpo ígneo, uma vez que os contatos do fácies correspondem também àqueles limites.

Exemplo diferente é dado pelos "nefelina sienitos cinzas do Anel Norte", da mesma forma encaixados em tinguaiços. As rochas possuem cor cinzenta, granulação em geral grossa, com a textura dominada pela presença de feldspatos alongados a irregulares; por outro lado, a nefelina aparece ora como cristais milimétricos, em parte incluídos em feldspatos, ora como cristais subidiomórficos de considerável tamanho (até centimétrico). Os afloramentos desse fácies petrográfico ocorrem em zona de densa cobertura vegetal, não sendo portanto possível decidir se se trata de exposições contínuas de um só corpo ou, ao contrário, de corpos diferentes vizinhos entre si.

Extremamente complexos do ponto de vista petrográfico são os chamados "nefelina sienitos ocidentais com eudialita". Os afloramentos são esporádicos, conquanto apresentem aparente continuidade quando localizados num mapa. As amostras co-

lhidas nos diferentes pontos de amostragem mostram, no entanto, características petrográficas muito variadas. Tipicamente, as texturas são foiaíticas, porém com diferenças marcantes quanto ao conteúdo de minerais acessórios: algumas amostras possuem eu-dialita intersticial, na forma de cristais isolados (1-3%), enquanto que outras não contêm o mineral, mas sim outros silicatos de metais raros. Às vezes, alguns poucos metros de distância separam amostras diferentes, particularmente do ponto de vista da concentração de acessórios. Face principalmente à falta de afloramentos contínuos, esse conjunto heterogêneo de rochas é interpretado como constituindo um "corpo", no sentido discutido anteriormente.

Um caso muito diferente é o dos corpos claramente compostos por várias fácies interrelacionados. Aqui, atribuem-se os diversos fácies ao mesmo corpo em função de critérios tanto mineralógico-texturais, como estruturais. O melhor exemplo dessa situação refere-se ao *corpo lujaurítico ocidental* do Anel Norte. Neste corpo, de dimensões muito reduzidas (aproximadamente 1500 x 500 metros), encontram-se 5 fácies diferentes, que se sucedem do centro para a borda com uma estratigrafia característica. Um segundo exemplo é o corpo de *chibinitos de Botelhos*, também colocado no Anel Norte em tinguaitos, apresentando vários tipos faciológicos que são aqui agrupados em função de características petrográficas.

2.1.3. Nomenclatura de fácies petrográficas e corpos ígneos em Poços de Caldas

A nomenclatura usada para identificar fácies e corpos não pode fugir da monotonia das petrografias presentes na área (H.H.Ulbrich, em preparação). O nome mais empregado para a identificação de fácies é o termo "nefelina sienito", com o qual simplesmente se caracteriza uma rocha fanerítica leuco- a holo leucocrática do campo 11 da classificação da IGUS (Streckeisen, 1976). A esse termo agregam-se apenas dois outros. O primeiro é o "lujaurito", identificando uma rocha leucocrática a mesocráti-

ca, com forte foliação, e tendo eudialita como mineral essencial. O segundo termo adicional é o "chibinito", que se aplica para um nefelina sienito leucocrático, de granulação grossa, e textura foliática não orientada, com eudialita como mineral essencial (Johannsen, 1931; Sørensen, 1974b). Ambos os termos já foram utilizados na região por diversos autores (ver Ellert, 1959).

Esses três termos são empregados para indicar o nome raiz do fácies petrográfico. Para caracterizações mais detalhadas, faz-se necessário agregar outros mais, lembrando a textura, a cor, ou a presença de um dado mineral acessório. Utilizam-se então, para definir fácies petrográficos, nomes como "nefelina sienito porfirítico", "nefelina sienito com eudialita", etc. Um nefelina sienito muito típico apresenta sistematicamente, nos seus contatos com tinguaitos, uma profusão de xenólitos tinguaiticos arredondados e frequentemente com sinais de recristalização; para ele optou-se pela aplicação do termo "nefelina sienito híbrido".

Os corpos são caracterizados pela mesma nomenclatura dos fácies. Às vezes, a nomenclatura é totalmente paralela, porém, em geral prefere-se agregar um aditivo geográfico permitindo a localização dos corpos.

2.1.4. Distribuição dos nefelina sienitos estudados no presente trabalho

A distribuição geral dos nefelina sienitos no distrito de Poços de Caldas é vista na Fig. 1 (segundo mapa realizado por Ellert *et al.*, 1959). A maioria desses nefelina sienitos foi investigada no presente trabalho, sendo sua localização indicada na Fig. 2. Utiliza-se nessa figura a nomenclatura discutida nas páginas anteriores.

Um mapa mais minucioso é dado na Fig. 3, onde, tomando por base o mapa geral do distrito, ampliam-se 4 áreas que mostram os detalhes resultantes de mapeamentos recentes (H.H. Ul-

Figura 2 - Localização geral dos corpos de nefelina sienitos estudados (mapa segundo Ellert *et al.*, 1959).

A nomenclatura adotada é a utilizada no presente trabalho.

Figura 3 - Geologia dos corpos de nefelina sienitos, segundo H. H. Ulbrich, (em preparação).

As quatros áreas aparecem ampliadas separadamente; o mapa base central é o de Ellert *et al.*, (1959). Os números indicam amostras com análises de minerais (químicas e de raios X).

Figura 3

Ulbrich, em preparação). Nessas 4 áreas acha-se localizada a totalidade dos nefelina sienitos estudados. São elas: 1) a área do Anel Norte, ao norte da cidade de Poços de Caldas, que compreende grande parte do desnível topográfico norte; 2) uma área no interior do maciço, situada imediatamente ao sul da cidade de Poços de Caldas; 3) a área de Cascata-Morro do Serrote; e 4) uma área que abrange a parte ocidental do Anel Norte.

2.2. PETROGRAFIA DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

Indicam-se a seguir as características petrográficas e geológicas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas estudados e representados na Fig. 3. As descrições são feitas agrupando-se os corpos segundo as quatro áreas geográficas mencionadas no item anterior. Ao final do capítulo apresenta-se um resumo das características macroscópicas das rochas (Tabela 1) e suas modas (Tabela 2).

2.2.1. Anel Norte (A, Fig.3)

Corpos lujauríticos ocidental e oriental

Trata-se de dois pequenos corpos separados entre si (Fig. 3). O corpo ocidental é de dimensões menores e reúne bons afloramentos, cuja continuidade permite estabelecer a sequência dos vários fácies que o compõem, tal como se observa na Fig. 4. No corpo oriental, por outro lado, os afloramentos são muito pobres ou acham-se ocultos, aparecendo as rochas como blocos rolados; o seu posicionamento é, no entanto, de tal natureza que permite deduzir um condicionamento estrutural semelhante ao do corpo ocidental (H.H.Ulbrich, comunicação personal).

Os cinco fácies petrográficos do corpo lujaurítico ocidental foram caracterizados geológica e petrograficamente por meio de mapeamento de detalhe (Fig. 4; Ulbrich *et.al.*,

Figura 4 - Geologia do corpo leucocrático ocidental, segundo H.H.Ulbrich (em preparação). Os números indicam amostras com análises de minerais (químicas e de raios X).

1979). Na região central do corpo, afloram os lujauritos I, de granulação grossa e com foliação subhorizontal, que passam externamente a um fácies de borda com poucos metros de espessura. No fácies de borda, a atitude estrutural das rochas evidencia maior mergulho; trata-se dos lujauritos II, de granulação mais fina. Sucedem-se externamente, e com total concordância estrutural, dois nefelina sienitos exibindo acentuada orientação planar de feldspatos e piroxênios: são os nefelina sienitos traquitóides I, de granulação média, e II, de granulação grossa. Envolvendo externamente o conjunto, aparecem os chibinitos como o quinto tipo faciológico.

Lujauritos I: São rochas mesocráticas a leucocráticas, de granulação grossa e marcadamente inequigranulares. Os feldspatos idiomórficos mostram hábito placóide e cristais de até 3 cm, com proeminente orientação planar. A nefelina ocorre em grãos menores intersticiais. O piroxênio aparece em finas agulhas milimétricas, às vezes centimétricas, também com orientação planar, formando uma densa malha de agulhas intercrescidas que rodeiam como "folhas máficas" os feldspatos; estes últimos apresentam por vezes a forma de "olhos". A textura total das rochas assemelha-se à de um "augen" ou "flaserigneiss", como já indicado por Shand (1928) em suas descrições dos lujauritos de Pilanesberg. A eudialita é o mineral acessório mais comum e ocorre na forma de cristais intersticiais de distribuição heterogênea, concentrando-se em áreas irregulares a alongadas; esporadicamente estão presentes outros silicatos de metais raros.

Ao *microscópio*, observa-se que os feldspatos potássicos, placóides, apresentam geminação de Carlsbad e, subordinadamente, de Baveno. São comuns as placas com geminação em grade pouco desenvolvida, e geralmente localizada apenas em partes dos cristais (ver Fotomicrografias 14 e 16, item 3.3.1). A nefelina está presente na forma de grãos idiomórficos isolados ou em agrupamentos monominerálicos (Fotomicrografias 1 e 2). Os prismas e agulhas idiomórficas de piroxênio egirínico ocorrem agrupados; em certas partes circundam os minerais félsicos e comumente apare-

Fotomicrografias 1 e 2 - Textura de lujaauritos

1 - Prismas e agulhas de piroxênio egirínico (cinza escuro a preto), agrupados e orientados em faixas subparalelas, circundando parcialmente grãos e agregados granulares de feldspato potássico e nefelina. Feldspato potássico, branco; nefelina, branco cinzento, com as linhas de clivagem e fraturas salientadas devido à alteração incipiente para natrolita. X 10; nicóis paralelos; filtro verde.

2 - Igual à anterior, nicóis cruzados; filtro branco. Observa-se que os prismas de piroxênio estão incluídos nas bordas dos cristais de feldspato. Vê-se também um grão de feldspato com geminação de Baveno, no canto superior esquerdo da fotomicrografia.

Fotomicrografia 1

Fotomicrografia 2

cem incluídos nas bordas dos grãos de feldspato (Fotomicrografias 1 e 2). Em algumas lâminas nota-se a presença de cristais xenomórficos de anfibólio arfvedsonítico de tamanho centimétrico, por vezes zonados, e incluindo abundantes prismas de piroxênio e minerais félsicos. A eudialita forma agregados de grãos intersticiais ocasionalmente de tamanho centimétrico. O mineral exhibe zoneamento setorial e mostra-se parcialmente alterado em catapleíta; por vezes, inclui grãos idiomórficos de minerais félsicos (Fotomicrografia 3). Outros minerais acessórios de ocorrência mais rara são os agregados de grãos de astrofilita, placas de lamprofilita, agregados de prismas de rinquita e, às vezes, material opaco intersticial. Aparecem também algumas espécies não identificadas. Em geral as rochas são frescas, com a nefelina tendo como principais produtos de alteração a natrolita e, mais raramente, a cancrinita e a analcima.

Lujauritos II. São rochas texturalmente semelhantes aos lujauritos I, porém de granulação mais fina, além de mais leucocráticas. Em geral são pobres em eudialita, que, por vezes, chega mesmo a inexistir.

Devido à menor quantidade de piroxênio egirínico, percebe-se ao *microscópio* que os contatos entre o feldspato potássico e a nefelina são por vezes as faces de crescimento de ambos os minerais. Comumente, nefelina subidiomórfica acha-se em contato com grãos mais irregulares de feldspato. Este corresponde principalmente a ortoclásio, mostrando geminações semelhantes às dos lujauritos I. Por outro lado, nos lujauritos II aparece albita, em placas alongadas, sem indícios de alteração, e com geminação polissintética. De contornos mais ou menos irregulares, a albita não apresenta orientação particular, ocorre entre os grãos de minerais félsicos e corta geralmente a estrutura planar característica dessas rochas. Os grãos de feldspato potássico próximos à albita possuem pertitas e geminação em grade fina a muito fina (Fotomicrografias 12 e 17, item 3.2 e 3.3.1 respectivamente). Nos lujauritos II a arfvedsonita é rara. Os minerais acessórios são os mesmos da litologia anterior, e os produtos de alteração, tam-

Fotomicrografias 3 e 4 - Texturas de lujauros e de nefelina sienitos traquitóides

3 - Lujauro. A mesma secção delgada das Fotomicrografias 1 e 2.

Porção inferior direita, piroxênios e minerais fêlsicos com a típica textura dos lujauros. Na parte central, observam-se cristais idiomórficos de feldspato potássico e nefelina (brancos) em meio a um agregado de grãos de eudialita (preto a cinza escuro). Nota-se o caráter intersticial da eudialita, que ocorre entre os cristais de feldspato e nefelina. X 10; nicóis paralelos; filtro vermelho.

4 - Nefelina sienito traquitóide. Cristais tabulares-irregulares de feldspato potássico e subidiomórficos-idiomórficos de nefelina (branco, cinza, preto), bordejados em parte por raros prismas pequenos de piroxênio egirínico (cinza-preto com relevo). Os feldspatos apresentam unicamente geminação simples (Baveno e Carlsbad), além de escassas pertitas num cristal ocupando a porção central inferior da fotomicrografia. Albita geminada é visível na borda direita da montagem. X 16; nicóis cruzados; filtro branco.

Fotomicrografia 3

Fotomicrografia 4

bem escassos, correspondem à natrolita e à cancrinita; observam-se ainda agregados de grãos intersticiais de analcima (primários?).

Nefelina sienitos traquitóides I. São rochas leucocráticas, de granulação fina a média, e muito diferentes dos tipos facirológicos anteriormente descritos. A textura traquitóide é feição característica, achando-se representada por feldspatos alongados idiomórficos com orientação planar, aos quais se juntam prismas isolados milimétricos de piroxênio, da mesma maneira fortemente orientados. A eudialita e outros minerais acessórios são muito abundantes.

A observação *microscópica* demonstra que os cristais placóides tabulares de feldspato potássico são os minerais dominantes; apresentam-se também geminados segundo as leis de Carlsbad e Baveno, ocasionalmente, com geminação em grade fina (Fotomicrografia 4; ver também Fotomicrografia 15, item 3.3.1). Raramente aparecem cristais idiomórficos de nefelina. Este mineral ocorre comumente em agregados de grãos subidiomórficos a xenomórficos, com incipiente alteração para natrolita; esses agregados são, em parte, intersticiais aos feldspatos. Os prismas finos de piroxênio e girínico mostram-se orientados paralelamente aos feldspatos e em geral incluídos nas suas bordas. Essas rochas possuem albita tabular, com características semelhantes às descritas para o caso dos lujauritos II. Eudialita é o mineral acessório mais importante, acompanhado por quantidades menores de astrofilita, rinquita, lamprofilita e outras espécies não identificadas. Observa-se por vezes a presença de agregados de grãos subidiomórficos de analcima (primários?).

Nefelina sienitos traquitóides II. São muito similares aos nefelina sienitos traquitóides I, diferindo no entanto pela granulação mais grossa e quantidades menores de eudialita. Os piroxênios, mais escassos, são também prismáticos e igualmente orientados, alcançando tamanhos maiores, até centimétricos, em alguns casos.

Ao *microscópio* nota-se que a característica mais notável dessas rochas reside no fato de que os cristais maiores de piroxênio egirínico intersticial contêm abundantes inclusões de minerais félsicos concentradas nas bordas dos grãos. Os piroxênios se assemelham àqueles dos chibinitos, que serão descritos a seguir.

Chibinitos. São rochas tipicamente maciças, com textura hipidiomórfica granular e granulação grossa; algumas variedades exibem localmente orientação traquitóide. Uma feição marcante é a presença de piroxênio placóide e de contorno irregular, poiquilítico, e frequentemente de dimensões centimétricas. Esse hábito é típico de todos os chibinitos de Poços de Caldas. A eudialita, constituinte essencial dessas rochas, aparece concentrada em agregados com aspecto macroscópico de "manchas" arredondadas, globulares, com diâmetros às vezes maiores que 10 cm. Os feldspatos e nefelinas formam um mosaico de cristais comumente irregulares ou subidiomórficos.

Nos contatos com tinguaitos, ocorre geralmente um fácies de borda com rochas de granulação média, sem eudialita, e com piroxênios de hábito prismático (Fig. 4, am. 142).

Ao *microscópio*, verifica-se que nos chibinitos típicos os feldspatos potássicos formam tanto cristais tabulares-placóides idiomórficos, como indivíduos de contorno irregular incluindo nefelina e raro piroxênio. A nefelina é idiomórfica a subidiomórfica e acha-se em contato com o feldspato placóide, geralmente segundo faces de crescimento. O tamanho dos minerais félsicos é variável e, como resultado, a textura torna-se foiaítica em algumas áreas e hipidiomórfica granular em outras. Em algumas amostras, observam-se raros cristais idiomórficos de sodalita primária. A geminação dos feldspatos é semelhante à descrita para outras rochas dos corpos lujauríticos; contudo, nos chibinitos, a geminação em grade está melhor desenvolvida nos cristais menores. Os piroxênios egirínicos ocorrem segundo três maneiras distintas:

- a) prismas idiomórficos, sem orientação, de tamanhos menores que 3 mm;
- b) grãos xenomórficos, intersticiais e poiquilíticos, com marcado zoneamento setorial, caracterizado por mudanças na cor e no pleocroísmo em diferentes setores dos cristais, com dimensões via de regra maiores que 5 mm (ver Fotomicrografias 19 e 20, item 5.5);
- c) agregados fibro-radiais ou paralelos, totalmente intersticiais.

Das três formas apontadas, a mais comum é a ocorrência como cristais poiquilíticos. Os agregados de eudialita-eucolita são intersticiais, com o mineral exibindo zoneamento setorial, além de se encontrar parcialmente alterado em catapleíta. Outros minerais acessórios presentes incluem: astrofilita, rinquita, lamprofilita, titanita, fluorita, bem como algumas fases não identificadas.

Os chibinitos em contato com os tinguaitos possuem granulação média e textura foiaítica, onde se destacam raros cristais maiores alongados, de contorno irregular, de feldspato potássico portadores de inclusões de nefelina e piroxênio. A nefelina, como grãos isolados ou agregados de grãos, é predominantemente idiomórfica a subidiomórfica; alguns grãos de nefelina intersticial contêm inclusões de piroxênio. O piroxênio egirínico está presente na forma de cristais prismáticos, com arfvedsonita de contorno irregular no interior dos grãos; os cristais poiquilíticos são raros e de pequeno tamanho. Nessas rochas observou-se também albita tabular com as características descritas para o caso dos lujaunitos II. Os minerais acessórios são os mesmos que os do fácies de granulação grossa.

A alteração dos chibinitos é muito variável; algumas rochas são totalmente frescas, enquanto que em outras as nefelinas e, em parte, os feldspatos potássicos acham-se transformados em natrolita e cancrinita; áreas intersticiais inteiramente ocupadas por zeólitas, com apenas alguns relictos de nefelina, são também comuns em algumas amostras.

Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte

Essas rochas constituem um maciço de porte médio no Anel Norte do distrito de Poços de Caldas. Na região onde se tornam encaixantes do corpo lujaurítico ocidental, o corpo apresenta a forma de dique, estendendo-se depois para leste como um corpo de dimensões regulares (Fig.3).

Esse corpo (ou corpos?) consiste de diversos tipos faciológicos semelhantes, diferindo apenas entre si pelo fato de apresentarem variações no conteúdo de minerais máficos e, sobretudo, no tamanho das nefelinas. A variedade petrográfica mais característica é maciça de cor cinza médio a cinza claro, e portadora de textura hipidiomórfica inequigranular; a granulação é grossa com tendência a muito grossa, sendo mais raras as variedades de menor granulação. Os feldspatos cinzentos são alongados, de hábito placóide, porém com contornos mais ou menos irregulares; incluem grãos pequenos idiomórficos de nefelina. A nefelina ocorre também como mineral intersticial aos feldspatos, e frequentemente como cristais idiomórficos. Os minerais ferromagnesianos, de pequeno tamanho, são escassos e raramente ultrapassam 5 a 6% nas rochas de granulação grossa; dentre eles, o piroxênio é dominante, às vezes se fazendo acompanhar por biotita em palhetas finas. São sempre intersticiais, e em geral distribuídos homogeneamente pela rocha. Os silicatos de metais raros (eudialita, rinquita, etc) ocorrem com frequência nas rochas das áreas vizinhas ao corpo lujaurítico ocidental (Figs. 3 e 4), sendo, contudo, raros ou mesmo ausentes nos restantes afloramentos. Por conseguinte, suspeita-se que a presença restrita desses minerais acessórios seja devida a influências de caráter local (efeitos metasomáticos de contato?) e, portanto, não caracterizem esses nefelina sienitos.

Um segundo tipo faciológico mostra cristais pseudohexagonais de nefelina de tamanhos consideráveis, atingindo dimensões de 2 x 3 cm; o mineral ocorre intersticialmente aos feldspatos dominantes de dimensões centimétricas.

O exame *microscópico* das rochas de granulação grossa revela que a maior parte da nefelina encontra-se no interior dos cristais tabulares e irregulares, de tamanhos geralmente centimétricos, de feldspato potássico. As inclusões concentram-se principalmente nas porções centrais dos feldspatos. Nas rochas de granulação média a média-fina, a textura apresenta aspecto porfiróide, tendo em vista que entre os cristais poiquilíticos maiores de feldspato xenomórfico, que nessas rochas incluem tanto nefelina como placas pequenas de feldspato potássico, ocorrem agregados de minerais félsicos e máficos de tamanho milimétrico; nesses agregados, os feldspatos são tabulares e as nefelinas subidiomórficas. Um outro aspecto textural interessante é dado pelas rochas portadoras de nefelinas de tamanhos centimétricos; esses minerais contêm inclusões de feldspato potássico próximas às bordas dos cristais.

Em todas as rochas os feldspatos potássicos aparecem em geral geminados segundo a lei de Carlsbad, além de possuírem geminação em grade fina, melhor desenvolvida nos grãos de tamanho médio. Os minerais ferromagnesianos (piroxênio egirínico e biotita) são pouco abundantes, ocorrendo agrupados e associados a titanita e a fases opacas. Os piroxênios estão presentes, ora como agregados de prismas finos, com típica textura em "*synneusis*", ora como cristais maiores agrupados, de hábito mais ou menos prismático, porém com bordas poiquilíticas intersticiais (sobretudo nos fácies de granulação grossa). São também comuns os agregados intersticiais de hábito fibroso radiado ou paralelo. Zoneamento setorial, mais ou menos marcado, está presente sobretudo nos piroxênios de maior tamanho. Placas de biotita marrom exibem geralmente zoneamento complexo (ver item 6.1.3 e Fotomicrografia 22), enquanto que lâminas pequenas, de coloração marrom avermelhada e sem zoneamento, ocorrem comumente associadas a grãos opacos ou no interior dos cristais de piroxênio. Os minerais acessórios comuns, ainda que escassos, são titanita, fluorita e opacos, acompanhados de quantidades variáveis de astrofilita, lamprofilita, eudialita e rinquita, entre outros, sobretudo nas amostras coletadas perto do corpo lu-

jaurítico ocidental. Nessas rochas aparecem com frequência áreas intersticiais ocupadas por zeólitas, às vezes com abundantes placas pequenas hexagonais de biotita verde, ou de agregados fibrosos esferulíticos de um mineral marrom, não identificado. A alteração das rochas é variável, com a nefelina, na maioria delas, parcialmente alterada em natrolita e cancrinita.

Chibinitos de Botelhos

Trata-se de um maciço complexo do ponto de vista faciológico, devido às variações bruscas observáveis na textura, hábito do piroxênio e presença de eudialita. Por essas razões, e também em parte porque os afloramentos são insatisfatórios, os diferentes fácies foram mapeados como uma unidade.

O fácies mais característico, ao qual o corpo deve a sua identificação como "chibinito", acha-se representado por uma rocha inequigranular, com 15 a 25% de máficos, de granulação grossa e com marcada textura foiaítica; ali, os feldspatos formam placas idiomórficas a subidiomórficas centrimétricas, entre as quais se dispõem nefelina, freqüentemente idiomórfica, cristais tabulares menores de feldspato, e piroxênio irregular a placóide. O piroxênio apresenta o hábito próprio dos chibinitos de Poços de Caldas (ver descrição precedente sobre os piroxênios dos chibinitos dos corpos lujauríticos), enquanto que a eudialita e outros silicatos de metais raros aparecem como grânulos xenomórficos intersticiais, homogeneamente distribuídos pela rocha, em quantidades que variam entre 5 e 10%. Algumas variedades não contêm eudialita. Equivalentes pegmatíticos do fácies são encontrados localmente, na forma de segregações ou veios irregulares, mostrando marcada textura foiaítica, além de feldspatos tabulares idiomórficos de tamanhos superiores a 6 cm.

Associado intimamente ao fácies dominante, aparece um outro, de granulação mais fina, em especial nas áreas vizinhas aos contatos com os tinguaitos (ver Fig. 3). As suas ro-

chas possuem também textura foiaítica de granulação média a grossa, com feldspato tabular-placóide, nefelina idiomórfica e piroxênio subordinado, com pouca ou nenhuma eudialita. Os piroxênios apresentam-se principalmente como cristais idiomórficos prismáticos, ao contrário do hábito típico das variedades chibiníticas do distrito.

Localmente, em particular na parte central do corpo, encontra-se ainda um fácies diferente, com claras evidências de bandamento mineralógico, que se tornam marcantes em alguns afloramentos isolados (por exemplo, am.476, ver localização na Fig. 3). As rochas são inequigranulares, de granulação grossa, com os piroxênios exibindo típico hábito "chibinítico" e presentes na forma de grandes placas irregulares poiquilíticas. O bandamento mineralógico torna-se evidente devido à distribuição heterogênea dos piroxênios, que se concentram em bandas irregulares, mais ou menos alinhadas, e de limites imprecisos, raramente ultrapassando 2 cm de espessura. A irregularidade dessas bandas dificulta a visualização da feição em amostra de mão, que, no entanto, é muito acentuada na escala de bloco ou de afloramento. Nas bandas félsicas, ricas em feldspato e nefelina, observa-se clara orientação planar de, pelo menos, alguns feldspatos, que se dispõem paralelamente ao bandamento, realçado pela distribuição dos piroxênios. Essa rocha lembra, ainda que remotamente, as descrições do "kakortokito" de Ilímaussaq (Ferguson e Pulvertaft, 1963).

As características *microscópicas* do fácies de granulação grossa são semelhantes às dos chibinitos dos corpos lujauríticos. Contudo, a textura é mais foiaítica do que hipidiorfíca granular, com os cristais maiores de feldspato potássico alongados e irregulares incluindo nefelina e algum piroxênio. Este ocorre predominantemente como grandes cristais poiquilíticos. Cristais idiomórficos de sodalita e também de analcima foram observados nos "chibinitos bandados"; nestas rochas, a nefelina possui abundantes inclusões de prismas finos incolores de mineral não identificado, com índice de refração maior que o hospedeiro.

deiro, birrefringência média, e aspecto semelhante ao da rinquita. Os minerais acessórios incluem eudialita, com alteração para catapleíta, rinquita, lamprofilita, titanita e outras espécies não identificadas. A eudialita não forma agregados, ocorrendo mais como cristais intersticiais homogeneamente distribuídos. Algumas rochas mostram abundante alteração de natrolita e analcima e escassa cancrinita, enquanto que outras são frescas.

As rochas de granulação média, praticamente equigranulares, do fácies de borda (am. 462), são também semelhantes às daquelas do contato dos chibinitos dos corpos lujauríticos, tanto no tocante à textura foiaítica, como no tipo e hábito dos minerais presentes. Nelas, o piroxênio forma prismas idiomórficos ora isolados, ora em agrupamentos associados com titanita e grãos pequenos de arfvedsonita. Albita tabular é comum; feldspatos próximos à albita possuem abundante peritita e geminação em grade fina. Os minerais acessórios presentes correspondem aos já citados acima, com a eudialita ocorrendo como grãos intersticiais frescos.

Chibinitos Orientais

Trata-se de um conjunto de nefelina sienitos constituindo um corpo mal definido, em razão de afloramentos escassos e isolados, e ocorrência em áreas densamente cobertas por vegetação.

As rochas caracterizando o tipo faciológico dominante correspondem a nefelina sienitos de granulação média a grossa, portadores de textura foiaítica inequigranular. Os feldspatos maiores possuem forma tabular e atingem tamanhos de até 1,5 cm; em geral mostram contornos irregulares. Entre aqueles cristais, situam-se outros de menor tamanho, além de piroxênio, nefelina e eudialita. A nefelina ocorre em grãos pequenos, de coloração cinzenta, e o piroxênio apresenta-se tanto na forma de cristais prismáticos como placóides, às vezes poiquilíticos, em quantidades de até 10%. A eudialita é o mineral característico,

aparecendo em agregados de grãos irregulares e em proporções por vezes maiores que 5%.

Outras variedades, trazendo pouca ou nenhuma eudialita, são inteiramente semelhantes às descritas acima. Na área mapeada como "chibinito oriental", encontram-se também alguns afloramentos de nefelina sienitos de granulação mais fina, de aspecto similar ao dos nefelina sienitos finos do Anel Norte (descritos mais adiante).

Em termos gerais, pode-se dizer que os chibinitos orientais são macroscopicamente semelhantes a outros nefelina sienitos com eudialita da região ocidental e da área do Morro do Serrote, diferenciando-se, no entanto, pelos teores mais elevados de eudialita. São também, por sua vez, muito parecidas com os chibinitos de Botelhos; por outro lado, quando comparado aos chibinitos dos corpos lujauríticos, exibem texturas mais tipicamente foidiíticas e contêm feldspatos mais laminares, piroxênios às vezes prismáticos, e quantidades menores de eudialita.

A observação *microscópica* dos chibinitos orientais típicos confirma as suas semelhanças com os chibinitos de Botelhos, tanto no que se refere à textura, predominantemente foidiítica, como nas características dos minerais presentes.

Nefelina sienitos finos do Anel Norte

Trata-se de tipo faciológico formando dois corpos de tamanho médio no Anel Norte do maciço de Poços de Caldas. As rochas possuem cor cinzenta e aspecto "manchado", este dado pela alternância de áreas cinzentas com outras onde o feldspato aparece esbranquiçado. Em geral a sua granulação é fina a média, com alguns cristais de feldspato alcançando ocasionalmente dimensões maiores (até 2 cm em alguns casos). A textura varia de foidiítica a ligeiramente hipidiomórfica inequigranular. Os feldspatos são tabulares, comumente com bordas irregulares, ora cinzentos, ora esbranquiçados. As nefelinas formam cristais idiomórfi-

cos, milimétricos, às vezes agrupados, e de cor cinzenta clara a escura. O único mineral ferromagnesiano observado nas amostras de mão é o piroxênio, em proporções que variam desde 3 a 5% até um máximo de 10% em alguns casos; ocorre mais freqüentemente na forma de prismas idiomórficos e, às vezes, como grãos ou agregados de grãos irregulares intersticiais. Em algumas amostras observam-se ainda alguns grãos pequenos idiomórficos de titanita e pirita, além de outros opacos.

Ao *microscópio*, a textura dessas rochas mostra grande variação: em algumas lâminas, observa-se uma típica textura hipidiomórfica granular, fina a média, constituída por cristais tabulares de feldspato potássico, e grãos subidiomórficos de nefelina de igual tamanho; os espaços intersticiais acham-se por vezes preenchidos por analcima. Em outras amostras, a textura é hipidiomórfica a foiaítica, com feldspatos e nefelinas aparecendo como mosaicos de grãos subidiomórficos. Albita tabular, fresca, com geminação polissintética, é abundante em algumas rochas e ausente em outras; ocorre nos interstícios dos minerais félsicos e por vezes aparece penetrando os grãos de feldspato potássico. Nas rochas com albita, os feldspatos potássicos contêm abundantes pertitas. Os piroxênios aparecem na sua totalidade agrupados entre os minerais félsicos; o hábito tende a ser prismático, à exceção das bordas dos grãos de ocorrência intersticial. Na maioria das rochas, os núcleos dos cristais são de augita incolor ($\gamma_{Ac} = 35-37^\circ$), de contornos corroídos, rodeados por zonas finas de egirina-augita de composição variável, a julgar pelas mudanças bruscas nas características ópticas (cor, pleocroísmo e ângulo de extinção). As bordas são de piroxênio egirínico ($\alpha_{Ac} \approx 0-5^\circ$). Em algumas rochas os piroxênios variam de egirina-augitas até egirinas, com os núcleos augíticos ausentes. Agregados fibrosos de piroxênio intersticial são também comuns. Os minerais acessórios correspondem a opacos, titanita idiomórficos, escassa fluorita, biotita (na forma de lâminas pequenas de cor marrom avermelhada) e raros cristais do mineral *giannetita*, descrito por Guimarães (1948) em várias rochas de Poços de Caldas (ver também Branco, 1956; Winchell, 1959; Bushee, 1974). A *giannetita* é um silicato de metais raros, incolor, com índice de refração em

torno de 1,66, e birrefringência média a baixa levemente anômala; biaxial, com $2V_Y \approx 25^\circ$. Nos nefelina sienitos finos do Anel Norte, a giannetita está presente na forma de cristais xenomórficos de até 0,7 cm de diâmetro, com as bordas convertidas num agregado fino de grãos opacos, fluorita e calcita. As rochas mostram em geral alteração abundante para natrolita e analcima, com escassa cancrinita.

Pseudoleucita nefelina sienitos

Trata-se de um corpo muito peculiar, no qual notam-se claramente dois elementos texturais muito diferentes: por um lado, pseudoleucitas esbranquiçadas centimétricas, e por outro, uma matriz de cor acinzentada, de granulação média a grossa. A quantidade de pseudoleucita é variável, com algumas amostras apresentando total predomínio da matriz e até mesmo ausência de pseudoleucitas; em outras, as pseudoleucitas e a matriz aparecem em quantidades equivalentes.

As *pseudoleucitas* são em sua maioria ovóides a irregulares e, mais raramente, possuem contornos cristalinos. Variam de tamanhos milimétricos até centimétricos, tendo sido reconhecidos cristais com mais de 10 cm de diâmetro. Em geral a sua distribuição é heterogênea. As pseudoleucitas, comumente zonadas, estão constituídas por intercrescimentos de feldspato potássico esbranquiçado e nefelina cinzenta subordinada. Os núcleos desses agregados consistem de um mosaico xenomórfico a subidiomórfico de feldspato potássico e nefelina, de granulação média a grossa, e sem qualquer orientação. As bordas são de granulação mais fina, e nelas encontra-se feldspato potássico tabular-placóide orientado perpendicularmente ao contorno externo das pseudoleucitas; mais raramente, essas aparecem limitadas externamente por um agregado fino a muito fino de feldspato e nefelina. Nos núcleos das pseudoleucitas é comum a ocorrência de piroxênio egirínico parcial ou totalmente substituído por biotita; o piroxênio forma cristais idiomórficos de tamanho variável, até centimétrico, geralmente com orientação radial. Placas

de biotita são vistas tanto nos núcleos, como nas bordas das pseudoleucitas.

Além das típicas pseudoleucitas, são também frequentes os agregados de feldspato e nefelina sem qualquer estrutura interna, e que se apresentam como "manchas" irregulares a ovóides. Esses agregados são, pelo menos do ponto de vista petrográfico, equivalentes aos agregados zonados de pseudoleucita referidas acima.

A *matriz* é de granulação média a grossa, porfirítica a seriada. Contém feldspatos maiores cinzentos, tabulares, de tamanhos geralmente superiores a 1 cm, bem como menores, além de nefelinas milimétricas, subidiomórficas a xenomórficas. A textura é em geral hipidiomórfica ou xenomórfica inequigranular. Os minerais máficos dominantes correspondem a agregados de biotita, homogeneamente distribuídos e escasso piroxênio.

Ao *microscópio*, nota-se que a textura da matriz das rochas é muito variável; os feldspatos e nefelinas de maior tamanho formam agregados de textura hipidiomórfica granular, entre os quais encontram-se por vezes feldspato tabular e nefelina subidiomórfica de pequeno tamanho, com textura foiaítica. Os cristais de feldspato potássico possuem geminação de Carlsbad e em grade, pouco desenvolvida. O mineral ferromagnesiano mais típico é a biotita, presente na forma de palhetas intersticiais, às vezes até poiquilíticas, particularmente nos agregados foiaíticos finos. Ela exhibe cor marrom avermelhado-vermelho e marcado zoneamento (ver Fotomicrografia 21, item 6.1.3). Numa única amostra reconheceram-se adicionalmente placas pequenas idiomórficas de biotita verde restritas contudo às áreas ocupadas por zeólita intersticial. Espalhados no interior das rochas ocorrem ainda agregados finos de clorita e grãos opacos, exibindo em conjunto formas prismáticas; ocasionalmente esses agregados são portadores de relictos de piroxênio de cor verde intenso. Por outro lado, encontram-se também piroxênios frescos, prismáticos até fibrosos, que aparecem em áreas de zeólita intersticial, nitidamen

te de cristalização tardia (Fotomicrografia 5). Os únicos minerais acessórios reconhecidos foram grãos opacos associados com biotita.

Os agregados de feldspato e nefelina, presentes nas rochas como "manchas" ovóides, consistem de um agregado de cristais xenomórficos de feldspato potássico com nefelina no seu interior, formando intercrescimentos que, uma vez de granulação grossa, lembram a textura gráfica e, quando finos a muito finos, adquirem aspecto de intercrescimento vermicular, semelhante ao de cristais mirmequíticos.

A alteração das rochas é variável; em geral as nefelinas contêm abundante cancrinita, em particular os cristais de menor tamanho.

2.2.2. Região do interior do maciço (B, Fig.3)

Nefelina sienitos híbridos

As rochas desse corpo representam tipos faciográficos variados, que se distinguem de outros nefelina sienitos da região pelo aspecto "manchado" e cor cinza-rósea.

O fácies petrográfico mais comum é um nefelina sienito leucocrático, de granulação média a grossa, com textura foiaítica, no qual os feldspatos tabulares a placóides exibem tamanhos muito variáveis, conferindo às rochas aspecto seriado. Os feldspatos de maior tamanho (até 1,5 cm) possuem cores acinzentadas, e os menores são esbranquiçados. As nefelinas são geralmente de aspecto vítreo e cor acinzentada a rósea devido à alteração, possivelmente de natrolita. Os cristais são subidimórficos e ocorrem entre as placas de feldspato; grãos menores de nefelina aparecem incluídos nos cristais maiores de feldspato. O mineral máfico mais freqüente é piroxênio, presente como cristais prismáticos idiomórficos, ou então, como agregados pequenos e irregulares de vários cristais. Em algumas variedades

Fotomicrografias 5, 6, 7 - Piroxênios de nefelina sienitos

5 - Prismas de piroxênio de cristalização tardia em pseudoleucita nefelina sienito. Os prismas acham-se totalmente localizados numa área rica em zeólitas entre grãos de feldspato potássico com abundante alteração. A porção inferior do feixe de prismas (preto-cinza escuro) é de cor marrom, com pleocroísmo muito fraco; o prisma da esquerda (cinza médio) é de cor verde intenso, além de pleocróico: os prismas finos da direita mostram cristais sobrepostos de piroxênio na forma de pente. X 12,5; nicóis paralelos; filtro laranja.

6 - Agregado de cristais zonados em nefelina sienito híbrido. Os cristais estão fraturados, com as fraturas por vezes preenchidas por material de alteração. Observam-se as inclusões idiomórficas de nefelina (brancas) no interior do piroxênio (cinza claro) e, em adição, que os grãos opacos subidiomórficos, principalmente de magnetita, se concentram nas partes externas do núcleo e nas zonas de egirina-augita (cinza médio claro). As bordas de egirina-augita muito sódica e egirina (cinza médio mais escuro) não apresentam inclusões. X 25; nicóis paralelos; filtro verde.

7 - Cristais prismáticos com bordas poiquilíticas em nefelina sienito fino ocidental. Observa-se que apenas alguns grãos de pequeno porte são totalmente poiquilíticos. X 10; nicóis paralelos; filtro verde.

Fotomicrografia 5

Fotomicrografia 6

Fotomicrografia 7

observam-se comumente áreas intersticiais ocupadas por natrolita de cor amarelo-marrom.

Nas regiões próximas ao contato com os tinguaiños encaixantes, encontram-se claras evidências de assimilação de xenólitos de tinguaiño. Os xenólitos são via de regra arredondados, de granulação muito fina ou afaníticos, mostrando por vezes sinais de recristalização. A recristalização é visível, sobretudo, em alguns xenólitos ostentando zonalidade textural, com bordas de granulação mais grossa, que acompanha os seus contornos no contato com os nefelina sienitos.

Às vezes, notam-se regiões de contato mal definidas, aparentemente transicionais para nefelina sienitos típicos, contendo rochas com texturas mais finas e cores cinzentas mais escuras; estas áreas são interpretadas como resultantes de estágios mais avançados de assimilação de tinguaiños.

Observa-se ao *microscópio* que existem notáveis diferenças texturais entre os nefelina sienitos híbridos de granulação média e os de granulação grossa. Nos primeiros, a nefelina ocorre como pequenos cristais idiomórficos incluídos nos grãos placóides-irregulares de feldspato potássico (Fotomicrografias 8 e 9); raramente observam-se agregados xenomórficos intersticiais de nefelina. Já nas rochas de granulação grossa, a maior parte da nefelina apresenta-se na forma de cristais subidiomórficos de até 2 mm de diâmetro, localizados entre as placas de feldspato potássico de tamanho variável; os feldspatos possuem raras inclusões idiomórficas de nefelina; em geral essas inclusões são subidiomórficas e acham-se alojadas junto às bordas dos feldspatos maiores (Fotomicrografia 10). O feldspato potássico é ortoclásio, geminado segundo Carlsbad, e também com indícios de geminação em grade nas rochas de granulação grossa.

Em todas as rochas, os piroxênios exibem zoneamento, com núcleos incolores augíticos ($\gamma_A c = 35-37^\circ$) corroídos, rodeados por zonas finas de egirina-augita verde, com caracterís

Fotomicrografias 8 e 9 - Relações texturais entre feldspato potássico e nefelina em nefelina sienitos híbridos de granulação média

8- Grãos maiores, tabulares a irregulares, de feldspato potássico, com abundantes inclusões pequenas de nefelina idiomórfica. A direita, cristal tabular de feldspato com geminação de Carlsbad. No canto superior esquerdo aparece principalmente piroxênio. X 10; nicóis cruzados; filtro branco.

9- Detalhe da fotomicrografia anterior. X 25; nicóis cruzados; filtro branco.

Fotomicrografia 8

Fotomicrografia 9

ticas ópticas variáveis; esta disposição configura um zoneamento contínuo para as bordas, comumente incompleto, de piroxênio egirínico ($\alpha_{Ac} \approx 0-30$). Os poucos cristais isolados de piroxênio indicam que as zonas mais internas de egirina-augita são idiomórficas, enquanto que as bordas mais sódicas ocorrem intersticialmente aos feldspatos. A maior parte do piroxênio está presente como agregados, associados a titanita idiomórfica e grãos opacos; os últimos encontram-se comumente incluídos nas partes mais externas dos núcleos augíticos e também nas zonas de egirina-augita, junto com titanita, estando ausentes nas bordas egirínicas. Os núcleos dos grãos de piroxênio estão geralmente livres de inclusões, à exceção de alguns cristais pequenos e idiomórficos de nefelina (Fotomicrografia 6). Além dos cristais zonados, são também comuns os agregados fibrosos de piroxênio egirínico. Como principais minerais acessórios incluem-se titanita e grãos opacos; nas rochas de granulação média, encontram-se cristais frescos de giannetita xenomórfica; uma única amostra de granulação média a grossa apresenta placas de biotita marrom avermelhada, com zoneamento fraco. A alteração das rochas é muito variável. Nas de granulação grossa, ela é mais intensa, com as nefelinas exibindo abundante alteração principalmente para cancrinita e natrolita subordinada; já as rochas de granulação média aparecem em geral menos afetadas.

Os nefelina sienitos finos, próximos ao contato com tinguaitos, possuem características texturais e mineralógicas semelhantes aos de granulação média. Aquelas rochas contêm cristais de feldspato potássico, ortoclásio, com inclusões idiomórficas de nefelina, além de piroxênios de distribuição homogênea. Os piroxênios aparecem como cristais individuais de bordas poiquilíticas, em muitos casos sem núcleos augíticos, e também na forma de agregados fibrosos intersticiais. Os grãos opacos e a titanita são menos frequentes; giannetita em grãos xenomórficos, frescos, de aspecto esponjoso, é abundante. Nesses nefelina sienitos a alteração é mais rara.

Fotomicrografias 10 e 11 - Relações texturais entre feldspato potássico e nefelina em nefelina sienitos híbridos de granulação grossa e nefelina sienitos porfiríticos do Serrote

10- Nefelina sienito híbrido de granulação grossa. Porção esquerda da fotomicrografia, cristal de feldspato potássico com algumas inclusões pequenas de nefelina e abundante alteração fina. Observa-se na parte central a presença de dois grãos subidiomórficos de nefelina de tamanho médio, com as linhas de clivagem acentuadas face à alteração, sobretudo de cancrinita. Outros grãos de nefelina aparecem também no canto inferior direito. X 12,5; nicóis cruzados; filtro verde.

11- Nefelina sienito porfirítico do Serrote, matriz da rocha.

Cristais idiomórficos de nefelina com abundante alteração para natrolita mostrando prismas muito finos de piroxênio egirínico alinhados paralelamente às suas bordas. Entre os grãos de nefelina ocorre piroxênio egirínico intersticial de hábito fibroso (preto). À direita, cristais tabulares de feldspato potássico com alteração fina (cinza claro-médio), com os espaços triangulares entre os feldspatos ocupados essencialmente por natrolita. X 12,5; nicóis paralelos; filtro verde.

Fotomicrografia 10

Fotomicrografia 11

2.2.3. Região do Morro do Serrote (C, Fig.3)

Nefelina sienitos com eudialita do Serrote

O fácies característico consiste de nefelina sienitos maciços de granulação média a grossa e coloração em geral esbranquiçada. Os feldspatos maiores, centimétricos, possuem cor branca e hábito tabular a placóide, às vezes de contorno irregular. Esses feldspatos conferem às amostras aspecto textural tipicamente foiaítico; contudo, observam-se variações gradacionais nos tamanhos dos feldspatos que chegam a atingir até dimensões milimétricas. Os cristais menores são de coloração cinzenta semelhante à da nefelina, esta presente como grãos subidiomórficos, às vezes xenomórficos e intersticiais aos feldspatos. As rochas são leucocráticas ou mesmo hololeucocráticas, com teores de piroxênio inferiores a 5%. Esse mineral exibe hábito prismático a acicular, e ocorre ora como prismas isolados, ora como pequenos agregados de poucos prismas; às vezes, observam-se também agregados de piroxênio fibroso. Dentre os minerais acessórios, destaca-se a eudialita, em proporções raramente superiores a 3% ocorre como cristais isolados intersticiais ou em agregados milimétricos, comumente associados a piroxênios e outros acessórios. A distribuição da eudialita é irregular, tanto em escala de amostra de mão como de afloramento; por vezes, outros minerais de metais raros, à sua exceção, acham-se presentes. É também comum a ocorrência de agregados pegmatóides de contorno irregular, ou como veios pouco extensos, contendo concentrações anormalmente elevadas de eudialita; a mudança de granulação marcando a passagem da rocha normal para a pegmatóide é brusca.

Localmente observam-se outras variedades de nefelina sienitos, que se caracterizam pela cor cinza médio a forte e granulação fina, com o piroxênio na forma de prismas idiomórficos isolados e homogeneamente distribuídos. Nestas rochas, a eudialita está ausente ou então presente em pequenas quantidades.

Percebe-se ao *microscópio* que a textura mais comum é a hipidiomórfica granular antes que a foiaítica; esta é visível apenas em algumas amostras. Os feldspatos potássicos tabulares aparecem às vezes agrupados, a exemplo do que sucede com os grãos subidiomórficos de nefelina. O feldspato é microclínio com geminação de Baveno e típica geminação em grade (ver Fotomicrografia 18, item 3.3.1). Em algumas rochas, o feldspato potássico, e notadamente a nefelina, possuem abundantes inclusões prismáticas finas de um mineral incolor de aspecto semelhante àquele presente nas nefelinas de alguns chibinitos. Inclusões de piroxênio são raras e ocorrem nas bordas de alguns feldspatos de maior tamanho, bem como nas raras nefelinas xenomórficas. Os cristais de piroxênio egirínico mostram hábito prismático, aparecendo ora como cristais isolados maiores, de até 2 mm de comprimento, ora como agregados de poucos cristais de menor tamanho, associados a titanita idiomórfica; os prismas maiores mostram marcado zoneamento setorial. É comum observar-se a presença de arfvedsonita no interior de alguns cristais. Piroxênios prismáticos tardios (hidrotermais ou deutéricos) são também muito frequentes, formando agregados fibrosos intersticiais, ou então prismas de cor e pleocroísmo variável (azul, amarelo, etc.) totalmente localizados em áreas intersticiais ocupadas por zeólitas; via de regra encontram-se associados a um mineral fibroso-esferulítico de cor marrom, igualmente reconhecido nos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte. Os acessórios incluem titanita idiomórfica e vários silicatos de metais raros de ocorrência intersticial, os mais abundantes correspondendo a eudialita, lamprofilita e rinquita. Cancrinita e natrolita são os principais minerais de alteração, substituindo inteiramente a nefelina em algumas amostras.

Nefelina sienitos cinzas do Serrote

Trata-se de um pequeno corpo na forma de dique, aparentemente limitado por falhas em partes do seu percurso (Fig. 3). O fácies petrográfico consiste de rochas de cor cinzenta escura, de granulação média a grossa, e textura hipidio-

mórfica inequigranular; a nefelina forma pequenos cristais isolados, enquanto que o piroxênio aparece em quantidades variáveis, às vezes reduzidas. Pequenos cristais de pirrotita foram identificadas.

Observa-se ao *microscópio* que a textura é sempre hipidiomórfica, variando de fina a grossa em áreas diferentes da mesma lâmina petrográfica: as placas de feldspato potássico, principalmente ortoclásio, são sempre de maior tamanho que a nefelina subidiomórfica a xenomórfica associada. O piroxênio e-girínico ocorre em prismas finos agrupados, resultando numa típica textura em "*synneusis*". Por vezes, feldspatos e nefelinas acham-se totalmente separados por agregados prismáticos de piroxênio; esses rodeiam as nefelinas e ocasionalmente aparecem incluídos nos cristais xenomórficos. Essas rochas contêm biotita, de cor amarelo a marrom, portadora de zoneamento semelhante ao descrito para o caso das micas dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte; o mineral ocorre em quantidades menores, tanto no interior dos cristais de piroxênio, como em palhetas finas intersticiais. Outros minerais presentes incluem titanita, fluorita, opacos e grãos pequenos de um mineral de cor vermelha, sem pleocroísmo, não identificado; vez por outra foram observados agrupamentos de cristais de astrofilita. O mineral de alteração mais comum é a cancrinita, enquanto que natrolita ocorre mais raramente.

Nefelina sienitos com biotita do Serrote

Trata-se de um conjunto de tipos facirológicos encontrados num corpo de dimensões reduzidas que, em partes, está em contato direto com os nefelina sienitos com eudialita do Serrote (Fig. 3).

O fácies mais característico, e que empresta nome ao conjunto, consiste de rochas cinzentas, com textura hipidiomórfica levemente inequigranular, de granulação grossa, nas quais o máfico predominante, ou mesmo único, é a biotita (apro-

ximadamente 3%); o mineral ocorre ora como agregados irregulares intersticiais, ora como uma superposição de pequenas placas, de contornos pseudo-hexagonais e dimensões milimétricas. Ao lado da biotita, tem-se também piroxênio prismático. Variedades de nefelina sienito de granulação média e texturas mais foliáticas foram igualmente reconhecidas, com biotita e piroxênio prismático aparecendo em quantidades semelhantes.

Nas vizinhanças do pequeno corpo de nefelina sienitos cinzas (Fig. 3), encontram-se tipos faciológicos diferentes dos anteriores. Em geral são rochas de granulação média a média-grossa, com piroxênio egirínico como máfico principal ou único, além de pouca ou nenhuma biotita. Caracterizam-se também pela presença de sulfetos (pirita e pirrotita); numa amostra colhida perto do contato com os nefelina sienitos cinzas, os sulfetos ocorrem em agregados intersticiais milimétricos.

A observação *microscópica* demonstra claramente as diferenças texturais e as variações no teor de minerais máficos dos diversos fácies do corpo. As rochas constituintes do fácies característico possuem cristais grandes tabulares de feldspato potássico, principalmente ortoclásio, incluindo nefelina, e às vezes com o aspecto de intercrescimento gráfico; a nefelina acha-se muito alterada em natrolita e cancrinita. Entre os feldspatos ocorrem grãos e agregados de grãos subidiomórficos de nefelina, igualmente alterados em natrolita e cancrinita. As placas de biotita aparecem dispersas no interior das rochas; quando fresco, esse mineral possui cor amarelo a marrom avermelhado e forte pleocroísmo; por vezes a mica mostra-se muito cloritizada.

De ocorrência rara, o piroxênio está presente em algumas rochas como indivíduos intersticiais de hábito prismático, ou como agregados fibrosos de cristalização tardia; em outras o mineral inexistente, aparecendo no entanto agregados finos de clorita e material opaco sem contornos geométricos, que poderiam ter-se originado da sua alteração. Os minerais acessórios comuns são titanita, opacos e fluorita, além de raros e peque-

nos cristais do mineral de cor vermelha, igualmente comum aos nefelina sienitos cinzas do Serrote.

Nas rochas do fácies com textura foiaítica, de granulação média, notam-se alguns grãos maiores xenomórficos de feldspato potássico, com bordas poiquilíticas, bem como alguns cristais maiores de nefelina subidiomórfica com alteração para cancrinita; esses contêm inclusões de opacos e de prismas finos de piroxênio egirínico, alinhados paralelamente às bordas daqueles cristais. Os feldspatos potássicos, predominantemente ortoclásio, possuem geminação de Carlsbad, e geminação em grade pouco desenvolvida, além de observada unicamente nos feldspatos poiquilíticos. Piroxênio egirínico e biotita ocorrem em quantidades semelhantes e mostram-se homogeneamente distribuídos no interior das rochas; ora acham-se agrupados, em associação com opacos, titanita idiomórfica e fluorita, ora formam cristais independentes. Os piroxênios são prismáticos, sendo muito raros os agregados fibrosos tardios. Por vezes, as placas de biotita marrom a marrom avermelhado exibem zoneamento; a sua ocorrência é intersticial, apresentando raramente contornos subidiomórficos; quando associada ao piroxênio, as evidências texturais sugerem que ela substitui aquele mineral (ver Fotomicrografia 23, item 6.1.3.).

As rochas coletadas nas imediações do contato com os nefelina sienitos com eudialita do Serrote (Fig. 3) mostram textura hipidiomórfica granular média e caracterizam-se por possuírem unicamente piroxênio, em agregados de prismas finos distribuídos homogeneamente, com textura em "*synneusis*" como mineral ferromagnésiano. Nelas, encontram-se minerais de metais raros (lamprofilita, rinquita, etc.), ausentes nos fácies típicos do corpo de nefelina sienitos com biotita.

Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote

Trata-se de variedade faciológica de nefelina sienitos muito peculiar, com afloramentos situados a oeste do Morro do Serrote, e restritos à área que bordeja, como expressão to

pográfica marcada, a parte oriental do Vale do Quartel (na Fig. 1, item 1.1., o Vale do Quartel estende-se desde Águas da Prata para o norte, estando ocupado por uma faixa longitudinal de rochas piroclásticas). O fácies é representado por mais de uma dúzia de corpos pequenos, com formas irregulares até alongadas, aflorando desde a localidade de Cascata, ao norte, até Águas da Prata, ao sul (Fig. 1); alguns desses corpos estão indicados na Fig. 3. Todos eles são intrusivos em tinguaitos, o mais setentrional ocorrendo em parte encaixado em tufitos e brechas vulcânicas.

O tipo faciológico mais característico é nitidamente porfirítico, com fenocristais idiomórficos de feldspato potássico branco, mais placóide do que tabular, com tamanhos variáveis de alguns milímetros até um máximo de 1,0 cm, e constituindo desde 15 até 40-45% da rocha. Os fenocristais exibem com frequência acentuada orientação planar. A matriz possui coloração cinzenta esverdeada a avermelhada, granulação fina a média, e consiste essencialmente de abundante nefelina alterada, de aspecto vítreo, e feldspato de dimensões menores. O piroxênio está presente em proporções menores que 10%, e ocorre geralmente como prismas curtos ou agregados irregulares; alguns prismas maiores são milimétricos, vindo ocasionalmente a formar fenocristais. A maioria das rochas apresenta claros sinais de alteração com feldspatos brancos, nefelinas de aspecto vítreo convertidas em natrolita, e áreas intersticiais isoladas de natrolita.

Uma segunda variedade faciológica, aparentemente limitada aos corpos menores, mostra fenocristais de feldspato branco em matriz cinzenta fina a muito fina composta de nefelina e feldspato e, menos comumente, piroxênio prismático a irregular. Esses nefelina sienitos representam muito provavelmente um fácies de resfriamento mais rápido.

Ressalta-se ao *microscópio* o caráter porfirítico dessas rochas; fenocristais placóides de feldspato potássico estão imersos em matriz hipidiomórfica granular com feldspa-

tos potássicos tabulares e nefelinas idiomórficas, em grãos isolados ou como agrupamentos. Os feldspatos e as nefelinas apenas raramente apresentam contato mútuo, estando separados, às vezes por piroxênio em placas intersticiais ou em agregados fibrosos tardios e, geralmente, por natrolita. Os feldspatos correspondem a microclínio com geminação de Carlsbad e típica geminação em grade. A nefelina encontra-se quase completamente alterada em natrolita. Em todos os grãos nota-se a presença de faixa fina de inclusões paralela ao contorno regular dos cristais; essas inclusões são de pequenos prismas de piroxênio egirínico (Fotomicrografia 11, item 2.2.2.). Os piroxênios formam raros cristais prismáticos de até 2 mm, ou, mais freqüentemente, grãos menores intersticiais ou ainda agregados fibrosos tardios. Por vezes, os cristais são zonados, com núcleos pequenos de egirina-augita verde pálido e fraco pleocroísmo, passando bruscamente a egirina-augita verde intenso com pleocroísmo forte. Os agregados fibrosos são de piroxênio egirínico. O único mineral acessório presente, de ocorrência rara, é a titanita subidiomórfica. Por outro lado, natrolita, como produto de alteração da nefelina, aparece em grande quantidade.

2.2.4. Região ocidental do Anel Norte (D, Fig.3)

Nefelina sienitos ocidentais com fluorita

Ocorrem na forma de dique encaixado nos tinguai-
tos na parte setentrional do grande dique anelar, estendendo-se por mais de 5 km com percurso ligeiramente curvo (Fig. 3).

O fácies predominante acha-se representado por rochas hololeucocráticas de cor cinzenta e textura hipidiomórfica inequigranular grossa. Os feldspatos ocorrem como grãos tabulares a irregulares, de dimensões às vezes centimétricas, ora idiomórficos ora xenomórficos. As nefelinas formam cristais menores intersticiais aos feldspatos. Os minerais ferromagnesianos raramente ultrapassam 2 a 3% modal, aparecendo biotita como máfi-
co único ou dominante acompanhado de...

fibroso. A biotita é intersticial, ocorrendo, ora como placas de tamanhos milimétricos, ora como agregados de palhetas finas, irregularmente orientadas. Uma característica adicional desse fá-cies consiste na presença de grãos isolados de fluorita, pirita e magnetita, ainda que em quantidades muito reduzidas.

Observa-se por vezes a existência de um fá-cies de borda constituído de rochas de granulação média com piroxênio prismático a fibroso, como máfico único ou dominante; essas rochas possuem também pirita, fluorita e magnetita.

Ao *microscópio*, destaca-se prontamente o caráter inequigranular dessas rochas; assim, entre os agregados de grãos maiores xenomórficos de feldspato potássico e nefelina co-mumente intercrescidos, ocorrem quantidades menores de cristais subidiomórficos dos mesmos minerais, de tamanho milimétrico, num arranjo tipicamente foiaítico. Os cristais de feldspato exibem geminação de Carlsbad e em grade muito fina. As placas de biotita, invariavelmente intersticiais, e de dimensões inferiores a 2 mm, possuem cor marrom avermelhado e contém comumente fases opacas como inclusões. A biotita associa-se a titanita subidiomórfica. As rochas são frescas, conquanto os cristais de nefelina mostrem alguma alteração para cancrinita.

Nefelina sienitos ocidentais com eudialita

Este é um nome coletivo dado a um conjunto de tipos faciológicos que afloram como um corpo de dimensões médias na porção ocidental do maciço (Fig. 3).

→ O tipo faciológico dominante é constituído de rochas com índice de coloração entre 5 e 10%, e tendências porfiríticas. Nota-se a presença de poucos cristais de feldspato centimétrico tabulares a placóides, esbranquiçados, em meio a uma matriz de granulação média a média-grossa, com feldspatos de menor tamanho, nefelinas e piroxênios prismáticos ou mesmo ainda placóides. Os silicatos de metais raros (eudialita, além

de outros não identificados) aparecem em pequenas proporções, em torno de 2-3%, ou estão mesmo ausentes. A eudialita, em especial, acha-se distribuída de maneira muito irregular, tanto na escala de blocos e afloramentos, como, às vezes, até na escala de amostras de mão.

→ Um segundo tipo faciológico é semelhante aos nefelina sienitos finos do Anel Norte de granulação fina a média (ver descrição em páginas precedentes, e também Fig. 3). As rochas ostentam textura foiaítica a hipidiomórfica equigranular, com feldspato tabular ou placóide, e contêm aproximadamente 5 a 10% de piroxênio prismático. Nessas rochas, eudialita está ausente, reconhecendo-se contudo a presença de poucos cristais intersticiais de um silicato não identificado, de cor marrom-amarelado. As observações de campo sugerem que esse fácies é mais comum junto às bordas do corpo (H.H.Ulbrich, em preparação).

Um terceiro tipo faciológico, mais rico em eudialita, encontra-se muito bem delimitado, e resulta provavelmente de concentrações locais de substâncias voláteis e elementos raros. As rochas correspondentes aparecem como um fácies inequigranular, de granulação grossa, com textura foiaítica; feldspatos centimétricos tabulares, nefelinas subidiomórficas milimétricas e piroxênios geralmente prismáticos, às vezes placóides, são os seus principais constituintes minerais. A eudialita é intersticial, ocorrendo como cristais isolados e alcançando por vezes quantidades superiores a 5%. Essas rochas afloram nos extremos setentrional e meridional do corpo, em contato com nefelina sienitos ocidentais (Fig. 3).

Observa-se ao *microscópio* que a matriz média a grossa das rochas do fácies dominante exhibe textura hipidiomórfica levemente inequigranular, com feldspatos potássicos tabulares e, às vezes, de contorno irregular, contendo inclusões subidiomórficas de nefelina e de prismas finos de piroxênio. Por sua vez, as nefelinas aparecem como grãos subidiomórficos de tamanho pouco menor que o feldspato. Nas placas de feldspato potássico (micro-

clínio), reconhecem-se geminação de Carlsbad, Baveno e em grade. Os cristais de nefelina possuem abundantes inclusões finas prismáticas de um mineral não identificado (parecido com rinquita), já mencionado em alguns fácies de chibinitos. O piroxênio egirínico forma cristais de hábito com tendência prismática, trazendo bordas poiquilíticas intersticiais; ocorre como grãos isolados, ou então, em agrupamentos de poucos cristais associados, às vezes, com titanita subidiomórfica e opacos de contornos corroídos. Zoneamento setorial é visível nos cristais maiores de piroxênio. Como minerais acessórios aparecem titanita, opacos, eudialita (rara), rinquita, giannetita e alguns grãos pequenos de um mineral vermelho, sem pleocroísmo, igualmente reconhecido nos nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote. Alguns grãos opacos são idiomórficos, enquanto que outros, mostrando contornos corroídos, possuem às vezes bordas finas de um mineral marrom-avermelhado com forte pleocroísmo (enigmatita?); a giannetita forma cristais de 2 a 3 mm de diâmetro, com as bordas convertidas num agregado de grãos opacos pequenos e material muito fino, pulverulento, marrom-avermelhado.

Nas rochas do fácies com textura foiaítica fina a média, nota-se a presença de cristais maiores xenomórficos de feldspato potássico com abundantes inclusões de nefelina e, ocasionalmente, de piroxênio, dispostas junto às bordas dos grãos, e deixando límpidos os seus núcleos. Algumas rochas do fácies contêm mais raramente grãos idiomórficos de sodalita e analcima, além de albita tabular; a albita encontra-se comumente inclusa nos grãos de feldspato potássico que, nestas ocasiões, apresenta abundantes pertitas finas (ver Fotomicrografia 13, item 3.2) e também geminação em grade, esta pobremente desenvolvida em outros cristais da mesma litologia. O piroxênio egirínico, de distribuição homogênea, ocorre, ora como prismas idiomórficos isolados ou em agrupamentos de poucos cristais, ora em grãos intersticiais, relativamente à nefelina, mostrando porém contatos interpenetrantes com o feldspato potássico. É comum encontrar-se arfvedsonita de contorno irregular no interior dos prismas de piroxênio. Os minerais acessórios são os mesmos das rochas do fácies

característico do corpo; a giannetita forma abundantes grãos intersticiais, frescos e poiquilíticos com aspecto esponjoso, semelhantes aos descritos para os nefelina sienitos híbridos de fácies de borda. Nas amostras investigadas microscopicamente, não foi reconhecido o mineral marrom-amarelado visível nas amostras de mão.

As rochas do fácies exibindo textura foiaítica grossa são semelhantes às descritas acima; nelas observa-se claramente que o anfibólio arfvedsonítico substitui o piroxênio prismático (Fotomicrografia 24, item 6.2.3). Por outro lado, mostram-se também mais ricas em silicatos de minerais raros que as rochas de granulação fina a média.

As rochas dos vários fácies são por vezes totalmente frescas, com quantidades mínimas de natrolita e cancrinita como produtos de alteração de nefelina; outras amostras, no entanto, contêm tanto nefelina como feldspato fortemente alterados. Por vezes, as rochas de granulação mais grossa são portadoras de abundante analcima preenchendo os espaços existentes entre as ripas de feldspato.

Nefelina sienitos finos ocidentais

As rochas desse pequeno corpo, localizado no setor ocidental do maciço (Fig. 3), são semelhantes às dos nefelina sienitos finos do Anel Norte descritos em páginas anteriores. A sua granulação é mais fina (tamanho máximo 2-3 mm) e a textura é foiaítica. O piroxênio é o único mineral ferromagnésiano presente, ocorrendo na forma de pequenos prismas, ou então, como cristais intersticiais irregulares.

Ao *microscópio*, observa-se que as rochas exibem textura predominantemente foiaítica, com grãos subidiomórficos de nefelina dispostos entre os cristais tabulares de feldspato potássico; contudo, a presença de alguns grãos maiores, xenomórficos e poiquilíticos (com inclusões de nefelina e piroxênio), de

feldspato potássico confere a essas rochas aspecto porfirítico. Colocados entre os minerais félsicos predominantes, ocorrem alguns grãos ou agregados de sodalita subidiomórfica, além de albita tabular, com características similares às já descritas para outros nefelina sienitos de Poços de Caldas. Os feldspatos apresentam geminação de Carlsbad e em grade fina; comumente são também pertíticos. Os piroxênios aparecem unicamente como prismas curtos, idiomórficos, com bordas poiquilíticas, e acham-se distribuídos homogeneousmente no interior das rochas (Fotomicrografia 7, item 2.2.1). Numa única lâmina petrográfica, foram observados cristais de piroxênio com núcleos augíticos ($\gamma_{Ac} = 35^\circ$) corroídos, semelhantes aos assinalados para os nefelina sienitos finos do Anel Norte e nefelina sienitos híbridos. É comum encontrar-se arfvedsonita, de contorno mais ou menos irregular, nos núcleos dos cristais de piroxênio. Os minerais acessórios correspondem a opacos, titanita idiomórfica e giannetita. A giannetita está presente como grãos xenomórficos, frescos, de aspecto esponjoso e distribuição homogênea. A alteração das rochas é incipiente, aparecendo natrolita, cancrinita e analcima como principais produtos.

Tabela 1

Principais características petrográficas dos vários nefelina sienitos de Poços de Caldas

Corpos e Fácies

Resumo das características macroscópicas

ANEL NORTE
Corpos lujauríticos
ocidental e oriental

<i>Lujauritos I</i>	Rochas inequigranulares de aspecto gnáissico, px acicular, formando "folhas". FK placóide-laminar; máficos aproximadamente 30%. Eud em cristais intersticiais, formando "manchas" (até 10%). Ver moda (amostras: 46a, 46b).
<i>Lujauritos II</i>	De borda, mais fino que Lu I, com menos eud. Aspecto gnáissico. Ver moda (amostras: 134; 161).
<i>Nefelina sienitos traquitóides I</i>	Externo ao Lu II. FK placóide orientado. Px prismático isolado. Textura traquitóide fina a média. Eud, e outros SMR, muito abundantes. M ±10. Ver moda (amostra: 163).
<i>Nefelina sienitos traquitóides II</i>	Semelhante ao NeS traquitóide I. Textura traquitóide média a grossa. Hololeucocrática. Eud muito rara. Ver moda (amostra: 164).
<i>Chibinitos</i>	Fácies mais externo. Rochas de granulação grossa, geralmente maciças. Textura hipidiomórfica inequigranular com FK centimétrico; px isolado em placas centimétricas irregulares poiquilíticas (hábito "chibinitico"). Eud e outros SMR abundantes intersticiais; eud formando "manchas". M ±10-20. Ver moda (amostras: 47, 173).
Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte	
<i>Fácies predominante</i>	Rochas inequigranulares hipidiomórficas de cor cinza. FK placóide de bordas irregulares; ne pequena intersticial ou incluída no FK. Hololeucocráticas, maciças, granulação grossa. Sem SMR (só aparecem no contato com lujauritos). Ver moda (amostras: 222, 220).
<i>Fácies com nefelina centimétrica</i>	Rochas hololeucocráticas maciças com textura hipidiomórfica, granulação grossa. FK e ne milimétricos a centimétricos, cinzentos. Sem SMR.
Chibinitos de Botelhos	
<i>Fácies característico</i>	Rochas maciças com textura foiaítica, granulação grossa. FK placóide-laminar; ne intersticial; px como cristais placóides isolados poiquilíticos de hábito chibinitico. Eud (e outros SMR) intersticiais, aproximadamente 5%. Eud xenomórfica. M ±15-25. Ver moda (amostra: 410).
<i>Fácies mais fino</i>	Semelhante ao anterior, com granulação média (fácies de borda?). Passagem rápida para o fácies grosseiro no afloramento. Px prismático. Pobre em eud. M ±10-15. Ver moda (amostra: 462).
<i>Fácies pegmatóide</i>	Semelhante ao fácies característico, granulação mais grossa. Passagem rápida no afloramento para outros fácies.
<i>Fácies bandado</i>	Semelhante ao fácies característico. Bandas irregulares milimétricas a centimétricas, com predomínio de FK ou px. Px com hábito chibinitico. Ocorre na parte central do corpo.
Chibinitos orientais (corpo com afloramentos esparços, mal definidos)	
<i>Fácies predominante</i>	Rochas maciças com textura foiaítica inequigranular média a grossa FK placóide-laminar, centimétrico; ne intersticial. Px às vezes com hábito chibinitico. Eud intersticial, até 5-7%, outras vezes, escassa. M ±10. Ver moda (amostra: 543).
Nefelina sienitos finos do Anel Norte (dois corpos no Anel Norte; afloramentos esparços, também dentro do chibinito oriental)	
<i>Fácies característico</i>	Rochas com textura foiaítica, granulação fina a média (por vezes média a grossa), aspecto "manchado": FK maiores, brancos, placóides idiomórficos; ne cinzenta. Pouco px (3-5 até 10%), prismático. Sem SMR, ou muito raros. Ver moda (amostras: 540, 541).

Tabela 1 (continuação)

Corpos e Fácies	Resumo das características macroscópicas
Pseudoleucita nefelina sienitos (corpo bem definido; fâcies de borda(?) sem pseudoleucitas)	Pseudoleucitas globulares-arredondadas (raramente idiomórficas), de até 10-15 cm; às vezes, até 50% da rocha. Matriz hipidiomórfica fina a média; ocasionalmente porfirítica com FK centimétrico. Px isolado, escasso, e palhetas de bio. Intercrescimentos irregulares de FK e ne como "manchas" de pseudoleucita. Sem SMR. Ver moda (amostras: 482E, 482D).
<i>Fácies característico</i>	
REGIÃO DO INTERIOR DO MACIÇO	
Nefelina sienitos híbridos (o corpo mais importante do Planalto aflora desde a Pedreira da Prefeitura, perto da cidade de Poços de Caldas, até aproximadamente o Morro do Serrote).	
<i>Fácies característico</i>	Rochas de granulação média a grossa, com textura foiaítica inequigranular, ocasionalmente com tendência porfirítica (FK centimétrico). Típico aspecto "manchado" e cor dominante esbranquiçada a cinza-rósea. FK maiores, cinza-róseos; FK menores, ne, etc., esbranquiçados. Leucocráticas, px como pequenos agregados irregulares. Às vezes, natrolita secundária como manchas características marrom-amareladas. SMR raros ou ausentes. Ver moda (amostras: 235, 236, 37).
REGIÃO DO MORRO DO SERROTE	
Nefelina sienitos com eudialita do Serrote (corpo bastante homogêneo, domina o fâcies característico)	
<i>Fácies característico</i>	Rochas maciças de textura foiaítica, algo inequigranulares; cor esbranquiçada dominante. FK idiomórficos, brancos, centimétricos, tabulares-placóides; ne, etc. intersticiais. Px prismático, cristais isolados. Eud em escassos cristais isolados (1-3%). Distribuição irregular de eud e outros SMR. M ±5-10%. Ver moda (amostra: 364).
Nefelina sienitos cinzas do Serrote (pequeno corpo com forma aproximada de dique, em parte limitado por falhas(?))	
<i>Fácies característico</i>	Rochas maciças de cor cinza escuro com textura hipidiomórfica, granulação média a grossa. FK cinzentos, hipidiomórficos. Px como agregados, bio intersticial. Sem SMR; as vezes sulfetos como acessórios. M ±10-15. Ver moda (amostra 178).
Nefelina sienitos com biotita do Serrote (corpo em contato com os nefelina sienitos com eudialita; pouco homogêneo; mal definido, em parte afloramentos escassos).	
<i>Fácies com biotita</i> (parte setentrional do corpo)	Rochas maciças de cor cinza escuro, hololeucocráticas. Textura hipidiomórfica de granulação média a grossa, com FK irregular-placóide, em parte poiquilítico. Rara bio, geralmente como único máfico (3-5%), de distribuição homogênea, em lâminas isoladas ou agregados. Sem SMR. Ver moda (amostra: 311).
<i>Fácies com biotita e pirrotina</i> (parte meridional do corpo)	Rochas leucocráticas com textura hipidiomórfica a foiaítica, granulação média a grossa, com FK esbranquiçado-cinzentos. Px prismático e agregados de bio. Às vezes, com sulfetos (pirita, pirrotina?). Ver moda (amostra: 314).

Tabela 1 (continuação)

Corpos e Fácies

Resumo das características macroscópicas

Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote (vários corpos pequenos, intrusivos em tinguaítos; muito homogêneos faciologicamente)

Fácies característico

Rochas porfiríticas com FK brancos, centimétricos, placóides e idiomórficos, em matriz fina a média, com FK menores, ne, pouco px prismático e natrolita secundária de aspecto vítreo. Fenocristais de FK, em proporções de 15-40%, freqüentemente orientado. M -5. Ver moda (amostra: 358).

REGIÃO OCIDENTAL DO ANEL NORTE

Nefelina sienitos ocidentais com fluorita (corpo na forma de dique, alongado por vários kms, em contato quase direto com embasamento; faciologicamente homogêneo).

Fácies característico

Rochas de cor cinza claro, hololeucocráticas. Textura hipidiomórfica inequigranular, média a grossa. FK centimétrico a milimétrico, irregular. Escassa bio (1-3%), em agregados, com opacos associados. Rara fluorita como acessório constante. Sem SMR. Ver moda (amostra: 525).

Nefelina sienitos ocidentais com eudialita (corpo faciologicamente muito heterogêneo; alternam-se afloramentos com 2-3% de eudialita e outros sem eudialita. Afloramentos escassos, geralmente blocos rolados. Vários corpos pequenos, diferentes?).

Fácies característico

Rochas com textura foiaítica, granulação média a grossa, tendência porfirítica. FK tabular, até centimétrico, com FK menores, ne e px. Px prismáticos isolados. Eud e outros SMR escassos (2-3%), como cristais intersticiais heterogeneamente distribuídos. M ±10. Ver moda (amostras: 513, 531).

Fácies rico em eudialita

Rochas maciças com textura foiaítica, granulação média a grossa. Px prismático. Eud intersticial como cristais isolados, localmente até 10%.

Fácies sem eudialita

Rochas parecidas aos NeS finos do Anel Norte; maciças de granulação fina a média. Textura foiaítica a hipidiomórfica. Px prismático. Eud ausente; outros SMR raros. M ±10-15. Ver moda (amostra: 522).

Nefelina sienitos finos ocidentais

Fácies característico

Rochas cinzentas com textura foiaítica fina. Macroscopicamente semelhantes aos NeS finos do Anel Norte. Px prismático (5 até 15%). SMR escassos ou ausentes. Ver moda (amostra: 530).

bio = biotita

FK = feldspato potássico

ne = nefelina

px = piroxênio

eud = eudialita

M = índice de coloração

NeS = nefelina sienito

SMR = silicatos de metais raros

Tabela 2

Análises modais de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Corpos	Lujauríticos ocidental e oriental					Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte		Chibinitos de Botelhos		Chibinitos orientais	Pseudoleucita nefelina sienitos(matriz)	Nefelina sienitos finos do Anel Norte
Fácies	Lujauritos		Nefelina sienitos traquitóides		Chibinitos	Gran. grossa	Gran. média	Gran. grossa	Gran. média			
Amostras	I	II	I	II								
	46a(1)	134(1)	163(1)	164(1)	47(1)	222(1)	176(1)	410(2)	462(1)	543(1)	482E(1)	540(1)
	46b(1)	161(1)			173(1)	220(1)					482D(2)	541(1)
Feldspato potássico	38,2	46,0	49,3	49,2	59,0	58,4	52,8	45,4	51,7	54,0	61,0	50,3
Nefelina	24,8	24,9	27,7	30,2	18,6 ^a	33,8 ^a	34,9 ^c	24,8 ^a	34,9	31,9 ^a	33,2 ^b	36,0 ^a
Albita		0,8	1,0	2,2					1,0			1,9
Analcima ^d	tr	8,8	8,5	7,3	tr			3,0	1,8	tr	0,4	tr
Sodalita ^e				tr	0,2			1,6	0,2	tr		
Piroxênio	27,3	17,1	8,6	5,8	10,1	4,2	9,4	17,2	7,1	9,1	3,0	8,2
Anfibólio	0,7								tr			
Biotita						1,1	0,3				1,4	0,2
Titanita, Fluorita, Grãos opacos	tr				0,2	0,9	1,0		0,3	0,8	1,0	2,0
<i>Silicatos de metais raros</i>												
principalmente eudialita	7,6	1,6	4,1	0,9	7,9	tr	0,4	5,2	2,6	3,8		
principalmente giannetita												
outros ^f	1,4	0,8	0,8	4,4	4,0	1,6	1,2	2,8	0,4	0,4		1,4

a, b, c: nefelina com abundante alteração; inclui às vezes alteração intersticial com relictos de nefelina

a: predominância de natrolita ou natrolita e analcima;

b: principalmente cancrinita;

c: alteração de natrolita e cancrinita, com ou sem analcima.

d, e: analcima ou sodalita em grãos idiomórficos a subidiomórficos.

f: inclui astrofilita, lamprofilita, rinquita e outras espécies não identificadas.

Tabela 2 (continuação)

Corpos	Nefelina sienitos híbridos		Nefelina sienitos com eudialita do Serrote	Nefelina sienitos cinzas do Serrote	Nefelina sienitos com biotita do Serrote		Nefelina sienitos porfiritico do Serrote	Nefelina sienitos ocidentais com Fluorita	Nefelina sienitos ocidentais com eudialita		Nefelina sienitos finos ocidentais
Fácies	Gran. grossa	Gran. fina a grossa	Gran. grossa		Gran. grossa	Gran. média			Gran. grossa (porfiritica)	Gran. média (de borda)	
Amostras	235(1) 236(1)	37(1)	364(2)	178(1)	311(1)	314(1)	358(1)	525(1)	513(1) 531(1)	522(1)	530(1)
Feldspato potássico	55,2	53,4	58,4	52,9	58,7	53,4	58,4	65,7	54,4	53,0	45,6
Nefelina	31,7 ^c	27,6	29,0 ^c	29,6 ^b	36,0 ^c	35,5 ^c	34,1 ^a	32,4	31,3 ^a	31,0	34,6 ^c
Albita										1,2	0,9
Analcima ^d										tr	tr
Sodalita ^e										0,4	1,6
Piroxênio	10,1	15,3	9,5	15,4	1,9	5,8	7,2		11,0	10,5	13,1
Anfibólio										tr	
Biotita				1,3	2,6	3,0		1,2			
Titanita, Fluorita, Grãos opacos	3,0	2,8	tr	0,8	0,8	2,3	0,3	0,7	0,6	0,2	0,6
<i>Silicatos de metais raros</i>											
Eudialita			2,9						1,4		
Giannetita		0,9							0,2	1,8	2,4
Outros ^f			0,2	tr					1,1	1,9	1,2

CAPÍTULO 3

FELDSPATOS ALCALINOS: QUIMISMO, ESTADO ESTRUTURAL E PETROLOGIA

Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas, os feldspatos são os minerais mais importantes, já que constituem aproximadamente 2/3 dessas rochas. Em geral dominam os feldspatos ricos em K, aqui denominados de *feldspatos potássicos*, sendo *albita* rara ou mesmo inexistente na maioria dos tipos petrográficos analisados.

Antes de discutir o quimismo e as feições ópticas e cristalográficas dos feldspatos alcalinos (feldspatos potássicos e albita), é útil fazer-se um breve resumo das suas características gerais, tanto químicas, quanto estruturais, recorrendo-se à nomenclatura adotada na literatura universal.

3.1. QUÍMICA E ESTRUTURA

Em termos gerais, a estrutura dos feldspatos consiste de unidades tetraédricas $(\text{Si}, \text{Al})\text{O}_4$ unidas pelos vértices, formando um arcabouço tridimensional de tectossilicato, com cavidades relativamente grandes ocupadas pelos cátions, essencialmente K, Na e Ca nos feldspatos alcalinos. São as chamadas posições M com coordenações octaédricas ou superiores. Esses sítios podem ser também ocupados por outros cátions, notadamente Ba. Este elemento é facilmente incorporado à estrutura dos feldspatos, face ao fato de possuir a mesma carga que o cálcio e um raio iônico semelhante ao do potássio. Segundo Heier (1962), não existem razões cristalográficas indicando que o cálcio deva ser mais abundante que o bário nos feldspatos alcalinos; aliás como observado por Herz e Dutra (1966) e Smith (1974b), muitos feldspatos potássicos possuem teores maiores em bário do que em cálcio. Além do bário, outros elementos traços podem ocorrer nos feldspatos, chegando mesmo a adquirir a importância de elementos menores; es

te é o caso do Sr, um elemento bivalente possuindo raio iônico intermediário entre o do cálcio e o do potássio (Smith, 1974b). Os maiores teores de estrôncio e menores de bário ocorrem nos feldspatos contendo quantidades de potássio relativamente baixas (Long, 1978). O teor em SrO nos feldspatos varia entre 100 e 2000 ppm (Smith, 1974b), conquanto concentrações mais elevadas, da ordem de 0,5% em média, tenham sido determinadas por Heier (1966) em nefelina sienitos da região de Stjernby, Noruega.

Nas unidades tetraédricas, as posições correspondentes, denominadas de sítios T, podem ser ocupadas adicionalmente por pequenas quantidades de Fe^{3+} . Teores de Fe_2O_3 de até 1,0% foram encontrados por Nash *et al.* (1969) em anortoclásios de lavas fonolíticas do vulcão de Mount Suswa, Kenya; contudo, a maioria dos ortoclásios e microclínicos contém 0,2% ou menos de Fe_2O_3 .

Independentemente dessa distribuição de cátions, tem-se também um ordenamento na posição de Si e Al na estrutura dos feldspatos. Nestes, as características cristaloquímicas requerem que a relação Si:Al seja sempre mantida em 3:1, não obstante o ordenamento relativo desses elementos nos feldspatos triclinicos mostre-se diferente do ordenamento nos monoclinicos. Nos esquemas da Fig.5 (Ribbe, 1975), observam-se os quatro sítios possíveis (T_1^0 , T_1^m , T_2^0 , T_2^m) para o alojamento de Al em cada anel tetraédrico do arcabouço dos tectossilicatos.

Nos cristais de menor simetria, correspondentes ao grupo espacial triclinico $C\bar{1}$ (Fig. 5c), o Al concentra-se no sítio T_1^0 , uma das 4 posições estruturais possíveis (T_1^0 e T_1^0c acham-se relacionados pelo centro de simetria). No entanto, face à possibilidade de substituição de Si por Al, este último pode preencher qualquer das outras posições tetraédricas até o limite em que cada sítio T aparece estatisticamente ocupado por Al através da estrutura, mantendo sempre as proporções estequiométricas de 1/4 Al e 3/4 Si. Neste caso, todas as posições tetraédricas tornam-se equivalentes e a simetria passa a ser monoclini

Figura 5 - Arcabouço tetraédrico dos feldspatos (reprodução de Ribbe, 1975).

a) Projeção parcial idealizada, no plano (001), na qual identifica-se a nomenclatura dos diferentes sítios, tais como aparecem em cristais triclinicos; b) Nos feldspatos monoclinicos (grupo espacial $C2/m$), o alumínio não tem localização preferencial, existindo, portanto, somente 2 sítios diferentes, T_1 e T_2 . Na figura os sítios aparecem diferenciados para permitir a comparação com cristais triclinicos; c) Nos cristais de microclínio máximo (grupo espacial $C\bar{1}$), o alumínio concentra-se nos sítios T_{10} (círculo vazio) e aparece também nos sítios T_{1Oc} devido ao centro de simetria (representado por pequeno círculo no interior da unidade estrutural). A ocupação das posições tetraédricas, em termos da probabilidade de encontrar-se alumínio em cada sítio estrutural, é indicada ao pé das figuras.

ca de grupo espacial C2/m (Fig. 5b), surgindo um plano de simetria e um eixo binário, ausentes no grupo espacial C $\bar{1}$.

Com a letra t (minúscula), identifica-se a probabilidade de encontrar Al ocupando uma determinada posição (Kroll, 1971; citado em Ribbe, 1975), tal que, por exemplo, t_1^o representa a probabilidade de encontrar-se Al nos sítios T_1^o . No estado estrutural totalmente ordenado, chamado de "microclínio máximo", tem-se $t_1^o=1,0$, $t_1^m=t_2^o=t_2^m=0,0$; o outro extremo, o estado totalmente desordenado, ou da "sanidina de alta temperatura", possui $2t_1=2t_2=0,5$; já na "sanidina de baixa temperatura" e no "ortoclásio" $2t_1 > 0,5$ e $2t_2 = 1,0 - 2t_1$.

A caracterização do estado estrutural dos feldspatos alcalinos pode ser feita em função das propriedades ópticas e, principalmente, cristalográficas.

3.2. QUIMISMO DE FELDSPATOS ALCALINOS DOS DIFERENTES FÁCIES DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

Em geral existem várias características comuns aos feldspatos potássicos analisados. São feldspatos potássico-sódicos pertencentes óptica e estruturalmente à série microclínio-ortoclásio, comumente ricos em K_2O , portadores de teores de Na_2O raramente excedendo a 2%, e com cálcio presente em quantidades muito pequenas ou mesmo aparecendo como elemento traço. Ferro, provavelmente como Fe_2O_3 , e exibindo coordenação tetraédrica, é encontrado na maioria dos cristais, onde ocorre substituindo o alumínio. Não obstante, existe a possibilidade de que em alguns feldspatos parte do Fe_2O_3 detectado seja devido à presença de partículas finíssimas de óxidos de ferro.

As somas catiônicas dos elementos nas posições T (Si, Al, Fe^{3+}) aproximam-se de 16 (Tabelas 3 a 13), uma vez calculadas as fórmulas na base de 32 oxigênios, do mesmo modo que a soma nos sítios M responde à estequiometria.

Em alguns fácies petrográficos encontra-se, em quantidades subordinadas, um tipo granular-tabular de albita praticamente pura (98-100% de Ab), aqui chamada de *albita tabular* para diferenciá-la da variedade pertítica. Esta albita, de dimensões semelhantes às dos outros grãos da rocha, forma cristais frescos e geminados segundo as leis da albita e albita - Carlsbad, de hábito geralmente tabular e bordas irregulares a onduladas; na maioria das vezes, encontra-se parcial ou totalmente inclusa em cristais maiores de feldspato potássico (Fotomicrografias 12 e 13).

Os resultados da análise dos feldspatos potássicos obtidos com a microsonda integram as Tabelas 3 a 13, juntamente com as fórmulas estruturais e proporções moleculares de ortoclásio, albita e anortita, que, por sua vez, aparecem representadas no diagrama ternário da Fig.6. Os dados relativos à albita tabular constam da Tabela 14.

Cabe mencionar que todas as rochas portadoras de albita tabular contêm também feldspato potássico pertítico. Este intercrescimento é muito heterogêneo, porquanto a distribuição da albita pertítica afigura-se irregular, tanto dentro de um determinado cristal, como no corpo da lâmina; em geral os cristais pertíticos encontram-se próximos aos da albita tabular, indicando que essas fases guardam relação genética entre si. A distribuição homogênea da albita pertítica através de todos os cristais de feldspato potássico somente foi observada nos nefelina sienitos finos do Anel Norte. Nessas rochas foram também reconhecidas estruturas de intercrescimento, sugerindo a substituição de feldspato potássico por albita. Algumas poucas tentativas de determinação com a microsonda da composição da albita pertítica revelaram tratar-se de albita sódica (aproximadamente Ab_{99}), semelhante no quimismo às albitas tabulares.

A seguir, acham-se resumidas as características químicas dos feldspatos de diversos corpos de nefelina sienitos.

Fotomicrografias 12 e 13 - Relações texturais entre feldspato potássico e albita tabular

12- Cristal tabular de albita com geminação polissintética em contato com feldspato potássico em Iujaurito II. Nota-se que nas proximidades daquele cristal, o feldspato potássico a apresenta pertitas de contorno irregular (branco) e abundante alteração fina; nessa região ocorre também geminação múltipla. X 32; nicóis cruzados; filtro branco.

13- Cristais de feldspato potássico (cinza) e albita (branco) em nefelina sienito ocidental com eudialita. As placas menores de albita, de contorno mais ou menos irregular, estão incluídas no feldspato potássico. Nota-se a presença de abundantes pertitas do tipo colar (*string*) localizadas perto dos cristais de albita. O feldspato potássico possui geminação em grade boa e muito fina, porém, não visível na fotomicrografia. X 25; nicóis cruzados, filtro branco.

Fotomicrografia 12

Fotomicrografia 13

1. Corpos lujauríticos ocidental e oriental. Os vários fácies que constituem cada um desses corpos mostram-se muito diferentes tanto no que se refere à textura, quanto à petrografia, conquanto os feldspatos potássicos guardem semelhanças químicas (Tabelas 3 a 5; Fig. 6, nºs 1,2,3). Zoneamento químico foi reconhecido nos feldspatos dos lujauritos I, de granulação grossa, e nos dos chibinitos. Nestes últimos, os núcleos são mais ricos em Na (Tabela 5, *ams. 169 e 47*), enquanto que nos lujauritos I o zoneamento, quando presente, é oscilatório. Por outro lado, os feldspatos dos nefelina sienitos traquitóides e dos lujauritos II são homogêneos.

Contrariamente às rochas de granulação grossa, albita tabular está presente nos nefelina sienitos traquitóides I e II e nos lujauritos II. As análises (Tabela 14) indicam valores de 98-100% para a molécula de albita, ou seja, que se trata do membro albita pura. Uma única amostra de rocha de granulação grossa, um chibinito encontrado perto do contato com tinguaitos (*am.142*), apresenta ripas idiomórficas finas de albita.

2. Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte. Apesar da granulação grossa dessas rochas, com cristais atingindo até 2 cm, os seus feldspatos são quimicamente muito homogêneos (Tabela 6; Fig. 6, nº 4), com apenas uma única amostra (*500*) apresentando núcleos mais sódicos que as bordas.

3. Chibinitos de Botelhos e chibinitos orientais. À exceção apenas de duas amostras do corpo de Botelhos (*462*, pequeno afloramento isolado em tinguaito, (ver Fig.3); *480* tipo pegmatóide), que se apresentam mais enriquecidas em Na_2O (Tabela 7; Fig.6, nº 5), as demais possuem feldspatos de composição química homogênea. Albita tabular ocorre somente em amostras perto do contato com o tinguaito.

4. Nefelina sienitos finos do Anel Norte. Foram analisadas três amostras de feldspatos pertíticos (Tabela 8;

Tabela 3
Composição química de feldspatos potássicos de corpos lujauríticos - Lujauritos I e II

	Corpo ocidental						Corpo oriental			
	I	I	II	II	II	I	I	II		
	46a	46b	134	161	126	505	175	217		
	Z	Z				Z	Z			
SiO ₂	64,3	64,3	64,2	64,7	64,5	64,7	64,4	64,8	64,8	64,8
Al ₂ O ₃	18,0	18,1	18,1	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,1	18,2
Fe ₂ O ₃ ¹	0,54	0,59	0,68	0,46	0,58	0,66	0,28	0,09	0,53	0,76
CaO	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Na ₂ O	1,05	1,05	1,57	1,85	1,54	1,52	0,52	1,34	1,38	1,65
K ₂ O	15,8	15,6	14,5	14,3	14,5	14,4	15,8	15,0	15,0	14,5
Total	99,72	99,66	99,08	99,34	99,25	99,50	99,22	99,56	99,84	99,93
Fórmula estrutural ²										
Si	11,946	11,941	11,950	11,992	11,974	11,973	11,993	11,989	11,978	11,951
Al	3,951	3,970	3,965	3,929	3,954	3,962	3,989	3,993	3,939	3,958
Fe	0,076	0,082	0,095	0,063	0,081	0,091	0,039	0,012	0,074	0,105
Ca	0,006	0,004	0,006	0,006	0,006	0,004	0,004	0,006	0,006	0,004
Na	0,378	0,378	0,568	0,665	0,555	0,545	0,189	0,479	0,497	0,590
K	3,744	3,693	3,442	3,382	3,434	3,399	3,752	3,539	3,541	3,415
Z ³	15,973	15,993	16,010	15,984	16,009	16,026	16,021	15,994	15,991	16,014
X ³	4,128	4,075	4,016	4,053	3,995	3,948	3,945	4,024	4,044	4,009
Or ⁴	91,1	91,1	86,4	84,2	86,7	86,8	95,4	91,6	88,2	85,9
Ab	8,7	8,8	13,4	15,6	13,1	13,1	4,5	8,2	11,6	14,0
An	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1

Observações válidas para todas as tabelas de feldspatos:

- 1) Fe (total) calculado como Fe₂O₃.
- 2) Unidade de cálculo adotada para a fórmula estrutural = 32 oxigênios.
- 3) Posições estruturais: Z = Σ Si, Al, Fe e X = Σ Ca, Na, K.
- 4) Porcentagem em peso.
- 5) N = núcleo; B = borda dos cristais. Z = zonas de diferente composição em cristais com zoneamento oscilatório.

Tabela 4

Composição química de feldspatos potássicos de corpos lujaauríticos:

Nefelina sienitos traquitóides I e II

	Corpo ocidental		Corpo oriental	
	I	II	II	
	163	138	164	216
SiO ₂	64,2	63,9	64,7	64,4
Al ₂ O ₃	18,0	18,3	18,1	18,2
Fe ₂ O ₃	0,61	0,78	0,90	0,60
CaO	0,02	0,03	0,03	0,03
Na ₂ O	1,81	1,88	1,61	1,66
K ₂ O	14,6	14,6	14,6	14,2
Total	99,24	99,49	99,94	99,09

Fórmula estrutural

Si	11,942	11,875	11,948	11,957
Al	3,950	4,009	3,937	3,981
Fe	0,085	0,108	0,122	0,084
Ca	0,004	0,006	0,006	0,006
Na	0,654	0,676	0,575	0,600
K	3,468	3,459	3,438	3,367
Z	15,977	15,992	16,007	16,022
X	4,126	4,141	4,019	3,973
Or	84,9	84,3	86,2	85,5
Ab	15,0	15,5	13,6	14,3
An	0,1	0,2	0,2	0,2

Tabela 5

Composição química de feldspatos potássicos de corpos lujauríticos:
Chibinitos

	142	Corpo ocidental						Corpo oriental
		169		47		45	173	224a
		N	B	N	B			
SiO ₂	64,7	65,0	64,6	64,8	64,3	64,3	63,9	63,6
Al ₂ O ₃	18,6	18,2	18,1	18,0	18,2	18,3	18,2	18,0
Fe ₂ O ₃	0,09	0,44	0,44	0,37	0,46	0,22	0,27	0,11
CaO		0,03	0,03	0,02	0,03		0,02	
Na ₂ O	0,10	1,88	0,78	1,46	0,76	0,46	0,25	0,22
K ₂ O	16,6	14,6	15,4	14,6	15,8	16,4	16,5	17,8
Total	100,09	100,15	99,35	99,25	99,55	99,68	99,14	99,73

Fórmula estrutural

Si	11,969	11,965	11,995	12,011	11,950	11,954	11,949	11,924
Al	4,048	3,946	3,965	3,939	3,992	4,014	4,017	3,974
Fe	0,012	0,061	0,062	0,051	0,064	0,031	0,037	0,016
Ca		0,006	0,006	0,004	0,006		0,004	
Na	0,038	0,672	0,280	0,526	0,272	0,166	0,091	0,080
K	3,907	3,435	3,650	3,455	3,754	3,881	3,944	4,254
Z	16,029	15,972	16,022	16,001	16,006	15,999	16,003	15,914
X	3,945	4,113	3,936	3,985	4,032	4,047	4,039	4,336
Or	99,1	84,3	93,1	87,4	93,4	96,1	97,8	98,2
Ab	0,9	15,5	6,7	12,5	6,4	3,9	2,1	1,8
An		0,2	0,2	0,1	0,2		0,1

Figura 6

Tabela 6

Composição química de feldspatos potássicos de nefelinas sienitos
cinzas do Anel Norte

		222	131	49a	205b	551	176	432	500b
64,17	SiO ₂	64,2	64,2	64,3	63,9	63,7	63,9	64,8	64,4
18,09	Al ₂ O ₃	18,0	17,7	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	18,1
0,53	Fe ₂ O ₃	0,56	0,47	0,46	0,30	0,44	0,67	0,20	0,33
0,02	CaO		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03
0,97	Na ₂ O		0,20	0,17	0,28	0,37	0,39	0,68	1,17
16,2	K ₂ O	16,7	16,5	16,6	16,3	16,0	16,3	16,1	15,1
	Total	99,46	99,09	99,85	99,10	98,73	99,38	99,82	99,13

Fórmula estrutural

Si	11,985	12,019	11,951	11,951	11,950	11,936	12,011	11,981
Al	3,952	3,903	4,003	4,025	4,017	3,983	3,933	3,974
Fe	0,078	0,066	0,064	0,042	0,063	0,094	0,028	0,047
Ca		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,008	0,006
Na		0,073	0,061	0,103	0,134	0,141	0,245	0,423
K	3,974	3,939	3,934	3,886	3,824	3,880	3,813	3,583
Z	16,015	15,988	16,018	16,018	16,030	16,013	15,972	16,002
X	3,974	4,016	3,999	3,993	3,961	4,025	4,066	4,012
Or	100,0	98,2	98,5	97,5	96,7	96,6	94,1	89,9
Ab		1,7	1,4	2,4	3,2	3,3	5,7	10,0
An		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1

Tabela 7

Composição química de feldspatos potássicos de chibinitos

	Botelhos					Orientais		
	410	411b	476	462	480	544	550	548
SiO ₂	65,0	64,6	64,3	65,0	64,9	64,2	64,4	64,1
Al ₂ O ₃	18,3	18,0	18,0	18,6	18,5	18,4	18,5	18,6
Fe ₂ O ₃	0,22	0,09	0,17	0,34	0,47	0,28	0,07	0,07
CaO	0,01	0,01		0,02	0,02	0,01		
Na ₂ O	0,19	0,29	0,08	2,15	2,19	0,52	0,35	0,17
K ₂ O	16,4	16,5	16,6	13,7	13,2	16,4	16,6	16,6
Total	100,12	99,49	99,15	99,81	99,28	99,81	99,92	99,54
Fórmula estrutural								
Si	12,003	12,029	12,012	11,949	11,964	11,928	11,944	11,932
Al	3,987	3,937	3,966	4,021	4,016	4,035	4,050	4,084
Fe	0,031	0,012	0,023	0,048	0,065	0,035	0,009	0,009
Ca	0,002	0,002		0,004	0,004	0,002		
Na	0,068	0,106	0,030	0,766	0,784	0,189	0,124	0,061
K	3,862	3,926	3,955	3,222	3,111	3,886	3,930	3,934
Z	16,021	15,978	16,001	16,018	16,045	15,998	16,003	16,025
X	3,932	4,034	3,985	3,992	3,899	4,077	4,054	3,995
Or	98,3	97,5	99,3	81,6	80,8	95,6	97,1	98,6
Ab	1,6	2,4	0,7	18,3	19,1	4,3	2,9	1,4
An	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		

Tabela 8

Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos
finos do Anel Norte

	540	548		541	
		N	B	N	B
SiO ₂	65,4	64,8	65,0	64,6	64,2
Al ₂ O ₃	18,8	18,3	18,3	18,4	18,2
Fe ₂ O ₃	0,46	0,04	0,04	0,33	0,24
CaO	0,07	0,02	0,01	0,02	0,02
Na ₂ O	3,65	1,55	0,77	1,71	0,89
K ₂ O	11,0	15,4	16,2	14,7	15,7
Total	99,38	100,11	100,32	99,76	99,25
Fórmula estrutural					
Si	11,942	11,952	11,991	11,933	11,955
Al	4,043	3,990	3,974	4,012	4,003
Fe	0,063	0,006	0,006	0,046	0,034
Ca	0,014	0,004	0,002	0,004	0,004
Na	1,293	0,556	0,277	0,614	0,322
K	2,572	3,634	3,817	3,472	3,741
Z	16,048	15,948	15,971	15,991	15,992
X	3,879	4,184	4,096	4,090	4,067
Or	67,6	87,3	93,6	85,7	92,4
Ab	32,0	12,6	6,4	14,2	7,5
An	0,4	0,1		0,1	0,1

Fig. 6, nº 7), tomando-se as devidas providências com vistas à obtenção da composição total dos cristais. Na amostra 540, o feldspato possui 67,6% da molécula de ortoclásio e não apresenta zoneamento. As outras duas (541 e 548) contêm feldspato potássico zonado, com valores aproximados de $Or_{86}Ab_{14}$ no centro dos cristais e $Or_{93}Ab_7$ nas bordas, além de abundante albita tabular (Tabela 14).

5. Pseudoleucita nefelina sienitos. Este corpo possui feldspato potássico tanto nos agregados de pseudoleucita, como na matriz. As rochas são comumente de granulação média a grossa, com textura dominante do tipo foiaítico. Somente foram realizadas análises nos feldspatos da matriz que, além da composição homogênea, são ricos em Or (Tabela 9; Fig.6, nº 8).

6. Nefelina sienitos híbridos. Todos os minerais destas rochas apresentam considerável complexidade química. Nos feldspatos potássicos, as variações encontradas são de dois tipos: por um lado, zonalidade marcante, e por outro, composição química pouco comum, devido principalmente aos teores relativamente elevados de estrôncio. Em termos de composição, SrO alcança até 1,40% nos núcleos dos cristais, caindo nas bordas para 0,12% (Tabela 10). Como regra, os teores de cálcio são bem mais elevados que nos feldspatos dos outros nefelina sienitos, com os seguintes valores extremos: 0,36% de CaO no centro e 0,07% nas bordas. Bário está presente em quantidades semelhantes às do cálcio; contudo, como os dados são erráticos, eles deixaram de ser incluídos nas tabelas.

A zonalidade dos feldspatos potássicos é contínua do centro para as bordas. Em geral os núcleos são mais sódicos que as bordas, além de possuírem teores mais elevados de Sr, Ca e Ba; quando recalculados em termos dos componentes Or e Ab, chega-se a valores extremos bastante diferentes, por exemplo, na amostra 31 a composição dos núcleos é $Or_{56}Ab_{44}$ e a das bordas $Or_{81}Ab_{19}$. A Fig.7 mostra a relação entre Sr e Ca nos núcleos e bordas dos grãos. Em geral, nota-se maior variação na

Tabela 9
Composição química de feldspatos potássicos de pseudoleucita
nefelina sienitos

	482E	539	456
SiO ₂	64,2	64,7	64,4
Al ₂ O ₃	18,3	18,0	18,2
Fe ₂ O ₃	0,40	0,56	0,28
CaO	0,02	0,02	0,02
Na ₂ O	0,52	0,38	0,51
K ₂ O	16,2	16,2	16,1
Total	99,64	99,86	99,51

Fórmula estrutural

Si	11,944	11,995	11,979
Al	4,005	3,938	3,983
Fe	0,056	0,077	0,039
Ca	0,004	0,004	0,004
Na	0,190	0,136	0,185
K	3,844	3,833	3,828
Z	16,005	16,010	16,001
X	4,038	3,973	4,017
Or	95,5	96,6	95,6
Ab	4,4	3,3	4,3
An	0,1	0,1	0,1

Tabela 10

Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos híbridos

	236		238		31		384		386	
	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B
SiO ₂	64,9	64,6	65,3	64,4	64,7	65,2	65,3	65,0	65,1	64,7
Al ₂ O ₃	18,2	18,0	19,4	19,7	19,1	18,5	18,4	18,4	18,5	18,4
Fe ₂ O ₃	0,50	0,57	0,46	0,58	0,38	0,53	0,59	0,63	0,40	0,44
CaO	0,29	0,10	0,36	0,08	0,34	0,07	0,07	0,08	0,07	0,09
Na ₂ O	3,40	1,64	4,76	2,91	5,11	2,14	3,23	2,41	3,32	1,98
K ₂ O	10,9	14,50	9,04	12,9	9,3	13,4	12,3	13,7	12,0	13,7
SrO	1,3	0,14	1,38	0,33	1,40	0,27	0,27	0,23	0,27	0,12
Total	99,49	99,55	100,70	100,90	100,33	100,11	100,16	100,45	99,66	99,43

Fórmula estrutural

Si	11,941	11,971	11,806	11,739	11,792	11,950	11,938	11,920	11,939	11,950
Al	3,948	3,929	4,135	4,229	4,094	4,005	3,971	3,970	3,999	4,004
Fe	0,074	0,079	0,063	0,079	0,052	0,073	0,081	0,087	0,055	0,062
Ca	0,057	0,021	0,069	0,016	0,066	0,014	0,014	0,016	0,014	0,018
Na	1,226	0,591	1,669	1,030	1,806	0,761	1,147	0,858	1,181	0,711
K	2,562	3,434	2,084	2,988	2,163	3,123	2,858	3,209	2,816	3,235
Sr	0,137	0,015	0,145	0,035	0,148	0,028	0,028	0,025	0,029	0,012
Z	15,963	15,979	16,004	16,047	15,938	16,028	15,990	15,977	15,993	16,016
X [⊕]	3,982	4,061	3,967	4,069	4,183	3,926	4,047	4,108	4,040	3,976
Or	65,1	85,3	53,5	74,5	52,7	80,3	71,7	79,0	70,8	82,2
Ab	29,4	13,8	40,4	24,1	41,5	18,4	27,1	19,9	28,0	17,0
An	5,5	0,9	6,1	1,4	5,8	1,3	1,2	1,1	1,2	0,8

⊕ inclui Sr.

Figura 7 - Relação entre Sr e Ca nos feldspatos potássicos dos nefelina sienitos híbridos.

As linhas unem os centros dos grãos (círculos cheios) com as bordas (X).

composição química dos feldspatos nas rochas encontradas perto do contato com tinguaitos, antes que nas amostras do interior do corpo (384 e 386: ver Fig. 3).

Na Tabela 10 apresentam-se os valores médios para os núcleos e bordas de cristais representativos, dada a grande variação no quimismo e a dificuldade de obterem-se os dados completos para cada uma das zonas. Esses resultados acham-se projetados na Fig.6, nº 9.

7. Nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Os feldspatos potássicos destas rochas são muito homogêneos, além de ricos em ortoclásio (Tabela 11, Fig.6, nº 10). Zoneamento pouco pronunciado, com os núcleos mostrando-se mais sódicos que as bordas, somente foi encontrado numa única amostra do corpo (364), em feldspatos que ocorrem como pequenas ripas incluídas em nefelina.

8. Nefelina sienitos cinzas e Nefelina sienitos com biotita do Serrote. Os feldspatos potássicos de ambos os corpos são zonados, com aumento do teor de K_2O do centro para as bordas dos grãos, como é bem visível na amostra 178 (Tabela 11, Fig. 6, nº 11) do primeiro corpo. Os dados referentes às variedades portadoras de biotita constam da Tabela 11, e representam-se no gráfico nº 12 da Fig. 6.

9. Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote. Este fácies constitui mais de uma dúzia de corpos ocorrendo nas elevações que rodeiam o Vale do Quartel (ver Fig.3), apresentando características petrográficas pouco variadas. Neste trabalho, somente são apresentados os dados relativos à amostra 358, possuindo fenocristais tabulares em matriz de granulação média (Tabela 11, Fig. 6, nº 13).

10. Nefelina sienitos ocidentais com fluorita. Os feldspatos deste corpo são ricos em Or e homogêneos quanto ao quimismo, com a análise da Tabela 12 (Fig. 6, nº 14) tomada como

Tabela 11

Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos do Serrote

	porfirítico	com eudialita				cinza		com biotita			
	358	159	112b	364		178		341	314	321	311
				grãos maiores	pequenas inclusões	N	B				
SiO ₂	64,1	64,4	64,4	64,0	63,8	64,7	64,5	64,7	64,7	64,8	64,5
Al ₂ O ₃	18,1	18,4	18,1	17,9	18,5	18,2	17,6	18,1	18,1	18,4	18,1
Fe ₂ O ₃	0,04	0,06	0,07	0,20	0,78	0,34	0,55	0,50	0,39	0,44	0,53
CaO	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Na ₂ O	0,07	0,16	0,14	0,30	1,88	1,11	0,63	1,40	1,22	1,03	0,55
K ₂ O	16,7	16,7	15,9	16,6	14,0	14,5	15,6	15,1	15,0	14,6	16,1
Total	99,03	99,73	98,62	99,02	99,97	98,88	98,91	99,82	99,43	99,29	99,80

Fórmula estrutural

Si	11,996	11,972	12,040	11,996	11,875	12,012	12,041	11,963	12,000	11,994	11,978
Al	3,990	4,025	3,987	3,949	4,058	3,983	3,878	3,952	3,950	4,008	3,951
Fe ³⁺	0,006	0,008	0,009	0,028	0,108	0,048	0,078	0,069	0,054	0,062	0,074
Ca	0,004	0,002	0,002	0,004	0,002	0,006	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004
Na	0,027	0,057	0,049	0,107	0,680	0,400	0,229	0,504	0,441	0,368	0,197
K	3,995	3,953	3,793	3,968	3,318	3,447	3,723	3,574	3,540	3,449	3,810
Z	15,992	16,004	16,036	15,973	16,041	16,043	15,997	15,984	16,004	16,064	16,003
X	4,026	4,012	3,844	4,079	4,000	3,853	3,958	4,082	3,985	3,821	4,011
Or	99,3	98,6	98,7	97,5	83,8	90,0	94,4	82,2	89,5	90,7	95,2
Ab	0,6	1,4	1,3	2,4	16,1	9,8	5,5	11,7	10,4	9,2	4,7
An	0,1			0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Tabela 12

Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos
ocidentais, finos e com fluorita

	com fluorita 525		finos 530
		N	B
SiO ₂	64,3	65,1	64,4
Al ₂ O ₃	17,9	18,8	18,5
Fe ₂ O ₃	0,40	0,44	0,32
CaO	0,02	0,03	0,03
Na ₂ O	0,71	2,73	0,58
K ₂ O	15,8	12,9	15,8
Total	99,13	100,00	99,63

Fórmula estrutural

Si	11,995	11,917	11,946
Al	3,940	4,054	4,041
Fe	0,056	0,061	0,044
Ca	0,004	0,006	0,006
Na	0,258	0,968	0,207
K	3,765	3,008	3,741
Z	15,991	16,032	16,031
X	4,027	3,982	3,954
Or	93,9	76,6	94,9
Ab	6,0	23,2	5,0
An	0,1	0,2	0,1

representativa para o agrupamento.

11. Nefelina sienitos ocidentais com eudialita

Trata-se de um corpo com variações petrográficas bastante marcadas, semelhante nesse sentido aos chibinitos de Botelhos. Essa variação reflete-se também na composição dos feldspatos. Assim, conquanto as diferenças entre centros e bordas de grãos sejam relativamente pequenas, o intervalo composicional em algumas amostras é muito grande, indo de $\text{Or}_{99}\text{Ab}_1$ até $\text{Or}_{77}\text{Ab}_{23}$. Umas poucas amostras são ricas em albita tabular. As análises integram a Tabela 13 e acham-se representadas na Fig.6 nº 15.

12. Nefelina sienitos finos ocidentais. As rochas deste corpo possuem textura foiaítica fina, porém, apesar do pequeno tamanho das ripas de feldspato, sua composição é variável, passando de $\text{Or}_{77}\text{Ab}_{23}$ nos centros a $\text{Or}_{95}\text{Ab}_5$ nas bordas (Tabela 12, Fig. 6, nº 16). Albita intersticial ocorre abundantemente.

3.3. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

3.3.1. Geminação

O hábito mais comum dos feldspatos potássicos nos nefelina sienitos é o de ripas ou placas alongadas, paralelas à zona {010} dominante nos feldspatos "hipersolvus" (Sørensen, 1974a). As geminações simples são frequentes, principalmente segundo as leis de Carlsbad e de Baveno. Algumas variedades, por exemplo, os nefelina sienitos com eudialita do Serrote, mostram-se geminados segundo Baveno, sendo a lei de Carlsbad rara ou mesmo ausente. Além dessas geminações, aparece ainda uma outra, desenvolvida de forma muito variável, que merece descrição detalhada. Neste tipo, os indivíduos são muito finos e irregulares, formando "domínios" geminados, que podem aparecer de maneira restrita num cristal ou tomar conta de todo o grão. Os indivíduos são distinguíveis pelas mudanças nas posições de extinção e possuem limites irregulares, pouco precisos, inclusive quando obser

Tabela 13

Composição química de feldspatos potássicos de nefelina sienitos ocidentais com eudialita

	512	513	519	531		522		514	389
				N	B	N	B		
SiO ₂	64,2	63,9	64,3	64,3	64,8	64,7	65,1	64,8	64,8
Al ₂ O ₃	18,4	18,4	18,3	18,0	18,8	18,5	18,7	18,5	18,5
Fe ₂ O ₃	0,03	0,09	0,04	0,13	0,49	0,22	0,39	0,41	0,41
CaO			0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,03
Na ₂ O	0,08	0,19	0,21	0,25	1,46	0,80	2,73	1,82	2,40
K ₂ O	16,5	16,7	15,8	16,3	14,6	15,9	13,3	14,8	13,4
Total	99,21	99,28	98,66	99,00	100,17	100,14	100,25	100,34	99,54

Fórmula estrutural

Si	11,972	11,942	12,020	12,016	11,900	11,944	11,913	11,917	11,941
Al	4,048	4,044	4,022	3,966	4,081	4,026	4,033	4,014	4,015
Fe	0,005	0,012	0,006	0,019	0,068	0,031	0,053	0,057	0,057
Ca			0,002	0,004	0,004	0,004	0,006	0,002	0,006
Na	0,030	0,068	0,076	0,091	0,523	0,285	0,968	0,648	0,856
K	3,924	3,991	3,757	3,885	3,429	3,758	3,109	3,472	3,153
Z	16,025	15,998	16,048	16,001	16,049	16,001	15,999	15,988	16,013
X	3,954	4,059	3,835	3,980	3,956	4,047	4,083	4,122	4,015
Or	99,3	98,4	98,1	97,8	87,4	93,2	77,2	85,0	79,5
Ab	0,7	1,6	1,9	2,1	12,5	6,7	22,6	15,0	20,3
An				0,1	0,1	0,1	0,2		0,2

Tabela 14
Composição química de albita tabular

	Nefelina sienito traquitos I	Lujauritos II			Nefelina sienitos finos do Anel Norte
	163	134	161	126	541
SiO ₂	68,7	68,6	69,6	68,6	68,6
Al ₂ O ₃	19,4	19,2	19,3	19,1	19,3
Fe ₂ O ₃	0,16	0,22	0,34	0,21	
CaO					
Na ₂ O	11,6	11,5	10,5	11,7	11,9
K ₂ O	0,27	0,21	0,04		0,24
Total	100,13	99,73	99,88	99,61	100,04
Fórmula estrutural					
Si	11,993	12,018	12,112	12,016	11,995
Al	3,996	3,965	3,955	3,954	3,983
Fe	0,020	0,029	0,045	0,028	
Ca					
Na	3,914	3,894	3,544	3,988	4,016
K	0,060	0,047	0,009		0,054
Z	16,009	16,012	16,112	15,998	15,978
X	3,974	3,941	3,553	3,988	4,070
Or	1,6	1,2	0,3		1,4
Ab	98,4	98,8	99,7	100,0	98,6
An					

vados com objetivas de maior aumento. Geralmente essas áreas aprecem com aspecto "sujo" ou manchado, seja por constituírem-se em locais preferenciais de alteração fina, seja porque ali se concentram minúsculos cristais de óxidos de ferro, produtos de exsolução. Pouco pode ser dito sobre as relações de geminação entre os indivíduos constituintes dessas zonas, exceto que o aspecto geral é o da geminação em grade do microclínio, com a consequente presença das leis da albita e periclínio. Na literatura, são escassas as referências a esse tipo de geminação. Sørensen (1974a, p.28) apresenta uma figura ilustrando essa feição, e menciona que os diferentes indivíduos encontram-se interpenetrados e relacionados segundo a lei da albita. Essas áreas com geminação múltipla estão presentes na maioria dos nefelina sienitos de Poços de Caldas, com exceção das amostras de granulação fina a média dos nefelina sienitos híbridos, onde somente foi observada a geminação de Carlsbad.

A caracterização e sistematização da geminação múltipla é importante, porque representa, sem dúvida, um indício de triclinicidade, ilustrando opticamente o que foi confirmado através de estudos cristalográficos de raios X, ou seja, a existência, na maioria dos nefelina sienitos, de feldspatos exibindo pelo menos dois estados estruturais distintos (ver item 3.4.2 . relativo aos estudos de raios X).

Os diferentes tipos passíveis de caracterização são os seguintes.

*Gemin*ação múltipla incipiente: indivíduos pequenos e irregulares, interpenetrados, constituindo áreas esparsas dentro do cristal; fora dessas áreas, o cristal possui extinção "relâmpago", é limpo e sem geminação (Fotomicrografia 14).

Pobre: a maior parte do cristal aparece tomada pelas áreas com geminação múltipla, encontrando-se ainda algumas regiões com extinção "relâmpago" e sem geminação (Fotomicrografias 15 e 16).

Fotomicrografias 14, 15, 16 - Geminação múltipla em feldspatos potássicos.

14 - Cristal com geminação incipiente em lujauro I. Ortoclásio (cinza médio), com extinção ondulante, e portador de "veios" e áreas irregulares onde o mineral exibe geminação múltipla. Na parte inferior central observa-se uma área de microclínio, constituída de indivíduos pequenos interpenetrados (brancos e pretos). X 12,5; nicóis cruzados; filtro branco.

15 - Cristal ocupando o centro da fotomicrografia com geminação pobre em nefelina sienito traquitóide I (a mesma secção da Fotomicrografia 4). Ortoclásio (cinza médio homogêneo) corresponde à porção esquerda do cristal, enquanto que a parte à direita acha-se representada por microclínio com geminação múltipla fina (branco e preto). Nota-se que outros cristais tabulares e irregulares de feldspato potássico não apresentam geminação múltipla. X 12,5; nicóis cruzados; filtro branco.

16 - Cristal com geminação pobre em lujauro I. Áreas de microclínio (branco e preto) que se alternam com outras de ortoclásio (cinza médio homogêneo), na parte inferior do grão. Nas áreas de microclínio observa-se que os indivíduos estão principalmente relacionados por geminação segundo a lei da Albita (planos paralelos às faces 010 do cristal de feldspato). Grãos pretos de contorno irregular a arredondado (parte superior do cristal) representam produtos de alteração (zeólitas). X 12,5; nicóis cruzados; filtro branco.

Fotomicrografia 14

Fotomicrografia 15

Fotomicrografia 16

Boa: todo o cristal apresenta geminação múltipla do tipo descrito que, no entanto, é de aspecto muito variável. Em alguns casos, a geminação fina a muito fina é homogênea em todo o grão (Fotomicrografia 17); em outros, este aparece subdividido em áreas de contorno irregular com diferente orientação óptica, sendo que em cada uma dessas regiões o cristal exhibe geminação múltipla fina.

Muito boa: o cristal apresenta-se com um tipo de geminação em grade, onde os indivíduos independentes podem ser facilmente identificados; as relações entre os indivíduos geminados se fazem através das leis da albita e periclínio. O aspecto geral desta geminação é mostrado na Fotomicrografia 18.

A seguir, indicam-se os tipos de geminação múltipla presentes nos feldspatos potássicos dos vários fácies estudados.

1) *Feldspatos sem geminação ou com geminação incipiente.*

Nefelina sienitos híbridos.

2) *Feldspatos com geminação incipiente, pobre até boa.*

a) *Geminação incipiente predominante, com muitos cristais ainda sem geminação:*

nefelina sienitos traquitóides I e II dos corpos lujauríticos ocidental e oriental,

lujauritos II (idem ao anterior),

(nos nefelina sienitos traquitóides e nos lujauritos ocorrem às vezes cristais com geminação muito boa),

nefelina sienitos com biotita do Serrote.

b) *Predomina geminação pobre, com alguns cristais de maior tamanho apresentando geminação incipiente; escassos cristais com geminação muito boa:*

lujauritos I e chibinitos dos corpos lujauríticos ocidental e oriental.

Fotomicrografias 17 e 18 - Geminação múltipla em feldspatos potássicos.

17- Cristal de microclínio com geminação boa em lujauro II. A geminação múltipla fina ocupa todo o cristal tabular de feldspato. Nota-se que o feldspato potássico acha-se "atravessado" por um cristal de albita; outras placas finas de albita geminada aparecem na sua borda inferior. X 16; nicóis cruzados ; filtro branco.

18- Cristal de microclínio com geminação muito boa em nefelina sienito com eudialita do Serrote. Típica geminação em grade, onde os indivíduos se relacionam segundo as leis da albita e do periclínio. X 16; nicóis cruzados; filtro branco.

Fotomicrografia 17

Fotomicrografia 18

c) Predomina geminação boa, fina a muito fina; os cristais maiores, quando presentes, mostram geminação incipiente a pobre:
nefelina sienitos cinzas do Anel Norte,
chibinitos de Botelhos (exceto fácies pegmatóides e de contato),
chibinitos orientais.

d) Geminação incipiente a pobre em todos os grãos; predomina a geminação pobre:
pseudoleucita nefelina sienitos,
nefelina sienitos ocidentais com fluorita,
nefelina sienitos cinzas do Serrote.

3) *Feldspatos com geminação variável em diferentes amostras.*

a) Em algumas amostras, feldspatos com geminação incipiente a pobre e, em outras, com geminação muito boa:

nefelina sienitos finos do Anel Norte,
nefelina sienitos ocidentais com eudialita.

b) Feldspatos com geminação boa em algumas amostras, e muito boa em outras:

nefelina sienitos com eudialita do Serrote.

4) *Feldspatos com geminação muito boa.*

nefelina sienitos porfiríticos do Serrote,
fácies pegmatóides e de contato do corpo de chibinitos de Botelhos.

A Tabela 20 (item 3.5), resume as características ópticas, de geminação e estruturais dos feldspatos potássicos estudados.

3.3.2. Ângulos 2V

Os ângulos 2V foram medidos com platina universal nas áreas dos cristais sem geminação, e nos indivíduos de maior tamanho nas áreas com geminação múltipla. Os resultados

obtidos em amostras representativas são mostradas na Fig.8, na qual encontram-se também os dados comparativos tomados da literatura (Smith, 1974a). A orientação óptica é, em todos os casos, a do ortoclásio, ou seja, com plano dos eixos ópticos normal a (010).

Os cristais exibindo geminação múltipla muito boa deram valores de $2V_{\alpha}$ entre 76° e 84° , por exemplo, as amostras 548 (nefelina sienito fino do Anel Norte), 159 (nefelina sienito com eudialita do Serrote), e 512 (nefelina sienito ocidental com eudialita da Fig.8). Os grãos com geminação incipiente e pobre mostram duas áreas diferentes. Uma delas é limpa e sem geminação e apresenta comumente valores de $2V$ menores que 50° , como indicam os dados de alguns cristais da amostra 321 (nefelina sienito com biotita do Serrote), das amostras 500 e 551 (nefelina sienitos cinzas do Anel Norte) e um dos dados ($2V_{\alpha}=23^{\circ}$) do cristal com geminação pobre da amostra 482 E (pseudoleucita nefelina sienito), da Fig.8. Nas áreas geminadas, o $2V$ varia desde mais de 50° até menos de 70° , como se pode observar pelos valores obtidos na amostra 525 (nefelina sienito ocidental com fluorita), na amostra 540 (nefelina sienito fino do Anel Norte), e pelo valor de $2V_{\alpha}=50^{\circ}$ medido no cristal da amostra 482 E.

Como mencionado, não se observou geminação múltipla na maioria das amostras de nefelina sienitos híbridos, exceto em rochas de granulação grossa nas quais os feldspatos potássicos mostram indícios de geminação. Os feldspatos potássicos dos nefelina sienitos híbridos, contudo, raramente aparecem limpos, já que possuem partículas de óxidos de ferro distribuídas homogeneamente por todo o cristal. Na amostra 31 (Fig.8), $2V_{\alpha}$ varia de $54-56^{\circ}$ nos centros dos cristais a $44-46^{\circ}$ nas bordas.

3.3.3. Micropertitas

Nos cristais pertíticos, as lamelas de albita pertítica aparecem irregularmente distribuídas. As pertitas são do tipo colar (*string*) ou pérolas (*beads*); estão subparalelamente

Figura 8 - Relação entre o valor de $2V_{\alpha}$ e o teor de Or em feldspatos potássicos.

Gráfico superior - As linhas tracejadas referem-se às séries de Tuttle (1952): Mi, microclínio criptopertita; Or, ortoclásio criptopertita; S-A, sanidina-anortoclásio criptopertita; Ab, albita, de alta temperatura, e Sd, sanidina, de alta temperatura. As linhas cheias são de Smith (1974a), bem como a pontilhada delimitando campo na forma de domo onde ocorrem os feldspatos peritéticos.

Gráfico inferior - Projeção dos dados relativos às rochas de Poços de Caldas. Nos feldspatos dos nefelina sienitos, os valores diferentes de $2V_{\alpha}$ para o mesmo cristal são unidos por linhas cheias. Na amostra 31, a linha une centros de grãos (círculo cheio) com as bordas (cruz).

Figura 8

orientadas e concentradas em algumas regiões dos cristais, não relacionadas às bordas dos grãos. Por vezes, sua observação é extremamente difícil, devido à concentração de partículas finas de óxidos de ferro na fase hospedeira. Cabe destacar que nas áreas pertíticas dos cristais observa-se geminação de microclínio boa a muito boa, independentemente do tipo de geminação presente em outras áreas dos mesmos cristais, ou em outros cristais da amostra (Fotomicrografias 12 e 13, item 3,2).

3.4. ESTUDOS DE RAIOS X

Com o intuito de caracterizar o estado estrutural dos feldspatos potássicos, foram escolhidas amostras de granulação média a grossa, representativas dos diversos tipos de nefelina sienitos, para estudos com raios X. A lista das amostras estudadas encontra-se na Tabela 17 (item 3.4.2). Os difratogramas foram realizados no intervalo de $2\theta_{Cu}$ 10 a 85° , nas condições explicadas no Apêndice.

3.4.1. Metodologia específica

Foram vários os pesquisadores que estudaram a variação dos parâmetros da cela a , b , c , α , β , γ , nos feldspatos alcalinos homogêneos, em função da composição e das mudanças no estado estrutural, dado pelas relações de ordem-desordem de Si:Al (ver Smith, 1974a).

As relações e diagramas utilizados neste trabalho são as seguintes:

Estimativa quantitativa da triclinicidade

As variações no estado estrutural dos feldspatos são acompanhadas por deslocamentos das reflexões nos difratogramas de raios X. Algumas reflexões são muito sensíveis e desdobram-se ao passar da simetria monoclínica à triclínica. Uti

lizando essas reflexões, diversos autores propuseram fórmulas que permitem obter parâmetros quantitativos relativos a essas variações. Em particular, Goldsmith e Laves (1954) basearam-se nas variações entre os espaçamentos das reflexões 131 e $1\bar{3}1$, separadas nos cristais triclinicos. O parâmetro proposto é $\Delta_{131} = 12,5(d_{131} - d_{1\bar{3}1})$, e apresenta o valor de 1 no caso de trinicidade máxima, e de zero quando o cristal é monoclinico. Posteriormente, Smith (1974a) propôs um parâmetro semelhante, $\Delta_{130} = 7,8 (d_{130} - d_{1\bar{3}0})$, cujos valores máximo e mínimo são também 1 e zero. Entre os valores de triclinicidade do microclínio máximo ($\Delta_{131} = 1$ ou $\Delta_{130} = 1$) e do ortoclásio ($\Delta_{131} = 0$ ou $\Delta_{130} = 0$) existe toda uma série de estados estruturais nos feldspatos triclinicos, dando origem aos microclínios intermediários com valores de triclinicidade maiores que zero e menores que 1.

Diagrama das 3 reflexões

Este método utiliza o valor de 2θ (radiação $\text{CuK}\alpha$) das reflexões $\bar{2}01$, 060 e 204 (Wright, 1968). A reflexão $\bar{2}01$ é geralmente intensa e livre de interferências com outros picos e o $2\theta_{\bar{2}01}$ depende principalmente do parâmetro a da cela unitária, que muda com a composição do feldspato, mas é praticamente independente do estado estrutural (Tuttle e Bowen, 1958). Os $2\theta_{060}$ e $2\theta_{204}$ dependem dos parâmetros b e c , e são muito sensíveis a mudanças no estado estrutural dos feldspatos e pouco sensíveis a variações na composição, pelo menos no intervalo $0r_{50}$ a $0r_{100}$ (Wright e Stewart, 1968). A reflexão 060 é intensa e sem interferências. A reflexão $\bar{2}04$ aparece muitas vezes larga e mal definida, e deve-se recorrer a fórmulas adequadas (ver Wright, 1968) para estimar o $2\theta_{\bar{2}04}$.

O diagrama construído por esse autor (ver Fig.11) tem os valores de $2\theta_{\text{Cu}}$ das reflexões 060 e $\bar{2}04$ como coordenadas, com as quais os valores extremos formam um quadrilátero interior que é subdividido por meio de isolinhas (linhas de igual valor) de $2\theta_{\bar{2}01}$ Cu.

Diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$

Estes diagramas baseiam-se nas modificações que ocorrem nos parâmetros da cela à medida que se altera o estado estrutural dos feldspatos. Eles podem ser obtidos utilizando-se programas de computação, a partir de difratogramas completos indexados corretamente. Stewart (1975a) discute em detalhe a metodologia para obtenção dos parâmetros da cela por meio de difratogramas.

O diagrama $b-c$ foi proposto por Wright e Stewart (1968) e o $\alpha^*-\gamma^*$ (valores do retículo recíproco) por Mackenzie e Smith (1955). Stewart e Ribbe (1969) e Stewart e Wright (1974) deram-lhes a forma hoje utilizada. Nos diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$ (ver Figs. 15 e 16), os vértices dos quadriláteros interiores representam os valores dos parâmetros da cela para os extremos das séries sódico-potássicas de alta e baixa temperatura que são utilizados como referências. Os valores do parâmetro a estão indicados no diagrama $b-c$ por meio de isolinhas subverticais.

O diagrama $b-c$ está subdividido por linhas paralelas que indicam iguais teores de alumínio nos sítios T_1 , representados pela soma $t_{10}+t_{1m}$. As linhas paralelas que subdividem o diagrama $\alpha^*-\gamma^*$ representam a diferença no teor de alumínio nos sítios T_{10} e T_{1m} dada pela relação $t_{10}-t_{1m}$. O erro estimado tanto para $t_{10}+t_{1m}$, quanto para $t_{10}-t_{1m}$, é de 0,05 (Stewart, 1975b).

A utilização conjunta dos diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$ permite estimar a ocupação da cela unitária, ou seja, as proporções relativas de Si e Al destinadas às várias posições tetraédricas.

Anomalias nos parâmetros da cela

Os valores do parâmetro a e de $2\theta_{201}$ (reflexão que depende fortemente de a) podem ser obtidos independentemente nos diagramas $b-c$ e das três reflexões e , respectivamente, compa

rados com os valores experimentais, ou seja, com o valor de a calculado utilizando-se programas de computação e com o valor de $2\theta_{\bar{2}01}$ medido nos difratogramas. Muitas vezes os valores obtidos a partir dos diagramas não coincidem com os experimentais. Nesses casos, fala-se em "feldspatos com dimensões anômalas da cela". Segundo Wright (1968), Wright e Stewart (1968) e Stewart e Wright (1974), anomalias nos parâmetros da cela são indicadas quando o valor de a , obtido experimentalmente, excede em mais de 0,05 o valor estimado a partir dos diagramas $b-c$ (Δa) ou, alternativamente, quando o $2\theta_{\bar{2}01}$, derivado do diagrama das três reflexões, é maior que o $2\theta_{\bar{2}01}$ medido nos difratogramas numa quantia de $0,1^\circ$ ou mais ($\Delta 2\theta_{\bar{2}01}$).

As anomalias nos parâmetros da cela são atribuídas às tensões internas (*strain*) que ocorrem nos feldspatos (*strained feldspars*) possuindo criptopertitas coerentes. Nessas, somente visíveis aos raios X, o reticulado Si-Al é contínuo (ou coerente) na interfase das lamelas; no entanto, como as redes cristalinas das fases hospede e hospedeira possuem diferentes dimensões, seu ajuste gera tensões elásticas nos cristais.

Nos feldspatos com micropertitas, as lamelas de maior tamanho, visíveis ao microscópio, são incoerentes porquanto não há continuidade estrutural entre as fases hospede e hospedeira. Nestes casos, os cristais estão livres de tensões internas. Por outro lado, segundo mencionam Stewart e Wright (1974), existe uma relação direta entre as tensões internas nos feldspatos e a sua composição. Raramente existem tensões (*strain*) em feldspatos de composição muito potássica, visto que é mais provável que eles sejam homogêneos e, no caso da existência de exsolução, devem possuir pequenas quantidades de lamelas sódicas. Valores elevados de $\Delta 2\theta_{\bar{2}01}$ e/ou Δa podem ser reflexos de mudanças no quimismo, devidas, por exemplo, à presença de teores relativamente elevados de Rb, Cs, Ba, NH_4^+ , etc. (Smith, 1974a ; Stewart, 1975b); nestas condições, não é possível falar-se em dimensões anômalas da cela.

3.4.2. Difrátogramas de feldspatos potássicos dos nefelina sienitos

São várias as feições que merecem ser discutidas nos difratogramas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Em primeiro lugar, serão tratados brevemente os difratogramas com pertitas, dado que na maioria não se observou exsolução de fase sódica. Posteriormente, e com maior detalhe, analisar-se-ão os difratogramas da fase potássica, com vistas a estabelecer, quando possível, o seu estado estrutural.

Difrátogramas de micropertitas

Das 29 amostras analisadas com raios X (ver Apêndice), somente 7 acusaram a presença de albita; pertitas são, em todos os casos, observadas ao microscópio.

A listagem das amostras de feldspato potássico pertítico é fornecida na Tabela 15, dela também constando os valores de $2\theta_{Cu}$ das reflexões que puderam ser medidas com precisão, em cada amostra estudada. Na Fig. 9, são apresentadas porções de difratogramas entre $2\theta_{Cu}=20^\circ$ e $2\theta_{Cu}=31^\circ$ das amostras possuindo quantidades diferentes de albita pertítica. Nos difratogramas das Figs. 9a e 9b, a identificação da fase sódica pode ser feita tanto pela presença de duas reflexões $\bar{2}01$, pertencentes ao feldspato potássico ($2\theta_{Cu}=21,0$) e à albita ($2\theta_{Cu} = 22,0$), quanto pelas reflexões 002-040, que formam um pico único a aproximadamente $2\theta_{Cu} = 27,95^\circ$. No difratograma da Fig. 9c a reflexão $\bar{2}01$ está ausente e a fase sódica somente pode ser reconhecida pela presença das reflexões 002-040, cujas intensidades dependem da concentração de albita e que podem ser detectadas em misturas com apenas 2% de albita (Mackenzie, 1954). Com exceção das reflexões $\bar{2}01$, 002-040 e 131 ($2\theta_{Cu}=31,2$), todas as reflexões intensas da albita superpõem-se com picos de feldspato potássico, microclínio ou ortoclásio (Parsons, 1965). Este autor apresenta vários exemplos de superposição de reflexões de feldspato alcalino e albita. Na Fig. 10, mostra-se a interferência en

Tabela 15
 2θ Cu[§] de reflexões de albita pertítica

Corpo	Amostra	$2\theta_{701}$ Cu	$2\theta_{111}$ Cu	$2\theta_{020-040}$ Cu	$2\theta_{041}$ Cu	$2\theta_{131}$ Cu	$2\theta_{241}$ Cu	$2\theta_{241}$ Cu	$2\theta_{060}$ Cu
Nefelina sienito traquitóide II (corpo lujaurítico co oriental)	216	22,10		27,96	(30,48) [®] 30,53 ^{®®}				42,53
Nefelina sienito cinza do Anel Norte	432			27,91					
Chibinitos de Botelhos	480 462			27,92 27,94					
Nefelina sienitos finos do Anel Norte	540 541	22,08 22,09	23,61 23,58	27,98 27,96	30,55 30,53	31,29	35,04	36,74	42,53
Nefelina sienito ocidental com eu- dialita	512			presente					

Observações:

§, valor angular, em graus.

®, possivelmente 022.

®, possivelmente 041.

Figura 9 - Difractogramas de feldspatos potássicos periticos (ortoclásio e microclínio), no intervalo de $2\theta_{\text{Cu}}=20$ a 31° . O pico 111 do padrão interno de silício (Si) localizado a $2\theta_{\text{CuK}\alpha}=28,47^\circ$ serve como referência. Nos difratogramas estão indicadas somente as reflexões de albita que não interferem com as de feldspato potássico; para maiores detalhes ver texto. Amostras investigadas: a-540, nefelina sienito fino do Anel Norte; b-216, nefelina sienito traquitóide II (corpo lujaurítico oriental), c-432, nefelina sienito cinza do Anel Norte.

Figura 10 - Detalhes dos difratogramas das Figs. 9a e 9b nos intervalos de $2\theta_{\text{Cu}} = 23$ a 25° e $2\theta_{\text{Cu}} = 29$ a 32° . As figuras mostram a interferência das reflexões de albита com as de ortoclásio e/ou microclínio. Índices das reflexões extraídos de Borg e Smith (1969).

tre as fases sódica e potássica dos difratogramas das Figs. 9a e 9b nos intervalos de $2\theta_{Cu} = 23^{\circ}$ - 25° e $2\theta_{Cu} = 29^{\circ}$ - 32° . Contudo, este problema é pouco importante no conjunto do material estudado, porquanto somente duas amostras (540 e 541, nefelina sienitos finos do Anel Norte) possuem quantidades maiores de albita pertítica.

Existem dúvidas quanto à presença de albita pertítica nos difratogramas dos nefelina sienitos híbridos. Os difratogramas são de difícil interpretação (Fig. 12) e, conquanto não tivessem sido observadas micropertitas, a possível presença de albita como criptopertita pode estar oculta face à superposição com linhas de feldspato potássico, em particular considerando-se o teor relativamente elevado em sódio dos feldspatos dessas rochas.

Estado estrutural da albita pertítica

As reflexões 002-040 e $\bar{2}01$ mudam pouco entre a albita de alta e a de baixa temperatura. Segundo Smith (1956), uma reflexão mais sensível é a 131, que varia entre $2\theta_{Cu} = 31,23^{\circ}$ para albita de baixa temperatura e $2\theta_{Cu} = 31,53^{\circ}$ para albita de alta temperatura. A reflexão 131 somente pôde ser medida com precisão nos difratogramas de nefelina sienitos finos do Anel Norte; os resultados indicam tratar-se de uma fase sódica de baixa temperatura (Tabela 15).

Difratogramas de feldspato potássico

Para efeito de interpretação de difratogramas, usa-se apenas a área compreendida entre $2\theta_{Cu} = 20^{\circ}$ - 36° . Nesta área, aparecem reflexões muito sensíveis a mudanças estruturais, em particular as 131 e 130; estas reflexões são sistematicamente empregadas na literatura para se estabelecer o estado estrutural dos feldspatos alcalinos, representando, ainda, a base para definição dos parâmetros de triclinicidade. A vantagem de sua utilização é demasiado evidente já que são relativamente intensas e

ocupam áreas de boa resolução. O único inconveniente está ligado a possíveis interferências causadas pelas reflexões de albita, como discutido anteriormente. O problema mais sério, pouco mencionado na literatura (Parsons e Boyd, 1971), relaciona-se com a dificuldade de identificar corretamente a coexistência de dois estados estruturais em uma mesma amostra ou, ainda, no mesmo cristal de feldspato. Quando coexistem, por exemplo, um estado estrutural "desordenado" (ortoclásio) com outro de alto ordenamento estrutural (microclínio quase máximo ou microclínio máximo), encontrar-se-ão nos difratogramas as reflexões pertencentes a ambas as estruturas; por um lado, reflexões $131-1\bar{3}1$ e $130-1\bar{3}0$, características da fase triclinica, e, sobrepostas, as reflexões 131 e 130 , pertencentes ao estado estrutural mais desordenado. O difratograma será, por conseguinte, de difícil interpretação. Neste caso, não se pode esperar dificuldades grandes não só na leitura, como também na indexação das reflexões. As que não dependem do estado estrutural do feldspato, como, por exemplo, a 201 ($2\theta_{Cu} = 21,0 - 22,0$), aparecem sempre como picos agudos e intensos. A maioria das reflexões restantes, porém, será larga, devido ao fato de resultarem da superposição de picos de ortoclásio e microclínio. Isto tem grande importância no caso de se tentar determinar as constantes da cela a partir de dados extraídos desses tipos de difratogramas, uma vez que os valores calculados pelos programas de computação mostram erros padrões muito grandes. Parece óbvia, portanto, a conclusão de Parsons (1978), que insiste na inviabilidade de se estabelecer com precisão os estados estruturais de amostras ou cristais "mistos".

Neste trabalho, foram utilizados critérios comparativos com vistas a definir, ainda que qualitativamente, o estado estrutural dos feldspatos dos nefelina sienitos.

Em primeiro lugar os difratogramas foram separados em função de dois parâmetros: presença de reflexões mistas de ortoclásio e microclínio, e intensidade relativa das reflexões correspondentes aos dois estados estruturais (para proporções mínimas detectáveis por raios X, ver Steiger e Hart, 1967).

Nos casos de dúvida, foram de grande ajuda, adicionalmente, os perfis dos difratogramas na área compreendida entre $2\theta_{Cu} = 34^\circ$ e 36° . Posteriormente, foram obtidos os índices de triclinicidade da fase triclínica presente, quando possível, utilizando-se tanto o valor de Δ_{131} , quanto o de Δ_{130} . O resultado dessas observações foi a caracterização de 7 tipos de difratogramas denominados 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a e 4b. Exemplos representativos de cada tipo são apresentados nas Figs. 11 e 12, e os perfis correspondentes à área entre $2\theta_{Cu} = 34-36^\circ$, para os difratogramas dos tipos 1a, 2a, 3, 4a e 4b, são mostrados na Fig. 13. Para facilitar a interpretação dos difratogramas, as amostras utilizadas nos exemplos acima consistem de feldspatos potássicos não pertíticos. Os valores de $2\theta_{Cu}$ de algumas reflexões importantes dos difratogramas desses feldspatos acham-se na Tabela 16, juntamente com os do microclínio máximo, microclínio intermediário e ortoclásio, citados em Borg e Smith (1969), para efeitos de comparação. A seguir, são descritas as principais características dos diversos tipos de difratogramas (Figs. 11 e 12).

Nos difratogramas do tipo 1a, aparecem reflexões agudas típicas de ortoclásio. Contudo, na base dos picos 130 ($2\theta_{Cu} = 23,58$), $\bar{1}31$ ($2\theta_{Cu} = 24,60$), 220 ($2\theta_{Cu} = 26,99$) e 131 ($2\theta_{Cu} = 29,85$), já se fazem presentes as reflexões de microclínio, assinaladas na Fig. 11 por setas. O pico que ocorre a $2\theta_{Cu} = 35,2^\circ$ é moderado a intenso, porquanto corresponde à superposição das reflexões 112 de ortoclásio e $2\bar{2}1$, $1\bar{1}2$ de microclínio (ver Fig. 13). Nos difratogramas do tipo 1b, a fase triclínica é mais marcada e já podem ser medidas algumas reflexões de microclínio, como, por exemplo, a 220 ($2\theta_{Cu} = 26,5$). Nos difratogramas dos tipos 2a e 2b, aparecem tanto reflexões de ortoclásio como de microclínio. Os picos 130- $\bar{1}30$ de microclínio permitem obter os valores do índice de triclinicidade, porém, a maioria das reflexões restantes é larga e resulta da superposição de picos de ortoclásio e microclínio; os valores de 2θ obtidos são portanto intermediários entre os dois estados estruturais (ver Tabela 16). As diferenças entre os tipos 1a e 2b são então atribuídas à coexistência de diferentes proporções de ortoclásio e microclínio.

Figura 11 - Tipos de difratogramas de feldspatos potássicos no intervalo de $2\theta_{Cu} = 20$ a 36° .

1a - am.47, chibinito (corpo lujaurítico ocidental)

1b - am.223, lujaurito I (corpo lujaurítico oriental)

2a - am.551, nefelina sienito cinza do Anel Norte

2b - am. 413, nefelina sienito cinza do Anel Norte

Reflexões de ortoclásio em *itálico sublinhado*

Figura 11

Figura 12 - Tipos de difratogramas de feldspatos potássicos no intervalo de $2\theta_{\text{Cu}} = 20-36^\circ$

3 - am. 30, nefelina sienito híbrido

4a - am. 482E, pseudoleucita nefelina sienito

4b - am. 112-4, nefelina sienito com eudialita do Serrote.

Reflexões de ortoclásio em itálico sublinhado.

Figura 13 - Difractogramas de feldspatos potássicos no intervalo de $2\theta_{Cu} = 34$ a 36° .

1a - am. 47, chibinito (corpo lujaurítico ocidental)

3 - am. 30, nefelina sienito híbrido

2a - am. 551, nefelina sienito cinza do Anel Norte

4a - am. 482E, pseudoleucita nefelina sienito

4b - am. 112-4 nefelina sienito com eudialita do Serrote

Figura 13

Tabela 16

2 θ Cu[§] de algumas reflexões de feldspatos potássicos

Reflexão	Borg e Smith (1969)						Valores de 2 θ Cu medidos nos 7 tipos de difratogramas das Figuras 11 e 12						
	Microclínio máximo		Microclínio intermediário		Ortoclásio		1a	1b	2a	2b	3	4a	4b
	I	2 θ Cu	I	2 θ Cu	I	2 θ Cu	Am. 47	Am. 223	Am. 551	Am. 413	Am. 30	Am. 482E	Am. 112-4
Z01	76	21,07	55	21,01	57	21,05	21,04	21,03	20,99	21,01	21,03	21,00	21,05
111	17	22,29	9	22,43	17	22,54	22,53	22,53	22,40 ^{@@}	22,37 [@]	pr ^{@@}	22,38	22,34
111	8	22,64	6	22,55				pr	22,52	22,52 [@]		22,60	22,65
130	44	23,20	34	23,44	74	23,55	Mi pr Or 23,58	Mi pr Or 23,57	Mi 23,28 Or 23,55	Mi 23,27 Or 23,53	23,36 23,62	23,29	23,23
T30	46	24,00	34	23,74			pr	pr	Mi 23,93	Mi 23,92	pr	23,94	24,01
220	67	26,44	50	26,71	100	26,91	Mi pr Or 26,99	Mi 26,51 Or 27,02	Mi 26,53 Or 26,87	Mi 26,52	26,60	26,63	26,48
131	33	29,43	27	29,70	59	29,84	Mi pr Or 29,85	Mi pr Or 29,86	Mi 29,53 Or 29,82	Mi 29,53 Or 29,81	29,64 [@] 30,10 ^{@@}	29,57	29,48
131	42	30,23	30	29,97			pr	pr	Mi 30,13	Mi 30,13	pr	30,17	30,22
T13	6	38,61	3	38,64	7	38,73	38,68 ^{@@}	38,66 ^{@@}	38,64 ^{@@}	38,66 ^{@@}	38,67 [@]	38,65	38,59
060	31	41,84	21,	41,79	25	41,66	41,73 ^{@@}	41,75 ^{@@}	41,78 ^{@@}	41,79 ^{@@}	41,78 [@]	41,83	41,83
Z04	29	50,57	17	50,60	23	50,74	50,68 ^{@@}	50,69 ^{@@}	50,63 ^{@@}	50,64 ^{@@}	50,68 [@]	50,63 [@]	50,57

Observações:

§, valor angular, em graus

I, intensidade das reflexões

pr, presente; @, picos largos; @@, picos de ortoclásio e microclínio.

nas amostras. Nos tipos 1a a 2a a fase monoclinica é importante, enquanto que no tipo 2b predomina o microclínio, tal como é demonstrado não só pela relação de intensidades entre os picos correspondentes para ambas as fases como também pelo início de separação do pico 111 do ortoclásio a $2\theta_{Cu} = 22,5^\circ$, no tipo 2a, e o aparecimento dos picos 111 e $\bar{1}\bar{1}1$ do microclínio a $2\theta_{Cu} = 22,3^\circ$ e $22,6^\circ$, no tipo 2b.

O difratograma do tipo 3, correspondente tão somente a feldspatos dos nefelina sienitos híbridos, é diferente dos analisados até aqui e também dos seguintes. Os únicos picos agudos são as reflexões $\bar{2}01$ e $\bar{1}12$; todas as demais aparecem como picos largos mais ou menos simétricos. Nas regiões onde ocorrem as reflexões 131 - $\bar{1}\bar{3}1$ e 130 - $\bar{1}\bar{3}0$, parecem existir picos tanto de ortoclásio, quanto de microclínio. A área abrangida por esses picos é, no entanto, estreita, sugerindo a presença de microclínio de baixa triclinicidade. O perfil do difratograma do tipo 3 na região compreendida entre $2\theta_{Cu} = 34^\circ$ - 36° (Fig.13) guarda semelhança com o do tipo 1a, com ortoclásio predominante, porém, não há qualquer correspondência para os valores de $2\theta_{Cu}$ das reflexões mais intensas; nesta região, o aspecto geral do difratograma do tipo 3 é visto como intermediário entre os dos tipos 1a e 2a. Os difratogramas dos tipos 4a e 4b são, à primeira vista, muito semelhantes; contudo, diferenças notáveis podem ser reconhecidas nos perfis da Fig. 13, mostrando que somente nos difratogramas do tipo 4b ocorrem os picos $\bar{2}41$, $\bar{3}12$ e $\bar{2}41$ de microclínio máximo, a sugerir que os do tipo 4a representem microclínio intermediário. Contudo, a falta de resolução das reflexões nessa área não permite afastar a possibilidade de que nos difratogramas do tipo 4a exista material monoclinico subordinado.

Para completar a análise dos difratogramas, foram obtidos valores de triclinicidade Δ_{131} e/ou Δ_{130} para todos os difratogramas analisados, nos quais essas reflexões puderam ser medidas sem ambigüidade. Os valores de triclinicidade, junto com os dados de $2\theta_{Cu}$ das reflexões 131 e 130 da fase monoclini

ca, quando presentes, e do tipo de difratograma com ou sem albita, constam da Tabela 17. Nesta, nota-se que os valores de Δ_{131} e Δ_{130} mostram-se em geral muito semelhantes; porém, as mudanças no par de reflexões $131-1\bar{3}1$ são mais marcadas que no par $130-1\bar{3}0$. Os índices de triclinicidade variam continuamente desde 0,65 até 0,95, não existindo qualquer parâmetro numérico que permita estabelecer limites entre, por exemplo, os difratogramas do tipo 4b e os restantes, apesar de que os primeiros são facilmente separados a partir da simples observação da região entre $2\theta_{Cu} = 34^{\circ} - 36^{\circ}$.

Todas as observações resultantes da discussão prévia podem resumir-se como se segue.

- 1) Os difratogramas do tipo 1a, 1b, 2a e 2b constituem uma sequência representando uma mistura em proporções variáveis de feldspato monoclinico e triclinico.
- 2) Nos difratogramas do tipo 4, o feldspato monoclinico está ausente (4b) ou, então, é encontrado em quantidades muito reduzidas (4a).
- 3) Os difratogramas do tipo 4b representam feldspatos com alto grau de ordenamento estrutural, com índice de triclinicidade maior que 0,83, sendo denominados de microclínio máximo.
- 4) Tanto os difratogramas do tipo 4a, quanto a fase triclinica dos difratogramas 1a, 1b, 2a e 2b, representam microclínio intermediário de alta triclinicidade, com índices Δ_{131} entre 0,66 e 0,83 e Δ_{130} entre 0,66 e 0,87.
- 5) Ainda que no caso dos difratogramas do tipo 3 não possa ser obtido o valor numérico da triclinicidade, é evidente que eles representam uma mistura de feldspatos monoclinico e triclinico de baixa triclinicidade, bem menor que 0,65, estando ambas as fases possivelmente em proporções equivalentes.

Tabela 17

Amostras de feldspato potássico analisados com raios X (Índices de triclinicidade Δ_{131} e Δ_{130} , tipos de difratogramas e outras informações adicionais)

Corpo ou fácies	Amostra	Δ_{131}	$2\theta_{131}^{Cu}$ ortoclásio	Δ_{130}	$2\theta_{130}^{Cu}$ ortoclásio	Albita	Tipo de difratogramas
Nefelina sienito porfirítico do Serrote	661	0,98		0,85			4b
Chibinito de Botelhos	462	0,95		0,94		presente	4b
Nefelina sienito com eudialita do Serrote	159	0,94		0,89			4b
Nefelina sienito ocidental com eudialita	512	0,93		0,95		presente	4b
Nefelina sienito finos do Anel Norte	548	0,91		0,98			4b
Nefelina sienito com eudialita do Serrote	112-4	0,91		0,95			4b
Chibinito de Botelhos	480	0,89		0,88		presente	4b
Nefelina sienito ocidental com eudialita	519	0,87		0,92			4b
Chibinito de Botelhos	476	0,86		0,91			4b
Nefelina sienito porfirítico do Serrote	669	0,86		0,89			4b
Nefelina sienito finos do Anel Norte	541	0,83		0,87		presente	4a
Nefelina sienito cinza do Anel Norte	49a	0,81		0,84			4a
Nefelina sienito fino do Anel Norte	540	0,79		0,84		presente	4a
Nefelina sienito cinza do Anel Norte	551	0,75	29,824	0,81	23,555		2a
Nefelina sienito cinza do Anel Norte	413	0,75	29,813	0,80	23,529		2b
Nefelina sienito ocidental com fluorita	525	0,75	29,823	0,81	23,532		2a
Nefelina sienito cinza do Serrote	178	0,74	29,860	0,66	23,570		2a
Pseudoleucita nefelina sienito	482E	0,73		0,80			4a
Nefelina sienito cinza do Anel Norte	500	0,72		0,82			4a
Nefelina sienito cinza do Anel Norte	432	0,66		0,71		presente	4a
Nefelina sienito híbrido	30				23,620		3
Nefelina sienito híbrido	234				23,637		3
Lujaurito I (corpo lujaurítico oriental)	223		29,864		23,570		1b
Nefelina sienito traquitóide II (corpo lujaurítico oriental)	216		29,875	0,70	23,576	presente	1b
Nefelina sienito com biotita do Serrote	327		29,849	0,74	23,568		1b
Nefelina sienito com biotita do Serrote	321		29,839		23,554		1b
Chibinito (corpo lujaurítico ocidental)	169		29,876		23,612		1b
Chibinito (corpo lujaurítico ocidental)	47		29,851		23,580		1a
Nefelina sienito com biotita do Serrote	311		29,852		23,554		1a

*Ordenação segundo valores decrescentes de Δ_{131}

Figura 14 - Valores de $2\theta_{Cu}$ das reflexões 060 e $\bar{2}04$ de feldspatos potássicos projetados no diagrama das três reflexões de Wright (1960).

Os dados correspondem a difratogramas dos tipos: 1a (ams. 47 e 311), 4a (ams. 482E, 500, 49a, 432, 540 e 541) e 4b (amostras restantes). As amostras aparecem separadas segundo o corpo de nefelina sienito ao qual pertencem (Tabela 18). MM: microclínio máximo; Ab (bT): albita de baixa temperatura; Mi: microclínio intermediário; Or: ortoclásio; S (aT): sanidina de alta temperatura; Ab (aT): albita de alta temperatura.

Tabela 18
Dados correspondentes ao diagrama das 3 reflexões (Figura 14)

Corpo ou fácies	Amostra	Tipo de difratograma	$2\theta_{060}\text{Cu}$	$2\theta_{201}\text{Cu}$	A= $2\theta_{201}\text{Cu}$ medido nos difratogramas	B= $2\theta_{201}\text{Cu}$ obtido no diagrama das 3 reflexões	$\Delta 2\theta_{201}\text{Cu} = B - A$
Chibinito (corpo lujaurítico ocidental)	47	1a	41,73	50,68	21,04	21,19	0,15
Nefelina sienito com biotita do Serrote	311	1a	41,70	50,69	21,07	21,12	0,05
Pseudoleucita nefelina sienito	482E	4a	41,83	50,63	21,00	22,28	1,28
Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte	500	4a	41,79	50,57	21,00	21,02	0,02
	49a	4a	41,81	50,60	21,00	21,18	0,18
	432	4a	41,81	50,61	21,02	21,20	0,18
	540	4a	41,83	50,60	21,04	21,21	0,17
Nefelina sienitos finos do Anel Norte	541	4a	41,82	50,62	21,06	21,24	0,18
	548	4b	41,83	50,56	21,08	21,10	0,02
	462	4b	41,81	50,55	21,02	21,03	0,01
Chibinitos de Botelhos	480	4b	41,82	50,55	21,02	21,05	0,04
	476	4b	41,81	50,56	21,00	21,05	0,02
Nefelina sienitos ocidentais com eudialita	512	4b	41,81	50,54	21,02	21,02	-
	519	4b	41,82	50,55	21,02	21,05	0,03
Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote	661	4b	41,81	50,54	20,99	21,02	0,03
	669	4b	41,82	50,54	21,01	21,05	0,04
Nefelina sienitos com eudialita do Serrote	112-4	4b	41,83	50,57	21,06	21,11	0,05
	159	4b	41,81	50,55	21,05	21,03	0,02

mas do tipo 1a, aparecem no diagrama como se fossem microclínios intermediários, quando na realidade a fase predominante é ortoclásio, evidenciando, assim, que os 20Cu das reflexões 060 e $\bar{2}04$ são os resultados da superposição de picos de ortoclásio e microclínio. As observações feitas acima sugerem que apenas as reflexões medidas nos difratogramas do tipo 4b e, possivelmente, 4a da amostra 500, correspondem a um estado estrutural único, sendo, portanto, passíveis de utilização nos diagramas b-c e $\alpha^*-\gamma^*$.

b) Diagramas b-c e $\alpha^*-\gamma^*$

Os dados das constantes da cela dos difratogramas dos tipos 4b e 4a(am. 500) acham-se reunidos na Tabela 19 e aparecem projetados nos diagramas correspondentes das Figs. 15 e 16. No diagrama b-c, os feldspatos possuem valores de $t_{10} + t_{1m}$ entre 0,93 e 1,0; a diferença $t_{10}-t_{1m}$, lida no diagrama $\alpha^*-\gamma^*$, oscila entre 0,9 e 1,0. Os valores de $t_{10} + t_{1m}$ e $t_{10}-t_{1m}$ são obtidos de forma mais precisa a partir das fórmulas deduzidas por Luth (1974), citado em Stewart e Wright (1974); estes valores estão incluídos na Tabela 19 e foram empregados neste trabalho. Observa-se tanto nos gráficos, quanto na tabela, que os valores de $t_{10}-t_{1m}$ são em geral um pouco maiores que os de $t_{10} + t_{1m}$ e, ainda, que os dados de algumas das amostras aparecem projetados no diagrama $\alpha^*-\gamma^*$ fora do quadrilátero. Stewart e Wright (1974) assinalam que essas características não são de todo raras nos feldspatos com valores de t_{10} elevados, maiores que 0,85, resultando provavelmente de erros nos cálculos dos parâmetros da cela e a subsequente propagação desses erros pelos resultados estimativos obtidos através da utilização dos diagramas. Estes aspectos poderiam contudo ser vistos como indicativos da existência de tensões internas nos feldspatos, sobretudo nos casos em que os valores de $\Delta\alpha$ são demasiado elevados. No entanto, essa possibilidade parece pouco provável; assim, as características acima mencionadas são atribuídas principalmente à combinação ou somatória de erros. Pequenas proporções de feldspato de estado estrutural diferente poderiam ocorrer na amostra 500 (tipo 4a), que apresenta valor de $\Delta\alpha$ de 0,08.

Tabela 19
Parâmetros da cela unitária de feldspatos potássicos

Amostra	Nº de refle- ções	a	b	c	$\alpha^0_{\alpha^*}$	β^0	$\alpha^0_{\gamma^*}$	Volume($\text{\AA}^3$)	1 Δa	2 $t_1^0+t_1^m$	3 $t_1^0-t_1^m$	4 t_1^0	t_1^m	$t_2^0(=t_2^m)$
500	33	8,565(4)	12,958(4)	7,211(3)	90,569(25) 90,443(23)	115,805(22)	87,777(31) 92,194(29)	719,9(6)	0,08	0,94	0,95	0,95	-	0,025
476	45	8,564(3)	12,967(3)	7,214(2)	90,670(23) 90,375(22)	115,876(16)	87,692(23) 92,240(23)	720,3(5)	-0,02	0,94	0,99	0,96	-	0,020
480	46	8,574(3)	12,963(3)	7,212(2)	90,597(24) 90,419(20)	115,873(22)	87,767(25) 92,192(21)	720,7(4)	0,02	0,94	0,96	0,95	-	0,025
462	57	8,572(2)	12,971(2)	7,214(2)	90,566(15) 90,448(13)	115,860(18)	87,777(21) 92,195(19)	721,3(4)	0,002	0,93	0,95	0,94	-	0,030
548	65	8,564(2)	12,961(2)	7,214(1)	90,601(17) 90,417(15)	115,863(15)	87,763(17) 92,195(15)	719,9(4)	0,04	0,95	0,96	0,95	-	0,025
669	50	8,568(2)	12,960(3)	7,215(2)	90,606(25) 90,438(24)	115,861(20)	87,707(19) 92,254(18)	720,3(4)	0,04	0,96	0,99	0,97	-	0,015
112-4	46	8,585(3)	12,962(3)	7,220(2)	90,523(17) 90,435(15)	115,982(23)	87,913(26) 92,066(25)	721,8(5)	0,005	0,99	0,89	0,94	0,05	0,010
512	58	8,575(3)	12,959(2)	7,219(2)	90,659(14) 90,398(12)	115,900(18)	87,673(18) 92,267(17)	721,1(4)	0,03	0,99	1,00	1,0	-	-
519	39	8,572(3)	12,961(3)	7,213(2)	90,598(20) 90,418(19)	115,861(18)	87,766(28) 92,192(28)	720,6(4)	0,02	0,95	0,96	0,95	-	0,025

Observações:

Coluna 1: $\Delta a = a$ (experimental) - a (teórico, do diagrama $b-c$).

Colunas 2 e 3: Fórmulas utilizadas para calcular os valores assinalados são as de LUTH(1974, In: STEWART e WRIGHT, 1974)

Coluna 4: Representa a média das 2 colunas precedentes.

O erro padrão das constantes da cela, afetando a última ou as duas últimas casas decimais, é dado entre parênteses.

Figura 15 - Dados das constantes da cela de feldspatos potássicos projetados no diagrama b - c de Stewart e Wright (1974). Representam-se os valores das constantes b e c da cela unitária dos feldspatos potássicos com difratogramas 4a (am. 500) e 4b (amostras restantes). Os dados constam da Tabela 19. As amostras estão separadas segundo o corpo de nefelina sienito ao qual pertencem (ver Tabela 17). Os braços das cruzes, marcando a posição dos pontos nos diagramas, indicam o erro padrão calculado pelo programa de obtenção de constantes de cela. Ab (bT): albita de baixa temperatura; MM: microclínio máximo; Anb: analbita; S (aT): sanidina de alta temperatura.

Figura 16 - Dados das constantes da célula de feldspatos potássicos projetados no diagrama α^* - γ^* de Stewart e Wright (1974).

Representam-se os valores dos ângulos α e γ do retículo recíproco das mesmas amostras apresentadas na Fig. 15. Os dados constam da Tabela 19. FM: feldspato monoclinico. Outras referências, idênticas às da figura anterior.

Ordenamento estrutural dos feldspatos potássicos

O conhecimento da distribuição dos átomos de alumínio na estrutura dos feldspatos, obtido a partir dos diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$, permite reconstruir o processo de ordenamento estrutural, ou seja, o caminho percorrido pelos átomos distribuídos nos sítios T_1 e T_2 (Fig.5) dos cristais monoclinícos até a sua concentração nos sítios T_1 do microclínio máximo. Stewart e Wright (1974) e Cherry e Trembath (1979), entre outros pesquisadores, mostraram que o caminho de ordenamento (*ordering path*) dos feldspatos potássicos é um processo que ocorre em dois estágios (*two-step process*). Um primeiro estágio consiste na migração contínua do alumínio dos sítios T_2 para os T_1 (Fig.5) de sanidinas (e ortoclásios), até que teores relativamente elevados do elemento se concentrem em T_1 ; os ortoclásios possuem em média $2t_1 = 0,8 \pm 0,1$. Segue-se a transformação da simetria monoclinica em triclínica, quando então têm lugar as principais mudanças nos sítios T_1 (Cherry e Trembath, 1979), com o alumínio se deslocando para um desses sítios, o T_1 (Fig.5) nos cristais triclínicos. O avanço do ordenamento nos feldspatos triclínicos é dado pela concentração do alumínio nos sítios T_1 , com a migração do elemento esvaziando mais rapidamente os sítios T_1 antes que os T_2 e T_2 .

Em relação aos feldspatos dos nefelina sienitos de Poços de Caldas, observa-se nos diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$ (Figs. 15 e 16), que tanto nos microclínios máximos (difratogramas do tipo 4b; ver Fig.12), quanto no microclínio intermediário da amostra 500 (difratogramas do tipo 4a), t_1 é maior que 0,9, sendo que possivelmente t_{1m} é igual a zero e $t_{2o} + t_{2m}$ não chega a 0,1. É notável a semelhança entre os dados obtidos para os difratogramas do tipo 4b e o do tipo 4a da amostra 500, apesar das diferenças apontadas em páginas anteriores. Como os difratogramas do tipo 4a estão representados por uma única amostra, os dados devem ser tomados com a devida cautela, porém, é pouco provável que o ordenamento estrutural desses feldspatos seja muito diferente do que se deduz dos diagramas $b-c$ e $\alpha^*-\gamma^*$. O difratograma da amostra 500 é semelhante a todos os restantes do tipo

4a, os quais contêm provavelmente uma fase monoclínica subordinada. Também não foram observadas diferenças entre o difratograma da amostra 500 e a fase triclínica dos difratogramas 1b, 2a e 2b, em particular quanto ao afastamento das reflexões sensíveis 131-131 e 130-130, tal como indicado pelos índices de triclinicidade (Tabela 17). Concluindo, pode-se dizer que na maioria dos nefelina sienitos os feldspatos estão quase ou totalmente ordenados em algumas rochas; em outras, aparece uma fase quase que completamente ordenada, que com certeza se originou a partir do feldspato monoclínico coexistente, sem evidências de formas intermediárias de ordenamento estrutural, indicativas do caminho seguido.

No que diz respeito aos difratogramas do tipo 3 (Fig.12), de feldspatos dos nefelina sienitos híbridos, nada pode ser dito com absoluta certeza, com as suposições baseadas apenas em dados de literatura. Stewart e Wright (1974) relacionam a resolução de picos sensíveis, como 131 e 111 nos difratogramas de feldspatos triclínicos, com o valor de t_{10} . Segundo esses autores, quando as reflexões são largas, t_{10} é menor que 0,05; os primeiros indícios claros de divisão dos picos ocorrem quando t_{10} situa-se entre 0,5 e 0,7, e somente quando t_{10} é maior que 0,7 observam-se picos agudos e separados. Nos difratogramas do tipo 3, o pico 111 é largo, e as reflexões 131 e 130 da fase triclínica mostram um início de subdivisão; supõe-se, portanto, que nesses feldspatos t_{10} não é muito maior que 0,5. As reflexões de microclínio acham-se superpostas às de ortoclásio, e ambas fases ocorrem possivelmente em proporções equivalentes. Lembrando que os ortoclásios possuem em média $2t_{10} = \pm 0,8$, pode-se concluir que a passagem de ortoclásio a microclínio nesses feldspatos representa uma pequena mudança na distribuição do alumínio nos sítios T_1 . Nesse intervalo do caminho de ordenamento, é de se esperar que coexistam a fase triclínica com a monoclínica em vias de transformação, tal como mostram os trabalhos experimentais de Cherry e Trembath (1979).

3.5. ANÁLISE COMPARATIVA: CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS E DE RAIOS X

O quadro comparativo é um resumo das características ópticas dos feldspatos das amostras utilizadas para fins de estudos de raios X. Da Tabela 20 constam também dados químicos, com o propósito de salientar que todos os nefelina sienitos, à exceção dos híbridos, são de composição praticamente homogênea e muito ricos em potássio.

Na maioria dos casos, as amostras listadas representam todas as variações reconhecidas nos feldspatos dos corpos de nefelina sienito correspondentes; em outros, somente indicam as características de fácies especiais desses corpos, por exemplo, de contato ou pegmatóides. Contudo, a idéia principal do quadro é a de mostrar a correspondência existente entre as observações ópticas, principalmente valor do ângulo $2V$ e o caráter da geminação múltipla observada, com o estado estrutural dos feldspatos, representados pelo tipo de difratograma produzido.

Em todos os casos referentes à presença de microclínio máximo (difratograma do tipo 4b; ver Fig.12), a geminação do microclínio é muito boa, com os indivíduos nítidos, permitindo a determinação com precisão do ângulo $2V$. O valor do ângulo óptico nesses cristais é sempre maior que 75° . Por outro lado, todos os feldspatos com geminação pobre a boa, em que os indivíduos geminados mostram-se às vezes muito finos e de difícil identificação, produzem difratogramas mistos, com ortoclásio e microclínio intermediário (quase máximo) em proporções variáveis, representados pelos tipos 1b, 2a, 2b e 4a. Nos poucos casos em que se tornou possível a medida do $2V$ nas porções geminadas dos cristais, os valores obtidos variam em torno de 60° .

Os cristais com geminação incipiente correspondem a feldspatos com ortoclásio predominante e microclínio de alta triclinicidade em proporções subordinadas (difratogramas do tipo 1a), e o exemplo mais típico é dado pela amostra 311, de um nefelina sienito com biotita do Serrote. Nas áreas limpas e sem gemi

Tabela 20

Quadro comparativo das características ópticas, químicas e de raios X de feldspatos potássicos dos nefelina sienitos de

1	2	3	4	5	6	7
Corpo ou fácies	Amostra	Tipo de difratograma	Ângulo 2V _a	Poços de Caldas Geminção do microclínio	Outros tipos de geminação Microperititas	Composição química
Lujauritos I (corpo lujaurítico oriental)	223	1b	43-46 [§]	Muito variável. Incipiente [§] , pobre [§] a boa	Carlsbad e Baveno Microperititas	Or ₉₆ Ab ₄ [®] -Or ₈₆ Ab ₁₄
Nefelina sienitos traquitóides (corpo lujaurítico oriental)	216	1b	-	Incipiente a pobre. Muito variável, com placas sem geminação e outras, escassas, com geminação muito boa	Carlsbad e Baveno Microperititas	Or ₈₆ Ab ₁₄
Chibinitos (corpo lujaurítico ocidental)	47	1a	30 [§] a 40 [§]	Cristais maiores com geminação incipiente [§] ; cristais menores, pobre a boa; a am. 47 possui alguns cristais com geminação muito boa	Carlsbad e Baveno	Or ₈₇ Ab ₁₃ -Or ₉₃ Ab ₇ Or ₈₄ Ab ₁₆ -Or ₉₃ Ab ₇
	169	1b				
	432	4a	-			Or ₉₄ Ab ₆
	49a	4a	-			Or ₉₉ Ab ₁
Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte	413	2b	-	Pobre a boa, em geral muito fina; raros cristais com geminação incipiente [§] a pobre [§]	Carlsbad	-
	500	4a	40-42 [§] a 48 [§]			Or ₉₀ Ab ₁₀
	551	2a	44-46 [§]			Or ₉₇ Ab ₃
	476	4b	-		Carlsbad Microperititas	Or ₉₉ Ab ₁
Chibinitos de Botelhos	480	4b	76-82	Muito boa		Or ₈₁ Ab ₁₉
	462	4b	±80	Muito boa	Carlsbad Microperititas	Or ₈₂ Ab ₁₈
Nefelina sienitos finos do Anel Norte	540	4a	Variável		Carlsbad;	Or ₆₈ Ab ₃₂
	541	4a	50 [§] a 63 [§]	Incipiente a pobre [§] em todos os grãos	Ans. 540 e 541 com microperititas; am. 548 microperititas escassas	Or ₈₆ Ab ₁₄ -Or ₉₃ Ab ₇
	548	4b	84	Muito boa		Or ₈₇ Ab ₁₃ -Or ₉₄ Ab ₆
Pseudoleucita nefelina sienitos	482E	4a	23-50 no mesmo cristal	Incipiente a pobre em todos os grãos	Carlsbad	Or ₉₆ Ab ₄
Nefelina sienitos híbridos	30	3	56(núcleos) até 44-46 (bordas)	Sem geminação visível	Carlsbad	Or ₆₉ Ab ₃₁ [®] -Or ₈₆ Ab ₁₄ [®]
	234	3		Geminção aparente em alguns grãos		
Nefelina sienitos com eudialita do Serrote	112-4	4b	78-80	Muito boa	Baveno	Or ₉₉ Ab ₁
	159	4b				
Nefelina sienitos cinzas do Serrote	178	2a	-	Geminção incipiente a pobre, muito fina	Carlsbad	Or ₉₀ Ab ₁₀ -Or ₉₄ Ab ₆
	311	1a	±30	Grandes cristais com geminação incipiente		Or ₉₅ Ab ₅
Nefelina sienitos com biotita do Serrote	321	1b	28-30 [§]	Incipiente [§] a pobre nos cristais maiores; placas da matriz sem geminação	Carlsbad	Or ₉₁ Ab ₉
	327	1b	-	Incipiente a pobre, muito fina, em todos os grãos		-
Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote	661	4b	±80	Muito boa	Carlsbad	Or ₉₉ Ab ₁ [®]
	669	4b				
Nefelina sienitos ocidentais com fluorita	525	2a	56-58 [§]	Em geral incipiente a pobre [§] , raros cristais com geminação boa, fina	Carlsbad	Or ₉₄ Ab ₆
Nefelina sienitos ocidentais com eudialita	512	4b	78-82	Muito boa	Carlsbad e Baveno	Or ₉₉ Ab ₁
	519	4b				Or ₉₈ Ab ₂

Coluna 1: para corpos e fácies, ver Capítulo II, mapa de localização (Figura 2);

Coluna 2: para localização das amostras, ver Figuras 3 e 4;

Coluna 3: ver Figuras 11 e 12;

Coluna 4: os valores medidos (em graus), são os de alguns cristais selecionados; no caso da apresentação de vários tipos de geminação múltipla, utiliza-se o símbolo § para indicar a geminação do cristal cujo 2V é citado na coluna 4;

Coluna 5: para descrição da geminação, ver texto;

Coluna 6: ver item 2.2 e Tabela 15;

Coluna 7: ver Tabelas 3 a 13. As composições correspondem às das amostras listadas; em alguns casos, assinalados com o símbolo ®, trata-se da composição média para o corpo ou fácies, ou da composição de amostras semelhantes do mesmo fácies.

nação, o $2V$ é de 30° ; por outro lado, áreas semelhantes em feldspatos de outras amostras deram valores entre 28° a quase 60° . O difratograma do tipo la obtido na amostra 47 (chibinito do corpo lujaurítico) representa o estado estrutural dos cristais maiores com geminação incipiente, escolhidos preferencialmente durante a separação manual do material para estudos de raios X.

As características ópticas e de raios X dos feldspatos de nefelina sienitos de Poços de Caldas mostradas na Tabela 20 e discutidas acima, permitem que se tirem as seguintes conclusões de caráter geral.

Em primeiro lugar, observa-se a existência de correlação direta entre o aspecto microscópico dos cristais de feldspato e o seu estado estrutural. Assim, um cristal com geminação incipiente ou pobre contém proporções de microclínio equivalentes às das áreas geminadas. Por outro lado, os cristais com geminação muito boa estão, quase com certeza, convertidos totalmente em microclínio máximo. Estas conclusões são válidas, contudo, somente para os nefelina sienitos, e aqui atribuídas ao tipo particular de modificação ocorrida, permitindo a preservação de ortoclásio junto com microclínio quase máximo.

Em segundo lugar, são evidentes as dificuldades existentes para a classificação do estado estrutural dos feldspatos potássicos utilizando unicamente o valor do ângulo $2V$; este faz com que, em geral, a nomenclatura dos feldspatos seja complicada, sobretudo na literatura mais antiga, rica em dados ópticos de feldspatos potássicos (ver Smith, 1974a). Na literatura, os feldspatos potássicos monoclinicos homogêneos, nos quais o plano dos eixos ópticos é normal a (010), e que apresentam ângulos $2V_\alpha$ pequenos, são denominados de "sanidinas"; o valor máximo do $2V_\alpha$ varia, segundo diferentes autores, de 40° a 55° (40° : Laves, 1952; 43° : Marfunin, 1961; 50° : Stewart, 1975c; 55° : Smith, 1974a). Os "microclínios com típica geminação em grade" apresentam sempre ângulos $2V_\alpha$ maiores que $75-80^\circ$. O "ortoclásio" já é muito mais difícil de ser caracterizado. Segundo Laves e Viswanathan (1967),

os feldspatos potássicos com $2V_{\alpha}$ menor que 65° podem ser *realmente monoclinicos*, da mesma forma que aqueles mostrando ângulos $2V$ maiores que 65° *devem necessariamente consistir de domínios geminados submicroscopicamente*. Stewart (1974) aponta a existência de superposição no valor dos ângulos $2V_{\alpha}$ de feldspatos monoclinicos e triclinicos, bem como a ausência de um limite superior definido para o ângulo $2V_{\alpha}$ dos feldspatos monoclinicos. Esse autor menciona um caso de feldspato monoclinico (tanto opticamente quanto aos raios X) com $2V_{\alpha}$ de 82° . Bambauer e Bernotat (1982) consideram que o $2V_{\alpha}$ de ortoclásios varia entre 50 e 85° , porém, mencionam feldspatos opticamente monoclinicos com $2V_{\alpha}$ entre 90 e 108° (conhecidos na literatura como "iso-ortoclásios", ver Smith, 1974a), e feldspatos com $2V_{\alpha}$ de 66° e com *geminção em grade difusa*.

Os feldspatos monoclinicos das rochas de Poços de Caldas exibem ângulos $2V_{\alpha}$ variando aproximadamente entre 30 a quase 60° , sendo, no entanto, que a maioria possui ângulos menores que 50° , e, por conseguinte, deveriam ser denominados de "sanidinas". Em todos os casos, porém, as fases monoclinicas mostram difratogramas semelhantes, correspondentes ao ortoclásio de Borg e Smith (1969) (Tabela 16 e 20; ver também Parsons e Boyd, 1971), enquanto que os feldspatos geminados com ângulos $2V$ maiores de 60° são, óptica e cristalograficamente, microclínios.

Situação interessante é a dos feldspatos potássicos dos nefelina sienitos híbridos. Nas rochas de granulação fina a média (como, por exemplo, a am.30), a geminção está ausente; porém, nas variedades de granulação grossa (am.234) alguns cristais aparecem geminados. A caracterização da geminção é, no entanto, difícil, devido particularmente ao fato de os feldspatos possuírem abundantes partículas finíssimas de óxidos de ferro homogeneamente distribuídas. O valor do ângulo $2V_{\alpha}$ nas bordas dos cristais ostentando quimismo parecido ao dos feldspatos das outras rochas estudadas oscila entre 44 e 46° , sendo semelhante àquele das áreas limpas dos cristais com geminção incipiente a pobre, aqui considerados como monoclinicos.

Em termos gerais, pode-se dizer que a maioria das amostras de nefelina sienitos híbridos é portadora de feldspatos opticamente monoclônicos, produzindo difratogramas de raios X on de coexistem ortoclásio e microclínio de baixo ordenamento estrutural. Entretanto, não é de todo raro que feldspatos triclônicos aos raios X comportem-se opticamente como monoclônicos (Stewart e Wright, 1974); isto decorre do fato de que os domínios triclínicos são menores que o poder de resolução do microscópio, de modo que aparecem estatisticamente com simetria óptica monoclíni-ca (Smith, 1974a).

3.6. CONSIDERAÇÕES PETROLÓGICAS

Não é necessário assinalar a importância dos feldspatos alcalinos como componentes de rochas, visto que este grupo de minerais está presente em proporções importantes, em ge-ral dominantes, na maioria das rochas ígneas félsicas.

Do ponto de vista petrológico, são de importân -cia fundamental tanto a composição como o estado estrutural dos feldspatos alcalinos. As evidências geológicas e de laboratório, mostram claramente que o primeiro fator, a composição, depende essencialmente da natureza do líquido magmático a partir do qual o mineral cristaliza.

Conquanto as opiniões se mostrem unânimes quanto ao primeiro assunto, as interpretações sobre o estado estrutural ainda são objeto de vasta polêmica.

Historicamente, a primeira interpretação ligava o estado estrutural à história de resfriamento do corpo ígneo. Assim, a experiência geológica mostra que um polimorfo da sanidina, hoje denominado de "sanidina de baixa temperatura", é a fase mais comum nas rochas félsicas resfriadas bruscamente (derrames, alguns corpos subvulcânicos, etc.). Estima-se que este polimorfo é estável entre 800 e 900°C, com o resfriamento brusco do magma simplesmente impedindo a sua conversão para estados estruturais

mais estáveis a temperaturas menores (ver, por exemplo, Stewart e Wright, 1974).

Ao contrário, em granitos supostamente resfriados de maneira lenta, encontra-se como tipo mais comum o microclínio máximo, estado estável a temperaturas baixas. Este é também o polimorfo presente nas rochas metamórficas de grau baixo a médio (até a fácies anfibolito). Estima-se que o microclínio máximo é o polimorfo estável a temperaturas inferiores a 400°C (Wright, 1967).

Entre esses dois extremos, sanidina e microclínio máximo, situam-se os demais estados estruturais, ortoclásio e microclínios intermediários. Com base na interpretação acima, seriam esses estados estruturais o resultado de regimes térmicos "intermediários" de resfriamento. Estudos realizados em áreas de metamorfismo progressivo sugerem que o ortoclásio é a fase estável a temperaturas superiores a 600°C (Guidotti *et al.* 1973).

Contrapondo-se a esta interpretação, algumas feições são citadas e discutidas por vários autores; por exemplo, o caso de corpos graníticos com ortoclásio no centro e microclínio nas bordas, ou ainda, de granitos com ortoclásio cortados por pequenos diques aplíticos com microclínio (Marmo, 1959, e Caillère e Kraut, 1960; citados em Mackenzie e Smith, 1961).

Estes exemplos requerem outras explicações que as dadas acima. Uma interpretação que se afasta da relação "estado estrutural-história térmica" é a oferecida por Mackenzie e Smith (1961). Estes autores sugerem que o estado estrutural do feldspato é condicionado pela própria composição do feldspato. Aplicada ao caso dos ortoclásio granitos cortados por microclínio aplíticos referido acima, esta hipótese indicaria que o teor de Na, maior no feldspato dos granitos, inibe a conversão do mineral a estados estruturais mais ordenados que o do ortoclásio, enquanto que o feldspato dos aplitos, mais rico em K, converte-se facilmente em polimorfo ordenado.

No entanto, os exemplos descritos de muitos corpos ígneos, tanto de rochas graníticas como sieníticas, contribuem pouco para a sustentação de interpretações tão claras como as anteriores. Tilling (1968) descreve as variações observadas no estado estrutural de feldspatos alcalinos do granodiorito de Rader Creek, um dos componentes do batólito de Boulder, EUA, e observa que as fases mais sódicas (Or_{66-78}) apresentam-se predominantemente como microclínio, enquanto que as de composição mais potássica (Or_{84-85}) correspondem a ortoclásios; o autor atribui essas variações ao efeito de metamorfismo térmico (ver também Parsons e Boyd, 1971).

Mais espetaculares ainda são as características mostradas pelos feldspatos alcalinos, comumente ricos em Or, de nefelina sienitos "hipersolvus". Observa-se em geral nessas rochas a coexistência de dois estados estruturais distintos, ortoclásio e microclínio quase máximo (ou máximo), não apenas nas mesmas amostras, mas, principalmente, nos mesmos cristais de feldspato. O primeiro trabalho de detalhe em cristais mistos de feldspato, com ortoclásio e microclínio máximo, foi o de Mackenzie (1954) em pegmatitos de nefelina sienitos das Montanhas Bearpaw, EUA (ver também Stewart e Wright, 1974). Exemplos semelhantes foram estudados por Retief (1962) em nefelina sienitos de Pilanesberg, África do Sul, e são mencionados por Czygan (1969) em rochas semelhantes da Serra de Monchique, Portugal. Vlasov *et al.* (1966) descrevem e ilustram com fotomicrografias, microclínios de nefelina sienitos de Lovozero, Península de Kola, Rússia, *destituídos de geminação em grade típica e apresentando uma estrutura de geminação que lembra pertitas ou albita "chequer"*. É provável que também nas rochas de Lovozero se encontrem tanto cristais mistos de feldspato, com ortoclásio e microclínio, como grãos de microclínio máximo. Mais recentemente, Sørensen (1974a) indica que os microclínios dos lujauros de Illímaussaq, Groenlândia, exibem textura particular desconhecida nos feldspatos de rochas calco-alcalinas; os cristais caracterizam-se por apresentar uma *geminação de interpenetração intrincada, segundo a lei da albita* (Sørensen, 1974a).

Este breve resumo histórico procura demonstrar que a hipótese relacionando o estado estrutural dos feldspatos alcalinos com a história de resfriamento é provavelmente correta quando se trata de confrontar estados estruturais totalmente desordenados (sanidinas), com aqueles onde os feldspatos se mostram parcial ou totalmente ordenados (ortoclásios e microclínios). Entretanto, ela é insuficiente para explicar as complicações apresentadas acima, que fogem de esquemas interpretativos mais simples.

Uma interpretação muito interessante é dada por Parsons e Boyd (1971). Longe de se aterem ao estudo de exemplos locais, estes autores examinam a evolução do estado estrutural dos feldspatos alcalinos em grandes suites de rochas comagmáticas, relacionadas por algum processo de diferenciação. Constatase que nas rochas menos diferenciadas (por exemplo, monzonitos ou tonalitos) a fase representante é ortoclásio, enquanto que nas mais diferenciadas (granitos ou leucogranitos) é microclínio. Parece existir, portanto, uma ligação direta entre composição do magma e estado estrutural do feldspato.

As possibilidades abertas por esta interpretação são várias (Parsons e Boyd, 1971; Parsons, 1978). Em primeiro lugar, os fatos citados sugerem que o próprio magma poderia controlar diretamente o aparecimento do polimorfo final, existindo *uma forte tendência para a formação de microclínio, às expensas do ortoclásio, à medida que aumenta o grau de fracionamento do magma* (Parsons e Boyd, 1971). Os magmas mais diferenciados são geralmente mais ricos em fluídos (H_2O , F, Cl, etc.) e álcalis, e esta composição "alcalina" facilitaria a formação de um polimorfo ordenado (ver também Emeleus e Smith, 1959; Martin, 1969).

Em segundo lugar, pode-se supor que a composição do magma condiciona diretamente o conteúdo de fluídos; os líquidos mais evoluídos geram com maior facilidade resíduos ricos em voláteis, que se apresentariam seja como magmas hiperfluídos, seja como soluções deutérico-hidrotermais. A presença desses resí

duos condicionaria a estabilização de um determinado polimorfo, por cristalização direta ou por transformação pós-magmática.

3.6.1. Feldspatos alcalinos de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Os exemplos mencionados nas páginas precedentes evidenciam claramente que os casos mais significativos de variação no estado estrutural de feldspatos ocorrem em nefelina sienitos. As sugestões apresentadas na literatura (Parsons e Boyd, 1971 e Parsons, 1978) indicam que o microclínio encontra-se em geral associado a rochas derivadas da cristalização de líquidos muito diferenciados, que se caracterizam por duas feições químicas marcantes: enriquecimento em álcalis e conteúdo relativamente alto em voláteis. Neste contexto, os nefelina sienitos exibem condições químicas sem dúvida mais exageradas que a maioria dos demais tipos litológicos, mais precisamente, o seu caráter fortemente alcalino e até peralcalino, com evidências inequívocas de riqueza em voláteis. Cabe citar particularmente o caso dos nefelina sienitos agpaíticos, onde a maioria dos minerais acessórios é testemunho da importância de processos magmáticos e pós-magmáticos caracterizados pela grande riqueza em álcalis e voláteis (Sørensen, 1974a; Kogarko, 1974; Sørensen e Larsen, 1978).

A seguir, acham-se resumidas as observações relativas aos feldspatos das rochas de Poços de Caldas, a fim de possibilitar a sua interpretação petrológica.

- 1) Os feldspatos dos nefelina sienitos são, via de regra, feldspatos potássicos com $Or > 80\%$, e com teores muito baixos de Ca. Por outro lado, os feldspatos dos nefelina sienitos híbridos, possuem composições variáveis entre $Or_{53}Ab_{41}An_6$ e $Or_{82}Ab_{17}An_1$, além de quantidades importantes de Ba e elevadas de Sr.
- 2) Os feldspatos potássicos de alguns fácies apresentam pertitas; as pertitas ocorrem em rochas com abundante albita tabular, de origem pós-magmática e provavelmente metasomática (ver

discussão sobre pertitas e albita tabular mais adiante).

- 3) Na maioria dos nefelina sienitos de Poços de Caldas coexistem mais de um estado estrutural de feldspatos potássicos, freqüentemente num mesmo cristal. Em rochas inequigranulares, como, por exemplo, nos chibinitos dos corpos lujauríticos, os cristais maiores de feldspato apresentam geminação incipiente, enquanto que a geminação é pobre a boa nos de menor tamanho (ver Tabela 20)
- 4) Do ponto de vista *óptico*, a coexistência de dois estados estruturais revela-se pela presença de textura característica: áreas limpas, sem geminação e com $2V_{\alpha}$, variáveis, menores que 60° , alternando com outras portadoras de geminação múltipla fina a muito fina.
- 5) Do ponto de vista *estrutural*, definem-se os seguintes casos:
 - a) coexistência de ortoclásio e microclínio quase máximo (difratogramas do tipo 1a, 1b, 2a, 2b e 4a):
 - os vários fácies dos corpos lujauríticos ocidental e oriental,
 - nefelina sienitos cinzas do Anel Norte,
 - pseudoleucita nefelina sienitos,
 - nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote e
 - nefelina sienitos ocidentais com fluorita;
 - b) presença de microclínio quase máximo (possivelmente com ortoclásio subordinado) ou de microclínio máximo (difratogramas do tipo 4a e 4b, respectivamente):
 - nefelina sienitos finos do Anel Norte e
 - nefelina sienitos com eudialita do Serrote;
 - c) coexistência de ortoclásio e microclínio de baixa triclinicidade, presentes opticamente como cristais monoclinicos e que raramente exibem indícios de geminação múltipla:
 - nefelina sienitos híbridos;

- d) microclínio máximo como polimorfo único, com difratogramas do tipo 4b:
- os vários corpos de nefelina sienitos porfiríticos do Serrote.
- 6) Microclínio máximo (difratogramas do tipo 4b) foi reconhecido em algumas amostras de chibinitos de Botelhos e nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Por outro lado, as observações ópticas efetuadas em outras amostras de rochas dos mesmos corpos, e também nos chibinitos orientais, mostram a coexistência de ortoclásio e microclínio nos mesmos cristais de feldspato.
- 7) Não se dispõem de dados de raios X dos nefelina sienitos finos ocidentais, portadores de cristais maiores de feldspato com geminação incipiente, e menores com geminação múltipla muito fina.
- 8) A presença de microclínio não pode ser correlacionada com a história térmica do corpo. Cristais mistos, com ortoclásio e microclínio, estão presentes tanto em rochas de contato de granulação fina, como em amostras de granulação grossa localizadas no interior do mesmo corpo. Contudo, a fase monoclinica é mais abundante nos nefelina sienitos de granulação mais fina.
- 9) As proporções de ortoclásio e microclínio variam notavelmente nos diferentes corpos do maciço (Tabela 20). Exemplo ilustrando esta característica é indicado pela abundância de ortoclásio nos feldspatos dos diversos fácies que compõem os corpos lujauríticos (difratogramas do tipo 1a e 1b), enquanto que os corpos vizinhos de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte possuem microclínio dominante (difratogramas do tipo 2a, 2b e 4a).

Nenhuma das feições estruturais e ópticas apontadas é compatível com explicações baseadas na história de resfriamento das rochas. Cabe apelar portanto às hipóteses que condicio

nam o estado estrutural dos feldspatos a transformações resultantes da atuação de líquidos magmáticos ou residuais (Parsons e Boyd, 1971; Parsons, 1978). São estes líquidos evoluídos os agentes efetivos da transformação e ordenamento dos feldspatos. Este esquema permite explicar todas as características indicadas acima, inclusive o fato de que em rochas faneríticas inequigranulares, os grãos menores, mais facilmente atingidos pelas soluções residuais, apresentam grau de ordenamento frequentemente maior que os megacristais.

O processo de transformação ortoclásio-microclínio deve ser rápido. O mecanismo da transformação ajusta-se ao crescimento de pequenos domínios submicroscópicos ordenados, já formados incipientemente no ortoclásio, que se ampliam até formar domínios maiores, visíveis opticamente como indivíduos geminados segundo as leis da albita e periclínio (Parsons, 1978; Smith 1974a). Nos domínios ordenados submicroscópicos do ortoclásio, o Al já está preferencialmente localizado numa das posições T_1 e, portanto, passa-se de ortoclásio a microclínio quase máximo ou máximo, sem o desenvolvimento de formas intermediárias de baixa triclinicidade (Parsons, 1978).

Este mecanismo de transformação permite explicar satisfatoriamente as texturas presentes nos feldspatos dos diversos corpos de nefelina sienitos, ora ostentando homogeneidade óptica e ausência de geminação múltipla, ora mostrando os vários tipos de geminação mencionados neste capítulo.

As diferenças marcantes que se observam no predomínio relativo de um polimorfo sobre outro (ponto 9, acima) são vistas como função da "eficiência" com a qual os fluidos residuais convertem os cristais em polimorfos ordenados (ver também Parsons, 1978), decorrente da composição desses fluidos ou, mais provavelmente, do tempo de atuação dos mesmos nas rochas.

Um caso de difícil interpretação é o dos nefelina sienitos híbridos, em cujos feldspatos domina o ortoclásio acom-

panhado de microclínio de baixa triclinicidade, principalmente visível nas amostras de granulação média a grossa. Uma hipótese a considerar é a suposição de que, neste caso, os líquidos residuais foram muito diferentes daqueles presentes nos outros nefelina sienitos. Com efeito, a composição particular desses feldspatos (Tabela 10) confere algum fundamento a esta suposição, com a qual poder-se-ia justificar transformações polimórficas algo diferentes das observadas nos feldspatos de outros corpos. No entanto, é possível que a própria composição dos feldspatos com teores mais elevados de Ab e ricos em Sr, Ca e Ba (ver Tabela 10), possa conduzir a modificações polimórficas diferentes. Na realidade, pouco se conhece no tocante aos efeitos dos elementos menores como Ca, Ba e Sr sobre a transformação polimórfica em feldspatos (Smith, 1974a; Propach e Adloff, 1982).

3.6.2. Origem das micropertitas e da albita tabular

Outro problema que merece ser discutido é o da presença de pertitas nos feldspatos potássicos das rochas portadoras de albita tabular. A relação entre o processo de exsolução da fase sódica no feldspato potássico e as ripas limpas de albita quase pura, com geminação polissintética, é clara na maioria das rochas estudadas, conquanto os melhores exemplos reconhecidos referam-se aos nefelina sienitos traquitóides I e II e lujauros II do corpo lujaurítico ocidental. Estas rochas contêm 0,5 a 1,0% de albita tabular modal de distribuição heterogênea; o feldspato potássico é predominantemente ortoclásio, e apenas os cristais localizados nas proximidades das ripas de albita contêm pertitas; além disso, as porções pertíticas dos grãos de feldspato exibem ainda geminação múltipla e abundantes inclusões finíssimas (óxidos de ferro?). Dessa forma, conclui-se que existe uma relação genética entre a formação da albita tabular nas rochas e o processo de exsolução e ordenamento dos feldspatos potássicos.

São freqüentes na literatura as menções sobre nefelina sienitos "subsolvus" (Tuttle, 1955, em Tuttle e Bowen, 1958), que se caracterizam pela presença de cristais independentes de

albita e feldspato potássico; exemplos desse tipo são os descritos para os maciços de Pilanesberg (Retief, 1962), Ilímaussaq (Sørensen, 1974d) e Lovozero (Vlasov et al., 1966), entre outros. Em alguns nefelina sienitos a albita pode resultar da desmisturação de um feldspato alcalino inicialmente homogêneo, durante o resfriamento lento das rochas, ou ter-se derivado da cristalização cotética com feldspato potássico e nefelina, a temperaturas baixas. A segunda alternativa é a proposta para explicar a coexistência de albita e feldspato potássico nos lujaunitos de Ilímaussaq (Sørensen, 1962, em Priotrowski e Edgar, 1970; Sørensen, 1974a).

Temperaturas baixas de cristalização ou de recristalização encontram reflexo na composição de feldspatos e nefelinas coexistentes (ver discussão detalhada no item 4.4), bem como no estado estrutural do feldspato potássico. Cabe mencionar que a albita cristalizada sob tais condições deveria se fazer acompanhar de nefelinas de composição muito restrita (entre $\text{Ne}_{75,1}\text{Ks}_{20,9}\text{Qz}_{4,0}$ e $\text{Ne}_{73}\text{Ks}_{27}$) e de microclínio máximo. Pelo contrário, nos exemplos acima citados de Poços de Caldas, a albita tabular coexiste com nefelinas de composição muito variável e feldspatos potássicos nos quais o microclínio é muito escasso. Assim, é provável que a albita tenha-se formado independentemente a partir de soluções pós-magmáticas que facilitaram localmente o ordenamento Na-K e Si-Al nos feldspatos já cristalizados, favorecendo o crescimento de pertitas e o ordenamento estrutural do feldspato potássico (Parsons, 1978; ver também Propach e Adloff, 1982).

Na literatura são poucas as referências a processos análogos. Um caso semelhante é o descrito para alguns nefelina sienitos de Khibina, que Borutskiy (1971) denomina de *alterados*, na suposição de que a albita cristaliza de soluções pós-magmáticas; essas rochas diferenciam-se das que não apresentam albita pós-magmática, por mostrar feldspato micropertítico em lugar de criptopertítico, com maior ordenamento estrutural, incluindo em alguns casos microclínio máximo.

CAPÍTULO 4

NEFELINAS: QUIMISMO E PETROLOGIA

Os segundos minerais félsicos em importância nos nefelina sienitos são as nefelinas. As evidências texturais indicam que esses minerais formam-se conjuntamente com os feldspatos potássicos, sendo comumente de tamanhos menores. Ocorrem como pequenos cristais incluídos nos feldspatos, sob a forma de prismas curtos subidiomórficos, ou ainda, como material intersticial aos feldspatos. Em algumas rochas (por exemplo, partes dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte), apresentam-se como grãos subidiomórficos a xenomórficos de dimensões centimétricas. Segue-se uma breve introdução sobre as características químicas e cristalográficas das nefelinas.

4.1. QUÍMICA E ESTRUTURA

O arcabouço tetraédrico da estrutura da nefelina é semelhante ao da tridimita, com os tetraedros se distribuindo em planos paralelos a (0001) e compartilhando três dos seus oxigênios para formar anéis hexagonais. Na nefelina, a metade dos átomos de silício acha-se substituída por alumínio, sendo a deficiência de carga positiva compensada pela entrada de álcalis nas cavidades da estrutura. Contudo, devido ao fato de o arcabouço mostrar-se distorcido em razão da rotação dos tetraedros, as cavidades ocupadas pelos álcalis são de dois tamanhos diferentes. Na nefelina ideal, cuja fórmula baseada em 32 oxigênios é $\text{Na}_6\text{K}_2\text{Al}_8\text{Si}_8\text{O}_{32}$ (Buerger, 1947; Tilley, 1954), dos oito sítios destinados aos álcalis, seis deles, de menor tamanho, estão ocupados por sódio (e quantidades menores de Ca, Mg, etc.), enquanto que nos outros dois, de maior tamanho, encontra-se potássio. Esta distribuição, também denominada de composição de Buerger, equivale a 73% da molécula de nefelina (Ne) e 27% da molécula de Kalsilita (Ks), (% em peso). No entanto, na natureza, as com-

posições encontradas fogem um pouco dessa situação ideal, variando desde aproximadamente $\text{Ne}_{55}\text{Ks}_{45}$ até mais ou menos $\text{Ne}_{92}\text{Ks}_8$, com as mais comuns situadas entre $\sim \text{Ne}_{>70}\text{Ks}_{<30}$ e $\text{Ne}_{80}\text{Ks}_{20}$. As complicações são todavia bem maiores, visto que, na maioria das nefelinas naturais, as quantidades de Si e Al não correspondem às proporções estequiométricas teóricas, havendo excesso de Si. Esta falta de estequiometria pressupõe a existência de vacâncias nos locais catiônicos não tetraédricos e, como resultado, a fórmula geral da nefelina é assim expressa (Donnay *et al.*, 1959):

onde $\square$ representa as vacâncias na estrutura. Na prática, costuma-se calcular as fórmulas estruturais das nefelinas em função dos componentes nefelina (Ne), kalsilita (Ks) e sílica (Qz) (ver exemplos em Tilley, 1954). Como elementos químicos presentes em pequenas proporções, citam-se Fe^{3+} , substituindo possivelmente o Al, além de Ca, Mg, etc. (Deer *et al.*, 1966) nas posições dos cátions não tetraédricos; cabe ressaltar, porém, que Ba e Sr não entram facilmente na estrutura das nefelinas (Barth, 1963; Hier, 1966). Em muitas nefelinas, os teores de Fe^{3+} são maiores que os de Ca (Mitchell, 1972; Brown, 1970; entre outros), justificando-se, assim, a sua incorporação na fórmula geral do mineral, como feito por Mitchell (1972); a fórmula geral modificada é a seguinte:

Comparações entre nefelinas ricas e pobres em ferro podem ser feitas calculando-se a molécula $\text{NaFe}^{3+}\text{SiO}_4$, denominada "nefelina de ferro" (FeNe) por Bailey e Schairer (1966), e que representa a solubilidade desse elemento no mineral (Onuma *et al.*, 1972), mediante a substituição de Al por Fe^{3+} .

4.1.1. Relações entre a cristaloquímica das nefelinas e o excesso de sílica

O teor de sílica das nefelinas é função da temperatura de cristalização e da história de resfriamento das rochas.

Teores mais elevados ocorrem em rochas vulcânicas, com a relação Na:K dependendo da composição dos magmas. Em rochas submetidas a processo lento de cristalização, as características iniciais das nefelinas sofrem mudanças em virtude do intercâmbio de cátions (Si, Al, Na, K) com o líquido magmático, e também de reações subsolidus de Na e K entre nefelina e feldspatos (Hamilton, 1961). As nefelinas resultantes de processos de resfriamento lento possuem composição restrita (Miyashiro, 1951; Tilley, 1954), que no diagrama Ne-Ks-Qz aparece localizada entre a composição de Buerger ($\text{Ne}_{73}\text{Ks}_{27}$) e a de Morozewicz ($\text{Ne}_{75,1}\text{Ks}_{20,9}\text{Qz}_{4,0}$; ver Morozewicz, 1930, citado em Tilley, 1954). Este campo composicional restrito é hoje denominado "campo de convergência Morozewicz- Buerger", seguindo a proposta formulada originalmente por Tilley (1954). Entre a composição de Buerger, com relação Na:K de 3:1, e a de Morozewicz, com excesso de sílica, a diferença fundamental reside na existência de vacâncias na estrutura. Todos os estudos, tanto químicos quanto de raios X (baseados no cálculo de constantes da cela, Tuttle e Smith, 1958; Hamilton e Mackenzie, 1960), sugerem que as vacâncias correspondem preferencialmente aos sítios de K na estrutura. A composição de Morozewicz, com seis dos oito sítios dos álcalis preenchidos por Na e vacâncias ocupando os sítios do K representa, portanto, a composição estável para nefelinas com pequeno excesso de sílica. Em nefelinas com teores de sílica mais elevados que os da composição acima é provável que, na hipótese da ocorrência de intercâmbio catiônico entre nefelina e líquido ou entre nefelina e feldspato, esse tenha sido incompleto, não conduzindo a um estado de equilíbrio. Como consequência, as composições serão mais variadas, e as vacâncias não se restringirão aos sítios do K (Bose, 1964).

A fim de visualizar as relações cristaloquímicas das nefelinas, em particular daquelas possuindo teores elevados de Qz, será utilizado neste trabalho o diagrama apresentado por Hamilton e Mackenzie (1960). Trata-se do diagrama Ne-Ks-Qz, no qual esses autores projetam, em porcentagem molecular, as composições indicando séries de solução sólida, com as vacâncias restritas tão somente aos sítios do K, denominadas "séries de solu

ção por omissão". Também aparecem no diagrama as composições de Buerger e Morozewicz e o limite de solução sólida da sílica em nefelina a 700°C, obtido experimentalmente por Hamilton e Mackenzie (1960).

4.2. QUIMISMO DE NEFELINAS DOS DIFERENTES FÁCIES DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

As análises de nefelinas foram realizadas com microsonda eletrônica, segundo a metodologia resumida no Apêndice. Além da análise de Si, Al, Fe, Na e K, foram feitos testes para determinar a presença de Mg, Ca, Sr e Ba, sendo os dois últimos elementos não detectados em nenhuma das amostras estudadas. As nefelinas dos nefelina sienitos híbridos não contêm Sr, conquanto esse elemento seja abundante nos feldspatos coexistentes. Já Mg e Ca estão presentes apenas em algumas amostras, porém, em quantidades muito pequenas, dentro dos limites de detecção da microsonda.

A característica química mais marcante das nefelinas dos nefelina sienitos é a presença de quantidades menores, porém significativas, de ferro que, em geral, varia inversamente com o conteúdo de alumínio. O teor de K das nefelinas, como dado nas fórmulas estruturais, calculadas na base de 32 oxigênios, é maior que 1,0 e menor que 2,0 átomos, indicando que esses minerais, para todos os corpos de nefelina sienitos, pertencem às variedades denominadas "meio-potássicas" (Deer *et al.*, 1966). Os dados químicos, com ferro calculado como Fe_2O_3 , foram convertidos em proporções catiônicas e calculados como moléculas de Ne, Ks e Qz, segundo o esquema proposto por Tilley (1954). Os resultados acham-se reunidos nas Tabelas 21 a 35 e integram a Fig. 17.

A seguir, será feita uma breve descrição das nefelinas de rochas dos diferentes corpos de nefelina sienitos.

1. Corpos lujauríticos ocidental e oriental. As nefelinas dos vários fácies que compõem esses corpos apresentam características químicas diferentes:

a) *Lujauritos I e II*: as nefelinas dos lujauritos II, de granulação média, possuem entre 5,4 e 7,6% de sílica em excesso (Qz); por outro lado, as do lujauritos I, de granulação mais grossa, acham-se projetadas dentro do campo de Morozevich-Buerger (Tabela 21; Fig. 17, nº 1). Na Tabela 22, é apresentada a fórmula geral para cada análise de nefelina, com as proporções catiônicas obtidas diretamente da Tabela 21. As vacâncias foram calculadas a partir da fórmula de Donnay *et al.* (1959), assumindo-se $\square = 8 - [x(\text{Na}) + y(\text{K})]$ ou seja, deficiência de álcalis na fórmula estrutural na base de 32 oxigênios. Observa-se nas tabelas que existe uma diferença apreciável no teor de K entre os lujauritos I e II, diferença essa que não se faz acompanhar de variações sistemáticas no teor de Na. Nota-se também que o teor de ferro é mais elevado nos lujauritos II, apesar de os lujauritos I serem mais ricos em minerais com Fe^{3+} (principalmente egirina). As relações entre o excesso de sílica e o teor de ferro das nefelinas acham-se melhor evidenciadas na Tabela 23, com os dados químicos calculados em função das moléculas Ne, FeNe, Ks e Qz.

b) *Nefelina sienitos traquitóides I e II*: tanto a variedade de granulação média (I), quanto a de granulação mais grossa (II), possuem nefelinas com teores elevados de sílica em excesso, à semelhança dos lujauritos II, e apresentam também zonas ricas e pobres em ferro (Tabela 24, Fig. 17, nº 2). A fórmula geral das nefelinas é dada na Tabela 25; contudo, as variações na relação Na/K com o aumento de sílica são mais bem vistas no diagrama Ne-Ks-Qz da Fig. 18. Nota-se neste gráfico que todos os pontos estão concentrados ao longo da linha indicativa de "solução sólida por omissão" para composições entre $\text{Na}_6\text{K}_2\text{Al}_8\text{Si}_8\text{O}_{32}$ e $\text{Na}_6\text{K}_1\square_1\text{Al}_8\text{Si}_8\text{O}_{32}$, sugerindo que as vacâncias ocorrem predominantemente nos sítios do K. Todos os pontos aparecem projetados acima da linha tracejada, que marca o limite de solução

Tabela 21
Composição química de nefelinas de corpos lujauríticos: Lujauritos I e II

	Corpo ocidental						Corpo oriental		
	I 46a	I 46b	II 161	II 134	II 126		I 175	I 505	II 217
			N	B					
SiO ₂	42,6	43,3	45,3	44,4	44,9	44,3	43,4	42,4	44,5
Al ₂ O ₃	33,6	33,2	31,4	32,6	31,4	31,8	33,2	33,7	32,0
Fe ₂ O ₃ ¹	0,46	0,52	2,00	0,84	1,98	1,49	0,62	0,48	1,97
Na ₂ O	14,9	15,1	16,2	15,8	16,2	15,9	16,0	16,4	15,4
K ₂ O	7,86	7,43	5,72	6,58	6,04	6,05	6,96	7,20	5,70
Total	99,42	99,55	100,62	100,22	100,52	99,54	100,18	100,18	99,57
	Fórmula estrutural ²								
Si	8,282	8,381	8,641	8,519	8,600	8,547	8,363	8,205	8,567
Al	7,703	7,584	7,062	7,360	7,089	7,248	7,532	7,691	7,249
Fe	0,067	0,076	0,287	0,121	0,285	0,216	0,091	0,068	0,285
Na	5,612	5,663	6,001	5,877	6,004	5,934	5,970	6,130	5,729
K	1,951	1,836	1,390	1,609	1,475	1,488	1,710	1,775	1,400
Z ³	16,052	16,041	15,990	16,000	15,974	16,011	15,986	15,964	16,101
X ³	7,563	7,499	7,391	7,586	7,479	7,422	7,680	7,905	7,129
Ne ⁴	69,4	70,1	74,2	72,5	74,0	73,7	73,2	74,6	72,7
Ks	26,8	25,3	19,2	22,1	20,2	20,5	23,3	24,0	19,7
Qz	3,8	4,6	6,6	5,4	5,8	5,8	3,5	1,4	7,6

Observações válidas para todas as tabelas de nefelinas:

- 1) Fe(total) calculado como Fe₂O₃
- 2) Unidade de cálculo adotada para a fórmula estrutural = 32 oxigênios.
- 3) Posições estruturais: Z = Σ Si, Al, Fe e X = Σ Ca, Na, K.
- 4) Porcentagem em peso.
- 5) N, núcleo; B, borda dos cristais; Z, zonas de diferente composição em cristais com zoneamento oscilatório.

Figura 17 - Composição de nefelinas de rochas dos corpos de nefelina sienitos, expressa em termos das moléculas de Ne, Ks e Qz.

Os triângulos representam as composições de Morozewicz ($Ne_{75}, 1 Ks_{20}, 9 Qz_{4,0}$) e de Buerger ($Ne_{73} Ks_{27}$).

1,2,3 - Corpos lujauríticos ocidental e oriental (1- Lujauritos 1, círculos vazios, e Lujauritos 11, círculos cheios; 2- Nefelina sienitos traquitóides 1 e 11; 3- Chibinitos); 4- Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte; 5- Chibinitos de Botelhos; 6- Chibinitos orientais; 7- Nefelina sienitos finos do Anel Norte; 8- Pseudoleucita nefelina sienitos; 9- Nefelina sienitos híbridos; 10- Nefelina sienitos com eudialita do Serrote; 11- Nefelina sienitos cinzas do Serrote; 12- Nefelina sienitos com biotita do Serrote; 13- Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote; 14- Nefelina sienitos ocidentais com fluorita; 15- Nefelina sienitos ocidentais com eudialita; 16- Nefelina sienitos finos ocidentais.

Tabela 22

Fórmula geral das nefelinas dos lujauritos I e II dos corpos lujauríticos ocidental e oriental

Lujauritos II, granulação média							Excesso de sílica [⊕]	Amostra
K _{1,390}	Na _{6,001}	□ _{0,609}	Al _{7,062}	Fe _{0,287}	Si _{8,641}	O ₃₂	6,6 (N)	161
K _{1,609}	Na _{5,887}	□ _{0,504}	Al _{7,360}	Fe _{0,121}	Si _{8,519}	O ₃₂	5,4 (B)	
K _{1,475}	Na _{6,004}	□ _{0,521}	Al _{7,089}	Fe _{0,285}	Si _{8,600}	O ₃₂	5,8	134
K _{1,400}	Na _{5,727}	□ _{0,873}	Al _{7,249}	Fe _{0,285}	Si _{8,567}	O ₃₂	7,5	217
K _{1,488}	Na _{5,934}	□ _{0,578}	Al _{7,248}	Fe _{0,216}	Si _{8,547}	O ₃₂	5,8	126
Lujauritos I, granulação grossa								
K _{1,836}	Na _{5,663}	□ _{0,501}	Al _{7,584}	Fe _{0,076}	Si _{8,381}	O ₃₂	4,6	46b
K _{1,951}	Na _{5,612}	□ _{0,437}	Al _{7,703}	Fe _{0,067}	Si _{8,282}	O ₃₂	3,8	46a
K _{1,710}	Na _{5,970}	□ _{0,320}	Al _{7,532}	Fe _{0,091}	Si _{8,363}	O ₃₂	3,5	175
K _{1,775}	Na _{6,130}	□ _{0,095}	Al _{7,691}	Fe _{0,068}	Si _{8,205}	O ₃₂	1,4	505

⊕ Porcentagem de Qz na análise (ver Tabela 21).

Tabela 23

Composição de nefelinas de lujaauritos I e II, em termos das moléculas de nefelina, nefelina de ferro, kalsilita e quartzo (% em peso)

Amostra	Lujaauritos I			
	Nefelina (Ne)	Nefelina de ferro (FeNe)	Kalsilita (Ks)	Quartzo (Qz)
46b	68,7	1,4	25,2	4,6
46a	68,2	1,3	26,8	3,7
175	71,6	1,7	23,3	3,5
505	73,3	1,3	23,9	1,4
	Lujaauritos II			
	Nefelina (Ne)	Nefelina de ferro (FeNe)	Kalsilita (Ks)	Quartzo (Qz)
161 (N)	69,0	5,5	19,0	6,5
161 (B)	70,3	2,3	22,0	5,4
134	68,9	5,4	20,0	5,7
217	67,4	5,5	19,5	7,6
126	69,7	4,1	20,4	5,8

Tabela 24

Composição química de nefelinas de corpos lunares:
Chibinitos e nefelina sienitos traquitóides I e II

Chibinitos								Nefelina sienitos traquitóides I e II					
Corpo ocidental				Corpo oriental				Corpo ocidental		Corpo oriental			
137	47		142	224a		I		II	II	II		II	
	Z	Z	Z	Z	Z	163	138	164	216	Z	Z	Z	Z
SiO ₂	41,7	43,9	42,5	43,0	42,5	41,9	41,3	44,0	44,1	44,2	44,5	44,9	43,9
Al ₂ O ₃	33,4	31,4	32,9	33,2	33,8	32,6	33,8	30,6	33,2	32,2	31,4	31,1	32,6
Fe ₂ O ₃	0,64	2,47	1,27	2,00	0,56	2,02	0,29	2,11	0,87	2,61	3,31	1,78	0,83
Na ₂ O	15,7	15,9	15,7	15,9	15,8	16,0	16,2	16,2	15,8	15,7	15,9	15,7	16,0
K ₂ O	8,00	6,25	7,49	7,30	7,61	8,04	7,96	6,42	6,22	6,27	5,80	5,59	6,11
Total	99,44	99,92	99,86	101,40	100,27	100,56	99,55	99,33	100,19	100,98	100,91	99,07	99,44
Fórmula estrutural													
Si	8,157	8,492	8,259	8,239	8,217	8,151	8,084	8,572	8,434	8,436	8,505	8,679	8,472
Al	7,712	7,148	7,547	7,493	7,698	7,491	7,795	7,024	7,502	7,249	7,079	7,084	7,420
Fe ³⁺	0,094	0,359	0,184	0,289	0,081	0,296	0,042	0,308	0,124	0,375	0,476	0,257	0,120
Na	5,950	5,969	5,912	5,904	5,917	6,033	6,153	6,126	5,865	5,826	5,901	5,885	5,989
K	1,999	1,542	1,857	1,790	1,879	1,998	1,991	1,594	1,519	1,523	1,414	1,376	1,504
Z	15,963	15,999	15,990	16,021	15,996	15,938	15,921	15,904	16,060	16,060	16,060	16,020	16,012
X	7,949	7,511	7,769	7,694	7,796	8,031	8,144	7,720	7,384	7,349	7,315	7,261	7,493
Ne	72,0	73,6	72,3	72,7	72,3	72,6	73,5	74,1	73,3	72,9	73,9	73,4	74,1
Ks	26,9	21,2	25,3	24,4	25,5	26,8	26,5	21,5	21,1	21,3	19,7	19,1	20,8
Qz	1,1	5,2	2,5	2,9	2,2	0,6		4,4	5,6	5,8	6,4	7,5	5,1
Ne ¹								71,4	69,6	68,9	69,2	67,8	70,6
Ks								18,6	17,9	18,1	16,6	15,8	17,9
Qz								10,0	12,5	13,0	14,2	16,4	11,5

1) Porcentagem molecular

Tabela 25

Fórmula geral das nefelinas dos nefelina sienitos traquitóides I e II

Nefelinas sienitos traquitóides I, granulação média-fina	Excesso de sílica [⊕]	Amostra
$K_{1,594} Na_{6,126} \square_{0,280} Al_{7,058} Fe_{0,311} Si_{8,612} O_{32}$	4,4	163
$K_{1,519} Na_{5,865} \square_{0,616} Al_{7,502} Fe_{0,124} Si_{8,434} O_{32}$	5,6	
Nefelinas sienitos traquitóides II, granulação média-grossa		
$K_{1,376} Na_{5,885} \square_{0,739} Al_{7,084} Fe_{0,257} Si_{8,679} O_{32}$	7,5	216
$K_{1,504} Na_{5,989} \square_{0,507} Al_{7,420} Fe_{0,120} Si_{8,472} O_{32}$	5,1	
$K_{1,523} Na_{5,826} \square_{0,651} Al_{7,249} Fe_{0,375} Si_{8,436} O_{32}$	5,8	138
$K_{1,414} Na_{5,901} \square_{0,685} Al_{7,079} Fe_{0,476} Si_{8,505} O_{32}$	6,4	164

⊕ Porcentagem de Qz na análise (ver Tabela 24).

sólida da sílica em nefelinas a 700°C (Hamilton e Mackenzie, 1960).

c) *Chibinitos*: as nefelinas dos chibinitos situam-se em geral dentro do campo de Morozewicz-Buerger, com a maioria das análises aproximando-se mais da primeira composição (Tabela 24; Fig. 17, nº 3). O intervalo composicional é semelhante ao dos lujaunitos. Também mostram alguma zonalidade decorrente de variação inversa nos teores de Fe^{3+} e Al.

2. Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte. A maioria das análises destas rochas apresenta teores muito baixos de Qz, estando dentro dos campos de Morozewicz-Buerger e próximos da composição de Buerger (Tabela 26; Fig. 17, nº 4). Em algumas amostras, as bordas dos cristais mostram maior enriquecimento em ferro; em outras, as nefelinas são homogêneas, além de possuírem teores relativamente baixos de ferro. Exceção ao quadro é dada pela amostra 551, contendo teores altos (até 5%) de sílica em excesso e quantidades de ferro também elevadas nos centros dos grãos (1,87% de Fe_2O_3).

3. Chibinitos de Botelhos e Chibinitos Orientais. Os dados químicos obtidos (Tabela 27; Fig. 17, nº 5 e 6) são no conjunto muito semelhantes aos dos chibinitos dos corpos lujauniticos. As nefelinas dos chibinitos de Botelhos exibem maior quantidade de Qz que as dos orientais, cuja composição é muito próxima daquela de Buerger. Excluídas a amostra 462, em contato com tinguaitos, e a 480, correspondente a um fácies pegmatóide, as demais nefelinas dos chibinitos de Botelhos contêm baixo teor em ferro. Por outro lado, apenas uma única amostra dos chibinitos orientais (550) exhibe enriquecimento em ferro.

4. Nefelina sienitos finos do Anel Norte. Nestas rochas, os cristais subidiomórficos de nefelina apresentam invariavelmente teores elevados de Qz (Tabela 28; Fig. 17, nº 7). A fórmula geral (Tabela 29) evidencia que a proporção de vacâncias é semelhante àquela dos nefelina sienitos traquitóides I e II e lujaunitos II, conquanto a relação Na:K se mostre um pouco diferen-

Tabela 26

Composição química de nefelinas de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte

	131		176		222		205	500	432	551	
	N	B	Z	Z	N	B				N	B
SiO ₂	41,6	41,5	41,7	41,9	41,9	41,7	41,7	41,7	42,4	44,6	43,1
Al ₂ O ₃	33,0	31,3	34,3	33,4	33,2	32,2	33,7	34,8	32,8	31,2	32,6
Fe ₂ O ₃	0,61	2,58	0,29	1,20	0,63	2,34	0,49	0,73	0,26	1,87	0,94
Na ₂ O	15,7	16,0	16,1	16,2	15,8	15,9	15,7	15,9	16,0	15,8	15,7
K ₂ O	7,83	7,61	7,30	7,29	7,60	7,74	6,84	7,94	7,65	6,98	6,99
Total	98,74	98,99	99,69	99,99	99,13	99,88	98,43	101,07	99,11	100,45	99,33
Fórmula estrutural											
Si	8,204	8,229	8,103	8,152	8,222	8,164	8,186	8,030	8,311	8,587	8,382
Al	7,655	7,299	7,861	7,651	7,666	7,444	7,797	7,899	7,552	7,070	7,469
Fe ³⁺	0,089	0,384	0,042	0,173	0,093	0,345	0,072	0,105	0,038	0,270	0,137
Na	5,984	6,123	6,061	6,111	5,965	6,048	5,935	5,922	6,078	5,919	5,924
K	1,969	1,924	1,811	1,809	1,902	1,937	1,712	1,953	1,912	1,714	1,734
Z	15,948	15,912	16,006	15,976	15,981	15,953	16,055	16,034	15,901	15,927	15,988
X	7,953	8,047	7,872	7,920	7,867	7,985	7,647	7,875	7,990	7,633	7,658
Ne	72,4	73,6	74,2	74,3	72,8	73,0	73,8	72,4	72,9	71,8	72,5
Ks	26,4	25,6	24,6	24,5	25,6	26,0	23,6	26,7	25,5	23,2	23,7
Qz	1,2	0,8	1,2	1,2	1,6	1,0	2,6	0,9	1,6	5,0	3,8

Tabela 27

Composição química de nefelinas de chibinitos

	Botelhos						Orientais						
	410	411b	476	180		480		543	544		550		
SiO ₂	42,6	44,1	42,3	41,9	44,1	42,2	44,1	41,7	41,9	42,6	42,2	43,9	42,3
Al ₂ O ₃	34,0	33,4	34,6	33,3	31,3	33,5	31,3	34,3	34,5	33,1	34,4	31,7	34,3
Fe ₂ O ₃	0,23	0,09	0,16	0,11	1,57	0,22	1,77	0,17	0,10	0,61	0,08	2,11	0,49
Na ₂ O	15,7	15,3	15,9	16,2	16,3	15,9	15,9	16,4	16,3	16,4	16,3	16,6	16,5
K ₂ O	7,47	7,02	7,69	7,66	6,25	7,12	5,96	7,90	8,15	8,15	7,68	7,66	8,00
Total	100,00	99,91	100,65	99,17	99,52	98,94	99,03	100,47	100,95	100,86	100,66	101,97	101,59
	Fórmula estrutural												
Si	8,232	8,470	8,144	8,213	8,546	8,234	8,577	8,079	8,077	8,232	8,136	8,399	8,102
Al	7,751	7,556	7,847	7,678	7,147	7,724	7,150	7,829	7,852	7,549	7,811	7,149	7,761
Fe	0,035	0,013	0,022	0,016	0,230	0,033	0,260	0,024	0,014	0,089	0,011	0,304	0,072
Na	5,872	5,694	5,925	6,152	6,140	6,018	5,968	6,155	6,087	6,140	6,101	6,167	6,129
K	1,844	1,720	1,889	1,915	1,548	1,774	1,476	1,967	2,005	2,011	1,888	1,867	1,957
Z	16,018	16,039	16,013	15,907	15,923	15,991	15,987	15,932	15,943	15,870	15,958	15,852	15,935
X	7,716	7,414	7,814	8,067	7,688	7,792	7,444	8,122	8,092	8,151	7,989	8,034	8,086
Ne	72,2	70,7	72,6	73,8	74,5	73,6	73,9	73,9	73,2	73,0	73,5	73,3	73,7
Ks	25,2	23,8	25,7	25,5	21,0	24,1	20,3	26,1	26,8	26,6	25,4	24,8	26,2
Qz	2,6	5,5	1,7	0,7	4,5	2,3	5,8			0,4	1,1	1,9	0,1

Tabela 28
Composição química de nefelinas de nefelina sienitos finos do
Anel Norte

	540		541	
	Z	Z	Z	Z
SiO ₂	45,0	44,2	45,6	45,3
Al ₂ O ₃	32,7	32,5	31,3	32,0
Fe ₂ O ₃	0,84	1,07	1,22	1,58
Na ₂ O	16,1	16,1	16,3	16,6
K ₂ O	5,74	5,76	5,39	5,45
Total	100,38	99,63	99,81	100,93
Fórmula estrutural				
Si	8,573	8,506	8,727	8,594
Al	7,339	7,365	7,063	7,163
Fe	0,121	0,155	0,175	0,226
Na	5,934	6,003	6,042	6,116
K	1,396	1,412	1,314	1,317
Z	16,033	16,026	15,965	15,983
X	7,330	7,415	7,356	7,433
Ne	74,1	74,7	74,8	75,7
Ks	19,4	19,6	18,1	18,2
Qz	6,50	5,7	7,1	6,1

Tabela 29

Fórmula geral das nefelinas dos nefelina sienitos finos do Anel Norte

	Excesso de sílica [⊕]	Amostra
$K_{1,396} Na_{5,934} \square_{0,670} Al_{7,339} Fe_{0,121} Si_{8,573} O_{32}$	6,5	
$K_{1,412} Na_{6,003} \square_{0,585} Al_{7,365} Fe_{0,155} Si_{8,506} O_{32}$	5,7	540
$K_{1,314} Na_{6,042} \square_{0,644} Al_{7,063} Fe_{0,175} Si_{8,727} O_{32}$	7,1	
$K_{1,317} Na_{6,116} \square_{0,567} Al_{7,163} Fe_{0,226} Si_{8,594} O_{32}$	6,1	541

⊕ Porcentagem de Qz na análise (ver Tabela 28).

te. Quando comparadas às variedades dos corpos lujauríticos, as nefelinas deste agrupamento distinguem-se pela maior concentração em Na_2O e SiO_2 (Fig.17). Parece evidente que nestes minerais as vacâncias ocorrem nos sítios do K. No tocante ao conteúdo em Fe_2O_3 , este é moderado a alto, além de variável em diferentes zonas dos cristais.

5. Pseudoleucita nefelina sienitos. Somente foram analisadas as nefelinas da matriz das pseudoleucitas (ver item Petrografia), com o mineral exibindo quantidades variáveis de ferro em diferentes amostras e contendo um mínimo de excesso de sílica (Tabela 30). Como mostrado na Fig.17, nº 8, a composição é idêntica à de Buerger.

6. Nefelina sienitos híbridos. As nefelinas destas rochas apresentam características texturais diversas (Fotomicrografias 8,9 e 10, item 2.2.2) que, por sua vez, guardam correlação com diferenças químicas marcantes (Tabela 31, Fig.17, nº 9). Nas rochas de granulação fina e média, os cristais idiomórficos são individualmente de composição homogênea, malgrado o fato de alguns grãos ou mesmo agregados de grãos exibirem proporções variáveis de Si, Al e Fe na mesma seção de microsonda (por exemplo, am. 386 da Tabela 31). Os excessos de sílica (Qz) são elevados, atingindo quase 10%, representando praticamente os teores máximos possíveis de dissolução de sílica em nefelinas subpotássicas a meio-potássicas (Kogarko e Romanchev, 1977). As composições de agregados de grãos xenomórficos (am. 386), assim como de cristais subidiomórficos de rochas de granulação grossa (am. 234), localizam-se dentro dos campos de Morozewicz - Buerger, próximos da de Buerger (Fig.17, nº 9). Unicamente as nefelinas com pouco Qz exibem zoneamento químico, com diminuição de Fe_2O_3 e aumento de Al_2O_3 no sentido das bordas dos cristais. A Tabela 32 fornece a fórmula geral dos minerais analisados, destacando-se o elevado número de vacâncias existentes. À exceção da amostra 31, a proporção de Na mantém-se em torno de 6 átomos por fórmula para as nefelinas das demais rochas; já a relação Na:K é semelhante à das nefelinas dos nefelina sienitos

Tabela 30
Composição química de nefelinas

	Pseudoleucitas nefelina sienitos		Nefelina sienitos finos ocidentais
	539	482-EE	530
SiO ₂	42,1	41,2	45,1
Al ₂ O ₃	33,5	33,9	32,0
Fe ₂ O ₃	1,40	0,21	1,38
Na ₂ O	15,8	15,9	16,4
K ₂ O	7,71	8,01	5,81
Total	100,51	99,22	100,69
Fórmula estrutural			
Si	8,151	8,074	8,596
Al	7,644	7,847	7,190
Fe	0,203	0,031	0,196
Na	5,935	6,063	6,048
K	1,902	2,006	1,410
Z	15,998	15,952	15,982
X	7,837	8,069	7,458
Ne	72,4	72,9	74,7
Ks	25,9	26,9	19,4
Qz	1,7	0,2	5,9

Tabela 31
Composição química de nefelinas de nefelina sienitos híbridos

	234		236 [⊗]		238	240 [⊗]		31	386 [⊗]				452
	N	B							1				
SiO ₂	43,7	41,6	44,4	45,1	45,9	46,3	45,6	45,2	42,3	45,4	45,3	45,3	46,9
Al ₂ O ₃	32,1	34,6	31,1	31,0	31,8	31,6	31,7	32,0	34,5	31,2	31,4	31,6	31,2
Fe ₂ O ₃	1,98	0,22	2,48	1,91	1,84	0,33	0,92	1,81	0,21	1,59	1,93	1,07	1,38
Na ₂ O	15,9	15,7	16,6	16,7	16,1	16,2	16,0	15,0	16,3	16,3	16,2	16,1	16,2
K ₂ O	7,53	7,55	5,80	5,59	5,26	4,73	5,09	5,40	7,38	5,85	6,04	5,54	5,35
Total	101,21	99,67	100,38	100,30	100,90	99,16	99,31	99,41	100,69	100,34	100,87	99,61	101,03
Fórmula estrutural													
Si	8,389	8,082	8,536	8,641	8,693	8,838	8,738	8,668	8,144	8,679	8,643	8,695	8,843
Al	7,274	7,929	7,051	7,011	7,083	7,114	7,157	7,221	7,814	7,042	7,046	7,137	6,940
Fe	0,285	0,033	0,357	0,274	0,262	0,048	0,132	0,262	0,030	0,228	0,277	0,154	0,195
Na	5,921	5,919	6,208	6,216	5,921	6,011	5,936	5,551	6,076	6,049	5,990	5,994	5,938
K	1,845	1,872	1,421	1,365	1,268	1,152	1,244	1,327	1,810	1,425	1,469	1,355	1,285
Z	15,948	16,044	15,944	15,926	16,038	16,000	16,027	16,151	15,988	15,949	15,966	15,986	15,978
X	7,766	7,791	7,629	7,581	7,189	7,163	7,180	6,878	7,886	7,474	7,459	7,349	7,223
Ne	71,9	72,7	75,8	75,9	74,6	75,1	75,0	71,5	74,1	74,2	73,7	74,2	73,6
Ks	24,8	25,8	19,4	18,6	17,5	16,0	17,3	18,9	24,6	19,5	20,1	18,7	17,8
Qz	3,3	1,5	4,8	5,5	7,9	8,9	7,7	9,6	1,3	6,3	6,2	7,1	8,6
Ne ²	70,6	73,1	72,5	71,9	68,4	68,0	69,1	64,4	74,8	69,6	69,4	69,0	66,9
Ks	21,9	23,3	16,7	15,7	14,5	13,0	14,3	15,2	22,2	16,4	17,0	15,6	14,6
Qz	7,5	3,6	10,8	12,4	17,1	19,0	16,6	20,4	3,0	14,0	13,6	15,4	18,5

⊗ As análises correspondem a diferentes cristais na mesma amostra.

1 Dados de agregados de grãos de contorno irregular.

2 Porcentagem molecular

Tabela 32

Fórmula geral das nefelinas dos nefelina sienito híbridos

						Excesso de sílica [⊕]	Amostra
K _{1,845}	Na _{5,921}	□ _{0,234}	Fe _{0,285}	Al _{7,274}	Si _{8,389} O ₃₂	3,26 (N)	234
K _{1,872}	Na _{5,919}	□ _{0,209}	Fe _{0,033}	Al _{7,929}	Si _{8,082} O ₃₂	1,48 (B)	
K _{1,421}	Na _{6,208}	□ _{0,371}	Fe _{0,357}	Al _{7,051}	Si _{8,536} O ₃₂	4,80	236
K _{1,365}	Na _{6,216}	□ _{0,419}	Fe _{0,274}	Al _{7,011}	Si _{8,641} O ₃₂	5,54	
K _{1,268}	Na _{5,921}	□ _{0,811}	Fe _{0,262}	Al _{7,083}	Si _{8,693} O ₃₂	7,89	238
K _{1,152}	Na _{6,011}	□ _{0,837}	Fe _{0,048}	Al _{7,114}	Si _{8,838} O ₃₂	8,90	240
K _{1,244}	Na _{5,936}	□ _{0,820}	Fe _{0,132}	Al _{7,157}	Si _{8,738} O ₃₂	7,66	
K _{1,327}	Na _{5,551}	□ _{1,112}	Fe _{0,262}	Al _{7,221}	Si _{8,668} O ₃₂	9,60	31
K _{1,810}	Na _{6,076}	□ _{0,114}	Fe _{0,030}	Al _{7,814}	Si _{8,144} O ₃₂	1,28 agregado com con- torno irregular	
K _{1,425}	Na _{6,049}	□ _{0,526}	Fe _{0,228}	Al _{7,042}	Si _{8,679} O ₃₂	6,30	386
K _{1,469}	Na _{5,990}	□ _{0,541}	Fe _{0,277}	Al _{7,046}	Si _{8,643} O ₃₂	6,15	
K _{1,355}	Na _{5,994}	□ _{0,651}	Fe _{0,154}	Al _{7,137}	Si _{8,695} O ₃₂	7,06	
K _{1,285}	Na _{5,938}	□ _{0,777}	Fe _{0,195}	Al _{6,940}	Si _{8,843} O ₃₂	8,60	452

⊕ Porcentagem de Qz na análise (ver Tabela 31).

finos do Anel Norte.

Na Fig. 19, a maioria dos pontos acha-se projetada muito perto ou mesmo sobre a linha representando a "série de solução sólida por omissão", sugerindo, assim, que as vacâncias ocorrem nos sítios do K.

7. Nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Estas rochas contêm nefelinas com marcada zonalidade Fe^{3+} -Al, e composição dentro dos campos de Morozewicz-Buerger (Tabela 33; Fig. 17, nº 10).

8. Nefelina sienitos cinzas e Nefelina sienitos com biotita do Serrote. As nefelinas de ambos os corpos apresentam baixos teores de Qz e concentrações variáveis de ferro para diferentes zonas dos cristais. Nas variedades com biotita, algumas zonas chegam a possuir até 3% de Fe_2O_3 (Tabela 34, Fig. 17, nº 11 e 12).

9. Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote. A única amostra analisada é portadora de nefelinas idiomórficas (Fotomicrografia 11, item 2.2.2), praticamente sem ferro, e com composição próxima à de Buerger (Tabela 34; Fig. 17, nº 13).

10. Nefelina sienitos ocidentais com fluorita. O fácies acha-se representado pela amostra 525 (Tabela 34; Fig. 17, nº 14). As nefelinas caracterizam-se por apresentar baixo teor de Qz; já as proporções de Al e Fe^{3+} variam inversamente.

11. Nefelina sienitos ocidentais com eudialita. Estas rochas apresentam características texturais muito diversas, com o conjunto dos dados químicos das nefelinas formando na Fig. 17, nº 15, uma faixa que se estende desde a composição de Buerger até além da de Morozewicz. Do mesmo modo que os feldspatos potássicos, a composição varia com a amostra (Tabela 35), com teores mínimos de Qz em algumas rochas (ams. 512, 513), e maiores de 6% em outras (534). De idêntica maneira, as concentrações de

Figura 19 - Composição de nefelinas de nefelina sienitos híbridos, expressa em termos de Ne-Ks-Qz, em porcentagem molecular. Diagrama de Hamilton e Mackenzie (1960).

Para referências, ver Fig. 18.

Tabela 33
Composição química de nefelinas de nefelina sienitos com eudialita
do Serrote

	159	112		364	
		Z	Z	Z	Z
SiO ₂	41,5	41,6	41,9	43,1	43,2
Al ₂ O ₃	34,1	32,4	34,1	31,8	32,9
Fe ₂ O ₃	0,12	1,53	0,16	2,64	0,36
Na ₂ O	16,2	15,6	15,5	16,1	15,8
K ₂ O	7,96	7,81	8,11	6,70	6,72
Total	99,88	98,94	99,77	100,34	98,98
Fórmula estrutural					
Si	8,086	8,209	8,152	8,344	8,395
Al	7,835	7,530	7,815	7,257	7,548
Fe	0,017	0,227	0,023	0,384	0,052
Na	6,120	5,932	5,867	6,055	5,957
K	1,978	1,966	2,012	1,654	1,667
Z	15,938	15,966	15,990	15,985	15,995
X	8,098	7,898	7,877	7,709	7,624
Ne	73,5	72,1	71,2	74,1	73,1
Ks	26,5	26,5	27,3	22,6	22,8
Qz		1,4	1,5	3,3	4,1

Tabela 34
Composição química de nefelinas de vários corpos de nefelina sienitos

	Nefelina sienitos ocidentais com fluorita		Nefelina sienitos do Serrote							
			porfirítico	com biotita					cinza	
	525			341	321			314	178	
					Z	Z	Z		N	B
SiO ₂	43,6	42,1	42,3	43,8	42,4	42,1	41,9	42,7	42,2	41,6
Al ₂ O ₃	32,1	34,3	35,0	33,5	32,1	33,9	35,0	32,8	31,6	33,9
Fe ₂ O ₃	1,29	0,21	0,01	0,79	3,10	1,26	0,39	1,70	2,30	0,50
Na ₂ O	16,4	15,9	15,8	16,1	16,0	15,6	15,5	16,2	16,1	15,9
K ₂ O	6,65	7,81	7,80	6,7	7,03	6,83	6,84	7,69	7,30	7,56
Total	100,04	100,32	100,91	100,89	100,63	99,69	99,63	101,09	99,50	99,46
Fórmula estrutural										
Si	8,423	8,145	8,137	8,366	8,226	8,154	8,106	8,224	8,280	8,127
Al	7,320	7,815	7,885	7,533	7,326	7,758	7,969	7,476	7,302	7,794
Fe	0,185	0,031	0,001	0,112	0,452	0,183	0,057	0,245	0,339	0,072
Na	6,153	5,961	5,880	5,966	6,031	5,874	5,810	6,045	6,136	6,009
K	1,639	1,926	1,905	1,632	1,738	1,690	1,687	1,888	1,826	1,883
Z	15,928	15,991	16,023	16,011	16,004	16,095	16,132	15,945	15,921	15,993
X	7,792	7,887	7,785	7,598	7,769	7,564	7,497	7,933	7,962	7,892
Ne	74,6	71,8	72,2	73,6	74,4	73,3	73,1	73,1	73,9	73,3
Ks	22,1	25,8	22,1	22,4	23,9	23,5	23,7	25,4	24,5	25,5
Qz	3,3	2,4	1,7	4,0	1,7	3,2	3,2	1,5	1,6	1,2

Tabela 35

Composição química de nefelinas de nefelina sienitos ocidentais com eudialita

	512	513	514	519 [⊗]		522		531	534		389	
				N	B	Z	Z		N	B	Z	Z
SiO ₂	42,2	42,3	43,1	44,6	42,1	44,7	44,2	43,2	44,1	44,9	44,2	44,5
Al ₂ O ₃	35,1	35,0	33,9	31,7	34,2	33,0	31,3	34,0	31,8	31,4	32,2	31,4
Fe ₂ O ₃	0,11	0,08	0,36	1,74	0,19	1,10	1,70	0,20	1,54	2,56	1,22	2,34
Na ₂ O	16,3	16,2	16,5	16,0	16,0	16,5	16,6	16,1	16,1	16,2	15,8	15,9
K ₂ O	7,80	7,65	6,61	6,18	7,42	6,05	6,25	6,73	5,84	5,83	6,09	5,83
Total	101,51	101,23	100,47	100,22	99,91	101,35	100,05	100,23	99,38	100,89	99,51	99,97
Fórmula estrutural												
Si	8,063	8,072	8,272	8,567	8,162	8,475	8,536	8,295	8,620	8,571	8,528	8,563
Al	7,920	7,928	7,669	7,168	7,808	7,366	7,114	7,699	7,158	7,066	7,315	7,118
Fe	0,015	0,011	0,051	0,252	0,027	0,157	0,247	0,029	0,221	0,367	0,177	0,338
Na	6,031	6,022	6,134	5,957	6,010	6,067	6,233	5,986	5,965	5,997	5,918	5,937
K	1,907	1,869	1,620	1,513	1,834	1,465	1,539	1,649	1,420	1,420	1,497	1,430
Z	15,998	16,011	15,992	15,987	15,997	15,998	15,897	16,023	15,999	16,004	16,020	16,019
X	7,938	7,891	7,754	7,470	7,844	7,532	7,772	7,635	7,385	7,417	7,415	7,367
Ne	73,6	73,0	75,1	73,5	73,4	74,9	75,2	74,0	73,9	74,3	73,4	73,9
Ks	25,8	26,2	22,0	20,8	25,0	20,1	20,8	22,6	19,6	19,6	20,7	19,8
Qz	0,6	0,8	2,9	5,7	1,6	5,0	4,0	3,4	6,5	6,1	5,9	6,3
Ne ¹	74,9	74,3	73,9	69,6	73,7	71,6	72,8	72,3	69,3	69,8	69,3	69,3
Ks	23,6	24,0	19,4	17,6	22,5	17,3	18,0	19,8	16,5	16,6	17,6	16,7
Qz	1,5	1,7	6,7	12,8	3,8	11,1	9,2	7,9	14,2	13,6	13,1	14,0

⊗ Zoneamento extremo em alguns cristais de maior tamanho.

1 Porcentagem molecular.

ferro são muito baixas e constantes ou, então, podem variar entre os centros e as bordas de grãos, ou ainda em zonas que se alternam. Em alguns casos, é possível fazer-se uma correlação direta entre os dados de feldspatos e nefelinas; por exemplo, nas amostras 512 e 513, os feldspatos homogêneos contêm mais de 98% de Or, e as nefelinas, com teores mínimos de ferro, possuem composições muito próximas às de Buerger. Nas amostras restantes, tanto os feldspatos, quanto as nefelinas exibem composições mais variadas. No diagrama da Fig. 20, nota-se que os dados situados entre as composições de Buerger e Morozewicz, ou muito perto desta última composição, mostram certa dispersão; contudo, os dados relativos às nefelinas com excesso de sílica maior de 5,5% aparecem concentrados em torno da linha representando a "solução sólida por omissão", entre as composições: $\text{Na}_6\text{K}_2\text{Al}_8\text{Si}_8\text{O}_{32}$ e $\text{Na}_6\text{K}_1\text{Al}_8\text{Si}_8\text{O}_{32}$.

12. Nefelina sienitos finos ocidentais. Somente foi analisada uma amostra deste corpo (Tabela 30; Fig. 17, nº 16). A nefelina é muito homogênea, além de portadora de teores moderados de ferro e 5,9% de sílica em excesso; a relação Na/K é semelhante à dos nefelina sienitos finos do Anel Norte para os mesmos teores de Qz.

4.3. RELAÇÕES Si-Al-Fe E ZONEAMENTO

As relações Si-Al e as possíveis substituições de Fe^{3+} nos sítios tetraédricos são itens de grande interesse na cristaloquímica das nefelinas. Todos os diagramas de fase indicam que esses minerais pertencem a séries de solução sólida parcial. As escassas referências ao zoneamento das nefelinas em rochas voltam-se principalmente às variações na relação Al-Fe, pouco ou nada havendo quanto ao comportamento dos cátions maiores K e Na. Parte do trabalho analítico aqui executado com a microsonda foi direcionado nesse sentido, tomando-se cuidados especiais quanto às variações no conteúdo de ferro, com vistas a estabelecer-se um possível padrão de zoneamento nas nefelinas. Os resultados obtidos demonstram que o comportamento do ferro é

Figura 20 - Composição de nefelinas de nefelina sienitos ocidentais com eudialita, expressa em termos de Ne-Ks- Qz, em porcentagem molecular.

Diagrama de Hamilton e Mackenzie (1960). Para referências ver Fig. 18.

irregular, mantendo-se constante em determinadas nefelinas, ou então, mudando bruscamente entre os centros e as bordas dos grãos de outras; em muito casos observou-se também um zoneamento oscilatório, marcado por altos e baixos sucessivos no conteúdo de ferro. Em geral pode-se dizer que o padrão de distribuição é uniforme para uma determinada lâmina, sem que esses resultados possam ser extrapolados para outras amostras do mesmo corpo. Estes resultados estão de acordo com os de Brown (1970), que apresenta um dos poucos estudos dedicados especificamente ao zoneamento de nefelinas. As nefelinas analisadas por esse autor, provenientes de um tufito de lapilli do Lago Neutron, Tanzânia, mostram zonas cujo conteúdo de Fe_2O_3 varia entre 1,40% e 4,60%, e que podem inclusive ser percebidas opticamente em razão de mudanças nos índices de refração. Brown (197) concluiu que nas nefelinas o Fe^{3+} substitui o Al e, mais ainda, que, mesmo sendo as variações de ferro muito bruscas de uma zona para outra, não existe um padrão claro de zoneamento. O conteúdo em Fe_2O_3 de nefelinas citadas na literatura é variável, aparecendo como mais comuns as referências a teores baixos (entre 0 e 0,5%), e mais moderados (entre aproximadamente 0,8 e 1,2% de Fe_2O_3 ; ver exemplos em Deer *et al.*, 1963). Teores elevados de ferro, além dos já citados por Brown (1970), aparecem num rischorrito do maciço de Khibina, Península de Kola, Rússia (3,40%, Perchuk e Ryabchikov, 1968, Tabela 1).

As nefelinas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas possuem, em média, teores moderados de ferro; contudo, a variação encontrada é grande, passando-se de 0,0% em algumas amostras a 3,3% em outras. Portanto, é de grande interesse analisar os dados de ferro das nefelinas estudadas, com vistas à definição de um possível esquema cristaloquímico de substituições. Para tanto, as proporções catiônicas de Si, Al e Fe de nefelinas de alguns corpos acham-se representadas em diagramas Fe^{3+} : Al, Fe^{3+} : Si (Figs. 21 a 23), Al: Si+ Fe^{3+} (Figs. 21 e 22) e Al: Si (Fig. 23). Um número relativamente grande de dados foi obtido a partir de amostras de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte e nefelina sienitos ocidentais com eudialita. Eles constam das

Figura 21 - Diagramas Fe^{3+} : Al, Fe^{3+} : Si e Al: $Si+Fe^{3+}$ de nefelinas dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte.

a,b - as linhas cheias unem centros e bordas de grãos ou zonas diferentes em cristais zonados.

Os pontos isolados representam nefelinas de composição homogênea.

c - Relação inversa entre Al e $Si+Fe^{3+}$. A linha cheia mostra a tendência dos pontos.

Figura 22 - Diagramas $Fe^{3+}:Al$, $Fe^{3+}:Si$ e $Al:Si+Fe^{3+}$ de nefelinas dos nefelina sienitos ocidentais com eudialita.
a,b - as linhas tracejadas unem cristais homogêneos coexistentes na mesma secção. Outras referências, constam da Fig. 21.

Figura 23 - Diagramas Al:Si, Fe³⁺:Si e Fe³⁺:Al de nefelinas dos nefelina sienitos híbridos.

Cristais subidiomórficos zonados, círculos vazios; cristais idiomórficos não zonados, círculos cheios. Outras referências constam das Figs. 21 e 22.

Figs. 21 e 22 e servem para ilustrar a tendência geral observada nos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Como exceção ao quadro, tem-se o comportamento das nefelinas dos nefelina sienitos híbridos, cujas variações $\text{Fe}^{3+}:\text{Al}$ e $\text{Fe}^{3+}:\text{Si}$ estão representadas na Fig. 23 b,c. Nas nefelinas dos dois primeiros agrupamentos litológicos (Figs. 21 e 22) observa-se claramente uma correlação negativa entre Fe^{3+} e Al, sugerindo a existência de relação de substituição entre os dois cátions; por outro lado, nos diagramas $\text{Si}:\text{Fe}^{3+}$ ambos os cátions aumentam conjuntamente, ou o aumento de Fe^{3+} se faz com Si mantido constante. No diagrama $\text{Al}:\text{Si}+\text{Fe}^{3+}$, as relações entre os ocupantes das posições tetraédricas são as esperadas, uma vez que a soma é igual ou semelhante a 16 cátions para fórmulas calculadas na base de 32 oxigênios. Por conseguinte, na maioria das nefelinas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas o Fe^{3+} está presente substituindo o Al. No entanto, na Fig. 22, nota-se que a inclinação da linha unindo cristais zonados no diagrama $\text{Fe}^{3+}:\text{Si}$ muda para valores mais elevados de silício (acima de 8,6 átomos), o que poderia indicar que pelo menos parte do Fe^{3+} pode ocorrer substituindo o Si nessas nefelinas. Entretanto, as variações mais notáveis entre esses elementos são vistas nas nefelinas dos nefelina sienitos híbridos (Fig. 23). Nestas, o comportamento de Fe^{3+} varia em função dos cristais considerados. Por um lado, estão os cristais idiomórficos, não zonados, que ocorrem nas rochas de granulação fina e média e, por outro, os cristais subidiomórficos zonados de amostras de granulação mais grossa, e também os grãos e agregados de grãos de contornos irregulares. Os cristais idiomórficos são muito ricos em Si (8,5 até mais de 8,8 átomos) e pobres em Al; Si e Fe^{3+} mostram clara tendência à correlação inversa, enquanto que nenhuma relação parece existir entre Al e Fe^{3+} . Contrariamente, os cristais zonados continuam a exibir a mesma tendência reconhecida nas Figs. 21 e 22, ou seja, correlação negativa entre Al e Fe^{3+} . Disso resulta que parecem estar presentes nestas rochas duas gerações distintas de nefelina. Uma primeira geração, de alta temperatura, responsável pela formação de cristais regulares com teores de sílica em excesso, cujos valores estão próximos dos teores máximos possíveis em nefelinas meio-potássicas, e

nos quais Fe^{3+} não substitui o Al e ocupa as posições do Si na estrutura (ver Onuma *et al.*, 1972). Uma segunda geração, de menor temperatura, aparece na forma de cristais subidiomórficos a xenomórficos, com Fe^{3+} substituindo o Al.

4.4. CONSIDERAÇÕES PETROLÓGICAS

Os aspectos que serão aqui considerados referem -se a algumas das características relacionadas com a composição das nefelinas e sua utilização como termômetro geológico. A composição desses minerais, como observado nas páginas anteriores, é de tal maneira complexa que excede os simples limites de uma solução sólida binária. Importam portanto não só as variações nas proporções relativas de Na e K, como também o conteúdo de Si. O estudo pormenorizado dessas variações levou vários autores a sugerirem que a composição das nefelinas é um geotermômetro potencial, já que pode ser comprovada a existência de relação direta entre a temperatura de cristalização (ou melhor, de resfriamento) de uma determinada rocha e o quimismo da nefelina.

Como primeira aproximação, vários autores demonstraram que as nefelinas de "alta temperatura", que se cristalizam em rochas vulcânicas rapidamente resfriadas, possuem teores variáveis de Na e K, além de quantidades elevadas de sílica em excesso (Tilley, 1954; Miyashiro, 1951; Barth, 1963). Contrapõem-se a essas nefelinas as de "baixa temperatura", que se formam em rochas plutônicas de resfriamento mais lento, e cuja composição restringe-se estritamente ao "campo de convergência de Morozewicz-Buerger" (ver Fig. 17 e item 4.1); apresentam baixos teores de sílica em excesso e proporções de álcalis que se aproximam de 3Na:K (Miyashiro, 1951; Barth, 1963).

Este contraste marcado sugere que as nefelinas de "alta temperatura" são minerais em equilíbrio com magmas, enquanto que as de "baixa temperatura" refletem composições provindas provavelmente de recristalização (submagmática?), particularmente entre nefelinas e feldspatos alcalinos. A temperaturas

de cristalização (ou recristalização?) muito baixas (menores de 500°C), a composição das nefelinas tende a adequar-se àquela de Buerger ($\text{Na}_6\text{K}_2\text{Al}_8\text{Si}_8\text{O}_{32}$), constituindo um composto supostamente ordenado (Tuttle e Smith, 1958).

4.4.1. Nefelinas como geotermômetros

Todo geotermômetro baseia-se em reações de equilíbrio, seja sólido-sólido, seja sólido-líquido. No caso particular das nefelinas, estes minerais relacionam-se quimicamente, por um lado, com os magmas a partir dos quais precipitam e, por outro, com os feldspatos alcalinos coexistentes.

Uma das propostas de geotermômetro citadas na literatura parte da investigação experimental da composição de nefelinas em contato com magmas (Hamilton e Mackenzie, 1960; Hamilton, 1961). O outro modelo estabelece relações de intercâmbio de Na, K (e Si?) entre nefelinas e feldspatos alcalinos (Perchuk e Ryabchikow, 1968; Powell e Powell, 1977). Na interpretação de Hamilton, as temperaturas de cristalização de nefelinas estão diretamente ligadas ao excesso de sílica na sua composição, e são representadas como isothermas no diagram Ne-Ks-Qz (de 500°C até 775°C , ver exemplos mais adiante). Dos enfoques teóricos, o mais aprimorado parece ser o de Powell e Powell (1977), no qual se comparam três parâmetros: a proporção de albita no feldspato alcalino (x_{Ab}), a da kalsilita na nefelina (x_{Kals}), e a do excesso de sílica no mesmo mineral ($x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}}$).

À primeira vista, parece fácil utilizar as isothermas apresentadas por Hamilton (1961), aplicáveis sobretudo às rochas vulcânicas ou subvulcânicas, com nefelina de alta temperatura. Entre 500 e 700°C , contudo, as variações no teor de sílica nas soluções sólidas de nefelina são muito pequenas, pequenos erros nas análises químicas levam fatalmente a grandes erros nos cálculos de excessos de SiO_2 , invalidando, portanto, a estimativa de temperaturas baseada nesse geotermômetro.

Aparentemente, ainda são maiores as dificuldades de interpretação dos resultados obtidos utilizando-se os diagramas teóricos. O primeiro trabalho que interpreta as composições de nefelinas e feldspatos potássicos de nefelina sienitos é o de Tilley (1954). Este autor assinala que o reequilíbrio provocado por reações submagmáticas conduz à diminuição do teor de Si e Na nas nefelinas (cuja composição acerca-se à de Morozewicz, $\text{Ne}_{75,1} \text{Ks}_{20,9} \text{Qz}_{4,0}$), enquanto que os feldspatos tornam-se mais sódicos, ao lado do fato de se ordenarem. Mudanças semelhantes foram reconhecidas nos trabalhos experimentais de Piotrowski e Edgar (1970); para estes autores, a composição de Morozewicz é inquestionavelmente aquela à qual se ajustam as nefelinas em resposta a temperaturas decrescentes.

Não parece existir divergência de opiniões quanto à possibilidade de intercâmbio Na:K entre feldspato alcalino e nefelina (Hamilton, 1961), que ocorreria facilmente ainda em presença de pequenas quantidades de líquido residual (por exemplo, vestígios de magma "intercumulus"; Powell, 1978). Não é tão facilmente aceita a possibilidade de intercâmbio de Si no estado subsólido. Enquanto que Tilley (1954) e outros (ver também Mitchell e Platt, 1982) acenam com essa possibilidade, Hamilton (1961) afirma que as proporções Si:Al das nefelinas fixam-se por reações com o magma e, portanto, não mudam em função de reações subsolidus.

Resta então compatibilizar essas opiniões com a tendência também claramente estabelecida na literatura de que muitas nefelinas de rochas intrusivas (plutônicas e subvulcânicas) apresentam-se com pouca sílica em excesso e de composição distante daquela de Morozewicz. Estas nefelinas aproximam-se da composição de Buerger ($\text{Ne}_{73} \text{Ks}_{27}$). Parece claro, portanto, que nestas nefelinas plutônicas ou subvulcânicas, o reequilíbrio afetou também as proporções Si:Al. Faltam, entretanto, evidências mineralógicas que indiquem o destino da sílica em excesso, aparentemente extraída da nefelina já cristalizada. Hamilton (1961), por exemplo, sugere que nefelinas ricas em sílica

exsolvem feldspato potássico, mas não encontra nas suas rochas qualquer vestígio de tal evento.

A discussão precedente ilustra as dificuldades enfrentadas na utilização indiscriminada dos geotermômetros propostos na literatura, especialmente para a aplicação no caso de nefelina sienitos de granulação grossa e de evidente cristalização lenta. Nestes casos, parece por demais arriscado estabelecerem-se temperaturas na base da composição da nefelina, ou do par nefelina-feldspato alcalino, já que estas temperaturas representam, na melhor das hipóteses, temperaturas de reequilíbrio, portanto, provavelmente muito distantes das verdadeiras temperaturas de cristalização magmática. A esta característica adiciona-se ainda uma outra certamente importante: como reconhecer, a partir de meras observações petrográficas, se os minerais encontram-se em "equilíbrio textural"?

Em muitos nefelina sienitos, e particularmente nos de Poços de Caldas, ocorre uma outra transformação, a dos feldspatos potássicos originais em polimorfos de menor temperatura (microclínios de alta triclinicidade e microclínios máximos). Desconhece-se totalmente a influência que estas transformações exercem sobre o intercâmbio Na:K entre nefelinas e feldspatos.

A experiência da literatura (e a própria, ver páginas seguintes), mostra que são frequentes as incompatibilidades entre as estimativas obtidas a partir dos geotermômetros de Hamilton e de Powell e Powell. Em geral, as isotermas de Powell e Powell determinam estimativas de temperaturas relativamente baixas para as nefelinas (com quaisquer excesso de sílica) que coexistem com feldspatos homogêneos *ricos em K*. Ao contrário, esse geotermômetro dará temperaturas relativamente elevadas para as nefelinas (com teores mínimos de excesso de sílica) coexistentes com feldspatos homogêneos *ricos em Na*; Powell e Powell (1977, Tabela 5) exemplificam o caso de um pegmatito de nefelina sienito (com feldspato rico em Na), cuja suposta temperatura de cristalização é de 750 a 1000°C ou, alternativamente, de 500°C, segundo o método estimativo utilizado por Powell e Powell ou por

Hamilton, respectivamente.

Parte das discrepâncias relaciona-se provavelmente ao fato de que as composições de nefelinas e feldspatos são função não somente da temperatura de cristalização, como também da composição global do próprio magma. Não existem trabalhos de avaliação sobre o assunto, e parece difícil propor, por enquanto, um modelo que permita incluir todas as possíveis variáveis que controlam a composição dos minerais félsicos.

4.4.2. Temperaturas de cristalização de diversos magmas alcalinos

Várias experiências demonstram que a temperatura tanto do "liquidus" como do "solidus" de magmas alcalinos intrusivos depende em muito da sua composição. Piotrowski e Edgar (1970) e Edgar e Parker (1974) indicam que tanto a natureza dos máficos, como a sua quantidade, exercem influência sobre essas temperaturas, as quais são, por outra parte, fortemente dependentes tanto do índice agpaítico, como do conteúdo em voláteis. Alguns resultados de experimentos de fusão e de cristalização no laboratório são surpreendentes. Sood (1981), que compila os dados apresentados na literatura, indica que o Iujaurito de Ilímaussaq atinge temperaturas de "solidus" não superiores a 400°C (a 1 kbar de P_{H_2O}), com o "liquidus" a aproximadamente 850°C (a 1 kbar); esta rocha, com um índice agpaítico de 1,46, mostra-se rica em voláteis. Ao contrário, rochas sieníticas com índices agpaíticos da ordem de 1,00, e mais pobres em voláteis, cristalizam-se totalmente a 620°C (a 1 kbar), com o "liquidus" a aproximadamente 820°C (a igual pressão). Estes valores devem ser lembrados, uma vez que determinam limites realistas para avaliar as temperaturas obtidas de geotermômetros.

4.4.3. Quimismo resumido de nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas

A seguir, acham-se resumidas algumas das feições

químicas das nefelinas estudadas.

- 1) As nefelinas com elevados teores de Qz (maiores de 5%) caracterizam-se por apresentar vacâncias unicamente nas posições estruturais correspondentes ao K (Figs. 18,19 e 20). Nos diagramas das figuras citadas, estas nefelinas aparecem projetadas acima da linha tracejada, que indica o limite de solução sólida da sílica em nefelina a 700°C. Os dados de nefelinas com teores de Qz menores de 5% mostram maior dispersão (ver exemplos nas Figs. 19 e 20); contudo é evidente que a diminuição de Si é compensada principalmente por aumentos no teor de K.
- 2) As nefelinas possuem teores médios a elevados em ferro. Não se reconhece qualquer padrão particular com respeito à substituição de Al por Fe^{3+} . O Fe^{3+} pode ser mais abundante nos núcleos ou nas bordas dos cristais, ou mostrar variações acentuadas em zonas alternantes; analogamente, diferentes amostras do mesmo corpo podem exibir teores variáveis de Fe^{3+} .
- 3) Também não existe uma relação inequívoca entre o teor de Qz da nefelina e o seu conteúdo de Fe^{3+} . Contudo, em alguns corpos ou fácies, as nefelinas com elevados teores de Qz são também ricas em ferro. O melhor exemplo é dado pelas diferenças de composição das nefelinas referentes aos fácies de lujaunitos I e lujaunitos II dos corpos lujauniticos ocidental e oriental (Tabelas 21,22 e 23). Por outro lado, muitas nefelinas de outras rochas com teores elevados de Fe_2O_3 mostram teores mínimos de Qz.
- 4) Nefelinas com excesso de sílica maior que aproximadamente 5% são encontradas em corpos exibindo predominância de rochas de granulação fina, e também nos fácies de contato de outros corpos.
 - a) *Nefelina sienitos híbridos*. Em algumas rochas de granulação fina e média, as nefelinas ocorrem como inclusões idio

mórficas no interior de cristais de ortoclásio ricos em Na, e com marcado zoneamento.

- b) *Lujauritos II e Nefelina sienitos traquitóides I e II*. As nefelinas são geralmente idiomórficas a subidiomórficas, conquanto nos nefelina sienitos traquitóides também estejam presentes cristais xenomórficos. Os feldspatos destas rochas são ricos em K e apresentam estado estrutural variável, com predomínio de ortoclásio sobre microclínio quase máximo (ver Capítulo 3). A presença de albita tabular é comum, e alguns cristais de feldspato exibem pertitas. Os lujauritos II correspondem ao fácies de borda dos lujauritos I; da mesma maneira, os nefelina sienitos traquitóides I e II parecem ser fácies de contato dos chibinitos (mapa da Fig. 4, item 2.2.1).
- c) *Nefelina sienitos finos do Anel Norte e Nefelina sienitos finos ocidentais*. Em ambos os corpos os cristais de nefelina são subidiomórficos e as placas de feldspato potássico pertítico exibem estado estrutural variável, com dominância de microclínio de alta triclinicidade. A albita tabular é abundante, principalmente nos nefelina sienitos finos do Anel Norte.
- 5) À exceção dos casos mencionados no ponto 4 acima, as nefelinas dos demais fácies possuem teores de sílica variáveis, a maioria dos dados situando-se entre as composições de Morozewicz e Buerger (Fig.17). A seguir, serão discutidas as características das nefelinas e dos feldspatos de alguns fácies.
- a) *Nefelina sienitos híbridos de granulação grossa*. Nestas rochas as nefelinas ocorrem como cristais subidiomórficos associados a feldspatos com geminação incipiente. As nefelinas contêm pouco Qz, em marcado contraste com as inclusões idiomórficas abordadas no ponto 4.

b) *Nefelina sienitos ocidentais com eudialita*. Como mencionado no item 2.1.2. e 2.2.4. e no capítulo dedicado aos feldspatos, as várias amostras deste corpo mostram notáveis diferenças quanto à textura das rochas e quanto a composição e estado estrutural dos feldspatos. Também as nefelinas variam, possuindo excessos de sílica de 6 a 6,5% em algumas amostras; no entanto, em outras, as composições são próximas às de Buerger. Existe contudo uma clara correspondência química e estrutural entre os feldspatos e as nefelinas dessas rochas. Por exemplo, nas rochas com feldspatos de estado estrutural variável e composição mais sódica, as nefelinas são portadoras de elevados teores de excesso de sílica (ams. 522 e 539); nas rochas com microclínio máximo rico em Or (Or>98%), as nefelinas mostram composições próximas às de Buerger (ams. 512 e 513). A albita tabular presente é de cristalização tardia.

c) *Nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote*. As rochas de ambos corpos possuem cristais subidiomórficos de nefelina com composições compreendidas entre a de Morozewicz e a de Buerger; os feldspatos associados exibem estado estrutural variável, predominando no entanto os grãos sem geminação. Cabe lembrar que o valor de $2V_{\alpha}$ medido em alguns cristais de feldspato nos nefelina sienitos com biotita corresponde ao da sanidina (ver item 3.5).

d) *Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote*. As nefelinas idiomórficas a subidiomórficas destas rochas apresentam praticamente a composição de Buerger. São muito homogêneas e mostram teores de Fe_2O_3 próximos aos limites inferiores de detecção da microsonda (0,01%). O feldspato acompanhante é microclínio máximo, muito rico em Or.

4.4.4. Geotermometria das nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas

O quimismo das nefelinas, ora isoladamente, ora

comparado com o dos feldspatos associados, permite estabelecer uma estimativa da temperatura seja de recristalização, seja de cristalização direta a partir do magma. Convém separar na discussão seguinte dois casos diferentes, catalogados segundo as suas características geológicas e texturais contrastadas. Por um lado, encontra-se o caso dos nefelina sienitos que representam fácies de "borda" ou de "contato". Por outro, estão os nefelina sienitos de granulação mais grossa, ora integrantes de corpos texturalmente mais homogêneos, ora relacionados com os fácies do tipo anterior, dos quais representam a variedade de cristalização mais demorada.

Geotermometria dos fácies de borda ou de contato

Em princípio, parecem ser estas as rochas que reúnem melhores condições para fornecer dados geotermométricos guardando correspondência com temperaturas *diretas* de cristalização. Com efeito, pode-se supor que estas rochas, devido à sua posição geológica, resfriem sob condições que minimizam os efeitos de recristalização posteriores. A Tabela 36 apresenta de maneira resumida as estimativas geotermométricas.

Selecionam-se para discussão dos exemplos, o dos *fácies de granulação fina a média de nefelina sienitos híbridos* e o dos vários fácies que separam no campo os lujaunitos de granulação grossa dos chibinitos: *lujaunitos II (mais finos)* e *nefelina sienitos traquitóides I e II*.

1) *Nefelina sienitos híbridos de granulação fina a média*. Foram analisados vários nefelina sienitos deste tipo (Fig. 17, nº 9, e Tabela 31), e selecionados para discussão e comparação duas amostras, uma com granulação fina (am.238) e outra com granulação média (am.236). O excesso de sílica na nefelina, utilizando-se o geotermômetro de Hamilton (Figs. 24 a,b), sugere temperaturas maiores de 775°C, possivelmente em torno dos 800°C para as rochas mais finas, e de aproximadamente 730°C para as de granulação média. Por outro lado, faz-se difícil utilizar

Tabela 36

Estimativas de temperaturas de nefelina sienitos de Poços de Caldas (Ver Figuras 24 e 26-30 e texto)

Corpo ou Fácies	Geotermômetro de HAMILTON(1961) (°C)	Geotermômetro de POWELL e POWELL (1977) (°C)
Fácies dos corpos lujauríticos		
Lujauritos I		<500-540
Lujauritos II	±750	±580
Nefelina sienitos traquitóides I e II	±750	±580-600
Chibinitos		500-540
Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte		<500-550
Chibinitos de Botelhos		500-540
Chibinitos orientais		<500
Nefelina sienitos finos do Anel Norte	±770	
Pseudoleucita nefelina sienitos		<500
Nefelina sienitos híbridos		
granulação fina	±800	<600-750
granulação média	±730	600
granulação grossa [⊗]	<500	
Nefelina sienitos com eudialita do Serrote		<500
Nefelina sienitos cinzas do Serrote		500
Nefelina sienitos com biotita do Serrote		500-550
Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote		<500
Nefelina sienitos ocidentais com fluorita		±500
Nefelina sienitos ocidentais com eudialita	> 700 - < 500	
Nefelina sienitos finos ocidentais	±750	

⊗ Não se dispõem de dados de feldspatos.

Figura 24 - Geotermometria de nefelina sienitos híbridos.

Amostra 238, granulação fina; amostra 236, granulação média.

a) Geotermômetro de nefelina de Hamilton (1961).

Diagrama parcial do sistema Ne-Ks-Qz com as isotermas de 500, 700 e 775°C. A linha tracejada representa o limite aproximado de solução sólida da sílica em nefelina a 1068°C. O triângulo representa a composição de Morozewicz (M).

b) Dados das amostras 238 e 236 no geotermômetro de Hamilton. Os triângulos representam as composições de Morozewicz (M) e Buerger (B).

c) Geotermômetro de nefelina e feldspato alcalino coexistentes de Powell e Powell (1977).

Os diagramas representam a proporção de albita no feldspato alcalino (x_{Ab}) com respeito ao teor de sílica na nefelina ($x_{SiO_2}^{ne}$) para diferentes valores de kalsilita na nefelina (x_{Kals}). As isotermas cobrem o intervalo de temperatura entre 600 e 1000°C. A linha tracejada suvertical indica composições de feldspatos coexistentes com nefelina.

Os dados de nefelinas e feldspatos potássicos das amostras 238 e 236 estão representados por linhas cheias que atravessam as isotermas. Os feldspatos potássicos de ambas as amostras possuem zonalidade centro-borda, enquanto que as nefelinas são de composição homogênea, podendo variar de composição em diferentes cristais.

Os valores representados nos diagramas de Powell e Powell são:

	Am. 238		Am. 236	
	núcleo	borda	núcleo	borda
x_{Ab}	0,404	0,241	0,294	0,138
x_{Kals}	0,175		0,186	
$x_{SiO_2}^{ne}$	0,079		0,050

Figura 24

neste caso o geotermômetro de Powell e Powell, que se baseia no intercâmbio de Na e K entre nefelina e feldspato potássico. Os dados de borda e centro de nefelina e feldspato da amostra 238, lançados no diagrama de Powell e Powell (Fig. 24c), situam-se respectivamente sobre as isotermas de 600°C e 750°C, cobrindo um intervalo de temperatura que parece pouco realista. Com efeito, as nefelinas dessa rocha são homogêneas e idiomórficas, e aparecem predominantemente englobadas como pequenos cristais em feldspatos potássicos maiores, fortemente zonados. Admite-se, portanto, que os cristais de nefelina são anteriores aos de feldspato pelo qual foram englobados. Dessa forma, é provável que a nefelina represente uma fase de formação precoce, que por estar incorporada ao feldspato, deixou de participar de eventuais trocas de Na e K com líquidos magmáticos, à medida que se processou a cristalização desse mineral; não cabe portanto a utilização do geotermômetro de Powell e Powell. Considerações semelhantes podem ser feitas para a amostra 236. Nesta rocha de granulação média, a composição total dos feldspatos e das nefelinas é diferente daquela das rochas de granulação fina (Fig. 25), porém, as relações texturais dos minerais são similares às da amostra 238. Torna-se evidente que também neste caso não é possível se utilizar o diagrama de Powell e Powell (ver Fig. 24c).

2) *Lujauritos II e Nefelina sienitos traquitóides I e II*. Os lujauritos II e os nefelina sienitos traquitóides I e II são interpretados como fácies de "borda" de lujauritos I de granulação mais grossa e de chibinitos, respectivamente. Os três fácies encontram-se em contato, segundo uma estratigrafia relatada na parte descritiva deste trabalho (item 2.2.1 e Fig. 4). As texturas dessas rochas evidenciam que os cristais de feldspato potássico e nefelina mostram contatos mútuos, e a interpretação mais provável é a de cristalização simultânea, portanto com provável equilíbrio nas relações Na:K entre os dois minerais.

Os dados das nefelinas, utilizando o geotermômetro de Hamilton, fornecem temperaturas maiores de 700°C, com valores médios de 750°C (Figs. 26 a,b). No geotermômetro de Powell

Figura 25 - Composições de nefelinas e feldspatos potássicos coe
xistentes de nefelina sienitos híbridos projetadas
no diagrama Ne-Ks-Qz (% em peso).

Am. 238, granulação fina; am. 236, granulação média. Os núcleos
dos cristais de feldspato acham-se representados por círculos
cheios, enquanto que as bordas por círculos vazios. As linhas
cheias unem minerais coexistentes.

Figura 26 - Geotermometria de lujauros II e de nefelina sienitos traquitóides I e II.

Dados de nefelinas projetados no geotermômetro de Hamilton (1961). Para referências gerais, ver Fig. 24.

a) Lujauritos II.

b) Nefelina sienitos traquitóides I e II.

c) Dados de nefelinas e feldspatos potássicos coexistentes nos lujauros II e nefelina sienitos traquitóides I e II projetados nos diagramas de Powell e Powell (1977).

Os diagramas representam as proporções de albita no feldspato (x_{Ab}) com respeito às proporções de kalsilita na nefelina (x_{Kals}), para diferentes valores de sílica na nefelina ($x_{SiO_2}^{ne}$). O diagrama para ($x_{SiO_2}^{ne}$) = 0,04 foi construído utilizando-se os dados de Powell e Powell (1977). Para outras referências, ver Fig. 24. Os dois diagramas da figura cobrem aproximadamente o intervalo de variação da sílica nas nefelinas das três fácies; a maioria das nefelinas porém, apresenta $x_{SiO_2}^{ne} > 0,050$. Os valores projetados nos diagramas são:

	$x_{SiO_2}^{ne} = 0,04$	$x_{SiO_2}^{ne} = 0,08$
x_{Ab}	0,130 - 0,150	0,140 - 0,143
x_{Kals}	0,205 - 0,220	0,191 - 0,197
$x_{SiO_2}^{ne}$	0,044 - 0,058	0,065 - 0,078

Figura 26

e Powell, as variações na composição de feldspatos e nefelinas com $x_{Kals} > 1,8$ devem ser representadas em diferentes diagramas, cada um com teores fixos de $x_{SiO_2}^{ne}$ (Fig. 26c); observa-se nestes diagramas que o intervalo de temperatura para os minerais coexistentes nas rochas dos três fácies varia entre aproximadamente 530 e 600°C, com um valor médio mais perto de 600°C.

As discrepâncias que resultam da aplicação de ambos os geotermômetros são marcantes. Os dados experimentais (ver item 4.4.2) sugerem para o lujauro de Poços de Caldas temperaturas de "solidus" da ordem de 400°C. Não existem dados para as rochas chibiníticas; contudo, deve-se supor que estes valores não são muito diferentes, haja visto serem os chibinitos rochas agpaíticas e, provavelmente, também ricas em voláteis (ver discussão adiante). Admitindo-se para o lujauro e chibinito temperaturas mínimas da ordem de 400-500°C, pode-se sugerir que temperaturas equivalentes, porém algo mais elevadas, devam aplicar-se aos fácies de "contato" de granulação mais fina em discussão. À luz destas possibilidades, afiguram-se realistas as temperaturas de 580-600°C obtidas com o geotermômetro de Powell e Powell.

Geotermometria de corpos com predomínio de rochas de granulação fina-média

Incluem-se nesta categoria os *nefelina sienitos finos de Anel Norte* e os *nefelina sienitos finos ocidentais*. As rochas de ambos os corpos possuem nefelinas com elevado e quase constante excesso de sílica, acompanhadas de feldspatos potássicos com marcado zoneamento. O geotermômetro de Powell e Powell fornece resultados semelhantes aos observados para o caso da amostra 236 de nefelina sienito híbrido. No geotermômetro de Hamilton (Fig. 27 a,b) obtêm-se temperaturas de aproximadamente 770°C para os nefelina sienitos finos do Anel Norte e de 750°C para os nefelina sienitos finos ocidentais. Estas temperaturas parecem razoáveis, considerando que a composição mineralógica das rochas de ambos corpos não sugere um índice agpaítico ele-

Figura 27 - Geotermometria de nefelina sienitos finos do Anel Norte (a) e de nefelina sienitos finos ocidentais (b).

Dados de nefelinas projetados no geotermômetro de Hamilton (1961). Para referências gerais, ver Fig. 24.

vado.

Geotermometria dos fácies de granulação grossa

Nos fácies de granulação grossa, a nefelina possui teores de Qz geralmente menores de 5%. Esse mineral coexiste com feldspatos ricos em Or e de estado estrutural variável, mostrando ora predomínio de ortoclásio, ora de microclínio quase máximo ou máximo (ver Tabela 36, para resumo dos resultados).

As composições das nefelinas deste fácies acham-se representadas no diagrama de Hamilton entre as composições de Morozewicz e a de Buerger, o que indica temperaturas da ordem de 500°C ou até inferiores (para maiores referências, ver Figs. 17 e 24a). No geotermômetro de Powell e Powell, os dados de nefelinas e feldspatos situam-se em regiões de temperaturas inteiramente compatíveis com as que são sugeridas no diagrama de Hamilton (da ordem de 500°C ou menores), tal como observado nos exemplos das Figs. 28-30. No tocante aos diagramas de Powell e Powell, cabe mencionar que, devido ao fato de as nefelinas possuírem $x_{Kals} > 1,8$, a variação de composição de nefelinas e feldspatos de alguns corpos ou fácies não pode ser representada num único diagrama (ver comentário anterior sobre o assunto e as referências das Figs. 24 e 26); nestes casos, preferiu-se projetar os dados em dois diagramas um com $x_{SiO_2}^{ne} = 0,0$ e o outro com $x_{SiO_2}^{ne} = 0,04$ para poder estabelecer um "intervalo de temperatura" com valores máximos e mínimos para o fácies em questão.

Nas Figs. 28-30, observa-se que as variações de composição de feldspatos e nefelinas representam linhas horizontais ou subparalelas às isotermas de Powell e Powell; estes resultados atestam claramente que as nefelinas são minerais de baixa temperatura, desconhecendo-se, no entanto, à primeira vista, qual a interpretação preferida: se cristalização direta a partir do magma ou, alternativamente, se recristalização sob condições submagmáticas. Em alguns casos, é a própria rocha que sugere limites possíveis para a interpretação. O caso mais claro é dado

Figura 28 - Geotermometria de nefelina sienitos da região de Serrote.

Dados de nefelinas e feldspatos potássicos coexistentes projetados nos diagramas de Powell e Powell (1977). Para referências gerais, ver Figs. 24 e 26.

a) Nefelina sienitos com biotita do Serrote

Os dados projetados nos diagramas com $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,0$ e $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,04$ cobrem o intervalo de composição de feldspatos e nefelinas coexistentes nas várias amostras estudadas. Os dados são:

$$x_{\text{Ab}} \quad 0,104 - 0,117$$

$$x_{\text{Kals}} \quad 0,254 - 0,224$$

$$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} \quad 0,015 - 0,040$$

b) Nefelina sienitos cinzas do Serrote. Os dados são:

$$x_{\text{Ab}} \quad 0,055 - 0,098$$

$$x_{\text{Kals}} \quad 0,255 - 0,245$$

$$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} \quad 0,011 - 0,016$$

c) Nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Os dados são:

$$x_{\text{Ab}} \quad 0,014 - 0,024$$

$$x_{\text{Kals}} \quad 0,275 - 0,227$$

$$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} \quad 0,0 - 0,040$$

Os valores foram projetados unicamente no diagrama com $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,0$, uma vez que devido aos baixos teores de x_{Ab} no feldspato, obter-se-iam resultados semelhantes no diagrama com $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,04$.

d) Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote. Os dados são:

$$x_{\text{Ab}} \quad 0,006$$

$$x_{\text{Kals}} \quad 0,261$$

$$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} \quad 0,017$$

Figura 28

Figura 29 - Geotermometria de chibinitos.

Dados de nefelinas e feldspatos potássicos coexistentes projetados nos diagramas de Powell e Powell (1977). Para referências gerais, ver Figs. 24 e 26.

a) Chibinitos do corpo lujaurítico ocidental.

Os dados projetados nos diagramas com $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,0$ e $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,04$ cobrem o intervalo de composição de feldspatos e nefelinas coexistentes em algumas amostras com cristais zonados. Os dados são:

$$x_{\text{Ab}} \quad 0,064 - 0,130$$

$$x_{\text{Kals}} \quad 0,250 - 0,212$$

$$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} \quad 0,025 - 0,050$$

b) Chibinitos orientais. Os dados são:

$$x_{\text{Ab}} \quad 0,014 - 0,043$$

$$x_{\text{Kals}} \quad 0,268 - 0,250$$

$$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} \quad 0,0 - 0,019$$

Figura 29

Figura 30 - Geotermometria de nefelina sienitos vários.

Dados de nefelinas e feldspatos potássicos coexistentes projetados nos diagramas de Powell e Powell (1977). Para referências gerais, ver Figs. 24 e 26.

a) Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte.

Dados de rochas de contato com os corpos ígneos ocidentais e orientais projetados no diagrama com $x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}} = 0,0$:

x_{Ab}	0,017 - 0,036
x_{Kals}	0,264 - 0,236
$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}}$	0,008 - 0,026

Dados de outras amostras de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte:

	432	500	551
x_{Ab}	0,057	0,100	0,032
x_{Kals}	0,255	0,267	0,232 - 0,237
$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}}$	0,016	0,009	0,050 - 0,038

b) Nefelina sienitos ocidentais com fluorita. Os dados de uma amostra com nefelina zonada são:

x_{Ab}	0,060
x_{Kals}	0,222 - 0,258
$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}}$	0,033 - 0,024

c) Pseudoleucita nefelina sienitos. Os dados são:

x_{Ab}	0,033 - 0,044
x_{Kals}	0,259 - 0,269
$x_{\text{SiO}_2}^{\text{ne}}$	0,017 - 0,002

Figura 30

pelas rochas ricas em minerais de metais raros, (lujauritos I, de granulação grossa, e chibinitos). Na Fig. 29a, foram projetados os dados de amostras de *chibinitos do corpo lujaurítico ocidental* exibindo feldspatos e nefelinas zonadas. As temperaturas obtidas situam-se entre aproximadamente 500 e 540°C e, muito provavelmente, representam temperaturas de cristalização magmática inteiramente compatíveis com os valores obtidos através de experiências várias em laboratório para rochas semelhantes (ver discussão no item 4.4.2). O mesmo intervalo de temperaturas é obtido utilizando-se os dados de algumas amostras de *lujauritos I* e de *chibinitos de Botelhos*; já as rochas dos *chibinitos orientais* fornecem temperaturas menores de 500°C (Fig. 29b).

Os *nefelina sienitos cinzas do Anel Norte* apresentam interessante padrão geotermométrico (Fig. 30a). As amostras coletadas perto do contato com os lujauritos, intrusivos nos nefelina sienitos cinzas, possuem feldspatos e nefelinas de composição muito restrita; no geotermômetro de Powell e Powell estes minerais fornecem temperaturas abaixo de 500°C. Em amostras obtidas longe do contato (ams. 500 e 551) e num pequeno dique de nefelina sienito cinza em tinguaito (am. 432), os minerais félsicos mostram composição variável, indicando nos diagramas de Powell e Powell temperaturas um pouco mais elevadas, até aproximadamente 550°C. Cabem várias interpretações para essa variação. As diferenças nas composições de feldspatos potássicos e nefelinas e, portanto, as diferenças nas estimativas geotermométricas, podem refletir variações faciológicas não mapeáveis (ver itens 2.2.1. e 2.2.2.); entretanto, é mais provável que as baixas temperaturas obtidas nas rochas em contato com lujauritos sejam efeitos de recristalização produzida por influência do magma lujaurítico, controlada por aquecimento das rochas e abundância de fluidos intersticiais.

Em muitas fácies de granulação grossa estudados, todas as nefelinas apresentam valores médios extremamente baixos de excesso de sílica e, portanto com composições próximas às de Buerger; vários autores (por exemplo, Hamilton, 1961; Piotrowski

e Edgar, 1970) sugerem que a composição de Buerger é a de nefelinas reequilibradas a temperaturas submagmáticas, processo que, por outra parte, é raramente verificado através de observações texturais.

Entretanto, alguma confirmação pode ser obtida mediante a comparação entre as composições das nefelinas e o estado estrutural dos feldspatos potássicos. Frequentemente o baixo teor de Qz nas nefelinas correlaciona-se com a presença de microclínio quase máximo ou máximo, a exemplo do que foi constatado em algumas amostras de *nefelina sienitos ocidentais com eudialita* (ver menção no item 4.4.3.), de *nefelina sienitos com eudialita do Serrote* e de *nefelina sienitos porfiríticos do Serrote* (Fig. 28 c,d), que possuem nefelinas praticamente sem Qz e microclínio máximo (ver Tilley, 1954; Hamilton, 1961). Segundo as interpretações indicadas no capítulo dedicado aos feldspatos (item 3.6.1), a transformação ortoclásio-microclínio pode ter seu início no estágio magmático, porém, é evidente que culmina no estágio submagmático; paralelamente a essa modificação, deveria processar-se a recristalização da nefelina.

Conclui-se, portanto, que composições de nefelinas próximas às de Buerger deveriam estar acompanhadas por ordenamento crescente dos feldspatos coexistentes, sendo os dois processos controlados por recristalização submagmática.

Os exemplos aqui discutidos abrangem praticamente todos os fácies de granulação grossa, exceção feita aos *nefelina sienitos ocidentais com eudialita*; constata-se, como já mencionado no item 4.4.3., a extrema heterogeneidade composicional dos minerais fêlsicos nas diversas amostras. Algumas rochas apresentam temperaturas de cristalização superiores a 700°C no geotermômetro de Hamilton (ver Figs. 17, 20 e 24a), enquanto que em outras a composição de feldspatos e nefelinas indica temperaturas menores de 500°C.

4.4.5. Fe^{3+} nas nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Como observado previamente, a maioria das nefelinas presentes em nefelina sienitos e rochas afins constantes da literatura tem por característica o teor baixo a médio de Fe_2O_3 , raramente superior a 1,2% (ver exemplos em Deer *et al.*, 1963; Heier, 1966; Perchuk e Ryabchikov, 1968; Mitchell, 1972; Powell, 1978; Mitchell e Platt, 1982). Entre as exceções, citam-se os casos de nefelinas de tufitos do Lago Neutron, Tanzânia, mostrando notável zoneamento químico definido sobretudo pelas relações $\text{Fe}^{3+}:\text{Al}$ (Brown, 1970), e as de um rischorrito do maciço de Khibina, Península de Kola, URSS (Perchuk e Ryabchikov, 1968, Tabela 1); os *rischorritos* são nefelina sienitos inequigranulares cuja característica principal consiste em apresentar cristais grandes de feldspato potássico com inclusões de nefelina, além de intercrescimentos gráficos e micropegmatíticos de ambos os minerais félsicos (Gerasimovsky *et al.*, 1974). Enquanto que as nefelinas citadas por Brown (1970) são claramente de "alta temperatura", as encontradas nos rischorritos (com teores de Fe_2O_3 de 3,4%) são decididamente de "baixa", uma vez que o par nefelina-feldspato potássico mostra composições indicativas de temperaturas de cristalização (ou de recristalização?) próximas a 500°C (Powell e Powell, 1977, Tabela 5). A explicação sugerida por Brown (1970) para as nefelinas da suite vulcânica baseia-se no papel desempenhado pelas proporções de $\text{Fe}^{3+}:\text{Fe}^{2+}$ nos magmas; magmas com razões baixas de oxidação do ferro, ainda que ricos em Fe (total), inibem o ingresso de Fe^{3+} na estrutura da nefelina. No ambiente vulcânico, atribui-se a zonalidade $\text{Fe}^{3+}-\text{Al}$ das nefelinas principalmente às possíveis variações bruscas de $P_{\text{H}_2\text{O}}$, controladas, por exemplo, por explosões vulcânicas descontínuas (Brown, 1970). De qualquer maneira, o conteúdo elevado de Fe^{3+} nas nefelinas liga-se provavelmente à fugacidade de oxigênio do magma; nefelinas ricas em Fe^{3+} cristalar-se-iam apenas a partir de magmas relativamente "oxidados".

As nefelinas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas caracterizam-se, quimicamente, por um marcado zoneamento $\text{Fe}^{3+}-\text{Al}$, similar àquele presente nas nefelinas de rochas vulcânicas

descritas por Brown (1970). Este padrão de zoneamento é, por outra parte, incomum ou mesmo desconhecido junto às referências de nefelina sienitos encontradas na literatura; com efeito, não existem registros sobre esta feição na literatura geológica.

Os únicos nefelina sienitos de Poços de Caldas contendo nefelinas com teores constantes e muito baixos de Fe^{3+} são aqueles pertencentes ao corpo de nefelina sienito porfirítico do Serrote (ver sua localização na Fig. 3). Nos demais, os teores de Fe_2O_3 são em média elevados; a zonalidade notada varia de algo menos de 0,5% até 2,5-3,3% (ver Tabelas 21 a 35).

Das explicações sugeridas na literatura (ver Brown, 1970), a mais adequada parece ser aquela que relaciona o ingresso de Fe^{3+} na nefelina com a razão $\text{Fe}^{3+} : \text{Fe}^{2+}$ do magma, combinando-se, porém, essa característica com controles de tipo essencialmente cinéticos. É possível que as causas do zoneamento em nefelinas de rochas de cristalização profunda ou subvulcânica estejam ligadas mais a controles efetivados por migrações de Al e Fe^{3+} no magma imediatamente em contato com o cristal em crescimento, do que a controles por mudanças bruscas nas variáveis intensivas (T ou $\text{P}_{\text{H}_2\text{O}}$, etc.; ver Brown, 1970).

Este esquema que sugere a migração seletiva de Al e Fe^{3+} nas nefelinas controlada por fatores cinéticos poderia explicar o quimismo e a textura exibidos pelas nefelinas dos nefelina sienitos porfiríticos do Serrote, com nefelinas muito pobres em Fe_2O_3 (0,01%) e abundantes inclusões pequenas de piroxênio prismático concentradas nas bordas dos grãos e alinhadas paralelamente às mesmas (ver item 2.2.3, e Fotomicrografia 11 no item 2.2.2.). Se durante o crescimento dessas nefelinas, o Al fosse preferencialmente incorporado nos cristais, o líquido vizinho ficaria notavelmente enriquecido em Fe^{3+} , com os minúsculos prismas de piroxênio egiirínico formando-se num estágio posterior deutérico ou hidrotermal. Nyamback (1980) descreve e discute um exemplo semelhante.

Os dados compilados da literatura, combinados com

os aqui apresentados sobre a composição das nefelinas de nefelina sienitos de Poços de Caldas, embora algo esparsos e, portanto, insuficientes, permitem que se tirem algumas considerações de caráter geral.

- 1) O teor de Fe^{3+} presente nas nefelinas de nefelina sienitos e rochas afins independe do ambiente de cristalização, haja visto que nefelinas tanto de rochas plutônicas, como de vulcânicas, possuem por vezes teores elevados de Fe^{3+} .
- 2) Não existe aparentemente qualquer razão cristaloquímica inibindo o ingresso de Fe^{3+} (em quantidades moderadas, ver Onuma *et al.*, 1972) na estrutura das nefelinas, sejam elas plutônicas ou vulcânicas.
- 3) Se as nefelinas com quimismo tanto de "alta" como de "baixa temperatura" coexistem com feldspatos alcalinos de composição adequada, e apresentam-se, ao mesmo tempo, relativamente ricas em Fe^{3+} , infere-se que as mudanças que ocorrem durante a cristalização do mineral deixam intato o conteúdo inicial de Fe^{3+} e modificam sobretudo as proporções de Na e K e, eventualmente, também as de Si e Al do mineral.

CAPÍTULO 5

PIROXÊNIOS: QUIMISMO E PETROLOGIA

Os piroxênios são os minerais máficos mais importantes dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Ocorrem em proporções variáveis: escassos nas rochas leucocráticas e alcançando 25-30% nos lujaunitos.

A maioria dos piroxênios corresponde opticamente às variedades egirina-augita e egirina. Dados químicos mais completos mostram que as variações composicionais são muito complexas, correspondendo em parte a resultados já apresentados por outros autores na literatura sobre piroxênios de intrusões alcalinas.

Inicia-se esta parte com uma discussão geral sobre a estrutura e o quimismo de piroxênios, assinalando em particular a complexidade resultante da presença de Fe^{3+} , Na e Ti. Em continuação, discutem-se os vários métodos utilizados na literatura, e no presente trabalho, para estimar a quantidade de Fe^{3+} a partir do Fe total determinado com microsonda. Os resultados obtidos para os diferentes nefelina sienitos de Poços de Caldas são apresentados e discutidos com base na cristaloquímica de piroxênios sódicos.

5.1. ESTRUTURA E QUÍMICA

Os piroxênios augíticos e sódicos cristalizam-se no grupo espacila C2/c. As características gerais da estrutura são mostrados na Fig. 31, segundo projeção no plano (100) (Cameron e Papike, 1981). Observando a figura, vê-se que ela consiste de camadas alternantes de tetraedros e octaedros paralelos ao plano (100). Na camada tetraédrica, cada tetraedro compartilha dois vértices com os tetraedros adjacentes para formar cadeias paralelas ao eixo c. A camada octaédrica compõe-se de cátions M

Figura 31 - Estrutura cristalina de piroxênios do grupo espacial $C2/c$ (reprodução de Cameron e Papike, 1981).
 Projeção no plano (100), mostrando as posições ocupadas pelos átomos. T: cátions com coordenação tetraédrica; M(1): cátions com coordenação octaédrica; M(2): cátions com números de coordenação 6, 7 ou 8. O(1): oxigênios apicais; O(2): oxigênios basais.

com coordenação 6 a 8; os seus poliedros de coordenação comparti_{lham} arestas e formam no seu conjunto folhas contínuas de polie_{dros} no plano (100), paralelas ao eixo c.

Os cátions M distribuem-se em duas posições, M_1 e M_2 . Os sítios M_1 encontram-se no centro de um octaedro regular e acomodam cátions divalentes, trivalentes e tetravalentes com raio iônico variando de 0,53 Å (Al) a 0,83 Å (Mn). Os sítios M_2 colocam-se no centro de poliedros maiores e menos regulares que os M_1 , com números de coordenação 6, 7 ou 8, segundo o raio iôni_{co} do cátion que alojam. Nestas posições, aparecem os cátions grandes como Ca e Na (raio iônico 1,12 Å e 1,16 Å, respectivamen_{te}), com número de coordenação 8, porém, podem também estar pre_{sentes} cátions com raio iônico menor, de até 0,72 Å (Mg) e núme_{ro} de coordenação 6.

A fórmula geral dos piroxênios é a seguinte:

onde: W = Ca, Na; X = Mg, Fe^{2+} , Mn; Y = Al, Fe^{3+} ; Z = Si, Al.

Os cátions W ocupam as posições M_2 , enquanto que as M_1 e T são preenchidas, respectivamente, pelos cátions X-Y e Z. A maioria das substituições ocorre nos grupos X e Y, envol_{vendo} geralmente cátions de carga diferente, que produzem ex_{ces}so ou defeito de carga nos sítios M_1 , compensada por substitui_{ções} nos sítios M_2 (grupo W) ou T (grupo Z).

Nos piroxênios da série soda-augita → egrina-augita → egrina, a substituição característica é a de (Ca + Mg) e (Fe^{2+} + Mn) por Na e Fe^{3+} . O aumento de sódio nos piroxênios comumente se faz acompanhar de um incremento de silício (Lar_{sen}, 1976), não sendo raras as egrinas com 2 átomos de silício por fórmula; porém, se o teor de alumínio dos piroxênios for baixo, pode acontecer que a soma de Si+Al não chegue a comple_{tar} os sítios T, surgindo então deficiências catiônicas nesses locais. Os baixos teores de Si+Al são, em parte, devidos a análi_{se}

ses defeituosas; contudo, parece mais lógico considerar que há ou tros cátions ocupando parte das posições T (Robinson, 1981).

Outros elementos, principalmente o titânio, podem estar presentes em quantidades elevadas nos piroxênios, com as possíveis substituições desse elemento na estrutura discutidas por vários pesquisadores. Em termos gerais, é possível dizer-se que o titânio entra nas posições octaédricas como Ti^{4+} ; Ti^{3+} foi detectado em piroxênios de rochas lunares e meteoritos, refletindo a baixa fugacidade do oxigênio nesses ambientes (Dowty e Clark, 1973; Burns e Huggins, 1973; Papike, 1981). Não há evidências da presença de Ti^{3+} em piroxênios de rochas terrestres.

A substituição de Fe^{3+} por Ti^{4+} em piroxênios parece evidente quando são comparados piroxênios titaníferos e não titaníferos com teores de sódio semelhantes (ver análises químicas em Deer *et al.*, 1978); quanto maior o teor de titânio nos piroxênios, tanto menor é o teor de Fe^{3+} .

Aoki (1964) sugere a presença de titânio de coordenação tetraédrica em piroxênios sódicos. Por sua vez, Hartmann (1969) adianta que o titânio somente poderia assumir coordenação tetraédrica nos silicatos sem Al ou Fe^{3+} .

O candidato mais provável para as substituições nas posições T parece ser o Fe^{3+} . Huckenholz *et al.* (1969) mostraram a existência de Fe^{3+} em piroxênios ricos em ferro, com pouco sódio e pobres em alumínio. A presença de Fe^{3+} tetraédrico foi confirmada por estudos de espectroscopia e Mössbauer, feitos em ferridiopsídios e titanoaugitas por Rossman (1981).

Algumas análises de egirina-augitas e egirinas con têm teores elevados de Mn. Larsen (1976) e Deer *et al.* (1978) men cionam que em piroxênios variando de hedenbergitas até egirinas, e também em augitas, ocorre a substituição direta de Mg por Mn^{2+} . Por outro lado, os estudos feitos por Vinokurov (1966) em piroxênios da série diopsídio-hedenbergita mostraram que o Mn^{2+} pode

substituir tanto o Mg como o Ca. Os únicos piroxênios nos quais o Mn possivelmente encontra-se como Mn^{2+} e Mn^{3+} são os denominados "violan", descritos em rochas associadas a jazidas de Mn (Brown *et al.*, 1978; Mottana *et al.*, 1979); a presença de Mn^{2+} e Mn^{3+} é evidenciada pela cor azul e o intenso pleocroísmo, variável de azul a rosa (Mottana *et al.*, 1979; ver também item 5.6).

Os piroxênios sódicos de rochas alcalinas possuem em geral pequenas quantidades de Zr (Gomes *et al.*, 1970; Larsen, 1976). Egirinas com até 7% de ZrO_2 são mencionadas na literatura (Jones e Peckett, 1980). O Zr^{4+} , a exemplo de Ti^{4+} , entra nas posições octaédricas.

5.1.1. Moléculas de piroxênios

Desde os trabalhos iniciais sobre a química de piroxênios, vem se observando a complexidade química desses minerais e a necessidade de expressarem-se as fórmulas estruturais segundo esquemas de soluções sólidas, a partir do equacionamento de membros finais (*end members*) (Tabela 37). Nesse sentido, as fórmulas dos piroxênios não sódicos são expressas em função das moléculas de enstatita (En), $Mg_2Si_2O_6$, wollastonita (Wo), $Ca_2Si_2O_6$, e ferrosilita (Fs), $Fe_2Si_2O_6$, com as quais se formam as moléculas de diopsídio ($Di=1En + 1Wo$) e hedenbergita ($Hd=1Fs+1Wo$). O sódio e o correspondente excesso de alumínio presente nas fórmulas químicas aparecem caracterizados na molécula de jadeíta (Jd), $NaAlSi_2O_6$. O excesso de Al e a presença comum de pequenas quantidades de Ti estão indicados nas moléculas tschermakíticas, principalmente na magnésio tschermakita (Mg-Ts): $MgAlSiAlO_6$, cálcio tschermakita (Ca-Ts): $CaAlSiAlO_6$, e cálcio-titânio tschermakita (CaTi-Ts): $CaTiAl_2O_6$.

Este esquema de moléculas é insuficiente para cobrir todo o intervalo de variações presentes nos piroxênios sódicos, sobretudo daqueles que se cristalizam com quantidades relativamente elevadas de Ti, Mn ou Zr. Nestes casos, é imprescindível a introdução não somente da molécula de acmita (Ac), $NaFe^{3+}Si_2O_6$,

Tabela 37
 MOLÉCULAS DE PIROXÊNIOS

Nome	Símbolo	Fórmula	Citada em:
Enstatita	(En)	$Mg_2Si_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Wollastonita	(Wo)	$Ca_2Si_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Ferrosilita	(Fs)	$Fe_2Si_2O_6$ $(Fe,Mn)_2Si_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Diopsídio	(Di)	$CaMgSi_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Hedenbergita	(Hd)	$CaFeSi_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Tschermakitas			
Cálcio tschermakita	(Ca-Ts)	$CaAlSiAlO_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Magnésio tschermakita	(Mg-Ts)	$MgAlSiAlO_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Cálcio-titanio tschermakita	(CaTi-Ts)	$CaTiAl_2O_6$	Kushiro, 1962
Cálcio-ferri tschermakita	$(Ca_2Fe^{3+}-Ts)$	$CaFe^{3+}SiFe^{3+}O_6$	Huckenholtz <i>et al.</i> , 1969
Cálcio- Fe^{3+} tschermakita	$(CaFe^{3+}-Ts)$	$CaFe^{3+}SiAlO_6$	Kushiro, 1962
Moléculas de Ti e Al			
Cálcio- Fe^{2+} TAL	$(CaFe^{2+}-TAL)$	$CaTi_{0,5}Fe_{0,5}SiAlO_6$	Cameron e Papike, 1981
Cálcio-magnésio TAL	$(CaMg-TAL)$	$CaTi_{0,5}Mg_{0,5}SiAlO_6$	Cameron e Papike, 1981
Fe^{2+} TAL	$(Fe^{2+}-TAL)$	$Fe^{2+}Ti_{0,5}Fe_{0,5}SiAlO_6$	Cameron e Papike, 1981
Magnésio TAL	$(Mg-TAL)$	$MgTi_{0,5}Mg_{0,5}SiAlO_6$	Cameron e Papike, 1981
Moléculas de Na			
Jadeíta	(Jd)	$NaAlSi_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Acmita	(Ac)	$NaFe^{3+}Si_2O_6$	Deer, <i>et al.</i> , 1966
Moléculas de Na e Ti			
NATAL	(NATAL)	$NaTiSiAlO_6$	Flower, 1974
NATFE	(NATFE)	$NaTiSiFe^{3+}O_6$	Flower, 1974
Fe^{2+} NAT	$(Fe^{2+}-NAT)$	$NaTi_{0,5}(Fe,Mn)_{0,5}Si_2O_6$	Pedersen <i>et al.</i> , 1975; Ferguson, 1977
Magnésio NAT	$(Mg-NAT)$	$NaTi_{0,5}Mg_{0,5}Si_2O_6$ $NaTi^{3+}Si_2O_6$	Rønsbo <i>et al.</i> , 1977 Flower, 1974
Moléculas de Na e Zr			
NAZAL	(NAZAL)	$NaZrSiAlO$	Jones e Peckett, 1980
FM NAZ	(FM-NAZ)	$NaZr_{0,5}(Fe^{2+},Mg)_{0,5}Si_2O_6$	Jones e Peckett, 1980

como também de um conjunto de outras moléculas, como, por exemplo, a $\text{Mn}_2\text{Si}_2\text{O}_6$ (ou considerando que o Mn é covariante com o Fe^{2+} , a Fs modificada $(\text{Fe},\text{Mn})_2\text{Si}_2\text{O}_6$), mas principalmente moléculas de Na e Ti, ou de Na e Zr, nos casos, mais raros, em que o Zr é abundante (Jones e Peckett, 1980). Na Tabela 37, acham-se resumidas as várias moléculas de piroxênios. Cabe ressaltar que a literatura sobre piroxênios ricos em Na e Ti, bem como em Na e Zr, é relativamente recente, visto que há apenas pouco tempo começaram a aparecer na literatura dados químicos mais precisos sobre estes tipos de piroxênios sódicos de rochas alcalinas.

5.1.2. Possíveis componentes em piroxênios de séries sódicas

As moléculas de Di, Hd e Jd respondem pelos principais cátions (Mg , Fe^{2+} , Ca e Na) dos piroxênios augíticos. As moléculas de tschermakita são insaturadas em sílica, com o Al (ou Fe^{3+}) ocupando total ou parcialmente as posições tetraédricas, e podem resultar de várias combinações de cátions bivalentes (Ca , Fe^{2+} , Mg), trivalentes (Al , Fe^{3+}) ou tetravalentes (Ti).

Nos piroxênios cálcicos, os membros tschermakíticos mais comuns são a Ca-Ts e a CaTi-Ts. A Ca-Ts é um componente abundante em piroxênios de inclusões ultramáficas em basaltos, em piroxênios de granulitos e de eclogitos; encontra-se também nos piroxênios de rochas lunares. Estas paragéneses são todas de altas pressões e altas temperaturas (Okamura *et al.*, 1974). Por outra parte, a solubilidade da CaTi-Ts em diopsídios decresce com o aumento da pressão, sendo praticamente insolúvel a pressões elevadas (Yagi e Onuma, 1967). A CaTi-Ts é portanto um componente comum de titanaugitas e de augitas titaníferas de séries sódicas. A $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$ ($\text{CaFe}^{3+}\text{SiFe}^{3+}\text{O}_6$, com Fe^{3+} tetraédrico e octaédrico) é muito solúvel em diopsídio, indicando condições altamente oxidantes (Huckenholtz *et al.*, 1969).

Nos piroxênios de séries sódicas adiciona-se Ac ($\text{NaFe}^{3+}\text{Si}_2\text{O}_6$) às moléculas mencionadas. Excesso de $\text{Fe}^{3(\text{VI})}$, re-

lativamente incomum em piroxênios de rochas alcalinas, condicio na a formação de moléculas do tipo $\text{CaFe}^{3+}\text{-Ts}$ ($\text{CaFe}^{3+}\text{SiAlO}_6$), que indica a substituição $\text{Si} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Al} + \text{Fe}^{3+}(\text{VI})$ por aumentos na fugacidade de oxigênio (Vieten, 1980).

No entanto, a característica de muitos piroxênios egirínicos é o seu enriquecimento em titânio, frequentemente acompanhado de considerável excesso de Na sobre Fe^{3+} , e quantidades relativamente baixas de Al. As moléculas de Na-Ti (Tabela 37) aparecem então na evolução desses piroxênios, sendo razoável admitir-se que tanto o Al quanto o Fe^{3+} tetraédricos fazem parte desse conjunto de moléculas.

As moléculas de Na-Ti são essencialmente de dois tipos.

- 1) Tipo Na:Ti, subsaturadas com cátions trivalentes em posições tetraédricas, e tendo como representantes a NATAL (com Al^{VI}) e a NATFE (com $\text{Fe}^{3+}(\text{VI})$), (Tabela 37).
- 2) Tipo 2Na:Ti, saturadas, com cátions divalentes em posições oc taédricas, e tendo como representantes a $\text{Fe}^{2+}\text{-NAT}$ (com $\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$) e a Mg-NAT (Tabela 37).

Somente as moléculas NATAL E NATFE foram detec tadas experimentalmente, com Flower (1974) concluindo que a pre sença desses componentes nos piroxênios sódicos depende de ele vadas temperaturas e altas fugacidades de oxigênio. Não se conta no momento com trabalhos experimentais sobre a estabilidade das moléculas $\text{Fe}^{2+}\text{-NAT}$ e Mg-NAT, conquanto o seu possível campo de estabilidade tenha sido discutido por vários autores (Ferguson, 1977; Rønsbo *et al.*, 1977; Ferguson, 1978; Rossi, 1978; Grapes *et al.*, 1979; Nielsen, 1979). Os componentes $\text{Fe}^{2+}\text{-NAT}$ e Mg-NAT aparecem em quantidades relativamente elevadas em egrinas titaní feras portadoras de 2 átomos de Si por fórmula. Em geral, egiri nas titaníferas são encontradas tanto em nefelina sienitos, co mo em granitos alcalinos (e equivalentes vulcânicos), fato índica

tivo de que variações de pressão, de temperatura ou de atividade da sílica no fundido silicático não determinam a estabilidade ou a composição desses minerais (Ferguson, 1977; ver também item 5.7.4. deste capítulo).

5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS PIROXÊNIOS

Como não existe unanimidade entre os diversos autores quanto à classificação dos piroxênios (ver, por exemplo, Clark e Papike, 1968), adotar-se-á aqui a nomenclatura proposta por Deer *et al.* (1978), segundo a qual esses minerais são divididos em augitas, soda-augitas, egirina-augitas e egirinas.

As *augitas* e as *soda-augitas* são piroxênios cuja composição pode ser expressa essencialmente em função das moléculas de En, Fs e Wo. A maioria das augitas citadas na literatura apresenta pequenas proporções de Fe^{3+} , e o conteúdo de Na (para oxigênio=6) raramente excede de 0,1 átomo, oscilando em geral ao redor de 0,03 átomo. As análises de soda-augitas compiladas por Deer *et al.* (1978) exibem teores de Na que variam entre 0,11 e 0,3 átomo. Uma consequência da maior quantidade de Na é que nesses minerais a relação $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ é maior que nas augitas comuns, sendo de aproximadamente 0,8 para as soda-augitas e de 0,35 em média, para as augitas.

Os critérios para a separação de *soda-augitas*, *egirina-augitas* e *egirinas* variam segundo os diferentes autores; trabalhos mais modernos (Clark e Papike, 1968 ; Deer *et al.* 1978) empregam o teor de Fe^{3+} como elemento discriminador, ignorando automaticamente o Na, uma vez que ambos elementos aumentam conjuntamente. Segundo essa nomenclatura, as egirina-augitas apresentam mais de 0,2 átomo de Fe^{3+} (por fórmula padrão), enquanto que as egirinas possuem mais de 0,8 átomo de Fe^{3+} . Uma classificação baseada no teor de Fe^{3+} gera problemas quanto à definição de limites devido às dificuldades existentes para a determinação precisa do teor de Fe^{3+} utilizando-se análises químicas feitas com a microsonda (ver discussão no item 5.3.). Os limi-

tes entre os dois tipos podem ser mais bem caracterizados com o auxílio adicional do teor de Na. A quantidade de Na das egirina-augitas e egirinas é, em linhas gerais, maior que a do Fe^{3+} (o Na entra na formação da molécula de jadeíta). Portanto, parece prudente considerar-se como limite entre as egirina-augitas e as egirinas um teor de 0,85 átomo de Na. Por outro lado, salienta-se que a palavra *aemita* não é nome de mineral, sendo utilizado tão somente para identificar a molécula $\text{NaFe}^{3+}\text{Si}_2\text{O}_6$.

As maioria dos piroxênios, tanto os "normais" como os sódicos, apresenta teores variáveis de Ti. Em geral existe uma relação inversa entre o Fe^{3+} e o Ti, sobretudo nas egirina-augitas e egirinas; quanto maior o conteúdo de Ti, menor o de Fe^{3+} , sem que o teor de Na seja fundamentalmente afetado. Assim, no caso dos piroxênios sódicos ricos em Ti, não se justifica a utilização de teor de Fe^{3+} como base do esquema de classificação. Com efeito, muitas egirinas com Ti mostram teores reduzidos de Fe^{3+} , a tal ponto que, uma vez valendo-se da classificação de Clark e Papike (1968), seriam denominados de egirina-augitas, não obstante contenham teores de Na equivalentes aos das egirinas. Nestes casos é mais conveniente utilizar-se apenas o Na como elemento de classificação. Os piroxênios serão aqui denominados de egirina-augitas titaníferas quando portadores de $\text{Na} > 0,2$ átomo e $\text{Ti} > 0,04$ átomo, e de egirinas titaníferas quando contendo $\text{Na} > 0,85$ átomo e $\text{Ti} > 0,04$ átomo. Nos casos em que $\text{Ti} > 0,1$ átomo, os piroxênios serão denominados de titânio egirina-augitas e titânio egirinas (em parte, segundo Rønnebo *et al.*, 1977; Vieten, 1980).

O teor de Mn dos piroxênios é de modo geral reduzido não sendo, porém, raras as suites de rochas alcalinas onde esses minerais exibem teores médios relativamente elevados de Mn, equivalentes por exemplo a 0,04-0,05 átomo por fórmula padrão, como no caso dos minerais dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Neste trabalho somente serão dados nomes especiais, ou seja, manganês egirina-augitas ou manganês egirinas, aos piroxênios com teores de Mn superiores a 0,1 átomo. Piroxê-

nios com teores muito elevados de Ti e Mn serão chamados de titânio-manganês egirina-augitas e titânio-manganês egirinas.

Na Tabela 38, encontram-se resumidos os critérios de classificação descritos.

5.3. DETERMINAÇÃO DE Fe^{3+} A PARTIR DE DADOS DE MICROSSONDA

A distinção entre Fe^{2+} e Fe^{3+} é fundamental para os piroxênios ricos em Na. Atualmente, a maioria das análises químicas de minerais é feita com a microsonda eletrônica e torna-se imprescindível o emprego de algum método de cálculo para a determinação do teor de Fe^{3+} dos piroxênios.

Alguns autores (Stephenson, 1972; Mitchell, 1980) estimam o Fe^{3+} partindo de premissa de que em piroxênios alcalinos a quantidade de Na (+K) é praticamente igual à de Fe^{3+} (Carmichael, 1962). Assim, após calcular as proporções atômicas dos vários elementos com todo o ferro como Fe^{2+} , adjudicam ao Fe^{3+} uma quantidade de átomos igual à do Na. Este método tem a vantagem de não pressupor qualquer estequiometria, além de minimizar a influência dos possíveis erros analíticos. Por outro lado, sua aplicação se limita a piroxênios sem jadeíta e nos quais elementos como o Zr ou o Ti não formam moléculas com o Na (ver mais adiante). Robinson (1981) menciona também que esse método deixa a desejar nos casos em que existe a possibilidade de substituição de Al^{IV} por Fe^{3+} .

[Contudo, na maioria das egirinas-augitas e egirinas, o Na excede o Fe^{3+} , o que força a recorrer a outras formas de cálculo. Vários pesquisadores analisaram os possíveis métodos de determinação de Fe^{3+} e erros resultantes. Os métodos propostos são essencialmente de 2 tipos.

- 1) Métodos baseados na estequiometria dos piroxênios, fixando a soma dos cátions em 4, ou a soma dos cátions e a dos oxigênios em 4 e 6 respectivamente.

Tabela 38

Critérios de classificação dos piroxênios de Poços de Caldas
(proporções catiônicas na base de 6 oxigênios)

Soda-augita	$\text{Fe}^{3+} \leq 0,2$
Egirina-augita	$0,2 < \text{Fe}^{3+} \leq 0,8$ e/ou $\text{Na} \leq 0,85$ $\text{Ti} \leq 0,04$
Egirina	$\text{Fe}^{3+} > 0,8$ e/ou $\text{Na} > 0,85$ $\text{Ti} \leq 0,04$
Egirina-augita titanífera	$0,2 < \text{Na} \leq 0,85$ $0,04 < \text{Ti} \leq 0,1$
Egirina titanífera	$\text{Na} > 0,85$ $0,04 < \text{Ti} \leq 0,1$
Titânio egirina-augita	$0,2 < \text{Na} \leq 0,85$ $\text{Ti} > 0,1$
Titânio egirina	$\text{Na} > 0,85$ $\text{Ti} > 0,1$
Manganês egirina-augita	
Manganês egirina	$\text{Mn} > 0,1$
Titânio-manganês egirina-augita	
Titânio-manganês egirina	$\text{Ti} > 0,1$ $\text{Mn} > 0,1$

- 2) Método molecular, onde a discriminação entre Fe^{2+} e Fe^{3+} é calculada a partir de moléculas ou membros finais dos piroxênios.

Hamm e Vieten (1971) e Vieten e Hamm (1978) discutem extensamente os problemas resultantes da utilização de métodos estequiométricos para fins de determinação do teor de Fe^{3+} , terminando por propor o cálculo das proporções catiônicas com base em 4 átomos por fórmula. O Fe^{3+} é obtido mediante o balanceamento das cargas eletrostáticas por meio de duas fórmulas:

$$\begin{aligned}\text{Fe}^{3+} &= \text{Na} + |\text{Al}^{\text{IV}} - (\text{Al}^{\text{VI}} + 2\text{Ti})| \text{ quando } \text{Si} < 2 \text{ e } \text{Si} + \text{Al} > 2, \\ \text{Fe}^{3+} &= \text{Fe}^{3+(\text{IV})} + \text{Na} + |(\text{Al} + \text{Fe}^{3+})^{\text{IV}} - 2\text{Ti}| \text{ quando } \text{Si} + \text{Al} < 2\end{aligned}$$

Cawthorn e Collerson (1974) examinaram 344 análises de piroxênios com teores conhecidos de Fe^{3+} , provenientes dos mais variados ambientes. Recalcularam as proporções catiônicas na base de 6 oxigênios e, após separar os dados segundo as afinidades geológicas dos minerais, construíram histogramas com a soma de cátions obtida. A maioria dos piroxênios, à exceção daqueles portadores de mais de 20% de moléculas de jadeíta e dos subcálcicos, deram aproximadamente 4 cátions por fórmula (média de 4,0028); no entanto, a dispersão de pontos no histograma é grande.

Baseando-se no trabalho de Cawthorn e Callerson (1974), e nas suas próprias observações feitas em análises de clinopiroxênios de Bushveld, Edwards (1976) sugere que as proporções catiônicas sejam calculadas na base de 6 oxigênios.

Vieten e Hamm (1978) tecem muitas críticas ao método de cálculo de Fe^{3+} na base de 6 oxigênios. Cabe salientar que esse método somente encontra aplicação nos casos em que o Fe^{3+} é o único cátion apresentando na análise mais de um estado de oxidação. A suposição alternativa, a de que $M=4$, fica também em parte invalidada devido à possibilidade de erros analíti

cos, ou mesmo falta de estequiometria.

O aqui denominado método molecular foi proposto por Cawthorn e Collerson (1974). Nele, a discriminação entre Fe^{2+} e Fe^{3+} resulta da formação de moléculas ou membros finais dos piroxênios. A partir da análise química feita com a microsonda, com todo o ferro expresso como FeO , vão-se formando moléculas segundo um cálculo normativo que se inicia com Jd, seguida de Ac e as moléculas de Tschermak ($\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$; CaTi-Ts ; Ca-Ts). O Fe presente nas moléculas com Fe^{3+} (Ac e $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$) determinam o conteúdo total de Fe_2O_3 na análise.

No presente trabalho, as relações $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ foram calculadas a partir de dados de microsonda, recorrendo-se ao programa SILCAL (Ulbrich e Ulbrich, 1982), que permite discriminar entre os dois estados de oxidação, segundo três aproximações diferentes:

- 1) As proporções catiônicas são obtidas na base de 6 oxigênios. A seguir, as proporções catiônicas vão sendo modificadas, variando-se as relações $\text{Fe}^{3+}:\text{Fe}^{2+}$, até que a soma de cátions seja aproximadamente igual a 4;
- 2) Método de Hamm e Vieten (1971);
- 3) Método molecular de Cawthorn e Collerson (1974).

Com o intuito de comparar os 3 métodos, o programa foi utilizado em 67 análises de augitas, hedenbergitas, salitas, egirina-augitas e egirinas contidas em Deer *et al.* (1966, 1978). O único critério de escolha das análises foi o da semelhança com os piroxênios dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Os resultados obtidos são mostrados nas Figs. 32a, b e 33 a, por meio de diagramas onde, tomando-se como referência o teor de CaO dos piroxênios, indica-se na abscissa o erro do método, definido como: $\Delta = \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ (calculado)} - \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ (observado)}$; o primeiro valor é o calculado pelo programa e o segundo

Figura 32 - Erro na determinação de Fe_2O_3 em piroxênios, utilizando métodos de cálculo baseados na estequiometria do mineral.

Os dados representados correspondem a augitas, hedenbergitas, salitas, egirina-augitas e egirinas, extraídos de Deer *et al.*, 1966, 1978).

a) Diferença (Δ) entre o valor de Fe_2O_3 calculado pelo método 1 (ver texto) e o valor determinado por métodos químicos, $\Delta = \text{Fe}_2\text{O}_3 (c) - \text{Fe}_2\text{O}_3 (o)$.

b) Idem, empregando-se o segundo método de cálculo (ver texto).

Figura 33 - Erro na determinação de Fe_2O_3 em piroxênios, utilizando o método de cálculo Fe_2O_3 "molecular" de Cawthorn e Collerson (1974), e comparação entre os métodos estequiométricos.

a) Diferença (Δ) entre o valor de Fe_2O_3 calculado pelo método "molecular" e o valor determinado por métodos químicos, $\Delta = \text{Fe}_2\text{O}_3 (c) - \text{Fe}_2\text{O}_3 (o)$. As análises químicas são as mesmas da figura anterior.

b) Diferença (Δ) entre os valores de Fe_2O_3 obtidos pelos métodos 1 (m1) e 2 (m2), em análises químicas de piroxênios feitos com microsonda e apresentados por Larsen (1976).

o determinado por métodos químicos, e citado na bibliografia.

Nos diagramas correspondente aos dois primeiros esquemas de cálculo (Figs. 32 a,b), observa-se grande dispersão dos pontos e nenhuma tendência particular: a diferença máxima é de $\pm 5\%$ de Fe_2O_3 , e de 2% na maioria das análises. Não há qualquer indicação quanto à conveniência de adoção de um ou outro método.

Os resultados obtidos com o método de Cawthorn e Collerson (1974) mostram uma grande dispersão dos pontos e, sobretudo, uma tendência particular que o invalida (Fig. 33 a). Observe-se que nos piroxênios augíticos, o Fe_2O_3 calculado é sempre menor que o analisado, o oposto ocorrendo nos piroxênios sódicos. Além disso, os maiores valores negativos e positivos de Δ na Fig. 33a correspondem respectivamente a augitas titaníferas e egirinas titaníferas (com mais de $1,4\%$ de TiO_2), indicando que o esquema daqueles autores não é apropriado.

A partir dos métodos 1 e 2, obtêm-se valores de Fe_2O_3 (calculado) semelhantes, como observável comparando-se análises individuais nos diagramas das Figs. 32a e 32b, e como também confirmado com os dados de piroxênios de Poços de Caldas. Na realidade, as diferenças introduzidas na determinação do Fe^{3+} pela utilização de um ou outro método são menores que as existentes entre o valor de Fe_2O_3 calculado por qualquer um deles e o Fe_2O_3 obtido por meio de análises químicas convencionais. Para reforçar este ponto, foram recalculados os dados de piroxênios analisados com a microsonda eletrônica por Larsen (1976) valendo-se dos métodos acima; as diferenças entre o Fe_2O_3 calculado pelos dois esquemas aparecem lançadas na Fig. 33 b. Observa-se claramente que a grande maioria dos resultados não apresenta variações maiores de $\pm 1\%$. Em média, a diferença no cálculo de Fe_2O_3 não é maior que $\pm 0,6\%$, seguramente menor que as diferenças que ocorreriam entre as análises dos mesmos piroxênios feitas em diferentes laboratórios (ver também Finger, 1971).

Neste trabalho, calcula-se o teor de Fe^{3+} dos piroxênios com o auxílio do primeiro dos métodos do programa SIL
CAL.

5.4. AS MOLÉCULAS DOS PIROXÊNIOS DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

O quimismo dos piroxênios analisados no presente trabalho varia muito, desde os cristais com pouco sódio, até os de composição mais complexa. As complicações devem-se sobretudo ao aumento nos teores de Na, com o conseqüente incremento de Fe^{3+} , e frequentemente também de Ti. Configura-se nestes casos a necessidade de calcular um número grande de moléculas para satisfazer as características químicas dos piroxênios. Impõe-se portanto uma discussão mais aprofundada sobre a viabilidade não só do esquema de cálculo, como também das moléculas propostas.

5.4.1. Soda-Augitas

O quimismo desses piroxênios é relativamente simples. Os cátions octaédricos mais importantes são Ca, Mg e Fe^{2+} , sendo que o teor de $\text{Mg}+(\text{Fe}^{2+}+\text{Mn})$ é muito semelhante ao de Ca. Dessa forma, o quimismo é expresso principalmente em função de moléculas não tschermakíticas, Di, Hd, En e Fs (ver Tabelas 50 a 52, item 5.5).

O Si varia inversamente ao Al (total), e as deficiências nos teores de Si fazem com que a maior parte do Al (total) ocupe posições tetraédricas. Em alguns casos, deve-se admitir a presença de $\text{Fe}^{3+}(\text{IV})$ para completar as deficiências de $\text{Al}(\text{IV})$, tal como se observa no diagrama Na- Fe^{3+} versus Si+Al, da Fig.34 apresentado por Larsen (1976). Em geral o Na forma acmita, devido aos pequenos teores de $\text{Al}(\text{VI})$. O $\text{Al}(\text{IV})$ acha-se essencialmente associado às moléculas tschermakíticas, a mais importante delas, no caso em discussão, sendo a CaTi-Ts (Tabelas 50 a 52), Via de regra, as relações $\text{Al}(\text{IV})$: Ti ultrapassam as proporções 2:1 da molécula de CaTi-Ts (Figs. 35), com o excesso de Al

Figura 34 - Relação $\text{Na} - \text{Fe}^{3+}$ com respeito a $\text{Si} + \text{Al}$ (total) em soda-augitas.

Os dados representam átomos por fórmula. Os valores positivos da ordenada indicam excesso de Na, enquanto que os negativos, de Fe^{3+} . A linha (α) tem pendente igual a 2.

Figura 35 - Relação entre os teores de Al^{IV} e Ti em soda-augitas. Os dados são os da figura anterior. Linha de referência (α) tem pendente 2.

so de $Al^{(IV)}$ obrigando a formação da molécula $CaFe^{3+}-Ts$ (com Fe^{3+} octaédrico). Ao lado do baixo teor em Na, nota-se certa tendência para excessos de Fe^{3+} , já que a relação $\Delta=Na-Fe^{3+}$ é frequentemente negativa (Fig. 34). Confirma-se também com essa relação a presença de moléculas $CaFe^{3+}-Ts$. Nos casos citados em que aparece $Fe^{3+(IV)}$ deve-se formar também a $Ca_2Fe^{3+}-$ (com Fe^{3+} tetraédrico).

5.4.2. Egirina-augitas e egirinas

O quimismo mais complexo desses minerais determina a necessidade de estabelecer-se uma série maior de moléculas. Os cátions octaédricos mais importantes correspondem ao Na e ao Fe^{3+} , disso resultando que a molécula de acmita é dominante. O balanceamento final, contudo, depende das quantidades relativas de Si, Al (total) e Ti, além dos cátions octaédricos normais Ca, Fe^{2+} e Mg. Algumas das relações que serão discutidas aparecem identificadas claramente no diagrama $Na-Fe^{3+}$ versus $Si+Al$ (total).

A Fig. 36 apresenta os dados para quantidade significativa de piroxênios de Poços de Caldas contendo sempre $Ti < 0,04$ átomo; incluem-se também nessa figura os piroxênios com conteúdos muito elevados de Mn (maior que 0,1 átomo). A dispersão de pontos é pequena, ocorrendo maior concentração ao redor de uma linha de pendente 2. A seguir, discute-se cada um dos 4 setores reconhecidos.

Setor 1: este setor apresenta deficiência de Al^{IV} e, ao mesmo tempo, de Na sobre Fe^{3+} ; conseqüentemente, encontra-se excesso de Fe^{3+} . Algumas conclusões são imediatas. A deficiência de Al^{IV} deve ser compensada pela entrada de Fe^{3+} nas posições tetraédricas; pelas mesmas razões, não se forma a molécula de jadeíta, devido à inexistência de Al^{VI} .

Em geral, os pontos acham-se espalhados segundo uma linha de pendente 2. Esta linha é equidistante para $Fe^{3+(IV)} = Fe^{3+(VI)}$, sendo que o $Fe^{3+(IV)}$ compensa a deficiência de Al^{IV} .

Figura 36 - Relação Na-Fe^{3+} com respeito a $\text{Si+Al}(\text{total})$ em egirina-augitas e egirinas.

Os dados representam átomos por fórmula.

Egirina-augitas (x), egirinas (+), manganês egirina-augita e manganês egirina ($\square$).

Os valores positivos da ordenada indicam excesso de Na, e os negativos de Fe^{3+} . O quimismo da análise A é discutido no texto. Linha de referência (α) tem pendente 2.

Figura 36

Nesses piroxênios, portanto, é possível a formação da molécula $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$ (Fe^{3+} octaédrico e tetraédrico).

Contudo, a presença de Ti impõe algumas considerações adicionais. Observe-se o caso do ponto A (Fig. 36), onde a deficiência de Al e o excesso de Fe^{3+} são praticamente equivalentes, necessitando portanto recorrer-se ao Fe^{3+} para preencher as posições tetraédricas.

Parte do Ti desse piroxênio deve entrar na molécula de CaTi-Ts , que utiliza 2Al^{IV} por molécula; porém, deve haver um excesso de Ti para formar as moléculas de Na e Ti. Na Fig. 37 (setor 1), nota-se que o ponto A se encontra numa linha de pente igual a 1, indicando que somente metade do Ti pode ser incorporada à molécula de CaTi-Ts assumindo-se todo o Al presente; a outra metade formará moléculas com Na.

Esta análise demonstra que é necessário preencher as posições tetraédricas antes de se proceder ao cálculo das moléculas dos piroxênios.

Setor 2: caracteriza-se este setor por apresentar excesso de Na sobre Fe^{3+} , mantida ainda a deficiência de Al. Por conseguinte, parte do Fe^{3+} irá para as posições tetraédricas. Não se encontra jadeíta nesses piroxênios.

O $\text{Fe}^{3+}(\text{IV})$ deve ser utilizado para formar, com igual quantidade de $\text{Fe}^{3+}(\text{VI})$, a molécula $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$, com o qual fica diminuída a quantidade de Fe^{3+} livre para formar acmita. O excesso de Na não pode ser gasto para formar jadeíta e, portanto, deve ser absorvido por moléculas de Na e Ti do tipo NATAL, etc. (Fig. 37, setor 2); deve-se supor que sejam muito raros os piroxênios deste grupo com pouco Ti, e os dados constantes da Fig. 36 confirmam a suposição; nesse gráfico a maioria das análises localiza-se perto da origem das coordenadas.

Setor 3: neste setor acomoda-se a maioria das análises

Figura 37 - Relação entre os teores de Al^{IV} e Ti em egrina-augistas e egrinas. Cada diagrama representa os dados do setor correspondente da Fig. 36; simbologia e referências iguais às daquela figura. Nos setores 1 e 2: $Al^{IV} = Al^{(total)}$. Incluem-se linhas de referência (α) de pendentes 1 e 2.

lises de egirina-augitas e egirinas pobres em Ti. São análises possuindo tanto excesso de Na como de Al, com a maior parte dos pontos situada acima da linha de pendente 2. Portanto, geralmente menos da metade do Na em excesso é absorvido por Jd (relação $\text{Na}:\text{Al}^{\text{VI}}$ de 1:1), o resto formando as moléculas de Na e Ti. Estas relações estão igualmente representadas no diagrama $\text{Ti}-\text{Al}^{\text{IV}}$ (Fig. 37, setor 3). As egirina-augitas espalham-se ao redor de uma linha de pendente 1 (e para a sua direita), ao longo da qual não são satisfeitas as condições estequiométricas para a formação da CaTi-Ts (2Al^{IV} para cada Ti). Como resultado, todos os piroxênios colocados à direita da linha de pendente 2 (Fig. 37, setor 3) irão formar moléculas várias de Na e Ti. Nos piroxênios localizados na abcissa do diagrama não se formará NATAL.

Setor 4: o quimismo deste setor é dominado pelo Al^{VI} e excesso de Fe^{3+} . Não se forma a molécula $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$. O Fe^{3+} em excesso é octaédrico, sendo absorvido pela molécula $\text{CaFe}^{3+}\text{-Ts}$, enquanto que o Ti forma CaTi-Ts (Fig. 37, setor 4). Não são encontrados, portanto, piroxênios com moléculas de Na e Ti. Por outro lado, são poucos os piroxênios representados nessa área (Fig. 36).

5.4.3. Egirina-augitas e egirinas titaníferas, titânio egirina-augitas e titânio egirinas

Os dados referentes aos piroxênios ricos em Ti serão discutidos em conjunto. Para efeito comparativo, eles foram projetados no diagrama $\text{Na}-\text{Fe}^{3+}$ vs. $\text{Si}+\text{Al}$ (Fig. 38). Em geral, observa-se que esses piroxênios são mais pobres em $\text{Si} + \text{Al}$ que os equivalentes com $\text{Ti} < 0,04$ átomo (comparar Figs. 36 e 38). O valor de $\text{Si}+\text{Al}$ situa-se entre 1,98 e 2,03. Os 66 pontos representados na Fig. 38 acham-se espalhados sobretudo pelos setores 2 e 3; só duas análises caem no setor 1, com excesso de Fe^{3+} . No setor 2, com excesso de Na e $\text{Fe}^{3+}(\text{IV})$, aparecem 21 análises

Uma discussão mais minuciosa do quimismo dos pi-

Figura 38 - Relação Na-Fe³⁺ com respeito a Si+Al(total) em egi-
rina-augitas e egrinas ricas em Ti.
Os dados representam átomos por fórmula.
Egirina-augitas titaníferas (o), egrinas titaníferas (Δ), titâ-
nio egirina-augitas (●), titânio egrinas (▲), e titânio-manga-
nês egirina (■). Linha de referência (α) tem pendente 3.

roxênios ricos em Ti é facilitada através da interpretação das reações do excesso de Na versus Ti. As Figs. 39 e 40 reúnem os dados dos setores 2 e 3. Na ordenada, representa-se sempre um cátion corrigido. A Fig. 40 mostra os dados do setor 3, onde Na_c representa Na corrigido = Na total - Na jadeíta. Os piroxênios com pouco Ti (apr. 0,05 átomo) espalham-se pela linha de pendente 1, correspondente às moléculas Na:Ti (relação 1:1), enquanto que aqueles com teores maiores de Ti e Na formam moléculas do tipo 2Na:Ti (relação 2:1, indicada pela linha de pendente 2).

A Fig. 39 mostra os dados dos piroxênios do setor 2, não portadores de jadeíta. Nesse diagrama relaciona-se o Fe^{3+} corrigido (Fe_c^{3+}), já que parte do Fe^{3+} deve ser tetraédrico e formar a molécula Ca_2Fe^{3+} - Ts. Por conseguinte, $Fe_c^{3+} = Fe_{total}^{3+} - Fe^{3+(IV)}$. Os pontos são indicativos de que se formam tanto as moléculas Na:Ti como as 2Na:Ti, em proporções variáveis. Como pontos anômalos, têm-se dois piroxênios com Ti entre 0,04 e 0,05, e excesso de Na inferior a 0,02; correspondem aos dois piroxênios de ocorrência isolada no setor 1 da Fig. 38.

5.4.4. Esquema de cálculo das moléculas de piroxênios adotado neste trabalho

As considerações precedentes justificaram a utilização de uma série de moléculas e permitiram também estabelecer um esquema de cálculo. As premissas básicas utilizadas são as de considerar essencialmente corretas tanto as análises como o cálculo de Fe^{3+} . O esquema de cálculo é o seguinte.

- 1) Caso o piroxênio apresente Fe^{3+} tetraédrico e excesso de Fe^{3+} sobre Na (equivalente ao quimismo do setor 1, Fig. 36), procede-se da seguinte forma:
 - a) forma-se Ca_2Fe^{3+} -Ts
 - b) acmita forma-se com o Na disponível

Figura 39 - Relação Na-Fe^{3+} (Fe^{3+} corrigido) com respeito a Ti, em egirina augitas e egirinas ricas em Ti e sem Al^{VI} . Fe^{3+} corrigido = $\text{Fe}^{3+}_{\text{total}} - \text{Fe}^{3+}_{\text{tetraédrico}}$

Os dados projetados no diagrama são os dos setores 1 e 2 da Fig. 38; simbologia e referências iguais às daquela figura. Linhas de referência (α) tem pendentes 1 e 2.

Figura 40 - Relação $\text{Na}_C\text{-Fe}^{3+}$ (Na corrigido) com respeito a Ti , em egrina-augitas e egrinas ricas em Ti e com Al^{VI}

$$\text{Na}_{\text{corrigido}} = \text{Na}_{\text{total}} - \text{Na}_{\text{jadeita}}$$

Os dados projetados no diagrama são os do setor 3 da Fig. 38 ; simbologia e referências iguais às daquela figura. Linhas de referência (α) tem pendentes 1 e 2.

- c) Ti e Al^{IV} formam CaTi-Ts
 - d) excesso de Fe^{3+} é utilizado para formar $CaFe^{3+}$ -Ts
 - e) Mg, $Fe^{2+}+Mn$ e Ca formam Di e Hd; excesso de Mg, $Fe^{2+}+Mn$ ou Ca aparecem como En, Fs ou Wo. (As quantidades de Di e Hd e de En e Fs, são proporcionais aos teores de Mg e $Fe^{2+} + Mn$ nas análises químicas).
- 2) Caso o piroxênio apresente Fe^{3+} tetraédrico, e excesso de Na (quimismo do setor 2, Fig. 36), o esquema é o seguinte:
- a) forma-se Ca_2Fe^{3+} -Ts
 - b) acmita forma-se com o Fe^{3+} ainda disponível
 - c) com o excesso de Na forma-se a molécula de NATAL
 - d) Ti e Al^{IV} remanescentes formam CaTi-Ts
 - e) Formam-se Di e Hd e, adicionalmente, En, Fs ou Wo.
- 3) Para os piroxênios com Al^{VI} e excesso de Na (quimismo do setor 3, Fig. 36), procede-se como se segue:
- a) com Al^{VI} forma-se jadeíta
 - b) forma-se acmita com o Fe^{3+}
 - c) com Na e Ti formam-se as várias moléculas de Na:Ti e 2Na:Ti, na seguinte ordem: NATAL, $(Fe^{2+}+Mn)$ -NAT e Mg-NAT, segundo a disponibilidade dos outros cátions (Al^{IV} , $Fe^{2+} + Mn$ e Mg). As quantidades de $(Fe^{2+}+Mn)$ -NAT e Mg-NAT são proporcionais aos teores de $Fe^{2+}+Mn$ e Mg, nas análises químicas
 - d) forma-se Di e Hd e, finalmente, En, Fs ou Wo.
- 4) Os piroxênios titaníferos (mais de 0,04 átomo de Ti) estão projetados nos setores 2 e 3 da Fig. 38; o método de cálculo é semelhante ao dos piroxênios não titaníferos que ocupam os mesmos setores na Fig. 36. Contudo, no caso dos piroxênios titaníferos, as moléculas de Na e Ti são dominantes, de modo que, em lugar de Ca_2Fe^{3+} -Ts, aparecerá a molécula de NAT-FE. O Al^{IV} formará unicamente NATAL, e os excessos de Ti entrarão nas moléculas $(Fe^{2+}+Mn)$ -NAT e Mg-NAT.

5.5. QUIMISMO DE PIROXÊNIOS DOS DIFERENTES FÁCIES DE NEFELINA SIENITOS DE POÇOS DE CALDAS

A discussão nas páginas anteriores evidencia que é possível estabelecer vários métodos diferentes de cálculo de moléculas, cada um deles influenciando de maneira mais ou menos marcada tanto o resultado final (expresso em moléculas), como o teor calculado de Fe^{3+} (ver também discussão em Cawthorn e Collerson, 1974). As análises de piroxênios são aqui recalculadas utilizando-se o método indicado acima, onde o Fe^{3+} é computado de maneira puramente analítica, com os cátions distribuídos de maneira a formar as moléculas piroxênicas, segundo o esquema apontado.

Os resultados da análise de núcleos, bordas e diferentes zonas ou setores dos grãos de piroxênios, obtidos por meio da microsonda eletrônica (ver metodologia no Apêndice), constam das Tabelas 40 a 53, onde também se faz menção à cor particular (amarelo, laranja, azul) de algumas bordas ou zonas. Seguem-se os valores de Fe_2O_3 e FeO calculados, as colunas de proporções catiônicas, as contendo os resultados do cálculo molecular e por último a classificação dos minerais. Para a discussão, utilizam-se adicionalmente alguns diagramas representando tendências. Nestas representações, prefere-se utilizar as proporções catiônicas de Mg , $\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$ e Na , e não as proporções equivalentes (Di , Hd , Ac), buscando-se assim fugir das possíveis incompatibilidades implícitas nos diversos métodos de cálculo de moléculas, e melhor comparar os resultados com os citados na literatura. Nessas figuras, os piroxênios apresentam-se com símbolos diferenciados, que identificam os vários tipos (soda-augitas, titânio egirinas, etc.; (ver páginas anteriores e tabela 38 para nomenclatura); também identificam-se com símbolos especiais os piroxênios portadores de teores significativos de Mn ($>0,1$ átomo).

Tanto as tabelas como as figuras mostram claramente a grande variação composicional presente nos piroxênios dos nefelina sienitos. Em geral as rochas de cada corpo possuem

piroxênios com quimismo e tendência de evolução próprias e, às vezes, marcadamente diferente. Os piroxênios de várias fácies, e também de alguns corpos, exibem semelhanças, sendo portanto discutidos conjuntamente. Para facilitar a leitura e as interpretações, resumem-se na Tabela 39 as características gerais de piroxênios dos diversos fácies e corpos.

1. Corpos lujauríticos ocidental e oriental. Dos cinco tipos faciológicos compondo esses corpos, são os piroxênios dos chibinitos os que mostram características texturais e químicas variáveis.

a) *Lujauritos I e II*: os piroxênios dos lujauritos I, de granulação grossa, que ocorrem na parte central dos corpos (sobretudo do corpo ocidental), apresentam-se semelhantes, química e texturalmente, aos dos lujauritos II, mais finos, e que representam a variedade em contato com os nefelina sienitos traquitóides. O mineral ocorre em geral na forma de prismas alongados, e frequentemente também com hábito acicular. Os piroxênios são levemente zonados, com as variações químicas pouco marcadas. Trata-se de egirina-augitas com centros de composição $\text{Di}_9\text{Hd}_{31}\text{Ac}_{70}$ e bordas $\text{Di}_6\text{Hd}_{11}\text{Ac}_{83}$ (Tabela 40, Figs. 41a, b). Devido ao número considerável de análises efetuadas, os dados dos lujauritos I e II foram projetados em diagramas separados; observa-se nos diagramas que os lujauritos I são de composição mais restrita, via da regra mais ricos em Na que os piroxênios dos lujauritos II, apresentando inclusive algumas bordas de egirina, com composição $\text{Di}_2\text{Hd}_{1,5}\text{Ac}_{96,5}$. As quantidades de Ti e Mn são baixas e os teores de Al apenas suficientes para formar pequenas quantidades de jadeíta.

b) *Nefelina sienitos traquitóides I e II*: os cristais são em geral prismáticos e portadores de leve zoneamento. O quimismo é semelhante ao dos lujauritos, em particular dos lujauritos II de granulação fina. São também pobres em Ti e Mn. A carência de suficiente Al em alguns cristais leva o Fe^{3+} a ocupar posições tetraédricas (Tabela 41, Fig. 41c).

Tabela 39

Características gerais dos piroxênios de nefelina sienitos

Tabelas	Nomes dos corpos	Textura dos piroxênios	Quimismo dos piroxênios
40	Lujauritos I - II		Egirina augitas, de composição restrita - Pobres
41	Nefelina sienitos traquitóides I-II	Prismas finos, compridos, geralmente agrupados	em Ti e Mn, variam de aproximadamente $Di_9Hd_{31}Ac_{70}$ até $Di_4Hd_9Ac_{87}$, chegando até $Di_2Hd_{1,5}Ac_{96,5}$ em algumas bordas nos Lujauritos II.
42	Chibinitos dos corpos lujauríticos		Cristais poiquilíticos com zoneamento setorial e quimismo muito variável nos vários setores.
43	Chibinitos de Botelhos	Cristais grandes, poiquilíticos. Prismas isolados.	Prismas, variam de egirina augitas ($Di_{34}Hd_{24}Ac_{42}$) até egirina ($Di_4Hd_6Ac_{90}$) e titanio egirina.
44	Chibinitos orientais	Agregados fibrosos intersticiais	As fibras são de egirina titanífera.
45	Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte	Piroxênios prismáticos e também cristais mais ou menos poiquilíticos xenomórficos.	Piroxênios com zoneamento setorial e composição variável nos vários setores; com enriquecimento em Ti e Mn. Contudo os piroxênios se caracterizam por possuir teores elevados de Si e baixos de Al e Mg. Os nefelina sienitos cinza são de composição mais restrita.
46	Nefelina sienitos com eudialita do Serrote	Agregados fibrosos.	
47	Nefelina sienitos com eudialita ocidentais		Em geral o quimismo dos piroxênios varia de egirina augitas ($Di_7Hd_{35}Ac_{58}$) até egirinas ($Di_7Hd_3Ac_{90}$).
48	Pseudoleucita nefelina sienitos	Relictos de piroxênios primários. Prismas e fibras de cristalização tardia.	Tanto os piroxênios primários, quanto os hidrotermais (ou deutéricos), caracterizam-se por serem pobres em Si e Al. Variam de $Di_{18}Hd_{12}Ac_{70}$ até $Di_4Hd_8Ac_{88}$ - Fibras tardias ricas em Ti e Mn.
49	Nefelina sienitos cinzas do Serrote	Prismas pequenos isolados ou agrupados.	Piroxênios ricos em Mg e Ca, com pouco Ti e com teores moderados de Mn. Variam de $Di_{18}Hd_{12}Ac_{70}$ até $Di_4Hd_8Ac_{88}$.
49	Nefelina sienitos com biotita do Serrote	Agregados fibrosos escassos	
50	Nefelina sienitos híbridos	Prismas curtos isolados ou agrupados.	Cristais prismáticos com zoneamento normal desde soda augita ($Di_{62}Hd_{26}Ac_{12}$) até bordas de egirina augita titanífera e egirina titanífera.
52	Nefelina sienitos finos do Anel Norte	Agregados fibrosos intersticiais.	Agregados fibrosos de egirina titanífera.
53	Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote	Cristais prismáticos. Agregados fibrosos	Variam de egirina augita com $Di_{25}Hd_{47}Ac_{28}$ até $Di_{14}Hd_{42}Ac_{44}$. As bordas e fibras são de egirina augita titanífera.
53	Nefelina sienitos finos ocidentais	Cristais pequenos poiquilíticos	Piroxênios relativamente ricos em Si e de composição restrita. Núcleos de cristais com $Di_{14}Hd_{42}Ac_{44}$ e bordas de egirina augita com pouco Ti ($Di_3Hd_{24}Ac_{73}$).

Tabela 40

Composição química de piroxênios de corpos lujauríticos: Lujauritos I e II
Corpo ocidental

-225-

	I 46a			II 134		II 135		II 136		II 126	
	N	B	B verde claro 51,9	N	B	N	B	N	B	N	B
SiO ₂	50,9	51,0	51,9	51,2	51,7	51,0	50,9	50,5	51,1	50,5	50,4
TiO ₂	0,73	1,09	1,63	0,89	1,00	1,07	0,99	1,45	1,24	1,07	1,54
Al ₂ O ₃	0,88	0,92	1,09	0,73	0,68	0,80	0,83	0,88	0,88	0,81	0,81
Fe ₂ O ₃ ¹	24,3	26,5	24,5	21,5	23,6	21,2	26,5	22,3	26,8	22,8	28,6
FeO ¹	3,85	2,65	5,52	6,44	5,31	6,35	2,64	5,01	2,68	5,12	1,35
MnO	1,10	1,45	1,07	1,20	1,00	0,86	0,68	0,81	0,87	1,12	1,22
MgO	1,56	1,15	0,60	1,95	1,33	1,90	1,63	2,46	1,54	1,85	1,20
CaO	6,57	3,32	1,59	7,90	4,90	6,60	5,38	6,65	4,34	6,90	4,33
Na ₂ O	9,74	11,2	11,4	8,83	10,4	9,30	10,3	9,21	10,8	9,29	11,0
ZrO ₂	0,25	0,18	0,16	0,17	0,25	0,18	0,20	n.d.	n.d.	0,26	0,24
Total	99,88	99,46	99,46	100,81	100,17	99,26	100,05	99,27	100,25	99,72	100,69
FeO ²	25,7	26,5	27,6	25,8	26,6	25,4	26,4	25,0	26,8	25,6	27,1
Fórmula estrutural ³											
Si	1,973	1,977	2,007	1,974	1,996	1,989	1,963	1,961	1,962	1,966	1,938
Al ^{IV}	0,027	0,023		0,026	0,004	0,011	0,037	0,039	0,038	0,034	0,037
Fe ³⁺											0,025
Al ^{VI}	0,013	0,019	0,050	0,007	0,027	0,026	0,001	0,001	0,002	0,003	
Ti	0,021	0,032	0,048	0,026	0,029	0,031	0,028	0,042	0,035	0,031	0,045
Fe ³⁺	0,708	0,773	0,715	0,623	0,687	0,621	0,767	0,651	0,774	0,667	0,802
Fe ²⁺	0,125	0,086	0,179	0,208	0,172	0,207	0,085	0,163	0,086	0,167	0,044
Mn	0,036	0,048	0,035	0,039	0,033	0,028	0,022	0,027	0,028	0,037	0,040
Mg	0,090	0,067	0,035	0,112	0,077	0,110	0,094	0,143	0,088	0,107	0,069
Ca	0,273	0,138	0,066	0,327	0,203	0,276	0,222	0,277	0,179	0,288	0,179
Na	0,732	0,843	0,857	0,660	0,779	0,703	0,770	0,694	0,801	0,701	0,819
Mg ⁴	9,2	6,4	3,1	11,0	7,2	10,5	9,6	13,9	8,8	10,6	7,1
Fe ²⁺ +Mn	16,4	12,8	19,4	24,2	19,3	22,5	11,1	18,5	11,4	20,1	8,6
Na	74,4	80,8	77,5	64,8	73,5	67,0	79,3	67,6	79,8	69,3	84,3
Moléculas ⁵											
Ca2Fe ³⁺ -Ts											1,8
Jd	1,3	1,9	5,0	0,7	2,7	2,6	0,1	0,1	0,2	0,3	
Ac	70,5	77,5	72,0	62,4	68,9	62,0	76,9	65,2	77,5	66,6	78,0
NATAL	1,2	2,3		2,6	0,4	1,1	1,0	4,2	3,0	3,1	3,7
NATFE											0,8
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT		1,2	8,2		3,6	2,6					
Mg-NAT		0,6	1,3		1,4	1,3					
CaTi-Ts	0,9						1,8		0,5		
CaFe ³⁺ -Ts											
Di	9,0	4,6	0,9	10,2	5,5	8,8	9,4	11,9	7,6	9,9	6,9
Hd	16,0	9,2	5,7	22,5	14,8	18,8	10,7	15,8	9,8	18,9	8,4
En		0,9	0,9	0,5	0,8	1,1		1,2	0,6	0,4	
Fs ⁶		1,8	6,0	1,1	1,9	1,7		1,6	0,8	0,8	
Wo	1,1						0,1				0,4
Classificação ⁷	eg-aug	eg-aug	eg titan	eg-aug	eg-aug	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan

Observações válidas para todas as tabelas de piroxênios.

- 1) Fe₂O₃ e FeO calculados por meio de programa SILCAL (Ulbrich e Ulbrich, 1982);
 - 2) Fe (total) calculado como FeO;
 - 3) Unidade de cálculo adotada para a fórmula estrutural = 6 oxigênios;
 - 4) e 5) porcentagem em peso;
 - 6) Fs = (Fe,Mn)₂Si₂O₆;
 - 7) aug = augita; eg = egirina; eg-aug = egirina-augita; eg titan = egirina titanífera; eg-aug titan = egirina-augita titanífera; Mn eg = manganês egirina; Mn eg-aug = manganês egirina-augita; soda-aug = soda-augita; Ti-Mn eg = titânio-manganês egirina; Ti-eg = titânio-egirina; Ti eg-aug = titânio egirina-augita.
- N = núcleo; B = borda dos cristais; Z = zona interior (entre núcleo e borda) em cristais com zoneamento concêntrico; S = setor, em cristais com zoneamento setorial; SB = setor de borda; SM = composição média em cristais com zoneamento setorial fraco.

Tabela 40 (continuação)

	Corpo oriental					
	I		I		II	
	176		505		217	
	N	B	N	B	N	B
SiO ₂	50,8	51,3	51,2	51,8	51,0	51,3
TiO ₂	1,62	1,49	1,48	1,19	0,96	0,95
Al ₂ O ₃	0,78	0,87	0,79	0,80	1,05	1,20
Fe ₂ O ₃	26,3	27,2	23,6	30,2	23,0	26,4
FeO	2,63	2,72	5,31		5,18	2,63
MnO	0,95	1,80	0,83	0,89	0,87	1,13
MgO	1,33	1,15	1,39	0,79	1,60	1,20
CaO	5,11	2,81	4,49	0,70	5,80	3,73
Na ₂ O	10,6	11,2	10,3	12,7	10,0	11,0
ZrO ₂	n.d.	n.d.	0,10	0,10	0,29	0,17
Total	100,12	100,54	99,49	99,17	99,75	99,71
FeO	26,3	27,2	26,5	27,2	25,9	26,4
Fórmula estrutural						
Si	1,956	1,966	1,986	1,993	1,979	1,980
Al ^{IV}	0,036	0,034	0,014	0,007	0,021	0,020
Fe ³⁺	0,008					
Al ^{VI}		0,005	0,022	0,029	0,047	0,035
Ti	0,047	0,043	0,043	0,034	0,028	0,028
Fe ³⁺	0,753	0,785	0,689	0,875	0,672	0,766
Fe ²⁺	0,085	0,087	0,172		0,168	0,085
Mn	0,031	0,059	0,027	0,029	0,029	0,037
Mg	0,076	0,066	0,080	0,045	0,093	0,069
Ca	0,211	0,116	0,187	0,029	0,241	0,154
Na	0,792	0,836	0,775	0,948	0,752	0,819
Mg	7,8	6,3	7,6	4,4	8,9	6,8
Fe ²⁺ +Mn	11,7	13,9	18,9	2,9	18,9	12,1
Na	80,5	79,8	73,5	92,7	72,2	81,1
Moléculas						
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts						
Jd		0,5	2,2	3,0	2,7	3,5
Ac	75,0	78,3	69,1	87,4	67,8	76,6
NATAL	3,6	3,4	1,4	0,7	2,0	2,7
NATFE	0,8					
(Fe ²⁺ +Mn)- NAT	0,6	1,2	4,2	2,0	1,1	
Mg-NAT		0,6	1,1	3,3	0,5	
CaTi-Ts						
CaFe ³⁺ -Ts						
Di	7,6	3,6	5,5	1,7	7,8	5,6
Hd	11,3	8,0	13,2	1,2	16,5	9,8
En		1,4	1,0	0,5	0,5	0,6
Fs		3,0	2,3	0,2	1,1	1,2
Wo	1,1					
Classificação	eg-aug titan	eg-aug titan	eg-aug titan	eg	eg-aug	eg-aug

Figura 41 - Diagrama Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na de piroxênios dos vários fácies dos corpos lujaúrficos:

a- lujaúrfitos I; b-lujaúrfitos II; c- nefelina sienitos traquitóides I e II; d- chibinitos. Os dados representam porcentagem de átomos. A simbologia adotada é a mesma das Figs. 36 e 38, a saber: egirina-augitas (x), egirina (+), egirina-augita titanífera (o), egirina titanífera (Δ), manganês egirina (□), titânio egirina (▲). As "linhas de união" (*tie lines*) unem centros e bordas de grãos, zonas coexistentes em cristais com zoneamento concêntrico, ou diferentes setores em cristais com zoneamento setorial. Pontos isolados nos diagramas, representam a média de vários cristais de composição homogênea numa mesma seção de microsonda ou a composição de monocristais pequenos, geralmente aciculares, que formam parte de agregados fibrosos intersticiais. Amostra 142: dados de cristais prismáticos, sem zoneamento setorial, obtidos numa amostra de chibinito.

Tabela 41
Composição química de piroxênios dos corpos lujauríticos: Nefelina sienitos traquitóides I e II

	Corpo ocidental		Corpo oriental	
	I 163	II 138	II 216	
	N	B	N	B
SiO ₂	50,3	50,8	51,1	51,0
TiO ₂	0,93	1,60	0,85	0,74
Al ₂ O ₃	0,72	0,84	1,01	0,98
Fe ₂ O ₃	24,5	25,1	21,4	27,0
FeO	3,88	3,99	6,43	2,69
MnO	1,26	1,17	1,16	1,08
MgO	1,80	0,85	1,83	0,97
CaO	8,56	5,60	6,31	4,0
Na ₂ O	8,94	10,4	9,30	11,0
ZrO ₂	0,26	0,20	0,26	0,10
Total	101,15	100,55	99,65	99,56
FeO	25,9	26,6	25,7	26,9
Fórmula estrutural				
Si	1,938	1,960	1,986	1,976
Al ^{IV}	0,033	0,038	0,014	0,024
Fe ³⁺	0,029	0,002		
Al ^{VI}			0,032	0,021
Ti	0,027	0,047	0,025	0,022
Fe ³⁺	0,680	0,727	0,627	0,786
Fe ²⁺	0,125	0,129	0,209	0,087
Mn	0,041	0,038	0,038	0,036
Mg	0,103	0,049	0,106	0,056
Ca	0,353	0,232	0,263	0,166
Na	0,668	0,778	0,701	0,827
Mg	11,0	4,9	10,1	5,6
Fe ²⁺ +Mn	17,7	16,8	23,4	12,2
Na	71,3	78,3	66,5	82,2
Moléculas				
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts	2,9			
Jd			3,2	2,1
Ac	65,2	72,6	63,1	78,5
NATAL	1,8	3,8	1,4	2,2
NATFE		0,2		
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT		1,4	1,2	
Mg-NAT			1,0	
CaTi-Ts	0,9			
CaFe ³⁺ -Ts				
Di	10,3	4,9	8,1	5,2
Hd	16,6	16,0	18,4	11,4
En			1,0	0,2
Fs			2,6	0,4
Wo	2,3	1,1		
Classificação	eg-aug	eg-aug titan	eg-aug	eg-aug titan

c) *Chibinitos*: os piroxênios destas rochas ocorrem principalmente como grandes cristais placóides e poiquilíticos, de bordas irregulares, e com típico e marcado zoneamento setorial (Fotomicrografias 19 e 20). Em proporções subordinadas, estão presentes variedades prismáticas e fibrosas, estas de cristalização tardia, intersticiais. Os dados de piroxênios poiquilíticos setoriais constam da Fig. 41d, onde mostram uma certa dispersão, formando uma banda composicional paralela ao lado Fe-Na do diagrama (ver também Tabela 42). Esta tendência não é a única observada, já que numa amostra com piroxênios prismáticos, que se encontra em contato direto com tinguaito (am. 142, ver Tabela 42), aparece uma variação diferente, caracterizada pelo maior teor de Mg (Fig. 41d).

Distinguem-se portanto nesses chibinitos duas tendências perfeitamente definidas. Uma, aparentemente dominante, é a dada pelos piroxênios maiores de hábito poiquilítico, em geral pobres em Mg; a outra, correspondendo aos piroxênios prismáticos da amostra 142, com menor dispersão e teores maiores de Mg. Estas duas tendências repetem-se em outras rochas chibiniticas do Anel Norte (ver parágrafo seguinte).

2. Chibinitos de Botelhos e Chibinitos orientais.
Estes corpos apresentam notável variação petrográfica e textural; contudo, os piroxênios são em geral química e texturalmente muito semelhantes aos encontrados nos chibinitos dos corpos lujauríticos. Dominam na maioria das amostras as variedades placóides e poiquilíticas, exibindo quase sempre zoneamento setorial. Em outras rochas, encontram-se também piroxênios pequenos e prismáticos.

Numa rocha de um pequeno corpo de chibinito associado a tinguaito (am. 462), e numa variedade pegmatóide de granulação grossa a muito grossa (am. 480), observa-se que o piroxênio ocorre como prismas médios a pequenos, não poiquilíticos, às vezes formando agregados, e sem zoneamento setorial.

Fotomicrografias 19 e 20 - Zoneamento setorial em piroxênios poi quilíticos de chibinitos.

19- Vista parcial de um cristal de piroxênio em chibinito do corpo lujaurítico ocidental. Setores cinza escuro a cinza médio são de cor verde mais ou menos intensa, com pleocroísmo $\alpha' =$ verde, $\gamma' =$ amarelo. Por outro lado, os setores finos, de cor cinza muito claro, são incolores. Observa-se que os setores são grosso modo paralelos à zona {010} do piroxênio. X 10; nicóis paralelos; filtro laranja.

20- Vista parcial de um cristal de piroxênio na mesma lâmina da fotomicrografia anterior. A cor cinza médio escuro corresponde a um piroxênio verde pleocróico, e a cinza muito claro a um piroxênio incolor a verde pálido. Nota-se que os setores são aproximadamente paralelos e/ou normais à clivagem prismática do cristal. X 10; nicóis paralelos; filtro laranja.

Fotomicrografia 19

Fotomicrografia 20

Tabela 42

-231-

Composição química de piroxênios dos corpos lujauríticos: Chibinitos

	47 SM	173									224	
		S			S			N			S	
		verde		incolor	laranja			Z	B		verde	incolor
SiO ₂	51,2	51,8	51,6	51,9	50,7	50,1	50,5	51,4			51,3	51,8
TiO ₂	1,26	1,13	2,09	0,82	0,51	0,63	0,80	1,10			1,10	0,85
Al ₂ O ₃	1,02	0,81	0,82	0,68	1,50	0,59	0,64	0,65			0,52	1,93
Fe ₂ O ₃	24,8	21,0	21,1	29,5	29,0	23,7	25,6	26,6			23,9	28,1
FeO	5,57	6,54	8,12	1,40		3,76	2,56	2,66			5,37	2,81
MnO	0,76	0,91	1,00	1,21	3,92	1,40	1,39	1,22			1,41	0,96
MgO	0,69	1,27	1,30	0,83	0,02	1,78	1,54	1,10			1,09	0,01
CaO	2,57	6,69	3,83	1,50	1,20	8,46	6,43	4,49			4,80	0,43
Na ₂ O	11,1	9,58	10,2	12,2	12,2	8,9	9,9	11,0			10,1	12,5
ZrO ₂	0,16	0,25	n.d.	0,10	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0,33	0,0
Total	99,63	99,98	100,06	100,14	99,05	99,32	99,36	100,22			99,92	99,39
FeO	27,9	26,2	27,1	27,9	26,1	25,1	25,6	26,6			26,8	28,1
Fórmula estrutural												
Si	2,002	1,993	1,996	1,991	1,976	1,957	1,963	1,977			1,994	1,994
Al ^{IV}		0,007	0,004	0,009	0,024	0,027	0,029	0,023			0,006	0,006
Fe ³⁺						0,016	0,008					
Al ^{VI}	0,047	0,030	0,034	0,022	0,045			0,007			0,018	0,082
Ti	0,037	0,033	0,061	0,024	0,015	0,019	0,023	0,032			0,032	0,025
Fe ³⁺	0,723	0,632	0,613	0,851	0,849	0,681	0,742	0,770			0,698	0,816
Fe ²⁺	0,181	0,211	0,263	0,045		0,123	0,083	0,086			0,175	0,091
Mn	0,025	0,030	0,033	0,039	0,129	0,046	0,046	0,040			0,047	0,031
Mg	0,040	0,073	0,075	0,048	0,001	0,104	0,089	0,063			0,063	0,001
Ca	0,107	0,276	0,159	0,062	0,050	0,354	0,268	0,185			0,200	0,018
Na	0,831	0,715	0,763	0,907	0,922	0,674	0,746	0,818			0,761	0,934
Mg	3,7	7,1	6,6	4,6	0,1	10,9	9,2	6,2			6,0	0,1
Fe ²⁺ +Mn	19,1	23,4	26,1	8,1	12,3	17,9	13,4	12,5			21,2	11,5
Na	77,2	69,5	67,3	87,3	87,6	71,2	77,4	81,3			72,8	88,4
Di ¹	2,1	1,1	4,3	2,5		11,0	9,2	6,3			4,9	
Hd	10,8	23,3	16,3	4,3	5,6	17,9	13,4	12,5			17,4	2,2
Ac	87,1	69,6	79,4	93,2	94,4	71,1	77,3	81,2			77,7	97,8
Moléculas												
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts						1,6	0,8					
Jd	4,7	3,0	3,4	2,2	4,5			0,7			1,8	8,2
Ac	72,2	62,9	61,3	85,0	85,0	66,5	73,7	77,0			69,6	81,4
NATAL		0,7	0,4	0,9	1,5		0,5	2,3			0,6	0,6
NATFE												
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT	6,2	4,0	8,4	2,0				1,2			4,0	3,8
Mg-NAT	1,2	1,2	3,0	1,0				0,6			1,2	
CaTi-Ts						1,8	1,8					
CaFe ³⁺ -Ts												
Di	1,7	6,4	3,3	2,3		10,3	8,8	6,0			4,4	
Hd	9,0	21,1	12,6	3,9	5,0	16,7	12,8	12,0			15,5	1,8
En	0,8	0,3	1,3	1,0							0,6	
Fs	4,2	0,4	6,3	1,7	4,0						2,3	4,2
Wo						3,1	1,6	0,2				
Classificação	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan	eg	Mn-eg	eg-aug	eg	Ti-eg			eg-aug	eg-aug

1) Porcentagem em peso.

O quimismo dos dois tipos de piroxênios (os poiquilíticos e os prismáticos) reproduzem as tendências já assinaladas no caso dos cristais de chibinitos dos corpos lujauríticos (Tabelas 43 e 44; Figs. 41 e 42).

Zoneamento setorial e quimismo de piroxênios poiquilíticos em chibinitos. O zoneamento normal, tipo borda-centro, explica-se comumente em função da falta de homogenização de cristais durante o crescimento. Do ponto de vista cinético, a velocidade de difusão de íons no cristal não acompanha a velocidade de cristalização e o conseqüente suprimento de íons para as superfícies em crescimento.

Diferente é o caso do zoneamento setorial, onde são os cristais que crescem mais rapidamente. As áreas do líquido em contato com o cristal ficam empobrecidas nos íons necessários para gerar cristais homogêneos, devido ao fato de que é a velocidade de difusão dos íons correspondentes que agora não acompanha a velocidade de crescimento do cristal. Deve-se supor que, ao zoneamento setorial no crescimento do cristal, corresponde um zoneamento equivalente no líquido imediatamente vizinho ao cristal (Leung, 1974; Larsen, 1981).

É importante salientar que o zoneamento setorial não está diretamente relacionado à evolução de um determinado líquido, uma vez que líquidos idênticos poderiam eventualmente originar vários tipos de zoneamento setorial (ver Hollister e Gancarz, 1971). Por outro lado, a microsonda detecta em muitos casos um segundo e leve zoneamento do tipo normal, superposto ao setorial (ver também Larsen, 1981). Caracteriza-se essa tendência pelo aumento de Fe e Na do interior do cristal para as bordas, em cada um dos setores. Este comportamento evidencia que as leis da evolução magmática são realmente obedecidas, em termos gerais, independentemente de variações locais impostas por diversas condições cinéticas.

O quimismo dos piroxênios com zoneamento seto-

Tabela 43

Composição química de piroxênios dos chibinitos de Botelhos

	410			411b			476			480			482			
	S verde	S azul	F	S verde intenso	S verde médio	S verde claro	S verde intenso	F	N verde	B amarelo	B verde claro	N	B	Z	F	
SiO ₂	51,0	50,8	51,6	50,5	50,2	51,2	50,6	51,3	51,2	50,1	50,6	51,2	50,7	51,0	50,5	51,6
TiO ₂	0,48	4,15	3,16	0,91	3,08	1,50	0,49	3,14	2,77	0,76	2,38	4,62	0,39	1,36	0,84	2,18
Al ₂ O ₃	0,86	1,10	0,74	0,66	0,70	0,75	0,79	0,67	0,48	0,93	0,84	0,89	0,93	0,94	0,89	0,70
Fe ₂ O ₃	16,6	20,2	23,9	24,6	23,4	24,8	14,0	17,7	23,5	26,6	28,8	25,6	14,6	29,6	23,3	26,2
FeO	9,94	7,78	5,38	5,53	7,00	5,57	12,6	10,6	5,28	2,66	1,36	2,56	5,64	1,40	5,24	4,16
MnO	1,05	0,84	0,99	1,44	1,23	1,10	1,47	1,49	2,48	1,00	1,03	1,89	1,93	0,88	1,12	1,07
MgO	2,02	0,70	0,61	0,47	0,47	0,30	2,22	0,27	0,13	1,67	0,94	0,18	6,42	0,87	2,00	0,30
CaO	11,6	4,08	2,41	6,10	3,55	3,49	11,4	3,57	2,12	6,13	2,28	0,14	14,0	2,24	6,09	0,69
Na ₂ O	7,04	10,7	11,8	10,0	10,7	11,0	6,17	10,19	11,5	9,84	12,0	13,0	5,23	12,0	9,47	12,2
ZrO ₂	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,17	0,25	0,02	0,20	0,27	0,02	0,11	0,40	0,25	0,07
Total	100,59	100,35	100,59	100,21	100,33	99,71	99,91	99,18	99,48	99,89	100,50	100,10	99,95	100,69	99,70	99,17
FeO	24,9	25,9	26,9	27,6	28,0	27,9	25,2	26,6	26,4	26,6	27,3	25,6	18,8	28,0	26,2	27,8
Fórmula estrutural																
Si	1,982	1,960	1,978	1,967	1,952	1,990	1,993	2,015	1,995	1,942	1,942	1,963	1,948	1,958	1,966	2,000
Al ^{IV}	0,018	0,040	0,022	0,030	0,032	0,010	0,007		0,005	0,043	0,038	0,037	0,042	0,042	0,034	
Fe ³⁺				0,003	0,016					0,015	0,020		0,010			
Al ^{VI}	0,021	0,010	0,011			0,024	0,030	0,031	0,017			0,003		0,001	0,007	0,032
Ti	0,014	0,120	0,091	0,027	0,090	0,044	0,015	0,093	0,081	0,022	0,069	0,133	0,011	0,039	0,025	0,064
Fe ³⁺	0,484	0,585	0,689	0,720	0,667	0,724	0,414	0,523	0,688	0,763	0,813	0,738	0,413	0,854	0,682	0,765
Fe ²⁺	0,323	0,251	0,172	0,180	0,228	0,181	0,414	0,349	0,172	0,086	0,044	0,082	0,181	0,045	0,171	0,135
Mn	0,035	0,027	0,032	0,048	0,041	0,036	0,049	0,050	0,082	0,033	0,034	0,061	0,063	0,029	0,037	0,035
Mg	0,117	0,040	0,035	0,027	0,027	0,017	0,130	0,016	0,008	0,097	0,054	0,010	0,368	0,050	0,116	0,017
Ca	0,484	0,169	0,099	0,255	0,148	0,145	0,479	0,150	0,089	0,255	0,094	0,006	0,578	0,092	0,254	0,029
Na	0,530	0,799	0,878	0,755	0,803	0,829	0,471	0,776	0,866	0,740	0,894	0,963	0,390	0,892	0,715	0,918
Moléculas																
Mg	11,6	3,6	3,1	2,7	2,5	1,7	12,2	1,3	0,7	10,1	5,3	0,9	36,7	4,9	11,2	1,6
Fe ²⁺ +Mn	35,6	24,9	18,3	25,5	24,4	20,4	43,5	33,5	22,5	12,5	7,5	12,8	24,4	7,3	20,0	15,4
Na	52,8	71,5	78,6	74,8	73,1	77,9	44,3	65,2	76,8	77,4	87,2	86,3	38,9	87,8	68,8	83,0
Di	12,2	2,7	1,9	2,8	1,6	1,3	11,7	0,9	0,4	10,2	4,2		34,2	3,9	9,7	0,4
Hd	37,3	19,7	10,7	23,5	16,6	15,5	41,9	21,4	11,0	12,5	6,2	0,8	24,1	5,8	17,5	3,3
Ac	50,5	77,6	87,4	73,7	81,8	83,2	46,4	77,7	88,6	77,3	89,6	99,2	41,7	90,3	72,8	96,3
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts				0,3						1,5			1,0			
Jd	2,1	1,0	1,1			2,4	3,0	3,2	1,7			0,3			0,7	3,2
Ac	48,5	59,2	69,3	71,5	66,7	72,5	41,5	53,6	68,9	74,4	81,2	73,7	38,9	85,2	68,4	76,4
NATAL	1,4	4,0	2,2	2,7	3,2	1,0	0,7		0,5		3,8	3,7		3,9	2,5	
NATFE					1,6						2,0					
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT	14,2	11,9		7,6	6,4		1,2	18,2	14,8		1,2	18,0				11,6
Mg-NAT	2,0	2,0		0,8	0,4		0,4	0,8	0,4		1,0	1,2				1,2
CaTi-Ts										2,2			1,1			
CaFe ³⁺ -Ts													1,3			
Di	11,7	2,1	1,5	2,7	1,3	1,1	10,5	0,6	0,3	9,8	3,8		31,9	3,7	9,1	0,3
Hd	35,9	15,0	8,5	22,8	13,5	13,5	37,5	14,8	8,6	12,0	5,6	0,6	22,4	5,5	16,4	2,6
En		0,4	0,5		0,5	0,2	1,1	0,3	0,1		0,6	0,2	2,4	0,7	1,2	0,4
Fs		3,1	3,0		4,8	2,5	4,1	8,5	4,7		0,8	2,3	1,0	1,0	1,7	4,3
No	0,4									0,1						
Classificação	eg-aug	Ti eg-aug	eg titan	eg-aug	eg-aug titan	eg-aug titan	eg-aug	eg-aug titan	eg titan	eg-aug	eg titan	Ti-eg	eg-aug	eg	eg-aug	eg titan

Tabela 44

Composição química de piroxênios dos chibinitos orientais

	543				544			550		
	S verde mē- dio claro	SB verde mēdio	SB verde intenso	F	S verde	SB azul	SB amarela	S verde intenso	SB verde claro	F
SiO ₂	49,3	51,4	51,0	51,8	50,1	51,6	51,8	50,7	51,4	51,4
TiO ₂	0,59	0,78	3,62	3,03	0,79	4,42	1,32	0,55	4,01	1,32
Al ₂ O ₃	0,68	0,61	0,70	0,62	0,71	0,64	1,88	0,79	0,64	0,77
Fe ₂ O ₃	20,3	26,0	21,2	23,6	22,1	19,3	26,5	17,9	25,2	30,6
FeO	7,83	5,84	8,19	7,08	8,51	7,46	4,21	8,67	2,52	1,45
MnO	1,74	1,32	1,41	1,37	1,08	2,11	1,39	1,39	1,45	1,31
MgO	1,58	0,21	0,20		0,98	0,33	0,22	2,17	0,33	0,06
CaO	12,2	3,58	3,62	0,88	6,34	2,10	0,47	11,2	2,40	1,22
Na ₂ O	6,63	10,9	10,8	12,0	8,70	11,4	12,2	7,12	12,3	12,5
ZrO ₂	0,12	0,10	0,12	0,02	0,24	0,02	0,02	0,18	0,15	0,08
Total	100,97	100,74	100,86	100,40	99,55	99,38	100,01	100,67	100,40	100,71
FeO	26,1	29,2	27,3	28,3	28,4	24,9	28,1	24,8	25,2	29,0
Fórmula estrutural										
Si	1,928	1,988	1,970	1,999	1,974	2,001	1,989	1,971	1,967	1,970
Al ^{IV}	0,031	0,012	0,030	0,001	0,026		0,011	0,029	0,029	0,030
Fe ³⁺	0,041								0,004	
Al ^{VI}		0,016	0,002	0,027	0,007	0,029	0,074	0,007		0,005
Ti	0,017	0,023	0,105	0,088	0,023	0,129	0,038	0,016	0,116	0,038
Fe ³⁺	0,556	0,756	0,617	0,685	0,654	0,565	0,767	0,524	0,721	0,884
Fe ²⁺	0,256	0,189	0,265	0,228	0,280	0,242	0,135	0,282	0,081	0,047
Mn	0,058	0,043	0,046	0,045	0,036	0,069	0,045	0,046	0,047	0,043
Mg	0,092	0,012	0,012		0,058	0,019	0,013	0,126	0,019	0,003
Ca	0,510	0,149	0,150	0,036	0,268	0,087	0,019	0,465	0,099	0,050
Na	0,503	0,819	0,809	0,896	0,664	0,858	0,909	0,537	0,916	0,926
Moléculas										
Mg	10,1	1,1	1,0		5,5	1,6	1,1	12,7	1,8	0,3
Fe ²⁺ +Mn	34,6	21,9	27,5	23,4	30,5	26,2	16,4	33,1	12,0	8,8
Na	55,3	77,0	71,5	76,6	64,0	72,2	82,5	54,2	86,2	90,9
Di	10,1	0,8	0,6		4,6	0,8	0,1	12,8	1,0	
Hd	34,6	15,6	19,0	5,0	24,5	12,6	2,3	33,3	7,2	5,4
Ac	55,3	83,6	80,4	95,0	70,9	86,6	97,6	53,9	91,8	94,6
Moléculas										
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts	4,1									
Jd		1,6	0,2	2,7	0,7	2,9	7,4	0,7		0,5
Ac	50,8	75,8	61,8	68,6	65,1	56,7	76,9	52,2	71,9	88,2
NATAL		1,2	3,0	0,1	2,3		1,1	0,6	2,9	3,0
NATFE									0,4	
(Fe ²⁺ +Mn)- NAT		2,0	14,4	17,5		24,3	5,0		14,4	1,6
Mg-NAT		0,2	0,6			1,6	0,4		2,2	
CaTi-Ts	1,7							1,6		
CaFe ³⁺ - Ts										
Di	9,3	0,7	0,5		4,2	0,5	0,1	12,4	0,8	
Hd	31,8	14,2	14,6	3,6	22,5	8,3	1,8	32,3	5,6	5,0
En		0,2	0,2		0,8	0,3	0,5			0,1
Fs		4,1	4,7	7,5	4,4	5,4	6,8	0,2		1,6
Wo	2,3								1,8	
Classificação	eg-aug	eg-aug	Ti eg-aug	eg titan	eg-aug	Ti-eg	eg	eg-aug	Ti-eg	eg

Figura 42 - Diagrama Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na de piroxênios de chibinitos:
a- chibinitos de Botelhos, b- chibinitos orientais.
Simbologia e referências iguais às da figura anterior, incluindo também titânio egirina-augita (●). Amostras 462 e 480 representando dados de cristais prismáticos sem zoneamento setorial.

rial permite mostrar algumas das vantagens do cálculo molecular. Em vez de apresentar os dados só em função dos cátions (Fig. 43a), é conveniente recalcular os resultados e representar o qui mesmo através das variações das moléculas Hd, Di e Ac (Fig. 43b). Estas acham-se corrigidas dos efeitos introduzidos por cátions a dicionais, visto que foram subtraídas as contribuições das moléculas de Na-Ti (ver Tabelas 42,43,44), ocultas nos parâmetros p ramente catiônicos. Uma vez representados os dados em função de moléculas (Figs. 43b), diminui consideravelmente a dispersão dos pontos, sobretudo no caso dos piroxênios poiquilíticos com zonabilidade setorial. É possível agora definir com maior clareza algumas feições separando ligeiramente os piroxênios poiquilíticos dos três corpos diferentes. Os piroxênios poiquilíticos de chibi nitos que acompanham lujauros caracterizam-se por um maior con teúdo de Di e menor variabilidade química.

3. Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte. As rochas deste conjunto de corpos são muito variáveis quanto à granu lometria, indo desde as de granulação média, com piroxênios agru pados, até as de granulação grossa a muito grossa, com piroxênios em cristais maiores, em geral com zoneamento setorial. No entanto, as variações composicionais são pequenas, com os mine rais correspondendo egirina-augitas com bordas de egirina, como se observa na Tabela 45 e Fig. 44a. Caracterizam-se esses piroxênios por possuírem teores baixos de Al e Ti, constantes de Mg e elevados de Si e, portanto, concentrações pequenas de Di e de mo léculas de Na-Ti; a maior parte do Ti está presente na molécula ($\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$)-NAT. Por outro lado, face ao fato de os piroxênios serem ricos em Si, aparece Jd.

4. Nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Os cristais prismáticos de piroxênio possuem zoneamento setorial; alguns setores mostram marcado enriquecimento em Ti (formando ti tânio egirinas) e, às vezes, em Al. Em geral os piroxênios são ricos em Si e possuem teores quase constantes de Mg (Tabela 46, Fig. 44b); nesse sentido, o quimismo é semelhante ao dos nefeli na sienitos cinzas do Anel Norte, com o Ti aparecendo principal-

Figura 43 - Diagramas Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na e Di-Hd-Ac de piroxênios de chibinitos dos corpos lujaúrfíticos, de Botelhos e orientais.

Os dados constam das Tabelas 42, 43 e 44. Piroxênios prismáticos das amostras 142, 462, 480 (Figs. 41d e 42a), representados por círculos cheios (●). Piroxênios poiquilíticos com zoneamento setorial em chibinitos dos corpos lujaúrfíticos (○), chibinitos de Botelhos (+) e chibinitos orientais (x).

Tabela 45
Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte

	222		176		131		49a			432	
	S verde médio	S verde claro	S verde médio	S verde claro	S verde médio	S incolor	S verde médio	S verde claro	SB incolor	S verde claro	S verde muito claro
SiO ₂	51,2	51,0	51,2	51,5	51,5	51,5	51,6	51,8	51,5	50,5	51,3
TiO ₂	0,58	0,57	0,70	0,47	1,10	0,56	1,57	0,68	0,71	0,73	1,62
Al ₂ O ₃	0,48	0,45	0,44	0,52	0,50	0,41	0,50	0,46	0,43	0,74	1,20
Fe ₂ O ₃	26,3	31,7	23,4	29,5	25,7	28,6	24,3	27,2	30,6	29,4	30,9
FeO	4,17		7,03	2,95	5,78	4,54	7,30	6,12	3,06	2,94	1,46
MnO	1,57	1,62	2,06	1,30	0,80	0,50	0,83	0,65	0,71	0,76	0,51
MgO	0,98	0,90	0,70	0,50	0,38	0,13	0,25	0,18	0,13	0,38	0,13
CaO	4,79	2,85	3,66	2,07	3,30	0,81	2,05	1,50	0,55	2,56	0,25
Na ₂ O	10,3	11,8	10,2	11,5	10,9	12,0	11,3	11,5	12,3	11,7	13,0
ZrO ₂	0,08	0,08	0,05	0,10	0,10	0,13	0,04	0,13	0,19	0,11	0,10
Total	100,45	100,97	99,44	100,41	100,06	99,18	99,74	100,22	100,18	99,82	100,47
FeO	27,8	28,5	28,1	29,5	28,9	30,3	29,2	30,6	30,6	29,4	29,3
Fórmula estrutural											
Si	1,979	1,954	2,005	1,986	1,998	2,008	2,007	2,008	1,991	1,963	1,964
Al ^{IV}	0,021	0,020		0,014	0,002				0,009	0,034	0,036
Fe ³⁺		0,026								0,003	
Al ^{VI}	0,001		0,020	0,010	0,021	0,019	0,023	0,021	0,011		0,018
Ti	0,017	0,016	0,021	0,014	0,032	0,016	0,046	0,020	0,021	0,021	0,047
Fe ³⁺	0,764	0,888	0,691	0,856	0,750	0,840	0,713	0,793	0,890	0,858	0,890
Fe ²⁺	0,135		0,230	0,095	0,187	0,148	0,238	0,198	0,099	0,096	0,047
Mn	0,051	0,053	0,068	0,042	0,026	0,017	0,027	0,021	0,023	0,025	0,017
Mg	0,057	0,051	0,041	0,029	0,022	0,008	0,015	0,010	0,008	0,022	0,007
Ca	0,199	0,117	0,154	0,086	0,137	0,034	0,086	0,062	0,023	0,107	0,010
Na	0,775	0,877	0,774	0,860	0,817	0,911	0,849	0,864	0,920	0,879	0,965
Moléculas											
Mg	5,6	5,2	3,7	2,8	2,1	0,7	1,3	0,9	0,7	2,2	0,7
Fe ²⁺ +Mn	18,3	5,4	26,8	13,4	20,3	15,2	23,5	20,1	11,7	11,8	6,1
Na	76,1	89,4	69,5	83,8	77,6	84,1	75,2	79,0	87,6	86,0	93,2
Ca2Fe ³⁺ -Ts		2,6								0,3	
Jd			2,0	1,0	2,1	1,9	2,3	2,1	1,1		1,8
Ac	76,2	86,0	69,8	85,0	74,7	85,1	72,2	80,2	88,7	85,3	88,9
NATAL	1,7	1,6		1,4	0,2				0,9	2,1	3,6
NATFE											
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT			3,7		5,4	3,2	8,9	3,8	2,2		2,0
Mg-NAT			0,6		0,6		0,4	0,2	0,2		0,2
CaTi-Ts											
CaFe ³⁺ -Ts											
Di	4,7	4,5	2,1	1,5	1,3	0,2	0,5	0,2		1,6	0,1
Hd	15,2	4,6	13,4	7,1	12,3	3,3	8,2	6,1	2,3	8,7	0,9
En	0,5	0,3	0,9	0,7	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
Fs	1,7	0,4	7,5	3,3	3,1	6,0	7,1	7,1	4,4	1,7	2,3
Wo											
Classificação	eg-aug	eg	eg-aug	eg	eg-aug	eg	eg-aug titan	eg	eg	eg	eg titan

Figura 44 - Diagramas Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na de piroxênios de:
a- nefelina sienitos cinzas do Anel Norte; b- nefelina sienitos com eudialita do Serrote, c- nefelina sienitos ocidentais com eudialita. Simbologia e referências iguais às da Fig. 41; inclui também titânio-manganes egirina (■).

Tabela 46

Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos com eudialita do Serrote

	S verde 51,8	364 S verde médio 52,5	S verde claro 52,7	169 SB verde	S azul 50,8	S verde intenso 52,0	112b S verde claro 51,6	S amarelo 53,1
SiO ₂								
TiO ₂	0,97	1,20	1,60	0,47	4,51	0,88	3,82	1,46
Al ₂ O ₃	1,09	1,07	1,62	0,58	1,39	0,57	0,59	0,59
Fe ₂ O ₃	15,4	21,3	27,8	18,4	23,0	22,3	25,4	26,4
FeO	13,9	8,23	2,78	11,0	6,91	6,69	2,53	4,19
MnO	1,25	1,06	0,62	1,58	0,48	1,28	1,57	0,77
MgO	0,81	0,81	0,42	0,94	0,20	1,10	0,61	0,63
CaO	5,35	3,35	0,36	5,89	0,30	4,27	0,40	0,88
Na ₂ O	8,53	10,53	12,9	8,57	12,2	10,18	12,9	12,5
ZrO ₂	n.d.	n.d.	n.d.	0,18	0,10	n.d.	n.d.	n.d.
Total	99,10	100,05	100,80	99,41	99,89	99,27	99,42	100,52
FeO	27,8	27,4	27,8	27,6	27,6	26,8	25,3	27,9
Si	2,040	2,024	1,997	Fórmula estrutural		2,023	1,986	2,024
Al ^{IV}			0,003		0,040		0,014	
Fe ³⁺								
Al ^{VI}	0,051	0,049	0,069	0,027	0,023	0,026	0,013	0,027
Ti	0,029	0,035	0,046	0,014	0,131	0,026	0,111	0,042
Fe ³⁺	0,458	0,620	0,791	0,544	0,669	0,652	0,734	0,757
Fe ²⁺	0,457	0,266	0,088	0,363	0,223	0,217	0,082	0,134
Mn	0,042	0,035	0,020	0,053	0,016	0,042	0,051	0,025
Mg	0,048	0,047	0,024	0,055	0,012	0,064	0,035	0,036
Ca	0,226	0,139	0,015	0,248	0,012	0,178	0,017	0,036
Na	0,652	0,788	0,946	0,653	0,916	0,767	0,961	0,923
Mg	4,0	4,1	2,2	4,9	1,0	5,8	3,1	3,2
Fe ²⁺ +Mn	41,6	26,5	10,0	37,0	20,5	23,8	11,8	14,2
Na	54,4	69,4	87,8	58,1	78,5	70,4	85,1	82,6
				Moléculas				
Ca2Fe ³⁺ -Ts								
Jd	5,4	5,1	6,9	2,8	2,3	2,7	1,3	2,9
Ac	48,8	64,3	79,1	57,1	66,9	67,4	74,2	78,6
NATAL			0,3		4,0		1,4	
NATFE								
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT	5,8	6,2	7,0	2,5	17,4	4,3	15,7	7,0
Mg-NAT	0,4	1,0	1,6	0,4	0,8	1,0	4,0	1,7
CaTi-Ts								
CaFe ³⁺ -Ts								
Di	1,8	2,0	0,3	3,1		3,6		0,6
Hd	22,2	12,4	1,2	23,0	1,2	14,8	1,7	3,1
En	1,5	1,2	0,6	1,5	0,4	1,2		1,1
Fs	14,1	7,8	3,0	9,8	7,0	5,0	1,7	5,0
Wo								
Classificação	eg-aug	eg-aug	eg titan	eg-aug	Ti-eg	eg-aug	Ti-eg	eg titan

mente como $(\text{Fe}^{2+} + \text{Mn})\text{-NAT}$. Em geral possuem teores elevados de Al, do que decorre que as quantidades de Jd são também altas.

5. Nefelina sienitos ocidentais com eudialita .

As rochas deste corpo, petrograficamente muito heterogêneas, apresentam variações tanto texturais, como mineralógicas. Os piroxênios são em geral prismáticos, porém, em alguns casos, poiquilíticos e xenomórficos. São raros os cristais com zoneamento setorial; quanto ao quimismo, as diferenças mais notáveis ocorrem nas bordas dos grãos, onde por vezes aparecem teores muito elevados de Ti e Mn, originando a titânio-manganês egirina (Tabela 47, Fig. 44c). Possuem teores relativamente elevados de Si e baixos de Al. A relação $\text{Mg}:\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$ mantém-se constante quando passando de egirina-augitas para egirinas; contudo, algumas bordas e fibras exibem concentrações mínimas de Mg.

6. Pseudoleucita nefelina sienitos. Nestas rochas o mineral ferromagnesiano mais importante é a biotita. Os cristais primários de piroxênio estão alterados em clorita e opacos, assim que apenas alguns poucos relitos foram passíveis de análise, com os dados indicando uma composição $\text{Di}_{46}\text{Hd}_{19}\text{Ac}_{35}$. São piroxênios pobres em Ti e relativamente ricos em Mn (Tabela 48, coluna 1, Fig. 45a). Os piroxênios frescos encontrados na matriz das rochas são de origem hidrotermal-deutérica, aparecendo seja como fibras intersticiais, seja como prismas idiomórficos associados a zeólitas. Os últimos são particularmente interessantes por apresentarem, às vezes, zoneamento setorial, como se nota nos prismas da Fotomicrografia 5 (item 2.2.1). A metade de um dos prismas é de cor marrom e contém 1% de TiO_2 e 4,5% de MnO, enquanto que a outra metade apresenta cor verde intenso e teor médio de TiO_2 de 2,7% além de aproximadamente 3% de MnO (Tabela 48, colunas 4 e 5, respectivamente).

Em termos gerais, todos os piroxênios dessas rochas são muito pobres em Si e Al, disso resultando que as posições tetraédricas devem ser completadas com Fe^{3+} . No cálculo de moléculas forma-se $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$ ou NATFE , dependendo do teor de Ti.

Tabela 47

Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos ocidentais com eudialita

	389	N verde intenso	512 B verde médio	B amarela	N 513	B	N 514	B	N verde	519 B verde médio	B verde mē dio claro
SiO ₂	50,6	50,0	51,0	51,6	50,5	50,6	51,0	51,1	50,6	51,4	50,9
TiO ₂	1,21	0,50	1,78	2,38	0,75	1,71	1,51	1,30	0,61	1,19	1,70
Al ₂ O ₃	1,00	0,65	0,59	0,63	0,59	0,57	0,71	0,75	0,70	0,62	0,59
Fe ₂ O ₃	28,8	19,8	25,4	24,4	21,4	25,6	23,1	29,3	14,9	22,9	27,0
FeO		9,59	5,71	5,49	8,26	5,75	5,20	1,39	13,4	8,83	4,28
MnO	0,89	1,60	1,40	1,73	1,38	1,12	1,41	1,36	1,28	1,25	1,39
MgO	1,15	1,17	0,46	0,53	0,51	0,55	1,23	0,84	1,13	0,48	0,54
CaO	4,36	9,94	3,08	1,39	7,17	4,33	6,43	3,37	9,80	3,49	2,98
Na ₂ O	11,30	7,43	10,98	11,79	9,05	10,55	9,80	11,5	7,0	10,3	11,3
ZrO ₂	n.d.	0,23	0,06	0,04	0,34	0,16	0,12	0,21	0,22	0,25	0,06
Total	99,31	100,91	100,46	99,98	99,95	100,94	100,51	101,12	99,64	100,71	100,74
FeO	25,9	27,4	28,6	27,5	27,5	28,8	26,0	27,7	26,8	29,4	28,6
Fórmula estrutural											
Si	1,955	1,959	1,974	1,995	1,985	1,958	1,969	1,955	2,004	1,998	1,964
Al ^{IV}	0,045	0,030	0,026	0,005	0,015	0,026	0,031	0,034		0,002	0,027
Fe ³⁺		0,011				0,016		0,011			0,009
Al ^{VI}			0,001	0,024	0,012		0,001		0,033	0,026	
Ti	0,035	0,015	0,052	0,069	0,022	0,050	0,044	0,037	0,018	0,035	0,049
Fe ³⁺	0,836	0,572	0,740	0,710	0,634	0,728	0,672	0,831	0,444	0,670	0,773
Fe ²⁺		0,314	0,185	0,178	0,272	0,186	0,168	0,044	0,444	0,287	0,138
Mn	0,029	0,054	0,046	0,057	0,046	0,037	0,046	0,044	0,043	0,041	0,045
Mg	0,066	0,068	0,027	0,031	0,030	0,032	0,071	0,048	0,067	0,028	0,031
Ca	0,180	0,417	0,128	0,058	0,302	0,180	0,266	0,138	0,416	0,145	0,125
Na	0,846	0,564	0,825	0,883	0,690	0,791	0,734	0,853	0,538	0,775	0,843
Moléculas											
Mg	7,0	6,8	2,5	2,7	2,9	3,0	7,0	4,9	6,1	2,5	2,9
Fe ²⁺ +Mn	3,1	36,7	21,3	20,4	30,6	21,3	21,0	8,9	44,6	29,0	17,4
Na	89,9	56,5	76,2	76,9	66,5	75,7	72,0	86,2	49,3	68,5	79,7
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts		1,1						0,8			
Jd				2,4	1,2		0,2		3,3	2,6	
Ac	84,0	55,9	74,2	71,2	63,6	72,8	67,2	82,0	44,9	67,2	77,6
NATAL	1,0	0,4	2,6	0,5	1,5	2,6	3,1	3,4		0,2	2,7
NATFE						1,6		0,3			0,9
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT			4,6	11,5	1,2	1,4	2,0		3,3	6,0	2,2
Mg-NAT			0,6	1,4	0,2	0,2	0,6		0,4	0,6	0,4
CaTi-Ts	2,5	1,1									
CaFe ³⁺ -Ts											
Di	6,6	6,2	1,3	0,7	2,6	2,3	6,6	4,6	2,1	1,1	1,8
Hd	2,9	33,3	11,6	5,1	27,8	15,7	20,0	8,3	39,9	13,3	10,6
En		0,3	0,5	0,8	0,1	0,4	0,1	0,2	2,2	0,7	0,5
Fs		1,7	4,6	6,4	1,8	3,0	0,2	0,4	3,9	8,3	3,3
Wo	3,0										
Classificação	eg	eg-aug	eg-aug titan	eg titan	eg-aug	eg-aug titan	eg-aug titan	eg	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan

Tabela 47 (continuação)

	522			531			534	
	N	Z	B	N	B	F	S	S
	verde		amarela		amarela		verde intenso	verde médio
SiO ₂	51,2	50,8	51,5	50,4	51,4	50,7	50,9	50,8
TiO ₂	1,07	3,44	4,99	2,19	2,60	2,85	1,25	2,67
Al ₂ O ₃	0,87	0,85	0,59	0,60	0,56	0,81	0,68	0,72
Fe ₂ O ₃	18,1	14,3	20,6	23,7	22,9	25,4	22,5	22,2
FeO	10,8	12,9	4,63	7,10	8,84	5,72	6,74	5,31
MnO	1,22	1,86	3,55	1,40	2,20	1,71	1,36	1,55
MgO	1,14	0,97	0,64	0,18	0,03	0,06	1,00	0,96
CaO	6,54	6,03	2,28	4,69	0,77	0,55	5,31	2,88
Na ₂ O	8,74	8,63	11,7	10,1	10,0	12,0	9,77	11,0
ZrO ₂	0,16	0,12	0,16	0,35	0,04	0,04	0,35	0,24
Total	99,84	99,90	100,64	100,71	99,34	99,84	99,86	98,33
FeO	27,1	25,8	23,1	28,4	29,5	28,6	27,0	25,3
Fórmula estrutural								
Si	2,004	1,992	1,976	1,962	1,998	1,971	1,987	1,993
Al ^{IV}		0,008	0,024	0,028	0,002	0,029	0,013	0,007
Fe ³⁺				0,010				
Al ^{VI}	0,040	0,031	0,003		0,024	0,008	0,018	0,026
Ti	0,032	0,101	0,144	0,064	0,076	0,083	0,037	0,079
Fe ³⁺	0,532	0,422	0,594	0,684	0,670	0,744	0,660	0,663
Fe ²⁺	0,355	0,422	0,149	0,231	0,287	0,186	0,220	0,166
Mn	0,041	0,062	0,115	0,046	0,072	0,056	0,045	0,052
Mg	0,067	0,057	0,037	0,010	0,002	0,004	0,058	0,056
Ca	0,275	0,253	0,094	0,196	0,032	0,023	0,222	0,121
Na	0,664	0,656	0,867	0,765	0,831	0,902	0,740	0,835
Mg	5,9	4,7	3,1	1,0	0,1	0,3	5,5	5,1
Fe ²⁺ +Mn	35,1	40,5	22,6	26,3	30,2	21,1	24,9	19,6
Na	59,0	54,8	74,3	72,7	69,7	78,6	69,6	75,3
Moléculas								
Ca2Fe ³⁺ -Ts								
Jd	4,0	3,1	0,3		2,3	0,8	1,8	2,6
Ac	53,8	42,3	59,5	68,2	66,8	74,7	66,1	66,1
NATAL		0,8	2,4	2,8	0,3	2,9	1,3	0,7
NATFE				1,1				
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT	5,5	16,7	21,0	4,8	14,6	10,7	4,0	11,4
Mg-NAT	1,0	2,0	3,0	0,2		0,2	0,08	3,0
CaTi-Ts								
CaFe ³⁺ -Ts								
Di	4,0	2,6	1,2	0,7			4,0	2,4
Hd	23,8	22,8	8,2	18,9	3,2	2,3	18,2	9,7
En	1,1	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,7	0,9
Fs	6,8	8,7	3,9	3,2	12,7	8,3	3,1	3,2
Wo								
Classificação	eg-aug	Ti eg-aug	Ti-Mn eg	eg-aug titan	eg-aug titan	eg titan	eg-aug	eg-aug titan

Tabela 48
Composição química de piroxênios dos pseudoleucita nefelina sienitos

		482-E			482-EE			539
	relictos	Z amarelo- marrom	R verde claro	S marrom	S verde médio	SB verde médio	SB verde claro	
SiO ₂	49,2	51,6	50,9	50,9	50,8	50,2	50,6	50,3
TiO ₂	0,37	2,26	1,73	1,05	2,70	2,50	3,62	1,90
Al ₂ O ₃	0,78	0,37	0,53	0,49	0,49	0,60	0,57	0,33
Fe ₂ O ₃	15,4	28,4	30,6	26,4	24,5	29,8	29,6	30,6
FeO	3,46	1,35	1,45	2,64	3,88		1,40	1,45
MnO	2,58	2,22	0,99	4,53	2,92	1,68	0,74	0,98
MgO	7,68	0,51	0,18	0,32	0,52	1,52	0,17	0,33
CaO	15,9	1,72	0,77	3,71	3,01	2,76	0,53	2,14
Na ₂ O	4,24	12,2	12,8	10,6	11,1	11,8	13,1	12,0
ZrO ₂	0,08	0,04	0,02	0,15	0,26	0,10	0,32	0,05
Total	99,69	100,67	99,97	100,79	100,18	100,96	100,65	100,08
FeO	17,3	26,9	29,0	27,4	25,9	26,8	28,0	29,0
				Fórmula estrutural				
Si	1,900	1,975	1,965	1,973	1,971	1,919	1,943	1,947
Al ^{IV}	0,035	0,017	0,024	0,022	0,022	0,027	0,026	0,015
Fe ³⁺	0,064	0,008	0,011	0,005	0,007	0,054	0,031	0,038
Al ^{VI}								
Ti	0,011	0,065	0,050	0,031	0,079	0,072	0,105	0,055
Fe ³⁺	0,382	0,810	0,878	0,765	0,708	0,804	0,822	0,853
Fe ²⁺	0,112	0,043	0,047	0,086	0,126		0,045	0,047
Mn	0,084	0,072	0,032	0,149	0,096	0,054	0,024	0,032
Mg	0,442	0,029	0,010	0,019	0,030	0,087	0,010	0,019
Ca	0,658	0,071	0,032	0,154	0,125	0,113	0,022	0,089
Na	0,318	0,906	0,955	0,796	0,832	0,874	0,971	0,900
				Moléculas				
Mg	46,3	2,8	1,0	1,8	2,8	8,5	0,9	1,9
Fe ²⁺ +Mn	20,5	11,0	7,6	22,3	20,5	5,4	6,6	7,9
Na	33,2	86,2	91,4	75,9	76,7	86,1	92,5	90,2
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts	6,5					0,9		
Jd								
Ac	31,7	80,8	88,2	76,3	70,7	79,3	82,1	85,1
NATAL		1,7	2,4	2,2	2,2	2,7	2,6	1,5
NATFE		0,8	1,1	0,5	0,7	4,5	3,1	3,8
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT		6,4	3,0	0,8	8,8		8,4	0,4
Mg-NAT		1,6			1,2		1,2	
CaTi-Ts	1,1							
CaFe ³⁺ -Ts								
Di	41,4	1,4	0,4	1,3	2,1	7,0	0,3	1,8
Hd	16,5	5,7	2,8	14,1	10,4	4,3	1,9	7,1
En	1,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8		
Fs	1,5	1,3	1,8	4,5	3,7	0,5	0,4	0,3
Wo								
Classificação	eg-aug	eg titan	eg titan	Mn eg-aug	eg-aug titan	eg titan	Ti-eg	eg titan

Figura 45 - Diagramas Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na de piroxênios de:
a- pseudoleucita nefelina sienitos; b- nefelina sienitos com biotita do Serrote;
c- nefelina sienitos cinzas do Serrote. Simbologia e referências iguais às da Fig. 41; in
clui também manganês egirina-augita (□).

7. Nefelina sienitos cinzas do Serrote e nefelina sienitos com biotita do Serrote. Os piroxênios presentes formam pequenos prismas e ocorrem comumente agrupados. A variação química entre centro e borda de grãos é pouco marcante (Tabela 49, Figs. 45 b,c). São relativamente pobres em Ti e somente algumas bordas de egirina titanífera aparecem nos nefelina sienitos com biotita. A composição química, expressa em função de Mg, $\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$ e Na, é semelhante àquela representada pelas moléculas de $\text{Di}_{18}\text{Hd}_{12}\text{Ac}_{70}$ nos núcleos até $\text{Di}_4\text{Hd}_8\text{Ac}_{88}$ nas bordas. Em termos gerais, caracterizam-se por conterem teores relativamente baixos de Si e Al, com a conseqüente ausência de Jd e presença de $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$. O teor de Mg é relativamente elevado.

8. Nefelina sienitos híbridos. Os piroxênios deste corpo apresentam zonalidade contínua e um amplo intervalo composicional, que evolui em geral de soda-augita no centro de muitos cristais até egirina e titânio egirina nas bordas e fibras tardias intersticiais (Tabela 50). A Fig. 46 mostra no diagrama ternário Mg-($\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$)-Na o extenso campo composicional desses minerais. Por outro lado, a Fig. 47 correlaciona essas variações em função do parâmetro Na-Mg, proposto por Stephenson (1972) como índice de diferenciação de piroxênios alcalinos. Tendências que duplicam inteiramente as observadas no conjunto de amostras dos nefelina sienitos híbridos encontram-se representadas em alguns monocristais zonados. O quimismo de um desses cristais (am.30) consta da Tabela 51 e acha-se projetado no diagrama da Fig. 46b. Detalhes das variações químicas obtidas pelo método do "step scanning" (ver Apêndice) são fornecidos nas Figs. 48 e 49, esta última em função do parâmetro Na-Mg.

Observa-se que a mudança composicional mostrada nos diagramas de variação, tanto binários, como ternários (Figs. 46, 47 e 49) é extremamente ampla e contínua. É possível documentar, com grande número de dados, as variações presentes nos

Tabela 49
Composição química de piroxênios de nefelina sienitos do Serrote
Cinza Com biotita

	178		314		327	
	N	B	N	B amarela	N	B
SiO ₂	50,1	51,1	50,4	51,5	50,0	50,9
TiO ₂	1,03	1,04	0,75	2,24	0,70	0,95
Al ₂ O ₃	0,62	0,54	0,68	0,58	1,19	0,79
Fe ₂ O ₃	24,6	30,5	24,8	27,4	27,1	29,7
FeO	2,46		3,94	1,30	2,71	1,41
MnO	1,31	1,40	1,48	2,02	1,18	0,98
MgO	3,36	1,28	2,10	1,10	1,21	0,80
CaO	7,53	2,46	6,95	2,25	5,48	2,81
Na ₂ O	9,00	12,0	9,18	11,9	10,4	11,8
ZrO ₂	0,30	0,30	0,25	0,15	n.d.	n.d.
Total	100,31	100,62	100,53	100,44	99,97	100,14
FeO	24,6	27,4	26,3	26,0	27,1	28,1
Fórmula estrutural						
Si	1,932	1,959	1,949	1,972	1,939	1,960
Al ^{IV}	0,028	0,024	0,031	0,026	0,054	0,036
Fe ³⁺	0,040	0,017	0,020	0,002	0,007	0,004
Al ^{VI}						
Ti	0,030	0,030	0,022	0,065	0,021	0,028
Fe ³⁺	0,675	0,863	0,702	0,790	0,783	0,858
Fe ²⁺	0,079		0,127	0,042	0,088	0,045
Mn	0,043	0,045	0,049	0,066	0,039	0,032
Mg	0,193	0,073	0,121	0,063	0,070	0,046
Ca	0,311	0,101	0,288	0,092	0,228	0,116
Na	0,673	0,892	0,688	0,883	0,782	0,878
Mg	19,5	7,2	17,8	6,0	7,2	4,6
Fe ²⁺ +Mn	12,4	4,5	12,3	10,2	12,9	7,7
Na	68,1	88,3	69,9	83,8	79,9	87,7
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts	3,8	1,1	Moléculas 2,0		0,7	0,4
Jd						
Ac	63,7	85,5	67,7	79,5	77,4	85,0
NATAL	2,8	2,4	0,8	2,6		2,2
NATFE	0,2	0,6		0,2		
(Fe ²⁺ Mn)-NAT				4,9		
Mg-NAT				1,4		
CaTi-Ts			1,4		2,1	0,6
CaFe ³⁺ -Ts						
Di	16,8	5,5	11,1	3,4	7,0	4,2
Hd	10,6	3,5	16,1	5,9	12,7	7,3
En	1,3	0,9	0,4	0,8		0,1
Fs	0,8	0,5	0,5	1,3		0,2
Wo					0,1	
Classificação	eg-aug	eg	eg-aug	eg titan	eg-aug	eg

Tabela 50
Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos híbridos

	31			240			37		234		
	N	Z	F	N	Z	B	N	F	N	B	B
SiO ₂	48,9	50,8	50,9	49,6	50,4	51,2	48,7	50,6	49,2	50,3	51,1
TiO ₂	1,84	2,10	2,14	1,62	0,78	3,72	1,50	2,33	1,44	3,58	2,71
Al ₂ O ₃	3,70	1,11	0,84	3,13	1,33	1,15	2,90	1,00	2,70	1,02	1,04
Fe ₂ O ₃	5,14	22,7	26,9	5,25	8,96	21,2	5,75	29,4	5,73	21,2	24,4
FeO	6,94	5,12	2,68	7,09	12,1	6,37	7,76		7,74	4,76	5,50
MnO	0,68	0,91	0,86	0,84	1,82	0,97	1,21	1,11	0,85	0,91	0,68
MgO	10,9	1,56	0,68	10,7	5,25	1,20	10,3	0,48	10,2	1,61	0,51
CaO	19,8	5,37	3,03	20,1	16,3	4,42	19,7	2,76	19,5	5,52	1,98
Na ₂ O	1,59	10,3	11,8	1,63	3,49	10,6	1,52	12,3	1,62	10,1	11,7
ZrO ₂	0,08	0,38	0,28	n.d.	n.d.	n.d.	0,08	0,36	n.d.	n.d.	n.d.
Total	99,57	100,35	100,11	99,96	100,43	100,83	99,42	100,34	98,98	99,00	99,62
FeO	11,6	25,6	26,9	11,8	20,2	25,5	12,9	26,4	12,9	23,8	27,5
Fórmula estrutural											
Si	1,853	1,960	1,964	1,874	1,954	1,957	1,865	1,944	1,884	1,952	1,977
Al ^{IV}	0,147	0,040	0,036	0,126	0,046	0,043	0,131	0,045	0,116	0,047	0,023
Fe ³⁺							0,004	0,011		0,001	
Al ^{VI}	0,019	0,011	0,002	0,013	0,014	0,009			0,006		0,025
Ti	0,053	0,061	0,062	0,046	0,023	0,107	0,043	0,067	0,042	0,105	0,079
Fe ³⁺	0,147	0,661	0,780	0,149	0,261	0,611	0,162	0,838	0,165	0,618	0,712
Fe ²⁺	0,220	0,165	0,087	0,224	0,392	0,204	0,249		0,248	0,155	0,178
Mn	0,022	0,030	0,028	0,027	0,060	0,031	0,039	0,036	0,028	0,030	0,022
Mg	0,616	0,090	0,039	0,605	0,304	0,068	0,586	0,028	0,583	0,093	0,029
Ca	0,804	0,222	0,125	0,812	0,679	0,181	0,808	0,114	0,800	0,230	0,082
Na	0,117	0,769	0,883	0,119	0,263	0,786	0,113	0,918	0,120	0,762	0,874
Moléculas											
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts							0,4				
Jd	1,9	1,1	0,2	1,3	1,4	0,9			0,6		2,5
Ac	9,8	66,2	78,3	10,6	25,1	61,0	11,3	83,8	11,6	61,5	71,5
NATAL		4,0	3,6			4,3		4,5		4,7	2,3
NATFE								1,1		0,1	
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT		3,0	3,8			10,0		1,2		7,5	9,9
Mg-NAT		1,2	1,4			2,8		1,0		3,8	1,4
CaTi-Ts	5,3			4,6	2,3		4,3		4,3		
CaFe ³⁺ -Ts	4,9			4,3			4,5		3,2		
Di	50,5	7,1	3,1	51,4	26,4	4,1	48,0	2,3	49,0	7,3	0,7
Hd	19,7	15,2	9,5	21,1	39,8	14,0	23,6	3,0	24,5	14,6	7,5
En	5,3	0,7		4,6	2,1	0,7	5,3		5,1		0,4
Fs	2,6	1,5	0,1	2,1	2,9	2,2	2,6		1,7		3,8
Wo								3,1		0,5	
Classificação	soda -aug	eg-aug titan	eg titan	soda -aug	eg aug	Ti eg-aug	soda -aug	eg titan	soda -aug	Ti eg-aug	eg titan

Tabela 50 (continuação)

	236		238			452					
	N	Z	N	B verde azulado	B laranja	N	Z	B azul	B laranja	B incolor	F
SiO ₂	50,2	49,7	50,1	51,5	50,9	49,0	50,1	50,2	51,2	51,5	50,7
TiO ₂	1,34	0,70	1,26	4,02	3,17	0,84	1,38	4,96	3,00	0,29	4,08
Al ₂ O ₃	2,64	1,37	2,45	1,28	0,95	1,10	0,73	0,93	0,65	0,87	0,73
Fe ₂ O ₃	3,05	8,82	3,28	21,2	25,3	7,94	20,8	21,8	28,6	32,0	29,6
FeO	11,0	11,9	11,8	6,8		10,7	6,23	4,89			
MnO	0,94	1,46	1,16	0,99	2,98	2,00	1,79	1,20	2,41	1,00	1,21
MgO	8,57	5,28	8,04	0,54	0,47	6,90	1,74	0,50	0,18	0,17	0,33
CaO	19,9	17,5	19,2	3,13	2,45	18,7	8,24	3,15	0,35	0,69	0,79
Na ₂ O	1,65	3,17	1,90	11,3	12,4	2,10	8,53	11,5	13,1	13,0	13,1
ZrO ₂	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,09	0,39	0,40	0,03	0,03	0,12
Total	99,29	99,90	99,19	100,76	98,62	99,37	99,93	99,53	99,52	99,55	100,66
FeO	13,7	19,8	14,7	25,9	22,8	17,9	24,9	24,5	25,7	28,8	26,6
Fórmula estrutural											
Si	1,928	1,941	1,934	1,967	1,974	1,919	1,959	1,950	1,973	1,986	1,934
Al ^{IV}	0,072	0,059	0,066	0,033	0,026	0,051	0,034	0,043	0,027	0,014	0,033
Fe ³⁺						0,030	0,008	0,008			0,033
Al ^{VI}	0,048	0,004	0,045	0,025	0,018				0,003	0,026	
Ti	0,039	0,021	0,037	0,116	0,092	0,025	0,041	0,145	0,087	0,008	0,117
Fe ³⁺	0,088	0,259	0,095	0,621	0,739	0,204	0,604	0,628	0,828	0,930	0,817
Fe ²⁺	0,353	0,388	0,381	0,207		0,351	0,204	0,159			
Mn	0,031	0,048	0,038	0,032	0,098	0,066	0,059	0,040	0,079	0,033	0,039
Mg	0,491	0,307	0,463	0,031	0,027	0,403	0,101	0,029	0,010	0,010	0,019
Ca	0,819	0,731	0,796	0,128	0,102	0,785	0,345	0,131	0,015	0,029	0,032
Na	0,123	0,240	0,142	0,837	0,932	0,160	0,647	0,868	0,979	0,972	0,966
Moléculas											
Ca2Fe ³⁺ -Ts						3,0					
Jd	4,0	0,4	4,6	2,5	1,8				0,3	2,5	
Ac	8,9	23,7	9,5	61,9	74,2	16,2	60,4	62,9	82,7	93,1	81,3
NATAL				3,3	2,6		3,4	4,3	2,7	0,8	3,3
NATFE							0,7	0,8			3,3
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT				14,5	10,5			16,4	10,6		6,8
Mg-NAT				2,0	2,8			2,4	1,4		3,4
CaTi-Ts	3,9	2,1	3,7			2,5					
CaFe ³⁺ -Ts		1,7									
Di	44,0	29,0	38,1	1,4	1,3	36,3	9,6	1,6	0,2	0,6	0,2
Hd	34,4	40,6	37,9	11,4	4,6	37,4	24,9	11,5	1,3	2,3	0,5
En	2,7	0,9	4,1	0,4		2,2	0,3		0,1	0,2	
Fs	2,1	1,6	2,1	2,6		2,4	0,7	0,1	0,7	0,5	
Wo					2,2						1,2
Classificação	soda -aug	eg-aug	soda -aug	Ti eg-aug	eg titan	eg-aug	eg-aug titan	Ti-eg	eg titan	eg	Ti-eg

Figura 46 - Diagrama Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na de piroxênios de nefelina sienitos híbridos.
a- Dados das várias amostras da Tabela 50. Simbologia e referências iguais às das Figs. 41 e 42; inclui também soda augita (◇). b- Monocrystal da amostra 30, analisado pelo método de "step scanning" (Tabela 51). Núcleo (●), zona intermediária (◐) e borda (○).

Figura 47 - Variação dos elementos químicos nos piroxênios de nefelina sienitos híbridos, em função do índice de diferenciação Na-Mg (Stephenson, 1972).

Os dados representam átomos por fórmula, e a simbologia é a mesma da Fig. 46.

Tabela 51 (continuação)

SiO ₂	50,0	49,7	49,5	50,3	50,3	50,8	51,1	51,3	50,9	50,9
TiO ₂	0,66	0,62	0,77	1,70	3,00	3,99	4,31	2,41	3,90	4,01
Al ₂ O ₃	1,31	1,18	0,76	0,87	0,80	0,89	0,84	0,83	0,95	0,73
Fe ₂ O ₃	7,40	10,5	17,5	21,7	22,2	23,6	22,30	27,0	24,6	22,6
FeO	9,99	9,47	6,73	4,87	5,00	3,74	5,01	2,69	3,90	5,08
MnO	1,78	1,67	1,99	1,42	1,29	1,32	1,11	0,83	1,12	1,00
MgO	7,50	6,61	4,09	2,23	1,54	1,31	0,79	0,69	0,68	0,71
CaO	17,9	17,0	12,4	7,10	5,05	4,02	2,54	2,09	1,97	2,10
Na ₂ O	2,45	3,21	6,09	9,20	10,30	11,20	11,80	12,00	12,00	11,90
ZrO ₂	0,05	0,06	0,13	0,29	0,32	0,26	0,28	0,34	0,30	0,36
Total	99,04	100,02	99,96	99,68	99,80	101,13	100,08	100,18	100,32	99,39
FeO	16,7	18,9	22,4	24,4	25,0	24,9	25,1	27,0	26,0	25,4
Fórmula estrutural										
Si	1,944	1,926	1,930	1,957	1,952	1,940	1,968	1,974	1,957	1,976
Al ^{IV}	0,056	0,054	0,035	0,040	0,037	0,040	0,032	0,026	0,043	0,024
Fe ³⁺		0,020	0,035	0,003	0,011	0,020				
Al ^{VI}	0,005						0,006	0,012		0,009
Ti	0,019	0,018	0,023	0,050	0,088	0,115	0,125	0,070	0,113	0,117
Fe ³⁺	0,217	0,287	0,478	0,631	0,639	0,656	0,646	0,780	0,712	0,660
Fe ²⁺	0,325	0,307	0,220	0,158	0,163	0,119	0,161	0,087	0,126	0,165
Mn	0,059	0,055	0,066	0,047	0,043	0,043	0,036	0,027	0,037	0,033
Mg	0,435	0,382	0,258	0,129	0,089	0,075	0,045	0,040	0,039	0,041
Ca	0,747	0,705	0,519	0,296	0,210	0,164	0,105	0,086	0,081	0,087
Na	0,185	0,241	0,461	0,694	0,772	0,831	0,882	0,895	0,894	0,895
Mg	43,4	38,8	24,2	12,6	8,4	7,0	4,0	3,8	3,6	3,6
Fe ²⁺ +Mn	38,2	36,7	29,0	20,0	19,2	15,2	17,6	10,8	14,8	17,5
Na	18,4	24,5	46,8	67,4	72,4	77,8	78,4	85,4	81,6	78,9
Moléculas										
Ca2Fe ³⁺ -Ts		2,0	3,5							
Jd	0,5						0,6	1,2		0,9
Ac	18,2	24,3	44,2	63,1	63,9	65,7	64,8	77,7	71,1	66,3
NATAL			1,8	4,0	3,7	4,0	3,2	2,6	4,3	2,4
NATFE				0,3	1,1	2,0				
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT				0,8	5,6	7,6	15,3	6,5	11,4	15,5
Mg-NAT				0,6	2,4	3,4	3,4	2,2	2,6	3,2
CaTi-Ts	1,9	1,8	0,5							
CaFe ³⁺ -Ts	1,8	1,8								
Di	38,3	33,5	21,7	11,4	6,3	5,2	2,0	2,3	1,6	1,5
Hd	33,7	31,8	26,0	18,2	14,7	11,2	8,5	6,3	6,5	7,2
En	3,0	2,5	1,0	0,6	0,7	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5
Fs	2,6	2,3	1,3	1,0	1,6	0,6	1,8	0,9	2,0	2,5
Wo										
Classificação	eg-aug	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan	eg-aug titan	Ti eg-aug	Ti-eg	eg titan	Ti-eg	Ti-eg

Figura 48 - Mudanças no quimismo de um monocristal de piroxênio de nefelina sienito híbrido (am. 30), em função da distância do seu núcleo à borda. Estudo feito com "step scanner", adotando-se equidistância de 20 μ .

Figura 49 - Variação dos elementos químicos no monocristal de piroxênio de nefelina sienito híbrido (am.30), em função do Índice de diferenciação Na-Mg (Stephenson, 1972). Os dados representam átomos por fórmula, e a simbologia é a mesma da Fig. 46a.

dois extremos, o da soda-augita e o da titânio egirina. Dados para composições intermediárias (entre 3,50% e 8,50% de Na_2O) são encontrados em zonas extremamente finas e de rápidas mudanças composicionais (ver Fig. 48), facilmente reconhecidas ao microscópio por suas propriedades ópticas. Os valores obtidos por "step scanning" no cristal da amostra 30 (Fig. 48) indicam que a modificação química é contínua, porém rápida, não se configurando portanto a existência de um "intervalo composicional" (*compositional gap*). Essas variações não são detectadas nas análises pontuais rotineiras, devido ao maior desenvolvimento dos núcleos e das bordas (Fotomicrografia 6, item 2.2.1), respondendo por uma maior densidade de pontos nas Figs. 46a e 47. Comparando o quimismo do monocristal da amostra 30 com o de outros cristais dos nefelina sienitos híbridos, verifica-se, para o primeiro caso, um conteúdo maior de Mg (Fig. 46). Na amostra 30, teve lugar a cristalização de biotita (ausente nas outras amostras), conjuntamente com zonas mais externas dos piroxênios, provavelmente absorvendo parte de Fe^{2+} - Fe^{3+} do sistema e, portanto, enriquecendo seletivamente esses minerais em Mg. A evolução química dos piroxênios dos nefelina sienitos híbridos é mostrada nos diagramas das Figs. 47 e 49. Observa-se nas soda-augitas um rápido aumento de Si e diminuição de Al, mantendo-se o Ca mais ou menos uniforme, condicionados apenas a pequenas mudanças no parâmetro Na-Mg. Algumas variações nos teores de Fe^{2+} e Fe^{3+} são visíveis nas soda-augitas da Fig. 47; contudo, os dados do monocristal da amostra 30 (Fig. 49) demonstram que a relação $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ é praticamente constante, permanecendo em torno de 0,6. Aumentos maiores de Na, já nas zonas das egirina-augitas e egirinas, processam-se a teores mais ou menos constantes de Si e Al. O teor de Ti diminui das soda-augitas para as egirina-augitas, para, em seguida, crescer bruscamente até as bordas egirínicas (Fig. 47); nestas, a quantidade do elemento, conquanto irregular, apresenta-se elevada. O Zr exhibe comportamento semelhante ao do Ti. O Mn ocorre em concentrações mais elevadas nas bordas de alguns grãos de egirina; por exemplo, nas amostras 238, que pertence ao fácies de borda, e 452, que é uma rocha de fácies pegmatóide formando veios em tinguai

to (ver Tabela 50). Em geral o perfil do Mn opõe-se ao do Ti, alcançando e mantendo os valores mais elevados nas partes mais externas dos núcleos de soda-augita e nas egirina-augitas com menos Na.

9. Nefelina sienitos finos do Anel Norte. Os piroxênios exibem a mesma variação composicional presente nos nefelina sienitos híbridos. Possuem núcleos de soda-augita, que passam gradativamente para egirinas titaníferas nas bordas (Tabela 52, Fig. 50a). Esses núcleos, no entanto, são pequenos e encontram-se em geral reabsorvidos, inexistindo mesmo nos piroxênios de algumas variedades. Assim, por exemplo, na amostra 548, os centros dos cristais são de egirina-augita, com aproximadamente 10% de CaO e 8% de Na₂O. As Figs. 50a e 51 representam as variações nesses piroxênios, semelhantes em termos de tendência evolutiva aos piroxênios dos nefelina sienitos híbridos.

10. Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote. Os piroxênios dessas rochas são egirina-augitas pobres em Ti e com teores moderados de Mn. As quantidades de Si e Al são suficientes para formar a molécula Jd (Tabela 53, Fig. 50b). As modificações composicionais entre centros e bordas de cristais são pequenas podendo ser representadas em função das moléculas de Di, Hd e Ac. Os piroxênios variam de Di₂₅Hd₄₇Ac₂₈ até Di₁₄Hd₄₂Ac₄₄. Opticamente, identificam-se os núcleos pela sua cor levemente esverdeada e pleocroísmo fraco; contudo, a mudança de composição dos centros às bordas é gradativa. Somente alguns cristais apresentam bordas descontínuas de egirina-augita titanífera com teores de Na relativamente elevados. Essas bordas possuem composição semelhante às fibras dos agregados intersticiais.

11. Nefelina sienitos finos ocidentais. Nestas rochas os piroxênios ocorrem como cristais prismáticos poiquilíticos (Fotomicrografia 7, item 2.2.1) que passam de egirina-augita nos núcleos até egirina-augita titanífera (com somente 0,049 átomos de Ti) nas bordas (Tabela 53, Fig. 50c). Numa única seção delgada observaram-se dois cristais com núcleos augíticos (ver

Tabela 52

Composição química de piroxênios dos nefelina sienitos finos do Anel Norte

	540			541			548		
	N	B	B	N	B	B	N	B	F
SiO ₂	49,1	49,8	50,3	48,1	50,5	51,4	50,5	51,6	51,3
TiO ₂	0,77	0,51	2,38	1,10	1,38	2,20	0,84	5,04	1,90
Al ₂ O ₃	2,58	1,31	1,08	3,02	0,80	0,84	0,74	0,65	0,84
Fe ₂ O ₃	6,52	22,6	28,0	7,34	30,2	30,8	18,4	23,7	30,6
FeO	5,87	5,09	1,32	9,91			7,08	3,76	1,45
MnO	1,52	2,23	2,27	1,20	1,11	0,35	1,19	0,14	1,0
MgO	11,0	1,94	0,20	8,21	0,76	0,18	2,30	0,23	0,10
CaO	20,4	8,07	0,98	20,0	3,63	0,21	9,96	1,47	0,55
Na ₂ O	1,32	8,47	12,37	1,50	11,64	13,4	7,74	12,9	12,9
ZrO ₂	0,07	0,10	0,60	0,05	0,54	0,26	0,16	0,03	0,04
Total	99,15	100,12	99,50	100,43	100,56	99,64	98,91	99,52	100,68
FeO	11,7	25,5	26,5	16,52	27,2	27,7	23,6	25,1	29,0
Fórmula estrutural									
Si	1,877	1,939	1,959	1,851	1,945	1,975	1,982	1,981	1,964
Al ^{IV}	0,116	0,060	0,041	0,137	0,036	0,025	0,018	0,019	0,036
Fe ³⁺	0,007	0,001		0,012	0,019				
Al ^{VI}			0,009			0,013	0,016	0,010	0,002
Ti	0,022	0,015	0,070	0,032	0,040	0,064	0,025	0,146	0,055
Fe ³⁺	0,181	0,662	0,820	0,201	0,855	0,891	0,543	0,684	0,881
Fe ²⁺	0,188	0,166	0,043	0,319			0,233	0,121	0,046
Mn	0,049	0,074	0,075	0,039	0,036	0,011	0,040	0,005	0,033
Mg	0,625	0,113	0,012	0,471	0,044	0,010	0,135	0,013	0,006
Ca	0,836	0,337	0,041	0,823	0,150	0,009	0,419	0,061	0,023
Na	0,098	0,639	0,934	0,112	0,869	0,998	0,590	0,960	0,955
Moléculas									
Mg	65,1	11,4	1,1	50,0	4,6	1,0	13,5	1,2	0,5
Fe ²⁺ +Mn	24,7	24,1	11,1	38,1	3,8	1,1	27,3	11,4	7,6
Na	10,2	64,5	87,8	11,9	91,6	97,9	59,2	87,4	91,9
Ca2Fe ³⁺ -Ts	0,7	0,1		1,2	1,8				
Jd			0,9			1,3	1,6	1,0	0,2
Ac	9,8	63,6	82,0	11,3	83,6	90,3	54,2	68,1	87,9
NATAL			4,1		4,0	2,5	1,8	1,9	3,6
NATFE									
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT			5,2			2,3	1,0	22,9	3,6
Mg-NAT			0,6			2,0	0,4	2,4	0,2
CaTi-Ts	2,2	1,5		3,2					
CaFe ³⁺ -Ts	7,2	2,2		7,3					
Di	53,1	9,7	0,4	39,3	4,4	0,4	13,3	0,1	0,2
Hd	20,6	20,2	3,7	31,5	3,6	0,5	26,8	1,1	2,1
En	4,8	0,8	0,3	4,0		0,4			0,2
Fs	1,6	1,9	2,8	2,2		0,3			2,0
Wo					2,6		0,9	2,5	
Classificação	soda -aug	eg-aug	eg titan	soda -aug	eg titan	eg titan	eg-aug	Ti-eg	eg titan

Figura 50 - Diagrama Mg-(Fe²⁺+Mn)-Na de piroxênios de:
a- nefelina sienitos finos do Anel Norte; b- nefelina sienitos porfiríticos do Serrote; c- nefelina sienitos finos ocidentais. Simbologia e referências iguais às das Figs. 41 e 46.

Figura 51 - Variação dos elementos químicos nos piroxênios de nefelina sienitos finos do Anel Norte, em função do índice de diferenciação Na-Mg (Stephenson, 1972). Os dados representam átomos por fórmula, e a simbologia é a mesma da Fig. 50.

Tabela 53
Composição química de piroxênios de nefelina sienitos

	finos ocidentais			porfiríticos do Serrote		
	530	530	530	358	358	358
	N	B	B	N	B	B,F
SiO ₂	50,8	51,0	51,2	49,3	49,4	50,8
TiO ₂	0,69	0,85	1,67	0,66	0,66	2,91
Al ₂ O ₃	0,94	0,88	0,76	1,75	1,16	1,06
Fe ₂ O ₃	12,9	20,6	23,4	9,35	13,5	21,4
FeO	11,6	8,0	7,0	12,6	12,2	8,26
MnO	1,60	1,40	1,00	2,55	2,36	1,14
MgO	2,58	1,57	0,59	4,44	2,75	0,27
CaO	11,7	7,78	4,16	16,2	12,5	3,26
Na ₂ O	6,32	8,40	10,40	3,43	5,21	10,6
ZrO ₂	0,18	0,22	0,22	n.d.	n.d.	n.d.
Total	99,21	100,70	100,40	100,28	99,74	99,70
FeO	23,2	26,5	28,1	21,0	24,4	27,5
Fórmula estrutural						
Si	2,000	1,978	1,984	1,931	1,952	1,978
Al ^{IV}		0,022	0,016	0,069	0,048	0,022
Fe ³⁺						
Al ^{VI}	0,044	0,018	0,019	0,012	0,006	0,027
Ti	0,020	0,025	0,049	0,019	0,020	0,085
Fe ³⁺	0,382	0,602	0,683	0,275	0,402	0,628
Fe ²⁺	0,382	0,258	0,228	0,413	0,402	0,269
Mn	0,053	0,046	0,033	0,085	0,079	0,038
Mg	0,152	0,091	0,034	0,259	0,162	0,016
Ca	0,494	0,323	0,173	0,679	0,529	0,136
Na	0,483	0,632	0,781	0,260	0,399	0,802
Mg	14,2	8,9	3,2	25,5	15,5	1,4
Fe ²⁺ +Mn	40,7	29,6	24,2	48,9	46,2	27,3
Na	45,1	61,5	72,6	25,6	38,3	71,3
Moléculas						
Ca ₂ Fe ³⁺ -Ts						
Jd	4,4	1,7	1,9	1,2	0,6	2,7
Ac	38,3	60,0	68,1	24,7	39,3	62,7
NATAL		2,5	1,6			2,2
NATFE						
(Fe ²⁺ +Mn)-NAT	3,0		5,8			12,0
Mg-NAT	1,0		0,8			0,6
CaTi-Ts				1,9	2,0	
CaFe ³⁺ -Ts				2,7	0,8	
Di	12,9	7,4	2,0	21,7	12,5	0,7
Hd	36,7	24,8	15,3	41,6	37,6	12,9
En	1,0	0,9	0,5	2,1	1,9	0,3
Fs	2,7	2,7	4,0	4,1	5,3	5,9
Wo						
Classificação	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan	eg-aug	eg-aug	eg-aug titan

item 2.2.4). A tendência evolutiva das egirina-augitas é paralela à dos nefelina sienitos porfiríticos do Serrote, com a diferença de que, além de serem mais ricos em Na, o são também em Si, bem como mais pobres em Al. Por outro lado, os líquidos finais, que deram origem aos agregados fibrosos intersticiais, mostram-se semelhantes em ambos os corpos, e diferentes em relação aos líquidos equivalentes dos nefelina sienitos híbridos.

5.6. RELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA E A COR DOS PIROXÊNIOS SÓDICOS

A característica óptica mais notável dos piroxênios sódicos é a sua cor verde, cuja intensidade diminui no sentido dos termos mais sódicos. O típico pleocroísmo é α = verde, γ = verde-amarelado, amarelo. Contudo, são comuns na literatura as referências a piroxênios sódicos, geralmente egirinas, de cores verde-azulado, azul, amarelo-marrom ou até mesmo incolor. Essas egirinas ocorrem frequentemente na forma de pequenos prismas, agregados de fibras intersticiais, e bordas de cristais de egirina-augita ou egirina, sendo portanto impossível a determinação das suas características ópticas. Tyler e King (1967) sugerem a possibilidade de que as cores diferentes dos piroxênios sódicos resultem de concentrações elevadas de elementos menores; porém, só apenas mais recentemente começaram a ser realizados trabalhos de correlação envolvendo a cor e a composição química desses minerais, face à possibilidade surgida, via microsonda eletrônica, de se obterem análises químicas completas em pequenas áreas. Assim, nos trabalhos mais modernos sobre egirinas titaníferas é feita menção à cor verde-azulada a azul desses piroxênios, cuja única característica especial reside na presença de teores relativamente elevados de Ti. Curtis e Gittins (1979) discutem as possíveis causas do pleocroísmo muito particular exibido pelos piroxênios azuis que ocorrem no Complexo Alcalino de Red Wine, Labrador. Adicionalmente, Curtis e Currie (1981) apresentam um esquema de cor dos piroxênios da região, que variam de onfacita até egirina com teores variáveis de Ti, tomando como base os teores de Ti e Na.

Nas rochas de Poços de Caldas, os piroxênios sódicos de composição normal (com teores baixos a moderados de Ti e/ou Mn) exibem as cores descritas na literatura. Cores pouco usuais encontram-se em setores de cristais com zoneamento setorial e sobretudo em piroxênios tardios, que aparecem comumente como bordas descontínuas de egirina-augita ou egirina, bem como agregados fibrosos intersticiais. Na maior parte das vezes, devido ao tamanho muito pequeno das áreas estudadas, torna-se difícil determinar o esquema pleocróico. Contudo, algumas dessas áreas, embora fortemente coloridas, carecem de pleocroísmo ou apresentam pleocroísmo muito fraco. Dadas essas dificuldades, registra-se, portanto, unicamente a cor dominante ou diferente dos vários piroxênios de Poços de Caldas. O esquema de cor é mostrado na Fig. 52b, em função dos teores de Ti e Na. Na Fig. 52c, tenta-se uma delimitação dos campos de cores. Observam-se tendências gerais semelhantes às já citadas na literatura, particularmente as variações para o verde-azulado/azul ao se aumentar o conteúdo de Ti, e a diminuição da intensidade da cor verde com o incremento em Na. Nas variedades sódicas, encontra-se a cor azul dominante só a partir de conteúdos de Ti maiores que 0,1 átomo, muito superiores aos teores citados para onfacitas de cores semelhantes (Curtis e Currie, 1981; Fig. 52a). Os piroxênios muito sódicos, pobres em Ti, aparecem com cores suaves (amarelo pálido, verde claro), ou até mesmo incolores (Figs. 52a,b) numa faixa composicional compreendida entre 0,85 e 0,98 átomo de Na, com valores máximos de Ti de até 0,07 átomo.

Citam-se na literatura dois tipos de egirina-augitas a egirinas manganesíferas de composição química semelhante, porém com cor e pleocroísmo diferentes (Bilgrami, 1956; Roy, 1971). Ambos possuem entre 1,0 e 7% de MnO, e são encontrados em rochas com paragênese manganesífera associadas a jazidas de Mn. Um dele, a *blanfordita*, exibe um esquema pleocróico com α = rosa, β = azulado roxo, γ = azul claro-azul céu, semelhante àquele encontrado nos piroxênios "*violan*" (onfacitas diopsídicas com Mn), que possivelmente devem suas cores (com predomínio de rosa e azul-roxo) à presença de Mn^{3+} e Mn^{2+} (Mottana et

Figura 52 - Mudanças na cor de piroxênios sódicos, em função dos teores de Na e Ti.

Os dados representam átomos por fórmula.

a) Esquema de Curtis e Currie (1981) para os piroxênios do Complexo Alcalino de Red Wine, Labrador. Os minerais variam de onfa_cita a egirina, com teores variáveis de Ti.

b) Dados correspondentes às egirina-augitas e egirinas de Poços de Caldas. Simbologia segundo a cor dominante: verde, passando a verde intenso, em piroxênios contendo mais de 0,6 átomo de Na, ou a verde-azulado, nas variedades portadoras de mais de 0,1 átomo de Ti (●); verde médio (◐); verde médio claro, verde claro, verde muito claro (◑); incolor a amarelo (Δ); azul (▲).

Os piroxênios ricos em Mn (aproximadamente 0,1 átomo), são identificados por uma cruz. A sua cor característica varia segundo o teor de Ti e Na, a saber: marrom, na egirina-augita da amostra 482-EE; amarelo intenso, na egirina titanífera da amostra 522; nas egirinas com mais de 0,9 átomo de Na, a cor é laranja-vermelho nas amostras 173 e 452, e laranja-marrom na amostra 238.

c) Delimitação das áreas de ocorrência de piroxênios de cor diferente, indicando-se também as mudanças de tonalidade, à exceção espécies ricas em Mn.

Figura 52

al., 1979). O segundo tipo, denominado *piroxênio manganêsífero marrom* (Roy, 1971) é uma egirina-augita portadora de pleocroísmo variando de marrom a amarelo. Cabe ressaltar que, em geral, ambos os piroxênios não coexistem nas mesmas rochas, porém, Roy (1971) menciona a presença de alguns cristais com núcleos de blanfordita e bordas de piroxênio manganêsífero marrom. Se as diferenças na cor e no pleocroísmo das egirina-augitas e egirinas manganêsíferas resultam do estado de oxidação do Mn, é provável que nos piroxênios de Poços de Caldas o Mn esteja presente inteiramente como Mn^{2+} , já que não foram reconhecidas cores róseas ou violetas. Estas correspondem a amarelo intenso a laranja-vermelho ou marrom, dependendo do teor de Ti e Na, além do fato de o pleocroísmo ser muito fraco ou mesmo ausente.

5.7. CONSIDERAÇÕES PETROLÓGICAS

Seguem-se algumas considerações petrológicas.

5.7.1. Quimismo dos piroxênios como indicador de tendências evolutivas dos nefelina sienitos

Nos maciços não alcalinos, os principais minerais félsicos são via de regra os plagioclásios, os quais, juntamente com os máficos presentes (olivinas, piroxênios e anfibólios), convertem-se, através de modificações de seu quimismo, em claros indicadores da evolução dos magmas. Surgem assim tendências de evolução dos plagioclásios que se relacionam, em termos de variabilidade química, a outras análogas apresentadas pelos piroxênios e demais minerais máficos. Por exemplo, o bandamento críptico dos complexos estratiformes (Skaergaard, Bushveld e outros) encontra correspondência tanto nos plagioclásios, como nos minerais máficos.

Nos complexos alcalinos, os minerais félsicos mais importantes são os feldspatos alcalinos e os feldspatóides,

exibindo comumente pequenas variações composicionais. A sua pequena variabilidade individual limita a relevância desses minerais como fatores identificadores de tendências magmáticas.

Os minerais máficos mostram, ao contrário, maior complexidade do ponto de vista químico e possibilitam o aparecimento de nítidas tendências evolutivas, refletindo o magma do qual cristalizaram. Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas, são os piroxênios os minerais que melhor se prestam ao reconhecimento de possíveis afinidades evolutivas.

Resumem-se abaixo as características químicas gerais dos piroxênios analisados, comparando-se os dados obtidos neste trabalho com os da literatura, vindo a seguir as interpretações petrológicas.

Tendências de evolução de piroxênios de séries sódicas

A composição dos corpos rochosos de uma região particular, projetada em diagramas Mg-Fe-Na ou equivalentes, definem uma ou várias tendências de evolução, indicando a existência ou não de consangüinidade entre os diversos tipos litológicos. A Fig. 53 reúne algumas das tendências de evolução citadas na literatura; em geral esses exemplos correspondem a piroxênios de suites com variada litologia, onde as rochas mais diferenciadas (geralmente nefelina sienitos e variedades pegmatíticas) possuem egirina-augitas muito sódicas ou egirinas, enquanto que nas menos diferenciadas (às vezes rochas mesocráticas ou melano-cráticas) encontram-se piroxênios augíticos ou soda-augitas. Assim, as suites de South Qôroq centre (Fig. 53a, curva 5; Stephen son, 1972) e de Itapirapuã (Fig. 53a, curva 2; Gomes *et al.*, 1970) exibem grandes variações litológicas, passando-se de augita sienitos e essexitos até nefelina sienitos e pegmatitos, no primeiro caso, e de melteigitos e cancrinita mariupolitos até nefelina sienitos, no segundo. Em geral, a tendência uniforme dos piroxênios fundamenta a hipótese da existência de um único magma submetido à diferenciação (por exemplo, em South Qorôq cen-

Figura 53 - Tendências de evolução de piroxênios de rochas alcalinas.

Os dados representam porcentagem de átomos.

a) Tendências apresentadas na literatura: 1 - Cantal (Auvergne, França), Varet, 1969; 2 - Itapirapuã (São Paulo, Brasil), Gomes *et al.*, 1970; 3 - Leste de Uganda, Tyler e King, 1967; 4 - Morotu, Sakhalin, Yagi, 1966; 5 - South Qôroq centre (sul da Groenlândia), Stephenson, 1972; 6 - Ilímaussaq (sul da Groenlândia), Larsen, 1976.

b) Tendências dos piroxênios de nefelina sienitos de Poços de Caldas.

1 - Nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote; 2 - Pseudoleucita nefelina sienitos (unicamente os relictos de egirina - augita); 3 - Nefelina sienitos dos corpos lujauríticos ocidental e oriental (lujauritos I e II, nefelina sienitos traquitóides I e II, chibinitos), chibinitos de Botelhos e chibinitos orientais (foram omitidos os dados dos piroxênios poiquilíticos com zoneamento setorial dos vários fácies de chibinitos); 4 - Nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte; 5 - Nefelina sienitos finos ocidentais; 6 - Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote; 7 - Nefelina sienitos ocidentais com eudialita; 8 - Nefelina sienitos com eudialita do Serrote; 9 - Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte (as linhas 8 e 9 tracejadas indicam que os piroxênios possuem zoneamento setorial).

Figura 53

tre, Stephenson, 1972).

As composições químicas dos piroxênios de Poços de Caldas estão representadas na Fig. 53b. Observa-se que os dados conformam panorama totalmente diferente daquele discutido acima e ilustrado na Fig. 53a. Em primeiro lugar, conquanto todos os piroxênios analisados provenham de nefelina sienitos, notam-se tendências características e bem definidas para cada corpo em particular. Em segundo lugar, registra-se que vários corpos, notadamente os nefelina sienitos híbridos e os nefelina sienitos finos do Anel Norte, apresentam variações muito acentuadas, tão extremas quanto as citadas na literatura para maciços inteiros. A diferença petrológica é marcante, uma vez que, em Poços de Caldas, essas variações refletem zoneamento em grãos individuais de piroxênios de um único fácies ou corpo de nefelina sienito, enquanto que nos outros maciços (ver Fig. 53a) equivalem ao quimismo de piroxênios constituintes de litologias muito contrastadas.

Tendências evolutivas gerais dos piroxênios de Poços de Caldas

A partir da observação da Fig. 53b, é possível resumirem-se as principais feições evolutivas caracterizando o quimismo dos piroxênios dos nefelina sienitos de Poços de Caldas.

Com algumas exceções, os piroxênios de cada corpo de nefelina sienito convergem para o vértice Na, no triângulo cationico $\text{Mg}-(\text{Fe}^{2+}+\text{Mn})-\text{Na}$ (Fig. 53b), porém partindo de composições iniciais às vezes muito diferentes, tanto no tocante à proporção $\text{Na}:\text{Mg}+(\text{Fe}^{2+}+\text{Mn})$, como também à de $\text{Mg}:\text{Fe}^{2+}+\text{Mn}$. Definem-se assim linhas independentes de evolução, em geral subparalelas entre si.

Variações nos teores de Si, Al, Ti, Zr e Mn nos piroxênios de Poços de Caldas

As variações químicas nos piroxênios devidas à incorporação de Na e Fe^{3+} , com a conseqüente diminuição nos teores de Mg, Ca e Fe^{2+} , se fazem acompanhar de mudanças correspondentes

nos teores de Si, Al, Ti, Zr e Mn, aparentemente tão importantes como as anteriores, para fins de definir ou caracterizar a linha evolutiva desses minerais junto aos diversos corpos de nefelina sienito. Em seguida, discute-se o quimismo dos piroxênios, enfatizando as mudanças ocorridas nos teores dos vários elementos.

Si. Os teores de Si dos piroxênios mostram-se em geral comparáveis aos citados em muitos exemplos da literatura (em particular, Itapirapuã, Gomes *et al.*, 1970; South Qôroq centre, Stephenson, 1972). Por outro lado, são um pouco maiores que os encontrados nas hedenbergitas e egirina hedenbergitas de Ilímaussaq (Larsen, 1976).

Uma característica aparentemente universal nos piroxênios sódicos é que o aumento no teor de Si acompanha a elevação do Na (Gomes *et al.*, 1970; Nash e Wilkinson, 1970; Larsen, 1976, entre outros), como também se observa nos piroxênios aqui discutidos. Em geral são as *soda-augitas* as que contêm teores mais baixos de Si, enquanto que as *egirina-augitas* e *egirinas* possuem conteúdos de Si iguais ou superiores a 1,95 átomos por fórmula padrão.

Duas características devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, as *soda-augitas* presentes nos nefelina sienitos híbridos exibem acentuado aumento no teor de Si, do centro para as bordas dos cristais, com pouca ou nenhuma modificação nas quantidades de Ca, Mg, e Na ou na relação $Fe^{2+}: Fe^{3+}$ (ver Figs. 48 e 49). Em segundo lugar, todas as *egirina-augitas* e *egirinas*, não obstante o corpo analisado, não mudam aleatoriamente o seu teor de Si e a sua proporção $Mg:Fe^{2+}+Mn$, uma vez que os dois parâmetros estão inversamente correlacionados. Como exemplos citam-se dois casos extremos.

- 1) As *egirina-augitas* e *egirinas* dos nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote (Tabela 49, Fig. 45b, c) mostram teores de Si mais baixos que os piroxênios sódicos dos nefelina sienitos ocidentais com eudialita, ou dos nefelina sienitos

cinzas do Anel Norte, mais ricos em $\text{Fe}^{2+} + \text{Mn}$ (Tabela 45, 47, Fig. 44a,c).

- 2) Os relictos de egirina augita presentes nos pseudoleucita nefelina sienitos são ricos em Mg e possuem 1,90 átomos de Si (Tabela 48, Fig. 45a), enquanto que os cristais dos nefelina sienitos porfiríticos do Serrote (Tabela 53, Fig. 50b), com teores semelhantes de Na, contêm 1,93 a 1,95 átomos de Si.

Al. O teor de Al dos piroxênios diminui das soda-augitas para as egirina-augitas e egirinas. Nas soda-augitas dos nefelina sienitos híbridos, o Al mostra uma relação inversa com o Si, diminuindo de aproximadamente 0,16 átomo, nos centros dos cristais, até aproximadamente 0,09 nas bordas (Figs. 47 e 49). Em termos gerais os teores médios de Al das soda-augitas são comparáveis aos observados nos piroxênios equivalentes de alguns maciços alcalinos (por exemplo, Itapirapuã, Gomes *et al.*, 1970; Shonkin Sag, Nash e Wilkinson, 1970), porém superiores aos de outras localidades (South Qorôq centre, Stephenson, 1972; Ilímaussaq, Larsen, 1976). Nas egirina-augitas e egirinas, os teores de Al mostram-se baixos, semelhantes aos encontrados em South Qorôq centre e Ilímaussaq (ver referências já citadas). Egirinas com quantidades de Al superiores a 0,07 átomo são raras e reconhecidas apenas em alguns setores de cristais com zoneamento setorial (ver também Larsen, 1976, 1981). Em geral os teores baixos e quase constantes de Al, que independem do conteúdo de Na, determinam que os centros dos cristais zonados de egirina-augita-egirina contenham comumente a molécula de $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$, enquanto que nas bordas define-se a constituição da molécula de jadeíta. A $\text{Ca}_2\text{Fe}^{3+}\text{-Ts}$ é um componente importante nos piroxênios dos nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote, bem como nos relictos de egirina-augita dos pseudoleucita nefelina sienitos, onde os baixos teores de Si não são compensados com aumentos adequados de Al.

Ti. As variações observadas no teor de Ti dos piroxênios dos diversos corpos de nefelina sienito indicam que a

sua incorporação na estrutura desses minerais acha-se diretamente ligada à cristalização de outras fases titaníferas. Exemplos característicos são as rochas constituindo os corpos com lujauros e chibinitos; elas contêm egirina-augitas com teores moderados de Ti, geralmente inferiores a 0,05 átomo, que coexistem com lamprofilita, astrofilita e outros silicatos de metais raros possivelmente ricos em Ti. Em alguns chibinitos, o Ti alcança valores de 0,1 átomo por fórmula padrão somente em áreas de cristalização tardia ou até mesmo pós-magmática, tais como bordas de alguns cristais e agregados fibrosos intersticiais. Por outro lado, nos nefelina sienitos híbridos portadores de titanita e magnetita como minerais acessórios predominantes, os núcleos de soda-augita, que se cristalizaram antes daqueles minerais, convertem-se numa fase receptora de Ti pelo menos durante um curto intervalo; estes núcleos possuem teores relativamente elevados de Ti. O perfil químico obtido no cristal da amostra 30 (Fig.48) exibe claramente uma descontinuidade no teor de TiO_2 ligada à cristalização da titanita; mostra também que, após a sua cristalização, o TiO_2 aumenta continuamente de egirina-augitas para egirinas. Caracteriza-se portanto uma tendência no sentido da incorporação de Ti pelos piroxênios, dependente da cristalização de titanitas e outros silicatos e óxidos; o Ti ingressa preferencialmente nessas fases e, de forma subordinada, nos piroxênios. Portanto, piroxênios ricos em Ti devem ter-se cristalizado sob condições em que representavam os únicos receptores de Ti. Embora não citadas na literatura conhecida, deve-se esperar que se manifestem tendências similares quanto ao comportamento do Ti também nos piroxênios de outros maciços alcalinos, tais como Lovozero e Pilanesberg, litológica e ao que parece geoquimicamente semelhantes ao de Poços de Caldas (ver Mathias, 1974; Ellert, 1959; Vlasov *et al.*, 1966; Gerasimovski e Kuznetsova, 1967). Por outro lado, os magmas de Ilimaussaq são pobres em Ti (Gerasimovski e Kuznetsova, 1967; Larsen, 1976).

Zr. O Zr é um dos elementos traços que pode ser muito abundante nos magmas alcalinos, e que ingressa predominantemente nos minerais de metais raros (zirconossilicatos como eudi

alita), mas também em proporções menores em minerais ferromagnesianos (piroxênios e anfibólios; Sørensen *et al.*, 1978). A exemplo do que acontece com o Ti, as variações no teor de Zr dos piroxênios dos vários corpos de nefelina sienito dependem diretamente da presença e abundância de eudialita nas rochas (ver Larsen, 1976). Nas rochas com eudialita, a quantidade de Zr nos piroxênios é pequena (aproximadamente 0,2% de ZrO_2) e alcança teores mínimos nas bordas descontínuas e nos agregados fibrosos formados após a eudialita (0,05% de ZrO_2 , em média), indicando que os líquidos residuais ficaram notavelmente empobrecidos em Zr; mais uma vez os exemplos característicos são fornecidos pelos lujaunitos e chibinitos. Nos nefelina sienitos híbridos, sem eudialita, o perfil de ZrO_2 é muito semelhante ao de TiO_2 (Fig. 48); o teor de Zr é baixo nas soda-augitas e nas egirina-augitas das zonas mais internas, aumentando rapidamente no sentido das bordas dos cristais de egirina-augita e egirina. As bordas dos cristais possuem em média 0,35% de ZrO_2 ; é provável que a quebra brusca da pendente na linha de variação do ZrO_2 (Fig. 48) decorra do fato de que parte do Zr incorpora-se à titanita.

Em Ilímaussaq, os piroxênios apresentam quantidades de ZrO_2 de até 1,82% (Larsen, 1976) e, em Lovozero, contêm entre 0,4 e 1,18% de ZrO_2 (Bussen e Sakharov, 1972, em Larsen, 1976), teores muito mais elevados que os encontrados nos piroxênios de Poços de Caldas.

Mn. Os piroxênios dos nefelina sienitos possuem em geral teores moderados de Mn, entre 0,03 e 0,06 átomo, algo maiores que os de piroxênios de algumas rochas alcalinas descritas na literatura, por exemplo, Itapirapuã ou South Qorôq centre, e bem mais elevados que os de Ilímaussaq (ver referências citadas anteriormente). O Mn é covariante com Fe^{2+} (ver tabelas de análises químicas 40 a 52, e também Larsen, 1976). Nos nefelina sienitos híbridos, o teor de Mn aumenta das soda-augitas para as egirina-augitas, acompanhando a elevação de Fe^{2+} , enquanto que nas egirina-augitas mais sódicas e egirinas está presente em quantidades baixas (Figs. 47, 48 e 49); observa-se, contudo, que

em algumas bordas descontínuas dos cristais de egirina, de evidente cristalização tardia, os teores de Mn atingem valores elevados (próximos a 0,1 átomo), o mesmo ocorrendo nos piroxênios de outros nefelina sienitos, sugerindo que a relação entre Fe^{2+} e Mn nos piroxênios não se mantém necessariamente nos estádios finais da cristalização magmática.

5.7.2. Individualidade química dos magmas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas

O mapeamento de detalhe feito em Poços de Caldas (H.H.Ulbrich, em preparação) determinou a presença de grande quantidade de corpos de nefelina sienito. Esses corpos foram identificados como possíveis unidades reológicas independentes, sobretudo na base de suas características texturais e mineralógicas (ver discussão no item 2.1). As tendências dos piroxênios dos nefelina sienitos confirmam, em grande parte, a individualidade química e evolutiva desses corpos. A observação da Fig. 53b mostra que a maioria dos corpos de nefelina sienito apresenta uma tendência única, não repetida em outros corpos. Em alguns casos, corpos diferentes exibem claros sinais de que são, de fato, o resultado da cristalização de magmas afins, o que fica evidenciado principalmente porque os piroxênios exibem tendências idênticas ou muito parecidas. Um desses casos é o dos nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte, portadores de piroxênios semelhantes, tanto do ponto de vista químico como textural (ver discussão no item 5.5 deste capítulo e Fig. 53); no entanto, se se atentar para a composição de todos os minerais, e não somente dos piroxênios, têm-se que ambos os corpos possuem um quimismo único, porquanto as semelhanças nas tendências dos piroxênios não se refletem na composição dos feldspatos, que são nitidamente diferentes nos dois casos (ver Capítulo 3).

5.7.3. Atividade da sílica (a_{SiO_2}) e atividade da alumina ($a_{\text{Al}_2\text{O}_3}$) nos magmas dos nefelina sienitos

O conteúdo de Si nos piroxênios dos nefelina sienitos em discussão mostra-se comparável ao apresentado pela maioria dos nefelina sienitos citados na literatura, exceção feita à aqueles das rochas do maciço de Ilímaussaq (ver item 5.7.1). O conteúdo de SiO_2 pode correlacionar-se diretamente com a a_{SiO_2} dos magmas, uma vez que nesses minerais manifesta-se a possibilidade de substituição geral de Si por outros elementos sem grandes limitações estequiométricas. Portanto, é possível deduzir-se que a a_{SiO_2} nos magmas pode ter sido variável (ver item 5.7.1), mas não foi particularmente baixa, como aparentemente é o caso dos magmas de Ilímaussaq (Larsen, 1976). O incremento de Si à medida que cresce o Na, do centro para a borda dos cristais, ou de piroxênios iniciais para tardios, decorre de uma elevação na a_{SiO_2} como função do conteúdo maior de substâncias voláteis, principalmente F nos líquidos residuais, que conduzem a um aumento na "acidez" dos líquidos e, conseqüentemente, também da a_{SiO_2} (Kogarko, 1974). Por outro lado, a maior entrada de Si nos piroxênios ricos em Na pode ser devida a razões puramente cristaloquímicas: as temperaturas mais elevadas favorecem o ingresso de Al^{IV} nos piroxênios (Kushiro, 1960; Verhoogen, 1962).

O conteúdo de Al diminui de soda-augitas para egirina-augitas (ver item 5.7.1). Por sua vez, a maioria dos corpos de nefelina sienitos possui egirina-augitas e egirinas com baixos teores de Al, refletindo a pobreza em Al dos líquidos magmáticos dos quais cristalizaram os piroxênios. Considera-se que a $a_{\text{Al}_2\text{O}_3}$ nos magmas dos nefelina sienitos foi baixa, comparável com a que existiu nos magmas de Ilímaussaq.

5.7.4. Estimativas de fugacidade de oxigênio (f_{O_2}) dos magmas por meio de parâmetros químicos e mineralógicos

Em termos gerais, o quimismo dos piroxênios depende diretamente do quimismo dos magmas dos quais se originam. Por

outro lado, as mudanças químicas que ocorrem nesses minerais, e a sua associação com outras fases presentes nas rochas, permitem avaliar, pelo menos qualitativamente, alguns dos fatores que controlaram a cristalização, por exemplo a f_{O_2} .

Em primeiro lugar, comentam-se os resultados já citados na literatura que fornecem valiosos parâmetros para o caso em estudo, após o que se discutem os piroxênios de Poços de Caldas.

Atividade do Fe^{3+} nos magmas e relação com a f_{O_2}

Os estudos da literatura indicam que a cristalização em magmas de nefelina sienitos vários processa-se em regimes muito diferentes de f_{O_2} . Algumas suites alcalinas estão claramente marcadas pela cristalização a baixas f_{O_2} , correspondentes às do "buffer" sintético faialita-magnetita-quartzo (FMQ, Wones e Gilbert, 1969), ou menores (ver Fig. 54). Nas rochas, a associação característica é titânio magnetita-ferro olivina. Esta paragênese foi citada, por exemplo, nos shonkinitos e sienitos de Shonkin Sag (Nash e Wilkinson, 1970) e nos teschenitos e doleritos de Morutu Sakhalin (Yagi, 1953). O caso de Ilimaussaq é muito especial, porquanto as rochas fortemente peralcalinas (naujaítos e sodalita foiaítos) contêm faialita e hedenbergita, indicando que os magmas permaneceram sob condições de f_{O_2} muito baixas até estágios avançados da cristalização (ver discussão em Larsen, 1976). De outra parte, a olivina desaparece geralmente nos magmas alcalinos ao se aumentar o teor de Na nos piroxênios (e portanto o Fe^{3+}), em níveis maiores que aproximadamente 5% de Ac (Nash e Wilkinson, 1970). Stephenson e Upton (1982) correlacionam esse aumento de Ac nos piroxênios com as mudanças no valor da f_{O_2} , que se elevaria acima do "buffer" FMQ. A coexistência de titanita e magnetita nas rochas sugere também f_{O_2} relativamente elevadas (Carmichael e Nicholls, 1967; Nash e Wilkinson, 1970; Neumann, 1976).

Figura 54 - Diagrama $-\log f_{O_2}$: T para várias associações sintéticas utilizadas como "buffers" de oxigênio, a $P_{total} = 2.000$ b, (segundo Buddington e Lindsley, 1964). A linha tracejada mais grossa marca o limite do campo de estabilidade de anfibólios alcalinos, a $P_{total} = 2.000$ b, segundo Ernst (1968). As linhas tracejadas finas indicam duas composições de equilíbrio de biotitas, na associação sintética biotita-sanidina-magnetita, a $P_{total} = 2.070$ b, segundo Wones e Eugster (1965).

Cristalização de egirina, o teor de Ti dos piroxênios, e a f_{O_2}

Estudos experimentais para estabelecer o campo de estabilidade da acmita foram realizados por vários autores (Yagi, 1966; Bailey, 1969; Gilbert, 1969; Popp e Gilbert, 1972; para acmitas ricas em Ti, ver Flower, 1974). Esses trabalhos mostram, como aliás sugerido pelas texturas das rochas, que os piroxênios acmíticos formam-se tanto no estágio magmático, como no deutérico-hidrotermal, em condições diversas de P_{total} (entre 2 e 45 Kb), em ambientes ricos em água como secos. As opiniões variam no entanto quanto à influência da f_{O_2} . Para Yagi (1966), a "acmita" é favorecida por f_{O_2} crescentes, enquanto que Nash e Wilkinson (1970) mencionam piroxênios enriquecidos em Ac cristalizados sob condições de f_{O_2} decrescentes e moderadas, porém superiores às do "buffer" FMQ. Flower (1974) sugere que o Ti ingressa preferencialmente nas acmitas a temperatura elevada e alta f_{O_2} , superior à do "buffer" FMQ. Essa sugestão está pelo menos parcialmente em conflito com a existência de egirinas ricas em Ti, cristalizadas nos estádios magmáticos finais, como se observa nos nefelina sienitos de Poços de Caldas (ver também Scott, 1976; Ferguson, 1977; Rønsbo *et al.*, 1977; Grapes *et al.*, 1979; Nielsen, 1979), e com a presença da associação arfvedsonita-enigmatita-egirina rica em Ti, encontrada nos fonólitos e nefelina sienitos de Tenerife, Ilhas Canárias (Scott, 1976), provavelmente formadas a T e f_{O_2} relativamente baixas (ver discussão mais adiante).

Parece provável que, por razões cristaloquímicas, o ingresso de Ti na estrutura dos piroxênios seja favorecido por T elevadas (e baixas a_{SiO_2}), como foi proposto por Kushiro (1960) e Verhoogen (1962); por outro lado, o teor elevado de Ti nos piroxênios tardios não parece ligado à f_{O_2} ou à T, mas diretamente à própria composição dos líquidos residuais que apresentariam "excesso de silicato de sódio" (Bailey, 1969) e quantidades elevadas de Ti.

Estimativa da f_{O_2} a partir do geotermômetro e barômetro de oxigênio ilmenita-magnetita

Desde o trabalho pioneiro de Buddington e Lindsley (1964), utiliza-se o geotermômetro ilmenita-magnetita, baseado na solubilidade do Ti nos respectivos óxidos coexistentes; paralelamente estima-se também a f_{O_2} . Esse geotermômetro-barômetro de oxigênio foi satisfatoriamente aplicado a muitas suites de rochas, e não merece maiores reparos. Contudo, os dados apresentados por Buddington e Lindsley (1964) calibram o geotermômetro para óxidos pobres em Mn, tal como foi discutido por Neumann (1974, 1976).

Enigmatita e f_{O_2}

Vários autores encontram claras evidências de que a enigmatita só se cristaliza em nefelina sienitos a f_{O_2} menores que as do "buffer" FMQ (Neumann, 1976; Grapes *et al.*, 1979). A enigmatita, como mostrado por trabalhos experimentais (Lindsley, *et al.*, 1971), cristaliza-se entre 900 e 400°C, a f_{O_2} baixas a moderadas, próximas ou até maiores que as do "buffer" FMQ. Apresenta relações de reação com óxidos de Fe e Ti, com os quais portanto não coexiste (Nicholls e Carmichael, 1969; Marsh, 1975; Larsen, 1977). Nicholls e Carmichael (1969) propuseram a existência de um "campo sem óxidos" (*no oxide field*), onde coexistem diretamente acmita e enigmatita sem a presença de óxidos. Em magmas alcalinos subsaturados, esse campo se localizaria num intervalo de temperaturas inferiores a aproximadamente 900°C e a f_{O_2} inferiores às do "buffer" FMQ (Marsh, 1975). Por outro lado, nos líquidos ricos em "silicato de sódio", dos quais precipita abundante egirina, a enigmatita seria estável sob condições de f_{O_2} muito próximas às do "buffer" FMQ (Marsh, 1975).

Arfvedsonita e f_{O_2}

A arfvedsonita só se cristaliza em condições de

f_{O_2} muito baixas, correspondentes às do "buffer" wüstita-ferro, até 700°C de temperatura (Ernst, 1962, 1968). As condições de cristalização dos anfibólios sódicos, superimpostas às várias curvas "buffer", são mostradas na Fig. 54 (a P_{H_2O} de 2 kb). A associação egirina-arfvedsonita, muito comum em rochas peralcalinas, cristalizaria a temperaturas menores e em condições de f_{O_2} superiores às do "buffer" wüstita-ferro (Bailey, 1969; Nash e Wilkinson, 1970).

Biotitas e f_{O_2}

A composição das micas associadas geralmente a piroxênios minerais opacos em rochas alcalinas pode fornecer subsídios para estimar as possíveis variações na f_{O_2} dos líquidos durante a sua cristalização. Assim o aumento no teor de annita das biotitas com o avanço da cristalização indica valores decrescentes de f_{O_2} (Wones e Eugster, 1965). Esse tópico será discutido no Capítulo 6, após a apresentação dos dados químicos das biotitas de Poços de Caldas.

5.7.5. f_{O_2} nos magmas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas

As considerações precedentes possibilitam formular algumas conclusões sobre a f_{O_2} que existiu nos magmas a partir dos quais cristalizaram os nefelina sienitos. Os resultados citados, tanto experimentais-teóricos, como provenientes do estudo de suites particulares, podem ser adotados com algumas modificações. Provavelmente algumas diferenças composicionais e de associação estabilizam os minerais a f_{O_2} e T maiores que as indicadas em estudos experimentais. Assim, a presença de Mg e F nas arfvedsonitas elevaria a T de cristalização do mineral (Ernst, 1960, 1968), enquanto que a associação enigmatita-arfvedsonita-egirina certamente se deve estabilizar a f_{O_2} maiores, equivalentes à do "buffer" FMQ (Kogarko e Romanchev, 1977; Larsen, 1977).

Seguem-se algumas conclusões para os nefelina

sienitos de Poços de Caldas.

- 1) Não se encontra enigmatita na condição de cristais individuais nas rochas investigadas. A f_{O_2} de cristalização dos piroxênios foi portanto superior à necessária para a cristalização da enigmatita; provavelmente, no contexto dos nefelina sienitos com egirina, igual ou superior à do "buffer" FMQ.
- 2) A ausência de faialita nessas rochas aponta para conclusão idêntica à anterior.
- 3) Um único corpo de nefelina sienito mostra cristais corroídos de óxidos de Fe-Ti, rodeados às vezes por bordas finas de um mineral (não identificado, enigmatita?) com forte pleocroísmo; trata-se do nefelina sienito ocidental com eudialita. Essa feição sugere que as condições de cristalização se processaram em parte sob f_{O_2} inferiores às do "buffer" FMQ, ou que a queda da f_{O_2} com a diminuição da T durante a cristalização do magma foi mais acentuada que em outros corpos (ver Fig. 54).
- 4) Em alguns corpos de nefelina sienito ocorre magnésio arfvedsonita no interior de cristais de piroxênio substituindo egirina-augita previamente cristalizada (ver item 6.2.3). A feição indica nesse caso uma relação de reação e não de equilíbrio observada em outros maciços (por exemplo, em Shonkin Sag, Nash e Wilkinson, 1970). A magnésio arfvedsonita não aparece nas bordas dos cristais de piroxênio. O desequilíbrio arfvedsonita-egirina provavelmente está condicionado a mudanças nas condições de f_{O_2} (Bailey, 1969; Larsen, 1977), possivelmente devido ao fato de que o equilíbrio nas relações de oxidação nos estágios avançados da cristalização magmática já não é mais controlado pelas fases sólidas (silicatos e óxidos) presentes no sistema (*internally buffered systems*), mas passou a depender da fase gasosa (*externally buffered systems*) (ver Carmichael e Nicholls, 1967).
- 5) Nos lujauritos de granulação grossa (lujauritos I) ocorrem cristais poiquilíticos de magnésio arfvedsonita intersticial

(ver Capítulo 6), que portanto se cristalizaram tardiamente, sob temperaturas não maiores de 500°C e baixas f_{O_2} (ver Fig. 54).

- 6) Condições notáveis de flutuação na f_{O_2} resultam em cristais de piroxênio fortemente zonados (de augita sódica até egirina), apenas admitidas nos nefelina sienitos híbridos e nos nefelina sienitos finos do Anel Norte (para discussão detalhada, ver item 5.7.6., a seguir).
- 7) Análises de reconhecimento de óxidos nos nefelina sienitos mostram que, em alguns corpos, não ocorre ilmenita e nos casos em que ilmenita e magnetita coexistem nas rochas, ambos minerais são muito ricos em Mn (até 10% nas magnetitas e mais de 15% nas ilmenitas). Dessa maneira, o geotermômetro-barômetro de oxigênio de Buddington e Lindsley (1964) não pode ser empregado para estimativas da f_{O_2} .

5.7.6. f_{O_2} como possível controlador do zoneamento de piroxênios: nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte

A importância das alterações na f_{O_2} dos magmas pode ser documentada através de uma discussão da zonalidade extrema existente nos piroxênios dos nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte. Para facilitar essa discussão, resumem-se aqui as principais observações químicas e texturais referentes a esses minerais.

- 1) Os cristais de piroxênio exibem extremo zoneamento óptico e químico (ver tendências de evolução na Fig. 53); num único cristal verifica-se uma tendência contínua tão variada como a que se observa nos piroxênios das diversas rochas de outras suites alcalinas.
- 2) Identificam-se claramente uma zona de núcleos de composição geral de soda-augita e uma zona externa fortemente pleocrômica

de egirina-augita-egirina, passando por uma "zona de transição", de pouca expressão volumétrica, porém, com rápidas mudanças químicas.

- 3) Em alguns casos reconhecem-se nítidos sinais de que os núcleos foram reabsorvidos, podendo aparentemente até desaparecer; os melhores exemplos encontram-se nos nefelina sienitos finos do Anel Norte.
- 4) Os núcleos de soda-augita apresentam variações mínimas quanto aos teores de Ca, Mg, Ti, Na, Fe^{2+} e Fe^{3+} ; porém, nota-se nos nefelina sienitos híbridos um marcado aumento de Si e conseqüente diminuição de Al, do centro dos núcleos para as bordas dos mesmos.
- 5) A relação $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ nos núcleos é, em média, da ordem de 0,6, sendo portanto, muito elevada.
- 6) Nos nefelina sienitos híbridos identificam-se alguns núcleos bem conservados, idiomórficos; nessas rochas existem abundantes cristais pequenos idiomórficos de nefelina incluídos nos feldspatos potássicos.
- 7) As texturas de todas as rochas sugerem que a titanita e a magnetita começaram a sua cristalização posteriormente aos núcleos, e que são, pelo menos em parte, contemporâneas às zonas de egirina-augita.

As características acima evidenciam claramente que os núcleos e as bordas cristalizaram-se em ambientes diferentes, e que a passagem de um para o outro ocorreu de maneira acelerada; em certas partes, as variações são tão marcadas que o núcleo tende a ser reabsorvido.

A cristalização dos núcleos de soda-augita processou-se em condições de alta temperatura. A julgar pelos valores elevados (730-800°C) sugeridos pelo geotermômetro de nefeli

na (ver item 4.4.4, Tabela 36) são essas as condições que facilitam o ingresso de Al^{IV} na estrutura dos piroxênios segundo Kushi-ro (1960) e Verhoogen (1962). À medida que tem lugar a cristalização da soda-augita, diminui a temperatura e, como resultado, o Al^{IV} que ingressa nos piroxênios; por outro lado, deve-se lembrar que o Al é requisitado também pela nefelina, que começa a se formar conjuntamente com a soda-augita. As relações $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ elevadas são devidas provavelmente à f_{O_2} relativamente alta do magma original. Não se reconheceu olivina (faialita) nas rochas, e o conteúdo de Ac das soda-augitas já é muito elevado, da ordem de 9 a 14%; as duas feições (ver item 5.7.4) sugerem que a f_{O_2} estava acima da do "buffer" FMQ, a temperaturas de aproximadamente 800°C quando teve início a cristalização da soda-augita. Durante a cristalização dos núcleos, a queda da f_{O_2} , que acompanhou a diminuição da temperatura, permitiu manter a relação $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ nos piroxênios mais ou menos constante (ver Gibb, 1973).

Após a formação dos núcleos de soda-augita, sofrem as condições de cristalização rápidas mudanças, produzindo-se um aumento muito marcado na atividade do Fe^{3+} (e do Na?) nos magmas. Essas modificações são também por vezes bruscas, a ponto de gerarem claras condições de desequilíbrio e, portanto, uma tendência para a reabsorção dos núcleos. Não cabem dúvidas de que essas variações estão controladas, pelo menos em parte, por um aumento da f_{O_2} ; observe-se que o teor de Ti das soda-augitas que é moderado e mantém-se aproximadamente constante, começa a diminuir nas "zonas de transição" e se eleva rapidamente em direção às bordas dos cristais onde aparecem egirina-augitas e egirinas ricas em Ti. Essas variações estão relacionadas à cristalização da magnetita (com Ti) e, sobretudo, da titanita, mais ou menos simultaneamente com a passagem para as zonas de borda. A coexistência de magnetita e titanita indicam claramente que a f_{O_2} foi superior à do "buffer" FMQ (ver item 5,7.4).

É interessante comparar mais uma vez o comportamento do Ti nos piroxênios dos nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte com o observado em outros nefelina

sienitos francamente agpaíticos, onde esses minerais não mostram enriquecimento em Ti (por exemplo, nos lujaauritos), ou então o enriquecimento se faz presente apenas nas fases tardia a pós-magmáticos (ver item 5.7.1). Nos nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte, o piroxênio é o único mineral capaz de incorporar Ti após a formação de magnetita e titanita ; o ingresso de Ti nas egirina-augitas pode ter sido favorecido pela f_{O_2} relativamente elevada (ver item 5.7.4). Por outro lado, nas rochas agpaíticas, o Ti é preferencialmente incorporado nos vários minerais de metais raros, tão característicos dessas litologias, minerais esses, diga-se de passagem, freqüentemente de cristalização tardia.

CAPÍTULO 6

BIOTITAS E ANFIBÓLIOS: QUIMISMO E PETROLOGIA

Biotitas e anfibólios são minerais encontrados apenas esporadicamente nos nefelina sienitos de Poços de Caldas.

As *biotitas* estão ausentes em vários fácies muito importantes do maciço como, por exemplo, nos *lujaunitos* e *chibinitos*. Por outro lado, aparecem sistematicamente em outras fácies, em particular nos portadores de teores mínimos de minerais de metais raros, ou nos quais esses minerais inexistem; nestes últimos fácies, as biotitas constituem-se, por vezes, em máficos importantes ou até mesmo únicos.

Os *anfibólios* são ainda de ocorrência mais restrita que as biotitas. Acham-se sempre subordinados aos piroxênios, aparecendo em quantidades que raramente alcançam 1% modal. São invariavelmente anfibólios alcalinos da série *eckermannita-arfvedsonita*.

Biotitas e anfibólios raramente ocorrem juntos nas rochas, e não foi observada a presença de anfibólio naqueles fácies onde a biotita é um mineral ferromagnésiano relativamente importante.

6.1. BIOTITAS

As biotitas ocorrem em geral na forma de placas xenomórficas distribuídas homogeneamente no interior das rochas, seja como mineral intersticial a feldspatos e nefelinas, seja associado ao piroxênio com o qual apresenta frequentemente relações de substituição (via de regra, biotita substitui o piroxênio). A variedade predominante possui forte pleocroísmo, passando de marrom amarelado a marrom-avermelhado intenso. Biotita verde somente

foi encontrada em duas lâminas petrográficas, uma de nefelina sienito cinza do Anel Norte, a outra de pseudoleucita nefelina sienito; apresenta-se como agregados de pequenas placas idiomórficas, menores que 0,1 mm, incluídas em áreas de alteração zeolítica intersticial (ver item 2.2.1), e, provavelmente, resulta de cristalização ou recristalização, em condições submagmáticas. Esse tipo de biotita não será examinado neste trabalho.

Antes de adentrar-se na discussão do quimismo das biotitas presentes nos nefelina sienitos, dedica-se uma parte à apresentação de informações sobre a sua estrutura e quimismo geral.

6.1.1. Estrutura e química

A unidade estrutural básica das micas é uma folha composta por duas camadas tetraédricas de $(\text{Si}, \text{Al})\text{O}_4$, encerrando entre si uma camada de cátions octaédricos.

Essa estrutura pode ser visualizada especialmente na projeção sobre (010), onde se notam as duas camadas tetraédricas com os seus oxigênios apicais se dispondo frente a frente (Fig. 55a). Os cátions octaédricos (Mg, Fe, Al, etc.) satisfazem a coordenação octaédrica utilizando-se desses oxigênios apicais. Na projeção (001), observa-se que cada camada tetraédrica dispõe os seus tetraedros individuais formando o típico arranjo de anéis hexagonais tão conhecidos nos filossilicatos (Figs. 55b, c). Contudo, cabe assinalar que as duas camadas de cada folha não se encontram estritamente superpostas: a camada tetraédrica superior acha-se deslocada com respeito à equivalente de posicionamento inferior, numa distância igual a $a/3$. A origem dos politipos de micas e de outros filossilicatos deve-se a esse deslocamento (para maiores detalhes, ver resumos em Deer *et al.*, 1966; Bailey, 1967a, 1967b, 1967c).

Nas micas naturais, as complicações estruturais são ainda maiores, devido à presença de vários fatores adicio-

Figura 55 - Estrutura "ideal" das micas trioctaédricas (reprodução de Smith e Yoder, 1956).

a) Projeção no plano (010) mostrando uma folha completa e as camadas tetraédricas das folhas adjacentes. À direita, a posição dos cátions e ânions. O_A , oxigênios apicais; O_B , oxigênios basais. O_A e O_B ocupam os vértices dos tetraedros.

b) Projeção segundo (001), mostrando o deslocamento dos anéis hexagonais formados pelos oxigênios apicais (O_A) na folha de mica (seta).

c) Projeção segundo (001), na qual se observam as bases dos tetraedros da folha de mica; os oxigênios basais (O_B) estão nos vértices dos triângulos.

nais: ordem-desordem Si:Al, distorções nas camadas tetraédricas e octaédricas, rotação de tetraedros por efeitos de carga, etc. Em razão dessas complicações, a simetria dos anéis deixa de ser hexagonal para converter-se em ditrigonal (para detalhes ver Brindley, 1967; McCauley e Newnham, 1971; Apollo, 1978).

Os cátions interfoliares, dentre os quais o mais importante é o K, localizam-se entre as folhas sucessivas e são monovalentes ou divalentes, de raios iônicos consideráveis. Esses cátions compensam o excesso de carga negativa apresentado pelas camadas.

A fórmula geral das micas é a seguinte:

onde X: cátion interfoliar (K e outros); Y: cátions octaédricos (principalmente Al, Mg, Fe^{2+} , Fe^{3+} e, em proporções menores, Mn, Ti, Cr, Li, etc.); Z: cátions tetraédricos (Si, Al, às vezes substituídos por Fe^{3+} ou Ti).

As micas contendo apenas 2 cátions octaédricos por cada 4 íons tetraédricos são chamadas de micas dioctaédricas (muscovita, paragonita, etc.), enquanto que as portadoras de 3 cátions octaédricos são ditas micas trioctaédricas (biotita, flogopita, etc.).

As micas trioctaédricas mais comuns são os membros da série flogopita-biotita, tendo num extremo a flogopita $K_2(Mg, Fe^{2+})_6Si_6Al_2O_{20}(OH, F)_4$, e no outro a biotita com Fe^{2+} como cátion octaédrico predominante, freqüentemente também com quantidades significativas de Al octaédrico (siderofilita) ou Fe^{3+} octaédrico (lepidomelana) (Foster, 1960; Deer et al., 1966). A composição das biotitas é vista como o resultado da substituição do Mg das flogopitas por Fe^{2+} e por R^{3+} octaédrico, principalmente Al e/ou Fe^{3+} . Ambas as substituições ocorrem conjuntamente, porém sem estarem interligadas, uma vez que não se observa correlação

entre o teor de Fe^{2+} e o R^{3+} . Colocam-se contudo limites definidos para essas substituições. Dados bibliográficos (discutidos em Foster, 1960) mostram que não se encontram biotitas naturais com mais de 4,40 sítios octaédricos, de cada 6, ocupados por Fe^{2+} ; da mesma maneira, os cátions trivalentes ocupam nos cristais naturais, como máximo, 2 das 6 posições possíveis. Assim, o Fe^{3+} raramente apresenta-se com teores que ultrapassem 0,7 cátions. Explica-se então porque não se encontra na natureza o equivalente da annita ou, por outro lado, composições nas quais dominem os R^{3+} como cátions octaédricos.

Da discussão prévia decorre que as camadas octaédricas podem ser consideradas como as camadas diretrizes do quimismo das micas. Com efeito, as micas apresentam em geral 2 cargas negativas por cada unidade 2:1 (2 camadas tetraédricas com a correspondente camada octaédrica), que são satisfeitas geralmente por cátions interfoliares monovalentes (K, Na, etc.), às vezes, também divalentes (Ca, Ba, etc.). Essa carga negativa da unidade 2:1 deve-se à própria estrutura das micas, só em parte compensada pelos cátions nas camadas octaédricas; as valências não saturadas são compensadas pelos cátions interfoliares. Na série flogopita-biotita, as cargas divalentes octaédricas (Mg , Fe^{2+}) da flogopita são gradativamente substituídas, pelo menos em parte, por cargas tri- ou tetravalentes (sideromelana, etc.). Isto representa um excesso de carga na camada octaédrica, que só pode ser compensado de duas maneiras, já que a carga interfoliar continua sem mudar (2 cargas negativas). Uma das possibilidades é a compensação por aumento da carga negativa nas camadas tetraédricas, mediante a substituição de Si por Al; a outra é o aparecimento de vacâncias nas camadas octaédricas, produzidas por exemplo, por substituição de 3 cátions divalentes por 2 trivalentes (Foster, 1960; Robert e Maury, 1979).

De outra parte, F e Cl apresentam-se diversamente distribuídos. O fluor é abundante nas flogopitas, formando-se entre Mg e F ligações particularmente fortes (Ekstrom, 1972; Munoz e Ludington, 1974), enquanto que Fe^{2+} evita formar ligações com

F não apenas nas micas, como também em outros silicatos onde F po de substituir OH⁻ (Rosenberg e Foit, 1976).

A separação das micas trioctaédricas é tarefa das mais arbitrárias. Deer *et al.* (1966) colocam a separação entre flogopita e biotita no limite Fe:Mg igual a 1:2. Para Foster (1960), as flogopitas apresentam teores mínimos de MgO de 19% e máximos de FeO de 8,5%. As micas com menos de 19% de MgO correspondem às biotitas, para as quais Foster (1960) propõe os nomes de Mg-biotitas e Fe-biotitas em função do cátion octaédrico dominante, respectivamente, Mg ou Fe.

Numerosas compilações bibliográficas assinalam as diferenças químicas ligadas às diferentes paragéneses de biotitas (Heinrich, 1946; Nockolds, 1947; Engel e Engel, 1960; Foster, 1960). De particular relevância para o presente trabalho são as conclusões referentes às micas presentes nos nefelina sienitos (Foster, 1960):

- 1) as biotitas apresentam teores baixos de Al, tanto octaédrico, como total. Às vezes, o teor de Al total é tão baixo que não chega a preencher totalmente as posições tetraédricas; sugere-se nesse caso o ingresso de Fe³⁺ nessas posições;
- 2) os teores de Fe³⁺ são em geral elevados; os de Mn são maiores que os encontrados em outras rochas ígneas e nas rochas metamórficas;
- 3) o teor de Ti é muito variável;
- 4) muitas biotitas possuem vacâncias nas posições octaédricas.

6.1.2. Nomenclatura de biotitas

Outro item a ser discutido refere-se à nomenclatura a ser aplicada às biotitas, especialmente aquelas exibindo variações consideráveis nas proporções Mg:Fe. No presente trabalho

identificam-se como "magnésio-biotitas" as que mostram uma relação $Mg:Fe^{2+} > 1$ ($Fe^{2+} = Fe$ total), e "ferro-biotitas" aquelas onde essa relação é menor que 1. Esta definição é muito rígida, aproximando-se da proposta por Foster (1960). Um paralelismo total entre a definição dessa autora e a adotada aqui é impossível, devido ao fato de se desconhecer a relação $Fe^{2+}:Fe^{3+}$ nas micas dos nefelina sienitos (ver discussão no item 6.1.3).

Na literatura, são comumente usados nomes específicos para as biotitas com teores elevados de alguns elementos menores. Mitchell e Platt (1982) chamam de "biotitas titaníferas" (*titaniferous biotite*) as micas do Complexo de Coldwell que contêm entre 0,3 e 0,6 átomo de Ti por fórmula calculada na base de 22 oxigênios; já Rock (1982) denomina de "titânio biotitas" (*titanbiotites*) as micas com mais de 0,5 átomo de Ti, que ocorrem nas rochas do Complexo de Monchique, reservando o termo "biotitas titaníferas" para aquelas que possuem entre 0,1 e 0,5 átomo de Ti. Neste trabalho, preferiu-se usar para as biotitas ricas em Ti e/ou Mn um esquema de classificação guardando alguma semelhança ao empregado para os piroxênios; assim, são denominadas "biotita titanífera" e "biotita manganesífera" as micas apresentando quantidades de Ti ou Mn entre 0,4 e 1,0 átomo por fórmula padrão.

6.1.3. Quimismo de biotitas de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Uma das primeiras indicações sobre a possível complexidade química e paragenética das biotitas nos nefelina sienitos é dada pela observação do pleocroísmo. Este varia de amarelo claro-médio a marrom-avermelhado ou vermelho, sendo em geral intenso; contudo, raramente é homogêneo e constante nos cristais de biotita de um determinado fácies. Na maioria das placas de mica, sobretudo nas de maior tamanho, notam-se mudanças marcantes na intensidade do pleocroísmo segundo áreas ou zonas geralmente bem definidas. Dois casos são visíveis: um deles, mais raro, mostra a passagem gradativa de uma zona com pleocroísmo intenso, por

exemplo, α = amarelo, γ = marrom, para outra zona com pleocroísmo mais fraco, por exemplo, α = marrom-avermelhado, γ = vermelho, tal como se ilustra na Fotomicrografia 21. Entretanto, o caso mais comum configura-se quando duas áreas com pleocroísmo diferente apresentam-se com contatos nítidos; os limites entre as duas áreas podem ser retos ou, mais comumente, interdigitados (Fotomicrografia 22). Essas regiões com pleocroísmo diverso devem também mostrar quimismo diferente. Nos casos em que existem contatos gradacionais, trata-se de cristais com zoneamento concêntrico, onde podem ser identificadas as modificações químicas processadas durante a cristalização do mineral; já nas placas constituídas por zonas interpenetrantes é difícil na maior parte das vezes decidir quanto à sequência de cristalização. Na totalidade das lâminas petrográficas, encontram-se tanto biotitas zonadas, como cristais de aspecto homogêneo.

As análises de biotitas de cor amarela-marrom a vermelha dos vários nefelina sienitos foram realizadas com microsonda eletrônica (ver metodologia no Apêndice). Os resultados analíticos obtidos nos cristais zonados, e em outros de composição homogênea, constam das Tabelas 54 a 57, juntamente com os valores das proporções catiônicas, calculadas na base de 22 oxigênios, sem considerar o teor de F das análises, seguindo a prática comum na literatura. Cabe salientar que, em adição aos elementos listados nas tabelas, foram feitas também análises sistemáticas para detectar Cl e, esporádicas, para Ba; em todos os casos os resultados indicam teores inferiores aos níveis de detecção da microsonda.

As discussões na literatura ressaltam a grande importância de se conhecer a relação $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ para a correta identificação do quimismo das biotitas (Foster, 1960). Conhecido apenas o teor de Fe(total), é praticamente impossível obter-se essa relação por métodos de cálculo, dada a extraordinária complexidade de cristalochímica das micas. Nenhum método particular é recomendado na literatura, onde é de praxe a apresentação dos resultados de análises de microsonda colocando todo o Fe como Fe^{2+} . I-

Fotomicrografias 21 e 22 - Zoneamento em biotitas

21 - Placas de biotita zonada em pseudoleucita nefelina sienito. A placa de biotita está constituída por duas zonas principais, uma de cor marrom claro e pleocroísmo intenso, que varia de α' = amarelo-marrom, γ' = marrom (cinza médio claro na foto) e outra de cor vermelha forte e pleocroísmo fraco (preto na foto). Observa-se que existe uma mudança gradacional entre ambas as zonas na porção central da placa (zonas finas de cor cinza escuro), e que a zona cinza claro está circundada por uma zona preta fina. X 12,5; nicóis paralelos; filtro laranja.

22 - Placas de biotita zonada em nefelina sienito cinza do Anel Norte. As placas estão constituídas por duas zonas (cinza claro e cinza médio escuro), com contornos parcialmente irregulares e cor diferente, que se interpenetram. O pleocroísmo é α' = amarelo, γ' amarelo-marrom, na zona cinza claro e α' = avermelhado, γ' = marrom, na zona cinza médio escuro. X 32; nicóis paralelos; filtro verde.

Fotomicrografia 21

Fotomicrografia 22

dêntico procedimento foi adotado neste trabalho.

A seguir, serão discutidas as características químicas das biotitas presentes nos nefelina sienitos. As variações na relação $\text{Mg}:\text{Fe}^{2+}+\text{Mn}$ nas micas é mostrada no diagrama ternário $\text{Mg}-(\text{Fe}^{2+}+\text{Mn})-\text{Al}$ da Fig. 56. A sequência utilizada na projeção dos dados nesse gráfico pretende enfatizar as diferenças na composição das micas dos vários corpos de nefelina sienitos.

1. Nefelina sienitos cinzas e nefelina sienitos com biotita do Serrote. Em ambos os corpos, as placas de biotita ocorrem ora como fase intersticial aos minerais fêlsicos, ora substituindo prismas de piroxênio (Fotomicrografia 23); os cristais intersticiais mostram-se comumente zonados. As micas são em geral de cor amarela-marrom com pleocroísmo forte, à exceção de algumas zonas muito ricas em Mg de cor amarela, que possuem pleocroísmo pouco marcado. Trata-se de magnésio-biotitas e ferro-biotitas com teores moderados de Ti e Mn; algumas ferro-biotitas são manganesíferas (Tabela 54, Fig. 56, nºs 1 e 2).

2. Nefelina sienitos híbridos. A biotita é um constituinte tipicamente ausente nesse tipo faciológico. Entretanto, algumas placas do mineral foram encontradas na amostra 30; trata-se de cristais de cor marrom a marrom-avermelhada, com zoneamento pouco marcado. São ferro-biotitas titaníferas, com teores de MnO inferiores aos das micas de outros nefelina sienitos (Tabela 55, col. 1 e 2; Fig. 56 nº 3).

3. Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte. Nessas rochas as biotitas ocorrem principalmente como placas de até 1mm; são de cor amarelo-marrom, com marcado pleocroísmo, e estão comumente zonadas (Fotomicrografia 22). Observam-se, em quantidades subordinadas, lâminas finas de biotita homogênea, de cor marrom-avermelhada a vermelha, com pleocroísmo fraco, que ocorrem associadas a grãos opacos ou no interior dos cristais de piroxênio. As micas desses nefelina sienitos são manganesíferas (Tabela 56); as placas que apresentam pleocroísmo intenso variam de magnésio-bio

Fotomicrografias 23 - 24 - Substituições em piroxênios

23- Biotita substituindo ao piroxênio em nefelina sienito com biotita do Serrote. Biotita, cinza médio; piroxênio, cinza mais claro, com relevo e clivagens marcadas. X 64; nicóis paralelos; filtro verde.

24- Arfvedsonita substituindo ao piroxênio em nefelina sienito ocidental com eudialita. Arfvedsonita, cinza claro, sem clivagem visível; piroxênio, cinza médio com clivagem. X 32; nicóis paralelos; filtro branco.

Fotomicrografia 23

Fotomicrografia 24

Tabela 54
Composição química de biotitas de nefelina sienitos do Serrote

	Cinzas		Com biotita				
	178		314	311		321	
	z	z	m	z	z	m	
SiO ₂	43,7	37,2	45,4	38,1	36,8	39,1	38,5
TiO ₂	2,21	4,24	3,76	3,11	2,80	3,17	2,93
Al ₂ O ₃	8,72	9,88	7,72	11,23	9,80	8,58	9,95
FeO	9,50	22,1	8,40	18,7	26,3	21,3	23,8
MnO	2,77	4,52	3,05	3,47	3,84	2,48	2,73
MgO	16,5	8,93	14,7	11,9	8,34	9,88	9,80
CaO	0,02	0,05	0,06	0,01		0,22	0,13
Na ₂ O	0,21	0,18	0,14	0,04	0,08	0,34	0,30
K ₂ O	10,5	9,67	10,4	9,92	9,80	9,41	9,55
F	3,28	1,14	3,65	1,48	1,29	1,40	1,88
Total	97,41	97,91	97,28	97,96	99,05	95,88	99,58
O = F	-1,38	-0,48	-1,53	-0,62	-0,54	-0,59	-0,79
Fórmula estrutural							
Si	6,503	5,831	6,727	5,848	5,831	6,177	5,948
Al	1,497	1,828	1,273	2,096	1,829	1,595	1,814
				*	*	*	*
Al	0,032		0,077				
Ti	0,247	0,501	0,420	0,358	0,333	0,376	0,341
Fe	1,181	2,902	1,042	2,399	3,478	2,806	3,075
Mn	0,349	0,601	0,384	0,451	0,514	0,332	0,357
Mg	3,652	2,089	3,247	2,715	1,968	2,325	2,259
Ca	0,003	0,008	0,010	0,002		0,037	0,021
Na	0,059	0,055	0,041	0,012	0,024	0,105	0,088
K	1,984	1,935	1,958	1,941	1,910	1,894	1,885
Mg	54,4	28,2	53,9	35,4	25,3	32,9	30,1
Fe+Mn	22,8	47,2	23,7	37,2	51,2	44,5	45,7
Al	22,8	24,6	22,4	27,4	23,5	22,6	24,2
Fe+Mn							
Fe+Mn+Mg	0,30	0,63	0,31	0,51	0,67	0,57	0,60

Figura 56 - Diagrama Mg-(Fe+Mn)-Al de biotitas de nefelina sienitos. Fe = Fe(total) calculado como Fe²⁺. Os dados representam porcentagem de átomos.

1- Nefelina sienitos cinzas do Serrote; 2- Nefelina sienitos com biotita do Serrote; 3- Nefelina sienitos híbridos; 4- Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte; 5- Pseudoleucita nefelina sienitos; 6- Nefelina sienitos ocidentais com fluorita; 7- Nefelina sienitos finos do Anel Norte. As linhas unem zonas coexistentes nas placas de mica.

Tabela 55

Composição química de biotitas de nefelina sienitos

	Híbridos		Ocidentais com fluorita	Finos do Anel Norte
	30		525	541
	z	z	m	m
SiO ₂	39,7	37,8	38,6	35,8
TiO ₂	3,29	4,31	3,80	3,61
Al ₂ O ₃	9,33	9,11	10,9	10,9
FeO	20,7	24,8	20,2	33,0
MnO	1,61	2,05	2,35	4,58
MgO	11,3	8,05	11,6	2,90
CaO	0,02	0,02		0,06
Na ₂ O	0,44	0,32	0,12	0,27
K ₂ O	9,68	9,45	9,78	9,26
F	2,74	1,62	1,84	0,48
Total	98,81	97,53	99,19	100,86
O ≡ F	-1,50	-0,68	-0,77	-0,20
	Fórmula estrutural			
Si	6,105	5,981	5,879	5,691
Al	1,692	1,701	1,960	2,041
	*	*	*	*
Ti	0,381	0,513	0,410	0,432
Fe	2,668	3,282	2,571	4,397
Mn	0,210	0,275	0,304	0,618
Mg	2,593	1,899	2,637	0,687
Ca	0,003	0,003		0,010
Na	0,131	0,098	0,036	0,085
K	1,900	1,909	1,902	1,878
Mg	36,2	26,5	35,3	8,9
Fe + Mn	58,2	49,7	38,5	64,8
Al	23,6	23,8	26,2	26,3
$\frac{\text{Fe}+\text{Mn}}{\text{Fe}+\text{Mn}+\text{Mg}}$	0,53	0,65	0,52	0,88

Tabela 56

Composição química de biotitas de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte

	422	422	432	551	zm	zm	13		
	%	%	m	m					
SiO ₂	44,5	40,3	39,6	39,4	42,8	40,0	36,3	35,2	35,6
TiO ₂	2,65	2,77	2,82	2,27	3,10	3,68	3,28	3,96	4,06
Al ₂ O ₃	8,75	8,97	10,6	12,4	9,05	9,22	8,68	8,70	8,65
FeO ¹	10,4	16,9	17,7	18,3	12,8	18,7	25,5	28,9	30,7
MnO	3,60	5,02	4,28	2,04	3,23	3,33	6,10	4,14	3,34
MgO	14,4	11,2	11,1	13,1	12,6	9,40	5,08	4,02	3,53
CaO	0,07	0,08	0,04	0,03	0,01	0,04	0,06	0,04	0,05
Na ₂ O	0,07	0,10	0,23	0,07	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03
K ₂ O	10,02	9,87	9,55	9,92	9,70	9,59	9,14	9,22	9,11
F	2,25	1,32	1,80	1,77	2,35	1,42	0,48	0,25	0,20
Total	96,71	96,53	97,72	99,30	95,68	95,43	94,65	94,33	95,27
O = F	-0,94	-0,55	-0,76	-0,74	-0,99	-0,60	-0,20	-0,11	-0,08

Fórmula estrutural²

Si	6,605	6,238	6,071	5,891	6,510	6,262	6,011	5,893	5,918
Al	1,395	1,635	1,915	2,109	1,490	1,701	1,695	1,719	1,697
		*	*			*	*	*	*
Al	0,134			0,074	0,132				
Ti	0,295	0,322	0,325	0,255	0,355	0,433	0,408	0,499	0,508
Fe	1,292	2,192	2,270	2,290	1,624	2,449	3,527	4,046	4,275
Mn	0,452	0,658	0,555	0,258	0,415	0,442	0,855	0,587	0,471
Mg	3,193	2,573	2,535	2,923	2,852	2,194	1,254	1,004	0,876
Ca	0,011	0,013	0,007	0,005	0,002	0,007	0,010	0,007	0,009
Na	0,019	0,031	0,069	0,020	0,011	0,016	0,011	0,011	0,011
K	1,896	1,948	1,866	1,892	1,881	1,916	1,930	1,972	1,935
Mg	49,4	36,4	34,8	38,2	43,8	32,3	17,1	13,6	12,0
Fe+Mn	27,0	40,4	38,8	33,3	31,3	42,6	59,8	63,0	64,8
Al	23,6	23,2	26,4	28,5	24,9	25,1	23,1	23,4	23,2
Fe+Mn									
Fe+Mn+Mg	0,35	0,53	0,53	0,47	0,42	0,57	0,78	0,82	0,84

titas a ferro-biotitas pobres em Fe (Tabela 56, cols. 1 a 6) enquanto que as de cor vermelha e pleocroísmo fraco são ferro-biotitas titaníferas com teores de MgO entre 3 e 5% (Tabela 56, cols. 7 a 9). A Fig. 56 nº 4, ilustra as principais características químicas das biotitas dessas rochas.

4. Pseudoleucita nefelina sienitos. Nesse fácies as biotitas aparecem tanto na matriz, como nas pseudoleucitas. Na matriz, apresentam-se como cristais de até 1,5 mm, comumente zonados, e, às vezes, com zoneamento concêntrico (Fotomicrografia 21), e também na forma de placas finas nos agregados de clorita e opacos pseudomorfos de piroxênio (ver itens 2.2.1 e 5.5). As maiores mudanças na cor e no pleocroísmo são vistas nos cristais zonados, onde se reconhecem duas zonas principais, uma de cor amarelo-marrom e pleocroísmo intenso, e outra marrom- avermelhada a vermelha e pleocroísmo pouco marcado. As micas dessas rochas são todas ferro-biotitas com teores moderados de Ti e quantidades muito variáveis de Mn (Tabela 57). Em algumas amostras, o aumento no conteúdo de FeO é acompanhado por uma elevação no teor de Al_2O_3 e diminuição de MnO (ams. 482E, 482EE); em outros casos, a relação é inversa (am. 539). As variações químicas dessas biotitas em função dos parâmetros Mg-(Fe+Mn)-Al estão representadas na Fig. 56 nº 5.

5. Nefelina sienitos ocidentais com fluorita. Nessas rochas a biotita é, na maioria dos casos, o único silicato máfico presente; o mineral ocorre em proporções que raramente ultrapassam a 2% modal, associado a grãos opacos e titanita. As placas de biotita, de até 2,5 mm, possuem cor marrom algo avermelhada, com marcado pleocroísmo, e são em geral quimicamente homogêneas; trata-se de ferro-biotitas titaníferas (Tabela 55, col. 3; Fig. 56 nº 6).

6. Nefelina sienitos finos do Anel Norte. As biotitas ocorrem na forma de placas finas, homogêneas, de cor marrom-avermelhada, associadas a grãos opacos, e também no interior dos piroxênios. Trata-se de ferro-biotitas manganesíferas e tita

Tabela 57

Composição química de biotitas de pseudoleucita nefelina sienitos

	456		539		482EE				482E		
	m	m	z	z		z	z		z	z	
SiO ₂	37,1	37,7	37,2	35,4	37,5	37,1	34,3	33,3	36,3	35,8	33,0
TiO ₂	1,61	2,59	2,36	3,30	2,34	2,42	2,81	2,41	2,33	2,58	2,11
Al ₂ O ₃	10,3	12,0	11,3	9,13	10,9	10,8	13,1	13,0	11,4	9,84	13,3
FeO	22,0	21,8	23,2	31,0	21,9	24,2	32,2	37,2	23,4	26,6	36,4
MnO	3,17	2,76	2,91	6,24	2,82	2,99	0,67	1,07	3,00	3,95	1,32
MgO	11,6	11,7	10,6	4,22	11,1	10,2	3,97	0,87	9,87	8,00	1,39
CaO	0,01	0,01		0,01			0,02		0,06	0,06	0,01
Na ₂ O	0,08	0,13	0,08	0,02	0,19	0,12	0,15	0,04	0,11	0,11	0,01
K ₂ O	9,45	9,54	9,87	9,46	9,73	9,47	9,02	9,11	9,48	9,42	9,31
F	1,68	1,29	1,41	0,28	1,30	0,95			1,42	0,45	0,03
Total	97,0	99,52	98,93	99,06	97,78	98,25	96,24	97,00	97,37	96,81	96,83
O ≡ F	-0,70	-0,54	-0,59	-0,12	-0,55	-0,40			-0,60	-0,19	-0,01

Fórmula estrutural

Si	5,857	5,733	5,759	5,747	5,852	5,787	5,575	5,532	5,734	5,762	5,493
Al	1,917	2,153	2,067	1,747	1,999	1,984	2,425	2,468	2,415	1,869	2,507
	*	*	*	*	*	*			*	*	
Al							0,091	0,085			0,099
Ti	0,192	0,296	0,275	0,403	0,273	0,284	0,343	0,300	0,276	0,313	0,264
Fe	2,908	2,766	3,001	4,212	2,843	3,150	4,376	5,169	3,098	3,590	5,058
Mn	0,424	0,355	0,383	0,859	0,371	0,395	0,092	0,150	0,402	0,539	0,186
Mg	2,728	2,646	2,459	1,022	2,583	2,378	0,960	0,216	2,324	1,921	0,344
Ca	0,002	0,002		0,002			0,003		0,010	0,010	0,002
Na	0,026	0,039	0,025	0,007	0,058	0,004	0,047	0,011	0,033	0,035	0,004
K	1,905	1,850	1,952	1,960	1,930	1,884	1,868	1,930	1,911	1,937	1,974
Mg	34,2	33,4	31,1	13,0	33,1	30,1	12,1	2,7	29,3	24,3	4,2
Fe+Mn	41,8	39,4	42,8	64,7	41,2	44,8	56,2	65,8	44,1	52,1	64,0
Al	24,0	27,2	26,1	22,3	25,7	25,1	31,7	31,5	26,6	23,6	31,8
Fe+Mn											
Fe+Mn+Mg	0,55	0,54	0,58	0,83	0,55	0,60	0,82	0,96	0,60	0,68	0,94

níferas (Tabela 55, col.4; Fig. 56 nº 7).

6.1.4. Conteúdo de annita das biotitas de nefelinas sienitos de Poços de Caldas

Como na maioria dos trabalhos recentes sobre biotitas, procura-se representar o Fe (total) como Fe^{2+} e tomar o parâmetro $(\text{Fe}+\text{Mn})/(\text{Fe}+\text{Mn}+\text{Mg})$ como indicador aproximado do teor de annita. Essa prática serve apenas para estimar os valores de annita, em particular nas micas mais ricas em Fe^{3+} , e nas quais se dá a formação da molécula de oxiannita, $\text{KFe}^{2+}\text{Fe}^{3+}\text{AlSi}_3\text{O}_{12}$ (Wones e Eugster, 1965).

A Fig. 57 mostra que as biotitas analisadas abrangem um intervalo relativamente grande de composição (30 até 96% de annita). As maiores variações ocorrem nos nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote (annita₃₀₋₆₇), nefelina sienitos cinzas do Anel Norte (annita₃₅₋₈₄) e pseudoleucita nefelina sienitos (annita₅₄₋₉₆). Nas rochas desses corpos, zonas adjacentes interpenetrantes de mica apresentam diferenças de até 35% no conteúdo de annita.

Relações entre o teor de annita, a cor e o pleocroísmo das biotitas

As maiores mudanças na cor e no esquema pleocróico das biotitas acham-se relacionadas com variações no conteúdo de Fe e Mg. As biotitas muito ricas em Mg (annita₃₀) são de cor amarelada e pleocroísmo fraco; este torna-se mais intenso nas micas com annita₅₀₋₆₀, sendo o esquema pleocróico o seguinte: α = amarelo a amarelo-alaranjado, γ = marrom a marrom-avermelhado. As biotitas que apresentam teores elevados de Fe (annita₇₀ ou mais) exibem cores mais fortes, marrom avermelhada a vermelha e, conseqüentemente, mudanças pleocróicas menos marcadas. De outra parte, é evidente que o esquema de cor depende fortemente das variações no conteúdo de Fe^{3+} , Mn e Ti, além das diferenças na razão $\text{Fe}^{2+}:\text{Mg}$ (Rimsaite, 1967).

Figura 57 - Variação dos elementos químicos nas biotitas de nefelina sienitos, em função do parâmetro $\text{Fe}+\text{Mn}/\text{Fe}+\text{Mn}+\text{Mg}$. $\text{Fe} = \text{Fe}(\text{total})$ calculado como Fe^{2+} . Os dados são em átomos por fórmula, exceto os de F que representam a porcentagem desse elemento nas análises químicas. Nefelina sienitos cinzas do Serrote ($+$); nefelina sienitos com biotita do Serrote ($\diamond$); nefelina sienitos híbridos ($\blacktriangle$); nefelina sienitos cinzas do Anel Norte ($\circ$); pseudoleucita nefelina sienitos ($\bullet$); nefelina sienitos ocidentais com fluorita ($\square$); nefelina sienitos finos do Anel Norte ($\triangle$). As linhas unem zonas coexistentes nas placas de mica.

6.1.5. Considerações petrológicas

Os dados apresentados em páginas precedentes demonstram que as biotitas dos nefelina sienitos investigados possuem características particulares. Por um lado, variações grandes na composição química e, por outro, zoneamento peculiar na maioria das rochas.

A interpretação petrológica da textura e do quimismo das biotitas deve ser feito no contexto mais amplo das condições de cristalização dos nefelina sienitos. Com esse propósito em mente, é feito a seguir um resumo da sequência de cristalização das micas nos vários corpos de nefelina sienitos e das características químicas gerais desses minerais, comparando-se os dados obtidos com os de biotitas de nefelina sienitos da literatura.

Sequência de cristalização de biotitas de nefelina sienitos de Poços de Caldas

As biotitas, particularmente as ricas em ferro, apresentam-se intersticiais aos minerais félsicos; por outro lado, exibem relações complexas com os piroxênios, opacos e titanita. O quimismo e algumas feições texturais sugerem que as magnésio-biotitas são de cristalização inicial, enquanto que as ferro-biotitas das placas zonadas ou das que substituem piroxênio são tardias (ver discussão adiante sobre "biotitas e f_{O_2} "). Nos *nefelina sienitos híbridos*, os raros cristais de biotita são de formação posterior aos opacos, estando, porém, marginalmente inter-crescidos com a titanita (ver item 5.7.6). A biotita dos *nefelina sienitos finos do Anel Norte* é posterior às zonas externas dos piroxênios, constituídas de egrina-augita, e também aos opacos. Nos *nefelina sienitos cinzas e nefelina sienitos com biotita do Serrote*, as micas mais magnesianas (por exemplo, am. 314, Tabela 54, col.3) encontram-se texturalmente associadas aos piroxênios e grãos opacos, sem que no entanto seja possível estabelecer-se a ordem de cristalização desses minerais; entretanto, as micas

que substituem o piroxênio (Fotomicrografia 23) são mais ricas em Fe (com pelo menos 60% de annita). Nos *pseudoleucita nefelina sienitos*, as relações texturais são bem mais complicadas. Biotitas exibindo forte zoneamento (annita₅₈₋₈₃) ocorrem na matriz das rochas associadas aos opacos, com os quais estão parcialmente intercrescidas. Por outro lado, o mineral também é visto formando lâminas finíssimas, e na condição de pseudomorfos de piroxênio, agora convertidos em agregados finos de clorita e opacos, com raros relictos de egirina-augita. Os piroxênios se converteram em clorita e opacos provavelmente como resultado do aumento da P_{H_2O} durante os estágios magmáticos tardios; nesses pseudomorfos, a biotita concentra-se sobretudo nas bordas, sendo portanto, de cristalização tardia. Nos *nefelina sienitos cinzas do Anel Norte*, as biotitas (predominantemente annita₅₀) acham-se associadas aos opacos, piroxênio, titanita e outros minerais; quando zonadas (annita₃₅₋₅₇; Fotomicrografia 22), as zonas ricas em Mg (annita₃₅₋₄₂) exibem evidências de reabsorção, enquanto que as enriquecidas em Fe são de cristalização posterior, adaptando-se aos contornos dos piroxênios. Algumas placas isoladas de biotita (annita₇₈₋₈₄) estão presentes no interior de agregados de grãos opacos, ou ainda incluídas no piroxênio. Nos *nefelina sienitos ocidentais com fluorita*, sem piroxênio, as biotitas (annita₅₂) estão associadas aos opacos.

Variações nos conteúdos de Si, Al, Ti, Mn e F com respeito ao teor de annita das biotitas

As biotitas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas pertencem à série flogopita-annita-oxiannita (Eugster e Woones, 1965). As modificações na relação Mg:Fe são diferentes para cada corpo de nefelina sienitos, porém, em conjunto, abrangem um campo composicional que vai de annita₃₀ a annita₉₆. Essas mudanças no teor de annita estão acompanhadas também por variação nos teores de Si, Al, Ti, Mn e F, como se discute em seguida.

Si. A observação das Tabelas 54 a 57 e da Fig. 57 mostra que existe uma relação inversa entre o conteúdo de Si das

micas e o seu teor de annita. Além disso, observa-se claramente no gráfico que, de todas as micas analisadas, as dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte são as mais ricas em Si, enquanto que os teores mais baixos aparecem junto ao pseudoleucita nefelina sienitos. Essas variações comportam-se de forma análoga às registradas para os piroxênios dos mesmos corpos (ver item 5.7.1).

Al. Todas as micas analisadas possuem teores baixos de Al_2O_3 , entre 7,7 e 13,3%. Em geral, Al e Si variam inversamente. As fórmulas estruturais calculadas na base de 22 oxigênios apontam para uma marcada deficiência de Al, assim que comumente $Si + Al < 8$; constituem exceções as magnésio-biotitas ricas em Si e portadoras de algum Al^{VI} (Tabelas 56, col. 1,4 e 5; 54, col. 1 e 3). Esses resultados analíticos são, entretanto, artificiais, uma vez que são afetados por mudanças no cálculo das proporções catiônicas, dado o desconhecimento das relações $Fe^{2+} : Fe^{3+}$ e, por conseguinte, do oxigênio total na fórmula verdadeira. Problemas idênticos foram levantados por ocasião da análise do grupo dos piroxênios (ver ainda Vieten e Hamm, 1978). Uma discussão mais detida do assunto pode ser feita para as biotitas dos pseudoleucita nefelina sienitos. Apesar de os teores de Al dessas micas serem dos mais elevados, as concentrações de Si são baixas, além de constantes (ver Fig. 57), conduzindo a uma relação Si:Al (ou Si: R^{3+}) sistematicamente menor que 6:2. Esse déficit de Si nas camadas tetraédricas condiciona a provável existência de carga negativa, compensada por um excesso de carga positiva nas camadas octaédricas e ingresso de Fe^{3+} nas posições tetraédricas. Consequentemente, é possível inferir-se com razoável certeza que essas biotitas devem conter teores apreciáveis de Fe^{3+} octaédrico, com composição global do tipo das lepidomelanas (Foster, 1960).

Ti. Os teores de Ti mostram-se moderados, entre 0,2 e 0,5 átomos, e mais ou menos característicos para cada corpo de nefelina sienitos; os teores mais baixos estão presentes nas micas dos pseudoleucita nefelina sienitos.

Mn. Embora com variações marcantes, o teor de Mn é elevado nas biotitas, e em geral superior ao de Ti (Fig. 57). Existe, pelo menos em alguns casos, uma relação direta entre o conteúdo de Mn e o teor de annita, como se observa sobretudo nos cristais zonados dos nefelina sienitos cinzas do Serrote e cinzas do Anel Norte. Nos pseudoleucita nefelina sienitos, os teores de Mn são variáveis, em particular nas biotitas com teores de annita mais elevados.

F. Este elemento está presente nas biotitas substituindo o grupo (OH), substituição essa facilitada pela maior proporção de Fe, como se nota na Fig. 47.

Comparação do quimismo das micas das rochas de Poços de Caldas com o de biotitas de outros maciços alcalinos

Ainda são poucos os dados químicos sobre biotitas de complexos alcalinos em geral, e de nefelina sienitos em particular (Nash e Wilkinson, 1970; Mitchell, 1972; Powell, 1978; Mitchell e Platt, 1982; Rock, 1982; Stephenson e Upton, 1982, entre outros). Nos complexos citados na literatura, ocorrem biotitas em praticamente todas as rochas, desde as máficas (lamprófiros, gabros, essexitos, malignitos, shonkinitos) até as félsicas subsaturadas ou supersaturadas (nefelina sienitos vários, monzonitos, granitos alcalinos, etc.). As mudanças composicionais são todavia muito contrastantes. Por exemplo, no maciço de Kûngnât Fjeld na Groelândia, observa-se que as biotitas comuns aos diferentes tipos litológicos variam desde magnésio-biotitas (annita₃₁), em diques iniciais de gabros, até ferro-biotitas muito ricas em Fe (annita₉₈), em granitos alcalinos tardios (Stephenson e Upton, 1982). Por outro lado, a maioria das rochas do complexo alcalino de Monchique em Portugal (lamprófiros, essexitos, malignitos e nefelina sienitos vários) possui biotita de composição pouco variada (annita₂₀₋₃₅; Rock, 1982).

Os nefelina sienitos de Poços de Caldas, não obstante a sua monotonia petrográfica, exibem mudanças notáveis na

composição das biotitas, em termos da relação Fe:Mg. Registre-se que em apenas um corpo, o dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte, as micas passam de annita₃₅ a annita₈₄, um intervalo composicional pouco diferente do obtido para o conjunto de tipos litológicos diversificados de Kungnat Fjeld (Stephenson e Upton, 1982). As variações observadas nas rochas de Poços de Caldas são devidas em grande parte ao marcado zoneamento presente nas micas de praticamente todos os tipos faciológicos (ver item 6.1.3). Esse é outro caráter específico dos nefelina sienitos de Poços de Caldas, raramente mencionado na literatura para rochas alcalinas feldspáticas (Mitchell e Platt, 1982), porém comum em carbonatitos e rochas associadas (Heinrich, 1966; Rimsaite, 1969; Ferguson e Currie, 1970).

A composição geral das biotitas estudadas, em termos dos teores dos diversos elementos, é compatível com a constante da literatura (ver também Foster, 1960); salientam-se principalmente os baixos teores de Al e as quantidades provavelmente significativas de Fe³⁺ nas variedades mais ricas em Fe total. Os teores de Ti são moderados, menores que 0,5 átomos, e o Mn achase presente em quantidades muito variáveis, em alguns casos maiores que 0,8 átomo. Nem Cl nem Ba foram detectados nessas micas.

Relação Fe:Mg nas biotitas e f_{O_2}

A comparação do quimismo de piroxênios e biotitas revela algumas características interessantes.

Tome-se como exemplo o caso dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte e nefelina sienitos com biotita do Serrote. Nestes últimos, os piroxênios são em média enriquecidos em Mg ($Mg_{5-20}Fe^{2+} + Mn_{8-12}Na_{68-87}$) e coexistem com magnésio-biotitas ou ferro-biotitas relativamente ricas em Mg (annita₃₀₋₆₇). Nos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte, os piroxênios são pobres em Mg ($Mg_{1-5}Fe^{2+} + Mn_{6-25}Na_{70-93}$) e coexistem com biotitas cuja composição, embora variável, mostra-se rica em Mg (annita_{<60}). As relações texturais entre esses dois minerais indicam que, muito provavelmente, as biotitas com maiores teores de Mg cristaliza -

ram-se antes dos piroxênios ou mesmo simultaneamente, dando-se em seguida a formação de biotitas com teores mais elevados de Fe total e Fe^{3+} , que em parte substituem ao piroxênio. Nesses estádios tardios da cristalização, ainda magmática, a biotita é o único mineral a incorporar tanto Mg como Fe^{3+} . As micas zonadas com contatos bruscos entre zonas de diferente composição, aliás feição comum na maioria dos corpos com biotita, mostram inclusive evidências da existência de reabsorção das micas ricas em Mg, previamente à cristalização das ferro-biotitas (Fotomicrografia 22).

Igualmente interessantes são as relações texturais das micas presentes na matriz dos pseudoleucita nefelina sienitos. Nestas rochas, a ordem provável de cristalização dos máficos é a seguinte: piroxênio inicial $\rightarrow$ biotita zonada $\rightarrow$ piroxênio tardio, em parte contemporâneo com a biotita. O zoneamento das micas é às vezes concêntrico, com "núcleos" magnesianos e "bordas" ricas em Fe (tanto Fe total como Fe^{3+}); a passagem entre elas é muito rápida, aparecendo apenas delgadas "zonas de transição" de quimismo variável.

Torna-se difícil conciliar as características acima mencionadas com uma interpretação baseada unicamente na composição dos líquidos magmáticos residuais. As considerações precedentes mostram que, uma vez coexistentes piroxênios e biotitas, o Mg ingressa preferencialmente na biotita, enquanto que o Fe, principalmente como Fe^{3+} , se incorpora ao piroxênio.

Os trabalhos experimentais de Wones e Eugster (1965) demonstram a importância da f_{O_2} durante a cristalização das micas, na presença de sanidina e magnetita. Mantendo-se constantes a T e a $P_{\text{H}_2\text{O}}$, a composição da biotita depende fortemente da f_{O_2} ; o conteúdo de annita (praticamente sem oxiannita, dadas às condições de "buffer") aumenta rapidamente com a diminuição da f_{O_2} (Fig. 54, item 5.7.4). Por outro lado, a diminuição da T com f_{O_2} constante ou crescente favorece a incorporação do Mg nas micas. Assim, o abaixamento da T e da f_{O_2} propicia a

formação de biotitas com teores maiores de Fe:Fe+Mg.

Os resultados obtidos no trabalho referido acima podem ser aplicados, pelo menos tentativamente, para os nefelina sienitos investigados, cuja paragênese não é muito diferente da aquela presente nos experimentos, uma vez que os nefelina sienitos com biotita possuem magnetita como opaco freqüente, ainda que pouco abundante. Do exposto é possível concluir-se o seguinte:

- 1) as micas mais magnesianas, anteriores ou contemporâneas ao piroxênio, cristalizam-se num ambiente de alta f_{O_2} ; nestas condições, o Mg entra preferencialmente nas micas, enquanto que o Fe, sobretudo como Fe^{3+} , é incorporado ao piroxênio;
- 2) as micas tardias, posteriores ao piroxênio, ao qual substituem em parte, cristalizam-se sob condições de T e f_{O_2} mais baixas, tornando-se dessa forma mais ricas em Fe;
- 3) as mudanças bruscas, ou muito rápidas, no zoneamento das biotitas, passando de magnesianas a ferrosas, acompanham a diminuição da T, e resultam provavelmente de variações bruscas na f_{O_2} (e P_{H_2O} ?). O zoneamento das micas acha-se condicionado a fatores geológicos diversos, como perda de voláteis por possíveis explosões vulcânicas, "abertura" do sistema através de fendas e fraturas, etc. Esses tópicos serão discutidos no capítulo seguinte.

6.2. ANFIBÓLIOS

Os anfibólios são minerais encontrados apenas esporadicamente nos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Ocorrem subordinadamente aos piroxênios, com os quais guardam na maior parte das vezes relações de substituição. Aparecem como duas variedades texturais distintas, a mais comum sendo um anfibólio parcial ou totalmente incluído em cristais de piroxênio. A segunda variedade acha-se restrita aos lujauritos I dos corpos lujauríticos ocidental e oriental; nessas rochas, o mineral aparece na for

ma de grandes cristais poiquilíticos, de contorno irregular e totalmente intersticiais, de evidente cristalização tardia, porém em quantidades não superiores a 0,1-0,2% modal. Nas duas oportunidades as propriedades ópticas são semelhantes, em particular o pleocroísmo, α = verde-azulado e γ = verde-amarelado claro. Em alguns casos observa-se zoneamento óptico, ao qual correspondem pequenas variações no quimismo.

6.2.1. Estrutura

A feição estrutural característica dos anfibólios é a presença de cadeias duplas de tetraedros de $(\text{Si}, \text{Al})\text{O}_4$, que se estendem indefinidamente na direção do eixo c da cela unitária (Fig. 58a). Nessa direção, as cadeias acham-se formadas por anéis sucessivos de seis tetraedros, dos quais quatro deles compartilham três dos seus vértices, como nas micas (T_1 na Fig. 58a), enquanto que os dois tetraedros laterais possuem dois vértices livres (T_2 na Fig. 58a). No centro dos anéis, e no plano dos oxigênios apicais, encontram-se os ânions monovalentes dos anfibólios (OH, F, e Cl). Pares de cadeias adjacentes na direção aproximada do eixo a apresentam seus oxigênios apicais dispostos frente a frente e ligados por cátions divalentes e trivalentes de tamanho médio, entre 0,53 e 0,83, denominados cátions do tipo C (Mg, Fe^{2+} , Mn, Al, etc.; Leake, 1978; Hawthorne, 1981), que ocupam posições estruturais M_1 , M_2 e M_3 com coordenação octaédrica (Fig. 58a). Nas partes mais externas dos elos do par de cadeias, situam-se os cátions de tipo B (Na, Ca, e outros) de maior tamanho, ocupando os sítios M_4 , com número de coordenação 6 a 8 (Fig. 58a); esses cátions proporcionam as forças de atração necessárias para a união dos pares de cadeias vizinhas.

A estrutura dos anfibólios pode ser melhor visualizada na Fig. 58b, considerando que consiste em unidades ou "módulos", trazendo uma camada de cátions octaédricos entre duas tetraédricas, ligadas lateralmente em zig-zag pelos cátions de tipo B com coordenação 6 a 8. Entre os vários módulos existem cavidades que podem estar vazias ou ocupadas por cátions grandes; são

Figura 58 - Estrutura $C2/m$ dos anfibólios, à qual pertence a maioria dos grupos, entre eles o dos anfibólios alcalinos.

a) Projeção no plano (100), (reprodução de Hawthorne, 1981). T(1), T(2): cátions com coordenação tetraédrica; M(1), M(2), M(3): cátions com coordenação octaédrica; M(4): cátions com número de coordenação 6 a 8. Os espaços vazios entre os pares de cadeias podem estar ocupados por cátions A, com coordenação 10 a 12. O(1), O(2): oxigênios apicais; O(4), O(5), O(6), O(7): oxigênios basais. As posições O(3) podem estar parcial ou totalmente ocupadas por OH^- , F, Cl ou O_2^{2-} . b) Projeção segundo o eixo cristalográfico c (reprodução de Cameron e Papike, 1979) mostrando os "módulos" constituídos por uma camada octaédrica entre duas tetraédricas (parte sombreada), unidos em zig-zag pelos cátions M(4). Os espaços vazios entre os módulos podem estar ocupados por cátions A.

as denominadas posições A (Na e K) com número de coordenação 10 a 12.

6.2.2. Química e nomenclatura

Dada a complexidade estrutural e química dos anfibólios, e a impossibilidade de correlacionar-se adequadamente as propriedades ópticas com a composição química, opta-se nos trabalhos mais modernos por classificar os anfibólios com base na química cristalina (Leake, 1978; Hawthorne, 1981; Robinson *et.al.*, 1982).

A fórmula geral dos anfibólios é a seguinte:

onde A: Na, K; B: Na, Ca (e, em menores proporções, também Mn, Fe²⁺ e Mg); C: Mg, Fe²⁺, Mn, Al, Fe³⁺, Ti (e outros); T: Si, Al.

As fórmulas dos anfibólios são calculadas na base de 24 ânions (O, OH, F, Cl) quando conta-se com análises completas, ou então, na base de 23 oxigênios, para o caso de análises incompletas (Borg, 1967).

Uma proposta geral de classificação (Leake, 1978) baseia-se nas proporções dos cátions B mais importantes (Ca e Na), que na estrutura ocupam as posições M₄. Os grupos assim definidos denominam-se da seguinte maneira:

Ferro-Magnésio-Manganês anfibólios	$(Ca + Na)_B < 1,34$
Anfibólios cálcicos	$(Ca + Na)_B \geq 1,34; Na_B < 0,67$
Anfibólios sódico-cálcicos	$(Ca + Na)_B \geq 1,34; 0,67 \leq Na < 1,34$
Anfibólios alcalinos	$Na_B \geq 1,34$

Essa primeira divisão permite classificações posteriores, mais detalhadas, em função das proporções catiônicas

presentes em outras posições.

Os anfibólios de interesse no presente trabalho são os alcalinos, que se subdividem em glaucofânio-riebeckita e eckermannita-arfvedsonita, segundo qual o teor de Na + K nas posições estruturais A, tal como ilustra a Fig. 59.

Por outro lado, adjetivos adequados acrescentados ao nome do anfibólio permitem identificar as variedades ricas em Ti, Mn, etc. (Leake, 1978).

Cálculo da fórmula estrutural dos anfibólios

Não existe maneira adequada de se conhecer a verdadeira distribuição dos cátions na cela unitária dos anfibólios se a relação $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ é desconhecida. Com efeito, o quimismo dos anfibólios é tão complexo que praticamente qualquer esquema de cálculo permite satisfazer as condições cristaloquímicas do mineral. Esse argumento é melhor entendido quando se considera que Fe^{2+} encaixa-se nas posições B e C (ver fórmula geral). Se for processada qualquer mudança no estado de oxidação do Fe por meio de cálculo, o Fe^{3+} simplesmente ocupará as posições C, diminuindo com tal artifício o conteúdo de Fe^{2+} em C e, eventualmente, também em B. Paralelamente, deve-se lembrar que os sítios A podem estar totalmente vazios (ver fórmula geral e Fig. 58a,b). Consequentemente, variações na relação $\text{Fe}^{2+}:\text{Fe}^{3+}$ afetam também o teor de Na nas posições B, havendo simplesmente uma transferência de Na de B para A (para discussão mais completa do assunto, ver Robinson *et al.*, 1982).

No presente trabalho, as fórmulas estruturais foram calculadas na base de 23 oxigênios, assumindo-se todo o Fe como FeO. Para poder obter limites extremos, ainda que irreais, na composição dos anfibólios, algumas fórmulas estruturais foram também calculadas com o Fe total como Fe_2O_3 (ver Robinson *et al.*, 1982).

6.2.3. Quimismo de anfibólitos de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Em geral todos os anfibólitos de nefelina sienitos, portadores de feições ópticas semelhantes, apresentam quimismo relativamente uniforme, independentemente das características texturais do mineral. Nos lujauritos I, os anfibólitos são intersticiais e exibem um fraco zoneamento químico. Nas rochas de outros corpos, em particular, dos nefelina sienitos com eudialita do Serrote, nefelina sienitos ocidentais com eudialita e chibinitos de Botelhos e do corpo lujaurítico ocidental, o mineral ocorre no interior dos cristais de piroxênio prismático como "áreas" de contorno irregular, em cristais muito pequenos intersticiais ou ainda em grãos maiores penetrando o piroxênio (Fotomicrografia 24). A interpretação mais procedente é a de que o anfibólito tardio encontra-se substituindo o piroxênio. Nos nefelina sienitos finos ocidentais, o anfibólito ocupa os núcleos dos pequenos prismas de piroxênio.

As análises de microsonda dos anfibólitos dos corpos acima citados, exceção feita aos nefelina sienitos finos ocidentais (ver Apêndice), integram as Tabelas 58 e 59, juntamente com as proporções catiônicas. Nelas verifica-se que o quimismo dos diferentes anfibólitos é muito semelhante, permitindo uma discussão conjunta das suas principais características.

Os anfibólitos dos nefelina sienitos são alcalinos, com mais de 6,5% de Na_2O e mais de 2,0% de K_2O , além de teores baixos de CaO e Al_2O_3 . Adicionalmente, mostram-se relativamente ricos em MnO .

A identificação do tipo de anfibólito pode ser feita utilizando-se a aproximação mencionada em páginas precedentes, segundo a qual o Fe total da análise é calculado primeiramente como Fe^{2+} e, mais tarde, como Fe^{3+} . Esse procedimento permite indicar quais são as ocupações máximas e mínimas nas posições A, e quais os valores limites da relação $\text{Mg}/\text{Mg} + \text{Fe}^{2+}$. Na

Tabela 58
Composição química de anfibólios de Iajaritos I e II
Corpo Ocidental

	Corpo Ocidental								Corpo Oriental
	I				II				I
	46a		46b		135		136	505	
	z	z	z	z	z	z	m	m	
SiO ₂	50,3	52,8	52,6	54,1	51,8	53,9	50,5	50,8	
TiO ₂	1,42	0,40	0,70	0,46	1,40	0,62	1,49	1,30	
Al ₂ O ₃	1,68	0,64	0,77	0,58	1,54	1,03	1,66	1,25	
FeO ¹	22,1	14,5	17,6	12,9	19,7	17,2	19,6	17,6	
MnO	3,84	5,99	5,26	5,94	2,28	3,37	2,99	2,97	
MgO	7,37	10,8	8,31	11,0	6,98	8,81	7,41	8,01	
CaO	1,52	0,69	0,96	0,70	1,90	1,67	2,07	1,38	
Na ₂ O	7,16	6,97	7,23	7,05	7,60	8,00	7,57	8,42	
K ₂ O	2,20	3,38	2,82	3,64	2,26	2,13	2,23	2,39	
F	1,50	1,73	1,61	1,93	1,66	1,78	1,47	1,70	
Total	99,09	97,90	97,86	98,30	97,12	98,51	96,99	95,82	
O ≡ F	-0,63	-0,73	-0,68	-0,81	-0,70	-0,75	-0,62	-0,71	
Fórmula estrutural ²									
Si	7,798	8,083	8,114	8,187	8,048	8,163	7,895	7,999	
Al	0,202						0,105	0,001	
Al	0,105	0,115	0,140	0,104	0,281	0,184	0,201	0,231	
Ti	0,165	0,046	0,082	0,052	0,164	0,071	0,176	0,154	
Fe	2,861	1,851	2,277	1,627	2,557	2,181	2,560	2,312	
Mn	0,504	0,776	0,688	0,761	0,299	0,432	0,395	0,396	
Mg	1,703	2,467	1,913	2,480	1,616	1,991	1,727	1,879	
Ca	0,252	0,113	0,158	0,113	0,316	0,271	0,348	0,232	
Na	2,151	2,067	2,164	2,068	2,287	2,351	2,295	2,567	
K	0,435	0,659	0,556	0,703	0,448	0,413	0,445	0,481	
Mg	22,2	31,5	25,2	32,5	22,4	27,0	23,3	24,6	
Fe + Mn	44,0	33,6	39,0	31,2	39,6	35,5	39,8	39,9	
Na + K	33,8	31,9	35,8	36,3	38,0	37,5	36,9	35,5	

Tabela 59

Composição química de anfibólios de nefelina sienitos vários

	Chibinitos do corpo lujarítico ocidental	Chibinitos de Botelhos	Nefelina sienitos com eudialita do Serrote	Nefelina sienitos ocidentais com eudialita	
	142	462	159	389	522
	m	m	m	m	m
SiO ₂	52,6	49,4	52,7	54,7	51,2
TiO ₂	0,94	1,15	0,58	1,02	1,37
Al ₂ O ₃	1,36	1,99	1,04	1,17	1,45
FeO	15,9	19,6	17,3	16,8	20,7
MnO	4,10	3,48	2,98	3,27	3,78
MgO	11,3	7,00	10,2	9,64	8,79
CaO	2,26	1,94	1,92	1,59	1,79
Na ₂ O	6,78	8,37	6,21	8,42	7,82
K ₂ O	3,34	2,19	3,07	1,99	1,97
F	1,60	1,70	1,53	1,50	1,47
Total	100,18	96,82	97,53	100,10	100,34
O ≡ F	-0,67	-0,71	-0,64	-0,63	-0,62
Fórmula estrutural					
Si	7,875	7,809	8,062	8,102	7,777
Al	0,125	0,191			0,223
Al	0,114	0,180	0,188	0,204	0,037
Ti	0,106	0,137	0,067	0,113	0,157
Fe	1,983	2,599	2,218	2,080	2,630
Mn	0,519	0,467	0,386	0,410	0,487
Mg	2,512	1,652	2,321	2,126	1,990
Ca	0,362	0,328	0,315	0,252	0,292
Na	1,969	2,569	1,845	2,415	2,304
K	0,638	0,442	0,600	0,377	0,383
Mg	33,0	21,4	31,5	28,7	25,5
Fe + Mn	32,8	39,7	35,3	33,6	40,0
Na + K	34,2	38,9	33,2	37,7	34,5

Tabela 60 expõe-se o cálculo feito para uma análise de anfibólio de lujauro I; a distribuição dos cátions é realizada segundo critérios cristaloquímicos evidentes a partir da fórmula geral indicada previamente. A ocupação máxima e mínima de cátions em A é de 0,98 e 0,74, disso resultando que o mineral pertence à série eckermannita-arfvedsonita (Fig. 59). Por outro lado, o Al aparece em teores muito baixos e, muito provavelmente, concentrado nas posições tetraédricas. O teor mínimo de $Mg / (Mg + Fe^{2+})$ é de 0,46, com $Fe_{total} = Fe^{2+}$, enquanto que a relação $Fe^{3+} / (Fe^{3+} + Al)$ possivelmente será maior que 0,5. Devido portanto ao teor relativamente elevado de Mg, e à presença constante de quantidades apreciáveis de Mn (entre 0,3 e 0,8 átomo por fórmula padrão), pode-se identificar o anfibólio em questão como sendo uma magnésio-arfvedsonita manganesífera.

Idêntica conclusão aplica-se aos anfibólios de outro fácies face à semelhança no quimismo (Tabelas 58 e 59).

6.2.4. Considerações petrológicas

As arfvedsonitas, em sentido amplo, são os típicos anfibólios de rochas peralcalinas muito diferenciadas, possuindo provavelmente um índice agpaítico elevado (Giret *et al.*, 1980, Rock, 1982). Correspondem sempre a minerais de cristalização magmática tardia, podendo ser até hidrotermais (Fabriès, 1978), e formam-se a partir de líquidos residuais peralcalinos, ricos em voláteis e muito pobres em Al (Nolan, 1966). Caracterizam-se quimicamente por possuírem teores elevados de Si+Na+K (maiores que 10 átomos por fórmula padrão) e menos de 1,0 átomo de $Ca + Al^{IV}$; por outro lado, as relações Mg:Fe, são muito variáveis (Fabriès, 1978; Giret *et al.*, 1980).

Nesse contexto, as características químicas e texturais das magnésio-arfvedsonitas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas não merecem maiores comentários. No capítulo sobre os piroxênios, já foram discutidas as suas possíveis relações com as magnésio-arfvedsonitas (itens 5.7.4 e 5.7.5).

Tabela 60

Distribuição dos cátions nas diferentes posições estruturais para uma análise de anfibólio de Iujaurito I.

Os cálculos foram feitos considerando o Fe como FeO (colunas 1) e como Fe₂O₃ (colunas 2)

Amostra 46b			1	2				1	2
SiO ₂	52,6	Si	8,114	7,737	Si	8,114	7,737		
Al ₂ O ₃	0,77	Al	0,140	0,134	Al		0,134		
TiO ₂	0,70	Ti	0,082	0,078	Fe ³⁺		0,129		
Fe ₂ O ₃	19,6	Fe ³⁺	-	2,170	ΣT	8,114	8,000		
FeO	17,6	Fe ²⁺	2,277	-					
					Al	0,140			
MnO	5,26	Mn	0,683	0,656					
					Ti	0,082	0,078		
MgO	8,31	Mg	1,913	1,823	Fe ³⁺		2,041		
CaO	0,96	Ca	0,158	0,151					
					Fe ²⁺	2,277			
Na ₂ O	7,23	Na	2,164	2,062					
					Mn	0,588	0,656		
K ₂ O	2,82	K	0,556	0,530					
					Mg	1,913	1,823		
F	1,61								
		Total	16,092	15,341	ΣC	5,000	4,598		
					Mn	0,100			
					Ca	0,158	0,151		
					Na	1,742	1,849		
					ΣB	2,000	2,000		
					Na	0,422	0,213		
					K	0,556	0,530		
					ΣA	0,978	0,743		

Mg	
0,46	
Mg + Fe ²⁺	
Fe ³⁺	
1,0	
Fe ³⁺ + Al ^{VI}

Figura 59 - Classificação e nomenclatura dos anfibólios alcalinos , segundo Hawthorne (1981).

Comparação do quimismo das magnésio-arfvedsonitas das rochas de Poços de Caldas com o de arfvedsonitas de outros maciços alcalinos

Na Fig. 60, acham-se projetados os dados químicos das magnésio-arfvedsonitas de Poços de Caldas, juntamente com análises de arfvedsonitas e magnésio-arfvedsonitas da literatura. Os anfibólios de Ilímaussaq e Shonkin Sag contêm pouco Mg, enquanto que os do Complexo de Gardiner mostram-se mais ricos; já as magnésio-arfvedsonitas de Lovozero são semelhantes às de Poços de Caldas. Apesar de o conjunto de dados ser pouco representativo, parece que se confirmam as interpretações de Ernst (1962), que indicam que a relação Fe/Mg dos anfibólios alcalinos depende essencialmente dos líquidos dos quais cristalizam. Nota-se que os magmas de Ilímaussaq são muito pobres em Mg (Larsen, 1976), enquanto que os piroxênios sódicos das rochas de Gardiner exibem tendência de extremo enriquecimento em Mg (ver Nielson, 1979).

Por outro lado, as arfvedsonitas de Poços de Caldas diferenciam-se das demais pelo teor sistematicamente elevado de K e, sobretudo, de Mn.

As magnésio-arfvedsonitas analisadas dos vários corpos de nefelina sienitos são muito parecidas, com essa constância química sugerindo, em primeiro plano, cristalização sob condições de P, T, etc. semelhantes (ver item a seguir).

Temperaturas de cristalização

Trabalhos petrográficos e experimentais (Ernst, 1962, 1968; Nash e Wilkinson, 1970) indicam que as arfvedsonitas ricas em F provavelmente se cristalizaram em temperaturas mais e levadas que as carentes desse elemento (ver item 5.7.4). Para arfvedsonitas com 1,5% de F, Nash e Wilkinson (1970) estimam um limite máximo de temperatura de cristalização de 700°C.

Estimativas limites podem ser estabelecidas para

Figura 60 - Diagrama Mg-(Fe+Mn)-(Na+K) de arfvedsonitas de rochas de vários maciços alcalinos.

Fe = Fe (total calculado como Fe^{2+}). Os dados representam porcentagem de átomos. Campo 1: Ilímaussaq (Larsen, 1976); 2: Shonkin Sag (Nash e Wilkinson, 1970); 3: Lovozero (Vlasov *et al.*, 1966); 4: Gardiner (Nielsen, 1979). Dados de magnésio-arfvedsonitas de nefelina sienitos de Poços de Caldas: Iujauritos I e II, cristais zonados conectados por "linhas de união" (●); nefelina sienitos com eudialita do Serrote, chibinitos de Botelhos, chibinitos do corpo Iujaurítico ocidental, nefelina sienitos ocidentais com eudialita (X), sem discriminar.

as rochas de Poços de Caldas recorrendo-se aos valores sugeridos pelo geotermômetro nefelina-feldspato potássico (ver item 4.4.4 e Tabela 36). Nos lujaunitos I, observa-se a presença de arfvedsonita poiquilítica intersticial de cristalização tardia. As temperaturas estimadas estão entre 500 e 540 °C, e são interpretadas como possíveis temperaturas de cristalização magmática (item 4.4.4); sugerem-se assim temperaturas dessa ordem de grandeza também para as arfvedsonitas. Arfvedsonitas tardias ocorrem com frequência nos nefelina sienitos ocidentais com eudialita; as relações texturais evidenciam claramente que o anfibólio substitui ao piroxênio (Fotomicrografia 24). Por outro lado, a composição de feldspatos e nefelinas nessas rochas é muito heterogênea, e tanto o geotermômetro de nefelina como o de nefelina-feldspato potássico fornecem temperaturas que variam de menos de 500°C, indicando reequilíbrio entre os minerais félsicos, até temperaturas de cristalização magmática em torno de 700°C. Assim, parece provável que a cristalização do anfibólio tenha se dado a temperaturas mais elevadas que nos lujaunitos, talvez próximas mesmo de 700°C. Uma característica notável dos nefelina sienitos ocidentais com eudialita é a possível existência de enigmatita (ver item 5.7.5), sugerindo f_{O_2} menores que as que prevaleceram durante a cristalização de outros nefelina sienitos, ou uma queda mais brusca da f_{O_2} , com a diminuição da temperatura. Poder-se-ia argumentar que, em condições de f_{O_2} menores, a arfvedsonita se cristaliza a T mais elevadas. De difícil interpretação contudo são as texturas reconhecidas nos nefelina sienitos finos ocidentais (por exemplo, am. 530). Não foi possível a obtenção de dados químicos dos anfibólios nessa rocha onde o mineral é encontrado somente no interior de cristais prismáticos de piroxênio. As feições texturais, em particular o contorno irregular do anfibólio, parecem indicar a substituição de piroxênio por arfvedsonita. Entretanto, este último mineral nunca ocorre como zona externa, evidência essa sugestiva de que a formação do anfibólio dos núcleos foi seguida pela cristalização de piroxênio, que seria nesse caso posterior. Não é possível decidir-se entre essas duas possibilidades apenas em função das relações texturais. De qualquer maneira, o geotermôme -

tro de nefelina estima uma temperatura da ordem de 750°C (item 4.4.4 e Tabela 36), representando aqui claramente temperaturas magmáticas de cristalização. Esse valor é uma estimativa limite para a cristalização da arfvedsonita: *superior* se o anfibólio for posterior ao piroxênio, e *inferior*, no caso oposto. De outra parte, esse anfibólio é opticamente idêntico aos anfibólios tardios presentes nos outros nefelina sienitos.

Em conjunto, e excluía a am.530, os dados sugerem temperaturas moderadas de cristalização para as arfvedsonitas, entre 500 e 600°C até um máximo de 700°C, coincidindo com as estimativas de Nash e Wilkinson (1970). É possível que o conteúdo elevado de F de todas as magnésio-arfvedsonitas de Poços de Caldas, da ordem de 1,5 a 1,9%, seja devido não tanto às altas temperaturas de cristalização, mas ao alto teor de Mg. Esta composição condiciona uma provável afinidade cristaloquímica com F, como citado para o caso das flúor-flogopitas (Ekström , 1972; Munoz e Ludington, 1974).

CAPÍTULO 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da mineralogia e petrografia dos nefelina sienitos de Poços de Caldas fornece elementos importantes para a interpretação das características petrológicas gerais das rochas faneríticas do maciço alcalino, em particular quando a ele se adicionam dados geológicos provenientes de trabalhos de campo. A seguir, é feito um resumo de algumas das conclusões descritas em capítulos precedentes, seguidas da discussão de itens de interesse petrológico.

Feldspatos potássicos

Os feldspatos potássicos constituem-se nos minerais mais abundantes das rochas do distrito; em geral são ricos em K e de grande complexidade estrutural, mostrando na maioria dos casos a coexistência de ortoclásio e microclínio de alta triclinicidade num mesmo cristal ou em diferentes grãos da amostra (item 3.4.2). Presume-se que o ordenamento dos feldspatos tenha se processado a partir de pequenos domínios altamente ordenados, os quais, ao crescerem, converteram o cristal em microclínio máximo; esse processo vê-se facilitado pelo caráter peralcalino dos magmas. Confirmam-se assim interpretações constantes da literatura que relacionam o ordenamento estrutural dos feldspatos não somente à velocidade de resfriamento das rochas, mas principalmente à influência dos magmas dos quais o feldspato cristaliza e/ou dos líquidos residuais alcalinos (Parsons e Boyd, 1971; Parsons, 1978). O processo de ordenamento em feldspatos potássicos é comumente acompanhado da redistribuição dos íons de Na, conduzindo à formação de pertitas. Nos nefelina sienitos estudados, as pertitas estão invariavelmente associadas a albita tabular, à qual se atribui origem metassomática; de outra parte, as áreas de feldspato potássico que hospedam a albita acham-se con-

vertidas em microclínio máximo. Ambos os processos - ordenamento estrutural dos feldspatos potássicos e redistribuição dos íons de Na (com eventual formação de pertitas e albita tabular) - são portanto fenômenos de reequilíbrio e demonstram, ainda que em escala reduzida, a influência da recristalização sob condições submagmáticas (controladas por soluções sódicas?).

Os feldspatos potássicos dos nefelina sienitos híbridos, ricos em Sr e com teores moderados de Ca e Ba, estão pouco ordenados uma vez que os difratogramas de raios X sugerem a coexistência de ortoclásio e microclínio de baixa triclinicidade (item 3.4.2). Supõe-se que os teores elevados de elementos menores e traços inibem o ordenamento estrutural.

Nefelinas

Em todas as rochas estudadas as nefelinas pertencem à variedade "meio-potássica" (Deer *et al.* 1966). Considera-se que os teores às vezes elevados de Fe^{3+} nesses minerais sejam devidos às razões $\text{Fe}^{3+}:\text{Fe}^{2+}$ altas dos magmas. Por outro lado, as variações nas quantidades de Na e K acham-se diretamente relacionadas às mudanças no "excesso de sílica" e são o resultado da história de resfriamento e recristalização das rochas. As nefelinas que ocorrem em rochas de granulação fina a média possuem composição variando de aproximadamente $\text{Ne}_{75}\text{Ks}_{20}\text{Qz}_5$ até $\text{Ne}_{71}\text{Ks}_{19}\text{Qz}_{10}$; o seu elevado excesso de sílica indica, segundo estudos experimentais (Hamilton e Mackenzie, 1960; Hamilton, 1961), cristalização em temperaturas elevadas, superiores a 700°C ou até mesmo 800°C . Em alguns nefelina sienitos de granulação média, a textura das rochas aponta para cristalização mais ou menos simultânea de feldspatos e nefelinas; nesses casos, a geotermometria de feldspatos e nefelinas fornece temperaturas de cristalização em torno de 600°C (Powell e Powell, 1977) condizente com os resultados obtidos em experimentos de fusão de rochas afins (Sood, 1981). Em todos os fácies de granulação grossa, a composição das nefelinas concentra-se no campo de Morozewicz-Buerger, localizado entre as composições $\text{Ne}_{75,1}\text{Ks}_{20,9}\text{Qz}_4$ e $\text{Ne}_{73}\text{Ks}_{27}$, que

em geral correspondem a temperaturas de cristalização inferiores a 500°C. A composição dessas nefelinas deve-se provavelmente a reequilíbrio submagmático.

Na maioria das vezes existe uma certa correspondência entre a composição das nefelinas e o estado estrutural dos feldspatos potássicos associados; as rochas com microclínio máximo possuem também nefelinas de baixa temperatura, próximas à composição de Buerger ($\text{Ne}_{73}\text{Ks}_{27}$). Sugere-se assim que a recristalização submagmática da nefelina afeta tanto as proporções de Na e K, como também as de Si e Al.

Piroxênios

Os piroxênios são os minerais ferromagnesianos mais típicos dos nefelina sienitos. Ocorrem com abundância nos lujaunitos e encontram-se praticamente ausentes em outras fácies e corpos (nefelina sienitos ocidentais com fluorita). Em geral variam de egirina-augitas (nos centros dos grãos) até egirinas (nas bordas); são também comuns os agregados de fibras intersticiais de egirina de cristalização tardia. Em três dos corpos investigados, as rochas possuem piroxênios com núcleos de soda-augita mais ou menos reabsorvidos. Nos nefelina sienitos híbridos e nos nefelinas sienitos finos do Anel Norte, esses núcleos acham-se melhor preservados e os piroxênios exibem zonamento contínuo, soda-augita → egirina-augita → egirina; nos nefelina sienitos finos ocidentais, os núcleos de soda-augita aparecem raramente. A reabsorção dos núcleos é atribuída a flutuações no f_{O_2} durante os estádios iniciais de cristalização dos magmas. O quimismo global dos piroxênios depende assim tanto da composição, como das condições de cristalização dos magmas.

As variações químicas mais marcantes resultam, em todos os casos, do aumento nos teores de Fe^{3+} e Na (do centro para a borda dos grãos) e à conseqüente diminuição de Ca, Mg e Fe^{2+} . No diagrama $\text{Mg}-(\text{Fe}^{2+}+\text{Mn})-\text{Na}$ os piroxênios de cada fácies ou corpo destacam-se por apresentar, em detalhe, uma tendência

de evolução característica ou até única. Por outro lado, os piroxênios de tipos petrográficos semelhantes mostram tendências paralelas ou convergentes (por exemplo, os vários fácies e corpos de chibinitos).

O conteúdo de alguns elementos menores, particularmente Zr e Ti, está diretamente relacionado ao caráter mais ou menos peralcalino e agpaítico dos magmas. Nos magmas agpaíticos, o Zr concentrado nos líquidos residuais forma, juntamente com outros cátions, os silicatos de metais raros, principalmente eudialita e, em consequência, as bordas egrínicas dos cristais de piroxênio mostram-se empobrecidas em Zr; observações semelhantes foram descritas para os piroxênios dos lujaunitos de Ilímaussaq (Larsen, 1976). Conclui-se assim que egrinas relativamente ricas em Zr devem ser características de magmas miasquíticos. Idêntico raciocínio aplica-se na interpretação do comportamento do Ti. Nos magmas miasquíticos, o Ti pode concentrar-se nos líquidos finais e, dessa forma, ingressar nas bordas dos cristais de piroxênio ou em outros minerais ferromagnesianos, uma vez formadas as fases titaníferas como titanita, magnetita, etc., que são comumente de cristalização precoce; ao contrário, nos magmas agpaíticos, o Ti aparece nos silicatos de metais raros de cristalização tardia.

Biotitas e anfibólios

As micas e os anfibólios (magnésio arfvedsonita) são minerais pouco importantes nos nefelina sienitos de Poços de Caldas. As magnésio arfvedsonitas ocorrem em alguns nefelina sienitos agpaíticos e também nos nefelina sienitos finos ocidentais (afinidade intermediária?), enquanto que as biotitas, que variam de magnésio-biotitas a ferro-biotitas, associam-se a grãos opacos e titanita, nas rochas de afinidade miasquítica. Os dois minerais aparecem em duas variedades texturais características. Na primeira, a biotita ou o anfibólio substituem ao piroxênio; já na segunda, o mineral máfico é, ora predominantemente intersticial aos piroxênios (biotita), ora mostra-se poiquilítico

e de crescimento tardio, englobando tanto a piroxênios como a minerais fêlsicos (anfibólio).

As biotitas possuem quimismo variado e complexo. As placas intersticiais exibem zoneamento peculiar, onde zonas mais ricas e mais pobres em ferro se interpenetram irregularmente; as relações texturais sugerem que as zonas mais magnesianas são contemporâneas ou mesmo anteriores aos piroxênios. Por outro lado, as micas que substituem ao piroxênio são sempre ricas em Fe. Observa-se assim uma evolução na cristalização das biotitas, passando de mais magnesianas para ferrosas.

As magnésio arfvedsonitas têm quimismo constante, sendo ricas em Mn e F. Nos lujaunitos I (de granulação grossa), o anfibólio ocorre na forma de grãos intersticiais, de cristalização tardia; os dados de nefelinas sugerem para esse fácies agpaítica temperaturas da ordem de 500 a 540°C, provavelmente próximas das verdadeiras temperaturas de cristalização magmática (Piotrowski e Edgar, 1970; Sood, 1981) o que, portanto, permite identificar um limite inferior de temperatura para a cristalização da magnésio arfvedsonita. Em outras rochas, por exemplo, nos nefelina sienitos ocidentais com eudialita, o anfibólio pode ter-se cristalizado a temperaturas mais elevadas (item 6.2.3).

Nefelina sienitos miasquíticos e agpaíticos

A antiga divisão entre rochas miasquíticas e agpaíticas com base apenas na relação molecular ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} / \text{Al}_2\text{O}_3$) é ampliada, incluindo-se feições mineralógicas resultantes do qui mismo distinto dos magmas. Nas rochas agpaíticas, o piroxênio po de estar associado a anfibólio arfvedsonítico aparecendo, na condição de acessórios, silicatos sem alumínio, portadores de metais raros. Nas rochas miasquíticas, ocorrem em quantidades acessórias minerais típicos de rochas calco-alcalinas normais: titanita, zircão, biotita, apatita, etc. Dessa forma, a composição dos minerais máficos e acessórios tende a mostrar o caráter ou a afinidade miasquítica ou agpaítica das rochas.

As observações petrográficas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas demonstram que essas rochas são muito variadas, tanto na sua mineralogia, como na textura. Assim, são tidos como nefelina sienitos tipicamente agpaíticos, os lujaunitos e chibinitos. Ao contrário, apresentam afinidade miasquítica sobretudo os nefelina sienitos híbridos e os nefelina sienitos finos do Anel Norte (ver resumo na Tabela 61).

Tabela 61

Afinidade miasquítica ou agpaítica de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Corpo ou fácies	Minerais máficos (exceto piroxênio) e acessórios	Afinidade
ANEL NORTE		
- os vários fácies dos corpos lujauniticos ocidental e oriental	arfvedsonita, eudialita, lamprofilita, rinquita, astrofilita, etc.	agpaítica
- NeS cinzas do Anel Norte	biotita, titanita, fluorita, opacos	miasquítica
- chibinitos de Botelhos e orientais	Arfvedsonita rara, eudialita, rinquita, lamprofilita, titanita, etc.	agpaítica
- NeS finos do Anel Norte	biotita escassa, opacos, titanita, fluorita giannetita.*	miasquítica
- pseudoleucita NeS	biotita, opacos	miasquítica
REGIÃO DO INTERIOR DO MACIÇO		
- NeS híbridos	biotita rara, titanita, opacos, giannetita.*	miasquítica
REGIÃO DO MORRO DO SERROTE		
- NeS com eudialita do Serrote	arfvedsonita rara, eudialita, lamprofilita, rinquita, titanita escassa, etc.	agpaítica
- NeS cinzas do Serrote	biotita, titanita, fluorita, opacos, etc.	miasquítica

- NeS com biotita do Serrote	biotita, titanita, fluorita, opacos, etc.	miasquítica
- NeS porfiríticos	titanita	miasquítica
REGIÃO OCIDENTAL DO ANEL NORTE		
- NeS ocidentais com fluorita	biotita, opacos, titanita, fluorita	miasquítica
- NeS ocidentais com eudialita	arfvedsonita rara, enigmatita?, eudialita, rinquita, titanita, opacos, giannetita*, etc.	intermediária-agpaítica
- NeS finos ocidentais	arfvedsonita escassa, opacos, titanita, giannetita*	miasquítica intermediária?

NeS: nefelina sienitos

(*) Giannetita, mineral miasquítico?

Ordem de cristalização dos minerais: agpaítica versus miasquítica

As evidências texturais mostram que, nos nefelina sienitos agpaíticos de Poços de Caldas, os feldspatos potássicos e/ou as nefelinas são as primeiras fases a cristalizarem (fases "liquidus"); em seguida, formam-se os piroxênios. Os piroxênios aparecem frequentemente como cristais prismáticos idiomórficos, por exemplo, nos lujauritos e nos nefelina sienitos traquitóides I e II; entretanto, as texturas sugerem que o hábito dos piroxênios egrínicos é uma característica que guarda mais relação com a cinética da cristalização antes que a sua sequência. Considere-se o caso dos lujauritos, nos quais os piroxênios são prismático-aciculares e ocorrem, no entanto, como grãos intersticiais aos cristais maiores de feldspato e nefelina, aos quais rodeiam fluidamente. Assim, nos nefelina sienitos agpaíticos respeita-se a "ordem agpaítica de cristalização", presente em rochas agpaíticas do mundo inteiro (Kogarko e Romanchev, 1977, entre outros).

Os nefelina sienitos híbridos são as rochas mais miasquíticas de Poços de Caldas. Nelas, os piroxênios contêm nú-

cleos de soda-augita, comumente reabsorvidos, e exibindo por vezes contornos idiomórficos. As bordas egrínicas dos grãos apresentam-se descontínuas e irregulares. Portanto, a textura sugere que os núcleos de soda-augita se formaram muito antes que as bordas egrínicas e, mais, que são anteriores, ou pelo menos contemporâneos, aos minerais félsicos. Esta conclusão encontra também apoio em argumentos cristaloquímicos. Assim, os núcleos de soda-augita mostram, do centro para as bordas, um aumento no conteúdo de Si e diminuição no teor de Al (item 5.7.1., Figs. 48 e 49). A interpretação mais plausível é a de que as soda-augitas que constituem os primeiros cristais a se formarem, só começam a incorporar menos Al ao entrarem em competição com uma fase rica em Al, ou seja, quando as nefelinas idiomórficas iniciam a sua cristalização. Nessas rochas, os piroxênios representam a fase "liquidus", seguida posteriormente pelos minerais félsicos.

Idades relativas dos corpos de nefelina sienitos

Os nefelina sienitos ocorrem na forma de corpos intrusivos pequenos e discretos, com o mapeamento não permitindo derivar as suas relações de idade. No entanto, algumas observações de detalhe feitas no Anel Norte e na região do Morro do Serrote fundamentam conclusões que podem ser extrapoladas, ainda que tentativamente, para todo o maciço (Ulbrich *et al.*, 1979; H.H.Ulbrich, em preparação). Na parte mais setentrional do Anel Norte, os nefelina sienitos cinzas são intrusivos nos tinguai^ltos e anteriores aos vários fácies que constituem o corpo lujaurítico ocidental. No Morro do Serrote, a provável sequência intrusiva é a seguinte: tinguai^ltos, seguidos pelos nefelina sienitos cinzas do Serrote, anteriores (?) aos nefelina sienitos com biotita do Serrote; por último, aparecem os nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Tem-se assim para as duas áreas uma possível sequência começando com nefelina sienitos menos agpaíticos (ou até miasquíticos), e culminando com invasões magmáticas de nefelina sienitos agpaíticos. Na Tabela 62 apresenta-se uma possível correlação de idades relativas de nefelina sienitos.

Tabela 62

Idade Relativa Inferida para vários corpos de nefelina sienitos
(Ulbrich *et al.*, 1979)

ANEL NORTE*		REGIÃO DO INTERIOR DO MACIÇO	REGIÃO DO MORRO DO SERROTE
mais novo	Corpos lujauríticos ocidental e oriental (chibinitos, NeS tra- quitóides I e II, lu- jauritos I e II). Chibinitos de Bote- lhos e orientais	_____?	NeS com eudialita do Serrote
			NeS com biotita do Serrote
			NeS cinzas do Ser- rote
	NeS cinzas do Anel Norte e NeS finos do Anel Norte	_____?_____ NeS híbridos_____?	NeS porfiríticos do Serrote

NeS: nefelina sienitos

* Não existem dados geológicos permitindo inferir-se a idade da colocação dos pseudoleucita nefelina sienitos (posteriores aos nefelina sienitos cinzas?).

Tipos evolutivos de magmas

A tentativa de estabelecer-se uma seqüência de intrusões (Tabela 62) sugere que a variedade de tipos magmáticos é certamente menor que a dos corpos mapeados. No contexto das litologias presentes em Poços de Caldas, o magma agpaítico dos lujauritos, por exemplo, deve ser visto como uma unidade à parte daquela que originou os nefelina sienitos cinzas, bem menos agpaítico (ou até miasquítico). Um mesmo tipo de magma parece dispor-se na forma de vários corpos discretos, geralmente muito separados entre si (ver Fig. 3, item 2.1.4). Assim, são demasiado comuns no distrito tipos faciológicos contendo eudialita e outros silicatos de metais raros como acessórios importantes ou, pelo menos, identificadores dos fácies. No *Anel Norte*, encontram-se os dois corpos lujauríticos e os chibinitos de Botelhos e orien-

tais. Na *região ocidental do Anel Norte*, reconhece-se o complexo corpo de nefelina sienitos ocidentais com eudialita e, na *região do Morro do Serrote*, afloram os nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Em detalhe, o quimismo de feldspatos, nefelinas e piroxênios desses corpos é muito variado; contudo, a evolução química dos minerais mostra-se semelhante para a maioria deles.

Como conclusão geral, pode-se dizer que cada corpo de nefelina sienito constitui uma *unidade geológica perfeitamente definida* por suas características mineralógicas, petrográficas, texturais e geológicas. Por outro lado, é também evidente que o *número de corpos individuais* excede notavelmente o dos *tipos magmáticos*. Do exposto, concebe-se a existência de pelo menos dois tipos de magmas na região, o agpaítico e o miasquítico (ou menos agpaítico); entretanto, essas duas denominações devem ser encaradas como de ordem geral, visto encobrirem variações maiores que a escassez de dados ainda não permite identificar.

Profundidade de cristalização dos nefelina sienitos

Uma das características notáveis do maciço de Poços de Caldas reside na coexistência de nefelina sienitos e tinguaítos. Muito provavelmente, os tinguaítos representam os precursores subvulcânicos dos tipos faneríticos. Quando observáveis, as relações entre esses dois tipos litológicos mostram invariavelmente caráter intrusivo; em geral são os nefelina sienitos os que invadem tinguaítos (Ulbrich *et al.*, 1979).

As primeiras manifestações magmáticas levaram à formação de importantes depósitos de rochas vulcanoclásticas, dos quais pouco resta atualmente (ver item 1.1.; Ellert, 1959). Assume-se que os tinguaítos, posteriores, resfriaram-se em ambiente subvulcânico aberto à superfície (condições explosivas?), enquanto que os nefelina sienitos invadiram rochas ainda aquecidas e cristalizaram-se em câmaras fechadas, porém, em profundidades não muito distintas das dos tinguaítos. Essas inferências acham-se reforçadas pelas características atuais do aparelho vulcânico que

aparece pouco erodido, com remanescentes de tufitos em muitas áreas, especialmente no interior do maciço. Assim, conclui-se que o conjunto dos nefelina sienitos cristalizou-se sob uma cobertura de poucos quilômetros, em ambiente essencialmente subvulcânico.

Temperaturas magmáticas de cristalização

Neste trabalho foram utilizados os dados de nefelinas e feldspatos potássicos coexistentes para estimar as possíveis temperaturas de cristalização das rochas; para tanto, recorreu-se aos geotermômetros de Hamilton (1961) e Powell e Powell (1977)

Nos fácies e corpos de granulação fina a média de natureza miasquítica (caso dos nefelina sienitos híbridos, nefelina sienitos finos do Anel Norte e nefelina sienitos finos ocidentais), a composição das nefelinas indica temperaturas que variam de 730°C até mais de 800°C. O conjunto das características geológicas dos corpos e fácies, assim como a textura das rochas e a composição dos feldspatos e nefelinas, sugerem que essas temperaturas devem estar próximas das verdadeiras temperaturas magmáticas de cristalização.

Os lujauritos II e os nefelina sienitos traquitóides I e II representam os únicos fácies de afinidade agpaítica nos quais tanto as evidências geológicas (fácies de "contato"), como as petrográficas (granulação média), apontam para um resfriamento mais ou menos rápido. Nessas rochas, o geotermômetro de Powell e Powell (1977) fornece temperaturas entre 580°C e 600°C.

Portanto, em Poços de Caldas, a temperatura de cristalização dos nefelina sienitos agpaíticos é menor que a dos miasquíticos, em consonância com as avaliações constantes da literatura. Com efeito, a maior peralcalinidade dos magmas agpaíticos condiciona uma maior solubilidade dos voláteis e, consequentemente, temperaturas menores do "liquidus", mas não necessariamente uma P_{H_2O} mais elevada (Piotrowski e Edgar, 1970; Kogarko e

Romanchev, 1977; Sood, 1981).

f_{O_2} e a cristalização dos minerais máficos

Admite-se que tanto o conteúdo como as variações de Fe^{3+} nos minerais máficos são predominantemente controlados por mudanças na f_{O_2} . Em geral, a ausência de faialita e enigmatita nos nefelina sienitos menos agpaíticos sugere que a cristalização dessas rochas processou-se sob condições de f_{O_2} muito elevadas, superiores às do "buffer" FMQ (item 5.7.5).

Nos nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos finos do Anel Norte, após a reabsorção dos núcleos de soda-augita, tem lugar a cristalização de uma "zona de transição" de egrina-augita de composição variável e pobre em Ti, conjuntamente com a qual se formam magnetita e titanita. Uma vez finalizada a cristalização desses minerais, as bordas egrínicas do piroxênio tornam-se mais ricas em Ti (item 5.7.6). A formação de magnetita e titanita é feita sob condições de f_{O_2} relativamente altas que parecem ser incompatíveis com a cristalização da soda-augita. Têm-se assim um evento brusco na sequência de cristalização, indicado sobretudo pela reabsorção da soda-augita dos núcleos dos cristais de piroxênio, que pode estar relacionado com algum fenômeno geológico marcante. Os estudos levados a efeito são ainda muito incompletos para tentar-se explicar todas essas feições. Nota-se, entretanto, que esses nefelina sienitos miasquíticos estão entre os primeiros a se colocarem, segundo a cronologia tentativa apresentada na Tabela 62, e possivelmente cristalizaram-se sob condições mais "abertas" que as dos corpos posteriores.

Inicialmente, as biotitas possuem composição mais magnesianas, terminando como micas ricas em annita (item 6.1.5). Essas variações são explicadas em função da diminuição tanto da temperatura, como da f_{O_2} dos magmas (item 6.1.5.; Fig. 54, item 5.7.4). A passagem de magnésio biotita para ferro biotita nas placas zonadas é brusca, o que sugere mudanças também acentuadas nas variáveis intensivas, principalmente na f_{O_2} . É interes-

sante comparar as rochas trazendo biotita como máfico freqüente (por exemplo, os pseudoleucita nefelina sienitos, os nefelina sienitos com biotita do Serrote e os nefelina sienitos ocidentais com fluorita) com aquelas onde o mineral é de ocorrência rara, caso particular dos nefelina sienitos híbridos nos quais a mica aparece apenas numa única lâmina, ou mesmo dos nefelina sienitos finos do Anel Norte, onde as placas de mica são muito pequenas e escassas. Todos esses corpos mostram afinidade miasquítica. A nível de discussão meramente qualitativa, pode-se considerar que, muito possivelmente, são poucos os fatores que controlam a cristalização de biotitas. As evidências geológicas e experimentais indicam que se necessita de condições mínimas de P_{H_2O} ; na sua ausência, dá-se a formação de outros minerais ferromagnesianos. Por outro lado, as relações entre os teores de K e Na e a razão Mg:Fe nos magmas respectivos devem ser favoráveis à cristalização do mineral; por exemplo, atividades elevadas de Na propiciam a formação de egirinas. Ao que tudo faz crer, os nefelina sienitos híbridos e os nefelina sienitos finos do Anel Norte cristalizaram-se provavelmente em condições de P_{H_2O} mais baixas. Os outros tipos por sua vez formaram-se em condições de P_{H_2O} mais elevadas; variações na P_{H_2O} influenciaram de forma imediata a f_{O_2} , condicionada através da reação de dissociação da água (Eugster e Wones, 1965), provocando assim mudanças na composição da biotita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amaral, G.; Bushee, J.; Cordani, U.G.; Kawashita, K. e Reynolds, J.H. (1967) Potassium-argon ages of alkaline rocks from southern Brazil. *Geochim.Cosmochim. Acta*, 31, 117-142.
- Aoki, K.I. (1964) Clinopyroxenes from alkaline rocks of Japan. *Amer.Mineral.*, 49, 1199-1223.
- Apello, C.A. (1978) Layer deformation and crystal energy of micas and related minerals. I-Structural models for 1M and 2M polytypes. *Amer.Mineral.*, 63, 782-792.
- Artur, A.C. (1980) Rochas metamórficas dos arredores de Itapira, SP. Dissert. de Mestrado, Inst. Geoc., USP, 192p.
- Ashry, M.M. (1962) Studies of three rock samples from Brazil. *Soc. Bras. Geol.*, Bol. 11, 89-116.
- Bailey, D.K. (1969) The stability of acmite in the presence of H_2O . *Amer.J.Sci.*, Schairer vol. 267-A, 1-16.
- Bailey, D.K. e Schairer, J.F. (1966) The system $Na_2O-Fe_2O_3-Al_2O_3-SiO_2$ at 1 atmosphere, and the petrogenesis of alkaline rocks. *J.Petrol.*, 7, 140-170.
- Bailey, S.W. (1967a) Polytypism of layer silicates. In Bailey, S. W. (ed.). Short Course Lecture Notes. Layer Silicates. *Amer. Geol. Inst.*, Washington, D.C., SB-1A- SB-28A.
- Bailey, S.W. (1967b) Crystal structure of layer silicates I. In Bailey, S.W. (ed.). Short Course Lecture Notes. Layer Silicates. *Amer.Geol.Inst.*, Washington, D.C., SB-1B - SB-21B.
- Bailey, S.W. (1967c) Crystal structure of layer silicate II. In Bailey, S.W. (ed.). Short Course Lecture Notes. Layer Silicates. *Amer.Geol.Inst.*, Washington, D.C., SB-1C - SB-17C.

- Bambauer, H.U. e Bernotat, W.H. (1982) The microcline/sanidine transformation isograd in metamorphic regions. I. Composition and structural state of alkali feldspars from granitoid rocks of two N-S traverses across the Aar Massif and Gotthard "Massif", Swiss Alps. Schweiz.Mineral. Petrogr. Mitt., 62, 185-230.
- Barbosa, O. (1934) Nota sobre algumas rochas da região de Poços de Caldas. An. Acad. bras. Ciênc., Ano 6, 211-219.
- Barbosa, O. (1936) Notas preliminares sobre o planalto de Poços de Caldas e suas possibilidades econômicas. Dep. Nac. Prod. Min./Serv.Fom.Prod.Min., Avulso 8, 33 p.
- Barbosa, O. (1948) Sobre a idade das rochas alcalinas e a origem do planalto de Poços de Caldas. Mineral. e Metalurg., vol. 13, nº 76, 235-237.
- Barth, T.F.W. (1963) The composition of nepheline. Schweiz. Mineral.Petrogr. Mitt., 43, 153-164.
- Bence, A.E. e Albee, A.L. (1968) Empirical correction factors for the electron microanalysis of silicates and oxides. J. Geol., 76, 382-403.
- Bilgrami, S.A. (1956) Manganese silicate minerals from Chikla, Bhandara district, India. Mineral. Mag., 31, 236-244.
- Björnberg, A.J.S. (1959) Rochas clásticas do planalto de Poços de Caldas. Fac. Fil. Ciênc. Let., USP, Bol. 237, 65-122.
- Borg, I.Y. (1967) On conventional calculations of amphibole formulae from chemical analyses with inaccurate $H_2O(+)$ and F determinations. Mineral.Mag., 36, 583-590.
- Borg, I.Y. e Smith, D.K. (1969) Calculated X-ray powder pat-

terns for silicate minerals. Geol. Soc. Amer., Mem. 122 , 896 p.

Borutskiy, B.Y. (1971) X-ray study of exsolution textures in alkalic feldspars from nepheline syenite of the Khibiny pluton. Tradução inglesa: Amer.Geol.Inst., Earth Sci. Section, 200, 140-143.

Bose, M.K. (1964) Observations on the nepheline syenites of Koprput, Orissa. Geol.Mag., 101, 558-563.

Branco, J.J.R. (1956) Notas sobre a geologia e petrografia do planalto de Poços de Caldas, MG. Esc. Eng., Univ. Minas Gerais, Inst. Pesq. Radioativas, Publ. 5, 72 p.

Brindley, G.W. (1967) Disorder in phyllosilicates. In Bailey, S.W. (ed.). Short Course Lecture Notes. Layer Silicates. Amer.Geol. Inst., Washington, D.C., GWB 1C - GWB 33C

Brown, F.H. (1970) Zoning in some volcanic nephelines. Amer.Mineral., 55, 1670-1680.

Brown, P., Essene, E.J. e Peacor, D.R. (1978) The mineralogy and petrology of manganese-rich rocks from St. Marcel, Piedmont, Italy. Contr. Mineral. Petrol. 67, 227-232.

Buddington, A.F. e Lindsley, D.H. (1964) Iron-titanium oxide minerals and synthetic equivalents. J.Petrol., 5, 310-357.

Buerger, M.J. (1947) The stuffed derivatives of the silica structures. J.Chem.Phys., 15, 600-614.

Burnham, C.W. (1962) Lattice constant refinement. Ann.Rep. Dir. Geophys. Lab., Carnegie Inst., Washington, Yearbook 61, 132-135.

Burns, R.G. e Huggins, F.E. (1973) Visible-region absorption

- spectra of a Ti^{3+} fassaite from the Allende meteorite: a discussion. *Amer.Mineral.*, 58, 955-961.
- Bushee, J. (1974) Geology and petrography of the Iujaurite and nearby rocks, Poços de Caldas, Brazil. Ph.D. thesis, Dept. of Geol. and Geophys., Univ. California, Berkeley, 137p.
- Cameron, M. e Papike, J.J. (1979) Amphibole crystal chemistry: a review. *Fortschr.Mineral.*, 57, 28-67.
- Cameron, M. e Papike, J.J. (1981) Structural and chemical variations in pyroxenes. *Amer.Mineral.*, 66, 1-50.
- Carmichael, I.S.E. (1962) Pantelleritic liquids and their phenocrysts. *Mineral.Mag.*, 33, 86-113.
- Carmichael, I.S.E. e Nicholls, J. (1967) Iron-titanium oxides and oxygen fugacities in volcanic rocks. *J.Geophys.Res.*, 72, 4665-4687.
- Cawthorn, R.G. e Collerson, K.D. (1974) The recalculation of pyroxene end-member parameters and the estimation of ferrous and ferric iron content from electron microprobe analyses. *Amer. Mineral.*, 59, 1203-1208.
- Cherry, M.E. e Trembath, L.T. (1979) The disordering of alkali feldspars. I. Dry heating of a microcline perthite. *Canad. Mineral.*, 17, 527-535.
- Choudhuri, A., Fiori, A.P. e Bettencourt, J.S. (1978) Charnockitic gneisses and granulites of the Botelhos region, southern Minas Gerais. *An. XXX Congr.Bras.Geol.*, Recife, vol. 3, 1236-1249.
- Clark, J.R. e Papike, J.J. (1968) Crystal-chemical characterization of omphacites. *Amer.Mineral.*, 53, 840-868.

- Cordani, U.G. e Bittencourt, I. (1967) Determinação de idade por potássio-argônio em rochas do grupo Açungui. An. XXI Congr. Bras. Geol., Curitiba, 218-233.
- Curtis, L.W. e Currie, K.L. (1981) Geology and petrology of the Red Wine alkaline complex, Central Labrador. Bull.Geol.Surv. Canada, 294, 59p.
- Curtis, L.W. e Gittins, J. (1979) Aluminous and titaniferous clinopyroxenes from regionally metamorphosed agpaitic rocks in Central Labrador. J.Petrol., 20, 165-186.
- Czygan, W. (1969) Petrographie und Alkali-Verteilung im Foyait der Serra de Monchique, Süd-Portugal. Neues Jb.Mineral.Abh. 111, 32-73.
- Deer, W.A.; Howie, R.A. e Zussman, J. (1963) Rock-Forming Minerals, vol. 4: Framework Silicates, Longmans, Londres, 435 p.
- Deer, W.A., Howie, R.A. e Zussman, J. (1966) An introduction to the Rock-Forming Minerals. John Wiley and Sons, Inc., Nova Iorque, 528 p.
- Deer, W.A.; Howie, R.A. e Zussman, J. (1978) Rock-Forming Minerals. Vol. 2A - Single Chain Silicates. 2^{da} ed., Longmans Group Ltd., Londres, 668 p.
- Donnay, G.; Schairer, J.F. e Donnay, J.D.H. (1959) Nepheline solid solution. Mineral.Mag., 32, 93-109.
- Dowty, E. e Clark, J.R. (1973) Crystal structure refinement and optical properties of a Ti^{3+} fassaite from the Allende meteorite. Amer. Mineral., 58, 230-242.
- Ebert, H. (1971) Os Paraibides entre São João del Rei, MG, e Itapira, SP, e a bifurcação entre Paraibides e Araxaides

XXV Congr.Bras.Geol., São Paulo, Resumo das Comunic., Bol. Espec. 1, 177-178.

Edgar, A.D. (1977) A comment on "agpaicity revisited: pattern recognition in the chemistry of nepheline syenite rocks" by Dagbert *et alli*. Geochim. Cosmochim. Acta, 41, 439-440.

Edgar, A.D. e Parker, L.M. (1974) Comparison of melting relationships of some plutonic and volcanic peralkaline under saturated rocks. Lithos, 7, 263-273.

Edwards, A.C. (1976) A comparison of the methods for calculating Fe^{3+} contents of clinopyroxenes from microprobe analyses. Neues Jahrb.Mineral.Monatsh., 1976, 508-512.

Ekström, T.K. (1972) The distribution of fluorine among some co-existing minerals. Contrib.Mineral.Petrol., 34, 192-200.

Ellert, R. (1959) Contribuição à geologia do maciço alcalino de Poços de Caldas. Fac.Fil.Ciênc.Let., USP, Bol. 237, 5-63.

Ellert, R.; Björnberg, A.J.S. e Coutinho, J.M.V. (1959) Mapa geológico do maciço alcalino de Poços de Caldas, Brasil. Fac. Fil. Ciênc. e Let., USP.

Emeleus, C.H. e Smith, J.V. (1959) The alkali feldspars. VI. Sanidine and orthoclase perthites from the Slieve Gullion area, Northern Ireland. Amer.Mineral., 44, 1187-1209.

Engel, A.E.J. e Engel, C.G. (1960) Progressive metamorphism and granitization of the Major paragneiss, northwest Adirondack Mountains, New York. Part II, Mineralogy. Geol. Soc. Amer., Bull. 71, 1-57.

Ernst, W.G. (1962) Synthesis, stability relations and occurrence of riebeckite-arfvedsonite solid solutions. J.Geol., 70, 951-980.

- Ernst, W.G. (1968) Amphiboles. Springer-Verlag, Nova Iorque, 125p.
- Fabriès, J. (1978) Les types paragénetiques des amphiboles sodiques dans les roches magmatiques. Bull.Minéral., 101, 155-165.
- Ferguson, A.K. (1977) The natural occurrence of aegirine-neptunite solid solution. Contr.Mineral.Petrol., 60, 247-253.
- Ferguson, A.K. (1978) Reply to G.Rossi on the "pretended" occurrence of aegirine-neptunite solid solution. Contr.Mineral. Petrol., 66, 111-112.
- Ferguson, J. e Currie, K.L. (1970) Evidence of liquid immiscibility in alkaline ultrabasic dikes at Callander Bay, Ontario. J. Petrol., 12, 561-585.
- Ferguson, J. e Pulvertaft, T.C.R. (1963) Contrasted styles of igneous layering in the Gardar province of South Greenland. Mineral.Soc.Amer., Spec. Paper 1, 10-21.
- Finger, L.W. (1972) The uncertainty in the calculated ferric iron content of a microprobe analysis. Ann.Rep.Dir.Geophys.Lab., Carnegie Inst., Washington, Yearbook 71, 600-603.
- Fiori, A.P.; Wernick, F. e Bettencourt, J.S. (1978) Evolução políclica na região nordeste do Estado de São Paulo e áreas vizinhas do Estado de Minas Gerais. An. XXX Congr. Bras. Geol. Recife, vol. 1, 309-320.
- Flower, M.J.F. (1974) Phase relation of titan-acmite in the system $\text{Na}_2\text{O}-\text{Fe}_2\text{O}_3-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{TiO}_2-\text{SiO}_2$ at 1000 bars total water pressure. Amer.Mineral., 59, 536-548.
- Foster, M.D. (1960) Interpretation of the composition of trioctahedral micas. U.S. Geol. Surv., Prof. Paper 354-B, 48p.

- Fujimori, K. (1974) Minerais radioativos do Campo Agostinho, Poços de Caldas, MG., Tese de Livre Docência, Inst.Geoc., USP, 161 p.
- Gerassimovsky, V.I. e Kuznetsova, S.Ya. (1967) On the petrochemistry of the Ilímaussaq intrusion, South Greenland. Tradução inglesa; *Geochem.Int.*, 4, 236-246.
- Gerasimovsky, V.I.; Volkov, V.P.; Kogarko, L.N. e Polyakov, A.I. (1974) Kola Peninsula. In Sørensen, H. (ed.). *The Alkaline Rocks*. John Wiley and Sons, Inc., Londres, 206-221.
- Gibb, F.G.F. (1973) The zoned clinopyroxenes of the Shiant Isles Sill, Scotland. *J.Petrol.*, 14, 203-230.
- Gilbert, M.C. (1969) High-pressure stability of acmite. *Amer.J. Sci.*, Schairer Vol. 267-A, 145-159.
- Giret, A.; Bonin, B. e Leger, J.M. (1980) Amphibole compositional trends in oversaturated and undersaturated alkaline plutonic ring-complexes. *Canad.Mineral.*, 18, 481-495.
- Goldsmith, J.R. e Laves, F. (1954) The microcline-sanidine stability relations. *Geochim.Cosmochim. Acta*, 5, 1-19.
- Gomes, C.B.; Moro, S.I. e Dutra, C.V. (1970) Pyroxenes from the alkaline rocks of Itapirapuã, São Paulo, Brazil. *Amer.Mineral.*, 55, 224-230.
- Gorsky, V.A. e Gorsky, E. (1974) Contribuição à mineralogia e petrografia do planalto de Poços de Caldas. *Com.Nac. Energia Nuclear*, Bol. 13, 93p.
- Grapes, R.; Yagi, K. e Okumura, K. (1979) Aenigmatite, sodic pyroxene, arfvedsonite and associated minerals in syenites from Morotu, Sakhalin. *Contrib.Mineral.Petrol.*, 69, 97-103.

- Guidotti, C.V.; Herd, H.H. e Tuttle, C.L. (1973) Composition and structural state of K-feldspars from K-feldspar + sillimanite grade rocks in northwestern Maine. Amer.Mineral., 58, 705-716.
- Guimarães, D. (1947) Origem das rochas alcalinas. Inst.Tecnol. Ind., Minas Gerais, Bol. 5, 103 p.
- Guimarães, D. (1948) The zirconium ore deposits of the Poços de Caldas Plateau, Brazil, and zirconium geochemistry. Inst. Tecnol.Ind., Minas Gerais, Bol. 6, 79 p.
- Guimarães, D.; Campos, M. e Figueiredo, D.G. (1953) Algumas rochas alcalinas de Poços de Caldas relacionadas com as jazidas de caldasito uranífero. Esc.Eng., Univ. Minas Gerais, Inst.Pesq.Radioativas, Publ. 2, 1-34.
- Guimarães, D. e Dutra, C.V. (1962) Contribuição à geoquímica das rochas alcalinas do Brasil. Dep.Nac.Prod.Min./Div.Fom.Prod. Min., Bol. 112, 50-70.
- Hamilton, D.L. (1961) Nephelines as crystallization temperature indicators. J.Geol., 69, 321-329.
- Hamilton, D.L. e Mackenzie, W.S. (1960) Nepheline solid solution in the system NaAlSiO_4 - KAlSiO_4 - SiO_2 . J.Petrol., 1, 56-72.
- Hamm, H.M. e Vieten, K. (1971) Zur Berechnung der kristall-chemischen Formel und des Fe^{3+} -Gehaltes von Klinopyroxenen aus Elektronen-Strahl-Mikroanalysen. Neues Jahrb.Mineral. Monatsh., 1971, 310-314.
- Hartmann, P. (1969) Can Ti^{4+} replace Si^{4+} in silicates? Mineral. Mag., 287, 366-368.
- Hawthorne, F.C. (1981) Crystal chemistry of the amphiboles. Mineral.Soc.Amer. Reviews in Mineralogy, vol. 94: Amphiboles

- and Other Hydrous Pyriboles - Mineralogy, 1-102.
- Heier, K.S. (1962) Trace elements in feldspars - A review. Norsk Geol.Tidsskr., 42, 415-454.
- Heier, K.S. (1966) Some crystallo-chemical relations of nephelines and feldspars on Stjernøy, North Norway. J.Petrol. 7, 95-113.
- Heinrich, F.W. (1946) Studies in the mica group; the biotite phlogopite series. Amer.J.Sci., 244, 836-848.
- Heinrich, F.W. (1965) Microscopic identification of Minerals. McGraw Hill Book Co., Nova Iorque, 414 p.
- Heinrich, E.W. (1966) The Geology of Carbonatites. Rand McNally, Chicago, 555 p.
- Hertz, N. e Dutra, C.V. (1966) Trace elements in alkali feldspars, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. Amer. Mineral., 51, 1593-1607.
- Hollister, L.S. e Gancarz, A.J. (1971) Compositional sector-zoning in clinopyroxene from the Narce area, Italy. Amer. Mineral., 56, 959-979.
- Huckenholtz, H.G.; Schairer, F.J. e Yoder, Jr. H.S. (1969) Synthesis and stability of ferridiopside. In Papike, J.J. (ed.). Pyroxenes and Amphiboles: Crystal chemistry and phase petrology. Mineral.Soc.Amer., Spec. Paper 2, 163-177.
- Huebner, S.J. (1981) Pyroxene phase equilibria at low pressure. Mineral.Soc.Amer. Reviews in Mineralogy, vol. 7: Pyroxenes, 213-288.
- Hutchison, C.S. (1974) Laboratory Handbook of Petrographic Techniques. John Wiley and Sons, Inc., Nova Iorque, 527 p.

- Johannsen, A. (1931) A descriptive petrography of the igneous rocks. Vol. 1 - Introduction, textures, classifications and glossary. Univ. Chicago Press, Chicago, 318 p.
- Jones, A. e Peckett, A. (1980) Zirconium-bearing aegirines from Motz feldt, South Greenland. *Contr.Mineral.Petrol.*, 75, 251-255.
- Kogarko, L.N. (1974) Rôle of volatiles. In Sørensen, H. (ed.). *The Alkaline Rocks*. John Wiley and Sons, Inc., Londres, 474-487.
- Kogarko, L.N e Romanchev, B.P. (1977) Temperature, pressure, redox conditions and mineral equilibria in agpaitic nepheline syenites and apatite-nepheline rocks. *Tradução inglesa : Geochem. Int.*, 113-128.
- Kushiro, I. (1960) Si-Al relations in clinopyroxenes from igneous rocks. *Amer.J.Sci.*, 258, 548-554.
- Kushiro, I. (1962) Clinopyroxene solid solution. Part.I. The $\text{CaAl}_2\text{SiO}_6$ component. *Japan J.Geol. Geogr.*, 33, 213-220.
- Larsen, L.M. (1976) Clinopyroxenes and coexisting mafic minerals from the alkaline Ilímaussaq intrusion, South Greenland. *J. Petrol.*, 17- 258-290.
- Larsen, L.M. (1977) Aenigmatites from the Ilímaussaq intrusion, South Greenland: chemistry and petrological implications. *Lithos*, 10, 257-270.
- Larsen, L.M. (1981) Sector zoned aegirine from the Ilímaussaq alkaline intrusion, South Greenland. *Contr.Mineral.Petrol.*, 76, 285-291.
- Laves, F. (1952) Phase relations of the alkali feldspars. I. Introductory remarks. *J.Geol.*, 60, 436-450.

- Laves, F. e Viswanathan, K. (1967) Relations between optic axial angle and triclinicity of potash feldspars and their significance for the definition of "stable" and "unstable" states of alkali feldspars. Schweiz.Mineral.Petrogr.Mitt. , 47, 147-162.
- Leake, B.E. (1978) Nomenclature of amphiboles. Canad.Mineral. , 16, 501-520.
- Leung, I. (1974) Sector-zoned titanaugites: morphology, crystal chemistry, and growth. Amer.Mineral., 59, 127-138.
- Lindsley, D.H. e Haggerty, S.E. (1971) Phase relations of Fe- Ti oxides and aenigmatite; oxygen fugacity of the pegmatoid zones. Ann.Rep.Dir.Geophys.Lab., Carnegie Inst., Washington, Yearbook 69, 278-284.
- Long, P.E. (1978) Experimental determination of partition coefficients for Rb, Sr, and Ba between alkali feldspar and silicate liquid. Geochim.Cosmochin. Acta, 42, 833-846.
- Mackenzie, W.S. (1954) The orthoclase-microcline inversion. Mineral. Mag., 30, 354-366.
- Mackenzie, W.S. e Smith, J.V. (1955) The alkali feldspars: I. Orthoclase microperthites. Amer.Mineral., 40, 707-732.
- Mackenzie, W.S. e Smith, J.V. (1961) Experimental and geological evidence for the stability of alkali feldspars. Cursos e Conferencias, Inst.Invest.Geol. Lucas Mallada, VIII, 53-69.
- Marfunin, A.S. (1961) The relation between structure and optical orientation in potash-soda feldspars. Cursos y Conferencias, Inst.Invest.Geol. Lucas Mallada, VIII, 97-109.
- Marsh, J.S. (1975) Aenigmatite stability in silica-undersaturated rocks. Contrib.Mineral.Petrol., 50, 135-144.

- Martin, R. (1969) The hydrothermal synthesis of low albite. *Contrib. Mineral.Petrol.*, 23, 323-339.
- Mathias, M. (1974) Alkaline rocks of Southern Africa. *In* Sørensen, H. (ed.). *The alkaline Rocks*. John Wiley and Sons, Inc., London, 189-202.
- McCauley, J.W. e Newnham, R.F. (1971) Origin and prediction of ditrigonal distorsions in micas. *Amer.Mineral.*, 56, 1626-1638.
- Mitchell, R.H. (1972) Composition of nepheline, pyroxene and biotite in ijolite from the Seabrook Lake complex, Ontario, Canada. *Neues Jahrb.Mineral.Monath.*, 9, 415-422.
- Mitchell, R.H. (1980) Pyroxenes of the Fen alkaline complex, Norway. *Amer.Mineral.*, 65, 45-54.
- Mitchell, R.H. e Platt, R.G. (1982) Mineralogy and petrology of nepheline syenites from the Coldwell alkaline complex, Ontario, Canada. *J.Petrol.*, 23, 186-214.
- Miyashiro, A. (1951) The range of chemical composition in nepheline and their petrogenetic significance. *Geochim. Cosmochim. Acta*, 1, 278-283.
- Moniz, A.C. (1969) Estudo mineralógico de argilas do maciço alcalino de Poços de Caldas. *Fac.Fil.Ciênc.Let.*, USP, Bol. 304, 134 p.
- Morimoto, N. (1974) Crystal structure end fine texture of pyroxenes *Fortschr.Mineral.*, 52, 52-80.
- Mottana, A.; Rossi, G.; Kracher, A.; Kurat, G. (1979) Violan revisited: Mn-bearing omphacite and diopside. *Tschermaks Min. Petrol.Mitt*, 26, 187-201.

- Munoz, J.L. e Ludington, S.D. (1974) Fluoride-hydroxyl exchange in biotite. *Amer.J.Sci.*, 274, 396-413.
- Nash, W.P.; Carmichael, I.S.E. e Johnson, R.W. (1969) The mineralogy and petrology of Mount Suswa, Kenya. *J.Petrol.*, 10, 409-439.
- Nash, W.P. e Wilkinson, J.F.G. (1970) Shonkin Sag Lacolith, Montana I - Mafic minerals and estimates of temperature, pressure and oxygen fugacity and silica activity. *Contrib.Mineral. Petrol.*, 25, 241-269.
- Neumann, E.R. (1974) The distribution of Mn^{2+} and Fe^{2+} between ilmenites and magnetites in igneous rocks. *Amer.J.Sci.*, 274, 1074-1088.
- Neumann, F.R. (1976) Compositional relations among pyroxenes, amphiboles and other mafic phases in the Oslo region plutonic rocks. *Lithos*, 9, 85-109.
- Nicholls, J. e Carmichael, I.S.E. (1969) Peralkaline acid liquids: a petrological study. *Contrib.Mineral.Petrol.*, 20, 268-294.
- Nielsen, T.F.D. (1979) The occurrence and formation of Ti-aegirines in peralkaline syenites. An example from the Tertiary ultramafic alkaline Gardiner complex, East Greenland. *Contr. Mineral.Petrol.*, 69, 235-244.
- Nockolds, S.R. (1947) The relation between chemical composition and paragenesis in the biotite micas of igneous rocks. *Amer. J.Sci.*, 245, 401-420.
- Nolan, J. (1966) Melting-relations in the system $NaAlSi_3O_8$ - $NaAlSiO_4$ - $NaFeSi_2O_6$ - $CaMgSi_2O_6$ - H_2O , and their bearing on the genesis of alkaline undersaturated rocks. *Quart. J. Geol.Soc.London*, 122, 119-157.

- Nyambok, I.O. (1980) Petrology and geochemistry of the alkaline intrusion, Jombo Hill, Kenya. *Geol.Mag.*, 117, 327-338.
- Okamura, F.P.; Ghose, S. e Ohashi, H. (1974) Structure and crystal chemistry of calcium Tschermak's pyroxene, CaAlAlSiO_6 . *Amer.Mineral.*, 59, 549-557.
- Oliveira, M.A.F. (1973) Petrologia das rochas metamórficas da região de São José do Rio Pardo, SP. *Rev.Bras.Geoc.*, 3, 257-278.
- Onuma, K.; Iwai, T. e Yagi, K. (1972) Nepheline-"iron nepheline" solid solution. *J.Fac.Sci. Hokkaido Univ.*, séries 4, 1-2, 180-189.
- Papike, J.J. (1981) Pyroxene mineralogy of the moon and meteorites. *Mineral.Soc.Amer. Review in Mineralogy*, vol. 7: Pyroxenes. 495-525.
- Parrish, W. (1980) Results of the I.U.Cr. precision lattice parameters project. *Acta Crystallogr.*, 13, 838-850.
- Parsons, I. (1965) The feldspathic syenites of the Loch Ailsh intrusion, Assynt, Scotland. *J.Petrol.*, 6, 365-394.
- Parsons, I. (1978) Feldspars and fluids in cooling plutons. *Mineral. Mag.*, 42, 1-17.
- Parsons, I. e Boyd, R. (1971) Distribution of potassium feldspar polymorphs in intrusive sequences. *Mineral.Mag.*, 38, 295-311.
- Pedersen, A.K.; Engell, J. e Rønsbo, J.G. (1975) Early Tertiary vulcanism in the Skaergaard: new chemical evidence from ash-layers in the mo-clay of northern Denmark. *Lithos*, 8, 255-268.

- Perchuk, L.L. e Ryabchikov, I.D. (1968) Mineral equilibria in the system nepheline-alkali feldspar-plagioclase and their petrological significance. *J.Petrol.*, *9*, 123-167.
- Piotrowski, J.M. e Edgar, A.D. (1970) Melting relations of undersaturated alkaline rocks from South Greenland compared to those of Africa and Canada. *Meddr.Grønland.*, *181*, 1-62.
- Popp, R.K. e Gilbert, M.C. (1972) Stability of acmite- jadeite pyroxenes at low pressure. *Amer.Mineral.*, *57*, 1210-1231.
- Powell, M. (1978) The crystallisation history of the Igdlersfigssalik nepheline syenite intrusion, Greenland. *Lithos*, *11*, 99-120.
- Powell, M. e Powell, R. (1977) A nepheline-alkali feldspar geothermometer. *Contr.Mineral.Petrol.*, *62*, 193-204.
- Propach, G. e Adloff, L.R. (1982) Ordering and unmixing of alkali feldspars in a porphyritic granite and its country rocks. *Tschermaks Min.Petr.Mitt.*, *30*, 117-128.
- Retief, F.A. (1962) Preliminary observations on the feldspars from the Pilanesberg alkaline complex, Transvaal, South Africa. *Norsk Geol.Tidsskr.*, *Feldspar vol. 42*, 493-513.
- Ribbe, P.H. (1975) The chemistry, structure and nomenclature of feldspars. *Mineral.Soc.Amer. Short Course Notes*, vol. 2: *Feldspar Mineralogy*, R1 - R52.
- Rimsaite, J.H.Y. (1967) Studies of rock-forming micas. *Geol. Surv. Canada, Bull.* *149*, 82 p.
- Rimsaite, J.H.Y. (1969) Evolution of zoned micas and associated silicates in the Oka carbonatite. *Contr.Mineral.Petrol.* *23*, 340-360.

- Robert, J.L. e Maury, R.C. (1979) Natural occurrences of a (Fe, Mn, Mg) tetrasilicic potassium mica. *Contr.Mineral.Petrol.*, 68, 117-123.
- Robinson, P. (1981) The composition space of terrestrial pyroxenes-internal and external limits. *Mineral. Soc. Amer. Reviews in Mineralogy*, vol. 7. Pyroxenes, 419-494.
- Robinson, P.; Spear, F.S.; Schumacher, J.C.; Laird, J.; Klein, C.; Evans, B.W. e Doolan, B.L. (1982) Phase relations of metamorphic amphiboles: natural occurrence and theory. *Mineral.Soc. Amer. Reviews in Mineralogy*, vol. 9B: Amphiboles : Petrology and Experimental Phase Relations, 1-227.
- Rock, N.M.S. (1982) Chemical mineralogy of the Monchique alkaline Complex, Southern Portugal. *Contrib.Mineral.Petrol.*, 81, 64-78.
- Rosenberg, P.E. e Foit, F.F. Jr. (1977) Fe^{2+} - F avoidance in silicates. *Geochim.Cosmochim.Acta*, 41, 345-346.
- Rossi, G. (1978) On the pretended ocurrence of aegirine-neptunite solid solution. *Contrib.Mineral.Petrol.*, 66, 109.
- Rossman, G.R. (1981) Pyroxene spectroscopy. *Mineral.Soc.Amer. Reviews in Mineralogy*, vol. 7. Pyroxenes, 93-115.
- Roy, S. (1971) Studies of manganese-bearing silicate minerals from metamorphosed manganese formations of India. II. Blanfordite, manganoan diopside, and brown manganiferous pyroxene. *Mineral.Mag.*, 38, 32-42.
- Rønbo, J.G.; Pedersen, A.K. e Engell, J. (1977) Titan- aegirine from the tertiary ash layers in northern Denmark. *Lithos*, 10, 193-204.
- Scott, P.W. (1976) Crystallization trends of pyroxenes from the

alkaline volcanic rocks of Tenerife, Canary Islands. Mineral Mag., 40, 805-816.

Shand, S.J. (1928) The geology of Pilansberg (Pilaan's Berg) in the Western Tranvaal: a study of alkaline rocks and ring-intrusions. Trans.Geol.Soc.South Africa, 31, 97-156.

Smith, J.V. (1956) The powder pattern and lattice parameters of plagioclase feldspars. I. The soda-rich plagioclase. Mineral Mag., 31, 47-68.

Smith, J.V. (1974a) Feldspar Minerals, vol.1 - Crystal Structure and Physical Properties. Springer-Verlag, Berlim, 622 p.

Smith, J.V. (1974b) Feldspar Minerals, vol.2 - Chemical and Textural Properties. Springer-Verlag, Berlim, 690 p.

Smith, J.V. e Yoder, H.S. (1956) Experimental and theoretical studies of the mica polymorphs. Mineral.Mag., 31, 209-235.

Sood, M. (1981) Modern Igneous Petrology. John Wiley and Sons, Inc. Nova Iorque, 244 p.

Steiger, R.H. e Hart, S.R. (1967) The microcline-orthoclase transition within a contact aureole. Amer.Mineral., 52, 87-115.

Stephenson, D. (1972) Alkali clinopyroxenes from nepheline syenites of the South Qôroq Centre, south Greenland., Lithos, 5, 187-201.

Stephenson, D. e Upton, B.G.J. (1982) Ferromagnesian silicates in a differentiated alkaline complex: Kûngnât Fjeld, South Greenland. Mineral.Mag., 46, 283-300.

Stewart, D.B. (1974) Optical axial angle and extinction angle of alkali feldspars related by cell parameters to Al/Si order and composition. In Mackenzie, W.S. e Zussmann, J. (eds.).

The Feldspars, Manchester Univ. Press.

- Stewart, D.B. (1975a) Least-squares refinement programs for unit cell parameters. Mineral.Soc.Amer. Short Course Notes, vol. 2: Feldspar Mineralogy, A1-A6.
- Stewart, D.B. (1975b) Lattice parameters, composition, and Al/Si order in alkali feldspars. Mineral.Soc.Amer. Short Course Notes, vol. 2: Feldspar Mineralogy, St 1 - St 22.
- Stewart, D.B. (1975c) Optical properties of alkali feldspars. Mineral.Soc.Amer. Short Course Notes, vol. 2: Feldspar Mineralogy, St 23 - St 30.
- Stewart, D.B. e Ribbe, P.H. (1969) Structural explanation for variations in cell parameters of alkali feldspars with Al/Si ordering. Amer.J.Sci., 267-A, 444-462.
- Stewart, D.B. e Wright, T.L. (1974) Al/Si order and symmetry of natural alkali feldspars, and the relationship of strained cell parameters to bulk composition. Bull. Soc. fr. Minéral. Cristallogr., 97, 356-377.
- Streckeisen, A. (1976) To each plutonic rock its proper name. Earth-Sci.Rev., 12, 1-33.
- Sørensen, H. (1974a) Alkali syenites, feldspathoidal syenites and related lavas. In Sørensen, H. (ed.). The Alkaline Rocks. John Wiley and Sons, Inc., Londres, 22-52.
- Sørensen, H. (1974b) Glossary of alkaline and related rocks. In Sørensen, H. (ed.). The Alkaline Rocks. John Wiley and Sons, Inc., Londres, 558-577.
- Sørensen, H. e Larsen, L.M. (1978) Aspects of the crystallization of volatile-rich peralkaline undersaturated magmas - exemplified by the Ilímaussaq intrusion, South Greenland. Journ.

- Mineral. Recife, Vol. Djalma Guimarães 7, 135-142.
- Tilley, C.E. (1954) Nepheline-alkali feldspar parageneses. Amer. J.Sci., 252, 65-75.
- Tilling, R.I. (1968) Zonal distribution of variations in structural state of alkali feldspars within the Rader Creek pluton, Boulder Batholith, Montana. J.Petrol., 9, 331-357.
- Tuttle, O.F. (1952) Optical studies on alkali feldspars. Amer.J. Sci., Bowen vol., 533-567.
- Tuttle, O.F. e Bowen, N.L. (1958) Origin of granite in the light of experimental studies in the system $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ - KAlSi_3O_8 - SiO_2 - H_2O . Geol.Soc.Amer., Mem.74, 153 p.
- Tuttle, O.F. e Smith, J.V. (1958) The nepheline-kalsilite system.II. Phase relations. Amer.J.Sci., 256, 571-589.
- Tyler, R.C. e King, B.C. (1967) The pyroxenes of the alkaline igneous complexes of eastern Uganda. Mineral.Mag., 36, 5-21.
- Ulbrich, H.H.G.J. e Gomes, C.B. (1981) Alkaline rocks from continental Brazil. Earth-Sci. Reviews, 17, 135-154.
- Ulbrich, H.H.G.J.; Ulbrich, M.N.C.; Kahn, H.; Vlach, S. e Bagnoli, E. (1979) Estrutura e petrologia dos nefelina sienitos do maciço alcalino de Poços de Caldas, MG-SP: Nota preliminar. Bol. Mineralógico, Recife, 6, 31-40.
- Ulbrich, M.N.C. e Ulbrich, H.H. (1982) Esquema de cálculo para a determinação do $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ de piroxênio egirínico. XXXII Congr.Bras.Geol., Salvador, Resumos e Breves Comunic., Bol. Esp. 2, 78.
- Utsumi, O.; Oliveira, A.G.; Parisi, C.A. e William, D.D. (1971)

- Roteiro de Excursões: Poços de Caldas, MG. XXV Congr.Bras. Geol., São Paulo, Bol.Esp. 2, 7-13.
- Varet, J. (1969) - Les pyroxènes des phonolites du Cantal (Auvergne, France). Neues Jahrb.Mineral.Monatsh., 4, 174-184.
- Verhoogen, J. (1962) Distribution of titanium between silicates and oxides in igneous rocks. Amer.J.Sci., 260, 211-220.
- Vieten, K. (1980) The minerals of the volcanic rock association of the Siebengebirge. 1 - Clinopyroxenes. 2 - Variation of chemical composition of Ca-rich clinopyroxenes (salites) in the course of crystallization. Neues Jahrb.Mineral. Abh., 140, 54-88.
- Vieten, K. e Hamm, H.M. (1978) Additional notes "On the calculation of the crystal chemical formula of clinopyroxenes and their contents of Fe^{3+} from microprobe analyses". Neues Jahrb.Mineral. Monatsh., 2, 45-92.
- Vinokurov, V.M. (1966) Electron paramagnetic resonance data on isomorphism of manganese and iron in certain minerals. Tradução inglesa: Geochem. Int., 3, 996-1002.
- Vlasov, K.A.; Kuz'menko, M.Z. e Es'kova, F.M. (1966) The Lovozero Alkali Massif. Hafner Publishing Co., Nova Iorque, 624 p.
- Wernick, F. e Artur, A.C. (1983) Regenerações sucessivas de terrenos arqueanos no leste do Estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. (inédito), 15 p.
- Wernick, F.; Artur, A.C. e Fiori, A.P. (1981) Reavaliação de dados geocronológicos da região nordeste do Estado de São Paulo e unidades equivalentes dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Atas III Simp.Reg.Geol., Curitiba, Soc.Bras.Geol. núcleo São Paulo, 1, 328-342.

- Wernick, E. e Penalva, F. (1973) As relações entre os grupos Amparo e Itapira, SP. XXVIII Congr. Bras. Geol., Porto Alegre, Resumo das Comunic., Bol. Esp., 1, 116-117.
- Wernick, E. e Penalva, F. (1980) O Grupo Pinhal na região norte do Estado de São Paulo e áreas vizinhas do Estado de Minas Gerais. Bol. Inst. Geo., USP, vol. 11, 1-20.
- Winters, A.A.M. (1981) A geologia do maciço sienítico da Pedra Branca, MG. Dissert. de Mestrado, Inst. Geoc., USP, 92 p.
- Wones, D.R. e Eugster, H.P. (1965) Stability of biotite: experiment, theory, and application. Amer. Mineral., 50, 1228 - 1272.
- Wones, D.R. e Gilbert, M.C. (1969) The fayalite- magnetite - quartz assemblage between 600° and 800°C. Amer. J. Sci. Schairer vol. 267-A, 480-488.
- Wright, T.L. (1967) The microcline-orthoclase transformation in the contact aureole of the Eldora stock, Colorado. Amer. Mineral., 52, 117-135.
- Wright, T.L. (1968) X-ray and optical study of alkali feldspar : II. An X-ray method for determining the composition and structural state from measurements of 2θ values for three reflexions Amer. Mineral., 53, 88-104.
- Wright, T.L. e Stewart, D.B. (1968) X-ray and optical study of alkali feldspar: I. Determination of composition and structural state from refined unit-cell parameters and 2V. Amer. Mineral., 53, 38-87.
- Yagi, K. (1953) Petrochemical studies on the alkalic rocks of the Morotu district, Sakhalin. Geol. Soc. Amer. Bull., 64, 769-810.

Yagi, K. (1966) The system acmite-diopside and its bearing on the stability relations of natural pyroxenes of the acmite-hedenbergite-diopside series. Amer.Mineral., 51, 976-1000.

Yagi, K. e Onuma, K. (1967) The join $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ - $\text{CaTiAl}_2\text{O}_6$ and its bearing on the titanaugites. J.Fac.Sci.Hokkaido Univ., series 4, 463-483.

AGRADECIMENTOS

Ao finalizarmos esta dissertação queremos deixar consignados nossos agradecimentos às pessoas e instituições que, direta ou indiretamente tornaram possível a sua realização.

Ao orientador da tese, Dr. Celso de Barros Gomes, professor titular do Departamento de Mineralogia e Petrologia que sugeriu o tema de trabalho e que, com sua experiência no campo das rochas alcalinas, deu inestimável colaboração e apoio durante os vários estágios da sua elaboração, tomando especial cuidado na revisão da versão final do manuscrito.

Ao Prof.Dr. Horstpeter H. Ulbrich, que cedeu rochas e mapas, além de fornecer informações geológicas e contribuir com valiosas discussões nos tópicos mais controvertidos.

Ao Prof.Dr. José Moacyr Vianna Coutinho, sempre disposto a atender um apelo de auxílio, seja para confirmar uma observação petrográfica, seja para ver um possível "mineral novo".

Ao Prof.Dr. Raphael Hypolito e ao pessoal técnico do Laboratório de Química do Departamento de Mineralogia e Petrologia, pela ajuda oferecida durante os trabalhos de separação química de minerais.

Ao Prof. Excelso Ruberti, que, sempre atento ao bom funcionamento da microsonda, facilitou as tarefas de laboratório.

Ao Dr. Jean Delvigne, pela obtenção das fotomicrografias.

À Profa.Dra. Sonia Maria Barros de Oliveira pela sua colaboração na leitura do texto final da tese.

Aos colegas do Instituto, em particular os do Departamento de Mineralogia e Petrologia, pelas discussões e trocas

de opiniões no tocante ao tema das rochas alcalinas.

Ao pessoal técnico dos Laboratórios de Raios X e de Geocronologia, pela grande disposição em colaborar conosco.

Às Senhoras Melany T. Isauk e Anileda D. de Mello Morente, pela confecção das lâminas delgadas e secções de microsonda, respectivamente.

À Senhorita Itacy Kroehne pela elaboração dos mapas e diagramas que ilustram esta tese, e ao Senhor Jaime de Souza Marcos, pela execução das cópias fotográficas.

À Senhora Claudete Salinas, pelo trabalho de datilografia, e ao Senhor José Ponchirolli, pela preparação das tabelas.

Ao Senhor Jaime Alves da Silva e toda equipe de funcionários da Seção Gráfica, pela impressão do texto.

Finalmente, às agências pelo apoio financeiro recebido através de vários auxílios. Destaca-se em particular o auxílio FINEP (Proc.nº 3.3-82.0381.00, "Petrologia de Rochas Alcalinas Brasileiras e Depósitos Minerais Associados", Coordenador Prof. Celso de Barros Gomes) que possibilitou parte dos trabalhos de laboratório e de coleta de amostras, e os auxílios FAPESP (Proc.79/206-5) e CNPq (Proc.40.1412/81), ambos tendo o Prof. Horstpeter Ulrich como beneficiário, que permitiram tanto os trabalhos de mapeamento e coleta de amostras, como em parte também a obtenção de dados.

APÊNDICE

O presente trabalho é parte integrante de projeto de maior envergadura visando a caracterização geológica e petrológica das rochas do maciço de Poços de Caldas (item 1.2); logo, realizaram-se inúmeras excursões à região, acompanhando de perto os trabalhos de mapeamento e amostragem do conjunto de rochas faneríticas aflorantes nas porções setentrional e central do distrito (H.H.Ulbrich, em preparação). Visitas de curta duração serviram para elucidar problemas surgidos durante a realização das pesquisas de laboratório.

Aproximadamente 130 secções delgadas dos diferentes fácies de nefelina sienitos foram examinados ao microscópio, um aparelho Ortholux de fabricação Leitz, e análises modais de 34 delas feitas com o auxílio de um contador de pontos automático. O número de pontos por secção variou entre 1500 e 3000, à exceção de algumas lâminas de rochas de granulação fina onde o total atingiu 5000 pontos. Nas secções delgadas de amostras de granulação fina a média, a distinção entre os feldspatos potássicos e os feldspatóides viu-se facilitada face à utilização da técnica de coloração com azul de metileno (ver Heinrich, 1965).

Os ângulos 2V de feldspatos potássicos foram determinados utilizando-se uma platina universal de fabricação Leitz.

Os trabalhos analíticos nos minerais dos nefelina sienitos foram realizados com microsonda eletrônica e difratômetro de raios X.

Microsonda eletrônica

O programa analítico consistiu da análise dos principais minerais dos nefelina sienitos: feldspato potássico, albita, nefelina, piroxênio, biotita e anfibólio sódico. Com es-

sa finalidade, selecionou-se um total de 84 amostras, tidas como representativas dos diversos fácies reconhecidos no maciço.

Os trabalhos foram executados no laboratório do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. As secções delgadas polidas foram cobertas por uma película de C, recorrendo-se a um metalizador automático de fabricação Bendix. Para as análises químicas dos minerais empregou-se um instrumento de fabricação ARL (*Applied Research Laboratories*), modelo EMX-SM, equipado com três espectrômetros dispersivos e três pares de cristais (LiF/ADP, LiF/ADP, LiF/RAP), com os dados registrados numa teletipo acoplada ao conjunto.

Durante o trabalho analítico procedeu-se ao controle do fator flutuação (*drift*) por meio da execução de leituras periódicas dos padrões usados; o fator tempo morto (*dead time*) foi considerado negligenciável, dado que as contagens dos contadores mantiveram-se sempre abaixo do limite permissível (5000/segundo). Para as correções da radiação de fundo (*background*), assim como as devidas ao fator flutuação (*drift*), valeu-se de programa de computação (SLAVE) de uso interno. Todos os dados foram corrigidos para os fatores absorção de massa, número atômico e fluorescência secundária, utilizando-se o programa BETA, baseado no método de Bence e Albee (1968).

Método de trabalho: Os grãos dos minerais analisados foram escolhidos durante o estudo microscópico prévio, buscando-se assim cobrir todas as possíveis variações de composição para um dado mineral. Tendo em mente esse aspecto deu-se atenção especial à textura das rochas, individualizando-se cristais idiomórficos, xenomórficos, inclusões, agregados intersticiais, etc. No caso dos minerais coloridos (piroxênios, biotitas e anfibólios), a cor e o pleocroísmo foram de grande valia para a caracterização de fases com quimismo diferente. Adicionalmente, fizeram-se desenhos pormenorizados de áreas específicas das secções delgadas a fim de auxiliar os trabalhos de análise. O número de grãos analisados por lâmina variou consideravelmente, dependendo sobretudo do teor modal do mineral na rocha.

No caso dos feldspatos potássicos e nefelinas, analisaram-se entre <10 e 20 grãos por secção delgada, em função da granulometria da rocha, exceto nos casos em que a nefelina mostrava-se alterada. O zoneamento dos minerais félsicos foi detectado por meio de perfis analíticos, com os pontos de leitura equidistantes de 20 μ , percorrendo-se os cristais transversalmente. Para o controle do espaçamento usou-se um dispositivo permitindo o deslocamento automático e constante da amostra na direção prefixada (*step scan attachment*). Em geral, foram feitas análises dos centros e das bordas dos grãos em todos os minerais félsicos (em média, 5 pontos cada).

No caso dos minerais coloridos, o zoneamento é, via de regra, visível opticamente e os perfis analíticos executaram-se para conhecer tanto as mudanças no teor dos vários elementos químicos, como para caracterizar o tipo de zoneamento, - se contínuo e gradual, ou constituído por zonas de composição diferente unidas por contatos bruscos, como ocorre em piroxênios com zoneamento setorial e em biotitas - De forma rotineira, procedeu-se também à análise dos centros e margens dos grãos nos minerais ferromagnesianos, dando-se especial atenção às bordas dos cristais de piroxênio exibindo cores variáveis (azul, amarelo, marrom, laranja, etc).

Em geral, não houve dificuldades na análise das bordas finas dos cristais de piroxênio, ou ainda dos agregados de fibras intersticiais. Por outro lado, provou-se muito difícil a obtenção de dados químicos precisos quando os minerais de pequeno tamanho apresentam também contornos muito irregulares. Este é o caso de algumas biotitas e anfibólios que ocorrem no interior dos cristais de piroxênio, por exemplo, o anfibólio que ocupa os núcleos dos prismas finos de piroxênio nos *nefelina sienitos finos do Anel Norte*. Os dados erráticos devem-se, provavelmente, ao fato de que o mineral apresenta, além de pequena área, espessura mínima na lâmina.

Os resultados constantes das tabelas de análises

químicas representam valores médios para uma determinada secção, à exclusão de alguns casos indicados, particularmente bordas de grãos, setores ou zonas nos minerais ferromagnesianos.

A exatidão (*accuracy*) dos resultados obtidos varia segundo a concentração do elemento presente na fase mineral estudada, estimando-se o erro em 3% para os elementos maiores e 5% para os menores.

As condições de instrumentação geralmente empregadas foram as seguintes: potencial de aceleração, 15 V; corrente de amostra, 0,02-0,03 μ A; tempo de integração dos contadores 10", e diâmetro do feixe eletrônico ao redor de 1 μ . Para a análise dos minerais fêlsicos (feldspato potássico, albita e nefelina), recorreu-se a um diâmetro maior, da ordem de 20 μ , a fim de minimizar os efeitos da volatilização dos álcalis (Na e K); nos casos de cristais muito pequenos (inclusões), e em particular em nefelinas com abundante alteração, utilizou-se um diâmetro de feixe de aproximadamente 10 μ e diminuiu-se o tempo de contagem para 4", possibilitando assim a análise de maior número de pontos.

A escolha dos padrões mais adequados foi precedida da realização de vários testes, com a preferência recaindo, quando possível, em padrões de substâncias naturais. A seguir, é fornecida a lista dos padrões empregados na análise dos diversos minerais:

Feldspato potássico: Utilizou-se ortoclásio (Or - 3) para Si, Al e K; albita (Tiburón) para Na; bytownita (Crystal Bay) para Ca e Fe, e o padrão sintético $\text{SiO}_2\text{.SrO}$ (eutético) para Sr.

Albita: Si, Al e Na foram analisados com albita Tiburón; Ca e Fe com bytownita (Crystal Bay), e K com Ortoclásio (Or-3).

Nefelina: A albita (Tiburón) foi usada para Si, Al e Na; ortoclásio (Or-3) para K; bytownita (Crystal Bay) para Ca, Fe e Mg; benitoíta (San Benito) para Ba, e SiO_2 .SrO (eutéctico) para Sr.

Piroxênios: Para as egirinas e a maioria das egirina-augitas, recorreu-se à egirina-augita (17 A) para Si, Fe, Mg, Mn, Ca e Na; à augita (A-209) para Al e Ti, e à baddeleyita (Palabora) para Zr. Para as egirina-augitas com teores baixos de Na, e para as soda-augitas, os padrões foram os seguintes: clinopiroxênio (Cpx-118) para Si; egirina-augita (17 A) para Mn; egirina-augita (15 B) para Fe, Mg, Ca e Na; augita (A-209) para Al e Ti, e baddaleíta (Palabora) para Zr. Testes esporádicos visando à detecção de K foram feitos com biotita (B-3).

Biotita: O padrão de biotita (B-3) foi empregado para Si, Fe, Mg, K e F; para Ca e Mn usou-se a egirina-augita (17 A); a augita (A-209) para Al e Ti, e a escapolita (17120) para Cl.

Anfibólio: Si foi analisado com o padrão de egirina-augita (16 A); Fe, Mg, Ca e K com a hornblenda (Kakanui); Al e Ti com a augita (A-209); Mn com a egirina-augita (17 A); Na com a egirina-augita (15 B); F com a biotita (B-3), e Cl com a escapolita (17120).

Difratometria de raios X

Com o propósito de caracterizar o estado estrutural dos feldspatos potássicos, efetuaram-se 36 difratogramas de raios X do mineral. Empregou-se um aparelho de fabricação Rigaku Denki, Geiger Flex, pertencente ao Instituto de Geociências. Os difratogramas foram obtidos a partir da radiação $K\alpha$ do cobre, no intervalo de 2θ : 10 a 80° , com velocidade de varredura de $1/2^\circ$ por minuto (para outras condições operacionais, ver Hutchinson, 1974). O refinamento das constantes de cela dos feldspatos foi feito utilizando-se o programa LCLSQ (Burnham, 1962; para comen-

tários sobre o programa, ver Stewart, 1975).

Preparação do material: Quando possível, usaram -se as mesmas amostras de rochas das quais se extraíram as seções de microsonda. As rochas foram quebradas com martelo, e os fragmentos de feldspato potássico separados manualmente com o auxílio de lupa binocular de fabricação Leitz. Esse método revelou-se porém ineficaz para os casos de amostras com abundantes minerais ferromagnesianos (por exemplo, os lujaunitos), e também para os feldspatos potássicos portando inclusões de nefelina e/ou zeólitas. No primeiro caso, grande parte do piroxênio foi isolada por centrifugação e separação magnética no laboratório de Geocronologia, facilitando assim a posterior seleção manual do feldspato. No segundo caso, recorreu-se ao ataque químico para dissolver a nefelina e as zeólitas, em conformidade com o método preconizado por Wilkinson (1964). Nesse método, a amostra moída é atacada com uma solução de HCl a 10% em banho maria, durante 4 horas; o ácido é eliminado posteriormente utilizando-se uma solução de Na_2CO_3 a 10%. A lavagem final da amostra é feita com água destilada. Melhores resultados foram obtidos utilizando-se HCl quente, durante 4 a 6 horas, quando toda a nefelina achava-se dissolvida, restando no entanto parte da natrolita. A separação da natrolita foi facilmente efetuada sob a lupa, devido ao seu hábito fibroso e brilho vítreo intenso.

A preparação das amostras de raios X envolveu a mistura de pó muito fino de feldspato com aproximadamente 10% de pó de silício, este na qualidade de padrão interno (ver Parrish, 1960).

Difratogramas. Dos 36 difratogramas obtidos, apenas 29 foram considerados aptos para posterior leitura e indexação das reflexões. Esses difratogramas com boa resolução apresentam pouca ou nenhuma "contaminação" de nefelina e zeólitas, com as reflexões mais características desses minerais ausentes ou ocorrendo como picos largos de intensidade mínima.

Para a obtenção dos índices das reflexões, os valores de 2θ lidos nos difratogramas foram corrigidos mediante a utilização do padrão interno de silício, e comparados com os dados relativos a microclínio máximo, microclínio intermediário e ortoclásio de Borg e Smith (1969).