NÃO CIRCULA

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO A

ESTRATIGRAFIA

DA

REGIÃO DE TAIÓ, S. C.

DEDALUS - Acervo - IGC

30900009336

Tese de Doutorado
apresentada por
Antonio Carlos Rocha Campos

1 9 6 4

ÍNDICE

	Página
Resumo.....	1
I - INTRODUÇÃO	3
II - ESTUDOS PRÉVIOS.....	5
III - FISIOGRAFIA.....	6
IV - FISIOESTRATIGRAFIA.....	8
A - Generalidades.....	8
B - Grupo Tubarão.....	9
a- Sedimentos proglaciais "várvidos".....	9
b- Formação Bonito.....	11
Horizonte com fósseis marinhos.....	12
c- Formação Palermo.....	15
C - Grupo Passa Dois.....	17
Formação Irati.....	17
D - Intrusivas básicas.....	17
a- Sills.....	17
b- Diques.....	19
V - GEOLOGIA ESTRUTURAL.....	20
VI - A FAÚNULA MARINHA DE TAIÓ.....	21
VII - CORRELAÇÕES; PROCEDÊNCIA DA FAUNA.....	29
A - Bacia do Paraná.....	29
B - Outras Bacias do Brasil.....	29
C - Outras regiões continentais e extra- continentais.....	29
D - Procedência da fauna.....	31
VIII - PALEONTOLOGIA SISTEMÁTICA.....	32
A - Revisão da nomenclatura prévia.....	32
B - Lamelibrânquios.....	33
C - Outros grupos.....	51
IX - CONCLUSÕES.....	54
X - BIBLIOGRAFIA.....	55

RESUMO

O presente trabalho contém os resultados de investigações estratigráficas e paleontológicas realizadas na região de Taió, Santa Catarina. Acompanha-se de um mapa geológico na escala de 1:27.000.

O interesse geológico principal dessa região reside na ocorrência de fósseis marinhos descobertos por Annibal Alves Bastos, em 1929 e estudados, sucessivamente, por F.R. Cowper Reed (1930, 1935) e W. Kegel e M.T. da Costa (1951).

A região é constituída, predominantemente, por sedimentos (Grupos Tubarão e Passa Dois) mas, também, por rochas ígneas (sills e diques de diabásio). O Grupo Tubarão é formado, na parte inferior, por sedimentos proglaciais "várvidos," de excepcional desenvolvimento na área e, na parte superior, por rochas das formações Bonito e Palermo.

A Formação Bonito (230 m de espessura, aproximadamente), é constituída, localmente, por arenitos finos a médios, geralmente feldspáticos, contendo pequenas espessuras de folhelhos, siltitos e carvão intercalados.

O horizonte marinho é representado por alguns decímetros de arenito fino, situando-se, estratigraficamente, na parte média-superior local da Formação Bonito. Existe somente um nível de fósseis marinhos na região. A ingressão ocupou, provavelmente, parte da antiga bacia de deposição dos sedimentos glaciais e teve, aparentemente, caráter restrito.

A Formação Palermo (cêrca de 120 m de espessura), é constituída por siltitos compactos ou estratificados. O Grupo Passa Dois é representado na região por ocorrência restrita de calcários da Formação Irati.

O tectonismo que afetou a área estudada parece não ter sido intenso; algumas falhas foram assinaladas com base nas fotografias aéreas e nas observações de campo.

As primeiras descrições dos fósseis de Taió foram feitas por Cowper Reed (1930, 1935) que distinguiu as seguintes entidades: Aviculopecten (Deltopecten) catharinae, A. (Deltopecten) relegatus, A. (Deltopecten) unicus, A. (Deltopecten) miscellus, A. (Deltopecten ?) crassicostatus, Pseudamusium ? sp., Stutchburia brasiliensis, Spathella tayoensis, Allorisma ? sp., Edmondia sp., Maeonia cf. cuneata, Solenopsis sp., Schizodus occidentalis, Schizodus ? sp., Bellerophon ? cf. micromphalus, Chonetes (ou Chonetella) ? e Discinisca tayoensis.

Kegel e Costa (1951) referiram os pectinídeos a um novo gênero, Heteropecten, assinalando ainda duas novas espécies, H. platicosta,

H.bastosi e uma variedade, H.catharinae var. dygllipha.

No presente trabalho, entretanto, concluímos que as diversas "espécies" de Heteropecten dos autores prévios, constituem, na realidade, variantes morfológicas ligadas entre si por formas de transição. A maioria dos outros gêneros de lamelibrânquios assinalados por Reed, em face da presente revisão, foi atribuída a novas entidades genéricas.

Dêsse modo, a lista faunística atual fica assim constituída:

Lamellibranchia

- Heteropecten catharinae (Reed), 1930
- Tayoa erichseni Campos, 1964
- Kegelia tayoensis (Reed), 1930
- Schizodus occidentalis Reed, 1930
- Cowperreedia brasiliensis (Reed), 1930
- Bastosia costata Campos, 1964

Gastropoda

Wartnia sp.

Brachiopoda

Orbiculoidea tayoensis (Reed), 1935

Foi assinalada também a presença de equinodermas (ofiuróides e asteróides) associados aos fósseis de Taió.

A assembléia fóssil parece constituir uma tanatocenose formada por conchas acumuladas por correntes ou ondas, em águas rasas, submetidas em alguns locais à exposição subaérea.

O caráter endêmico da fauna não permite correlação segura com outras bacias nacionais, ou extra-nacionais. A vinculação anteriormente sugerida com achados de Nova Gales do Sul, Austrália, não se positivou através das investigações aqui contidas.

A existência de fauna permo-carbonífera de caráter mais cosmopolita no Uruguai e Argentina, poderia sugerir uma origem meridional para as ocorrências da Bacia do Paraná.

O propósito principal das investigações desta tese foi o de esclarecer, tanto quanto possível, a posição estratigráfica do horizonte fóssilífero marinho, permo-carbonífero, da região de Taió, Estado de Santa Catarina, bem como o de reestudar paleontologicamente a fauna nêle contida.

Iniciamos as pesquisas de campo em 1962, retornando a elas em todos os períodos de férias até o final de 1963; aproveitamos o ensejo para ampliar as nossas investigações no sentido de contribuir para o conhecimento da geologia geral dessa interessante região.

Situa-se geograficamente a região em aprêço, no Município de Taió, Estado de Santa Catarina; geologicamente, localiza-se no flanco oriental da Bacia Sedimentar do Paraná.

Uma das dificuldades com as quais nos defrontamos desde o início, foi a inexistência de mapa-base adequado. Recorremos por isso à construção de um mapa-base a partir das fotografias aéreas, usando a técnica da triangulação radial com controle limitado no terreno (Dipol e Gordini, 1961).

O mapa planimétrico obtido, com escala igual à das fotos, mostrou-se adequado às nossas finalidades.

O mapeamento geológico que acompanha o presente trabalho foi feito utilizando-se fotografias aéreas na escala aproximada de 1:275.000, relativas ao levantamento realizado em 1957, para o Governo do Estado de Santa Catarina. A área geologicamente levantada, contida no mapa, tem cerca de 300 km², limitando-se aproximadamente pelos meridianos de 49°55' e 50°5'W e paralelos de 27° e 27°10' (Fig. 1).

Os afloramentos são escassos e descontínuos na área estudada, como decorrência, principalmente, da natureza dos sedimentos, facilmente intemperizáveis, sob o clima quente e úmido da região.

Somente em poucos locais, verificamos diretamente o contato entre as formações. As exposições de rocha são quase sempre decompostas e, mesmo nos cortes às margens das estradas que sobem os morros, ou junto às escarpas mais abruptas, onde os afloramentos são melhores, o reconhecimento da litologia é, também, bastante dificultado pela existência de mistura das rochas locais e depósitos de talude.

Algumas das melhores exposições foram encontradas nos leitos e barrancos dos rios e ribeirões, principalmente onde a proximidade de intrusivas produziu um endurecimento secundário dos sedimentos. Assim, a maioria dos contatos assinalados no mapa correspondem antes a zonas de contato;

foram inferidos através de observações de campo e estudo de fotografias aéreas, pelo que sua aproximação varia de até 100 m.

As descrições, aqui apresentadas baseiam-se, principalmente, em seis seções medidas, na sua maior parte, com clinômetro tipo Abney e, em alguns trechos, com auxílio de trena ou da "varinha de Jacob" ("Jacob staff").

Na determinação das cores dos sedimentos usamos a "Tabela de Cores de Rochas", organizada pelo "The Rock-Color Chart Committee", 1951.

A descrição petrográfica baseia-se, em boa parte, no estudo de lâminas das rochas da região.

A escala de Wentworth, (1922), os esquemas de Pettijohn (1957) e McKee e Weir (1953) foram adotados para a descrição dos sedimentos e na terminologia dos tipos de estratificação.

Agradecimentos.— O autor deseja consignar, em primeiro lugar, seus agradecimentos ao Prof. Dr. Josué Camargo Mendes, sob cuja orientação foi realizado o presente trabalho.

A construção do mapa-base usando as técnicas da triangulação radial foi orientada pelo Dr. Mauro Ricci, a quem deixamos consignada nossa gratidão.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o Conselho Nacional de Pesquisas, subvencionaram a maior parte das despesas de trabalho de campo.

O Departamento Estadual de Geografia e Cartografia do Estado de Santa Catarina emprestou as fotografias aéreas de que nos utilizamos.

Ao Dr. Paulo Erichsen de Oliveira, da Divisão de Geologia e Paleontologia, do Departamento Nacional da Produção Mineral, devemos o empréstimo dos tipos descritos por Cowper Reed e Kegel e Costa; ao Prof. Dr. Fernando F.M. de Almeida, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, também devemos o empréstimo de valiosa coleção de espécimes.

A geólogos da Petrobrás, do Departamento de Exploração da Bacia do Paraná, agradecemos o fornecimento de interessantes informações sobre a geologia e estratigrafia da área.

A todos os acima citados, assim como aos alunos do Curso de Geologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da U.S.P. que nos acompanharam e auxiliaram durante os trabalhos de campo expressamos nossos sinceros agradecimentos.

II - ESTUDOS GEOLÓGICOS PRÉVIOS

Várias são as referências encontradas na bibliografia geológica brasileira sobre a região de Taió.

A localidade foi mencionada pela primeira vez na literatura em 1929, quando Annibal Alves Bastos, geólogo do antigo Serviço Geológico do Brasil descobriu fósseis marinhos na região. Euzébio Paulo de Oliveira, em 1930, em uma conferência na Associação Brasileira de Educação, referiu-se a essa descoberta, cuja situação estratigráfica acreditava ser superior à das camadas marinhas de Mafra, Santa Catarina. Posteriormente, Cowper Reed (1930 e 1935), a quem o Serviço Geológico enviara os fósseis coletados na região, apresentou um estudo sistemático da fauna de Taió, reconhecendo nela gêneros comuns aos do Nova Galos do Sul, Austrália.

Em 1938, Carvalho e Pinto realizaram reconhecimentos geológicos no Estado de Santa Catarina organizando um mapa preliminar e levantando perfis geológicos com referência à área de Taió.

Martin (1961), apresentou informações interessantes sobre os sedimentos da região.

O assunto da estratigrafia e da fauna marinha foi objeto de discussão de diversos autores.

Assim, Gordon Jr. (1947), na publicação em que propõe nova classificação estratigráfica dos sedimentos da Bacia do Paraná, refere-se à estratigrafia da área de Taió. Lange (1954), também sugere novo esquema de divisão estratigráfica para a "Série" Tubarão, mencionando aspectos da geologia local. Maack (1947) em um estudo sobre a geologia dos Estados do Paraná e Santa Catarina, apresenta algumas observações sobre a geologia da região, sugerindo a denominação "Formação" Taió.

Novos estudos paleontológicos foram realizados por Silva Santos (1947), que descreveu um espinho de Ctenacanthus ocorrente nos arenitos de Taió. Em 1951, Kegel e Costa estabeleceram o novo gênero Heteropecten para os pectinídeos fósseis. Beurlen (1954 e 1957) discutiu a paleoecologia e a filogênese dos lamelibrânquios de Taió.

Em 1961, Rocha Campos assinalou a ocorrência de novos fósseis (Asteroidea e Ophiuroidea).

Referências breves, na sua maior parte citações das observações de alguns dos autores já mencionados são freqüentes na literatura, especialmente em trabalhos de caráter estratigráfico ou paleogeográfico, não tendo sido aqui registrados.

Podemos discriminar, na região estudada, as seguintes unidades geomórficas: a. Formas tabulares; b. Formas arredondadas; c. Planície aluvial.

a. Formas tabulares. São as mais conspícuas, constituindo chapadas de grande extensão, cujas altitudes variam em torno de 600 m (Fig. 2).

Esses planaltos sedimentares, como os denominou Almeida (1952), correspondem freqüentemente a cuestas na sua borda oriental, suavizadas e recortadas pela intensa erosão e decomposição.

Constituem-se esses planaltos por sedimentos do Grupo Tubarão ou Passa Dois, capeados por sills de diabásio - rocha que apresenta na região maior resistência à erosão - particularmente comuns nas imediações do contato entre as formações Palermo e Irati (Almeida, 1952).

Nas encostas dos planaltos sedimentares, e principalmente onde as vertentes são mais acentuadas, (morro do Kremer, morro da Fuma, morro do Ribeirão do Ouro, etc.), são notáveis os perfis escalonados formados por sucessão de plataformas mais ou menos amplas em consequência da erosão diferencial (Fig. 2, 18, 19).

A Serra do Mirador, expressão topográfica mais proeminente da região, apresenta-se constituída por sedimentos permo-carboníferos capeadas por extenso sill (Almeida, 1952).

b. Formas arredondadas. Aparecem na parte sudeste da área estudada, onde afloram sedimentos da parte inferior do Grupo Tubarão, principalmente varvitos cuja menor resistência à erosão propiciou o desenvolvimento de uma paisagem mais suave, com morros arredondados de altitude variando em torno de 400 m.

c. Planície aluvial. A região é atravessada de NE para SE pelo rio Itajaí do Oeste, para onde drenam todos os outros cursos d'água importantes: rio Taió, ribeirões da Vargem, Grande, Pequeno e do Salto.

O fundo dos vales do rio Itajaí do Oeste e seus tributários está colmatado por aluvião constituído por sedimentos finos. O vale do rio Itajaí alarga-se bastante nas alturas da cidade de Taió, ao receber seus afluentes, ribeirões Grande e Pequeno, formando uma planície muito ampla de aproximadamente 340 m de altitude, que atinge até 2 km de largura. (Fig. 18,19). A montante da cidade de Taió apresenta um estreitamento causado pela presença de um sill de diabásio que constitui uma soleira, suportando os sedimentos subjacentes, no local onde será construída a barragem Itajaí do Oeste pelo D.N.O.S.; a planície alarga-se novamente ao re

ceber o ribeirão da Vargem e o Braço Seco.

A planície aluvial apresenta dois níveis de terraços, respectivamente a 5 e 8 m acima do nível médio das águas. O mais antigo é mais extenso, e, sobre ele, assenta-se a cidade de Taió; o terraço inferior é representado por faixas em meia lua, visíveis na parte oeste do rio Itajaí e na parte sul do rio Taió. Esse terraceamento representaria duas fases de rejuvenescimento da drenagem, por variações recentes do nível de base.

A planície aluvial do rio Taió, a partir da cidade do mesmo nome, estende-se para sudoeste e não ultrapassa 1 km de largura.

- X -

O relevo e a drenagem dendrítica dos rios da região têm, como causa principal, a estrutura geológica de camadas horizontais, associada ao clima úmido que ali vigora e que propicia intenso intemperismo químico (Almeida, 1952).

A geomorfogênese local pode ser perfeitamente explicada pelo intemperismo e pela erosão seletiva, que produzem o destaque das formações mais resistentes, mormente das intrusivas locais, que sustentam as formas tabulares do relevo.

Quanto à drenagem, seus traços principais são aparentemente motivados por causas estruturais. O rio Itajaí do Oeste tem o traçado geral NW-SE, subsequente às estruturas com essa direção, profundamente encravado nos sedimentos permo-carboníferos, controlado pelo nível de base local representado pelo rio Itajaí Açu (Almeida, 1952). Seus principais afluentes têm também seus percursos adaptados às direções estruturais predominantes na região. O vale do rio Itajaí do Oeste, principalmente à montante de Taió, onde é marginado por escarpa de diabásio, deve ter caráter tectônico. O exame do mapa anexo mostra que as variações recentes do nível de base, evidenciadas pelos níveis de terraços que ocorrem nas planícies aluviais, causou o estabelecimento de meandros encaixados, com trechos retilíneos, principalmente na parte sul da região, concordantes com as principais direções tectônicas locais (Fig. 4,5).

Em alguns trechos, o encaixamento atingiu sills de diabásio, formando corredeiras de pequena extensão.

IV - FISIOESTRATIGRAFIA

A. Generalidades

As rochas mais antigas que afloram na região de Taió, pertencem ao Grupo Tubarão, cuja idade é admitida como permo-carbonífera por alguns autores e por outros como neo-carbonífera (Mendes, 1961, p. 17). Sua parte inferior é constituída, na coluna local, por uma extensão excepcional de sedimentos "várvidos" com laminação irregular, adquirindo em alguns níveis o aspecto de típicos varvitos (Fig. 2). Intercalam-se, também, camadas de arenito e siltito laminado, de espessuras variáveis. Essas rochas aparecem desde o limite oriental da região até, aproximadamente, a altura do ribeirão do Salto. No presente trabalho, serão denominadas informalmente sedimentos proglaciais "várvidos."

Os sedimentos do pacote seguinte, os mais desenvolvidos na área estudada, são discriminados em duas formações: Rio Bonito e Palermo (Fig. 2).

Assentam-se sem discordância aparente sobre a sequência inferior, sendo a Formação Bonito constituída por arenitos finos a médios, cinza-claros com intercalações de siltitos e folhelhos, e de pelo menos, três intercalações centimétricas de folhelho carbonoso e carvão. Restos vegetais carbonizados são encontrados em vários níveis; na sua parte inferior, aparecem restos de peixes e, na parte média superior, uma camada de arenito com, aproximadamente, 0,5 m de espessura, contendo abundante fauna marinha.

A parte superior do pacote (Formação Palermo) é constituída por siltitos amarelos e cinza escuros, maciços na sua parte basal e bem estratificados no topo.

Num ponto restrito do oeste da região aflora, no morro do Kremer, a Formação Irati, termo do sucedente Grupo Passa Dois, cuja idade permiana é aceita unânimemente pelos autores.

Constitui-se localmente de calcário argiloso, cinza-escuro médio, betuminoso.

Ocorrem na região intrusivas básicas sob a forma de sills e diques, ligados ao vulcanismo mesozóico (Leinz, 1949). Os sills formam a cobertura das chapadas e morros tendo sido encaixados primitivamente em sedimentos neo-paleozóicos, junto do contato do Grupo Tubarão com o Grupo Passa Dois (Fig. 2). A espessura dos sills é, atualmente, da ordem de 50-70 m. Mostram grande homogeneidade petrográfica. Os diques são mais raros; o maior, com alguns quilômetros de extensão, cruza a região formando cristas intermitentes, com a direção SE-NW e atitude vertical.

Sedimentos recentes (aluvião constituído por arcias finas, siltes

e argilas) ocorrem nas planícies aluviais dos rios Itajaí do Oeste e Taió e afluentes (Fig. 2).

No diagrama da figura 3, apresentamos uma tentativa de correlação entre as seções estudadas, representativas das rochas que constituem a coluna geológica local.

B. Grupo Tubarão

O Grupo Tubarão, no sentido por nós adotado (Gordon Jr., 1947; Barbosa e Almeida, 1949) inclui tanto os sedimentos glaciais (glaciais e proglaciais, Flint, 1957), que a literatura consigna sob a denominação "Grupo" ou "Série" Itararé (Oliveira, 1927; Gordon Jr., 1947), como os sedimentos não glaciais designados freqüentemente como "Série" Tubarão, (Oliveira, 1927) ou ainda "Grupo" Guatá (Gordon Jr., 1947). Esses sedimentos não glaciais de grande desenvolvimento na região de Santa Catarina ("Grupo Guatá", Gordon Jr., 1947), são aqui descritos sob as designações Formação Rio Bonito - predominantemente arenitos com folhelhos, siltitos e carvão intercalados - e Formação Palermo, com predominância de siltitos.

a. Sedimentos proglaciais "várvidos". - Aparecem desde o limite oriental da região estudada, numa faixa que acompanha o vale do rio Itajaí do Oeste, até a altura do ribeirão do Salto.

As melhores exposições encontram-se em cortes às margens da estrada de rodagem para Rio do Sul, desde as alturas de Rio do Oeste. Além disso, os afloramentos constituem escarpas nos vales de alguns afluentes como no Braço Fischer (Fig. 3), por exemplo, e nas cabeceiras do ribeirão do Salto.

Constituem-se de lâminas ou camadas de argilitos e siltitos ou arenitos muito finos regular ou irregularmente alternadas, formando faixas escuras e claras, cujas espessuras variam de menos de 1 mm até 1 cm ou 2 cm respectivamente. A cor das faixas escuras é cinza-médio a cinza-médio escuro enquanto a das faixas claras é o cinza-oliva claro. As faixas claras são compostas por fragmentos angulares de quartzo com granulação variando de silte até areia, além de micas (biotita e muscovita) intersticiais, paralelas à estratificação, plagioclásios e restos carbonizados. As faixas escuras são constituídas, principalmente, pelos minerais micáceos e argilosos, com matéria carbonosa mais abundante; os grãos de quartzo são aí raros e de tamanho menor.

Nas lâminas de sedimento de granulação mais grosseira observa-se, às vezes, micro-laminação cruzada ("micro-cross-lamination", Potter e Pettijohn, 1963) assumindo, freqüentemente, a forma lenticular alongada.

Em vários níveis, existem faixas com laminação regular, típicos varvitos, com intercalações de zonas onde essa laminação está perturbada por grande número de micro-deformações penecontemporâneas do tipo de sobrecarga ("load-cast"; "flame-structures", Potter e Pettijohn, 1963, p. 147, pl. 27 A) (Fig. 25). Essas estruturas assemelham-se às que foram estudadas por Greensmith (1956) e por êle atribuídas a fenômenos de "injeção" ("wash out"), sobrecarga, à ação de organismos e consideradas como evidências de sedimentação em condições de águas relativamente rasas (Greensmith, 1956, p. 354). São bastante comuns também as gretas de dessecamento ("mud-cracks"), preenchidas e deformadas em ziguezague pela compactação (Fig. 25), além de marcas de corrente e faixas delgadas de conglomerados intraformacionais. Pistas do tipo das comumente atribuídas a artrópodes foram também verificadas nos planos de acamamento.

Nos afloramentos existentes sob a forma de escarpas, no flanco direito do vale do Braço Fischer, onde foi medida a seção da fig. 3, a parte superior do Grupo Tubarão, na seção local, apresenta grande número de intercalações, principalmente de siltitos laminados e arenitos feldspáticos, finos a médios. As faixas constituídas por varvitos típicos, são raras e pouco espessas. Nos afloramentos existentes na estrada Rio do Sul-Taió, entre Rio do Oeste e o ribeirão do Salto, as intercalações são espessadas, se bem que possam atingir espessuras de até 5 m, sendo constituídas principalmente por arenitos feldspáticos, muitas vezes com estratificação cruzada de estratos médios (McKee e Weir, 1953).

A espessura máxima atingida por êsse pacote sedimentar na região, computada através de medidas de vários afloramentos, é da ordem de 100 m.

O contato inferior dessa sequência ocorre fora da área estudada; o contato superior, com a Formação Bonito, não foi observado diretamente. Notou-se, entretanto, como já mencionamos acima, que no tópo do pacote de sedimentos "várvidos" há maior ocorrência de intercalações arenosas (Fig. 3). Para fins de mapeamento, no presente trabalho, a delimitação do contato entre as duas formações foi estabelecida no tópo da última intercalação de varvito (Código de Nomenclatura Estratigráfica, art. 5, obs. A).

Êsses sedimentos constituem, provavelmente, depósitos de antigo lago glacial (Flint, 1957, p. 144) de grandes dimensões, a julgar pela extensão dos afloramentos que aparecem desde Rio do Oeste até ribeirão do Salto (mais ou menos 20 km) sendo as suas estruturas primárias, na sua maior parte, associadas à deposição em águas rasas.

A área de ocorrência da seqüência de sedimentos "várvidos" estende-se, entretanto, muito além da abrangida pela presente investigação, pois um reconhecimento geológico realizado comprovou sua continuidade desde os arredores de Rio do Sul até Ituporanga, adiante de Barra do Trombudo e, ao norte, até Barra do Dolmann (Fig. 1).

Os horizontes de conglomerados glaciais intercalados são restritos, ocorrendo, principalmente, junto ao contato com o cristalino, na região de Lontras, e os conglomerados flúvio-glaciais são insignificantes (Leinz, 1937, p.6; Martin, 1961, p. 27). Os "pséudo-tilitos" observados por Leinz nos arredores de Rio do Sul (1937, p.6, 16) foram também interpretados por Martin (1961, p. 27) como "boulder-shales", depósitos de gêlos flutuantes, em vista da orientação dos seixos, com seus eixos maiores perpendiculares aos planos de estratificação. Acamamento nítido existe na maioria das ocorrências.

Sondagens realizadas pela Petrobrás em Barra Nova (BN-1-SC e BN-2-SC) e em Petrolândia (ex-Perimbó; Pa-1-SC), confirmaram a grande espessura desses sedimentos ("Grupo Itararé") constituídos, nas duas localidades, por folhelhos, siltitos laminados ("várvidos"), arenitos e calcários. Em Petrolândia, perfuração ainda não completada, até a data desta redação, atravessou mais de uma centena de metros de folhelhos, siltitos e calcários.

b. Formação Rio Bonito. - As rochas atribuíveis a essa formação (Gordon Jr., 1947, p. 7) são as mais desenvolvidas na região, recobrimdo pouco mais da metade da área estudada.

As melhores exposições são encontradas em alguns cortes às margens dos caminhos que sobem os morros do Kremer e do ribeirão do Ouro, ou então nos barrancos e leitos de alguns ribeirões como o Braço Seco, afluente da margem esquerda do ribeirão Pequeno, no ribeirão Bugio, etc., onde formam uma série de escarpas e quedas d'água (Fig. 3).

A Formação Rio Bonito é constituída por uma seqüência pouco variada de arenitos de granulação muito fina a média, às vezes argilosos, raras vezes grosseira (conglomerática). Apresenta intercalações delgadas de siltitos e folhelhos, além de algumas lentes finas de carvão, restos carbonizados de vegetais da flora de Glossopteris em vários níveis, além de restos de peixes (Ctenacanthidae), na sua parte média inferior. Os arenitos têm, geralmente, aspecto maciço, principalmente em afloramentos de rochas mais decompostas, onde a micro-laminação cruzada ("micro-cross-lamination", Potter e Pettijohn, 1963) e outras estruturas sedimentares tornam-se apagadas (afloramentos do ribeirão Bugio (Fig. 23) e na estrada de Rio do Sul,

etc.), ou podem apresentar-se bem estratificados, com camadas finas a médias (afluente do ribeirão Pequeno, estrada para Mirim Doce) (Fig. 22).

A metade inferior da Formação Bonito é constituída por uma sequência onde predominam arenitos muito finos, às vezes argilosos, compactos ou com estratificação irregular, com intercalações de arenitos de granulação média e siltitos, aflorantes, por exemplo, nas margens e leito do ribeirão do Bugio (Fig. 23), onde formam série de quedas d'água. Essas intercalações têm espessura de 1-2 metros, mostrando, muitas vezes, estratificação cruzada plana, com estratos médios (McKee e Weir, 1953).

Em outros locais, os arenitos têm coloração cinza-claro, muito finos a finos, com aparência maciça ou com estratificação média, que afloram, formando, às vezes, pequenas escarpas ou quedas d'água, sendo aproveitados para pedras de construção, como por exemplo, atrás do prédio da beneficiadora de arroz, nos terrenos do Clube de Caça e Tiro, etc. Nesses afloramentos foi constatada a presença de restos de peixes, além de moldes internos de vegetais atribuíveis a *Sphenophyta* (*Calamitales* ?) e concreções piritosas. Mostram, comumente, estratificação cruzada com estratos pequenos (McKee e Weir, 1953) associadas a marcas de onda ("ripple-marks") (Fig. 26, 28). Em alguns níveis, ocorrem arenitos finos com estratificação cruzada, semelhantes aos do topo desta formação.

No exame ao microscópio, esses arenitos revelaram-se constituídos por grãos angulares de quartzo, além de muscovita e biotita, orientadas paralelamente à estratificação pouco nítida, feldspatos (plagioclásios principalmente), e restos carbonizados sob a forma de glomérulos e fiapos. A matriz é constituída por material clorítico-argiloso.

As lentes de carvão já mencionadas, cujas espessuras atingem até 10 cm, foram constatadas na parte média e superior da formação. Trata-se de depósitos de caráter local, constituídos por folhelho carbonoso, com intercalação de lâminas milimétricas de carvão. As características deste carvão correspondem mais às de depósito alóctone, em que a matéria vegetal foi transportada para o local da formação do carvão (Stutzer e Noé, 1940, p. 151-153), pois são estratificadas, têm extensão muito limitada e mostram grande abundância de clásticos, tendo Martin (1961) já os atribuído a depósitos de "drift".

Horizonte com fósseis marinhos. - Situa-se, estratigráficamente, pouco acima da parte média local da Formação Bonito (Carvalho e Pinto, 1938). Corresponde a um arenito fino, cor cinza-oliva claro a cinza esverdeado, quando fresco, ou cinza amarelado, quando decomposto. Aflora em di-

versos locais nos arredores de Taió (vide mapa) não ultrapassando 0,5 m de espessura. A estratificação é pouco visível macroscopicamente, marcada geralmente pela posição paralela dos fósseis e mais raramente, por uma maior orientação dos minerais micáceos (Fig. 31). Petrograficamente constitui-se o arenito, principalmente de grãos de quartzo subarredondados a arredondados, na sua maioria, cheios de inclusões, mostrando algum crescimento secundário, com deposição de sílica óticamente isorientada. Os outros minerais constituintes são: muscovita, sericita, biotita e feldspatos (plagioclásios, microclínios, microperitita ou microantiperitita), turmalina, zircão e opacos. O cimento é constituído por um agregado de minerais clo-rítico-argilosos. Em todos os afloramentos, essas características se mantêm, devendo-se notar, todavia que, na maioria das vezes, as exposições não são boas, constituídas por blocos semi-decompostos, mais ou menos "in situ", quando as outras rochas do local já se encontram completamente intemperizadas (Fig. 21).

Parece existir somente um horizonte com fósseis marinhos, pois em nenhuma das secções examinadas constatamos fósseis marinhos em mais de um nível, embora a litologia acima descrita se repita, como é o caso da secção do afluente do ribeirão Grande (Fig. 3).

Além de lamelibrânquios, gastrópodes, braquiópodes e equinodermas aqui descritos, a literatura menciona a presença de restos de peixe (espinho de nadadeira) de *Ctenocanthus gondwanus* associados aos fósseis marinhos (Santos, 1947).

Em alguns dos afloramentos, faixas de arenito com fósseis marinhos assentam-se separados por diastema (plano de descontinuidade erosiva - Fig. 31) - sobre uma zona onde ocorre grande número de estruturas de natureza ainda não esclarecida. (Preenchimento de tubos de vermes?) Essas estruturas são constituídas por cilindros com diâmetro de 3-8 mm e com comprimento variável (atingem 5-6 cm) revestidos por argila cinza-escuro e preenchidos por arenito. Nesse nível, a estratificação do arenito acha-se visivelmente perturbada, incluindo fragmentos do material argiloso cinzento e sendo a rocha mais friável que a faixa superior com fósseis. Os tubos dispõem-se, na sua maior parte, verticalmente em relação à estratificação, terminando bruscamente no plano de separação entre as duas faixas e apresentando, às vezes, um estreitamento na extremidade voltada para baixo (Fig. 31). Estruturas semelhantes a essas têm sido descritas na literatura, em depósitos atribuídos a planícies de maré (Van Straaten, 1954, in Dunbar e Rodgers, 1957, p. 72, fig. D; 1959, p. 200).

A parte superior da Formação Bonito aflorante no caminho para ribeirão do Ouro, morro do Kremer e Braço Scoz (fig. 3), é formada por arenitos finos a médios e siltitos, com muitas intercalações de arenitos finos, micáceos, com estratificação cruzada, cor cinza-esverdeado claro ou cinza oliva (um tanto decompostos). Nas encostas do vale do Braço Scoz, formam escarpas de pelo menos uma dezena de metros de altura. As lâminas variam em espessura de 3 mm a 1 cm e formam estratos médios (McKee e Weir, 1953).

Em alguns níveis, foram encontrados concreções calcárias decompostas (até alguns decímetros de diâmetro).

O topo da Formação Bonito, junto ao contato com a Formação Palermo, é marcado por intercalações de siltitos cinzentos ou oliva, compactos (Fig. 3).

Em outras regiões (norte do Paraná, sul de Santa Catarina, etc.), o contato entre as formações tem sido marcado por uma camada de sílex cuja presença não foi reconhecida na região. (Gordon Jr., 1947; Maack, 1947; Lange, 1954.)

A convenção para mapeamento estabelecida para a atual investigação foi a de colocar o contato no topo da última intercalação de arenito (Código de Nomenclatura Estratigráfica, art. 5, obs. a.).

A espessura localmente encontrada para essa formação foi da ordem de 230 m (Fig. 3).

Os sedimentos da Formação Bonito resultaram, provavelmente, do retrabalhamento dos sedimentos glaciais, aos quais são muito semelhantes litológicamente, (Leinz, 1937; Sanford e Lange, 1960, p. 1334) num clima ainda rigoroso, que teria produzido um retardamento no processo do intemperismo dos minerais instáveis (feldspatos), na região de origem dos sedimentos, em ambiente continental, provavelmente depositados localmente na depressão formada pelo antigo lago glacial (Martin, 1961). A camada com fósseis marinhos, registra a presença de águas salgadas, durante um período relativamente curto, instalando-se uma pequena baía ou lagoa de águas de salinidade reduzida (Bourlen, 1957, p. 229-236), comparável com o que sucedeu em certas fases da história geológica do mar Báltico (Leinz, 1937, p. 39; Dunbar e Rodgers, p. 54; Flint, 1957, p. 374). A julgar pela área de ocorrência dos fósseis marinhos, essa ingressão foi bastante local, com dimensões aproximadas de 18 x 8 km, orientada com seu maior eixo na direção NE-SW (Fig. 5). Durante essa época, a antiga bacia de deposição deveria já estar bastante reduzida em tamanho pelo preenchimento, as

sociado a uma compensação isostática, após o término da glaciação, a exemplo do levantamento após o degelo da calota escandináva que excluiu o "mar de Somma" da bacia do Báltico (Flint, 1957, p. 374,375); o mecanismo da ingressão permanece, entretanto, obscuro, podendo estar relacionado com variações das condições eustáticas devidos ao degelo (Sanford e Lange, 1960, p. 1354).

O exame da matriz e o modo de ocorrência dos fósseis (p.22 ~~esq.~~) indicam ambiente de águas relativamente rasas, com a concentração dos restos orgânicos pela ação de ondas ou correntes, existindo também, evidências de exposição (tubos de vermes).

As intercalações de arenitos com estratificação cruzada indicam ação predominante de correntes competentes em certos locais da bacia de deposição e talvez sejam atribuíveis a depósitos de canal; poderiam ser responsáveis também, pela deposição em certos locais de grande quantidade de detritos vegetais, responsáveis pela formação de carvão (Martin, 1961).

A mudança das condições de sedimentação Bonito-Palermo, é de natureza transicional, marcada pela ocorrência de maior número de intercalações de siltitos no topo dessa Formação.

c. Formação Palermo. - Sedimentos atribuídos à Formação Palermo (Gordon Jr., 1947), afloram nos morros da Fuma e Kremer (Fig. 3) sob o espesso sill de diabásio que capota os dois morros. É possível que os siltitos da parte superior da secção do caminho do ribeirão do Ouro também pertençam a essa formação.

A parte inferior da Formação é constituída por siltitos arenosos de cor amarela-fosca ou oliva pálido, de aparência maciça, desagregando-se em fragmentos arredondados e mostrando, em alguns níveis micro-laminação cruzada ("micro-cross lamination", Potter e Pettijohn, 1963). Afloram, com espessura total de mais ou menos 70 m, aparecendo intermitentemente, em faixas menos decompostas separadas por zonas intemperizadas ou cobertas por vegetação e depósitos de talude, às margens dos caminhos que sobem o morro do Kremer e Fuma (Fig. 3).

Em certos níveis, aparecem concreções calcárias de tamanho variável, semi-decompostas, atingindo até 40 cm de diâmetro, cor marrom-fosco.

A parte superior é constituída por, aproximadamente, 30 m de siltitos cinza-escuro bem estratificados (camadas muito finas), decompostas, separando-se em placas ou lâminas angulares. (Fig. 3).

Não foram encontrados quaisquer vestígios seguros de restos fossilizados nesses sedimentos. Somente em alguns níveis, aparecem estruturas in-

teressantes, cuja origem não está ainda esclarecida, semelhantes às já referidas para a Formação Bonito. Trata-se, também, de cilindros de secção circular, com diâmetro variando de 2-10 mm, e comprimento atingindo até 8 cm, cuja posição variável em relação ao plano de estratificação, a maior parte das vezes perpendicular a êle, mas também paralelos, ou oblíquos e mesmo assumindo uma forma um tanto encurvada. Achrom-se preenchidos por material de granulação igual ou mais grosseira que a rocha matriz sendo, muitas vezes, subdivididas em "pastilhas" de 1-4 mm de espessura. São mais comuns nos siltitos compactos, aparecendo também, raramente, nos do topo da secção.

Suas características coincidem com as das estruturas descritas por Salamuni (1961, p. 163 e 1962, p.154), encontradas em siltitos da mesma formação e que foram atribuídos a tubos de vermes ou lamelibrânquios (?). Sua ocorrência parece ser comum nos sedimentos da Formação Palermo pois Putzer (1954, p.1) e Salamuni (1962) registram sua presença em grandes quantidades no Paraná e Santa Catarina. Aliás, Putzer (1954, p. 26), que realizou os trabalhos mais alentados sobre o comportamento estratigráfico dessa Formação na região carbonífera de Santa Catarina, mencionou a presença de "canais de vermes", além de ter registrado labirintodontes que foram tidos como do tipo Loxomma.

Parece não haver dúvida de que o contato superior da Formação Palermo com o Grupo Passa Dois é concordante (Maack, 1947; Gordon Jr., 1947; Putzer, 1952; Mendes, 1954; Beurlen, 1955; Sanford e Lange, 1960); de nossa parte, só conseguimos verificá-lo diretamente fora da área estudada.

A espessura total da formação (Fig. 3) na região, não pôde ser determinada com segurança, pois em nenhuma das secções verificadas pudemos encontrar contatos suficientemente expostos. A maior espessura verificada foi da ordem de 120 m no caminho do morro do Kremer e coincide, grosso modo com as espessuras determinadas em outros locais (Gordon Jr., 1947; Maack, 1947).

Os sedimentos da Formação Palermo depositaram-se em ambiente calmo pela grande predominância de clásticos finos (siltitos). Aliás, essa é característica constante da Formação Palermo na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Salamuni, 1961). A presença de perfurações atribuíveis a vermes é evidência de possíveis variações do nível das águas (marés?), com periódicas exposições (Putzer, 1954; Salamuni, 1961). Este último, estudando testemunhos de sondagens realizadas pela Petrobrás no Paraná e Santa Catarina, refere-se à presença constante de estruturas sedimen-

-17-

tares que evidenciam exposições periódicas durante a deposição dos sedimentos Palermo (conglomerados de pelotas de argilas, "mud cracks."), além de profundidade rasa das águas (marcas de onda associada com grêtas de contração). Segundo Salamuni (1962, p. 154), os "vermes" produziram também um retrabalhamento do material depositado, apagando, muitas vezes, os vestígios da estratificação. Essas estruturas são bastante semelhantes às descritas para depósito de planícies de maré ("tidal flats", Van Straaten, 1954 in Dunbar e Rodgers, 1957 e 1959 p. 200-201).

Essa formação foi interpretada por alguns autores como depositada em ambiente marinho, o que não encontra apoio na documentação paleontológica (Salamuni, 1961).

C - Grupo Passa Dois

a. Formação Irati. - Rochas pertencentes a essa formação afloram numa área restrita no flanco norte do vale do Braço Scoz, sob a forma de uma cunha alongada no leito de um afluente do Braço Scoz, que desce a escarpa do lado norte do morro do Kremer; situa-se entre os sedimentos da Formação Palermo e o sill que recobre o morro do Kremer

É constituída, no local, por calcários argilosos, cinza médio-escuros, muito finos, pirobetuminosos; são bem estratificados, com espessura das camadas variando de muito finas a finas. Não forneceram nenhum resto fossilizado apesar de trabalhos anteriores. (Pinto e Carvalho, 1937) registraram a presença de Mesosaurus brasiliensis, nos sedimentos dessa formação, na região de Taió.

D - Intrusivas Básicas

Rochas ígneas intrusivas são bastante comuns na região.

Apresentam-se sob a forma de extensos sills e de alguns diques. As ocorrências mais importantes estão assinaladas no mapa anexo.

a. Sills. - Constituem as ocorrências de rochas ígneas mais importantes na região. Recobrem atualmente os morros mais altos, determinando, devido à sua maior resistência à erosão, a formação de extensas chapadas de tôpo mais ou menos plano.

As espessuras dos sills variam de 70 m (morros do Kremer e Furna) a 90 m (Bugio). A altitude da base situa-se a 500 m no morro do Bugio e ribeirão do Ouro, 590 m no morro do Kremer, 800 m no morro da Furna.

Os diabásios assinalados no mapa e que recobrem os morros da Furna, do ribeirão do Ouro e Kremer (Fig. 2) constituem, na realidade, restos de um enorme sill introduzido nos sedimentos neo-palcozóicos com posição estratigráfica variável e atitude discordante, atualmente recortado pela ação erosiva dos rios que drenam a região. Sua continuidade física pôde ser verificada tanto pelo exame de fotos aéreas, como também em trabalhos de campo.

A erosão intensa a que foi submetida a região isolou algumas "ilhas" desse antigo corpo, que constituem elevações de menor importância ou morros testemunhos (morro da Palha, Taquarucu).

Nos morros do Bugio e ribeirão do Ouro, o sill assenta-se sobre arenitos carboníferos, na parte superior da Formação Bonito. À medida que se caminha para oeste a sua posição estratigráfica é mais elevada. Assim, no morro do Kremer e no da Furna, apresenta-se sotoposto a siltitos da Formação Palermo (Fig. 3). No flanco N do morro do Kremer, no vale do Braço Scoz, assenta-se sobre os calcários da Formação Irati, que formam uma espécie de cunha, separada provavelmente durante a intrusão (Putzer, 1953, p. 41).

Na parte oeste da área estudada, na altura de Passo Manso, fora da área do mapa, o sill atinge as alturas das formações permianas intercalando-se entre sedimentos correspondentes provavelmente a Formação Serra Alta e Terezina. Nesse local, especialmente no lado N do vale do Itajaí do Oeste, constitui uma escarpa retilínea por alguns quilômetros, com mais de 100 m de altura, atribuível talvez a falhamento. No lado sul do vale, a escarpa, também bastante notável não é, entretanto, contínua (Fig. 20).

Além desse corpo maior, existem outras intrusões concordantes nos sedimentos da Formação Bonito em posição estratigráfica mais baixa; destes, o maior é o sill do ribeirão do Lobo (50 m de espessura). Outros corpos menores foram também encontrados e assinalados no mapa geológico; nos barrancos e no leito do rio Itajaí do Oeste, intercalados na Formação Bonito afloram diabásios que constituem provavelmente um ou dois corpos intrusivos.

O estudo petrográfico macroscópico dessas rochas, em amostras provenientes de diversas ocorrências, mostrou uma grande homogeneidade nas suas características. Trata-se de uma rocha escura, de granulação fina a média. Ao microscópio mostrou-se constituída principalmente por plagioclásios, piroxênios, opacos (magnetita e ilmenita), apatita, anfíbólio e biótita. Apresenta textura ofítica com ripas de plagioclásio de até

3 mm de comprimento. Nos contatos mostram granulação mais fina, às vezes com típica textura feltrosa ("felty-texture"), com micro-fenocristais de plagioclásios e raros piroxênios, com disposição radial, em matriz constituída por plagioclásios, piroxênios e opacos. Produziram nos sedimentos encaixantes algum endurecimento e silicificação, cujos efeitos, entretanto, não ultrapassaram alguns metros.

b. Diques. - Um grande dique percorre praticamente toda a área, aparecendo, entretanto, sob a forma de corpos lineares descontínuos e com espessura variável, desde a altura do ribeirão da Erva até o morro da Fuma (20 km) com direção NW-SE. Sua espessura máxima é de, aproximadamente, 200 m e, aparentemente, sua atitude é vertical. Forma uma crista saliente, facilmente observada em fotografias aéreas e no campo, mesmo quando corta os sills de diabásio.

Estende-se continuamente desde o ribeirão da Erva até a altura do morro da Palha, (cortado pelos dois "percões" do ribeirão da Erva e da Palha) e confunde-se com o sill que recobre esse morro. Apresenta uma inflexão pouco antes desse morro continuando após, sem aparente mudança de atitude.

Daí até a altura de Taió, sua presença não foi verificada. Reaparece além do rio Itajaí do Oeste sob a forma de cristas isoladas, mas com a mesma orientação, prolongando-se até pouco além do vale do ribeirão Pequeno. Dessa região até o morro da Fuma (mais ou menos 5 km) não nos foi possível individualizá-lo, existindo, entretanto, na área correspondente ao seu alinhamento, alguns afloramentos de diabásio bastante decompostos.

No morro da Fuma, forma novamente uma crista nítida que avança sobre o sill, cortando-o e prolongando-se até o limite setentrional da região.

Petrograficamente sua composição é muito semelhante à dos sills.

A intrusão sob a forma de dique poderia corresponder ao preenchimento da fissura de alimentação dos sills e o seu realce topográfico seria resultado de uma maior resistência à erosão. O exame de fotografias aéreas da região mais ao norte, permitiu observar que o dique perde sua individualidade morfológica desaparecendo gradualmente sob o diabásio mais espesso, que constitui a cobertura do morro da Fuma.

Outros corpos menores, cujas espessuras não ultrapassam poucos metros, foram encontrados cortando os sedimentos da formação Rio Bonito, aparecendo, também, introduzidos no Palermo. Para alguns não foi possível

determinar a atitude, mas parecem ser verticais.

V - GEOLOGIA ESTRUTURAL

As rochas aflorantes na região não mostram, de maneira geral, evidências de tectonismo intenso.

Deve-se ressaltar, entretanto, que a decomposição e ausência de camadas-guia de extensão regional, dificultam a verificação do comportamento tectônico dos sedimentos locais, fato já assinalado por Putzer (1953).

As formações sedimentares dispõem-se sem perturbação aparente da inclinação, com mergulho regional da ordem de 1° SW, avaliado por levantamento altimétrico dos diversos afloramentos da camada contendo fósseis marinhos.

As principais estruturas acham-se assinaladas no mapa da fig. 5 e foram deduzidas, principalmente, do exame de fotografias aéreas, não tendo sido possível, às vezes, sua verificação no campo.

As linhas estruturais marcadas no mapa, referem-se a alinhamentos localizados principalmente ao longo dos vales dos rios, ou a linhas de fratura ocupadas posteriormente por intrusivas.

O grande dique de direção N30W, parece corresponder a uma zona de falhamento. As evidências que permitem tal interpretação são: 1° discrepância altimétrica do horizonte fossilífero marinho, nos dois lados do alinhamento, em dois jazigos muito próximos (estrada para Saleté e ribeirão Pequeno). 2° Entre o ribeirão Pequeno e o ribeirão Grande, aparece no mesmo alinhamento, uma escarpa ravinada, recuada e rebaixada pela erosão de uma série de ribeirões de curso mais ou menos paralelos, que descem o morro do ribeirão do Ouro. Trata-se, provavelmente, de uma linha de escarpa de falha bastante dissecada ("fault line scarp"). O rejeito seria da ordem de 30 m com ascensão do bloco setentrional.

O alinhamento persistente de direção N20E, localizado no vale do ribeirão do Salto, na parte norte e ribeirão da Erva, na parte sul, (aproximadamente 14 km de comprimento) poderia corresponder também a um falhamento, cortando os sedimentos glaciais, se bem que não tenha sido possível sua verificação no campo.

No extremo NW do mapa, aparece ainda marcada, parte da falha com direção N40E, que corta as formações carboníferas e o diabásio que capota o morro da Furna, atravessando o vale do rio Itajaí do Oeste, onde muda de

direção para N20E.

Quanto à natureza dos falhamentos não nos é possível dar uma interpretação segura. Cremos, entretanto, tratar-se de falhamentos normais, comuns na Bacia do Paraná (Putzer, 1953).

Putzer (1953) refere-se, em trabalho sobre a tectônica da parte meridional de Santa Catarina, à associação comum entre diques e regiões de falhamentos, Mau (1958) verificou também esse tipo de ocorrência no Paraná.

As direções dessas estruturas coincidem aproximadamente com as três direções tectônicas predominantes da região. Estas evidenciaram-se perfeitamente pelo estudo dos alinhamentos ("linears", Lueder, 1960) verificadas nas fotografias aéreas e apresentados no diagrama da fig. 4. Nota-se, nitidamente, a predominância dos alinhamentos com direção N24W, N25E e N65E.

A direção tectônica N25E, predominante na região pode ser correlacionada com a direção "rio-grandense" (Putzer, 1953).

As direções tectônicas N25W e sua normal N65E, coincidem também com as direções "catarinenses" estabelecidas por Putzer (1953).

Quanto à origem dessas deformações, Putzer (1953) como também Freitas (1951) supõem terem resultado do levantamento epirogênico do escudo brasileiro, em época mais ou menos recente (post-Cretáceo). (Freitas, 1951.)

VI - A FAUNULA MARINHA DE TAIÓ.

Como resultado do presente trabalho, a lista faunística atual da intercalação marinha de Taió está assim estabelecida:

Lamellibranchia

Heteropecten catharinae (Reed), 1930

Tayoa orichsoni Campos, 1964

Kogelia tayoensis (Reed), 1930

Schizodus occidentalis Reed, 1930

Cowperreedia brasiliensis (Reed), 1930

Bastusia costata Campos, 1964

Gastropoda

Warthia sp.

Brachiopoda

Orbiculoidea tayoensis (Reed), 1935

Asteroidea

Ophiuroidea

Além das formas listadas acima, encontramos alguns moldes internos de concha que evocam o gênero Oriocrassatella, embora apresente algumas diferenças na forma e em detalhes da charmeira; o estado de conservação dos espécimes não é, entretanto, perfeito, além de não contarmos com moldes externos.

Formação da assembléia fóssil. - Já comentamos anteriormente as características dos afloramentos fossilíferos onde foram coletados os espécimes aqui descritos e que constituem desde o início uma limitação a uma análise paleoecológica mais rigorosa, pois, como observou Johnson (1960, p. 1083 e segs.), muitas feições importantes só podem ser observadas nas assembléias não perturbadas de um afloramento com grande extensão superficial. No nosso caso, as dificuldades dessa natureza são praticamente insuperáveis; tentamos, não obstante, aplicar para o caso dos fósseis de Taió, alguns critérios atualmente usados para o estudo da formação de assembléias fósseis, especialmente os desenvolvidos por Olson (1957), Johnson (1960) e Boucot (1963).

As observações referem-se, especialmente, aos lamelibrânquios, em vista de sua maior ocorrência.

Os gêneros pertencentes aos outros grupos, ofiuróides, asteróides, gastrópodes (Warthia) e braquiópodes (Orbiculoidea), encontrados associados aos lamelibrânquios são formas marinhas, bentônicas, sósseis, cuja ocorrência pouco abundante poderia ser decorrente de causas acidentais. Os braquiópodes, ofiuróides e alguns asteróides parecem preferir fundos de lama ou areia (Twenhofel, 1932, p. 175; Hyman, 1955, p. 668).

É interessante notar que gastrópodes, asteróides e ofiuróides são considerados como pouco sensíveis a variações de salinidade (Loosanoff, 1945; Dunbar, 1957, p. 149).

1. Composição faunística.

A faunula (Fenton e Fenton, 1928, p. 15) marinha fóssil de Taió, constitui, ao que parece, uma tanatocenose (Wasmund, 1926, p. 6, in Nicol, 1944), dominada por lamelibrânquios, dos quais os pectinídeos constituem a grande maioria (tabela 1; fig. 7).

Composição percentual baseada no material total manipulado

Lamelibrânquios:	%	nº de espécimes
<u>Meteropecten catharinae</u>	72,3	559
<u>Bastusia costata</u>	6,9	54
<u>Schizodus occidentalis</u>	4,9	38
<u>Cowporreedia brasiliensis</u>	4,6	36
<u>Kegelia tayoensis</u>	4,0	31
<u>Tayoa erichsoni</u>	0,9	7
Gastrópodos:		
<u>Warthia</u> sp.	2,8	22
Ofiuróides e Asteróides	2,8	22
Braquiópodes:		
<u>Orbiculoidea tayoensis</u>	0,5	4

TABELA 1

Queremos chamar a atenção, desde logo, para as deficiências apresentadas pela tabela acima. A amostragem contém, como é comum nas coleções destinadas a determinações sistemáticas, um "bias", pois, por motivos de ordem subjetiva, pode ter havido um aumento no número dos espécimes maiores ou mais bem conservados. Contou-se somente espécimes praticamente inteiros, facilmente identificáveis, não se levando em conta fragmentos de determinação obscura.

As inferências sobre a paleoecologia baseadas na composição faunística restringem-se às observações de caráter geral, dadas as dificuldades naturais que o registro de uma fauna fóssil apresenta.

A assembléia de lamelibrânquios fósseis de Taió poderia ser dividida em dois grupos, quanto ao hábito de vida:

a. Formas sósseis pertencentes à "infauna" (Thorson, 1957), isto é, animais que habitam as camadas superficiais do fundo do mar, vivendo enterradas ou escavando: Bastusia costata; Kegelia tayoensis; Tayoa erichsoni; Cowporreedia brasiliensis.

Esses gêneros têm em comum a forma alongada e linha palial com sinus discreto, exceto Tayoa, para o qual não pudemos verificar a existên-

cia dessa estrutura. Schizodus occidentalis, poderia ser também considerado como pertencente a esse grupo, não mostrando, entretanto, elemento algum indicativo de hábito de vida. Algumas espécies desse gênero possuem um sinus raso (Waagen, 1881, p. 233, estp. 19, fig. 7-10; Dickinson, 1956, p. 30).

Os caracteres morfológicos sugerem, fortemente, que essas conchas tiveram hábito escavador, vivendo enterradas nos sedimentos do fundo. Não verificamos sua ocorrência em aparente posição natural, mas sempre caoticamente concentradas; portanto, sua associação com matriz constituída por arenito, poderia ser discordante com as características do fundo correspondente ao seu hábito de vida (Figs. 33, 34).

É interessante notar que Schizodus, que comparece em pequena proporção (5%), foi considerado por Nicol (1944, p. 553) como especialmente adaptado a mares fechados ("shallow land-locked seas") e um tanto hipersalinos.

b. Formas natantes. Os pectinídeos foram, aparentemente, adaptados à livre natação, em vista das características morfológicas de suas conchas (desenvolvimento das aurículas, simetria, etc.; Dakin, 1909; Jackson, 1890 in Dickinson, 1963, p. 75-76). Sorian, nesse caso, menos dependentes da natureza do fundo (Dickinson, 1963, p. 75).

Os pectinídeos atuais são referidos na literatura como resistentes às variações de salinidade. (Vide p.ex. Fischer, 1961, p. 1660-1661).

2. Variação da espessura das conchas.

Na assembléia fóssil estudada existe predominância de formas que possuem concha pouco espessa como Cowperreedia, Megelia, Bastusia e Schizodus. Tayoa tinha, provavelmente, concha ainda mais fina, o que talvez tenha sido a causa da sua menor freqüência de aparecimento na amostra.

Os pectinídeos têm as duas valvas diferentes, sendo a esquerda mais espessa que a direita, ocorrendo aquela, em maior proporção. A valva direita, provavelmente mais frágil, poderia ter possuído ainda a parte marginal menos calcificada (Kegel, 1952; Dickinson, 1963, p. 77).

3. Densidade dos fósseis.

Uma das características mais notáveis dos afloramentos de Taió é a grande densidade de fósseis em certos planos de acamamento (Figs. 30, 32, 33, 34).

Uma estimativa realizada em alguns jazigos mostrou-nos que o número de fósseis, por unidade de área (m^2), chega a atingir algumas centenas. Essa concentração, principalmente por não se referir ao mesmo plano de es

tratificação, pode refletir fortemente a influência da velocidade de deposição (Boucot, 1953, p. 33; Johnson, 1960, p. 1081). Seria necessário também que a determinação da densidade fôsse comparada com a respectiva distribuição em vida para determinados estágios de crescimento dos diversos organismos (Boucot, 1953, p. 33) o que não nos foi possível realizar.

4. Distribuição das freqüências de tamanho.

A análise de distribuição de freqüências de tamanho foi somente realizada para os pectinídeos, o único grupo que ocorre em número suficientemente grande para permitir tal verificação, resumida no gráfico da fig. 8; na sua construção utilizamos a altura como medida de tamanho.

As populações fósseis apresentam insuperáveis problemas de amostragem e a gama completa de variação de tamanho de determinadas espécies, incluindo todos os estágios ontogenéticos nos quais há partes duras, não é representado no material preservado como já observamos anteriormente (Olson, 1957, p. 311) e, em muito menor escala ainda no amostrado, que reflete também a influência de fatores materiais (características inerentes aos afloramentos) e pessoais. Dessa maneira, como observou Olson (1957, p. 311), na grande maioria das vezes (cerca de 80%) os indivíduos dos grupos de tamanho "muito pequenos" não são representados. Para o nosso caso, a distribuição representada na fig. 8, afasta-se ainda mais da distribuição da freqüência de tamanho de uma população fossilizada e, especialmente, da distribuição teórica em vida. Poderíamos levar em consideração a curva representada na fig. 8 como base de discussão, representando, aproximadamente, a variação de distribuição atual de uma amostra satisfatória da população fóssil de pectinídeos.

Deevey (1947 in Boucot 1953, p. 26) notou que invertebrados marinhos, especialmente lamelibrânquios, têm velocidade inicial de reprodução e morte muito altos em relação a outros grupos. Dessa maneira, seria de se prever uma curva de distribuição teórica de freqüência de tamanhos, de crescente correspondendo a grande número de indivíduos imaturos, número moderado de adultos e menor número de indivíduos gerônticos (Boucot, fig. 1, p. 29; Olson, 1957, p. 329, fig. 14). Não é o que se verifica no gráfico da fig. 8. Provavelmente, tal curva de distribuição sofreu a influência de condições seletivas secundárias que, no caso, admitimos corresponderem, principalmente, às condições físicas (correntes e ondas?). Essa ação se reflete especialmente na zona litorânea, sendo que algumas evidências sugerem que os fósseis de Taió se depositaram em águas rasas, onde se processa uma alteração da posição primária e seleção dos restos orgâni-

cos (vide p. 13). Dêsse modo, haveria uma alteração da distribuição de tamanho original, devido à seleção, que produziria uma curva sinusoidal como a da figura acima (Boucot, 1953, p.30; Olson, 1957, p. 311).

5. Proporção dos indivíduos com valvas conjugadas.

A tabela 2 apresenta as porcentagens aproximadas de valvas conjugadas encontradas para os diversos gêneros de lamelibrânquios de Taió.

As diferenças de resistência e modos de articulação das valvas dos diversos gêneros devem ser levados em conta ao se discutir este aspecto do problema (Boucot, 1953, p. 33; Johnson, 1960, p. 1081).

Espécies	Nº de espécimes	Nº de espécimes com valvas articuladas	Porcentagem
<u>Heteropecten catharinae</u>	559	10	1,7
<u>Bastusia costata</u>	54	14	25,9
<u>Schizodus occidentalis</u>	38	1	2,7
<u>Cowperreedia brasiliensis</u>	36	5	14,2
<u>Kegelia tayoensis</u>	31	5	16,1
<u>Tayoa erichsoni</u>	7	3	42,7

TABELA 2

Percebe-se, pelo exame da tabela, que nos gêneros cujo ligamento era provavelmente mais forte, Cowperreedia, Kegelia, Bastusia, ocorrem porcentagens grandes de valvas conjugadas (p. 43, 47, 49).

Nos pectinídeos, assim como em Schizodus, cujo ligamento é, sem dúvida, dos mais frágeis, a porcentagem de valvas conjugadas é pequena.

6. Fragmentação dos restos.

Em quase todos os jazigos fossilíferos, constatou-se a existência de grande quantidade de conchas fragmentadas; em alguns planos de acamamento, estes predominam sensivelmente sobre as conchas inteiras, evidenciando intensa movimentação do material. (Figs. 32,33). Reflexo disso é, por exemplo, a menor frequência de ocorrência de valvas direitas de pectinídeos e de concha do gênero Tayoa, menos calcificadas.

7. Disposição e orientação dos fósseis.

O exame de 10 amostras de diversos afloramentos, orientadas em relação ao topo e base, mostrou-nos que, aproximadamente, 58% das valvas dos diversos gêneros, estão orientadas com o lado côncavo para baixo (Figs. 30, 31, 32).

Além disso, a grande maioria encontra-se com o seu eixo maior orientado paralelamente ao plano de acamamento quanto este é distinguível (Figs. 31, 34). Encontramos, todavia, orientação diferente. Existem, em alguns jazigos, concentrações de conchas inclinadas e até perpendiculares ao plano de estratificação, grande número de conchas encaixadas, num padrão de interferência que sugere a ação de correntes ou ondas, associada com a compactação desse conjunto que, provavelmente, também causou alguma reorientação (Johnson, 1960, p. 1081-1082). Esses aglomerados de conchas de disposição caótica poderiam corresponder aos "bancos de concha" de Dickins (1963). (Figs. 33, 34).

8. Tipo de fossilização.

As conchas ocorrem sob a forma de moldes, cujo exame mais detido chamou-nos a atenção para certos aspectos interessantes, que serão aqui discutidos, em virtude de sua importância no entendimento das características morfológicas das conchas descritas.

Os moldes externos das valvas dos lamelibrânquios, apresentam a ornamentação bem marcada em toda a extensão da valva. (Vide p.ex. estp.1, fig.2; estp.2, fig.2). Os moldes internos, entretanto, reproduzem em grau muito variável a ornamentação, mostrando, muitas vezes, feições internas associadas (marcas musculares, linha palial, etc.), especialmente na região junto ao umbo (metade superior da concha). Encontramos alguns desses moldes completamente lisos, apresentando indícios de ornamentação, somente nas margens das valvas (abaixo da linha palial); outros apresentam marcas de ornamentação em certas partes da valva, como por exemplo, costelas auriculares (Estp. 1, fig. 1, 3, 4, 8, 11).

O caso das outras formas é aparentemente semelhante. *Cowperreedia*, *Kegelia*, *Schizodus* apresentam-se da mesma forma; moldes internos lisos ou com ornamentação marcada em extensão variável. *Bastesia*, cujas costelas parecem refletir-se internamente (pelo menos na região umbonal) apresenta também esses moldes complexos (Estp. 4, fig. 3, 4; estp.5, fig. 1, 4).

Portanto, o tipo de fossilização para o caso das conchas de Taió não se enquadraria, ao nosso ver, na classificação normal de molde interno e externo, em vista de coexistirem características internas e externas no mesmo molde.

Pelo exame de espécimes de pectinídeos atuais e fósseis (Newell, 1937), verifica-se que a ornamentação é, na maioria das vezes, apagada na parte interna das valvas junto ao umbo, até a altura das marcas musculares, sendo as aurículas geralmente lisas. A ornamentação aparece, en-

-20-

tretanto, junto à margem inferior das valvas. Newell (1937) acredita que a maioria das formas do Paleozóico eram lisas ou com costelas. Consideramos ser êsse também o caso das formas de Taió, e somente os moldes completamente lisos corresponderiam a moldes internos (Estp.1,figs. 3,4,8).

McAlester (1962, p.70) criou uma terminologia especial para o caso de moldes de conchas onde existe essa superimposição de feições, denominando-as "moldes compostos." Seriam êstes formados por um ajustamento do molde externo ao interno (relativamente liso) pela compactação sedimentar, produzindo moldes finais, compostos, combinando feições do interior e exterior da concha original. Distinguiu, também, os moldes internos "predominantemente internos" (Estp.1,figs.3,4,8) e "predominantemente externos" (Estp.2,figs.1,3,5,6,10,11) e "molde composto negativo." (Estp.1,fig.2).

O tipo de fossilização das conchas de Taió, enquadra-se perfeitamente na classificação criada por McAlester (1962, p. 70), para as conchas do Devoniano, com a diferença de que os seus "moldes compostos", referem-se sempre a moldes em sedimento muito compactável (argilas). No nosso caso, não há possibilidade de usarmos a mesma explicação para o mecanismo de comparecimento dos caracteres internos e externos por vários motivos:

A) A matriz dos fósseis é um arenito e a compactação êsse tipo de rocha parece ser muito pequena (Pettijohn, 1957, p. 87; De Sitter, 1956, p. 36); encontramos, não obstante, algumas valvas deformadas, mas cuja deformação foi causada por outros fenômenos e não pela compactação do arenito. (Fig. 34).

B) No caso de Taió, não aparece nos moldes internos superimposição total. Os caracteres ornamentais externos notam-se apenas em certos pontos dos moldes, especialmente na parte correspondente à metade distal da valva. (Estp.1,figs.4,11). Consideramos tratar-se de dissolução parcial das conchas antes da moldagem, aparentemente semelhante ao processo descrito por Newell (1937, p. 15-16) para formação dos "moldes subinternos."

C) Verifica-se a manutenção de um espaço estreito, mas nítido, entre os dois moldes (Estp.1,fig.12). Neste caso, a remoção somente do material do óstraco interno da concha, ter-se-ia dado mais ou menos cedo, na história geológica da formação da assembléia fóssil. McAlester (1962, p.73) sugeriu, para casos semelhantes, que a estrutura da concha era predominantemente aragonítica (Newell, 1937, p. 26).

9. Características da matriz.

As características físicas da matriz dos fósseis de Taió, como foram descritas anteriormente (p.13), indicam-nos que o ambiente onde se depositaram essas conchas era relativamente agitado, de águas rasas e sujeitas, aparentemente, a exposições periódicas.

Tudo parece indicar que a fauna fóssil do Taió é, caracteristicamente, uma assembléia composta de restos transportados. Esse modelo de formação de depósitos fossilíferos é provavelmente, mais comum em águas rasas, mais ou menos turbulentas (Johnson, 1960, p. 1078). Este autor (1960, p. 1078) encontrou exemplos desse conjunto de circunstâncias em canais margeando planícies de maré ("tidal flats"), praias erodidas por ondas e em águas muito rasas adjacentes a praias.

VII - CORRELAÇÕES; PROCEDÊNCIA DA FAUNA.

A. Intercalações marinhas da Bacia do Paraná. - São numerosas as ocorrências de horizontes com fósseis marinhos intercaladas em sedimentos permo-carboníferos do sul do Brasil (Fig. 6, Tabela, 3).

As características comuns dessas intercalações são a pequena espessura de sedimentos com fósseis marinhos e restrito número de espécies (Beurlen, 1954; Martin, 1961).

Em Taió, os fósseis marinhos ocorrem em posição estratigráfica mais alta, em toda a bacia, afastados dos sedimentos de origem glacial, de mais de uma centena de metros, enquanto que nas outras ocorrências, estão associados direta ou proxivamente a sedimentos de caráter glacial. Os gêneros descritos são diferentes, a não ser pela presença generalizada de Orbiculoides. (Tabela 3.)

B. Outras Bacias do Brasil. - A fauna de Taió não apresenta similaridades com as outras ocorrências nacionais, sendo os gêneros de lameli-brânquios, aparentemente indígenas. Heteropecten não foi registrado até agora em nenhuma das outras localidades onde existem pectinídeos (Kegel e Costa, 1951, p. 21).

C. Outras regiões continentais e extra-continentais. - Parece não existir, atualmente, qualquer possibilidade de correlação entre as faunas marinhas permo-carboníferas brasileiras e as faunas setentrionais. Barroisella Hall, característica das faunas carboníferas da América do Norte, foi recentemente redescrita como Lengella imbituvensis (Mendes, 1961), gênero até agora restrito à Bacia do Paraná.

Reed (1930) supôs que Solenopsis, atual Tayca, fosse semelhante à Solenomorpha equatorialis Thomas (Carbonífero do Peru) atribuída posteriormente por Howell et al. (1953), ao gênero Volcellina, um Mytilidae (vide p. 42).

Em relação às ocorrências gondwânicas, a correlação a princípio

LOCAL	MATRIZ	POSIÇÃO ESTRATIGRÁFICA	FÓSSEIS
Capivari, S.P. (Mendes, 1952)	Siltitos 20-30 cm	Entre sedimentos glaciais	<u>Crurithyris aff. planoconvexa</u> , <u>Rhynchopora grossopunctata</u> , <u>Aviculopecten capivarionsis</u> , <u>Nuculana</u> sp.
Itaporanga, S.P. (Mozzali-ra, 1956)	Arenito siltico cinzento 30 m (?)	25 m acima de varvitos	<u>Nuculana limai</u> , <u>Orbiculoides</u> cf. <u>guaraunensis</u> .
Teixeira Soares, Imbituva, PR. (Lange, 1952; Beurlen, 1954)	Folhelho (siltito) escuro 30 m (?) "Folhelho Passinho"	Entre siltitos ou "drift"	<u>Langella imbituvensis</u> , <u>Crurithyris roxoi</u> , <u>Orbiculoides guaraunensis</u> , <u>Chonetes rionegrensis</u> , <u>Nuculana woodworthi</u> , <u>Mourlonia ? oliveirai</u> , <u>Phylloblatta oliveirai</u> , <u>P. roxoi</u> , <u>P. pauloi</u> , <u>Elonichthys gondwanus</u> , <u>Limipecten</u> , <u>Allorisma</u> .
Rio da Arcia, (Kegel e Costa, 1952)	Arenito fino	Entre tilitos	<u>Aviculopectinídeos</u> , <u>Promytilus</u> , <u>Myalina</u>
Rio da Arcia, (Beurlen, 1954)	Arenito fino	Entre sedimentos glaciais	<u>Prosopecten</u> , <u>Aviculopecten</u> , <u>Limipecten</u> , <u>Sanguinolites</u> , <u>Solenomorpha</u> , <u>Allorisma</u> , <u>Promytilus</u> , <u>Myalina</u> , <u>Leiopteria</u> , <u>Schizodus</u> .
Baitaca, (Beurlen, 1954)	Siltito fino	Entre sedimentos glaciais	<u>Aviculopecten</u> , <u>Sanguinolites</u> , <u>Allorisma</u> , <u>Chacomya</u> , <u>Nuculana</u> , <u>Schizodus</u> .
Mafra-Bela Vista, S.C. (Oliveira, 1927)	Folhelhos	Entre tilitos	<u>Orbiculoides guaraunensis</u> , <u>Chonetes rionegrensis</u> , peixes palconiscídeos.
Taió, S.C. (Santos, 1947; Campos, 1964)	Arenito fino 50 cm	100 m acima de varvitos	<u>Heteropecten catharinae</u> , <u>Tayoa erichsoni</u> , <u>Kegelia tayoensis</u> , <u>Cowperreedia brasiliensis</u> , <u>Bastusia costata</u> , <u>Schizodus occidentalis</u> , <u>Orbiculoides</u> sp., <u>Warthia</u> sp., <u>Ctenacanthus gondwanus</u> , <u>Asteroides</u> , <u>Ophiuroidea</u> .
Budó, S. Gaúcho, S. Sepé, RS (Martins, 1948-1951; Martins e Sena Sobrinho, 1950, 1952; Pinto, 1947, 1949)	Arenito fino	"Série Tubarão"	<u>Langella imbituvensis</u> , <u>Orbiculoides maricaensis</u> , <u>Aviculopecten cambahyensis</u> , <u>Acrania</u> , ostracódeos, vermes (maxilas), espículas de esponja, escama de peixes, vegetais.
Picada das Picardas, Uruguai, (Delaney e Goni, 1963)	Concreções calcárias	Entre tilitos	Amonóides e nautilóides

evocada foi com achados da Nova Galés do Sul, Austrália (Reed, 1930). Kegel (1951) desfez um dos elos ao propôr para os pectinídeos de Taió, um gênero novo, Heteropecten. Trabalho recente de Dickins (1961, p. 286) menciona espécimes atribuíveis a esse gênero na Austrália, não os ilustrando, entretanto.

Quanto aos outros lamelibrânquios as diferenças são maiores, pois sua análise cuidadosa, contando com espécimes em melhor estado de conservação, levou-nos a criar para eles gêneros presentemente só encontrados na Bacia do Paraná.

D. Procedência da fauna. - O caráter mais cosmopolita da fauna das Camadas Bonoto da Argentina apresentando semelhanças com formas descritas na Austrália e África (Harrington, 1955; Dickins e Thomas, 1959), poderia indicar proveniência meridional das ingressões (Sanford e Lange, 1960, p. 1334). Recentes investigações demonstraram a presença de fósseis marinhos intercalados nos sedimentos glaciais do Uruguai (amonóides e nautilóides). (Delancy e Goñi, 1963, p. 10).

Os gêneros descritos por Harrington são, entretanto, diferentes dos brasileiros, a não ser pela ocorrência de Schizodus. Allorisma inflectoventris Harrington (1955, p. 126-7, estp. 24, fig. 8), poderia corresponder a Cowperreodia, apesar das diferenças mencionadas por Harrington (1955, p. 127).

Além disso, a fauna marinha argentina é considerada como permiana (Koidel, 1939; Harrington, 1955), enquanto que a idade neo-carbonífera é aceita por muitos para os sedimentos do Grupo Tubarão do sul do Brasil, baseada na suposta presença de répteis do tipo Loxomma (Putzer, 1955), evidência essa considerada inconclusiva (Mendes, 1961; Martin, 1961). É possível, portanto, que futuramente se verifique que as camadas glaciais dessas duas regiões sejam, na verdade, contemporâneas na idade (Martin, 1961, p. 14). Este autor acredita que o caráter endêmico das faunas marinhas da Bacia do Paraná seria consistente com suas interpretações paleogeográficas sobre a glaciação no sul do Brasil.

VIII .. PALEONTOLOGIA SISTEMIÁTICA

A. Revisão da nomenclatura prévia.

COWPER REED, 1930

Lamellibranchiata

<u>Solenopsis</u> sp.	<u>Tayoa erichsoni</u> Campos, gen. et sp.nov.
<u>Spatholla tayoensis</u> Reed	<u>Mogelia tayoensis</u> (Reed)
<u>Maconia</u> cf. <u>cuneata</u>	" " "
<u>Stutchburia brasiliensis</u> Reed	<u>Cowperreedia brasiliensis</u> (Reed)
<u>Allorisma</u> ? sp.	<u>Bastosia costata</u> Campos, gen. et sp.nov.
<u>Edmondia</u> sp.	" " " " " "
<u>Schizodus occidentalis</u> Reed	<u>Schizodus occidentalis</u> Reed
<u>Schizodus</u> ? sp.	" " "
<u>Aviculopecten</u> (<u>Deltopecten</u>) <u>catharinae</u> Reed	<u>Heteropecten catharinae</u> (Reed)
<u>Aviculopecten</u> (<u>Deltopecten</u>) <u>relegatus</u> Reed	" " "
<u>Aviculopecten</u> (<u>Deltopecten</u>) <u>miscellus</u> Reed	" " "
<u>Aviculopecten</u> (<u>Deltopecten</u>) <u>unicus</u> Reed	" " "
<u>Aviculopecten</u> (<u>Deltopecten</u> ?) <u>crassicostatus</u> Reed	" " "
<u>Pseudamusium</u> ? sp.	" " "

Gasteropoda

Belerophon ? cf. micromphalus
 Morris

Warthia sp.Brachiopoda

Chonetes (ou Chonetella) ? sp. Região umbonal da valva esquerda de
 Heteropecten
Discinisca tayoensis Reed Oriculoidea tayoensis (Reed)

KEGEL E COSTA, 1951

LamelibranchiataHeteropecten catharinae var.dyglicha Kegel e CostaHeteropecten catharinae (Reed)Heteropecten bastosi Kegel

e Costa

" " "

Heteropecten platycosta

Kegel e Costa

" " "

B. Lamelibrânculos

Abreviações e convenções

A = altura

C = comprimento

Pr.U. = comprimento pró-umbonal

P.U. = comprimento pós-umbonal

C.A. = comprimento alar

V.D. = valva direita

V.E. = valva esquerda

 α = ângulo umbonalD.G.M. = Divisão de Geologia e Mineralogia do Departamento Nacional da
Produção Mineral.D.G.P. = Departamento de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.

E.P. = Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Estp. = estampa

Fig. = figura (s)

Col. = coleção

M.I., M.E., M.C., M.C.M., C.M. = Moldes interno, externo, composto, composto
negativo e contra-molde.Gênero Heteropecten Kegel e Costa 1951, emend. Campos

Diagnose

Concha pectinóide, áclina ou ligeiramente prosóclina, inequival-
va. Valva esquerda convexa, valva direita no início convexa e depois cõn-
cava. Aurículas triangulares, a anterior maior que a posterior com sulco
bissal profundo na valva direita e sinus bissal na valva esquerda. Área
cardinal da valva esquerda subparalela ao plano de comissura, com resili-
fero triangular; área cardinal da valva direita estreita, oblíqua em rela-
ção ao plano de fechamento das valvas, com resiliífero trapezoidal. Ambas

as áreas percorridas por linhas de crescimento paralelas.

Musculatura consistindo na valva direita em cicatriz do adutor posterior, oval, contro-posterior, cicatriz dos pediais, acima do adutor e junto ao sulco bissal e músculos branquiais, abaixo do adutor e, internamente, junto ao pedial. Valva esquerda com os mesmos músculos, porém, menores. Linha palial contínua na parte marginal das duas valvas e descontínua na metade superior; na valva direita situa-se mais próxima à margem da valva.

Ornamentação da valva esquerda, constituída por costelas primárias e secundárias originadas por intercalação e divisão. Valva direita com a mesma ornamentação, predominando a divisão. Linhas de crescimento finas, numerosas, além de algumas cristas fortes.

Generótipo: Heteropecten catharinae Reed 1930

Discussão

Os trabalhos mais importantes a respeito do problema da classificação dos pectinídeos são os de Newell (1937), Ishikawa (1958) e Dickins (1963). Este último autor propôs uma nova classificação dessas conchas, incluindo as viventes, baseada nos esquemas apresentados pelos autores anteriores e que será utilizada no presente trabalho.

Na diagnose da subfamília Aviculopectininae, por exemplo, Newell (1937, p. 43) restringe a esse grupo, as conchas com aurícula posterior maior que a anterior, o que não é o caso das conchas de Taió (Kegel e Costa, 1951, p. 10). Dickins (1963, p. 72) fornece elementos diagnósticos mais amplos, abrangendo o gênero Heteropecten.

Kegel e Costa (1951) apontaram as principais feições características do gênero principalmente as distintivas em relação à Aviculopecten. Os resultados de nossas observações não diferem, essencialmente, dos atingidos por eles.

1. A presença de sulcos longitudinais, na área cardinal, é um caráter notável nas conchas do gênero Heteropecten (Kegel e Costa, p. 18) não sendo, entretanto, privativo do gênero, foi interpretado como sulcos ligamentares. Dickins (1957, p. 40 e 1963, p. 72 e 78), aponta essa feição como característica da nova família Deltopectinidae, proposta por ele e como Newell (1937, p. 30) acredita serem essas estruturas correspondentes a linhas de crescimento e não a sulcos ligamentares. Parece ser essa a interpretação correta, pois, aparentemente, as linhas são contínuas em toda a área cardinal, atravessando inclusive o resilífero (Estep. 1, fig. 9).

2. "Discordância" das valvas. Este aspecto da morfologia das valvas dos pectinídeos já foi tratado por Newell e Merchant (1939), Kegel e Costa (1951) e Kegel (1951), Ishikawa (1958) e Dickins (1963). Acreditam esses autores que essa discordância em tamanho das valvas seja causada pela menor calcificação da área marginal da valva direita. Realmente, a parte marginal menos calcificada das valvas é de ocorrência rara em conchas grandes, cujas valvas direitas ultrapassaram em crescimento a região em que são convexas. As valvas direitas são também menos freqüentes ocorrendo maior número de seus fragmentos. Não acreditamos, entretanto, como supõem Kegel e Costa (1951), Kegel (1951) e Dickins (1963, p. 77) que a região marginal tenha sido composta de conchiolina, pois exemplares com as duas valvas articuladas e tendo as valvas direitas completas, mostram persistência até as bordas, das estruturas do corpo da valva (ornamentação). (Estp. 1, figs. 5, 6, 7, 10).

3. A estrutura em ziguezague descrita por Kegel e Costa (p. 16-17), para o óstraco interno de Heteropecten e mencionada por Newell (1937, p. 23) Dickins (1963, p. 78), para Deltopecten, Acanthopecten e Limipecten parece corresponder ao modo particular de fragmentação do material que preencheu o espaço entre os moldes "interno" e externo (sílica), que se desagrega em lamelas e que mantido parcialmente em alguns moldes externos fragmenta-se preferencialmente nos interespaços ou saliências permanecendo protegida nas costelas ou sulcos. O fato do material de preenchimento ser plicado e o tipo especial de fossilização das conchas, indicando dissolução prematura do hipóstraco e óstraco interno (p. 27), favorecem essa suposição (Estp. 2, figs. 2, 4).

4. Em relação à musculatura, o gênero Heteropecten, somente mostra semelhanças gerais com Aviculopecten (Kegel e Costa, 1951, p. 13, fig. 1). Existem várias diferenças, pois valvas direitas de Heteropecten (Fig. 11; estp. 1, fig. 1, 3, 8) apresentam cicatriz do retrator do pé separado da do adutor por sulco raso e a parte posterior superior da linha palial é interrompida (Newell, 1937, p. 23, fig. 2-3). Na valva esquerda (Estp. 1, figs. 11, 10) a distinção é ainda mais marcante, apresentando Heteropecten alguma similaridade com Pseudomonotis e Limipecten (Newell, 1937, p. 23, fig. 2-5, estp. 11, fig. 7a - 7b). Difere de Aviculopecten pela forma da cicatriz do adutor, pelo não comparecimento de alguns músculos (poderia se tratar de defeito de fossilização) e aparente interrupção da linha palial no seu trecho pósterio-superior (Fig. 10; estp. 1, fig. 11).

5. Forma das valvas. Newell (1937, p. 44) descreve as valvas direita dos Aviculopectininae como sendo quase chatas, raramente côncavas.

Heteropecten apresenta valvas direitas levemente convexas, até certa fase do crescimento (aproximadamente 40 mm de altura). Após esse tamanho, as valvas direitas, são côncavas (Kegel e Costa, 1951, p. 19), encaixadas nas valvas esquerdas correspondentes (Estep. 1, figs. 5, 7, 10). Esse fato poderia advir da parte marginal da valva, menos calcificada, ser flexível (Dickins, 1963, p. 77).

6. Área cardinal e resilífero. Segundo Kegel e Costa (1951, p. 17), a área cardinal da valva esquerda é quase paralela ao plano de fechamento das valvas e a da valva direita é bem oblíquo; na realidade, esta é quase perpendicular ao plano. O resilífero, na valva direita (trapezoidal), é menos marcado que na esquerda (triangular), ao contrário do que Kegel e Costa registram (Estep. 1, figs. 5, 9).

Heteropecten catharinae Reed, emend. Campos

Estampas: 1, figs. 1-12; 2, figs. 1-11; 3, figs. 1-8.

1930 Aviculopecten (Doltopecten) catharinae Reed 1930, p. 10, estp. 1, fig. 1-6; estp. 2, fig. 2, 4; estp. 3, fig. 2, 3; estp. 4, fig. 3; estp. 6, fig. 2, 4.

Aviculopecten (Doltopecten) relegatus Reed, 1930, p. 16, estp. 2, fig. 1, 1a, 5; estp. 5, fig. 1; estp. 6, fig. 3, 5; estp. 1, fig. 7; estp. 4, fig. 4.

Aviculopecten (Doltopecten) unicus Reed 1930, p. 20, estp. 3, fig. 1, 1a.

Aviculopecten (Doltopecten) miscellus Reed 1930, p. 22, estp. 6, fig. 1.

Aviculopecten (Doltopecten ?) crassicostatus Reed 1930, p. 24, estp. 5, fig. 2.

Pseudamusium (?) sp. Reed 1930, p. 26.

Heteropecten catharinae var. dygllipha Kegel e Costa, 1951, p. 22, estp. 3, fig. 3; estp. 5, fig. 2; estp. 6, fig. 4.

Heteropecten bastosi Kegel e Costa, 1951, p. 23, estp. 2, fig. 1, 2; estp. 3, fig. 1; estp. 4, fig. 2, 3; estp. 6, fig. 3.

Heteropecten platycosta Kegel e Costa, 1951, p. 27, estp. 2, fig. 5, 6; estp. 3, fig. 2, 4; estp. 4, fig. 1; estp. 6, fig. 1, 5.

Material: Algumas centenas de moldes "internos" e externos pertencentes às coleções do D.G.M., E.P. e D.G.P.

Descrição: Concha pectinóide de tamanho médio, áclina a ligeiramente prosóclina, inequilateral e fortemente inequivalva.

Valva esquerda de convexidade média; valva direita pouco convexa até certo tamanho (40 mm de comprimento) e côncava a partir daí. Aurículas triangulares, a anterior maior que a posterior, dotada de sulco bissal profundo na valva direita, triangular, agudo, com o vértice voltado para o umbo, e, de um sinus bissal na valva esquerda. Área cardinal da valva esquerda comprida, subparalela ao plano de comissura, com resilífero triangular; área cardinal da valva direita mais estreita, quase perpendicular ao plano de comissura com resilífero trapezoidal, oblíquo. Linhas de crescimento paralelas percorrem as áreas ligamentares das duas valvas.

Marcas musculares da valva direita consistindo de cicatriz do adutor posterior, grande, oval, situado na região centro-posterior e cicatrizes dos pediais, pequenas, uma triangular, acima do adutor e separada d'oste por um sulco raso e a menor na asa anterior junto ao sulco bissal; cicatrizes dos músculos branquiais (2?), em forma de meia lua abaixo do adutor e um pequeno acima e adiante do pedial posterior. Linha palial inteira na parte inferior e consistindo de vários pontos na metade superior, situada bem próxima da margem inferior da concha (Fig. 11).

Marcas musculares da valva esquerda muito semelhantes, a não ser pelo aparecimento da cicatriz do pedial superior sobre a do adutor (defeito de fossilização?), cicatrizes do adutor e pedial anterior, menores, e presença somente da cicatriz do branquial inferior ao adutor, aparentemente com a mesma forma que na valva direita, interior em relação à linha palial, situando-se esta mais afastada da margem da valva (atinge, aproximadamente a metade da valva). (Fig. 10).

Ornamentação variável representada na valva esquerda por costelas primárias arredondadas a chatas, com intercalação de secundárias em número e posição variáveis, desde fase bem jovem, junto ao umbo, até a metade da valva. Costelas primárias com crescimento e divisão variáveis, esta geralmente precoce, produzindo duas costelas até fascículos irregulares de 3-5 costelas finas. Na valva direita, a ornamentação é aparentemente mais simples, mas da mesma natureza, predominando a divisão. As linhas de crescimento (lamelas de crescimento, imbricantes) são finas e numerosas, aparecendo em várias alturas, algumas cristas fortes (Estep. 2, fig. 9).

X

Na classificação dos pectinídeos de Taió defrontamo-nos com o problema das espécies simpátricas, isto é, duas ou mais espécies atribuídas a um mesmo gênero ocorrendo associadas num mesmo jazigo (Mayr, Linsley e Usinger, 1953, p. 121).

É muito conhecido o princípio biológico de que somente uma espécie de qualquer gênero pode ocupar um mesmo nicho (Newell, 1947, p. 164-165; Burma, 1948, p. 728-734; Mayr et al., 1953, p. 121). Tanto Cowper Reed (1930) como Kegel e Costa (1951) distinguiram espécies simpátricas. Resolvemos analisar detidamente as coleções para aquilatar da validade dessas entidades pois, já Kegel e Costa notaram, por exemplo, a precaridade da caracterização da "espécie" Noteropecton relegatus Reed, que se liga por uma série de transição à variedade mais comum (Kegel e Costa, 1951, p. 32), tendo elegido, além disso, a categoria infra-específica de variedade para distinguir formas com ornamentação "fasciculada" (Kegel e Costa, 1951, p. 8, 9, 22, 23).

A revisão das diversas "espécies" discriminadas pelos autores (Reed, 1930; Kegel e Costa, 1951), mostrou-nos que a maioria dos traços morfológicos distintivos podem ser reconhecidos como meros atributos da fossilização, cuja análise não foi objeto de cuidado especial por parte de autores prévios. Como já nos referimos em capítulo anterior, ao lado de moldes internos puros, existem alguns com parcial combinação de características externas, devido à solução precoce do endóstraco; assim, também há moldes externos puros e compostos; motivaram, parcialmente, confusão nas determinações sistemáticas anteriores.

Outra linha de evidência advém da análise das propriedades morfométricas das conchas estudadas. Neste particular, utilizamos a construção do gráfico sugerido por Burma, 1948, p. 755, 756), apresentado na fig. 12.

Na sua construção, procuramos escolher uma classe de tamanho que representasse um estágio adulto. O exame do gráfico da fig. 8 mostra a predominância nítida da classe de 40-50 mm. Não a utilizamos, entretanto, em vista destas formas serem consideradas ainda jovens (p. 35, e, portanto, sujeitas às variações ontogenéticas. A sua ocorrência, em maior proporção na amostra, poderia ser relacionada com as vicissitudes da maneira especial de formação da assembléia fóssil (p. 28, 29).

O gráfico triangular da fig. 12 mostra as relações entre as medidas consideradas mais seguras para o material estudado; a grande concentração de pontos numa pequena área é bastante sugestiva em relação à homogeneidade da população (Burma, 1948, p. 755-756; in Leitch, 1940).

Finalmente, o exame cuidadoso da ornamentação, caráter importante na taxonômia dos pectinóides paleozóicos, (Newell, 1937, p. 21) mostrou uma intergradação entre as formas variantes. Essa sequência de transição,

embora não completa, dada a insuficiência da amostra, levou-nos a considerar as antigas "espécies" como correspondendo realmente às variantes morfológicas dentro da população (Newell, 1947, p. 163-167; Burma, 1948, p. 741).

Os espécimes D.G.P. 7/1027 e D.G.M. 405 (estp.1, figs 3,4,8) por exemplo, mostram o aspecto de moldes predominantemente internos, em que a forma das aurículas, contorno do corpo da valva e ornamentação diferem, sensivelmente, dos moldes predominantemente externos.

Assim, em relação às valvas esquerdas, consideramos a "espécie" Heteropecten catharinae Reed, corresponder às formas mais frequentes, com intercalação de costelas secundárias comum, predominando sobre a divisão das costelas primárias (D.G.M. 396, D.G.P. 7/1045, 7/1029, 7/1038; estp. 2, fig. 1,2; estp. 1, fig.11; estp. 2, figs. 3,4; fig.6).

H. relogatus, H. unicus corresponderiam às formas que mostram poucas intercalações, em parte como decorrência do tipo de fossilização. Os espécimes de Reed D.G.M. 414 e 418, usados na descrição original correspondem a moldes compostos predominantemente internos; todos eles mostram intercalação de algumas costelas após exame cuidadoso, fato já mencionado por Kegel e Costa (1951, p. 32). Existem formas intermediárias com costelas secundárias raras, como por exemplo D.G.P. 7/1037 (estp.1, fig.12), D.G.M. 411 (estp.2, fig.5), D.G.M. 4422. As outras feições diagnósticas como já referimos, acreditamos serem atribuíveis à fossilização (vide estp.1, figs. 11, 12, p.e.).

A denominação variedade dyglicha Kegel e Costa (D.G.P. 7/1031, 7/1033, 7/1051; estp.2, fig.11; estp.3, fig.5, 7), acreditamos ter sido corretamente aplicada às formas com divisão comum que se ligam a H. catharinae por formas intermediárias, como D.G.P. 7/1038, 7/1041 (estp. 2, figs. 6,7, 8).

Nas formas com crescimento das costelas primárias, produzindo costelas mais largas, onde a divisão é fenômeno comum e com intercalação em grau variável, abrangeriam as "espécies" "H. bastosi" Kegel e Costa "platicosta" Kegel e Costa e "crassicostatus" Reed; formas intermediárias como D.G.M. 402, D.G.P. 7/1028, etc. apresentam intercalação, costelas mais largas e já algumas divisões; algumas destas apresentam divisão visível somente nos moldes internos (E.P. XV, estp. 3, figs. 3,4).

H. miscellus caracterizado pelo grande número de costelas, revelou tratar-se de formas com intercalação generalizada, com crescimento das costelas secundárias, atingindo o tamanho das primárias e, além disso,

intercalação de uma nova série (3 as), um tanto tardiamente; os espécimes D.G.P. 7/1050, 7/1052 (estp. 3, fig. 1, 2) já mostram essa tendência no aumento exagerado do número total de costelas.

Em relação às valvas direitas a situação é aparentemente idêntica. O exame dos caracteres internos não revelou alguma distinção significativa. Muitos espécimes, cuja forma geral difere entre si, consistem em fragmentos de valvas direitas, onde a parte marginal se destacou (D.G.M. 405, 406, 416; estp. 1, figs. 1, 2, 3). A ornamentação apresenta-se mais simples como já comentaram Kogel e Costa (1951, p. 19) o que, aliás, concorda com as idéias de Davenport (1900, p. 869) de que os caracteres da valva direita são mais conservativos.

Algumas diferenças notadas por aqueles autores e que serviram à discriminação de valvas direitas das diversas espécies, especialmente a ornamentação, não passam também, de variações decorrentes da fossilização (p.e. D.G.M. 4234, molde interno e externo da valva direita e estp. 1, figs. 2, 3, 8).

A observação dessas características em valvas direitas, em exemplares com as duas valvas conjugadas, até então não encontradas (Kogel, 1951, p. 30) corrobora também essa afirmação. (D.G.P. 7/1049, estp. 1, figs. 5, 6; E.P. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, etc.). (Estp. 1, fig. 10).

Dimensões em mm (exemplares figurados)

Nº	A	C	C.A.	OX	(graus)
D.G.M. 416-M.C.	26	26	32	-	± 78
D.G.M. 406-M.C, N.	36+	36+	52	-	95
D.G.M. 405-M.I.	35+	40	48	-	80
D.G.P. 7/1027-M.I.	56	47	39	14	65
D.G.P. 7/1049-M.C.	70+	43+	+	14	70
D.G.P. 7/1048-M.I.	44+	47	36+	-	80
D.G.P. 7/1045-M.C.	50	43	39	13	70
D.G.P. 7/1037-MC+CM.	40	35	23+	12	75
D.G.P. 7/1037-M.E.	40	64	32+	12	80
D.G.M. 396-M.C.	45	42	33+	10	70
D.G.M. 396-M.E.	45	42			
D.G.P. 7/1029-M.E.	48	39	37	12	70
D.G.M. 411-M.C.	40	35	25	10	70
D.G.P. 7/1038-M.C.	46+	40+	35+	14	70
D.G.P. 7/1038-M.E.	46+	35+	32+	14	70
E.P. XXI-M.C.	45+	66+	+	17	70

Nº	A	C	C.A.	CX	(graus)
D.G.P.7/1041-M.E.	54	51+	+	12	80
D.G.P.7/1043-M.E.	56+	50	+	+	+
D.G.P.7/1043-M.C,	60	55+	37+	14	70
D.G.P.7/1028-M.C,	60	54	37+	14	70
D.G.P.7/1031-M.C,	60	50	40	19	75
D.G.P.7/1050-M.E,	50+	44+	+	13	70
D.G.P.7/1052-M.E.	42	38+	38+	12	78
E.P.XV - M.C,	68	62	42+	13	75
E.P.XV - M.E.	69	61	41+	14	75
D.G.P.7/1033-M.E,	62+	56+	45	12	80
D.G.P.7/1051-M.E,	58+	37+	+	+	+
D.G.P.7/1029-M.E.	49+	40+	39	13	70
+ Exemplar incompleto.					

Gênero Tayoa Campos, gen. nov.

Diagnose

Concha alongada com os bordos dorsal e ventral subparalelos, sem carena umbonal. Aberta nas duas extremidades. Umbo pequeno subanterior. Ligamento externo, opistodético. Carneira aparentemente edentelosa. Ornamentação consistindo apenas em linhas de crescimento. Impressões dos adutores e da linha palial desconhecidos.

Generótipo. - Tayoa erichsoni Campos, gen. et sp. n.

Discussão

A primeira descrição desta concha deve-se a Reed (1930, p. 38, estp. 8, fig. 5); foi então registrada como Solenopsis sp. O espécime achava-se incompletamente preparado e a sua reconstituição, de acordo com Reed, fêz supôr uma concha menos alongada. A sua atribuição a Solenopsis (=Solenomorpha) carece de fundamento (Mind, 1900, p. 412, estp. 51. fig. 2-5); tal gênero inclui conchas afiladas posteriormente. Apresenta, entretanto, alguma similaridade de forma com Solenopsis parallela Mind (1900, p. 415, estp. 44, fig. 10 e estp. 51, fig. 2 e 2a), que possui a parte posterior não afilada, com as margens dorsal e ventral quase paralelas. Afasta-se dela por outros caracteres. Assim: o umbo é mais afastado do bordo anterior; a porção anterior mais pontuda em Solenopsis parallela.

lola, etc. Aproxima-se pelo traçado do gênero Palaeosolen Hall do Devoniense; falta-lhe, porém, uma carena umbonal e o bordo posterior não é verticalmente truncado (Hall; 1885, p. 483, estp. 78, fig. 33). Assemelha-se ainda, pelo seu formato, a Solen Linnæus (Cenozóico-Recente); porém, não apresenta a margem dorsal encurvada e nem o bordo posterior sub-reto; além disso, não se percebem indícios da presença de dentes na concha brasileira nem se conhecem as suas impressões musculares e paliais.

Reed (1930, p. 38) julgou a presente forma comparável a Solenomorpha equatorialis Thomas do Carbonífero Superior do Perú; de acordo com Howell et al. (1953, p. 158, estp. 31, fig. 9), aquela espécie mereceria atribuição ao gênero Volsellina Howell, um Mytilidae. A julgar pela sua descrição, trata-se de uma forma oblíqua, mais estreita anteriormente e apresentando carena umbonal.

Não constatamos a ocorrência de nenhuma forma similar em terras nos paleozóicos superiores, gondwânicos ou extra-gondwânicos.

Tayoa erichsoni Campos, sp. nov.

Estampa: 4, figs. 1-2.

1930 - Solenopsis sp. Reed, p. 38, estp. 8, fig. 5

Material. - Os espécimes mais completos são dois moldes internos, um dos quais corresponde ao originalmente ilustrado e descrito por Reed (Col. D.G.M.428) e outro ao D.G.P.7/1022). Foram obtidos, além disso, seis espécimes fragmentários.

Descrição: (+) Concha alongada subcilíndrica, aberta nas duas extremidades. Umbo pequeno, subanterior, pouco saliente acima da linha da charneira. Bordos dorsal e ventral subparalelos (afilamento posterior de 3,5%). Bordo anterior levemente convexo; bordo posterior acentuadamente mais convexo. Linhas de crescimento subconcêntricas. Nem lúnula e nem escudo individualizados.

Charneira aparentemente edentelosa; reta na sua extensão pós-umbonal; levemente sinuosa no trecho pré-umbonal. Engrossada neste último trecho, como também na porção pós-umbonal, imediatamente após o umbo (numa extensão de 7,5 mm, no espécime descrito), possivelmente em concomitância com o ligamento.

Não são visíveis as impressões musculares e da linha palial.

(+) Baseada principalmente no molde interno de uma valva esquerda (Col. D.G.P. 7/1022).

O molde interno que serviu de base à presente descrição acha-se erodido na área pré-umbonal, abaixo da linha cardinal.

A concha parece ter sido fina exceto ao longo do bordo anterior, onde ocorre um espessamento interno, arredondado.

Nº	C	A	Pr.U.	P.U
D.G.P.7/1022	48	14	6	42

O molde interno incompleto da valva direita que serviu de base à descrição de Reed (estp. 8, fig. 5), D.G.M.428, após preparação, forneceu as seguintes medidas: C= 44 mm; A= 13 mm.

Holótipo. - D.G.P.7/1022

Gênero Cowperreedia Campos, gen. nov.

Diagnose

Concha grande, alongada, elíptica, com carena umbonal pouco nítida, estreitando-se pouco posteriormente. Umbo subanterior pouco saliente. Charneira espessa e reta em toda a sua extensão. Ligamento externo, opistodótico, profundo e longo. Ornamentação consistindo em linhas de crescimento.

Linha palial com pequeno sinus. Cicatriz do adutor anterior elíptico, oblíquo; adutor posterior arredondado, póstero-superior, marginado internamente por um sulco largo, inclinado para a frente. Músculo pedial pequeno, sub-umbonal, acima do adutor anterior.

Generótipo. - Cowperreedia brasiliensis (Reed)

Discussão

Na fauna de Taió, ocorrem moldes internos e externos dessa concha, cujos espécimes adultos alcançam 10 cm de comprimento e que evocam o gênero Sanguinolites. A carena, em geral bem pronunciada em Sanguinolites, (Hind, 1900, p. 362) é apenas esboçada na forma brasileira; a ornamentação tuberculada própria das Sanguinolites não foi verificada nos moldes externos dos espécimes brasileiros; também o fato de a altura da porção posterior não sobrepassar a da porção anterior, é outro caráter que distancia a forma brasileira da diagnose de Sanguinolites. Entretanto, várias são as espécies mantidas nêsse gênero que apresentam o mesmo grau de divergência em relação à diagnose (Hind, 1900, S. plicatus estp. 44, fig. 12). Lembramos também o fato de Sanguinolites ter a linha palial simples,

lúnula e escudo grandes (Mind, 1900, p. 362). Com exceção do espécime de Stutchburia figurado por Etheridge Jr. (1900, estp. 31, fig. 1), o tamanho das espécies figuradas por êsse autor e por Dickins (estp. 1, fig. 12, 17) é bem menor. A posição do adutor anterior e do músculo pedial, a posição subanterior do umbo, o ligamento externo opistodóctico relativamente profundo e ainda o perfil elíptico transversalmente, evocam Stutchburia (Etheridge Jr., p. 179, estp. 31, fig. 1,3; estp. 32, fig. 3).

A presença de um sinus discreto, nitidamente visível na concha brasileira, é um caráter diferencial em relação a Stutchburia (Etheridge Jr., 1900, p. 179). Embora a diagnose original dêsse gênero não refira que a comissura, na sua extensão anterior, apresenta uma torção para a direita, logo em frente ao umbo, tal caráter é observado nas ilustrações fornecidas por Etheridge Jr. (S. farleyensis estp. 32, fig. 4-6; S. compressa, estp. 33, fig. 1) tendo sido notado por Dickins (1956, p. 15; S. muderonensis, estp. 1, fig. 16); na forma brasileira a comissura é reta na extensão anterior. O espécime figurado por Reed à estampa 8, fig. 3, isolado da matriz mostra a charneira reta.

Dedicamos o gênero proposto à memória de F.R. Cowper Reed, autor das primeiras descrições dos fósseis de Taió.

Cowperreedia brasiliensis (Reed), 1930

Estampa: 4, figs. 3-5.

Fig. de texto: 14

1930 - Stutchburia brasiliensis Reed, p. 26, estp. 8, fig. 1-3.

Material. - Consta de moldes internos e externos e grande número de fragmentos (Cols. D.G.M., D.G.P. e E.P.).

Descrição. - Concha grande, alongada, elíptica transversalmente, com carena umbonal pouco nítida, bordos anterior e posterior arredondados. Umbo subanterior pouco saliente. Charneira reta, espessada em toda a sua extensão, contém um ligamento interno, relativamente profundo e longo.

Linha palial simples afastada da margem inferior, subparalela a esta com sinus pequeno, separando uma área externa plana, algo deprimida.

Cicatriz do adutor anterior grande, elíptica, oblíqua em relação à charneira, situada bastante anteriormente, junto à extensão pré-umbonal da charneira e marginado internamente por uma crista larga, alta junto

ao músculo, desvanecendo-se para o interior da concha; cicatriz do adutor posterior pouco maior, arredondada, situada na região póstero-superior, afastada da margem. Cicatriz do músculo pedial, pequena, triangular, subumbonal, acima do adutor anterior, separado d'êste por uma crista curta.

A concha parece ter sido espessada pelo menos na região pré e pós umbonal e em toda a borda anterior.

Ornamentação consistindo em linhas de crescimento finas e numerosas, concêntricas.

Dimensões (mm) - exemplares figurados

Nº	C	A	Pr.U.	P.U.
D.G.P.7/1008+	79	33	9	70
Reed nº 4+	47	30	10	-
E.P.XII	80	32	10	67

+ Exemplar incompleto.

Holótipo. - Col. E.P.XII

Gênero Schizodus Murchison e de Verneuil, 1844

Schizodus occidentalis Reed, 1930

Estampã: 4, fig. 6-8.

Fig. do texto: 13

1930 Schizodus occidentalis Reed, 1930, p. 38

Estampa: 7, fig. 3, 3a.

1930 Schizodus ? sp. Reed, 1930, p. 40, estp. 7, fig. 2.

Material. - Moldes internos e externos pertencentes às coleções do D.G.M., D.G.P. e E.P.

Evoca pelo seu contorno certos espécimes de Schizodus oklahomensis Reed ilustrados por Roth, Newell e Burma (estp. 45, p. 8 e 9) mas não pelas dimensões ou outros caracteres, inclusive ornamentação, caráter da carena umbonal, dentição, etc.; pelas dimensões e pela forma, inclusive ca

ráter da carena umbonal (arredondada), assemelha-se a Schizodus harii Miller (Hind, 1898, estp. 16, fig. 1 e 1a), diferindo por detalhes da região cardinal. Distingue-se bem de Schizodus cf. meckanus Girty do Ponsilvaniano do Perú (segundo Newell et al. 1953, p. 154, muito provavelmente a mesma forma identificada por Thomas como S. cf. meckanus Girty e S. harii Miller) e de S. cycloliratus Harrington (1955, p. 118-119, estp. 24, fig. 9) do Paleozóico Superior da Argentina (Grupo Pillahuinco) que tem forma diferente e carena pronunciada. Tão pouco se aproxima de S. wheeleri Swallow do Paleozóico Superior da América do Norte e a que Derby (1879, p. 173) referiu espécimes do Carbonífero da Amazônia, embora nunca os ilustre.

Nas ilustrações fornecidas por Waagen dos lamelibrânquios do Productus-limestone da Índia, não se observa formas muito semelhante a S. occidentalis, a não ser Schizodus pinguis e S. compressus (Waagen, 1881, estp. 19, fig. 7-10; estp. 19, fig. 6) que se afastam da espécie brasileira respectivamente pela carena bem nítida, e linha palial com sinus raso, além de outros detalhes (p. 237).

No Permiano da Austrália foi descrita recentemente (Dickins, 1956, p. 30, estp. 5, fig. 1-10) Schizodus kennedyensis, de tamanho similar à brasileira, mas de forma mais triangular que a S. occidentalis, com a carena mais distinta, como já fez ver o próprio Dickins (p. 31). Além disso, essa forma possui a linha palial com sinus raso (Dickins, p. 30).

A charneira, conquanto a sua preservação não seja muito satisfatória, parece consistir, na valva esquerda, em um dente cardinal forte, na posição do bico do umbo, numa fosseta anteriormente situada e, aparentemente, num dente posterior levemente oblíquo.

Nos moldes internos da valva direita (um deles descrito por Reed) por nós examinados, parece ocorrer um forte dente cardinal oblíquo em posição imediatamente anterior ao bico do umbo, uma fosseta na posição do umbo e, aparentemente, um dente levemente oblíquo, comparativamente mais delgado atrás da fosseta, e, acima do mesmo, uma fosseta alongada.

Lembra Sedgwickia superficialmente, mas a charneira dêsse gênero é edentelosa com um só pequeno dente cardinal na valva esquerda (Hind, 1899, p. 277).

Músculo adutor anterior oval, separado do músculo pedial por uma crista. Adutor posterior menos marcado, aparentemente elíptico e maior. Cristas finas internas na região posterior, radiais.

Linha palial aparentemente simples.

Ornamentação consistindo de linhas de crescimento finas, concêntricas.

Dimensões em mm (exemplares figurados)

Nº	C	A
D.G.P.7/1005	41	33
D.G.P.7/1006	46	38

Holótipo: Col. D.G.P. 7/1005.

Gênero Kegelia Campos, gen. nov.

Diagnose

Concha alongada, com afilamento posterior, provida de carena umbonal. Umbo relativamente elevado, subanterior, prosógiro.

Valva provida de uma depressão bem marcada, desde o terço anterior do corpo, até pouco antes da carena umbonal.

Charneira reta, engrossada nas regiões pró e pós umbonal. Escudo bem individualizado. Ligamento opistodético profundo.

Linha palial com um pequeno sinus. Cicatriz do adutor anterior guarnecida internamente por uma crista. Ornamentação consistindo em linhas de crescimento.

Generótipo. - Kegelia tayoensis (Reed)

Discussão

O espécime referido por Reed como Maconia cf. cuneata (Nº 23 da numeração citada por Reed, atual 432 da Col. do D.G.M., estp. 6, fig. 6), após ter sido preparado revelou-se, como já notara Beurlen, (1954, p. 115) corresponder exatamente ao que o próprio Reed rotulou como Spathella tayoensis.

Não se trata, porém, nem de Myonia e nem de Spathella. De qualquer forma, a similaridade externa para com Spathella cylindrica McCoy, por exemplo, é maior do que para com as Myonia (Lind, 1904, estp. 23, fig. 1-4). Os umbos são voltados para diante na concha brasileira e não para trás como nas australianas (Myonia = gênero endêmico da Austrália); o bordo posterior da concha é arredondado em vez de reto como em Myonia, as marcas musculares são diferentes (Fletcher, 1932, p. 394-397). Em relação à Spathella, o próprio Reed mencionou um caráter de maior importância distin

tiva: as impressões musculares são diferentes (Reed, 1930, p. 32); distinguem-se também de Spathella, pela forma, tamanho e ausência de uma crista guarnecendo a porção posterior do adutor anterior (Hind, 1904, p. 153 e McAlester, 1962, p. 47). Além disso, a linha palial de Spathella é simples (Hind, 1904, p. 153), enquanto em Kegelia verifica-se a presença de um pequeno sinus logo abaixo da cicatriz muscular posterior. Este último caráter também a diferencia de Myonia (Fletcher, 1932, p. 397).

Num dos moldes internos, (valva direita) observa-se uma crista bem configurada, delgada e pouco extensa (côrca de 1 cm) de disposição horizontal, indo do umbo para trás, perdendo, progressivamente, a individualidade. A sua posição é na porção espessada da margem cardinal e parece corresponder a um sulco ligamentar profundo, semelhante ao das Stutchburia (Etheridge Jr., 1900, p. 179).

Em relação a Sanguinolites, poderia ser comparado quanto à forma a Sanguinolites angustatus (Hind, 1900, p. 366, estp. 40, fig. 3; S. striatus granulatus, estp. 42, fig. 19; S. subcarinatus, estp. 47, fig. 1-3). Sanguinolites, entretanto, possui a linha palial simples e lúnula grande (Hind, 1900, p. 362).

A forma característica desta concha, aliada aos outros caracteres que permitem sua fácil identificação, permitem-nos propôr para ela um gênero novo. A sua designação deriva do nome do Dr. Wilhelm Kegel.

Kegelia tayoensis (Reed), 1930

Estampa: 5, figs. 5-6

Fig. de texto: 16

1930 Spathella tayoensis, Reed, p. 30, estp. 6, fig. 7; estp. 7, fig. 1, 1a, 1b; estp. 8, fig. 4

1930 Maconia cf. cuneata (Dana) Reed, p. 36, estp. 6, fig. 6

Material. - Nove moldes internos e um externo pertencentes às coleções do D.G.M., D.G.P. e E.P., além de mais de uma dezena de fragmentos.

Descrição. - Concha alongada, afilando-se bastante posteriormente. Bordos anterior e posterior arredondados. Carena umbonal bem marcada, percorrendo toda a extensão da concha, separando posteriormente uma região plana ou levemente convexa. Umbo grande, bastante elevado da linha cardinal, situado, aproximadamente, no primeiro quarto anterior da concha, com o bico enrolado, prosógiro. Valvas providas de uma depressão acentuada,

desde o terço anterior do corpo, até pouco antes da carena umbonal.

Charneira reta, espessada nas regiões pré e pós umbonal, aqui numa extensão maior, contendo um sulco estreito e curto, horizontal, aparentemente correspondente a um ligamento profundo. Escudo bem individualizado, guarnecido externamente por uma crista fina; lúnula menos visível, estreita.

Ornamentação consistindo em linhas de crescimento finas, concêntricas.

Linha palial afastada da margem inferior, com pequeno sinus. Cicatriz do adutor anterior grande, situada junto ao bordo anterior, triangular, com o ápice voltado para o umbo, guarnecida posteriormente por uma crista curva; cicatriz do adutor posterior maior, arredondada, situada entre a carena umbonal e o escudo.

Dimensões (mm) -- exemplares figurados

Nº	C	A	Pr.U.	P.U.
D.G.M.426	73	34	18	55
D.G.M.425+	68	33	18	50

+ Exemplar incompleto.

Holótipo.-- Col. D.G.M.426.

Gênero Bastosia Campos, gen. nov.

Diagnose

Concha suboval, com carena umbonal. Umbo subanterior, volumoso, prosógiro. Charneira espessada, ligeiramente ondulada. Ligamento externo, opistodético, profundo. Ornamentação consistindo em costelas concêntricas. Escudo bem individualizado; lúnula estreita (?). Depressão mediana, ligeira, mas perceptível. Adutor anterior, junto ao bordo anterior da concha cercado posteriormente por uma crista curva, rasa; adutor posterior maior, arredondado. Linha palial com discreto sinus.

Generótipo. - Bastosia costata Campos, gen. et sp. nov.

Discussão

O espécime figurado à estp. 7, fig. 4 (nº 428 D.G.M.; nº 30 da numeração de Reed) e descrito por Reed como Allorisma (p. 32, estp. 7, fig.

4), corresponde à porção jovem de Edmondia sp. (p. 34, estp. 8, fig. 6 e 6a); observe-se principalmente a fig. 6a, região umbonal, com similares costelas.

Pela forma e ornamentação de costelas concêntricas evoca Allorisma e Pracundulonya. Da primeira se distingue pelo caráter da linha palial com um sinus pequeno na concha brasileira e um sinus profundo em Allorisma (Hind, 1900, p. 417); da segunda, pela ausência dos sulcos radiais posteriores, de sinus, depressão rasa mediana, abertura posterior entre as valvas além de outros pormenores (Dickins, 1956, p. 10-12).

Evoca Edmondia pela forma e ornamentação, mas distingue-se pelo tipo de charneira, linha palial, ausência de escudo etc. (Hind, 1899, p. 287; Dickins, 1963, p. 43). Entre as Sanguinolites, existem algumas espécies, cujas formas lembram à da concha brasileira. Distinguem-se, entretanto, pela ornamentação e caráter da linha palial (Hind, 1900, S.v-scriptus, estp. 42, fig. 6; S.interruptus, estp. 41, fig. 5; S.luxurians, estp. 46, fig. 3). De Myonia, cuja forma evoca, distancia-se pela ornamentação, que naquela é constituída por linhas de crescimento, enrolamento posterior do bico do umbo, ausência de sinus, etc. (Fletcher, 1932, p. 397).

A designação do novo gênero constitui uma homenagem ao Dr. Annibal Alves Bastos, que descobriu os fósseis marinhos da região de Taió.

Bastosia costata Campos, sp. nov.

Estampa: 5, figs. 1-4.

Fig. de texto: 15

1930 Allorisma sp. Reed, p. 32 e 34, estp. 7, fig. 4

1930 Edmondia sp. " p. 34 e 36, " 8, " 6 e 6a

Material. - 13 moldes internos e externos pertencentes às coleções do D.G.M., D.G.P. e E.P.

Descrição. - Concha suboval, inequilateral, com a altura máxima caindo na região do umbo. Bordo anterior mais fortemente encurvado que o posterior. Bordo ventral convexo levemente sinuoso na porção mediana. Umbo relativamente volumoso, alteando-se moderadamente acima da linha da charneira, situado na sua porção anterior (1º terço). Depressão mediana moderada, mas bem perceptível, de disposição oblíqua, do umbo até o bordo ventral da concha.

Na porção posterior de cada valva ocorrem duas caronas, não

muito acentuadas, a externa sendo a mais forte e a interna guarnecendo o escudo alongado. A lúnula é, relativamente estreita, mas perceptível.

Não se observam nos moldes indícios de dentres, mas o bordo dorsal, numa pequena extensão da região anterior e numa extensão aproximadamente equivalente à metade da porção posterior ou foi bastante espessada ou era revirada.

Cicatriz do adutor anterior, triangular, com o ápice voltado para o umbo, situado na região anterior da concha, cercado anteriormente por crista comprida; adutor posterior arredondado, maior, situado entre a carena umbonal e a margem externa do escudo. Linha palial simples, com um discreto sinus.

A ornamentação consiste em costelas concêntricas relativamente pouco espaçadas, melhor individualizadas na região umbonal e pouco visíveis na área supra carinal posterior da concha.

Dimensões em mm (exemplares figurados)

Nº	C	A	Pr.U.	P.U.
P VI-A+	68	38	17	51
P V	64	33	16	48

+ Exemplar incompleto.

Holótipo.-- Col. E.P., P. VI-A

C. Outros grupos.

1. Gasteropoda:

Gênero Warthia Waagen, 1880

Warthia sp.

Estampa: 4, fig. 9-10; estp. 5, fig. 7

Fig. de texto: 17

1930 - Bellerophon cf. micromphalus Reed, p. 43, estp. 7, fig. 5-5a

Material.-- 10 moldes internos e externos, pertencentes às coleções do D.G.P., D.G.M. e E.P.

Discussão.-- Os espécimes referidos a êsse gênero são relativamente abundantes na camada marinha do Taió, sendo representados sob a forma de moldes internos e externos incompletos, faltando a região da abertura. Foram referidos por Reed, ao gênero Bellerophon (1930, p. 43, estp. 7, fig. 5-5a). Distinguem-se, entretanto, da diagnose dêsse gênero pela sua forma menos inflada, ausência de selenizona e de expansões laterais da abert

tura, ornamentação, etc. (Waagen, 1880, p. 159, estp. 15, fig. 6-7; Knight, 1941, p. 54, estp. 11, fig. 3a-3c). Das espécies descritas por Waagen, difere pela sua aparência mais estreita (1880, estp. 15, fig. 6-7; estp. 14, fig. 8). De W. micromphala Morris afasta-se também pela forma, além desta apresentar ornamentação diferente (Fletcher, 1958, p. 148, estp. 16, fig. 4-5); também pela aparência menos globulosa, distancia-se de W. perspecta (Fletcher, 1958, p. 149, estp. 15, fig. 3-10).

Waterhouse considera W. stricta Dana, semelhante à espécie brasileira, pela sua forma mais estreita (1963, p. 105, estp. 67, fig. 8, 9, 11 e 14); outros caracteres não puderam, entretanto, ser comparados devido à precária fossilização dos nossos exemplares. As espécies recentemente descritas por Dickins (1963, p. 109-111, estp. 21, fig. 10-19 e 22, fig. 1-8), destoam da brasileira pela forma, ausência de carena e ornamentação.

Dimensões em mm (exemplares figurados)

Nº	d.c.	d.l.	l.a.
D.G.M.432+	10	8	5
D.G.P.7/1014+	8	7	5

+ Exemplar incompleto .

2. Brachiopoda:

Gênero Orbiculoidea Orbigny, 1847

Orbiculoidea tayoensis (Reed), 1935

Estampa: 5, fig. 8

Discinisca tayoensis (Reed), 1935, p.201-202, 2 fig.

Trata-se de uma forma muito rara na fauna de Taió, pois contamos nas coleções por nós manuscadas com apenas três exemplares, um dos quais é o originalmente descrito por Reed (1935, p. 201-202).

O gênero Discinisca Waagen é, entretanto, reservado para formas recentes (Muir-Wood, 1955, p. 64).

Os espécimes de Taió lembram, grosso modo, os de Orbiculoidea guaraunensis Oliveira (1930, p. 18-19) embora estes últimos sejam menores.

Dimensões (mm)

Nº	Diâmetro
D.G.M.435	15

3. Asteroidoidea:

Ordem Phanerozonida ?

Estampa: 5, figs. 9-10.

Material. - 2 moldes externos, coleções do D.G.P. e D.G.M.

A presença de Asteroidoidea, na fauna de Taió, foi constatada por Rocha Campos (1961). A forma é relativamente abundante em alguns afloramentos, representada por moldes externos, principalmente da face oral. O tamanho dos espécimes varia de 6 a 8 mm.

A presença de placas laterais, estreitas, bem visíveis, aparentemente opostas (mais ou menos 14), identificam esta forma como pertencente a Ordem Phanerozonida, Subordem Pustulosa (Piveteau, 1953, p. 829).

4. Ophiuroidea:

Ordem Ophiurida ?

Estampa: 5, fig. 11

Material. - 3 moldes externos pertencentes às coleções E.P. e D.G.P.

Em amostras pertencentes às coleções da E.P. e do D.G.P., constatamos a presença de formas atribuíveis à Subclasse Ophiuroidea (?) (Rocha Campos, 1961). Trata-se de moldes externos precariamente conservados, com diâmetro atingindo até 25 mm. Os braços são compridos (10 mm), petalóides e foram aparentemente flexíveis. Não notamos a presença de sulco ambulacral, aparecendo, nessa região, uma série de placas pouco visíveis. As placas laterais, pequenas, são também pouco nítidas (Piveteau, 1953, p. 815, 817).

Observação. - Todos os espécimes localizam-se sobre os moldes internos de lamelibrânquios. Poderiam ter sido soterrados, quando se encontravam dentro das valvas dos lamelibrânquios; uma destas, a julgar pela sua posição na matriz, fossilizou-se com a concavidade voltada para cima (Estp. 5, fig. 11).

IX - CONCLUSÕES

1. Os sedimentos da parte inferior do Grupo Tubarão, na região de Taió-Rio do Sul, aqui denominados sedimentos proglaciais "várvidos", correspondem a depósitos de um lago glacial de grande extensão geográfica.
2. A ocorrência de intercalação marinha na região de Taió, em nível estratigráfico mais alto em toda a Bacia do Paraná, associada as grandes espessuras obtidas para a Formação Bonito na região (sondagens e afloramentos), indicam permanência dessa área negativa até a época de deposição do Grupo Guatá, possibilitando a ingressão marinha da parte média-superior da Formação Bonito.
3. Ao contrário do que se supôs, na região de Taió ocorre somente um horizonte marinho, representado por alguns decímetros de arenito fino, contendo fauna marinha, relativamente abundante, composta por lamelibrânquios, gasterópodes, equinodermas e braquiópodes.
4. A intercalação marinha situa-se a aproximadamente 100 m acima dos sedimentos glaciais, um pouco mais alto que a metade (local) da Formação Bonito.
5. A área de ocorrência dos fósseis marinhos é, aparentemente, restrita e parece corresponder à antiga bacia parálica; quando da ingressão marinha as águas mantiveram, aparentemente, salinidade reduzida (provavelmente com áreas de exposição periódica).
6. Pelas suas características, a assembléia de fósseis marinhos parece constituir uma tanatocenose formada pela concentração de restos orgânicos em águas rasas e agitadas.
7. Na fáunula marinha fóssil, predominam os lamelibrânquios, principalmente os pectinídeos. Estes parecem constituir uma única espécie, Heteropecten catharinae, com variantes morfológicas.
8. Os outros gêneros de lamelibrânquios foram redescritos merecendo discriminação em novas entidades genéricas, aparentemente de caráter endêmico na Bacia do Paraná.
9. Não se pode pois, propugnar correlação estreita com achados de Nova Gales do Sul, Austrália, mencionada em trabalhos anteriores.
10. A ingressão marinha é suposta ter vindo do sul, onde as ocorrências do Uruguai e Argentina mostram caráter mais cosmopolita.

X - BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, F.F.M. de 1952 Contribuição à geomorfologia da região oriental de Santa Catarina, Bol.Paul.Geogr., n. 10, p. 3-32.
- BARBOSA, O. e ALMEIDA, F.F.M. de 1949 A série Tubarão na Bacia do rio Tietê, Estado de São Paulo, D.G.M., Notas Prel. e Estudos, n. 48.
- BASTOS, A.A. 1929 in Geologia do Brasil, A. de Oliveira e O.H.Leonardos, 2ª edição, Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura, 1943.
- BEURLIN, K. 1954 As faunas de lamelibrânquios do sistema gondwânico no Paraná, Paleontologia do Paraná (Paraná, Comis.Comem. do Centenário, Curitiba), p. 107-136.
- " " 1955 As formações gondwânicas do sul do Estado do Paraná, D.G.M., Bol.153.
- " " 1957 Faunas salobras fósseis e o tipo ecológico paleogeográfico das faunas gondwânicas no Brasil, An.Acad.brasil.Ciên. vol. 29, n.2, p.228-241.
- BOUCOT, A.J. 1953 Life and death assemblages among fossils, Am. J. Sci., vol. 251, n. 1, p. 25-40.
- BURMA, B.H. 1948 Studies in Quantitative Paleontology: I. Some aspects of the theory and practice of quantitative Invertebrate paleontology, J.Paleontology, vol. 22, n.6.
- CARVALHO, P.F.D. e PINTO, E.A. 1938 Reconhecimento geológico no Estado de Santa Catarina, S.G.M., Bol. n. 92.
- COMISSÃO AMERICANA DE NOMENCLATURA ESTRATIGRÁFICA 1963 Código de Nomenclatura Estratigráfica, Trad. J.C.Mendes, Inst.Geol. Univ. do Recife, Série Didática, n. 1.
- COWPER REED, F.R. 1930 Uma nova fauna permo-carbonífera do Brasil, S.G.M., Monografia 10.

COWPER REED, F.R.	1935	A new brachiopod from the Upper Carboniferous of Santa Catharina, Brazil, An.Acad.brasil.Ciênc., vol. 7, n.2, p. 201-202.
DAKIN, W.J.	1909	Pecten - Mar. Biol. Comm. Liverpool, Mem. 17 in J.M. Dickins; Permian pelecypods and gastropods from Western Australia, Bur.Min. Resour. Aust.Bull., n. 63.
DAVENPORT, C.B.	1900	On the variation of the shell of Pecten irradians, Lamarck from Long Island, Am.Natur. vol. 34, n. 397, p.863-877.
DELANEY, P. e
GONI, J.	1963	Correlação preliminar entre as formações gondwânicas do Uruguai e Rio Grande do Sul, Brasil, Bol. Paran.Geogr., n.8-9, p. 3-21.
DERBY, O.A.	1894	Amazonian Upper Carboniferous fauna, Journal Geol., vol. 2, p. 480-501.
DICKINS, J.M.	1956	Permian pelecypods from the Carnavon Basin, Western Australia, Bur. Min. Resour.Aust.Bull.n.29.
" "	1957	Lower Permian pelecypods and gastropods from the Carnavon Basin, Western Australia; Bur.Min. Resour. Aust. Bull. n.41.
DICKINS, J.M. e
THOMAS, G.A.	1959	The marine fauna of the Lyons Group and Carrandibby Formation of the Carnavon Basin, Western Australia, Bur. Min.Resour.Aust. Rep. n. 38, p. 65-96.
DICKINS, J.M.	1961	Mesozoic and Permian fossils from the Canning Basin in The Geology of the Canning Basin, J.J.Veevers e A.T.Wells, Bur.Min.Resour.Aust. Bull. n.60, p. 282-288.
" "	1963	Permian pelecypods and gastropods from Western Australia, Bur.Min. Resour. Aust. Bull. n. 63.
ETHERIDGE JR., R.E.	1900	Little-known and undescribed permo-carboniferous Pelecypoda in the Australian Museum, Rec.Aust. Mus. n.3, p. 178-187.

- FENTON, C.L. e
FENTON, M.A. 1928 Ecologic interpretation of some biostratigraphic terms, I-faunule and zonule; Am. Midland Naturalist, vol. 2, n.1.
- FISCHER, A.G. 1961 Stratigraphic record of transgressing seas in the light of sedimentation on Atlantic Coast of New Jersey, Am.Ass.Petr.Geol. vol. 45, n.10, p.1656-1666.
- FLETCHER, H.O. 1932 A revision of the genus Myonia with notes on some allied genera from permocarboniferous of New South Wales, Rec.Aust.Mus., vol. 18, n.8, p.389-410.
- FLETCHER, H.O. 1958 The Permian gastropods of New South Wales, Rec.Aust.Mus., vol. 24, n.10, p. 115-164.
- FLINT, R.F. 1957 Glacial and Pleistocene Geology, New York, John Wiley & Sons, Inc.
- FREITAS, R.O. 1951 Ensaio sobre a tectônica moderna do Brasil, Fac.Fil.Ciën.Letr., U.S.P., Bol. n.130, Geologia n.6.
- GORDON JR., M. 1947 Classificação das formações gondwânicas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, D.G.M., Notas Prel. e Estudos, n. 38, p. 1-20.
- GREENSMITH, J.T. 1956 Sedimentary structures in the Upper Carboniferous of North and Central Derbyshire, England, J. Sed. Petrol., vol. 26, n.4, p. 343-355.
- HALL, J. 1885 Dymiarina of the Upper Heidelberg, Hamilton, Portage and Chemung Groups, Lamellibranchiata II, Paleontol.vol. 5, Parte 1, Geol. Surv. N. York.
- HARRINGTON, H. 1955 The Permian Eurydesma fauna of Eastern Argentina, J.Paleontol., vol. 29, n.1, p. 112-128.
- HIND, W. 1898 A monograph of the British Carboniferous Lamellibranchiata, Parte 3, p. 209-276.
- " " 1899 A monograph of the British Carboniferous Lamellibranchiata, Parte 4, p. 277-360.

HIND, W.	1900	A monograph of the British Carboniferous Lamellibranchiata, Parte 5, p. 361-376.
" "	1904	A monograph of the British Carboniferous Lamellibranchiata, Parte 3, p. 125-216.
HYMAN, L.H.	1955	The Invertebrates: Echinodermata, vol. 4, New York, McGraw-Hill Book Co.
ISHIKAWA, K.	1958	Zur Taxonomie und Phylogenie der Triadischen "Pteriidae", Paleontographica, Bd. 3, Abt. A., p. 131-212.
JACKSON, R.T.	1890	Phylogeny of the Pelecypoda; the Aviculidae and their allies. Mem. Boston Soc. Nat. Hist. n.4.
JOHNSON, R.G.	1960	Models and methods for analysis of the mode of formation of fossil assemblages, Geol. Soc. Am. Bull. vol. 71, n.7, p. 1075-1086.
KEGEL, W.	1951	Diskordanz der Schalen bei Pectiniden und Pteriiden, Senckenberg. Naturf. Ges., Abh. 485, p. 81-86.
KEGEL, W. e
COSTA, M.T. da	1951	Espécies neo-paleozóicas do Brasil, da família Aviculopectenidae, ornamentadas com costelas fasciculadas, D.G.M., Bol. 137.
KEGEL, W. e
COSTA, M.T. da	1952	Nota preliminar sobre a fauna da Série Itararé em Rio da Areia, Estado do Paraná, An. Acad. brasil. Ciên., vol. 24, n.2, p. 172-173.
KEIDEL, J.	1939	Über die "Gondwaniden" Argentines, Geol. Rundschau; Band 30, Heft. 1-2, p. 148-296.
KNIGHT, J.B.	1941	Palaeozoic gastropod genotypes, Geol. Soc. Am., Sp. Paper n.32.
LANGE, F.W.	1952	Revisão da fauna marinha do folhelho Passinho, Dusenja, Fasc. I.
" "	1954	Estratigrafia e idade geológica da Série Tubarão, Arq. Mus. Paran., Nova Série, Geologia n.2.

LEINZ, V.	1937	Estudos sobre a glaciação permo-carbonífera do sul do Brasil, S.F.P.M., Bol. n. 21.
" "	1949	Contribuição à geologia dos derrames basálticos do sul do Brasil; Fac.Fil.Ciën.Letr., U.S.P., Bol. n.103, Geologia n.5.
LEITCH, D.	1940	A statistical investigation of the <u>Anthracomyas</u> of the basal <u>Similis-Pulchra</u> Zone in Scotland; Quart. J. Geol. Soc. London, vol. 96, Parte 1, p. 13-37.
LOOSANOFF, V.L.	1945	Effects of sea water of reduced salinities upon starfish, <u>A.forbesi</u> , of Long Island Sound; Trans. Conn. Acad. Arts and Sci., vol. 36, p. 813-835 in Treatise on Marine Ecology and Paleocology, Geol.Soc.Am.Mem. 67, Ecology vol. 1.
LUEDER, D.R.	1959	Aerial Photographic Interpretation, New York, McGraw-Hill Book Co., Inc.
MAACK, R.	1947	Breves notícias sobre a geologia dos Estados do Paraná e Santa Catarina, Arq.Biol.Tecnol. Paraná, vol. 2, p. 155-208.
MARTINS, E.	1948	Fósseis marinhos na Série Maricá. Estado do Rio Grande do Sul, Mineração e Metalurgia, vol. 12, n. 71, p. 237-239.
MARTINS, E. e
SENA SOBRINHO, M.	1950	Novos fósseis e a idade da Formação Maricá, Rio Grande do Sul, Bol.Mus.Nac., Nova Série, Geologia n.8.
MARTINS, E.	1951	<u>Aviculopecten cambahyensis</u> , n.sp. do permo-carbonífero do Rio Grande do Sul, Bol.Mus.Nac., Nova Série, Geologia n. 13.
MARTINS, E. e
SENA SOBRINHO, M.	1952	Perfil geológico de S.Gabriel-Cambá Grande, Rio Grande do Sul, Bol.Mus.Nac., Nova Série, Geologia n. 16.

- MARTIN, H. 1961 The hypothesis of continental drift in the light of recent advances on geological knowledge in Brazil and in South West Africa, Geol. Soc. South Africa, Annexure vol. LXIV, Alex. L. du Toit Memorial Lectures.
- MAU, H. 1958 Contribuição para a geologia da região de Ibañiti; Paraná, Bol. Soc. Bras. Geol., vol. 7, n. 1, p. 13-28.
- MAYR, E., LINSLEY, E.G. e USINGER, R.L. 1953 Methods and principles of Systematic Zoology, New York, McGraw-Hill Book Co., Inc.
- McALESTER, A.L. 1962 Mode of preservation in early paleozoic pelecypods and its morphologic and ecologic significance, J. Paleontol. vol. 36, n. 1, p. 69-73.
- McALESTER, A.L. 1962 Upper Devonian pelecypods of the New York Chemung Stage, Peabody Mus. Nat. Hist., Yale Univ., Bol. 15.
- McKEE, D.E. e WEIR, G.W. 1953 Terminology for stratification and cross-stratification; Geol. Soc. Am. Bull. vol. 64, n. 4, p. 381-390.
- MENDES, J.C. 1952 Fauna permo-carbonífera marinha de Capivari, Fac. Fil. Ciên. Letr., U.S.P., Bol. 134, Geologia n. 7.
- " " 1954 Contribuição à estratigrafia da Série Passa Dois no Estado do Paraná, Fac. Fil. Ciên. Letr. U.S.P., Bol. n. 175, Geologia n. 10.
- " " 1961 Algumas considerações sobre a estratigrafia da Bacia do Paraná, Bol. Paran. Geogr. n. 45, p. 3-35.
- " " 1961 Langella, novo gênero de linguídeo da Série Tubarão, Bol. Univ. Paraná, Geologia n. 5, p. 1-8.
- MEZZALANA, S. 1956 Novas ocorrências de camadas marinhas permo-carboníferas no Estado de São Paulo; Bol. Soc. Bras. Geol., vol. 5, n. 1, p. 61-69.
- MUIR-WOOD, H.M. 1955 A history of the classification of the Phylum Brachiopoda, London British Museum.

- NEWELL, N.D. 1937 Late paleozoic pelecypods, Pectinacea, Bull. Geol. Surv. Kansas, vol. 10.
- NEWELL, N. e
MERCHANT, E.E. 1939 Discordant valves in pleurothetic pelecypods, Am. J. Sci., vol. 237, n.3, p. 175-177.
- NEWELL, N. 1947 Intraspecific categories in Invertebrate Paleontology, Evolution, vol. 1, n.3, p. 163-171.
- NEWELL, N.D., CHRONIC, J.
e ROBERTS, T.G. 1953 Upper Paleozoic of Peru, Geol. Soc. Am., Mem. 58.
- NICOL, D. 1944 Paleocology of three faunules in the Permian Kaibab Formation at Flagstaff, Arizona; J. Paleontol., vol. 18, n.6, p. 553-557.
- OLIVEIRA, E.P. de 1927 Geologia e recursos minerais do Estado do Paraná, S.G.M., Monografia 6.
- OLIVEIRA, E.P. de 1930 Fósseis marinhos na Série Itararé no Estado de Santa Catarina, An. Acad. Brasil. Ciên., vol. 2, n. 1, p. 17-21.
- OLIVEIRA, E.P. de 1930 Conferências na Associação Bras. de Educ. p. 75, in Geologia do Brasil, A.I. de Oliveira e O.H. Leonardos, 2ª edição, Rio de Janeiro, Min. Agricultura, 1943.
- OLSON, E.C. 1957 Size-frequency distribution in samples of extinct organisms, J. Geol., vol. 65, n.3, p. 309-333.
- PINTO, I.D. 1947 Novos fósseis na Formação Maricá, Bol. Fac. Fil. Ciên. Letr.; Univ. Rio Grande do Sul, vol. 1, n. 1, p. 9.
- PINTO, I.D. 1949 Contribuição ao reconhecimento de novos fósseis na Formação Maricá (afloramentos Budó), Fac. Fil. Ciên. Letr., Univ. Rio Grande do Sul, Publ. n.2, p. 1-6.
- PIVETEAU, J. 1953 Traité de Paléontologie, vol. II, Paris, Masson et Cie.
- POTTER, P.E. e
PETTIJOHN, F.J. 1963 Paleocurrents and Basin Analysis, Berlin, Springer Verlag.

- PUTZER, H. 1952 Contribuição ao Itararé em Santa Catarina, An.Acad.brasil.Ciôn., vol. 24, n.4, p. 365-387.
- PUTZER, H. 1953 Diastrofismo germanótipo e sua relação com o vulcanismo basáltico na parte meridional de Sta. Catarina, Bol.Soc.Bras.Geol., vol. 2, n.1, p. 37-77.
- PUTZER, H. 1954 Divisão da Formação Palermo no sul de Sta.Catarina e tentativa de interpretação genética, Bol. Soc.Bras.Geol., vol. 3, n.1, p. 1-28.
- PUTZER, H. 1955 Geologia da fôlha de Tubarão, Estado de Sta.Catarina, Brasil, D.F.P.M., Bol. 96.
- RICCI, M. e CORDANI, U.G. (no prelo) Nota sobre triangulação radial.
- ROCHA CAMPOS, A.C. 1961 Ocorrências de nêvos fósseis marinhos em Taió, Sta. Catarina, An.Acad.brasil.Ciôn. vol. 33, n. 3 e 4, p. 27.
- RODGERS, J. 1957 Principles of Stratigraphy, New York, John Wiley & Sons, Inc.
- ROTH, R., NEWELL, N. BURMA, B.H. 1941 Permian pelecypods in the Lower Quaternaster Formation, Texas, J. Paleontol., vol. 15, n. 3, p. 312-317.
- SALAMUNI, R. 1961 Indícios de sedimentação cíclica no Paleozóico Superior da Bacia do Paraná, Bol. Paran. Geogr., n. 4 e 5, p. 153-171.
- SALAMUNI, R. 1962 Algumas notas sobre os orifícios de vermes da formação geológica Palermo (Carbonífero Superior, Série Tubarao), Ciôn. e Cult., vol. 14, n.3, p. 154-155.
- SANFORD, R.M. e LANGE, F.W. 1960 Basin-study approach to oil evaluation of Paraná, Miogeosyncline, South Brazil, Bull. Am. Ass.Petr.Geol., v.44, n.8, p. 1316-1370.
- SANTOS, R. da S. 1947 Um Ctenacanthus do Gondwana brasileiro, An.Acad.brasil.Ciôn., vol. 19, n.3, p. 247-251.

- STUTZER, O. c
NOÉ, A.C. 1940 Geology of Coal, The University of Chicago Press.
- TABELA DE CÔRES DE
ROCHAS 1951 The Rock-Color Chart Committee; Geological Society of America.
- THORSON, G. 1957 Botton Communitoes (Sublittoral or shallow shelf) in Treatise on Marine Ecology and Paleocology, Geol.Soc.Am.Mem. 67, Ecology, vol. 1.
- TWENHOFEL, W.H. 1932 Treatise on Sedimentation, 2^e ed., Baltimore, Williams and Wilkens Co.
- Van STRAATEN, L.M.J.U. 1954 Sedimentology of recent tidal-flat deposits and the Psammites du Condroz, Geologie en Mijnbouw, Nieuwe Serie, Jaarg. 16, p. 25-47.
- Van STRAATEN, L.M.J.U. 1959 Minor structures of some littoral and neritic sediments, Geologie en Mijnbouw; Nieuwe Serie, Jaarg. 21, n.7, p. 185-238.
- VEEVERS, J.J. e
WELLS, A.T. 1961 The Geology of the Canning Basin Western Australia, Bur.Min. Resour. Austr. Bull., n. 60.
- von ZITTEL, K.A. 1937 Text-book of Paleontology, ed. Charles R. Eastman, London, McMillan and Co., Ltd.
- WAAGEN, W. 1880 Productus - limestone fossils. 2. Pisces-Cephalopoda: Supplement Gasteropoda, Mem.Geol. Survey India Paleont.Indica, Ser. XIII Salt-Range Fossils.
- WAAGEN, W. 1881 Productus - limestone fossils, 3. Pelecypoda, Mem.Geol.Survey India Paleontologia Indica, Ser. XIII. Salt-Range Fossils.
- WASMUND, E. 1926 Biocenose und thanatocenose, Arch. für Hydrobiologie, Band 17, Heft 1, in D. Nicol, Paleocology of three faunules in the Permian Kaibab Formation at Flagstaff, Arizona, J.Paleontol. vol. 18, n.6, p. 553-557.

WATERHOUSE, J.B.

1963

Permian gastropods of New Zealand, Pt. 1- Bellerophontacea e Euomphalacea, N.Z.J.Geol. Geophys., vol. 6, n.1.

WENTWORTH, C.K.

1922

in Sedimentary rocks, F.J. Pettijohn, 2^a edição, New York, Harper & Brothers, 1957.

Fig. 1-Mapa-índice mostrando a localização da área e vias de acesso.

Fig. 6-Intercalações marinhas permo-carboníferas do Brasil Meridional.

Fig. 7-Gráfico das abundâncias relativas dos fósseis.

Fig. 9-Esquemas de símbolos e medidas - Lamelibrânquios.

Fig. 8-Frequências das classes de tamanho dos pectinídeos.

Fig. 10-Esquema do interior de valva esquerda de Heteropecten catharinae. a. Cicatriz do adutor posterior; b. cicatriz do branquial; p. cicatriz do pedial; l.p. linha palial.

Fig. 11-Esquema do interior de valva direita de Heteropecten catharinae. a. Cicatriz do adutor posterior; b. cicatriz do branquial; p. cicatriz do pedial; l.p. linha palial.

Fig. 15-Esquema do interior de valva esquerda de Bastosia costata.
a.a. Cicatriz do adutor anterior; a.p. cicatriz do adutor posterior; l.p. linha palial.

Fig. 16-Esquema do interior de valva direita de Kegelia tayoensis.
a.a. Cicatriz do adutor anterior; a.p. cicatriz do adutor posterior; l.p. linha palial.

Fig. 17-Dimensões dos gasterópodes. d.c. Diâmetro no comprimento;
d.l. diâmetro na largura; l.a. largura da abertura.

Fig. 18-Vista panorâmica da região mostrando a morfologia típica da área: planície aluvial sôbre a qual se situa a cidade e topografia escalonada nas encostas do morro do Kremer (Fms. Bonito e Palermo), à direita, recoberto por diabásio.

Fig. 19-Vista panorâmica do morro da Palha (sill sôbre Fm. Bonito), planície aluvial do Itajaí do Oeste e morro do Kremer ao fundo.

Fig. 20-Escarpa de diabásio ($\pm$ 100 m de altura);
estrada Taió-Passo Manso.

Fig. 21-Arenito marinho aflorando no leito do rio
Itajaí do Oeste, a 5 km a oeste de Taió.

Fig. 22-Arenitos da Fm. Bonito aflorando na estrada
Taió-Mirim Doce (5 km de Taió).

Fig. 23-Arenitos da Fm. Bonito aflorando no ribeirão do
Bugio, junto à serraria Eitz.

Fig. 24-Estratificação cruzada em arenitos da parte superior da Fm. Bonito. Escarpa no flanco esquerdo do vale do Braço Scoz.

Fig. 25-Outro aspecto do mesmo afloramento; notar a separação das lâminas pela decomposição.

Fig. 26-Arenitos da Fm. Bonito com faixas de estratificação cruzada. Pedreira do Clube de Caça e Tiro.

Fig. 27-Detalhe do mesmo afloramento. Estratificação cruzada associada a marcas de onda.

Fig. 28-"Varvitos" da pedreira Canôa Quebrada (km 27 da estrada Taió-Rio do Sul). Observar estratificação irregular, microdeformações penecontemporâneas e grêtas de contração ("mud cracks").

Fig. 29-Arenitos da Fm. Bonito; pedreira do Clube de Caça e Tiro. Observar estratificação cruzada associada a marcas de onda.

Fig. 30-Lamelibrânquios orientados com lado côncavo para
baixo em amostra de arenito marinho.

Fig. 31-Mesma amostra da fig. 30, de perfil; notar faixa inferior com estratificação revolvida e estruturas colunares.

Fig. 32-Arenito com fósseis marinhos mostrando grande quantidade de fragmentos de conchas associados a valvas inteiras.

Fig. 33-"Banco de conchas" com grande número de valvas de lamelibrânquios em posição caótica.

Fig. 34-Mesma amostra de perfil; notar valvas encaixadas.

EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

ESTAMPA 1

As fotografias obedecem à iluminação convencional, exceto nos casos das figuras: 4, 8, 9, (Estp. 2); 2, 3, 5, 6, 7, (Estp. 3) e 6 (Estp. 5).

Fig. 1-10.- Heteropecten catharinae (Reed)

- Fig. 1.-V.D., vista lateral, molde composto, X 1,7 (D.G.M.416).
 Fig. 2.-V.D., " " " " negativo, X 1,1 (D.G.M.406).
 Fig. 3.-V.D., vista lateral, molde interno, X 1 (D.G.M.405).
 Fig. 4.-V.D., " " " " X 1 (D.G.P.7/1027).
 Fig. 5.-Valvas conjugadas, vista lateral de V.D., molde composto, X 1 (D.G.P.7/1049).
 Fig. 6.-V.D., vista lateral, molde externo, X 1 (D.G.P.7/1049).
 Fig. 7.-V.E., vista de perfil, molde interno, X 0,7 (D.G.P.7/1049).
 Fig. 8.-V.D., vista lateral, molde interno, X 1 (D.G.P. 7/1048).
 Fig. 9.-V.D., molde interno, detalhe da charneira, X 1,1 (D.G.P.7/1048).
 Fig.10.-Valvas conjugadas, vista de perfil, molde composto, X 0,7 (E.P. XXI).
 Fig.11.-V.E., vista lateral, molde composto, X 1,3 (D.G.P.7/1045).
 Fig.12.-V.E., vista lateral, molde composto e contra-molde, X 1,4 (D.G.P.7/1037).

ESTAMPA 2

Fig. 1-11.- Heteropecten catharinae (Reed)

- Fig. 1.-V.E., vista lateral, molde composto, X 1,2 (D.G.M.396),
 Fig. 2.-V.E., " " " externo, X 1,3 (D.G.M.396).
 Fig. 3.-V.E., " " " composto, X 1,8 (D.G.P.7/1029),
 Fig. 4.-V.E., " " " externo, X (D.G.P.7/1029).
 Fig. 5.-V.E., " " " composto, X 1,7 (D.G.M.411).
 Fig. 6.-V.E., " " " " X 1,9 (D.G.P.7/1038).
 Fig. 7.-V.E., " " " externo, X 2 (D.G.P.7/1038),
 Fig. 8.-V.E., " " " " X 1,3 (D.G.P.7/1041).
 Fig. 9.-V.E., " " " " X 1,3 (D.G.P.7/1043).
 Fig.10.-V.E., " " " composto, X 1 (D.G.P.7/1043).
 Fig.11.-V.E., " " " " X 1 (D.G.P.7/1031).

ESTAMPA 3

Fig. 1-8.- Heteropecten catharinae (Reed)

- Fig. 1.-V.E., vista lateral, molde externo, X 1,5 (D.G.P.7/1050).
 Fig. 2.-V.E., " " " " X 1,7 (D.G.P.7/1052).
 Fig. 3.-V.E., " " " " X 1 (E.P.XV),
 Fig. 4.-V.E., " " " composto, X 1 (E.P.XV).
 Fig. 5.-V.E., " " " externo, X 1,3 (D.G.P.7/1033),
 Fig. 6.-V.E., " " " " X 1,6 (D.G.P.7/1037),
 Fig. 7.-V.E., " " " " X 1 (D.G.P.7/1051),
 Fig. 8.-V.E., " " " composto, X 0,83 (D.G.P.7/1028).

ESTAMPA 4

Fig. 1-2.- Tayoa erichseni Campos, gen. et sp. nov.

- Fig. 1.-Holótipo, V.E., molde interno, X 1,3 (D.G.P.7/1022).
 Fig. 2.-V.D., molde interno, X 1,1 (D.G.M.428).

Fig. 3-4.- Cowperreedia brasiliensis (Reed)

- Fig. 3.-Holótipo, V.E., molde composto, X 1 (E.P.XII).
 Fig. 4.-V.D., molde interno, X 1,2 (D.G.P.7/1008).
 Fig. 5.-Valvas conjugadas, vista de perfil, X 2 (Reed, nº 4).

Fig. 6-8.- Schizodus occidentalis Reed

- Fig. 6.-Holótipo, V.E., vista lateral, molde interno, X 1,2 (D.G.P.7/1005).
 Fig. 7.-V.E., vista lateral, molde interno, X 1,7 (D.G.P.7/1006).
 Fig. 8.-V.E., vista umbonal, molde interno, X 2,2 (D.G.P.7/1006).

Fig. 9-10.- Warthia sp.

- Fig. 9.-Molde interno, vista lateral, X 5 (D.G.P.7/1014).
 Fig. 10.- " " " apertural, X 4 (D.G.P.7/1014).

ESTAMPA 5

Fig. 1-4. Bastosia costata Campos, gen. et sp. nov.

- Fig. 1.-Holótipo, V.E., vista lateral, molde composto, X 1,2 (E.P.VI-A).

Fig. 2.-Holótipo, V.E., vista lateral, molde composto, X 1,3
(E.P.VI-A).

Fig. 3.-Valvas conjugadas, molde composto, X 1,3 (E.P.V).

Fig. 4.- " " vista lateral, molde composto, X 1,5
(D.G.P.7/1055).

Fig.5-6.- Kegelia tayoensis (Reed)

Fig. 5.-Holótipo, V.D., molde interno, X 1,2 (D.G.M.426).

Fig. 6.-V.D., molde externo, X 1 (D.G.M.425).

Fig.7.- Warthia sp.

Fig. 7.-Molde interno, vista lateral, X 3,2 (D.G.M.432).

Fig.8.-Orbiculoidea tayoensis (Reed)

Fig. 8.-Holótipo, molde externo, vista pedicular, X 4,4 (D.G.M.435).

Fig. 9-10.-Asteróides indeterminados

Fig. 9.-Molde externo, face ventral, X 6,6 (D.G.P.7/1020).

Fig.10.- " " " " X 5 (D.G.P.7/1021).

Fig. 11.- Ofiuróide indeterminado

Fig. 11.-Molde externo, X 4,4 (D.G.P.7/1019).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 9

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 5

Fig. 11

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 4

Fig. 11

Fig. 7

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 3

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 1

Fig. 8

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 2

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 9

Fig. 5

Fig. 10

Fig. 1

Fig. 11

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 9

Fig. 4

Fig. 10

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8

CONVENÇÕES

Alluvium
Areias finas,
siltes e argilas

Intrusivos básicos
Siltos Diques

Grupo São Bento (Mesoz.)

Form. Itati
Calcareos
cinza-escuros,
betuminosos

Grupo Passa Dois (P)

Form. Palermo
Siltitos cinza-medios

Form. Rio Bonito
Arenitos finos, cinza-claros
com intercalações de carvão,
siltitos e folhelhos

Grupo Tubarão (P-C)

Sedimentos várvicos com
intercalações de arenitos
e siltitos

Contato verificado

Contato inferido

Jazigos fossilíferos

Estrada principal

Estradas secundárias

Caminhos

Povoados

Norte magnético
Norte verdadeiro

ESCALA APROXIMADA
0 1 2 3 km

MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DE TAIÓ

T 2672
AC.C