UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

**O GRUPO CARRANCAS E A FRENTE DA NAPPE ANDRELÂNDIA NA
BORDA SUL DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO: PROVENIÊNCIA
SEDIMENTAR E IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS**

Alice Westin Teixeira

Orientador: Prof. Dr. Mario da Costa Campos Neto

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduação em Mineralogia e Petrologia

SÃO PAULO

2011

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho por qualquer meio convencional ou eletrônico para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Westin, A. **O Grupo Carrancas e a frente da Nappe Andrelândia na borda sul do cráton do São Francisco: proveniência sedimentar e implicações tectônicas.** 2011. 154p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.

*“Uma pergunta de quando eu era pequena e
que só agora me respondo: as pedras são feitas ou nascem?”*

Resposta: as pedras estão”

Clarice Lispector

A toda minha família.

Ao Rafa.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a toda a minha família (mãe, pai, Cris, vó, tias, tios, primos, primas e sobrinhos-primos..ufa!). Vocês todos têm participação em tudo que eu decido e realizo na minha vida. Ao Rafa, meu amor e companheiro pra todas as horas. Obrigada pelas risadas, pelas conversas inúteis e por todo o carinho, sempre.

Ao Pavão pelas coordenadas UTM, pela base do mapa geológico e por sempre estar disposto a ajudar. Muito obrigada.

À Bis, por tudo. Pelas caronas, pela parceria no pilates, pelas cervejas de nomes impronunciáveis, pela ajuda com o mapa, resumo e abstract, por aturar minhas perguntas sem sentido. Enfim, por tudo mesmo.

À Lua, parceira! Obrigada por sempre estar disposta a ajudar. Obrigada pela ajuda com o resumo e abstract e pelos chocolatinhos que sempre me animam!

Ao Harry, por me ensinar nesses anos de convivência a ser muito mais paciente. Obrigada pelo carinho e preocupação e por se animar comigo quando eu descobro coisas que são incrivelmente legais....por 5 minutos.

Às minhas irmãs Carol, Joaquina (agora com a Luiza!), Grazi, Junia e Lua (de novo!), por me animarem, sempre.

Aos meus amigos, irmãos, camaradas de turma que não me abandonaram neste barco: Popó, Bruna, GG, Meninão, Pânico, Rejeitto e Xang. Ao Kabong pelas risadas, por ouvir meus desabafos e por me dar muitos abraços.

Ao CEPEGE, que mais uma vez provou seu dom de fazer com que os problemas se tornem pequeninhoss....pequeninhossss...

Ao Mário por me orientar neste trabalho. Por respirar fundo e contar até 10 de vez em quando e por me ensinar e orientar sempre. Suas observações e puxões de orelha foram imprescindíveis para evolução deste trabalho.

Agradeço também às pessoas que com certeza tornaram a minha vida e a confecção da dissertação muito mais fáceis: Aninha e Magali por sempre salvarem a pátria em momentos de desespero; Zé Paulo pelo auxílio na preparação das amostras; Sandra e Paulinho pelos dados de geoquímica de rocha; Vasco e Mauricio pela grandissíssíssima ajuda na separação dos zircões (por duas vezes, inexistentes); ao pessoal da biblioteca pela simpatia e ajuda; ao pessoal da gráfica por tornarem o momento mais desesperador da dissertação muito mais tranquilo.

Por fim, agradeço à FAPESP pelo apoio financeiro que tornou possível a realização deste trabalho.

RESUMO

O Sistema de Nappes Carrancas compõe um sistema de nappes que circunda ao sul o Cráton do São Francisco e é formado pela Unidade Biotita Xisto e pelas formações Campestre e São Tomé das Letras do Grupo Carrancas. A Unidade Biotita Xisto contém veios de quartzo e xistosidade anastomosada e é formada por quartzo, biotita, muscovita, clorita e, localmente plagioclásio, carbonato e granada. A Formação Campestre é formada por quartzitos intercalados a filitos/xistos que variam de cloritóide filitos grafitosos, com muscovita, quartzo e turmalina e, localmente, granada a xistos com granada, estauroлита e cianita.

A investigação da Unidade Biotita Xisto como autóctone em relação ao Cráton do São Francisco, seu potencial agrupamento com o Grupo Carrancas em uma megassequência deposicional, bem como sua comparação com a unidade alóctone Xisto Santo Antônio (Nappe Andrelândia) constituem parte dos objetivos deste estudo. Para tal, foram feitas análises químicas e isotópicas (Sr e Nd) em rocha total e geocronologia U-Pb em cristais de zircão detríticos, tanto na Unidade Biotita Xisto como na Formação Campestre, com intuito de elucidar a relação entre as mesmas e compará-las com dados da literatura disponíveis para o Xisto Santo Antônio.

A Unidade Biotita Xisto apresenta características químicas compatíveis com sedimentos que sofreram intemperismo químico de intensidade e período de tempo moderados, depositados em ambientes de colisão continental, com área-fonte composta essencialmente por rochas félsicas. Assinaturas de elementos traço e isotópicas de Sr ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ entre 0,713 e 0,715) e Nd (ϵ_{Nd} entre -6 e -5) indicam contribuição de arco magmático e crosta continental e diferem, portanto, daquelas esperadas em ambientes de margem passiva. A mesma contribuição é observada para o Xisto Santo Antônio, cuja área fonte registra importante assinatura de material juvenil. As idades U-Pb LA-MC-ICP MS obtidas em cristais de zircão mostram contribuição principal de rochas do final do Criogeniano e contribuição secundária do Riaciano. A classe modal ao redor de 665 Ma é comparável com a idade cristais de zircão detrítico do Xisto Santo Antônio, o que aponta para uma mesma área-fonte principal para ambas unidades. A deposição dos sedimentos precursores da Unidade Biotita Xisto ocorreu entre 630-611 Ma, sendo as fontes principais os granulitos cálcio-alcalinos e rochas vulcânicas co-genéticas, além de granitos sin-colisionais da Nappe Socorro-Guaxupé. A pouca representatividade de idades paleoproterozóicas e a ausência de assinaturas químicas de margem passiva, inviabilizam as rochas do Cráton do São Francisco como parte da área-fonte.

Desta forma, a Unidade Biotita Xisto não é autóctone em relação ao Cráton do São Francisco, sendo, potencialmente, a unidade que compõe a frente da Nappe Andrelândia.

Por outro lado, a Formação Campestre possui assinatura geoquímica de sedimentos que sofreram uma intensa reciclagem e alteração da composição do sedimento original. As assinaturas químicas de elementos traço e isotópicas Sr e Nd indicam contribuição de crosta continental superior, com componente de crosta antiga e sem afinidade com sedimentos depositados em margem passiva ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ entre 0,74 e 0,76; ϵ_{Nd} entre -18 e -15). Os zircões detríticos analisados forneceram idades U-Pb LA-MC-ICP-MS variadas, do Toniano ao Mesoarqueano, correlacionáveis com rochas vulcânicas e plutônicas do Cráton do São Francisco, com as faixas marginais do Cráton de Angola e/ou faixas orogênicas do Cráton Amazônico e com rochas dos arcos Mara Rosa e Goiás. A abrangência das idades U-Pb da Formação Campestre e das formações Chapada dos Pilões e Paracatu, permite a correlação, no Orógeno Brasília, entre os Grupos Carrancas e Canastra. A paleogeografia mais provável é a de um ambiente de rifte, antecessor à deriva e ao estabelecimento de uma margem continental passiva.

Palavras-chave: proveniência sedimentar; ambiente deposicional; geoquímica elemental e isotópica; geocronologia U-Pb.

ABSTRACT

The Carrancas Nappe System composes a system of nappes that surround the southern margin of the São Francisco Craton and is formed by the Biotite Schist Unit and by the Campestre and São Tomé das Letras formations of the Carrancas Group. The Biotite Schist Unit encompass quartz veins and anastomosed schistosity and is formed by quartz, biotite, muscovite, chlorite and, locally plagioclase, carbonate and garnet. The Campestre Formation is composed by interleaved quartzites and phyllite/schist that varies from graphite-chloritoid phyllites, with muscovite, quartz, tourmaline and garnet, and locally garnet schists and schists with garnet, staurolite and kyanite.

The investigation of the Biotite Schist Unit as autochthonous in relation to the São Francisco Craton, it's potencial grouping with the Carrancas Group in a deposicional megasequence, as well as it's comparison with the allochthonous Santo Antônio Schist (Andrelândia Nappe) is part of the goals of this study. For this purpose, chemical and isotopic (Sr and Nd) whole rock analysis were obtained, along with U-Pb detrital zircon data, in the Biotite Schist Unit and also in the Campestre Formation, in order to elucidate the relationship between these units and compare them with literature data available for the Santo Antônio Schist.

The Biotite Schist Unit show chemical characteristics compatible with sediments that underwent chemical weathering of moderate intensity and time, deposited in continental collision setting, with source region composed essentially by felsic rocks. Trace elements and Sr isotopic signatures ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ between 0,713 and 0,715) and Nd (ϵ_{Nd} between -6 and -5) points to contribution from magmatic arc and continental crust, and are different from the expected for passive margin settings. The same contribution is observed in the Santo Antônio Schist, which source area registers an important juvenile material signature. The U-Pb LA-MC-ICP MS zircon data show major contribution from rocks of the later Cryogenian and minor contribution from the Ryacian. The modal class around 655 Ma is comparable with the U-Pb detrital zircon data from the Santo Antônio Schist, pointing to the same source area for both units. The deposition of the precursors sediment of the Biotite Schist Unit occurred between 630 – 611 Ma, and the main sources were the calc-alkaline granulites and co-genetic volcanic rocks, besides the Socorro-Guaxupé Nappe sin-collisional granites. The low representation of Paleoproterozoic ages and the absence of passive margin chemical signatures preclude the rocks of the São Francisco Craton as part of the source area. Thus, Biotite Schist Unit is not an autochthonous unit in relation to the São Francisco Craton,

and is, potentially, the unit that composes the Andrelândia Nappe front.

On the other hand, the Campestre Formation has geochemical signatures of sediments that underwent intense recycling and alteration of the original sediment. The trace element and Sr and Nd isotopic signatures indicates upper continental crust contribution, with older crust component and no affinity with passive margin sediments ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ between 0,74 and 0,76; ϵ_{Nd} between -18 and -15). The U-Pb LA-MC-ICP MS detrital zircon data provide varied ages, from the Tonian to the Mesoarchean, correlated with volcanic and plutonic rocks of the São Francisco Craton, with the marginal belts of the Angola Craton, and/or orogenic belts of the Amazonian Craton and with the Mara Rosa and Goiás magmatic arcs. The range of the U-Pb ages of the Campestre Formation and the Chapada dos Pilões and Paracatu formations, allows the correlation, in the Brasília Orogen, of the Campestre and Canastra groups. The most likely paleogeography is that of a rift setting, before the continental drift and the establishment of a passive continental margin.

Keywords: provenance analysis; tectonic setting; chemical and isotopic whole rock analysis; U-Pb detrital zircon data.

SUMÁRIO

Capítulo I - INTRODUÇÃO.....	1
I.1. Considerações Iniciais.....	1
I.2. Objeto de estudo e objetivos	2
I.3. Localização da área de estudo	3
Capítulo II - MATERIAIS E MÉTODOS	4
II.1. Levantamentos Bibliográficos.....	4
II.2. Trabalho de campo	4
II.3. Petrografia	5
II.4. Geoquímica Elemental.....	6
<i>II.4.1. Análise de elementos maiores, menores e traços por FRX.....</i>	<i>7</i>
<i>II.4.2. Análise de elementos terras raras por ICP-MS</i>	<i>7</i>
II.5. Geoquímica Isotópica	8
<i>II.5.1. Geoquímica Isotópica em Rocha Total</i>	<i>8</i>
<i>II.5.1.1. Sistema isotópico Rb-Sr em rocha total</i>	<i>9</i>
<i>II.5.1.2. Sistema isotópico Sm-Nd em rocha total.....</i>	<i>13</i>
<i>II.5.2. Geoquímica Isotópica Mineral.....</i>	<i>15</i>
<i>II.5.2.1. Sistema isotópico U-Pb em zircão detrítico</i>	<i>17</i>
II.6. Elaboração da dissertação.....	22
Capítulo III - PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR.....	23
III.1. Proveniência Sedimentar – Aplicações.....	25
III.2. Proveniência sedimentar – Métodos de determinação	25
<i>III.2.1. Análise mineralógica petrográfica de minerais detríticos</i>	<i>26</i>
<i>III.2.2. Geoquímica mineral</i>	<i>30</i>
<i>III.2.3. Geoquímica de rochas sedimentares</i>	<i>35</i>
<i>III.2.3.1. Classificação química de arenitos</i>	<i>36</i>
<i>III.2.3.2. Elementos maiores e o intemperismo.....</i>	<i>38</i>
<i>III.2.3.3. Geoquímica de elementos traço</i>	<i>39</i>
Capítulo IV - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL.....	46

IV.1. Unidades Mapeadas.....	48
IV.2. Metamorfismo.....	49
IV.3. Análise Estrutural	51
IV.4. Relação entre deformação e metamorfismo	54
IV. 5. Geocronologia	55
IV.6. Paleoambiente deposicional	56
Capítulo V - LITOTIPOS AMOSTRADOS	58
V.1. Unidade Biotita Xisto (UBX) – Pranchas de fotos I, II, III e IV	59
V.2. Formação Campestre (FC) - Pranchas de fotos I, V, VI e VII	61
<i>V.2.1. Grafita-muscovita xisto</i>	<i>61</i>
<i>V.2.2. Quartzito.....</i>	<i>63</i>
V.3. Formação São Tomé das Letras – Prancha de fotos VIII	63
Capítulo VI - GEOQUÍMICA ELEMENTAL	65
VI.1. Elementos maiores e menores	66
<i>VI.1.1. Classificação</i>	<i>69</i>
<i>VI.1.2. Chemical Index of Alteration - CIA</i>	<i>70</i>
VI.2. Geoquímica de elementos traços.....	71
<i>VI.2.1. Elementos Terras Raras (ETR)</i>	<i>76</i>
<i>VI.2.3. Reciclagem sedimentar</i>	<i>81</i>
Capítulo VII - GEOQUÍMICA ISOTÓPICA	83
VII.1. Sistema Rb-Sr em rocha total.....	83
VII.2. Sm-Nd em rocha total	84
Capítulo VIII - GEOCRONOLOGIA U – Pb	87
Capítulo IX - AMBIENTE DEPOSICIONAL E ÁREA-FONTE PRINCIPAL	94
IX.1. Ambiente de deposição	94
IX.2. Área-Fonte principal	96
Capítulo X - COMPARAÇÕES ENTRE A UNIDADE BIOTITA XISTO E A FORMAÇÃO CAMPESTRE.....	101

X.1. Geoquímica de elementos maiores e menores.....	101
<i>X.1.1. Classificação Química</i>	<i>103</i>
<i>X.1.2. Chemical Index of Alteration (CIA)</i>	<i>103</i>
X.2. Geoquímica de elementos traços	105
<i>X.2.1. Elementos Terras Raras (ETR)</i>	<i>108</i>
<i>X.2.2. Razões Th/Sc e Cr/V</i>	<i>109</i>
<i>X.2.3. Reciclagem sedimentar.....</i>	<i>110</i>
X.3. Assinatura isotópica	112
X.4. U-Pb em cristais de zircão detrítico	115
X.5. Prováveis áreas-fonte.....	121
Capítulo XI - COMPARAÇÕES ENTRE AS UNIDADES BIOTITA XISTO E XISTO SANTO ANTÔNIO	127
XI.1. Elementos maiores e menores	127
<i>XI.1.1. Classificação</i>	<i>129</i>
<i>XI.1.2. Chemical Index of Alteration - CIA</i>	<i>129</i>
XI.2. Geoquímica de elementos traços.....	131
<i>XI.2.1. Elementos Terras Raras (ETR)</i>	<i>132</i>
<i>XI.2.2. Razão Th/Sc.....</i>	<i>136</i>
XI.3. Sistema Rb-Sr em rocha total	137
XI.4. Sm-Nd em rocha total.....	138
Capítulo XII - CONCLUSÕES	141
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	145

Índice de Figuras

Capítulo I - Introdução

Figura I.1: Localização e acesso à área de estudo.....	3
---	---

Capítulo II – Materiais e Métodos

Figura II.1: Diagrama isocrônico do sistema Rb-Sr extraído de White (2009).	10
Figura II.2: Gráfico ϵ_{Nd} vs. $^{87}Sr/^{86}Sr$ com a delimitação dos campos de rochas de origem mantélica e de origem crustal.	11
Figura II.3: Gráfico ϵ_{Nd} vs. $^{87}Sr/^{86}Sr$	12
Figura II.4: Gráfico ϵ_{Nd} vs. Th/Sc	14
Figura II.5: Parte da tabela de núclídeos que mostra os elementos intermediários que participam das reações de decaimento de ^{238}U , ^{235}U e ^{232}Th para ^{206}Pb , ^{207}Pb e ^{208}Pb	19
Figura II.6: Diagrama $^{206}Pb/^{238}U$ vs. $^{207}Pb/^{235}U$ com concórdia calibrada em Ma.	20
Figura II.7: Histograma de distribuição de probabilidade e densidade de idades U-Pb	21

Capítulo III – Proveniência Sedimentar

Figura III.1: Esquema em bloco de um ambiente de sedimentação com os principais mecanismos que controlam a assembléia mineral de uma rocha sedimentar	24
Figura III.2: Características ópticas observáveis em microscópio petrográfico de três inossilicatos pertencentes ao Grupo dos Piroxênios	27
Figura III.3: Características ópticas observáveis em microscópio petrográfico de três nesossilicatos, polimorfos de Al_2SiO_5	28
Figura III.4: Texturas de dissolução em minerais estáveis e moderadamente estáveis.....	29
Figura III.5: Diagrama de classificação dos minerais pertencentes ao grupo dos piroxênios de rochas ígneas de diferentes ambientes tectônicos.....	32
Figura III.6: Diagrama de classificação de minerais do grupo do piroxênio a partir de suas concentrações de óxidos de Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca e Na	32
Figura III.7: Diagrama de Nb ppm vs. Cr ppm com os campos de composição de rutilo de rochas máficas, rochas metacumuláticas e rochas metapelíticas.....	33
Figura III.8: Gráficos de concentração Y (ppm) vs. U (ppm) e Ce/Ce* vs. Eu/Eu* para zircões de origem ígnea de diferentes litotipos	35
Figura III.9: Gráfico SiO_2/Al_2O_3 vs. Na_2O/K_2O de classificação de arenitos.....	37
Figura III.10: Gráfico SiO_2/Al_2O_3 vs. Fe_2O_3/K_2O de classificação de arenitos	38
Figura III.11: Diagramas ternários da fração molar de A-CN-K.....	40

Capítulo IV – Contexto Geológico Regional

Figura IV.1: Mapa geológico regional com ênfase na Megassequência Andreilândia.....	47
Figura IV.2: Mapa Tectônico do Orógeno Brasília Meridional.....	48
Figura IV.3: Mapa estrutural da zona de interferência das Faixas Brasília e Ribeira.....	53

Capítulo V – Litotipos Amostrados

Figura V.1: Fotos de afloramentos da Unidade Biotita Xisto e das formações Campestre e São Tomé das Letras	60
---	----

Capítulo VI – Geoquímica Elemental

Figura VI.1: Gráficos binários de dispersão de SiO ₂ vs. elementos maiores e menores analisados por FRX.	68
Figura VI.2: Amostras da UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Pettijohn et al. (1972).	69
Figura VI.3: Amostras da UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Herron (1988).	70
Figura VI.4: Amostras analisadas plotadas no diagrama ternário da fração molar de A-CN-K	72
Figura VI.5: Diagrama <i>spider</i> de elementos traços para as amostras da UBX.	73
Figura VI.6: Diagramas de Al ₂ O ₃ vs. Rb, Cs e Ba para as amostras da UBX.	75
Figura VI.7: Diagramas Harker de Zr e Hf.....	75
Figura VI.8: Padrão de Elementos Terras Raras das amostras da UBX analisadas.	77
Figura VI.9: Gráfico de fracionamento de ETRP vs. Anomalia de Eu para a UBX.....	78
Figura VI.10: Diagramas Th/Sc vs. CIA, Eu/Eu* vs. CIA e Eu/Eu* vs. Cr/V para a UBX	80
Figura VI.11: Gráfico Zr/Sc vs. Th/Sc para a UBX.	81

Capítulo VII – Geoquímica Isotópica

Figura VII.1: Diagrama ⁸⁷ Rb/ ⁸⁶ Sr vs. ⁸⁷ Sr/ ⁸⁶ Sr para a UBX.	84
Figura VII.2: Gráfico T (Ga) vs. εNd _(t) para as amostras da unidade UBX.....	86

Capítulo VIII – Geocronologia U-Pb

Figura VIII.1: Cristais de zircão detrítico da UBX separados para análise do sistema U-Pb	88
Figura VIII.2: Imagens <i>back-scattered</i> dos cristais de zircão detrítico analisados.	89
Figura VIII.16: Diagramas concórdia ²⁰⁷ Pb/ ²³⁸ U vs. ²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U e idades ²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb obtidas em cristais de zircão detrítico da UBX.....	92

Capítulo IX – Ambientes Depositional e Área-Fonte principal

Figura IX.1: Classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição.	95
Figura IX.2: Ilustração comparativa dos intervalos de idades obtidas em zircões detríticos da UBX com os intervalos de idade de granulitos, charnokitos, migmatitos, gnaisses, granitos, mangeritos, monzogranitos e sienitos da Nappe Socorro-Guaxupé.	98
Figura IX.2: Diagramas. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ vs. ϵNd e Th/Sc vs. ϵNd para as amostras da UBX, com os campos dos granulitos da Nappe Socorro-Guaxupé.....	99

Capítulo X – Comparações entre a Unidade Biotita Xisto e a Formação Campestre

Figura X.1: Diagramas Harker para as amostras da FC.....	102
Figura X.2: Amostras da unidade UBX e da FC plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Herron (1988).	104
Figura X.3: Amostras analisadas plotadas no diagrama ternário da fração molar A-CN-K.....	105
Figura X.4: Diagrama <i>spider</i> das concentrações de elementos traço da FC e da UBX.	108
Figura X.5: Padrão de Elementos Terras Raras das amostras da FC em comparação com as amostras da UBX.	109
Figura X.6: Gráfico de fracionamento de ETRP vs. Anomalia de Eu da FC.	109
Figura X.7: Diagrama CIA vs. Th/Sc , CIA vs. Eu/Eu^* e Eu/Eu^* vs. Cr/V para a FC e para a UBX.	110
Figura X.8: Gráfico Zr/Sc vs. Th/Sc para a FC e para a UBX.....	111
Figura X.9: Gráfico T (Ga) vs. $\epsilon\text{Nd}_{(t)}$ para FC.	114
Figura X.10: Diagramas de classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição para a FC.....	115
Figura X.11: Cristais de zircão detrítico da FC separados para análise do sistema U-Pb.	120
Figura X.12: Imagens <i>back-scattered</i> dos cristais detríticos da FC analisados.	122
Figura X.13: Diagrama concórdia $^{207}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ vs. $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ e distribuição de probabilidade do quartzito da Formação Campestre.	123
Figura X.14: Idades obtidas nos cristais de zircão detrítico da amostra CAR-II-179 e as idades das possíveis rochas-fonte para os sedimentos da Formação Campestre.	124

Capítulo XI – Comparações entre a Unidade Biotita Xisto e o Xisto Santo Antônio

Figura XI.1: Gráficos binários de dispersão de SiO_2 vs. elementos maiores e menores analisados por FRX para as amostras do XSA e da UBX.	127
Figura XI.2: Amostras do XSA e da unidade UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Pettijohn et al. (1972).	129
Figura XI.3: Amostras do XSA da unidade UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Herron (1988).	129

Figura XI.4: Amostras do XSA e da unidade UBX plotadas no diagrama ternário da fração molar A-CN-K.....	130
Figura XI.5: Diagrama <i>spider</i> de elementos traços para as amostras do XSA e da UBX.	131
Figura XI.6: Diagramas de Al ₂ O ₃ vs. Ba, Rb e Cs para as amostras do XSA e da UBX.	133
Figura XI.7: Padrão de Elementos Terras Raras das amostras do XSA.	135
Figura XI.8: Gráfico de fracionamento de ETRP vs. Anomalia de Eu com as amostras do XSA e da UBX.	135
Figura XI.9: Diagramas CIA vs. Th/Sc, CIA vs. Eu/Eu* e Th/Sc vs. Cr/V para as amostras do XSA e da UBX.	136
Figura XI.10: Gráfico T (Ga) vs. εNd _T para as amostras do XSA e da UBX.	
Figura XI.11: Amostras do XSA e da UBX plotadas em diagramas de classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição.	138

Índice de tabelas

Capítulo II – Materiais e Métodos

Tabela II.1: amostras analisadas petrograficamente.	5
Tabela II.2: amostras analisadas quimicamente para obtenção de elementos maiores, menores, traço e Elementos Terras Raras.....	6
Tabela II.3: amostras analisadas para obtenção dos sistemas Rb-Sr e Sm-Nd.	9
Tabela II.4: amostras analisadas para obtenção do sistema U-Pb em cristais de zircão detrítico.	15
Tabela II.5: meia-vida ($t_{1/2}$) e constante de decaimento das reações que produzem os três elementos radioativos de Pb presentes na natureza.....	18

Capítulo III – Proveniência Sedimentar

Tabela III.1: classificação de estabilidade dos principais minerais pesados utilizados em estudos de proveniência.....	26
Tabela III.2: principais líquidos densos utilizados na separação de minerais detríticos.....	27
Tabela III.3: razões minerais aplicadas em estudos de HMA convencional.	29
Tabela III.4: assinaturas de elementos traço de zircões metamórficos e ígneos	34
Tabela III.5: concentrações de Hf e Y em zircões de rochas ígneas formadas a partir de processos geológicos crustais distintos)	34
Tabela III.6: razão Zr/Hf em rochas ígneas de diferentes ambientes tectônicos	35
Tabela III.7: composição de elementos maiores da crosta continental superior.....	40

Tabela III.8: composição de alguns elementos traço da crosta continental superior.....	41
Tabela III.9: concentração de elementos traço de várias médias composicionais de sedimentos clásticos.....	43

Capítulo IV – Contexto Geológico Regional

Tabela IV.10: principais paragêneses metamórficas dos grupos Carrancas e São João del Rei....	52
Tabela IV.11: paleoambientes possíveis para unidades da Megassequência Andrelândia.....	56/57

Capítulo VI – Geoquímica Elemental

Tabela VI.1: simbologia das amostras e a divisão adotada segundo a localização geográfica em relação às serras das Bicas e do Pombeiro e a estrutura regional.	65
Tabela VI.2: resultados obtidos para elementos maiores e menores por FRX para a UBX.	67
Tabela VI.3: valores de CIA para as amostras analisadas.....	71
Tabela VI.3: análises de elementos traço obtidas por FRX a UBX.	72
Tabela VI.4: análises de elementos traço obtidas por LA-ICP MS para a unidade UBX.	74
Tabela VI.5: valores da razão Th/Sc, Cr/V e Eu_N/Eu^* para as amostras da UBX.....	79
Tabela VI.6: valores das razões La/Sc, Th/Sc e Zr/Sc para as amostras da UBX e valores de referência para crosta continental superior, média e inferior extraídos da literatura.	82

Capítulo VII - Geoquímica Isotópica

Tabela VII.1: dados isotópicos e elementais do sistema Rb-Sr para a UBX.	83
Tabela VII.2: dados isotópicos e elementais do sistema Sm-Nd para UBX.	85
Tabela VII.3: ϵNd_{TDM} e recalculados para 590 Ma e 610 Ma para UBX.	85

Capítulo VIII – Geocronologia U-Pb

Tabela VIII.1: razões $^{207}Pb/^{235}U$, $^{206}Pb/^{238}U$, $^{207}Pb/^{206}Pb$, seus respectivos erros (1σ) e os valores de rho da UBX.....	90
Tabela VIII.2: idades $^{207}Pb/^{235}U$, $^{206}Pb/^{238}U$, $^{207}Pb/^{206}Pb$, seus respectivos erros e os valores de concordância da UBX.	91

Capítulo IX – Ambiente Depositional e Área-Fonte principal

Tabela IX.1: idades $^{207}Pb/^{206}Pb$ em monazita e zircão para granulitos, charnokitos e granitos da Nappe Socorro-Guaxupé.	97
--	----

Capítulo X – Comparações entre a Unidade Biotita Xisto e a Formação Campestre

Tabela X.1: resultados obtidos para elementos maiores e menores por análises de FRX para amostras da FC	101
Tabela X.2: valores de CIA para as amostras da FC	104
Tabela X.3: razões e concentrações de elementos traço obtidas pelo método de FRX a FC	106
Tabela X.4: elementos traço obtidas pelo método de ICP-MS para a FC	107
Tabela X.3: valores das razões La/Sc, Th/Sc e Zr/Sc para a FC	111
Tabela X.7: dados isotópicos e elementais do sistema Rb-Sr para a FC	112
Tabela X.8: dados isotópicos e elementais do sistema Sm-Nd para a FC	113
Tabela X.10: razões $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros (1σ) e os valores de rho da FC	116/117/ 118
Tabela X.11: idades $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros e os valores de concordância da amostra C-431 da FC	118/119/ 120

Capítulo XI – Comparações entre a Unidade Biotita Xisto e o Xisto Santo Antônio

Tabela XI.1: Síntese dos resultados obtidos para elementos maiores e menores por análises de FRX das amostras do XSA e da unidade UBX.	128
Tabela XI.2: valores de CIA para as amostras do XSA e da unidade UBX.	130
Tabela XI.3: valores de elementos traço obtidos através de análise em LA-ICP MS para as amostras do XSA	132
Tabela XI.4: valores de elementos terras raras (ETR) para as amostras do XSA.	134
Tabela XI.5: valores da razão Th/Sc para as amostras do XSA e da unidade UBX.	136
Tabela XI.6: dados isotópicos e elementais do sistema Rb-Sr para as amostras do XSA e da unidade UBX	137
Tabela XI.7: dados isotópicos e elementais do sistema Sm-Nd para as amostras do XSA e da unidade UBX.	137

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

I.1. Considerações Iniciais

A crosta continental, com espessura média de aproximadamente 40 km (Rudnick e Gao, 2003), abrange apenas 0,35% da massa da Terra (Taylor e McLennan, 1995), sendo formada por litologias variadas que contêm grandes proporções de elementos traços (Taylor e McLennan, 1995; Rudnick e Gao, 2003).

A reincorporação da crosta continental superior ao manto é incomum e o estudo da composição química deste importante reservatório geoquímico é uma forte ferramenta para a determinação de modelos da composição global da Terra (Taylor e McLennan, 1995). Além disso, determinar se a composição química global da crosta continental superior se modificou, ou não, ao longo da evolução geológica da Terra é de extrema importância para entender se os processos de formação da crosta e de diferenciações geoquímicas, que influenciam os mecanismos de evolução do planeta, sofreram modificações temporais (Taylor e McLennan, 1985; Rudnick e Gao, 2003).

As rochas sedimentares têm sido formadas por processos relativamente contínuos de erosão da crosta continental e sedimentação há pelo menos 4,0 bilhões de anos (McLennan, 2001). Os estudos geoquímicos destas rochas auxiliam nas estimativas da composição da crosta continental superior, pois registram grande parte da evolução geoquímica da crosta ao longo da formação do planeta. (McLennan, 2001).

Alterações químicas associadas ao intemperismo, erosão, transporte sedimentar, deposição, diagênese e metamorfismo são comuns durante a formação de rochas sedimentares e interferem na composição final destas rochas. Entretanto, elementos traço como Th e Sc e Terras Raras são insolúveis na água do mar (Bhatia e Crook, 1986) e transportados para sedimentos terrígenos. A distribuição destes elementos, nas rochas sedimentares, pode, então, refletir a composição da área-fonte (McLennan et al., 1990; McLennan e Taylor, 1991). Outros elementos como zircônio (Zr), háfnio (Hf), nióbio (Nb) e estanho (Sn) têm comportamento semelhante aos citados anteriormente, porém suas concentrações estão condicionadas ao fracionamento mineral durante transporte e deposição do sedimento, pois

tendem a se concentrar em minerais pesados, como zircão, monazita e apatita (McLennan et al., 1990; McLennan e Taylor, 1991).

A comparação entre a composição das rochas sedimentares e a composição da crosta continental superior deveria ser feita, em princípio, a partir das análises e dos cálculos de médias composicionais de todas as rochas sedimentares aflorantes na superfície terrestre (McLennan e Taylor, 1991). Entretanto, os sedimentos terrígenos de granulação fina (argilitos e siltitos) compreendem cerca de 70% da massa sedimentar (Garrels e Mackenzie, 1971) e são enriquecidos em elementos traços (ETR, Th e Sc) quando comparados a outras rochas sedimentares (como a maioria dos arenitos, carbonatos e evaporitos). Assim, as análises das composições químicas destas rochas seriam suficientes para estimar a composição da crosta terrestre, pois elas controlariam completamente o balanço de massa destes elementos (McLennan e Taylor, 1991).

O estudo destes elementos traço e suas variáveis (como razões e anomalias negativas e positivas) aliados à geoquímica isotópica de rocha total (como sistema Sm-Nd) e mineral (U-Pb em zircão detrítico) formam um grupo de análises consistentes para a determinação de proveniência de rochas sedimentares e metassedimentares e, conseqüentemente, para o estabelecimento do ambiente de deposição e do contexto tectônico vigentes durante o processo de sedimentação (Taylor e McLennan, 1985).

I.2. Objeto de estudo e objetivos

O objeto de estudo desta monografia é a Unidade Biotita Xisto, homogênea e de cor acinzentada, descrita pela primeira vez por Trouw et al. (1980), como sendo uma rocha composta por quartzo, biotita, muscovita, clorita e, localmente plagioclásio, carbonato e granada e, caracteristicamente, com vênulas de quartzo.

O estudo destas rochas tem como objetivo principal avaliar se estas são autóctones em relação ao Cráton do São Francisco (Trouw et al., 2000), com base no ambiente tectônico e idade da área-fonte, bem como das condições gerais de deposição. São comparadas com a unidade alóctone, Xisto Santo Antônio, da Nappe Andrelândia, estas oriundas de ambiente exótico ao cráton (Campos Neto et al., 2011) e procura discutir o agrupamento destas unidades e do Grupo Carrancas como uma megassequência deposicional (Ribeiro et al., 1995; Pacciullo et al., 2002).

Para cumprir tal objetivo, as seguintes etapas foram executadas:

(i) Identificar sua proveniência, ambiente tectônico durante a sedimentação e idade máxima da deposição através de análises químicas de rocha total (elemental e isotópica) e pontuais em zircão (sistema isotópico U-Pb).

(ii) Comparar as feições observadas em campo e os dados obtidos nas análises químicas e isotópicas com as características do Xisto Santo Antônio (Trouw et al. 1983; Campos Neto et al., 2007) da Nappe Andrelândia e com as rochas das unidades do Grupo Carrancas (Heilbron 1984 e 1985; Ribeiro e Heilbron, 1982; Trouw et al, 1983; Valeriano et al., 2004; Valladares et al., 2008).

I.3. Localização da área de estudo

A área objeto deste estudo localiza-se a norte da cidade de Carrancas, no sudeste de Minas Gerais. Trata-se de um polígono de, aproximadamente, 32 km x 14 km de área, que compreende parte das serras do Pombeiro, da Estância, de Carrancas e das Bicas (**figura I.1B**).

A principal via de acesso se dá pela rodovia BR-381 (Rodovia Fernão Dias) até a cidade de Lavras, onde se encontra o acesso à rodovia BR-265, Passando a cidade de Itumirim, há uma saída para as cidades de Itutinga e Carrancas que, conseqüentemente, acessa a área estudada (**figura I.1A**).

Figura I.1: Localização e acesso à área de estudo (retângulo vermelho na figura I.1 B). Na figura I.1A, o balão verde com a letra A corresponde à cidade de São Paulo e o balão com a letra B corresponde à cidade de Carrancas.

Capítulo II

MATERIAIS E MÉTODOS

II.1. Levantamentos Bibliográficos

A revisão bibliográfica foi feita através da consulta de artigos publicados em revistas científicas, trabalhos apresentados em congressos e simpósios, livros texto, relatórios de mapeamento geológico, além de trabalhos acadêmicos como monografias de trabalho de formatura, dissertações de mestrado e teses de doutorado.

Todo o material consultado foi adquirido na biblioteca do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc – USP) e no portal Periódicos CAPES.

II.2. Trabalho de campo

As atividades de campo foram realizadas no início e fim do ano de 2009 com o orientador Prof. Dr. Mario da Costa Campos Neto, e o geólogo Leandro Coutinho, mestrando do IGc – USP.

A primeira etapa foi direcionada para a região nordeste da cidade de Carrancas e a leste das serras de Carrancas e das Bicas (folha Itutinga – SF-23-X-C-I-4). A segunda etapa concentrou-se na área a noroeste da cidade de Carrancas , na região da Serra do Pombeiro (folha Itutinga e folha Itumirim – SF-23-X-C-I-3).

Seções contínuas ao longo destas áreas foram executadas com o intuito de identificar as unidades geológicas, suas características estruturais de campo (foliações, faixas de cisalhamento, fases de deformação) e as relações de contato, quando observáveis, entre a Unidade Biotita Xisto e as demais Unidades do Grupo Carrancas (Trouw et al., 1980). Foi realizada a amostragem sistemática para os estudos petrográficos, químicos, isotópicos e geocronológicos.

II.3. Petrografia

As amostras utilizadas para as descrições petrográficas foram coletadas durante os trabalhos de campo da disciplina 0440420 - Mapeamento Geológico do IGc – USP durante os anos de 2008 e 2009 e durante as etapas de campo deste trabalho (**tabela II.1**).

Estas amostras foram serradas em serra circular e enviadas para a Seção de Laminação do IGc - USP para a confecção de seções delgadas de 30 µm de espessura.

Depois de prontas, as seções foram descritas em um microscópio petrográfico Olympus, modelo BXP – 50, no Laboratório de Microscopia Petrográfica do IGc – USP com ênfase na mineralogia, texturas e microestruturas deformacionais, bem como as reações metamórficas entre os minerais e a relação destas com as fases de deformação observadas nesta escala.

	Mapeamento Geológico IGc - USP		Etapas de campo deste trabalho
	2008	2009	
Unidade Biotita Xisto	CAR-I-51; CAR-IV-06; CAR-IV-06a; CAR-IV-06ba; CAR-IV-42; CAR-V-116; CAR-IX-129	CM-III-25	C-300; C-309b; C-325b; C-328a; C-329a; C-330a; C-330b; C-331b; C-333b; C-335; C-336; C-337; C-340 C-341b; C-345b; C-359; C410; C-410a; C-411; C-430; C-431
Formação Campestre (Trouw et al., 1980)	CAR-I-32; CAR-II-76; CAR-II-108; CAR-IV-52B; CAR-IV-129; CAR-IV-152; CAR-V-17; CAR-IX-11; CAR-II-179	-	C-301b; C-308a; C-317; C-318; C-344; C-371; C-375; C-379; C-381a; C-381b; C-397; C-400; C-412; C-421; C-421b; C-426
Formação São Tomé das Letras (Trouw et al., 1980)	-	-	C-305; C-398; C-399a; C-399c; C-401; C-401a; C-417,

Tabela II.1: amostras analisadas petrograficamente.

II.4. Geoquímica Elemental

Para a obtenção de elementos maiores, menores, traços e elementos terras raras (ETR) foram analisadas 13 (treze) amostras daquelas coletadas nos trabalhos de campo mencionados no item II.1, sendo 11 (onze) amostras da Unidade Biotita Xisto e 2 (duas) do Xisto Grafitoso da Formação Campestre (**tabela II.2**).

As amostras foram analisadas em três etapas: (i) lote 1: amostras CAR-I-31, CAR-I-52 e CAR-II-76; (ii) lote 2: C-325c, C-333, C-337, C-340, C-341 e CM-III-25; e (iii) lote 3: amostras C-410, C-411, C-430 e C-431,

A preparação das amostras para análise laboratorial foi efetuada no Laboratório de Tratamento de Amostras (LTA) do IGc – USP, com a orientação do técnico responsável MSc. José Paulo Sertek e consistiu em:

- (i) limpeza das amostras que foram lavadas e serradas para extração das porções alteradas;
- (ii) Cominuição em prensa hidráulica para obter fragmentos menores que 1 cm e para a retirada de possíveis porções alteradas remanescentes da primeira etapa;
- (iii) Quarteamento para retirada de aproximadamente 100g representativos da amostra;
- (iv) Moagem em moinho de ágata do tipo planetário até obtenção de pó com tamanho de grão inferior a 200 *mesh*;

	Mapeamento Geológico		Etapas de campo deste trabalho
	2008	2009	
Unidade Biotita Xisto	CAR-I-51	CM-III-25	C-325b; C-333; C-337; C-340; C-341; C-410; C-411; C-430; C-431
Formação Campestre - Xisto Grafitoso	CAR-I-32; CAR-II-76	-	-

Tabela II.2: amostras analisadas quimicamente para obtenção de elementos maiores, menores, traço e Elementos Terras Raras.

II.4.1. Análise de elementos maiores, menores e traços por Fluorescência de Raio-X (FRX):

Os elementos maiores, menores e alguns traços foram analisados a partir de pastilhas fundidas e prensadas no laboratório de Espectometria de Fluorescência de Raio-X (FRX) do IGc – USP pelo físico e técnico especializado responsável Paulo Ernesto Mori (**tabelas VI.2 e VI.3**). Utilizou-se o equipamento automático Philips, modelo PW2400 e a metodologia empregada foi a descrita em Mori et al.(1999).

As pastilhas prensadas foram confeccionadas no LTA. Após a moagem, cerca de 7,0 g de cada amostra foram micronizados e levados para secagem na estufa. Após esta etapa, as amostras foram homogeneizadas manualmente com 20% de ligante em pó e depois levadas para prensa hidráulica. As pastilhas fundidas foram produzidas no laboratório de Laboratório de Química e ICP-AES/MS do IGc - USP pelo técnico especializado Paulo Ernesto Mori.

Os materiais de referência geoquímica internacional utilizados para o teste de exatidão foram o basalto JB-1a, nos lotes 1 e 3 e o granodiorito JG-1a no lote 2, Os valores obtidos para os óxidos apresentaram exatidão ideal, sendo que a diferença entre os valores recomendados e obtidos não ultrapassou os 5% em todas as etapas. Os valores obtidos para os elementos menores e traços também foram satisfatórios e no geral a diferenças entre valores recomendados e obtidos não ultrapassou os 10% em todas as etapas, com exceção dos elementos Ce, La, Nd, Pb, Th e V nos lotes 1 e 3 e Cr, Nb, Ni, Pb, Th, U e V no lote 2, que apresentaram diferenças de até 56%.

Análise de duplicata foi feita apenas no segundo lote para a 4^a (quarta) amostra analisada. A diferença entre as análises não ultrapassou os 5% para os óxidos e os 10% para os elementos menores e traço, com exceção dos elementos Nd, Sc, U e Y que chegaram a ultrapassar os 30%.

II.4.2. Análise de elementos terras raras por espectrometria de massa com plasma induzido acoplado (ICP-MS)

Para obtenção de elementos traços e ETR, as 13 (treze) amostras citadas no item II.4 foram analisadas no Laboratório de Química e ICP-AES/MS do IGc – USP, pela química e

técnica especializada MSc Sandra Andrade, utilizando critérios descritos em Navarro (2004). O laboratório utiliza um espectrômetro do tipo quadropolo, modelo ELAN 6100DRC da PerkinElmer/Sciex para obtenção de elementos traço e terras raras.

Os materiais de referência utilizados para o teste de exatidão foram o granito JG-3 e o riolito JR-1 nos 3 (três) lotes. Os valores obtidos (**tabela VI.4**) foram coerentes, sendo que a diferença entre os resultados obtidos e recomendados para a maioria dos elementos ficou abaixo de 10%. Valores acima disso ocorreram para ambos os padrões, sendo que o elemento Ho se destacou dos demais por apresentar altos valores em todos os lotes (padrão JG-3: entre 38 e 43%; padrão JR-1: entre 15 e 17%).

Análise de duplicata foi executada para a última análise feita em cada um dos 3 (três) lotes. Com exceção da amostra CM-III-25 do segundo lote, que apresentou diferenças entre 11 e 27% para a maioria dos elementos, as duplicatas deram valores com diferenças abaixo de 10% em relação aos resultados obtidos na primeira análise.

II.5. Geoquímica Isotópica

Análises de geoquímica isotópica podem fornecer, além de idades, informações sobre as condições de formação da rocha estudada, sejam em rocha total ou em mineral.

A utilização de diversos sistemas isotópicos de maneira combinada é uma importante ferramenta para a identificação e caracterização da área fonte que gerou sedimentos e metassedimentos. Neste caso, é possível identificar o tipo de rocha que atuou como fonte, se esta tem origem mantélica, crustal ou é produto de reciclagem sedimentar, permitindo uma identificação geral do ambiente de deposição e do contexto geotectônico da época da sedimentação.

II.5.1. Geoquímica Isotópica em Rocha Total

Para análises de geoquímica isotópica em rocha total foram escolhidos os sistemas Rubídio-Estrôncio (Rb-Sr) e Samário-Neodímio (Sm-Nd). Estes sistemas, além de amplamente utilizados e descritos na literatura, são os que oferecem melhores resultados no que diz respeito à identificação de proveniência sedimentar. Idades modelo (Sm-Nd), idades de episódios de formação (Rb-Sr), e caracterização de fonte, são algumas das informações que podem ser extraídas no tratamento de dados provenientes de análises destes sistemas em rochas sedimentares e metassedimentares. Para isto, foram analisadas 11 (onze) amostras

daquelas coletadas nos trabalhos de campo mencionados no item II.1, sendo 08 (oito) amostras da Unidade Biotita Xisto e 3 (três) do Xisto Grafitoso da Formação Campestre) (tabela II.3).

A preparação das amostras foi efetuada no LTA do IGc - USP, com a orientação do técnico responsável MSc. José Paulo Sertek e seguindo os quatro passos descritos no item II.4, Após esta etapa, as amostras foram enviadas ao Centro de Pesquisas Geocronológicas onde foram encaminhadas para os laboratórios de Rb-Sr e de Sm-Nd.

	Mapeamento Geológico		Etapas de campo deste trabalho
	2008	2009	
Unidade Biotita Xisto	<i>CAR-I-51; CAR-IX-129</i>	<i>CM-III-25</i>	<i>C-325b; C-333; C-337; C-340; C-341</i>
Formação Campestre - Xisto Grafitoso	<i>CAR-I-32; CAR-II-76; CAR-IX-11</i>	-	-

Tabela II.3: amostras analisadas para obtenção dos sistemas Rb-Sr e Sm-Nd.

II.5.1.1. Sistema isotópico Rb-Sr em rocha total

Na natureza são encontrados dois isótopos naturais do elemento químico Rb, sendo estes o ^{85}Rb (72,17% de abundância relativa) e ^{87}Rb (27,83% de abundância relativa).

O isótopo ^{87}Rb é radioativo e decai para o elemento radiogênico ^{87}Sr segundo a seguinte equação:

Onde β^- é a partícula radioativa emitida durante o decaimento e Q é a energia liberada durante a reação. O decaimento ocorre segundo uma taxa constante, entretanto, no caso do sistema Rb-Sr, a baixa energia de decaimento - 275 keV – dificulta a determinação da constante, sendo que valores distintos, porém semelhantes, são encontrados na literatura (Dickin, 1995a):

- Neumann & Huster (1976): $48,8 \pm 0,8$ Byr $\rightarrow$ constante $1,42 \times 10^{-11}/\text{yr}$;
- Davis *et al.* (1977): $48,9 \pm 0,4$ Byr $\rightarrow$ constante $1,42 \pm 0,01 \times 10^{-11}/\text{yr}$;
- Pinson *et al.* (1963): 48,8 Byr confirmado por amostras datadas por outros métodos;
- Minster *et al.* (1982): $49,4 \pm 0,3$ Byr $\rightarrow$ constante $1,402 \pm 0,008 \times 10^{-11}/\text{yr}$, com amostras com U-Pb e Rb-Sr precisas (isócronas concordantes).

Frente à estes valores variados, adota-se como convenção internacional o valor de $t_{1/2} = 48,8$ Byr, com constante de $1,42 \times 10^{-11}/\text{yr}$ (Dickin, 1995a).

Aplicações

Este sistema indica idades para eventos geológicos formadores de rochas com dados de ampla interpretação (Souza, 2009).

Uma das maneiras de obter estas idades se dá pelo método gráfico. Neste os valores obtidos para cada amostra cogenética são plotados em um diagrama isocrônico (**figura II.1**), onde a ordenada (y) correspondem às razões isotópicas $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$ e a abscissa (x) às razões $\text{Rb}^{87}/\text{Sr}^{86}$, e depois ligados por uma isócrona. A idade do conjunto de amostras é obtida calculando-se a tangente da divisão do ângulo que a isócrona forma com a horizontal pela constante de decaimento (White, 2009).

Figura II.1: Diagrama isocrônico do sistema Rb-Sr extraído de White (2009). A linha vermelha representa a isócrona gerada a partir de cinco amostras analisada pelo autor.

Outra maneira de obter as idades do evento geológico seria através da equação abaixo (White, 2009):

$$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} = (^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_0 + (^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr})(\lambda t)$$

Onde λ é a constante de decaimento, $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_0$ é a razão inicial da Terra, $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ da Terra é de 0,085 e $t \ll 1/\lambda$. A razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ inicial da Terra pode ser estimada da razão inicial em meteoritos considerando que todo o sistema solar tinha $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ uniforme no momento de sua formação. Uma vez formada, a Terra é um sistema fechado, portanto evolui segundo uma linha reta com inclinação proporcional à média de $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ da Terra. A razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ condritica atual é de cerca de 0,725, enquanto $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ da Terra é de cerca de 0,705 (White, 2009).

Além de estimar uma idade para o evento gerador da rocha estudada, este sistema, quando aliado ao sistema Sm-Nd pode fornecer dados sobre a origem da rocha-fonte, diferenciando reservatórios mantélicos daquelas de origem crustal (**figura II.2**), identificando o tipo de ambiente no qual o sedimento foi depositado (**figura II.3**).

Figura II.2: gráfico ϵ_{Nd} vs. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ extraído e traduzido de White (2009) com a delimitação dos campos de rochas de origem mantélica daquelas de origem crustal. Os campos “enriquecido” e “empobrecido” indicam onde reservatórios enriquecidos e empobrecidos em elementos incompatíveis seriam plotados.

As razões iniciais $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ também fornecem dados sobre o período de residência crustal da rocha analisada, pois quanto maior a razão, maior a quantidade do isótopo radiogênico. Rochas de assinatura juvenil tendem a apresentar menores razões isotópicas iniciais $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ do que rochas de assinatura crustal (**figuras II.2 e II.3**).

Figura II.3: gráfico ϵ_{Nd} vs. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ extraído e modificado de McLennan et al (1990). Os campos delimitados se referem a amostras analisadas pelos autores provenientes de cada um dos ambientes de deposição identificados. NASC: *North American Shale Composite* (média das composições de pelitos norte americanos de idade no pós-Arqueano definida por Haskin, 1968).

Desvantagens

Segundo Dickin (1995a), a utilização deste sistema só é confiável quando relacionado a outros métodos de datação como Sm-Nd e U-Pb. Uma das razões para tal precaução é que a mobilidade destes elementos, principalmente do Rb, traz desvantagens para geocronologia já que o sistema fechado assumido é violado. Toda rocha pode ser contaminada durante eventos pós-diagenéticos, como intemperismo e hidrotermalismo, assim a mobilidade de Rb e Sr pode resultar em idades imprecisas ou razões iniciais incorretas (White, 2009).

Outra desvantagem do método, no caso da datação de rochas metamórficas, é que o sistema só permanece fechado durante o evento térmico (permitindo a datação da cristalização da rocha) livre de processos hidrotermais que possam facilitar a drenagem de Sr para os fluidos percolantes (Dickin, 1995a).

No caso das rochas sedimentares, a datação Rb-Sr depende da hipótese de que a concentração de Sr tenha sido homogeneizada durante a deposição ou início da diagênese, se mantendo como um sistema fechado até os dias atuais (Dickin, 1995a). Entretanto, o resultado

também depende da natureza da fase mineral que contém Rb. Minerais detríticos, apesar de resistentes a aberturas de sistemas durante metamorfismo de soterramento, influenciam na quantidade de Sr presente na rocha. Por outro lado, minerais autigênicos, apesar de serem depositados diretamente na água do mar, apresentando homogeneidade de isótopo inicial de Sr, são altamente susceptíveis a recristalização após soterramento e podem não se comportar como sistemas fechados (Dickin, 1995a).

II.5.1.2. Sistema isotópico Sm-Nd em rocha total

O elemento químico Sm se apresenta na natureza na forma de sete isótopos, sendo ^{147}Sm , ^{148}Sm e ^{149}Sm radioativos. Os dois últimos tem meia-vida extensa, o que impede a medição da variação dos elementos radiogênicos ^{144}Nd e ^{145}Nd . Para o isótopo ^{147}Sm a taxa de decaimento é de $6,54 \times 10^{-12}/\text{ano}$ (λ) (Dickin, 1995b), com meia-vida de $1,06 \times 10^{11}$ anos (DePaolo, 1976), favorecendo a determinação da variação de ^{143}Nd radiogênico nos dias atuais. O decaimento se dá segundo a reação:

Aplicações

O sistema Sm-Nd foi utilizado como método de datação pela primeira vez por Lugmair (1974) e Lugmair et al (1975) que o aplicou para determinar idades de condritos e basalto lunar, e detectou que a razão $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ indica as mudanças na abundância relativa de ^{143}Nd causada pelo decaimento de ^{147}Sm .

DePaolo e Wasserburg (1976) foram os primeiros a determinar concentrações de Nd em rochas ígneas terrestres, o que gerou implicações para petrogênese e para história da crosta e manto terrestres. Neste mesmo trabalho, os autores entendem que se a linha de evolução CHUR (curva de evolução condrítica) define a razão inicial de rochas ígneas continentais através do tempo, a medição de $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ e $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ em qualquer rocha crustal daria uma idade modelo para a formação da rocha, ou da sua precursora, a partir da fonte de composição condrítica. Os autores expressam este modelo pela seguinte equação:

$$T^{\text{Nd}}_{\text{CHUR}} = 1/\lambda \ln \{ [1 + \epsilon_{\text{Nd}}(0) \cdot I_{\text{CHUR}}(0) \cdot 10^{-4}] / f_{\text{Sm/Nd}} (^{147}\text{Sm}/^{143}\text{Nd})_{\text{CHUR}} \}$$

Onde $f_{\text{Sm/Nd}} = \{[(\text{Sm/Nd})_{\text{M}} / (\text{Sm/Nd})_{\text{CHUR}}] - 1\}$ e $\epsilon_{\text{Nd}}(0) = \{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{M}} / I_{\text{CHUR}}(0)] - 1\} \cdot 10^4$, considerando o sistema fechado com $(\text{Sm/Nd})_{\text{CHUR}} = 0,1936$ e $I_{\text{CHUR}}(0) = 0,511836$, Partindo da premissa que a razão Sm/Nd não sofreu modificações desde a separação do condrito (ou fonte mantélica), a T_{CHUR} pode dar uma idade formação para vários litotipos. Além disso, os autores conseguiram diferenciar rochas basálticas continentais das oceânicas (medições de ϵ_1^{CHUR}), estabeleceram que a razão Sm/Nd da Terra é aproximadamente igual à média dos meteoritos condrícticos e sugeriram que razões $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ diferentes para basaltos jovens distintos pode indicar fontes mantélicas distintas.

Segundo White (2009), valores negativos de ϵ_{Nd} implicam que durante a evolução da história da Terra a razão Sm/Nd desta rocha ou de sua fonte tem sido menor que a do condrito, ou seja, o padrão de terras raras da rocha ou de sua fonte é enriquecido em ETRL. Por outro lado, valores positivos indicam que o padrão de terras raras da rocha ou de sua fonte é empobrecido em ETRL.

Além de idades-modelo, o sistema Sm-Nd pode fornecer dados que, quando combinados com sistema Rb-Sr (figuras II.2 e II.3) e outros elementos traço, como a razão Th/Sc (figura II.4), indicam a assinatura geoquímica da área-fonte e do ambiente deposicional.

Figura II.4: Gráfico ϵ_{Nd} vs. Th/Sc extraído e traduzido de McLennan et al. (1990). As amostras plotadas foram analisadas pelos autores.

Vantagens e Desvantagens

A aplicabilidade da idade-modelo Nd para identificar proveniência sedimentar é eficiente porque é capaz de datar eventos anteriores à sedimentação e à erosão, pois as concentrações de Sm e Nd não são consideravelmente afetadas por estes eventos geológicos (Dickin, 1995b). Um grande fracionamento da razão Sm/Nd é observado na formação da crosta, porém passados os estágios de formação de rochas crustais, a razão Sm/Nd das mesmas tende a não se modificar (razão da maioria das rochas crustais é uniforme e ao redor de 0,13) (White, 2009). Estas constatações tornam a idade modelo, ou tempo de residência crustal, um método confiável de datação, pois, considerando $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ e $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ medidos, e assumindo que a razão $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ era constante do tempo de formação, podemos estimar o tempo de residência destes elementos na crosta.

No caso do estudo de proveniência sedimentar, uma característica dos elementos terras raras é que não há mudanças significativas das abundâncias relativas destes elementos mesmo na produção de sedimentos muito finos a partir de rochas cristalinas. Isto significa que idades de residência crustal da rocha fonte podem ser calculadas a partir de rochas sedimentares (White, 2009). Entretanto, no caso de sedimentos que têm área-fonte heterogênea as idades T_{DM} refletem a mistura de e sua interpretação deve ser feita associada a outros tipos de datação, como sistema isotópico U-Pb em zircão detrítico.

II.5.2. Geoquímica Isotópica Mineral

Quatro amostras foram preparadas para catação dos cristais (**tabela II.4**), sendo duas da Unidade Biotita Xisto na região da Serra das Bicas, uma da Unidade Biotita Xisto na região da Serra do Pombeiro e uma do quartzito da Formação Campestre descrita por Trouw et al (1980).

Unidade Biotita Xisto	Serra das Bicas	<i>C-331; C-337</i>
	Serra do Pombeiro	<i>C-431</i>
Formação Campestre (Trouw et al., 1980)		<i>CAR-II-179</i>

Tabela II.4: amostras analisadas para obtenção do sistema U-Pb em cristais de zircão detrítico.

A preparação das amostras foi efetuada no LTA do IGc-USP (citado anteriormente) e no laboratório de Separação do Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGEO) do IGc-USP com orientação dos técnicos Vasco Antonio P. Loios, responsável pela separação, e Maurício Dias de Souza, responsável pela catação dos grãos, montagem dos *mounts* e obtenção das imagens de catodoluminescência. Foram seguidas as seguintes etapas:

- (i) Limpeza das amostras e fragmentação das mesmas com marreta para obtenção de pedaços menores do que 3 (três) centímetros, aproximadamente;
- (ii) Britagem em britador primário de mandíbulas de aço para cominuição das amostras em fragmentos menores do que 1 (um) centímetro;
- (iii) Moagem em moinho de disco de tungstênio e peneiramento para a separação de frações de granulação entre 100 e 200 μm e porções de grãos menores do que 200 μm .
- (iv) Concentração de minerais densos por pressão de água e vibração em mesa de concentração Wiffley;
- (vi) Na porção de minerais densos concentrados, separação dos minerais magnéticos com imã de mão;
- (vii) Após a passagem do imã de mão, nova separação dos minerais magnéticos dos não magnéticos em separador magnético do tipo Frantz, a 0,5A;
- (viii) A porção não magnética foi levada para capela de exaustão para passagem em bromofórmio (CHBr_3 , densidade = 2,89 g/cm^3) para separação dos minerais mais densos do que 2,89 g/cm^3 ;
- (ix) Na porção de minerais mais densos que o bromofórmio, nova separação de minerais magnéticos a 0,5A dos não magnéticos foi realizada no Frantz a 0,5A;
- (x) A porção não magnética foi levada a capela de exaustão para passagem em iodeto de metileno (CH_2I_2 , densidade = 3,32 g/cm^3) para separação dos minerais mais densos do que 3,32 g/cm^3 ;
- (xi) A porção mais densa do que o iodeto de metileno foi analisada em uma lupa Leika para observar a existência (ou não) de cristais de zircão;
- (xii) As amostras preparadas foram encaminhadas para catação dos cristais em lupa e posterior montagem de *mounts* com utilização de resina *epoxy*;
- (xiii) Imagens de catodoluminescência foram obtidas em EDS do tipo EDS-X-MAX da marca Oxford, a partir de detector CENTAUROS, para a identificação de inclusões e microfraturas nos cristais. Estas imagens foram utilizadas para auxiliar no posicionamento do

feixe de laser durante as análises no LA-MC-ICP MS (*laser ablation multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry*). Nesta etapa, após a análise de EDS (*Energy Dispersive Spectroscopy*), foi constatado que os grãos separados da amostra C-331 não eram de zircão. A amostra C-337 foi selecionada para substituí-la, mas descartada na etapa (xi) por não apresentar cristais de zircão visíveis em lupa. Portanto, foram encaminhadas para a próxima etapa as amostras C-431 e CAR-II-179;

(xiv) As idades de proveniência a partir das medidas das razões $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ e $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ em zircão detrítico foram obtidas por LA-MC-ICP MS, com feixe de 29 μm , com auxílio do técnico responsável Walter Mauricio Sproesser no CPGEO do IGc-USP.

II.5.2.1. Sistema isotópico U-Pb em zircão detrítico

A análise do sistema Urânio-Chumbo (U-Pb) em cristais detríticos de zircão foi escolhida para obtenção de idades de proveniência por ser um método consistente, preciso, de fácil obtenção e de ampla utilização na literatura (Fedo et al., 2003). Além disso, o zircão é resistente a ações do intemperismo, diagênese e metamorfismo, mantendo o sistema fechado em condições extremas de temperatura e pressão, preservando idades mais antigas, facilmente sobrepostas em outros sistemas isotópicos.

Por causa de suas características refratárias o zircão pode ser encontrado praticamente em todos os depósitos sedimentares e metassedimentares, e por isso exerce um papel importante no entendimento da proveniência dos mesmos (Fedo et al., 2003).

A determinação das razões $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ e $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ em zircões detríticos por LA-MC-ICPMS foi a escolhida neste trabalho porque este método permite a análise de diversos grãos em um espaço de tempo relativamente curto, permitindo que uma grande variedade de dados úteis para análises de proveniência possam ser avaliados.

Método

Na natureza encontram-se quatro isótopos de Pb, ^{204}Pb , ^{206}Pb , ^{207}Pb e ^{208}Pb , sendo apenas o primeiro não radiogênico, ou seja, não é produto do decaimento radioativo de urânio (U) ou tório (Th). Os isótopos radioativos que decaem para os isótopos radiogênicos, com suas respectivas meia-vida e a constante de decaimento são mostrados na **tabela II.5** a partir dos dados de Jaffey *et al.* (1971) em Dickin (1995c).

Equação de decaimento	$t_{1/2}$, Ga	Constante de decaimento λ , ano ⁻¹
$^{238}\text{U} \rightarrow ^{206}\text{Pb}$	4,47	$1,55125 \times 10^{-10}$
$^{235}\text{U} \rightarrow ^{207}\text{Pb}$	0,704	$9,8485 \times 10^{-10}$
$^{232}\text{Th} \rightarrow ^{208}\text{Pb}$	14,01	$0,49475 \times 10^{-10}$

Tabela II.5: dados de Jaffey et al. (1971) para meia-vida ($t_{1/2}$) e constante de decaimento das reações que produzem os três elementos radioativos de Pb presentes na natureza (extraído de Dickin, 1995c).

O decaimento de cada isótopo radioativo se dá segundo reações que passam por diversos estágios e elementos intermediários que tem meia-vida relativamente curta, variando de milisegundos a minutos (White, 2009), o que os torna dispensáveis em trabalhos geoquímicos (**figura II.5**). Entretanto, alguns destes elementos intermediários possuem meia-vida variável de dias a centenas de milhares de anos e provêm informações úteis sobre processos geológicos de curta duração, sendo de grande eficácia na datação de sedimentos ($^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{U}$: meia-vida de 246,000 anos) ou na determinação de taxas de sedimentação e idades de lavas ($^{238}\text{U} \rightarrow ^{230}\text{Th}$) (White, 2009).

Aplicações

Uraninita e monazita foram os primeiros minerais utilizados em geocronologia U-Pb, devido sua tendência de incorporar grandes concentrações de U e pouco Pb comum inicial. Entretanto, o zircão se tornou o mineral mais analisado, pois além de ser um mineral rico em U é encontrado na maioria das rochas intermediárias a ácidas, além de ser resistente a processos geológicos como metamorfismo, intemperismo, diagênese e hidrotermalismo.

O sistema U-Pb raramente se mantém fechado em rochas silicáticas devido à mobilidade do Pb e do U em condições de metamorfismo de baixo grau e intemperismo, dificultando a obtenção de idades concordantes em análises de rocha total. Porém, como a relação entre ^{235}U e ^{238}U com ^{207}Pb e ^{206}Pb é quimicamente coerente, a obtenção de idades mesmo em sistemas perturbados, se torna possível.

Uma das técnicas que exploram tal relação é a que analisa o sistema U-Pb em cristais de zircão, partindo da premissa que o zircão incorpora U durante sua cristalização, mas não Pb, tornando as equações abaixo confiáveis:

$$^{206}\text{Pb} = ^{238}\text{U} (e^{\lambda_{238}t} - 1)$$

$$^{207}\text{Pb} = ^{235}\text{U} (e^{\lambda_{235}t} - 1)$$

Onde Pb representa apenas o Pb radiogênico.

Figura II.5: parte da tabela de nuclídeos extraída de White (2009) que mostra os elementos intermediários que participam das reações de decaimento de ^{238}U , ^{235}U e ^{232}Th para ^{206}Pb , ^{207}Pb e ^{208}Pb . Em vermelho os nuclídeos da série ^{238}U , em preto os nuclídeos da série ^{235}U e em cinza os nuclídeos da série ^{232}Th (o tempo de cada decaimento se encontra abaixo do elemento).

A partir do ^{204}Pb , ou Pb comum, pode-se construir diagramas isocrônicos (**figura II.6**) que permitem a datação de rochas utilizando-se as seguintes equações:

$$(^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_P = (^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_I + ^{238}\text{U}/^{204}\text{Pb} (e^{\lambda_{238}t} - 1)$$

$$(^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_P = (^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_I + ^{235}\text{U}/^{204}\text{Pb} (e^{\lambda_{235}t} - 1)$$

Sendo, $(^{206;207;208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_P$ a abundância nos dias atuais e $(^{206;207;208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb})_I$ a abundância inicial.

Sistemas fechados dão valores concordantes de t quando as composições isotópicas são inseridas do lado esquerdo das equações acima. Quando estas idades concordantes são plotadas no diagrama isocrônico, definem uma curva denominada CONCÓRDIA DE WETHERILL (**figura II.6**), que pode ser desenhada pela substituição das constantes de decaimento e valores sucessivos de t no lado direito das equações, e plotando os resultados para cada valor de t (Dickin, 1995c).

As frações iniciais de ^{204}Pb incorporado pelo cristal de zircão, no caso de cristais de zircão com Pb comum baixo, são corrigidas estimando o Pb comum de um modelo de evolução de Pb terrestre geral (Stacey & Kramers, 1975).

Ahrens (1955) obteve idades U-Pb para monazita e uraninita que plotavam fora da concórdia, porém seguiam uma reta, denominada pelo mesmo autor de DISCÓRDIA (**figura II.6**). O método aplicado quando há discordância dos dados é conhecido como idades de intersecção superior (Dickin, 1995c), e fornece idades através do prolongamento da discórdia até intersecção desta com a concórdia na sua porção superior (t_1).

Figura II.6: Diagrama $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ vs. $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ extraído de Dickin (1995c) com concórdia calibrada em Ma. A discórdia foi gerada por perdas de chumbo variadas em minerais do Zimbabwe ricos em U com 2700 Ma de idade.

Visando a obtenção da melhor intersecção da discórdia com a concórdia é preferível analisar várias frações do zircão que perdeu diferentes quantidades de Pb, o que provoca uma

regressão linear nos resultados. Esta regressão não pode ser resolvida algebricamente para fornecer idades superiores e inferiores de intersecção, assim, são calculadas graficamente em relação à uma concórdia calibrada, ou por computador.

Se processos de perda de Pb atuaram em diferentes tempos na história do zircão a discórdia será difusa, caindo longe da intersecção superior (Dickin, 1995c). Este espalhamento dos dados causa pouca incerteza na superior, mas muita na inferior. Para diminuir a incerteza, coloca-se barras de erros, considerando sua discordância (Davis, 1982). Por outro lado, Krogh (1982a,b) sugere que ao invés de refinar os dados matematicamente, seria melhor remover Pb discordante da amostra antes da análise, excluindo, por exemplo, os zircões metamíticos (ricos em impurezas, como Fe) no separador magnético do tipo Frantz.

Histogramas de distribuição de probabilidade e densidade (**figura II.7**) são muito utilizados em estudos de proveniência sedimentar, pois consideram os erros dos dados e gera uma distribuição de probabilidade de toda a amostra que varia individualmente para cada idade obtida (Fedo et al., 2003). Além disso, estes histogramas apresentam os vários grupos de idades, quando existentes, de maneira clara e de fácil visualização, entendimento e interpretação.

Figura II.7: histograma de distribuição de probabilidade e densidade extraído e traduzido de Fedo et al. (2003) com dados de idades $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ de zircões detríticos analisados por Rainbird et al (1998).

Perda de chumbo

Segundo Holmes (1954) quando as idades $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ e $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ são discordantes indicam que houve perda de Pb pelo cristal. Neste mesmo trabalho o autor definiu que a discórdia estaria associada a perda de Pb por difusão.

Wetherill (1956) estabeleceu a perda de chumbo episódica em dois momentos (**figura II.6**): t_1 relativa o tempo de formação do mineral; e t_2 relativa a eventos termais, como metamorfismo, intrusão, extrusão. Por outro lado, Russel e Ahrens (1957) estabeleceram que a perda de Pb pode ocorrer durante o decaimento, quando os membros intermediários seriam ejetados em micro-fissuras do mineral, produzidas pela radiação, e depois perdidos por difusão ou por lixiviação.

Outra explicação para a perda de chumbo foi dada por Goldrich e Mudrey (1972) que sugeriram que os danos da radiação seriam responsáveis por formar uma rede micro-capilar no cristal que seria preenchida por fluidos. O Pb difuso nestes fluidos seria perdido durante o soerguimento do embasamento, que causaria dilatação do mineral, expelindo os fluidos.

Condições estabelecidas para utilização do sistema U-Pb como geocronômetro

Em um primeiro momento, deve-se identificar se o sistema permaneceu fechado. Além disso, deve-se assumir que não há interferência da cadeia de fissão do ^{235}U , o que é muito raro de ocorrer na natureza, mas é possível.

A partir do momento que estas premissas forem confirmadas os sistemas $^{238}\text{U} - ^{206}\text{Pb}$ e $^{235}\text{U} - ^{207}\text{Pb}$ apresentarão idades concordantes, exceto quando há perdas de chumbo pelo cristal.

II.6. Elaboração da dissertação

A dissertação foi elaborada utilizando o programa Word, versões 2003 e 2007, As figuras foram editadas no programa Corel Draw, versões 12 e X3 e os mapas confeccionados no programa ArcGis 9.0 utilizando como base as folhas topográficas citadas no item II.2, que por sua vez foram adquiridas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Capítulo III

PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR

O estudo de proveniência sedimentar conjuga diversas áreas da geologia, como mineralogia, geoquímica, geocronologia, sedimentologia, petrologias ígnea e metamórfica, sendo muito utilizado na caracterização de contexto tectônico em escala regional e local (Haughton et al., 1991). Análises químicas e texturais de minerais detríticos (em sedimentos inconsolidados ou rochas sedimentares), bem como as análises químicas de rochas sedimentares são as ferramentas mais utilizadas na literatura nos dias atuais para a realização destes estudos (McLennan et al., 1990), pois diferentes tipos de rochas tendem a apresentar diferentes assembléias minerais que lhes são características (Pettijohn, 1975).

Considerando que, apesar de muitas vezes crucial, a análise de um só mineral não pode ser o único fator determinante da proveniência ou do contexto tectônico, sendo necessária a avaliação do contexto regional e de toda a assembléia mineral detrítica que compõe a amostra, a observação dos seguintes mecanismos que controlam a assembléia mineral, e conseqüentemente a composição global, da rocha sedimentar (**figura III.1**) é crucial para a identificação de sua proveniência (Morton e Hallsworth, 1999):

Intemperismo: pode afetar a rocha-fonte, modificando sua composição antes da incorporação do sedimento no sistema de transporte, ou da rocha sedimentar antes da amostragem no afloramento;

Abrasão mecânica: ocasionada pelo transporte, pode diminuir a diversidade mineralógica, pois causa cominuição dos grãos de dureza menor;

Processos hidráulicos: refletido pelos parâmetros granulométricos do sedimento (como tamanho do grão e seleção), controlam a abundância absoluta e relativa dos minerais durante o transporte e a deposição;

Variações nos procedimentos laboratoriais: atenção a possíveis erros cometidos durante o tratamento químico, na separação e na identificação do mineral.

Figura III.1: esquema em bloco de um ambiente de sedimentação com os principais mecanismos que controlam a assembléia mineral de uma rocha sedimentar (Morton e Hallsworth, 1999).

No caso de rochas metassedimentares, além de todos estes parâmetros relacionados acima, deve-se considerar todas as modificações físicas e químicas que podem ocorrer durante o aumento de temperatura e pressão e/ou deformação. Rochas metamorfas a baixo grau raramente sofrem alterações químicas consideráveis, exceto nos casos em são afetadas por processos hidrotermais, ou forte intemperismo químico após sua formação. Por outro lado, rochas metamórficas de alto grau são facilmente modificadas quimicamente, perdendo elementos químicos para fluidos hidrotermais exógenos ou endógenos, expelidos com o aumento de temperatura e pressão combinado com processos deformacionais.

Em rochas metamórficas deformadas de faixas orogênicas, a obliteração freqüente das estruturas sedimentares, dificulta, ou inviabiliza o estudo das condições e do ambiente de deposição. Neste caso, o estudo da composição química destas rochas, aliado ao estudo detalhado das estruturas deformacionais, das condições de metamorfismo e do posicionamento estratigráfico, torna-se um importante objeto de estudo para caracterização da fonte do sedimento original, as características do ambiente tectônico durante a sedimentação e o grau de alteração/reciclagem do sedimento a partir da área-fonte. A caracterização geoquímica da rocha é feita a partir de análises de elementos traços e isotópicos, pois tais elementos não são afetados significativamente por processos como intemperismo, erosão, diagênese e metamorfismo (McLennan et al, 1990).

III.1. Proveniência Sedimentar – Aplicações

Dentre as principais aplicações dos estudos de proveniência estão:

(i) **Evolução crustal:** a composição química de rochas sedimentares fornece dados que indicam a composição da crosta continental superior (Taylor e McLennan, 1985), sendo um importante meio para entender e determinar como a mesma evolui através do tempo geológico (McLennan e Taylor, 1991). Variações de elementos-traço nos minerais e nas rochas indicam mudanças composicionais da crosta superior, enquanto dados isotópicos podem detalhar o padrão de geração de crosta e a importância da reciclagem sedimentar (Haughton et al., 1991);

(ii) **Caracterização de crosta erodida:** registros detríticos muitas vezes são os únicos elementos que restam de blocos crustais e de níveis erodidos, sendo um dos únicos meios de identificação de ambientes tectônicos quando apenas um registro parcial é preservado *in situ* (ex.: magmatismo de arco preservado);

(iii) **Implicações paleoclimáticas:** determinadas por parâmetros mineralógicos e químicos que diferenciam, através de índices pré-estabelecidos, se a rocha sofreu intemperismo químico e/ou físico, com consequências para o diagnóstico do clima vigente na época da sedimentação;

(iv) **Contexto tectônico:** determinação de reciclagem, idades precisas e ambientes tectônicos ativos identificados por mudanças brusca de sedimentação;

(v) **Correlação estratigráfica de sub-superfície:** feita principalmente por minerais pesados e por combinação de geoquímica de elementos maiores e traços.

III.2. Proveniência sedimentar – Métodos de determinação

Os três principais métodos de avaliação de proveniência, ambiente deposicional e contexto tectônico de rochas sedimentares observados na literatura são:

- (i) Análise mineralógica petrográfica dos minerais detríticos;
- (ii) Análise química mineral;
- (iii) Análise geoquímica de rochas sedimentares.

III.2.1. Análise mineralógica petrográfica de minerais detríticos

Baseada principalmente em minerais pesados (**tabela III.1**), esta análise é feita com montagem de grãos de granulação entre 0,062 e 0,125 mm em lâminas delgadas, pois esta é a faixa com maior concentração de minerais pesados.

CLASSIFICAÇÃO DE MINERAIS PESADOS COMUNS QUANTO À ESTABILIDADE FÍSICA E QUÍMICA (PETTIJOHN ET AL., 1972)	
ULTRAESTÁVEIS	Rutilo (4,18-4,25); zircão (4,68); turmalina (3,0-3,25); anatásio (3,9)
ESTÁVEIS	Apatita (3,15-3,20); Fe-granada (3,5-4,3); estaurolita (3,65-3,75); monazita (4,6-5,4); biotita (2,8-3,2); ilmenita (4,7); magnetita (5,18)
MODERADAMENTE ESTÁVEIS	Epidoto (3,35-3,45); cianita (3,55-3,66); Fe-granada; sillimanita (3,23); titanita (3,40-3,55); zoisita (3,35)
INSTÁVEIS	Hornblenda (3,0-3,4); actinolita (3,1-3,3); augita (3,2-3,4); diopsídio (3,2); hiperstênio (3,4-3,5); andaluzita (3,16-3,20)
MTO INSTÁVEIS	Olivina (3,27-4,37)

Tabela III.1: classificação de estabilidade dos principais minerais pesados utilizados em estudos de proveniência extraída de Pettijohn et al. (1972). Os números em parênteses referem-se à densidade de cada mineral em g/cm³.

A separação dos minerais é feita com líquidos densos (**tabela III.2**) e a determinação dos minerais em microscópio petrográfico através da análise das características individuais e próprias de cada espécie (Mange e Maurer, 1992), como relevo, cor, pleocroísmo, forma, clivagem, extinção, birrefringência, alongação, caráter óptico, ângulo 2V, arredondamento e texturas superficiais, como feições de dissolução (**figuras III.2 e III.3**). A observação destas características, além de determinar diferentes minerais, auxilia na separação de minerais de um mesmo grupo.

A contagem dos grãos para determinar sua frequência na lâmina em número e porcentagem é o último passo antes da aplicação dos dados em padrões e índices pré-estabelecidos.

LÍQUIDO	COMPOSIÇÃO	DENSIDADE MÁXIMA	SOLVENTE
Bromofórmio	CHBr ₃	2,88	Benzol, xileno, tetracloreto de carbono, etilenobromida, álcool
Tetrabromoetano	C ₂ H ₂ Br ₄	2,95	Benzol, xileno, tetracloreto de carbono, etilenobromida
Solução de Thoulet	KI + HgI ₂ (aq.)	3,19	H ₂ O
Iodeto de Metileno	CH ₂ I ₂	3,33	Benzol, xileno, tetracloreto de carbono
Solução de Clerici	Malonato + formiato de tálio (aq.)	4,2	H ₂ O
Politungstato de sódio	NaWO ₄ (aq.)	-	H ₂ O

Tabela III.2: principais líquidos densos utilizados na separação de minerais detríticos. A densidade máxima é dada em g/cm³.

Figura III.2: características ópticas observáveis em microscópio petrográfico de três inossilatos pertencentes ao Grupo dos Piroxênios (Mange e Maurer, 1992).

Figura III.3: características ópticas observáveis em microscópio petrográfico de três nesossilicatos, polimorfos de Al_2SiO_5 (Mange e Maurer, 1992).

Índices minerais

Apesar da sobreposição dos processos que controlam a distribuição dos minerais pesados nos sedimentos, as assembléias minerais guardam informações importantes sobre a proveniência da rocha ou sedimento estudado (Morton e Hallsworth, 1999). Quando minerais específicos destas assembléias são aplicados em índices específicos pré-estabelecidos, como HMA (*Heavy Mineral Assemblages*) convencional e variante, fornecem informações cruciais para a proveniência do sedimento (Morton e Hallsworth, 1999).

O HMA convencional utiliza todos os minerais pesados encontrados na rocha, aplicando razões minerais que consideram características hidrodinâmicas e de estabilidade frente ao soterramento diagenético (**tabela III.3 e figura III.4**), que são para Morton e Hallsworth (1999) os principais mecanismos que determinam a composição de minerais pesados em sedimentos. Para aplicação deste método os minerais escolhidos devem ser

estáveis nas condições diagenéticas de estudo e devem ser de tamanho e densidade iguais, pois estes são os controladores do comportamento hidrodinâmico.

ÍNDICE	
Apatita-turmalina (ATi)	100 x contagem de apatita / (total apatita + turmalina)
Granada-zircão (GZi)	100 x contagem de granada / (total granada + zircão)
Grupo TiO ₂ -zircão (RZi)	100 x contagem grupo TiO ₂ / (total grupo TiO ₂ + zircão)
Rutilo-zircão (RuZi)	100 x contagem rutilo / (total rutilo + zircão)
Monazita-zircão (MZi)	100 x contagem monazita / (total monazita + zircão)
Cromo espinélio-zircão (CZi)	100 x contagem cromo espinélio / (total cromo espinélio + zircão)

Tabela III.3: razões minerais propostas por Morton e Hallsworth (1994) aplicadas em estudos de HMA convencional.

Figura III.4: texturas de dissolução em minerais estáveis e moderadamente estáveis do Mar Norte central publicadas por Morton (1984) e extraídas e traduzidas de Morton e Hallsworth (1999). As texturas são causadas pela dissolução provocada pelo soterramento diagenético. Observar a diminuição da diversidade mineral com o aumento da profundidade.

Por outro lado, o HMA variante se concentra nas características de cada mineral individualmente. Tradicionalmente, a diferenciação de proveniência utilizando este método se

concentra em cor (ex.: turmalina), hábito (ex.: feições de arredondamento), zoneamento químico (ex.: quantidade de Ca na granada controla sua estabilidade em profundidade) e química isotópica (datações em zircão e monazita).

Ambos os métodos são importantes e o ideal é trabalhar com os dois combinados. Morton *et al.*, (1999) sugere que o primeiro passo para um trabalho confiável é a caracterização, diferenciação e mapeamento dos tipos de areia usando o HMA convencional, que dá informações importantes sobre natureza e localização da área-fonte. Após esta etapa seleciona-se um ou mais minerais para fazer comparações mineralógicas diretas através do HMA variante para obter informações detalhadas sobre a litologia, com a provável determinação da área-fonte. Associada a estes mecanismos, a aquisição de dados isotópicos é complementar, pois estes fornecem intervalos de idade da área-fonte.

III.2.2. Geoquímica mineral

A geoquímica de grãos, além de diferenciar os vários tipos de minerais de um mesmo grupo, ou até identificar minerais de propriedades ópticas semelhantes, ajuda a contextualizar o sedimento em um ambiente tectônico provável, caracterizando a assinatura geoquímica da área-fonte e estabelecendo o intervalo, ou intervalos, no caso de mais de uma rocha-fonte, de idade no qual a mesma foi gerada.

A geoquímica de grãos minerais é realizada por análises composicionais quantitativas em microsonda eletrônica ou por determinações de sistemas isotópicos em espectrômetros de massa (ex.: LA-ICP MS, LA-MC-ICP MS) e microsonda iônica de alta resolução (SHRIMP).

A composição química detalhada de um mineral obtida em microsonda eletrônica é uma ferramenta consistente utilizada para identificar a rocha-fonte do sedimento e seu respectivo contexto tectônico. A predominância de minerais detríticos tipicamente metamórficos, como polimorfos de Al_2SiO_5 , estauroлита, serpentina, hiperstênio entre outros, indica que rochas de origem metamórfica seriam a área-fonte principal, e uma análise mais detalhada permite muitas vezes identificar o grau metamórfico em que esta rocha se formou. Por outro lado, minerais encontrados preferencialmente em rochas ígneas podem indicar, além do tipo de rocha o ambiente tectônico em que esta se formou, principalmente se estes minerais pertencem ao grupo dos piroxênios ou dos anfibólios, pois a composição química dos minerais pertencentes a estes grupos tem relação com o tipo de magmatismo que os gerou, e

consequentemente, indicam suas fontes e o ambiente tectônico em que foi formado (Barros et al., 2005).

Minerais pesados ultraestáveis e estáveis (**tabela III.1**) como zircão, monazita e rutilo, apesar de serem encontrados em diversos tipos de rocha, são muito utilizados em datações absolutas (zircão e monazita) para a identificação direta da área-fonte pelo intervalo de idade obtido, e em geoquímica de elementos traço (rutilo e zircão) para identificação de assinaturas geoquímicas específicas para cada ambiente em que o mineral é formado (Belousuova et al, 2001; Zack et al., 2004).

Neste trabalho serão detalhados apenas as características químicas de zircão, rutilo e dos minerais do grupo do piroxênio.

Análise química de minerais do grupo do piroxênio

O uso de piroxênios como indicador de proveniência é limitado pela sua instabilidade em ambientes de temperatura baixa, onde é corroído e dissolvido por fluidos intersticiais, sendo raro em arenitos porosos (Morton, 1984). Porém, em arenitos de ambiente eólico ou em arenitos não-porosos chega a ser o mineral predominante da assembléia..

Barros *et al.* (2005) compilaram dados da literatura e utilizando o diagrama ternário de Morimoto *et al.* (1998) e o diagrama binário Nisbet e Pearce (1977) demonstraram que a composição química de piroxênios ajuda a identificar a rocha, ígnea ou metamórfica, que serviu de proveniência para o sedimento (**figura III.5**) e até mesmo o ambiente tectônico vigente durante a formação da mesma (**figura III.6**).

Geoquímica de cristais de rutilo

O rutilo é, junto com zircão, turmalina e anatásio, considerado um mineral ultraestável (**tabela III.1**) devido à sua resistência física e química frente às ações do intemperismo e da diagênese (Pettijon et al., 1975). Como resultado disso, contém informações da sua fonte primária, mesmo em sedimentos extremamente maduros e após soterramento em profundidades consideráveis (Zack et al., 2004b).

Enquanto zircão geralmente sobrevive ao ciclo das rochas de sedimentação até metamorfismo de alto grau e até mesmo a processos magmáticos, a quebra do rutilo ocorre no início da fácies xisto verde e é novamente formado em fácies de anfibolito superior. Portanto, quando presente na rocha sedimentar, indica características do pico metamórfico sofrido pela rocha fonte.

Figura III.5: Diagrama de classificação dos minerais pertencentes ao grupo dos piroxênios de rochas ígneas de diferentes ambientes tectônicos, extraído de Barros et al. (2005). Wo – wollastonita; En – enstatita; Fs – ferrosilita (Diagrama: Morimoto *et al.*, 1988; Dados plotados: Barros *et al.*, 2005).

Figura III.6: diagrama de classificação de minerais do grupo do piroxênio a partir de suas concentrações de óxidos de Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca e Na, extraído Barros et al. (2005). $F1 = -(0,012 \times SiO_2) - (0,0807 \times TiO_2) + 0,0026 \times Al_2O_3 - (0,0012 \times FeO^*) - (0,0026 \times MnO) + (0,0087 \times MgO) - (0,0128 \times CaO) - (0,0419 \times Na_2O)$; $F2 = -(0,0469 \times SiO_2) - (0,0818 \times TiO_2) - (0,0212 \times Al_2O_3) - (0,0041 \times FeO^*) - (0,1435 \times MnO) - (0,0029 \times MgO) + (0,0085 \times CaO) + (0,016 \times Na_2O)$; OFB: basalto de fundo oceânico; VAB: basaltos de arco vulcânico; WPT: basalto toleítico intraplaca; WPA: basalto alcalino intraplaca. (Diagrama: Nisbet & Pearce, 1977; Dados plotados: Barros *et al.*, 2005).

Através da observação da química de elementos traço de cristais de rutilo analisados em microsonda eletrônica, Zack et al. (2004b) identificaram uma relação entre as concentrações de Nb e Cr em rutilo de rochas metabásicas e rochas metapelíticas. A partir da compilação dos dados é evidente que metacumulatos são caracterizados por rutilo com alto teor de Cr, enquanto outras rochas metamáficas contêm rutilo com baixo Cr e Nb e metapelitos contêm rutilo com baixo Cr e alto Nb (**figura III.7**).

Figura III.7: diagrama de Nb ppm vs. Cr ppm com os campos de composição de rutilo de rochas máficas, rochas metacumuláticas e rochas metapelíticas (Zack et al., 2004b).

Associado a esta relação, o geotermômetro zircônio em rutilo (Tomkins et al., 2007; Zack et al., 2004a; Watson et al, 2006), que utiliza a medida de Zr em rutilo detrítico, pode ser usado para estimar a temperatura mínima experimentada pela rocha fonte, se for possível identificar que havia zircão e quartzo como fases em excesso. Como estas fases estão sempre presentes em metapelitos, se a rocha estudada tiver baixo Cr e alto Nb, o geotermômetro pode ser utilizado (Zack et al., 2004b).

Geoquímica de cristais de zircão

O mineral zircão é resistente a ações do intemperismo, diagênese e metamorfismo, mantendo o sistema fechado em condições extremas de temperatura e pressão, preservando idades variadas, muitas vezes relacionadas a processos geológicos diferentes. Por causa destas características, este mineral é o mais utilizado na literatura, tanto para análises geoquímicas de elementos traço, quanto para análises de sistemas isotópicos. Além disso, a baixa velocidade de difusão intracristalina dos íons nos cristais de zircão favorece a preservação de sua

composição química e isotópica durante a maior parte dos processos geológicos (Barros *et al.*, 2005), e as principais características geoquímicas utilizadas na identificação de suas possíveis fontes, e do contexto tectônico das mesmas, são relacionadas aos teores de Zr, Hf, ETR, U, Th, Nb e Y.

Hoskin e Black (2000) analisaram elementos traço em cristais de zircão de rochas ígneas e metamórficas e identificaram diferenças marcantes com relação às concentrações de Ce, Th, U, Pb e elementos terras raras leves (ETRL) (**tabela III.4**).

ZIRCÕES DE ORIGEM METAMÓRFICA	ZIRCÕES DE ORIGEM ÍGNEA
Razão Th/U < 0,1	Anomalias positivas de Ce; Forte empobrecimento de ETRL, Th e Pb.

Tabela III.4: assinaturas de elementos traço de zircões metamórficos e ígneos identificadas por Hoskin e Black (2000).

Pupin (2000, apud Barros *et al.*, 2005) identificou diferenças marcantes na concentração de Hf e Y e na razão Zr/Hf de diferentes rochas ígneas geradas por processos geológicos diversos (**Tabelas III.5 e III.6**). Além disso, dados obtidos para HfO₂ em zircões pegmatíticos foram sempre maiores que 2%.

	Hf	Y
Granitóides Toleíticos	Baixo	Alto
Associações alcalinas sienó-granito	Baixo	Médio a baixo
Granitos de anatexia e migmatitos	Alto	Baixo

Tabela III.5: concentrações de Hf e Y em zircões de rochas ígneas formadas a partir de processos geológicos crustais distintos (Pupin, 2000, apud Barros *et al.*, 2005).

No mesmo contexto, Belousova *et al.* (2002) consideram que zircões detríticos em rochas sedimentares podem ser atribuídos a litotipos específicos, o que acrescenta base para as informações comumente utilizadas em estudos de proveniência, como idade U-Pb ou concentração de Hf. Neste trabalho os autores analisaram concentrações de elementos traço

em zircões de diferentes tipos de rocha, obtendo campos específicos para cada litotipo (**figura III.6**). Para os autores, o reconhecimento de zircões relacionados a rochas mineralizadas pode contribuir para a exploração mineral, pois a identificação de zircões kimberlíticos, por exemplo, pode ser útil na exploração de diamantes.

	Crosta Continental	Mantélicos	Intraplaca	Cálcio-Alcalinos e fusão parcial	Sienitos Nefeliníticos
Zr/Hf	36 - 45	60 – 68	> 60	< 60	73 – 135

Tabela III.6: razão Zr/Hf em rochas ígneas de diferentes ambientes tectônicos segundo Pupin (2000, apud Barros *et al.*, 2005).

Figura III.8: gráficos de concentração Y (ppm) vs. U (ppm) e Ce/Ce* vs. Eu/Eu* para zircões de origem ígnea de diferentes litotipos extraídos e traduzidos de Belousova et al.(2002). Os números no campo dos granitoides significam: (1) aplitos e leucogranitos; (2) granitos; (3) granodioritos e tonalitos.

III.2.3. Geoquímica de rochas sedimentares

A geoquímica de rochas sedimentares, quando utilizada em estudos de proveniência sedimentar, deve considerar o comportamento de vários elementos químicos frente ao intemperismo, erosão, transporte, deposição e diagênese (Bhatia, 1985; McLennan et al., 1990). Estes processos geológicos secundários podem alterar a concentração de elementos químicos no sedimento, o que faz com que o mesmo possa não representar a composição química original da rocha-fonte (McLennan et al., 1990).

A utilização de elementos que têm sua concentração intensamente alterada por processos intempéricos (como Na, Ca, K e Al) não é confiável em estudos de proveniência. Entretanto, estes podem ser aplicados em diagramas de classificação de arenitos ou em

índices de alteração química para inferir as condições paleoclimáticas vigentes durante intemperismo, erosão da área-fonte do sedimento (Nesbitt e Young, 1982) e a distância relativa em relação à área-fonte.

Por outro lado, alguns elementos traços têm comportamento insolúvel e, por isso, são transportados quantitativamente para sedimentos terrígenos. A geoquímica destes elementos em rochas sedimentares tem sido amplamente utilizada em estudos que visam estimar a composição da crosta continental superior, conhecer os processos responsáveis por sua diferenciação e inferir ambientes tectônicos de deposição de sedimentos (Taylor e McLennan, 1985). Elementos Terras Raras, Th e Sc são os mais indicados nestes estudos, porque não tendem a se concentrar em minerais pesados, não sofrem influência de processos de fracionamento durante o transporte, como Zr, Hf, Nb e Sn (Bhatia, 1985; Bhatia e Crook, 1986; McLennan, 2001; McLennan e Taylor, 1991; McLennan et al., 1990; Taylor e McLennan, 1985, 1995). Outros elementos como Cr, Ni, Co e Ba, devem ser considerados de maneira cautelosa, pois têm suas concentrações fortemente afetadas, independente da intensidade, por processos como intemperismo, dissolução, transporte, deposição e diagênese (McLennan et al., 1990).

McLennan *et al.* (1990) demonstraram que a concentração de elementos maiores, elementos traço e composições isotópicas de Nd e Sr em turbiditos está relacionada ao ambiente tectônico em que o sedimento foi depositado. Os autores reconheceram diferenças significantes na composição de elementos traço de turbiditos modernos em relação aos turbiditos arqueanos, o que sugere que processos de criação e diferenciação da crosta continental se modificaram ao longo de sua evolução. A idade modelo Nd (T_{DM}^{Nd}) é variada para os turbiditos pós-Arqueanos o que sugere que a incorporação de componentes derivados do manto durante a reciclagem sedimentar é igualmente variável e relacionada com a dinâmica das placas tectônicas (McLennan et al., 1990). Além disso, a tectônica de placas influencia as características de proveniência e os processos sedimentares, pois afeta as assinaturas geoquímicas e isotópicas dos sedimentos (Bhatia, 1985; Bhatia e Crook, 1986; McLennan et al., 1990).

III.2.3.1. Classificação química de arenitos

A variedade composicional de matriz e fragmentos líticos e as diferentes abundâncias destes e de feldspatos detríticos nas rochas sedimentares arenosas, que definem os limites composicionais exatos para essas rochas, não podem ser obtidos por nenhum esquema de

classificação química (Herron, 1988). Entretanto, alguns autores têm desenvolvido diagramas que visam às classificações químicas de arenitos considerando as relações entre composição elemental, mineralogia e tipo de rocha, baseados principalmente na presença frequente de feldspato potássico, muscovita e quartzo nestes sedimentos.

Pettijohn et al. (1972) sugere que a classificação seja baseada nas razões $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ e $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ (**figura III.9**), pois a primeira diferencia rochas ricas em plagioclásio albitico de rochas ricas em feldspato potássico e micas ricas em K e a segunda razão diferencia rochas maduras de imaturas (pobre em aluminossilicatos).

Figura III.9: gráfico $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ vs. $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ de classificação de arenitos segundo Pettijohn et al. (1972).

Por outro lado, Herron (1988) considera a utilização da razão $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ eficaz apenas na separação de *graywackes* e arcóseos, mas não é adequada para distinguir entre rochas ricas em fragmentos líticos daquelas mais ricas em feldspatos, rochas estas que compõe parte fundamental da maioria das classificações de arenitos. O autor sugere a substituição de Na_2O por Fe_2O_3 (**figura III.10**), pois a razão $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{O}$, por ser indicador de estabilidade mineral, distingue rochas ricas em feldspato potássico, muscovita e quartzo (minerais ricos em potássio, pobres em ferro e estáveis nas condições de baixa temperatura e pressão) daquelas ricas em fragmentos líticos, que são comumente ricos em minerais ferromagnesianos, e por isso menos estáveis às condições de temperatura e pressão da superfície terrestre. Outra diferença entre os esquemas de classificação de Pettijohn et al. (1972) e Herron (1988) é a

ausência de pelitos no primeiro, que no segundo se diferenciam de rochas do tipo *wacke* (com matriz aluminosa que varia entre 15 - 75%) pelas menores razões $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Figura III.10: gráfico $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ vs. $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{O}$ de classificação de arenitos segundo Herron (1988).

III.2.3.2. Elementos maiores e o intemperismo

O intemperismo químico progressivo em rochas silicáticas causa perda de elementos, como K^+ , Na^+ e Ca^{2+} , ocasionando a transformação de minerais primários em minerais secundários mais estáveis às condições da superfície terrestre. Esta reação resulta na formação de rochas sedimentares ricas em argilominerais, como caulinita e illita, e óxidos de ferro hidratado, como goethita.

Nesbitt e Young (1982) consideram que o processo dominante durante o intemperismo é a degradação de minerais do grupo do feldspato concomitante com a formação de argilominerais, pois os primeiros são os minerais reativos mais abundantes da crosta superior. Esta reação ocorre por meio de soluções agressivas que removem do feldspato os elementos Ca, Na e K, o que faz com que a proporção de Al em relação aos álcalis aumente, com o avanço do intemperismo. Partindo desta premissa, os autores desenvolveram um índice de alteração química (CIA - Chemical Index of Alteration) a partir das proporções moleculares dos óxidos de Ca, Na, K e Al:

$$\text{CIA (IAQ)} = [\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO}^* + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})] \times 100$$

Sendo o CaO^* a quantidade de CaO incorporada na porção silicática da rocha (correção feita para conteúdo de carbonato e apatita). Posteriormente, McLennan et al. (1990) inseriram a correção da quantidade de Na_2O para possíveis alterações devido a interações com a água do mar (no caso de rochas coletadas em fundos oceânicos).

Este índice pode ser utilizado em rochas metassedimentares com confiança, pois os valores não sofrem mudanças significativas durante metamorfismo já que resultados similares foram obtidos em rochas que sofreram metamorfismo de baixo e alto grau na área analisada pelos autores.

Outro método de avaliação da intensidade de intemperismo químico e da proveniência de rochas sedimentares foi sugerido por McLennan et al. (1990). Neste trabalho os autores utilizaram gráficos ternários A-CN-K para representar as composições de elementos maiores em rochas coletadas de ambientes tectônicos ativos e passivos (**figura III.11**). Os autores compararam estas composições com a composição de minerais e de alguns tipos de rocha (extraídas de Nesbitt e Young, 1984, 1989), e identificaram que amostras de margens passivas sofrem maior intemperismo químico (plotam próximo às composições enriquecidas em Al_2O_3) do que amostras de ambientes vulcanicamente ativos (plotam próximo a composições enriquecidas em CaO e Na_2O). Esta diferença ocorre porque ambientes tectonicamente ativos estão associados a altas altitudes, onde predomina o intemperismo físico e o tempo necessário para que haja intemperismo químico significativo não existe. Além disso, ambientes de margem passiva geralmente apresentam idades mais antigas do que os de margem ativa, sugerindo fonte de rochas mais antigas e sedimentos intensamente reciclados. Sucessivos ciclos de intemperismo que ocorrem nessa longa história contribuem para os maiores índices.

III.2.3.3. Geoquímica de elementos traço

Elementos traço, principalmente ETR, Th e Sc, são amplamente utilizados para determinação de proveniência, ambiente deposicional e contexto tectônico de rochas sedimentares e metassedimentares (Bhatia e Crook, 1986; McLennan et al., 1990, 1995; McLennan e Taylor, 1991) por causa das características químicas, inerentes a estes elementos, mencionadas no item III.3.3 deste capítulo.

As análises obtidas nestes estudos são utilizadas como base para estimativas da composição global da crosta continental superior (**tabelas III.7 e III.8**), da composição média de sedimentos clásticos (**tabela III.9**) e para estabelecer assinaturas geoquímicas de sedimentos clásticos depositados em diferentes ambientes tectônicos. Além disso, estas análises levam ao conhecimento sobre a

proveniência destes sedimentos e, conseqüentemente, da evolução dos processos de formação da crosta desde o Arqueano até os dias atuais (McLennan et al., 1990).

Figura III.11: diagramas ternários da fração molar de Al₂O₃ (A) – CaO + Na₂O em silicatos (CN) – K₂O (K) extraído, modificado e traduzido de McLennan et al. (1990). A figura mostra os campos pelitos e arenitos analisados pelos autores de ambientes de margens passiva e ativa.

	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO _T	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
Condie (1993)	67,0	0,56	15,14	4,76	-	2,45	3,64	3,55	2,76	0,12
Taylor e McLennan (1985)	65,89	0,50	15,17	4,49	0,07	2,20	4,19	3,89	3,39	0,20
Rudnick e Gao (2003)	66,62	0,64	15,40	5,04	0,10	2,48	3,59	3,27	2,80	0,15

Tabela III.7: composição de elementos maiores da crosta continental superior segundo Condie (1993), Taylor e McLennan (1985) e Rudnick e Gao (2003). FeO_T = Fe total como FeO; Unidade: porcentagem em peso de óxido.

	Condie (1993)	Taylor e McLennan (1985,1995)	Rudnick e Gao (2003)
Sc	13,4	13,6*	14
V	86	107*	97
Cr	112	85*	92
Co	18	17*	17,3
Ni	60	44*	47
Cu	-	25	28
Zn	-	71	67
Rb	83	112	84
Sr	289	350	320
Y	24	22	21
Zr	160	190	193
Nb	9,8	12*	12
Mo	-	1,5	1,1
Sn	-	5,5	2,1
Cs	-	4,6*	4,9
Ba	633	550	624
La	28,4	30	31
Ce	37,5	64	63
Pr	-	7,1	7,1
Nd	25,6	26	27
Sm	4,59	4,5	4,7
Eu	1,05	0,88	1,0
Gd	4,21	3,8	4,0
Tb	0,66	0,64	0,7
Dy	-	3,5	3,9
Ho	-	0,8	0,83
Er	-	2,3	2,3
Tm	-	0,33	0,30
Yb	1,91	2,2	2,0
Lu	0,32	0,32	0,31
Hf	4,3	5,8	5,3
Pb	17	17*	17
Th	8,6	10,7	10,5
U	2,2	2,8	2,7

Tabela III.8: composição de alguns elementos traço da crosta continental superior segundo Condie (1993), Taylor e McLennan (1985) e Rudnick e Gao (2003). Unidade: $\mu\text{g/g}$; (-): elemento não considerado pelo autor; (*): valores corrigidos por McLennan (2001).

Rochas sedimentares de idade pós-arqueana se diferenciam dos sedimentos de idade arqueana principalmente pelos padrões de ETR (Bhatia, 1985; McLennan e Taylor, 1991; McLennan et al., 1990). Pelitos do pós-Arqueano apresentam enriquecimento em ETRL, padrão condrito-normalizado plano e constante de ETRP e empobrecimento significativo de Eu, com anomalia (Eu/Eu^*) variável entre 0,60 e 0,70, com média de 0,65 (McLennan et al., 1990). Turbiditos do Fanerozóico, apesar de terem sido depositados em ambiente de margem

passiva, têm a mesma assinatura. McLennan et al. (1990) reconheceram, com base em assinaturas geoquímicas, quatro áreas-fonte principais para os sedimentos pós-arqueanos:

(i) Crosta Continental Superior Antiga: crosta continental superior antiga formada por rochas ígneas e metamórficas que sofreram diferenciação intracrosta e/ou reciclagem sedimentar. Características diagnósticas: grande abundância de elementos LIL (*large ion lithophile elements*); altos valores das razões Th/Sc, La/Sm e Th/U (este provavelmente devido aos longos e/ou repetidos ciclos de intemperismo); anomalias negativas de Eu; e baixos valores de $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ ($\epsilon_{\text{Nd}} < -10$).

(ii) Arco Jovem não diferenciado: material ígneo de arco jovem (vulcânico ou plutônico) que não sofreu diferenciação intracrosta significativa e por isso não apresenta anomalias negativas de Eu consideráveis. Características diagnósticas: abundâncias variáveis de elementos LIL; valores variáveis das razões Th/Sc e La/Sm; razão Th/U abaixo de 3,0 (derivados de fontes de manto empobrecido); razão $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ relativamente alta ($\epsilon_{\text{Nd}} > +5$) que o diferencia do componente anterior.

(iii) Arco Jovem Diferenciado: material ígneo de arco jovem que sofreu diferenciação intracrosta envolvendo cristalização fracionada de cristais de plagioclásio, representada por anomalias negativas de Eu. Anomalias negativas de Eu consideráveis ($\text{Eu}/\text{Eu}^* < 1,0$) diferenciam este componente do anterior.

(iv) Basalto do tipo MORB (*Mid-Ocean Ridge Basalt*): características diagnósticas: baixos teores de elementos LIL; baixas razões Th/Sc, La/Sm, Th/U e $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ ($\epsilon_{\text{Nd}} > +5$). Diferencia-se dos componentes de arco jovem pelos altos teores de elementos traço ferromagnesianos (ex.: Cr, Ni) e pela razão $\text{Ba}_\text{N}/\text{La}_\text{N} < 1,0$.

Por outro lado, sedimentos arqueanos têm menor enriquecimento em ETRL e pouca ou nenhuma ocorrência de anomalias de Eu. Os padrões de ETR podem ser divididos em dois, sendo os inclinados referentes a sedimentos de primeiro ciclo derivados diretamente de terrenos TTG (tonalitos, trondhjemitos e granodioritos) e os padrões planos derivados dos precursores do basalto e de sedimentos do primeiro ciclo (Taylor e McLennan, 1995). Além disso, apresentam menores razões de elementos incompatíveis contra elementos compatíveis (ex.: Th/Sc, La/Sc), sugerindo composição global mais máfica, e valores menores de anomalias negativas de Eu, o que indica que processos de diferenciação crustal eram menos atuantes e menos importantes no controle da formação e da composição da crosta arqueana (McLennan e Taylor, 1991).

Elementos (ppm)	SEDIMENTOS CLÁSTICOS DE GRANULAÇÃO FINA			SEDIMENTOS CLÁSTICOS DE GRANULAÇÃO GROSSA			
	NASC ¹	PAAS ²	Loess ³	Condie sandstone ⁴	Condie graywacke ⁵	PM sand ⁷	AM sand ⁸
Sc	15	16	7,8	2,0	14	5,85	14,4
Ti	4200	6000	3720	1500	4320	2360	3800
V	-	140	77	15	135	36	98
Cr	127	100	56	30	75	41	43
Co	26	20	10,6	2,5	18	6,5	13,5
Ni	58	60	20	8	38	19	16
Rb	125	160	73	25	90	61	67
Zr	200	210	302	105	147	285	155
Nb	-	18	12,7	4,0	10	7,71	6,73
Cs	5,2	6,0	3,8	-	-	1,42	2,57
Ba	636	650	458	150	625	403	441
La	32	38,2	27,9	10,3	28	27,2	20,7
Hf	6,3	5,0	8,9	3,1	3,8	9,68	4,73
Ta	1,12	1,28	0,92	0,30	0,83	-	-
Pb	-	20	14,1	19	11	15,4	14,2
Th	12,3	14,6	8,6	4,2	8,8	11	9,2

Tabela III.9: Concentração de elementos traço de várias médias de sedimentos clásticos extraída de McLennan (2001). ¹North American shale composite (Gromet et al., 1984); ²Post-Archean average Australian shale (Nace e Taylor, 1976; McLennan, 1981, 1989; Taylor e McLennan, 1985; Barth et al., 2000); ³Média da composição de loess baseada em oito médias regionais; ⁴Média de arenito cratônicos de idade fanerozóica (Condie, 1993); ⁵Média de graywacke do Fanerozóico (Condie, 1993); ⁶Média de bacias de *Trailing Edge* e Colisão Continental do pós-Arqueano (McLennan et al., 1990) e de arenitos do Paleozóico de margem passiva da Austrália (Bhatia, 1981, 1985; Bhatia e Crook, 1986); ⁷Média de turbiditos arenosos de margem ativa derivados de bacias modernas de margem ativa (McLennan et al., 1993) e média de Arco de Ilha Oceânica, Arco Continental e Margens do tipo-Andino de idade paleozóica (Bhatia, 1985; Bhatia e Crook, 1986).

Anomalia de Eu

O Eu ocorre na natureza como Eu^{2+} (condições redutoras) e Eu^{3+} , característica única que o diferencia de outros ETR trivalentes. Anomalias negativas de Eu são interpretadas como herança de uma assinatura ígnea anterior caracterizada pela substituição de Sr^{2+} por Eu^{2+} em cristais de plagioclásio cálcico, fase residual ou formada por cristalização fracionada durante processos ígneos responsáveis pela diferenciação da crosta. Como o plagioclásio é estável em profundidades menores que 40 km estes processos são superficiais, e, por isso, anomalias de Eu são utilizadas para diferenciar áreas-fonte de origem mantélica daquelas de origem intracrosta (McLennan e Taylor, 1991).

Anomalias de Eu são calculadas a partir da equação:

$$\text{Eu}/\text{Eu}^* = \text{Eu}_N / [(\text{Sm}_N)(\text{Gd}_N)]^{1/2}$$

Onde N subscrito indica que são valores condrito-normalizados e Eu^* representa o valor de Eu esperado para um padrão condrito-normalizado suave de ETR. Valores maiores que 1,0 são considerados positivos e valores menores que 1,0 negativos.

A presença de recorrente de anomalias negativas de Eu na maioria dos sedimentos pós-arqueanos indicam que processos intracrosta dominam a diferenciação da crosta continental, diferentemente do ocorrido durante o Arqueano, pois valores semelhantes são escassos em análises químicas de sedimentos desta idade (McLennan et al., 1990).

Razão Th/Sc

O Th é um elemento fortemente incompatível durante processos ígneos de fusão e fracionamento, se concentrando tipicamente em rochas graníticas. Por outro lado, Sc tem comportamento compatível devido ao seu menor tamanho atômico em relação ao Th e outros ETR, e tende a entrar na estrutura cristalina de fases minerais estáveis a níveis profundos, como piroxênio, se concentrando em rochas ígneas básicas (McLennan e Taylor, 1991; Taylor e McLennan, 1995). Portanto, a razão Th/Sc, e La/Sc pelas mesmas características, é um indicador sensível de processos ígneos de diferenciação crustal (McLennan e Taylor, 1991).

McLennan *et al.* (1990) mostraram que turbiditos depositados em ambientes de margem passiva ou colisão continental a razão Th/Sc é relativamente constante e igual a 1,0, provavelmente pelo fato de que os sedimentos são oriundos de crosta continental estável e/ou da reciclagem de rochas sedimentares. Por outro lado, em ambientes de margem ativa os

valores são variáveis e geralmente menores que 1,0, sugerindo que nestes ambientes a proveniência é mais variável e predominantemente máfica.

Outros elementos

O fracionamento hidráulico durante a sedimentação concentra minerais pesados ultraestáveis e estáveis nas porções arenosas da bacia, pois estes apresentam maior densidade, o que impede seu carregamento para porções mais profundas e argilosas. Elementos como ETRL, ETRP, Zr e Hf tendem a se concentrar nestes minerais (ex.: monazita, apatita e zircão) e, portanto, a análises de suas concentrações pode diferenciar amostras de níveis distais ou proximais de uma bacia quando a relação elementos *vs.* minerais pesados *vs.* fracionamento hidráulico pode ser comprovada (McLennan et al., 1990).

Fralick e Kronberg (1997) sugerem que métodos de avaliação de imobilidade de elementos químicos podem auxiliar na determinação da proveniência de um sedimento. Estes métodos partem do princípio que elementos imóveis terão sua concentração aumentada ou diminuída à medida que elementos móveis são perdidos ou adquiridos pela rocha durante intemperismo, seleção, diagênese, metamorfismo e alterações hidrotermais. Os elementos imóveis que são concentrados em minerais selecionados por seu comportamento hidrodinâmico podem ser utilizados em razões que indicam a assinatura geoquímica da(s) área(s)-fonte, pois estes são transportados quantitativamente para o sedimento (McLennan et al., 1990). Além disso, o comportamento hidrodinâmico do elemento pode indicar se este se concentra nas porções arenosas ou argilosas do depósito sedimentar, diferenciando amostras depositadas em porções distantes ou próximas da área-fonte da bacia.

CAPÍTULO IV

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Cráton São Francisco, de idade no Arqueano-Paleoproterozóico, é circundado ao sul por um sistema de *nappes* com distintos campos de gradientes metamórficos e delimitados por contatos rúpteis de empurrão ou por rampas laterais, relacionado à colisão continental entre as placas São Francisco e Paranapanema, ocorrida durante o Neoproterozóico (Campos Neto, 2000).

Trouw et al. (1994) separaram este sistema de *nappes* em dois domínios, sendo um interpretado como uma continuidade meridional da Faixa Brasília, provavelmente resultante de uma colisão continental E-W, e outro interpretado como uma área de interferência das Faixas Brasília e Ribeira, resultante da superimposição de uma nova compressão com movimento de topo para NNW, seguida por transpressão destrai relacionada a Faixa Ribeira.

Ribeiro et al. (1995) identificaram três domínios pré-cambrianos principais para este sistema:

(i) *Domínio I (Autóctone)*: transição do Cráton São Francisco para a porção autóctone da zona orogênica. A deformação aumenta de norte para o interior da zona orogênica, localizada a sul;

(ii) *Domínio II (Alóctone)*: sucessão de *nappes* e escamas empurradas, apresentando transporte tectônico para ENE. As superfícies marcadas como falhas de empurrão foram definidas a partir da observação de truncamentos ou repetição de unidades estratigráficas, pela presença de lentes do embasamento entre os metassedimentos e pulos metamórficos. Redobramentos, clivagens de crenulação e lineações dobradas permitiram a caracterização de duas fases de deformação, relacionadas à tectônica da Faixa Móvel Brasília;

(iii) *Domínio III (Alóctone)*: zona de interferência mais intensa entre as faixas Brasília e Ribeira. Neste mesmo trabalho os autores caracterizam três eventos termo-tectônicos principais: (I) Transporte tectônico para E (600Ma), resultando em um conjunto de *nappes* e escamas tectônicas, com metamorfismo associado de pressão elevada (fácies granulito e rochas eclogíticas) correspondendo à colisão entre o Maciço Guaxupé e o proto-Cráton São Francisco; (II) Encurtamento crustal com transporte para NNW (570Ma), acompanhado de

dobramento em escala regional e associado a um metamorfismo de pressão mais baixa com sillimanita, cordierita e corpos graníticos anatócticos; (III) Nova pressão E-W que gerou zonas de cisalhamento transpressionais subverticais, de orientação NE-SW com movimento destral. Os dois últimos episódios foram, por esses autores, relacionados à Faixa Móvel Ribeira.

Trouw et al. (2000) interpretam a área como uma megassequência deposicional e a nomeiam Megassequência Andrelândia, dividindo-a em 6 (seis) unidades distribuídas em 2 (duas) sequências deposicionais distintas (**figura IV.1**).

Figura IV.1: Mapa geológico regional com ênfase na Megassequência Andrelândia (Trouw et al., 2000, extraído de Paciullo et al., 2002).

Por outro lado, Campos Neto et al. (2004) apresenta a região como Orógeno Tocantins Meridional (Orógeno Brasília Meridional – Campos Neto et al., 2007), interpretando as *nappes* como estruturas dúcteis sin-metamórficas, com removimentação rúptil pós-metamórfica e deslocamento mínimo de 300 km. Dividiram o sistema orogênico, dos

domínios internos (S-SW) aos externos (E-NE), em: *Nappe* Socorro-Guaxupé, Sistema de *Nappes* Andrelândia, Sistema de *Nappes* Carrancas e *Nappe* Lima Duarte (**figura IV.2**).

Figura IV.2: Mapa Tectônico do Orógeno Brasília Meridional (Campos Neto et al., 2011). **tpvn:** *Nappe* Três Pontas-Varginha; **pan:** *Nappe* Pouso Alto; **ak:** *Klippe* Aiuruoca; **ck:** *Klippe* Carvalhos; **snk:** *Klippe* Serra da Natureza.

IV.1. Unidades Mapeadas

Desde Ebert (1956, *apud* Trouw et al., 1980) trabalhos de mapeamento geológico na região de Luminárias, Carrancas, Itumirim e Andrelândia, sudeste de Minas Gerais, vêm sendo efetuados, principalmente durante a década de 80 e nos anos 2000.

Apesar de todos estes trabalhos apresentarem similaridades quanto ao embasamento e quanto às características geológicas de campo, têm diferenças marcantes nas interpretações estratigráficas e tectônicas, principalmente quanto ao posicionamento do biotita xisto encontrado na base da Serra de Carrancas e na região de Luminárias (Formação Tiradentes e parte da Formação Carandaí de Ebert, 1956, *apud* Trouw et al., 1980; Unidade Biotita Xisto

de Trouw et al., 1980; Fácies Sedimentar Autóctone do Grupo Carrancas de Ribeiro & Heilbron, 1982; Unidade E do Grupo São João Del Rei de Trouw et al., 1983; base do Grupo Andrelândia em Trouw et al., 1986; Unidade A5 de Paciullo et al., 2000; e Unidade Na5 de Paciullo et al., 2002).

Os resultados dos principais trabalhos de mapeamento estão exemplificados nas **Tabelas IV.1 a IV.9 (Anexo I)**.

IV.2. Metamorfismo

Campos Neto et al. (2004) considera as *nappes* estruturas dúcteis sin-metamórficas que sofreram removimentação rúptil pós-metamórfica. O padrão metamórfico regional é invertido (Teixeira, 2008; Motta, 2009), mas o sistema caracteriza-se por alóctonos com distintos campos de gradientes metamórficos, delimitados por contatos rúpteis de empurrão ou pelas rampas laterais (Campos Neto et al., 2007).

O grau metamórfico aumenta de norte para sul, da fácies xisto verde, na borda cratônica, até a anatexia, nas porções centrais da faixa móvel (Trouw et al., 1983 e 2000).

Paciullo et al. (2002) considera dois eventos metamórficos (descritos por Heilbron, 1984 e 1985), e os relaciona com a Faixa Brasília (M_{BR}) e com a Faixa Ribeira (M_R). Segundo os autores, a característica marcante do M_{BR} é a inversão metamórfica, com *nappes* em fácies granulito (Trouw et al., 1998) imbricadas sobre *nappes* em fácies anfibolito e xisto verde, além da presença de cianita e ausência de granitos. O M_R caracterizaria-se pelo aparecimento de sillimanita, ausência de cianita e abundantes leucogranitos. Duas isógradas foram identificadas: entrada de sillimanita na porção central da faixa orogênica e a isógrada de saída da cianita (Trouw et al., 1983 e 2000b).

No entanto, para Campos Neto e Caby (1999, 2000), Santos et al. (2004), Campos Neto et al. (2004, 2010) e Motta (2009) a entrada na zona da sillimanita representa trajetórias de descompressão na evolução das *nappes*, dentro de uma única evolução orogênica.

Sistema de *Nappes* Andrelândia (Campos Neto et al., 2007)

O Sistema de *nappes* Andrelândia foi interpretado por Campos Neto et al. (2004) como um domínio continental subductado, evidenciado pelas *nappes* de alta pressão, estiradas e transportadas para ENE e NE.

Nappe Pouso Alto e Klippen Aiuruoca, Carvalhos e Serra da Natureza

Rochas de alta temperatura e pressão que ocorrem nas *nappes* superiores do sistema. Consistem em rochas metapelíticas de fácies granulito, com bandamento composicional herdado de estratificação sedimentar e delineado por distintas proporções entre cianita e granada e entre plagioclásio e feldspato potássico. São correlacionáveis a *Nappe Três Pontas-Varginha* (Campos Neto e Caby, 2000) e atingiram pico metamórfico a temperatura de 900 °C e pressão de 15 kbar (Trouw et al., 1998; 2000 a, b). Condições de temperatura entre 850 e 900 °C para pressão de 12 kbar foram obtidas para o pico metamórfico dos granulitos da *Klippe Carvalhos* (Campos Neto et al., 2010).

Nappe Liberdade (Trouw et al., 2000 a)

Seqüência metapelítica, com metapsamitos e gnaisses calciossilicáticos subordinados, metamorfisados em fácies anfibolito de alta pressão e contendo lascas de rochas metabásicas retro-eclogíticas, associadas à metaultramáficas. Migmatitos diatexíticos sin-cinemáticos estão presentes na retaguarda da *nappe* (Migmatitos Alagoa), e são cortados por plútons de muscovita-biotita granitos tardi-cinemáticos e por corpos tabulares de (granada)-turmalina-muscovita leucogranitos tardi a pós-cinemáticos (Campos Neto *et al.*, 2004 e 2007).

Santos et al. (2004) calcularam condições metamórficas em torno de 770° C e 11 kbar para rochas metapelíticas, enquanto que as rochas metabásicas retroeclogíticas atingiram condições báricas de 17 kbar para temperaturas de 680°C (Campos Neto e Caby, 1999; Trouw et al., 2000 a, b).

Nappe Andrelândia (Trouw et al., 2000 a)

A *Nappe Andrelândia* possui um padrão metamórfico invertido, caracterizado por condições de fusão parcial e geração de leucossoma trondjemítico, no topo da estrutura, onde localmente ocorre feldspato potássico. Na base da *nappe* as rochas metapelíticas encontram-se na zona da estauroлита (Teixeira, 2008; Motta, 2009).

Cálculos de temperatura e pressão em metapelitos indicam condições de 660 °C e 11 kbar, com descompressão isotérmica passando por condições de 650 °C e 7,5 kbar e resfriamento isobárico posterior (Santos et al., 2004). Condições semelhante foram obtidas por (Motta, 2009).

Sistema de *Nappes* Carrancas (Campos Neto et al., 2004) - Grupo Carrancas (Trouw et al., 1980)

Heilbron (1984 e 1985) considera duas gerações de paragêneses metamórficas, sendo a primeira a principal com características de pressão intermediária, e progressão de fácies xisto verde a anfibolito, produzindo paragêneses retrógradas no embasamento. A segunda geração tem características de fácies xisto verde e tem caráter tardio em relação às fases de deformação que atuaram na área.

Ainda neste trabalho, a autora identificou que a progressão do metamorfismo principal se dá desde fácies xisto verde até anfibolito médio, com paragêneses específicas da fácies xisto verde médio, da fácies xisto verde superior, da transição fácies xisto verde fácies anfibolito e da fácies anfibolito (**tabela IV.10**). Três isógradas foram traçadas: aparecimento de almandina, aparecimento de estauroлита e cianita nos xistos grafitosos, e o desaparecimento de cloritóide primário.

Quanto à segunda geração de paragêneses, a autora reconhece como resultante de um metamorfismo tardi-D₃, sendo caracterizada por grandes porfiroblastos e agregados de cloritóide nos xistos (substitui cristais de almandina), pelo crescimento de placas de cristais de muscovita discordantes da estrutura geral observada nas lâminas delgadas e pelo aparecimento de porfiroblastos e/ou agregados de clorita sobre a xistosidade principal.

Silva (2010) obteve padrões metamórficos para os metapelitos da *Klippe* Carrancas (Trouw et al., 2000) com pico metamórfico progressivo de $10,0 \pm 1,7$ kbar e 577 ± 8 °C para a associação mineral estauroлита-granada-clorita-cloritóide-muscovita-quartzo e de $12,9 \pm 1,0$ kbar e $608,5 \pm 19,5$ °C para a associação mineral cianita-estauroлита-granada-quartzo, com paragênese retrometamórfica estabilizada em $7,0 \pm 2,2$ kbar e $541,5 \pm 25,5$ °C.

IV.3. Análise Estrutural

Trouw et al. (2000) divide a Megassequência Andrelândia (Paciullo et al., 2002) nos domínios autóctone e alóctone que na área de estudo desta monografia são representados por (**figura IV.3**):

- Domínio Autóctone: embasamento e sequências A1 a A5 da bacia Andrelândia;
- Domínio Alóctone: *nappes* Luminárias (unidades A1 a A5) e São Tomé (unidades A1 a A5) e *Klippe* Carrancas (unidades A3 e A4).

FÁCIES	PARAGÊNESE
Xisto Verde Médio	<p>Metapelitos dos grupos Carrancas e São João del Rei: mica branca + quartzo + grafita + cloritóide ± clorita ± opacos ± turmalina; mica branca + quartzo + grafita + clorita ± opacos ± turmalina; mica branca + quartzo + grafita ± opacos ± turmalina.</p> <p>Biotita xisto do Grupo São João del Rei: mica branca + Bt ± Chl ± Qtz ± Pl ± opacos ± almandina ± carbono.</p> <p>Quartzitos de Itutinga: mica branca + Qtz + opacos + turmalina ± Ky.</p>
TRANSIÇÃO: ISÓGRADA DA GRANADA ALMANDINA	
Xisto Verde Superior	<p>Grupo São João del Rei: mica branca + Qtz + grafita + clorita + granada ± opacos ± turmalina.</p> <p>Formação Campestre: mica branca + Qtz + grafita + Cld + Grt + opacos ± turmalina.</p> <p>Biotita Xisto: mica branca + Qtz + Bt + Grt ± Chl ± opacos ± turmalina.</p>
Transição Xisto Verde - Anfibolito	<p>Marcada pela coexistência de cloritóide primário e estaurolita.</p> <p>Paragênese típica: mica branca + Qtz + grafita + Cld + Grt + St ± Ky ± opacos ± turmalina.</p>
TRANSIÇÃO: DESAPARECIMENTO DO CLORITÓIDE PRIMÁRIO	
Anfibolito	Xistos grafitosos da Formação Campestre: granada + estaurolita

Tabela IV.10: principais paragêneses metamórficas dos grupos Carrancas e São João del Rei, segundo Heilbron (1985). Litotipos segundo Trouw et al., 1983

De maneira geral, foram estabelecidos três fases deformacionais (D_1 , D_2 e D_3), cada uma responsável por um grupo de estruturas que se superpõe, respectivamente, e que integram um só ciclo orogênético (Trouw et al., 1980, 1982 e 1983; Paciullo, 1983):

D_1 : esta fase foi definida pela observação de algumas feições, como: foliação S_2 em muitos lugares é uma foliação de crenulação; nos quartzitos as dobras D_2 deformam

uma clivagem anterior; escamas e/ou *nappes* de metassedimentos, empilhados e separados por embasamento quando se desdobram as dobras D_2 e D_3 (empurrões de placas relativamente rígidas de metassedimentos pré- D_2). Esta fase foi responsável por uma clivagem regional, poucas dobras e grandes movimentos de empurrão que causaram uma distribuição regional dos metassedimentos em escamas e *nappes* (Trouw et al., 1983).

D₂: Fase responsável pela formação de uma clivagem e/ou xistosidade penetrativa (S_2) geralmente acompanhada por uma lineação mineral (L_2), além de dobras. Dentro do plano S_2 , e paralelo aos eixos de dobras D_3 , ocorre uma lineação mineral, L_2 , definida por conjuntos de cristais de quartzo orientados. Minerais metamórficos, como cianita ou muscovita, podem, quando são alongados, também contribuir a formação de L_2 .

Figura IV.3: Mapa estrutural da zona de interferência das Faixas Brasília e Ribeira, extraído de Trouw et al. (2000 b), que mostra os domínios autóctone e alóctone .

D₃: São dobras desde muito suaves até quase isoclinais. Em grande parte da área as dobras tem uma assimetria notável, resultando na frequência da forma Z no mapa. Clivagem de crenulação S_3 , além de lineação de crenulação L_3 bem marcantes localmente (Trouw et al.,

1983; Paciullo, 1983). Uma zona de falha com direção SW-NE, que atravessa grande parte da região, é subparalela a S_3 , e associada a zonas de dobramento intenso. Por esta razão e por evidências microtectônicas, a falha foi interpretada como sendo gerada durante esta fase (Trouw et al., 1983).

Paciullo et al. (2002) consideram a *Klippe* Carvalhos e a *Klippe* Carrancas, e as *nappes* Liberdade e Andrelândia estruturas regionais da Faixa Brasília. A *Nappe* que contém os Gnaisses Piedade, a deflexão para norte da *Nappe* Liberdade e a antiformal de Bom Jardim de Minas seriam estruturas regionais da Faixa Ribeira para os mesmos autores.

IV.4. Relação entre deformação e metamorfismo

A primeira fase de deformação D_1 é marcada pelo início do metamorfismo com crescimento ou recristalização dos primeiros minerais metamórficos a temperatura e pressão de fácies xisto verde. Clorita, mica branca, biotita, opacos, cloritóide cresceram e se orientaram segundo a clivagem ardosiana S_1 . Alguns destes minerais podem ter origem detrítica, e posteriormente cresceram e/ou recristalizaram durante D_1 (Heilbron 1985).

Posteriormente, pressão e temperatura começam a aumentar entre D_1 e D_2 com início de geração de granada e estauroлита. Pico metamórfico foi atingido durante D_2 com crescimento de granada, cianita, estauroлита e ($\pm$) sillimanita. Nos xistos e filitos houve a geração da foliação S_2 que transpôs (parcial ou totalmente) a clivagem ardosiana S_1 , que foi amoldada aos porfiroblastos de granada, estauroлита e cianita, indicando que o crescimento destes minerais foi interrompido antes do término da deformação D_2 (Heilbron, 1985).

A falta de cristais intercinemáticos indica que provavelmente não houve intervalo de tempo entre D_1 e D_2 e que estas seriam duas subfases de uma fase maior, também responsável pelos empurrões (Trouw et al., 1980). O campo de tensões alterado durante as deformações D_1 e D_2 é reequilibrado pela intensa recristalização de quartzo e micas após D_2 , ainda sob alta temperatura (Heilbron, 1985).

Ao fim da deformação D_3 começa a cristalização de uma nova geração de clorita, cloritóide e muscovita que truncam estruturas dessa fase. Depois de D_3 , a recristalização foi insipiente e os efeitos da deformação ficaram preservados nos minerais através de extinção ondulante, bandas e lamelas de deformação (Heilbron, 1985).

A diminuição de temperatura na fase de deformação D_3 é interpretada tanto como resultante do retrometamorfismo da trajetória metamórfica de pico em fácies anfibolito em D_2

(Trouw et al., 1983) quanto como um segundo evento metamórfico de pico em fácies xisto verde separado no tempo daquele com pico metamórfico em D₂ (Heilbron, 1985).

IV. 5. Geocronologia

Sistema de *Nappes* Andrelândia

A idade do metamorfismo foi investigada através de análises U-Pb TIMS em cristais de monazita nas rochas do sistema de *nappes* (Campos Neto et al., 2007, 2010 e 2011). Na *nappe* Andrelândia foram obtidos valores entre 606 ± 2 Ma (rochas em presença de cianita e sillimanita) e 611 ± 2 Ma (em presença de cianita). Para a *nappe* Liberdade as idades ficaram ao redor de 611 ± 18 Ma e 616 Ma. Cianita granulitos da *Klippe* Carvalhos possuem as idades mais antigas, $617,7 \pm 1,3$ Ma. Indicam uma propagação normal do sistema de *nappes*, com as *nappes* inferiores mais jovens que as superiores. A idade de leucogranitos não deformados, intrusivos no Migmatito Alagoa, interior da *Nappe* Liberdade, pós-data em 596 ± 5 Ma o transporte sin-metamórfico deste sistema.

Cristais de zircão detrítico do Xisto Santo Antônio forneceram idade U-Pb TIMS neoproterozóica, de 668 ± 28 Ma (Campos Neto et al., 2004). Indica uma área fonte exótica ao Cráton do São Francisco e a idade máxima para a sedimentação desta unidade. Metabasalto toleítico retro-eclogítico da *Nappe* Liberdade possui idade magmática semelhante à dos grãos detríticos de zircão do Xisto Antônio, ou seja, U-Pb SHRIMP de 669 ± 25 Ma (Campos Neto et al., 2011).

Rochas arqueanas ocorrem no extremo sudoeste do sistema de *nappes*. São metatexitos tonalito-trondjemíticos, com restos de sequência máfico-ultramáficas, que definem o Complexo Migmatítico Amparo de 2,85 Ga. Tonalito gnaisses, em parte metatexíticos do Complexo Serra Negra, aparentemente são intrusivos e possuem 2,77 Ga. Ambos foram submetidos a um metamorfismo fácies anfibolito superior com anatexia há 2,04 Ga (Tassinari e Nutman, 2001; Fetter et al., 2001). Migmatitos polimetamórficos, com protolitos em uma suíte plutônica cálcio-alcalina tonalito-granodiorito-granítica, ocorrem no interior e na base da *Nappe* Liberdade. São rochas riacianas (idades U-Pb TIMS em zircão entre 2,05 Ga - 2,15 Ga) em parte com assinaturas Nd juvenis (Fetter et al., 2001; Peternel et al., 2005; Campos Neto et al., 2004 e 2011).

Sistema de *Nappes* Carrancas

Valladares et al. (2004) analisaram grãos detríticos de zircão, por LA-ICPMS, de quartzitos da Formação Campestre nos domínios tidos como alóctone e autóctone. Obtiveram idades $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ entre 1,0 Ga e 3,1 Ga, com predomínio de idades entre 1200 Ma - 1300 Ma e 2100 Ma – 2200 Ma. A idade máxima indicada para a sedimentação foi de 1,05 Ga.

O metamorfismo registrado pela monazita (U-Pb TIMS) na frente do sistema de *nappes* Carrancas encontra-se entre 590 Ma e 575 Ma (Valeriano et al., 2004; Campos Neto et al., 2011).

IV.6. Paleoambiente deposicional

Será considerado neste item o trabalho de Paciullo et al. (2002), pois este faz considerações sobre o possível ambiente deposicional das unidades da região (**tabela IV.11**).

	UNIDADE	AMBIENTE DEPOSICIONAL
SEQUÊNCIA SERRA DO TURVO	Na ₆	Pelas associações de litofácies – rochas pelíticas e semi-pelíticas com intercalações de rochas máficas, calciossilicáticas, e chert, esta unidade é interpretada como sucessão distal da megassequência Andrelândia depositada sobre assoalho oceânico, provavelmente constituída por depósitos turbidíticos e hemipelágicos de fundo marinho.
	Na ₅	Interpretada regionalmente como uma sucessão constituída, na base, por turbiditos pelíticos (domínios alóctones), localmente com seixos pingados e, no topo, por pelitos hemipelágicos transgressivos (domínio autóctone). Representariam assim, sedimentação em períodos de mar baixo e mar alto, relacionado a variações glacio-eustáticas.
SEQUÊNCIA CARRANCAS	Na ₄	São interpretadas como parassequências retrogradacionais depositadas em trato de sistema de mar alto. Representam um período de inundação máxima da bacia, com pelitos ultrapassando o limite sul da bacia original e recobrando a unidade Na ₁₊₂ , embasamento e pelitos da Megassequência Carandaí nas folhas Lavras e São João Del Rei.

Tabela IV.11: paleoambientes possíveis para unidades da Megassequência Andrelândia, segundo Paciullo et al. (2002).

	UNIDADE	AMBIENTE DEPOSICIONAL
SEQUÊNCIA CARRANCAS	Na ₃	Trata-se de quartzito metarenitos com intercalações delgadas de metapelitos e raros metaconglomerados, interpretados como parassequências agradacionais plataformais (<i>shoreface</i>) depositadas em trato de sistema transgressivo. Os quartzitos incluem lentes delgadas e lâminas de xistos com muscovita esverdeada que ocorrem separando camadas de quartzitos, representando superfícies de inundação ou recobrimento pelítico em estratos cruzados. Nas sucessões quartzíticas da <i>Klippe</i> Carrancas predomina a estratificação média a espessa com poucas intercalações pelíticas, enquanto nas <i>nappes</i> Luminárias e São Tomé das Letras, predomina a estratificação média a delgada com maior quantidade de intercalações pelíticas. Essas variações faciológicas são interpretadas como devido à diferentes posições desses depósitos na bacia sedimentar original. Por outro lado, para Trouw et al. (2002) as frequentes intercalações de lâminas micáceas parecem registrar breves períodos de detenção de correntes e decantação de finos, sugerindo ambiente dominado por marés.
	Na ₂	Todo o conjunto é interpretado como parassequências retrogradacionais de trato de sistema transgressivo. Os quartzitos e xistos representam a franca entrada do mar na bacia (retrogradação), culminando na deposição das unidades seguinte Na ₃ e Na ₄ ,
	Na ₁	Os paragneisses são interpretados como intercalações de arenitos feldspáticos e pelitos. Essa associação é interpretada como possivelmente depositada em ambientes parálicos (planície costeira?) e como depósitos turbidíticos, em período de trato de sistema de mar baixo, nos primórdios do preenchimento da bacia sedimentar. Os anfibolitos representam atividade ígnea máfica contemporâneos: basaltos subalcalinos toleíticos, de composições químicas semelhantes aos basaltos continentais e de fundo oceânico tipo MORB enriquecido (Paciullo 1997).

Continuação tabela IV.11: paleoambientes possíveis para unidades da Megassequência Andrelândia, segundo Paciullo et al. (2002).

CAPÍTULO V

LITOTIPOS AMOSTRADOS

As unidades geológicas do Grupo Carrancas na região, como descritas por Trouw et al (1980), admitem, simplificadaamente, uma sequência quartzítica basal, com intercalações subordinadas de muscovita-quartzo xisto e de grafita-muscovita xisto (Formação São Tomé das Letras), sobreposta por uma sequência de grafita-muscovita xisto com alternâncias subordinadas de quartzitos (Formação Campestre). As rochas pelíticas registram um aumento das condições metamórficas de norte para sul, a partir de paragêneses fácies xisto verde (Mg clorita-muscovita-cloritóide) e de fácies xisto-verde de alta pressão (muscovita-cloritóide-cianita-granada). A entrada no campo da estauroлита (fácies anfibolito inferior) é gradual, com coexistência de cloritóide-estauroлита, seguida por paragêneses a estauroлита-muscovita-Mg clorita-cianita-granada. As condições de maior temperatura foram atingidas na Chapada das Perdizes, sul da Serra das Bicas, registradas pela paragênese granada-cianita-biotita, estauroлита ausente. A sillimanita é rara, intersticial e associada à trajetória de descompressão no soerguimento da pilha de nappes (Silva, 2010).

A unidade Biotita Xisto, preservada entre e as serras do Grupo Carrancas, não atingiu condições metamórficas de fácies anfibolito. Apresenta paragênese de granada-muscovita-Mg clorita-(biotita-plagioclásio) e de granada-muscovita-biotita-(Mg-clorita-plagioclásio), sugerindo um aumento de temperatura, sob condições xisto verde, também de norte para sul.

O pico metamórfico foi atingido durante a fase D₂ da deformação, evidenciado por cristais de granada e estauroлита sin- tardi-cinemáticos. A temperatura continuou elevada em estágios pós-cinemáticos, evidenciada por cristais idiomórficos e pós-foliação de granada e de estauroлита em rochas de fácies anfibolito e de cloritóide em rochas de fácies xisto-verde. A diminuição de temperatura e pressão, e conseqüente retrometamorfismo, ocorrem pós-S₂, pré a sin-S₃ (clivagem de crenulação). O retrometamorfismo é marcado pela substituição de estauroлита e granada por cloritóide nos xistos grafitosos, e pela substituição de granada por clorita na unidade Biotita Xisto. Em algumas amostras, identificou-se foliação S₃ associada ao retrometamorfismo, marcada pela cristalização de muscovita, clorita ou cloritóide retrometamórfico.

Essas rochas, tidas em um domínio autóctone em relação ao Cráton do São Francisco, foram amostradas entre as Formações São Tomé das Letras e Campestre (**figura V.1 – Anexo II**), alóctones e tidas na *Klippe* Carrancas (Trouw et al., 2000 a, b).

V.1. Unidade Biotita Xisto (UBX) – Pranchas de fotos I, II, III e IV (Anexo III)

Aflora geralmente na forma de lajes extensas, podendo ocorrer em drenagens e como blocos rolados (**Figura V.2**). A rocha que representa esta unidade apresenta coloração acinzentada, estrutura xistosa e textura que varia entre granolepidoblástica, lepidogranoblástica e porfiroblástica. A mineralogia principal é composta por biotita, muscovita, plagioclásio e quartzo, os dois últimos em proporções variadas. Clorita ocorre determinando a foliação da rocha na região próxima a Serra do Pombeiro e porfiroblastos de granada são observados frequentemente nos afloramentos próximos a Serra das Bicas.

Intensamente crenulados e dobrados, os afloramentos apresentam vênulas de quartzo, que acompanham o padrão de deformação da rocha, na forma de sigmóides, *mullions* e lentes dobradas e descontínuas.

Os afloramentos alterados são de coloração avermelhada e identificados pelos porfiroblasto de granada e lentes descontínuas de quartzo que resistem a processos intempéricos.

Petrografia

Rocha de granulação fina a média e estrutura xistosa, alterna porções de textura lepidoblástica com porções granoblásticas. Composta principalmente por biotita, muscovita e quartzo, pode apresentar concentrações variadas de opacos, clorita, granada e plagioclásio, com algumas amostras apresentando carbonato (CAR-I-51) e turmalina como minerais acessórios.

Os porfiroblastos de granada, quando intercinemáticos (Passchier e Trouw, 1996; Vernon, 2004) registram uma fase deformacional anterior a foliação principal (S_2) e um zonação textural (núcleo com inclusões orientadas e obliquas à foliação externa principal e borda límpida e idiomórfica. Microporfiroblastos idiomórficos e límpidos são comuns. As porções granoblásticas são formadas principalmente por quartzo e, subordinadamente, plagioclásio (CAR-I-51, CAR-IV-06, CAR-IV-06a, CAR-IV-06ba, CAR-IV-42, C-300, C-309b, C-325b). O quartzo ocorre em cristais poligonizados e sem extinção ondulante, recristalizados dinamicamente por redução de borda de grãos até estágios pós-cinemáticos –

recristalização estática. Estágios iniciais deste processo, registrados em cristais amebóides e com extinção ondulante e extinção em zona de plagioclásio também são comuns. O plagioclásio, quando ocorre, é sericitizado e de granulação mais grossa do que o quartzo, podendo ocorrer como porfiroblastos deformados (C-410, C-410a e C-411).

Figura V.2: afloramentos da Unidade Biotita Xisto e das formações Campestre e São Tomé das Letras.

As porções lepidoblásticas são formadas por muscovita e biotita, com clorita subordinada, substituindo granada e biotita (na região a leste da serra das Bicas) e por muscovita e clorita, com biotita subordinada, substituindo a clorita da foliação (na região a sul das serras do Pombeiro e Estância). Essa variação, aliada aos porfiroblastos de granada em presença de biotita, deve estar controlada pelo aumento de temperatura (e pressão) dentro das condições metamórficas de fácies xisto verde. Portanto, as rochas variam de granada-clorita-biotita-muscovita-(plagioclásio)-quartzo xisto, a norte (sul das serras da Estância e Pombeiro), até granada-muscovita-biotita-(plagioclásio)-quartzo xisto, a leste da serra das Bicas.

As rochas desta unidade são intensamente deformadas o que pode ser visto por dobras, *microlithons*, muscovita *fish* e sigmóides de foliação. A foliação principal é uma S_2 , definida por arcos poligonais de biotita e muscovita e por dobras intrafoliais. A foliação S_2 encontra-se crenulada em algumas amostras e dobrada em outras, podendo gerar ou não uma foliação S_3 marcada pelas micas.

Veios de quartzo descontínuos, característicos desta unidade, são fortemente recristalizados, dobrados, na forma de sigmóides e muitas vezes orientados segundo S_3 .

V.2. Formação Campestre (FC) - Pranchas de fotos I, V, VI e VII (Anexo III)

Caracterizada pela alternância entre quartzito com muscovita, muscovita quartzito e grafita-muscovita xisto (**figura V.2**).

V.2.1. Grafita-muscovita xisto

Esta rocha apresenta estrutura xistosa e textura que varia entre lepidoblástica e porfiroblástica. A mineralogia principal é composta por muscovita e grafita, com presença de estauroлита, granada e cianita ao sul da área estudada e cloritóide e Mg clorita ao norte. Quartzo, com exceção de níveis delgados de muscovita xistos, localmente com cianita, está sempre presente na matriz, em concentrações variadas. Pares S/C crenulados e injeções de material quartzo-feldspático dobrado com a foliação foram observados em campo.

Petrografia

Rochas de estrutura xistosa e granulação fina, com textura que varia de nematolepidoblástica, lepidoblástica e porfiroblástica, podendo apresentar amostras nematoblásticas, com lentes descontínuas granoblásticas.

A mineralogia é variada e define lentes de diferentes composições dentro da unidade, mas todas têm em comum a presença de grafita e muscovita, em diferentes proporções:

(i) amostra C-318: formada por muscovita, estaurolita e grafita com matriz rica em quartzo de granulação fina e intensamente recristalizado. Lentes descontínuas de quartzo são comuns e os cristais de estaurolita são tardi- a pós cinemáticos, identificados por foliação interna no núcleo compatível com a externa principal (S_2) e bordas idiomórficas sem inclusões;

(ii) amostras CAR-IX-11, C-308a, C-317, C-421 e C-426: caracterizadas pela presença de porfiroblastos de granada e estaurolita em matriz rica em quartzo e muscovita e cloritóide. Granada sin-cinemática, com foliação interna rotacionada em relação à externa principal (S_2). Estaurolita tardi- a pós-cinemática com foliação interna oblíqua a externa principal (S_2) e bordas idiomórficas e sem inclusões. Os cristais de cloritóide determinam a foliação principal com os cristais de muscovita, sendo que cristais cristalizados no plano axial (S_2) de microdobras resultantes da crenulação de S_2 foram observados. Na amostra C-426 os polimorfos de granada foram completamente substituídos por estaurolita e posteriormente cloritóide;

(iii) amostras CAR-I-32, CAR-II-76, CAR-II-108, CAR-IV-52b, CAR-IV-129, CAR-IV-152, C-397, C-400, C-421b: lentes granoblásticas de quartzo intercaladas com lentes nematolepidoblásticas formadas por muscovita, cloritóide e grafita. Polimorfos de granadas substituídos por cloritóide e muscovita foram observados, algumas vezes associados a estaurolita. Cloritóides *fish* foram identificados na amostra CAR-II-108 e clorita substitui cristais de granada na amostra C-421b;

(iv) amostras CAR-V-17, C-375, C-376 e C-399c: intercalação de lentes granoblásticas de quartzo e lepidoblásticas formadas por muscovita e grafita. Possíveis polimorfos de granada observados;

(v) amostras C-344 e C-381b: rocha formada essencialmente por muscovita, grafita e estaurolita, idiomórfica e pós-cinemática. Muscovita define a foliação S_2 principal e também se cristaliza em S_3 ;

(vi) amostras C-301b, C-379, C-381b e C-412: rocha formada essencialmente por muscovita e grafita com cianita (C-301b), turmalina (CAR-I-32) e opacos como minerais acessórios.

Portanto, foram encontrados desde cloritóide-grafita-muscovita xistos com granada subordinada até estaurolita-grafita-muscovita-cloritóide xistos com granada, passando por

cloritóide-grafita-muscovita xisto e granada-muscovita-grafita-cloritóide-estaurolita xisto. além de muscovita xistos com cianita.

As amostras ricas em muscovita registram as várias fases de deformação, e são intensamente crenuladas. A foliação principal é S_2 , identificada pela presença de dobras intrafoliais D_2 , *microlithons* preservados em sombras de pressão de porfiroblastos de granada e entre a foliação principal e arcos poligonais de cloritóide e muscovita com plano axial paralelo à foliação principal. A crenulação de S_2 gerou dobras abertas com plano axial oblíquo à S_2 , sendo que em algumas amostras foram observados cloritóide e muscovita definindo a foliação S_3 ,

As porções granoblásticas quando ocorrem são formadas essencialmente por quartzo, fortemente recrystalizados. Lentes quartzosas descontínuas, quando observadas, são afetadas pela fase de deformação D_2 e pela crenulação D_3 ,

V.2.2. Quartzito

O quartzito é formado essencialmente por quartzo e muscovita, tem estrutura foliada e textura granolepidoblástica. Assim como o xisto, encontra-se fortemente deformado, o que pode ser observado por dobras intrafoliais e pela crenulação.

Petrografia

Rocha de granulação fina a média, de textura granoblástica a lepidogranoblástica, de estrutura maciça a levemente foliada, formada essencialmente por quartzo e muscovita com opacos como minerais acessórios principais. As amostras variam de quartzito com muscovita até muscovita quartzitos.

Os cristais de quartzo não estão orientados segundo uma direção preferencial, têm extinção ondulante e contatos amebóides, sugerindo estágios iniciais de recrystalização em estado sólido. A muscovita ocorre em lentes, com cristais orientados e sua concentração varia de < 5% a 20% da rocha.

A deformação sofrida pela rocha que afetou a foliação principal é registrada na forma de *mullions*, dobras e muscovita *fish*.

V.3. Formação São Tomé das Letras – Prancha de fotos VIII

Ocorre na forma de lentes espessas e diferencia-se do quartzito da unidade anterior por apresentar muscovita verde em escala mesoscópica, além de não apresentar alternância

recorrente com o xisto grafitoso (**figura V.2**). Os quartzitos têm estrutura que varia de maciça a xistosa e textura granoblástica a lepidogranoblástica, dependendo da quantidade de muscovita presente. Quartzo e muscovita verde são os minerais principais e turmalina é o acessório mais comum

Assim como as outras unidades, apresenta-se fortemente crenulado, com *mullions* e veios de quartzo afetados pela deformação.

Petrografia

As rochas desta formação variam de muscovita quartzitos a muscovita xistos e são caracterizadas pela presença de muscovita verde e turmalina.

O muscovita xisto caracteriza-se pela presença de *mullions* e arcos poligonais de muscovita entre a foliação principal evidenciando foliação S_1 anterior à S_2 principal, características observadas nas outras amostras analisadas. A foliação S_3 é observada na forma de cristais de muscovita orientados obliquamente à foliação principal.

Os cristais de quartzo são intensamente recristalizados, com contatos poligonais predominantes sobre os contatos lobados.

As rochas desta formação, quando ricas em quartzo, se diferem do quartzito da Formação Campestre pela presença de turmalina e pela coloração esverdeada da muscovita.

CAPÍTULO VI

GEOQUÍMICA ELEMENTAL

As amostras da Unidade Biotita Xisto (UBX) analisadas foram agrupadas segundo a estrutura em que foram coletadas (**Anexo I e tabela VI.1**), para que possíveis diferenças geoquímicas pudessem ser identificadas. As amostras coletadas a leste da Serra das Bicas, sob o cavalgamento das unidades do Grupo Carrancas, estão agrupadas na denominação UBX – SB. As amostras coletadas a sul da Serra Pombeiro, em uma estrutura sinformal alóctone sobre o Grupo Carrancas, em UBX – SP.

		Amostra
Unidade Biotita Xisto (UBX)	A nordeste da Serra das Bicas (UBX – SB)	C-325c
		C-333
		C-337
		C-340
		C-341
		CM-III-25
	Entre as Serras do Pombeiro (UBX – SP)	C-410
		C-411
		C-430
		C-431
		CAR-I-51

Tabela VI.1: simbologia das amostras e a divisão adotada segundo a localização geográfica em relação às serras das Bicas e do Pombeiro e a estrutura regional.

As diferenças químicas são poucas entre esses grupos de amostras, confirmando a correlação de campo e petrográfica dessas rochas (expressas e mapeadas por Quéméneur et al., 2002). No entanto, quando analisadas no seu conteúdo isotópico e em elementos traços, destacam-se diferenças na natureza da área-fonte e no clima, intemperismo e reciclagem do sedimento, quando dos processos de erosão, transporte e sedimentação.

VI.1. Elementos maiores e menores

As amostras analisadas apresentam valores aproximados com teores intermediários de SiO_2 (58,25 - 68,09) valores de CaO e Na_2O baixos (0,22 - 1,49 e 1,79 - 2,92) e valores de Al_2O_3 , Fe_2O_3 , K_2O e MgO entre 14,63 – 19,69, 5,65 - 7,92, 2,9 - 4,69 e 2,32 - 3,48, respectivamente (**tabela VI.2**).

As concentrações de Al_2O_3 , Fe_2O_3 , K_2O e MgO são maiores quanto maior a proporção de minerais micáceos em relação ao quartzo, determinada em análises petrográficas, indicando que estes elementos estão condicionados à presença de muscovita $[\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2]$, biotita $[\text{K}(\text{Mg,Fe})_3(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2]$ e clorita $[(\text{Mg,Fe})_3(\text{Si,Al})_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2(\text{Mg,Fe})_3(\text{OH})_6]$, minerais estes formados a partir do metamorfismo de argilominerais. A presença de plagioclásio rico em albita e carbonato na amostra CAR-I-51 é responsável pelo relativo alto teor de Na_2O e CaO nesta amostra. A concentração de Na_2O também é alta na amostra C-410 que apresentou cristais de plagioclásio de granulação grossa em lâmina petrográfica. A relação diretamente proporcional entre CaO e P_2O_5 e a presença de apatita em todas as amostras analisadas petrograficamente indicam que este mineral pesado condiciona as concentrações destes elementos nas amostras.

Os elementos maiores e menores foram plotados em diagramas de Harker (**figura VI.1**) que, de um modo geral, demonstram que a correlação entre SiO_2 vs. Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO , MgO e K_2O é negativa e entre SiO_2 vs. P_2O_5 , TiO_2 , CaO e Na_2O positiva. Com exceção dos diagramas de SiO_2 vs. Al_2O_3 e Fe_2O_3 , as amostras se subdividem em dois grupos que partem de composições diferentes, provavelmente devido à diferenças composicionais do sedimento ocasionada por diferenças geoquímicas na área-fonte.

Transporte e deposição de sedimentos durante processos de erosão e intemperismo podem ter sido responsáveis pela correlação negativa entre SiO_2 e os demais elementos químicos, pois argilominerais, geralmente ricos em Al, Fe, Mg e K, tendem a se concentrar na fração silte/argila do sedimento, diferentemente de quartzo e feldspato que tendem a se

concentrar em frações arenosas, resultando na diminuição de Si e Na fração silte/argila (Taylor e McLennan, 1985).

Por outro lado, o fracionamento de minerais pesados como apatita pode ter sido responsável pela correlação positiva entre SiO_2 e os óxidos CaO e P_2O_5 , pois a alta densidade destes minerais faz com que sua deposição ocorra em frações de granulação mais grossa.

Sugere-se, assim, que as amostras enriquecidas em Al, Fe, Mg e K, sobretudo 3 amostras agrupadas no alóctone a sul da Serra do Pombeiro (C-411, C-430 e C-431), possuíam um maior conteúdo em argilo-minerais, provavelmente devido ao depósito em domínios mais distantes da área fonte, ou devido alternâncias na atividade tectônica sin-sedimentar, isto é, foram depositadas em um período tectonicamente mais estável. As amostras enriquecidas em Si, P e Ca resultam de depósitos de granulação mais grossa, mais proximais à área-fonte, ou depositadas em períodos tectonicamente mais ativos.

Amostras	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
C-325c	67,91	0,87	14,63	5,65	0,10	2,32	1,19	2,47	2,90	0,19
C-333	64,30	0,85	15,71	6,54	0,13	2,75	1,14	2,56	3,33	0,20
C-337	65,81	0,85	14,97	6,36	0,11	2,72	1,34	2,49	3,09	0,18
C-340	61,32	0,91	17,29	7,10	0,11	3,03	0,83	2,57	3,76	0,17
C-341	65,63	0,92	15,12	6,22	0,13	2,63	1,49	2,81	2,92	0,21
CM-III-25	62,60	0,80	16,61	7,17	0,10	3,02	0,42	1,88	3,88	0,12
C-410	68,09	0,86	14,14	6,04	0,09	2,51	0,64	2,78	2,69	0,18
C-411	58,25	0,92	19,69	7,92	0,10	3,45	0,22	1,79	4,61	0,14
C-430	61,31	0,93	17,70	7,55	0,13	3,48	0,87	2,33	4,00	0,16
C-431	60,19	0,93	17,81	7,73	0,13	3,26	0,80	2,07	4,69	0,16
CAR-I-51	62,83	1,03	16,46	6,68	0,17	2,76	1,90	2,92	3,20	0,22

Tabela VI.2: resultados obtidos para elementos maiores e menores por análises de FRX. Valores em % peso de óxido.

Figura VI.1: gráficos binários de dispersão de SiO_2 vs. elementos maiores e menores analisados por FRX.

VI.1.1. Classificação

No diagrama de Pettijohn et al. (1972 – **figura VI.2**), com exceção das amostras C-411, C-431 e CM-III-25 todas as rochas foram classificadas como *graywacke*. As três exceções são enriquecidas em alumínio, potássio e em Fe_2O_3 em relação às demais amostras e são rochas que possuem um maior volume de muscovita, biotita e clorita, refletindo uma maior proporção de fração argilosa rica em alumínio.

Por outro lado, no diagrama de Herron (1988), observa-se que grande parte das amostras da UBX plotam no campo composicional dos pelitos, com exceção das amostras C-325c, C-337 e C-410 que plotam no campo de *wacke* (**figura VI.3**). A razão para esta distinção também estaria relacionada com a porcentagem da fração argilosa nos sedimentos, pois as três amostras, mais ricas em Si, apresentam maior proporção de lentes granoblásticas, formadas essencialmente por quartzo, em relação às lentes lepidoblásticas, formadas por muscovita, biotita e clorita.

Figura VI.2: amostra da UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Pettijohn et al. (1972).

Figura VI.3: amostra da UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Herron (1988).

VI.1.2. Chemical Index of Alteration - CIA

As amostras da UBX apresentaram valores intermediários a altos do CIA, entre 58,41 e 70,26 (**tabela VI.3** e **figura VI.4**). Quanto maior esse índice, maior foi o intemperismo químico da área fonte, ou maior foi a reciclagem dos depósitos sedimentares (Nesbitt e Young, 1982). A predominância de valores intermediários de CIA sugere que os sedimentos precursores das rochas analisadas sofreram intemperismo químico de intensidade e período de tempo moderados, no caso de exposição da área-fonte contemporânea a sedimentação, ou que a área fonte já estaria submetida a um intemperismo químico moderado.

Os valores obtidos foram maiores nas rochas enriquecidas em minerais micáceos (C-411, CM-III-25) e menores nas amostras com plagioclásio como mineral constituinte (CAR-I-51, C-410), ou com maior proporção de porções granoblásticas ricas em quartzo (C-341, C-337, C-325c).

Considerando que quanto maior a proporção de fração argilosa, maior a distância relativa da amostra em relação à área-fonte, ou maior o tempo de deposição, os valores de CIA confirmam as correlações entre os elementos químicos observados nos diagramas Harker (amostras enriquecidas em Al_2O_3 apresentaram valores de CIA maiores do que as amostras enriquecidas em SiO_2).

Amostra	CIA
C-325c	60,97
C-333	61,37
C-337	60,25
C-340	63,82
C-341	59,03
CM-III-25	67,34
C-410	62,05
C-411	70,26
C-430	64,49
C-431	64,19
CAR-I-51	58,41

Tabela VI.3: valores de CIA para as amostras analisadas. $CIA = [Al_2O_3 / (Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O)] * 100$; óxidos em proporção molecular.

As concentrações de elementos maiores obtidas também foram plotadas no gráfico ternário A (Al_2O_3) – CN ($CaO + Na_2O$) – K (K_2O) de avaliação de intensidade de intemperismo (**figura VI.6**), sugerido por McLennan et al. (1990). As rochas apresentaram uma tendência de intemperismo químico a partir de composições iniciais semelhantes à de andesitos de arcos de ilha. Como a intensidade de alteração, no diagrama, é pouco variável, os sedimentos precursores das amostras analisadas foram submetidos a semelhantes condições intempéricas.

VI.2. Geoquímica de elementos traços

Os resultados das análises de elementos traço por FRX e ICP-MS são apresentados nas **tabelas VI.3 e VI.4** e foram aplicados no estudo de caracterização geoquímica, análise de proveniência e ambientação tectônica.

Figura VI.4: amostras analisadas plotadas no diagrama ternário da fração molar de Al_2O_3 (A) – $\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O}$ em silicatos (CN) – K_2O (K) extraído, modificado e traduzido de McLennan et al. (1990).

	CAR-I-51	C-325c	C-333	C-337	C-340	C-341	CM-III-25	C-410	C-411	C-430	C-431
Co	18,3	13,1	15,6	18,2	17,3	14,2	18,4	17,1	20,4	21,3	22,9
Cr	101,6	81,1	88,0	87,1	97,4	89,5	89,4	77,4	107,5	100,4	96,0
Cu	12,2	36,4	15,8	34,6	23,9	30,3	30,7	23,5	37,2	29,2	28,7
Ga	21,2	18,5	20,9	19,4	23,9	20,7	25,0	17,8	28,9	24,8	24,5
Ni	42,1	36,2	37,4	43,1	47,2	38,6	43,5	39,9	54,1	46,9	53,0
Rb	137,3	121,8	142,4	134,5	154,5	125,9	161,7	124,7	184,4	157,6	192,1
Sc	16,6	< 14	15,2	13,7	15,3	15,1	14,6	11,1	18,3	16,8	17,0
V	120,5	89,5	113,7	103,1	124,3	110,6	120,2	88,7	143,2	143,4	146,5
Zr	212,5	214,2	180,2	191,1	192,4	190,6	160,9	194,8	185,6	189,5	197,0

Tabela VI.3: análises de elementos traço obtidas por FRX para as amostras da unidade UBX (valores em ppm).

O diagrama *spider*, normalizado segundo a composição média da crosta superior de Taylor e McLennan (1995), apresentado na **figura VI.5** mostra que as amostras da unidade UBX são caracterizadas por anomalias negativas de Sr e subordinadamente de Ba e enriquecidas em Cs, Th, Rb, La, Ce, Nd e Sm, sobretudo para aquelas coletadas no alóctone a sul da Serra do Pombeiro. As amostras C-411 e CM-III-25 são as mais empobrecidas em Sr, enquanto a amostras CAR-I-51 é a mais enriquecida neste elemento.

As amostras C-333, C-337 e C-340, todas coletadas sob a Nappe Carrancas, a leste da Serra das Bicas, são as que apresentam as maiores anomalias negativas de Ba e leve empobrecimento em La, Ce, Nd e Sm.

Observa-se também, que amostras deste domínio (C-333, C-337 e C-341) têm valores totais de ETR menores e que os maiores valores totais de ETR, ETRL e ETRP são de amostras do alóctone a sul da Serra do Pombeiro (C-411 e C-430).

Os elementos alcalinos e alcalinos terrosos são solubilizados durante intemperismo, com exceção de Rb, Cs e Ba que apresentam maior raio iônico e são retidos em argilominerais durante o intemperismo (Taylor e McLennan, 1985), comportando-se como elementos imóveis durante os processos sedimentares. Diagramas de Al_2O_3 vs. Rb, Cs e Ba (**figura VI.6**) mostram que estes elementos traço correlacionam-se positivamente com óxido de alumínio, confirmando a tendência de sua concentração em argilo-minerais.

Por outro lado, elementos como Zr e Hf, apesar não serem afetados pelo intemperismo químico são fortemente fracionados durante a sedimentação, pois tendem a se concentrar em minerais pesados, como zircão, depositados em frações arenosas. Diagramas Harker de Zr e Hf (**figura VI.7**) demonstram a correlação positiva entre estes elementos traço e SiO_2 , sugerindo que houve perda de zircão durante a sedimentação por processos mecânicos de fracionamento.

Figura VI.5: diagrama *spider* de elementos traços normalizados segundo valores para crosta continental superior de Taylor e McLennan (1995) para as amostras da UBX.

	CAR-I-51	C-325c	C-333	C-337	C-340	C-341	CM-III-25	C-410	C-411	C-430	C-431
Sr	165,9	139,1	116,9	100,8	101,3	116,7	64,1	140,0	60,8	115,5	123,7
Y	34,1	29,8	22,1	22,3	23,1	21,6	18,9	24,8	34,2	34,0	27,9
Nb	17,8	15,2	14,4	14,6	15,2	14,9	13,8	17,2	17,7	16,3	17,4
Cs	7,4	7,3	8,9	7,8	9,8	7,5	9,8	9,2	11,5	10,9	13,6
Ba	378,7	383,0	361,8	340,4	383,6	336,3	340,9	272,2	348,1	430,0	469,0
La	31,6	35,6	13,9	16,8	31,4	16,7	29,5	34,8	67,7	47,6	39,3
Ce	77,6	78,6	42,9	49,4	76,0	41,7	70,0	62,8	125,0	65,2	71,6
Pr	8,0	8,7	4,2	3,9	7,7	4,5	6,9	8,3	13,1	9,9	8,8
Nd	31,0	33,8	16,4	15,5	30,0	17,1	27,1	31,3	49,5	37,3	33,2
Sm	6,5	6,9	3,3	3,1	6,1	3,4	5,4	6,3	9,2	7,1	6,5
Eu	1,4	1,4	0,8	0,8	1,2	0,8	1,0	1,3	1,9	1,4	1,3
Gd	5,7	6,1	3,0	3,0	5,1	2,9	4,4	5,4	8,0	6,5	5,6
Tb	0,9	1,0	0,6	0,5	0,8	0,6	0,7	0,8	1,2	1,0	0,9
Dy	5,3	5,5	3,8	3,6	4,6	3,8	3,8	4,8	6,2	5,7	4,9
Ho	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8	1,0	1,2	1,2	1,0
Er	3,2	3,2	2,4	2,5	2,6	2,5	2,1	2,6	3,4	3,2	2,8
Tm	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
Yb	3,2	3,0	2,5	2,6	2,5	2,8	2,2	2,5	3,2	2,7	2,8
Lu	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
Hf	5,4	5,9	4,8	5,3	5,1	5,1	4,2	5,2	5,0	5,2	5,4
Pb	17,9	19,0	18,8	19,6	19,4	18,8	19,1	18,6	14,9	21,8	24,1
Th	12,8	12,5	10,4	11,7	12,7	11,8	12,1	12,6	14,3	14,1	15,2
U	2,8	2,9	2,5	2,4	2,9	2,8	2,6	2,3	3,2	2,0	2,3
Ba _N	75,10	70,93	66,75	75,21	65,95	66,84	53,37	68,25	84,31	91,96	74,25
La _N	64,73	25,28	30,46	57,03	30,39	53,63	63,18	122,91	86,41	71,33	57,46
Ce _N	54,78	29,85	34,38	52,94	29,02	48,73	43,77	87,10	45,45	49,87	54,05
Pr _N	42,19	20,62	19,11	37,25	21,75	33,82	40,19	63,54	48,42	43,02	39,17
Nd _N	31,70	15,34	14,51	28,13	16,05	25,42	29,34	46,44	34,94	31,10	29,06
Sm _N	19,84	9,67	8,95	17,70	9,93	15,71	18,21	26,48	20,44	18,62	18,80
Eu _N	10,95	5,82	5,82	9,23	6,20	8,03	10,09	14,56	10,85	10,04	10,85
Gd _N	13,26	6,49	6,57	11,13	6,26	9,61	11,76	17,42	14,16	12,17	12,41
Tb _N	11,04	6,53	6,26	9,28	6,38	7,72	9,76	13,22	11,46	9,81	10,60
Dy _N	9,70	6,59	6,34	8,04	6,62	6,57	8,41	10,90	9,99	8,66	9,26
Ho _N	9,45	6,89	6,94	7,97	6,97	6,14	7,55	9,65	9,09	7,95	8,86
Er _N	8,50	6,53	6,58	6,97	6,81	5,75	7,05	9,21	8,49	7,53	8,46
Tm _N	8,92	7,30	7,31	7,28	7,65	6,21	7,21	9,25	8,14	7,79	9,01
Yb _N	8,18	6,85	6,97	6,66	7,44	5,84	6,72	8,60	7,36	7,45	8,51
Lu _N	7,71	6,36	6,59	6,06	7,03	5,36	6,15	8,12	6,85	6,86	8,15
Eu _N /Eu*	0,68	0,73	0,76	0,66	0,79	0,65	0,69	0,68	0,64	0,67	0,71
La _N /Yb _N	7,91	3,69	4,37	8,56	4,08	9,19	9,40	14,29	11,73	9,57	6,75
La _N /Sm _N	3,26	2,61	3,40	3,22	3,06	3,41	3,47	4,64	4,23	3,83	3,06
Gd _N /Yb _N	1,62	0,95	0,94	1,67	0,84	1,65	1,75	2,03	1,92	1,63	1,46

Tabela VI.4: análises de elementos traço obtidas por LA-ICP MS para a unidade UBX (valores em ppm). Elementos Terras Raras condrito-normalizados segundo Taylor & McLennan (1985). $Eu^* = [(Sm_N)(Gd_N)]^{1/2}$.

Figura VI.6: diagramas de Al_2O_3 vs. Rb, Cs e Ba para as amostras da UBX. Observar a correlação positiva entre os elementos.

Figura VI.7: diagramas Harker de Zr e Hf que mostram a correlação positiva entre os elementos.

VI.2.1. Elementos Terras Raras (ETR)

As amostras apresentam padrões de ETR típicos de rochas sedimentares pós-arqueanas (McLennan *et al.*, 1990) com enriquecimento de ETRL, padrões relativamente constantes de ETRP e anomalias negativas de Eu (**figura VI.8**).

Rochas coletadas no alóctone a sul da Serra do Pombeiro tendem a apresentar maiores valores de fracionamento de ETR (média de 10,35), ETRL (média de 3,84), ETRP (média de 1,76) e maiores anomalias negativas de Eu (média de 0,68). Por outro lado, as rochas coletadas na região nordeste da Serra das Bicas apresentam valores menores do que as da Serra do Pombeiro, com média de $La_N/Yb_N = 6,30$, média de $La_N/Sm_N = 3,16$, média de $Gd_N/Yb_N = 1,28$ e anomalias negativas de Eu com valor médio de 0,71. Entretanto, apesar das diferenças é possível separar as amostras segundo três assinaturas distintas:

(i) Amostra C-411 (alóctone a sul da Serra do Pombeiro): maiores valores totais de ETR ($\Sigma ETR = 515,65$) com forte fracionamento de ETR ($La_N/Yb_N = 14,29$), ETRL ($La_N/Sm_N = 4,64$) e ETRP ($Gd_N/Yb_N = 2,03$). Anomalia de Eu é intermediária ($Eu_N/Eu^* = 0,68$);

(ii) Amostras C-333, C-337 e C-341 (leste da Serra das Bicas): menores valores totais de ETR (ΣETR entre 231,06 e 234,04), com menores fracionamentos de ETR (La_N/Yb_N entre 3,69 e 4,37), ETRL (La_N/Sm_N entre 2,61 e 3,40) e ETRP (Gd_N/Yb_N entre 0,84 e 0,95). Anomalias negativas de Eu também são as menores (Eu_N/Eu^* entre 0,73 e 0,79);

(iii) Demais amostras: valores totais de ETR intermediários (ΣETR entre 305,88 e 406,36) com La_N/Yb_N entre 6,75 e 11,73, La_N/Sm_N entre 3,22 e 4,23, Gd_N/Yb_N entre 1,46 e 1,92 e Eu_N/Eu^* entre 0,64 e 0,71. Neste grupo, a amostra CAR-I-51 apresenta os menores valores de fracionamento de ETR, ETRL, ETRP e de anomalia negativa de Eu. Por outro lado, a amostra C-430 tem os maiores valores de fracionamento de ETR, ETRL, ETRP e de anomalia negativa de Eu.

As amostras do grupo (iii) são as que mais se assemelham às composições médias de pelitos do pós-Arqueano da Austrália (PAAS) e da América do Norte (NASC) definidos por Nance e Taylor (1976) e Haskin (1968), respectivamente.

A amostra C-411 tem um maior valor total de ETRL, enquanto as amostras do grupo (ii) têm valores menores que os padrões médios para os mesmos elementos.

As anomalias negativas de Eu são ($Eu_N/Eu^* = 0,64 - 0,79$), compatíveis com o valor médio da crosta continental superior (Taylor e McLennan, 1985; McLennan *et al.*, 1990). Estes valores combinados com baixos valores de fracionamento de ETRP (**figura VI.9**) sugerem área-fonte com rochas ígneas geradas a partir de fracionamento químico intracrosta

durante a evolução magmática foram a principal fonte dos sedimentos da Unidade Biotita Xisto (McLennan et al., 1990; McLennan e Taylor, 1991; Taylor e McLennan, 1985 e 1995). O empobrecimento em Sr observado na **figura VI.5** sugere que o fracionamento químico intracrosta ocorreu principalmente em presença de plagioclásio rico em Ca, pois Eu^{2+} substitui Sr^{2+} neste mineral ocasionando as anomalias negativas de ambos elementos químicos no líquido residual (McLennan e Taylor, 1991).

Segundo Taylor e McLennan (1985), apesar da forma geral dos padrões de ETR serem semelhantes em arenitos e pelitos pós-arqueanos, os primeiros tendem a apresentar menores valores totais de ETR e de La_N/Yb_N do que os segundos. Considerando essa característica geoquímica, as amostras do grupo (ii) são mais ricas em frações arenosas do que as demais, o que é corroborado pelos menores valores tanto do fracionamento de ETRP, quanto da menor anomalia negativa de Eu. Essas amostras do grupo (ii) encontram-se, no diagrama de classificação química de arenitos de Herron (1988), na fronteira entre os campos dos pelitos e wackes, apesar daquelas, no campo de wackes, encontrarem-se no grupo (iii). A amostra C-411, que apresenta maiores valores totais de ETR, encontra-se destacada, no campo dos pelitos no diagrama de Herron (**figura VI.3**).

Figura VI.8: Diagrama de Condrito-normalizado (Taylor & McLennan, 1985) mostrando o padrão de Elementos Terras Raras das amostras da UBX analisadas. Valores médios de pelitos pós-Arqueanos foram plotados para comparação. PAAS: *Post-Archean Australian Shale* (Nance e Taylor, 1976); NASC: *North American Shale Composite* (Haskin, 1968).

Figura VI.9: gráfico de fracionamento de ETRP vs. Anomalia de Eu com as amostras analisadas. Linha $Eu/Eu^* = 0,85$: McLennan et al. (1990) considera que cerca de 80% de amostras sedimentares do Arqueano apresentam $Eu/Eu^* > 0,85$, enquanto nos turbiditos modernos apenas 30% apresentam valores de anomalia de Eu superiores a este valor; Linha $Gd_N/Yb_N = 2,0$: os mesmos autores consideram que turbiditos arqueanos apresentam valores maiores do que 2,0,

VI.2.2. Razão Th/Sc

A razão Th/Sc foi utilizada nestes trabalho com intuito de estabelecer a importância de rochas derivadas de fontes mais evoluídas (félsicas) e de fontes primitivas (máficas) na proveniência das rochas estudadas, pois Th comporta-se como elemento incompatível em sistemas ígneos e Sc é compatível e tende a se concentrar em cristais de piroxênio.

As amostras analisadas apresentam valores da razão Th/Sc variáveis e menores do que 1,0 (**tabela VI.5**), com exceção da amostra C-410, Segundo McLennan et al. (1990) amostras que possuem tais características químicas são oriundas de ambientes tectonicamente ativos e predominantemente máficos, mas como os valores das amostras são sempre próximos a 1,0 eles sugerem que áreas-fonte félsicas exerceram papel importante na proveniência da bacia.

AMOSTRA	Th/Sc	Cr/V	Eu _N /Eu*
C-325c	-	0,91	0,68
C-333	0,68	0,77	0,73
C-337	0,85	0,84	0,76
C340	0,83	0,78	0,66
C-341	0,78	0,81	0,79
CM-III-25	0,83	0,74	0,65
C-410	1,13	0,87	0,69
C-411	0,78	0,75	0,68
C-430	0,84	0,70	0,64
C-431	0,89	0,66	0,67
CAR-I-51	0,77	0,84	0,71

Tabela VI.5: valores da razão Th/Sc, Cr/V e Eu_N/Eu* para as amostras da UBX analisadas.

Nos gráficos Th/Sc vs. CIA e Eu/Eu* vs. CIA (**figura VI.10**) e na **tabela VI.5** observa-se, de uma maneira geral, com exceção da amostra C-337, que as rochas com valores de Th/Sc mais próximos de 1.0 (entre 0,83 e 1.13) são aquelas que possuem anomalias de Eu mais negativas e maiores valores de CIA, ao passo que as rochas com valores Th/Sc menores (entre 0,68 e 0,78) possuem Eu/Eu* menos negativas e menor índice de alteração química. Considerando-se uma mesma área-fonte principal para os sedimentos, as amostras CAR-I-51, C-341, C-337, C-333, C-325c e C-410, pelos menores valores em CIA, relativamente menores valores da razão Th/Sc e maiores da razão Cr/V e menores anomalias negativas de Eu, sugerem ser oriundas de sedimentos depositados em porções mais próximas à área-fonte, e menos afetadas por processos de intemperismo químico durante a sedimentação.

Figura VI.10: Diagramas Th/Sc vs. CIA, Eu/Eu* vs. CIA e Eu/Eu* vs. Cr/V para as amostras da unidade UBX.

McLennan et al. (1993) sugere que altas razões Cr/V indicam enriquecimento de Cr sobre outros elementos traços ferromagnesianos e a contribuição de rochas máficas-ultramáficas na área-fonte do sedimento, na medida em que o Cr tende a se concentrar em espinélio, piroxênio e olivina. Por exemplo, séries ofiolíticas apresentam valores Cr/V maiores que 8,0,

Os valores de Cr/V obtidos para as rochas analisadas (**tabela VI.5**) se mantêm sempre abaixo de 1,0, indicando que rochas máficas não foram tão importantes na proveniência dos sedimentos. Entretanto, amostras com menores valores da razão Cr/V tendem a apresentar as maiores anomalias negativas de Eu (**figura VI.10 e tabela VI.5**), confirmando a divisão em dois grupos de amostras, um com maior componente máfico e menos afetado pelo intemperismo químico e outro com maior componente félsico e mais afetado pelo intemperismo químico.

VI.2.3. Reciclagem sedimentar

Elementos químicos como Zr e Hf são comumente concentrados em zircão, mineral pesado resistente a processos intempéricos e de reciclagem sedimentar. Maiores valores para a razão Zr/Sc e para a concentração de Hf sugerem maior concentração de zircão e, por isso, reciclagem sedimentar mais intensa (McLennan et al., 1993)

Os valores das razões Th/Sc e Zr/Sc obtidos para as amostras da unidade UBX (**figura VI.11** e **tabela VI.6**) são semelhantes aos sugeridos por Taylor e McLennan (1985, 1995 e 2001), Condie (1993), Rudnick e Fountain (1995) e Rudnick e Gao (2003) para a crosta continental superior. O mesmo ocorre para os valores obtidos para a concentração de Hf, com exceção da amostra CM-III-25.

As rochas da unidade UBX não sofreram grande influência de processos de reciclagem sedimentar, pois não houve enriquecimento e concentração de minerais pesados, indicado pelos valores intermediários obtidos para a razão Zr/Sc e para a concentração de Hf.

Figura VI.11: gráfico Zr/Sc vs. Th/Sc extraído de McLennan et al. (1993) para as amostras da unidade UBX que mostra a intensidade da reciclagem sedimentar do sedimento e a sua composição em relação às composições do manto e da crosta continental superior. Valores médios para a crosta continental superior, média, inferior e para a composição global da crosta continental sugeridos por Taylor e McLennan (1985, 1995, 2001), Condie (1993), Rudnick e Fountain (1995) e Rudnick e Gao (2003) foram plotados para comparação.

	Hf (ppm)	Th/Sc	Zr/Sc
C-325c	5,94	-	-
C-333	4,77	0,68	11,86
C-337	5,32	0,85	13,95
C-340	5,07	0,83	12,62
C-341	5,11	0,78	12,62
CM-III-25	4,18	0,83	11,02
C-410	5,22	1,13	17,55
C-411	4,96	0,78	10,14
C-430	5,23	0,84	11,28
C-431	5,38	0,89	11,59
CAR-I-51	5,37	0,77	12,80
Crosta Continental Superior	5,8 ^A		
		0,79 ^A	14,0 ^A
	4,3 ^B		
		0,64 ^B	12,0 ^B
	4,4 ^C		
		0,75 ^D	13,8 ^D
	5,3 ^D		
Crosta Continental Média	4,0 ^C	0,28 ^C	5,7 ^C
	4,4 ^D	0,34 ^D	7,8 ^D
Crosta Continental Inferior	2,1 ^A	0,05 ^A	2,0 ^A
	1,9 ^C	0,04 ^C	2,2 ^C
Composição Média da Crosta Continental			3,3 ^A
	3,0 ^A	0,14 ^A	
			5,6 ^C
	3,7 ^{C, D}	0,25 ^{C, D}	
			6,0 ^D

Tabela VI.6: valores das razões La/Sc, Th/Sc e Zr/Sc para as amostras da unidade UBX analisadas e valores de referência para crosta continental superior, média e inferior extraídos da literatura. ^A: Taylor e McLennan (1985, 1995, 2001); ^B: Condie (1993); ^C: Rudnick e Fountain (1995); ^D: Rudnick e Gao (2003).

CAPÍTULO VII

GEOQUÍMICA ISOTÓPICA

VII.1. Sistema Rb-Sr em rocha total

As razões iniciais $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i$ foram calculadas a partir dos dados isotópicos e elementais apresentados na **tabela VII.1** e da idades de 590 Ma e 610 Ma referentes às idades de metamorfismo obtidas em cristais de monazita para rochas do Sistema de Nappes Carrancas (Campos Neto et al., 2011) e Sistema de Nappes Andrelândia (Campos Neto *et al.*, 2007).

Amostra	Rb (ppm)	Sr (ppm)	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	erro (2 σ)	$^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i$ (590 Ma)	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i$ (610 Ma)
C-325c	121,80	131,90	0,7353	0,00007	2,48633	0,71440	0,71369
C-333	142,40	121,50	0,7421	0,00008	3,15566	0,71559	0,71468
C-337	134,50	106,80	0,7445	0,00009	3,39084	0,71606	0,71509
C-340	154,50	112,00	0,7482	0,00007	3,71421	0,71696	0,71589
C-341	125,90	128,40	0,7368	0,00007	2,64008	0,71460	0,71385
CM-III-25	161,70	67,70	0,7706	0,00005	6,43098	0,71653	0,71469
CAR-I-51	137,30	168,00	0,7325	0,00007	2,20048	0,71399	0,71336

Tabela VII.1: dados isotópicos e elementais do sistema Rb-Sr para as amostras da unidade UBX. $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} = (\text{Rb}_{\text{ppm}}/\text{Sr}_{\text{ppm}}) * 2.8937 * 0.93047$; $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i = ^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} - ^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} (\lambda t)$.

As razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i$ obtidas ficaram entre o intervalo de 0,71399 e 0,71696 para idade de 590 Ma e 0,71336 e 0,71589 para idade de 610 Ma.

A **figura VII.1** mostra a variação de $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ e $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ para as amostras analisadas. Todas as razões alinham-se próximo à isócrona de referência de idade 630 ± 44 Ma e razão inicial 0,7135. Esta idade se aproxima dos valores considerados para o metamorfismo na região da Nappe Socorro-Guaxupé (Campos Neto et al., 2004) e na Nappe de Passos (Valeriano et al., 2004). No entanto, o alto valor de MSWD (565) faz com que a idade obtida seja considerada com muita cautela.

Figura VII.1: Diagrama $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ vs. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ para as amostras da unidade UBX.

Menores razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ são acompanhadas por maiores teores elementais de Sr e, conseqüentemente, são menos radiogênicas do que as demais, com exceção da amostra C-337. A amostra CAR-I-51, que possui plagioclásio como mineral constituinte, apresenta o menor índice de alteração química (**tabela VI.3**) e a maior concentração de Sr das amostras (168 ppm).

VII.2. Sm-Nd em rocha total

Os valores das razões isotópicas, das idades modelo e $\epsilon\text{Nd}_{\text{TDM}}$ e recalculados para 590 Ma e 610 Ma são apresentados nas **tabelas VII.2 e VII.3**.

Os valores de $\epsilon(0)$ variam entre -12.586 e -11.268 e as idades modelo T_{DM} variam de 1.550 a 1.627 Ga (**figura VII.2**). Valores de ϵNd_{590} e ϵNd_{610} estão no intervalo -6.251 e -5.472 e -6.045 e -5.275, respectivamente.

Considerando que idades-modelo de rochas sedimentares representam a mistura de diferentes rochas presentes na área-fonte (McCulloch e Wasseburg, 1978), que o sistema Sm-Nd não sofre alterações significativas durante o metamorfismo, as idades T_{DM} obtidas no

Mesoproterozóico podem refletir a mistura de fontes jovens de idade no Neoproterozóico e de fontes mais antigas que 1,6 Ga.

Amostra	Sm (ppm)	Nd (ppm)	$^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$	erro ¹	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$	$\epsilon_{(0)}$	T_{DM} (Ga)
C-325c	7,118	37,009	0,1163	0,0007	0,5120	-12,301	1,618
C-333	4,302	21,555	0,1207	0,0007	0,5121	-11,409	1,619
C-337	3,685	18,901	0,1179	0,0007	0,5120	-11,822	1,605
C-340	6,817	34,444	0,1197	0,0007	0,5121	-11,268	1,590
C-341	4,037	20,367	0,1199	0,0007	0,5120	-11,503	1,612
CM-III-25	5,981	30,314	0,1193	0,0007	0,5120	-11,792	1,627
CAR-I-51	7,785	39,395	0,1195	0,0007	0,5120	-11,585	1,613
CAR-IX-129	13,418	73,351	0,1106	0,0007	0,5120	-12,586	1,550

Tabela VII.2: dados isotópicos e elementais do sistema Sm-Nd para as amostras da unidade UBX. Branco analítico para Sm = 47 pg e para Nd = 114 ; Razão isotópica $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ calculada a partir da equação: = [(Conc Sm/Conc Nd)*0,604491]; Razões isotópicas $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ normalizadas para o valor de 0,7219 (DePaolo, 1981); Valor médio para a razão $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ do padrão JNdi = $0,512100 \pm 0,000004$; Idade Modelo T_{DM} calculada pela equação: = $\{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{am}}/0,512638] - 1\} * 10^4$, onde $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}_{\text{CHUR}} = 0,512638$ (Hamilton et al., 1983); $\epsilon_{\text{Nd}}(0)$ corresponde ao valor atual ($t = 0$) e é calculado segundo a equação: = $\{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{am}}/0,512638] - 1\} * 10^4$.

Amostra	$\epsilon_{(\text{TDM})}$	$\epsilon_{(590\text{Ma})}$	$\epsilon_{(610\text{Ma})}$
C-325c	4,294	-6,251	-6,045
C-333	4,292	-5,687	-5,493
C-337	4,321	-5,891	-5,690
C-340	4,355	-5,472	-5,275
C-341	4,305	-5,720	-5,524
CM-III-25	4,274	-5,967	-5,770
CAR-I-51	4,304	-5,775	-5,578
CAR-IX-129	4,442	-6,108	-5,889

Tabela VII.3: $\epsilon_{\text{Nd}_{\text{TDM}}}$ e recalculados para 590 Ma e 610 Ma para as amostras da unidade UBX.

Valores de ϵ_{Nd} entre -6 e -5 para 590 e 610 Ma confirmam a influência de fontes magmáticas na crosta continental.

Figura VII.2: gráfico T (Ga) vs. $\epsilon_{Nd(t)}$ para as amostras da unidade UBX.

Capítulo VIII

GEOCRONOLOGIA U – Pb

Os cristais de zircão foram separados de maneira aleatória para evitar distorções estatísticas que levassem à supervalorização de uma sub-população sobre outra, considerando o objetivo do trabalho de analisar todo tipo de morfologia de grão possível para a análise mais completa da proveniência do sedimento.

Na amostra C-431 (**figura VIII.1**), foram realizados 23 pontos de análise em doze (12) cristais de zircão (3 cristais não apresentaram sinal analítico). Quatro grupos foram reconhecidos e analisados, respeitando morfologia e zoneamentos internos observados nas imagens *back-scattered* (**figura VIII.2**):

- **A**: cristais de tamanho entre 250 e 350 μm , prismáticos, alongados, bipiramidais e angulosos, com pequenos arredondamentos locais nas extremidades e com zoneamento interno de crescimento de origem magmática. A estrutura zonada é de crescimento episódico, indicado pela alternância de zonas de cores claras e escuras. As bordas podem apresentar delgado sobrecrecimento que trunca o zoneamento anterior. Estes cristais foram pouco ou nada retrabalhados por processos sedimentares indicando que foram fornecidos por rochas ígneas no fim da sedimentação da bacia, ou por processos vulcânicos explosivos.

- **B**: cristais que variam de 80 a 200 μm , tendendo a equidimensionais, com terminações piramidais preservadas ou não. Zoneamento de crescimento episódico foi observado e varia desde padrões complexos com núcleo arredondado sobrecrecido por três bordas com padrões de zonados distintos que se truncam até grãos com núcleo sem zoneamento aparente e borda com zoneamento bipiramidal. Alguns cristais exibem delgado sobrecrecimento;

- **C**: cristais de 80 a 120 μm , em agulhas fragmentadas, mas que ainda preservam terminações bipiramidais subarredondadas a arredondadas. O zoneamento é homogêneo a concêntrico, sem diferenças entre núcleo e borda, ou com núcleos de

zoneamento concêntrico e bordas zonadas truncando o anterior. Um cristal de núcleo com textura *patchy* (Corfu et al., 2003) com duas fases de crescimento de zoneamento diferentes que se truncam também foi observado, além de delgados sobrecrecimentos homogêneos.

- **D:** cristais fragmentados, com dimensões entre 33 e 95 μm , exibindo zoneamento interno de crescimento episódico piramidal, ou não zonados. Apresentam bordas intensamente angulosas e com sobrecrecimento delgado.

O sobrecrecimento observado em alguns grãos, independente do grupo a que pertencem, tem dimensões inferiores a 5 μm .

Figura VIII.1: cristais de zircão detrítico da amostra C-431 separados para análise do sistema U-Pb. Notar o faturamento, fragmentação e irregularidades superficiais dos grãos.

As **tabelas VIII.1 e VIII.2** e as **figuras VIII.3 A, B e C** mostram a distribuição das idades da unidade UBX. Dos pontos de análise realizados, 60% apresentaram valores de concordância acima de 95% e 26% valores de concordância abaixo de 90%. A idade 749 ± 60 além de ser 30% discordante, apresentou elevada concentração de Pb comum e por isso foi desconsiderada. As idades 917 ± 155 Ma e 1053 ± 80 Ma apresentaram diferenças de até 300 Ma entre as idades $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ e $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ com concordância de 65 e 60%, respectivamente, e por isso também foram desconsideradas na interpretação da proveniência, pois forneceram dados inconsistentes. A maioria dos cristais forneceu idades $^{206}\text{Pb}/^{207}\text{Pb}$ no Neoproterozóico entre 632 Ma e 691 Ma (concordância entre 96 e 98%) com classe modal entre 663 Ma e 667 Ma.

Dois cristais do grupo B e 1 do grupo C forneceram idades de $704,2 \pm 59$ Ma, $764,7 \pm 49$ Ma e $743,5 \pm 179$ Ma. A segunda idade foi obtida em um ponto analítico com 21% de discordância, feito em um cristal que apresenta fraturas concêntricas que partem do núcleo mais escuro para a borda mais clara. Segundo Corfu et al. (2003) este padrão de fraturamento é característico de cristais metamíticos e possibilitam a percolação de fluidos que ocasionam a

perda de Pb do cristal que, por isso, fornece idades irreais. A terceira, além de apresentar discordância de 17%, têm erro associado muito grande fazendo com que a idade varie de 564 Ma a 922 Ma. A primeira, de $704,2 \pm 59$ Ma apresenta concordância de 96% e foi obtida no núcleo de um cristal do grupo B, cristal este com idade $^{206}\text{Pb}/^{207}\text{Pb}$ de $592,2 \pm 97$ Ma, também concordante (96%), na borda.

Figura VIII.2: imagens *back-scattered* dos cristais de zircão detrítico analisados. Os grupos A, B, C e D foram morfológicamente separados segundo sua forma e tipo de zoneamento de crescimento observado. Idades em milhões de anos (Ma); Círculos de cor azul escuro acompanhados por idades de cor preta correspondem às análises com concordância maior que 90%; Círculos de cor azul escuro acompanhados por idades de cor cinza clara correspondem às idades com valores de concordância menores do que 90%; Cristais sem círculos não apresentaram sinal analítico.

Ponto	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	1σ	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	1σ	rho
1.1	0,78399	0,0112	0,08398	0,0005	0,06423	0,0009	0,730
2.1	0,97860	0,0120	0,10994	0,0006	0,06288	0,0008	0,739
3.1	0,86095	0,0148	0,10140	0,0006	0,05969	0,0009	0,707
4.1	0,86224	0,0102	0,09805	0,0005	0,06470	0,0007	0,795
5.1	0,77449	0,0093	0,09316	0,0004	0,05981	0,0006	0,797
6.1	0,69533	0,0105	0,08437	0,0005	0,05975	0,0008	0,720
7.1	0,69044	0,0084	0,08632	0,0004	0,05835	0,0006	0,777
8.1	0,70664	0,0094	0,08706	0,0004	0,05870	0,0007	0,763
9.1	0,91771	0,0080	0,10656	0,0004	0,06226	0,0005	0,844
10.1	0,84029	0,0122	0,09867	0,0006	0,06169	0,0007	0,777
11.1	0,89613	0,0095	0,10667	0,0005	0,06179	0,0006	0,812
12.1	0,87957	0,0086	0,10518	0,0006	0,06079	0,0005	0,848
13.1	0,90327	0,0240	0,10581	0,0007	0,06249	0,0015	0,531
14.1	0,87220	0,0403	0,09916	0,0013	0,06406	0,0027	0,413
15.1	0,83115	0,0375	0,09866	0,0011	0,06095	0,0025	0,395
16.1	0,86124	0,0161	0,10252	0,0013	0,06124	0,0008	0,792
17.1	0,82798	0,0153	0,10078	0,0009	0,06097	0,0007	0,796
18.1	0,89550	0,0182	0,10561	0,0009	0,06180	0,0009	0,738
19.1	7,73004	0,1817	0,40613	0,0066	0,13978	0,0014	0,885
20.1	5,09116	0,0878	0,28670	0,0026	0,12972	0,0012	0,840
21.1	0,87860	0,0150	0,10378	0,0009	0,06160	0,0006	0,831
22.1	1,07062	0,0330	0,10323	0,0015	0,07445	0,0014	0,710
23.1	0,94948	0,0324	0,09691	0,0014	0,06963	0,0026	0,473

Tabela VIII.1: razões $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros (1σ) e os valores de rho da amostra C-431 da unidade UBX. Os valores em rosa se referem às amostras descartadas.

	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ Idade (Ma)	erro (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ Idade (Ma)	erro (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ Idade (Ma)	erro (Ma)	Conc. 207 /206	Obs.
1.1	519,8	16,0	587,8	18,4	749,4	60,3	70	Alto Pb comum
2.1	672,4	20,5	692,9	20,6	704,2	59,5	96	
3.1	622,6	19,1	630,6	20,2	592,2	66,7	106	
4.1	603,0	18,2	631,3	17,7	764,7	48,6	79	
5.1	574,2	17,1	582,3	16,3	596,8	48,6	97	
6.1	522,1	16,0	536,0	17,4	594,5	63,6	89	
7.1	533,7	16,0	533,1	15,8	542,8	52,9	99	
8.1	538,1	16,2	542,7	16,3	555,9	55,2	98	
9.1	652,7	19,2	661,1	16,8	682,9	40,0	96	
10.1	606,6	18,6	619,3	18,1	663,4	53,2	92	
11.1	653,4	19,6	649,7	17,5	666,7	46,2	99	
12.1	644,7	19,5	640,7	16,8	632,0	40,9	103	
13.1	648,4	20,3	653,5	28,1	690,9	106,9	95	
14.1	609,5	23,1	636,8	43,1	743,5	179,3	83	
15.1	606,6	21,5	614,2	41,0	637,5	179,5	96	
16.1	629,1	23,2	630,8	22,0	647,8	62,1	98	
17.1	619,0	20,7	612,5	19,2	638,0	55,0	98	
18.1	647,2	21,4	649,3	21,5	667,0	65,4	98	
19.1	2197,2	81,6	2200,1	42,8	2224,4	39,3	99	
20.1	1625,0	49,9	1834,6	33,3	2094,2	38,1	78	
21.1	636,5	20,8	640,2	18,6	660,2	47,4	97	
22.1	633,3	24,8	739,0	29,1	1053,7	79,8	60	Análise ruim.
23.1	596,3	23,8	677,8	41,5	917,5	155,4	65	Análise ruim.

Tabela VIII.2: idades $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros e os valores de concordância da amostra C-431 da unidade UBX. Os valores em rosa se referem às amostras descartadas.

Idades entre 543Ma e 597 Ma foram obtidas no cristal prismático e alongado do grupo A, com nítido arredondamento, por abrasão na deposição, das terminações piramidais, apresentam concordância acima de 95% (com uma exceção de 89% de concordância, tabela VIII.2). No entanto esses valores encontram-se, na margem de erro, na idade do

metamorfismo para o Grupo Carrancas, obtidos pelo método U-Pb ID-TIMS em monazita (590 Ma, Valeriano et al., 2004; 573 ± 2.9 Ma e 590 ± 2.8 Ma, Campos Neto et al., 2011) e para a Nappe Andrelândia (Campos Neto et al., 2007). Essas idades aumentam progressivamente da borda direita para a borda esquerda do cristal (tomar **figura VIII.2** como referência), e o mesmo encontra-se fraturado (**figura VIII.1**) sugerindo abertura do sistema U-Pb por percolação de fluidos (Corfu et al., 2003). A ausência de sinal analítico no outro cristal alongado e bipiramidal com fraturas semelhantes reforçam a hipótese de que houve abertura do sistema isotópico.

Figura VIII.16: diagramas concórdia $^{207}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ vs. $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ (A e B) e idades $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ obtidas em cristais de zircão detrítico da amostra C-431.

Um cristal do grupo B, de idade $592,2 \pm 67$ Ma, apresenta alto erro associado e baixa discordância de 6%. Se esse valor também se encontra na margem de erro das idades metamórficas, o cristal também exibe arredondamento por abrasão. Assim, esse valor pode representar mistura de idades, com o *spot* do laser atingindo tanto o cristal com zoneamento ígneo quanto a borda de sobrecrecimento mais claro sem zoneamento.

Um cristal do grupo C sem zoneamento forneceu duas idades no Paleoproterozóico: borda de 2094 ± 38 Ma (78% de concordância) e núcleo de 2224 ± 39 Ma (99% de concordância).

Portanto, considerou-se que a deposição dos sedimentos se deu entre 630 Ma (idade mais jovem obtida foi de 632 Ma) e 590 Ma, ou 611 Ma (idades mínimas para o metamorfismo nas nappes Carrancas e Andrelândia, respectivamente).

Descartadas as idades com concordância abaixo de 95%, os cristais detríticos de zircão mostram uma distribuição essencialmente unimodal, no Neoproterozóico, fim-Criogeniano, com classe modal de 665 Ma. É um valor comparável com a idade U-Pb TIMS de cristais de zircão do Xisto Santo Antônio, Nappe Andrelândia (Campos Neto et al., 2004) e com a idade U-Pb SHRIMP do magmatismo básico toleítico precursor das rochas retroeclogíticas da Nappe Liberdade (Campos Neto et al., 2011). Deve representar a época de maior atividade ígnea félsica na área-fonte.

CAPÍTULO IX

AMBIENTE DEPOSICIONAL E

ÁREA-FONTE PRINCIPAL

IX.1. Ambiente de deposição

A **figura IX.1** mostra gráficos elaborados, segundo diversos autores, para a classificação quanto ao ambiente tectônico de deposição de rochas sedimentares.

Segundo estes gráficos as amostras da unidade UBX são compatíveis quimicamente com sedimentos depositados em ambientes de colisão continental (**figura IX.1 A**) e que tiveram como área-fonte arco magmático continental e rochas de composição semelhante à da crosta continental superior (**figuras IX.C, D, E e F**). Razões Th/Sc abaixo mas próximas de 1,0 (**figuras IX.1 B e C**) e baixas razões La/Th (**figura IX.1 F**) indicam forte contribuição de rochas félsicas e a **figura IX.B** mostra que a área-fonte esteve submetida a um intemperismo químico moderado ou que os sedimentos precursores sofreram intemperismo químico de intensidade e período de tempo moderados; ambos sugerem ambientes orogênicos com exposição da área-fonte penecontemporânea à sedimentação.

Razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ relativamente baixas, ϵNd pouco negativo (**figuras C, D e F**) sugerem assinatura isotópica distinta daquelas consideradas para ambientes tectônicos de margem passiva e para crosta continental antiga.

Figura IX.1: diagramas de classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição. ϵ_{Nd} e razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ foram recalculados para 630 Ma (pico de idade dos cristais de zircão detrítico da amostra C-431). **A** e **B:** extraídos de Campos Neto et al. (2011) formulados com base nos dados de McLennan et al. (1990); **C:** McLennan et al. (1993); **D:** McLennan et al. (1990); **E:** White (2009); **F:** Floyd e Leveridge (1987).

IX.2. Área-Fonte principal

A assinatura geoquímica, isotópica e as idades $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ no Neoproterozóico de cristais de zircão detrítico obtidas para a amostra C-431 foram comparadas com as idades de rochas meta-ígneas da Nappe Socorro-Guaxupé, obtidas por Basei et al. (1995), Ebert et al. (1996), Topfner (1996) e Janasi (1999). Rochas de idade paleoproterozóica são encontradas no substrato do Sistema de Nappes Andrelândia (Campos Neto et al., 2011) e na Faixa Apiaí (Kaufuss, 2001; Prazeres Filho, 2005; Ribeiro, 2006; Siga Jr et al., 2011). Busca-se verificar se essas rochas poderiam ser as fontes mais prováveis para o sedimento. Idades U-Pb TIMS e SHRIMP em cristais de monazita e de zircão, e dados isotópicos $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_{625\text{Ma}}$, valores de $\epsilon\text{Nd}_{625\text{Ma}}$ e de elementos traço foram utilizados e estão representados na **tabelas IX.1 e figuras IX.2 e IX.3**.

A Nappe Socorro Guaxupé é interpretada como um domínio de arco magmático desenvolvido na margem continental ativa da Placa Paranapanema (Campos Neto, 2000) apresenta-se como uma espessa lasca de aproximadamente 15 km de espessura de crosta continental profunda. É segmentada em dois lobos separados por rampas laterais de alto ângulo: Guaxupé a norte e Socorro a sul e dividida em três Unidades principais (Campos Neto & Caby, 2000): *Unidade Granulítica Basal* (formada por granulitos enderbíticos associados a leucossomas e veios de charnokitos, além de intercalações de gnaiss gabro-norítico, considerados como intrusões sin-metamórficas); *Unidade Diatexitica Intermediária* (corresponde a biotita-hornblenda diatexitos estromáticos, envoltos por biotita-hornblenda granitos e por granitos porfiríticos deformados. No topo da unidade predominam tonalitos e gnaisses granodioríticos com lentes metabásicas e bandas estromáticas leucotonalíticas a trondhjemiticas); *Unidade Migmatito Superior* (migmatitos pelíticos a semi-pelíticos e lentes subordinadas de quartzito, gnaiss cálcio-silicático, raros mármore e metamáficas intrusivas). Toda a nappe possui um comportamento geral sub-horizontal e, sua terminação meridional é truncada por um cinturão de cisalhamento de direção ENE. Granitos sin- e tardi-orogênicos são abundantes (Supersuite mangerítico-granítica São José do Rio Pardo, granitos tipo Pinhal e Nazaré Paulista; maciço Serra do Lopo e suite Bragança Paulista) e as estruturas sin-metamórficas são cortadas por plútons dioríticos e sieníticos circulares, ricos em potássio, como as suítes Pedra Branca e Capituva (Campos Neto et al., 1988; Janasi et al., 1993). Ebert et al. (1996) consideram que a deformação da área ocorreu entre 655 Ma e 595 Ma, intervalo obtido com datações de um granitóide migmatítico e de granito tardi-orogênico,

respectivamente. A partir de datações pelo sistema U-Pb em zircão de granitos sin-orogênicos, Janasi (1999) sugere que o metamorfismo regional afetou a área há 625 ± 5 Ma.

	²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb em zircão (zir) e U-Th-Pb em monazita (mnz) – idades em Ma	OBSERVAÇÕES
MONZOGRANITO SUITE SERRA DO LOPO	(zir) 595 ± 12^B	cristalização magmática
SIENITO PEDRA BRANCA	(zir) 612 ± 3^C	cristalização magmática
GRANITO TIPO PINHAL	(zir) $624,6 \pm 3,0^D$	
SUPERSUITE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	(zir) $623 \pm 3,0^D$	mangerito maciço São Pedro de Caldas
	(zir) 625 ± 7^A	mangerito maciço Divinolândia
BATÓLITO SOCORRO	(zir) 629 ± 3^C	
MIGMATITO NAZARÉ PAULISTA	(mnz) 625 ± 8^F	leucossoma granítico
	(mnz) 624 ± 4^F	leucossoma trondhjemitico
GRANITO NAZARÉ PAULISTA	(zir) $631,5 \pm 4,8^D$	
	(mnz) $623,6 \pm 1,9^D$	
GRANULITO DO COMPLEXO PARAISÓPOLIS	(zir) 646 ± 7^E	
CHARNOKITO GNÁISSICO DO COMPLEXO METAMÓRFICO PIRACAIA	(zir) 653 ± 13^E	idade do protólito ígneo
CHARNOKITO GNÁISSICO CÁLCIO-ALCALINO	(zir) 643 ± 12^A	
GNAISSE GRANÍTICO MILONÍTICO DOMÍNIO SOCORRO	(zir) 642 ± 1^E	cristalização magmática
	(zir) 650 ± 2^E	herança
MIGMATITO ESTROMÁTICO COM NEOSSOMA DO GRANITO SOCORRO I	(zir) 655 ± 2^B 645 ± 12^B	

Tabela IX.1: idades ²⁰⁷Pb/²⁰⁶Pb em monazita e zircão para granulitos, charnokitos e granitos da Nappe Socorro-Guaxupé. ^A: Basei et al. (1995); ^B: Ebert et al. (1996); ^C: Topfner (1996); ^D: Janasi (1999); ^E: Hackspacher et al. (2003); ^F: Martins et al. (2009).

Os granitos tipo Nazaré Paulista dificilmente seriam área-fonte dos sedimentos, pois ocorrem como corpos pequenos associados às rochas metassedimentares (Janasi, 1999). São granitos anatóticos no Complexo Metamórfico Piracaia (Campos Neto et al., 1983; Janasi et al., 2005), Unidade Migmatítica Superior da Nappe Socorro-Guaxupé, que possuem cerca de 630 Ma (U-Pb TIMS em zircão) e cerca de 625 Ma (U-Pb TIMS em monazita).

O soerguimento e exumação da crosta média-superior da Nappe Socorro-Guaxupé, lobo Guaxupé, foi cinematicamente ativo até as intrusões rasas de rochas sieníticas isotrópicas há 612 Ma (Janasi, 1999). A partir de 590 Ma o lobo meridional desta nappe, Socorro, registrou, no magmatismo da Província Granítica Itú (Janasi et al., 2009) o intenso adelgaçamento litosférico e colapso do domínio orogênico interno.

Figura IX.2: ilustração comparativa dos intervalos de idades com concordância acima de 90% (em Ma) obtidas em zircões detríticos da amostra C-431 (em azul; azul claro: classe modal) com os intervalos de idade de granulitos, charnokitos, migmatitos, gnaisses, granitos, mangeritos, monzogranitos e sienitos da Nappe Socorro-Guaxupé descritos na tabela IX.1. Intervalo laranja (630 – 590 Ma) refere-se ao período máximo possível para a sedimentação definido pela idade do cristal de zircão detrítico mais jovem e pela idade do metamorfismo no sistema de nappes Carrancas.

Charnokitos e migmatitos de idade entre 655 Ma e 642 Ma pertencentes a Nappe Socorro-Guaxupé podem ter sido, em parte, a fonte de cristais detríticos de zircão, considerando os erros associados. Os cristais detríticos ao redor de 635 Ma (com seus erros associados) podem ter sido fornecidos pelas rochas ígneas sin-colisionais (granito tipo Pinhal, mangeritos da Supersuíte São José do Rio Pardo e batólito Socorro-Ipuiuna).

A classe modal de idades de zircão detrítico (663-667 Ma, figura VI.3) não está representada nas idades deste magmatismo plutônico cálcio-alcálico potássico e mangerítico da Nappe Socorro-Guaxupé. O substrato deste magmatismo são rochas plutônicas de arco: metatonalitos que ocorrem como paleossoma em migmatitos, granada enderbito gnaisses e granada granulitos básicos (Campos Neto e Caby, 2000). Destas, os granulitos máficos, intermediários e ácidos configuram uma suíte cálcio-alcálica, cujos dados isotópicos registram Nd TDM entre 2,29 Ga e 1,17 Ga e $\epsilon_{\text{Nd}_{625\text{Ma}}}$ entre -18,7 e 0,0 com predominância dos valores fracamente negativos, além de baixas razões iniciais de Sr_{625} (Janasi, 1999). Essas rochas, se de idades ainda desconhecidas, representam o registro neoproterozóico mais primitivo do arco magmático.

Gráficos $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_{625\text{Ma}}$ vs. $\epsilon_{\text{Nd}_{625\text{Ma}}}$ e Th/Sc vs. $\epsilon_{\text{Nd}_{625\text{Ma}}}$ foram elaborados e apresentados na **figura IX.3** para comparações, pois elementos traço como Th e Sc são transferidos quantitativamente para os sedimentos (McLennan et al., 1990) e o sistema Sm-Nd tende a permanecer fechado em condições até metamórficas (White, 2009). Os gráficos mostram que as amostras da unidade UBX plotam no campo dos granulitos cálcio-alcálicos da Nappe Socorro-Guaxupé. Corrobora assim a hipótese de que estas rochas, ou rochas vulcânicas co-genéticas, possam ter sido a fonte para os sedimentos da bacia.

Figura IX.2: diagramas. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ vs. ϵ_{Nd} e Th/Sc vs. ϵ_{Nd} para as amostras da unidade UBX, com os campos dos granulitos da Nappe Socorro-Guaxupé (Janasi, 1999).

A idade de 2224 Ma obtidas em um cristal de zircão detrítico sugere contribuição secundária de fonte mais antiga (Paleoproterozóico) para os sedimentos. As idades modelo-Nd no (entre 1,5 e 1,6 Ga podem representar uma mistura de fontes de idades diferentes, entre o Neoproterozóico e o Paleoproterozóico. Séries ortognáissicas paleoproterozóicas (Riaciano) e arqueanas (Neoarqueano) ocorrem no substrato do Sistema de Nappes Andrelândia (Campos Neto et al., 2011). Idades no Riachiano também foram obtidas em ortognaisses no interior de núcleos antiformais na Faixa Apiaí (Kaufuss, 2001; Ribeiro, 2006; Siga Jr et al., 2011) e está registrada em zircões herdados de granitóides neoproterozóicos desta mesma faixa orogênica (Prazeres Filho, 2005).

A distribuição unimodal de idades fim-Criogeniano dos cristais detríticos de zircão, a pouca representatividade de idades no Paleoproterozóico e a ausência de assinaturas químicas de margem passiva, inviabilizam o domínio cratônico (Cráton do São Francisco) como uma das áreas-fonte possíveis para as rochas da Unidade Biotita Xisto.

CAPÍTULO X

COMPARAÇÕES ENTRE A UNIDADE BIOTITA XISTO E A FORMAÇÃO CAMPESTRE

Para a análise de proveniência da Formação Campestre (FC) do Grupo Carrancas e sua comparação com a unidade UBX, foram realizadas análises químicas de elementos maiores (**tabela X.1**), menores e traços, análises isotópicas Sm, Nd e Sr do grafita-muscovita xisto e a determinação de idades absolutas em zircões detríticos de uma amostra de muscovita quartzito (CAR-II-179).

X.1. Geoquímica de elementos maiores e menores

As diferenças geoquímicas entre as amostras das unidades analisadas são marcantes no que se refere aos elementos maiores, principalmente nas concentrações dos óxidos de Fe^{3+} , Al^{3+} , Si^{4+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} e Na^+ (**tabela X.1**).

	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MnO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	P_2O_5
UBX	58,25 a 68,09	0,80 a 1,03	14,14 a 19,69	5,65 a 7,92	0,09 a 0,17	2,32 a 3,48	0,80 a 1,90	1,79 a 2,81	2,69 a 4,69	0,14 a 0,22
CAR-I-32	50,8 5	1,02	26,99	12,46	0,16	1,84	0,36	0,36	2,02	0,33
CAR-II-76	55,14	0,92	25,35	8,73	0,17	1,54	0,21	1,04	2,95	0,17
SC-07	58,17	1,00	22,77	6,86	0,11	1,37	0,04	0,99	4,07	0,09
SC-08	54,65	1,06	27,71	6,11	0,07	0,84	0,14	1,63	3,31	0,09
SC-30B	42,93	1,23	33,75	6,19	0,04	0,88	0,14	0,91	8,15	0,15
SC-30C	43,79	1,14	33,97	4,89	0,05	0,97	0,08	1,03	8,21	0,15

Tabela X.1: resultados obtidos para elementos maiores e menores por análises de FRX para amostras da Formação Campestre (em laranja). As amostras com sigla SC foram compiladas de Silva (2010). Os intervalos obtidos para as amostras da unidade UBX foram colocados para comparação (em azul). Valores em % peso de óxido.

Nos diagramas Harker ilustrados na **figura X.1** observa-se, para as amostras FC, correlações negativas entre SiO_2 e TiO_2 , Al_2O_3 e MgO e CaO e positiva entre SiO_2 e Na_2O e K_2O . Destaca-se que as amostras UBX exibem, para o K_2O , uma correlação negativa e apresentam maiores concentrações de SiO_2 , MgO , CaO , Na_2O e P_2O_5 e menores de TiO_2 , Fe_2O_3 e Al_2O_3 . Estas características provavelmente se devem ao fato de que as amostras do grafita-muscovita xisto da FC possuem maior concentração de minerais aluminosos e ricos em Fe, como cloritóide, estaurolita e granada. Por outro lado, as amostras da unidade UBX apresentam maiores proporções de quartzo, biotita e clorita, com a presença local de plagioclásio e apatita como mineral acessório principal.

Figura X.1: diagramas Harker para as amostras do do grafita-muscovita xisto da FC. Amostras da unidade UBX foram plotadas para comparação.

As amostras CAR-I-32, CAR-II-76, SC-07, SC-08 localizam-se na região da Serra do Pombeiro, e encontram-se sob condições metamórficas de fácies xisto-verde em presença de cloritóide. Estas são enriquecidas em SiO_2 , MgO , CaO , Fe_2O_3 , MnO e empobrecidas em TiO_2 , Al_2O_3 e K_2O quando comparadas com as amostras SC-30B e SC-30C localizadas na região da Serra das Bicas e sob condições de fácies anfibolito inferior em presença de estauroлита e granada, com cianita eventual. As concentrações de Na_2O e P_2O_5 são muito semelhantes e não apresentam diferenças quanto à região que em que as amostras foram coletadas.

As maiores concentrações de óxidos de alumínio e potássio e menores de SiO_2 nas amostras SC-30B e SC-30B respondem por maiores teores modais de muscovita, granada e estauroлита em relação ao quartzo, indicando sedimento predominantemente pelítico. Maior teor de cloritóide na amostra CAR-I-32 deve-se ao enriquecimento em ferro no pelito aluminoso original.

X.1.1. Classificação Química

Como os pelitos não são considerados na classificação de Pettijohn (1972), apenas o diagrama de Herron (1988) foi utilizado para a classificação dos xistos grafitosos (**figura X.2**).

Observa-se que as amostras do grafita-muscovita xisto da FC distanciam-se, no campo dos pelitos, das amostras UBX e destaca o caráter rico em ferro do metapelito CAR-I-32.

X.1.2. Chemical Index of Alteration (CIA)

Contrariamente às amostras da unidade UBX, valores intermediários a altos de CIA foram obtidos para as amostras do grafita-muscovita xisto da FC (**tabela X.2**), entre 76 e 88,72. Essas relações favorecem uma intensa reciclagem e alteração do sedimento original, compatíveis com ciclos longos e/ou repetitivos de intemperismo químico, ou períodos de extremas condições de clima quente e úmido.

No gráfico ternário A (Al_2O_3) – CN ($\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O}$) – K (K_2O) de avaliação de intensidade de intemperismo (**figura X.3**) as amostras do grafita-muscovita xisto da FC da Serra do Pombeiro plotam no estágio final do *trend* de alteração de rochas com composição

inicial semelhante a da crosta continental superior, mais rica em feldspato potássico do que plagioclásio, diferenciando-as das amostras da unidade UBX.

Figura X.2: amostras da unidade UBX e grafita-muscovita xisto da FC plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Herron (1988).

Amostra	CIA
UBX	58,41 a 70,26
CAR-I-32	88,72
CAR-II-76	82,75
SC-07	78,85
SC-08	80,96
SC-30B	76,15
SC-30C	76,00

Tabela X.2: valores de CIA para as amostras do grafita- muscovita xisto analisadas neste trabalho e por Silva (2010). CIA = $[Al_2O_3 / (Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O)] * 100$; óxidos em proporção molecular.

Os índices de alteração química são menores para as amostras ricas em alumínio da região da Serra das Bicas provavelmente porque estas são extremamente enriquecidas em potássio, elemento químico que tende a se concentrar em argilominerais. O enriquecimento

em potássio pode estar relacionado com fontes ricas em feldspato potássico, ou com formação de argilominerais autigênicos na diagênese.

X.2. Geoquímica de elementos traços

Os valores obtidos para elementos traço pelos métodos de FRX e ICP-MS e suas respectivas razões e valores normalizados (condrito Taylor e McLennan, 1985) estão apresentados nas **tabelas X.3 e X.4**.

Figura X.3: amostras analisadas plotadas no diagrama ternário da fração molar de Al_2O_3 (A) – $CaO + Na_2O$ em silicatos (CN) – K_2O (K) extraído, modificado e traduzido de McLennan et al. (1990).

Apesar de os teores de Zr e Hf dos grafita-muscovita xistos analisados apresentarem correlação positiva com SiO_2 , sugerindo que zircão sofreu fracionamento hidrodinâmico como na unidade UBX, apenas duas amostras foram analisadas, portanto padrões destes elementos químicos traço não devem ser estabelecidos com segurança.

No diagrama *spider* (**figura X.4**) o grafita-muscovita xisto apresenta empobrecimento em Cs, Rb, Nb, Sr, Hf, Zr e ETRP e enriquecimento em Th, U, La, Ce, Nd e Sm. O empobrecimento em Hf, Zr e ETRP sugere fracionamento de minerais pesados no sedimento pelítico, concentrado em frações arenosas correlatas, durante períodos de alta energia, ou constante retrabalhamento do depósito, por um longo período de tempo, se em ambiente de menor energia.

Destacam-se menores concentrações de Rb e Ba, apesar da relativamente alta concentração de K. Provavelmente aqueles elementos foram solubilizados durante o intemperismo químico.

Quando comparadas as unidades, as amostras FC apresentam menores teores de Cs, Rb, Tm e Yb e maiores concentrações de Th, U, Nb e Ce.

	CAR-I-32	CAR-II-76
Co	21,6	18,2
Cr	110,8	144,9
Cu	26,2	14,8
Ga	35,5	33,3
Ni	20,2	30,4
Pb	19,3	24,3
Rb	82,3	126,6
Sc	17,6	19,2
Th	21,10	14,60
V	144,3	151,8
Zn	121,5	96,2
Zr	165,5	180,1
Th/Sc	1,20	1,10
Cr/V	0,77	0,95

Tabela X.3: razões e concentrações de elementos traço obtidas pelo método de FRX para as amostras do grafita-muscovita xisto da Formação Campestre.

	CAR-I-32	CAR-II-76
Sr	94,06	131,28
Y	19,56	12,36
Nb	23,50	15,40
Cs	1,47	3,02
Ba	299,06	408,39
La	70,47	37,96
Ce	160,51	113,27
Pr	13,74	8,26
Nd	49,53	30,07
Sm	8,16	5,21
Eu	1,74	1,11
Gd	5,34	3,39
Tb	0,69	0,45
Dy	3,35	2,12
Ho	0,60	0,39
Er	1,62	1,04
Tm	0,22	0,14
Yb	1,42	0,90
Lu	0,21	0,13
Hf	4,13	4,49
Pb	14,44	20,59
Th	21,81	14,81
U	4,94	3,88
La _N	128,00	68,95
Ce _N	111,82	78,91
Pr _N	66,84	40,19
Nd _N	46,44	28,19
Sm _N	23,55	15,05
Eu _N	13,32	8,49
Gd _N	11,63	7,39
Tb _N	7,93	5,15
Dy _N	5,86	3,72
Ho _N	4,72	3,06
Er _N	4,34	2,79
Tm _N	4,12	2,68
Yb _N	3,83	2,42
Lu _N	3,67	2,33
Σ ETR	494,71	349,39
Σ ETRL	376,65	231,29
Σ ETRP	46,10	29,54
Eu _N /Eu*	0,81	0,80
La _N /Yb _N	33,43	28,50
La _N /Sm _N	5,44	4,58
Gd _N /Yb _N	3,04	3,05

Tabela X.4: razões e concentrações de elementos traço obtidas pelo método de ICP-MS para as amostras do grafita-muscovita xisto da Formação Campestre.

Figura X.4: diagrama *spider* das concentrações de elementos traço das amostras do grafita-muscovita xisto da FC (laranja) e da unidade UBX (azul claro e escuro), normalizado segundo os valores médios da crosta continental superior sugeridos por Taylor e McLennan (1995).

X.2.1. Elementos Terras Raras (ETR)

Os padrões de ETR indicam diferenças marcantes de assinatura entre as rochas destas unidades (**figura X.5**).

As amostras CAR-I-32 e CAR-II-76 apresentam forte fracionamento de ETR ($La_N/Yb_N = 33,43 - 28,50$), de ETRP ($Gd_N/Yb_N = 3,04$ e $3,05$), ETRL ($La_N/Sm_N = 5,44 - 4,58$) e anomalia negativa de Eu de 0,805 para ambas amostras. Os valores de ETRL são maiores e os de ETRP menores do que aqueles sugeridos para a crosta continental superior pós-Arqueana (PAAS e NASC).

Anomalias de Eu baixas sugerem que rochas geradas por processos de diferenciação na crosta, relacionadas com cristalização fracionada de plagioclásio, não foram tão importantes na proveniência dos sedimentos precursores do grafita-muscovita xisto quanto na unidade UBX, mas atuaram de maneira secundária vista a anomalia de Sr no diagrama *spider*. Entretanto, como se tratam de metapelitos, deve-se considerar o fracionamento de minerais

pesados durante os processos de deposição sedimentar, o que causaria o empobrecimento em ETRP nas rochas pelíticas ocasionando forte fracionamento de ETR.

Figura X.5: Diagrama com normalização condrito de Taylor & McLennan (1985) mostrando o padrão de Elementos Terras Raras das amostras do xisto grafitos em comparação com as amostras da unidade UBX analisadas e com os valores médios da crosta superior PAAS e NASC.

X.2.2. Razões Th/Sc e Cr/V

Os valores das razões Th/Sc e Cr/V (**figura X.7**) para as amostras CAR-I-32 e CAR-II-76 foram muito variados, não permitindo uma caracterização da assinatura geoquímica da área-fonte do sedimento (CAR-I-32: $Th/Sc = 1,24$ e $Cr/V = 0,76$; CAR-II-76: $Th/Sc = 0,77$ e $Cr/V = 0,95$). Entretanto, pode-se observar que a amostra que possui maior razão Th/Sc apresenta menor razão Cr/V e maior valor para CIA, em relação à outra.

Figura X.6: gráfico de fracionamento de ETRP vs. Anomalia de Eu com as amostras do grafita-muscovita xisto da FC. As amostras da unidade UBX foram plotadas para comparação. Para linhas $Eu/Eu^* = 0,85$ e $Gd_N/Yb_N = 2,0$ veja capítulo VI.

Comparadas às amostras da unidade UBX as amostras FC também apresentam valores para a razão Th/Sc próximos de 1,0 e para a razão Cr/V menor do que 1,0, o que indica que rochas máfico-ultramáficas não foram importantes na proveniência dos sedimentos.

X.2.3. Reciclagem sedimentar

Os valores de Hf obtidos para as amostras CAR-I-32 e CAR-II-76 (**tabela X.3**) são semelhantes aos valores para a crosta continental superior (**capítulo III – tabela III.8**).

Com base nas relações Th/Sc vs Zr/Sc, as amostras da FC, assim como da UBX, não registram influência de processos de reciclagem sedimentar (**figura X.8**), pois não houve enriquecimento e concentração de minerais pesados, indicado pelas razões unitárias obtidas (e pela ausência de anomalia em Hf).

Figura X.7: Diagrama CIA vs. Th/Sc, CIA vs. Eu/Eu* e Eu/Eu* vs. Cr/V para as amostras do grafita-muscovita xisto e da unidade UBX.

	Hf (ppm)	Zr/Sc	Th/Sc
UBX	4,18 a 5,94	10,14 a 13,95	0,68 a 1,13
CAR-I-32	4,13	9,40	1,20
CAR-II-76	4,49	9,38	1,10
Crosta Continental Superior	5,8 ^A	14,0 ^A	0,79 ^A
	4,3 ^B	12,0 ^B	0,64 ^B
	5,3 ^C	13,8 ^C	0,75 ^C
Crosta Continental Média	4,4 ^C	7,8 ^C	0,34 ^C
Crosta Continental Inferior	2,1 ^A	2,0 ^A	0,05 ^A

Tabela X.3: valores das razões La/Sc, Th/Sc e Zr/Sc para as amostras do grafita-muscovita xisto analisadas e valores de referência para crosta continental superior, média e inferior. ^A: Taylor e McLennan (1985, 1995, 2001); ^B: Condie (1993); ^C: Rudnick e Gao (2003).

Figura X.8: gráfico Zr/Sc vs. Th/Sc extraído de McLennan et al. (1993) para as amostras do grafita-muscovita xisto e da unidade UBX que mostra a intensidade da reciclagem sedimentar do sedimento e a sua composição em relação às composições do manto e da crosta continental superior. Valores médios para a crosta continental superior, média, inferior e para a composição global da crosta continental sugeridos por Taylor e McLennan (1985, 1995, 2001), Condie (1993), Rudnick e Fountain (1995) e Rudnick e Gao (2003) foram plotados para comparação.

X.3. Assinatura isotópica

Três amostras do grafita-muscovita xisto (CAR-I-32, CAR-II-72 e CAR-IX-11) foram analisadas para obtenção das razões isotópicas $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, entretanto, apenas duas destas, por terem sido encaminhadas para a FRX, apresentam dados de concentrações de Rb e Sr em ppm, o que limitou em duas amostras os dados isotópicos da razão $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ dificultando o estabelecimento de idades relativas por este método.

Os dados obtidos para a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ foram maiores e da razão $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ menores do que os obtidos para a unidade UBX (**tabela X.7**), o que sugere que as amostras da FC tiveram um maior período de residência crustal. A amostra CAR-I-32 apresentou perda de Rb, provavelmente devido à alteração química durante intemperismo, pois esta possui o maior valor de CIA (88,72) entre as amostras do grafita-muscovita xisto.

Os valores da razões isotópicas, das idades modelo, $\epsilon\text{Nd}_{\text{TDM}}$ para as amostras do grafita-muscovita xisto da FC (CAR-I-32, CAR-II-76 e CAR-IX-11) são apresentados nas

tabelas X.8 e X.9. Os valores de ϵ_{Nd} foram recalculados para 590 Ma, idade obtida por Campos Neto et al. (2011) e Valeriano et al. (2004) para o metamorfismo regional.

O grafita-muscovita xisto apresenta valores de Sm_{ppm} , Nd_{ppm} , $\epsilon_{(0)}$ e idades modelo T_{DM} maiores, valores para $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$, $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ e ϵ_{TDM} menores e ϵ_{590} mais negativos do que os apresentados pelas amostras da unidade UBX.

As idades modelo T_{DM} variam de 2,05 a 2,46 Ga (**figura X.9**) e os valores de $\epsilon_{\text{Nd}_{590}}$, fortemente negativos, estão no intervalo entre -18,47 e -15,99.

	Rb (ppm)	Sr (ppm)	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	erro (2 σ)	$^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_{590}$
UBX	121,80 –	67,70 –	0,7325 –	-	2,2005 –	0,7139 –
	161,70	168,00	0,7706		6,4310	0,7169
CAR-I-32	82,30	129,10	0,7473	0,00005	1,7163	0,7329
CAR-II-76	126,60	166,50	0,7493	0,00005	2,0473	0,7320
CAR-IX-11	-	-	0,7630	0,00007	-	-

Tabela X.7: dados isotópicos e elementais do sistema Rb-Sr para as amostras do grafita-muscovita xisto da FC (em laranja). Valores obtidos para as amostras da unidade UBX foram colocados para comparação (em azul).

$$^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} = (\text{Rb}_{\text{ppm}}/\text{Sr}_{\text{ppm}}) * 2.8937 * 0.93047; \quad ^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i = ^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} - ^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} (\lambda t).$$

Amostra	Sm (ppm)	Nd (ppm)	$^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$	erro ¹	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$	T_{DM} (Ga)	$\epsilon_{(590\text{Ma})}$
UBX	3,685 a	18,901 a	0,1106 a	-	0,5120 a	1,550 a	-6,251 a
	13,418	73,351	0,1207		0,5121	1,627	-5,472
CAR-I-32	15,599	97,337	0,097	$1.2 * 10^{-5}$	0,5113	2,27	-18,47
CAR-II-76	33,127	216,790	0,092	$7.0 * 10^{-6}$	0,5114	2,05	-15,99
CAR-IX-11	12,380	69,118	0,108	$1.0 * 10^{-5}$	0,5114	2,46	-18,42

Tabela X.8: dados isotópicos e elementais do sistema Sm-Nd para as amostras do grafita-muscovita xisto da FC (em laranja). Valores obtidos para as amostras da unidade UBX foram colocados para comparação (em azul).

Branco analítico para Sm = 47 pg e para Nd = 114 ; Razão isotópica $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ calculada a partir da equação: = $[(\text{Conc Sm}/\text{Conc Nd}) * 0,604491]$; Razões isotópicas $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ normalizadas para o valor de 0,7219 (DePaolo, 1981); Valor médio para a razão $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ do padrão JNdi = $0,512100 \pm 0,000004$; Idade Modelo T_{DM} calculada pela equação: = $\{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{am}}/0,512638] - 1\} * 10^4$, onde $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}_{\text{CHUR}} = 0,512638$ (Hamilton et al., 1983); $\epsilon_{\text{Nd}}(0)$ corresponde ao valor atual ($t = 0$) e é calculado segundo a equação: = $\{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{am}}/0,512638] - 1\} * 10^4$.

Considerando que idades-modelo de rochas sedimentares representam a mistura de diferentes rochas presentes na área-fonte (McCulloch e Wasseburg, 1978) e que o sistema Sm-Nd não sofre alterações significativas durante o metamorfismo, as idades T_{DM} obtidas no Paleoproterozóico indicam que a área-fonte dos sedimentos precursores do grafita-muscovita xisto era composta por rochas mais antigas que as que originaram as rochas da unidade UBX. Valores de ϵ_{Nd} entre -18,47 e -15,99 para 590 Ma confirmam a longa residência na crosta do Nd.

A **figura X.10** mostra gráficos elaborados por diversos autores para a classificação quanto ao ambiente tectônico de deposição de rochas sedimentares. Destaca-se uma proveniência de crosta continental superior com componente de crosta antiga associado (ϵ_{Nd} fortemente negativo e altos valores para a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$), diferenciando-as da unidade UBX que apresenta compatibilidade química com sedimentos gerados a partir da erosão de crosta continental superior e de arco magmático (**figuras X.10 A e B**).

Figura X.9: gráfico T (Ga) vs. $\epsilon_{Nd(t)}$ para as amostras do grafita-muscovita xisto da FC (em laranja). Valores da unidade UBX foram colocados para comparação (em azul). Dados de $\epsilon_{Nd}(t)$ recalculados para 590 e 610 Ma.

Figura X.10: diagramas de classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição. ϵ_{Nd} e razões $^{87}Sr/^{86}Sr$ foram recalculados para 590 Ma (idade do metamorfismo). Gráficos extraídos e traduzidos de McLennan et al. (1990).

X.4. U-Pb em cristais de zircão detrítico

A amostra CAR-II-179 pertencente a um quartzito lenticular nos grafita-muscovita xistos do topo da Formação Campestre, em uma zona de charneira sinformal na Serra do Pombeiro, foi preparada para separação de cristais de zircão detríticos.

Os cristais variam de 65 a 200 μm , sendo que a maioria apresenta zoneamento de crescimento episódico concêntrico e truncado, com cristais arredondados predominantes sobre os prismáticos e subarredondados. Alguns grãos apresentam uma auréola sobrecrecida, sem zoneamento interno e irregular, com espessuras que chegam a 18 μm . Ocorrem, subordinadamente, cristais com zoneamento paralelo ao eixo C e com padrão irregular de alternância entre bandas claras e escuras, por vezes convergentes.

Foram separados 128 cristais de zircão (**figura X.11**) e 91 pontos (**figura X.12**) de análises por U-Pb LA-MC-ICPMS foram realizados. Destes, 51% apresentaram valores de concordância entre acima de 90% (**tabelas X.10 e X.11**).

As análises pontuais em cristais metamíticos, com coloração amarelada e intensamente fraturados, indicaram baixa concordância (abaixo de 80%) e perda de Pb.

As **figuras X.13 A e B** mostram a distribuição dos cristais de zircão do quartzito da FC, com predomínio de cristais com idade $^{206}Pb/^{207}Pb$ no Mesoproterozóico entre 1576 e 1020 Ma (55% dos dados, 60 % destes entre 1450 e 1150 Ma), e no Paleoproterozóico entre 2455 e 1766 Ma (36.6% dos dados, dos quais 40% entre 2104 e 2216 Ma). Dois cristais

fornececeram idades no Neoproterozóico de 882 ± 49 Ma e 798 ± 79 Ma e outros três cristais apresentaram idades no Arqueano de 2751 ± 50 Ma, 2631 ± 50 Ma e 2626 ± 37 Ma.

Ponto	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	2s error	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	2s error	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	2s error	rho
1.1	5,02540	0,22107	0,33333	0,01429	0,1357	0,0034	0,948
2.1	5,73263	0,29301	0,32664	0,01449	0,1100	0,0011	0,846
3.1	5,00851	0,22465	0,27350	0,01185	0,1347	0,0016	0,940
4.1	2,58632	0,11465	0,22846	0,00981	0,0816	0,0009	0,943
5.1	5,64146	0,25721	0,27358	0,01195	0,1511	0,0020	0,933
6.1	5,03314	0,24533	0,32428	0,01507	0,1111	0,0016	0,931
7.1	1,47393	0,15511	0,10640	0,01018	0,1043	0,0046	0,904
8.1B	3,75315	0,17321	0,28696	0,01236	0,0974	0,0016	0,908
8.2B	3,47889	0,15472	0,27146	0,01167	0,0950	0,0011	0,940
8.3N	3,64234	0,16171	0,28438	0,01213	0,0923	0,0011	0,934
9.1	1,64571	0,08447	0,15550	0,00695	0,0718	0,0018	0,849
10.1	8,24707	0,54843	0,36303	0,02245	0,1618	0,0040	0,918
11.1	2,80822	0,18365	0,21184	0,01232	0,0988	0,0030	0,876
12.1	2,19230	0,08183	0,20342	0,00671	0,0791	0,0014	0,843
13.1	3,07364	0,13806	0,24849	0,00952	0,0913	0,0021	0,824
14.1	6,46497	0,21463	0,37133	0,01184	0,1263	0,0012	0,914
15.1	2,68165	0,09588	0,22744	0,00732	0,0879	0,0014	0,857
16.1	3,23294	0,11977	0,17066	0,00595	0,1436	0,0018	0,902
17.1	6,21489	0,21601	0,36529	0,01213	0,1228	0,0013	0,912
18.1	7,18359	0,23709	0,39611	0,01262	0,1315	0,0011	0,918
19.1	4,76976	0,17427	0,28192	0,00986	0,1251	0,0013	0,918
20.1	2,02167	0,09595	0,18723	0,00836	0,0775	0,0012	0,917
21.1	2,00907	0,08069	0,18745	0,00646	0,0790	0,0016	0,823
22.1	3,56809	0,12103	0,26944	0,00871	0,0959	0,0010	0,907
23.1	6,20247	0,20644	0,36147	0,01160	0,1245	0,0011	0,917
24.1	2,40114	0,08276	0,20943	0,00674	0,0837	0,0010	0,888

25.1	7,17306	0,26256	0,39349	0,01293	0,1333	0,0021	0,856
26.1	7,31186	0,25706	0,40290	0,01305	0,1304	0,0018	0,878
27.1	3,17494	0,10793	0,24954	0,00793	0,0911	0,0011	0,889
28.1	3,19609	0,10804	0,25576	0,00810	0,0902	0,0011	0,890
29.1	4,83061	0,16779	0,29123	0,00932	0,1222	0,0017	0,876
30.1	1,88984	0,07624	0,14132	0,00520	0,1034	0,0017	0,878
31.1	4,78325	0,16605	0,31849	0,01031	0,1083	0,0014	0,888
32.1	1,56261	0,06109	0,16575	0,00543	0,0684	0,0015	0,799
33.1	6,40775	0,22522	0,38154	0,01262	0,1241	0,0015	0,898
34.1	7,69706	0,30514	0,38509	0,01292	0,1487	0,0031	0,808
35.1	10,47779	0,46308	0,46451	0,01838	0,1599	0,0032	0,867
36.1	2,79838	0,11898	0,23505	0,00901	0,0867	0,0016	0,871
37.1	2,49605	0,09019	0,21857	0,00708	0,0809	0,0013	0,854
38.1	5,93469	0,23182	0,28115	0,00983	0,1545	0,0027	0,859
39.1	13,61964	0,59923	0,52517	0,02070	0,1911	0,0037	0,867
40.1	2,81376	0,11710	0,23966	0,00894	0,0867	0,0016	0,864
41.1	2,99098	0,11702	0,24458	0,00849	0,0883	0,0016	0,851

Continuação tabela X.10: razões $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros (1σ) e os valores de rho da amostra C-431 da unidade UBX.

Ponto	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	2s error	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	2s error	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	2s error	rho
42.1	2,83124	0,11203	0,23905	0,00847	0,0859	0,0015	0,859
43.1	1,77236	0,07259	0,17534	0,00623	0,0732	0,0015	0,834
44.1	1,08761	0,05657	0,12236	0,00455	0,0657	0,0024	0,689
45.1	3,38806	0,15051	0,26460	0,01062	0,0937	0,0018	0,876
46.1	0,93780	0,04536	0,09159	0,00392	0,0742	0,0017	0,862
47.1	2,56242	0,13224	0,22305	0,01035	0,0854	0,0019	0,878
48.1	2,74142	0,12969	0,22675	0,00916	0,0854	0,0021	0,828
49.1	2,38478	0,11376	0,20791	0,00884	0,0832	0,0018	0,866
50.1	2,20665	0,11547	0,20055	0,00888	0,0824	0,0023	0,824
51.1	7,95140	0,35330	0,42256	0,01663	0,1391	0,0029	0,857
52.1	10,59977	0,44398	0,43856	0,01617	0,1771	0,0035	0,848
53.1	2,85295	0,11992	0,21781	0,00800	0,0965	0,0020	0,842
54.1	1,94815	0,08366	0,15472	0,00554	0,0928	0,0022	0,802
55.1	1,65078	0,06984	0,12845	0,00469	0,0934	0,0020	0,831
56.1	3,62334	0,15422	0,27724	0,00978	0,0953	0,0023	0,796
57.1	1,56321	0,08216	0,12705	0,00587	0,0870	0,0022	0,859
58.1	2,10404	0,08982	0,19027	0,00693	0,0811	0,0018	0,821
59.1	1,80246	0,08090	0,16800	0,00617	0,0760	0,0020	0,789
60.1	1,46320	0,06381	0,13693	0,00521	0,0752	0,0016	0,842
61.1	2,87875	0,12072	0,18892	0,00685	0,1121	0,0024	0,832
62.1	6,58294	0,29263	0,36027	0,01431	0,1350	0,0027	0,865
63.1	1,48118	0,08147	0,11193	0,00549	0,1002	0,0025	0,874
64.1	5,50030	0,28617	0,34212	0,01758	0,1171	0,0010	0,969
65.1	5,86608	0,30726	0,36016	0,01867	0,1192	0,0009	0,971
66.1	6,85827	0,38539	0,36641	0,02023	0,1362	0,0014	0,966

67.1	6,96288	0,35888	0,38434	0,01960	0,1334	0,0010	0,970
68.1	6,69682	0,34739	0,36926	0,01892	0,1333	0,0011	0,969
69.1	3,68239	0,22243	0,13766	0,00772	0,1925	0,0043	0,913
70.1	2,55165	0,13624	0,16128	0,00843	0,1158	0,0013	0,961
71.1	8,40822	0,47045	0,34055	0,01849	0,1804	0,0024	0,954
72.1	3,29627	0,17101	0,22338	0,01138	0,1084	0,0011	0,963
73.1	6,00504	0,36416	0,35915	0,02116	0,1229	0,0018	0,958
74.1	4,20885	0,23344	0,28582	0,01477	0,1080	0,0022	0,915
75.1	4,39267	0,23122	0,26159	0,01358	0,1256	0,0011	0,968
76.1	1,88841	0,09563	0,17260	0,00864	0,0806	0,0006	0,969
75.1	11,04614	0,62691	0,45991	0,02251	0,1777	0,0051	0,844
76.1	3,18486	0,19663	0,20670	0,01016	0,1132	0,0042	0,780
77.1	1,73290	0,09205	0,13950	0,00639	0,0959	0,0026	0,842
78.1	3,63312	0,16552	0,27243	0,01037	0,0945	0,0024	0,807
79.1	3,64799	0,16772	0,27392	0,01049	0,0952	0,0024	0,804
80.1	2,24067	0,13868	0,13932	0,00761	0,1170	0,0034	0,868
81.1	3,06021	0,13550	0,16670	0,00635	0,1373	0,0031	0,831

Continuação tabela X.10: razões $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros (1σ) e os valores de rho da amostra C-431 da unidade UBX.

Ponto	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	2s error	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	2s error	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	2s error	rho
82.1	2,69858	0,12322	0,13814	0,00556	0,1466	0,0032	0,854
83.1	5,83587	0,26823	0,33198	0,01334	0,1284	0,0029	0,847
84.4	5,71600	0,26154	0,25521	0,01012	0,1697	0,0039	0,839
85.1	9,69102	0,43854	0,30500	0,01196	0,2334	0,0053	0,838
86.1	3,24671	0,18146	0,20316	0,01016	0,1132	0,0028	0,877
87.1	5,31771	0,23783	0,29642	0,01165	0,1311	0,0028	0,850

Continuação tabela X.10: razões $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros (1σ) e os valores de rho da amostra C-431 da unidade UBX.

Ponto	error (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ Idade (Ma)	error (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ Idade (Ma)	error (Ma)	% Disc
1.1	68,70	1823,61	36,59	2173,53	47,6	18,5
2.1	70,00	1936,30	43,26	1799,76	25,6	-3,5
3.1	59,69	1820,76	37,27	2160,19	26,8	31,3
4.1	51,30	1296,77	31,95	1236,05	29,1	-8,1
5.1	60,21	1922,46	38,58	2358,34	28,1	38,1
6.1	72,94	1824,91	40,47	1817,44	32,3	0,4
7.1	59,03	919,74	61,74	1702,78	82,8	64,8
8.1B	61,63	1582,79	36,34	1575,78	36,2	-3,6
8.2B	58,88	1522,44	34,48	1528,72	28,6	-1,4
8.3N	60,57	1558,83	34,77	1474,07	30,2	-10,7
9.1	38,64	987,91	31,91	980,61	55,3	5,4
10.1	105,29	2258,52	58,50	2474,95	44,6	22,4
11.1	65,22	1357,73	47,82	1601,62	58,8	24,9

12.1	35,85	1178,60	25,70	1173,72	39,8	-1,9
13.1	48,98	1426,14	33,84	1453,63	48,5	1,8
14.1	55,44	2041,14	28,78	2047,20	24,0	0,7
15.1	38,34	1323,41	26,11	1380,15	35,5	4,7
16.1	32,66	1465,09	28,33	2271,36	27,7	59,6
17.1	57,04	2006,55	29,95	1997,80	25,4	-0,5
18.1	58,01	2134,47	29,00	2118,68	23,1	-1,8
19.1	49,39	1779,59	30,21	2029,88	25,8	23,8
20.1	45,24	1122,82	31,74	1134,40	37,7	2,7
21.1	35,00	1118,58	26,87	1171,78	45,3	6,0
22.1	44,06	1542,46	26,55	1545,13	27,0	0,5
23.1	54,69	2004,80	28,69	2021,96	23,6	1,9
24.1	35,81	1242,94	24,41	1285,60	31,0	5,1
25.1	59,54	2133,16	32,11	2142,37	33,2	0,2
26.1	59,70	2150,26	30,93	2103,63	29,7	-4,4
27.1	40,79	1451,08	25,92	1449,42	29,8	1,0

Tabela X.11: idades $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros e os valores de concordância da amostra C-431 da unidade UBX.

	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ Idade (Ma)	error (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ Idade (Ma)	error (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ Idade (Ma)	error (Ma)	% Disc
28.1	1468,10	41,45	1456,21	25,81	1428,96	29,5	-3,1
29.1	1647,65	46,36	1790,24	28,81	1989,07	29,9	19,4
30.1	852,14	29,29	1077,52	26,44	1685,18	35,7	52,7
31.1	1782,35	50,23	1781,96	28,74	1771,82	29,2	-0,7
32.1	988,64	29,95	955,50	23,92	881,69	49	-13,1
33.1	2083,47	58,63	2033,33	30,41	2015,86	27,5	-3,9
34.1	2100,01	59,84	2196,26	35,01	2331,52	40,0	11,6
35.1	2459,45	80,39	2477,95	40,16	2454,74	37,4	-0,2
36.1	1360,93	46,88	1355,11	31,32	1353,52	40,3	-0,6
37.1	1274,29	37,35	1270,89	25,86	1219,90	37,1	-4,9
38.1	1597,13	49,28	1966,33	33,39	2396,48	34,1	37,6
39.1	2721,07	86,91	2723,63	40,79	2751,42	36,1	1,4
40.1	1384,93	46,30	1359,21	30,71	1352,88	40,5	-2,6
41.1	1410,47	43,84	1405,33	29,34	1388,12	39,6	-1,8
42.1	1381,77	43,89	1363,85	29,26	1335,54	39,2	-3,8
43.1	1041,46	34,09	1035,39	26,24	1019,63	45,9	-2,3
44.1	744,13	26,09	747,34	27,15	797,71	79	7,1
45.1	1513,34	53,93	1501,64	34,24	1501,11	40,6	-0,9
46.1	564,94	23,14	671,73	23,49	1048,15	49,5	48,1
47.1	1297,95	54,31	1289,98	37,01	1325,70	47,9	2,3
48.1	1317,44	47,97	1339,76	34,60	1325,41	51,4	0,7
49.1	1217,66	47,00	1238,05	33,57	1274,94	46,5	4,9
50.1	1178,28	47,49	1183,15	35,92	1254,90	58,0	6,7
51.1	2272,07	74,92	2225,53	39,31	2216,28	39,7	-3,0
52.1	2344,21	72,06	2488,69	38,14	2625,97	37,0	12,8

53.1	1270,32	42,22	1369,59	31,12	1557,03	42,7	20,3
54.1	927,37	30,88	1097,81	28,41	1483,18	48,7	40,2
55.1	779,04	26,74	989,85	26,41	1495,25	44,6	50,8
56.1	1577,43	49,19	1554,67	33,32	1533,69	48,6	-3,2
57.1	771,03	33,50	955,74	32,03	1361,06	51,9	46,0
58.1	1122,83	37,42	1150,13	28,96	1224,27	48,0	9,0
59.1	1001,09	33,99	1046,35	28,90	1094,43	55,3	9,2
60.1	827,29	29,48	915,33	25,97	1072,85	47,3	24,4
61.1	1115,55	37,06	1376,37	31,12	1833,50	42,2	42,6
62.1	1983,45	67,46	2057,06	38,45	2163,49	38,9	9,7
63.1	683,92	31,76	922,71	32,80	1627,09	49,8	61,0
64.1	1896,85	83,89	1900,64	43,75	1912,60	23,2	1,0
65.1	1982,93	87,88	1956,23	44,45	1944,66	22,4	-2,3
66.1	2012,49	94,73	2093,28	48,61	2179,50	25,2	8,9
67.1	2096,52	90,63	2106,71	44,76	2143,01	21,8	2,5
68.1	2025,91	88,48	2072,20	44,82	2142,38	22,4	6,3
69.1	831,40	43,57	1567,56	47,12	2763,94	40,5	74,3
70.1	963,86	46,61	1286,91	38,22	1891,80	26,7	52,7

Tabela X.11: idades $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros e os valores de concordância da amostra C-431 da unidade UBX.

	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ Idade (Ma)	error (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$ Idade (Ma)	error (Ma)	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ Idade (Ma)	error (Ma)	% Disc
71.1	1889,33	88,29	2276,07	49,54	2656,72	27,9	33,2
72.1	1299,68	59,70	1480,17	39,63	1772,39	25,5	29,4
73.1	1978,14	99,59	1976,58	51,46	1998,46	31,1	1,2
74.1	1620,59	73,65	1675,75	44,52	1766,27	41,0	9,3
75.1	1497,98	69,01	1710,96	42,63	2037,07	23,5	29,6
76.1	1026,41	47,34	1077,02	33,07	1212,68	24,6	16,6
75.1	2439,17	98,65	2527,03	51,51	2631,45	50,5	8,8
76.1	1211,20	54,04	1453,49	46,62	1850,67	69,9	37,8
77.1	841,84	36,05	1020,83	33,64	1544,91	53,9	48,5
78.1	1553,15	52,35	1556,82	35,64	1518,34	50,8	-2,6
79.1	1560,69	52,85	1560,07	35,99	1531,52	51,5	-2,1
80.1	840,82	42,92	1193,87	42,55	1910,92	55,2	59,6
81.1	993,92	35,02	1422,79	33,33	2193,18	42,8	58,9
82.1	834,15	31,40	1328,07	33,28	2306,97	40,9	67,9
83.1	1847,98	64,22	1951,75	39,08	2076,16	43,1	12,6
84.4	1465,29	51,76	1933,79	38,79	2554,32	41,7	47,5
85.1	1716,05	58,81	2405,85	40,82	3075,46	39,4	50,1
86.1	1192,27	54,23	1468,39	42,49	1850,63	48,5	38,9
87.1	1673,53	57,65	1871,71	37,52	2112,57	41,4	23,6

Tabela X.11: idades $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$, seus respectivos erros e os valores de concordância da amostra C-431 da unidade UBX.

Figura X.11: cristais de zircão detrítico da amostra CAR-II-179 separados para análise do sistema U-Pb.

As duas idades neoproterozóicas foram obtidas na borda de dois cristais bipiramidados, ambos com delgada auréola de sobrecrecimento, de larguras inferiores ao *spot* laser. As idades 1019 ± 46 Ma e 798 ± 79 Ma foram obtidas na mesma posição em um mesmo cristal zonado (**figura X.12**), aquela no limite Neoproterozóico-Mesoproterozóico é a que apresenta melhor concordância e menor erro associado (**tabela X.12**). Os cristais de idade arqueana são variados, sendo o mais antigo arredondado e sem zoneamento de crescimento aparente. Apresentam delgada borda de sobrecrecimento texturalmente amorfa.

As idades T_{DM} entre 2,46 e 2,05 Ga obtidas para o grafita-muscovita xisto devem, assim, representar uma mistura de sedimentos de proveniência diversa, do Arqueano ao Neoproterozóico, com predomínio de uma área fonte Mesoproterozóica.

A idade máxima para a sedimentação da Formação Campestre foi de 790 Ma.

X.5. Prováveis áreas-fonte

Idades paleoproterozóicas e arqueanas como as obtidas para o quartzito da Formação Campestre são facilmente encontradas no Cráton São Francisco (**figura X.14**) que apresenta granitóides de idades paleoproterozóicas Sideriano-Riacianas, entre 2,5 e 2,1 Ga e rochas

ígneas vulcânicas Estaterianas, entre 1760 e 1710 pertencentes ao Supergrupo Espinhaço (Machado et al., 1989; Schobbenhaus et al., 1994; Dussin e Dussin, 1995). Rochas de idade arqueana ao redor de 2,7 Ga (Noce et al., 1998; Teixeira et al., 2000 Ávila et al., 2005). Entretanto, 50% dos pontos analisados neste trabalho apresentaram idade mesoproterozóica concentrada entre 1,45 e 1,15 Ga e cristais de idade neoproterozóica de 882 e 798 Ma.

A alta concentração de zircões mesoproterozóicos no quartzito analisado, semelhantes as obtidas por Pimentel et al. (2011) e Valeriano et al. (2004) na Faixa Brasília, torna a proveniência a partir de diques máficos do Craton São Francisco sugerida por Valladares et al. (2004) improvável e sugere que faixas orogênicas mesoproterozóicas deveriam estar expostas e próximas e da bacia de sedimentação.

Figura X.12: imagens *back-scattered* dos cristais detríticos da amostra CAR-II-179 analisados. Idades em milhões de anos (Ma). Círculos azuis acompanhados por idades na cor preta correspondem à análises com concordância acima de 80%; Círculos azuis acompanhados por idades na cor cinza correspondem à análises descartadas com concordância abaixo de 80%.

Figura X.13: diagrama concórdia $^{207}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ vs. $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ (B) e distribuição de probabilidade do quartzito da Formação Campestre (A). No diagrama concórdia, as elipses vermelhas referem-se às idades no Neoproterozóico; elipses verdes referem-se às idades no Mesoproterozóico; elipses azuis referem-se às idades no Paloproterozóico; elipses pretos referem-se às idades no Arqueano; elipses na cor cinza referem-se às idades $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ com concordância abaixo de 80%.

Na Faixa Apiaí (**figura X.14**) encontram-se rochas metavulcânicas e metabásicas com idades entre 1036 e 1500 Ma (Basei et al., 2003 e 2008; Siga Jr. et al., 2011) relacionadas à cobertura metassedimentar. Subordinadamente ocorrem, nos núcleos de embasamento das faixas mesoproterozóicas, gnaisses monzo e sienograníticos do Estateriano (Kaulfuss, 2001, Prazeres Filho, 2005; Siga Jr. et al., 2005 e 2011). O baixo conteúdo em zircão das rochas metabásicas desta faixa orogênica não as indicariam como fonte para os sedimentos estudados.

Figura X.14: Idades obtidas nos cristais de zircão detrítico da amostra CAR-II-179 (linhas laranja e intervalos em cinza) e as idades das possíveis rochas-fonte para os sedimentos da Formação Campestre (em verde). (**AMG**) **ARCO MAGMÁTICOS GOIÁS:** AMG-A - tonalitos e granodioritos (Mara Rosa) e AMG-B - rochas metavulcanossedimentares; (**MGC**) **MACIÇO GOIÁS CENTRAL:** MGC-A - Complexos Paleoproterozóicos e MGC-B - Núcleos Arqueanos; (**CA**) **CRÁTON AMAZÔNICO:** CA-A - Sunsás-Aguapeí, CA-B - Rondonian-San Ignácio, CA-C - Rio Negro-Juruena, CA-D - Ventuari-Tapajós, CA-E - Maroni-Itacaiúnas e CA-F - Bloco Xingu-Iricoumé; (**CSF**) **CRÁTON SÃO FRANCISCO:** CSF-A - vulcânicas do Supergrupo Espinhaço, CSF-B - Cinturão Mineiro, CSF-C - Granitóides, CSF-D - Terrenos TTG e Greenstone Belt e CSF-E - Ortognaisses migmatíticos do Complexo Campo Belo; (**FA**) **FAIXA APIAÍ:** FA-A - Metabásicas da Formação Betara, FA-B - Metabásicas e sienogranitos Núcleo Betara; FA-C - Granodioritos protomiloníticos; (**CO**) **CONGO OESTE:** CO-A - basaltos, CO-B - riolitos e granitos peralcalinos e CO-C - embasamento; (**FK**) **FAIXA KAKO:** FK-A - granitóides e FK-B - embasamento; (**CA**) **CRÁTON ANGOLA:** CA-A - Granitóides alcalinos e cálcio-alcalinos, CA-B - Associação granito-pórfito-riolito, CA-C - Magmatismo anorogênico, CA-D - Granitos e sienitos, CA-E - Granitos e tonalitos, CA-F - Granitos e migmatitos e CA-G - Complexo gabro-norito-charnokito. **Referências:** AMG: Cordani e Teixeira (2011) e Pimentel et al. (2011); MGC: Campos Neto (2000) e Cordani e Teixeira (2007), Pimentel et al. (2011); CA: Cordani e Teixeira (2007); CSF: Machado et al. (1989), Schobbenhaus et al. (1994), Dussin e Dussin (1995), Noce et al. (1998), Teixeira et al. (2000) e Ávila et al. (2005 e 2010); FA: Kaulfuss (2001), Basei et al (2003 e 2008), Prazeres Filho (2005), Siga Jr. et al. (2005 e 2011); CO: Basei et al. (2008); FK: Basei et al. (2008); CA: Heilbron et al. (2008).

Basei et al. (2008) sugere que a fonte para os sedimentos do segmento central da Faixa Ribeira poderia estar localizada na África devido à similaridade das idades encontradas em zircões detríticos das unidades destas faixas com as faixas Gariep, Damara e West Congo

(**figura X.14**). Entretanto, nestas faixas não são encontradas idades Arqueanas, justificadas pela barreira causada por um alto estrutural do Complexo Namaqua, de idade fim-mesoproterozóica, no Esteniano (Frimmel et al., 2002; Basei et al., 2008)

O cráton Amazônico (**figura X.14**) é formado por faixas orogênicas de idade mesoproterozóica representado pelos cinturões acrescionários Sunsas-Aguapeí (1250 a 1000 Ma), Rondoniano-San Ignácio (1500 a 1300 Ma) e Rio Negro-Juruena (1780 a 1550) (Cordani e Teixeira, 2007). Idades no Paleoproterozóico entre 2250 e 1800 (cinturão Ventuari-Tapajós e província tectônica Maroni-Itacaiunas) são encontradas, além de núcleo Arqueanos entre 3200 e 2600 Ma (Cordani e Teixeira, 2007).

No Maciço Central de Goiás, séries arqueanas (2850 e 2700 Ma) ocorrem como substrato do arco magmático, em parte insular, Mara Rosa, de idade entre 860 e 800 Ma e, mais a sul, no noroeste do Arco Magmático de Goiás, de até 900 Ma (Pimental et al., 2011).

Os zircões detríticos do Estateriano, do Riachiano, Neoarqueano e do Mesoarqueano podem ser encontrados no sul do Cráton do São Francisco, respectivamente, no vulcanismo e plutonismo relacionado ao Rift Espinhaço, no Cinturão Mineiro, no Super Grupo Rio das Velhas e domos granitóides associados e nos Migmatitos Campo Belo.

No entanto as idades no Mesoproterozóico, compatíveis com a super faixa orogênica grenviliana, estão ausentes neste cráton. Podem estar parcialmente representadas nas faixas marginais do Cráton de Angola (Heilbron et al., 2008) e sobretudo nas faixas orogênicas sequenciadas do Cráton Amazônico (**figura X.14**).

As idades de zircão detrítico no Toniano podem ser oriundas parte do arco insular Mara Rosa e parte do Arco Magmático de Goiás, na borda da Microplaca Paranapanema.

Se diferentes massas cratônicas (placas, ou microplacas) possam ter sido área fonte para os depósitos psamíticos da Formação Campestre, a paleogeografia mais provável, provavelmente para todo o Grupo Carrancas, é a de um ambiente de rifte, antecessor à deriva e ao estabelecimento de uma margem continental passiva.

A abrangência das idades dos grãos detríticos de zircão da Formação Campestre (tanto no Arqueano e Paleoproterozóico, quanto no Mesoproterozóico), como para as formações Chapada dos Pilões e Paracatu (Pimentel et al., 2011) permite a correlação, no Orógeno Brasília, entre os Grupos Carrancas e Canastra.

CAPÍTULO XI

COMPARAÇÕES ENTRE AS UNIDADES BIOTITA XISTO E XISTO SANTO ANTÔNIO

Os dados de geoquímica de elementos maiores, menores e traços para as rochas do Xisto Santo Antônio (XSA) da Nappe Andrelândia foram extraídos de Campos Neto *et al.* (2007 e 2011).

Descrito pela primeira vez por Ribeiro e Heilbron (1982) como granada-cianita-biotita xisto do Grupo Andrelândia, passou a ser denominado biotita xisto Santo Antônio por Trouw *et al.* (1983). Compõe, juntamente com o Xisto Serra da Boa Vista e o Xisto Rio Capivari, a Nappe Andrelândia, com espessura aparente de cerca de 850 m, base do Sistema de Nappes Andrelândia (Campos Neto *et al.*, 2007). Assim como a Unidade Biotita Xisto, aflora na forma de extensos lajedos e tem como característica diagnóstica lentes de quartzo na forma de dobras e sigmóides que acompanham a foliação principal. As rochas do Xisto Santo Antônio são predominantemente granoblásticas e diferem-se daquelas da Unidade Biotita Xisto pelo alto teor modal em plagioclásio e menor conteúdo de muscovita em sua composição. São rutilo-granada-biotita-plagioclásio-quartzo xistos, localmente com estauroлита e cianita (sillimanita) e encontram-se sob condições metamórficas de fácies anfibolito.

XI.1. Elementos maiores e menores

As concentrações de elementos maiores e menores (**tabela XI.1**) foram plotadas em diagramas Harker (**figura XI.1**). Demonstram que a correlação negativa entre SiO_2 vs. Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MnO , MgO e K_2O e positiva entre SiO_2 vs. P_2O_5 , TiO_2 , CaO e Na_2O , observadas na UBX, se mantém para as amostras do XSA. Neste diagramas, principalmente nos *trends* composicionais dos óxidos de alumínio, ferro³⁺ e magnésio, observa-se uma clara afinidade geoquímica entre as rochas da unidade UBX e do XSA.

As amostras do XSA possuem assinatura geoquímica semelhante àquelas da unidade UBX que foram proximais (**capítulo VI** – amostras CAR-I-51, C-341, C-337, C-333, C-325c e C-410). A maior concentração de CaO e menor de K_2O são as exceções e provavelmente se devem à maior concentração de plagioclásio e menores teores de muscovita nas rochas do XSA.

Figura XI.1: gráficos binários de dispersão de SiO_2 vs. elementos maiores e menores analisados por FRX para as amostras do XSA e da unidade UBX.

	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
UBX	58,25									
	a	0,80 a	14,14 a	5,65 a	0,09 a	2,32 a	0,80 a	1,79 a	2,69 a	0,14 a
	68,09	1,03	19,69	7,92	0,17	3,48	1,90	2,81	4,69	0,22
XSA	62,05				0,058					
	a	0,467	13,83 a	3,60 a	a	1,20 a	0,71 a	0,65 a	1,92 a	0,03 a
	70,31	a 1,07	16,88	7,46	0,139	4,06	4,63	4,16	4,82	0,219

Tabela XI.1: Síntese dos resultados obtidos para elementos maiores e menores por análises de FRX das amostras do XSA e da unidade UBX. Valores em % peso de óxido.

Considerando que Al, Fe, Mg e K encontram-se com maior frequência em argilominerais, enquanto quartzo e feldspato se concentram em frações arenosas (Taylor e McLennan, 1985), as amostras do XSA são mais enriquecidas em sedimentos de granulação areia do que as amostras da unidade UBX.

XI.1.1. Classificação

Nos diagramas de classificação de arenitos, as amostras do XSA e da unidade UBX apresentam assinatura geoquímica semelhante, demonstrada anteriormente pelos *trends* dos diagramas Harker da **figura XI.1**. As amostras do XSA apresentam maiores valores para as razões Na₂O/K₂O e Fe₂O₃/K₂O. Maiores proporções de fragmentos líticos vulcânicos aumentariam a proporção de plagioclásio e de minerais ferromagnesianos no sedimento, o que, por sua vez, ocasionaria o aumento de Fe³⁺ e a diminuição de K⁺, este proveniente de feldspato potássico detrítico. As diferentes concentrações CaO e K₂O no XSA discutidas no item anterior corroboram esta hipótese.

Nos diagramas de classificação química de sedimentos (Pettijohn et al., 1972 – **figura XI.2** e Herron, 1988 - **figura XI.3**) nota-se uma correlação entre as amostras XSA e UBX.

XI.1.2. Chemical Index of Alteration - CIA

As amostras do XSA apresentaram valores baixos para CIA (Nesbitt e Young, 1982), entre 47,85 e 68,28, sugerindo que as rochas analisadas sofreram, quando sedimentos, intemperismo químico leve em um curto período de tempo, ou, por outro lado, resultam de

uma prevalência de intemperismo físico na área-fonte. Esses valores de CIA são menores do que os apresentados pela unidade UBX (**tabela XI.2**) sugerindo uma relação mais proximal da área-fonte para o Xisto Santo Antônio.

Figura XI.2: amostras do XSA e da unidade UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Pettijohn et al. (1972).

Figura XI.3: amostras do XSA da unidade UBX plotadas no diagrama de classificação química de arenitos segundo Herron (1988).

As concentrações de elementos maiores obtidas também foram plotadas no gráfico ternário A (Al_2O_3) – CN ($\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O}$) – K (K_2O) de avaliação de intensidade de intemperismo (**figura XI.4**), sugerido por McLennan et al. (1990). As rochas do Xisto Santo Antônio seguem o mesmo padrão de intemperismo das rochas da unidade UBX, a partir de composições iniciais semelhantes à de andesitos de arcos de ilha. O caráter mais proximal dos sedimentos precursores XSA fica explicitado neste diagrama.

CIA	
UBX	58,41 a 70,26
XSA	47,85 a 68,28

Tabela XI.2: valores de CIA para as amostras do XSA e da unidade UBX. $\text{CIA} = [\text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})] * 100$; óxidos em proporção molecular.

Figura XI.4: amostras do XSA e da unidade UBX plotadas no diagrama ternário da fração molar de Al_2O_3 (A) – $\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O}$ em silicatos (CN) – K_2O (K) extraído, modificado e traduzido de McLennan et al. (1990).

XI.2. Geoquímica de elementos traços

O diagrama *spider* (elaborado a partir dos dados apresentados na **tabela XI.3**), normalizado segundo a composição média da crosta superior de Taylor e McLennan (1995), apresentado na **figura XI.5** mostra que as amostras do XSA são empobrecidas em Rb, Th, U, Nb, Sr, Hf e Zr e enriquecidas em Cs, Ba e ETRP. Estas amostras se diferem da unidade UBX

ao apresentar menores anomalias negativas de Sr, empobrecimento em Rb, Th e Nb e enriquecimento em Ba.

Os elementos alcalinos e alcalinos terrosos são solubilizados durante intemperismo, com exceção de Rb, Cs e Ba que apresentam maior raio iônico e são retidos em argilominerais durante o intemperismo (Taylor e McLennan, 1985). Diagramas de Al_2O_3 vs. Rb, Cs e Ba (**figura XI.6**) mostram uma fraca correlação positiva entre estes elementos traço e o óxido de alumínio (ao contrário das amostras UBX). O empobrecimento em Rb e Cs sugere um caráter menos pelítico.

XI.2.1. Elementos Terras Raras (ETR)

Os ETR do XSA (**tabela XI.3**) apresentam, assim como as rochas da unidade UBX, padrões de ETR típicos de rochas sedimentares pós-arqueanas (McLennan *et al.*, 1990) com enriquecimento de ETRL, padrões relativamente constantes de ETRP e anomalias negativas de Eu (**figura XI.7**), mas têm valores totais de ETR maiores do que os PAAS e NASC.

Apresentam assinatura de ETR compatível aos valores intermediários do grupo (ii) da unidade UBX (**tabela XI.4**), valores semelhantes de anomalia de Eu, compatíveis com valores médios da crosta continental superior (McLennan *et al.*, 1990), valores menores de fracionamento de ETRL e maiores valores de conteúdos totais de ETRP.

Figura XI.5: diagrama *spider* de elementos traços normalizados segundo valores para crosta continental superior de Taylor e McLennan (1995) para as amostras do XSA (em verde) e da unidade UBX (em azul).

	TG-18A	IBA-II-14	NESG 1065B	NESG 833	NESG 1067	NESG 1116A	NESG 806E
Rb	88,3	73,6	75,6	86,4	69,0	70,6	109
Sr	218	210	203	170	198	201	184
Y	37,2	31,3	35,4	30,4	29,9	28,6	38,2
Zr	200	189	238	161	129	142	236
Nb	9,69	8,95	9,15	10,5	9,41	10,4	11,2
Cs	4,94	3,92	3,97	4,84	4,61	3,98	6,37
Ba	424	475	481	593	461	464	650
La	17,2	21,7	23,8	27,4	27,0	25,2	30,1
Ce	47,8	47,6	60,6	59,4	55,6	55,0	68,7
Pr	5,17	6,30	7,11	6,97	6,89	6,46	8,08
Nd	21,5	25,7	28,8	27,8	27,8	26,1	32,1
Sm	5,10	5,57	6,27	5,86	5,93	5,51	6,92
Eu	1,27	1,32	1,31	1,24	1,33	1,29	1,50
Gd	5,25	5,25	5,97	5,28	5,44	5,02	6,33
Tb	0,92	0,83	0,94	0,86	0,87	0,79	1,03
Dy	5,61	4,85	5,52	4,96	4,96	4,59	5,94
Ho	1,26	1,05	1,22	1,05	1,02	0,97	1,28
Er	3,65	3,07	3,61	2,82	2,69	2,62	3,51
Tm	0,56	0,47	0,55	0,44	0,41	0,41	0,53
Yb	3,50	2,90	3,49	2,83	2,63	2,65	3,40
Lu	0,57	0,47	0,57	0,44	0,40	0,40	0,52
Hf	4,95	4,52	5,96	3,90	3,12	3,37	5,97
Ta	0,75	0,64	0,72	0,73	0,67	0,90	0,74
Pb	19,8	14,2	14,3	15,9	13,4	14,4	19,1
Th	7,50	6,37	6,64	7,79	6,33	6,73	8,46
U	2,25	2,01	2,37	2,50	2,00	2,15	3,00

Tabela XI.3: valores de elementos traço obtidos através de análise em LA-ICP MS para as amostras do XSA.
Valores em ppm.

Os valores de anomalia negativa de Eu, combinados com os valores de fracionamento de ETRP abaixo de 2,0 sugerem que rochas ígneas evoluídas, geradas a partir de diferenciação magmática intracrosta (McLennan et al., 1990), foram a principal fonte dos sedimentos do XSA, assim como da Unidade Biotita Xisto (**figura XI.8**). O empobrecimento em Sr observado na **figura XI.5** sugere que o fracionamento químico intracrosta ocorreu principalmente pela cristalização fracionada de plagioclásio rico em Ca, pois Eu^{2+} substitui Sr^{2+} neste mineral ocasionando as anomalias negativas de ambos elementos químicos no líquido residual (McLennan e Taylor, 1991).

Figura XI.6: diagramas de Al_2O_3 vs. Ba, Rb e Cs para as amostras do Xisto Santo Antônio e da unidade UBX.

Os valores totais e fracionamento de ETR, o fracionamento ETRP e a anomalia negativa de Eu são, todos, nas amostras XSA, menores que nas amostras UBX. Essas feições sugerem uma maior concentração em minerais pesados (zircão, apatita), plagioclásio e predominância de frações silto-arenosas em relação as amostras UBX. São também sugestivas de depósitos relativamente mais proximais à área-fonte.

	TG-18A	IBA-II-14	NESG 1065B	NESG 833	NESG 1067	NESG 1116A	NESG 806E
LaN	46,97	59,21	64,83	74,54	73,62	68,61	82,05
CeN	49,92	49,76	63,28	62,09	58,12	57,51	71,80
PrN	37,71	45,98	51,89	50,84	50,26	47,19	59,01
NdN	30,24	36,19	40,50	39,08	39,09	36,77	45,17
SmN	22,10	24,11	27,16	25,36	25,68	23,86	29,95
EuN	14,63	15,15	15,07	14,22	15,25	14,82	17,23
GdN	17,17	17,14	19,52	17,27	17,77	16,39	20,69
TbN	15,90	14,35	16,24	14,91	15,07	13,70	17,83
DyN	14,74	12,72	14,49	13,02	13,01	12,04	15,60
HoN	14,77	12,36	14,36	12,30	12,02	11,38	15,07
ErN	14,66	12,34	14,50	11,33	10,79	10,53	14,11
TmN	15,72	13,08	15,37	12,45	11,61	11,63	14,88
YbN	14,12	11,68	14,08	11,42	10,60	10,68	13,70
LuN	15,05	12,39	14,91	11,44	10,41	10,54	13,60
Σ ETRL	186,9	215,24	247,66	251,91	246,78	233,93	287,99
Σ ETRP	107,0	93,67	108,56	92,70	90,87	86,34	111,87
LaN/YbN	3,33	5,07	4,60	6,53	6,95	6,43	5,99
LaN/SmN	2,13	2,46	2,39	2,94	2,87	2,88	2,74
GdN/YbN	1,22	1,47	1,39	1,51	1,68	1,54	1,51
EuN/Eu*	0,75	0,75	0,65	0,68	0,71	0,75	0,69

Tabela XI.4: valores de elementos terras raras (ETR) para as amostras do XSA.

Figura XI.7: Diagrama com normalização condrito de Taylor & McLennan (1985) mostrando o padrão de Elementos Terras Raras das amostras do XSA. Valores médios da UBX e de pelitos pós-Arqueanos (PAAS e NASC) foram plotados para comparação.

Figura XI.8: gráfico de fracionamento de ETRP vs. Anomalia de Eu com as amostras do XSA e da unidade UBX. Para linhas $Eu/Eu^* = 0,85$ e $Gd_N/Yb_N = 2,0$, ver capítulo VI.

XI.2.2. Razão Th/Sc

Amostras do XSA, de maneira geral, apresentam valores da razão Th/Sc menores e maiores valores para razão Cr/V (**tabela XI.4** e **figura XI.9**). São relações químicas que sugerem a participação (ou preservação) de componentes máficos (McLennan et al., 1993). Como a concentração de minerais Fe-magnesianos, ricos em Sc e Cr pode estar mais

preservada em presença de menor intemperismo químico, este, como visto no item XI.1.2, foi menor nas amostras XSA.

	Th/Sc	Cr/V	Eu/Eu*
UBX	0,68 – 1,13	0,66 – 0,91	0,64 – 0,79
XSA	0,14 – 2,85	0,68 – 1,04	0,65 – 0,75

Tabela XI.5: valores da razão Th/Sc para as amostras do XSA e da unidade UBX.

Figura XI.9: Diagramas CIA vs. Th/Sc, CIA vs. Eu/Eu* e Th/Sc vs. Cr/V para as amostras do XSA e da unidade UBX.

XI.3. Sistema Rb-Sr em rocha total

A tabela XI.5 e a figura XI.10 mostram as a variação de Rb (ppm), Sr (ppm), ⁸⁷Rb/⁸⁶Sr, ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr e ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr₆₁₀ para as amostras do XSA e da unidade UBX.

	Rb (ppm)	Sr (ppm)	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i$ (610 Ma)
UBX	121,80 – 161,70	67,70 – 168,00	0,73251 – 0,77064	2,20048 – 6,43098	0,71336 – 0,71589
XSA	50,89 – 133,38	160,62 – 223,61	0,71361 – 0,72635	0,85308 – 1,68968	0,70612 – 0,71165

Tabela XI.6: dados isotópicos e elementais do sistema Rb-Sr para as amostras do XSA e da unidade UBX.
 $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} = (\text{Rb}_{\text{ppm}}/\text{Sr}_{\text{ppm}}) * 2,8937 * 0,93047$; $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i = ^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} - ^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr} (\lambda t)$.

Os dados obtidos, nas amostras XSA, para a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ e para a razão $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ são menores que aqueles para a unidade UBX. Indicam que as amostras XSA tiveram um menor período de residência na crosta. Indicam também uma maior contribuição de fontes máficas (juvenis) nos sedimentos.

XI.4. Sm-Nd em rocha total

Os valores da razões isotópicas, das idades modelo e $\epsilon\text{Nd}_{\text{TDM}}$ e recalculados para 610 Ma são apresentados nas **tabelas XI.7**.

As amostras do XSA apresentam valores de $\epsilon(0)$, idades modelo T_{DM} e ϵNd_{610} menores quando comparados aos da unidade UBX (**figura XI.10**). Os valores de ϵNd_{610} indicam uma maior contribuição de material juvenil, compatível com as baixas razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_{610}$. As idades T_{DM} são mais jovens, entre 1,16 e 1,39, provavelmente por uma menor variedade do material da área-fonte.

	Sm (ppm)	Nd (ppm)	$^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$	T_{DM} (Ga)	$\epsilon(610\text{Ma})$
UBX	3,685 a 13,418	18,901 a 73,351	0,1106 a 0,1207	0,5120 a 0,5121	1,550 a 1,627	-5,275 a - 6,045
XSA	2,364 a 4,408	11,454 a 20,868	0,1235 a 0,1358	0,5123 a 0,5124	1,164 a 1,399	-1,794 a 0,348

Tabela XI.7: dados isotópicos e elementais do sistema Sm-Nd para as amostras do XSA e da unidade UBX. Branco analítico para Sm = 47 pg e para Nd = 114 ; Razão isotópica $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ calculada a partir da equação: $= [(\text{Conc Sm}/\text{Conc Nd}) * 0,604491]$; Razões isotópicas $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ normalizadas para o valor de 0,7219 (DePaolo, 1981); Valor médio para a razão $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ do padrão JNdi = $0,512100 \pm 0,000004$; Idade Modelo T_{DM} calculada pela equação: $= \{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{am}}/0,512638] - 1\} * 10^4$, onde $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}_{\text{CHUR}} = 0,512638$ (Hamilton et al., 1983); $\epsilon\text{Nd}(0)$ corresponde ao valor atual ($t = 0$) e é calculado segundo a equação: $= \{[(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{am}}/0,512638] - 1\} * 10^4$.

Figura XI.10: gráfico T (Ga) vs. ϵNd_T para as amostras do XSA (em verde) e da unidade UBX (em azul).

XI.5. Ambiente de deposição

A **figura XI.11** mostra gráficos elaborados por diversos autores para a classificação quanto ao ambiente tectônico de deposição de rochas sedimentares e segundo estes as amostras do XSA (com 3 exceções) são compatíveis quimicamente com sedimentos depositados em ambientes de colisão continental e margem ativa, possivelmente uma bacia relacionada a arcos magmáticos (**figuras XI.11 C, D e F**). Assim como as rochas da unidade UBX, os sedimentos precursores do XSA têm assinatura geoquímica que indica contribuição de crosta continental superior e de arco magmático em margem continental ativa. Apresentam uma maior afinidade com o ambiente de arco e mesmo de arco insular, por apresentarem valores de ϵNd menos negativos a positivos (**figura XI.11 C**).

A diferença entre as duas unidades está, principalmente, na intensidade do intemperismo químico que as afetou. As amostras do XSA apresentam menores valores de CIA, menores razões Th/Sc (abaixo de 1.0) (**figuras XI.11 B e C**) e maiores e altas razões La/Th (**figura XI.11 F**) o que sugere maior contribuição de rochas máficas e/ou menor intemperismo químico.

As razões isotópicas de Sr e Nd não são compatíveis com ambientes de margem passiva e com a erosão de crosta continental antiga (**figuras XI.11 C, D e E**). A assinatura geoquímica e isotópica indicam que a Unidade Biotita Xisto é equivalente distal do Xisto Santo Antônio. As **figuras XI.11 B, C, D e F** destacam a correlação entre essas unidades ao

longo de um *trend* composicional que parte de composições juvenis e menos alteradas quimicamente.

Figura XI.11: amostras do XSA e da unidade UBX plotadas em diagramas de classificação química segundo o ambiente tectônico de deposição. ϵ_{Nd} e razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ foram recalculados para 610 Ma. **A** e **B**: extraídos de Campos Neto et al. (2011); **C** e **D**: McLennan et al. (1990); **E**: White (2009); **F**: Floyd e Leveridge (1987).

CAPÍTULO XII

CONCLUSÕES

O estudo da proveniência e ambiente tectônico da UBX (UBX), e suas relações com a FC (FC) e o XSA (XSA), através de análises de geoquímica elemental, isotópica e do sistema U-Pb em zircão detrítico permite as seguintes conclusões:

- ❖ Há uma clara afinidade geoquímica entre as unidades UBX e XSA, sendo que a última tem concentrações de elementos maiores semelhantes às amostras da UBX consideradas proximais. Por outro lado, as amostras da FC exibem padrões de correlação opostos para óxido de K^+ e menores concentrações de SiO_2 , MgO , CaO , Na_2O e P_2O_5 e maiores de TiO_2 , Fe_2O_3 e Al_2O_3 do que as unidades mencionadas anteriormente;
- ❖ As análises das amostras da UBX sugerem intemperismo químico de intensidade e período de tempo moderados (no caso de exposição da área-fonte contemporânea a sedimentação) ou que a área fonte já estaria submetida a um intemperismo químico moderado. O XSA exibe padrão de intemperismo químico leve em um curto período de tempo, ou prevalência de intemperismo físico na área-fonte (Campos Neto et al., 2011). A FC, contrariamente às amostras da UBX e do XSA apresenta valores intermediários a altos de CIA, sugerindo uma intensa reciclagem e alteração do sedimento original (ciclos longos e/ou repetitivos de intemperismo químico) ou períodos de condições de clima úmido e quente extremas;
- ❖ As unidades UBX e XSA apresentam padrões de ETR típicos de rochas sedimentares pós-arqueanas (McLennan *et al.*, 1990), enquanto as amostras da FC apresentam forte fracionamento de ETR, de ETRP, ETRL e leve anomalia negativa de Eu. Os valores de anomalia negativa de Eu, combinados com os valores de fracionamento de ETRP sugerem que rochas ígneas evoluídas, geradas a partir de diferenciação magmática intracrosta (McLennan et al., 1990), foram a principal fonte dos sedimentos da UBX e do XSA.

- ❖ As razões Th/Sc e Cr/V indicam que as áreas-fonte dos sedimentos precursores das três unidades estudadas era formada predominantemente por rochas félsicas. O XSA, provavelmente devido ao menor intemperismo químico, possui maiores concentrações de minerais ferromagnesianos e, por isso, menores razões Th/Sc e maiores razões Cr/V. Por outro lado, os valores das razões para a FC pode ter sido alterado devido ao forte intemperismo químico sofrido por estas rochas.
- ❖ Os dados obtidos, nas amostras XSA, para a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ e para a razão $^{87}\text{Rb}/^{86}\text{Sr}$ são menores que aqueles para a unidade UBX e indicam que as primeiras tiveram um menor período de residência na crosta e maior contribuição fontes juvenis nos sedimentos. Os valores obtidos para as amostras da FC indicam que estas tiveram um maior período de residência na crosta do que as amostras UBX.
- ❖ Os valores de T_{DM} e $\epsilon\text{Nd}_{(t)}$ das unidades UBX e XSA indicam área-fonte composta por rochas de idades variadas e contribuição de assinatura juvenil, compatível com as baixas razões $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_t$, sendo o XSA o que possui menor variedade na área-fonte e maior contribuição de rochas juvenis. Quando comparada com a FC, a UBX apresenta menores valores de T_{DM} e $\epsilon\text{Nd}_{(t)}$ menos negativos, indicando que os sedimentos precursores da FC tiveram proveniência a partir de rochas fonte mais antigas e com assinatura isotópica mais evoluída.
- ❖ As unidades UBX e XSA são compatíveis quimicamente com sedimentos depositados em ambientes de colisão continental, sendo a segunda compatível também com ambientes de margem ativa. A deposição ocorreu, possivelmente, em uma bacia relacionada a arcos magmáticos, com contribuição de crosta continental superior e de arco magmático em margem continental ativa, sem contribuição de crosta antiga, sendo que o XSA apresenta uma maior afinidade com o ambiente de arco (mesmo de arco insular) do que a unidade UBX.
- ❖ A FC apresenta proveniência de crosta continental superior com componente de crosta antiga associado (ϵNd fortemente negativo e altos valores para a razão $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$), diferenciando-a das outras unidades.
- ❖ As razões isotópicas de Sr e Nd das três unidades não são compatíveis com ambientes de margem passiva.

- ❖ A maioria dos cristais de zircão detrítico da UBX forneceu idades $^{206}\text{Pb}/^{207}\text{Pb}$ com distribuição essencialmente unimodal, no Neoproterozóico, fim-Criogeniano e contribuição secundária no Paleoproterozóico, Riacciano. A classe modal ao redor de 665 Ma é comparável com a idade cristais de zircão detrítico do XSA, Nappe Andrelândia, e com a idade do magmatismo básico toleítico precursor das rochas retroeclogíticas da Nappe Liberdade (Campos Neto et al., 2011), e deve representar a época de maior atividade ígnea félsica na área-fonte de ambas as unidades.
- ❖ Valores de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_{625\text{Ma}}$, $\epsilon\text{Nd}_{625\text{Ma}}$ e Th/Sc mostram que as amostras da unidade UBX plotam no campo dos granulitos cálcio-alcálicos da Nappe Socorro-Guaxupé, o que corrobora a hipótese de que estas rochas, ou rochas vulcânicas co-genéticas, possam ter sido a fonte para os sedimentos da bacia. Granitos crustais sin-colisionais presentes na nappe forneceram os cristais detríticos ao redor de 635 Ma.
- ❖ Portanto, a deposição dos sedimentos precursores das unidades UBX e XSA se deu entre 630 Ma 611 Ma (idade do zircão detrítico mais jovem e do metamorfismo da Nappe Andrelândia, respectivamente) com área-fonte principal no arco magmático representado pela Nappe Socorro-Guaxupé.
- ❖ A pouca representatividade de idades no Paleoproterozóico e a ausência de assinaturas químicas de margem passiva, inviabilizam a possibilidade de o Cráton do São Francisco ser uma das áreas-fonte.
- ❖ Portanto, a UBX não é autóctone em relação ao Cráton do São Francisco, sendo, provavelmente, a unidade que compõe a frente da Nappe Andrelândia.
- ❖ Os zircões detríticos do Estateriano, do Riacciano, Neoarqueano e do Mesoarqueano encontrados na FC, podem ser relacionados ao sul do Cráton do São Francisco, respectivamente, ao vulcanismo e plutonismo do Rift Espinhaço, do Cinturão Mineiro, do Super Grupo Rio das Velhas e domos granitóides associados e nos Migmatitos Campo Belo.
- ❖ As idades no Mesoproterozóico, compatíveis com a orogênica grenviliana, estão ausentes neste cráton. Podem estar parcialmente representadas nas faixas marginais do Cráton de Angola e nas faixas orogênicas do Cráton Amazônico.

As idades de zircão detrítico no Toniano podem ser oriundas em parte do arco insular Mara Rosa e em parte do Arco Magmático de Goiás, na borda da Microplaca Paranapanema.

- ❖ Se diferentes massas cratônicas possam ter sido área fonte para os depósitos da FC, a paleogeografia mais provável, possivelmente para todo o Grupo Carrancas, é a de um ambiente de rifte, antecessor à deriva e ao estabelecimento de uma margem continental passiva.
- ❖ A abrangência das idades dos grãos detríticos de zircão da FC (tanto no Arqueano e Paleoproterozóico, quanto no Mesoproterozóico) e das formações Chapada dos Pilões e Paracatu (Pimentel et al., 2011) permite a correlação, no Orógeno Brasília, entre os Grupos Carrancas e Canastra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHRENS, L. H. The convergent lead ages of the oldest monazites and uraninites (Rhodesia, Manitoba, Madagascar, and Transvaal). **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v.7, n. 5-6, 294-300, 1955.
- ÁVILA, C. A.; VALENÇA, J. G.; TEIXEIRA, W.; BARRUETO, H. R.; CORDANI, U. G.; MOURA, C. A. V.; PEREIRA, R. M.; MARTINS, V. T. Geocronologia U-Pb da Suite Serrinha: implicações para a evolução paleoproterozóica da margem sul do Cráton São Francisco. In: SIMPÓSIO DE VULCANISMO E AMBIENTES ASSOCIADOS, 3, 2005, Cabo Frio. **Anais...** Cabo Frio: 2005, p. 357 – 361.
- ÁVILA, C. A.; TEIXEIRA, W.; CORDANI, U. G.; MOURA, C. A. V.; PEREIRA, R. M. Rhyacian (2.23–2.20 Ga) juvenile accretion in the southern São Francisco craton, Brazil: Geochemical and isotopic evidence from the Serrinha magmatic suite, Mineiro belt. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 29, n. 2, p. 464 – 482, 2010.
- BARROS, C. E., NARDI, L. V. S., DILLENBURG, S. R. Geoquímica de minerais detríticos em estudos de proveniência: uma revisão. **Revista Pesquisas em Geociências**, v. 32, n. 1, p. 3-15, 2005.
- BASEI, M. A. S.; SIGA Jr., O.; SATO, K.; SPROESSER, W. M. A metodologia Urânio-Chumbo na USP. Princípios metodológicos, aplicações e resultados obtidos. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 67, p. 221-237, 1995.
- BASEI, M. A. S.; FRIMMEL, H. E.; NUTMAN, A. P.; PRECIOZZI, F.; JACOB, J. A connection between the Neoproterozoic Dom Feliciano (Brazil/Uruguai) and Gariep (Namibia/South Africa) orogenic belts. **Precambrian Research**, v. 139, p. 139 – 221, 2005.
- BASEI, M. A. S.; FRIMMEL, H. E.; NUTMAN, A. P.; PRECIOZZI, F. West Gondwana amalgamation based on detrital zircon ages from Neoproterozoic Ribeira and Dom Feliciano belts of South America and comparison with coeval sequences from SW Africa. **Geological Society of London**, Special Publications, v. 294, p. 239 – 256, 2008.
- BELOUSOVA, E. A., GRIFFIN, W. L., O'REILLY, S. Y., FISHER, N. I. Igneous zircon: trace element composition as an indicator of source rock type. **Contribution to Mineralogy and Petrology**, v. 143, p. 602-622, 2002.
- BHATIA, M. R. Rare Earth Element geochemistry of Australian Paleozoic graywackes and mudrocks: provenance and tectonic control. **Sedimentary Geology**, v. 45, p. 97 – 113, 1985.

- BHATIA, M. R.; CROOK, K. A. W. Trace elements characteristics of graywackes and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. **Contributions to Mineralogy and Petrology**, n. 92, p. 181 – 193, 1986.
- CAMPOS NETO, M. C. Orogenic systems from Southwestern Gondwana: an approach to Brasiliano-Pan African Cycle and orogenic collage in Southwestern Brazil. In: CORDANI, U. G., MILANI, E. J., THOMAZ FILHO, A., CAMPOS, D. A. (Eds.). **Tectonic Evolution of South America**. 1st ed. Rio de Janeiro: 31 INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 2000, p. 335-365.
- CAMPOS NETO, M. C. & CABY, R. Neoproterozoic high pressure metamorphism and tectonic constraint from the nappe system south of São Francisco Craton, southeast Brazil. **Precambrian Research**, v. 97, p. 3 - 26, 1999.
- _____. Terrane accretion and upward extrusion of high-pressure granulites in the Neoproterozoic nappes of southeast Brazil: petrologic and structural constraints. **Tectonics**, v. 19, n. 4, p. 669 - 687, 2000,
- CAMPOS NETO, M. C.; FIGUEIREDO, M. C. H.; JANASI, V. A.; BASEI, M. A. S.; FREYER, B. J. The São José do Rio Pardo mangeritic-granitic suíte, southeastern Brazil. **Geochimica Brasiliensis**, v. 2, p. 185 – 189, 1988.
- CAMPOS NETO, M. C.; BASEI, M. A. S.; VLACH, S. R. F.; CABY, R.; SZABÓ, G. A. J.; VASCONCELOS, P. Migração de orógenos e superposição de orogêneses: um esboço da colagem brasileira no sul do Cráton do São Francisco, SE – Brasil. **Revista do Instituto de Geociências – USP**, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 13 - 40, 2004.
- CAMPOS NETO, M. C.; JANASI, V. A.; BASEI, M. A. S.; SIGA JR, O. Sistema de Nappes Andrelândia, setor oriental: litoestratigrafia e posição estratigráfica. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 37, p. 47 - 60, 2007. Suplemento 4.
- CAMPOS NETO, M. C.; CIOFFI, C. R.; MORAES, R.; MOTTA, R. G.; JUNIOR, O. S.; BASEI, M. A. S. Structural and metamorphic control on the exhumation of high-P granulites: The Carvalhos Klippe example, from the oriental Andrelândia Nappe System, southern portion of the Brasília Orogen, Brazil. **Precambrian Research**, v. 180, n. 3-4, p. 125 – 142, 2010,
- CAMPOS NETO, M. C.; BASEI, M. A. S.; JANASI, V. A.; MORAES, R. Orogen migration and tectonic setting of the Andrelândia Nappe system: an Ediacaran western Gondwana collage, south of São Francisco craton. **Journal of South American Earth Sciences** (2011), doi:10.1016/j.jsames.2011.02.006.
- CORDANI, U. G.; TEIXEIRA, W. 2007. Proterozoic accretionary belts in the Amazonian Craton. In: HATCHER Jr., R. D.; CARLSON, M. P., MCBRIDE, J. H., CATALÁN, J. R. M. (Eds.). **4-D Framework of Continental Crust**. 1st ed. Colorado: The Geological Society of America, 2007, p. 297 – 320,

- CORFU, F.; HANCHAR, J. M.; HOSKIN, P. W. O.; KINNY, P. Atlas of zircon textures. In: HANCHAR, J. M.; HOSKIN, P. W. O. (eds.). **Zircon: Reviews in Mineralogy and Geochemistry**. Washington: The Mineralogical Society of America, 2003. Cap. 16, p. 469-500,
- DAVIS, D. W. Optimum linear regression and error estimation applied to U-Pb data. **Canadian Journal of Earth Sciences**, v. 19, p. 2141-2149, 1982.
- DAVIS, D. W.; GRAY, J.; CUMMING, G. L. Determination of the ^{87}Rb decay constant. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 41, p. 1745-1749, 1977.
- DEPAOLO, D. J. A Neodymium and Strontium isotopic study of the Mesozoic calc-alkaline granitic batholiths of the Sierra Nevada and Peninsular Ranges, California. **Journal of Geophysical Research**, v. 86, n. 10, p. 10470-10488, 1981.
- DEPAOLO, D. J.; WASSERBURG, G. J. Nd isotopic variations and petrogenetic models. **Geophysical Research Letters**, v. 3, n.5, p. 249-252, 1976.
- DICKIN, A. P. 1995a. The Rb-Sr method. In:_____. **Radiogenic Isotope Geology**. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1995. Cap. 3, p. 42-69.
- _____. 1995b. The Sm-Nd method. In:_____. **Radiogenic Isotope Geology**. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1995. Cap. 4, p. 70-100,
- _____. 1995c. The Sm-Nd method. In:_____. **Radiogenic Isotope Geology**. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1995. Cap. 5, p. 101-135.
- DUSSIN, I. A. E DUSSIN, T. M. Supergupo Espinhaço: Modelo de evolução geodinâmica. **Geonomos**, v. 3, p. 19 – 26, 1995.
- EBERT, H. Resumo dos resultados obtidos no ano de 1955 no sul de Minas Gerais. **Relatório Anual do Diretor Rio de Janeiro**, DF, DGM / DNPM, p. 69 – 81, 1956.
- EBERT, H. The Manganese-bearing Lafaiete Formation as a guide-horizon in the Precambrian of Minas Gerais. **Anais da Academia Brasileira de Ciências Rio de Janeiro, RJ**, v. 35, p. 545 - 559, 1963.
- EBERT, H. D.; CHEMALE Jr., F.; BABINSKI, M.; ARTUR, A. C.; VAN SCHMUS, W. R. Tectonic setting and U-Pb zircon dating of the plutonic Socorro Complex in the Transpressive Rio Paraíba do Sul Shear belt, SE Brazil. **Tectonics**, v. 15, n. 2, p. 688 – 699, 1996.
- FEDO, C. M.; SIRCOMBE, K. N.; RAINBIRD, R. H. Detrital zircon analysis of the sedimentary record. In: HANCHAR, J. M.; HOSKIN, P. W. O. (eds.). **Zircon - Reviews in Mineralogy & Geochemistry**. Mineralogical Society of America and Geochemical Society: 2003, v. 53, p. 277-303.
- FETTER, A. H., HACKSPACKER, P. C., EBERT, H. D., DANTAS, E. L., COSTA, A. C. D. New Sm/Nd and U/Pb geochronological constraints on the Archean to Neoproterozoic evolution of the Amparo basement complex of the central Ribeira belt, south-eastern Brazil. In: SOUTH

- AMERICAN SYMPOSIUM ON ISOTOPE GEOLOGY, 3, 2001, Santiago. **Extend Abstracts**, CD-ROM.
- FLOYD, P. A.; LEVERIDGE, B. E. Tectonic environment of the Devonian Gramscatho basin, south Cornwall: framework mode and geochemical evidence from turbiditic sandstones. **Journal of the Geological Society**, v. 144, p. 531 – 542, 1987.
- FRALICK, P. W.; KRONBERG, B. I. Geochemical discrimination of elastic sedimentary rock sources. **Sedimentary Geology**, v. 113, p. 111-124, 1997.
- FRIMMEL, H. E.; FÖLLING, P. G.; ERIKSSON, P. G. Neoproterozoic tectonic and climatic evolution recorded in the Gariep Belt, Namibia and South Africa. **Basin Research**, v. 14, p. 55-67, 2002.
- GARCIA, M.G.M.; CAMPOS NETO, M.C. Contrasting metamorphic conditions in the Neoproterozoic collision-related nappes, south of São Francisco Craton, SE Brazil. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 15, n. 8, p. 853 – 870, 2003.
- GARRELS, R. M.; MACKENZIE, F. T. **Evolution of sedimentary rocks**. New York: Norton, 1971, 397p.
- GOLDRICH, S. S.; MUDREY, M. G. Dilatancy model for discordant U-Pb zircon ages. In: TUGARINOV, A. I. (ed.). **Contributions to Recent Geochemistry and Analytical Chemistry**. Moscow: Nauka Publication Office, p. 415-418, 1972.
- HACKSPACHER, P.C., FETTER, A.H., EBERT, H.D., JANASI, V.A., DANTAS, E.L., OLIVEIRA, M.A.F., BRAGA, I.F., NEGRI, F.D.A. Magmatismo há 660–640 Ma no Domínio Socorro: registros de convergência pré-colisional na aglutinação do Gondwana Ocidental. **Geologia USP - Série Científica**, v. 3, n. 1, p. 85 – 96, 2003.
- HAMILTON, P. J.; O'NIONS, R. K.; BRIDGWATER, D.; NUTMAN, A. Sm-Nd studies of Archean metasediments and metavolcanics from West Greenland and their implications for the Earth's early history. **Earth and Planetary Science Letters**, v. 62, p. 263-272, 1983.
- HASKIN, L. A.; WILDEMAN, T. R.; FREY, F. A.; COLLINS, K. A.; KEEDY, C. R.; HASKIN, M. A. Rare Earths in sediments. **Journal of Geophysical Research B: Solid Earth**, v. 71, n. 24, p. 6091-6105, 1966.
- HAUGHTON, P. D. W., TODD, S. P., MORTON, A. C. Sedimentary provenance studies. In: A. C. Morton, S. P. Todd & P. D. W. Haughton (eds.). **Developments in Sedimentary Provenance Studies**. The Geological Society of London: Geological Society Special Publication, 1991, v. 57, p. 1 – 11.
- HEILBRON, M. **Evolução metamórfico-estrutural da área entre Itutinga e Madre de Deus de Minas, MG**. 151f. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1984.

- HEILBRON, M. O metamorfismo da área de Itutinga – Madre de Deus – MG. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 3., 1985, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: SBG – Núcleo Sudeste, 1985. p. 219-227.
- HERRON, M. M. Geochemical Classification of Terrigenous Sands and Shales from Core or Log Data. **Journal of Sedimentary Petrology**, v. 58, p. 820 - 829, 1988.
- HOSKIN, P. W. O.; BLACK, L.P. Metamorphic zircon formation by solid-state recrystallization of protolith igneous zircon. **Journal of Metamorphic Geology**, v. 18, p. 423 - 439, 2000,
- JAFFEY, A. H.; FLYNN, K. F.; GLENDENIN, L. E.; BENTLEY, W. C.; ESSLING, A. M. Precision measurement of the half-lives and specific activities of U235 and U238. **Physical Review C**, v. 4, p. 1889-1907, 1971.
- JANASI, V. A. **Petrogênese de granitos crustais da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé (SP-MG): uma contribuição da geoquímica elemental e isotópica**. Tese de Livre Docência – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
- JANASI, V. A.; VLACH, S. R. F.; ULBRICH, H. H. G. J. Enriched-mantle contributions to the Itú granitoid belt, southeastern Brazil: evidence from K-rich diorites and syenites. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 65, p. 107-118, 1993.
- JANASI, V. A.; ALVES, A.; VLACH, S. R. F. Granitos peraluminosos da porção central da Faixa Ribeira, estado de São Paulo: sucessivos eventos de reciclagem da crosta continental no neoproterozóico. **Geologia USP – Série Científica**, v. 3, p. 12 – 24, 2003.
- JANASI, V. A.; VLACH, S. R. F.; CAMPOS NETO, M. C.; ULBRICH, H. H. G. J. Associated A-type subalkaline and high-K calc-alkaline granites in the Itú granite province, southeastern Brazil: petrological and tectonic significance. **The Canadian Mineralogist**, v. 47, p. 1505 – 1526, 2009.
- KAULFUSS, G. A. **Geocronologia e Geoquímica dos Núcleos do Setuva , Betara e Tigre , Noroeste de Curitiba-PR**. 1991. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.
- KROGH, T. E. Improved accuracy of U-Pb zircon dating by selection of more concordant fractions using a high gradient magnetic separation technique. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 46, p. 631-635, 1982a.
- KROGH, T. E. Improved accuracy of U-Pb zircon ages by the creation of more concordant systems using the air abrasion technique. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 46, p. 637-649, 1982b.
- LUGMAIR, G. W. Sm-Nd ages: a new dating method (abs.). **Meteoritics**, v. 9, p. 369, 1974.
- LUGMAIR, G. W.; SCHEININ, N. B.; MARTI, K. Search for extinct ^{146}Sm , I. The isotopic abundance of ^{142}Nd in the Juvinas meteorite. **Earth and Planetary Science Letters**, v. 27, p. 9479-9484, 1975.

- MACHADO, N.; SCHRANK, A.; ABREU, F. R.; KNAUER, L. G.; ALMEIDA ABREU, P. Resultados preliminares da geocronologia U/Pb na Serra do Espinhaço Meridional. **Sociedade Brasileira de Geologia – Núcleo Minas Gerais**, boletim, v. 10, p. 171 – 174, 1989.
- MANGE, M. A.; MAURER, H. F. W. **Heavy Minerals in Colour**. London: Chapman & Hall, 1992, 147p.
- MARTINS, L.; VLACH, S. R. F.; JANASI, V. A. Reaction microtextures of monazite: Correlation between chemical and age domains in the Nazaré Paulista migmatite, SE Brazil. **Chemical Geology**, v. 261, p. 271 – 285, 2009.
- MCCULLOCH, M. T.; WASSERBURG, G. J. Sm-Nd and Rb-Sr chronology of continental crust formation. **Science**, v. 200, n. 4345, p. 1003-1011, 1978.
- MCLENNAN, S. M. Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust. **Geochemistry, Geophysics, Geosystems (G³)**, v. 2, 2001.
- MCLENNAN, S. M.; TAYLOR, S. R. Sedimentary rocks and crustal evolution: tectonic setting and secular trend. **The Journal of Geology**, v. 99, n. 1, p. 1 - 21, 1991.
- MCLENNAN, S. M., TAYLOR, S. R., MCCULLOCH, M. T., MAYNARD, J. B. Geochemical and Nd-Sr isotopic composition of deep-sea turbidities: crustal evolution and plate tectonic associations. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 54, p. 2015-2050, 1990,
- MCLENNAN, S. M.; HEMMING, S.; McDANIEL, D. K.; HANSON, G. N. Geochemical approaches to sedimentation, provenance, and tectonics. In: JOHNSON, M. J.; BASU, A. (eds.). **Processes controlling the Composition of Clastic Sediments**. Colorado: Geological Society of America, *Special Paper 284*, 1993.
- MCLENNAN, S. M.; HEMMING, S. R.; TAYLOR, S. R.; ERIKSSON, K. A. Early Proterozoic crustal evolution: Geochemical and Nd-Pb isotopic evidence from metasedimentary rocks, southwestern North America. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 59, n. 6, p. 1153-1177, 1995.
- MINSTER, J. F.; BIRCK, J. L.; ALLÈGRE, C. J. Absolute age of formation of chondrites studied by the ⁸⁷Rb-⁸⁷Sr method. **Nature**, v. 300, p. 414-419, 1982.
- MORI, P. E.; REEVES, S.; CORREIA, C. T.; HAUKKA, M. Development of a fused glass disc XRF facility and comparison with pressed powder pellet technique at Instituto de Geociências, São Paulo University. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 29, n. 3, p. 441-446, 1999.
- MORIMOTO, N.; FABRIES, J.; FERGUNSON, A. K.; GINZBURG, I. V.; ROSS, M.; SEIFERT, F. A.; ZUSMAN, J.; AOKI, K.; GOTTARDI, G. Nomenclature of pyroxenes. **American Mineralogist**, v. 73, p. 1123-1133, 1988.
- MORTON, A. C. Stability of detrital heavy minerals in Tertiary sandstones from the North Sea Basin. **Clay Minerals**, v. 19, p. 287-308, 1984.

- MORTON, A. C.; HALLSWORTH, C. R. Processes controlling the composition of heavy mineral assemblages in sandstones. **Sedimentary Geology**, v. 124, p. 3-29, 1999.
- MOTTA, R. G. **Evolução tectono-metamórfica do Domínio Serra da Natureza, Terreno Andrelândia, MG**. 2009. 158f. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- NANCE, W. B.; TAYLOR, S. R. Rare earth element patterns and crustal evolution I: Australian post-Archean sedimentary rocks. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 40, p. 1539-1551, 1976.
- NESBITT, H. W.; YOUNG, G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major elements chemistry of lutites. **Nature**, v. 299, p. 715 - 717, 1982.
- NESBITT, H. W.; YOUNG, G. M. Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations. **Geochimica et Cosmochimica Acta**, v. 48, p. 1523-1534, 1984.
- NESBITT, H. W.; YOUNG, G. M. Formation and diagenesis of weathering profiles. **The Journal of Geology**, v. 97, p. 129-147, 1989.
- NEUMMAN, W.; HUSTER, E. Discussion of the ^{87}Rb half-life determined by absolute counting. **Earth and Planetary Science Letters**, v. 33, p. 277-288, 1976.
- NISBET, E. G.; PEARCE, J. A. Clinopyroxene compositions in mafic lavas from different tectonic settings. **Contributions to Mineralogy and Petrology**, v. 63, p. 149-160, 1977.
- NOCE, C. M.; MACHADO, N.; TEIXEIRA, W. U-Pb geochronology of gneisses and granitoids in the Quadrilátero Ferrífero (southern São Francisco craton): age constraints for Archean and Paleoproterozoic magmatism and metamorphism. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 28, n. 1, p. 95 – 102, 1998.
- PACIULLO, F. V. P. Mapeamento geológico-estrutural da área de Minduri – MG. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS, 2., 1983, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: SBG – Núcleo Sudeste, 1983. p. 440 - 448.
- PACIULLO, F. V. P., RIBEIRO, A., ANDREIS, R. R. Reconstrução de uma bacia fragmentada: o caso do Ciclo Depositional Andrelândia. In: SIMPÓSIO DO CRÁTON SÃO FRANCISCO, 2, 1993, Salvador. **Anais...** Salvador: 1993, p. 224 - 226.
- PACIULLO, F. V. P., RIBEIRO, A., ANDREIS, R. R., TROUW, R. A. J. The Andrelândia basin, a neoproterozoic intraplate continental margin, southern Brasília Belt, Brazil. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 30, n. 1, p. 200 - 202, 2000,
- PACIULLO, F. V. P., TROUW, R. A. J., RIBEIRO, A. Geologia da Folha Andrelândia. In: A. C. PEDROSA-SOARES, C. M. NOCE, R. A. J. TROUW, M. HEILBRON (orgs.), **Projeto sul de Minas – Etapa 1**. COMIG, UFRJ e UFMG, 2002. Cap. 4, p. 98 - 119.

- PETERNEL, R., TROUW, R. A. J., SCHMITT, R. Interferência entre duas faixas móveis neoproterozóicas: o caso das faixas Brasília e Ribeira, no sudeste do Brasil. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 35, n. 3, p. 297 – 310, 2005.
- PETTIJOHN, F. J. **Sedimentary rocks**. New York: Harper and Row, 1975, 628p.
- PETTIJOHN, F. J.; POTTER, P. E.; SIECER, R. **Sand and Sandstone**. New York, Heidelberg, Berlin: Springer-Verlag, 1972, 618p.
- PIMENTEL, M. M.; RODRIGUES, J. B.; DELLAGIUSTINA, M. E. S.; JUNGES, S. L. J.; MATTEINI, M. The tectonic evolution of the Neoproterozoic Brasília belt, central Brazil, based on SHRIMP and LA-ICPMS U-PB sedimentary provenance data: a review. **Journal of South American Earth Sciences** (2011). doi: 10.1016/j.jsames.2011.02.011.
- PINSON, W. H.; SCHNETZLER, C. C.; BEISER, E.; FAIRBAIRN, H. W.; HURLEY, P. M. Rb-Sr age of stony meteorites. **MIT Geochronological Laboratorie 11th Ann. Rep**, NYO-10, p. 517, 1963.
- PIRES, F. R. M. **Geologia do Distrito Manganêsífero de Conselheiro Lafaiete**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1978.
- PRAZERES FILHO, H. J. **Caracterização geológica e petrogenética do batólito granítico Três Córregos (PR-SP): Geoquímica isotópica (Nd-Sr-Pb), idades (ID-TIMS/SHRIMP) e $\delta^{18}\text{O}$ em zircão**. 2005, 207f. Tese (Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- PUPIN, J. P. Granite genesis related to geodynamics from Hf-Y in zircon. **Transactions of the Royal Society of Edinburgh**, v. 91, p. 245-256, 2000,
- QUÉMÉNEUR, J. J. G.; RIBEIRO, A.; TROUW, R. A. J.; PACIULLO, F. V. P.; HEILBRON, M. **Geologia da Folha de Lavras**. Projeto sul de Minas – Etapa I: COMIG-UFMG-UFRJ-UERJ, 2002.
- RAINBIRD, R. H. et al. U-Pb geochronology of Riphean sandstone and gabbro from southeast Siberia and its bearing on the Laurentia-Siberia connection. **Earth and Planetary Science Letters**, v. 164, p. 409-420, 1998.
- RIBEIRO, A. & HEILBRON, M. Estratigrafia e metamorfismo dos Grupos Carrancas e Andrelândia, sul de Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32, 1982, Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, 1982, p. 177 - 186.
- RIBEIRO, A.; TROW, R. A. J.; ANDREIS, R. R.; PACIULLO, F.V.P.; VALENÇA, J. G. Evolução das bacias proterozóicas e o termo-tectonismo brasileiro na margem sul do Cráton São Francisco. **Revista Brasileira de Geociências**, v. 25, p. 235-248, 1995.
- RIBEIRO, A., PACIULLO, F. V. P., TROUW, R. A. J., VALENÇA, J. G. Síntese geológica regional do bloco ocidental (Campos das Vertentes e Sul de Minas). In: A. C. PEDROSA-SOARES, C.

- M. NOCE, R. A. J. TROUW, M. HEILBRON (orgs.), **Projeto sul de Minas – Etapa I.** COMIG, UFRJ e UFMG, 2002. cap. 3, p. 51 - 83.
- RIBEIRO, L. M. A. L. **Estudo geológico-geocronológico dos Terrenos granito-gnáissicos e sequências metavulcanossedimentares da região do Betara (PR).** 2006. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- RUDNICK, R. L.; GAO, S. Composition of the Continental Crust. In: HOLLAND, H. D.; TUREKIAN, K. K. (eds.) **Treatise on Geochemistry.** Oxford: Elsevier-Pergamon, p. 1-64, 2003.
- RUSSEL, R. D.; AHRENS, L. H. Additional regularities among discordant lead-uranium ages. **Reviews of Geophysics and Space Physics**, v. 10, p. 529-549, 1957.
- SANTOS, L. P.; CAMPOS NETO, M. C.; GROHMANN, C. H. Metamorphic path constrained by metapelitic rocks from the inner Aiuruoca-Andrelândia Nappe, south of São Francisco craton, SE Brazil. **Journal of South American Earth Sciences**, p. 725 - 741, 2004.
- SCHOBENHAUS, C.; HOPPE, A.; BAUMANN, A.; LORK, A. Idade U/Pb do vulcanismo Rio dos Remédios Chapada Diamantina, Bahia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38, 1994, Balneário Camboriú. **Resumos Expandidos.** Balneário Camboriú: SBG, v.2, 1994, p. 397 – 398.
- SIGA Jr., O.; CURY, L. F.; HARARA, O. M. M.; RIBEIRO, L. M. A. L.; BASEI, M. A. S.; PRAZERES FILHO, H. J.; SATO, K.; PASSARELLI, C. R. Evidências de regimes extensionais no Estateriano no leste paranaense, com base em estudos geocronológicos U-Pb (zircão). In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 10, 2005, Curitiba. **Resumos Expandidos.** Curitiba: v. 10, 2005, p. 353 – 356.
- SIGA Jr, O.; CURY, L. F.; McREATH, I.; RIBEIRO, L. M. A. L.; SATO, K.; BASEI, M. A. S.; PASSARELLI, C. R. Geology and geochronology of the Betara region in south-southeastern Brazil: Evidence for possible Statherian (1.80–1.75 Ga) and Calymmian (1.50–1.45 Ga) extension events. **Gondwana Research**, v. 19, n. 1, p. 260 – 274, 2011.
- SILVA, M. P. **Modelamento metamórfico de rochas das fácies xisto verde e anfibolito com uso de pseudosseções: exemplo das rochas da Klippe Carrancas, sul de Minas Gerais.** 2010, 147f. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010,
- STACEY, J. S.; KRAMERS, J. D. Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model. **Earth and Planetary Science Letters**, v. 26, p. 207-221, 1975.
- TASSINARI, C. C. G., NUTMAN, A. P. Archean and Proterozoic multiple tectono-thermal events recorded by gneisses in the Amparo region, São Paulo State, Brazil. In: SOUTH AMERICAN

- SYMPOSIUM ON ISOTOPE GEOLOGY, 3, 2001, Santiago. **Extended Abstracts**. Santiago: 2001, p. 252 – 254.
- TAYLOR, S. R.; MCLENANN, S. M. **The Continental Crust: Its composition and evolution**. Oxford: Blackwell, 1985, 312p.
- TAYLOR, S. R.; MCLENANN, S. M. The geochemical evolution of the continental crust. **Reviews of Geophysics**, v. 33, p. 241-265, 1995.
- TEIXEIRA, A. W. **Influência da pilha de nappes na trajetória metamórfica da Nappe Andrelândia, borda sul do cráton São Francisco**. 2008. 42f. Monografia de Trabalho de Formatura (Bacharelado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- TEIXEIRA, W.; SABATÉ, P.; BARBOSA, J.; NOCE, C. M.; CARNEIRO, M. A. 2000, Archean and Paleoproterozoic tectonic evolution of the São Francisco Craton, Brazil. In: CORDANI, U. G., MILANI, E. J., THOMAZ FILHO, A., CAMPOS, D. A. (Eds.). **Tectonic Evolution of South America**. 1st ed. Rio de Janeiro: 31 INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 2000, p. 101 - 137.
- TOMKINS, H. S.; POWELL, R.; ELLIS, D. J. The pressure dependence of zirconium-in-rutile thermometer. **Journal of Metamorphic Geology**, v. 25, p. 703-713, 2007.
- TOPFNER, C. Brasiliano-granitoide in den Bundesstaaten São Paulo und Minas Gerais, Brasilien-eine Vergleichende studie. **Münchner Geol. Hefte**, A17, p. 258, 1996. proveniencia UBX
- TROUW, R. A. J., RIBEIRO, A., PACIULLO, F. V. P. Evolução estrutural e metamórfica de uma área a SE de Lavras – Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31, 1980, Balneário de Camboriú. **Anais...** Balneário Camboriú: SBG, 1980, p. 2773 - 2784.
- TROUW, R. A. J., PACIULLO, F. V. P., CHRISPIM, S. J., DAYAN, H. Análise de deformação numa área a SE de Lavras Minas Gerais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 37. 1982. Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, 1982, p. 187 - 198.
- TROUW, R. A. J.; RIBEIRO, A.; PACIULLO, F. V. P. Geologia estrutural dos Grupos São João del Rei, Carrancas e Andrelândia, sul de Minas Gerais. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 55, n. 1, p. 71 - 85, 1983.
- TROUW, R. A. J.; RIBEIRO, A.; PACIULLO, F. V. P. Contribuição à geologia da Folha Barbacena – 1:250,000, In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 34. 1986, Goiânia. **Anais...** Goiânia: SBG, 1986, p. 974 - 986.
- TROUW, R. A. J. & PANKHURST, R. J. Idades radiométricas ao sul do Cráton São Francisco: região da folha Barbacena, Minas Gerais. In: SIMPÓSIO SOBRE O CRÁTON SÃO FRANCISCO, 2. 1993, Salvador. **Anais...** Salvador: SBG, 1993, p. 260 - 262.
- TROUW, R. A. J., PACIULLO, F. V. P., RIBEIRO, A. A Faixa Alto Rio Grande reinterpretada como zona de interferência entre a Faixa Brasília e a Faixa Ribeira. In: CONGRESSO

- BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38, Balneário Camboriú. **Boletim de Resumos...** Balneário Camboriú: SBG, 1994, p. 234 - 235.
- TROUW, R. A. J., HEILBRON, M., RIBEIRO, A., PACIULLO, F. V. P., VALERIANO, C. M., ALMEIDA, J. C. H., TUPINAMBÁ, M., ANDREIS, R. R. The Central Segment of the Ribeira Belt. In: CORDANI, U. G., MILANI, E. J., THOMAZ FILHO, A., CAMPOS, D. A. (Eds.). **Tectonic Evolution of South America**. 1st ed. Rio de Janeiro: 31 INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 2000a, p. 335-365.
- TROUW, R. A., RIBEIRO, A., PACIULLO, F. V. P., HEILBRON, M. Interference between the neoproterozoic Brasília and Ribeira belts, with special emphasis on high pressure granulites. In: INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 31, 2000, Rio de Janeiro. **Field Trip Guide**: 2000b, 45f
- VALERIANO, C. M., MACHADO, N., SIMONETTI, A., VALLADARES, C. S., SEER, H. J., SIMÕES, L. S. A. U-Pb geochronology of the southern Brasília Belt (SE-Brazil): sedimentary provenance, Neoproterozoic orogeny and assembly of West Gondwana. **Precambrian Research**, v. 130, p. 27 - 55, 2004.
- VALLADARES, C. S.; MACHADO, N.; HEILBRON, M.; GAUTHIER, G. Ages of detrital zircon from siliciclastic successions south of the São Francisco craton, Brazil: implications for the evolution of Proterozoic basins. **Gondwana Research**, v. 7, n. 4, p. 913 – 921, 2004.
- VALLADARES, C. S., MACHADO, N., HEILBRON, M., DUARTE, B. P., GAUTHIER, G. Sedimentary provenance in the central Ribeira Belt based on laser-ablation ICPMS ²⁰⁷Pb/²⁰⁶Pb zircon ages. **Gondwana Research**, v. 13, p. 516 - 526, 2008.
- ZACK, T.; MORAES, R.; KRONZ, A. Temperature dependence of Zr in rutile: empirical calibration of a rutile thermometer. **Contributions to Mineralogy and Petrology**, v. 148, p. 471-488, 2004a.
- ZACK, T.; VON EYNATTEN, H.; KRONZ, A. Rutile geochemistry and its potential use in quantitative provenance studies. **Sedimentary Geology**, v. 171, p. 34-58, 2004b.
- WATSON, E.B.; WARK, D.A.; THOMAS, J.B. Crystallization thermometers for zircon and rutile. **Contributions to Mineralogy and Petrology**, v. 151, n. 4, p. 413-433, 2006.
- WHITE, W. M. **Radiogenic Isotope Geochemistry**. Ithaca: Cornell University, 2009. Disponível em: www.geo.cornell.edu/geology/classes/Chapters/Chapter08.pdf. Acesso em: 20 Dec de 2010,