ERRATA

p. 5 - No lugar do primeiro parágrafo, leia-se:

Uma intensa fase diastrófica dobrou a série Maricá, metamorfizando-a parcialmente. Seguiu-se a colocação em anticlinórios dos granitos de Caçapava e de Lavras.

p. 17 - Na última linha, leia-se:

... ocorrem pelo menos dois grandes stocks...

p. 22 - No 5º parágrafo, leia-se:

a densidade passa de 2,44 no topo, para 2,49 e para 2,50 na base

p. 24 - Na 1ª. linha, leia-se:

... pertencente à série Maricá. Não pudemos...

p. 56 - Depois do 1º parágrafo, inserir:

Ocorre um corpo de serpentinito ao sul de Lavras (ponto 18, fig. 3). Apresenta forma de um dique com cerca de 6 km de comprimento por 400 m de largura, encaixado em gnaisses.

p. 62 - Na 6ª. linha de baixo para cima, leia-se:

Caminhando para noroeste,...

p. 68 - Na 6ª. linha de cima para baixo, leia-se:

...andesíticas entre os conglomerados.

p. 70 - Na penúltima linha, leia-se:

...orientação planar conspícua,...

Na última linha, leia-se:

...entre norte-sul e N30°E,...

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

U.S.P.

VULCANISMO E PLUTONISMO NA REGIÃO DE CAÇAPAVA-LAVRAS,

R.G.S.

Tese de doutoramento apresentada
por

Henry Mau

1960

DEDALUS - Acervo - IGC

30900005174

ÍNDICE

- I INTRODUÇÃO
- II GEOLOGIA GERAL E MAPA GEOLÓGICO
- III IGNI MBRITOS
 - A. Ignimbritos em geral
 - 1) Definição
 - 2) Origem
 - 3) Características
 - 4) Terminologia empregada
 - B. Os ignimbritos do Rio Grande do Sul
 - 1) Generalidades
 - 2) Áreas de ocorrência e volumes dos ignimbritos
 - 3) Fisiografia e estrutura
 - 4) Secções geológicas
 - a) Planalto da Ramada
 - b) Serra de Santa Barbrinha
 - 5) Correlação dos ignimbritos
 - 6) Fenômenos de recristalização
- IV LAVAS E TUFOS ÁCIDOS
 - A. Riólitos e vitrófiros
 - B. Keratófiros
 - C. Texturas e alteração das lavas
 - D. Tufos e brechas piroclásticas ácidas
 - E. Distribuição das lavas e piroclásticas ácidas no tempo e no espaço
 - 1) Anteriores ou contemporâneas à série Maricá
 - 2) Na Formação Riolítica da Sequência Vulcânica

V TRANSIÇÕES DE IGNIMBRITOS PARA RIÓLITOS

VI ANDESITOS

A. Petrografia

B. Distribuição dos andesitos no tempo e no espaço

1) Anteriores ou contemporâneos à série Maricá

a) Lavas

b) Sedimentos vulcanógenos

c) Andesitos metamorfizados

d) Correlação das rochas metamórficas com a série Maricá

2) Pertencentes à Formação Andesítica da Sequência Vulcânica

3) Contemporâneos à base da série Camaquã

4) Distinção de rochas da série São Bento (jurássico ?)

VII GRANITOS

A. O granito Caçapava

B. O granito Lavras

C. Idade dos granitos

VIII CORRELAÇÕES ESTRATIGRÁFICAS COM ESTADOS E PAÍSES VIZINHOS

IX CONSIDERAÇÕES GERAIS

X SUMÁRIO

XI BIBLIOGRAFIA

I - INTRODUÇÃO

Uma atividade vulcânica muito importante, seguida de intrusões graníticas, atingiu uma área de talvez 8.000 km² no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, durante um longo tempo geológico. Esta atividade não encontra paralelos no país na variedade dos produtos de erupção.

Durante cerca de oito meses, entre os anos de 1958 e 1960, um grupo de geólogos do Departamento Nacional da Produção Mineral e do United States Geological Survey (êstes sob os auspícios do Ponto IV, International Cooperation Administration) fizeram um mapa de reconhecimento de uma área de cerca de 3.600 km². O autor participou dos trabalhos na qualidade de geólogo contratado pelo D.N.P.M.

Uma grande quantidade de dados geológicos utilizados no presente estudo, bem como a maior parte do mapa geológico anexo (fig. 2) resultam do trabalho deste grupo e, em especial, do eng. Geraldo C. Melcher e do geólogo Robert F. Johnson.

O autor propõe-se a descrever os ignimbritos, lavas e tufos riolíticos, as lavas e tufos andesíticos e os granitos da região. Esta descrição é apresentada em caráter de reconhecimento, da mesma forma como os dados geológicos em que ela se baseia.

Trabalhos anteriores - Desde os primeiros estudos na região, houve consideráveis modificações nas concepções estratigráficas. Deve-se a Paulino F. de Carvalho (1932) a primeira descrição publicada da geologia da região de Caçapava-Lavras. Anteriormente vários autores já haviam feito observações geológicas, aliás, geral

mente limitadas às jazidas de cobre e ouro.

Carvalho estabeleceu a sucessão de arqueano, algonquiano, andesitos e sedimentos (série Camaquã). Reconheceu discordância entre essas rochas e a série Tubarão.

Seguiu-se o importante trabalho de Leinz e Barbosa (1941) que apresentaram um mapa geológico na escala de 1:200.000 e uma descrição mais pormenorizada. Ao contrário do trabalho de Carvalho acima citado, esses autores limitaram seu estudo à região de Caçapava-Lavras. Criaram a série Maricá e reconheceram a significação de vulcanismo ácido (já mencionado, aliás, por Leinz (1939, p. 206). A sucessão estratigráfica de Leinz e Barbosa compreende: arqueano, algonquiano, incluindo a maioria das rochas xistosas ao redor e a noroeste do stock granítico de Caçapava, bem como os xistos a oeste e sul de Lavras; formação Maricá, vulcanismo riolítico, série Camaquã, vulcanismo andesítico, mineralização de cobre e ouro e, após hiato, a série Tubarão. Uma formação local, o conglomerado Seival, seria posterior à mineralização, mas de idade desconhecida.

Estão em fase final de preparação dois trabalhos compreendendo a contribuição do grupo de geólogos do D.N.P.M. e U.S.G.S. ao conhecimento da geologia e recursos minerais da região de Caçapava-Lavras. Um resumo dos novos conhecimentos geológicos adquiridos na região foi dado por Melcher e Mau (1960). A tabela 1 compara as diversas concepções estratigráficas citadas acima.

Agradecimentos - Os nossos melhores agradecimentos dirigem-se ao Prof. Dr. Viktor Leinz, catedrático de Geologia da Universidade de São Paulo, que nos orientou desde os primeiros passos

como geólogo; ao eng. Irnack C. de Amaral, da Divisão de Fomento da Produção Mineral do D.N.P.M., cuja cooperação permitiu este estudo; ao eng. Geraldo C. Melcher que orientou o projeto pelo lado do D.N.P.M., e nos iniciou na geologia da região e a quem este trabalho muito deve; ao Dr. J. Moacyr V. Coutinho da Universidade de São Paulo, pelo generoso auxílio na parte petrográfica; ao Dr. Clarence S. Ross do U.S. Geological Survey em Washington, pela remessa de valiosas fotomicrografias de ignimbritos comentadas por ele; aos demais colegas da Universidade de São Paulo, U.S. Geological Survey e Departamento Nacional da Produção Mineral. Agradecemos ainda a gentil colaboração da Companhia Brasileira de Cobre e do Curso de Geologia da Universidade do Rio Grande do Sul, nas pessoas, respectivamente, do eng. Theodorico Bessa e dos profs. Irajá D. Pinto e Arthur W. Schneider.

II - GEOLOGIA GERAL E MAPA GEOLÓGICO

Daremos aqui um apanhado das principais unidades ^{geológicas} estratigráficas da região, segundo os estudos efetuados pelo grupo de geólogos do D.N.P.M. e do U.S.G.S.

O embasamento da região é constituído por rochas ígneas e metamórficas (pré-cambriano inferior a médio ?) incluindo granitos, gnaisses, bem como espessas sucessões de quartzitos, mármore e xistos, etc. Tais rochas ocorrem a noroeste do mapa, em direção a São Gabriel, a sudoeste em direção a Bagé e a leste, em direção a Encruzilhada (fig. 1). Parte dessas rochas talvez constitua a série Porongos, considerada algonquiana. Nas presentes considerações não nos ocuparemos especialmente do embasamento antigo.

Sobre os gnaisses e xistos antigos encontramos a série Maricá (pré-cambriano superior ?) compreendendo grauvaças, folhelhos e conglomerados ricos em detritos vulcânicos, bem como lavas andesíticas e riolíticas. Apresenta uma espessura de muitas centenas de metros e acha-se bastante dobrada.

Seguiu-se uma época de intenso vulcanismo do qual resultaram extensos depósitos andesíticos na base e riolíticos no topo. Constituem a chamada Sequência Vulcânica (pré-cambriano superior ou cambriano inferior ?) com uma espessura ao redor de 300 m na serra de Santa Barbrinha e que parece aumentar à medida que se caminha para o sul. Compreende a Formação Andesítica na base, constituída de lavas, rochas piroclásticas e conglomerados vulcânicos e a Formação Riolítica, constituída de ignimbritos, tufos

e lavas riolíticas.

Uma intensa fase diastrófica ^{dobrou} ~~provocou o dobramento~~ ^{metamorfizando-a parcialmente.} da série Maricá, e da Sequência Vulcânica, ~~bem como metamorfis-~~ ^{seguiu-se} ~~mo localizado na primeira. No auge, ou pouco depois, dêsses mo-~~ vimentos, houve a colocação em anticlinórios, dos granitos de Lavras e de Caçapava.

Discordantemente sobre as rochas mais velhas acha-se a série Camaquã (cambriano superior ?) constituída de siltitos, arenitos e conglomerados, cuja espessura chega a alcançar 2.700 m. Intercalados em sedimentos da base da série, encontram-se tufos e lavas andesíticas com espessuras de algumas dezenas de metros, no máximo.

Após a deposição da série Camaquã houve ainda uma fase de dobramento de intensidade moderada, acompanhada por falhamentos em bloco (fig. 4).

A região de Caçapava-Lavras apresenta numerosas ocorrências de cobre e ouro, havendo duas minas em operação, ambas para cobre: Camaquã e Seival. A origem da mineralização não está clara, mas parece relacionar-se às intrusões graníticas da região.

Foi feita uma determinação de idade pelo método do potássio-argônio com a biotita do granito de Caçapava, dando 506 milhões de anos (R.F. Johnson, comunicação escrita). Embora só contemos com uma determinação, consideramos tentativamente o granito Caçapava de idade cambriana superior, a série Camaquã, talvez cambriana superior, a série Maricá pré-cambriana superior e a Sequência Vulcânica, pré-cambriana superior ou mesmo cambriana

inferior.

Mapa geológico na escala de 1:200.000 (fig. 2) acompanha o presente trabalho. A base topográfica é constituída por fotografias aéreas do Serviço Geográfico do Exército, com a escala média de 1:37.500. As fotografias aéreas foram montadas sem controle, pelo processo de triangulação radial. Posteriormente, fêz-se a redução.

O mapeamento geológico foi feito nas fotografias aéreas. A presente versão do mapa constitui uma primeira aproximação e inclui trechos com muito pouco controle (indicados por linhas tracejadas).

A metade setentrional do mapa foi obra, principalmente, de G.C. Melcher, enquanto que a maior parte da metade meridional foi feita por R.F. Johnson. O autor trabalhou especialmente no canto noroeste da fôlha, na serra de Santa Barbrinha e a leste do stock de Caçapava.

III - IGNIMBRITOS

A. Ignimbritos em geral

1) Definição

São depósitos piroclásticos tabulares formados por processos semelhantes às nuvens ardentes ("nuées ardentes"); apresentam estrutura eutaxítica, especialmente próximo à sua base, onde os fragmentos que os constituem são soldados uns aos outros, em maior ou menor grau, dando ao ignimbrito um aspecto de lava; gradualmente, para cima, o depósito torna-se mais poroso e menos coerente, menos soldados os seus constituintes, tomando um aspecto de tufo.

O termo foi criado por Marshall (1932) a partir do latim ignis (fogo) e imber (chuva) (Hjelmqvist, 1956, p. 3). Na literatura, encontram-se outros termos para designar o mesmo tipo de depósito, tais como tufo soldado ("welded tuff"), derrame de areia ("sand flow"), derrame de cinza ("ash flow"), tufo fundido ("Schmelztuff"), etc. Por vários motivos, ignimbrito exprime melhor do que todas as outras designações propostas a natureza sui-generis do depósito.

Os termos incluindo a palavra 'derrame' falsificam tanto as condições de transporte como as de deposição da rocha. A nuée não é um líquido e seu depósito tem forma tabular (Cook, 1957, p. 197). A inclusão do conceito de grão em 'areia' ou 'cinza' não serve nenhum propósito útil, já que existem numerosos ignimbritos de grã variável. O termo 'soldado' por outro lado, só se pode aplicar àquelas partes dos ignimbritos que são

efetivamente soldadas e não a um depósito inteiro, cuja parte superior teria de ser descrita justamente como 'não soldada'! (Mackin, 1960).

Ignimbrito é uma designação genética-estrutural e, por isso, deve ser seguida do termo litológico, assim, p. ex., ignimbrito riolítico.

Marshall (1935) empregou ignimbrito no duplo sentido de tipo de rocha e de unidade-rocha. Seria vantajoso restringir o termo a apenas este sentido (Cook, 1957, p. 197). Segundo a classificação dual das unidades estratigráficas, um ignimbrito seria uma unidade-rocha, mapeável, distinta e identificável por critérios físicos objetivos e observáveis no campo e em estudos de sub-superfície (Schenk e Muller, 1941).

2) Origem

A origem dos ignimbritos ainda não está bem estabelecida, mas acredita-se que eles tenham sido depositados por erupções análogas às nuvens ardentes descritas das Pequenas Antilhas, do Japão e alhures.

A evidência mais forte neste sentido é o fato de se encontrarem tôdas as passagens entre rochas resistentes, semelhantes a lavas, e tufos não consolidados. Além disso, os depósitos apresentam forma tabular e cobrem uma grande área (Martin, 1959, p. 395). De qualquer modo, os ignimbritos constituem um grupo heterogêneo e "não se pode mais duvidar que entre lavas verdadeiras e derrames de emulsão de gas e pó de vidro haja todas as passagens" (Williams, 1941, p. 279).

A estrutura laminada, pseudo-fluidal, dos ignimbritos deve-se à compressão das rochas sobrejacentes e não ao fluir viscoso da rocha. Aliás, a falta de lineação indica que a laminação se produziu após a cessação do movimento da massa.

A nuvem ardente, conforme observada, seria devida à formação de espuma no magma da qual resultasse uma massa de gás quente carregada de púmice pulverizado, mais pesada do que o ar, que escorre com velocidade de furacão. Essa massa aquecida ao rubro tem um comportamento semelhante ao de um líquido. Sua baixa viscosidade dever-se-ia à subdivisão da lava em partículas que são rodeadas e suspensas em uma atmosfera gasosa altamente comprimida, causada especialmente pela emissão de gases por parte das próprias partículas (Perret, 1935, p. 84).

Recentemente, com o concurso de experiências, Mc Taggart (1960) propôs uma outra teoria sobre o movimento das nuvens ardentes. Reynolds (1954) sugeriu que a mobilidade das "nuées" seria devida ao fato de serem elas "fluidizadas", isto é, as partículas seriam carregadas em suspensão por um jato de gás, processo utilizado na indústria. Acontece, porém, que o escape de gases reduziria logo de muito a fluidização, processo que é altamente eficiente dentro de um cano ou um tubo, mas não ao ar. Mc Taggart sugere que a parte inferior, quente, relativamente compacta da nuvem ardente, na sua descida rola sobre ar frio, englobando-o e aprisionando-o momentaneamente. Assim, a parte frontal da nuvem seria constantemente fluidizada por novos suprimentos de ar que, ao se aquecer, expande-se progressivamente explosivamente à medida que sobe pela massa da nuvem. A parte posterior

desta, menos eficientemente fluidizada, deposita uma camada de material clástico quente ao longo do rastro da nuvem ardente (Mc Taggart, 1960, p. 380-381).

A avalanche incandescente que desce pelos declives é acompanhada por uma grande nuvem escura que sobe e se expande rapidamente. Esta nuvem é que vai depositar o material sólto, tufáceo, que costuma constituir o tôpo das unidades de ignimbrito.

As nuvens ardentes conhecidas de tempos históricos diferem em muitos aspectos das que teriam sido responsáveis pelos gigantescos depósitos de ignimbritos conhecidos em todos os continentes, desde o pré-cambriano até o pleistoceno.

A maioria das nuvens ardentes observadas saiu de crateras e deu depósitos de composição andesítica, geralmente não soldados; por outro lado, a maioria dos ignimbritos saiu de fissuras, deu origem a depósitos onde os fragmentos de vidro estavam soldados entre si, especialmente próximo à base e eram de composição entre riólito e dacito. Conhece-se entretanto, pelo menos uma nuvem ardente que originou um depósito de ignimbrito soldado: é a nuvem ardente de Agatsama, no vulcão Asama, no Japão (erupção de 1783) (Cook, 1959, p. 5).

Assim, as nuvens ardentes atuais não constituem um modêlo das erupções que no passado produziram ignimbritos, sendo muito menores, e possivelmente até diferentes (Mackin, 1960, p. 84). Por outro lado, é provável que haja mais de um proceso responsável pelos numerosos tipos de ignimbritos já observados e descritos na literatura.

3) Características dos ignimbritos

Os ignimbritos apresentam características próprias que permitem diferenciá-los, no campo e no laboratório, de outros depósitos ígneos, sejam lavas ou tufos. Marshall (1935) (citado por Vlodav'etz, 1957), Weyl (1954, p. 16) e outros autores procuraram estabelecer critérios para a identificação de ignimbritos.

Os ignimbritos diferem dos tufos:

- 1-porque têm textura uniforme, normalmente fina
- 2-pela ausência de estratificação verdadeira
- 3-pela ausência de classificação granulométrica segundo o afastamento da origem do material
- 4-pela disjunção colunar bem desenvolvida
- 5-pela coerência e solidez das rochas
- 6-pela distribuição no terreno, seguindo apenas os vales
- 7-pela estrutura pseudo-fluidal em lâmina delgada, devida ao envergamento dos fragmentos plásticos de vidro ao redor dos cristais pré-formados.

Diferem de lavas:

- 1-pela ausência de bordas vítreas
- 2-pela falta de uma superfície escoriácea
- 3-pelo baixo peso específico
- 4-pela freqüente presença de uma delgada camada de cinza vítrea na base do ignimbrito propriamente dito
- 5-pelo aumento gradual do peso específico e do grau de soldamento de cima para baixo, em cada unidade de ignimbrito
- 6-pela ausência de lineação e outras evidências de fluxo em

massa

- 7-por serem compostos de fragmentos de vidro soldados em maior ou menor grau
- 8-pela sua grande extensão lateral
- 9-pela raridade com que se pode determinar o aparelho vulcânico de origem do depósito.

Entre os caracteres megascópicos mais evidentes dos ignimbritos estão os seguintes: a) lenticulas-corpos discóides alinhados paralelamente à base do ignimbrito, freqüentemente com brilho vítreo. Apresentam forma de lente ou chama quando vistas em secção. Geralmente são constituídas por lapilli púmicos e se encontram com maior freqüência e mais bem desenvolvidas próximo à base dos depósitos.

b) fragmentos de rochas pré-existents, vulcânicas ou não, costumam existir embora não sejam abundantes, em geral.

c) os cristais que a rocha encerra são geralmente fragmentos e raramente conservam suas formas cristalinas.

4) Terminologia empregada

Lenticulas-(vide acima)-(italiano, russo-fiamme; francês, inglês: lenticles, lenticules). Podem ser vítreas, rochosas, porosas ou cristalinas. São interpretadas como fragmentos líticos achatados ou intensa cristalização local no tufo (Martin, 1959, p. 405).

* Soldamento- a expressão foi usada por Zirkel em 1876 e por Idings, em 1899 que notaram o fenômeno em "riólitos" do oeste dos Estados Unidos. O soldamento seria

causado pela compressão do material sobrejacente, enquanto que os cacos de vidro constituintes da rocha ainda estivessem em estado pastoso. Pode haver ainda uma influência em maior ou menor grau da ação pneumatolítica de gases vulcânicos (Fenner, 1937, p. 237). Ao microscópio, pode-se avaliar o grau de soldamento pela reentrância que os estilhaços de vidro sofrem, onde foram atingidos por fragmentos de rocha ou cristais, muito pouco compressíveis.

Cacos de vidro com bordas côncavas (também fragmentos, farrapos, estilhaços, lascas; inglês-shard; francês-écharde). São lascas de vidro bicúspides ou tricúspides, com formas de Y, originalmente vítreas, hoje devitrificadas. Trata-se de partes de paredes de vesículas produzidas pela expansão dos gases do magma e posteriormente quebradas. Constituem a textura vitro-clástica (Pirsson, 1915, p. 194), estrutura de cacos ou lascas, etc. ("shard structure").

B. Os ignimbritos do Rio Grande do Sul

1) Generalidades

De longa data se conhecem rochas vulcânicas no Rio Grande do Sul. Dentre estas, as chamadas lavas riolíticas ocupavam lugar proeminente, reunidas sob a designação geral de quartzo-pórfiros (Leinz, 1939, p. 206).

Pudemos demonstrar a existência de ignimbritos entre os vulcanitos ácidos desta região (Mau, 1959). Reconhece-

mos as seguintes características:

a-megascópicas

Aspecto de lava e caráter fragmentar

Lentículas irregulares de forma discoidal e brilho frequentemente vítreo

Fragmentos de rochas anteriores

Diaclasamento colunar proeminente

Pêso específico baixo

b-microscópicas

Natureza clástica de toda a massa fundamental da rocha

Soldamento maior ou menor dos fragmentos da massa entre si e nos fragmentos e cristais inclusos

Cristais quase sempre fragmentários

Muitas ocorrências de ignimbritos puderam ser reconhecidas na região, graças à identificação de diversos dos caracteres acima. Outros critérios citados na literatura como característicos de ignimbritos não puderam ser aplicados às rochas desta região. A elevada idade (presumivelmente pré-cambriana superior) e as vicissitudes sofridas pela região neste longo tempo decorrido, dificultam bastante o reconhecimento de muitas feições consideradas características dos ignimbritos. Assim, a recristalização das rochas mascara muitos aspectos; intrusões posteriores, alteração hidrotermal ou intempérica contribuem; dobramentos e falhamentos, recobrimento por formações mais recentes e longo tempo de exposição à erosão, completam o quadro.

Entre características que não foram encontradas no Rio Grande do Sul estão as seguintes:

a-Distribuição no terreno seguindo apenas os vales

Não foi esclarecida a paleotopografia.

b-Ausência de bordas vítreas e superfície escoriácea

Este fator não pôde ser empregado, já que raramente se conseguiram reconhecer as superfícies primitivas desses depósitos.

c-Presença freqüente de uma delgada camada de cinza vítrea na base do ignimbrito

Este caráter não foi observado por vários autores, mesmo em depósitos mais recentes e se existisse, talvez escapasse da observação devido aos fatos citados no item acima.

d-Aumento gradual do peso específico de cima para baixo em cada unidade de ignimbrito

Foi observada apenas em casos isolados. As unidades são freqüentemente descontínuas, suas exposições perturbadas tectonicamente, invalidando a amostragem em seqüência. O peso específico é ainda sujeito a fatores estranhos, tais como o grau de recristalização.

e-Grande extensão lateral

A extensão atual é relativamente limitada, já que só se nos apresentam remanescentes de erosão. Mesmo extrapolando-se a área original para incluir toda a área entre os afloramentos extremos visíveis hoje, o depósito ficaria ainda muito aquém dos grandes ignimbritos descritos na literatura.

f-Raramente pode-se determinar o aparelho vulcânico que deu origem ao depósito

Não conseguimos determinar aparelho vulcânico rela-

cionado a esses depósitos, mas devido aos fatores já expostos, também não conseguimos no caso de outras rochas vulcânicas da região.

Acreditamos entretanto, que os critérios que podemos aplicar identificam os depósitos como ignimbritos, ainda que, em certos casos, não esclareçam suficientemente suas características e origem.

Tivemos ocasião de comparar as rochas em questão com depósitos de outras regiões e idades. Para citar só os dois exemplos pré-cambrianos que vimos na literatura, os ignimbritos de Caçapava parecem-se muito com os de Tiouine, no Marrocos (Bouladon, Jouravsky, 1954) e com os de Dalarna, na Suécia Central (Hjelmqvist, 1956).

Na interpretação das estruturas dos ignimbritos, grau de soldamento e de recristalização, utilizamos com grande proveito a magnífica coleção de fotomicrografias feitas e comentadas pelo dr. Clarence S. Ross. Esse autor, trabalhando com secções inteiras de rochas cenozóicas pôde interpretar a natureza e sequência dos acontecimentos. Tendo encontrado estruturas semelhantes nos ignimbritos do Rio Grande do Sul, mesmo sem ter relações de campo muito completas, foi-nos possível explicar o que víamos por analogia com as fotos do dr. Ross. Para comparação e interpretação de estruturas, utilizamos ainda os trabalhos de Gilbert (1938), Westerveld (1942), Weyl (1954), Enlows (1955), Vlodav'etz (1957) e Martin (1959).

2) Área de ocorrência e volume dos ignimbritos

Na região mapeada, os ignimbritos ocorrem no planalto da Ramada e na serra de Santa Barbrinha. A primeira área representa cerca de 280 km² e a segunda, cerca de 5 km². Admitindo uma espessura média de 40 m para a secção de ignimbritos, obtemos um total de mais de 11 km³, talvez ao redor de 35 km³.

Estas ocorrências constituem apenas remanescentes de erosão, mas é provável que a extensão original de ignimbritos fôsse superior a 2000 km². Admitindo uma espessura média de 40m, teríamos um volume ao redor de 80 km³, que colocaria êsse distrito entre os pequenos distritos de ignimbrito do mundo (tabela 2).

3) Fisiografia e estrutura

Constitui uma área elevada, de cerca de 30 km por 10 km, situada na parte noroeste do mapa (fig. 2). Limita-se por todos os lados por escarpas mais ou menos íngremes, medindo entre 30 e 70 m de altura. A superfície do planalto é muito pouco acidentada, tem uma drenagem deficiente e são raros os afloramentos de rocha.

O planalto é quase todo constituído por ignimbritos que, nas bordas, apresentam mergulhos centrípetos: ao sul, 15° para NE e a nordeste, 40° - 50° para S. No interior, parece que há consideráveis variações nos mergulhos, provavelmente devido a perturbações tectônicas. Por conseguinte, o planalto não é um planalto estrutural, próximo da horizontal.

Além dos ignimbritos, ocorrem ^{dois} pelo menos ~~um~~ grandes

stock de riólito granofírico e, estratigraficamente abaixo dos primeiros, manchas irregulares de conglomerados vulcânicos da Formação Andesítica.

A cerca de 4 km da borda sul do planalto, há um graben constituído por ignimbritos, orientados N 70°W-S 70°E, com um comprimento de cerca de 13 km e largura de algumas centenas de metros.

2) A serra de Santa Barbrinha

Constitui um espigão abrupto de tópo mais ou menos regular, orientado cerca de N 30° E, paralelamente ao curso do arroio Santa Bárbara, na parte centro-setentrional do mapa (fig. 2). Tem cerca de 30 km de comprimento e é constituído quase exclusivamente por rochas resistentes da Formação Riólítica.

Para sudoeste, a serra passa para a chamada Coxilha da Árvore, que é um divisor de águas de relêvo suave, recortado por afluentes dos arroios Camaquã-América e Santa Bárbara. Compreende riólitos, arenitos e conglomerados da série Camaquã e andesitos da região da mina Seival.

A serra de Santa Barbrinha tem uma altura que oscila entre 250 e 300 m. Apresenta uma escarpa abrupta para sudeste e uma face pouco íngreme para noroeste.

É constituída, de baixo para cima e de noroeste para sudeste, por lavas, piroclásticas e conglomerados vulcânicos da Formação Andesítica, keratófiros, ignimbritos e piroclásticas da Formação Riólítica. Estas últimas rochas são responsáveis pela face oriental abrupta. Os keratófiros constituem grande

parte do t $\acute{o}$ po. O conjunto parece ser um bloco de falha basculado, com mergulhos geralmente dirigidos para sudeste, entre 10° e 60°.

A hist $\acute{o}$ ria vulc $\acute{a}$ nica desta $\acute{a}$ rea parece ser mais complicada do que a da Ramada. H $\acute{a}$ maior movimentação tect $\acute{o}$ nica e $\acute{e}$ mais freq $\ddot{u}$ ente encontrarmos aqui corpos vulc $\acute{a}$ nicos lenticulares de extens $\tilde{a}$ o lateral limitada, constituindo uma pilha complexa.

4) Sec $\tilde{c}$ ões Geol $\acute{o}$ gicas

Conhecemos c $\acute{e}$ rca de 15 ocorr $\tilde{e}$ ncias de ignimbritos diferentes entre si e reconhec $\acute{i}$ veis por seus caracteres mega- e microsc $\acute{o}$ picos. As sec $\tilde{c}$ ões acham-se, em geral, incompletas, tendo sido conservadas de prefer $\tilde{e}$ ncia as por $\tilde{c}$ ões mais bem soldadas e recristalizadas. Os membros pouco soldados ou tuf $\acute{a}$ ceos dos ignimbritos s $\acute{o}$ aparecem onde houve um recobrimento por rochas mais resistentes.

Vamos limitar-nos a descrever algumas sec $\tilde{c}$ ões incluindo ignimbritos, procedendo por $\acute{a}$ reas de ocorr $\tilde{e}$ ncia e distinguindo a base do t $\acute{o}$ po do pacote. A tabela 3 resume as sec $\tilde{c}$ ões descritas.

a) Planalto da Ramada: Base da sucess $\tilde{a}$ o de ignimbritos

A base est $\acute{a}$ exposta em v $\acute{a}$ rios pontos. Descreveremos sec $\tilde{c}$ ões pr $\acute{o}$ ximo $\grave{a}$ est $\acute{a}$ ncia Vista Clara, de propriedade do snr. Dalmiro Teixeira, de Lavras; no C $\acute{e}$ rro Partido, na est $\acute{a}$ ncia das Cordilheiras, do snr. Val $\acute{e}$ rio Teixeira, de Lavras; na escarpa nordeste do planalto e no graben, ao sul do mesmo; e no centro, pr $\acute{o}$ ximo ao marco de triangula $\tilde{c}$ ao.

Secção 1: estrada Lavras-estância Vista Clara (fig.3,5).

Destacam-se pelo menos três sucessões (fig. 5): na base, brechas ácidas (as piroclásticas são descritas no capítulo IV, abaixo); no meio, ignimbrito moderadamente soldado e tufo; no topo, ignimbritos passando de bastante a intensamente, soldados e recrystalizados.

Na base está uma brecha ácida com vaga estratificação, fragmentos centimétricos pouco selecionados e raras lenticulas. À medida que se sobe na secção, a estratificação torna-se mais distinta. A brecha é castanha-avermelhada sendo muitos dos fragmentos verdes ou esverdeados. Ao microscópio, nota-se que a maioria dos fragmentos da brecha são constituídos de púmice, recrystalizado em maior ou menor grau; ocorrem ainda fragmentos de granó-firo, riólito e tufo. O teor de cristais na rocha não é muito elevado, e torna-se mais alto à medida que se sobe na secção. Predominam fragmentos de cristais de quartzo, ortoclásio e raro plagioclásio sódico. Encontram-se ainda clorita, calcedônia, muscovita e magnetita, todos bastante raros.

A brecha parece terminar por uma superfície de erosão sub-horizontal sobre a qual se depositou uma camada decimétrica de tufo retrabalhado, bem estratificado e selecionado. A grã varia desde centímetro até décimo de milímetro, parecendo haver uma certa gradação que se repete 2-3 vezes.

No meio da secção ocorre um ignimbrito moderadamente soldado que, para cima, passa a tufáceo. Apresenta uma massa creme-rósea com lenticulas longas e delgadas, negras, de brilho baço, constituídas de púmice comprimido, terminando em fiapos.

Os cristais são raros; o quartzo, quebrado e cheio de concavidades e o ortoclásio em fragmentos irregulares. Encontramos raros seixos de grauvaca e granófiro. Os cacos de vidro estão bem preservados e nota-se a recristalização pectinada, com os cristais prismáticos crescendo perpendicularmente às paredes das lascas, fenômeno observado por vários autores em outros ignimbritos.

Para cima, a rocha passa para um tufo poroso, de cor roxa, resistente ao martelo, com raras lenticulas escuras. Os cacos de vidro estão mal preservados. São raros os cristais de quartzo e feldspato.

O topo da seção é constituído por ignimbritos muito soldados e recristalizados, e forma o degrau do planalto, logo ao sul da estância Vista Clara. Tem aspecto de lava, apresentando bandas roxas e creme, secundárias. A rocha é pobre em cristais e fragmentos líticos, sendo raras as lenticulas pumíceas, longas e delgadas. As lascas de vidro apresentam formas muito bem preservadas, com soldamento intenso umas às outras e aos cristais inclusos. Ocorrem com certa frequência pequenos nódulos de quartzo, alongados paralelamente às camadas, que serão descritos abaixo.

É provável que a erosão tenha removido pelo menos a parte não soldada do ignimbrito do topo da seção.

Seção 2: Cêrro Partido

Observa-se um ignimbrito alaranjado claro, com cerca de 37 m de espessura, descansar sobre uma espessa seção de conglomerados vulcânicos da Formação Andesítica. (fig. 3,5).

Apresenta-se como uma lava porfirítica, muito rica em grãos quebrados de quartzo e pertita, com raras lenticulas mal preservadas, raros seixos estranhos de andesito e ardósia e excelente disjunção colunar.

Enquanto que a base da secção é constituída por um ignimbrito com aspecto de lava fluidal, bandeada, à medida que se sobe no Cêrro, e na secção, encontram-se rochas menos recristalizadas onde as bandas ainda não são contínuas. Próximo ao tôpo do cêrro, notam-se lenticulas extensas, aglutinadas, constituindo horizontes persistentes, intrincadamente dobrados (fig. 6, 7).

Ao microscópio, nota-se próximo à base, a completa destruição da estrutura de cacos de vidro e recristalização muito adiantada. As lenticulas só são representadas por "fantasmas" resultantes da reprodução grosseira dos contornos das mesmas por uma recristalização gráuda. O soldamento, onde pode ser visto, é intenso. Várias das bandas mais espessas apresentam intercrescimentos granofíricos.

Subindo-se na secção, encontram-se rochas onde ainda se reconhecem lenticulas e mesmo, localmente, cacos de vidro. Já as grandes lenticulas dobradas do tôpo da secção revelam-se com aspecto de dobras plásticas, com espessamentos nas zonas axiais e afinamentos nos flancos. Abaixo dos "fenocristais", estas lenticulas "compostas" apresentam depressões e acima dê les, abaulamentos.

A densidade passa de 2,44, ^{no tôpo,} para 2,49 e, ^{para} ~~no tôpo~~ 2,50 ^{na base.}

Respectivamente a 1,5 e 4,5 km a nordeste do Cêrro Partido há outros testemunhos de ignimbrito da Ramada. São se

melhantes às rochas acima descritas só que se observa melhor, especialmente no primeiro dêles (densidade 2,55), a estrutura de cacos e lenticulas pumíceas em forma de chama. A cor destes ignimbritos é vermelha a alaranjada, podendo também ser negra. e sua densidade chega a 2,55.

Secção 3: escarpa nordeste da Ramada

O ignimbrito negro a castanho avermelhado repousa sobre uma sucessão de grauvas da série Maricá, brecha ácida, riólito, tufo e lava andesítica. Os três últimos pacotes têm espessuras da ordem de um metro cada um, e o ignimbrito da ordem de 50 m (fig. 5). As atitudes do ignimbrito são um tanto variáveis com mergulhos ao redor de 40° a 50° para o sul.

Litológicamente, este ignimbrito assemelha-se bastante ao da região do Cêrro Partido. Tem aspecto de lava, é bandado, rico em cristais de quartzo, ortoclásio e peritita; raros seixos de andesito. Reconhece-se diaclasamento colunar.

Ao microscópio, nota-se que à medida que se sobe na secção, as bandas vão se mostrando constituídas de fragmentos de vidro, hoje recristalizados e acham-se freqüentemente substituídas por intercrescimentos gráficos. Estes últimos mostram nitidamente o agrupamento da massa granofírica ao redor dos cristais preexistentes do ignimbrito. Onde se pode observá-lo, o grau de soldamento foi intenso (fig. 8).

Secção 4: o graben ao sul do planalto

Ocorrem aqui quatro tipos de ignimbritos associados a um folhelho amarrotado de cor verde-oliva, presumívelmen

te pertencente à *Série Manicá* ~~Seqüência Vulcânica~~. Não pudemos esclarecer a sucessão entre os diversos ignimbritos entre si e com o folhelho.

O primeiro ignimbrito tem aspecto de lava fitada, cor negra, rico em cristais de quartzo e ortoclásio, raros seixos de andesito, com diaclasamento colunar proeminente. Assemelha-se bastante aos descritos acima nas secções 2 e 3. Ao microscópio, nota-se o intenso grau de recristalização e soldamento; raramente pode-se reconhecer a estrutura de cacos que, entretanto, aparecem localmente formando as bandas por coalescimento. Algumas de tais bandas formam agregados granofíricos (fig. 9).

O segundo tipo de ignimbrito é uma rocha pouco soldada com grandes e espessas lenticulas castanhas em uma massa de cor creme, rica em cristais de quartzo e ortoclásio. Apresenta também aspecto de lava. Ao microscópio, os cacos de vidro pretéritos estão bem conservados e as lenticulas são constituídas de inter-crescimentos granofíricos. Notamos raros seixos de folhelho verde e andesito (fig. 10).

O terceiro tipo de ignimbrito apresenta-se pouco soldado, tufáceo, muito rico em fragmentos de folhelho verde e arenito. Cristais de pertita e quartzo fragmentares são abundantes. As lenticulas são curtas, verdes ou negras, em uma massa róseo castanha. Ao microscópio, notam-se zonas onde a estrutura de cacos está bem preservada, mostrando soldamento apenas incipiente. Certas zonas da rocha parecem fitadas, aparentemente devido à coalescência dos cacos de vidro.

Um quarto tipo de ignimbrito apresenta-se com as mes

mas características mega- e microscópicas do ignimbrito médio da secção 1 (Vista Clara).

Planalto da Ramada: tópo da sucessão de ignimbritos

Secção 5: Marco da Ramada

Na escarpa norte e no centro do planalto, próximo ao grande marco de triangulação metálico da Ramada, ocorre uma sucessão de ignimbritos roxo-escuros com grandes lenticulas castanho-avermelhadas. A rocha tem aspecto de lava, é rica em quartz e pobre em ortoclásio. Ocorrem seixos esparsos de granófiro, quartzito, ardósia e ignimbrito. Acha-se bastante perturbada, apresentando mergulhos até 90°, localmente. A espessura do pacote é superior a 70 m.

Ao microscópio, nota-se intenso soldamento e adiantado grau de recristalização (esferulítica ou maculosa - v. item 6, abaixo) que poupou, entretanto, áreas com estruturas de cacos bem preservada. São numerosos os nódulos de quartzo (descritos no item 6 abaixo): onde eles ocorrem, fica obliterada a estrutura de cacos. As grandes lenticulas são constituídas por púmice comprimido. Além de quartzo e ortoclásio, reconhecem-se raros plagioclásios e clorita.

Não se notou diferença de peso específico (2,60) ou de aspecto ao microscópio, entre rochas da parte basal da secção e rochas da parte superior.

8) Serra de Santa Barbrinha

Foram feitas observações em vários pontos da serra, tendo sido encontrados seis ignimbritos de aspecto, extensão e espessura diversos, na mesma posição estratigráfica, isto é, no topo da Formação Riolítica. Ao contrário do planalto da Ramada, a intervenção de corpos de intrusivas e de rochas piroclásticas separa os corpos de ignimbrito e perturba a correlação.

Secção 6: estância Gaspar Teixeira

A Formação Riolítica inicia-se aqui com um pacote de tufos ácidos, com cerca de 40 m de espessura, descansando sobre conglomerados vulcânicos da Formação Andesítica. Uma sucessão de ignimbritos com cerca de 20 m de espessura acha-se assentada sobre esses tufos, e exposta numa pequena área oval, com diâmetros de 500 m por 300 m. Aham-se bastante perturbados por falhamento em bloco, o que veio dificultar o esclarecimento da sucessão. Para cima, ignimbritos soldados passam a rochas não soldadas que continuam para nordeste até constituir a escarpa oriental da serra de Santa Barbrinha.

Megascôpicamente, o ignimbrito é bandeado, violeta claro com bandas longas e delgadas de cor creme; as lenticulas são róseas a creme. Cristais fragmentares de quartzo e pertita são abundantes, da mesma forma que seixos de andesito, grauvaça, siltito, folhelho e riólito, nessa ordem. A densidade varia de 2,36 a 2,51, sem relação com o grau de soldamento.

Microscôpicamente, nota-se que as lenticulas, ori-

ginalmente pumíceas, são recristalizadas em bandas esferulíticas ou com texturas dictitaxíticas, deixando uma cavidade alongada aberta no centro. Tal estrutura é responsável pela baixa densidade que apresentam inclusive rochas bem soldadas da secção.

A massa fundamental compõe-se de cacos de vidro recristalizados, soldados em maior ou menor grau uns aos outros e aos fragmentos de cristais inclusos. Localmente, de preferência nas rochas mais bem soldadas, nota-se o aparecimento de numerosos 'nódulos' de quartzo (descritos abaixo, no item 6). Entre os minerais, salientam-se quartzo, peritita, raramente plagioclásio ácido e piroxênio. A massa toda acha-se permeada por poeira hematítica (fig. 11, 12).

Secção 7: escarpa oriental da serra de Sta. Barbrinha
(sul)

Com apenas pequenas diferenças litológicas, encontra-se este ignimbrito ao longo de cerca de 5 km da crista sudeste da serra de Sta. Barbrinha, sempre acima de lavas keratofíricas, que constituem aqui a base da Formação Riolítica. Não foi determinado o limite desta unidade para nordeste. O corpo tem direcção de cerca de N 30° E e mergulhos ao redor de 25° para SE. A espessura total da secção pode ultrapassar 100 m, sendo geralmente ao redor de 25 m.

O ignimbrito apresenta-se sempre pouco soldado com grandes lenticulas azul-claras e roxo-azuladas em uma massa fundamental vermelha a chocolate. O teor de cristais varia de alto a moderado. As rochas apresentam aspecto tufáceo, poroso (fig. 13).

AO microscópio, observa-se excelente preservação da estrutura de cacos, com recristalização destrutiva apenas local. As lenticulas são sempre pumíceas, bem conservadas e com aspecto desabado. Os minerais encontrados incluem quartzo, pertita e poeira hematítica. Os fragmentos estranhos compreendem andesito, pumíce, tufo, ignimbrito, folhelho, e quartzo.

Secção 8: Cêrro das Furnas

Sôbre keratófiros da base da Formação Riolítica encontra-se um ignimbrito, com cêrca de 36 m de espessura, inclinado de 40° a 60° para sudeste (Mau, 1959, p. 13). A fig. 5 ilustra a estratigrafia.

Megascôpicamente o ignimbrito apresenta numerosas lenticulas negras com brilho vítreo, em uma massa fundamental creme a rósea, com raros cristais de quartzo e pertita. Seixos de diversos tipos texturais de andesitos são abundantes, bem como fragmentos de grauvacas. Nota-se um diaclasamento colunar bem marcado.

Microscôpicamente, o grau de recristalização é elevado, destruindo com freqüência a estrutura de cacos; as lenticulas pumíceas acham-se recristalizadas grosseiramente; as lascas de vidro antigas apresentam devitrificação do tipo pectinado. Além do quartzo e pertita, encontra-se raramente, plagioclásio ácido (fig. 14).

Secção 9: nordeste da serra

Sôbre lavas andesíticas e conglomerado vulcânico da Formação Andesítica, encontra-se um pacote com mais de 15 m de espessura e mergulho de cêrca de 45° para SE.

Megascôpicamente, o ignimbrito mostra grandes lentículas castanho-avermelhadas em uma matriz castanho escura. A rocha tem aspecto de lava com abundantes cristais de ortoclásio, pertita e quartzo. São abundantes os seixos de andesitos, de diversas texturas, bem como de grauvaca, tufo, folhelho, apresentando diâmetro até 3 cm.

Microscôpicamente, nota-se soldamento de fraco até intenso, com recristalização adiantada, esferulítica e granofírica vermicular, destruindo quase por toda parte os fragmentos de vidro primitivos. As lentículas são constituídas de púmice filamentoso comprimido. Além de ortoclásio e quartzo, observam-se plagioclásio ácido e clorita.

Secção 10: a extremidade da serra

Os 3 km terminais da serra de Sta. Barbrinha constituem morrotes baixos, já separados pela erosão. Ocorre aí um ignimbrito com aspecto e mesmo, à primeira vista, textura de lava, com lentículas filamentosas pouco proeminentes de cor cinza, muito rico em cristais de quartzo e ortoclásio, com pequenos seixos esparsos de andesito, tufo e púmice. Tem espessura de cerca de 20 m e mergulho de 40°-50° para SE (Mau, 1959).

Ao microscópio, nota-se soldamento de moderado a intenso, com recristalização adiantada, em que esferulitos destroem grandes extensões de cacos primitivos. Estes, onde se conservaram, apresentam as melhores texturas que se encontraram na região (Mau, 1959, figs. 1,2). Predominam entre os cristais, ortoclásio e quartzo, seguidos por clorita e calcita, provavelmente substi-

tuindo um mineral máfico, zircão e hematita pulverulenta.(fig. 15).

5) Correlação dos ignimbritos

Os ignimbritos constituem unidades estratigráficas quase ideais: apresentam extensão lateral considerável, superfície superior aproximadamente plana quando de sua deposição, foram formados em um só instante do tempo geológico e possuem numerosos caracteres que permitem individualizá-los, admitindo uma correlação segura (Mackin, 1960, p. 104).

Entre os caracteres dos ignimbritos que podem servir à correlação estão a cor, o grau de soldamento, o teor de cristais ou fragmentos, ou ambas as coisas, em relação ao de matriz, a natureza e abundância dos fragmentos estranhos, o tipo e frequência da disjunção colunar, etc. (Cook, 1957).

A correlação entre os ignimbritos em nossa área procurou basear-se nesses critérios, tanto mega- como microscopicamente. Várias unidades não encontraram correspondente, seja porque nunca o tiveram, seja porque tivesse sido erodido, coberto por rochas mais recentes, deslocado tectonicamente ou modificado por recristalização, a ponto de perder as características que o identificassem.

Enquanto que no planalto da Ramada as condições de deposição dos ignimbritos parecem ter sido normais e as correlações são possíveis para distâncias de até 15 km, na serra de Sta. Brinha tal não acontece. Nesta serra houve intenso tectonismo e as unidades parecem ser lenticulares e de pouca persistência lateral. Não se conseguiu estabelecer correlações a mais de 5-6 km de distância.

5-6 km de distância.

Apresenta dificuldades especiais a correlação de ignimbritos da Ramada com outros da serra Santa Barbrinha. Não há continuidade física: as duas áreas estão separadas por lacunas de erosão e derrames de riólito que talvez representem os ignimbritos, mas não permitem conclusões seguras.

a) Planalto da Ramada

Podemos correlacionar os ignimbritos pretos ou vermelhos, ricos em fragmentos de cristais, que apresentam bandas de cacos de vidro coalescidos. Ocorrem nas secções 2, 3 e 4.

Correlacionamos também os ignimbritos porosos, de cor creme-rósea, com longas lenticulas, de cor preta e brilho baço, encontrados no centro da secção 1 e na secção 4 (quarto tipo).

São também comparáveis os ignimbritos bem soldados, pobres em cristais e fragmentos estranhos, com raras lenticulas e abundantes nódulos de quartzo como o do topo da secção 1 e os da secção 5.

Sabemos, portanto, que temos próximo à base da sucção de ignimbritos da Ramada: a-espessa sucessão de brechas; b-"riólito bandeado" preto ou vermelho, rico em cristais de quartzo e feldspato. Sabemos que o graben ao sul da Ramada deve pertencer à base da secção, até, no máximo o meio (embora não conheçamos a sucessão precisa). Parece não haver outras unidades entre o que observamos na secção 1 e na secção 5.

Pode-se, por conseguinte, estimar a espessura total dos ignimbritos da Ramada, tomando cerca de 50 m da secção 1 e

mais de 70 m da secção 5, com provável repetição da unidade-chave. Estimamos uma espessura total de cerca de 100 metros.

b) Serra de Santa Barbrinha

Podemos comparar os ignimbritos pouco soldados do topo da secção 6 (grandes lenticulas azul claras e roxo azuladas em massa fundamental vermelha a chocolate, soldamento incipiente, cacos bem preservados) com os que constituem a secção 7. Esta correlação se fez por cerca de 6 km de distância, ao longo da serra.

É possível correlacionar entre si, pela sua posição estratigráfica (sobre a Formação Andesítica e sobre os keratófiros) as secções 7, 8, 9 e 10, faltando, entretanto, características litológicas comparáveis.

Quanto à comparação entre a secção da Ramada e a da serra de Santa Barbrinha, o que podemos dizer no momento, é que também estas secções ocupam posições estratigráficas equivalentes, isto é, sobre a série Maricá e a Formação Andesítica.

6) Fenômenos de recristalização

Comumente, observa-se nos ignimbritos intensa compactação e soldamento, especialmente próximo à sua base (Gilbert, 1938; Westerveld, 1942; Enlows, 1955, entre outros). Igualmente comuns e importantes são os processos de devitrificação e recristalização, que afetam praticamente todas as rochas antigas ricas em vidro. Finalmente, é comum os ignimbritos se apresentarem silicificados.

No Rio Grande do Sul tivemos oportunidade de obser -

var freqüentemente rochas bem soldadas, já que estas são as que melhor resistem à erosão. Por outro lado, praticamente todos os ignimbritos acham-se devitrificados, recrystalizados e silicificados em maior ou menor grau. A recrystalização pode ir ainda um passo além, dando origem a pseudo-riólitos, como veremos no capítulo V.

a-cavidades alongadas

São freqüentes ao longo das bandas dos ignimbritos mais bem soldados e recrystalizados. Apresentam-se com comprimentos de até 2-3 cm e larguras de fração de milímetro até alguns mm. Tal cavidade pode estar atapetada por cristais bem formados, geralmente de feldspato, estando o centro vazio ou preenchido parcialmente por quartzo. É provável que parte destas cavidades, especialmente as de formas mais regulares, sejam primárias e constituam uma textura dictitaxítica (constituída por numerosas pequenas cavidades angulares com a forma dos interstícios entre prismas de feldspato de orientações quaisquer (Williams, 1954, p. 24). As bandas lateralmente mais persistentes, apresentando cavidades, resultam provavelmente de recrystalização, por vezes granofírica, com o concurso de soluções. Estas estruturas são responsáveis pela baixa densidade, justamente das rochas mais bem soldadas e recrystalizadas.

b-"nódulos quartzosos"

São corpos esferoidais de quartzo, com diâmetro da ordem de décimo de milímetro, por vezes com forma de pera e ligeira

mente achatados paralelamente à pseudo-fluidiez. Associam-se frequentemente aos horizontes mais bem soldados de ignimbritos. Idênticas estruturas foram descritas nos ignimbritos pré-cambrianos de Tiouine, no Marrocos (Bouladon e Jouravsky, 1954, p. 44). Esses autores acham que se trata do preenchimento de vesículas aprisionadas na rocha quando de sua formação. Poder-se-ia, em nosso caso, tratar da recristalização do quartzo a partir de numerosos centros dentro da massa da rocha. Nota-se bem que a ocorrência de nódulos coincide com uma completa destruição da estrutura de blocos da rocha (fig. 16).

IV - LAVAS E TUFOS ÁCIDOS

Além dos ignimbritos, ocorrem na região estudada outras rochas de composição semelhante e aspecto, seja de lava, se ja de rochas piroclásticas. Distinguem-se entre as primeiras, por seus caracteres mega e microscópicos, riólitos, vitrófiros e keratófiros; entre as segundas, tufos e brechas.

A. Riólitos e vitrófiros

Megascopicamente, os riólitos são rochas porfiríticas de cor rosa-claro até tijolo, afanítica até fanerítica. Distinguem-se, já a olho nu, fenocristais de quartzo e feldspato roseo, sendo variável a proporção de cristais entre si e com a massa.

Foram examinadas cerca de 30 lâminas delgadas dessas rochas. Apresentam textura porfirítica, com fenocristais de quartzo mal formados, corroídos ou fragmentários e feldspato, também com frequência quebrados. Os feldspatos mais comuns são ortoclásio e pertita. Ocasionalmente, encontram-se albita e plagioclásio de composição de oligoclásio a andesina. Os minerais coloridos são raros e não foram observados como fenocristais. /sanidade não

A massa fundamental apresenta composição uniforme. Reconhecem-se quartzo, ortoclásio, limonita, e, raramente plagioclásio ácido, muscovita, calcedônia. Entre os minerais coloridos, sempre raros, estão clorita, epídoto, biotita, e em um caso, riebeckita. Minerais opacos, provavelmente magnetita, e uma fina poeira translúcida de limonita e hematita, permeiam todas as ro-

chas, sendo responsáveis por sua coloração megascópica. Dentre os acessórios, encontraram-se zircão, apatita e rutílio.

A granulação da mesóstase varia de alguns microns até uns 2 mm, compreendendo diversas texturas (vide descrição abaixo).

Vitrófiros ainda ricos em vidro foram encontrados próximo à jazida de cobre de Crespos, na serra de Santa Barbrinha (Leinz (Leinz e Barbosa, 1941, p. 20). São constituídos de uma massa negra vítrea onde se acham alguns cristais de quartzo e feldspato.

B. Keratófiros

Megascopicamente são rochas compactas, de cor vermelho-arroxeadas a chocolate ou mesmo rosa-clara, com fenocristais de feldspato cor de carne, esparsamente distribuídos. Ocorrem frequentemente em grandes lages exibindo magníficas estruturas fluidais (fig. 17).

Microscopicamente, foram examinadas cerca de 15 lâminas delgadas. Notamos uma textura porfirítica em que fenocristais de albita, amiúde substituídos por ortoclásio, e raramente plagioclásio ácido, estão imersos em uma massa fundamental micropoiquilítica, ou simplesmente microlítica.

A massa fundamental é constituída por feldspato de índice de refração inferior ao do bálsamo do Canadá, quartzo, pequenos grãos de clorita, epidoto?, apatita, titanita e zircão, além da poeira de limonita e hematita, em menor ou maior quantidade.

Incluimos estas rochas entre os keratófiros, devido à sua composição mineralógica, quartzo, albita e ortoclásio associados em proporções variáveis e inversas e quantidades meno-

res de clorita, biotita, leucoxênio e zircão. Não há fenocristais de quartzo, que ocorre, entretanto, na massa fundamental (Battey, 1955, p. 104). A principal característica dos keratófiros é que a quantidade de minerais coloridos e seus produtos de alteração é mínima, parecendo ser rochas altamente leucocráticas (Loewinson-Lessing, 1928, citado por Johannsen III, 1937, p. 48). Suas texturas reliquiarias ligam-~~as~~ aos riólitos de que se distinguem nitidamente por sua mineralogia de baixa temperatura (Battey, 1955, p. 123).

A origem dos keratófiros é explicada de vários modos. Certos autores propugnam um magma sódico, outros falam em introdução de álcalis do meio para a rocha em processo de consolidação (Turner e Verhoogen, 1960, p. 267-269). Trabalhando nos lugares clássicos de ocorrência de keratófiros, Battey (1955, p. 122) acredita que o teor de álcalis na rocha é constante, não sendo nem muito elevado, nem adicionado a partir do meio. Ocorre a redistribuição dos álcalis dentro de cada derrame de lava, o que é apoiado pela constância da soma dos teores de álcalis e pelas estruturas encontradas, especialmente substituição de fenocristais de albita. Os minerais dessas rochas são de baixa temperatura, formados em condições de grande atividade migratória dos álcalis e da sílica, já no estado sólido.

C. Texturas e alteração das lavas

As lavas apresentam-se geralmente com textura porfírica, com fenocristais de quartzo e feldspato numa massa de granulação variável. Trata-se de rochas originalmente muito ri-

cas em vidro, hoje recristalizado. Examinemos alguns dos aspectos com que se apresentam as massas fundamentais devitrificadas:

a) textura criptocristalina - Consiste em agregados felsíticos, com baixo índice de refração, presumivelmente compostos por quartzo e ortoclásio. A exata natureza e os limites dos grãos são difíceis de distinguir, dado seu pequeno tamanho.

b) textura sacaróide - É composta por grãos desorientados, equidimensionais, de quartzo, ortoclásio e pequena quantidade de minerais acessórios. A granulação varia desde alguns microns (onde assume o aspecto criptocristalino, mencionado acima) até 1-2 mm. No caso deste tipo de recristalização, não se observa nenhuma estrutura original da rocha. O que porventura tenha existido, foi destruído na devitrificação.

c) textura micropoiquilitica - Confere à rocha um aspecto maculoso: ao girar-se a platina do microscópio entre nícois cruzados, alternam-se de claro a escuro numerosos campos em que se divide a massa fundamental. As máculas são devidas à inclusão de micrólitos de ortoclásio em massas irregulares de quartzo (Bascom, 1893, p. 814). O mosaico tem um aspecto grosseiramente granofírico, devido à extinção simultânea de muitas máculas. Freqüentemente notam-se entre nícois paralelos, estruturas não destruídas no processo de recristalização. Battey (1955, p. 114) observou que tipos microlíticos formam as margens dos derrames cujos interiores são micropoiquiliticos.

d) textura granofírica - É muito comum e consiste no inter -

crescimento mais ou menos regular, de massas de quartzo e ortoclásio. Raramente atinge a perfeição geométrica dos micropegmatitos. Estes intercrescimentos são observados em grãos com diâmetros desde alguns microns até 2 mm. Geralmente as estruturas originais da rocha são destruídas por esta recristalização.

Pertence a este tipo textural um intercrescimento em que o feldspato se apresenta em grossos filamentos ramificados em fundo de quartzo.

e) textura esferulítica - Os esferulitos são constituídos de quartzo, ortoclásio ou ambos, sendo que o segundo caso parece ser o mais comum. Seu tamanho varia desde pequena fração de milímetro até meio centímetro. São quase sempre secundários, já que destroem as estruturas primárias das rochas.

Distribuem-se pela massa fundamental, por vezes irregularmente, outras vezes, seguindo certos níveis. Neste caso, as camadas ricas em esferulitos apresentam aspecto aveludado, colorido pelo óxido de ferro.

f) textura bandeada - Dá à rocha um aspecto fitado. As bandas são freqüentemente irregulares, parecendo fluidais. Este aspecto será discutido abaixo (Cap. V).

Em luz polarizada, nota-se que as faixas são constituídas, seja por agregados granofíricos, seja por níveis de esferulitos. Parte destas rochas parecem provir da recristalização completa de ignimbritos.

Alteração - além da devitrificação, observa-se com freqüência a alteração hidrotermal das lavas ácidas, como aliás também

das rochas piroclásticas. O fenômeno mais comum é a silicificação, que pode atingir grandes volumes de rocha. O processo resulta provavelmente, seja do final da fase de vulcanismo ácido, seja de atividade ígnea posterior. Ocasionalmente notam-se a caolinização e sericitização dos feldspatos e cloritização da biotita.

D. Tufos e brechas piroclásticas ácidas

De acordo com a nomenclatura geralmente aceita, brechas são as rochas piroclásticas cujos componentes têm mais de 32 mm de diâmetro, e estão imersos em uma matriz mais fina, tufáceas. Tufos são rochas constituídas de fragmentos vulcânicos com diâmetros menores de 4 mm (Howell, 1957).

Podemos reconhecer nesta região tufos e brechas vítreos, líticos e de cristais, sendo os dois primeiros os mais comuns.

Geralmente as rochas piroclásticas não estão estratificadas e sua verdadeira natureza só se revela quando as partículas são visíveis a olho nu. Apresentam frequentemente consistência de lava, embora se possam encontrar tufos com aspecto poroso e densidade baixa.

Em lâmina delgada, especialmente nos tufos vítreos, distingue-se amiúde a textura vitroclástica, que consiste em uma massa de cacos de vidro bi- e tri-cuspidatos, com bordas côncavas.

Os tufos líticos apresentam maior ou menor teor de fragmentos de rochas arrancadas do conduto vulcânico, em uma matriz que pode ser vítrea.

Tufos de cristais são muito raros. O que se verifica,

em geral, é que as rochas piroclásticas contêm vidro, fragmentos de rocha e também cristais.

Os fragmentos estranhos mais comuns nos tufos e brechas são: andesitos de diversos tipos texturais, vários tipos de ignimbritos, grauvacas, ardósias, riólitos e granófiros. O constituinte mais abundante das rochas piroclásticas da região é o púmice, que predomina na maior parte das brechas.

Tanto o púmice como os cacos de vidro acham-se recristalizados, geralmente em uma massa felsítica fina.

Os cristais mais frequentes nessas rochas são o quartzo, ortoclásio, pertita, e plagioclásios. Ocorrem mais raramente micas (muscovita, clorita), hematita, limonita e zircão.

E. Distribuição das lavas e piroclásticas ácidas no tempo e no espaço

Ocorrem rochas piroclásticas e lavas de composição ácida: 1) anteriormente ou contemporaneamente à série Maricá

2) na Formação Riolítica da Seqüência Vulcânica

- - -

1) Vulcanitos ácidos da série Maricá ou anteriores

Sabemos de sua existência pela freqüente ocorrência de seixos nos conglomerados da série Maricá, mas não podemos apontar nenhum corpo de rocha que pertença seguramente a esta categoria. Identificamos seixos de riólito, ignimbrito quartzo-latítico e tufo. Isso indica que as condições vulcânicas da época teriam sido bastante semelhantes às que reinaram mais tarde, ao tempo da Seqüência Vulcânica.

2) Formação Riolítica da Sequência Vulcânica

Encontram-se aí lavas, ignimbritos, tufos e brechas piroclásticas, apresentando uma composição bastante constante, mas estruturas e texturas bem diversificadas.

Distribuem-se em quatro grandes áreas de ocorrência:

- a-Serra de Santa Barbrinha
- b-Planalto da Ramada
- c-Testemunhos entre o arroio Pecegueiros e o Passo dos Machados
- d-Stock a nordeste de Lavras

Existem corpos menores, especialmente constituídos por riólitos e tufos em diversas partes da região.

a- Serra de Santa Barbrinha

Ocorrem tufos, brechas, ignimbritos e lavas. Em uma extensão de cerca de 16 km, conhecem-se keratófiros na escarpa oriental da serra. Constituem derrames que estão sobre a Formação Andesítica e abaixo dos ignimbritos da área.

b- Planalto da Ramada

Encontram-se especialmente riólitos dos tipos bandeados e sacaróide, além de corpos de granófiro com aspecto de "stock". As rochas mais abundantes no planalto são, entretanto, os ignimbritos.

Conhecem-se pelo menos dois stocks de granófiro, grosso e regular. Apresenta uma textura porfirítica reliquiar, com fenocristais de feldspato e quartzo mergulhados em uma mesóstase granofírica de granulação ligeiramente inferior. Diques de granó

firo, com orientação ao redor de N 60 E e comprimentos de até 5 km cortam a série Maricá.

Tufos e brechas parecem mais abundantes na base do pacote, como se nota nas escarpas sul, norte e nordeste do planalto.

c- Testemunhos entre os arroios Pecegueiros e Passo dos Machados

Constituem o prolongamento da Ramada para nordeste e são compostos de riólitos holocristalinos, porfiróides, geralmente grosseiros e com aspecto de lava. Trata-se de corpos tabulares falhados em bloco.

d- "Stock" a nordeste de Lavras

Merece menção o pequeno stock isolado, a 12 km a nordeste de Lavras, constituído de granófiro. Trata-se de uma área complexamente falhada, localizada entre andesitos, rochas piroclásticas e a série Camaquã, onde é difícil esclarecer a sucessão cronológica. Este corpo pode até mesmo ser intrusivo na série Camaquã (R.F. Johnson, informação verbal).

V - TRANSIÇÕES DE IGNIMBRITOS PARA RIÓLITOS

72229 O processo de recristalização dos ignimbritos pode obliterar todos os traços de texturas clásticas, dando à rocha um aspecto bandeado, "fluidal" ou mesmo granular, felsítico a microgranítico. O primeiro caso é o das rochas com aparência de lava, cores negras a vermelhas, aspecto fitado, teor elevado de cristais quebrados, (secções 2, 3 e 4). Estes fragmentos de cristais provocam o desvio das bandas ao redor deles, contribuindo para a impressão de fluxo viscoso, com irregularidades locais que sugerem a passagem de fluxo laminar para fluxo turbilhonar. O segundo tipo de rocha recristalizada é porfirítico, com fenocristais de quartzo, e ortoclásio em uma massa fundamental variando de afanítica a fanerítica (com grãos até 2 mm) cor de tijolo. Foi possível observar o que nos pareceram ser passagens graduais entre ignimbritos nitidamente clásticos e tais rochas.

Na secção 2 (Cerro Partido) observamos horizontes dobrados, parecendo constituídos de lenticulas aglutinadas. A origem dessas dobras é obscura. Conhecendo-se o hábito dos farrapos de vidro dos ignimbritos, parece que a maior parte do comprimento dessas dobras corresponde à posição de antigos fragmentos ou lenticulas.

A correlação entre as dobras e a estrutura de cacos impõe-se especialmente em vista do comportamento das "dobras" do ignimbrito do topo do Cerro Partido, nas proximidades de um "fenocristal". Há precisamente a depressão que se pode observar em ignimbritos não tão recristalizados, devido à queda de um fragmento

sólido, pouco compressível, sôbre material ainda não consolidado. A única diferença é que os abaulamentos abaixo e acima dos cristais de quartzo e feldspato acham-se unidos a toda a faixa intrincadamente dobrada, contínua por vários centímetros. Esta faixa parece seguir essencialmente as posições dos antigos farrapos e lenticulas de vidro ou púmice, só saindo das formas dêstes para estabelecer conexões com outros fragmentos das proximidades (fig. 6, 7).

Sugere-se a possibilidade de que tenha havido mobilização do material de certos horizontes com uma determinada composição, segundo um gradiente tal como, por exemplo, da redistribuição de álcalis na rocha (Battey, 1955). Tal redistribuição poderia seguir um trajeto de menor resistência, que coincidiria com a posição dos antigos fragmentos de vidro: daí o aspecto de dobra ptigmática dessas faixas, sugerindo que a recristalização "salta" de um para o outro dos antigos cacos ou lenticulas. Tal hipótese parece ser reforçada pela verificação de Vlodav'etz (1953) de uma diferença de composição entre as lenticulas (riodacíticas) e a massa (dacítica) de um ignimbrito ("lava tufácea" de Semiatichinsk, U.R.S.S.).

Uma demonstração cabal de que não houve interferência de fenômenos tectônicos para a formação dessas dobras é a ausência de vestígios de esforços nos cristais de quartzo e feldspato inclusos na massa dobrada. Aliás, no campo, não se achou evidência de tectonismo algum correspondente a tais estruturas.

Esta ocorrência é talvez a melhor para mostrar a passagem de rocha com caracteres de piroclástica para o "riólito

fluidal", ainda que os pormenores do processo não estejam esclarecidos.

Na secção 4 (graben ao sul da Ramada), dentro de um raio de 30 m do terceiro tipo de ignimbrito descrito acima, afloram riólitos porfiríticos, granulares, cor de tijolo, incluindo seixos estranhos, inclusive granito e lentes recristalizadas, com aspecto de folhelho, de cor verde (fig. 18). Os fenocristais são de quartzo e ortoclásio. A zona do riólito mais próxima ao ignimbrito apresenta maior número de lentículas verdes do que mais para longe, onde a rocha apresenta aspecto homogêneo. Recordase que um folhelho semelhante às lentes ocorre nas proximidades. A densidade desta rocha é de 2,49, mais próxima de ignimbritos que de riólitos.

Em determinadas zonas deste mesmo ignimbrito observouse uma recristalização em pequena escala. A rocha nitidamente clástica, com numerosos fragmentos líticos e cacos de vidro recristalizados, passa bruscamente para uma zona com aspecto de "riólito fluidal" em que bandas escuras alternam com outras mais claras, suavemente onduladas em secção. Dentro das bandas escuras, ricas em limonita, vêem-se, aqui e ali, restos de cacos de vidro, dando a impressão de não se tratar de um contacto mas de uma transformação dentro do corpo da rocha.

O fenómeno poderia ser devido à recristalização e cimentação por parte de limonita. Seu carácter local talvez se deva a uma fonte de fluidos e calor localizada, como, por exemplo, uma fenda.

Na secção 3, um ignimbrito bandeado ("riólito fitado")

semelhante aos das secções 2 e 4, apresenta intercalações localmente espessas de granófiro. Pode-se observar em lâmina o desaparecimento progressivo dos antigos farrapos de vidro por recristalização. Reconhece-se, também, como a massa fundamental granofírica se agrupa ao redor dos antigos "fenocristais" do ignimbrito.

Assim, está indicado que, nesta região, muitas rochas com aspecto de riólitos fluidais originam-se, não de uma intrusão de magma viscoso, mas de um ignimbrito, piroclástico. A textura "fluidal" de muitos desses riólitos não lhes teria sido impressa pelo fluxo laminar de um líquido altamente viscoso e as irregularidades de tal textura não representariam um fluxo localmente turbilhonar. A textura foi impressa numa rocha que nunca teve um fluxo viscoso e que resulta, provavelmente, de recristalização, a partir de uma refusão em maior ou menor escala, da rocha piroclástica original. O aspecto fluidal, por sua vez, é devido apenas à compactação.

É possível que em certos ignimbritos se mantenha localmente uma temperatura suficientemente alta para efetuar uma refusão em presença de fluidos e reações exotérmicas. A importância de tais reações é ilustrada por Fenner (1950) que mostra a possibilidade de um relaxamento de pressão permitir o escape dos constituintes voláteis do magma, com evolução de calor suficiente para assimilar grandes quantidades de rochas básicas.

Formar-se-iam, a partir dos ignimbritos, primeiro, os "riólitos fluidais" e finalmente, os granófiros e riólitos grosseiros do tipo microgranito e granito-pórfito.

Embora admitindo uma origem a partir de um magma fundido, Demay (1953) mostrou que certos microgranitos teriam resultado de devitrificação e recristalizações sucessivas no estado sólido.

A textura fluidal - é objeto de muitas conjecturas desde há longo tempo, especialmente nas chamadas lavas ácidas. Não é fácil compreender o bandeamento, por vezes delicado, de certos riólitos. Iddings (1887) procurando explicar o fenômeno, sugeriu ser o bandeamento devido ao movimento paralelo ao substrato de porções de fluido, contendo diferentes proporções ou tipos de componentes. Dentre estes, estariam esferulitos, triquitos, micrólitos, etc., que se teriam espalhado em planos graças ao fluxo. Iddings apela aqui para os gases mineralizadores absorvidos pelas diversas camadas, para explicar as diferenças de consistência e de fases de cristalização.

Fuller (1927, p. 572) atribuiu a laminação ao movimento relativo de duas camadas adjacentes de lava. Considerou a rotação dos fenocristais o fator responsável pelo amassamento das camadas sobrejacentes. Tal rotação teria sido causada pelo movimento diferencial ao longo dos planos fluidais.

Ambas estas hipóteses parecem ser sobrepujadas pela idéia de que, certos riólitos pelo menos, teriam sido transformados por recristalização a partir de ignimbritos, e as texturas observadas em tais riólitos atestam essa origem. Isso explicaria também a frequência e a abundância de importantes depósitos de lavas ácidas, no passado. Esses riólitos, por vezes ocupando grandes áreas, estão em flagrante contradição com a elevada viscosidade do magma ácido e a raridade com que se observam hoje em dia lavas ácidas. Efetivamente, nenhum dos 500 vulcões que estão ou estiveram ativos em períodos históricos teriam formado lavas riolíticas ou traquíticas (Gêze, 1957, p. 348), embora vários deles o

tivessem feito ainda no pleistoceno (von Wolff, 1929 e 1931).

A discussão, entretanto, ainda prossegue. Há autores como Bordet (1958) que afirmam que um elevado teor de água permitiria reduzir consideravelmente a viscosidade do magma riolítico, permitindo-lhe cobrir grandes áreas. Por outro lado, autores como Vlodav'etz (1957) e Grange (1937) são de opinião que os ignimbritos são depositados por lavas em condições especiais, invert^endo, por conseguinte, o problema.

VI - ANDESITOS

São numerosos os corpos de rochas intermediárias na região, constituindo especialmente derrames e pequenas intrusões. É também notável a persistência no tempo das manifestações de tal vulcanismo, que se estende desde a época da sedimentação da série Maricá ou mesmo antes, até o começo da deposição da série Camaquã.

A - Petrografia

Megascôpicamente, os andesitos são rochas geralmente compactas, densas, de cor negra, quando frescas. Podem ser maciças, afaníticas ou nitidamente porfiríticas. Também as estruturas variam bastante. Temos rochas uniformes, escoriáceas, vesiculares, amigdalóides, freqüentemente passando de um a outro tipo dentro do mesmo derrame. Devem-se citar as estruturas fluidais, representadas pelo alinhamento de cristais de feldspato ou pela distorsão de amígdalas. São freqüentes as lavas aglomeráticas, especialmente no grande corpo andesítico dos arredores da mina Seival (Leinz e Barbosa, 1941, p. 25).

A quantidade e persistência das estruturas é geralmente insuficiente para a elucidação das atitudes dos grandes corpos de andesito, como o que ocorre ao norte e a leste de Lavras do Sul.

As rochas em questão apresentam uma maneira característica de alteração. Tomam um aspecto maciço, cortadas por diáclases pouco espaçadas em várias direções, com cores castanho-avermelhadas a amarela. Apresentam tendência para o desenvolvimento de disjunção esferoidal, ocorrendo a desagregação de escamas centimétricas da rocha. O solo formado sobre os andesitos é argilo

so, escuro, sendo bem reconhecível de longe no campo ou, ocasionalmente, em fotografia aérea.

O caráter básico dos plagioclásios e a riqueza em minerais máficos colocam estas rochas entre os andesitos e os basaltos (Leinz e Barbosa, 1941, p. 24). Conservamos a designação geral de andesitos, embora se pudesse colocar algumas delas entre os basaltos.

A distinção entre andesitos e basaltos não é, aliás, fácil e os critérios propostos variam bastante de um autor para outro. Citamos como exemplo, um tratadista. Williams (1954, p. 43) recomenda o limite de 52% de sílica, abaixo do qual as rochas seriam basaltos e acima do qual seriam andesitos. Esse autor não considera diagnóstica a presença de olivina ou a textura ofítica, embora ambas sejam mais freqüentemente encontradas em basaltos (1954, p. 43, 93). O índice de côr seria superior a 40% nos basaltos (1954, p. 43).

A ausência de análises químicas não permitiu uma classificação segundo a porcentagem de sílica. Os plagioclásios foram determinados geralmente em fenocristais, empregando apenas o método da medição dos ângulos de extinção simétrica dos geminados segundo a lei da albita, na zona perpendicular a (010) (Tabelas em Troeger, 1956, p. 99-111). O pequeno tamanho e elevado grau de alteração dos minerais da massa fundamental dificultaram muito a determinação, seja dos plagioclásios, seja do índice de côr.

O teor máximo de anortita nos plagioclásios vistos pelo autor é de apenas 56%, e isso em fenocristais. O índice de côr não ultrapassa em geral os 50%.

Por conseguinte, colocamos todas as rochas aqui mencionadas entre os andesitos. Estudos mais particulares dos andesitos, especialmente da região da mina Seival, devem-se a Karl Walther (1912) e Alceu F. Barbosa (1958, inédito).

Foram examinadas cerca de 100 lâminas delgadas de andesitos, inclusive alguns dacitos.

Os minerais mais comuns são:

1-plagioclásio, muitas vezes zonado, com "gôtas" de vidro e numerosas inclusões. Está frequentemente caolinizado ou sericitizado, podendo estar substituído por calcedônia, clorita, ou mais raramente, epídoto. A andesina é o componente mais freqüente, seguida por labradorita, oligoclásio e albita.

2-piroxênio é o mais comum dentre os minerais máficos primários. Apresenta-se incolor, monoclinico, freqüentemente zonado ou geminado. Está o mais das vezes parcial ou totalmente alterado em cloritas, carbonatos, epídoto e magnetita. Trata-se de um mineral do grupo do diopsídio.

3-outros minerais máficos primários: olivina, rara e alterada para serpentina, clorita e magnetita; hornblenda, rara também; biotita, com pleocroísmo intenso, é pouco freqüente.

4-Cloritas são abundantes e são poucas as rochas que não as apresentam. Constituem produto de alteração de piroxênio, anfíbólio ou biotita, podendo também substituir plagioclásios. Não se tentou distinguir entre os componentes deste grupo. Aparecem em vênulas e amígdalas.

5-Carbonatos são também freqüentes e abundantes, resultando da alteração de minerais máficos e de plagioclásios. Não foram

determinados os tipos de carbonatos presentes.

6-Magnetita-hematita-limonita constituem o grupo dos óxidos de ferro, um dos quais se acha sempre presente nos andesitos. Chamamos genêricamente de magnetita os minerais equidimensionais, reticulados ou arborescentes que são opacos e apresentam cor negra em luz refletida; estes minerais são acessórios comuns das rochas. Chamamos de limonita as massas irregulares amarelas ou castanho-avermelhadas, que por vezes substituem toda a massa fundamental. Ocasionalmente, podem reconhecer-se cristais vermelhos de hematita.

7-Calcedônia e quartzo aparecem por vezes na massa fundamental, em pequenas quantidades, sendo de origem secundária. A calcedônia é frequente em vênulas e amígdalas, bem como substituindo plagioclásios.

8-Apatita verde, prismática, de comprimentos até vários decímetros de milímetros é o acessório mais comum, depois da magnetita.

9-Vidro: em algumas rochas ainda se encontram restos de vidro intersticial, escuro, com índice de refração bem mais alto que o bálsamo do Canadá.

É grande a variedade de texturas encontradas nos andesitos da região. Destacam-se as texturas pilotaxítica, traquítica, intersertal e subofítica. Foram observadas raramente rochas com texturas ofíticas e intergranular. A granulação das rochas varia muito, desde grosseira com aspecto de gabro até afaníticas, finíssimas, mesmo ao microscópio. Os plagioclásios medem desde 2 cm de comprimento até alguns centésimos de milímetro.

Alteração dos andesitos

A maioria das rochas intermediárias na região encontra-se bastante alterada, não apenas por intemperismo como também, e principalmente, por efeitos hidrotermais, deutéricos ou mesmo bem posteriores à consolidação das rochas. A alteração hidrotermal mais importante é a propilitização. Consiste na substituição de minerais da rocha original por clorita, carbonatos, epídoto, quartzo secundário, magnetita e ocasionalmente, albita. O mais comun é a propilitização alterar completamente os minerais máficos da rocha, poupando os plagioclásios, que permanecem bastante frescos ou são albitizados.

A alteração propilítica não parece estar relacionada com a ocorrência de vieiros hidrotermais metalíferos e também ocorre em áreas onde aqueles são desconhecidos.

É freqüente a substituição pseudomórfica de minerais máficos por clorita e carbonatos. Permanecendo constante o volume, os minerais lixiviados em parte de uma rocha deverão ser depositados alhures. Daí o aparecimento de clorita e carbonatos, entre outros, em amígdalas e vênulas (Wilshire, 1959, p. 109).

A propilitização poderia ser causada: a- por soluções hidrotermais ligadas às últimas fases do vulcanismo andesítico, que produziu a rocha alterada em questão; b- por soluções relacionadas com uma fase de mineralização; a larga distribuição, horizontal e vertical, da alteração propilítica torna inverossímil esta hipótese; c- por soluções relacionadas à intrusão dos grani }
tos, hipótese que nos parece a mais provável. ?

É assaz conhecido o fato de que rochas andesíticas,

especialmente as de grã fina, são muito susceptíveis à alteração. Por outro lado, efeitos semelhantes aos produzidos por soluções hidrotermais podem resultar de um metamorfismo regional de grau baixo, de processos diagenéticos e de intemperismo (Wilshire, 1959, p. 105).

B - Distribuição dos andesitos no tempo e no espaço

Podemos classificar as rochas andesíticas em quatro grandes grupos segundo sua idade.

- 1-anteriores ou contemporâneas à série Maricá
- 2-pertencentes à Formação Andesítica da Seqüência Vulcânica
- 3-contemporâneas à base da série Camaquã
- 4-distinção de rochas da série São Bento (jurássico ?)

Nem sempre é fácil ou mesmo possível, determinar a qual destes quatro grupos uma determinada rocha pertence, mesmo contando-se com suas relações de campo. Assim, existem na série Maricá rochas semelhantes às da Seqüência Vulcânica; algumas rochas destas são, por sua vez, semelhantes aos andesitos da base da série Camaquã. Por outro lado, diques de composição basáltica da série São Bento são semelhantes a algumas rochas de outras idades e dados precisos são necessários para colocar com segurança um dique nessa série.

1- Andesitos anteriores ou contemporâneos à série Maricá

Encontramos diversos tipos de rochas nesta categoria, a saber: a- lavas; b- sedimentos vulcanógenos encontrados na série e c- andesitos metamorfizados, correlacionáveis à série Maricá.

a- Lavas

Dois grandes corpos de andesito, incluindo tufos, estão dentro da série Maricá na rodovia BR-37, um no ponto 1 e outro, no ponto 2 (fig. 3). É provável que haja outros andesitos desta idade e que não tenham sido identificados devido ao desconhecimento da estrutura da série Maricá. Rochas desta composição em contacto com sedimentos Maricá são considerados como pertencentes à Sequência Vulcânica.

Ocorre um corpo de serpentinito ao sul de Lavras (ponto 18, fig. 3). Apresenta forma de um dique com cerca de 6 km de comprimento por 400 m de largura, encaixado em gnaisses.

b- Sedimentos vulcanógenos

A série Maricá parece ser constituída em grande parte por sedimentos de origem vulcânica. Estes sedimentos compreendem especialmente arenitos tufáceos, grauvas e conglomerados. Quanto aos folhelhos da série, é difícil afirmar-se algo sobre a origem de seus constituintes.

Os conglomerados são sempre muito ricos em matriz, constituindo grauvas ou folhelhos com seixos. Estes são geralmente caracterizados por seu excelente arredondamento e alto grau de esfericidade. Contam-se entre os seixos dos conglomerados, granitos, gnaisses, quartzitos, bem como andesitos e riólitos. Os andesitos parecem-se bastante aos de outras idades e procedências, de mesma forma como os riólitos, descritos no Cap. IV, acima.

As grauvas e arenitos tufáceos constituem provavelmente mais da metade do total de rochas da série Maricá em áreas onde ela não foi metamorfizada. Apresentam-se em leitos decimétricos persistentes, alternando-se muitas vezes com leitos de folhelho chocolate. Outras ocorrências são constituídas por espessas sucessões de rochas de granulação média, sem intercalações

importantes de folhelho.

Megascôpicamente, estas rochas têm côr creme, com ligeiro tom arroxado. São muito bem consolidadas, distinguindo-se bem dos arenitos Camaquã que ocorrem na região, tanto pelo grau de cimentação como pela côr.

~~As estruturas~~ estruturas sedimentares observadas nestas rochas compreendem alternância de leitos de grau vacase folhelho, com aspecto resedimentado, estratificação cruzada, marcas de onda, acamamento regular e persistente e, raramente, "acamamento gradual" ("graded bedding").

Microscôpicamente, foram examinadas cerca de 30 lâminas delgadas de rochas clásticas de granulação média, procedentes das diversas regiões de afloramento da série Maricá na área do mapa. Além disso, foi examinada uma lâmina procedente do afloramento Budó, 50 km ao sul de Lavras do Sul, na estrada para Bagé.

Trata-se de rochas com grau de seleção de médio a baixo, arredondamento dos grãos geralmente baixo. Os componentes mais importantes são: quartzo, plagioclásio, fragmentos de lavas intermediárias, óxidos de ferro e clorita. A porcentagem de matriz é freqüentemente importante, sendo constituída por um ou mais dos seguintes: clorita, calcita, calcedônia e caolim?

Os grãos de lavas, supostamente andesíticas, estão muito alterados, distinguindo-se apenas a textura pilotaxítica ou traquítica, graças à disposição de feldspatos alterados em uma massa fundamental limonitizada.

Ocorrem ainda cacos de vidro com formas côncavas, bem como quartzo em lascas que sugerem curto transporte e origem vul-

cânica. Ocasionalmente, pudemos reconhecer grãos de lavas ácidas e ardósias.

A classificação destas rochas apresenta duas grandes dificuldades: em primeiro lugar, verificam-se transições entre rochas cujos grãos são predominantemente vulcânicos, com muito pouco transporte e rochas onde tais grãos sofreram transporte mais ou menos prolongado e mistura com grãos não vulcanógenos. A distinção que estabelecemos entre arenitos tufáceos e grauvacas é, por conseguinte, completamente artificial. Em segundo lugar, o velho termo grauvacas tem sido usado com acepções as mais diversas. Diferentes autores procuram fixar determinadas porcentagens de matriz e constituintes para distinguir tipos diversos de rochas clásticas de grã média. Da maioria de tais sistemas de classificação resulta que, numa mesma sucessão, devido a alguma pequena diferença na porcentagem de matriz ou feldspato, por exemplo, a rocha passa de um grupo a outro. Tais grupos são freqüentemente considerados como representando ambientes muito diversos, como é o caso de arcósios e grauvacas.

O inconveniente acima mencionado é evitado por classificações naturais que distinguem as rochas segundo seu ambiente de origem, só então passando a classificá-las. Packham (1954) sugere o uso de estruturas sedimentares para determinar se um determinado arenito foi depositado em água rasa por correntes de tração ou em águas profundas por correntes de turvação ("turbidity currents"). No primeiro caso, teríamos arenitos (sensu strictu) e no segundo, grauvacas. Estes dois grupos podem ser então, mais subdivididos.

Com efeito, julgamos que as rochas em questão têm mais

caracteres que as aproximam dos depósitos de correntes de turvação do que dos depósitos de correntes de tração; consequentemente, colocamo-las entre as grauvas (Packham, 1954, p. 467). Precisamos reconhecer que, embora seja a mais provável, esta classificação não é realmente satisfatória, dado o número insuficiente de estruturas concordantes entre as rochas examinadas e os depósitos de correntes de turvação, especialmente a raridade da estratificação gradual.

As rochas clásticas de grã média da série Maricá seriam então grauvas, provavelmente depositadas em águas profundas por correntes de turvação. Poderiam ser chamadas grauvas lábeis, seg. Packham, dada a grande porcentagem de grãos instáveis, especialmente de feldspato e fragmentos de rocha. Segundo Crook (1960) poderiam ser subdivididas ainda, em grauvas litofeldspáticas e feldspatolíticas, conforme predomine este ou aquele constituinte na rocha. Ambos os tipos foram constatados na série Maricá.

8- Andesitos metamorfizados

Ocorrem na região estudada diversos corpos de rocha com um grau de metamorfismo baixo a médio, com fácies de xisto verde a anfibólito, segundo Eskola. Parece-nos possível distinguir esses metamorfitos que seriam correlacionáveis com a série Maricá (Melcher, Mau, 1950) de uma outra sucessão metamórfica mais antiga, pertencente ao embasamento cristalino antigo.

Efetivamente, podem-se distinguir duas sucessões distintas de rochas metamórficas na região. Ao redor e a noroeste do "stock" de Caçapava ocorrem predominantemente clorita-xistos, filitos, anfibólitos e hornfels básicos. Já na rodovia BR-37, para

oeste das ocorrências de andesito e grauvacas, há um gnaiss escuro, e adiante, em direção a São Gabriel, xistos antigos. Também entre Caçapava e Encruzilhada, logo a leste dos últimos testemunhos da série Camaquã, afloram os xistos antigos. O mesmo se verifica a sudoeste de Lavras do Sul. Estas rochas compreendem secções aparentemente muito espessas, constituídas predominantemente por quartzitos, muscovita-xistos e mármore.

Passamos a descrever algumas rochas metamórficas, pertencentes à primeira sucessão, possivelmente correlacionáveis com a série Maricá. Vamos deter-nos apenas com rochas que apresentam texturas reliquias demonstrando terem sido rochas de composição intermediária a básica, antes do metamorfismo.

Na estrada Caçapava-mina Camaquã (ponto 3, fig. 3) ocorre um grande corpo especialmente constituído por hornfels básico. Apresenta em um caso, textura blastoamigdalóide e uma massa granular constituída por piroxênio, carbonato e restos muito alterados de feldspato. As amígdalas contêm calcedônia, quartzo e carbonato. Noutro caso, notamos textura blastofítica, com albita, actinolita, quartzo, clorita e epídoto. Uma terceira rocha mostrou textura blastopilotaxítica, com plagioclásio sódico, hornblenda e clorita. Essas rochas são de granulação fina a média. Megascopicamente, apresentam grande resistência ao choque do martelo e cor verde sujo.

Na rodovia BR-37, (ponto 4, fig. 3) ocorre um andesito, com aspecto cataclástico que parece estar gradualmente passando para um clorita-xisto. Apresenta textura blastoporfirítica com fenocristais reliquias de andesina em uma massa granular de carbo-

nato, epídoto, clorita, sericita, quartzo e magnetita. Outra rocha da mesma área, certamente um tufo, apresenta delicado bandejamento, granulação variável e dobras com aspecto plástico. Foi apenas ligeiramente recristalizada e apresenta cor verde. Localmente, encontra-se uma rocha básica metamórfica, granoblástica grosseira, aspecto de hornfels. É constituída de andesina e hornblenda grosseiras com quartzo, piroxênio, epídoto, magnetita e apatita.

Nas jazidas de cobre de Andradas e Primavera a sudoeste de Caçapava, D. Guimarães (in Carvalho, 1929, p. 51) descreveu andesitos cisalhados.

A noroeste de Caçapava, (ponto 5, fig. 3) um anfíbólito apresenta textura blastoporfirítica com grandes cristais reliquiais de oligoclásio-andesina e fêmico transformado em hornblenda e epídoto; a massa é constituída de pirita, quartzo, anfíbólio, feldspato e apatita.

Ocorrem ainda na região numerosos clorita-xistos e anfíbólitos, sem texturas reliquiais, parte dos quais, pelo menos, poderiam ser derivados de andesitos ou grauvas.

d- Correlação das rochas metamórficas com a série Maricá

Os argumentos que nos levam a correlacionar estas rochas metamórficas com a série Maricá são de três ordens:

- sucessão estratigráfica
- passagens graduais
- natureza das rochas

-Sucessão estratigráfica - Tanto as rochas clásticas

da série Maricá como as metamórficas em questão descansam sobre rochas cristalinas do embasamento e são recobertas com discordância angular por lavas e tufos da Sequência Vulcânica. Onde esta falta, tanto as clásticas como as metamórficas podem ser cobertas pelas rochas da série Camaquã.

Efetivamente, ao norte de Lavras (ponto 6, fig. 3) grauvacas da série Maricá assentam com contacto frio sobre granitos do embasamento. De mesma forma, na rodovia BR-37 (ponto 7) xistos verdes estão sobre gnaisses escuros do embasamento.

Rochas clásticas da série Maricá são cobertas pela Sequência Vulcânica ao norte de Lavras, na Ramada, no vale do arroio Pecegueiros de mesma forma como o são os filitos na rodovia Caçapava-Lavras (ponto 8) e na estrada Caçapava-São Sepé (ponto 9, fig. 3).

Tanto as rochas clásticas como as metamórficas são cortadas pelos granitos de Lavras e de Caçapava.

-Passagens graduais - Conhecem-se na região transições de sedimentos para rochas xistosas, filitos e xistos verdes.

1) No ponto 10 (fig. 3) na nova rodovia Caçapava-Pelotas aflora um espesso pacote de siltitos chocolate com intercalações de grauvaca. Caminhando-se para ^{noroeste} nordeste, observa-se a passagem dos siltitos para um leito de conglomerado, um siltito calcário com intercalações de clorita-xisto e, finalmente, o corpo principal dêste. A xistosidade concorda com a estratificação dos sedimentos pouco para sudeste e não notamos evidência de perturbação tectônica.

2) No ponto 11, uma sucessão de conglomerado, grauvaca e filito apresenta-se contínua com a grande faixa de filitos logo para nordeste. O conglomerado e a grauvaca só se apresentam cislhados; os membros mais finos da sucessão sofreram um metamorfismo brando e foram transformados em filito.

3) Ao longo da rodovia BR-37 (ponto 4, fig. 3) uma larga faixa de andesitos passa gradualmente a clorita-xistos. Diques de granito cortam o conjunto. Toda a faixa acha-se consideravelmente enriquecida em feldspato, chegando a formar-se localmente um hornfels grossoiro, constituído principalmente de plagioclásio e anfibólio.

- Natureza das rochas - Os metamorfitos ora correlacionados com a série Maricá são constituídos de rochas clásticas e vulcânicas básico-intermediárias, que sofreram um metamorfismo de intensidade baixa a média.

As clásticas constituem filitos, e mais raramente, muscovita e biotita-xistos. Os vulcanitos estão representados por clorita-xistos, anfibólitos e hornfels básicos.

Examinamos cerca de 40 lâminas delgadas e constatamos a existência de texturas reliquiarias, e composição indicando derivação de rochas ígneas básicas ou intermediárias; outras rochas, mostraram textura blastopsamítica e blastops^eafítica, podendo ser descritas como clorita-xistos; finalmente, numerosos clorita-xistos e anfibólitos não mostraram texturas reliquiarias, podendo ter sido derivados tanto de rochas ígneas básico-intermediárias ou grauvacas como de calcários impuros. Os filitos ~~originaram-se~~ ^{originalmente} de

grandes quantidades de sedimentos argilosos e apresentam frequentemente discrepância entre seus planos de estratificação e de xistosidade. Nota-se, pois, que é semelhante a associação de rochas, ora metamorfizadas, com as variedades encontradas na série Maricá.

Discussão - Vimos que se pode estabelecer uma analogia estratigráfica e litológica entre a série metamórfica em questão e a série Maricá. Além disso, constataram-se passagens graduais de Maricá sedimentar ou vulcânico para metamórfico. Por outro lado, há que considerar que se observaram diversos contactos por falhamento ou por intercalação de corpos ígneos. Mencionaremos uma estrutura que poderia sugerir uma discordância, bem como o problema dos mármore.

Com efeito, em vários pontos notamos contactos tectônicos ou ígneos entre rochas metamórficas e clásticas da série Maricá. No ponto 12 (fig. 3) bem como no ponto 13, xistos e folhelhos apresentam-se concordantes, sem transição visível e a pouca distância um do outro. Andesitos ou riólitos com espessuras de algumas dezenas de metros são encontrados em vários pontos. Em 14 um riólito felsítico separa uma grauvasa com seixos esparsos e variados de um filito com seixos ligeiramente estirados. No ponto 15, estrada de Caçapava a Cachoeira, um derrame de andesito está entre xistos verdes e grauvasas.

Ainda na rodovia BR-37 (ponto 16) encontramos um contacto de um folhelho claro com um anfibólito, sendo a estratificação do primeiro coincidente com a xistosidade do segundo. Na ausência de evidências de falha, deve tratar-se de um contacto deposicional. O anfibólito, por conseguinte, já estaria metamor-

fizado quando da deposição do folhelho.

Resta mencionar o problema dos mármore. Entre os xistos que ocorrem ao redor do "stock" de Caçapava, ocorrem diversas lentes de mármore impuro, rico em silicatos de cálcio e magnésio (Leinz e Barbosa, 1941, p. 13-14). Na série Maricá, por outro lado, não se tem notícia ainda de sedimentos calcários.

Como se vê, o problema da correlação entre as rochas metamórficas ao redor e a noroeste de Caçapava com a série Maricá não está ainda resolvido, devendo esperar levantamentos mais pormenorizados.

Ainda recentemente J.F. Robertson teria achado provas de que estas rochas metamórficas são mais antigas que a série Maricá, portanto, não correlacionáveis com ela (informação verbal). Neste caso, os metamorfitos em questão, derivados em grande parte de rochas intermediárias ou básicas, deverão ser considerados parte da série Porongos.

b- Andesitos pertencentes à Formação Andesítica da Sequência Vulcânica

Consistem de lavas, brechas piroclásticas, tufos e conglomerados vulcânicos e podem atingir várias centenas de metros de espessura.

Na região em estudo, distinguem-se dois corpos principais de rochas andesíticas. O primeiro constitui uma grande massa, incluindo lavas compactas, amigdalóides e aglomeráticas bem como rochas piroclásticas. Aflora ao norte e a leste de Lavras do Sul. O segundo corpo de andesitos acha-se bem desenvolvido na falda ocidental.

dental da serra de Santa Barbrinha e ao sul do planalto da Ramada. Avultam aí os conglomerados, sendo as lavas e piroclásticas subordinadas.

Não se conseguiu determinar uma diferença sensível de textura ou de composição, seja entre as rochas das duas principais áreas de ocorrência, seja entre as lavas por um lado e os numerosos diques por outro. Tais diques devem ser, pelo menos em parte, alimentadores dos derrames encontrados na região.

Tufos e brechas piroclásticas andesíticos

São freqüentes na região e consistem essencialmente de fragmentos de rochas porfiríticas, que estão mais ou menos alteradas e cuja massa fundamental está limonitizada. Os fragmentos pertencem a diversos tipos texturais de andesitos, sendo ainda abundantes os grãos de plagioclásio, clorita e óxidos de ferro. O arredondamento e a esfericidade dos grãos, bem como o grau de seleção variam muito. Em praticamente todos os casos observa-se uma mistura do material nitidamente piroclástico com material clástico comum. Em muitos tufos é certo que tenha havido retrabalhamento, alterando ainda mais a composição, seleção e outras propriedades da rocha.

No campo, os depósitos piroclásticos acham-se interdigitados com lavas de composição semelhante, constituindo pilhas vulcânicas de difícil individualização.

a. Conglomerados vulcânicos andesíticos

Constituem um espesso pacote podendo chegar, local-

mente a mais de 100 m. Apresentam má seleção, estratificação indistinta, teor de seixos 2-3 vezes inferior ao de matriz. Os seixos são constituídos predominantemente de andesitos, de diversos tipos texturais, ocorrendo ainda seixos de granito, gnaiss, quartzo, riólito, etc. O arredondamento dos seixos é baixo a regular. As cores são castanho-avermelhadas e esverdeadas.

Vários caracteres destas rochas parecem apontar para uma origem de "lahar", termo indonésio que designa brechas vulcânicas transportadas por torrentes de lama (van Bemmelen, 1949, p. 191). Esse autor enumera diversas causas para torrentes de lama: chuvas pesadas caindo sobre material solto em uma região vulcânica, acompanhadas ou não por terremotos, que também podem causar a movimentação de grandes massas em equilíbrio instável; erupções vulcânicas através de lagos de cratera; erupções provocando o degelo de neve e gelo.

Existem vários critérios para reconhecer-se um determinado conglomerado vulcânico tem origem de lahar. É preciso tomar em conjunto diversos destes para poder identificar o processo. Seriam característicos: a falta de seleção; a falta de acamamento, devido à falta de capacidade de seleção do lahar; a relação transicional do contacto inferior do conglomerado com as rochas subjacentes (material solto pode ser incorporado pelo lahar); a natureza heterolítica das brechas: sua composição varia com a do vulcão, do substrato e do terreno em volta; o arredondamento diferente de um depósito para outro, já que lahars com diferentes teores de água, mesmo que tenham percorrido distâncias iguais, podem apresentar depósitos com arredondamento diferente; os grãos de

minerais, especialmente plagioclásio e piroxênio, em diferentes graus de alteração, fato que não seria de esperar-se se o material proviesse do mesmo magma (Fisher, 1960, p. 130-131).

Os conglomerados vulcânicos são portanto oriundos do rápido desgaste de uma região vulcânica provavelmente ativa na ocasião, já que se encontram lavas andesíticas entre ^{os conglomerados} ~~as brechas~~.

3) Andesitos contemporâneos à base da série Camaquã

São conhecidos vários corpos de andesito vesicular dentro da série Camaquã. Aham-se próximos à sua base e apresentam no máximo algumas dezenas de metros de espessura.

Essas lavas têm cor castanho-avermelhada e, nas rochas que examinamos, há menos carbonato que nos andesitos mais antigos. Parece que estas rochas foram menos afetadas pela propilitização.

Entre outros pontos, ocorrem na Coxilha da Árvore, a leste da mina Seival; no vale do arroio Seival (ponto 17, fig.3); a leste de Caçapava do Sul; pouco a sudeste do ponto 3, na estrada para a mina Camaquã; na estrada da mina Camaquã para o passo do Cação, a uns 2 km a sudeste da mina; nos arredores de Cêro dos Martins.

Foi nesta última localidade que Leinz (1939, p. 205) pela primeira vez constatou o andesito perfurando, metamorfizando e recobrando rochas da série Camaquã. Esta observação, que pudemos corroborar, levou Leinz a considerar os andesitos posteriores à série Camaquã, ao contrário de Carvalho (1932), que os considerou anteriores.

A composição e textura das amostras que examinamos não nos autorizam a usar apenas êstes dois critérios na identificação estratigráfica de um andesito desta região.

4) Distinção de rochas da série São Bento (jurássico?)

Leinz e Barbosa (1941, p. 27) citam a ocorrência de diques de diabásio cuja composição química e mineralógica assemelha-se muito aos diques de diabásio conhecidos em outras partes do sul do Brasil e países limítrofes. Pertenceriam à série São Bento.

Uma maneira segura de datar tais diques seria determinar pontos em que êles cortam rochas de idade conhecida. É um caso excepcional, que realmente ocorreu, o do dique que atravessa o tilito, próximo à estância do snr. Zico Felix, na estrada que vai à jazida de cobre de Bom Jardim (ocorrência descoberta por Leinz, Barbosa, 1941).

Em outros casos, tem sido verificado que as rochas de diques jurássicos são muito pouco alteradas, apresentando todos os seus minerais frêscos. Embora tal possa acontecer, mui raramente, em rochas mais antigas, que também podem chegar a ter uma composição algo semelhante à dos diabásios, trata-se de um critério bastante seguro.

VII - GRANITOS

Ocorrem na região vários corpos de granito mais recentes que o embasamento cristalino antigo.

A - O granito Caçapava

Forma um "stock" alongado na direção norte-sul, com cerca de 25 km de comprimento e 10 km de largura, em média.

Megascopicamente, o granito tem cor róseo clara, acha se foliado em toda a massa. Em certos pontos, notam-se massas graníticas de cor cinza.

Microscopicamente, o granito róseo apresenta textura hipidiomorfa granular, com aspecto mais ou menos cataclástico. Consiste de 49% de quartzo, 44% de ortoclásio, 3% de oligoclásio e 4% de minerais coloridos. O granito cinza apresenta 39% de quartzo, 40% de ortoclásio, 7% de oligoclásio e 14% de minerais coloridos.

Os plagioclásios, especialmente do granito escuro, po dem ser zonados. O quartzo apresenta-se sempre com extinção ondu lante. São freqüentes os intercrescimentos mirmequíticos. Microclínio e pertita ocorrem por vezes, e foram incluídos na porcentagem do ortoclásio. Entre os minerais escuros, notam-se, no granito róseo, biotita e magnetita e no granito cinza, biotita, clorita, allanita, titanita, apatita e magnetita. Ocasionalmente aparece muscovita.

O granito apresenta uma orientação planar ~~conspícua~~, orien tada entre norte-sul e N 30° E, concordante, em grandes traços, com

a xistosidade das rochas encaixantes. Uma "ilha" de granito está situada a sudeste do stock, separada dele por uma estreita faixa xistosa.

Nas proximidades do granito, observa-se nos xistos uma auréola cornubianítica (Leinz e Barbosa, 1941, p. 14).

O contacto não é nítido e entre o stock e os xistos encaixantes fica uma zona de transição com largura variável de algumas centenas de metros até um km. Observa-se que caminhando do granito para os xistos, aparecem lentes cada vez mais possantes deste, separadas por corpos cada vez mais delgados de granito. Gradualmente, penetra-se na massa do xisto encaixante e os "diques" de granito vão rareando; termina assim a zona de contactos. A direção das inclusões de xisto e dos corpos tabulares de granito varia entre N 20° - 30° E, sendo os mergulhos variáveis de 0° a 90°. A direção é aproximadamente a regional dos xistos.

Não se notou diminuição da grã do granito nas proximidades do contacto.

O padrão de afloramento dos xistos e da série Maricá sugere que o granito se tenha introduzido em um grande anticlinório durante a fase diastrófica. Nota-se que o stock é parcialmente concordante, seja porque se tenha orientado segundo a direção de compressão predominante, seja por ter sido injetado em zonas de fraqueza dos xistos.

Também neste caso, o problema da origem e mise-en-place do granito admite mais de uma solução.

Diversos fatores falam a favor de uma origem magnética. A estrutura, interpretada como fluidal, primária, consituindo

um domo; os contactos gradacionais e a abundância de diques invadindo a encaixante, interpretados como influência decrescente do granito no sentido radial; a textura cataclástica, atribuída ao movimento viscoso do granito quase consolidado; a circunstância de que os eixos das dobras no xisto são mais íngremes junto ao contacto do granito do que mais longe dêle. Isso indicaria que o granito amarrotou sua encaixante, criando assim, lugar para si (Buddington, 1959, p. 697).

Por outro lado, sugerem uma origem por transformação a concordância geral da direção de foliação do granito com a da encaixante, bem como os contactos graduais; a ausência de diminuição da grã do granito junto ao contacto com uma encaixante presumivelmente mais fria; a feldspatização dos xistos; a intercalação concordante de uma faixa de granito escuro no granito róseo foliado, na saída oeste de Caçapava para a estrada dos Lanceiros; isso indicaria possivelmente transformação de leitos de xistos com composições diferentes. Encontramos ainda, allanita zonada, idiomorfa, tanto nos xistos da região como no granito escuro, com o mesmo aspecto.

Infelizmente, nenhum dos indícios acima descritos, ou o seu conjunto, esclarecem a questão da origem do granito.

Diques a nordeste de Caçapava - Dois diques ao norte da ponte da rodovia sobre o arroio Sta. Barbara cortam rochas da série Maricá e aparentemente também da Sequência Vulcânica. Apresentam textura hipidiomorfa granular, cataclástica, lembrando o aspecto do granito Caçapava. São constituídos de quartzo (com extinção ondu

lante) microclínio, oligoclásio, ortoclásio, muscovita e biotita.

Outro dique corta andesitos cisalhados na BR-37, ponto 4 (fig. 3).

B - O granito Lavras

Constitui um "stock" aproximadamente equidimensional, com um diâmetro médio de 10 km.

É formado de granito tendendo a alaskito (Leinz e Barbosa, 1941, p. 14); porfiróide, com uma diferenciação granodiorítica formando um arco ao norte do maciço (R.F. Johnson, in formação verbal).

A textura porfiróide deve-se a "fenocristais" de ortoclásio de até 3 cm de comprimento, freqüentemente envolvidos por uma capa de albita-oligoclásio, dando ao conjunto um contorno elipsoidal. A massa granular é constituída por quartzo, ortoclásio, plagioclásio sódico, biotita passando a clorita e hornblenda.

Todo o aspecto dêste granito sugere ausência ou pouca intensidade de modificações. As zonas de cisalhamento são raras e as próprias diáclases são espaçadas.

Da mesma maneira como em Caçapava, o granito penetrou em uma estrutura dômica, compreendendo de dentro para fóra, a série Maricá, os andesitos da Sequência Vulcânica e a série Camaquã. Para sul e sudoeste do stock, ocorrem xistos, gnaisses e granitos do embasamento cristalino antigo.

Condizente com o aspecto pouco movimentado do granito, as encaixantes não mostram muito tectonismo. No contacto do granito com grauvas e arenitos tufáceos da série Maricá, na es-

trada que sai de Lavras com rumo sudeste, observa-se uma faixa de alguns decímetros intensamente sericitizada, dando à rocha um aspecto cozido. Os sedimentos não apresentam movimentação maior.

No contacto com a grande massa de andesitos para norte e nordeste do "stock," há uma auréola de algumas centenas de metros de espessura de hornfels. Nesta área, na estrada de Lavras para a estância do snr, João Souza, perto da jazida de ouro e cobre de Volta Grande, observaram-se dois diques de adamellito-porfiro cortando o andesito. Neste ponto, a encaixante apresenta cristais de quartzo e ortoclásio, certamente devidos à ação do granito. O hornfels, perto do contacto com o granito, apresenta-se bem compacto, com textura blastoporfirítica. Menocristais reliquias de labradorita sericitizada e diopsídio substituído por hornblenda na margem, são delineados por pequenos grânulos neo-formados de biotita, hornblenda, magnetita, apatita, quartzo xenomorfo, provavelmente introduzido.

Noutros pontos, nota-se a ^{reabsorção} dissolução dos minerais fêmicos originais, bem como dos plagioclásios, restando apenas vestígios dos contornos desses minerais. A massa é granular, compreendendo hornblenda, biotita, magnetita, epídoto, quartzo e apatita. Localmente, observam-se grandes cristais de albita e pertita substituindo plagioclásio cálcico.

O contacto granito com andesito está magnificamente exposto num barranco de sanga a cerca de 500 m a sudoeste do veio novo, na ocorrência de ouro e cobre de Volta Grande. A encaixante acha-se atravessada por veios graníticos desde 30 cm até alguns milímetros de espessura.

C - Idade dos granitos

A idade absoluta dos granito Caçapava foi determinada como 506 milhões de anos, com o emprêgo do método do potássio-argônio, na biotita do granito. O trabalho foi executado nos laboratórios do Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, Mass., Estados Unidos (R.F. Johnson, informação escrita).

Os laboratórios de determinação de idades admitem erros de até 5% na determinação e advertem os geólogos sobre a necessidade de confrontar os resultados com uma determinação feita por um outro método. Isso ainda não pôde ser feito, de modo que o resultado acima deve ser encarado como uma primeira aproximação.

A tendência atual parece ser a de aumentar a duração das eras geológicas a partir do paleozóico. Segundo dados recentes de Kulp, o começo do cambriano e, conseqüentemente, do paleozóico, situar-se-ia a cerca de 600 milhões de anos atrás (Norman Herz, informação verbal). Isso colocaria o granito Caçapava no cambriano superior, aproximadamente.

O granito de Lavras é certamente posterior, tanto à série Maricá como aos andesitos da Sequência Vulcânica. O granito Caçapava é intrusivo nos xistos que o rodeiam. Se considerarmos os xistos ao redor e a noroeste do "stock," como correlacionáveis à série Maricá, o granito deverá ser então, no mínimo, mais recente que essa série. Poderia ou não ser mais recente também, do que a Sequência Vulcânica.

O fato de o granito Caçapava achar-se cataclasado e o granito Lavras apresentar-se inalterado não prova necessária-

mente uma idade menor para este último, embora sugira tal. Está em curso uma determinação da idade absoluta do granito Lavras, que deve esclarecer melhor o problema. Seria aconselhável proceder-se a outra determinação de idade, a saber de um dos granitos do chamado embasamento cristalino. Isso permitiria definir ainda melhor o assunto.

Como não há contactos entre granitos e a Sequência Vulcânica na serra de Santa Barbrinha (salvo os dois diques de granito acima mencionados, de posição estratigráfica incerta) há uma possibilidade de que a Sequência Vulcânica tenha outra idade nessa região do que a dos arredores de Lavras do Sul. Assim, a Formação Riolítica poderia até ser mais jovem que o granito Caçapava. Faltam evidências para melhor enquadramento das formações na coluna estratigráfica.

VIII - CORRELAÇÕES ESTRATIGRÁFICAS COM ESTADOS E PAÍSES VIZINHOS

A correlação das camadas sedimentares e vulcânicas do chamado escudo sul-riograndense com ocorrências homólogas nos estados e países vizinhos não é fácil. Foi tentada já por Leinz e Barbosa (1941, p.8) e evoluiu pouco nestes últimos vinte anos.

No Uruguai, rochas efusivas ácidas e básicas ocorrem na série Lavalleya (anteriormente conhecida como série Minas do Uruguai), considerada algonquiana, e na série Lascano (anteriormente Aiguá), considerada pós-proterozóica, talvez pré-devoniana e, segundo alguns, até mesmo cretácea. É na série Lascano que aparecem arenitos compostos por grãos de rochas efusivas lembrando as grauvas da série Maricá. Tais arenitos foram intensamente dobrados antes de serem recobertos por outros derrames, indicando uma longa atividade vulcânica (Caorsi, Goñi, 1958, p. 20-21).

No Paraná e em Santa Catarina ocorrem riólitos pré-devonianos (certamente no primeiro caso, provavelmente no segundo), associados a rochas arcossianas, sem fragmentos de rochas vulcânicas (Leinz, 1936; Almeida, 1949; Coutinho, 1955). Já Leinz e Barbosa (1941) e Freitas (1945) procuraram correlacionar a série Itajaí de Santa Catarina com a série Camaquã do Rio Grande do Sul, para o que, entretanto, faltam dados mais concretos. Quanto aos tipos de rochas encontrados aí, não se conhecem andesitos, nem entre os riólitos, ignimbritos, tão característicos das rochas vulcânicas do Rio Grande do Sul. Aliás, O. Barbosa (1957, p. 27) declara ter reconhecido ignimbritos entre os riólitos de Campo Ale-

gre, no norte de Santa Catarina. Nossos exames de campo, laboratório e literatura não puderam confirmar isso.

Rochas riolíticas e localmente, básico-intermediárias, são conhecidas na República do Paraguai (Eckel, 1959), mas, por motivos óbvios e correlação é ainda mais duvidosa do que a de outras regiões mencionadas.

As maiores dificuldades na correlação são: o pouco conhecimento que se tem de pormenores das rochas e da estratigrafia, tanto no Rio Grande do Sul como nas regiões circunjacentes; a falta de continuidade das formações em questão, separadas por centenas de quilômetros de depósitos mais modernos; e, finalmente, a probabilidade de que mudanças normais de fácies sedimentar e tipos de rochas vulcânicas dificultam o reconhecimento de formações litologicamente dissemelhantes, mas síncronas.

Limitamos-nos, por conseguinte, à correlação da série Lascano do Uruguai com a série Maricá e Sequência Vulcânica do Rio Grande do Sul; e esta última e mais a série Camaquã com a série Itajaí e com os riólitos de Santa Catarina, bem como com os arcósios e riólitos da região de Pirai-Castro no Paraná. Dado o escasso número de dados, tais correlações devem ser consideradas tentativas.

VIII - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A região centro-sul do Rio Grande do Sul foi outrora ocupada por uma bacia de forma indefinida onde foram depositadas consideráveis quantidades de grauvas e rochas vulcânicas.

O vulcanismo que afetou a região, compreendendo associação de lavas e tufos andesíticos, olivina-basaltos e riólitos é altamente característico, em faixas geossinclinais, como acompanhante de orogênese, especialmente em suas fases posteriores (Turner e Verhoogen, 1960, p. 272).

Os sedimentos vulcanógenos, lavas olivínicas e serpentinito (êste ao sul de Lavras, ponto 18, fig. 3) da série Maricá sugerem fortemente a existência de uma fase vulcânica "inicial", pré-orogênética (de Sitter, 1956).

Ainda na série Maricá, deu-se a sedimentação de grandes espessuras de grauvas com características de redeposição. Essas rochas, mal selecionadas e ricas em minerais instáveis, foram cobertas antes que os agentes do meio pudessem operar sobre elas. Dado o rápido influxo de material detrítico, rochas não-clásticas são raras em relação às clásticas (Krumbein e Sloss, 1955, p. 352). Está indicada uma bacia em rápida subsidência, recebendo material abundante de uma área que está sendo enérgicamente levantada.

Após o paroxisma do dobramento da série Maricá, durante o qual pode ter havido colocação de granitos em profundidade, houve o vulcanismo pós-orogênético da Sequência Vulcânica, com andesitos e riólitos.

As grandes quantidades de material riolítico encontradas nesta e noutras regiões tornam difícil aceitar sua origem por diferenciação magmática normal, segundo Bowen (Bederke, 1959, p. 14). Ter-se-ia formado um magma riolítico secundário a partir da refusão de rochas da crosta.

O granito de Caçapava poderia ser mais antigo que a Seqüência Vulcânica, enquadrando-se entre os granitos sintectônicos, o que, aliás, seria apoiado por certos pormenores de sua estrutura. O granito de Lavras seria pós-tectônico, posterior ao vulcanismo "subseqüente" da Seqüência Vulcânica, e talvez mais recente mesmo do que a série Camaquã.

Em resumo, as características dos sedimentos e das rochas vulcânicas encontradas sugerem deposição numa bacia do tipo geosinclinal, possivelmente intracratônica, que sofreu considerável subsidência, tendo sido preenchida e, posteriormente, dobrada. Em determinadas zonas, especialmente na região de Caçapava, o diastrorfismo provocou metamorfismo regional de intensidade moderada e formação de granitos em profundidade. Com o término da fase de dobramento mais intenso, verificou-se importante vulcanismo, seguido da intrusão do granito Lavras, posterior talvez à grande massa de sedimentos clásticos continentais, predominantemente grosseiros, da série Camaquã.

X - SUMÁRIO

Sobre um embasamento cristalino antigo repousam várias centenas de metros de grauvas, arenitos tufáceos e folhelhos da série Maricá, que também inclui andesitos. São correlacionáveis com esta série rochas metamórficas encontradas ao redor e a noroeste do stock granítico de Caçapava.

Um espesso pacote de rochas vulcânicas, designado Sequência Vulcânica foi depositado sobre a série Maricá. Compreende uma Formação Andesítica na base, constituída de lavas, tufo e conglomerados vulcânicos e uma Formação Riolítica no topo, com lavas, ignimbritos e tufo.

A Sequência Vulcânica é recoberta por sedimentos clásticos, especialmente arenitos e conglomerados, da série Camaquã. Em alguns pontos, separada das rochas mais antigas por discordância angular, aflora a série Tubarão.

Ignimbritos riolíticos são frequentes na região. Apresentam peso específico geralmente baixo, diaclasamento colunar proeminente, riqueza em fragmentos estranhos e lentes achatadas pumíceas. Ao microscópio, nota-se a natureza clástica de toda a massa da rocha, estando os cacos de vidro, hoje devitrificado, mais ou menos soldados uns aos outros e aos cristais e fragmentos inclusos.

Os ignimbritos ocupam hoje uma área de cerca de 280 km², sendo provável que sua extensão original tivesse ultrapassado os 2000 km². Calculamos um volume original superior a 80 km³, dos quais restam hoje mais de 11, talvez até 35 km³. Nas secções observadas, a espessura dos ignimbritos varia de 15 m a 70 m. Em vá-

rios casos, pôde-se observar a diminuição, de baixo para cima na secção, do grau de soldamento e recristalização, e da densidade das rochas, que podem passar a tufos.

Lavas e tufos ácidos - encontram-se já anteriormente ou contemporaneamente à série Maricá, conforme atestam seixos encontrados nos conglomerados dessa série. Outrossim, o vulcanismo ácido foi muito intenso na parte terminal da deposição da Seqüência Vulcânica, com a deposição da Formação Riolítica.

Transições de ignimbritos para riólitos - foram observadas em pelo menos três pontos. Em uma localidade, as bandas "fluidais" de um riólito fitado passam, subindo-se na secção, para lenticulas coalescidas com aspecto de dobras, provavelmente resultantes da recristalização de ignimbritos. Outros riólitos fitados apresentam bandas que localmente são constituídas pela fusão de numerosos cacos de vidro filiformes. Finalmente, observaram-se riólitos de baixa densidade, com seixos estranhos e lentes de folhelhos, próximo a ignimbritos com lentes das mesmas rochas.

Em pelo menos alguns casos, podemos dizer que a textura chamada fluidal de muitas lavas ácidas já é uma feição de recristalização, não tendo sido impressa, portanto, pelo fluxo viscoso e mais ou menos turbilhonar, de uma lava. O aspecto "fluidal" resultaria da coalescência de lenticulas e cacos de vidro de uma rocha originalmente clástica.

Andesitos de composição freqüentemente transicional para basaltos, encontram-se, tanto em derrames dentro da série Maricá, como em seixos e grãos dentro dos conglomerados e grauvas dessa série. Constituem ainda a Formação Andesítica da Seqüência Vulcânica e

aparecem intercalados na base da série Camaquã.

Além de lavas, são frequentes as brechas e tufos, bem como conglomerados vulcânicos, ricos em seixos de andesito, apresentando características de origem em "lahars" (torrentes de lama).

A maioria das rochas andesíticas da região apresenta-se intensamente propilitizada, talvez por efeito de soluções provenientes das intrusões graníticas da região.

Muitas das rochas metamórficas correlacionadas com a série Maricá parecem corresponder a andesitos ou basaltos antigos. Encontram-se, efetivamente, estruturas reliquias de lavas em hornfels básicos, clorita-xistos e mesmo anfibólitos. Embora o problema da correlação não esteja ainda resolvido, pudemos observar transições entre rochas vulcânicas e sedimentares da série Maricá e os metamorfitos em questão. Outrossim, são semelhantes às da série Maricá, a seqüência estratigráfica e litologia original das rochas metamórficas.

Granitos - Formam dois stocks na área examinada. O granito de Caçapava é cataclástico e apresenta uma foliação orientada de acordo com a xistosidade das rochas encaixantes, constituindo um dômô. Seus contactos não são nítidos, e há uma zona em que se alternam corpos de xistos com "diques" graníticos; localmente, observaram-se hornfels. Segundo as observações de campo, a origem deste granito tanto poderia ser por intrusão como por transformação.

O granito de Lavras, apresenta contactos nítidos, sem evidências de movimentação. Contra as grauvacas, há uma zona centimétrica sericitizada, enquanto que no contacto com os andesitos,

formou-se um hornfels. Este granito é posterior à Sequência Vulcânica e talvez; posterior também, à série Camaquã.

Considerações gerais - A correlação das rochas estudadas com outras de regiões adjacentes é difícil. A série Maricá e a Sequência Vulcânica poderiam ser correlacionadas com a série Lascano (ex-Aiguá) do Uruguai. A Sequência Vulcânica e a série Camaquã poderiam corresponder, por outro lado, à série Itajaí e aos riólitos pré-devonianos do Paraná e Santa Catarina.

De uma maneira geral, pode-se notar que os sedimentos da série Maricá (grauvacas e folhelhos) foram depositados, provavelmente em água profunda, por correntes de turvação. A bacia de sedimentação, de tipo geossinclinal (intracratônico ?) teria sido preenchida por grande espessura de sedimentos clásticos. Deu-se uma fase vulcânica inicial (ofiólitos), compreendendo andesitos, olivina-basaltos e serpentina. Uma fase diastrófica dobrou os sedimentos e vulcânicas, provocando a colocação, em profundidade, do granito Caçapava (sintectônico ?) e zonas de metamorfismo baixo a médio ao redor. Após o dobramento, deu-se o importante vulcanismo subsequente, com produtos intermediários e ácidos, bem como a intrusão do granito Lavras (pós-tectônico).

XI - BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, F.F.M.de, (1949)-Novo campo de riólitos e tufos no sul do Brasil: Min. e Met., v. 14, p. 101-103.
- BARBOSA, OCTÁVIO, (1957)- Observações e comparações sôbre algumas ocorrências vulcânicas no Perú, no México e no Brasil: Brasil, D.N.P.M., D.G.M., Bol. 167, 43 p.
- BASCOM, F. (1893)- The structures, origin and nomenclature of the acid volcanic rocks of South Mountain: Jour.Geol., v. 1, p. 813-832.
- BATTEY, M.H., (1955)- Alkali metasomatism and the petrology of some keratophyres: Geol.Mag., v. 92, p. 104-126.
- BEDERKE, E., (1959)- Probleme des Permischen Vulkanismus: Geol. Rsch., v. 48, p. 10-18.
- BORDET, PIERRE, (1958)- À propos des ignimbrites: Soc. Géol. France, C.R.Som.Sc., n. 5 (3 fév. 1958), p. 77-80.
- BOULADON, J. e JOURAVSKY, G., (1954)- Les ignimbrites du Précambien Tiouine III de Tiouine et du sud marocain: Notes et Mém.Serv.Géol.Maroc, n. 120, p. 37-58.
- BUDDINGTON, A.F., (1959)- Granite emplacement with special reference to North America: Geol.Soc.Amer., Bull., v. 70, p. 671-747.
- CAORSI, J.H. e GONZI, J.C., (1958)- Geologia uruguaia: Inst.Geol. Urug., Bol. 37, Montevideo, 73 p.
- CARVALHO, P.F.de, (1929)- Reconhecimento geológico efetuado no município de Caçapava: Brasil, Serv.Geol.Min., Rel.An.Dir., 1928, p. 41-55.
- (1932)- Reconhecimento geológico no estado do Rio Grande do Sul: Brasil, Serv.Geol.Min., Bol. n. 66, 72 p.
- COOK, E.F., (1957)- Stratigraphic and structural utility of layered volcanic rocks: XX Congr. Geol. Intern., Seccion I, p. 189-203.
- (1959)- Ignimbrite bibliography: Idaho Bureau of Mines and Geology, Inform.Circ.n.4, 30 p.

- COUTINHO, J.M.V., (1955)- Geologia e Petrologia da região de Pirai do Sul, Paraná: Soc.Bras.Geol., Bol. v. 4, p. 49-65.
- CROOK, K.A.W., (1960)- Classification of arenites: Am.Jour.Sci., v. 258, n. 6, p. 419-428.
- DEMAY, ANDRÉ, (1953)- Sur la structure et la gnse de quelques types de microgranites et d'aplites et de granites, prsentrant quelques caractres microgranitiques: XIX e.Cong.Gol.Intern., C.R., v.6, p. 139-151.
- de SITTER, L.U., (1956)- Structural Geology: Mc Graw-Hill Book Co., Inc., New York, 552 p.
- ECKEL, E.B., (1959)- Geology and resources of Paraguay- a reconnaissance: U.S.Geol.Sur., Prof. Paper 327, 110 p.
- ENLOWS, H.E., (1955)- Welded tuffs of Chiricahua National Monument, Geol.Soc.Amer., Bull. v. 66, p.1215-1246.
- FENNER, C.N., (1937)- Tuffs and other volcanic deposits of Katmai and Yellowstone Park: Am.Geophys. Un., Trans., 18 th Ann.Meet., p. 236-239.
- (1950)- The chemical kinetics of the Katmai eruption: Am.Jour.Sci., v. 248, p.593-627; 697-725.
- FISHER, R.V., (1960)- Criteria for recognition of laharic breccias, Southern Cascade Mountains, Washington: Geol.Soc.Amer., Bull. v. 71, p.127-132.
- FREITAS, R.O.de, (1945)- O conglomerado do Ba (srie Itaja, Santa Catarina): Univ.S.Paulo, Fac.Fil., Cien. Letr., Bol. 50(Geol.n.2), p. 35-115.
- FULLER, R.E., (1927)- The mode of origin of the color of certain varicolored obsidians: Jour.Geol., v. 35, p. 570-573.
- GZE, BERNARD, (1957)- Rflexions sur les ignimbrites et les laves acides: Soc.Gol.France, C.R.Som.Sc., n. 15 (2 Dc.1957) p. 348-351.
- GILBERT, C.M., (1938)- Welded tuff in Eastern California: Geol. Soc.Amer., Bull., v. 49, p. 1829-1862.
- GRANGE, L.I., (1937)- The geology of the Rotorua-Taupo Subdivision-Rotorua and Kaimanawa Divisions: New Zeal.Geol.Sur., Bull.n.37, p.

- HOWELL, J.V. (coord. 1957)- Glossary of geology and related sciences: Nat. Acad. Sci.-Nat. Res. Coun. Publ. 501, Amer. Geol. Inst., Washington, 325 p.
- HJELMQVIST, S., (1956)- On the occurrence of ignimbrite in the Pre-Cambrian: Sver. Geol. Undersok., ser. C, n. 542, p. 3-11.
- IDDINGS, J.P., (1887)- Nature and origin of lithophysae and the lamination of acid lavas: Am. Jour. Sci. III, v. 33 (133), p. 36-44.
- JOHANNSEN, ALBERT, (1937)- A descriptive petrography of the igneous rocks: v. III, University of Chicago Press, Chicago, 360 p.
- KRUMBEIN, W.C. e SLOSS, L.L., (1955)- Stratigraphy and sedimentation: W.H. Freeman and Co., San Francisco, 497 p.
- LEINZ, VIKTOR, (1936)- Os porphyros de Castro: Acad. Bras. Cien., Anais, v. 8, p. 305-310.
- (1939)- Problema geológico do post-arqueano no Rio Grande do Sul: Min. e Met., v. 4, p. 203-206.
- LEINZ, VIKTOR e BARBOSA, A.F., (1941)- Mapa geológico Caçapava-Lavras: Rio Grande do Sul, Dir. Prod. Min., Bol. n. 90, 39 p.
- MACKIN, J.H., (1960)- Structural significance of Tertiary volcanic rocks in Southeastern Utah: Jour. Sci., v. 258, p. 81-131.
- MARTIN, R.C., (1959)- Some field and petrographic features of American and New Zealand ignimbrites: New Zeal. Jour. Geol. Geophys., v. 2, p. 394-411.
- MAU, HENRY, (1959)- "Ignimbritos" na região de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul: Eng., Min. e Met., v. 29, p. 13-14.
- MC TAGGART, K.C., (1960)- The mobility of nuées ardentes: Am. Jour. Sci., v. 258, p. 369-382.
- MELCHER, G.C. e MAU, HENRY, (1960)- Novas observações geológicas na região de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Acad. Bras. Cien., Anais, v. 32, p. 43-50.
- PACKHAM, G.H., (1954)- Sedimentary structures as an important factor in the classification of sandstones: Am. Jour. Sci., v. 252, p. 466-476.

- PERRET, F.A., (1935)- The eruption of Mt. Pelée 1929-1932: Carnegie Inst., Washington, Pub. 458, 125 p.
- PIRSSON, L.V., (1915)- The microscopical characters of volcanic tuffs-a study for students: Am. Jour. Sci., 4 th Ser., p. 191-211.
- REYNOLDS, D.L., (1954)- Fluidization as a geological process, its bearing on the problem of intrusive granites: Am. Jour. Sci., v. 252, p. 577-613.
- SCHENK, H.G. e MULLER, S.W., (1941)- Stratigraphic terminology: Geol. Soc. Amer., Bull. v. 52, p. 1419-1426.
- TROEGER, W.E., (1956)- Optische Bestimmung der Gesteinsbildenden Minerale- Teil 1, Bestimmungstabellen, Stuttgart, 147 p.
- TURNER, F.J. e VERHOOGEN, JOHN, (1960)- Igneous and metamorphic petrology: Mc Graw-Hill Book Co., New York, 694 p.
- van BEMMELEN, R.W., (1949)- The geology of Indonesia, v. IA, Govt. Printing Office, The Hague, 732 p.
- VLODAV'ETZ, V.I., (1953)- Sobre algumas lavas tufáceas de Semiacchinsk e sua origem (em russo): Acad. Cien. U.R.S.S., Bull., ser. geol., n. 3, p. 96-106.
- (1957)- Sobre a origem da rocha geralmente chamada lava tufácea ou ignimbrito (em russo): Laborat. Vulcanol., Trans., n. 14, p. 3-16.
- von WOLFF, F., (1929, 1931)- Der Vulkanismus, v. II, 1-2, Ferdinand Enke, Stuttgart, 1111 p.
- WALTHER, KARL, (1912)- Zur Geologie der Gegend von Seibal in Staat Rio Grande do Sul und ihrer Kupfererz lagerstaetten: Zeits. f. Prakt. Geol., Jg. 20, p. 404-414.
- WESTERVELD, J., (1942)- Welded rhyolitic tuffs or "ignimbrites" in the Pasoemah region, West Palembang, South Sumatra: Leids, Geol. Meded., v. 13, p. 202-217.
- WEYL, RICHARD, (1954)- Beitrage zur Geologie El Salvadors: V- die Schmelztuffe der Balsamkette: Neues Jb. Geol. Pal., Abh., v. 99, p. 1-32.
- WILLIAMS, HOWEL, (1941)- Calderas and their origin: Dept. Geol., Univ. Calif., Bull., v. 25, p. 239-346.

WILLIAMS, HOWEL, (1954)- in Williams, Turner, Gilbert-Petrography: an introduction to the study of rocks in thin sections: W.H.Freeman and Co. San Francisco, 406 p.

WILSHIRE, H.G., (1959)- Deuteric alteration of volcanic rocks: Roy. Soc.N.S.W., Jour.Proceed., v.93, p.105-120.

Trabalho Inédito

BARBOSA, A.F., (1958)- Alguns aspectos da mineralização de cobre e da pesquisa das jazidas do Seival, Estado do Rio Grande do Sul, Tese de concurso apresentada à Escola Politécnica da U.S.P., 80 p.

(Adaptado de
TABELA 1 Melcher, Mau, 1959)

	Carvalho (1932)	Leinz e Barbosa (1941)
Jurássico(?)		diques de diabasio
Carbonifero superior (?)	Série Tubarão Série Itararé discordância	Série Tubarão -tilitos, varvitos discordância Conglomerado Seival Andesitos (com Au, Cu) (lavas, brechas, tufos) discordância
Devoniano (?)	Série Camaquã (Conglomerado arenito folhelho) Andesito (com Au, Pb, Cu)	Série Camaquã (Conglomerado arenito siltito) discordância Riólitos (lava e tufo) Formação Maricá (Conglomerado arenito) discordância
Siluriano (?)		
Cambriano (?)	discordância	discordância
		Granitos alcalinos (com Sn e W)
Pré-Cambriano superior	Filitos de Ibaré, quartzitos, xistos e mármores de Vacacai, xistos micáceos Porongos	Série Porongos (xisto, quartzito, mármore, etc.) discordância
Pré-Cambriano médio e inf. (?)	Gneiss, granito, dolomito, micaxisto	Granitos calcoalcalinos gnaissificados, leptinitos, etc.

Melcher, Johnson, Mau, Robertson
diques de diabasio
Série Tubarão s.l.-facies Itararé (tilitos, varvitos, etc.) Camadas marinhas com Orbiculoidea e Barroisella discordância
Andesitos (lavas e tufos)
Série Camaquã (Conglomerado, arenito, siltito) discordância
Granito-Caçapava?, Lavras (com Au, Cu?) discordância
Sequência Vulcânica riólitos (ignimbrito, tufo, brecha, lava) andesitos (conglomerado vulcânico brecha, tufo, lava) discordância
Série Maricá (Conglomerado grauvaca folhelho) (marmor, filito, xisto)
Riólitos-Andesitos tufo andesítico (xisto verde) discordância
Metamórficas e intrusivas antigas, micaxisto, gnaisse, granito, leptinito, dolomito

TABELA 2

Comparação entre alguns ignimbritos do mundo (seg.

Westerveld, 1942; Weyl, 1954)

Localidade	área	espessura	volume	Idade	autor
Taupo-Rotorua Ilha Norte, Nova Zelândia	25.900 km ²	30m	750km ³	plioceno-pleistoceno	Marshall (1935)
Lago Toba-Sumatra Ociden- tal, Indonésia	25.000 km ²	50-600m	2.000km ³	pleistoceno	citado por Weyl (1954)
Snake river Idaho-Montana, E.E.U.U.	13.000 km ²	6-15m	80-200km ³	pleistoceno	Mansfield e Ross (1935)
Caldena Aira Kiushu, Japão	1.650 km ²	100m	165km ³	-	Williams (1941, 1942)
Bishop tuff Califórnia oriental, E.E.U.U.	1.028-1.065km ²	122-152m	146km ³	pleistoceno	Gilbert (1938)
Perú meridional	1.000km ²	250-500m	grande	pleistoceno inferior	Fenner (1948)
Pasumah, Sumatra meridional, Indonésia	800km ²	50m	40km ³	pleistoceno	Westerveld (1942)
Brisbane, Queensland Austrália	790km ²	61-152m	47-118km ³	triássico	Richards e Bryan (1933)
Dalarna, Suécia central	450km ²	-	-	pré-cambriano	Hjelmqvist (1956)
Vale das 10.000 Fumaças, Alaska	100km ²	3-61m	4-17km ³	recente	Fenner (1923)
Comalapa, El Salvador	75km ²	100m	7-10km ³	plioceno superior	Weyl (1954)
Tiouine, Marrocos	-	2-60m	-	pré-cambriano	Bouladon e Jouravsky (1954)
Caçapava-Lavras Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-
Hoje	280km ²	40m	11km ³	-	-
original?	2.000km ²	40m	80km ³	pré-cambriano	Mau (presente trabalho)

TABELA 3: COMPARAÇÃO ENTRE IGNIMBRITOS DAS DIVERSAS SECÇÕES

Secção	côr da massa	cristais de quartzo e feldspato	fragmentos estranhos	teor lenticulas	aspecto	caços de vidro	grau de soldamento	densidade	diferenciação vertical	espessura		
RAMADA												
Secção 1	meio	creme-rósea	raros		raros:grauvaca granófiro	baixo	longas,delgadas negras,brilho baço	bem conservados	moderado	2,49	passa a tufo para cima	
	tôpo	creme e roxa	raros		raros:grauvaca	baixo	longas,delgadas brilho baço	bem conservados	intenso	2,48		incluindo brechas basais, 50 m
Secção 2		vermelho-alaranjada e preta	abundantes		raros:andesito	baixo	finas,longas coalescidas	raros e mal conservados	intenso	2,44-2,50 cima p/baixo	passa a menos recristalizado em cima	37 m
Secção 3		negra a castanho-avermelhada	abundantes		raros:andesito	alto	coalescidas fili-formes	raros;formam fitas	intenso	2,59-2,60	pouco menos soldado no tôpo do que na base	50 m
Secção 4	tipo 1	negra	abundantes		raros:ardósia	alto	coalescidas fili-formes	raros;formam fitas	intenso	2,63		
	tipo 2	creme	pouco freqüentes		raros:folhelho andesito	alto	espessas,castanho avermelhadas	bem conservados	baixo	2,58		30 m
	tipo 3	creme-rósea	abundantes		abundantes: folhelho,arenito	moderado	curtas,pretas ou verdes	conservados localmente	muito baixo			
	tipo 4	rósea-castanha	raros		-	baixo	longas,finas,negras, brilho baço	bem conservados	moderado			
Secção 5		roxo escura	pouco freqüentes		raros:granófiro, quartzito,folhelho, ignimbrito	alto	grandes,espessas,castanho-avermelhadas	bem conservados	intenso	2,60-2,62	menos soldado em cima do que em baixo	15 m 70 m
STA. BARBRINHA												
Secção 6		rósea	pouco freqüentes		abundantes:arenito, andesito	baixo	curtas e espessas; róseas a creme	bem conservados	intenso a baixo	2,36-2,51	passa de muito soldado a tufáceo	20 m
Secção 7		vermelha-castanha	abundantes a pouco freqüentes		abundantes:tufo, púmice,folhelho,ignimbrito	moderado a alto	azul claras a arroxeadas; espessas	bem conservadas	baixo	2,46-2,50		50 m
Secção 8		creme a rósea	raros		abundantes:andesito	alto	grandes,negras brilho vítreo	raros	intenso	2,45-2,49		32-36 m
Secção 9		castanho escura	abundantes		abundantes:andesito, grau vaca	alto	grandes,castanho-avermelhadas	mal conservados	baixo a intenso	2,54		17 m
Secção 10		castanha	abundantes		pouco freqüentes:andesito, tufo, púmice	baixo	finas,curtas escuras	bem a mal conservados	baixo a intenso	2,48-2,54		20 m

Fig. 1

Mapa de localização da área

Rochas Metamórficas (Série Maricá?)
Série Maricá
Embasamento Cristalino

Riólitos
Ignimbritos-Tufos
Formação Andesítica

Sequência Vulcânica

Série Camaquã
Granodiorito
Granito

Série Tubarão
Andesitos na base da Série Tubarão

X Minas

X Jazidas abandonadas

Estrada

Contacto

Contacto inferido

Falha

A — — A
Secção

Fig. 3

Mapa- índice dos pontos e secções de ignimbritos
mencionados no texto

Fig. 4

Secções geológicas pela região

SECÇÕES TRANSVERSAIS PELA REGIÃO

Fig. 5
Secções esquemáticas de ignimbritos

Fig. 6:

Fig. 7:

Tôpo da Secção 2, Cêrro Partido
Transição de ignimbrito para riólito
(fotomicrografias)

Fig. 8
Secção 3:
"riólito fluidal"

Fig. 9
Secção 4:
"riólito fluidal"

(fotomicrografias)

Fig. 10

Secção 4 (tipo 2):
Ignimbrito
Notar grandes lenticulas

Fig. 11

Secção 6:
Intemperismo de ignimbrito

Fig. 12

Secção 6:
Ignimbrito bastante recristalizado

Fig. 13
Secção 7:
Ignimbrito pouco soldado
Notar lenticulas e lascas de vidro
(fotomicrografia)

Fig. 14
 Secção 8:
 Ignimbrito
 Notar grandes lenticulas

Fig. 15
 Secção 10:
 Ignimbrito
 Notar lascas de vidro
 (fotomicrografia)

Fig. 16
 "Nódulos" de quartzo em
 um ignimbrito bem solda-
 do da secção 6
 (fotomicrografia)

Fig. 17
 Estrutura fluidal em
 keratófiros
 Próximo à foz do arroio
 Pecegueiros

Fig. 18
 Riólito com lenticula e
 xenólito de granito
 Recristalizado a partir-
 de um ignimbrito da secção 4