NÃO CIRCULA

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO À GEOLOGIA DO MACIÇO ALCALINO
DE POÇOS DE CALDAS

Tese de doutoramento apresentada por
Reinholt Ellert

DEDALUS - Acervo - IGC

30900013445

ÍNDICE

I - INTRODUÇÃO	1
II - AGRADECIMENTOS	2
III - TRABALHOS ANTERIORES	2
IV - GEOLOGIA REGIONAL	3
V - GEOLOGIA DO MACIÇO ALCALINO	5
Brechas e tufo	6
Rochas Efusivas e Hipabissais	
1 - Ankaratritos	8
2 - Lavas fonolíticas	9
3 - Tinguaito e fonolito	9
4 - Pseudo leucita tinguaito	11
5 - Analcita tinguaito	13
6 - Brecha de tinguaito	13
Rochas Plutônicas	
1 - Foisitos	14
2 - Foisitos traquítoides	16
3 - Lujauro e chibinito	17
VI - MECANISMO DA INTRUSÃO ALCALINA	
1 - Levantamentos	18
2 - Atividade vulcânica	19
3 - Subsidência da parte central	20
4 - Ascensão do magma nefelínico	22
5 - Diques anulares	23
6 - Formação de lujauro, chibinito e foisito	26
VII - COMPARAÇÃO COM OUTROS JAZIGMENTOS ALCALINOS	26
VIII - TECTÔNICA	31
IX - MAPA GEOLÓGICO	34
X - RECURSOS MINERAIS	40
XI - RESUMO	42
XII - BIBLIOGRAFIA	45

INTRODUÇÃO

Aos maciços alcalinos do mundo inteiro coube nos últimos cinquenta anos a atenção especial dos geólogos e petrógrafos para a elucidação dos processos geológicos e petrológicos que lhes deram origem.

No Brasil, onde as ocorrências de intrusões alcalinas, no escudo cristalino, são numerosas e algumas de área considerável, poucos levantamentos geológicos foram feitos para a elucidação dos processos responsáveis por tais jazimentos.

O presente trabalho apresenta uma tentativa para a compreensão da geologia do complexo alcalino de Poços de Caldas. A existência de mapas topográficos atualizados nas escalas de 1:10.000 e 1:25.000 facilitou a apresentação do mapa geológico. Os trabalhos de campo foram realizados principalmente durante os meses de férias escolares dos anos de 1954 a 1957, quando contamos com a colaboração dos colegas José Moacyr V. Coutinho e Alfredo J. Simon Björnberg, que muito contribuíram para a apresentação deste trabalho.

O complexo alcalino aqui estudado situa-se nos limites dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, ocupando neste a sua maior área, que é da ordem de 800 quilômetros quadrados, colocando-se assim entre as maiores manifestações alcalinas do mundo, superada apenas pelos maciços da Península de Kola, na Rússia, com 1.300 quilômetros quadrados (Eliseev et al., 1937) e do Itatiaia, no Brasil, com 1.200 quilômetros quadrados (Lanero, 1936), sendo comparável aos jazimentos de Pilansberg, no Transvaal, (Thand, 1929) e de Illimaussak, na Groenlândia, (Ussing, 1911). A sua forma é ligeiramente clipe-

tica, com o eixo maior, de 35 quilômetros, no sentido NE-SW e o menor, com 30 quilômetros, no sentido NW-SE, possuindo ainda um pequeno "stock" de folialto, no bordo NE, de aproximadamente 5 quilômetros de comprimento por 2,5 quilômetros de largura, separado do maciço por uma faixa de gnaiss de 1,5 quilômetros. A região é há muito conhecida pelas suas fontes de águas termas, medicinais e radiativas de Águas da Prata, Poços de Caldas e Poções do Rio Verde, situadas respectivamente nos setores W, N e E do complexo alcalino.

AGRADECIMENTOS

Devo consignar os sinceros agradecimentos ao Conselho Nacional de Pesquisas pelo auxílio concedido para os trabalhos de campo, ao Prof. Dr. Elysiário Távora, da Universidade do Brasil e aos Drs. Max White e Gene Tolbert pela ajuda desinteressada. Ao Eng. Geraldo Conrado Melcher, da Universidade de São Paulo, por ter fornecido parte da bibliografia especializada e ao Eng. Rest Frahya, do Departamento Nacional da Produção Mineral, pelos dados de sondagens.

Ao Prof. Dr. Viktor Leinz, Diretor do Departamento de Geologia e Paleontologia, pelo seu estímulo, orientação e crítica valiosa, a minha gratidão.

TRABALHOS ANTERIORES

O primeiro trabalho sobre a geologia de Poços de Caldas data do século passado e foi realizado por Parby (1887). Tive o mérito de reconhecer a natureza vulcânica da região, bem como mostrar que rochas de granulação fina, os fonolitos,

podem passar a rochas de granulação grosseira como os foliões. Machado (1938) apresentou um excelente e minucioso estudo petrográfico das rochas da região. Trabalhos de natureza petrográfica foram realizados por Guimarães (1947, 1953) que advogou para o magma alcalino uma origem por diferenciação do magma básico, responsável pelos derrames de basalto do Sul do Brasil. Barbosa (1934, 1936 e 1948) apresentou observações geológicas e petrográficas reivindicando para o maciço duas atividades do magma alcalino, muito distanciadas no tempo, situando a primeira, de natureza plutônica, no pré-oroviciano e a segunda, vulcânica, no fim do mesozóico. Freitag (1947) publicou um trabalho sobre a geomorfologia da região. Branco (1956) fez um estudo sobre a petrografia de algumas rochas, acompanhado de um mapa geológico esquemático que abrange pequena área de bordo W do maciço. Foram também publicadas vários estudos e pesquisas sobre os recursos minerais da região, como bauxita (Tolzeira, 1937), sílica (Teixeira, 1937, Francos, 1947 e Guimarães, 1948) e últimamente sobre os minerais radioativos (Tolbert, 1955, Guimarães e outros 1953).

GEOLOGIA REGIONAL

A região de Pocos de Caldas acha-se geologicamente nos limites da bacia sedimentar do Paraná e dos contrafortes da serra da Mantiqueira.

Ao redor da intrusão alcalina, com exceção do topo da serra do Mirante da Fartura, afloram rochas do embasamento cristalino, formadas de granito e gnaiss, com gnaissificação predominante N-40-70W. Diques de diabásio, anfibolito e tinguaite cortam frequentemente estas rochas. A zircão-

de e o mergulho do gnaíse são variáveis. Assim, no bordo norte do maciço, a direção predominante é NW-SE, com mergulho para o sul. No entanto, no bordo SW, a direção do gnaíse é de N-50-70E e no quadrante SE, a direção geral é NW-SE, mergulhando para o norte e para o sul.

Nessa região e em menor escala no bordo NW o gnaíse foi afetado metamorficamente pela intrusão alcalina, sofrendo o processo de fenitização. Para o termo fenito usamos o conceito de Hokermann (1951, pg. 27), como sendo rochas de contacto com a intrusão alcalina alteradas metamorficamente "in situ". Na área SE, o fenito e gnaíse formam a Serra da Pedra Branca, que se eleva a mais de 1.700 metros, em forma de crescente. A passagem do gnaíse ao fenito é brusca no sentido normal à gnaíscificação, enquanto que aparentemente gradual, com interdigitações ao longo da xistocidade. A cor rósea e a orientação dos minerais no gnaíse e no fenito são concordantes, havendo neste, variação no tamanho dos minerais, enriquecimento de piroxênios, diminuição e desaparecimento de quartzo, que é preservado somente em veios e pegmatitos. Em faixas pegmatíticas a orientação dos minerais é paralela aos contactos e concordante com a orientação dos minerais do fenito. Mesmo em rochas aparentemente frescas são comuns pequenas cavidades preenchidas por material ocreoso. Entre Pocinhos do Rio Verde e Caldas o fenito forma uma escarpa abrupta e o contacto com o gnaíse é quase paralelo à estrada de rodagem que une as duas localidades, afastando-se para "E" nas proximidades da cidade de Caldas.

Na área NW, o gnaíse de cor rósea foi transformado em fenito, de cor cinza esverdeada, considerado por Freitas (1956) como alarito. Do gnaíse para o fenito, ao longo da estrada de rodagem Caserta - São Roque da Furtura pode ser observada a seguinte sequência:

- a - Em primeiro lugar, a mudança da cor rósea dos feldspatos no gnaiss para cor cinza esverdeada, em zonas irregulares.
- b - Diminuição do teor de quartzo na rocha.
- c - Aumento do tamanho dos minerais, principalmente dos feldspatos.
- d - Aparecimento de anfíbios sódicos.

Esta sequência assemelha-se à formação dos fenitos brancos de Spitzkop, África do Sul, descritos por Strauss e Truter (1954, pg. 89). A evolução do processo de fenitização é estudada petrograficamente e descrita por Coutinho (1958).

GEOLOGIA DO MACIÇO ALCALINO

No bordo interno do maciço, acompanhando o contacto com as encaixantes, ocorrem sedimentos anteriores às atividades do magma alcalino e estão conservados entre rochas piroclásticas, lavas e tinguaitos. As áreas de maiores afloramentos são em Águas da Prata e ao norte de Andradás, onde formam pacotes de mais de 100 metros de espessura. Constituem-se, na base, de folhelhos com intercalações de camadas arenosas e no topo de arenitos com estratificação cruzada. Estes estão geralmente silicificados e recristalizados, o que não se dá com os folhelhos, onde não se notam sinais de recristalização, mesmo quando cortados por diques de rochas alcalinas. Nos sedimentos ocorrem intrusões de diabásio, que aparecem em diques e pequenos sills irregulares e afloram, principalmente, ao norte de Águas da Prata e em menor escala, ao norte de Andradás, na fazenda Pinheirinho. A sua textura e composição mineral permite analogia com as demais intrusões básicas do mo-

sozais (Gentilho, 1958).

Os sedimentos foram identificados em Águas da Prata por Derby (1987), que os considerou duvidosamente carboníferos. Barbosa (1936) e Freitas (1943) compararam os folhelhos da base com os da formação Estrada Nova (Permiano) e os arenitos do topo, com estratificação cruzada, ao Arenito Botucatu (Triássico), e foram petrograficamente estudados por Björnberg (1958). Arenitos e folhelhos foram perturbados e deslocados de suas posições iniciais, principalmente nas proximidades do contato com o tinguaito, como ao norte de Andaraí, onde se apresentam dobrados e intensamente falhados, com mergulho próximo à vertical. Quando menos perturbados, o mergulho dos sedimentos é, em geral, para dentro do maciço.

BRECHAS E TUFOS

Rochas de origem vulcânica como tufos, brechas e aglomerados foram reconhecidas por Derby (1987), ao longo do vale do Quartel, entre Águas da Prata e Cascata. Ocorrem ainda ^{em} vários pontos, acompanhando o bordo interno do complexo, geralmente associados a arenitos e lavas.

A área de maior número de afloramentos é uma faixa em forma de crescente, com largura variável, abrangendo o quadrante N-NE-W do maciço. As brechas parecem ser de duas origens: a - vulcânica, propriamente dita.

b - brechas de origem vulcânica, com transporte posterior, apresentando-se em camadas com alternância de fragmentos mais grosseiros na base e finos no topo.

Nesta área, onde brechas e tufos formam uma faixa quase contínua, observa-se que foram depositados sobre arenitos ou intercalados com lavas. No vale do Quartel, as

brechas são ricas em fragmentos angulosos, cujos diâmetros, em geral, não excedem 10 cms; eles são formados, principalmente, de gnaíse, arenito, siltito e diabásio (fotos ns. 1 e 2). No cimento são abundantes calcita e quartzo detrítico, geralmente arredondado, indicando contribuição dos sedimentos. Quando fresca, a brecha apresenta cor escura, entre castanho e roxo, provavelmente graças à abundância de ferro no cimento areno-argiloso. Desde Cascata até as proximidades da cidade de Poços de Caldas afloram principalmente tufos e brechas com pequenas intercalações de lavas aglomeráticas alteradas. Quando fresca a brecha possui cor verde clara, com manchas azuladas, de contornos irregulares (Foto n. 3). Em geral, os fragmentos são escassos e são constituídos principalmente por arenito recristalizado, gnaíse e diabásio albitizado. Formam pacotes espessos, tendo uma sondagem, na barragem Bortolan, atravessado quase 80 metros com grande variação litológica. O cimento é rico em quartzo detrítico, calcita, feldspatos, apatita e pequenos prismas de aegirina. O quartzo não raro acha-se substituído parcial ou totalmente por calcita e os piroxênios parecem ser secundários, como produto de metasomatismo, proveniente de soluções de magma alcalino. Nas proximidades do contato com o tinguaíto a quantidade de quartzo diminui, chegando mesmo, em alguns casos, a desaparecer. Quando apresentam estratificação, tufos e brechas mergulham, no geral, para o interior do maciço.

No bordo E, junto com arenitos, ocorrem pequenas faixas de brecha, bem como na área SE, nas proximidades do contato com o fenito. A brecha apresenta estratificação, com alternância de camadas constituídas de fragmentos grosseiros e finos. Nestes afloramentos, aparentemente de pequena espessura, as brechas estão alteradas e são cortadas por tinguaíto.

Ocorre ainda, no vale do Quartel, um aglomerado vulcâ-

nico, formado por fragmentos de tamanho desde alguns milímetros até mais de 10 centímetros de diâmetro, constituídos de lavas ankaratríticas e cimentados por minerais fragmentados da lava, como augita, titanaugita, olivina cloritizada e calcita secundária. A alteração de piroxênios e olivina em clorita e depois para calcita é comum tanto em amostras de superfície como em testemunhos de sondagem, de mais de 70 metros de profundidade.

ROCHAS EXTRUSIVAS E HIPABISSAIS

1 - Ankaratritos

Rochas extrusivas, às vezes com aspecto de lavas aglomeráticas, aparecem em extensos afloramentos no bordo NW-W do maciço, assentadas sobre sedimentos ou intercaladas com tufos e brechas, com acamamentos e mergulhos variáveis, mas quase sempre com ângulos menores do que 30° , dirigidos para o interior do maciço. Boas exposições ocorrem no vale do Quartel, entre Águas da Prata e Cascata, onde as lavas, quando frescas, mostram cor cinza escura, com texturas microcristalina ou porfirítica, exibindo neste caso fenocristais de piroxênio, às vezes com mais de 3 cm de comprimento. Afloramentos de lava aglomerática, na fazenda Santa Maria, exibem fragmentos com mais de 15 cm de diâmetro, formados de lava rica em cavidades preenchidas por calcita e cimentados por uma matriz microcristalina (foto n. 4). Esta lava é cortada por diques de tingualto e serviu, juntamente com as brechas, de encaixante para as intrusões de tingualto e folaito. Quando alterada é comum a decomposição esferoidal apresentando cor cinza esverdeada.

Microscopicamente é formada por fenocristais de augita, às vezes titanífera, sanidina, analcita e raras prismas

de olivina cloritizada, dispersos em matriz microcristalina de augita, nefelina, analcita, ortoclásio, magnetita e grande quantidade de calcita secundária, pertencendo assim, à fração básica da clã alcalina. Acompanhando a faixa de brechas entre Cascata e o rio das Antas, os afloramentos de lava são raras, de pequena espessura e sempre alterados. No bordo E do planalto, perto do contacto com o gnaíse, ocorre também um pequeno afloramento de lava aglomerática alterada.

2 - Lavas fonolíticas

Na área sul do planalto afloram derrames de lavas fonolíticas, com centenas de metros de espessura, capotando sedimentos, sem intercalações de tufos e brechas. Formam degraus que se ressaltam morfologicamente, com mergulho suave, para o interior do maciço, às vezes perturbado por intrusões posteriores de tingualito, como pode notar-se nos morros do Mol e do Tamanduá. Estão quase sempre alteradas e quando frescas, sua cor é castanha escura, com textura fluidal visível, formando frequentemente pequenas dobras irregulares, sugerindo que quando se deu o derrame a lava estava num estado semifluido. Nos derrames mais espessos nota-se que o resfriamento mais lento permitiu a formação de textura mais grosseira, assemelhando-se a tingualito e até mesmo a microfoialito. A rocha está, em geral intensamente fraturada e quando semi-alterada, a sua cor é branco amarelada, cor essa, talvez conseqüente da percolação de soluções hidrotermais.

3 - Tingualito e fonolito

Quase dois terços da área do complexo são constituídos de rochas compactas, de textura afanítica, porfirítica, sacroide ou granular, de cores verde a quase preta e são consideradas como correspondentes efusivos e hipabissais do fol-

alto. Darby (1887) considerou-as simplesmente como fenolitos, que formam derrames, diques e stocks. Segundo a classificação de Johansen (1939, vol. 4, pg. 146) usamos o termo fenolito para rochas de textura afanítica ou porfírica e para as rochas de textura granular ou sacaróide o termo tinguaíto. No entanto, é comum a transição de um tipo a outro o que dá a essa separação um caráter muito arbitrário, fato que também foi assinalado por Shand (1929, pg. 135). No conjunto predominam as rochas consideradas como tinguaíto, que podem apresentar fases de transição para foliito.

No tinguaíto, que forma o grande dique anelar, são comuns pequenos autólitos esféricos, de poucos centímetros, de microfoliito, onde os minerais possuem comumente disposição radial, (foto n. 9)

A área centro-sudeste do maciço é formada de tinguaíto, mas são escassos, em certas zonas os afloramentos de rochas frescas. O tinguaíto está profundamente alterado, apresentando no campo espessa camada de canga limonítica e laterítica e no leito dos riachos a rocha semi-alterada é de cor rósea. No fundo de alguns vales, às vezes com mais de 50 metros de profundidade, o tinguaíto apresenta cor branco-cinza, com abundantes cristais de pirita. Ao microscópio notam-se feldspatos e feldspatóides ligeiramente alterados, enquanto que dos piroxênios somente resta um esqueleto de material opaco. Nesta área ocorrem diques de magnetita, que se destacam na topografia, possuindo geralmente menos de 1 metro de espessura. São limonitizados na superfície possuindo direção preferencial NE e mergulho vertical ou quase vertical, nesse caso para N. O morro do Ferro é cortado por um dique de magnetita, com quase 3 metros de espessura, com direção NW, mergulho cerca de 60° para NE. A rocha encaixante acha-se profundamente alterada, mas segundo dados de sondagem parece ser mi-

crofoialto em profundidade (Branco, 1957, pg. 59). Nesse morro foram descobertos importantes depósitos de tório e terras raras. São produtos secundários, formados provavelmente pelas soluções hidrotermais que alteraram os minerais zirconíferos, contendo tório e terras raras, possibilitando sua concentração em forma de veios ao longo de fraturas. A ocorrência de diques de magnetita, cortando tinguaito parcialmente alterado, poderia sugerir lixiviação de ferro dos minerais ferromagnesianos e sua posterior precipitação ao longo de fendas. No entanto, diques de magnetita, de origem magmática, associados a rochas alcalinas, são conhecidos na região das montanhas de Adirondack, ao norte de Nova Iorque (Lindgren, 1933, pg. 794). Nos Urais ocorrem, em rochas sieníticas, provavelmente formando "schlieren" e também no Brasil, em Ipanema, nesse caso associados a depósitos de apatita (Leinz, 1940).

4 - Pseudo-leucita tinguaito

Tinguaitos com pseudomorfos de leucita são conhecidos em Poços de Caldas desde os trabalhos pioneiros de Derby (1887) e Hussak (1900). Foram originalmente considerados como derrames fonolíticos e apresentam normalmente cor cinza clara, com textura microcristalina, raras vezes grosseira, em que os pseudomorfos têm forma aproximada de icositetraedros dispostos irregularmente e muitas vezes concrecidos. Têm tamanho variado, desde milimétricos até mais de 20 cm de diâmetro. Os pseudomorfos maiores possuem, às vezes, na parte central, um agregado de ortoclásio, nefelina, aegerina e titanita, rodeados por uma massa microcristalina de ortoclásio e nefelina. Nos limites o pseudo cristal é envolto por uma zona mais escura, milimétrica, originada pela concentração de aegerina (foto n. 5). A principal área de

ocorrência é em Cascata, onde aflora em uma faixa em forma de crescente, limitada entre o analcita-tinguaíto e o folaíto. Entre os morros do Serrotinho e do Serrote aparece como uma zona de poucos metros de espessura, que vai aumentando em direção a SW. É anterior ao folaíto do morro do Serrote, pois, este no contacto é pegmatóide e emite pequenos pegmatitos para dentro do tinguaito. No entanto, em vários pontos, principalmente nas proximidades das minas de zircão, o tinguaito com pseudo leucita é de textura grosseira, assemelhando-se a microfolaíto. Contém pseudomorfos de leucita de vários tamanhos entre concentrações pegmatóides de folaíto. O contacto com o analcita-tinguaíto pode ser brusco ou transicional e nas proximidades do contacto com o folaíto passa às vezes a tinguaito comum. Diques de tinguaito com pseudomorfos de leucita afloram também na serra do Quartel, cortando tinguaito. Um dos maiores, de forma ligeiramente curva, é o que aparece a NW do túnel do Pinhalzinho, na estrada de ferro, já citado por Derby (1887). Entre as estradas de ferro e de rodagem, um pouco ao norte da fazenda Santa Maria, há outro afloramento; também no topo da serra do Quartel, a NE do túnel do Pinhalzinho, há uma faixa de tinguaito com pseudoleucita. Nas proximidades da cachoeira do Ozório há um afloramento intemperizado de onde é extraído caulim rico em potássio. Outro afloramento de menor extensão aparece ao sul do morro do Taquarí, na área SE do maciço, em forma de dique irregular, encaixado ou diferenciado do tinguaito.

A singularidade do modo de ocorrência do analcita-tinguaíto e do tinguaito com pseudoleucita levou Shand (1929) a admitir para o jazimento de Filansberg, a hipótese de serem os pseudomorfos, alterações a partir de analcita e não de leucita.

5 - Analcita-tinguaíto ou analcita-fonolito

Em Cascata aflora uma faixa de fonolito porfirítico, de cor castanho escura a esverdeada, com pórfiros de analcita, de tamanho desde poucos milímetros até mais de 3 cm, cor rósea e contorno mais ou menos regular de icositetraedro, dispersos numa matriz afanítica a microcristalina, com pequenas ripas de feldspato (foto n. 6). Quando a rocha é de cor castanha os pórfiros de analcita são numerosos e na passagem para rocha de cor verde escura os pórfiros diminuem em número e tamanho até desaparecerem, restando-se apenas na rocha intemperizada. A maior ocorrência é uma faixa que se inicia na face N do morro do Serrotinho estendendo-se para SW, cobrindo uma área de vários quilômetros quadrados. Não forma com o tinguaíto contacto nítido, mas sim transicional, com o desaparecimento dos cristais de analcita. No morro do Serrotinho o analcita tinguaíto corta a brecha vulcânica e também em pequenos afloramentos nas proximidades da fazenda Sobradinho.

Pequenos afloramentos de analcita-tinguaíto ocorrem no bordo SE do complexo, onde aparecem como diferenciações do tinguaíto.

6 - Brecha de tinguaíto

Na área W e SW do complexo, numa faixa de vários quilômetros quadrados, ocorre uma brecha de tinguaíto. Apresenta-se em camadas, provavelmente de derrames, com estratificação variável, mas de modo geral com direção NE e mergulho suave para o sul. É formada de fragmentos de tinguaíto e o cimento é constituído por uma matriz fonolítica, com pórfiros de nefelina e sanidina.

No maciço de Poços de Caldas apenas um terço de sua área é constituída de rochas que podem ser consideradas como representantes de atividades plutônicas. Sob este aspecto assemelha-se ao complexo de Pilansberg (Shand, 1929), pois os demais grandes complexos alcalinos, como o da Península de Kola (Ramsay, 1894), Ilimaussak (Ussing, 1911) e Itatiaia (Lamego, 1936) são formados principalmente por rochas plutônicas.

Em Poços de Caldas, como tipos plutônicos, ocorrem as seguintes rochas:

- 1 - Foliaitos
- 2 - Foliaitos traquitóides
- 3 - Lujaurito e chibinito

1 - Foliaitos

Os foliaitos apresentam comumente textura granular grosseira, às vezes ligeiramente traquitóide. Em geral são intrusivos nos tinguaitos, mas ocorrem também zonas de transição de um tipo para outro, observando-se a sequência foliaito-microfoliaito-tinguaíto.

a - Foliaito Aeroporto-Serrote - A maior área de ocorrência de foliaitos é uma faixa no sentido NE-SW, na zona centro norte do maciço e aqui chamado de foliaito "aeroporto-Serrote". O contacto do foliaito intrusivo, ao norte do aeroporto é paralelo à textura fluidal do tinguaito. Na faixa do contacto observa-se que quando se deu a formação do foliaito, este pegmatóide, englobou fragmentos de tinguaito, de tamanho variável, que perdem seu contorno anguloso à medida que se afastam do contacto (foto n. 7). Ocorrem também fragmentos arre-

dondados de tinguaito, cuja textura varia de dentro para fora, passando do tinguaito para uma zona de microfoiaito e depois foiaito, fazendo supor tratar-se de autólitos de tinguaito no foiaito. Essa mesma sequência microfoiaito-foiaito é observada ao redor de alguns xenólitos de lavas ankaratriticas.

O contacto NE entre o foiaito e tinguaito é aparentemente transicional o que também se dá no contacto sul desta faixa. No morro do Serrote o foiaito aflora em forma circular e na face norte, apesar do foiaito ser intrusivo no tinguaito, a textura fluidal deste é ao longo do contacto. Aí o foiaito, de textura grosseira, não raro com bolsões pegmatóides, corta o tinguaito em veios pegmatíticos. O foiaito, quando pegmatóide, apresenta frequentemente concentrações de eudialita. O paralelismo do contacto e a textura fluidal do tinguaito permitem supor contemporaneidade da "mise-en-place" das duas rochas.

b - Foiaito do Taquari - Nesta zona, situada na área SE do maciço, o foiaito também é intrusivo no tinguaito. Na faixa do contacto, por vários metros, apresenta-se pegmatóide, com muita fluorita, feldspatos e piroxênios formando cristais idiomorfos com mais de 5 cm de comprimento. A NW do morro do Taquari, no córrego do Pouso Alegre, aflora também foiaito intrusivo no tinguaito.

c - Foiaitos no dique anelar - Na metade norte do maciço ocorrem faixas de foiaito, em forma de diques, cortando e acompanhando o dique anelar. Apresentam contactos nítidos com o tinguaito e frequentemente xenólitos angulosos de tinguaito que foram englobados com a intrusão do magma.

d - Stock Rio Pardo - Ao lado do Rio Pardo, no bordo NE do

complexo, o foliaito forma um pequeno stock, com mais ou menos 10 quilômetros quadrados, que se ressalta topograficamente do gnaissse encaixante. Este está numa altitude média de 850-900 metros, enquanto que o topo do stock atinge 1.450 metros, alinhando-se no mesmo nível que o dique anelar de tinguaito. A forma do stock é ligeiramente alongada e corta diagonalmente a direção de xistosidade do gnaissse. Em geral é de textura granular, uniforme, assemelhando-se ao foliaito do aeroporto e nas proximidades do contacto, no lado E, passa em faixas irregulares a microfoliaito. São comuns, no foliaito, nas proximidades do gnaissse, xenólitos de até meio metro de diâmetro.

2 - Foliaitos traquitóides

a - Serras do Paiol e Quartel - Nas serras do Paiol e do Quartel afloram foliaitos que apresentam, com o tinguaito, contactos nítidos e também passagem gradual. Diferem um pouco dos demais foliaitos da área central do complexo pela sua textura, que é ora traquitóide, com disposição subparalela dos feldspatos tabulares, de cor branco leitosa, ora ligeiramente porfiróides, no qual os fenocristais de feldspato ressaltam-se dos minerais restantes.

b - Morro do Mel - No morro do Mel, nas proximidades do bordo sul, o foliaito corta o tinguaito em forma de crescente. A sua textura é granular, às vezes porfiróide ou traquitóide, com faixas em que aparecem agregados de feldspato, variando o tamanho de 1 cm até mais de 10 cm, que se ressaltam pelo intemperismo. Os feldspatos, nas proximidades do tinguaito, apresentam disposição sub-paralela acompanhando o contacto. A diferenciação das duas rochas sugere contemporaneidade, revelada pelo paralelismo da textura fluidal do tinguaito com o contacto

e a passagem aparentemente gradual, no contacto E, de uma rocha para outra.

3 - Lujaurito e Chibinito - Em forma de crescente, aflora no bordo N do maciço, uma faixa de lujaurito e chibinito, muito ricos em concentrações de eudialita. O lujaurito é formado de feldspatos alongados, com disposição paralela e entre eles abundantes acículas de aegerina, com arranjo sub-paralelo. (foto n. 13)

O lujaurito passa para chibinito nas proximidades do dique anelar. É de granulação grosseira, com textura traquítóide e freqüente intercrescimento poiquilítico de feldspatos em piroxênios. Ocorrem pegmatitos irregulares, com alguns decímetros de espessura e muito ricos em eudialita. Ao longo da estrada de rodagem para Campestre notam-se massas de chibinito de granulação fina envolvidas pelo chibinito de granulação grosseira.

MECANISMO DA INTRUSÃO ALCALINA

A evolução do processo geológico de Poços de Caldas poderá ser assim esquematizada:

- 1 - Levantamentos, provavelmente escalonados por falhas, de blocos de embasamento cristalino após a sedimentação do arenito Botucatu.
- 2 - Atividade vulcânica, com formação de brechas, tufo e derrames de lavas.
- 3 - Subsidência da parte central.
- 4 - Ascensão do magma nefelínico por fendas radiais e circulares e formação de fonolitos, tinguaitos e por diferenciação foiaítos.
- 5 - Formação do dique anelar.
- 6 - Intrusão de ohibinito, lujaurito e foiaíto.

1 - Levantamentos - Os indícios de que a atividade vulcânica foi precedida ou pelo menos acompanhada de levantamentos, provavelmente escalonados, de blocos gnaissicos, após a deposição dos sedimentos do arenito Botucatu, são indiretos e fundamentam-se tanto em observações geomorfológicas como em deduções geológicas.

a - Em Águas da Prata, no bordo W do maciço, numa altitude de 850 metros, no lado interno do complexo, ocorrem sedimentos ligeiramente perturbados, mergulhando para o interior do maciço e separados do gnaiss por uma delgada faixa de tinguaito. A NW de Águas da Prata, a serra do Mirante da Fatura, com sedimentos assentados sobre o gnaiss, formando um pacote de cerca de 30 metros de espessura, acha-se sobreleva-

da a mais de 1550 metros, indicando um desnível de pelo menos 700 metros, em relação aos sedimentos de Águas da Prata. Ao contrário dos sedimentos do lado interno do complexo, que mergulham para o centro, estes, com pequeno ângulo, mergulham para fora.

b - No contacto do cristalino com as rochas alcalinas, nota-se que em quase todo o bordo, as rochas encaixantes estão topograficamente mais altas, diminuindo de altitude à medida que se afastam do contacto.

c - No bordo sul, os sedimentos capeados por lavas fonolíticas, acham-se topograficamente mais baixos que o gnaíse encaixante, do qual estão separados pelo dique anelar do tinguaito. O gnaíse, ao sul de Andradas, encontra-se também sobrelevado, ocorrendo em altitudes de mais de 1450 metros.

d - Na área E, em Poções do Rio Verde, numa altitude de 900 metros, aflora no contacto entre tinguaito e fenito, uma pequena faixa de arenito, intensamente perturbado. O arenito está incluso em tinguaito e o fenito, no contacto, forma uma grande escarpa que se eleva a mais de 1.700 metros, em forma de crescente, com largura máxima de 10 quilômetros e comprimento de pouco mais de 20 quilômetros.

2 - Atividade vulcânica - Após ou durante o levantamento do embasamento cristalino teve início a atividade vulcânica, com alternância de fases explosivas e efusivas, durante a qual se depositaram, sobre os sedimentos, camadas de brechas e tufos alternados com derrames de lavas ankaratríticas. Os testemunhos dessa atividade estão melhor expostos e conservados na faixa de forma semicircular entre Águas da Prata e as proximidades da cidade de Poços de Caldas.

No vale do Quartel, rochas piroclásticas, aglomerados

vulcânicos e lavas ankaratríticas formam um pacote de algumas centenas de metros. As rochas piroclásticas e lavas apresentam estratos, às vezes perturbados, mas com mergulho, em geral, dirigido para o centro do maciço e são atravessados por diques de tinguaito. Vestígios de brechas e lavas são encontrados em quase todo o bordo interno do maciço, indicando que a atividade vulcânica, durante esta fase, havia abrangido a área atualmente ocupada pelas rochas alcalinas.

Seguindo-se esta primeira fase, em que as lavas representam os tipos básicos da clã alcalina, houve uma segunda na área sul do complexo, formando as lavas fonolíticas, pelo extravasamento do magma, que com centenas de metros de espessura não possuem intercalações de rochas piroclásticas.

3 - Subsidência da parte central - Observando-se o mapa geológico, chama atenção a grande uniformidade litológica, em que rochas consideradas de jazimento hipabissal, os tinguaitos, abrangem a maior área e certamente formaram-se após a atividade vulcânica. Apesar de existir mais de uma geração de tinguaitos, estes apresentam grande uniformidade mineral e textural, indicando homogeneidade na composição química do magma, o que permite supor certa contemporaneidade dos vários eventos geológicos. Esta uniformidade litológica, no entanto, dificulta a interpretação das várias fases da intrusão e diferenciação das rochas.

Para o grande jazimento de Pilansberg, que em planta também se apresenta com forma circular, Shand (1929, pg. 148) admite a formação de uma rede de canais entre blocos falhados que, por sucessivas atividades explosivas, abriram caminho para a ascensão do magma. Este teria levantado os tufo e brechas, formando assim espesso lacólito entre o embasamento cris-

talino e as rochas piroclásticas. Hipótese semelhante, para o caso de Pogos de Caldas, foi também aventada por Freitas (1943, 1947 e 1951), onde o tinguaito está geralmente em níveis topográficos mais elevados que seu correspondente plutônico. No entanto, a forma quase circular do maciço, limitado por uma sequência de serras, constituídas de tinguaito, com textura fluidal de mergulho vertical ou quase vertical e ressaltadas morfologicamente, formando um anel quase completo, bem como o fato de estar o embasamento cristalino sobrelevado ao redor do contacto ocorrendo em níveis topográficos mais elevados invalidam essa hipótese. (Perfis ns.1,2,3,4 e8).

Comparando-se as posições atuais dos sedimentos estudados por Björnberg (1958), que podem servir de níveis guias, nota-se que estes se acham em posição variada e deslocados a altitudes diversas, situando-se ora sob brechas e lavas ankarríticas, como em Águas da Prata e Cascata, ora sob lavas fonolíticas como ao norte de Andradas e ainda entre e sobre tinguaito como em Pocinhos do Rio Verde, ao sul de Laranjeiras e nas proximidades da barragem no rio das Antas. No lado externo do maciço, na serra do Mirante da Fartura, os sedimentos estão sobrelevados a mais de 200 metros em relação à posição dos sedimentos no planalto.

Por outro lado, como não há ocorrências de afloramentos do embasamento cristalino na área interna do maciço e apenas os sedimentos que sobre ele se depositaram, deve-se admitir que após a atividade vulcânica houve abatimento da parte central, que foi compensada pela ascensão do magma. Os indícios deste abatimento são os seguintes:

a - A área central do maciço, com pequenas exceções, é formada exclusivamente por foidaito e tinguaito, enquanto que nas proximidades do contacto com o embasamento ocorrem maiores variações litológicas. O mergulho das camadas de sedimentos

tufos, brechas e também das lavas é sempre dirigido para dentro do maciço, com mergulho variável, que é maior nas proximidades do dique anelar, fato esse também assinalado por Billings (1943).

b - O gnaisse, acompanhando o contacto, está frequentemente em posição mais elevada que o dique anelar (perfis nr. 1, 2, 3 e 4).

c - Os sedimentos, brechas, tufos e lavas adunadas, em todo o bordo, em posição topográfica inferior ao embasamento. (perfil nr. 2 a 8).

d - No foliote do Aeroporto ocorrem xenólitos de lavas anatríticas que foram carregadas com a ascensão do magma.

e - No dique anelar são comuns xenólitos de rochas alcalinas, principalmente ao norte da cidade de Pocos de Caldas, onde apresentam grande variação litológica.

O abatimento do edifício vulcânico não foi no entanto, total, tendo parte servido de encaixante ao magma que originou o tinguaíto. Mesmo no atual estágio de erosão são encontrados pequenos afloramentos de brechas e tufos, que foram perturbados com a intrusão do magma, como na área ao sul do morro do Barrotinho, em Cascaeta e ao norte do morro do Tamanduá, na área centro sul do planalto. As lavas fonolíticas, ao sul do maciço, também foram perturbadas com a intrusão do tinguaíto dos atócos dos morros do Mel e Tamanduá.

O abatimento central de rochas vulcânicas entre diques anelares foi assinalado e demonstrado por numerosos autores, entre os quais Kingsley (1931, pg. 150), Podols (1936), Chapman (1940, pg. 203) e Billings (1943 e 1945).

4 - Ascensão do magma nefelínico e formação do fonólitos, tin-

guaíto e foiaíto; êstes por diferenciação.

O abatimento da parte central foi compensado com a ascensão do magma nefelínico, que, na periferia subiu ao longo de fendas circulares e radiais, enquanto que na parte central, graças à uniformidade litológica não se notam feições estruturais e morfológicas que permitam ^{hipóteses} quanto a forma geométrica das intrusões. Ocorrem stocks, como o do morro do Tamanduá, onde as direções das texturas fluidais acompanham o contacto com as lavas fonolíticas e o tinguaito do morro do Mel, corta as lavas fonolíticas como dique radial. Na área centro-este são comuns vales assimétricos, semicirculares, talvez conseqüentes das variações no mergulho das texturas fluidais. O tinguaito servindo de teto precedeu a formação do foiaíto. Contudo, existem em algumas áreas, diversos indícios que permitem supor que a diferenciação dêste foi contemporânea com a formação do tinguaito. São os seguintes:

a - Na área Aeroporto-Serrote o contacto do foiaíto acompanha a textura fluidal do tinguaito e é pegmatóide, emitindo pequenos pegmatitos que acompanham a textura fluidal do tinguaito.

b - O tinguaito pode passar gradualmente a foiaíto.

c - Ocorrem diques de tinguaito cortando foiaíto.

5 - Diques anelares

Nos últimos 50 anos foram descritos diques anelares em numerosos lugares do globo. O trabalho clássico refere-se ao jazimento de Glen Coe, na Escócia, descrito por Clough et al (1909). Posteriormente, foram identificados em

vários países e frequentemente associados a jazimentos de rochas alcalinas, sendo que nos Estados Unidos, no Estado de New Hampshire, ocorrem 15 complexos diferentes, (Billings, 1943). Admite-se que a intrusão de um dique anelar é precedida pela formação de uma ou mais fendas circulares quase verticais. No entanto, existem dois problemas fundamentais: o primeiro refere-se às forças envolvidas para a formação das fendas circulares e o segundo à origem do espaço ocupado pelo dique anelar. O conceito do mecanismo da intrusão de um dique anelar foi estabelecido por Anderson (1936). Admite este autor uma câmara magnética a vários quilômetros de profundidade, com forma parabólica, tendo o magma, inicialmente, o mesmo peso específico que as encaixantes, estando por isso sujeito às mesmas pressões. No entanto, havendo um aumento da pressão da câmara magnética, as encaixantes estariam sujeitas a um sistema de tensões atuando através da superfície, que, nas proximidades da câmara magnética seria grosseiramente cônica, representado pelas linhas finas da figura n. 1 que representam a intersecção dessas superfícies com o plano do diagrama. As tensões superimpostas, com o aumento da pressão do magma, seriam a causa da formação de uma série de fraturas, ao longo das quais o magma subiria formando os "cone-sheet".

Se mudarem as condições e a pressão da câmara magnética diminuir, as encaixantes estarão sujeitas a tensão. As fraturas de tensão em tais condições seriam paralelas ao contacto da câmara magnética e estão na figura n. 1 representadas pelas linhas interrompidas. O mergulho divergente de tais fraturas seria muito pequeno, segundo Anderson, para ser ocupado por um dique anelar. Admite que o dique anelar segue a direção de ruptura representado pelas linhas grossas da figura n. 1. Um corpo limitado por tal sistema de fraturas seria parabólico e convexo para cima. Uma cavidade potencial entre

a rocha encaixante e o bloco central em abatimento seria ocupada pela ascensão do magma. Posteriormente, a erosão faria ressaltar um corpo intrusivo, anelar em planta, mergulhando para fora. No entanto, numerosas observações em diques anelares, (Billings, 1945), (Kingsley, 1931, pg.162), mostram que essa hipótese não é inteiramente satisfatória, pois os contactos externos dos diques anelares quase sempre são verticais ou mergulham para o centro do complexo. Diques anelares verticais são explicáveis se admitirmos uma intrusão controlada por uma zona circular de fraturas verticais, com largura comparável à do dique anelar. (fig. n. 2 segundo Billings, 1945).

Como já foi assinalado no item 4 deste capítulo, o magma nefelínico subiu na periferia do maciço ao longo de fendas circulares formando o grande dique anelar, quase completo, apenas não reconhecido no bordo SE do maciço. Ressalta-se morfológicamente, delimitando quase todo o maciço e é acompanhado na metade norte por outro incompleto. No atual estágio de erosão a altitude do dique anelar é em parte função de sua espessura e posição com o gnaíse encaixante. Assim, a menor altitude e espessura são a W de Águas da Prata, onde possuem poucos metros. No bordo W, a SW de Cascata, o dique anelar diminui rapidamente de espessura e altitude, limitando-se no lado externo com o gnaíse sobrelevado e no interno com os sedimentos e rochas vulcânicas perturbadas que mergulham para o interior do complexo. Os contactos externos do dique anelar, quando expostos, são verticais ou quase verticais e nesse caso mergulham para o interior do maciço. O seu raio é de mais ou menos 16 km, assemelhando-se ao de Franconia Quadrangle, em New Hampshire, que possui 7,5 milhas de raio (Billings, 1943). O dique anelar em quase todo o bordo externo limita-se com o gnaíse ou fenito, com exceção do bor-

do NE-N-NW, onde ocorrem intrusões posteriores de folaíto, lujaurito e chibinito.

O dique anelar é formado de tinguaiíto, semelhante aos demais do maciço, tendo a diferenciá-lo a ocorrência de pequenos autólitos de microfolaíto, cujo tamanho geralmente não excede 3 cm de diâmetro. São formados de cristais de feldspato e piroxênio com disposição radial. A quantidade desses autólitos varia de um afloramento a outro, havendo zonas de maior concentração. São comuns também pontos pretos, milimétricos formados de hauína e dispostos irregularmente. O melhor afloramento é o da pedreira Bortolan, à margem da rodovia Poços de Caldas-Cascata. No tinguaiíto ocorrem freqüentemente concentrações pegmatóides de folaíto, formando bolsões irregulares ou veios pegmatóides, assim como xenólitos que foram levados com a ascensão do magma, fato esse, também assinalado por outros autores na descrição de diques anelares, (Billings, 1945, pg. 51, Kingsley, 1931, pg. 162, Richey e Thomaz, 1932, pg. 784 e Clough et al, 1909, pg. 633). No bordo N do planalto, na serra de Poços, numa faixa de algumas dezenas de metros, o tinguaiíto assemelha-se a uma brecha magmática, tal a quantidade de xenólitos. A matriz com textura porfirítica engloba numerosos fragmentos, variando o tamanho desde menos de 1 cm até mais de meio metro. O contorno dos xenólitos é anguloso ou arredondado e no contacto com a matriz observa-se nesta, às vezes, cor diferente (bordo de reação ?) e fenocristais de tamanho menor. Os xenólitos são formados principalmente de folaíto, às vezes de granulação grosseira, microfolaíto, tinguaiíto, fonolito, piroxenitos e biotita piroxenitos, de textura e granulação variáveis e raros fragmentos de arenito silicificado. Alguns xenólitos, aparentemente de piroxenitos pegmatóides, são formados por agregados de aegerina com mais de 2 cm de comprimento e dispostos irregular-

mente entre massas foliáticas. Em xenólitos de granulação fina, a aegerina e a biotita possuem disposição paralela e apresentam textura xistosa. Não observamos nenhum fragmento de gnaiss. A matriz é rica em cavidades preenchidas por calcita, agulhas de aegerina, prismas de natrolita e raramente neptunita e apofilita. Microscopicamente a matriz apresenta grande quantidade de nefelina, que forma fenocristais idiomorfos, com freqüente alteração parcial ou total para cancrinita ou natrolita, fenocristais de sanidina e pequena quantidade de cristais de aegirina, geralmente hipidiomorfos ou xenomorfos, rodeados por uma massa microcristalina de feldspato, feldspatóides e aegerina. Em algumas lâminas a matriz apresenta textura protoblástica, na qual os fenocristais de nefelina estão partidos e dispostos paralelamente ao alinhamento dos minerais da matriz microtinguaítica, sugerindo movimentação num estado plástico. A presença de grande número de cavidades preenchidas por minerais primários e secundários da rocha e a freqüente alteração da nefelina em cancrinita e natrolita, bem como a ocorrência de calcopirita fazem supor atividade hidrotermal. Ocorrem xenólitos em todo o dique anelar, se bem que menos numerosos. (fotos ns. 10 e 12)

O mergulho da textura fluidal é para o interior do maciço. Da serra de Poços para o interior do maciço afloram somente tinguaítos numa faixa de vários quilômetros e depois o foliaito do Aeroporto. Torna-se assim difícil compreender como e porque acham-se concentrados, numa estreita faixa, xenólitos com tão grande variação de tamanho e litologia. Ocorrem rochas desde superficiais até plutônicas, algumas de densidade elevada, como os piroxenitos (3,2), que não afloram na superfície. Devemos admitir um abatimento inicial no centro que possibilitou a formação e diferenciação das várias rochas encontradas como xenólitos. Em estágios posteriores de abatimento, na

ocasião da ascensão do magma formando o dique anelar, foram englobados e carregados fragmentos de diferentes rochas situadas em diferentes níveis.

6 - Formação de lujauro, chibinito e foiaito

Na metade norte do maciço ocorrem intrusões posteriores de foiaito, cortando e acompanhando o dique anelar. Igualmente posterior é a formação do lujauro e chibinito, em forma de crescente, com a maior espessura numa direção normal à xistosidade do gnaíse. O chibinito, no contacto NE, é separado do gnaíse por foiaito também posterior ao dique anelar. Às vezes o chibinito parece ser intrusivo no foiaito e em outros casos reconhece-se uma simples transição, desaparecendo as concentrações de endialita e mudando gradualmente a textura traquitóide para equigranular.

COMPARAÇÃO COM OUTROS JAZIMENTOS ALCALINOS

Dentre os grandes maciços alcalinos de Kola, Ilmaussak, Itatiaia, Pilansberg e Poços de Caldas, os três primeiros são constituídos principalmente por rochas do tipo plutônico, enquanto que nos dois últimos ocorrem em grande área rochas vulcânicas (Pilansberg) e hipabissais (Poços de Caldas). No quadro abaixo, observa-se que os jazimentos do tipo plutônico apresentam grande variação litológica, aflorando junto à periferia as rochas mais ácidas, como granito e lestitarito, em Kola (Ferguson, 1894), soda granito e nordmarquito, em Ilmaussak (Ussing, 1911), nordmarquito em Itatiaia, (Lamego, 1936) e mais para o centro estão representados tipos cada vez mais insaturados. Segundo Backlund

(1933, pg. 4), nos maciços alcalinos plutônicos parece ser regra que a variação da composição químico-mineralógica apresenta maior diversificação com o aumento do tamanho da intrusão.

Quadro comparativo das rochas plutônicas				
1	2	3	4	5
Lestivarito	Soda Granito	Nordmarkito	Sienito	Foiáito
Umptekito	Nordmarkito	Sienito	Foiáito	Chibinito
Chibinito	Augita-Sienito	Foiáito		Lujaurito
Chibinito traquitol- do	Foiáito			
Foiáitos	Manjaíto			
Urtito	Karhotchito			
Ijolito	Lujaurito			

1 - Península de Kola (Fersman, in Becklund, 1933)

2 - Ilmaussak, (Ussing, 1911)

3 - Itatiaia, (Lamogo, 1936)

4 - Pilansberg, (Stand, 1929)

5 - Pocos de Caldas

Como Pocos de Caldas e Pilansberg não podem ser considerados jazimentos plutônicos, seria talvez essa a causa da pequena variação litológica. O mecanismo da intrusão do maciço de Kola é muito complicado, principalmente na periferia, que representa as fases mais antigas da intrusão e na parte central do maciço ocorre um conjunto de "cone sheet" e diques anulares (Elisev et al, 1937). Ussing (1929, pg. 299) admite para Ilmaussak a ascensão do magma pelo abatimento de blocos

do teto sugerido pelos contactos verticais com as encaixantes e a existência, no augita-sienito, de grandes blocos de arenito, de até 200.000 metros cúbicos. Em nenhum dos três maciços, de Kola, Ilimaussak e Pilansberg é feita menção de perturbações tectônicas nas encaixantes como consequência da intrusão do magma alcalino, como ocorreu em Poços de Caldas. Os grandes complexos calco-alcalinos da África do Sul, contemporâneos ao vulcanismo de Poços de Caldas, como Erongo, Brandberg e Messum (Korn e Martin, 1953, 54) são caracterizados por atividade passiva do magma que preencheu vazios formados pelo abatimento de blocos do teto.

O escudo cristalino no sul do Brasil foi atravessado por numerosas intrusões alcalinas. Como pode ser visto na fig.

estas se estendem ao longo de duas direções principais. A primeira, no sentido NE, pode ser subdividida em duas paralelas: uma, acompanhando a linha da costa com as intrusões de Cananéia, São Sebastião e ilhas próximas, Tinguá, Gericinó, Mandanha e Cabo Frio e a outra mais para o interior: Lages, Jacupiranga, Serrote, Ipanema e Itatiaia. A segunda direção, quase normal à primeira, no sentido NW, consta das intrusões de São Sebastião, Poços de Caldas, Araxá, Salite e Serra Negra.

Guimarães (1947, pg. 39) já chamou a atenção para a ocorrência dos jazimentos alcalinos, paralelos à costa, no Estado do Rio de Janeiro. Freitas (1951, pg. 86) associa as intrusões alcalinas com os fenômenos tectônicos responsáveis pela formação da serra do Mar e da Mantiqueira. Em seu mapa tectônico do Brasil, Freitas (1951) considera de arqueamento do escudo cristalino no sul do Brasil as direções NW e NE. O arqueamento do escudo cristalino, produzindo tensões regionais em grande escala, seria o responsável pelo ciclo diastrófico que teria possibilitado no fim do Mesozóico a ascensão do magma básico e posteriormente a formação dos maciços alcalinos. A existência de duas linhas de tensão, no sul do Brasil, uma paralela à linha da costa e outra normal a primeira, que permitiram a subida do magma básico foi reconhecida por Leinz (1949, pg. 54).

No Sudoeste da África, as direções de falha do Mesozóico ou posteriores são paralelas à linha da costa e as grandes intrusões alcalino-graníticas, posteriores às manifestações básicas, alinham-se numa direção contínua de tensão, mais ou menos normal às direções de falha e em menor escala, paralelas à costa. (fig. n. 3).

No capítulo referente ao mecanismo da intrusão alcalina, no jazimento de Poços de Caldas, já foi mencionado o levantamento, provavelmente escalonado, de blocos do embasamento cristalino. Nos contactos com o tinguaito, o gnaíse está geralmente fraturado e são freqüentes zonas de milonitização. Também no tinguaito, perto do contacto é comum um aumento na freqüência das diaclases, principalmente no bordo SE.

Na fig. n. 5 estão representados alguns dos elementos estruturais observados no maciço de Poços de Caldas. As várias observações são representadas pelos polos dos planos projetados em diagrama de Wulff. Os dados foram colhidos nos seguintes afloramentos:

- 1 - Gnaíse - Afloramento próximo ao contacto com o tinguaito, na estrada de rodagem para São Sebastião da Gramma.
- 2 - Fenito - Serra da Lagôa
- 3 - Brecha vulcânica - Barragem do Bortolan, no rio das Antas.
- 4 - Tinguaito - Pedreira Bortolan
- 5 - Tinguaito - Pedreira da Prefeitura
- 6 - Tinguaito - Estrada de rodagem para Caldas, ao sul de Laranjeiras.
- 7 - Tinguaito - Corte na estrada de rodagem Poços de Caldas-Andradas.
- 8 - Lava fonolítica - idem

No gnaíse e no fenito (projeções 1 e 2) predominam as diaclases de tensão, perpendiculares à xistosidade. No tinguaito do dique anelar (projeções 4, 5 e 6) ocorrem, além das diaclases de tensão, as longitudinais. A projeção das diaclases na brecha (projeção 3) mostra dois máximos de freqüência, um normal à direção dos afloramentos da brecha e outro paralelo. Nas

diaclasses do tinguaito, na área centro sul, predominam também as longitudinais e as de tensão.

É provável que seja íntimas as relações entre as direções de diaclasses e a drenagem dos rios no planalto. Observando-se a redução do mosaico do levantamento aéreo (foto n.16) notam-se duas áreas mais ou menos distintas em sua feição morfológica. A maior, apresentando estágio de maturidade, ocupa a área N-W-S do maciço e mostra drenagem anelar, ao passo que a menor, na área E, com relevo entre juventude e maturidade, possui um sistema mixto de drenagem radial e anelar.

O rio principal, o das Antas, nasce perto do bordo SE e dirige-se para NW atravessando todo o complexo. Na área ocupada pelo tinguaito e foiaito o seu curso é em ângulos quase retos, ora para NE e ora para NW, direção essa também seguida pelos seus afluentes. A erosão remontante, no atual curso do rio das Antas, perto do contacto com o gnaíse, parece ser fenômeno de captura, pois o curso normal, ao cortar o dique anelar, seria o do rio do Peixe.

Após a formação do dique anelar ocorreram falhamentos em grande extensão. Os indícios de que estes falhamentos são posteriores às atividades magmáticas são principalmente morfológicos:

a - No bordo S, tangenciando o dique anelar, corre um grande vale no sentido E-W, desde a E da cidade de São João da Boa Vista até Santa Rita de Caldas, assemelhando-se a um "graben". É limitado ao sul pelo gnaíse falhado em blocos escalonados, com escarpas abruptas, diagonais à xistosidade, formando uma linha quase contínua. No topo da escarpa há uma superfície suave, que mergulha para o sul e os riachos que vão ter ao vale apresentam vales suspensos. O "graben" no seu lado norte é menos regular, formando reentrâncias, como a serra do Óleo,

onde são comuns vales suspensos e em parte a serra do Caracol. Os indícios de que estes falhamentos são posteriores ao dique anelar são revelados pelos riachos, que com grande gradiente, conseguiram cortar o dique anelar, onde a sua espessura é menor. Atualmente exercem grande trabalho erosivo, nos sedimentos pouco consolidados e lavas fonolíticas alteradas, desenvolvendo um sistema de drenagem dentritica e capturando as cabeceiras dos riachos do planalto.

b - Outra direção de falhamento é N-S, tangenciando o maciço no bordo W. É também ressaltada morfologicamente, cortando diagonalmente a xistosidade, como se observa na fotografia n. 16

c - Na fotografia n.16 nota-se, no quadrante NE do maciço, uma linha contínua de vales, que se ressaltam morfologicamente, servindo de divisor de duas áreas morfológicas distintas. Esta linha continua para fora do maciço, formando a serra da Picada, cuja linha de escarpa de falha é quase normal à xistosidade do gnaíse.

d - O escarpamento do gnaíse no sentido N-S, a E da cidade de Caldas, bem como o escarpamento no fenito, acompanhando o contacto SE com o tinguaito sugerem pertencer a falhamentos posteriores à intrusão alcalina.

MAPA GEOLÓGICO

O levantamento geológico por nós elaborado foi feito com auxílio de mapas topográficos nas escalas de 1:10.000 e 1:25.000. As observações de campo, que abrangem mais de 2.000 afloramentos foram transcritas em mapa na escala de 1:50.000. Como o mapa topográfico não abrange pequena área a W de Águas da Prata, o contacto da intrusão alcalina e as encaixantes dei

xou de ser representado.

Em vários lugares, tanto nas rochas alcalinas como no embasamento cristalino, observamos desvios na agulha da bússola de até 180° , quando em contacto com a rocha.

Gnaísse e fenitos

Os contactos da intrusão alcalina e as encaixantes, sempre que possível foram acompanhados e na ausência de afloramentos observamos e anotamos o aparecimento de grãos de quartzo no solo. Contactos nítidos, nos quais se observam as duas rochas lado a lado e no estado fresco, são raros. O gnaísse está muitas vezes brechado ou pelo diaclasamento intenso muito alterado.

Sedimentos

No mapa geológico, os vários tipos de sedimentos estão mapeados em conjunto. Estes compreendem camadas argilo-arenosas, com estratificação horizontal e arenitos silicificados com estratificação cruzada. Os sedimentos da base do pacote, formados pela alternância de leitos arenosos e siltosos, com intercalações de folhelhos, afloram apenas a E da cidade de Águas da Prata e ao norte de Andradas. A melhor exposição dos sedimentos da base é ao longo da estrada de rodagem que sobe beirando uma elevação de quase 200 metros, ligando Águas da Prata à fazenda Refúgio. As camadas estão perturbadas de sua posição inicial, mergulhando para o interior do maciço, com ângulo menor de 20° e atravessadas por pequenos diques alterados. Na cidade de Águas da Prata, situada na base da elevação, afloram principalmente os arenitos do topo do pacote, deslocados por falhamentos, provavelmente NS. Num afloramento ao norte da cidade, nas proximidades do parque municipal, sedimentos argilosos foram cortados por intrusão de tinguaito, no qual notamos agregados centimétricos de feldspato e nefelina, assemelhan-

do-se a pseudoleucita. Os demais afloramentos de sedimentos desta área são sempre de arenitos que acompanham o dique anelar estando cobertos por rochas piroclásticas e lavas. Às vezes, os arenitos apresentam indícios de retrabalhamento com adição de material provavelmente vulcânico, o que pode ser observado na fazenda Cachoeirinha e num afloramento nas proximidades da estrada de ferro entre Cascata e Poços de Caldas, onde delgadas camadas de arenito estão intercaladas com brechas alteradas. No rio das Antas, nas proximidades da cachoeira do Ozório, os arenitos limitam-se com o tinguaito do dique anelar e brechas. Formam uma faixa, em forma de cunha, que penetra no dique anelar e foram soerguidos com a ascensão do magma.

No afloramento ao sul de Laranjeiras o arenito silicificado está englobado no dique anelar e mergulha para o interior do maciço. Os sedimentos do sul do planalto foram intensamente perturbados, sobretudo nas proximidades do dique anelar.

Rochas vulcânicas

Como rochas vulcânicas estão mapeados tufos, brechas, aglomerados vulcânicos e lavas ankaratríticas. Na faixa N-NW-W do completo ocorrem as maiores variações litológicas, formando camadas alternadas, comumente decompostas, o que impede a delimitação correta das várias rochas.

Tufos e brechas - As rochas piroclásticas são constituídas principalmente por brechas e em menor escala por tufos. A estratificação em vários afloramentos de brecha sugere retrabalhamento e deposição posterior. Entre Águas da Prata e Cascata as brechas são de cor castanho escura, predominando fragmentos de gnaíse, diabásio e sedimentos e no cimento ocorre quartzo arredondado em grande quantidade. Tufos com intercalações de bombas vulcânicas aparecem na estrada de ferro, um pouco acima do cruzamento com a estrada para a fonte Platina. De Cascata, até as pro-

ximidades de Poços de Caldas, as brechas, quando frescas, são de cor verde e, em geral, com poucos fragmentos.

Na área central do maciço há dois afloramentos de compostos formados de rochas vulcânicas. O primeiro, é cortado pela rodovia Poços de Caldas-Andradas e consta de camadas alternadas, constituídas de material de granulação fina, com quartzo rolado e cimento argiloso. Trata-se provavelmente de um antigo lago que recebeu contribuição de tufo vulcânicos e sedimentos retrabalhados. O segundo, um pouco a SE do primeiro, situado numa posição topográfica mais elevada, consta de brechas alteradas estratificadas. Nos dois afloramentos observa-se que estas rochas foram perturbadas pela intrusão de tinguaito. A pequena área formada de brechas alteradas, nas proximidades do contacto SE com o fenito, foi também cortada por tinguaito, bem como os pequenos afloramentos ao norte de Pocinhos do Rio Verde.

Aglomerados vulcânicos e lavas ankaratríticas - No Vale do Quartel aparecem bons afloramentos de lavas ankaratríticas, geralmente aglomeráticas. Estão quase sempre associadas aos aglomerados vulcânicos, que são constituídos de fragmentos de lavas, cimentados pelos próprios minerais da lava fragmentados. Pequenos afloramentos de lavas ankaratríticas alteradas ocorrem entre Cascata e a cachoeira do Ozório e também ao sul de Laranjeiras, nas proximidades do contacto com o gnaiss.

Lavas fonolíticas

As lavas fonolíticas, em geral intemperizadas formam um relevo suave no sul do maciço. Bons afloramentos ocorrem somente em alguns cortes na estrada de rodagem. Os contactos com o tinguaito foram demarcados apenas no dique anelar, e nos morros do Mel e do Tamanduá, sendo os demais inferidos devido a ausência de afloramentos.

Tinguaítos e fonolitos

A arbitrariedade do critério na individualização dessas duas rochas,, que mostram frequentemente passagem gradual de um tipo a outro, já foi mencionada na p. 15 . Formam a maior parte do maciço e apresentam algumas variações como o analcita-fonolito e tinguaíto com pseudo-leucita. As áreas de brechas de tinguaíto, do bordo SE, são irregulares e os contactos com o tinguaíto são pouco nítidos.

Rochas plutônicas

Foram observadas as relações tinguaíto e foiaíto e sempre que possível os contactos foram seguidos.

O contacto do foiaíto com o tinguaíto, ao N do aeroporto, segue geralmente a direção NE, acompanhando de certo modo a crista das elevações. Neste contacto há bons afloramentos no campo e nas pedreiras em exploração, que permitem estabelecer as relações das duas rochas. O caráter intrusivo do foiaíto já foi descrito na p. 14 . Mais para o norte, na base da serra do Selado e ao longo do ribeirão do Charque, o foiaíto é de granulação fina, apresentando passagem gradual para o tinguaíto. Nas pedreiras do lado esquerdo da estrada para Campestre, aflora microfoiaíto, com zonas pegmatíticas e bolsões pegmatóides. O contacto sudeste desta larga faixa de foiaíto obedece também direção geral NE, mas é pouco nítido, dificultado pela passagem quase gradual para tinguaíto.

Na área do Serrote, o foiaíto apresenta-se como um corpo quase circular, tendo em seu interior afloramentos de tinguaíto. No contacto E o foiaíto, de granulação grosseira, corta o tinguaíto em vênulas e pequenos pegmatitos acompanhando a textura fluidal do tinguaíto e a N-NW o foiaíto corta o tinguaíto e tinguaíto com pseudoleucita. Este, perto das minas de zir-

cônio, pode apresentar granulação grosseira, assemelhando-se a foidaíta com pseudo-leucita. Nas proximidades do contacto, os pseudomorfos diminuem de tamanho, tornando-se reconhecíveis, às vezes, apenas no tinguaito decomposto. O contacto ao sul é comumente uma zona de microfoidaíta. Nas duas rochas são frequentes agregados de eudialita.

Nas demais ocorrências de foidaítos da área interna do maciço, os contactos com o tinguaito, graças à cobertura vegetal, em geral são inferidos.

Na parte N do complexo, o lujaurito apresenta passagem gradual para chibinito. Com o foidaíta os contactos do chibinito não puderam ser observados pela ausência de afloramentos, mas os contactos lujaurito e foidaíta estão razoavelmente demarcados.

RECURSOS MINERAIS

As principais riquezas minerais do planalto de Poços de Caldas são representadas pelas jazidas de bauxita e zircônio uranífero. Últimamente foram descobertos e estão sendo prospectados os depósitos de tório e terras raras do morro do Ferro.

Bauxita - Jazidas de bauxita foram descobertas nos últimos vinte anos (Teixeira, 1937) e atualmente está sendo incrementada a prospecção por várias companhias. As maiores jazidas estão situadas na metade norte do complexo e formadas principalmente a partir da decomposição dos tinguaítos.

Minerais de zircônio - Nos estudos petrográficos das rochas alcalinas do maciço não foi descrito o zircão como mineral primário. Nos foliaítos e tinguaítos são comuns como minerais zirconíferos primários principalmente a eudialita, lavenita, rosenbuchita, giannetita e pennaita, estes dois últimos primeiramente descritos por Guimarães (1948). Os minerais zirconíferos teriam sido destruídos por processos hidrotermais e posteriormente precipitados em fendas sob forma de óxidos e silicatos de zircônio (Franco, 1947).

No minério zirconífero foi constatada a presença de urânio com teor médio, em geral, de 0,5 por cento de óxido de urânio. Num levantamento aéreo, as maiores anomalias radioativas estão em geral associadas a depósitos de minérios de zircônio, com exceção do morro do Ferro, onde as anomalias resultam da ocorrência de minérios de tório (Oliveira, 1956). As maiores jazidas zirconíferas são as do Serrote, Taquarí e Pouso Alegre e acham-se nas proximidades do contacto foliaí-

to-tinguaíto. Compreendem depósitos primários (vieiros) e secundários (aluviais e eluviais). Os vieiros, cortando rochas profundamente intemperizadas, são formados por zircão, baddeleyta e caldasita, que é uma mistura formada pela associação de óxido e silicato de zircônio. Nos depósitos secundários predominam concreções mamelonares, constituídas de óxidos de zircônio e chamadas "favas".

A área NE do planalto formada principalmente por lujaurito e chibinito, rochas ricas em eudialita, apresenta também fortes anomalias radioativas. No entanto, fenômenos de atividade hidrotermal parecem estar ausentes, pela ausência de depósitos zirconíferos.

O presente trabalho apresenta um estudo da geologia do maciço alcalino de Poços de Caldas. Pela sua área, que é da ordem de 800 quilômetros quadrados, é considerado um dos maiores complexos formados exclusivamente por rochas nefelínicas. Possui forma elíptica, com 35 km no sentido NE-W e 30 km no sentido NW-SE e ainda um "stock" de folião, com cerca de 10 quilômetros quadrados. A W limita-se com a bacia sedimentar do Paraná e a E com os contrafortes da serra da Mantiqueira. O maciço está encaixado entre granito e gnaísse, que nos quadrantes SE e em menor escala no quadrante NW, foi afetado metassomáticamente pelo processo de fenitização, principalmente ao longo da direção de xistosidade. No quadrante NW o fenito é de cor cinza esverdeada e no quadrante SE sua cor é vermelha.

O maciço é constituído principalmente por rochas nefelínicas, tinguaítos e foliaítos, mas possui em seu interior rochas anteriores à intrusão alcalina. São sedimentos e rochas vulcânicas formadas por tufos, brechas, aglomerados e lavas ankara-tríticas. Os sedimentos acompanham o contacto com o gnaísse e afloram em maior extensão nas áreas W e S do complexo. A base do pacote sedimentar consta de camadas argilo-arenosas, com estratificação horizontal e o topo é formado por arenitos com estratificação cruzada. Achan-se perturbados e mergulham, no geral, para o interior do maciço. Sobre os sedimentos foram depositados brechas, tufos e lavas, que formam uma faixa contínua no bordo N-W. Nas brechas predominam fragmentos de sedimentos, gnaísse, diabásio e lavas. O cimento é rico em quartzo detrítico arredondado. Na diagênese, a ação de soluções hidrotermais é evidenciada pelo aparecimento de biotita

autígena e um feltro de microcristais de aegerina e apatita. No cimento, a calcita secundária é muito comum, chegando a substituir parcial ou totalmente o quartzo. As lavas ankaraíticas, quase sempre em espessos derrames, formam frequentemente aglomerados. Vestígios de rochas vulcânicas são encontrados em quase todo o bordo interno, indicando que a atividade vulcânica abrangeu grande área. Após essa atividade vulcânica formaram-se fonolitos, tinguaítos e foiaítos, com frequentes passagens de um tipo de rocha a outro. Os tinguaítos constituem a maior área do complexo e apresentam grande uniformidade. Em algumas áreas principalmente nas proximidades de Cascata afloram variedades com pseudoleucita e analcita. Os foiaítos são intrusivos no tinguaíto, mas a "mise-en-place" provavelmente deu-se contemporaneamente, sugerida pela passagem, não raro, gradual de uma rocha a outra.

Além dos vários tipos de foiaítos, equigranulares e traquitoides, afloram em pequena extensão lujaurito e chibinito. Para o mecanismo da intrusão é admitido o levantamento de blocos do embasamento cristalino que precedeu a atividade vulcânica. Durante ou após a atividade vulcânica deu-se o abatimento da parte central com formação de fendas radiais e circulares, que permitiram a subida do magma. A existência, mesmo no atual estágio de erosão, de pequenas áreas de material vulcânico perturbado pela intrusão, indica que o abatimento não foi total, tendo parte do teto servido de encaixante para a formação dos tinguaítos e diferenciação de foiaítos. Na periferia formou-se o grande dique anelar de tinguaíto, com mergulhos verticais ou quase verticais, de espessura variável, formando um anel quase completo. A dedução da forma geométrica da intrusão de tinguaítos da parte central do maciço é dificultada pela grande homogeneidade mineral e textural das rochas. O abatimento iniciou-se no centro, onde a intensidade

dêste fenômeno deu-se em maior escala, sendo anterior à formação do dique anelar. Evidenciando êste fato, observamos no interior do dique numerosos xenólitos de rochas do interior do maciço. Finalizando os eventos magnéticos na região, deu-se a intrusão dos foliões sob a forma de diques menores cortando o grande dique anelar.

A seqüência das intrusões parece ser do centro para a periferia, contrariando a observada na maioria das intrusões alcalinas.

O planalto é formado de duas áreas geomorfologicamente distintas: a maior, com drenagem anelar e a menor, com relevo entre juventude e maturidade, na qual predomina a drenagem radial. É provável que parte do sistema de drenagem obedea as direções principais de diaclases.

Após a atividade do magma alcalino ocorreram falhamentos em grande área, das quais o principal formou o "graben" E-W que tangencia o bordo sul do complexo.

Os recursos minerais são representados por jazidas de bauxita, e de minerais zirconíferos com zircão, caldasita, baddeleyta, nos quases há teores variáveis de urânio, e os depósitos de tório e terras raras. Os minerais zirconíferos e os de tório são formados a partir de fenômenos ligados a processos hidrotermais, que destruíram os minerais primários e possibilitaram a posterior precipitação em fendas.

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, E. M. - (1936): The dynamics of the formation of cone sheet, ring-dikes and caldron subsidences - Proc. Roy. Soc. Edinburg, v. 56, p. 128-157.

BACKLUND, H. G. - (1933): On the mode of ^{intrusion of} deep-seated alkaline bodies - Bull. Geol. Inst. Upsala, v. 24, p. 1-24.

BARBOSA, O - (1934): Nota sobre algumas rochas da região de Poços de Caldas - Acad. Bras. Cien., Ano 6, p. 211-219. Rio de Janeiro.

----- (1936): Notas preliminares sobre o planalto de Poços de Caldas e suas possibilidades econômicas. Dep. Nac. Prod. Min., Serv. Fom. Prod. Min., Avulso 8, 33 p.. Rio de Janeiro.

----- (1948): Sobre a idade das rochas alcalinas e a origem do planalto de Poços de Caldas - Min. Met., v. 13, n. 76, p. 235-237. Rio de Janeiro.

BILLINGS, M. P. - (1943): Ring-dikes and their origin - Trans. N. York Acad. Sc., ser. 2, v. 5, p. 131-144.

----- (1945): Mechanics of Igneous intrusion in New Hampshire - Amer. Jour. Sc., v. 243-A, Daly Volume, p. 40-68.

BJORNBERG, J.A.S. - (1956): Arenitos do bordo do planalto de Poços de Caldas - Anais Acad. Bras. Ciên., v. 28, n. 4, p. 465-471. Rio de Janeiro.

----- (1958): Rochas clásticas do planalto de Poços de Caldas - no prelo.

- BRANCO, J.J. R. - (1956): Notas sobre a geologia e petrografia do planalto de Poços de Caldas, MG. - Escola de Engenharia, Univ. Minas Gerais, Inst. Pesq. Radioativas, Publ. n. 5, 72 p.. Belo Horizonte.
- CHAPMAN, R.W. - (1935): Percy Ring-dike complex - Amer. Jour. Sc., v. 30, n. 230, p. 401-431.
- CHAPMAN, R.W. e CHAPMAN, C.A. - (1940): Cauldron subsidence at Ascutney Mountain, Vermont - Bull. Geol. Soc. Amer., v. 51, n. 2, p. 191-212.
- CLOUGH, C. T., MAUFE, H. B. e BAYLEY, E.B. - (1909): The cauldron-subsidence of Glen Coe, and the associated igneous phenomena - Quart. Jour. Geol. Soc. London, v. 65, p. 611-678.
- DERBY, O. A. - (1887): On nepheline rocks in Brasil, with special reference to the association of phonolite and foyaitite - Quart. Jour. Geol. Soc., v. 43, p. 457-473.
- ELISEEV, N. A., OGINSKY, J.S. e VOLODIN, E.N. - (1937): Geological and Petrographical description of the Khibine Tundras - Int. Geol. Congress, XVII Session, p. 51-85.
- FRANCO, R.R. - (1947): Minerais de zircônio na região de Poços de Caldas, Minas Gerais - Bol. Fac. Fil. Ciên. Letr., Univ. S.Paulo, n. 99, Mineralogia n. 7, p. 7-28. São Paulo.
- FREITAS, R.O. de - (1943): As estruturas fósseis do sistema Santa Catarina no planalto de Poços de Caldas - Ass. Geogr. Brasil, Ano 3, n. 3, p. 25-37. São Paulo.
- (1947): Geologia e Petrologia da Ilha de São Sebastião - Bol. Fac. Fil. Ciên. Letr., Univ. S. Paulo n. 35, Geologia n. 3, 244 p. São Paulo.

FREITAS, R.O. de - (1951): Ensaio sobre a tectônica moderna do Brasil - Bol. Fac. Fil. Ciên. Letr., Univ. S. Paulo, n. 130, Geologia n. 6, 120 p.. São Paulo.

----- (1953): Ensaio sobre o relevo tectônico do Brasil - Rev. Bras. Geog., Ano 13, n. 2, p. 171-222. Rio de Janeiro.

----- (1956): Sobre um akerito da Serra do Mirante - Bol. Soc. Bras. Geol. v. 5, n. 2, p. 77-90. São Paulo.

GUIMARÃES, D. - (1947): Origem das rochas alcalinas - Inst. Tec. Ind. Minas Gerais, Bol. n. 5, 103 p. Belo Horizonte.

----- (1948): The zirconium ore deposits of the Pocos de Caldas Plateau, Brazil, and zirconium geochemistry - Inst. Tec. Ind., n. 6, 79 p. Belo Horizonte.

GUIMARÃES, D., CAMPOS, M. e FIGUEIREDO, D.G. - (1953): Alguas rochas alcalinas de Pocos de Caldas relacionadas com as jazidas de caldasito uranífero. Escola de Engenharia da Univ. de Minas Gerais, Instituto de Pesquisas Radioativas, public. n. 2, p. 1-34. Belo Horizonte.

HUSSAK, E. - (1900): Über ein Leukokrates gemischtes Ganggestein der Serra de Caldas, Brasilien - M. Jb. f. Min. Geol. u. Paleo. B. I, p. 22-27.

JOHANNSEN, A. - (1939): A descriptive Petrography of the Igneous Rocks - V. 1-4, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois.

KINGSLEY, L. - (1931): Cauldron-subsidence of the Ossipee Mountains - Amer. Jour. Sc., 5th Ser. V. 22, n. 222, p. 139-168.

KORN, H. e MARTIN, H. - (1953): Der intrusionsmechanismus der grossen Karroo-Plutone in Südwestafrika - Geol. Rundschau, v. 41, Sonderband, p. 41-58.

KORN, H. e MARTIN, H. - (1954): The Messum Igneous complex in South West Africa - Trans. Proceed. Geol. Soc. South Africa, V. 57, p. 83-124. Johannesburg.

LANEIRO, A.R. - (1936): O maciço do Itatiaia e regiões circundantes - Dep. Nac. Prod. Min., Serv. Geol. Min., Bol. n. 88, 93 p.. Rio de Janeiro.

LEINZ, V. - (1940): Petrologia das jazidas de apatita de Iva-nema (Est. S. Paulo) - Dep. Nac. Prod. Min., Div. Fom. Prod. Min., Bol. n. 40, 52 p.. Rio de Janeiro.

----- (1949): Contribuição à geologia dos derrames basálticos do Sul do Brasil - Bol. Fac. Fil., Ciên. Letr., Univ. S. Paulo, Geologia n. 5, 61 p.. São Paulo.

LINDGREN, W. - (1933): Mineral Deposits - McGraw-Hill Book Company, Ind., 930 p. N.York.

MACHADO, J. - (1888): Beitrag zur Petrographie der Sudwestlichen Grenze zwischen Minas Gerais und São Paulo - Tschcr. Min. u. Petr. Mitt., Bd. 9, p. 329-360.

MODELL, D. - (1936): Ring-Dike complex of Belknap Mountains, N. Hampshire - Bull. Geol. Soc. Amer., V. 47, n. 12, p. 1885-1932.

OLIVEIRA, A.I. de - (1956): Ocorrências brasileiras de Urânio - Min. Met. V. 24, n. 142, p. 209-212. Rio de Janeiro.

RAMSAY, W. - (1894): Das Nephelin Gebiet auf der Halbinsel Kola I, - Fennia II.

RICHEY, J.E. e THOMAS, H.H. - (1932): The ring complex of Slieve Guillion - Quart. Jour. Geol. Soc. London, v. 88, p. 776-846.

WILSON, J. S. - (1929): The geology of Mianyang in the Southern Transvaal: A study of alkaline rocks and ring-fracturing - Trans. Geol. Soc. South Africa, v. 32, p. 97-156. Johannesburg.

WILSON, J. S. & JAMES, F. S. - (1954): The Alkali Conifer at Spitzkoppe, Soutwunland, Eastern Transvaal - Trans. Geol. Soc. South Africa, v. 53, p. 81-130. Johannesburg.

WILSON, J. S. - (1937): Alcalino no Estado de São Paulo de Caldas, São Paulo e Minas Gerais - Min. Pet., v. 1, n. 4, p. 159-160. Rio de Janeiro.

WILSON, J. S. - (1937): Alcalino no Estado de São Paulo de Caldas, Estado de Minas Gerais - Min. Pet., v. 1, n. 5, p. 215-218. Rio de Janeiro.

WILSON, J. S. - (1955): Preliminary report of the alkaline ore deposits of the Poços de Caldas, Transvaal, -inédito.

WILSON, J. S. - (1911): Geology of the Country around the Mianyang, Transvaal - Geol. Surv., v. 31.

VON KROG, P. - (1940): The Alkaline District of Alagoa Island - Transvaal Geol. Soc. Johannesburg, Trans. Geol., n. 36, 176 p.

COUTINHO, J. M. V. - (1958): Petrologia do maciço alcalino de Poços de Caldas - (em elaboração)

Fotografia n. 1

Brecha vulcânica com fragmentos angulosos de arenito (a) e diabásio (d). Águas da Prata.

Fotografia n. 2

Brecha vulcânica com fragmento angular de diabásio.
Águas da Prata

Fotografia n. 3

Brecha vulcânica. As zonas escuras são formadas por agregados de piroxênios aciculares. Barragem Bortolan.

Fotografia n. 4

Lava ankaratrítica aglomerática, rica em vesículas preenchidas por calcita. Fazenda Santa Maria.

Fotografia n. 5

Pseudoleucita tinguaite. Ao redor dos pseudomorfos nota-se uma zona mais escura devida a concentração de piroxênios. Serrote.

Fotografia n. 6

Analcita-tinguaite. Serrotinho.

Fotografia n. 7

Contacto tinguaíto com foiaíto. O foiaíto pegmatóide engloba fragmentos angulosos de tinguaíto. Aeroporto.

Fotografia n. 8

Foiaíto com xenólito de tinguaíto. Aeroporto.

Fotografia n. 9

Tinguaíto do dique anelar. São abundantes pequenos autólitos de foiaíto e pontos pretos formados por concentrações de hauína. Pedreira Bortolan.

Fotografia n. 10

Tinguaíto rico em xenólitos do dique anelar. Serra do Poços de Caldas.

Fotografia n. 11
Afloramento de brecha de tinguaíto. Águas de Prata.

Fotografia n. 12
Xenólito de piroxenito no tinguaíto do dique anelar. Serra de Poços de Caldas.

Fotografia n. 13
Lujaurito. Pedra Balão. Poços de Caldas.

Fotografia n. 14
Serra de tinguaito, ao norte de Andradas, formando o grande dique anelar.

Fotografia n. 15
Vista do Vale do Quartel. Em primeiro plano, à direita, a superfície plana formada pelas brechas de tinguaito. Nos fundos, à esquerda, a Serra do Mirante.

Fotografia n. 16
Redução do mosaico do levantamento aerofotogramétrico.

Fig. n. 1
Diagrama da formação de diques anulares e "cone-sheet"
segundo Anderson, 1936.

Fig. n. 2
Diagrama esquemático para a formação de diques anulares
verticais, segundo Billings, 1945.

Fig. n. 3

Fig. n. 4

Figura n. 5

Perfil nº 1

Perfil nº 2

Perfil nº 3

perfil n° 1

Perfil nº 5

Perfil nº 6

Perfil nº 3

MAPA GEOLÓGICO DO MACIÇO ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS BRASIL 1958

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA - F.F.C.L. Universidade de São Paulo

0 500 1000 2000 3000 4000 5000m

Escala 1:50.000

Curvas de nível: 50 em 50 metros

CONVENÇÕES

Lujaurito e Chibinito
Foiatito
Tinguaito e Fonolito
Brecha de Tinguaito
Lava Fonolítica

Agglomerados Vulcânicos, Brechas, Tufos e Ankaratritos (Indistintos)
Sedimentos Clásticos
Fenito
Embasamento Cristalino

Posição das Camadas
Textura Flúida (Linhação Inclinação)
Textura Flúida (Linhação Vertical)
Xistosidade
Contactos Verificados
Contactos Inferidos
Diques

JAZIDAS MINERAIS

Zr Zircônio Al Bauxita
Th Tório

Reinhold Ellert
Alfredo J.S. Björnerberg
José Moacyr V. Coutinho