UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA
DE SCHROEDER-BERNSTEIN PARA
ESPAÇOS DE BANACH

Roberto Nicolosi

DISSERTAÇÃO APRESENTADA
AO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PARA
OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE
EM
MATEMÁTICA

Área de Concentração: **Análise Matemática**

Orientador: **Prof. Dr. Elói Medina Galego**

– São Paulo, março de 2002 –

UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA
DE SCHROEDER-BERNSTEIN PARA
ESPAÇOS DE BANACH

Este exemplar corresponde à redação final da dissertação apresentada por Roberto Nicolosi, devidamente corrigida e aprovada pela Comissão Julgadora

São Paulo, 09 maio de 2002.

Comissão Julgadora

- Prof. Dr. Elói Medina Galego (Orientador) - IME-USP
- Prof. Dr. Raimundo Luiz de Alencar - ITA
- Prof. Dr. Jorge Túlio Mujica Ascui - IMECC-UNICAMP

Agradecimentos

A meu orientador, **Professor Doutor Elói Medina Galego**, pela orientação e assistência na elaboração deste trabalho. Meu profundo agradecimento.

À minha esposa, **Teresinha Cristina**, pelo incentivo e incondicional apoio.

Ao **Sr. Walter Vicente Fernandes**, pela dedicação e pelo excelente trabalho de digitação.

A todos os professores, colegas de curso e amigos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar a primeira solução para o problema de Schroeder-Bernstein para espaços de Banach construída por W. T. Gowers.

Dois espaços não isomorfos são construídos, tais que cada um é um subespaço complementado do outro. Além disso, os espaços são da forma Z e Z^2 , onde Z é isomorfo a Z^3 .

Abstract

The purpose of this work is to present the first solution to the Schroeder-Bernstein problem for Banach spaces constructed by Gowers, W. T.

Two non-isomorphic Banach spaces are constructed, such that either is a complemented subspace of the other. Moreover, the spaces are of the form Z and Z^2 , where Z is isomorphic to Z^3 .

A meu filho Victor

Sumário

Notações	1
Introdução	4
0 Preliminares	6
1 O espaço W	16
2 Uma solução para o problema de Schroeder-Bernstein para espaços de Banach	45
Problemas em aberto	84
Referências bibliográficas	85

Notações

Seja X um espaço de Banach sobre $\mathbb{R}$; se Y é um subespaço fechado de X , escrevemos $Y < X$.

Sejam X e Y espaços de Banach, dizemos que X é isomorfo a Y e escrevemos $X \sim Y$, se existe uma aplicação linear limitada, bijetora, $T : X \rightarrow Y$, com inversa limitada.

Sejam X e Y espaços de Banach, dizemos que X contém uma cópia isomorfa de Y e escrevemos $Y \hookrightarrow X$, se existe $Z, Z < X$ com $Z \sim Y$.

Sejam X e Y espaços de Banach, dizemos que X contém uma cópia isomorfa de Y complementada em X e escrevemos $Y \overset{c}{\hookrightarrow} X$, se existem $Z < X, Z \sim Y$ e $W < X$, tais que $X \sim W \oplus Z$, isto é, X é a soma direta de W e Z .

Sejam X e Y espaços de Banach, escrevemos $X \underset{\otimes}{\oplus} Y$ para designar a soma direta externa de X e Y , isto é,

$$X \underset{\otimes}{\oplus} Y = \{(x, y) : x \in X \text{ e } y \in Y\}, \text{ com } \|(x, y)\| = \max\{\|x\|, \|y\|\}.$$

Seja X um espaço de Banach, então X^n denota a soma de n cópias de X , $n \in \mathbb{N}^*$.

Seja X um espaço de Banach, $B(X)$ indica o espaço de Banach dos operadores lineares limitados, $T : X \rightarrow X$, com a norma $\|T\| = \sup\{\|T(x)\| : \|x\| \leq 1\}$.

Seja X um espaço de Banach, indicamos por X^* o espaço de Banach de todos os funcionais lineares limitados de X (dual topológico de X). Escrevemos x^* , para indicar um funcional linear limitado de X .

Seja X um espaço de Banach, por $\dim X$ denotamos a dimensão linear do espaço X , isto é, $\dim X$ pode ser finita ou infinita.

Sejam X um espaço normado e $V \subset X$, escrevemos $[V]$ para representar o fecho do subespaço linear gerado pelo conjunto V .

Sejam X um espaço de Banach e $T \in B(X)$, por $\ker T$ denotamos o núcleo de T e por $\operatorname{Im} T$ denotamos a imagem de T .

Denotamos por c_{00} , o espaço vetorial das seqüências de escalares com apenas um número finito de coordenadas não nulas, e a base vetorial unitária desse espaço por $(e_n)_{n=1}^{\infty}$.

Um intervalo E de inteiros é um subconjunto de $\mathbb{N}$ da forma $\{a, a+1, \dots, b\}$ para algum $a, b \in \mathbb{N}$.

Sejam E e F intervalos, escrevemos $E < F$, se $\max E < \min F$.

Sejam $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i \in c_{00}$ e E um intervalo de $\mathbb{N}$. Denotamos por $E(x)$ o vetor $\sum_{i \in E} a_i e_i$.

Por $\operatorname{supp}(x)$ denotamos o suporte de um vetor $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i \in c_{00}$, isto é, $\operatorname{supp}(x) = \{i \in \mathbb{N} : a_i \neq 0\}$ e por $\operatorname{ran}(x)$ denotamos o menor intervalo E , contendo o seu suporte.

Para $x, y \in c_{00}$, escrevemos $x < y$ quando $\max \operatorname{supp}(x) < \min \operatorname{supp}(y)$ ou equivalente, $\operatorname{ran}(x) < \operatorname{ran}(y)$. Se $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, dizemos que $x_1, x_2, \dots, x_n$

são sucessivos.

Denotamos por c_0 , o espaço de Banach das seqüências de escalares, cujo limite é igual a zero, ou seja,

$$c_0 = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) : a_n \in \mathbb{R} \text{ e } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 \right\}$$

com a norma $\|(a_n)_{n=1}^\infty\|_\infty = \max\{|a_n| : n \in \mathbb{N}\}$.

Por ℓ_p denotamos o espaço de Banach das seqüências p -somáveis, $1 \leq p < \infty$, isto é,

$$\ell_p = \left\{ (a_n)_{n=1}^\infty : a_n \in \mathbb{R} \text{ e } \sum_{n=1}^\infty |a_n|^p < \infty \right\}$$

com a norma $\|(a_n)_{n=1}^\infty\|_p = \left(\sum_{n=1}^\infty |a_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$.

Por ℓ_∞ denotamos o espaço de Banach das seqüências limitadas, isto é,

$$\ell_\infty = \left\{ (a_n)_{n=1}^\infty : a_n \in \mathbb{R} \text{ e } \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n| < \infty \right\}$$

com a norma $\|(a_n)_{n=1}^\infty\| = \sup\{|a_n| : n \in \mathbb{N}\}$.

Se $(X_n)_{n=1}^\infty$ for uma seqüência de espaços de Banach, $\left(\sum_{n=1}^\infty X_n \right)_0$ é o espaço de Banach das seqüências $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, $x_n \in X_n$, tais que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n\| = 0$ com a norma $\|x\| = \max\{\|x_n\| : n \in \mathbb{N}\}$ e $\left(\sum_{n=1}^\infty X_n \right)_{\ell_p}$, $1 \leq p < \infty$, é o espaço de Banach das seqüências $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, $x_n \in X_n$, tais que $\sum_{n=1}^\infty \|x_n\|^p < \infty$, com a norma $\|x\| = \left(\sum_{n=1}^\infty \|x_n\|^p \right)^{\frac{1}{p}}$.

Usamos $a \vee b$ para indicar $\max\{a, b\}$, com $a, b \in \mathbb{R}$.

Para indicar o término de uma demonstração, usamos o símbolo ■

Introdução

O principal objetivo desta dissertação é apresentar detalhadamente a primeira solução para o problema de Schroeder-Bernstein para espaços de Banach, que consiste na seguinte questão: “Sejam X e Y espaços de Banach. Se $X \xhookrightarrow{c} Y$ e $Y \xhookrightarrow{c} X$, então $X \sim Y$?” A solução que apresentaremos (contra-exemplo) foi construída por W. T. Gowers em 1996.

O problema de Schroeder-Bernstein surge naturalmente, veja [Ca], a partir dos seguintes métodos de decomposição em espaços de Banach:

(M1) Sejam X e Y espaços de Banach. Se $X \xhookrightarrow{c} Y$, $Y \xhookrightarrow{c} X$, $X^2 \sim X$ e $Y^2 \sim Y$, então $X \sim Y$.

(M2) Sejam X e Y espaços de Banach. Se $X \xhookrightarrow{c} Y$, $Y \xhookrightarrow{c} X$, $\left(\sum_{n=1}^{\infty} X_n\right)_0 \sim X$ ou $\left(\sum_{n=1}^{\infty} X_n\right)_{\ell_p} \sim X$, então $X \sim Y$.

Esses métodos foram apresentados por A. Pelczynski na década de 60, e têm até hoje um papel muito importante na teoria isomorfa de espaços de Banach.

O contra-exemplo para o problema de Schroeder-Bernstein, proposto por W. T. Gowers, é formado por dois espaços de Banach da forma: $X \oplus \mathbf{W}$ e $\mathbf{W}$. O espaço X é a versão real do primeiro espaço de Banach hereditariamente indecomponível,

construído por W. T. Gowers e B. Maurey em 1993, veja [G-M1] e [C].

O espaço $\mathbf{W}$ é da forma $\mathbf{W} = \sum_{i=1}^{\infty} \oplus X_i$, onde cada X_i é uma cópia isométrica de X e a soma direta infinita é uma decomposição de Schauder de $\mathbf{W}$.

Escrevendo $Z = X \oplus \mathbf{W}$, mostraremos que $Z \xhookrightarrow{c} Z^2$, $Z^2 \xhookrightarrow{c} Z$ e também $Z^3 \sim Z$ (Lema 1.22), mas pelo Teorema 2.22, obteremos $Z \not\sim Z^2$, logo Z e Z^2 formarão o contra-exemplo para o problema de Schroeder-Bernstein. Além disso, obteremos o primeiro espaço de Banach Z , com $Z \not\sim Z^2$ mas $Z \sim Z^3$.

Finalmente, observamos que outras soluções para o problema de Schroeder-Bernstein foram apresentadas por W. T. Gowers e B. Maurey em [G-M2].

Capítulo 0

Preliminares

Neste capítulo apresentaremos definições e resultados sobre a teoria dos espaços de Banach e também sobre o espaço X , construído por W. T. Gowers e B. Maurey em [G-M1]. Estes resultados e definições serão utilizados nos capítulos seguintes.

Definição 0.1 Uma seqüência $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ em um espaço de Banach E é uma base de Schauder de E se, e somente se, para cada $x \in E$, existe uma única seqüência de escalares $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ tal que $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$.

Pela proposição 1.a.2 [L-T, pág. 1], as projeções $P_n : E \rightarrow E$ definidas por $P_n \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ são limitadas e $\sup\{\|P_n\| : n \in \mathbb{N}\} < \infty$. O número $\sup\{\|P_n\| : n \in \mathbb{N}\}$ é chamado de constante básica de $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ e quando esse número for igual a 1, a base é chamada monótona.

Definição 0.2 Uma seqüência $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ que é base de Schauder do subespaço fechado gerado por ela, isto é, $[(x_n)_{n=1}^{\infty}]$, é chamada de seqüência básica.

Teorema 0.3 (Ga, pág. 47) *Seja $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma seqüência de elementos não nulos no espaço de Banach E . Então $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma seqüência básica se, e somente se, existe um número real positivo k , tal que para qualquer seqüência de escalares $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ e inteiros $m < n$, tem-se $\left\| \sum_{i=1}^m a_i x_i \right\| \leq k \left\| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right\|$.*

Definição 0.4 Sejam E um espaço de Banach, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma seqüência básica em E , $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ uma seqüência estritamente crescente de inteiros positivos e $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ uma seqüência de números reais. Uma seqüência $(u_j)_{j=1}^{\infty}$ dada por $u_j = \sum_{n=p_j+1}^{p_{j+1}} a_n x_n$, com $u_j \neq 0, \forall j \in \mathbb{N}$, é chamada de base de bloco de $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

Observação 0.5 Se $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma seqüência básica de E , então pelo Teorema 0.3 toda base de bloco $(u_j)_{j=1}^{\infty}$ de $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ é também uma seqüência básica de E . O subespaço fechado de E , gerado por $(u_j)_{j=1}^{\infty}$, $[(u_j)_{j=1}^{\infty}]$, é chamado de subespaço de bloco de E .

Definição 0.6 Sejam E um espaço de Banach e $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma seqüência básica em E . Para todo inteiro positivo j , o funcional linear limitado f_j^* definido por $f_j^* \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i \right) = a_j$ é chamado de funcional biortogonal ou funcional coeficiente da seqüência básica $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

Definição 0.7 Duas bases de Schauder $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ e $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ de espaços de Banach E e F respectivamente, são ditas equivalentes se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ converge se, e somente se, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x_n$ também converge. Escrevemos $(x_n)_{n=1}^{\infty} \sim (y_n)_{n=1}^{\infty}$.

Proposição 0.8 (Ga, pág. 50) *Sejam E e F espaços de Banach. Uma base de Schauder $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ de E é equivalente a uma base de Schauder $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ de F se, e somente se, existe um isomorfismo $T : E \rightarrow F$, tal que $T(x_n) = y_n, \forall n \in \mathbb{N}$.*

Proposição 0.9 (L-T, pág. 53) *Seja E um dos espaços de Banach, c_0 ou $\ell_p, 1 \leq p < \infty$, e $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ uma base de bloco de $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ normalizada em E . Então $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ é equivalente a $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ e $[(z_n)_{n=1}^{\infty}]$ é isométrico a E .*

Proposição 0.10 (L-T, pág. 7) *Seja $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma base de Schauder de um espaço de Banach E e $y_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^k x_n, k = 1, 2, \dots$, uma seqüência de vetores tais que:*

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sup \|y_k\| > 0 \quad e \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} a_n^k = 0.$$

Então, existe uma subseqüência $(y_{k_j})_{j=1}^{\infty}$ de $(y_k)_{k=1}^{\infty}$, que é equivalente a uma base de bloco de $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

Observação 0.11 (Ga, pág. 52) Seja F um subespaço de dimensão infinita de um espaço de Banach E e $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma base de Schauder de E , então para todo inteiro positivo p existe $y \in F$ tal que $y = \sum_{n=p+1}^{\infty} a_n x_n$, com $\|y\| = 1$.

Proposição 0.12 (Ho, pág. 189) Seja F um espaço de Banach reflexivo, então todo subespaço vetorial fechado F de E é reflexivo.

Proposição 0.13 (Ho, pág. 183) Sejam E um espaço normado, F um subespaço vetorial fechado de E , F^0 o conjunto de todos os funcionais lineares $x^* \in E^*$, tais que $x^*(x) = 0$ para todo vetor $x \in F$ e $x_1 \in E$ um vetor com $x_1 \notin F$. Então existe $x^* \in F^0$, tal que $\|x^*\| = 1$, $x^*(x_1) = \delta = d(x_1, F) = \inf\{\|x_1 - x\| : x \in F\}$.

Corolário 0.14 (Ho, pág. 182) Sejam E um espaço normado, E_0 um subespaço linear de F e $f_0 : E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear limitado. Então existe um funcional linear limitado $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = f_0(x)$ para todo $x \in E_0$ com $\|f\| = \|f_0\|$.

Definição 0.15 Sejam E um espaço de Banach e $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma base de Schauder de E .

(a) $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ é contrátil se para todo $x^* \in E^*$ sendo $x^*|_{[(x_i)_{i=n}^{\infty}]} : [(x_i)_{i=n}^{\infty}] \rightarrow \mathbb{R}$
 $\forall n \in \mathbb{N}$, a restrição de x^* ao fecho do subespaço gerado por $(x_i)_{i=n}^{\infty}$, tem-se
 $\|x^*|_{[(x_i)_{i=n}^{\infty}]}\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

(b) $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ é limitadamente completa, se para qualquer seqüência de escalares $(a_i)_{i=1}^{\infty}$ com $\sup \left\{ \left\| \sum_{i=1}^n a_i x_i \right\| : n \in \mathbb{N} \right\} < \infty$, a série $\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ é convergente.

Proposição 0.16 (L-T, pág. 8) Sejam $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ uma base de Schauder de um espaço de Banach E e $(f_j^*)_{j=1}^{\infty}$ a seqüência de funcionais biortogonais associada à base

$(x_n)_{n=1}^\infty$. A seqüência $(f_j^*)_{j=1}^\infty$ é base de Schauder de E^* se, e somente se, a base $(x_n)_{n=1}^\infty$ é contrátil.

Teorema 0.17 (L-T, pág. 9) *Sejam E um espaço de Banach e $(x_n)_{n=1}^\infty$ uma base de Schauder de E . O espaço E é reflexivo se, e somente se, $(x_n)_{n=1}^\infty$ é contrátil e limitadamente completa.*

Definição 0.18 Sejam E um espaço normado e $(x_n)_{n=1}^\infty$ uma seqüência de E . Dizemos que $(x_n)_{n=1}^\infty$ converge fracamente para $x \in E$, se $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^*(x_n) = x^*(x)$, $\forall x^* \in E^*$. Escrevemos então, $x_n \xrightarrow{w} x$.

Definição 0.19 Uma seqüência infinita $(G_n)_{n=1}^\infty$, $G_n \neq \{0\}$, de subespaços (não necessariamente fechados) de um espaço de Banach E , é chamada de decomposição (ou uma base de subespaços) de E , se $\forall x \in E$ existe uma única seqüência $(y_n)_{n=1}^\infty$ com $y_n \in G_n$, tal que $x = \sum_{n=1}^\infty y_n$.

Definição 0.20 Seja $(G_n)_{n=1}^\infty$ uma decomposição do espaço de Banach E . A seqüência das projeções $(P_n)_{n=1}^\infty$ em E , definidas por $P_n(x) = y_n$, $x = \sum_{i=1}^\infty y_i \in E$, onde $y_n \in G_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, é chamada de seqüência de projeções coordenada associada à decomposição $(G_n)_{n=1}^\infty$.

Definição 0.21 Uma decomposição $(G_n)_{n=1}^\infty$ de um espaço de Banach E é uma decomposição de Schauder (ou uma base de Schauder de subespaços) de E , se toda projeção coordenada P_n em E é limitada.

Teorema 0.22 (S, pág. 489) *Uma decomposição $(G_n)_{n=1}^\infty$ de um espaço de Banach E é uma decomposição de Schauder se, e somente se, G_n é fechado, $\forall n \in \mathbb{N}$.*

Teorema 0.23 (S, pág. 502) *Sejam E um espaço de Banach e $(G_n)_{n=1}^\infty$ uma seqüência de subespaços fechados de E , com $G_n \neq \{0\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ e $\left[\bigcup_{n=1}^\infty G_n \right] = E$. Então as seguintes afirmações são equivalentes:*

(a) $(G_n)_{n=1}^\infty$ é uma decomposição de Schauder de E ;

(b) existe uma constante C , com $1 \leq C < \infty$, tal que $\left\| \sum_{i=1}^n y_i \right\| \leq C \left\| \sum_{i=1}^{n+m} y_i \right\|$,
 $\forall m, n \in \mathbb{N}$ e $\forall y_i \in G_i$ ($i = 1, \dots, n+m$).

Definição 0.24 Seja X um espaço de Banach. Um operador $T : X \rightarrow X$ é estritamente singular, se a restrição de T a qualquer subespaço fechado de X de dimensão infinita não é um isomorfismo.

Proposição 0.25 (L-T, pág. 76) (a) A soma de dois operadores estritamente singulares é um operador estritamente singular.

(b) A composição de um operador estritamente singular e um operador limitado é um operador estritamente singular.

Definição 0.26 Sejam X e Y espaços de Banach, $T : X \rightarrow Y$ um operador linear limitado com $T(X)$ fechado, $\alpha(T) = \dim \ker T$ e $\beta(T) = \dim Y/T(X)$ (espaço quociente de Y por $T(X)$). Se $\alpha(T) < \infty$ ou $\beta(T) < \infty$, definimos o índice de T por $i(T) = \alpha(T) - \beta(T)$.

Definição 0.27 Sejam X e Y espaços de Banach e $T : X \rightarrow Y$ um operador linear limitado. Se $\alpha(T)$ e $\beta(T)$ são ambos finitos (logo $i(T)$ é definido e é finito), então T é chamado de operador de Fredholm.

Proposição 0.28 (L-T, pág. 77) Sejam X e Y espaços de Banach, $T_1 : X \rightarrow Y$ e $T_2 : Y \rightarrow Z$ operadores de Fredholm. Então $T_2 T_1$ é um operador de Fredholm e $i(T_2 T_1) = i(T_2) + i(T_1)$.

Proposição 0.29 (L-T, pág. 79) Sejam X e Y espaços de Banach, $T : X \rightarrow Y$ um operador com imagem fechada, $S : X \rightarrow Y$ um operador estritamente singular. Então $\alpha(T + S) < \infty$, $T + S$ tem imagem fechada e $i(T + S) = i(T)$.

Definição 0.30 Uma álgebra linear sobre o corpo $\mathbb{R}$ é um espaço vetorial V sobre $\mathbb{R}$, com uma operação adicional dita multiplicação de vetores, que associa a cada par de vetores x e $y \in V$, o vetor $xy \in V$ e que satisfaz as seguintes propriedades:

- (a) $x(yz) = (xy)z, \forall x, y, z \in V$
- (b) $x(y + z) = xy + xz$ e $(x + y)z = xz + yz, \forall x, y, z \in V$
- (c) $\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x, y \in V.$

Sejam V e V' duas álgebras lineares. Uma transformação linear $\Phi : V \rightarrow V'$ diz-se um homomorfismo de álgebra, se satisfaz a seguinte condição: $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$, $\forall x, y \in V$.

Apresentaremos agora algumas definições e resultados que foram utilizados na construção do espaço X de Gowers e Maurey e no estudo de suas propriedades. A teoria apresentada pode ser encontrada em [G-M1] e [C].

Definição 0.31 Denotamos por $\mathcal{F}$ o conjunto das funções $f : [1, +\infty) \rightarrow [1, +\infty)$, satisfazendo as seguintes propriedades:

- (1) $f(1) = 1$ e $f(x) < x, \forall x > 1$;
- (2) f é estritamente crescente e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-q} f(x) = 0, \forall q > 0$;
- (4) A função $\frac{x}{f(x)}$ é côncava;
- (5) $f(xy) \leq f(x)f(y), \forall x, y \geq 1$.

Pelas observações 2.1 e 2.2 [C, pág. 39 a 43] as funções $f(x) = \log_2(x + 1)$ e $\sqrt{f(x)}$ pertencem a $\mathcal{F}$.

Definição 0.32 Seja $\mathcal{X}$ a classe dos espaços normados da forma $X = (c_{00}, \|\cdot\|)$, tal que para cada espaço X , $(e_i)_{i=1}^\infty$ é uma base normalizada e monótona de X . Sejam $f \in \mathcal{F}$ e $X \in \mathcal{X}$, se para todo vetor $z \in X$ ocorrer a desigualdade:

$$\|z\| \geq \sup \left\{ f(N)^{-1} \sum_{i=1}^N \|E_i(z)\| : N \in \mathbb{N}, E_1 < \cdots < E_N \right\},$$

onde $E_1, \dots, E_N$ são intervalos, dizemos que X satisfaz uma f -estimativa inferior.

Observação 0.33 Se X satisfaz uma f -estimativa inferior, então para todo vetor $z \in X$ e todo intervalo $E \subset \mathbb{N}$, teremos $\|E(z)\| \leq \|z\|$.

Definição 0.34 Sejam $X \in \mathcal{X}$ e um vetor $z \in X$, dizemos que z é um ℓ_{1+}^n -average com constante C , se $\|z\| = 1$ e $z = \sum_{i=1}^n z_i$ para alguma seqüência $z_1 < \cdots < z_n$ de vetores não nulos de X , tais que $\|z_i\| \leq Cn^{-1}$, $1 \leq i \leq n$.

Lema 0.35 (G-M1, pág. 857) *Sejam $f \in \mathcal{F}$ e $X \in \mathcal{X}$ satisfazendo uma f -estimativa inferior. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$ e $C > 1$, qualquer subespaço de bloco Y de X contém um ℓ_{1+}^n -average com constante C .*

Definição 0.36 Sejam $f \in \mathcal{F}$ e $M_f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $M_f(x) = f^{-1}(36x^2)$. Dizemos que uma seqüência $z_1 < z_2 < \cdots < z_N$ é uma seqüência rapidamente crescente de ℓ_{1+} -averages, ou RIS, para f de comprimento N com constante $1 + \varepsilon$, se z_k é um $\ell_{1+}^{n_k}$ -average com constante $1 + \varepsilon$ para cada k , $n_1 \geq 2(1 + \varepsilon)M_f(N/\varepsilon')/\varepsilon'f'(1)$ e $\frac{\varepsilon'}{2}f(n_k)^{1/2} \geq |\text{ran}(z_{k-1})|$ para cada $k = 2, \dots, N$, onde $f'(1)$ é a derivada à direita de f em 1 e ε' é a notação usual para $\min\{\varepsilon, 1\}$.

Observação 0.37 Um ponto importante na definição de uma RIS é que os n_k 's aumentam rapidamente; a velocidade dependerá do tamanho da ran dos z_j 's anteriores. Algumas vezes será conveniente chamar um vetor de um vetor-RIS, se ele for um múltiplo não nulo da soma de uma RIS.

Definição 0.38 Seja $g \in \mathcal{F}$. Um funcional $y^* \in X^*$ é chamado de uma (M, g) -forma se $\|y^*\| \leq 1$ e $y^* = \sum_{j=1}^M y_j^*$, para alguma seqüência $y_1^* < \dots < y_M^*$ de funcionais sucessivos, tais que $\|y_j^*\| \leq g(M)^{-1}$, para cada j , $1 \leq j \leq M$.

Definição 0.39 Seja $J \subset \mathbb{N}$ o conjunto denotado por $\{j_1, j_2, \dots\}$, onde $j_1 = 10^{10^{10^{400}}}$, $j_2 = 10^{10^{10^4(j_1)^2}}$, $\dots$, $j_{n+1} = 10^{10^{10^4(j_n)^2}}$.

Lema 0.40 (C, pág. 83) *Para os elementos do conjunto J , temos*

$$(j_{2k})^{\frac{1}{40}} \geq \frac{40M_f(10k)}{f'(1)}, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

onde $f(x) = \log_2(x+1)$.

Definição 0.41 Sejam K e L subconjuntos de J , $K = \{j_1, j_3, j_5, \dots\}$ e $L = \{j_2, j_4, j_6, \dots\}$, Q o subconjunto de c_{00} de todas as seqüências cujas coordenadas são números racionais de módulo menor ou igual a um e σ uma função injetora definida no conjunto das seqüências finitas de elementos sucessivos de Q com imagem no conjunto L , tal que se $Z_1, \dots, Z_s$ é uma qualquer dessas seqüências sucessivas, $S = \sigma(Z_1, \dots, Z_s)$ e $Z = \sum_{i=1}^s Z_i$, então $\frac{1}{20}f(S^{\frac{1}{40}})^{\frac{1}{2}} \geq |\text{ran}(Z)|$.

Definição 0.42 Seja $X = (c_{00}, \|\cdot\|)$ um espaço normado sobre as seqüências de suporte finito. Para todo $m \in \mathbb{N}$, definimos $A_m^*(X)$ como sendo o conjunto dos funcionais lineares da forma $f(m)^{-1} \sum_{i=1}^m f_i$ tais que

$$(1) \quad f_1 < f_2 < \dots < f_m$$

$$(2) \quad \|f_i\| \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Definição 0.43 Seja $X = (c_{00}, \|\cdot\|)$. Se $k \in \mathbb{N}$, seja Γ_k^X o conjunto das seqüências $g_1 < g_2 < \dots < g_k$ tais que $g_i \in Q$, para cada i , $g_1 \in A_{j_{2k}}^*(X)$ e $g_{i+1} \in A_{\sigma(g_1, \dots, g_i)}^*(X)$ para qualquer i , $1 \leq i \leq k-1$. Estas seqüências são chamadas de seqüências especiais.

Definição 0.44 Seja $X = (c_{00}, \|\cdot\|)$, para todo $k \in \mathbb{N}$, definimos $B_k^*(X)$ como o conjunto dos funcionais lineares da forma $f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{j=1}^k g_j$ tal que $(g_1, \dots, g_k) \in \Gamma_k^X$. Estes funcionais são chamados de funcionais especiais.

Definição 0.45 (C, págs. 85 e 86) Seja $X_0 = (c_{00}, \|\cdot\|_0)$, onde $\|z\|_0 = \|z\|_\infty$ e para $N \geq 0$ definimos:

$$\begin{aligned} \|z\|_{X_{N+1}} = & \|z\|_{X_N} \vee \sup \left\{ f(n)^{-1} \sum_{i=1}^n \|E_i(z)\|_{X_N} : n \geq 2, E_1 < \dots < E_n \right\} \\ & \vee \sup \{ |\bar{g}(E(z))| : k \in K, \bar{g} \in B_k^*(X_N), E \subset \mathbb{N} \}, \end{aligned}$$

onde $E, E_1, \dots, E_n$ são intervalos. A seqüência de normas $(\|z\|_{X_N})_{N=0}^\infty$ é crescente e é limitada pela norma ℓ_1 , logo existe $\lim_{N \rightarrow +\infty} \|z\|_{X_N}$. Definimos então $\|z\| = \lim_{N \rightarrow +\infty} \|z\|_{X_N}$ e o espaço normado $X = (c_{00}, \|\cdot\|)$. Além disso, pela proposição 4.10 [C, pág. 87],

$$\begin{aligned} \|z\| = & \|z\|_\infty \vee \sup \left\{ f(n)^{-1} \sum_{i=1}^n \|E_i(z)\| : n \geq 2, E_1 < \dots < E_n \right\} \\ & \vee \sup \{ |\bar{g}(E(z))| : k \in K, \bar{g} \in B_k^*(X), E \subset \mathbb{N} \} \end{aligned}$$

é uma forma implícita para a norma de $z \in X = (c_{00}, \|\cdot\|)$.

Definição 0.46 O completado de $X = (c_{00}, \|\cdot\|)$ é o espaço de Gowers e Maurey, denotado por X_{GM} ou simplesmente X .

Observação 0.47 (G-M1, págs. 863 e 865) A seqüência $(e_n)_{n=1}^\infty$ é uma base normalizada do espaço X de Gowers e Maurey. Além disso, o espaço X satisfaz uma f -estimativa inferior.

Lema 0.48 (G-M1, pág. 865) *Sejam $N \in L$, $n \in [\log N, \exp N]$, $\varepsilon > 0$ e $z_1, \dots, z_n$ uma RIS com constante $1 + \varepsilon$. Então $\left\| \sum_{i=1}^n z_i \right\| \leq (1 + \varepsilon + \varepsilon') n f(n)^{-1}$.*

Lema 0.49 (G-M1, pág. 866) *Sejam $k \in K$, $s_1^*, \dots, s_k^*$ uma seqüência especial de comprimento k , onde cada s_i^* é uma (M_i, f) -forma. Seja $z_1, \dots, z_k$ uma seqüência de vetores sucessivos tais que todo z_i é um vetor RIS normalizado de comprimento M_i e constante $1 + \varepsilon/4$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$. Assuma que $\left| \left(\sum_{i=1}^k s_i^* \right) \left(\sum_{i=1}^k E(z_i) \right) \right| \leq 2$ para todo intervalo E . Então $\left\| \sum_{i=1}^k z_i \right\| \leq (1 + 2\varepsilon)k/f(k)$.*

Proposição 0.50 (C, pág. 110) O espaço X de Gowers e Maurey é um espaço reflexivo.

Definição 0.51 Um espaço de Banach X de dimensão infinita é H.I. (hereditariamente indecomponível) se nenhum subespaço fechado de X de dimensão infinita, pode ser decomposto como soma direta topológica de dois subespaços fechados de X de dimensão infinita.

Teorema 0.52 (G-M1, pág. 867) *O espaço de Banach X de Gowers e Maurey é hereditariamente indecomponível.*

Lema 0.53 (C, pág. 121) *Um espaço de Banach X é hereditariamente indecomponível se, e somente se, para quaisquer Y e Z subespaços fechados de dimensão infinita de X e para qualquer $\varepsilon > 0$, existem $y \in Y$ e $z \in Z$, $\|y\| = \|z\| = 1$ e $\|y - z\| < \varepsilon$.*

Capítulo 1

O espaço $\mathbf{W}$

Neste capítulo construiremos o espaço de Banach $\mathbf{W}$. Como já foi dito na introdução, mostraremos que este espaço e o espaço $X \oplus \mathbf{W}$ formam o contra-exemplo para o problema de Schroeder-Bernstein. Para facilitar a leitura, faremos agora um esboço da estrutura deste capítulo.

Inicialmente apresentaremos duas propriedades importantes do espaço X de Gowers e Maurey. A primeira (Lema 1.1) se refere a uma desigualdade válida para a norma de vetores de X , que são soma finita de vetores sucessivos de X , e será utilizada no capítulo seguinte.

A segunda propriedade (Lema 1.7) garantirá a existência de uma seqüência normalizada de vetores sucessivos $(x_i)_{i=1}^{\infty} \subset X$ tal que, para todo $T \in B(X)$, existirá $\lambda \in \mathbb{R}$ com $\lim_{i \rightarrow +\infty} T(x_i) - \lambda x_i = 0$. Esta seqüência e a propriedade do limite, terão um papel importante na construção da solução para o problema de Schoreder-Bernstein.

Para a construção de $\mathbf{W}$, utilizaremos o espaço vetorial $\mathbf{V}$, de todas as seqüências finitas de vetores pertencentes a $X \oplus_{\infty} X$.

A partir do Lema 1.8, definiremos uma seqüência $(x_i^*)_{i=1}^{\infty}$ de funcionais lineares associados à seqüência $(x_i)_{i=1}^{\infty}$, que nos ajudarão a definir uma norma $\|\cdot\|_{\mathbf{v}}$ em $\mathbf{V}$.

O espaço de Banach $\mathbf{W}$ será o completado de $\mathbf{V}$ com a norma $\|\cdot\|_v$.

No final, concluiremos que a seqüência $(X_i)_{i=1}^\infty$ de cópias isométricas de X é uma decomposição de Schauder de $\mathbf{W}$ (Lema 1.17 e Observação 1.20). Além disso, pelo Lema 1.22, provaremos $\mathbf{W} \xhookrightarrow{c} X \oplus \mathbf{W}$ e $X \oplus \mathbf{W} \xhookrightarrow{c} \mathbf{W}$ e também que $(X \oplus \mathbf{W})^3 \sim (X \oplus \mathbf{W})$ e $(X \oplus \mathbf{W})^2 \sim \mathbf{W}$.

A teoria apresentada neste capítulo pode ser encontrada em [G-M1] e [G].

Lema 1.1 *Sejam X o espaço de Gowers e Maurey e $z_1 < z_2 < \dots < z_n$ uma seqüência de vetores sucessivos de X . Então vale a desigualdade*

$$\left\| \sum_{i=1}^n z_i \right\| \geq (\log_2(n+1))^{-1} \sum_{i=1}^n \|z_i\|.$$

Demonstração: Sejam $z = \sum_{i=1}^n z_i$, $f(x) = \log_2(x+1) \in \mathcal{F}$ (veja a Definição 0.31) e $E_i(z) = \text{ran}(z_i)$. Como X satisfaz uma f -estimativa inferior (veja a Definição 0.32 e Observação 0.47) e $E_i(z) < E_{i+1}(z)$, $i = 1, \dots, n-1$, teremos $\|z\| \geq (f(n))^{-1} \sum_{i=1}^n \|E_i(z)\| = (\log_2(n+1))^{-1} \sum_{i=1}^n \|z_i\|$. ■

Definição 1.2 Sejam X o espaço de Gowers e Maurey, $T \in B(X)$ e $y \in X$, tais que y e $T(y)$ têm suporte finito. Definimos $I(y)$ como sendo o menor intervalo que contém $\text{supp}(y)$ e $\text{supp}(T(y))$.

Lema 1.3 *Sejam X o espaço de Gowers e Maurey, $T \in B(X)$, $(y_n)_{n=1}^\infty$ uma seqüência contida em X de ℓ_{1+}^n -averages sucessivos com constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, e também $\delta > 0$. Então existe uma subseqüência $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ de $(y_n)_{n=1}^\infty$, um operador limitado $\bar{T} : Y \rightarrow X$ onde $Y = [(y_{n_k})_{k=1}^\infty]$, tal que se $T' : Y \rightarrow X$ é a restrição do operador T ao subespaço Y , então $\|\bar{T} - T'\| < \delta$. Além disso, podemos obter uma subseqüência $(y_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty$ de $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ tal que, se $I(y_{n_{k_i}})$ é o menor intervalo que contém $\text{supp}(y_{n_{k_i}})$ e $\text{supp}(\bar{T}(y_{n_{k_i}}))$ então, $I(y_{n_{k_i}}) < I(y_{n_{k_{i+1}}})$, $\forall i \in \mathbb{N}$.*

Demonstração: Mostremos inicialmente que $y_n \xrightarrow{w} 0$. A seqüência de ℓ_{1+}^n -averages $(y_n)_{n=1}^\infty$ (veja Definição 0.34), é uma seqüência básica de X ; pois $y_n \neq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, e se $(a_n)_{n=1}^\infty$ é uma seqüência de escalares e m, n são inteiros com $m < n$, teremos $\left\| \sum_{i=1}^m a_i y_i \right\| \leq \left\| \sum_{i=1}^n a_i y_i \right\|$, pois se considerarmos $\sum_{i=1}^n a_i y_i = x \in X$ e $E(x) = \sum_{i=1}^m a_i y_i$; então pela Observação 0.33, $\|E(x)\| \leq \|x\|$, pois X satisfaz uma f -estimativa inferior.

Assim, $(y_n)_{n=1}^\infty$ é base de Schauder normalizada do subespaço fechado $Z = [(y_n)_{n=1}^\infty]$ de X . Pela Proposição 0.50, X é um espaço reflexivo, logo pela Proposição 0.12 Z é reflexivo, então pelo Teorema 0.17 a base $(y_n)_{n=1}^\infty$ é shrinking.

Considerando os funcionais biortogonais $f_n^* : Z^* \rightarrow \mathbb{R}$, associados à base $(y_n)_{n=1}^\infty$ (veja Definição 0.6) temos pela Proposição 0.16 que $(f_n^*)_{n=1}^\infty$ é base de Z^* . Em particular, temos $f_n^*(y_n) = 1$, logo $\|f_n^*\| \geq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Seja $z^* \in Z^*$, existe uma única seqüência de escalares $(b_n)_{n=1}^\infty$ tal que $z^* = \sum_{n=1}^\infty b_n f_n^*$, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|b_n f_n^*\| = 0$, em particular, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |b_n| = 0$, mas $z^*(y_n) = \sum_{i=1}^\infty b_i f_i^*(y_n) = b_n$ e portanto, $\lim_{n \rightarrow +\infty} z^*(y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, logo para qualquer $x^* \in X^*$, teremos $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^*(y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x^*|_Z(y_n) = 0$.

Olhemos agora para a seqüência de vetores $(T(y_n))_{n=1}^\infty$. Como $y_n \xrightarrow{w} 0$ e $T \in B(X)$, segue que $T(y_n) \xrightarrow{w} 0$. Considerando os funcionais biortogonais e_j^* associados à base $(e_j)_{j=1}^\infty$ de X , temos $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_j^*(T(y_n)) = 0$, $\forall j \in \mathbb{N}$. Escrevemos $e_j^*(T(y_n)) = \lambda_j^n$ (a j -ésima coordenada do vetor $T(y_n)$ na base $(e_j)_{j=1}^\infty$), logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_j^n = 0$ para todo $j \in \mathbb{N}$.

Mostremos agora que dado $\delta > 0$ é possível determinar uma subsequência de $(T(y_n))_{n=1}^\infty$, $(T(y_{n_k}))_{k=1}^\infty$ e uma seqüência z_k de blocos finitos contida em X e com

$\lim_{k \rightarrow +\infty} \min \text{supp}(z_k) = +\infty$, em relação à base $(e_j)_{j=1}^\infty$ de X e tal que $\sum_{k=1}^\infty \|T(y_{n_k}) - z_k\| < \delta$.

De fato, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $T(y_{n_1}) = \sum_{j=1}^\infty \lambda_j^{n_1} e_j$ tem $\|\lambda_1^{n_1} e_1\| < \frac{\delta}{4}$ e existe $N_1 \in \mathbb{N}$, $N_1 > 1$, tal que $\left\| \sum_{j=N_1+1}^\infty \lambda_j^{n_1} e_j \right\| < \frac{\delta}{4}$. Consideremos $z_1 = \sum_{j=2}^{N_1} \lambda_j^{n_1} e_j$, logo $\|T(y_{n_1}) - z_1\| = \left\| \lambda_1^{n_1} e_1 + \sum_{j=N_1+1}^\infty \lambda_j^{n_1} e_j \right\| < \frac{\delta}{4} + \frac{\delta}{4} = \frac{\delta}{2}$ e $\min \text{supp}(z_1) = 2$.

Existe $n_2 > n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $T(y_{n_2}) = \sum_{j=1}^\infty \lambda_j^{n_2} e_j$ tem $\|\lambda_1^{n_2} e_1 + \lambda_2^{n_2} e_2\| < \frac{\delta}{8}$ e existe $N_2 \in \mathbb{N}$, $N_2 > N_1$ tal que $\left\| \sum_{j=N_2+1}^\infty \lambda_j^{n_2} e_j \right\| < \frac{\delta}{8}$. Tomemos $z_2 = \sum_{j=3}^{N_2} \lambda_j^{n_2} e_j$, logo $\|T(y_{n_2}) - z_2\| = \left\| \lambda_1^{n_2} e_1 + \lambda_2^{n_2} e_2 + \sum_{j=N_2+1}^\infty \lambda_j^{n_2} e_j \right\| < \frac{\delta}{8} + \frac{\delta}{8} = \frac{\delta}{4}$ e também $\min \text{supp}(z_2) = 3$.

Vamos provar agora por indução que para todo $k \in \mathbb{N}$, existem $T(y_{n_k})$ e z_k , tais que $\|T(y_{n_k}) - z_k\| < \frac{\delta}{2^k}$ e $\min \text{supp}(z_k) = k$.

Suponhamos que para $k > 2$ tenhamos $T(y_{n_k}) = \sum_{j=1}^\infty \lambda_j^{n_k} e_j$ e $z_k = \sum_{j=k+1}^{N_k} \lambda_j^{n_k} e_j$. Existirá $n_{k+1} \in \mathbb{N}$, $n_{k+1} > n_k$, tal que $T(y_{n_{k+1}}) = \sum_{j=1}^\infty \lambda_j^{n_{k+1}} e_j \in X$ tem $\|\lambda_1^{n_{k+1}} e_1 + \dots + \lambda_{k+1}^{n_{k+1}} e_{k+1}\| < \frac{\delta}{2^{k+2}}$ e existirá $N_{k+1} \in \mathbb{N}$, $N_{k+1} > N_k$ tal que $\left\| \sum_{j=N_{k+1}+1}^\infty \lambda_j^{n_{k+1}} e_j \right\| < \frac{\delta}{2^{k+2}}$.

Consideremos $z_{k+1} = \sum_{j=k+2}^{N_{k+1}} \lambda_j^{n_{k+1}} e_j$, logo $\|T(y_{n_{k+1}}) - z_{k+1}\| = \left\| (\lambda_1^{n_{k+1}} e_1 + \dots + \lambda_{k+1}^{n_{k+1}} e_{k+1}) + \sum_{j=N_{k+1}+1}^\infty \lambda_j^{n_{k+1}} e_j \right\| < \frac{\delta}{2^{k+2}} + \frac{\delta}{2^{k+2}} = \frac{\delta}{2^{k+1}}$ e $\min \text{supp}(z_{k+1}) = k+2$.

Concluimos que $\sum_{k=1}^\infty \|T(y_{n_k}) - z_k\| < \left(\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k} \right) \delta < \delta$, além disso $\lim_{k \rightarrow +\infty} \min \text{supp}(z_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} k + 1 = +\infty$.

Seja $Y = [(y_{n_k})_{k=1}^\infty]$, $Y < X$, conforme verificamos anteriormente para o subespaço Z , a seqüência $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ é base de Schauder normalizada de Y .

Definimos uma aplicação $\bar{T} : Y \rightarrow X$ por $\bar{T}(y_{n_k}) = z_k$, isto é, $\bar{T}\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k z_k$. Mostremos que $\bar{T}$ está bem definida. Antes porém, observemos que $|a_k| = \|a_k y_{n_k}\| \leq \left\| \sum_{i=k}^l a_i y_{n_i} \right\|$ para todo $k, l \in \mathbb{N}$, com $l > k$; pois X satisfaz uma f -estimativa inferior.

Consideremos a seqüência das somas parciais $S_p = \sum_{k=1}^p a_k z_k$, se $p, l \in \mathbb{N}$ com $l > p$ teremos:

$$\begin{aligned} \|S_l - S_p\| &= \left\| \sum_{k=p+1}^l a_k z_k \right\| \leq \left\| \sum_{k=p+1}^l a_k (z_k - T(y_{n_k})) \right\| + \left\| \sum_{k=p+1}^l a_k T(y_{n_k}) \right\| \\ &\leq \sum_{k=p+1}^l |a_k| \|T(y_{n_k}) - z_k\| + \left\| \sum_{k=p+1}^l a_k T(y_{n_k}) \right\| \\ &\leq \left\| \sum_{k=p+1}^l a_k y_{n_k} \right\| \delta + \left\| \sum_{k=p+1}^l a_k T(y_{n_k}) \right\|. \end{aligned}$$

Como as séries $\sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k}$ e $\sum_{k=1}^{\infty} a_k T(y_{n_k})$ convergem, então $\|S_l - S_p\| \rightarrow 0$ quando $l, p \rightarrow +\infty$, isto é, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k z_k$ converge. Obviamente $\bar{T}$ é linear.

Falta mostrar que $\bar{T}$ é limitada. Consideremos para isso o operador limitado $T' : Y \rightarrow X$ definido por $T'\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k}\right) = T\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k}\right)$. Seja $y = \sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k}$ com $\|y\| = 1$. Como X satisfaz uma f -estimativa inferior, temos $|a_k| = \|a_k y_{n_k}\| \leq \left\| \sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k} \right\| = 1$. Logo, $\|(\bar{T} - T')(y)\| = \left\| (\bar{T} - T')\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k y_{n_k}\right) \right\| = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} a_k (T(y_{n_k}) - z_k) \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \|T(y_{n_k}) - z_k\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|T(y_{n_k}) - z_k\| < \delta$. Portanto, $\bar{T}$ é limitada e $\|\bar{T} - T'\| < \delta$.

Para finalizar, como y_{n_1} é um ℓ_1 -average, sejam $q_1 = \min \text{supp}(y_{n_1})$ e $p_1 = \max \text{supp}(y_{n_1})$. Como $\bar{T}(y_{n_1})$ é um bloco finito, sejam $s_1 = \min \text{supp}(\bar{T}(y_{n_1}))$ e $r_1 = \max \text{supp}(\bar{T}(y_{n_1}))$. Tomemos $L_1 = \min\{q_1, s_1\}$ e $M_1 = \max\{p_1, r_1\}$ e consideremos $I(y_{n_1}) = I(y_{n_{k_1}}) = \{L_1, L_1 + 1, \dots, M_1\}$, logo $I(y_{n_1})$ é o menor intervalo que contém $\text{supp}(y_{n_1})$ e $\text{supp}(\bar{T}(y_{n_1}))$.

Agora, como $\lim_{k \rightarrow +\infty} \min \text{supp}(\overline{T}(y_{n_k})) = +\infty$ e $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ é uma seqüência crescente de ℓ_1^k -averages, existe $k_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\min \text{supp}(\overline{T}(y_{n_{k_2}})) = s_2 > M_1$ e $\min \text{supp}(y_{n_{k_2}}) = q_2 > M_1$. Sejam $\max \text{supp}(\overline{T}(y_{n_{k_2}})) = r_2$ e $\max \text{supp}(y_{n_{k_2}}) = p_2$. Tomemos $L_2 = \min\{s_2, q_2\}$ e $M_2 = \max\{p_2, r_2\}$ e consideremos $I(y_{n_{k_2}}) = \{L_2, L_2 + 1, \dots, M_2\}$.

Continuando desta forma obtemos uma subseqüência $(y_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty$ de $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ contida em Y tal que $I(y_{n_{k_i}}) < I(y_{n_{k_{i+1}}})$, $\forall i \in \mathbb{N}$. ■

Lema 1.4 *Sejam X o espaço de Gowers e Maurey, $T : X \rightarrow X$ um operador limitado, $\delta > 0$, $k \in K$, $y^* = \sum_{i=1}^M y_i^*$ uma (M, f) -forma, $M \in L$ e $z \in X$, $z = \sum_{i=1}^M z_i$, um vetor RIS normalizado de comprimento M satisfazendo $\text{ran}(y_i^*) \subset I(z_i)$, $1 \leq i \leq M$, $y^*(z) = 0$ e $y^*(T(z)) > \delta$. Então, existe uma (M, f) -forma $s^* \in Q$ tal que $|s^*(z)| \leq k^{-2}$, $\text{ran}(s^*) \subset I(z)$ e $s^*(T(z)) > \frac{\delta}{2}$.*

Demonstração: Temos por hipótese (veja Definição 0.36, Observação 0.37 e Definição 0.38) que $\|y^*\| \leq 1$, $\|y_i^*\| \leq f(M)^{-1}$, $y_1^* < y_2^* < \dots < y_M^*$. Além disso, $z_1 < \dots < z_M$ e também $\text{ran}(y_i^*) \subset I(z_i)$.

Sejam $n_i = \max\{\max \text{ran}(z_i), \max \text{ran}(y_i^*)\}$, $p_i = \min\{\min \text{ran}(z_i), \min \text{ran}(y_i^*)\}$, $1 \leq i \leq M$, $N = \max\{n_i - p_i : 1 \leq i \leq M\}$ e coloquemos $y_i^* = (c_{p_i}^i, c_{p_i+1}^i, \dots, c_{n_i}^i)$, onde alguns desses c_j^i 's são nulos.

Seja $\varepsilon \in \mathbb{R}$, definindo:

$$(1) \quad \alpha = f(M)^{-1};$$

$$(2) \quad \beta(\varepsilon) = \varepsilon N + \alpha;$$

$$(3) \quad \gamma(\varepsilon) = \varepsilon N M + 1;$$

$$(4) \quad \theta(\varepsilon) = \left(1 - \frac{\alpha}{\varepsilon N + \alpha}\right) (\varepsilon N M + 1) + \varepsilon N M;$$

$$(5) \quad \mu(\varepsilon) = \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)}$$

Como $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \theta(\varepsilon) = 0$, $\mu(0) = 1$, $\mu(\varepsilon) \leq 1$, $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}$ e μ é contínua, pelo teorema do valor intermediário do cálculo, existe $\varepsilon \in \mathbb{R}$ tal que:

$$(6) \quad \theta(\varepsilon) < \min \left\{ k^{-2}, \frac{\delta}{2\|T\|} \right\}, \text{ onde } k \in K \text{ (veja Definições 0.39 e 0.41);}$$

$$(7) \quad \mu(\varepsilon) \text{ é um número racional.}$$

Seja $r_i^* = (b_{p_i}^i, b_{p_i+1}^i, \dots, b_{n_i}^i) \in Q$ (veja Definição 0.41), onde os b_j^i 's são não nulos, $1 \leq i \leq M$, com $|c_j^i - b_j^i| \leq \varepsilon$, $p_i \leq j \leq n_i$.

$$\text{Seja } t \in X, \|t\| \leq 1, \text{ com } t = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i, \text{ temos } |r_i^*(t) - y_i^*(t)| = \left| \sum_{j=p_i}^{n_i} a_j (c_j^i - b_j^i) \right| \leq \sum_{j=p_i}^{n_i} |a_j (c_j^i - b_j^i)| \leq \varepsilon (n_i - p_i) \max \{|a_j| : p_i \leq j \leq n_i\} \leq \varepsilon N.$$

Logo $|r_i^*(t)| \leq |r_i^*(t) - y_i^*(t)| + |y_i^*(t)| \leq \varepsilon N + \|y_i^*\| \|t\| \leq \varepsilon N + f(M)^{-1} = \beta(\varepsilon)$ e assim $\|r_i^*\| \leq \beta(\varepsilon)$, isto é, $\left\| \frac{r_i^*}{\beta(\varepsilon)} \right\| \leq 1$, $1 \leq i \leq M$.

Consideremos agora, $r^* = \sum_{i=1}^M r_i^*$. Seja $t \in X$, $\|t\| \leq 1$. Logo, $|r^*(t) - y^*(t)| \leq \sum_{i=1}^M |r_i^*(t) - y_i^*(t)| \leq \varepsilon N M$.

Portanto, $|r^*(t)| \leq |r^*(t) - y^*(t)| + |y^*(t)| \leq \varepsilon N M + \|y^*\| \|t\| \leq \varepsilon N M + 1 = \gamma(\varepsilon)$ e assim $\|r^*\| \leq \gamma(\varepsilon)$, isto é, $\left\| \frac{r^*}{\gamma(\varepsilon)} \right\| \leq 1$.

Vamos finalmente definir s^* pondo $s^* = \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} r^*$, ou seja, $s^* = \sum_{i=1}^M \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} r_i^*$. Portanto, s^* tem as seguintes propriedades:

$$(a) \quad \left\| \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} r_i^* \right\| = \frac{\alpha}{\gamma(\varepsilon)} \left\| \frac{r_i^*}{\beta(\varepsilon)} \right\| \leq \alpha 1 = f(M)^{-1};$$

$$(b) \quad \|s^*\| = \left\| \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} r^* \right\| = \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)} \left\| \frac{r^*}{\gamma(\varepsilon)} \right\| \leq 1;$$

(c) $r_1^* < r_2^* < \dots < r_M^*$ e $\text{ran}(s^*) \subset I(z)$;

$$\begin{aligned}
(d) \quad |s^*(z)| &= |s^*(z) - y^*(z)| = \left| \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} r^*(z) - y^*(z) \right| \leq \left| \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} r^*(z) - r^*(z) \right| \\
&\quad + |r^*(z) - y^*(z)| = \left| \left(\frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} - 1 \right) r^*(z) \right| + |r^*(z) - y^*(z)| \\
&\leq \left(1 - \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)\gamma(\varepsilon)} \right) \|r^*\| \|z\| + \varepsilon NM \leq \left(1 - \frac{\alpha}{\beta(\varepsilon)} \right) (\varepsilon NM + 1) + \varepsilon NM \\
&= \theta(\varepsilon) < k^{-2}.
\end{aligned}$$

Por (a), (b), (c) e (d), temos que s^* é uma (M, f) -forma, $s^* \in Q$, $\text{ran}(s^*) \subset I(z)$ e $|s^*(z)| < k^{-2}$.

Finalmente, temos pelo item (d) que $|s^*(t) - y^*(t)| \leq \theta(\varepsilon)$, $\forall t \in X$ com $\|t\| = 1$, logo $\|s^* - y^*\| \leq \theta(\varepsilon)$ e assim $|s^*(T(z)) - y^*(T(z))| = |(s^* - y^*)(T(z))| \leq \|s^* - y^*\| \|T(z)\| \leq \|s^* - y^*\| \|T\| \leq \theta(\varepsilon) \|T\| < \frac{\delta}{2\|T\|} \|T\| = \frac{\delta}{2}$. Concluimos que $s^*(T(z)) > y^*(T(z)) - \frac{\delta}{2} > \frac{\delta}{2}$. ■

Lema 1.5 *Sejam X o espaço de Gowers e Maurey, $T \in B(X)$ e $(y_n)_{n=1}^\infty$ uma seqüência contida em X , de ℓ_{1+}^n -averages sucessivos com constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(T(y_n), [y_n]) = 0$, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \{\|T(y_n) - \alpha y_n\| : \alpha \in \mathbb{R}\} = 0$.*

Demonstração: Suponhamos que o resultado não seja válido, então existem $T \in B(X)$, $\delta > 0$ e uma subsequência de $(y_n)_{n=1}^\infty$, que continuaremos denotando por $(y_n)_{n=1}^\infty$, tais que $d(T(y_n), [y_n]) > 2\delta$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Seja $(e_j)_{j=1}^\infty$ a base de X .

Aplicamos os resultados do Lema 1.3 à seqüência $(y_n)_{n=1}^\infty$; logo existem um subespaço fechado Y de X , um operador limitado $\bar{T} : Y \rightarrow X$ tal que, se $T' = T|_Y$, então $\|\bar{T} - T'\| < \frac{\delta}{8}$. Além disso, obtemos uma subsequência de $(y_n)_{n=1}^\infty$, que para facilitar a notação denotaremos novamente por $(y_n)_{n=1}^\infty$, contida em Y e tal que, se $I(y_n)$ é

o menor intervalo que contém $\text{supp}(y_n)$ e $\text{supp}(\overline{T}(y_n))$, então $I(y_n) < I(y_{n+1})$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Como consequência do teorema de Hahn-Banach (veja Proposição 0.13), podemos tomar $S_n^* \in X^*$, tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $\|S_n^*\| = 1$, $S_n^*(\overline{T}(y_n)) = d(\overline{T}(y_n), [y_n]) > \delta$ e $S_n^*(y_n) = 0$.

Consideremos os intervalos $I(y_n) = \{n_n, n_n + 1, \dots, m_n\}$ e as projeções $E_n : X \rightarrow [e_{n_n}, e_{n_n+1}, \dots, e_{m_n}]$, definidas por $E_n \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j \right) = \sum_{j=n_n}^{m_n} a_j e_j$. Definimos então, os funcionais lineares $y_n^* : X \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $y_n^*(z) = S_n^*(E_n(z))$, $\forall z \in X$.

O funcional y_n^* é limitado, pois S_n^* é limitado e $\|E_n(z)\| \leq \|z\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, já que X satisfaz uma f -estimativa inferior, além disso vale também $y_n^*(y_n) = S_n^*(E_n(y_n)) = S_n^*(y_n) = 0$ e $y_n^*(\overline{T}(y_n)) = S_n^*(E_n(\overline{T}(y_n))) = S_n^*(\overline{T}(y_n)) > \delta$. Temos também que $\text{supp}(y_n^*) \subset I(y_n)$, logo $\text{ran}(y_n^*) \subset I(y_n)$. Para justificar esta última afirmação, observemos que se $z \in X$, $z = \sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j$ então, $y_n^*(z) = S_n^* \left(E_n \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j \right) \right) = S_n^* \left(\sum_{j=n_n}^{m_n} a_j e_j \right) = \sum_{j=n_n}^{m_n} a_j S_n^*(e_j)$ e considerando $S_n^*(e_j) = b_j$, $n_n \leq j \leq m_n$, teremos $y_n^*(z) = \sum_{j=n_n}^{m_n} a_j b_j$, isto é, $\text{supp}(y_n^*) \subset \{n_n, n_n + 1, \dots, m_n\} = I(y_n)$.

Mostremos agora que dados $p \in L$ e $m \in \mathbb{N}$, é sempre possível tomar um vetor RIS normalizado $z \in Y$ de comprimento p e constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$ e uma (p, f) -forma y^* tais que $m < I(z)$, $\text{ran}(y^*) \subset I(z)$, $y^*(z) = 0$ e $y^*(\overline{T}(z)) > \frac{\delta}{2}$.

De fato, dados $p \in L$ e $m \in \mathbb{N}$, podemos escolher uma subsequência finita $y_{n_1}, y_{n_2}, \dots, y_{n_p}$ ($n_1 > n_2 > \dots > n_p$) da sequência $(y_n)_{n=1}^{\infty}$, de tal forma que $n_1 \geq 2(1 + \varepsilon)M_f \left(\frac{p}{\varepsilon'} \right) / \varepsilon' f'(1)$ com $\min \text{supp}(y_{n_i}) > m$ e $\frac{\varepsilon'}{2} f(n_i)^{1/2} \geq |\text{ran}(y_{n_{i-1}})|$ para cada $i = 2, \dots, p$. Logo $y_{n_1}, \dots, y_{n_p}$ formam uma RIS de comprimento $p \in \bar{L}$ e

constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$ tal que $m < I(y_{n_1})$. Escolhemos então $z = (y_{n_1} + \cdots + y_{n_p}) / \|y_{n_1} + \cdots + y_{n_p}\|$, que é um vetor RIS normalizado, pertencente a Y de comprimento p dado, constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$ e tal que $m < I(z)$.

Além disso, como $p \in [\log p, e^p]$, temos pelo Lema 0.48 que $\left\| \sum_{i=1}^p y_{n_i} \right\| \leq \frac{2p}{f(p)}$.

Seja agora $y^* = (y_{n_1}^* + y_{n_2}^* + \cdots + y_{n_p}^*) f(p)^{-1} \in X^*$, temos $y^* \left(\sum_{i=1}^p \overline{T}(y_{n_i}) \right) = \left(\sum_{i=1}^p f(p)^{-1} y_{n_i}^* \right) \left(\sum_{i=1}^p \overline{T}(y_{n_i}) \right) = \sum_{i=1}^p f(p)^{-1} y_{n_i}^* (\overline{T}(y_{n_i}))$, pois $\text{ran}(y_{n_i}^*) \subset I(y_{n_i})$. Logo $y^* \left(\sum_{i=1}^p \overline{T}(y_{n_i}) \right) \geq \frac{\delta p}{f(p)}$.

Temos também que $y^* \left(\sum_{i=1}^p y_{n_i} \right) = \sum_{i=1}^p f(p)^{-1} y_{n_i}^* (y_{n_i}) = 0$. Agora, $y^*(\overline{T}(z)) = \left(\left\| \sum_{i=1}^p y_{n_i} \right\| \right)^{-1} y^* \left(\sum_{i=1}^p \overline{T}(y_{n_i}) \right) \geq \frac{f(p)}{2p} \frac{\delta p}{f(p)} = \frac{\delta}{2}$ e $y^*(z) = \left(\left\| \sum_{i=1}^p y_{n_i} \right\| \right)^{-1} y^* \left(\sum_{i=1}^p y_{n_i} \right) = 0$. Obtemos também $\text{ran}(y^*) \subset I(z)$, pois $\text{ran}(y_{n_i}^*) \subset I(y_{n_i})$, $i = 1, 2, \dots, p$.

Falta mostrar que y^* é uma (p, f) -forma. Pela Definição 0.38, provemos que valem as propriedades a seguir:

- (a) $f(p)^{-1} y_{n_i}^* < f(p)^{-1} y_{n_{i+1}}^*$, para $i = 1, 2, \dots, p-1$.
- (b) Seja $z \in X$ com $\|z\| \leq 1$ logo, $|y_{n_i}^*(z)| = |S_{n_i}^*(E_{n_i}(z))| \leq \|S_{n_i}^*\| \|E_{n_i}(z)\| = \|E_{n_i}(z)\| \leq \|z\| \leq 1$, assim $\|f(p)^{-1} y_{n_i}^*\| \leq f(p)^{-1}$ para $i = 1, 2, \dots, p$.
- (c) Seja $z \in X$ com $\|z\| \leq 1$, então $|y^*(z)| = \left| f(p)^{-1} \sum_{i=1}^p y_{n_i}^*(z) \right| \leq f(p)^{-1} \sum_{i=1}^p |y_{n_i}^*(z)| \leq f(p)^{-1} \sum_{i=1}^p \|E_{n_i}(z)\| \leq \|z\|$, pois X satisfaz uma f -estimativa inferior.

Concluimos então, que $\|y^*\| \leq 1$.

Baseados neste resultado, faremos a seguir a seguinte construção. Dado $k \in K$, seja $z_1 \in Y$, $z_1 = (y_{n_1} + \cdots + y_{n_{M_1}}) / \|y_{n_1} + \cdots + y_{n_{M_1}}\|$ um vetor RIS normalizado

de comprimento $M_1 = j_{2k} \in L$ e constante $(1 + \frac{\varepsilon}{4})$, onde pelo Lema 0.40, $M_1^{\varepsilon/4} = N_1 \geq 4Mf(\frac{k}{\varepsilon})/\varepsilon f'(1)$ e seja $y_1^* = (y_{n_1}^* + \dots + y_{n_{M_1}}^*)f(M_1)^{-1}$ a (M_1, f) -forma tal que $\text{ran}(y_{n_i}^*) \subset I(y_{n_i})$, $1 \leq i \leq M_1$, $y_1^*(z_1) = 0$ e $y_1^*(\overline{T}(z_1)) > \frac{\delta}{2}$.

Pelo Lema 1.4, existe uma (M_1, f) -forma $s_1^* \in Q$ com $|s_1^*(z_1)| \leq k^{-2}$ e $s_1^*(\overline{T}(y_1)) > \frac{\delta}{4}$, podemos assumir também que $\text{ran}(s_1^*) \subset I(z_1)$.

Seja agora $p = M_2 = \sigma(s_1^*)$ (veja a Definição 0.41). Tomemos um vetor RIS normalizado $z_2 \in Y$ de comprimento M_2 e constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$, tal que $m = \max \text{supp}(y_{n_{M_1}}) < I(z_2)$ (a construção de z_2 é análoga à feita para z_1).

Como no caso anterior, podemos determinar pelo Lema 1.4 uma (M_2, f) -forma $s_2^* \in Q$ com $|s_2^*(z_2)| \leq k^{-2}$, $s_2^*(\overline{T}(z_2)) > \frac{\delta}{4}$ e $\text{ran}(s_2^*) \subset I(z_2)$.

Continuando esta construção, dado $k \in K$, obtemos um par de seqüências $z_2, z_2, \dots, z_k$ e $s_1^*, s_2^*, \dots, s_k^*$, com várias propriedades que necessitaremos.

- (1) $I(z_i) \subset I(z_{i+1})$ para todo i , $1 \leq i \leq k-1$.
- (2) $\|z_i\| = 1$, $\|s_i^*\| \leq 1$ e $\text{ran}(s_i^*) \subset I(z_i)$, para todo i , $1 \leq i \leq k$.
- (3) $|s_i^*(z_i)| \leq k^{-2}$ e $s_i^*(\overline{T}(z_i)) > \frac{\delta}{4}$ para todo i , $1 \leq i \leq k$.
- (4) A seqüência $s_1^*, s_2^*, \dots, s_k^*$ foi construída de forma a ser uma seqüência especial de comprimento k , pois $s_i^* < s_{i+1}^*$, $s_1^* \in Q$, $s_i^* \in A_{j_{2k}}^*(X)$ e $s_{i+1}^* \in A_{\sigma(s_1^*, \dots, s_i^*)}^*(X)$, para todo i , $1 \leq i \leq k-1$ (veja a Definição 0.43).

Vamos determinar uma limitação superior para $\left\| \sum_{i=1}^k z_i \right\|$. Para isso usaremos o Lema 0.49, porém antes é necessário que $\left| \left(\sum_{i=1}^k s_i^* \right) \left(\sum_{i=1}^k E(z_i) \right) \right| \leq 2$ para todo intervalo E .

Desenvolvendo o módulo acima temos: $\left| \left(\sum_{i=1}^k s_i^* \right) \left(\sum_{i=1}^k E(z_i) \right) \right| = \left| \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k s_i^*(E(z_j)) \right|$
 $= \left| \sum_{i=1}^k s_i^*(E(z_i)) \right|$, pois $\text{ran}(s_i^*) \subset I(z_i)$ e $I(z_i) < I(z_{i+1})$ acarretam $s_i^*(E(z_j)) = 0$
para $i \neq j$.

Podemos verificar, utilizando a demonstração do Lema 1.4, item (d), que para $s_i^*(E(z_i))$ vale também $|s_i^*(E(z_i))| \leq k^{-2}$, seja qual for o intervalo E e $i = 1, \dots, k$.

$$\text{Assim, } \left| \left(\sum_{i=1}^k s_i^* \right) \left(\sum_{i=1}^k E(z_i) \right) \right| \leq \sum_{i=1}^k |s_i^*(E(z_i))| \leq k k^{-2} < 2$$

$$\text{Utilizando o Lema 0.49, teremos } \left\| \sum_{i=1}^k z_i \right\| \leq (1 + 2\varepsilon) k f(k)^{-1} < 2k f(k)^{-1}.$$

Pela definição de norma (veja Definição 0.45),

$$\left\| \sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right\| \geq \sup \left\{ \left| \bar{g} \left(E \left(\sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right) \right) \right| : k \in K, \bar{g} \in B_k^*(X), E \subset \mathbb{N} \right\}.$$

Considerando $E = \text{ran} \left(\sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right)$, temos $\left\| \sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right\| \geq \left| \bar{g} \left(\sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right) \right| =$
 $\left| f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{j=1}^k g_j \left(\sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right) \right| \geq f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{j=1}^k g_j \left(\sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right)$, onde $(g_j)_{j=1}^k$ é uma seqüência
especial de comprimento $k \in K$ e $\bar{g} = f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{j=1}^k g_j$ um funcional especial (veja a
Definição 0.44).

Consideremos, em particular, $g_j = s_j^*$ para qualquer j , $1 \leq j \leq k$. Logo, temos
 $\left\| \sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right\| \geq f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^k s_j^* \left(\sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right) = f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^k s_j^*(\bar{T}(z_i)).$

Como $\text{ran}(s_i^*) \subset I(z_i)$ e $I(z_i) < I(z_{i+1})$ teremos também $s_j^*(\bar{T}(z_i)) = 0$ se $i \neq j$.
Portanto, $\left\| \sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right\| \geq f(k)^{-\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^k s_i^*(\bar{T}(z_i)) \geq f(k)^{-\frac{1}{2}} k \frac{\delta}{4}.$

Concluimos que dado $k \in K$, é possível construir uma seqüência $z_1, \dots, z_k$ de
vetores de Y , tais que $\left\| \sum_{i=1}^k z_i \right\| \leq 2k f(k)^{-1}$ e $\left\| \sum_{i=1}^k \bar{T}(z_i) \right\| = \left\| \bar{T} \left(\sum_{i=1}^k z_i \right) \right\| > k f(k)^{-\frac{1}{2}} \frac{\delta}{4},$
isto é, $\|\bar{T}\| \geq \frac{\delta f(k)^{\frac{1}{2}}}{8}$. Como $\|\bar{T} - T'\| < \frac{\delta}{8}$, teremos $\|T'\| \geq \|\bar{T}\| - \frac{\delta}{8} \geq \frac{\delta}{8} (f(k)^{\frac{1}{2}} - 1),$

o que contraria a hipótese de que T é um operador limitado. ■

Lema 1.6 *Sejam X o espaço de Gowers e Maurey, $T \in B(X)$ e $(y_n)_{n=1}^\infty$ uma seqüência contida em X de ℓ_{1+}^n -averages sucessivos com constante $1 + \frac{\varepsilon}{4}$, $\varepsilon = \frac{1}{10}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então existe $\lambda \in \mathbb{R}$, tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(y_n) - \lambda y_n = 0$.*

Demonstração: Se $T = 0$, então tomemos $\lambda = 0$, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(y_n) - \lambda y_n = 0$. Suponhamos $T \neq 0$. Mostremos inicialmente que, sob a hipótese do lema, é possível obter uma subsequência $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ de $(y_n)_{n=1}^\infty$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (y_{n_k}) - \lambda y_{n_k} = 0. \quad (1.1)$$

De fato, pelo Lema 1.5 e utilizando a hipótese, obtemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(T(y_n), [y_n]) = 0$, o que significa, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf\{\|T(y_n) - \alpha y_n\| : \alpha \in \mathbb{R}\} = 0$. Podemos então determinar uma subsequência $(y_{n_i})_{i=1}^\infty$, tal que para todo $i \in \mathbb{N}$, $\inf\{\|T(y_{n_i}) - \alpha y_{n_i}\| : \alpha \in \mathbb{R}\} < \frac{1}{i}$. Logo, existe uma seqüência $(\alpha_i)_{i=1}^\infty \in \mathbb{R}$ tal que $\|T(y_{n_i}) - \alpha_i y_{n_i}\| < \frac{1}{i}$, isto é, $\lim_{i \rightarrow +\infty} T(y_{n_i}) - \alpha_i y_{n_i} = 0$.

Além disso, $\|\alpha_i y_{n_i}\| = |\alpha_i| \|y_{n_i}\| = \|T(y_{n_i}) - \alpha_i y_{n_i} + T(y_{n_i})\| \leq \|T(y_{n_i}) - \alpha_i y_{n_i}\| + \|T(y_{n_i})\| \leq C + \|T\|$, $C > 0$, pois a seqüência $T(y_{n_i}) - \alpha_i y_{n_i}$ é limitada. Segue que $(\alpha_i)_{i=1}^\infty$ é limitada, logo existem uma subsequência $(\alpha_{i_k})_{k=1}^\infty$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \alpha_{i_k} = \lambda$.

Obtemos então, uma subsequência $(y_{n_{i_k}})_{k=1}^\infty$ de $(y_n)_{n=1}^\infty$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que $\lim_{k \rightarrow +\infty} T(y_{n_{i_k}}) - \alpha_{i_k} y_{n_{i_k}} = 0$ e $\lim_{k \rightarrow +\infty} (\alpha_{i_k} - \lambda) y_{n_{i_k}} = 0$. Logo $\lim_{k \rightarrow +\infty} T(y_{n_{i_k}}) - \lambda y_{n_{i_k}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} T(y_{n_{i_k}}) - \alpha_{i_k} y_{n_{i_k}} + (\alpha_{i_k} - \lambda) y_{n_{i_k}} = 0$.

Suponhamos agora, que para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ não vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(y_n) - \lambda y_n = 0$.

Afirmamos que neste caso, existem $c, d \in \mathbb{R}^*$ e subsequências de $(y_n)_{n=1}^\infty$ que,

para facilitar a notação, escreveremos $(u_n)_{n=1}^\infty$ e $(v_n)_{n=1}^\infty$, tais que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T(u_n) - cu_n = 0 \text{ e } \lim_{n \rightarrow \infty} (T - cI)(v_n) - dv_n = 0 \quad (1.2)$$

Pelo resultado (1.1) obtido anteriormente é possível encontrar $\alpha \in \mathbb{R}$ e $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ uma subsequência de $(y_n)_{n=1}^\infty$, tais que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} T(y_{n_k}) - \alpha y_{n_k} = 0. \quad (1.3)$$

Como não vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(y_n) - \alpha y_n = 0$, então existe uma outra subsequência $(y_{n_l})_{l=1}^\infty$ de $(y_n)_{n=1}^\infty$ e $\varepsilon_1 > 0$ tais que $\|T(y_{n_l}) - \alpha y_{n_l}\| > \varepsilon_1, \forall l \in \mathbb{N}$.

Aplicando o resultado (1.1) para $(T - \alpha I) \in B(X)$ e a sequência $(y_{n_l})_{l=1}^\infty$ de $\ell_{1+}^{n_l}$ -averages sucessivos, existe $\beta \in \mathbb{R}$ e uma subsequência $(y_{n_{l_i}})_{i=1}^\infty$ de $(y_{n_l})_{l=1}^\infty$ e conseqüentemente de $(y_n)_{n=1}^\infty$, tais que

$$\|T(y_{n_{l_i}}) - \alpha(y_{n_{l_i}})\| > \varepsilon_1, \forall i \in \mathbb{N} \quad (1.4)$$

e

$$\lim_{i \rightarrow +\infty} (T - \alpha I)(y_{n_{l_i}}) - \beta y_{n_{l_i}} = 0. \quad (1.5)$$

Notemos que $\beta \neq 0$, pois se $\beta = 0$ teríamos por (1.5) $\lim_{i \rightarrow +\infty} T(y_{n_{l_i}}) - \alpha y_{n_{l_i}} = 0$, o que contraria (1.4).

Analisemos agora $\alpha \in \mathbb{R}$. Se $\alpha \neq 0$, então por (1.3) e (1.5) a afirmação (1.2) está provada onde $c = \alpha$, $d = \beta$, $u_n = y_{n_k}$ e $v_n = y_{n_{l_i}}$.

Vamos supor então, que $\alpha = 0$. Utilizando a afirmação (1.5), teremos:

$$\lim_{i \rightarrow +\infty} T(y_{n_{l_i}}) - \beta y_{n_{l_i}} = 0 \quad (1.6)$$

e também como não vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(y_n) - \beta y_n = 0$, existe uma subsequência $(y_{n_r})_{r=1}^\infty$ de $(y_n)_{n=1}^\infty$ e $\varepsilon_2 > 0$ tais que $\|T(y_{n_r}) - \beta(y_{n_r})\| > \varepsilon_2, \forall r \in \mathbb{N}$.

Aplicando novamente o resultado (1.1) para $(T - \beta I) \in B(X)$ e à seqüência $(y_{n_r})_{r=1}^\infty$ de $\ell_{1+}^{n_r}$ -averages sucessivos, existe $\gamma \in \mathbb{R}$ e uma subsequência $(y_{n_{r_i}})_{i=1}^\infty$ de $(y_{n_r})_{r=1}^\infty$ e conseqüentemente de $(y_n)_{n=1}^\infty$, tais que:

$$\lim_{i \rightarrow +\infty} (T - \beta I)(y_{n_{r_i}}) - \gamma(y_{n_{r_i}}) = 0. \quad (1.7)$$

Notemos que também nesse caso $\gamma \neq 0$, logo por (1.6) e (1.7) a afirmação (1.2) está provada, onde $\beta = c$, $\gamma = d$, $u_n = y_{n_i}$ e $v_n = y_{n_{r_i}}$.

Voltando ao resultado (1.2), como $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(u_n) - cu_n = 0$, podemos obter uma subsequência $(u_{n_k})_{k=1}^\infty$ de $(u_n)_{n=1}^\infty$ tal que $\|T(u_{n_k}) - cu_{n_k}\| < \frac{1}{2^k} \frac{|d|}{6}$, $k \in \mathbb{N}$. Isto garante que $\sum_{k=1}^\infty \|T(u_{n_k}) - cu_{n_k}\| < \frac{|d|}{6}$.

Analogamente, podemos tomar uma subsequência $(v_{n_k})_{k=1}^\infty$ de $(v_n)_{n=1}^\infty$, tal que $\|(T - cI)(v_{n_k}) - dv_{n_k}\| < \frac{1}{2^k} \frac{|d|}{6}$, logo $\sum_{k=1}^\infty \|(T - cI)(v_{n_k}) - dv_{n_k}\| < \frac{|d|}{6}$.

Sejam $L = [(u_{n_k})_{k=1}^\infty]$ e $M = [(v_{n_k})_{k=1}^\infty]$. Fazendo uso de argumentos idênticos aos utilizados para a seqüência $(y_n)_{n=1}^\infty$ no Lema 1.3, concluimos que $(u_{n_k})_{k=1}^\infty$ e $(v_{n_k})_{k=1}^\infty$ são seqüências básicas e portanto são bases de Schauder normalizadas de L e M , respectivamente.

Pelo Teorema 0.52, X é um espaço hereditariamente indecomponível, logo pelo Lema 0.53, existem $x \in L$ e $u \in M$ com $\|x\| = \|u\| = 1$ e $\|x - u\| < \delta$, onde $\delta = \min \left\{ \frac{|d|}{2|c|}, \frac{|d|}{6\|T\|} \right\}$.

Observemos que se $x \in L$, $x = \sum_{k=1}^\infty a_k u_{n_k}$ com $\|x\| = 1$; então $|a_k| = \|a_k u_{n_k}\| \leq \|x\| = 1$, $\forall k \in \mathbb{N}$, já que X satisfaz uma f -estimativa inferior.

Assim, $\|T(x) - cx\| = \left\| \sum_{k=1}^\infty a_k (T(u_{n_k}) - cu_{n_k}) \right\| \leq \sum_{k=1}^\infty |a_k| \|T(u_{n_k}) - cu_{n_k}\| \leq \sum_{k=1}^\infty \|T(u_{n_k}) - cu_{n_k}\| < \frac{|d|}{6}$. Utilizando o mesmo raciocínio, chegamos a $\|(T - cI)(u) -$

$\|du\| < \frac{|d|}{6}$. Concluimos que:

$$\begin{aligned}\|cx - (c + d)u\| &\leq \|cx - T(x)\| + \|T(x) - T(u)\| + \|T(u) - (c + d)u\| \\ &< \frac{|d|}{6} + \|T\| \frac{|d|}{6\|T\|} + \frac{|d|}{6} = \frac{|d|}{2}\end{aligned}$$

e também:

$$\begin{aligned}\|cx - (c + d)u\| &= \|-du - (-cx + cu)\| \geq \|-du\| - \|c(u - x)\| \\ &> |d| - |c| \frac{|d|}{2|c|} = \frac{|d|}{2},\end{aligned}$$

o que é uma contradição. ■

Lema 1.7 *Se X é o espaço de Gowers e Maurey, então X contém uma seqüência normalizada $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ de vetores sucessivos, tal que para todo $T \in B(X)$ existe $\lambda \in \mathbb{R}$ satisfazendo $\lim_{i \rightarrow +\infty} T(x_i) - \lambda x_i = 0$.*

Demonstração: Sejam $(e_j)_{j=1}^{\infty}$ base de X e $c = 1 + \frac{\varepsilon}{4}$, com $\varepsilon = \frac{1}{10}$. Pelo Lema 0.35, existe $x_1 \in X$, x_1 um ℓ_{1+}^1 -average com constante c . Consideremos $n_1 \in \mathbb{N}$, $n_1 > \text{máx supp}(x_1)$ e $X_2 = [(e_j)_{j=n_1}^{\infty}]$.

Como X_2 é um subespaço de bloco de X existe novamente, pelo Lema 0.35, um vetor $x_2 \in X_2 < X$, x_2 um ℓ_{1+}^2 -average com constante c .

Continuando este raciocínio, obtemos uma seqüência $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ contida em X , tal que $x_i \in X_i = [(e_j)_{j=n_{i-1}}^{\infty}]$ ($n_0 = 1$) e x_i é um ℓ_{1+}^i -average com constante c , para todo $i \in \mathbb{N}$.

Assim, $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ é uma seqüência normalizada de vetores sucessivos de X . Aplicando o Lema 1.6, dado $T \in B(X)$, existe $\lambda \in \mathbb{R}$, tal que $\lim_{i \rightarrow +\infty} T(x_i) - \lambda x_i = 0$. ■

Vamos agora associar, à seqüência $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ do lema anterior, uma seqüência de funcionais lineares $(x_i^*)_{i=1}^{\infty}$ contida em X^* . Estes funcionais são chamados de funcionais suporte para a seqüência $(x_i)_{i=1}^{\infty}$.

Lema 1.8 *Se X é o espaço de Gowers e Maurey e $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ é a seqüência de vetores contida em X com as propriedades do lema anterior, então existe uma seqüência $(x_i^*)_{i=1}^{\infty}$ contida em X^* de funcionais lineares, tais que $\text{supp}(x_i^*) \subset \text{ran}(x_i)$. Além disso, $x_i^*(x_j) = \delta_{ij}$ e $\|x_i^*\| = 1$, para todo $i \in \mathbb{N}$.*

Demonstração: Sejam $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ a seqüência do lema anterior e $R_i^* : [x_i] \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $R_i^*(\alpha x_i) = \alpha$. O funcional $R_i^* \in X^*$ para todo $i \in \mathbb{N}$; pois $R_i^*(\alpha x_i + \beta x_i) = R_i^*((\alpha + \beta)x_i) = \alpha + \beta = R_i^*(\alpha x_i) + R_i^*(\beta x_i)$ e $R_i^*(\gamma(\alpha x_i)) = R_i^*((\gamma\alpha)x_i) = \gamma\alpha = \gamma R_i^*(\alpha x_i)$.

Temos também que $\sup \{|R_i^*(\alpha x_i)| : \|\alpha x_i\| \leq 1\} = \sup \{|\alpha| : |\alpha| \leq 1\} \leq 1$. Além disso $\|R_i^*\| = 1$, pois $R_i^*(x_i) = 1$ e $\|x_i\| = 1$.

Consideremos $\text{ran}(x_i) = \{n_i, n_i + 1, \dots, n_i + m_i\}$. Como consequência do Teorema de Hahn-Banach (veja o Corolário 0.14), existe $\overline{R_i^*} : [e_{n_i}, e_{n_i+1}, \dots, e_{n_i+m_i}] \rightarrow \mathbb{R}$, $\overline{R_i^*} \in X^*$, tal que $\overline{R_i^*}|_{[x_i]} = R_i^*$ e $\|\overline{R_i^*}\| = \|R_i^*\| = 1$.

Dado $x = \sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j$, sejam $E_i : X \rightarrow [e_{n_i}, e_{n_i+1}, \dots, e_{n_i+m_i}]$, as projeções dadas por $E_i \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j \right) = \sum_{j=n_i}^{n_i+m_i} a_j e_j$.

Vamos agora definir $x_i^* : X \rightarrow \mathbb{R}$ por $x_i^*(x) = \overline{R_i^*}(E_i(x))$, $\forall x \in X$. Cada $x_i^* \in X^*$, pois $\overline{R_i^*} \in X^*$ e decorrente da desigualdade $\|E_i(x)\| \leq \|x\|$, $\forall x \in X$, temos que $E_i : X \rightarrow [e_{n_i}, e_{n_i+1}, \dots, e_{n_i+m_i}]$ é uma aplicação linear limitada.

A seqüência $(x_i^*)_{i=1}^{\infty}$ assim construída, satisfaz as seguintes propriedades:

(1) $x_i^*(x_j) = \delta_{ij}$. De fato, se $i = j$, então $x_i^*(x_j) = \overline{R_i^*}(E_i(x_i)) = \overline{R_i^*}(x_i) = R_i(x_i) = 1$ e se $i \neq j$, então $x_i^*(x_j) = \overline{R_i^*}(E_i(x_j)) = \overline{R_i^*}(0) = 0$.

(2) $\|x_i^*\| = 1$, pois $\sup\{|\overline{R_i^*}(E_i(x))| : \|x\| \leq 1\} \leq \sup\{\|\overline{R_i^*}\| \|E_i(x)\| : \|x\| \leq 1\} \leq 1$, mas $x_i^*(x_i) = 1$ e $\|x_i\| = 1$, logo $\|x_i^*\| = 1$.

(3) $\text{supp}(x_i^*) \subset \text{ran}(x_i)$

Seja $x \in X$, $x = \sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j$, então $x_i^*(x) = \overline{R_i^*}\left(E_i\left(\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j\right)\right) = \overline{R_i^*}\left(\sum_{j=n_i}^{n_i+m_i} a_j e_j\right) = \sum_{j=n_i}^{n_i+m_i} a_j \overline{R_i^*}(e_j)$. Considerando $\overline{R_i^*}(e_j) = b_j$, $n_i \leq j \leq n_i+m_i$, teremos $x_i^*(x) = \sum_{j=n_i}^{n_i+m_i} a_j b_j$. Podemos então escrever, $\text{supp}(x_i^*) \subset \{n_i, n_i+1, \dots, n_i+m_i\} = \text{ran}(x_i)$.

(4) $(x_i^*)_{i=1}^{\infty}$ é uma seqüência de vetores sucessivos. Como $\text{supp}(x_i^*) \subset \text{ran}(x_i)$ e $\text{ran}(x_i) < \text{ran}(x_{i+1})$ para todo $i \in \mathbb{N}$, então $\max \text{supp}(x_i^*) < \min \text{supp}(x_{i+1}^*)$.

■

Vamos iniciar agora a construção do espaço de Banach $\mathbf{W}$, espaço importante na apresentação da primeira solução para o problema de Schroeder-Bernstein.

Sejam X o espaço de Gowers e Maurey, $\mathcal{W} = (X \oplus X) = \{(z_1, z_2) : z_1, z_2 \in X\}$ com $\|(z_1, z_2)\| = \max\{\|z_1\|, \|z_2\|\}$ e $(\mathcal{W}_j)_{j=1}^{\infty}$ uma seqüência de cópias isométricas de $\mathcal{W}$.

Definição 1.9 Definimos um espaço vetorial $\mathbf{V}$ do seguinte modo: $\mathbf{V} = \{(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) : w_j \in \mathcal{W} \text{ e } w_j \neq 0 \text{ somente para um número finito de índices } j \in \mathbb{N}\}$.

Observação 1.10 Consideraremos cada cópia $\mathcal{W}_j$ um subespaço vetorial de $\mathbf{V}$, através do isomorfismo sobre a imagem, $T : \mathcal{W}_j \rightarrow \mathbf{V}$ definido por $T(w_j) = (0, 0, \dots, w_j, 0, \dots) \in \mathbf{V}$.

Faremos então a seguinte identificação: $\mathcal{W}_j = \{(0, 0, \dots, w_j, 0, \dots) : w_j \in \mathcal{W}\}$ e o vetor $\mathbf{w}_j$ de $\mathbf{V}$ como o vetor $\mathbf{w}_j = (0, 0, \dots, w_j, 0, \dots)$, onde $w_j \in \mathcal{W}$.

Definição 1.11 Seja $\mathbf{w} \in \mathbf{V}$, definimos $\text{supp}(\mathbf{w}) = \{j \in \mathbb{N} : w_j \neq 0\}$ e escreveremos $\mathbf{w} < \mathbf{u}$, se $\text{máx supp}(\mathbf{w}) < \text{min supp}(\mathbf{u})$.

Fixemos agora uma seqüência normalizada de vetores $(x_i)_{i=1}^\infty$ de X , satisfazendo a propriedade do Lema 1.7 e também a seqüência $(x_i^*)_{i=1}^\infty$ de funcionais suporte para $(x_i)_{i=1}^\infty$ definida no Lema 1.8.

Estas duas seqüências serão muito utilizadas no decorrer do trabalho. Inicialmente vamos definir funcionais lineares limitados que serão utilizados na definição de uma norma que daremos ao espaço $\mathbf{V}$; antes porém faremos a seguinte observação.

Observação 1.12 Temos, $\mathcal{W}^* = (X \oplus X)^* \sim (X^* \oplus X^*)$, pelo isomorfismo $T : (X^* \oplus X^*) \rightarrow (X \oplus X)^*$ definido por $T(z_1^*, z_2^*)(z_1, z_2) = z_1^*(z_1) + z_2^*(z_2)$.

Assim, identificaremos cada funcional linear limitado $w^* \in \mathcal{W}^*$ com um funcional linear limitado $(z_1^*, z_2^*) \in (X^* \oplus X^*)$ tal que $w^*(z_1, z_2) = z_1^*(z_1) + z_2^*(z_2)$, $(z_1, z_2) \in (X \oplus X)$, com $\|(z_1^*, z_2^*)\| = \text{máx} \{\|z_1^*\|, \|z_2^*\|\}$.

Definição 1.13 Para cada $i, j \in \mathbb{N}$, definimos os funcionais lineares limitados u_{ij}^*, v_{ij}^* e w_{ij}^* em $\mathcal{W}_j^*$ como cópias dos funcionais $(x_i^*, -x_i^*)$, $(x_i^*, 0)$ e $(0, x_i^*)$, respectivamente.

Observação 1.14 Os funcionais u_{ij}^*, v_{ij}^* e w_{ij}^* pertencem também a $\mathbf{V}^*$. Por exemplo, fixado $i \in \mathbb{N}$, $u_{ij}^* : \mathbf{V} \rightarrow \mathbb{R}$ é definido por $u_{ij}^*(\mathbf{w}) = u_{ij}^*(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) = u_{ij}^*(0, 0, \dots, w_j, 0, \dots) = u_{ij}^*(w_j) = (x_i^*, -x_i^*)(z_{1j}, z_{2j}) = x_i^*(z_{1j}) + (-x_i^*)(z_{2j})$, onde $\mathbf{w} \in \mathbf{V}$ e $(z_{1j}, z_{2j}) = w_j$.

Antes de definirmos uma conveniente norma em $\mathbf{V}$, será necessário que façamos uma partição de $\mathbb{N}$ em cinco subconjuntos infinitos que denominaremos N_0, N_1, N_2, N_3 e N_4 .

Dada uma seqüência $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) \in \mathbf{V}$, definimos $\|\cdot\|_V : \mathbf{V} \rightarrow \mathbb{R}_+$ por:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w}\|_V = & \sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} \vee \sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1\right\} \\ & \vee \sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2\right\} \vee \sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3\right\} \\ & \vee \sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4\right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4\right\} \end{aligned}$$

Observemos inicialmente que $\|\cdot\|_V : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ está bem definida; pois $\sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} < \infty$, já que $w_j \neq 0$ somente para um número finito de índices $j \in \mathbb{N}$. Temos também $\sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1\right\} < \infty$.

De fato, sejam $j \in \mathbb{N}$ e $\mathbf{w} \in \mathbf{V}$. Fixado $i \in N_1$, temos $|u_{ij}^*(\mathbf{w})| = |u_{ij}^*(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)| = |u_{ij}^*(w_j)| \leq \|u_{ij}^*\| \|w_j\| = \max\{\|x_i^*\|, \|\cdot - x_i^*\|\} \|w_j\| = \|w_j\|$. Sejam $P = \text{supp}(\mathbf{w})$, $S = \sup\{\|w_j\| : j \in P\}$ e $|P|$ a cardinalidade do conjunto P . Então, $\left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{j \in P} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{j \in P} \|w_j\|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq (|P|S^2)^{\frac{1}{2}} \leq |P|S < \infty$. Assim, $\sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1\right\} \leq |P|S < \infty$. Raciocínios análogos nos levam a:

$$\begin{aligned} \sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2\right\} & \leq |P|S < \infty, \\ \sup\left\{\left(\sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^2\right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3\right\} & \leq |P|S < \infty \end{aligned}$$

$$\text{e } \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + \sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} \leq 2|P|S < \infty.$$

Mostremos agora que $\|\mathbf{w}\|_V$ é norma em $\mathbf{V}$.

(1) Se $\|\mathbf{w}\|_V = 0$ então, $\sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} = 0$ logo, $\|w_j\| = 0$ e portanto $\mathbf{w} = 0$.

Se $\mathbf{w} = 0$ então, $\|w_j\| = 0$ logo $\sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} = 0$ e $u_{ij}^*(\mathbf{w}) = 0$, $v_{ij}^*(\mathbf{w}) = 0$, $w_{ij}^*(\mathbf{w}) = 0$, para todo $j \in \mathbb{N}$ e $i \in \mathbb{N}$ segue que $\|\mathbf{w}\|_V = 0$.

(2) $\|\mathbf{w}\|_V \geq \sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} \geq 0$;

(3) $\|\lambda\mathbf{w}\|_V = |\lambda|\|\mathbf{w}\|_V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Inicialmente temos que $\sup\{\|\lambda w_j\| : j \in \mathbb{N}\} = \sup\{|\lambda|\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} = |\lambda| \sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\}$. Sejam $\mathbf{w} \in \mathbf{V}$ e $j \in \mathbb{N}$, fixado $i \in N_1$, temos $|u_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^2 = |\lambda u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 = |\lambda|^2 |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2$, logo $\left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(|\lambda|^2 \sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |\lambda| \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$.

Assim, $\sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} = \sup \left\{ |\lambda| \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} = |\lambda| \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\}$. De forma análoga obteremos

$\sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2 \right\} = |\lambda| \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2 \right\},$

$\sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3 \right\} = |\lambda| \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3 \right\}$

e $\sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^4 + |w_{ij}^*(\lambda\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\}$

$= |\lambda| \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\}.$

Concluimos que:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{w}\|_V &= |\lambda| \left(\sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} \vee \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} \right. \\ &\quad \vee \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2 \right\} \vee \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3 \right\} \\ &\quad \left. \vee \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + \sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} \right) = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_V. \end{aligned}$$

$$(4) \quad \|\mathbf{w} + \mathbf{u}\|_V \leq \|\mathbf{w}\|_V + \|\mathbf{u}\|_V, \quad \forall \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbf{V}.$$

$$\text{Caso 1: } \|\mathbf{w} + \mathbf{u}\|_V = \sup\{\|w_j + u_j\| : j \in \mathbb{N}\}$$

$$\|w_j + u_j\| \leq \|w_j\| + \|u_j\|, \quad \forall j \in \mathbb{N},$$

$$\text{logo } \sup\{\|w_j + u_j\| : j \in \mathbb{N}\} \leq \sup\{\|w_j\| + \|u_j\| : j \in \mathbb{N}\} = \sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} + \sup\{\|u_j\| : j \in \mathbb{N}\} \leq \|\mathbf{w}\|_V + \|\mathbf{u}\|_V.$$

$$\text{Caso 2: } \|\mathbf{w} + \mathbf{u}\|_V = \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\}.$$

$$\text{Sejam } \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbf{V} \text{ e } j \in \mathbb{N}. \text{ Fixado } i \in N_1, \text{ temos } |u_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^2 = |u_{ij}^*(\mathbf{w}) + u_{ij}^*(\mathbf{u})|^2 \leq (|u_{ij}^*(\mathbf{w})| + |u_{ij}^*(\mathbf{u})|)^2.$$

$$\text{Logo, } \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} (|u_{ij}^*(\mathbf{w})| + |u_{ij}^*(\mathbf{u})|)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{Assim, } \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} &\leq \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right. \\ &+ \left. \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} = \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} + \\ &\sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} \leq \|\mathbf{w}\|_V + \|\mathbf{u}\|_V. \end{aligned}$$

De forma análoga obteremos $\|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|_V \leq \|\mathbf{u}\|_V + \|\mathbf{w}\|_V$ para os casos:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|_V &= \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2 \right\}, \\ \|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|_V &= \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |w_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3 \right\}.\end{aligned}$$

Finalmente, se $\|\mathbf{w} + \mathbf{u}\| = \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\}$, teremos $\left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w}) + v_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w}) + w_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}}$

$$\begin{aligned}&\text{Assim, } \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w} + \mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} \\ &\leq \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} \\ &= \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{w})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} + \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 + |w_{ij}^*(\mathbf{u})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} \\ &= \|\mathbf{w}\|_V + \|\mathbf{u}\|_V.\end{aligned}$$

Definição 1.15 O completado de $(\mathbf{V}, \|\cdot\|_V)$ é o espaço de Banach que denominaremos de $\mathbf{W}$.

Observação 1.16 Cada cópia $\mathcal{W}_j$ de $\mathcal{W} = (X \oplus X)$ é isomorfa ao subespaço $\mathcal{W}_j = \{(0, \dots, w_j, 0, 0, \dots) : w_j \in W\}$ de $\mathbf{V}$ ou $\mathbf{W}$. De fato, pela definição de norma em $\mathbf{V}$ e em $(X \oplus X)$, teremos $\|w_j\| \leq \|(0, 0, \dots, w_j, 0, \dots)\|_V \leq 2\|w_j\|$.

Concluimos também que cada subespaço $\mathcal{W}_j$ de $\mathbf{W}$ é fechado.

Lema 1.17 A seqüência $(\mathcal{W}_j)_{j=1}^{\infty}$ de subespaços de $\mathbf{W}$ é uma decomposição de Schauder de $\mathbf{W}$.

Demonstração: Inicialmente observemos que $\mathcal{W}_j \neq \{0\}$, $\forall j \in \mathbb{N}$. Dado $\mathbf{w} \in \mathbf{V}$, com $\max \text{supp}(\mathbf{w}) = p$, temos que $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_p, 0, 0, \dots) = \sum_{j=1}^p \mathbf{w}_j \in \left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right]$. Logo, $\mathbf{V} \subset \left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right]$.

Como $\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \subset \mathbf{W}$, então $\left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right] \subset \mathbf{W}$, pois $\mathbf{W}$ é fechado. Ainda, pelo fato de que $\mathbf{V} \subset \left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right]$, temos $[\mathbf{V}] \subset \left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right]$; mas $[\mathbf{V}] = \mathbf{W}$.

Concluimos que $\mathbf{W} = [\mathbf{V}] \subset \left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right] \subset \mathbf{W}$, isto é,

$$\left[\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{W}_j \right] = \mathbf{W}. \quad (1.8)$$

Mostremos agora que existe C , com $1 \leq C < \infty$, tal que $\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_{\mathbf{V}} \leq C \left\| \sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right\|_{\mathbf{V}}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}$, e $\mathbf{w}_j \in \mathcal{W}_j$ ($j = 1, 2, \dots, n+m$).

Caso 1: Seja $\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_{\mathbf{V}} = \sup\{\|\mathbf{w}_j\| : 1 \leq j \leq n\}$.

Como $\sup\{\|\mathbf{w}_j\| : 1 \leq j \leq n\} \leq \sup\{\|\mathbf{w}_j\| : 1 \leq j \leq n+m\}$; então $\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_{\mathbf{V}} \leq \sup\{\|\mathbf{w}_j\| : 1 \leq j \leq n+m\} \leq \left\| \sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right\|_{\mathbf{V}}$.

Caso 2: Seja $\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_{\mathbf{V}} = \sup \left\{ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| u_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\}$.

$$\begin{aligned} & \text{Fixado } i \in N_1, \text{ teremos } \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| u_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| \sum_{j=1}^n u_{ik}^*(\mathbf{w}_j) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^n |u_{ik}^*(\mathbf{w}_k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^{n+m} |u_{ik}^*(\mathbf{w}_k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| \sum_{j=1}^{n+m} u_{ik}^*(\mathbf{w}_j) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| u_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ Logo, } \sup \left\{ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| u_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} \leq \end{aligned}$$

$$\leq \sup \left\{ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| u_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\} \leq \left\| \sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right\|_V.$$

De maneira análoga, teremos $\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V \leq \left\| \sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right\|_V$, para os casos

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V &= \sup \left\{ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| v_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_2 \right\}, \\ \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V &= \sup \left\{ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| w_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_3 \right\} \\ \text{e } \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V &= \sup \left\{ \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left| v_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^4 + \left| w_{ik}^* \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right) \right|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\}. \end{aligned}$$

Concluimos que existe $C = 1$ tal que $\forall m, n \in \mathbb{N}$ e $\mathbf{w}_j \in \mathcal{W}_j$,

$$\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V \leq C \left\| \sum_{j=1}^{n+m} \mathbf{w}_j \right\|_V \quad (1.9)$$

De (1.8) e (1.9), utilizando o Teorema 0.23, temos que $(\mathcal{W}_j)_{j=1}^{\infty}$ é uma decomposição de Schauder do espaço $\mathbf{W}$. Escreveremos $\mathbf{W} = \sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j$. ■

Observação 1.18 Pela Definição 0.19 segue que, dado $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$, existe uma única seqüência $(\mathbf{w}_j)_{j=1}^{\infty}$ com $\mathbf{w}_j \in \mathcal{W}_j$ tal que $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$.

Observação 1.19 Como consequência do lema anterior, temos também que $\|\mathbf{w}\| = \left\| \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j \right\| = \left\| \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V$ e como a constante de decomposição $C = 1$, segue que $\left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V \leq \left\| \sum_{j=1}^{n+1} \mathbf{w}_j \right\|_V \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Concluimos que $\|\mathbf{w}\| = \sup \left\{ \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V : n \in \mathbb{N} \right\}$, onde $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$, $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$.

Além disso, a projeção coordenada P_j associada à decomposição $(\mathcal{W}_j)_{j=1}^{\infty}$, $P_j : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ definida por $P_j(\mathbf{w}) = \mathbf{w}_j$ é, pela Definição 0.21, limitada para todo $j \in \mathbb{N}$ e também $\|P_j(\mathbf{w})\|_V = \|\mathbf{w}_j\|_V \leq \left\| \sum_{k=1}^j \mathbf{w}_k \right\|_V \leq \|\mathbf{w}\|$, isto é, $\|P_j\| = 1, \forall j \in \mathbb{N}$.

Observação 1.20 Considerando cada subespaço $\mathcal{W}_j$ de $\mathbf{W}$, concluímos que a sequência $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ de cópias do espaço X , é também uma decomposição de Schauder de $\mathbf{W}$.

De fato, supondo por exemplo que $i = 2j$ para algum $j \in \mathbb{N}$, a cópia X_i de X é isométrica ao subespaço de $\mathbf{V}$, $X_{2j} = \{(0, 0, \dots, (0, z_{2j}), 0, 0, \dots) : (0, z_{2j}) \in \mathcal{W}\}$ pela isometria $T : X_i \rightarrow X_{2j}$ definida por $T(z_i) = (0, 0, \dots, (0, z_i), 0, 0, \dots)$, pois $\|T(z_i)\|_V = \|(0, 0, \dots, (0, z_i), 0, 0, \dots)\|_V = \|z_i\|$. Assim, para cada $j \in \mathbb{N}$, os subespaços de $\mathbf{W}$, X_{2j-1} e X_{2j} , são fechados.

Além disso, dado $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$, existe uma única sequência $(\mathbf{w}_j)_{j=1}^{\infty}$ com $\mathbf{w}_j \in \mathcal{W}_j$ e $\sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j = \mathbf{w}$, mas como $\mathbf{w}_j \in \mathcal{W}_j \sim X_{2j-1} \oplus X_{2j}$, existe um único par (z_{2j-1}, z_{2j}) com $\mathbf{w}_j = (0, 0, \dots, (z_{2j-1}, z_{2j}), 0, 0, \dots)$.

Assim, dado $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$, existe uma única sequência $(z_{2j-1}, z_{2j})_{j=1}^{\infty}$ com $z_{2j-1} \in X_{2j-1}$ e $z_{2j} \in X_{2j}$ tal que $\sum_{j=1}^{\infty} (z_{2j-1} + z_{2j}) = \mathbf{w}$.

Escreveremos simplesmente $\mathbf{W} = \sum_{i=1}^{\infty} \oplus X_i$ e $\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{\infty} z_i$, $z_i \in X_i$, observando que a convergência se dá na norma definida em $\mathbf{W}$.

Observação 1.21 As projeções $P_i : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ associadas a decomposição $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ de $\mathbf{W}$ são, pela Definição 0.21, limitadas. Além disso, supondo novamente $i = 2j$, temos $\|P_i(\mathbf{w})\|_V = \|(0, 0, \dots, (0, z_{2j}), 0, 0, \dots)\|_V = \|z_{2j}\| \leq \max\{\|z_{2j-1}\|, \|z_{2j}\|\} = \|\mathbf{w}_j\| \leq \|\mathbf{w}_j\|_V \leq \left\| \sum_{k=1}^j \mathbf{w}_k \right\|_V \leq \|\mathbf{w}\|$, isto é, $\|P_i\| = 1$, $\forall i \in \mathbb{N}$.

Lema 1.22 Se X é o espaço de Gowers e Maurey e $\mathbf{W}$ o espaço de Banach da Definição 1.15, então

$$(a) \quad \mathbf{W} \xhookrightarrow{c} X \oplus \mathbf{W} \text{ e } X \oplus \mathbf{W} \xhookrightarrow{c} \mathbf{W};$$

$$(b) \quad (X \oplus \mathbf{W})^2 \sim \mathbf{W};$$

$$(c) (X \oplus \mathbf{W})^3 \sim X \oplus \mathbf{W}.$$

Demonstração: (a) $\mathbf{W} \xrightarrow{c} X \oplus \mathbf{W}$, pois existe $X < X \oplus \mathbf{W}$, tal que $X \oplus \mathbf{W} \sim X \oplus \mathbf{W}$

$$\begin{aligned} \mathbf{W} &= \sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \sim \mathcal{W}_1 \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \sim (X_1 \oplus X_2) \oplus \left(\sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \right) \\ &\sim X_1 \oplus \left(X_2 \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \right) \end{aligned} \quad (1.10)$$

Mostraremos que $\sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \sim \mathbf{W}$, logo o subespaço de $\mathbf{W}$, $X_2 \oplus \left(\sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \right)$, será isomorfo a $X \oplus \mathbf{W}$, pois X_2 é cópia isométrica de X e daí teremos $X_1 \oplus \left(X_2 \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j \right) \right) \sim X \oplus (X \oplus \mathbf{W})$ assim, por (1.10), obteremos $\mathbf{W} \sim X \oplus (X \oplus \mathbf{W})$ e $X \oplus \mathbf{W} \xrightarrow{c} \mathbf{W}$.

Para mostrarmos que $\mathbf{W} \sim \sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j$, observemos que $\sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j$ é a decomposição de Schauder de um subespaço fechado $\mathbf{W}_0$ de $\mathbf{W}$ ($\mathbf{W} \sim \mathcal{W}_1 \oplus \mathbf{W}_0$) e que dado $\mathbf{w} \in \mathbf{W}_0$, existe uma única seqüência $(\mathbf{w}_j)_{j=1}^{\infty}$ com $\mathbf{w}_1 = 0$ tal que $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$.

Associamos a $\mathbf{w}$ a seqüência $(0, w_2, w_3, \dots, w_j, w_{j+1}, \dots)$, com $\|\mathbf{w}\| = \sup \left\{ \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V : n \in \mathbb{N} \right\} = \sup \{ \|(0, w_2, w_3, \dots, w_j, 0, 0, \dots)\|_V : j \in \mathbb{N} \}.$

Definimos então, a aplicação linear $T : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}_0$ por $T(\mathbf{w}) = T(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) = (0, w_1, w_2, \dots, w_j, \dots).$

A aplicação T está bem definida, pois $T(\mathbf{w}) = (0, w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)$ e $\sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$ converge, já que $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) \in \mathbf{W}$.

T é isometria, pois $\|T(\mathbf{w})\| = \|T(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)\| = \|(0, w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)\| = \sup \{ \|(0, w_1, w_2, \dots, w_j, 0, 0, \dots)\|_V : j \in \mathbb{N} \} = \sup \{ \|(w_1, w_2, \dots, w_j, 0, 0, \dots)\|_V : j \in \mathbb{N} \} = \|\mathbf{w}\|.$

Finalizando, dado $\mathbf{z} \in \mathbf{W}_0$, $\mathbf{z} = (0, w_2, w_3, \dots, w_j, \dots)$, temos que $\mathbf{z} = \sum_{j=2}^{\infty} \mathbf{w}_j$ converge, logo existe $\mathbf{x} = (w_2, w_3, \dots, w_j, \dots)$, $\mathbf{x} \in \mathbf{W}$, tal que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{z}$.

Assim, T é isometria sobre $\mathbf{W}_0$ e $\mathbf{W} \sim \sum_{j=2}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_j$.

(b) $X \oplus \mathbf{W} \sim X_1 \oplus \mathbf{W}$ e $X \oplus \mathbf{W} \sim X_2 \oplus \mathbf{W}$, logo

$$(X \oplus \mathbf{W})^2 \sim (X_1 \oplus \mathbf{W}) \oplus_{\infty} (X_2 \oplus \mathbf{W}). \quad (1.11)$$

Mostremos inicialmente que $\mathbf{W} \sim \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j+1} \right)$ e $\mathbf{W} \sim \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right)$.

Observemos que $\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j}$ é a decomposição de Schauder de um subespaço fechado $\mathbf{W}_2$ de $\mathbf{W}$ ($\mathbf{W} \sim \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j-1} \right) \oplus \mathbf{W}_2$) e dado $\mathbf{w} \in \mathbf{W}_2$, existe uma única sequência $(\mathbf{w}_j)_{j=1}^{\infty}$ com $\mathbf{w}_{2j-1} = 0$, tal que $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$.

Identificamos $\mathbf{w}$ com a sequência $(0, w_2, 0, w_4, 0, w_6, \dots, 0, w_{2j}, 0, \dots)$ e $\|\mathbf{w}\| = \sup \left\{ \left\| \sum_{j=1}^n \mathbf{w}_j \right\|_V : n \in \mathbb{N} \right\} = \sup \{ \|(0, w_2, 0, w_4, 0, \dots, 0, w_{2j}, 0, \dots)\|_V : j \in \mathbb{N} \}$.

Dado $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)$, definimos a aplicação linear $T : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}_2$ por $T(\mathbf{w}) = (0, w_1, 0, w_2, \dots, 0, w_j, \dots)$.

A aplicação T está bem definida, pois $T(\mathbf{w}) = (0, w_1, 0, w_2, \dots, 0, w_j, 0, \dots)$ e $\sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$ converge, já que $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) \in \mathbf{W}$.

A aplicação T é isometria, pois $\|T(\mathbf{w})\| = \|T(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)\| = \|(0, w_1, 0, w_2, 0, \dots, 0, w_j, \dots)\| = \sup \{ \|(0, w_1, 0, w_2, 0, \dots, 0, w_j, 0, \dots)\|_V : j \in \mathbb{N} \} = \sup \{ \|(w_1, w_2, \dots, w_j, 0, 0, \dots)\|_V : j \in \mathbb{N} \} = \|\mathbf{w}\|$.

Temos também que se $\mathbf{z} \in \mathbf{W}_2$, $\mathbf{z} = (0, w_2, 0, w_4, 0, \dots, 0, w_{2j}, \dots)$, $\mathbf{z} = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_{2j}$ converge, segue que existe $\mathbf{x} = (w_2, w_4, \dots, w_{2j}, \dots)$, $\mathbf{x} \in \mathbf{W}$, tal que $T(\mathbf{x}) = \mathbf{z}$.

Assim, T é isometria sobre $\mathbf{W}_2$ e $\mathbf{W} \sim \sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j}$.

Considerando $\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j+1}$ a decomposição de Schauder do subespaço $\mathbf{W}_3$ de

$\mathbf{W}$ e definindo a aplicação linear $T : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}_3$ por $T(w_1, w_2, \dots, w_j, \dots) = (0, 0, w_1, 0, w_2, 0, \dots, w_j, \dots)$, concluimos, utilizando raciocínio análogo ao caso anterior, que $\mathbf{W} \sim \mathbf{W}_3$.

$$\begin{aligned} \text{Agora, de (1.11), teremos } (X \oplus \mathbf{W})^2 &\sim \left(X_1 \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j+1} \right) \right) \oplus_{\infty} \left(X_2 \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right) \right) \\ &\sim \left(X_1 \oplus X_2 \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j+1} \right) \right) \oplus_{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right) \sim \left(\mathcal{W}_1 \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j+1} \right) \right) \oplus_{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right) \\ &\sim \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j-1} \right) \oplus_{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right) \sim \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j-1} \right) \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right) \sim \mathbf{W}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } (X \oplus \mathbf{W})^3 &\sim (X \oplus \mathbf{W})^2 \oplus_{\infty} (X \oplus \mathbf{W}) \sim \mathbf{W} \oplus_{\infty} (X \oplus \mathbf{W}) \sim \mathbf{W} \oplus (\mathbf{W} \oplus X) \sim \\ &(\mathbf{W} \oplus \mathbf{W}) \oplus X \sim \mathbf{W} \oplus X \sim X \oplus \mathbf{W}. \end{aligned}$$

$$\text{Observemos que } \mathbf{W} \oplus \mathbf{W} \sim \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j-1} \right) \oplus \left(\sum_{j=1}^{\infty} \oplus \mathcal{W}_{2j} \right) \sim \mathbf{W} \quad \blacksquare$$

A partir deste lema concluimos que $\mathbf{W}$ e $X \oplus \mathbf{W}$ são espaços de Banach, tais que $\mathbf{W} \xhookrightarrow{c} X \oplus \mathbf{W}$ e $X \oplus \mathbf{W} \xhookrightarrow{c} \mathbf{W}$.

Nosso principal objetivo é mostrar que $\mathbf{W} \not\sim X \oplus \mathbf{W}$. Observemos que se $Z = X \oplus \mathbf{W}$, o contra-exemplo para o problema de Schroeder-Bernstein será dado por $Z = X \oplus \mathbf{W}$ e $Z^2 \sim \mathbf{W}$ (pelo item (b) do lema anterior). Teremos também, $Z \sim Z^3$ (pelo item (c) do mesmo lema).

Capítulo 2

Uma solução para o problema de Schroeder-Bernstein para espaços de Banach

Neste capítulo mostraremos que o par de espaços de Banach $\mathbf{W}$ e $X \oplus \mathbf{W}$, definidos no capítulo anterior, é contra-exemplo para o problema de Schroeder-Bernstein.

Novamente, para facilitar a leitura, apresentaremos a seguir a estrutura dos resultados deste capítulo.

Apoiados na propriedade do Lema 1.7 do Capítulo 1, será possível a cada operador $T \in B(\mathbf{W})$ associar uma única matriz infinita de números reais, $\Lambda_T \in M_\infty(\mathbb{R})$ e um único operador $T_\Lambda \in c_0$, de tal forma que $T_\Lambda(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$. Indicaremos por $\Phi : B(\mathbf{W}) \rightarrow B(c_0)$ esta associação, isto é, $\Phi(T) = T_\Lambda$.

Mostraremos no Lema 2.18 que Φ é um homomorfismo sobre a álgebra dos operadores de $\mathbf{W}$. No Lema 2.21 mostraremos que, se $\Phi(T) = T_\Lambda$ é um operador de Fredholm, então $i(T_\Lambda)$ é par.

No resultado principal (Teorema 2.22), iremos supor que exista $T : \mathbf{W} \rightarrow X \oplus \mathbf{W}$,

T um isomorfismo e concluiremos que, neste caso, $\Phi(T) = T_\Lambda$ é um operador de Fredholm com $i(T_\Lambda)$ ímpar, logo $\mathbf{W} \not\sim X \oplus \mathbf{W}$.

A teoria apresentada neste capítulo pode ser encontrada em [G].

Provaremos inicialmente um lema, que será utilizado posteriormente por razões essencialmente “técnicas”.

Lema 2.1 *Se $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_N$ é uma seqüência de vetores sucessivos de $\mathbf{W}$, então*

$$\left\| \sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right\|_V \leq \left(\sum_{k=1}^N \|\mathbf{w}_k\|_V^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Demonstração: Observemos antes da demonstração, que os vetores $\mathbf{w}_k$ no enunciado do lema, não são necessariamente os vetores $\mathbf{w}_k = (0, 0, \dots, w_k, 0, \dots) \in \mathcal{W}_k$, definidos anteriormente na decomposição de Schauder de $\mathbf{W}$, mas sim quaisquer vetores de suporte finito de $\mathbf{W}$. Seja $\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k = (w_1, w_2, \dots, w_j, \dots)$.

Caso 1: $\left\| \sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right\|_V = \sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\}.$

$$\text{Neste caso, } \sup\{\|w_j\| : j \in \mathbb{N}\} \leq \sup \left\{ \left\| P_j \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right) \right\|_V : j \in \mathbb{N} \right\}.$$

Como $\mathbf{w}_1 < \mathbf{w}_2 < \dots < \mathbf{w}_k$, existirá k_0 com $1 \leq k_0 \leq N$ e $j_0 \in \mathbb{N}$, tais que

$$\begin{aligned} \sup \left\{ \left\| P_j \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right) \right\|_V : j \in \mathbb{N} \right\} &= \|P_{j_0}(\mathbf{w}_{k_0})\|_V \leq \|\mathbf{w}_{k_0}\|_V = (\|\mathbf{w}_{k_0}\|_V^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^N \|\mathbf{w}_k\|_V^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Caso 2: Seja $\left\| \sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right\|_V = \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^\infty \left| u_{ij}^* \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} : i \in N_1 \right\}.$

$$\text{Fixados } i \in N_1 \text{ e } j \in \mathbb{N}, \text{ teremos } \left| u_{ij}^* \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right) \right|^2 = \left| \sum_{k=1}^N u_{ij}^*(\mathbf{w}_k) \right|^2.$$

Como $\mathbf{w}_1 < \mathbf{w}_2 < \dots < \mathbf{w}_N$, $\left| \sum_{k=1}^N u_{ij}^*(\mathbf{w}_k) \right|^2 = |u_{ij}^*(\mathbf{w}_k)|^2$ para um único k ,
tal que $P_j(\mathbf{w}_k) \neq 0$ ou $\left| \sum_{k=1}^N u_{ij}^*(\mathbf{w}_k) \right|^2 = 0$, se $P_j(\mathbf{w}_k) = 0$, $1 \leq k \leq N$. Assim,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left| u_{ij}^* \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right) \right|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^N u_{ij}^*(\mathbf{w}_k) \right|^2 = \sum_{k=1}^N \left(\sum_{j=1}^{\infty} |u_{ij}^*(\mathbf{w}_k)|^2 \right) \leq \sum_{k=1}^N \|\mathbf{w}_k\|_V^2.$$

Concluimos que $\left(\sum_{j=1}^{\infty} \left| u_{ij}^* \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^N \|\mathbf{w}_k\|_V^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ para todo $i \in N_1$. Logo,

$$\left\| \sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right\|_V \leq \left(\sum_{k=1}^N \|\mathbf{w}_k\|_V^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

De maneira análoga, obtemos a desigualdade ao trocarmos u_{ij}^* por v_{ij}^* ou w_{ij}^* no valor de $\left\| \sum_{k=1}^N \mathbf{w}_k \right\|_V$. ■

Definição 2.2 Sejam $P_i : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ as projeções coordenada associadas à decomposição $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ de $\mathbf{W}$ e $T : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ um operador limitado. Definimos para cada $i, j \in \mathbb{N}$ o operador $T_{ij} : X_j \rightarrow X_i$ como sendo a restrição de $P_i T$ em X_j , isto é, $T_{ij} = P_i T|_{X_j}$.

Observação 2.3 T_{ij} é limitado para todo $i, j \in \mathbb{N}$ pois $T \in B(\mathbf{W})$ e P_i é limitado para todo $i \in \mathbb{N}$ (pela Observação 1.21).

Pelo Lema 1.7, para cada $i, j \in \mathbb{N}$ existe $\lambda_{ij} \in \mathbb{R}$, tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij} x_{ni} = 0$, onde $(x_{ni})_{n=1}^{\infty}$ indica a cópia da seqüência de X , $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ do Lema 1.7, em cada X_i .

Observação 2.4 Para cada $i, j \in \mathbb{N}$, $\lambda_{ij} \in \mathbb{R}$ é único, pois se λ_{ij} e β_{ij} são tais que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij} x_{nj} - \lambda_{ij} x_{ni} = 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij} x_{nj} - \beta_{ij} x_{ni} = 0$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\beta_{ij} - \lambda_{ij}) x_{ni} = 0$ segue que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |\beta_{ij} - \lambda_{ij}| \|x_{ni}\| = 0$, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} |\beta_{ij} - \lambda_{ij}| = 0$ e conseqüentemente $\lambda_{ij} = \beta_{ij}$.

Definição 2.5 Dado $T \in B(\mathbf{W})$ pela observação anterior, podemos definir uma aplicação $\phi : B(\mathbf{W}) \rightarrow M_\infty(\mathbb{R})$ por $\phi(T) = (\lambda_{ij})_{i,j=1}^\infty$, onde o termo geral $\lambda_{ij} \in \mathbb{R}$ é tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij}x_{ni} = 0$ e $M_\infty(\mathbb{R})$ é o espaço vetorial das matrizes infinitas sobre $\mathbb{R}$.

Escreveremos $\phi(T) = \Lambda_T = (\lambda_{ij})_{i,j=1}^\infty$, para representar esta matriz associada ao operador $T \in B(\mathbf{W})$.

Observação 2.6 $\phi : B(\mathbf{W}) \rightarrow M_\infty(\mathbb{R})$ é uma aplicação linear. De fato, sejam $T, S \in B(\mathbf{W})$, $\Lambda_T = (\lambda_{ij})_{i,j=1}^\infty$ e $\Lambda_S = (\beta_{ij})_{i,j=1}^\infty$ as matrizes associadas aos operadores T e S .

Para todo $i, j \in \mathbb{N}$, teremos $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij}x_{ni} = 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{ij}(x_{nj}) - \beta_{ij}x_{ni} = 0$. Logo, $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) + S_{ij}(x_{nj}) - (\lambda_{ij} + \beta_{ij})x_{ni} = 0$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} (T_{ij} + S_{ij})(x_{nj}) - (\lambda_{ij} + \beta_{ij})x_{ni} = 0$, portanto $\lim_{n \rightarrow +\infty} (T + S)_{ij}(x_{nj}) - (\lambda_{ij} + \beta_{ij})x_{ni} = 0$, isto é, $\phi(T + S) = \Lambda_{T+S} = (\lambda_{ij} + \beta_{ij})_{i,j=1}^\infty = \Lambda_T + \Lambda_S = \phi(T) + \phi(S)$.

Além disso, dado $\gamma \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij}x_{ni} = 0$, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} \gamma[T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij}x_{ni}] = 0$, portanto $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\gamma T)_{ij}(x_{nj}) - (\gamma \lambda_{ij})x_{ni} = 0$, conseqüentemente $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\gamma T)_{ij}(x_{nj}) - (\gamma \lambda_{ij})x_{ni} = 0$, isto é, $\phi(\gamma T) = \Lambda_{\gamma T} = (\gamma \lambda_{ij})_{i,j=1}^\infty = \gamma \Lambda_T = \gamma \phi(T)$.

Mostraremos a seguir que a cada operador $T \in B(\mathbf{W})$ podemos associar, a partir de uma aplicação que denominaremos de Φ , um único operador $T_\Lambda \in c_0$, tal que $T_\Lambda(a) = \phi(T)(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$, onde $\Lambda_T = (\lambda_{ij})_{i,j=1}^\infty$ é a matriz associada ao operador T .

Nosso objetivo imediato será mostrar que $\Phi : \mathbf{W} \rightarrow c_0$ é na verdade um homomorfismo de álgebra; para isso precisaremos dos lemas que virão a seguir (2.10, 2.11, 2.12, 2.14 e 2.16). Antes porém, daremos a definição de um produto que utilizaremos nesses lemas.

Definição 2.7 Sejam $S = \{(a_i)_{i=1}^\infty, a_i \in \mathbb{R}\}$ o espaço vetorial das seqüências de números reais e X o espaço de Gowers e Maurey. Dados $a \in S$ e $z \in X$, definimos o produto $a \otimes z$ pelo vetor $(a_1z, a_2z, \dots, a_nz, \dots)$.

Escreveremos $(a \otimes z)_i$, para representar a projeção do vetor em cada cópia X_i de X , isto é, $(a \otimes z)_i = a_i z_i$ e $(a \otimes z)_j$ para representar a projeção do vetor em $\mathcal{W}_j$, isto é, $(a \otimes z)_j = a_{2j-1}z_{2j-1} + a_{2j}z_{2j}$. Assim, representaremos também o vetor $a \otimes z$, a partir da seqüência: $(a_1z_1, a_2z_2, \dots, a_i z_i, \dots)$ onde z_i é cópia de $z \in X$, em cada cópia X_i .

Observação 2.8 Se $a \otimes z \in \mathbf{W}$, escreveremos também $a \otimes z = \sum_{i=1}^\infty a_i z_i$ e $(a \otimes z)_i = P_i(a \otimes z)$, onde P_i são as projeções associadas à decomposição $(X_i)_{i=1}^\infty$ de $\mathbf{W}$.

Analogamente, se $a \otimes z \in \mathbf{W}$, escreveremos também $a \otimes z = \sum_{j=1}^\infty w_j$ e $(a \otimes z)_j = P_j(a \otimes z)$, onde P_j são as projeções associadas à decomposição $(\mathcal{W}_j)_{j=1}^\infty$ de $\mathbf{W}$.

Observação 2.9 Se $a \in c_{00}$, então $a \otimes z \in \mathbf{W}$, pois $a \otimes z \in \mathbf{V}$, já que $\text{supp}(a)$ é finito.

Lema 2.10 Se $a \in c_{00}$, $T \in B(\mathbf{W})$ e $\Lambda_T = (\lambda_{k,j})_{k,j}^\infty$ é a matriz associada a T , então a seqüência $T(a \otimes x_n) - (\Lambda_T a) \otimes x_n$ converge pontualmente a zero, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (T(a \otimes x_n))_i - (\Lambda_T a \otimes x_n)_i = 0$.

Demonstração: Seja $a \in c_{00}$ com $\text{máx supp}(a) = p$, então $T(a \otimes x_n) = T(a_1x_{n1} + a_2x_{n2} + \dots + a_px_{np}) = \sum_{j=1}^p a_j T(x_{nj})$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$\text{Assim, } (T(a \otimes x_n))_i = \sum_{j=1}^p a_j (T(x_{nj}))_i = \sum_{j=1}^p a_j T_{ij}(x_{nj}).$$

$$\text{Por outro lado, } \Lambda_T a = (\lambda_{11}a_1 + \lambda_{12}a_2 + \dots + \lambda_{1p}a_p, \lambda_{21}a_1 + \dots + \lambda_{2p}a_p, \dots, \lambda_{k1}a_1 + \dots + \lambda_{kp}a_p, \dots) = \left(\sum_{j=1}^p \lambda_{kj}a_j \right)_{k=1}^\infty \text{ e } (\Lambda_T a \otimes x_n) = \left(\sum_{j=1}^p \lambda_{kj}a_j x_{nk} \right)_{k=1}^\infty, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Portanto, $(\Lambda_T a \otimes x_n)_i = \sum_{j=1}^p \lambda_{ij} a_j x_{ni}$.

Assim, fixado $i \in \mathbb{N}$, $(T(a \otimes x_n))_i - (\Lambda_T a \otimes x_n)_i = \sum_{j=1}^p a_j T_{ij}(x_{nj}) - \sum_{j=1}^p \lambda_{ij} a_j x_{ni} = \sum_{j=1}^p a_j [T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij} x_{ni}]$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij} x_{ni} = 0$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_j [T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij} x_{ni}] = 0$, para cada j , $1 \leq j \leq p$.

Podemos concluir então que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^p a_j [T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij} x_{ni}] = 0. \quad \blacksquare$$

Lema 2.11 (a) Se $c \in c_0$ e $n \in N_0$, então $c \otimes x_n \in \mathbf{W}$ e $\|c \otimes x_n\| = \|c\|_\infty$.

(b) Se $a \in c_{00}$ e $n \in N_4$, então $\|a \otimes x_n\|_V = \|a\|_4$.

Demonstração: (a) Sejam $c \in c_0$, $c = (c_i)_{i=1}^\infty$ e $n \in N_0$. Mostremos que $c \otimes x_n = (c_1 x_{n1}, c_2 x_{n2}, \dots, c_i x_{ni}, \dots)$ é um vetor de $\mathbf{W}$, isto é, que $\sum_{i=1}^\infty c_i x_{ni}$ converge na norma definida em $\mathbf{V}$.

Consideremos a seqüência das somas parciais $S_k = \sum_{i=1}^k c_i x_{ni}$. Sejam $l, k \in \mathbb{N}$, com $l > k$, logo $\|S_l - S_k\|_V = \left\| \sum_{i=1}^l c_i x_{ni} - \sum_{i=1}^k c_i x_{ni} \right\|_V = \|c_{k+1} x_{nk+1} + c_{k+2} x_{nk+2} + \dots + c_l x_{nl}\|_V$.

Observemos que se $n \in N_0$ e $i \in N_1$, então para todo $j \in \mathbb{N}$, $u_{ij}^*(c_{2j-1} x_{n2j-1}, c_{2j} x_{n2j}) = (x_i^*, -x_i^*)(c_{2j-1} x_{n2j-1}, c_{2j} x_{n2j}) = c_{2j-1} x_i^*(x_{n2j-1}) - c_{2j} x_i^*(x_{n2j}) = c_{2j-1} 0 - c_{2j} 0 = 0$; pois $N_0 \cap N_1 = \emptyset$.

O mesmo ocorrerá com v_{ij}^* se $i \in N_2$, w_{ij}^* se $i \in N_3$ e também com v_{ij}^* e w_{ij}^* se $i \in N_4$. Assim, $\|S_l - S_k\|_V = \max \{\|c_i x_{ni}\| : k+1 \leq i \leq l\} = \max \{|c_i| \|x_{ni}\| : k+1 \leq i \leq l\} = \max \{|c_i| : k+1 \leq i \leq l\}$, mas $\lim_{i \rightarrow +\infty} |c_i| = 0$, logo $\|S_l - S_k\|_V \rightarrow 0$ se $l, k \rightarrow +\infty$, isto é, $\sum_{i=1}^\infty c_i x_{ni}$ converge e $c \otimes x_n \in \mathbf{W}$.

Pela Observação 1.19, temos $\|c \otimes x_n\| = \left\| \sum_{i=1}^{\infty} c_i x_{ni} \right\| = \sup \left\{ \left\| \sum_{i=1}^k c_i x_{ni} \right\|_V : k \in \mathbb{N} \right\} = \sup \{ \|c_i x_{ni}\| : i \in \mathbb{N} \} = \sup \{ |c_i| : i \in \mathbb{N} \} = \|c\|_{\infty}$.

(b) Sejam $n_0 \in N_4$ e $a \in c_{00}$ com $\max \text{supp}(a) = p$. Como $n_0 \in N_4$, pela definição de norma em V , se $i \in N_1$, então para todo $j \in \mathbb{N}$, temos $u_{ij}^*(w_j) = u_{ij}^*(a_{2j-1}x_{n_0 2j-1} + a_{2j}x_{n_0 2j}) = (x_i^*, -x_i^*)(a_{2j-1}x_{n_0 2j-1} + a_{2j}x_{n_0 2j}) = a_{2j-1}x_i^*(x_{n_0 2j-1}) - a_{2j}x_i^*(x_{n_0 2j}) = a_{2j-1}0 - a_{2j}0 = 0$, pois $N_4 \cap N_1 = \emptyset$.

O mesmo ocorrerá com v_{ij}^* se $i \in N_2$, w_{ij}^* se $i \in N_3$ e também com v_{ij}^* e w_{ij}^* se $i \in N_4$ com $i \neq n_0$. Assim, $\|a \otimes x_{n_0}\|_V = \left\| \sum_{i=1}^p a_i x_{n_0 i} \right\|_V = \max \{ \|a_i x_{n_0 i}\| : 1 \leq i \leq p \} \vee \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{ij}^*(a \otimes x_{n_0})|^4 + |w_{ij}^*(a \otimes x_{n_0})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : i \in N_4 \right\} = \max \{ |a_i| : 1 \leq i \leq p \} \vee \left(|x_{n_0}^*(a_1 x_{n_0 1})|^4 + |x_{n_0}^*(a_2 x_{n_0 2})|^4 + \cdots + |x_{n_0}^*(a_p x_{n_0 p})|^4 \right)^{\frac{1}{4}} = \max \{ |a_i| : 1 \leq i \leq p \} \vee \left(\sum_{i=1}^p |a_i|^4 \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\sum_{i=1}^p |a_i|^4 \right)^{\frac{1}{4}} = \|a\|_4. \blacksquare$

Lema 2.12 *Se $T \in B(W)$ e Λ_T é a matriz associada a T , $(\phi(T) = \Lambda_T)$, então existe um único operador $T_{\Lambda} \in B(c_0)$, tal que $T_{\Lambda}(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$. Além disso, $\|T_{\Lambda}\| \leq \|T\|$.*

Demonstração: Seja $T \in B(W)$, $T = 0$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_{ij}(x_{nj}) - \lambda_{ij}(x_{ni}) = 0$ é equivalente a $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\lambda_{ij}(x_{ni}) = 0$, isto é, $\lambda_{ij} = 0$, logo $\Lambda_T = (0)_{i,j=1}^{\infty}$ e T_{Λ} é o operador nulo de c_0 .

Caso contrário podemos supor, sem perda de generalidade, que $\|T\| = 1$.

Consideremos $L : c_{00} \rightarrow l_{\infty}$ definida por $L(a) = \Lambda_T a = \phi(T)(a)$, $\forall a \in c_{00}$.

Afirmamos que se $\|a\|_{\infty} = 1$, então $\|\Lambda_T a\|_{\infty} \leq 1$. Provada esta afirmação, teremos mostrado que L está bem definida, pois dado $a \in c_{00}$, $\left\| \Lambda_T \frac{a}{\|a\|_{\infty}} \right\|_{\infty} \leq 1$ acarreta $\|\Lambda_T a\|_{\infty} \leq \|a\|_{\infty}$ e $\Lambda_T a \in l_{\infty}$, e também que a aplicação linear L de c_{00}

para l_∞ é limitada, com norma menor ou igual a 1.

Suponhamos que a afirmação anterior seja falsa, logo existe $a \in c_{00}$, com $\|a\|_\infty = 1$ e $\varepsilon > 0$, tais que $\|\Lambda_T a\|_\infty \geq 1 + 3\varepsilon$.

Seja $b = \Lambda_T a$, fixemos i , tal que $|b_i| \geq 1 + 2\varepsilon$ (isto é possível, pois $\|\Lambda_T a\|_\infty \geq 1 + 3\varepsilon$).

Pelo Lema 2.10, temos que $T(a \otimes x_n) - b \otimes x_n$ converge pontualmente a zero, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_i(T(a \otimes x_n)) - b_i x_{ni} = 0$, para todo $i \in \mathbb{N}$.

Logo, para i fixado anteriormente, existirá n_i tal que se $n > n_i$, então $\|P_i(T(a \otimes x_n)) - b_i x_{ni}\| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Temos também $\|b_i x_{ni}\| = |b_i| \geq 1 + 2\varepsilon$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Como $\|b_i x_{ni}\| = \|P_i(T(a \otimes x_n)) + b_i x_{ni} - P_i(T(a \otimes x_n))\| \leq \|P_i(T(a \otimes x_n)) - b_i x_{ni}\| + \|P_i(T(a \otimes x_n))\|$, podemos tomar $n_0 \in \mathbb{N}$, $n_0 > n_i$ tal que $\|P_i(T(a \otimes x_{n_0}))\| \geq \|b_i x_{n_0 i}\| - \|P_i(T(a \otimes x_{n_0})) - b_i x_{n_0 i}\| \geq 1 + 2\varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} \geq 1 + \varepsilon$.

Segue que $1 + \varepsilon \leq \|P_i(T(a \otimes x_{n_0}))\| \leq \|T(a \otimes x_{n_0})\|$, mas $n_0 \in \mathbb{N}$, logo pelo Lema 2.11 item (a), $\|a \otimes x_{n_0}\|_V = \|a\|_\infty = 1$;

Obtemos assim $1 + \varepsilon \leq \|T(a \otimes x_{n_0})\| \leq \|a \otimes x_{n_0}\|_V = 1$, o que é uma contradição.

Assim, $L : c_{00} \rightarrow l_\infty$ é uma aplicação linear limitada com $\|L\| \leq 1$. Podemos estender L a um operador único $T_\Lambda : c_0 \rightarrow l_\infty$, com $T_\Lambda(a) = L(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$ e $\|T_\Lambda\| \leq 1$. Mostramos, que se $\|T\| = 1$, então $\|T_\Lambda\| \leq 1$, isto é, $\forall T \in B(\mathbf{W})$, $\|T_\Lambda\| \leq \|T\|$.

Vamos agora, utilizando argumentos semelhantes, mostrar que $\bar{T}_\Lambda$ é um operador limitado de c_0 para c_0 .

Consideraremos para $a \in c_{00}$, com $\text{máx supp}(a) = p$, $\|a\|_4 = \left(\sum_{i=1}^p |a_i|^4\right)^{\frac{1}{4}}$.

Dado $T \in B(\mathbf{W})$, seja $L_1 : c_{00} \rightarrow l_4$ definida por $L_1(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$. Afirmamos que se $\|a\|_4 = 1$, então $\|\Lambda_T a\|_4 \leq 1$, onde denotando $b = \Lambda_T a$, $\|\Lambda_T a\|_4 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^4\right)^{\frac{1}{4}}$.

Provada esta afirmação, teremos mostrado como no caso anterior que dado $a \in c_{00}$, $\left\|\Lambda_T \frac{a}{\|a\|_4}\right\|_4 \leq 1$ acarreta $\|\Lambda_T a\|_4 \leq \|a\|_4$, logo $\Lambda_T a \in l_4$ e L_1 estará bem definida e assim, mostraremos que se $a \in c_{00}$, então $\Lambda_T a \in c_0$.

Suponhamos novamente que a afirmação seja falsa, logo existem $a \in c_{00}$ com $\|a\|_4 = 1$ e $\varepsilon > 0$ tais que $\|\Lambda_T a\|_4 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^4\right)^{\frac{1}{4}} \geq 1 + 3\varepsilon$. Fixemos $M \in \mathbb{N}$ tal que $\left(\sum_{i=1}^M |b_i|^4\right)^{\frac{1}{4}} \geq 1 + 2\varepsilon$ (isto é possível, pois $\|\Lambda_T a\|_4 \geq 1 + 3\varepsilon$).

Pelo Lema 2.10, temos que $T(a \otimes x_n) - b \otimes x_n$ converge pontualmente a zero, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_i(T(a \otimes x_n)) - b_i x_{ni} = 0$.

Portanto existem $n_1, n_2, \dots, n_M$ naturais, tais que se $n > \text{máx}\{n_1, n_2, \dots, n_M\}$, então $\|P_i(T(a \otimes x_n)) - b_i x_{ni}\| \leq \frac{\varepsilon}{2i}$, $1 \leq i \leq M$.

Segue que existe $n_0 \in N_4$, $n_0 > \text{máx}\{n_1, \dots, n_M\}$ tal que

$$\|P_i(T(a \otimes x_{n_0})) - b_i x_{n_0 i}\| \leq \frac{\varepsilon}{2i}, \quad 1 \leq i \leq M. \quad (2.1)$$

Temos também que para todo i , $1 \leq i \leq M$, $|x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0}))) - b_i x_{n_0 i}| \leq \|x_{n_0}^*\| \|P_i(T(a \otimes x_{n_0})) - b_i x_{n_0 i}\| = \|P_i(T(a \otimes x_{n_0})) - b_i x_{n_0 i}\|$.

Assim, de (2.1) teremos também:

$$|x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0}))) - b_i x_{n_0 i}| \leq \frac{\varepsilon}{2i}, \quad 1 \leq i \leq M. \quad (2.2)$$

Além disso, da Observação 1.19, $\|T(a \otimes x_{n_0})\| \geq \left\| \sum_{i=1}^M P_i(T(a \otimes x_{n_0})) \right\|_V$.

Pela definição de norma em V e considerando $P_i(T(a \otimes x_{n_0})) = z_i \in X_i$ e $w_j = z_{2j-1} + z_{2j}$, teremos:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^M P_i(T(a \otimes x_{n_0})) \right\|_V &\geq \sup \left\{ \left(\sum_{j=1}^{\infty} |v_{n_j}^*(w_j)|^4 + |w_{n_j}^*(w_j)|^4 \right)^{\frac{1}{4}} : n \in N_4 \right\} \\ &\geq \left(|x_{n_0}^*(z_1)|^4 + |x_{n_0}^*(z_2)|^4 + \cdots + |x_{n_0}^*(z_M)|^4 \right)^{\frac{1}{4}} \\ &= \left(\sum_{i=1}^M |x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0})))|^4 \right)^{\frac{1}{4}} \end{aligned} \quad (2.3)$$

Observemos também que $b_i = x_{n_0}^*(b_i x_{n_0 i}) - x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0}))) + x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0})))$, logo pela desigualdade de Minkowsky [Ho, pág. 98], podemos escrever:

$$\left(\sum_{i=1}^M |x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0})))|^4 \right)^{\frac{1}{4}} \geq \left(\sum_{i=1}^M |b_i|^4 \right)^{\frac{1}{4}} - \left(\sum_{i=1}^M |x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0}))) - b_i x_{n_0 i}|^4 \right)^{\frac{1}{4}} \quad (2.4)$$

Assim, de (2.2), (2.3) e (2.4), obtemos $\|T(a \otimes x_{n_0})\| \geq \left(\sum_{i=1}^M |x_{n_0}^*(P_i(T(a \otimes x_{n_0})))|^4 \right)^{\frac{1}{4}} \geq \left(\sum_{i=1}^M |b_i|^4 \right)^{\frac{1}{4}} - \left(\sum_{i=1}^M \frac{\varepsilon^4}{(2^4)^i} \right)^{\frac{1}{4}} \geq \left(\sum_{i=1}^M |b_i|^4 \right)^{\frac{1}{4}} - \varepsilon \left(\sum_{i=1}^M \frac{1}{(2^4)^i} \right)^{\frac{1}{4}} \geq \left(\sum_{i=1}^M |b_i|^4 \right)^{\frac{1}{4}} - \varepsilon \geq 1 + 2\varepsilon - \varepsilon = 1 + \varepsilon$. Mas, $n_0 \in N_4$, logo pelo Lema 2.11 item (b), $\|a \otimes x_{n_0}\|_V = \|a\|_4 = 1$.

Obtemos então, $1 + \varepsilon \leq \|T(a \otimes x_{n_0})\| \leq \|a \otimes x_{n_0}\|_V = 1$, o que é uma contradição.

Concluimos que dado $T \in B(\mathbf{W})$, podemos definir uma aplicação linear limitada $L : c_{00} \rightarrow c_0$ por $L(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$ e estender L a um operador único limitado $T_\Lambda : c_0 \rightarrow c_0$ com $T_\Lambda(a) = L(a) = \Lambda_T a$, $\forall a \in c_{00}$, além disso $\|T_\Lambda\| \leq \|T\|$. ■

Definição 2.13 A partir do lema anterior podemos definir uma aplicação $\Phi : B(\mathbf{W}) \rightarrow B(c_0)$ por $\Phi(T) = T_\Lambda$, $\forall T \in B(\mathbf{W})$.

Lema 2.14 (a) Sejam $a \in c_{00}$ e $T \in B(\mathbf{W})$. Suponhamos que exista $c \in c_0$ tal que $T(a \otimes x_n) - c \otimes x_n$ converge pontualmente a zero. Então $c = T_\Lambda(a)$.

(b) Sejam $c \in c_0$, $n \in N_0$ e $S \in B(\mathbf{W})$. Então a seqüência $S(c \otimes x_n) - S_\Lambda(c) \otimes x_n$ converge pontualmente a zero.

Demonstração: (a) Seja $b = T_\Lambda(a) - c$. Consideremos a seqüência $b \otimes x_n$. Mostremos que $b \otimes x_n$ converge pontualmente a zero.

De fato, $b \otimes x_n = (T_\Lambda(a) - c) \otimes x_n = T_\Lambda(a) \otimes x_n - c \otimes x_n = -T(a \otimes x_n) + T_\Lambda(a) \otimes x_n + T(a \otimes x_n) - c \otimes x_n$.

Pelo Lema 2.10, $T(a \otimes x_n) - T_\Lambda(a) \otimes x_n$ converge pontualmente a zero e pela hipótese $T(a \otimes x_n) - c \otimes x_n$ converge pontualmente a zero, logo $b \otimes x_n$ converge pontualmente a zero.

Concluimos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b \otimes x_n)_i = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|b_i x_{ni}\| = 0$, conseqüentemente, $|b_i| = 0$ e $b_i = 0$. Assim, $b = 0$ e $T_\Lambda(a) = c$.

(b) Suponhamos que $S = 0$, logo $S(c \otimes x_n) = 0$. Temos também $S_\Lambda = 0$, logo $S(c \otimes x_n) - S_\Lambda(c) \otimes x_n = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e, portanto, converge pontualmente a zero.

Sejam então, $S \in B(\mathbf{W})$, $S \neq 0$, $c \in c_0$, $c = \sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i$ e $\varepsilon > 0$.

Existe $b \in c_{00}$, $b = \sum_{i=1}^p c_i e_i$ tal que $\|c - b\|_\infty < \frac{\varepsilon}{4\|S\|}$.

Consideremos para $n \in N_0$ a seqüência $S(c \otimes x_n - b \otimes x_n) = S((c - b) \otimes x_n)$.

Temos que $\|S((c-b) \otimes x_n)\| \leq \|S\| \|(c-b) \otimes x_n\| = \|S\| \|c-b\|_\infty < \|S\| \frac{\varepsilon}{4\|S\|} = \frac{\varepsilon}{4}$.

Logo, para cada $i \in \mathbb{N}$,

$$\|(S(c \otimes x_n))_i - (S(b \otimes x_n))_i\| = \|P_i(S((c - b) \otimes x_n))\| \leq$$

$$\leq \|P_i\| \|S((c-b) \otimes x_n)\| < \frac{\varepsilon}{4} \quad (2.5)$$

Analisemos agora, para $n \in N_0$, a seqüência $S_\Lambda(b) \otimes x_n - S_\Lambda(c) \otimes x_n = (S_\Lambda(b) - S_\Lambda(c)) \otimes x_n = S_\Lambda(b-c) \otimes x_n$. Neste caso, temos $\|S_\Lambda(b-c) \otimes x_n\| = \|S_\Lambda(b-c)\|_\infty \leq \|S_\Lambda\| \|b-c\|_\infty \leq \|S\| \frac{\varepsilon}{4\|S\|} = \frac{\varepsilon}{4}$. Assim, para cada $i \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \|(S_\Lambda(b) \otimes x_n)_i - (S_\Lambda(c) \otimes x_n)_i\| &= \|P_i(S_\Lambda(b-c) \otimes x_n)\| \\ &\leq \|P_i\| \|S_\Lambda(b-c) \otimes x_n\| < \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Sabemos, pelo Lema 2.10, que $S(b \otimes x_n) - S_\Lambda(b) \otimes x_n$ converge pontualmente a zero logo, para cada $i \in \mathbb{N}$, existe $n_i \in \mathbb{N}$ tal que se $n > n_i$, teremos

$$\|(S(b \otimes x_n))_i - (S_\Lambda(b) \otimes x_n)_i\| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2.7)$$

Finalizando, podemos escrever: $\|(S(c \otimes x_n))_i - (S_\Lambda(c) \otimes x_n)_i\| \leq \|(S(c \otimes x_n))_i - (S(b \otimes x_n))_i\| + \|(S(b \otimes x_n))_i - (S_\Lambda(b) \otimes x_n)_i\| + \|(S_\Lambda(b) \otimes x_n)_i - (S_\Lambda(c) \otimes x_n)_i\|$.

Assim, para cada $i \in \mathbb{N}$, dado $\varepsilon > 0$, $\exists n_i \in N_0$ e $b \in c_{00}$ tais que, se $n > n_i$, utilizando (2.5), (2.6) e (2.7), obtemos $\|(S(c \otimes x_n))_i - (S_\Lambda(c) \otimes x_n)_i\| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$.

Concluimos que para $n \in N_0$, a seqüência $S(c \otimes x_n) - S_\Lambda(c) \otimes x_n$ converge pontualmente a zero. ■

Observação 2.15 Podemos também concluir que para $n \in N_0$, $c \in c_0$ e $S \in B(\mathbf{W})$, se existe $d \in c_0$ tal que a seqüência $S(c \otimes x_n) - d \otimes x_n$ converge pontualmente a zero, então $d = S_\Lambda(c)$. A demonstração é idêntica à do item (a) do lema anterior. Assim, esse resultado e o item (b) do lema anterior, caracterizam a imagem do operador T_Λ , isto é, se $T \in B(\mathbf{W})$, $\Phi(T) = T_\Lambda : c_0 \rightarrow c_0$ é tal que $\text{Im } T_\Lambda = \{d \in c_0 \text{ tal que } T(c \otimes x_n) - d \otimes x_n \text{ converge pontualmente a zero, para } c \in c_0 \text{ e } n \in N_0\}$.

Lema 2.16 Se $T \in B(\mathbf{W})$ e $(z_n)_{n=1}^\infty \in \mathbf{W}$ é uma seqüência limitada que converge pontualmente a zero, então $(T(z_n))_{n=1}^\infty$ converge pontualmente a zero.

Demonstração: Vamos supor que $(T(z_n))_{n=1}^\infty$ não converge pontualmente a zero, em conseqüência existem $\delta > 0$, $i \in \mathbb{N}$ e uma subseqüência de $(T(z_n))_{n=1}^\infty$, que continuaremos denotando por $(T(z_n))_{n=1}^\infty$, tais que $\|P_i(T(z_n))\| > \delta$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Além disso, podemos a partir da hipótese, obter também uma subseqüência de $(z_n)_{n=1}^\infty$, $(z_{n_k})_{k=1}^\infty$ e uma seqüência de vetores $(v_k)_{k=1}^\infty$ de $\mathbf{V}$, tais que $\|z_{n_k} - v_k\| < \frac{1}{2^k}$ e $\max \text{supp}(v_k) < \min \text{supp}(v_{k+1})$, para todo $k \in \mathbb{N}$.

De fato, consideremos $z_{n_1} \in \mathbf{W}$, $z_{n_1} = \sum_{i=1}^\infty z_{n_1 i}$. Existe $s_1 \in \mathbb{N}$, tal que $\left\| \sum_{i=s_1+1}^\infty z_{n_1 i} \right\| < \frac{1}{2}$. Seja $v_1 = \sum_{i=1}^{s_1} z_{n_1 i} \in \mathbf{V}$, portanto

$$\|z_{n_1} - v_1\| = \left\| \sum_{i=s_1+1}^\infty z_{n_1 i} \right\| < \frac{1}{2}.$$

Agora, como $(z_n)_{n=1}^\infty$ converge pontualmente a zero, existem $m_1, m_2, \dots, m_{s_1+1}$ naturais, tais que $\|z_{m_i}\| < \frac{1}{2^3} \frac{1}{2^i}$, para todo i , $1 \leq i \leq s_1 + 1$.

Tomemos $n_2 \in \mathbb{N}$, $n_2 = \max\{n_1, m_1, m_2, \dots, m_{s_1+1}\}$; assim teremos $\|z_{n_2}\| < \frac{1}{2^3} \frac{1}{2^i}$, para todo i , $1 \leq i \leq s_1 + 1$.

Consideremos então, $z_{n_2} \in \mathbf{W}$, $z_{n_2} = \sum_{i=1}^\infty z_{n_2 i}$. Existe $s_2 > s_1 + 2$, tal que $\left\| \sum_{i=s_2+1}^\infty z_{n_2 i} \right\| < \frac{1}{2^3}$.

$$\begin{aligned} \text{Seja } v_2 = \sum_{i=s_1+2}^{s_2} z_{n_2 i} \in \mathbf{V}, \text{ portanto } \|z_{n_2} - v_2\| &= \left\| \sum_{i=1}^{s_1+1} z_{n_2 i} + \sum_{i=s_2+1}^\infty z_{n_2 i} \right\| \leq \\ &\left\| \sum_{i=1}^{s_1+1} z_{n_2 i} \right\| + \left\| \sum_{i=s_2+1}^\infty z_{n_2 i} \right\| \leq \sum_{i=1}^{s_1+1} \|z_{n_2 i}\| + \left\| \sum_{i=s_2+1}^\infty z_{n_2 i} \right\| < \frac{1}{2^3} \left(\sum_{i=1}^{s_1+1} \frac{1}{2^i} \right) + \frac{1}{2^3} < \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2^2}. \end{aligned}$$

Temos também que $\max \text{supp}(v_1) < \min \text{supp}(v_2)$.

Vamos provar por indução que para todo $k \in \mathbb{N}$, existem $\mathbf{z}_{n_k} \in \mathbf{W}$ e $\mathbf{v}_k \in \mathbf{V}$, com $\|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{v}_k\| < \frac{1}{2^k}$ e $\mathbf{v}_{k-1} < \mathbf{v}_k$.

Suponhamos que para $k > 2$ exista $\mathbf{z}_{n_k} = \sum_{i=1}^{\infty} z_{n_k i}$ e $\mathbf{v}_k = \sum_{i=s_{k-1}+2}^{s_k} z_{n_k i}$.

Como $(\mathbf{z}_n)_{n=1}^{\infty}$ converge pontualmente a zero, existem $m_1, m_2, \dots, m_{s_k+1}$ naturais, tais que $\|z_{m_i i}\| < \frac{1}{2^{k+2}} \frac{1}{2^i}$, para todo i , $1 \leq i \leq s_k + 1$.

Tomemos $n_{k+1} \in \mathbb{N}$, $n_{k+1} = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k, m_1, m_2, \dots, m_{s_k+1}\}$; portanto $\|z_{n_{k+1} i}\| < \frac{1}{2^{k+2}} \frac{1}{2^i}$, para todo i , $1 \leq i \leq s_k + 1$.

Considerando $\mathbf{z}_{n_{k+1}} \in \mathbf{W}$, $\mathbf{z}_{n_{k+1}} = \sum_{i=1}^{\infty} z_{n_{k+1} i}$, existe $s_{k+1} > s_k + 2$, tal que $\left\| \sum_{i=s_{k+1}+1}^{\infty} z_{n_{k+1} i} \right\| < \frac{1}{2^{k+2}}$.

Seja então $\mathbf{v}_{k+1} = \sum_{i=s_k+2}^{s_{k+1}} z_{n_{k+1} i}$. Portanto, obtemos $\|\mathbf{z}_{n_{k+1}} - \mathbf{v}_{k+1}\| \leq \sum_{i=1}^{s_k+1} \|z_{n_{k+1} i}\| + \left\| \sum_{i=s_{k+1}+1}^{\infty} z_{n_{k+1} i} \right\| < \frac{1}{2^{k+2}} \left(\sum_{i=1}^{s_k+1} \frac{1}{2^i} \right) + \frac{1}{2^{k+2}} < \frac{1}{2^{k+1}}$ e também $\mathbf{v}_k < \mathbf{v}_{k+1}$.

Novamente, para facilitar a notação, denotemos a subsequência $(\mathbf{z}_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ obtida, por $(\mathbf{z}_n)_{n=1}^{\infty}$; assim supondo falso o resultado do lema, obtivemos até aqui, uma sequência $(\mathbf{z}_n)_{n=1}^{\infty}$ de $\mathbf{W}$, uma sequência $(\mathbf{v}_n)_{n=1}^{\infty}$ de $\mathbf{V}$, $i \in \mathbb{N}$ e $\delta > 0$ tais que $\|\mathbf{z}_n - \mathbf{v}_n\| < \frac{1}{2^n}$ e $\|P_i(T(\mathbf{z}_n))\| > \delta$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Olhemos agora para os vetores $P_i(T(\mathbf{z}_n))$ pertencentes à cópia X_i . Seja $P_i(T(\mathbf{z}_n)) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^n e_k$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (pois $(e_k)_{k=1}^{\infty}$ é base de X). Para estes vetores pode ocorrer uma das duas situações:

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_k^n = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$, ou

(2) existem $k_0 \in \mathbb{N}$, $\varepsilon > 0$ e uma subsequência $(\mathbf{z}_{n_r})_{r=1}^{\infty}$ de $(\mathbf{z}_n)_{n=1}^{\infty}$, tais que $|\lambda_{k_0}^{n_r}| > \varepsilon$, $\forall r \in \mathbb{N}$.

Comecemos pela (2). Neste caso, podemos supor sem perda de generalidade que $\lambda_{k_0}^{n_r} > \varepsilon$, $\forall r \in \mathbb{N}$ (pois haverá uma subsequência de $(z_{n_r})_{r=1}^\infty$, que denotaremos também por $(z_{n_r})_{r=1}^\infty$ de termos positivos ou negativos que verificam a desigualdade (2)).

Logo, para todo $r \in \mathbb{N}$, teremos $\|T(z_{n_1} + z_{n_2} + \cdots + z_{n_r})\| \geq \|P_i(T(z_{n_1} + \cdots + z_{n_r}))\| = \|P_i(T(z_{n_1})) + \cdots + P_i(T(z_{n_r}))\| \geq \|(\lambda_{k_0}^{n_1} + \lambda_{k_0}^{n_2} + \cdots + \lambda_{k_0}^{n_r})e_{k_0}\| = |\lambda_{k_0}^{n_1} + \lambda_{k_0}^{n_2} + \cdots + \lambda_{k_0}^{n_r}| = \lambda_{k_0}^{n_1} + \cdots + \lambda_{k_0}^{n_r} > r\varepsilon$.

$$\text{Assim, } r\varepsilon \leq \left\| T\left(\sum_{i=1}^r z_{n_i}\right) \right\| \leq \left\| T\left(\sum_{i=1}^r z_{n_i}\right) - T\left(\sum_{i=1}^r v_{n_i}\right) \right\| + \left\| T\left(\sum_{i=1}^r v_{n_i}\right) \right\| \leq \|T\| \left\| \sum_{i=1}^r (z_{n_i} - v_{n_i}) \right\| + \left\| T\left(\sum_{i=1}^r v_{n_i}\right) \right\| \leq \|T\| \left(\sum_{i=1}^r \frac{1}{2^{n_i}} \right) + \|T\| \left\| \sum_{i=1}^r v_{n_i} \right\|.$$

Como $(v_{n_i})_{i=1}^\infty$ é uma seqüência de vetores sucessivos de $\mathbf{W}$, pelo Lema 2.1, temos $\|T\| \left(\sum_{i=1}^r \frac{1}{2^{n_i}} \right) + \|T\| \left\| \sum_{i=1}^r v_{n_i} \right\| \leq \|T\| + \|T\| \left(\sum_{i=1}^r \|v_{n_i}\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|T\| + \|T\| \left(\sum_{i=1}^r \|z_{n_i}\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|T\| + \|T\|(rc^2)^{\frac{1}{2}}$, pois $(z_n)_{n=1}^\infty$ é limitada, logo $\|z_{n_i}\| \leq c$, $c > 0$, para todo $i \in \mathbb{N}$.

Concluimos então que para todo $r \in \mathbb{N}$, $r\varepsilon \leq \|T\|(1 + r^{\frac{1}{2}}c)$, logo para $r > \frac{1}{c^2}$, isto é, $r^{\frac{1}{2}}c > 1$, teremos

$$r\varepsilon \leq \|T\|2r^{\frac{1}{2}}c \quad \text{e} \quad \varepsilon r^{\frac{1}{2}} \leq 2\|T\|c,$$

o que é um absurdo, pois $\lim_{r \rightarrow +\infty} \varepsilon r^{\frac{1}{2}} = +\infty$.

Analisemos então a situação (1). Suponhamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_k^n = 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Neste caso, mostraremos que existirá $\varepsilon > 0$, $\varepsilon = \frac{\delta}{4}$ e uma subsequência $(z_{n_r})_{r=1}^\infty$ de $(z_n)_{n=1}^\infty$, tais que $\frac{\varepsilon r}{\log_2(r+1)} \leq \|T(z_{n_1} + z_{n_2} + \cdots + z_{n_r})\|$, para todo $r \in \mathbb{N}$.

De fato, seja $P_i(T(z_{n_1})) \in X_i$, $P_i(T(z_{n_1})) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{n_1} e_k$. Existe $s_1 \in \mathbb{N}$, tal que $\left\| \sum_{k=s_1+1}^{\infty} \lambda_k^{n_1} e_k \right\| < \frac{\delta}{2^3}$, portanto $\left\| \sum_{k=1}^{s_1} \lambda_k^{n_1} e_k \right\| > \frac{\delta}{2}$ (pois $\|P_i(T(z_{n_1}))\| > \delta$).

Seja $u_1 \in X_i$, $u_1 = \sum_{k=1}^{s_1} \lambda_k^{n_1} e_k$, portanto $\|u_1\| > \frac{\delta}{2}$ e $\|P_i(T(z_{n_1})) - u_1\| < \frac{\delta}{2^3}$.

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_k^n = 0$, existem $m_1, m_2, \dots, m_{s_1}$ tais que $|\lambda_k^{m_k}| < \frac{\delta}{2^6} \frac{1}{2^k}$, para todo k , $1 \leq k \leq s_1$. Tomemos $n_2 = \max\{n_1, m_1, \dots, m_{s_1}\}$ e obtemos $\|\lambda_k^{n_2} e_k\| < \frac{\delta}{2^6} \frac{1}{2^k}$, para todo k , $1 \leq k \leq s_1$.

Consideremos $P_i(T(z_{n_2})) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{n_2} e_k \in X_i$. Existe $s_2 > s_1$, tal que $\left\| \sum_{k=s_2+1}^{\infty} \lambda_k^{n_2} e_k \right\| < \frac{\delta}{2^6}$.

Seja $u_2 \in X_i$, $u_2 = \sum_{k=s_1+1}^{s_2} \lambda_k^{n_2} e_k$, portanto $\|P_i(T(z_{n_2})) - u_2\| = \left\| \sum_{i=1}^{s_1} \lambda_k^{n_2} e_k + \sum_{k=s_2+1}^{\infty} \lambda_k^{n_2} e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{s_1} \|\lambda_k^{n_2} e_k\| + \left\| \sum_{k=s_2+1}^{\infty} \lambda_k^{n_2} e_k \right\| < \frac{\delta}{2^6} \left(\sum_{k=1}^{s_1} \frac{1}{2^k} \right) + \frac{\delta}{2^6} < \frac{\delta}{2^5}$.

Temos também $\|u_2\| > \frac{\delta}{2}$ e $\min \text{supp}(u_1) < \max \text{supp}(u_2)$ (suporte em relação à base $(e_k)_{k=1}^{\infty}$ de X_i).

Vamos provar por indução que para todo $r \in \mathbb{N}$, existem $P_i(T(z_{n_r})) \in X_i$ e $u_r \in X_i$, tais que $\|P_i(T(z_{n_r})) - u_r\| < \frac{\delta}{2^{2r+2}}$, $\|u_r\| > \frac{\delta}{2}$ e $u_{r-1} < u_r$.

Suponhamos que para $r > 2$, tenhamos $P_i(T(z_{n_r})) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{n_r} e_k$ e $u_r = \sum_{k=s_{r-1}+1}^{s_r} \lambda_k^{n_r} e_k$.

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_k^n = 0$, existem $m_1, m_2, \dots, m_{s_k}$ tais que $|\lambda_k^{m_k}| < \frac{\delta}{2^{2(r+1)+2}} \frac{1}{2^k}$, para todo k , $1 \leq k \leq s_r$.

Tomemos $n_{r+1} = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k, m_1, m_2, \dots, m_{s_k}\}$ e obtemos $\|\lambda_k^{n_{r+1}} e_k\| < \frac{\delta}{2^{2(r+1)+2}} \frac{1}{2^k}$, para todo k , $1 \leq k \leq s_r$.

Consideremos $P_i(T(\mathbf{z}_{n_{r+1}})) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^{n_{r+1}} e_k \in X_i$. Existe $s_{r+1} > s_r$, tal que

$$\left\| \sum_{k=s_{r+1}+1}^{\infty} \lambda_k^{n_{r+1}} e_k \right\| < \frac{\delta}{2^{2(r+1)+2}}.$$

Seja $u_{r+1} \in X_i$, $u_{r+1} = \sum_{k=s_r+1}^{s_{r+1}} \lambda_k^{n_{r+1}} e_k$, portanto $\|P_i(T(\mathbf{z}_{n_{r+1}})) - u_{r+1}\| = \left\| \sum_{k=1}^{s_r} \lambda_k^{n_{r+1}} e_k + \sum_{k=s_r+1}^{\infty} \lambda_k^{n_{r+1}} e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{s_r} \|\lambda_k^{n_{r+1}} e_k\| + \left\| \sum_{k=s_r+1}^{\infty} \lambda_k^{n_{r+1}} e_k \right\| < \frac{\delta}{2^{2(r+1)+2}} \left(\sum_{k=1}^{s_r} \frac{1}{2^k} \right) + \frac{\delta}{2^{2(r+1)+2}} < \frac{\delta}{2^{2(r+1)+1}}.$

Obtemos também $\|u_{r+1}\| > \frac{\delta}{2}$ e $u_r < u_{r+1}$.

Assim, para todo $r \in \mathbb{N}$, teremos $\|P_i(T(\mathbf{z}_{n_1})) + P_i(T(\mathbf{z}_{n_2})) + \dots + P_i(T(\mathbf{z}_{n_r}))\| \geq \|u_1 + u_2 + \dots + u_r\| - (\|u_1 - P_i(T(\mathbf{z}_{n_1}))\| + \dots + \|u_r - P_i(T(\mathbf{z}_{n_r}))\|).$

Como $u_1 < u_2 < \dots < u_r$, pelo Lema 1.1, temos que $\|u_1 + u_2 + \dots + u_r\| \geq r \frac{\delta}{2 \log_2(r+1)}.$

Portanto, $\|T(\mathbf{z}_{n_1} + \mathbf{z}_{n_2} + \dots + \mathbf{z}_{n_r})\| \geq \|P_i(T(\mathbf{z}_{n_1})) + \dots + P_i(T(\mathbf{z}_{n_r}))\| > r \frac{\delta}{2 \log_2(r+1)} - \sum_{i=1}^r \frac{\delta}{2^{2i+1}} > r \frac{\delta}{2 \log_2(r+1)} - \frac{\delta}{4} = \frac{\delta}{4} \left(\frac{2r}{\log_2(r+1)} - 1 \right) \geq \frac{\delta}{4} \left(\frac{2r}{\log_2(r+1)} - \frac{r}{\log_2(r+1)} \right) = \frac{\delta}{4} \left(\frac{r}{\log_2(r+1)} \right).$

Concluimos como no caso anterior, utilizando o Lema 2.1, que para todo $r \in \mathbb{N}$, $r \frac{\delta}{4 \log_2(r+1)} \leq \left\| T \left(\sum_{i=1}^r \mathbf{z}_{n_i} \right) \right\| \leq \|T\| (1 + r^{\frac{1}{2}} c)$ logo, para $r > \frac{1}{c^2}$, isto é, $r^{\frac{1}{2}} c > 1$, teremos

$$r \frac{\delta}{4 \log_2(r+1)} \leq \|T\| 2r^{\frac{1}{2}} c \quad \text{e} \quad \frac{\delta}{4 \log_2(r+1)} \leq 2\|T\|c,$$

o que é um absurdo, pois $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{r^{\frac{1}{2}}}{\log_2(r+1)} = +\infty$. ■

Lema 2.17 Se S e $T \in B(\mathbf{W})$, então $\Phi(ST) = \Phi(S)\Phi(T)$, isto é, $(ST)_{\Lambda} = S_{\Lambda}T_{\Lambda}$.

Demonstração: Dados $S, T \in B(\mathbf{W})$, $a \in c_{00}$, sejam $\Phi(T) = T_\Lambda \in B(c_0)$ e $\Phi(S) = S_\Lambda \in B(c_0)$.

Pelo Lema 2.10, a seqüência $(z_n)_{n=1}^\infty = T(a \otimes x_n) - T_\Lambda(a) \otimes x_n$ converge pontualmente a zero; ainda pelo Lema 2.12, temos $\|\Lambda_T a\|_\infty = \|T_\Lambda(a)\|_\infty \leq \|T_\Lambda\| \|a\|_\infty \leq \|T\| \|a\|_\infty$.

Se $n \in N_0$, então $z_n \in \mathbf{W}$; pois $T_\Lambda(a) \in c_0$ (pelo Lema 2.12) e $T_\Lambda(a) \otimes x_n \in \mathbf{W}$ (pelo Lema 2.11, item (a)). Temos também que $(z_n)_{n \in N_0}$ é limitada, pois $\|z_n\| = \|T(a \otimes x_n) - T_\Lambda(a) \otimes x_n\| \leq \|T(a \otimes x_n)\| + \|T_\Lambda(a) \otimes x_n\| \leq \|T\| \|a \otimes x_n\|_V + \|T_\Lambda(a)\|_\infty$, mas, pela observação anterior, $\|T\| \|a \otimes x_n\|_V + \|T_\Lambda(a)\|_\infty \leq \|T\| \|a\|_\infty + \|T\| \|a\|_\infty = 2\|T\| \|a\|_\infty$.

Agora, consideremos

$$\begin{aligned} (ST)(a \otimes x_n) &= S(T(a \otimes x_n)) = S(T_\Lambda(a) \otimes x_n + z_n) = S(T_\Lambda(a) \otimes x_n) - S_\Lambda(T_\Lambda(a)) \\ &\otimes x_n + S_\Lambda(T_\Lambda(a)) \otimes x_n + S(z_n) = S_\Lambda(T_\Lambda(a)) \otimes x_n + w_n + S(z_n), \end{aligned} \quad (2.8)$$

onde $w_n = S(T_\Lambda(a) \otimes x_n) - S_\Lambda(T_\Lambda(a)) \otimes x_n$.

A seqüência $(z_n)_{n \in N_0}$ converge pontualmente a zero, logo pelo Lema 2.16 $(S(z_n))_{n \in N_0}$ converge pontualmente a zero.

Além disso, a seqüência $(w_n)_{n \in N_0}$ converge pontualmente a zero, pelo Lema 2.14, item (b).

Assim, voltando à expressão (2.8), temos $(ST)(a \otimes x_n) - S_\Lambda(T_\Lambda(a)) \otimes x_n = w_n + S(z_n)$, que converge pontualmente a zero se $n \in N_0$. Logo, pelo Lema 2.14, item (a), temos $S_\Lambda(T_\Lambda(a)) = (ST)_\Lambda(a)$.

Concluimos que, para todo $a \in c_{00}$, $S_\Lambda(T_\Lambda(a)) = (ST)_\Lambda(a)$, logo $(ST)_\Lambda = S_\Lambda T_\Lambda$,

isto é, $\Phi(ST) = \Phi(S)\Phi(T)$. ■

Lema 2.18 $\Phi : B(W) \rightarrow B(c_0)$ é um homomorfismo de álgebra.

Demonstração: Para $a \in c_{00}$, $\Phi(T + S)(a) = \phi(T + S)(a)$ e pela Observação 2.6, $\phi(T + S)(a) = \phi(T)(a) + \phi(S)(a) = T_\Lambda(a) + S_\Lambda(a) = \Phi(T)(a) + \Phi(S)(a)$.

Assim, para todo $a \in c_{00}$, $\Phi(T + S)(a) = \Phi(T)(a) + \Phi(S)(a)$. Concluimos que $\Phi(T + S) = \Phi(T) + \Phi(S)$.

Analogamente, $\Phi(\gamma T)(a) = \phi(\gamma T)(a)$ e novamente pela Observação 2.6, $\phi(\gamma T)(a) = \gamma\phi(T)(a) = \gamma T_\Lambda(a) = \gamma\Phi(T)(a)$, isto é, $\Phi(\gamma T) = \gamma\Phi(T)$, $\forall \gamma \in \mathbb{R}$.

O lema anterior garante $\Phi(TS) = \Phi(T)\Phi(S)$. Pela Definição 0.30, Φ é um homomorfismo de álgebra. ■

A seguir, iremos enunciar e demonstrar dois resultados de álgebra linear, que serão utilizados na demonstração do Lema 2.21.

Lema 2.19 (a) Sejam V um espaço vetorial e S um subespaço de dimensão finita de $W = V \oplus V$, com a seguinte propriedade: se $(a, b) \in S$, então $(b, a) \in S$, $(a, 0) \in S$ e $(0, b) \in S$. Então, $\dim S$ é par.

(b) Sejam V um espaço vetorial, $W = V \oplus V$, $P_1, P_2 : W \rightarrow W$ projeções definidas por $P_1(a, b) = (a, 0)$ e $P_2(a, b) = (0, b)$, $Z = P_1(Z) \oplus P_2(Z)$ um subespaço de W de codimensão finita com a propriedade: $(a, 0) \in P_1(Z)$, se e somente se, $(0, a) \in P_2(Z)$. Então $P_1(Z)$ e $P_2(Z)$ têm codimensão finita em $V \oplus 0$ e $0 \oplus V$, respectivamente. Além disso, Z tem codimensão par.

Demonstração: (a) Consideremos os seguintes subespaços de S : $S \cap (V \oplus 0) = S_1$ e $S \cap (0 \oplus V) = S_2$. Temos $S = S_1 \oplus S_2$, pois $S_1 \cap S_2 = \{(0, 0)\}$ e dado $(a, b) \in S$, $(a, b) = (a, 0) + (0, b)$ com $(a, 0) \in S_1$ e $(0, b) \in S_2$.

Suponhamos inicialmente que $S_1 = \{(0, 0)\}$. Então, pela propriedade de S , $S_2 = \{(0, 0)\}$. Assim, $S = \{(0, 0)\}$ e $\dim S = 0$. Se $S_1 \neq \{(0, 0)\}$, tomemos uma base β , $\beta = \{(a_1, 0), (a_2, 0), \dots, (a_k, 0)\}$ de S_1 .

Pela propriedade do subespaço S , temos que $\beta' = \{(0, a_1), (0, a_2), \dots, (0, a_k)\}$ é um conjunto de vetores de S_2 e β' é base de S_2 .

De fato,

$$\alpha_1(0, a_1) + \alpha_2(0, a_2) + \dots + \alpha_k(0, a_k) = (0, 0) \Leftrightarrow \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_k a_k = 0,$$

se e somente se, $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$, pois o conjunto β é l.i. Portanto, β' é

um conjunto l.i. (2.9)

Agora, dado $(0, a) \in S_2$, consideremos o vetor $(a, 0) \in S_1$. Como $[\beta] = S_1$, existem $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ tais que $(a, 0) = \alpha_1(a_1, 0) + \alpha_2(a_2, 0) + \dots + \alpha_k(a_k, 0)$, isto é, $\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_k a_k = a$, logo $(0, a) = \alpha_1(0, a_1) + \alpha_2(0, a_2) + \dots + \alpha_k(0, a_k)$, portanto,

$$[\beta'] = S_2. \quad (2.10)$$

De (2.9) e (2.10), β' é base de S_2 . Como $S = S_1 \oplus S_2$ e S tem dimensão finita, teremos $\dim S = \dim S_1 + \dim S_2 = 2k$.

(b) Se $W = V \oplus V$ tem dimensão finita, então $P_1(Z)$ e $P_2(Z)$ têm codimensão finita.

Segue que $V \oplus 0 = P_1(Z) \oplus F_1$ e $0 \oplus V = P_2(Z) \oplus F_2$, com dimensão de F_1 e F_2 finita.

$$\text{Logo, } \dim V \oplus 0 = \dim P_1(Z) + \dim F_1 = \dim P_2(Z) + \dim F_2 = \dim 0 \oplus V.$$

Mas, $P_1(Z) \sim P_2(Z)$, pelo isomorfismo $T : P_1(Z) \rightarrow P_2(Z)$ definido por $T(a, 0) = (0, a)$, $\forall (a, 0) \in P_1(Z)$, assim $\dim P_2(Z) = \dim P_1(Z)$ e $\dim F_1 = \dim F_2$.

Agora, $(a, b) \in V \oplus V$ se escreve de maneira única como soma de $(a_1, 0) + (f_1, 0) \in P_1(Z) + F_1$ e $(0, a_2) + (0, f_2) \in P_2(Z) + F_2$, mas $((a_1, 0) + (f_1, 0)) + ((0, a_2) + (0, f_2)) = ((a_1, 0) + (0, a_2)) + ((f_1, 0) + (0, f_2))$, onde $(a_1, 0) + (0, a_2) \in P_1(Z) + P_2(Z)$ e $(f_1, 0) + (0, f_2) \in F_1 + F_2$.

Logo, podemos escrever $W = V \oplus V = (P_1(Z) \oplus P_2(Z)) \oplus (F_1 \oplus F_2) = Z \oplus (F_1 \oplus F_2)$. Concluimos que a codimensão de Z é igual a $\dim F_1 \oplus F_2 = \dim F_1 + \dim F_2 = 2 \dim F_1$.

Analisemos agora o caso em que $\dim W$ é infinita. Inicialmente observemos que, dada uma base $\{(a_i, 0)_{i \in I}\}$ de $P_1(Z)$, devido à hipótese: $(a, 0) \in P_1(Z)$, se e somente se, $(0, a) \in P_2(Z)$, temos que $\{(0, a_i)_{i \in I}\}$ é base de $P_2(Z)$ e como $Z = P_1(Z) \oplus P_2(Z)$, teremos também que $B = \{(a_i, 0)_{i \in I} \cup (0, a_i)_{i \in I}\}$ é base de Z .

Suponhamos que $P_1(Z)$ tenha codimensão infinita, logo existe um conjunto infinito $\{(c_j, 0)_{j \in J}\}$ de vetores de $V \oplus 0$ tal que $A = \{(a_i, 0)_{i \in I} \cup (c_j, 0)_{j \in J}\}$ é um conjunto linearmente independente em $V \oplus 0$.

Pela hipótese, os vetores $(0, c_j)_{j \in J} \in P_2(Z)$ e considerando o conjunto $A' = \{(0, a_i)_{i \in I} \cup (0, c_j)_{j \in J}\}$, temos que A' é um conjunto de vetores linearmente independentes em $0 \oplus V$. Segue que o conjunto $D = \{(a_i, 0)_{i \in I} \cup (0, a_i)_{i \in I} \cup (c_j, 0)_{j \in J} \cup (0, c_j)_{j \in J}\}$ é um conjunto de vetores linearmente independentes de W .

De fato, dada uma combinação linear desses vetores e igualando ao vetor nulo de W , teremos $\alpha_1(a_1, 0) + \dots + \alpha_p(a_p, 0) + \beta_1(0, a'_1) + \dots + \beta_q(0, a'_q) + \gamma_1(c_1, 0) + \dots + \gamma_r(c_r, 0) + \delta_1(0, c'_1) + \dots + \delta_s(0, c'_s) = (0, 0)$, se e somente se,

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_p a_p + \gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_r c_r = 0 \quad (2.11)$$

$$\text{e} \quad \beta_1 a'_1 + \dots + \beta_q a'_q + \delta_1 c'_1 + \dots + \delta_s c'_s = 0. \quad (2.12)$$

Como A é um conjunto l.i., de (2.11) teremos $\alpha_1 = \cdots = \alpha_p = \gamma_1 = \cdots = \gamma_r = 0$ e como A' é um conjunto l.i., de (2.12), teremos $\beta_1 = \cdots = \beta_q = \delta_1 = \cdots = \delta_s = 0$.

Concluimos que existe uma base B de Z e um conjunto infinito $C = \{(c_j, 0)_{j \in J} \cup (0, c_j)_{j \in J}\}$ de vetores de W , tal que $B \cup C$ é um conjunto de vetores linearmente independentes de W , contrariando a hipótese de que Z tem codimensão finita. Assim, a codimensão de $P_1(Z)$ e de $P_2(Z)$ é finita.

Para finalizar, consideremos então que $V \oplus 0 = P_1(Z) \oplus F_1$ tenha uma base $\{(a_i, 0)_{i \in I} \cup (c_n, 0)_{n=1}^k\}$, onde $(c_n, 0)_{n=1}^k$ é base de F_1 e portanto $\dim F_1 = k$.

Como $\{(0, a_i)_{i \in I} \cup (0, c_n)_{n=1}^k\}$ é uma base de $0 \oplus V = P_2(Z) \oplus F_2$ e $(0, a_i)_{i \in I}$ é base de $P_2(Z)$, resulta que $(0, c_n)_{n=1}^k$ é base de F_2 e assim $\dim F_2 = k$.

Podemos escrever, como no caso finito, que $W = V \oplus V = (P_1(Z) \oplus P_2(Z)) \oplus (F_1 \oplus F_2) = Z \oplus (F_1 \oplus F_2)$. Concluimos que a codimensão de Z é igual a $\dim (F_1 \oplus F_2) = \dim F_1 + \dim F_2 = 2k$. ■

Lema 2.20 *Sejam V um espaço vetorial, $W = V \oplus V$, $A : V \rightarrow V$ um operador linear, $L : W \rightarrow W$ um operador linear definido por $L(a, b) = (A(a), A(b))$, $\forall (a, b) \in W$. Se $\dim \text{Ker } L < \infty$ e codimensão de $L(W) < \infty$, então a diferença entre $\dim \text{Ker } L$ e a codimensão de $L(W)$ é par.*

Demonstração: Se $(a, b) \in \text{Ker } L$, então $(A(a), A(b)) = (0, 0)$, logo $A(a) = 0$, $A(b) = 0$ e como $A(0) = 0$, teremos $(b, a) \in \text{Ker } L$, $(a, 0) \in \text{Ker } L$ e $(0, b) \in \text{Ker } L$.

Concluimos pelo lema anterior item (a), que $\dim \text{Ker } L$ é par.

Mostremos agora que codimensão de $L(W)$ é par. Preliminarmente, observemos que se $(A(a), A(b)) \in L(W)$, então existe $(a, b) \in W$, tal que $L(a, b) = (A(a), A(b))$,

logo $L(b, a) = (A(b), A(a)) \in L(W)$, $L(a, 0) = (A(a), 0) \in L(W)$ e $L(0, b) = (0, A(b)) \in L(W)$.

Considerando as projeções $P_1, P_2 : W \rightarrow W$ definidas por $P_1(a, b) = (a, 0)$ e $P_2(a, b) = (0, b)$, temos pela observação anterior que $P_1(L(W)) \subset L(W)$, pois se $(A(a), A(b)) \in W$, então $P_1(A(a), A(b)) = (A(a), 0) \in L(W)$. Analogamente, temos $P_2(L(W)) \subset L(W)$.

Definindo $P_1|_{L(W)} : L(W) \rightarrow L(W)$, temos que $P_1|_{L(W)}$ é projeção, o mesmo ocorrendo com $P_2|_{L(W)} : L(W) \rightarrow L(W)$.

Assim, podemos escrever que

$$L(W) = P_1(L(W)) \oplus P_2(L(W)) \quad (2.13)$$

Temos também que

$$(A(a), 0) \in P_1(L(W)) \Leftrightarrow (0, A(a)) \in P_2(L(W)). \quad (2.14)$$

De fato, se $(A(a), 0) \in P_1(L(W))$, então existe $(A(a), A(b)) \in L(W)$ tal que $P_1(A(a), A(b)) = (A(a), 0)$. Como $(A(a), A(b)) \in L(W)$, então $(A(b), A(a)) \in L(W)$, segue que $P_2(A(b), A(a)) = (0, A(a))$ e $(0, A(a)) \in P_2(L(W))$. A recíproca se prova de forma análoga.

Finalizando, por hipótese temos que a codimensão de $L(W)$ é finita, além disso valendo (2.13) e (2.14), concluímos pelo lema anterior, item (b), que $L(W)$ tem codimensão par e assim, a diferença entre $\dim \text{Ker } L$ e a codimensão de $L(W)$ é par. ■

Lema 2.21 *Seja $T \in B(W)$. Se $\Phi(T) = T_\Lambda$ é um operador de Fredholm com índice n , então n é par.*

Demonstração: Dado $T \in B(\mathbf{W})$, seja $\Phi(T) = T_\Lambda : c_0 \rightarrow c_0$ o operador determinado no Lema 2.12.

Identifiquemos c_0 com $c_0 \oplus_\infty c_0$; a partir da isometria: $\ell(a_1, b_1, a_2, b_2, \dots) \mapsto ((a_1, a_2, \dots), (b_1, b_2, \dots))$.

Se $(a, b) \in c_0 \oplus_\infty c_0$ e $z \in X$, definimos o produto $(a, b) \odot z$ por $(a, b) \odot z = \ell^{-1}(a, b) \otimes z = (a_1 z, b_1 z, a_2 z, b_2 z, \dots, a_i z, b_i z, \dots) = (a_1 z_1, b_1 z_2, a_2 z_3, b_2 z_4, \dots, a_i z_{2i-1}, b_i z_{2i}, \dots)$ (veja Definição 2.7).

Seja $\tilde{T}_\Lambda : c_0 \oplus_\infty c_0 \rightarrow c_0 \oplus_\infty c_0$ o operador limitado definido por $\tilde{T}_\Lambda(a, b) = \ell T_\Lambda \ell^{-1}(a, b)$, $\forall (a, b) \in c_0 \oplus_\infty c_0$.

Podemos para este operador escrever,

$$\begin{aligned} \tilde{T}_\Lambda(a, b) &= \tilde{T}_\Lambda((a, 0) + (0, b)) = \tilde{T}_\Lambda(a, 0) + \tilde{T}_\Lambda(0, b) \\ &= (P_1 \tilde{T}_\Lambda i_1(a), P_2 \tilde{T}_\Lambda i_1(a)) + (P_1 \tilde{T}_\Lambda i_2(b), P_2 \tilde{T}_\Lambda i_2(b)), \end{aligned} \quad (2.15)$$

onde P_1 e P_2 são as projeções $P_1, P_2 : c_0 \oplus_\infty c_0 \rightarrow c_0 \oplus_\infty c_0$ definidas por $P_1(a, b) = (a, 0)$ e $P_2(a, b) = (0, b)$ respectivamente, e i_1 e i_2 são as inclusões $i_1, i_2 : c_0 \rightarrow c_0 \oplus_\infty c_0$, definidas por $i_1(a) = (a, 0)$ e $i_2(b) = (0, b)$, respectivamente.

Assim, definindo os operadores limitados de c_0 , $A = P_1 \tilde{T}_\Lambda i_1$, $B = P_1 \tilde{T}_\Lambda i_2$, $C = P_2 \tilde{T}_\Lambda i_1$ e $D = P_2 \tilde{T}_\Lambda i_2$, podemos, da expressão (2.15), escrever:

$$\begin{aligned} \tilde{T}_\Lambda(a, b) &= (A(a), C(a)) + (B(b), D(b)) = (A(a) + B(b), C(a) + D(b)) \\ &= (A(a) + B(b), C(a) + D(b)) - (0, A(b)) + (0, A(b)) \\ &= (A(a), A(b)) + (B(b), 0) + (0, C(a)) - (0, A(b) - D(b)); \\ &\quad \forall (a, b) \in c_0 \oplus_\infty c_0. \end{aligned}$$

Agora, considerando os operadores de $c_0 \oplus_\infty c_0$; $\tilde{T}_{\Lambda_A}$, $\tilde{T}_{\Lambda_B}$, $\tilde{T}_{\Lambda_C}$ e $\tilde{T}_{\Lambda_{A-D}}$ definidos

por:

$$\begin{aligned}\tilde{T}_{\Lambda_A}(a, b) &= (A(a), A(b)), \quad \tilde{T}_{\Lambda_B}(a, b) = (B(b), 0), \\ \tilde{T}_{\Lambda_C}(a, b) &= (0, C(a)) \text{ e } \tilde{T}_{\Lambda_{A-D}}(a, b) = (0, A(b) - D(b)).\end{aligned}$$

Podemos finalmente escrever:

$$\tilde{T}_\Lambda(a, b) = \tilde{T}_{\Lambda_A}(a, b) + \tilde{T}_{\Lambda_S}(a, b); \quad (2.16)$$

onde

$$\tilde{T}_{\Lambda_S}(a, b) = \tilde{T}_{\Lambda_B}(a, b) + \tilde{T}_{\Lambda_C}(a, b) - \tilde{T}_{\Lambda_{A-D}}(a, b).$$

Nosso objetivo é demonstrar que os operadores B , C e $A - D$ são estritamente singulares e daí como $\tilde{T}_{\Lambda_B} = i_1 B i_2^{-1} P_2$, pela Proposição 0.25 item (b), $\tilde{T}_{\Lambda_B}$ é estritamente singular, o mesmo ocorrendo com $\tilde{T}_{\Lambda_C} = i_2 C i_1^{-1} P_1$ e $\tilde{T}_{\Lambda_{A-D}} = i_2 (A - D) i_2^{-1} P_2$.

Logo, pela Proposição 0.25, item (a), teremos $\tilde{T}_{\Lambda_S}$ um operador estritamente singular.

Além disso, $\tilde{T}_\Lambda$ é um operador de Fredholm de índice n , já que por hipótese T_Λ é um operador de Fredholm com $i(T_\Lambda) = n$ e $i(\ell) = 0 = i(\ell^{-1})$, pois ℓ é uma isometria sobrejetora.

Logo, pela Proposição 0.28, teremos $i(\tilde{T}_\Lambda) = i(T_\Lambda) = n$. Mas, da expressão (2.16) e pela Proposição 0.29, $\tilde{T}_{\Lambda_A} = \tilde{T}_\Lambda - \tilde{T}_{\Lambda_S}$ é um operador de Fredholm com

$$i(\tilde{T}_{\Lambda_A}) = i(\tilde{T}_\Lambda - \tilde{T}_{\Lambda_S}) = i(\tilde{T}_\Lambda) = n. \quad (2.17)$$

Finalizando a argumentação, como $\tilde{T}_{\Lambda_A} : c_0 \oplus c_0 \rightarrow c_0 \oplus c_0$ é um operador de Fredholm definido por $\tilde{T}_{\Lambda_A} = (A(a), A(b))$, onde A é um operador de c_0 , temos pelo Lema 2.20 que a diferença entre $\dim \text{Ker } \tilde{T}_{\Lambda_A}$ e a codimensão de $\tilde{T}_{\Lambda_A}(c_0 \oplus c_0)$ é par, isto é, $i(\tilde{T}_{\Lambda_A})$ é par. Logo, por (2.17), n é par e assim, $i(T_\Lambda) = n$ é par.

Comecemos então, supondo que o operador B definido anteriormente não seja estritamente singular. Sendo assim, mostremos inicialmente que é possível determinar uma seqüência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ de vetores de c_0 , normalizada, com $a_n < a_{n+1}$ e $\varepsilon > 0$ tais que $\|B(a_n)\|_{\infty} > \varepsilon$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

De fato, se B não é estritamente singular, existe um subespaço fechado A de c_0 com $\dim A = \infty$ e tal que $B|_A$ é um isomorfismo sobre a imagem. Logo, existe $M > 0$ tal que $\|B(c)\|_{\infty} \geq M\|c\|_{\infty}$, $\forall c \in A$.

Seja $c_1 \in A$, com $\|c_1\|_{\infty} = 1$. Como $c_1 \in c_0$, podemos escrever $c_1 = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i^1 e_i = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$, onde $S_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i^1 e_i$ e também concluir que existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\max\{|\alpha_i| : i \in \mathbb{N}\} = |\alpha_{n_1}| = 1$.

Consideremos então, $S_{n_1} = \sum_{i=1}^{n_1} \alpha_i^1 e_i$. Logo, $\|S_{n_1}\|_{\infty} = 1$. Além disso, $B|_A$ é um operador limitado, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} B(S_n) = B(c_1)$, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|B(S_n)\|_{\infty} = \|B(c_1)\|_{\infty}$. Assim, existe $m_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\|B(S_{m_1})\|_{\infty} > \frac{M}{2}$.

Podemos então, determinar $p_1 \in \mathbb{N}$, $p_1 = \max\{n_1, m_1\}$, tal que $S_{p_1} = \sum_{i=1}^{p_1} \alpha_i^1 e_i$ tem as seguintes propriedades: $\|S_{p_1}\|_{\infty} = 1$ e $\|B(S_{p_1})\|_{\infty} > \frac{M}{2}$. Tomemos $a_1 = S_{p_1}$.

Agora, como A é um subespaço de dimensão infinita de c_0 e $(e_i)_{i=1}^{\infty}$ é base de Schauder de c_0 , pela Observação 0.11, existe $c_2 \in A$ da forma $c_2 = \sum_{i=p_1+1}^{\infty} \alpha_i^2 e_i$ e $\|c_2\|_{\infty} = 1$.

Então, utilizando o raciocínio anterior, podemos encontrar $p_2 \in \mathbb{N}$ ($p_2 \geq p_1 + 1$) tal que $\|S_{p_2}\|_{\infty} = 1$, onde $S_{p_2} = \sum_{i=p_1+1}^{p_2} \alpha_i^2 e_i$ e $\|B(S_{p_2})\|_{\infty} > \frac{M}{2}$. Ponhamos $a_2 = S_{p_2}$.

Continuando desta forma, obtemos uma seqüência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ de vetores de c_0 , com $a_n = S_{p_n} = \sum_{i=p_{n-1}+1}^{p_n} \alpha_i^n e_i$ (considerando $p_0 = 0$), tal que $\|a_n\|_{\infty} = 1$, $\|B(a_n)\|_{\infty} >$

$\frac{M}{2} = \varepsilon$ e como $p_n \geq p_{n-1} + 1 > p_{n-1}$, temos $\max \text{supp}(S_{p_n}) < \min \text{supp}(S_{p_{n+1}})$, isto é, $a_n < a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Mostremos agora que é possível também determinar uma subsequência $(a_{n_p})_{p=1}^\infty$ de $(a_n)_{n=1}^\infty$, uma sequência crescente $(j_i)_{i=1}^\infty, j_i \in \mathbb{N}$ e $\varepsilon > 0$, tais que o módulo da coordenada j_i do vetor $B(a_{n_i})$ é maior do que ε e a soma do módulo da coordenada j_i , dos $(B(a_{n_p}))$ vetores com $i \neq p$, é menor do que $\frac{\varepsilon}{2}$.

Para isso, observemos inicialmente que $a_n \xrightarrow{w} 0$; pois $(a_n)_{n=1}^\infty$ é uma base de bloco de $(e_n)_{n=1}^\infty$ normalizada em c_0 . Logo, pela Proposição 0.9, $(a_n)_{n=1}^\infty \sim (e_n)_{n=1}^\infty$ e como $e_n \xrightarrow{w} 0$, então $a_n \xrightarrow{w} 0$.

De $a_n \xrightarrow{w} 0$, temos $B(a_n) \xrightarrow{w} 0$. Considerando a sequência $(e_j^*)_{j=1}^\infty$ de funcionais biortogonais associados à base $(e_i)_{i=1}^\infty$ e $B(a_n) = \sum_{i=1}^\infty \gamma_i^n e_i$, temos que para todo $j \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_j^*(B(a_n)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} e_j^*\left(\sum_{i=1}^\infty \gamma_i^n e_i\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \gamma_j^n = 0$.

Vamos escrever, para facilitar a notação, $\gamma_j^n = (B(a_n))_j$, a j -ésima coordenada do vetor $B(a_n) \in c_0$. Assim, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (B(a_n))_j = 0, \forall j \in \mathbb{N}$.

Sejam $\varepsilon = \frac{M}{2}$ e $B(a_1) = B(a_{n_1})$. Como $B(a_{n_1}) \in c_0$, existe $m_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|B(a_{n_1})_j| < \frac{\varepsilon}{4}$ para $j \geq m_1$; além disso, $\|B(a_{n_1})\|_\infty > \varepsilon$. Logo, existe $j_1 \in \mathbb{N}$, $1 \leq j_1 < m_1$, tal que $|B(a_{n_1})_{j_1}| > \varepsilon$.

Mas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (B(a_n))_j = 0$. Assim, dado $\frac{\varepsilon}{4}$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$, $n_2 > n_1$ e $a_{n_2} \in c_0$ tais que $|(B(a_{n_2}))_j| < \frac{\varepsilon}{4}$, para $1 \leq j \leq m_1$. Consequentemente, $|B(a_{n_2})_{j_1}| < \frac{\varepsilon}{4}$.

Como $\|B(a_{n_2})\|_\infty > \varepsilon$, existe $j_2 \in \mathbb{N}$, $j_2 > m_1 > j_1$ tal que $|(B(a_{n_2}))_{j_2}| > \varepsilon$. Teremos também $|(B(a_{n_1}))_{j_2}| < \frac{\varepsilon}{4}$.

Agora, $B(a_{n_2}) \in c_0$. Logo, existe $m_2 \in \mathbb{N}$, $m_2 > j_2 > m_1 > j_1$, tal que se $j \geq m_2$,

$$|(B(a_{n_2}))_j| < \frac{\varepsilon}{8}.$$

Como novamente $\lim_{n \rightarrow +\infty} (B(a_n))_j = 0$, dado $\frac{\varepsilon}{8}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$, $n_3 > n_2 > n_1$ e $a_{n_3} \in c_0$, tais que $|(B(a_{n_3}))_j| < \frac{\varepsilon}{8}$ se $1 \leq j \leq m_2$. Conseqüentemente, $|(B(a_{n_3}))_{j_1}| < \frac{\varepsilon}{8}$ e $|(B(a_{n_3}))_{j_2}| < \frac{\varepsilon}{8}$. Mas $\|B(a_{n_3})\|_\infty > \varepsilon$, logo, existe $j_3 \in \mathbb{N}$, com $j_3 > m_2 > j_2 > m_1 > j_1$, tal que $|(B(a_{n_3}))_{j_3}| > \varepsilon$, teremos também, $|(B(a_{n_1}))_{j_3}| < \frac{\varepsilon}{4}$ e $|(B(a_{n_2}))_{j_3}| < \frac{\varepsilon}{8}$.

Continuando este raciocínio, será possível determinar para todo $p \in \mathbb{N}$, n_p com $n_{p+1} > n_p$ e conseqüentemente obter uma subsequência $(a_{n_p})_{p=1}^\infty$ de $(a_n)_{n=1}^\infty$ e também uma seqüência crescente $(j_i)_{i=1}^\infty$ de naturais, tais que $|(B(a_{n_p}))_{j_i}| > \varepsilon$ se $p = i$ e $\sum_{p \neq i} |(B(a_{n_p}))_{j_i}| < \sum_{k=1}^\infty \frac{\varepsilon}{2^{2k}} < \frac{\varepsilon}{2}$.

A seguir, para facilitar a notação, denotaremos a seqüência $(a_{n_p})_{p=1}^\infty$ simplesmente por $(a_n)_{n=1}^\infty$. Logo, obtemos $a_n < a_{n+1}$, $\|a_n\| = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|(B(a_n))_{j_i}| > \varepsilon$ e $\sum_{n \neq i} |(B(a_n))_{j_i}| < \frac{\varepsilon}{2}$.

O próximo passo é mostrar que $\lim_{k \rightarrow +\infty} T((0, a_n) \odot x_k) - \tilde{T}_\Lambda(0, a_n) \odot x_k = 0$ pontualmente para todo $n \in \mathbb{N}$.

Pela definição dada no início do lema, para cada $n \in \mathbb{N}$, $(0, a_n) \odot x_k = \ell^{-1}(0, a_n) \otimes x_k = (0, a_{n_1}, 0, a_{n_2}, \dots, 0, a_{n_{s_n}}, 0, \dots) \otimes x_k$, onde $s_n = \max \text{supp}(a_n)$.

Assim, podemos escrever para todo $n \in \mathbb{N}$, $(0, a_n) \odot x_k = a_n^p \otimes x_k$, onde $a_n^p = (0, a_{n_1}, 0, a_{n_2}, 0, \dots, 0, a_{n_{s_n}}, 0, \dots) \in c_{00}$. Agora, $\tilde{T}_\Lambda(0, a_n) = \ell T_\Lambda \ell^{-1}(0, a_n) = \ell T_\Lambda(a_n^p)$

Por definição, $\tilde{T}_\Lambda(0, a_n) \odot x_k = \ell^{-1}(\tilde{T}_\Lambda(0, a_n)) \otimes x_k = \ell^{-1}(\ell T_\Lambda(a_n^p)) \otimes x_k = T_\Lambda(a_n^p) \otimes x_k$.

Segue que $\lim_{k \rightarrow +\infty} (T((0, a_n) \odot x_k))_i - (\tilde{T}_\Lambda(0, a_n) \odot x_k)_i = \lim_{k \rightarrow +\infty} (T(a_n^p \otimes x_k))_i -$

$$(T_\Lambda(a_n^p) \otimes x_k)_i.$$

Mas como $a_n^p \in c_{00}$, pelo Lema 2.10 teremos $\lim_{k \rightarrow +\infty} (T(a_n^p \otimes x_k))_i - (T_\Lambda(a_n^p) \otimes x_k)_i = 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Notemos que para todo i, j, k e $n \in \mathbb{N}$ temos $v_{ij}^*((0, a_n) \odot x_k) = 0$. De fato, para cada $n \in \mathbb{N}$, $(0, a_n) \odot x_k = a_n^p \otimes x_k = 0 + a_{n1}x_{k2} + 0 + a_{n2}x_{k4} + \cdots + 0 + a_{ns_n}x_{k2s_n}$, onde $\text{máx supp}(a_n) = s_n$.

Logo, a projeção P_j do vetor $(0, a_n) \odot x_k$ em $\mathcal{W}_j$ tem a primeira componente em X_{2j-1} igual a zero, isto é, $P_j((0, a_n) \odot x_k) = 0 + a_{nj}x_{k2j} \in \mathcal{W}_j$. Assim, $v_{ij}^*((0, a_n) \odot x_k) = (x_i^*, 0)(0, a_{nj}x_{k2j}) = x_i^*(0) - 0a_{nj}x_{k2j} = 0$.

Se $k \in N_2$ e $i \in N_1 \cup N_3 \cup N_4$, então $i \neq k$, logo o mesmo ocorre com os funcionais u_{ij}^* e w_{ij}^* , isto é, $u_{ij}^*((0, a_n) \odot x_k) = (x_i^*, -x_i^*)(0, a_{nj}x_{k2j}) = x_i^*(0) - x_i^*(a_{nj}x_{k2j}) = -a_{nj}x_i^*(x_{k2j}) = -a_{nj}0 = 0$ e $w_{ij}^*((0, a_n) \odot x_k) = (0, x_i^*)(0, a_{nj}x_{k2j}) = x_i^*(a_{nj}x_{k2j}) = a_{nj}x_i^*(x_{k2j}) = a_{nj}0 = 0$.

Dado $N \in \mathbb{N}$, consideremos o vetor de $\mathbf{V}$, $\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k = \sum_{n=1}^N a_n^p \otimes x_k = 0 + a_{11}x_{k2} + 0 + a_{12}x_{k4} + \cdots + 0 + a_{1s_1}x_{k2s_1} + 0 + a_{2s_1+1}x_{k2(s_1+1)} + \cdots + 0 + a_{2s_2}x_{k2s_2} + \cdots + 0 + a_{Ns_{N-1}+1}x_{k2(s_{N-1}+1)} + \cdots + 0 + a_{Ns_N}x_{k2s_N}$ e $k \in N_2$.

Pela definição de norma e das observações anteriores obtemos, para todo $N \in \mathbb{N}$, $\left\| \sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right\|_{\mathbf{V}} = \text{máx} \{ \|w_j^n\| : 1 \leq n \leq N \text{ e } 1 \leq j \leq s_n \}$, onde $w_j = (0, a_{nj}x_{k2j})$; e a norma é a de um vetor do espaço $\mathcal{W}_j = X_{2j-1} \oplus X_{2j}$.

Segue que, $\text{máx} \{ \|w_j^n\| : 1 \leq n \leq N \text{ e } 1 \leq j \leq s_n \} = \text{máx}_{1 \leq n \leq N} \{ \text{máx} \|a_{nj}x_{k2j}\| : 1 \leq j \leq s_n \} = \text{máx}_{1 \leq n \leq N} \{ \text{máx} |a_{nj}| : 1 \leq j \leq s_n \} = \text{máx} \{ \|a_n^p\|_\infty : 1 \leq n \leq N \} = \text{máx} \{ \|a_n\|_\infty : 1 \leq n \leq N \}$.

Mas, $a_1 < a_2 < \dots < a_N$ e $\|a_n\|_\infty = 1$, para $1 \leq n \leq N$. Logo,

$$\max\{\|a_n\|_\infty : 1 \leq n \leq N\} = \|a_1 + a_2 + \dots + a_N\|_\infty = \left\| \sum_{n=1}^N a_n \right\|_\infty = 1.$$

Façamos agora uma estimativa da norma do vetor $T\left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k\right)$.

Em primeiro lugar, observemos que pela definição dada dos operadores B e D , temos que $\tilde{T}_\Lambda(0, a_n) = (B(a_n), D(a_n))$.

Concluimos anteriormente que para todo $n \in \mathbb{N}$, $T((0, a_n) \odot x_k) - (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k$ converge pontualmente a zero se $k \rightarrow +\infty$. Fixemos $i \in \mathbb{N}$. Logo, dado $\varepsilon > 0$, para $1 \leq n \leq N$, existirá $k_n \in \mathbb{N}$ tal que, se $k > k_n$, então $\|(T((0, a_n) \odot x_k))_i - ((B(a_n), D(a_n)) \odot x_k)_i\| < \frac{\varepsilon}{N}$, onde a norma é a de um vetor pertencente a X_i .

$$\begin{aligned} \text{Tomemos } k_0 &= \max\{k_n : 1 \leq n \leq N\}, \text{ logo se } k > k_0 \text{ teremos } \left\| \sum_{n=1}^N (T((0, a_n) \odot x_k))_i \right. \\ &- \left. \sum_{n=1}^N ((B(a_n), D(a_n)) \odot x_k)_i \right\| \leq \sum_{n=1}^N \|(T((0, a_n) \odot x_k))_i - ((B(a_n), D(a_n)) \odot x_k)_i\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{N} N = \varepsilon. \end{aligned}$$

Assim, para todo $N \in \mathbb{N}$, a sequência

$$T\left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k\right) - \sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \text{ converge pontualmente} \quad (2.18)$$

a zero, se $k \rightarrow +\infty$

Segue que, dados $N \in \mathbb{N}$, $\varepsilon > 0$ e $j \in \mathbb{N}$, podemos determinar por (2.18), $k_j \in \mathbb{N}$, tal que se $k > k_j$,

$$\begin{aligned} &\left\| \left[T\left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k\right) - \sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right]_j \right\|_V \\ &\leq 2 \max \left\{ \left\| \left(T\left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k\right) \right)_{2j-1} - \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right)_{2j-1} \right\|, \right. \\ &\quad \left. \left\| \left(T\left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k\right) \right)_{2j} - \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right)_{2j} \right\| \right\} < \frac{\varepsilon}{4}, \\ &\text{onde } j \text{ é a projeção do vetor no espaço } \mathcal{W}_j. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Fixemos então, $\varepsilon > 0$ (determinado na construção dos vetores a_n) e $N \in \mathbb{N}$, $N > \left(\frac{4\|T\|}{\varepsilon}\right)^2$. Podemos por (2.19) determinar $k \in N_2$, $k = \max\{k_{j_i} : 1 \leq i \leq N\}$, tal que

$$\left\| \left[T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) - \sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right]_{j_i} \right\|_V < \frac{\varepsilon}{4},$$

para cada $i = 1, 2, \dots, N$.

Lembremos que $j_1, j_2, \dots, j_N$ é parte da sequência crescente $(j_i)_{i=1}^\infty$ construída anteriormente e a norma é a de um vetor do espaço $\mathcal{W}_{j_i}$.

Podemos agora, para cada $i = 1, 2, \dots, N$, considerando $v_{k_{j_i}}^* \in \mathcal{W}_{j_i}^*$ e $k \in N_2$ escolhido, obter:

$$\begin{aligned} & \left| v_{k_{j_i}}^* \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right) \right| \leq \left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| \\ & + \left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) - \sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right) \right| \\ & \leq \left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| + \|v_{k_{j_i}}^*\| \left\| \left[T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) - \sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right]_{j_i} \right\|_V \\ & \leq \left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| + \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

Concluimos então que:

$$\left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| \geq \left| v_{k_{j_i}}^* \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4} \quad (2.20)$$

Olhemos agora para o vetor $\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k$. Pela definição, para cada $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} & (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k = \ell^{-1}(B(a_n), D(a_n)) \otimes x_k \\ & = \left((B(a_n))_1, (D(a_n))_1, (B(a_n))_2, (D(a_n))_2, \dots, (B(a_n))_{j_1}, (D(a_n))_{j_1}, \dots, \right. \\ & \quad \left. (B(a_n))_{j_2}, (D(a_n))_{j_2}, \dots, (B(a_n))_{j_N}, (D(a_n))_{j_N}, \dots \right) \otimes x_k \\ & = \left((B(a_n))_1 x_{k1}, (D(a_n))_1 x_{k2}, \dots, (B(a_n))_{j_1} x_{k2j_1-1}, (D(a_n))_{j_1} x_{k2j_1}, \dots, \right. \end{aligned}$$

$$(B(a_n))_{j_2} x_{k2j_2-1}, (D(a_n))_{j_2} x_{k2j_2}, \dots, (B(a_n))_{j_N} x_{k2j_N-1}, (D(a_n))_{j_N} x_{k2j_N}, \dots).$$

Logo, $\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k = \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n))_{2j-1} x_{k2j-1}, \sum_{n=1}^N (D(a_n))_{2j} x_{k2j} \right)_{j=1}^{\infty}$,
onde $\left(\sum_{n=1}^N (B(a_n))_{2j-1} x_{k2j-1}, \sum_{n=1}^N (D(a_n))_{2j} x_{k2j} \right)$ é um vetor do espaço $\mathcal{W}_j$.

Voltando ao resultado (2.20), tínhamos para cada $i = 1, 2, \dots, N$,

$$\begin{aligned} & \left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| \geq \left| v_{k_{j_i}}^* \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n), D(a_n)) \odot x_k \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\ &= \left| (x_k^*, 0) \left(\sum_{n=1}^N B(a_n)_{j_i} x_{k2j_i-1}, \sum_{n=1}^N (D(a_n))_{j_i} x_{k2j_i} \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\ &= \left| x_k^* \left(\sum_{n=1}^N (B(a_n))_{j_i} x_{k2j_i-1} \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4} = \left| \sum_{n=1}^N (B(a_n))_{j_i} \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\ &\geq |B(a_i)_{j_i}| - \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq i}}^N |B(a_n)_{j_i}| - \frac{\varepsilon}{4} \geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{4}. \end{aligned}$$

Agora, o vetor $T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \in \mathbf{W}$. Logo, $T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{w}_j$.

Assim, pela definição de norma, pela Observação 1.19 e sabendo que $k \in N_2$, ob-

$$\begin{aligned} \text{teremos } \left\| T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right\|^2 &\geq \left\| \sum_{j=1}^{j_N} \mathbf{w}_j \right\|_V^2 \geq \sum_{j=1}^{j_N} \left| v_{k_j}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right|^2 \geq \\ &\sum_{i=1}^N \left| v_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right) \right|^2 \geq N \frac{\varepsilon^2}{16} > \left(\frac{4\|T\|}{\varepsilon} \right)^2 \frac{\varepsilon^2}{16} = \|T\|^2. \end{aligned}$$

Concluimos que, se B não é estritamente singular, teremos $\left\| T \left(\sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right) \right\| > \|T\|$, o que é uma contradição, já que $\left\| \sum_{n=1}^N (0, a_n) \odot x_k \right\|_V = 1$ e $T : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ era pela hipótese um operador limitado.

Raciocínio análogo nos leva a uma contradição, supondo que o operador C não seja estritamente singular.

Neste caso, encontramos uma seqüência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ de vetores de c_0 , normalizada, com $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, e uma seqüência crescente $(j_i)_{i=1}^{\infty}$ de naturais, tais que $|C(a_n)_{j_i}| > \varepsilon$ se $n = i$ e $\sum_{n \neq i} |(C(a_n))_{j_i}| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Pelo Lema 2.10, temos que $T((a_n, 0) \odot x_k) - \tilde{T}_{\Lambda}(a_n, 0) \odot x_k$ converge pontualmente a zero se $k \rightarrow +\infty$, para todo $n \in \mathbb{N}$, e pela definição dos operadores A e C , $\tilde{T}_{\Lambda}(a_n, 0) = (A(a_n), C(a_n))$.

Para todo i, j, k e $n \in \mathbb{N}$, temos $w_{ij}^*((a_n, 0) \odot x_k) = 0$, pois a segunda componente da projeção P_j do vetor $(a_n, 0) \odot x_k$ em $\mathcal{W}_j$ é igual a zero, isto é, $P_j((a_n, 0) \odot x_k) = a_{nj}x_{k2j} + 0 \in \mathcal{W}_j$. Se $k \in N_3$ e $i \in N_1 \cup N_2 \cup N_4$, o mesmo ocorre com u_{ij}^* e v_{ij}^* , pois $i \neq k$.

Assim, pela definição de norma, se $k \in N_3$ e $N \in \mathbb{N}$, obtemos como no caso anterior que $\left\| \sum_{n=1}^N (a_n, 0) \odot x_k \right\|_V = \left\| \sum_{n=1}^N a_n \right\|_{\infty} = 1$. Estimamos a norma do vetor $T\left(\sum_{n=1}^N (a_n, 0) \odot x_k\right)$ da mesma forma que fizemos no caso do operador B e encontramos $k \in N_3$ e $N \in \mathbb{N}$, tais que $\left\| T\left(\sum_{n=1}^N (a_n, 0) \odot x_k\right) \right\| \geq \|T\|$, o que é uma contradição, pois T é um operador limitado.

Sabendo que B e C são operadores de c_0 estritamente singulares, vamos supor para finalizar, que o operador $A - D$ não seja.

Neste caso, obtemos utilizando argumentos semelhantes aos casos anteriores, $\varepsilon > 0$, uma seqüência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ de vetores de c_0 normalizada com $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ e uma seqüência crescente $(j_i)_{i=1}^{\infty}$ de naturais, tais que $|((A - D)(a_n))_{j_i}| > \varepsilon$ se $n = i$ e $\sum_{n \neq i} |((A - D)(a_n))_{j_i}| < \frac{\varepsilon}{4}$.

Além disso, é possível determinar uma subseqüência de $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ que denotaremos

novamente por $(a_n)_{n=1}^\infty$ com a propriedade adicional: $\max(\|B(a_n)\|_\infty, \|C(a_n)\|_\infty) < \varepsilon 10^{-n}$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Mostremos para isso que $\lim_{n \rightarrow +\infty} B(a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} C(a_n) = 0$.

Suponhamos que não ocorra para B , logo $\|B(a_n)\| \not\rightarrow 0$ e como $B(a_n) \xrightarrow{w} 0$, pela Proposição 0.10, existe uma subsequência $(B(a_{n_k}))_{k=1}^\infty$ de $(B(a_n))_{n=1}^\infty$, que é uma seqüência básica, equivalente a uma base de bloco da base $(e_i)_{i=1}^\infty$ de c_0 .

Temos também $a_{n_k} \xrightarrow{w} 0$ e $\|a_{n_k}\| = 1$, para todo $k \in \mathbb{N}$, utilizando novamente a Proposição 0.10 existe uma subsequência de $(a_{n_k})_{k=1}^\infty$, $(a_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty$ que é uma seqüência básica e $(a_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty \sim (u_i)_{i=1}^\infty$, onde $(u_i)_{i=1}^\infty$ é base de bloco de $(e_i)_{i=1}^\infty$. Observemos que a subsequência $(B(a_{n_{k_i}}))_{i=1}^\infty$ de $(B(a_{n_k}))_{k=1}^\infty$ é também uma seqüência básica e $(B(a_{n_{k_i}}))_{i=1}^\infty \sim (v_i)_{i=1}^\infty$, onde $(v_i)_{i=1}^\infty$ é base de bloco de $(e_i)_{i=1}^\infty$.

As seqüências normalizadas, $\left(\frac{u_i}{\|u_i\|}\right)_{i=1}^\infty$ e $\left(\frac{v_i}{\|v_i\|}\right)_{i=1}^\infty$, são bases de bloco de $(e_i)_{i=1}^\infty$. Logo, pela Proposição 0.9, $\left(\frac{u_i}{\|u_i\|}\right)_{i=1}^\infty \sim (e_i)_{i=1}^\infty$ e $\left(\frac{v_i}{\|v_i\|}\right)_{i=1}^\infty \sim (e_i)_{i=1}^\infty$; mas $(a_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty \sim \left(\frac{u_i}{\|u_i\|}\right)_{i=1}^\infty$ e $(B(a_{n_{k_i}}))_{i=1}^\infty \sim \left(\frac{v_i}{\|v_i\|}\right)_{i=1}^\infty$, o que acarreta $(a_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty \sim (B(a_{n_{k_i}}))_{i=1}^\infty$.

Considerando $A = [(a_{n_{k_i}})_{i=1}^\infty]$ e $Y = [(B(a_{n_{k_i}}))_{i=1}^\infty]$, temos pela Proposição 0.8 que $B : A \rightarrow Y$ é isomorfismo, o que contraria a hipótese que fizemos de que B é estritamente singular. Raciocínio análogo pode ser aplicado ao operador C .

Como nos casos anteriores, pelo Lema 2.10, obtemos que $T((a_n, a_n) \odot x_k) - \tilde{T}_\Lambda(a_n, a_n) \odot x_k$ converge pontualmente a zero se $k \rightarrow +\infty$, onde, pela definição dos operadores A, B, C e D , $\tilde{T}_\Lambda(a_n, a_n) = ((A + B)(a_n), (C + D)(a_n))$.

Notemos também que para todo i, j, k e $n \in \mathbb{N}$, temos $u_{ij}^*((a_n, a_n) \odot x_k) = 0$, pois $(x_i^* - x_i^*)(a_{nj}x_{k2j-1}, a_{nj}x_{k2j}) = a_{nj}x_i^*(x_{k2j-1}) - a_{nj}x_i^*(x_{k2j}) = 0$. Se $k \in N_1$ e $i \in N_2 \cup N_3 \cup N_4$, o mesmo ocorre com v_{ij}^* e w_{ij}^* , pois $i \neq k$.

Dado $N \in \mathbb{N}$, consideremos o vetor de $\mathbf{V}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n, a_n) \odot x_k$. Se $k \in N_1$ e $N \in \mathbb{N}$, obtemos como nos casos anteriores que $\left\| \sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right\|_V = \left\| \sum_{n=1}^N a_n \right\|_{\infty} = 1$.

Concluimos também que para todo $n \in \mathbb{N}$, $T \left(\sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right) - \sum_{n=1}^N ((A + B)(a_n), (C + D)(a_n)) \odot x_k$ converge pontualmente a zero, se $k \rightarrow +\infty$.

Segue que, dados $N \in \mathbb{N}$, $\varepsilon > 0$ e $j \in \mathbb{N}$, podemos determinar $k_j \in \mathbb{N}$, tal que se $k > k_j$,

$$\left\| \left[T \left(\sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right) - \sum_{n=1}^N ((A + B)(a_n), (C + D)(a_n)) \odot x_k \right]_j \right\|_V \leq \frac{\varepsilon}{4}. \quad (2.21)$$

Fixemos $\varepsilon > 0$ (determinado na construção dos vetores a_n) e $N \in \mathbb{N}$, $N > \left(\frac{4\|T\|^2}{\varepsilon} \right)$. Podemos por (2.21) determinar $k \in N_1$, $k = \max \{k_{j_i} : 1 \leq i \leq N\}$ tal que

$$\left\| \left[T \left(\sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right) - \sum_{n=1}^N ((A + B)(a_n), (C + D)(a_n)) \odot x_k \right]_{j_i} \right\|_V \leq \frac{\varepsilon}{4},$$

para cada $i = 1, 2, \dots, N$.

Considerando $u_{k_{j_i}}^* \in \mathcal{W}_{j_i}^*$ e $k \in N_1$ escolhido, podemos obter como nos casos anteriores:

$$\left| u_{k_{j_i}}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| \geq \left| u_{k_{j_i}}^* \left(\sum_{n=1}^N ((A + B)(a_n), (C + D)(a_n)) \odot x_k \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4}. \quad (2.22)$$

Agora, neste caso, o vetor $((A + B)(a_n), (C + D)(a_n)) \odot x_k$ é igual a

$$\begin{aligned} & \ell^{-1}((A + B)(a_n), (C + D)(a_n)) \otimes x_k \\ &= \left([(A(a_n))_1 + (B(a_n))_1], [(C(a_n))_1 + (D(a_n))_1], [(A(a_n))_2 + (B(a_n))_2], \right. \\ & \quad [(C(a_n))_2 + (D(a_n))_2], \dots, [(A(a_n))_{j_1} + (B(a_n))_{j_1}], [(C(a_n))_{j_1} + (D(a_n))_{j_1}], \dots, \\ & \quad \left. [(A(a_n))_{j_N} + (B(a_n))_{j_N}], [(C(a_n))_{j_N} + (D(a_n))_{j_N}], \dots \right) \otimes x_k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left([(A(a_n))_1 + (B(a_n))_1]x_{k1}, [(C(a_n))_1 + (D(a_n))_1]x_{k2}, \dots, \right. \\
&\quad \left. [(A(a_n))_{j_1} + (B(a_n))_{j_1}]x_{k2j_1-1}, [(C(a_n))_{j_1} + (D(a_n))_{j_1}]x_{k2j_1}, \dots, \right. \\
&\quad \left. [(A(a_n))_{j_N} + (B(a_n))_{j_N}]x_{k2j_N-1}, [(C(a_n))_{j_N} + (D(a_n))_{j_N}]x_{k2j_N}, \dots \right).
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^N ((A+B)(a_n), (C+D)(a_n)) \odot x_k \\
&= \left(\sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{2j-1} + (B(a_n))_{2j-1}] x_{k2j-1}, \sum_{n=1}^N [(C(a_n))_{2j} + (B(a_n))_{2j}] x_{k2j} \right)_{j=1}^{\infty},
\end{aligned}$$

onde $\left(\sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{2j-1} + (B(a_n))_{2j-1}] x_{k2j-1}, \sum_{n=1}^N [(C(a_n))_{2j} + (B(a_n))_{2j}] x_{k2j} \right)$ é um vetor do espaço $\mathcal{W}_j$.

Voltando ao resultado (2.22), tínhamos para cada $i = 1, 2, \dots, N$,

$$\begin{aligned}
&\left| u_{kj_i}^* \left(T \left(\sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right) \right) \right| \geq \left| u_{kj_i}^* \left(\sum_{n=1}^N ((A+B)(a_n), (C+D)(a_n)) \odot x_k \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&= \left| (x_k^*, -x_k^*) \left(\sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{j_i} + (B(a_n))_{j_i}] x_{k2j_i-1}, \sum_{n=1}^N [(C(a_n))_{j_i} + (D(a_n))_{j_i}] x_{k2j_i} \right) \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&= \left| \sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{j_i} + (B(a_n))_{j_i}] + \sum_{n=1}^N [(-C(a_n))_{j_i} + (-D(a_n))_{j_i}] \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&= \left| \sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{j_i} - (D(a_n))_{j_i}] + \sum_{n=1}^N [(B(a_n))_{j_i} - (C(a_n))_{j_i}] \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&\geq \left| \sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{j_i} - (D(a_n))_{j_i}] \right| - \left| \sum_{n=1}^N [(B(a_n))_{j_i} - (C(a_n))_{j_i}] \right| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&\geq \left| \sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{j_i} - (D(a_n))_{j_i}] \right| - \sum_{n=1}^N |[(B(a_n))_{j_i} - (C(a_n))_{j_i}]| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&\geq \left| \sum_{n=1}^N [(A(a_n))_{j_i} - (D(a_n))_{j_i}] \right| - \sum_{n=1}^N |(B(a_n))_{j_i}| - \sum_{n=1}^N |(C(a_n))_{j_i}| - \frac{\varepsilon}{4} \\
&\geq |((A-D)(a_i))_{j_i}| - \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq i}}^N |((A-D)(a_n))_{j_i}| - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{10^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{10^n} - \frac{\varepsilon}{4} \\
&\geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{4} - \frac{2\varepsilon}{9} - \frac{\varepsilon}{4} > \frac{\varepsilon}{4}.
\end{aligned}$$

Assim, obtemos como nos casos anteriores $\left\| T \left(\sum_{n=1}^N (a_n, a_n) \odot x_k \right) \right\| \geq \|T\|$, o que é uma contradição. ■

Finalmente estamos em condições de demonstrar o principal resultado dessa dissertação.

Teorema 2.22 *O espaço $X \oplus \mathbf{W}$ é isomorfo ao seu cubo, mas não ao seu quadrado.*

Demonstração: Mostraremos que o espaço $\mathbf{W}$ não é isomorfo ao seu subespaço $X \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{W}_j$, onde podemos pensar em X como sendo a segunda componente (X_2) do espaço $\mathcal{W}_1$.

Como já vimos no Lema 1.22, item (a), $X \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{W}_j \sim X \oplus \mathbf{W}$, logo se $\mathbf{W} \not\sim X \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{W}_j$, então $\mathbf{W} \not\sim X \oplus \mathbf{W}$ e, conseqüentemente, pelo Lema 1.22, item (b), $(X \oplus \mathbf{W})^2 \sim \mathbf{W} \not\sim X \oplus \mathbf{W}$.

Suponhamos então que exista um isomorfismo $T : \mathbf{W} \rightarrow X \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{W}_j$. Seja $P : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ a projeção de $\mathbf{W}$ no seu subespaço $X \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{W}_j$.

Consideremos também $S : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ a inversa à esquerda de T , definida por $(T^{-1}P)(a)$, $\forall a \in \mathbf{W}$.

Assim, $ST : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$ é tal que $ST = T^{-1}PT = Id_{\mathbf{W}}$ e $TS : \mathbf{W} \rightarrow X \oplus \sum_{j=2}^{\infty} \mathcal{W}_j$ é tal que $TS = TT^{-1}P = P$.

Verifiquemos inicialmente que $\Phi(Id_{\mathbf{W}}) = Id_{c_0}$ e que $\Phi(P) = Q$, onde $Q : c_0 \rightarrow c_0$ é a projeção de c_0 no seu subespaço fechado $[(e_j)_{j=2}^{\infty}]$, isto é, dado $c \in c_0$, $c = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j e_j$, temos $Q(c) = \sum_{j=2}^{\infty} \alpha_j e_j$.

Antes, porém, lembremos que $\Phi(Id_{\mathbf{W}}) = I_{\Lambda} : c_0 \rightarrow c_0$ e $I_{\Lambda}(a) = \Lambda Id_{\mathbf{W}} a$, $\forall a \in c_{00}$,

onde $\Lambda_{Id_{\mathbf{W}}}$ é a matriz de termo geral α_{ij} , com a propriedade de que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_{ij}(x_{nj}) - \alpha_{ij}(x_{ni}) = 0$, $\forall i, j \in \mathbb{N}$ e $I_{ij} : X_j \rightarrow X_i$ é o operador definido por $I_{ij} = P_i Id_{\mathbf{W}}|_{X_j}$.

Assim, se $i \neq j$, então $I_{ij}(x_{nj}) = (P_i Id_{\mathbf{W}}|_{X_j})(x_{nj}) = (P_i Id_{\mathbf{W}})(x_{nj}) = P_i(x_{nj}) = 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Logo, de $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_{ij}(x_{nj}) - \alpha_{ij}(x_{ni}) = 0$ temos $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\alpha_{ij}(x_{ni}) = 0$ e como $\|x_{ni}\| = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, temos $\alpha_{ij} = 0$.

Se $i = j$, então $I_{ij}(x_{nj}) = (P_i Id_{\mathbf{W}}|_{X_j})(x_{nj}) = (P_i Id_{\mathbf{W}})(x_{nj}) = P_i(x_{nj}) = x_{nj}$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Assim, de $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_{ij}(x_{nj}) - \alpha_{ij}(x_{ni}) = 0$ temos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{nj} - \alpha_{ij}x_{ni} = 0$, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{nj} - \alpha_{ij}x_{nj} = 0$, portanto $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \alpha_{ij})x_{nj} = 0$ e como $\|x_{nj}\| = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, temos $1 - \alpha_{ij} = 0$, isto é, $\alpha_{ij} = 1$.

Concluimos que $\Lambda_{Id_{\mathbf{W}}}$ é a matriz identidade e que $\Phi(Id_{\mathbf{W}}) = I_{\Lambda}$ é o operador Id_{c_0} .

Da mesma forma, temos $\Phi(P) = P_{\Lambda} : c_0 \rightarrow c_0$ e $P_{\Lambda}(a) = \Lambda_P(a)$, $\forall a \in c_{00}$, onde Λ_P é a matriz de termo geral β_{ij} , tal que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{ij}(x_{nj}) - \beta_{ij}(x_{ni}) = 0$, $\forall i, j \in \mathbb{N}$ e $P_{ij} : X_j \rightarrow X_i$ é o operador definido por $P_{ij} = P_i P|_{X_j}$.

Neste caso, se $i = 1$ e $j \in \mathbb{N}$, $j \neq 1$, temos $P_{1j}(x_{nj}) = (P_1 P|_{X_j})(x_{nj}) = (P_1 P)(x_{nj}) = P_1(x_{nj}) = 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$, segue que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_{ij}(x_{nj}) - \beta_{ij}(x_{ni}) = 0$ logo, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\beta_{ij}(x_{ni}) = 0$ e portanto $\beta_{ij} = 0$. No caso em que $i = j = 1$, temos $P_{1j}(x_{n1}) = (P_1 P|_{X_1})(x_{n1}) = (P_1 P)(x_{n1}) = P_1(P(x_{n1})) = P_1(0) = 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$, logo $\beta_{ij} = 0$.

Assim, a matriz Λ_P tem $\beta_{ij} = 0$ se $i = 1$ e $j \in \mathbb{N}$, logo $\Lambda_P(b) = 0$, se $b \in c_{00}$ e $b \in [e_1]$, portanto $\Phi(P) = P_{\Lambda}$ é o operador Q definido anteriormente. Agora, $\Phi(ST) = \Phi(Id_{\mathbf{W}}) = Id_{c_0}$, logo pelo Lema 2.17, temos

$$\Phi(S)\Phi(T) = Id_{c_0} \quad (2.23)$$

e também pelo mesmo lema,

$$\Phi(T)\Phi(S) = \Phi(P) = Q. \quad (2.24)$$

Finalmente, mostremos que $\text{Ker } \Phi(T) = \{0\}$ e a codimensão de $\text{Im } \Phi(T)$ é igual a 1.

Pelo resultado (2.23), temos $\Phi(S)(\Phi(T)(c)) = c$, para todo $c \in c_0$, logo se $c \in \text{Ker } \Phi(T)$ temos $\Phi(T)(c) = 0$ e conseqüentemente $\Phi(S)(\Phi(T)(c)) = c = \Phi(S)(0) = 0$.

Temos também que $\Phi(S)$ é sobre c_0 , pois dado $c \in c_0$, por (2.23), $c = \Phi(S)(\Phi(T)(c))$, logo existe $z = \Phi(T)(c) \in c_0$ tal que $\Phi(S)(z) = c$. Segue que $\dim \text{Im } \Phi(T) = \dim \text{Im } \Phi(T)\Phi(S)$, mas por (2.24), $\dim \text{Im } \Phi(T)\Phi(S) = \dim \text{Im } Q$, que tem codimensão 1.

Assim, se T fosse isomorfismo, $\Phi(T) = T_\Lambda : c_0 \rightarrow c_0$ seria um operador limitado com $\Phi(T)(c_0) = [(e_j)_{j=2}^\infty]$ e tal que $\dim \text{Ker } \Phi(T) = 0$. Mas, $\dim c_0 / [(e_j)_{j=2}^\infty] = 1$, logo $\Phi(T)$ seria um operador de Fredholm de índice ímpar, o que contraria o resultado do lema anterior. ■

Problemas em aberto

Terminamos a dissertação apresentando dois problemas que acreditamos ainda estejam em aberto, relacionados com o problema de Schroeder-Bernstein. O primeiro se refere a métodos de decomposição em espaços de Banach.

Problema 1: Sejam X e Y espaços de Banach. Se $X \xhookrightarrow{c} Y$, $Y \xhookrightarrow{c} X$ e $X^2 \sim X \oplus Y$, então $X \sim Y$?

O problema 1 é importante, pois se tiver uma solução positiva ele unifica os métodos de decomposição de A. Pelczynski apresentados na introdução; pois se $X \sim X^2$ e $Y \sim Y^2$, então $X^2 \sim X \oplus Y$ e se $X \sim \left(\sum_{n=1}^{\infty} \oplus X_n \right)_0$ ou $X \sim \left(\sum_{n=1}^{\infty} \oplus X_n \right)_{\ell_p}$, então $X^2 \sim X \oplus Y$, isto é, o problema 1 seria um método mais geral de decomposição para o isomorfismo $X \sim Y$.

Vimos, como um dos principais resultados desta dissertação, que existe um espaço de Banach Z , tal que $Z \not\sim Z^2$ e $Z \sim Z^3$. O segundo problema vai nesta direção.

Problema 2: Existe um espaço de Banach X , tal que $X \not\sim X^2$ mas $X^2 \sim X^3$?

Referências bibliográficas

- [C] Cristina, C., *O primeiro espaço de Banach hereditariamente indecomponível*. Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, 2000. (Dissertação de Mestrado)
- [Ca] Casazza, P. G., The Schroeder-Bernstein property for Banach spaces, *Contemp. Math.*, **85**, 1989, 61–78.
- [Ga] Galego, E. M., Alguns aspectos de geometria de espaços de Banach através de $c_0(\mathbb{N})$, *4º Seminário Brasileiro de Análise*, IME-USP, 1996.
- [G] Gowers, W. T., A solution to the Schroeder-Bernstein problem for Banach spaces, *Bull. London. Math. Soc.*, **28**, 1996, 297–304.
- [G-M1] Gowers, W. T.; Maurey, B., The unconditional basic sequence problem, *Journal of the American Mathematical Society*, **6**(4), 1993, 851–874.
- [G-M2] Gowers, W. T.; Maurey, B., Banach spaces with small spaces of operators, *Math. Ann.*, **307**, 1997, 543–568.
- [Ho] Hönig, C. S. *Análise Funcional e Aplicações*, v.1, IME-USP, 1970.
- [L-T] Lindenstrauss, J.; Tzafriri, L., *Classical Banach Spaces*, v.1, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1977.
- [S] Singer, I., *Bases in Banach Spaces*, v.2, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1981.