**Sobre Álgebras de Grupo
Fortemente Associativas**

Jonas Gonçalves Lopes

**TESE APRESENTADA
AO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PARA
OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
EM
MATEMÁTICA**

Área de concentração: Matemática
Orientador: **Prof. Dr. Michael Dokuchaev**

Durante este trabalho, o autor teve o apoio financeiro
da CAPES / PICDT - UFRN

São Paulo, 18 de abril de 2005.

Sobre Álgebras de Grupo Fortemente Associativas

Este exemplar corresponde à redação
final da tese de doutorado devidamente corrigida
e defendida por Jonas Gonçalves Lopes
e aprovada pela comissão julgadora.

São Paulo, 18 de abril de 2005.

Banca examinadora:

- Prof. Dr. Michael Dokuchaev (Orientador) - IME-USP
- Prof. Dr. Francisco César Polcino Milies - IME-USP
- Prof. Dr. Miguel Angel Alberto Ferrero - UFRGS
- Prof. Dr. Antonio Paques - UNICAMP
- Prof. Dr. Guilherme Augusto de La Rocque Leal - UFRJ

“ Deus marcou o tempo certo para
cada coisa” .

Eclesiastes 4; 11.

Aos meus Pais,
Luis Carlos Lopes e
Júlia Gonçalves Lopes,
In memory

À minha esposa Lizete,
e aos meus filhos,
Jonatha e Janethe.

Agradecimentos

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por viabilizar a realização desse curso.

À CAPES / PICDT-UFRN, pelo apoio financeiro.

Ao meu orientador, prof. Dr. Michael Dokuchaev, pelo excelente trabalho de orientação.

Aos professores da banca examinadora, pelas sugestões apresentadas, as quais contribuíram para a redação final desta tese.

Ao IME-USP, pelo acolhimento e infra-estrutura disponibilizados.

A todos os professores do IME com os quais tive a oportunidade de estudar, por contribuírem diretamente para o sucesso alcançado.

Aos funcionários da secretaria de pós-graduação do IME, Sebastião F. Pinho Souza, Patrícia Cristina Martorelli, Rosemary Colombo Lima e Alessandra F. Bernardo da Silva, pela dedicação no atendimento.

Aos funcionários da biblioteca do IME.

Aos amigos André e Rita, pelo apoio recíproco.

Ao amigo David, pelo trabalho de digitação.

Resumo

Uma álgebra $\mathcal{A}$ é chamada fortemente associativa se para qualquer grupo G e toda ação parcial α de G sobre $\mathcal{A}$, o produto cruzado parcial $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ é associativo.

O objetivo desta tese é pesquisar o problema de caracterização das álgebras de grupo FH fortemente associativas, em que H é um grupo finito e F é um corpo cuja característica p divide a ordem de H .

Se H é um grupo nilpotente, foi demonstrado que FH é fortemente associativa se, e somente se, $|H| = 2$ ou $|H| = 3$.

Agora, se H é um grupo de Frobenius com complemento P , em que P é um p -subgrupo de Sylow de H , foi provado que FH é fortemente associativa se, e somente se, $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Dentre outros resultados destaca-se o seguinte Teorema:

Sejam H um grupo p -solúvel, P um p -subgrupo de Sylow de H e seja F um corpo de característica $p > 0$. Suponha que $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra semisimples.

Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, H é um dos seguintes dois tipos:

- (i) H é cíclico de ordem 2 ou 3;*
- (ii) H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' , $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.*

Em particular, se H é metabeliano e F é algebricamente fechado, as álgebras de grupo FH modulares fortemente associativas são completamente caracterizadas, pois neste caso $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é semisimples.

Também foram feitas caracterizações para o grupo simétrico S_n e para os grupos diedrais D_n de ordem $2n$. Para S_n , $n \geq 5$, temos exemplos de grupos não solúveis, para os quais as álgebras de grupo não são fortemente associativas.

Abstract

An algebra $\mathcal{A}$ is called strongly associative if for any group G and every partial action α of G on $\mathcal{A}$, the crossed product $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ is associative.

The purpose of this thesis is to investigate the problem of the characterization of the strongly associative group algebras FH , where H is a finite group and F is a field whose characteristic p divides the order of H .

If H is nilpotent, we prove that FH is strongly associative if and only if $|H| = 2$ or $|H| = 3$.

Now, if H is a Frobenius group with complement P , where P is a Sylow p -subgroup of H , it is proved that FH is strongly associative if and only if $|P| = 2$ or $|P| = 3$.

Among other results we point out the following theorem:

Let H be a p -solvable group, P a Sylow p -subgroup of H and let F be a field whose characteristic is p . Suppose that $\Delta(H, O_{p'}(H))$ is a semisimple F -algebra. Then the group algebra FH is strongly associative if and only if H is one of the following two types:

- (i) H is cyclic of order 2 or 3;
- (ii) H is a Frobenius group with complement P and kernel H' , $|P| = 2$ or $|P| = 3$.

In particular, if H is metabelian and F is algebraically closed, the strongly associative modular group algebras FH are completely characterized, since in this case $\Delta(H, O_{p'}(H))$ is semisimple.

We also obtained such characterizations for the symmetric groups S_n and the Dihedral group D_n of the order $2n$. For S_n , $n \geq 5$, we have examples of non-solvable groups whose group algebras are not strongly associative.

Introdução

O objetivo deste trabalho é pesquisar o problema de caracterização das álgebras de grupo modulares “fortemente associativas”. Mais precisamente: Se H é um grupo finito e F é um corpo cuja característica p divide a ordem de H , queremos determinar condições necessárias e suficientes para que a álgebra de grupo FH seja “fortemente associativa”.

Esse problema foi sugerido no artigo “Associativity of crossed products by partial actions, enveloping actions and partial representations”, devido a M. Dokuchaev e R. Exel (vide [3]).

Para esse fim, é utilizado o conceito de “ação parcial de um grupo”, o qual foi definido explicitamente, pela primeira vez, por R. Exel em [9]. Esse conceito aparece implicitamente em várias áreas da Matemática. Por exemplo, o fluxo de um campo de vetores diferenciável é uma ação parcial (vide [1], Ex.1.2). Além disso, o grupo de Möbius age globalmente na esfera de Riemann, mas parcialmente no plano complexo (vide [16], Proposição 3.16). Em particular, o referido conceito aparece na teoria de álgebras de operadores como um poderoso instrumento no seu estudo (vide [8], [10]). Cabe salientar que o número de pesquisas envolvendo o conceito algébrico de “ação parcial de um grupo” vem crescendo (vide [3], [4], [5] e [6]).

No artigo citado acima, de M. Dokuchaev e R. Exel, define-se “uma ação parcial de um grupo sobre uma F -álgebra” do seguinte modo:

Seja G um grupo com elemento neutro 1 e seja $\mathcal{A}$ uma álgebra, associativa (não necessariamente com unidade).

Uma ação parcial de G sobre $\mathcal{A}$ é um par $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$, formado por uma coleção de ideais (bilaterais) $\mathcal{A}_g$ de $\mathcal{A}$, e por uma coleção de isomorfismos de álgebras

$$\alpha_g : \mathcal{A}_{g^{-1}} \longrightarrow \mathcal{A}_g,$$

satisfazendo para todo $g, h \in G$:

- (i) $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}$ e α_1 é o automorfismo identidade de $\mathcal{A}$;
- (ii) $\mathcal{A}_{(gh)^{-1}} \supseteq \alpha_h^{-1}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}})$;
- (iii) $\alpha_g \circ \alpha_h(x) = \alpha_{gh}(x)$, para cada $x \in \alpha_h^{-1}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}})$.

Passamos agora a considerar uma generalização do conceito de produto cruzado.

Dada uma ação parcial $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ de um grupo G sobre uma F -álgebra $\mathcal{A}$, o produto cruzado parcial de $\mathcal{A}$ e G por α , denotado por $\mathcal{A} *_{\alpha} G$, é o conjunto de todas as somas formais finitas $\{\sum_{g \in G} a_g \delta_g : a_g \in \mathcal{A}_g\}$, em que δ_g são símbolos.

A adição é definida componente à componente, e a multiplicação é determinada por

$$(a_g \delta_g) \cdot (b_h \delta_h) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_g) b_h) \delta_{gh}.$$

A questão que surgiu naturalmente foi determinar se $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ é associativo ou não. No caso de uma C^* -álgebra, há cerca de dez anos, R. Exel provou em [7] a associatividade desse produto cruzado, usando a existência de unidades aproximadas.

Em [3], M. Dokuchaev e R. Exel provaram que $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ é sempre associativo se $\mathcal{A}$ é semiprima. Lembremos que uma álgebra $\mathcal{A}$ com unidade é chamada semiprima se $\mathcal{A}$ não contém ideais nilpotentes não nulos. É fácil ver que esse resultado representa uma generalização daquele obtido no contexto de C^* -álgebras.

Entretanto $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ nem sempre é associativo. Veremos no Exemplo 2.4.1 que se H é o grupo de Klein, de ordem 4, e F é um corpo de característica 2, então o produto cruzado $FH *_{\alpha} G$ não é associativo, em que FH denota a álgebra de grupo do grupo H sobre F . Pelo teorema de Maschke segue que FH não é semiprima.

Para futuras referências, foi introduzida em [3] a seguinte terminologia:

Diremos que uma álgebra $\mathcal{A}$ é fortemente associativa se, para qualquer grupo G e para toda ação parcial α de G sobre $\mathcal{A}$, o produto cruzado parcial $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ é associativo.

Portanto, uma álgebra semiprima é fortemente associativa.

Dada uma álgebra $\mathcal{A}$, e considerando a álgebra $W(\mathcal{A})$, chamada a álgebra dos multiplicadores de $\mathcal{A}$, veremos no Cap. 1 (vide Lema 1.2.1) que se $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ é uma ação parcial arbitrária de um grupo G sobre $\mathcal{A}$, então $\mathcal{A}$ é fortemente associativa se, e somente se, a condição (1.1) verifica-se, isto é,

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_a = L_a \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}})$$

é válida em A_g , para todo $g \in G$ e todo $a, c \in \mathcal{A}$.

Verificaremos a validade dessa condição sempre que formos provar que a álgebra de grupo FH , de um grupo finito H sobre um corpo F cuja característica p divide a ordem de H , é fortemente associativa.

No Exemplo 2.1.1 veremos que a álgebra de grupo do grupo cíclico de ordem 2 sobre um corpo de característica 2 é fortemente associativa.

Também, se $H = \langle y : y^3 = 1 \rangle$ é um grupo cíclico de ordem 3, e F é um corpo de característica 3, verifica-se no Exemplo 2.2.1 que FH é fortemente associativa.

Agora, se $H = \langle y : y^4 = 1 \rangle$ é um grupo cíclico de ordem 4, ou $H = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$ ou $H = \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$, e se F é um corpo de característica 2, os Exemplos 2.3.1, 2.5.1 e 2.6.1, respectivamente, mostram que FH não é fortemente associativa.

O capítulo 3 é dedicado ao problema de caracterização das álgebras de grupo fortemente associativas. A Proposição 3.1.1 considera o caso quando $H = \langle y : y^p = 1 \rangle$ é um grupo cíclico de ordem p .

O Lema 3.2.1 desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.

Usando a Proposição 3.1.1 e o Lema 3.2.1 demonstra-se o Teorema 3.3.1, no qual H é um grupo nilpotente.

Agora, usando alguns resultados da teoria de blocos caracteriza-se FH quando H é um grupo de Frobenius com complemento P , em que P é um p -subgrupo de Sylow de H (vide Teorema 3.5.3).

No Teorema 3.6.2, o grupo H é p -solúvel e $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra semisim-

ples.

Usando o Teorema 3.7.3 podemos concluir que FS_4 não é fortemente associativa (vide Exemplo 3.7.1).

Usando também alguns resultados sobre grupos p -nilpotentes são demonstrados os Teoremas 3.8.4 e 3.9.4. No Teorema 3.8.4, H é um grupo metabeliano e F é um corpo algebricamente fechado de característica $p > 0$, enquanto no Teorema 3.9.4, o grupo H é p -solúvel, $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra não-semisimples, e F é algebricamente fechado de característica $p > 0$. Aqui a condição (1.1) é substituída ou reduzida à uma outra, dada no item (iv) desse Teorema 3.9.4.

Finalmente, no capítulo 4 são feitas caracterizações para o grupo simétrico S_n , e para os grupos diedrais D_n de ordem $2n$. Como $S_n, n \geq 5$, não é solúvel, obtem-se exemplos de grupos não solúveis para os quais as álgebras de grupo não são fortemente associativas.

Índice

1	Multiplicadores de Álgebras $\times$ Associatividade Forte de Álgebras	1
1.1	Definições (Ação Parcial de um Grupo sobre uma Álgebra, Produto Cruzado Parcial, Álgebra dos Multiplicadores de uma Álgebra dada)	1
1.2	Condição Necessária e Suficiente para uma Álgebra ser Fortemente Associativa	5
2	Exemplos de Álgebras de Grupo Fortemente Associativas e Não-fortemente Associativas	9
2.1	Grupo Cíclico de ordem 2	13
2.2	Grupo Cíclico de ordem 3	13
2.3	Grupo Cíclico de ordem 4	14
2.4	Grupo de Klein	15
2.5	$H = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$	16
2.6	$H = \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$	16
3	O Problema de Caracterização das Álgebras de Grupo Fortemente Associativas	19

3.1	O Grupo é Cíclico de ordem p prima	19
3.2	Uma Condição para a Álgebra de Grupo não ser Fortemente Associativa .	21
3.3	O Grupo é Nilpotente	22
3.4	Resultados Auxiliares	23
3.5	O Grupo é de Frobenius com complemento P	26
3.6	O Grupo H é p -solúvel e $\Delta(H, 0_{p'}(H))$ é uma F -álgebra Semisimples .	34
3.7	Um Tipo Particular de Grupo p -Solúvel	36
3.8	O Grupo é Metabeliano	40
3.9	O Grupo H é p -Solúvel e $\Delta(H, 0_{p'}(H))$ é uma F -álgebra não-Semisimples	43
4	Caracterizações Para o Grupo Simétrico S_n e Grupos Diedrais D_n de ordem $2n$	53

Multiplicadores de Álgebras $\times$ Associatividade Forte de Álgebras

1.1 Definições (Ação Parcial de um Grupo sobre uma Álgebra, Produto Cruzado Parcial, Álgebra dos Multiplicadores de uma Álgebra dada)

Seja G um grupo com elemento neutro 1 e seja $\mathcal{A}$ uma álgebra, associativa (não necessariamente com unidade).

Definição 1.1.1. *Uma ação parcial de G sobre $\mathcal{A}$ é um par $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$, formado por uma coleção de ideais (bilaterais) $\mathcal{A}_g$ de $\mathcal{A}$, e por uma coleção de isomorfismos de álgebras*

$$\alpha_g : \mathcal{A}_{g^{-1}} \longrightarrow \mathcal{A}_g,$$

satisfazendo para todo $g, h \in G$:

- (i) $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}$ e α_1 é o automorfismo identidade de $\mathcal{A}$;
- (ii) $\mathcal{A}_{(gh)^{-1}} \supseteq \alpha_h^{-1}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}})$;
- (iii) $\alpha_g \circ \alpha_h(x) = \alpha_{gh}(x)$, para cada $x \in \alpha_h^{-1}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}})$.

As condições (ii) e (iii) nos dizem que α_{gh} é uma extensão de $\alpha_g \circ \alpha_h$. Agora,

tomando $h = g^{-1}$ em (iii), obtemos

$$\alpha_g \circ \alpha_{g^{-1}}(x) = \alpha_1(x) = x,$$

para todo $x \in \alpha_{g^{-1}}^{-1}(\mathcal{A}_{g^{-1}} \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}) = \mathcal{A}_g$; isso implica que $\alpha_{g^{-1}} = \alpha_g^{-1}$, para todo $g \in G$.

Além disso, é fácil ver que as condições (i) – (iii) são equivalentes às seguintes:

- (i) $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}$ e α_1 é o automorfismo identidade de $\mathcal{A}$;
- (ii') $\alpha_g(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}) = \mathcal{A}_g \cap \mathcal{A}_{gh}, \forall g, h \in G$;
- (iii') $\alpha_g(\alpha_h(x)) = \alpha_{gh}(x), \forall x \in \mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_{(gh)^{-1}}, \forall g, h \in G$.

Com efeito, segue de (ii) que

$$\alpha_h^{-1}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}) \subseteq \mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_{h^{-1}g^{-1}}.$$

Substituindo h por h^{-1} e g por gh temos $\alpha_{h^{-1}}^{-1}(\mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_{h^{-1}g^{-1}}) \subseteq \mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}$, e consequentemente

$$\alpha_{h^{-1}}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}) \supseteq \mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_{h^{-1}g^{-1}}.$$

Como $\alpha_{h^{-1}} = \alpha_h^{-1}$ obtemos

$$\alpha_h^{-1}(\mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}) = \mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_{h^{-1}g^{-1}},$$

de modo que vale (iii').

Finalmente, usando novamente que $\alpha_{h^{-1}} = \alpha_h^{-1}$ e substituindo h^{-1} por g segue (ii').

Passamos agora a considerar uma generalização do conceito de produto cruzado.

Definição 1.1.2. Dada uma ação parcial $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ de um grupo G sobre uma F -álgebra $\mathcal{A}$, o produto cruzado parcial de $\mathcal{A}$ e G por α , denotado por $\mathcal{A} *_{\alpha} G$, é o conjunto de todas as somas formais finitas $\{\sum_{g \in G} a_g \delta_g : a_g \in \mathcal{A}_g\}$, em que δ_g são símbolos.

A adição é definida componente à componente, e a multiplicação é determinada por

$$(a_g \delta_g) \cdot (b_h \delta_h) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_g) b_h) \delta_{gh}.$$

Note que como $\alpha_{g^{-1}}(a_g) \in \mathcal{A}_{g^{-1}}$ e $b_h \in \mathcal{A}_h$, e sendo $\mathcal{A}_{g^{-1}}$ e $\mathcal{A}_h$ ideais, temos que $\alpha_{g^{-1}}(a_g) b_h \in \mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{g^{-1}}$. Segue da condição (ii') que

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_g) b_h) \in \mathcal{A}_g \cap \mathcal{A}_{gh} \subseteq \mathcal{A}_{gh},$$

1.1 Definições (Ação Parcial de um Grupo sobre uma Álgebra, Produto Cruzado Parcial, Álgebra dos Multiplicadores de uma Álgebra dada) 3

e o produto está bem definido.

Note também que podemos identificar $\mathcal{A}$ com $\mathcal{A}\delta_1$.

Para futuras referências, foi introduzida em [3] a seguinte terminologia:

Definição 1.1.3. Dizemos que uma álgebra $\mathcal{A}$ é fortemente associativa se, para qualquer grupo G e para toda ação parcial α de G sobre $\mathcal{A}$, o produto cruzado parcial $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ é associativo.

Sejam F um corpo e $\mathcal{A}$ uma F -álgebra.

Definição 1.1.4. Um multiplicador de $\mathcal{A}$ é um par (L, R) , em que L e R são transformações lineares de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{A}$ satisfazendo para todo $a, c \in \mathcal{A}$:

- i) $L(ac) = L(a)c$,
- ii) $R(ac) = aR(c)$,
- iii) $aL(c) = R(a)c$.

Chamamos L a ação à esquerda e R a ação à direita do multiplicador (L, R) .

O conjunto de todos multiplicadores de $\mathcal{A}$ será denotado por $W(\mathcal{A})$. É fácil verificar que $W(\mathcal{A})$ é uma álgebra sob as seguintes operações :

$$\begin{aligned} (L, R) + (L', R') &= (L + L', R + R') ; \\ \lambda(L, R) &= (\lambda L, \lambda R) \quad (\lambda \in F) ; \\ (L, R)(L', R') &= (L \circ L', R' \circ R). \end{aligned}$$

Com essas operações $W(\mathcal{A})$ é chamada a álgebra dos multiplicadores de $\mathcal{A}$. $W(\mathcal{A})$ tem o elemento unidade (Id, Id) , em que $Id: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ é a aplicação identidade.

Agora suponha que I é um ideal (bilateral) de $\mathcal{A}$. Note que cada $a \in \mathcal{A}$ dá origem a um multiplicador $\eta_a = (L_a, R_a)$ de I definido por

$$L_a(b) = ab, \quad R_a(b) = ba, \quad \forall b \in I.$$

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} \Psi: \mathcal{A} &\longrightarrow W(I) \\ a &\longrightarrow \eta_a. \end{aligned}$$

Ψ é um homomorfismo de álgebras pois Ψ é F -linear e, além disso,

$$L_{ac} = L_a \circ L_c, \quad R_{ac} = R_c \circ R_a,$$

de modo que

$$\begin{aligned} \Psi(ac) &= \eta_{ac} = (L_{ac}, R_{ac}) = (L_a \circ L_c, R_c \circ R_a) = \\ &= (L_a, R_a)(L_c, R_c) = \eta_a \eta_c = \Psi(a)\Psi(c). \end{aligned}$$

Seja $\phi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ um isomorfismo de F -álgebras. É fácil ver que se $(L, R) \in W(\mathcal{A})$, então $(\phi \circ L \circ \phi^{-1}, \phi \circ R \circ \phi^{-1})$ é um elemento de $W(\mathcal{B})$, e temos o seguinte resultado, o qual está enunciado em [3] sem demonstração.

Proposição 1.1.1. *A aplicação $\bar{\phi} : W(\mathcal{A}) \longrightarrow W(\mathcal{B})$ definida por $\bar{\phi}(L, R) = (\phi \circ L \circ \phi^{-1}, \phi \circ R \circ \phi^{-1})$ é um isomorfismo de F -álgebras.*

Demonstração: Com efeito, $\bar{\phi}$ é F -linear pois ϕ, L, R, ϕ^{-1} são F -lineares, de modo que as compostas $\phi \circ L \circ \phi^{-1}$ e $\phi \circ R \circ \phi^{-1}$ o são; também temos

$$\begin{aligned} \bar{\phi}((L, R)(L', R')) &= \bar{\phi}(L \circ L', R' \circ R) \\ &= (\phi \circ L \circ L' \circ \phi^{-1}, \phi \circ R' \circ R \circ \phi^{-1}) \\ &= (\phi \circ L \circ \phi^{-1} \circ \phi \circ L' \circ \phi^{-1}, \phi \circ R' \circ \phi^{-1} \circ \phi \circ R \circ \phi^{-1}) \\ &= (\phi \circ L \circ \phi^{-1}, \phi \circ R \circ \phi^{-1})(\phi \circ L' \circ \phi^{-1}, \phi \circ R' \circ \phi^{-1}) \\ &= \bar{\phi}(L, R) \bar{\phi}(L', R'), \text{ para todo } (L, R), (L', R') \in W(\mathcal{A}). \end{aligned}$$

Agora, $\bar{\phi}$ é sobrejetora pois dado $(L'', R'') \in W(\mathcal{B})$, tomando

$$(L, R) = (\phi^{-1} \circ L'' \circ \phi, \phi^{-1} \circ R'' \circ \phi) \in W(\mathcal{A}), \text{ obtemos } \bar{\phi}(L, R) = (L'', R'').$$

Finalmente, se $\bar{\phi}(L, R) = (\phi \circ L \circ \phi^{-1}, \phi \circ R \circ \phi^{-1}) = (0, 0)$ segue que $\phi \circ L \circ \phi^{-1} \equiv 0$ e $\phi \circ R \circ \phi^{-1} \equiv 0$, e daí obtemos $L \equiv 0$ e $R \equiv 0$, isto é, $(L, R) = (0, 0)$, e portanto $\bar{\phi}$ é injetora. Isso completa a demonstração. ■

1.2 Condição Necessária e Suficiente para uma Álgebra ser Fortemente Associativa

Observação 1.2.1. *Seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre uma F -álgebra $\mathcal{A}$. Sejam $a, c \in \mathcal{A}$. Considere $\eta_a = (L_a, R_a)$ como um multiplicador de $\mathcal{A}_g$, $g \in G$, e $\eta_c = (L_c, R_c)$ como um multiplicador de $\mathcal{A}_{g^{-1}}$. Sendo $\alpha_g : \mathcal{A}_{g^{-1}} \longrightarrow \mathcal{A}_g$ um isomorfismo, segue pela Proposição 1.1.1 que a aplicação $\bar{\alpha}_g : W(\mathcal{A}_{g^{-1}}) \longrightarrow W(\mathcal{A}_g)$ definida por:*

$$\begin{aligned}\bar{\alpha}_g(L, R) &= (\alpha_g \circ L \circ \alpha_g^{-1}, \alpha_g \circ R \circ \alpha_g^{-1}) \\ &= (\alpha_g \circ L \circ \alpha_{g^{-1}}, \alpha_g \circ R \circ \alpha_{g^{-1}})\end{aligned}$$

é um isomorfismo de F -álgebras, de modo que

$$\bar{\alpha}_g(L_c, R_c) = (\alpha_g \circ L_c \circ \alpha_{g^{-1}}, \alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}).$$

Portanto, podemos considerar L_a como a ação à esquerda do multiplicador η_a de $\mathcal{A}_g$ e $\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}$ como a ação à direita do multiplicador $\bar{\alpha}_g(L_c, R_c)$ de $\mathcal{A}_g$.

L_a e $\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}$ aparecem naturalmente no próximo resultado, cuja demonstração está contida na prova do Teorema 3.1 de [3], p.6, devido a M. Dokuchaev e R. Exel.

Lema 1.2.1. *Seja $\mathcal{A}$ uma álgebra (associativa) e seja $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial de um grupo G sobre $\mathcal{A}$. Então o produto cruzado parcial $\mathcal{A} *_\alpha G$ é associativo se, e somente se, a igualdade*

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_a = L_a \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \quad (1.1)$$

é válida em $\mathcal{A}_g$, para todo $g \in G$ e todo $a, c \in \mathcal{A}$.

Verificaremos a validade dessa condição (1.1) sempre que formos provar que uma certa álgebra $\mathcal{A}$ é fortemente associativa.

Demonstração do Lema 1.2.1: Obviamente $\mathcal{A} *_\alpha G$ é associativo se, e somente se,

$$(a\delta_h \ b\delta_g) \ c\delta_f = a\delta_h (b\delta_g \ c\delta_f) \quad (1.2)$$

para arbitrários $h, g, f \in G$ e $a \in \mathcal{A}_h$, $b \in \mathcal{A}_g$, $c \in \mathcal{A}_f$. Notemos que

$$(a\delta_h b\delta_g) c \delta_f = \alpha_h (\alpha_{h^{-1}}(a) b) \delta_{hg} c \delta_f = \alpha_{hg} \{ \alpha_{hg}^{-1} [\alpha_h (\alpha_{h^{-1}}(a) b) c] \} \delta_{hgf}.$$

Vemos que $\alpha_{h^{-1}}(a) b \in \mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_g$ implica

$$\alpha_h (\alpha_{h^{-1}}(a) b) \in \alpha_h (\mathcal{A}_{h^{-1}} \cap \mathcal{A}_g) = \mathcal{A}_h \cap \mathcal{A}_{hg}, \text{ por (ii')} \text{ de 1.1.1.}$$

Agora por (iii') de 1.1.1 segue que

$$\alpha_{hg}^{-1} [\alpha_h (\alpha_{h^{-1}}(a) b) c] = \alpha_{g^{-1}} \{ \alpha_{h^{-1}} [\alpha_h (\alpha_{h^{-1}}(a) b) c] \} = \alpha_{g^{-1}} (\alpha_{h^{-1}}(a) b) c.$$

Como esse elemento pertence a $\mathcal{A}_{g^{-1}} \cap \mathcal{A}_{g^{-1}h^{-1}}$, podemos também separar α_{hg} , donde

$$(a\delta_h b\delta_g) c \delta_f = \alpha_h \{ \alpha_g [\alpha_{g^{-1}} (\alpha_{h^{-1}}(a) b) c] \} \delta_{hgf}.$$

Comparando com

$$a\delta_h (b\delta_g c\delta_f) = a\delta_h \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(b) c) \delta_{gf} = \alpha_h [\alpha_{h^{-1}}(a) \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(b) c)] \delta_{hgf},$$

e aplicando $\alpha_{h^{-1}}$, obtemos que (1.2) vale se, e somente se,

$\alpha_g \{ \alpha_{g^{-1}} (\alpha_{h^{-1}}(a) b) c \} = \alpha_{h^{-1}}(a) \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(b) c)$ é verificada para todo $a \in \mathcal{A}_h$, $b \in \mathcal{A}_g$, $c \in \mathcal{A}_f$.

Como $\alpha_{h^{-1}} : \mathcal{A}_h \longrightarrow \mathcal{A}_{h^{-1}}$ é um isomorfismo, $\alpha_{h^{-1}}(a)$ pertence a $\mathcal{A}_{h^{-1}}$ e, consequentemente, a condição acima é equivalente a

$$\alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(ab) c) = a \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(b) c) \tag{1.3}$$

para todo $a \in \mathcal{A}_{h^{-1}}$, $b \in \mathcal{A}_g$, $c \in \mathcal{A}_f$. Se $h = f = 1$, então $\mathcal{A}_h = \mathcal{A}_f = \mathcal{A}$ e logo $\mathcal{A} *_{\alpha} G$ é associativo se, e somente se, (1.3) vale para $g \in G$, $a, c \in \mathcal{A}$ e $b \in \mathcal{A}_g$ arbitrários. Isso é equivalente a afirmar que a igualdade (1.1) é válida em $\mathcal{A}_g$ para todo $g \in G$ e todo $a, c \in \mathcal{A}$.

■

Foram obtidos os dois seguintes resultados auxiliares:

Lema 1.2.2. *Seja $\mathcal{A} = \mathcal{B} \times \mathcal{D}$, em que $\mathcal{B}$ e $\mathcal{D}$ são F -álgebras. Se a F -álgebra $\mathcal{A}$ é fortemente associativa, então $\mathcal{B}$ e $\mathcal{D}$ são fortemente associativas.*

Demonstração: Provaremos que $\mathcal{B}$ é fortemente associativa, de modo análogo prova-se que $\mathcal{D}$ é fortemente associativa.

Suponhamos que $\mathcal{B}$ não seja fortemente associativa. Então existe um grupo G e uma ação parcial $\mu = (\{\mathcal{B}_g\}_{g \in G}, \{\mu_g\}_{g \in G})$ de G sobre $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{B} *_\mu G$ não é associativo. Pelo Lema 1.2.1, isso implica que existe um ideal $\mathcal{B}_{g_o} \neq \mathcal{B}$ com $g_o \neq 1$ tal que

$$(\mu_{g_o} \circ R_c \circ \mu_{g_o^{-1}}) \circ L_a \neq L_a \circ (\mu_{g_o} \circ R_c \circ \mu_{g_o^{-1}})$$

em $\mathcal{B}_{g_o}$ para algum $a \in \mathcal{B}$ e para algum $c \in \mathcal{B}$.

Mas $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ dada por:

$$\mathcal{A}_g = \mathcal{B}_g, \forall g \in G, g \neq 1, \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}, \alpha_g = \mu_g \forall g \in G, g \neq 1,$$

$\alpha_1 = Id_{\mathcal{A}}$, é uma ação parcial de G sobre $\mathcal{A}$, pois para cada $g \in G$, $\mathcal{B}_g$ é um ideal de $\mathcal{A}$. Consequentemente a igualdade (1.1) não é válida em $\mathcal{A}_{g_o} = \mathcal{B}_{g_o}$ para os elementos a e c , contradizendo a associatividade forte de $\mathcal{A}$. Portanto, $\mathcal{B}$ e $\mathcal{D}$ são fortemente associativas. ■

Lema 1.2.3. *Sejam $\mathcal{A}$ uma F -álgebra, F um corpo, G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre $\mathcal{A}$. Se um ideal $\mathcal{A}_g$, $g \in G$, é um somando direto de $\mathcal{A}$, então a igualdade (1.1) é satisfeita em $\mathcal{A}_g$, para todo $a, c \in \mathcal{A}$.*

Demonstração : Seja $\mathcal{A}_{g_o}$ um somando direto de $\mathcal{A}$ e seja $\mathcal{I}$ um ideal de $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{g_o} \oplus \mathcal{I}$.

Queremos provar que

$$(\alpha_{g_o} \circ R_c \circ \alpha_{g_o^{-1}}) \circ L_a = L_a \circ (\alpha_{g_o} \circ R_c \circ \alpha_{g_o^{-1}})$$

é válida em $\mathcal{A}_{g_o}$, $\forall a, c \in \mathcal{A}$.

Para isso, sejam $b \in \mathcal{A}_{g_o}$, $a, c \in \mathcal{A}$. Escreva $a = a_1 + a_2$, em que $a_1 \in \mathcal{A}_{g_o}$, $a_2 \in \mathcal{I}$. Então,

$$\begin{aligned}
 \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}(a \ b) \ c) &= \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}((a_1 + a_2) \ b) \ c) \\
 &= \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}(a_1 \ b) \ c) \\
 &= \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}(a_1) \ \alpha_{g_o}^{-1}(b) \ c) \\
 &= a_1 \ \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}(b) \ c) \\
 &= (a_1 + a_2) \ \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}(b) \ c) \\
 &= a \ \alpha_{g_o}(\alpha_{g_o}^{-1}(b) \ c).
 \end{aligned}$$

Portanto, a igualdade (1.1) é satisfeita em todo somando direto $\mathcal{A}_g$ de $\mathcal{A}$, para todo $a, c \in \mathcal{A}$.

■

Exemplos de Álgebras de Grupo

Fortemente Associativas e

Não-fortemente Associativas

Para uso posterior, os seguintes resultados bem conhecidos são necessários.

Lema 2.0.1. *Seja $H = \langle y : y^{p^n} = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem p^n e seja F um corpo de característica p . Então para cada $i \in \{0, 1, 2, \dots, p^n\}$, a álgebra de grupo FH tem exatamente um ideal de dimensão $p^n - i$ sobre F , a saber $J(FH)^i = FH(y-1)^i$ (i -ésima potência do radical de Jacobson $J(FH)$ de FH).*

Demonstração : (Adaptada de [15], Lema 17.13(ii), p. 295).

Com efeito, considere a aplicação

$$\begin{aligned} \theta : F[X] &\longrightarrow FH && \text{definida por} \\ f &\longrightarrow f(y). \end{aligned}$$

Note que θ é um homomorfismo sobrejetor de álgebras, logo $\frac{F[X]}{\ker(\theta)} \simeq FH$, em que $\ker(\theta) = \{f \in F[X] : f(y) = 0\}$.

Como $F[X]$ é um domínio de ideais principais, $\ker(\theta)$ é o ideal gerado pelo polinômio mônico f_o , de grau mínimo, tal que $f_o(y) = 0$.

Agora, sendo $y^{p^n} = 1$ temos que $X^{p^n} - 1 \in \ker(\theta)$.

Note ainda que se $f = \sum_{i=0}^r k_i X^i$ é um polinômio de grau $r < p^n$, segue que

$f(y) = \sum_{i=0}^r k_i y^i \neq 0$, pois os elementos $\{1, y, y^2, \dots, y^r\}$ são linearmente independentes sobre F . Logo $\ker(\theta) = \langle X^{p^n} - 1 \rangle$, de modo que $\frac{F[X]}{\langle X^{p^n} - 1 \rangle} \simeq FH$.

Sabemos que qualquer ideal de $\frac{F[X]}{\langle X^{p^n} - 1 \rangle}$ tem a forma $\frac{I}{\langle X^{p^n} - 1 \rangle}$, em que I é um ideal de $F[X]$ contendo $\langle X^{p^n} - 1 \rangle$. Como $F[X]$ é um domínio de ideais principais, $I = \langle f \rangle$ para algum f dividindo $X^{p^n} - 1$. Mas $X^{p^n} - 1 = (X - 1)^{p^n}$, de modo que $I = \langle (X - 1)^i \rangle$ para algum i , $0 \leq i \leq p^n$, e a imagem I^* de I em FH é $I^* = FH(y - 1)^i$.

Porque $J(FH) = \Delta(H)$ (ideal de aumento de FH) e H é gerado por y , temos também $J(FH) = FH(y - 1)$. Portanto os ideais de FH são os

$J(FH)^i = FH(y - 1)^i$, $0 \leq i \leq p^n$ e $\dim_F \frac{FH}{J(FH)^i} = \dim_F \frac{F[X]}{\langle (X - 1)^i \rangle} = i$, donde $\dim_F J(FH)^i = p^n - i$, $0 \leq i \leq p^n$.

■

Lema 2.0.4. (Vide [15], p. 303, Lema 1.2). Seja H um grupo de ordem p^n , $n \geq 1$, e seja

$$H = H_1 \supsetneq H_2 \supsetneq \dots \supsetneq H_n \supsetneq H_{n+1} = 1$$

uma série de composição de H . Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, escolha $g_i \in H_i - H_{i+1}$. Seja F um corpo de característica p . Então os elementos $\lambda(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{i=1}^n (g_i - 1)^{a_i}$ com $0 \leq a_i < p$ formam uma F -base de FH . Além disso, esses elementos com $\lambda(0, 0, \dots, 0) = 1$ excluído formam uma F -base para $\Delta(H)$ (o ideal de aumento de FH).

Corolário 2.0.1. Seja $H = \langle y : y^{p^n} = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem p^n e seja F um

corpo de característica p . Então

$$B = \{(y-1)^k : 0 \leq k \leq p^n - 1\}$$

é uma F -base da álgebra de grupo FH .

Demonstração (Alternativa).

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, escolha $g_i \in H_i - H_{i+1}$ como $g_i = y^{\frac{p^n}{p^{n-(i-1)}}} = y^{p^{i-1}}$.
Pelo Lema 2.0.2 segue que os elementos

$$\begin{aligned} \lambda(a_1, a_2, \dots, a_n) &= \prod_{i=1}^n (g_i - 1)^{a_i} \quad (0 \leq a_i \leq p-1) \\ &= (y-1)^{a_1} (y^p-1)^{a_2} \dots (y^{p^{n-1}}-1)^{a_n} \\ &= (y-1)^{a_1} (y-1)^{pa_2} \dots (y-1)^{p^{n-1}a_n} \\ &= (y-1)^{(1+p+\dots+p^{n-1}) a_1} \\ &= (y-1)^{\left(\frac{p^n-1}{p-1}\right) a_1} \\ &= (y-1)^k, \text{ em que } k = \left(\frac{p^n-1}{p-1}\right) a_1, \end{aligned}$$

formam uma F -base de FH . Além disso, como $0 \leq a_i \leq p-1$ obtemos $0 \leq \frac{a_i}{p-1} \leq 1$ e consequentemente, $0 \leq \left(\frac{p^n-1}{p-1}\right) a_i \leq p^n - 1$, isto é, $0 \leq k \leq p^n - 1$. Portanto

$$B = \{(y-1)^k : 0 \leq k \leq p^n - 1\}$$

é uma F -base de FH . ■

Observação. Seja $H = H_1 \times H_2$, em que H_1 e H_2 são grupos finitos, e seja F um corpo. Sejam β_1 e β_2 F -bases de FH_1 e FH_2 , respectivamente.

Como existe um isomorfismo

$$\begin{aligned} f^* : FH_1 \otimes FH_2 &\longrightarrow F[H_1 \times H_2] \quad \text{tal que} \\ f^*(u \otimes v) &= uv \quad (u \in FH_1, v \in FH_2) \end{aligned}$$

segue que $B = f^*(\beta_1 \otimes \beta_2)$ é uma F -base de $F[H_1 \times H_2] = FH$.

Usando a observação anterior, segue pelo Corolário 2.0.1 e por indução o seguinte

Lema 2.0.5. *Seja $H = \langle a_1 \rangle \times \cdots \times \langle a_r \rangle$ um p -grupo abeliano finito decomposto como um produto direto de p -subgrupos cíclicos $\langle a_1 \rangle, \dots, \langle a_r \rangle$, de ordens $p^{n_1}, \dots, p^{n_r}$, respectivamente. Seja F um corpo de característica p . Então*

$$B = \{(a_1 - 1)^{k_1} (a_2 - 1)^{k_2} \cdots (a_r - 1)^{k_r} : 0 \leq k_i \leq p^{n_i} - 1, i = 1, \dots, r\}$$

é uma F -base da álgebra de grupo FH .

Uma outra demonstração do Lema 2.0.3 pode ser vista no artigo de W. E. Deskins, "Finite abelian groups with isomorphic group algebras", Duke Math. J. 23 (1956), 35-40.

Vimos no Lema 1.2.1 que dada uma ação parcial $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ de um grupo G sobre uma álgebra $\mathcal{A}$, então $\mathcal{A}$ é fortemente associativa se, e somente se, a condição (1.1) verifica-se, isto é,

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_a = L_a \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}})$$

é válida em $\mathcal{A}_g$, para todo $g \in G$ e todo $a, c \in FH$.

Para evitar repetições de argumentos, foi obtido o seguinte

Lema 2.0.6. *Seja H um grupo finito e seja F um corpo. Seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre a álgebra de grupo FH . Suponha que $g \in G$ é tal que $\mathcal{A}_g = FH$ ou $\mathcal{A}_g = \Delta(H)$. Então a igualdade (1.1) verifica-se em $\mathcal{A}_g$, com $a, c \in F$ arbitrários.*

Demonstração : Queremos provar que

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_a = L_a \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}})$$

é válida em $\mathcal{A}_g$, $\forall a, c \in FH$.

Com efeito, se $\mathcal{A}_g = FH$, então α_g é um automorfismo de FH . Como $a \in \mathcal{A}_g$ obtemos para $b \in \mathcal{A}_g$, $c \in FH$, que

$$\begin{aligned} \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(ab) c) &= \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(a) \alpha_{g^{-1}}(b) c) \\ &= \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(a)) \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(b) c) \\ &= a \alpha_g (\alpha_{g^{-1}}(b) c), \end{aligned}$$

e a igualdade (1.1) verifica-se neste caso.

Agora, se $\mathcal{A}_g = \Delta(H)$, sejam $b \in \Delta(H)$, $a, c \in FH$. Usando que $FH = \Delta(H) \oplus F$ (soma direta de F -espaços), escreva $a = a' + \lambda$, em que $a' \in \Delta(H)$, $\lambda \in F$.

Então

$$\begin{aligned} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab) c) &= \alpha_g((\alpha_{g^{-1}}(a'b) c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda b) c) \\ &= \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a')\alpha_{g^{-1}}(b) c) + \lambda \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b) c) \\ &= a' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b) c) + \lambda \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b) c) \\ &= (a' + \lambda) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b) c) \\ &= a \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b) c), \end{aligned}$$

de modo que a igualdade (1.1) é satisfeita em $\mathcal{A}_g = \Delta(H)$.

■

A seguir são apresentados dois exemplos de álgebras de grupo fortemente associativas.

2.1 Grupo Cíclico de ordem 2

Exemplo 2.1.1: *Seja $H = \langle y : y^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2, e seja F um corpo de característica 2. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa.*

Com efeito, pelo Lema 2.0.1 o único ideal não trivial de FH é $J(FH) = FH(y - 1)$.

Seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre FH . Então, para todo $g \in G$, temos $\mathcal{A}_g = FH$ ou $\mathcal{A}_g = J(FH)$. Como H é um 2-grupo segue que $J(FH) = \Delta(H)$. Pelo Lema 2.0.4, segue que a condição (1.1) é satisfeita. Portanto, FH é fortemente associativa.

2.2 Grupo Cíclico de ordem 3

Exemplo 2.2.1: *Seja $H = \langle y : y^3 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 3, e seja F um corpo de característica 3. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa.*

De fato, pelo Lema 2.0.1 temos que os únicos ideais não triviais de FH são $J(FH) = FH(y-1)$ e $J(FH)^2 = FH(y-1)^2$.

Seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre FH . Neste caso, $\forall g \in G$, temos $\mathcal{A}_g = FH$ ou $\mathcal{A}_g = J(FH)$, ou $\mathcal{A}_g = J(FH)^2$.

Como H é um 3-grupo segue que $J(FH) = \Delta(H)$. Logo, pelo Lema 2.0.4, a igualdade (1.1) é válida em $\mathcal{A}_g = FH$ e em $\mathcal{A}_g = J(FH)$.

Agora, seja $\mathcal{A}_g = J(FH)^2$. Como $\dim_F J(FH)^2 = 1$, vemos facilmente que $\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}$ e L_a comutam em $\mathcal{A}_g$, $\forall a, c \in FH$. Portanto, FH é fortemente associativa.

Os próximos exemplos exibem álgebras de grupo as quais não são fortemente associativas.

2.3 Grupo Cíclico de ordem 4

Exemplo 2.3.1: Seja $H = \langle y : y^4 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 4, e seja F um corpo de característica 2. Então FH não é fortemente associativa.

Com efeito, pelo Corolário 2.0.1, $B = \{1, (y-1), (y-1)^2, (y-1)^3\}$ é uma F -base de FH . Tome I o ideal gerado por $(y-1)^2$ (I é o subespaço de FH gerado por $(y-1)^2$ e $(y-1)^3$). Seja $G = \langle g : g^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2.

Considere a ação parcial α de G sobre FH dada por $\mathcal{A}_g = I$, e

$$\begin{aligned} \alpha_g : (y-1)^2 &\longrightarrow (y-1)^3 \\ (y-1)^3 &\longrightarrow (y-1)^2. \end{aligned}$$

(Por definição $\mathcal{A}_1 = FH$ e α_1 é o automorfismo identidade de FH).

Agora, tomando $x = (y-1)\delta_1 + (y-1)^2\delta_g$, obtemos:

$$\begin{aligned} xx &= ((y-1)\delta_1 + (y-1)^2\delta_g)((y-1)\delta_1 + (y-1)^2\delta_g) \\ &= (y-1)^2\delta_1 + (y-1)^3\delta_g + 0 + 0. \end{aligned}$$

Por um lado, temos

$$\begin{aligned}(xx)x &= [(y-1)^2\delta_1 + (y-1)^3\delta_g] ((y-1)\delta_1 + (y-1)^2\delta_g) \\ &= (y-1)^3\delta_1 + 0 + (y-1)^2\delta_g + 0 \\ &= (y-1)^3\delta_1 + (y-1)^2\delta_g;\end{aligned}$$

enquanto

$$\begin{aligned}x(xx) &= ((y-1)\delta_1 + (y-1)^2\delta_g) ((y-1)^2\delta_1 + (y-1)^3\delta_g) \\ &= (y-1)^3\delta_1 + 0 + 0 + 0 \\ &= (y-1)^3\delta_1.\end{aligned}$$

Como $(xx)x \neq x(xx)$, segue que FH não é fortemente associativa.

2.4 Grupo de Klein

Exemplo 2.4.1: Seja $H = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} = \langle a_1 : a_1^2 = 1 \rangle \times \langle a_2 : a_2^2 = 1 \rangle$, e seja F um corpo de característica 2. Então a álgebra de grupo FH não é fortemente associativa.

Com efeito, pelo Lema 2.0.3 $B = \{1, (a_1 - 1), (a_2 - 1), (a_1 - 1)(a_2 - 1)\}$ é uma F -base de FH . Seja $G = \langle g : g^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2 e tome I o ideal de FH gerado por $v = (a_2 - 1)$ (I é o subespaço gerado por v e $(a_1 - 1)v$).

Considere a ação parcial α de G sobre FH dada por $\mathcal{A}_g = I$,

$$\begin{aligned}\alpha_g : v &\longrightarrow (a_1 - 1)v \\ (a_1 - 1)v &\longrightarrow v.\end{aligned}$$

(Por definição $\mathcal{A}_1 = FH$ e α_1 é a aplicação identidade de FH). Então o produto cruzado $FH *_\alpha G$ não é associativo. Para ver isso, tome $x = (a_1 - 1)\delta_1 + v\delta_g$. Neste caso é fácil ver que $(xx)x = v\delta_g$, enquanto $x(xx) = 0$.

Como $(xx)x = v\delta_g \neq 0 = x(xx)$ segue o resultado.

$$2.5 \quad H = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

Exemplo 2.5.1: Seja $H = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} = \langle a_1 : a_1^2 = 1 \rangle \times \langle a_2 : a_2^2 = 1 \rangle \times \langle a_3 : a_3^2 = 1 \rangle$, e seja F um corpo de característica 2. Então a álgebra de grupo FH não é fortemente associativa.

De fato, pelo Lema 2.0.3

$$B = \{1, (a_1-1), (a_2-1), (a_1-1)(a_2-1), (a_3-1), (a_1-1)(a_3-1), (a_2-1)(a_3-1), (a_1-1)(a_2-1)(a_3-1)\}$$

é uma F -base de FH . Seja $G = \langle g : g^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2 e tome I o ideal de FH gerado por $v = (a_2-1)(a_3-1)$ (I é o subespaço gerado por v e $(a_1-1)v$).

Considere a ação parcial α de G sobre FH dada por $\mathcal{A}_g = I$,

$$\alpha_g : v \longrightarrow (a_1-1)v, \quad (a_1-1)v \longrightarrow v.$$

Tome $x = (a_1-1)\delta_1 + v\delta_g$. Como no Exemplo 2.4.1 é fácil ver que $(xx)x = v\delta_g$, enquanto $x(xx) = 0$, logo FH não é fortemente associativa.

$$2.6 \quad H = \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

Exemplo 2.6.1: Seja $H = \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} = \langle a_1 : a_1^4 = 1 \rangle \times \langle a_2 : a_2^2 = 1 \rangle$, e seja F um corpo de característica 2. Então a álgebra de grupo FH não é fortemente associativa.

Com efeito, novamente pelo Lema 2.0.3,

$$B = \{1, (a_1-1), (a_1-1)^2, (a_1-1)^3, (a_2-1), (a_1-1)(a_2-1), (a_1-1)^2(a_2-1), (a_1-1)^3(a_2-1)\}$$

é uma F -base de FH . Considere também $G = \langle g : g^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2 e tome agora I o ideal de FH gerado por $v = (a_1-1)^2(a_2-1)$ (I é o subespaço gerado por v e $(a_1-1)v$).

Tomando a ação parcial α de G sobre FH dado por $\mathcal{A}_g = I$,

$\alpha_g : v \longrightarrow (a_1 - 1)v$, $(a_1 - 1)v \longrightarrow v$, então para $x = (a_1 - 1)\delta_1 + v\delta_g$, obtemos

$$\begin{aligned} xx &= ((a_1 - 1)\delta_1 + v\delta_g)((a_1 - 1)\delta_1 + v\delta_g) \\ &= (a_1 - 1)^2\delta_1 + (a_1 - 1)v\delta_g + 0 + 0. \end{aligned}$$

Por um lado, temos

$$\begin{aligned} (xx)x &= [(a_1 - 1)^2\delta_1 + (a_1 - 1)v\delta_g]((a_1 - 1)\delta_1 + v\delta_g) \\ &= (a_1 - 1)^3\delta_1 + 0 + v\delta_g + 0 \\ &= (a_1 - 1)^3\delta_1 + v\delta_g; \end{aligned}$$

enquanto

$$\begin{aligned} x(xx) &= ((a_1 - 1)\delta_1 + v\delta_g)[(a_1 - 1)^2\delta_1 + (a_1 - 1)v\delta_g] \\ &= (a_1 - 1)^3\delta_1 + 0 + 0 + 0 \\ &= (a_1 - 1)^3\delta_1. \end{aligned}$$

Como $(xx)x \neq x(xx)$, segue que FH não é fortemente associativa.

O Problema de Caracterização das Álgebras de Grupo Fortemente Associativas

Iniciamos agora o estudo da caracterização das álgebras de grupo FH fortemente associativas, em que H é um grupo finito e F é um corpo cuja característica p divide a ordem de H .

3.1 O Grupo é Cíclico de ordem p prima

Os Exemplos 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 sugerem a validade da seguinte

Proposição 3.1.1. *Seja $H = \langle y : y^p = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem p e seja F um corpo de característica $p > 0$. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, $|H| = 2$ ou $|H| = 3$.*

Demonstração: ($\Leftarrow$) Se $|H| = 2$ ou $|H| = 3$, vimos nos Exemplos 2.1.1 e 2.2.1, respectivamente, que FH é fortemente associativa.

($\Rightarrow$) Reciprocamente, se FH é fortemente associativa, suponhamos que $|H| \geq 5$.

Sendo H cíclico, temos pelo Lema 2.0.1 que $J(FH)^{p-2}$ tem dimensão 2 sobre F , e

podemos afirmar que $J(FH) \supsetneq J(FH)^{p-2}$.

Pelo Corolário 2.0.1,

$$B = \{1, (y-1), \dots, (y-1)^{p-2}, (y-1)^{p-1}\}$$

é uma F -base de FH , de modo que $J(FH)^{p-2} = FH(y-1)^{p-2}$ é o subespaço gerado por $(y-1)^{p-2}$ e $(y-1)^{p-1}$.

Tome $G = \langle g : g^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2, $I = J(FH)^{p-2}$ e considere a ação parcial α de G sobre FH dada por $\mathcal{A}_{g^{-1}} = \mathcal{A}_g = I$, e

$$\begin{aligned} \alpha_g : \mathcal{A}_{g^{-1}} &\longrightarrow \mathcal{A}_g \\ (y-1)^{p-2} &\longrightarrow (y-1)^{p-1} \\ (y-1)^{p-1} &\longrightarrow (y-1)^{p-2}. \end{aligned}$$

(Por definição $\mathcal{A}_1 = FH$ e $\alpha_1 = Id_{FH}$). Tomando $x = (y-1)\delta_1 + (y-1)^{p-2}\delta_g$, (note que $(y-1) \in J(FH) \subset FH = \mathcal{A}_1$ e $(y-1) \notin J(FH)^{p-2} = \mathcal{A}_g$), obtemos:

$$\begin{aligned} xx &= ((y-1)\delta_1 + (y-1)^{p-2}\delta_g)((y-1)\delta_1 + (y-1)^{p-2}\delta_g) \\ &= (y-1)^2\delta_1 + (y-1)^{p-1}\delta_g + 0 + 0. \end{aligned}$$

Por um lado, temos

$$\begin{aligned} (xx)x &= [(y-1)^2\delta_1 + (y-1)^{p-1}\delta_g]((y-1)\delta_1 + (y-1)^{p-2}\delta_g) \\ &= (y-1)^3\delta_1 + 0 + (y-1)^{p-2}\delta_g + 0 \\ &= (y-1)^3\delta_1 + (y-1)^{p-2}\delta_g; \end{aligned}$$

enquanto,

$$\begin{aligned} x(xx) &= ((y-1)\delta_1 + (y-1)^{p-2}\delta_g)[((y-1)^2\delta_1 + (y-1)^{p-1}\delta_g)] \\ &= (y-1)^3\delta_1 + 0 + 0 + 0 \\ &= (y-1)^3\delta_1. \end{aligned}$$

Logo, o produto cruzado parcial $FH *_\alpha G$ não é associativo, o que contradiz a hipótese. Portanto, $|H| = 2$ ou $|H| = 3$.

3.2 Uma Condição para a Álgebra de Grupo não ser Fortemente Associativa

O próximo resultado desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.

Lema 3.2.1. *Sejam H um grupo finito e $M \neq H$ um subgrupo normal de H . Seja F um corpo de característica p . Se $p \mid |M|$, então a álgebra de grupo FH não é fortemente associativa.*

Demonstração : Denotemos por $T = \{1 = h_1, h_2, \dots, h_k\}$ um transversal à esquerda de M em H (conjunto completo de representantes de classes à esquerda de M), em que o elemento identidade 1 de H é escolhido como o representante da classe M . Seja $\tilde{h} = 1 + h_2 + \dots + h_k$, e considere $\widehat{M} = \sum_{x \in M} x$, o qual é um elemento não nulo central de FH .

É fácil ver que

$$\tilde{h}\widehat{M} = \widehat{M}\tilde{h} = \widehat{H}, \quad \tilde{h}^2\widehat{M} = k\widehat{H}, \quad \widehat{M}^2 = 0 \text{ (pois } \widehat{M}^2 = |M|\widehat{M}, \text{ e } p \mid |M|).$$

Seja $I = \langle \widehat{M} \rangle$ o ideal de FH gerado por $\widehat{M}$, o qual tem F -base

$$\{\widehat{H}, \widehat{M}, h_2\widehat{M}, \dots, h_{k-1}\widehat{M}\}.$$

Tome $G = \langle g : g^2 = 1 \rangle$ um grupo cíclico de ordem 2, e considere a ação parcial α de G sobre FH dada por $\mathcal{A}_{g^{-1}} = \mathcal{A}_g = I$,

$$\alpha_g : \mathcal{A}_{g^{-1}} \longrightarrow \mathcal{A}_g$$

$$\text{se } k = 2 \left\{ \begin{array}{l} \widehat{H} \longrightarrow \widehat{M} \\ \widehat{M} \longrightarrow \widehat{H}, \end{array} \right.$$

$$\text{e se } k \geq 3 \left\{ \begin{array}{l} \widehat{H} \longrightarrow \widehat{M} \\ \widehat{M} \longrightarrow \widehat{H} \\ \dots \\ \text{fixa os demais} \\ \text{elementos da base} \end{array} \right.$$

(Por definição $\mathcal{A}_1 = FH$ e $\alpha_1 = Id_{FH}$).

Finalmente, tomando $x = \tilde{h}\delta_1 + \widehat{M}\delta_g$, obtemos:

$$\begin{aligned} xx &= (\tilde{h}\delta_1 + \widehat{M}\delta_g)(\tilde{h}\delta_1 + \widehat{M}\delta_g) \\ &= \tilde{h}^2\delta_1 + \widehat{H}\delta_g + k\widehat{M}\delta_g + 0. \end{aligned}$$

Por um lado, temos

$$\begin{aligned} (xx)x &= [\tilde{h}^2\delta_1 + \widehat{H}\delta_g + k\widehat{M}\delta_g](\tilde{h}\delta_1 + \widehat{M}\delta_g) \\ &= \tilde{h}^3\delta_1 + k\widehat{H}\delta_g + \widehat{M}\delta_g + 0 + k^2\widehat{M}\delta_g + 0 \\ &= \tilde{h}^3\delta_1 + \left[k\widehat{H} + (1 + k^2)\widehat{M} \right] \delta_g; \end{aligned}$$

enquanto,

$$\begin{aligned} x(xx) &= (\tilde{h}\delta_1 + \widehat{M}\delta_g) [\tilde{h}^2\delta_1 + \widehat{H}\delta_g + k\widehat{M}\delta_g] \\ &= \tilde{h}^3\delta_1 + k\widehat{H}\delta_g + k\widehat{H}\delta_g + k^2\widehat{M}\delta_g + 0 + 0 \\ &= \tilde{h}^3\delta_1 + \left[2k\widehat{H} + k^2\widehat{M} \right] \delta_g. \end{aligned}$$

Note que $(xx)x - x(xx) = (\widehat{M} - k\widehat{H})\delta_g \neq 0$. Portanto, FH não é fortemente associativa.

■

3.3 O Grupo é Nilpotente

Segue como consequência da Proposição 3.1.1 e do Lema 3.2.1 o seguinte

Teorema 3.3.1. *Seja H um grupo nilpotente e seja F um corpo cuja característica p divide a ordem de H . Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, $|H| = 2$ ou $|H| = 3$.*

Demonstração: ($\implies$) Suponha que FH é fortemente associativa.

Afirmção. Devemos ter $|H| = p$.

Com efeito, sendo H nilpotente finito e como p divide $|H|$, temos que o p -subgrupo de Sylow P de H não é trivial e é normal em H ; Se $P \subsetneq H$ segue pelo Lema 3.2.1 que FH não é fortemente associativa, o que é uma contradição. Logo $H = P$, e existe um

subgrupo normal M de H tal que $|H/M| = p$ (vide [13], Teorema 7.2). Se $M \neq \{1\}$, pelo Lema 3.2.1, obtemos novamente que FH não é fortemente associativa, o que é uma contradição. Portanto, $|H| = p$, provando a afirmação.

Neste caso, pela Proposição 3.1.1 segue que $|H| = 2$ ou $|H| = 3$.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, se $|H| = 2$ ou $|H| = 3$, pelos Exemplos 2.1.1 e 2.2.1 temos que FH é fortemente associativa. ■

3.4 Resultados Auxiliares

Os próximos resultados são bem conhecidos e serão usados nas demonstrações dos teoremas subsequentes.

Teorema 3.4.1. (Vide [14], p. 182, Teorema 12.9(a)). Seja M um subgrupo normal de H e seja F um corpo de característica p . Suponha que M é um p' -grupo e ponha $e = |M|^{-1} \sum_{x \in M} x$. Então e é um idempotente central de FH e $ex = e$ para todo $x \in M$. Além disso,

$$FH = FHe \oplus FH(1 - e)$$

é uma decomposição direta de FH em ideais (bilaterais). A aplicação φ de FHe sobre $F(H \setminus M)$ definida por $\varphi(ge) = gM$ ($g \in H$) é um isomorfismo de F -álgebras e também um isomorfismo de FH -módulos. Também temos $FH(1 - e) = \Delta(H, M)$.

Definição 3.4.1. Seja $\mathcal{A}$ uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo F . Um idempotente central e em $\mathcal{A}$ é chamado centralmente primitivo se $e \neq 0$ e e não pode ser escrito como uma soma de dois idempotentes centrais ortogonais não nulos em $\mathcal{A}$.

Proposição 3.4.1. (Vide [15], p.57, Proposição 10.8 (i), (ii), ou [14], Teorema 12.1 a), b)). Seja $\mathcal{A}$ uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo F .

(i) Existe uma decomposição direta

$$\mathcal{A} = B_1 \oplus \cdots \oplus B_n$$

de $\mathcal{A}$ em ideais bilaterais indecomponíveis $B_i \neq 0$ com $B_i B_j = 0$ para $i \neq j$.

(ii) Escreva $1 = e_1 + \cdots + e_n$ com $e_i \in B_i$. Então os e_i são idempotentes centralmente primitivos mutuamente ortogonais e $B_i = Ae_i = e_i A$.

Lembremos agora o importante conceito de bloco.

Definição 3.4.2. Seja $\mathcal{A} = \bigoplus_{i=1}^n B_i = \bigoplus_{i=1}^n Ae_i$ a decomposição definida na Proposição 3.4.1. B_i é chamado um bloco e e_i um idempotente de bloco de $\mathcal{A}$. Escreve-se também $B = B(e)$ para indicar que B é um bloco contendo o idempotente de bloco e .

A partir da próxima Proposição até a Proposição 3.4.3 $\mathcal{A}$ denotará uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo F .

Sejam $e_1, e_2, \dots, e_n$ os idempotentes de blocos de $\mathcal{A}$ e seja V um $\mathcal{A}$ -módulo indecomponível. Seja $\mathcal{A} = B(e_1) \oplus \cdots \oplus B(e_n)$ a decomposição direta de $\mathcal{A}$ em soma de blocos. Dizemos que V pertence ao bloco $B(e_i)$ se existe $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ tal que

$$e_i V = V \text{ e } e_j V = 0 \quad \text{para todo } j \neq i.$$

Observe que se V pertence ao bloco $B(e_i)$, então:

- (a) Todos $\mathcal{A}$ -módulos isomorfos a V pertencem a $B(e_i)$,
- (b) $v = 1 \cdot v = e_i v$ para todo $v \in V$.

Proposição 3.4.2. (Vide [15], p. 59, Proposição 10.10 (i), (ii), (iii), ou [14], Teorema 12.1 d), e), f)). Seja $\mathcal{A} = B(e_1) \oplus \cdots \oplus B(e_n)$ a decomposição direta de $\mathcal{A}$ em soma de blocos.

- (i) Para todo $\mathcal{A}$ -módulo V , $V = \bigoplus_{i=1}^n e_i V$ é uma decomposição direta de V em $\mathcal{A}$ -módulos. Em particular, se V é indecomponível, então $V = e_i V$ para um único $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.
- (ii) Para cada ideal à esquerda I de $\mathcal{A}$, temos

$$I = \bigoplus_{i=1}^n (I \cap B(e_i)).$$

Em particular, cada ideal à esquerda indecomponível pertence a exatamente um dos $B(e_i)$.

- (iii) Se $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ são ideais de $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2$, então $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ são somas diretas de blocos. Em particular, os blocos são os únicos ideais indecomponíveis que são somandos diretos de $\mathcal{A}$.

Definição 3.4.3. *Seja ${}_A A = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n$ uma decomposição de ${}_A A$ em submódulos indecomponíveis $\{I_i\}$. Esses somandos $\{I_i\}$ são chamados os módulos indecomponíveis principais (à esquerda) de A .*

Prova-se (vide [2], Teorema (54.5)) que um ideal à esquerda I de A é um módulo indecomponível principal de A se, e somente se, $I = Ae$ para algum idempotente primitivo e em A . Lembremos que um idempotente $e \in A$ é chamado primitivo se e não pode ser expresso como uma soma de dois idempotentes ortogonais.

Definição 3.4.4. *Dois A –módulos indecomponíveis principais gerados por idempotentes primitivos e e f estão ligados se existe uma seqüência $e_1, \dots, e_n$ de idempotentes primitivos com $e_1 = e$, $e_n = f$, tal que para cada i , Ae_i e Ae_{i+1} têm um fator de composição em comum. Dois idempotentes primitivos e e f estão ligados quando os módulos Ae e Af estão ligados. A relação $\sim$ de estar ligado é uma relação de equivalência, e podemos decompor o conjunto de todos A –módulos indecomponíveis principais em um número finito de classes de equivalência.*

No que segue denotamos por $X_1, \dots, X_m$ as classes de equivalência de $\sim$.

Proposição 3.4.3. *(Vide [15], p. 63, Proposição 10.14). Seja $A = \bigoplus_{i=1}^n Ae_i$ uma decomposição de A em módulos indecomponíveis principais, e para cada $j \in \{1, \dots, m\}$ ponha*

$$I_j = \bigoplus_{Ae_i \in X_j} Ae_i$$

- (i) $I_1, \dots, I_m$ são todos os blocos de A .
- (ii) *Dois A –módulos indecomponíveis principais estão ligados se e somente se eles pertencem ao mesmo bloco.*

Agora, apresentamos a seguinte

Definição 3.4.5. *Seja H um grupo finito e seja F um corpo arbitrário de característica $p > 0$. Por bloco principal de FH entendemos o bloco que contém o FH –módulo trivial 1_H ou 1_{FH} (o módulo para a 1–representação ou representação trivial de H de grau 1).*

Denotemos o p' -subgrupo normal maximal de H por $O_{p'}(H)$, enquanto $O_p(H)$ indica o p -subgrupo normal maximal de H .

Definição 3.4.6. Um grupo H é chamado p -restrito se H satisfaz a propriedade

$$C_H(\tilde{H}/M) \subset \tilde{H}$$

para $M = O_{p'}(H)$ e $\tilde{H} = O_{p',p}(H)$ (imagem inversa de $O_p(H/M)$ em H).

Proposição 3.4.4. (Vide [15], p. 115, Proposição 1.20). Seja H p -restrito, seja $M = O_{p'}(H)$ e seja $e = |M|^{-1} \sum_{x \in M} x$. Então $FHe \simeq F(H/M)$ é o bloco principal de FH .

3.5 O Grupo é de Frobenius com complemento P

Alguns resultados conhecidos permitem facilmente caracterizar as álgebras de grupo modulares fortemente associativas tais que H é um grupo de Frobenius com complemento P , em que P é um p -subgrupo de Sylow de H .

Lembremos inicialmente a definição de grupo de Frobenius.

Definição 3.5.1. Um grupo de permutações H agindo sobre um conjunto S é dito transitivo quando para $s, s' \in S$, existe $\gamma \in H$ tal que $\gamma(s) = s'$.

Definição 3.5.2. Um grupo de permutações transitivo H sobre m letras no qual somente a identidade fixa mais que uma letra, mas para alguma letra i , $1 \leq i \leq m$, o subgrupo fixando i é não-trivial, é chamado um grupo de Frobenius.

Os seguintes resultados bem conhecidos serão usados nesta seção:

Teorema 3.5.1. (Frobenius) (Vide [11], p. 38, Teorema 7.5). Seja H um grupo de Frobenius e seja H_1 o subgrupo fixando uma letra. Então o subgrupo de H consistindo da identidade junto com aqueles elementos os quais fixam nenhuma letra formam um subgrupo normal M de H de ordem $(H : H_1)$.

M é chamado o núcleo de Frobenius de H e H_1 é chamado um complemento de Frobenius.

Lema 3.5.1. (Vide [11], p. 38, Teorema 7.6).

Seja H um grupo de Frobenius com complemento H_1 e núcleo M . Então

- (i) $H = MH_1$ com $M \cap H_1 = \{1\}$, de modo que H é o produto semidireto de M por H_1 .
- (ii) $|H_1|$ divide $|M| - 1$.
- (iii) Todo elemento de $H_1 - \{1\}$ induz por conjugação um automorfismo de M o qual fixa somente o elemento identidade de M .
- (iv) $C_H(y) \subseteq M$ para todo y em $M - \{1\}$.

Observação 3.5.1. Prova-se (em [11], p. 39, Teorema 7.7) o seguinte resultado:

Seja H_1 um subgrupo não trivial de H . Então H é um grupo de Frobenius com complemento H_1 se, e somente se, H_1 é disjunto de seus conjugados e $N_H(H_1) = H_1$.

Observação 3.5.2. Prova-se também (vide [17], p. 280, Teorema 2.6) que se H é um grupo de Frobenius e M é o núcleo de Frobenius de H , então M é um subgrupo nilpotente. Usando esse resultado é fácil ver que M é o único subgrupo normal próprio de H o qual satisfaz a condição (iv) no Lema 3.5.1. Logo, um grupo de Frobenius tem um único núcleo de Frobenius.

Teorema 3.5.2. (Motose (1974)), (Vide [15], p. 189, Teorema 7.7). Seja H um grupo de Frobenius com complemento H_1 e núcleo M e seja F um corpo arbitrário de característica $p > 0$.

- (i) Se p divide $|M|$ e P é um p -subgrupo de Sylow de M (e portanto de H , pelo Lema 3.5.1 (ii)), então $J(FH) = FH \cdot \Delta(P) = \Delta(H, P)$.
- (ii) Se p não divide $|M|$, então

$$J(FH) = J(FH_1)e \quad \text{e} \quad \dim_F J(FH) = \dim_F J(FH_1),$$

em que $e = |M|^{-1} \sum_{m \in M} m$.

Corolário 3.5.1. (Wallace (1958)), (Vide [15], p. 189). Seja P um p -subgrupo de Sylow de H , seja F um corpo de característica p e seja H um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo M . Então

$$J(FH) = \Delta(P)e$$

em que $e = |M|^{-1} \sum_{m \in M} m$.

Em particular, $\dim_F J(FH) = |P| - 1$.

O próximo resultado obtido é o

Teorema 3.5.3. *Seja H um grupo de Frobenius com complemento P , em que P é um p -subgrupo de Sylow de H , e seja F um corpo de característica $p > 0$. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.*

Demonstração : Pelo Teorema de Frobenius e Lema 3.5.1 (i), existe um subgrupo normal M de H tal que

$$H = MP, \quad M \cap P = \{1\}.$$

Como $|H| = |M||P|$, M é um p' -grupo. Segue obviamente que $M = O_{p'}(H)$ e que H é p -restrito.

Seja $e = |M|^{-1} \sum_{x \in M} x$. Pelo Teorema 3.4.1 segue que

$$FH = FHe \oplus FH(1 - e), \tag{3.1}$$

em que $FHe \simeq F(H/M) \simeq FP$ e $FH(1 - e) = \Delta(H, M)$.

$\Rightarrow$) Supondo que FH é fortemente associativa, temos pelo Lema 1.2.2 que FHe é fortemente associativa. Como $FHe \simeq FP$ segue que FP é fortemente associativa.

Pelo Teorema 3.3.1, concluímos que $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

$\Leftarrow$) Reciprocamente, se $|P| = 2$ ou $|P| = 3$, segue de (3.1) e pela Proposição 3.4.2 (iii) que os ideais FHe e $FH(1 - e)$ de FH são somas diretas de blocos. Mas, sendo H p -restrito, obtemos pela Proposição 3.4.4 que FHe é o bloco principal de FH . Assim,

$$FH = FHe \oplus FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_n$$

é a decomposição direta de FH em soma de blocos, em que $e, e_1, \dots, e_n$ são idempotentes centralmente primitivos mutuamente ortogonais.

Agora pelo Corolário 3.5.1 (Wallace), segue que

$$J(FH) = \Delta(P)e = J(FP)e;$$

como $FHe \cong FP$ segue que $J(FHe) = J(FP)e$, e $J(FH) = J(FHe)$. Logo, $J(FHe_i) = 0$, $\forall i = 1, \dots, n$. Isso implica que cada bloco FHe_i , $i = 1, \dots, n$, é uma F -álgebra simples.

Queremos provar que FH é fortemente associativa. Para isso, seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre FH .

Analisemos inicialmente o caso $|P| = 2$. Neste caso, as possibilidades para $\mathcal{A}_g$ são ou $FH, FHe, J(FH) = J(FH)e, FHe_{i_1} \oplus \dots \oplus FHe_{i_t}$, em que $1 \leq i_1 < \dots < i_t \leq n$, ou $FHe \oplus FHe_{i_1} \oplus \dots \oplus FHe_{i_t}$ ou $J(FH)e \oplus FHe_{i_1} \oplus \dots \oplus FHe_{i_t}$.

Vamos provar que a condição (1.1) verifica-se.

Com efeito, em $\mathcal{A}_g = FH$ segue pelo Lema 2.0.4 que a igualdade (1.1) é satisfeita; Em $\mathcal{A}_g = FHe, FHe_{i_1} \oplus \dots \oplus FHe_{i_t}$, e $FHe \oplus FHe_{i_1} \oplus \dots \oplus FHe_{i_t}$, obtém-se pelo Lema 1.2.3 a validade de (1.1). Agora, como $\dim_F J(FH)e = 1$ segue que essa igualdade é válida em $\mathcal{A}_g = J(FH)e$.

Finalmente, seja $\mathcal{A}_g = J(FH)e \oplus FHe_{i_1} \oplus \dots \oplus FHe_{i_t}$.

Suporemos (para fixar a notação) que $i_1 = 1, \dots, i_t = t < n$. Como $FHe \simeq FP$ temos que $J(FH)e = J(FHe) \simeq J(FP)$. Assim, sendo $FP = J(FP) \oplus F$ (como F -espaços), $FHe = J(FH)e \oplus Fe$ (como F -espaços). Sejam $b \in \mathcal{A}_g$, $a, c \in FH$. Escreva $a = a' + a_1 + \dots + a_t + a_{t+1} + \dots + a_n$, em que $a' \in FHe$, $a_j \in FHe_j$, $j = 1, \dots, n$, Seja $\tilde{a} = a_1 + \dots + a_t$, então

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\tilde{a}b)c).$$

Escrevendo agora $a' = a'' + \lambda e$, em que $a'' \in J(FH)e$, $\lambda e \in Fe$, obtemos

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a''b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda eb)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\tilde{a}b)c).$$

Note que $a''b = 0$ pois $(J(FH)e)^2 = 0$ e $J(FH)e \cap (FHe_1 \oplus \dots \oplus FHe_t) = 0$. Assim, como $\tilde{a} \in \mathcal{A}_g$ temos

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = 0 + \lambda \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c).$$

Afirmção: $\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) = e \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c)$.

De fato, escreva $b = b' + b''$, em que $b' \in J(FH)e$, $b'' \in FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_t$.

1º caso: $b'' = 0$. Então $b = b'$, de modo que $eb = eb' = b'$, pois e é a identidade de $J(FH)e$, e tem-se

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb')c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b')c).$$

Por outro lado, observe que $\mathcal{A}_{g^{-1}} = J(FH)e \oplus \alpha_{g^{-1}}(FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_t)$, e que $\alpha_{g^{-1}}(FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_t)$ é um ideal da forma $FHe_{j_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{j_t}$. Como e é a identidade de $JFHe$, temos que

$$e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) = e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b')c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b')c).$$

Assim,

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) = e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c).$$

2º caso: $b' = 0$. Então $b = b''$ e $eb = eb'' = 0$, de modo que

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb'')c) = 0.$$

Por outro lado, devido ao isomorfismo

$$\alpha_g : J(FH)e \oplus \alpha_{g^{-1}}(FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_t) \longrightarrow J(FHe) \oplus FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_t$$

também temos $e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) = 0$. Logo, vale a afirmação neste caso.

Finalmente, se $b = b' + b''$, $b', b'' \neq 0$, pelos 1º e 2º casos segue que

$$\begin{aligned} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) &= \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb')c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb'')c) \\ &= e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b')c) + e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b'')c) \\ &= e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b' + b'')c) \\ &= e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c), \end{aligned}$$

e segue a afirmação. Observe que a demonstração dessa afirmação não depende do índice de nilpotência do radical. Portanto,

$$\begin{aligned} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) &= \lambda e\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \tilde{a}\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= (a'' + \lambda e)\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \tilde{a}\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= (a' + \tilde{a})\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= a\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c), \end{aligned}$$

isto é, a igualdade (1.1) é satisfeita em $\mathcal{A}_g = J(FH)e \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$. Logo, a condição (1.1) verifica-se, e FH é fortemente associativa.

Suponhamos agora que $|P| = 3$. Aqui, as possibilidades para $\mathcal{A}_g$ são ou $FH, FHe, J(FH)e, (J(FH)e)^2, FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}, 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n, FHe \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}, J(FH)e \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$, ou $(J(FH)e)^2 \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$.

Argumentando de modo análogo à demonstração do caso $|P| = 2$, vemos que em $\mathcal{A}_g = FH, FHe, FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$, e em $FHe \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$, a igualdade (1.1) é satisfeita. Agora, como $\dim_F(J(FH)e)^2 = 1$ segue que essa igualdade é válida em $\mathcal{A}_g = (J(FH)e)^2$.

Seja $\mathcal{A}_g = J(FH)e$ e sejam $b \in \mathcal{A}_g, a, c \in FH$. Escreva $a = a' + a_1 + \cdots + a_n$, onde $a' \in FHe, a_j \in FHe_j, j = 1, \dots, n$.

Então $\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'b)c)$. Usando que $FHe = J(FH)e \oplus Fe$ (como F -espaços), escreva $a' = a'' + \lambda e$, em que $a'' \in J(FH)e, \lambda e \in Fe$, para obter

$$\begin{aligned} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) &= \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a''b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda eb)c) \\ &= a'' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda b)c) \\ &= a'' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \lambda \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= a'' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \lambda e \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= (a'' + \lambda e) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= a' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= a \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c), \end{aligned}$$

em que usamos que e é a identidade do ideal $\mathcal{A}_g = J(FH)e$. Logo a igualdade (1.1) verifica-se.

Considere agora $\mathcal{A}_g = J(FH)e \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$. Suporemos (para fixar a notação) que $i_1 = 1, \dots, i_k = k < n$. Sejam $b \in \mathcal{A}_g, a, c \in FH$. Escreva $a = a' + a_1 + \cdots + a_k + \cdots + a_n$, em que $a' \in FHe, a_j \in FHe_j, j = 1, \dots, n$. Seja $\tilde{a} = a_1 + \cdots + a_k$. Então

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\tilde{a}b)c);$$

usando agora que $FHe = J(FH)e \oplus Fe$, escrevemos $a' = a'' + \lambda e$, em que $a'' \in$

$J(FH)e, \lambda e \in Fe$, e obtemos

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a''b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda eb)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\tilde{a}b)c).$$

Notando que $a'', \tilde{a} \in \mathcal{A}_g$, segue que

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = a'' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \lambda \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c).$$

Agora, escrevendo $b = b' + b''$, em que $b' \in J(FH)e, b'' \in FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_k$, e observando que

$$\mathcal{A}_{g^{-1}} = J(FH)e \oplus \alpha_{g^{-1}}(FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_k),$$

já vimos anteriormente (caso $|P| = 2$) que

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(eb)c) = e \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c).$$

Logo,

$$\begin{aligned} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) &= a'' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \lambda e \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= (a'' + \lambda e) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= a' \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= (a' + \tilde{a}) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\ &= a \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c), \end{aligned}$$

de modo que a igualdade (1.1) é satisfeita em

$$\mathcal{A}_g = J(FH)e \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}.$$

Finalmente, seja $\mathcal{A}_g = (J(FH)e)^2 \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}$ e suponhamos, como antes, que $i_1 = 1, \dots, i_k = k < n$. Sejam $b \in \mathcal{A}_g, a, c \in FH$. Escreva $a = a' + a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1} + \cdots + a_n$, em que $a' \in FHe, a_j \in FHe_j, j = 1, \dots, n$. Seja $\tilde{a} = a_1 + \cdots + a_k$. Então

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\tilde{a}b)c);$$

usando que $FHe = J(FH)e \oplus Fe$, escrevemos $a' = a'' + \lambda e$, em que $a'' \in J(FH)e, \lambda e \in Fe$, e obtemos

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(ab)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a''b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda eb)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\tilde{a}b)c).$$

Note que $a''b = 0$ pois $(J(FH)e)^3 = 0$ e $J(FH)e \cap (FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_k) = 0$, e que $\tilde{a} \in A_g$. Assim

$$\alpha_g(\alpha_{g-1}(ab)c) = 0 + \lambda \alpha_g(\alpha_{g-1}(eb)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c).$$

Agora, escrevendo $b = b' + b''$, em que $b' \in (J(FH)e)^2$, $b'' \in FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_k$, e observando que

$$A_{g-1} = (J(FH)e)^2 \oplus \alpha_{g-1}(FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_k),$$

já vimos anteriormente que

$$\alpha_g(\alpha_{g-1}(eb)c) = e \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c).$$

Logo,

$$\begin{aligned} \alpha_g(\alpha_{g-1}(ab)c) &= 0 + \lambda e \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c) \\ &= (a'' + \lambda e) \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c) + \tilde{a} \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c) \\ &= (a' + \tilde{a}) \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c) \\ &= a \alpha_g(\alpha_{g-1}(b)c), \end{aligned}$$

de modo que a igualdade (1.1) é também satisfeita em

$$A_g = (J(FH)e)^2 \oplus FHe_{i_1} \oplus \cdots \oplus FHe_{i_k}.$$

Portanto, a condição (1.1) verifica-se, e FH é fortemente associativa. Isso completa a demonstração. ■

Exemplo 3.5.1: Seja $H = A_4$ o grupo alternado de grau 4. Temos

$$A_4 = \langle a, b, c : a^2 = b^2 = c^3 = 1, ab = ba, cac^{-1} = b, cbc^{-1} = ab \rangle.$$

Seja F um corpo de característica $p = 3$. Então A_4 é um grupo de Frobenius com complemento $P = \langle c \rangle$ e núcleo $M = \langle a, b \rangle$. Note que P é um 3-subgrupo de Sylow de A_4 . Como $|P| = 3$, segue pelo Teorema 3.5.3 que FA_4 é fortemente associativa.

3.6 O Grupo H é p -solúvel e $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra Semisimples

Iniciamos esta seção com a seguinte

Definição 3.6.1. *Seja p um número primo. Um grupo H é dito p -solúvel se H tem uma série subnormal*

$$H_0 = H \supseteq H_1 \supseteq H_2 \supseteq \cdots \supseteq H_r = \{1\}$$

tal que H_{i-1}/H_i é um p -grupo ou um p' -grupo para cada i .

Observação 3.6.1. *Denotando por $\pi(H)$ o conjunto de primos dividindo $|H|$, é fácil ver que todo grupo solúvel (finito) é p -solúvel para todo primo p em $\pi(H)$. Além disso, prova-se (vide [17], p. 170) que todo grupo p -solúvel é p -restrito.*

Aqui, além de alguns resultados anteriores, usaremos o seguinte

Teorema 3.6.1. *(Wallace (1958) [15], p. 198, Teorema 8.11). Seja P um p -subgrupo de Sylow de H . Então $\dim_F J(FH) = |P| - 1$, se, e somente se, ou $H = P$ ou H é um grupo de Frobenius com complemento P .*

O próximo resultado obtido é o

Teorema 3.6.2. *Sejam H um grupo p -solúvel, P um p -subgrupo de Sylow de H e seja F um corpo de característica $p > 0$. Suponha que $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra semisimples. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, H é um dos seguintes dois tipos:*

- (i) H é cíclico de ordem 2 ou 3;
- (ii) H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' , $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Demonstração :

$\implies$) Suponha que FH é fortemente associativa. Como H é p -solúvel, existe um subgrupo normal M de H tal que H/M é um p' -grupo ou H/M tem ordem p .

Se H/M é um p' -grupo, então P é um p -subgrupo de Sylow de M , de modo que p divide $|M|$. Pelo Lema 3.2.1 segue que FH não é fortemente associativa, o que é uma

3.6 O Grupo H é p -solúvel e $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra Semisimple 35

contradição. Portanto, $|H/M| = p$ e $p \nmid |M|$. Então $M = O_{p'}(H)$ e $H = MP$, $M \cap P = \{1\}$, $|P| = p$.

Note que sendo H/M abeliano segue que $H' \subseteq M$. Se $H' \subsetneq M$, como $H'P \neq H$ é um subgrupo normal de H e p divide $|H'P| = |H'||P|$, teríamos novamente pelo Lema 3.2.1 que FH não é fortemente associativa, o que é uma contradição. Portanto $M = H'$.

Se $H' = \{1\}$, então $H = P$ e pela Proposição 3.1.1 temos que $|H| = 2$ ou $|H| = 3$; logo, H é do tipo (i).

Vamos supor a partir de agora que $H' \neq \{1\}$. Neste caso, note que p divide $|P|$ implica que P não é normal em H , e consequentemente H não é nilpotente. Seja $e_1 = |H'|^{-1} \sum_{h' \in H'} h'$.

Pelo Teorema 3.4.1 segue que

$$FH = FHe_1 \oplus FH(1 - e_1),$$

em que $FHe_1 \simeq F(H/H') \simeq FP$ e $FH(1 - e_1) = \Delta(H, H')$.

Sendo FH fortemente associativa, temos pelo Lema 1.2.2 que FHe_1 é fortemente associativa. Como $FHe_1 \simeq FP$ segue que FP é fortemente associativa. Pelo Proposição 3.1.1 concluímos que $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Agora, como $\Delta(H, H') = FH(1 - e_1)$ é uma F -álgebra semisimples, por hipótese, temos que $J(FH(1 - e_1)) = 0$. Assim,

$$\begin{aligned} J(FH) &= J(FHe_1) \oplus J(FH(1 - e_1)) \\ &= J(FHe_1) \simeq J(FP). \end{aligned}$$

Isso implica que $\dim_F J(FH) = |P| - 1$. Como $H \neq P$ (pois $H' \neq \{1\}$), concluímos pelo Teorema 3.6.1 que H é um grupo de Frobenius com complemento P (e núcleo H' , pela unicidade do núcleo de Frobenius (observação 3.5.2)). Isso completa a demonstração da parte ‘‘somentese.’’

$\Leftarrow$) Reciprocamente, se $|H| = 2$ ou $|H| = 3$ vimos nos Exemplos 2.1.1 e 2.2.1, respectivamente, que FH é fortemente associativa.

Agora, se H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' , $|P| = 2$ ou $|P| = 3$, segue pelo Teorema 3.5.3 que FH é fortemente associativa. Isso completa a

demonstração. ■

3.7 Um Tipo Particular de Grupo p -Solúvel

Lembremos agora a definição de defeito de um bloco, dada em [15], p. 77.

Definição 3.7.1. *Seja C uma classe de conjugação de H e seja $h \in C$. Um p -subgrupo de Sylow de $C_H(h)$ é chamado um grupo de defeito de C (com respeito a p).*

Logo, todos grupos de defeito de C são conjugados e portanto têm a mesma ordem, digamos p^d . O inteiro d é chamado o defeito de C .

Definição 3.7.2. *Seja e um idempotente de bloco de FH e seja $B = B(e)$ (o bloco contendo o idempotente de bloco e). Como $e \in Z(FH)$, segue que (o suporte de e)*

$$\text{supp } e = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_r$$

para alguns $C_i \in Cl(H)$ (o conjunto de todas as classes de conjugação de H). O maior dos grupos de defeito de C_i , $1 \leq i \leq r$, é chamado um grupo de defeito de e (ou de B).

Prova-se que todos os grupos de defeito de e são conjugados e portanto têm a mesma ordem, digamos p^d . O inteiro d é chamado o defeito de e (ou de B).

Observação 3.7.1. *Sejam H um grupo (finito) e P um p -subgrupo de H . Seja F um corpo de característica p . Temos $P \cdot C_H(P) \subset N(P)$. Sejam $C_1, \dots, C_s$ todas as classes de conjugação de H . Defina*

$$C'_i = \sum_{x \in C_i \cap C_H(P)} x \quad 1 \leq i \leq s$$

ou $C'_i = 0$ se $C_i \cap C_H(P)$ é vazio. Note que se $C'_i \neq 0$, então C'_i é uma soma de elementos os quais constituem determinadas classes de conjugação em $N_H(P)$. Logo cada C'_i pertence

ao centro de $FN_H(P)$. É fácil ver que $\sum_{i=1}^s FC'_i$ é um subanel de $Z(FN_H(P))$. Podemos definir um F -homomorfismo

$$\begin{aligned} \pi : Z(FH) &\longrightarrow \sum_{i=1}^s FC'_i \subset Z(FN_H(P)) \\ C_i^+ &\longrightarrow C'_i, \quad 1 \leq i \leq s. \end{aligned}$$

Prova-se (vide [2], Lema (87.14)) que π é de fato um homomorfismo de álgebras. π é chamado homomorfismo de Brauer.

Usaremos nesta seção os três seguintes resultados bem conhecidos:

Teorema 3.7.1. (Correspondência de Brauer, vide [2], p. 625, Teorema (87.29) ou [15], p. 223, Teorema 9.21). Seja P um p -subgrupo de H . Então o homomorfismo de Brauer $\pi : Z(FH) \longrightarrow Z(FN_H(P))$ determina uma correspondência bijetora entre os idempotentes de blocos de FH os quais têm P como um de seus grupos de defeito e os idempotentes de blocos de $FN_H(P)$ os quais têm P como seu único grupo de defeito.

Definição 3.7.3. Sejam H um grupo finito, $h \in H$, seja p um primo. Diz-se que h é p -regular se sua ordem é prima com p . Uma classe de conjugação C de H é chamada p -regular se todos os seus elementos são p -regulares.

Sejam $C_1 = \{1\}, C_2, \dots, C_r$ todas as classes p -regulares de H . O conjunto

$$S_i = \{h \in H : h_{p'} \in C_i\} \quad (1 \leq i \leq r),$$

em que $h_{p'}$, a p' -parte de h , é um elemento p -regular, chama-se uma seção p -regular de H associada com C_i .

Segue imediatamente da definição que

(i) $H = \cup_{i=1}^r S_i$ com $S_i \cap S_j = \emptyset$ para $i \neq j$, cada S_i é uma união de classes de conjugação de H e S_1 é uma união de classes de conjugação de p -elementos (os quais têm ordens divisíveis por p) de H .

(ii) Uma classe de conjugação C de H é uma seção p -regular se, e somente se, C tem p -defeito zero.

Teorema 3.7.2. (Vide [15], p. 179, Teorema 6.4 i). Sejam $S_1, S_2, \dots, S_r$ todas as seções p -regulares de H e seja $Z_{p'} = \sum_{i=1}^r FS_i^+$. Então :

- (i) $Z_{p'}$ é um ideal de $Z(FH)$ e os idempotentes primitivos de $Z_{p'}$ são os idempotentes de blocos de FH de defeito zero.
- (ii) Um bloco B de FH é de defeito zero se, e somente se, B é uma F -álgebra simples.

Lema 3.7.1. (Vide [15], p. 248, Lema 12.2). Seja B o bloco principal de FH . Então os p -subgrupos de Sylow de H são grupos de defeito de B . Em particular, se $J(B) = 0$ então $J(FH) = 0$.

Usaremos também o Teorema 3.6.2 para demonstrar o seguinte

Teorema 3.7.3. Seja H um grupo p -solúvel, $H = MN_H(P)$, $M \cap N_H(P) = \{1\}$, em que $M = O_{p'}(H) \neq \{1\}$ e P é um p -subgrupo de Sylow de H , e seja F um corpo de característica $p > 0$. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' , $|P| = 2$ ou $|P| = 3$. (Em particular, $N_H(P) = P$).

Demonstração

$\implies$) Suponha que FH é fortemente associativa.

Seja $e_1 = |M|^{-1} \sum_{x \in M} x$. Pelo Teorema 3.4.1 temos que

$$FH = FHe_1 \oplus FH(1 - e_1),$$

em que $FHe_1 \simeq F(H/M) \simeq FN_H(P)$ e $FH(1 - e_1) = \Delta(H, M)$. Sendo FH fortemente associativa, segue pelo Lema 1.2.2 que FHe_1 é fortemente associativa; como $FHe_1 \simeq FN_H(P)$, obtemos que $FN_H(P)$ é fortemente associativa. Isso implica que $N_H(P) = P$, pois se $P \subsetneq N_H(P)$, como p divide $|P|$ e $P \triangleleft N_H(P)$, teríamos pelo Lema 3.2.1 que $FN_H(P)$ não é fortemente associativa, o que é uma contradição.

Portanto, $N_H(P) = P$. Pelo Teorema 3.3.1 segue que $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Afirmção: $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra semisimples.

Pela Proposição 3.4.2 (iii) segue que os ideais FHe_1 e $FH(1 - e_1)$ de FH são somas diretas de blocos. Mas, sendo H p -solúvel, temos que H é p -restrito, e pela Proposição 3.4.4 segue que FHe_1 é o bloco principal de FH . Assim,

$$FH = FHe_1 \oplus FHe_2 \oplus \cdots \oplus FHe_n$$

é a decomposição direta de FH em soma de blocos, em que $e_1, e_2, \dots, e_n$ são idempotentes centralmente primitivos mutuamente ortogonais.

Porque $|P| = 2$ ou $|P| = 3$, temos pela Definição 3.7.2 que os blocos de FH têm defeito 1 ou 0. Agora, pelo Lema 3.7.1, os p -subgrupos de Sylow de H são grupos de defeito do bloco principal FHe_1 . Portanto, FHe_1 é um bloco de defeito 1.

Como $FN_H(P) = FP \simeq FHe_1$ segue que $FN_H(P)$ contém somente um bloco, obviamente com grupo de defeito P . Então, pelo Teorema 3.7.1 (de correspondência de Brauer) deduzimos que FH contém somente um bloco com grupo de defeito P , isto é, de defeito 1. Portanto, o bloco principal FHe_1 é o único bloco de FH de defeito 1.

Assim, $FHe_2, \dots, FHe_n$ são blocos de defeito zero, e portanto, pelo Teorema 3.7.2 (ii), são F -álgebras simples, de modo que $J(FHe_i) = 0$, $\forall i = 2, \dots, n$. Portanto,

$$\begin{aligned} J(\Delta(H, O_{p'}(H))) &= J(FHe_2) \oplus \dots \oplus J(FHe_n) \\ &= 0, \end{aligned}$$

e segue a afirmação,

Agora, como H é p -solúvel, e sendo $O_{p'}(H) \neq \{1\}$, temos pelo Teorema 3.6.2 que H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' . Isso completa a demonstração da parte ''somente se.''

$\Leftarrow$) Reciprocamente, se H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' , $|P| = 2$ ou $|P| = 3$, segue pelo Teorema 3.5.3 que FH é fortemente associativa. ■

Exemplo 3.7.1: Seja $H = S_4$ o grupo das permutações de 4 letras. Temos que $|S_4| = 24$ e H é solúvel. Seja F um corpo de característica 3. O grupo de defeito P do bloco principal B_1 é um 3-subgrupo de Sylow, o qual é gerado por qualquer 3-ciclo. Temos

$$N_H(P) = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}, \quad |N_H(P)| = 6 \text{ e } N_H(P) \simeq S_3.$$

Denotando por $M = \{(1), (12)(34), (14)(23), (13)(24)\}$, vemos facilmente que

$$S_4 = MN_H(P), \quad M \cap N_H(P) = \{1\}, \quad M = O_{p'}(H) \triangleleft S_4.$$

Como $N_H(P) \neq P$, segue pelo Teorema 3.7.3 que FS_4 não é fortemente associativa.

3.8 O Grupo é Metabeliano

Definição 3.8.1. Um grupo H é chamado um grupo metabeliano se H contém um subgrupo normal M tal que M e H/M são ambos abelianos.

Definição 3.8.2. Um grupo H é dito p -nilpotente se H tem um p' -subgrupo normal N , chamado o p -complemento normal, tal que H/N é um p -grupo.

Além de alguns resultados anteriores, usaremos nesta seção os seguintes resultados conhecidos:

Teorema 3.8.1. (Vide [14], p. 198, Teorema 14.9 a), b), c)). Seja F um corpo de característica p . As seguintes condições são equivalentes:

- a) O bloco principal B_1 de H contém somente um (a menos de isomorfismo) FH -módulo irredutível.
- b) H é p -nilpotente.
- c) Todo bloco de H contém somente um FH -módulo irredutível.

Teorema 3.8.2. (Vide [15], p. 153, Teorema 4.12). Seja N um subgrupo normal de H , seja F um corpo algebricamente fechado e seja V um FH -módulo irredutível. Se $\text{Car}(F) = p > 0$ divide $(H : N)$, suponha que H/N é p -solúvel. Então $\dim_F V$ divide $(H : N)s$, em que s é a dimensão de uma componente irredutível de V_N .

Corolário 3.8.1. (Dade (1968), Swan (1963)), (Vide [15], p. 154). Seja F um corpo algebricamente fechado de característica $p > 0$ e seja A um subgrupo normal abeliano de um grupo p -solúvel H . Então as dimensões dos FH -módulos irredutíveis dividem $(H : A)$.

Teorema 3.8.3. (Vide [15], p. 79, Teorema 2.7). Seja F um corpo algebricamente fechado de característica $p > 0$, seja H um grupo de ordem $p^n m$ com $(p, m) = 1$ e seja B um bloco de FH com defeito d . Então d é o menor inteiro tal que p^{n-d} divide as dimensões de todos os FH -módulos irredutíveis em B .

Assim como 3.7, veremos que 3.8 é um caso particular de 3.6. De fato, obtem-se o seguinte

Teorema 3.8.4. *Seja H um grupo metabeliano e seja F um corpo algebricamente fechado cuja característica p divide a ordem de H . Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, H é um dos seguintes dois tipos:*

- (i) H é cíclico de ordem 2 ou 3;
- (ii) H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' , em que P é um p -subgrupo de Sylow de H , $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Demonstração

$\Rightarrow$) Suponha que FH é fortemente associativa. Se H é abeliano, então pelo Teorema 3.3.1, $|H| = 2$ ou $|H| = 3$; logo, H é do tipo (i). Suponha agora que H não é abeliano. Como H é metabeliano, H contém um subgrupo normal M abeliano tal que H/M é também abeliano. Temos que $M \neq \{1\}$ e $|H| = |M||H/M|$. Note que $p \nmid |M|$, pois caso contrário teríamos pelo Lema 3.2.1 que FH não é fortemente associativa, o que é uma contradição. Como p divide $|H|$ segue que p divide $|H/M|$.

Seja $e_1 = |M|^{-1} \sum_{x \in M} x$. Pelo Teorema 3.4.1 temos que

$$FH = FHe_1 \oplus FH(1 - e_1),$$

em que $FHe_1 \simeq F(H/M)$ e $FH(1 - e_1) = \Delta(H, M)$.

Sendo FH fortemente associativa, temos pelo Lema 1.2.2 que FHe_1 é fortemente associativa. De $FHe_1 \simeq F(H/M)$ segue que $F(H/M)$ é fortemente associativa; Como H/M é abeliano e p divide $|H/M|$ temos pelo Teorema 3.3.1 que $|H/M| = 2$ ou $|H/M| = 3$. Então $M = O_{p'}(H)$ e $H = MP$, $M \cap P = \{1\}$, em que P é um p -subgrupo de Sylow de H com $p = |P| = 2$ ou $p = |P| = 3$.

Note que p divide $|P|$ implica que P não é normal em H , e consequentemente H não é nilpotente.

Pela Proposição 3.4.2 (iii) segue que os ideais FHe_1 e $FH(1 - e_1)$ de FH são somas diretas de blocos. Mas sendo H metabeliano implica que H é solúvel, logo é p -solúvel, e consequentemente H é p -restrito, de modo que pela Proposição 3.4.4, FHe_1 é o bloco principal de FH . Assim,

$$FH = FHe_1 \oplus FHe_2 \oplus \cdots \oplus FHe_k$$

é a decomposição direta de FH em soma de blocos, em que $e_1, \dots, e_k$ são idempotentes centralmente primitivos mutuamente ortogonais.

Pela Definição 3.7.2 temos que os blocos de FH têm defeito $d = 1$ ou $d = 0$. Agora, pelo Lema 3.7.1, os p -subgrupos de Sylow de H são grupos de defeito do bloco principal FHe_1 . Portanto, FHe_1 é um bloco de defeito 1.

Afirmção: $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra semisimples.

Vamos provar que todo bloco não principal de FH têm defeito zero.

Suponha que existe $j, 2 \leq j \leq k$, tal que FHe_j é um bloco de defeito 1, isto é, FHe_j é um bloco com grupo de defeito P . Observe que H é p -nilpotente. Pelo Teorema 3.8.1 segue que todo bloco de FH contém somente um FH -módulo irredutível. Assim, o bloco principal FHe_1 contém somente um FH -módulo irredutível, o qual é necessariamente o FH -módulo trivial 1_H (o módulo para a 1-representação ou representação trivial de H de grau 1).

Se L é um corpo, é bem conhecido que existe uma correspondência 1 – 1 entre as L -representações unidimensionais distintas de H e as L -representações unidimensionais distintas de H/H' . De modo análogo à demonstração do Teorema 3.6.2 temos que $M = O_{p'}(H) = H'$.

Como $H/H' \simeq P$ é um p -grupo (abeliano) segue que a única representação modular irredutível de H/H' é a 1-representação. Logo,

$$\begin{aligned} &\text{existe uma única } F\text{-representação unidimensional} \\ &\text{de } H, \text{ a saber a 1-representação.} \end{aligned} \tag{3.2}$$

Agora, seja W_j o único FH -módulo irredutível contido no bloco FHe_j . Seja $z_j = \dim_F W_j$. Como H é p -solúvel e $M = O_{p'}(H)$ é abeliano temos pelo Corolário 3.8.1 que z_j divide $(H : M) = p$. Logo, $z_j = 1$ ou $z_j = p$.

Como FHe_j tem defeito $d = 1$, então pelo Teorema 3.8.3, 1 é o menor inteiro tal que $p^{1-1} = 1$ divide z_j . Isso implica que $z_j = 1$, pois caso contrário zero seria o menor inteiro tal que $p^{1-0} = p$ divide z_j , o que é uma contradição. Mas $z_j = 1$ contradiz (3.2), e segue que para todo $i = 2, \dots, k$, FHe_i tem defeito zero.

Pelo Teorema 3.7.2 (ii) temos que $FHe_2, \dots, FHe_k$ são F -álgebras simples, de modo que $J(FHe_i) = 0, \forall i = 2, \dots, k$. Assim,

$$\begin{aligned} J(\Delta(H, O_{p'}(H))) &= J(FHe_2) \oplus \dots \oplus J(FHe_k) \\ &= 0, \end{aligned}$$

e segue a afirmação.

Finalmente, como $O_{p'}(H) \neq \{1\}$, segue pelo Teorema 3.6.2 que H é um grupo de Frobenius com complemento P e núcleo H' . Isso completa a demonstração da parte ‘‘somente se’’.

$\Leftarrow$) Segue dos Exemplos 2.1.1 e 2.2.1 e do Teorema 3.5.3. Isso completa a demonstração. ■

3.9 O Grupo H é p -Solúvel e $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra não-Semisimples

Iniciamos esta seção lembrando a seguinte

Definição 3.9.1. *Sejam H um grupo (finito), $M \triangleleft H$ e seja F um corpo. Seja V um FM -módulo e seja $h \in H$. Defina hV o FM -módulo cujo espaço subjacente é V e sobre o qual os elementos $x \in M$ agem de acordo com a regra*

$$x \cdot v = (h^{-1}xh) v, \quad v \in V.$$

Dizemos que dois FM -módulos V_1 e V_2 são H -conjugados se $V_1 \simeq {}^hV_2$ para algum $h \in H$. Obviamente H -conjugação é uma relação de equivalência, de modo que o conjunto de FM -módulos é uma união disjunta de classes de H -conjugação.

Serão usados também os seguintes resultados:

Teorema 3.9.1. *(Vide [14], p. 233, Teorema 16.10), (Michler, Srinivasan). Suponha que H é p -nilpotente e $M = O_{p'}(H)$. Seja F um corpo perfeito de decomposição para M*

de característica p . Seja $f_1, \dots, f_m$, um conjunto completo de representantes das classes de H -conjugação de idempotentes centrais indecomponíveis em $Z(FM)$. Seja

$$\mathcal{I}_i = \{ h \in H : h f_i h^{-1} = f_i \}$$

o grupo de inércia de f_i , e seja

$$H = \bigcup_{j=1}^{p^{a_i}} h_{ij} \mathcal{I}_i$$

uma decomposição de H em classes à esquerda de $\mathcal{I}_i$.

a) Os elementos

$$e_i = \sum_{j=1}^{p^{a_i}} h_{ij} f_i h_{ij}^{-1} \quad (i = 1, \dots, m)$$

são os idempotentes centrais indecomponíveis de FH . Em particular, H tem exatamente m blocos.

b) Seja $V_1, \dots, V_m$, um conjunto completo de representantes das classes de H -conjugação de FM -módulos irredutíveis. Escreva $P_i = V_i^H (= FH \otimes_{FM} V_i)$. Então a menos de isomorfismo, $P_1, \dots, P_m$ são todos os FH -módulos projetivos indecomponíveis.

c) $W_i = P_i / P_i J(FH)$ é um FH -módulo absolutamente irredutível. Em particular, F é um corpo de decomposição para H .

d) $(W_i)_M \simeq \bigoplus_{j=1}^{p^{a_i}} h_{ij} \otimes V_i$.

Em particular, $\dim_F W_i = |H : \mathcal{I}_i| \dim_F V_i$. Também, o comprimento de composição de P_i é $|\mathcal{I}_i/M|$.

e) Se $|H/M| = p^a$, então

$$\dim_F FHe_i = (\dim_F V_i)^2 p^{a+a_i}$$

e

$$\dim_F J(FHe_i) = (\dim_F V_i)^2 p^{2a_i} (p^{a-a_i} - 1).$$

Observação 3.9.1. Observe que conjugação por $h \in H$ induz uma ação de H sobre os conjuntos de todos idempotentes de blocos de FM e todos blocos de FM , e que e_i é exatamente a soma dos elementos na H -órbita de f_i . Nos referimos à H -órbita de f_i como a classe de H -conjugação de f_i .

Corolário 3.9.1. *Seja H um grupo p -nilpotente e seja F um corpo algebricamente fechado de característica p . Se B é um bloco de FH com grupo de defeito D , então $B \simeq M_n(FD)$ para algum $n \geq 1$.*

(Esse último resultado é o Corolário 10.10 do Teorema 10.9 de [15], p. 243).

Teorema 3.9.2. *(Vide [15], p.490), (Koshitani). Seja H um grupo p -solúvel e seja B um bloco de FH com grupo de defeito D de ordem p^d . Então*

- (i) $d(p-1) + 1 \leq t(B) \leq p^d$
- (ii) $t(B) = p^d$ se e somente se D é cíclico. Aqui $t(B)$ indica o índice de nilpotência de $J(B)$.

Teorema 3.9.3. *(Vide [12], p. 87, Teorema 7.12). Suponha que a característica de F é igual a 2 e $2 \nmid \dim_F V$ para qualquer FH -módulo irredutível V . Então H tem um 2-subgrupo de Sylow normal.*

Observação 3.9.2. *O Teorema 3.9.3 permanece verdadeiro se substituirmos 2 por qualquer primo ímpar (vide [12], p. 88, Observação 7.13).*

Estamos agora em condições de demonstrar o último resultado desta tese, a saber o

Teorema 3.9.4. *Sejam H um grupo p -solúvel, P um p -subgrupo de Sylow de H e seja F um corpo algebricamente fechado de característica $p > 0$. Suponha que $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra não-semisimples. Então a álgebra de grupo FH é fortemente associativa se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:*

- (i) $H = O_{p'}(H)P$ (produto semidireto), $O_{p'}(H) = H'$;
- (ii) $|P| = 2$ ou $|P| = 3$;
- (iii) Todo bloco de FH tem defeito 1 ou 0, pelo menos um bloco não principal de FH tem defeito 1 e pelo menos um bloco não principal de FH tem defeito 0;
- (iv) Para qualquer bloco FHe_i de FH de defeito 1, tem-se: Para todo grupo G e toda ação parcial $\alpha = (\{A_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ de G sobre FH ,

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_{ye_i} = L_{ye_i} \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}})$$

é válida em todo A_g contendo $J(FH)e_i$ ou $(J(FH)e_i)^2$, para todo $y \in O_{p'}(H)$, $c \in FH$.

Demonstração

$\Rightarrow$) Suponha que FH é fortemente associativa.

Porque H é p -solúvel, obtemos como na demonstração do Teorema 3.6.2 que $H = MP$, $M \cap P = \{1\}$, $M = O_{p'}(H) = H'$, $|P| = p$.

Seja $e_1 = |M|^{-1} \sum_{y \in M} y$. Pelo Teorema 3.4.1 temos que

$$FH = FHe_1 \oplus FH(1 - e_1), \quad (3.3)$$

em que $FHe_1 \simeq F(H/M) \simeq FP$ e $FH(1 - e_1) = \Delta(H, M)$.

Sendo FH fortemente associativa, temos pelo Lema 1.2.2 que FHe_1 é fortemente associativa. Como $FHe_1 \simeq FP$ segue que FP é fortemente associativa. Pela Proposição 3.1.1 concluímos que $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Como vale (3.3) segue pela Proposição 3.4.2 (iii) que os ideais FHe_1 e $FH(1 - e_1)$ de FH são somas diretas de blocos. Mas, sendo H p -solúvel, temos que H é p -restrito, e pela Proposição 3.4.4 obtemos que FHe_1 é o bloco principal de FH . Assim,

$$FH = FHe_1 \oplus FHe_2 \oplus \cdots \oplus FHe_m$$

é a decomposição direta de FH em soma de blocos, em que $e_1, \dots, e_m$ são idempotentes centralmente primitivos mutuamente ortogonais.

Porque $|P| = 2$ ou $|P| = 3$, segue pela Definição 3.7.2 que os blocos de FH têm defeito $d = 1$ ou $d = 0$. Agora, pelo Lema 3.7.1, os p -subgrupos de Sylow de H são grupos de defeito do bloco principal FHe_1 . Portanto, FHe_1 é um bloco de defeito 1.

Como $\Delta(H, O_{p'}(H))$ é uma F -álgebra não-semisimples, por hipótese, temos que

$$J(\Delta(H, O_{p'}(H))) = J(FHe_2) \oplus \cdots \oplus J(FHe_m) \neq 0.$$

Isso implica que existe $i, 2 \leq i \leq m$, tal que $J(FHe_i) \neq 0$. Segue que o bloco FHe_i não é uma F -álgebra simples, e pelo Teorema 3.7.2 (ii) obtemos que FHe_i não tem defeito zero; logo, o bloco FHe_i tem defeito 1, isto é, é um bloco com grupo de defeito P ; agora, se todo bloco não principal de FH tem defeito 1, temos que p não divide $\dim_F W$ para qualquer FH -módulo irredutível W . De fato, como H é p -nilpotente, temos pelo Teorema 3.8.1 que todo bloco de FH possui um único FH -módulo irredutível. Se p divide $\dim_F W$

para algum FH -módulo irredutível W , então W pertence a um bloco (não principal) de defeito 1, pois FH não possui blocos de defeito zero. Neste caso, zero seria o menor inteiro tal que $p^{1-0} = p$ divide $\dim_F W$ e pelo Teorema 3.8.3, isso contradiz o fato que esse bloco tem defeito 1. Então, pelo Teorema 3.9.3 e Observação 3.9.2, P é normal em H , contradizendo (i). Portanto, existe pelo menos um bloco não principal de defeito zero, provando (iii).

Finalmente, seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre FH . Seja FHe_i um bloco de defeito 1 e seja $\mathcal{A}_g$ um ideal contendo $J(FH)e_i$ ou $J(FHe_i)^2$. Como FH é fortemente associativa temos pelo Lema 1.2.1 que a condição (1.1) verifica-se, isto é,

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_a = L_a \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}})$$

é válida em $\mathcal{A}_g$ para todo $g \in G$ e todo $a, c \in FH$. Em particular, para $\mathcal{A}_g$ dado acima,

$$(\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}}) \circ L_{ye_i} = L_{ye_i} \circ (\alpha_g \circ R_c \circ \alpha_{g^{-1}})$$

é válida para todo $y \in O_{p'}(H), c \in FH$. Isso completa a demonstração da parte ' ' somente se ' '.

$\Leftarrow$) Reciprocamente, se $H = O_{p'}(H)P$, $O_{p'}(H) \cap P = \{1\}$, $|P| = 2$ ou $|P| = 3$, note que H é p -nilpotente. Denotemos por $M = O_{p'}(H)$.

Seja $f_1, \dots, f_m$, um conjunto completo de representantes das classes de H -conjugação de idempotentes de blocos de FM , em que por convenção

$$f_1 = |M|^{-1} \sum_{y \in M} y.$$

Agora, seja $V_1, \dots, V_m$, um conjunto completo de representantes das classes de H -conjugação de FM -módulos irredutíveis. É bem conhecido que

$$FMf_j \simeq M_{n_j}(F), \quad j = 1, \dots, m, \quad \text{em que } n_j = \dim_F V_j. \quad (3.4)$$

Pelo Teorema 3.9.1 (a) temos que

$$e_i = \sum_{j=1}^{p^{a_i}} h_{ij} f_j h_{ij}^{-1} \quad (i = 1, \dots, m)$$

são os idempotentes de blocos de FH . Assim,

$$FH = FHe_1 \oplus \cdots \oplus FHe_m$$

é a decomposição direta de FH em soma de blocos.

Observe que $a_i = 0$ ou $a_i = 1$, pois $|P| = 2$ ou $|P| = 3$.

Se e_i tem defeito 1, então $a_i = 0$, pois se $a_i = 1$ teríamos pelo item (e) do Teorema 3.9.1 que $J(FHe_i) = 0$, o que é uma contradição. Assim, nesse caso, $e_i = h_{i1} f_i h_{i1}^{-1}$, de modo que $e_i = h_{i1}^{-1} e_i h_{i1} = f_i$. Portanto, supondo que e_i tem defeito 1, obtemos por (3.4) que

$$FMe_i \simeq M_{n_i}(F), \quad n_i = \dim_F V_i. \quad (3.5)$$

Agora, porque $f_1 = |M|^{-1} \sum_{y \in M} y$ temos que $e_1 = f_1$.

Sendo H p -sólvel, temos que H é p -restrito, e como $e_1 = f_1 = |M|^{-1} \sum_{y \in M} y$ obtemos pela Proposição 3.4.4 que FHe_1 é o bloco principal de FH . Pelo Lema 3.8.1, os p -subgrupos de Sylow de H são grupos de defeito do bloco principal. Portanto, FHe_1 é um bloco de defeito 1.

Para fixar a notação vamos supor que $FHe_2, \dots, FHe_r$, $r < m$, são também blocos de defeito 1, isto é, blocos com grupos de defeito P , e $FHe_{r+1}, \dots, FHe_m$ são blocos de defeito zero, ou seja, são F -álgebras simples.

Pelo Corolário 3.9.1, temos para cada $i = 2, \dots, r$, que

$$FHe_i \simeq M_{k_i}(FP), \quad \text{para algum } k_i \geq 1. \quad (3.6)$$

Pelo Teorema 3.9.1 (e), segue que $k_i = n_i = \dim_F V_i$. Note que $n_i > 1$, pois caso contrário teríamos pelo Teorema 3.9.1 (d) que $\dim_F W_i = |H : \mathcal{I}_i| \dim_F V_i = p^{a_i} \dim_F V_i = 1$ (pois $a_i = 0$). Mas $H/H' \simeq P$ é um p -grupo, de modo que H tem uma única representação modular unidimensional, a saber a representação trivial de H de grau 1, o que é uma contradição. Note também que n_i não é divisível por p , pois caso contrário teríamos pelo Teorema 3.9.1 (d) que $\dim_F W_i$ é divisível por p , de modo que zero seria o menor inteiro tal que $p^{1-0} = p$ divide $\dim_F W_i$, e pelo Teorema 3.8.3, isso contradiz o fato que FHe_i tem defeito 1.

Agora, (3.6) implica em

$$J(FHe_i) \simeq M_{n_i}(J(FP)), \quad i = 2, \dots, r. \quad (3.7)$$

Por (3.5), temos que

$$FMe_i \simeq M_{n_i}(F), \quad i = 2, \dots, r. \quad (3.8)$$

Usando que $FP = J(FP) \oplus F$ (soma direta de F -espaços) obtemos para cada i , $2 \leq i \leq r$, que

$$M_{n_i}(FP) = M_{n_i}(J(FP)) \oplus M_{n_i}(F) \text{ (soma direta de } F\text{-espaços)}.$$

Assim, $\dim_F M_{n_i}(FP) = \dim_F M_{n_i}(J(FP)) + \dim_F M_{n_i}(F)$, e por (3.6), (3.7) e (3.8) segue que

$$\dim_F FHe_i = \dim_F J(FH)e_i + \dim_F FMe_i.$$

Como $J(FH)e_i \oplus FMe_i \subseteq FHe_i$, concluímos que

$$FHe_i = J(FH)e_i \oplus FMe_i, \quad i = 2, \dots, r \quad (3.9)$$

(soma direta de F -espaços).

Note que se $i = 1$, então (3.9) torna-se: $FHe_1 = J(FH)e_1 \oplus Fe_1$.

Queremos provar que FH é fortemente associativa. Para isso, seja G um grupo qualquer e $\alpha = (\{\mathcal{A}_g\}_{g \in G}, \{\alpha_g\}_{g \in G})$ uma ação parcial arbitrária de G sobre FH .

Analisemos inicialmente o caso $|P| = 2$. Por simplificação, considere $r = 2$.

Seja $\mathcal{A}_g = J(FH)e_2$. Vamos provar que a igualdade (1.1),

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a b)c) = a \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c),$$

é válida para todo $b \in \mathcal{A}_g$, $a, c \in FH$. Escreva $a = a_1 + a_2 + \dots + a_m$, em que $a_j \in FHe_j$, $j = 1, \dots, m$. Então, $\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a b)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_2 b)c)$.

Agora, usando (3.9), escreva $a_2 = a'_2 + y_2$, em que $a'_2 \in J(FH)e_2$, $y_2 \in FMe_2$. (3.10)

Assim, usando a hipótese (iv),

$$\begin{aligned}
 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a \ b)c) &= \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'_2 \ b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(y_2 \ b)c) \\
 &= a'_2 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + y_2 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= (a'_2 + y_2) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a_2 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c),
 \end{aligned}$$

Portanto a igualdade (1.1) é válida em $\mathcal{A}_g$.

Agora, seja $\mathcal{A}_g = J(FH)e_1 \oplus J(FH)e_2$. Sejam $b \in \mathcal{A}_g$, $a, c \in FH$. Escreva $a = a_1 + a_2 + \dots + a_m$, em que $a_j \in FHe_j$, $j = 1, \dots, m$. Então,

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a \ b)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_1 \ b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_2 \ b)c).$$

Usando que $FHe_1 = J(FH)e_1 \oplus Fe_1$ (soma direta de F -espaços), e utilizando (3.9), escreva $a_1 = a'_1 + \lambda e_1$, em que $a'_1 \in J(FH)e_1$, $\lambda e_1 \in Fe_1$. Usando (iv), e operando em $J(FH)e_2$ como (3.10), obtemos

$$\begin{aligned}
 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a \ b)c) &= \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'_1 \ b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(\lambda e_1 \ b)c) + \\
 &\quad + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_2 \ b)c) \\
 &= a'_1 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + \lambda e_1 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &\quad + a_2 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= (a'_1 + \lambda e_1) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + a_2 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a_1 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + a_2 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= (a_1 + a_2) \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c).
 \end{aligned}$$

Logo, também nesse ideal, a igualdade (1.1) é satisfeita.

Para os ideais $\mathcal{A}_g$ restantes, a validade da igualdade (1.1) é verificada de modo análogo à demonstração da parte "se" do Teorema 3.5.3

Finalmente, analisemos o caso $|P| = 3$. Novamente, considere $r = 2$.

Seja $\mathcal{A}_g = (J(FH)e_2)^2$. Sejam $b \in \mathcal{A}_g$, $a, c \in FH$. Escreva $a = a_1 + a_2 + \dots + a_m$, em que $a_j \in FHe_j$, $j = 1, \dots, m$. Então,

$$\alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a \ b)c) = \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a_2 \ b)c).$$

Agora usando (3.9) escreva $a_2 = a'_2 + y_2$, em que $a'_2 \in J(FH)e_2$, $y_2 \in FMe_2$. Como P é cíclico, temos pelo Teorema 3.9.2 (ii) que $t(FHe_2) = 3$. Assim,

$$\begin{aligned}
 \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a \ b)c) &= \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(a'_2 \ b)c) + \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(y_2 \ b)c) \\
 &= 0 + y_2 \ \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a'_2 \ \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) + y_2 \ \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= (a'_2 + y_2) \ \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a_2 \ \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c) \\
 &= a \ \alpha_g(\alpha_{g^{-1}}(b)c).
 \end{aligned}$$

Logo, a igualdade (1.1) é válida em $\mathcal{A}_g = (J(FH)e_2)^2$.

Para os demais ideais $\mathcal{A}_g$ de FH , a validade da igualdade (1.1) segue como na demonstração da parte ‘‘se’’ do Teorema 3.5.3. Portanto, a condição (1.1) verifica-se, e FH é fortemente associativa. Isso completa a demonstração.

■

Caracterizações Para o Grupo Simétrico S_n e Grupos Diedrais D_n de ordem $2n$

Estamos em condições de caracterizar as álgebras de grupo FS_n do grupo simétrico S_n , $n \geq 2$, sobre um corpo F de característica p tal que p divide $|S_n| = n!$.

- (i) Para $n = 2$ e $p = 2$, então $|S_2| = 2$ e pelo Exemplo 2.1.1 temos que FS_2 é fortemente associativa;
- (ii) Para $n = 3$ e $p = 2$, sabemos que

$$S_3 = \{id, (123), (132), (12), (13), (23)\}$$

é um grupo de Frobenius com complemento $P = \langle (12) \rangle$, em que P é um 2-subgrupo de Sylow de S_3 .

Como $|P| = 2$, segue pelo Teorema 3.5.3 que FS_3 é fortemente associativa;

- (iii) Para $n = 3$ e $p = 3$, considere

$$M = \{id, (123), (132)\} \triangleleft S_3.$$

Note que $p = 3 \mid |M| = 3$, de modo que pelo Lema 3.2.1, FS_3 não é fortemente associativa.

- (iv) Para $n = 4$, sabemos que os únicos subgrupos próprios normais do grupo S_4 são A_4 ,

o grupo alternado de grau 4, e o grupo de Klein

$$K = \{id, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

Assim, se $p = 2$ temos $2 \mid |K| = 4$ ($2 \mid |A_4| = 12$, também), enquanto se $p = 3$, $3 \nmid |A_4| = 12$. Em ambos os casos segue pelo Lema 3.2.1 que FS_4 não é fortemente associativa.

Também, com $p = 3$ podemos usar o Exemplo 3.7.1 para concluir que FS_4 não é fortemente associativa.

(v) Finalmente, para $n \geq 5$, sabemos que A_n , o grupo alternado de grau n , é o único subgrupo próprio normal de S_n . Note que $p \mid n!$ implica $p \mid |A_n| = \frac{n!}{2}$, e portanto pelo Lema 3.2.1, $FS_n, n \geq 5$, não é fortemente associativa.

Observação 4.0.1. (v) nos dá exemplos de grupos não solúveis para os quais as álgebras de grupo não são fortemente associativas.

Passamos agora a caracterizar as álgebras de grupo do grupo diedral

$D_n = \langle a, b : a^n = 1 = b^2, ba = a^{-1}b \rangle$, de ordem $2n$, sobre um corpo F de característica p tal que p divide $2n$.

(i) Se $p = 2$ e n é ímpar, sabemos que D_n é um grupo de Frobenius com complemento $P = \langle b : b^2 = 1 \rangle$, em que P é um 2-subgrupo de Sylow de D_n .

Como $|P| = 2$, segue pelo Teorema 3.5.3 que FD_n é fortemente associativa.

Agora, considerando $M = \langle a : a^n = 1 \rangle \triangleleft D_n$, note que para qualquer outro primo $p > 2$, tal que $p \mid 2n$ implica que $p \mid |M|$; Portanto, pelo Lema 3.2.1, FD_n não é fortemente associativa, para esses primos.

(ii) Se n é par, então qualquer $p \mid 2n$ implica $p \mid |M|$. Portanto pelo Lema 3.2.1, FD_n não é fortemente associativa.

Referências Bibliográficas

- [1] F. Abadie, Enveloping actions and Takai duality for partial actions, *J. Functional Anal.* **197** (1) (2003), 14–67.
- [2] C. Curtis e I. Reiner, *Representation Theory of Finite Groups and Associative Algebras*, New York, Wiley-Interscience, 1962.
- [3] M. Dokuchaev e R. Exel, Associativity of crossed products by partial actions, enveloping actions and partial representations, *Trans. Amer. Math. Soc.* **357** (2005), 1931–1952.
- [4] M. Dokuchaev, Ruy Exel e Paolo Piccione, Partial representations and partial group algebras, *J. Algebra* **226** (2000), no. 1, 505–532.
- [5] M. Dokuchaev, M. Ferrero e A. Paques, *Partial Galois theory of commutative rings*, Preprint.
- [6] M. Dokuchaev e C. Polcino Milies, Isomorphisms of partial group rings, *Glasg. Math. J.* **46** (2004), no. 1, 161–168.
- [7] R. Exel, Circle actions on C^* -algebras, partial automorphisms and generalized Pimsner-Voiculescu exact sequences, *J. Funct. Anal.* **122** (1994), no. 3, 361–401.
- [8] R. Exel, Twisted partial actions: a classification of regular C^* -algebraic bundles, *Proc. London Math. Soc.* **74** (1997), no. 3, 417–443.

- [9] R. Exel, Partial actions of groups and actions of inverse semigroups, *Proc. Amer. Math. Soc.* **126** (1998), no. 12, 3481–3494.
- [10] R. Exel, M. Laca e J. Quigg, Partial dynamical systems and C^* -algebras generated by partial isometries, *J. Operator Theory* **47** (2002), no. 1, 169–186.
- [11] D. Gorenstein, *Finite Groups*, New York, Harper and Row, 1968.
- [12] R. Gow, R. Huppert, R. Knorr, O. Manz e W. Willems, *Representation Theory in Arbitrary Characteristic*, CEDAM, 1993.
- [13] B. Huppert, *Endliche Gruppen, 1*, Springer - Verlag, Berlin, 1967.
- [14] B. Huppert e N. Blackburn, *Finite Groups. II*, Springer-Verlag, Berlin, 1982.
- [15] G. Karpilovsky, *The Jacobson Radical of Group Algebras*, Notas de Matematica, vol. 115, North-Holland Mathematics studies 135, 1987.
- [16] J. Kellendonk e M.V. Lawson, Partial actions of groups, *Int. J. Algebra Comp.* **14** (2004), no. 1, 388–413.
- [17] M. Suzuki, *Group Theory II*, Springer-Verlag, 1986.