Resolubilidade Semiglobal e Global para uma Classe de Campos Vetoriais Complexos em Variedades Diferenciáveis

Bruno de Lessa Victor

DISSERTAÇÃO APRESENTADA
AO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PARA
OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE
MESTRE EM CIÊNCIAS

Programa: Matemática Aplicada
Orientador: Prof. Dr. Paulo Domingos Cordaro

Durante o desenvolvimento deste trabalho o autor recebeu auxílio financeiro do CNPq

São Paulo, março de 2017

Resolubilidade Semiglobal e Global para uma Classe de Campos Vetoriais Complexos em Variedades Diferenciáveis

Esta versão da dissertação contém as correções e alterações sugeridas pela Comissão Julgadora durante a defesa da versão original do trabalho, realizada em 03/03/2017. Uma cópia da versão original está disponível no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.

Comissão Julgadora:

- Prof^a. Dr^a. Paulo Domingos Cordaro (orientador) - IME-USP
- Prof. Dr. Alexandre Kirilov - UFPR
- Prof. Dr. Paulo Leandro Dattori da Silva - ICMC-USP

Agradecimentos

Gostaria primeiramente de agradecer aos meus pais, Denilson e Sandra, que sempre me deram antes de tudo liberdade para escolher meus objetivos e todo o suporte possível para que eu conseguisse alcançá-los. Sem eles com certeza não teria chegado até aqui.

Ao resto de minha família, em particular ao meu irmão Caio e à minha avó Darcila, que sempre tiveram e continuam tendo tremenda importância em minha vida.

Ao professor Cordaro, não só pela orientação dada neste trabalho, mas pela referência que rapidamente se tornou como pessoa, professor, orientador e pesquisador.

Aos meus colegas de orientação Luis Fernando Ragognette, Gabriel Cueva Candido Soares de Araújo, Nicholas Braun Rodrigues, Max Reinhold Jahnke e Antonio Victor da Silva Júnior; por todo o estudo e aprendizado em conjunto, além da formação do entrosado "time Cordaro".

Aos professores José Carlos Corrêa Eidam e Alexandre Kirilov: o primeiro por ter sido um ótimo orientador em minha graduação e ter me apresentado ao professor Cordaro, e o segundo por ter aceitado se tornar meu orientador daqui em diante.

E por fim aos meus amigos: Thalian, Rafael, Joana, Luciano, Rodrigo, Bruno, Carolina, Nilmara e Carolinne. Em especial à ultima, pela revisão ortográfica do trabalho.

Resumo

VICTOR, B. L. **Resolubilidade Semiglobal e Global para uma Classe de Campos Vetoriais Complexos em Variedades Diferenciáveis.** 2017. 120 f. Dissertação - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Neste trabalho estudamos a resolubilidade C^∞ de campos vetoriais complexos suaves da forma $L = L_1 + iL_2$, em uma variedade suave M , com as seguintes propriedades: $\forall x \in M$, $L_1(x)$ e $L_2(x)$ são linearmente independentes e $[L_1, L_2](x)$ é uma combinação linear de $L_1(x)$ e $L_2(x)$. Para tratar da resolubilidade local, nos utilizamos da teoria dos espaços $B_{p,k}$ e operadores de força constante. Seguindo para a resolubilidade semiglobal, estudamos a folheação gerada por L_1 e L_2 : mostramos que neste caso as folhas possuem estrutura de variedade complexa, o que nos permite obter um panorama bastante completo sobre o problema. Para encerrar, provamos que L é globalmente resolúvel se e somente se for semiglobalmente resolúvel e M for L -convexa; exibimos condições suficientes para que isto ocorra.

Palavras-chave: Folheação, Resolubilidade Semiglobal, Resolubilidade Global.

Abstract

VICTOR, B. L. **Semi-Global and Global Solvability for a Class of Complex Vector Fields in Differentiable Manifolds**. 2010. 120 f. Dissertação - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

In this work we shall study the smooth solvability of C^∞ complex vector fields $L = L_1 + iL_2$ on a smooth manifold M , assuming the following properties: $\forall x \in M$, $L_1(x)$ and $L_2(x)$ are linearly independent and $[L_1, L_2](x)$ is a linear combination de $L_1(x)$ and $L_2(x)$. Discussing local solvability, we shall employ the theory of $B_{p,k}$ Spaces and Operators of Constant Strength. Moving on to Semi-Global Solvability, we shall study the foliation that is generated by L_1 and L_2 : we prove that in this case the leaves are actually complex manifolds, which allow us to obtain an wide comprehension of the problem. Finally, we show that L is globally solvable if and only if it is semi-globally solvable and M is L -convex; we then exhibit sufficient conditions in order to it occurs.

Keywords: Foliation, Semi-Global Solvability, Global Solvability.

Sumário

1	Introdução	1
2	Preliminares	3
2.1	Classe dos Operadores em Estudo	3
2.2	Resolubilidade Local	3
3	Operadores com Força Constante	7
3.1	Os Espaços $B_{p,k}$	7
3.2	Definição e Propriedades	11
4	Folheação associada a L	17
4.1	Forma local do Operador	17
4.2	A Estrutura Complexa de Cada Folha	21
5	Uma Análise da Regularidade das Soluções	25
5.1	A Função Regularidade	25
5.2	Propagação de Singularidades e de Suportes nas Folhas	34
6	A Topologia em $C^\infty(M)$	37
7	Resolubilidade Semiglobal	43
8	Resolubilidade Global	49
	Referências Bibliográficas	57

Capítulo 1

Introdução

Dado P um operador diferencial parcial linear, sabemos que Pu é uma função suave sempre que u também o for. Na grande maioria dos casos, porém, a recíproca não é verdadeira: um exemplo é o operador da onda $P = \partial_t^2 - \partial_x^2$, onde existem soluções do caso nulo ($Pu = 0$) que não são sequer funções. Os operadores para os quais a recíproca vale são chamados de hipoléticos.

São conhecidos na literatura exemplos ainda mais intrincados: para os operadores de Hans Lewy e Mizohata-Grushin, existem funções de classe C^∞ que não possuem nem mesmo solução local no espaço das distribuições. Discorreremos um pouco mais sobre ambos adiante.

Analisando este contexto, percebe-se o porquê do interesse no estudo da resolubilidade C^∞ (soluções suaves para funções suaves) de um ODPL. Esta dissertação trata exatamente de um caso desta forma: um campo complexo $L = L_1 + iL_2$ definido em uma variedade real M , com as seguintes hipóteses sobre L_1, L_2 :

- $[L_1, L_2](x)$ é combinação linear de $L_1(x)$ e $L_2(x)$, para todo $x \in M$.
- $L_1(x)$ e $L_2(x)$ são linearmente independentes, para cada $x \in M$.

O problema acima foi estudado por Duistermaat e Hörmander em [DH72], entre as páginas 242 e 248. Dito isto, o principal objetivo do trabalho é facilitar a compreensão do paper (cujos autores são famosos pela escrita extremamente concisa), desenvolvendo de modo mais detalhado as contas e a teoria matemática por trás de cada passo dado.

Iniciamos com a resolubilidade local, definindo o conceito tanto no contexto de funções suaves como no de distribuições. Em seguida, analisamos a importância das hipóteses assumidas inicialmente, fazendo comparações com importantes exemplos de campos vetoriais complexos não-resolúveis localmente.

Após aplicar o Teorema de Frobenius, obtemos uma forma local especial para o operador. Trazemos a teoria dos espaços $B_{p,k}$ e definimos os operadores de força constante. Provando que estes são sempre localmente resolúveis e que L é um operador do tipo, concluímos que L (com as hipóteses impostas) sempre será localmente resolúvel.

Nosso próximo passo é estudar a folheação gerada por L_1 e L_2 . Em um primeiro momento, sabemos apenas que uma folha é uma variedade real, de dimensão 2. Verificamos que esta admite estrutura de variedade complexa, logo após a exibição de uma nova descrição local de L ; obtemos que em cada folha L é localmente um múltiplo do operador del-barra. Introduzimos o que chamaremos de funções subharmônicas.

Com um resultado de subharmonicidade (como definido anteriormente) demonstrado para a função de regularidade

$$s_u(x) = \sup \{t \in \mathbb{R}; u \in H^t \text{ em uma vizinhança de } x\},$$

conseguimos resultados sobre propagação de singularidades e de suportes nas folhas.

Tais resultados são fundamentais para chegarmos à seguinte conclusão: L será semiglobalmente resolúvel se e somente se nenhuma folha for relativamente compacta, além de outras três propriedades equivalentes à ambas.

Na prova da afirmação, aplicamos inúmeros fatos de topologia e análise funcional, mais modernos e sofisticados do que aqueles apresentados no artigo original, que são descritos de maneira minuciosa à medida que são utilizados.

Por fim, introduzimos o conceito de P -convexidade e provamos que M ser L -convexa aliado a L ser semiglobalmente resolúvel é equivalente à resolubilidade global do operador. Após alguns resultados, exibimos um exemplo em que $L(C^\infty(M)) = C^\infty(M)$: quando M for uma variedade pseudoconvexa, definição esta feita no texto.

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Classe dos Operadores em Estudo

Em todo o trabalho, será denominada de M uma variedade real, C^∞ , paracompacta e de dimensão n . Denotaremos por L um campo vetorial complexo suave em M , dado por $L = L_1 + iL_2$, onde L_1, L_2 são campos vetoriais reais de classe C^∞ e assumem as seguintes hipóteses:

$$[L_1, L_2](x) \text{ é combinação linear de } L_1(x) \text{ e } L_2(x), \text{ para todo } x \in M. \quad (2.1)$$

$$L_1(x) \text{ e } L_2(x) \text{ são linearmente independentes, para cada } x \in M. \quad (2.2)$$

Note que ambas as condições são invariantes se multiplicarmos por uma função C^∞ a valores complexos que nunca se anula.

Daqui em diante, assumiremos que f é função de classe C^∞ e estudaremos a existência de soluções suaves da equação

$$Lu = f. \quad (2.3)$$

Isto é, nosso objetivo será tratar da resolubilidade C^∞ do operador L , que dividiremos em três casos.

2.2 Resolubilidade Local

Definição 1. *Dado P um operador diferencial, dizemos que P é um **localmente resolúvel no caso** C^∞ se, fixado $x_0 \in M$ e dadas U vizinhança aberta de x_0 , $f \in C^\infty(U)$, existem um aberto $V \ni x_0$ contido em U e $u \in C^\infty(V)$ tais que $Pu = f$ em V .*

Mostraremos ainda neste capítulo que as hipóteses 2.1 e 2.2 são suficientes para a existência local de uma solução suave. Antes disto, não obstante, faremos uma breve análise sobre a relevância de ambas as propriedades.

Se na Definição 1 trocamos $C^\infty(V)$ por $\mathcal{D}'(V)$, dizemos que P é apenas localmente resolúvel. É muito conhecido na literatura o fato de que nem todo ODPL com coeficientes de classe C^∞ é localmente resolúvel. No ano de 1957, Hans-Lewy mostrou em [Lew57] que

$$Q(x, y, w) = \frac{i}{2}D_x - \frac{1}{2}D_y + (x + iy)D_w \quad (2.4)$$

não é localmente resolúvel em nenhum ponto de $\mathbb{R}^3$.

Outro famoso exemplo é o operador de Mizohata-Grushin, que age em $(t, x) \in \mathbb{R}^2$ da seguinte maneira:

$$M_k = \frac{\partial}{\partial t} - it^k \frac{\partial}{\partial x}, \quad (2.5)$$

onde $k \in \mathbb{N}$. É sabido que M_k é localmente resolúvel na origem se, e somente se, k é par.

Uma pergunta interessante que pode ser feita neste momento: quais das condições que implicam a resolubilidade local suave de L falham para Q e M_1 ?

Iniciando a análise com o operador Q , temos:

$$Q(x, y, w) = \frac{i}{2}D_x - \frac{1}{2}D_y + (x + iy)D_w = \underbrace{\left(\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial w}\right)}_{P_1} + i \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial y} - x\frac{\partial}{\partial w}\right)}_{P_2}$$

É fácil notar que P_1 e P_2 são linearmente independentes para qualquer (x, y, w) em $\mathbb{R}^3$. Por outro lado,

$$[P_1, P_2](x, y, w) = -\frac{\partial}{\partial w},$$

que claramente não é combinação linear de P_1 e P_2 em nenhum ponto do espaço.

Proposição 1. *A condição 2.2 não é suficiente para que haja resolubilidade local.*

Procedemos agora de modo análogo para M_1 , M_2 e M_3 :

$$M_1(t, x) = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)}_{R_1} + i \cdot \underbrace{\left(-t\frac{\partial}{\partial x}\right)}_{R_2}, \quad M_2(t, x) = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)}_{R_3} + i \cdot \underbrace{\left(-t^2\frac{\partial}{\partial x}\right)}_{R_4}, \quad M_3(t, x) = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)}_{R_5} + i \cdot \underbrace{\left(-t^3\frac{\partial}{\partial x}\right)}_{R_6}$$

Vemos aqui que os pares (R_1, R_2) , (R_3, R_4) e (R_5, R_6) , são linearmente independentes se e somente se $t \neq 0$. Calculando o colchete de Lie,

$$[R_1, R_2](t, x) = -\frac{\partial}{\partial x}, \quad [R_3, R_4](t, x) = -2t \cdot \frac{\partial}{\partial x}, \quad [R_5, R_6](t, x) = -3t^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x},$$

podemos verificar que $[R_1, R_2]$ é gerado por R_1, R_2 se e somente se $t \neq 0$. Em contrapartida, $[R_3, R_4]$ e $[R_5, R_6]$ são combinações lineares de (R_3, R_4) e (R_5, R_6) respectivamente em todo o plano.

Proposição 2. *A condição 2.2 não é necessária para que haja resolubilidade local.*

Demonstração. Basta ver que M_2 é resolúvel na origem, contudo a condição não é satisfeita neste caso. $\square$

Proposição 3. *A propriedade 2.1 não é suficiente para que haja resolubilidade local.*

Demonstração. Sabemos que M_3 não é resolúvel em $(0, 0)$, apesar de valer a propriedade referida no ponto. $\square$

Proposição 4. *M_1 , M_2 e M_3 são localmente resolúveis no caso C^∞ para todo $(t, x) \in \mathbb{R}^2$ tal que $t \neq 0$.*

Para finalizar, note que em todos os casos em que sabíamos que não vale a resolubilidade local, a Propriedade 2.1 falhou. De fato, é possível demonstrar que esta é uma condição necessária. Para demonstração, verifique o Teorema 6.1.1 de [Hör03].

Assim, inferimos imediatamente que Q não é localmente resolúvel em nenhum elemento de $\mathbb{R}^3$ e M_1 não é localmente resolúvel nos pontos da forma $(0, x)$.

Voltamos agora ao objetivo inicial proposto. Unindo a condição 2.1 com o Teorema de Frobenius, obtemos a existência de um sistema coordenadas locais $y_1, \dots, y_n$ em uma vizinhança da origem, denotada aqui por V , tal que:

$$L_1 = b_{n-1} \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + b_n \frac{\partial}{\partial y_n}, \quad L_2 = c_{n-1} \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + c_n \frac{\partial}{\partial y_n}, \quad (2.6)$$

onde b_{n-1} , b_n , c_{n-1} e c_n são funções reais de classe C^∞ . Como $L = L_1 + iL_2$, concluímos que

$$L = (b_{n-1} + ic_{n-1}) \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + (b_n + ic_n) \frac{\partial}{\partial y_n} \doteq a_{n-1} \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + a_n \frac{\partial}{\partial y_n} \quad (2.7)$$

Proposição 5. *Tanto a_{n-1} quanto a_n não se anulam em nenhum ponto.*

Demonstração. Suponha por absurdo existir x_0 de maneira que $a_{n-1}(x_0) = 0$. Então temos que $b_{n-1}(x_0) = c_{n-1}(x_0) = 0$, e conseqüentemente

$$\begin{vmatrix} b_{n-1}(x_0) & b_n(x_0) \\ c_{n-1}(x_0) & c_n(x_0) \end{vmatrix} = 0, \quad (2.8)$$

o que contradiz o fato de L_1 e L_2 serem linearmente independentes. Para a_n , a prova é completamente análoga. $\square$

Considere agora L como operador nas variáveis $y'' = (y_{n-1}, y_n)$, dependendo dos parâmetros $y' = (y_1, \dots, y_{n-2})$.

Proposição 6. *Para cada parâmetro $w' = (w_1, \dots, w_{n-2})$, L é um operador elíptico nas variáveis y'' .*

Demonstração. Dado $\xi = (\xi_{n-1}, \xi_n) \in \mathbb{R}^2$, suponha que $a_{n-1}(w', y'')\xi_{n-1} + a_n(w', y'')\xi_n = 0$. Então

$$\begin{cases} b_{n-1}(w', x'')\xi_{n-1} + b_n(w', x'')\xi_n = 0 \\ c_{n-1}(w', x'')\xi_{n-1} + c_n(w', x'')\xi_n = 0 \end{cases}$$

Aplicando mais uma vez o fato de L_1, L_2 serem linearmente independentes, concluímos que $\xi = 0$ e portanto o operador é elíptico. $\square$

Capítulo 3

Operadores com Força Constante

Para solucionar o problema local, temos a liberdade de supor M um aberto de $\mathbb{R}^n$ e L como em (2.7). Utilizando-nos de tal fato como ponto de partida, mostraremos que L é um operador de força constante em uma vizinhança de cada ponto e que todo ODPL deste tipo é localmente C^∞ -resolúvel.

Este resultado requer uma considerável quantidade de pré-requisitos. Apresentaremos então somente um apanhado geral de tudo que será necessário para o teorema principal e o provaremos. As demonstrações restantes, entretanto, não serão exibidas e podem ser encontradas com detalhes em [Hör05].

3.1 Os Espaços $B_{p,k}$

Definição 2. Uma função positiva k definida em $\mathbb{R}^n$ será chamada de **peso** se existirem constantes positivas C e N tais que

$$k(\xi + \eta) \leq (1 + C|\xi|)^N k(\eta), \quad \forall \xi, \eta \in \mathbb{R}^n \quad (3.1)$$

Denotaremos o espaço de todas as funções peso por $\mathcal{H}$. Um exemplo muito simples e importante é, para cada $s \in \mathbb{R}$:

$$h_s(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2}. \quad (3.2)$$

Proposição 7. Dados $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, então $(1 + |\alpha + \beta|^2) \leq (1 + |\alpha|^2)(1 + |\beta|^2)$.

Demonstração. Aplicando a desigualdade triangular,

$$1 + |\alpha + \beta|^2 \leq (1 + |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\alpha||\beta|). \quad (3.3)$$

Por outro lado,

$$(1 + |\alpha|^2)(1 + |\beta|^2) = 1 + |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\alpha|^2|\beta|^2 + 2|\alpha|^2|\beta| + 2|\beta|. \quad (3.4)$$

Analisando (3.3) e (3.4), concluímos que é suficiente demonstrar que

$$2(|\alpha|^2|\beta| + |\beta|) \geq 2(|\alpha||\beta|), \quad (3.5)$$

o que não é difícil de checar: basta verificar separadamente casos $|\alpha| \geq 1$ e $|\alpha| < 1$.

□

Corolário 1. A função $h_s(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2}$ é de fato um peso.

Demonstração. Começamos com o caso onde $s > 0$. Pela Proposição 7, tomando $\alpha = \eta$ e $\beta = \xi$, segue que

$$(1 + |\xi + \eta|^2) \leq (1 + |\eta|^2) \cdot (1 + |\xi|^2) \implies (1 + |\xi + \eta|^2)^{s/2} \leq (1 + |\eta|^2)^{s/2} \cdot (1 + |\xi|^2)^s.$$

Isto é, obtemos a desigualdade (3.1) com $C = 1$ e $N = s$.

Como o caso $s = 0$ é trivial, só falta o verificarmos para $s < 0$. Nesta situação, escolhemos $\alpha = \xi + \eta, \beta = -\xi$. Logo,

$$(1 + |\eta|^2) \leq (1 + |\xi + \eta|^2) \cdot (1 + |\xi|^2) \implies \frac{(1 + |\eta|^2)}{(1 + |\eta + \xi|^2)} \leq (1 + |\xi|^2)^2 \quad (3.6)$$

Elevando à $s/2$ a última desigualdade em (3.6), obtemos:

$$\frac{(1 + |\eta|^2)^{s/2}}{(1 + |\eta + \xi|^2)^{s/2}} \geq (1 + |\xi|^2)^s, \quad (3.7)$$

e portanto

$$(1 + |\eta + \xi|^2)^{s/2} \leq (1 + |\xi|^2)^{-s} \cdot (1 + |\eta|^2)^{s/2}. \quad (3.8)$$

□

Considere agora P um polinômio na variável ξ e defina $P^\alpha \doteq \partial_\xi^\alpha P$.

Proposição 8. A função $\tilde{P}(\xi)^2 \doteq \sum_{|\alpha| \geq 0} |P^\alpha(\xi)|^2$ é um peso.

Demonstração. Fixamos um polinômio P com grau m . Pela fórmula de Taylor,

$$\partial_\xi^\alpha P(\xi + \eta) = \partial_\xi^\alpha P(\eta) + \sum_{1 \leq |\beta| \leq m - |\alpha|} \partial_\xi^{\alpha + \beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!}. \quad (3.9)$$

Segue de 3.9 que

$$\begin{aligned} \tilde{P}(\xi + \eta)^2 &= \sum_{|\alpha| \leq m} \left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) + \sum_{1 \leq |\beta| \leq m - |\alpha|} \partial_\xi^{\alpha + \beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right|^2 \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \left(\left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right| + \left| \sum_{1 \leq |\beta| \leq m - |\alpha|} \partial_\xi^{\alpha + \beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right| \right)^2 \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \left[\left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right|^2 + 2 \left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right| \cdot \left| \sum_{1 \leq |\beta| \leq m - |\alpha|} \partial_\xi^{\alpha + \beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right| \right] + \\ &\quad + \sum_{|\alpha| \leq m} \left| \sum_{1 \leq |\beta| \leq m - |\alpha|} \partial_\xi^{\alpha + \beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right|^2 \end{aligned}$$

Estimemos a segunda parcela da expressão dentro do somatório acima:

$$\begin{aligned}
2 \left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right| \cdot \left| \sum_{1 \leq |\beta| \leq m-|\alpha|} \partial_\xi^{\alpha+\beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right| &\leq 2 \left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right| \cdot \sum_{1 \leq |\beta| \leq m-|\alpha|} \left| \partial_\xi^{\alpha+\beta} P(\eta) \right| \cdot \frac{|\xi|^{|\beta|}}{\beta!} \\
&\leq \left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right| \cdot \sum_{|\gamma| \leq m} \left| \partial_\xi^\gamma P(\eta) \right| \cdot C_{\alpha,1} \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^j \right)
\end{aligned}$$

Fazendo análise semelhante da última parcela,

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{1 \leq |\beta| \leq m-|\alpha|} \partial_\xi^{\alpha+\beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right|^2 &\leq \left(\sum_{1 \leq |\beta| \leq m-|\alpha|} \left| \partial_\xi^{\alpha+\beta} P(\eta) \cdot \frac{\xi^\beta}{\beta!} \right| \right)^2 \\
&\leq \left(\sum_{1 \leq |\beta| \leq m-|\alpha|} \left| \partial_\xi^{\alpha+\beta} P(\eta) \right| \cdot \frac{|\xi|^{|\beta|}}{\beta!} \right)^2 \\
&\leq C'_\alpha \left(\sum_{1 \leq |\beta| \leq m-|\alpha|} \left| \partial_\xi^{\alpha+\beta} P(\eta) \right|^2 \cdot \frac{|\xi|^{2|\beta|}}{\beta!^2} \right) \\
&\leq \sum_{|\gamma| \leq m} \left| \partial_\xi^\gamma P(\eta) \right|^2 \cdot C_{\alpha,2} \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^{2j} \right)
\end{aligned}$$

Desta forma, deduzimos que:

$$\begin{aligned}
\tilde{P}(\xi + \eta)^2 &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \left[\left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right|^2 + \left| \partial_\xi^\alpha P(\eta) \right| \cdot \sum_{|\gamma| \leq m} \left| \partial_\xi^\gamma P(\eta) \right| \cdot C_{\alpha,1} \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^j \right) \right] + \\
&+ \sum_{|\alpha| \leq m} \left[\sum_{|\gamma| \leq m} \left| \partial_\xi^\gamma P(\eta) \right|^2 \cdot C_{\alpha,2} \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^{2j} \right) \right] \\
&\leq \tilde{P}(\eta)^2 + C' \cdot \left(\sum_{|\gamma| \leq m} \left| \partial_\xi^\gamma P(\eta) \right| \right)^2 \cdot \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^j \right) + C'' \cdot \tilde{P}(\eta)^2 \cdot \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^{2j} \right) \\
&\leq \tilde{P}(\eta)^2 + C_0 \cdot \tilde{P}(\eta)^2 \cdot \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^j \right) + C'' \cdot \tilde{P}(\eta)^2 \cdot \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^{2j} \right) \\
&\leq \tilde{P}(\eta)^2 \cdot \left[1 + C_0 \cdot \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^j \right) + C'' \cdot \left(\sum_{j=1}^m |\xi|^{2j} \right) \right] \\
&\leq \tilde{P}(\eta)^2 (1 + C|\xi|)^{2m},
\end{aligned}$$

o que encerra a prova. □

Neste trabalho, o polinômio P será o símbolo de um operador diferencial linear com coeficientes constantes. Este é um exemplo crucial de peso, sendo o alicerce fundamental da teoria de Hörmander.

Também é importante salientar que o conjunto das funções peso é fechado para soma, multiplicação e divisão. Estamos devidamente preparados para introduzir os espaços $B_{p,k}$.

Definição 3. Se $k \in \mathcal{K}$ e $1 \leq p < \infty$, determinamos por $B_{p,k}$ o conjunto de todas as distribuições $u \in \mathcal{S}'$ tais que $\mathcal{F}u$ é uma função e

$$\|u\|_{p,k} \doteq \frac{1}{(2\pi)^n} \left(\int |k(\xi)(\mathcal{F}u)(\xi)|^p d\xi \right)^{1/p} < \infty \quad (3.10)$$

Quando $p = \infty$, definimos $\|u\|_{\infty,k} \doteq \text{ess sup } |k(\xi)\mathcal{F}(u)(\xi)|$.

Repare que se tomamos $k = h_s$ como definido em (3.2) e $p = 2$, temos os espaços H_s . Cada espaço com a norma $\|\cdot\|_{p,k}$ é um espaço de Banach, e valem as inclusões $\mathcal{S} \subset B_{p,k} \subset \mathcal{S}'$.

Exibiremos agora resultados sobre a ação de operadores com coeficientes constantes em $B_{p,k}$, a relação entre estes com a suavidade de funções e uma versão da Desigualdade de Young.

Teorema 1. Considere $P(D)$ um operador diferencial parcial linear com coeficientes constantes. Se $u \in B_{p,k\tilde{P}}$, então $P(D)u \in B_{p,k}$. No caso em que u é uma distribuição com suporte compacto, também vale a recíproca.

Teorema 2. Sejam $k \in \mathcal{K}$ e j é um inteiro não-negativo tais que

$$\frac{(1 + |\xi|)^j}{k(\xi)} \in L^q, \text{ com } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (3.11)$$

Neste caso, $B_{p,k} \subset C^j$. Reciprocamente, se $B_{p,k} \cap \mathcal{E}'(X) \subset C^j$ para algum aberto X , então vale (3.11).

Teorema 3. Suponha que $u_1 \in B_{p,k_1} \cap \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ e $u_2 \in B_{\infty,k_2}$. Então $u_1 * u_2 \in B_{p,k_1 k_2}$ e vale a estimativa

$$\|u_1 * u_2\|_{p,k_1 k_2} \leq \|u_1\|_{p,k_1} \|u_2\|_{\infty,k_2}. \quad (3.12)$$

Uma maneira clássica de constatar que uma certa distribuição é na realidade uma função suave seria demonstrar que ela pertence a todo espaço H_{loc}^s , com s real. Como tudo definido até o momento é uma generalização dos Espaços de Sobolev, surge naturalmente uma questão sobre a existência de espaços $B_{p,k}^{\text{loc}}$. Vejamos de que modo se pode defini-los.

Teorema 4. Sejam $u \in B_{p,k}$ e $\varphi \in \mathcal{S}$. Então $\varphi u \in B_{p,k}$ e vale a desigualdade abaixo:

$$\|\varphi u\|_{p,k} \leq C(\varphi) \|u\|_{p,k} \quad (3.13)$$

Teorema 5. Seja $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\int \varphi(x) dx = 1$. Denotamos $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \varphi(x/\varepsilon)$. Se $u \in B_{p,k}$ com $p < \infty$, então $u * \varphi_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} u$ em $B_{p,k}$.

O Teorema 5 é uma consequência do Teorema 4, o qual nos mostra como as funções regularizantes podem ser aplicadas aqui como em outros casos já conhecidos. Já o Teorema 4 nos mostra que é viável discutir regularidade $B_{p,k}$ em vizinhanças de pontos. Reescrevendo de maneira mais formal:

Definição 4. *Um subespaço W de $\mathcal{D}'(X)$ é chamado de **semilocal** se $\varphi u \in W$ quando $u \in W$ e $\varphi \in C_c^\infty(X)$. Quando W for semilocal e contiver u sempre que $\varphi u \in W$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(X)$, diremos que W será **local**.*

Note que já vimos que $B_{p,k}$ é semilocal. Isto é suficiente para induzir uma definição de $B_{p,k}^{\text{loc}}$, através do resultado abaixo:

Teorema 6. *Se W é semilocal, o menor espaço local contendo W é o espaço*

$$W^{\text{loc}} \doteq \{u; u \in \mathcal{D}'(X), \varphi u \in W, \forall \varphi \in C_c^\infty(X)\}.$$

Para os espaços $B_{p,k}^{\text{loc}}$, temos versões análogas dos Teoremas 1 e 2, com ambas as voltas verdadeiras. O conjunto é fechado para multiplicação por funções suaves e tem estrutura de espaço de Frechét com a topologia induzida pelas seminormas $u \longrightarrow \|\varphi u\|_{p,k}, \varphi \in C_c^\infty(X)$.

Outro fato interessante e de bastante utilidade para a demonstração de nosso resultado, é que podemos estimar a regularidade de uma solução fundamental para um ODPL com coeficientes constantes.

Teorema 7. *Se $P(D)$ é um operador diferencial parcial linear com coeficientes constantes e não-nulo, então existe E uma solução fundamental $E \in B_{\infty, \tilde{P}}^{\text{loc}}$.*

Afirmamos que o resultado acima é preciso, no seguinte sentido: o espaço $B_{\infty, \tilde{P}}^{\text{loc}}$ é o "melhor" espaço do tipo que pode conter uma solução fundamental. Suponha existir uma distribuição E pertencendo $B_{p,k}^{\text{loc}}$ tal que $P(D)E = \delta$. Pelo que já discutimos previamente,

$$\delta = P(D)E \in B_{p,k/\tilde{P}}^{\text{loc}} \quad (3.14)$$

Assim $\frac{k}{\tilde{P}} \cdot \mathcal{F}(\delta) = \frac{k}{\tilde{P}} \in L^p$.

Observe que se $u \in B_{\infty, \tilde{P}}$, então $\|k \cdot \mathcal{F}(u)\|_p \leq \left\| \frac{k}{\tilde{P}} \right\|_p \cdot \left\| \tilde{P} \cdot \mathcal{F}(u) \right\|_\infty$. Ou seja,

$$B_{\infty, \tilde{P}}^{\text{loc}} \subset B_{p,k}^{\text{loc}}. \quad (3.15)$$

3.2 Definição e Propriedades

Sejam agora $P_1(D), P_2(D)$ dois operadores diferenciais com coeficientes constantes. Sabemos que as funções induzidas $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2$ são funções peso. Podemos nos questionar: comparando as funções peso, é possível de algum modo comparar os operadores em si?

Considere $P(x, D)$ um ODPL qualquer. Tomando y_1, y_2 quaisquer, é factível obter propriedades de P estudando as relações entre $\widetilde{P}_{y_1}$ e $\widetilde{P}_{y_2}$? A resposta é afirmativa para ambas as indagações; nosso objetivo será trazer um bom exemplo para a derradeira.

Definição 5. *Sejam $P(D), Q(D)$ operadores com coeficientes constantes. Dizemos que Q é **mais fraco** que P , ou $Q < P$ se existe $C > 0$ tal que*

$$\frac{\widetilde{Q}(\xi)}{\widetilde{P}(\xi)} < C, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \quad (3.16)$$

*Quando $Q < P < Q$, dizemos que ambos os operadores são **igualmente fortes**.*

Definição 6. *Um operador diferencial $P(x, D)$ definido em X é dito de **força constante** em X se para $y_1, y_2 \in X$ arbitrários, os operadores de coeficientes constantes $P(y_1, D), P(y_2, D)$ possuem a seguinte propriedade:*

$$\frac{\widetilde{P}(y_1, \xi)}{\widetilde{P}(y_2, \xi)} \leq C(y_1, y_2), \quad C(y_1, y_2), \quad \xi \in \mathbb{R}^n, . \quad (3.17)$$

Tome um operador de coeficientes constantes P , de ordem m . É fácil reparar que o conjunto de operadores mais fracos do que P tem estrutura de espaço vetorial e nenhum operador de ordem estritamente maior que m pertence a ele. Logo, a dimensão do espaço é finita.

Lema 1. *Suponha que $P(x, D)$ é um operador com coeficientes suaves e força constante. Fixado x_0 , definimos $P_0(D) \doteq P(x_0, D)$. Seja $P_0, P_1, \dots, P_r$ uma base do espaço de operadores de coeficientes constantes que são mais fracos que P_0 . Então*

$$P(x, D) = P_0(D) + \sum_{j=1}^r c_j(x) P_j(D), \quad (3.18)$$

onde as funções c_j são unicamente determinadas, se anulam em x_0 e são de classe C^∞ .

Temos agora todas as ferramentas para demonstrar o resultado principal.

Teorema 8. *Seja $P(x, D)$ um operador diferencial com coeficientes C^∞ e de força constante em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Se X é uma vizinhança suficientemente pequena de x_0 , existe uma transformação linear $E : \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ com as seguintes propriedades:*

$$P(x, D)Ef = f \text{ em } X, \text{ se } f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n). \quad (3.19)$$

$$\|Ef\|_{p, \widetilde{P}_0 k} \leq C_k \|f\|_{p, k}, \quad \text{se } f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \cap B_{p, k} \text{ e } k \in \mathcal{K}. \quad (3.20)$$

Demonstração. Seja $X_\varepsilon = \{x; |x - x_0| < \varepsilon\}$. Pela hipótese, podemos encontrar ε_0 tal que $P(x, D)$ possui coeficientes suaves e é de força constante em X_{ε_0} . Escolha uma função de corte $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ de modo que $\chi \equiv 1$ em uma vizinhança de $\overline{B(0, 2\varepsilon_0)}$.

Considere a decomposição de P feita em (3.18) e seja $E_0 \in B_{\infty, \widetilde{F}_0}^{\text{loc}}$ uma solução fundamental de $P_0(D)$, cuja existência é garantida pelo Teorema 7. Escrevemos $F_0 \doteq \chi E_0$. Segue imediatamente que $F_0 \in B_{\infty, \widetilde{F}_0}$.

Além disto, $F_0 * f = E_0 * f$ em X_{ε_0} quando $\text{supp } f$ está contido em X_{ε_0} , já que

$$E_0 * f = \underbrace{(\chi E_0 * f)}_A + \underbrace{[(1 - \chi) E_0 * f]}_B$$

e $y \in \text{supp } B$ pode ser escrito como $y_1 + y_2$, onde $|y_1| > 2\varepsilon_0$ e $|y_2 - x_0| < \varepsilon_0$. Assim,

$$P_0(D)(E_0 * f) = P_0(D)(F_0 * f) = F_0 * (P_0(D)f) = f \text{ em } X_{\varepsilon_0}, \text{ se } f \in \mathcal{E}'(X_{\varepsilon_0}) \quad (3.21)$$

Tome $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\psi \equiv 1$ na bola unitária fechada, com suporte no conjunto $\{x; |x| \leq 2\}$. Como usual, escrevemos $\psi_\varepsilon \doteq \psi\left(\frac{x - x_0}{\varepsilon}\right)$. Suponha por um instante que existe $\varepsilon_1 > 0$ para o qual dado $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ existe uma única $g \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ tal que

$$g + \sum_{j=0}^r \psi_\varepsilon c_j P_j(D)(F_0 * g) = \psi_\varepsilon f, \quad 0 < \varepsilon < \varepsilon_1 < \varepsilon_0/2 \quad (3.22)$$

Determinamos então $Ef \doteq F_0 * g$. É imediato que E é linear e leva elementos de $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ em $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. Mais ainda, isolando g na equação (3.22), notamos que na verdade $\text{supp } g \subset \text{supp } \psi_\varepsilon$ e, consequentemente, $g \in \mathcal{E}'(X_{\varepsilon_0})$. Portanto,

$$\begin{aligned} P(x, D)Ef &= P(x, D)(F_0 * g) \\ &= P_0(D)(F_0 * g) + \sum_{j=0}^r c_j P_j(x, D)(F_0 * g) \\ &= g + \sum_{j=1}^r c_j P_j(x, D)(F_0 * g) \\ &= g + \sum_{j=1}^r \psi_\varepsilon c_j P_j(x, D)(F_0 * g), \quad \text{em } X_\varepsilon \\ &= f, \quad \text{em } X_\varepsilon, \end{aligned}$$

o que mostra (3.19). Precisamos provar ainda a unicidade de (3.22) e a desigualdade (3.20). Estudemos a seguinte função:

$$\begin{aligned} A_\varepsilon : \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) &\rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \\ g &\rightarrow \sum_{j=0}^r \psi_\varepsilon c_j P_j(D)(F_0 * g). \end{aligned}$$

Fixemos $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. Sabemos que existe $k \in \mathcal{K}$ tal que $f \in B_{2,k}$. De forma mais geral, demonstraremos que A_ε leva $B_{p,k}$ em si mesmo. Logo em seguida, calcularemos sua norma. Mas antes, temos de enunciar dois lemas:

Lema 2. Fixado $k \in \mathcal{K}$, podemos encontrar $\delta_0 > 0$ tal que para todo $0 < \delta < \delta_0$ existe uma função peso k_δ de modo que

$$\|\varphi u\|_{p,k_\delta} \leq 2 \|\varphi\|_{1,1} \|u\|_{p,k_\delta}, \quad u \in B_{p,k_\delta} \quad (3.23)$$

onde $\varphi \in \mathcal{S}$ e $B_{p,k} = B_{p,k_\delta}$ (ou seja, os dois pesos são equivalentes).

Lema 3. Suponha $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e seja $\psi_\varepsilon(x) = \psi\left(\frac{x-x_0}{\varepsilon}\right)$. Se $h(x)$ é suave em uma vizinhança de x_0 e $h(x_0) = 0$, segue que $\|\psi_\varepsilon h\|_{1,1} = O(\varepsilon)$, quando ε é suficientemente pequeno.

Agora, lembre-se que $F_0 \in B_{\infty, \widetilde{P}_0}$. Logo, existe $C > 0$ tal que $|P_0(\xi)\mathcal{F}(F_0)(\xi)| \leq C$, para cada $\xi \in \mathbb{R}^n$. Como cada P_j é mais fraco do que P_0 , podemos tomar C de modo que

$$|P_j(\xi)\mathcal{F}(F_0)(\xi)| \leq C, \quad j = 0, 1, \dots, r. \quad (3.24)$$

Suponha que $g \in B_{p,k_\delta}$, para δ suficientemente pequeno onde vale o Lema 2. Pelo Teorema 3, obtemos:

$$\begin{aligned} \|A_\varepsilon g\|_{p,k_\delta} &\leq \sum_{j=0}^r \|\psi_\varepsilon c_j P_j(D)(F_0 * g)\|_{p,k_\delta} \\ &\leq \sum_{j=0}^r \|\psi_\varepsilon c_j (P_j(D)F_0 * g)\|_{p,k_\delta} \\ &\leq 2 \sum_{j=0}^r \|\psi_\varepsilon c_j\|_{1,1} \|(P_j(D)F_0 * g)\|_{p,k_\delta} \\ &\leq 2 \sum_{j=0}^r \|\psi_\varepsilon c_j\|_{1,1} \|P_j(D)F_0\|_{\infty,1} \|g\|_{p,k_\delta} \\ &\leq 2C \sum_{j=0}^r \|\psi_\varepsilon c_j\|_{1,1} \|g\|_{p,k_\delta}. \end{aligned}$$

Utilizando o Lema 3, é possível selecionar ε_1 de maneira que $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_0/2$ e

$$\sum_{j=0}^r \|\psi_\varepsilon c_j\|_{1,1} < \frac{1}{4C}, \quad \text{quando } 0 < \varepsilon < \varepsilon_1. \quad (3.25)$$

Como a escolha de ε_1 vale para qualquer peso k , concluímos que A_ε pode ser visto como um operador de B_{1,k_δ} , e juntando a desigualdade (3.25) com a estimativa anterior, notamos que

$$\|A_\varepsilon g\|_{p,k_\delta} \leq \frac{1}{2} \|g\|_{p,k_\delta}. \quad (3.26)$$

Isto é, sua norma é menor ou igual a $\frac{1}{2}$.

Resumindo, temos um operador linear $A_\varepsilon : B_{2,k_\delta} \rightarrow B_{2,k_\delta}$ que possui norma menor do que 1. Logo, $I + A_\varepsilon$ é inversível, o que nos permite concluir a existência de uma única solução da equação (3.22), considerando à primeira vista apenas o espaço B_{2,k_δ} e portanto $B_{2,k}$.

Não obstante, a unicidade é mais geral, valendo para $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. De fato, suponha existirem g_1, g_2 soluções distintas, sendo a primeira a encontrada acima. Logo $g_1, f \in B_{2,k_1}$ e $g_2 \in B_{2,k_2}$. Por podermos encontrar k de modo que $B_{2,k_1}, B_{2,k_2} \subset B_{2,k}$, teríamos duas soluções distintas em $B_{2,k}$ de f . Contradição.

Finalizamos a prova com a estimativa prometida. De (3.26),

$$2 \|\psi_\varepsilon f\|_{p,k_\delta} = 2 \|A_\varepsilon g + g\|_{p,k_\delta} \geq 2 \|g\|_{p,k_\delta} - 2 \|A_\varepsilon g\|_{p,k_\delta} \geq \|g\|_{p,k_\delta} \quad (3.27)$$

Portanto,

$$\|Ef\|_{p,\widetilde{P}_0 k_\delta} \leq \|F_0\|_{\infty,\widetilde{P}_0} \|g\|_{p,k_\delta} \leq 2 \|F_0\|_{\infty,\widetilde{P}_0} \|\psi_\varepsilon f\|_{p,k_\delta} \leq 4 \|F_0\|_{\infty,\widetilde{P}_0} \|\psi_\varepsilon\|_{1,1} \|f\|_{p,k_\delta}, \quad (3.28)$$

aplicando o Teorema 3, a desigualdade (3.27) e o Lema 2. O resultado como enunciado segue novamente do fato das normas $\|\cdot\|_{p,k}$ e $\|\cdot\|_{p,k_\delta}$ serem equivalentes. $\square$

Corolário 2. *Seja $P(x, D)$ e X como no Teorema 8. Então a equação $P(x, D)u = f$ possui (em X) solução $u \in C^\infty(X)$ para cada $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Demonstração. Seja f um elemento de $C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Tomamos $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\varphi \equiv 1$ em X . Repare que $\varphi f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \cap H^s(\mathbb{R}^n)$ para $s \in \mathbb{R}$ arbitrário. Por (3.19), $P(x, D)E(\varphi f) = \varphi f = f$ em X . Segue de (3.20) que $Ef \doteq u$ pertence a H^s para cada s ; logo de classe C^∞ . $\square$

Teorema 9. *Dado $x \in M$, existe uma vizinhança $V \ni x$ tal que L é um operador de força constante em V .*

Demonstração. Fixe $x_0 \in M$, e considere um aberto U que contém x_0 tal que

$$L|_U = a_{n-1} \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + a_n \frac{\partial}{\partial y_n}.$$

Tomando $V \ni x_0$ um aberto compactamente contido em U , existem $C_1, C_2 > 0$ de modo que

$$C_1 \leq |a_{n-1}(x)|, |a_n(x)| \leq C_2, \quad \forall x \in V \quad (3.29)$$

pois já vimos na Proposição 5 que ambos os coeficientes nunca se anulam. Portanto, dados x_1, x_2 em V ,

$$\begin{aligned} \widetilde{L}(x_j, \xi)^2 &= |a_{n-1}(x_j) \cdot \xi_{n-1} + a_n(x_j) \cdot \xi_n|^2 + |a_{n-1}(x_j)|^2 + |a_n(x_j)|^2 \\ &\leq |a_{n-1}(x_j)|^2 (1 + 2|\xi_{n-1}|^2) + |a_n(x_j)|^2 (1 + 2|\xi_n|^2), \\ &\leq 2 \cdot C_2^2 (1 + |\xi_{n-1}|^2 + |\xi_n|^2), \quad j = 1, 2. \end{aligned}$$

Reciprocamente, aplicando a Proposição 6 com possivelmente uma redução de V , constatamos que existe $c_1 > 0$ de maneira que:

$$\begin{aligned}\tilde{L}(x_j, \xi)^2 &= |a_{n-1}(x_j) \cdot \xi_{n-1} + a_n(x_j) \cdot \xi_n|^2 + |a_{n-1}(x_j)|^2 + |a_n(x_j)|^2 \\ &\geq 2 \cdot c_1^2 (|\xi_{n-1}|^2 + |\xi_n|^2) + |a_{n-1}(x_j)|^2 + |a_n(x_j)|^2 \\ &\geq 2 \cdot c_1^2 (|\xi_{n-1}|^2 + |\xi_n|^2) + 2C_1^2 \\ &\geq 2 \cdot c_2^2 (1 + |\xi_{n-1}|^2 + |\xi_n|^2), \quad j = 1, 2;\end{aligned}$$

onde $c_2 = \min \{C_1, c_1\}$.

Ou seja, $\frac{|\tilde{L}(x_2, \xi)|}{|\tilde{L}(x_1, \xi)|} \leq \frac{C_2}{c_2}$, o que finaliza a prova.

□

Corolário 3. *L é um operador localmente C^∞ -resolúvel.*

Capítulo 4

Folheação associada a L

Pelo fato dos operadores reais L_1 e L_2 formarem uma estrutura involutiva, existe uma folheação de M de modo que cada uma das folhas tem o espaço tangente gerado por tais campos. Para mais detalhes sobre folheações, recomendamos [CLN85].

A priori, uma folha neste caso é somente uma variedade real de dimensão 2, que localmente pode ser descrita como um subconjunto de M cujas primeiras $n - 2$ variáveis são fixas.

Complexificando seu fibrado tangente e definindo $\bar{L} = L_1 - iL_2$, segue que

$$L_1 = \frac{L + \bar{L}}{2}, \quad L_2 = \frac{L - \bar{L}}{2i}. \quad (4.1)$$

Consequentemente, L e $\bar{L}$ são linearmente independentes e também formam um conjunto gerador. Isto é, em cada folha o subfibrado gerado por L forma uma estrutura complexa, como descrito em [BCH08].

4.1 Forma local do Operador

Apresentaremos agora uma nova caracterização local do operador L , que será de suma importância no decorrer deste trabalho.

Teorema 10. *Para cada ponto de M , existe um sistema local de coordenadas de forma que $L = a \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$, onde a é função de classe C^∞ e $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$*

Demonstração. Primeiramente, fixamos um ponto em M que será a origem, e recordamos que podemos considerar $L = a_{n-1} \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + a_n \frac{\partial}{\partial y_n}$ em um sistema local de coordenadas $y_1, \dots, y_n$ definido em uma vizinhança U deste ponto, de maneira que as funções a_{n-1} e a_n não se anulam em U .

Considere então $L' \doteq L/a_{n-1}$. Note que provar o resultado para L' é equivalente a provar para L . Portanto, podemos supor que

$$L = \frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + b_n \frac{\partial}{\partial y_n}, \quad (4.2)$$

onde $b_n \doteq \beta_n + i\gamma_n$ é uma função que nunca se anula.

Considere o seguinte problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \frac{\partial y_{n-1}}{\partial t} = 1, \\ \frac{\partial y_n}{\partial t} = \beta_n(y_1, \dots, y_{n-2}, y_{n-1}, y_n) \\ y_{n-1}(y_1, \dots, y_{n-2}, 0, \zeta) = 0 \\ y_n(y_1, \dots, y_{n-2}, 0, \zeta) = \zeta \end{cases}$$

Com uma conta simples, conseguimos provar que $(y_1, \dots, y_{n-2}, t, \zeta) \mapsto (y_1, \dots, y_{n-2}, y_{n-1}, y_n)$ é um difeomorfismo em torno da origem, e consequentemente $(y_1, \dots, y_{n-2}, t, \zeta)$ é sistema local de coordenadas.

Verifiquemos a forma do campo L neste novo sistema:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial y_{n-1}} \cdot \frac{\partial y_{n-1}}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y_n} \cdot \frac{\partial y_n}{\partial t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial y_{n-1}} + \frac{\partial f}{\partial y_n} \cdot \beta_n \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y_{n-1}} + \beta_n \cdot \frac{\partial}{\partial y_n} \right) f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \zeta} &= \frac{\partial f}{\partial y_{n-1}} \cdot \frac{\partial y_{n-1}}{\partial \zeta} + \frac{\partial f}{\partial y_n} \cdot \frac{\partial y_n}{\partial \zeta} \\ &= \frac{\partial f}{\partial y_n} \cdot \frac{\partial y_n}{\partial \zeta} \\ &= \left(\frac{\partial y_n}{\partial \zeta} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y_n} \right) f, \end{aligned}$$

visto que $y_{n-1} = t$, pela unicidade de solução do problema de Cauchy. Concluimos assim que

$$L = \frac{\partial}{\partial t} + i\varphi \frac{\partial}{\partial \zeta}, \quad (4.3)$$

com $\varphi \in C^\infty(U)$ e assumindo apenas valores reais. Note que, como L e $\bar{L}$ são linearmente independentes, a função φ é diferente de 0 em cada ponto.

Considere $f \doteq -i\varphi_\zeta$. Visto termos demonstrado que L é localmente C^∞ -resolúvel, a menos de uma redução de U , existe v de maneira que

$$Lv = v_t + i\varphi v_\zeta = f = -i\varphi_\zeta \quad (4.4)$$

Posto isto, definimos a seguinte função:

$$u(y', t, \zeta) \doteq \int_0^\zeta e^{v(y', t, \theta)} d\theta. \quad (4.5)$$

Aplicando L em u , obtemos:

$$\begin{aligned}
Lu(y', t, \zeta) &= \int_0^\zeta v_t(y', t, \theta) \cdot e^{v(y', t, \theta)} d\theta + i\varphi(y', t, \zeta)e^{v(y', t, \zeta)} \\
&= \int_0^\zeta [-i\varphi_\zeta - i\varphi v_\zeta](y', t, \theta) \cdot e^{v(y', t, \theta)} d\theta + i\varphi(y', t, \zeta)e^{v(y', t, \zeta)} \\
&= -i \int_0^\zeta [\varphi_\zeta + \varphi v_\zeta](y', t, \theta) \cdot e^{v(y', t, \theta)} d\theta + i\varphi(y', t, \zeta)e^{v(y', t, \zeta)} \\
&= -i \int_0^\zeta \left[\varphi e^{v(y', t, \theta)} \right]_\zeta (y', t, \theta) d\theta + i\varphi(y', t, \zeta)e^{v(y', t, \zeta)} \\
&= i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)}
\end{aligned}$$

Escrevemos agora

$$Z(y', t, \zeta) \doteq u(y', t, \zeta) - i \int_0^t \varphi(y', \xi, 0) e^{v(y', \xi, 0)} d\xi \quad (4.6)$$

e afirmamos que $LZ = 0$, $Z_\zeta \neq 0$ em U . De fato,

$$\begin{aligned}
LZ(y', t, \zeta) &= Lu(y', t, \zeta) - iL \left[\int_0^t \varphi(y', \xi, 0) e^{v(y', \xi, 0)} d\xi \right] \\
&= i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)} - iL \left[\int_0^t \varphi(y', \xi, 0) e^{v(y', \xi, 0)} d\xi \right] \\
&= i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)} - i \left\{ \frac{\partial}{\partial t} + i\varphi \frac{\partial}{\partial x} \right\} \left[\int_0^t \varphi(y', \xi, 0) e^{v(y', \xi, 0)} d\xi \right] \\
&= i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)} - i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Além disso, $Z_\zeta(y', t, \zeta) = u_\zeta(y', t, \zeta) = e^{v(y', t, \zeta)} \neq 0$. Ou seja, $dZ \neq 0$.

Daqui em diante tomaremos y' apenas como parâmetro fixado. Repare que esta atitude poderia ter sido tomada desde o início, pois em nenhum momento houve qualquer alteração nas primeiras $n - 2$ coordenadas. Mas a opção feita aqui teve exatamente o fim didático de explicitar esse fato.

Para prosseguir com a demonstração, necessitamos do resultado a seguir:

Proposição 9. *As formas $dZ, d\bar{Z}$ são linearmente independentes.*

Demonstração. Sejam a_1, a_2 funções suaves tais que $a_1 dZ + a_2 d\bar{Z} = 0$. Aplicando em L ,

$$a_1 dZ(L) + a_2 d\bar{Z}(L) = a_2 d\bar{Z}(L) = a_2 L(\bar{Z}) = a_2 \overline{L(Z)} = 0 \quad (4.7)$$

Em contrapartida,

$$\begin{aligned}
\bar{L}Z(y', t, \zeta) &= \bar{L}u(y', t, \zeta) - i\bar{L} \left[\int_0^t \varphi(y', \xi, 0) e^{v(y', \xi, 0)} d\xi \right] \\
&= -i \int_0^\zeta \left[\varphi e^{v(y', t, \theta)} \right]_\zeta (y', t, \theta) d\theta - i\varphi(y', t, \zeta) e^{v(y', t, \zeta)} - \\
&\quad - i \left\{ \frac{\partial}{\partial t} - i\varphi \frac{\partial}{\partial x} \right\} \left[\int_0^t \varphi(y', \xi, 0) e^{v(y', \xi, 0)} d\xi \right] = \\
&= -2i\varphi(y', t, \zeta) e^{v(y', t, \zeta)} + i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)} - i\varphi(y', t, 0) \cdot e^{v(y', t, 0)} = \\
&= -2i\varphi(y', t, \zeta) e^{v(y', t, \zeta)},
\end{aligned}$$

que nunca se anula. Logo, $a_2 \equiv 0$. Analogamente, aplicando em $\bar{L}$ obteremos que $a_1 \equiv 0$, encerrando a prova. $\square$

Repare que a Proposição 9 nos permite inferir que $d(\operatorname{Re}Z)$ e $d(\operatorname{Im}Z)$ são linearmente independentes. Determinando

$$Z(y', \zeta, t) = x_{n-1}(y', \zeta, t) + ix_n(y', \zeta, t), \quad (4.8)$$

segue que (x_{n-1}, x_n) é um sistema de coordenadas. Calculemos L neste sistema. Como $LZ = 0$;

$$\frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} + i \frac{\partial x_n}{\partial t} + i\varphi \frac{\partial x_{n-1}}{\partial \zeta} + i\varphi \left(i \frac{\partial x_n}{\partial \zeta} \right) = 0 \quad (4.9)$$

Da equação (4.9) extraímos duas igualdades:

$$\begin{cases} \frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} = \varphi \frac{\partial x_n}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial x_n}{\partial t} = -\varphi \frac{\partial x_{n-1}}{\partial \zeta} \end{cases}$$

Tomamos $f \in C^\infty(U)$ arbitrária e aplicamos L :

$$\begin{aligned}
Lf &= \frac{\partial f}{\partial t} + i\varphi \frac{\partial f}{\partial \zeta} \\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t} \right) + i\varphi \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \frac{\partial x_{n-1}}{\partial \zeta} + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial \zeta} \right) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \left[\frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} + i\varphi \frac{\partial x_{n-1}}{\partial \zeta} \right] + \frac{\partial f}{\partial x_n} \left[\frac{\partial x_n}{\partial t} + i\varphi \frac{\partial x_n}{\partial \zeta} \right] \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \left[\frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} - i \frac{\partial x_n}{\partial t} \right] + i \frac{\partial f}{\partial x_n} \left[-i \frac{\partial x_n}{\partial t} + \frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} \right] \\
&= \left[\frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} - i \frac{\partial x_n}{\partial t} \right] \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)
\end{aligned}$$

Se denotamos $\psi \doteq \left[\frac{\partial x_{n-1}}{\partial t} - i \frac{\partial x_n}{\partial t} \right]$,

$$L = \psi \left(\frac{\partial}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \quad (4.10)$$

o que estabelece o término da demonstração do Teorema 10. □

Como pode notar o leitor familiarizado com a teoria de estruturas formalmente integráveis, o que acabamos de provar decorre imediatamente do Teorema de Newlander-Nirenberg, que afirma que toda estrutura complexa é localmente integrável. Uma demonstração do resultado e a teoria geral podem ser vistas em [BCH08].

4.2 A Estrutura Complexa de Cada Folha

Provemos por fim que cada folha tem estrutura de variedade complexa. Fixamos um ponto x_0 da variedade M , denominamos de $\mathcal{L}$ a folha que passa por ele e escolhemos $(y_1, \dots, y_n)$ sistema de coordenadas em um aberto $W_1 \ni x_0$ da variedade como no Teorema 10.

Logo, existe $V_1 \ni x_0$ aberto da folha tal que $g \doteq y_{n-1} + iy_n$ é um homeomorfismo de V_1 em um aberto de $\mathbb{C}$. Suponha $(x_1, \dots, x_n)$ outro sistema de coordenadas para o qual L é caracterizado da mesma maneira, definido em um aberto W_2 tal que $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$.

Analogamente, existirá $V_2 \subset \mathcal{L}$ aberto de modo que $V = V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ e $h \doteq x_{n-1} + ix_n$ é homeomorfismo de V_2 em um aberto de $\mathbb{C}$. Afirmamos agora que $y' = (y_1, \dots, y_{n-2})$ é uma função apenas de $x' = (x_1, \dots, x_{n-2})$ e vice-versa. De fato,

$$\begin{aligned} Lf &= a \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \\ &= b \cdot \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial y_j} \cdot \frac{\partial y_j}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_n} \right) \\ &= c \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial y_{n-1}} + i \frac{\partial f}{\partial y_n} \right). \end{aligned}$$

Ou seja, $\frac{\partial y_j}{\partial x_{n-1}} = \frac{\partial y_j}{\partial x_n} = 0$ para $j = 1, 2, \dots, n-2$. O raciocínio para mostrar que x' só depende de y' é totalmente análogo.

Resumindo: quando ocorre a troca de sistema de coordenadas e as variáveis x' são fixadas, o mesmo acontece para y' . Falta-nos mostrar que a função de transição em $\mathcal{L}$ dada por $g \circ h^{-1}$ é holomorfa.

Fazendo uma simples conta, deduzimos que $Lf = Lg = 0$ e, em $V_1 \cap V_2$, segue que:

$$\frac{\partial g}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial g}{\partial x_n} = 0. \quad (4.11)$$

Mas isto é o mesmo que afirmar que

$$\left[\frac{\partial(g \circ f^{-1})}{\partial x} + i \frac{\partial(g \circ f^{-1})}{\partial y} \right] \circ f = 0, \quad (4.12)$$

onde x, y são coordenadas em $\mathbb{C}$. Ou seja, $\frac{\partial(g \circ f^{-1})}{\partial \bar{z}} = 0$ e assim concluímos que a função é holomorfa.

Temos portanto um atlas para M que induz uma estrutura de variedade complexa em cada folha, o que nos permite introduzir o seguinte conceito:

Definição 7. *Seja $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$, onde Ω é um aberto de uma folha da L -folheação. Diremos que a função será subharmônica se for semicontínua superiormente e $\partial\bar{\partial}\varphi \geq 0$, no sentido de distribuições (ou $\varphi \equiv -\infty$). Quando φ for de classe C^2 , diremos que será estritamente subharmônica no caso de a desigualdade ser estrita.*

Definição 8. *Se φ é definida em M , diremos que será subharmônica se for semicontínua superiormente e a restrição a cada folha for subharmônica.*

Definição 9. *Diremos que φ será superharmônica quando $-\varphi$ for subharmônica.*

Relacionaremos agora a subharmonicidade de uma função com a ação dos operadores L e $\bar{L}$ sobre a mesma. Com tal intuito, calculemos o colchete de Lie dos campos:

De (4.1),

$$\begin{aligned} [L, \bar{L}] &= [L_1 + iL_2, L_1 - iL_2] \\ &= -i[L_1, L_2] + i[L_2, L_1] \\ &= 2i[L_2, L_1] \\ &= 2i(\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2) \\ &= (\alpha_2 + i\alpha_1)L - ((\alpha_2 - i\alpha_1))\bar{L} \\ &= \lambda L - \bar{\lambda}\bar{L}, \end{aligned}$$

onde $\lambda \in C^\infty(M)$.

Proposição 10. $\partial\bar{\partial}\varphi \geq 0$ se e somente se $(\bar{L} + \lambda)L\varphi \geq 0$ em cada folha.

Demonstração. Para iniciar, a afirmação é local. De fato, precisamos somente provar que para cada ponto da variedade existe uma vizinhança na qual a distribuição $\partial\bar{\partial}\varphi$ é não-negativa.

Por isso, podemos considerar $L = a \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$, $\bar{L} = \bar{a} \frac{\partial}{\partial z}$ e encontrar a função λ explicitamente:

$$L\bar{L} = a\bar{a} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z} + a \overline{\left(\frac{\partial a}{\partial z} \right)} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \quad (4.13)$$

$$\bar{L}L = a\bar{a} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z} + \bar{a} \left(\frac{\partial a}{\partial z} \right) \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \quad (4.14)$$

Assim,

$$\begin{aligned}
[L, \bar{L}] &= a \overline{\left(\frac{\partial a}{\partial z}\right)} \frac{\partial}{\partial z} - \bar{a} \left(\frac{\partial a}{\partial z}\right) \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \\
&= \overline{\left(\frac{\bar{a} \partial a}{a \partial z}\right)} \bar{a} \frac{\partial}{\partial z} - \left(\frac{\bar{a} \partial a}{a \partial z}\right) a \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \\
&= - \left(\frac{\bar{a} \partial a}{a \partial z}\right) L + \overline{\left(\frac{\bar{a} \partial a}{a \partial z}\right)} \bar{L}.
\end{aligned}$$

Concluimos deste modo que $\lambda = - \left(\frac{\bar{a} \partial a}{a \partial z}\right)$. Portanto,

$$\begin{aligned}
(\bar{L} + \lambda) L \varphi &= (\bar{L} + \lambda) a \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} \\
&= \bar{L} \left(a \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} \right) - \bar{a} \frac{\partial a}{\partial z} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} \\
&= \bar{L}(a) \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} + a \bar{a} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z \partial \bar{z}} - \bar{a} \frac{\partial a}{\partial z} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} \\
&= |a|^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z \partial \bar{z}}.
\end{aligned}$$

□

Capítulo 5

Uma Análise da Regularidade das Soluções

5.1 A Função Regularidade

Aqui usaremos das ferramentas obtidas até o momento a fim de obter melhor descrição das singularidades e dos suportes de $Lu = f$. Para medir a regularidade de uma distribuição em M , definimos

$$s_u(x) = \sup \{t \in \mathbb{R}; u \in H^t \text{ em uma vizinhança de } x\}. \quad (5.1)$$

Proposição 11. *A função s_u é semicontínua inferiormente.*

Demonstração. Considere $A_c = \{x \in M; s_u(x) > c\}$. Se $x \in A_c$, existe uma vizinhança V de x tal que $u|_V \in H^r$, com $r > c$. Dado $y \in V$, temos pela definição que $s_u(y) \geq r > c$. Logo A_c é aberto. $\square$

O restante desta seção será dedicado à demonstração do resultado abaixo.

Teorema 11. *Se $u \in \mathcal{D}'(M)$ e $Lu = f$, então $\min\{s_u, s\}$ é uma função superharmônica se s é superharmônica e $s_f \geq s$.*

Demonstração. Pelo que foi discutido na demonstração da Proposição 10, podemos assumir que M é um aberto de $\mathbb{R}^n$ e

$$L = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial}{\partial x_{n-1}} + i \frac{\partial}{\partial x_n},$$

pois a é uma função suave que nunca se anula.

Pela Definição 8, precisamos apenas atestar que a função é superharmônica em cada folha. Cada uma destas é uma superfície de Riemann (variedade complexa de dimensão 1), que podemos considerar localmente definida em $\{w\} \times \mathbb{C}$, com $w \in \mathbb{R}^{n-2}$.

Sem perda de generalidade, vamos supor que $w = 0$ e considerar um disco de raio r centrado em $z = 0$. Com isto, $\min(s_u, s)(0, z)$ será superharmônica se, e somente se, para qualquer h harmônica em $\{|z| < r\}$ de modo que $\min(s_u, s)(0, z) \geq h(z)$ se $|z| = r$, então $\min(s_u, s)(0, z) \geq h(z)$ quando $|z| < r$.

Proposição 12. *Tomando h uma função como definido logo acima, são equivalentes:*

1. $\min(s_u, s)(0, z)$ é superharmônica.
2. Se $\min(s_u, s)(0, z) > h(z)$ para $|z| = r$, então $\min(s_u, s)(0, z) > h(z)$ quando $|z| < r$.
3. Se $\min(s_u, s)(0, z) > h(z)$ para $|z| = r$, então $\min(s_u, s)(0, z) \geq h(z)$ quando $|z| < r$.

Demonstração.

1 $\Rightarrow$ 2. Suponha que $\min(s_u, s)(0, z) - h(z) > 0$ em $\{|z| = r\}$. Como o conjunto é compacto e $\min(s_u, s) - h$ é semicontínua inferiormente, esta assume mínimo. Ou seja, existe $\varepsilon > 0$ de modo que $\min(s_u, s)(0, z) - h(z) \geq \varepsilon$ em $\{|z| = r\}$.

Pela hipótese, deduzimos que $\min(s_u, s)(0, z) - h(z) \geq \varepsilon$ quando $|z| < r$, e consequentemente $\min(s_u, s)(0, z) > h(z)$ em $\{|z| < r\}$.

2 $\Rightarrow$ 3. Trivial.

3 $\Rightarrow$ 1. Consideramos que $\min(s_u, s)(0, z) \geq h(z)$ quando $|z| = r$. Para todo $\varepsilon > 0$, obtemos $\min(s_u, s)(0, z) > h(z) - \varepsilon$ no mesmo conjunto. Aplicando a hipótese, $\min(s_u, s)(0, z) \geq h(z) - \varepsilon$ em $\{|z| < r\}$. Como ε é arbitrário, inferimos que $\min(s_u, s)(0, z) \geq h(z)$ para $|z| \leq r$, o que comprova a afirmação. □

Voltamos à prova do Teorema 11 com a hipótese de que vale

$$\min(s_u, s)(0, z) > h(z), \quad |z| = r, \quad (5.2)$$

e demonstraremos que a desigualdade estrita continua valendo para $|z| < r$.

Visto que s é superharmônica por definição, precisamos demonstrar a propriedade apenas para s_u . Defina

$$v = \chi_1 \chi_2 u, \quad \chi_1 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{n-2}), \quad \chi_2 \in C_c^\infty(\mathbb{C}); \quad (5.3)$$

onde $\chi_1(0) = 1$, enquanto que $\chi_2 \equiv 1$ em $\{|z| \leq r\}$. Neste caso,

$$\frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = \chi_1 \chi_2 f + \chi_1 \frac{\partial \chi_2}{\partial \bar{z}} u \doteq g. \quad (5.4)$$

Proposição 13. $s_g(x', z) > h(z)$, para todo $(x', z) \in M$.

Demonstração. Como a função $\min\{s_u, s\}$ é semicontínua inferiormente e $\min\{s_u, s\}(0, z) > h(z)$ para $|z| = r$, existem $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ de modo que

$$\min\{s_u, s\}(x', z) > h(z), \quad \forall |x'| < \varepsilon_1, \quad r - \varepsilon_2 < |z| < r + \varepsilon_2. \quad (5.5)$$

Pela superharmonicidade de s ,

$$s(x', z) > h(x), \quad \forall |x'| < \varepsilon_1, \quad |z| < r + \varepsilon_2. \quad (5.6)$$

Analisamos a equação (5.4): $\frac{\partial \chi_2}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ no conjunto $\{|z| \leq r\}$, o que nos mostra que $s_g(x', z) \geq s_f(x', z)$ para $|z| \leq r$. Assim, unindo (5.6) com a hipótese de que $s_f \geq s$,

$$s_g(x', z) > h(z), \quad \forall |x'| < \varepsilon_1, |z| \leq r. \quad (5.7)$$

Note bem: (5.5) implica que $\min\{s_u, s_f\}(x', z) > h(z)$ para $|x'| < \varepsilon_1$ e $r < |z| < r + \varepsilon_2$. Juntando o fato de que $s_g \geq \min\{s_u, s_f\}$ com (5.7),

$$s_g(x', z) > h(z), \quad \forall |x'| < \varepsilon_1, |z| < r + \varepsilon_2. \quad (5.8)$$

Por fim, escolhemos χ_1 e χ_2 que se anulem quando $|x'| \geq \varepsilon_1/2$ e $|z| \geq r + \varepsilon_2/2$ respectivamente. $\square$

A seguir, usaremos as notações usuais para o cálculo de operadores pseudodiferenciais. O espaço de símbolos de tipo (ρ, δ) e ordem m será denotado por $S_{(\rho, \delta)}^m$. Enquanto que a classe de operadores pseudodiferenciais de mesmo tipo e ordem será denotada por $\Psi_{(\rho, \delta)}^m$. Recomendamos [Hör71] e [Trè80] como referências para a teoria.

Tome uma função F holomorfa em $\mathbb{C}$ de modo que $\operatorname{Re} F = h$ e defina como Q o operador pseudo-diferencial cujo símbolo é dado por

$$Q(x, \xi) = (1 + \xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2)^{\frac{F(z)}{2}} = (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} \quad (5.9)$$

Proposição 14. $\frac{\partial(Qv)}{\partial \bar{z}} = Qg$.

Demonstração. Se $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, temos:

$$Q(w)(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \int e^{i \cdot \langle x-y, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} w(y) dy d\xi \quad (5.10)$$

Derivando sob o sinal da integral,

$$\begin{aligned} \frac{\partial(Qw)}{\partial x_{n-1}}(x) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int \int \left[e^{i \cdot \langle x-y, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} w(y) \right] \left[i\xi_{n-1} + \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_{n-1}} \log(1 + |\xi|^2) \right] dy d\xi \\ \frac{\partial(Qw)}{\partial x_n}(x) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int \int \left[e^{i \cdot \langle x-y, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} w(y) \right] \left[i\xi_n + \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_n} \log(1 + |\xi|^2) \right] dy d\xi \end{aligned}$$

Fazendo a multiplicação da segunda equação por i , a soma das duas e aplicando o fato de F ser holomorfa, segue que

$$\frac{\partial(Qw)}{\partial \bar{z}}(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \int \left[e^{i \cdot \langle x-y, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} w(y) \right] \cdot \frac{1}{2} [i\xi_{n-1} - \xi_n] dy d\xi. \quad (5.11)$$

Em contrapartida,

$$\begin{aligned}
Q\left(\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}\right)(x) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int \int e^{i\langle x-y, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{\partial w}{\partial y_{n-1}} + i \frac{\partial w}{\partial y_n} \right] (y) dy d\xi \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int e^{i\langle x, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} \int e^{i\langle -y, \xi \rangle} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{\partial w}{\partial y_{n-1}} + i \frac{\partial w}{\partial y_n} \right] (y) dy d\xi \\
&= \frac{1}{(2\pi)^n} \int e^{i\langle x, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} \cdot \frac{1}{2} \int e^{i\langle -y, \xi \rangle} \left(\frac{\partial w}{\partial y_{n-1}} \right) (y) dy d\xi + \\
&\quad + \frac{1}{(2\pi)^n} \int e^{i\langle x, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} \cdot \frac{i}{2} \int e^{i\langle -y, \xi \rangle} \left(\frac{\partial w}{\partial y_n} \right) (y) dy d\xi
\end{aligned}$$

Não obstante,

$$\begin{aligned}
\int e^{i\langle -y, \xi \rangle} \left(\frac{\partial w}{\partial y_{n-1}}(y) \right) dy &= i\xi_{n-1} \int e^{i\langle -y, \xi \rangle} w(y) dy \quad \text{e} \\
\int e^{i\langle -y, \xi \rangle} \left(\frac{\partial w}{\partial y_n}(y) \right) dy &= i\xi_n \int e^{i\langle -y, \xi \rangle} w(y) dy.
\end{aligned}$$

Logo,

$$Q\left(\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}\right)(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \int \left[e^{i\langle x-y, \xi \rangle} (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} w(y) \right] \cdot \frac{1}{2} [i\xi_{n-1} - \xi_n] dy d\xi. \quad (5.12)$$

Por extensão, a igualdade também segue para v , como queríamos provar. $\square$

Proposição 15. Para todo x e todo $0 < \rho < 1$, $Q \in \Psi_{(\rho, 1-\rho)}^t$ em uma vizinhança de x se $h(x'') < t$, com $x'' = (x_{n-1}, x_n)$.

Demonstração. Nosso ponto de partida é obter a estimativa sem qualquer derivada.

$$Q(x, \xi) = (1 + |\xi|^2)^{\frac{F(z)}{2}} = \exp \left[\frac{F(z)}{2} \log (1 + |\xi|^2) \right].$$

Assim,

$$|Q(x, \xi)| = \left| \exp \left[\frac{F(z)}{2} \log (1 + |\xi|^2) \right] \right| = \exp \left[\frac{h(z)}{2} \log (1 + |\xi|^2) \right] = (1 + |\xi|^2)^{\frac{h(z)}{2}} < (1 + |\xi|^2)^{\frac{t}{2}}$$

e consequentemente

$$|Q(x, \xi)| \leq C (1 + |\xi|)^t. \quad (5.13)$$

Vejamos o que acontece quando derivamos em ξ :

$$\partial_{\xi_j} Q(x, \xi) = Q(x, \xi) \left[\frac{F(z)}{2} \cdot \frac{2\xi_j}{1 + |\xi|^2} \right] \implies |\partial_{\xi_j} Q(x, \xi)| \leq C (1 + |\xi|)^{t-1}.$$

Generalizemos este resultado: afirmamos que $\left| D_\xi^\alpha Q(x, \xi) \right| \leq C(1 + |\xi|)^{t-|\alpha|}$, $\forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^n$.

Provaremos por indução em $|\alpha|$. Já demonstramos o caso em que $|\alpha| = 0$ e supomos verdadeiro para $|\alpha| \leq j$. Se $|\alpha| = j + 1$,

$$\begin{aligned} \partial_\xi^\alpha Q(x, \xi) &= \partial_\xi^\beta \partial_{\xi_i} (Q(x, \xi)) = F(z) \cdot \partial_\xi^\beta \left[Q(x, \xi) \left(\frac{\xi_i}{1 + |\xi|^2} \right) \right] \\ &= F(z) \cdot \sum_{\gamma \leq \beta} \binom{\beta}{\gamma} \partial_\xi^{\beta-\gamma} (Q(x, \xi)) \cdot \partial_\xi^\gamma \left(\frac{\xi_i}{1 + |\xi|^2} \right). \end{aligned}$$

Note que $p_1(\xi) = 1 + |\xi|^2 \in S_{(1,0)}^2 \implies p_2(\xi) = \frac{\xi_i}{1 + |\xi|^2} \in S_{(1,0)}^{-1}$. Portanto,

$$\begin{aligned} |\partial_\xi^\alpha Q(x, \xi)| &\leq C_1 \sum_{\gamma \leq \beta} \binom{\beta}{\gamma} \left| \partial_\xi^{\beta-\gamma} (Q(x, \xi)) \right| \cdot \left| \partial_\xi^\gamma \left(\frac{\xi_i}{1 + |\xi|^2} \right) \right| \\ &\leq C_1 \sum_{\gamma \leq \beta} \binom{\beta}{\gamma} C_2 (1 + |\xi|)^{t-|\beta|+|\gamma|} \cdot C_3 (1 + |\xi|)^{-1-|\gamma|} \\ &\leq C (1 + |\xi|)^{t-1-|\beta|} \\ &\leq C (1 + |\xi|)^{t-|\alpha|}. \end{aligned}$$

O próximo passo é verificar o comportamento de $D_x^\beta Q(x, \xi)$:

$$\partial_{x_j} Q(x, \xi) = \log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \cdot \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_j}(x)$$

$$\partial_{x_k} \partial_{x_j} Q(x, \xi) = \log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \cdot \left[\frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_k}(x) + \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_j}(x) \cdot \frac{\partial F}{\partial x_k}(x) \log(1 + |\xi|^2) \right].$$

Para seguir com a prova da Proposição 15, nos utilizaremos do lema a seguir:

Lema 4. Para $\beta \neq 0$, $\partial_x^\beta Q(x, \xi) = \log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \left[\sum_{j=0}^{|\beta|-1} G_{\beta,j}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^j \right]$, onde cada $G_{\beta,j}$ é uma função de classe C^∞ .

Demonstração. Provaremos por indução em $|\beta| = n$. Os casos $n = 1, 2$ são exibidos logo acima. Consideramos então que vale para $n = p$, e provaremos que vale para $n = p + 1$.

$$\begin{aligned}
\partial_x^\beta Q(x, \xi) &= \partial_{x_k} \partial_x^\gamma (Q(x, \xi)) = \\
&= \partial_{x_k} \left[\log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\gamma|-1} G_{\gamma,j}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^j \right) \right] = \\
&= \left[\log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\gamma|-1} \frac{\partial G_{\gamma,j}}{\partial x_k}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^j \right) \right] + \\
&+ \left[\log(1 + |\xi|^2) \cdot \left(\log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \cdot \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_k}(x) \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\gamma|-1} G_{\gamma,j}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^j \right) \right].
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\partial_x^\beta Q(x, \xi) &= \log(1 + |\xi|^2) Q(x, \xi) \left\{ \sum_{j=1}^{|\gamma|-1} \left[\left(\frac{\partial G_{\gamma,j}}{\partial x_k}(x) + \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_k}(x) \cdot G_{\gamma,(j-1)}(x) \right) (\log(1 + |\xi|^2))^j \right] \right\} + \\
&+ \log(1 + |\xi|^2) Q(x, \xi) \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_k}(x) \cdot G_{\gamma, (|\gamma|-1)}(x) \cdot (\log(1 + |\xi|^2))^{|\gamma|} \right) + \\
&+ \log(1 + |\xi|^2) Q(x, \xi) \cdot \left(\frac{\partial G_{\gamma,0}}{\partial x_k}(x) \right).
\end{aligned}$$

Se $G_{\beta,0} \doteq \frac{\partial G_{\gamma,0}}{\partial x_k}$, $G_{(\beta,|\beta|-1)} \doteq \left(\frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_k} \cdot G_{\gamma, (|\gamma|-1)} \right)$ e $G_{\beta,j} \doteq \left(\frac{\partial G_{\gamma,j}}{\partial x_k} + \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_k} \cdot G_{\gamma,(j-1)} \right)$ para $1 \leq j \leq |\beta| - 2$, concluímos a prova. $\square$

Estamos preparados para estimar $D_x^\beta D_\xi^\alpha Q(x, \xi)$. Com tal finalidade, temos de estudar a função $\varphi(\xi) \doteq \log(1 + |\xi|^2)$. Da regra de L'Hospital, segue que

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \frac{(\varphi(\xi))^r}{|\xi|^a} = 0, \quad \forall a > 0, \quad \forall r \in \mathbb{N}. \quad (5.14)$$

Derivando em ξ apenas uma vez, decorre que $\partial_{\xi_j} \varphi(\xi) = \frac{\xi_j}{1 + |\xi|^2}$, que já temos ciência de pertencer a $S_{(1,0)}^{-1}$. Destas afirmações inferimos que

$$\varphi(\xi) \in S_{(1,0)}^a, \quad \forall a > 0. \quad (5.15)$$

Outro ponto a ser observado é que (5.15) também vale claramente para potências naturais de $\varphi(\xi)$. Assim, se $|\beta| \geq 1$,

$$\begin{aligned}
\partial_x^\beta \partial_\xi^\alpha Q(x, \xi) &= \partial_\xi^\alpha \left[\log(1 + |\xi|^2) \cdot Q(x, \xi) \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\beta|-1} G_{\beta,j}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^j \right) \right] \\
&= \partial_\xi^\alpha \left[Q(x, \xi) \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\beta|-1} G_{\beta,j}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^{j+1} \right) \right] \\
&= \sum_{\lambda \leq \alpha} \binom{\alpha}{\lambda} (\partial_\xi^\lambda Q(x, \xi)) \cdot \partial_\xi^{\alpha-\lambda} \left(\sum_{j=0}^{|\beta|-1} G_{\beta,j}(x) (\log(1 + |\xi|^2))^{j+1} \right) \\
&= \sum_{\lambda \leq \alpha} \binom{\alpha}{\lambda} (\partial_\xi^\lambda Q(x, \xi)) \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\beta|-1} G_{\beta,j}(x) \cdot \partial_\xi^{\alpha-\lambda} [(\log(1 + |\xi|^2))^{j+1}] \right).
\end{aligned}$$

Consequentemente, fixando $K \subset M$ compacto, $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$ e $a > 0$:

$$\begin{aligned}
|\partial_x^\beta \partial_\xi^\alpha Q(x, \xi)| &\leq \sum_{\lambda \leq \alpha} \binom{\alpha}{\lambda} |\partial_\xi^\lambda Q(x, \xi)| \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\beta|-1} |G_{\beta,j}(x)| \cdot \left| \partial_\xi^{\alpha-\lambda} [(\log(1 + |\xi|^2))^{j+1}] \right| \right) \\
&\leq \sum_{\lambda \leq \alpha} \binom{\alpha}{\lambda} C_\lambda (1 + |\xi|)^{t-|\lambda|} \cdot \left(\sum_{j=0}^{|\beta|-1} C_{\beta,j} \cdot C_{\alpha-\lambda,j} \cdot (1 + |\xi|)^{a-|\alpha|+|\lambda|} \right) \\
&\leq C \cdot (1 + |\xi|)^{t+a-|\alpha|} \\
&\leq C \cdot (1 + |\xi|)^{t+a-\rho \cdot |\alpha|}, \quad 0 < \rho < 1.
\end{aligned}$$

Selecionando $a = (1 - \rho)|\beta|$, alcançamos êxito na estimativa desejada para $|\beta| \geq 1$. Por já haver mostrado que ela também é válida no caso nulo, encerramos a prova da Proposição 15. $\square$

Voltemos à demonstração do Teorema 11. Associando a Proposição 15 (para $\rho > 1/2$) com a Proposição 13, obtemos que $Qg \in H_{\text{loc}}^0 \Rightarrow Qg \in L_{\text{loc}}^2$. Se $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é identicamente 1 em uma vizinhança de $\text{supp } v$, escrevemos $w \doteq \chi Qv$ e

$$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial \chi}{\partial \bar{z}} Qv + \chi \frac{\partial(Qv)}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial \chi}{\partial \bar{z}} Qv + \chi Qg,$$

utilizando a Proposição 14. Mas Q é pseudolocal, isto é,

$$\text{supp } \text{sing}(Qv) \subset \text{supp } \text{sing}(v).$$

Por $\frac{\partial \chi}{\partial \bar{z}}$ se anular no suporte de v , deduzimos que $\frac{\partial \chi}{\partial \bar{z}} Qv \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, e particularmente em L^2 . Logo $\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} \in L^2$, dado que χQg também é L^2 .

Afirmamos que $w \in L^2$; reiteramos que w é uma distribuição cujo suporte é compacto, e recorremos ao Teorema 1. Se $P(D) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ e $P(D)w \in L^2$, isto nos diz que $P(D)w \in B_{2,k}$ com $k \equiv 1$. Assim $w \in B_{2,\tilde{P}}$, com $\tilde{P}(\xi) = \sqrt{2 + \xi_{n-1}^2 + \xi_n^2}$. Como consequência,

$$\frac{1}{(2\pi)^n} \int (2 + \xi_{n-1}^2 + \xi_n^2) |\mathcal{F}(w)(\xi)|^2 d\xi < \infty \Rightarrow \mathcal{F}(w) \in L^2 \Rightarrow w \in L^2,$$

pelo Teorema de Plancherel.

Escrevemos assim $Qv = \chi Qv + (1 - \chi)Qv = \underbrace{w}_{\in L^2} + \underbrace{(1 - \chi)Qv}_{\in C^\infty}$, o que comprova que $Qv \in L_{\text{loc}}^2$.

Proposição 16. $v \in H^\tau$ em uma vizinhança de x sempre que $\tau < h(x'')$.

Demonstração. Seja $\tilde{Q}$ o operador pseudo-diferencial cujo símbolo é

$$\tilde{Q}(x, \xi) = (1 + \xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2)^{\frac{-F(z)}{2}} = (1 + |\xi|^2)^{\frac{-F(z)}{2}}. \quad (5.16)$$

Com argumentos análogos aos que foram feitos na Proposição 15, temos para todo x e todo $0 < \rho < 1$, $\tilde{Q} \in \Psi_{(\rho, 1-\rho)}^\sigma$ em uma vizinhança de x se $\sigma > -h(x'')$. Estudemos então a composição $\tilde{Q} \circ Q$; denominando por $q(x, \xi)$ seu símbolo,

$$\begin{aligned} q(x, \xi) &\approx \sum_{|\alpha| \geq 0} \frac{1}{\alpha!} \left(\partial_\xi^\alpha \tilde{Q}(x, \xi) \right) \cdot (D_x^\alpha Q(x, \xi)) \\ &\approx 1 + \sum_{|\alpha| \geq 1} \frac{1}{\alpha!} \left(\partial_\xi^\alpha \tilde{Q}(x, \xi) \right) \cdot (D_x^\alpha Q(x, \xi)). \end{aligned}$$

Lema 5. Dado $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, $\frac{1}{\alpha!} \left(\partial_\xi^\alpha \tilde{Q}(x, \xi) \right) \cdot (D_x^\alpha Q(x, \xi))$ pertence a $S_{(1,0)}^{a-|\alpha|}$, para cada $a > 0$.

Demonstração. Provaremos o resultado através da seguinte indução em $n = |\alpha|$: dado $a > 0$,

- $D_x^\alpha Q(x, \xi) = \underbrace{G_\alpha(x, \xi)}_{\in S_{(1,0)}^{a/2}} \cdot \exp \left[\frac{F(z)}{2} \log(1 + |\xi|^2) \right]$
- $\partial_\xi^\alpha \tilde{Q}(x, \xi) = \underbrace{H_\alpha(x, \xi)}_{\in S_{(1,0)}^{a/2-|\alpha|}} \cdot \exp \left[\frac{-F(z)}{2} \log(1 + |\xi|^2) \right]$

Quando $n = 0$, $G_\alpha(x, \xi) = H_\alpha(x, \xi) \equiv 1$ que é um elemento de $S_{(1,0)}^0$. Suponha a afirmação verdadeira para $n = k$. Se $|\alpha| = k + 1$ e $b > 0$,

$$\begin{aligned}
D_x^\alpha Q(x, \xi) &= D_x^{e_j} D_x^\beta Q(x, \xi) \\
&= D_x^{e_j} \left[G_\beta(x, \xi) \cdot e^{\left(\frac{F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)} \right] \\
&= D_x^{e_j} G_\beta(x, \xi) \cdot e^{\left(\frac{F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)} + G_\beta(x, \xi) \cdot D_x^{e_j} \left[e^{\left(\frac{F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)} \right] \\
&= \left[\underbrace{D_x^{e_j} (G_\beta(x, \xi))}_{\in S_{(1,0)}^{b/2}} + \underbrace{G_\beta(x, \xi)}_{\in S_{(1,0)}^{b/2}} \cdot \underbrace{D_x^{e_j} \left(\frac{F(z)}{2} \right) \cdot \log(1+|\xi|^2)}_{\in S_{(1,0)}^{b/2}} \right] \cdot e^{\left(\frac{F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)}.
\end{aligned}$$

Assim, $G_\alpha(x, \xi) = \left[D_x^{e_j} (G_\beta(x, \xi)) + G_\beta(x, \xi) \cdot D_x^{e_j} \left(\frac{F(z)}{2} \right) \cdot \log(1+|\xi|^2) \right] \in S_{(1,0)}^b$. Analogamente,

$$\begin{aligned}
\partial_\xi^\alpha \tilde{Q}(x, \xi) &= \partial_\xi^{e_j} \partial_\xi^\beta \tilde{Q}(x, \xi) \\
&= \partial_\xi^{e_j} \left[H_\beta(x, \xi) \cdot e^{\left(\frac{-F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)} \right] \\
&= \partial_\xi^{e_j} H_\beta(x, \xi) \cdot e^{\left(\frac{-F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)} + H_\beta(x, \xi) \cdot \partial_\xi^{e_j} \left[e^{\left(\frac{-F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)} \right] \\
&= \left[\underbrace{\partial_\xi^{e_j} (H_\beta(x, \xi))}_{\in S_{(1,0)}^{b/2-|\beta|-1}} + \underbrace{H_\beta(x, \xi)}_{\in S_{(1,0)}^{b/2-|\beta|}} \cdot \underbrace{\left(\frac{-F(z)}{2} \right) \cdot \partial_\xi^{e_j} (\log(1+|\xi|^2))}_{\in S_{(1,0)}^{b/2-1}} \right] e^{\left(\frac{-F(z)}{2} \log(1+|\xi|^2)\right)}.
\end{aligned}$$

Portanto, $H_\alpha(x, \xi) = \left[\partial_\xi^{e_j} (H_\beta(x, \xi)) + H_\beta(x, \xi) \cdot \left(\frac{-F(z)}{2} \right) \cdot \partial_\xi^{e_j} \log(1+|\xi|^2) \right] \in S_{(1,0)}^{b-|\alpha|}$.

Finalizamos a indução se estabelecemos $b = a/2$. Para provar o Lema, basta checar que

$$\frac{1}{\alpha!} \left(\partial_\xi^\alpha \tilde{Q}(x, \xi) \right) \cdot (D_x^\alpha Q(x, \xi)) = \frac{1}{\alpha!} G_\alpha(x, \xi) \cdot H_\alpha(x, \xi).$$

□

Retornamos à prova da Proposição 16. Pelo Lema 5, podemos escrever

$$\tilde{Q} \circ Q = I + P, \tag{5.17}$$

onde I é a identidade e $P \in \Psi_{(1,0)}^{-1/2}$. Fixe agora $\tau < h(x'')$.

Repare que $\tilde{Q} \in \Psi_{(\rho, 1-\rho)}^{-\tau}$ e v tem suporte compacto. Assim, existe $s \in \mathbb{R}$ de modo que $v \in H^s$.

Como $Qv \in L^2_{\text{loc}}$, por continuidade obtemos que $\tilde{Q}Qv \in H^{\tau}_{\text{loc}}$. Recorrendo a (5.17),

$$v = \underbrace{\tilde{Q}Qv}_{\in H^{\tau}_{\text{loc}}} - \underbrace{Pv}_{\in H^{s+1/2}_{\text{loc}}} . \quad (5.18)$$

Se $s + \frac{1}{2} < \tau$, então $v \in H^{s+1/2}$. Repetimos o processo até o momento em que $s + \frac{1}{2}$ for maior do que τ . Deduzimos por fim que $v \in H^{\tau}$, o que completa a prova da Proposição 16. □

Finalmente, estamos prontos para concluir a demonstração do Teorema 11. Para isto, baste verificar que a proposição acima comprova que $s_u(0, z) \geq h(z)$ quando $|z| \leq r$. □

Observação I: Se $a \in C^{\infty}(M)$ e $(L + a)u = f$, a mesma conclusão do Teorema 11 é válida. De fato, a afirmação é local e se b é função suave tal que $Lb = a$ em uma vizinhança, podemos utilizar o resultado com $v = e^b u$ e $g = e^b f$. Afinal,

$$L(v) = e^b \cdot L(u) + L(e^b) \cdot u = e^b (L(u) + uL(b)) = e^b (L + a)u = f e^b = g$$

e a regularidade de u, v e f, g são as mesmas para todo ponto.

Observação II: Quando f é C^{∞} , podemos tomar $s \equiv +\infty$ e consequentemente s_u é superharmônica.

5.2 Propagação de Singularidades e de Suportes nas Folhas

Nas duas proposições a seguir, a é um elemento de $C^{\infty}(M)$.

Proposição 17. *Seja $u \in \mathcal{D}'(M)$ e $(L + a)u = f$. Então $(\text{sing supp } u) \cap \mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$ é invariante sob a L -folheação em $\mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$. Isto é, se $x \in (\text{sing supp } u) \cap \mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$, a componente conexa da folha que passa por x em $\mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$ está contida em $\text{sing supp } u$.*

Demonstração. Inicialmente, recordamos o seguinte fato: em um aberto conexo, se f é uma função subharmônica e não é identicamente igual $+\infty$, o conjunto $\{y; f(y) = +\infty\}$ possui medida nula.

Sejam $x \in \text{sing supp } u \cap \mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$, $\mathcal{L}_x$ a folha da L -folheação que passa por x e C_x a componente conexa de $\mathcal{L}_x \cap \mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$ que contém x . Como $\mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$ é aberto, os conjuntos $\mathcal{L}_x \cap \mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$ e C_x são abertos de $\mathcal{L}_x$.

Definindo $M_1 = \mathfrak{L}(\text{sing supp } f)$, segue que $f|_{M_1} \in C^{\infty}(M_1)$. Pelo Teorema 11, s_u é uma função superharmônica em C_x . Suponha, por contradição, existir $y_0 \in \mathfrak{L}(\text{sing supp } u)$ pertencente a C_x . Teríamos assim um aberto U em C_x tal que $s_u(y) = \infty$ para todo $y \in U$, o que contradiz o fato de que $s_u(x) \neq \infty$. □

Proposição 18. *Seja $u \in \mathcal{D}'(M)$ e $(L + a)u = f$. Então $\text{supp } u \cap \mathfrak{L}(\text{supp } f)$ é invariante sob a L -folheação em $\mathfrak{L}(\text{supp } f)$.*

Demonstração. Sejam $x \in \text{supp } u \cap \mathcal{C}(\text{supp } f)$, $\mathcal{F}_x$ a folha da L -folheação que passa por x e C_x a componente conexa de $\mathcal{F}_x \cap \mathcal{C}(\text{supp } f)$ que contém x .

Considere, por contradição, a existência de $w \in C_x$ tal que $w \in \mathcal{C}(\text{supp } u)$; inferimos da Proposição 17 que $s_u = \infty$ em C_x , e portanto u é uma função em um aberto $\mathcal{U} \subset M$ que contém C_x .

Seja b uma solução local de $Lb = a$. Como já argumentado anteriormente, $L(e^b u) = e^b f$. Assim, fixado $y \in C_x$, existe uma vizinhança $\mathcal{V} \ni y$ de M de maneira que $\frac{\partial e^b u}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ em $\mathcal{V}$. Ou seja, $e^b u|_{\mathcal{V} \cap C_x}$ é holomorfa.

Quando y pertence ao suporte de u , deduzimos por continuação analítica que $\mathcal{V} \cap C_x \subset \text{supp } u$, já que $\text{supp } e^b u = \text{supp } u$. Isto é, $C_x \cap \text{supp } u$ é um conjunto aberto e fechado. Temos deste modo um absurdo, visto que $x \in \text{supp } u$, $w \in \mathcal{C}(\text{supp } u)$ e C_x é conexo. Portanto $C_x \subset \text{supp } u$. □

Uma consequência imediata da Proposição 17 é o caso em que $f \in C^\infty(M)$. Em tal situação, $\mathcal{C}_{\text{sing}} \text{supp } f = M$ e $C_x = \mathcal{F}_x$, pois toda folha é um conjunto conexo. Analogamente, se $f = 0$ e $x \in \text{supp } u$, inferimos da Proposição 18 que $\mathcal{F}_x$ está inteiramente contida em $\text{supp } u$.

Capítulo 6

A Topologia em $C^\infty(M)$

Após mostrar que L é sempre um operador "*resolúvel em cada ponto de M* ", nossos próximos passos serão estudar a resolubilidade do campo em subconjuntos compactos e finalmente na variedade toda.

Para tal objetivo, existe a necessidade de se impor uma topologia no conjunto das funções $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ . A questão de analisar quando o campo é globalmente resolúvel no caso suave, por exemplo, passa por verificar a sobrejetividade do operador linear $L : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$.

Com um enorme arsenal de resultados da Análise Funcional em nossas mãos para os mais diversos tipos de espaços de funções, colocar uma topologia adequada em $C^\infty(M)$ facilitará imensamente nosso trabalho. Seguimos para a construção.

Tome uma sequência g_j de funções em $C^\infty(M)$ cujo suporte é compacto, de maneira que:

- Para cada $j \in \mathbb{Z}^+$, temos: $\text{supp } g_j \subset \Omega_{j+1}$
- $\Omega_0 \subset \Omega_1 \subset \dots \subset \Omega_n \subset \dots \nearrow M$,

onde $\Omega_j \doteq \text{int } \{x \in M; g_j(x) = 1\}$.

A topologia de $C^\infty(M)$ será dada então pela seguinte família de seminormas:

$$f \mapsto \|g_k f\|_k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}^+; \quad (6.1)$$

onde $\|\cdot\|_k$ é a norma de Sobolev de ordem k . Para calcular a norma acima, escolhemos um conjunto finito de cartas (φ_{ij}, U_{ij}) , $i = 1, \dots, m$ tal que $\text{supp } g_j \subset \bigcup_{i=1}^m U_{ij}$ e tomamos uma partição da unidade χ_{ij} subordinada à cobertura. Portanto

$$\|g_j f\|_k \doteq \sum_{i=1}^m \left\| (\chi_{ij} \cdot g_j f) \circ \varphi_{ij}^{-1} \right\|_j \quad (6.2)$$

Supondo outro conjunto de cartas (ψ_{lj}, V_{lj}) , $l = 1, \dots, q$ tal que $\text{supp } g_j \subset \bigcup_{l=1}^q V_{lj}$ e uma partição da unidade μ_{lj} subordinada, afirmamos que a norma analogamente construída, que denominaremos $\|\cdot\|'_j$, é equivalente à primeira.

De fato,

$$\begin{aligned}
\|g_j f\|'_j &= \sum_{l=1}^q \left\| (\mu_{lj} \cdot g_j f) \circ \psi_{lj}^{-1} \right\|_j \\
&= \sum_{l=1}^q \left\| \sum_{i=1}^m (\chi_{ij} \cdot \mu_{lj} \cdot g_j f) \circ \psi_{lj}^{-1} \right\|_j \\
&\leq \sum_{l=1}^q \sum_{i=1}^m \left\| (\chi_{ij} \cdot \mu_{lj} \cdot g_j f) \circ \psi_{lj}^{-1} \right\|_j \\
&\leq \sum_{i=1}^m \sum_{l=1}^q C_{il} \left\| (\chi_{ij} \cdot \mu_{lj} \cdot g_j f) \circ \varphi_{ij}^{-1} \right\|_j \\
&\leq \sum_{i=1}^m \sum_{l=1}^q C_{il} \left\| (\chi_{ij} \cdot g_j f) \circ \varphi_{ij}^{-1} \right\|_j \\
&\leq C_1 \sum_{i=1}^m \left\| (\chi_{ij} \cdot g_j f) \circ \varphi_{ij}^{-1} \right\|_j \\
&\leq C_1 \|g_j f\|_j.
\end{aligned}$$

Por um processo semelhante, exibimos a existência de $C_2 > 0$ tal que $\|g_j f\|_j \leq C_2 \|g_j f\|'_j$, o que nos permite verificar que as normas são equivalentes. Assim, a topologia dada é bem definida.

Teorema 12. *Com a topologia dada acima, $C^\infty(M)$ é um espaço de Fréchet. Isto é, um espaço vetorial topológico localmente convexo, metrizável e completo.*

Demonstração. A fim de provar a afirmação, temos de encontrar uma norma que gere a mesma topologia e mostrar que o espaço é completo com esta. Definimos

$$\|f\|_* \doteq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \left(\frac{\|g_k f\|_k}{1 + \|g_k f\|_k} \right). \quad (6.3)$$

Precisamos somente verificar que $C^\infty(M)$ é completo com relação a métrica induzida, visto que as outras propriedades desejadas decorrem trivialmente da escolha de $\|\cdot\|_*$. Note bem: f_n é uma sequência de Cauchy com relação a $\|\cdot\|_*$ se e somente se é de Cauchy com relação a toda seminorma $\|g_k \cdot\|_k$.

De fato, dado $\varepsilon > 0$, suponha existir n_0 tal que $\|f_m - f_n\|_* < \varepsilon$, $\forall m, n \geq n_0$. Repare que

$$\left(\frac{\|g_k(f_m - f_n)\|_k}{1 + \|g_k(f_m - f_n)\|_k} \right) = 1 - \left(\frac{1}{1 + \|g_k(f_m - f_n)\|_k} \right) \leq 2^k \cdot \|f_m - f_n\|_* < 2^k \cdot \varepsilon.$$

Consequentemente,

$$1 - 2^k \varepsilon < \left(\frac{1}{1 + \|g_k(f_m - f_n)\|_k} \right).$$

Quando $\varepsilon < 2^{-(k+1)}$, obtemos

$$1 + \|g_k(f_m - f_n)\|_k < \frac{1}{1 - 2^k \varepsilon},$$

o que nos permite concluir que

$$\|g_k(f_m - f_n)\|_k < \frac{2^k \varepsilon}{1 - 2^k \varepsilon} < 2^{k+1} \varepsilon. \quad (6.4)$$

Ou seja, f_n é sequência de Cauchy com relação a $\|g_k \cdot\|_k$, para qualquer $k \in \mathbb{Z}^+$.

Em contrapartida, se g_n é uma sequência de Cauchy para cada norma $\|g_k \cdot\|_k$, fixado $\varepsilon > 0$, existem $n_0, m_0 \in \mathbb{N}$ de modo que

$$\sum_{k=m_0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \left(\frac{\|g_k(f_m - f_n)\|_k}{1 + \|g_k f\|_k} \right) < \sum_{k=m_0}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \sum_{k=0}^{m_0-1} \frac{1}{2^k} \cdot \left(\frac{\|g_k(f_m - f_n)\|_k}{1 + \|g_k f\|_k} \right) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{se } m, n \geq n_0. \quad (6.5)$$

E assim deduzimos que g_n é Cauchy em relação à norma $\|\cdot\|_*$.

Para finalizar, seja h_n uma sequência de Cauchy para $\|\cdot\|_*$. Pelo que provamos acima, fixado $x_0 \in M$, existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $g_k = 1$ em uma vizinhança coordenada $\mathcal{V}$ de x_0 para todo $k \geq j$. Decorre disto que $\partial^\alpha f_n$ é de Cauchy em $\mathcal{V}$ para qualquer $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$ e portanto f_n converge para f , função de classe C^∞ em $\mathcal{V}$.

Através da arbitrariedade de x_0 , deduzimos que $f_n \rightarrow f$ em $C^\infty(M)$, tal qual desejávamos. $\square$

Verificar que $C^\infty(M)$ é espaço de Fréchet é importante para nossas pretensões, porém ainda não suficiente. Para continuar progredindo, trazemos duas novas definições:

Definição 10. Um espaço E de Fréchet é chamado **Fréchet-Montel** se todo subconjunto fechado e limitado de E é compacto.

Seja F um espaço de Fréchet, com topologia dada por uma família crescente de seminormas p_n . Isto é, $p_n(x) \leq p_{n+1}(x)$, $\forall x \in F, n \in \mathbb{Z}^+$.

Definição 11. Diremos que F é **Fréchet-Schwartz** se dados $\varepsilon > 0$ e n natural, a n -bola unitária $V_n = \{x \in F; p_n(x) < 1\}$ pode ser coberta com um número finito de $(n-1)$ -bolas de raio ε .

Uma outra topologia usualmente imposta no espaço das funções suaves é dada do seguinte modo: fixamos uma sequência crescente de compactos K_n que exaure a variedade e escolhemos a subsequente família de seminormas:

$$\kappa_n(\psi) = \sup_{j; U_j \cap K_n \neq \emptyset} \sup_{x \in U_j \cap K_n} \sum_{|\beta| \leq n} |D^\beta \psi|, \quad (6.6)$$

onde os conjuntos U_i são abertos coordenados que cobrem M .

Na parte 6 do artigo [AV65], os autores provam que $C^\infty(M)$ é Fréchet-Schwartz com a topologia descrita logo acima. Extraímos ainda do mesmo trabalho as seguintes afirmações:

Proposição 19. Seja E um espaço de Fréchet-Schwartz. Então:

- E é Fréchet-Montel.
- Se N é subespaço fechado de E , tanto N como E/N serão Fréchet-Schwartz com respeito à topologia naturalmente induzida em ambos os casos.

Seja F_1 o espaço de Fréchet do conjunto $C^\infty(M)$ com a topologia definida no início da seção. Considere F_2 o espaço dado pelo mesmo conjunto com a topologia imposta em [AV65].

Proposição 20. F_1 e F_2 são isomorfos como espaços de Fréchet.

Demonstração. Definimos a identidade $I : F_1 \rightarrow F_2$. Como ambos espaços são Fréchet, existe um teorema da aplicação aberta (Teorema 17.1 de [Trè67b]). Mas a função é trivialmente sobrejetora, sendo assim suficiente verificar que I é contínua.

Fixamos $r_0 \in \mathbb{Z}^+$. Sem perda de generalidade, podemos escolher K_n em 6.6 como $\overline{\Omega_n}$. Decorre disto que

$$C_{r_0} \cdot \|g_{r_0} f\|_{r_0} \leq \kappa_{r_0}(f). \quad (6.7)$$

Em contra partida, pelo Teorema do Mergulho de Sobolev, encontramos s_0 suficientemente grande tal que

$$\kappa_{r_0}(f) = \kappa_{r_0}(g_{r_0} f) \leq C_{s_0} \cdot \|g_{r_0} f\|_{s_0} \leq C_{s_0} \cdot \|g_{s_0} f\|_{s_0}, \quad (6.8)$$

o que completa a prova. $\square$

De agora em diante, iremos nos referir a $C^\infty(M)$ como o espaço de Fréchet-Schwartz (e consequentemente Montel) dado pelas seminormas como em (6.1). Seu dual forte será denotado por $\mathcal{E}'(M)$, podendo ser visto como o espaço das distribuições cujo suporte é compacto.

Retornamos novamente a [AV65]: denotando por p_n a seminorma $f \mapsto \|g_n f\|_n$, definimos

$$N_n = \{g \in C^\infty(M); p_n(g) = 0\}, \quad (6.9)$$

isto é, o núcleo de p_n . Tomando o quociente $\Delta_n \doteq \frac{C^\infty(M)}{N_n}$, é fácil notar que

$$\begin{aligned} P_n : \Delta_n &\rightarrow \mathbb{R} \\ g &\rightarrow p_n(g) \end{aligned}$$

é uma norma neste espaço. Denominaremos por F_n o espaço de Banach dado pelo completamento de Δ_n com a norma P_n .

Um resultado provado no artigo é de que existem aplicações $\alpha_{n+1} : F_{n+1} \mapsto F_n$ compactas com imagem densa, de modo que $C^\infty(M) \cong \varprojlim F_n$. Ou seja, é o limite projetivo desta sequência de espaços de Banach. Mais ainda, seu dual pode ser descrito como o limite indutivo abaixo:

$$\mathcal{E}'(M) = \varinjlim F'_n, \quad (6.10)$$

onde as aplicações $\alpha'_n : F'_n \mapsto F'_{n+1}$ são compactas e injetoras.

Apesar de interessante do ponto de vista teórico, esta caracterização do dual forte de $C^\infty(M)$ obtida por Andreotti e Vesentini ainda se mostra difícil de trabalhar, pela dificuldade em obter uma boa caracterização dos espaços F'_n .

Por outro lado, se tomamos uma exaustão crescente por compactos K_n , temos ciência de que como conjuntos

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} F'_n = \mathcal{E}'(M) = \bigcup_{n=0}^{\infty} H^{-n}(K_n). \quad (6.11)$$

Observe também que as inclusões $I_n : H^{-n}(K_n) \hookrightarrow H^{-(n+1)}(K_{n+1})$ são injetoras e compactas, pelo Teorema de Rellich.

Se $\mathcal{G} \doteq \varinjlim H^{-n}(K_n)$, segue do Teorema 17 de [Kom67] que $\mathcal{G}$ é um espaço DFS. Em outras palavras, um dual de um espaço Fréchet-Schwartz. Sabendo que $\mathcal{G}$ e $\mathcal{E}'(M)$ são espaços DFS e iguais como conjuntos, uma pergunta natural a se fazer é se são de fato isomorfos.

Teorema 13. $\mathcal{E}'(M) \cong \varinjlim H^{-n}(K_n)$

Demonstração. Analogamente ao que já fizemos na demonstração da Proposição 20, provaremos que a aplicação identidade

$$I : \varinjlim H^{-n}(K_n) \rightarrow \varinjlim F'_n \quad (6.12)$$

é um isomorfismo, com o conhecimento prévio de que é bijetora.

Como o Teorema da Aplicação Aberta também é válido para espaços DFS (basta associar o Corolário A.6.4 de [Mor93] com o Corolário da Proposição 17.2 de [Trè67b]), temos apenas de comprovar a continuidade de I .

A fim de mostrar que a função é contínua, basta mostrar que para todo $q \in \mathbb{Z}^+$, a aplicação restrição

$$I|_{H^{-q}(K_q)} : H^{-q}(K_q) \rightarrow \varinjlim F'_n \quad (6.13)$$

é contínua.

Ou seja, se dado $q \in \mathbb{Z}^+$, encontrarmos $r \in \mathbb{Z}^+$ de modo que $H^{-q}(K_q) \subset F'_r$ e a inclusão for contínua, concluiremos que I também o é. Lembramos que

$$F'_r = N_r^\circ = \{ \mu \in \mathcal{E}'(M); \mu(f) = 0, \forall f \in C^\infty(M) \text{ de modo que } p_r(f) = 0 \}. \quad (6.14)$$

Fixado $n_0 \in \mathbb{Z}^+$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ de forma que $K_{n_0} \subset \Omega_{j_0}$ e $n_0 \leq j_0$. Tomados $\mu \in H^{-n_0}(K_{n_0})$ e $f \in C^\infty(M)$ tal que $p_{j_0}(f) = 0$, obtemos:

$$|\langle \mu, f \rangle| = |\langle \mu, g_{j_0} f \rangle| \leq \|\mu\|_{-n_0} \cdot \|g_{j_0} f\|_{n_0} \leq \|\mu\|_{-n_0} \cdot \|g_{j_0} f\|_{j_0} = 0, \quad (6.15)$$

e logo verificamos que $H^{-n_0}(K_{n_0}) \subset F'_{j_0}$.

Finalmente, considere uma sequência $(x_n, I(x_n)) \rightarrow (x, y)$ em $H^{-n_0}(K_{n_0}) \times F'_{j_0}$. Por valer a convergência no espaço das distribuições, segue que $I(x) = y$ e portanto o gráfico da aplicação é fechado. Pelo Teorema do Gráfico Fechado segue a continuidade de I , o que encerra a prova. $\square$

Capítulo 7

Resolubilidade Semiglobal

Trataremos nesta seção da resolubilidade C^∞ do operador L em um subconjunto K , compacto arbitrário de M . Com o intuito de definir isto de forma rigorosa, precisamos introduzir os espaços $C^\infty(K)$.

Definição 12. *Dados $U \subset \mathbb{R}^m$ e $w \in U$, dizemos que $f \in C^\infty(U)$ se anula de ordem infinita em w se $\partial^\alpha(f(w)) = 0$, $\forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^m$.*

Proposição 21. *A definição 12 é invariante por difeomorfismos.*

Demonstração. Sejam U, V abertos de $\mathbb{R}^m$, $f \in C^\infty(U)$ que se anula de ordem infinita em y_0 e $g : V \rightarrow U$ um difeomorfismo. Afirmamos que $f \circ g$ se anula de ordem infinita em $g^{-1}(y_0)$.

Escrevendo $h(x) \doteq (f \circ g)(x)$ e $g(x_0) = y_0$, é fácil notar que $h(x_0) = f(y_0) = 0$, por hipótese. Fixamos agora $\gamma \in \mathbb{Z}_+^n$ diferente de 0 e aplicamos a fórmula de Faà di Bruno (para ver uma demonstração, checar Proposição 4.3 de [BM04]):

$$\frac{1}{\gamma!} \cdot \partial^\gamma h(x_0) = \sum \frac{\alpha!}{k_1! \cdots k_l!} \cdot \left(\frac{1}{\alpha!} \cdot \partial^\alpha f(y_0) \right) \cdot \left(\frac{1}{\delta_1!} \cdot \partial^{\delta_1} g(x_0) \right)^{k_1} \cdots \left(\frac{1}{\delta_l!} \cdot \partial^{\delta_l} g(x_0) \right)^{k_l}, \quad (7.1)$$

onde $\alpha = k_1 + \dots + k_l$, a soma é tomada sobre todos os conjuntos $\{\delta_1, \dots, \delta_l\}$ com l elementos distintos de $\mathbb{N}^n \setminus \{0\}$ e todas as l -uplas ordenadas $(k_1, \dots, k_l)$ pertencentes a $(\mathbb{N} \setminus \{0\})^l$, e l varia nos naturais, de modo que

$$\gamma = \sum_{i=1}^l |k_i| \delta_i.$$

Como a suposição é de que f se anula de ordem infinita em y_0 , decorre imediatamente de (7.1) que o mesmo acontece para h em x_0 . □

Definição 13. *Dada $f \in C^\infty(M)$, dizemos que a função se anula de ordem infinita em x_0 se existe carta (ϕ, U) tal que $x_0 \in U$ e $\partial^\alpha(f \circ \phi^{-1})(\phi(x_0)) = 0$, $\forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^n$.*

Proposição 22. *$E(x_0) \doteq \{f \in C^\infty(M); f \text{ se anula de ordem infinita em } x_0\}$ é fechado na topologia de $C^\infty(M)$.*

Demonstração. Como $C^\infty(M)$ é metrizável, é suficiente atestar que o conjunto é sequencialmente fechado. Considere $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E(x_0)$ uma sequência que converge para g em $C^\infty(M)$.

Segue diretamente da definição que $\partial^\beta g_n$ converge pontualmente para $\partial^\beta g$ para qualquer vizinhança coordenada relativamente compacta de x_0 e qualquer β , o que nos leva a concluir que g se anula de ordem infinita em x_0 . $\square$

Definição 14. Dado $K \subset M$ compacto, definimos $E(K) \doteq \bigcap_{x \in K} E(x)$.

Definição 15. Definimos o espaço das funções suaves em K como o seguinte quociente:

$$C^\infty(K) \doteq C^\infty(M)/E(K). \quad (7.2)$$

Daremos ao conjunto definido a topologia quociente. Já vimos na Proposição 22 que $E(K)$ é subconjunto fechado de $C^\infty(M)$; obtemos da Proposição 19 que é um espaço de Fréchet-Schwartz.

Proposição 23. O dual forte de $C^\infty(K)$, que denotaremos por $\mathcal{E}'(K)$, pode ser visto como o espaço das distribuições com suporte em K .

Demonstração. Lembramos que $\mathcal{E}'(K) = \{\mu \in \mathcal{E}'(M); \mu(f) = 0, \forall f \in C^\infty(M) \cap E(K)\}$. Dada distribuição μ em $\mathcal{E}'(K)$, decorre facilmente da definição que

$$\langle \mu, \varphi \rangle = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(M \cap \mathfrak{U}K), \quad (7.3)$$

e assim $\text{supp } \mu \subset K$.

Em contra partida, se u é uma distribuição cujo suporte está contido em K e g um elemento de $C^\infty(M) \cap E(K)$, segue do Teorema 1.5.4 de [Hör76] que

$$\langle u, g \rangle = 0,$$

o que encerra a prova. $\square$

Proposição 24. L está bem definido como operador em $C^\infty(K)$.

Demonstração. Sejam $f_1, f_2 \in C^\infty(M)$ tais que $f_1 - f_2$ se anula de ordem infinita em K . Dado $x_0 \in K$, tome um sistema de coordenadas centrado em x_0 de maneira que $L = a \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ na vizinhança do ponto.

Neste caso, fazendo uma simples conta fica claro que $L(f_1 - f_2)$ se anula de ordem infinita em x_0 , o que finaliza a prova, pela arbitrariedade de x_0 . $\square$

Portanto, dizer que L é resolúvel em K (ou $L(C^\infty(K)) = C^\infty(K)$) é equivalente a afirmar que dada $f \in C^\infty(M)$, existe $u \in C^\infty(M)$ de modo que

$$Lu - f \text{ se anula de ordem infinita em } K.$$

Encontraremos agora condições necessárias e suficientes para a resolubilidade de L em K .

Teorema 14. *Fixado $K \subset M$ compacto, as seguintes condições são equivalentes:*

1. $LC^\infty(K) = C^\infty(K)$.
2. $(L + a)C^\infty(K) = C^\infty(K)$, $\forall a \in C^\infty(K)$.
3. $LC^\infty(K)$ e $(L + \bar{\lambda})C^\infty(K)$ são densos em $C^\infty(K)$, onde $[L, \bar{L}] = \lambda L - \bar{\lambda} \bar{L}$.
4. Existe uma função $\varphi \in C^\infty(K)$ estritamente subharmônica em K .
5. Nenhuma folha da L -folheação está contida em K .

Demonstração.

1 $\Rightarrow$ 2: Dada $f \in C^\infty(K)$, queremos encontrar $u \in C^\infty(K)$ tal que $(L + a)u = f$. Tome b e w tais que $L(b) = a$ e $L(w) = e^b f$. Definindo $u \doteq e^{-b}w$, temos

$$L(w) = L(e^b u) = e^b L(u) + u \cdot L(b) e^b = e^b (L(u) + au) = e^b f \Rightarrow (L + a)u = f.$$

2 $\Rightarrow$ 3: Imediata. Basta escolher $a \equiv 0$ e $a = \bar{\lambda}$.

3 $\Rightarrow$ 4: Selecione $f \in C^\infty(K)$ de maneira que $(L + \bar{\lambda})\bar{f}$ é suficientemente próxima de 1, para que

$$\operatorname{Re} [(\bar{L} + \lambda)f] = \operatorname{Re} [(L + \bar{\lambda})\bar{f}] > \frac{1}{2} \text{ em } K.$$

Como $f \in C^\infty(K)$, existe $\psi \in C^\infty(K)$ tal que $L(\psi)$ aproxima f e $\operatorname{Re} [(\bar{L} + \lambda)L\psi] > 0$ em K . Basta então recorrer à Proposição 10, com a função $\varphi \doteq \operatorname{Re} \psi$.

4 $\Rightarrow$ 5: Demonstraremos por contradição. Suponha a afirmação 4 válida e seja $\mathcal{L}$ uma folha da L -folheação. Se $\mathcal{L} \subset K$, então $\bar{\mathcal{L}} \subset K$. Logo, $\bar{\mathcal{L}}$ é compacto e existe $y_0 \in \bar{\mathcal{L}}$ onde a função φ atinge máximo.

Afirmamos que $\bar{\mathcal{L}}$ contém cada folha que passa por algum de seus pontos; isto segue imediatamente do Teorema 2 da Seção 1 do Capítulo 3 de [CLN85]. Assim, φ possui máximo local na folha $\mathcal{L}_{y_0}$, o que contradiz o fato de φ ser estritamente subharmônica.

O restante desta seção será dedicado à prova da implicação **5 $\Rightarrow$ 1**.

5 $\Rightarrow$ 1: Iniciamos a demonstração com duas proposições. Na primeira, faremos uso do transposto do operador L , definido em relação a uma medida fixada sobre M que em um sistema de coordenadas $(x_1, \dots, x_n)$ assume a expressão $f(x) dx$, com f de classe C^∞ e positiva.

Proposição 25. *Se $v \in \mathcal{E}'(K)$ e $L^t v = 0$, então $v = 0$.*

Demonstração. Pela expansão assintótica, é possível checar que o operador diferencial $(L + L^t)$ tem ordem 0 (visto que L e L^t são operadores de ordem 1). Concluimos assim que a soma de L com o seu transposto é uma função suave e portanto $L^t = -(L + b)$, onde $b \in C^\infty(M)$.

Supondo por absurdo que $(L + b)v = 0$ e $v \neq 0$, existe $x_0 \in K$ de modo que $x_0 \in \operatorname{supp} v$. Pela Proposição 18, $\mathcal{F}_{x_0} \subset \operatorname{supp} u \subset K$, o que contradiz a hipótese.

□

Proposição 26. *Se $v \in \mathcal{E}'(K)$, $L^t v = f$ e $s_f \geq t \in \mathbb{R}$, então $s_v \geq t$.*

Demonstração. Pelo Teorema 11, como $s_f \geq t$, temos que $S = \min\{s_v, t\}$ é superharmônica. É claro que $S \equiv t$ em $\mathbb{C}K$ e que $S \leq t$. Por ser semicontínua inferiormente, assume mínimo em algum ponto $x \in K$.

Neste caso, S será constante em $\mathcal{F}_x$, que por hipótese não está contida em K . Concluimos que $S \equiv t$ em $\mathcal{F}_x$ e consequentemente em M , o que nos mostra que $s_v \geq t$. $\square$

Perceba que a Proposição 26 nos mostra que $L^t v \in H^\sigma(K)$ implica dizer que $v \in H^{\sigma-\varepsilon}(K)$, para qualquer $\varepsilon > 0$. E note que afirmar que $L(C^\infty(K)) = C^\infty(K)$ é equivalente a dizer que $L : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(K)$ é uma aplicação sobrejetora. Recorremos agora à análise funcional:

Teorema 15. *Sejam E, F espaços localmente convexos e $u : E \rightarrow F$ uma transformação linear contínua. As seguintes condições são equivalentes:*

1. $u(E)$ é densa em F .
2. u^t é uma aplicação injetora.

Demonstração. Seguem diretamente do Teorema de Hahn-Banach os seguintes resultados:

- M é um subespaço denso em F se dado $f \in F'$ que se anula em M , f se anula em F .
- Se M é um subespaço próprio e fechado de F , existe $g \in F'$ não-nulo que se anula em M .

Provemos então a ida. Suponha $u(E)$ densa em F e que $u^t(f) \equiv 0$, com $f \in F'$. Como $u^t(f) = f \circ u$, constatamos que f se anula em $u(E)$ e portanto $f \equiv 0$.

Demonstremos a volta pela contrapositiva. Se $u(E)$ não é denso em F , existe $g \in F'$ não-nulo tal que $g \equiv 0$ em $\overline{u(E)}$. Neste caso, $u^t(g) = g \circ u \equiv 0$, o que prova que u^t não é injetor. $\square$

Teorema 16. *Sejam E, F espaços Fréchet-Montel e seja $u : E \rightarrow F$ uma aplicação linear contínua, com imagem densa em F . As seguintes propriedades são equivalentes:*

- $u(E) = F$
- Para toda sequência $\{y'_n\}$ em F' , tal que $\{u^t(y'_n)\}$ é fortemente limitada, temos que $\{y'_n\}$ é fortemente limitada.

Para aplicar os resultados acima, tomamos $E = C^\infty(M)$, $F = C^\infty(K)$, $u = L$, $E' = \mathcal{E}'(M)$ e $F' = \mathcal{E}'(K)$. Combinando a Proposição 25 com o Teorema 15, concluimos que $L(C^\infty(M))$ é densa em $C^\infty(K)$, obtendo assim as hipóteses para utilizar o Teorema 16.

Seja $\{\mu_n\}$ uma sequência em $\mathcal{E}'(K)$, tal que $\{L^t(\mu_n)\}$ é uma sequência limitada. Por uma propriedade dos Espaços DFS (ver Teorema A.5.7 de [Mor93]) e aplicando o Teorema 13, existem $s, C \in \mathbb{R}$ de modo que:

$$L^t(\mu_n) \in H^s(K), \quad \|L^t(\mu_n)\|_s \leq C, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (7.4)$$

Como já vimos, podemos fixar $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeno e inferir de (7.4) que para todo n natural $\mu_n \in H^{s-\varepsilon}(K)$. Nos falta apenas uma estimativa do tipo $\|\mu_n\|_{s-\varepsilon} \leq C' \|L^t(\mu_n)\|_s$.

Definimos $E \doteq \{u \in H^{s-1}(K); L^t u \in H^s(K)\}$ e $\|\cdot\|_1 = \|\cdot\|_{H^{s-1}} + \|L^t \cdot\|_{H^s}$ uma norma neste espaço. Mostremos que E com a norma $\|\cdot\|_1$ é um espaço de Banach. Se u_n é uma sequência de Cauchy no espaço, então

$$\begin{aligned} u_n &\rightarrow u \text{ em } H^{s-1}(K) \\ L^t u_n &\rightarrow v \text{ em } H^s(K) \end{aligned}$$

Mas $L^t u_n \rightarrow L^t u$ em $\mathcal{D}'$. Assim, $L^t u = v$, o que nos mostra que o espaço é completo. Seja

$$\begin{aligned} T : E &\rightarrow H^{s-\varepsilon}(K) \\ v &\mapsto v. \end{aligned}$$

T é uma aplicação bem definida, como visto logo após a Proposição 26. Provaremos que é contínua, através Teorema do Gráfico Fechado. Suponha que

$$\begin{aligned} x_n &\rightarrow x \text{ em } E \\ T(x_n) &\rightarrow y \text{ em } H^{s-\varepsilon}(K). \end{aligned}$$

Segue assim que:

$$\begin{aligned} x_n &\rightarrow x \text{ em } H^{s-1}(K) \\ x_n &\rightarrow y \text{ em } H^{s-\varepsilon}(K). \end{aligned}$$

Pelo Teorema de Rellich, a inclusão $H^{s-\varepsilon}(K) \hookrightarrow H^{s-1}(K)$ é compacta, e portanto contínua. Então, $x = y$ e T é contínua. Ou seja,

$$\|v\|_{s-\varepsilon} \leq C_1 (\|L^t v\|_s + \|v\|_{s-1}), \quad \forall v \in E. \quad (7.5)$$

Proposição 27. *Existe $C_2 > 0$ de maneira que*

$$\|v\|_{s-\varepsilon} \leq C_2 (\|L^t v\|_s), \quad \forall v \in E. \quad (7.6)$$

Demonstração. Provaremos por redução ao absurdo. Supondo que a Proposição 27 não vale para nenhum $C_2 > 0$, segue que para cada $j \in \mathbb{N}$, existe $w_j \in E$ tal que

$$\|w_j\|_{s-\varepsilon} > j (\|L^t w_j\|_s). \quad (7.7)$$

Estabelecemos $v_j = \frac{w_j}{\|w_j\|_{s-\varepsilon}}$. Logo, $\|v_j\|_{s-\varepsilon} = 1$ para qualquer j natural e $\|L^t v_j\|_s \rightarrow 0$, por (7.7).

Como $H^{s-\varepsilon}(K)$ é um espaço reflexivo, existe uma subsequência v_{j_k} fracamente convergente. Pelo Teorema de Rellich, v_{j_k} é fortemente convergente em H^{s-1} e denominamos por v seu limite.

Neste caso, $L^t v = 0$, o que nos permite deduzir que $v = 0$. Isto é, para k suficientemente grande,

$$\|L^t v_{jk}\|_s \leq \frac{1}{4C_1}, \quad \|v_{jk}\|_{s-1} \leq \frac{1}{4C_1}. \quad (7.8)$$

Portanto, por 7.5, $\|v_{jk}\|_{s-\varepsilon} \leq \frac{1}{2}$ por 7.5, o que é contradição. Está provada a afirmação. $\square$

Estamos prontos para finalizar a prova da implicação $5 \Rightarrow 1$: associando a hipótese 7.4 com a Proposição 27 e atentando ao fato de que $\mu_n \in E$ para qualquer n , concluímos que:

$$\mu_n \in H^{s-\varepsilon}(K), \quad \|\mu_n\|_{s-\varepsilon} \leq C.C_2, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (7.9)$$

Então a sequência é limitada e aplicando o Teorema 16, atingimos finalmente o resultado desejado. $\square$

Definição 16. Dizemos que L é semiglobalmente resolúvel se $L(C^\infty(K) = C^\infty(K))$ para todo $K \subset M$ compacto.

Corolário 4. A resolubilidade semiglobal de L é equivalente ao fato de nenhuma folha da L -folheação ser relativamente compacta em M .

Demonstração. L é semiglobalmente resolúvel se e somente se nenhuma folha está contida em qualquer compacto, pelo Teorema 14. Mas isto é o mesmo que dizer que nenhuma folha é relativamente compacta em M . $\square$

Uma observação a ser feita é de que a definição de resolubilidade em compactos dada no trabalho é um pouco diferente do conceito usual. Neste, L é resolúvel em K se para cada $f \in C^\infty(M)$, existe aberto $V \supset K$ e $u \in C^\infty(M)$ tal que $Lu = f$ em V .

Capítulo 8

Resolubilidade Global

Nosso objetivo nesta seção será estudar a resolubilidade suave global de L . Em outras palavras, encontrar condições suficientes para que dada $f \in C^\infty(M)$, exista $u \in C^\infty(M)$ de forma que $Lu = f$. Com tal intuito, começamos com a definição a seguir:

Definição 17. *Seja Ω uma variedade C^∞ e P um operador diferencial em Ω . Diremos que um aberto $X \subset \Omega$ é P -convexo se para cada $K \subset X$ compacto e $s \in \mathbb{R}$, existe um compacto $K' \subset X$ tal que:*

$$\mu \in \mathcal{E}'(X), P^t \mu \in H^s(X), \text{ supp } P^t \mu \subset K \implies \text{ supp } \mu \subset K'.$$

Veremos pouco à frente que o conceito de P -convexidade está diretamente ligado à resolubilidade global de L . Antes, não obstante, enunciamos um teorema:

Teorema 17. *Sejam E, F espaços de Fréchet-Schwartz, $u : E \rightarrow F$ uma transformação linear contínua com imagem $u(E)$ densa em F . Considere $E' = \lim \text{ind}(E'_p)$, $F' = \lim \text{ind}(F'_p)$ seus respectivos duais, onde cada E'_p, F'_p é Espaço de Banach e as inclusões $E'_p \hookrightarrow E'_{p+1}$, $F'_p \hookrightarrow F'_{p+1}$ são compactas para todo p natural. As seguintes proposições são equivalentes:*

- u é sobrejetora
- Para cada $p \in \mathbb{N}$, existe $q \in \mathbb{N}$ de modo que se $\mu \in F'$ e $u^t(\mu) \in E'_p$, então $\mu \in F'_q$.

Teorema 18. $LC^\infty(M) = C^\infty(M)$ se e somente se para cada compacto $K \subset M$ temos $LC^\infty(K) = C^\infty(K)$ e M um conjunto L -convexo.

Demonstração.

$\Rightarrow$ Se admitimos resolubilidade global, precisamos apenas provar que M é L -convexo. Fixando $K \subset M$ compacto e considerando $E = F = C^\infty(M)$, tome $\mu \in \mathcal{E}'(M)$ de maneira que $L^t \mu \in H^s(K)$.

Pela construção de $\mathcal{E}'(M)$ feita no Teorema 13, existe $j \in \mathbb{N}$ de modo que $L^t(\mu) \in H^{-j}(K_j)$ e aplicando Teorema 17 encontramos $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mu \in H^{-m}(K_m)$. É suficiente tomar $K' = K_m$.

$\Leftarrow$ Por hipótese, nenhuma folha da L -folheação é relativamente compacta em M . Segue imediatamente da Proposição 25 que L^t é injetora, e pelo Teorema 15 inferimos que $L(C^\infty(M))$ é denso em $C^\infty(M)$.

Note que a L -convexidade nos garante que dada $\mu \in \mathcal{E}'(M)$ tal que $L^t(\mu) \in H^s(K)$, existe um $K' \subset M$ compacto de forma que $\text{supp } \mu \subset K'$. Já a resolubilidade semiglobal, através da Proposição 26, nos permite concluir que $\mu \in H^{s-1}$. Como existe $q \in \mathbb{N}$ tal que $K' \subset K_q$ e $s-1 \geq -q$, constatamos que $\mu \in H^{-q}(K_q)$ e aplicamos o Teorema 17. $\square$

Quando estudamos o caso semiglobal, encontramos uma propriedade geométrica equivalente ao problema: basta analisar as folhas da L -folheação. Suponha que esta condição já foi checada; a fim de alcançar objetivo análogo para resolubilidade global, o Teorema 18 nos mostra que é suficiente encontrar propriedades que estabeleçam L -convexidade.

Baseados nisto, encontraremos algumas condições suficientes para haver resolubilidade C^∞ global.

Teorema 19. *Suponha verdadeiras as seguintes propriedades:*

1. *Nenhuma folha da L -folheação é relativamente compacta em M .*
2. *Para cada compacto $K \subset M$, existe $K' \subset M$ compacto de maneira que se $\mathcal{L}$ é uma folha da L -folheação e C é uma componente conexa de $\mathcal{L} \cap \mathbb{C}K$, que é relativamente compacta na topologia de M , então $C \subset K'$.*

Então $LC^\infty(M) = C^\infty(M)$.

Demonstração. Como a condição 1 nos dá resolubilidade semiglobal, é necessário mostrar somente que M é L -convexa. Mais uma vez fixamos $K \subset M$ compacto, $s \in \mathbb{R}$ e tomamos $\mu \in \mathcal{E}'(M)$ tal que $L^t(\mu) \in H^s(K)$.

Perceba que apenas precisamos provar que $(\text{supp } \mu \cap \mathbb{C} \text{supp } L^t(\mu))$ é subconjunto de um compacto fixo. De fato, se o conjunto sempre estiver contido em K' , teremos que $\text{supp } \mu \subset K'' \doteq K \cup K'$, que é claramente um compacto de M .

Seja $x \in (\text{supp } \mu \cap \mathbb{C} \text{supp } L^t(\mu))$. Denotamos por $\mathcal{L}_x$ a folha que passa por x e por C_x a componente conexa de $\mathcal{L}_x \cap \mathbb{C}K$ que passa por x na topologia da folha. Através da Proposição 18 deduzimos que $C_x \subset \text{supp } \mu \cap \mathbb{C}K$. Isto é, C_x é relativamente compacto.

Concluimos da Propriedade 2 que $C_x \subset K'$, para x arbitrário. Logo, $(\text{supp } \mu \cap \mathbb{C} \text{supp } L^t(\mu))$ é subconjunto de K' , o que fecha a prova. $\square$

Veremos agora propriedades que são equivalentes à Condição 2 do Teorema 19 quando já temos ciência de que L é semiglobalmente resolúvel.

No próximo enunciado, designaremos por $\mathcal{F}(M)$ a classe das funções contínuas em M que tem a seguinte propriedade: dado qualquer sistema de coordenadas em M , definido para $(x_1, \dots, x_{n-2})$ em I , (x_{n-1}, x_n) em J , onde I e J são intervalos respectivamente em $\mathbb{R}^{n-2}$ e $\mathbb{R}^2$, de maneira que a intersecção das folhas da L -folheação com $I \times J$ são definidas por $\{x_0\} \times J$, então $u|_{I \times J}$ pertence a $C(I; C^\infty(J))$.

Teorema 20. *Suponha que $LC^\infty(K) = C^\infty(K)$ para cada $K \subset M$ compacto. Então as seguintes condições são equivalentes:*

1. Para cada compacto $K \subset M$, existe $K' \subset M$ compacto de maneira que se $\mathcal{L}$ é uma folha da L -folheação e C é uma componente conexa de $\mathcal{L} \cap \mathbb{C}K$, que é relativamente compacta na topologia de M , então $C \subset K'$.
2. Para cada compacto $K \subset M$, existe um compacto $K' \subset M$ tal que para cada $x \notin K'$, existe uma solução $f \in C^\infty(M)$ de $Lf = 0$ com a seguinte propriedade:

$$|f(x)| > \sup_{y \in K} |f(y)|.$$

3. Existe uma função φ em $\mathcal{F}(M)$ subharmônica tal que $\{x; \varphi(x) \leq c\}$ é compacto em M para cada $c \in \mathbb{R}$.

Demonstração.

1 $\Rightarrow$ 2: A demonstração será feita por contradição. Sejam K, K' como no enunciado de 1. e suponha existir $x \notin K'$ de maneira que

$$|f(x)| \leq \sup_{y \in K} |f(y)|, \quad (8.1)$$

para toda $f \in C^\infty(M)$ tal que $Lf = 0$. Considere agora o conjunto $E \doteq \{f \in C^\infty(M); Lf = 0\}$.

Note que E pode ser considerado um subespaço de $C(K)$, o espaço das funções contínuas em K com a topologia do supremo; basta considerar suas restrições a K . Definimos então o seguinte funcional linear:

$$\begin{aligned} \Lambda : E &\rightarrow \mathbb{C} \\ f &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Por (8.1), Λ é contínuo. Pelo Teorema de Hahn-Banach, Λ pode ser estendido a um funcional $\Lambda' : C(K) \rightarrow \mathbb{C}$ contínuo. Trazemos agora um resultado.

Teorema 21. (Representação de Riesz) *Seja X um espaço topológico Hausdorff compacto. Então $C(X)^*$ é isometricamente isomorfo a $M(X)$, o espaço das medidas complexas de Radon em X .*

Demonstração. Corolário 7.18 de [Fol99]. □

Do Teorema 21, existe uma medida μ suportada em K de modo que

$$\mu(f) = \Lambda'(f) = \Lambda(f) = f(x), \quad (8.2)$$

para toda $f \in E$. Ou seja, $\delta_x - \mu$ é ortogonal ao kernel de L em $C^\infty(M)$. Fazemos uso dos seguintes teoremas auxiliares:

Teorema 22. *Sejam E, F dois espaços localmente convexos Hausdorff e $u : E \rightarrow F$ uma aplicação linear contínua. Então o ortogonal de $\text{Ker } u$ é o fecho fraco da imagem de u^t .*

Demonstração. Proposição 35.4 de [Trè67b]. □

Teorema 23. *Considere u, E, F como no Teorema 22. Neste caso, são equivalentes as condições abaixo:*

- $u(E)$ é fechada em F .
- $u^t(F')$ é fracamente fechada em E' .

Demonstração. Ler a demonstração do Lema 37.4 de [Trê67b]. □

Do Teorema 22, segue que $\delta_x - \mu$ está no fecho de $\text{Im } L^t$ em $\mathcal{E}'(M)$. Como já valem a resolubilidade semiglobal e a afirmação 1, empregando o Teorema 19 obtemos resolubilidade global. Pelo Teorema 23, notamos que $\delta_x - \mu$ pertence de fato a $\text{Im } L^t$. Portanto, existe $\omega \in \mathcal{E}'(M)$ tal que

$$L^t \omega = \delta_x - \mu. \quad (8.3)$$

Seja $\mathcal{L}$ a folha que passa por x e C a componente conexa de x em $\mathcal{L} \cap \mathbb{C}K$ na topologia da folha. Pela hipótese e por $x \notin K'$, C não é relativamente compacta em M . Então $C \setminus \{x\}$ não é relativamente compacta e é componente conexa de $\mathcal{L} \cap \mathbb{C}(K \cup \{x\})$.

Proposição 28. $\text{supp } \omega \cap (C \setminus \{x\}) = \emptyset$

Demonstração. Note que $(\text{supp } L^t \omega) \cap (C \setminus \{x\}) = \emptyset$ e $\text{supp } \omega$ é um conjunto compacto. Suponha por contradição que existe $y_1 \in (\text{supp } \omega) \cap (C \setminus \{x\})$. Pela Proposição 18, teríamos que

$$(C \setminus \{x\}) \subset \text{supp } \omega,$$

o que contradiz a compacidade do suporte de ω . □

Finalmente, estamos prontos para provar que $1 \Rightarrow 2$. A Proposição 28 mostra que existe uma vizinhança κ de x de modo que $L^t \omega = \delta_x$ em κ e

$$(\text{supp } \omega) \cap \kappa = \{x\}.$$

Tomando κ suficientemente pequena, de modo que seja uma vizinhança coordenada, teríamos que:

$$\omega = \sum_{|\alpha|=0}^m c_\alpha \cdot \partial^\alpha \delta_x, \quad \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}} + a \right) \omega = -\delta_x. \quad (8.4)$$

Lembrando o leitor que se $\sum_{\beta=0}^p b_\beta \cdot \partial^\beta \delta_x = 0$, então $b_\beta = 0$ para qualquer β , concluímos claramente que (8.4) é uma contradição, o que encerra a prova da afirmação.

$2 \Rightarrow 3$: Começamos fazendo a ressalva de que $K \subset K'$, se como em 2. Tome uma sequência K_n de compactos em M satisfazendo as seguintes propriedades:

- $K_j \nearrow M$.
- $K'_j \subset \text{int } K_{j+1}$, $\forall j \in \mathbb{N}$.

Fixaremos também abertos ω_j tais que

$$K_j \subset K'_j \subset \omega_j \subset K_{j+1}, \forall j \in \mathbb{N}.$$

Proposição 29. Para cada $j \in \mathbb{N}$, podemos tomar f_{jk} , com $k = 1, \dots, n_j$ soluções C^∞ de L de maneira que

1. $\sum_{k=1}^{n_j} |f_{jk}|^2 < \frac{1}{2^j}$ em K_j .
2. $\sum_{k=1}^{n_j} |f_{jk}|^2 > j$ em $K_{j+2} \cap (\mathbb{C}\omega_j)$

Demonstração. Dado $x_0 \in K_{j+2} \cap (\mathbb{C}\omega_j)$, existe por hipótese $g \in C^\infty(M)$ solução de L tal que $|g(x_0)| > \sup_{K_j} |g|$.

Seja $\lambda \in \mathbb{R}$; $|g(x_0)| > \lambda > \sup_{K_j} |g|$. Definindo $h \doteq \frac{g}{\lambda}$, verificamos que h continua sendo uma solução suave, $|h(x_0)| > 1$ e $\sup_{K_j} |h| < 1$. Além disso, existe $U_0 \ni x_0$ aberto para o qual $|h(x)| > 1$, $\forall x \in U_0$.

Por $K_{j+2} \cap (\mathbb{C}\omega_j)$ ser compacto, é possível encontrar $f_{j1}, \dots, f_{jq} \in C^\infty(M)$ soluções de L tais que:

- $\sup_{K_j} |f_{jk}| < 1$, para $k = 1, 2, \dots, q$.
- $\max_{1 \leq k \leq q} |f_{jk}| > 1$ em $K_{j+2} \cap (\mathbb{C}\omega_j)$.

Como o conjunto de soluções de um campo é fechado por multiplicação, basta elevarmos as funções f_{jk} a potências suficientemente grandes. Neste caso continuarão sendo suaves, soluções de L e valerão ambas as estimativas. □

Proposição 30. Se $f \in \mathcal{F}(M)$ e $Lf = 0$, então $|f|^2$ é subharmônica.

Demonstração. Recorremos à Proposição 10:

$$\begin{aligned}
 (\bar{L} + \lambda)[L(f\bar{f})] &= (\bar{L} + \lambda)[f \cdot L(\bar{f})] \\
 &= \lambda f \cdot L(\bar{f}) + \bar{L}[f \cdot L(\bar{f})] \\
 &= \lambda f \cdot L(\bar{f}) + \bar{L}(f) \cdot L(\bar{f}) + f \cdot \bar{L}L\bar{f} \\
 &= \lambda f \cdot L(\bar{f}) + |\bar{L}(f)|^2 + f \cdot (L\bar{L} - [L, \bar{L}])\bar{f} \\
 &= \lambda f \cdot L(\bar{f}) + |\bar{L}(f)|^2 + f \cdot (L\bar{L})\bar{f} - f \cdot [L, \bar{L}]\bar{f} \\
 &= \lambda f \cdot L(\bar{f}) + |\bar{L}(f)|^2 - f \cdot [L, \bar{L}]\bar{f} \\
 &= \lambda f \cdot L(\bar{f}) + |\bar{L}(f)|^2 - \lambda f \cdot L(\bar{f}) + f \cdot \bar{\lambda} \cdot \bar{L}\bar{f} \\
 &= |\bar{L}(f)|^2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

□

Definimos então $\varphi \doteq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{n_j} |f_{jk}|^2$. Por definição, segue que $\varphi \in \mathcal{F}(M)$. Mostremos que é de exaustão, isto é, $\{x; \varphi(x) \leq c\}$ é compacto em M para cada $c \in \mathbb{R}$.

Proposição 31. *Para cada j natural, temos $\varphi > j$ em $\mathbb{L}\omega_j$.*

Demonstração. Se $x \in K_{j+1} \cap \mathbb{L}\omega_j$, pela Proposição 29 segue que $\sum_{k=1}^{n_j} |f_{jk}(x)|^2 > j$ e portanto $\varphi(x) > j$. Caso contrário, seja $p = \max \{s; x \notin K_s\}$; neste caso, $x \notin \omega_{p-1}$ e $x \in K_{p+1}$.

Logo, $\sum_{k=1}^{n_{p-1}} |f_{(p-1,k)}(x)|^2 > p-1 \geq j$. Assim, concluímos que $\varphi(x) > j$ em ambos os casos, o que encerra a prova. $\square$

Corolário 5. *$\{x; \varphi(x) \leq c\}$ é compacto em M para cada $c \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Dado $c \in \mathbb{R}$, existe $j \in \mathbb{N}$; $j \geq c$. Logo, o conjunto acima é fechado e contido em ω_j , que por sua vez é subconjunto de K_{j+1} , sendo assim compacto. $\square$

Está completa a prova de que 2 $\Rightarrow$ 3.

3 $\Rightarrow$ 1: Sejam φ uma função subharmônica pertencente a $\mathcal{F}(M)$, de exaustão e $K \subset M$ um compacto arbitrário. Definimos

$$\sup \{\varphi(x); x \in K\} \doteq c, \quad K' \doteq \{x \in M; \varphi(x) \leq c\} \quad (8.5)$$

Por hipótese, K' é um conjunto compacto. Se C é como no enunciado, seu fecho $\overline{C}$ na topologia de M também é compacto.

Denotamos por $\partial' C$ a fronteira de C na topologia das folhas. Pelo que acabamos de discutir e por nenhuma folha ser relativamente compacta em M (resolubilidade semiglobal), este conjunto é não-vazio. Neste caso, temos que $\partial' C \subset K$.

Afirmamos que

$$\sup_{x \in \overline{C}} \varphi(x) = \sup_{x \in \partial' C} \varphi(x). \quad (8.6)$$

Lema 6. *Se $K \subset M$ é compacto e ψ é uma função subharmônica em uma vizinhança de K , então*

$$\sup_{x \in K} \psi(x) = \sup_{x \in \partial' K} \psi(x), \quad (8.7)$$

onde $\partial' K$ é a fronteira de K na topologia das folhas.

Demonstração. Tome $y \in K$ um ponto tal que $\sup_{x \in K} \psi(x) = \psi(y)$ e denote por $\mathcal{L}_y$ a folha que passa por y . Se y estiver na fronteira de $\mathcal{L}_y \cap K$, não há o que fazer. Caso contrário, ψ é constante na componente conexa do interior de $\mathcal{L}_y \cap K$ que contém y .

O argumento logo acima nos prova que a igualdade proposta vale quando ψ for estritamente subharmônica (perceba que podemos usar esta definição pois ψ é de classe C^∞ em cada folha). Mais do que isto: neste caso o supremo é atingido somente em $\partial'K$.

Suponha finalmente por contradição que $\psi(y) > \sup_{x \in \partial'K} \psi(x)$. Pelo Teorema 14, podemos encontrar $\eta \in C^\infty(M)$ estritamente subharmônica em K . Então $\eta(y) < \sup_{x \in K} \eta(x)$ e a igualdade (8.7) vale para $\psi + \varepsilon\eta$, para qualquer $\varepsilon > 0$.

Escolhemos $\varepsilon = \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{\psi(y) - \sup_{x \in \partial'K} \psi(x)}{\sup_{x \in K} \eta(x) - \eta(y)} \right]$. Se $w \in \partial'K$, segue que

$$\begin{aligned} [\psi(w) + \varepsilon\eta(w) - \psi(y) - \varepsilon\eta(y)] &= [\psi(w) - \eta(y)] + \varepsilon[\eta(w) - \eta(y)] \\ &\leq \left[\sup_{x \in \partial'K} \psi(x) - \psi(y) \right] + \varepsilon \left[\sup_{x \in K} \eta(x) - \eta(y) \right] \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \left[\sup_{x \in \partial'K} \psi(x) - \psi(y) \right] \\ &< 0, \end{aligned}$$

o que é absurdo, já que vale para todo $w \in \partial'K$. □

Retornando à demonstração, a igualdade 8.6 segue imediatamente do Lema 6. Se a aplicamos, junto ao fato de $\partial'C$ estar contido em K , obtemos que $C \subset K'$, como queríamos provar. □

Analisando os Teoremas 19 e 20, notamos que a existência de uma função suave, subharmônica e de exaustão, associada com resolubilidade semiglobal, implica em resolubilidade global. Por outro lado, o Teorema 14 exhibe a equivalência entre a existência de uma função estritamente subharmônica e a resolubilidade C^∞ em compactos.

Lembramos agora do seguinte resultado de Análise Complexa: um aberto $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ é pseudoconvexo se e somente se admite uma função ρ de exaustão, suave e estritamente plurisubharmônica. Inspirados nisto, fixando um campo L e a folheação gerada por ele, definimos:

Definição 18. *M é dita **pseudoconvexa com relação a L** se existir $\rho \in C^\infty(M)$ estritamente subharmônica (no sentido da Definição 8) de modo que para cada $c \in \mathbb{R}$*

$$\{x; \rho(x) \leq c\} \subset\subset M. \quad (8.8)$$

Teorema 24. *M é uma variedade pseudoconvexa com relação a L se, e somente se, existe $\varphi \in C^\infty(M)$ subharmônica, de exaustão, e L é semiglobalmente resolúvel.*

Demonstração. Se M é pseudoconvexa, existe ρ função suave, estritamente subharmônica e de exaustão. Dado $K \subset M$ compacto, a mesma é estritamente subharmônica em K . Recorrendo ao Teorema 14, segue que $L(C^\infty(K)) = C^\infty(K)$.

Reciprocamente, como já comentado logo após a prova do Teorema 20, deduzimos das hipóteses que $L(C^\infty(M)) = C^\infty(M)$. Não é difícil ver que as implicações $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4$ do Teorema 14 permanecem válidas quando trocamos K por M . Isto é, existe $\psi \in C^\infty(M)$ estritamente subharmônica.

Definimos então $\rho \doteq \varphi + e^\psi$. Obviamente $\rho \in C^\infty(M)$. Observe também que o conjunto $\{x; \rho(x) \leq c\} \subset \{x; \varphi(x) \leq c\}$, visto que e^ψ é estritamente positiva; logo é de exaustão. Nos falta verificar que é estritamente subharmônica:

$$\begin{aligned}
 (\bar{L} + \lambda)[L(\varphi + e^\psi)] &= (\bar{L} + \lambda)[L(\varphi)] + (\bar{L} + \lambda)[L(e^\psi)] \\
 &= (\bar{L} + \lambda)[L(\varphi)] + (\bar{L} + \lambda)[L(\psi) \cdot e^\psi] \\
 &= (\bar{L} + \lambda)[L(\varphi)] + \lambda \cdot e^\psi \cdot L(\psi) + (\bar{L}L\psi) \cdot e^\psi + L(\psi) \cdot \bar{L}(\psi) \cdot e^\psi \\
 &= (\bar{L} + \lambda)[L(\varphi)] + (\bar{L} + \lambda)[L(\psi)] \cdot e^\psi + L(\psi) \cdot \bar{L}(\psi) \cdot e^\psi \\
 &= \underbrace{(\bar{L} + \lambda)[L(\varphi)]}_{\geq 0} + \underbrace{(\bar{L} + \lambda)[L(\psi)] \cdot e^\psi}_{> 0} + \underbrace{|L(\psi)|^2 \cdot e^\psi}_{\geq 0}.
 \end{aligned}$$

Está demonstrado o resultado. □

Corolário 6. *Quando M é pseudoconvexa com relação a L , este operador é globalmente resolúvel.*

Referências Bibliográficas

- [AV65] Aldo Andreotti e Edoardo Vesentini. Carleman Estimates for the Laplace-Beltrami Equation on Complex Manifolds. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 25:81–130, 1965. [39](#), [40](#)
- [BCH08] Shiferaw Berhanu, Paulo D Cordaro e Jorge Hounie. *An Introduction to Involutive Structures*, volume 6. Cambridge University Press, 2008. [17](#), [21](#)
- [BM04] Edward Bierstone e Pierre D Milman. Resolution of Singularities in Denjoy-Carleman Classes. *Selecta Mathematica*, 10(1):1–28, 2004. [43](#)
- [Bou07] Nicolas Bourbaki. *Espaces Vectoriels Topologiques*. Springer, 2007.
- [CLN85] C Camacho e A Lins Neto. *Geometric Theory of Foliations*, volume 1. Birkhäuser Boston, 1985. [17](#), [45](#)
- [DH72] Johannes J Duistermaat e Lars Hörmander. Fourier Integral Operators II. *Acta mathematica*, 128(1):183–269, 1972. [1](#)
- [Fol99] Gerald B Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, volume 2. Wiley-Interscience, 1999. [51](#)
- [Hör71] Lars Hörmander. Fourier Integral Operators I. *Acta mathematica*, 127(1):79–183, 1971. [27](#)
- [Hör76] Lars Hörmander. *Linear Partial Differential Operators*, volume 116. Springer - Verlag, 1976. [44](#)
- [Hör90] Lars Hörmander. *An Introduction to Complex Analysis in Several Variables*, volume 7. Elsevier, 1990.
- [Hör03] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators. I*. Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2003. Distribution theory and Fourier analysis, Reprint of the second (1990) edition [Springer, Berlin; MR1065993 (91m:35001a)]. [5](#)
- [Hör05] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators II: Differential Operators with Constant Coefficients*, volume 257. Springer Science & Business Media, 2005. [7](#)
- [Hör07] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III: Pseudo-differential Operators*, volume 274. Springer Science & Business Media, 2007.
- [Kom67] Hikosaburo Komatsu. Projective and Injective Limits of Weakly Compact Sequences of Locally Convex Spaces. *Journal of the Mathematical Society of Japan*, 19(3):366–383, 1967. [41](#)
- [Kre89] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis With Applications*, volume 81. Wiley New York, 1989.

- [Lee03] John M Lee. Smooth manifolds. Em *Introduction to Smooth Manifolds*, páginas 1–29. Springer, 2003.
- [Lew57] Hans Lewy. An Example of a Smooth Linear Partial Differential Equation Without Solution. *Annals of Mathematics*, páginas 155–158, 1957. [3](#)
- [Mor93] Mitsuo Morimoto. *An Introduction to Sato’s Hyperfunctions*, volume 129. American Mathematical Soc., 1993. [41](#), [46](#)
- [Tre67a] François Trèves. *Locally Convex Spaces and Linear Partial Differential Equations*. Springer, 1967.
- [Trè67b] François Trèves. *Topological Vector Spaces, Distributions and Kernels*, volume 25. Courier Corporation, 1967. [40](#), [41](#), [51](#), [52](#)
- [Trè80] François Trèves. *Introduction to Pseudodifferential and Fourier Integral Operators Volume 1: Pseudodifferential Operators*, volume 2. Springer Science & Business Media, 1980. [27](#)