POLIEDROS DE GRAFOS TRANSITIVOS

Maria Angela Melo de Campos Gurgel

**TESE APRESENTADA
AO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
EM
MATEMÁTICA APLICADA**

**Área de concentração: Ciência da Computação
Orientadora: Profa. Dra. Yoshiko Wakabayashi**

– São Paulo, outubro de 1992 –

à minha mãe *Cloris*.
ao meu marido *Antonio Luiz* e
aos nossos filhos *Fernanda, Henrique e Thais*.

AGRADECIMENTOS

À Yoshiko, orientadora segura; minuciosa nos detalhes; que norteou meus passos pelo labirinto, como se conhecesse a saída;

Ao Professor Grötschel pelas sugestões que culminaram na obtenção das facetas semi- k -cercas;

Ao Arnaldo cujas ‘dicas’ contribuíram para simplificar as demonstrações de alguns resultados do capítulo IV;

À “vó” Có, aquela que efetivamente me substituiu em tantos momentos;

Ao “papai” Gurgel, que tão sabiamente alimentou meu ego;

Aos meus filhos Fê, Rick e Tatá; esta é a prova de que nunca é tarde para a realização de um sonho;

Aos meus irmãos Gina, Nenê e Rosa, pelo companheirismo que nos une;

Aos amigos Humberta, Edna, Bete, Inês, Mariane, Bel, Saulo, Graça, René, Lucinha, Nami e Yô, que presentes ou em pensamento, sempre estiveram comigo;

Aos meus ex-aluninhos Wania, Alan, Lúcia, Cris, Tito, Denise, Dilma e Carlinhos, por razões que ... só Freud explica;

Finalmente, aos meus professores e colegas do dia a dia, em especial ao Haroldo, que me ensinou a usar o xfig, muito obrigado a todos!

CONTEÚDO

Introdução	1
I. Conceitos Básicos	4
I.1 Teoria dos Grafos	4
I.2 Teoria dos Poliedros, Álgebra Linear e Programação Linear	10
I.3 Teoria da Complexidade Computacional	17
II. Problemas da Pré-Ordem Completa, da Pré-Ordem e da Ordem Parcial	22
II.1 Os Problemas	23
II.2 Complexidade Computacional	24
III. Politopo da Pré-Ordem Completa, da Pré-Ordem e da Ordem Parcial: Dimensão e Estrutura Facial	35
III.1 Introdução	35
III.2 Definições e Resultados Básicos	36
III.3 Facetas	41
III.3.1 Facetas dos triângulos	47
III.3.2 Facetas dos arcos paralelos	49
III.3.3 Facetas triviais	51
III.3.4 Facetas dos circuitos ímpares com duas cordas	52
III.3.5 Facetas dos pentágonos	59
III.3.6 Facetas dos heptágonos	66

III.3.7 Facetas das semi- k -cercas	73
III.4 Relação entre os politopos	83
III.5 Soluções fracionárias	85
IV. Diâmetro e Adjacência de Vértices do Politopo	
da Pré-Ordem Completa	90
Anexo	103
Considerações finais	125
Referências	126
Lista de Símbolos e Notação	129
Índice de Definições	132

ABSTRACT

Let $D_n = (V_n, A_n)$ be the complete digraph on n vertices. An edge set $A \subseteq A_n$ is called a *complete pre-order* (*pre-order*, *partial order*) of D_n if $H = (V_n, A)$ is a *total transitive* (*transitive*, *anti-symmetric transitive*) subgraph of D_n .

Given a digraph $D_n = (V_n, A_n)$ with a weight $p_e \in \mathbb{Z}$ assigned to each edge $e \in A_n$, the problem of finding a *complete pre-order* (*pre-order*, *partial order*) $A \subseteq A_n$ such that $p(A) := \sum_{e \in A} p_e$ is as large as possible is called the *complete pre-order* (*pre-order*, *partial order*) *problem*.

We study the polytopes associated with each of these problems, defined as the convex hull of the incidence vectors of all complete pre-orders (*pre-orders*, *partial orders*) of D_n . We present several classes of inequalities and investigate which class is facet-defining, valid or nonvalid for each of these polytopes. We study the adjacency relation on the vertices of the complete pre-order polytope and prove that the diameter of this polytope equals two. We also show that the three problems considered are INIP-hard.

RESUMO

Seja $D_n = (V_n, A_n)$ o digrafo completo com n vértices. Um subconjunto de arestas $A \subseteq A_n$ é chamado uma *pré-ordem completa* (*pré-ordem*, *ordem parcial*) de D_n se $H = (V_n, A)$ é um subgrafo *transitivo total* (*transitivo*, *anti-simétrico transitivo*) de D_n . Considerando uma função peso $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$, o problema de encontrar uma *pré-ordem completa* (*pré-ordem*, *ordem parcial*) $A \subseteq A_n$ de peso máximo, sendo $p(A) = \sum_{e \in A} p_e$, é chamado problema da *pré-ordem completa* (*pré-ordem*, *ordem parcial*).

Estudamos os politopos associados a cada um destes problemas, definidos como o fecho convexo dos vetores de incidência de todas as pré-ordens completas, pré-ordens e ordens parciais de D_n . Apresentamos várias classes de inequações e investigamos quais delas definem facetas para cada um desses politopos. Estudamos a relação de adjacência de vértices no politopo da pré-ordem completa e provamos que o diâmetro deste politopo é 2. Também mostramos que os três problemas considerados são INIP-difíceis.

Introdução

Neste trabalho são estudados, sob uma abordagem poliédrica, três problemas de otimização combinatória: o problema da *pré-ordem completa*, o da *pré-ordem* e o da *ordem parcial*. Cada um destes problemas tem como instância um digrafo completo $D_n = (V_n, A_n)$ com n vértices e uma função *peso* $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$, definida nas arestas de D_n , e tem como objetivo encontrar um subdigrafo H de D_n com certas propriedades especiais, que seja de *peso máximo*. Mais precisamente, no problema da *pré-ordem completa* procura-se em D_n um subdigrafo *gerador transitivo e total* $H = (VH, AH)$, tal que $p(AH) = \sum_{a \in AH} p(a)$ seja máximo. No problema da *pré-ordem*, o subdigrafo H deve ser *transitivo*; e no da *ordem parcial*, H deve ser *transitivo e anti-simétrico*.

Os três problemas referidos são INP-difíceis. Assim, a razão de se estudá-los sob o enfoque poliédrico foi dupla: por um lado, um interesse puramente teórico em “desvendar facetas” de poliedros associados a problemas difíceis; por outro lado, a esperança de que tais resultados teóricos poderão ser usados no desenvolvimento de algoritmos baseados em planos-de-corte e “branch and bound”, que sejam úteis na solução de instâncias reais.

Nosso estudo consistiu em definir para cada um dos problemas, um politopo (poliedro limitado) cujos vértices estão em correspondência um a um com as possíveis soluções do problema, e investigar a estrutura facial deste politopo.

O objeto inicial de nossa pesquisa foi o politopo da *pré-ordem completa*. Ao longo do desenvolvimento deste estudo, surgiram porém, várias classes de inequações que nos levaram a indagar se também seriam facetas do politopo da *pré-ordem* e da *ordem parcial*. Assim, de maneira natural, passamos a estudar os três politopos. Isto trouxe, de certa forma, uma unidade ao trabalho, já que há nos três problemas um elo comum que é a propriedade transitiva.

Investigando na literatura, descobrimos que dentre os problemas deste tipo, onde a transitividade é exigida, estes três eram os únicos ainda não estudados sob o enfoque poliédrico. Estes resultados, contribuíram assim, para completar o estudo da classe dos politopos associados a problemas sobre digrafos onde se procura subdigrafos com a propriedade transitiva, combinada (ou não) com outras propriedades como a *total*, *simétrica* e *anti-simétrica*.

A seguir, apresentamos um breve resumo do conteúdo de cada capítulo.

No **capítulo I**, revemos resultados fundamentais e definições básicas da *teoria dos grafos*, de *programação linear*, dos *poliedros* e da *complexidade computacional*. Aqui, reunimos quase todas as definições utilizadas ao longo da dissertação e estabelecemos a notação adotada. Os conceitos novos introduzidos neste capítulo, que merecem destaque, são os de digrafos *totais*, *transitivos*, *simétricos* ou *anti-simétricos*, conforme a relação binária sobre os vértices, definida pelo conjunto de suas arestas, seja de um desses tipos.

No **capítulo II**, introduzimos os problemas da *pré-ordem completa*, da *pré-ordem* e da *ordem parcial*. Provas de que estes problemas são INP-difíceis são aqui apresentadas.

O **capítulo III** contém a parte central da nossa pesquisa. Após definir os politopos associados aos problemas em estudo e provar que eles têm dimensão completa, apresen-

tamos o *lema da elevação*, usado em quase todas as demonstrações posteriores, para se estender inequações-facetadas de politopos de certa dimensão para poliedros de dimensões maiores. O restante deste capítulo apresenta grandes classes de inequações-facetadas dos politopos P_{POC} , P_{PO} e P_{OP} , associados aos problemas da pré-ordem completa, da pré-ordem e da ordem parcial, respectivamente. Mostramos que algumas dessas classes são de inequações que definem facetas apenas de P_{POC} , como é o caso das *inequações das semi- k -cercas*, das *inequações-pentágonos* e das *inequações-heptágonos*. Por outro lado, exibimos também inequações como a dos *k -circuitos ímpares com 2-cordas* que são inequações-facetadas apenas de P_{PO} e de P_{OP} . Para cada classe de inequações apresentada, fazemos um estudo procurando relacioná-la com cada um dos três politopos considerados. Neste aspecto, conforme pode ser observado no decorrer deste capítulo, ainda existem algumas questões não respondidas.

O **capítulo IV** contém a prova de que o diâmetro de P_{POC} é 2. A determinação dos diâmetros de P_{PO} e P_{OP} é um problema teórico interessante, em aberto.

O **anexo** contém apenas a prova da validade da inequação-heptágono para P_{POC} . Este resultado, que deveria ser parte do capítulo III, encontra-se no anexo por se tratar de uma demonstração longa e exaustiva que poderia comprometer a continuidade dos resultados apresentados nesse capítulo.

Capítulo I

Conceitos Básicos

Conceitos matemáticos básicos que serão usados no decorrer deste trabalho são introduzidos neste capítulo. Em cada seção, referências a textos apropriados serão feitas, sempre que necessário. Estes conceitos vêm geralmente da teoria dos grafos, teoria dos poliedros, programação linear e teoria da complexidade computacional.

I.1 Teoria dos Grafos

Como os problemas que estudamos são de otimização em grafos e não existe uma terminologia comum na teoria dos grafos para todos os conceitos que usamos, adotamos as definições que consideramos mais apropriadas para este trabalho. A maioria dos conceitos aqui definidos podem ser encontrados, com variação de notação, em Berge [1973], Bondy e Murty [1976], Lucchesi [1979] e Szwarcfiter [1984].

Um **digrafo** ou **grafo dirigido** $D = (V, A)$ consiste de um conjunto finito não vazio V

de elementos denominados **vértices** e um conjunto A de elementos denominados **arestas**, que são pares ordenados de vértices, isto é, $A \subseteq \{(u, v) : u, v \in V\}$. Se $\alpha = (u, v)$ é uma aresta de um digrafo $D = (V, A)$, dizemos que α **vai de u para v , incide em u e em v** , e que u e v são **extremos** de α . Também nos referimos a u como **início** e a v como **término** da aresta α .

Dois vértices u e v de um digrafo $D = (V, A)$ são **adjacentes** se (u, v) ou $(v, u) \in A$; uma aresta de D é um **laço** se seus extremos são iguais. Digrafos sem laços são denominados **simples**. A maioria dos digrafos que ocorrem neste trabalho são simples.

Algumas vezes, por simplicidade de notação, uma aresta $\alpha = (u, v)$ de um digrafo D será denotada sem os parênteses ou mesmo sem os parênteses e a vírgula. Por exemplo, se $\alpha = (u, v)$ subscreve uma variável x , usaremos uma das notações x_α , $x_{(u,v)}$, $x_{u,v}$ ou x_{uv} , dependendo da conveniência dentro do contexto.

Se W é um subconjunto de vértices de um digrafo $D = (V, A)$, denotamos por $I(W)$ o subconjunto das arestas de D com ambos os extremos em W e por $\delta(W)$ o subconjunto das arestas de D com um extremo em W e o outro em $V \setminus W$, isto é,

$$I(W) := \{(u, v) \in A : u, v \in W\} \quad \text{e}$$

$$\delta(W) := A \setminus (I(W) \cup I(V \setminus W)) .$$

No caso em que todas as arestas de $\delta(W)$ possuem início em W ou todas possuem término em W , $\delta(W)$ é denominado **corte orientado**; caso contrário é simplesmente um **corte**. Para cada $v \in V$, $\delta(v)$ abrevia $\delta(\{v\})$. Se $\delta(v)$ for um corte orientado, então v será denominado **fonte** (sorvedouro) se as arestas de $\delta(v)$ tiverem seu início (término) em v .

Se os digrafos $D = (V, A)$ e $G = (W, B)$ são tais que $W \subseteq V$ e $B \subseteq A$, então G é dito um **subdigrafo** de D . Neste caso, dizemos que D **contém** G ou que G **está contido** em D (denota-se por $G \subseteq D$). Se $E \subseteq A$, então o subdigrafo de D com conjunto de arestas E e vértices consistindo dos extremos das arestas de E é o **subdigrafo gerado por E** e

denotado por $\mathbf{D}[E]$. Se $W \subseteq V$, então $G = (W, I(W))$ é o **subdigrafo gerado** por W e denotado por $\mathbf{D}[W]$. Por simplicidade de notação, especialmente no capítulo III, também denotaremos por $\mathbf{[X]}$ o subdigrafo gerado por X , se $X \subseteq V$ ou $X \subseteq A$.

Se W é um subconjunto de vértices de um digrafo $D = (V, A)$, então $\mathbf{D} - \mathbf{W}$ denota o subdigrafo obtido de D , removendo-se W , definido com conjunto de vértices $V \setminus W$ e arestas $I(V \setminus W)$. Observe que $D - W = D[V \setminus W]$. Escrevemos $\mathbf{D} - \mathbf{v}$ para denotar o subdigrafo $D - \{v\}$, se v é um vértice de D .

Dois digrafos $D = (V, A)$ e $G = (W, B)$ são **isomorfos** se existe uma bijeção $\varphi : V \rightarrow W$ tal que para $u, v \in V$, tem-se que $(u, v) \in A$ se e somente se $(\varphi(u), \varphi(v)) \in B$. Escrevemos $G \cong D$ para indicar que G e D são isomorfos. Dizemos que um digrafo $D = (V, A)$ é **completo** se $A = V \times V \setminus \{(u, u) : u \in V\}$. Para todo natural n , existe, a menos de isomorfismo, um único digrafo completo com n vértices, que será, em geral, denotado por $\mathbf{D}_n = (\mathbf{V}_n, \mathbf{A}_n)$.

Se $\alpha = (u, v)$ é uma aresta de D_n , $\bar{\alpha}$ denota a aresta (v, u) , **reversa** à α . Generalizando este conceito, se $B \subseteq A_n$, então $\bar{B}$, chamado **reverso** de B , denota o conjunto das arestas reversas às de B .

Um **clique** em um digrafo $D = (V, A)$ é um subdigrafo completo de D , não necessariamente maximal.

Uma seqüência alternada não nula $S = \langle v_1, \alpha_1, v_2, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}, v_k \rangle$ é um **passeio** em um digrafo $D = (V, A)$ se $v_i \in V$ ($1 \leq i \leq k$), $\alpha_i \in A$ e os vértices v_i e v_{i+1} são extremos da aresta α_i ($1 \leq i \leq k-1$). Se a seqüência S acima é um passeio, então dizemos que é um passeio de v_1 a v_k ou um $[v_1 - v_k]$ -passeio. O comprimento de um tal passeio é $k-1$. No caso em que $v_i \neq v_j$ para $i \neq j$ ($1 \leq i, j \leq k$), S é um **caminho** entre v_1 e v_k . Se a seqüência S é um $[v_1 - v_k]$ -caminho, ele é **dirigido de v_1 para v_k** ou é um **caminho dirigido** se $\alpha_i = (v_i, v_{i+1})$ para $1 \leq i \leq k-1$. Neste caso, o caminho dirigido de v_1 para v_k pode ser denotado pela seqüência de seus vértices, isto é, por $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Se

$v_1 = v_k$ e $v_1, \dots, v_{k-1}$ forem todos distintos, então S é um **circuito**. O circuito é **dirigido** se todas as suas arestas estiverem orientadas num mesmo sentido. Neste caso, o circuito pode ser denotado pela seqüência de seus vértices, ou de suas arestas. Um passeio de comprimento k é um **k-passeio**; um k -passeio é **par** ou **ímpar**, conforme k seja par ou ímpar. Um 3-circuito é denominado um **triângulo**. Frequentemente usamos os termos caminho, circuito ou triângulo para denotar o digrafo correspondente a um caminho, um circuito ou um triângulo, respectivamente.

Se D é um digrafo com n vértices ($n \geq 1$), um n -caminho dirigido em D é um **caminho hamiltoniano** e um n -circuito dirigido é um **circuito hamiltoniano**. Um digrafo é **hamiltoniano** se contém um circuito hamiltoniano.

Se $C = \langle 1, 2, \dots, k \rangle$ é um k -circuito dirigido com vértices $1, 2, \dots, k$, $k \geq 5$, então o conjunto $\{(i, (i+2) \bmod k) : i = 1, \dots, k\}$ é denominado o conjunto das **2-cordas** de C e o conjunto $\{(i, (i+3) \bmod k) : i = 1, \dots, k\}$ é o conjunto das **3-cordas** de C .

Um digrafo $D = (V, A)$ é **conexo** se existe um caminho entre quaisquer dois vértices de D ; caso contrário, D é **desconexo** e denominamos **componentes** os subdigrafos conexos maximais de D . Dizemos que D é **fortemente conexo** se para quaisquer dois vértices $u, v \in V$, existe um $[u - v]$ e um $[v - u]$ -caminhos dirigidos em D . Subdigrafos maximais fortemente conexos de um digrafo D são denominados **componentes fortemente conexos** do digrafo.

Sejam $D_1, D_2, \dots, D_m$ os componentes fortemente conexos de um digrafo D . O **digrafo condensado** de D (denotado por $\widehat{D}$) é um digrafo com m vértices $v_1, v_2, \dots, v_m$; existe uma aresta em $\widehat{D}$ que vai de v_i para v_j ($i \neq j$) se e somente se existe uma aresta em D , com início em VD_i e término em VD_j .

Um subdigrafo $G = (W, B)$ de um digrafo $D = (V, A)$ é **gerador** se $|W| = |V|$.

Digrafos **acíclicos** são aqueles que não contém circuitos dirigidos.

Um digrafo $D = (V, A)$ é um **torneio** se, para quaisquer vértices $u, v \in V$, $u \neq v$,

exatamente uma das arestas com extremos u e v está em A .

Com a finalidade de definirmos grafos especiais que serão investigados neste trabalho, estabelecemos aqui algumas relações binárias R sobre S ($R \subseteq S \times S$). Em outros textos, as definições das relações transitiva e total podem ser ligeiramente diferentes. Dizemos que:

- R é **simétrica** se $(n, m) \in R \Rightarrow (m, n) \in R, \forall n, m \in S$;
- R é **anti-simétrica** se $(n, m) \in R$ e $(m, n) \in R \Rightarrow n = m, \forall n, m \in S$;
- R é **transitiva** se $(n, m) \in R$ e $(m, s) \in R \Rightarrow (n, s) \in R, \forall n, m, s \in S, n \neq m \neq s \neq n$;
- R é **total** se $(n, m) \in R$ ou $(m, n) \in R, \forall n, m \in S, n \neq m$.

Uma relação binária é uma:

- **pré-ordem** se é transitiva;
- **pré-ordem completa** se é transitiva e total;
- **ordem parcial** se é anti-simétrica e transitiva;
- **ordem linear** se é anti-simétrica, transitiva e total.

Note que, dado um digrafo $D = (V, A)$, o conjunto de arestas A é uma relação binária sobre V . Um tal digrafo é denominado **total**, **simétrico**, **anti-simétrico** ou **transitivo**, conforme A seja uma relação total, simétrica, anti-simétrica ou transitiva, respectivamente.

Seja $D = (V, A)$ um digrafo e $B \subseteq A$. Então dizemos que B é uma **pré-ordem** (**ordem parcial**, **ordem linear**, **pré-ordem completa**) de D , se B é uma pré-ordem (ordem parcial, ordem linear, pré-ordem completa) sobre V .

Se $D = (V, A)$ é um digrafo e se $B \subseteq A$ é uma ordem linear de D , existe um único caminho hamiltoniano em D , cujas arestas estão contidas em B . A sequência de vértices

deste caminho, digamos $O := \langle u_1, \dots, u_n \rangle$, é uma outra forma de nos referirmos à ordem linear B . Dizemos que tal ordem linear B é definida por O , e a denotamos também por $\mathbf{A}(\mathbf{O})$. Note que

$$\mathbf{A}(\mathbf{O}) = \{(u_i, u_j) : 1 \leq i < j \leq n\}.$$

O **fecho transitivo** de um digrafo G é o menor digrafo transitivo que contém G .

Um **emparelhamento** em um digrafo $D = (V, A)$ é um subconjunto de arestas de D , distintas de laços, tal que quaisquer duas arestas não possuem um extremo em comum. Dizemos que um emparelhamento $E \subseteq A$ é **perfeito** se todo vértice de D é extremo de alguma aresta em E e é um **k-emparelhamento** se $|E| = k$, $k \geq 1$.

Um **grafo** $G = (V, A)$ consiste de um conjunto finito não vazio V de elementos denominados **vértices** e um conjunto de pares não ordenados de elementos de V , denominados **arestas**, isto é, $A \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$.

Como vemos, a única diferença entre grafos e digrafos consiste na orientação das arestas. Todos os conceitos que não envolvem a noção de orientação se aplicam automaticamente para grafos.

Grafos **acíclicos** são aqueles que não contêm circuitos.

Um n -caminho em um grafo com n vértices é um **caminho hamiltoniano** e um n -circuito um **circuito hamiltoniano**. Um **grafo hamiltoniano** é um grafo que contém um circuito hamiltoniano.

Para cada natural n , existe, a menos de isomorfismo, um único grafo completo com n vértices, denotado por $\mathbf{K}_n = (\mathbf{V}_n, \mathbf{A}_n)$.

A **distância** $d(u, v)$ entre dois vértices quaisquer u e v de um grafo $G = (V, A)$ é o comprimento de um caminho mais curto (isto é, de menor comprimento) entre u e v , se existir; caso contrário, $d(u, v) = \infty$. O **diâmetro** de G , denotado por $\mathbf{diam}(G)$ é a maior distância entre dois vértices quaisquer de G .

Como a maioria dos grafos que ocorrem neste trabalho são dirigidos, às vezes usaremos

os termos grafo e subgrafo para denotar um digrafo e subdigrafo, respectivamente. Isto simplificará nossa notação e não causará confusão ao leitor atento.

Dado um grafo (digrafo) H , a menos de menção em contrário, $\mathbf{VH}$ e $\mathbf{AH}$ denotam o conjunto dos vértices e das arestas de H , respectivamente. Também nos referimos a $\mathbf{AP}$ e $\mathbf{VP}$ como o conjunto das arestas e dos vértices de um passeio P em um grafo (digrafo), respectivamente.

Diferenças simétricas de subconjuntos de arestas ou de vértices de um grafo (digrafo) são às vezes mencionadas. Se A e B são conjuntos, $\mathbf{A}\Delta\mathbf{B}$ denota a **diferença simétrica** de A e B , isto é, $A\Delta B := (A\setminus B) \cup (B\setminus A)$.

I.2 Teoria dos Poliedros, Álgebra Linear e Programação Linear

Os conceitos aqui apresentados são usados freqüentemente no capítulo III, onde analisamos a estrutura facial dos poliedros que associamos aos problemas que são objetos de estudo deste trabalho.

Denotamos por $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}$ os conjuntos dos números reais, inteiros e naturais, respectivamente. O conjunto dos reais não negativos será denotado por $\mathbb{R}^*$. O conjunto dos vetores n -dimensionais com componentes em um conjunto qualquer W será denotado por W^n , sendo $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Assim, $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{Z}^n$) denota o conjunto de todos os vetores com n componentes reais (inteiras). Ampliando esta notação, $\mathbb{R}^{m \times n}$ ($\mathbb{Z}^{m \times n}$) com $m, n > 0$, $m, n \in \mathbb{N}$, denota o conjunto das matrizes reais (inteiras), com m linhas e n colunas.

Se E é um conjunto finito ordenado e W um conjunto qualquer, $\mathbf{W}^E$ denota o conjunto dos vetores com $|E|$ componentes indexadas pelos elementos de E , com entradas em W . Similarmente, se A é uma matriz, $A \in \mathbb{R}^{E \times F}$ significa que A é real, possui $|E|$ linhas e $|F|$ colunas, indexadas pelos elementos dos conjuntos finitos ordenados E e F , respectivamente.

Para um número real x , $\lfloor x \rfloor$ denota o maior inteiro menor ou igual a x . A menos

de especificação em contrário, vetores serão vetores coluna. Assim, se x é um vetor, x^T denota seu transposto. Um vetor ou uma matriz de zeros será denotada por $\mathbf{0}$ e um vetor de uns por $\mathbf{1}$. Um vetor $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ é referido como **unitário** se $\exists i$, $1 \leq i \leq n$, tal que $x_i = 1$ e $x_j = 0$ para $j \neq i$.

Se E é um conjunto finito ordenado e $A \subseteq E$, denotamos por $\mathbf{x}^A$ o vetor de **incidência** ou vetor **característico** de A , definido como:

$$\mathbf{x}^A = (x_e^A, e \in E), \text{ sendo } x_e^A = \begin{cases} 1, & \text{se } e \in A \\ 0, & \text{se } e \in E \setminus A \end{cases}.$$

Ao longo deste trabalho, identificamos funções $p : A \rightarrow \mathbb{R}$ com vetores em $\mathbb{R}^A$. Assim, se $a \in A$, p_a pode ser a componente do vetor p indexada por $a \in A$, ou o valor $p(a)$ da função p . Se $B \subseteq A$ e $p : A \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $p \in \mathbb{R}^A$), então $p(B)$ denota a seguinte soma:

$$p(B) := \sum_{b \in B} p_b,$$

Um vetor $x \in \mathbb{R}^n$ é uma **combinação linear** dos vetores $x_1, x_2, \dots, x_t \in \mathbb{R}^n$, se, para algum $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_t) \in \mathbb{R}^t$,

$$x = \sum_{i=1}^t \alpha_i x_i.$$

Uma tal combinação linear é chamada

afim, se $\alpha_1 + \dots + \alpha_t = 1$,

cônica, se $\alpha_1, \dots, \alpha_t \geq 0$,

convexa, se for afim e cônica.

Para um conjunto não vazio $S \subseteq \mathbb{R}^n$, denotamos por $\text{lin}(S)$ (**cone**(S), **aff**(S), **conv**(S)) o **fecho linear** (**cônico**, **afim**, **convexo**) dos elementos de S , isto é, o conjunto

de todos os vetores que são combinação linear (cônica, afim, convexa) de um número finito de vetores de S , respectivamente. Se S for o conjunto vazio, então $\text{lin}(S) := \text{cone}(S) := \{0\}$ e $\text{conv}(S) := \text{aff}(S) := \emptyset$. Um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ é um **subespaço linear (cone, subespaço afim, conjunto convexo)** se $S = \text{lin}(S)$ ($S = \text{cone}(S)$, $S = \text{aff}(S)$, $S = \text{conv}(S)$).

Um subconjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ é **linearmente independente (independente afim)** se para qualquer subconjunto finito $\{x_1, \dots, x_t\}$ de S , $\sum_{i=1}^t \alpha_i x_i = 0$, $\alpha_i \in \mathbb{R}$ ($\sum_{i=1}^t \alpha_i x_i = 0$ e $\sum_{i=1}^t \alpha_i = 0$, $\alpha_i \in \mathbb{R}$) implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_t = 0$ (implicam $\alpha_1 = \dots = \alpha_t = 0$); caso contrário, S é **linearmente dependente (dependente afim)**. Para $S \subseteq \mathbb{R}^n$, o **posto (posto afim)** de S , denotado por **posto (S) (posto a(S))** é a cardinalidade de um maior subconjunto de S que é linearmente independente (independente afim). Observe que $\{0\}$ é independente afim, mas não é linearmente independente. Por outro lado, se S é um conjunto linearmente independente, então S é independente afim. Prova-se que para todo $S \subseteq \mathbb{R}^n$, se $0 \in \text{aff}(S)$, então $\text{posto a}(S) = \text{posto}(S) + 1$; e se $0 \notin \text{aff}(S)$, então $\text{posto a}(S) = \text{posto}(S)$.

O posto de uma matriz A , denotado por **posto (A)**, é o posto do conjunto de vetores coluna de A , que é igual ao posto do conjunto de vetores linha de A . Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tem **posto linha completo (posto coluna completo)** se $\text{posto}(A) = m$ ($\text{posto}(A) = n$).

Se $S \subseteq \mathbb{R}^n$, então a **dimensão** de S (denotada por **dim(S)** ou **dim S**), é definida como

$$\dim(S) := \text{posto a}(S) - 1 .$$

Um **poliedro** $P \subseteq \mathbb{R}^n$ é o conjunto solução de um sistema de inequações lineares, isto é,

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\} ,$$

para uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e um vetor $b \in \mathbb{R}^m$.

Se $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e $a_0 \in \mathbb{R}$, então o poliedro $\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq a_0\}$ é denominado **semi-espço** e o poliedro $\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = a_0\}$ é denominado **hiperplano**. Para simplificar a notação, nos referimos ao semi-espço $a^T x \leq a_0$ ou ao hiperplano $a^T x = a_0$. Observe que todo poliedro $P \subset \mathbb{R}^n$ é a intersecção de um número finito de semi-espços do $\mathbb{R}^n$.

Um conjunto de vetores é um **politopo** se for o fecho convexo de um conjunto finito de vetores. É intuitivo que os conceitos de poliedro e politopo estão relacionados. Isto pode ser observado mais precisamente no teorema de decomposição de poliedros (Motzkin [1936]) e no corolário conhecido como teorema de base finita para politopos (Minkowski [1896], Steinitz [1916], Weyl [1935]).

Teorema I.1 (decomposição de poliedros): $P \subseteq \mathbb{R}^n$ é um poliedro se e somente se existem subconjuntos V e E em $\mathbb{R}^n$ tal que $P = \text{conv}(V) + \text{cone}(E)$.

Teorema I.2 (base finita para politopos): Um conjunto P é um politopo se e somente se P é um poliedro limitado.

O resultado abaixo mostra como a dimensão de um poliedro pode ser determinada.

Teorema I.3: Se $P \subseteq \mathbb{R}^n$ é um poliedro e $\text{aff}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n : Cx = d\}$ para alguma matriz $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $d \in \mathbb{R}^m$, então $\dim(P) = n - \text{posto}(C)$.

Dizemos que um poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$ tem **dimensão completa** se $\dim(P) = n$; neste caso, não existe equação $a^T x = a_0$, com $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $a_0 \in \mathbb{R}$, tal que $P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = a_0\}$.

Uma inequação $a^T x \leq a_0$ com $a \in \mathbb{R}^n$, $a_0 \in \mathbb{R}$, é **válida** para um poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$, se $P \subseteq \{x : a^T x \leq a_0\}$. Um conjunto $F \subseteq P$ é uma **face** de P se existe uma inequação válida $a^T x \leq a_0$ para P tal que $F = \{x \in P : a^T x = a_0\}$. Neste caso, dizemos que F é

a **face definida** ou **induzida** por $a^T x \leq a_0$. Observe que, em particular, P é face de P , considerando a inequação $0x \leq 0$; as demais faces serão denominadas **faces próprias**.

Faces próprias não vazias maximais ou minimais com relação à inclusão são de extrema importância na investigação de um poliedro. A seguir, descrevemos estas faces e apresentamos alguns resultados que serão usados no decorrer deste trabalho.

Uma face de um poliedro P consistindo de um único ponto é um **vértice**. Se P for um politopo, usando o resultado abaixo, prova-se que P é o fecho convexo de seus vértices.

Teorema I.4: *Seja x um ponto do poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^n$. São equivalentes:*

- (i) x é um vértice de P ;
- (ii) existe um vetor $c \in \mathbb{R}^n$ tal que x é o único vértice de P que maximiza $c^T x$, i.e., $c^T x > c^T y$ para todo $y \in P$;
- (iii) $x \notin \text{conv}(P - \{x\})$.

Dizemos que dois vértices de um poliedro P são **adjacentes**, se existe uma face de dimensão 1 (denominada aresta) que os contém.

O resultado abaixo contém algumas caracterizações de adjacência em um politopo.

Teorema I.5: *Seja $P \subset \mathbb{R}^n$ um politopo com conjunto de vértices V . Sejam x e y vértices distintos de P . São equivalentes:*

- (i) x e y são adjacentes;
- (ii) $z \notin \text{conv}(P - \{x, y\})$, para todo z , tal que $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$, $0 < \lambda < 1$;
- (iii) todo z , tal que $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$, $0 < \lambda < 1$, pode ser escrito de forma única como combinação convexa dos vértices de V ;
- (iv) existe um vetor $c \in \mathbb{R}^n$ tal que x e y são os únicos vértices que maximizam $c^T x$ sobre P .

Uma face própria de um poliedro P é uma **faceta** se for não vazia e não estiver contida em nenhuma outra face própria de P , ou seja, é uma face não vazia cuja dimensão é igual a $\dim(P) - 1$. A inequação que define uma faceta é referida como uma **inequação-faceta**. Muitas vezes, por simplicidade, dizemos que uma inequação é faceta de um poliedro, devendo ficar subentendido que se trata de uma inequação-faceta.

O teorema enunciado a seguir caracteriza inequações-facetadas.

Teorema I.6: *Seja $P \subseteq \mathbb{R}^n$ um poliedro e F uma face não vazia de P , $F = \{x \in P : a^T x = a_0\}$. São equivalentes:*

- (i) F é uma faceta de P ;
- (ii) $\dim(F) = \dim(P) - 1$;
- (iii) se $\text{aff}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n : Cx = d\}$ (sendo $Cx = d$ um sistema minimal de equações) e $F \subseteq \{x \in P : b^T x = b_0\}$, sendo $b^T x \leq b_0$ uma inequação-faceta de P , então $\exists \lambda \in \mathbb{R}^{n-\dim(P)}$ e $\alpha \in \mathbb{R}^*$, tal que $b^T = \lambda^T C + \alpha a^T$;
- (iv) se P tem dimensão completa e $F \subseteq \{x \in P : b^T x = b_0\}$, sendo $b^T x \leq b_0$ uma inequação-faceta de P , então existe $\alpha \in \mathbb{R}^*$, tal que $b^T = \alpha a^T$.

Note que se um poliedro tem dimensão completa, o resultado acima diz que para cada faceta existe uma única inequação que a define, a menos de multiplicação por reais não-negativos. Além disso, o teorema sugere duas formas para se provar que uma inequação $a^T x \leq a_0$, válida para um poliedro P de dimensão completa, é uma inequação faceta. Ou exibimos $\dim(P)$ vetores independentes afim que satisfazem $a^T x \leq a_0$ com igualdade, ou consideramos

$$F_a = \{x \in P : a^T x = a_0\} \subseteq F_b = \{x \in P : b^T x = b_0\},$$

sendo F_b faceta de P e provamos os itens (i) e (ii) abaixo:

(i) $F_a \neq \emptyset$;

(ii) existe $\alpha \in \mathbb{R}^*$ tal que $a^T = \alpha b^T$.

Freqüentemente usaremos este segundo método no capítulo III, omitindo a prova do item (i), por ser este um fato trivial nas demonstrações.

Dado um polítopo P , o **esqueleto** de P é definido como o grafo $G(P)$, tal que: $G(P)$ tem como conjunto de vértices o conjunto dos vértices de P e dois vértices u e v em $G(P)$ são ligados por uma aresta se e somente se u e v são adjacentes em P . O **diâmetro** de um polítopo P , referido como **diam**(P), é o diâmetro do esqueleto de P .

O problema de maximizar ou minimizar uma função linear sobre um poliedro é denominado **problema de programação linear** (abrevia-se **PL**). Usualmente descreve-se um PL na forma:

$$\begin{cases} \text{maximize} & c^T x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \end{cases} \quad \text{ou} \quad \max\{c^T x : Ax \leq b\},$$

sendo $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}^n$.

Um vetor $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $A\hat{x} \leq b$ é denominado uma **solução viável** do PL. Se $\hat{x}$ é uma solução viável tal que $c^T \hat{x} \geq c^T x'$ para toda solução viável x' do PL, então $\hat{x}$ é denominada uma **solução ótima**. A função $c^T x$ é comumente referida como **função objetivo**.

Um PL com restrição de integridade é chamado **problema de programação linear inteira** e é denotado por **PLI**. São problemas da seguinte forma:

$$\begin{cases} \text{maximize} & c^T x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \\ & x \text{ inteiro} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \max\{c^T x : Ax \leq b, \ x \text{ inteiro}\}.$$

O problema de programação linear obtido de um PLI, ignorando a restrição “ x é inteiro”, é chamado **problema (de programação) linear relaxado**.

Os problemas pesquisados nesta tese podem ser formulados como PLI com a restrição especial de que $x \in \{0,1\}^n$. Frequentemente, problemas de otimização combinatória podem ser formulados como PLI. Infelizmente, uma tal formulação não é muito útil do ponto de vista algorítmico, já que o problema PLI é INP-difícil (Garey e Johnson [1979]).

Resultados fundamentais e outros conceitos de programação linear e programação linear inteira podem ser encontrados em Chvátal [1983], Dantzig [1963] e Schrijver [1986]. Para complementar a teoria dos poliedros recomendamos Grünbaum [1967], Schrijver [1986], Pulleyblank [1983] e Brøndsted [1983].

I.3 Teoria da complexidade computacional

Nesta secção, discutimos de uma maneira informal e intuitiva alguns conceitos básicos da teoria da complexidade computacional. Definições precisas destes conceitos e resultados nesta teoria podem ser encontrados em Garey e Johnson [1979] ou em Aho, Hopcroft e Ullman [1974].

Um **problema** é definido como uma questão com vários **parâmetros** ou **variáveis** cujos valores não são especificados e cuja solução deve satisfazer algumas propriedades. Se todos os parâmetros assumem valores específicos no problema, temos uma **instância** do problema. Por exemplo, a questão “existe num dado grafo G um k -circuito?” é um problema com parâmetros G e k , em aberto. Se especificarmos o grafo G e o valor de k , temos uma instância do problema.

Informalmente, um **algoritmo** para um determinado problema é um procedimento finito, executado passo a passo que, aplicado a cada instância desse problema, produz uma solução. Na discussão de algoritmos, emerge naturalmente a seguinte questão: “como medir a **eficiência** de um algoritmo?” Para se determinar a eficiência de um algoritmo, deve-se considerar os esforços computacionais exigidos por ele e por esta razão várias medidas de complexidade computacional foram sugeridas por diferentes pesquisadores.

Em particular, poderíamos mencionar os trabalhos de Cook [1971] e Karp [1972]. Como o **tempo de computação** é a medida mais utilizada para se determinar a eficiência ou a complexidade de um algoritmo, nos restringimos a ele como a medida de complexidade de nossos algoritmos.

É intuitivo perceber que o tempo que um algoritmo gasta para resolver uma instância de um problema varia de acordo com o tamanho da instância. A medida do **tamanho de uma instância** (referida como o tamanho da instância) é feita com o auxílio de um **esquema de codificação**, isto é, uma função que mapeia cada instância do problema em uma cadeia finita de símbolos de um alfabeto fixo. O tamanho de uma instância I , que será denotado por $C(I)$ é referido como a **entrada** da instância ao computador. Naturalmente, $C(I)$ depende do esquema de codificação adotado e do modelo de computador que executará o algoritmo. Para nossa discussão informal, podemos adotar por exemplo, código binário e máquina de Turing ou números codificados em uma base fixa diferente da unidade e um computador real qualquer.

Dado um algoritmo A para um problema P , a **complexidade de tempo** de A é uma função f_A que mapeia cada natural n no tempo máximo requerido por A para a solução de uma instância I de P tal que $C(I) \leq n$. Um algoritmo A é **polinomial** se existe um polinômio $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f_A(n) \leq c|p(n)|$ para uma constante c . Neste caso, dizemos que a função $f_A(n)$ é da **ordem** de $p(n)$ e a denotamos por $f_A(n) = O(p(n))$. Um algoritmo polinomial é usualmente aceito como sendo um algoritmo eficiente e um problema é geralmente considerado **fácil** se existe um algoritmo polinomial que o resolva.

A seguir, veremos uma classificação sistemática dos problemas, de acordo com a complexidade computacional de seus algoritmos.

Vamos analisar dois tipos de problemas: os chamados **problemas de decisão** que admitem, para cada instância, apenas um dos dois tipos de solução: “SIM” ou “NÃO”, e os **problemas de busca**, que admitem, para cada instância, um número arbitrário de

soluções. Por exemplo, “existe num dado grafo G um circuito” é um problema de decisão e “encontre em G um circuito” é um problema de busca.

Inicialmente, consideremos apenas problemas de decisão e denotemos por IP a classe dos problemas de decisão que podem ser resolvidos por um algoritmo polinomial. Entre os problemas mais famosos para os quais não se conhece algoritmos polinomiais para resolvê-los, destaca-se o problema do **circuito hamiltoniano**, enunciado como: “dado um grafo G , G é hamiltoniano?” Observe que para cada instância deste problema, cuja resposta é SIM, é possível, dado um circuito, verificar através de um algoritmo polinomial se ele é um circuito hamiltoniano. Problemas com esta propriedade pertencem à classe dos problemas referida como INP .

Informalmente, define-se a classe INP em termos de um algoritmo não determinístico, isto é, a classe dos problemas de decisão Q , tais que para cada instância I de Q cuja resposta é SIM, existe uma estrutura S através da qual, pode-se verificar a veracidade da resposta em tempo polinomial em $C(I)$. Observe que não precisamos saber como encontrar S em tempo polinomial, apenas verificar a resposta em tempo polinomial, utilizando a estrutura S .

Dizemos que um problema Q pertence à classe $co - INP$ se a negação de Q é um problema em INP . Até o momento, não se sabe se o problema de decidir se um grafo é não hamiltoniano está em INP . Portanto, encontra-se em aberto a questão de decidir se o problema do circuito hamiltoniano pertence à classe $INP \cap co - INP$.

É fácil ver que $IP \subseteq INP$. A implicação contrária tem sido vastamente investigada, desde 1971 (Cook [1971], Karp [1972]) e é até hoje um dos maiores problemas em aberto na área de teoria da computação. Entretanto, a maioria dos pesquisadores desta área acredita na conjectura de que $IP \neq INP$. Para esclarecer melhor essa conjectura, vamos definir uma subclasse especial de problemas em INP , a classe dos problemas INP -completos.

Dados dois problemas de decisão Q e Q' , dizemos que Q é **polinomialmente trans-**

formável em Q' (denotamos por $Q \sim Q'$) se existe um algoritmo que a cada instância I de Q , produz em tempo polinomial uma instância I' de Q' tal que a solução de I é SIM se e somente se a solução de I' é SIM.

Um problema de decisão Q é INIP-completo se satisfaz às duas condições abaixo:

- (i) $Q \in \text{INIP}$;
- (ii) $\forall Q' \in \text{INIP}, Q' \sim Q$.

Da transitividade da relação $\sim$, segue que se $Q \in \text{INIP}$ e existe um problema INIP-completo $\hat{Q}$ tal que $\hat{Q} \sim Q$, então Q é INIP-completo. Este é o método comumente usado para se demonstrar que um problema é INIP-completo. Um outro método para verificarmos que um problema Q é INIP-completo é o da **restrição**, que consiste simplesmente em mostrar que Q contém um problema conhecido INIP-completo Q' , como um caso especial. Observe que a prova de que um problema qualquer Q pertence simultaneamente às classes INIP-completo e IP implica $\text{IP} = \text{INIP}$. Por este motivo, acredita-se que os problemas INIP-completos são os mais difíceis de INIP. O problema do circuito hamiltoniano é INIP-completo e uma longa lista destes problemas podem ser encontradas em Garey e Johnson [1979].

Dizemos que um problema de busca Q é **Turing-redutível** a um outro problema de busca Q' (denota-se por $Q \sim_T Q'$) se:

- i) existe um algoritmo A que resolve Q usando um algoritmo hipotético S que resolve Q' , como um procedimento.
- ii) A é um algoritmo polinomial para Q se S é um algoritmo polinomial para Q' .

Um problema de busca Q é **INIP-difícil** se existe um problema de decisão Q' INIP-completo tal que $Q' \sim_T Q$.

É fácil verificar que a existência de um algoritmo polinomial para resolver um problema INP-difícil implica na igualdade $IP = INP$, ou seja, os problemas da classe INP-difícil são pelo menos tão difíceis quanto os da classe INP.

Da transitividade da relação $\sim_T$ segue que se um problema Q é INP-difícil e $Q \sim_T Q'$ então Q' é INP-difícil.

Para finalizar esta seção, faremos algumas observações sobre complexidade computacional em problemas de otimização, que são os objetos principais da nossa pesquisa.

Sabe-se que a maioria dos problemas de otimização são INP-difíceis. Portanto, sob a hipótese de que $IP \neq INP$, é pouco provável que se encontre algoritmos polinomiais para resolvê-los. Logo, é razoável procurar heurísticas que produzem soluções aproximadas ou pesquisar instâncias especiais do problema que podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais.

Mostramos agora como um problema de decisão pode ser derivado de um problema de otimização. Se o problema de otimização P investiga a existência de uma estrutura de custo mínimo entre todas as estruturas de um certo tipo (por exemplo, um circuito hamiltoniano de custo mínimo em um grafo completo com custos nas arestas), podemos associá-lo com o problema de decisão Q que inclui um limite k como um parâmetro adicional e investigar a existência de uma estrutura de custo no máximo igual a k (ou no mínimo igual a k , se o problema de otimização for de maximização). Logo, Q está relacionado com P da seguinte forma: Se resolvemos P eficientemente, podemos resolver Q eficientemente. Mais precisamente, ocorre que $Q \sim_T P$. Portanto se Q for INP-completo, P será INP-difícil. Este é o procedimento que usaremos no próximo capítulo, para provar que um problema de otimização é INP-difícil.

Para finalizar, cabe aqui mencionar os artigos de Edmonds [1965] e Cobham [1965], da década de 60, que contêm algumas idéias seminais sobre eficiência de algoritmos, que foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria de complexidade computacional.

Capítulo II

Problemas da Pré-Ordem Completa, da Pré-Ordem e da Ordem Parcial

Este capítulo contém demonstrações estabelecendo a complexidade dos problemas da **ordem parcial**, da **pré-ordem** e da **pré-ordem completa**.

Em 1986, num estudo sobre a complexidade computacional dos chamados **problemas de agregação de relações binárias**, Wakabayashi [1986] mostrou a equivalência destes problemas com certos problemas de otimização sobre digrafos, cujas instâncias são digrafos completos com pesos nas arestas, todos de mesma paridade. Nesse estudo, vários problemas foram provados serem INIP-difíceis. Fazendo uso de idéias encontradas nesse trabalho, apresentamos aqui, a prova da complexidade computacional dos problemas de nosso interesse, introduzindo algumas simplificações, já que não temos nenhuma restrição quanto à paridade dos pesos das arestas.

Devido a sua forte relação com os nossos problemas, incluímos também o estudo da complexidade do problema da **ordem linear**. Este problema, também referido na

literatura como o problema do torneio transitivo foi estudado por Reinelt [1985].

II.1 Os problemas

Como estabelecemos no capítulo anterior, $D_n = (V_n, A_n)$ denota o digrafo completo com n vértices. Uma função $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$ será referida como uma função *peso* nas arestas do digrafo. Se $A \subseteq A_n$ e p é uma função de A_n em $\mathbb{Z}$, então **peso de A**, denotado por $p(A)$, é a soma dos pesos das arestas de A , isto é,

$$p(A) = \sum_{\alpha \in A} p(\alpha) .$$

Cada um dos problemas que definimos a seguir, tem como parâmetros um digrafo completo $D_n = (V_n, A_n)$ e uma função peso $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$.

Problema da Ordem Linear (OL): Encontrar em D_n uma *ordem linear* $A \subseteq A_n$ de peso máximo.

Problema da Pré-Ordem Completa (POC): Encontrar em D_n uma *pré-ordem completa* $A \subseteq A_n$ de peso máximo.

Problema da Pré-Ordem (PO): Encontrar em D_n uma *pré-ordem* $A \subseteq A_n$ de peso máximo.

Problema da Ordem Parcial (OP): Encontrar em D_n uma *ordem parcial* $A \subseteq A_n$ de peso máximo.

Observe que a propriedade transitiva é comum às relações de ordem procuradas. Na ordem linear, pesquisamos subdigrafos geradores acíclicos transitivos totais; na ordem parcial, subdigrafos acíclicos transitivos; na pré-ordem completa, subdigrafos geradores transitivos totais; e na pré-ordem, subdigrafos transitivos. O diagrama abaixo ilustra a

relação dessas ordens em um digrafo completo.

II.2 Complexidade computacional

Provaremos que os problemas OL , OP , PO e POC são INP-difíceis, mostrando que o problema de decisão derivado de cada um destes problemas de otimização, conforme descrevemos no capítulo I, é INP-completo. É imediato como resolver qualquer um destes problemas de decisão em tempo polinomial por um algoritmo não determinístico; assim, omitimos de nossas demonstrações o fato de que estes problemas pertencem à classe INP. O problema do subdigrafo acíclico de peso máximo de um digrafo com peso nas arestas, será utilizado para mostrarmos que o problema de decisão associado a OL é INP-completo.

Associados aos problemas de procura OL , POC , PO e OP , vamos definir os problemas

de decisão $\widehat{OL}$, $\widehat{POC}$, $\widehat{PO}$ e $\widehat{OP}$, respectivamente. Cada um destes problemas tem como parâmetros um digrafo completo $D_n = (V_n, A_n)$, uma função $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$ e um inteiro k .

Problemas:

$\widehat{OL}$: Existe em D_n uma *ordem linear* $B \subseteq A_n$, ou equivalentemente, um *torneio transitivo* $H = (V_n, B)$, tal que $p(B) \geq k$?

$\widehat{POC}$: Existe em D_n uma *pré-ordem completa* $B \subseteq A_n$, ou equivalentemente, um *subdigrafo transitivo total* $H = (V_n, B)$, tal que $p(B) \geq k$?

$\widehat{PO}$: Existe em D_n uma *pré-ordem* $B \subseteq A_n$, ou equivalentemente, um *subdigrafo transitivo* $H = (V_n, B)$, tal que $p(B) \geq k$?

$\widehat{OP}$: Existe em D_n uma *ordem parcial* $B \subseteq A_n$, ou equivalentemente, um *subdigrafo acíclico transitivo* $H = (V_n, B)$, tal que $p(B) \geq k$?

O lema abaixo será usado para provarmos que os problemas $\widehat{OL}$ e $\widehat{OP}$ são INP-completos.

Lema II.1: Se $H = (V_n, B)$ é um subdigrafo acíclico de $D_n = (V_n, A_n)$, então H é um subdigrafo de um torneio transitivo $H' = (V_n, B')$ de D_n .

Prova: Indução em n .

Se $|V_n| = 1$ ou $B = \emptyset$, o lema é obviamente válido. Suponha então que $|V_n| > 1$ e $B \neq \emptyset$. É fácil ver que H possui um sorvedouro, digamos u . Seja $\hat{H} := H - u$. Pela hipótese de indução, $\hat{H}$ está contido em um torneio transitivo gerador de $D_n - u$, digamos T . Seja H' o digrafo obtido de T , adicionando a ele o vértice u e o conjunto de arestas $\{(w, u) : w \in VT\}$. É fácil ver que H' é um torneio transitivo gerador de D_n que contém H . □

O teorema II.2 usa o fato de que o problema de decisão descrito abaixo é INP-completo (Karp [1972]).

Problema do Subdigrafo Acíclico (PSA)

Parâmetros: Digrafo $D = (V, A)$ sem laços; inteiro positivo k .

Questão: Existe $B \subseteq A$ tal que $D[B]$ é um *subdigrafo acíclico* e $|B| \geq k$?

Teorema II.2: O problema de decisão $\widehat{OL}$ é INP-completo.

Prova: Dada uma instância do PSA, que consiste de um digrafo $D = (V, A)$ com n vértices e um inteiro positivo k , a correspondente instância do problema $\widehat{OL}$ será obtida da seguinte forma: $D_n = (V, A_n)$ é o digrafo completo obtido de D , adicionando arestas (u, v) tais que $u \neq v$ e $(u, v) \notin A$, e os custos $p(\alpha)$ para cada $\alpha \in A_n$ são definidos como:

$$p(\alpha) := \begin{cases} 1, & \text{se } \alpha \in A \\ 0, & \text{se } \alpha \in A_n \setminus A \end{cases}.$$

Vamos provar que D tem um *subdigrafo acíclico* $H = (V, B)$ com $|B| \geq k$ se e somente se D_n tem um *torneio transitivo* $H' = (V, B')$ com $p(B') \geq k$.

- (i) Seja $H = (V, B)$ um subdigrafo acíclico em D , tal que $|B| \geq k$. Então H é um subdigrafo acíclico de D_n . Pelo lema II.1, existe um torneio transitivo $H' = (V, B')$ em D_n que contém H . Logo,

$$p(B') = p(B) + p(B' \setminus B) \geq |B| \geq k.$$

- (ii) Seja $H' = (V, B')$ um torneio transitivo em D_n com $p(B') \geq k$. Considere o conjunto $B := \{\alpha \in B' : p(\alpha) = 1\}$.

Como $p(\alpha) = 0$ ou $p(\alpha) = 1$ para todo $\alpha \in B'$, segue que $|B| = p(B')$, donde $|B| \geq k$.

Então $H = (V, B)$ é um subdigrafo acíclico de D , com $|B| \geq k$.

□

Observação: Segue da demonstração do teorema anterior, que $\widehat{OL}$ é INP-completo mesmo se $p(\alpha) \in \{0, 1\}$ para toda aresta α e k é um inteiro positivo. Vamos nos referir a este particular problema como $\widehat{OL}(0, 1)$.

Teorema II.3: *O problema de decisão $\widehat{OP}$ é INP-completo.*

Prova: Considere $D_n = (V_n, A_n)$ e $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $p(\alpha) \in \{0, 1\}$ para todo $\alpha \in A_n$ e k um inteiro positivo.

Pelo lema II.1, podemos afirmar que D_n possui um *subdigrafo acíclico transitivo* (gerador) de peso pelo menos k se e somente se D_n possui um *torneio transitivo gerador* de peso pelo menos k , ou seja, se nos restringirmos às instâncias de $\widehat{OP}$ e $\widehat{OL}$ onde $p(\alpha) \in \{0, 1\}$ e k é um inteiro positivo, esses problemas são equivalentes. Como $\widehat{OL}(0, 1)$ é INP-completo, segue que $\widehat{OP}$ é INP-completo.

□

Teorema II.4: *O problema de decisão $\widehat{PO}$ é INP-completo.*

Prova: Mostraremos que $\widehat{OL}(0, 1)$ é polinomialmente transformável em $\widehat{PO}$. Com este objetivo em mente, suponha que $D_n = (V_n, A_n)$, uma função p e um inteiro positivo k ($k \leq \binom{n}{2}$), são dados como uma instância de $\widehat{OL}(0, 1)$ e vamos construir uma instância correspondente de $\widehat{PO}$, definida por D'_n, p' e k' . Assuma que $V_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $n \geq 2$. Então $D'_n = (V'_n, A'_n)$ é o digrafo completo de ordem $2n$ tal que $V'_n = \{u_1, u_2 : u \in V_n\}$. Os pesos p'_α das arestas α de A'_n são definidos como:

$$p'_\alpha := \begin{cases} -n^8 & , \text{ se } \alpha = (u_1, u_2), \quad u \in V_n \\ n^4 & , \text{ se } \alpha = (u_2, u_1), \quad u \in V_n \\ -n^2 & , \text{ se } \alpha = (u_2, v_1), \quad u \text{ e } v \in V_n, \quad u \neq v \\ 0 & , \text{ se } \alpha = (u_2, v_2), \quad u \text{ e } v \in V_n, \quad u \neq v \\ p_{uv} + n^2 & , \text{ se } \alpha = (u_1, v_1), \quad 1 \leq u < v \leq n \\ p_{vu} + n^2 & , \text{ se } \alpha = (v_1, u_2), \quad 1 \leq u < v \leq n \\ n^2 & , \text{ em caso contrário.} \end{cases}$$

O valor de k' é definido por:

$$k' := k + n^5 + \binom{n}{2} n^2 .$$

Figura II.1

Vamos provar que $D_n = (V_n, A_n)$ possui um *torneio transitivo* $H = (V_n, B)$ com $p(B) \geq k$ se e somente se $D'_n = (V'_n, A'_n)$ possui um *subdigrafo transitivo* $H' = (V'_n, B')$ com $p'(B') \geq k'$.

Observe que para cada par u, v , $1 \leq u < v \leq n$, as arestas (u, v) e (v, u) em D_n correspondem às arestas (u_1, v_1) e (v_1, u_2) em D'_n , respectivamente, e que os pesos destas

arestas acrescidos de n^2 constituem os pesos das respectivas arestas em D'_n (veja a figura II.1).

O peso da aresta (u_1, u_2) , $u \in V_n$ foi escolhido convenientemente, de tal forma que as arestas (u_1, v_1) e (v_1, u_2) não possam pertencer simultaneamente a um subdigrafo transitivo $H' = (V'_n, B')$ de D'_n , com $p(B') \geq k'$. Assim, as correspondentes arestas darão origem a um *torneio* em D_n .

Os pesos das demais arestas e o valor de k' foram escolhidos de tal forma que todo subdigrafo transitivo $H' = (V'_n, B')$ de D'_n com $p'(B') \geq k'$ é um *torneio transitivo* em D'_n . Com isto, esta mesma prova será suficiente para provarmos que $\widehat{PO}$ e $\widehat{POC}$ são NP-completos.

- (i) Dado um torneio transitivo $H = (V_n, B)$ em D_n , com $p(B) \geq k$, vamos construir $H' = (V'_n, B')$, definindo:

$$B' := \{(u_2, u_1) : u \in V_n\} \cup \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), (u_2, v_1), (u_2, v_2) : (u, v) \in B\} .$$

Para cada par $\alpha = (u, v)$, $1 \leq u, v \leq n$, seja R_α o seguinte subdigrafo básico.

Vamos provar inicialmente que $p'(B') \geq k'$.

Note que H' é a união de todos os subdigrafos básicos R_α , cada um deles correspondente à uma aresta $\alpha \in B$. Devido à estrutura bastante simétrica do grafo H' , é fácil verificar que:

$$\begin{aligned}
p'(B') &= \sum_{(u,v) \in B} p'(AR_{(u,v)} - (u_2, u_1) - (v_2, v_1)) + \sum_{u \in V_n} p'(u_2, u_1) \\
&= \sum_{\alpha \in B} (p(\alpha) + n^2) + nn^4 \\
&= p(B) + \binom{n}{2} n^2 + n^5 \geq k + n^5 + \binom{n}{2} n^2 = k'.
\end{aligned}$$

Resta provar que H' é transitivo.

Claramente, cada subdigrafo básico de H' é transitivo. Vamos mostrar que se $e := (u_r, v_s)$ e $f := (v_s, w_t)$ com $r, s, t \in \{1, 2\}$ são arestas de B' pertencentes a subdigrafos básicos distintos, então $g := (u_r, w_t) \in B'$. Note que u, v e w são dois a dois distintos, senão, e e f estariam no mesmo subdigrafo básico.

Como $(u_r, v_s) \in B'$ e $(v_s, w_t) \in B'$, sendo u, v e w dois a dois distintos, da definição de B' , segue que (u, v) e $(v, w) \in B$. Como H é transitivo, $(u, w) \in B$. Logo, $(u_p, v_q) \in B'$ para $p, q \in \{1, 2\}$, donde $g \in B'$.

Então H' é um torneio transitivo com $p(B') \geq k'$, como queríamos demonstrar.

- (ii) Seja $H' = (V'_n, B')$ um subdigrafo transitivo de D'_n com $p'(B') \geq k'$. Antes de construirmos um torneio transitivo $H = (V_n, B)$ de D_n , com $p(B) \geq k$, vamos verificar algumas propriedades do digrafo H' .

(P1) B' não contém nenhuma aresta α com $p'_\alpha = -n^8$.

Suponha que B' contenha tal aresta. Então,

$$\begin{aligned}
p'(B') &\leq -n^8 + n^5 + \binom{n}{2}(2 + 4n^2) \\
&= -n^8 + n^5 + n^2 \binom{n}{2} + (2 + 3n^2) \binom{n}{2} \\
&\leq -n^8 + \frac{3n^4}{2} + n^5 + n^2 \binom{n}{2} \\
&< n^5 + n^2 \binom{n}{2} \leq k',
\end{aligned}$$

uma contradição.

(P2) Para todo par (u, v) , $1 \leq u < v \leq n$, os pares de arestas (u_1, v_1) , (v_1, u_2) e (v_1, u_1) , (u_1, v_2) não pertencem simultaneamente ao grafo H' .

Esta propriedade pode ser facilmente verificada a partir de (P1), dado que H' é transitivo.

(P3) B' contém todas as arestas α com $p'_\alpha = n^4$.

Suponha que isto não ocorra. Dada a validade de (P1) e (P2), temos:

$$\begin{aligned}
p'(B') &\leq (n-1)n^4 + \binom{n}{2}(2n^2 + 1) \\
&= n^5 + \binom{n}{2}n^2 - n^4 + \binom{n}{2}(n^2 + 1) \\
&< n^5 + \binom{n}{2}n^2 \\
&\leq k'.
\end{aligned}$$

Nos próximos dois casos, apresentaremos propriedades relativas às arestas de B' que têm ambos os extremos no conjunto $\{u_1, u_2, v_1, v_2\}$, sendo $u, v \in V_n$, $u \neq v$.

Com este objetivo, dados u e v , $1 \leq u \neq v \leq n$, seja

$$\hat{B} = B' \cap (AR_\alpha \cup AR_{\bar{\alpha}}), \quad \text{onde } \alpha = (u, v).$$

$$(P4) \quad 2n^4 + n^2 \leq p'(\hat{B}) \leq 2n^4 + n^2 + 1 \quad .$$

Seja $X := \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), (v_1, u_1), (v_1, u_2)\}$ e $Y := \{(u_2, v_1), (v_2, u_1)\}$.

Então

$$p'(\hat{B}) = 2n^4 + p'(\hat{B} \cap X) + p'(\hat{B} \cap Y) \quad .$$

Se $\hat{B} \cap X = \emptyset$, então $p'(\hat{B}) \leq 2n^4$, donde $p'(\hat{B}) \leq 2n^4 + n^2 + 1$.

Suponha agora que $\hat{B} \cap X \neq \emptyset$. Por (P2), temos que $|\hat{B} \cap X| \leq 2$, e portanto, $p'(\hat{B} \cap X) \leq 2n^2 + 1$. Por outro lado, de (P3) e da transitividade de H' , vem que $|\hat{B} \cap Y| \geq 1$. Como as arestas de Y têm peso $-n^2$, segue que

$$p'(\hat{B}) \leq 2n^4 + n^2 + 1 \quad .$$

Para completar a prova de (P4), suponha por contradição que $p'(\hat{B}) < 2n^4 + n^2$. Neste caso, $p'(\hat{B}) \leq 2n^4 + 1$. Logo,

$$\begin{aligned} p'(B') &= p'(\hat{B}) + p'(B' \setminus \hat{B}) \\ &\leq n^5 + \left(\binom{n}{2} - 1 \right) (n^2 + 1) + 1 \\ &= n^5 + \binom{n}{2} n^2 + \binom{n}{2} - n^2 - 1 + 1 \\ &< n^5 + \binom{n}{2} n^2 \\ &\leq k' \quad , \end{aligned}$$

uma contradição.

$$(P5) \quad \text{Ou } \hat{B} = AR_\alpha \text{ ou } \hat{B} = AR_{\bar{\alpha}} \quad .$$

Como $p'(\hat{B}) \geq 2n^4 + n^2$, então $|X \cap \hat{B}| \geq 1$. Conforme vimos na demonstração de (P4), $\hat{B}$ possui uma aresta com peso $-n^2$. Como $n \geq 2$, segue que $|X \cap \hat{B}| \geq 2$. De (P2), $|X \cap \hat{B}| \leq 2$, e portanto $|X \cap \hat{B}| = 2$.

Se (u_1, v_1) e $(v_1, u_1) \in \hat{B}$, então (u_2, v_1) e $(v_2, u_1) \in \hat{B}$, donde $p'(\hat{B}) \leq 2n^4 + 1$, uma contradição. Logo, (u_1, v_1) e (v_1, u_1) não pertencem simultaneamente a $\hat{B}$.

Suponha agora que $(u_1, v_1) \in \hat{B}$. Então (v_1, u_1) e $(v_1, u_2) \notin \hat{B}$. Logo, $(u_1, v_2) \in \hat{B}$. Da transitividade de H' , segue que $(u_2, v_2) \in \hat{B}$ e $(u_2, v_1) \in \hat{B}$.

Se $(v_2, u_1) \in \hat{B}$, então $p'(\hat{B}) \leq 2n^4 + 1$, uma contradição. Se $(v_2, u_2) \in \hat{B}$, então $(v_2, u_1) \in \hat{B}$, uma contradição.

Logo, $\hat{B} = AR_\alpha$.

Com raciocínio análogo, verifica-se que se $(v_1, u_1) \in \hat{B}$, então $\hat{B} = AR_{\bar{\alpha}}$.

De (P5), segue que H' é um torneio em D'_n . Agora estamos em condições de mostrar a existência de um torneio transitivo $H = (V_n, B)$ em D_n , com $p(B) \geq k$. Seja

$$B := \{(u, v) : (u_1, v_1) \in B'\} .$$

Para todo par $u, v, 1 \leq u, v \leq n$, segue de (P5) que $(u_1, v_1) \in B'$, ou $(v_1, u_1) \in B'$, mas não ambos. Logo, $(u, v) \in B$, ou $(v, u) \in B$, mas não ambos, donde H é um torneio.

Para provar que H é transitivo, suponha que (u, v) e (v, w) são arestas de B , sendo $u \neq v, u \neq w$ e $v \neq w$.

Então (u_1, v_1) e (v_1, w_1) são arestas de B' . Como H' é transitivo, $(u_1, w_1) \in B'$ e portanto $(u, w) \in B$.

A validade da inequação $p(B) \geq k$ pode ser facilmente concluída, dada a estrutura de B' , caracterizada pela propriedade (P5) e o fato de que $p'(B') \geq k'$.

Como a transformação apresentada é polinomial, segue que $\widehat{PO}$ é INIP-completo.

□

Da demonstração acima, concluímos que se $H' = (V_n, B')$ é um subdigrafo transitivo de D'_n com $p'(B') \geq k'$, então H' é um torneio transitivo de D'_n . Portanto, esta mesma prova também garante a validade do seguinte teorema:

Teorema II.5: *O problema de decisão $\widehat{POC}$ é INP-completo.*

□

Capítulo III

Politopo da pré-ordem completa, da pré-ordem e da ordem parcial: dimensão e estrutura facial

III.1 Introdução

Estudamos neste capítulo a estrutura facial dos politopos associados aos problemas da **pré-ordem completa**, da **pré-ordem** e da **ordem parcial**.

Como mencionamos na introdução deste trabalho, tais resultados poderiam ser usados no desenvolvimento de algoritmos para esses problemas. De fato, são conhecidos na literatura, exemplos de problemas de otimização combinatória, onde o conhecimento parcial das facetas dos politopos a eles associados combinado com técnicas de programação linear, resultou em algoritmos que se mostraram bastante satisfatórios (sob o ponto de vista computacional) na resolução de instâncias reais. Tal abordagem, conhecida como **método dos planos-de-corte**, teve seu impulso com o sucesso obtido para o *problema*

do caixeiro viajante (Grötschel & Padberg [1985], Padberg & Grötschel [1985], Crowder e Padberg [1980]).

Além do problema do caixeiro viajante, outros onde esta abordagem forneceu bons resultados foram: o *problema da ordem linear* (Grötschel, Jünger e Reinelt [1984a, 1984b]), o *problema da partição em cliques* (Grötschel & Wakabayashi [1989]), o *problema do corte máximo* (Barahona & Maccione [1982]) e o *problema da ordenação seqüencial* (Ascheuer, Escudero, Grötschel & Stoer [1990]).

Na próxima seção discutiremos informalmente a idéia básica dessa abordagem poliédrica.

III.2 Definições e resultados básicos

Esta seção introduz os politopos P_{POC} , P_{PO} e P_{OP} , que associaremos aos problemas da **pré-ordem completa**, da **pré-ordem** e da **ordem parcial**, respectivamente. Por simplicidade, nos referiremos a esses politopos como da pré-ordem completa, da pré-ordem e da ordem parcial, respectivamente.

Convencionaremos aqui que cada um desses problemas tem como parte de uma instância um digrafo completo $D_n = (V_n, A_n)$ com n vértices, e denotaremos por $P_{POC}(n)$, $P_{PO}(n)$ e $P_{OP}(n)$, os respectivos politopos.

Dado um digrafo completo, $D_n = (V_n, A_n)$, lembramos que se $A \subseteq A_n$, o vetor característico de A , $x^A = (x_e^A)_{e \in A_n}$, é definido como

$$x_e^A = \begin{cases} 1 & , \text{ se } e \in A \\ 0 & , \text{ se } e \in A_n \setminus A. \end{cases}$$

Note que x^A pode ser visto como um vetor no espaço $|A_n|$ -dimensional $\mathbb{R}^{A_n}$ (cujos vetores estão indexados por A_n). Assim, podemos definir politopos em $\mathbb{R}^{A_n}$ tomando-se o fecho convexo de certos vetores característicos. É este o procedimento que adotaremos para definir cada um dos politopos $P_{POC}(n)$, $P_{PO}(n)$ e $P_{OP}(n)$, todos eles em $\mathbb{R}^{A_n}$.

Definição III.1: O politopo da *pré-ordem completa* (*pré-ordem*, *ordem parcial*) é o fecho convexo dos vetores característicos dos *pré-ordens completas* (*pré-ordens*, *ordens parciais*) de D_n . Isto é,

- $P_{POC}(n) = \text{conv}\{x^A \in \{0, 1\}^{A_n} : A \text{ é uma pré-ordem completa de } D_n\}$,
- $P_{PO}(n) = \text{conv}\{x^A \in \{0, 1\}^{A_n} : A \text{ é uma pré-ordem de } D_n\}$,
- $P_{OP}(n) = \text{conv}\{x^A \in \{0, 1\}^{A_n} : A \text{ é uma ordem parcial de } D_n\}$.

Como veremos a seguir, esses politopos têm uma estreita relação com o politopo da *ordem linear*, que denotaremos por $P_{OL}(n)$, definido analogamente, i.é:

- $P_{OL}(n) = \text{conv}\{x^A \in \{0, 1\}^{A_n} : A \text{ é uma ordem linear de } D_n\}$.

Este último politopo foi estudado por Reinelt [1985].

Note que cada um dos politopos foi definido como o fecho convexo de um conjunto de vetores 0/1. É um fato conhecido e fácil de provar, que tais politopos têm como vértices exatamente o conjunto dos vetores 0/1 considerado. Portanto, cada um dos politopos têm como vértices as possíveis soluções do problema em questão.

Segue então que se $p : A_n \rightarrow \mathbb{Z}$ é a função peso, que é dada como parte de uma instância do problema da pré-ordem completa (respectivamente pré-ordem e ordem parcial), esses problemas podem ser formulados da seguinte maneira:

$$POC(n) \quad \begin{cases} \text{maximize } p^T x \\ \text{sujeito a } x \in P_{POC}(n) \end{cases}$$

$$PO(n) \quad \begin{cases} \text{maximize } p^T x \\ \text{sujeito a } x \in P_{PO}(n) \end{cases}$$

$$OP(n) \quad \begin{cases} \text{maximize } p^T x \\ \text{sujeito a } x \in P_{OP}(n) \end{cases}$$

Note que os problemas acima são problemas de *programação linear*. Assim, poder-se-ia pensar em aplicar técnicas de programação linear para resolvê-los. Em princípio, para que isto fosse possível, seria necessário conhecer, ou saber gerar eficientemente, uma *descrição completa* do politopo em questão, digamos P . Isto é, seria preciso encontrar um sistema de inequações lineares $Ax \leq b$ tal que

$$P = \{x : Ax \leq b\} .$$

Sabe-se que para qualquer politopo P , tal sistema existe (Weyl [1935]). Não se sabe, porém, de nenhum problema combinatório INIP-difícil para o qual uma tal descrição completa seja conhecida. Além disso, conforme resultados devidos a Papadimitriou [1984], sabe-se que se o problema é INIP-difícil, então é pouco provável que se encontre uma descrição completa que seja ‘boa’ (no sentido de que o conjunto das facetas do politopo em questão esteja em INIP).

Neste ponto, devemos observar que, mesmo se conhecêssemos uma tal descrição, se o sistema contiver um número exponencial (em relação ao tamanho da instância) de inequações, certamente não seria viável listá-las todas e utilizar métodos convencionais de programação linear para se resolver o problema.

Para efeito de raciocínio, suponha que conhecemos o sistema $Ax \leq b$ que descreve P e que queremos resolver: $\max\{p^T x : x \in P\}$ (são conhecidos vários problemas polinomiais onde isto ocorre, como por exemplo, o problema do emparelhamento (Edmonds [1985])). Um procedimento que poderia então ser usado, é o seguinte:

1. Comece com uma *descrição parcial* de P ; i.e., um sistema $(S) : A'x \leq b'$, tal que

$$P \subseteq \{x : A'x \leq b'\} .$$

2. Resolva o problema de programação linear $\max\{p^T x : x \text{ satisfaz } S\}$, encontrando uma solução ótima $\bar{x}$.
3. Teste se $\bar{x}$ é um vértice de P . Se isto ocorrer, então $\bar{x}$ é solução ótima do problema original, pare. Senão, procure em $Ax \leq b$ uma inequação $a^T x \leq \beta$ tal que $a^T \bar{x} > \beta$. (Este último problema é chamado problema da *separação* ou *identificação de inequações violadas*.)

Se foi encontrada uma tal inequação, chame de S' o sistema obtido de S acrescentando-se essa inequação. Volte ao passo 2.

Se não foi encontrada, então pare. O ponto $\bar{x}$ não é solução ótima do problema original, mas fornece uma cota superior para o valor de $\max\{p^T x : x \in P\}$.

□

Note que, no procedimento acima descrito, parte-se de um subsistema de $Ax \leq b$, i.e., de uma *descrição parcial de P* , e vai-se gerando inequações violadas (pela solução corrente) à medida que isso se faz necessário. Eventualmente, sem fazer uso do sistema completo $Ax \leq b$, é possível encontrar uma solução ótima da particular instância considerada.

O procedimento descrito é essencialmente o *método dos planos-de-corte*. Observe que este procedimento pode ser aplicado mesmo que não se conheça o sistema $Ax \leq b$ que descreve P . Neste caso, ao invés de um tal sistema, usa-se um subsistema que dá apenas uma descrição parcial de P .

É importante notar que, para que este método seja útil do ponto de vista computacional, é preciso que o problema da separação seja resolvido eficientemente. É claro então que, se o sistema considerado contém um número exponencial de inequações, a identificação de inequações violadas não poderá ser feita através de um teste exaustivo. A este respeito, lembramos que se o problema da separação puder ser resolvido em tempo polinomial (no tamanho da instância) então o problema de otimização (relativo ao

sistema considerado) pode ser resolvido em tempo polinomial (cf. Grötschel, Lovász & Schrijver [1981]). No caso de problemas INIP-difíceis, são usadas heurísticas para resolver o problema da separação.

Eventualmente, se no passo 3 não conseguimos resolver o problema da separação, então devemos aplicar o método ‘branch-and-bound’ para se chegar a uma solução ótima.

Na descrição informal acima, apresentamos apenas a essência do método dos planos-de-corte. Recomendamos ao leitor interessado em detalhes e aspectos relativos à implementação desse método que consulte Padberg & Grötschel [1985].

Finalizamos esta discussão introdutória, mostrando que os politopos $P_{POC}(n)$, $P_{PO}(n)$ e $P_{OP}(n)$ têm dimensão completa. Nas demonstrações deste fato e em outras a seguir, o conceito de *inequação induzida* por um digrafo será usada.

Se $G = (V, A)$ é um subdigrafo de $D_n = (V_n, A_n)$, dizemos que uma inequação da forma

$$\sum_{\alpha \in A} a_{\alpha} x_{\alpha} \leq a_0, \quad a_{\alpha} \neq 0$$

é uma *inequação induzida* por G . Para relacioná-la com um dos politopos $P_{OL}(n)$, $P_{OP}(n)$, $P_{PO}(n)$ ou $P_{POC}(n)$, basta estendê-la para uma inequação em $\mathbb{R}^{A_n}$, da seguinte forma:

$$a^T x = \sum_{\alpha \in A_n} a_{\alpha} x_{\alpha} \leq a_0, \text{ onde } a \in \mathbb{R}^{A_n} \text{ e } a_{\beta} = 0 \text{ se } \beta \in A_n \setminus A.$$

Sempre que nos referirmos a uma inequação, digamos $a^T x \leq a_0$, fica subentendido que ela é uma inequação induzida por um subdigrafo de D_n .

Proposição III.2: *Os politopos $P_{PO}(n)$ e $P_{OP}(n)$ têm dimensão completa, isto é,*

$$\dim P_{PO}(n) = \dim P_{OP}(n) = |A_n| = n(n-1).$$

Prova: Basta observar que o vetor 0 e os vetores unitários em $\mathbb{R}^{A_n}$ são vetores de incidência de ordens parciais de D_n e que este conjunto de vetores é independente afim.

□

Proposição III.3: *O politopo $P_{POC}(n)$ tem dimensão completa, isto é,*

$$\dim P_{POC}(n) = n(n-1) .$$

Prova: Considere $a^T x = b$ uma equação tal que

$$P_{POC}(n) \subseteq \{x \in \{0,1\}^{A_n} : a^T x = b\} .$$

Seja $\alpha = (u, v)$ uma aresta qualquer de D_n . Considere a ordem linear $O = \langle v, u, w_1, \dots, w_s \rangle$ de D_n , sendo $\langle w_1, \dots, w_s \rangle$ uma ordem linear arbitrária de $D_n - \{u, v\}$. Considerando o conjunto de arestas $E = A(O)$, observa-se que E e $E \cup \{\alpha\}$ são pré-ordens completas de D_n . Então,

$$\sum_{\beta \in E} a_\beta x_\beta = \sum_{\beta \in E} a_\beta x_\beta + a_\alpha x_\alpha = b, \quad \text{donde } a_\alpha = 0 .$$

Logo, a é um vetor de zeros e a prova está completa, de acordo com o Teorema I.3.

□

III.3 Facetas

Nesta seção apresentaremos várias classes de facetas para os politopos $P_{OP}(n)$, $P_{PO}(n)$ e $P_{POC}(n)$. Algumas classes são comuns aos três politopos em estudo, outras a somente dois deles. Também descrevemos classes de facetas apenas para $P_{POC}(n)$ ou para $P_{OP}(n)$.

O *lema da elevação*, demonstrado abaixo, será de grande utilidade nesta seção, pois dada uma inequação $a^T x \leq b$, a prova de que ela é uma faceta de um dos politopos, digamos de $P_{PO}(n)$, seguirá, na maioria das vezes, o seguinte roteiro:

- (i) mostra-se que $a^T x \leq b$ é uma inequação válida para $P_{PO}(n)$;
- (ii) mostra-se que $a^T x \leq b$ é uma faceta de $P_{PO}(2)$ ou $P_{PO}(3)$;
- (iii) mostra-se, usando o lema da elevação, que $a^T x \leq b$ é uma faceta de $P_{PO}(k)$, para todo k , $k \geq 2$ ou $k \geq 3$.

Juntamos em um único lema, resultados para os politopos $P_{PO}(k)$, $P_{OP}(k)$ ou $P_{POC}(k)$. Basta substituir todas as ocorrências de $P(k)$, que ocorrem no lema de elevação, e teremos um resultado para cada um dos politopos em questão.

No que segue, vamos supor que o digrafo completo $D_n = (V_n, A_n)$ é tal que $V_n = \{1, 2, \dots, n\}$.

Lema III.4 (Lema da Elevação): *Seja $a^T x \leq a_0$ uma inequação-faceta de $P(n)$, $n \geq 2$.*

Defina $\hat{a} \in \mathbb{R}^{n(n+1)}$ como:

$$\begin{aligned}\hat{a}_{i,j} &= a_{i,j}, \text{ se } (i,j) \in A_n \\ \hat{a}_{i,n+1} &= \hat{a}_{n+1,i} = 0, \text{ se } i = 1, \dots, n.\end{aligned}$$

Se $A \subseteq A_n$ é uma ordem linear de D_n tal que $a^T x^A = a_0$, então $\hat{a}^T x \leq a_0$ é uma inequação-faceta de $P(n+1)$.

Prova: A inequação $\hat{a}^T x \leq a_0$ é obviamente válida para $P(n+1)$. Seja $F_{\hat{a}}$ a face de $P(n+1)$ definida por:

$$F_{\hat{a}} = \{x \in P(n+1) : \hat{a}^T x = a_0\}.$$

Suponha que $\hat{b}^T x \leq b_0$ é uma inequação-faceta de $P(n+1)$ tal que

$$F_{\hat{a}} \subseteq F_{\hat{b}} = \{x \in P(n+1) : \hat{b}^T x = b_0\}. \quad (1)$$

Seja $O = \langle i_1, i_2, \dots, i_n \rangle$ uma ordem linear de D_n tal que $a^T x^{A(O)} = a_0$. Vamos construir, para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, as seguintes ordens lineares de D_{n+1} :

$$\begin{aligned} O_1^j &= \langle i_1, \dots, i_j, n+1, i_{j+1}, \dots, i_n \rangle \quad \text{e} \\ O_2^j &= \langle i_1, \dots, i_{j-1}, n+1, i_j, \dots, i_n \rangle . \end{aligned}$$

Considere agora os conjuntos de arestas:

$$A_i^j = A(O_i^j), \quad i = 1, 2 .$$

Como $a^T x^{A(O)} = a_0$ e os conjuntos A_i^j ($1 \leq i \leq 2$, $1 \leq j \leq n$) foram obtidos de $A(O)$, adicionando arestas tais que um de seus extremos é o vértice $n+1$, segue que,

$$\hat{a}^T x^{A_1^j} = \hat{a}^T x^{A_2^j} = a_0, \quad j \in \{1, \dots, n\} .$$

Lembrando que $F_{\hat{a}} \subseteq F_{\hat{b}}$, concluimos que

$$\hat{b}^T x^{A_1^j} = \hat{b}^T x^{A_2^j} = b_0, \quad j \in \{1, \dots, n\} .$$

Logo, como $A_1^j \Delta A_2^j = \{(i_j, n+1), (n+1, i_j)\}$, temos que

$$\hat{b}_{n+1, i_j} = \hat{b}_{i_j, n+1} \quad \text{para todo } j \in \{1, \dots, n\} . \quad (2)$$

Vamos demonstrar agora que $\hat{b}_{n+1, i_j} = 0$ para $j \in \{1, \dots, n\}$. Inicialmente, suponha que $P(n) = P_{PO}(n)$ ou $P(n) = P_{POC}(n)$. Suponha que $j \in \{1, \dots, n\}$ e considere o seguinte conjunto de arestas:

$$A_3^j = A_1^j \cup \{(n+1, i_j)\} .$$

Observe que A_1^j e A_3^j são pré-ordens completas de D_{n+1} que satisfazem

$$\hat{a}^T x^{A_1^j} = \hat{a}^T x^{A_3^j} = a_0 .$$

De $F_{\hat{a}} \subseteq F_{\hat{b}}$, vem que $\hat{b}^T x^{A_1^j} = \hat{b}^T x^{A_3^j} = b_0$, donde

$$\hat{b}_{n+1, i_j} = 0 . \quad (3)$$

Suponha agora que $P(n) = P_{OP}(n)$. Neste caso, basta fixar $j \in \{1, \dots, n\}$ e considerar as ordens parciais A_1^j e A_4^j de D_{n+1} , sendo:

$$A_4^j = A_1^j \setminus \{(i_j, n+1)\}.$$

Com raciocínio análogo, concluímos que $\hat{b}_{i_j, n+1} = 0$. Portanto,

$$\hat{b}_{i_j, n+1} = 0 \quad \text{para todo } j \in \{1, \dots, n\}. \quad (4)$$

De (2) e (3) ou (2) e (4), segue que $\hat{b}_{ij} = 0$ para toda aresta $(i, j) \in A_{n+1}$, tal que $i = n+1$ ou $j = n+1$. Logo, $b^T x \leq b_0$ é válida para $P(n)$, sendo b a restrição de $\hat{b}$ às arestas de A_n .

De (1), segue que,

$$\{x \in P(n) : a^T x = a_0\} \subseteq \{x \in P(n) : b^T x = b_0\}.$$

Como $a^T x \leq a_0$ é faceta de $P(n)$ e cada politopo tem dimensão completa, segue que $b^T x \leq b_0$ é uma faceta de $P(n)$. Logo, pelo teorema I.6, existe μ real, $\mu \geq 0$ tal que

$$a^T = \mu b^T. \quad (5)$$

De $\hat{a}_{i, n+1} = \hat{a}_{n+1, i} = \hat{b}_{i, n+1} = \hat{b}_{n+1, i} = 0$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ e da equação (5), concluímos que $\hat{a}^T = \mu \hat{b}^T$. Portanto, $\hat{a}^T x \leq a_0$ é uma faceta de $P(n+1)$, como queríamos demonstrar.

□

Apresentamos a seguir várias classes de inequações-faceta para os três politopos em estudo. A figura abaixo relaciona cada classe de faceta com seus respectivos politopos.

Embora a figura sugira a existência de inequações-facetadas apenas do politopo $P_{PO}(n)$, não conseguimos encontrar nenhuma classe de inequações que confirme este fato. Como também não provamos que toda faceta de $P_{PO}(n)$ é faceta de $P_{POC}(n)$ ou de $P_{OP}(n)$, eventualmente a relação de inclusão entre estas classes pode ser diferente.

Facetas de $P_{POC}(n)$

Facetas de $P_{PO}(n)$

- *FTR. Facetas dos triângulos*

$$x_{i,j} + x_{j,k} - x_{i,k} \leq 1, \quad n \geq 3$$

- *FA. Facetas dos arcos paralelos*

$$\text{FA1. } x_{i,j} + x_{j,i} \geq 1$$

$$\text{FA2. } x_{i,j} + x_{j,i} \leq 1$$

- *FT. Facetas triviais*

$$\text{FT1. } x_{i,j} \leq 1$$

$$\text{FT2. } x_{i,j} \geq 0$$

- *FCC. Facetas dos circuitos ímpares com 2-cordas*

$$x(C) - x(CO) \leq \left\lfloor \frac{|C|}{2} \right\rfloor ,$$

induzida por um digrafo G , sendo $AG = C \cup CO$, onde C é o conjunto das arestas de um circuito ímpar dirigido e CO é o conjunto das 2-cordas de C , $|C| \geq 5$.

- *FP. Facetas dos pentágonos*

$$3x(C) - 3x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 4 ,$$

induzida por D_5 , sendo C o conjunto das arestas de um circuito hamiltoniano em D_5 , CO o conjunto das 2-cordas de C , $\overline{C}$ o reverso de C e $\overline{CO}$ o reverso de CO .

- *FH. Facetas dos heptágonos*

$$4x(C) - 4x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) + x(D) - x(\overline{D}) \leq 9 ,$$

induzida por D_7 , sendo C as arestas de um circuito hamiltoniano de D_7 , CO o conjunto das 2-cordas de C e D o conjunto das 3-cordas de C .

- *FSC. Facetas das semi- k -cerças, $k \geq 3$*

$$x(A^+) - x(A^-) \leq k^2 - 2k + 2 ,$$

induzida por um digrafo bipartido $G = (S \cup I, A^+ \cup A^-)$, sendo $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, $I = \{u_1, \dots, u_k\}$, $A^- = \{(u_i, v_i) : 1 \leq i \leq k-1\}$ e $A^+ = \{(v_k, u_k)\} \cup \{(u_i, v_j) : 1 \leq i, j \leq k \text{ e } i \neq j\}$.

III.3.1 Facetas dos triângulos

As inequações comuns aos três politopos, que surgem naturalmente de suas definições, estão relacionadas com a propriedade transitiva. Considere a seguinte definição:

Definição III.5: Seja G um subdigrafo de D_3 , com $VG = \{i, j, k\}$ e $AG = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, sendo $\alpha = (i, j)$, $\beta = (j, k)$ e $\gamma = (i, k)$. Então a inequação induzida por G ,

$$x_\alpha + x_\beta - x_\gamma \leq 1$$

é denominada *inequação-triângulo*.

Observe que D_3 possui seis subdigrafos que induzem inequações-triângulo duas a duas distintas.

Teorema III.6: *Seja G um subdigrafo de D_3 , conforme a definição anterior. Então a inequação-triângulo induzida por G ,*

$$x_\alpha + x_\beta - x_\gamma \leq 1$$

é uma faceta de $P_{OP}(n)$, $P_{PO}(n)$ e $P_{POC}(n)$, $n \geq 3$.

Prova: A validade da inequação-triângulo para $P_{OP}(n)$, $P_{PO}(n)$ e $P_{POC}(n)$, $n \geq 3$, segue da propriedade transitiva. Considere a matriz M abaixo, cujas colunas são indexadas pelas arestas de D_3 , isto é,

$$M = \begin{array}{c} \begin{matrix} (i,j) & (j,k) & (i,k) & (j,i) & (k,j) & (k,i) \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

É fácil ver que cada linha de M é o vetor característico de uma pré-ordem completa de D_3 que satisfaz a inequação-triângulo com igualdade. Como M tem posto completo, segue que a inequação-triângulo é uma faceta de $P_{POC}(3)$.

Como toda pré-ordem completa é uma pré-ordem, esta mesma prova é suficiente para mostrar que a inequação-triângulo é uma faceta de $P_{PO}(3)$, uma vez que $\dim P_{PO}(3) = \dim P_{POC}(3)$.

Pode-se verificar que a inequação-triângulo é uma faceta de $P_{OP}(3)$, observando que a matriz N abaixo tem posto completo e cada linha de N é o vetor característico de uma ordem parcial que satisfaz a inequação-triângulo com igualdade.

$$N = \begin{array}{c} \begin{matrix} (i,j) & (j,k) & (i,k) & (j,i) & (k,j) & (k,i) \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Para mostrar que a inequação-triângulo $x_\alpha + x_\beta - x_\gamma \leq 1$ é uma faceta de $P_{PO}(n)$, $P_{OP}(n)$ ou $P_{POC}(n)$, $n > 3$, vamos denotá-la por $a^T x \leq 1$. É fácil construir uma ordem linear A de D_n , que contém as arestas α, β e γ . Então, $a^T x^A = 1$. Pelo lema da elevação, segue que a inequação-triângulo é uma faceta de $P_{PO}(n)$, $P_{OP}(n)$ e $P_{POC}(n)$, para todo n , $n \geq 3$.

□

III.3.2 Facetas dos arcos paralelos

Suponha que α seja uma aresta do digrafo D_n . Da propriedade total, segue a validade da inequação $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \geq 1$ para $P_{POC}(n)$; e da propriedade anti-simétrica, a validade de $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \leq 1$, para $P_{OP}(n)$. Note que ambas as inequações não são válidas para $P_{PO}(n)$ e que a equação $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} = 1$ é obviamente válida para $P_{OL}(n)$, $n \geq 2$. Reinelt [1985] provou que $x_{i,j} + x_{j,i} = 1$ para $1 \leq i < j \leq n$ constitui um sistema minimal de equações de $P_{OL}(n)$.

Teorema III.7: *As afirmações abaixo são verdadeiras para toda aresta $\alpha \in A_n$, $n \geq 2$:*

- (i) $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \geq 1$ é uma faceta de $P_{POC}(n)$;
- (ii) $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \leq 1$ é uma faceta de $P_{OP}(n)$.

Prova: Pelo lema da elevação, é suficiente mostrar o resultado para $P_{POC}(2)$ e $P_{OP}(2)$, respectivamente. Isto é facilmente verificado, com os vetores característicos dos subdigrafos G_1 e G_2 de D_2 tais que $AG_1 = \{\alpha\}$ e $AG_2 = \{\bar{\alpha}\}$.

□

Uma generalização da inequação $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \leq 1$, que surge naturalmente na descrição de politopos associados a problemas envolvendo grafos dirigidos acíclicos é aquelas que exclui os vetores de incidência correspondentes a circuitos dirigidos. Considere C o conjunto das arestas de um circuito dirigido de D_n . Então a inequação

$$x(C) \leq |C| - 1$$

é denominada **inequação do k -circuito**, sendo $|C| = k$.

Esta inequação é obviamente válida para $P_{OP}(n)$ e $P_{OL}(n)$, $n \geq k$. Reinelt [1985] mostrou que a inequação do k -circuito é uma faceta de $P_{OL}(n)$ se e somente se $k = 3$. Jünger [1985] provou que a inequação do k -circuito é uma faceta de $P_{AC}(n)$, sendo este politopo definido como o fecho convexo dos vetores característicos de subdigrafos acíclicos de D_n . O teorema abaixo mostra que a inequação do k -circuito não define uma faceta de $P_{OP}(n)$, $n \geq k$.

Teorema III.8: *Seja C um k -circuito dirigido em D_n , $n \geq k > 2$. Então a inequação*

$$x(C) \leq k - 1$$

é válida, mas não define uma faceta de $P_{OP}(n)$.

Prova: Se $k = 3$, considere s.p.g., o circuito C com arestas $(1, 2)$, $(2, 3)$ e $(3, 1)$. A inequação $x(C) \leq 2$ é a soma das seguintes inequações-facetadas de $P_{OP}(n)$:

$$x_{1,2} + x_{2,3} - x_{1,3} \leq 1$$

$$x_{1,3} + x_{3,1} \leq 1 .$$

Logo, $x(C) \leq 2$ pode ser obtida como combinação linear de inequações-facetadas de $P_{OP}(n)$, e portanto não define uma faceta de $P_{OP}(n)$, $n \geq 3$.

Suponha agora que $k > 3$ e considere, s.p.g., $C = \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (k, 1) \rangle$. Seja C' o circuito dirigido $\langle (2, 3), \dots, (k-1, k), (k, 2) \rangle$. Somando as inequações

$$x_{k,1} + x_{1,2} - x_{k,2} \leq 1 \quad (\text{inequação-triângulo})$$

$$x_{2,3} + x_{3,4} + \dots + x_{k-1,k} + x_{k,2} \leq k-2, \quad (\text{inequação do } (k-1)\text{-circuito})$$

obtemos a inequação do k -circuito. Se $|C'| > 3$, podemos repetir este procedimento, concluindo que a inequação do k -circuito pode ser obtida como combinação linear de $k-3$ inequações-triângulo e uma inequação 3-circuito. Logo, ela não define uma faceta de $P_{OP}(n)$, $n \geq k$.

□

III.3.3 Facetas triviais

É imediato que para todo $\alpha \in A_n$, as inequações triviais $0 \leq x_\alpha \leq 1$ são sempre válidas para politopos definidos como fecho convexo de vértices cujos componentes são zero e um. O teorema abaixo nos responde para quais dos três politopos em estudo, estas inequações definem facetas.

Teorema III.9: *Para toda aresta $\alpha \in A_n$, $n \geq 2$,*

- (i) $x_\alpha \leq 1$ é faceta de $P_{PO}(n)$ e de $P_{POC}(n)$, mas não de $P_{OP}(n)$;
- (ii) $x_\alpha \geq 0$ é faceta de $P_{PO}(n)$ e de $P_{OP}(n)$, mas não de $P_{POC}(n)$.

Prova: Basta provar os resultados para $n = 2$, uma vez que é trivial contruir ordens lineares em D_n que contêm a aresta α (para o caso (i)) ou que contêm a aresta $\bar{\alpha}$ (para o caso (ii)) e estender o resultado para $n > 2$, usando o lema da elevação.

Considere subgrafos geradores G_i de D_2 , para $1 \leq i \leq 4$, sendo $AG_1 = \emptyset$, $AG_2 = \{\alpha\}$, $AG_3 = \{\alpha, \bar{\alpha}\}$ e $AG_4 = \{\bar{\alpha}\}$. Os vetores de incidência dos grafos G_2 e G_3 mostram que $x_\alpha \leq 1$ é faceta de $P_{PO}(2)$ e de $P_{POC}(2)$, enquanto que os vetores de incidência de G_1 e de G_4 provam que $x_\alpha \geq 0$ é faceta de $P_{PO}(2)$ e de $P_{OP}(2)$.

Por outro lado, a inequação $x_\alpha \leq 1$ pode ser obtida como combinação linear das inequações $-x_{\bar{\alpha}} \leq 0$ e $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \leq 1$, facetas de $P_{OP}(n)$. Logo, $x_\alpha \leq 1$ não é faceta de $P_{OP}(n)$.

Da mesma forma, a inequação $x_\alpha \geq 0$ não é faceta de $P_{POC}(n)$, pois pode ser obtida como combinação linear das inequações-facetadas de $P_{POC}(n)$, $-x_{\bar{\alpha}} \geq -1$ e $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \geq 1$. $\square$

III.3.4 Facetas dos circuitos ímpares com 2-cordas

Nesta e nas próximas seções, tanto indicamos um circuito pela sequência ou pelo conjunto de suas arestas ou de seus vértices.

Definição III.10: Seja G um digrafo com $AG = C \cup CO$, sendo C o conjunto das arestas de um circuito hamiltoniano em G e CO o conjunto das 2-cordas de C . Suponha também que $|VG| = n \geq 4$. Então a inequação induzida por G ,

$$x(C) - x(CO) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

é denominada inequação do n -circuito com 2-cordas.

Note que D_5 induz 24 inequações distintas do tipo acima, uma para cada circuito hamiltoniano de D_5 . Neste caso, se $C = \langle (1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,1) \rangle$, então $CO = \{(i, (i+2) \bmod 5) : 1 \leq i \leq 5\}$ é o conjunto das 2-cordas de C , que por sua vez é um circuito hamiltoniano de D_5 . Assim, algumas das inequações dos 5-circuitos com

2-cordas induzidas por subdigrafos de D_5 são

$$x(C) - x(CO) \leq 2$$

$$x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 2$$

$$x(CO) - x(\overline{C}) \leq 2$$

$$x(\overline{CO}) - x(C) \leq 2.$$

Observe que qualquer uma das inequações acima é induzida por um digrafo isomorfo ao digrafo abaixo:

Teorema III.11: *Seja G um digrafo de D_n com $AG = C \cup CO$, sendo C um circuito hamiltoniano, CO o conjunto das 2-cordas de C e $|VG| = n \geq 4$. Então a inequação do n -circuito com 2-cordas induzida por G , $FCC(n)$,*

$$x(C) - x(CO) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

é válida para $P_{PO}(n)$, $P_{POC}(n)$ e $P_{OP}(n)$. Além disso, ela é uma faceta de $P_{PO}(n)$ e de $P_{OP}(n)$ se e somente se n for ímpar.

Prova: Suponha, s.p.g., que $VG = \{1, 2, \dots, n\}$ e $C = \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n), (n, 1) \rangle$. Então $CO = \{(1, 3), (2, 4), \dots, (n-1, 1), (n, 2)\}$. Para estabelecer a validade de $FCC(n)$ para os três politopos em estudo, procedemos da seguinte forma: para cada

aresta $\alpha \in CO$, consideramos as duas arestas β e γ em C , tais que $G[\{\beta, \gamma, \alpha\}]$ induz a seguinte inequação-triângulo:

$$x_\beta + x_\gamma - x_\alpha \leq 1 .$$

Somamos as n inequações obtidas desta forma para cada $\alpha \in CO$, obtendo

$$2x(C) - x(CO) \leq |CO| = n . \quad (1)$$

Como a inequação

$$-x(CO) \leq 0$$

é válida para $P_{OP}(n)$, $P_{POC}(n)$ e $P_{PO}(n)$, adicionando-a à inequação (1) e dividindo o resultado por 2, obtemos a inequação válida:

$$x(C) - x(CO) \leq \frac{n}{2} .$$

Observe que para qualquer vértice de $P_{POC}(n)$, $P_{OP}(n)$ ou $P_{PO}(n)$, o lado esquerdo da inequação acima é um inteiro. Portanto, podemos arredondar o lado direito para o maior inteiro menor ou igual a $\frac{n}{2}$, sem perder a validade da inequação resultante. Concluímos assim que $FCC(n)$ é válida para os três politopos em questão.

Note que, se n for par, fica claro que $FCC(n)$ foi obtida por combinação linear de inequações válidas e portanto não define uma faceta.

Suponha agora que n é ímpar, $n = 2k + 1$, $k \geq 2$. Vamos provar inicialmente que $FCC(n)$ é faceta de $P_{OP}(n)$. Para isto, considere todas as adições módulo $2k + 1$.

Vamos denotar por $a^T x \leq a_0$ a inequação $x(C) - x(CO) \leq k$.

Seja $F_a = \{x \in P_{OP}(n) : a^T x = a_0\}$, e suponha que $b^T x \leq b_0$ é uma inequação-faceta de $P_{OP}(n)$ tal que:

$$F_a \subseteq F_b = \{x \in P_{OP}(n) : b^T x = b_0\} .$$

O próximo passo será mostrar que existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tal que $b = \lambda a$.

Para cada $i \in VG$, seja P_i um k -emparelhamento contido em $C \setminus \{(i, i+1), (i, i-1)\}$,

$$P_i = \{(i+1, i+2), (i+3, i+4), \dots, (i+2k-1, i+2k)\} .$$

É fácil ver que

$$x^{P_i} \in F_a \subseteq F_b \quad \text{para todo } i \in VG ,$$

e portanto,

$$b^T x^{P_1} = b^T x^{P_2} = \dots = b^T x^{P_{2k+1}} = b_0 .$$

Observe que $P_i \Delta P_{i+2} = \{(i, i+1), (i+1, i+2)\}$. Este fato, juntamente com a igualdade $b^T x^{P_i} = b^T x^{P_{i+2}}$ implica que $b_{i,i+1} = b_{i+1,i+2}$. Portanto, podemos concluir que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$b_\alpha = \lambda, \quad \text{para toda aresta } \alpha \in C . \quad (2)$$

Agora, para cada $i \in VG$, considere

$$Q_i = P_i \cup \{(i, i+1), (i, i+2)\} .$$

Claramente,

$$x^{Q_i} \in F_a \subseteq F_b \quad \text{para todo } i \in VG .$$

Como $x^{P_i} \in F_b$, segue que

$$b^T x^{P_i} = b^T x^{Q_i}$$

e portanto, $b_{i,i+1} + b_{i,i+2} = 0$. De (2), podemos concluir que $b_{i,i+2} = -\lambda$, donde

$$b_\beta = -\lambda \quad \text{para todo } \beta \in CO . \quad (3)$$

É fácil concluir que

$$b_{\overline{\alpha}} = 0 \quad \text{para todo } \overline{\alpha} \in \overline{C} . \quad (4)$$

Para isto, basta tomar as ordens parciais $P_i \cup \{(i+1, i)\}$ e efetuar comparações, como anteriormente. Também temos que

$$b_{\bar{\beta}} = 0 \quad \text{para todo } \bar{\beta} \in \overline{CO} . \quad (5)$$

Para verificar este fato, tome, para $i \in VG$, a ordem parcial

$$Q_i = P_i \cup \{(i+1, i), (i+2, i)\} .$$

De $x^{P_i}, x^{Q_i} \in F_a \subseteq F_b$, vem que

$$b^T x^{Q_i} = b^T x^{P_i} ,$$

donde $b_{i+1,i} + b_{i+2,i} = 0$. Usando o fato (5), concluimos que

$$b_{i+2,i} = 0 .$$

O próximo passo é mostrar que $b_\gamma = 0$ para todo $\gamma \in A_n \setminus (C \cup CO \cup \overline{C} \cup \overline{CO})$. Para tanto, considere $k > 2$ e tome o conjunto $J = \{3, 5, \dots, 2k-3\}$.

Observe que as arestas de $A_n \setminus (C \cup CO \cup \overline{C} \cup \overline{CO})$ são precisamente as do tipo $(i, i+j)$, $(i+j, i)$, $(i, i+j+1)$, $(i+j+1, i)$ para $i \in VG$, $j \in J$.

Para $i \in VG$, considere os seguintes conjuntos de arestas:

$$\begin{aligned} S_1^i &= P_i \cup \{(i+j, i)\}, \\ S_2^i &= P_i \cup \{(i+j, i), (i+j+1, i)\}, \\ S_3^i &= P_i \cup \{(i+j, i), (i, i+j+1)\} \quad \text{e} \\ S_4^i &= P_i \cup \{(i, i+j), (i, i+j+1)\} . \end{aligned}$$

Note que S_ℓ^i , $1 \leq \ell \leq 4$, são ordens parciais tais que $x^{S_\ell^i} \in F_a \subseteq F_b$. Como $x^{P_i} \in F_b$, temos que:

$$\begin{aligned} b^T x^{P_i} &= b^T x^{S_1^i}, \quad \text{donde } b_{i+j,i} = 0 , \\ b^T x^{S_1^i} &= b^T x^{S_2^i}, \quad \text{donde } b_{i+j+1,i} = 0 , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b^T x^{S_1^i} &= b^T x^{S_3^i}, \quad \text{donde } b_{i,i+j+1} = 0, \quad \text{e} \\ b^T x^{S_3^i} &= b^T x^{S_4^i}, \quad \text{donde } b_{i+j,i} = -b_{i,i+j}. \end{aligned}$$

Como $b_{i+j,i} = 0$ segue que $b_{i,i+j} = 0$.

Reunindo todos os casos, concluimos que existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$b_\alpha = \begin{cases} \lambda & , \text{ se } \alpha \in C \\ -\lambda & , \text{ se } \alpha \in CO \\ 0 & , \text{ se } \alpha \in A_n \setminus C \cup CO \end{cases},$$

isto é, $b_\alpha = \lambda a_\alpha$ para toda aresta $\alpha \in A_n$ e $b^T x \leq b_0$ pode ser escrita como

$$\lambda(x(C) - x(CO)) \leq \lambda k.$$

Logo $b = \lambda a$, para $\lambda \in \mathbb{R}^*$, e portanto pelo Teorema I.6, concluimos que $FCC(n)$ é uma faceta de $P_{OP}(n)$.

Como toda ordem parcial é uma pré-ordem e $\dim(P_{OP}(n)) = \dim(P_{PO}(n))$, concluimos que $FCC(n)$ é também uma faceta de $P_{PO}(n)$.

□

Para mostrar que a inequação $x(C) - x(CO) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ define uma faceta de $P_{PO}(m)$ ou $P_{OP}(m)$, para todo m , $m > n$, vamos provar que a condição do lema da elevação está satisfeita, através do seguinte resultado:

Teorema III.12: *Seja G como no teorema anterior, sendo $|VG| = n = 2k + 1$, $k \geq 2$. Existe uma ordem linear A de D_n tal que*

$$x^A(C) - x^A(CO) = k,$$

sendo $x(C) - x(CO) \leq k$ a inequação do n -circuito com 2-cordas.

Prova: Suponha que $VG = \{1, 2, \dots, 2k + 1\}$ e que $C = \langle (1, 2), (2, 3), \dots, (2k, 2k + 1), (2k + 1, 1) \rangle$. Então

$$CO = \langle (1, 3), (2, 4), \dots, (2k - 1, 2k + 1), (2k, 1), (2k + 1, 2) \rangle.$$

Considere a ordem linear $O = \langle 1, 2k, 2k - 2, \dots, 2, 2k + 1, 2k - 1, \dots, 3 \rangle$ de D_n , e seja $A = A(O)$. Como no teorema anterior, todas as operações serão realizadas módulo $2k + 1$.

Inicialmente, vamos mostrar que $|C \cap A| = k + 1$. Para isto, considere $C \cap A = A_1 \cup A_2$, sendo

$$A_1 = \{(i, i + 1) \in A : i \text{ é ímpar}\} \text{ e}$$

$$A_2 = \{(i, i + 1) \in A : i \text{ é par}\}.$$

É fácil ver que $|A_1| = 1$, pois na seqüência O todos os vértices ímpares ocorrem após todos os vértices pares, com exceção do vértice 1. Este mesmo fato é suficiente para concluirmos que $|A_2| = k$.

O próximo passo será provarmos que $|CO \cap A| = 1$, concluindo assim que $x^A(C) - x^A(CO) = k$. Suponha então que exista $i \in VG$ tal que $(i, i + 2) \in CO \cap A$. Se $1 \leq i \leq 2k - 1$, como i e $i + 2$ têm a mesma paridade, observando que na seqüência O os vértices pares ocorrem em ordem decrescente, segue que i é ímpar. Neste caso, a única possibilidade é $(i, i + 2) = (1, 3)$, já que os vértices ímpares maiores que 1 ocorrem em ordem decrescente. Obviamente $(2k, 1) \notin A$ e $(2k + 1, 2) \notin A$. Portanto, $|CO \cap A| = 1$, como queríamos provar.

□

Teorema III.13: *Seja G definido como no teorema III.11. Então*

$$x(C) - x(CO) \leq \left\lfloor \frac{|C|}{2} \right\rfloor$$

é uma inequação válida para $P_{OP}(m)$, $P_{PO}(m)$, $m \geq |C| \geq 4$ e define uma faceta desses politopos se e somente se $|C|$ é ímpar.

Observação: Veremos mais adiante que a inequação do 5-circuito com 2-cordas não é uma faceta de $P_{POC}(n)$, para todo $n \geq 5$.

III.3.5 Facetas dos pentágonos

Nesta secção, todas as adições e subtrações devem ser consideradas módulo 5.

Definição III.14: Seja G um digrafo com 5 vértices, tal que $AG = C \cup CO \cup \overline{C} \cup \overline{CO}$, onde C é o conjunto das arestas de um circuito hamiltoniano em G e CO é o conjunto das 2-cordas de C . Então a inequação induzida por G ,

$$3x(C) - 3x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 4$$

é denominada *inequação-pentágono*.

Observe que D_5 induz 24 inequações-pentágonos diferentes, uma para cada circuito hamiltoniano. Para facilitar a notação, se $VG = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, vamos convencionar que $C = \{(i, i+1) : 1 \leq i \leq 5\}$. Na figura abaixo, para visualizarmos melhor a inequação-pentágono, indicamos nas arestas os coeficientes correspondentes a essas arestas na inequação induzida por G .

O objetivo desta seção é provarmos que a inequação-pentágono é faceta de $P_{POC}(n)$, $n \geq 5$. Para provar a validade da inequação-pentágono, usaremos o fato de que a inequação

$$x(C) - x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq k$$

é válida para $P_{POC}(2k+1)$. Esta inequação, denominada inequação do n -circuito duplo com 2-cordas, fez-nos pensar inicialmente, que havíamos encontrado uma classe bastante interessante de facetas para $P_{POC}(n)$. Entretanto, obtivemos a comprovação de que a inequação do n -circuito duplo com 2-cordas não é faceta de $P_{POC}(n)$, quando $n = 5$ e

$n = 7$. Foi porém, introduzindo pequenas variações na inequação do 5-circuito duplo com 2-cordas, que obtivemos a *inequação-pentágono*.

Proposição III.15: *A inequação do n -circuito duplo com 2-cordas, definida como,*

$$x(C) - x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq k ,$$

é válida para $P_{POC}(n)$, sendo $n = 2k + 1$.

Prova: Nesta prova, fica subentendido que o politopo em consideração é $P_{POC}(n)$. Somando inequações-triângulo, obtemos a validade das inequações abaixo, conforme foi visto na prova do Teorema III.11.

$$2x(C) - x(CO) \leq 2k + 1 \quad (1)$$

$$2x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 2k + 1 \quad (2)$$

Da propriedade total, obtém-se a validade da inequação

$$-x(CO) - x(\overline{CO}) \leq -(2k + 1) . \quad (3)$$

Somando as inequações (1), (2) e (3), obtemos:

$$2x(C) + 2x(\overline{C}) - 2x(CO) - 2x(\overline{CO}) \leq 2k + 1 . \quad (4)$$

Dividindo ambos os lados da inequação (4) por 2 e arredondando o lado direito para o maior inteiro menor ou igual a $(2k + 1)/2$, obtemos a inequação do n -circuito duplo com 2-cordas.

□

Teorema III.16: *Seja $a^T x \leq a_0$ a inequação-pentágono*

$$3x(C) - 3x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 4 ,$$

induzida por um digrafo G , como na definição III.14. As seguintes afirmações são verdadeiras:

- (i) $a^T x \leq a_0$ é válida para $P_{POC}(5)$;
- (ii) $a^T x \leq a_0$ é uma faceta de $P_{POC}(5)$;
- (iii) $a^T x \leq a_0$ é uma faceta de $P_{POC}(n)$, para todo $n > 5$.

Prova:

- (i) Esta demonstração será feita através de combinações e arredondamento de inequações válidas para $P_{POC}(5)$.

Da propriedade total, segue a validade de

$$-x(CO) - x(\overline{CO}) \leq -5 \quad (1)$$

Das inequações-triângulo, obtém-se a validade de

$$2x(C) - x(CO) \leq 5 \quad \text{e} \quad (2)$$

$$x(\overline{C}) + x(\overline{CO}) - x(CO) \leq 5 . \quad (3)$$

Somando as inequações abaixo,

$$2x(C) - x(CO) \leq 5 \quad \text{e}$$

$$-x(CO) \leq 0 ,$$

dividindo o resultado por 2 e arredondando o lado direito para o maior inteiro menor ou igual a $5/2$, obtemos a inequação (4), também válida para $P_{POC}(5)$:

$$x(C) - x(CO) \leq 2 . \quad (4)$$

Somando 2 vezes a inequação do 5-circuito duplo com 2-cordas,

$$2x(C) - 2x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) \leq 4 ,$$

com as inequações abaixo,

$$\begin{array}{rclcl} 6x(C) & -3x(CO) & & \leq 15 & 3 \times (2) \\ & -x(CO) & +x(\overline{C}) & +x(\overline{CO}) & \leq 5 & (3) \\ & -2x(CO) & & -2x(\overline{CO}) & \leq -10 & 2 \times (1) \\ x(C) & -x(CO) & & & \leq 2 & (4) \end{array}$$

obtemos a inequação

$$9x(C) - 9x(CO) + 3x(\overline{C}) - 3x(\overline{CO}) \leq 16 .$$

Dividindo esta inequação por 3 e arredondando, obtemos:

$$3x(C) - 3x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 5 . \quad (5)$$

Adicionando a inequação (5) à inequação do 5-circuito duplo com 2-cordas, dividindo o resultado por 2 e arredondando, obtemos:

$$2x(C) - 2x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 3 . \quad (6)$$

Considere agora o seguinte conjunto de inequações, obviamente válidas para $P_{POC}(5)$, pois são combinações lineares de inequações anteriormente discutidas:

$$\begin{array}{rclcl}
8x(C) & -8x(CO) & +4x(\overline{C}) & -4x(\overline{CO}) & \leq 12 & 4 \times (6) \\
3x(C) & -3x(CO) & +x(\overline{C}) & -x(\overline{CO}) & \leq 5 & (5) \\
6x(C) & -3x(CO) & & & \leq 15 & 3 \times (2) \\
& -x(CO) & +x(\overline{C}) & +x(\overline{CO}) & \leq 5 & (3) \\
& -2x(CO) & & -2x(\overline{CO}) & \leq -10 & 2 \times (1) \\
x(C) & -x(CO) & & & \leq 2 & (4)
\end{array}$$

Somando-as, obtemos a inequação:

$$18x(C) - 18x(CO) + 6x(\overline{C}) - 6x(\overline{CO}) \leq 29 .$$

Dividindo ambos os termos por 6 e arredondando, obtemos a inequação-pentágono.

Logo, ela é válida para $P_{POC}(5)$.

- (ii) Para mostrar que a inequação-pentágono define uma faceta de $P_{POC}(5)$, suponha s.p.g., que $VG = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e que $C = \{(i, i+1) : 1 \leq i \leq 5\}$. Denote por F_a a face definida por $a^T x \leq a_0$ e seja F_b uma faceta de $P_{POC}(5)$ tal que:

$$F_a = \{x \in P_{POC}(5) : a^T x = a_0\} \subseteq F_b = \{x \in P_{POC}(5) : b^T x = b_0\} .$$

Vamos provar que existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tal que $b = \lambda a$.

Inicialmente, para cada $i \in VG$, seja O_i a ordem linear de D_5 representada por $\langle i, i+1, i+2, i+3, i+4 \rangle$. Considere os seguintes conjuntos de arestas:

$$\begin{aligned}
M_i &= A(O_i) \cup \{(i+1, i), (i+3, i+2)\} \quad \text{e} \\
M'_i &= A(O_i) \cup \{(i+1, i), (i+4, i+3)\} .
\end{aligned}$$

É fácil verificar que

$$x^{M_i}, x^{M'_i} \in F_a \subseteq F_b \quad \text{para todo } i \in VG .$$

Portanto,

$$b^T x^{M_i} = b^T x^{M'_i}, \quad \text{para todo } i \in VG .$$

Como $M_i \Delta M_i' = \{(i+3, i+2), (i+4, i+3)\}$, concluímos das igualdades acima que

$$b_{i+3, i+2} = b_{i+4, i+3} \quad \text{para } i = 1, 2, 3, 4, 5 .$$

Logo, $b_{4,3} = b_{5,4} = b_{1,5} = b_{2,1} = b_{3,2} = \lambda$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}$. Portanto,

$$b_\alpha = \lambda \quad \text{para todo } \alpha \in \overline{C} .$$

Considere agora, para cada $i \in VG$ o seguinte conjunto de arestas:

$$M_i'' = M_i \cup \{(i+4, i+3), (i+4, i+2)\} .$$

Como $x^{M_i''} \in F_a \subseteq F_b$, concluímos que:

$$b^T x^{M_i} = b^T x^{M_i''} ,$$

donde $b_{i+4, i+2} = -b_{i+4, i+3} = -\lambda$.

Deste modo, obtemos

$$b_{5,3} = b_{4,2} = b_{3,1} = b_{2,5} = b_{1,4} = -\lambda ,$$

donde

$$b_\alpha = -\lambda \quad \text{para todo } \alpha \in \overline{CO} .$$

Com raciocínio análogo, obtém-se, para algum $\mu \in \mathbb{R}$:

$$b_\beta = \mu \quad \text{para toda aresta } \beta \in C$$

$$\text{e } b_\beta = -\mu \quad \text{para todo } \beta \in CO$$

A inequação $b^T x \leq b_0$ pode ser então reescrita como:

$$\mu x(C) - \mu x(CO) + \lambda x(\overline{C}) - \lambda x(\overline{CO}) \leq b_0 = \lambda + \mu . \quad (7)$$

Considere agora a ordem linear $0 = < 2, 5, 3, 1, 4 >$ e o conjunto $A = A(O)$, indicado na figura abaixo.

Por inspeção pode-se verificar que $x^A \in F_a$. Como $F_a \subseteq F_b$, de (7) podemos concluir que

$$2\mu - 2\lambda = \lambda + \mu ,$$

donde $\mu = 3\lambda$.

Portanto, $b^T x \leq b_0$ pode ser escrita como

$$3\lambda x(C) - 3\lambda x(CO) + \lambda x(\overline{C}) - \lambda x(\overline{CO}) \leq 4\lambda .$$

Logo, $b = \lambda a$ para $\lambda \in \mathbb{R}^*$ e, portanto, pelo teorema I.6, $a^T x \leq a_0$ é uma faceta de $P_{POC}(5)$, como queríamos provar.

- (iii) A prova de que a inequação-pentágono é uma faceta de $P_{POC}(n)$, $n > 5$, segue usando o lema da elevação.

□

Corolário III.17: *A inequação do 5-circuito com 2-cordas,*

$$x(C) - x(CO) \leq 2 ,$$

não define uma faceta de $P_{POC}(n)$, $n \geq 5$.

Prova: Basta observar que $x(C) - x(CO) \leq 2$ pode ser obtida dividindo-se a soma das inequações abaixo por 7. Como a validade dessas inequações para $P_{POC}(n)$, $n \geq 5$, foi verificada anteriormente, segue que a inequação do 5-circuito com 2-cordas não define uma faceta de $P_{POC}(n)$.

$$\begin{array}{rclcl}
 3x(C) & -3x(CO) & +x(\overline{C}) & -x(\overline{CO}) & \leq 4 \\
 -x(C) & & & +2x(\overline{CO}) & \leq 5 \\
 6x(C) & -3x(CO) & & & \leq 15 \\
 -x(C) & & -x(\overline{C}) & & \leq -5 \\
 & -x(CO) & & -x(\overline{CO}) & \leq -5
 \end{array}$$

□

Corolário III.18: A inequação do 5-circuito duplo com 2-cordas,

$$x(C) - x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 2 ,$$

não define uma faceta de $P_{POC}(n)$, $n \geq 5$.

Prova: Basta observar que a inequação do 5-circuito duplo com 2-cordas pode ser obtida dividindo-se por 4 a soma das duas inequações-pentágono abaixo:

$$\begin{array}{rcl}
 3x(C) - 3x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) & \leq & 4 \\
 x(C) - x(CO) + 3x(\overline{C}) - 3x(\overline{CO}) & \leq & 4
 \end{array}$$

□

III.3.6 Facetas dos heptágonos

Nesta seção, todas as adições e subtrações devem ser consideradas módulo 7.

Definição III.19: Seja G um digrafo com $VG = \{1, 2, \dots, 7\}$ e $AG = C \cup CO \cup \overline{C} \cup \overline{CO} \cup D \cup \overline{D}$, sendo $C = \{(i, i+1) : i = 1, \dots, 7\}$, $CO = \{(i, i+2) : i = 1, \dots, 7\}$ e

$D = \{(i, i + 3) : i = 1, \dots, 7\}$. Então a inequação induzida por G ,

$$4x(C) - 4x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) + x(D) - x(\overline{D}) \leq 9$$

é denominada *inequação-heptágono*. Os conjuntos C , CO e D são denominados *circuito externo*, *circuito das cordas* e *circuito das diagonais*, respectivamente.

Observe que D_7 dá origem a 720 diferentes inequações-heptágono. Algumas delas, considerando-se os mesmos conjuntos acima podem ser escritas como:

$$4x(C) - 4x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) + x(D) - x(\overline{D}) \leq 9$$

$$4x(CO) - 4x(\overline{D}) + 2x(\overline{CO}) - 2x(D) + x(C) - x(\overline{C}) \leq 9$$

$$4x(D) - 4x(\overline{C}) + 2x(\overline{D}) - 2x(C) + x(CO) - x(\overline{CO}) \leq 9$$

$$4x(\overline{C}) - 4x(\overline{CO}) + 2x(C) - 2x(CO) + x(\overline{D}) - x(D) \leq 9$$

$$4x(\overline{CO}) - 4x(D) + 2x(CO) - 2x(\overline{D}) + x(\overline{C}) - x(C) \leq 9$$

$$4x(\overline{D}) - 4x(C) + 2x(D) - 2x(\overline{C}) + x(\overline{CO}) - x(CO) \leq 9$$

A inequação-heptágono surgiu como uma extensão da inequação-pentágono. Não conseguimos porém, generalizar este resultado para $n > 7$. Como veremos adiante, as demonstrações do caso $n = 7$ são exaustivas, desencorajando qualquer tentativa de generalização.

Teorema III.20: *Seja $a^T x \leq 9$ a seguinte inequação-heptágono,*

$$4x(C) - 4x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) + x(D) - x(\overline{D}) \leq 9 ,$$

induzida por um digrafo G , $G \subseteq D_7$, como na definição III.19. As seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) $a^T x \leq 9$ é válida para $P_{POC}(7)$;

- (ii) $a^T x \leq 9$ é uma faceta de $P_{POC}(7)$;
 (iii) $a^T x \leq 9$ é uma faceta de $P_{POC}(n)$ para todo $n > 7$.

Prova:

- (i) Infelizmente não conseguimos provar a validade da inequação heptágono para $P_{POC}(7)$ através de combinações e arredondamentos de inequações válidas, como fizemos na maioria das vezes. Neste caso, mostramos que para todo digrafo $H \subseteq D_7$ tal que x^{AH} é um vértice de $P_{POC}(7)$, tem-se que $a^T x^{AH} \leq 9$. Dado que esta prova consiste na análise de vários casos e subcasos, decidimos incluí-la no anexo.
- (ii) De acordo com a definição III.19, $VG = \{1, \dots, 7\}$, $C = \{(i, i+1) : i = 1, \dots, 7\}$, $CO = \{(i, i+2) : i = 1, \dots, 7\}$ e $D = \{(i, i+3) : i = 1, \dots, 7\}$. Denote por F_a a face definida por $a^T x \leq 9$ e seja F_b uma faceta de $P_{POC}(7)$, tal que

$$F_a = \{x \in P_{POC}(7) : a^T x = 9\} \subseteq F_b = \{x \in P_{POC}(7) : b^T x = b_0\}.$$

Vamos provar que existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tal que $b = \lambda a$.

Para cada $i \in VG$, considere em D_7 a ordem linear $O_i = \langle i, i+1, \dots, i+5, i+6 \rangle$.

Considere os seguintes conjuntos de arestas:

$$M_i = A(O_i) \cup \{(i+1, i), (i+3, i+2), (i+5, i+4)\} \quad \text{e}$$

$$M'_i = A(O_i) \cup \{(i+1, i), (i+3, i+2), (i+6, i+5)\}.$$

Não é difícil ver que

$$x^{M_i}, x^{M'_i} \in F_a \subseteq F_b \quad \text{para todo } i \in VG.$$

Portanto,

$$b^T x^{M_i} = b^T x^{M'_i}, \quad \text{para todo } i \in VG.$$

Como $M_i \Delta M'_i = \{(i+5, i+4), (i+6, i+5)\}$, concluímos das igualdades acima que

$$b_{i+5, i+4} = b_{i+6, i+5} \quad \text{para } i = 1, \dots, 7 .$$

Logo,

$$b_{6,5} = b_{7,6} = b_{1,7} = b_{2,1} = b_{3,2} = b_{4,3} = b_{5,4} .$$

Ou seja, para algum $\lambda \in \mathbb{R}$ temos que

$$b_\alpha = \lambda \quad \text{para todo } \alpha \in \overline{C} . \quad (1)$$

Considere agora, para cada $i \in VG$, o conjunto de arestas

$$M''_i = M_i \cup \{(i+6, i+5), (i+6, i+4)\} .$$

Como $x^{M''_i} \in F_a \subseteq F_b$, concluímos que

$$b^T x^{M_i} = b^T x^{M''_i} ,$$

donde $b_{i+6, i+5} = -b_{i+6, i+4} = \lambda$.

Logo,

$$b_\alpha = -\lambda \quad \text{para todo } \alpha \in \overline{CO} . \quad (2)$$

Com raciocínio análogo, obtém-se, para algum $\mu \in \mathbb{R}$:

$$b_\beta = \mu \quad \text{para todo } \beta \in C \quad \text{e} \quad (3)$$

$$b_\beta = -\mu \quad \text{para todo } \beta \in CO . \quad (4)$$

Considere agora, para cada $i \in VG$, o seguinte conjunto de arestas:

$$\begin{aligned} M'''_i &= M_i \setminus \{(i+1, i+2), (i+1, i+3), (i, i+2), (i, i+3)\} \\ &\quad \cup \{(i+2, i+1), (i+3, i+1), (i+2, i), (i+3, i)\} . \end{aligned}$$

As arestas do fecho transitivo dos grafos H_i e K_i abaixo correspondem às arestas M_i e M_i''' , respectivamente:

H_i

K_i

Como $x^{M_i'''} \in F_a$ e $F_a \subseteq F_b$, segue que

$$b^T x^{M_i} = b^T x^{M_i'''}.$$

Logo,

$$b_{i+1,i+2} + b_{i,i+2} + b_{i,i+3} + b_{i+1,i+3} = b_{i+2,i+1} + b_{i+2,i} + b_{i+3,i} + b_{i+3,i+1}.$$

De (1), (2), (3) e (4), concluímos que

$$b_{i,i+3} - b_{i+3,i} = \mu - \lambda, \quad \text{para } i = 1, \dots, 7. \quad (5)$$

Para cada $i \in VG$, considere agora o grafo G_i , indicado na figura abaixo:

G_i

Sejam N'_i e N''_i as arestas dos fechos transitivos dos grafos G'_i e G''_i , obtidos de G_i como:

$$\begin{aligned} AG'_i &= AG_i - \{(i+3, i), (i+3, i+6)\} \\ AG''_i &= AG_i - \{(i, i+3), (i+6, i+3)\} . \end{aligned}$$

De $x^{AG_i}, x^{AG'_i} \in F_a$ e $F_a \subseteq F_b$, vem que

$$b_{i+3, i} = -b_{i+3, i+6} . \quad (6)$$

De $x^{AG_i}, x^{AG''_i} \in F_a$ e $F_a \subseteq F_b$, vem que

$$b_{i, i+3} = -b_{i+6, i+3} . \quad (7)$$

De (6), concluimos que

$$b_{i, i+4} = -b_{i, i+3} . \quad (8)$$

Como $-b_{i, i+3} = b_{i+6, i+3}$ de (7), segue que

$$b_{i, i+4} = b_{i+6, i+3} . \quad (9)$$

Então

$$b_{1,5} = b_{7,4} = b_{6,3} = b_{5,2} = b_{4,1} = b_{3,7} = b_{2,6} = -\delta , \text{ para } \delta \in \mathbb{R} .$$

Portanto,

$$b_\alpha = -\delta \text{ para todo } \alpha \in \overline{D} \quad (10)$$

De (8) e (10), concluimos que

$$b_\alpha = \delta \text{ para todo } \alpha \in D .$$

De (5), $b_\alpha - b_{\bar{\alpha}} = \mu - \lambda$ para todo $\alpha \in D$. Portanto, $2\delta = \mu - \lambda$, implicando $\delta = (\mu - \lambda)/2$.

A inequação $b^T x \leq b_0$ pode então ser reescrita como:

$$\mu x(C) - \mu x(CO) + \lambda x(\overline{C}) - \lambda x(\overline{CO}) + \frac{\mu - \lambda}{2} x(D) - \frac{(\mu - \lambda)}{2} x(\overline{D}) \leq b_0$$

sendo $b_0 = (3\mu + 3\lambda)/2$.

Considere agora a ordem linear $O = \langle 4, 2, 7, 5, 3, 1, 6 \rangle$ e o conjunto $T = O(A)$.

Veja na figura abaixo as arestas de T .

É fácil verificar que $x^T \in F_a$. Como $F_a \subseteq F_b$, segue que $x^T \in F_b$. Logo,

$$3\mu - 3\lambda + 3\delta = (3\mu + 3\lambda)/2 ,$$

donde $\mu = 2\lambda$. Então $b^T x \leq b_0$ pode ser reescrita como:

$$2\lambda x(C) - 2\lambda x(CO) + \lambda x(\overline{C}) - \lambda x(\overline{CO}) + \frac{\lambda}{2} x(D) - \frac{\lambda}{2} x(\overline{D}) \leq \frac{9\lambda}{2} .$$

Logo, $b = \lambda a$ para $\lambda = 2$ e, pelo teorema 1.6, $a^T x \leq 9$ é uma faceta de $P_{POC}(7)$, como queríamos provar.

(iii) A prova de que a inequação-heptágono é uma faceta de $P_{POC}(n)$, $n > 7$, segue usando o lema da elevação. Note que no final da prova anterior exibimos uma ordem linear de D_7 que satisfaz as condições do lema da elevação.

□

Corolário III.21: *A inequação do 7-circuito duplo com 2-cordas,*

$$x(C) - x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 3 ,$$

não define uma faceta de $P_{POC}(7)$.

Prova: Basta observar que a inequação do 7-circuito duplo com 2-cordas pode ser obtida dividindo-se por 6 a soma das duas inequações-heptágono abaixo:

$$4x(C) - 4x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) + x(D) - x(\overline{D}) \leq 9$$

$$2x(C) - 2x(CO) + 4x(\overline{C}) - 4x(\overline{CO}) - x(D) + x(\overline{D}) \leq 9$$

□

III.3.7 Facetas das semi k -cercas

Definição III.22: Um digrafo D é denominado uma k -cerca se satisfaz às seguintes propriedades:

- 1) $|VD| = 2k$, $k \geq 2$;
- 2) Existe uma partição de VD em dois subconjuntos $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ e $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ tal que

$$AD = \{(s_j, i_j) : 1 \leq j \leq k\} \cup \{(i_j, s_l) : 1 \leq j, l \leq k \text{ e } j \neq l\} .$$

Exemplo: O digrafo abaixo é uma 4-cerca:

As arestas (s_j, i_j) são denominadas **estacas**; os vértices de S são denominados **superiores** e os de I , **inferiores**. Note que uma k -cerca é uma particular orientação de um grafo bipartido completo com $2k$ vértices e que, se invertermos todas as arestas de uma k -cerca, obtemos novamente uma k -cerca.

Dada uma k -cerca, para obtermos um subdigrafo acíclico, precisamos retirar no mínimo $k - 1$ arestas. Note que um tal conjunto minimal de arestas ou consiste de $k - 1$ estacas, ou $k - 2$ estacas e uma aresta que não é estaca, cujos extremos não coincidem com os das $k - 2$ estacas consideradas.

Se D é uma k -cerca então a seguinte inequação induzida por D

$$x(AD) \leq k^2 - k + 1$$

é chamada uma **inequação- k -cerca**.

A inequação acima é obviamente válida para $P_{OL}(n)$ e para $P_{OP}(n)$, $n \geq 2k$. Reinelt [1985] mostrou que esta inequação é uma faceta de $P_{OL}(n)$, para todo $n \geq 2k$. Verificamos, através de uma demonstração exaustiva que a inequação 3-cerca não é uma faceta de $P_{OP}(6)$.

É imediato que $P_{OL}(n) \subseteq P_{POC}(n) \subseteq P_{OP}(n)$. (Na próxima seção mencionamos esta relação bem como outros resultados correlatos. O leitor interessado poderá consultar a próxima seção, antes de prosseguir lendo esta seção.)

Portanto, se $a^T x \leq a_0$ é uma inequação válida para $P_{POC}(n)$, ela será obviamente válida para $P_{OL}(n)$. O contrário não ocorre. Observe, por exemplo, que a inequação k -cerca não é válida para $P_{POC}(n)$. Entretanto, se $a^T x \leq a_0$ é uma faceta de $P_{OL}(n)$, não necessariamente válida para $P_{POC}(n)$, adicionando inequações válidas para $P_{POC}(n)$ a esta inequação, eventualmente ocorre de obtermos inequações válidas (ou mesmo facetas) para $P_{POC}(n)$. Deste modo um tanto incomum — que pode ser justificado geometricamente — foi gerada a inequação *semi- k -cerca*, definida a seguir.

Definição III.23: Seja G um digrafo obtido de uma k -cerca, invertendo exatamente $k-1$ estacas, isto é:

- 1) $|VG| = 2k$, $k \geq 2$;
- 2) VG pode ser particionado em dois subconjuntos, $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ e $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ e existe um único t , $1 \leq t \leq k$ tal que

$$AG = \{(s_t, i_t)\} \cup \{(i_l, s_j) : 1 \leq j, l \leq k\} \setminus \{(i_t, s_t)\}.$$

Então G é denominado uma *semi- k -cerca*.

Exemplo: O digrafo abaixo é uma *semi-3-cerca*.

Definição III.24: Seja G uma semi- k -cerca conforme a difinição III.23. Considere a partição de AG nos conjuntos

$$A^- = \{(i_j, s_j) \in AG : j \neq t\} \text{ e}$$

$$A^+ = AG \setminus A^- .$$

Então a inequação induzida por G ,

$$x(A^+) - x(A^-) \leq k^2 - 2k + 2 ,$$

é denominada *inequação semi- k -cerca*. Uma aresta $\alpha \in AG$ é dita *positiva* se $\alpha \in A^+$; e *negativa* se $\alpha \in A^-$.

É fácil ver que a inequação semi- k -cerca pode ser obtida da inequação k -cerca adicionando-se $k - 1$ inequações de arcos paralelos, $-x_\alpha - x_{\bar{\alpha}} \leq -1$, uma para cada aresta $\alpha \in A^-$.

Teorema III.25: *Seja $a^T x \leq a_0$ a seguinte inequação induzida por uma semi- k -cerca G , $G \subseteq D_n$, $k \geq 3$, conforme a definição III.24:*

$$x(A^+) - x(A^-) \leq k^2 - 2k + 2 .$$

Então:

- (i) $a^T x \leq a_0$ é válida para $P_{POC}(n)$, $n \geq 2k$;
- (ii) $a^T x \leq a_0$ é uma faceta de $P_{POC}(n)$, $n \geq 2k$.

Prova: Vamos supor s.p.g., que $\{(s_k, i_k)\} \in A^+$. Logo, $A^- = \{(i_1, s_1), (i_2, s_2), \dots, (i_{k-1}, s_{k-1})\}$.

- (i) A prova da validade será por simples contagem. Seja então H um subdigrafo de D_n tal que x^{AH} é um vértice de $P_{POC}(n)$ e suponha que $a^+ = |A^+ \cap AH|$ e $a^- = |A^- \cap AH|$. Então $a^+ \leq k^2 - k + 1$ e $a^- \leq k - 1$. Mostraremos que

$$x(A^+ \cap AH) - x(A^- \cap AH) \leq k^2 - 2k + 2 .$$

Temos três casos a considerar:

Caso 1: $a^- \geq k - 2$

Se $a^+ = k^2 - k + 1$, isto é, H contém todas as arestas positivas de G , segue da transitividade de AH que $a^- = k - 1$ e a desigualdade acima se verifica.

Se $a^+ \leq k^2 - k$, é imediato que $x(A^+ \cap AH) - x(A^- \cap AH) \leq k^2 - 2k + 2$.

Caso 2: $a^- = k - 3$

Sejam $\alpha = (i_l, s_l)$ e $\beta = (i_p, s_p)$ as duas arestas em $A^- \setminus AH$. Como $\bar{\alpha}$ e $\bar{\beta} \in AH$, então $(i_l, s_p) \notin A^+$ ou $(i_p, s_l) \notin A^+$.

Se $(s_k, i_k) \notin A^+$, então $a^+ \leq k^2 - k - 1$. Caso contrário, $(i_l, s_k) \notin A^+$ ou $(i_k, s_l) \notin A^+$ e portanto $a^+ \leq k^2 - k - 1$. Logo $a^+ - a^- \leq k^2 - 2k + 2$.

Caso 3: $a^- < k - 3$

Sejam α e β duas arestas em $A^- \setminus AH$, $\alpha = (i_l, s_l)$ e $\beta = (i_p, s_p)$, $l \neq p$. Como $x^{AH} \in P_{POC}(n)$, então $\bar{\alpha}, \bar{\beta} \in AH$. Neste caso, ou $(i_l, s_p) \notin AH$ ou $(i_p, s_l) \notin AH$; caso contrário, $\alpha, \beta \in AH$, uma contradição. Concluimos aqui que para cada duas arestas negativas que não pertencem ao grafo H , no mínimo uma aresta positiva não pertence a H . Claramente, tais arestas positivas não pertencentes a H são todas distintas. Dado que $k - 1 - a^-$ arestas estão em $A^- \setminus AH$, no mínimo $\binom{k-1-a^-}{2}$ arestas positivas não estão no grafo H . Portanto,

$$a^+ \leq k^2 - k + 1 - \binom{k-1-a^-}{2}.$$

Como $a^- < k - 3$, então $k - 1 - a^- > 2$. Isto implica em

$$\binom{k-1-a^-}{2} \geq k - 1 - a^-.$$

Logo, $a^+ \leq k^2 - k + 1 - (k - 1 - a^-)$, e portanto, $a^+ - a^- \leq k^2 - 2k + 2$.

Isto completa a prova da validade da inequação semi- k -cerca.

(ii) Inicialmente vamos provar que a inequação semi- k -cerca é uma faceta de $P_{POC}(2k)$.

Considere $F_b = \{x \in P_{POC}(2k) : b^T x = b_0\}$ uma faceta de $P_{POC}(2k)$ tal que $F_b \supseteq F_a = \{x \in P_{POC}(2k) : a^T x = a_0\}$.

Vamos provar que existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tal que $b = \lambda a$, na seguinte ordem:

- a) $b_\alpha = 0$ para todo $\alpha \in \overline{AG}$;
- b) $b_\alpha = 0$ para todo $\alpha \in AD_{2k} \setminus (AG \cup \overline{AG})$;
- c) $b_\alpha = \lambda a_\alpha$ para todo $\alpha \in AG$.

a) Seja O a seguinte ordem linear de D_{2k} .

$$O = \langle i_1, i_2, \dots, i_{k-1}, s_k, i_k, s_1, s_2, \dots, s_{k-1} \rangle .$$

Então o conjunto $A(O)$ é uma pré-ordem completa de D_{2k} tal que $x^{A(O)} \in F_a \subseteq F_b$. Fica a cargo do leitor verificar que $b_\alpha = 0$ se $\alpha \in \overline{A(O)}$.

Como $AG \subseteq A(O)$, segue que $b_\alpha = 0$ para todo $\alpha \in \overline{AG}$.

b) Considere $S' = S \setminus \{s_k\}$ e $I' = I \setminus \{i_k\}$.

Inicialmente, vamos verificar que $b_{u,v} = 0$ se $u, v \in S'$.

Suponha então que $u = s_i$ e $v = s_j$, $1 \leq i \neq j \leq k-1$. Considere a seguinte ordem linear de D_{2k} :

$$O = \langle i_1, i_2, \dots, i_{k-1}, s_k, i_k, s_j, s_i, O' \rangle ,$$

sendo O' uma seqüência qualquer de vértices em $S' \setminus \{s_j, s_i\}$.

Então $A(O)$ e $A(O) \cup \{(s_i, s_j)\}$ são pré-ordens completas cujos vetores de incidência pertencem a F_a . Como $F_a \subseteq F_b$, estes vetores estão em F_b , donde:

$$0 = b^T x^{A(O)} - b^T x^{A(O) \cup \{(s_i, s_j)\}} .$$

Portanto $b_{s_i, s_j} = 0$.

Com argumento análogo, verifica-se que $b_{u, v} = 0$ se $u, v \in I'$.

Para completar a demonstração de b), devemos verificar a validade das afirmações abaixo, para todo $r \neq k$ e $l \neq k$.

$$(b_1) \quad b_{s_r, s_k} = 0,$$

$$(b_2) \quad b_{s_k, s_r} = 0,$$

$$(b_3) \quad b_{i_k, i_l} = 0,$$

$$(b_4) \quad b_{i_l, i_k} = 0.$$

Como (s_k, s_r) e (i_l, i_k) são arestas de $A(O)$, sendo O a ordem linear definida no item a), segue deste mesmo item que $b_{s_r, s_k} = b_{i_k, i_l} = 0$, verificando a validade de (b_1) e (b_3) .

Para verificar (b_2) , construa o grafo H , a partir do grafo G , invertendo as arestas $\alpha = (s_k, i_k)$ e $\beta = (i_j, s_j)$, $j \neq r$. A aresta β existe, pois $k \geq 3$. Então,

$$|AH \cap A^+| = k^2 - k \quad \text{e} \quad |AH \cap A^-| = k - 2.$$

Logo,

$$x(AH \cap A^+) - x(AH \cap A^-) = k^2 - 2k + 2.$$

O conjunto AH pode ser estendido para a seguinte ordem linear:

$$O = \langle O', s_j, i_j, O'', s_r, s_k \rangle,$$

sendo O' uma seqüência de vértices em $I \setminus \{i_j\}$ e O'' uma seqüência de vértices em $S \setminus \{s_j, s_r, s_k\}$. Observe que $A(O)$ e $A(O) \cup \{(s_k, s_r)\}$ são pré-ordens completas cujos vetores de incidência estão em F_a , e portanto, em F_b .

Logo,

$$0 = b^T x^{A(O)} - b^T x^{A(O) \cup \{(s_k, s_r)\}},$$

donde, $b_{s_k, s_r} = 0$, como queríamos provar.

Com raciocínio semelhante prova-se o item (b₄). Esta demonstração fica a cargo do leitor.

c) Suponha que $b_{s_k, i_k} = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e $IND = \{1, 2, \dots, k-1\}$. Vamos provar que:

$$(c_1) \quad b_{i_j, s_j} = -\lambda, \quad \forall j \in IND;$$

$$(c_2) \quad b_{i_j, s_k} = \lambda, \quad \forall j \in IND;$$

$$(c_3) \quad b_{i_k, s_r} = \lambda, \quad \forall r \in IND;$$

$$(c_4) \quad b_{i_j, s_r} = \lambda, \quad \forall r, j \in IND, r \neq j.$$

(c₁) Considere o grafo H , construído a partir do grafo G , invertendo as arestas (s_k, i_k) e (i_j, s_j) . Os conjuntos das arestas de G e de H podem ser estendidos para as ordens lineares O_G e O_H , indicadas abaixo:

$$O_G = \langle i_1, \dots, i_{k-1}, s_k, i_k, s_1, \dots, s_{k-1} \rangle$$

$$O_H = \langle i_1, \dots, i_{j-1}, i_k, i_{j+1}, \dots, i_{k-1}, s_j, i_j, s_1, \dots, s_{j-1}, s_k, s_{j+1}, \dots, s_{k-1} \rangle.$$

Então $A(O_G)$ e $A(O_H)$ são pré-ordens completas e $x^{A(O_G)}, x^{A(O_H)} \in F_a \subseteq F_b$. Usando os resultados obtidos nos itens a) e b), concluímos que

$$b_{i_j, s_j} + b_{s_k, i_k} = 0, \quad \text{donde}$$

$$b_{i_j, s_j} = -b_{s_k, i_k}.$$

Logo, $b_{i_j, s_j} = -\lambda$.

(c₂) Considere o grafo H , construído a partir do grafo G , invertendo as arestas (i_j, s_k) e (i_j, s_j) . Como no caso (c₁), considere a ordem linear O_H

estendendo o conjunto das arestas de H :

$$O_H = \langle i_1, \dots, i_{j-1}, i_{j+1}, \dots, i_{k-1}, s_k, i_k, s_j, i_j, s_1, \\ \dots, s_{j-1}, s_{j+1}, \dots, s_{k-1} \rangle .$$

Não é difícil ver que $x^{A(O_H)} \in F_a \subseteq F_b$. Então

$$b^T x^{A(O_H)} - b^T x^{A(O_G)} = 0 ,$$

sendo O_G a ordem linear definida em (c_1) .

Usando resultados provados anteriormente, concluímos que

$$b_{i_j, s_k} + b_{i_j, s_j} = 0 .$$

De (c_1) , segue que $b_{i_j, s_k} = \lambda$.

- (c₃) Considere agora o grafo H , obtido a partir de G , invertendo as arestas (i_k, s_r) e (i_r, s_r) . Como em (c_2) , temos a ordem linear

$$O_H = \langle i_1, \dots, i_{r-1}, i_{r+1}, \dots, i_{k-1}, s_r, i_r, s_k, i_k, s_1, \\ \dots, s_{r-1}, s_{r+1}, \dots, s_{k-1} \rangle .$$

Analogamente ao caso anterior, obtemos

$$b_{i_r, s_r} + b_{i_k, s_r} = 0 .$$

De (c_1) , segue que $b_{i_k, s_r} = \lambda$.

- (c₄) Suponha, s.p.g., que $r < j$ e considere o grafo H , construído a partir do grafo G , invertendo as arestas (s_k, i_k) , (i_j, s_r) , (i_j, s_j) e (i_r, s_r) . O conjunto

das arestas de H pode ser estendido para a seguinte ordem linear:

$$O_H = < i_1, \dots, i_{r-1}, i_{r+1}, \dots, i_{j-1}, i_{j+1}, \dots, i_k, s_r, i_r, s_j, i_j, s_1, \\ \dots, s_{r-1}, s_{r+1}, \dots, s_{j-1}, s_{j+1}, \dots, s_k > .$$

Observe que $A(O_H)$ é uma pré-ordem completa e que as únicas arestas positivas de G que não estão em $A(O_H)$ são as arestas (i_j, s_r) e (s_k, i_k) . Como as únicas arestas negativas de G que não pertencem a $A(O_H)$ são as arestas (i_j, s_j) e (i_r, s_r) , segue que

$$x(A(O_H) \cap A^+) + x(A(O_H) \cap A^-) = k^2 - 2k + 2$$

e portanto, $x^{A(O_H)} \in F_a$. Como $F_a \subseteq F_b$, vem que

$$b^T x^{A(O_G)} - b^T x^{A(O_H)} = 0 ,$$

sendo O_G a ordem linear definida em (c_1) .

Usando os resultados obtidos em a) e b), podemos concluir que

$$b_{s_k, i_k} + b_{i_r, s_r} + b_{i_j, s_j} + b_{i_j, s_r} = 0 .$$

Como $b_{i_r, s_r} = b_{i_j, s_j} = -\lambda$ por (c_1) e $b_{s_k, i_k} = \lambda$, por hipótese, segue que $b_{i_j, s_r} = \lambda$, o que completa a prova deste item.

Os itens (c_1) , (c_2) , (c_3) e (c_4) provam que

$$b_\alpha = \lambda a_\alpha \quad \text{se } \alpha \in AG, \text{ sendo } \lambda \in \mathbb{R} .$$

De a), b) e c), concluímos que

$$b = \lambda a \quad \text{para } \lambda \in \mathbb{R}^* .$$

Logo, $a^T \leq a_0$ é uma faceta de $P_{POC}(2k)$.

Como a condição do lema da elevação é facilmente verificada para esta inequação, segue que

$$x(A^+) - x(A^-) \leq k^2 - 2k + 2$$

é uma faceta de $P_{POC}(n)$, $n \geq 2k$, como queríamos demonstrar. □

Note que para $n \geq 6$ a classe das inequações semi- k -cerca, $3 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, é bastante grande. A cardinalidade desta classe é:

$$\sum_{k=3}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left[\binom{n}{2k} \binom{2k}{k} k \right].$$

III.4 Relação entre os politopos

Nesta seção apresentamos a relação com respeito à *inclusão* entre os politopos $P_{OL}(n)$, $P_{POC}(n)$, $P_{OP}(n)$ e $P_{PO}(n)$. Além disso, veremos quais dentre esses politopos são faces de outros. Para isto, observemos inicialmente que:

$$P_{OL}(n) = \text{conv} \left\{ x \in \{0,1\}^{A_n} : \begin{array}{l} x_{ij} + x_{ji} = 1, \quad i, j \in V_n, \quad i \neq j \quad \text{e} \\ x_{ij} + x_{jk} - x_{ik} \leq 1, \quad i, j, k \in V_n, \quad i \neq j \neq k \neq i \end{array} \right\}$$

$$P_{POC}(n) = \text{conv} \left\{ x \in \{0,1\}^{A_n} : \begin{array}{l} x_{ij} + x_{ji} \geq 1, \quad i, j \in V_n, \quad i \neq j \quad \text{e} \\ x_{ij} + x_{jk} - x_{ik} \leq 1, \quad i, j, k \in V_n, \quad i \neq j \neq k \neq i \end{array} \right\}$$

$$P_{OP}(n) = \text{conv} \left\{ x \in \{0,1\}^{A_n} : \begin{array}{l} x_{ij} + x_{ji} \leq 1, \quad i, j \in V_n, \quad i \neq j \quad \text{e} \\ x_{ij} + x_{jk} - x_{ik} \leq 1, \quad i, j, k \in V_n, \quad i \neq j \neq k \neq i \end{array} \right\}$$

$$P_{PO}(n) = \text{conv} \left\{ x \in \{0,1\}^{A_n} : x_{ij} + x_{jk} - x_{ik} \leq 1, \quad i, j, k \in V_n, \quad i \neq j \neq k \neq i \right\}.$$

É imediato que a seguinte relação de inclusão ocorre entre esses politopos:

$$\begin{array}{ccccc} P_{OL}(n) & \subseteq & P_{POC}(n) & \subseteq & P_{PO}(n) \\ & \subsetneq & & & \subsetneq \\ & & P_{OP}(n) & & \end{array}$$

Também é fácil ver que para $n \geq 3$ todas as inclusões indicadas são próprias.

Uma outra relação que pode ser facilmente verificada é:

$$P_{OL}(n) = P_{OP}(n) \cap P_{POC}(n) .$$

Convém aqui observar que

$$P_{PO}(n) \supseteq P_{OP}(n) \cup P_{POC}(n) ,$$

e que esta inclusão é própria para $n \geq 3$.

Mais forte do que a simples relação de inclusão entre $P_{OL}(n)$ e $P_{POC}(n)$ é o seguinte fato:

$$P_{OL}(n) \text{ é uma face de } P_{POC}(n) .$$

Para verificar isto, para cada aresta $\alpha \in A_n$, considere o conjunto

$$F_\alpha = \{x \in P_{POC}(n) : x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} = 1\} .$$

É imediato que

$$P_{OL}(n) = \bigcap_{\alpha \in A_n} F_\alpha .$$

De acordo com o teorema III.7, F_α é uma faceta de $P_{POC}(n)$. Portanto, $P_{OL}(n)$ é uma face de $P_{POC}(n)$. Como F_α é também uma faceta de $P_{OP}(n)$, conforme o teorema III.7, analogamente, podemos concluir que

$$P_{OL}(n) \text{ é uma face de } P_{OP}(n) .$$

Além disso, é fácil verificar que

$$\dim P_{OL}(n) = \frac{n(n-1)}{2}$$

No caso $n = 2$ a relação entre os politopos pode ser visualizada na figura abaixo:

Note que $P_{OP}(2)$ e $P_{PO}(2)$ não são faces de $P_{PO}(2)$.

III.5 Soluções fracionárias

Nesta seção mostraremos que os politopos obtidos através de relaxações simples dos politopos em questão possuem vértices fracionários. Faremos a análise para o caso $n = 5$, mas resultados análogos podem ser obtidos quando $n > 5$. Considere as seguintes inequações/restrições em $\mathbb{R}^{A_5}$:

- (1) $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \geq 1 \quad \forall \alpha \in A_5,$
- (2) $x_\alpha + x_{\bar{\alpha}} \leq 1 \quad \forall \alpha \in A_5,$
- (3) $x_{ij} + x_{jk} - x_{ik} \leq 1 \quad \forall i, j, k \in V_5, \quad i \neq j \neq k \neq i,$
- (4) $x_\alpha \in \{0, 1\} \quad \forall \alpha \in A_5,$
- (5) $0 \leq x_\alpha \leq 1 \quad \forall \alpha \in A_5.$

Note que

$$P_{POC}(5) = \text{conv}\{x \in \mathbb{R}^{A_5} : x \text{ satisfaz (1), (3) e (4)}\} ,$$

$$P_{OP}(5) = \text{conv}\{x \in \mathbb{R}^{A_5} : x \text{ satisfaz (2), (3) e (4)}\} \text{ e}$$

$$P_{PO}(5) = \text{conv}\{x \in \mathbb{R}^{A_5} : x \text{ satisfaz (3) e (4)}\} .$$

Chamemos de $\hat{P}_{POC}(5)$, $\hat{P}_{OP}(5)$ e $\hat{P}_{PO}(5)$ os politopos obtidos de $P_{POC}(5)$, $P_{OP}(5)$ e $P_{PO}(5)$, respectivamente, substituindo-se a restrição (4) pela restrição (5). Note que os conjuntos de pontos que satisfazem as respectivas restrições são convexos e limitados e portanto,

$$\hat{P}_{POC}(5) = \{x \in \mathbb{R}^{A_5} : x \text{ satisfaz (1), (3) e (5)}\}$$

$$\hat{P}_{OP}(5) = \{x \in \mathbb{R}^{A_5} : x \text{ satisfaz (2), (3) e (5)}\} \text{ e}$$

$$\hat{P}_{PO}(5) = \{x \in \mathbb{R}^{A_5} : x \text{ satisfaz (3) e (5)}\} .$$

Claramente, $P_{POC}(5) \subseteq \hat{P}_{POC}(5)$, $P_{OP}(5) \subseteq \hat{P}_{OP}(5)$ e $P_{PO}(5) \subseteq \hat{P}_{PO}(5)$. Vamos mostrar que estas inclusões são todas próprias, ou seja, que estes novos politopos possuem vértices fracionários. Para isto, vamos exibir primeiramente uma função peso $p : A_5 \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que

$$\max\{p^T x : x \in \hat{P}_{PO}(5)\} \text{ e} \tag{6}$$

$$\max\{p^T x : x \in \hat{P}_{OP}(5)\} \tag{7}$$

têm soluções ótimas fracionárias que são vértices do respectivo politopo.

Considere um circuito hamiltoniano $C = \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$ em D_5 , e defina $p^T x$ como

$$p^T x = x(C) - x(CO) .$$

sendo CO o conjunto das 2-cordas de C .

O vetor $\hat{x} \in \mathbb{R}^5$ tal que

$$\hat{x}_\alpha = \begin{cases} 1/2, & \text{se } \alpha \in C \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

é um vértice de $\hat{P}_{PO}(5)$ e de $\hat{P}_{OP}(5)$ que é uma solução ótima de (6) e de (7), ambos com valor objetivo ótimo = 5/2.

Note que $\hat{x}$ não satisfaz a restrição

$$x(C) - x(CO) \leq 2 ,$$

que é uma inequação-faceta de $P_{PO}(5)$ e de $P_{OP}(5)$, conforme o teorema III.11. A título de comentário, vale observar que, após acrescentar esta inequação ao sistema que define $\hat{P}_{OP}(5)$ (resp. $\hat{P}_{PO}(5)$), obtivemos uma solução ótima 0/1.

Vamos agora mostrar que $\hat{P}_{POC}(5)$ tem vértice fracionário. Para isto, considere a função peso $\bar{p} : A_5 \rightarrow \mathbb{Z}$ como sendo

$$\bar{p}^T x = 3x(C) - 3x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) .$$

Resolvendo-se o PL

$$\max\{\bar{p}^T x : x \in \hat{P}(5)\} ,$$

usando o método simplex, obtivemos como solução ótima o vetor $\bar{x}$ (que é portanto um vértice de $\hat{P}_{POC}(5)$) cujos componentes têm os valores indicados no digrafo G abaixo, sendo $\bar{x}_\alpha = 0$ se $\alpha \notin AG$.

Podemos verificar que $\bar{p}^T \bar{x} = 11/2$, e portanto, $\bar{x}$ não satisfaz a restrição

$$3x(C) - 3x(CO) + x(\bar{C}) - x(\bar{CO}) \leq 4$$

que é uma inequação-faceta de $P_{POC}(5)$, de acordo com o teorema III.16.

Acrescentamos esta última inequação ao sistema que define $\hat{P}_{POC}(5)$ e resolvemos o novo LP, obtendo desta vez a solução ótima x^* , indicada no digrafo G^* a seguir, sendo $x_\alpha^* = 0$ se $\alpha \notin AG^*$ e $x_\alpha^* = 1$, se $\alpha \in AG^*$.

Como x^* é uma solução 0/1 e pertence ao politopo $P_{POC}(5)$, então x^* é o vetor característico de uma pré-ordem completa de $P_{POC}(5)$. Logo, x^* é também solução ótima da seguinte instância:

$$\max\{\bar{p}^T x : x \in P_{POC}(5)\}.$$

Capítulo IV

Diâmetro e adjacência de vértices do politopo da pré-ordem completa

Quando duas pré-ordens completas, digamos S e T , estão relacionadas pela inclusão, o digrafo induzido pela diferença simétrica de S e T tem uma estrutura simples, que explorada convenientemente possibilitou-nos a determinação do diâmetro de $P_{POC}(n)$.

É imediato que $\text{diam}(P_{POC}(2)) = 1$. Provamos neste capítulo que $\text{diam}(P_{POC}(n)) = 2$, se $n \geq 3$. O fato de que este diâmetro é pequeno nos surpreendeu, apesar de encontrarmos na literatura vários exemplos de problemas INP-difíceis, cujos politopos associados possuem diâmetros pequenos. Isto ocorre, por exemplo, no politopo do caixeiro viajante e no da ordem linear, cujos diâmetros têm valor 2 (Padberg e Rao [1974] e Young [1978]).

Infelizmente, não conseguimos caracterizar adjacência de dois vértices quaisquer de $P_{POC}(n)$; assim, apresentamos apenas alguns resultados que caracterizam adjacência de

vértices particulares. Cabe aqui observar, entretanto, que embora em alguns casos, como no politopo da ordem linear, adjacência de dois vértices quaisquer pode ser facilmente testada, no politopo do caixeiro viajante, decidir se dois vértices são não adjacentes é INP-completo (Papadimitriou [1978]).

Neste capítulo, a notação **p.o.c.** será usada para abreviar o termo **pré-ordem completa**. Consideraremos $n \geq 2$, sempre que o valor de n não estiver explícito.

Seja T uma p.o.c. de D_n . Então os subgrafos maximais fortemente conexos de $[T]$ são cliques (maximais). Além disso, se contrairmos cada um destes cliques, obtemos o grafo *condensado* de $[T]$, cujas arestas constituem uma ordem linear. Esta ordem pode ser representada pela seqüência de vértices que a define. Assim, denotamos por $OLT = \langle T_1, \dots, T_k \rangle$ tal seqüência, sendo $T_1, \dots, T_k$ os cliques maximais de $[T]$. Portanto, T estará bem definida, se especificada a ordem linear sobre os cliques maximais de $[T]$.

Uma aresta $\alpha \in T$ é denominada **local** em T se seus extremos estão num mesmo clique de OLT ; caso contrário, é denominada de **ligação** em T . Note que se $\alpha = (u, v)$ é uma aresta de ligação em T tal que $u \in VT_i$ e $v \in VT_j$, então $i < j$.

Sejam S e T pré-ordens completas de D_n . Dizemos que S é um **refinamento** de T se e somente se $S \subseteq T$. O exemplo abaixo ilustra duas p.o.c. S e T em D_{10} tais que $S \subseteq T$.

Exemplo IV.1: Sejam S e T p.o.c. em D_{10} , onde $VD_{10} = \{1, 2, \dots, 10\}$, definidos por:

$$OLS = \langle \{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}, \{7\}, \{8, 9\}, \{10\} \rangle \text{ e}$$

$$OLT = \langle \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{7\}, \{8, 9, 10\} \rangle .$$

Na figura IV.1, ilustramos as pré-ordens completas S e T , enfatizando os cliques de OLS e OLT . Omitimos as arestas entre cliques não consecutivos, implicadas pela transitividade.

$S :$

$T :$

FIGURA IV.1

Se S e T são p.o.c. tais que S é um refinamento de T , então todas as arestas de *ligação* em T são arestas de *ligação* em S e todas as arestas *locais* em S são *locais* em T . Usando este fato, fica fácil verificar a validade da seguinte proposição:

Proposição IV.2: *Sejam S e T p.o.c. em D_n com $OLS = \langle S_1, \dots, S_p \rangle$ e $OLT = \langle T_1, \dots, T_q \rangle$. Se $S \subseteq T$, então para todo i, j tais que $1 \leq i < j \leq p$, são válidas:*

(a) $S_i \subseteq T_\ell$, para algum ℓ , $1 \leq \ell \leq q$.

(b) Se $S_i, S_j \subseteq T_\ell$ ($1 \leq \ell \leq q$), então $S_k \subseteq T_\ell$ para todo k , $i \leq k \leq j$.

Prova: A validade de (a) é imediata. Para provar (b), suponha por contradição que existam $S_i, S_j \subseteq T_\ell$ e $S_k \subseteq T_m$, sendo $i < k < j$ e $m \neq \ell$. Sejam u, v e w vértices em VS_i, VS_k e VS_j , respectivamente. De $(u, v) \in S$, segue que $(u, v) \in T$. Como $u \in VT_\ell$ e $v \in VT_m$, a aresta (u, v) é de *ligação* em T ; logo, $\ell < m$. Por outro lado, como $(v, w) \in S$, por um raciocínio análogo conclui-se que (v, w) é uma aresta de *ligação* em T e que $m < \ell$, uma contradição.

□

O corolário abaixo pode ser facilmente provado:

Corolário IV.3: *Sejam S e T como na proposição IV.2, sendo $S \subseteq T$. Então os vértices de cada clique de OLT são vértices de cliques consecutivos de OLS . Mais precisamente, OLS pode ser expresso na forma:*

$$OLS = \langle S_1 = \underbrace{S_1^1, \dots, S_{t_1}^1}_{}, \underbrace{S_1^2, \dots, S_{t_2}^2}_{}, \dots, \underbrace{S_1^q, \dots, S_{t_q}^q}_{} = S_p \rangle,$$

onde $VS_1^i \cup VS_2^i \cup \dots \cup VS_{t_i}^i = VT_i$, para $i = 1, \dots, q$.

As próximas proposições são relativas ao digrafo H , gerado por $T \setminus S$, onde S e T são p.o.c. tais que $S \subseteq T$. O resultado que apresentaremos na proposição IV.4 não será usado

posteriormente, mas é interessante por si só. Na figura IV.2, ilustramos o digrafo $[T \setminus S]$, para S e T dados na figura IV.1.

FIGURA IV.2

Proposição IV.4: *Sejam S e T p.o.c. distintas de D_n tais que $S \subseteq T$, $OLS = \langle S_1, \dots, S_p \rangle$ e $OLT = \langle T_1, \dots, T_q \rangle$. Então o digrafo gerado por $T \setminus S$ é acíclico transitivo.*

Prova: Seja $H = [T \setminus S]$. É imediato que H não possui circuitos dirigidos, pois se $(u, v) \in AH$, então $u \in VS_i$, $v \in VS_j$, sendo $i > j$.

Para mostrar que H é um digrafo transitivo, suponha que (u, v) e (v, w) são arestas de H . Como S tem a propriedade total e $(u, v) \notin S$, segue que $(v, u) \in S$. Neste caso, se (u, w) pertencesse a S , então da transitividade de S teríamos que $(v, w) \in S$, uma contradição. Logo, $(u, w) \notin S$. Por outro lado, como (u, v) e $(v, w) \in T$, segue que $(u, w) \in T$, da transitividade de T . Logo, $(u, w) \in T \setminus S$, e portanto é uma aresta de H .

□

Proposição IV.5: *Sejam S e T p.o.c de D_n e $H = [T \setminus S]$, com componentes $H_1, \dots, H_p$, $p \geq 2$. Se $S \subseteq T$ e $OLT = \langle T_1, \dots, T_q \rangle$, então para todo i, j , $1 \leq i < j \leq p$, são válidas as seguintes afirmações:*

(a) $H_i \subseteq T_l$, para algum l , $1 \leq l \leq q$.

(b) Se $H_i \subseteq T_l$ e $H_j \subseteq T_m$ ($1 \leq l, m \leq q$), então $l \neq m$.

Prova: A validade de (a) é imediata, uma vez que H_i tem pelo menos uma aresta, é conexo e só contém arestas locais em T . Para provar (b), suponha por contradição que $H_i, H_j \subseteq T_l$, para algum l , $1 \leq l \leq q$. Como H é gerado por um conjunto de arestas, H não possui vértices isolados. Seja $\alpha = (u, v) \in AH_i$ e $w \in VH_j$. Como (u, w) e (w, v) são arestas de $T \setminus AH$, então estas arestas estão em S . Da transitividade de S , segue que $\alpha \in S$, uma contradição.

□

O próximo resultado mostra que existe uma relação especial entre os cliques de OLT e OLS , quando $H = [T \setminus S]$ é conexo. Como veremos, a existência de tal relação também garante a conexidade de H .

Corolário IV.6: *Sejam S e T p.o.c. distintas em D_n tais que $S \subseteq T$ e seja $H = [T \setminus S]$. Então H é conexo se e somente se existe um único clique em OLT cujo conjunto de vértices é a união dos conjuntos de vértices de dois ou mais cliques (consecutivos) de OLS .*

Prova: A demonstração deste resultado é imediata, a partir do Corolário IV.3 e da Proposição IV.5.

□

Teorema IV.7: *Sejam S e T p.o.c. distintas de D_n tais que $S \subseteq T$ e seja $H = [T \setminus S]$. Então x^S é adjacente a x^T em $P_{POC}(n)$ se e somente se H é conexo.*

Prova: Suponha inicialmente que H é conexo. Da Proposição IV.5, segue que $H \subseteq T_i$, para algum clique T_i de OLT . Suponha, s.p.g., que $H \subseteq T_1$. Do Corolário IV.6 concluímos

que T_1 é o único clique de OLT cujo conjunto de vértices é a união de conjuntos de vértices de dois ou mais cliques de OLS . Pelo Corolário IV.3 podemos então supor que

$$OLT = \langle T_1, \dots, T_k \rangle \quad \text{e} \quad OLS = \langle S_1, \dots, S_m, \dots, S_{m+k-1} \rangle ,$$

sendo $VT_1 = \bigcup_{i=1}^m VS_i$, $m \geq 2$, e $VT_j = VS_{m+j-1}$, $2 \leq j \leq k$.

Seja $\alpha = (w, z) \in AH$, com $w \in VS_m$ e $z \in VS_1$. Denote por t o número de arestas de $AT_1 \setminus S$ e considere a função $p : AD_n \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por:

$$p(\beta) = \begin{cases} t-1 & , \text{ se } \beta = (w, z) \\ -1 & , \text{ se } \beta \in AT_1 \setminus S, \quad \beta \neq (w, z) \\ t & , \text{ se } \beta \in S \\ -t & , \text{ se } \beta \in AD_n \setminus T . \end{cases}$$

Então $p(T) = p(S) + p(AT_1 \setminus S) = t|S|$, e portanto,

$$p(T) = p(S) = t|S| . \tag{1}$$

Seja R uma p.o.c. de D_n cujo vetor característico maximiza a função $\sum_{\ell \in AD_n} p_\ell x_\ell$. Da igualdade (1), segue que

$$\sum_{\ell \in AD_n} p_\ell x_\ell^R \geq t|S| . \tag{2}$$

Como $p(\beta) = t$ para toda aresta $\beta \in S$ e, excetuando a aresta (w, z) , todas as demais arestas têm peso negativo, de (2) concluímos que $S \subseteq R$ e que se $p(\beta) = -t$, então $\beta \notin R$.

Se $(w, z) \notin R$, concluímos de (2) que $\beta \notin R$ para toda aresta $\beta \in AT_1 \setminus S$. Neste caso, temos que $R = S$. Se $(w, z) \in R$, da transitividade de R fica fácil ver que $\beta \in R$ para toda aresta $\beta \in AT_1$. Neste caso, $R = T$.

Portanto, x^T e x^S são os únicos vértices de $P_{POC}(n)$ que maximizam a função acima. Logo, pelo Teorema I.5, são adjacentes neste politopo.

Para provar que a conexidade de H é condição necessária, suponha por contradição que H possui componentes $H_1, \dots, H_p$, $p \geq 2$, e considere os subconjuntos de AD_n definidos por:

$$Q_i = S \cup AH_i, \quad i = 1, \dots, p.$$

Da Proposição IV.5, segue que existe $T_\ell \in OLT$ tal que $H_1 \subseteq T_\ell$. Suponha, s.p.g., que $\ell = 1$. Não é difícil verificar que Q_1 é uma p.o.c. de D_n tal que:

$$\begin{aligned} OLQ_1 &= \langle T_1, S_t, S_{t+1}, \dots, S_k \rangle, \quad \text{sendo} \\ OLS &= \langle S_1, \dots, S_t, \dots, S_k \rangle, \quad \text{e} \quad VT_1 = \bigcup_{j=1}^{t-1} VS_j. \end{aligned}$$

Com raciocínio análogo, verifica-se que cada Q_i , $i = 2, \dots, p$, é uma p.o.c. de D_n . Logo, x^{Q_i} é vértice de $P_{POC}(n)$, para $i = 1, \dots, p$.

Considere agora um ponto y_λ no interior do segmento que liga x^T a x^S em $P_{POC}(n)$, i.e.,

$$y_\lambda = \lambda x^S + (1 - \lambda)x^T, \quad \text{onde } 0 < \lambda < 1.$$

Note que, como $S \subseteq T$, então $y_\lambda = x^S + (1 - \lambda)x^{T \setminus S}$. Por outro lado, usando os resultados anteriores, temos que

$$y_\lambda = (1 - p + p\lambda)x^S + \sum_{i=1}^p (1 - \lambda)x^{Q_i}.$$

Logo, tomando-se λ tal que $\frac{p-1}{p} < \lambda < 1$, segue que y_λ pode ser escrito de duas formas distintas como combinação convexa de vértices de $P_{POC}(n)$. Pelo Teorema I.5, x^S não é adjacente a x^T neste politopo, uma contradição.

□

À primeira vista, pareceu-nos que $[S\Delta T]$ conexo fosse uma condição necessária e suficiente para que x^S e x^T fossem adjacentes em $P_{POC}(n)$, sendo S e T p.o.c. quaisquer de D_n .

Entretanto, encontramos exemplos como o que indicamos a seguir, onde $[S\Delta T]$ é conexo e x^S não é adjacente a x^T em $P_{POC}(n)$. Este fato levou-nos à investigação do caso em que S e T estão relacionados pela relação de inclusão, já que neste caso $S\Delta T$ tem uma estrutura bastante simples, como pudemos verificar anteriormente.

Exemplo IV.8: Considere $T = \langle 1, 2, \dots, n \rangle$ uma ordem linear de D_n e $\bar{T} = \langle n, n-1, \dots, 1 \rangle$ a ordem linear reversa à T , sendo $V_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Note que $H = [T\Delta\bar{T}]$ é conexo. Seja $\alpha := (i, i+1) \in T$, $1 \leq i < n$. Então,

$$S = \langle 1, 2, \dots, i-1, i+1, i, i+2, \dots, n \rangle \quad \text{e}$$

$$R = \langle n, n-1, \dots, i+2, i, i+1, i-1, \dots, 1 \rangle$$

são ordens lineares de D_n e portanto p.o.c. de D_n . Considerando y o ponto médio do segmento que liga x^T a $x^{\bar{T}}$ em $P_{POC}(n)$, temos que:

$$y = \frac{1}{2}x^T + \frac{1}{2}x^{\bar{T}} = \frac{1}{2}x^S + \frac{1}{2}x^R.$$

Logo, x^T não é adjacente a $x^{\bar{T}}$ em $P_{POC}(n)$.

Corolário IV.9: *Seja T uma p.o.c. de D_n , $n \geq 3$, tal que $T \neq AD_n$. Então x^T é adjacente a x^{AD_n} em $P_{POC}(n)$.*

Prova: Devido ao Teorema IV.7, é suficiente provarmos que $H = [AD_n \setminus T]$ é conexo. Para isto, note que $VH = VD_n$ e considere $OLT = \langle T_1, \dots, T_k \rangle$, $u \in VT_i$ e $v \in VT_j$, tais que $u \neq v$. Se $i < j$ ($i > j$) então $(v, u) \in AH$ ($(u, v) \in AH$) e se $i = j$ existe em H um caminho de u para v , passando por um vértice não pertencente a VT_i .

□

Teorema IV.10: $\text{DIAM}(P_{POC}(n)) = 2$, se $n \geq 3$.

Prova: Pelo Corolário IV.9, se T é uma p.o.c. de D_n distinta de AD_n , então x^T é adjacente a x^{AD_n} em $P_{POC}(n)$. Logo,

$$\text{DIAM}(P_{POC}(n)) \leq 2 .$$

Para concluir o resultado, resta mostrar que existem p.o.c. S e T de D_n , tais que x^S não é adjacente a x^T em $P_{POC}(n)$. Isto pode ser concluído do Exemplo IV.8.

□

Observação: Uma outra forma de provar que existem p.o.c. em D_n , $n \geq 3$, cujos vetores característicos não são adjacentes em $P_{POC}(n)$, é usando o teorema devido a Young [1978] (veja também Hausmann [1980]) que caracteriza adjacência de dois vértices quaisquer no politopo da ordem linear, $P_{OL}(n)$. Com o objetivo de enunciar este resultado, faremos as seguintes convenções: se x e y são vetores característicos de ordens lineares de D_n , denotamos por $x \odot y$ (resp. $x \oplus y$) o vetor de zeros e uns obtido pelo cálculo da função lógica ‘e’ (resp. ‘ou exclusivo’) nos componentes de x e y . Isto é,

$$(x \odot y)_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i = y_i = 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} ;$$

$$(x \oplus y)_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} .$$

Teorema IV.11: *Sejam S e T duas ordens lineares distintas de D_n . Construa o grafo $L(S, T) = (VL, AL)$ tal que:*

$$VL = \left\{ \{u, v\}, u \text{ e } v \in V(D_n) : z_{(u,v)} = 1, \text{ sendo } z = x^S \oplus x^T \right\} \text{ e}$$

$$AL = \left\{ \{ \{u, v\}, \{v, w\} \} : z_{(u,w)} = 1 \text{ ou } z_{(w,u)} = 1, \text{ sendo } z = x^S \odot x^T \right\}$$

Então x^S e x^T são adjacentes em $P_{OL}(n)$ se e somente se $L(S, T)$ for conexo.

□

Usando o teorema acima, podemos obter o resultado desejado. Para isto, considere uma ordem linear T de D_n e $\bar{T}$ seu reverso, $n \geq 3$. Então $x^T \oplus x^{\bar{T}} = 1$ e $x^T \odot x^{\bar{T}} = 0$. O grafo $L(T, \bar{T})$ consiste de $\binom{n}{2}$ vértices e não possui arestas. Como $n \geq 3$, $L(T, \bar{T})$ é desconexo. Portanto, os vetores x^T e $x^{\bar{T}}$ não são adjacentes em $P_{OL}(n)$. Como $P_{OL}(n)$ é uma face de $P_{POC}(n)$, conforme vimos no capítulo III, segue que x^T e $x^{\bar{T}}$ não são adjacentes em $P_{POC}(n)$.

Finalizamos este capítulo apresentando um resultado que caracteriza adjacência de vértices em $P_{POC}(n)$, se eles diferem em apenas dois componentes. Considere inicialmente a proposição:

Proposição IV.12: *Sejam S e T p.o.c. de D_n tais que $S \setminus T = \{a\}$, $T \setminus S = \{b\}$ e seja $H = [\{a, b\}]$. Então H é desconexo se e somente se $S \cup T$ e $S \cap T$ são p.o.c. de D_n .*

Prova: Suponha inicialmente que $S \cup T$ e $S \cap T$ são p.o.c. de D_n . A prova será por contradição. Para isto, considere H conexo.

Se $b = \bar{a}$, então $(S \cap T) \cap \{a, \bar{a}\} = \emptyset$. Logo, $[S \cap T]$ não é total e portanto $S \cap T$ não é p.o.c. de D_n .

Suponha então que $b \neq \bar{a}$. Como S e T são p.o.c., $\bar{a} \in T$ e $\bar{b} \in S$. De $b \neq \bar{a}$, segue que $\bar{a} \in S$ e $\bar{b} \in T$. Logo, $\{\bar{a}, \bar{b}\} \subseteq S \cap T$. Além disso, como H é conexo, $[\{\bar{a}, \bar{b}\}]$ é conexo. Sejam i e j vértices de VD_n que são extremos do caminho $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle$. Como T é p.o.c., $\{\bar{a}, \bar{b}, b\} \subseteq T$ e $a \notin T$, segue que $(i, j) \in T$ se e somente se $(j, i) \notin T$. Seja $\alpha \in \{(i, j), (j, i)\}$ e suponha, s.p.g., que $\alpha \notin T$. Como $\alpha \neq a$, segue que $\alpha \notin S$ e portanto $\alpha \notin S \cup T$. De $\{a, \bar{a}, b, \bar{b}\} \subseteq S \cup T$ e $\alpha \notin S \cup T$, segue que $[S \cup T]$ não é transitivo e portanto $S \cup T$ não é p.o.c. de D_n .

Para provar a recíproca, suponha que H é desconexo e vamos mostrar que $S \cup T$ e $S \cap T$ são p.o.c. de D_n . Como $S \subseteq S \cup T$ e S é p.o.c., segue que $[S \cup T]$ é total. Se $[S \cup T]$ não é transitivo, como S e T são p.o.c., existe um subgrafo F de $[S \cup T]$ não transitivo tal que $|VF| = 3$ e $\{a, b\} \subseteq AF$. Isto implica H conexo, uma contradição. Logo, $S \cup T$ é uma p.o.c.

Claramente, $[S \cap T]$ é transitivo, pois S e T são p.o.c.. Se $[S \cap T]$ não é total, como S e T são p.o.c., segue que $b = \bar{a}$. Neste caso, H é conexo, uma contradição.

Portanto, $S \cap T$ e $S \cup T$ são p.o.c. de D_n e a demonstração está completa.

□

Corolário IV.13: *Sejam S e T p.o.c. de D_n e seja $H = [S \Delta T]$. Se $|AH| = 2$, então x^S e x^T são adjacentes em $P_{POC}(n)$ se e somente se H é conexo.*

Prova: Se $S \subseteq T$ ou $T \subseteq S$ o resultado é um corolário do Teorema IV.7. Suponha então que $S \setminus T = \{a\}$ e $T \setminus S = \{b\}$ e considere um ponto y no interior do segmento que liga x^S a x^T em $P_{POC}(n)$,

$$y = \frac{1}{2}x^S + \frac{1}{2}x^T.$$

Suponha que $R_1, \dots, R_k$ sejam p.o.c. de D_n , duas a duas distintas, tais que:

(a) $R_i \not\subseteq \{S, T\}$, $i = 1, \dots, k$.

(b) $y = \sum_{i=1}^k \lambda_i x^{R_i}$, $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$, $0 < \lambda_i < 1$.

Neste caso, temos que se $\alpha \in S \cap T$, então

$$1 = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_\alpha^{R_i},$$

e se $\alpha \in AD_n \setminus (S \cup T)$, então

$$0 = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_\alpha^{R_i}.$$

Como $\lambda_i > 0$ para todo $i = 1, \dots, k$, segue que

$$x_{\alpha}^{R_i} = \begin{cases} 1, & \text{se } \alpha \in S \cap T \\ 0, & \text{se } \alpha \in AD_n \setminus (S \cup T) \end{cases} .$$

Portanto,

$$S \cap T \subseteq R_i \subseteq S \cup T \quad \text{para } i = 1, \dots, k ,$$

donde podemos concluir que $k = 2$ e podemos afirmar, s.p.g., que $R_1 = S \cap T$ e $R_2 = S \cup T$. Como $y = \frac{1}{2}x^{R_1} + \frac{1}{2}x^{R_2}$, concluimos que x^S e x^T não são adjacentes em $P_{POC}(n)$ se e somente se $S \cup T$ e $S \cap T$ são p.o.c. de D_n . Pela Proposição IV.12, segue que x^S e x^T são adjacentes em $P_{POC}(n)$ se e somente se H é conexo.

□

ANEXO

Teorema: *A inequação-heptágono, apresentada na definição III.19,*

$$4x(C) - 4x(CO) + 2x(\overline{C}) - 2x(\overline{CO}) + x(D) - x(\overline{D}) \leq 9$$

é válida para $P_{POC}(7)$.

Prova: Denote a inequação-heptágono por $a^T x \leq 9$ e considere todas as operações aritméticas módulo 7. Como na definição III.19, suponha que $C := \{(i, i+1) : i = 1, \dots, 7\}$, $CO := \{(i, i+2) : i = 1, \dots, 7\}$ e $D := \{(i, i+3) : i = 1, \dots, 7\}$. Para facilitar o desenvolvimento posterior, escrevemos $a^T x \leq 9$ como $2a_1^T x + a_2^T x \leq 9$, sendo:

$$a_1^T x = 2x(C) - 2x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \quad \text{e}$$

$$a_2^T x = x(D) - x(\overline{D}) .$$

Vamos provar o teorema, mostrando que se H é um subdigrafo de D_7 tal que x^{AH} é um vértice de $P_{POC}(7)$, então $a^T x^{AH} \leq 9$. Para isto, será suficiente verificarmos que para um tal H , valem os seguintes lemas:

Lema 1: $a_1^T x \leq 6$ e $a_2^T x \leq 7$ são válidas para $P_{POC}(7)$.

Lema 2: Se $a_2^T x^{AH} \leq -3$ ou $a_2^T x^{AH} \geq 6$, então $a^T x^{AH} \leq 9$.

Lema 3: Se $a_1^T x^{AH} = 6$ então $a^T x^{AH} \leq 9$.

Lema 4: Se $4 \leq a_2^T x^{AH} \leq 5$ então $a_1^T x^{AH} < 3$.

Lema 5: Se $2 \leq a_2^T x^{AH} \leq 3$ então $a_1^T x^{AH} < 4$.

Lema 6: Se $0 \leq a_2^T x^{AH} \leq 1$ então $a_1^T x^{AH} < 5$.

Note que, provados os lemas 1, 2 e 3, podemos restringir nossa atenção aos casos em que $3 \leq a_1^T x^{AH} \leq 5$ e $0 \leq a_2^T x^{AH} \leq 5$. Feito isto, a validade dos lemas 4, 5, e 6 garantirá a validade do teorema.

Nas demonstrações, devemos determinar as cardinalidades dos conjuntos $AH \cap Z$, para $Z \in \mathcal{C}$, sendo $\mathcal{C} = \{C, \overline{C}, CO, \overline{CO}, D, \overline{D}\}$. Para simplificar a notação, S_H denota o conjunto $S \cap AH$, para $S \subseteq A(D_7)$. Todas as afirmações a seguir são referentes a um digrafo $H \subseteq D_7$ tal que x^{AH} é um vértice de $P_{POC}(7)$.

Para auxiliar a prova desses lemas, vários resultados auxiliares serão provados ou enunciados.

Os cinco seguintes resultados serão utilizados na prova dos lemas. O primeiro resultado foi provado no capítulo III; os resultados R2 e R3 seguem da transitividade de H ; o resultado R4 segue de R1; e o resultado R5 segue do fato de que H é total.

R1. As seguintes inequações são válidas para $P_{POC}(7)$:

$$x(C) - x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 3 ,$$

$$x(C) - x(CO) \leq 3 \quad \text{e}$$

$$x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 3 .$$

R2. Se $Z \in \mathcal{C}$ e $|Z_H| = 6$ então os valores da figura A1 se verificam. A interpretação da primeira linha se refere ao caso $Z_H = C_H$ e é a seguinte: se $|C_H| = 6$, então $|\overline{C}_H| \geq 1$, $|CO_H| \geq 5$, $|\overline{CO}_H| \geq 2$, $|D_H| \geq 4$ e $|\overline{D}_H| \geq 3$. Nos demais casos, a interpretação é análoga.

Z_H	≥ 1	≥ 5	≥ 2	≥ 4	≥ 3
C_H	$ \overline{C}_H $	$ CO_H $	$ \overline{CO}_H $	$ D_H $	$ \overline{D}_H $
$\overline{C}_H$	$ C_H $	$ \overline{CO}_H $	$ CO_H $	$ \overline{D}_H $	$ D_H $
CO_H	$ \overline{CO}_H $	$ \overline{D}_H $	$ D_H $	$ \overline{C}_H $	$ C_H $
$\overline{CO}_H$	$ CO_H $	$ D_H $	$ \overline{D}_H $	$ C_H $	$ \overline{C}_H $
D_H	$ \overline{D}_H $	$ \overline{C}_H $	$ C_H $	$ CO_H $	$ \overline{CO}_H $
$\overline{D}_H$	$ D_H $	$ C_H $	$ \overline{C}_H $	$ \overline{CO}_H $	$ CO_H $

Figura A1

R3. Se $Z \in \mathcal{C}$ e $|Z_H| = 5$, então $|ZO_H| \geq 3$, sendo ZO o conjunto das 2-cordas de Z .

Para facilitar, listamos a seguir os pares (Z_H, ZO_H) para $Z \in \mathcal{C}$:

$$(C_H, CO_H), (\overline{C}_H, \overline{CO}_H), (CO_H, \overline{D}_H), (\overline{CO}_H, D_H), (D_H, \overline{C}_H), (\overline{D}_H, C_H) .$$

R4. Se $4 \leq a_1^T x^{AH} \leq 5$ então $|C_H| - |CO_H| \geq 1$.

R5. As seguintes afirmações são verdadeiras:

- i) se $|D_H| \leq 3$ então $a_2^T x^{AH} \leq -1$;
- ii) se $|D_H| = 4$ então $a_2^T x^{AH} \leq 1$;
- iii) se $|D_H| = 5$ então $a_2^T x^{AH} \leq 3$;
- iv) se $|D_H| = 6$ então $a_2^T x^{AH} \leq 5$.

Lema 1: $a_1^T x \leq 6$ e $a_2^T x \leq 7$ são válidas para $P_{POC}(7)$.

Prova do Lema 1: Obviamente $a_2^T x \leq 7$ é válida para $P_{POC}(7)$. Uma vez que a inequação $a_1^T x \leq 6$ resulta da soma das inequações $x(C) - x(CO) + x(\overline{C}) - x(\overline{CO}) \leq 3$ e $x(C) - x(CO) \leq 3$, sua validade segue de R1.

□

Lema 2: Se $a_2^T x^{AH} \leq -3$ ou $a_2^T x^{AH} \geq 6$, então $a^T x^{AH} \leq 9$.

Prova do Lema 2: Se $a_2^T x^{AH} \leq -3$, segue do Lema 1 que $a^T x^{AH} \leq 9$.

Observe que se H possui um circuito $Z \in \mathcal{C}$, devido à transitividade de H , temos que $a^T x^{AH} = 0$. Por outro lado, como H é total, $a_2^T x^{AH} \geq 6$ implica $D \subseteq H$, e portanto $a^T x^{AH} \leq 9$, como queríamos demonstrar.

□

Como vimos na demonstração do lema acima, $|Z_H| = 7$ para $Z \in \mathcal{C}$ implica $a^T x^{AH} = 0$. Portanto, como H é total, a partir daqui, vamos considerar $1 \leq |Z_H| \leq 6$ para $Z \in \mathcal{C}$.

Lema 3: Se $a_1^T x^{AH} = 6$, então $a^T x^{AH} \leq 9$.

Prova do Lema 3: Como $a_1^T x^{AH} = 2(|C_H| - |CO_H|) + |\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| = 6$; e por R1

temos que

$$|C_H| - |CO_H| + |\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 3, \quad |C_H| - |CO_H| \leq 3 \quad \text{e} \quad |\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 3,$$

então

$$|C_H| - |CO_H| = 3 \quad \text{e} \quad |\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| = 0.$$

- Se $|CO_H| = 1$ então $|\overline{CO}_H| \geq 6$. Como estamos supondo $|\overline{CO}_H| \leq 6$, então $|\overline{CO}_H| = 6$, e portanto, $|\overline{C}_H| = 6$. Neste caso, de R2 segue que $|CO_H| \geq 2$, uma contradição.
- Se $|CO_H| = 2$ então $|C_H| = 5$, o que contraria R3.
- Se $|CO_H| = 3$ então $|C_H| = 6$. De R2 segue que $|CO_H| \geq 5$, uma contradição.
- Se $|CO_H| \geq 4$ então $|C_H| \geq 7$, contrariando a hipótese de que $|C_H| \leq 6$.

Portanto, $a_1^T x^{AH} = 6$ não ocorre sob a hipótese de que para $Z \in \mathcal{C}$, $|Z_H| \leq 6$. Como já vimos, para $Z \in \mathcal{C}$, se $|Z_H| = 7$ então $a^T x^{AH} \leq 9$.

□

Veremos a seguir as demonstrações dos lemas 4, 5 e 6. Para isso, será usado seguinte roteiro:

Inicialmente, usando a hipótese, prova-se que H possui um número grande de arestas em alguns dos seis circuitos $C, \overline{C}, CO, \overline{CO}, D$ ou $\overline{D}$. Constrói-se, a partir destas arestas o subdigrafo $\widehat{H}$, implicado pela transitividade. Em seguida, calcula-se $a_1^T x^{\widehat{H}}$. A partir daí, mostra-se que:

“Para todo subdigrafo H' de D_7 tal que $\widehat{H} \subseteq H'$ e H' satisfaz as hipóteses do lema, vale a tese.”

Obviamente, $H = H'$ para algum H' descrito acima.

Para facilitar a notação, identificamos o digrafo H com cada digrafo H' , descrito acima, isto é, tentamos adicionar arestas ao grafo $\widehat{H}$, de forma a maximizar o valor de $a_1^T x$. Isto só será possível se acrescentarmos arestas aos conjuntos $C_{\widehat{H}}$ e $\overline{C}_{\widehat{H}}$, uma vez que não podemos decrescer $|CO_{\widehat{H}}|$ ou $|\overline{CO}_{\widehat{H}}|$.

Lembramos aqui que, a partir deste ponto, estamos supondo $3 \leq a_1^T x^{AH} \leq 5$.

Lema 4: Se $4 \leq a_2^T x^{AH} \leq 5$ então $a_1^T x^{AH} < 3$.

Prova do Lema 4:

Pela hipótese, $4 \leq |D_H| - |\overline{D}_H| \leq 5$ e portanto $|D_H| \geq 4 + |\overline{D}_H|$. Como $|\overline{D}_H| \geq 1$, temos que $|D_H| \geq 5$. Usando R5, concluímos que $|D_H| \neq 5$. Logo, $|D_H| = 6$, donde,

$$|\overline{D}_H| \leq 2. \quad (III)$$

Seja $\widehat{H}$ o subdigrafo de D_7 , implicado por transitividade, a partir das arestas de D_H . Este digrafo pode ser visualizado na figura A2 abaixo. Em $\widehat{H}$, temos:

$$|\overline{D}_{\widehat{H}}| = 1, \quad |\overline{C}_{\widehat{H}}| = 5, \quad |C_{\widehat{H}}| = 2, \quad |\overline{CO}_{\widehat{H}}| = 3 \quad \text{e} \quad |CO_{\widehat{H}}| = 4.$$

Figura A2

Observe que se $|C_H| > 2$, então $|\overline{D}_H| > 2$, uma contradição à (III). Logo, não podemos aumentar $|C_{\widehat{H}}|$. Isto é suficiente para concluirmos a validade do lema, pois mesmo se $|\overline{C}_H| = 6$, teríamos $a_1^T x^{AH} \leq -1$.

□

Lema 5: Se $2 \leq a_2^T x^{AH} \leq 3$ então $a_1^T x^{AH} < 4$.

Prova do Lema 5:

Sendo $a_2^T x^{AH} > 1$, segue de R5 que $|D_H| \geq 5$. Temos dois casos a analisar:

Caso 1. $|D_H| = 6$.

Neste caso, pela hipótese,

$$|\overline{D}_H| \leq 4. \quad (IV)$$

Conforme pode-se observar na figura A2, no subdigrafo $\widehat{H}$ de D_7 implicado pela transitividade a partir das arestas de D_H , temos:

$$|\overline{D}_{\widehat{H}}| = 1, \quad |\overline{C}_{\widehat{H}}| = 5, \quad |C_{\widehat{H}}| = 2, \quad |\overline{CO}_{\widehat{H}}| = 3 \quad \text{e} \quad |CO_{\widehat{H}}| = 4.$$

Suponha por absurdo que $a_1^T x^{AH} \geq 4$. Como $a_1^T x^{AH} \leq 5$, de R4, vem que $|C_H| \geq |CO_H| + 1$. Logo, $|C_H| \geq 5$. Mas, se $|C_H| > 4$, então C_H contém pelo menos duas arestas em um dos conjuntos $X = \{a, b\}$ ou $Y = \{c, d, e\}$, indicadas na figura A2. Isto implica $|\overline{D}_H| \geq 5$, uma contradição à inequação (IV).

Caso 2. $|D_H| = 5$.

Neste caso,

$$|\overline{D}_H| \leq 3 \quad (V)$$

Vamos analisar três subcasos:

Caso 2.1. O comprimento máximo de um caminho em D_H é 5.

Caso 2.2. O comprimento máximo de um caminho em D_H é 4.

Caso 2.3. O comprimento máximo de um caminho em D_H é 3.

Caso 2.1. Considere o grafo $\widehat{H}$, representado na figura A3 abaixo, obtido a partir das arestas de D_H , acrescentando-se algumas arestas, devido à propriedade total.

Figura A3

Observe que $|C_H| > 3$ implica $|\overline{D}_H| \geq 4$, contradizendo (V). Logo, $|C_H| \leq 3$. Como $|CO_H| \geq 3$, segue que $|C_H| - |CO_H| \leq 0$. Usando R1, podemos concluir que $a_1^T x^{AH} \leq 3$.

Caso 2.2. Considere o grafo $\widehat{H}$, conforme descrição anterior, representado na figura A4 abaixo:

Note que $|C_H| > 4$ implica $|\overline{D}_H| > 3$, contrariando (V). Logo, $|C_H| \leq 4$.

Da observação da figura A4, concluímos que $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|CO_H| \geq 2$.

Figura A4

A inequação

$$|\overline{C}_H| - |CO_H| \leq 1 \quad (VI)$$

é verdadeira neste caso, isto é, a cada aresta distinta acrescentada ao conjunto $\overline{C}_{\hat{H}}$, devemos acrescentar pelo menos uma aresta distinta ao conjunto $CO_{\hat{H}}$. A verificação deste fato fica a cargo do leitor.

Suponha por absurdo que $a_1^T x^{AH} \geq 4$. Como estamos nos restringindo a $a_1^T x^{AH} \leq 5$, devido a R4, basta considerarmos os casos em que $|C_H| - |CO_H| \geq 1$. De $|C_H| \leq 4$ e $|CO_H| \geq 2$, concluímos que devem ser analisados os seguintes casos:

Caso 2.2.1. $|C_H| = 4$ e $|CO_H| = 2$.

Neste caso, $|\overline{C}_H| \geq 3$. Das inequações (VI), $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|CO_H| = 2$, segue que $|\overline{C}_H| = 3$. Como H é total, $|\overline{CO}_H| \geq 5$. Logo, $a_1^T x^{AH} \leq 2$.

Caso 2.2.2. $|C_H| = 4$ e $|CO_H| = 3$.

Como H é total, $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|\overline{CO}_H| \geq 4$.

Usando a inequação (VI), concluímos que $|\overline{C}_H| \leq 4$. Logo, $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 0$, donde $a_1^T x^{AH} \leq 2$.

Caso 2.2.3. $|C_H| = 3$ e $|CO_H| = 2$.

Como H é total, $|\overline{C}_H| \geq 4$. Isto implica $|\overline{C}_H| - |CO_H| \geq 2$, uma contradição à inequação (VI).

Caso 2.3. Considere o grafo $\hat{H}$, conforme descrição anterior, representado na figura A5 abaixo.

Figura A5

Observe que $|C_H| > 4$ implica $|\overline{D}_H| > 3$, uma contradição à inequação (V). Logo, $|C_H| \leq 4$. Neste caso, $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|CO_H| \geq 1$, conforme pode ser observado na figura A5. A inequação

$$|\overline{C}_H| - |CO_H| \leq 2 \quad (VII)$$

é verdadeira, neste caso, e sua verificação fica a cargo do leitor.

Como no caso anterior, basta considerar os casos em que $|C_H| - |CO_H| \geq 1$. De $|C_H| \leq 4$ e $|CO_H| \geq 1$, concluímos que devem ser analisados os seguintes casos:

Caso 2.3.1. $|C_H| = 4$ e $|CO_H| = 1$.

Da propriedade total, segue que $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|\overline{CO}_H| \geq 6$. Como $|\overline{CO}_H| \leq 6$, concluímos que $|\overline{CO}_H| = 6$. Usando (VII), concluímos que $|\overline{C}_H| = 3$. Logo, $a_1^T x^{AH} = 3$.

Caso 2.3.2. $|C_H| = 4$ e $|CO_H| = 2$.

Da propriedade total, segue que $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|\overline{CO}_H| \geq 5$.

Usando (VII), concluímos que $|\overline{C}_H| \leq 4$. Logo, $a_1^T x^{AH} \leq 3$.

Caso 2.3.3. $|C_H| = 4$ e $|CO_H| = 3$.

Da propriedade total, segue que $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|\overline{CO}_H| \geq 4$.

Usando (VII), concluímos que $|\overline{C}_H| \leq 5$. Logo, $a_1 x^{AH} \leq 3$.

Caso 2.3.4. $|C_H| = 3$ e $|CO_H| = 1$.

Neste caso, $|\overline{C}_H| \geq 4$. Logo, $|\overline{C}_H| - |CO_H| \geq 3$, uma contradição à (VII).

Caso 2.3.5. $|C_H| = 3$ e $|CO_H| = 2$.

Então $|\overline{C}_H| \geq 4$ e $|\overline{CO}_H| \geq 5$. Usando (VII), segue que $|\overline{C}_H| \leq 4$. Logo, $a_1^T x^{AH} \leq 1$.

Caso 2.3.6. $|C_H| = 2$ e $|CO_H| = 1$.

Então $|\overline{C}_H| \geq 5$. Isto implica $|\overline{C}_H| - |CO_H| \geq 4$, uma contradição à (VII).

Com estes subcasos completamos a demonstração do Lema 5.

□

Lema 6: Se $0 \leq a_2^T x^{AH} \leq 1$ então $a_1^T x^{AH} < 5$.

Prova do Lema 6:

Neste caso, basta provar que $a_1^T x^{AH} \neq 5$. Para isto, suponha, por absurdo, que $a_1^T x^{AH} = 5$. Do resultado R4, segue que $|C_H| - |CO_H| \geq 1$. Este fato será usado freqüentemente nesta prova, sem uma referência explícita. A demonstração deste lema é exaustiva, pois analisamos 18 casos.

Caso 1. $2 \leq |C_H| \leq 3$.

Então, $1 \leq |CO_H| \leq 2$ e $0 \leq |C_H| - |CO_H| \leq 2$.

Da propriedade total, segue que $|\overline{C}_H| \geq 4$ e $|\overline{CO}_H| \geq 5$. Logo, $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 1$.

Como $a_1^T x^{AH} = 5$, concluímos que $|C_H| - |CO_H| = 2$ e $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| = 1$. Portanto, $|C_H| = 3$ e $|CO_H| = 1$. Da propriedade total, concluímos que $|\overline{CO}_H| \geq 6$, donde $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 0$, uma contradição.

Caso 2. $|C_H| = 4$.

Neste caso, devemos analisar os três subcasos:

Caso 2.1. $|CO_H| = 3$.

Então, $|\overline{CO}_H| \geq 4$ e $|\overline{C}_H| \geq 3$. Logo, $a_1^T x^{AH} \leq 4$, um absurdo.

Caso 2.2. $|CO_H| = 2$.

Neste caso, $6 \geq |\overline{C}_H| \geq 3$ e $6 \geq |\overline{CO}_H| \geq 5$.

Como $a_1^T x^{AH} = 5$, $|C_H| = 4$ e $|CO_H| = 2$, segue que $|\overline{C}_H| = 6$ e $|\overline{CO}_H| = 5$.

A figura A6 representa o grafo $\widehat{H}$ implicado por transitividade, pelas arestas de $\overline{C}_H$.

Figura A6

Observe que $|D_{\hat{H}}| = 3$, $|\overline{D}_{\hat{H}}| = 4$ e $|CO_{\hat{H}}| = 2$. Como $0 \leq a_2^T x^{AH} \leq 1$, segue que $|D_H| - |\overline{D}_H| \geq 0$.

Por outro lado, $|D_{\hat{H}}| - |\overline{D}_{\hat{H}}| = -1$. A única forma de aumentar esta diferença é acrescentar arestas ao conjunto $D_{\hat{H}}$. Mas isto é impossível, pois a cada nova aresta que acrescentamos a $D_{\hat{H}}$, devemos acrescentar uma nova aresta ao conjunto $CO_{\hat{H}}$.

Caso 2.3. $|CO_H| = 1$.

Então $|\overline{C}_H| \geq 3$ e $|\overline{CO}_H| \geq 6$.

Como $a_1^T x^{AH} = 5$ e $|C_H| - |CO_H| = 3$, segue que $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| = -1$. De $|\overline{CO}_H| = 6$ vem que $|\overline{C}_H| = 5$.

A figura A7 abaixo representa o grafo $\widehat{H}$ implicado por transitividade, pelas arestas de $\overline{CO}_H$.

Figura A7

Observe que $|\overline{C}_{\hat{H}}| = 3$. Com o objetivo de obter o grafo H , devemos acrescentar duas arestas ao conjunto $\overline{C}_{\hat{H}}$.

Por outro lado, nenhuma aresta do conjunto $\{\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\}$ pode ser acrescentada ao conjunto $\overline{C}_{\hat{H}}$, pois o acréscimo de qualquer uma delas implica no acréscimo de uma nova aresta ao conjunto $CO_{\hat{H}}$. Logo, este caso é impossível.

Caso 3. $|C_H| = 5$.

Neste caso, segue que $|CO_H| \geq 3$, pelo resultado R3.

Como $|C_H| - |CO_H| \geq 1$, temos os seguintes subcasos:

Caso 3.1. $|CO_H| = 4$.

Então $|\overline{CO}_H| \geq 3$ e $|\overline{C}_H| \geq 2$.

Se $|\overline{C}_H| = 6$ então $|\overline{CO}_H| \geq 5$ e $a_1^T x^{AH} \leq 3$.

Caso contrário, $a_1^T x^{AH} \leq 4$.

Em ambos os casos, $a_1^T x^{AH} \leq 4$, um absurdo.

Caso 3.2. $|CO_H| = 3$.

Neste caso, $|\overline{C}_H| \geq 2$ e $|\overline{CO}_H| \geq 4$.

Como $a_1^T x^{AH} = 5$ e $|C_H| - |CO_H| = 2$, segue que $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| = 1$. Temos aqui novamente dois subcasos:

Caso 3.2.1. $|C_H| = 5$, $|CO_H| = 3$, $|\overline{C}_H| = 6$ e $|\overline{CO}_H| = 5$.

Caso 3.2.2. $|C_H| = 5$, $|CO_H| = 3$, $|\overline{C}_H| = 5$ e $|\overline{CO}_H| = 4$.

Caso 3.2.1

Vamos analisar o grafo $\widehat{H}$ representado na figura A6, implicado por transitividade pelas arestas de $\overline{C}_H$.

Como $0 \leq a_2 x^{AH} \leq 1$, segue que $|D_H| - |\overline{D}_H| \geq 0$.

Em $\widehat{H}$, $|D_{\widehat{H}}| = 3$, $|CO_{\widehat{H}}| = 2$, $|\overline{D}_{\widehat{H}}| = 4$ e $|C_{\widehat{H}}| = 1$.

Como $|D_H| \geq |\overline{D}_H|$ e $|\overline{D}_H| \geq |\overline{D}_{\widehat{H}}|$, segue que

$$|D_H| \geq 4 \quad \text{e} \quad |\overline{D}_H| \geq 4.$$

Conforme foi observado no caso 2.2, a cada nova aresta que acrescentamos ao conjunto $D_{\widehat{H}}$, devemos acrescentar uma nova aresta ao conjunto $CO_{\widehat{H}}$. Como $|CO_H| = 3$ e $|CO_{\widehat{H}}| = 2$, apenas uma aresta pode ser acrescentada ao conjunto $D_{\widehat{H}}$. Logo, $|D_H| = 4$.

As inequações $|D_H| = 4$, $|\overline{D}_{\widehat{H}}| = 4$ e $|D_H| - |\overline{D}_H| \geq 0$ implicam $|\overline{D}_H| = 4$.

Devemos prosseguir, analisando o grafo representado pela figura A8, abaixo. É fácil ver que as arestas a e b devem ser acrescentadas ao conjunto $C_{\widehat{H}}$ pois se isto não ocorre, ao acrescentar quatro novas arestas ao conjunto $C_{\widehat{H}}$, teríamos necessariamente de acrescentar pelo menos duas novas arestas ao conjunto $CO_{\widehat{H}}$ e isto implicaria $|CO_H| > 3$.

Figura A8

Como $|D_H| = 4$, devemos acrescentar uma aresta ao conjunto $D_{\widehat{H}}$. Observe que não podemos acrescentar as arestas $\bar{d}$ ou $\bar{e}$, pois isto implicaria no acréscimo de uma outra aresta ao conjunto $\overline{D}_H$.

Por outro lado, o acréscimo de $\bar{f}$ ($\bar{c}$) ao conjunto $D_{\widehat{H}}$ implica no acréscimo das arestas $\bar{g}$ e $\bar{h}$ ($\bar{i}$ e $\bar{n}$) ao conjunto $CO_{\widehat{H}}$, o que é impossível, pois $|CO_H| = 3$.

Caso 3.2.2

As equações $|C_H| = 5$ e $|CO_H| = 3$ dão origem a dois grafos distintos, gerando dois subcasos.

Caso 3.2.2.1. O comprimento máximo de um caminho em C_H é 3.

Caso 3.2.2.2. O comprimento máximo de um caminho em C_H é 4.

Caso 3.2.2.1. A figura A9 representa o grafo $\widehat{H}$, implicado por transitividade pelas a-

restas de C_H e acrescído de algumas arestas implicadas pela propriedade total.

Figura A9

Como $|\overline{C}_H| = 5$ e $|\overline{C}_{\hat{H}}| = 2$, devemos acrescentar três arestas ao conjunto $\overline{C}_{\hat{H}}$. Se acrescentarmos as arestas $\bar{a}$ e $\bar{b}$ ou $\bar{c}$ e $\bar{d}$ ou $\bar{d}$ e $\bar{e}$, teremos que acrescentar uma aresta ao conjunto $\overline{CO}_{\hat{H}}$, o que é impossível, pois $\overline{CO}_H = \overline{CO}_{\hat{H}} = 4$.

Logo, as arestas $\bar{c}$ e $\bar{e}$ pertencem ao conjunto $\overline{C}_H$.

Novamente, devemos considerar dois subcasos:

Caso 3.2.2.1.1. A aresta $\bar{a}$ está em $\overline{C}_H$.

Caso 3.2.2.1.2. A aresta $\bar{b}$ está em $\overline{C}_H$.

Em ambos os casos, $a_2^T x^{A\hat{H}} = -1$. Como $0 \leq a_2^T x^{AH} \leq 1$, devemos aumentar a diferença $|D_{\hat{H}}| - |\overline{D}_{\hat{H}}|$.

Considere inicialmente, o caso 3.2.2.1.1., representado na figura A10. Colocando as

Figura A10

Figura A11

arestas (2,5), (3,6) ou (5,1) em $D_{\hat{H}}$, teremos $|CO_H| > 3$, um absurdo. Resta então acrescentar as arestas (4,7) ou (1,4) a $D_{\hat{H}}$. Mas o acréscimo de (4,7) a $D_{\hat{H}}$ implica no acréscimo de (4,1) a $\overline{D}_{\hat{H}}$ e o acréscimo de (1,4) a $D_{\hat{H}}$ implica no acréscimo de (7,4) a $\overline{D}_{\hat{H}}$. Logo é impossível aumentar $a_2^T x^{A\hat{H}}$.

Para o caso representado pela figura A11, pode-se fazer uma verificação análoga a esta.

Caso 3.2.2.2. Considere, neste caso, a seguinte figura:

Figura A12

Como $|\overline{C}_{\hat{H}}| = 2$ e $|\overline{C}_H| = 5$, devemos acrescentar três arestas ao conjunto $\overline{C}_{\hat{H}}$. Não é possível acrescentar duas arestas consecutivas pertencentes ao conjunto $\{\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}, \overline{d}\}$, pois isto implicaria $|\overline{CO}_H| > 4$.

Temos então três possibilidades:

Caso 3.2.2.2.1. As arestas $\overline{e}$, $\overline{b}$ e $\overline{d}$ estão em $\overline{C}_H$.

Caso 3.2.2.2.2. As arestas $\bar{e}$, $\bar{a}$ e $\bar{c}$ estão em $\overline{C}_H$.

Caso 3.2.2.2.3. As arestas $\bar{e}$, $\bar{a}$ e $\bar{d}$ estão em $\overline{C}_H$.

Os três casos estão representadas nas figuras A13, A14 e A15 abaixo.

Nos três casos, $a_1^T x^{A\hat{H}} = 5$ e $a_2^T x^{A\hat{H}} = -1$. A única forma de aumentar $a_2^T x^{A\hat{H}}$ é acrescentar arestas ao conjunto $D_{\hat{H}}$.

Nos dois primeiros casos, o acréscimo de qualquer aresta ao conjunto $D_{\hat{H}}$ implica $|CO_H| > 3$, uma contradição.

No caso 3.2.2.2.3, o acréscimo das arestas (2,5) ou (4,7) a $D_{\hat{H}}$ implica $|CO_H| > 3$, uma contradição. Por outro lado, o acréscimo das arestas (5,1), (3,6) ou (1,4) a $D_{\hat{H}}$ implica no acréscimo de (4,1), (3,7) ou (1,5) a $\overline{D}_{\hat{H}}$, respectivamente. Logo, é impossível aumentar $a_2^T x^{A\hat{H}}$.

Figura A13

Figura A14

Figura A15

Caso 4. $|C_H| = 6$.

Da transitividade de H , segue que $|CO_H| \geq 5$. De $|C_H| - |CO_H| \geq 1$, $|C_H| = 6$ e $|CO_H| \geq 5$, vem que $|CO_H| = 5$. Como H é total, concluímos que $|\overline{CO}_H| \geq 2$ e $|\overline{C}_H| \geq 1$. De $a_1^T x^{AH} = 5$ e $|C_H| - |CO_H| = 1$, segue que:

$$|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| = 3. \quad (VIII)$$

Se $|\overline{C}_H| \leq 4$, então $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 2$, uma contradição à (VIII). Se $|\overline{C}_H| = 5$, segue de R4 que $|\overline{CO}_H| \geq 3$, donde $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| < 3$, uma contradição a (VIII).

Finalmente, se $|\overline{C}_H| = 6$, segue da transitividade de H que $|\overline{CO}_H| \geq 5$, donde $|\overline{C}_H| - |\overline{CO}_H| \leq 1$, uma contradição à (VIII). Isto completa a prova do Lema 6.

□

A prova do teorema segue dos lemas 1 a 7, como já observamos anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mencionamos aqui algumas questões em aberto – de especial interesse para nós – que surgiram durante o desenvolvimento deste trabalho.

Como já observamos anteriormente, as classes de facetas apresentadas neste trabalho podem ser usadas no desenvolvimento de algoritmos que utilizam o método dos planos-de-corte para resolver instâncias reais dos problemas aqui estudados. Para isso, é preciso resolver eficientemente o problema da separação para essas classes de facetas (cf. definimos na página 39).

É fácil verificar que para várias classes de facetas aqui apresentadas o problema da separação pode ser resolvido em tempo polinomial. Não sabemos porém resolver este problema eficientemente para a classe das facetas dos circuitos ímpares com 2-cordas e para a classe das semi- k -cercas. É possível que esses problemas sejam INIP-completos e neste caso, seria interessante desenvolver heurísticas para resolvê-los. Neste contexto, um projeto que nos interessa sobremaneira é a implementação de um algoritmo do tipo *branch and cut* baseado nas classes de facetas aqui apresentadas.

Uma outra questão refere-se à figura apresentada na página 45. Mais precisamente, interessa-nos saber qual seria a resposta à seguinte questão: *Existem facetas de $P_{PO}(n)$ que não são facetas de $P_{OP}(n)$ ou de $P_{POC}(n)$?*

Finalmente, um problema teórico interessante consiste em caracterizar adjacência de dois vértices quaisquer de cada um dos politopos $P_{PO}(n)$, $P_{POC}(n)$ e $P_{OP}(n)$. Conforme pode ser observado no capítulo IV, obtivemos apenas dois resultados caracterizando adjacência de vértices particulares de $P_{POC}(n)$.

REFERÊNCIAS

- Aho, A.V. & Hopcroft, J.E. & Ullman, J.D. [1974]: *The Design and Analysis of Computer Algorithms*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1974.
- Ascheuer, N.; Escudero, L.F., Grötschel, M. & Stoer, M. [1990]: *A cutting plane approach to the sequential ordering problem (with applications to job scheduling in manufacturing)*, Institut für Mathematik, Universität Augsburg, Report n^o 190, 1990.
- Barahona, F. & Maccioni, E. [1982]: *On the exact ground states of three-dimensional Ising spin glasses*, Journal of Physics A: Math. Gen. 15 (1982), 1611-615.
- Berge, C. [1973]: *Graphs and Hypergraphs*, North Holland, Amsterdam, 1973.
- Bondy, J.A. & Murty, U.S.R. [1976]: *Graph Theory with Applications*, Macmillan, London, 1976.
- Brøndsted, A. [1983]: *An Introduction to Convex Polytopes*, Springer, New York, 1983.
- Chvátal, V. [1983]: *Linear Programming*, Freeman, New York, 1983.
- Cobham, A. [1965]: *The intrinsic computational difficulty of functions*, in: Y. Bar-Hillel (ed.), Proceedings of 1964 International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science, North-Holland, 1965, 24-30.
- Crowder, H.P. & Padberg, M.W. [1980]: *Solving large scale travelling salesman problems to optimality*, Management Science 26 (1980), 495-509.
- Cook, S.A. [1971]: *The complexity of theorem proving procedures*, Proc. Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing Association for Computing Machinery, New York, 1971, 151-158.
- Dantzig, G.B. [1963]: *Linear Programming and Extensions*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1963.
- Edmonds, J. [1965]: *Paths, trees and flowers*, Canad. J. Math. 17 (1965), 449-467.

- Garey, M.R. & Johnson, D.S. [1979]: *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-completeness*, Freeman, San Francisco, 1979.
- Grötschel, M. & Lovász, L. & Schrijver, A. [1981]: *The ellipsoid method and its consequences in combinatorial optimization*, *Combinatorica* 1 (1981), 169-197.
- Grötschel, M. & Jünger, M. & Reinelt, G. [1984a]: *A cutting plane algorithm for the linear ordering problem*, *Operations Research*, vol. 32 (6), 1984, 1195-1220.
- Grötschel, M. & Jünger, M. & Reinelt, G. [1984b]: *Optimal triangulation of large real-world input-output matrices*, *Statistische Heft*, 25 (1984) 261-295.
- Grötschel, M. & Padberg, M.W. [1985]: *Polyhedral aspects of the travelling salesman problem I: theory*, in: E.L. Lawler, J.K. Lenstra and A.H.G. Rinnooy Kan (eds.), *The Travelling Salesman Problem*, Wiley, New York, 1985.
- Grötschel, M. & Wakabayashi, Y. [1989]: *A Cutting Plane Algorithm for a Clustering Problem*, *Mathematical Programming* 45 (1989), 59-96.
- Grünbaum, B. [1967]: *Convex Polytopes*, Wiley, New York, 1967.
- Hausmann, D. [1980]: *Adjacency on Polytopes in Combinatorial Optimization*, Verlag, A. Hain, Meisenheim, 1980.
- Jünger, M. [1985]: *Polyhedral Combinatorics and the Acyclic Subdigraph Problem*, (Research and Exposition in Mathematics 7) Heldermann Verlag, Berlin, 1985.
- Karp, R.M. [1972]: *Reducibility among combinatorial problems*, in: R.E. Miller and J.W. Thatcher (eds.), *Complexity of Computer Computations*, pp. 85-103, Plenum Press, New York, 1972.
- Lucchesi, C.L. [1979]: *Introdução à Teoria dos Grafos*, 12o. Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1979.
- Minkowski, H. (1986): *Geometrie der Zahlen (Erste Lieferung)*, Teubner, Leipzig, 1896 [reeditado: Chelsea, New York, 1953].
- Motzkin, T.S. [1936]: *Beiträge zur Theorie der linearen Ungleichungen* (Inaugural Dissertation Basel), Azriel, Jerusalem, 1936 [Tradução Inglesa: Contributions to the Theory of Linear Inequalities, RAND Corporation Translation 22, Santa Monica, Cal., 1952 [reeditado em: Theodore S. Motzkin: Selected Papers (D.

- Cantor, B. Gordon and B. Rothschild, eds.), Birkhäuser, Boston, 1983), 1-80].
- Padberg, M.W. & Grötschel, M. [1985]: *Polyhedral aspects of the travelling salesman problem II: computation*, in: E.L. Lawler, J.K. Lenstra and A.H.G. Rinnooy Kan (eds.), *The Travelling Salesman Problem*, Wiley, New York, 1985.
- Padberg, M.W. & Rao, M.R. [1974]: *The travelling salesman problem and a class of polyhedra of diameter two*, *Mathematical Programming* 7(1974), 32-45.
- Papadimitriou, C.H. [1978]: *The adjacency relation on the travelling salesman problem is NP-complete*, *Mathematical Programming* 14 (1978), 312-324.
- Papadimitriou, C.H. [1984]: *Polytopes and Complexity*, in: *Progress in Combinatorial Optimization*, Academic Press, 1984, 295-305.
- Pulleyblank, W.R. [1983]: *Polyhedral combinatorics*, in: A. Bachem, M. Grötschel and B. Korte (eds.), *Mathematical Programming, Bonn 1982 - The State of the Art*, Springer Verlag, Berlin (1983), 312-345.
- Reinelt, G. [1985]: *The Linear Ordering Problem: Algorithms and Applications*, (Research and Exposition in Mathematics 8) Heldermann Verlag, Berlin, 1985.
- Schrijver, A. [1986]: *Theory of Linear and Integer Programming*, John Wiley & Sons, New York, 1986.
- Steinitz, E. [1916]: *Bedingt konvergente Reihen und konvexe Systeme (Schluss)*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 146 (1916), 1-52.
- Szwarcfiter, J.L. [1984]: *Grafos e Algoritmos Computacionais*, Editora Campus, 1984.
- Wakabayashi, Y. [1986]: *Aggregation of Binary Relations: Algorithmic and Polyhedral Investigations*, Tese, Universität Augsburg, 1986.
- Weyl, H. [1985]: *Elementare Theorie der Konvexen Polyeder*, *Commentarii Mathematici Helvetici* 7, 1935, 290-306 [Tradução Inglesa: *The elementary theory of convex polyhedra*, in: *Contributions to the Theory Games* (H.W. Kuhn and A.W. Tucker, eds.), Princeton University Press, Princeton, N.J., 1950, 3-18].
- Young, H.P. [1978]: *On permutations and permutation polytopes*, *Mathematical Programming Study* 8 (1978), 128-140.

Lista de símbolos e notação

$\binom{n}{k}$	número de combinações de n elementos tomados k a k .
s.p.g.	sem perda de generalidade .
$\lfloor x \rfloor$	o maior inteiro menor ou igual a x .
$ X $	cardinalidade de X .
$A \cap B$	conjunto intersecção de A e B .
$A \cup B$	conjunto união de A e B .
$A \setminus B$	conjunto dos elementos que estão em A e não estão em B .
$A \Delta B$	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
$A \subseteq B$	A é um subconjunto (subgrafo, subdigrafo) de B .
$A \subset B$	$A \subseteq B$ e A é diferente de B .
K_n	grafo completo com n vértices.
D_n	digrafo completo com n vértices
V_n	conjunto dos vértices de D_n .
A_n	conjunto das arestas de D_n .
VG	conjunto dos vértices do grafo (digrafo) G .
AG	conjunto das arestas do grafo (digrafo) G .
$G[S], [S]$	subgrafo (subdigrafo) gerado pelo conjunto de vértices (ou arestas) S .

$G - S$	grafo (digrafo) obtido de G , removendo S .
$\delta(v)$	grau do vértice v .
$\delta(\omega)$	veja página 5
$\overline{\alpha}$	aresta reversa à aresta α .
$\overline{B}$	conjunto das arestas reversas às de B .
$\mathbb{R}^A$	conjunto dos vetores reais $ A $ -dimensionais, indexados por A .
$\mathbb{Z}^A$	conjunto dos vetores inteiros $ A $ -dimensionais, indexados por A .
x^T	transposto do vetor x .
$x(A)$	$\sum_{\alpha \in A} x(\alpha)$
$\text{conv}(S)$	fecho convexo de S .
$\text{lin}(S)$	fecho linear de S .
$\text{cone}(S)$	fecho cônico de S .
$\text{aff}(S)$	fecho afim de S .
$\text{dim}(P)$	dimensão de P .
$\text{diam}(G)$	diâmetro de G .
LP	problema de programação linear.
ILP	problema de programação linear inteira.
p.o.c.	pré-ordem completa.
OL	problema da ordem linear.
POC	problema da pré-ordem completa.
PO	problema da pré-ordem.

OP	problema da ordem parcial.
P_{OL}	politopo da ordem linear.
P_{POC}	politopo da pré-ordem completa.
P_{PO}	problema da pré-ordem.
P_{OP}	problema da ordem parcial.
FTR	facetas dos triângulos.
FA	facetas dos arcos paralelos.
FT	facetas triviais.
FCC	facetas dos circuitos ímpares com 2-cordas.
FP	facetas dos pentágonos.
FH	facetas dos heptágonos.
FSC	facetas das semi-cercas.

Índice de Definições

adjacência de vértices de um poliedro	14
algoritmo	17
– polinomial	18
aresta	5
– de ligação	90
– local	90
– reversa	6
caminho	6
– dirigido	6
– hamiltoniano	7
circuito	7
– dirigido	7
– hamiltoniano	7
clique	6
combinação afim	11
combinação convexa	11
combinação linear	11
complexidade de tempo	18
componentes	7
– fortemente conexos	7
cone	12
conjunto convexo	12
conjunto das 2-cordas	7
conjunto das 3-cordas	7
conjunto reverso	6
corte	5
– orientado	5
descrição parcial de um politopo	39
diâmetro de um grafo	9
diâmetro de um politopo	16
diferença simétrica	10
digrafo	4
– acíclico	7
– anti-simétrico	8
– completo	6
– condensado	7

– conexo	7
– desconexo	7
– fortemente conexo	7
– gerado	7
– k -cerca	73
– semi- k -cerca	75
– simétrico	8
– simples	5
– total	8
– transitivo	8
digrafos isomorfos	6
dimensão	12
– completa	13
distância	9
eficiência de um algoritmo	17
emparelhamento	9
– perfeito	9
esqueleto de um politopo	16
esquema de codificação	18
extremos	5
face	14
– definida (induzida) por $a^T x \leq a_0$	14
faces próprias	14
faceta	15
– das semi- k -cercas	47
– dos arcos paralelos	45
– dos circuitos ímpares com 2-cordas	46
– dos heptágonos	46
– dos pentágonos	46
– dos triângulos	45
– triviais	46
fecho afim	11
fecho cônico	11
fecho convexo	11
fecho linear	11
fecho transitivo	9
fonte	5
grafo	9
– acíclico	9
– dirigido	4
grau	5
hiperplano	13

inequação do n -circuito com 2-cordas	52
inequação do n -circuito duplo com 2-cordas	60
inequação-faceta	15
inequação-heptágono	66
inequação induzida por um digrafo G	40
inequação k -cerca	74
inequação-pentágono	59
inequação semi- k -cerca	76
inequação-triângulo	47
inequação-válida	13
início	5
método dos planos-de-corte	39
ordem linear	8
ordem parcial	8
passeio	6
– ímpar	7
– par	7
poliedro	12
polinomialmente transformável	19
politopo	13
– da ordem linear	37
– da ordem parcial	37
– da pré-ordem	37
– da pré-ordem completa	37
posto	12
– afim	12
– coluna completo	12
– linha completo	12
pré-ordem	12
– completa	8
problema	17
– da ordem linear	23
– da ordem parcial	23
– da pré-ordem	23
– da pré-ordem completa	23
– da separação	39
– de programação linear	16
– inteira	16
– relaxado	16
– do circuito hamiltoniano	19
– do subdigrafo acíclico	26
– fácil	18

– INP-completo	20
– INP-difícil	20
problemas de busca	18
problemas de decisão	18
refinamento de uma pré-ordem completa	90
relação anti-simétrica	8
relação binária	8
relação simétrica	8
relação total	8
relação transitiva	8
semi-espaço	13
solução ótima	16
solução viável	16
sorvedouro	5
subconjunto dependente afim	12
subconjunto independente afim	12
subconjunto linearmente dependente	12
subconjunto linearmente independente	12
subdigrafo	5
– gerado	5
– gerador	7
subespaço afim	12
subespaço linear	12
término	5
torneio	7
triângulo	7
turing-redutível	20
vértice de um digrafo	5
vértice de um poliedro	14
vetor característico (de incidência)	11
vetor unitário	11