UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica)

GUSTAVO GROSS BELCHIOR

**Geração de clones de células HEK293
superprodutores de isoformas
recombinantes de *VEGF-A* (Fator de
Crescimento Endotelial Vascular A) humano
visando à produção de biofármacos para
terapia molecular e engenharia tecidual**

Versão corrigida da Tese defendida
A versão original se encontra na Secretaria de Pós-Graduação do IQ-USP

São Paulo

Data de Depósito na SPG:

21/02/2014

GUSTAVO GROSS BELCHIOR

**Geração de clones de células HEK293
superprodutores de isoformas recombinantes de
VEGF-A (Fator de Crescimento Endotelial Vascular
A) humano visando à produção de biofármacos
para terapia molecular e engenharia tecidual**

*Tese apresentada ao Instituto de Química da
Universidade de São Paulo para obtenção do Título
de Doutor em Ciências (Bioquímica)*

Orientadora: Prof^{el}. Dr^a. Mari Cleide Sogayar

São Paulo

2014

Ficha Catalográfica
Elaborada pela Divisão de Biblioteca e
Documentação do Conjunto das Químicas da USP.

	Belchior, Gustavo Gross
B427g	Geração de clones de células HEK293 superprodutores de isoformas recombinantes de <i>VEGF-A</i> (Fator de Crescimento Endotelial Vascular A) humano visando à geração de biofármacos para terapia molecular e engenharia tecidual / Gustavo Gross Belchior. -- São Paulo, 2014. 216p.
	Tese (doutorado) - Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Departamento de Biquímica. Orientador: Sogayar, Mari Cleide
	1. Biologia celular 2. Proteínas recombinantes 3. Fatores de crescimento I. T. II. Sogayar, Mari Cleide, orientador.
	574.87 CDD

Dedico este trabalho:

aos meus pais, Evelyn e Fernando, minha base, meus educadores, meus melhores amigos;
à toda minha família, meus pilares, meus exemplos, minhas melhores vivências;
à Mulher da minha vida, Heloisa, meu maior presente, minha mudança de vida,
meu caminho para tornar-me um Homem melhor.

AGRADECIMENTOS

À Prof^a. Dr^a. Mari Cleide Sogayar, pelos muitos anos de orientação e de ensinamentos diversos. Por ter me aceito em seu grupo há sete anos e ter me apresentado à ciência diretamente e indiretamente através dos profissionais excepcionais. Por acreditar na minha capacidade a todo momento. Pelo exemplo de determinação e perseverança, garra e ânimo ininterruptos. Pelo grupo de pessoas fantástico que foi capaz de reunir em um só laboratório, me dando amigos para a vida.

À Dr^a. Ana Claudia Oliveira Carreira, por ter me acolhido cientificamente em um novo projeto no qual pude evoluir cientificamente como nunca havia imaginado. Pela excepcional criadora e desenvolvedora de projetos científicos que é, dona de ideias fantásticas que somente um oráculo seria capaz de ter e que infalivelmente dão certo. Pelo papel fundamental que teve no desenvolvimento deste projeto como uma real co-orientadora. Por me mostrar o resultado de fazer aquilo que se ama.

À Prof^a. Dr^a. Tracy C. Grikscheit, do Saban Research Institute do Children's Hospital Los Angeles - USC, por ser um exemplo de profissional da saúde, sabendo alcançar, todos os dias da vida, o objetivo de salvar crianças. Por ter me acolhido em seu laboratório por quatro meses e confiado nas minhas decisões. Por ter permitido que eu e minha namorada acompanhássemos cirurgias em um dos melhores hospitais para crianças dos Estados Unidos. Por cativar em mim e em todos ao seu redor a vontade de ajudar pessoas.

À Flávia Borella Pereira de Godoy, minha aluna de iniciação científica por quase três anos, por ter confiado em mim como seu supervisor no laboratório e ter resistido aos meus métodos de ensino por tanto tempo. Pela desafiadora clonagem da isoforma VEGF_{165b}, que nos fez quebrar a cabeça - mas chegamos lá. Pela pessoa fantástica que é, espero que possamos nos encontrar "in Juuulho".

Ao Prof. Dr. Vitor Fortuna, do ICS-UFBA, pelos ensinamentos com complexos modelos para avaliação de angiogênese. Pelas conversas científicas e pela valiosa atenção dada a uma breve discussão sobre esta tese.

À Prof^a. Dr^a. Chao Yun Irene Yan, do ICB-USP, pelos ensinamentos iniciais e dicas constantes para execução do ensaio da membrana corioalantoide, assim como pelos ensinamentos da disciplina Embriologia Molecular.

Ao Prof. Dr. Ricardo José Garcia Pereira, da FMVZ-USP, pela ajuda no ensaio da membrana corioalantoide e a troca de conhecimentos científicos. Pelos olhos e ouvidos atentos durante as duas semanas intensas do curso em que tive o prazer de ser seu monitor.

Ao Prof. Dr. Ricardo Giordano, à Prof^{ra}. Dr^a. Carla Columbano e ao Prof. Dr. Eduardo Reis pelas importantes contribuições no Exame de Qualificação.

Ao Dr. Marcos Demasi, mais um oráculo do nosso laboratório, por saber tudo sobre tudo em Biologia Celular e Molecular, e Bioquímica. Pelas discussões sobre espectrometria de massas e demais assuntos do mundo das proteínas. Acima de tudo, pelo exemplo de humildade, gentileza, educação e generosidade.

À Prof^{ra}. Dr^a. Letícia Labriola, pela inspiração para ser um profissional melhor. Obrigado pelas conversas e sugestões, e por eu ter podido acompanhar uma pequena parte do desenvolvimento de uma carreira que já é brilhante.

À Raquel Cruz e à Regina Machtura, por serem pessoas tão generosas, e por toda a ajuda, principalmente, na cultura dos clones celulares, nos experimentos de *Western* e no cuidado com os materiais.

Ao Caio Dalmaso, meu segundo e breve aluno de IC, mas com quem aprendi muito. Parabéns pela vontade de fazer ciência e determinação para conquistar o que quer.

Ao Gabriel Levin, pelo exemplo de enorme dedicação e qualidade da pesquisa desde o início da carreira acadêmica.

À Mariele Moraes e Ingrid Cunha, pela grande ajuda, principalmente com os experimentos de *Western* e do ensaio da membrana corioalantoide.

A todos os colegas do NUCEL, principalmente nos tempos de LBCM e UIPH no IQ-USP. Primeiramente, aos colegas de pós-graduação: Aline Maia, Ana Lúcia Campanha, Erik Halcsik, Letícia Terra, Marina Lima, Tatiane Maldonado, que ingressaram junto comigo no Programa e com quem foi um prazer estudar por muitas horas, para muitas provas. À Aline, por ser uma pessoa tão divertida e companheira, pelas risadas, e por me mostrar muito gentilmente o quão tosco eu sou todos os dias da minha vida laboratorial. À Ana Prússia, fiel aos nossos Book Clubs, pela paixão por Asimov, Sagan e Clarke e o conto “*The Sentinel*”, por tornar o laboratório mais emocionante e provavelmente mais insalubre com suas danças e demais entretenimentos mineiros. Ao Erik, indivíduo realmente único, pelo iPod que vendi a ele, pelo tênis que ele me vendeu, pelo “*Questions?*” e o churros. À Lê, também fiel aos nossos Book Clubs, pela paixão por Poe, King e Gaiman e o conto “*Murder Misteries*”, pelas pausas para cafés na copinha, as risadas, os estudos e discussões dentro e fora da ciência, por ter me ensinado a revelar papelão (ok, o mérito é meu, eu sei), por ser a memória das coisas sem noção que eu fiz durante tantos anos no lab e pela grande ajuda no depósito desta tese. À Marina, a pessoa tímida mais conhecida do IQ, da USP e provavelmente de São Paulo, pelo jeito carinhoso, a disposição pra sempre fazer tudo, e por querer que eu case com a Isa ano passado. À Tati, uma Recombinante autêntica, por

ser naturalmente divertida e engraçada, com sua bipolaridade inigualável e pelas festas de Halloween inesquecíveis.

À Gi, que sempre foi especial, mesmo antes do namoro com o Léo. À Lu Gomes, um dos meus exemplos de profissional e pesquisadora; não fui padrinho no seu casamento, mas tá tudo bem. À Roberta, que é agradavelmente descompensada e por preencher as lacunas em “___ ___ *is on fire*”. À Erika, a Cientista, por emanar ciência pelos poros e mostrar um balanço interessante entre a razão na bancada e a insanidade fora dela. À Marluce, pela incrível determinação e capacidade de dedicar tanto pelo grupo. À Nathali, pela coragem, pela amizade rápida que construímos e por todo o apoio no alcovite. Ao Mateus (Musguinho), pelas risadas e bons momentos. À Rosângela, pela determinação para perseguir o sonho de iniciar uma vida acadêmica. À Talita e à Ancély, pela convivência muito agradável durante esse tempo. À Flavinha Tobaruella, sempre muito querida. À Nicole, pelas muitas risadas e conversas. À Karin, Fernanda Festa, Angelita e Maria Fernanda pelos ensinamentos durante a Iniciação Científica. À Theri pelos conhecimentos e conversas científicas. Aos demais colegas de laboratório, antigos e novos, por todo o apoio: Dr^a. Katiúcia Paiva, Luiz, Camila, Luana, Érica, Adauto, Tatiene, Thais, Fernando, Paty, Prof. Dr. Miguel, Patrícia, Renato, Prof^a. Dr^a. Anna Carla Goldberg, Ícaro, Dr. Antero, Prof. Dr. Wagner Montor, e a todos os demais membros, antigos e novos, do grupo. Aos técnicos Zizi, Débora, Sandra e Ricardo, pelo essencial trabalho que garante nossa pesquisa.

A todos os colegas do Grikscheit Lab: Xiaogang Hou, Christa Grant, Salvador Garcia, Panagiotis Maghsoudlou, Daniel Levin, Ryan Spurrier, Justin Dreyfuss e Jonathan Bushman.

À Universidade de São Paulo, ao Instituto de Química, ao Departamento de Bioquímica e ao Instituto de Biociências por proporcionarem um riquíssimo universo de possibilidades.

A todas as agências financiadoras que de alguma forma contribuíram para este projeto, especialmente ao CNPq, pela bolsa de doutorado no país, e à CAPES, pela bolsa de doutorado sanduíche no exterior (PDSE).

Aos meus mais que queridos amigos que tenho o privilégio e o prazer de conhecer desde o início do curso de Biologia em 2005: Léo, Alegria, CET, Pelúcia, CPF e Gozzoli (mesmo sumido). Obrigado por proporcionarem tantos momentos gostosos e inesquecíveis! Levarei vocês comigo pra sempre!

Ao Di, pelas bolas e fitas entre primos, pelo amor e determinação ao esporte, à ciência e ao empreendedorismo que me influenciaram muito positivamente.

À Dé, que se tornou uma amiga ainda mais querida em tempos mais modernos. Obrigado pelas tantas conversas e risadas nas caronas diárias durante aqueles seis meses.

Ao Mateus Adolphi, pela excelência como pesquisador, por me inspirar a dar o meu melhor e pela pessoa singular que é.

À Karina Galhardi, minha “irmãzinha” que conheci aos nove anos de idade, por ser uma das melhores e mais carinhosas pessoas que eu conheço.

À Alessandra Medeiros, uma mulher fantástica, à frente de seu tempo, que me acolheu carinhosamente durante um mês e meio de recuperação. Nunca um braço quebrado valeu tanto a pena.

E, principalmente,

à Heloisa, que a vida me deu nos meados deste projeto. Você me ajudou de maneiras que você nem imagina para que eu continuasse dando o meu melhor até o fim. Obrigado pela paciência e força, principalmente neste último ano, pelo tanto que me ensinou, por me mostrar a importância de fazermos aquilo que amamos, pelos próximos 100 anos de amor e da mais pura felicidade;

à minha família, por terem um papel fundamental na minha criação, por sempre me acolherem em casa com tanto carinho, por entenderem minha ausência, por me darem tantas experiências inesquecíveis;

aos meus pais, Evelyn e Fernando, por todo o amor, por serem meus maiores exemplos e meus melhores amigos há 27 anos, por tudo o que sou de bom, por garantirem sempre o melhor para mim, por me darem o poder de escolha na medida certa e a maturidade que me cabia, pelas conversas que nunca deveriam acabar, pelas viagens maravilhosas, por me formarem para a vida.

“And AC said, ‘LET THERE BE LIGHT!’
And there was light.”

The Last Question, Isaac Asimov

RESUMO

Belchior, G.G. **Geração de clones de células HEK293 superprodutores de isoformas recombinantes de VEGF-A (Fator de Crescimento Endotelial Vascular A) humano visando à produção de biofármacos para terapia molecular e engenharia tecidual.** 2014. 216 páginas. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Os primeiros vasos sanguíneos do embrião de vertebrados, formados *de novo* a partir de células originadas da mesoderme, originam os vasos linfáticos em um processo denominado vasculogênese. Já no adulto, novos vasos são formados principalmente através da angiogênese (ou linfoangiogênese) a partir da vasculatura pré-existente. Em indivíduos saudáveis, a arquitetura vascular é relativamente estática, sendo que o excesso ou a insuficiência de vasos são comumente relacionados à angiogênese patológica, vinculada a diversas doenças, como câncer, degeneração macular relacionada à idade, isquemia de membros e muitas outras. Dessa forma, o controle local da densidade de vasos sanguíneos torna-se interessante para o tratamento de condições patológicas visando melhoria de prognóstico e cura. Dentre os diversos fatores de crescimento conhecidos, o fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, destaca-se como o principal regulador do processo de angiogênese através de isoformas pró-angiogênicas (VEGF_{xxx}) e antiangiogênicas (VEGF_{xxx}b) do gene *VEGF-A*. Consequentemente, as proteínas codificadas por esse gene constituem um alvo com alto potencial terapêutico. No presente estudo, propusemos a produção das isoformas proteicas recombinantes rhVEGF₁₆₅, rhVEGF₁₆₅b e rhVEGF₁₂₁, oriundas do gene *VEGF-A* humano, visando à geração de biofármacos que podem ser utilizados para terapia molecular e engenharia tecidual. As sequências codificadoras das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁ foram amplificadas a partir do cDNA total sintetizado de amostras de RNA total de pulmão humano, enquanto que a da isoforma rhVEGF₁₆₅b foi gerada através da mutação sítio-dirigida da sequência de rhVEGF₁₆₅. As sequências foram clonadas no vetor de clonagem pGEM[®]-T Easy, sendo em seguida subclonadas no vetor pLV-eGFP, um vetor plasmidial de transferência lentiviral, que permite a expressão de transgenes em células de mamíferos e, também, da proteína repórter eGFP. Células humanas HEK293 em cultura aderente foram independentemente cotransfectadas com cada uma das construções geradas (pLV-rhVEGF₁₆₅, pLV-rhVEGF₁₆₅b e pLV-rhVEGF₁₂₁) juntamente com o vetor pTK-Hyg na proporção de 40:1 (m/m), viabilizando a seleção dos transfectantes com o antibiótico higromicina B, além da detecção de eGFP. Os clones celulares superprodutores das proteínas de interesse foram avaliados quanto à cinética de expressão em meio carente de soro e adaptados para a cultura em suspensão estática na presença de meio na ausência de componentes derivados de animais, demonstrando a capacidade de expressão das isoformas rhVEGFs nestas condições de cultivo. Para o nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho a descrever a expressão de isoformas de *VEGF-A* em células HEK293 mantidas em suspensão. As isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₆₅b foram purificadas por cromatografia de afinidade a heparina, a partir do meio condicionado pelos clones superprodutores gerados. Ensaios *in vitro*, utilizando o AngioPhase[™] Kit, e *in vivo*, através do ensaio da membrana corioalantoide em embriões de galinha (CAM

Assay), ambos próprios para avaliação da atividade pró- e antiangiogênica de diferentes compostos, demonstraram que a isoforma rhVEGF₁₆₅ possui atividade biológica, enquanto a isoforma rhVEGF_{165b} não apresentou a atividade esperada (inibição da angiogênese). Estas isoformas foram testadas em modelo murino de engenharia tecidual do intestino curto, com indícios de que poderiam contribuir para o uso terapêutico neste contexto. A purificação da isoforma rhVEGF₁₂₁, bem como as análises estruturais das proteínas produzidas, estão em processo de otimização.

Palavras-chave: VEGF, proteínas recombinantes, angiogênese, células HEK293, sistema de expressão heterólogo, purificação de proteínas

ABSTRACT

Belchior, G.G. **Generation of HEK293 cell clones overexpressing recombinant isoforms of human VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor A) with the aim of producing biopharmaceuticals for molecular therapy and tissue engineering.** 2014. 216 pages. PhD Thesis – Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

The first blood vessels of the vertebrate embryo are formed *de novo* from mesoderm-derived cells and give rise to lymph vessels in a process termed vasculogenesis. In the adult, new blood vessels are formed mainly through angiogenesis (or lymphangiogenesis) from the pre-existing vasculature. In healthy individuals, the vascular architecture is fairly static, and both the excess and the insufficiency of vessels comprise a pathological angiogenic state, to which is credited the onset and/or progression of several diseases such as cancer, age-related macular degeneration, limb ischemia, and many others. Therefore, locally controlling the blood vessel density becomes interesting for the treatment of pathological conditions aiming at prognosis improvement and cure. Among the various known growth factors, the vascular endothelial growth factor, VEGF, stands out as the major regulator of the angiogenic process. This process is mediated through the action of pro- (VEGF_{xxx}) and antiangiogenic (VEGF_{xxx}b) isoforms, which are derived from the *VEGF-A* gene. Consequently, the proteins encoded by this gene are potential therapeutic targets. In this work, we set out to produce the recombinant protein isoforms rhVEGF₁₆₅, rhVEGF₁₆₅b, and rhVEGF₁₂₁, which originate from the human *VEGF-A* gene, with the aim of generating biopharmaceuticals to be used for molecular therapy and tissue engineering. The rhVEGF₁₆₅ and rhVEGF₁₂₁ coding sequences were amplified from total cDNA synthesized from human lung total RNA. Conversely, the rhVEGF₁₆₅b coding sequence was generated by site-directed mutagenesis of the rhVEGF₁₆₅ sequence. The sequences were cloned into the pGEM[®]-T Easy cloning vector. These cDNAs were then subcloned into pLV-eGFP, a plasmid lentiviral transfer vector that allows for expression of transgenes and the eGFP reporter protein in mammalian cells. Human HEK293 cells cultivated under adherent conditions were independently co-transfected with each of the obtained constructs (pLV-rhVEGF₁₆₅, pLV-rhVEGF₁₆₅b, and pLV-rhVEGF₁₂₁) and the pTK-Hyg vector at a proportion of 40:1 (m/m), enabling for the selection of transfectants with hygromycin B, apart from the detection of eGFP. The cell clones overexpressing the proteins of interest were evaluated for expression kinetics in serum-deprived conditioned media and adapted to static suspension culture in medium free of animal-derived components, demonstrating that expression of the protein isoforms was possible in these culture conditions. To the best of our knowledge, this is the first work that describes the expression of *VEGF-A* isoforms in HEK293 cells in suspension culture. The rhVEGF₁₆₅ and rhVEGF₁₆₅b isoforms were purified by affinity chromatography from media previously conditioned by the overexpressing cell clones. The biological activity of rhVEGF₁₆₅ was demonstrated *in vitro*, by the AngioPhase[™] Kit assay, and *in vivo* with the CAM (chorioallantoic membrane) assay, both of which are suitable for evaluating the pro- and antiangiogenic activity of different compounds. The rhVEGF₁₆₅b did not show the expected antiangiogenic activity. These isoforms were tested in a model of murine tissue-engineered small intestine, indicating a possible contribution to therapeutic use in this context. The purification of rhVEGF₁₂₁, as well as the structural analysis of all three proteins, are in the process of being optimized.

Keywords: VEGF, recombinant proteins, angiogenesis, HEK293 cells, heterologous expression system, protein purification

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Angiogênese por brotamento e por intussuscepção.....	26
Figura 1.2. Estrutura dos receptores VEGFRs e correceptores NRPs e a seletividade pelos ligantes VEGFs.....	29
Figura 1.3. Estrutura gênica de <i>VEGF-A</i> e suas isoformas oriundas de <i>splicing</i> alternativo.....	32
Figura 3.1. Mapa do vetor pGEM [®] -T Easy.....	58
Figura 3.2. Estratégia para amplificação da isoforma rhVEGF ₁₆₅ b.....	67
Figura 3.3. Cronograma do ensaio da membrana corioalantoide para embriões de galinha (<i>Gallus gallus domesticus</i>) (A) e de codorna (<i>Coturnix</i> sp.) (B).....	88
Figura 4.1. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de rhVEGF ₁₆₅	100
Figura 4.2. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de rhVEGF ₁₂₁	101
Figura 4.3. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de rhVEGF ₁₆₅ b.....	103
Figura 4.4. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR de colônias para triagem de clones bacterianos transformados com as construções pGEM [®] -rhVEGF ₁₆₅ , pGEM [®] -rhVEGF ₁₂₁ e pGEM [®] -rhVEGF ₁₆₅ b.....	106
Figura 4.5. Fracionamento em gel de agarose da reação de PCR para amplificação de rhVEGF ₁₆₅ b a partir de cDNA de células ARPE-19.....	114
Figura 4.6. Fracionamento em gel de agarose da reação de PCR III para amplificação de rhVEGF ₁₆₅ b a partir da construção pGEM [®] -rhVEGF ₁₆₅	115
Figura 4.7. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR de colônias para triagem de clones bacterianos transformados com a construção pGEM [®] -rhVEGF ₁₆₅ b.....	116
Figura 4.8. Fracionamento em gel de agarose das digestões das construções pGEM [®] -rhVEGF ₁₆₅ , pGEM [®] -rhVEGF ₁₆₅ b e pGEM [®] -rhVEGF ₁₂₁ com as enzimas <i>EcoRI</i> e <i>NotI</i>	120
Figura 4.9. Exemplo de procedimento para determinação da orientação correta dos insertos por diagnóstico de restrição e fracionamento em gel de agarose das digestões da construção pLV-rhVEGF ₁₂₁	122
Figura 4.10. Seleção por higromicina B de células de células HEK293 cotransfectadas com as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP e vetor pTK-Hyg para geração de clones celulares.....	124
Figura 4.11. Avaliação da estabilidade da expressão da proteína eGFP pelos clones celulares A1, A4, B2, B13, D3, D14 e E1 em passagem P10.....	126
Figura 4.12. Análise da expressão das isoformas rhVEGFs por <i>Western blot</i> para os clones celulares A, B e D, a partir de meios condicionados.....	128
Figura 4.13. Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs por <i>Western blot</i> dos meios condicionados pelos clones celulares A, B e D em cultura na ausência de soro fetal bovino.....	130
Figura 4.14. Avaliação da estabilidade da expressão da proteína eGFP pelos clones celulares adaptados à cultura em suspensão.....	132
Figura 4.15. Expressão das isoformas rhVEGFs por <i>Western blot</i> dos meios condicionados pelos clones A, B e D em cultura em suspensão.....	133
Figura 4.16. Análise do grau de purificação das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF ₁₆₅ b através de cromatografia de afinidade a heparina.....	136
Figura 4.17. Modelo de curva-padrão para ensaios enzimáticos de quantificação das rhVEGFs purificadas.....	138

Figura 4.18. Análise de estabilidade das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas no tampão de eluição.....	141
Figura 4.19. Purificação da isoforma rhVEGF ₁₂₁ por cromatografia de afinidade a metal.....	142
Figura 4.20. Otimização da purificação da isoforma rhVEGF ₁₆₅ por cromatografia de afinidade a heparina no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100.....	144
Figura 4.21. Otimização da purificação da isoforma rhVEGF _{165b} por cromatografia de afinidade a heparina no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100.....	146
Figura 4.22. Análise do grau de purificação das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} através de cromatografia de afinidade a heparina no sistema de HPLC.....	148
Figura 4.23. Ensaio da membrana corioalantoide (<i>CAM Assay</i>) em embriões de galinha para avaliação <i>in vivo</i> da atividade das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas.....	150
Figura 4.24. Ensaio da membrana corioalantoide (<i>CAM Assay</i>) em embriões de galinha para avaliação <i>in vivo</i> do efeito da ação combinada de rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas.....	152
Figura 4.25. Ensaio da membrana corioalantoide (<i>CAM Assay</i>) em embriões de codorna transgênicos (Tie1:H2B-eYFP) para avaliação <i>in vivo</i> da atividade das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas.....	154
Figura 4.26. AngioPhase™ Kit: cultura celular para avaliação <i>in vitro</i> da atividade das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas.....	156
Figura 4.27. AngioPhase™ Kit: marcação para CD31 da cultura celular para avaliação <i>in vitro</i> da atividade das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas.....	158
Figura 4.28. AngioPhase™ Kit: ensaio de ELISA para detecção de CD31 através da medida do substrato solúvel p-NPP.....	160
Figura 4.29. Culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides de camundongos C57Bl/6 eGFP ⁺	162
Figura 4.30. Expressão do mRNA de <i>Kdr</i> (<i>Vegfr-2</i>) em amostras de culturas de unidades organoides murinas.....	163
Figura 4.31. Tentativa de padronização da reação de PCR para expressão do mRNA de <i>Flt-1</i> (<i>Vegfr-1</i>) em amostras de vasos sanguíneos murinos.....	164
Figura 4.32. Efeito das isoformas rhVEGFs sobre o tamanho e a massa de TESI murino implantado por 14 dias.....	167
Figura 4.33. Efeito das isoformas rhVEGFs sobre a expressão de E-Caderina e Ki-67 em TESIs murinos.....	168
Figura 4.34. Efeito de hipóxia sobre o tamanho e a massa de TESIs murinos implantados por 28 dias.....	172
Figura 4.35. Fracionamento em gel de agarose das digestões das construções pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1.....	174

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1.1. Agentes anti-VEGF para o tratamento de câncer.....	37
Tabela 3.1. Sequências dos <i>primers</i> para amplificação das sequências codificadoras de rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF ₁₂₁	55
Tabela 3.2. Sequências dos <i>primers</i> que pareiam no vetor pGEM®-T Easy.....	60
Tabela 3.3. Sequências dos <i>primers</i> para geração da sequência codificadora de rhVEGF _{165b}	65
Tabela 3.4. Sequências dos <i>primers</i> para amplificação do cDNA correspondente às sequências codificadoras dos genes <i>Flt-1</i> e <i>KDR</i> murinos.....	92
Tabela 4.1. Sequência codificadora da isoforma VEGF ₁₆₅ e correspondente proteico.....	99
Tabela 4.2. Sequência codificadora da isoforma VEGF ₁₂₁ e correspondente proteico.....	101
Tabela 4.3. Sequência codificadora da isoforma VEGF _{165b} e correspondente proteico.....	102
Tabela 4.4 Concentração das isoformas rhVEGFs nos eluatos dos processos de purificação.....	139

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AMD: *Age-related Macular Degeneration* (degeneração macular relacionada à idade)

BLAST[®]: *Basic Local Alignment Search Tool*[®]

BMP: *Bone Morphogenetic Protein* (proteína morfogenética óssea)

CAM: *Chorioallantoic Membrane*

CD: *Cluster of Differentiation*

CD31 (PECAM-1): *Cluster of Differentiation 31 (Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule-1)*

(cluster de diferenciação 1 (molécula de adesão a plaqueta de célula endotelial 1))

cDNA: DNA complementar

CE: célula endotelial

CHCA: α -Cyano-4-hydroxycinnamic acid (ácido α -ciano-4-hidroxicinâmico)

CHO: *Chinese Hamster Ovary* (ovário de *hamster* chinês)

CXCR4: *CXC-chemokine receptor 4* (receptor 4 de quimiocina CXC)

DC: difração circular

DHFR: diidrofolato redutase

DNA: *Deoxyribonucleic Acid* (ácido desoxirribonucleico – ADN)

dNTPs: *2-deoxyriboNucleotide TriPhosphate* (2-desoxirribonucleotídeos trifosfatados)

ddNTPs: *2,3-dideoxyriboNucleotide TriPhosphate* (2,3-didesoxirribonucleotídeos trifosfatados)

DMEM: *Dulbecco's Modified Eagle Medium* (meio Dulbecco's Modified Eagle)

DSS: *Distal Splice Site*

E: dia embrionário

eCG: *equine Corionic Gonadotrophin* (gonadotropina coriônica equina)

EDTA: *Ethylenediaminetetraacetic Acid* (ácido etilenodiaminotriacético)

eGFP: *Enhanced Green Fluorescent Protein* (proteína fluorescente verde melhorada)

ELISA: *Enzyme-linked Immunosorbent Assay* (ensaio imunoenzimático)

eYFP: *Enhanced Yellow Fluorescent Protein* (proteína fluorescente amarela melhorada)

a/bFGF: *acid/basic Fibroblast Growth Factor* (fator de crescimento de fibroblastos ácido/básico)

FSH: *Follicle-Stimulating Hormone* (hormônio folículo estimulante)

g: grama; força da gravidade

G-CSF: *Granulocyte Colony-Stimulating Factor* (fator estimulante de colônias de granulócitos)

GM-CSF: *Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor* (fator estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos)

HBSS: *Hank's Balanced Salt Solution* (solução salina balanceada de Hank)

HEK: *Human Embryonic Kidney* (rim embrionário humano)

hnRNA: *heterogeneous nuclear RNA* (RNA heterogêneo nuclear)

HPLC: *High Performance Liquid Chromatography* (cromatografia líquida de alta performance)

INF- α : interferon alfa

IRES: *Internal Ribosome Entry Site* (sítio de entrada interna do ribossomo)

kDa: quilodalton

L: litro

LB: Luria-Bertani; *Lysogeny Broth* (meio lisogênico)

MCS: *Multiple Cloning Site* (sítio múltiplo de clonagem)

MEC: matriz extracelular

mRNA: *messenger RNA* (RNA mensageiro)

m: metro

MTX: metrotexato

M: molar

NCBI: *National Center for Biotechnology Information*

U. S. NLM: *United States National Library of Medicine* (biblioteca nacional de medicina dos Estados Unidos)

ORF: *Open Reading Frame* (quadro/janela aberto/a de leitura)

pb: pares de base

PBS: *Phosphate Buffered Saline* (solução salina tamponada com fosfato)

PBS(A): *Phosphate Buffered Saline (Absent)* (solução salina tamponada com fosfato (sem cálcio ou magnésio))

PCR: *Polymerase Chain Reaction* (reação em cadeia da polimerase)

PDGF: *Platelet-Derived Growth Factor* (fator de crescimento derivado de plaquetas)

PIGF: *Placental Growth Factor* (fator de crescimento de placenta)

p-NPP: *p-NitroPhenol Phosphate* (p-nitrofenol fosfato)

PTM: padrão de tamanho molecular

PSS: *Proximal Splice Site*

rh: *recombinant human* (recombinante humano(a))

rm: *recombinant murine* (recombinante murino(a))

RNA: *Rybonucleic Acid* (ácido ribonucleico – ARN)

rpm: rotações por minuto

SDS: *Sodium Dodecyl Sulfate* (dodecil sulfato de sódio)

SDS-PAGE: *Sodium Dodecyl Sulphate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis* (eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS)

SDF1: *stromal cell-derived factor 1* (fator derivado de célula estromal 1)

SFB: soro fetal bovino

TCA: *Trichloroacetic acid* (ácido tricloroacético)

TESI: *Tissue-Engineered Small Intestine* (intestino delgado engenheirado)

VC: volumes de coluna

VEGF: *Vascular Endothelial Growth Factor* (fator de crescimento endotelial vascular)

VEGFR: *Vascular Endothelial Growth Factor Receptor* (receptor do fator de crescimento endotelial vascular)

v/v: volume em volume

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	24
1.1	Sistema circulatório e angiogênese	24
1.2	VEGFs e seus receptores	26
1.3	O gene <i>VEGF-A</i> e suas isoformas de <i>splicing</i>	30
1.4	Angiogênese e VEGF/VEGFR como alvos terapêuticos.....	34
1.4.1	Terapias antiangiogênicas	34
1.4.2	Terapias pró-angiogênicas	40
1.5	Biofármacos e seus sistemas de produção	45
2	OBJETIVOS	50
2.1	Objetivo Geral.....	50
2.2	Objetivos Específicos	50
3	MATERIAL E MÉTODOS.....	53
3.1	Extração de RNA e síntese de cDNA.....	53
3.2	Desenho dos <i>primers</i> (oligonucleotídeos iniciadores).....	54
3.3	Amplificação e isolamento das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF ₁₂₁	55
3.4	Clonagem das sequências codificadoras de rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF ₁₂₁ no vetor comercial pGEM® T-Easy	57
3.5	Transformação de bactérias <i>Escherichia coli</i> (cepa XL-1 Blue) com as construções pGEM®-rhVEGF ₁₆₅ e pGEM®-rhVEGF ₁₂₁	59
3.6	Confirmação de incorporação das construções através de PCR de colônias	60
3.7	Sequenciamento de DNA das sequências codificadoras nas construções pGEM®-rhVEGF ₁₆₅ e pGEM®-rhVEGF ₁₂₁ pelo método de terminação de cadeia (Sanger).....	61
3.8	Confirmação das sequências geradas através da ferramenta BLAST® e estocagem dos clones bacterianos positivos.....	63
3.9	Geração da sequência codificadora da isoforma rhVEGF _{165b} através de mutação sítio-dirigida de rhVEGF ₁₆₅	64
3.10	Subclonagem das sequências rhVEGF ₁₆₅ , rhVEGF _{165b} e rhVEGF ₁₂₁ do vetor pGEM®-T Easy no vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP, transformação de bactérias <i>Escherichia coli</i> e triagem dos clones bacterianos	68
3.11	Linhagens celulares	70
3.12	Meios de cultura, soluções e condições de cultivo de células HEK293 em aderência e suspensão	71
3.12.1	Cultura em aderência.....	71
3.12.1.1	Meio de cultura:.....	71

3.12.1.2	Soluções:	71
3.12.1.3	Condições de cultivo.....	72
3.12.2	Cultura em suspensão	72
3.12.2.1	Meios de cultura:	72
3.12.2.2	Soluções:	73
3.12.2.3	Condições de cultivo:.....	73
3.13	Meios de cultura, soluções e condições de cultivo de células ARPE-19	74
3.14	Cotransfecção de células HEK293 em cultura aderente com as construções pLV-rhVEGFs e o vetor de seleção pTK-Hyg para geração de clones celulares eGFP ⁺	74
3.15	Seleção dos clones de células HEK293 gerados através de seleção com o antibiótico higromicina B e isolamento de colônias eGFP ⁺	75
3.16	Análise da produção das isoformas de VEGF-A pelos clones celulares A, B e D produtores de VEGFs.....	76
3.17	Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs em meios condicionados pelos clones celulares A, B e D na ausência de soro fetal bovino	78
3.18	Expressão das isoformas rhVEGFs pelos clones celulares A, B e D adaptados à cultura em suspensão	79
3.19	Purificação das isoformas rhVEGFs por concentração seguida de cromatografia de afinidade a heparina (rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b}) e a metal (rhVEGF ₁₂₁)	79
3.19.1	rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b}	80
3.19.2	rhVEGF ₁₂₁	81
3.20	Otimização da purificação das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} por cromatografia líquida de alta performance.	83
3.21	Caracterização das isoformas rhVEGFs por espectrometria de massas, dicroísmo circular e eletroforese capilar.....	83
3.21.1	Espectrometria de massas	84
3.21.2	Dicroísmo circular	84
3.21.3	Eletroforese capilar.....	84
3.22	Quantificação das isoformas rhVEGFs nos eluatos por ensaio enzimático “sanduíche” (ELISA). 85	
3.23	Avaliação da atividade biológica das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b} purificadas	85
3.23.1	Ensaio da membrana corioalantoide (<i>CAM Assay</i>)	86
3.23.2	AngioPhase TM Kit.....	89
3.24	Avaliação dos efeitos de rhVEGFs sobre a formação de intestino curto engenheirado (TESI, do inglês <i>Tissue-Engineeried Small Intestine</i>) murino	90
3.24.1	Culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides	91

3.24.2	Imageamento em tempo real das culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides tratadas com rhVEGFs.....	93
3.24.3	Efeito de rhVEGFs sobre a formação de TESI	94
3.25	Avaliação dos efeitos de hipóxia sobre a formação de intestino curto engenheirado (TESI, do inglês <i>Tissue-Engineered Small Intestine</i>) murino	95
3.26	Produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-Espondina 1	96
4	RESULTADOS.....	98
4.1	Amplificação das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF ₁₆₅ , rhVEGF ₁₂₁ e rhVEGF _{165b} do gene <i>VEGF-A</i> humano	98
4.1.1	rhVEGF ₁₆₅	98
4.1.2	rhVEGF ₁₂₁	100
4.1.3	rhVEGF _{165b}	102
4.2	Clonagem das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF ₁₆₅ , rhVEGF _{165b} e rhVEGF ₁₂₁ do gene <i>VEGF-A</i> humano no vetor pGEM®-T Easy e geração e triagem de clones de bactérias <i>Escherichia coli</i>	104
4.2.1	Estratégias alternativas para amplificação da isoforma rhVEGF _{165b}	113
4.3	Subclonagem das sequências rhVEGF ₁₆₅ , rhVEGF _{165b} e rhVEGF ₁₂₁ no vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP e triagem das construções contendo insertos na orientação correta... ..	119
4.4	Cotransfecção de células HEK293 com as construções pLV-rhVEGFs e o vetor de seleção pTK-Hyg para geração de clones celulares eGFP ⁺	122
4.5	Análise da expressão proteica de clones celulares expressando as isoformas rhVEGFs.....	127
4.6	Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs em meios condicionados por clones celulares na ausência de soro fetal bovino	128
4.7	Adaptação de clones celulares superprodutores à cultura em suspensão.....	131
4.8	Purificação das isoformas rhVEGFs por cromatografia de afinidade a heparina (rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b}) e a níquel (rhVEGF ₁₂₁)	134
4.8.1	Padronização da purificação: concentração dos meios condicionados e carregamento das colunas com uso de bomba peristáltica.....	134
4.8.1.1	rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b}	134
4.8.1.1.1	Concentração das isoformas rhVEGFs nos eluatos e massa total das proteínas	138
4.8.1.2	rhVEGF ₁₂₁	141
4.8.2	Otimização da purificação em sistema cromatográfico HPLC	142
4.9	Ensaio para análise da atividade angiogênica de rhVEGFs	149
4.9.1	Ensaio da membrana corioalantoide (<i>CAM Assay</i>)	149
4.9.2	AngioPhase™ Kit.....	154

4.10	Avaliação dos efeitos de rhVEGFs sobre a cultura de unidades organoides e a formação de intestino curto engenheirado (TESI) murino.....	161
4.10.1	Culturas de unidades organoides.....	161
4.10.2	Expressão do RNA de <i>Kdr</i> (<i>Vegfr-2</i>) e <i>Flt-1</i> (<i>Vegfr-1</i>) em culturas de unidades organoides...	163
4.10.3	Imageamento em tempo real das culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides tratadas com rhVEGFs.....	165
4.10.4	Formação de TESIS	166
4.11	Avaliação dos efeitos de hipóxia sobre a formação de intestino curto engenheirado (TESI) murino.	172
4.12	Produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-Espondina 1	174
5	DISCUSSÃO	177
5.1	Clonagem das sequências codificadoras das isoformas de <i>VEGF-A</i>	178
5.2	Transfecção de células HEK293, expressão das isoformas rhVEGFs, seleção dos clones e adaptação à cultura em suspensão	181
5.3	Purificação e análises estruturais das isoformas rhVEGF	188
5.4	Análise da atividade biológica das isoformas rhVEGF ₁₆₅ e rhVEGF _{165b}	191
5.5	rhVEGFs em engenharia tecidual do intestino delgado.....	194
5.6	Produção de R-Espondinas para uso em engenharia tecidual do intestino delgado	197
6	CONCLUSÕES	198
7	PRÓXIMOS PASSOS.....	199
8	PERSPECTIVAS.....	201
9	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	202
	LISTA DE ANEXOS.....	217

1 INTRODUÇÃO

1.1 Sistema circulatório e angiogênese

O coração é o primeiro órgão funcional a ser formado no embrião de vertebrados. Contudo, o sistema circulatório, a primeira unidade funcional formada, é essencial para que o sangue bombeado pelo músculo cardíaco possa nutrir e oxigenar as células embrionárias, e para que excretas produzidas por elas possam ser coletadas e a homeostase seja mantida (S. F. Gilbert, 2000). O desenvolvimento do sistema circulatório no embrião ocorre através da vasculogênese, onde o crescimento *de novo* de vasos sanguíneos se dá pela diferenciação *in situ* de células progenitoras endoteliais (angioblastos) a partir de seus precursores (hemangioblastos), originados da mesoderme. O sistema linfático só passa a ser formado a partir da metade do período gestacional, sendo derivado de células endoteliais venosas que adquirem um destino linfático e ramificam-se para formar os sacos primários primitivos. No adulto, a vasculogênese passa a ter menor importância fisiológica, e o crescimento e remodelamento de vasos sanguíneos ocorrem principalmente a partir da vasculatura pré-existente, em um processo denominado angiogênese (ou neovascularização), sendo linfoangiogênese sua contrapartida para vasos do sistema linfático (Drake, 2003; Lohela, Bry, Tammela, & Alitalo, 2009; Risau & Flamme, 1995; Woolard, Bevan, Harper, & Bates, 2009).

Apesar da arquitetura vascular no indivíduo adulto saudável ser relativamente quiescente, a angiogênese é de grande importância em alguns contextos fisiológicos, como na formação da placenta durante a gravidez, no ciclo menstrual feminino e no reparo de lesões (Brown et al., 1992; Peters, De Vries, & Williams, 1993; Redmer & Reynolds, 1996; Reynolds & Redmer, 1998). Ela está ainda relacionada com a regulação de um grande número de doenças,

classicamente com o câncer (Carmeliet, 2005; Napoleone Ferrara, 2002; Judah Folkman & Kalluri, 2004; Shibuya, 2006).

Dois principais mecanismos de angiogênese são descritos: brotamento e intussuscepção (Figura 1.1). A angiogênese por brotamento é um processo lento, sendo caracterizado por vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e proliferação celular. Primeiramente ocorre uma degradação da membrana basal, seguida da migração de células endoteliais para a matriz celular e proliferação das mesmas, ou vice versa. Os brotos reorganizam-se internamente formando um lúmen vascular e, então, conectam-se a outros segmentos capilares (Ausprunk & Folkman, 1977; Burger, Chandler, & Klintworth, 1983; Djonov, Baum, & Burri, 2003). Já na angiogênese por intussuscepção, menos compreendido, paredes capilares opostas formam uma zona de contato, o que é seguido por uma reorganização das junções celulares interendoteliais e pela perfuração central da bicamada formada na zona de contato. Um pilar central intersticial é formado e invadido por pericitos e miofibroblastos que depositam fibrilas de colágeno. No último estágio ocorre a expansão do crescimento dos pilares formados (Burri & Tarek, 1990; Caduff, Fischer, & Burri, 1986; Djonov et al., 2003).

Décadas de pesquisa revelaram muitos fatores proteicos que foram descritos como reguladores da angiogênese fisiológica e patológica, como fator de crescimento epidermal (EGF – *Epidermal Growth Factor*), fator de crescimento transformante (TGF – *Transforming Growth Factor*) - α e - β , fator de necrose tumoral (TNF – *Tumor Necrosis Factor*), angiogenina, fator de crescimento de fibroblasto ácido/básico (a/bFGF – *acidic/basic Fibroblast Growth Factor*), fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGF – *Platelet-Derived Growth Factor*) e outros. Contudo, o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF – *Vascular Endothelial Growth Factor*) é tido até hoje como o principal regulador do crescimento de vasos do sistema circulatório

(Campochiaro, 2013; Napoleone Ferrara, 2002; J Folkman & Klagsbrun, 1987; Shibuya, 2013; Thanigaimani, Kichenadasse, & Mangoni, 2011).

Figura 1.1 Angiogênese por brotamento e por intussuscepção.

O processo de angiogênese por brotamento (A) envolve a sinalização de fatores (como no eixo VEGF-VEGFR) que regulam o recrutamento de células precursoras circulantes (*e.g.*, RBCCs, ou células circulantes recrutadas derivadas da medula óssea), ao passo que a angiogênese por intussuscepção (B) resulta na divisão do vaso sanguíneo pela inserção de tecido pilar central. CE: célula endotelial. VEGF: fator de crescimento endotelial vascular. VEGFR: receptor do fator de crescimento endotelial vascular. SDF1: fator derivado de célula estromal 1. CXCR4: receptor 4 de quimiocina CXC. CXC: quimiocinas de motivo C-X-C/ α -quimiocinas. +: estímulo positivo. -: estímulo negativo. Figura adaptada (Adams & Alitalo, 2007).

1.2 VEGFs e seus receptores

Os fatores de crescimento endotelial vascular, VEGFs, constituem uma família de proteínas que pertence à superfamília PDGF/VEGF de fatores de crescimento. Consistem em glicoproteínas homo-/heterodiméricas e secretadas que contêm um motivo nó de cisteína

(*cysteine knot motif*) e que possuem oito resíduos de cisteína característicos em cada monômero. Em mamíferos são descritos cinco genes, quais sejam: *VEGF-A* (ou *VEGF*), *VEGF-B*, *VEGF-C*, *VEGF-D* e *PlGF* (*Placental Growth Factor*, ou fator de crescimento de placenta), localizados em cromossomos diferentes. Há ainda dois outros homólogos: *VEGF-E*, de vírus Orf da família Poxviridae, e *VEGF-F*, de cobras (Lohela et al., 2009). Como descrito adiante, muitas isoformas de *VEGF-A* já foram descritas, ao passo que somente um produto gênico de *VEGF-C* é conhecido.

A primeira proteína da família VEGF foi identificada como um fator que promovia aumento da permeabilidade vascular, tendo sido por esse motivo inicialmente denominado de VPF (*Vascular Permeability Factor*, ou Fator de Permeabilidade Vascular) (Senger et al., 1983). Já em 1898, Ferrara *et al.* e Connolly *et al.* paralelamente isolaram, purificaram de forma homogênea e sequenciaram a proteína VEGF (Connolly et al., 1989; N Ferrara & Henzel, 1989) – no caso, correspondente à isoforma VEGF₁₆₅, oriunda do gene *VEGF-A*, mas, naquela época, não se tinha conhecimento da existência de diferentes isoformas (Harper & Bates, 2008). Nos anos que se seguiram, novas descobertas sobre os membros que compõe essa família de glicoproteínas foram geradas, revelando os receptores e correceptores aos quais eles se ligam (Napoleone Ferrara, 2002).

Os produtos dos genes *VEGF* exercem suas atividades biológicas através da ligação com membros da família de receptores enzimáticos VEGFR (*VEGF Receptors*), que são estruturalmente relacionados à família de receptores de PDGF (PDGFR/Fms/Kit/FLT3) (Shibuya, 2013). VEGFRs são receptores transmembrana do tipo tirosina-quinase que consistem de um componente extracelular contendo sete domínios homólogos a imunoglobulinas, um segmento transmembrana único, um segmento justaposto à membrana, um domínio intracelular

tirosina-quinase e uma porção carboxiterminal. Três membros dessa família são conhecidos: VEGFR-1 (ou Flt-1, *fms-like tyrosyl kinase-1*, onde *fms* refere-se a *feline McDonough sarcoma virus*) e sua isoforma solúvel sVEGFR-1 (sFlt-1), VEGFR-2 (ou Flk-1/KDR, *fetal liver kinase-1/kinase insert domain containing receptor*) e VEGFR-3 (ou Flt-4) (Roskoski Jr, 2008). Enquanto *Drosophila* possui somente um homólogo de *VEGFR*, o número de genes *VEGFR* é conservado de anfíbios a mamíferos (Shibuya, 2013). A transdução de sinal dada pelo sistema VEGF-VEGFR se inicia pela ligação dos fatores de crescimento ao ectodomínio de seus receptores, levando à dimerização dos mesmos, ativação da atividade de quinase, *trans*-autofosforilação e iniciação das vias de sinalização (Lemmon & Schlessinger, 2000; Roskoski Jr, 2008). Há ainda as neuropilinas NRP-1 e NRP-2, que atuam como correceptores não enzimáticos e só são capazes de transduzir respostas funcionais quando coexpressas com VEGFRs. Os receptores enzimáticos e seus correceptores não enzimáticos apresentam relativa seletividade para seus ligantes VEGFs. VEGFR-1, por exemplo, tem como ligantes produtos proteicos de *VEGF-A*, *VEGF-B* e *PlGF*; VEGFR-3 liga-se a produtos de *VEGF-C* e *VEGF-D*; já VEGFR-2 é mais promíscuo, ligando-se aos produtos de *VEGF-A*, *VEGF-C*, *VEGF-D*, *VEGF-E* e *VEGF-F*. O mesmo ocorre para as neuropilinas, sendo NRP-1 menos seletiva do que NRP-2 (Pellet-Many, Frankel, Jia, & Zachary, 2008; Roskoski Jr, 2008). A Figura 1.2 ilustra a estrutura e relativa seletividade entre receptores/correceptores e seus ligantes.

Apesar de VEGFR-1 ter maior afinidade por seus ligantes do que VEGFR-2 (aproximadamente uma ordem de magnitude maior), sua atividade tirosina-quinase é aproximadamente dez vezes menor. Somada a esse fato, a presença do um produto gênico solúvel sVEGFR-1 sugere que este receptor possa regular negativamente a angiogênese em certos contextos (Sawano, Takahashi, Yamaguchi, Aonuma, & Shibuya, 1996). De fato, camundongos

knockout para *Vegfr-2* (*Vegfr-2* $-/-$) morrem em E8,5-E9 por falta de vasculogênese, enquanto que mutantes de *Vegfr-1* (*Vegfr-1* $-/-$) morrem no mesmo estágio por excesso de crescimento de células endoteliais e desorganização de vasos sanguíneos, o que mostra um papel antagônico dessas isoformas durante a formação de vasos na embriogênese (Fong, Rossant, Gertsenstein, & Breitman, 1995; Shibuya, 2013).

Figura 1.2. Estrutura dos receptores VEGFRs e correceptores NRPs e a seletividade pelos ligantes VEGFs.

Os dímeros de VEGFs interagem com os receptores VEGFRs e correceptores NRPs com especificidades variáveis. Ao se ligarem, os ligantes induzem dimerização dos receptores e ativação da atividade tirosina-quinase de domínios intracelulares, que por sua vez recrutam moléculas sinalizadoras a jusante. Figura adaptada (Lohela et al., 2009).

Os receptores e correceptores determinam as funções de cada proteína da família VEGF.

VEGF-C e -D ligam-se ao dímero de VEGFR-3, e a NRP-2, mesmo sem terem sido processadas,

levando à ativação preferencial desse receptor e, com isso, têm um papel central na linfoangiogênese do embrião e do adulto. Por outro lado, os demais VEGFs guardam maior relação com a vasculogênese e angiogênese por se ligarem aos receptores VEGFR-1 e -2 e ao correceptor NRP-1 (Lohela et al., 2009). Ainda, estudos estruturais e de rastreamento de mutações em resíduos de aminoácidos mostraram que esses dois receptores enzimáticos reconhecem epítomos próximos na molécula de VEGF.

Dentre todas as proteínas VEGF envolvidas na angiogênese, os produtos gênicos de *VEGF-A* destacam-se como os reguladores centrais, sendo que sua isoforma mais abundante e biologicamente ativa (VEGF₁₆₅, apesar da existência de isoformas de *VEGF-A* não ser conhecida na época) foi a primeira descoberta independentemente por três grupos da década de 1980 (Connolly et al., 1989; Ferrara & Henzel, 1989; Senger et al., 1983).

1.3 O gene *VEGF-A* e suas isoformas de *splicing*

A sequência gênica completa do gene *VEGF-A* se estende por 16.272 pares de base (pb) no cromossomo 6, banda p12 (localização 43.737.921 – 43.754.224). Camundongos *knockout* para *Vegf-A* são embrionicamente letais, tanto em homo (–/–) como em heterozigose (+/–), devido à formação imatura de vasos sanguíneos, o que indica que a concentração local de VEGF-A no embrião precisa ser muito bem regulada para que os processos de vasculogênese e angiogênese ocorram de forma a não comprometer a viabilidade do embrião (Shibuya, 2013).

O RNA heterogêneo nuclear (hnRNA) produzido a partir da transcrição de *VEGF-A* contém 8 éxons. Enquanto os éxons 1-5 estão presentes em todas as isoformas, é através de *splicing* alternativo dos éxons 6 e 7 (e seus subéxons 6a, 6b, 7a e 7b) e seleção diferencial dos subéxons 8a (no sítio proximal de *splicing*, ou PSS – *Proximal Splice Site*) ou 8b (no sítio distal

de *splicing*, ou DSS – *Distal Splice Site*) que diversas isoformas proteicas são formadas. Quando o PSS é selecionado, o mRNA passa a conter o subéxon 8a e sua tradução leva à produção de fatores pró-angiogênicos, representados por VEGF_{xxx}, onde “xxx” corresponde ao número de resíduos de aminoácidos nas cadeias polipeptídicas das isoformas, sendo que as seguintes isoformas já foram descritas: VEGF₁₁₁, VEGF₁₂₁, VEGF₁₄₅, VEGF₁₄₈, VEGF₁₆₂, VEGF₁₆₅, VEGF₁₈₃, VEGF₁₈₉ e VEGF₂₀₆ (Anthony, Wheeler, Elcock, Pickett, & Thomas, 1994; Cheung, Singh, Ebaugh, & Brace, 1995; Houck et al., 1991; Lei, Jiang, & Pei, 1998; Lohela et al., 2009; Mineur et al., 2007; Woolard et al., 2009). Por outro lado, a seleção do DSS, localizado 66 pb a jusante do PSS, incorpora o subéxon 8b, gerando transcritos com um quadro aberto de leitura contendo o mesmo número de resíduos de nucleotídeo que as variantes VEGF_{xxx}, mas que são traduzidos em proteínas que contêm seis resíduos de aminoácidos distintos na região carboxiterminal (Figura 1.3). Enquanto o subéxon 8a codifica os resíduos CDKPRR, o subéxon 8b codifica SLTRKD, gerando uma subfamília de proteínas antiangiogênicas mais recentemente descoberta e que são representadas por VEGF_{xxx}b. Até o momento foram identificadas as isoformas VEGF₁₂₁b, VEGF₁₄₅b, VEGF₁₆₅b, VEGF₁₈₃b e VEGF₁₈₉b, todas também capazes de se ligar aos mesmos receptores de VEGF (Bates et al., 2013; Lohela et al., 2009; Woolard et al., 2009). Diversos são os fatores que comandam a seleção PSS/DSS, como hipóxia, citocinas, hormônios sexuais, quimiocinas e fatores de crescimento (Harper & Bates, 2008).

Figura 1.3. Estrutura gênica de *VEGF-A* e isoformas oriundas de *splicing* alternativo.

O gene *VEGF-A* se estende por aproximadamente 16,3 kb e seu hnRNA possui oito éxons (A). Diversas isoformas são geradas a partir do *splicing* do hnRNA, formando proteínas de diferentes tamanhos, propriedades físicoquímicas e atividades biológicas. A seleção do subéxons 8a (TGA1) ou 8b (TGA2) resulta em duas subfamílias às quais são atribuídas atividades antagônicas: pró-angiogênese e antiangiogênese. A maioria das isoformas geradas a partir de *VEGF-A* são mostradas (B). Figura adaptada (Harper & Bates, 2008).

As diversas isoformas de VEGF-A possuem diferentes níveis de expressão, sendo, por exemplo, VEGF₁₆₅, VEGF₁₂₁ e VEGF₁₈₉ mais abundantes (com destaque para VEGF₁₆₅) do que VEGF₁₄₅ e VEGF₂₀₆. Todas as isoformas possuem uma N-glicosilação no resíduo Asn-75, mas elas também diferem quanto a suas propriedades bioquímicas, o que determina distintas propriedades biológicas. VEGF₁₂₁ é um polipeptídeo ácido e livremente secretado e não apresenta capacidade de ligação a heparina. Isoformas maiores possuem o equivalente proteico aos éxons 6 e 7, o que as confere a habilidade de ligação a proteoglicanos de heparan-sulfato e, por similaridade estrutural, à heparina. VEGF₁₈₉ e VEGF₂₀₆, isoformas altamente básicas, ligam-se com forte afinidade à heparina, ficando sequestradas na matriz extracelular (MEC). Já VEGF₁₆₅ tem propriedades intermediárias, dado que é secretada mas tem uma fração significativa

retida na MEC (Napoleone Ferrara, 2004; Houck, Leung, Rowland, Winer, & Ferrara, 1992; J. E. Park, Keller, & Ferrara, 1993). Essas características físicoquímicas são também válidas para as isoformas VEGF_{xxx}b, dado que a substituição dos seis resíduos no C-terminal das proteínas não ocorre nos domínios que determinam tais propriedades. Além disso, todas as isoformas possuem uma N-glicosilação no resíduo Asn-75 (Pizarro et al., 2010).

A mudança dos resíduos C-terminais entre VEGF_{xxx} e VEGF_{xxx}b, entretanto, acarreta em alterações consideráveis, tanto que leva às ações pró- e antiangiogênicas de membros dessas duas famílias, respectivamente. Tomando VEGF₁₆₅ e VEGF₁₆₅b como exemplo, as principais alterações em resíduos de aminoácidos são a perda de uma Cys160 em VEGF₁₆₅b e uma substituição de argininas positivamente carregadas na isoforma VEGF₁₆₅ por um dipeptídeo Lys-Asp de carga líquida neutra na VEGF₁₆₅b (Cébe-Suarez et al., 2008). Essas diferenças resultam em profundas implicações estruturais, de interação com receptores e de função. A ligação de VEGF₁₆₅ leva à dimerização dos receptores VEGFR-2, reposicionamento do domínio tirosina-quinase por rotação da porção intracelular do receptor e indução de autofosforilação dos resíduos de tirosina 951, 1054, 1152 e 1214. Em contrapartida, ao se ligar ao mesmo dímero de receptores, VEGF₁₆₅b leva a uma rotação insuficiente e fosforilação incompleta do receptor, somente nos resíduos 951, 1152 e 1214. Essa fosforilação incompleta acaba por sinalizar para degradação do receptor, não ativando vias de sinalização angiogênicas (Kawamura, Li, Harper, Bates, & Claesson-Welsh, 2008).

O desenvolvimento de anticorpos e sondas que detectam especificamente as isoformas VEGF-A_{xxx}b revelaram que a expressão basal dessas isoformas é dominante sobre as isoformas VEGF-A_{xxx} em diversos tecidos. A placenta é uma exceção, onde essas isoformas representam menos da metade de VEGF-A total (Bevan et al., 2008; Perrin et al., 2005). Em culturas

primárias de células, como podócitos, células do epitélio pigmentar de retina e células epiteliais colônicas, as isoformas VEGF_{xxx}b também são predominantes. Contudo, em células de melanoma, carcinoma colorretal, câncer de bexiga e podócitos diferenciados em proliferação, as isoformas VEGF_{xxx} compreendem a maior parte de VEGF-A expresso (Cui et al., 2004; Nowak et al., 2008; Varey et al., 2008).

Conforme mencionado anteriormente, a arquitetura de vasos no indivíduo não sofre alterações significativas em um contexto fisiológico saudável. Entretanto, uma desregulação do *status* angiogênico de um tecido é um denominador comum de diversas doenças de alta relevância.

1.4 Angiogênese e VEGF/VEGFR como alvos terapêuticos

O estudo da angiogênese cresceu principalmente em função de sua associação com diversas doenças, mais notadamente com o câncer. Os primeiros relatos de uma relação entre angiogênese e o desenvolvimento tumoral datam do final do século XIX, quando patologistas alemães sugeriram que novos vasos tinham importância na progressão do câncer pelo alto grau de vascularização de alguns tumores humanos (Napoleone Ferrara, 2002). Após intenso progresso na área, em 1971 Judah Folkman propôs, de forma inovadora, que o tratamento do câncer humano com inibidores angiogênicos seria algo promissor (Judah Folkman, Merler, Abernathy, & Williams, 1971; Judah Folkman, 1971).

1.4.1 Terapias antiangiogênicas

Depois de mais de quatro décadas, a importância da sinalização de VEGF para o crescimento de tumores ficou bem consolidada (Alitalo & Carmeliet, 2002; Shibuya & Claesson-Welsh, 2006; Shibuya, 2011). Tumores sólidos que apresentam uma alta taxa de crescimento

passam a apresentar hipóxia, o que se dá pela falta de irrigação e consequente aporte insuficiente de oxigênio, além de falta de nutrientes e de uma via para liberação de excretas. A consequência é a limitação do crescimento do tumor, que não consegue crescer além de 1 mm³, além de ter reduzida probabilidade de metastatizar. Entretanto, o estresse hipóxico causado desencadeia a produção de VEGF através da estabilização e ativação do fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1, *Hypoxia Inducible Factor 1*), um fator de transcrição que se liga a uma região localizada a 5' (montante) da sequência gênica de *VEGF*, levando a um aumento da expressão gênica. Kim e colaboradores comprovaram que VEGF derivado das células tumorais tem um papel central no processo de angiogênese tumoral (K. J. Kim et al., 1993). Além disso, os VEGFRs, especialmente VEGFR-2, também são superexpressos sob condições de hipóxia (Ulyatt, Walker, & Ponnambalam, 2011).

De fato, autópsias de indivíduos que morreram de trauma frequentemente revelam a presença de colônias microscópicas de células cancerosas, também denominadas tumores *in situ*, que não haviam sido clinicamente diagnosticadas *antemortem*. Foi estimado que mais de 33% de mulheres com idades entre 40 e 50 anos que não tiveram indícios de câncer ao longo da vida possuíam tumores mamários *in situ*. Contudo, somente 1% de mulheres nessa faixa etária é identificado com câncer. De forma similar, biópsias indicam que quase a totalidade de homens entre 50 e 70 anos de idade possuem carcinoma *in situ* na glândula tireoide, ao passo que somente 0,1% desses indivíduos é clinicamente diagnosticado com câncer de tireoide. Assim, o fato de um número considerável de pessoas possuir tumores que se apresentam em um estado dormente sugere que este estado seja mantido graças a habilidades inerentes do organismo de impedir que eles recrutem vasos sanguíneos. Entretanto, alguns tumores escapam desse controle e são capazes de se ligar a vasos sanguíneos (e linfáticos) para que as necessidades de suas altas taxas

metabólicas sejam atendidas (Judah Folkman & Kalluri, 2004). O *angiogenic switch*, termo cunhado no final da década de 80, consiste justamente do momento durante a progressão tumoral em que o balanço entre fatores pró- e antiangiogênicos passa a favorecer a condição pró-angiogênica e, possivelmente, a transição do estado de dormência da hiperplasia avascularizada para um tumor vascularizado maligno (Baeriswyl & Christofori, 2009).

Até 2012, diversas drogas anti-VEGF/anti-VEGFR já haviam sido aprovadas como agentes no tratamento de diferentes tipos de câncer (Tabela 1.1). Entre elas, merece destaque o anticorpo monoclonal humanizado bevacizumab (Avastin[®], Genentech/Roche), que foi o primeiro anticorpo destinado ao tratamento de câncer que tem VEGF como alvo. Trata-se de um anticorpo IgG1 que se liga a um epítipo de VEGF que tem parte reconhecida pelos sítios de ligação dos receptores VEGFR-1 e -2, levando à inibição da ligação deste fator aos seus receptores por impedimento estérico (Lien & Lowman, 2008). Seu uso é atualmente aprovado nos EUA pelo *Food and Drug Administration* (FDA) para o tratamento de câncer colorretal metastático, carcinoma de pulmão metastático não escamoso de células não pequenas, glioblastoma multiforme recorrente e carcinoma renal metastático (Tie & Desai, 2012). Outros modos de ação alternativos, mas também direcionados para a inibição dos efeitos de VEGF, também são eficazes. É o caso dos inibidores de quinases (*e.g.*, sunitinib – Sutent[®], Pfizer; sorafenib – Nexavar[®], Bayer/Onyx Pharmaceuticals etc.), destinados ao tratamento de carcinoma renal metastático, tumor estromal gastrointestinal, câncer de pulmão, câncer renal e outros. Apesar do sucesso dessas moléculas na clínica, algumas reações adversas já foram reportadas, como é o caso de hipertensão, proteinúria, trombose e sangramento. Os efeitos de supressão tumoral desencadeados por essas moléculas ocorrem de várias formas: (i) supressão direta da angiogênese, (ii) promoção da apoptose de células endoteliais pré-existentes nos tumores, (iii)

“normalização vascular” que diminui os níveis de permeabilidade vascular e pressão intratumoral e resultam em aumento da eficácia de quimioterápicos e (iv) supressão de reações inflamatórias pró-angiogênicas (Shibuya, 2013).

Tabela 1.1. Agentes anti-VEGF para o tratamento de câncer.

Agente	Classe	Alvos	Indicações
Aprovados pelo FDA			
Bevacizumab	Anticorpo monoclonal	VEGF-A	Câncer colorretal metastático, carcinoma de pulmão não escamoso de células não pequenas metastático, glioblastoma multiforme recorrente e carcinoma renal metastático
Sunitinib	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-2, PDGFR, FLT3, c-Kit	Carcinoma renal metastático, tumor estromal gastrointestinal avançado, tumores neuroendócrinos pancreáticos avançados
Sorafenib	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-2, PDGFR, FLT3, c-Kit	Carcinoma renal metastático, carcinoma hepatocelular não ressecável
Pazopanib	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3	Carcinoma renal metastático
Vandetanib (ZD6474)	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-2, EGFR, RET	Câncer tireoidiano medular avançado
Aflibercept	Receptor solúvel	VEGF-A, PlGF, VEGF-B	Câncer colorretal metastático, câncer de próstata metastático refratário
Axitinib (AG013736)	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR- β , c-Kit	Carcinoma renal metastático, câncer tireoidiano
Em estado final de desenvolvimento clínico			
Ramucirumab	Anticorpo monoclonal	VEGFR-2	Câncer gástrico metastático
Cediranib (AZ2171)	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR- β , c-Kit	Câncer colorretal metastático, glioblastoma multiforme recorrente
Vatalanib (PTK787)	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR- β , c-Kit	Tumor estromal gastrointestinal metastático, câncer colorretal metastático, câncer de pulmão de células não pequenas metastático
Tivozanib (AV951)	Inibidor de tirosina quinase	VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3	Carcinoma renal metastático

FLT3: *Fms-Like Tyrosine kinase receptor 3* (receptor tirosina-quinase semelhante a fms 3); PlGF: *Placental Growth Factor* (fator de crescimento de placenta); PI3K: *Phosphatidylinositol-3 Kinases* (fosfatidilinositol-3 quinases); VEGF: *Vascular Endothelial Growth Factor* (fator de crescimento endotelial vascular); VEGFR (receptor do fator de crescimento endotelial vascular). Tabela adaptada (Tie & Desai, 2012).

Um crescimento exacerbado de vasos sanguíneos também é responsável por doenças do olho que podem levar à perda completa de visão. As doenças vascular retiniana e vascular coroidal são as causas mais comuns de perda de visão moderada e severa em países desenvolvidos. Elas podem ser divididas em duas classes: doenças vasculares retinianas, onde há vazamento e/ou neovascularização a partir de vasos sanguíneos da retina, e neovascularização subretiniana, onde novos vasos crescem na região externa da retina e espaço subretiniano, onde normalmente não devem haver vasos. Doenças como retinopatia diabética, oclusão venosa da retina e retinopatia da prematuridade são incluídas na primeira classe, ao passo que degeneração macular relacionada à idade (AMD, *Age-related Macular Degeneration*), histoplasiose ocular, miopia patológica e outras doenças relacionadas pertencem ao segundo grupo. Um contexto hipóxico na retina tem um importante papel para a primeira classe de doenças, elevando níveis de HIF-1 e, conseqüentemente, VEGF e outros fatores pró-angiogênicos. Já na segunda classe de doenças, apesar de hipóxia não aparentar ser necessária, HIF-1 também é superexpresso e, assim, leva à produção das mesmas moléculas pró-angiogênicas (Campochiaro, 2013).

O anticorpo ranibizumab (Lucentis[®], Genentech/Novartis) é o mais indicado para o tratamento de AMD, edema macular diabético e oclusão venosa da retina. Trata-se de um fragmento de anticorpo (Fab – *Fragment antigen binding*) IgG1 que tem a mesma origem que bevacizumab e que também se liga a VEGF e inativa-o, mas que sofreu um processo de humanização distinto – baseado em mutagênese sítio-dirigida e *phage display*, ao passo que bevacizumab foi humanizado somente por mutagênese. Além disso, seu menor tamanho permite a penetração na retina e um *clearance* mais rápido do que o de um anticorpo inteiro (Lien & Lowman, 2008). O oligonucleotídeo pegaptanib (Macugen[®], Eyetech/Pfizer) é um aptâmero que

foi desenhado para se ligar especificamente à isoforma VEGF₁₆₅, sendo atualmente aprovado para tratar AMD e testado para outras oculopatias proliferativas (Ng et al., 2006; Rinaldi et al., 2012; Vinekar, Sund, Quiram, & Capone, 2010).

Isoformas VEGF_{xxx}b também têm sido investigadas em diferentes contextos para reparar o desbalanço angiogênico local e serem aplicadas em possíveis terapias. No rim, as diferentes isoformas de VEGF-A regulam a barreira glomerular para filtração apropriada do sangue. Em um estudo de Alsop *et al.*, a superexpressão da isoforma pró-angiogênica murina VEGF₁₆₄, em camundongos transgênicos com expressão induzível, levou a um aumento da ultrafiltração glomerular. Contudo, a superexpressão, também condicional, da isoforma humana VEGF_{165b} restaurou as condições normais de permeabilidade (Alsop et al., 2012). Outro estudo descreve a capacidade da isoforma VEGF_{164b} de reverter o quadro inflamatório de colite ulcerosa, onde a excessiva proliferação vascular tem função relevante na inflamação (Cromer et al., 2013). Células de mamífero superexpressando VEGF_{165b} (e interferon alfa (INF- α)) foram microencapsuladas em alginato-poli-L-lisina-alginato (APA), resultando em um complexo com a habilidade de produzir esses fatores por 28 dias (Afkhami, Durocher, & Prakash, 2012). Essa habilidade, juntamente com uma liberação controlada, pode ser útil para o tratamento de doenças nas quais um ambiente antiangiogênico é desejado.

O papel de VEGFR-1/sVEGFR-1 como um regulador negativo de angiogênese já foi abordado anteriormente. De fato, Ambati e colaboradores descreveram que sVEGFR-1 é expresso no olho para que a córnea seja mantida avascularizada (Ambati et al., 2006). Seu envolvimento em patologias pelo bloqueio da ação de VEGF, como por exemplo na hipertensão, também está sob investigação. Sinais mediados por VEGF estimulam a enzima óxido nítrico sintase de células endoteliais (eNOS, *endothelial Nitric Oxide Synthase*) e levam ao aumento da

produção de óxido nítrico (NO), um vasodilatador. Além disso, VEGF é um potente fator indutor de permeabilidade vascular. Dessa forma, diminuições nos níveis de NO e de permeabilidade mediadas pelo sequestro de VEGF por sVEGFR-1, além de um desbalanço angiogênico local, podem estar envolvidas no desenvolvimento do quadro hipertenso (Belgore, Blann, Li-Saw-Hee, Beevers, & Lip, 2001; Dvorak, 2002; Ferroni et al., 2012; J. S. Gilbert, Babcock, & Granger, 2007; Hainsworth et al., 2004). Ainda, diversos grupos já reportaram que esse receptor também aparenta estar relacionado com o desenvolvimento de pré-eclâmpsia (Koga et al., 2003; Levine et al., 2004; Maynard et al., 2003).

1.4.2 Terapias pró-angiogênicas

Algumas doenças também ocorrem devido a uma arquitetura vascular insuficiente, contexto em que um ambiente pró-angiogênico controlado é desejado. É o caso de isquemia de membros, derrame isquêmico, doença arterial periférica (PAD, *Periferic Arterial Disease*) e outras. No caso de isquemia de membros, diversos estudos envolvendo a entrega das isoformas VEGF₁₆₅ e VEGF₁₂₁ através de terapia gênica já foram conduzidos. Em paralelo, investigações dos efeitos benéficos de células mononucleares da medula óssea e do sangue periférico também apontaram resultados promissores no tratamento de membros isquêmicos e de PAD, que também tem seu quadro melhorado através de terapias angiogênicas (Banfi et al., 2012; Davies, 2012; Grochot-Przeczek, Dulak, & Jozkowicz, 2013). Em um modelo murino pós-natal de dano pulmonar por hiperóxia, que causa lesões alveolares e vasculares no pulmão distal que não regridam após exposição a normóxia, Kunig *et al.* mostraram que camundongos também se beneficiaram do tratamento com rhVEGF (rh: *recombinant human*, ou recombinante humano(a)), com melhora da arquitetura pulmonar (Kunig et al., 2005).

No teste clínico VIVA (*Vascular Endothelial Growth Factor in Ischemia for Vascular Angiogenesis Trial*), randomizado, duplo-cego e com placebo, conduzido com 178 pacientes portadores de angina estável e não indicados para o tratamento de revascularização convencional, a administração intracoronariana de diferentes doses de VEGF₁₆₅ (rhVEGF₁₆₅, *recombinant human VEGF*) aparentou ser segura e bem tolerada. Ademais, pacientes tratados com a dose alta (50 ng/kg/min) tiveram melhora significativa no quadro de angina depois de 120 dias, com tendências favoráveis no teste de tolerância a exercício e diminuições na frequência de angina (Henry, 2003). Já o estudo de prova de conceito RAVE (*Regional Angiogenesis with Vascular Endothelial Growth Factor Study*), randomizado, duplo-cego e com placebo, examinou a eficácia e segurança da entrega intramuscular da isoforma VEGF₁₂₁ através de um vetor adenoviral (Ad(GV)VEGF(121.10)) em 105 pacientes com PAD. Nesse caso, contudo, não houve alteração dos parâmetros avaliados (tempo máximo de caminhada depois de 12 semanas, índice tornozelo-braquial (ITB), tempo de início de claudicação e qualidade de vida) entre o grupo controle, de dose baixa e dose alta (Rajagopalan et al., 2003).

A engenharia tecidual é uma área da medicina extremamente promissora para o tratamento de diversas doenças através da substituição de órgãos, ou suas partes, que apresentam algum nível de perda de função. Independente do órgão de interesse, os implantes utilizados como substituintes saudáveis, feitos geralmente de uma matriz biocompatível ou de um órgão descelularizado, devem servir de um arcabouço tridimensional com a estrutura necessária para permitir a formação do(s) tecido(s) em crescimento. Nesse sentido, uma característica essencial do implante é possuir uma rede de poros (de pelos menos 100 µm de diâmetro) para permitir o aporte de células, o crescimento interno do novo órgão e sua vascularização (Freyman, Yannas, Yokoo, & Gibson, 2001; Guarino, Causa, & Ambrosio, 2007). Assim, uma forma de agregar

ganho de função ao arcabouço escolhido é carregá-lo com fatores de crescimento que, entre outras funções, possam induzir o crescimento de vasos, atuando sobre os tecidos vizinhos ao sítio de implante (Mouriño & Boccaccini, 2010). Há mais de uma década diversos grupos vêm investigando os benefícios de proteínas indutoras do crescimento de vasos sanguíneos, incluindo VEGF, sobre o desenvolvimento de órgãos engenheirados (Elçin, Dixit, & Gitnick, 2001; Soker, Machado, & Atala, 2000; Tanihara, Suzuki, Yamamoto, Noguchi, & Mizushima, 2001), ressaltando também a importância da forma de biodisponibilização das biomoléculas de interesse (des Rieux et al., 2011; Lindhorst et al., 2010).

Em 2003, Gardner-Thorpe e colaboradores utilizaram um modelo murino para mostrar como concentrações de VEGF e bFGF eram reduzidas no intestino delgado engenheirado (TESI, *Tissue-Engineered Small Intestine*), ao contrário do que é encontrado no desenvolvimento do intestino nativo em ratos jovens (Gardner-Thorpe et al., 2003). Isso indicou que a suplementação do implante com fatores indutores do crescimento de vasos sanguíneos poderia acelerar crescimento e maturação, resultando num órgão funcional em um menor espaço de tempo. Alguns anos depois, Rocha *et al.* foram capazes de melhorar a rede vascular no entorno do TESI, o que também resultou em um órgão maior e mais denso do que os controles. Esses resultados foram obtidos através do encapsulamento da isoforma VEGF₁₆₅ em esferas de ácido poli(lático-co-glicólico) (PGLA, *Poly(lactide-co-glycolide acid)*), o que garantiu sua liberação constante (Rocha et al., 2008). Os efeitos benéficos de isoformas pró-angiogênicas de VEGF sobre o TESI também foram constatados por Matthews *et al.*, através de um sistema induzível de expressão ubíqua de VEGF. De forma geral, unidades organoides intestinais que superexpressam VEGF formaram intestinos que cresceram mais rapidamente e possuíram maior tamanho depois de implantadas, quando comparados com intestinos engenheirados controle. A maior funcionalidade

do TESI formado foi confirmada pela existência de vilosidades maiores e criptas mais profundas contendo os quatro tipos celulares intestinais diferenciados. Ainda, a marcação contra CD31 (PECAM-1; uma proteína de adesão expressa em células endoteliais) e Ki-67 (um marcador de proliferação celular), evidenciaram a presença de uma rede capilar melhor estabelecida e maior número de células da cripta em proliferação (J. A. Matthews, Speer, Warburton, & Grikscheit, 2009).

Um dos maiores obstáculos para o transplante de órgãos inteiros - ou agregados celulares - é a perda de células viáveis por falta de oxigênio e nutrientes nos períodos logo após o transplante (Linn et al., 2003). Ao serem submetidas a estímulo hipóxico, as ilhotas pancreáticas respondem através do aumento da expressão de VEGF_{xxx} e FGF, mas em níveis que não são suficientes para prevenir a queda do número de células endoteliais das ilhotas, que possuem notada capacidade angiogênica. Lai e colaboradores mostraram, em um modelo de ilhotas transgênicas cuja expressão de insulina é induzível por glicose, que o aumento de expressão de VEGF_{xxx} resulta na formação de ramificações vasculares. Uma vez transplantadas na cápsula renal de camundongos diabéticos, as ilhotas apresentaram aumento significativo da densidade microvascular e do fluxo sanguíneo no enxerto, bem como da taxa de animais curados (90%) quando comparado com o controle (20%) (Lai et al., 2005). Também já foi mostrado que uma queda na massa de ilhotas em animais induzidos à hipoglicemia é reduzida através da administração exógena de VEGF_{xxx}, o que não ocorre em animais normoglicêmicos. Ainda, animais hipoglicêmicos apresentam um aumento na taxa de apoptose de células endoteliais que precede o aumento de apoptose de células beta. Essas e outras considerações relevantes de como VEGF pode contribuir para o aumento da massa de células beta podem ser encontradas no trabalho de Xiao *et al.* (Xiao et al., 2013).

O reparo de lesões é um processo complexo que envolve três fases concatenadas: inflamatória, proliferativa e de remodelamento. Com a manipulação da composição de fatores proteicos presentes no nicho da lesão, é possível modificar esse processo de forma a diminuir o tempo necessário para o reparo. A etapa proliferativa, por exemplo, é dependente de angiogênese para que possa ser seguida pela fase de remodelamento e, por esse motivo, pode ser acelerada pela adição local de VEGF_{xxx} (Elçin et al., 2001; Enoch, Grey, & Harding, 2006; Grazul-Bilska et al., 2003). De fato, queratinócitos da epiderme expressam VEGF_{xxx} durante o reparo de lesões, e a inibição desse fator retarda o processo regenerativo (Brown et al., 1992; Rossiter et al., 2004). VEGF é essencial para o processo de ossificação endocondral, tendo um papel de destaque no reparo de lesões ósseas. Os estudos de Street *et al.*, em um modelo murino de fratura femoral, mostram evidências de que VEGF pró-angiogênico é essencial para a formação do calo ósseo e mineralização (Street et al., 2002). Já Wernike *et al.* usaram um modelo de janela craniana em que foram implantados discos de biomaterial cerâmico contendo rhVEGF coprecipitado. Essa abordagem garantiu a liberação constante do fator, levando à vascularização do biomaterial e formação óssea (Wernike et al., 2010).

VEGFs podem ainda promover alguns efeitos benéficos no sistema nervoso, como citoproteção de neurônios em isquemia, ação anti-inflamatória e plasticidade, além de estimular o recrutamento e proliferação de células precursoras neurais. Com isso, essas proteínas também passam a ser interessantes em contextos de isquemia cerebral, como é o caso de alguns derrames. Entretanto, uma rota e um momento de administração apropriados são cruciais para os efeitos benéficos das moléculas sobre o acidente isquêmico (Ma, Zechariah, Qu, & Hermann, 2012).

1.5 Biofármacos e seus sistemas de produção

Um biofármaco, também denominado medicamento biológico, pode ser definido como “uma substância farmacêutica, proteína ou ácido nucleico, usada para propósitos terapêuticos ou de diagnósticos *in vivo*, que é produzida por meios que não aquele da extração direta a partir de uma fonte biológica nativa (não sintética)” (Walsh, 2002). Essa proposta de definição do termo só ocorreu duas décadas depois da produção do primeiro biofármaco feito em larga escala, o hormônio peptídico insulina produzido em *E. coli*, que passou a ser comercializado pela empresa americana Eli Lilly and Company a partir de 1982 (e que está em vias de ser produzida no Brasil pela Biommm S/A, em associação com a Novo Nordisk). Atualmente, mais de 300 produtos classificados como biofármacos já foram aprovados para comercialização e centenas estão em estágios finais de testes clínicos. Apesar de somente três em cada dez produtos serem aprovados em todas as etapas da fase clínica, esses compostos biológicos compõem uma parcela crescente do mercado da indústria farmacêutica.

O *International Market Analysis Research & Consulting* (IMARC) estima que o valor em vendas mundiais de biofármacos exceda a marca de US\$ 166 bilhões em 2017, o que representa um crescimento de mais de 50% em cinco anos (Authors, 2012) e que certamente irá superar o crescimento de pequenas moléculas terapêuticas (Butler & Meneses-Acosta, 2012). Muito desse sucesso econômico dos biológicos é devido aos anticorpos, cujas vendas globais em 2011 foram estimadas em US\$ 44,6 bilhões, representando 36% do valor global total dessas moléculas, seguidos de hormônios na segunda posição, com 21% (US\$ 26,02 bi). Já fatores de crescimento ficaram em terceiro lugar, com um total de vendas (US\$ 24,78 bi) que representa 20% desse valor. As demais classes de moléculas, como citocinas, proteínas de fusão, enzimas terapêuticas,

vacinas recombinantes, fatores sanguíneos e anticoagulantes, representam parcelas menores desse mercado (Aggarwal, 2011).

Diversos sistemas de expressão já foram desenvolvidos para a produção dessas biomoléculas e muitos outros estão em constante evolução. Atualmente, são usados na indústria farmacêutica células eucarióticas, bactérias, animais transgênicos e síntese direta. Entretanto, o maior número de produtos no mercado são feitos em células de mamíferos e *E. coli*. Outros sistemas bem explorados são células de insetos (transduzidas com baculovírus) e *Picchia pastoris* e plantas (Hefferon, 2012; Walsh, 2010; Whittaker, 2013). De qualquer forma, a demanda pela produção de proteínas recombinantes a partir de células de mamíferos continua, principalmente devido a um aumento no número de aprovações dessas moléculas como biofármacos para o tratamento de doenças para as quais não existem boas opções terapêuticas. Essa demanda resultou na melhoria da eficiência de produção, bem como na qualidade dos produtos obtidos desses sistemas de expressão (Butler & Meneses-Acosta, 2012).

No contexto de células mamíferos, muitas linhagens de células murinas foram desenvolvidas, como CHO (ovário de *hamster* chinês; linhagem onde a maioria dos biofármacos foi produzida), NS0 (mieloma linfoblastoide) e BHK-21 (rim de *hamster* neonato) (Zhu, 2012). Essas células possuem uma forte maquinaria para síntese de proteínas, garantindo altas taxas de produção das proteínas de interesse. As células CHO, por exemplo, são o sistema predominante para transfecção estável, com uma alta eficiência de produção em larga escala. A produtividade específica dessas células pode chegar a mais de 50 pg/célula/dia, gerando sistemas de cultura que podem produzir acima de 5 g/L em condições ideais (Butler & Meneses-Acosta, 2012). Entretanto, uma desvantagem natural desses sistemas é o fato de possuírem uma maquinaria

celular que resulta na adição de modificações pós-traducionais daquelas presentes no perfil humano.

Dentre os diversos tipos de modificações pós-traducionais existentes, um dos mais relevantes para o contexto de biofármacos é a glicosilação. Glicoproteínas, ou glicoconjugados, possuem grupos de açúcar adicionados enzimaticamente por processos que ocorrem no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. Os resíduos de glicanos são ligados covalentemente na cadeia polipeptídica, normalmente via ligações N ou O. N-glicosilações consistem de uma cadeia de açúcar covalentemente ligada a um resíduo de asparagina (Asn), comumente envolvendo um resíduo de N-acetilglicosamina (GlcNAc) e a sequência peptídica consenso Asn-X-Ser/Thr. N-glicanos compartilham um núcleo de pentassacarídeo e podem ser divididos em três classes: tipo oligomanose (ou alta manose), tipo complexo e tipo híbrido. Por outro lado, O-glicosilações geralmente envolvem a ligação de um resíduo de N-acetilgalactosamina (GalNAc) a um grupo hidroxil de um resíduo de serina (Ser) ou treonina (Thr) e apresentam uma grande variedade de núcleos estruturais (A, Cummings, & Esko, 2009). Essas estruturas de glicanos chegam a formar complexas redes ramificadas que garantem o correto enovelamento proteico, o tempo de meia-vida e, muitas vezes, a atividade biológica das proteínas às quais são ligadas. Além disso, a variação entre animais de espécies diferentes pode resultar na geração de proteínas impróprias para o uso seguro em humanos quando produzidas em sistemas heterólogos.

Alternativamente, existe um número grande de tipos celulares disponíveis para a produção de proteínas glicosiladas que tenham modificações pós-traducionais com compatibilidade imunológica para uso em seres humanos. É o caso de células PER.C6, derivadas de células de retina embrionária humana transformada com o adenovírus E1 (Havenga et al., 2008), que possuem vantagens importantes para a produção de proteínas recombinantes.

Primeiramente, foi mostrado que elas são capazes de atingir grandes densidades em cultura em suspensão, da ordem de 10^8 células/mL, e titulações de proteínas secretadas de 8 g/L em sistema de batelada alimentada ou 25 g/L em culturas de perfusão (Kuczewski, Schirmer, Lain, & Zarbis-Papastoitsis, 2011). Além disso, por serem células humanas, o perfil de glicosilação das glicoproteínas produzidas é totalmente do tipo humano. Um exemplo dessa vantagem é o da produção de eritropoietina. Quando produzida em células PER.C6, essa proteína estava livre de ácido glicolilneuramínico (Neu5Gc), uma modificação que pode ser imunogênica, enquanto que a produção em células CHO resulta na presença de quantidades significantes desse ácido (Diaz et al., 2009).

Por serem de origem humana, as células HEK293, de rim embrionário (*Human Embryonic Kidney*), também possuem um sistema de modificação pós-traducional que garante a segurança de proteínas terapêuticas superexpressas, somado ao fato de possuírem uma robusta maquinaria de síntese proteica e altas taxas de replicação (Thomas & Smart, 2005). Essas células são amplamente usadas para a rápida produção de proteínas recombinantes e partículas virais em escala laboratorial, inclusive no modelo de cultura em suspensão na ausência de soro (Ghani et al., 2006). Sistemas baseados no crescimento de células em suspensão têm a vantagem de não apresentarem a inibição por contato e poderem crescer em altas densidades, ao contrário de culturas aderentes, que acabam tendo uma limitação no rendimento de produção. Além disso, essas células têm melhor escalabilidade e simplificam processos subsequentes e as etapas de purificação, fora o fato de apresentarem menor risco de contaminação (Arthuso, Bartolini, & Soares, 2012; Beyer et al., 2009; Link et al., 2004; Swiech et al., 2011; Tsao, Condon, Schaefer, Lio, & Liu, 2002). Entretanto, células em suspensão, especialmente no caso de células HEK293, tendem a formar agregados celulares que podem levar a alterações metabólicas e de propagação,

podendo reduzir a produção de proteínas recombinantes quando comparado com culturas aderentes (Guy, McCloskey, Lye, Mitrophanous, & Mukhopadhyay, 2013; Tsao et al., 2002). O melhoramento de sistemas mamíferos de expressão, como é o caso da linhagem HEK293, ainda está sendo explorado, visando o aumento da produção e a geração de biofármacos seguros (Butler & Meneses-Acosta, 2012; Thomas & Smart, 2005; Zhu, 2012).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Gerar clones superprodutores de células HEK293 expressando individualmente três isoformas recombinantes do fator de crescimento endotelial vascular (*VEGF-A*) humano, especificamente rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁, visando obter produtos proteicos devidamente purificados, biologicamente ativos e caracterizados quanto a suas estruturas e perfis de glicosilação.

2.2 Objetivos Específicos

- Amplificar as sequências codificadoras das isoformas rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁ do gene *VEGF-A* humano;
- Clonar as sequências (cDNAs) obtidas em um vetor de clonagem;
- Transformar bactérias *Escherichia coli* com as construções geradas e selecionar clones bacterianos positivos para a presença dos insertos no vetor;
- Verificar a integridade dos insertos presentes nos clones bacterianos positivos e gerar estoques dos clones que possuem sequências íntegras;
- Subclonar os diferentes insertos de cDNA no vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP para expressão das proteínas em células de mamíferos e selecionar os clones bacterianos que possuem construções com insertos subclonados na orientação correta;

- Cotransfectar células da linhagem HEK293 independentemente com cada uma das construções do vetor pLV-eGFP geradas (pLV-rhVEGF₁₆₅, ou pLV-rhVEGF_{165b}, ou pLV-rhVEGF₁₂₁), ou o vetor pLV-eGFP sem inserto (utilizado como controle) em conjunto com o vetor plasmidial pTK-Hyg de resistência ao antibiótico higromicina B;
- Selecionar as culturas de células HEK293 cotransfectadas através de sua resistência ao antibiótico higromicina B;
- Isolar clones celulares resistentes a higromicina B e positivos para o gene repórter *eGFP*;
- Analisar a superexpressão das isoformas recombinantes nos clones celulares isolados;
- Selecionar os clones celulares que indicam maiores níveis de expressão e verificar a cinética de expressão dos mesmos nos meios condicionados das culturas celulares mantidas na ausência de soro fetal bovino;
- Adaptar os clones celulares à cultura em suspensão estática e avaliar a capacidade de superexpressão das isoformas;
- Purificar as isoformas recombinantes superexpressas;
- Detectar os níveis de expressão das proteínas recombinantes;
- Testar a atividade biológica das isoformas de *VEGF-A*;
- Avaliar a contribuição das isoformas para o desenvolvimento do intestino delgado engenheirado.

- Caracterizar as isoformas através de ensaios de espectrometria de massas, dicroísmo circular, eletroforese capilar e digestão por endoglicosidases e HPLC.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Extração de RNA e síntese de cDNA

Nosso grupo estabeleceu um banco de cDNAs a partir de amostras de RNA total isoladas de culturas de células humanas (Carreira *et al.*, em preparação) e de um painel comercial de RNA total de tecidos humanos (Human Total RNA Master Panel II, Clontech Laboratories Inc., Takara Bio Company, Mountain View, CA, EUA). A qualidade das amostras de cDNAs foi testada através da amplificação de fragmentos dos genes *p53*, *NOTCH2* e *GAPDH*, assim como para ausência de DNA genômico através da amplificação de um fragmento do gene *MHL1*, como já descrito anteriormente (Sogayar *et al.*, 2004).

Para a extração de RNA total a partir de culturas aderentes de células, utilizou-se colunas de sílica disponibilizadas comercialmente através do RNeasy Mini Kit seguindo-se as orientações do fabricante (QIAGEN, Hilden, Alemanha). A concentração de RNA em cada preparação foi determinada através de quantificação em nanoespectrofotômetro (ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop Technologies Inc., Wilmington, EUA) e com leitura de absorbância a 260 nm. O grau de pureza do RNA total foi estimado pela relação Abs_{260}/Abs_{280} (contaminação por proteínas) e Abs_{260}/Abs_{230} (contaminação por compostos orgânicos), admitindo-se, respectivamente, os valores de aproximadamente 2,0 e entre 1,8 e 2,2, respectivamente, como ideais.

Uma vez consideradas satisfatoriamente puras, as amostras de RNA foram submetidas a reações de transcrição reversa. Para tal, uma alíquota de 0,5 µg de cada RNA total foi incubada por 10 min a 37 °C com 2,0 µL de DNase I (1 U/µL, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, EUA), em solução contendo 2,0 µL de tampão 5x de síntese de primeira fita para a enzima SuperScriptTM III RT (Life TechnologiesTM, Carlsbad, EUA) e 0,5 µL de RNase OUTTM (40

U/ μ L, Life TechnologiesTM) em volume final de 10,0 μ L. Posteriormente, esta enzima foi inativada por aquecimento a 75 °C por 10 min. A cada amostra de RNA previamente tratado, foram adicionados 0,5 μ L de Oligo dT (0,5 μ g/ μ L, Life TechnologiesTM), 0,5 μ L de *Random Primer* dT (0,1 μ g/ μ L, Life TechnologiesTM), 1,0 μ L de dNTP (10 mM, Life TechnologiesTM) e 1,0 μ L de água deionizada (Milli Q), obtendo-se um volume final de reação de 13,0 μ L. Em seguida, as amostras foram incubadas a 65 °C por 10 min para desnaturação das moléculas e imediatamente colocadas no gelo. Então, foram adicionados 7,0 μ L de uma solução contendo 4,0 μ L de tampão 5x de síntese de primeira fita para a enzima SuperScriptTM III RT (Life TechnologiesTM), 1,0 μ L de ditioneitol (DTT 0,1 M, Life Technologies), 0,5 μ L de RNase OUTTM (40 U/ μ L, Life TechnologiesTM), 1,0 μ L da enzima SuperScriptTM III RT (200 U/ μ L, Life TechnologiesTM) e 0,5 μ L de água deionizada, para um volume final de reação de 20,0 μ L. As amostras foram incubadas a 25 °C por 10 min para pareamento dos *primers* e, posteriormente, a 50 °C por 2 h, para síntese dos cDNAs. Em seguida, a enzima transcriptase reversa foi inativada por meio da incubação das amostras a 72 °C por 15 min. Para a degradação das moléculas de RNA molde, adicionou-se 1,0 μ L de RNase H (5 U/ μ L, Thermo Fisher Scientific Inc.). As amostras foram incubadas a 37° C por 30 min e, posteriormente, a 72 °C por 10 min para inativação da enzima. Em seguida as amostras foram diluídas 3 vezes em água deionizada, obtendo-se um volume final de 60 μ L, aliquotadas em 3 volumes de 20,0 μ L e estocadas a – 20 °C.

3.2 Desenho dos *primers* (oligonucleotídeos iniciadores)

Os *primers* utilizados para amplificação das sequências de cDNA foram desenhados baseando-se nas sequências codificadoras completas de cada uma das três isoformas constantes

na base de dados de nucleotídeos do NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore>; National Center for Biotechnology Information, U. S. NLM - U. S. National Library of Medicine, Bethesda, EUA). Não se fez uso de um programa computacional para o desenho dos oligonucleotídeos. Todos os *primers* foram sintetizados pela empresa Life TechnologiesTM. Os *primers* liofilizados foram reconstituídos em solução tampão 10 mM Tris-Cl (pH 8,0) para gerar uma solução estoque a 100 µM e soluções de uso a 10 µM.

3.3 Amplificação e isolamento das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁

O cDNA total de tecidos pulmonar e renal humanos foi utilizado para a amplificação das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁. As sequências dos *primers* utilizados na amplificação dessas isoformas estão discriminadas na Tabela 3.1 abaixo, assim como a temperatura de desnaturação estimada pelo programa Tm Calculator (Life TechnologiesTM).

Tabela 3.1. Sequências dos *primers* para amplificação das sequências codificadoras de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁.

Oligonucleotídeo	Sequência (5'-3')	Tm (°C)
VEGF-A-mut-F	GAATTC <u>CGCCACCATG</u> AACTTTCTGCTGTCTTGGG	77,32
VEGF-A-mut-R	GCGGCCGCTC ACCGCCTCGGCTT	81,04

Negrito: sítios de restrição para as enzimas *EcoRI* (*primer forward*) e *NotI* (*primer reverse*); Sublinhado: sequência consenso de Kozak.

Para a amplificação, utilizou-se a enzima PhusionTM Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Fisher Scientific Inc.), seguindo-se as orientações do fabricante. A 2,0 µL

de amostras de cDNA foram adicionados 10,0 µL de tampão 5x Phusion GC (Thermo Fisher Scientific Inc.), 1,0 µL de dNTP (10 mM, Life Technologies™), 2,5 µL de dimetil sulfoxido (5% DMSO, Thermo Fisher Scientific Inc.), 2,5 µL do *primer* VEGF-A-mut-F (10 µM, Life Technologies™), 2,5 µL do *primer* VEGF-A-mut-R (10µM, Life Technologies™), 0,5 µL de enzima DNA polimerase (informações descritas acima) e 29,0 µL de água deionizada para completar 50,0 µL de volume de reação. As seguintes condições foram utilizadas na reação em cadeia da polimerase (PCR): 98 °C por 2 min (desnaturação inicial); 40 ciclos de 92 °C por 10 seg (desnaturação) e 72 °C por 1 minuto e 15 seg (pareamento e extensão); 72 °C por 5 min (extensão final).

Os *amplicons* foram detectados através de geis de agarose 0,8%. Para isso, 0,96 g de agarose (Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Suíça) em tampão 1x TAE (40 mM Tris (USB®, Affymetrix®, Santa Clara, EUA), 20 mM ácido acético glacial (Merck KgaA, Darmstadt, Alemanha), 1 mM EDTA (pH 8,0, GE Healthcare, Little Chalfont, Reino Unido)) e a solução foi aquecida para solubilização da agarose. Depois de brevemente resfriada, adicionou-se solução a 10 mg/mL de brometo de etídeo. Foi usado o marcador de tamanho molecular GeneRuler™ 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). Após aplicação das amostras, os geis foram submetidos a uma diferença de potencial de 90 V em tampão de corrida 1x TAE em cuba eletroforética horizontal Midigel 2 (APELEX, Massy, França). Para verificar a presença de bandas nos geis, os mesmos foram expostos à luz ultravioleta em um aparelho fotodocumentador MiniBIS Pro (DNR Bio-Imaging Systems, Jerusalém, Israel). Bandas de tamanho correto foram removidas dos geis com bisturis descartáveis e o DNA nelas presente foi isolado utilizando-se o QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN), seguindo-se as orientações do fabricante. A concentração de DNA em cada amostra foi determinada por leitura em nanoespectrofotômetro a

260 nm. A partir deste momento os procedimentos foram feitos de forma independente para cada uma das isoformas.

3.4 Clonagem das sequências codificadoras de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁ no vetor comercial pGEM[®] T-Easy

O vetor pGEM[®]-T Easy (Promega Corporation, Madison, EUA) foi o vetor de clonagem escolhido para a estratégia de clonagem. Trata-se de um vetor fornecido na forma linearizada, contendo: uma timidina 3'-terminal em cada uma das extremidades pra aumento da eficiência de ligação de insertos; um sítio múltiplo de clonagem (MCS, do inglês *Multiple Cloning Site*) com 19 sítios de restrição (15 diferentes sítios no total); cassete de resistência ao antibiótico ampicilina; e uma região codificadora da enzima β -galactosidase que contém o MCS e, dessa forma, permite a triagem de colônias pelo método azul/branco (coloração diferencial azul (vetor sem inserto)/branca (construção)) (Figura 3.1).

Figura 3.1. Mapa do vetor pGEM®-T Easy.

O mapa indica os elementos do MCS, as timidinas 3'-terminais, a localização da região codificadora da enzima β -galactosidases (*lac Z*) que engloba o MCS, o cassete que confere resistência ao antibiótico ampicilina (Amp^r), a origem de replicação (*f1 ori*) e 3 outros sítios de restrição fora do MCS. O vetor possui 3.015 pares de base (pb). (Extraído de: Technical Manual. pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector Systems. Promega Corporation).

Inicialmente, os insertos foram poliadenilados para otimizar a eficiência de ligação no vetor de clonagem. Para isso, 233,7 μ g do inserto de rhVEGF₁₆₅ e 250 μ g do inserto de rhVEGF₁₂₁ foram tratados com 0,4 μ L de dATP (10 mM, Themor Fisher Scientific Inc.), 0,8 μ L de MgCl₂ (50 mM, Meridian Life Science® Company, Londres, Reino Unido), 2,0 μ L de tampão de reação 10x com NH₄ (Meridian Life Science® Company), 2,0 μ L de enzima DNA polimerase (5 U/ μ L, Meridian Life Science® Company) e volume de água deionizada para completar 20,0 μ L de volume de reação. As reações foram incubadas a 72 °C por 30 min.

Em seguida os insertos poliadenilados foram clonados/ligados no vetor comercial. Para a reação de ligação, foram utilizados 4,0 μ L de cada inserto poliadenilado, 6,0 μ L de tampão de reação de ligação 2x (Promega Corporation), 1,0 μ L de solução contendo o vetor pGEM®-T Easy

(50 ng/ μ L, Promega Corporation) e 1,0 μ L de enzima T4 DNA ligase (Promega Corporation). A reação se deu a 4 °C por 16 h. A partir deste momento as construções geradas serão denominadas pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁.

3.5 Transformação de bactérias *Escherichia coli* (cepa XL-1 Blue) com as construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁

O volume total de cada reação de ligação foi aplicado sobre uma membrana de celulose com porosidade de 0,025 μ m (EMD Millipore Corporation) e as amostras foram dialisadas contra água deionizada por 4 h para diluição da concentração de sais. O volume final obtido foi de aproximadamente 50,0 μ L.

Bactérias da espécie *Escherichia coli*, cepa XL-1 Blue (genótipo: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F' proAB lacIqZ Δ M15 Tn10 (Tetr)], Agilent Technologies, Santa Clara, EUA) foram escolhidas para o procedimento de transformação. Para tal, 15,0 μ L de cada uma das amostras dialisadas foram adicionados a 40,0 μ L de suspensão bacteriana em solução de glicerol 10% de baixa força iônica. O método de transformação escolhido foi eletroporação por pulso elétrico curto de alto voltagem. As misturas foram, então, adicionadas a cubetas para eletroporação de bactérias com espaço de 0,1 cm (Gene Pulser[®] Cuvetter E. coli Pulser[®] Cuvette, Bio-Rad Laboratories, Hercules, EUA) e submetidas a 1,8 kV de diferença de potencial, utilizando-se um eletroporador Gene Pulser Xcell[™] (Bio-Rad). Imediatamente após o eletrochoque as bactérias foram incubadas em meio de cultura S.O.C. (Life Technologies[™]) a 37 °C por 1 hora. Em seguida, as suspensões de bactérias transformadas foram plaqueadas sobre solução em gel de meio lisogênico LB (Luria-Bertani/*Lysogeny Broth*; Becton, Dickinson and

Company, Franklin Lakes, EUA) e ágar (Select Agar[®], Life Technologies[™]). As placas de 150 mm de diâmetro (P150) contendo o meio LB-ágar foram previamente plaqueadas com soluções de isopropil β -D-1-tiogalactopiranosídeo (IPTG, 0,5 mM Thermo Fisher Scientific, Inc.) e 5-bromo-4-cloro-indolil- β -D-galactopiranosídeo (X-gal, 80 μ g/mL, Life Technologies[™]), permitindo selecionar colônias de bactérias contendo as construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ (colônias brancas) ou somente o vetor pGEM[®]-T Easy (colônias azuis). Depois de plaqueadas, as bactérias foram incubadas a 37°C por 16 h.

3.6 Confirmação de incorporação das construções através de PCR de colônias

As colônias de bactérias de coloração branca (supostamente recombinantes) foram isoladas, inoculadas em meio lisogênico LB (Becton, Dickinson and Company) e incubadas a 37 ° por 16 h. Para verificar as construções que de fato possuíam os insertos de tamanho predito, as suspensões bacterianas referentes a cada colônia isolada foram submetidas a PCR de colônias com *primers* que pareiam no vetor pGEM[®]-T Easy (sequências e temperaturas estimadas de desnaturação na Tabela 3.2).

Tabela 3.2. Sequências dos *primers* que pareiam no vetor pGEM[®]-T Easy.

Oligonucleotídeo	Sequência (5'-3')	Tm (°C)
pGEM [®] -F	CCAGGGTTTTCAGTCAGGAC	65,14
pGEM [®] -R	TTTCACACAGGAAACAGCTATGAC	59,50

Para esta reação foram aliquotados 0,5 µL de dNTP (10 mM, Themor Fisher Scientific Inc.), 1,0 µL de MgCl₂ (50 mM, Meridian Life Science[®] Company), 2,5 µL de tampão de reação 10x com NH₄ (Meridian Life Science[®] Company), 1,0 µL do *primer* pGEM[®]-F (10 µM, Life Technologies[™]), 1,0 µL do *primer* pGEM[®]-R (10 µM, Life Technologies[™]), 2,0 µL de enzima DNA polimerase (5 U/µL, Meridian Life Science[®] Company), 0,4 µL de suspensões bacterianas e volume de água deionizada para completar 25,0 µL de volume de reação. As seguintes condições foram utilizadas na reação: 95 °C por 2 min (desnaturação inicial); 40 ciclos de 95 °C por 45 seg (desnaturação), 55 °C por 45 seg (pareamento) e 72 °C por 30 seg (extensão); 72 °C por 5 min (extensão final).

Os *amplicons* foram detectados através de geis de agarose 1,0%, análogo ao que já foi descrito anteriormente (tópico 3.3). Para verificar a presença de bandas nos geis, os mesmos foram expostos à luz ultravioleta em um aparelho fotodocumentador MiniBIS Pro (DNR Bio-Imaging Systems). Pela análise do tamanho predito das bandas foi possível selecionar clones bacterianos para serem submetidos a sequenciamento.

3.7 Sequenciamento de DNA das sequências codificadoras nas construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ pelo método de terminação de cadeia (Sanger)

Quatro clones bacterianos transformados com a construção pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e três com a construção pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ foram selecionados para serem submetidos a sequenciamento de DNA pelo método de terminação de cadeia, ou método de Sanger. Neste método, uma PCR é montada de forma a conter 2,3-dideoxirribonucleotídeos trifosfatados

(ddNTPs) acoplados a fluoróforos (um fluoróforo distinto marca cada um dos quatro ddNTPs: ddATP, ddTTP, ddCTP e ddGTP) além de 2-desoxirribonucleotídeos (dNTPs) não fluorescentes. Os ddNTPs promovem o bloqueio da amplificação das cadeias em extensão pela ausência de um grupo hidroxila (-OH) ligado ao carbono 3' do anel da ribose, gerando cadeias polinucleotídicas de tamanhos variáveis. Uma vez terminada a reação, as amostras são submetidas a eletroforese capilar e a determinação da sequência se dá pela detecção do comprimento de onda específico para cada fluoróforo em um sequenciador.

As reações de sequenciamento foram montadas independentemente para cada uma das amostras da PCR, cada uma correspondente a um clone bacteriano distinto. Assim, em uma microplaca para PCR de 96 poços (PCR[®] Microplate, Axygen Scientific Inc., Union City, EUA), 3,0 µL de reação de PCR de colônias foram adicionados a 4,0 µL de tampão 5x de sequenciamento (BigDye Terminator v3.1 Sequencing Buffer, Life TechnologiesTM), 0,5 µL do *primer* pGEM[®]-F ou pGEM[®]-R (10 µM, Life TechnologiesTM), 2,0 µL de Big Dye Mix (Life TechnologiesTM) e volume de água deionizada para completar 20,0 µL de volume de reação. As seguintes condições foram utilizadas: 40 ciclos de 96 °C por 10 seg (desnaturação), 53 °C por 20 seg (pareamento) e 60 °C por 4 min (extensão). Para cada amostra, as reações foram feitas em triplicata com cada *primer* independentemente (três reações com o *primer forward* e três reações com o *primer reverse*). Depois da termociclagem, todas as amostras foram submetidas a precipitação. Foram adicionados, em cada poço, 20,0 µL de água deionizada seguidos de 60,0 µL de isopropanol (Merck KGaA). As amostras foram homogeneizadas por *vortexing* e centrifugadas a 700 × g. A placa foi então protegida da luz, incubada a temperatura ambiente por 15 min e centrifugada a 3.000 × g a 20 °C por 30 min. O sobrenadante foi descartado por inversão da placa e centrifugação até 700 × g. 150 µL de solução 70% isopropanol foram adicionados por

poço, seguido de centrifugação a $3.000 \times g$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 30 min e novamente inversão e centrifugação até $700 \times g$. A placa foi então incubada a $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 10 min para que todo o isopropanol evaporasse. Uma vez precipitadas, as amostras foram submetidas a eletroforese capilar em um aparelho Abi Prism 3700 DNA Analyzer (Life TechnologiesTM). Através dos cromatogramas originados foram gerados segmentos de DNA sobrepostos (*contigs*) pela ferramenta Phrap, seguido da análise de qualidade pelo programa Phred.

3.8 Confirmação das sequências geradas através da ferramenta BLAST[®] e estocagem dos clones bacterianos positivos

Uma vez geradas, as sequências foram alinhadas contra sequências previamente depositadas em bancos de dados através da ferramenta BLAST[®] (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>; Basic Local Alignment Search Tool[®], NCBI, U. S. NLM). Primeiramente se fez uso do programa *nucleotide blast* (ou *blastn*), para nucleotídeos, e somente as sequências que apresentaram 100% de identidade e 0% de lacunas quando comparadas com as sequências codificadoras depositadas para VEGF₁₆₅ e VEGF₁₂₁ foram selecionadas. As sequências nucleotídicas corretas foram então traduzidas *in silico* através da ferramenta *Translate tool* do portal de recurso de bioinformática ExPASy (<http://www.expasy.org/>; Expert Protein Analysis System, Swiss Institute of Bioinformatics) e as sequências peptídicas foram agora alinhadas através do programa *protein blast*, para sequências proteicas. Novamente, somente as sequências que mostraram 100% de identidade e 0% de lacunas foram consideradas para experimentos futuros. Os clones bacterianos contendo as sequências corretas foram expandidos em meio lisogênico LB e estocados a $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ em meio de

congelamento composto de ½ volume de solução de glicerol 30% em água (v/v) e ½ volume de meio lisogênico LB (Becton, Dickinson and Company). Os clones bacterianos contendo construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ dotadas de insertos de sequências corretas foram inoculados em meio lisogênico LB (Becton, Dickinson and Company) a 37 ° C por 16 h sob agitação orbital a 300 rotações por minuto (rpm). Para isolamento de DNA plasmidial, utilizou-se o GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Fisher Scientific Inc.), seguindo-se as orientações do fabricante. A concentração das amostras foi determinada por quantificação em nanoespectrofotômetro (ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop Technologies Inc.) e leitura a 260 nm.

3.9 Geração da sequência codificadora da isoforma rhVEGF₁₆₅b através de mutação sítio-dirigida de rhVEGF₁₆₅

A amplificação da sequência codificadora correta da isoforma rhVEGF₁₆₅b foi alcançada somente depois de três tentativas.

Primeiramente procedeu-se da mesma forma que feito para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁, buscando a amplificação a partir das amostras cDNA total de rim e pulmão. Contudo, resultados do sequenciamento evidenciaram que a sequência amplificada não correspondia a rhVEGF₁₆₅b, mas sim rhVEGF₁₆₅.

Assim, numa segunda tentativa, utilizou-se cDNA total de ARPE-19 (*Arising Retinal Pigment Epithelial*), uma linhagem celular de epitélio pigmentar de retina. As células da linhagem ARPE-19 foram cultivadas em aderência e em meio de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium, Life TechnologiesTM) suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB –

Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil). As culturas foram mantidas até atingirem > 85% de confluência, sendo então lavadas com PBSA (*Phosphate Buffered Saline Absent*, solução salina tamponada com fosfato – sem $MgCl_2$ ou $CaCl_2$; PBSA foi uma denominação feita pelo nosso grupo para designar a solução PBS que não possui os cátions divalentes Mg^{2+} ou Ca^{2+}), isoladas com a ajuda de um rodo raspador e tiveram seu RNA total isolado com uso do RNeasy Mini Kit, seguindo-se as orientações do fabricante (QIAGEN). A qualidade do RNA obtido foi avaliada, a síntese de cDNA foi realizada como descrito anteriormente (tópico 3.1) e este foi utilizado na reação de PCR para amplificação. O *amplicon* obtido foi clonado no vetor pGEM[®]-T Easy e, assim como na primeira tentativa, os resultados do sequenciamento indicaram que a isoforma rhVEGF₁₆₅ havia sido amplificada.

O *amplicon* correto foi finalmente obtido através de mutação sítio-dirigida da porção 3' da fita antisenso da sequência de rhVEGF₁₆₅, a qual difere da isoforma antiangiogênica. Os *primers* utilizados para esta etapa estão descritos na Tabela 3.3.

Tabela 3.3. Sequências dos *primers* para geração da sequência codificadora de rhVEGF₁₆₅b.

Oligonucleotídeo	Sequência (5'-3')	Tm (°C)
VEGF-A-mut-F	GAATTC <u>CGCCACCATGA</u> ACTTTCTGCTGTCTTGGG	77,32
VEGF ₁₆₅ b-FI	AAACGAACGTACTTGCAGATCTCTCACCAGGAAAGACTGA	76,40
VEGF ₁₆₅ b-RI	TCAGTCTTTCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTC	77,13
VEGF ₁₆₅ b-RII	TTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTTCGTTT	72,92
VEGF ₁₆₅ b-mut-R	GCGGCCGCTCAGTCTTTCTG GTGAGAGATC	78,18

Negrito: sítios de restrição para as enzimas *EcoRI* (*primer forward*) e *NotI* (*primer reverse*); Sublinhado: sequência consenso de Kozak.

Foram realizadas três reações em cadeia da polimerase, denominadas PCR I, PCR II e PCR III (Sarkar & Sommer, 1990). A sequência codificadora rhVEGF₁₆₅, previamente clonada no

vetor pGEM[®]-T Easy, foi usada como molde para a PCR I, juntamente com o par de *primers* VEGF₁₆₅b-FI e VEGF₁₆₅b-RI. O *primer* VEGF₁₆₅b-FI possui em sua porção 3'-terminal uma pequena região complementar à porção da sequência de VEGF₁₆₅ que é comum a VEGF₁₆₅b, e uma região maior (5'-terminal) exclusiva à isoforma VEGF₁₆₅b. Por sua vez, o segundo *primer*, VEGF₁₆₅b-RI, é inteiramente complementar ao primeiro e ainda estende-se cinco bases na região comum às duas isoformas. Dessa forma, essa reação gerou como *amplicon* (*Amplicon* 1) um fragmento contendo uma pequena porção comum às isoformas VEGF₁₆₅ e VEGF₁₆₅b e uma porção maior exclusiva à isoforma VEGF₁₆₅b.

Em uma segunda reação (PCR II), e também tendo pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ como molde, os *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF₁₆₅b-RII permitiram a amplificação da região comum à sequência codificadora de ambas as isoformas (*Amplicon* 2). Finalmente, na PCR III foram utilizados os *amplicons* 1 e 2 como moldes, formando dois heteroduplex, sendo que somente um possuía extremidades 3'-OH livres que permitiam a amplificação da cadeia. Juntamente com o par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF₁₆₅b-mut-R, o resultado da terceira reação em cadeia foi a sequência codificadora completa para rhVEGF₁₆₅b (*Amplicon* 3). A Figura 3.2 apresenta um esquema da estratégia utilizada.

Figura 3.2. Estratégia para amplificação da isoforma rhVEGF_{165b}.

O processo de obtenção da sequência codificadora da isoforma rhVEGF_{165b} se deu em três etapas de PCR (PCR I, II, III). Primeiramente gerou-se a porção exclusiva a VEGF_{165b} por mutação sítio-dirigida de rhVEGF₁₆₅. Na segunda reação foi amplificada a sequência comum às isoformas VEGF₁₆₅ e VEGF_{165b}. Em ambas as reações, rhVEGF₁₆₅ foi usado como molde. Na terceira reação, os *amplicons* obtidos nas PCR I e PCR II foram usados como molde e resultaram na sequência codificadora completa de rhVEGF_{165b}. *Primers*: FI: VEGF_{165b}-FI, RI: VEGF_{165b}-RI, FII: VEGF-A-mut-F, RII: VEGF_{165b}-RII, RIII: VEGF_{165b}-mut-R.

A sequência de rhVEGF₁₆₅b foi clonada no vetor pGEM[®]-T Easy, gerando a construção pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅b. Clones bacterianos foram transformados com a construção e quanto à presença do inserto. Clones positivos foram submetidos a sequenciamento de DNA pelo método de Sanger. O clone bacteriano contendo a construção com sequência confirmada por comparação com bancos de dados foi expandido e estocado a -80 °C.

3.10 Subclonagem das sequências rhVEGF₁₆₅, rhVEGF₁₆₅b e rhVEGF₁₂₁ do vetor pGEM[®]-T Easy no vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP, transformação de bactérias *Escherichia coli* e triagem dos clones bacterianos

Após confirmação das sequências, 1 µg das construções do vetor pGEM[®]-T Easy foi digerido com as enzimas de restrição *Eco*RI e *Not*I (Thermo Fisher Scientific Inc.) a 37 °C por 2 h, e inativação da enzima a 65 °C por 20 min. Em seguida, as extremidades 5' e 3' coesivas foram tornadas cegas por ação do fragmento Klenow, fragmento grande da DNA Polimerase I dotado de atividade polimerase 5'–3' e exonuclease 3'–5' (Thermo Fisher Scientific Inc.) Para tanto, adicionou-se fragmento Klenow (10 U) às reações de digestão, seguido de incubação por 30 min a 37 °C e inativação por 10 min a 75 °C. As amostras foram então submetidas a eletroforese em gel de agarose, as bandas correspondentes a cada isoforma foram isoladas do gel e o DNA foi purificado como já descrito (tópico 3.3). As sequências codificadoras foram subclonadas em um vetor plasmidial de transferência lentiviral, p156RRLsinPPTCMVIns3IRESPRE, que possui a sequência codificadora da proteína fluorescente verde de *Aequorea victoria* melhorada (eGFP, do inglês *enhanced Green Fluorescent Protein*) como gene repórter (Dull et al., 1998). Este vetor foi

modificado em nosso grupo, sendo que a região codificadora da *Ins3* de rato foi deletada, sendo introduzida em seu lugar uma sequência de múltipla clonagem. Esse vetor passou, então, a ser denominado pLV-eGFP. Para isso, o vetor foi previamente linearizado por ação da enzima *EcoRV*, gerando extremidades 5' e 3' cegas. Utilizou-se a razão molar inserto:vetor de 3:1 ($MI = 3 \times MV \times TI/TV$, onde MI = massa inserto, MV = massa vetor, TI = tamanho inserto e TV = tamanho vetor), onde as massas de inserto variaram de aproximadamente 12,5 a 50 ng. À mistura inserto-vetor, foram adicionados tampão 10x T4 DNA Ligase Buffer (New England Biolabs® Inc., Ipswich, MA, EUA), 400 U T4 DNA Ligase (New England Biolabs® Inc.) e água deionizada suficiente para completar 20 µL. A reação se deu a 16 °C por 16 h. A partir daqui, esse vetor será denominado pLV-eGFP e as construções serão denominadas de acordo com as sequências codificadoras que possuem, quais sejam: pLV-rhVEGF₁₆₅, pLV-rhVEGF_{165b} e pLV-rhVEGF₁₂₁. Em seguida, os mesmos passos descritos anteriormente no item 3.5 foram realizados para a transformação de bactérias *Escherichia coli*, cepa XL-1 Blue. Depois da incubação por 1 hora a 37 °C das suspensões bacterianas eletroporadas, as mesmas foram plaqueadas sobre solução em gel de meio lisogênico LB e ágar. Em seguida foi feita a triagem para detecção da orientação correta dos insertos nas construções obtidas, necessária graças às reações de ligação terem ocorrido entre fragmentos que apresentavam extremidades cegas, que se deu por diagnóstico de restrição das construções com as enzimas *XbaI* e *EcoNI* (Thermo Fisher Scientific Inc.). Primeiramente, as sequências codificadoras dos insertos foram clivadas *in silico* pelo programa NEBcutter V2.0 (New England Biolabs® Inc.), permitindo determinar as enzimas de restrição capazes de clivar as sequências, bem como o sítio de clivagem e o número de clivagens que cada enzima catalisaria. A escolha das enzimas seguiu os seguintes critérios:

- para a enzima utilizada na clivagem do inserto, capacidade de clivar a sequência de DNA em uma região fora do centro e das extremidades da mesma;
- para a enzima utilizada na clivagem do vetor, capacidade de clivar a sequência de DNA em uma única região, próxima ao sítio de ligação dos insertos.

Dessa forma, para um mesmo inserto, o padrão de bandas gerado por fracionamento em gel de agarose das construções digeridas seria diferente caso a inserção tivesse ocorrido no sentido correto (+) e no incorreto (-).

Assim, 1 µg das construções do vetor pLV-eGFP foram digeridas com as enzimas de restrição a 37 °C por 2 h, e inativação da enzima a 65 °C por 20 min. As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de agarose para fracionamento e, uma vez identificados, os bacterianos contendo construções com insertos na orientação correta foram estocados a – 80 °C em meio de congelamento como já descrito (tópico 3.8). Para obtenção de uma massa suficiente de cada construção para experimentos futuros, foram feitos isolamentos de DNA plasmidial em média escala utilizando-se o QIAGEN Plasmid Midi Kit (QIAGEN), seguindo-se as orientações do fabricante. A concentração das amostras foi determinada por quantificação em nanoespectrofotômetro (ND-1000 Spectrophotometer, NanoDrop Technologies Inc.) e leitura a 260 nm.

3.11 Linhagens celulares

Células da linhagem HEK293, de rim embrionário humano, foram adquiridas da empresa *American Type Culture Collection* (ATCCTM – Número ATCC[®]: CRL-1573TM) e cultivadas em meio DMEM (Life TechnologiesTM) suplementado com 10 % (v/v) SFB (Vitrocell Embriolife) e

1 mM piruvato de sódio (Life TechnologiesTM), em cultura aderente. As células foram sempre incubadas em atmosfera úmida a 37 °C e 2% CO₂ / 98% ar. O estoque de células foi mantido pelo congelamento em meio de cultura suplementado com 10% DMSO (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA) e armazenamento em ultrafreezer a – 80 °C.

3.12 Meios de cultura, soluções e condições de cultivo de células

HEK293 em aderência e suspensão

3.12.1 Cultura em aderência

3.12.1.1 Meio de cultura:

DMEM (Life TechnologiesTM): suplementado com 10 % (v/v) SFB (Thermo Fisher Scientific Inc.) e 1 mM piruvato de sódio (Life TechnologiesTM), para células em cultura aderente. Antibióticos adicionados: 25 mg/mL ampicilina (Sigma-Aldrich Co.) e 100 mg/mL estreptomicina (Sigma-Aldrich Co.)

3.12.1.2 Soluções:

Solução salina: PBSA (*Phosphate Buffered Saline Absent* – sem cálcio ou magnésio), solução salina tamponada (pH 7,2), composta por NaCl 140 mM, KCl 2,7 mM, Na₂HPO₄ 8 mM e KH₂PO₄ 1,5 mM.

Tripsina: solução 0,1% de tripsina (Life TechnologiesTM) em PBSA contendo 1 mM EDTA (pH 8,0).

3.12.1.3 Condições de cultivo

As células foram mantidas em frascos T ou placas tratados, próprias para o cultivo de células em aderência (Thermo Fisher Scientific Inc.; Becton, Dickinson and Company; Corning Inc., Corning, EUA; ou TPP Techno Plastic Products, Trasadingen, Suíça), incubadas em atmosfera úmida a 37 °C e 2% CO₂ / 98% ar. O meio de cultura foi trocado a cada dois dias. Ao atingirem confluência maior ou igual a 85%, as células foram subcultivadas, sendo lavadas com solução salina PBSA, seguida de adição de solução de 0,1% tripsina e inativação da mesma com meio de cultivo contendo SFB.

3.12.2 Cultura em suspensão

3.12.2.1 Meios de cultura:

DMEM (Life TechnologiesTM): suplementado com 10 % (v/v) SFB (Thermo Fisher Scientific Inc.) e 1 mM piruvato de sódio (Life TechnologiesTM), para células em cultura aderente. Antibióticos adicionados: 25 mg/mL ampicilina (Sigma-Aldrich Co.) e 100 mg/mL estreptomicina (Sigma-Aldrich Co.). Este meio foi utilizado somente no processo de adaptação sequencial dos clones celulares em suspensão.

HyQ[®]SFM4HEK293TM (Thermo Fisher Scientific Inc.): meio livre de componentes derivados de animais, utilizado para adaptação das células à cultura em suspensão (estática e dinâmica).

3.12.2.2 Soluções:

Anti-Clumping Agent (Life TechnologiesTM): solução quimicamente definida, livre de componentes derivados de animais que evita a formação de agregados (*clumps*) celulares.

3.12.2.3 Condições de cultivo:

As células foram adaptadas à cultura em suspensão e mantidas em garrafas não tratadas, próprias para o cultivo de células em suspensão estática, incubadas a 37 °C e 2% CO₂ / 98% ar em atmosfera úmida. Dois processos de adaptação à cultura em suspensão foram adotados: direto e sequencial. Na adaptação direta, as células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspensas em meio HyQ[®]SFM4HEK293TM, e transferidas para as garrafas para cultura em suspensão contendo 100% de meio HyQ[®]SFM4HEK293TM. Já na adaptação sequencial, as células foram passadas para garrafas contendo 50% de meio HyQ[®]SFM4HEK293TM e 50% do meio DMEM condicionado por elas. O subcultivo se deu através de trocas subsequentes de 50% do meio de cultura (50% de meio condicionado + 50% de meio HyQ[®]SFM4HEK293TM fresco), tanto para o processo direto quanto para o indireto. As células foram consideradas adaptadas quando o SFB foi diminuído abaixo de 0,006% (após 14 passagens).

Nas culturas em suspensão dos clones celulares superprodutores das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, foi adicionado Anti-clumping Agent (Life TechnologiesTM) para se evitar a formação de agregados celulares.

3.13 Meios de cultura, soluções e condições de cultivo de células ARPE-19

As células de epitélio pigmentar de retina ARPE-19 foram mantidas em cultura aderente. O meio de cultura utilizado foi DMEM/F12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12; Life TechnologiesTM) suplementado com 10% SFB. As condições de cultivo foram iguais às adotadas para a cultura aderente de células HEK293, como descrito anteriormente (tópico 3.12.1.3).

3.14 Cotransfecção de células HEK293 em cultura aderente com as construções pLV-rhVEGFs e o vetor de seleção pTK-Hyg para geração de clones celulares eGFP⁺

Para a geração de clones celulares expressando estavelmente cada uma das três isoformas recombinantes de VEGF-A, células HEK293 em passagem P22, cultivadas em placas aderentes de 100 mm de diâmetro (P100), foram independentemente cotransfectadas com cada uma das construções de pLV-rhVEGFs juntamente com o vetor de seleção pTK-Hyg (Clontech Laboratories Inc.), que confere resistência ao antibiótico higromicina B, usando uma razão de massa de DNA de 40:1 (8 µg pLV-rhVEGFs : 200 ng pTK-Hyg), como previamente descrito (Armelin et al., 1984). Os plasmídios foram primeiramente misturados com 16 µL do reagente de transfecção FuGENE HD Transfection Reagent (Hoffmann-La Roche Ltd.) em meio de cultura DMEM na ausência de SFB para formação dos complexos DNA-lipossomo. Células HEK293 foram incubadas com os complexos e o meio de cultura foi trocado depois de 24 h. O vetor pLV-

eGFP, sem inserto algum, também foi cotransfectado para gerar um clone a ser usado como controle negativo de expressão.

3.15 Seleção dos clones de células HEK293 gerados através de seleção com o antibiótico higromicina B e isolamento de colônias eGFP⁺

72 h após a transfecção, a expressão da proteína eGFP pelas células foi confirmada sob microscópio invertido acoplado a um sistema de emissão de luz e detecção de fluorescência e, em seguida, as culturas passaram a ser tratadas com 200 µg/mL higromicina B (Life Technologies™) para seleção das células resistentes ao antibiótico. O meio de cultura foi trocado a cada 48 h e a seleção foi conduzida até que muitas células morressem e poucas e pequenas colônias de reduzido número de células eGFP⁺ fossem visualizadas, de forma a aumentar o potencial de origem clonal das mesmas. Essas colônias foram isoladas das placas de 100 mm de diâmetro e transferidas para poços de placas de 96 poços para estabelecimento dos clones celulares, o que foi feito pelo uso de aneis (cilindros) de clonagem como descrito a seguir. Uma vez que as colônias foram identificadas, um círculo foi desenhado ao redor delas na parte externa da base da placa de cultura. O meio de cultura foi descartado e as placas foram lavadas com PBSA para facilitar a tripsinização e remover células já destacadas. Os aneis previamente esterilizados foram levemente recobertos em graxa de silicone estéril, formando uma camada uniforme de graxa na base do anel. Em seguida, os aneis foram cuidadosamente posicionados nas placas, sobre e ao redor das colônias, de forma a isolá-las do resto da placa, pressionando-os levemente e impedindo o contato com as células. Após confirmação da posição dos aneis ao microscópio invertido, 50 µL de solução 0,1% de tripsina foram adicionados no centro dos aneis e as placas

foram incubadas a 37 °C brevemente até que houvesse mudança observável de morfologia e destacamento das células da superfície da placa. Meio de cultura DMEM suplementado com 10% SFB e 1 mM piruvato de sódio foi adicionado para inativação da tripsina e ressuspensão das células de cada uma das colônias, que foram transferidas para a placa de 96 poços. O tratamento com higromicina B foi mantido até duas semana.

Os clones transfectados com as construções pLV-rhVEGF₁₆₅, pLV-rhVEGF_{165b} e pLV-rhVEGF₁₂₁ e os clones contendo somente o vetor pLV-eGFP foram denominados, respectivamente, A, B, D e E, e devidamente enumerados. Todos os clones foram estocados em passagens próximas àquela da transfecção (P22) a – 80 °C como já descrito.

3.16 Análise da produção das isoformas de VEGF-A pelos clones celulares A, B e D produtores de VEGFs

A partir deste ponto, os termos “isoformas” e “proteínas” poderão ser usados de forma intercambiável.

Os clones celulares foram mantidos em cultura aderente. Os meios condicionados por células dos clones A, B, D e E em passagem baixa (P2, P3 ou P5) foram coletados para que a superexpressão das isoformas recombinantes fosse confirmada. As células foram plaqueadas em placas de 100 mm de diâmetro e tiveram 100% do meio de cultura trocado ao atingirem aproximadamente 85% de confluência. Os meios condicionados foram coletados depois de 24 h e estocados a – 80 °C. Diferentes clones foram selecionados e comparados quanto aos níveis de expressão para cada isoforma de interesse. As amostras de meio condicionado foram descongeladas em gelo e as proteínas precipitadas utilizando-se ácido tricloroacético (TCA, do

inglês *trichloroacetic acid*). Para tanto, 1,0 mL de solução 10% TCA a 4 °C foi adicionado a 200 µL de meio condicionado pelos clones e as misturas foram mantidas no gelo por 10 min. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 min a 15.000 × g, a 4 °C, os sobrenadantes foram descartados com o auxílio de um micropipetador e os *pellets* foram lavados com 500 µL de solução tampão 50 mM MOPS, pH 7,5. As amostras foram novamente centrifugadas por dois min a 15.000 × g, a 4 °C e os sobrenadantes foram descartados com o auxílio de um micropipetador. Os *pellets* remanescentes foram ressuspensos em tampão de amostra 1x (tampão de amostra para SDS-PAGE: 60 mM Tris-Cl pH 6,8; 2,0 % SDS; 10 % glicerol; 0,025 % azul de bromofenol; 700 mM β-mercaptoetanol) e fervidos por 5 min a 100 °C.

As amostras foram aplicadas em minigeis de poliacrilamida (SDS-PAGE) 12% submergidos em tampão de corrida (0,3% de Tris; 1,44% de glicina; 0,1% de SDS (Sigma-Aldrich Co.)) e fracionados por eletroforese a corrente elétrica de 100 V, 100 W e 350 mA por aproximadamente 2 h. Os marcadores de massa molecular Prestained Protein Ladder, Broad Range (New England Biolabs® Inc.) e BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder (Life Technologies™) foram usados como referência na determinação do tamanho das bandas encontradas. As proteínas foram então transferidas para membranas de nitrocelulose Hybond ECL Nitrocellulose (GE Healthcare) por *eletroblotting*, aplicando-se uma corrente elétrica 100 V, 100 W e 350 mA por 1 hora e 30 min em cubas contendo tampão de transferência (0,3% de Tris; 1,44% de glicina; 0,1% de SDS e 20% metanol). Todas as incubações e lavagens a seguir foram feitas sob agitação. As membranas foram bloqueadas com solução 5% leite desnatado em PBSA ou Starting Block (PBS) Blocking Buffer (Thermo Fisher Scientific Inc.) contendo 0,05% Tween® 20 (Sigma-Aldrich Co.) por 16 h a 4 °C. Em seguida, as membranas foram incubadas por 3 h a temperatura ambiente com anticorpo primário policlonal de coelho anti-VEGF 1:1.000

(Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, EUA), que reconhece as três isoformas, diluído na mesma solução de bloqueio. Depois, foram lavadas 4 vezes por 5 min com PBSA contendo 0,05% Tween[®] 20 e incubadas por 1 hora a temperatura ambiente com anticorpo secundário anti-IgG de colho 1:1.000 (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, EUA) também diluído na mesma solução de bloqueio. As membranas foram lavadas 4 vezes por 5 min, novamente com solução de PBSA contendo 0,05% Tween[®] 20, seguido de 2 lavagens de 5 min somente com PBSA. Em seguida, aplicou-se o reagente Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate (EMD Millipore Corporation, Billerica, EUA). Para que fossem reveladas por quimiluminescência, as membranas foram expostas a filmes Amersham Hyperfilm ECL Films (GE Healthcare) usados para autoradiografia por intervalos de tempo que variaram de 1 a 5 segundos. Para todos os experimentos de *Western blot*, a isoforma VEGF₁₆₅ proteica recombinante humana produzida em *Spodoptera frugiperda* (R&D Systems Inc.) foi utilizada como controle positivo, ao passo que o meio condicionado por células do clone E1 foi utilizado como controle negativo.

3.17 Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs em meios condicionados pelos clones celulares A, B e D na ausência de soro fetal bovino

As células dos clones A, B, D e E em passagens P8 – P10 foram plaqueadas em placas de 100 mm de diâmetro e, ao atingirem aproximadamente 85% de confluência, tiveram o meio descartado, sendo em seguida lavadas com PBSA para remoção de metabólitos, resto de componentes do meio antigo e células em suspensão/mortas, e receberam 100% do meio de cultura fresco sem SFB. Depois da troca, o meio foi coletado após 24, 48 e 72 h de

condicionamento pelos clones, procedendo-se a análise de expressão por *Western blot* como descrito anteriormente (tópico **3.16**), utilizando-se 200 µL de meio condicionado.

3.18 Expressão das isoformas rhVEGFs pelos clones celulares A, B e D adaptados à cultura em suspensão

Clones celulares A, B e D em passagens P10 foram adaptados à cultura em suspensão em meio na ausência de componentes derivados de animais pelos processos direto e sequencial (para mais detalhes, vide tópico **3.12**). Os meios condicionados por esses clones por 48 h foram submetidos a análise de *Western blot* com descrito anteriormente (tópico **3.16**), utilizando-se 200 µL de meio condicionado por células nas passagens P22 e P30.

3.19 Purificação das isoformas rhVEGFs por concentração seguida de cromatografia de afinidade a heparina (rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}) e a metal (rhVEGF₁₂₁)

300 mL de meios condicionados pelos clones celulares A, B e D por 48 h foram concentrados em dispositivos de filtração por centrifugação Centricon[®] Plus-70 (EMD Millipore Corporation) de limite nominal de massa molecular de 10.000 Da. Dado que o dispositivo possuía volume limitado e inferior ao total do volume de meio condicionado destinado à concentração, 70 mL de cada meio foram adicionados consecutivamente e submetidos a 3.500 × g por períodos de tempo que variaram de 20 a 40 min, sempre a 4 °C (as amostras de meio condicionado foram também mantidas constantemente a 4 °C). As proteínas de interesse ficaram

retidas no filtro por possuírem massa molecular maior do que o limite nominal do mesmo. O meio de cultura que passou pelos filtros foi descartado. Depois que todo o meio de cultura foi concentrado, as soluções retidas (retentados) foram recuperadas por inversão dos dispositivos. Como os volumes finais recuperados dos retentados variaram, as amostras concentradas foram diluídas em tampão de equilíbrio (100 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0 para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}; e 50 mM Na₃PO₄, 300 mM NaCl, pH 7,8 para a isoforma rhVEGF₁₂₁) de forma a alcançarem o volume final de 3 mL.

3.19.1 rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}

Devido às suas capacidades de ligação a heparina, as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} foram purificadas, em procedimentos totalmente independentes, utilizando-se colunas cromatográficas nas quais a fase estacionária possui heparina natural extraída de proteoglicano nativo da mucosa intestinal porcina HiTrapTM Heparin HP (GE Healthcare) de 1 mL. Em um primeiro momento, foi utilizada uma bomba peristáltica LKB P-1 Pump (Pharmacia, Uppsala, Suécia). As amostras de meio condicionado concentrado, a coluna cromatográfica, os capilares e os tubos coletores foram mantidos a 4 °C, e o mesmo procedimento foi seguido para ambas as amostras.

Primeiramente, o equivalente a cinco volumes de coluna (5 VC) de tampão de equilíbrio (100 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0) foi injetado nas colunas de heparina de forma a ajustar as condições de ligação. Em seguida, cada amostra (3 mL) foi aplicada e seguiu-se a etapa de lavagem também com tampão de equilíbrio (5 VC). Ao se verificar que a amostra havia atingido o final da coluna (possível graças à coloração avermelhada do meio concentrado devido

à presença de vermelho fenol), foi coletado o permeado (3 mL), fração onde se encontram as proteínas que não possuem afinidade pela coluna de heparina. Uma vez que toda a amostra havia passado pela coluna (momento em que a coloração avermelhada do meio concentrado foi substituída pela solução incolor do tampão de lavagem), foi coletado o lavado (5 mL), que corresponde às proteínas que possuem baixa afinidade pela coluna de heparina. Em seguida, aplicou-se três tampões de eluição (3 VC cada) contendo concentrações crescentes de cloreto de sódio: I (300 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0), II (650 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0) e III (1 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0). As frações coletadas em seguida consistiram dos eluatos, sendo que cada um foi dividido em duas alíquotas (300 mM', 300 mM'', 650 mM', 650 mM'', 1 M' e 1 M''). Todas as frações foram estocadas a 4 °C por curtos períodos ou – 20 °C por períodos longos.

3.19.2 rhVEGF₁₂₁

A isoforma rhVEGF₁₂₁ possui dois resíduos de histidina nas posições 11 e 12 de sua cadeia. Dessa forma, optou-se por purificar essa isoforma através de cromatografia de afinidade a metal, no caso Ni²⁺, utilizando-se uma coluna Poly-Prep (Bio-Rad) de 1 mL empacotada com resina His·Bind[®] Resin (Novagen; EMD Biosciences, Inc., San Diego, CA, EUA) e contendo NiSO₄ (Sigma-Aldrich Co.). Em um primeiro experimento piloto, as condições permitiram que somente as amostras de meio condicionado e os tubos coletores fossem mantidos a 4 °C.

O procedimento de purificação da isoforma rhVEGF₁₂₁ foi feito de forma semelhante àquele descrito para as duas outras isoformas. O volume correspondente a 5 VC de tampão de equilíbrio (50 mM Na₃PO₄, 300 mM NaCl, pH 7,8) foi injetado nas colunas de níquel de forma a

ajustar as condições de ligação. Em seguida, cada amostra foi aplicada (3 mL) e seguiu-se a etapa de lavagem com tampão 5 mM imidazol, pH 7,8 (5 VC). Ao se verificar que a amostra havia atingido o final da coluna, foi coletado o permeado (3 mL). Uma vez que toda a amostra havia passado pela coluna, foi coletado o lavado (5 mL). Em seguida, aplicou-se três tampões de eluição (3 mL cada) contendo concentrações crescentes de imidazol: I (10 mM Imidazol, pH 6,2), II (25 mM Imidazol, pH 6,2) e III (100 mM Imidazol, pH 6,2). As frações coletadas em seguida consistiram dos eluatos obtidos a 10 mM, 25 mM e 100 mM. Todas as frações foram estocadas a 4 °C por curtos períodos ou – 20 °C por períodos longos.

Para as três isoformas purificadas, 16 µL dos meios condicionados, e das demais frações obtidas, foram submetidos a fracionamento por eletroforese em geis SDS-PAGE 12% sob condições não redutoras (tampão de amostras sem β-mercaptoetanol: 60 mM Tris-Cl pH 6,8; 2,0 % SDS; 10 % glicerol; 0,025 % azul de bromofenol) e sem a etapa de incubação por 5 min a 100 °C, e analisadas por coloração dos geis com nitrato de prata pelo uso do kit ProteoSilver™ Plus Silver Stain (Sigma-Aldrich Co.), seguindo-se as orientações do fabricante, e *Western blot* para detecção específica das isoformas e confirmação da eficiência de purificação. Os resultados obtidos nesses experimentos indicaram quais eluatos da purificação apresentavam maior concentração e massa das isoformas, bem como quais continham as proteínas melhor purificadas. Esses eluatos foram escolhidos para a etapa de quantificação.

3.20 Otimização da purificação das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} por cromatografia líquida de alta performance.

O sistema Äkta Purifier UPC-100 (GE Healthcare), de cromatografia líquida de alta performance (HPLC, *High Performance Liquid Chromatography*), associado a uma coluna HiTrapTM Heparin HP (GE Healthcare) de 1 mL, foi utilizado na otimização da purificação das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, em procedimentos independentes. O fluxo constante de 2 mL/min foi utilizado durante todo o processo. A coluna foi primeiramente equilibrada com 3 VC a um utilizando o tampão de equilíbrio (100 mM NaCl, 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0). Em seguida, 100 mL de meio condicionado foram aplicados à coluna, seguido de lavagem da coluna (2 VC) com o tampão de equilíbrio. Para a eluição, um gradiente linear de concentração de NaCl foi aplicado, iniciado em 100 mM e finalizado em 2 M (tamponado com solução 20 mM fosfato de sódio, pH 7,0), em um intervalo de 10 VC. As frações de permeado e lavado foram coletadas, bem como cinco frações dos eluatos contendo 2 mL cada, e mantidas a 4 °C. Para as duas isoformas purificadas, 30 µL de cada fração foram utilizados para análises em geis de poliacrilamida utilizando o corante *Coomassie Brilliant Blue* e também análises de *Western blot*.

3.21 Caracterização das isoformas rhVEGFs por espectrometria de massas, dicroísmo circular e eletroforese capilar

As amostras obtidas nas purificações das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} otimizadas em sistema de HPLC serão submetidas a análises de espectrometria de massas do tipo MALDI-

TOF (*Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time Of Flight*), dicroísmo circular (DC) e eletroforese capilar.

3.21.1 Espectrometria de massas

Para o experimento de espectrometria de massas, que será realizado na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, as amostras de proteínas purificadas serão submetidas a digestão trípica, imobilizadas em matriz de CHCA (ácido α -ciano-4-hidroxicinamínico) e analisadas em aparelho de MALDI-TOF ultrafleXtreme (Bruker Daltonics Corporation, Billrica, MA, EUA). Os perfis massa/carga (m/z), gerados como consequência da digestão trípica e ionização, serão plotados e comparados contra o bancos de dados de domínio público (*e.g.*, Mascot - http://www.matrixscience.com/search_form_select.html e PeptIdent - http://www.pdg.cnb.uam.es/cursos/BioInfo2004/pages/visualizacion/programas_manuales/spdbv_userguide/us.expasy.org/tools/peptident.html).

3.21.2 Dicroísmo circular

Para o experimento de dicroísmo circular, as amostras foram submetidas a análise em um aparelho Jasco J-720 (Jasco, Inc., MD, EUA). A leitura foi feita no intervalo de comprimento de ondas de 190 a 260 nm.

3.21.3 Eletroforese capilar

As amostras de eluatos contendo as proteínas purificadas foram preparadas utilizando-se o SDS-MW Analysis Kit (Beckman Coulter, Inc., Pasadena, CA, EUA), seguindo-se as orientações

do fabricante, e analisadas em aparelho Beckman Coulter Proteomelab PA800 (Beckman Coulter, Inc.) da Prof. Dra. Marina Tavares do IQ-USP.

3.22 Quantificação das isoformas rhVEGFs nos eluatos por ensaio enzimático “sanduíche” (ELISA)

Para quantificação das isoformas presentes nos eluatos, utilizou-se um ensaio imunoenzimático colorimétrico disponibilizado na forma do kit comercial Quantikine® ELISA Human VEGF Immunoassay (R&D Systems Inc., Minneapolis, MN, EUA), seguindo-se as orientações do fabricante. As amostras de eluatos selecionadas foram diluídas de 10.000 a 1.000.000 x em PBSA, por diluição seriada, de forma a se obter concentrações das isoformas que eram compatíveis com a sensibilidade do kit. Para toda medida foram estabelecidas curvas-padrão às quais as medidas de absorbância. Os resultados foram obtidos por leitura em aparelho espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 nm e correção em 540 nm.

3.23 Avaliação da atividade biológica das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas

A avaliação da atividade biológica de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} foi realizada através de duas estratégias, quais sejam: o ensaio da membrana corioalantoide (*CAM assay*) e o AngioPhase™ Kit.

3.23.1 Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay)

No *CAM assay* optou-se pela abordagem *ex ovo*. Ovos fertilizados de galinha (*Gallus gallus domesticus*) foram adquiridos de diferentes fornecedores (McIntyre Poultry & Eggs, Lakeside, CA, EUA; Laboratório do pesquisador Scott Fraser, Division of Biology, Caltech - California Institute of Technology, Pasadena, CA, EUA) em E0 (E: dia embrionário), esterilizados com solução 70% etanol e incubados a 37,5 °C e 70-75% umidade relativa em incubadora apropriada, sem rotação e mantendo-se o eixo de simetria do ovo paralelo ao plano do chão. Para cada experimento, o número inicial de ovos variou de 3 a 6 dúzias. Em E3 os ovos foram mantidos na posição vertical, ou seja, com o eixo de simetria perpendicular ao plano do chão, por pelo menos 30 min e novamente esterilizados com solução 70% etanol. Cada ovo foi cuidadosamente quebrado contra uma superfície aguda e serrilhada, garantindo que o saco vitelino e o embrião fossem mantidos intactos, e todo o conteúdo interno do ovo foi transferido para uma barca de pesagem (81 mm x 81 mm x 18 mm) previamente esterilizada com solução 70% etanol e luz ultravioleta para prevenir a contaminação por microorganismos (fungos, principalmente). Cada barca de pesagem contendo um embrião foi coberta com uma segunda barca de pesagem e todos os embriões foram devolvidos à incubadora nas mesmas condições de incubação (37,5 °C, 70-75% umidade relativa) e mantidos por dez dias nessas condições (Deryugina & Quigley, 2009). Tramas de ácido poliglicólico (PGA, do inglês *polyglycolic acid*) contendo 5% de ácido poli-L-láctico (PLLA, do inglês *poly-L-lactic acid*) foram cortadas em quadrângulos de 3 mm x 3 mm e as seguintes soluções foram adicionadas a elas: PBSA (controle negativo), 500 ng de rhVEGF₁₆₅ purificado, 500 ng de rhVEGF_{165b} purificado ou uma combinação de 500 ng de cada isoforma purificada. As tramas foram secas em fluxo laminar antes de serem cuidadosamente colocadas sobre a CAM em regiões contendo vasos sanguíneos

claramente visíveis. Procurou-se testar pelo menos os pontos amostrais das proteínas individuais (500 ng rhVEGF₁₆₅ e 500 ng rhVEGF_{165b} – quando possível, 500 ng de ambos) e o controle negativo (PBSA) em um mesmo embrião. O tratamento com os fatores se deu por 72 h sob as mesmas condições de incubação, chegando até o dia E16. Nesse dia, as regiões contendo os implantes foram fixadas com solução 37% formaldeído, removidas do embrião e sua porção interna foi documentada com imagem obtida de estereomicroscópio (aumento de 8x) (Figura 3.3).

Decidiu-se também realizar o mesmo ensaio em um modelo semelhante, utilizando embriões de codorna (*Coturnix* sp.) transgênicos expressando eYFP (do inglês, *enhanced Yellow Fluorescent Protein*) no núcleo de células endoteliais (Tie1:H2B-eYFP), fornecido pelo laboratório do pesquisador Scott Fraser (Division of Biology, Caltech, Pasadena, CA, EUA) para melhor visualização dos capilares formados ou inibidos pelos fatores recombinantes (Sato et al., 2010). Assim como descrito anteriormente para os embriões de galinha, os ovos de codorna foram incubados de E0 a E3 sob condições apropriadas (37,5 °C, 70-75% umidade relativa, sem rotação e mantendo-se o eixo de simetria do ovo paralelo ao plano do chão; demais períodos de incubação se deram sob as mesmas condições). Devido ao menor tamanho do ovo de codorna, optou-se pela abordagem *in ovo*. Dessa forma, em E3 uma janela foi aberta na parte superior dos ovos. Para isso, cada ovo foi inicialmente esterilizado com solução 70% etanol e teve uma fita adesiva colada na extremidade inferior do ovo, próxima à região onde se localiza a câmara de ar. Com o uso de uma agulha 18G de 2 polegadas e de uma seringa de 1 mL (Becton, Dickinson and Company), foi feito um furo na extremidade inferior do ovo e aproximadamente 1 mL de albúmen foi retirado de forma a baixar o nível do embrião, distanciando-o da casca, e o furo remanescente foi selado com fita adesiva. Em seguida colou-se fita adesiva na parte lateral

voltada para cima (região mais próxima do embrião) e foi feita uma incisão com o auxílio de uma tesoura de ponta fina. A janela foi aberta com a mesma tesoura de forma a apresentar um formato elipsoide de aproximadamente 1 cm x 1,5 cm. A fita adesiva colocada previamente à abertura preveniu que fragmentos da casca caíssem dentro do ovo. Depois de aberta, a janela foi selada com fita adesiva e os ovos foram incubados por quatro dias. Em E7 foi realizado o implante (somente um ponto por ovo, devido a seu tamanho e fragilidade reduzidos) das tramas de PGA/PLLA contendo os fatores e o tratamento se deu por 72 h, chegando a E10. Nesse dia as regiões contendo os implantes foram fixadas com solução 37% formaldeído, removidas do embrião e documentadas em estereomicroscópio acoplado a um sistema de detecção de fluorescência (Figura 3.3).

A

Embriões de galinha

B

Embriões de codorna

Figura 3.3. Cronograma do ensaio da membrana corioalantoide para embriões de galinha (*Gallus gallus domesticus*) (A) e de codorna (*Coturnix sp.*) (B).

3.23.2 AngioPhase™ Kit

O AngioPhase™ Kit foi adquirido da empresa MBL International (Woburn, MA, EUA). Seguindo-se as orientações do fabricante (para mais detalhes, visitar http://www.jomar.on.net/AngioPhase_MBL.pdf), no dia um a ampola de células endoteliais derivadas de veia de cordão umbilical humano (HUVECs, do inglês *Human Umbilical Vein-derived Endothelial Cells*) e células de suporte criopreservadas foi descongelada e as células foram semeadas uniformemente sobre os poços de uma placa de cultura de 24 poços, sendo em seguida incubadas a 37 °C e 2% CO₂ / 98% ar em atmosfera úmida. No dia dois foi iniciado o tratamento com controle positivo (2 ng/mL VEGF), controle negativo (20 µM suramin), controle de meio de cultura (fornecido no kit) e das amostras de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificados (2, 10 e 50 ng/mL de concentração final para ambas, testadas separadamente). Os controles (positivo, negativo e somente meio de cultura) foram testados em triplicada e as amostras das isoformas expressas foram testadas em triplicatas ou duplicatas. O meio de cultura foi trocado a cada dois dias. As células foram documentadas ainda em cultura (contraste de fase em microscópio invertido Leica DMI 6000 B (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Hesse, Alemanha)) e depois marcadas para detecção do marcador de células endoteliais CD31 (PECAM-1). Tanto o procedimento “*CD31 Tubule Staining Insoluble Substrate (BCIP/NBT)*” quanto o procedimento opcional “*CD31 ELISA Soluble Substrate (p-NPP)*”, indicativos da presença de vasos, foram realizados, seguidos de fixação permanente.

3.24 Avaliação dos efeitos de rhVEGFs sobre a formação de intestino curto engenheirado (TESI, do inglês *Tissue-Engineeried Small Intestine*) murino

Todos os experimentos envolvendo animais no pré- e pós-operatório, bem como métodos adotados para criação e formas de manutenção, foram realizados no Saban Research Institute do Children's Hospital Los Angeles (Los Angeles, CA, EUA) e seguiram as normas da Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC, EUA). Os testes do efeito de rhVEGFs sobre TESI foram feitos em culturas de unidades organoides intestinais murinas e em camundongos.

Inicialmente isolou-se unidades organoides dos intestinos de camundongos C57Bl/6 (selvagens ou eGFP⁺) tendo entre 11 e 23 dias de vida. Para isso, os animais foram eutanasiados em câmara de CO₂. O intestino delgado dos camundongos foi então ressectado e isolado. Em seguida, um corte longitudinal foi aberto de forma a expor todo o lúmen do intestino, que foi então lavado por agitação intensa para a remoção de fezes e da maior parte das vilosidades com 1x HBSS (Hanks Balanced Salt Solution, Life TechnologiesTM) suplementado com 1x antibiótico/antimicótico (A/A) (Life TechnologiesTM). Esse procedimento foi repetido até que a turbidez da solução após a agitação fosse mínima (geralmente entre 4 e 6 vezes). Os órgãos foram então reduzidos a pequenos pedaços (2-3 mm) e digeridos com 38,81 mg de collagenase tipo IV (310 u/mg) (Worthington Biochemical Corporation, Lakewood, NJ, EUA) e 1,2 mg de dispase (1,77 u/mg) (Life TechnologiesTM) em 10 mL de HBSS a 37 °C por 30 min sob agitação. A digestão foi parada por adição de meio de cultura 1x DMEM High Glucose suplementado com 10% SFB e 1x antibiótico/antimicótico (todos Life TechnologiesTM). A suspensão foi ressuspendida aproximadamente 50 vezes com pipeta de 50 mL e centrifugada a 500 rpm por 8

min. O sobrenadante foi descartado e o *pellet* foi novamente ressuspensionado em meio DMEM com SFB e A/A e centrifugado a 800 rpm por 5 min. O sobrenadante foi novamente descartado e os *pellets* mantidos em gelo e usados para estabelecer culturas de unidades organoides ou TESIS.

3.24.1 Culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides

Para as culturas de unidades organoides foram utilizados camundongos C57Bl/6 eGFP⁺. *Pellets* de unidades organoides (sempre mantidos no gelo) com um volume de 200 µL foram misturados com 200 µL do meio de cultura DMEM suplementado com SFB e A/A e 200 µL de Growth Factor Reduced BD MatrigelTM Matrix Basement Membrane (Becton, Dickinson and Company). A mistura foi então ressuspensionada até que ficasse homogênea e 150 µL foram plaqueados em poços de placas de cultura de 6 poços preenchidos com 2 mL de meio de cultura 1x DMEM High Glucose suplementado com 10% SFB e 1x A/A, formando um ambiente tridimensional (3D) para o crescimento das células. As culturas de unidades organoides foram mantidas por até cinco dias em ambiente úmido a 37 °C e 5% de CO₂, sendo documentadas com auxílio de um microscópio invertido Leica DMI 6000 B (Leica Microsystems GmbH). O RNA total das culturas foi isolado com uso do Rneasy Mini Kit (QIAGEN), o cDNA sintetizado com uso do iScriptTM cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad) e as reações de PCR feitas com o Platinum[®] Blue PCR SuperMix (Life TechnologiesTM) ou com o MyTaqTM Red Mix (Meridian Life Science[®] Company), seguindo-se as orientações dos fabricantes. Em todas as reações, exceto aquelas para amplificação de *GAPDH*, foi adicionado DMSO para uma concentração final de 3% ou 5%. *Primers* foram adquiridos (Eurofins MGW Operon, Huntsville, AL, EUA) e utilizados para amplificar o cDNA correspondente aos genes *Flt-1* (*VEGFR-1*) e *KDR* (*VEGFR-2*), bem

como o do gene de expressão constitutiva (controle positivo da reação) *GAPDH*. Os cDNAs sintetizados a partir do RNA total de vasos sanguíneos torácicos e do jejuno de camundongos foram utilizados como controles da expressão de *Flt-1* e *KDR*. A Tabela 3.4 traz as sequências de cada *primer*.

Tabela 3.4. Sequências dos *primers* para amplificação do cDNA correspondente às sequências codificadoras dos genes *Flt-1* e *KDR* murinos.

Oligonucleotídeo	Sequência (5'-3')	T _m (°C)
Flt-1_F	CAAGGCCTCCATGAAGATAG	60,4
Flt-1_R	TCTGTTCTCCCTTTCCTCC	60,2
KDR_F	AACAAATTATCTCCATCTTTTGG	55,6
KDR_R	AACCTTCCAAAACCAAACC	55,8
mGAPDH_F	CAATGTTCCGTCGTGGATCT	62,6
mGAPDH_R	GTCCTCAGTGTAGCCCAAGAT	62,6

m: murino.

Para visualização, as reações de PCR foram fracionadas no sistema Enduro™ Gel XL (Labnet International, Inc., Edison, NJ, EUA) em geis de agarose 1,2% em tampão 1x TAE contendo 1x RedSafe™ Nucleic Acid Staining Solution (iNtRON Biotechnology, Sangdaewon-Dong, Joongwon-Ku, Sungnam, Kyungki-Do, Coreia) e os geis fotodocumentados. Os tamanhos previstos dos *amplicons* para *Flt-1*, *KDR* e *GAPDH* são, respectivamente, 599 pb, 820 pb e 124 pb.

Foram realizados cinco experimentos de isolamento e plaqueamento, cada um gerando uma quantidade de unidades organoideis suficiente para o plaqueamento de 4 a 7 poços.

3.24.2 Imageamento em tempo real das culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides tratadas com rhVEGFs

Para análise do efeito das isoformas rhVEGFs sobre as culturas de unidades organoides, 30 μ L da mistura de unidades organoides (isoladas de camundongos C57Bl/6 eGFP⁺) com meio de cultura e MatrigelTM (ambiente 3D) foram plaqueados em poços de placas Lab-TekTM II Chambered Coverglasse (8 poços) (Thermo Fisher Scientific Inc.) contendo meio de cultura. Todos os pontos experimentais, feitos em duplicata, continham meio de cultura 1x DMEM High Glucose e 1x A/A, sendo divididos em quatro grupos experimentais: (i) suplementado com 10% SFB, (ii) suplementado com 10% SFB + 100 ng/mL rhVEGF₁₆₅, (iii) suplementado com 10% SFB + 100 ng/mL rhVEGF_{165b} e (iv) não suplementado (0% SFB e sem rhVEGFs). A placa foi então acoplada a um microscópio Leica DM IRE2 acoplado a uma incubadora Leica Incubator BLX 200 (Leica Microsystems GmbH) climatizada para manutenção de ambiente úmido a 37 °C e 5% CO₂. Os meios de cultura foram trocados a cada 48 h. O *software* Micro-Manager versão 1.4.10 (Vale Lab, University of California, San Francisco, CA, EUA) foi utilizado para programar a câmera do microscópio para tirar fotos com os seguintes parâmetros:

- número de posições ao longo dos quatro grupos experimentais em duplicata: 41;
- intervalo de tempo entre as fotos: 1 hora;
- duração: 139 h;
- número de planos focais (eixo z): 9;
- número de canais: 2 (luz transmitida e fluorescente);
- número total de imagens: 102.582

Finalizada a documentação, os arquivos foram compilados e concatenados utilizando o pacote Fiji (64-bit).Ink, baseado no *software* ImageJ (<http://rsb.info.nih.gov/ij/>; NIH - National

Institutes of Health, EUA) para geração dos vídeos de imageamento em tempo real. O melhor plano focal (eixo z) foi escolhido para cada vídeo de acordo com o foco.

3.24.3 Efeito de rhVEGFs sobre a formação de TESI

Para a formação de TESI, o *pellet* de unidades organoides isoladas de camundongos C57Bl/6 foi ressuspendido com o meio de cultura DMEM suplementado com SBF e A/A (1 volume de meio/1 volume de *pellet*). A suspensão celular foi semeada sobre arcabouços de trama de PGA/PLLA, moldados em formato cilíndrico, contendo, separadamente, PBS (controle negativo), 5 µg rhVEGF165, 5 µg rhVEGF165b ou uma combinação de 5 µg de cada isoforma e os complexos de unidades organoides + arcabouços foram mantidos a 4 °C até o momento do implante. Camundongos receptores NOD/SCID foram devidamente anestesiados e tiveram os complexos implantados no omento, individualmente. Os animais foram eutanasiados e tiveram os TESIs explantados depois de 14 ou 28 dias. Os TESIs explantados foram medidos, pesados, seccionados transversalmente na metade e fixados em formaldeído 37%.

Os explantes fixados foram enviados ao Department of Pathology and Laboratory Medicine do Children's Hospital Los Angeles para inclusão em blocos de parafina e realização de cortes de 100 µm de espessura, posteriormente depositados sobre lâminas de vidro para experimentos de imunofluorescência. Resumidamente, as lâminas de vidro foram desparafinadas e submetidas a um protocolo para recuperação de epítomos e, então, individualmente incubadas por 16 h a 4 °C com as soluções de anticorpo primário policlonal anti-E-caderina (Santa Cruz Biotechnology, Inc.) ou monoclonal anti-Ki-67 (Thermo Fisher Scientific Inc.), ambos na concentração de 1:100. As lâminas foram então lavadas e incubadas com solução de anticorpo

secundário anti-IgG (fabricante desconhecido) na concentração de 1:200 por 1 h a temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas lavadas e marcadas com VectaShield® contendo DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) (Vector Laboratories, Inc.), seladas e fotodocumentadas com o auxílio de um microscópio invertido Leica DMI 6000 B para fluorescência (Leica Microsystems GmbH).

3.25 Avaliação dos efeitos de hipóxia sobre a formação de intestino curto engenheirado (TESI, do inglês *Tissue-Engineered Small Intestine*) murino

Todos os experimentos envolvendo animais no pré- e pós-operatório, bem como métodos adotados para criação e formas de manutenção, foram realizados no Saban Research Institute do Children's Hospital Los Angeles (Los Angeles, CA, EUA) e seguiram as normas da Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC, EUA).

Os testes do efeito de hipóxia sobre a formação de TESI foram feitos em animais. Para isso, camundongos C57Bl/6 foram mantidos por 6 h sob hipóxia sistêmica em atmosfera contendo 6% de pressão parcial de O₂. Em seguida os animais foram imediatamente submetidos a eutanásia em câmara de CO₂, seguida do deslocamento vertebral para confirmação do óbito, e suas unidades organoides intestinais foram isoladas e semeadas sobre arcabouços de trama de PGA/PLLA (como descrito nos tópicos **3.21** e **3.21.2**). Os complexos unidades organoides + arcabouços foram mantidos a 4 °C até o momento do implante. Nenhum complexo recebeu proteínas recombinantes. Camundongos receptores NOD/SCID foram devidamente anestesiados e tiveram os complexos implantados no omento, individualmente. Os animais foram eutanasiados

e verificados para a formação de TESIS 28 dias após o procedimento cirúrgico de implantação. Os TESIS foram pesados, medidos e fixados em formaldeído 37%.

3.26 Produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-Espondina 1

Dada a importância de R-Espondinas (RSPO1-4) para a manutenção do nicho de células-tronco da cripta do intestino delgado, um projeto paralelo para produção de R-Espondina 1 humana e murina recombinantes (rhR-Espondina 1 e rmR-Espondina 1) foi iniciado. Para isso, as sequências codificadoras foram adquiridas da empresa GenScript USA Inc. (Piscataway, NJ, EUA), tendo passado pelo processo de otimização de códons e sendo independentemente clonadas no vetor de clonagem pUC57 através de um sítio de restrição para a enzima *EcoRV*, gerando as construções pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1. O Vetor pUC57 possui 2.710 pb e contém um cassete de resistência a ampicilina e o MCS inserido no *operon LacZ*. Ambas as sequências foram sintetizadas contendo o sítio de restrição *EcoRI* a 5' e o sítio de restrição *NotI* a 3', permitindo futuros procedimentos de subclonagem. O inserto contendo a sequência humana e aquele contendo a sequência murina ficaram, respectivamente, com um tamanho final de 815 pb e 821 pb. As sequências do inserto e do vetor foram confirmadas por sequenciamento e os tamanhos dos insertos foram verificados por digestões com enzimas de restrição. Foram fornecidos 4 µg de DNA liofilizado de cada construção.

Ao serem recebidas, as amostras das construções foram centrifugadas, ressuspendidas em 20 µL de água deionizada e estocadas. Bactérias *E. coli* foram independentemente transformadas por choque térmico e os clones resistentes a ampicilina foram estocados. Os clones contendo as

construções foram cultivados em condições ideais (37 °C, 16 h, 300 rpm) para obtenção de DNA plasmidial. Os DNAs plasmidiais isolados foram submetidos a digestões simples com a enzima *EcoRV* e a duplas digestões com as enzimas *EcoRI* e *NotI*. As amostras digeridas foram submetidas a fracionamento em gel de agarose 1,2%, juntamente com as construções não digeridas, para verificação dos tamanhos dos insertos. Para isolamento dos insertos, as construções foram digeridas simultaneamente com as enzimas *EcoRI* e *NotI*, fracionadas por eletroforese em gel de agarose 0,8% e as bandas foram removidas dos geis para experimentos futuros.

4 RESULTADOS

4.1 Amplificação das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF₁₆₅, rhVEGF₁₂₁ e rhVEGF_{165b} do gene *VEGF-A* humano

4.1.1 rhVEGF₁₆₅

A sequência codificadora completa da isoforma VEGF₁₆₅ obtida na base de dados de nucleotídeos do NCBI segue abaixo, e a Tabela 4.1 mostra o correspondente proteico de cada intervalo na sequência codificadora.

```

1      atgaactttc tgctgtcttg ggtgcattgg agccttgcct tgctgctcta cctccaccat
61      gccaagtggg cccaggctgc acccatggca gaaggaggag ggcagaatca tcacgaagtg
121     gtgaagttca tggatgtcta tcagcgcagc tactgccatc caatcgagac cctggtggac
181     atcttccagg agtaccctga tgagatcgag tacatcttca agccatcctg tgtgcccctg
241     atgcgatgcg ggggctgctg caatgacgag ggctggagt gtgtgcccac tgaggagtcc
301     aacatcacca tgcagattat gcggatcaaa cctcaccaag gccagcacat aggagagatg
361     agcttcctac agcacaacaa atgtgaatgc agaccaaaga aagatagagc aagacaagaa
421     aatccctgtg ggcccttgctc agagcggaga aagcatttgt ttgtacaaga tccgcagacg
481     tgtaaagtgt cctgcaaaaa cacagactcg cgttgcaagg cgaggcagct tgagttaaac
541     gaacgtactt gcagatgtga caagccgagg cggtga

```

Tabela 4.1. Sequência codificadora da isoforma VEGF₁₆₅ e correspondente proteico.

Intervalo (Nº de pares de base)	Região proteica correspondente (Nº de resíduos de aminoácidos)
1 – 78 (78)	Peptídeo sinal (26)
79 – 573 (495)	Isoforma proteica VEGF ₁₆₅ madura (165)
574 – 576 (3)	Não se aplica – códon de terminação (0)

O par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R (Tabela 3.1) foi utilizado nas reações de PCR para amplificação da sequência, feitas individualmente a partir de cDNA total de tecidos pulmonar e renal humanos, e as amostras foram submetidas a fracionamento em gel de agarose 0,8% por eletroforese. A análise do fracionamento mostrou que *amplicons* de tamanhos variados foram obtidos, dentre os quais um que continha o tamanho esperado para a isoforma VEGF₁₆₅, localizado entre as bandas de 500 e 600 pb do marcador molecular (Figura 4.1). Esse resultado era esperado, uma vez que as diferentes isoformas originadas a partir de *splicing* alternativo do hnRNA do gene *VEGF-A* humano possuem 100% de identidade nas as regiões 5'-terminal e 3'-terminal nas quais os *primers* desenhados pareiam-se. A identidade entre essas regiões permitiu, inclusive, que o mesmo par de *primers* fosse utilizado para amplificação da isoforma rhVEGF₁₂₁, mas não para a isoforma rhVEGF_{165b}, como descrito a seguir.

Figura 4.1. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de rhVEGF₁₆₅.

O par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R foi utilizado nas reações de amplificação de rhVEGF₁₆₅, tendo amostras de cDNA total de rim e pulmão humanos como *template*. O *amplicon* correspondente à isoforma rhVEGF₁₆₅ está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler™ 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

4.1.2 rhVEGF₁₂₁

A sequência codificadora completa da isoforma VEGF₁₂₁ obtida na base de dados de nucleotídeos do NCBI segue abaixo, e a Tabela 4.2 mostra o correspondente proteico de cada intervalo na sequência ou codificadora.

```

1      atgaactttc tgctgtcttg ggtgcattgg agccttgcct tgctgtcteta cctccaccat
61     gccaaagtggc cccaggctgc acccatggca gaaggaggag ggcagaatca tcacgaagtg
121    gtgaagttca tggatgtcta tcagcgcagc tactgccatc caatcgagac cctggtggac
181    atcttccagg agtaccctga tgagatcgag tacatcttca agccatcctg tgtgcccctg
241    atgcgatgcg ggggctgctg caatgacgag ggcttgaggt gtgtgccac tgaggagtcc
301    aacatcacca tgcagattat gcggatcaaa cctcaccaag gccagcacat aggagagatg

```

361 agcttcctac agcacaacaa atgtgaatgc agaccaaaga aagatagagc aagacaagaa
 421 aaatgtgaca agccgaggcg gtga

Tabela 4.2. Sequência codificadora da isoforma VEGF₁₂₁ e correspondente proteico.

Intervalo (Nº de pares de base)	Região proteica correspondente (Nº de resíduos de aminoácidos)
1 – 78 (78)	Peptídeo sinal (26)
79 – 441 (363)	Isoforma proteica VEGF ₁₂₁ (121)
442 – 444 (3)	Não se aplica – códon de terminação (0)

O mesmo par de *primers* (VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R - Tabela 3.1) utilizado na amplificação da isoforma rhVEGF₁₆₅ foi utilizado nas reações para amplificação da isoforma rhVEGF₁₂₁ (Figura 4.2.). As amostras foram analisadas através de fracionamento eletroforético e resultados similares foram gerados.

Figura 4.2. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de rhVEGF₁₂₁.

O par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF-A-mut-R foi utilizado nas reações de amplificação de rhVEGF₁₂₁ (o mesmo utilizado para a amplificação da isoforma rhVEGF₁₆₅ – Figura 4.1), tendo amostras de cDNA total de rim e pulmão humanos como *template*. O *amplicon* correspondente à isoforma rhVEGF₁₂₁ está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler™ 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

4.1.3 rhVEGF₁₆₅b

A sequência codificadora completa da isoforma VEGF₁₆₅b obtida na base de dados de nucleotídeos do NCBI segue abaixo, e a Tabela 4.3 mostra o correspondente proteico de cada intervalo na sequência codificadora.

```

1      atgaactttc tgctgtcttg ggtgcattgg agccttgcct tgctgctcta cctccaccat
61     gccaaagtgg cccaggctgc acccatggca gaaggaggag ggcagaatca tcacgaagtg
121    gtgaagttca tggatgtcta tcagcgcagc tactgccatc caatcgagac cctggtggac
181    atcttccagg agtaccctga tgagatcgag tacatcttca agccatcctg tgtgcccttg
241    atgcgatgcg ggggctgctg caatgacgag ggcttgaggt gtgtgcccac tgaggagtcc
301    aacatcacca tgcagattat gcggatcaaa cctcaccaag gccagcacat aggagagatg
361    agcttctctac agcacaacaa atgtgaatgc agaccaaaga aagatagagc aagacaagaa
421    aatccctgtg ggcttgctc agagcggaga aagcatttgt ttgtacaaga tccgcagacg
481    tgtaaattgt cctgcaaaaa cacagactcg cgttgcaagg cgaggcagct tgagttaaac
541    gaacgtactt gcagatctct caccaggaaa gactga

```

Tabela 4.3. Sequência codificadora da isoforma VEGF₁₆₅b e correspondente proteico.

Intervalo (Nº de pares de base)	Região proteica correspondente (Nº de resíduos de aminoácidos)
1 – 78 (78)	Peptídeo sinal (26)
79 – 573 (495)	Isoforma proteica VEGF ₁₆₅ b madura (165)
574 – 576 (3)	Não se aplica – códon de terminação (0)

O par de *primers* utilizado para a amplificação da sequência de VEGF₁₆₅b foi VEGF-A-mut-F e VEGF₁₆₅b-mut-R. Pôde-se fazer uso o mesmo *primer forward* usado nas amplificações das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁. Contudo, devido à diferença de sequência na porção 3’-

terminal da isoforma VEGF₁₆₅ e das demais isoformas, um diferente *primer forward* foi sintetizado e utilizado. Assim como para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁, as amostras foram analisadas por fracionamento em gel de agarose (Figura 4.3). Detectou-se novamente mais de um *amplicon*, o que também pode ser explicado pela identidade das sequências das diferentes isoformas de VEGF-A.

Figura 4.3. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR para amplificação de rhVEGF_{165b}.

O par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF_{165b}-mut-R foi utilizado nas reações de amplificação de rhVEGF_{165b}, tendo amostras de cDNA total de rim e pulmão humanos como *template*. O *amplicon* correspondente à isoforma rhVEGF_{165b} está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler™ 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

Para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, optou-se por remover do gel as bandas originadas de reações que tiveram o cDNA de pulmão como *template*. Para rhVEGF₁₂₁ isolou-se a banda referente à reação onde cDNA de rim foi utilizado. Os critérios utilizados para essa escolha foram a intensidade da banda (para rhVEGF₁₂₁ e rhVEGF_{165b}) e a capacidade de separar o *amplicon* desejado dos demais (para rhVEGF₁₆₅). Depois de isolados, os fragmentos dos geis

contendo os *amplicons* foram digeridos e tiveram o DNA purificado utilizando-se o QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN), permitindo, então, seu uso na reação de ligação no vetor de clonagem.

4.2 Clonagem das sequências codificadoras das isoformas rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁ do gene *VEGF-A* humano no vetor pGEM[®]-T Easy e geração e triagem de clones de bactérias *Escherichia coli*

Os três *amplicons* isolados dos geis foram submetidos, independentemente, a reações de ligação no vetor comercial de clonagem pGEM[®]-T Easy. As construções geradas, denominadas pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅, pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ e pGEM[®]-rhVEGF_{165b}, foram independentemente introduzidas em bactérias *Escherichia coli* da cepa XL-1 Blue por eletroporação. Diversos clones cresceram em meio LB-ágar, sendo selecionados em quatro passos, descritos a seguir.

A primeira forma de análise se deu pelo crescimento dos clones bacterianos no meio LB-ágar contendo o antibiótico ampicilina. Esse antibiótico é capaz de selecionar praticamente só as bactérias capazes de metabolizá-lo (ou aquelas que apresentam resistência a ele naturalmente), ou seja, somente aquelas que possuem o cassete Amp^r presente no vetor pGEM[®]-T Easy. Dessa forma, as demais bactérias que não receberam o vetor, não cresceram no plaqueamento que seguiu a transformação.

Como é esperado que uma proporção dos vetores não se ligue aos insertos formando as construções desejadas, uma segunda triagem foi feita, pela seleção *blue-white screening*. O MCS do vetor pGEM[®]-T Easy está localizado dentro da sequência codificadora do peptídeo α da enzima β -galactosidase. Quando esta sequência está íntegra, as bactérias que possuem o vetor são

capazes de gerar colônias azuis na presença do indutor IPTG e do substrato X-gal. Por outro lado, bactérias contendo as construções receberam vetores com a sequência codificadora do peptídeo α truncada pelos insertos, fazendo com que não haja metabolização do substrato X-gal. Nesse caso, colônias brancas são formadas e podem ser diferenciadas das azuis.

No terceiro passo de triagem, as colônias brancas de bactérias foram isoladas, cultivadas individualmente em poços de placas de cultura de 96 poços com fundo côncavo, em meio LB na presença de ampicilina e estocadas a -20 °C. Um pequeno volume das suspensões de bactérias de cada clone foi utilizado como *template* em reações de PCR de colônias contendo o par de *primers* pGEM[®]-F e pGEM[®]-R. Esses *primers* pareiam em regiões específicas do vetor, flanqueado o MCS e amplificando uma região de 315 pb. Dessa forma, o tamanho final esperado dos *amplicons* gerados foi de 891 pb (576 pb + 315 pb) para os clones contendo as construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ e pGEM[®]-rhVEGF_{165b} e 759 pb (444 pb + 315 pb) para os clones contendo a construção pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁. As amostras resultantes das reações foram fracionadas em geis de agarose 1,0% para detecção dos *amplicons*.

Como é possível verificar na Figura 4.4, as reações de PCR de colônias geraram *amplicons* de tamanhos variados devido à ligação de diferentes elementos no MCS do vetor pGEM[®]-T Easy. Os *amplicons* de tamanhos esperados estão indicados pelas setas, e correspondem a 891 pb para as construções contendo as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, e 759 pb para as construções contendo a isoforma rhVEGF₁₂₁. Os clones bacterianos representados por bandas de tamanhos esperados foram identificados nas placas de 96 poços para posterior isolamento.

rhVEGF₁₆₅ **rhVEGF₁₂₁** **rhVEGF_{165b}**

Figura 4.4. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR de colônias para triagem de clones bacterianos transformados com as construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅, pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ e pGEM[®]-rhVEGF_{165b}.

O par de *primers* pGEM[®]-F e pGEM[®]-R foi utilizado nas reações de PCR de colônias, tendo amostras de suspensão dos clones bacterianos transformados como *template*. Cada canaleta se refere a um clone bacteriano obtido, para cada construção. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler[™] 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

As amostras resultantes do PCR de colônia que apresentaram *amplicons* de tamanho esperado foram reamplificadas em novas reações de PCR para sequenciamento de DNA pelo método de terminação de cadeia (método de Sanger). As novas amostras foram submetidas a

A análise pelo programa *nucleotide blast*, para sequências de nucleotídeos, permitiu verificar que clones bacterianos haviam sido transformados com a construção pGEM®-rhVEGF₁₆₅ contendo a sequência codificadora correta da isoforma rhVEGF₁₆₅, ou seja, apresentando 100% de identidade e sem lacunas. Vale ressaltar que o dinucleotídeo “GC” no início da sequência (sublinhado) corresponde a resíduos do sítio de restrição para a enzima *NotI*. Da mesma forma, o trinucleotídeo “GGT” no final da sequência (sublinhado) corresponde a resíduos da sequência consenso de Kozak. Esses resíduos não fazem parte da sequência codificadora da isoforma rhVEGF₁₆₅. O alinhamento segue abaixo:

Homo sapiens vascular endothelial growth factor A (VEGFA), transcript variant 4, mRNA
Sequence ID: [ref|NM_001171626.1|](#)Length: 3554Number of Matches: 1

Score		Expect	Identities	Gaps	Strand
1049 bits(1162)		0.0	581/581(100%)	0/581(0%)	Plus/Minus
Query	382	<u>G</u> CTCACC GCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCC			441
Sbjct	1616	GCTCACC GCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCC			1557
Query	442	TTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTACAAAC			501
Sbjct	1556	TTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTACAAAC			1497

```

Query  502  AAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTC  561
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1496  AAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTC  1437

Query  562  TTTGGTCTGCATTACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCT  621
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1436  TTTGGTCTGCATTACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCT  1377

Query  622  TGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACAC  681
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1376  TGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACAC  1317

Query  682  TCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTG  741
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1316  TCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTG  1257

Query  742  AAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGA  801
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1256  AAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGA  1197

Query  802  TGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCT  861
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1196  TGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCT  1137

Query  862  CCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAG  921
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1136  CCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAG  1077

Query  922  GCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  962
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct  1076  GCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036

```

Depois de validada, somente a porção codificadora da sequência foi traduzida *in silico* pela ferramenta *Translate tool*, do portal de recurso de bioinformática ExPASy, e alinhada através do programa *protein blast*, para sequências proteicas. O resultado do alinhamento confirmou que a sequência primária da isoforma também estava correta, apresentando 100% de

identidade e ausência de lacunas. A cadeia polipeptídica apresentada abaixo mostra os 191 resíduos de aminoácidos que representam a proteína completa, composta pelo peptídeo sinal (26 resíduos) e pela proteína madura (165 resíduos), com destaque para a sequência CDKPRR, presentes em isoformas pró-angiogênicas (colorida em vermelho). O alinhamento segue abaixo:

vascular endothelial growth factor A isoform d [Homo sapiens]

Sequence ID: [ref|NP_001020539.2|](#) Length: 371 Number of Matches: 1

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps
413 bits(1061)	2e-142	Compositional matrix adjust.	191/191(100%)	191/191(100%)	0/191(0%)
Query 1	MNFLLSVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				60
	MNFLLSVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				
Sbjct 181	MNFLLSVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				240
Query 61	IFQEYPDEIEYIFKPCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				120
	IFQEYPDEIEYIFKPCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				
Sbjct 241	IFQEYPDEIEYIFKPCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				300
Query 121	SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCCKNTDSRCKARQLELN				180
	SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCCKNTDSRCKARQLELN				
Sbjct 301	SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCCKNTDSRCKARQLELN				360
Query 181	ERTCR CDKPRR				191
	ERTCR CDKPRR				
Sbjct 361	ERTCR CDKPRR				371

As mesmas etapas foram realizadas para a isoforma rhVEGF₁₂₁, e o programa *nucleotide blast* também indicou que clones bacterianos haviam sido transformados com a construção pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ contendo a sequência codificadora correta dessa isoforma (100% de identidade e sem lacunas). O dinucleotídeo “GC” e o trinucleotídeo “GGT”, não codificadoras, também estão presentes e indicados (sublinhados). O alinhamento segue abaixo:

Query	508	<u>GCT</u> CACCGCCTCGGCTTGTCACATTTTTCTTGCTTGCTCTATCTTTCTTTGGTCTGCAT	567
Sbjct	1484	<u>GCT</u> CACCGCCTCGGCTTGTCACATTTTTCTTGCTTGCTCTATCTTTCTTTGGTCTGCAT	1425
Query	568	TCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTGGTGAGGTTTG	627
Sbjct	1424	TCACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTGGTGAGGTTTG	1365
Query	628	ATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTCCAGGCCCTCG	687
Sbjct	1364	ATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTCCAGGCCCTCG	1305
Query	688	TCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAAGATGTACTCG	747
Sbjct	1304	TCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAAGATGTACTCG	1245
Query	748	ATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATGGCAGTAGCTG	807
Sbjct	1244	ATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATGGCAGTAGCTG	1185
Query	808	CGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCTCCTCCTTCTGCC	867
Sbjct	1184	CGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTGCCCTCCTCCTTCTGCC	1125
Query	868	ATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGCAAGGCTCCAA	927
Sbjct	1124	ATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGCAAGGCTCCAA	1065
Query	928	TGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT	956
Sbjct	1064	TGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT	1036

A tradução *in silico* através da ferramenta *Translate tool* e o alinhamento através do programa *protein blastx* também foram feitos (somente porção codificadora da sequência). O alinhamento confirmou que a sequência primária da isoforma rhVEGF₁₂₁ também estava correta, apresentando 100% de identidade e ausência de lacunas. A cadeia polipeptídica apresentada abaixo mostra os 147 resíduos de aminoácidos que representam a proteína completa, composta pelo peptídeo sinal (26 resíduos) e pela proteína madura (121 resíduos), com destaque para a sequência CDKPRR, presentes em isoformas pró-angiogênicas (colorida em vermelho). O alinhamento segue abaixo:

VEGFA protein [Homo sapiens]

Sequence ID: [gbjAAH65522.2](#) Length: 302 Number of Matches: 1

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps
322 bits(824)	2e-108	Compositional matrix adjust.	147/147(100%)	147/147(100%)	0/147(0%)
Query 1	MNFLLSVHWSLALLLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				60
	MNFLLSVHWSLALLLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				
Sbjct 156	MNFLLSVHWSLALLLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				215
Query 61	IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				120
	IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				
Sbjct 216	IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				275
Query 121	SFLQHNKCECRPKKDRARQEKCDKPRR				147
	SFLQHNKCECRPKKDRARQEKCDKPRR				
Sbjct 276	SFLQHNKCECRPKKDRARQEKCDKPRR				302

Ao se conduzir as mesmas etapas de análise de sequência para a isoforma rhVEGF_{165b}, e ao contrário do esperado, o alinhamento acusou que a sequência fornecida correspondia àquela da isoforma VEGF₁₆₅. Esse foi o caso para as sequências correspondentes a todos os clones que haviam sido triados por tamanho de *amplicon* no PCR de colônias. Dado que o erro foi detectado

Score		Expect	Identities	Gaps	Strand
1164 bits(1290)		0.0	645/645(100%)	0/645(0%)	Plus/Minus
Query	100	<u>TCAGTCTTTCTGGTGAGAGATCTGGTTCCCGAAACCCTGAGGGAGGCTCCTTCCTCCTG</u>			159
Sbjct	1680	TCAGTCTTTCTGGTGAGAGATCTGGTTCCCGAAACCCTGAGGGAGGCTCCTTCCTCCTG			1621
Query	160	<u>CCCGGCTCACC GCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTCAAGCTGCCT</u>			219
Sbjct	1620	<u>CCCGGCTCACC GCCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTCAAGCTGCCT</u>			1561
Query	220	CGCCTTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTACACGTCTGCGGATCTTGTA			279
Sbjct	1560	CGCCTTGCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTACACGTCTGCGGATCTTGTA			1501
Query	280	AAACAAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCACAGGGATTTTCTGTCTTGCTCTATC			339
Sbjct	1500	AAACAAATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCACAGGGATTTTCTGTCTTGCTCTATC			1441
Query	340	TTTCTTTGGTCTGCATTACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTG			399
Sbjct	1440	TTTCTTTGGTCTGCATTACATTTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTG			1381
Query	400	GCCTTGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCAC			459
Sbjct	1380	GCCTTGGTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCAC			1321
Query	460	ACACTCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGG			519
Sbjct	1320	ACACTCCAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGG			1261

```

Query  520  CTTGAAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGAT  579
          |||
Sbjct  1260  CTTGAAGATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGAT  1201

Query  580  TGGATGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTG  639
          |||
Sbjct  1200  TGGATGGCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACTTCACCACTTCGTGATGATTCTG  1141

Query  640  CCCTCCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAG  699
          |||
Sbjct  1140  CCCTCCTCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAG  1081

Query  700  CAAGGCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  744
          |||
Sbjct  1080  CAAGGCAAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036

```

O processo de geração da isoforma rhVEGF₁₆₅b foi interrompido neste ponto e alternativas para sua amplificação foram iniciadas.

4.2.1 Estratégias alternativas para amplificação da isoforma rhVEGF₁₆₅b

Como segunda estratégia adotada para a obtenção da isoforma rhVEGF₁₆₅b, buscou-se amplificá-la a partir de cDNA total de células ARPE-19, de epitélio pigmentar de retina, utilizando-se o par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF₁₆₅b-mut-R (Figura 4.5). Assim como na primeira tentativa de amplificação dessa isoforma (e nas amplificações das demais isoformas), o fracionamento em gel de agarose evidenciou mais de uma banda, mostrando que mais de um *amplicon* havia sido gerado, o que era esperado devido à identidade existente entre diferentes

isoformas do gene *VEGF-A*. Um dos *amplicons* possuía o tamanho esperado para a isoforma rhVEGF_{165b}.

Figura 4.5. Fracionamento em gel de agarose da reação de PCR para amplificação de rhVEGF_{165b} a partir de cDNA de células ARPE-19.

O par de *primers* VEGF-A-mut-F e VEGF_{165b}-mut-R foi utilizado na reação de amplificação de rhVEGF_{165b}, tendo uma amostra de cDNA total de células ARPE-19 como *template*. O *amplicon* correspondente à isoforma rhVEGF_{165b} está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

Depois de identificada, a banda correspondente à isoforma rhVEGF_{165b} foi isolada, o DNA nela presente purificado, clonado no vetor pGEM®-T Easy e as bactérias transformadas com a construções pGEM®-rhVEGF_{165b} foram triadas da mesma forma que para as outras isoformas. Ao se comparar as sequências obtidas do sequenciamento com aquelas do banco de dados do NCBI, verificou-se novamente que a isoforma incorreta (rhVEGF₁₆₅) havia sido amplificada (dados não mostrados).

Dessa forma, optou-se por uma segunda alternativa, consistindo de uma estratégia mutagênica, onde a sequência da isoforma rhVEGF₁₆₅ seria alterada em 18 resíduos de

nucleotídeos na sua porção 3' de forma a passar a ter a sequência da isoforma rhVEGF₁₆₅b. Para tal, novos *primers* foram desenhados (Tabela 3.3) de forma a provocar uma mutação sítio-dirigida no local desejado em três reações de PCR (Figura 3.2), sendo que a primeira e a segunda reações (PCR I e PCR II, respectivamente) tiveram como *template* a construção pGEM®-rhVEGF₁₆₅ previamente obtida. A reação final (PCR III) gerou um *amplicon* visualizado na forma de banda única após fracionamento em gel de agarose, apresentando tamanho correspondente ao esperado para a isoforma rhVEGF₁₆₅b (Figura 4.6).

Figura 4.6. Fracionamento em gel de agarose da reação de PCR III para amplificação de rhVEGF₁₆₅b a partir da construção pGEM®-rhVEGF₁₆₅.

Em um total de três reações de PCR, os pares de *primers* VEGF₁₆₅b-FI e VEGF₁₆₅b-RI, VEGF-A-mut-F e VEGF₁₆₅b-RII, e VEGF-A-mut-F e VEGF₁₆₅b-mut-R foram utilizados nas reações de amplificação para mutação sítio dirigida da sequência codificadora da isoforma rhVEGF₁₆₅ para obtenção da isoforma rhVEGF₁₆₅b, onde a construção pGEM®-rhVEGF₁₆₅ foi utilizada como *template*. O *amplicon* único correspondente à isoforma rhVEGF₁₆₅b está indicado com uma seta. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base

Mais uma vez, o DNA amplificado foi purificado e clonado no vetor pGEM®-T Easy, gerando a construção pGEM®-rhVEGF₁₆₅b que foi introduzida em bactérias *E. coli*. As reações de PCR de colônias evidenciaram que todos os clones bacterianos testados continham a construção com o inserto de tamanho correto (891 pb) (Figura 4.7).

Figura 4.7. Fracionamento em gel de agarose das reações de PCR de colônias para triagem de clones bacterianos transformados com a construção pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅b.

O par de *primers* pGEM[®]-F e pGEM[®]-R foi utilizado nas reações de PCR de colônias, tendo amostras de suspensão dos clones bacterianos transformados como *template*. Os *amplicons* de tamanho esperado estão localizados na altura indicada pela seta. Seis reações de PCR de colônias foram realizadas. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler[™] 100bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

A análise dos *contigs* gerados pós-sequenciamento da região codificadora da isoforma revelou que clones contendo a sequência correta e íntegra (100% de identidade e sem lacunas) haviam sido gerados utilizando esta estratégia mutagênica. Abaixo segue uma das sequências analisadas (os resíduos do trinucleotídeo não codificador “GGT” estão sublinhados):

Homo sapiens vascular endothelial growth factor A (VEGFA), transcript variant 7, mRNA
Sequence ID: [ref|NM_001171629.1](#)|Length: 3488Number of Matches: 1

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
1113 bits(579)	0.0	579/579(100%)	0/579(0%)	Plus/Minus
Query 384	TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCCTT	443		
Sbjct 1614	TCAGTCTTTCCTGGTGAGAGATCTGCAAGTACGTTTCGTTTAACTCAAGCTGCCTCGCCTT	1555		
Query 444	GCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTAACAACAA	503		
Sbjct 1554	GCAACGCGAGTCTGTGTTTTTGCAGGAACATTTACACGTCTGCGGATCTTGTAACAACAA	1495		
Query 504	ATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCACAGGGATTTTCTTGCTCTGCTCTATCTTTCTT	563		

```

Sbjct  1494  ATGCTTTCTCCGCTCTGAGCAAGGCCACAGGGATTTTCTTGTCTTGCTCTATCTTTCTT  1435

Query  564  TGGTCTGCATTACATTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTG  623
          |||
Sbjct  1434  TGGTCTGCATTACATTGTTGTGCTGTAGGAAGCTCATCTCTCCTATGTGCTGGCCTTG  1375

Query  624  GTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTC  683
          |||
Sbjct  1374  GTGAGGTTTGATCCGCATAATCTGCATGGTGATGTTGGACTCCTCAGTGGGCACACACTC  1315

Query  684  CAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAA  743
          |||
Sbjct  1314  CAGGCCCTCGTCATTGCAGCAGCCCCCGCATCGCATCAGGGGCACACAGGATGGCTTGAA  1255

Query  744  GATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATG  803
          |||
Sbjct  1254  GATGTACTCGATCTCATCAGGGTACTCCTGGAAGATGTCCACCAGGGTCTCGATTGGATG  1195

Query  804  GCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACCTCACCCTTCGTGATGATTCTGCCCTCC  863
          |||
Sbjct  1194  GCAGTAGCTGCGCTGATAGACATCCATGAACCTCACCCTTCGTGATGATTCTGCCCTCC  1135

Query  864  TCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGC  923
          |||
Sbjct  1134  TCCTTCTGCCATGGGTGCAGCCTGGGACCACTTGGCATGGTGGAGGTAGAGCAGCAAGGC  1075

Query  924  AAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  962
          |||
Sbjct  1074  AAGGCTCCAATGCACCCAAGACAGCAGAAAGTTCATGGT  1036

```

A tradução *in silico* da isoforma rhVEGF_{165b} e o subsequente alinhamento confirmaram que a sequência primária da isoforma rhVEGF_{165b} estava finalmente correta, apresentando 100% de identidade e ausência de lacunas. A cadeia polipeptídica apresentada abaixo mostra os 191 resíduos de aminoácidos que representam a proteína completa, composta pelo peptídeo sinal (26

resíduos) e pela proteína madura (165 resíduos) com destaque para a sequência SLTRKD, presentes em isoformas antiangiogênicas (colorida em verde). O alinhamento segue abaixo:

vascular endothelial growth factor A isoform g [Homo sapiens]

Sequence ID: [ref|NP_001028928.1|](#) Length: 371 Number of Matches: 1

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps
413 bits(1062)	9e-143	Compositional matrix adjust.	191/191(100%)	191/191(100%)	0/191(0%)
Query 1	MNFLLSVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				60
	MNFLLSVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				
Sbjct 181	MNFLLSVHWSLALLLYLHHAKWSQAAPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVD				240
Query 61	IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				120
	IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				
Sbjct 241	IFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTESNITMQIMRIKPHQGQHIGEM				300
Query 121	SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCCKNTDSRCKARQLELN				180
	SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCCKNTDSRCKARQLELN				
Sbjct 301	SFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSERRKHLFVQDPQTCKCCKNTDSRCKARQLELN				360
Query 181	ERTCRSLTRKD	191			
	ERTCRSLTRKD				
Sbjct 361	ERTCRSLTRKD	371			

Clones bacterianos que haviam sido individualmente transformados com construções contendo as sequências codificadoras corretas para cada uma das três isoformas foram expandidos em meio lisogênico (LB) e estocados em solução 10% glicerol, em ultrafreezer (– 80 °C).

4.3 Subclonagem das sequências rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁ no vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP e triagem das construções contendo insertos na orientação correta

Uma vez que construções contendo as sequências codificadoras íntegras para as três isoformas foram geradas, estas puderam ser transferidas para o vetor plasmidial de transferência lentiviral pLV-eGFP, a ser utilizado como vetor de expressão nas células HEK293. Para isso, isolou-se DNA plasmidial, independentemente, de três clones contendo as construções, seguido da digestão de cada preparação plasmidial com as enzimas de restrição *EcoRI* e *NotI* e tratadas com o fragmento Klenow, de forma que os insertos fossem separados do vetor pGEM[®]-T Easy e pudessem ser fracionados por eletroforese em gel de agarose (Figura 4.8).

Figura 4.8. Fracionamento em gel de agarose das digestões das construções pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅, pGEM[®]-rhVEGF_{165b} e pGEM[®]-rhVEGF₁₂₁ com as enzimas *Eco*RI e *Not*I.

As preparações de DNA plasmidial referentes a cada construção foram submetidas a reações de dupla digestão com as enzimas *Eco*RI e *Not*I (Thermo Fisher Scientific Inc.), que foram em seguida aplicadas em geis de agarose para fracionamento (pGEM[®]-rhVEGFs_E/N). As bandas correspondentes aos insertos estão indicadas por setas. PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler[™] DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.). E/N: amostra digerida com as enzimas *Eco*NI e *Not*I pb: pares de base.

Duas bandas podem ser visualizadas nas canaletas que correspondem às construções digeridas, sendo que a de maior tamanho (*ca.* 3.000 pb) corresponde ao vetor de expressão e a de menor tamanho corresponde a cada um dos insertos (indicadas pelas setas). As construções não digeridas (pGEM[®]-rhVEGFs) apresentam mais de uma banda, correspondendo a diferentes conformações adotadas pelos plasmídios/construções. As bandas correspondentes aos insertos foram isoladas dos geis e tiveram seu DNA purificado. Os insertos obtidos foram independentemente subclonados no vetor pLV-eGFP previamente linearizado. Como a subclonagem dos insertos no vetor consistiu de ligações entre fragmentos de extremidade cega (não coesivas), foi necessário realizar a triagem dos clones bacterianos que continham insertos que estavam ligados na orientação correta em relação ao vetor, o que se deu por diagnóstico de restrição. Para isso, foram selecionadas enzimas de restrição que reconhecessem uma única sequência interna aos insertos, mas que não na metade dos mesmos, bem como uma única sequência no vetor - neste caso, próxima da região de inserção dos mesmos. Seguindo esses critérios, as amostras digeridas da preparação plasmidial de cada construção pLV-rhVEGFs apresentariam um padrão de fracionamento em gel de agarose que poderia ser diferenciado de acordo com o sentido da orientação do inserto no vetor. Depois de digeridas, as amostras foram aplicadas em geis de agarose para fracionamento, permitindo diferenciar construções que possuíam o inserto na orientação correta (+) daqueles que estavam na orientação incorreta (-), de acordo com o padrão de bandas formado (Figura 4.9).

Figura 4.9. Exemplo de procedimento para determinação da orientação correta dos insertos por diagnóstico de restrição e fracionamento em gel de agarose das digestões da construção pLV-rhVEGF₁₂₁.

As preparações de DNA plasmidial da construção pLV-rhVEGF₁₂₁ foram submetidas a reações de digestão com a enzima *Eco*NI (Thermo Fisher Scientific Inc.), previamente selecionada de acordo com os padrões de digestão da sequência do inserto pelo programa NEBcutter V2.0 e do conhecimento dos sítios de restrição do vetor. As bandas que possibilitaram diferenciar os clones positivos (+) estão indicadas pelas setas. Os sinais de negativo (-) indicam clones que mostraram não conter os insertos na orientação correta. O mesmo procedimento foi realizado para as construções pLV-rhVEGF₁₆₅ e pLV-rhVEGF_{165b} (resultados não mostrados). PTM: padrão de tamanho molecular GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.). pb: pares de base.

Os clones bacterianos que continham construções contendo insertos na orientação correta foram expandidos e estocados em ultrafreezer.

4.4 Cotransfecção de células HEK293 com as construções pLV-rhVEGFs e o vetor de seleção pTK-Hyg para geração de clones celulares eGFP⁺

Uma vez que as construções pLV-rhVEGFs corretas foram identificadas, pôde-se partir para a transfecção de células HEK293 para a produção das isoformas de VEGF. O vetor pLV-eGFP possui a sequência codificadora da proteína eGFP, possibilitando a análise de células que receberam as construções, dado que as mesmas emitem fluorescência no comprimento de onda próximo da cor verde (507 nm). Contudo, optamos por uma segunda estratégia para seleção de clones celulares contendo as construções. Assim, cada uma das construções de pLV-rhVEGFs (ou o vetor pLV-eGFP, para uso futuro como controle negativo da expressão das isoformas) foi

independentemente cotransfectada com uma massa 40 vezes menor do vetor plasmidial pTK-Hyg, que confere resistência ao antibiótico higromicina B. Dessa forma, as células selecionadas por serem resistentes a higromicina, devido à presença do vetor pTK-Hyg, teriam probabilidade 40 vezes maior de conter as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP (devido à proporção em massa de 40:1). As células HEK293 foram cotransfectadas na passagem P22.

72 h depois da transfecção, a emissão de fluorescência pelas células foi confirmada sob microscópio invertido e, desse momento em diante, as culturas de células transfectantes passaram a ser tratadas com 200 µg/mL higromicina B. A partir do momento de início da adição de higromicina às culturas até 14 e 21 dias de tratamento houve uma redução acentuada do número de células viáveis, até que somente um número muito reduzido de células ainda emitindo fluorescência verde havia sobrado nas placas de cultura. Supõe-se que estas células possuem um maior número de cópias do vetor pTK-Hyg - o que lhes conferiu maior resistência ao antibiótico - e, conseqüentemente, maior probabilidade de possuírem cada uma das construções pLV-rhVEGFs. Uma vez que células fluorescentes individuais foram obtidas, as mesmas foram mantidas até que formassem pequenas colônias sem contato entre si, que foram em seguida isoladas das placas de cultura originais e transferidas para poços de placas de cultura de 96 poços para o estabelecimento dos clones celulares (Figura 4.10).

Figura 4.10. Seleção por higromicina B de células de células HEK293 cotransfectadas com as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP e vetor pTK-Hyg para geração de clones celulares.

No início do processo de seleção das células cotransfectadas com as construções pLV-rhVEGFs/pLV-eGFP e o vetor pTK-Hyg e tratadas com o antibiótico higromicina B, ainda foi possível detectar um número elevado de células vivas emitindo fluorescência (A). Ao longo da seleção, células menos resistentes ao antibiótico morrem, deixando somente aquelas células que provavelmente receberam um maior número de cópias do vetor pTK-Hyg e que, assim, tinham maior probabilidade de conter cada uma das construções pLV-rhVEGFs (B). Ao final do processo, células individuais puderam ser identificadas e mantidas até formarem colônias de células eGFP⁺ (C). Essas colônias foram individualmente transferidas das placas originais em que estavam para poços de placas de cultura de 96 poços, passando a estabelecer os clones celulares. Aumento: 100x (barra = 40 μ m).

Os clones celulares expressando rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁ e aqueles contendo somente o vetor pLV-eGFP foram denominados, respectivamente, de A, B, D e E (vale ressaltar que apesar de existirem os genes *VEGF-A*, *VEGF-B*, *VEGF-D* e *VEGF-E*, a presente tese apresenta somente a produção de isoformas pertencentes ao gene *VEGF-A*, não lidando com nenhuma outra isoforma e, portanto, o código adotado para a nomenclatura dos clones não guarda relação alguma com nenhum outro gene que não o *VEGF-A*). O número total de colônias e, portanto, de clones celulares, que se obteve nesse processo de seleção foi: cinco para rhVEGF₁₆₅ (clones A1-A5), treze para rhVEGF_{165b} (clones B1-B13), quinze para rhVEGF₁₂₁ (clones D1-D15) e um para pLV-eGFP (clone E1). Todos os clones foram mantidos sob as mesmas condições de cultivo (o antibiótico foi retirado do meio depois de uma semana), tendo sido subcultivados, expandidos e congelados para geração de um banco de clones de baixa passagem a

ser utilizado como estoque. As células foram constantemente checadas quanto à manutenção da capacidade de emissão de fluorescência, o que indica expressão da proteína eGFP, dando indícios de que a transfecção ocorreu de forma estável se detectada em passagens avançadas e indicando, também, que há expressão das isoformas rhVEGFs. Clones que morreram durante as etapas de subcultivo ou que pararam de emitir fluorescência foram descartados. A Figura 4.11 mostra sete clones celulares (A1, A4, B2, B13, D3, D14 e E1) em passagem P10 que mantiveram a expressão da proteína eGFP, indicando que a transfecção havia ocorrido de forma estável.

Figura 4.11. Avaliação da estabilidade da expressão da proteína eGFP pelos clones celulares A1, A4, B2, B13, D3, D14 e E1 em passagem P10.

Os clones celulares originados das colônias obtidas na seleção pelo antibiótico higromicina B foram subcultivados, expandidos e mantidos em cultura aderente. As células foram constantemente checadas quanto à expressão da proteína eGFP. Clones que perderam a viabilidade ou que pararam de emitir fluorescência foram descartados. Sete clones em passagem P10 são mostrados: A1 e A4 (rhVEGF₁₆₅), B2 e B13 (rhVEGF_{165b}), D3 e D14 (rhVEGF₁₂₁) e E1 (pLV-eGFP). Aumento: 40x (barra = 100 µm) e 100x (barra = 40 µm).

4.5 Análise da expressão proteica de clones celulares expressando as isoformas rhVEGFs

A determinação de quais clones celulares eGFP⁺ de fato expressavam as isoformas rhVEGFs foi realizada através de experimentos de *Western blot*. Uma vez que as proteínas continham o peptídeo sinal, era esperado que as mesmas fossem secretadas e, portanto, deveriam ser encontradas no meio de cultura condicionado. Dessa forma, os meios condicionados por células dos clones A, B, D e E nas passagens P2, P3 ou P5 foram coletados e as proteínas neles presentes precipitadas (a partir de um mesmo volume de meio condicionado para todas as amostras) e aplicadas em geis de poliacrilamida para fracionamento eletroforético. Em seguida, foi feita a transferência das proteínas dos geis por *eletroblotting*, imunolocalização com um anticorpo anti-VEGF (que reconhece as três isoformas) e revelação por quimiluminescência. Os devidos controles positivo (isoforma VEGF₁₆₅ proteica recombinante humana produzida em *E. coli*) e negativo (meio condicionado por células do clone E1) foram adicionados ao ensaio.

Os resultados apresentados na Figura 4.12 indicam que alguns dos clones celulares eGFP⁺ expressavam as isoformas rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁. Além disso, é possível constatar que alguns clones fluorescentes não expressavam a isoforma da maneira esperada. Ainda, pode-se verificar que existem clones que apresentaram uma diferença dos níveis de expressão das respectivas proteínas quando duas passagens diferentes foram comparadas. A banda correspondente ao controle positivo, que consiste de uma isoforma VEGF₁₆₅ humana comercial produzida em *S. frugiperda*, possui massa molecular menor (ca. 22 kDa) do que a isoforma rhVEGF₁₆₅ obtida dos clones de células HEK293 gerados nesse projeto, e que apresentam bandas múltiplas (ca. 23-25 kDa).

Figura 4.12. Análise da expressão das isoformas rhVEGFs por *Western blot* para os clones celulares A, B e D, a partir de meios condicionados.

Os meios condicionados pelos clones celulares A, B e D nas passagens P2, P3 ou P5 foram coletados após 24 h de condicionamento e estocados a - 20 °C. Uma vez descongelados, os meios tiveram as proteínas precipitadas utilizando-se ácido tricloroacético. Em seguida, as proteínas foram ressuspensas em tampão de amostra e aplicadas em geis SDS-PAGE 12% (condição redutora) para fracionamento por eletroforese. Uma vez fracionadas, as proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose, que foram então incubadas com uma solução de anticorpo policlonal anti-VEGF e reveladas em filmes por quimiluminescência (tempo de exposição: 2 seg) que foram documentados. As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes aos preditos para as isoformas estão indicadas com setas. Controle positivo: isoforma VEGF₁₆₅ proteica recombinante humana produzida em *E. coli*. Controle negativo: meio condicionado por células do clone E1 (contendo o vetor sem inserto). Padrão de massa molecular: BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons.

4.6 Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs em meios condicionados

por clones celulares na ausência de soro fetal bovino

A cinética de expressão foi importante para que se pudesse determinar melhor o tempo de condicionamento dos meios de cultura pelas células expressando as proteínas recombinantes.

Além disso, era necessário confirmar a estabilidade das isoformas ao longo dos diferentes períodos de condicionamento dos meios de cultura, de forma que nenhuma ou pouca degradação proteica fosse detectada.

Dessa forma, as células dos clones em passagem P8 – P10 foram cultivadas até atingirem aproximadamente 85% de confluência, momento em que o meio de cultura foi descartado. As células foram lavadas com solução salina e meio DMEM fresco sem soro fetal bovino foi adicionado às culturas. As culturas foram então incubadas e os meios de cultura condicionados foram coletados depois de 24, 48 ou 72 h. As proteínas presentes nos meios condicionados foram precipitadas e as amostras preparadas, sendo então aplicadas em geis de poliacrilamida para experimentos de *Western blot*. A avaliação da cinética de expressão dos clones celulares A1, A4, B2, B13, D3 e D14, escolhidos inicialmente com base na análise de expressão proteica das isoformas, permitiu verificar que as células continuaram expressando as proteínas de interesse mesmo quando cultivadas na ausência de soro fetal bovino (Figura 4.13).

Os mesmos volumes iniciais de meio de cultura condicionado foram usados para precipitar as proteínas de interesse, sendo possível comparar e verificar que houve uma maior expressão das proteínas depois de 48 e 72 h de condicionamento. Isso foi evidenciado por bandas mais eletrodensas do que as amostras correspondentes a meios coletados após 24 h de condicionamento. Ainda, apesar de haver um menor número de bandas e menos arraste do que o experimento retratado na Figura 4.12, pelo menos duas bandas foram observadas nas amostras referentes às isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, possivelmente devido aos mesmos motivos citados anteriormente, mas o mesmo não foi observado para rhVEGF₁₂₁. Além disso, é possível observar que, para todas as isoformas, as bandas apresentaram massa molecular maior do que

aquela predita, notavelmente para a isoforma rhVEGF₁₂₁. Não foram detectadas bandas para as amostras provenientes do clone E1, conforme esperado.

Figura 4.13. Cinética de expressão das isoformas rhVEGFs por *Western blot* dos meios condicionados pelos clones celulares A, B e D em cultura na ausência de soro fetal bovino.

As células dos clones A, B e D em passagens P8 – P10 foram cultivadas até atingirem 85% de confluência, momento em que tiveram o meio de cultura trocado para meio sem SFB. Os meios condicionados pelos clones foram coletados 24, 48 e 72 h depois da troca e estocados. Uma vez descongelados, os meios tiveram as proteínas precipitadas utilizando-se TCA. Em seguida, as proteínas foram ressuspensas em tampão de amostra e aplicadas em geis SDS-PAGE 12% (condição redutora) para fracionamento por eletroforese. Uma vez fracionadas, as proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose, que foram então incubadas com uma solução de anticorpo policlonal anti-VEGF e reveladas em filmes por quimiluminescência (tempo de exposição: 2 seg) que foram documentados. As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes aos preditos para as isoformas estão indicadas com setas. Padrão de massa molecular: BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons.

Uma vez que altos níveis de expressão já foram detectados depois de 48 h de condicionamento dos meios de cultura, este intervalo de tempo foi escolhido para a coleta de

meios para experimentos de purificação. Meios correspondentes a 24 e 72 h de condicionamento foram também coletados e estocados, mas não foram inicialmente utilizados para a purificação das isoformas.

4.7 Adaptação de clones celulares superprodutores à cultura em suspensão

Após avaliação da cinética de expressão dos clones celulares em cultura aderente, amostras desses clones celulares em passagem P10 foram adaptadas à cultura em suspensão estática, em meio sem componentes derivados de animais, pelos processos direto e sequencial. Como mostrado na Figura 4.14, as células de cinco clones (A1 e A4 - rhVEGF₁₆₅; B2 e B13 - rhVEGF_{165b}; D3 - rhVEGF₁₂₁) testados na condição de cultura em suspensão mantiveram a expressão da proteína eGFP após diversas gerações na cultura em suspensão. Nesta figura, os clones A1 e B13 foram adaptados pelo processo direto, e os clones A4, B2 e D3 pelo processo sequencial. Apesar de todos os clones terem sido inicialmente adaptados à cultura em suspensão por esses dois processos, houve queda de viabilidade ou perda da capacidade de emissão de fluorescência por parte de alguns deles, os quais foram então descartados. Principalmente para os clones superexpressando as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, é possível verificar a presença de aglomerados de células em suspensão. No caso do clone D3, superexpressando a isoforma rhVEGF₁₂₁, esses aglomerados foram encontrados em menor número e apresentavam menor tamanho. Os números das passagens indicadas nas legendas da figura correspondem ao número total de passagens e ao número de passagens feitas somente na cultura em suspensão (correspondente ao número total subtraído de 10, dado que a adaptação foi iniciada em P10).

Figura 4.14. Avaliação da estabilidade da expressão da proteína eGFP pelos clones celulares adaptados à cultura em suspensão.

Os clones celulares foram submetidos à adaptação a cultura em suspensão estática pelos processos direto e sequencial. As células foram constantemente checadas quanto à expressão da proteína eGFP. Clones que perderam a viabilidade ou que pararam de emitir fluorescência foram descartados. Cinco dos clones obtidos para as diferentes isoformas são mostrados. Passagens dos clones: clones A1, A4 e D3: P32 (22 passagens em suspensão), clone B2: P28 (18 passagens em suspensão) e clone B13: P33 (23 passagens em suspensão). Processo de adaptação: direto: A1 e B13; sequencial: A4, B2 e D3. Aumento: 40x (barra = 100 µm) e 100x (barra = 40 µm).

O meio de cultura condicionado pelos clones adaptados à cultura em suspensão que mantiveram a expressão de eGFP foram submetidos a análise por *Western blot* para confirmar a expressão das isoformas. A Figura 4.15 mostra o resultado de experimentos de *Western blot* onde podem ser visualizadas bandas que apresentam massas correspondentes às isoformas rhVEGFs.

Em **B** é possível visualizar bandas fracas de aproximadamente 40 kDa nas canaletas onde se encontram amostras referentes aos clones A1 e B13, superexpressando rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, respectivamente.

Figura 4.15. Expressão das isoformas rhVEGFs por Western blot dos meios condicionados pelos clones A, B e D em cultura em suspensão.

Os meios condicionados pelos clones celulares A, B e D adaptados à cultura em suspensão foram coletados depois de 48 h e tiveram as proteínas precipitadas utilizando-se TCA. Em seguida, as proteínas foram ressuspensas em tampão de amostra e aplicadas em geis SDS-PAGE 12% (condição redutora) para fracionamento por eletroforese. Uma vez fracionadas, as proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose, que foram então incubadas com uma solução de anticorpos anti-VEGF e reveladas em filmes por quimiluminescência (tempo de exposição: 3 ou 5 seg) que foram documentados. As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes àqueles preditos para as isoformas estão indicadas com setas. Passagens dos clones: em A: P 22 (12 passagens em suspensão); em B: P30 (20 passagens em suspensão). Padrão de massa molecular: BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder (A) ou Prestained Protein Ladder, Broad Range (B). kDa: quilodaltons.

4.8 Purificação das isoformas rhVEGFs por cromatografia de afinidade a heparina (rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}) e a níquel (rhVEGF₁₂₁)

4.8.1 Padronização da purificação: concentração dos meios condicionados e carregamento das colunas com uso de bomba peristáltica

Visando alcançar maior massa e pureza das proteínas de interesse, optou-se pela concentração dos meios de cultura condicionados, seguida de cromatografia de afinidade. Assim, 300 mL de meios condicionados por 48 h pelos clones celulares A1, B2 e D3 foram individualmente concentrados por centrifugação em colunas contendo filtros de celulose com limite nominal de massa molecular de 10.000 Da, gerando retentados que variaram de 2,5 a 1,5 mL, resultando em uma taxa de concentração que variou de 120 a 200 x. O volume dessas soluções foi normalizado para 3 mL pela adição de tampão de equilíbrio apropriado e, em seguida, as soluções de proteínas concentradas foram aplicadas em colunas cromatográficas (1 mL) de afinidade por heparina, no caso das proteínas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, ou níquel, no caso da proteína rhVEGF₁₂₁.

4.8.1.1 rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}

Colunas diferentes foram utilizadas na purificação de cada uma das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}. Depois das colunas serem equilibradas e seguindo a aplicação das amostras de proteínas, três tampões de eluição contendo a mesma concentração de fosfato de sódio (20 mM) e concentrações crescentes de NaCl (300 mM, 650 mM e 1 M) foram utilizados em sequência (*stepwise*) para a eluição das proteínas de interesse. Depois da coleta das frações de permeado e

lavado, dado que o volume de entrada de cada tampão foi de 3 mL, os eluatos foram coletados em frações de 3 mL e divididas em duas alíquotas de 1,5 mL cada, totalizando seis frações determinadas 300 mM', 300 mM'', 650 mM', 650 mM'', 1 M' e 1 M''. As amostras foram então aplicadas em geis SDS-PAGE 12% e submetidas a fracionamento eletroforético, em condições não redutoras, seguido de coloração por nitrato de prata. Experimentos de *Western blot*, feitos sob as mesmas condições até o momento do fracionamento, permitiram verificar se as proteínas purificadas correspondiam especificamente às isoformas de interesse. Os padrões de bandas dos eluatos foram comparados àqueles do meio condicionado e das frações permeada e de lavagem. Inicialmente foram feitos três processos (1º, 2º e 3º) completos de purificação, que apresentaram padrões de bandas semelhantes quando analisados por *Western blot* e coloração nitrato de prata. A Figura 4.16 mostra os resultados obtidos para amostras do 2º processo de purificação realizado.

Figura 4.16. Análise do grau de purificação das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} através de cromatografia de afinidade a heparina.

O meio condicionado pelos clones celulares A1 e B2 por 48 h foram coletados e concentrados em filtros de celulose Centricon[®] Plus-70 com limite de massa molecular de 10.000 Da. Os retentados tiveram os volumes ajustados para 3 mL em tampão de equilíbrio e foram aplicados em colunas cromatográficas de afinidade a heparina HiTrapTM Heparin HP equilibradas com tampão de equilíbrio. O tampão de lavagem foi aplicado e o permeado foi coletado, seguido da coleta do lavado. Em seguida os tampões de eluição com diferentes forças iônicas foram aplicados e os eluatos (300 mM', 300 mM'', 650 mM', 650 mM'', 1 M' e 1 M'' – NaCl) foram coletados. Para avaliação da eficiência do método cromatográfico de purificação, as amostras foram submetidas a fracionamento em geis SDS-PAGE 12% (condição não redutora) que foram então corados com nitrato de prata (painéis superiores) ou tiveram as proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose para experimentos de *Western blot* (painéis inferiores), sendo então documentados. As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes àqueles preditos para as isoformas estão indicadas com setas. As imagens mostradas nesta figura são referentes ao 2º processo de purificação. Padrão de massa molecular: BenchMarkTM Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons.

É possível observar que o processo de purificação cromatográfico baseado nas afinidades das proteínas por heparina foi eficiente para a purificação em pequena escala. Na canaleta correspondente ao meio condicionado, a coloração dos geis por nitrato de prata indicou que diversas proteínas estavam presentes no sobrenadante do meio condicionado pelas culturas das células superprodutoras (Figura 4.16). Os experimentos de *Western blot* evidenciaram que as

bandas de tamanhos de aproximadamente 40 kDa eram correspondentes aos dímeros das isoformas de rhVEGF. Somente no caso do gel referente à isoforma rhVEGF₁₆₅ foram identificadas bandas inespecíficas de intensidade fraca. As amostras de permeado mostraram as proteínas que não se ligaram à coluna, onde somente uma quantidade desprezível da isoforma rhVEGF₁₆₅ foi detectada (no experimento de *Western blot*, provavelmente devido a um artefato de preparação causado pela contaminação do poço – ou fração – do permeado pela amostra de meio condicionado). As canaletas referentes à fração de lavagem e eluato 300 mM’ não indicaram bandas para nenhum dos experimentos. Para as duas isoformas, foi possível detectar bandas específicas e de tamanho esperado para os dímeros, no eluato 300 mM’’, principalmente para rhVEGF_{165b}. Para ambas proteínas de interesse, os eluatos 650 mM’ e 650 mM’’ apresentaram as maiores quantidades de proteína, analisando-se de forma empírica o padrão de bandas dos geis. Algumas bandas inespecíficas e de baixa intensidade também foram imunorreativas.

No caso de rhVEGF₁₆₅ também foram detectadas duas bandas mais fracas presentes nesse eluato 300 mM’’. Ainda, bandas de alta densidade podem ser observadas para as duas frações eluídas com 1 M de NaCl. O gel corado com prata evidenciou de forma mais clara a presença de duas bandas próximas à altura equivalente a 40 kDa, indicando que diferentes formas da proteína (glicoformas ou formas não totalmente processadas) foram purificadas. Já para rhVEGF_{165b}, somente a fração 1 M’ apresentou pequenas quantidades dessa isoforma.

4.8.1.1.1 Concentração das isoformas rhVEGFs nos eluatos e massa total das proteínas

Com o objetivo de detectar as concentrações de cada uma das isoformas nos eluatos, foi utilizado um kit comercial para ensaio imunoenzimático colorimétrico (Quantikine® ELISA Human VEGF Immunoassay). Uma vez que os experimentos para verificar a eficiência da purificação das proteínas indicou que haviam grandes quantidades das mesmas nos eluatos, as amostras foram diluídas em PBSA de 10.000 a 1.000.000 vezes para somente então serem quantificadas. Uma curva-padrão foi utilizada para cada um dos experimentos de quantificação (Figura 4.17).

Figura 4.17 Modelo de curva-padrão para ensaios enzimáticos de quantificação das rhVEGFs purificadas.

Uma curva-padrão foi estabelecida para cada um dos ensaios imunoenzimáticos realizados para determinar a concentração das isoformas rhVEGFs. Todos os reagentes necessários, incluindo uma solução padrão de VEGF de concentração conhecida, foram fornecidos no kit Quantikine® ELISA Human VEGF Immunoassay. A leitura de absorbância dos pontos da curva-padrão foi feita em comprimento de onda de 450 nm, sendo em seguida subtraída da leitura de densidade óptica feita a 570 nm para correção de imperfeições na placa e aumento da precisão do teste. Os dados de absorbância corrigidos, juntamente com valores conhecidos de concentrações de VEGF, foram plotados para construção da curva-padrão. A equação da reta ($y = ax + b$) e o coeficiente de determinação (R^2) estão discriminados na figura.

Todas as curvas-padrão geradas tiveram um coeficiente de determinação (R^2) próximo de 1, indicando que as linhas de regressão representavam os dados de forma fiel. Assim, as curvas-padrão eram confiáveis para a determinação das concentrações dos rhVEGFs nas amostras através da medida da absorbância (leitura a 450 nm e correção em 540 nm) de cada ponto ao final dos experimentos.

Com base nos experimentos de *Western blot* e coloração com nitrato de prata, eluatos dos 2º e 3º processos de purificação foram selecionados para a quantificação das isoformas.

Os processos e eluatos foram escolhidos pelos padrões de bandas mais correspondentes aos esperados para as proteínas de interesse e pelas bandas mais intensas, respectivamente. A Tabela 4.4 mostra as concentrações das isoformas nos eluatos, sendo possível notar que houve grande variação nas concentrações das proteínas entre eluatos diferentes. A medida da concentração das isoformas no meio condicionado será realizada em breve e é essencial para inferir o rendimento do processo de purificação.

Tabela 4.4 Concentração das isoformas rhVEGFs nos eluatos dos processos de purificação.

Processo de Purificação	Isoforma	Eluato	[rhVEGF] ng/ μ L
2º	rhVEGF ₁₆₅	300 mM''	11,59
		650 mM'	88,72
		650 mM''	46,31
	rhVEGF ₁₆₅ ^b	300 mM''	25,55
		650 mM'	110,97
3º	rhVEGF ₁₆₅	300 mM''	77,56
		650 mM'	67,23
	rhVEGF ₁₆₅ ^b	300 mM''	50,90
		650 mM'	18,76

Amostras desses eluatos foram utilizadas para os ensaios de atividade biológica e análises estruturais descritos nas sessões adiante.

Com a finalidade de avaliar a estabilidade das proteínas purificadas, as amostras foram mantidas nos tampões originalmente utilizados nas eluições do 2º processo cromatográfico de purificação a 4 °C por três meses, sendo então submetidas a análise por *Western blot* (Figura 4.18). Os resultados obtidos evidenciam que as isoformas apresentam relativa estabilidade nas condições em que foram mantidas. Para a isoforma rhVEGF₁₆₅, a altura das bandas a ela correspondentes permaneceu praticamente inalterado para as amostras dos eluatos 650 mM', 1 M' e 1 M'', o que não ocorreu para as demais frações, incluindo a amostra de meio condicionado. Já no caso de rhVEGF_{165b}, o padrão de bandas permaneceu praticamente inalterado quando comparado com aquele observado no experimento de *Western blot* feito em seguida à purificação (resultados deste experimento apresentados na Figura 4.16), exceto no caso da amostra de meio condicionado.

Figura 4.18. Análise de estabilidade das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas no tampão de eluição.

As frações obtidas na purificação das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} e mantidas a 4 °C foram submetidas a análise de estabilidade por *Western blot*. Para isso, as amostras foram submetidas a fracionamento em geis SDS-PAGE 12% (condição não redutora) que tiveram as proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose em experimentos de *Western blot*, sendo então documentados. As bandas que apresentaram massas correspondentes às preditas para as isoformas estão indicadas com setas. As imagens mostradas nesta figura são referentes ao 2º processo de purificação. Padrão de massa molecular: Prestained Protein Ladder, Broad Range. kDa: quilodaltons.

4.8.1.2 rhVEGF₁₂₁

Uma coluna de 1 mL empacotada com resina contendo íons Ni^{2+} foi utilizada na purificação da isoforma rhVEGF₁₂₁. A coluna foi equilibrada e a amostra de meio condicionado concentrado foi aplicada a ela, seguida pelos três tampões de eluição contendo concentrações crescentes de imidazol (10 mM, 25 mM e 100 mM), em sequência (*stepwise*). Depois da coleta da fração de permeado e lavado, os eluatos foram coletados em frações de 3 mL (10 mM, 25 mM e 100 mM de imidazol). As amostras foram então aplicadas em geis SDS-PAGE 12% e submetidas a fracionamento eletroforético, em condições não redutoras, seguido de coloração por nitrato de prata. Experimentos de *Western blot* também foram realizados para detectar,

especificamente, as isoformas purificadas. Os padrões de bandas dos eluatos foram comparados com aqueles do meio condicionado e frações permeada e de lavagem (Figura 4.19).

Figura 4.19. Purificação da isoforma rhVEGF₁₂₁ por cromatografia de afinidade a metal.

O meio condicionado pelo clone D3 por 48 h foi coletado concentrado em um filtro de celulose Centricon® Plus-70 com limite de massa molecular de 10.000 Da. O retentado teve o volume ajustado e foi aplicado em uma coluna cromatográfica de afinidade a metal (Ni²⁺) equilibrada com tampão de equilíbrio. O tampão de lavagem foi aplicado e o permeado foi coletado, seguido da coleta do lavado. Em seguida os tampões de eluição com diferentes concentrações de imidazol (10 mM, 25 mM e 100 mM) foram aplicados e os eluatos foram coletados. Para avaliação da eficiência do método cromatográfico de purificação, as amostras foram submetidas a fracionamento em geis SDS-PAGE 12% (condição não redutora) que foram então corados com nitrato de prata ou tiveram as proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose para experimentos de *Western blot*, sendo então documentados. As bandas que apresentaram massas correspondentes às previstas para as isoformas estão indicadas com setas. Padrão de massa molecular: Prestained Protein Ladder, Broad Range. kDa: quilodaltons.

4.8.2 Otimização da purificação em sistema cromatográfico HPLC

Para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}, o processo de purificação foi otimizado no sistema de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) Äkta Purifier UPC-100 (GE Healthcare). Um volume de 100 mL de cada amostra de meio condicionado foi aplicado a colunas HiTrap™ Heparin HP (GE Healthcare) de 1 mL e as isoformas foram eluídas através do aumento da pressão iônica do tampão de eluição, dado, por sua vez, pelo aumento da concentração de NaCl no tampão de eluição.

O cromatograma obtido para a purificação da isoforma rhVEGF₁₆₅ indicou um pico de absorbância de luz UV (16,429 mAU) no eluato correspondente a 36,421 mS/cm de condutância equivalente a 986 mM NaCl. Um outro pico de menor intensidade (7,603 mAU) foi identificado a 85,264 mS/cm (1,702 M NaCl). Outros picos aparentes também foram identificados a 53,275 mS/cm (11,257 mAU, 1,236 M NaCl), a 64,139 mS/cm (8,366 mAU; 1,394 M NaCl). e a 101,399 mS/cm (3,196 mAU; 1,944 M NaCl). Já para rhVEGF_{165b}, o pico de absorbância de luz UV (11,938 mAU) se deu no eluato correspondente a 37,915 mS/cm de condutância, equivalente a 1,006 M NaCl. Outros três picos aparentes também foram identificados a 80,611 mS/cm (3,07 mAU; 1,622 M NaCl), 90,7 mS/cm (2,456 mAU; 1,780 M NaCl) e 98,14 mS/cm (2,035 mAU; 1,89 M NaCl). Os cromatogramas das purificações das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} são apresentados nas Figuras 4.20 e 4.21.

Figura 4.20. Otimização da purificação da isoforma rhVEGF₁₆₅ por cromatografia de afinidade a heparina no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100.

O meio condicionado pelo clone celular A1 por 48 h foi coletado e carregado (100 mL) no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100, ao qual foi conectada uma coluna cromatográfica de afinidade a heparina HiTrapTM Heparin HP. A amostra foi injetada depois de a coluna ser equilibrada, seguido da lavagem. Em seguida, a eluição se deu pelo aumento em gradiente das concentrações de NaCl e, consequentemente, da força iônica (A). A ampliação do cromatograma na etapa de eluição permite a visualização de um pico principal de absorbância de luz UV (fração D1), bem como um segundo pico a uma maior força iônica e alguns picos aparentes (frações D1, D2 e D3) (B).

Figura 4.21. Otimização da purificação da isoforma rhVEGF₁₆₅b por cromatografia de afinidade a heparina no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100.

O meio condicionado pelo clone celular B2 por 48 h foi coletado e carregado (100 mL) no sistema cromatográfico Äkta Purifier UPC-100, ao qual foi conectado uma coluna cromatográfica de afinidade a heparina HiTrapTM Heparin HP. A amostra foi injetada depois de a coluna ser equilibrada, seguido da lavagem. Em seguida, a eluição se deu pelo aumento em gradiente das concentrações de NaCl e, consequentemente, da força iônica (A). A ampliação do cromatograma na etapa de eluição permite a visualização de um pico principal de absorbância de luz UV (fração C8), bem como um segundo pico a uma maior força iônica e dois picos aparentes (frações C9 e C10) (B). Houve um pico de absorbância de luz UV ao final na injeção da amostra, o que aumentou a escala representada no eixo y quando comparado com o cromatograma da purificação da isoforma rhVEGF₁₆₅, causando a impressão de haver consideravelmente menos quantidade de rhVEGF₁₆₅b nos elutos do que rhVEGF₁₆₅ (A – Figuras 4.20 e 4.21). A ampliação da imagem do cromatograma mostrou que a diferença não foi tão contrastante (B – Figuras 4.20 e 4.21).

A análise dos eluatos obtidos através das purificações através de fracionamento em geis de poliacrilamida corados com *Coomassie Brilliant Blue* ou por *Western blot* confirmaram a presença das bandas nos tamanhos esperados. Os eluatos para os quais foram identificadas as bandas nos geis corresponderam às frações que evidenciaram os maiores picos de absorbância de luz UV nos cromatogramas (Figura 4.22).

Figura 4.22. Análise do grau de purificação das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} através de cromatografia de afinidade a heparina no sistema de HPLC.

Os eluatos obtidos nas purificações das isoformas através do sistema de HPLC foram aplicados em geis de poliacrilamida submetidas a fracionamento em geis SDS-PAGE 12% (condição não desnaturante) que foram então corados com *Coomassie Brilliant Blue* ou tiveram as proteínas transferidas para membranas de nitrocelulose para experimentos de *Western blot*, sendo então documentados. Amostras dos permeados das purificações também foram aplicadas. Amostras das proteínas purificadas no 2º processo de purificação foram aplicadas na canaleta 1 de cada gel (rhVEGF₁₆₅ Purif. e rhVEGF_{165b} Purif.). As bandas que apresentaram tamanhos correspondentes aos preditos para as isoformas estão indicadas com setas. Padrão de massa molecular: BenchMark™ Pre-Stained Protein Ladder. kDa: quilodaltons.

As amostras dos eluatos em que as bandas mais intensas foram identificadas (C12 ou D1 para rhVEGF₁₆₅ e C8 para rhVEGF_{165b}) serão submetidas a digestão triptica e análise por espectrometria de massas do tipo MALDI-TOF. Os perfis cromatográficos gerados serão comparados com aqueles de bancos de dados, o que permitirá mais uma análise sobre a identidade das proteínas de interesse. As análises por dicroísmo circular e eletroforese capilar necessitam de otimização - que está em andamento - para geração de resultados conclusivos.

4.9 Ensaios para análise da atividade angiogênica de rhVEGFs

4.9.1 Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay)

Na abordagem *in ovo* do ensaio da membrana corioalantoide, ovos de galinha fertilizados foram mantidos em incubadora com temperatura e humidade adequadas a partir do dia embrionário E0. Em E3 todo o conteúdo dos ovos foi transferido para barcas de pesagem médias e retornado para as mesmas condições de incubação por dez dias. Em E13 500 ng das proteínas purificadas foram aplicados (cada proteína individualmente ou em conjunto) sobre pequenos pedaços (9 mm²) quadrangulares de trama de PGA/5% PLLA, que foram então colocados sobre vasos sanguíneos da membrana corioalantoide desenvolvida. Um ponto contendo PBS foi usado como controle negativo. As regiões da membrana corioalantoide foram fixadas com formaldeído após 72 h de indução e as tramas foram coletadas e documentadas (E16). O tratamento com a isoforma rhVEGF₁₆₅ levou a um crescimento de vasos sanguíneos de diferentes calibres de forma mais acentuada que o controle negativo, o que é evidenciado na Figura 4.23 (C). Quanto à isoforma rhVEGF_{165b}, não foi possível verificar uma diferença na densidade de vasos quando comparado com o controle.

Figura 4.23 Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) em embriões de galinha para avaliação *in vivo* da atividade das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas.

Embriões de galinha (*Gallus gallus domesticus*) foram mantidos em incubadoras próprias para ovos de aves do dia da postura (E0) até o dia E3 (A), quando foram transferidos para barcas de pesagem médias e incubados nessa condição até o término dos experimentos. No dia E13, as isoformas purificadas (ou PBS – controle negativo) foram aplicadas sobre pedaços de trama de PGA/5% PLLA, que foram então colocadas sobre vasos sanguíneos da membrana corioalantoide desenvolvida. Um mesmo embrião recebeu mais de uma trama, contendo solução salina (PBS - controle negativo), 500 ng rhVEGF₁₆₅, 500 ng rhVEGF_{165b} ou mesmo 500 ng de ambos (B). As setas apontam os pedaços de trama de PGA/5% PLLA contendo o controle negativo ou os fatores. Após 72 h (E16), as regiões da membrana corioalantoide onde foram colocados os pedaços de trama foram fixados com 37% formaldeído, coletados e a porção interna da membrana foi documentada sob estereomicroscópio (C). Em C são mostrados pontos coletados de dois ovos que foram induzidos e permaneceram viáveis até E16. Neste experimento não foi realizada a indução de um ponto contendo 500 ng de ambas as isoformas.

A Figura 4.24 mostra uma repetição desse experimento, na qual foi estudada, também, a combinação de 500 ng de cada um dos dois fatores. Três embriões sobreviveram, contudo somente até o dia E15 e, dessa forma, o tempo de indução foi de 48 h. Em todos os casos, os pontos induzidos com a isoforma rhVEGF₁₆₅ apresentaram maior densidade de vasos sanguíneos de pequeno calibre, quando comparado com o controle contendo PBS. Os pontos induzidos com rhVEGF_{165b} também aparentaram conter mais vasos do que o controle (principalmente ovos #36 e #38). Já para os pontos em que a indução foi feita com ambos os fatores, a densidade de vasos sanguíneos foi semelhante àquela dos pontos induzidos somente com rhVEGF₁₆₅.

Figura 4.24. Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) em embriões de galinha para avaliação *in vivo* do efeito da ação combinada de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₆₅b purificadas.

O experimento foi repetido sob as mesmas condições detalhadas para o experimento da Figura 4.23, agora adicionando também um ponto contendo 500 ng de ambas as isoformas. As amostras deste experimento foram coletadas após 48 h de indução pois foi constatado que os embriões não estavam vivos em E15.

O ensaio também foi repetido em um modelo de embriões de codorna transgênica Tie1:H2B-eYFP, que expressam eYFP (*enhanced Yellow Fluorescent Protein*) no núcleo de células endoteliais, empregando-se a abordagem *in ovo*. Os ovos de codorna foram mantidos em incubadoras próprias para ovos de aves do dia E0 ao E3, quando uma janela foi aberta na região lateral da casca dos ovos, expondo o embrião e a membrana corioalantoide em desenvolvimento. Depois de 48 h (E7) foi feita a aplicação dos pedaços de tramas de PGA/5% PLLA contendo PBS (controle negativo) ou as isoformas purificadas (500 ng rhVEGF165 ou 500 ng rhVEGF165b). Devido ao pequeno tamanho dos ovos, somente um ponto experimental (ou controle) pôde ser testado por embrião. A indução se deu por 72 h, até E10, quando as regiões induzidas foram fixadas com formaldeído 37% e analisadas sob um estereomicroscópio acoplado a um sistema de detecção de fluorescência (Figura 4.25).

Somente três embriões sobreviveram até o momento da coleta dos pontos, sendo que o embrião que recebeu a isoforma rhVEGF_{165b} não era transgênico e, portanto, a fluorescência das células endoteliais não pôde ser avaliada. Ao se comparar a densidade de vasos presentes na região da trama contendo a isoforma rhVEGF165, não foi possível verificar uma diferença da mesma com relação ao embrião controle exposto a PBS.

Figura 4.25. Ensaio da membrana corioalantoide (CAM Assay) em embriões de codorna transgênicos (Tie1:H2B-eYFP) para avaliação *in vivo* da atividade das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas.

Embriões de codorna (*Coturnix* sp.) transgênicos expressando eYFP no núcleo de células endoteliais (Tie1:H2B-eYFP) foram mantidos em incubadoras próprias para ovos de aves do dia da postura (E0) até o dia E3, quando uma janela foi aberta na região lateral dos ovos, de forma a expor o embrião e a membrana corioalantoide. Em E7 foi feita a aplicação dos pedaços de tramas de PGA/5% PLLA contendo PBS (controle negativo) ou as isoformas purificadas (500 ng rhVEGF₁₆₅ ou 500 ng rhVEGF_{165b}). Somente um ponto experimental, ou controle, foi aplicado por embrião. Depois de 72 h (E10) as regiões foram fixadas e analisadas sob um estereomicroscópio acoplado a um sistema de detecção de fluorescência. Três diferentes aumentos são mostrados.

4.9.2 AngioPhase™ Kit

Em uma segunda abordagem para avaliação da atividade biológica das isoformas, foi utilizado o kit comercial AngioPhase™ Kit, responsivo a moléculas estimuladoras e inibidoras de

angiogênese. Todos os reagentes (incluindo as células), menos as soluções de lavagem, bloqueio e fixação do procedimento de fixação, foram fornecidos no kit. No dia 1, uma cultura mista de células HUVEC e células de suporte foi plaqueada em um placa de 24 poços e mantida sob condições padrão de cultura, com todos os poços da placa recebendo o mesmo meio de cultura. No dia 2 o meio de cultura foi trocado e as células foram induzidas independentemente com cada proteína de interesse, nas concentrações de 2, 10 e 50 ng/mL. Os pontos de controle positivo (2 ng/mL VEGF), negativo (20 μM suramin) e aquele contendo somente o meio de cultura “base” também foram analisados. Os meios de cultura foram trocados a cada dois dias, mantendo-se sempre a mesma condição para cada ponto, até o dia 14. Nesse dia as culturas foram documentadas e, logo em seguida, lavadas e fixadas e marcadas para CD31 (PECAM-1). O procedimento de marcação das células/túbulos por CD31 (substrato insolúvel BCIP/NBT) e o procedimento opcional de ELISA (substrato solúvel p-NPP) foram realizados. Os resultados representam as médias de pontos em duplicata (10 ng/mL e 50 ng/mL rhVEGF₁₆₅b; 50 ng/mL rhVEGF₁₆₅) ou triplicata (todos os controles; 2 ng/mL rhVEGF₁₆₅b; 2 ng/mL e 10 ng/mL rhVEGF₁₆₅).

A Figura 4.26 mostra os registros de microscopia de contraste de fase de regiões representativas dos pontos das células ainda em cultura, no dia 14. É possível visualizar, para todos os pontos, estruturas tubulares que se comunicam e ramificam, formando uma rede de microvasos que seriam formados pelas células HUVEC. Abaixo desses microvasos estão células de suporte, alongadas, dispostas lado a lado e com um padrão mais organizado do que as estruturas tubulares ramificadas acima delas. Contudo, não é possível distinguir, claramente, a diferença da densidade da rede capilar entre os pontos controle e induzidos com as isoformas.

Figura 4.26. AngioPhase™ Kit: cultura celular para avaliação *in vitro* da atividade das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas.

Todas as orientações do fabricante foram seguidas para realização do experimento com o AngioPhase™ Kit. No dia um, a cultura mista de células endoteliais derivadas de veia do cordão umbilical humano (HUVEC) e células de suporte foram descongeladas, plaqueadas uniformemente sobre uma placa de cultura de 24 poços e sempre mantidas sob condições convencionais de cultura. O tratamento com as proteínas de interesse (2, 10 e 50 ng/mL) e controles (positivo, negativo e somente meio de cultura) teve início no dia dois e término no dia 14. Os meios de cultura foram trocados a cada dois dias. As imagens são de campos representativos de cada ponto experimental ou controle no dia 14. Imagens em contraste de fase obtidas através de um microscópio invertido. Controle positivo: 2 ng/mL VEGF. Controle negativo: 20 μM suramin. Meio controle: somente meio de cultura. Replicatas dos pontos: proteínas de interesse – duplicata ou triplicata; controles: triplicata.

A marcação para células CD31⁺ (endoteliais) das culturas ressaltou a presença de células endoteliais em cada um dos pontos experimentais e controle. A Figura 4.27 apresenta a documentação, por imagem em estereomicroscópio, das culturas marcadas, reveladas e fixadas.

Para as duas isoformas, todas as concentrações de tratamento resultaram em marcação para CD31 em maior extensão e de forma mais intensa do que o controle negativo ou na presença de somente meio de cultura. No caso de rhVEGF₁₆₅, os pontos tratados com a concentração de 10 ng/mL apresentaram a marcação mais positiva, seguidos daqueles mantidos com a concentração de 50 ng/mL. O tratamento com 2 ng/mL resultou em marcação semelhante àquela do controle positivo. Para a isoforma rhVEGF_{165b}, as marcações foram menos intensas do que aquelas dos pontos tratados com a isoforma rhVEGF₁₆₅, para as mesmas concentrações. A marcação dos pontos tratados com 2 ng/mL também ficou semelhante ao do controle positivo.

Figura 4.27. AngioPhase™ Kit: marcação para CD31 da cultura celular para avaliação *in vitro* da atividade das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas.

Todas as orientações do fabricante foram seguidas para realização do experimento com o AngioPhase™ Kit. As mesmas etapas descritas na Figura 4.27 foram seguidas até o dia 14. Depois de documentadas em cultura, as células foram lavadas, fixadas e bloqueadas antes da marcação com anticorpo 1^{ário} anti-CD31, anticorpo 2^{ário} e revelação (substrato insolúvel BCIP/NBT). Depois da revelação, a coloração foi permanentemente fixada. As regiões escuras nas foto a presença de vasos sanguíneos CD31⁺. As imagens são de campos representativos de cada ponto experimental ou controle. Imagens obtidas através de um estereomicroscópio. Controle positivo: 2 ng/mL VEGF. Controle negativo: 20 μM suramin. Meio controle: somente meio de cultura Replicatas dos pontos: proteínas de interesse – duplicata ou triplicata; controles: triplicata.

O ensaio de ELISA para detecção do substrato solúvel p-nitrofenol fosfato (p-NPP, *p-NitroPhenol Phosphate*), indicador indireto da concentração de CD31, foi realizado após a marcação das células com o anticorpo anti-CD31. A quantificação da presença p-NPP se deu pela medida de absorbância no comprimento de onda de 405 nm. O teste de variância one-way

ANOVA foi empregado, sendo que a análise foi feita no programa GraphPad Prism versão 4.0. Os resultados apresentados na Figura 4.28 evidenciam não haver diferença entre o controle positivo e o tratamento com 2, 10 e 50 ng/mL rhVEGF₁₆₅ ou com 2 ng/mL rhVEGF_{165b}. O único tratamento que mostrou uma diferença estatística, quando comparado com o controle, e entre todas as concentrações de ambas as isoformas, foi o de 10 ng/mL rhVEGF₁₆₅. Todos os pontos apresentaram diferença estatística ($p \leq 0,001$) em relação ao controle negativo.

Figura 4.28. AngioPhase™ Kit: ensaio de ELISA para detecção de CD31 através da medida do substrato solúvel p-NPP.

O ensaio de ELISA foi realizado depois da etapa de marcação de CD31 com os anticorpos primário e secundário e antes da revelação/fixação permanente (Figura 4.27), seguindo todas as orientações do fabricante. A quantificação de CD31 é dada através da absorbância ($\lambda = 405 \text{ nm}$) do substrato solúvel p-NPP. **A:** controles VS rhVEGF₁₆₅; **B:** controles VS rhVEGF_{165b}; **C:** rhVEGF₁₆₅ VS rhVEGF_{165b}. Controle positivo: 2 ng/mL VEGF. Controle negativo: 20 μM suramin. Meio controle: somente meio de cultura. rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}: duplicata ou triplicata; controles: triplicata. *, $p \leq 0,05$; **, $p \leq 0,01$; ***, $p \leq 0,001$. Análise estatística: One-way ANOVA; GraphPad Prism versão 4.0.

4.10 Avaliação dos efeitos de rhVEGFs sobre a cultura de unidades organoides e a formação de intestino curto engenheirado (TESI) murino

4.10.1 Culturas de unidades organoides

Unidades organoides isoladas de camundongos C57Bl/6 eGFP⁺ foram misturadas a meio de cultura e MatrigelTM, plaqueadas em poços de placas de cultura de seis poços e mantidas em cultura 3D por até cinco dias. As unidades organoides formam estruturas esféricas visíveis sob luz transmitida e sistema de detecção de fluorescência. Juntamente com as unidades organoides, é possível verificar a presença de células e estruturas coisoladas que fazem parte do mesênquima. As culturas foram mantidas por até cinco dias, sendo possível notar um crescimento e enriquecimento das unidades organoides (Figura 4.29).

Figura 4.29. Culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides de camundongos C57Bl/6 eGFP⁺.

Camundongos C57Bl/6 eGFP⁺ foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e MatrigelTM (ambiente 3D), plaqueadas em poços de placa de cultura P6 e observadas sob microscópio invertido com fonte de luz transmitida e luz fluorescente. Em **A** as imagens retratam uma cultura um dia após o plaqueamento. As cabeças de seta nos painéis superiores indicam um fragmento de mesênquima coisolado com as unidades organoides. As setas nos painéis inferiores indicam algumas das unidades organoides. Aumento: 100x (painéis superiores) e 200x (painéis inferiores). Em **B** é retratada uma cultura de unidades organoides um, três e cinco dias após o plaqueamento. Aumento: 100x. **A** e **B** consistiram de experimentos distintos.

4.10.2 Expressão do RNA de *Kdr* (*Vegfr-2*) e *Flt-1* (*Vegfr-1*) em culturas de unidades organoides

Para a análise de expressão dos genes *Kdr* (*Vegfr-2*) e *Flt-1* (*Vegfr-1*), o RNA total das culturas de unidades organoides foi isolado e, a partir deste, o cDNA total foi sintetizado e submetido a reações de PCR contendo *primers* específicos para a amplificação dos dois genes, além do gene *Gapdh*, de expressão constitutiva. As amostras foram então submetidas a fracionamento em gel de agarose para visualização.

Como mostrado na Figura 4.30, o par de *primers* KDR_F e KDR_R, utilizado em reações de PCR contendo como *template* o cDNA total de vasos sanguíneos torácicos, jejuno e culturas de unidades organoides de camundongos, geraram um *amplicon* do tamanho esperado para *Kdr* (820 pb).

Figura 4.30. Expressão do mRNA de *Kdr* (*Vegfr-2*) em amostras de culturas de unidades organoides murinas.

O RNA total de culturas de unidades organoides murinas foi isolado e usado para síntese de cDNA (amostras UO-1, -2 e -3). Amostras de vasos sanguíneos torácicos (VS-1) e jejuno (J-1 e J-2) foram usadas como controle positivo da expressão de *Kdr*. Uma reação de PCR contendo amostra de cDNA de jejuno (J-2) e o par de *primers* para amplificação de *Gapdh* foi utilizada como controle positivo da reação. As bandas correspondentes aos *amplicons* estão indicadas por setas. PTM: padrão de tamanho molecular DNA Ladder IV (Meridian Life Science® Company). pb: pares de base.

Não foi possível obter um *amplicon* do tamanho esperado para *Flt-1* (599 pb), mesmo sob diferentes condições de reação (Figura 4.31).

Figura 4.31. Tentativa de padronização da reação de PCR para expressão do mRNA de *Flt-1* (*Vegfr-1*) em amostras de vasos sanguíneos murinos.

O RNA total de vasos sanguíneos murinos foi isolado e usado para síntese de cDNA (amostras VS-1 e VS-2). As amplificações de *Gapdh* e *Kdr* foram usadas como controles positivos das reações. Em A foram utilizadas amostras VS-2, e as condições das reações foram: 1 – 5% DMSO e pareamento a 53 °C por 30 seg; 2 – 3% DMSO e pareamento a 50 °C por 30 seg; 3 – 5% DMSO e pareamento a 50 °C por 30 seg; 4 – 0% DMSO e pareamento a 53 °C por 30 seg. Em B foram utilizadas amostras VS-1 e -2, e as condições das reações (todas com 3% DMSO) foram: 1 – pareamento a 53 °C por 30 seg; 2 – pareamento a 53 °C por 30 seg; 3 – pareamento a 50 °C por 45 seg; 4 – pareamento a 50 °C por 45 seg. Em C foram utilizadas amostras VS-1 e uma enzima polimerase diferente (MyTaq™ Red Mix), e as condições das reações (todas com 3% DMSO) foram: 1 – pareamento a 53 °C por 25 seg; 2 – pareamento a 53 °C por 25 seg. As bandas correspondentes aos *amplicons* estão indicadas por setas. PTM: padrão de tamanho molecular DNA Ladder IV (Meridian Life Science® Company). pb: pares de base.

4.10.3 Imageamento em tempo real das culturas tridimensionais (3D) de unidades organoides tratadas com rhVEGFs

Culturas 3D de unidades organoides isoladas de camundongos C57Bl/6 eGFP⁺ foram tratadas com meio de cultura (i) suplementado com 10% SFB, (ii) suplementado com 10% SFB + 100 ng/mL rhVEGF₁₆₅, (iii) suplementado com 10% SFB + 100 ng/mL rhVEGF_{165b} e (iv) não suplementado (0% SFB e sem rhVEGFs). A concentração de 100 ng/mL foi escolhida por já ter sido utilizada em trabalhos de diferentes grupos, tendo mostrado ser suficiente para resultar em respostas biológicas (Catena et al., 2010; G. Y. Lee, Jung, Kang, & Bang, 2006; S.-B. Lee et al., 2008). A placa de cultura foi acoplada a um microscópio e mantida em ambiente controlado (úmido, a 37 °C e 5% CO₂). Com uso do *software* Micro-Manager versão 1.4.10 a câmera foi programada para tirar fotos de diversas posições pré-determinadas ao longo da cultura, tendo também outros parâmetros estabelecidos (intervalo de tempo entre fotos, duração, número de planos focais e número de canais). As imagens foram compiladas e concatenadas utilizando-se o pacote Fiji (64-bit).Ink.

Os vídeos encontram-se no CD (mídia) em anexo (Vídeo 4.1). Pela análise dos vídeos, é possível notar que células e estruturas que permanecem vivas movimentam-se nos três eixos (x, y, z) da cultura tridimensional, passando a deslocar-se em taxia positiva, o que ficou mais evidente depois de aproximadamente 50 h de imageamento, agregando-se para formar estruturas maiores. Contudo, não parece haver diferença entre as culturas mantidas em meio de cultura somente na presença de SFB e na presença dos fatores rhVEGF₁₆₅ ou rhVEGF_{165b}. As culturas mantidas em meio sem SFB mostraram queda na viabilidade, de forma que poucas células mostraram indícios de movimentação nos momentos finais de registro da cultura.

4.10.4 Formação de TESISs

As unidades organoides foram isoladas de camundongos C57Bl/6, misturadas a meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de PGA/PLLA contendo, separadamente, PBS (controle negativo), 5 µg rhVEGF₁₆₅, 5 µg rhVEGF_{165b} ou uma combinação de 5 µg de cada isoforma. Os complexos foram implantados no omento de animais imunocomprometidos, explantados após 14 dias e então documentados, tendo seu peso e tamanho avaliados. Não foi possível obter TESISs implantados por 28 dias (os animais morreram ou não houve formação de TESI). O tamanho dos TESISs formados variaram longitudinalmente de 4 mm (rhVEGF_{165b}) a 5,5 mm (rhVEGF₁₆₅ + rhVEGF_{165b}), e transversalmente de 3,5 mm (PBS) e 5,3 (rhVEGF₁₆₅). A média das massas foi 35,75 mg, sendo o TESI de menor massa aquele tratado com rhVEGF_{165b} (20 mg), e o de maior massa foi aquele tratado com rhVEGF₁₆₅ (56 mg) (Figura 4.32).

Figura 4.32. Efeito das isoformas rhVEGFs sobre o tamanho e a massa de TESI murino implantado por 14 dias.

Camundongos C57Bl/6 foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de ácido poliglicólico com 5% de ácido poli-L-láctico (PGA/PLLA). Os arcabouços haviam sido previamente tratados com uma de quatro condições: PBS, 5 μ g rhVEGF₁₆₅, 5 μ g rhVEGF_{165b} e 5 μ g rhVEGF₁₆₅ + 5 μ g rhVEGF_{165b}. Os complexos unidades organoides + arcabouços foram individualmente implantados no omento de camundongos receptores NOD/SCID e os TESIs explantados depois de 14 dias. Em **A** os tecidos engenheirados crescidos sob cada uma das condições são mostrados lado-a-lado, colocados na mesma posição. Aumento: 8x (estereomicroscópio). Em **B**, o gráfico tem plotadas as massas de cada um dos TESIs explantados.

Os explantes foram fixados e emblocados para serem seccionados. Lâminas de vidro contendo as secções foram submetidas a protocolo de imunofluorescência para marcação de E-caderina e Ki-67. Os núcleos foram marcados com DAPI.

Como mostrado na Figura 4.33, de forma geral, os TESIs tratados com as isoformas rhVEGFs apresentaram um maior número de células marcadas para E-caderina e Ki-67 quando

comparados com o controle contendo somente PBS. Ainda, conjuntos de células organizadas indicando uma morfologia tipicamente epitelial evidenciaram marcação tanto de E-caderina quanto Ki-67, o que ficou mais evidente no aumento de 200x (para E-caderina: grupo tratado com PBS, para Ki-67: grupo tratado com 5 μ g rhVEGF_{165b}).

A

E-Caderina

B**Ki-67**

100x

200x

Controle Negativo

PBS

5 μ g
rhVEGF₁₆₅5 μ g
rhVEGF_{165b}5 μ g rhVEGF₁₆₅
+
5 μ g rhVEGF_{165b}

Figura 4.33. Efeito das isoformas rhVEGFs sobre a expressão de E-Caderina e Ki-67 em TESIs murinos.

Camundongos C57Bl/6 foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de ácido poliglicólico com 5% de ácido poli-L-láctico (PGA/PLLA). Os arcabouços haviam sido previamente tratados com uma de quatro condições: PBS, 5 µg rhVEGF₁₆₅, 5 µg rhVEGF_{165b} e 5 µg rhVEGF₁₆₅ + 5 µg rhVEGF_{165b}. Os complexos unidades organoides + arcabouços foram individualmente implantados no omento de camundongos imunocomprometidos e os TESIs explantados depois de 14 dias. Os TESIs foram fixados, emblocados e seccionados para posterior marcação com anticorpos anti-E-caderina (A) ou anti-Ki-67 (B). O núcleo das células está marcado com DAPI. Controle negativo: lâminas não marcadas com anticorpo primário. Aumento: 100x e 200x.

4.11 Avaliação dos efeitos de hipóxia sobre a formação de intestino curto engenheirado (TESI) murino

Camundongos C57Bl/6 foram submetidos a hipóxia sistêmica (pO_2 (ambiente) = 6%) por 6 h tiveram suas unidades organoides isoladas, semeadas sobre arcabouços de trama de PGA/PLLA e implantadas no omento de camundongos NOD/SCID para a formação de TESIS (TESIs hipóxicos), como no protocolo já descrito. Um animal normóxico também teve suas unidades organoides isoladas e implantadas para formação de um TESI controle (TESI normóxico). Os TESIS foram explantados depois de 28 dias, documentados e tiveram tamanho e peso medidos.

O TESI normóxico apresentou massa de 34 mg e medidas de tamanho de 4,5 mm longitudinalmente e 5 mm transversalmente. Já os TESIS hipóxicos apresentaram massa média de 47 mg (menor massa: 35 mg; maior massa: 64 mg) e medidas de tamanho variando de 5 mm a 6,8 mm longitudinalmente e 4,9 mm a 5,3 mm transversalmente (Figura 4.34).

Figura 4.34. Efeito de hipóxia sobre o tamanho e a massa de TESIS murinos implantados por 28 dias.

Camundongos C57Bl/6 submetidos a hipóxia sistêmica (pO_2 (ambiente) = 6%) por 6 h e um camundongo controle normóxico foram eutanasiados e tiveram seus intestinos delgados ressectados. Suas unidades organoides foram isoladas, misturadas em meio de cultura e semeadas sobre arcabouços de trama de ácido poliglicólico contendo 5% de ácido poli-L-láctico (PGA/PLLA). Os complexos unidades organoides + arcabouços foram individualmente implantados no omento de camundongos receptores NOD/SCID e os TESIS explantados depois de 28 dias. Em **A** os tecidos engenheirados crescidos sob as duas condições são mostrados lado-a-lado, colocados na mesma posição. Aumento: 8x (estereomicroscópio). Em **B**, o gráfico tem plotadas as massas do TESI oriundo de unidades organoides em normóxia e a média das massas dos TESIS oriundos de unidades organoides em hipóxia. Barra: desvio padrão da média.

4.12 Produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-Espondina 1

As sequências codificadoras das isoformas humana e murina recombinantes de R-Espondina 1 foram adquiridas da empresa GenScript USA Inc., fornecidas como construções do vetor pUC57. Bactérias *E. coli* foram independentemente transformadas e quantidades suficientes de DNA plasmidial foram obtidas a partir dos clones bacterianos gerados. As construções pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1 foram então submetidas a reações de digestão simples com a enzima *EcoRV* e a duplas digestões com as enzimas *EcoRI* e *NotI*. As amostras digeridas foram fracionadas em geis de agarose para verificação dos tamanhos dos insertos e isolamento das bandas correspondentes a cada uma das sequências codificadoras das proteínas.

A Figura 4.35 mostra o resultado dos fracionamentos eletroforéticos. A digestão das construções com a enzima *EcoRV* gerou um padrão de bandas muito semelhante àquele das construções não digeridas, o que era esperado, confirmando que o sítio para essa enzima havia sido perdido no momento da clonagem das sequências codificadoras. Já a dupla digestão com as enzimas *EcoRI* e *NotI* resultou em duas bandas visíveis, que correspondiam ao vetor pUC57 linearizado e a cada um dos insertos (rh/mR-Espondina 1). Todas as bandas apresentaram os tamanhos esperados, sendo de aproximadamente 2,7 kb para o vetor linearizado e 0,8 kb para os insertos. As bandas correspondentes aos insertos, oriundas de uma dupla digestão *EcoRI/NotI*, foram independentemente isoladas de um gel de agarose 0,8% para experimentos futuros de subclonagem no vetor pNU1 de expressão, desenvolvido por nosso grupo (patente em preparação).

Figura 4.35. Fracionamento em gel de agarose das digestões das construções pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1.

Para análise da perda do sítio *EcoRV* e do tamanho dos insertos, amostras das construções pUC57-rhR-Espondina1 e pUC57-rmR-Espondina1 foram independentemente submetidas a digestões simples com a enzima *EcoRV* ou digestões duplas com as enzimas *EcoRI* e *NotI* e fracionadas em gel de agarose 1,2% (A). Para isolamento das bandas correspondentes às sequências codificadoras, as construções foram submetidas a digestões duplas com as enzimas *EcoRI* e *NotI* e fracionadas em gel de agarose 0,8% (B). As construções não digeridas foram usadas como controle negativo da reação. PTM: padrão de tamanho molecular DNA Ladder IV (Meridian Life Science® Company) (A) e GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific Inc.) (B). pb: pares de base. Massa de DNA por amostra: 1 µg (A) e 2 µg (B).

O projeto de produção das proteínas hR-Espondina 1 e mR-Espondina 1 foi desenvolvido até esse ponto e passará a ser desenvolvido por um outro integrante do grupo, visando à produção

destas proteínas recombinantes e seu uso em modelos animais de TESI e, futuramente, em pacientes pediátricos.

5 DISCUSSÃO

O sistema circulatório possui um papel essencial para o equilíbrio fisiológico dos organismos que o possuem. Através dele, O₂ e nutrientes são fornecidos às células e CO₂ e outras excretas podem ser descartados. Além disso, este sistema colabora na manutenção da temperatura e na disponibilização, de forma sistêmica, de produtos do metabolismo, componentes do sistema imune e hormônios. Sua importância é ressaltada por ser a primeira unidade funcional formada no embrião de vertebrados, um processo denominado vasculogênese. Em indivíduos adultos, a formação de vasos sanguíneos a partir da vasculatura pré-existente é denominada angiogênese (e linfoangiogênese, no caso de vasos linfáticos). Contudo, esses processos ocorrem em taxas bem mais modestas do que em certos estágios do embrião em desenvolvimento, e vasos sanguíneos e linfáticos são encontrados em estado de relativa quiescência quando em condições fisiológicas. Algumas exceções a essa regra resumem-se, basicamente, a três casos: ciclo menstrual feminino, gravidez e reparo de lesões. Por outro lado, diversas doenças têm, como agente causador ou agravante, um desbalanço na arquitetura vascular e, portanto, a restauração da vasculatura normal pode ser de interesse terapêutico em diversos tratamentos. Até o momento, as proteínas da família VEGF foram identificadas como os principais fatores reguladores da angiogênese fisiológica e patológica, sendo, por esse motivo, alvos terapêuticos relevantes. Nesse contexto, o presente projeto teve como objetivo a produção de três isoformas recombinantes do gene *VEGF-A*, especificamente rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁, visando seu uso futuro como biofármacos. De forma a garantir rastreabilidade; um padrão de modificações pós-traducionais (como glicosilações) próximo do humano e, conseqüentemente, a segurança das proteínas

produzidas; altos níveis de expressão proteica; e escalabilidade da produção, células humanas da linhagem HEK293 foram utilizadas como o sistema de expressão.

5.1 Clonagem das sequências codificadoras das isoformas de *VEGF-A*

Para a clonagem das sequências codificadoras das isoformas rhVEGFs, a base de dados de nucleotídeos do NCBI foi consultada para obtenção das sequências codificadoras completas de cada proteína de interesse, permitindo o desenho dos pares de *primers* utilizados nas reações de PCR para amplificação. Todos os *primers* desenhados se ligam às extremidades 5' e 3' das regiões codificadoras e foram desenhados de forma a conter porções mutagênicas em suas extremidades 5', visando acrescentar sítios de restrição desejados (5'-*EcoRI* e 3'-*NotI*) e a sequência de Kozak. Amostras de cDNA de rim e pulmão foram escolhidas como fontes dos cDNAs devido à sua disponibilidade e dados apresentados na literatura (Woolard et al., 2009). No fracionamento dos produtos das reações em geis de agarose, múltiplas bandas correspondentes a diferentes *amplicons* puderam ser identificadas, o que era esperado como artefato das reações dado que diversas isoformas são geradas a partir da transcrição do gene *VEGF-A* e apresentam complementariedade de bases com os *primers* desenhados (Woolard et al., 2009). Dessa forma, os tamanhos das bandas foram utilizados como referência para isolamento das isoformas de interesse (entre 500 e 600 pb para rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}; entre 300 e 400 pb para rhVEGF₁₂₁).

Os *amplicons* foram então clonados no vetor comercial pGEM[®]-T Easy digerido com as enzimas *EcoRI* e *NotI* e bactérias *E. coli* foram transformadas com as construções obtidas. O vetor pGEM-T[®] Easy possui diversas vantagens como um vetor de clonagem, como alto número

de cópias, cassete de seleção para ampicilina, MCS com diversos sítios de restrição e seleção pelo método azul/branco (Promega Corporation, 2010). Muitas colônias positivas para a presença das construções foram obtidas, revelando uma boa eficiência de ligação dos insertos no vetor e de transformação das bactérias. Além disso, o fracionamento em geis de agarose e a visualização dos *amplicons* confirmou a presença de insertos do tamanho esperado em diferentes clones, alguns dos quais foram escolhidos para sequenciamento.

O sequenciamento dos insertos confirmou que as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₂₁ haviam sido corretamente e completamente sequenciadas. Entretanto, a análise da sequência nucleotídica da isoforma rhVEGF_{165b} amplificada indicou que a isoforma obtida havia sido a rhVEGF₁₆₅, o que exigiu uma outra abordagem. Para a nova tentativa de amplificação da isoforma rhVEGF_{165b}, o cDNA da cultura de células da linhagem de epitélio pigmentar de retina ARPE-19 foi utilizado como *template* da reação de PCR, dado que o mRNA de VEGF_{165b} é detectado nessas células, que também expressam maiores níveis dessa isoforma do que VEGF₁₆₅ (Bates et al., 2013; Nowak et al., 2008). Apesar de um fragmento de tamanho esperado ter sido obtido, o sequenciamento do mesmo acusou novamente que a isoforma incorreta (rhVEGF₁₆₅) havia sido amplificada. De fato, as estratégias de amplificação de isoformas VEGF_{xxx}b ainda está sob investigação. Qui *et al.* sugeriram que isoformas VEGF_{xxx} podem ser amplificadas preferencialmente em reações de PCR, mesmo quando transcritos VEGF_{xxx} e VEGF_{xxx}b estão presentes em abundância similar. Os autores também propõem que diferenças na estrutura secundária da porção 3'UTR entre os transcritos VEGF_{xxx} e VEGF_{xxx}b podem causar eficiências diferentes na transcrição reversa, resultando em favorecimento da amplificação de isoformas VEGF_{xxx} (Qiu, Hoareau-Aveilla, Oltean, Harper, & Bates, 2009). Em um artigo publicado recentemente, Harris *et al.* ressaltam que essas isoformas não são comumente expressas em

tecidos humanos. Ainda nesse trabalho, os autores foram capazes de amplificar isoformas pró-angiogênicas em experimentos destinados à amplificação específica de VEGF_{xxx}b, a partir de células modificadas para bloquear a expressão destas isoformas antiangiogênicas (Harris et al., 2012). Em outro artigo mais recente, Bates e colaboradores ressaltam pontos importantes no momento de se elaborar o desenho experimental para a amplificação das diferentes isoformas de *VEGF-A* – especialmente no caso de VEGF_{xxx}b, utilizando controles apropriados, amostras frescas e sequenciamento dos produtos de PCR (Bates et al., 2013).

Dada a dificuldade de amplificação da isoforma VEGF₁₆₅b diretamente a partir do cDNA de amostras de células e tecidos, optou-se pela estratégia de mutação sítio-dirigida da porção 3' da fita antisense da sequência de rhVEGF₁₆₅, na região que difere da isoforma antiangiogênica (Sarkar & Sommer, 1990). Esta abordagem consistiu de três reações de PCR que resultaram em um *amplicon* final único correspondente ao tamanho esperado. Demais *amplicons* não foram detectados devido ao uso da construção pGEM[®]-rhVEGF₁₆₅ como molde e da especificidade dos *primers* escolhidos, impedindo a amplificação de outras isoformas de *VEGF-A*. O inserto foi sequenciado e a análise pelo programa *nucleotide blast* confirmou 100% de identidade e ausência de lacunas, mostrando que a estratégia de mutação sítio-dirigida foi eficiente na geração da isoforma rhVEGF₁₆₅b, permitindo que as próximas etapas fossem realizadas.

Atualmente, diversas empresas prestam o serviço de síntese de genes inteiros a um preço acessível, o que na época não era a opção mais viável para o desenvolvimento do presente projeto. A terceirização da obtenção de sequências codificadoras sintéticas é interessante pois elimina as etapas de desenho de *primers* (de clonagem e mutagênicos), síntese de cDNA a partir de amostras de mRNA, amplificação das isoformas a partir das amostras de cDNA e ligação dos insertos em um vetor de clonagem. Dessa forma, muito tempo é economizado e a obtenção dos

produtos proteicos finais pode ser em muito acelerada. Essa abordagem foi adotada no projeto paralelo para a obtenção das sequências codificadoras das isoformas humana e murina de R-Spo1.

5.2 Transfecção de células HEK293, expressão das isoformas rhVEGFs, seleção dos clones e adaptação à cultura em suspensão

As três sequências nucleotídicas íntegras foram traduzidas *in silico*, também confirmando 100% de integridade e ausência de lacunas para a sequência peptídica, levando à conclusão de que todos os aminoácidos estavam corretos. Essa confirmação permitiu que as sequências codificadoras das três isoformas de interesse pudessem ser independentemente subclonadas no vetor pLV-eGFP. O sentido da inserção das sequências foi confirmado por diagnóstico de restrição, indicando que diversas construções possuíam os insertos na orientação correta em relação ao promotor de citomegalovírus (CMV). Vale ressaltar que, apesar de poder ser usado para a geração de partículas virais quando cotransfectado com três outros vetores plasmidiais estruturais (Tiscornia, Singer, & Verma, 2006), no presente projeto as construções pLV-rhVEGF_{xxx}(b) (e o vetor pLV-eGFP sem inserto) foram independentemente cotransfectadas com o vetor pTK-Hyg, que confere resistência ao antibiótico higromicina B. A relação de massa de vetor de expressão pLV-rhVEGF_{xxx}(b) para vetor de resistência pTK-Hyg utilizada foi de 40 : 1, a fim de garantir que células selecionadas com o antibiótico tivessem maior probabilidade de terem incorporado as construções contendo as sequências codificadoras visando gerar colônias de células que expressam as proteínas de interesse. Além disso, com a intenção de futuramente transferir as sequências codificadoras para o vetor plasmidial pNU1 (de propriedade de nosso

grupo), o método de cotransfecção aqui utilizado consiste de um modelo similar àquele que será futuramente adotado, sem a transdução com partículas virais, e que permitiria a rápida caracterização das proteínas produzidas em outras linhagens celulares. Atualmente, o vetor pNU1 já foi construído, sequenciado e usado na transfecção de células da linhagem CHO DG44 para a produção de proteínas recombinantes humanas em nosso laboratório, complementando um portfólio de produção de 10 proteínas recombinantes (BMP-2, BMP-4, BMP7, eCG, Fator VIII, Fator IX, FSH, G-CSF, GM-CSF, PDGF-BB).

O pNU1 é um vetor plasmidial para expressão de produtos gênicos em células de mamíferos e que tem como base o sistema DHFR (diidrofolato redutase). Células CHO DG44 são *dhfr*^{-/-} e, portanto, deficientes na produção da enzima DHFR, que catalisa a redução de ácido fólico a diidrofolato e, em níveis mais significativos, de diidrofolato a tetraidrofolato, tendo um papel central na manutenção de níveis intracelulares de folato. Folato, por sua vez, é vital para a células, participando de diferentes vias biossintéticas (Cario et al., 2011). Com isso, as células *dhfr*^{-/-} são incapazes de sobreviver em meio de cultura na ausência de nucleosídeos. Quando transfectadas com construções obtidas a partir do vetor pNU1, que possui o cassete de expressão da enzima DHFR, essas células têm a função da enzima restaurada, podendo crescer na ausência de nucleosídeos e ser selecionadas com um inibidor químico da enzima (MTX, ou metrotexato). Esse sistema garante a amplificação gênica de *Dhfr*, o que potencializa a seleção dos clones que mais produzem o gene de interesse (Lucas et al., 1996), já tendo sido utilizado, inclusive, para a produção de isoformas de VEGF (N Ferrara et al., 1993; S.-B. Lee et al., 2008). Por esse motivo, as sequências codificadoras serão subclonadas no vetor pNU1 em um futuro próximo.

Poucos dias após a transfecção das células HEK293 com as construções pLV-rhVEGF_{xxx}(b), muitas células evidenciaram a expressão de eGFP quando sob fluorescência,

sendo que diversas morreram sob seleção com higromicina B. Esse processo permitiu a geração de clones celulares que expressavam, em diferentes níveis, as isoformas de interesse no nível proteico. O vetor pLV utilizado possui uma sequência IRES (*Internal Ribosome Entry Site*) entre as sequências codificadoras das isoformas e a sequência codificadora de eGFP e, como já mostrado anteriormente, o segundo gene nesses sistemas pode ter níveis de expressão significativamente menores do que os do primeiro gene (Mizuguchi, Xu, Ishii-Watabe, Uchida, & Hayakawa, 2000). Dessa forma, como a proteína eGFP (codificada pelo segundo gene) já havia sido claramente detectada, era esperado que alguns dos clones estivessem expressando as isoformas de interesse. Dado que este experimento se deu em condições redutoras, a massa identificada das isoformas proteicas correspondeu àquela esperada para os monômeros de cada uma delas. O padrão de bandejamento múltiplo que foi observado em muitos dos clones celulares era esperado, dado que pode haver isoformas das proteínas processadas de forma incompleta, bem como glicofomas, que resultam em bandas de tamanhos diferenciados no fracionamento por SDS-PAGE. Isso pode ter ocorrido graças à presença de uma maquinaria de modificação pós-traducional exclusiva das células HEK293. Com isso, estas células podem catalisar reações nas quais essas modificações são introduzidas (como resíduos de glicanos), gerando proteínas que apresentam maior massa do que quando são produzidas em procariotos.

Ainda, o fato das proteínas serem detectadas no meio condicionado comprovou que estavam sendo secretadas pelas células. Bandas de diferentes massas moleculares foram detectadas em quase todas as amostras de meio condicionado, o que pode ser devido à presença de diferentes glicofomas ou ao processamento incompleto das proteínas (S.-B. Lee et al., 2008). De fato, diversos trabalhos de outros grupos onde as isoformas proteicas de *VEGF-A* foram submetidas a análises de *Western blot* ou feitas em geis de poliacrilamida comumente mostram a

presença de mais de uma banda (Afkhami et al., 2012; Bates et al., 2013; S.-B. Lee et al., 2008; Mohanraj, Olson, & Ramakrishnan, 1995; Nowak et al., 2008; Pizarro et al., 2010; Wu et al., 2004). A observação empírica das análises permitiu a seleção de clones que mais expressavam as proteínas.

Os clones superprodutores foram testados quanto às suas cinéticas de expressão por *Western blot*. Após 24 h de condicionamento, alguns dos clones não apresentaram níveis detectáveis de expressão, ao passo que depois de 48 e 72 h de condicionamento, as isoformas proteicas foram identificadas para todos os clones. A literatura descreve, em diferentes sistemas, a detecção de rhVEGFs já a partir de 24 h de condicionamento (N Ferrara et al., 1993), mas tempos mais longos permitem, de fato, maior acúmulo das proteínas secretadas no meio (G. Y. Lee et al., 2006; S.-B. Lee et al., 2008; Pizarro et al., 2010; Wu et al., 2004). Em células HEK293 superexpressando rhVEGF₁₆₅b, microencapsuladas em alginato-poli-L-lisina-alginato (APA), a isoforma também foi detectada depois de 72 h de encapsulamento (Afkhami et al., 2012). Dessa forma, os meios de cultura condicionados por 48 e 72 h foram priorizados para os demais experimentos.

O fato dos clones manterem a capacidade de expressão das proteínas na ausência de SFB merece destaque. Apesar do soro bovino ser extensamente usado na manutenção de células de mamíferos, ele passou a ser evitado na área de produção de biofármacos dada a percepção do perigo de contaminação dos produtos com vírus e príons de origem bovina. Hidrolisados peptídicos de plantas e microorganismos usados amplamente na indústria alimentícia tornaram-se agora fontes valiosas de componentes não animais para promover o crescimento de células de mamíferos em cultura. Já meios quimicamente definidos são ainda mais interessantes por terem uma composição pré-determinada conhecida. Dessa forma, não só praticamente se evitam as

possíveis contaminações, como também se tem um maior controle da formulação do meio de cultura, diminuindo a possível variação entre lotes (Butler & Meneses-Acosta, 2012), o que pode comprometer a produção das proteínas em larga escala. Além disso, o SFB possui diversas proteínas com diferentes características físicoquímicas que atrapalhariam no processo de purificação das proteínas de interesse por representarem contaminantes indesejados. Ainda, esses componentes incluem fatores de crescimento, proteínas estabilizantes e outras que garantem boas taxas de crescimento e sobrevivência celular, e estabilidade das proteínas secretadas no meio. Com isso, o fato das isoformas continuarem a ser produzidas na ausência de SFB indicou que sua produção também seria possível em meio na ausência de componentes derivados de animais, ou mesmo quimicamente definido.

Uma outra etapa importante no desenvolvimento de biofármacos é o escalonamento da produção, que tem como um de seus passos iniciais a adaptação das células para a cultura em suspensão em meios sem SFB. A principal vantagem dessa forma de cultura é que as células podem proliferar rapidamente até atingirem altas densidades celulares em recipientes adequados, como frascos *spinner* ou biorreatores, o que leva à redução de passos nas etapas subsequentes de processamento e purificação, podendo resultar na redução de custos. Ainda, as células podem ser cultivadas de forma simples, com subcultivos feitos por simples diluição em volume fixo de meio de cultura para manutenção, ou em volume crescente de meio, para expansão das culturas. Não menos importante, esse sistema oferece maior segurança biológica por garantir menores riscos de contaminação devido à ausência de proteases ou glicosidases, príons, vírus e outros (Arthuso et al., 2012; Beyer et al., 2009; Link et al., 2004). Culturas em suspensão, na ausência de soro, e mantidas em biorreatores sob agitação são hoje consideradas o padrão para produção de proteínas

recombinantes, sendo que a maioria dos produtos aprovados pelo FDA são produzidos sob essas condições (Zhang, Sun, Zhang, Zhang, & Tian, 2005).

Para o processo de adaptação dos clones superprodutores ao cultivo em suspensão, as células foram submetidas a dois processos de adaptação: direto e indireto. A adaptação das células ao processo direto, sem a necessidade de uma transição mais moderada (sequencial) já foi descrita (Chun, Bang, Park, & Woo, 2001; Link et al., 2004). Contudo, a maioria dos meios de cultura sem soro ou proteínas não suporta o crescimento celular que ocorre em uma adaptação direta a partir da cultura aderente na presença de soro para a cultura em suspensão na ausência de soro, levando em conta, ainda, que nem todas as linhagens celulares podem ser facilmente adaptadas para a cultura em suspensão (Chun et al., 2001; Haldankar, Kopchick, & Ridgway, n.d.). De fato, não existem muitos trabalhos que descrevem a adaptação de culturas aderentes para culturas em suspensão, apesar deste ser um processo bem conhecido e largamente aplicado (Arthuso et al., 2012).

Os clones superprodutores responderam diferentemente aos dois processos de adaptação, o que foi primeiramente avaliado pela capacidade de expressão de eGFP. Alguns perderam totalmente a viabilidade ou a capacidade de emissão de fluorescência, sendo então descartados. Apesar de células HEK293 naturalmente terem a tendência a agregar em culturas em suspensão (Guy et al., 2013), os níveis de agregação das células variou. Clones expressando as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} mostraram maior grau de agregação. Essas isoformas possuem o domínio de ligação a heparan-sulfato, um componente de matriz extracelular também encontrado na superfície das células. Com isso, acredita-se que essas isoformas possam estar se acumulando do lado externo das células e resultando na agregação das mesmas. A formação de agregados intermoleculares entre produtos biológicos é um problema comum de culturas em suspensão

destinadas à produção de proteínas recombinantes, podendo resultar na diminuição do rendimento final. Fora a adição de compostos químicos, estratégias como a exposição das células à hipotermia branda também podem mitigar esse problema (Rodriguez, Spearman, Huzel, & Butler, 2005; Sunley & Butler, 2010).

Os clones adaptados à cultura em suspensão, em sem componentes derivados de animais, mantiveram a capacidade de superexpressão, o que indica que a produção por alguns dos clones pode ser escalonada para frascos de maior volume e sob agitação (como os frascos *spinner* ou biorreatores já citados). Vale destacar que alguns clones (B13 (rhVEGF_{165b}) - adaptação direta; D3 (rhVEGF₁₂₁) - adaptação sequencial) não evidenciaram expressão das isoformas em um primeiro momento, mas tiveram a expressão confirmada em passagens mais tardias. Com efeito, outros grupos também já descreveram a expressão diferencial de proteínas recombinantes produzidas em cultura em suspensão quando amostras de meio coletadas em diferentes momentos foram analisadas, havendo um aumento da expressão em coletas mais tardias. Isso é explicado pela provável adaptação mais tardia por parte de alguns dos clones em culturas em suspensão na ausência de soro (Arthuso et al., 2012).

Apesar desses experimentos terem sido feitos em condições redutoras, bandas de menor intensidade puderam ser visualizadas próximas à massa de 37 kDa para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}. Dessa forma, acredita-se que essas duas isoformas, e também provavelmente a isoforma rhVEGF₁₂₁, são encontradas na forma dimerizada e, portanto, biologicamente ativa. Este é o primeiro trabalho que mostra que células HEK293 são capazes de produzir rhVEGFs, de forma estável, em culturas em suspensão em meio sem componentes derivados de animais.

5.3 Purificação e análises estruturais das isoformas rhVEGF

Em um primeiro momento, enquanto nosso grupo ainda não possuía o cromatógrafo Äkta Purifier UPC-100 (GE Healthcare), a purificação das isoformas de VEGF-A foi realizada através da concentração de 300 mL de cada meio condicionado em filtros Centricon[®] Plus-70 (EMD Millipore Corporation) de limite nominal de massa molecular de 10.000 Da, seguida de carregamento das colunas com o uso de bombas peristálticas e eluição em sequência (*stepwise*).

As isoformas VEGF₁₆₅ e VEGF_{165b} possuem os domínios de ligação a heparan-sulfato, regiões que são codificadas pelos éxons 6 e 7 do hnRNA (Harper & Bates, 2008). Um dos primeiros grupos a isolar uma das isoformas de VEGF-A (VEGF₁₆₅ bovina) usou essa propriedade para purificá-la, o que foi seguido por estudos mais recentes (N Ferrara & Henzel, 1989; G. Y. Lee et al., 2006; S.-B. Lee et al., 2008; Pizarro et al., 2010). Dessa forma, para a purificação de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} foram utilizadas colunas cromatográficas de afinidade a heparina. A análise das frações obtidas permitiu confirmar que o domínio de ligação a heparina de ambas as isoformas permaneceu intacto ao longo do processo. A análise por *Western blot* de amostras das frações obtidas das purificações estocadas a 4 °C por três meses mostrou que as isoformas se mantiveram relativamente estáveis quando preservadas nos tampões de eluição, o que não foi verificado nas amostras de meio condicionado estocadas sob as mesmas condições. A concentração das isoformas nos eluatos, calculada por ensaio imunoenzimático colorimétrico (ELISA), indicou que a massa das proteínas de interesse era suficiente para experimentos futuros. É necessário, contudo, que a concentração das isoformas no meio condicionado (antes da purificação) seja determinada para avaliar a eficiência do processo. Entretanto, pelas concentrações obtidas é possível estimar que as maiores concentrações encontradas no meio condicionado foram de, aproximadamente, 0,68 µg/mL e 0,73 µg/mL, para rhVEGF_{165b} e

rhVEGF₁₆₅, respectivamente. Considerando que a confluência das células dos clones estava próxima de 100% durante o período de condicionamento do meio de cultura, o que representa, aproximadamente, $1,3 \times 10^5$ células/cm², especula-se que a taxa de produção das isoformas foi de 0,697 pcd e 0,748 pcd, para rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₆₅, respectivamente (não mostrado nos resultados).

O uso do sistema de HPLC Äkta Purifier UPC-100 permitiu que todas as condições de purificação fossem melhor controladas e acompanhadas, além de permitir volumes maiores de entrada de meio de cultura condicionado e eluições por gradiente da concentração de NaCl variando de 100 mM a 2 M. A eluição de ambas as isoformas se deu em condições de força iônica (concentração de NaCl) e condutância muito próximas, o que era esperado devido à alta identidade entre as duas isoformas (96,4%) (Bates et al., 2002). Nos dois casos, fora os picos de maior intensidade de absorbância de luz UV, outros também foram identificados, podendo representar glicoformas ou outras formas de processamento das proteínas que apresentam diferentes graus de interações com heparina. As amostras obtidas das purificações feitas no sistema de HPLC foram analisadas por *Western blot*, mostrando que os eluatos nos quais se constatarem os picos de absorbância de luz UV correspondiam às proteínas rhVEGF. Também foi possível observar que, diferentemente do obtido nas primeiras purificações realizadas com o auxílio de bomba peristáltica, as isoformas estavam presentes em um número menor de eluatos, indicando uma otimização do processo.

Vale destacar que no cromatograma referente à purificação da isoforma rhVEGF_{165b}, houve um aumento considerável da medida de absorbância de luz UV ao final da injeção da amostras, possivelmente devido à presença de bolhas de ar no sistema. O pico detectado alterou a escala representada no eixo y, que chegou ao valor de 1000 mAU, mais de três vezes o pico da

escala na purificação da isoforma rhVEGF₁₆₅ (300 mAU). Essa diferença gera a impressão de que há muito menos proteína rhVEGF_{165b} nos eluatos do que rhVEGF₁₆₅, o que não representa a realidade e que ficou evidente na ampliação da imagem do cromatograma. As isoformas obtidas através da purificação por HPLC serão quantificadas por ELISA para determinação da concentração das mesmas nos eluatos.

As isoformas purificadas no sistema Äkta foram submetidas a análises estruturais de dicroísmo circular e eletroforese capilar. Os perfis gerados pela técnica de dicroísmo circular podem ser comparados com dados já gerados para as proteínas de interesse e permitem confirmar as proporções de estruturas secundárias de cada proteína. A análise para as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} indicou que o tampão utilizado gerou interferências nas medidas de absorbância de luz UV, provavelmente devido à concentração elevada de íons fosfato (dados não mostrados). Outros tampões parecem ser mais adequados, como é o caso de PBS, devendo ser utilizados futuramente para a análise de estruturas secundárias (Brandner, Kurkela, Vihko, & Kungl, 2006). Já a técnica de eletroforese capilar consiste de um método qualitativo e quantitativo realizado através de uma separação eletroforética de alta resolução em gel de SDS, podendo indicar o grau de pureza das proteínas purificadas e até o perfil de glicosilação das mesmas. Os experimentos de eletroforese capilar estavam em fase de padronização no momento do depósito da tese, sendo que dados conclusivos ainda não puderam ser gerados. A análise das isoformas por espectrometria de massas também será realizada em breve.

Ao contrário das isoformas VEGF₁₆₅ e VEGF_{165b}, a isoforma VEGF₁₂₁ não possui o domínio de ligação a heparina. Além disso, poucos trabalhos foram publicados descrevendo a produção e purificação dessa isoforma na forma selvagem, e não associada a outros motivos proteicos. Como as demais isoformas de VEGF-A, VEGF₁₂₁ possui dois resíduos de histidina nas

posições 11 e 12. Assim, com base em um artigo de Mohanraj *et al.* e Siemeister *et al.*, a isoforma rhVEGF₁₂₁ foi purificada por cromatografia de afinidade a metal (Ni²⁺; colunas HisTrapTM HP, GE Healthcare), partindo-se do pressuposto que o homodímero proteico leva à aproximação dos dois resíduos de histidina, resultando em uma maior afinidade pelos íons de níquel (Mohanraj *et al.*, 1995; Siemeister *et al.*, 1996). A análise das frações obtidas em geis SDS-PAGE não redutores corados com nitrato de prata evidenciou a presença de diversas bandas, inclusive nos eluatos, indicando a presença de diversas proteínas contaminantes que não foram eliminadas nas frações de permeado e lavagem. Nenhuma das bandas mais intensas aparentava ter a massa correspondente ao homodímero, ou mesmo ao monômero, de rhVEGF₁₂₁. Através de experimentos de *Western blot* foi possível verificar, nos eluatos contendo 10 e 25 mM de imidazol, uma banda mais intensa de um pouco menos de 37 kDa, que poderia representar o dímero da proteína, bem como uma segunda banda, também mais intensa, de aproximadamente 26 kDa, que poderia representar o monômero glicosilado. Até o momento, a isoforma rhVEGF₁₂₁ foi parcialmente purificada e o método de purificação está sendo otimizado no sistema Äkta Purifier UPC-100.

5.4 Análise da atividade biológica das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b}

A atividade biológica das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificadas foi avaliada através de um modelo *in vivo*, o ensaio da membrana corioalantoide (*CAM Assay*) e um modelo *in vitro*, o AngioPhaseTM Kit.

O *CAM Assay* é um clássico ensaio para avaliar o potencial angiogênico de fatores, células e tecidos. Trata-se de um ensaio tecnicamente simples, de baixo custo, que permite

triagens em larga escala e envolve procedimentos não invasivos (Deryugina & Quigley, 2009; Norrby, 2006). Outros trabalhos usando o mesmo modelo para testar a atividade biológica de rhVEGF₁₆₅ obtiveram resultados somente com concentrações da proteína maiores do que aquela utilizada no presente projeto (500 ng) (Wilting, Christ, Bokeloh, & Weich, 1993; Wilting, Christ, & Weich, 1992). Não foi detectada uma diminuição dos vasos sanguíneos no caso dos pontos com a isoforma antiangiogênica rhVEGF₁₆₅b. Inclusive, experimentos cessados depois de 48 h de indução também mostraram maior vascularização da membrana corioalantoide na presença de rhVEGF₁₆₅ e de quantidades iguais de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF₁₆₅b quando comparado com o controle, mas a isoforma rhVEGF₁₆₅b também aparentou induzir o crescimento de vasos, o que não era esperado já que isoformas VEGF_{xxx}b são classicamente descritas como sendo antiangiogênicas.

Apesar das vantagens do modelo *CAM Assay*, ele possui algumas desvantagens quando comparado com experimentos de kits comerciais já padronizados. Os embriões são extremamente sensíveis a variações de temperatura, humidade e tensão de oxigênio, além de contaminarem com facilidade. Ainda, a membrana corioalantoide apresenta altas taxas endógenas de proliferação até o dia E9, sendo facilmente irritável até esse momento. Dessa forma, é aconselhável que testes de angiogênese sejam feitos a partir do dia E13, quando um menor número de embriões viáveis está disponível (Norrby, 2006; Wilting et al., 1992). De fato, muitos embriões foram perdidos nos diversos lotes testados e, em alguns casos, nenhum embrião estava vivo em E16, impedindo um maior número de replicatas experimentais. Ademais, a utilização de embriões de codorna transgênica Tiel:H2B-eYFP, que permitiriam a melhor visualização dos vasos sanguíneos formados, não gerou resultados suficientemente conclusivos devido ao número reduzido de embriões que permaneceram vivos até o estágio final do experimento (dia embrionário E10).

Ainda, um dos embriões não era transgênico e, por isso, não pôde ser analisado. De fato, nem todos os embriões eram transgênicos, dado que a taxa de transgenia não é de 100% (Sato et al., 2010).

Um dos tipos celulares mais utilizados em testes de atividade biológica de isoformas de VEGF-A são células endoteliais derivadas de veias do cordão umbilical humano (HUVEC). O AngioPhaseTM Kit faz uso dessas células e provê os controles positivo (VEGF) e negativo (suramin) para testes de atividade biológica de agentes pró-angiogênicos, bem como agentes antiangiogênicos, permitindo fazer replicatas e testes de diferentes concentrações dos agentes testados. Os resultados da marcação das culturas com o anticorpo anti-CD31 levam à conclusão de que tanto a isoforma rhVEGF₁₆₅ quanto a rhVEGF_{165b}, em diferentes concentrações, induziram angiogênese, atividade que não era esperada para a última isoforma. O procedimento de ELISA permitiu confirmar os efeitos das isoformas sobre as células HUVEC de forma mais precisa, através das média das medidas de p-NPP obtidas e, indiretamente, da presença do marcador CD31. Os resultados confirmaram uma das concentrações da isoforma rhVEGF₁₆₅ (10 ng/mL) resultou em maiores níveis de CD31 quando comparado com o meio controle. Os resultados para a isoforma rhVEGF_{165b} não indicaram haver diferença significativa entre as três diferentes concentrações (2, 10 e 50 ng/mL) e o meio controle, ou as concentrações de 2 e 50 ng/mL de rhVEGF₁₆₅. Isso indicou, mais uma vez, que a ação de rhVEGF_{165b} não foi de inibição do crescimento de vasos e de proliferação de HUVECs.

De fato, alguns trabalhos já foram publicados nos quais a real função biológica de VEGF_{xxx}b é discutida. Catena e colaboradores verificaram que as isoformas VEGF_{165b} e VEGF_{121b} se mostraram fracamente pró-angiogênicas (e não anti-, com esperado) em um modelo murino *in vivo* (Catena et al., 2010). Harris *et al.* inclusive questionam se a detecção de isoformas

proteicas VEGF_{xxx}b não seria um artefato experimental, ainda mais quando não são comumente expressas em tecidos humanos (Harris et al., 2012).

5.5 rhVEGFs em engenharia tecidual do intestino delgado

A engenharia tecidual é uma das áreas mais promissoras da medicina para o tratamento de doenças ainda incuráveis. A reposição de tecidos e órgãos em falência por novas partes permite ganho de função, melhoria da qualidade de vida e pode, muitas vezes, ser a única solução para a cura. Uma aplicação muito promissora da engenharia tecidual é voltada para a cura da síndrome do intestino curto, uma doença que acomete principalmente crianças prematuras, apresentando milhões de casos por ano no mundo (Thompson, Rochling, Weseman, & Mercer, 2012). A importância da angiogênese para o crescimento do intestino curto engenheirado (TESI) é conhecida, bem como do papel positivo que isoformas pró-angiogênicas de VEGF-A têm sobre o crescimento do novo órgão (Gardner-Thorpe et al., 2003; J. A. Matthews et al., 2009; J. A. Matthews et al., 2012). As unidades organoides intestinais, estruturas que podem ser isoladas e que contêm células-tronco responsáveis pela manutenção do ativo epitélio do intestino, podem ser isoladas e expandidas em cultura (Huch et al., 2013), permitindo um aumento da massa de células que podem ser usadas para construir o intestino delgado.

Com base nesses dados, unidades organoides derivadas de camundongos C57Bl/6 eGFP⁺ foram isoladas e mantidas em cultura. Para avaliar se as unidades organoides poderiam responder a rhVEGFs, a expressão do mRNA de *KDR*, ou *VEGFR-2*, o principal receptor da família VEGFR para indução ou inibição de angiogênese (Harper & Bates, 2008), foi avaliada. Resultados de RT-PCR feitos com amostras de RNA total de culturas de unidades organoides

comprovaram que as mesmas expressam o RNA mensageiro desse receptor e, assim, seriam responsivas a isoformas de VEGF-A. O mesmo foi investigado para *Flt-1* (ou *VEGFR-1*), um receptor com possível função de quelante de isoformas de VEGF (Shibuya, 2013), mas não se obteve um *amplicon* que indicasse que esse receptor também é expresso em culturas de unidades organoides. Não há na literatura artigos que tratem da expressão dos diferentes receptores da família de *VEGFRs* em unidades organoides em cultura.

Na tentativa de verificar o impacto das isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} sobre a cultura de unidades organoides, essas duas isoformas foram independentemente adicionadas ao meio de cultura dessas estruturas e as culturas foram submetidas a imageamento em tempo real. As imagens mostraram que as culturas mantidas na presença de rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} se desenvolveram de forma semelhante às culturas contendo somente SFB, o que pode ser um resultado da presença dos demais fatores de crescimento presentes no soro. Nessas condições, é possível notar o desenvolvimento de unidades organoides, o que é seguido da aproximação de agrupamentos celulares, formando agregados celulares maiores pelo que aparenta ser uma taxa positiva, possivelmente resultado da secreção de moléculas sinalizadoras pelas células. Avaliar se sinalizadores estão de fato sendo secretados e se eles têm um papel em uma possível quimiotaxia positiva, bem como investigar quais são esses fatores, poderia ser de interesse para os futuros estudos de manutenção das unidades organoides em cultura. Uma vez que culturas de unidades organoides não sobreviveram na ausência de SBF (o que ocorreu mesmo na presença de rhVEGFs – dados não mostrados), uma nova formulação de meio de cultura que não contenha fatores que mascarem os efeitos de rhVEGFs, ao mesmo tempo em que permita o crescimento das unidades organoides, poderia ser desenvolvida para que melhores resultados sejam obtidos

desse experimento. Ainda, a observação das culturas por períodos mais longos (> 140 h) também pode gerar informações relevantes (Vídeo 4.1 – CD (mídia) em anexo).

Como já mencionado, a formação do TESI é influenciada pela presença de isoformas proteicas de VEGF-A (J. A. Matthews et al., 2009; J. a Matthews et al., 2012). Dessa forma, as rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} foram testadas nesse contexto em um modelo murino de intestino engenheirado. Nesse experimento, a massa do TESI na qual foi aplicada rhVEGF₁₆₅ (56 mg) foi a maior em relação aos demais grupos, ao passo que aquela que continha rhVEGF_{165b} (20 mg) foi a menor. Já o arcabouço que recebeu quantidades equimolares das duas isoformas apresentou um TESI com uma massa intermediária (38 mg). Apesar desses resultados irem de acordo com o esperado, os resultados não possuem significância estatística. Além disso, esses valores foram inferiores ao que já foi descrito na literatura para TESIs gerados em duas semanas, o que coloca em questão se as estruturas explantadas haviam, de fato, iniciado a formação de intestinos engenheirados (J. A. Matthews et al., 2009). Com efeito, apesar dos explantes terem apresentado evidência de que a expressão de um marcador epitelial (E-caderina) e de um marcador de proliferação (Ki-67) foi maior nos grupos tratados com as isoformas, a morfologia típica do epitélio intestinal foi vista somente em algumas regiões de alguns dos cortes histológicos analisados. Somado a isso, Matthews *et al.* também apontam para o fato de que diferenças estatisticamente significativas entre o grupo experimental e o controle só foram observadas depois de quatro semanas em experimentos utilizando animais superexpressando VEGF_{xxx}, o que indica que esses experimentos devem ser conduzidos por períodos de tempo mais longos (J. A. Matthews et al., 2009).

Dado que baixas pressões parciais de oxigênio induzem a secreção de moléculas pró-angiogênicas, incluindo VEGF_{xxx}, e que hipóxia pode contribuir para a engenharia de tecidos

(Hadjipanayi et al., 2011; K. Park, 2011; Perez-amodio et al., 2011), unidades organoides isoladas de camundongos mantidos em hipóxia sistêmica foram utilizadas na formação de TESISs. Nesse experimento, os animais sobreviveram até 28 dias após o procedimento cirúrgico de implantação. A média das massas dos TESISs formados a partir de unidades organoides em hipóxia foi maior do que a massa do TESI formado a partir de unidades organoides em normóxia. Entretanto, todos os valores foram novamente inferiores àqueles observados para intestinos formados em camundongos depois de 28 dias (J. A. Matthews et al., 2009).

5.6 Produção de R-Espondinas para uso em engenharia tecidual do intestino delgado

R-Espondinas (RSPO1-4) são proteínas capazes de se ligar a receptores Lgr (Lgr4-6) e potencializar a via de Wnt. Em particular, células-tronco do intestino Lgr5⁺, localizadas em um nicho na base da cripta, respondem a RSPO1, tornando-se altamente proliferativas, o que leva ao crescimento do epitélio intestinal em camundongos (Carmon, Gong, Lin, Thomas, & Liu, 2011; de Lau et al., 2011; Glinka et al., 2011; K.-A. Kim et al., 2005). Dado o potencial uso dessa proteína para o melhoramento da formação do intestino delgado engenheirado, foi iniciado um projeto, em paralelo, para a produção das isoformas humana e murina de R-Espondina 1. A sequência codificadora de ambas as isoformas foi sintetizada e a presença dos sítios de restrição corretos flanqueando as sequências a 5' e 3' foi confirmada. A continuidade deste projeto será dada por um outro membro do nosso grupo.

6 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que foi possível gerar clones superprodutores estáveis das isoformas rhVEGF₁₆₅, rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁ do gene *VEGF-A* humano em células humanas HEK293. As proteínas foram produzidas e secretadas em meio de cultura, na presença e na ausência de SFB, e em cultivo em suspensão com células adaptadas para esta condição. Esse fato representa um importante passo para o escalonamento da produção dessas isoformas pois é o primeiro trabalho que mostra que isoformas proteicas de *VEGF-A* podem ser produzidas em células HEK293 sob essas condições de cultivo.

Um protocolo de purificação das isoformas proteicas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} foi estabelecido por cromatografia de afinidade a heparina a partir do meio condicionado pelos clones superprodutores. A isoforma rhVEGF₁₆₅ apresentou atividade biológica em ensaios *in vitro* (AngioPhaseTM Kit) e *in vivo* (CAM Assay). Não foram obtidos resultados conclusivos nesses mesmos modelos para a isoforma rhVEGF_{165b}, cujo real papel biológico de fato é contraditório e não bem estabelecido na literatura, parecendo ser dependente do contexto em que está presente. As duas isoformas biologicamente ativas puderam ser utilizadas em engenharia tecidual para o desenvolvimento do intestino curto em murinos. Apesar de indícios promissores, é necessário investigar mais a fundo como as isoformas estão atuando nesse contexto de engenharia tecidual.

A isoforma rhVEGF₁₂₁ também foi produzida com sucesso e, por ser de mais difícil isolamento, seu processo de purificação ainda está em fase de otimização.

A caracterização da estrutura proteica e do perfil de glicosilação das isoformas recombinantes estão em andamento.

7 PRÓXIMOS PASSOS

Os resultados gerados no presente projeto sugerem algumas abordagens futuras de destaque para continuação do estudo:

- a) quantificar as isoformas rhVEGF₁₆₅ e rhVEGF_{165b} purificados no sistema de HPLC por ELISA, comparando-se com a quantidade de proteína total;
- b) otimizar e padronizar a purificação da isoforma rhVEGF₁₂₁;
- c) confirmar a atividade biológica das isoformas rhVEGF_{165b} e rhVEGF₁₂₁;
- d) comparar a atividade biológica das isoformas com um biofármaco comercial de referência;
- e) otimizar e finalizar as análises estruturais (espectrometria de massas, dicroísmo circular e eletroforese capilar) e o perfil de glicosilação das isoformas;
- f) escalonar o cultivo dos clones superprodutores adaptados para crescimento em suspensão para frascos *spinner* e avaliar parâmetros das culturas (taxa de proliferação, viabilidade, consumo de nutrientes e O₂, produção de metabólitos etc.);
- g) determinar a relação pg/célula/dia (PCD) para a produção das isoformas pelos clones superprodutores;
- h) caracterizar molecularmente os clones celulares quanto ao número de cópias inseridas e local de inserção dos transgenes no genoma das células HEK293;
- i) subclonar as sequências codificadoras das isoformas no vetor de expressão pNU1, transfectar as construções em células CHO DG44, selecionar clones superprodutores e seguir as etapas de produção, purificação, avaliação da atividade

biológica e caracterização das isoformas, além do escalonamento dos clones gerados, visando à produção de biofármacos para uso em terapia celular em humanos;

- j) dar continuidade ao projeto de produção das isoformas recombinantes humana e murina de R-Espondina 1.

8 PERSPECTIVAS

Uma vez produzidas e purificadas de forma homogênea, as isoformas de *VEGF-A* poderão ter seu potencial terapêutico verificado em modelos de mamíferos de grande porte. Essa abordagem permitirá uma primeira análise da aplicabilidade dessas proteínas e a portabilidade de tratamento de doenças humanas. Diversos aspectos da administração das isoformas, como formulação, rota, mecanismo de liberação, tempo de meia vida etc. deverão ser também investigados. É importante destacar, também, que, para que os testes em modelos animais possam ser realizados, uma grande massa das proteínas será necessária. Isso será alcançado através de um sistema de expressão em suspensão (biorreator de pequena escala), na ausência de produtos derivados de animais e com rigoroso controle de parâmetros da cultura (taxa de crescimento e mortalidade, pH, oxigenação, metabólitos secretados e outros). É esperado que células CHO transfectadas com as construções do vetor pNU1 contendo as sequências codificadoras das proteínas de interesse (VEGFs) constituam o modelo ideal para a produção das mesmas.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- A, V., Cummings, R., & Esko, J. (2009). *Essentials of Glycobiology* (2nd Editio.). Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Adams, R. H., & Alitalo, K. (2007). Molecular regulation of angiogenesis and lymphangiogenesis. *Nature reviews. Molecular cell biology*, 8(6), 464–78. doi:10.1038/nrm2183
- Afkhami, F., Durocher, Y., & Prakash, S. (2012). Microencapsulated mammalian cells for simultaneous production of VEGF165b and IFN α . *Artificial cells, blood substitutes, and immobilization biotechnology*, 40(1-2), 1–6. doi:10.3109/10731199.2011.560120
- Aggarwal, S. (2011). What's fueling the biotech engine--2010 to 2011. *Nature biotechnology*, 29(12), 1083–9. doi:10.1038/nbt.2060
- Alitalo, K., & Carmeliet, P. (2002). Molecular mechanisms of lymphangiogenesis in health and disease. *Cancer cell*, 1(3), 219–27. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086857>
- Alsop, C., Bates, D. O., Patel, P., Neal, C. R., Qiu, Y., Ahad, T., ... Mavrou, A. (2012). VEGF165b overexpression restores normal glomerular water permeability in VEGF164-overexpressing adult mice. *AJP: Renal Physiology*. doi:10.1152/ajprenal.00410.2011
- Ambati, B. K., Nozaki, M., Singh, N., Takeda, A., Jani, P. D., Suthar, T., ... Ambati, J. (2006). Corneal avascularity is due to soluble VEGF receptor-1. *Nature*, 443, 993–997.
- Anthony, F. W., Wheeler, T., Elcock, C. L., Pickett, M., & Thomas, E. J. (1994). Short report: identification of a specific pattern of vascular endothelial growth factor mRNA expression in human placenta and cultured placental fibroblasts. *Placenta*, 15, 557–561.
- Armelin, H. A., Armelin, M. C., Kelly, K., Stewart, T., Leder, P., Cochran, B. H., & Stiles, C. D. (1984). Functional role for c-myc in mitogenic response to platelet-derived growth factor. *Nature*, 310(5979), 655–60. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6088986>
- Arthuso, F. S., Bartolini, P., & Soares, C. R. J. (2012). Laboratory production of human prolactin from CHO cells adapted to serum-free suspension culture. *Applied biochemistry and biotechnology*, 167(8), 2212–24. doi:10.1007/s12010-012-9745-1
- Ausprunk, D. H., & Folkman, J. (1977). Migration and proliferation of endothelial cells in preformed and newly formed blood vessels during tumor angiogenesis. *Microvascular Research*, 14, 53–65.

- Authors. (2012). *Global Biopharmaceutical Market Report and Forecast (2012-2017)* (p. 238). Publisher through: Research and Markets.
- Baeriswyl, V., & Christofori, G. (2009). The angiogenic switch in carcinogenesis. *Seminars in Cancer Biology*, 19, 329–337.
- Banfi, A., von Degenfeld, G., Gianni-Barrera, R., Reginato, S., Merchant, M. J., McDonald, D. M., & Blau, H. M. (2012). Therapeutic angiogenesis due to balanced single-vector delivery of VEGF and PDGF-BB. *FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 26(6), 2486–97. doi:10.1096/fj.11-197400
- Bates, D. O., Cui, T., Doughty, J. M., Winkler, M., Sugiono, M., Shields, J. D., ... Harper, S. J. (2002). VEGF 165 b , an Inhibitory Splice Variant of Vascular Endothelial Growth Factor , Is Down-Regulated in Renal Cell Carcinoma 1, 4123–4131.
- Bates, D. O., Mavrou, A., Qiu, Y., Carter, J. G., Hamdollah-Zadeh, M., Barratt, S., ... Harper, S. J. (2013). Detection of VEGF-Axxxxb Isoforms in Human Tissues. *PloS one*, 8(7), e68399. doi:10.1371/journal.pone.0068399
- Belgore, F. M., Blann, A. D., Li-Saw-Hee, F. L., Beevers, D. G., & Lip, G. Y. (2001). Plasma levels of vascular endothelial growth factor and its soluble receptor (SFlt-1) in essential hypertension. *The American Journal of Cardiology*, 87, 805–807, A9.
- Bevan, H. S., Van Den Akker, N. M. S., Qiu, Y., Polman, J. A. E., Foster, R. R., Yem, J., ... Bates, D. O. (2008). The alternatively spliced anti-angiogenic family of VEGF isoforms VEGFxxxxb in human kidney development. *Nephron Physiology*, 110, p57–p67.
- Beyer, T., Lohse, S., Berger, S., Peipp, M., Valerius, T., & Dechant, M. (2009). Serum-free production and purification of chimeric IgA antibodies. *Journal of immunological methods*, 346(1-2), 26–37. doi:10.1016/j.jim.2009.05.002
- Brandner, B., Kurkela, R., Vihko, P., & Kungl, A. J. (2006). Investigating the effect of VEGF glycosylation on glycosaminoglycan binding and protein unfolding. *Biochemical and biophysical research communications*, 340, 836–839. doi:10.1016/j.bbrc.2005.12.079
- Brown, L. F., Yeo, K. T., Berse, B., Yeo, T. K., Senger, D. R., Dvorak, H. F., & van de Water, L. (1992). Expression of vascular permeability factor (vascular endothelial growth factor) by epidermal keratinocytes during wound healing. *The Journal of experimental medicine*, 176(5), 1375–9. Retrieved from <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2119412&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
- Burger, P. C., Chandler, D. B., & Klintworth, G. K. (1983). Corneal neovascularization as studied by scanning electron microscopy of vascular casts. *Laboratory investigation a journal of technical methods and pathology*, 48, 169–180.

- Burri, P. H., & Tarek, M. R. (1990). A novel mechanism of capillary growth in the rat pulmonary microcirculation. *The Anatomical record*, 228, 35–45.
- Butler, M., & Meneses-Acosta, a. (2012). Recent advances in technology supporting biopharmaceutical production from mammalian cells. *Applied microbiology and biotechnology*, 96(4), 885–94. doi:10.1007/s00253-012-4451-z
- Caduff, J. H., Fischer, L. C., & Burri, P. H. (1986). Scanning electron microscope study of the developing microvasculature in the postnatal rat lung. *The Anatomical record*, 216, 154–164.
- Campochiaro, P. a. (2013). Ocular neovascularization. *Journal of molecular medicine (Berlin, Germany)*, 91(3), 311–21. doi:10.1007/s00109-013-0993-5
- Cario, H., Smith, D. E. C., Blom, H., Blau, N., Bode, H., Holzmann, K., ... Schwarz, K. (2011). Dihydrofolate reductase deficiency due to a homozygous DHFR mutation causes megaloblastic anemia and cerebral folate deficiency leading to severe neurologic disease. *American journal of human genetics*, 88(2), 226–31. doi:10.1016/j.ajhg.2011.01.007
- Carmeliet, P. (2005). Angiogenesis in life, disease and medicine. *Nature*, 438, 932–936.
- Carmon, K. S., Gong, X., Lin, Q., Thomas, A., & Liu, Q. (2011). R-spondins function as ligands of the orphan receptors LGR4 and LGR5 to regulate Wnt/beta-catenin signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(28), 11452–7. doi:10.1073/pnas.1106083108
- Catena, R., Larzabal, L., Larrayoz, M., Molina, E., Hermida, J., Agorreta, J., ... Calvo, A. (2010). VEGF_{121b} and VEGF_{165b} are weakly angiogenic isoforms of VEGF-A. *Molecular cancer*, 9, 320. doi:10.1186/1476-4598-9-320
- Cébe-Suarez, S., Grünewald, F. S., Jaussi, R., Li, X., Claesson-Welsh, L., Spillmann, D., ... Ballmer-Hofer, K. (2008). Orf virus VEGF-E NZ2 promotes paracellular NRP-1/VEGFR-2 coreceptor assembly via the peptide RPPR. *The FASEB journal official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 22, 3078–3086.
- Cheung, C. Y., Singh, M., Ebaugh, M. J., & Brace, R. A. (1995). Vascular endothelial growth factor gene expression in ovine placenta and fetal membranes. *AmJObstetGynecol*, 173, 753–759.
- Chun, B. H., Bang, W. G., Park, Y. K., & Woo, S. K. (2001). Stable expression of recombinant human coagulation factor XIII in protein-free suspension culture of Chinese hamster ovary cells. *Cytotechnology*, 37(3), 179–87. doi:10.1023/A:1020555918441

- Connolly, D. T., Olander, J. V, Heuvelman, D., Nelson, R., Monsell, R., Siegel, N., ... Feder, J. (1989). Human vascular permeability factor. Isolation from U937 cells. *The Journal of Biological Chemistry*, 264, 20017–20024.
- Cromer, W. E., Ganta, C. V, Patel, M., Traylor, J., Kevil, C. G., Alexander, J. S., & Mathis, J. M. (2013). VEGF-A isoform modulation in an preclinical TNBS model of ulcerative colitis: protective effects of a VEGF164b therapy. *Journal of translational medicine*, 11(1), 207. doi:10.1186/1479-5876-11-207
- Cui, T.-G., Foster, R. R., Saleem, M., Mathieson, P. W., Gillatt, D. A., Bates, D. O., & Harper, S. J. (2004). Differentiated human podocytes endogenously express an inhibitory isoform of vascular endothelial growth factor (VEGF165b) mRNA and protein. *American journal of physiology Renal physiology*, 286, F767–F773.
- Davies, M. G. (2012). Critical limb ischemia: cell and molecular therapies for limb salvage. *Methodist DeBakey cardiovascular journal*, 8(4), 20–7. Retrieved from <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3549646&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
- De Lau, W., Barker, N., Low, T. Y., Koo, B.-K., Li, V. S. W., Teunissen, H., ... Clevers, H. (2011). Lgr5 homologues associate with Wnt receptors and mediate R-spondin signalling. *Nature*, 476(7360), 293–7. doi:10.1038/nature10337
- Deryugina, E. I., & Quigley, J. P. (2009). CHAPTER TWO: Chick Embryo Chorioallantoic Membrane Models to Quantify Angiogenesis Induced by Inflammatory and Tumor Cells or Purified Effector Molecules, 6879(08). doi:10.1016/S0076-6879(08)02802-4.CHAPTER
- Des Rieux, A., Ucakar, B., Mupendwa, B. P. K., Colau, D., Feron, O., Carmeliet, P., & Prat, V. (2011). 3D systems delivering VEGF to promote angiogenesis for tissue engineering. *Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society*, 150(3), 272–8. doi:10.1016/j.jconrel.2010.11.028
- Diaz, S. L., Padler-Karavani, V., Ghaderi, D., Hurtado-Ziola, N., Yu, H., Chen, X., ... Varki, N. M. (2009). Sensitive and specific detection of the non-human sialic Acid N-glycolylneuraminic acid in human tissues and biotherapeutic products. *PloS one*, 4, e4241. doi:10.1371/journal.pone.0004241
- Djonov, V., Baum, O., & Burri, P. H. (2003). Vascular remodeling by intussusceptive angiogenesis. *Cell and tissue research*, 314(1), 107–17. doi:10.1007/s00441-003-0784-3
- Drake, C. (2003). Embryonic and adult vasculogenesis. *Birth Defects Res*, 69(1), 73–82.
- Dull, T., Zufferey, R., Kelly, M., Mandel, R. J., Nguyen, M., Trono, D., & Naldini, L. (1998). A third-generation lentivirus vector with a conditional packaging system. *Journal of virology*, 72(11), 8463–71. Retrieved from

<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=110254&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>

- Dvorak, H. F. (2002). Vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor: a critical cytokine in tumor angiogenesis and a potential target for diagnosis and therapy. *Journal of Clinical Oncology*, 20, 4368–4380.
- Elçin, Y. M., Dixit, V., & Gitnick, G. (2001). Extensive in vivo angiogenesis following controlled release of human vascular endothelial cell growth factor: implications for tissue engineering and wound healing. *Artificial Organs*, 25, 558–565.
- Enoch, S., Grey, J. E., & Harding, K. G. (2006). Recent advances and emerging treatments. *BMJ (Clinical research ed.)*, 332, 962–965. doi:10.1136/bmj.332.7547.962
- Ferrara, N., & Henzel, W. J. (1989). Pituitary follicular cells secrete a novel heparin-binding growth factor specific for vascular endothelial cells. *Biochemical and biophysical research communications*, 161(2), 851–8. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2735925>
- Ferrara, N., Winer, J., Burton, T., Rowland, a, Siegel, M., Phillips, H. S., ... Levinson, a D. (1993). Expression of vascular endothelial growth factor does not promote transformation but confers a growth advantage in vivo to Chinese hamster ovary cells. *The Journal of clinical investigation*, 91(1), 160–70. doi:10.1172/JCI116166
- Ferrara, Napoleone. (2002). VEGF and the quest for tumour angiogenesis factors. *Nature reviews. Cancer*, 2(10), 795–803. doi:10.1038/nrc909
- Ferrara, Napoleone. (2004). Vascular endothelial growth factor: basic science and clinical progress. *Endocrine reviews*, 25(4), 581–611. doi:10.1210/er.2003-0027
- Ferroni, P., Della-Morte, D., Palmirotta, R., Rundek, T., Guadagni, F., & Roselli, M. (2012). Angiogenesis and hypertension: the dual role of anti-hypertensive and anti-angiogenic therapies. *Current vascular pharmacology*, 10(4), 479–93. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22272903>
- Folkman, J., & Klagsbrun, M. (1987). Angiogenic factors. *Science New York NY*, 235, 442–447.
- Folkman, Judah. (1971). Tumor Angiogenesis: Therapeutic Implications — NEJM. *New England Journal of Medicine*, 285, 1182–1186. doi:10.1056/NEJM197111182852108
- Folkman, Judah, & Kalluri, R. (2004). Cancer without disease. *Nature*, 427, 787.
- Folkman, Judah, Merler, E., Abernathy, C., & Williams, G. (1971). Isolation of a tumor factor responsible for angiogenesis. *The Journal of Experimental Medicine*, 133, 275–288.

- Fong, G. H., Rossant, J., Gertsenstein, M., & Breitman, M. L. (1995). Role of the Flt-1 receptor tyrosine kinase in regulating the assembly of vascular endothelium. *Nature*, 376, 66–70.
- Freyman, T. M., Yannas, I. V., Yokoo, R., & Gibson, L. J. (2001). Fibroblast contraction of a collagen-GAG matrix. *Biomaterials*, 22(21), 2883–91. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11561894>
- Gardner-Thorpe, J., Grikscheit, T. C., Ito, H., Perez, A., Ashley, S. W., Vacanti, J. P., & Whang, E. E. (2003). Angiogenesis in tissue-engineered small intestine. *Tissue engineering*, 9(6), 1255–61. doi:10.1089/10763270360728161
- Ghani, K., Garnier, A., Coelho, H., Transfiguracion, J., Trudel, P., & Kamen, A. (2006). Retroviral Vector Production Using Suspension-Adapted 293GPG Cells in a 3L Acoustic Filter-Based Perfusion Bioreactor. doi:10.1002/bit
- Gilbert, J. S., Babcock, S. A., & Granger, J. P. (2007). Hypertension produced by reduced uterine perfusion in pregnant rats is associated with increased soluble fms-like tyrosine kinase-1 expression. *Hypertension*, 50, 1142–1147.
- Gilbert, S. F. (2000). *Developmental Biology* (6th ed., p. 711). Sunderland (MA): Sinauer Associates.
- Glinka, A., Dolde, C., Kirsch, N., Huang, Y.-L., Kazanskaya, O., Ingelfinger, D., ... Niehrs, C. (2011). LGR4 and LGR5 are R-spondin receptors mediating Wnt/ β -catenin and Wnt/PCP signalling. *EMBO reports*, 12(10), 1055–61. doi:10.1038/embor.2011.175
- Grazul-Bilska, A. T., Johnson, M. L., Bilski, J. J., Redmer, D. A., Reynolds, L. P., Abdullah, A., & Abdullah, K. M. (2003). Wound healing: the role of growth factors. *Drugs of today (Barcelona, Spain : 1998)*, 39, 787–800.
- Grochot-Przeczek, A., Dulak, J., & Jozkowicz, A. (2013). Therapeutic angiogenesis for revascularization in peripheral artery disease. *Gene*, 525(2), 220–8. doi:10.1016/j.gene.2013.03.097
- Guarino, V., Causa, F., & Ambrosio, L. (2007). Bioactive scaffolds for bone and ligament tissue. *Expert Review of Medical Devices*, 4, 405–418.
- Guy, H. M., McCloskey, L., Lye, G. J., Mitrophanous, K. a, & Mukhopadhyay, T. K. (2013). Characterization of lentiviral vector production using microwell suspension cultures of HEK293T-derived producer cells. *Human gene therapy methods*, 24(2), 125–39. doi:10.1089/hgtb.2012.200
- Hadjipanayi, E., Cheema, U., Mudera, V., Deng, D., Liu, W., & Brown, R. a. (2011). First implantable device for hypoxia-mediated angiogenic induction. *Journal of controlled*

- release : official journal of the Controlled Release Society*, 153(3), 217–24.
doi:10.1016/j.jconrel.2011.03.029
- Hainsworth, J., Heim, W., Berlin, J., Baron, A., Griffing, S., Holmgren, E., ... Kabbinavar, F. (2004). new england journal, 2335–2342.
- Haldankar, R., Kopchick, J. J., & Ridgway, D. (n.d.). Stable production of a human growth hormone antagonist from CHO cells adapted to serum-free suspension culture. *Biotechnology progress*, 15(3), 336–46. doi:10.1021/bp9900460
- Harper, S. J., & Bates, D. O. (2008). VEGF-A splicing: the key to anti-angiogenic therapeutics? *Nature reviews. Cancer*, 8(11), 880–7. doi:10.1038/nrc2505
- Harris, S., Craze, M., Newton, J., Fisher, M., Shima, D. T., Tozer, G. M., & Kanthou, C. (2012). Do anti-angiogenic VEGF (VEGFxxx) isoforms exist? A cautionary tale. *PloS one*, 7(5), e35231. doi:10.1371/journal.pone.0035231
- Havenga, M. J. E., Holterman, L., Melis, I., Smits, S., Kaspers, J., Heemskerk, E., ... Goudsmit, J. (2008). Serum-free transient protein production system based on adenoviral vector and PER.C6 technology: high yield and preserved bioactivity. *Biotechnology and bioengineering*, 100, 273–283. doi:10.1002/bit.21757
- Hefferon, K. L. (2012). Plant virus expression vectors set the stage as production platforms for biopharmaceutical proteins. *Virology*, 433(1), 1–6. doi:10.1016/j.virol.2012.06.012
- Henry, T. D. (2003). The VIVA Trial: Vascular Endothelial Growth Factor in Ischemia for Vascular Angiogenesis. *Circulation*, 107(10), 1359–1365.
doi:10.1161/01.CIR.0000061911.47710.8A
- Houck, K. A., Ferrara, N., Winer, J., Cachianes, G., Li, B., & Leung, D. W. (1991). The vascular endothelial growth factor family: identification of a fourth molecular species and characterization of alternative splicing of RNA. *Molecular endocrinology Baltimore Md*, 5, 1806–1814.
- Houck, K. A., Leung, D. W., Rowland, A. M., Winer, J., & Ferrara, N. (1992). Dual regulation of vascular endothelial growth factor bioavailability by genetic and proteolytic mechanisms. *The Journal of Biological Chemistry*, 267, 26031–7.
- Huch, M., Dorrell, C., Boj, S. F., van Es, J. H., Li, V. S. W., van de Wetering, M., ... Clevers, H. (2013). In vitro expansion of single Lgr5+ liver stem cells induced by Wnt-driven regeneration. *Nature*, 494(7436), 247–50. doi:10.1038/nature11826
- Kawamura, H., Li, X., Harper, S. J., Bates, D. O., & Claesson-Welsh, L. (2008). Vascular endothelial growth factor (VEGF)-A165b is a weak in vitro agonist for VEGF receptor-2

- due to lack of coreceptor binding and deficient regulation of kinase activity. *Cancer Research*, 68, 4683–4692.
- Kim, K. J., Li, B., Winer, J., Armanini, M., Gillett, N., Phillips, H. S., & Ferrara, N. (1993). Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis suppresses tumour growth in vivo. *Nature*, 362, 841–844.
- Kim, K.-A., Kakitani, M., Zhao, J., Oshima, T., Tang, T., Binnerts, M., ... Tomizuka, K. (2005). Mitogenic influence of human R-spondin1 on the intestinal epithelium. *Science (New York, N.Y.)*, 309(5738), 1256–9. doi:10.1126/science.1112521
- Koga, K., Osuga, Y., Yoshino, O., Hirota, Y., Ruimeng, X., Hirata, T., ... Taketani, Y. (2003). Elevated serum soluble vascular endothelial growth factor receptor 1 (sVEGFR-1) levels in women with preeclampsia. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 88, 2348–2351.
- Kuczewski, M., Schirmer, E., Lain, B., & Zarbis-Papastoitsis, G. (2011). A single-use purification process for the production of a monoclonal antibody produced in a PER.C6 human cell line. *Biotechnology journal*, 6, 56–65. doi:10.1002/biot.201000292
- Kunig, A. M., Balasubramaniam, V., Markham, N. E., Morgan, D., Montgomery, G., Grover, T. R., & Abman, S. H. (2005). Recombinant human VEGF treatment enhances alveolarization after hyperoxic lung injury in neonatal rats. *American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology*, 289(4), L529–35. doi:10.1152/ajplung.00336.2004
- Lai, Y., Schneider, D., Kieszun, A., Hauck-Schmalenberger, I., Breier, G., Brandhorst, D., ... Linn, T. (2005). Vascular endothelial growth factor increases functional beta-cell mass by improvement of angiogenesis of isolated human and murine pancreatic islets. *Transplantation*, 79, 1530–1536. doi:10.1097/01.tp.0000163506.40189.65
- Lee, G. Y., Jung, W. W., Kang, C. S., & Bang, I. S. (2006). Expression and characterization of human vascular endothelial growth factor (VEGF165) in insect cells. *Protein expression and purification*, 46(2), 503–9. doi:10.1016/j.pep.2005.09.023
- Lee, S.-B., Park, J. S., Lee, S., Park, J., Yu, S., Kim, H., ... Yoon, J. (2008). Overproduction of recombinant human VEGF (vascular endothelial growth factor) in Chinese hamster ovary cells. *Journal of microbiology and biotechnology*, 18(1), 183–7. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18239438>
- Lei, J., Jiang, A., & Pei, D. (1998). Identification and characterization of a new splicing variant of vascular endothelial growth factor: VEGF183. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1443, 400–406.
- Lemmon, M. A., & Schlessinger, J. (2000). Cell signaling by receptor tyrosine kinases. *Cell*, 103, 211–225.

- Levine, R. J., Maynard, S. E., Qian, C., Lim, K.-H., England, L. J., Yu, K. F., ... Karumanchi, S. A. (2004). Circulating angiogenic factors and the risk of preeclampsia. *The New England Journal of Medicine*, 350, 672–683.
- Lien, S., & Lowman, H. B. (2008). Therapeutic anti-VEGF antibodies. *Handbook of experimental pharmacology*, (181), 131–50. doi:10.1007/978-3-540-73259-4_6
- Lindhorst, D., Tavassol, F., von See, C., Schumann, P., Laschke, M. W., Harder, Y., ... Rücker, M. (2010). Effects of VEGF loading on scaffold-confined vascularization. *Journal of biomedical materials research. Part A*, 95(3), 783–92. doi:10.1002/jbm.a.32902
- Link, T., Bäckström, M., Graham, R., Essers, R., Zörner, K., Gätgens, J., ... Noll, T. (2004). Bioprocess development for the production of a recombinant MUC1 fusion protein expressed by CHO-K1 cells in protein-free medium. *Journal of biotechnology*, 110(1), 51–62. doi:10.1016/j.jbiotec.2003.12.008
- Linn, T., Erb, D., Schneider, D., Kidszun, A., Elçin, a E., Bretzel, R. G., & Elçin, Y. M. (2003). Polymers for induction of revascularization in the rat fascial flap: application of vascular endothelial growth factor and pancreatic islet cells. *Cell transplantation*, 12(7), 769–78. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14653623>
- Lohela, M., Bry, M., Tammela, T., & Alitalo, K. (2009). VEGFs and receptors involved in angiogenesis versus lymphangiogenesis. *Current opinion in cell biology*, 21(2), 154–65. doi:10.1016/j.ceb.2008.12.012
- Lucas, B. K., Giere, L. M., Demarco, R. A., Shen, A., Chisholm, V., & Crowley, C. W. (1996). High-level production of recombinant proteins in CHO cells using a dicistronic DHFR intron expression vector, 24(9), 1774–1779.
- Ma, Y., Zechariah, A., Qu, Y., & Hermann, D. M. (2012). Effects of vascular endothelial growth factor in ischemic stroke. *Journal of neuroscience research*, 90(10), 1873–82. doi:10.1002/jnr.23088
- Matthews, J. a, Sala, F. G., Speer, A. L., Li, Y., Warburton, D., & Grikscheit, T. C. (2012). Mesenchymal-specific inhibition of vascular endothelial growth factor (VEGF) attenuates growth in neonatal mice. *The Journal of surgical research*, 172(1), 40–7. doi:10.1016/j.jss.2011.04.043
- Matthews, J. A., Speer, A. L., Warburton, D., & Grikscheit, T. C. (2009). VEGF optimizes the formation of tissue-engineered small intestine R esearch A rticle, 559–567.
- Maynard, S. E., Min, J.-Y., Merchan, J., Lim, K.-H., Li, J., Mondal, S., ... Karumanchi, S. A. (2003). Excess placental soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction, hypertension, and proteinuria in preeclampsia. *Journal of Clinical Investigation*, 111, 649–658. doi:10.1172/JCI200317189

- Mineur, P., Colige, A. C., Deroanne, C. F., Dubail, J., Kesteloot, F., Habraken, Y., ... Lambert, C. a. (2007). Newly identified biologically active and proteolysis-resistant VEGF-A isoform VEGF111 is induced by genotoxic agents. *The Journal of cell biology*, 179(6), 1261–73. doi:10.1083/jcb.200703052
- Mizuguchi, H., Xu, Z., Ishii-Watabe, A., Uchida, E., & Hayakawa, T. (2000). IRES-dependent second gene expression is significantly lower than cap-dependent first gene expression in a bicistronic vector. *Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy*, 1(4), 376–82. doi:10.1006/mthe.2000.0050
- Mohanraj, D., Olson, T., & Ramakrishnan, S. (1995). A novel method to purify recombinant vascular endothelial growth factor (VEGF121) expressed in yeast. *Biochemical and biophysical research communications*, 215(2), 750–756.
- Mouriño, V., & Boccaccini, A. R. (2010). Bone tissue engineering therapeutics: controlled drug delivery in three-dimensional scaffolds. *Journal of the Royal Society Interface the Royal Society*, 7, 209–227. doi:10.1098/rsif.2009.0379
- Ng, E. W. M., Shima, D. T., Calias, P., Cunningham, E. T., Guyer, D. R., & Adamis, A. P. (2006). Pegaptanib, a targeted anti-VEGF aptamer for ocular vascular disease. *Nature Reviews Drug Discovery*, 5, 123–132.
- Norrby, K. (2006). In vivo models of angiogenesis. doi:10.2755/jcmm010.003.01
- Nowak, D. G., Woolard, J., Amin, E. M., Konopatskaya, O., Saleem, M. a, Churchill, A. J., ... Bates, D. O. (2008). Expression of pro- and anti-angiogenic isoforms of VEGF is differentially regulated by splicing and growth factors. *Journal of cell science*, 121(Pt 20), 3487–95. doi:10.1242/jcs.016410
- Park, J. E., Keller, G. A., & Ferrara, N. (1993). The vascular endothelial growth factor (VEGF) isoforms: differential deposition into the subepithelial extracellular matrix and bioactivity of extracellular matrix-bound VEGF. *Molecular Biology of the Cell*, 4, 1317–1326.
- Park, K. (2011). Engineered cell/matrix platform for hypoxia-induced angiogenesis. *Journal of Controlled Release*, 153, 197.
- Pellet-Many, C., Frankel, P., Jia, H., & Zachary, I. (2008). Neuropilins: structure, function and role in disease. *The Biochemical journal*, 411(2), 211–26. doi:10.1042/BJ20071639
- Perez-amodio, S., Ph, D., Tra, W. M. W., Sc, B., Rakhorst, H. A., & Lilly, E. (2011). Hypoxia Preconditioning of Tissue-Engineered Mucosa Enhances Its Angiogenic Capacity In Vitro, 17. doi:10.1089/ten.tea.2010.0429

- Perrin, R. M., Konopatskaya, O., Qiu, Y., Harper, S., Bates, D. O., & Churchill, A. J. (2005). Diabetic retinopathy is associated with a switch in splicing from anti- to pro-angiogenic isoforms of vascular endothelial growth factor. *Diabetologia*, 48, 2422–2427.
- Peters, K. G., De Vries, C., & Williams, L. T. (1993). Vascular endothelial growth factor receptor expression during embryogenesis and tissue repair suggests a role in endothelial differentiation and blood vessel growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 90(19), 8915–9. Retrieved from <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=47471&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
- Pizarro, S. a, Gunson, J., Field, M. J., Dinges, R., Khoo, S., Dalal, M., ... Schmelzer, C. H. (2010). High-yield expression of human vascular endothelial growth factor VEGF(165) in *Escherichia coli* and purification for therapeutic applications. *Protein expression and purification*, 72(2), 184–93. doi:10.1016/j.pep.2010.03.007
- Promega Corporation. (2010). pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector Systems (p. 27). Madison: Promega Corporation.
- Qiu, Y., Hoareau-Aveilla, C., Oltean, S., Harper, S. J., & Bates, D. O. (2009). The anti-angiogenic isoforms of VEGF in health and disease. *Biochemical Society transactions*, 37, 1207–1213. doi:10.1042/BST0371207
- Rajagopalan, S., Mohler, E., Lederman, R. J., Saucedo, J., Mendelsohn, F. O., Olin, J., ... Hirsch, A. T. (2003). *Regional Angiogenesis with Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in peripheral arterial disease: Design of the RAVE trial*. *American heart journal* (Vol. 145, pp. 1114–1118). doi:10.1016/S0002-8703(03)00102-9
- Redmer, D. A., & Reynolds, L. P. (1996). Angiogenesis in the ovary. *Reviews of reproduction*, 1(3), 182–92. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9414456>
- Reynolds, L. P., & Redmer, D. A. (1998). Expression of the angiogenic factors, basic fibroblast growth factor and vascular endothelial growth factor, in the ovary. *Journal of animal science*, 76(6), 1671–81. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9655588>
- Rinaldi, M., Chiosi, F., dell’Omo, R., Romano, M. R., Parmeggiani, F., Semeraro, F., ... Costagliola, C. (2012). Intravitreal pegaptanib sodium (Macugen®) for treatment of diabetic macular oedema: a morphologic and functional study. *British journal of clinical pharmacology*, 74, 940–6. doi:10.1111/j.1365-2125.2012.04291.x
- Risau, W., & Flamme, I. (1995). Vasculogenesis. *Annual review of cell and developmental biology*, 11, 73–91. doi:10.1146/annurev.cb.11.110195.000445
- Rocha, F. G., Sundback, C. a, Krebs, N. J., Leach, J. K., Mooney, D. J., Ashley, S. W., ... Whang, E. E. (2008). The effect of sustained delivery of vascular endothelial growth factor

- on angiogenesis in tissue-engineered intestine. *Biomaterials*, 29(19), 2884–90. doi:10.1016/j.biomaterials.2008.03.026
- Rodriguez, J., Spearman, M., Huzel, N., & Butler, M. (2005). Enhanced production of monomeric interferon- α by CHO cells through the control of culture conditions. *Biotechnology Progress*, 21, 22–30. doi:10.1021/bp049807b
- Roskoski Jr, R. (2008). VEGF receptor protein–tyrosine kinases: Structure and regulation. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 375, 287 – 291.
- Rossiter, H., Barresi, C., Pammer, J., Rendl, M., Haigh, J., Wagner, E. F., & Tschachler, E. (2004). Loss of vascular endothelial growth factor activity in murine epidermal keratinocytes delays wound healing and inhibits tumor formation. *Cancer Res.*, 64, 3508–3516.
- Sarkar, G., & Sommer, S. S. (1990). The “megaprimer” method of site-directed mutagenesis. *BioTechniques*, 8(4), 404–7. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2340178>
- Sato, Y., Poynter, G., Huss, D., Filla, M. B., Czirok, A., Rongish, B. J., ... Lansford, R. (2010). Dynamic Analysis of Vascular Morphogenesis Using Transgenic Quail Embryos. *PLoS ONE*, 5, 12. doi:10.1371/journal.pone.0012674
- Sawano, A., Takahashi, T., Yamaguchi, S., Aonuma, M., & Shibuya, M. (1996). Flt-1 but not KDR/Flk-1 tyrosine kinase is a receptor for placenta growth factor, which is related to vascular endothelial growth factor. *Cell growth differentiation the molecular biology journal of the American Association for Cancer Research*, 7, 213–221.
- Senger, D. R., Galli, S. J., Dvorak, A. M., Perruzzi, C. A., Harvey, V. S., & Dvorak, H. F. (1983). Tumor cells secrete a vascular permeability factor that promotes accumulation of ascites fluid. *Science (New York, N.Y.)*, 219(4587), 983–5. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6823562>
- Shibuya, M. (2006). Differential roles of vascular endothelial growth factor receptor-1 and receptor-2 in angiogenesis. *Journal of biochemistry and molecular biology*, 39(5), 469–78. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17002866>
- Shibuya, M. (2011). Involvement of Flt-1 (VEGF receptor-1) in cancer and preeclampsia. *Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences*, 87(4), 167–78. Retrieved from <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3149381&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
- Shibuya, M. (2013). Vascular endothelial growth factor and its receptor system: physiological functions in angiogenesis and pathological roles in various diseases. *Journal of biochemistry*, 153(1), 13–9. doi:10.1093/jb/mvs136

- Shibuya, M., & Claesson-Welsh, L. (2006). Signal transduction by VEGF receptors in regulation of angiogenesis and lymphangiogenesis. *Experimental cell research*, 312(5), 549–60. doi:10.1016/j.yexcr.2005.11.012
- Siemeister, G., Schnurr, B., Mohrs, K., Schächtele, C., Marmé, D., & Martiny-Baron, G. (1996). Expression of biologically active isoforms of the tumor angiogenesis factor VEGF in *Escherichia coli*. *Biochemical and biophysical research communications*, 222(2), 249–55. doi:10.1006/bbrc.1996.0730
- Sogayar, M. C., Camargo, A. A., Bettoni, F., Carraro, D. M., Pires, L. C., Parmigiani, R. B., ... Simpson, A. J. G. (2004). A transcript finishing initiative for closing gaps in the human transcriptome. *Genome research*, 14(7), 1413–23. doi:10.1101/gr.2111304
- Soker, S., Machado, M., & Atala, A. (2000). Systems for therapeutic angiogenesis in tissue engineering. *World journal of urology*, 18(1), 10–8. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10766038>
- Street, J., Bao, M., deGuzman, L., Bunting, S., Peale, F. V, Ferrara, N., ... Filvaroff, E. H. (2002). Vascular endothelial growth factor stimulates bone repair by promoting angiogenesis and bone turnover. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(15), 9656–61. doi:10.1073/pnas.152324099
- Sunley, K., & Butler, M. (2010). Strategies for the enhancement of recombinant protein production from mammalian cells by growth arrest. *Biotechnology advances*, 28(3), 385–94. doi:10.1016/j.biotechadv.2010.02.003
- Swiech, K., Kamen, A., Ansorge, S., Durocher, Y., Picanço-Castro, V., Russo-Carbolante, E. M. S., ... Covas, D. T. (2011). Transient transfection of serum-free suspension HEK 293 cell culture for efficient production of human rFVIII. *BMC biotechnology*, 11(1), 114. doi:10.1186/1472-6750-11-114
- Tanihara, M., Suzuki, Y., Yamamoto, E., Noguchi, A., & Mizushima, Y. (2001). Sustained release of basic fibroblast growth factor and angiogenesis in a novel covalently crosslinked gel of heparin and alginate. *Journal of biomedical materials research*, 56(2), 216–21. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11340591>
- Thanigaimani, S., Kichenadasse, G., & Mangoni, A. a. (2011). The emerging role of vascular endothelial growth factor (VEGF) in vascular homeostasis: lessons from recent trials with anti-VEGF drugs. *Current vascular pharmacology*, 9(3), 358–80. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20807189>
- Thomas, P., & Smart, T. G. (2005). HEK293 cell line: a vehicle for the expression of recombinant proteins. *Journal of pharmacological and toxicological methods*, 51(3), 187–200. doi:10.1016/j.vascn.2004.08.014

- Thompson, J. S., Rochling, F. A., Weseman, R. A., & Mercer, D. F. (2012). Current management of short bowel syndrome. *Current problems in surgery*, 49(2), 52–115. doi:10.1067/j.cpsurg.2011.10.002
- Tie, J., & Desai, J. (2012). Antiangiogenic therapies targeting the vascular endothelial growth factor signaling system. *Critical reviews in oncogenesis*, 17(1), 51–67. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22471664>
- Tiscornia, G., Singer, O., & Verma, I. M. (2006). Production and purification of lentiviral vectors. *Nature protocols*, 1(1), 241–5. doi:10.1038/nprot.2006.37
- Tsao, Y., Condon, R., Schaefer, E., Lio, P., & Liu, Z. (2002). Development and improvement of a serum-free suspension process for the production of recombinant adenoviral vectors using HEK293 cells, (1997), 189–198.
- Ulyatt, C., Walker, J., & Ponnambalam, S. (2011). Hypoxia differentially regulates VEGFR1 and VEGFR2 levels and alters intracellular signaling and cell migration in endothelial cells. *Biochemical and biophysical research communications*, 404(3), 774–9. doi:10.1016/j.bbrc.2010.12.057
- Varey, A. H. R., Rennel, E. S., Qiu, Y., Bevan, H. S., Perrin, R. M., Raffy, S., ... Bates, D. O. (2008). VEGF 165 b, an antiangiogenic VEGF-A isoform, binds and inhibits bevacizumab treatment in experimental colorectal carcinoma: balance of pro- and antiangiogenic VEGF-A isoforms has implications for therapy. *British journal of cancer*, 98, 1366–1379.
- Vinekar, A., Sund, N., Quiram, P., & Capone, A. (2010). Choroidal neovascular membrane in persistent fetal vasculature syndrome managed with intravitreal pegaptanib sodium in an infant. *Retina Philadelphia Pa.*
- Walsh, G. (2002). Biopharmaceuticals and biotechnology medicines: an issue of nomenclature. *European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences*, 15(2), 135–8. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849909>
- Walsh, G. (2010). Biopharmaceutical benchmarks 2010. *Nature biotechnology*, 28(9), 917–24. doi:10.1038/nbt0910-917
- Wernike, E., Montjovent, M.-O., Liu, Y., Wismeijer, D., Hunziker, E. B., Siebenrock, K., ... Klenke, F. M. (2010). VEGF incorporated into calcium phosphate ceramics promotes vascularisation and bone formation in vivo. *European cells & materials*, 19, 30–40. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20178096>
- Whittaker, J. W. (2013). Cell-free protein synthesis: the state of the art. *Biotechnology letters*, 35(2), 143–52. doi:10.1007/s10529-012-1075-4

- Wilting, J., Christ, B., Bokeloh, M., & Weich, H. a. (1993). In vivo effects of vascular endothelial growth factor on the chicken chorioallantoic membrane. *Cell & Tissue Research*, 274(1), 163–172. doi:10.1007/BF00327997
- Wilting, J., Christ, B., & Weich, H. A. (1992). The effects of growth factors on the day 13 chorioallantoic membrane (CAM): a study of VEGF 165 and PDGF-BB, 251–257.
- Woolard, J., Bevan, H. S., Harper, S. J., & Bates, D. O. (2009). Molecular diversity of VEGF-A as a regulator of its biological activity. *Microcirculation (New York, N.Y. : 1994)*, 16(7), 572–92. doi:10.1080/10739680902997333
- Wu, X., Yin, Z., Cao, C., Huang, L., Lu, X., Liu, J., & Cui, W. (2004). Expression of human VEGF165 in silkworm (*Bombyx mori* L.) by using a recombinant baculovirus and its bioactivity assay. *Journal of biotechnology*, 111(3), 253–61. doi:10.1016/j.jbiotec.2004.04.016
- Xiao, X., Guo, P., Chen, Z., El-Gohary, Y., Wiersch, J., Gaffar, I., ... Gittes, G. K. (2013). Hypoglycemia reduces vascular endothelial growth factor A production by pancreatic beta cells as a regulator of beta cell mass. *Journal of Biological Chemistry*, 288, 8636–8646. doi:10.1074/jbc.M112.422949
- Zhang, W. C., Sun, R., Zhang, J., Zhang, J., & Tian, Z. (2005). Recombinant human prolactin protects against irradiation-induced myelosuppression. *Cellular & molecular immunology*, 2(5), 379–85. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16368065>
- Zhu, J. (2012). Mammalian cell protein expression for biopharmaceutical production. *Biotechnology advances*, 30(5), 1158–70. doi:10.1016/j.biotechadv.2011.08.022

LISTA DE ANEXOS**A – CERTIFICADO Nº 01/2014 (CEUA)****B – SÚMULA CURRICULAR****C – ARTIGOS PUBLICADOS****D – CD (MÍDIA) CONTENDO VÍDEO 4.1**

CERTIFICADO Nº 01/2014 (CEUA)

Universidade de São Paulo
Instituto de Química

CERTIFICADO Nº 01/2014

Certifico que o Projeto "Produção de Isoformas recombinantes do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF-A) humano em células HEK-293 visando à geração de biofármacos", desenvolvido sob responsabilidade da **Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar**, está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA), do IQ-USP, em 14/02/2014.

We attest that the project entitled "Produção de Isoformas recombinantes do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF-A) humano em células HEK-293 visando à geração de biofármacos", developed under the responsibility of Dr. **Mari Cleide Sogayar**, is in agreement with the National Council for Control of Animal Experimentation and has been approved by the Internal Animal Care and Use Committee of the Institute of Chemistry, University of São Paulo, on 02/14/2014.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014

Prof. Dra. Nadja Cristhina de Souza Pinto
Coordenadora CEUA

SÚMULA CURRICULAR

Gustavo Gross Belchior

Brasileiro, solteiro, 27 anos

gross.belchior@gmail.com

Formação Acadêmica

- Doutorado Direto em Bioquímica – Departamento de Bioquímica, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, SP, Brasil
Início: 03/2008 **Conclusão prevista: 1º Semestre/2014**
- Doutorado Sanduíche – Saban Research Institute, Children’s Hospital Los Angeles, University of Southern California, CA, EUA
Início: 07/2012 **Conclusão: 10/2012**
- Licenciatura em Ciências Biológicas – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, SP, Brasil
Início: 03/2008 **Conclusão: 06/2010**
- Iniciação Científica em Bioquímica – Departamento de Bioquímica, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, SP, Brasil
Início: 03/2007 **Conclusão: 12/2007**
- Bacharelado em Ciências Biológicas – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, SP, Brasil
Início: 02/2005 **Conclusão: 12/2007**

Qualificações/Expertise

- Técnicas de Biologia Celular, Biologia Molecular e Bioquímica
- PCR, RT-PCR, qRT-PCR, clonagem, eletroforese em gel de agarose e poliacrilamida (DNA e proteína), sequenciamento de DNA, isolamento de ácidos nucleicos e proteínas, etc.
- Cultura de células em aderência e em suspensão (estática e em biorreator)
- Expressão de proteínas recombinantes em células de mamíferos por transfecção e transdução viral e purificação cromatográfica de proteínas
- Ensaios *in vitro*, *in vivo* (animais vertebrados) e *ex vivo*
- Ensaios de atividade biológica
- Engenharia Tecidual e descelularização de órgãos
- Tradução científica/médica (Inglês-Português/Português-Inglês)
- Elaboração de um Plano de Negócios para a competição Ser Empreendedor (Poli Jr. USP / CIETEC / SEBRAE, 2007 – São Paulo, Brasil)

- Coelaboração, submissão e resultado favorável de projetos PIPE – Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (FAPESP, 2013 – São Paulo, Brasil)
- Tradução de textos (Inglês-Português) e revisão de documentos relacionados à aprovação comercial de organismos geneticamente modificados
- Ética, objetividade, empreendedorismo, foco em resultado, rigorosidade extrema com prazos, excelentes habilidades em comunicação e relação interpessoal

Aspirações Profissionais

- Cargos administrativos em empresas, gestão de pessoas, gestão de projetos, patente/propriedade intelectual, marketing
- MBA e demais cursos para diversificação e complementação de formação

Projetos de Pesquisa/Bolsas

- Produção de isoformas recombinantes do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF-A) humano em células HEK293 visando à geração de biofármacos (**03/2008 – Em andamento**). Bolsista de Doutorado Direto - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Instituto de Química, Departamento de Bioquímica, USP. Orientador: Prof^a. Dr^a. Mari Cleide Sogayar
- Estágio de 4 meses como Bolsista de Doutorado Sanduíche em Engenharia Tecidual (**07/2012 – 10/2012**) – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Saban Research Institute, Children's Hospital Los Angeles, Keck School of Medicine, University of Southern California. Orientador: Tracy Grikscheit
- Bases moleculares do efeito do estresse oxidativo em células-tronco embrionárias humanas (**04/2007 – 12/2007**). Bolsista de Iniciação Científica – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Instituto de Química, Departamento de Bioquímica, USP. Orientador: Prof^a. Dr^a. Mari Cleide Sogayar

Idiomas

- **Português:** Língua mãe
- **Inglês:** Proficiente/Avançado – fala, escrita, leitura, tradução (Certificate of Proficiency in English (CPE) – nível mais avançado (C2) da Common European Framework of Reference for Languages, University of Cambridge (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Language)
- **Alemão:** Nível Básico (5 semestres de curso na CAVC Idiomas, São Paulo, Brasil)

Experiência Profissional (Não Acadêmica)

- Sócio fundador – PluriCell Technologies – São Paulo, Brasil
Início: 07/2013 Concluído: 11/2013
- Especialista de Regulamentação – Monsanto do Brasil Ltda. – São Paulo, Brasil
Início: 03/2013 Em andamento

- Tradutor de textos médicos e de documentos para acreditação de centro de pesquisa brasileiro (Inglês-Português/Português/Inglês) - ATO Escola de Idiomas e Traduções – São Paulo, Brasil
Início: 03/2012 Conclusão: 09/2012
- Operador principal de PBX, assistente de garçom, anfitrião de restaurante e atendente de serviço de quarto – Equinox Resort and Spa – Vermont, EUA
Início: 12/2006 Conclusão: 03/2007

Experiência Acadêmica

Supervisões

- Flávia Borella Pereira de Godoy. **Geração de clones de células HEK293 superprodutores da isoforma antiangiogênica VEGF165b do gene VEGF-A humano**. 2011 (Concluída). Iniciação Científica (Graduanda em Medicina Veterinária) - Universidade de São Paulo
- Caio Dalmaso. **Introdução à pesquisa em um laboratório de Biologia Celular e Molecular**. 2012 (Concluída). Iniciação Científica (Graduando em Biomedicina) – Universidade de São Paulo

Organização de Cursos, Cursos Ministrados e Monitoria

- Biologia Molecular da Transformação Maligna - QBQ5717 (2011). Disciplina de Pós-Graduação ministrada junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Docente responsável: Prof^ª. Dr^ª. Mari Cleide Sogayar. Carga horária: 210 h. **Vínculo: organizador e monitor pleno (voluntário)**
- Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo – QBQ0211 (2011). Disciplina de graduação ministrada a alunos do curso de Medicina da USP junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Docente responsável: Prof. Dr. Frederico Gueiros Filho. Carga horária: 120 h. **Vínculo: monitor pleno (remunerado)**
- Biologia Molecular da Transformação Maligna - QBQ5717 (2010). Disciplina de Pós-Graduação ministrada junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Docente responsável: Prof^ª. Dr^ª. Mari Cleide Sogayar. Carga horária: 210 h. **Vínculo: organizador e monitor parcial (voluntário)**
- A Caminho da Biotecnologia (2010). Curso teórico-prático/workshop ministrado a alunos do Ensino Fundamental II das escolas See-Saw/Panamby Bilingual School, Nossa Escola Perdizes e Escola de Aplicação da USP. Docente responsável: Prof^ª. Dr^ª. Mari Cleide Sogayar. Carga horária: 16 h. **Vínculo: organizador e monitor pleno (voluntário)**
- Biologia Molecular do Gene - QBQ0126 (2008). Disciplina de graduação ministrada a alunos de curso de Medicina Veterinária da USP junto ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Docente responsável: Prof. Dr. Frederico Gueiros Filho. Carga horária: 120 h. **Vínculo: organizador e monitor pleno (voluntário)**

Produção Bibliográfica

Artigos Publicados em Periódicos

1. BELCHIOR, GG, SOGAYAR, MC, GRIKSCHIT, TC. Stem cells and biopharmaceuticals: vital roles in the growth of tissue-engineering small intestine. **Seminars in Pediatric Surgery**. Accepted for publication.
2. CARREIRA, ACO, LEVIN, G, COELHO, TM, BELCHIOR, GG, SOGAYAR, MC. Biofármacos: sua importância e as técnicas utilizadas em sua produção. **Genética na Escola**, 2013. 8(2):168-177.

Resumos em Anais de Congresso

1. CARREIRA, ACO, BELCHIOR, GG, HALCSIK, E, LOJUDICE, FH, ASOTIRNO-FILHO, R, DEGAKI, TL, SÁ, PM, SPINDOLA-JUNIOR, GRANJEIRO, JM, SOGAYAR, MC. Generation of recombinant human growth factors for tissue engineering and regenerative medicine. **World Stem Cell Summit, 2012**, West Palm Beach, EUA
2. CARREIRA, ACO; BELCHIOR, GG; SODRE, FC.; DEGAKI, TL; SOGAYAR, MC. Recombinant Human Growth Factors as an Alternative Therapeutical Approach to the Wound Healing Process. **4º Congresso Brasileiro de Biotecnologia, 2012**. Guarujá, Brasil
3. CARREIRA, ACO; BELCHIOR, GG; SODRE, FC.; DEGAKI, TL; SOGAYAR, MC. Recombinant Human Growth Factors as an Alternative Therapeutical Approach to the Wound Healing Process. **7º Congresso Brasileiro de Células-tronco e Terapia Celular (CBCTTC), 2012**, São Paulo, Brasil
4. CARREIRA, ACO; BELCHIOR, GG; SODRE, FC.; DEGAKI, TL; CRUZ, RS; SOGAYAR, MC. Production of Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factors in Mammalian Expression Systems for Angiogenesis and Wound Healing **10th International Congress on Cell Biology and XVI Meeting of the Brazilian Society for Cell Biology (SBBC), 2012**, São Paulo, Brasil
5. CARREIRA, ACO; BELCHIOR, GG; SODRE, FC.; DEGAKI, TL; CRUZ, RS; SOGAYAR, MC. Production of Recombinant Human Growth Factors in Mammalian Expression Systems for Angiogenesis and Wound Healing. **6º Congresso Brasileiro de Células-tronco e Terapia Celular (CBCTTC), 2011**, Bahia, Brasil
6. CARREIRA, ACO; BELCHIOR, GG; SODRE, FC.; DEGAKI, TL; CRUZ, RS; SOGAYAR, MC. Production of Recombinant Human Growth Factors in Mammalian Expression Systems for Angiogenesis and Wound Healing. **10th PEACe - Protein Expression in Animal Cells Conference, 2011**, Cascais, Portugal

7. CARREIRA, ACO; SODRE, FCM; BELCHIOR, GG; COELHO, TM; SOGAYAR, MC. Production of Biopharmaceuticals and Cell Therapy for Tissue Repair and Wound Healing. In: **XL Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2011**, Foz do Iguaçu, Brasil

8. CARREIRA, ACO; SODRE, FCM; BELCHIOR, GG; COELHO, TM; SOGAYAR, MC . Recombinant Human Growth Factors as an Alternative Therapeutical to the Wound Healing Process. **22nd ESACT-European Society for Animal Cell Technology, 2011**, Viena, Áustria

9. CARREIRA, ACO; SODRE, FCM; BELCHIOR, GG; CRUZ, LO; COELHO, TM; SOGAYAR, MC . Recombinant Human Growth Factors as an Alternative Therapeutical Approach to Wound Healing Process. **XXXIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2010**, Foz do Iguaçu, Brasil

10. FORNI, MF; BELCHIOR, GG; SOGAYAR, MC. Elucidating the role of oxidative stress and ageing in human dermis fibroblasts. **XXXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2008**, Águas de Lindóia, Brasil

11. Forni, MF; BELCHIOR, GG; Ferreira, AHP; SOGAYAR, MC. Ageing and reactive oxygen species associated alterations in dermal fibroblasts. **XXIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE), 2007**, Águas de Lindóia, Brasil

12. Forni, MF; BELCHIOR, GG; Ferreira, AHP; SOGAYAR, MC. Efeito do estresse oxidativo gerado por espécies reativas de oxigênio na expressão de metaloproteinases de matriz extracelular em fibroblastos da derme. **XXIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE), 2007**, Águas de Lindóia, Brasil.

13. Forni, MF; BELCHIOR, GG; Ferreira, AHP; SOGAYAR, MC. Aumento da Expressão de Enzimas Antioxidantes em Modelo de Senescência de Fibroblastos de Pele Humana. **53º Congresso da Sociedade Brasileira de Genética (SBG), 2007**, Águas de Lindóia, Brasil

14. Forni, MF; BELCHIOR, GG; SOGAYAR, MC. Elucidating the role of the oxidative stress in ageing in human dermis fibroblast model. **XV Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP), 2007**, Ribeirão Preto, Brasil

Apresentação Oral de Trabalhos

1. BELCHIOR, GG. Testing the biological activity of rhVEGF-A isoforms through the Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay and the improvement of organoid unit function in tissue engineering. Palestrante convidado. **Ciclos de Seminários Temáticos de Controle da Proliferação Celular e Origem de Neoplasias de 2012, 2012**, São Paulo, Brasil
2. BELCHIOR, GG. Production of Recombinant Human Vascular Endothelial Growth Factor A isoforms (rhVEGFs) in HEK293 cells aiming at the generation of biopharmaceuticals. Palestrante convidado. **Ciclos de Seminários Temáticos de Controle da Proliferação Celular e Origem de Neoplasias de 2012, 2012**, São Paulo, Brasil
3. BELCHIOR, GG. Como fazer apresentações. Palestrante convidado. **Colégio Vértice, 2011**, São Paulo, Brasil
4. BELCHIOR, GG. Dia a dia em um laboratório de Biologia Celular e Molecular. Palestrante convidado. **Colégio Vértice, 2011**, São Paulo, Brasil
5. BELCHIOR, GG. Princípios e Aplicações da Engenharia Genética Moderna. Palestrante convidado. **XIV Semana da Bio do Instituto de Biociências da UNESP – Campus Botucatu, 2012**, Botucatu, Brasil

Prêmios

- 1º lugar por apresentação de trabalho (pôster). Vínculo: coautor. **4º Congresso Brasileiro de Biotecnologia, 2012**. Guarujá, Brasil
- 1º lugar no exame de ingresso do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Vínculo: candidato. **Instituto de Química, USP, 2008**. São Paulo, Brasil.
- Menção honrosa por apresentação de trabalho (pôster). Vínculo: apresentador. **XV Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP), 2007**. Ribeirão Preto, Brasil
- Agraciado com o Curso de Plano de Negócios do SEBRAE por mérito na elaboração e submissão de um plano de negócios para a competição IV Ser Empreendedor – Poli Jr. Vínculo: coautor. **IV Ser Empreendedor – Poli Jr. USP / CIETEC / SEBRAE, 2007**. São Paulo, Brasil

Participação em Eventos

- **ACS (American Chemistry Society) on Campus events at University of São Paulo – USP, 2012**. Ouvinte. São Paulo, Brasil
- **USP Conference – Challenge for Integrating Molecular and System Biology, 2011**. Ouvinte. São Paulo, Brasil
- **4th International School on Production of Biologicals Using Animal Cell Cultures, 2011**. Ouvinte. Rio de Janeiro, Brasil
- **10th PEACe - Protein Expression in Animal Cells Conference, 2011**. Apresentação de trabalho. Cascais, Portugal

- **XXXIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2010.** Apresentação de Trabalho. Foz do Iguaçu, Brasil
- **XXXVIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2009.** Apresentação de Trabalho. Águas de Lindóia, Brasil
- **I Bioanalysis Conference MN in Brazil, 2008.** Ouvinte. São Paulo, Brasil
- **BOVESPA Master, Bolsa de Valores de São Paulo, 2008.** Ouvinte. São Paulo, Brasil
- **I Simpósio Brasileiro de Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, 2008.** Ouvinte. São Paulo, Brasil
- **XXXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2008.** Apresentação de Trabalho. Águas de Lindóia, Brasil
- **XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular (SBBC), 2008.** Ouvinte. São Paulo, Brasil
- **XXIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE), 2007.** Apresentação de trabalho. Águas de Lindóia, Brasil.
- **XV Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP), 2007.** Apresentação de trabalho. São Paulo, Brasil
- **XXXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2007.** Apresentação de Trabalho. Foz do Iguaçu, Brasil
- **II Simpósio Multidisciplinar Sobre Células-tronco, 2007.** Ouvinte. São Paulo, Brasil.
- **II Simpósio Internacional de Terapias Avançadas e Células-tronco, 2007.** Participação em evento. São Paulo, Brasil
- **54º Congresso da Sociedade Brasileiro de Genética (SBG), 2007.** Apresentação de Trabalho. Águas de Lindóia, Brasil
- **53º Congresso da Sociedade Brasileiro de Genética (SBG), 2006.** Participação em evento. Águas de Lindóia, Brasil
- **XXXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), 2006.** Apresentação de Trabalho. Águas de Lindóia, Brasil
- **9ª Semana Temática da Biologia, 2006.** Participação em evento. São Paulo, Brasil
- **8ª Semana Temática da Biologia, 2005.** Participação em evento. São Paulo, Brasil

ARTIGOS PUBLICADOS

GENÉTICA E SOCIEDADE

Biofármacos: sua importância e as técnicas utilizadas em sua produção

Ana Claudia Oliveira Carreira, Gabriel Levin, Tatiane Maldonado Coelho,
Gustavo Gross Belchior, Mari Cleide Sogayar

Instituto de Química, Departamento de Bioquímica, NUCEL-NETCEM-Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo.

Autor para correspondência: ancocl@iq.usp.br

Genética na Escola | Vol. 8 | Nº 2 | 2013

Contents lists available at ScienceDirect

Seminars in Pediatric Surgery

journal homepage: www.elsevier.com/locate/sempedsurg

Stem cells and biopharmaceuticals: Vital roles in the growth of tissue-engineered small intestine

Gustavo Gross Belchior^a, Mari Cleide Sogayar^{a,b}, Tracy Cannon Grikscheit^{c,*}^a Biochemistry Department, Chemistry Institute, University of São Paulo, Brazil^b Cell and Molecular Therapy Center (NUCEL/NETCEM), School of Medicine, University of São Paulo, Brazil^c Developmental Biology and Regenerative Medicine Program, Saban Research Institute, Children's Hospital Los Angeles, Los Angeles, California

ARTICLE INFO

Keywords:

Tissue-engineered small intestine

Stem cells

Biopharmaceuticals

ABSTRACT

Tissue engineering currently constitutes a complex, multidisciplinary field exploiting ideal sources of cells in combination with scaffolds or delivery systems in order to form a new, functional organ to replace native organ lack or loss. Short bowel syndrome (SBS) is a life-threatening condition with high morbidity and mortality rates in children. Current therapeutic strategies consist of costly and risky allotransplants that demand lifelong immunosuppression. A promising alternative is the implantation of autologous organoid units (OU) to create a tissue-engineered small intestine (TESI). This strategy is proven to be stem cell and mesenchyme dependent. Intestinal stem cells (ISCs) are located at the base of the crypt and are responsible for repopulating the cycling mucosa up to the villus tip. The stem cell niche governs the biology of ISCs and, together with the rest of the epithelium, communicates with the underlying mesenchyme to sustain intestinal homeostasis. Biopharmaceuticals are broadly used in the clinic to activate or enhance known signaling pathways and may greatly contribute to the development of a full-thickness intestine by increasing mucosal surface area, improving blood supply, and determining stem cell fate. This review will focus on tissue engineering as a means of building the new small intestine, highlighting the importance of stem cells and recombinant peptide growth factors as biopharmaceuticals.

© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

Introduction

Organ failure may arise from congenital or acquired conditions and with enhanced care and increasing survival of premature infants may be an early life event. Tissue engineering has emerged within the field of regenerative medicine as a field focused on developing tissue and organ surrogates to restore, maintain, or improve biological functions.¹ The oldest example of tissue engineering is a passage from the book of Genesis in which woman is created from a rib taken from man.² The first report of an organ being actually transplanted dates back to the 1950s, consisting of a kidney transplant between identical twins.³ Since then, this field has greatly matured, evolving from employing pre-existing organs to creating *de novo*, complex ones.

Due to its importance in providing the cellular and molecular building blocks for tissue growth and maintenance, the small intestine is a vital organ, especially in infants born with GI abnormalities or who undergo intestinal resection for various neonatal medical conditions. Loss of portions or the entirety of

segments of the small intestine may lead to variable degrees of absorption debilities, such as short bowel syndrome (SBS) and ultimately to death. One of the main strategies to overcome loss of intestinal tissue is to increase the surface area in order to restore the absorption level to that of the healthy organ. An ideal therapeutic approach would eliminate drawbacks of current treatments, such as the need for immunosuppressive drugs and total parenteral nutrition (TPN), allowing a better quality of life, and a higher survival rate for patients.

Intestinal stem cells (ISCs) maintain the pool of precursor and differentiated cells of the dynamically proliferating intestinal epithelium. Differentiated cells are shed from the tip of the villi after a journey of 7–10 days from their production at the base of the crypt.⁴ Preserving the intestinal stem cell niche with cells that produce important signaling proteins, along with the supporting mesenchyme, appears to be crucial for therapeutic approaches.⁵

Biopharmaceuticals are engineered biological molecules produced for therapy and/or diagnosis. They encompass hundreds of currently marketed products, ranging from nucleic acid sequences to complex proteins with post-translational modifications, such as growth factors, which control numerous cell and tissue processes. Several epithelial growth factors have proven to be important players in intestinal growth.⁶ Every engineered organ requires

* Corresponding author.

E-mail address: tgrikscheit@chla.usc.edu (T.C. Grikscheit).

UCL INSTITUTE OF CHILD HEALTH

DE COPPI PAOLO
Clinical Reader and Consultant in Paediatric Surgery
Head of Paediatric Surgery Unit

London 12/12/2013

To Whom It May Concern:

I am happy to confirm that the article by Belchior GG, Sogayar MC, Grikscheit TC entitled "*Stem cells and biopharmaceuticals: vital roles in the growth of tissue-engineered small intestine*" has been accepted for publication in the *Seminars in Pediatric Surgery*

Thank you for your assistance

Best Regards

Paolo De Coppi
Clinical Reader and Consultant
Head of the Surgery Unit
UCL Institute of Child Health and Great Ormond Street Hospital
London
Tel. +44 (0) 20 7905 2808 Fax +44 (0) 20 7404 6181
Email: p.decoppi@ucl.ac.uk