UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE QUÍMICA

**CARACTERIZAÇÃO DE DISINTEGRINAS DE VENENOS VIPERÍDEOS COMO
FERRAMENTAS SELETIVAS NA DETECÇÃO OU INIBIÇÃO DA FUNÇÃO DE
INTEGRINAS**

DIEGO ALBERTO BUTERA WADSWORTH

TESE DE DOUTORADO

ORIENTADORA: DRA. ANA MARIA MOURA DA SILVA

SÃO PAULO

30 de Outubro de 2003

“Caracterização de disintegrinas de venenos
viperídeos como ferramentas seletivas na
detecção ou inibição da função de integrinas”

DIEGO ALBERTO BUTERA WADSWORTH

Tese de Doutorado submetida ao Instituto de Química da Universidade
de São Paulo como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de
Doutor em Ciências – Área: Bioquímica.

Aprovada(o) por:

Profa. Dra. ANA MARIA MOURA DA SILVA
IQ – USP
(Orientadora e Presidente)

Profa. Dra. MARI CLEIDE SOGAYAR
IQ – USP

Profa. Dra. MARIA JÚLIA MANSO ALVES
IQ – USP

Profa. Dra. ANA MARISA CHUDZINSKI TAVASSI
IB

Prof. Dr. JONAS ENRIQUE PERALES AGUILAR
FIOCRUZ - RJ

SÃO PAULO
15 DE DEZEMBRO 2003.

*...A minha mãe,
por existir*

*....A meu pai,
pelo apoio e
exemplo*

Zona Franca

EL ARBOL

Yo te doy el aire que respiras.
Te doy la sombra que deseas
cuando te queman los rayos del sol.
Tu me dejas la mierda que tiras.
Te vas, y quedan esparcidas
todas tus sobras a mi alrededor.
No puedo ni moverme
y me revienta la impotencia
Solo me queda resignarme
y quedar pasivo ante tu violencia.
Yo te doy el paisaje que admiras
cuando llevas a tu familia
días felices de excursión.
Tu con fuego me quemas, vida apagada
y con tu tala descontrolaras.
Me dejas al borde de la extinción

Disidencia

“O paper é o alvo da
pesquisa do doutor,
e não consequência dum
objetivo maior...”
Dick Watson

Os sonhos não devem
ser consumados
Dick Watson

¿Y si en vez de planear
tanto voláramos un poco
más alto?
Mafalda

“O dia que controlemos o momento
de nossa morte nos apropriaremos de
nossa existência”.

Jose Silva

“As emoções aparecem na espécie
humana como um artifício da
natureza para compensar o raciocínio.
Um homem exclusivamente racional
se apropriaria de seu destino correndo
perigo sua existência”.

Jose Silva

A evolução individual é limitada...
Oscar White

“Quem não desconfia de
sim mesmo não merece a
confiança dos outros”
Malba Tahan

Viver Mata!
Título de filme

Los genios son para una sociedad aquellos individuos
que al ser comparados con ésta, resultan ser
superiores, nunca aquellos que no pueden ser
comparados.

Santo Cachón

"Como siempre: lo urgente no
deja tiempo para lo Importante."
Mafalda

AGRADECIMENTOS

A Ana (orientadora) pela oportunidade, confiança, incentivo, preocupação, carinho e exemplo.

A minha mãe por ter enchido tanto para que estudasse.

A meu pai por todo o apoio e por torcer sempre tanto por mim.

A mis abuelos pelo primeiro contato com a natureza.

A Andreita pelo amor, carinho, exemplo, respeito, paciência, etc, etc.

Ao Bicho pela amizade, companheirismo e generosidade.

A Mel, minha bebe, por ter me feito sentir tanto durante duas semanas.

A minhas irmãs por ter me apoiado sempre com minhas loucuras.

A Mono Blanco e Target, por dar-me tantas alegrias.

A Marú e Karlita pela amizade, carinho e por tanta coisa que passamos juntos.

Ao Pelicano e a Maria de Fátima Furtado por ter-me induzido a vir pro Brasil.

A Maisa, pelo companheirismo, amizade, carinho, paciência, caronas, e prêmios.

A Bellinha, pela amizade, entusiasmo e papers.

A Geralda, pelas piadas, discussões e por meia cama.

A Luciana, pelos testes de adesão e pela amizade.

A Telma e Cris pelos copinhos.

A Karen, ao André pela ajuda com os clones.

A Fernandinha pela ajuda com as referências.

A Claíne pela amizade e também pelo teste de agregação.

Ao Álvaro pelo Stryer, por ajudar-me para a prova de bioquímica e por tanta ajuda prática.

Ao Celso pelas inúmeras discussões, dicas e ajuda prática.

A Inácio pela correção desta tese, pelas bactérias competentes, french press, discussões, viagens, etc.

A Ingrid também pelas bactérias competentes.

A Ivana pela amizade, conselhos e discussões.

A Moniquim pela amizade e exemplo.

A Diva Cardoso pelas recordações.

Ao Paulinho pelos conselhos e amizade.

Ao Patrick e ao Johny, pelas discussões, amizade, etc.

A Cleusa, pela amizade e sempre boa disposição.

A Teresa, pelo profissionalismo e amizade.

A Iranilde, Jô, Jussara, Gerson, Chiquinho

A Patricia, Vivian, Letícia, Denise, Tânia, Danielle, Alice, Ana Amelia, Lidiane, Guilherme, Andréia, Edna, Claudia, Marília, Ana Flavia, Diana, Denise e Amanda.

A Mônica Colombini e a Patrícia Bianca pela ordem e disciplina.

Ao Miguel e ao Fernando pelas inúmeras conversas, carinho e compreensão.

Ao Enrique pelo exemplo de pessoa, amizade.

A Mary Ann McLane da Universidade de Delaware, por ceder-me seu laboratório durante um mês e pelas inúmeras discussões.

A Frederic Ducancel pelos vetores pLIP, as discussões, exemplo e amizade

A Dulce pelo modelo.

A Irene pela correção desta tese e pela amizade.

A Kátia, Fernandona, Harumi e ao Dr. Ivan Mota.

A Solange pela ajuda e amizade.

A Cibele e a Milton da Secretaria do IQ/USP pela disposição e sempre boa vontade.

A Cristina, ao Terenzi e a Suely da Pro-reitoria da Pós-graduação pela ajuda brindada durante todos estes anos.

A Lourdes de Cooperação Internacional da USP pela ajuda, disponibilidade e paciência ano após ano.

Ao Nivaldo, pela disponibilidade, bom humor e as fotocópias.

Às enfermeiras do Hospital Vital Brazil pelas inúmeras colhidas de sangue.

Dulce, Diva e Gilda de RH pela ajuda.

As tiazinhas da biblioteca do Butantan.

Aos Professores que de alguma maneira influenciaram meus rumos: Fred Garcia, Ivan Ramirez, Roger Chammas, André Menez e Frederic Ducancel.

Ao Instituto Butantan, USP, FAPESP e CNPq.

Ao Brasil por fazer-me sentir brasileiro.

Finalmente queria agradecer a cada indivíduo que formou parte do meio ambiente que induziu a expressão de emoções e pensamentos em mim, tornando-me um ser melhor.

Obrigado!

ÍNDICE

RESUMO	001
ABSTRACT	002
ABREVIACÕES	003
INTRODUÇÃO	004
I. INTEGRINAS	004
1. Características estruturais e funcionais	004
2. Integrinas e plaquetas	006
3. Integrinas e câncer	008
3.1. Transformação maligna	008
3.2. Tumor primário	010
3.3. Metástase	011
3.4. Angiogênese	013
4. Diagnósticos envolvendo integrinas	014
II. DISINTEGRINAS	014
1. As metaloproteínas de veneno	014
1.1. Estrutura e função das SVMp	017
OBJETIVOS	025
MATERIAIS E MÉTODOS	026
I. MATERIAL	026
1. Reagentes	026
2. Kits	026
3. Anticorpos	027
4. Soluções	027
5. Vetores	029
6. Cepas Bacterianas	032
7. Linhagens Celulares	032
8. Programas	033
II. MÉTODOS	034
1. Amplificação dos fragmentos de DNA por PCR	034
2. Purificação dos fragmentos de DNA	034
3. Eletroforese em gel de agarose	035
4. Extração de um fragmento de DNA a partir de um gel de agarose	035
5. Digestões com as endonucleases de restrição	036
6. Reações de ligação	037
7. Preparação de bactérias competentes	037
8. Transformação	037
9. Preparação do DNA do plasmídeo	038
10. Determinação da concentração de DNA	039
11. Triagem das colônias	039

12. Seqüenciamento	040
13. Mutagênese Sítio-dirigida	040
14. Expressão	040
15. Extração celular	041
16. Lise bacteriana	041
17. Extração periplásmica	042
18. Dosagem de proteínas	042
19. Eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDS-PAGE)	043
20. Western Blotting	043
21. Ligação ao colágeno por teste imunoenzimático	044
22. Isolamento das proteínas em fusão com GST	044
23. Purificação em sistema de HPLC	045
24. Obtenção de plaquetas	045
25. Teste de inibição da agregação plaquetária	046
26. Cultura celular	046
27. Atividade fosfatase alcalina	046
28. Teste de <i>dot blot</i>	047
RESULTADOS	048
I. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO FUNCIONAL DOS DOMÍNIOS ECD-DISINTEGRINA E RICO-EM-CISTEÍNAS (JARARAGINA-C)	048
1. Planejamento	048
2. Clonagem	052
3. Expressão	056
4. Purificação dos fragmentos	057
5. Atividade biológica	058
6. Caracterização do fragmento JD49	063
II. MARCADORES MOLECULARES	067
1. Produção de JD49 e da eristostatina	068
2. Construção da proteína quimérica ECD-Er/APv	077
3. Padronização de Er/APv como marcador molecular	084
3.1. Seletividade de Er/APv para α D β 3	084
3.2. Conservação da atividade fosfatase alcalina de Er/APv	085
3.3. Padronização do teste de dot blot para plaquetas	086
DISCUSSÃO	089
CONCLUSÕES	102
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	103
CURRICULUM VITAE	125
ANEXO	127

RESUMO

As integrinas são proteínas de membrana envolvidas em diversos processos biológicos como embriogênese, inflamação e agregação plaquetária. A alteração de seu padrão de expressão está relacionada com processos patológicos como trombose e câncer, fazendo das integrinas ótimos indicadores da progressão destas doenças. Assim, a integrina $\alpha 2\beta 1$ pode ser considerada como indicadora de angiogênese, sendo expressa nas células endoteliais durante o crescimento de novos vasos. Já a ausência da $\alpha \text{IIb}\beta 3$ em plaquetas está relacionada com a doença de Glanzmann, caracterizada por uma agregação plaquetária deficiente, e sua presença em outros tipos celulares está relacionada com processos de metástase e invasão de tecidos. Estas integrinas contêm antagonistas naturais nos venenos de serpentes da família *VIPERIDAE*: As RGD-disintegrinas bloqueiam a integrina $\alpha \text{IIb}\beta 3$ e as ECD-disintegrinas bloqueiam a integrina $\alpha 2\beta 1$. Estas últimas formam parte de metaloproteinases com múltiplos domínios de aproximadamente 50 kDa.

Interessados em desenvolver marcadores moleculares para estas integrinas, direcionamos nossos objetivos para: (1) a elucidação da região mínima das ECD-disintegrinas com atividade biológica e (2) construção de biomarcadores para a integrina $\alpha 2\beta 1$ utilizando a região elucidada, e para a integrina $\alpha \text{IIb}\beta 3$ utilizando uma RGD-disintegrina.

Neste trabalho conseguimos determinar uma região de 49 resíduos na porção C-terminal do domínio ECD-disintegrina da jararagina que reage com um anticorpo neutralizante das atividades hemorrágica e de ligação ao colágeno da proteína. Esta região foi subclonada e expressa em fusão com a fosfatase alcalina de *E. coli*, mas não teve funcionalidade como marcador. No entanto, a RGD-disintegrina eristostatina em fusão com a fosfatase alcalina mostrou bifuncionalidade, apresentando tanto atividade disintegrina como atividade catalítica. Além disso, verificamos sua seletividade pela integrina $\alpha \text{IIb}\beta 3$ e padronizamos um ensaio direto de dot blot para a presença dessa integrina em plaquetas, com um único passo de incubação.

ABSTRACT

Integrins are membrane proteins involved in biological processes such as embryogenesis, inflammation and platelet aggregation. The alteration of their expression pattern is related to pathological disorders such as thrombosis and cancer, making integrins suitable indicators of the progression of these diseases. Thus, the $\alpha 2\beta 1$ integrin, which is expressed in endothelial cells during capillary growth, may be an indicator of angiogenesis. The absence of $\alpha \text{IIb}\beta 3$ integrin in platelets is related to Glanzmann disease, characterized by defective platelet aggregation and its expression in other cellular types is related with metastasis and tissue-invasion processes. These integrins contain natural antagonists in venoms from the *VIPERIDAE* snake family: RGD-disintegrins, which block the $\alpha \text{IIb}\beta 3$ integrin and ECD-disintegrins, which block the $\alpha 2\beta 1$ integrin. The latter forming part of multidomain metalloproteinases of approximately 50 kDa.

In order to develop molecular markers for integrins, we have directed our objectives at: (1) determining the minimal region of ECD-disintegrins with biological activity and (2) engineering biomarkers for the $\alpha 2\beta 1$ integrin using the previously determined minimal region and for the $\alpha \text{IIb}\beta 3$ using an RGD-disintegrin.

In this work we have determined a 49-residue region located in the C-terminus of jararhagin ECD-disintegrin domain, which reacts with a neutralizing antibody of hemorrhagic and binding to collagen activities of the protein. This region was subcloned and expressed in fusion with *E. coli* alkaline phosphatase, but did not present a marker activity. On the other hand, the RGD-disintegrin eristostatin fused to alkaline phosphatase showed bifunctionality, presenting both, disintegrin and catalytic activities. Furthermore, we have characterized its selectivity for the $\alpha \text{IIb}\beta 3$ integrin and we have standardized a direct dot blot assay with one-step incubation for the presence of this integrin in platelets.

ABREVIACÕES

ADAM: A Disintegrin And Metalloproteinase (metalo-proteínas contendo domínio disintegrina)
amp: ampicilina
AP: Alkaline Phosphatase (fosfatase alcalina)
APv: APvariant (variante de fosfatase alcalina)
BCIP: bromo, cloro, indolyl phosphate
BSA: Bovine Serum Albumin (albumina sérica bovina)
cDNA: DNA complementar
EDTA: ácido etileno diamino tetra-acético
ELISA: Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay (ensaio de adsorção imuno-enzimático)
Er: eritostatina
GST: Glutathione S-Transferase
HPLC: High Performance Liquid Chromatography (cromatografia líquida de alta performance)
IPTG: Isopropil-tio- β -D-galactosídeo
LB: Luria Bertani
NBT: nitro blue tetrazolium;
OPD: *o*-diclorofenilenodiamina
PAGE: polyacrylamide gel electrophoresis (eletroforese em gel de poli-acrilamida)
pb: pares de bases
PBS: tampão fosfato-salina
PCR: polymerase chain reaction (reação de polimerase em cadeia)
pNPP: *p*-nitrophenylphosphate
SDS: dodecil sulfato de sódio
SVMP: snake venom metalloproteinase (metalo-proteína de veneno de serpente)
UV: ultravioleta
TIMP: Tissue Inhibitor of MetalloProteinase (inibidor tecidual de metalo-proteína)

INTRODUÇÃO

I. Integrinas

1. Características estruturais e funcionais

As células em organismos pluricelulares estão organizadas em tecidos, que por sua vez formam os órgãos. Estas estruturas cooperativas são bastante complexas e a organização das células depende do contato com um complexo de moléculas extracelulares conhecido como matriz extracelular. Toda esta estrutura organizada de matriz, células e tecidos é mantida por moléculas de adesão que se encontram tanto na estrutura da matriz como na membrana celular. Além de manter este contato, as moléculas de adesão podem fechar espaços entre células, como ocorre no tecido epitelial, e podem transmitir mensagens entre elas mediante sinais químicos ou elétricos (Alberts e col., 1994). Entre as mais importantes moléculas de adesão da membrana celular estão as integrinas. As integrinas são glicoproteínas transmembrânicas importantes para a ligação e resposta das células aos componentes da matriz extracelular, podendo mediar as interações bidirecionais entre estes componentes e o citoesqueleto. Também atuam como transdutores de sinal, participando assim de importantes eventos de comunicação e adesão. Dessa forma, as integrinas têm uma participação decisiva nos processos de desenvolvimento e funcionamento dos organismos, participando também de importantes doenças como trombose, inflamação e câncer (Hynes, 1992).

As integrinas são compostas de duas subunidades, α e β , associadas de forma não covalente. A combinação das cadeias α (19) e β (8) gera diversas integrinas de diferentes especificidades (Humphries, 2000). A especificidade e a afinidade da ligação com os diferentes componentes da matriz extracelular será definida segundo o tipo de integrina presente, o número de cópias em cada célula, e também o tipo da célula em que a molécula se apresenta, criando uma grande versatilidade dessa família de proteínas na fisiologia dos tecidos (Hynes, 1992).

Estruturalmente, cada subunidade está formada por um domínio extracelular volumoso, uma região transmembrânica e uma cauda citoplásmica. A subunidade α corresponde ao produto de um único gene que sofre proteólise resultando em uma cadeia

pesada e uma cadeia leve ligadas por uma ponte dissulfeto (Phillips e col., 1988). A subunidade β apresenta um enovelamento intrincado de pontes dissulfeto (Calvete, 1994) bastante conservado entre as 8 subunidades (Hynes, 1992). As duas subunidades (α e β) se juntam durante a biosíntese formando o complexo, necessário para a expressão na superfície da célula (Duperray e col., 1989). As integrinas têm sítios de ligação para cátions bivalentes, e estes cátions são necessários para a ligação das integrinas com seus agonistas (Plow e col., 1992). Na cauda citoplasmática, as duas subunidades formam um complexo, um segundo domínio de ligação, que reconhece sinais intracelulares e proteínas do citoesqueleto.

A expressão filogenética de integrinas parece ser geral encontrando-se desde fungos até mamíferos. Sua distribuição tecidual é ampla, sendo expressas praticamente em todo tipo de célula e tecido estudado (Virtanen e col., 1990). Durante o desenvolvimento, as integrinas são onipresentes, regulando os movimentos morfogenéticos e a migração celular e são especialmente expressas durante a gastrulação, neurulação e histogênese (Albelda e Buck, 1990). Adicionalmente, as integrinas participam de processos fisiológicos como inflamação, cicatrização e agregação plaquetária (Heino, 1993; Rudolph e Cheresch, 1990).

A transdução do sinal originado pelas integrinas é bidirecional, isto é: ocorre de dentro para fora e de fora para dentro da célula (Dedhar, 1995). Para que ocorra a adesão célula-célula e/ou célula-matriz extracelular, as integrinas têm que ser ativadas. Esta ativação ocorre mediante estímulo local de mediadores solúveis (hormônios, citocinas, fatores de crescimento, etc.) ou de interfaces sólidas como a matriz extracelular ou outras células. Igualmente importante é que as integrinas sejam inativadas para evitar a adesão celular e ligação a matriz em ocasiões e locais inadequados. A adesão inapropriada pode culminar em trombose ou processos inflamatórios não desejados. É importante que as integrinas tenham um eficiente mecanismo de ativação, uma vez que elas participam de processos rápidos como embriogênese e histogênese (Mizejewski, 1999).

A maior parte das células precisa aderir-se na matriz extracelular para crescer, funcionar e sobreviver apropriadamente (Gui e col., 1995). Durante a formação dos tecidos, a ligação célula-célula e célula matriz é mediada por integrinas. Células epiteliais normais

podem sofrer apoptose quando desprovidas da matriz extracelular (Virtanen e col., 1990). Em cultura celular, a ligação ocorre em estruturas especializadas da membrana denominadas sítios de adesão focal constituídos de agrupamentos de integrinas firmemente ligados à matriz extracelular (Dedhar, 1995). Sítios de adesão focal menos consistentes estão presentes no tecido epitelial permitindo maior flexibilidade e movimento celular. Estes agrupamentos de integrinas servem como sítios de ligação para fibras intracelulares de actina na superfície citoplasmática da membrana celular, influenciando assim a morfologia celular. Assim mesmo, neste centro de adesão focal tem início uma cascata de sinais que se cruzam com vias de fatores de crescimento, citocinas e quinases (Liu e col., 1997), as últimas incluindo a quinase de adesão focal (FAK) (BurrIDGE e Chrzanowska-Wodnicka, 1996). Esta cascata de interações também pode estar ligada a proteínas-G e tirosina quinases. Também tem sido relatado que a forma da célula está diretamente ligada com seu crescimento e taxa de sobrevivência. Dependendo da integrina envolvida os efeitos antiapoptóticos durante o crescimento celular tem sido delineados e descritos (Juliano, 1993; BurrIDGE e Chrzanowska-Wodnicka, 1996; Chen e col, 1997).

2. Integrinas e Plaquetas

As plaquetas são particularmente sensíveis à ação das integrinas. A agregação plaquetária ocorre pela interação destas com proteínas de adesão como fibrinogênio, colágeno, fator de von Willebrand, fibronectina e laminina, através de glicoproteínas de membrana específicas, muitas das quais são integrinas ($\alpha\text{IIb}\beta 3$, $\alpha 2\beta 1$, $\alpha \nu \beta 3$, $\alpha 5\beta 1$ e $\alpha 6\beta 1$). Entre estas, $\alpha 2\beta 1$ e $\alpha\text{IIb}\beta 3$ são as mais importantes como mediadores de adesão e agregação plaquetária (Ginsberg e col., 1988). A ativação das plaquetas é decorrente da adesão e pode ser iniciada por diversos estímulos mecânicos e químicos. A adesão ao colágeno do subendotélio através da integrina $\alpha 2\beta 1$ e a presença de trombina estão entre os estimuladores mais fortes da ativação plaquetária. Esta ativação leva à alterações no citoesqueleto resultando em mudanças de forma e degranulação com conseqüente liberação de diversos fatores (ADP, trombina, ATP, Ca^{2+} , GTP, serotonina, fator plaquetário IV, albumina, enzimas hidrolíticas, fibrinogênio, fibronectina, fator de von Willebrand, entre

outras moléculas) e ativação da integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ latente. Esta ativação depende basicamente da mudança de conformação da integrina (Hughes e Pfaff, 1998). Indiferentemente do agonista e do receptor inicial, a via final consiste na ligação do fibrinogênio à integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ levando à agregação plaquetária (Hynes, 1991). Além disso, estes receptores se agrupam formando *clusters* que geram eventos de sinalização de fora para dentro da célula que incluem a reorganização do citoesqueleto da plaqueta (Topol e col., 1999). A integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ também participa da adesão da plaqueta à fibrina (Lefkovits e col., 1995). A agregação plaquetária é importante para a coagulação sanguínea, uma vez que a formação do tampão hemostático evita a hemorragia. Por outro lado, em condições patológicas pode ocorrer a formação de trombos, principais responsáveis por distúrbios cardiovasculares.

A integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ é a mais abundante contendo de 60.000 a 80.000 cópias por plaqueta (Wagner e col., 1996). A ausência ou baixa expressão desta integrina está relacionada com a doença de Glanzmann que é caracterizada por um sangramento mucocutâneo recorrente, resultante de uma agregação plaquetária deficiente em resposta a qualquer estímulo fisiológico. Estudos a cerca da doença de Glanzmann serviram de base para o estabelecimento da inibição farmacológica da integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ como terapia anti-trombótica (Nurden e Caen, 1974). Outros estudos revelaram ainda novos agonistas para a integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ como fibronectina, vitronectina e fator de von Willebrand (Plow e Ginsberg, 1981; Plow e col., 1985) e demonstraram que as interações entre estes e o receptor são mutualmente exclusivas (Plow e col., 1984).

A integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ reconhece duas seqüências de peptídeos. A seqüência RGD, inicialmente identificada como a região adesiva na fibronectina (Pierschbacher e Ruoslahti, 1984) também está presente no fibrinogênio, fator de von Willebrand e vitronectina. Todos estes ligantes contém como mínimo um motivo RGD, enquanto o fibrinogênio contém quatro motivos RGD por molécula. De fato, a seqüência RGD é reconhecida por varias integrinas (Ruoslahti e Pierschbacher, 1986). A outra seqüência envolvida na ligação do fibrinogênio à integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ é KQAGDV localizada na posição C-terminal da cadeia γ do fibrinogênio (Kloczewiak e col., 1983). Esta seqüência é exclusiva do fibrinogênio e é provavelmente o sítio predominante de ligação com a integrina (Farrel e col., 1992).

A Integrina $\alpha 2\beta 1$ é a segunda integrina mais importante da plaqueta. É o receptor do colágeno e geralmente é quem desencadeia a agregação plaquetária em resposta a uma lesão (Saelman e col., 1994). Esta integrina é expressa em outros tipos celulares como células endoteliais e está envolvida na angiogênese. Sua diminuição está relacionada com a interrupção do crescimento de capilares e a indução de apoptose (Buda e col., 2003). Além disso, o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) induz a expressão da integrina $\alpha 2\beta 1$. Anticorpos anti- $\alpha 2$ inibem a ligação de células endoteliais ao colágeno tipo I e a angiogênese *in vivo* (Senger e col., 1997).

A interação estrutural da integrina $\alpha 2\beta 1$ com o colágeno foi recentemente elucidada mediante a cristalização do complexo formado entre o domínio I da integrina $\alpha 2\beta 1$ com a tripla hélice do colágeno (Emsley e col., 2000). O motivo GFOGER previamente determinado por Knight e colaboradores, (2000) parece ser crítico para esta interação. Adicionalmente 3 *loops* da face superior do domínio I da integrina, que coordenam o íon metálico, também interagem com o colágeno onde o ácido glutâmico do colágeno completa a esfera de coordenação do metal. A comparação com a estrutura do domínio I não ligado revela uma mudança na coordenação do metal e uma reorganização da face superior que juntas criam uma superfície complementar para a ligação com o colágeno.

3. Integrinas e Câncer

3.1. Transformação maligna

A transformação maligna é caracterizada pela perturbação da organização do citoesqueleto, diminuição da adesão e alteração das respostas dependentes de adesão. Estudos da expressão de integrinas em células transformadas sugerem que várias subunidades de integrinas participam tanto positiva como negativamente do fenótipo da célula transformada (Ruoslahti, 1992). Mudanças na expressão de integrinas receptoras de fibronectina têm sido observadas em alguns tipos de fibroblastos. Além disso, alterações nos padrões de expressão de integrinas têm sido observados em inúmeras células malignas (Plantefaber e Hynes, 1989). Em geral, o fenótipo de uma célula transformada pode conter

diversas alterações nos seus receptores (Akiyama e col., 1990). Por exemplo, altos níveis da integrina $\alpha 5 \beta 1$ parecem estar correlacionados com baixas taxas de transformação em certos tumores. No entanto, um incremento da expressão da integrina $\alpha v \beta 3$ está diretamente relacionado com aumento da malignidade em melanomas (Chan e col., 1991). Como regra geral podemos mencionar a falta de organização espacial da expressão de integrinas em tumores epiteliais. Em carcinomas, o arranjo das integrinas é bastante desordenado com uma distribuição difusa e menos abundante. Estes desarranjos podem afetar a afinidade da ligação e estão correlacionados com a desorganização concomitante da estrutura da membrana basal. Níveis reduzidos de expressão das subunidades $\alpha 5$, $\alpha 3$ e $\alpha 2$ têm sido reportados em carcinomas, enquanto um aumento dos níveis da integrina $\alpha 6 \beta 4$ aparece em tumores de cabeça, pescoço e pele (Mizejewski, 1999). Após transformação de linhagens celulares de roedores com o vírus de sarcoma, a integrina $\alpha 5 \beta 1$ desaparece da superfície celular enquanto os níveis de $\alpha 3 \beta 1$ permanecem constantes (Heino, 1993). Outras mudanças relacionadas com a transformação envolvem aumento da fosforilação, diminuição da afinidade por ligantes, aumento da glicosilação de oligosacarídeos N-ligados nas integrinas. Como mencionado acima, a presença da integrina $\alpha 5 \beta 1$ está associada com um fenótipo celular normal e a super expressão desta integrina pode normalizar um fenótipo transformado (Chen e col., 1991). Em comparação, células de osteosarcoma humano transformadas com vírus requerem o receptor $\alpha 2 \beta 1$ de colágeno. A reorganização da matriz (colágeno) parece ser uma das razões da importância da expressão desta integrina para as células transformadas formarem tumores (Mizejewski, 1999). Em geral, a transformação celular representa um estado pré-canceroso requerendo estratégias preventivas mais que terapias. Uma destas estratégias pode ser a determinação paralela do perfil de expressão específica de integrinas em células normais e tumorais do mesmo tecido.

3.2. Tumor primário

Durante o crescimento de tumores primários tem-se observado tanto alterações qualitativas como quantitativas do padrão de expressão de integrinas. Muitas integrinas são super expressas ou não mais expressas enquanto outras são fosforiladas afetando sua interação com o citoesqueleto e com a matriz extracelular (Klein e col., 1991). A formulação de uma assinatura celular da expressão de integrinas de biopsias pode ter potencial como diagnóstico para a detecção tanto da transformação como da progressão de tumores. Por exemplo, a super expressão da integrina $\alpha 5\beta 1$ em células CHO mostra uma redução na malignidade (Cheresh, 1992), enquanto a progressão de melanoma tem sido correlacionada com o aumento das integrinas $\alpha 3\beta 1$ e $\alpha 4\beta 1$ (Klein e col., 1991). Outros estudos mostram também o envolvimento da integrina $\alpha 6\beta 1$ nesta progressão (Natali e col., 1992). Embora a expressão das integrinas em células malignas seja alterada com relação as normais, muitos tumores mantêm a expressão normal de pelo menos algumas integrinas. As mudanças no padrão de expressão de integrinas e sua distribuição na superfície celular são específicas para cada tipo de célula tumoral. Carcinomas de mama, próstata e colo de útero mostram uma perda da expressão das integrinas $\alpha 3\beta 1$, $\alpha 2\beta 1$, $\alpha 5\beta 1$ e $\alpha 6\beta 4$; no entanto os sarcomas altamente malignos super expressam a integrina $\alpha 2\beta 1$, receptor de colágeno, que se acredita estar envolvido em metástases (Ingber e col., 1990). É interessante salientar que a integrina $\alpha IIb\beta 3$, normalmente exclusiva de megacariócitos, é expressa em outros tipos celulares em condições anormais. Chen e colaboradores, (1997) identificaram por RT-PCR a expressão do mRNA correspondente às subunidades αIIb e $\beta 3$ em diversas linhagens de células tumorais derivadas de diferentes tecidos de humano, rato e camundongo. Os resultados de PCR foram confirmados por sequenciamento e imunohistoquímica utilizando o anticorpo monoclonal anti- $\alpha IIb\beta 3$. Em geral, a perda ou ganho de uma integrina em particular parece estar indiretamente implicada na transformação maligna e diretamente envolvida na progressão de tumores e metástase.

3.3. Metástase

A metástase é um processo no qual as células cancerosas se desprendem do tumor primário, entram na circulação e extravasam em sítios distantes. A entrada da célula tumoral no sistema vascular envolve a perda da adesão e a produção de enzimas proteolíticas para digerir a matriz, formando um túnel através das barreiras dos tecidos. O processo metastático envolve o contacto e separação com diferentes componentes da matriz extracelular e requer mudanças no padrão de integrinas expresso pelas células tumorais. As células tumorais podem migrar efetivamente na matriz e isto depende do funcionamento harmônico das integrinas (Mizejewski, 1999).

Uma vez que as células tumorais entram na circulação estas precisam se aderir ao endotélio para invadir outros tecidos. Para isto as células tumorais formam complexos com plaquetas e esta associação junto ao estado hipercoagulado da doença maligna, parece ser essencial para uma metástase bem sucedida (Gould e col., 1990; Huang e col., 1991). A habilidade das células tumorais de induzir agregação plaquetária está bem difundida entre os diversos tipos de cânceres como carcinoma de mama, adenocarcinoma de colo, carcinoma de pulmão, melanomas, etc (Sheu e col., 1995 e 1997). A participação das plaquetas nos processos metastáticos parece resultar da ligação direta das plaquetas com as células tumorais e da liberação de agentes indutores solúveis por parte dos tumores. Estes agentes incluem ativadores clássicos de plaqueta como ADP, catepsina B, proteinases tipo trombina e colágeno (Zhou e col., 1995). Desta maneira, as plaquetas atuam facilitando todos os passos intermediários da metástase transvascular incluindo a retenção das células tumorais, interação com o sub-endotélio e extravasamento da microvasculatura. A expressão das integrinas $\alpha\text{IIb}\beta 3$ e $\alpha\text{v}\beta 3$ é essencial para a ligação de células de melanoma com plaquetas durante fluxo sanguíneo (Felding-Habermann e col., 1996). Além disso, a integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ é super produzida durante a metástase de células de adenocarcinoma de próstata (Trikha e col., 1998).

O extravasamento é parte do processo de invasão e envolve a adesão de células tumorais na membrana basal, a proteólise parcial de camadas desta membrana seguida da penetração celular através da parte digerida (migração). É interessante notar que as

integrinas também participam da regulação das atividades das MMPs, metaloproteinases de matriz que degradam a membrana basal. A membrana basal forma um suporte para as células e está composta de um complexo de proteínas que inclui laminina, colágeno e proteoglicanos. De fato a desintegração da organização ou integridade da membrana basal é um marcador histológico chave da transição de um tumor para um estágio invasivo. As células cancerosas produzem, ativam e liberam diversos tipos de proteases que clivam especificamente componentes da matriz extracelular. A degradação localizada da matriz extracelular requer a expressão de proteases específicas e a concomitante expressão de seus inibidores para prevenir um excesso da degradação da matriz. No caso de MMP2, esta é ativada na superfície celular por um complexo protéico formado por MMP2, MMP tipo 1 de membrana (MT1-MMP) e inibidor tecidual de MMP2 (TIMP2). Estudos recentes em melanomas, gliomas e células endoteliais angiogênicas indicam que este complexo também inclui a integrina $\alpha\beta3$ (Brooks e col., 1996; Deryugina e col., 1997). Inicialmente, a porção C-terminal de MMP2 liga-se a TIMP2 (Fridman e col., 1992) que por sua vez, associa-se com o MT1-MMP que está ancorado na membrana. MT1-MMP então cliva o pro-domínio N-terminal de MMP2 resultando em uma forma intermediária capaz de se ligar a integrina $\alpha\beta3$ na superfície celular (Deryugina e col., 2000). Esta interação ativa MMP2, na membrana celular das células invasoras abrindo o caminho para estas através da proteólise da matriz extracelular (Brooks e col., 1996). Resumindo, durante a invasão a integrina $\alpha\beta3$ funciona não só como um receptor de adesão e migração, mas também como ativador e fixador de proteases que são requeridas para a degradação da matriz extracelular. Uma regulação negativa da interação integrina-protease é requerida para prevenir um excesso de degradação da matriz que pode reduzir a tração celular e inibir a migração. A proteólise é negativamente regulada por PEX, proteína que bloqueia a ativação da protease competindo com MMP2 pela ligação com a integrina $\alpha\beta3$ (Brooks e col., 1998). De fato inibidores desta interação suprimem o crescimento de melanomas e gliomas em modelos animais (Silletti e col., 2001; Bello e col., 2001).

3.4. Angiogênese

A angiogênese consiste na iniciação do crescimento de capilares. Durante o crescimento de tumores, novos vasos são recrutados, primeiro na borda e depois dentro da massa intersticial do tumor em crescimento. A massa tumoral em crescimento precisa de uma neovascularização contínua, uma vez que a proliferação celular requer o suprimento permanente tanto de oxigênio como de nutrientes. As limitações de oxigênio e nutrientes promovem a indução de novos capilares por parte dos tumores (Vamier e Cheresch, 1996). O controle do crescimento e proliferação de capilares é um alvo potencial para o desenvolvimento de terapias anti-câncer. Agentes antiangiogênicos têm-se mostrado capazes de suprimir especificamente o crescimento de tumores sem causar toxicidade sistêmica. Estes agentes também diminuem a tolerância dos tumores a drogas. O efeito tóxico causado por parte dos antiangiogênicos é mínimo em tecidos normais, uma vez que as células endoteliais dos capilares crescem devagar (expressam baixos níveis de integrinas), enquanto os capilares dos tumores multiplicam-se rapidamente e mostram um elevado nível de expressão de integrinas (Liapis e col, 1997).

O papel das integrinas na angiogênese tumoral pode ser exemplificado por $\alpha v \beta 3$ em melanomas. A expressão diferencial desta integrina foi encontrada nos novos vasos formados, mas não nos pré-existentes (Danan e col., 1995). As integrinas vasculares como $\alpha v \beta 3$ e $\alpha v \beta 5$ estão implicadas na neovascularização e na angiogênese induzida por tumores. Antagonistas destas integrinas como anticorpos monoclonais, peptídeos inibidores e oligonucleotídeos antisense $\beta 3$ e $\beta 5$ causam a regressão de tumores (Gladson, 1996; Voest, 1996). Deste modo, a inibição da angiogênese atacando o suprimento de sangue e prevenindo o crescimento de novos vasos é uma das áreas mais promissoras de terapias anticancerígenas (Brooks e col, 1995; Boehm 1997).

4. Diagnósticos envolvendo integrinas

As integrinas são ótimos indicadores da progressão de câncer, uma vez que estão envolvidas em todas as etapas, desde a transformação maligna e crescimento do tumor primário até a metástase e angiogênese. Os métodos mais comuns para detectar integrinas envolvem técnicas de PCR, onde o mRNA das integrinas é amplificado usando *primers* específicos (Chen e col., 2001). Com a recente tecnologia de *cDNAarray* o perfil de expressão de integrinas pode ser rapidamente traçado para um determinado tipo de câncer (Hourihan e col., 2003). As integrinas podem ainda ser detectadas por técnicas de imunohistoquímica (Chen e col., 1997), ELISA (Bessos e col., 2003), citometria de fluxo (Leytin e col 1996) e *tissue-array* mediante o uso de anticorpos monoclonais.

No caso da doença de Glanzmann, onde o mRNA da subunidade α_{IIb} é deletado (410-427), técnicas de dot blot utilizando uma sonda marcada de DNA, têm ajudado a diagnosticar a doença (Newman e col., 1991).

II. Disintegrinas

Os venenos de serpentes da família *VIPERIDAE* contêm antagonistas naturais das integrinas denominados disintegrinas. Estas podem estar presentes como peptídeos livres (RGD-disintegrinas) ou formar parte de metaloproteínases complexas com vários domínios (ECD-disintegrinas) que geralmente apresentam intensa atividade hemorrágica. No entanto, ambas formas originam-se de precursores comuns que codificam metaloproteínases da sub-família das reprotinas e que incluem um peptídeo sinal, um pro-domínio e um domínio catalítico precedendo o domínio disintegrina, todos bastante conservados entre si.

1. As metaloproteínases de veneno

As metaloproteínases de veneno (SVMP de *Snake Venom Metalloproteinase*) podem ser classificadas de acordo com o número de domínios em três classes principais: A classe P-I que contém apenas o domínio catalítico; a classe P-II que contém o domínio catalítico seguido do domínio disintegrina na posição C-terminal; e a classe P-III que apresenta o

domínio catalítico seguido de um domínio ECD-disintegrina e um domínio rico-em-cisteínas. Estas três classes como mencionado acima são precedidas de um peptídeo sinal e um pro-domínio (Bjarnason e Fox, 1995). Estes mesmos autores sugerem a existência de uma quarta classe, P-IV, onde o domínio ECD-disintegrina estaria unido com dois domínios lectina em *tandem* através de duas pontes dissulfeto (Takeya e col., 1992). Entretanto, ainda não foi isolado o cDNA deste grupo podendo esta classe ser produto de uma modificação pós-traducional. Na figura 1 podemos observar as 4 classes de SVMP propostas por Bjarnason e Fox (1995).

Fig. 1. Classificação das Metaloproteinases de Veneno (SVMP). As SVMP classificam-se em 4 grupos, PI-IV, dependendo do número de domínios presente na proteína madura. Todas estas são geradas como zimogênios e só se ativam após remoção do pro-domínio (Pro). As PI compreendem apenas o domínio catalítico (Cat), enquanto as PII apresentam este domínio seguido do domínio disintegrina (Dis). Já as PIII, apresentam além dos primeiros domínios, um domínio rico-em-cisteínas (Cys). As PIV apresentam adicionalmente dois domínios lectina (Lec) ligados por 2 pontes S-S.

O peptídeo sinal é amplamente conservado entre as SVMPs e tem a função de direcionar a secreção das proteínas à glândula de veneno. Esta sequência consta de 18 aminoácidos com o sítio putativo de clivagem entre a glicina 18 e a serina 19 (Hite e col., 1992).

As SVMP são expressas como zimogênios no qual o pró-domínio desempenha um papel inibidor. Esta região de 190 resíduos aproximadamente apresenta uma sequência conservada, PKMCGVTV na qual a cisteína faz parte de um mecanismo denominado *cysteine-switch* que consiste na ligação do grupo tiol desta ao zinco do sítio ativo

impedindo a entrada de água ou do substrato, inibindo assim a atividade enzimática. Após processamento do pro-domínio o grupo tiol é deslocado e a enzima adquire atividade catalítica (Jia e col., 1996).

As SVMPs estão evolutivamente relacionadas com as ADAMs (*A Disintegrin And Metalloproteinase*) e as MMPs (*Matrix Metalloproteinases*). Estas proteínas estão incluídas na família M12 de metaloproteínases dependentes de zinco baseadas na estrutura do sítio catalítico e no motivo de ligação ao zinco (Blundell, 1994). O peptídeo sinal e o pro-domínio também são conservados na família. Entretanto, diferente das MMPs que apresentam o domínio hemopexina na extremidade C-terminal do domínio catalítico, as ADAMs e as SVMPs apresentam o domínio disintegrina e rico-em-cisteínas. As SVMPs são solúveis enquanto as ADAMs apresentam domínios transmembrânicos e citoplasmáticos, responsáveis por sua localização na superfície celular (Bjarnason e Fox, 1995).

As MMPs estão envolvidas na degradação de componentes da matriz extracelular e participam do remodelamento de tecidos durante a embriogênese, do desenvolvimento e da cicatrização tecidual. Por outro lado, estas proteínas estão envolvidas também em certas patologias como por exemplo artrite, periodontite e metástase de tumores. O domínio hemopexina das MMPs apresenta uma superfície carregada positivamente, com função adesiva, que permite sua interação eletrostática com a porção C-terminal do TIMP que é carregada negativamente (Willenbrock e col., 1993). Por este mecanismo, a pro-MMP é apresentada para uma MMP de membrana (MT-MMP) que irá clivar parcialmente o pró-domínio e ativar a metaloproteínase (Brooks e col., 1996).

Estruturalmente semelhantes, as ADAMs e as SVMPs fazem parte da subfamília das reprotisinas. O termo reprotisinas foi acunhado por Bjarnason e Fox (1995), devido ao fato das SVMP terem como fonte serpentes, que são répteis, e também por terem sido as primeiras ADAMs encontradas em tecidos reprodutivos (Blobel e col., 1992 e Wolfsberg e col., 1993).

O domínio catalítico das ADAMs está envolvido em diversas funções como, por exemplo, na liberação de TNF- α (Black e col., 1997), importante mediador da inflamação; na neurogênese (Loechel e col., 1998); na geração de fibras de colágeno (Millichip e col., 1998); na manutenção de cartilagens (Tortorella e col., 1999), etc. Porém, em várias ADAMs (2-7, 11, 14, 18, 22 e 29) a sequência consenso altamente conservada que liga ao zinco está ausente. Estas ADAMs estão geralmente envolvidas em processos de adesão no qual o domínio disintegrina atua como agonista, promovendo a adesão celular (Almeida e col., 1995). O domínio catalítico é removido durante a maturação, lembrando o processamento de muitas SVMPs da classe P-III (Moura da Silva e col., 2003). Tanto a fertilina α (ADAM1) como a β (ADAM2), envolvidas na ligação espermatozóide-óvulo, carecem do domínio catalítico (Blobel e col., 1992). Comparando a homologia estrutural das SVMPs e ADAMs, verificamos que seus domínios ECD-disintegrina apresentam degenerações nos aminoácidos contidos no provável *loop* de interação com as integrinas, sugerindo que estes domínios podem diferir quanto a especificidade pelo ligante com as quais elas interagem (Wolfsberg e White, 1996).

1.1. Estrutura e função das SVMP

Classe P-I:

A classe P-I, formada apenas pelo domínio catalítico, apresenta a sequência consenso HEXXHXXGXXH conservada na família M12 de metaloproteinases dependentes do íon zinco. A estrutura tridimensional de quatro metaloproteinases da classe P-I foi determinada por cristalografia: adamalisina II de *Crotalus adamanteus* (Gomis-Ruth e col., 1993), atrolisina-C de *Crotalus atrox* (Zhang e col., 1994), trimereisina II de *Trimeresurus flavoviridis* (Kumasaka e col., 1996) e acutolisina A de *Agkistrodon acutus* (Gong e col., 1998). Os resultados mostram que são moléculas elipsóides, contendo uma fenda catalítica superficial que separa um subdomínio inferior, irregularmente enovelado, de um domínio superior maior, composto de uma folha β de cinco fitas e quatro α hélices. O íon zinco se encontra nesta fenda, rodeado de três histidinas (142, 146 e 152) e uma molécula de água ancorada no ácido glutâmico 143, formando assim um tetraedro. O sítio de ligação ao substrato está flanqueado por uma *Met-turn* (Met166), que forma uma base hidrofóbica

para a molécula de zinco, e duas paredes formadas por uma fita composta dos resíduos 168-172 e uma fita β antiparalela do domínio superior (resíduos 108-112), mantendo assim a estrutura conformacional da enzima (Stocker e col., 1995).

A maioria das metaloproteinases, tanto hemorrágicas como não hemorrágicas são fibrino(gênio)líticas e agem clivando preferencialmente a cadeia $A\alpha$ e secundariamente a cadeia $B\beta$ do fibrinogênio (Markland 1998). BaP1, isolada do veneno de *Bothrops asper* degrada rapidamente a cadeia $A\alpha$ e vagarosamente a cadeia $B\beta$, enquanto não é observada degradação da cadeia γ (Gutierrez e col., 1995). A especificidade pelos substratos tem sido testada com caseína, peptídeos de insulina B e substratos de peptídeos de fluorescência apagada (Bjarnason e Fox, 1995; Takeya e col., 1993). As metaloproteinases hemorrágicas HR1A e HR2a e as não hemorrágicas H₂-Proteinase de *Trimeresurus flavoviridis* como Cbfb2 de *Crotalus basiliscus* clivam preferencialmente o enlace peptídico Pro516/Met517 da cadeia $A\alpha$ do fibrinogênio. Estas enzimas geralmente têm especificidade primária por substratos de mais de 5 aminoácidos com um resíduo hidrofóbico na posição P1' como Leu ou Met (Iwanaga e Takeya, 1993). O ativador de fator X de *Vipera russelli* parece requerer uma Arg na posição P1' (Takeya e col., 1993). As atrolisinas B e C de *Crotalus atrox* clivam a proteína agrecan de cartilagem em dois sítios, Asn341-Fen342 e Glu373-Ala374 (Tortorella e col., 1998).

Classe P-II (As Disintegrinas):

As SVMPS da classe P-II sofrem um segundo processamento retirando o domínio catalítico e dando origem às disintegrinas clássicas. As disintegrinas apresentam geralmente uma sequência RGD responsável pela sua ligação à integrina $\alpha IIb\beta 3$ de plaqueta, inibindo assim a agregação plaquetária. As RGD-disintegrinas podem ser classificadas de acordo com seu tamanho e número de cisteínas em quatro grupos (McLane e col., 1998). O primeiro grupo inclui disintegrinas curtas de 41-51 resíduos e 4 pontes dissulfeto. O segundo grupo é o mais abundante e é formado por disintegrinas médias que contêm aproximadamente 70 resíduos e 6 pontes dissulfeto. O terceiro grupo está formado por disintegrinas longas com 84 resíduos e 7 pontes dissulfeto. O quarto grupo é composto de disintegrinas diméricas, onde cada unidade contém aproximadamente 67 resíduos e 10

cisteínas envolvidas na formação de 4 pontes intracadeia e 2 pontes intercadeia (Calvete e col., 2000-A).

A atividade inibitória das disintegrinas é conferida pela estrutura primária do *loop* e é dependente da formação das pontes dissulfeto apropriadas (McLane e col., 1996). Estudos de ressonância magnética nuclear (RMN) mostram um *loop* flexível que sobressai de 14-17 Å da estrutura da proteína com o tripeptídeo RGD no seu ápice (Adler e col., 1991; Saudek e col., 1991; Senn e Klaus, 1993). Na maior parte das disintegrinas monoméricas o motivo funcional é o RGD (McLane e col., 1998). Estas disintegrinas ligam-se com diferente afinidade e seletividade às integrinas $\alpha\text{IIb}\beta 3$, $\alpha\text{v}\beta 3$ e $\alpha 5\beta 1$ que reconhecem a sequência RGD nos seus ligantes naturais. A seletividade é conferida pelos resíduos adjacentes ao motivo RGD e os aminoácidos da porção C-terminal (Wierzbicka-Patynowski e col., 1999). A barbourina, a bitistatina e a eristostatina apresentam um alto grau de especificidade pela integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ de plaqueta (McLane e col., 1998). Estas três disintegrinas têm em comum a presença do resíduo triptofano (W) depois do ácido aspártico (D). Estudos de modelagem da eristostatina mostram que resíduos hidrofóbicos, como a valina 25 e o triptofano 30, aumentam significativamente a largura do *loop*, conferindo-lhe especificidade por esta integrina (McLane e col., 1996).

As disintegrinas diméricas apresentam maior variabilidade no seu motivo funcional. A disintegrina heterodimérica EC3 de *Echis carinatus* apresenta a sequência VGD e MLD, mostrando-se um potente inibidor das integrinas $\alpha 4\beta 1$, $\alpha 4\beta 7$ e $\alpha 9\beta 1$ (Marcinkiewicz e col., 1999-A e 2000). Já a disintegrina heterodimérica EMF10, isolada do veneno de *Eristocophis macmahoni*, apresenta a sequência MGDW importante para a inibição seletiva da integrina $\alpha 5\beta 1$ (Marcinkiewicz e col., 1999-B). No caso de CC8, purificada do veneno de *Cerastes cerastes*, o motivo WGD aumenta o efeito inibitório sob as integrinas $\alpha\text{IIb}\beta 3$, $\alpha\text{v}\beta 3$ e $\alpha 5\beta 1$ (Calvete e col., 2002).

Todas as disintegrinas apresentam um *loop* de 11 resíduos com o ácido aspártico conservado na sexta posição. Estudos de cristalografia da porção extracelular da integrina $\alpha\text{v}\beta 3$, em complexo com um peptídeo cíclico contendo a sequência RGD, mostram que o oxigênio da carboxila do Asp penetra na fenda do domínio βA e participa de uma rede de interações polares (Xiong e col., 2002). Estes dados suportam a conservação deste resíduo

em todas as disintegrinas. No entanto, a obtustatina, isolada recentemente do veneno de *Vipera lebetina obtusa*, apresenta uma sequência KTS com importância funcional nesta região. Esta disintegrina, a menor até hoje descrita com 41 resíduos e 8 cisteínas, não só difere na conservação dos resíduos do *loop* como na extensão deste, apresentando 9 resíduos em lugar dos 11 conservados em todas as disintegrinas, inclusive as diméricas (Moreno-Murciano e col., 2003). Esta diferença parece conferir-lhe seletividade pela integrina $\alpha 1\beta 1$, inibindo a ligação desta ao colágeno IV com um IC_{50} de 2 nM.

O potencial das disintegrinas como drogas tem sido amplamente avaliado. Tanto a trigramina como a rodostomina têm se mostrado potentes inibidores da agregação plaquetária induzida por células tumorais (Gould e col., 1990; Sheu e col., 1997). No entanto, as duas disintegrinas utilizam diferentes vias para alcançar este objetivo. A trigramina é um antagonista específico da interação com células de câncer de mama, enquanto a rodostomina inibe a agregação plaquetária antagonizando a interação com células de adenocarcinoma de colo (Gould e col., 1990). No caso de células cancerosas de mama, próstata e colo, a agregação plaquetária induzida pelo fator ativador de trombina pode ser inibida tanto por trigramina como rodostomina (Gould e col., 1990; Huang e col., 1991; Sheu e col., 1997). A rodostomina inibe adicionalmente a angiogênese decorrente do fator de crescimento de fibroblasto suprimindo o crescimento de tumores (Yeh e col., 2001). Disintegrinas como a contortrostatina e a salmosina inibem a neovascularização bloqueando as integrinas $\alpha 5\beta 1$ e $\alpha v\beta 3$, respectivamente. Adicionalmente, a contortrostatina inibe a progressão de câncer de mama ligando as integrinas e bloqueando a adesão das células cancerosas à vitronectina e fibronectina da matriz extracelular (Zhou e col., 2000). A salmosina inibe o crescimento de células epiteliais após cirurgia de catarata. Isto é muito importante, uma vez que estas células podem causar uma opacificação capsular pós-cirúrgica (Kim e col., 2002).

As disintegrinas têm sido avaliadas como drogas anti-trombóticas. O desenvolvimento de drogas inibidoras da agregação plaquetária dirigidas contra a integrina $\alpha IIb\beta 3$ é muito importante uma vez que a inibição deste receptor previne a agregação independentemente da via metabólica iniciada. Estas drogas têm um amplo espectro de uso incluindo prevenção primária de doença cardiovascular e prevenção de eventos coronários

em pacientes de alto risco. Devido a seu tamanho e conformação, as disintegrinas não são usadas diretamente como drogas, mas têm servido como base para o desenho de antagonistas moleculares de baixo peso molecular. Eptifibatide (Integrelin) é um peptídeo cíclico baseado na barbourina, apresentando a sequência KGD (Phillips e Scarborough, 1997). Foi aprovado pela FDA para uso em intervenção coronária percutânea e síndromes coronárias e é atualmente manufaturado por COR Therapeutics, Schering Plough. Outros inibidores como Tirofiban (Merck and Co) baseado na sequência RGD são peptídeo miméticos aumentando o tempo de vida na circulação. A substituição da arginina (R) por um grupo amidino ou benzamidino e o uso de D-aminoácidos incrementam a resistência à degradação enzimática (Cox e col., 1994).

A eristostatina, isolada do veneno de *Eristocophis macmahoni* é a disintegrina mais potente inibindo a agregação plaquetária com um IC₅₀ de 59 nM (McLane e col., 1994). É uma das mais seletivas ligando-se preferencialmente à integrina α IIb β 3 de plaqueta. Esta disintegrina, uma das menores com 49 resíduos e 4 pontes dissulfeto, já foi produzida em *E. coli* mantendo sua seletividade e potência (Wierzbicka-Patynowski e col., 1999). A eristostatina tem se mostrado capaz de inibir o crescimento de células de melanoma B16F1 após o extravasamento (Morris e col., 1995). Assim mesmo, esta disintegrina inibiu fortemente a colonização do pulmão de camundongos após injeção de células de melanoma MV3 e foi verificada a ligação da eristostatina com estas células (Danen e col., 1998). Ademais, a eristostatina aumenta a susceptibilidade da linhagem SBcl2 de melanoma por células tipo-NK TALL-104 (McLane e col., 2001).

Classe P-III:

As metaloproteinases de veneno da classe P-III contêm as proteínas mais hemorrágicas (Bjarnason e Fox, 1994). A presença dos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas parece potencializar esta atividade, no entanto não se tem evidência direta de sua participação. A hemorragia é comumente relacionada com a atividade proteolítica, uma vez que a quelação do íon zinco, abole tanto a proteólise como os efeitos hemorrágicos (Bjarnason e Fox, 1994). É interessante notar que os venenos apresentam também metaloproteinases desprovidas de atividade hemorrágica (Markland, 1998; Willis e Tu,

1988). Alguns trabalhos têm identificado resíduos no domínio catalítico que parecem essenciais para exercer esta atividade (Hite e col., 1992; Takeya e col., 1990).

As metaloproteinases hidrolisam os componentes da membrana basal e este efeito está estreitamente relacionado com a hemorragia (Osaka e col., 1973). Tem sido claramente demonstrado que estas proteínas degradam laminina, fibronectina, colágeno IV e nidogênio *in vitro* (Rucavado e col., 1995 e 1999; Bjarnason e col., 1988; Baramova e col., 1989 e 1990; Maruyama e col., 1992) e a membrana basal *in vivo* (Ownby e col., 1978; Moreira e col., 1994). A hemorragia parece estar estreitamente relacionada com a hidrólise do colágeno IV, uma vez que metaloproteinases não hemorrágicas não conseguem hidrolisar esta molécula (Mashiko e col., 1998). Adicionalmente as metaloproteinases agem nas células endoteliais dos capilares ocasionando lesões através das quais os eritrócitos e outros componentes do sangue escapam ao espaço intersticial (McKay e col., 1970; Ownby e col., 1978).

Diferentemente das disintegrinas clássicas, o domínio ECD-disintegrina das SVMPs da classe P-III apresenta uma sequência ECD conservada no lugar do motivo RGD, conferindo-lhe assim atividade inibitória da agregação plaquetária dependente do colágeno. Esta classe de metaloproteinases também pode sofrer um segundo processamento, dando origem a um fragmento correspondente aos domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas. Desta maneira, no veneno podemos encontrar a forma composta dos domínios catalítico, ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas e o produto de proteólise correspondente aos dois últimos domínios (Moura da Silva, 2003).

Entre as SVMPs da classe P-III, a jararagina vem sendo estudada por vários grupos. Esta metaloproteinase isolada do veneno de *Bothrops jararaca* cliva a cadeia A α do fibrinogênio na porção C-terminal dando origem a um fragmento de 285-290 kDa que carece da sequência RGD (572-574) que se liga às plaquetas. No entanto, a sequência RGD (95-97) localizada na porção N-terminal da cadeia A α e a KQAGDV localizada na parte C-terminal da cadeia γ , permanecem intactas. Desta maneira a agregação plaquetária dependente de ADP não é afetada. Mesmo assim, a formação do coágulo de fibrina é defeituosa com uma baixa polimerização dos monômeros de fibrina (Kamiguti e col., 1994).

A jararagina é multifuncional sendo responsável pela atividade hemorrágica e pela inibição da agregação plaquetária dependente do colágeno. Adicionalmente, a jararagina tem sido relacionada a outras funções como no processamento do Pro-TNF α (Moura da Silva e col., 1996), na indução da migração de leucócitos e liberação de citocinas (Clissa e col., 2001; Costa e col., 2002.) e na clivagem do plasminogênio gerando angiostatina (Ho e col., 2002).

Embora o domínio catalítico seja comumente responsabilizado pela atividade hemorrágica, e os domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas pela inibição da agregação plaquetária, existem evidências que os domínios atuam sinergisticamente potencializando-se uns aos outros. Kamiguti e colaboradores (1996), mostraram que a jararagina cliva a subunidade $\beta 1$ da integrina $\alpha 2\beta 1$ confirmando a participação do domínio catalítico na inibição da agregação plaquetária. Além disso, anticorpos resultantes da imunização de camundongos com o cDNA correspondente aos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas neutralizaram a atividade hemorrágica da jararagina (Harrison e col., 2000) demonstrando-se assim a participação destes domínios nesta atividade.

A inibição da agregação plaquetária dependente de colágeno por parte da jararagina e as demais metaloproteinases do tipo P-III é um fato, no entanto a região ou domínio responsável por esta atividade e o mecanismo de ação não estão esclarecidos e ainda existem controvérsias nos dados da literatura. Da jararagina sabemos que inibe a agregação plaquetária induzida por colágeno com um IC₅₀ de 40 nM (Kamiguti e col., 1996) e a ligação de células $\alpha 2$ -K562 expressando a integrina $\alpha 2\beta 1$ ao colágeno (Moura da Silva e col., 2001). Com respeito às regiões responsáveis pela inibição da agregação plaquetária dependente de colágeno, sabe-se que o fragmento recombinante correspondente aos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas conserva atividade inibitória da agregação plaquetária (Moura da Silva e col., 1999). Trabalhos utilizando peptídeos sintéticos mostraram que o motivo de adesão está localizado no *loop* correspondente ao domínio ECD-disintegrina (Kamiguti e col., 1997; Zhou e col., 1996). No entanto, Jia e colaboradores (2000) mostraram atividade de inibição da agregação plaquetária por parte do domínio rico-em-cisteínas recombinante da atrolisina A. Ainda mais, Ivaska e colaboradores (1999), mostraram que o peptídeo TRKKHDNAQ correspondente aos

resíduos 241-249 do domínio catalítico da jararagina se liga no domínio I da integrina $\alpha 2$, ligante do colágeno tipo I, e seria uma das regiões responsáveis por inibir a agregação plaquetária dependente de colágeno.

A jararagina tem se mostrado eficaz também na inibição da progressão de células de melanoma (Correa e col., 2002). É interessante que a quelatação do íon zinco do sítio catalítico da jararagina com ortofenantrolina não diminuiu esta atividade, o que sugere que os domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas da jararagina estejam desempenhando um papel fundamental nesta inibição.

Concluindo, a jararagina é uma metaloproteinase multifuncional composta de três domínios: catalítico, ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas, no entanto não existe um consenso entre a estrutura e a função dos domínios desta proteína. Dos dados da literatura podemos concluir que os domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas são os responsáveis pela ligação ao colágeno (Zhou e col., 1996) e à integrina $\alpha 2\beta 1$ (Kamiguti e col., 1997) e ainda existem evidências indiretas que esta região potencializa as atividades hemorrágica e proteolítica da jararagina (Harrison e col., 2000). O esclarecimento da função dos domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas e sua participação nas atividades hemorrágica e proteolítica da jararagina são essenciais para melhor entender a estrutura e função desta molécula. Do mesmo modo, a determinação da porção que liga à integrina $\alpha 2\beta 1$ servirá de base para o desenho de inibidores e para a construção de marcadores moleculares para esta integrina. Com base nisto temos definido nossos objetivos.

OBJETIVOS

- Determinar a região dos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas responsável pela atividade disintegrina das SVMP da classe P-III utilizando a jararagina como modelo. Para tanto, utilizaremos duas abordagens principais que consistem na clonagem e expressão de fragmentos do cDNA que codifica os domínios disintegrina e rico-em-cisteínas da jararagina e a avaliação da atividade biológica. Paralelamente esses fragmentos serão utilizados para o mapeamento dos epítopos reconhecidos por anticorpos monoclonais que neutralizam as atividades biológicas da toxina.
- Construir marcadores moleculares para integrinas baseados na eristostatina e em motivos funcionais dos domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas. Estes marcadores serão construídos utilizando o sistema pLIP de expressão que resulta na produção da proteína recombinante em fusão com a fosfatase alcalina de *E. coli*, que pode ser usada então como marcador molecular.

MATERIAL E MÉTODOS

1. MATERIAL:

1. REAGENTES:

1.1. Enzimas:

- Fosfatase alcalina bacteriana, Gibco BRL
- Trombina, Novagen.
- DNA polimerase de *Termus aquaticus* (*Taq*), Applied Biosystems.
- DNA polimerase de *Pirococcus* sp. (*Pfx*), Invitrogen.
- Endonuclease de restrição *Bam*H I, Invitrogen.
- Endonuclease de restrição *Dpn* I, New England Biolabs.
- Endonuclease de restrição *Eco*R I, Invitrogen.
- Endonuclease de restrição *Not* I, New England Biolabs.
- Endonuclease de restrição *Sfi* I, New England Biolabs.
- Enzima de ligação T4 DNA ligase, Boehringer.

1.2. Marcadores:

- Marcador de massa molecular de DNA *Lambda* clivado com *Hind* III originando os fragmentos de 23130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564 e 125 pb, Invitrogen.
- Marcador de massa molecular de DNA e calibrador de concentração apresentando os fragmentos de 2000 (50 ng/μL), 1200 (30 ng/μL), 800 (20 ng/μL), 400 (10 ng/μL), 200 (5 ng/μL) e 100 pb (2,5 ng/μL), Invitrogen.
- Marcador de massa molecular de DNA *ladder* apresentando os fragmentos de 1500, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 e 100 pb, Promega.
- Marcador de massa molecular de proteínas para SDS-PAGE correspondente a 94; 67; 43; 30; 20,1 e 14,4 kDa. Amersham Biosciences.
- Marcador de massa molecular de proteínas para Western blotting correspondente a 104; 81; 47,7; 34,6; 28,3 e 19,2 kDa. Amersham Biosciences.

2. KITS:

- **Purificação de plasmídeos:**
 - Quantum Prep Plasmid Miniprep Kit, Biorad.
 - Quantum Prep Plasmid Midiprep Kit, Biorad.
- **Purificação de fragmentos de DNA do gel:**
 - Gene Clean II kit, Bio 101 Inc.
 - Mermaid kit, Bio 101 Inc.

- **Purificação de produtos de PCR:**
- Concert Rapid PCR Purification System, Life Technologies.
- **Quantificação da atividade fosfatase alcalina:**
- Alkaline Phosphatase Substrate Kit, Biorad.
- **Dosagem de proteínas:**
- Reativo de Bradford.

3. ANTICORPOS:

- **Anti-jararagina:** anticorpo policlonal de coelho produzido contra a jararagina nativa purificada (Moura da Silva e col., 1999).
- **Anti-GST:** anticorpo policlonal de coelho produzido contra a GST recombinante.
- **Anti-TRxJD9:** anticorpo policlonal de coelho produzido contra o fragmento recombinante correspondente aos domínios disintegrina e rico em cisteínas da jararagina (jararagina-C) em fusão com tioredoxina (Moura da Silva e col., 1999).
- **Anti-AP:** Anticorpo policlonal de coelho anti-fosfatase alcalina de *E. coli*. Chemicon International, Inc. (Cat. Num. AB1204).
- **MAJar3:** o anticorpo monoclonal murino MAJar3 forma parte de uma série de anticorpos desenvolvidos contra a jararagina nativa no mestrado de Isabelle Tanjoni. É do isotipo IgG1, tem uma K_D de 1.9×10^{-9} , reconhece um epítipo conformacional e inibe a ligação jararagina-colágeno, a atividade hemorrágica da jararagina *in vivo* além de inibir a agregação plaquetária dependente de colágeno (Tanjoni e col., *in press*).

4. SOLUÇÕES:

- Anticoagulante para plaquetas: EDTA 2%.
- Anticoagulante para sangue: citrato de sódio 3,8%.
- MTT [3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-yl) 2, 5 diphenyl tetrazolium bromide], Sigma. Diluir 10 mg de MTT em 2 mL de PBS. Esta solução é adicionalmente diluída em meio de cultura (1:10).
- Fosfato de potássio: 0,17 M KH_2PO_4 , 0,72 M K_2HPO_4 .
- Meio de cultura para células CHO 45% de DMEM, 45% de F12 e 10% de soro fetal bovino (FCS).
- Meio LB (por litro): 10 g peptona, 5 g de extrato de levedura, 10 g de NaCl, pH 7,0. Autoclavar a 120°C por 20 min.
- Meio 2YT (por litro): 16 g tripton, 10 g extrato de levedura, 5 g NaCl, pH 7,0. Autoclavar a 120°C por 20 min.

- Meio SOB (100 mL): 2 g peptona, 0,5 g Extrato de levedura, 0,05 g NaCl, 0,25 g $\text{MgCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, Água deionizada até 100 mL, pH 7,0. Autoclavar a 120°C por 20 min.
- Meio SOC (100 mL): 98 mL de meio SOB, 2 mL de Glicose 1 M estéril.
- Meio TB (por litro): 900 mL de água deionizada, 12 g peptona, 24 g de extrato de levedura, 4 mL de glicerol. Autoclavar a 120°C por 20 min e adicionar 100 mL de fosfato de potássio autoclavado quando esfriar.
- Meio TSB (Tryptic Soy Broth) (por litro): 17 g de triptona, 3 g de soytona, 5 g de extrato de levedura, 5 g de NaCl e 2,5 g de K_2HPO_4 , pH 7,5. Autoclavar a 120°C por 20 min
- Solução de sacarose: sacarose 20%, Tris-HCl 0,3 M, pH 8, EDTA 1mM.
- Solução estoque de BCIP (5-Bromo,-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate): dissolver uma pastilha de BCIP, contendo 25 mg de substrato (Sigma), em 0,5 mL de dimetilformamida 100%.
- Solução estoque de NBT (Nitro Blue Tetrazolium): dissolver uma pastilha de NBT, contendo 10 mg de substrato (Sigma), em 1 mL de água deionizada
- Tampão de NBT/BCIP: Tris 0,1 M, NaCl 0,1 M, MgCl_2 5 mM, pH 9,5.
- Substrato NBT/BCIP: 330 μL da solução estoque de NBT + 10 mL do tampão + 33 μL da solução estoque de BCIP.
- Solução de lavagem para Western e dot blot: Tris-salina (Tris 10 mM e NaCl 0,15 M, pH 7,5).
- Solução bloqueadora para Western e dot blot (5% de leite em pó desnatado Molico, Nestlé em Tris-Salina).
- Solução salina tamponada com fosfato (PBS): NaCl 140 mM, KCl 2,7 mM, Na_2HPO_4 10 mM, KH_2PO_4 1,8 mM, pH 7,4.
- Solução de lavagem para ELISA (PBS contendo 0,1% de Tween 20, Sigma).
- Solução bloqueadora para ELISA (PBS contendo 1% de BSA).
- Tampão da trombina: Tris 20 mM pH 8,4, NaCl 150 mM, CaCl_2 2,5 mM.
- Tampão de eletroforese TAE (50X): Tris 2 M, 57,1 mL de ácido acético glacial, EDTA 0,1 M, pH 8,0.
- Tampão de lavagem para plaquetas: NaCl 140 mM, NaHCO_3 10 mM, KCl 2,55 mM, Na_2HPO_4 0,92 mM, MgCl_2 2,1 mM, citrato de sódio 25 mM, glicose 0,55 mM, BSA 0,35%, pH=6,5.
- Tampão de amostra SDS-PAGE: Tris/HCl 125 mM, pH 6,8, contendo 2,5% de SDS, 2,5% de 2-mercaptoetanol, 20% de glicerol, 1 mM de PMSF, 1 mM de TLCK, 4 mM de EDTA e 0,05% de azul de bromofenol.
- Tampão de corrida SDS-PAGE: glicina 196 mM, SDS 0.1%, Tris-HCl 50 mM, pH 8.3.

- Solução descorante SDS-PAGE: 5% de metanol e 7,5% de ácido acético.
- Tampão de transferência Western blot: Tris 25 mM, glicina 190 mM, Metanol 20%.
- Alfa-4-cloro-naftol: dissolver o comprimido de 30 mg em 10 mL de metanol. Adicionar 3 mL desta solução a 17 mL de tris-salina e na hora de revelar adicionar 20 µL de H₂O₂.
- Solução cromógena para ELISA: 1 mg de OPD por mL de tampão citrato 0,2 M, pH 5 mais H₂O₂ 0,06%.

5. VETORES:

- pGEX-4T-1 (Amersham Biosciences). Este sistema desenvolvido por Smith e colaboradores (1988), já foi utilizado com sucesso na clonagem e expressão de diversas disintegrinas (Chang e col., 1997, Wierzbicka-Patynowski e col., 1999) e de fragmentos recombinantes correspondentes aos domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas de ADAMs (Bigler e col., 2000). A principal vantagem deste sistema sobre outros sistemas bacterianos é a possibilidade de se obter uma proteína de fusão facilmente purificável em condições não denaturantes. Este vetor de 4969 pb contém uma origem de replicação do plasmídeo pBR322; o gene *Amp^R*, que codifica a β-lactamase, que confere ao hospedeiro resistência a ampicilina; um gene *lac I^q* (que codifica um inibidor do promotor *lac*); um promotor *lac I* (promotor misto, contendo seqüências dos promotores *lacUV5* e *trp*, responsável por um alto nível de expressão protéica e induzível por IPTG (Boer e col., 1983), imediatamente seguido pela seqüência que codifica a porção efetora da enzima glutathione S-transferase de *Schistosoma japonicum* (que se liga especificamente a glutathione (Simons e col., 1977); uma seqüência que codifica o tetrapeptídeo alvo da trombina (Chang, 1985), que permite a separação da proteína de interesse da proteína GST e um sítio de clonagem múltipla (fig. 2).

Fig. 2. Diagrama do vetor pGEX-4T-1 onde podemos observar o gene da glutathione S-transferase precedendo o sítio de clivagem com trombina e o sítio de clonagem múltipla. Também podemos observar os genes que codificam a β -lactamase (Amp^r) e o repressor lac I. O sítio de origem de pBR322 e o sítio do promotor *P_{lac}* também estão representados.

- pLIP6-GN (Muller e col., 1999). Este vetor cedido pelo Dr. Frederic Ducancel (Département d'Ingénierie et d'Études des Protéines - CEA Saclay, Gif-Sur-Yvette, France) permite a expressão periplásmica de proteínas exógenas em fusão com uma variante de fosfatase alcalina de *E. coli* (APv). A diferença da enzima original a APv apresenta duas mutações nos resíduos 153 e 330 que lhe conferem 10 vezes mais atividade catalítica permitindo um melhor sinal. O vetor pLIP6-GN de 6448 pb apresenta uma única opção de clonagem nos sítios para *Sfi* I e *Not* I. Esta região está inserida no gene *phoA* da fosfatase alcalina na posição correspondente aos resíduos +6 e +7 da proteína madura. A clonagem nesta região permite o correto processamento do peptídeo sinal da fosfatase alcalina após a secreção no periplasma e a restituição do gene *PhoA*, o qual se encontra fora de fase de leitura no pLIP6-GN selvagem. Isto possibilita a triagem de colônias azuis positivas em placas de L-agar contendo o

substrato cromógeno da fosfatase alcalina BCIP. Este vetor é regulado pelo promotor *tac* (Boer e col., 1983), inducível por IPTG e codifica a enzima β -lactamase que lhe confere resistência a ampicilina. A figura 3 mostra o mapa do vetor pLIP6-GN com os sítios de clonagem indicados pelas setas e a estratégia de clonagem mostrando a restituição da fase de leitura do gene *PhoA*.

Gene *PhoA* antes da clonagem:

```

                Sfi I      Not I
cggacaccagaaatgccGGCCAGCCGGCCaagatctGCGGCCGCagttctggaaaa.....aacgggtga
 R T P E M P A Q P A K I C G R S S G K ..... N G stop
+1                +6                                +37

```

Gene *PhoA* após a clonagem:

```

                        inserto
cggacaccagaaatgccGGCCAGCCGGCCnnnGCGGCCGCagttctggaaaaccgg.....ctgaaataa
 R T P E M P A Q P A X A A V L E N R ..... L K stop
+1                +6                                +7                                +450

```

Fig. 3. Diagrama do vetor pLIP6-GN onde podemos observar os sítios únicos de restrição para *Sfi* I e *Not* I. Embaixo está representada a estratégia de triagem do vetor: antes da clonagem o gene *PhoA* da fosfatase alcalina se acha fora de fase de leitura originando uma proteína truncada de 37 resíduos. Após a clonagem de 3n pares de bases (vermelho) o gene *PhoA* restabelece sua fase de leitura dando origem à fosfatase alcalina de *E. coli*. (verde). Em azul estão representados os sítios de restrição para *Sfi* I e *Not* I.

- pLIP5-GN. Este vetor a diferença do pLIP6-GN apresenta o gene da fosfatase alcalina *PhoA* em fase de leitura expressando a APv após indução com IPTG.
- pLIP5m. Vetor derivado do pLIP5-GN apresentando mutações no sítio catalítico do gene *PhoA*. Após indução com IPTG a fosfatase alcalina de *E. coli* (APm) é expressa no periplasma, mas sem atividade enzimática.

6. CEPAS BACTERIANAS:

- **DH5 α** : [*F*⁻*endA*1 *hsdR*17 (*r*_K⁻*m*_K⁺) *glnV*44 *thi*-1 *recA*1 *gyrA* (Nal^r) *relA*1 Δ (*lacIZYA-argF*) *U169 deoR* (ϕ 80*dlac* Δ (*lacZ*)*M15*)] bactéria de clonagem utilizada na amplificação de plasmídeos e transformação de clones.
- **BL21**: [*F*⁻ *ompT* *hsdSb* (*r*_B⁻ *m*_B⁻) *gal* *dcm*] cepa utilizada para expressão, caracterizada por possuir reduzidas quantidades de proteases citoplasmáticas.
- **BL21(DE3)**: [*F*⁻ *ompT* *hsdSb* (*r*_B⁻ *m*_B⁻) *gal* *dcm* (DE3)] BL21 utilizada na expressão de plasmídeos com o promotor T7.
- **CC118**: [*F*⁻ Δ (*ara*⁻*leu*)7679 *araD*139 Δ *lacX*74 *galE* *galK* Δ *phoA*20 *thi* *rpsE* *rpoB* *argE*(Am) *recA*1 *appR*] Com deleção no gene *phoA* que codifica para a fosfatase alcalina de *E. coli*.
- **AD494(DE3)**: [Δ *ara*⁻ *leu*7967 Δ *lacX*74 Δ *phoA*Pvull *phoR* Δ *malF*3 *F'*[*lac*⁺(*lacI*^r)*pro*] *trxB::kan*(DE3)] Com deleção no gene *trxB* que permite a formação de pontes dissulfeto no citoplasma de *E. coli*. Utilizada na expressão de plasmídeos com o promotor T7.

7. LINHAGENS CELULARES:

- Células de ovário de hamster chinês (CHO) expressando basalmente a integrina α 5 β 1 (K1) (ATCC, Rockville, MD).
- Células de ovário de hamster chinês (CHO) transfectadas com o gene que codifica as subunidades da integrina α IIb β 3 (A5) (Dr. Ginsberg, Scripps Research Institute).
- Células de ovário de hamster chinês (CHO) transfectadas com o gene que codifica as subunidades da integrina α v β 3 (VNRC3) (Dr. Ginsberg, Scripps Research Institute).

- Células eritrocíticas K562 expressando a integrina $\alpha 5\beta 1$ (ATCC, Rockville, MD).
- Células eritrocíticas $\alpha 2$ K562. K562 transfectadas com o gene que codifica a subunidade $\alpha 2$, expressando a integrina $\alpha 2\beta 1$.

8. PROGRAMAS:

- **ProtParam tool:** foi utilizado na análise físico-química das proteínas.
<http://us.expasy.org/tools/protparam.html>
- **Primer tool:** utilizado no design de oligonucleotídeos
http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi
- **Manipulate a DNA sequence:** serve para inverter uma sequência de DNA ou obter sua sequência complementar.
<http://arbl.cvmbs.colostate.edu/molkit/manip/index.html>
- **WebCutter 2.0:** foi utilizado para verificar os sítios de clivagem das enzimas de restrição em uma sequência de DNA.
<http://www.firstmarket.com/cutter/cut2.html>
- **Translate tool:** foi utilizado para a decodificação do DNA em aminoácidos.
<http://us.expasy.org/tools/dna.html>
- **ClustalW** (Thompson e col., 1994): este programa foi usado para alinhar as sequências de aminoácidos.
http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=npsa_clustalw.html
- **Dialign:** programa utilizado no alinhamento de sequências de DNA, inclusive sequências com sua respectiva tradução em aminoácidos.
http://bibiserv.techfak.uni-bielefeld.de/cgi-bin/dialign_submit
- **Chromas 1.45:** este programa foi utilizado para visualizar os cromatogramas das sequências.
Connor McCarthy, School of Health Science, Griffith University.
Queensland, Australia.
- **Graph Pad Instat tm:** este programa foi utilizado para análise de regressão linear, desenho de curvas e cálculo de novos valores.
Copyright © 1990-93 Graph Pad Software V2.01
Dr. Cipolla-Neto, U. de São Paulo 930675S.

II. MÉTODOS:

1. AMPLIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS DE DNA POR PCR:

Os fragmentos de DNA foram amplificados por PCR. Foram realizadas reações de 50 μL com 50-100 ng de DNA molde, 2 μL de cada oligonucleotídeo (1 μM), 5 μL de tampão da *Taq* DNA polimerase 10X, 5 μL de dNTP (2 mM), 0,4 μL de *Taq* DNA polimerase (1U/ μL) e o volume foi completado com água deionizada para 50 μL . O programa utilizado foi: 1 ciclo de desnaturação de 94°C por 2 min., 30 ciclos com desnaturação a 94°C x 1 min.; anelamento a 55°C x 1 min.; e extensão a 72°C x 2 min, e um ciclo final para extensão dos fragmentos de 72°C por 5 min.

Quando utilizada a *Pfx* DNA polimerase empregamos o dobro de concentração de oligonucleotídeos e uma temperatura de extensão de 68°C.

2. PURIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS DE DNA:

2.1. Extração com fenol/clorofórmio:

As extrações com fenol/clorofórmio foram feitas com o seguinte protocolo: A cada amostra de DNA contida em um determinado volume de água, foram adicionados 0,6 volumes de fenol e homogeneizadas em vortex. Posteriormente, foram adicionados 0,6 volumes de clorofórmio, homogeneizados novamente em vortex e centrifugados a 10.000g por 1 min em microcentrifuga. A fase aquosa foi separada e submetida a uma nova extração. A esta se adicionou 1 volume de clorofórmio. Esta solução foi homogeneizada no vortex, centrifugada a 10.000g e a fase aquosa transferida para outro tubo. Esta extração com clorofórmio foi repetida mais uma vez para completa remoção do fenol. O sobrenadante final foi precipitado com 2,5 volumes de etanol 100% e 0,1 volumes de acetato de sódio 3M, pH 5,2, e mantido a -20°C *overnight*. A mistura foi então centrifugada a 10.000g por 15 min, o sobrenadante descartado e o *pellet* foi lavado rapidamente com 4 volumes de etanol 70% gelado e secado ao vácuo. O *pellet* foi ressuspenso em água deionizada.

2.2. Concert Rapid PCR Purification System:

Este sistema permite a rápida purificação de fragmentos de DNA. Este método se baseia na ligação do DNA a uma resina acoplada a um filtro. Após duas lavagens com o tampão de lavagem o DNA é eluído em água deionizada obtendo-se uma solução pura.

3. ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE:

As eletroforeses foram feitas em géis de agarose com concentrações entre 0,8 e 1,2 % de agarose, em tampão TAE. Para a corrida, foi utilizado o mesmo tampão ao qual foram adicionados 20 µl de Brometo de Etídio 10 mg/mL (Sambrook e col., 1989). Para os géis analíticos foi utilizado agarose tipo I da Amresco e para os géis preparativos foi utilizada agarose tipo VII da Sigma. O padrão de peso molecular usado foi o DNA do fago lambda digerido com *Hind* III ou o *ladder* descritos na lista de reagentes. As corridas foram feitas a 80 volts com um máximo de 300 mAmp.

4. EXTRAÇÃO DE UM FRAGMENTO DE DNA A PARTIR DE UM GEL DE AGAROSE LOW MELTING:

A banda foi cortada no transiluminador em ondas longas de UV para não danificar o DNA (Zimmermann e col., 1998) e colocada em um tubo de prova para ser pesada. O DNA foi então purificado por extração fenólica ou pelo kit Gene Clean.

4.1. Purificação com fenol:

Esta técnica se baseia na extração da agarose com fenol. Na amostra foram adicionados 500 µL de TAE 1X e incubou-se em banho maria a 70°C por 15 min (até a agarose liquefazer-se). A extração com fenol foi realizada como especificado anteriormente para um meio líquido.

4.2. Purificação utilizando o kit Gene Clean II:

A purificação baseia-se em uma matriz de sílica especial, *glass milk*, que liga DNA de dupla e simples fita de 200pb a 20kpb sem ligar contaminantes, garantindo a recuperação de até 80% do DNA. No caso de fragmentos menores, utilizamos o Mermaid kit que permite a purificação de oligômeros, de 10 a 200 pb.

No tubo de prova com a amostra foram adicionados 3 volumes de NaI e incubados a 55°C por 5 min ou até a dissolução da agarose. Logo após, foi adicionada a suspensão de matriz levando em conta que 1 µL desta liga até 2 µg de DNA. A reação foi mantida em gelo por 5 min agitando-se a cada 2 min para assegurar que a matriz se mantenha ressuspensa e se ligue à maior quantidade de DNA possível. A reação foi então centrifugada por 5 seg a 10.000g, o sobrenadante descartado e a matriz foi lavada 3 vezes com 50 volumes de tampão de lavagem gelado, utilizando o mesmo tempo e velocidade de centrifugação. O *pellet* foi ressuspenso em um volume de água deionizada igual ou maior ao de matriz utilizado (dependendo da concentração de DNA necessária) e mantido a 56°C por 3 min para permitir a separação do DNA da matriz. Para formar um precipitado sólido, o tubo foi centrifugado por 30 seg a 10.000g e o sobrenadante foi cuidadosamente colhido.

5. DIGESTÕES COM AS ENDONUCLEASES DE RESTRIÇÃO:

As digestões foram realizadas com o tampão apropriado para cada enzima e à temperatura de reação adequada como especificado pelo fabricante. A quantidade de tampão (10X) foi adicionada levando em conta o volume total da reação e a quantidade de enzima foi adicionada levando em conta a quantidade de DNA presente, partindo da premissa que uma unidade (U) de enzima cliva 1 µg de DNA em uma hora de reação à temperatura correspondente. Foram utilizadas entre 1 e 3 unidades por µg de DNA em reações de 3 a 4 horas.

6. REAÇÕES DE LIGAÇÃO:

As reações de ligação foram feitas em volumes de 15 μL . As reações incluem o vetor e o inserto na relação molar de 1:5, 2 U da T4 DNA ligase, o tampão da ligase (10X) correspondente a 10% do volume total da reação e 1 μL de ATP 10 mM. As reações foram realizadas a 16°C por 18 h.

7. PREPARAÇÃO DE BACTÉRIAS COMPETENTES:

Uma colônia fresca de bactéria foi cultivada em meio LB durante a noite a 37°C sob agitação. No dia seguinte, 100 μL desta cultura foram inoculados em 10 mL de LB e incubados nas mesmas condições até atingir a fase logarítmica de crescimento ($A_{600} = 0,5-0,8$). Em seguida, a cultura foi centrifugada durante 10 min a 1600g e 8°C. O *pellet* foi ressuspenso em 5 mL de CaCl_2 50 mM gelado e mantida em gelo durante 30 min. Após esse período, as bactérias foram centrifugadas durante 10 min a 4500g e 4°C; o sobrenadante foi descartado e as bactérias ressuspensas em 1 mL de CaCl_2 50 mM gelado. As células competentes foram aliqüotadas em volumes de 100 μL e utilizadas imediatamente na transformação.

8. TRANSFORMAÇÃO:

A mistura de ligação ou os plasmídeos foram usados na transformação das bactérias competentes. A 100 μL de células competentes, foram adicionados 1,7 μL de β -Mercapto etanol (1:20) e a mistura foi mantida em gelo por 10 min. Logo após, foi adicionado o produto da ligação o qual foi incubado com as bactérias competentes por 30 min em gelo, seguindo-se por uma rápida incubação de 55 seg a 42°C. Logo em seguida, as amostras foram colocadas no gelo por 2 min. As células foram então incubadas com meio SOC por 1 h a 37°C sob agitação, e centrifugadas. O *pellet* foi ressuspenso com 50 μL do sobrenadante, semeado em placas com 100 $\mu\text{g/mL}$ de ampicilina e incubado *overnight* a 37°C.

No caso das bactérias transformadas com fragmentos de DNA clonados nos vetores pLIP, as bactérias foram semeadas em placas contendo além da ampicilina, 100 μ M IPTG e 40 mg/mL de BCIP.

9. PREPARAÇÃO DO DNA DO PLASMÍDEO:

Os plasmídeos foram purificados usando os kits Quantum prep plasmid miniprep e midiprep da Biorad, seguindo as recomendações do fabricante. Este se baseia na separação do DNA por uma matriz de exoesqueleto de dióxido de silicone de diatomáceas, que tem alta afinidade pelo DNA e permite uma fácil resuspensão e eluição. A seguir apresentamos o protocolo de minipreparação: Uma colônia de bactéria contendo o plasmídeo foi incubada em 5 mL de meio TB *overnight* a 37°C. O meio foi centrifugado por 30 seg. a 10.000g e o *pellet* foi resuspendido em 200 μ L de solução de resuspensão por meio do vortex. As células foram então lisadas com 250 μ L de solução de lise, invertendo o tubo várias vezes até aparecer uma solução clara e viscosa. As proteínas e o DNA cromossomal foram precipitados invertendo o tubo 10 vezes com 250 μ L de solução de neutralização. A mistura foi centrifugada a 10.000g x 5 min., o *pellet* descartado, e o sobrenadante incubado sobre agitação com 200 μ L de solução de matriz. Esta mistura foi transferida para outro tubo contendo um filtro e filtrada por centrifugação a 10.000g x 30 seg. O filtrado foi descartado e a resina retida pelo filtro foi lavada com 500 μ L de solução de lavagem, por centrifugação a 10.000g por 30 seg no mesmo tubo. O filtrado foi descartado e o procedimento repetido com centrifugação a 10.000g por 2 min. O filtro foi então colocado em um novo tubo e o DNA foi eluído da matriz com 100 μ L de água deionizada previamente aquecida a 70°C e centrifugado a 10.000g por 30 segs. O material eluído foi estocado a -20°C.

9.1. Otimização da preparação de plasmídeo:

Este método foi adaptado do *Large scale plasmid preparation* (Sambrook e col., 1989). Uma colônia de *E. coli* DH5 α contendo o plasmídeo desejado foi inoculada em 3 mL de TB mais 100 μ g/mL de ampicilina e cultivada a 37°C sob agitação até atingir uma A_{600} de 0,6. Um volume de 2,5 mL desta cultura foi inoculado em 50 mL de TB contendo 100

µg/mL de ampicilina, e cultivado durante 2,5 h a 37°C sob agitação. Após este tempo foram adicionados 170 µg/mL de cloranfenicol, cultivando por 12-16 horas. A midipreparação foi realizada com 40 mL do meio utilizando o kit Quantum prep plasmid midiprep segundo o protocolo descrito acima, respeitando-se as proporções dos reagentes. O DNA foi eluído em 600 µL de água deionizada a 70°C e estocado a -20°C.

10. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE DNA:

Uma aliquota de 10 µL de DNA foi diluída em 90 µL de água deionizada. A absorbância foi determinada nos seguintes comprimentos de onda: 260 nm (correspondente ao pico de absorção de RNA e DNA) e 280 nm (correspondente ao pico de absorção de proteínas). A concentração de DNA dupla fita foi determinada considerando que $A_{260} = 1$ corresponde a 50 ng/µL. Para avaliar o grau de pureza do DNA obtido, o quociente das absorbâncias a 260/280 nm foi calculado. Um resultado perto de 2 representa um alto grau de pureza (Sambrook e col., 1989).

11. TRIAGEM DAS COLÔNIAS:

11.1. Por PCR direto:

As reações foram feitas utilizando 5 µL da cultura bacteriana como molde, 1 µL de cada oligonucleotídeo (1 µM), 2,5 µL de tampão da *Taq* DNA polimerase 10X, 2,5 µL de dNTP (2 mM), 0,2 µL de *Taq* DNA polimerase (1U/µL) e foi completado com água deionizada para 25 µL.

11.2. Por PCR após mini-prep:

As reações foram feitas após mini-prep, utilizando-se 2 µL de plasmídeo como molde.

Em ambos os casos, as reações foram feitas em volumes de 25 µL utilizando o programa especificado acima.

12. SEQÜENCIAMENTO:

Os seqüenciamentos foram feitos no Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan pelo método de terminação de cadeia por dideoxinucleotídeos (Sanger e col., 1977). As reações de PCR foram feitas em volumes de 20 µL utilizando 500 ng do plasmídeo, 3,2 pmol de *primer*, 2 µL de Big Dye 2 (Applied Biosystems) e 6 µL de tris 200 mM pH9,0 e 5 mM MgCl₂). As reações de seqüenciamento foram feitas no seqüenciador *ABI 3100* da Applied Biosystems, utilizando eletroforese capilar.

13. MUTAGÊNESE SÍTIO-DIRIGIDA:

13.1. Baseado na técnica do kit *QuinkChangeTM site-directed mutagenesis* da Stratagene (Catalog #200518).

Este sistema nos permite inserir, deletar ou substituir uma ou mais bases diretamente no vetor de clonagem (DNA de dupla fita), eliminando a subclonagem e as diversas transformações dos métodos convencionais. O procedimento utiliza um vetor dupla fita contendo o inserto de interesse e dois oligonucleotídeos contendo as mutações desejadas. Cada um dos oligos é complementar a uma das fitas de DNA. Após alguns ciclos (12-18) de extensão utilizando uma DNA polimerase de alta fidelidade (*Pfx*) varias cópias do vetor contendo a mutação desejada são geradas. Utilizando a endonuclease *Dpn* I (só digere DNA metilado) digeriremos a fita de DNA parental para garantir a transformação só com o vetor mutado. A mutação é confirmada por seqüenciamento dos clones.

13.2. Baseado na técnica de *Megaprimer* (Picard e col., 1994).

Construímos um *megaprimer* contendo os nucleotídeos a serem mutados para a posição 3'. Na posição 5' utilizamos o *primer* Eris5Sf1. Após amplificação por PCR, o produto foi clonado no vetor de escolha.

14. EXPRESSÃO:

Uma colônia de *E. coli* transformada com o plasmídeo de interesse foi semeada em LB contendo 100 µg/mL de ampicilina, mantendo a cultura *overnight* a 37°C sob agitação. As

células foram semeadas em uma diluição 1:50 em meio TSB ou 2YT suplementados com 100 µg/mL de ampicilina. As culturas foram incubadas a 37°C sob agitação até chegarem a fase logarítmica ($A_{600} = 0,5-0,8$). Neste momento foi adicionado IPTG para uma concentração de 100µM e a cultura foi mantida por 4h a 37°C. As culturas então foram submetidas a extração celular ou periplásmica.

15. EXTRAÇÃO CELULAR:

A extração celular foi realizada nos clones expressando a proteína de interesse no citoplasma bacteriano. Um volume de cultura foi centrifugado a 3000g por 5 min. O sobrenadante foi descartado e o *pellet* foi ressuspenso em 0,1 volumes de tampão PBS ou Tris-HCl. As bactérias foram então lisadas por sonicação ou por *french press*

16. LISE BACTERIANA

16.1. Lise por sonicação:

A sonicação se baseia na quebra das bactérias por ultra-som. Utilizou-se uma amplitude de 65 Hz e pulsos de 5 seg durante 8 min. Os produtos sonicados foram então centrifugados a 3000g por 5 min. e o sobrenadante foi estocado a -20°C.

16.2. Lise por *french press*:

Esta técnica se baseia na lise das bactérias ao serem submetidas a altas pressões passando por um orifício estreito regulado por uma válvula. A pressão utilizada foi de 1500 psi. Os produtos foram centrifugados a 3000g por 5 min. e os sobrenadantes colhidos e estocados a -20°C.

17. EXTRAÇÃO PERIPLÁSMICA:

Este protocolo descrito por Ducancel e colaboradores (1989), permite a obtenção das proteínas exportadas ao periplasma por choque osmótico. Um volume de cultura foi centrifugado a 5000g por 5 min e o sobrenadante descartado. O *pellet* foi ressuspensão em 0,1 volumes de solução de sacarose e incubado a temperatura ambiente por 10 min. Logo após as células foram centrifugadas a 5000g por 5 min. e o sobrenadante descartado. O *pellet* foi então ressuspensão em 0,1 volumes de MgCl₂ 0,5 mM gelado, incubado em gelo por 10 min. sob leve agitação. A solução foi submetida a centrifugação a 10.000g por 10 min., a 4°C, o *pellet* descartado e o sobrenadante estocado a -20°C.

18. DOSAGEM DE PROTEÍNAS:

18.1. Método de Bradford

As proteínas foram dosadas pelo método de Bradford (1976). A soroalbumina bovina (BSA) foi utilizada como padrão de referência. As amostras foram diluídas 1:100, e 10 µL destas foram incubadas com 90 µL do reagente de Bradford por 10 min a temperatura ambiente. Logo após, a absorbância foi medida no comprimento de onda de 595 nm. A concentração de proteínas foi calculada a partir de uma curva padrão de BSA, utilizando o programa Instat.

18.2. Eagle Eye (Stratagene):

Este método permite quantificar apenas uma banda de proteína em um gel de poliacrilamida. Nossas amostras foram submetidas ao SDS-PAGE 12% juntamente com quantidades crescentes de soroalbumina bovina (BSA) (0,05 a 1,6 µg de proteína por fileira). Após a corrida as bandas foram coradas com Comassie blue. O aparelho determinou um valor de intensidade para cada banda de BSA, construiu uma curva padrão de concentração de BSA por intensidade da coloração das bandas. A quantidade de proteína presente nas amostras foi automaticamente calculada frente a essa curva e os valores apresentados em µg.

18.3. Espectrofotometria:

As proteínas de fusão foram quantificadas mediante leitura da absorbância a 280 nm, segundo recomendado pelo manual do sistema pGEX. Brevemente, as proteínas eluídas da resina foram diluídas 1:10 em PBS e subsequentemente submetidas a leitura de 280 nm em espectrofotômetro. A quantidade de proteína foi calculada a partir do coeficiente de extinção da GST: 1 A_{280} corresponde a 0,5 mg/mL de proteína GST.

19. ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA CONTENDO SDS (SDS-PAGE)

As proteínas foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (Laemmli 1970). As amostras correspondentes foram diluídas em um mesmo volume de tampão de amostra contendo 2-mercaptoetanol (2-ME) e fervidas em banho maria por 5 min. O material foi então aplicado em um gel de empacotamento de 5% e gel de resolução de 12% de poliacrilamida e submetido a eletroforese com corrente constante de 25mA. Os géis foram corados com azul de Coomassie R-250, segundo a técnica de Blakesley e Boezi (1977).

20. WESTERN BLOTTING

Após o fracionamento por SDS-PAGE, na presença de 2-ME, as proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Towbin e col., 1979). Os antígenos presentes na membrana de nitrocelulose foram então submetidos à caracterização imunoenzimática. Após bloqueio com leite em pó desnatado (Molico, Nestlé) 5% em tampão Tris-Salina (Tris 10mM e NaCl 0,15M, pH 7,5), *overnight* a 4°C, as tiras de membrana foram incubadas com os soros dos coelhos (1:1000 em solução bloqueadora), por 3 horas à temperatura ambiente. Em seguida, as membranas foram lavadas com Tris-Salina e incubadas por 2 horas com o conjugado anti-IgG de coelho marcado com peroxidase, diluído 4.000 vezes. O excesso de conjugado foi removido com mais um ciclo de lavagens e os antígenos foram então revelados com o substrato cromógeno (4-cloro-1-

naftol 0,05% em metanol 15%, em presença de H_2O_2 0,03%), sendo a reação interrompida com água.

21. LIGAÇÃO AO COLÁGENO POR TESTE IMUNOENZIMÁTICO:

Placas de microtitulação de 96 orifícios (NUNC®/Marxisorp) foram sensibilizadas durante a noite a 4°C em câmara úmida, com 100 μL por poço de uma solução contendo 2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ de colágeno. Após este período, as placas foram lavadas com PBS contendo 0,1% de Tween 20 (Sigma®) e, em seguida, bloqueadas por 2 horas a 37°C com uma solução de PBS com 1% de BSA (200 μL por poço). Após um novo ciclo de lavagens, as placas foram mantidas a -20°C até o momento do uso.

Nas placas pré-sensibilizadas, foram realizadas diluições seriadas dos fragmentos recombinantes a partir da concentração de 1 mg/mL (100 $\mu\text{L}/\text{orifício}$). Estas placas foram incubadas por 1 hora a 37°C (100 $\mu\text{L}/\text{orifício}$), em câmara úmida. As placas então foram lavadas com PBS/Tween e, em seguida, novamente incubadas por 1 hora a 37°C com anticorpos de coelho anti-jararagina ou anti-GST. Após lavagem foi realizada uma incubação com anticorpo conjugado anti-IgG de coelho marcado com peroxidase (Sigma®) diluído 1:2000 em PBS contendo 0,5% de BSA (100 $\mu\text{L}/\text{orifício}$). Após novo ciclo de lavagens, a reação foi revelada, adicionando-se 100 μL por poço do substrato da enzima (1 mg de OPD - o-Fenilenodiamina/ mL em tampão citrato 0,2 M, pH 5,0, mais 0,06% H_2O_2). A reação foi interrompida pela adição de H_2SO_4 a 30% (50 $\mu\text{L}/\text{orifício}$). A intensidade da reação foi determinada pela leitura da densidade óptica a 492 nm em Multiskan.

22. ISOLAMENTO DAS PROTEÍNAS EM FUSÃO COM GST:

As proteínas de fusão foram isoladas seguindo as recomendações do fabricante (Amersham Biosciences). Brevemente, as bactérias ressuspensas em tampão PBS (pH 7,4) foram lisadas por *french press*. Os extratos bacterianos contendo as proteínas de fusão foram subsequentemente incubados por 30 min a temperatura ambiente com Glutathione Sepharose 4B (1 μL por mL de cultura inicial) sob agitação suave. Em seguida, a resina foi

centrifugada a 500g por 5 min. e o sobrenadante contendo proteínas não específicas descartado. Foram realizadas 3 lavagens da resina utilizando PBS, com a finalidade de retirar as proteínas não específicas. Finalmente, as proteínas em fusão com GST foram eluídas com 20 mM de glutatona reduzida pH 8 (2 µL por mL de cultura inicial). Com a finalidade de retirar a glutatona as proteínas de fusão foram dialisadas 2 vezes frente a PBS.

23. PURIFICAÇÃO EM SISTEMA DE HPLC (HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY):

A proteína de fusão GST/JD49 eluída da coluna foi dialisada frente ao tampão da trombina e subseqüentemente submetida a clivagem utilizando 1 U de trombina por 100 µg de proteína de fusão durante 18 h a temperatura ambiente. A porção JD49 clivada foi obtida em sistema de HPLC em coluna de fase reversa C18 (Vydac, Hesperia, USA) equilibrada em 0,1% de TFA (Ácido Tri Fluoroacético) e eluída por um gradiente de acetonitrila de 0 a 80% em um volume de 40 mL a um fluxo de 2 mL/min. A cromatografia foi monitorada por absorbância a 214 nm e as frações reunidas foram analisadas por SDS-PAGE 18% quanto a presença de uma banda de baixa massa molecular (~5 kDa) que corresponde a JD49 isolada.

24. OBTENÇÃO DE PLAQUETAS:

Sangue humano (50 mL) obtido de doadores saudáveis foi colhido em solução de citrato de sódio 3,8% (9:1) e centrifugado por 20 min a 125g para a obtenção do plasma rico em plaquetas (PRP). O PRP foi retirado e foram adicionados 0,4 mL de EDTA 2% para cada 10 mL de PRP. A solução foi centrifugada a 500g por 15 min. Após a centrifugação, o pellet de plaquetas foi vagarosamente ressuspense em 10 mL de tampão de lavagem. Esta lavagem foi repetida por mais uma vez e logo após a última centrifugação, o pellet foi ressuspense em 2 mL de tyrode's adicionado de glicose para uma concentração final de 1% (w/v). Após contagem das plaquetas, estas foram diluídas para uma concentração final de 3×10^8 /mL.

25. TESTE DE INIBIÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA:

Os efeitos dos fragmentos recombinantes sobre a inibição da agregação plaquetária foram avaliados através da sua incubação com plaquetas por 5 min a 37°C antes da adição de 1 µg/mL de colágeno (Horm-Chemie). A extensão da inibição da agregação plaquetária foi estimada como a diminuição da porcentagem de transmissão de luz tomando-se como 100% o valor obtido com as plaquetas desafiadas diretamente com o colágeno, mantidas por 5 min apenas com os diluentes dos fragmentos.

26. CULTURA CELULAR:

As linhagens celulares foram cultivadas em 15 mL de meio DMEM/F12, 10% FCS com (A5 e VNRC3) ou sem (K1) geneticina na concentração de 0,5 mg/mL a 37°C, 5% CO₂ até o estabelecimento de uma monocamada de células confluentes. Para os experimentos, as células foram então removidas dos frascos de cultura por adição de 2 mL de EDTA em PBS (2 mM) e lavadas 3 vezes com solução salina 0,15 M por centrifugação a 500g. A concentração foi ajustada para 4×10^5 células/mL.

27. ATIVIDADE FOSFATASE ALCALINA:

A atividade foi calculada utilizando o Alkaline Phosphate Substrate kit da Biorad. Este sistema utiliza o substrato p-Nitrophenylphosphate (pNPP) que ao ser defosforilado pela fosfatase alcalina emite uma coloração amarela que pode ser quantificada a 405 nm de comprimento de onda. Cinquenta microlitros dos extratos solúveis de cada amostra foram incubados com 100 µL do substrato (pNPP em tampão dietanolamina) a temperatura ambiente até o desenvolvimento de uma cor amarela. A absorbância a 405 nm foi então medida. Como controle utilizamos quantidades conhecidas de fosfatase alcalina de *E. coli*.

28. TESTE DE DOT BLOT:

Três microlitros, contendo 1×10^9 plaquetas/mL ou 4×10^5 células/mL, foram adicionados a uma membrana de nitrocelulose. As membranas foram bloqueadas com leite em pó desnatado (Molico, Nestlé) 5% em tampão Tris-Salina por 2 h a temperatura ambiente. As membranas foram então incubadas com as proteínas recombinantes em fusão com fosfatase alcalina ou GST:

28.1. Com as proteínas em fusão com fosfatase alcalina:

Os extratos periplásmicos correspondentes às proteínas recombinantes (1:15 em solução bloqueadora) foram incubados por 1 h a 37°C. Em seguida, a membrana foi lavada com Tris-Salina e as proteínas foram reveladas com o substrato cromógeno NBT/BCIP. A reação foi interrompida pela lavagem extensiva com água destilada.

28.2. Com os fragmentos em fusão com GST:

As membranas foram incubadas com os fragmentos recombinantes e os controles por 1 h a 37°C; após este período as membranas foram lavadas 3 vezes com Tris/NaCl e incubadas com o anticorpo anti-GST ou anti-jararagina nativa por 1 h a 37°C. As membranas foram lavadas novamente e incubadas com anticorpo anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase. Após a última lavagem, os dots foram revelados com alfa-4-cloro-naftol adicionado de água oxigenada.

RESULTADOS:

I. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO FUNCIONAL DOS DOMÍNIOS ECD-DISINTEGRINA E RICO-EM-CISTEÍNAS (JARARAGINA-C)

1. PLANEJAMENTO:

Com o objetivo de determinar a região funcional dos domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas da jararagina, nossa primeira abordagem foi a clonagem e expressão de fragmentos do cDNA da jararagina que codificam diferentes extensões desses domínios, para posterior avaliação da atividade biológica dos polipeptídeos resultantes. Para tanto, selecionamos 8 fragmentos, sendo que 3 correspondem ao domínio ECD-disintegrina, 4 ao domínio rico-em-cisteínas e o oitavo fragmento, JDC, corresponde aos dois domínios juntos. O fragmento JDC foi baseado na sequência proteica da jararagina-C (Moura da Silva e col., 2003) que se estende desde o resíduo 210 até o final da jararagina (421). A escolha dos outros fragmentos foi baseada no padrão de pontes dissulfeto da catrocolastatina-C (Calvete e col., 2000-B) que apresenta 98% de identidade com a jararagina-C e no alinhamento da jararagina com a eristostatina, menor RGD-disintegrina (49 resíduos); com a bitistatina, maior RGD-disintegrina (83 resíduos); com a catrocolastatina-C e por último com o domínio rico-em-cisteínas da atrolisina A. Nossa estratégia foi procurar por regiões funcionais a partir da comparação com a estrutura primária de RGD-disintegrinas ou fragmentos de SVMP da classe P-III com atividade biológica definida.

No alinhamento (fig. 4), podemos observar a alta conservação das cisteínas (vermelho) nas 5 proteínas, sendo que apenas a cisteína 40 da eristostatina e as cisteínas do tripeptídeo ECD (azul) da jararagina-C e catrocolastatina-C não se acham presentes nas outras sequências. Cabe lembrar que o tripeptídeo ECD substitui o motivo RGD, presente no *loop* de interação das disintegrinas clássicas. Por outro lado, o domínio rico-em-cisteínas da atrolisina-A, embora apresente uma menor identidade com a jararagina-C (63%), conserva todas as cisteínas na mesma posição. A diferença das sequências da jararagina e catrocolastatina-C, o domínio rico-em-cisteínas da atrolisina-A apresenta dois gaps de 4 resíduos e uma extensão de 9 resíduos na extremidade C-terminal. A sequência da bitistatina embora seja uma RGD-disintegrina, apresenta alta homologia com o domínio ECD-disintegrina da jararagina, conservando suas 14 cisteínas. No entanto, na região do *loop* podemos observar maior variação nos resíduos. Por outro lado, a eristostatina apresenta um *loop* quase idêntico à bitistatina, apresentando mais variação na região N-terminal.

Jararagina-C	IISPPVCGNELLEVGEEDCGTPENCQNECCDAATCKLKSGSQCGHGDCEEQCKFSKSGT
Catrocolastatina-C	IISPPVCGNELLEVGEEDCGTPENCQNECCDAATCKLKSGSQCGHGDCEEQCKFSKSGT
Atrolisina A	-----
Bitistatina	--SPPVCGNEILEQGEGDCGSPANCCDQCCNAATCKLTPGSQCNHGECCDQCKFKKART
Eristostatina	-----QEEPCATGPCCRRCKFKRAGK
Jararagina-C	<u>EC</u> <u>RASMSE</u> <u>CDPAEH</u> CTGQSSECPADVFKNGQPCLDNYGYCYNGNCPIMYHQC Y ALFGAD
Catrocolastatina-C	<u>EC</u> <u>RASMSE</u> <u>CDPAEH</u> CTGQSSECPADVFKNGQPCLDNYGYCYNGNCPIMYHQC Y DLFGAD
Atrolisina A	-----LHNFGYCYNGNCPIMYHQC Y ALWGSN
Bitistatina	V <u>CRI</u> ARGDWN-DDYCTGKSSDCPWNH-----
Eristostatina	V <u>CR</u> VARGDWN-DDYCTGKSCDPRNPWNG-----
Jararagina-C	VYEAEDSCFKDNQKGNYYGYCRKENGKKIPCAPEDVKCGRLYCKDNSPGQNNPC K MFYSN
Catrocolastatina-C	VYEAEDSCFERNQKGNYYGYCRKENGKNKIPCAPEDVKCGRLYCKDNSPGQNNPC K MFYSN
Atrolisina A	VTVPDACC F DINQSGNNSFYCRKENGVNIPCAQEDVKCGRLFCNVN---DFLCRHKYSD
Bitistatina	-----
Eristostatina	-----
Jararagina-C	DDEHKGMVLPGTKCADGKVC S NGHCVDVATAY-----
Catrocolastatina-C	EDEHKGMVLPGTKCADGKVC S NGHCVDVATAY-----
Atrolisina A	D---GMVDHGTKCADGKVC K NRQCVDVTTAYKSTSGFSQI
Bitistatina	-----
Eristostatina	-----

Fig 4. Alinhamento da jararagina-C com SVMP do tipo P-III e com RGD-disintegrinas. As seqüências foram obtidas do banco de dados do NCBI e foram alinhadas utilizando o programa Clustal-W utilizando a matriz *gonnet*. As cisteínas em vermelho são as conservadas nas 5 seqüências enquanto as cisteínas em azul representam as não conservadas. Os aminoácidos sublinhados em negrito correspondem à região do *loop*.

Foram selecionados os seguintes fragmentos:

- JD49, correspondente à porção C-terminal do domínio ECD-disintegrina e análogo à eristostatina. Estes peptídeos compartilham 7 das 8 cisteínas e apresentam uma homologia de 67%. Este fragmento se estende dos resíduos 250-298 da sequência da jararagina.
- JD89, correspondente ao domínio ECD-disintegrina e análogo à bitistatina. Este fragmento conserva 14 de suas 15 cisteínas com as cisteínas da bitistatina. Segundo o alinhamento as cisteínas estariam envolvidas em 7 pontes dissulfeto com a cisteína livre no motivo ECD. Este fragmento compreende os resíduos 210-298 da sequência da jararagina.
- JD98 contém o JD89 com 9 resíduos a mais na posição C-terminal que incluem a primeira cisteína do domínio rico-em-cisteínas. Esta cisteína formaria assim uma ponte com a cisteína do motivo ECD. Este fragmento se estende dos resíduos 210-307 da sequência da jararagina.
- JC116, correspondente ao domínio rico-em-cisteínas completo foi baseado no domínio rico-em-cisteínas da atrolisina A (Jia e col., 2000) apresentando uma identidade de 63% entre ambos. Decidimos excluir os resíduos N-terminal LDNY, primeiro, porque eram os menos conservados no início da sequência e segundo, porque estes resíduos já estavam incluídos no fragmento JD98. Na parte final da sequência, incluímos apenas os resíduos C-terminal da jararagina que alinham perfeitamente com a atrolisina A. Este fragmento compreende os resíduos 304-421.
- JC63, corresponde a um cluster de 3 pontes dissulfeto no centro do domínio rico-em-cisteínas e está baseado nas pontes dissulfeto da catrocolastatina-C. Este fragmento se estende dos resíduos 344-405 da sequência da jararagina.
- JC76, apresenta os resíduos C-terminal do domínio rico-em-cisteínas. Esta extensão contém duas cisteínas envolvidas em uma ponte. O fragmento compreende os resíduos 344-421.
- JC103 é similar a JC116, mas não apresenta a extensão C-terminal presente no fragmento JC76, compreendendo os resíduos 304-405.

Fig. 5. Fragmentos selecionados. O seguinte esquema mostra as sequencias selecionadas com suas respectivas pontes dissulfeto. Em vermelho estão representadas as cisteínas e as linhas que as unem representam as pontes S-S baseadas na catrocolastatina C (Calvete e col., 2000). Os resíduos do loop estão representados no quadro e os números entre parênteses correspondem aos resíduos da jararagina madura.

2. CLONAGEM:

- **Construção dos oligonucleotídeos:**

Os oligonucleotídeos foram desenhados com ajuda do programa *Primer Tool*. Levamos em consideração os sítios de clonagem, as bases de apoio para as enzimas de restrição e as 15 primeiras bases do DNA a ser amplificado da sequência da disintegrina do lado 5' no oligo *sense* e do lado 3' no *anti-sense*. Adicionalmente, os oligonucleotídeos *anti-sense* contêm o codon de terminação para a síntese protéica. Os sítios de restrição das endonucleases *Bam*H I e *Eco*R I foram adicionados nos *primers sense* e *anti-sense*, respectivamente. Estes sítios foram cuidadosamente escolhidos após uma análise de restrição dos fragmentos utilizando o programa *WebCutter 2.0* onde verificamos sua ausência nas sequências. Adicionalmente construímos o oligonucleotídeo de sequência universal para o pGEX (pGEX5seq) baseado no *primer* comercializado pela Amersham Biosciences.

JD49Bam5:	5'-gagagGGATCCgggtcacagtgtgga-3'	(JD49)
JD49EcoST3:	5'-attagGAATTC <u>tta</u> cttatggaagacatc-3'	(JD49, JD89)
JD98Bam5:	5'-gagagGGATCCattatttcacctcca-3'	(JD89, JD98, JDC)
JD98EcoST3:	5'-attagGAATTC <u>ttag</u> tagttatctaggca-3'	(JD98)
JDCEcoST3:	5'-attagGAATTC <u>ttag</u> taggctgtagccac-3'	(JDC, JC116, JC103)
JC116Bam5:	5'-gagagGGATCCctagataactacggt-3'	(JC116, JC76)
JC63Bam5:	5'-gagagGGATCCggcaattattatggc-3'	(JC63, JC103)
JC63EcoST3:	5'-attagGAATTC <u>tta</u> tccatctgcacattt-3'	(JC63, JC76)
PGEX5seq:	5'-GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG-3'	

Fig. 6. Oligonucleotídeos construídos. Os nucleotídeos em maiúsculas correspondem ao sítio de reconhecimento das endonucleases de restrição. Os nucleotídeos em minúsculas à direita do sítio de restrição correspondem as 15 primeiras bases do DNA a ser amplificado da sequência da disintegrina tanto do lado 5' como do lado 3'. Os nucleotídeos em minúsculas à esquerda do sítio de restrição correspondem ao lugar de apoio para as endonucleases. Os 3 nucleotídeos em negrito e sublinhados correspondem ao codon de terminação. Entre parênteses está o fragmento ou fragmentos resultantes da amplificação com esse oligonucleotídeo.

- **Amplificação do inserto por PCR e clonagem:**

Todos os fragmentos foram amplificados por PCR a partir do clone BjD4 contendo o cDNA da jararagina clonado em λ ZapII (Paine e col., 1992) utilizando os oligonucleotídeos acima descritos segundo o caso. Foram feitas 4 reações de 50 μ L. Uma reação sem o cDNA da jararagina foi usada como controle negativo. A amplificação dos produtos foi confirmada por gel de agarose 1% e a concentração do DNA foi calculada obtendo-se entre 160 e 220 ng/ μ L. Os produtos de PCR foram digeridos com *Bam*H I e *Eco*R I e subsequentemente ligados no vetor pGEX-4T-1 previamente digerido com as mesmas enzimas. Como controle negativo fizemos uma ligação só com o produto de PCR e outra só com o vetor tratado com as endonucleases. Estes produtos de ligação foram utilizados para transformar *E. coli* DH5 α que posteriormente foram semeadas em placas de L-Agar contendo ampicilina. Na placa correspondente apenas ao produto de PCR não pudemos observar o crescimento de colônias. No entanto, na placa correspondente à transformação com o vetor cortado cresceram algumas colônias, provavelmente procedentes de digestões parciais do vetor religadas. Nas placas semeadas com as bactérias transformadas com os produtos de ligação houve crescimento de um número bem maior de colônias. Como controle de bactéria crescemos *E. coli* DH5 α não transformada em placas com e sem ampicilina. Na primeira não houve crescimento, demonstrando-se a susceptibilidade da bactéria à ampicilina e a segunda apresentou um crescimento uniforme e espalhado mostrando a viabilidade da mesma.

- **Triagem:**

JD49

Dez colônias foram analisadas por PCR direto utilizando os *primers* de amplificação JD49Bam5 e JD49EcoST3. No gel abaixo (figura 7) podemos verificar a amplificação de uma única banda de 150 pb a partir dos 10 clones demonstrando o êxito da clonagem (colunas 1-10). Como controle corremos no último canal o produto de PCR de um clone contendo um inserto não relacionado onde podemos observar a ausência de amplificação. O clone 3 foi seqüenciado utilizando o *primer* pGEX5seq. A seqüência deste clone correspondeu perfeitamente com a seqüência esperada demonstrando a inserção correta do cDNA no sítio de clonagem selecionado. Este clone recebeu o nome de pKD31.

Fig 7. Triagem das colônias por PCR. As colônias foram triadas por PCR utilizando os *primers* de clonagem JD49Bam5 e JD49EcoST3. O produto de PCR foi analisado em gel de agarose 1%. As fileiras 1-10 correspondem aos 10 clones analisados. Como controle negativo realizamos uma reação a partir de um clone com inserto não relacionado (11).

JD89 e JD98

Os clones foram analisados por PCR utilizando-se o *primer* de sequência pGEX5seq e o *primer* interno antisense, respectivo para cada fragmento. Como mostra a figura 8, que corresponde à análise de 10 clones para JD89, pode-se verificar que somente o clone 4, sinalizado com a seta branca, apresentou a banda esperada de 300 pb. Entretanto, a clonagem do fragmento JD98 (parte superior), apresentou-se mais eficaz com 50% dos clones positivos (3, 4, 6, 7 e 9). O clone 4 do JD89 e o 3 de JD98 foram seqüenciados demonstrando-se a correta clonagem dos fragmentos.

Fig. 8. Análise dos clones dos fragmentos JD89 e 98. Dez colônias de cada fragmento foram amplificadas por PCR utilizando o *primer* de sequência pGEX5seq e o *primer* interno respectivo para cada fragmento. Logo após, os produtos de PCR foram aplicados em gel de agarose 1%. Na primeira fileira superior e inferior podemos ver o padrão de massa molecular. Na parte superior mostramos os 10 clones correspondentes ao fragmento JD98 na parte inferior corresponde à análise de 10 clones de JD89.

JDC

A triagem foi feita por PCR a partir de 20 clones conseguindo-se 85% de clones positivos. Vinte clones foram amplificados por PCR utilizando o *primer* de sequência pGEX5seq e o *primer* JDCEcoST3. A figura 9 mostra a banda de 700 pb correspondente ao produto esperado. Na linha central de corrida estão as bandas correspondentes ao padrão de migração. O clone selecionado pela intensidade da banda foi o 17, o qual foi seqüenciado mostrando sua correta inserção no quadro de leitura do vetor.

Fig. 9. Análise dos clones correspondentes ao fragmento JDC. Vinte clones foram ampliados por PCR utilizando o *primer* de sequência pGEX5seq e o *primer* JDCEcoST3. Os produtos foram fracionados em gel de agarose 1%. Os clones analisados estão denotados com números. Na parte central estão as bandas correspondentes ao padrão de PM.

JC63, JC76, JC103 e JC116

Os clones foram analisados por PCR utilizando-se o *primer* de sequência pGEX5seq e o *primer* interno anti-sense, respectivo para cada fragmento. A figura 10 mostra a análise de 5 clones para cada um dos 4 fragmentos. A clonagem do fragmento JC116 resultou em 4 clones positivos nos quais se pode verificar a presença da banda de 350 pb; JC103 apresentou 3 clones positivos representados pelas bandas de 315 pb; JC76 também apresentou 3 clones positivos que revelaram a banda de 228 pb; e por último, o fragmento JC63 representado pela banda de 190 pb, apresentou 2 clones positivos. Os clones foram selecionados com relação a intensidade de banda, sendo que para JC116, JC103, JC76 e JC63 escolhemos os clones 5, 2, 5 e 3, respectivamente. Estes clones foram subsequentemente seqüenciados confirmando-se a correta amplificação e inserção no vetor.

Fig. 10. Análise da clonagem dos fragmentos do domínio rico-em-cisteínas. Cinco clones correspondentes a cada um dos fragmentos foram amplificados por PCR utilizando o *primer* de sequência pGEX5seq e o *primer* interno antisense respectivo para cada fragmento. Na parte central do gel se encontra o padrão de massa molecular. Na parte superior esquerda estão presentes os clones correspondentes a JC116; na direita destes se encontram os clones de JC76. Na parte inferior esquerda e direita, se encontram os clones para JC103 e JC63, respectivamente.

3. EXPRESSÃO:

Os clones foram utilizados para transformar a linhagem de *E. coli* BL21. A expressão foi padronizada com respeito a concentração de IPTG, tempo e temperatura de indução resultando em valores de 100 μ M de IPTG por 4 h a 37°C (dados não mostrados). Após indução, o material foi analisado por SDS-PAGE 12%. Como podemos ver na figura 11, as proteínas correspondentes a GST (2), GST/JDC (3), GST/JD49 (4), GST/JD89 (5), GST/JD98 (6), GST/JC63 (7), GST/JC76 (8), GST/JC103 (9) e GST/JC116 (10) foram expressas com sucesso na forma solúvel. Na primeira fileira podemos ver o padrão de massa molecular. Como controle de expressão analisamos o produto do pGEX selvagem onde podemos ver a banda de 27 kDa correspondente a GST (fileira 2). Nas fileiras 3 a 10 podemos ver bandas maiores correspondentes as proteínas de fusão GST/JDC (50 kDa), GST/JD49 (32 kDa), GST/JD89 (36 kDa), GST/JD98 (37 kDa), GST/JC63 (34), GST/JC76 (35 kDa), GST/JC103 (38 kDa) e GST/JC116 (40 kDa).

Fig. 11. Análise da expressão por SDS-PAGE. Colônias em fase logarítmica de crescimento foram induzidas por 4 h com IPTG. Após centrifugação o *pellet* bacteriano foi ressuspensão em 1/10 de volume e logo após as bactérias foram lisadas por *french press*. O extrato solúvel foi analisado por SDS-PAGE 12%. A primeira fileira corresponde ao padrão de massa molecular. Como controle de expressão analisamos o produto do pGEX selvagem (2). As fileiras 3 a 10 correspondem a amostras das proteínas de fusão GST/JDC, GST/JD49, GST/JD89, GST/JD98, GST/JC63, GST/JC76, GST/JC103 e GST/JC116, respectivamente.

4. PURIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS COM GLUTATIONA SEPHAROSE.

As proteínas de fusão foram isoladas por afinidade a glutathiona Sepharose 4B como descrito em material e métodos. Após eluição das proteínas, a purificação foi verificada por SDS-PAGE 12%. Na figura 12, podemos observar pela intensidade das bandas e pela quantificação protéica que as proteínas de fusão não foram igualmente purificadas. GST/JD49 (4) apresentou melhor concentração com 2,1 mg/mL. As bandas correspondentes a GST/JD89 (5), GST/JD98 (6) e GST/JC63 (7) foram preferencialmente purificadas e apresentaram concentração similar com 1,35 mg/mL, 1,15 mg/mL e 1,2 mg/mL, respectivamente. GST/JDC (3), apresentou uma concentração de 0,7 mg/mL, no entanto, no gel podemos ver várias bandas menores que devem corresponder a produtos truncados de expressão. Proteínas truncadas também podem ser observadas conjuntamente com a banda do GST/JC76 (8) que apresentou concentração de 0,9 mg/mL. Já os fragmentos GST/JC103 (9) e GST/JC116 (10) apresentaram baixa concentração com 0,3 mg/mL e 0,5 mg/mL, respectivamente. Junto com esses fragmentos, podemos ver bandas correspondentes a proteínas truncadas também.

Fig. 12. Análise da purificação por SDS-PAGE. Os extratos bacterianos contendo as proteínas de fusão foram purificados com Glutathiona Sepharose 4B e as proteínas eluídas foram analisadas por SDS-PAGE 12%. Na primeira fileira podemos ver o padrão de massa molecular. Como controle purificamos o produto do pGEX selvagem (2). Nas fileiras 3 a 10 estão presentes os produtos de purificação das proteínas de fusão GST/JDC, GST/JD49, GST/JD89, GST/JD98, GST/JC63, GST/JC76, GST/JC103 e GST/JC116, respectivamente.

5. ATIVIDADE BIOLÓGICA:

A atividade biológica de todos os fragmentos foi avaliada pela inibição da agregação plaquetária, ensaios de ligação a plaquetas e ao colágeno e pela reatividade frente ao MAJar3, anticorpo monoclonal neutralizante da atividade hemorrágica e afinidade pelo colágeno presentes na jararagina nativa (Tanjoni e col., 2003).

- **Inibição da agregação plaquetária dependente de colágeno.**

Os resultados de agregação plaquetária estão mostrados na figura 13. Em A, podemos ver o perfil normal de agregação para os 2 canais após adição de 1 $\mu\text{g/mL}$ de colágeno; em B, a inibição total por parte da jararagina nativa na concentração de 100 $\mu\text{g/mL}$ (controle positivo em preto) enquanto a GST (controle negativo em azul) na concentração de 400 $\mu\text{g/mL}$ foi incapaz de inibir esta atividade. Os resultados de inibição com nossos fragmentos na concentração de 400 $\mu\text{g/mL}$ (C-F) mostraram-se negativos. Nenhum fragmento foi capaz de inibir a agregação plaquetária dependente de colágeno nas condições do teste. Testes com concentrações menores deram o mesmo resultado (dados não mostrados).

Fig. 13. Teste de inibição da agregação plaquetária. Os fragmentos recombinantes (200 µg) foram incubados com plaquetas lavadas por 5 min a 37°C antes da adição de 1 µg/mL de colágeno. A extensão da inibição da agregação plaquetária foi estimada como a diminuição da porcentagem de transmissão de luz tomando-se como 100% o valor obtido com as plaquetas desafiadas diretamente com o colágeno (A). Como controle negativo utilizamos 400 µg/mL de GST (B em azul) e como controle positivo 100 µg/mL de jararagina (B em preto). Os testes com 400 µg/mL dos fragmentos estão mostrados nas figuras C a F.

- **Avaliação dos fragmentos quanto à sua ligação às plaquetas por dot blot.**

Como alternativa ao teste de agregação plaquetária, decidimos avaliar a ligação direta dos fragmentos à plaqueta por dot blot. A figura 14 mostra que enquanto a jararagina se liga às plaquetas e ao colágeno; os fragmentos não conseguiram ligar-se, mostrando que não interagem com estas moléculas. Como controle positivo incubamos dots de proteínas recombinantes com os soros anti-jararagina e anti-GST onde podemos ver sua reatividade.

Fig. 14. Teste de adesão por dot blot. Membranas de nitrocelulose contendo 1×10^9 plaquetas/mL ou 1 mg/mL de colágeno foram incubadas com os fragmentos recombinantes por 1 h a 37°C; após este período as membranas foram lavadas 3 vezes com Tris/NaCl e incubadas com o anticorpo anti-GST ou anti-jararagina nativa por 1 h a 37°C. As membranas foram lavadas novamente e incubadas com anticorpo anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase. Após a última lavagem, os dots foram revelados com alfa-4-cloro-naftol adicionado de água oxigenada.

- **Avaliação dos fragmentos quanto à sua ligação ao colágeno por ensaio imunoenzimático.**

A ligação dos fragmentos ao colágeno foi também verificada utilizando placas de ELISA, através de um ensaio quantitativo. Neste teste verificamos que a jararagina tem alta afinidade pelo colágeno ligando-se em concentrações de 5 nM (não mostrados), porém os fragmentos não conseguiram ligar-se. Na concentração de 0,5 mg/mL, a extensão da ligação foi comparável à do GST utilizado como controle (figura 16A). No entanto, decidimos verificar se os fragmentos poderiam inibir a ligação da jararagina ao colágeno. Na figura 16B mostramos um ensaio de competição utilizando 10 ng de jararagina e 0,5 mg dos fragmentos por pocinho (100 µL). Podemos ver uma baixa inibição de 14% no caso de JDC, mas que desconsideramos devido ao fato desse valor não ser estatisticamente significativo. Deste modo confirmamos a baixa afinidade dos fragmentos para interagir com esta molécula.

Fig. 15. Teste de ligação ao colágeno por ELISA. Placas de microtitulação de 96 poços foram sensibilizadas por 12 a 18 horas, a 4°C em câmara úmida, com 100 µL por poço de uma solução contendo 2 µg/mL de colágeno. Após este período, as placas foram lavadas com PBS contendo 0,1% de Tween 20 (Sigma) e, em seguida, bloqueadas por 2 horas a 37°C com uma solução de PBS com 1% de BSA (200 µL por poço). Após um novo ciclo de lavagens, as placas foram mantidas a -20°C até o momento do uso. As placas foram incubadas por 1 h a 37°C com 0,5 mg dos fragmentos recombinantes em um ensaio de ligação (A) ou com 0,5 mg dos fragmentos recombinantes mais 10 ng de jararagina em um ensaio de competição (B), quantidades estas contidas em 100 µL de reação. Como controle positivo utilizamos jararagina e como controle negativo GST. As reações foram então incubadas com soro anti-GST (A) ou anti-jararagina (B), as placas lavadas e subsequentemente incubadas com anticorpo conjugado anti-IgG de coelho. Após lavagens as placas foram reveladas e lidas como indicado na parte experimental.

- **Reatividade dos fragmentos frente a anticorpos neutralizantes:**

A caracterização da região biologicamente ativa da jararagina foi então analisada de forma indireta através da localização de epítopos reconhecidos por anticorpos neutralizantes. Os fragmentos recombinantes foram então utilizados como antígenos em testes de dot blot com anticorpos policlonais ou com o anticorpo monoclonal MAJar3, que inibe a ligação da jararagina ao colágeno e neutraliza a atividade hemorrágica desta. Quando testado com nossos fragmentos (figura 16), MAJar3 reagiu com JD49, JD89 e JD98, não apresentando reatividade com os fragmentos correspondentes ao domínio rico em cisteínas. Os três fragmentos reconhecidos formam parte do domínio ECD-disintegrina, sendo que JD49 corresponde à porção C-terminal, análoga às menores RGD-disintegrinas. Este resultado sugere a importância da porção C-terminal do domínio disintegrina (JD49) como moduladora das atividades biológicas da jararagina.

Fig. 16. Reatividade dos fragmentos frente a anticorpos neutralizantes. A reatividade dos fragmentos foi testada frente ao anticorpo monoclonal MAJar3 (coluna 1) e ao anticorpo policlonal murino anti-jararagina (coluna 2). Como controle negativo utilizamos soro normal de camundongo (coluna 3). No lado esquerdo da figura podemos verificar os fragmentos recombinantes e a jararagina e a GST utilizadas como controle.

6. CARACTERIZAÇÃO DO FRAGMENTO JD49:

Uma vez demonstrada a reatividade do fragmento JD49 com o anticorpo neutralizante MAJar3, passamos a melhor estudar suas propriedades. Esse fragmento apresenta uma massa molecular teórica de 5199,6 e um ponto isoelétrico (pI) de 5,05. Sua estrutura 3-D foi determinada por modelagem. Este fragmento foi também separado da GST por clivagem com trombina e posteriormente purificado por HPLC e analisado quanto a atividade biológica.

- **Modelagem:**

A sequência do fragmento JD49 foi analisada pela Dra. Dulce Ferreira, do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo para a determinação de sua estrutura terciária por modelagem, utilizando a echistatina como molde. O modelo de JD49 apresenta um enovelamento muito semelhante ao da echistatina apesar da baixa identidade entre as duas sequências (34,78%). Na figura 17 podemos ver o modelo de JD49 com a estrutura secundária e o *loop* contendo a sequência ECD. No modelo podemos observar que JD49 é composta por duas fitas- β (em laranja) e um *loop* com a sequência ECD no seu ápice. Na sobreposição do modelo de JD49 com a estrutura da echistatina (figura 19) podemos observar que as sequências RGD e ECD não estão exatamente sobrepostas e os únicos resíduos que ocupam posições equivalentes são o ácido aspártico do RGD e o ácido glutâmico do ECD. Com respeito às pontes dissulfeto o modelo identifica 3 pontes formadas entre a Cys4-Cys13, Cys9-Cys35 e Cys22-Cys42, sendo que as Cys10 e Cys29 permaneceriam livres. A análise de qualidade do modelo mostra que 48,8% dos resíduos se encontram em uma região favorável, 36,6% se encontram em regiões adicionalmente permitidas e só um resíduo, a serina 27, está localizado em uma região desfavorável. Este resíduo encontra-se no *loop* que contém a sequência ECD e provavelmente apresenta certa flexibilidade o que pode justificar os valores desfavoráveis apresentados. Em resumo o modelo obtido sugere uma estrutura estável, com a sequência ECD exposta no *loop* e com a cisteína livre.

Fig. 17. Modelagem molecular de JD49. Esta sequência foi modelada utilizando a estrutura terciária da echistatina obtida por RMN como molde.

Fig 19. Sobreposição das estruturas dos loops da echistatina e de JD49. O modelo mostra a região do loop da echistatina e de JD49 contendo as seqüências RGD e ECD, respectivamente. Os resíduos RGD estão coloridos em lilas e os ECD em preto.

- **Obtenção do fragmento JD49 livre da fusão com GST:**

Para obtermos JD49 livre, inicialmente produzimos a proteína de fusão GST/JD49 por indução das culturas de BL21 transformadas com o clone pKD31. A proteína de fusão foi então isolada por afinidade à glutationa Sepharose 4B (Amersham Biosciences) e posteriormente submetida a clivagem com trombina. A clivagem da proteína de fusão com trombina foi padronizada com respeito a temperatura, tempo e concentração de enzima utilizada. Em todos os casos a padronização foi analisada por SDS-PAGE 18%. Foram utilizadas 0,03 U, 0,3 U e 0,65 U de trombina na clivagem de 30 µg de proteína recombinante. Estas reações foram realizadas tanto a 37°C por 2 h como a 23°C durante 16 h, onde pudemos verificar que a clivagem foi mais eficiente utilizando 0,65 U. Foi então que passamos a avaliar esta concentração e temperatura a diferentes tempos de incubação (12, 16, 24 e 36 h.) Os resultados mostraram uma melhor clivagem com 16 h de incubação. Nestas condições de 0,65 U de trombina por mg de proteína recombinante, a 23°C durante 16 h conseguimos clivar aproximadamente 75% da proteína de fusão (fig. 21, fileira 4).

- **Isolamento de JD49 por HPLC:**

Com a finalidade de isolar JD49 da GST e da proteína de fusão não clivada GST/JD49 (figura 21, fileira 4) e especialmente da trombina usada na clivagem, passamos a purificar esta fração por cromatografia de fase reversa em HPLC segundo protocolo anteriormente descrito para o isolamento das RGD disintegrinas de 49 resíduos, eristostatina e echistatina (McLane e col., 1994). A figura 20 mostra o perfil cromatográfico em coluna C-18. Seis picos foram eluídos à medida que o gradiente de acetonitrila aumentava e foram analisados por SDS-PAGE 18%. Nos picos eluídos aos 7, 9 e 12 min não apareceu banda alguma; o material eluído aos 26 min corresponderia à trombina segundo isolamentos anteriores com enzimas tipo trombina isoladas do veneno de *B. jararaca* no mesmo tempo de retenção; e por último o pico eluído aos 32 min corresponde a GST e GST/JD49. O material eluído aos 20 min, sinalizado com a seta, foi o único que apresentou uma banda correspondente a JD49 (Fig.21, fileira 4).

Fig. 20. Isolamento de JD49 por HPLC. A porção JD49 clivada foi obtida em sistema de HPLC em coluna de fase reversa C18 (Vydac, Hesperia, USA) equilibrada em 0,1% de TFA (Ácido Tri Fluoroacético) e eluída por um gradiente de acetonitrila de 0 a 80% em volume de 40 mL a um fluxo de 2 mL/min. A cromatografia foi monitorada por absorvância a 214 nm e as frações reunidas foram analisadas por SDS-PAGE 18% quanto à presença de uma banda de baixa massa molecular (~5 kDa) que corresponde a JD49 isolada

A figura 21 abaixo mostra todas as etapas envolvidas na purificação de JD49. Na primeira fileira podemos observar o extrato bacteriano, produto da expressão do clone pKD31, contendo GST/JD49 (32 kDa). A fileira 2 corresponde à purificação por afinidade deste material com glutathiona Sepharose 4B, onde podemos observar a purificação de GST/JD49. Na fileira 3 apresentamos este material clivado com trombina e por último, na fileira 4, indicada com a seta, podemos ver a banda de 5 kDa correspondente a JD49 purificada por HPLC, que foi concentrada com respeito ao material inicial (terceira banda da fileira 3).

Fig. 21. Etapas envolvidas na purificação de JD49. Na primeira fileira podemos observar o extrato bacteriano, produto da expressão do clone pKD31. A fileira 2 corresponde à purificação por afinidade deste material com glutathiona Sepharose 4B. Na terceira fileira apresentamos este material clivado com trombina; e por último a fileira 4 corresponde ao material isolado em fase reversa.

- **Avaliação da atividade biológica:**

Após a purificação de JD49 decidimos testar a atividade biológica deste fragmento. Uma vez que JD49 reage fracamente com o anticorpo anti-jararagina, descartamos o teste de dot blot e optamos por avaliar o fragmento quanto à sua habilidade de inibir a agregação plaquetária induzida por colágeno. Nossos resultados mostraram que JD49, purificada por HPLC, não apresentou atividade inibitória (dados não mostrados), embora a jararagina, purificada do veneno de *B. jararaca*, inibiu em 100% a agregação plaquetária, mantendo sua forte atividade disintegrina. Estes dados sugerem que esta região por si só não é suficiente para desenvolver a atividade e que outras porções da molécula precisam estar presentes.

Apesar de JD49 não possuir atividade biológica, a reatividade com o anticorpo monoclonal MAJar3 sugere que este fragmento está envolvido na ligação ao colágeno e na atividade hemorrágica da jararagina. Estes dados poderão servir de base para um estudo mais detalhado da jararagina e ainda podem servir como ponto de partida para a elaboração de marcadores moleculares da integrina $\alpha 2\beta 1$.

II. MARCADORES MOLECULARES

Com a finalidade de desenvolver marcadores moleculares seletivos para integrinas, decidimos clonar as disintegrinas no vetor pLIP6-GN que permite a expressão periplásmica de proteínas exógenas em fusão com a fosfatase alcalina de *E. coli*. A eristostatina, de 49 resíduos foi selecionada por seu pequeno tamanho e por apresentar seletividade pela integrina $\alpha IIb\beta 3$. Adicionalmente escolhemos o fragmento JD49, uma vez que demonstramos de forma indireta a participação desta sequência na ligação ao colágeno e na atividade hemorrágica da jararagina. Este produto resultaria em um possível marcador seletivo para a integrina $\alpha 2\beta 1$. Embora JD49 não tenha apresentado atividade biológica, acreditamos que o micro ambiente periplásmico facilite a solubilidade e permita a exposição das porções ativas deste fragmento. O periplasma bacteriano permitiria assim a correta formação das pontes dissulfeto adquirindo assim uma conformação adequada e atividade biológica preservada.

1. PRODUÇÃO DE JD49 E DA ERISTOSTATINA:

- **Clonagem:**

Os oligonucleotídeos usados para a amplificação do inserto por PCR foram construídos levando em conta os dois únicos sítios de clonagem do vetor pLIP6-GN: *Sfi* I (5') e *Not* I (3'), e os 15 primeiros nucleotídeos correspondentes às terminações 5' e 3' dos fragmentos de DNA que codificam as seqüências de JD49 e eristostatina. As seqüências teoricamente resultantes dessa clonagem foram avaliadas quanto à fase de leitura, com a ajuda do programa ExPASy - Translate tool. No caso do pLIP6-GN era especialmente importante ver se estava em fase tanto a região 5' (*Sfi* I), quanto a 3' (*Not* I) devido ao fato de que o fragmento será inserido dentro do gene *PhoA* da fosfatase alcalina. Com o programa WebCutter verificamos a ausência dos sítios de restrição para *Sfi* I e *Not* I dentro do DNA que codifica nossos fragmentos. Adicionalmente desenhamos os oligonucleotídeos para o seqüenciamento com a ajuda do programa *Primer Tool*. Estes *primers* foram construídos levando em conta o começo e o final da seqüência que codifica a fosfatase alcalina presente no vetor, assim mesmo se escolheu uma região onde o relação AT:GC esteja na proporção 1 : 1. O *primer* pLIPseq5' anela com a região 1612-1631 do vetor em quanto o *primer* pLIP5seq3' se localiza na posição 1796-1815.

JD49Sfi5:	5'-gagagGGCCCAGCCGGCCggggtcacagtgtgga-3'
JD49Not3:	5'-attagGCGGCCGCcttatggaagacatc-3'
ErSfi5:	5'-gagagGGCCCAGCCGGCCcaggaagaaccgtgt-3'
ErNot3:	5'-attagGCGGCCGCaccgttccatggggtt-3'
pLIPseq5' :	5'-caaagcactattgcactggc-3'
pLIPseq3' :	5'-tcgctaagagaatcacgcag-3'

Fig. 22. Oligonucleotídeos. Os nucleotídeos em maiúsculas correspondem ao lugar de reconhecimento das endonucleases de restrição. Os nucleotídeos em minúsculas à direita do sítio de restrição correspondem as 15 primeiras bases do DNA a ser amplificado da seqüência da disintegrina tanto do lado 5' como do lado 3'. Os nucleotídeos em minúsculas à esquerda do sítio de restrição correspondem ao lugar de apoio para as endonucleases.

Os fragmentos de DNA correspondentes a JD49 e a eristostatina foram amplificados seguindo o programa e protocolo descritos em material e métodos. Como moldes utilizamos o cDNA da jararagina no fago λ ZapII e o clone pG_{Er} contendo o gene sintético da eristostatina, gentilmente cedido pela Dra. Mary Ann McLane. Ao final dos 30 ciclos, a reação foi avaliada em gel de agarose 1% para verificar a amplificação dos fragmentos. Os produtos de PCR foram digeridos com *Not* I e *Sfi* I. Antes da digestão, estas enzimas de restrição foram testadas em reações independentes onde observamos a clivagem do vetor pLIP6-GN.

Os produtos de PCR foram ligados no vetor pLIP6-GN previamente digerido com as mesmas enzimas e subsequentemente foram utilizados para transformar *E. coli* DH5 α competente. As bactérias foram semeadas em placas de L-agar contendo ampicilina e o substrato de fosfatase alcalina BCIP. Desta forma, a ampicilina selecionou as bactérias transformadas e o substrato BCIP revelou as colônias azuis contendo o vetor pLIP6-GN clonado com os insertos de PCR. A clonagem mostrou uma eficiência média com 50% das colônias positivas (em azul). Além disso, todas as colônias azuis triadas por PCR mostraram-se positivas amplificando a banda de 150 pb correspondente aos fragmentos clonados. O clone pD7 de JD49 e pE5 da eristostatina tiveram seus insertos completamente sequenciados confirmando-se a correta inserção de ambas seqüências no gene *PhoA* da fosfatase alcalina. A figura 23 mostra a tradução de toda a seqüência usando o ExPASy Translate tool. Os nucleotídeos GGAG em negrito correspondem à seqüência Shine-Dalgarno onde se liga a seqüência 3' terminal do rRNA 16S de *E. coli*. A seqüência GTG corresponde à metionina iniciadora e junto com o restante de resíduos sublinhados, forma parte do peptídeo sinal de 21 resíduos. A seqüência da fosfatase alcalina madura começa com a arginina (R). Em minúsculas e negrito podemos ver os sítios de restrição que flanqueiam a seqüência clonada, no quadro. Em vermelho indicados por uma seta estão as regiões onde anelam os *primers* de seqüência.

JD49/APv

GGAGaaaataaaaGTGaaa**caaagcactattgcactggc**actcttaccggttactgtttacccctgtgacaaaa
 M K Q S T I A L A L L P L L F T P V T K
 gcccgacaccagaaatgcc**ggcccagccggc**gggtcacagtgtggacatggagactgttgtgagcaatgc
 A R T P E M P **a q p a** G S Q C G H G D C C E Q C
 aaatttagcaaatcaggaacagaatgccgggcatcaatgagtgaatgtgaccgggtgaacactgcactggc
 K F S K S G T E C R A S M S E C D P A E H C T G
 caatcttctgagtgtcctgcagatgtcttcataa**ggcgccgc**cagttctggaaaaccgggctgctcagggc
 Q S S E C P A D V F H K **a a a** V L E N R A A Q G
 gatattactgcacccggcggtgctcgccgtttaacgggtgatcagactgccgct**ctgcgtgattctcttagc**
 D I T A P G G A R R L T G D Q T A A L R D S L S
 gataaacctgcaaaaaatattatcttctgattggcgatgggatgggggactcggaaattactgccgcacgt
 D K P A K N I I L L I G D G M G D S E I T A A R
 aattatgccgaaggtgccccggcgttttttaaggtatagatgccttaccgcttaccgggcaatacactcac
 N Y A E G A G G F F K G I D A L P L T G Q Y T H
 tatgcgctgaataaaaaaacccggcaaacccggactacgtcacccgac
 Y A L N K K T G K P D Y V T D

Er/APv

tttaatgtatttgtacatGGAGaaaataaaaGTGaaa**caaagcactattgcactggc**act
 M K Q S T I A L A L
 tttacccctgtgacaaaagcccgacaccagaaatgcc**ggcccagccggc**caggaagaaccgtgctcacc
 F T P V T K A R T P E M P **a q p a** Q E E P C A T
 gggtcatgctgcagaagatgtaagttcaaacgtgctggtaaagtttgcgtgtggccagaggtgactggaac
 G P C C R R C K F K R A G K V C R V A R G D W N
 gacgactactgtaccggttaagtcttctgtgactgccgagaaacccatggaacggt**ggcgccgc**cagttctggaa
 D D Y C T G K S C D C P R N P W N G **a a a** V L E
 aaccgggctgctcagggcgatattactgcacccggcggtgctcgccgtttaacgggtgatcagactgccgct
 N R A A Q G D I T A P G G A R R L T G D Q T A A
 ctgcgtgattctcttagcgaataaacctgcaaaaaatattatcttctgattggcgatgggatgggggactcg
 L R D S L S D K P A K N I I L L I G D G M G D S
 gaaattactgccgcacgtaattatgccgaaggtgccccggcgttttttaaggtatagatgccttaccgctt
 E I T A A R N Y A E G A G G F F K G I D A L P L
 accgggcaatacactcactatgcgctgaataaaaaaacccggcaaacccggactacgtcacccgactcggctgca
 T G Q Y T H Y A L N K K T G K P D Y V T D S A A

Figura 23. Tradução do DNA sequenciado usando o ExPASy Translate tool. Os resíduos **GGAG** em **negrito** correspondem à sequência SD (Shine-Dalgarno) onde se liga a sequência 3' terminal do rRNA 16S de *E. coli*. A sequência **GTG** corresponde à metionina iniciadora e junto com o restante de resíduos sublinhados, forma parte do peptídeo sinal de 21 resíduos. A arginina 22 (R) dá início à sequência da fosfatase alcalina madura. Em minúsculas e **negrito** podemos ver os sítios de restrição que flanqueiam a sequência clonada, no quadro. Em **vermelho** indicados por uma seta estão as regiões onde anelam os *primers* de sequência.

- **Expressão:**

Inicialmente padronizamos a produção de nossas proteínas recombinantes em 4 cepas distintas de *E. coli*: BL21, BL21(DE3), CC118 e AD494(DE3). Nossos resultados mostraram uma maior quantidade de proteína solúvel na expressão em BL21. Esta bactéria foi utilizada para padronizar a concentração de IPTG, tempo e temperatura de indução ideal resultando nos valores de 100 μ M de IPTG a 37°C durante 4 horas. Em todos os casos as bactérias foram submetidas a choque osmótico e foi medida a concentração protéica dos extratos solúveis. O critério de avaliação foi baseado na atividade fosfatase alcalina de concentrações iguais de proteína periplásmica. Utilizando estas condições de indução, preparamos novas culturas para assim compararmos a atividade fosfatase alcalina, as bandas de migração em SDS-PAGE e os antígenos revelados por Western Blotting dos produtos do pLIP6, do pD7 (JD49/APv) e do pE5 (Er/APv), induzidos ou não induzidos.

O SDS-PAGE feito com as proteínas obtidas nestas condições ideais é apresentado a seguir. Foram aplicadas 10 μ g de proteína por fileira. Na primeira fileira pode-se ver o padrão de massa molecular, a segunda fileira corresponde às proteínas da bactéria vazia, a terceira e quarta fileiras correspondem à migração do pLIP6 sem induzir e induzido, respectivamente. Como esperado, a banda de 45 kDa correspondente à fosfatase alcalina de *E. coli* não está presente, devido ao fato do DNA que codifica esta proteína não estar em fase de leitura. A fileira 5 corresponde ao pD7 não induzido e a 6 ao induzido, é possível verificar o produto de expressão correspondente ao fragmento JD49 em fusão com a fosfatase alcalina de *E. coli* (62 kDa). Nas fileiras 7 e 8 podemos ver os produtos correspondentes ao clone pE5 não induzido e induzido, respectivamente, onde podemos ver neste último a banda de 62 kDa correspondente a Er/APv. A fileira 9 corresponde à fosfatase alcalina, produto do vetor pLIP5 induzido.

Figura 24. Análise de expressão das proteínas de fusão. Os clones pD7 e pE5 foram induzidos com IPTG, os extratos periplásmicos extraídos e avaliados por SDS-PAGE 12% quanto à expressão de JD49/APv (6) e Er/APv (8). Na primeira fileira podemos observar o padrão de massa molecular. Como controles utilizamos o extrato periplásmico correspondente a BL21 vazia (2), o produto de expressão do vetor pLIP6 sem induzir (3) e induzido (4), os clones pD7 (5) e pE5 (7) não induzidos e por último o produto do vetor pLIP5 induzido (9).

Os resultados de SDS-PAGE foram confirmados por Western blot utilizando anticorpos anti-jararagina, eristostatina e fosfatase alcalina de *E. coli* produzidos em coelho. A figura 25 mostra o Western blot utilizando o anticorpo policlonal anti-jararagina onde podemos verificar uma banda mais intensa de 62 kDa correspondente a JD49 em fusão com APv (4). Os controles de vetor vazio (1, 2, 7), clone pE5 (5, 6) e clone pD7 não induzido (3) mostram uma banda do mesmo tamanho, mas de menor intensidade que provavelmente corresponde a algum antígeno de *E. coli* reconhecido pelo soro. Como alternativa, repetimos o teste com soro anti-jararagina previamente adsorvido com antígenos de *E. coli* obtendo os mesmos resultados (dados não mostrados).

Figura 25. Análise de expressão de JD49/APv por Western blot. As proteínas de fusão foram analisadas por Western blot utilizando o anticorpo anti-jararagina. Como controles utilizamos o vetor pLIP6 sem induzir (1) e induzido (2), o clone pD7 não induzido (3), o clone pE5 não induzido (5) e induzido (6) e o vetor pLIP5 induzido (7). Na fileira 4 podemos observar a banda de 62 kDa correspondente a JD49/APv, produto do clone pD7.

A figura 26 corresponde à incubação do produto de expressão (5 µg de proteína por fileira) com soro policlonal anti-eristostatina. O canal 1 corresponde ao extrato periplásmico de *E. coli*, o canal 2 e 3 correspondem ao pLIP6-GN induzido e sem induzir, respectivamente. O canal 4 e 5 corresponde ao clone pD7 induzido e sem induzir, respectivamente. No canal 7 (pE5 induzido) pode ser verificada a banda de 62 kDa correspondente a proteína de fusão Er/APv. No canal 6 correspondente ao pE5 sem induzir se pode ver uma pequena expressão basal da proteína de fusão. Como controle negativo o canal 8 apresenta o produto de expressão do clone pE5.

Figura 26. Análise da expressão de Er/APv por Western blot. As proteínas de fusão foram analisadas por Western blot utilizando o anticorpo anti-eristostatina. Como controles utilizamos o periplasma bacteriano (1) o vetor pLIP6 sem induzir (2) e induzido (3), o clone pD7 não induzido (4) e induzido (5), o clone pE5 não induzido (6) e o vetor pLIP5 induzido (8). Na fileira 7 podemos observar a banda de 62 kDa correspondente à proteína de fusão Er/APv.

Adicionalmente, avaliamos ambos os fragmentos de fusão utilizando soro policlonal anti-fosfatase alcalina de *E. coli*. Os dados (fig. 27) mostram claramente que tanto a banda correspondente a JD49/APv (5), Er/APv (7) como APv (8) foram identificadas com o soro demonstrando a preservação de sua antigenicidade. Os controles de clones não induzidos (4, 6) apresentaram bandas fracas de 62 kDa correspondentes a um vazamento da expressão. Como controles negativos utilizamos periplasma bacteriano (1), pLIP6 não induzido (2) e induzido (3).

Figura 27. Análise da expressão das proteínas de fusão por Western blot. As proteínas de fusão foram analisadas por Western blot utilizando o anticorpo anti-fosfatase alcalina. Como controles negativos utilizamos o periplasma bacteriano (1) o vetor pLIP6-GN sem induzir (2) e induzido (3); e os clones pD7 (4) e pE5 (6) não induzidos. Como controle positivo utilizamos o vetor pLIP5-GN induzido (8). As fileiras 5 e 7 correspondem aos clones pD7 e pE5 induzidos, respectivamente.

• Dosagem protéica das disintegrinas de fusão:

Bactérias *E. coli* BL21 contendo os clones pD7 e pE5 foram cultivadas e, após indução, as proteínas periplásmicas foram extraídas. Na figura 28 podemos ver o produto do clone pD7 (1) apresentando uma banda intensa de 62 kDa correspondente a JD49/APv. Na coluna 2, podemos ver a banda da mesma migração pertencente a Er/APv (clone pE5) e na coluna 3 visualizamos a banda de APv (pLIP5). Uma vez que nossas proteínas de fusão não estavam puras e sim contaminadas com proteínas periplásmicas era impossível quantificá-las por métodos convencionais. Foi então que decidimos quantificar especificamente as bandas correspondentes a nossas disintegrinas em fusão utilizando medida de densitometria da banda no sistema Eagle Eye (Stratagene). Nas colunas 5 a 9 estão presentes as bandas correspondentes a 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 e 1,6 μ g de BSA. Os valores calculados para JD49/APv, Er/APv e APv resultaram em 140, 20 e 800 ng de proteína de fusão por μ L de periplasma.

Fig. 28. Dosagem protéica. Os extratos periplásmicos correspondentes aos clones pD7 (1), pE5 (2) e ao plasmídeo pLIP5-GN (3) foram fracionados por SDS-PAGE 12% junto com bandas de concentração conhecida de albumina indo de 0,05 a 1,6 μ g (fileiras 4-9). Utilizando o sistema Eagle Eye (Stratagene) foi construída uma curva com os valores obtidos de BSA e a concentração das bandas de JD49/APv (1), Er/APv (2) e APv (3) foi estimada através da comparação por densitometria.

ATIVIDADE BIOLÓGICA:

- **Atividade fosfatase alcalina.**

A atividade fosfatase alcalina foi testada em um ensaio de Western blot onde revelamos as proteínas periplásmicas diretamente com o substrato NBT/BCIP. Para tanto, utilizamos 4 µg do extrato periplásmico por pocinho. Na figura 29 mostramos as proteínas recombinantes e seus controles. A fileira 1 corresponde aos extratos periplásmico de BL21 e as fileiras 2 e 3 correspondem ao vetor pLIP6 sem induzir e induzido, onde se pode comprovar a ausência de bandas positivas para a atividade fosfatase alcalina (*phoA* fora de fase de leitura); nas fileiras 4 e 5 correspondentes ao clone pD7 sem induzir e induzido pode-se ver um aumento em intensidade da banda de 62 kDa (JD49/APv) correspondente ao clone induzido; no caso do clone pE5, esta banda (Er/APv) só se visualiza fracamente após indução (7); na fileira 8 podemos ver a banda correspondente à fosfatase alcalina (APv), produto do vetor pLIP5 (*phoA* em fase de leitura). Estes resultados mostram: primeiro, que nossas proteínas híbridas mantêm sua atividade fosfatase alcalina após serem submetidas a fracionamento eletroforético, e segundo, se compararmos com o SDS-PAGE (figura 24), podemos ver que entre todas as proteínas periplásmicas esta atividade é exclusiva de nossas proteínas recombinantes.

Figura 29. Determinação da atividade fosfatase alcalina das proteínas de fusão. As proteínas de fusão foram fracionadas por SDS-PAGE 12%, transferidas a uma membrana de nitrocelulose e posteriormente reveladas com o substrato NBT/BCIP da fosfatase alcalina. Como controles negativos utilizamos o periplasma bacteriano (1) o vetor pLIP6 sem induzir (2) e induzido (3); e os clones pD7 (4) e pE5 (6) não induzidos. Como controle positivo utilizamos o vetor pLIP5 induzido (8). As fileiras 5 e 7 correspondem ao produto de indução dos clones pD7 e pE5, respectivamente. Os números à esquerda correspondem às massas moleculares.

- **Determinação da atividade de inibição da agregação plaquetária.**

A habilidade das proteínas de fusão em inibir a agregação plaquetária induzida por ADP e colágeno foi testada como descrito em material e métodos. Como controles utilizamos extrato periplásmico, fosfatase alcalina livre (APv) e um mutante da mesma sem atividade catalítica (APm). Os resultados da tabela 1 mostram que a APv livre inibiu a agregação plaquetária em 100% impossibilitando assim a determinação da atividade das disintegrinas em fusão com a mesma. O controle APm, não conseguiu inibir esta atividade, o que sugere que a inibição se deva exclusivamente a atividade catalítica da fosfatase alcalina e não a uma interação desta com os receptores de plaqueta. Na figura 30, podemos observar que as bandas de 45 kDa correspondentes a APv e APm são praticamente idênticas quanto a tamanho, intensidade e imunogenicidade como mostra o SDS-PAGE e Western blot revelado com o soro anti-fosfatase alcalina. Porém, a diferença de APv, APm foi incapaz de catalisar o substrato NBT/BCIP e revelar a banda de 45 kDa, demonstrando-se assim a ausência de atividade enzimática.

Proteína	Periplasma	JD49/APv	Er/APv	APv	APm
ADP	0	89%	100%	100%	0
Colágeno	0	78%	100%	98%	0

Tabela1. Inibição da agregação plaquetária. A tabela mostra a porcentagem de inibição da agregação plaquetária por parte das disintegrinas de fusão e os controles. A linha superior corresponde às proteínas testadas; a segunda linha corresponde aos ensaios com ADP como indutor da agregação e a última linha aos ensaios utilizando colágeno como indutor.

Figura 30. Caracterização da fosfatase alcalina mutante (APm). A expressão de APm foi caracterizada por SDS-PAGE e Western blotting utilizando soro anti-fosfatase alcalina e a atividade catalítica foi determinada com o substrato NBT/BCIP. Como controle utilizamos APv.

- **Teste de dot blot direto utilizando JD49/APv e Er/APv:**

Como alternativa ao teste de agregação plaquetária estabelecemos um ensaio de *dot blot* para assim poder analisar a ligação destas proteínas à integrinas da superfície de plaquetas. Foram aplicados diretamente na membrana de nitrocelulose 3 µL de plaquetas ou plasma rico em plaquetas (PRP). As membranas foram bloqueadas e imediatamente incubadas com nossas proteínas recombinantes e seus controles por 1 h a 37°C. Após este período, as membranas foram lavadas e reveladas com o substrato cromógeno da fosfatase alcalina NBT/BCIP. Os resultados (fig. 31) mostram que só Er/APv foi capaz de reconhecer tanto o PRP como as plaquetas. Por outro lado, JD49/APv não conseguiu-se ligar nem ao PRP nem às plaquetas sugerindo que não esteja na conformação adequada. Lembrando a primeira parte do trabalho, JD49 apresenta duas cisteínas que estariam formando pontes com cisteínas não incluídas no fragmento. Estas pontes podem ser fundamentais para a formação do arcabouço da proteína e exposição do *loop* contendo a sequência ECD.

Fig. 31. Ligação das proteínas de fusão à plaqueta por dot blot. Dots de PRP e plaquetas foram incubados por 30 min a 37°C com as proteínas de fusão JD49/APv (3) e Er/APv (4). Como controles utilizamos extrato periplásmico (1) e fosfatase alcalina (2).

2. CONSTRUÇÃO DA PROTEÍNA QUIMÉRICA ECD-Er/APv:

Como alternativa a JD49/APv decidimos construir a proteína quimérica ECD-Er/APv. A diferença de JD49, a sequência SECDPA estaria inserida no arcabouço da eristostatina que é mais estável e têm suas 8 cisteínas formando 4 pontes dissulfeto. Para tanto, introduzimos mutações pontuais no gene da eristostatina conferindo a substituição dos resíduos contidos no *loop*. Em princípio foi utilizado o kit Quickchange site directed mutagenesis da Stratagene, o qual deu um resultado negativo devido ao excessivo número de substituições previstas. Como alternativa o mutante foi construído com uma modificação do método do megaprimer (Picard e col., 1999).

- **Alinhamento**

Com o objetivo de determinar os resíduos a serem mutados, alinhemos as seqüências protéicas da eristostatina (vermelho) e JD49 (azul) (fig. 32) utilizando o programa ClustalW (Thompson e col., 1994). Os símbolos (*), (:) e (.) correspondem a identidade, alta e baixa homologia, respectivamente. A figura também inclui as pontes dissulfeto onde podemos verificar que diferentemente da eristostatina, JD49 apresenta 2 cisteínas livres. Em negrito estão representados os resíduos pertencentes à região do *loop* de ambas as proteínas onde podemos ver que compartilham a arginina, sendo que JD49 tem um resíduo a mais na posição 32, o que indica que no total teríamos que substituir 10 aminoácidos e inserir um. Abaixo está representada a quimera ECD-Er onde podemos observar o *loop* de JD49 mantido na estrutura da eristostatina.

Fig. 32. Alinhamento das seqüências protéicas da eristostatina e JD49. As seqüências foram alinhadas com o programa Clustal W. Os símbolos (*), (:) e (.) correspondem a identidade, alta e baixa homologia, respectivamente. Em negrito estão os resíduos correspondentes à região do *loop*. As cisteínas estão marcadas em vermelho e as pontes dissulfeto diagramadas com uma linha. Na seqüência da quimera está representada o *loop* de JD49 na estrutura da eristostatina com as 4 pontes dissulfeto.

Na figura 33 mostramos os aminoácidos do *loop* da eristostatina (linha 1) com seus nucleotídeos correspondentes (linha 2). Na linha 3 mostramos os nucleotídeos da eristostatina com 11 substituições (vermelho) e 3 inserções (azul), número mínimo de alterações que dariam origem aos aminoácidos da região do *loop* de JD49 (linha 4). Este número mínimo de mutações foi selecionado sem deixar de levar em consideração a frequência de codons para cada aminoácido presente em *E. coli* (Nakamura e col., 1998).

```

(1)  C  R  V  A  R  G  D  W  N      D  D  Y  C
Er:  (2)  t g t c g t g t g g c c a g a g g t g a c t g g a a c --- g a c g a c t a c t g t
JD49: (3)  t g t c g t g c a t c c a t g a g t g a a t g t g a c c c g g c c g a a c a c t g t
      (4)  C  R  A  S  M  S  E  C  D  P  A  E  H  C

```

Fig. 33. Nucleotídeos a serem mutados. Nas linhas 1 e 2 mostramos as seqüências protéicas e de DNA da região do *loop* da eristostatina, respectivamente. Na linha 3 mostramos o mínimo de substituições (vermelho) e inserções (azul) necessárias para originar o *loop* de JD49 (linha 4).

- **Desenho do megaprimer:**

Baseando-nos no alinhamento dos resíduos dos *loops* da eristostatina e JD49, desenhamos o megaprimer antisense, de 99 nucleotídeos, que incluía as 11 substituições (vermelho) e 3 inserções (azul) no centro, flanqueadas por 10 nucleotídeos no extremo 3' e seguidos no lado 5' dos resíduos correspondentes ao C-terminal da eristostatina, incluindo-se o sítio de restrição para *Not* I (negrito) e as bases de apoio para esta mesma (sublinhado). Este oligonucleotídeo foi purificado por PAGE para evitar interferências durante a amplificação por parte de fragmentos menores.

>C-ErECD3' :

```

t t a g g c g g c c g c a c c g t t c c a t g g g t t t c t c g g g c a g t c a c a a g a c t t a c c g g t a c a g t g t t
c g g c c g g g t c a c a t t c a c t c a t g g a c g c a c g a c a a a c

```

Fig. 34. Megaprimer C-ErECD3' onde podemos ver os nucleotídeos a serem substituídos em vermelho e os nucleotídeos a serem inseridos em azul. Os nucleotídeos em preto são complementares ao *template* sendo que os resíduos em negrito correspondem ao sítio de restrição e os sublinhados as bases de apoio para *Not* I.

- **Reação de PCR:**

Foi feita uma primeira reação de PCR utilizando os *primers* Eris5Sfi e C-ErECD3'. Como controle positivo fizemos uma reação com os *primers* Eris5Sfi e Eris3Not e como controle negativo fizemos uma reação sem *primers*. Em todos os casos utilizamos como *template* o clone pE5 (gene da eristostatina clonado no vetor pLIP6). A banda resultante desta reação de 150 pb apareceu muito fraca (fig. 35, fileira 5). Para resolver este problema decidimos usar maior tempo de anelamento para favorecer a aderência do megaprimer com o *template*. Foi assim que dobramos o tempo de anelamento para 2 minutos e repetimos a reação de PCR utilizando os mesmos controles. Na figura 35, podemos ver o padrão de massa molecular (1), seguido das bandas de 150 pb dos produtos de PCR correspondentes à ECD-Er (2) e a eristostatina (3). O controle negativo (4) corresponde a uma reação sem *primers*. Como podemos observar, a banda correspondente à reação de PCR submetida a 2 min. de anelamento (2), embora apareça mais intensa do que a submetida a um minuto (5), não foi o suficientemente intensa para ser usada na clonagem.

Fig. 35. Produtos de PCR correspondentes à quimera. Podemos ver em 1 o marcador de massa molecular, seguido do produto de 150 pb correspondente à quimera (2) e a eristostatina (3). A fileira 4 corresponde ao controle negativo e a 5 à banda da quimera da reação de PCR anterior.

Devido à baixa quantidade do gene mutante produzido por PCR, decidimos usar esta banda como *template* e amplificá-la por PCR utilizando os *primers* Eris5Sfi e Eris3Not. Para isso, isolamos esta banda do gel e a purificamos utilizando o Mermaid kit. Nesta purificação perdemos cerca de 60% do material, deixando a banda quase imperceptível no gel (dados não mostrados). Posteriormente, realizamos 5 reações de PCR, utilizando o produto purificado como *template*, e obtivemos uma forte banda de 150 pb correspondente a ECD-Er (dados não mostrados).

O produto de PCR correspondente ao DNA de ECD-Er foi então clonado no vetor pLIP6-GN seguindo os procedimentos descritos para JD49 e Er. Para facilitar a triagem das colônias, bactérias *E. coli* DH5 α transformadas foram semeadas em TSB-Agar contendo 40 mg/L de

BCIP, 100 μM de IPTG, e 2,5 μg de ampicilina. Nas placas semeadas pudemos constatar que 28% das colônias eram azuis, correspondendo às bactérias transformadas com os produtos de ligação (*PhoA* em fase de leitura). As colônias brancas correspondiam às bactérias transformadas com o vetor pLIP6-GN (*PhoA* fora de fase de leitura).

Fig. 36. Seleção de colônias positivas em placas de cultura. Placas de TSB-agar contendo 40 mg/L de BCIP, 100 μM de IPTG, e 2,5 μg de ampicilina foram utilizadas para semear a bactéria transformada e os controles. O substrato BCIP foi catalisado pelas colônias que restituíram o gene *PhoA* da fosfatase alcalina, gerando assim uma coloração azul.

- **Triagem das colônias por PCR:**

Com a finalidade de verificar a presença do mutante nestas colônias, construímos o *primer* 5'ECD, correspondente aos resíduos SECDPA do *loop* de JD49.

>5' ECD

```
agtgaatgtgacccggct
S E C D P A
```

Fig. 37. *Primer* 5'ECD. A figura mostra os nucleotídeos do *primer* 5'ECD com a correspondente tradução nos aminoácidos SECDPA, pertencentes à região central do *loop* de JD49.

Sete colônias azuis foram triadas por PCR utilizando o *primer* 5'ECD (sense) que anelaria com a região central do *loop* de JD49 e o *primer* pLIPseq3' que anelaria no pLIP6 a 108 nucleotídeos downstream da região de clonagem. Como controle negativo usamos de *template* o clone pE5 (eristostatina clonada no pLIP6) e como controle positivo o clone pD7 (JD49 clonado no pLIP6). Na figura 38, primeira fileira, podemos observar o padrão de massa molecular; as fileiras 2 a 8 correspondem aos amplificados provenientes das 7 colônias; a fileira 9 corresponde ao controle negativo e a 10 ao positivo. A fileira 11 corresponde a uma reação sem *template*. O resultado mostra que 6 das 7 colônias deram a banda esperada de 180 pb, idêntica à do controle positivo (coluna 10) demonstrando a presença do cDNA

correspondente à disintegrina quimérica. O clone 4, denominado de mut4, foi completamente sequenciado verificando-se a correta construção da quimera e a inserção desta no gene *PhoA* da fosfatase alcalina. Este clone foi selecionado para transformar *E. coli* BL21.

Fig. 38. Triagem das colônias por PCR. No gel podemos observar a migração correspondente ao padrão de massa molecular (1) seguido dos produtos de amplificação de 7 colônias (2-8). Como controle negativo utilizamos o clone pE5 (9) de *template* e como positivo, o clone pD7 (10). Uma reação sem *template* foi feita como branco (11).

- **Expressão de ECD-Er/APv:**

A expressão foi realizada nas mesmas condições utilizadas para Er/APv. Após extração periplásmica a banda foi identificada por SDS-PAGE e Western blotting utilizando o soro policlonal anti-fosfatase alcalina de *E. coli*. Na figura 39, primeira coluna, podemos ver a banda de 62 kDa correspondente à quimera ECD-Er/APv. Nas fileiras 2-7 apresentamos valores crescentes de soroalbumina bovina utilizada para construir a curva e determinar a concentração da banda de ECD-Er/APv. A concentração obtida foi de 20 ng/μL, valor similar ao obtido para Er/APv.

Fig. 39. Expressão de ECD-Er/APv e Dosagem protéica. O extrato periplásmico correspondente ao clone M4 (1) foi fracionado por SDS-PAGE 12% junto com bandas de concentração conhecida de albumina indo de 0,05 a 1,6 μg (fileiras 2-7). Utilizando o sistema Eagle Eye (Stratagene) foi construída uma curva com os valores obtidos de BSA e a concentração das bandas de ECD-Er/APv (1) foi estimada através da comparação por densitometria.

- **Atividade biológica:**

O extrato periplásmico contendo a proteína de fusão ECD-Er/APv foi analisado por dot blot quanto à sua capacidade de ligar plaquetas e células $\alpha 2$ -K562 expressando a integrina $\alpha 2\beta 1$. As membranas foram incubadas por 1 h a 37°C com 3 μ g/mL de ECD-Er/APv (1). Como controles, foram utilizados 21 μ g/mL de JD49/APv (9), 3 μ g/mL de Er/APv (8) e 120 μ g/mL de APv (10). Na figura 40, podemos ver que só Er/APv (2) manteve sua alta afinidade pelas plaquetas emitindo um sinal positivo. Este resultado mostra por um lado que o *loop* da eristostatina é fundamental para a ligação as plaquetas, já que sua substituição aboliu totalmente esta afinidade e por outro, que o *loop* de JD49 não tem uma afinidade evidente pelas plaquetas. Estes resultados foram confirmados com concentrações de ECD-Er/APv de até 10 μ g/mL, e incubações a temperaturas de 6 e 37°C durante tempos de até 16 h. Adicionalmente realizamos testes com os outros 5 clones positivos obtidos (fig. 38). Em todos estes testes, os resultados de dot blot com as quimeras se mostraram negativos (dados não mostrados).

Fig. 40. Análise da atividade de ECD-Er/APv por dot blot. Dots de PRP, plaquetas e células $\alpha 2$ -K562 foram incubados com o extrato periplásmico contendo a quimera ECD-Er/APv (1). Como controle negativo das células utilizamos a linhagem K562 e do PRP e das plaquetas, plasma pobre em plaquetas (PPP). Adicionalmente incubamos os dots com Er/APv (2), JD49/APv (3), e APv (4).

3. PADRONIZAÇÃO DE Er/APv COMO MARCADOR MOLECULAR

3.1. Seletividade de Er/APv para α IIb β 3:

A seletividade da ligação de Er/APv pela integrina α IIb β 3 foi avaliada por ensaios de dot blot, utilizando plaquetas e células, e por testes de competição com a eristostatina livre.

- **Teste de seletividade por dot blot:**

A seletividade de Er/APv foi testada utilizando plaquetas (1), células K1 (2), A5 (3) e VNRC3 (4). A concentração de células foi ajustada para 4×10^5 U/mL e 3 μ L foram adicionadas por membrana. Os dots foram incubados com 100 ng/mL de Er/APv (B) durante 1 h a 37°C e revelados durante 2 min. com o substrato NBT/BCIP. Como controle negativo, realizamos uma incubação só com solução bloqueadora (A) e outra com APv (C). Como podemos ver na figura 41, o dot correspondente às células A5 (3B) expressando a integrina α IIb β 3 foi notoriamente reconhecido com respeito às células K1 (2B) e VNRC3 (4B). Assim mesmo, se o compararmos com o controle negativo, podemos evidenciar que o sinal é bem mais intenso que o basal correspondente as células A5 (3A). Como controle positivo podemos observar a forte reatividade de Er/APv com as plaquetas (1B).

Fig. 41. Teste de seletividade de Er/APv. Dots de plaqueta (1), células K1 (2), A5 (3) e VNRC3 (4) foram incubados com solução bloqueadora (A), Er/APv (B) e APv (C). Logo após os dots foram revelados com o substrato NBT/BCIP.

- **Teste de competição com eristostatina livre:**

Para verificar se Er/APv estava se ligando ao mesmo receptor que a eristostatina nativa, realizamos um teste de competição por dot blot (fig. 42). Neste caso, utilizamos eristostatina recombinante livre (r-Er), previamente caracterizada com respeito a sua seletividade pela integrina $\alpha\text{IIb}\beta_3$, por teste de inibição da agregação plaquetária induzida por ADP, mostrando um IC50 de 20 nM.

As plaquetas foram incubadas com 0,72 $\mu\text{g/mL}$ de r-Er por 1h a 37°C (3). Após lavagem, adicionamos 0,2 $\mu\text{g/mL}$ de Er/APv e continuamos a incubação por mais 1 h a 37°C. Após a incubação, as membranas foram lavadas e reveladas com o substrato NBT/BCIP da fosfatase alcalina. Como controle negativo e positivo, incubamos as plaquetas só com solução bloqueadora (1) e só com Er/APv (2), respectivamente. O resultado mostra uma inibição quase total da ligação de Er/APv às plaquetas por parte de r-Er (3) se o compararmos com os controles, podendo afirmar que Er/APv estaria se ligando ao mesmo receptor que r-Er.

Fig. 42. Teste de competição com eristostatina recombinante isolada. As plaquetas foram reveladas diretamente (1) ou após incubação com Er/APv (2), como controle negativo e positivo, respectivamente. O dot 3 corresponde à ligação das plaquetas a Er/APv após estas serem incubadas com eristostatina isolada.

3.2. Conservação da atividade fosfatase alcalina de Er/APv.

A atividade fosfatase alcalina específica de Er/APv e APv foi comparada a partir de uma curva de atividade construída a partir de diluições seriadas dos recombinantes. Nossos resultados (fig. 43.) mostraram valores similares para ambas as proteínas, sugerindo que toda Er/APv exportada ao periplasma estava enzimaticamente ativa. Desta forma, a inclusão da disintegrina no N-terminal parece não ter alterado a atividade enzimática da porção APv.

Fig. 43. Comparação da atividade fosfatase alcalina de Er/APv e APv. Diluições seriadas de Er/APv e APv foram aplicadas em placas de ELISA e subsequentemente reveladas durante 2 min utilizando o substrato pNPP de fosfatase alcalina. As placas foram lidas a 405 nm e uma curva foi traçada utilizando-se o programa Sigma Plot, relacionando-se a absorbância com a concentração de proteína.

3.3. Padronização do teste de dot blot para plaquetas:

Uma vez determinado que Er/APv se liga às plaquetas e tem atividade AP, passamos a padronizar o teste de dot blot para esta proteína de fusão. Realizamos a padronização de concentração de proteína e da concentração de plaquetas por dot, tempo e temperatura de incubação.

- **Padronização da concentração de Er/APv:**

Realizamos incubações de 1 h a 37°C com concentrações crescentes de Er/APv de 0,5 ng/mL até 160 ng/mL. Após 2 minutos de revelação podemos constatar, na figura 44, que a intensidade do dot aumenta à medida que aumentamos a concentração de Er/APv. No ensaio podemos observar que com apenas 0,5 ng/mL de Er/APv (2) é possível distinguir marcação em relação ao controle negativo (1), indicando o alto poder de sensibilidade desta proteína de fusão na detecção de integrinas de plaqueta.

Fig. 44. Padronização do teste de dot blot com respeito à concentração de Er/APv. Dots de plaqueta foram incubados durante 1 h a 37°C com concentrações crescentes de Er/APv e subsequentemente revelados durante 2 min com o substrato NBT/BCIP. Os números acima de cada dot indicam a concentração de proteína em ng/mL utilizada na incubação.

- **Padronização da temperatura de incubação:**

Com respeito à temperatura de incubação, realizamos os testes com 5 ng/mL de Er/APv por 1 h. a temperatura ambiente (20°C), 6°C e 37°C. A temperatura correspondente a 37°C foi a mais efetiva para a interação disintegrina-plaqueta.

Fig. 45. Padronização do teste de dot blot com respeito à temperatura de incubação. Dots de plaqueta foram incubados durante 1 h com 5 ng/mL de Er/APv a 6, 20 e 37°C. Logo após as membranas foram lavadas e reveladas durante 2 min com o substrato NBT/BCIP. Os números acima de cada dot indicam a temperatura utilizada na incubação.

- **Padronização do tempo de incubação:**

Para a padronização do tempo, utilizamos 50 ng/mL de Er/APv a 37°C durante tempos de 120, 60, 30, 20, 10 e 5 minutos. A figura 46 mostra que a intensidade do dot é diretamente proporcional ao tempo de incubação e que a reatividade já é evidente em 5 min de incubação.

Fig. 46. Padronização do teste de dot blot com respeito ao tempo de incubação. Dots de plaqueta foram incubados a 37°C com 50 ng/mL de Er/APv durante tempos decrescentes indicados acima em minutos. Logo após os dots foram revelados durante 2 min com o substrato NBT/BCIP.

- **Padronização da concentração de plaquetas:**

Esta padronização foi realizada para determinar a concentração mínima de plaquetas que permitiria a detecção da interação das mesmas com Er/APv. Para isso, incubamos diluições seriadas de plaquetas (7×10^8 até 11×10^6 plaquetas por mL) com 50 ng/mL de Er/APv durante 1 h a 37°C. As intensidades dos dots diminuem à medida que diluímos as plaquetas. Como pode ser observado na figura 47, podemos visualizar a marcação a partir de 2×10^7 plq/mL (dot 6), sendo que $1,75 \times 10^8$ plq/mL (dot 3), seria a concentração ótima para o teste. Para os testes futuros, decidimos utilizar a concentração de 3×10^8 plq/mL, por ser a concentração mais próxima da fisiológica.

Fig. 47. Padronização da concentração de plaquetas. Dots de plaquetas foram adicionadas em membranas de nitrocelulose em concentrações decrescentes de plaquetas indo de 7×10^8 até 11×10^6 . Estas foram incubadas por 1 hora a 37°C com 50 ng/mL de Er/APv e reveladas por 2 min com o substrato NBT/BCIP.

DISCUSSÃO:

A clonagem e expressão de cDNAs exógenos em vetores de *E. coli* é uma estratégia amplamente difundida para a super-produção de proteínas heterólogas (Ducancel e col., 1989) ou fragmentos destas (Moura-da-Silva e col., 1999). Uma das dificuldades mais freqüentes no uso destes sistemas é que a conformação da maioria das proteínas de eucariontes depende de pontes dissulfeto que não podem ser formadas no ambiente redutor do citoplasma bacteriano (Hwang e col., 1992). Tal é o caso das disintegrinas que contêm entre 13 e 20% resíduos de cisteínas. Para superar este empecilho, muitos vetores permitem a expressão de proteínas exógenas em fusão com proteínas que aumentam sua solubilidade no citoplasma, tal como é o caso da glutathione S-transferase (GST), produzida nos vetores pGEX (Smith and Johnson, 1988). Assim mesmo, proteínas de fusão como a tioredoxina impedem a formação de pontes dissulfeto no citoplasma, facilitando a solubilidade das proteínas recombinantes (Stewart e col., 1998). Outros sistemas abordam o problema de solubilidade sob uma perspectiva diferente, direcionando a expressão das proteínas exógenas ao periplasma. O periplasma, por sua vez não é um ambiente redutor e permite a formação de pontes dissulfeto (Uhlen e Moks, 1990). Nestes vetores as proteínas exógenas são geralmente clonadas após uma sequência sinal que possibilita o direcionamento destas ao periplasma (Gillet e col., 1992). Neste trabalho, utilizamos estas duas abordagens no sentido de produzirmos fragmentos ricos em cisteínas, correspondentes a diferentes extensões dos domínios C-terminais da jararagina, a fim de correlacionarmos motivos estruturais da toxina com as funções da mesma.

A jararagina inibe a agregação plaquetária induzida por colágeno com um IC_{50} de 40 nM (Kamiguti e col., 1996). Além disso, inibe seletivamente a ligação de células $\alpha 2$ -K562, expressando a integrina $\alpha 2\beta 1$, ao colágeno (Moura da Silva e col., 2001), confirmando assim a inibição da agregação plaquetária através do bloqueio desta integrina. Da mesma forma, a jararagina-C, produto de proteólise correspondente aos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas, conserva atividade inibitória da agregação plaquetária (Usami e col., 1994). Além do mais, foi demonstrado que o produto análogo de *Bothrops alternatus*, alternagina-C, inibe a adesão celular mediada pela integrina $\alpha 2\beta 1$ (Souza e col., 2000). Estes dados e outros (Wang e col., 2002; Ito e col., 2001) sugerem que os motivos

responsáveis pela inibição da agregação plaquetária se acham concentrados nos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas. Bigler e colaboradores (2000), têm demonstrado que o domínio ECD-disintegrina da ADAM2, fertilina β , presente na membrana do espermatozóide é responsável pela ligação à integrina $\alpha 6 \beta 1$ do óvulo. Foi demonstrado que este domínio recombinante liga no óvulo e, além disso, inibe a ligação e fusão espermatozóide-óvulo. Por outro lado, Evans e colaboradores (1998), mostraram que o domínio rico-em-cisteínas recombinante desta mesma proteína também se liga ao óvulo. Além do mais, o domínio rico-em-cisteínas da atrolisina A inibe a agregação plaquetária dependente de colágeno com um IC_{50} de 456 nM (Jia e col., 2000).

Trabalhos mais específicos mostram que o motivo de adesão se acha localizado no *loop* correspondente ao domínio ECD-disintegrina. O peptídeo sintético SECDPA, correspondente à região do *loop* do domínio disintegrina da jararagina conseguiu inibir a agregação plaquetária dependente de colágeno (Kamiguti e col., 1997). Zhou e colaboradores (1996), também conseguiram inibir esta atividade com um peptídeo cíclico contendo a sequência SECDPA da Catrocolastatina-C. Do mesmo modo foi demonstrado que o peptídeo AQDECDVT correspondente à região do *loop* do domínio ECD-disintegrina da ADAM2 é responsável pela ligação ao óvulo (Zhu e colaboradores, 2000). Entretanto, outros trabalhos indicam que outras regiões da molécula podem estar envolvidas nessa atividade. Recentemente, Kamiguti e colaboradores (2003), identificaram uma região no domínio rico-em-cisteínas da jararagina com atividade inibitória da agregação plaquetária dependente de colágeno. Ainda mais, Ivaska e colaboradores (1999), têm mostrado que o peptídeo TRKKHDNAQ correspondente aos resíduos 241-249 do domínio catalítico da jararagina liga no domínio I da integrina $\alpha 2$.

Com a finalidade de caracterizar a região da jararagina responsável por esta atividade produzimos 3 fragmentos correspondentes ao domínio ECD-disintegrina, 4 fragmentos correspondentes ao domínio rico-em-cisteínas e um oitavo fragmento, correspondente à jararagina-C, foi selecionado para expressar como controle positivo. A inibição da agregação plaquetária por parte da jararagina-C recombinante expressa no vetor pET-32 já foi demonstrada por Moura-da-Silva e colaboradores (1999). O teste de inibição da agregação plaquetária mostrou que nenhum dos fragmentos foi capaz de inibir esta

atividade enquanto a jararagina inibiu completamente a agregação plaquetária. Não conseguimos observar a ligação dos fragmentos nem ao colágeno nem às plaquetas. A ausência de atividade pode ser decorrente de uma baixa afinidade e por isto os fragmentos são deslocados quando adicionado o colágeno ou durante as lavagens nos ensaios de *dot blot* e ELISA. Outra possibilidade é que a região que compreende os fragmentos não seja suficientemente extensa para a interação com os receptores. Como explicado anteriormente, a jararagina é uma molécula que age integralmente nas suas funções. Podemos ver que os domínios ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas de metaloproteinases de veneno inibem a agregação plaquetária com muita menos potência que a molécula inteira (Usami e col., 1994, De Luca e col., 1995).

Os fragmentos foram utilizados no teste em fusão com GST e não clivados, primeiro, porque sob nossa experiência, a porção GST tem se mostrado inerte, mantendo a atividade natural da disintegrina. A insularina, disintegrina do veneno de *Bothrops insularis*, apresentou-se biologicamente ativa, após ser expressa em fusão com GST, tanto na inibição da agregação plaquetária dependente de ADP, como na sua ligação a células expressando a integrina $\alpha v \beta 3$ (Della-Casa, tese de doutorado em andamento). Assim mesmo a rodostomina, disintegrina do veneno de *Calloselasma rhodostoma* foi expressa em fusão com GST, conservando sua atividade disintegrina (Chang e col., 1997). Segundo, nos testes de ligação por *dot blot* ou ELISA precisávamos de um marcador para verificar a capacidade de interação dos fragmentos com as plaquetas ou o colágeno. Neste caso, utilizamos a porção GST como marcadora, uma vez que o anticorpo policlonal anti-GST reconhece similarmente todos os fragmentos. O anticorpo policlonal anti-jararagina reagiu distintamente com os fragmentos como podemos ver na figura 14. O uso deste anticorpo nos testes de ligação impediria a comparação de um fragmento com outro tornando difícil interpretar os resultados, além da possibilidade de interagir com epítopos envolvidos na atividade biológica, o que resultaria em competição no momento da detecção.

Mesmo considerando os pontos acima, nenhum dos fragmentos obtidos mostrou interatividade com $\alpha 2 \beta 1$ ou colágeno, sendo ineficientes em inibir a agregação plaquetária via colágeno. Com base nesses resultados, a região funcional da região ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas da jararagina foi caracterizada de forma indireta através do anticorpo monoclonal MAJar3. Este anticorpo neutraliza as principais funções da

jararagina: inibe a atividade hemorrágica da jararagina, sua ligação ao colágeno e a inibição da agregação plaquetária induzida por colágeno (Tanjoni e col., 2003). A reação do fragmento JD49 com o MAJar3 é muito interessante, uma vez que esta pequena região parece participar de diversas funções da jararagina. Harrison e colaboradores (2000), têm demonstrado que o anticorpo policlonal anti-jararagina-C consegue proteger camundongos da atividade hemorrágica da jararagina. A participação da região correspondente a JD49 nesta atividade reforça estes dados e localiza o epítipo de interação na porção C-terminal do domínio ECD-disintegrina da jararagina. Fica descartada uma alteração conformacional do domínio catalítico após ligação do MAJar3, uma vez que este anticorpo não conseguiu inibir a atividade proteolítica da jararagina em um substrato sintético fluorescente. Pelo fato do substrato corresponder a um peptídeo pequeno de 11 resíduos, este não teve nenhum impedimento para entrar na fenda catalítica (Tanjoni e col., 2003). A inibição da atividade hemorrágica provavelmente se deva a um bloqueio por parte do MAJar3 na ligação da jararagina com componentes da matriz extracelular como o colágeno. Nossos resultados sugerem que a porção correspondente a JD49 deva estar agindo como um exosítio que serviria para direcionar a jararagina ao substrato a ser catalisado. Os exosítios são regiões externas à região catalítica responsáveis pela ligação seletiva da enzima ao substrato aumentando a afinidade e muitas vezes preparando o substrato a ser clivado. Segundo dados de aditividade, o epítipo reconhecido pelo MAJar3 estaria muito próximo do domínio catalítico (Tanjoni e col., 2003) suportando a idéia de interação de ambas as regiões. A atividade collagenolítica de algumas MMPs têm sido relacionada com a presença de exosítios também. Na collagenase I, o domínio hemopexina C (exosítio) é fundamental para a atividade collagenolítica desta enzima. Após deletar este domínio se pode ver a extinção da collagenólise, no entanto, esta mantém sua atividade proteolítica em substrato sintético (Murphy e col., 1992). Assim mesmo, o domínio rico-em-cisteínas da ADAM 13 coopera intra-molecularmente com o domínio catalítico modulando a atividade da protease *in vivo* (Smith e col., 2002).

Em um trabalho recente temos demonstrado que o anticorpo monoclonal, MAJar1, também reage só com o fragmento JD49 (Tanjoni e col., 2003). Este anticorpo inibe em 100% a atividade proteolítica e neutraliza parcialmente a hemorragia induzida pela jararagina. É interessante notar que o MAJar1 reconhece um epítipo conformacional igual

que o MAJar3 e testes de aditividade mostram que ambos os epítomos estão muito próximos. Estes dados sustentam a presença de uma região funcional na porção C-terminal do domínio ECD-disintegrina da jararagina e que esta região é dependente de conformação. Por outro lado não podemos sugerir o mesmo da porção N-terminal, já que os MAJares 2, 6 e 7 que reagem com esta região não têm atividade neutralizante (Tanjoni e col., 2003).

O MAJar3 reconhece um epítopo conformacional presente no fragmento JD49, já que em condições redutoras este anticorpo monoclonal não apresentou reatividade (Tanjoni e col., 2003). Esta região é altamente conformacional e aparentemente não apresenta epítomos sequenciais uma vez que a reatividade foi a mesma quando usamos o soro policlonal anti-jararagina. Cabe lembrar que as cisteínas 263 e a 279, esta última correspondente ao ECD, formam pontes com cisteínas não incluídas no fragmento, razão pela qual a conformação do fragmento estaria comprometida. Podemos ver que a reatividade com os fragmentos JD89 e JD98, onde a cisteína 263 está pareada, é bem mais intensa que com JD49, pelo que poderíamos sugerir que a formação dessa ponte é importante para a manutenção do epítopo reconhecido pelo MAJar3. Já no caso do JD98, que a diferença de JD89 permitiria a formação da ponte entre a cisteína do ECD (279) e a 299, não vimos um aumento na intensidade do dot com respeito a JD89, pelo que podemos sugerir que a formação da ponte entre a cisteína 279 e a 299 não seria importante para a manutenção deste epítopo ou não estaria acontecendo no fragmento JD98. Resultados de *dot blot* com JD49/APv mostram que esta proteína de fusão não reage com o MAJar3 (dados não mostrados). A diferença do GST/JD49, no JD49/APv a extremidade C-terminal de JD49 não está livre e sim ligada com a fosfatase alcalina. Esta enzima deve estar mascarando o epítopo reconhecido pelo MAJar3 que provavelmente se acha na região C-terminal. Além do mais, trabalhos com RGD-disintegrinas mostram que a extremidade C-terminal é altamente funcional (Wierzbicka-Patynowski e col., 1999) o que sugere que anticorpos neutralizantes como o MAJar3 possam estar reconhecendo epítomos nesta região. Ainda mais, nossos resultados mostram que o epítopo estaria inteiramente localizado no fragmento, já que JD89, que é idêntico a JD49 na extremidade C-terminal, reage muito bem com o MAJar3. Destes dados podemos sugerir que o epítopo reconhecido pelo MAJar3 está totalmente incluído no JD49 e que se acha localizado no extremo C-terminal do fragmento.

Ainda não foi determinada qual seria a cisteína livre, nem a importância desta permanecer reduzida ou oxidada. Se nos baseamos em comparações com RGD-disintegrinas, podemos sugerir que a cisteína do motivo ECD esteja livre. O alinhamento do domínio ECD-disintegrina da jararagina com a bitistatina (fig. 4) mostra todas as cisteínas conservadas exceto a cisteína do ECD. Assim mesmo, o modelo de JD49, obtido a partir da estrutura da echistatina (fig. 18), mostra que a sequência ECD está inserida em um *loop* e com a cisteína livre. Por outro lado, os resultados de Calvete e colaboradores (2000-B) e de Fujimura e colaboradores (2000), sugerem que a cisteína do ECD está envolvida na formação de uma ponte dissulfeto. No entanto, estes dados não são conclusivos, uma vez que foram verificados apenas para a catrocolastatina-C e p29K, fragmentos correspondentes apenas aos domínios ECD-disintegrina/rico-em-cisteínas. No mesmo trabalho, Fujimura e colaboradores (2000), observaram a presença de um grupo SH livre na brevilisina H6, precursor de p29K apresentando os domínios: catalítico, ECD-disintegrina e rico-em-cisteínas. Sendo assim, fica em aberto a possibilidade da cisteína do ECD estar tanto reduzida como oxidada. Se a cisteína do ECD estiver envolvida na formação de uma ponte S-S, o *loop* não poderia formar-se. No modelo da figura 18 podemos observar que a formação do *loop* dependeria da presença da cisteína do ECD reduzida. A formação da ponte implicaria na desestruturação do *loop* o que sugeriria um papel mais estrutural que funcional desta cisteína. A funcionalidade desta cisteína, conservada também nas ADAMs, foi estudada por mutagênese sítio-dirigida. No caso da fertilina β , a cisteína do ECD não parece ter importância funcional uma vez que sua substituição por uma alanina reduziu a ligação a seu substrato só em 25% (Zhu e col., 2000). Mesmo que a jararagina não apresente um *loop* nesta região e a cisteína do ECD esteja envolvida em uma ponte dissulfeto, não podemos descartar funcionalidade à sequência SECDPA como mostram os resultados de Kamiguti e colaboradores (1997) e Zhou e colaboradores (1996).

Nesta primeira parte do trabalho conseguimos correlacionar uma sequência mínima da jararagina, correspondente ao fragmento JD49, com grande parte da sua atividade biológica. Um estudo mais apurado dos motivos envolvidos nessas atividades poderá ocorrer através da caracterização do epítipo reconhecido pelo MAJar3. Isto será muito importante para entender a estrutura e função da jararagina e outras metaloproteinases, incluindo as ADAMs e MMPs. No entanto, não podemos deixar de olhar a jararagina como

um todo e lembrar que existem potenciais regiões já descritas no domínio catalítico (Ivaska e col., 1999) e rico-em-cisteínas (Kamiguti e col., 2003) que interfeririam com a ligação integrina $\alpha 2\beta 1$ -colágeno.

A segunda parte do trabalho corresponde ao desenvolvimento de marcadores moleculares baseados em disintegrinas em fusão com a fosfatase alcalina de *E. coli*. Esta enzima foi selecionada como marcadora uma vez que é altamente estável, já foi amplamente usada como ferramenta molecular (Lindbladh e col., 1993; Gillet e col., 1993; Chanussot e col., 1996) e os substratos de detecção estão comercialmente disponíveis. A fosfatase alcalina é um homodímero de 96 kDa, possuindo 2 pontes intramoleculares em cada monômero (Kim e Wyckoff, 1990). Estas pontes precisam ser formadas para que a enzima possa ficar conformacionalmente ativa (DuBose e Hartl, 1991) o que não ocorre quando a proteína é retida no citoplasma (Derman e Beckwith, 1991). Para conseguir tal conformação e atividade é necessário que a proteína seja secretada ao periplasma. Como a maioria das proteínas de secreção, o precursor contém uma sequência sinal que é removida por uma peptidase de sinal associada à membrana interna, permitindo a saída da proteína madura ao espaço periplásmico (Inouye e Beckwith, 1977).

A utilização de disintegrinas como marcadores moleculares é uma nova abordagem para a detecção de integrinas. As disintegrinas ligam-se com altas afinidades nas integrinas (K_d , 10^{-7} ~ 10^{-8} M), são de baixo peso molecular (~5 kDa), apresentam uma estrutura filogeneticamente estável com um *loop* exposto de 14-17 Å (Adler e col., 1991; Saudek e col., 1991; Senn e Klaus, 1993), e muitas delas ligam-se às integrinas seletivamente. Muitos trabalhos têm mostrado a utilização de estruturas diferentes para a apresentação do *loop* com o motivo funcional RGD, gerando quimeras com atividade disintegrina (Lu e col., 1996; Vella e col., 2003). No entanto, nossos resultados mostram que a estrutura das disintegrinas recombinantes testadas é conformacionalmente estável o suficiente para apresentar atividade biológica preservada.

A eristostatina foi selecionada como base para a construção de marcadores moleculares devido a seu tamanho (49 resíduos), sua afinidade e seletividade pela integrina $\alpha IIb\beta 3$ de plaqueta. O fragmento JD49 também foi selecionado para ser usado como marcador. Uma vez que seria produzido no periplasma, acreditávamos que poderia

apresentar uma conformação correta e por consequência atividade biológica. A expressão de JD49/APv e Er/APv foi realizada com sucesso. Embora a porção disintegrina de ambas tivesse 8 cisteínas, as proteínas foram expressas com solubilidade no periplasma de *E. coli*. Os soros policlonais identificaram tanto as porções disintegrina como fosfatase alcalina na proteína híbrida e o teste de atividade fosfatase alcalina mostrou que a inserção da disintegrina na região N-terminal da fosfatase alcalina não estava interferindo com a atividade biológica, sugerindo também que a porção disintegrina possa estar em uma conformação adequada, estável e com atividade. Podemos ver no Western blot, revelado diretamente com o substrato NBT/BCIP, que a intensidade das bandas de JD49/APv e Er/APv é proporcional às mesmas bandas no SDS-PAGE, sugerindo que a atividade fosfatase alcalina das disintegrinas de fusão está diretamente relacionada com a quantidade de proteína. Ainda mais, mostramos que Er/APv tem atividade catalítica similar a APv. Isto sugere que toda a Er/APv exportada ao periplasma deve estar corretamente enovelada e com atividade biológica preservada. A formação das 4 pontes dissulfeto da porção eristostatina não deve afetar o enovelamento da porção fosfatase alcalina, e ainda mais, não deve interferir com a formação do homodímero, essencial para estabilizar a estrutura da fosfatase alcalina (Martin e col., 1999).

No teste de Western blot, onde utilizamos o substrato NBT/BCIP para revelar as bandas com atividade fosfatase alcalina, mostrou-se que só e exclusivamente as proteínas recombinantes JD49/APv e Er/APv apresentaram atividade fosfatase alcalina entre as proteínas periplásmicas de *E. coli*. Estes dados foram muito importantes, uma vez que nos possibilitou trabalhar diretamente com o extrato periplásmico nos ensaios de adesão. Muller e colaboradores (1999) utilizaram também o extrato periplásmico, contendo a fração ScFv de um anticorpo monoclonal em fusão com a fosfatase alcalina de *E. coli*, na detecção direta do antígeno alvo.

O teste de inibição da agregação plaquetária é o ensaio tradicional para avaliar a atividade das RGD-disintegrinas. No entanto, durante os experimentos pudemos observar que o controle de fosfatase alcalina também estava inibindo esta atividade, o que tornaria impossível determinar a inibição por parte da porção disintegrina. Com o objetivo de determinar se a inibição era decorrente da atividade catalítica da enzima ou de uma interação desta com as plaquetas, realizamos um teste de agregação utilizando fosfatase

alcalina recombinante desprovida de atividade catalítica. Com esta enzima pudemos confirmar que a atividade enzimática é a responsável pela inibição da agregação plaquetária induzida por ADP e colágeno. Estes dados foram confirmados com os dados de *dot blot* onde mostramos a incapacidade de APv de se ligar às plaquetas. A fosfatase alcalina por ser uma fosfomonoesterase inespecífica deve desfosforilar o ADP, e dessa maneira, impedir a ação deste sobre as plaquetas. Isto impossibilitaria a determinação da inibição da agregação plaquetária por parte da porção disintegrina. O ADP induz alterações conformacionais na plaqueta, por consequência a estrutura da integrina $\alpha IIb\beta 3$ muda de forma, permitindo a exposição de sítios de ligação (Marcinkiewicz e col., 1996), que levam à interação com o fibrinogênio, formando uma malha de plaquetas interligadas por este agonista (agregação plaquetária). No caso da agregação plaquetária induzida por colágeno, a fosfatase alcalina interfere também com esta atividade. Em condições naturais, o colágeno do subendotélio se liga à integrina $\alpha 2\beta 1$ desencadeando estímulos que levam à mudança de forma da plaqueta e à secreção de fatores dos grânulos (Murray e col., 1993). Para isto é preciso da fosforilação de ao menos duas proteínas: da cadeia leve da miosina (21 kDa) e da pleckstrina (47 kDa), envolvidas na mudança de forma da plaqueta e secreção, respectivamente (Kroll e Schafer, 1989). A presença da fosfatase alcalina no teste de agregação pode estar desfosforilando estas duas proteínas, inibindo assim a agregação plaquetária induzida por esta via.

O teste de adesão na forma de *dot blot* foi realizado como alternativa ao ensaio de agregação plaquetária. Neste teste, a proteína receptora pode ser aplicada diretamente na membrana sem ser submetida a tratamentos que possam implicar na sua desnaturação. Dessa forma, poderíamos testar o potencial das disintegrinas híbridas como ferramentas na detecção direta de seus receptores. Nossos resultados mostram a praticidade deste sistema, já utilizado com êxito na detecção direta de 2-acetylaminofluorene-DNA (AAF-DNA) por parte do ScFv anti-AAF-DNA conjugado com a fosfatase alcalina (Muller e col., 1999). A porção eristostatina de Er/APv manteve sua atividade disintegrina, ligando-se fortemente com as plaquetas e com o PRP. No entanto, no caso das membranas tratadas com JD49/APv, não pudemos detectar ligação desta nem às plaquetas, nem ao PRP. Como esperado o controle negativo, APv, não se ligou a nenhum dos substratos utilizados.

Pensamos que o fato de JD49/APv não interagir com as plaquetas podia se dever a uma alteração conformacional, onde a sequência SECDPA correspondente ao suposto motivo adesivo (Kamiguti e col., 1997), não estaria exposta. A partir do padrão das pontes dissulfeto da catrocollastatina-C (Calvete e col., 2000-B) podemos sugerir que JD49 esteja sem conformação natural preservada, já que 2 das 8 cisteínas estariam formando pontes com cisteínas não incluídas no fragmento. Outra possibilidade seria que devido à integrina $\alpha 2\beta 1$ se achar presente nas plaquetas em quantidades bem menores que a integrina $\alpha IIb\beta 3$, receptor da eristostatina (Hynes, 1991) os sítios de ligação para JD49/APv estariam em menor número. No entanto, esta proteína de fusão também não se ligou às células $\alpha 2$ -K562 que expressam a integrina $\alpha 2\beta 1$, contrariamente a jararagina que liga tanto a estas células como às plaquetas. Para solucionarmos esta questão optamos por inserir o *loop* de JD49 na estrutura da eristostatina, a qual está bem caracterizada e mantém suas 8 cisteínas envolvidas em 4 pontes dissulfeto (Calvete e col., 1994; McLane e col., 1996; Marcinkiewickz e col., 1996). Isto possibilitaria a estabilização do *loop* de JD49 e a exposição dos resíduos centrais SECDPA, supostamente responsáveis pela inibição da agregação plaquetária dependente de colágeno (Kamiguti e col., 1997).

Inicialmente utilizamos a técnica do QuickChange site-directed mutagenesis kit (Stratagene), mas sem resultados positivos, uma vez que o número de mutações excedia o estipulado pelo fabricante. Como alternativa, optamos pelo método de megaprimer já usado com êxito na mutagênese sítio-dirigida da eristostatina e echistatina (Wierzbicka-Patynowski e col., 1999). Com respeito aos resultados da amplificação da quimera por PCR utilizando o megaprimer C-ErECD3', podemos dizer que a fraca banda resultante deve-se à localização das mutações no megaprimer. As substituições do lado 3' dos *primers* geralmente afetam as taxas de síntese de DNA (Nassal e Rieger, 1990). Outro fato importante para esta baixa amplificação pode ser o grande tamanho do *primer*. Quanto maior for o *primer*, menor é sua velocidade de anelamento com o template (Brown, 1996). Em nossos resultados, podemos observar quando aumentamos o tempo de anelamento, que a intensidade da banda resultante aumentou.

A expressão de ECD-Er/APv foi similar à de Er/APv com uma concentração aproximada de 20 ng/mL e com atividade catalítica similar. Como mostrado nos resultados,

nem JD49/APv nem a quimera ECD-Er/APv foram capazes de se ligar nem às plaquetas nem às células $\alpha 2$ -K562. Este fato mostra por um lado que a região do *loop* da eristostatina é fundamental para a ligação às plaquetas, já que sua substituição aboliu totalmente esta atividade. Por outro lado, parece que a sequência do *loop* contendo o motivo ECD não é suficiente para ligar com a integrina $\alpha 2\beta 1$. Trabalhos com mutantes de disintegrinas mostram que os resíduos da porção terminal também são importantes para estabilizar a ligação com as integrinas (Wierzbicka-Patynowski e col., 1999). Outra possibilidade é que a sequência SECDPA não esteja formando parte de um *loop* originalmente como já discutido acima. Na construção ECD-Er/APv estamos forçando a exposição da sequência SECDPA em um *loop* que não necessariamente corresponde com a conformação funcional do fragmento. A idéia que esta região está envolvida na formação de um *loop* se sustenta em bases teóricas e não em fatos experimentais. O alinhamento das ECD-disintegrinas com as RGD-disintegrinas e o modelo de JD49 obtido a partir da echistatina sugerem a formação do *loop*. A análise de qualidade do modelo mostra um único resíduo em uma região desfavorável, a serina 27. Este resíduo se encontra no *loop* e antecede ao ácido glutâmico do ECD. No entanto, nosso modelo mostra a estrutura do *loop* muito flexível, o que pode justificar que a serina esteja em uma zona desfavorável. Porém, esta flexibilidade pode também justificar a adoção de uma outra conformação por parte dos resíduos SECDPA.

Por outro lado, a eristostatina mostrou-se ativa, preservando sua especificidade pela integrina $\alpha IIb\beta 3$. No teste de seletividade mostramos que Er/APv se liga preferencialmente às células A5 que expressam a integrina $\alpha IIb\beta 3$, demonstrando a preservação da especificidade da porção eristostatina por esta integrina. Nos controles negativos podemos observar uma marcação tênue que provavelmente corresponde à fosfatase alcalina nativa destas células. É importante mencionar que muitas destas células expressam fosfatase alcalina na sua superfície (Burtis e Ashwood, 2001), dando falsos positivos na hora de revelar os dots com o substrato NBT/BCIP. Para confirmar o resultado de seletividade pela integrina $\alpha IIb\beta 3$, realizamos um teste de competição utilizando eristostatina recombinante (r-Er) sem fusão e com atividade biológica preservada. O ensaio mostrou que r-Er inibe a ligação de Er/APv às plaquetas, indicando que ambas as moléculas estariam ligando-se ao mesmo receptor (ou receptores) na plaqueta.

Os dados de *dot blot* são conclusivos no que se refere à ligação de Er/APv às plaquetas. A padronização do teste de *dot blot* mostra que este é dose-dependente, sendo que mesmo quantias tão ínfimas de apenas 0,5 ng de proteína por mL (~10 pM) são capazes de ligar às plaquetas gerando um sinal ao ser reveladas com o substrato NBT/BCIP. Assim mesmo o teste também é tempo-dependente, mostrando um incremento da intensidade do dot com respeito ao tempo de incubação, sendo que com apenas 5 minutos de incubação pudemos revelar um *dot* positivo. Com respeito à temperatura de incubação obtivemos resultados similares tanto para 20 como para 37°C. Assim mesmo, concentrações fisiológicas de plaquetas mostraram ser suficientes na reação.

A demonstração da afinidade e seletividade de Er/APv pela integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ possibilita sua aplicação no diagnóstico de doenças dependentes da expressão desta integrina. A integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ está envolvida principalmente na doença de Glanzmann, que consiste na ausência ou baixa expressão desta integrina nas plaquetas, levando a uma deficiência na agregação plaquetária e aumentando o período de sangramento do paciente (Newman e col., 1991). Esta integrina, até pouco conhecida nas plaquetas e seus precursores, foi recentemente descoberta em tumores de várias origens (Chen e col. 1997), apresentando aumento de expressão durante a metástase de células de adenocarcinoma da próstata (Tripathi e col., 1998), também estando envolvida no *arrest* de células de melanoma em condições de fluxo (Felding-Habermann e col. 1996). A determinação da expressão da integrina $\alpha\text{IIb}\beta 3$ em cortes de tumores pode ser um ótimo indicador da progressão de um determinado tipo de câncer. Plaquetas tratadas com 3,7% de formaldeído foram igualmente reativas com Er/APv a plaquetas não tratadas (dados não mostrados). Isto é muito importante, uma vez que os cortes histológicos são rotineiramente fixados com formaldeído 3,7% nos hospitais.

Este trabalho estabelece um ponto de partida para a construção de marcadores moleculares baseados em disintegrinas e sugere a utilização da estrutura destas para a apresentação e estudo de motivos funcionais de outras proteínas. Er/APv mostrou-se muito estável, conservando tanto sua atividade disintegrina como fosfatase alcalina até por um ano após ser produzida. Além disso, verificamos que a liofilização de Er/APv não afetou em nada suas atividades comportando-se de igual maneira que a Er/APv recém preparada

nos ensaios de *dot blot*. Partindo do rendimento da expressão/extração de Et/APv, podemos afirmar que com 50 mL de cultura inicial podemos realizar pelo menos 1000 detecções de *dot blot*. Adicionalmente, estes testes podem ser realizados a temperatura ambiente e sem necessidade de aparelhos sofisticados. Como podemos ver, a diferença dos anticorpos monoclonais, os marcadores baseados em disintegrinas são muito mais baratos, estáveis e simples de usar possibilitando seu uso massificado pelo sistema de saúde pública, além de serem marcadores das regiões funcionais das integrinas, o que nem sempre ocorre com os demais reagentes.

CONCLUSÕES

- Neste trabalho foi identificada uma região na porção C-terminal do domínio ECD-disintegrina da jararagina com provável participação na ligação ao colágeno e atividade hemorrágica.
- A eristostatina foi produzida com êxito em fusão com a fosfatase alcalina resultando em uma proteína bifuncional com potencial uso como marcador molecular.
- Este trabalho serve de base para a produção de marcadores moleculares baseados em disintegrinas e a utilização da conformação destas para apresentar motivos exógenos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Adler M, Lazarus RA, Dennis MS, Wagner G. Solution structure of kistrin, a potent platelet aggregation inhibitor and GP IIb-IIIa antagonist. *Science* 1991 Jul 26;253(5018):445-8.
- Akiyama SK, Lajava H, Yamada KM. Differences in the biosynthesis and localization of the fibronectin receptor in normal and transformed cultured human cells. *Cancer Res* 1990 Mar 1;50(5):1601-7.
- Albelda SM, Buck CA. Integrins and other cell adhesion molecules. *FASEB J* 1990 Aug;4(11):2868-80.
- Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD, (1994) *Molecular Biology of the Cell*. Third ed, (1994) Garland Publishing, New York.
- Almeida EA, Huovila AP, Sutherland AE, Stephens LE, Calarco PG, Shaw LM, Mercurio AM, Sonnenberg A, Primakoff P, Myles DG, et al. Mouse egg integrin alpha 6 beta 1 functions as a sperm receptor. *Cell* 1995 Jun 30;81(7):1095-104.
- Baramova EN, Shannon JD, Bjarnason JB, Fox JW. Degradation of extracellular matrix proteins by hemorrhagic metalloproteinases. *Arch Biochem Biophys*. 1989 Nov 15;275(1):63-71.
- Baramova EN, Shannon JD, Bjarnason JB, Fox JW. Identification of the cleavage sites by a hemorrhagic metalloproteinase in type IV collagen. *Matrix* 1990 May;10(2):91-7.
- Bello L, Lucini V, Carrabba G, Giussani C, Machluf M, Pluderi M, Nikas D, Zhang J, Tomei G, Villani RM, Carroll RS, Bikfalvi A, Black PM. Simultaneous inhibition of glioma angiogenesis, cell proliferation, and invasion by a naturally occurring fragment of human metalloproteinase-2. *Cancer Res* 2001 Dec 15;61(24):8730-6.
- Bessos H, Perez S, Armstrong-Fisher S, Urbaniak S, Turner M. The development of a quantitative ELISA for antibodies against human platelet antigen type 1a. *Transfusion* 2003 Mar;43(3):350-6.
- Bigler D, Takahashi Y, Chen MS, Almeida EA, Osbourne L, White JM. Sequence-specific interaction between the disintegrin domain of mouse ADAM 2 (fertilin

- beta) and murine eggs. Role of the alpha(6) integrin subunit. *J Biol Chem*. 2000 Apr 21;275(16):11576-84.
- Bjarnason JB, Hamilton D, Fox JW. Studies on the mechanism of hemorrhage production by five proteolytic hemorrhagic toxins from *Crotalus atrox* venom. *Biol Chem Hoppe Seyler*. 1988 May;369 Suppl:121-9.
- Bjarnason JB, Fox JW. Hemorrhagic metalloproteinases from snake venoms. *Pharmacol Ther* 1994;62(3):325-72.
- Bjarnason JB, Fox JW. Snake venom metalloendopeptidases: repolysins. *Methods Enzymol* 1995;248:345-68
- Black RA, Rauch CT, Kozlosky CJ, Peschon JJ, Slack JL, Wolfson MF, Castner BJ, Stocking KL, Reddy P, Srinivasan S, Nelson N, Boiani N, Schooley KA, Gerhart M, Davis R, Fitzner JN, Johnson RS, Paxton RJ, March CJ, Cerretti DP. A metalloproteinase disintegrin that releases tumour-necrosis factor-alpha from cells. *Nature* 1997 Feb 20;385(6618):729-33.
- Blakesley RW, Boezi JA. A new staining technique for proteins in polyacrylamide gels using coomassie brilliant blue G250. *Anal Biochem*. 1977 Oct;82(2):580-2.
- Blobel CP, Wolfsberg TG, Turck CW, Myles DG, Primakoff P, White JM. A potential fusion peptide and an integrin ligand domain in a protein active in sperm-egg fusion. *Nature* 1992 Mar 19;356(6366):248-52.
- Blundell TL. Metalloproteinase superfamilies and drug design. *Nat Struct Biol* 1994 Feb;1(2):73-5.
- Boehm T, Folkman J, Browder T, O'Reilly MS. Antiangiogenic therapy of experimental cancer does not induce acquired drug resistance. *Nature* 1997 Nov 27;390(6658):404-7.
- Boer HA, Comstock LJ, Vasser M. The tac promoter: a functional hybrid derived from the trp and lac promoters. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1983 Jan;80(1):21-5.

- Brooks PC, Stromblad S, Klemke R, Visscher D, Sarkar FH, Cheresch DA. Antiintegrin alpha v beta 3 blocks human breast cancer growth and angiogenesis in human skin. *J Clin Invest* 1995 Oct;96(4):1815-22.
- Brooks PC, Stromblad S, Sanders LC, von Schalscha TL, Aimes RT, Stetler-Stevenson WG, Quigley JP, Cheresch DA. Localization of matrix metalloproteinase MMP-2 to the surface of invasive cells by interaction with integrin alpha v beta 3. *Cell* 1996 May 31;85(5):683-93.
- Brooks PC, Silletti S, von Schalscha TL, Friedlander M, Cheresch DA. Disruption of angiogenesis by PEX, a noncatalytic metalloproteinase fragment with integrin binding activity. *Cell* 1998 Feb 6;92(3):391-400.
- Brown TA. Gene cloning, an introduction. Third edition, (1996) Chapman and Hall, London.
- Buda A, Qualtrough D, Jepson MA, Martines D, Paraskeva C, Pignatelli M. Butyrate downregulates alpha2beta1 integrin: a possible role in the induction of apoptosis in colorectal cancer cell lines. *Gut* 2003 May;52(5):729-34.
- Burridge K, Chrzanowska-Wodnicka M. Focal adhesions, contractility, and signaling. *Annu Rev Cell Dev Biol* 1996;12:463-518.
- Burtis CA, Ashwood ER, Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Fifth edition, (2001) Saunders Company, Philadelphia, PA, p 366.
- Calvete JJ. Clues for understanding the structure and function of a prototypic human integrin: the platelet glycoprotein IIb/IIIa complex. *Thromb Haemost* 1994 Jul;72(1):1-15.
- Calvete JJ, McLane MA, Stewart GJ, Niewiarowski S. Characterization of the cross-linking site of disintegrins albolabrin, bitistatin, echistatin, and eristostatin on isolated human platelet integrin GPIIb/IIIa. *Biochem Biophys Res Commun*. 1994 Jul 15;202(1):135-40.
- Calvete JJ, Jurgens M, Marcinkiewicz C, Romero A, Schrader M, Niewiarowski S. Disulphide-bond pattern and molecular modelling of the dimeric disintegrin EMF-

- 10, a potent and selective integrin $\alpha 5\beta 1$ antagonist from *Eristocophis macmahoni* venom. *Biochem J* 2000 Feb 1;345 Pt 3:573-81.
- Calvete JJ, Moreno-Murciano MP, Sanz L, Jurgens M, Schrader M, Raida M, Benjamin DC, Fox JW. The disulfide bond pattern of catrocollastatin C, a disintegrin-like/cysteine-rich protein isolated from *Crotalus atrox* venom. *Protein Sci.* 2000 Jul;9(7):1365-73.
- Calvete JJ, Fox JW, Agelan A, Niewiarowski S, Marcinkiewicz C. The presence of the WGD motif in CC8 heterodimeric disintegrin increases its inhibitory effect on $\alpha II(b)\beta 3$, $\alpha (v)\beta 3$, and $\alpha 5\beta 1$ integrins. *Biochemistry* 2002 Feb 12;41(6):2014-21.
- Chan BM, Matsuura N, Takada Y, Zetter BR, Hemler ME. In vitro and in vivo consequences of VLA-2 expression on rhabdomyosarcoma cells. *Science* 1991 Mar 29;251(5001):1600-2.
- Chang HH, Tsai WJ, Lo SJ. Glutathione S-transferase-rhodostomin fusion protein inhibits platelet aggregation and induces platelet shape change. *Toxicon.* 1997 Feb;35(2):195-204.
- Chang JY. Thrombin specificity Requirement for apolar amino acids adjacent to the thrombin cleavage site of polypeptide substrate. *Eur J Biochem.* 1985 Sep 2;151(2):217-24.
- Chanussot C, Bellanger L, Ligny-Lemaire C, Seguin P, Menez A, Boulain JC. Engineering of a recombinant colorimetric fusion protein for immunodiagnosis of insulin. *J Immunol Methods.* 1996 Oct 16;197(1-2):39-49.
- Chen CS, Mrksich M, Huang S, Whitesides GM, Ingber DE. Geometric control of cell life and death. *Science* 1997 May 30;276(5317):1425-8.
- Chen FA, Repasky EA, Bankert RB. Human lung tumor-associated antigen identified as an extracellular matrix adhesion molecule. *J Exp Med* 1991 May 1;173(5):1111-9.
- Chen P, Melchior C, Brons NH, Schlegel N, Caen J, Kieffer N. Probing conformational changes in the I-like domain and the cysteine-rich repeat of human $\beta 3$ integrins following disulfide bond disruption by cysteine mutations: identification of cysteine

598 involved in α IIb β 3 activation. *J Biol Chem* 2001 Oct 19;276(42):38628-35.

Chen YQ, Trikha M, Gao X, Bazaz R, Porter AT, Timar J, Honn KV. Ectopic expression of platelet integrin α IIb β 3 in tumor cells from various species and histological origin. *Int J Cancer* 1997 Aug 7;72(4):642-8.

Cheresh DA. Structural and biologic properties of integrin-mediated cell adhesion. *Clin Lab Med* 1992 Jun;12(2):217-36.

Clissa PB, Laing GD, Theakston RD, Mota I, Taylor MJ, Moura-da-Silva AM. The effect of jararhagin, a metalloproteinase from *Bothrops jararaca* venom, on pro-inflammatory cytokines released by murine peritoneal adherent cells. *Toxicon* 2001 Oct;39(10):1567-73.

Correa MC Jr, Maria DA, Moura-da-Silva AM, Pizzocaro KF, Ruiz IR. Inhibition of melanoma cells tumorigenicity by the snake venom toxin jararhagin. *Toxicon* 2002 Jun;40(6):739-48.

Costa EP, Clissa PB, Teixeira CF, Moura-da-Silva AM. Importance of metalloproteinases and macrophages in viper snake envenomation-induced local inflammation. *Inflammation* 2002 Feb;26(1):13-7.

Cox D, Aoki T, Seki J, Motoyama Y, Yoshida K. The pharmacology of the integrins. *Med Res Rev* 1994 Mar;14(2):195-228.

Danen EH, van Muijen GN, Ruiter DJ. Role of integrins as signal transducing cell adhesion molecules in human cutaneous melanoma. Em: Hart I, Hogg N, Eds. *Cell Adhesion and Cancer. Cancer Surveys. Advances and Prospects in Clinical Epidemiological and Laboratory Oncology*. Plainview, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1995, Vol 24 pp 43-65.

Danen EH, Marcinkiewicz C, Cornelissen IM, van Kraats AA, Pachter JA, Ruiter DJ, Niewiarowski S, van Muijen GN. The disintegrin e ristostatin interferes with integrin α 4 β 1 function and with experimental metastasis of human melanoma cells. *Exp Cell Res* 1998 Jan 10;238(1):188-96.

- De Luca M, Ward CM, Ohmori K, Andrews RK, Berndt MC. Jararhagin and jaracetin: novel snake venom inhibitors of the integrin collagen receptor, alpha 2 beta 1. *Biochem Biophys Res Commun*. 1995 Jan 17;206(2):570-6.
- Dedhar S. Integrin mediated signal transduction in oncogenesis: an overview. *Cancer Metastasis Rev* 1995 Sep;14(3):165-72.
- Derman AI, Beckwith J. *Escherichia coli* alkaline phosphatase fails to acquire disulfide bonds when retained in the cytoplasm. *J Bacteriol*. 1991 Dec;173(23):7719-22.
- Deryugina EI, Bourdon MA, Luo GX, Reisfeld RA, Strongin A. Matrix metalloproteinase-2 activation modulates glioma cell migration. *J Cell Sci* 1997 Oct;110 (Pt 19):2473-82.
- Deryugina EI, Bourdon MA, Jungwirth K, Smith JW, Strongin AY. Functional activation of integrin alpha V beta 3 in tumor cells expressing membrane-type 1 matrix metalloproteinase. *Int J Cancer* 2000 Apr 1;86(1):15-23.
- DuBose RF, Hartl DL. Evolutionary and structural constraints in the alkaline phosphatase of *E. coli*. *Evolution at the molecular level* (1991). Sinauer Associates, Sunderland, Mass.
- Ducancel F, Boulain JC, Tremeau O, Menez A. Direct expression in *E. coli* of a functionally active protein A--snake toxin fusion protein. *Protein Eng* 1989 Nov;3(2):139-43
- Duperray A, Troesch A, Berthier R, Chagnon E, Frachet P, Uzan G, Marguerie G. Biosynthesis and assembly of platelet GPIIb-IIIa in human megakaryocytes: evidence that assembly between pro-GPIIb and GPIIIa is a prerequisite for expression of the complex on the cell surface. *Blood* 1989 Oct;74(5):1603-11.
- Emsley J, Knight CG, Farndale RW, Barnes MJ, Liddington RC. Structural basis of collagen recognition by integrin alpha2beta1. *Cell* 2000 Mar 31;101(1):47-56
- Evans JP, Schultz RM, Kopf GS. Roles of the disintegrin domains of mouse fertilins alpha and beta in fertilization. *Biol Reprod* 1998 Jul;59(1):145-52.

- Farrell DH, Thiagarajan P, Chung DW, Davie EW. Role of fibrinogen alpha and gamma chain sites in platelet aggregation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1992 Nov 15;89(22):10729-32.
- Felding-Habermann B, Habermann R, Saldivar E, Ruggeri ZM. Role of beta3 integrins in melanoma cell adhesion to activated platelets under flow. *J Biol Chem* 1996 Mar 8;271(10):5892-900.
- Fridman R, Fuerst TR, Bird RE, Hoyhtya M, Oelkelt M, Kraus S, Komarek D, Liotta LA, Berman ML, Stetler-Stevenson WG. Domain structure of human 72-kDa gelatinase/type IV collagenase. Characterization of proteolytic activity and identification of the tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) binding regions. *J Biol Chem*. 1992 Aug 5;267(22):15398-405.
- Fujimura S, Oshikawa K, Terada S, Kimoto E. Primary structure and autoproteolysis of brevilysin H6 from the venom of *Gloydus halys brevicaudus*. *J Biochem (Tokyo)*. 2000 Aug;128(2):167-73.
- Gillet D, Ducancel F, Pradel E, Leonetti M, Menez A, Boulain JC. Insertion of a disulfide-containing neurotoxin into *E. coli* alkaline phosphatase: the hybrid retains both biological activities. *Protein Eng*. 1992 Apr;5(3):273-8.
- Gillet D, Ezan E, Ducancel F, Gaillard C, Ardouin T, Istaiti M, Menez A, Boulain JC, Grognet JM. Enzyme immunoassay using a rat prolactin-alkaline phosphatase recombinant tracer. *Anal Chem*. 1993 Jul 1;65(13):1779-84.
- Ginsberg MH, Loftus JC, Plow EF. Cytoadhesins, integrins, and platelets. *Thromb Haemost* 1988 Feb 25;59(1):1-6.
- Gladson CL. Expression of integrin alpha v beta 3 in small blood vessels of glioblastoma tumors. *J Neuropathol Exp Neurol* 1996 Nov;55(11):1143-9.
- Gomis-Ruth FX, Kress LF, Bode W. First structure of a snake venom metalloproteinase: a prototype for matrix metalloproteinases/collagenases. *EMBO J* 1993 Nov;12(11):4151-7.

- Gong W, Zhu X, Liu S, Teng M, Niu L. Crystal structures of acutolysin A, a three-disulfide hemorrhagic zinc metalloproteinase from the snake venom of *Agkistrodon acutus*. *J Mol Biol* 1998 Oct 30;283(3):657-68.
- Gould RJ, Polokoff MA, Friedman PA, Huang TF, Holt JC, Cook JJ, Niewiarowski S. Disintegrins: a family of integrin inhibitory proteins from viper venoms. *Proc Soc Exp Biol Med* 1990 Nov;195(2):168-71.
- Gui GP, Puddefoot JR, Vinson GP, Wells CA, Carpenter R. In vitro regulation of human breast cancer cell adhesion and invasion via integrin receptors to the extracellular matrix. *Br J Surg* 1995 Sep;82(9):1192-6.
- Gutierrez JM, Romero M, Diaz C, Borkow G, Ovadia M. Isolation and characterization of a metalloproteinase with weak hemorrhagic activity from the venom of the snake *Bothrops asper* (terciopelo). *Toxicon* 1995 Jan;33(1):19-29.
- Harrison RA, Moura-Da-Silva AM, Laing GD, Wu Y, Richards A, Broadhead A, Bianco AE, Theakston RD. Antibody from mice immunized with DNA encoding the carboxyl-disintegrin and cysteine-rich domain (JD9) of the haemorrhagic metalloprotease, Jararhagin, inhibits the main lethal component of viper venom. *Clin Exp Immunol* 2000 Aug;121(2):358-63.
- Heino J. Integrin-type extracellular matrix receptors in cancer and inflammation. *Ann Med* 1993 Aug;25(4):335-42.
- Hite LA, Shannon JD, Bjarnason JB, Fox JW. Sequence of a cDNA clone encoding the zinc metalloproteinase hemorrhagic toxin e from *Crotalus atrox*: evidence for signal, zymogen, and disintegrin-like structures. *Biochemistry* 1992 Jul 14;31(27):6203-11.
- Ho PL, Serrano SM, Chudzinski-Tavassi AM, da Silva AM, Mentele R, Caldas C, Oliva ML, Batista Id Ide F, de Oliveira ML. Angiostatin-like molecules are generated by snake venom metalloproteinases. *Biochem Biophys Res Commun* 2002 Jun 21;294(4):879-85.

- Hourihan RN, O'Sullivan GC, Morgan JG. Transcriptional gene expression profiles of oesophageal adenocarcinoma and normal oesophageal tissues. *Anticancer Res* 2003 Jan-Feb;23(1A):161-5.
- Huang TF, Wang WJ, Teng CM, Ouyang C. Mechanism of action of the antiplatelet peptide, arietin, from *Bitis arietans* venom. *Biochim Biophys Acta* 1991 May 24;1074(1):144-50.
- Hughes PE, Pfaff M. Integrin affinity modulation. *Trends Cell Biol* 1998 Sep;8(9):359-64.
- Humphries MJ. Integrin structure. *Biochem Soc Trans* 2000;28(4):311-39.
- Hwang C, Sinskey AJ, Lodish HF. Oxidized redox state of glutathione in the endoplasmic reticulum. *Science*. 1992 Sep 11;257(5076):1496-502.
- Hynes RO. The complexity of platelet adhesion to extracellular matrices. *Thromb Haemost* 1991 Jul 12;66(1):40-3.
- Hynes RO. Integrins: versatility, modulation, and signaling in cell adhesion. *Cell* 1992 Apr 3;69(1):11-25.
- Ingber DE, Prusty D, Frangioni JV, Cragoe EJ Jr, Lechene C, Schwartz MA. Control of intracellular pH and growth by fibronectin in capillary endothelial cells. *J Cell Biol* 1990 May;110(5):1803-11.
- Inouye H, Beckwith J. Synthesis and processing of an *Escherichia coli* alkaline phosphatase precursor in vitro. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1977 Apr;74(4):1440-4.
- Ito M, Hamako J, Sakurai Y, Matsumoto M, Fujimura Y, Suzuki M, Hashimoto K, Titani K, Matsui T. Complete amino acid sequence of kaouthiagin, a novel cobra venom metalloproteinase with two disintegrin-like sequences. *Biochemistry*. 2001 Apr 10;40(14):4503-11.
- Ivaska J, Kapyla J, Pentikainen O, Hoffren AM, Hermonen J, Huttunen P, Johnson MS, Heino J. A peptide inhibiting the collagen binding function of integrin alpha2I domain. *J Biol Chem* 1999 Feb 5;274(6):3513-21.

- Iwanaga S, Takeya H. Structure and function of snake venom metalloproteinase family, in: K. Imahori, F. Sakiyama (Eds.), *Methods in Protein Sequence Analysis*, Plenum Press, NY, 1993, pp. 107-115.
- Jia LG, Shimokawa K, Bjarnason JB, Fox JW. Snake venom metalloproteinases: structure, function and relationship to the ADAMs family of proteins. *Toxicon*. 1996 Nov-Dec;34(11-12):1269-76.
- Jia LG, Wang XM, Shannon JD, Bjarnason JB, Fox JW. Inhibition of platelet aggregation by the recombinant cysteine-rich domain of the hemorrhagic snake venom metalloproteinase, atrolysin A. *Arch Biochem Biophys*. 2000 Jan 1;373(1):281-6.
- Juliano RL. The role of beta 1 integrins in tumors. *Semin Cancer Biol* 1993 Oct;4(5):277-83
- Kamiguti AS, Slupsky JR, Zuzel M, Hay CR. Properties of fibrinogen cleaved by Jararhagin, a metalloproteinase from the venom of *Bothrops jararaca*. *Thromb Haemost* 1994 Aug;72(2):244-9.
- Kamiguti AS, Hay CR, Zuzel M. Inhibition of collagen-induced platelet aggregation as the result of cleavage of alpha 2 beta 1-integrin by the snake venom metalloproteinase jararhagin. *Biochem J* 1996 Dec 1;320 (Pt 2):635-41.
- Kamiguti AS, Moura-da-Silva AM, Laing GD, Knapp T, Zuzel M, Crampton JM, Theakston RD. Collagen-induced secretion-dependent phase of platelet aggregation is inhibited by the snake venom metalloproteinase jararhagin. *Biochim Biophys Acta* 1997 Apr 17;1335(1-2):209-17.
- Kamiguti AS, Gallagher P, Marcinkiewicz C, Theakston RD, Zuzel M, Fox JW. Identification of sites in the cysteine-rich domain of the class P-III snake venom metalloproteinases responsible for inhibition of platelet function. *FEBS Lett*. 2003 Aug 14;549(1-3):129-34.
- Kim EE, Wyckoff HW. Structure of alkaline phosphatases. *Clin Chim Acta*. 1990 Jan 15;186(2):175-87.

- Kim JT, Lee do H, Chung KH, Kang IC, Kim DS, Joo CK. Inhibitory effects of salmosin, a disintegrin, on posterior capsular opacification in vitro and in vivo. *Exp Eye Res* 2002 May;74(5):585-94.
- Klein CE, Steinmayer T, Kaufmann D, Weber L, Brocker EB. Identification of a melanoma progression antigen as integrin VLA-2. *J Invest Dermatol* 1991 Feb;96(2):281-4.
- Kloczewiak M, Timmons S, Hawiger J. Recognition site for the platelet receptor is present on the 15-residue carboxy-terminal fragment of the gamma chain of human fibrinogen and is not involved in the fibrin polymerization reaction. *Thromb Res* 1983 Jan 15;29(2):249-55.
- Knight CG, Morton LF, Peachey AR, Tuckwell DS, Farndale RW, Barnes MJ. The collagen-binding A-domains of integrins alpha(1)beta(1) and alpha(2)beta(1) recognize the same specific amino acid sequence, GFOGER, in native (triple-helical) collagens. *J Biol Chem* 2000 Jan 7;275(1):35-40.
- Kroll MH, Schafer AI. Biochemical mechanisms of platelet activation. *Blood*. 1989 Sep;74(4):1181-95.
- Kumasaka T, Yamamoto M, Moriyama H, Tanaka N, Sato M, Katsube Y, Yamakawa Y, Omori-Sato T, Iwanaga S, Ueki T. Crystal structure of H2-proteinase from the venom of *Trimeresurus flavoviridis*. *J Biochem (Tokyo)* 1996 Jan;119(1):49-57.
- Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature*. 1970 Aug 15;227(259):680-5.
- Lefkovits J, Plow EF, Topol EJ. Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptors in cardiovascular medicine. *N Engl J Med* 1995 Jun 8;332(23):1553-9.
- Leytin V, Shapiro H, Novikov I, Radnay J. Flow cytometric analysis of the platelet surface area and surface density of glycoprotein IIb-IIIa of unactivated human platelets of various sizes. *Biochem Biophys Res Commun* 1996 Sep 4;226(1):94-100.
- Liapis H, Adler LM, Wick MR, Rader JS. Expression of alpha(v)beta3 integrin is less frequent in ovarian epithelial tumors of low malignant potential in contrast to ovarian carcinomas. *Hum Pathol* 1997 Apr;28(4):443-9.

- Lindbladh C, Mosbach K, Bulow L. Use of genetically prepared enzyme conjugates in enzyme immunoassay. *Trends Biochem Sci.* 1993 Aug;18(8):279-83.
- Liu Z, Brattain MG, Appert H. Differential display of reticulocalbin in the highly invasive cell line, MDA-MB-435, versus the poorly invasive cell line, MCF-7. *Biochem Biophys Res Commun* 1997 Feb 13;231(2):283-9.
- Loechel F, Gilpin BJ, Engvall E, Albrechtsen R, Wewer UM. Human ADAM 12 (meltrin alpha) is an active metalloprotease. *J Biol Chem* 1998 Jul 3;273(27):16993-7.
- Lu X, Rahman S, Kakkar VV, Authi KS. Substitutions of proline 42 to alanine and methionine 46 to asparagine around the RGD domain of the neurotoxin dendroaspin alter its preferential antagonism to that resembling the disintegrin elegantin. *J Biol Chem* 1996 Jan 5;271(1):289-94.
- Marcinkiewicz C, Rosenthal LA, Mosser DM, Kunicki TJ, Niewiarowski S. Immunological characterization of eristostatin and echistatin binding sites on alpha IIb beta 3 and alpha V beta 3 integrins. *Biochem J.* 1996 Aug 1;317 (Pt 3):817-25.
- Marcinkiewicz C, Calvete JJ, Marcinkiewicz MM, Raida M, Vijay-Kumar S, Huang Z, Lobb RR, Niewiarowski S. EC3, a novel heterodimeric disintegrin from *Echis carinatus* venom, inhibits alpha4 and alpha5 integrins in an RGD-independent manner. *J Biol Chem* 1999 Apr 30;274(18):12468-73.
- Marcinkiewicz C, Calvete JJ, Vijay-Kumar S, Marcinkiewicz MM, Raida M, Schick P, Lobb RR, Niewiarowski S. Structural and functional characterization of EMF10, a heterodimeric disintegrin from *Eristocophis macmahoni* venom that selectively inhibits alpha 5 beta 1 integrin. *Biochemistry* 1999 Oct 5;38(40):13302-9.
- Marcinkiewicz C, Taooka Y, Yokosaki Y, Calvete JJ, Marcinkiewicz MM, Lobb RR, Niewiarowski S, Sheppard D. Inhibitory effects of MLDG-containing heterodimeric disintegrins reveal distinct structural requirements for interaction of the integrin alpha 9beta 1 with VCAM-1, tenascin-C, and osteopontin. *J Biol Chem* 2000 Oct 13;275(41):31930-7.
- Markland FS. Snake venoms and the hemostatic system. *Toxicon* 1998 Dec;36(12):1749-800.

- Martin DC, Pastra-Landis SC, Kantrowitz ER. Amino acid substitutions at the subunit interface of dimeric *Escherichia coli* alkaline phosphatase cause reduced structural stability. *Protein Sci.* 1999 May;8(5):1152-9.
- Maruyama M, Sugiki M, Yoshida E, Shimaya K, Mihara H. Broad substrate specificity of snake venom fibrinolytic enzymes: possible role in haemorrhage. *Toxicon.* 1992 Nov;30(11):1387-97.
- Mashiko H, Takahashi H. Haemorrhagic factors from snake venoms. Structures of haemorrhagic factors and types and mechanisms of haemorrhage. *J. Toxicol. Toxin Rev* 1998 (17) 493-512.
- McKay DG, Moroz C, De Vries A, Csavossy I, Cruse V. The action of hemorrhagin and phospholipase derived from *Vipera palestinae* venom on the microcirculation. *Lab Invest* 1970 May;22(5):387-99.
- McLane MA, Kowalska MA, Silver L, Shattil SJ, Niewiarowski S. Interaction of disintegrins with the alpha IIb beta 3 receptor on resting and activated human platelets. *Biochem J* 1994 Jul 15;301 (Pt 2):429-36.
- McLane MA, Vijay-Kumar S, Marcinkiewicz C, Calvete JJ, Niewiarowski S. Importance of the structure of the RGD-containing loop in the disintegrins echistatin and eristostatin for recognition of alpha IIb beta 3 and alpha v beta 3 integrins. *FEBS Lett* 1996 Aug 5;391(1-2):139-43.
- McLane MA, Marcinkiewicz C, Vijay-Kumar S, Wierzbicka-Patynowski I, Niewiarowski S. Viper venom disintegrins and related molecules. *Proc Soc Exp Biol Med* 1998 Nov;219(2):109-19.
- McLane MA, Kuchar MA, Brando C, Santoli D, Paquette-Straub CA, Miele ME. New insights on disintegrin-receptor interactions: eristostatin and melanoma cells. *Haemostasis* 2001 May-Dec;31(3-6):177-82.
- Millichip MI, Dallas DJ, Wu E, Dale S, McKie N. The metallo-disintegrin ADAM10 (MADM) from bovine kidney has type IV collagenase activity in vitro. *Biochem Biophys Res Commun* 1998 Apr 17;245(2):594-8.

- Mizejewski GJ. Role of integrins in cancer: survey of expression patterns. *Proc Soc Exp Biol Med* 1999 Nov;222(2):124-38.
- Moreira L, Borkow G, Ovadia M, Gutierrez JM. Pathological changes induced by BaH1, a hemorrhagic proteinase isolated from *Bothrops asper* (Terciopelo) snake venom, on mouse capillary blood vessels. *Toxicon* 1994 Aug;32(8):976-87.
- Moreno-Murciano MP, Monleon D, Calvete JJ, Celda B, Marcinkiewicz C. Amino acid sequence and homology modeling of obtustatin, a novel non-RGD-containing short disintegrin isolated from the venom of *Vipera lebetina obtusa*. *Protein Sci* 2003 Feb;12(2):366-71.
- Morris VL, Schmidt EE, Koop S, MacDonald IC, Grattan M, Khokha R, McLane MA, Niewiarowski S, Chambers AF, Groom AC. Effects of the disintegrin eristostatin on individual steps of hematogenous metastasis. *Exp Cell Res* 1995 Aug;219(2):571-8.
- Moura-da-Silva AM, Laing GD, Paine MJ, Dennison JM, Politi V, Crampton JM, Theakston RD. Processing of pro-tumor necrosis factor-alpha by venom metalloproteinases: a hypothesis explaining local tissue damage following snake bite. *Eur J Immunol* 1996 Sep;26(9):2000-5.
- Moura-da-Silva AM, Linica A, Della-Casa MS, Kamiguti AS, Ho PL, Crampton JM, Theakston RD. Jararhagin ECD-containing disintegrin domain: expression in *escherichia coli* and inhibition of the platelet-collagen interaction. *Arch Biochem Biophys*. 1999 Sep 15;369(2):295-301.
- Moura-da-Silva AM, Marcinkiewicz C, Marcinkiewicz M, Niewiarowski S. Selective recognition of alpha2beta1 integrin by jararhagin, a Metalloproteinase/disintegrin from *Bothrops jararaca* venom. *Thromb Res*. 2001 Apr 15;102(2):153-9.
- Moura-da-Silva AM, Della-Casa MS, David AS, Assakura MT, Butera D, Lebrun I, Shannon JD, Serrano SM, Fox JW. Evidence for heterogeneous forms of the snake venom metalloproteinase jararhagin: a factor contributing to snake venom variability. *Arch Biochem Biophys* 2003 Jan 15;409(2):395-401.

- Muller BH, Chevrier D, Boulain JC, Guesdon JL. Recombinant single-chain Fv antibody fragment-alkaline phosphatase conjugate for one-step immunodetection in molecular hybridization. *J Immunol Methods*. 1999 Jul 30;227(1-2):177-85
- Murphy G, Allan JA, Willenbrock F, Cockett ML, O'Connell JP, Docherty AJ. The role of the C-terminal domain in collagenase and stromelysin specificity. *J Biol Chem*. 1992 May 15;267(14):9612-8.
- Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. *Harper's Biochemistry*. Ed. (1993) 23, Appleton & Lange, Norwalk, CT.
- Nakamura Y, Gojobori T, Ikemura T. Codon usage tabulated from the international DNA sequence databases. *Nucleic Acids Res*. 1998 Jan 1;26(1):334.
- Nassal M, Rieger A. PCR-based site-directed mutagenesis using primers with mismatched 3'-ends. *Nucleic Acids Res*. 1990 May 25;18(10):3077-8.
- Natali PG, Nicotra MR, Botti C, Mottolèse M, Bigotti A, Segatto O. Changes in expression of alpha 6/beta 4 integrin heterodimer in primary and metastatic breast cancer. *Br J Cancer* 1992 Aug;66(2):318-22.
- Newman PJ, Seligsohn U, Lyman S, Collier BS. The molecular genetic basis of Glanzmann thrombasthenia in the Iraqi-Jewish and Arab populations in Israel. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1991 Apr 15;88(8):3160-4.
- Nurden AT, Caen JP. An abnormal platelet glycoprotein pattern in three cases of Glanzmann's thrombasthenia. *Br J Haematol* 1974 Oct;28(2):253-60.
- Osaka A, Just M, Habermann E. Action of snake venom hemorrhagic principles on isolated glomerular basement membrane. *Biochim Biophys Acta*. 1973 Oct 25;323(3):415-28.
- Ownby CL, Bjarnason J, Tu AT. Hemorrhagic toxins from rattlesnake (*Crotalus atrox*) venom. Pathogenesis of hemorrhage induced by three purified toxins. *Am J Pathol* 1978 Oct;93(1):201-18.
- Paine MJ, Desmond HP, Theakston RD, Crampton JM. Purification, cloning, and molecular characterization of a high molecular weight hemorrhagic metalloprotease,

- jararhagin, from *Bothrops jararaca* venom. Insights into the disintegrin gene family. *J Biol Chem*. 1992 Nov 15;267(32):22869-76.
- Phillips DR, Charo IF, Parise LV, Fitzgerald LA. The platelet membrane glycoprotein IIb-IIIa complex. *Blood* 1988 Apr;71(4):831-43.
- Phillips DR, Scarborough RM. Clinical pharmacology of eptifibatide. *Am J Cardiol* 1997 Aug 18;80(4A):11B-20B.
- Pierschbacher MD, Ruoslahti E. Cell attachment activity of fibronectin can be duplicated by small synthetic fragments of the molecule. *Nature* 1984 May 3-9;309(5963):30-3.
- Plantefaber LC, Hynes RO. Changes in integrin receptors on oncogenically transformed cells. *Cell* 1989 Jan 27;56(2):281-90.
- Plow EF, Ginsberg MH. Specific and saturable binding of plasma fibronectin to thrombin-stimulated human platelets. *J Biol Chem* 1981 Sep 25;256(18):9477-82.
- Plow EF, Srouji AH, Meyer D, Marguerie G, Ginsberg MH. Evidence that three adhesive proteins interact with a common recognition site on activated platelets. *J Biol Chem* 1984 May 10;259(9):5388-91.
- Plow EF, McEver RP, Collier BS, Woods VL Jr, Marguerie GA, Ginsberg MH. Related binding mechanisms for fibrinogen, fibronectin, von Willebrand factor, and thrombospondin on thrombin-stimulated human platelets. *Blood* 1985 Sep;66(3):724-7.
- Plow EF, D'Souza SE, Ginsberg MH. Ligand binding to GPIIb-IIIa: a status report. *Semin Thromb Hemost* 1992;18(3):324-32.
- Rucavado A, Lomonte B, Ovadia M, Gutierrez JM. Local tissue damage induced by BaP1, a metalloproteinase isolated from *Bothrops asper* (Terciopelo) snake venom. *Exp Mol Pathol*. 1995 Dec;63(3):186-99.
- Rucavado A, Flores-Sanchez E, Franceschi A, Magalhaes A, Gutierrez JM. Characterization of the local tissue damage induced by LHF-II, a metalloproteinase

- with weak hemorrhagic activity isolated from *Lachesis muta muta* snake venom. *Toxicon*. 1999 Sep;37(9):1297-312.
- Rudolph R, Cheresch D. Cell adhesion mechanisms and their potential impact on wound healing and tumor control. *Clin Plast Surg* 1990 Jul;17(3):457-62.
- Ruoslahti E, Pierschbacher MD. Arg-Gly-Asp: a versatile cell recognition signal. *Cell* 1986 Feb 28;44(4):517-8.
- Ruoslahti E. The Walter Herbert Lecture. Control of cell motility and tumour invasion by extracellular matrix interactions. *Br J Cancer* 1992 Aug;66(2):239-42.
- Saelman EU, Nieuwenhuis HK, Hese KM, de Groot PG, Heijnen HF, Sage EH, Williams S, McKeown L, Gralnick HR, Sixma JJ. Platelet adhesion to collagen types I through VIII under conditions of stasis and flow is mediated by GPIa/IIa (alpha 2 beta 1-integrin). *Blood* 1994 Mar 1;83(5):1244-50.
- Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis, Molecular Cloning a laboratory manual. Second ed. (1989) Cold Spring Harbour Laboratory, Press. New York.
- Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. 1977. *Biotechnology*. 1992;24 104-8.
- Saudek V, Atkinson RA, Pelton JT. Three-dimensional structure of echistatin, the smallest active RGD protein. *Biochemistry* 1991 Jul 30;30(30):7369-72.
- Senger DR, Claffey KP, Benes JE, Perruzzi CA, Sergiou AP, Detmar M. Angiogenesis promoted by vascular endothelial growth factor: regulation through alpha1beta1 and alpha2beta1 integrins. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1997 Dec 9;94(25):13612-7.
- Senn H, Klaus W. The nuclear magnetic resonance solution structure of flavoridin, an antagonist of the platelet GP IIb-IIIa receptor. *J Mol Biol* 1993 Aug 5;232(3):907-25.
- Sheu JB, Ko WC, Hung WC, Peng HC, Huang TF. Interaction of thrombin-activated platelets with extracellular matrices (fibronectin and vitronectin): comparison of the activity of Arg-Gly-Asp-containing venom peptides and monoclonal antibodies against glycoprotein IIb/IIIa complex. *J Pharm Pharmacol* 1997 Jan;49(1):78-84.

- Sheu JR, Yen MH, Peng HC, Chang MC, Huang TF. Triflavin, an Arg-Gly-Asp-containing peptide, prevents platelet plug formation in in vivo experiments. *Eur J Pharmacol* 1995 Dec 27;294(1):231-8.
- Silletti S, Kessler T, Goldberg J, Boger DL, Cheresh DA. Disruption of matrix metalloproteinase 2 binding to integrin α v β 3 by an organic molecule inhibits angiogenesis and tumor growth in vivo. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001 Jan 2;98(1):119-24.
- Simons PC, Vander Jagt DL. Purification of glutathione S-transferases from human liver by glutathione-affinity chromatography. *Anal Biochem*. 1977 Oct;82(2):334-41.
- Smith DB, Johnson KS. Single-step purification of polypeptides expressed in *Escherichia coli* as fusions with glutathione S-transferase. *Gene*. 1988 Jul 15;67(1):31-40.
- Smith KM, Gaultier A, Cousin H, Alfandari D, White JM, DeSimone DW. The cysteine-rich domain regulates ADAM protease function in vivo. *J Cell Biol* 2002 Dec 9;159(5):893-902.
- Souza DH, Iemma MR, Ferreira LL, Faria JP, Oliva ML, Zingali RB, Niewiarowski S, Selistre-de-Araujo HS. The disintegrin-like domain of the snake venom metalloprotease alternagin inhibits α 2 β 1 integrin-mediated cell adhesion. *Arch Biochem Biophys*. 2000 Dec 15;384(2):341-50.
- Stewart EJ, Aslund F, Beckwith J. Disulfide bond formation in the *Escherichia coli* cytoplasm: an in vivo role reversal for the thioredoxins. *EMBO J*. 1998 Oct 1;17(19):5543-50.
- Stocker W, Grams F, Baumann U, Reinemer P, Gomis-Ruth FX, McKay DB, Bode W. The metzincins—topological and sequential relations between the astacins, adamalysins, serralysins, and matrixins (collagenases) define a superfamily of zinc-peptidases. *Protein Sci* 1995 May;4(5):823-40.
- Takeya H, Oda K, Miyata T, Omori-Satoh T, Iwanaga S. The complete amino acid sequence of the high molecular mass hemorrhagic protein HR1B isolated from the venom of *Trimeresurus flavoviridis*. *J Biol Chem* 1990 Sep 25;265(27):16068-73.

- Takeya H, Nishida S, Miyata T, Kawada S, Saisaka Y, Morita T, Iwanaga S. Coagulation factor X activating enzyme from Russell's viper venom (RVV-X). A novel metalloproteinase with disintegrin (platelet aggregation inhibitor)-like and C-type lectin-like domains. *J Biol Chem*. 1992 Jul 15;267(20):14109-17.
- Takeya H, Miyata T, Nishino N, Omori-Satoh T, Iwanaga S. Snake venom hemorrhagic and nonhemorrhagic metalloendopeptidases. *Methods Enzymol* 1993;223:365-78.
- Tanjoni I, Butera D, Bento L, Della-Casa M, Marques-Porto R, Takehara H, Gutierrez JM, Fernandes I, Moura-da-Silva AM. Snake Venom Metalloproteinases: Structure/function relationships studies using monoclonal antibodies. *Toxicon* 2003; 42(7): 801-808.
- Topol EJ, Byzova TV, Plow EF. Platelet GPIIb-IIIa blockers. *Lancet* 1999 Jan 16;353(9148):227-31.
- Tortorella MD, Pratta MA, Fox JW, Arner EC. The interglobular domain of cartilage aggrecan is cleaved by hemorrhagic metalloproteinase HT-d (atrolysin C) at the matrix metalloproteinase and aggrecanase sites. *J Biol Chem* 1998 Mar 6;273(10):5846-50
- Tortorella MD, Burn TC, Pratta MA, Abbaszade I, Hollis JM, Liu R, Rosenfeld SA, Copeland RA, Decicco CP, Wynn R, Rockwell A, Yang F, Duke JL, Solomon K, George H, Bruckner R, Nagase H, Itoh Y, Ellis DM, Ross H, Wiswall BH, Murphy K, Hillman MC Jr, Hollis GF, Arner EC, et al. Purification and cloning of aggrecanase-1: a member of the ADAMTS family of proteins. *Science* 1999 Jun 4;284(5420):1664-6.
- Towbin H, Staehelin T, Gordon J. Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. 1979. *Biotechnology*. 1992;24:145-9.
- Trikha M, Raso E, Cai Y, Fazakas Z, Paku S, Porter AT, Timar J, Honn KV. Role of $\alpha\text{IIb}\beta_3$ integrin in prostate cancer metastasis. *Prostate* 1998 May 15;35(3):185-92.

- Uhlen M, Moks T. Gene fusions for purpose of expression: an introduction. *Methods Enzymol.* 1990;185:129-43.
- Usami Y, Fujimura Y, Miura S, Shima H, Yoshida E, Yoshioka A, Hirano K, Suzuki M, Titani K. A 28 kDa-protein with disintegrin-like structure (jararhagin-C) purified from *Bothrops jararaca* venom inhibits collagen- and ADP-induced platelet aggregation. *Biochem Biophys Res Commun.* 1994 May 30;201(1):331-9.
- Varner JA, Cheresh DA. Integrins and cancer. *Curr Opin Cell Biol* 1996 Oct;8(5):724-30.
- Vella F, Thielens NM, Bersch B, Arlaud GJ, Frachet P. A recombinant chimeric epidermal growth factor-like module with high binding affinity for integrins. *J Biol Chem.* 2003 May 30;278(22):19834-43. Epub 2003 Mar 24.
- Virtanen I, Korhonen M, Kariniemi AL, Gould VE, Laitinen L, Ylanne J. Integrins in human cells and tumors. *Cell Differ Dev* 1990 Dec 2;32(3):215-27.
- Voest EE. Inhibitors of angiogenesis in a clinical perspective. *Anticancer Drugs* 1996 Sep;7(7):723-7.
- Wagner CL, Mascelli MA, Neblock DS, Weisman HF, Collier BS, Jordan RE. Analysis of GPIIb/IIIa receptor number by quantification of 7E3 binding to human platelets. *Blood* 1996 Aug 1;88(3):907-14.
- Wang WJ, Huang TF. Purification and characterization of a novel metalloproteinase, acurhagin, from *Agkistrodon acutus* venom. *Thromb Haemost.* 2002 Apr;87(4):641-50.
- Wierzbicka-Patynowski I, Niewiarowski S, Marcinkiewicz C, Calvete JJ, Marcinkiewicz MM, McLane MA. Structural requirements of echistatin for the recognition of alpha(v)beta(3) and alpha(5)beta(1) integrins. *J Biol Chem* 1999 Dec 31;274(53):37809-14.
- Willenbrock F, Crabbe T, Slocombe PM, Sutton CW, Docherty AJ, Cockett MI, O'Shea M, Brocklehurst K, Phillips IR, Murphy G. The activity of the tissue inhibitors of metalloproteinases is regulated by C-terminal domain interactions: a kinetic analysis of the inhibition of gelatinase A. *Biochemistry* 1993 Apr 27;32(16):4330-7.

- Willis TW, Tu AT. Purification and biochemical characterization of atroxase, a nonhemorrhagic fibrinolytic protease from western diamondback rattlesnake venom. *Biochemistry* 1988 Jun 28;27(13):4769-77.
- Wolfsberg TG, Bazan JF, Blobel CP, Myles DG, Primakoff P, White JM. The precursor region of a protein active in sperm-egg fusion contains a metalloprotease and a disintegrin domain: structural, functional, and evolutionary implications. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1993 Nov 15;90(22):10783-7.
- Wolfsberg TG, White JM. ADAMs in fertilization and development. *Dev Biol* 1996 Dec 15;180(2):389-401.
- Xiong JP, Stehle T, Zhang R, Joachimiak A, Frech M, Goodman SL, Arnaout MA. Crystal structure of the extracellular segment of integrin α V β 3 in complex with an Arg-Gly-Asp ligand. *Science* 2002 Apr 5;296(5565):151-5.
- Yeh CH, Peng HC, Yang RS, Huang TF. Rhodostomin, a snake venom disintegrin, inhibits angiogenesis elicited by basic fibroblast growth factor and suppresses tumor growth by a selective α (v) β 3 blockade of endothelial cells. *Mol Pharmacol* 2001 May;59(5):1333-42.
- Zhang D, Botos I, Gomis-Ruth FX, Doll R, Blood C, Njoroge FG, Fox JW, Bode W, Meyer EF. Structural interaction of natural and synthetic inhibitors with the venom metalloproteinase, atroxysin C (form d). *Proc Natl Acad Sci U S A* 1994 Aug 30;91(18):8447-51.
- Zhou Q, Smith JB, Grossman MH. Molecular cloning and expression of catrocollastatin, a snake-venom protein from *Crotalus atrox* (western diamondback rattlesnake) which inhibits platelet adhesion to collagen. *Biochem J* 1995 Apr 15;307 (Pt 2):411-7.
- Zhou Q, Dangelmaier C, Smith JB. The hemorrhagin catrocollastatin inhibits collagen-induced platelet aggregation by binding to collagen via its disintegrin-like domain. *Biochem Biophys Res Commun* 1996 Feb 27;219(3):720-6.
- Zhou Q, Sherwin RP, Parrish C, Richters V, Groshen SG, Tsao-Wei D, Markland FS. Contortrostatin, a dimeric disintegrin from *Agkistrodon contortrix contortrix*, inhibits breast cancer progression. *Breast Cancer Res Treat* 2000 Jun;61(3):249-60.

Zhu X, Bansal NP, Evans JP. Identification of key functional amino acids of the mouse fertilin beta (ADAM2) disintegrin loop for cell-cell adhesion during fertilization. J Biol Chem. 2000 Mar 17;275(11):7677-83.

CURRICULUM VITAE

NOME: Diego Alberto Butera Wadsworth

LOCAL E DATA DE NASCIMENTO: Sydney, Austrália, 10/09/1971

EDUCAÇÃO

Colégio Santa Margarita, Lima, Peru (1978-1988).

Universidade Ricardo Palma, Faculdade de Ciências Biológicas, Lima, Peru.
Bacharel em Biologia (1990-1996).

Universidade de São Paulo, Instituto de Química, Departamento de Bioquímica,
Doutor em Ciências – Bioquímica (1998-2003).

OCUPAÇÃO

Bolsista: FAPESP 1998 até Maio de 2003.

PUBLICAÇÕES

Butera D, Moura-da-Silva AM. Processo de obtenção da eristostatina/fosfatase alcalina quimérica, construção da eristostatina/fosfatase alcalina quimérica e seu produto expresso em periplasma, uso da proteína de fusão eristostatina/fosfatase alcalina e kit de diagnóstico. Patente de invenção depositada no INPI no 31 de janeiro de 2003. Número de registro PI0300212-8.

Butera D, Skielka K, Paquette-Straub C, McLane MA, Ducancel F, Moura-da-Silva AM. Cloning, expression and characterization of a bifunctional disintegrin/alkaline phosphatase hybrid protein. *Protein Expr Purif.* 2003 Oct;31(2):286-91.

Moura-da-Silva AM, Della-Casa MS, David AS, Assakura MT, Butera D, Lebrun I, Shannon JD, Serrano SM, Fox JW. Evidence for heterogeneous forms of the snake venom metalloproteinase jararhagin: a factor contributing to snake venom variability. *Arch Biochem Biophys.* 2003 Jan 15;409(2):395-401.

Tanjoni I, Butera D, Spencer PJ, Takehara H, Fernandes I, Moura-da-Silva AM. Phylogenetic conservation of a snake venom metalloproteinase epitope recognized by a monoclonal antibody that neutralizes hemorrhagic activity. *Toxicon.* 2003; 42(7): 809-816.

Tanjoni I, Butera D, Bento L, Della-Casa M, Marques-Porto R, Takehara H, Gutierrez JM, Fernandes I, Moura-da-Silva AM. Snake Venom Metalloproteinases: Structure/function relationships studies using monoclonal antibodies. *Toxicon.* 2003; 42(7): 801-808.