WALTER RIBEIRO TERRA

ASPECTOS BIOQUÍMICOS DA HEMOLINFA E DO CASULO
COLETIVO DE *RHYNCHOSCIARA AMERICANA*

Tese de Doutorado apresentada ao
Departamento de Bioquímica, Instituto
de Química, Universidade de São Paulo.

SÃO PAULO
1 9 7 2

A meus pais

AGRADECIMENTOS

Durante a elaboração desta tese houve sempre a colaboração de inúmeras pessoas e Instituições a quem expressei o meu mais profundo agradecimento. Entre elas gostaria de salientar:

— O Prof. Dr. Francisco J.S. Lara, orientador desta tese, que não poupou esforços em criar todas as condições necessárias para o desenvolvimento deste trabalho, assim como, pelo contínuo estímulo a mim proporcionado.

— O Sr. Antônio G. de Bianchi com quem dividi o entusiasmo e as frustrações da maior parte deste trabalho.

— O Sr. Ângelo G. Gambarini com quem realizei os estágios iniciais deste trabalho.

— A srta. Yolanda Tavares e Sra. Walkyria H. Lara, ambas do Instituto Adolfo Lutz, pela colaboração em campos de sua especialidade.

— O Dr. Gerhard Malnic, Dra. Rebeca C. de Angelis e Sra. Ilza C. M. Terra, todos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e Dr. Herval P. Ribeiro do Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pela prestação com que me emprestaram equipamentos de sua responsabilidade.

— Os meus colegas do Instituto de Química da Universidade de São Paulo: Dr. Fernando Galembeck, Jane Balsamo, Júlia M. Alves, Manuel T. Pueyo, Marila Cordeiro, Nelson Marques, Dr. Rogério Meneghini, Roberto V. Santelli, que colaboraram em algumas das fases experimentais ou contribuíram com valiosas críticas e sugestões.

— A Dra. Eline S. Prado em cujo curso de pós-graduação em química de proteínas aprendi várias técnicas que se tornaram úteis durante a realização deste trabalho.

— A Dra. Carminda da C. Landim que através de seu curso de Morfologia de Insetos muito contribuiu para uma boa interpretação de muitos resultados por mim obtidos.

— O Dr. Gilberto B. Domont do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro que me introduziu nas técnicas de cromatografia de aminoácidos.

— A sra. Mirian D. Marques que além de ter colaborado em uma das fases experimentais, forneceu numerosas informações não publicadas de seu trabalho.

— A srta. Hiromi Tamaki e Sr. José Coelho sem cuja assistência técnica teria sido muito difícil a realização desta tese.

— A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo que através de uma bolsa de Iniciação Científica e duas bolsas de Doutorado me possibilitou ingressar na vida científica.

— A srta. Yvone de Abreu responsável pela eficiente dactilografia desta tese.

ÍNDICE

	Pág.
Lista de Abreviaturas empregadas	1
INTRODUÇÃO	2
1. Considerações iniciais	2
2. Contrôla hormonal do desenvolvimento dos insetos....	6
3. Origem das proteínas do inseto adulto	9
4. Sêdas e casulos	14
5. Finalidades dêste trabalho	16
MÉTODOS	20
1. Cultura de <u>Rhynchosciara</u>	20
2. Determinação da idade fisiológica larval	20
3. Coleta de hemolinfa	23
4. Determinação do volume ocupado pelos hemocitos na hemolinfa	23
5. Métodos de estudo da coagulação e escurecimento da hemolinfa	24
6. Determinação da osmolaridade, densidade, volume e peso-sêco da hemolinfa	24
7. Determinação de pO_2 , pCO_2 , pH e HCO_3^- na hemo- linfa	25
8. Determinações químicas na hemolinfa	25
9. Cromatografia de troca iônica dos compostos ninhi- drina-positivos ácidos-solúveis na hemolinfa	29
10. Preparação dos pigmentos da hemolinfa	30
11. Identificação dos carotenóides	31
12. Preparação do casulo I, II e III e determinação da massa produzida por indivíduo	32
13. Determinação da solubilidade do casulo	32
14. Determinações químicas do casulo	33
15. Cromatografia em papel de carboidratos do casulo ...	35
16. Cromatografia de troca iônica de aminoácidos da fração insolúvel do casulo	36

	Pág.
17. Determinação de pêso-sêco e metais nos tubos de Malpighi	37
18. Determinação de glicogênio e pêso-sêco do corpo gorduroso	37
REAGENTES	38
RESULTADOS	39
A. Química da hemolinfa de larvas de <u>R. americana</u>	39
1. Resultados gerais	39
2. Cromatografia dos compostos ninhidrina-positivos solúveis em ácido	40
3. Apresentação dos resultados das análises químicas.	48
4. Pigmentos	50
B. Química do casulo coletivo de <u>R. americana</u>	58
1. Apresentação geral dos resultados	58
2. Solubilidade, conteúdo de cinzas e metais	59
3. Carboidratos	61
4. Compostos nitrogenados	65
5. Produção e composição do casulo em função do tempo	68
C. Aspectos químicos e fisiológicos durante o 4º estágio de <u>R. americana</u>	72
1. Massa corpórea e volume de hemolinfa	72
2. Determinações químicas na hemolinfa	76
3. Pêso-sêco e glicogênio no corpo gorduroso	81
4. Pêso-sêco e metais nos túbulos de Malpighi	82
DISCUSSÃO	85
A. Química da hemolinfa	85
1. Extensão da análise realizada	85
2. Componentes orgânicos da hemolinfa	87
3. Composição molar da hemolinfa e seus componentes inorgânicos.....	93
4. Coagulação e escurecimento	99
5. Pigmentos	100

	Pág.
B. Produção do casulo coletivo por larvas de <u>R. americana</u>	102
1. Química do casulo	102
2. Origem dos componentes do casulo	104
3. Mecanismos e regulação da produção do casulo ...	111
RESUMO	114
ABSTRACT	116
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	118

ABREVIATURAS

- TCA - Ácido tricloroacético
- 1ºP - Primeiro período do 4º estágio de R. americana (ver Tabela I). Da mesma forma 2ºP, 3ºP, 4ºP, 5ºP e 6ºP, correspondem aos demais períodos do 4º estágio.
- p.e. - Ponto de ebulição
- U.V. - Luz ultravioleta
- RNA - Ácido ribonucléico
- DNA - Ácido desoxirribonucléico
- Cf. - Confrontar com
- PAS - Periodic Acid Schiff, teste para carboidratos
- λ - Comprimento de onda
- p.ex.- Por exemplo
- p/p - Pêso por pêso
- P/V - Pêso por volume
- V/V - Volume por volume
- SDS - Dodecil sulfato de sódio
- Ác. - Ácido
- EC - Numeração das enzimas conforme recomendações feitas pela Enzyme Commission da International Union of Biochemistry em 1964.

INTRODUÇÃO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A classe Insecta constitui o grupo com o maior número conhecido de espécies no reino animal; cêrca de 900.000 para um total descrito de 1.200.000. Sua distribuição abrange tôda a superfície do planêta, com exceção das profundezas do oceano e está representada mesmo entre os poucos animais que habitam permanentemente a região do Polo Sul. Essa enorme distribuição ecológica e a variedade de formas que assume, a torna excelente para o estudo das relações organismo-meio e certamente seria muito interessante conhecer as razões morfológicas, fisiológicas e bioquímicas de seu sucesso.

A importância econômica dos insetos, pode ser avaliada quando se considera o montante de prejuízos causados por êles anualmente; sômente nos Estados Unidos, como consequência de seus ataques a colheitas, produtos armazenados, domésticos e similares, além das doenças e desconforto causados no homem e nos animais: 15 bilhões de dólares! (ROSS, 1965). Ainda dentro do prisma econômico, sua importância se faz sentir também na indústria da sêda natural, do mel, da cêra, etc.

O estudo dos insetos não tem sido estimulado apenas pelo seu número e sucesso biológico ou pelas possibilidades dêse conhecimento contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos de contrôle de pragas. Os insetos tem-se mostrado excelentes modelos para estudos de problemas genéticos e citogenéticos (SINNOT, DUNN & DOBZHANSKY, 1958), bioquímicos (GILMOUR, 1961), fisiológicos (WIGGLESWORTH, 1948, 1965), etc.

Todos os insetos, com exceção dos Ametabola, sofrem uma metamorfose. Esta pode ser definida, segundo WIGGLESWORTH (1965), como a mudança mais ou menos marcada de forma, que ocorre quando o inseto torna-se adulto; independente do fato dessa modificação requerer duas mudas e um estágio pupal como nos Holo

metabola, ou uma única muda final, como nos Hemimetabola.

Existem várias teorias para explicar a origem da metamorfose completa em insetos. Aquela de maior aceitação entre os especialistas é a de POYARKOFF-HINTON (Cf. NOVÁK, 1966). Segundo esta teoria a adaptação da larva e adulto a nichos ecológicos distintos os tornou muito diferentes morfológicamente. A pupa poderia ser interpretada como um meio de intercalar uma segunda muda entre a larva de último estágio e o adulto, permitindo o estabelecimento das ligações musculares imaginais em apôdemas cuticulares do adulto, que são completamente diferentes daqueles da larva, em duas etapas. A primeira muda permitiria o descolamento e histólise da musculatura larval e a segunda seria necessária para a ligação dos músculos imaginais.

Segundo WIGGLESWORTH (1965, 1970) a metamorfose, do ponto de vista ontogenético, poderia ser considerada como um tipo particular de polimorfismo. Os insetos Holometabola possuiriam três sistemas genéticos distintos, enquanto que os Hemimetabola possuiriam dois sistemas, correspondentes no primeiro caso à larva, pupa e adulto e no segundo caso à ninfa e adulto. Durante a metamorfose ocorreria a inibição de um sistema genético e a indução de outro.

O fato da profunda reorganização de tecidos e órgãos que caracteriza a metamorfose de insetos estar sob controle hormonal (ver item 2 abaixo), tem levado a se considerar esse fenômeno um excelente modelo para o estudo da regulação hormonal da expressão genética e seu papel na morfogênese. Isso tem inspirado um número crescente de trabalhos em bioquímica do desenvolvimento de insetos, que foram revistos recentemente por alguns autores (AGRELL, 1964; GILBERT, 1967b; WYATT, 1968).

A metamorfose nos insetos Holometabola inicia-se por ocasião da muda pupal, embora naqueles insetos que produzem um pupário ou tecem um casulo para a pupa, a metamorfose inicia-se mais precisamente com a produção dessas estruturas (WIGGLESWORTH 1965),

A respiração dos insetos durante a metamorfose segue uma curva em forma de U, indicando uma respiração mais intensa

no início e no fim do processo. Este fenômeno foi interpretado inicialmente como refletindo sucessivamente a histólise e histogênese dos tecidos (Cf. AGRELL, 1964). Entretanto, estudos histológicos mostraram que essa interpretação não era correta, pois os dois fenômenos ocorriam simultaneamente. Estudos posteriores indicaram que a curva em U da taxa de respiração era principalmente uma consequência do controle das vias respiratórias pelos níveis de ADP, ATP e fosfato inorgânico celular, refletindo, portanto, as demandas energéticas do inseto. Como a pupa ou o adulto farato* possuem pequena atividade muscular, a maior ou menor demanda energética na metamorfose tem sido relacionada com a maior ou menor atividade biossintética de proteínas (WYATT, 1968).

Os resultados comentados acima indicam, portanto, que as estruturas imaginais começam a ser formadas desde o início da metamorfose e que subjacentemente à formação dessas estruturas ocorrem processos que demandam energia e que devem incluir a biossíntese de proteínas.

As estruturas imaginais diferem bastante daquelas da larva, sugerindo que deve haver uma diferença notável entre as proteínas imaginais e as larvais. A extensão em que a constituição protéica do adulto difere daquela da larva da mesma espécie tem sido estudada principalmente nas proteínas da hemolinfa, devido às facilidades de sua coleta e pela dificuldade de se trabalhar com órgãos de larvas de insetos, devido ao seu pequeno tamanho. Esses estudos foram realizados principalmente com eletroforese de gel de poliacrilamida e mostraram que existe algumas diferenças de padrão protéico entre a larva e o adulto (ver revisão em WYATT, 1968. No caso de *R. americana*, consultar BIANCHI, 1972).

* HINTON (1946) propôs o termo "pharate" para designar o estágio que está fechado dentro da cutícula do estágio anterior. O termo "pharate" é derivado do grego "pharata" que significa "coberto por um véu". Como não existe nenhum termo em português para designar "pharate" será usado aqui o termo "farata" ou "farato", conforme o caso, que utiliza a mesma raiz grega usada por HINTON (1946). Dessa forma adulto farato corresponde ao adulto fechado dentro da cutícula pupal.

Eletroferogramas em gel de poliacrilamida de homogenatos de tecido, que devem ser mais significativos do que a hemolinfa na representação da constituição protéica do inseto, mostraram a existência de algumas diferenças entre larvas e adultos. Entretanto, devido ao número relativamente pequeno de bandas eletroforéticamente resolvidas (cêrca de 20), em relação às centenas de proteínas que devem estar presentes nas células, êsses resultados são pouco conclusivos na avaliação do grau de diferença existente entre a constituição protéica larval e imaginal.

Uma outra maneira de atacar o problema é isolar proteínas homólogas de diversos estágios do desenvolvimento do inseto e compará-las quimicamente. Poucos estudos foram realizados nêsse sentido para se ter uma idéia clara a respeito (ver revisão em WYATT, 1968). A questão da origem das proteínas do adulto, isto é, se elas originam-se integralmente por síntese "de novo" a partir de aminoácidos livres ou se parte das proteínas larvais são conservadas intactas no adulto, está intimamente relacionada ao problema da extensão em que as proteínas do inseto adulto diferem daquelas larvais. O problema encontra-se ainda relativamente pouco estudado e os resultados obtidos até o presente, embora conflitantes, sugerem que as proteínas imaginais poderiam originar-se em parte por síntese "de novo" e em parte a partir de proteínas larvais que se conservariam intactas no adulto (ver ítem 3, a seguir).

Abaixo será mostrado que a produção do casulo em R. americana* representa um modelo interessante para o estudo da origem das proteínas do adulto durante a metamorfose e quais objetivos dentro dêsse estudo se pretende atingir especificamente com esta tese. Antes disso, porém, será conveniente um comentário breve a respeito dos conhecimentos atuais sôbre o controle hormonal do desenvolvimento dos insetos, origem das proteínas do inseto adulto e sôbre a química de casulos e sêdas naturais.

* Rhynchosciara americana Wiedemann, 1821 (Diptera Nematocera Sciaridae), foi redescrita por NONATO & PAVAN (1951) como angelae e essa denominação foi usada em numerosas publicações até ser demonstrada sua sinonímia com americana por BREUER (1969).

2. CONTROLE HORMONAL DO DESENVOLVIMENTO DOS INSETOS

O estudo da regulação hormonal do desenvolvimento pós-embrionário dos insetos foi iniciado há mais de 50 anos. Os esforços conjugados de numerosos pesquisadores, permitiram estabelecer na década de 50 um modelo, hoje clássico, dessa regulação. Posteriormente este modelo foi ampliado para todos os insetos e enriquecido de detalhes porém sem nenhuma alteração substancial. As pesquisas básicas que levaram à proposição desse modelo foram revistas minuciosamente por vários autores (p. ex., GILBERT, 1964; SCHNEIDERMAN & GILBERT, 1964; WIGGLESWORTH, 1964; NOVÁK, 1966; HERMAN, 1968; WIGGLESWORTH, 1970) e não serão apreciadas aqui. O modelo clássico da regulação hormonal dos insetos pode ser resumido como segue abaixo.

As células neurosecretoras localizadas no "pars intercerebralis" secretam o "hormônio cerebral", que se acumula nas "corpora cardiaca", de onde se difunde para a hemolinfa, estimulando as glândulas protorácicas a secretar a ecdisona (hormônio da muda). Sob influência deste hormônio o processo de muda se inicia. O nível de hormônio juvenil, que é produzido nas "corpora allata", determina o tipo de muda. A presença de um título elevado de hormônio juvenil e ecdisona resulta em muda larva-larva; um decréscimo no título de hormônio juvenil leva à muda larva-pupa em Holometabola e as mudas para adulto ocorrem quando ecdisona está presente, mas o hormônio juvenil ausente.

Depois de estabelecido o modelo descrito acima, grande esforço foi realizado na identificação química dos três hormônios envolvidos. Graças aos trabalhos de vários pesquisadores, entre os quais se destacou KARLSON, a ecdisona foi cristalizada, identificada como sendo um esteróide e essa identificação foi confirmada por síntese. Estas descobertas foram amplamente revistas por KARLSON & SEKERIS (1966). Mais tarde foi identificado nas preparações de ecdisona um componente presente em menores quantidades, com atividade similar à ecdisona, ao qual se denominou inicialmente de β -ecdisona e que, após a determinação de sua estrutura, verificou-se tratar-se da 20-hidroxi-ecdisona. Esta substância foi demonstrada ser idêntica ao composto denominado ecdisterona e ao hormônio da muda de crustáceos, a crustecdisona (WIGGLESWORTH, 1970).

A identificação do hormônio juvenil de extratos de Hyalophora cecropia como um derivado terpenóide foi realizada por RÖLLER et alii (1967) e sua confirmação por síntese por DAHM, TROST & RÖLLER (1967).

A natureza química do hormônio cerebral ainda está mal definida, embora resultados recentes indicam tratar-se de um peptídeo ou proteína de baixo peso-molecular e que talvez seja formado por várias espécies de proteínas ou polipeptídeos (Cf. WIGGLESWORTH, 1970).

Além dos três hormônios mencionados acima são conhecidos numerosos outros, mas como não estão diretamente envolvidos no controle do desenvolvimento e metamorfose, não serão discutidos aqui. Os conhecimentos existentes sobre esses hormônios foram revistos por: GILMOUR (1965), NOVÁK (1966), WIGGLESWORTH, (1970), LAW & REGNIER (1971).

O modo de ação dos hormônios morfogenéticos dos insetos tem sido muito estudado. Entre eles o melhor estudado é aquele da ecdisona e nesse sentido merecem uma ênfase especial os estudos realizados em glândulas salivares de Diptera. Estas glândulas, possuem cromossomos politênicos que apresentam um padrão de "puffs" (expansões globulares dos cromossomos politênicos) que são típicos do estágio de desenvolvimento do inseto, assim como, do tecido em que se encontram (Cf. BREUER & PAVAN, 1955; BEERMAN, 1956). Esses "puffs" cromossômicos parecem representar gens em atividade (BEERMAN, 1963) e alguns "puffs" podem ser induzidos especificamente por injeção de ecdisona em larvas de Chironomus (CLEVER & KARLSON, 1960). Essa indução de "puffs" cromossômicos pela ecdisona parece ocorrer mesmo nas condições normais de desenvolvimento larval. Isso foi demonstrado pelo fato de larvas de Drosophila divididas em dois compartimentos por uma ligadura apresentar um padrão de "puffs" da época de formação do pupário, somente nos cromossomos de células das glândulas salivares presentes no mesmo compartimento que contém as glândulas protorácicas. Por outro lado implantes de glândulas salivares de pré-pupas de Drosophila em larvas de último estágio reverteram a um padrão de "puffs" correspondente à época do início da formação do pupário (BECKER, 1962). Mais recentemente AMABIS &

CABRAL (1970) mostraram, em experimentos similares aos de BECKER (1962), que os "puffs" da glândula salivar de R. americana também devem estar sob controles hormonal.

KARLSON e colaboradores conseguiram, em uma série de trabalhos, mostrar que ecdisona injetada em larvas de Calliphora erythrocephala dirige-se ao núcleo das células epidérmicas, onde induz a síntese preferencial de RNAs mensageiros para a síntese de dopa descarboxilase (EC 4.1.26), enzima chave para o início do processo de esclerotização na formação do pupário e, baseando-se nesses resultados e nos discutidos anteriormente, propuseram um modelo para o mecanismo de ação da ecdisona (ver revisão em KARLSON & SEKERIS, 1966). Este modelo consiste em assumir um mecanismo de regulação das células de insetos similar ao proposto por JACOB & MONOD para bactérias e o papel da ecdisona seria combinar-se com repressores específicos, liberando seções específicas do DNA para transcrição. Esse modelo apresenta várias dificuldades, entre elas a não indução de síntese de dopa descarboxilase (EC 4.1.26) na pupa de Calliphora, quando há elevação do título de ecdisona, o que torna mais provável admitir que a ação da ecdisona sobre o material genético seja mais complexa que a proposta por KARLSON & SEKERIS (1966), dependendo do tecido e do seu estágio de desenvolvimento (ver discussão mais ampla em WIGGLESWORTH, 1970).

O hormônio juvenil parece agir sobre o metabolismo de ácidos nucléicos, embora não exista ainda informação precisa sobre o seu mecanismo (SLÁMA, 1971).

Os estudos de endocrinologia de insetos descritos acima, além de terem permitido o estabelecimento de um excelente modelo para estudo da regulação hormonal da expressão genética, que é o desenvolvimento dos insetos, estão fadados a criarem as bases de uma revolucionária tecnologia de combate aos insetos daninhos. Esta tecnologia está assentada no fato do hormônio juvenil impedir o desenvolvimento da pupa em adulto. Assim, pupas de insetos submetidas ao contato, ou mesmo vapores do hormônio juvenil, acabam morrendo por não serem capazes de se desenvolverem até adultos ou, caso se desenvolvam, originam adultos estéreis (SLÁMA, 1971).

Intensas pesquisas estão sendo realizadas atualmente no sentido de se conseguir uma síntese química econômica de análogos do hormônio juvenil, quimicamente estáveis e altamente ativos, e assim criar uma nova geração de inseticidas que não tenham efeitos tóxicos sobre as plantas e animais, incluindo o homem, mas que sejam altamente eficazes contra os insetos (SLÁMA 1971; CRUICKSHANK e PALMERE, 1971). Os análogos do hormônio juvenil possuem, entretanto, uma desvantagem em relação aos inseticidas porque, enquanto estes matam os insetos em poucas horas, os análogos do hormônio juvenil simplesmente impedem a reprodução da praga. Em compensação, os análogos do hormônio juvenil agem em pequeníssimas quantidades, o que permitirá uma poluição ambiental bem menor do que ocorre com os inseticidas atuais, além do fato de alguns análogos do hormônio juvenil terem ação seletiva contra determinados insetos daninhos (SLÁMA, 1971). Recentemente uma firma industrial foi constituída com o exclusivo propósito de desenvolver essa nova geração de inseticidas que ela denominou "Entocon" (Cf. boletins técnicos da Zoecon Corporation 975 California Avenue, Palo Alto, Califórnia 94304).

3. ORIGEM DAS PROTEÍNAS DO INSETO ADULTO

A origem das proteínas do inseto adulto é um dos problemas bioquímicos mais fundamentais da metamorfose destes organismos. A maneira mais simples de considerar o problema (levando em conta o fato de que a pupa e o adulto farão sistemas fechados que trocam apenas gases com o meio ambiente), é admitir que as proteínas larvais são hidrolizadas paulatinamente durante a histólise dos tecidos larvais, desde o início do estágio pupal, e que concomitantemente as proteínas do adulto são sintetizadas "de novo" a partir de aminoácidos livres nos tecidos imaginais em desenvolvimento. Visto assim, esquematicamente a solução do problema se resumiria na demonstração de como é feita a repressão paulatina dos sistemas genéticos responsáveis pela síntese das proteínas larvais e a indução daqueles sistemas envolvidos na síntese das proteínas imaginais, assim como, do mecanismo de controle da hidrólise das proteínas larvais. Existem, entretanto, algumas evidências a indicar que o processo poderia ser

mais complexo, envolvendo a utilização de proteínas larvais na formação das proteínas do adulto sem hidrólise prévia.

As considerações acima mencionadas passaram a serem feitas com base experimental ao se verificar o papel das proteínas da hemolinfa na vitelogênese. Este estudo iniciou-se quando TELFER (1954) mostrou que uma proteína de hemolinfa é tomada pelos ovócitos em desenvolvimento e usada diretamente na constituição do vitelo em Hyalophora (Lepidoptera). Resultados similares foram obtidos por numerosos autores em diferentes ordens de insetos, mostrando que o fenômeno é geral em insetos (Coleoptera: De LOOF e WILDE, 1970. Dictyoptera: ADIYODI, 1967; NIELSEN e MILLS, 1968. Orthoptera: HILL, 1962. Diptera: STRANGWAYS-DIXON, 1962; ORR, 1954a, b). O controle hormonal desse processo foi estudado principalmente em Orthoptera, onde as células neurosecretoras do protocérebro estão implicadas no estímulo à síntese de proteínas da hemolinfa pelo corpo gorduroso, enquanto que a "corpora allata" estimula a tomada pinocitótica dessas proteínas pelos ovócitos em desenvolvimento (TELFER, 1965). Estudos realizados em outras ordens de insetos mostraram, entretanto, que pode haver variações no mecanismo proposto em Orthoptera, havendo uma alteração na importância relativa das células neurosecretoras e "corpora allata" na vitelogênese, conforme o inseto estudado (WIGGLESWORTH, 1970).

As proteínas da hemolinfa, além de serem utilizadas na constituição do vitelo, são tomadas por um processo pinocitótico para vários outros órgãos, no início da pupação (LOUGHTON e WEST 1965; LOCKE e COLLINS, 1966, 1967; TOBE e LOUGHTON, 1969; CHIPPENDALE e KILBY, 1969) onde forneceriam aminoácidos para a síntese "de novo" de proteínas imaginiais (LOCKE e COLLINS, 1966, 1967) e/ou transportariam nutrientes essenciais que lhes estão conjugados como: carboidratos, lipídeos ou cromóforos (LOUGHTON e WEST, 1965). Alguns resultados sugerem que a tomada pelos tecidos, pelo menos no caso do corpo gorduroso em Lepidoptera, seria estimulada pela ecdisona (COLLINS, 1969).

Os trabalhos referidos acima sobre metabolismo de proteínas durante a metamorfose dão uma idéia apenas qualitativa dos fenômenos envolvidos. Um estudo quantitativo desse metabolismo foi realizado por BOYD e MITCHELL (1966). Estes autores

injetaram proteínas da hemolinfa previamente marcadas em larvas de Drosophila melanogaster e verificaram que o seu "turnover" era bastante elevado, o que os levou a propor que as proteínas da hemolinfa seriam intermediários importantes pelos quais passaria a maior parte do "turnover" protéico total do inseto em metamorfose. Uma situação completamente diferente foi encontrada em Phormia regina por CHEN e LEVENBOOK (1966). Estes autores injetaram proteínas marcadas da hemolinfa em larvas, pupas e adultos de Phormia regina e verificaram que a velocidade de degradação das proteínas era sempre baixa e demonstraram também que a injeção de proteínas da hemolinfa marcadas em larvas maduras de Phormia regina pouco antes de puparem levava à recuperação de 3/4 da radioatividade total em proteínas nos tecidos do adulto. A partir desse resultado propuseram que as proteínas da hemolinfa passavam para os tecidos e eram em seguida usadas intactas na formação das estruturas do adulto. Essa proposição foi criticada por WYATT (1968) que argumentou que não é necessário admitir a transformação direta de proteínas da hemolinfa (ou outras proteínas larvais) em proteínas do adulto para explicar os resultados obtidos, bastando admitir que as proteínas tomadas pelos tecidos seriam ali degradadas e os aminoácidos resultantes permaneceriam dentro dos tecidos, onde seriam rapidamente utilizados na ressíntese protéica.

DINAMARCA e LEVENBOOK (1966) medindo a incorporação de alanina e lisina durante a metamorfose de Phormia regina, estimaram a síntese protéica "de novo" durante a sua metamorfose em apenas 2% do total das proteínas do adulto. Embora esse cálculo esteja baseado na hipótese simplificativa de que o "pool" de aminoácidos é homogêneo em todo o inseto, os autores sugeriram, de forma similar a CHEN e LEVENBOOK (1966), que uma parte das proteínas larvais seria conservada intacta no adulto sem degradação e ressíntese.

Devido às dificuldades envolvidas no estudo do metabolismo de proteínas durante a metamorfose, como pode-se avaliar dos trabalhos comentados acima, seria interessante o uso de técnicas mais refinadas, envolvendo o isolamento de proteínas específicas de tecidos individuais e o seu acompanhamento durante a metamorfose. Dentro desse prisma são muito interessantes os estudos relacionados com a califorina.

Califorina é uma proteína isolada de Calliphora erythrocephala, sintetizada pelo corpo gorduroso larval, armazenada principalmente na hemolinfa e que corresponde a 60, 40 e 10% das proteínas extraíveis de insetos com 4 dias após a eclosão, 2 dias após a formação do pupário e 3 dias após a emergência do adulto, respectivamente, indicando que deve ser uma proteína de armazenamento usada na formação dos tecidos imaginiais (MUNN, FEINSTEIN e GREVILLE, 1967; MUNN, PRICE e GREVILLE, 1969; MUNN e GREVILLE, 1969).

A presença de califorina foi pesquisada em outros insetos, utilizando-se técnicas imunológicas e os resultados indicam a ocorrência de reações de identidade completa ou parcial em 4 gêneros de outros Diptera Cyclorrhapha, de identidade parcial em 4 gêneros de Brachycera, apenas uma reação de identidade parcial em 3 gêneros de Nematocera e nenhuma reação em insetos de ordem diferente de Diptera, embora ocorressem partículas semelhantes (ao microscópio eletrônico) à califorina em várias espécies de insetos, especialmente Lepidoptera (MUNN e GREVILLE, 1969). Esses resultados sugerem a ocorrência generalizada de proteínas do tipo da califorina, que seriam armazenadas principalmente na hemolinfa e mais tarde seriam tomadas pelos tecidos no início da pupação (como discutido acima) e, após hidrólise, forneceriam os precursores para a síntese das proteínas do adulto. Essas proteínas poderiam então ser vistas como uma grande reserva de aminoácidos, que ocorreriam na forma de proteínas e não livres, para evitar aumentar a osmolaridade do animal.

Embora os estudos com a califorina indiquem claramente a existência em vários insetos de proteínas larvais com função de simples reserva aminoácidos, não excluem a possibilidade da ocorrência de proteínas larvais que permaneçam intactas no adulto, como comentado anteriormente.

A utilização de proteínas larvais específicas, sem hidrólise prévia, é demonstrada nos dois trabalhos que serão comentados a seguir.

LAUFER e NAKASE (1965) na base de estudos imunoquímicos e radioautográficos propuseram que a maioria das proteínas

da secreção da glândula salivar de Chironomus tentans não são ali sintetizadas, mas são sequestradas da hemolinfa. Esses resultados foram confirmações e a evidência a seu favor estendida pelo estudo das proteínas da hemolinfa e glândula por eletroforese de disco em gel de poliacrilamida, por estudos imunológicos da secreção salivar e por experimentos de incorporação de aminoácidos marcados realizados por DOYLE e LAUFER (1969).

Os resultados evidenciam que o processo de secreção salivar em Chironomus envolve o sequestro de proteínas da hemolinfa de forma similar àquela que ocorre durante a vitelogênese. Duas diferenças importantes devem ser, entretanto, assinaladas. A primeira delas é que o sequestro de proteínas da hemolinfa na formação da secreção salivar tem que ser específico, afim de assegurar que as propriedades químicas e físicas dessa secreção sejam as mesmas, enquanto que na vitelogênese isso não é tão necessário, porque o papel das proteínas sequestradas parece ser o de compor uma reserva de aminoácidos para o desenvolvimento do futuro embrião (geralmente uma proteína é tomada especificamente, enquanto que as outras são tomadas com menor especificidade, Cf. TELFER, 1965). A outra diferença notável é que a secreção é produzida e utilizada na confecção do casulo em que vive a larva do Chironomus enquanto, ele ainda está se alimentando (SÉGUY, 1951; IMMS, 1957), não há necessidade, portanto, dele lançar mão de suas reservas, como ocorre na vitelogênese que se realiza na vida pupal ou no imago recém emergido.

Essa mesma diferença entre a formação da secreção em Chironomus e a vitelogênese é também um obstáculo na consideração dessa formação como um modelo da produção das proteínas imaginiais porque, diferentemente destas, a secreção é formada enquanto as larvas estão se alimentando e em um ambiente hormonal muito distinto daquele em que se inicia a formação das proteínas imaginiais.

4. SÊDAS E CASULOS

As sêdas, definidas como um material fibroso secretado por certas espécies de Insecta e Arachnida (SEIFTER e GALLOP, 1966), apresentam vários tipos estruturais conhecidos. Segundo RUDALL (1962) é possível distinguir pelo menos 3 tipos principais de sêdas. Existem sêdas que são constituídas principalmente por fibroína (comum em *Lepidoptera*), colágeno (ocorrem em *Hymenoptera*) ou quitina (observado em *Dictyoptera*). Os estudos desse último tipo foram realizados apenas com difração de raios-X, mas revelam a existência de um componente protéico associado à quitina que deve-se assemelhar à proteína cuticular (RUDALL, 1962).

Um quarto e um quinto tipo de sêda foram reconhecidos mais tarde em *Neuroptera* cujos componentes principais são: um composto do tipo cuticulina e uma poliglicina, respectivamente (RUDALL e KENCHINGTON, 1971).

As sêdas melhor estudadas são aquelas constituídas principalmente de β -fibroína e produzidas por *Lepidoptera*. Análises de aminoácidos realizadas em fibroínas de 74 *Arthropoda*, principalmente *Lepidoptera*, mostraram que o conteúdo molar de aminoácidos pequenos (alanina, glicina e serina) varia entre 46,2 e 94,6% do total (LUCAS, SHAW e SMITH, 1958, 1960) o que explica uma série de características típicas de difração de raios-X que apresentam, e sua conformação β com cadeias polipeptídicas antiparalelas.

Além da conformação β , outras conformações foram reconhecidas nas fibroínas, usando difração de raios-X: conformação α , observada em *Hymenoptera* e "cross- β " em alguns *Hymenoptera* e em *Arachnocampa luminosa* (*Diptera*). O primeiro tipo de conformação referido permitiu a demonstração de outro caso de transição de conformação α para β por estiramento, além da queratina e o segundo forneceu o primeiro caso conhecido de transformação "cross- β " para β -paralela (RUDALL e KENCHINGTON, 1971).

Análises de aminoácidos realizadas nas sêdas com constituição diferente das β -fibroínas já referidas, permitiram uma melhor compreensão das sêdas tipo colágeno, poliglicina, fibroína,

"cross- β " e α -fibroína. As sêdas do tipo colágeno se caracterizam por um alto conteúdo de glicina, prolina e pela ocorrência de hidroxilisina; aquelas de tipo poliglicina apresentam cerca de 66% dos aminoácidos como glicina; α -fibroínas mostram um conteúdo de glicina baixo e um alto conteúdo de aminoácidos ácidos em relação às β -fibroínas e por fim, as sêdas do tipo "cross- β " caracterizam-se por um alto conteúdo de serina que chega a 43% do total (LUCAS e RUDALL, 1968).

Os estudos sobre as proteínas da sêda tiveram e têm importante papel no conhecimento da conformação de proteínas, além da contribuição ao conhecimento dos produtos naturais de insetos. Os trabalhos de MEYER e MARK (1928) em fibroína da sêda estabeleceram o conceito de cadeias polipeptídicas completamente estendidas, além de fortalecer a visão das proteínas como cadeias longas de α -aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Os trabalhos de MARSH, PAULING e COREY (1955a, b) com o mesmo material foram importantes, no estabelecimento do conceito da fôlha pregueada em estrutura protéica. A sêda rara de Chrysopa permitiu a demonstração da existência da conformação protéica "Cross β " e da transição "Cross β " $\longrightarrow$ β -paralela (PARKER e RUDALL, 1957). Por fim a sêda de Nematus ribesii, permitiu a demonstração de proteínas com conformação de colágeno sem apresentar, entretanto, hidroxiprolina na molécula (LUCAS e RUDALL, 1968; RUDALL e KENCHINGTON, 1971).

Os resultados acima referidos levaram RUDALL (1962) a afirmar que as proteínas da sêda representam modelos biológicos, convenientes para o estudo dos mecanismos evolucionários envolvidos nas transições de conformação de proteínas, além de ilustrar tipos intermediários de proteínas estruturais entre o colágeno e o grupo das proteínas fibrosas afins formado pela querratina, miosina, epidermina e fibrinogênio.

Os componentes não protéicos da sêda foram pouco estudados, como pode-se ver pelo fato das hexosaminas só terem sido determinadas na sêda de Bombyx mori, que é a sêda mais estudada, em 1965 (SMITH e CLARK, 1965).

Além da sêda, os casulos de insetos podem conter também sais, geralmente originados dos túbulos de Malpighi. Esses

sais podem ser de oxalato de cálcio (OHNISHI et alii, 1968) ou carbonato de cálcio (CLARK, 1958; WIGGLESWORTH, 1965).

5. FINALIDADES DÊSTE TRABALHO

O estudo da origem das proteínas imaginais seria muito facilitada se fôsse conhecida alguma estrutura do adulto formada por um pequeno número de proteínas, porém presentes em massa suficiente, para poderem ser isoladas, caracterizadas e ter a sua origem traçada com segurança ao longo da metamorfose. No desconhecimento de uma estrutura imaginal com as características descritas, seria talvez proveitosa a utilização de um modelo.

Um modelo adequado parece ser a produção do casulo por R. americana. Esse casulo possui uma massa considerável, deve possuir um número pequeno de proteínas e é feito depois que a larva parou de comer. Como a glândula salivar da larva não possui um reservatório para acúmulo de secreção, com a qual é feita pelo menos em parte o casulo, essa tem de ser sintetizada a partir das reservas do animal. Portanto, esta síntese dá-se de forma análoga àquela que ocorre durante a metamorfose, quando o animal sintetiza todas as proteínas imaginais a partir de reservas (não importa de que origem), porque nesta ocasião o inseto é um sistema fechado. A produção das proteínas da secreção, ainda de forma análoga àquela na metamorfose, deve ser específica a fim de manter inalteradas as propriedades físicas, químicas e biológicas do casulo.

Um outro aspecto importante do modelo em questão é a produção do casulo ter início no fim do estágio larval, no começo da metamorfose, em ambiente hormonal similar àquele em que tem início a produção das proteínas imaginais (ver item 1, acima). Este aspecto é muito importante porque, considerando-se a metamorfose um tipo particular de polimorfismo (ver item 1), onde os sistemas genéticos da larva, pupa e adulto seriam ativados um após o outro pelo ambiente hormonal interno do animal, se houvesse uma diferença muito grande entre a cronologia da produção do casulo e do início da formação das proteínas imaginais, o que não acontece neste caso, isso poderia corresponder também a um ambi-

ente hormonal muito distinto e, provavelmente, implicaria em processos radicalmente diferentes.

A produção do casulo em R. americana é feita de forma sincrônica e coordenada por larvas oriundas de uma mesma postura e sujeitas às mesmas condições ambientais, o que garante a possibilidade de se estudar larvas em diferentes estágios do desenvolvimento, apresentando um mínimo de variações individuais. Além do mais, a correlação de resultados é facilitada pela existência de um método de datar fisiologicamente as larvas, após o início da produção do casulo, baseado nos "puffs" cromossômicos das glândulas salivares (GUARACIABA e TOLEDO, 1967) que foi ligeiramente reformulado nesta tese (ver Métodos). Como esses "puffs" são regulados por hormônios, assim como todo o desenvolvimento larval, conforme foi comentado no item 2 acima, o referido método de datação é extremamente adequado. É importante acrescentar ainda o fato de que todos os estudos bioquímicos do desenvolvimento de R. americana são facilitados, em relação aos demais insetos Holometabola, com exceção de Lepidoptera, devido ao tamanho de sua larva, que permite com relativa facilidade o estudo de órgãos isolados por dissecação. A dificuldade de se estudar órgãos isolados em larvas da maioria dos Holometabola é a responsável pela incidência maior desses estudos em Lepidoptera, que possuem larvas maiores que as encontradas nas demais ordens de insetos (Cf. WYATT, 1968).

Em vista de todas as características comentadas acima, a produção do casulo por R. americana representa, provavelmente, um modelo mais promissor para o estudo da formação das proteínas imaginais do que a formação da secreção salivar em Chironomus e a vitelogênese referidos no item 3, acima.

A intenção básica deste trabalho é contribuir para o estudo da origem das proteínas do inseto adulto, utilizando como modelo a produção do casulo coletivo por larvas de R. americana. Entretanto, devido à carência quase absoluta de dados fisiológicos e bioquímicos fundamentais em R. americana durante essa produção, este trabalho orientou-se mais especificamente para a obtenção destes dados. Com esse objetivo, dois tópicos principais foram selecionados para estudo:

- a) a composição química da hemolinfa ao longo do desenvolvimento larval;
- b) composição química do casulo coletivo e suas alterações durante a sua produção.

Ênfase foi dada ao estudo da hemolinfa por várias razões:

- a) a hemolinfa corresponde a porção considerável do animal (37% do seu peso-úmido, 26% de seu peso-sêco) e é fácil de se obter;
- b) a hemolinfa deve refletir as principais alterações bioquímicas dos tecidos, porque os insetos possuem um sistema de circulação aberto, em que o único fluido corpóreo é a hemolinfa e somente através da qual muitos órgãos podem trocar compostos entre si;
- c) a participação da hemolinfa em muitos eventos bioquímicos no final da vida larval já foi documentada em vários insetos (WYATT, 1961; WYATT, 1968; ver também item 3), o que abre a possibilidade de la participar na produção do casulo de R. americana.

O estudo químico da hemolinfa foi feito com mais detalhe em larvas no fim da vida larval, pouco antes de iniciarem a produção do casulo (idade de 45-48 dias, quando mantidas a 20°C) porque nessa ocasião o volume de hemolinfa é maior.

O conhecimento da composição do casulo orienta a pesquisa sobre a origem de seus componentes e eventualmente sobre o mecanismo e regulação de sua síntese. Além disso, devido ao fato do casulo ser constituído pelo menos em parte por sêda, sua composição química apresenta um elevado interesse, conforme foi chamado a atenção no item 4 acima. Este interesse ainda é mais acentuado porque esse tipo de produto natural foi muito pouco estudado em Diptera, se fôr excluído o trabalho de GROSSBACH (1969), realizado com a secreção salivar de duas espécies de Camptochironomus. Neste caso a secreção é responsável pela pro-

dução de um fio, semelhante à sêda, que prende partículas de vários materiais, formando um tubo no interior do qual permanece a larva desse animal, não se constituindo, portanto, em um caso verdadeiro, em contraste com o que ocorre em R.americana, porque o tubo não é constituído inteiramente de secreções do animal (SÉGUY, 1951; IMMS, 1957).

MÉTODOS

1. Cultura de Rhynchosciara

Rhynchosciara americana (Diptera Nematocera Sciaridae) foi cultivada nas condições previamente descritas por LARA, TAMAKI e PAVAN (1965). Só foram utilizadas larvas de um mesmo sexo em todas as determinações para simplificar a interpretação dos resultados. O sexo utilizado foi sempre o feminino devido ao seu tamanho maior.

2. Determinação da idade fisiológica larval

O presente trabalho procura entre outras coisas o relacionamento de eventos fisiológicos com alterações químicas em alguns tecidos. Torna-se imperioso então a utilização de métodos adequados para a comparação de resultados obtidos em larvas oriundas de grupos de postura diferentes. Embora a comparação por idade cronológica seja a mais fácil de ser realizada, não é a mais adequada, mesmo em animais submetidos a idênticas condições de cultura. Pequenas diferenças na velocidade de desenvolvimento em grupos da mesma idade cronológica são frequentemente observadas. De maneira geral essas pequenas diferenças não são de importância, entretanto, em alguns casos, nos quais se incluem muitos daqueles descritos nesse trabalho, essas diferenças podem levar a resultados de interpretação difícil.

Um método de datação fisiológica para R. americana foi desenvolvido por GUARACIABA e TOLEDO (1967) para o 4º estágio, o qual corresponde a 70% da vida larval e onde ocorrem os principais e mais visíveis eventos larvais. Abaixo será apresentado o ciclo vital de R. americana afim de facilitar as discussões posteriores e uma tabela das subdivisões do 4º estágio segundo GUARACIABA e TOLEDO (1967) com modificações baseadas em observações feitas durante a realização desta tese. A notação aqui apresentada será empregada em toda a extensão deste trabalho.

As fêmeas de R. americana põem de 1500 a 2000 ovos que eclodem cerca de 13 dias após a postura, a 20°C. As mudas larvais ocorrem aos 7, 13 e 21 dias após a eclosão, enquanto que a muda pupal e a emergência do adulto se dão aos 64 e 70 dias respectivamente. A postura das fêmeas fecundadas inicia-se aos 75 dias. A Tabela I descreve os principais eventos fisiológicos do 4º estágio e a nomenclatura usada para a sua datação. De maneira geral, os eventos fisiológicos descritos (mudança de cor, início da produção de casulo, etc.) oscilam em torno da cronologia apresentada nessa tabela de cerca de 1 a 2 dias. Essa cronologia corresponde a animais se desenvolvendo a 20°C.

Algumas observações quanto à terminologia empregada devem ser feitas, em relação à tabela I. O termo "apólise" usado aqui corresponde ao descolamento das células epidérmicas do exoesqueleto antigo, como proposto por JENKIN e HINTON (1966). Muda será entendida aqui como o processo pelo qual o inseto se despre da cutícula antiga.

Pupa farata corresponde à pupa fechada no interior da cutícula do último estágio larval, como foi comentado no rodapé da introdução (p. 3). A pupa farata é formada, portanto, após a última apólise larval e é chamada também, muitas vezes, pelo termo menos preciso de pré-pupa.

A expressão larva madura que será usada frequentemente nesta tese, refere-se, à larva que atingiu o seu máximo desenvolvimento, isto é, uma larva que está no fim do 2º período (cerca de 45-48 dias de idade).

GUARACIABA e TOLEDO (1967) reportaram a existência de uma muda entre o 5º período e a muda pupal. Entretanto, nenhuma muda verdadeira parece ocorrer nesse intervalo de tempo; os autores devem estar chamando de muda à última apólise larval referida acima.

Outras informações sobre a biologia de R. americana podem ser encontradas em DREYFUS et alii (1951) e GUARACIABA e TOLEDO (1967).

TABELA I

Subdivisão do 4º estágio de R. americana

Idade Cronológica aproximada (dias)	Eventos Fisiológicos ou Aparência da larva	Correspondente ao início do período
21	3ª muda larval, larvas claras	1º
32	Larvas começam a se tornarem avermelhadas	2º
49	Larvas iniciam a tecer o casulo	3º
54	Início da formação do "puff" B-2 da glândula salivar. Casulo consistente	4º
57	Máximo desenvolvimento do "puff" B-2 larvas quietas, em posição curva	5º
58	Máximo desenvolvimento do "puff" C-3. Larvas curvas, mas já envolvidas por células individuais do casulo	6º
59	Última apólise larval. Túbulos de Malpighi livres de CaCO_3	Pré-Pupal (pupa farata)
61-64	Muda pupal	

3. Coleta de hemolinfa

As larvas eram lavadas com água, dispostas sobre gelo picado para ficarem imóveis, secas em papel de filtro e em seguida picadas na porção terminal do abdome com um estilete. A hemolinfa era recolhida em tubos de centrifuga mantidos em gelo. Após centrifugação a 3.200g a 4°C, para sedimentar hemocitos e fragmentos tissulares, a hemolinfa sobrenadante era usada nas determinações químicas.

Para a determinação de compostos ninhidrina-positivos, a hemolinfa era recolhida sobre cristais de feniltiouréia colocados nos tubos de centrifuga a fim de inibir a atividade da tirosinase (EC 1.10.3.1) endógena (LEVENBOOK, 1966). Nas determinações de metais, o estilete usado para picar a larva era de vidro e toda a vidraria usada era previamente lavada extensivamente com H_2SO_4 , HCl e água bidestilada e deionizada.

4. Determinação do volume ocupado pelos hemocitos na hemolinfa

Hemolinfa coletada com todo o cuidado para evitar contaminação com fragmentos tissulares e sem ser centrifugada foi aspirada para capilares de 25 μ l ("disposable micropipettes", DRUMOND Microcaps), conservando-se cerca de 4 mm de altura não preenchidos. Por esse lado, os capilares foram selados em lâmpada a álcool e em seguida, centrifugados envolvidos por algodão, em cabeças de centrifuga com tubos basculantes. Foram usadas rotações correspondentes a 1500g ou 3200g com resultados idênticos. A medida da altura do capilar ocupado pela hemolinfa e a altura da calota ocupada pelos hemocitos, realizada sob uma lupa estereoscópica, permitia calcular o volume de hemolinfa no capilar e o volume de hemocitos correspondente a essa hemolinfa. Esses dois resultados permitiram calcular facilmente o volume porcentual ocupado pelos hemocitos na hemolinfa.

5. Métodos de estudo da coagulação e escurecimento da hemolinfa

Cinco capilares de 15 μ l ("disposable micropipettes" , DRUMMOND Microcaps) foram preenchidos com hemolinfa total e cinco outros preenchidos com hemolinfa centrifugada de larvas de 29 P, 45 dias de idade. Após 1, 2, 5, 10 e 15 horas, os capilares eram observados quanto à cor, presença de sedimentos e fluidez. Paralelamente eram feitas observações similares em um tubo de ensaio com cerca de 0,5 ml de hemolinfa total.

6. Determinação da osmolaridade, densidade, volume e peso-seco da hemolinfa

As determinações de osmolaridade foram todas realizadas utilizando-se o método crioscópico em um Fiske Osmometer, gentilmente cedido pelo Dr. Gerhard Malnic.

A densidade foi sempre determinada pesando-se "disposable micropipettes" (Drummond Microcaps) de 15 μ l com e sem hemolinfa. Os desvios observados entre as determinações foram inferiores a 1%.

Os volumes de hemolinfa foram todos determinados pelo método de exanguinação (RICHARDSON, BURDETTE e EAGLESON, 1931). O método de diluição de corante (PRICE, 1961) foi também, tentado, produzindo-se nos casos favoráveis (larvas jovens), resultados muito semelhantes aos de exanguinação como pode ser visto em resultados (Tabela XVII). Esse método foi entretanto abandonado porque em larvas maduras os resultados variavam muito dependendo do intervalo de tempo entre a injeção e a coleta de hemolinfa. Essa variabilidade deve ser consequência de excreção do corante pelos túbulos de Malpighi, como demonstrado em Schistocerca gregaria por LEE (1961). Como nenhuma excreção de corante foi observada em larvas jovens isso parece sugerir que a eliminação de corante varia com a idade e que portanto, seria necessário determinar cuidadosamente os tempos máximos a serem usados entre injeção de corante e coleta de hemolinfa para cada idade. Em vista disso preferiu-se utilizar somente o método de exanguinação.

A massa de sólidos da hemolinfa foi obtida aquecendo-se amostras de hemolinfa centrifugada a 80°C até atingir peso constante.

7. Determinação de pO_2 , pCO_2 , pH e HCO_3^- na hemolinfa

Amostras de hemolinfa foram colhidas picando-se as larvas, limpas como descrito anteriormente, sob uma espessa camada de óleo de parafina. Essas amostras foram em seguida utilizadas para a determinação anaeróbica de pO_2 , pCO_2 e pH em um "pH/Gas Analyser Model 113" da "Instrumentation Laboratory Inc., Boston, Massachusetts", cedido pelo Dr. Herval P. Ribeiro. Todas essas determinações foram realizadas com o aparelho termoestatizado a $37^\circ C$.

As concentrações de HCO_3^- foram calculadas a partir das determinações de pH e pCO_2 usando a equação abaixo, assumindo-se que as constantes a e pK são idênticas na hemolinfa e plasma sanguíneo humano. Neste os valores de a e pK são 0,0310 e 6,10 respectivamente, a $37^\circ C$, quando HCO_3^- é medido em milimoles por litro e pCO_2 em milímetros de mercúrio (DAVENPORT, 1958).

$$pH = pK + \log \frac{[HCO_3^-]}{a(pCO_2)}$$

O pH de hemolinfa coletada como descrito acima foi medido a $25^\circ C$, em condições anaeróbicas, usando um microeletrodo de vidro de um "Metrohm Herisau pH Meter", gentilmente cedido pelo Dr. Gerhard Malnic.

8. Determinações químicas na hemolinfa

Aminoácidos e peptídeos livres serão discutidos separadamente no item 9.

α -amino-N total-ácido solúvel. Amostras de 80 μl de hemolinfa foram adicionadas a 0,72 ml de NaCl 0,1M e centrifugada a 4500g por 10 minutos, para a remoção de hemocitos. Juntou-se 0,5ml de $HClO_4$ 1N a 0,5ml do sobrenadante acima. Centrifugou-se 10 minutos a 11500g e lavou-se duas vezes o sedimento com 0,5 ml de $HClO_4$ 0,5N. Os sobrenadantes reunidos foram diluídos convenientemente e usados para a determinação de α -amino N total-ácido solúvel pelo método de ROSEN (1957). A padronização foi feita com DL-leucina.

Carboidrato e trealose. Alíquotas de 0,15 ml de hemolinfa centrifugada eram reunidas com 1 ml de etanol 60% v/v, deixados a 75°C por 10 minutos e após atingir a temperatura ambiente eram centrifugadas. Após recolher o sobrenadante, o sedimento era novamente aquecido com etanol 60% v/v e centrifugado como acima. Essa operação era repetida mais uma vez. Os sobrenadantes reunidos eram diluídos convenientemente com etanol 60% v/v e alíquotas desses eram usadas, depois de evaporadas em estufa a 60°C para a determinação de carboidratos com reagente de antro-na segundo MOKRASCH (1954). A massa de carboidratos era calculada como glicose.

O extrato alcoólico preparado acima foi usado também para o isolamento químico e determinação quantitativa de trealose de acordo com a metodologia de WYATT e KALF (1957).

Cloreto. Todas as determinações foram feitas com hemolinfa centrifugada total usando a técnica de SHALES e SHALES (1941).

Cinzas. Essas foram determinadas por incineração de amostras de 1 ml de hemolinfa centrifugada em cápsulas de platina, em mufla a 560°C, até produzir cinzas brancas.

Citrato. Foi determinado em amostras de hemolinfa centrifugada e desproteinizadas de acordo com ETTINGER, GOLDBAUM e SMITH Jr. (1952).

Fósforo total, inorgânico, ácido solúvel, lipídico e protéico. O método empregado para a determinação de fósforo total, inorgânico, lipídico e ácido solúvel foi aquele descrito por CHEN, TORIBARA e WARNER (1956). As amostras para a determinação de fósforo protéico foram preparadas por duas técnicas diferentes: uma envolvendo precipitação das proteínas por TCA e outra por sulfato de amônio. A primeira preparação consistia em tomar alíquotas de 0,2 ml de hemolinfa centrifugada e adicionar 0,8 ml de TCA 10% P/V. Após a centrifugação e desprezo do sobrenadante, o sedimento era lavado com 1 ml de TCA 5% P/V e o sobrenadante novamente desprezado. O sedimento era então suspenso em 1,5 ml de etanol-éter (3:1, v/v), aquecido à ebulição, centrifu-

gado e o sobrenadante desprezado. O último passo era repetido 3 vezes. O sedimento era em seguida lavado com 1,5 ml de acetona e depois incinerado e usado para a determinação de fósforo pela técnica referida acima.

A determinação de fósforo protéico, envolvendo precipitação das proteínas com sulfato de amônio foi realizada tomando alíquotas de 0,2 ml de hemolinfa centrifugada e lhes adicionando 0,6 ml de sulfato de amônio saturado (à temperatura ambiente, 23°C). Após a centrifugação e abandono do sobrenadante, o sedimento foi lavado com 1,0 ml de sulfato de amônio 75% saturado. Após nova centrifugação e desprezo do sobrenadante, o sedimento foi suspenso em 3,8 ml de etanol-éter (3:1, v/v), aquecido até a ebulição, centrifugado e o sobrenadante, descartado. O último passo foi repetido uma vez e o sobrenadante final, após incineração, foi usado para a determinação de fósforo.

O conteúdo do fósforo protéico determinado após a preparação das proteínas por qualquer das duas técnicas descritas acima, é o mesmo.

Glicogênio. Amostras de 0,4 ml de hemolinfa centrifugada eram desproteinizadas com 0,1 ml de HClO_4 2,5N. O sedimento obtido por centrifugação era lavado com 0,5 ml de HClO_4 0,5N e todos os sobrenadantes reunidos. A estes juntava-se 2,5 ml de etanol absoluto e incubava-se a preparação a 37°C por 15 minutos. Em seguida, o material era centrifugado e o sobrenadante desprezado. O sedimento era então lavado duas vezes com 0,5 ml de etanol 80%, evaporado em estufa a 60°C e usado para as determinações de carboidratos pela reação de antrona segundo MOKRASCH (1954). A massa de glicogênio era calculada como glicose. É possível que a fração assim isolada e determinada contenha substâncias antro-na-positivas diferentes do verdadeiro glicogênio (BALMAIN, BIGGERS e CLARINGBOLD, 1956).

Lipídeos. Estes foram isolados quantitativamente de amostras centrifugadas de hemolinfa pela técnica de FOLCH, LEE e SLOANE-STANLEY (1957) e determinados gravimêtricamente, após evaporação do solvente da extração por pressão reduzida, à temperatura ambiente, até se obter peso-constante.

Metais. A matéria orgânica de amostras de hemolinfa centrifugada com as precauções já descritas, era destruída e o material remanescente, após diluições convenientes em água bidestilada e deionizada era usado para as determinações de metais por espectroscopia de absorção atômica. Para essa finalidade foi empregado um "Atomic Spectrometer" da "Perkin-Elmer" operado pela srta Yolanda Taváres.

As determinações de sódio e potássio, entretanto, foram realizadas sem destruição prévia da matéria orgânica, por espectroscopia de chamas, em um "Flame Photometer Evans" da "Electroselenium Ltd.", gentilmente cedido pelo Dr. Gerhard Malnic.

Três técnicas distintas foram utilizadas para a destruição da matéria orgânica. A primeira delas consistia em incinerar a hemolinfa em cápsula de platina ou porcelana (os resultados foram idênticos) em uma mufla a 560°C até a formação de cinzas brancas. Outra técnica consistia em destruir a matéria orgânica da mesma forma que a descrita por CHEN, TORIBARA e WARNER (1956) antes de determinar fósforo total. Por fim outra técnica utilizada consistia em aplicar a hemolinfa em quadrados de papel Whatman nº1 de cerca de 4cm de lado e colocar o sistema em um frasco de combustão de Schöniger para a sua destruição por radiação infravermelha.

Como os resultados obtidos com as três técnicas de destruição foram idênticos passou-se a utilizar a técnica que fôsse mais conveniente na ocasião.

Proteínas. Estas foram determinadas utilizando-se o procedimento de LOWRY et alii (1951). Afim de se eliminar interferências de compostos não protéicos, a absorbância de cada amostra foi corrigida pela absorbância do sobrenadante de uma duplicata desproteïnizada com HClO_4 , em concentração final de 0,5N; ambas absorbâncias medidas após a reação colorimétrica. Os títulos de proteína foram calculados tendo albumina cristalina de sêro bovino como padrão.

9. Cromatografia de troca iônica dos compostos ninhidrina-positivos ácido-solúveis da hemolinfa

A preparação das amostras de hemolinfa, coletadas como descrito antes, para a identificação e quantificação dos compostos ninhidrina-positivos ácido solúveis, tanto hidrolizadas quanto não hidrolizadas, foi feita segundo LEVENBOOK e DINAMARCA (1966)

A cromatografia foi realizada em um "Beckman Aminoacid Analyser, Model 120C", gentilmente cedido pela Dra. Rebeca C. de Angelis, utilizando o procedimento para fluídos fisiológicos fornecido junto com o equipamento da Beckman e que consiste em uma pequena modificação do método de SPACKMAN, STEIN e MOORE (1958).

A identificação de cada pico nos cromatogramas foi feita baseando-se em seu tempo relativo de eluição, sua razão de absorbância 440/570 mμ (ZACHARIUS e TALLEY, 1962) e em seu comportamento na hidrólise. O tempo relativo de eluição dos compostos permitia a sua identificação por comparação com cromatogramas realizados com uma amostra de 17 aminoácidos, cromatograficamente puros adquiridos de "Mann Research Laboratories", ou/e com cromatogramas publicados (SPACKMAN, STEIN e MOORE, 1958; ZACHARIUS e TALLEY, 1962; HAMILTON, 1963). Para a observação do comportamento dos compostos na hidrólise, amostras eram hidrolizadas (ver acima) e cromatogramas obtidos com essas eram comparados com aqueles de amostras não hidrolizadas. Na identificação de vários picos não foi possível utilizar todos esses critérios. Nesses casos, a identificação foi considerada apenas tentativa.

Os resultados quantitativos foram obtidos por integração da área sob os picos dos cromatogramas e utilizando constantes de cor para cada aminoácido, conforme determinado nos cromatogramas padrões. No caso de compostos que não estavam presentes na mistura padrão, usou-se a constante de cor média, corrigida por fatores fornecidos pela "Beckman Instruments Inc." adequados para cada modelo de equipamento e correspondentes a cada composto. No caso de peptídeos usou-se a constante de cor média. Essa constante média é obtida tomando-se a média de todas as constantes de cor para os aminoácidos comuns exceto: histidina, lisina, arginina, prolina e cisteína.

As concentrações de serina, treonina, tirosina e prolina nas amostras hidrolizadas foram elevadas de 15, 5, 6 e 5% respectivamente para compensar as perdas durante a hidrólise ácida. As correções foram calculadas para o tempo de hidrólise de 18 horas utilizado aqui, a partir dos resultados de HIRS, STEIN e MOORE (1954).

10. Preparação dos pigmentos da hemolinfa

Um volume de hemolinfa centrifugado era reunido a 19 volumes de clorofórmio-metanol 2:1 (v/v, ambos redestilados) bem agitados e filtrados em papel de filtro quantitativo, pré-lavado com clorofórmio-metanol. Ao filtrado adicionou-se 0,2 volumes de água deionizada e após agitação o material foi centrifugado a 11500g por 10 minutos. A fase superior aquosa continha um pigmento de cor limão, enquanto que a fase lipídica apresentava uma cor alaranjada. A fase aquosa após ser evaporada à pressão reduzida e ao abrigo da luz, teve o seu resíduo dissolvido em metanol 90% (v/v) e lavado por agitação com igual volume de éter de petróleo (p.e. 30-50°C) duas vezes. Depois disso o pigmento cor de limão teve o seu solvente novamente evaporado e foi conservado no vácuo e ao abrigo da luz até a sua utilização. Essa preparação é chamada daqui para diante de pigmento limão.

A fase lipídica foi evaporada à pressão reduzida e ao abrigo da luz e em seguida, seu resíduo foi dissolvido em éter de petróleo (p.e. 30-50°C). Essa dissolução foi imediata e completa o que indicava, juntamente com a cor alaranjada, que se tratava de carotenóides. O material dissolvido em éter de petróleo, após duas lavagens por agitação com igual volume de água deionizada, foi recolhido, evaporado e conservado no vácuo, ao abrigo da luz até a sua utilização. Essa preparação é denominada daqui para diante de carotenóides da hemolinfa.

A saponificação dos carotenóides da hemolinfa foi realizada essencialmente como recomendado por KARRER e JUCKER (1950). A amostra foi dissolvida em 2 ml de KOH 12% em metanol, transferido para tubo de ensaio, ao qual, juntou-se alguns cristais de pirrogallol e deixou-se 25 minutos a 75°C, após fechar o tubo com algodão. Esfriou-se o tubo em gelo e adicionou-se 6ml de água deio

nizada e 4 ml de éter de petróleo (p.e. 30°-50°C). Depois de agitar bem, a fase do éter de petróleo foi recuperada, lavada por agitações com água e usada em seguida ou conservada no vácuo, ao abrigo da luz, após evaporação do solvente.

11. Identificação dos carotenóides

A identificação dos carotenóides da hemolinfa foi tentada utilizando-se: partição em duas fases, cromatografia de adsorção em hidroxiapatita e um teste qualitativo para astaxantina.

Partição. A separação dos carotenóides da hemolinfa em carotenóides epifásicos e hipofásicos foi feita por partição entre éter de petróleo (p.e. 30°-50°C) e metanol 90% v/v (Cf. KARRER e JUCKER, 1950). Com essa finalidade, a amostra dissolvida em éter de petróleo (p.e. 30°-50°C) foi juntada a igual volume de metanol 90% v/v, agitada e deixada a repousar.

Cromatografia. A montagem da coluna de hidroxiapatita foi feita como se segue. Uma coluna de vidro de 1,2 cm de diâmetro foi preenchida inferiormente com algodão formando uma camada de 2 cm de altura. Este algodão foi previamente lavado com acetona e éter de petróleo. Após fechar a extremidade inferior, adicionou-se uma suspensão de hidroxiapatita em éter de petróleo, suficiente para produzir uma coluna de sedimento de 8,0 cm de altura. Seguiu-se a adição de uma suspensão de Na₂SO₄ em éter de petróleo, para produzir um sedimento de 1,0 cm de altura.

As amostras de carotenóides saponificadas ou não eram dissolvidas em éter de petróleo (p.e. 30°-50°C) e aplicadas na coluna. A separação dos carotenóides ao longo da coluna de hidroxiapatita era feita com éter de petróleo (p.e. 30°-50°C), enquanto que a sua eluição para fora da coluna era realizada com solventes aplicados na seguinte ordem: éter de petróleo (p.e. 30°-50°C), acetona 7% em éter de petróleo e acetona.

Teste qualitativo para astaxantina. O teste foi realizado como descrito por GOODWIN e SRISUKH (1949). O t-butóxido de potássio usado no teste foi preparado segundo JOHNSON e SCHNEIDER (1963).

12. Preparação do casulo I, II e III e determinação da massa produzida por indivíduo

Diferentes grupos de larvas maduras limpas em número conhecido foram colocadas em recipientes forrados com um papel de filtro mantido sempre úmido. Os grupos após iniciar a produção de casulo tinham as suas larvas removidas em tempos adequados, o peso-sêco do casulo produzido até a ocasião era determinado e a partir do número de larvas presentes era calculada a produção por larva. Para facilitar o estudo, o período de produção do casulo foi dividido em 3 fases. A primeira fase corresponde à produção do casulo do início até o começo do 4º período do 4º estágio; a segunda, do começo do 4º período até 5º período e a terceira fase do 5º período até a muda pupal. O casulo produzido do início até o fim da primeira fase foi denominado de casulo I; do início até o fim da segunda fase, de casulo II; e do início até o fim da terceira fase, de casulo III. Evidentemente, pela nomenclatura usada o casulo III corresponde ao casulo terminado, enquanto que os demais correspondem ao casulo em fases anteriores de produção.

13. Determinação da solubilidade do casulo

Amostras secas e trituradas de casulo pesando cerca de 100 mg foram colocadas em tubos de centrífuga previamente levados a peso-constante. Essas amostras eram lavadas 3 vezes com 5 ml de água deionizada cada vez. A recuperação do material insolúvel foi sempre realizada por centrifugação a 11500g. O material remanescente após as lavagens foi pesado depois de ter sido seco a peso-constante em estufa a 100°C. A diferença de peso observada em relação às amostras antes de serem lavadas, foi considerada como a massa de material hidrossolúvel.

Amostras de cerca de 100 mg de casulo, lavadas com água como descrito acima, foram colocadas em tubos de centrífuga previamente levados a peso-constante. Adicionou-se em cada tubo 5ml de ácido acético 10% (v/v), agitando com bastão até a efervescência observada desaparecer. Após centrifugação a 11500 g, o sedimento foi lavado duas vezes com 1 ml de ácido acético 10% e uma vez com 1 ml de água. O sedimento remanescente das lavagens foi

sêco a pêsso constante e pesado. A diferença do último pêsso e o inicial foi assumido como massa de material hidroinsolúvel e ácido acético solúvel. O sedimento remanescente no final foi denominado fração insolúvel do casulo.

14. Determinações químicas do casulo

Aminoácidos da fração insolúvel serão discutidos no item 16.

α -amino-N total insolúvel. Amostras sêcas de cêrca de 50 mg da fração insolúvel, preparadas como descrito acima foram hidrolizadas em 100 ml de NaOH 5N a 100°C por 8 horas. Alíquotas diluídas do hidrolizado eram acertadas para pH 6,0 com ácido acético glacial e o conteúdo de α -amino N foi determinado pela técnica de ROSEN (1957), usando como padrão DL-leucina.

Carboídratos insolúveis e purificação de melanoidinas. Amostras sêcas de cêrca de 10 mg da fração insolúvel do casulo foram hidrolizadas em balões volumétricos de 10 ml, com cêrca de 2 ml de HCl 3N, a 100°C, durante vários períodos de tempo. Terminada a hidrólise, as amostras eram acertadas para 10 ml com água e filtradas em lã de vidro. Esses filtrados foram utilizados para a determinação de hexosaminas, ácidos urônicos, açúcares neutros e para a purificação e isolamento de melanoidinas.

As hexosaminas foram determinadas nos filtrados usando uma modificação do método de ELSON-MORGAN, após purificação em Dowex-50, como descrito por BOAS (1953). Foi utilizado como padrão galactosamina HCl purificada em Dowex-50 como as amostras.

Os açúcares neutros foram determinados nos filtrados dos hidrolizados pela reação de fenol- H_2SO_4 , segundo a técnica de DUBOIS et alii (1956). Tôdas as determinações foram realizadas na presença e ausência de fenol. O valor aceito para cada amostra foi a diferença entre as duas determinações. Esse cuidado foi tomado para eliminar as interferências devido à produção inespecífica de côr resultante do aquecimento com H_2SO_4 . Glicose foi utilizada como padrão nessas determinações. Deve-se notar que o

método de fenol- H_2SO_4 é empregável para açúcares neutros e ácidos urônicos. Entretanto, como no presente material o conteúdo de ácidos urônicos é insignificante em relação ao conteúdo de carboidratos total medido com fenol- H_2SO_4 (ver Resultados), a presente determinação pode ser considerada uma determinação de açúcares neutros.

Os ácidos urônicos foram determinados nos filtrados dos hidrolizados após reação com carbazol, segundo GALAMBOS (1967) utilizando ácido glicurônico como padrão.

O isolamento de melanoidinas dos filtrados dos hidrolizados foi conseguido como se segue. Amostras dos filtrados foram aplicados em uma coluna de Dowex-50 preparada como descrito por BOAS (1953) e eluídas com 10 ml de água, seguido de 5 ml de HCl 2N. Nessas condições os carboidratos ácidos e neutros, aminoácidos e hexosaminas são liberados da coluna, enquanto que o pigmento ainda fica retido. Esse foi então eluído com NaOH 2N. Após neutralização o eluato foi submetido à reação de ELSON-MORGAN na modificação proposta por BOAS (1953) e seu espectro de absorção realizado. A absorbância em cada comprimento de onda foi corrigida pela absorbância do pigmento purificado e na mesma diluição que aquele medido após a reação de ELSON-MORGAN.

Carboidratos solúveis. Foram determinados segundo DUBOIS et alii (1956) usando o mesmo cuidado para eliminar interferências descrito acima.

Carbonato. Foi identificado no casulo como descrito em seguida. Cerca de 50 mg de casulo foi colocado em um sistema fechado, 2 ml de H_2SO_4 0,1N foram adicionados e o frasco aquecido em banho-maria. O gás liberado foi recolhido em solução saturada de Ca(OH)_2 . Afim de evitar qualquer dúvida quanto à identidade do precipitado branco formado na solução de Ca(OH)_2 , cerca de 50 mg de casulo foi previamente tratada com H_2O_2 100 volumes e em seguida o procedimento acima foi repetido.

Cinzas. Foram determinadas após o aquecimento em cadinho de porcelana a 800°C , em mufla, até produzir cinzas brancas. Foram usadas amostras de casulo seco (determinação de cinzas to-

tais) e de casulo após lavagens em água e ácido como descrito no item 13 (determinação de cinzas insolúveis).

Lipídeos. Foram determinados como descrito para hemo-linfa.

Metais. Foram determinados como descrito para hemo-linfa, com exceção de K^+ que foi determinado como os outros metais, isto é, por espectroscopia de absorção atômica, após destruição da matéria orgânica.

Nitrogênio-total da fração insolúvel do casulo foi determinado segundo o método de Kjeldahl, como recomendado por ALBANESE e ORTO (1963).

Proteínas solúveis. Foram determinadas como descrito por LOWRY et alii (1951), usando albumina cristalina de sêro bovina como padrão.

15. Cromatografia em papel de carboidratos do casulo

Amostras de cerca de 7 mg de casulo lavado em água e ácido (ver item 3) foram hidrolizados em 1 ml de HCl 3N por 2 horas a 100°C. Os hidrolizados filtrados em lâ de vidro foram aplicados diretamente no papel de cromatografia.

O sistema de cromatografia usado foi sempre o descendente em cuba pré-saturada com o solvente a ser empregado para desenvolver o cromatograma. Foram usados dois tipos de sistemas solventes: um deles consistia em butanol-etanol-água (10:1:2, v/v/v) com um tempo corrido de 92-94 horas e o outro em butanol-piridina-água (3:1:1, v/v/v) com uma corrida de 27-29 horas. O papel para cromatografia usado foi Whatman nº 1 e em apenas um caso foi usado papel Whatman 3MM que produziu resultados idênticos.

A revelação dos cromatogramas foi realizada usando uma ligeira modificação do sistema de nitrato de prata introduzido por PARTRIDGE e WESTALL (1948). Foi usado também um sistema de

revelação específico para hexosaminas, baseando-se em uma modificação do método de ELSON-MORGAN desenvolvido por PARTRIDGE e WESTALL (1948).

A identificação dos carboidratos foi realizada correndo amostras de carboidratos conhecidos no mesmo cromatograma e comparando-se as migrações. A comparação da migração de um composto em cromatogramas diferentes foi feita pelo seu RG, definido pela razão entre sua migração e a da glicose no mesmo cromatograma.

16. Cromatografia na troca iônica de aminoácidos da fração insolúvel do casulo

Amostras de 6-9 mg da fração insolúvel do casulo secas e finamente pulverizadas, foram pesadas em ampolas. Adicionou-se 2 ml de HCl 6N em cada ampola. Estas foram seladas à vácuo (110 mm Hg) e 3 delas aquecidas a 105°C por 22 horas, enquanto que 3 outras por 70 horas. Então o conteúdo das ampolas e as lavagens dessas foram filtrados em lã de vidro. Os filtrados foram recolhidos, liofilizados e depois dissolvidos em 4,0 ml de tampão citrato de sódio pH 2,20 (0,2N em sódio). Alíquotas de 0,25 ml desses foram aplicados em um "Beckman Aminoacid Analyser Model 120C", gentilmente cedido pela Dra. Rebeca C. de Angelis, e as cromatografias foram realizadas usando o procedimento de 2 horas para hidrolizados protéicos, descritos em boletins técnicos fornecidos juntamente com o equipamento.

A identificação e quantificação de cada pico presente nos cromatogramas foi feita como descrito no item 9 acima. Os títulos dos aminoácidos instáveis em ácido foram extrapolados para tempo zero de hidrólise, como descrito por HIRS, STEIN e MOORE (1954), a partir dos resultados obtidos nos dois tempos de hidrólise empregados.

17. Determinação de peso-sêco e metais nos tubos de Malpighi

As larvas eram dissecadas em NaCl 0,1M, os túbulos de Malpighi removidos, lavados em NaCl e deixados de maneira a permitir o escoamento da solução de lavagem. Depois disso eles eram colocados em pesa-filtros previamente levados a peso-constante e secos até peso-constante, em estufa a 100°C, para determinação de seu peso-sêco ou aplicado em quadrados de papel Whatman nº 1 e usados para a determinação de metais, como descrito no item 8, com exceção do K, que também foi determinado por espectroscopia de absorção atômica, após destruição da matéria orgânica.

18. Determinação de glicogênio e peso-sêco do corpo gorduroso

As larvas eram dissecadas em NaCl 0,1M, os corpos gordurosos centrais eram removidos, lavados em NaCl 0,1M e deixados de maneira a permitir o escoamento da solução de lavagem, em tubos mantidos no gelo. Depois disso eles eram usados para as determinações de glicogênio ou colocados em pesa-filtros e secos até peso-constante em estufa a 100°C, para determinação de seu peso-sêco.

O glicogênio do corpo gorduroso foi preparado a partir de hidrolizado alcalino do tecido de forma similar àquela descrita por BELL e YOUNG (1934). Após a sua preparação o glicogênio foi quantificado por reação com antrona, segundo MOKRASCH (1954), usando glicose como padrão. É possível que a fração assim isolada e determinada contenha substâncias antrona-positivas diferentes do verdadeiro glicogênio (BALMAIN, BIGGERS e CLARINGBOLD, 1956).

REAGENTES

Os aminoácidos usados eram produtos cromatograficamente puros da Mann Research Laboratories.

A hidroxapatita empregada era produto especial para cromatografia em coluna (Bio Gel HTP) fornecida pelo Bio Rad Laboratories, Richmond, California.

Éter de petróleo foi obtido por destilação fracionada (fração de p.e. 30^o-50^oC) do produto técnico.

Etanol também foi obtido do produto técnico por destilação simples.

Clorofórmio, metanol e butanol eram produtos analíticos da British Drug Houses e eram redestilados antes de usar.

As resinas de troca iônica Dowex empregados foram obtidas da Sigma Chemical Company.

Todos os demais reagentes empregados foram produtos analíticos obtidos principalmente da British Drug Houses, E. Merck A. G. e J. T. Baker.

RESULTADOS

A. Química da hemolinfa de larvas de R. americana

1. Resultados Gerais

A hemolinfa de larvas maduras de R. americana é um líquido escuro, avermelhado, formado por 89% em massa de água e 11% de substâncias sólidas. Seu pH medido sem entrar em contacto com o ar é de 7,27, a 25°C ou 37°C e é similar ao determinado para outros Diptera Nematocera (Cf. BUCK, 1953).

O abaixamento do ponto de congelação observados em média é de -0,402°C, que corresponde a uma osmolaridade de 216 miliosmoles. Esse abaixamento é pequeno em relação aos demais insetos, com exceção de larvas aquáticas de Diptera (Cf. BUCK, 1953). TOKUMARU, FERRI e WORSMANN (1968) encontraram uma osmolaridade correspondente a 320 miliosmoles para a hemolinfa de R. americana, utilizando método baseado na alteração ou não do tamanho de gotas de hemolinfa fechadas em capilares e separadas por camadas de ar de gotas de soluções de KCl de concentrações conhecidas por 24 horas. Esses resultados são, entretanto, de valor duvidoso porque a hemolinfa possui numerosas enzimas hidrolíticas como amilases, esterases, proteases, fosfatases, etc. (FLORKIN e JEUNIAUX, 1964) e é difícil se assegurar que não tenha havido intensa hidrólise de compostos durante um período tão longo e à temperatura ambiente. Além do mais, meios com osmolaridade de cerca de 216 miliosmoles foram feitos e usados com sucesso para a incubação de glândulas salivares de R. americana (LARA e TOLEDO, citado em ARMELIN, MENECHINI e LARA, 1969; TERRA et alii, manuscrito em preparação).

A densidade média da hemolinfa de larvas maduras é de 1,043 que é um valor elevado entre insetos (Cf. BUCK, 1953).

A hemolinfa da maioria dos insetos apresenta hemócitos em circulação que podem ocupar volumes de até 15% do volume to-

tal da hemolinfa, em certas ocasiões como na muda (BUCK, 1953). Em R. americana, o volume ocupado pelos hemocitos é de cerca de 0,3% do volume total da hemolinfa, o que dispensa a necessidade de se corrigir os títulos dos compostos determinados no plasma (hemolinfa centrifugada) para hemolinfa total. O valor de 0,3% obtido concorda com a maioria dos determinados para hemolinfa de insetos (Cf. BUCK, 1953).

A hemolinfa de larvas de R. americana deixada em repouso por períodos de até 15 horas à temperatura ambiente, na ausência ou presença de hemocitos, não coagula e escurece muito pouco. Por outro lado, amostras de hemolinfa centrifugadas e diluídas 10 vezes com água deionizada, mesmo mantidas no gelo, escurecem e flocculam intensamente após 2 horas, resultando em espesso sedimento cinzento escuro. Entretanto, se uma centrifugação for feita logo após a diluição, resulta em sedimento amarelado, correspondente a apenas 3% das proteínas da hemolinfa.

2. Cromatografia dos compostos ninhidrina-positivos solúveis em ácido

A figura 1 mostra um cromatograma típico de uma amostra de compostos ninhidrina-positivos ácidos solúveis, não hidrolizada, de hemolinfa de larvas de R. americana do 29 período (45-48 dias de idade). Para facilitar a visualização, alguns picos foram ampliados, ficando fora da escala que é 1:4.

A identificação dos picos apresentados a seguir foi feita utilizando os critérios referidos em Métodos: 7, ácido aspártico; 8, treonina; 9, serina; 12, prolina; 13, ácido glutâmico; 14, glicina; 15, alanina; 18, valina; 19, cistatiónina; 20, metionina; 21, isoleucina; 22, leucina; 25, tirosina; 26, fenilalanina; 29, ornitina; 30, amônia; 32, lisina; 34, histidina; 35, triptofano; 36, arginina (Ver figura 1).

O pico nº 10 (figura 1) poderia ser identificado como asparagina e/ou glutamina porque o método utilizado não permite a resolução dos dois componentes. Entretanto, como TUNDISI et alii (1964), encontraram em um estudo qualitativo da hemolinfa de R. americana os dois compostos, utilizando cromatografia em papel, o pico foi atribuído a ambos os compostos.

Os picos nº 5, 11, 23, 31 e 33 foram atribuídos a peptídeos numerados respectivamente 1, 2, 3, 4 e 5 (ver figura 1). A identificação desses picos baseia-se no fato de seus tempos relativos de eluição não corresponderem a nenhum composto ninhidrina-positivo encontrável nos cromatogramas publicados referidos em Métodos e desaparecem por hidrólise.

Os picos que se seguem foram identificados tentativamente baseando-se nos seus tempos relativos de eluição: 1, fosfoserina; 2, fosfoetanolamina; 3, taurina; 4, uréia; 6, metioninas sulfóxidos; 16, ácido α -amino-adípico; 17, ácido α -amino-n-butírico; 24, glicosamina; 27, β -alanina; 28, ácido γ -amino-butírico (figura 1).

A quantificação dos picos dos cromatogramas foi realizada como descrito em Métodos e a Tabela II apresenta a média dos resultados obtidos em 3 determinações independentes. O desvio médio observados nas determinações ficou na maioria dos casos entre 5 e 15%. Variações dessa ordem e até maiores foram observadas em determinações semelhantes realizadas em outros insetos (LEVENBOOK e DINAMARCA, 1966).

O valor apresentado para o título de triptofano deve ser inferior ao que ocorre "in vivo", porque esse aminoácido sofre destruição parcial durante as desproteínizações da hemolinfa, na preparação da amostra para análise (MOORE e STEIN, 1954). Os títulos encontrados para ácido glutâmico devem estar ligeiramente superestimados e aqueles da glutamina + asparagina, subestimados, devido a hidrólise parcial das amidas, especialmente glutamina, durante a preparação e análise das amostras (MOORE e STEIN, 1954).

Figura 1 - Compostos ninhidrina-positivos solúveis em ácido sulfossalicílico 3% (P/V) da hemolinfa de larvas de *R. americana* no fim do 29 período (45-48 dias de idade). O cromatograma A corresponde à coluna de aminoácidos ácidos e neutros e o B, à coluna de aminoácidos básicos. A identificação dos picos numerados é a seguinte: 1, fosfoerina; 2, fosfoetanolamina; 3, taurina; 4, uréia; 5, peptídeo 1; 6, metioninas sulfóxidos; 7, ácido aspártico; 8, treonina; 9, serina; 10, glutamina + asparagina; 11, peptídeo 2; 12, prolina; 13, ácido glutâmico; 14, glicina; 15, alanina; 16, ácido α -aminoadípico; 17, ácido α -amino-n-butírico; 18, valina; 19, cistationina; 20, metionina; 21, isoleucina; 22, leucina; 23, peptídeo 3; 24, glicosamina; 25, tirosina; 26, fenilalanina; 27, β -alanina; 28, ácido γ -amino-butírico; 29, ornitina; 30, amônia; 31, peptídeo 4; 32, lisina; 33, peptídeo 5; 34, histidina; 35, triptofano; 36, arginina. Para maiores detalhes ver o texto.

TABELA II

Compostos ninhidrina-positivos, solúveis em ácidos, da hemolinfa de larvas de R. americana, 2º período, de 45-48 dias de idade¹

Composto	Concentração mM	Composto	Concentração mM
Fosfoserina	0,07	Peptídeo-1	0,20
Ác. aspático	0,35	Peptídeo-2	1,18
Treonina	13,15	Peptídeo-3	9,01
Serina	5,30	Peptídeo-4	0,95
Prolina	8,05	Peptídeo-5	1,38
Ác. glutâmico	7,65	total de peptídeos	12,78
Glicina	0,96		
Alanina	2,11	Amônia	26,25
Valina	3,92	Fosfoetanolamina	1,31
Metionina	0,41	total geral	102,96
Isoleucina	0,61		
Leucina	1,78	α-amino-N total ²	94,0
Tirosina	2,06		
Fenilalanina	0,27		
Ornitina	2,42		
Lisina	4,67		
Histidina	2,76		
Triptofano	1,40		
Arginina	0,89		
Cistationina	0,63		
Glutamina+asparagina	3,22		
Total de aminoácidos	62,62		

Traços³

Taurina	+++
Uréia	++
Metioninasulfóxidos	+++
Ác. α-amino adípico	+++
Ác. α-amino-n-butírico	+++
Glicosamina	++
β-alanina	++
Ác. γ-amino-butírico	++

1. Para maiores detalhes, consultar o texto.
2. Determinado na fração ácido solúvel da hemolinfa como descrito em Métodos.
3. Traços são denominados os compostos que nas diluições empregadas (ver Métodos) não podem ser convenientemente estimados. Correspondem a concentrações inferiores a 0,05 mM. O sinal (+++) indica que o composto foi encontrado 3 vezes em 3 análises e (++) indica que foi encontrado 2 vezes em 3 análises.

A concentração dos aminoácidos é elevada, como é característico de insetos, especialmente os Endopterygota (FLORKIN e JEUNIAUX, 1964). Os aminoácidos predominantes na hemolinfa são: treonina, prolina, ácido glutâmico e serina, que juntos perfazem mais do que 50% da concentração total de aminoácidos livres da hemolinfa. A ocorrência de ácido glutâmico e prolina entre os aminoácidos mais concentrados é típico de insetos Endopterygota (FLORKIN e JEUNIAUX, 1964). É interessante assinalar a ausência, até mesmo de traços, de cisteína ou cistina e citrulina. Cisteína, entretanto, também não foi detectado em vários outros Diptera como: Gastrophilus intestinalis (LEVENBOOK, 1950a), Phormia regina (LEVENBOOK, 1966). É notável também a concentração relativamente elevada da ornitina e a ocorrência de cistationina na hemolinfa, embora esta já tenha sido identificada em outros insetos (WYATT, 1961).

Os peptídeos ocorrem em pequeno número, embora a sua concentração total seja considerável. Dois deles são ácidos e 3 deles, representando cerca de 87% do total dos peptídeos, são neutros ou básicos, a julgar pelos seus tempos relativos de eluição. A concentração do peptídeo 3, que corresponde a 70% do total dos peptídeos, só é superada entre os aminoácidos pela treonina.

Vários insetos apresentam concentrações muito baixas de amônia na hemolinfa circulante, mas depois que essa é retirada da larva a sua concentração cresce rapidamente a partir de precursores desconhecidos (WIGGLESWORTH, 1965; LEVENBOOK, 1950a). Como nenhum estudo foi feito nesse sentido em R. americana, a elevada concentração de amônia atribuída à hemolinfa nesta tese deve ser considerada com certa reserva. Outro motivo para essa reserva é o fato da concentração de amônia determinada na hemolinfa, 26,3 mM, exceder de cinco vezes aquela concentração considerada tóxica, que é 5 mM (CRAIG, 1960).

A razoável concordância observada entre a soma dos compostos ninhidrina-positivos e a determinação direta de α -amino N, indica que nenhuma fração quantitativamente importante daqueles compostos deixou de ser analisada.

TABELA III

Aminoácidos da fração ácido solúvel da hemolinfa de R. americana, 2º período, 45-48 dias de idade, após hidrólise¹

Aminoácido	Concentração ² mM	Aminoácido	Concentração ² mM
Histidina	19,87	Isoleucina	1,26
Ácido aspártico	8,72	Fenilalanina	0,84
Ácido glutâmico	10,13	Arginina	1,42
Lisina	6,73	Alanina	2,60
Prolina	9,57	Valina	4,11
Glicina	2,03	Metionina	0,56
Leucina	2,84	Tirosina	2,17
Ornitina	3,11	Treonina	13,45
Serina	5,99	Total	95,40

1. Para maiores detalhes, consultar Métodos.

2. Média de duas determinações.

A concentração dos aminoácidos presentes na fração ácido solúvel da hemolinfa (aminoácidos livres) após hidrólise ácida é de 95,40 mM (Tabela III). Isso significa que a hidrólise ácida aumenta a concentração de aminoácidos livres de 32,70 mM. Assumindo que esse incremento é consequência da hidrólise dos peptídeos da hemolinfa, a razão entre esse valor e o título de peptídeos na hemolinfa corresponde ao número médio de resíduos de aminoácidos presentes por peptídeo. Esse número é 2,56 e corresponde a uma superestimativa, porque havendo outros peptídeos não identificados, eles fariam o número obtido baixar. Utilizando o número médio de resíduos de aminoácidos, por peptídeo e considerando as concentrações relativas dos vários peptídeos, é possível estimar o número de resíduos presente em vários peptídeos identificados. Assim, o peptídeo 3 que corresponde a 70% dos peptídeos deve ser um dipeptídeo, caso contrário a média de resíduos de aminoácidos seria certamente superior àquela observada. Além disso, como já foi acentuado acima, a média de 2,56 possivelmente de

ve estar superestimada, o que reforça ainda mais a conclusão acima. Assumindo que o peptídeo 3 é um dipeptídeo, os peptídeos 2, 4 e 5 devem ter no máximo 10 resíduos, enquanto que o peptídeo 1, por ocorrer em baixa concentração, não permite nenhuma estimativa segura.

A Tabela IV, mostra a participação porcentual dos vários aminoácidos no incremento aminoacídico total, após a hidrólise ácida da porção ácido solúvel da hemolinfa. Se fôr admitido, como foi feito acima, que o referido incremento é resultante da hidrólise dos peptídeos da hemolinfa, a Tabela IV é uma boa estimativa da composição porcentual molar dos aminoácidos peptídicos.

A presença de ornitina, na Tabela IV deve ser consequência de variações amostrais, porque a ornitina é um aminoácido tipicamente livre. Variações amostrais devem ser responsáveis também pela presença na Tabela de vários aminoácidos cuja participação no incremento é pequena como: tirosina, metionina, etc. A participação do ácido aspártico e glutâmico no incremento real é menor do que o indicado na Tabela, porque parte deles se originaram da hidrólise das amidas correspondentes. Apesar de todas as restrições acima, a Tabela IV permite concluir que os peptídeos são compostos principalmente de histidina e ácido aspártico, e em menor grau de ácido glutâmico, lisina e outros. A ocorrência generalizada de histidina explica porque os peptídeos presentes em concentrações mais significativas são neutros ou básicos, a julgar pelos seus tempos relativos de eluição.

TABELA IV

Participação porcentual dos vários aminoácidos no incremento
aminoacídico total, após hidrólise ácida*

Aminoácido	% do incremento total	Aminoácido	% do incremento total
Histidina	45,0	Isoleucina	1,7
Ácido aspártico	22,0	Fenilalanina	1,5
Ácido glutâmico	6,5	Arginina	1,4
Lisina	5,4	Alanina	1,3
Prolina	4,0	Treonina	0,8
Glicina	2,8	Valina	0,5
Leucina	2,8	Metionina	0,4
Ornitina	1,8	Tirosina	0,3
Serina	1,8	Total	100,0

* Dados calculados a partir das Tabelas II e III.

O peptídeo-3 como foi discutido acima, deve ser um di-peptídeo e, conseqüentemente, os aminoácidos derivados de sua hidrólise devem corresponder a cerca de 55% dos aminoácidos totais liberados por hidrólise. Caso seus dois resíduos sejam iguais deverá ocorrer um aminoácido que perfaça aproximadamente 55% dos aminoácidos totais liberados por hidrólise, enquanto que se os dois resíduos forem diferentes, deverá haver pelo menos dois aminoácidos que correspondam a 27% dos aminoácidos totais. Uma inspeção na Tabela IV permite observar que os resultados são favoráveis à hipótese de que o peptídeo-3 seja constituído por dois resíduos de histidina ou por um resíduo de histidina e outro de ácido aspártico. O tempo relativo de eluição do peptídeo-3 (Figura 1) favorece a hipótese de que ele seja formado por um resíduo de histidina e outro de ácido aspártico.

3. Apresentação dos resultados das análises químicas

As concentrações de Ca, Na, K e Cl na hemolinfa de larvas maduras de R. americana (Tabela V) são similares às determinadas para grande número de insetos, enquanto que a concentração de Mg é muito elevada, somente comparável com aquelas encontradas em alguns Lepidoptera e Coleoptera (BUCK, 1953; PROSSER e BROWN, 1961). Concentrações semelhantes às apresentadas na Tabela V para Cu e Zn foram determinadas em outro Diptera : Gastrophilus intestinalis (LEVENBOOK, 1950a).

TABELA V

Composição química da hemolinfa da larva de R. americana, 2º período, 45-48 dias de idade*

Composto	mg/100 ml
Mg	110
Ca	12,9
Cu	0,49
Zn	0,81
Fe	1,60
Na	77,5
K	67,6
P-inorgânico	9,7
P-ácido-solúvel	55,4
P-lipídico	10,2
P-protéico	2,8
P-total	65,5
HCO ₃ ⁻ (pH 7,270)	42,1
Cl ⁻	47,6
Proteína	6,9 g/100 ml
Carboidrato total	201
Trealose	140
Glicogênio	1,4
Lipídeo total	520
Ácido cítrico	391
Cinzas **	460

* Os resultados referentes a compostos ninhidrina-positivos encontram-se nas Tabelas II e III. Para maiores detalhes consultar o texto.

** Apenas uma determinação.

O conteúdo de fósforo total na hemolinfa de R. americana é elevado e a maior parte deste está ligado a compostos orgânicos ácido-solúveis, o que é característico da classe Insecta (WYATT, 1961). Só foram identificados na fração fósforo ácido solúvel orgânico: fosfoetanolamina e fosfoserina (Tabela II). O resultado apresentado para fósforo protéico poderia estar superestimado se ocorressem ácidos nucleicos na hemolinfa. O fato da proteína obtida por precipitação com sulfato de amônio apresentar o mesmo conteúdo em fósforo que aquela precipitada por ácidos, indica que o fósforo considerado protéico não está contaminado com fósforo de ácidos nucleicos. Isso porque nas condições salinas empregadas DNA não se precipitaria e RNA presente em concentrações de pelo menos até 100 µg/ml, também não, conforme foi observado em experiência controle utilizando RNA citoplasmático de glândula salivar de R. americana.

O título de citrato encontrado é bastante elevado, entretanto, títulos elevados como esse ocorrem em outros Diptera e em outros insetos, o que levou a se considerar esse fenômeno uma característica de larvas da Classe Insecta (LEVENBOOK e HOLLIS, 1961).

Trealose é o carboidrato predominante da hemolinfa, como ocorre em grande número de insetos (WYATT, 1961; FLORKIN, e JEUNIAUX, 1964), enquanto que glicogênio ocorre em pequena concentração.

As determinações para lipídeos totais na hemolinfa de larvas de insetos (BUCK, 1953; WYATT, 1961) são da mesma ordem de grandeza do valor encontrado em R. americana.

A concentração de proteínas encontrada na hemolinfa de R. americana é superior à média determinada na hemolinfa de larvas dos demais insetos (Cf. BUCK, 1953; ENGLE e WOODS, 1960), o que já poderia ser antecipado por sua osmolaridade baixa, mas densidade e conteúdo de sólidos mais elevados que a média dos outros insetos.

As determinações de pCO_2 a 37°C deram em média (3 determinações) 15,7 mmHg. A partir dessa determinação foi calculado (ver Métodos) o valor para bicarbonato apresentado na Ta-

bela. O título para bicarbonato "in vivo" deve diferir um pouco do apresentado. Primeiro porque a dissociação do ácido carbônico e a solubilidade do CO_2 na hemolinfa foram assumidos serem iguais aos determinados no plasma humano, o que pode não ser correto. Em segundo lugar, porque a temperatura em que foi determinado pCO_2 (37°C) é diferente daquela em que o animal normalmente vive, que é 20°C . Se forem corrigidos os valores obtidos a 37°C para bicarbonato, utilizando os parâmetros fornecidos por GAMBINO (1961) para o sangue humano, o valor "in vivo" seria 46% mais elevado que aquele determinado. Entretanto, o pH da hemolinfa parece não variar significativamente, com a temperatura (pH medidos a 25°C e 37°C são idênticos). Se fôr admitido nesse caso que a variação da concentração de bicarbonato depende apenas da variação de pCO_2 e da solubilidade do CO_2 com a temperatura, novo cálculo permite concluir que o bicarbonato "in vivo" seria cerca de 17% menor do que aquele apresentado. Dessa forma, embora o valor determinado para bicarbonato deva diferir do valor presente "in vivo" aquele deve representar uma boa estimativa desse.

pO_2 foi determinado a 37°C , resultando em média (3 determinações) 65,3 mmHg. Esta medida foi feita após um período de 60 segundos necessário para o aparelho entrar em equilíbrio. Esse valor representa uma subestimativa, pois as leituras não se estabilizam, caindo continuamente. Esse resultado deve ser causado pela oxidação de substâncias fenólicas presentes na hemolinfa, oxidação essa que se inicia assim que a hemolinfa é retirada, resultando em um consumo de oxigênio e impedindo medidas corretas de pO_2 , a não ser que se faça a determinação diretamente no interior da hemocela larval (WEINER, 1965).

4. Pigmentos

O espectro de absorção da hemolinfa total de larvas de R. americana (figura 2) mostra 3 picos de absorção: um em 270-280 m μ , outro a 310 m μ e o último a 460 m μ . O pico a 270-280 m μ deve resultar da presença de tirosina, fenilalanina e triptofano ligados a proteínas e uma pequena parcela aos mesmos aminoácidos, porém livres, conforme pode se concluir pela existência de um pico

Figura 2 - Espectro de absorção da hemolinfa de larvas maduras de *R. americana*. O espectro da hemolinfa total foi feito após diluição de 50 vezes em água deionizada e aqueles dos sobrenadantes de desproteinização com HClO_4 0,5N ou ácido sulfoossalícílico 3% (P/V) foram realizados após neutralização com NaOH e numa diluição final de 50 vezes.

nessa mesma posição em amostras desproteinizadas com HClO_4 0,5N (figura 2). O pico a 310 m μ deve estar ligado à existência de proteínas, pois ele quase desaparece após a desproteínização. O pico a 460 m μ , parece corresponder a carotenóides ligados a proteínas, conforme será mostrado abaixo. É interessante observar ainda o fato de que o sobrenadante da desproteínização com ácido sulfossalicílico apresenta absorção nos comprimentos de onda mais curtos do espectro visível, contrariamente ao sobrenadante de HClO_4 (figura 2). A referida absorção confere ao sobrenadante ácido sulfossalicílico uma cor limão, enquanto que o sobrenadante HClO_4 é incolor.

O sobrenadante de amostras desproteinizadas com TCA 10% (p/v) ou com ácido tungístico (Van SLYKE e HAWKINS, 1928), apresenta um espectro de absorção semelhante àquele obtido após precipitação das proteínas com HClO_4 0,5N, enquanto que aquelas amostras desproteinizadas com 100% de saturação em $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ou com um volume de clorofórmio apresentam sobrenadantes cujos espectros são idênticos àqueles obtidos após precipitação com ácido sulfossalicílico 3% (P/V). Esses resultados indicam que a maior parte dos pigmentos deve estar ligada a proteínas, pois são precipitadas por todos precipitantes de proteínas usados. Deve-se assinalar, entretanto, o fato de um pigmento de cor limão não ser precipitado por ácido sulfossalicílico 3% (ver figura 2), sulfato de amônio saturado e clorofórmio.

A figura 3 mostra o espectro de absorção do pigmento de cor limão após a sua preparação e purificação como descrito em Métodos. O seu resíduo obtido após a evaporação de seu solvente por pressão reduzida ao abrigo da luz é solúvel em: água deionizada, NaCl 0,1M, etanol 60% (V/V), KOH 5% (P/V) em metanol e NaOH 0,1N. O resíduo não é solúvel em éter de petróleo (p.e. 30°-50°C) e acetona.

O resíduo do pigmento cor de limão solubilizado em água é precipitável em HClO_4 0,5N, mas mantém-se solúvel em etanol 60% após aquecimento a 75°C por 10 minutos ou após adição de um volume de clorofórmio.

Figura 3 - Espectro de absorção do pigmento de côr limão em metanol 90% (V/V), após preparação e purificação como descrito em Métodos.

O pigmento c6r de lim6o ap6s solubiliza76o em 6gua, adi76o de um volume de HClO_4 4N produz um sedimento que ap6s lavagens com HClO_4 0,5N d6 reaq6o positiva em testes colorim6tricos para prote6na (LOWRY et alii, 1951) e para carboidrato (DUBOIS et alii, 1956).

As prepara766es do pigmento de c6r lim6o apresentam uma intensa fluoresc6ncia amarelo-esverdeado quando expostos a U.V. de comprimento de onda longo (315-380 m μ), enquanto que com U.V. de comprimento de onda curto (200-280 m μ), nenhuma fluoresc6ncia 6 observada.

A fluoresc6ncia das prepara766es 6 mantida mesmo em H_2SO_4 0,5N, NaOH 0,1N ou em meios aquosos com ditonito de s6dio em quantidades supersaturantes.

O pigmento que permanece no sobrenadante ap6s as desproteiniza766es da hemolinfa com 6cido sulfossalic6lico, 3% ou sulfato de am6nio 100% saturado, depois de purificado por precipita766o com HClO_4 0,5N, lavagens com o mesmo 6cido e dissolu766o em etanol 60% produz um espectro de absor766o id6ntico 6quele do pigmento c6r de lim6o, discutido acima. Al6m disso, 6sse pigmento apresenta o mesmo tipo de fluoresc6ncia que o pigmento lim6o. Isso permite concluir que o pigmento da hemolinfa precipit6vel com s6mente alguns precipitantes de prote6na deve ser o pigmento c6r de lim6o.

As propriedades observadas do pigmento de c6r lim6o sugerem que 6sse seja uma cromoglicoprote6na. Os resultados mais indicativos dessa hip6tese s6o: a sua solubilidade em etanol 60% e sulfato de am6nio saturado, al6m da reaq6o positiva observada para prote6nas e carboidratos. Os resultados indicam ainda que a mol6cula crom6gena do pigmento deve ser muito est6vel e que grupos ioniz6veis n6o devem estar comprometidos com a estrutura respons6vel pela fluoresc6ncia, porque essa n6o 6 alterada na presen76a de um redutor como ditonito de s6dio e nem em meios 6cidos ou b6sicos.

Os resultados obtidos com a parti766o dos caroten6ides da hemolinfa entre 6ter de petr6leo (p.e. 30 $^{\circ}$ -50 $^{\circ}$ C) e metanol 90% como descrito em M6todos, indicam que 6sses caroten6ides

são predominantemente epifásicos, embora ocorra também uma pequena concentração de pigmentos amarelados hipofásicos.

Amostras de carotenóides da hemolinfa, saponificadas ou não, separam-se em 6 bandas coloridas ao longo de uma coluna de hidroxiapatita (ver Métodos), durante eluição com éter de petróleo. A continuação da eluição com éter de petróleo permite o isolamento de duas frações distintas (Fração I e II) correspondentes às bandas 1 e 2 respectivamente (bandas numeradas segundo migração decrescente). A adição de acetona 7% em éter de petróleo elui as bandas 3 e 4 em uma única fração (Fração III), enquanto que adição de acetona elui as bandas 5 e 6 na fração IV. Esses resultados estão sumarizados na Tabela VI, juntamente com informações sobre as cores correspondentes a cada banda.

TABELA VI

Posição das bandas de carotenóides na coluna de hidroxiapatita, após desenvolvimento com éter de petróleo, eluentes usados e frações distintas obtidas

Nº da banda ¹	Côr da banda	Eluente	Fração recolhida
1	amarela	éter de petróleo	I
2	vermelha	éter de petróleo	II
3	amarela	acetona 7% em éter	III
4	alaranjada	acetona 7% em éter	III
5	amarela	acetona	IV
6	alaranjada	acetona	IV

1. Numeração segundo ordem decrescente de migração com éter de petróleo (p.e. 30°-50°C).

A banda 2 é bem mais intensa que todas as demais reunidas. A banda ¹ é de intensidade intermediária, as bandas 3, 5 e 6 são muito fracas e a banda 4 é mais intensa do que as últimas, embora menos que a banda 1. Em vista dessas observações nenhuma tentativa foi feita de se isolar os pigmentos das frações III e IV.

Figura 4 - Espectro de absorção das frações I e II dos carotenoides da hemolinfa, após preparação e cromatografia em hidroxiapatita, como descrito em Métodos. O espectro da fração I foi realizado em hexano e o da fração II em piridina.

A fração IV e possivelmente também a fração III contém xantofilas, devido a intensa adsorção de seus pigmentos constituintes à hidroxiapatita, que devem corresponder aos pigmentos hipofásicos observados na partição entre éter de petróleo e metanol 90%.

A figura 4 mostra os espectros de absorção das frações I e II, após evaporação do éter de petróleo a pressão reduzida e ao abrigo da luz e redissolução em hexano e piridina, respectivamente. A confrontação dos espectros obtidos com aqueles dos carotenóides mais conhecidos (KARRER e JUCKER, 1950) permite a suposição de que o pigmento da fração I seja β -caroteno. Essa suposição é fortalecida pelo fato daquele pigmento praticamente não ficar adsorvido na coluna, como seria de se esperar do β -caroteno. Nenhuma identidade pôde, entretanto, ser atribuída com segurança ao pigmento da fração II. É interessante assinalar a semelhança de seu espectro com aquele do astaceno em piridina.

Um teste qualitativo para astaxantina (ver Métodos) foi aplicado à fração II (fração predominante) de carotenóides extraídos da hemolinfa e cromatografados no mesmo dia. A experiência visava testar a afirmação de TUNDISI et alii (1964) de que a astaxantina é o pigmento predominante na hemolinfa, embora a fração II não tivesse o comportamento na coluna esperado para astaxantina e nem o seu espectro (Cf. KUHN e SØRENSEN, 1938). O resultado foi negativo.

B. Química do casulo coletivo de R. americana

1. Apresentação geral dos resultados

A composição geral do casulo III calculada a partir das análises quantitativas apresentadas nos itens seguintes, é mostrada na Tabela VII. Os valores apresentados são médias de 3 determinações.

TABELA VII

Composição química do casulo coletivo de R. americana¹

Constituinte	% do casulo em peso
Material hidrossolúvel não identificado	4,3
Carboidrato solúvel ²	2,4
Proteína solúvel ²	4,4
CaCO ₃ ³	43,5
Galactosamina insolúvel ⁴	1,9
Ácidos urônicos insolúveis ⁴	0,2
Açúcares neutros insolúveis ⁴	8,2
Proteína insolúvel ⁵	33,6
Cinzas insolúveis ⁶	4,3
Lípídeos	<1,0
Total ⁷	102,8

1. A composição se refere ao casulo III, isto é, ao casulo acabado. Maiores detalhes no texto.
2. Proteínas ou carboidratos determinados na lavagem com água adicionados àqueles medidos na lavagem com ácido acético.
3. Assumindo corresponder ao material hidroinsolúvel e ácido acético solúvel. A massa de proteínas e carboidratos solúvel nessas condições foi subtraída.
4. Extrapolado para tempo zero de hidrólise ácida da fração do casulo remanescente após as lavagens em água e ácido (fração insolúvel do casulo).
5. Calculado a partir dos aminoácidos de hidrolizado ácido da fração insolúvel, extrapolado para tempo zero de hidrólise.
6. Determinadas na fração insolúvel do casulo.
7. Excluído lipídeos.

A análise abrangeu a totalidade dos componentes do casulo, exceção feita naturalmente a compostos que possam estar presentes em quantidades insignificantes. A característica mais notável do casulo é o seu alto conteúdo em CaCO_3 e em proteínas e carboidratos insolúveis em todos solventes utilizados (ver abaixo).

2. Solubilidade, conteúdo de cinzas e metais

Apenas uma pequena parcela do casulo é hidrossolúvel (Tabela VIII). Dessa fração 2,5% correspondem a proteínas e 1,6% do peso seco do casulo a carboidratos, remanescendo 4,3% de material hidrossolúvel não identificado.

A massa de material solúvel em ácido acético 10% após a lavagem com água é de 46,2% do peso-seco do casulo. Cerca de 0,8%, em peso seco do casulo, dessa fração é carboidrato e 1,9% é proteína. A massa resultante de 43,5% do peso seco do casulo deve corresponder a CaCO_3 (ver abaixo).

Após as lavagens com água e ácido acético 10% sobram 45,4% do casulo. Essa fração foi denominada fração insolúvel do casulo (ver Métodos). Esse material permanece insolúvel nos seguintes solventes empregados, tanto a quente (37°C) quanto a temperatura ambiente (22°C): SDS 10% (P/V), uréia 6M, ácido fórmico 50% (P/V), HCl 2N, KOH 1M e NaHCO_3 1M.

TABELA VIII

Solubilidade e conteúdo de cinzas do casulo III de *Rhynchosciara americana**

Determinação	% em peso-seco do casulo
Massa hidrossolúvel	8,4
Massa hidroinsolúvel,	
Ácido acético solúvel	46,2
Massa insolúvel	45,4
Cinzas totais	32,5
Cinzas insolúveis**	4,3

* Para maiores detalhes consultar Métodos. Os resultados são médias de 3 determinações.

** Determinadas na fração insolúvel do casulo.

Os resultados mostram que existe massa considerável de cinzas no casulo e que a maior parte dessas é solúvel em ácido acético 10%, enquanto que a fração insolúvel é essencialmente orgânica. As análises de metais do casulo (Tabela IX) indicam que cálcio é o metal predominante, correspondendo a 19% do peso-seco do casulo; conseqüentemente, as cinzas das lavagens em ácido acético devem ser correspondentes a compostos de cálcio.

TABELA IX

Metais no casulo III de R. americana *

Metal	% do casulo (P/P)
Ca	19,0
Fe	0,108
Zn	0,024
Mg	0,002
Cu	0,002
K	0,001

* Para maiores detalhes consultar Métodos. Os resultados são médias de 3 determinações.

Um teste qualitativo para carbonatos realizado como descrito em Métodos, indicou a presença de quantidades consideráveis de carbonatos no casulo. Esse resultado juntamente com os apresentados acima sugerem que porção hidroinsolúvel e ácido acético solúvel do casulo é carbonato de cálcio. Os cálculos apresentados a seguir mostram que a hipótese referida é bastante verossímil. Calculando todo o Ca presente no casulo como CaCO_3 resulta em 47,5%, que é similar à massa determinada como material hidroinsolúvel e ácido acético solúvel, após subtrair a massa de proteínas e carboidratos solúveis. Por outro lado, calculando as cinzas correspondentes a todo Ca presente no casulo resulta em 26,6%, que é bem próximo dos 28,8% presente nas lavagens do casulo, como seria de se esperar se praticamente todo Ca estivesse na forma de CaCO_3 .

3. Carboidratos

A hidrólise ácida do casulo é acompanhada por um amarelo-ronzeamento da solução. A curva de absorbância a 400 m μ (Figura 5) dá uma idéia da progressão de formação de um pigmento amarelo amarronzado. É interessante observar que a maior parte do pigmento é formado nas primeiras 6 horas de hidrólise.

O pigmento amarelado (melanoidina) produzido durante a hidrólise e purificado como descrito em Métodos apresenta as seguintes propriedades: caráter altamente básico, a julgar pelo seu comportamento em Dowex-50, fluorescência azulada intensa em U.V. de comprimento de onda longo (315-380 m μ) e uma fluorescência fraca, mas também azulada em U.V. de comprimento de onda curto (200-280 m μ). Além disso o pigmento dá reação positiva com reagente de ELSON-MORGAN para hexosaminas, apresentando um espectro de absorção nessas condições com dois picos (Figura 6). As propriedades desse pigmento são similares aos produtos da "reação de Maillard" (Cf. ELLIS, 1959). Essa reação consiste em uma reação entre proteínas e carboidratos durante o aquecimento. Dessa forma, o incremento em melanoidinas observado durante a hidrólise do casulo (Figura 5) deve ser acompanhado de uma destruição desses, mais intensa no início e decrescendo depois de 6 horas. É interessante observar que mesmo no tempo zero de hidrólise já existe uma pequena quantidade de melanoidina. É possível que essa tenha sido formada ao se secar a amostra de casulo afim de se determinar o seu peso-seco antes da hidrólise. Reação de Maillard em amostras úmidas submetidas a aquecimento é fenômeno conhecido há já algum tempo (LEA, HANNAN e GREAVES, 1950; ELLIS, 1959).

A figura 5 mostra o resultado das determinações de carboidratos neutros na fração insolúvel do casulo III após vários tempos de hidrólise. A destruição dos açúcares neutros após 4 horas de hidrólise segue uma cinética de 1^a ordem. Se admitirmos que a destruição dos carboidratos segue a mesma velocidade desde o início da hidrólise, o que é bastante provável, a melhor determinação para açúcares neutros seria dada pela extrapolação gráfica da curva de cinética para tempo zero de hidrólise. Dessa forma a porcentagem em massa de açúcares neutros presentes na fração insolúvel seria de cerca de 18%. A

Figura 5 - Recuperação de açúcares neutros e ácidos urônicos após vários tempos de hidrólise da fração insolúvel do casulo III de *R. americana* e produção de melanoidinas nos mesmos tempos. Ver texto.

Figura 6 - Espectro de absorção do pigmento amarronzado (melanoidina) formado durante a hidrólise ácida da fração insolúvel do casulo III, após purificação em Dowex-50 e reação de Elson-Morgan. Ver detalhes em Métodos.

Figura 7 - Recuperação da galactosamina após vários tempos de hidrólise da fração insolúvel do casulo III de R. americana.

validade dessa extrapolação é apoiada ainda pelo fato dela estar de acordo com a previsão feita acima, baseando-se na formação das melanoidinas, de que a maior parte da destruição dos carboidratos deveria ocorrer antes de 6 horas de hidrólise.

O mesmo tipo de argumentação apresentado acima justifica a aceitação das extrapolações, para tempo zero de hidrólise, como a melhor determinação de ácidos urônicos (Figura 5) e galactosamina (Figura 7), que é a única hexosamina presente no casulo (ver abaixo). Os valores extrapolados para ácidos urônicos e galactosamina são, respectivamente: 0,45% e 4,1% da fração insolúvel do casulo.

Os resultados de cromatografias em papel feitas em dois sistemas solventes diferentes (2 cromatogramas em cada sistema) permitiram a identificação de glicose, galactose e galactosamina nos hidrolizados ácidos da fração insolúvel do casulo. Uma mancha pouco intensa, mas constante de todos cromatogramas e com elevada migração, não pôde ser identificada como nenhum dos carboidratos: ribose, xilose, manose, frutose, glicose, galactose, galactosamina, glicosamina, sorbose, N-acetilglicosamina e N-acetilgalactosamina. A identificação de galactosamina como única hexosamina presente nos hidrolizados foi confirmada em 2 cromatogramas revelados com reagente de ELSON-MORGAN.

4. Compostos nitrogenados

Além de aminoácidos e galactosamina parece não ocorrer nenhum composto nitrogenado em quantidades significantes nos hidrolizados da fração insolúvel do casulo (Tabela X). O fato da soma do nitrogênio dos compostos nitrogenados identificados exceder o conteúdo de N total deve ser devido a conjugação de dois fatores. O primeiro deles é o fato de que o método de Kjeldahl clássico empregado, de tubo aberto, não permitir uma recuperação de N rigorosamente quantitativa, como corre com o método do tubo selado e nem tão precisa (JACOB, 1965). Aliás, recuperações relativamente baixas de nitrogênio determinado pelo método de Kjeldahl foram também observados em cutículas de inse-

tos (HACKMAN e GOLDBERG, 1971) e em vários outros produtos naturais (STITCHER, citado em HACKMAN e GOLDBERG, 1971). Em vista disso, os valores para N-total mais exatos seriam mais elevados do que aqueles obtidos. O segundo fator a ser considerado é uma possível superestimativa do nitrogênio de aminoácidos como consequência de variações amostrais.

TABELA X

Compostos nitrogenados da fração insolúvel do casulo III
de R. americana

Determinação	% em N da fração insolúvel
N de aminoácidos ¹	10,0
N de galactosamina ²	0,3
Soma dos anteriores	10,3
N-total (Kjeldahl) ³	8,7

1. Calculado a partir da análise de aminoácidos, após correção para tempo zero de hidrólise. Ver Métodos.
2. Calculado a partir do valor extrapolado para zero da Figura 7.
3. Média de 3 determinações realizadas como descrito em Métodos.

Ácido glutâmico, ácido aspártico, serina e treonina são os aminoácidos mais abundantes da fração insolúvel do casulo, juntos correspondendo a 42% do total de aminoácidos (Tabela XI). A composição de aminoácidos da fração insolúvel do casulo assemelha-se mais àquela do pupário de L. cuprina do que a qualquer outra apresentada na Tabela XI.

TABELA XI

Composição porcentual molar dos aminoácidos da fração insolúvel
do casulo III de R. americana e de outros produtos de insetos

Aminoácido	% em moles				
	Casulo III R.america- na ¹	Pupário L. cu- prina ²	Secreção Salivar ³ C.tentans	Fibroína ⁴ P.cynthia	Sêda tipo colágeno N.ribesii ⁵
Ác.glutâmico	11,6	10,9	12,79	0,8	9,8
Ác.aspártico	10,9	9,1	6,18	3,5	5,8
Serina	10,2	8,3	9,39	5,1	11,0
Treonina	9,3	4,7	2,96	0,6	3,5
Glicina	8,1	13,1	4,51	31,4	27,5
Leucina	7,3	4,1	1,88	0,2	2,2
Alanina	6,4	8,0	10,54	47,8	13,8
Valina	6,0	6,6	2,84	0,6	3,8
Isoleucina	5,5	2,3	1,96	0,3	2,0
1/2 Cistina	4,5	1,5	12,88	-	-
Lisina	4,2	2,9	11,09	0,3	1,7
Tirosina	4,0	3,2	-	5,6	2,5
Fenilalanina	3,4	3,1	-	0,1	0,4
Prolina	3,1	7,8	2,49	0,3	9,7
Arginina	2,5	3,8	13,02	1,9	4,0
Histidina	2,0	3,9	-	1,5	0,5
Metionina	1,0	0,3	7,42	-	-
β-alanina	-	6,4	-	-	-
Hidroxilisina	-	-	-	-	1,8

1. As determinações foram realizadas em hidrolizados ácidos e corrigi-
das por perdas devido à hidrólise como descrito em Métodos.

2. Calculado a partir de GILBY e McKELLAR (1970).

3. Segundo GROSSBACH (1969).

4. Calculado a partir de LUCAS, SHAW e SMITH (1960).

5. Segundo LUCAS e RUDALL (1968).

5. Produção e composição do casulo em função do tempo

O pêso-sêco do casulo em distintas fases de sua produção é mostrado na TABELA XII. Conforme já foi apresentado em Métodos, o casulo III correspondente ao casulo já terminado, enquanto que o casulo II e casulo I correspondem ao casulo produzido até o início do 5º período e início do 4º período, respectivamente.

TABELA XII

Aumento do pêso-sêco do casulo ao longo do desenvolvimento*

Pêso-sêco do casulo mq/produzido/larva	Casulo
0,43	I
1,53	II
3,47	III

* Os valores determinados são médias de 3 determinações. Detalhes são encontrados em Métodos.

A alteração mais evidente que ocorre no casulo durante o desenvolvimento é um aumento porcentual da fração hidroinsolúvel-ácido acético solúvel, que foi admitida corresponder ao CaCO_3 (Tabela XIII). Ocorre também um grande aumento no conteúdo de Ca, como seria de se esperar na base do que já foi assumido acima e dos resultados apresentados no item B.2 anterior. Isso parece indicar que a deposição de CaCO_3 no casulo ocorre preferencialmente após o 4º período do 4º estágio.

TABELA XIII
Composição química do casulo em três
etapas do desenvolvimento¹

Determinação	Porcentagem do pêso-sêco do casulo		
	Casulo I	Casulo II	Casulo III
Material hidrossolúvel	3,0	3,1	8,4
CaCO ₃ ²	11,0	40,4	43,5
Ca	7,5	19,5	19,0
α-amino-N insolúvel ³	5,18	2,49	2,46
Fração insolúvel ⁴	84,2	54,5	45,4

1. Todas medidas, salvo indicação em contrário, são médias de três determinações. Procure Métodos para detalhes.
2. Assumido corresponder ao material hidroinsolúvel e ácido acético solúvel. A massa de proteínas e carboidratos solúvel nessas condições já foi subtraída.
3. Determinado por reação de ninhidrina após 8 horas de hidrólise alcalina da fração insolúvel do casulo. Os resultados são médias de duas determinações e nenhuma correção foi aplicada devido a destruição de aminoácidos sensíveis.
4. Material do casulo remanescente após lavagens com água e ácido conforme descrito em Métodos.

E' interessante notar também um aumento na fração hidrossolúvel do casulo III quando comparado com o II ou I. Isso pode estar relacionado com o fato do casulo III ser obtido no fim do período pré-pupal (pupa-farata), quando as larvas são de remoção difícil do casulo, sendo impossível evitar extravasamento de fluido exuvial de umas ou de hemolinfa de outras. Dessa forma, o incremento em material hidrossolúvel poderia ser derivado dos fluídos acima referidos, assim como das fezes que o animal elimina normalmente durante todo o feitio do casulo e que, conseqüentemente, ocorrem em maior quantidade no casulo III. Conforme já foi apresentado anteriormente, proteína é o componente majoritário da fração insolúvel do casulo III. Dessa forma as determinações de α-amino N insolúvel, permitem uma

comparação preliminar da composição da fração insolúvel nas três fases estudadas. Os resultados da Tabela XIII permitem calcular que a porcentagem de α -amino N na fração insolúvel dos casulos I, II e III é: 6,16, 4,57 e 5,40 respectivamente. Dessa forma pode-se admitir tentativamente que a composição da fração insolúvel do casulo varia um pouco com o desenvolvimento, sendo a fração do casulo I mais rica em proteínas e aquela do casulo II a mais pobre percentualmente.

Tentar obter valores para o conteúdo de proteínas insolúveis a partir desses dados de α -amino N é arriscado. Entretanto, partindo dos valores de α -amino N para o casulo III, assumindo um peso-molecular médio para o resíduo de aminoácido de 120 e considerando que a recuperação em um hidrolizado alcalino de albumina realizado e calculado com essas amostras de casulo é de 74%, obtemos um valor de cerca de 28,6% para as proteínas insolúveis. Esse valor concorda de forma razoável com aquele obtido de forma mais rigorosa apresentado na Tabela VII.

A Tabela XIV mostra a massa produzida dos principais componentes do casulo nas três fases estudadas, enquanto que a Tabela XV mostra a velocidade de produção desses componentes, nas mesmas fases.

TABELA XIV

Produção dos componentes do casulo ao longo do desenvolvimento*

Composto	Intervalos estudados					Total
	3ºP—	4ºP	4ºP—	5ºP	5ºP—pupa	
Proteína insolúvel	268		350		552	1170
Carboidrato insolúvel	82		106		170	358
CaCO ₃	47		572		891	1510

* Os dados foram calculados das Tabelas XII e XIII, assumindo que a fração insolúvel dos casulos I e II tem a mesma composição que aquela do casulo III. Todos os resultados estão expressos em μ g produzido/larva.

O intervalo de produção de casulo do 5º período até o dia anterior à muda pupal foi considerado, para fins de cálculo de velocidade de produção do casulo, como correspondente ao intervalo do 5º período até a última apólise larval. Essa consideração baseia-se no fato de que após essa apólise o inseto torna-se uma pupa farata, funcionando do ponto de vista fisiológico como uma pupa (HINTON, 1946), sendo então incapaz de continuar a produzir casulo. O número de dias correspondente aos intervalos: 3ºP — 4ºP, 4ºP — 5ºP e 5ºP — pupa farata são: 5, 3 e 2 dias respectivamente. Às vezes o intervalo 5ºP — pupa farata dura 3 dias. Consequentemente as velocidades apresentadas na Tabela XV correspondentes a esse intervalo podem estar um pouco superestimadas.

TABELA XV

Velocidade média de produção dos diferentes constituintes do casulo em três etapas de sua formação*

Composto	Intervalos estudados		
	3ºP — 4ºP	4ºP — 5ºP	5ºP — pupa farata **
Proteína insolúvel	54	117	276
Carboidrato insolúvel	16	35	85
CaCO ₃	9,4	191	446

* Dados calculados a partir da Tabela XIV. Maiores informações devem ser procuradas no texto. Todos os resultados estão expressos em µg produzidos/indivíduo/dia.

** Esses valores podem estar um pouco superestimados. Ver texto.

Os resultados indicam que a produção de todos os componentes do casulo é mais intensa em torno do 5º período, especialmente entre o 5ºP e pupa farata. É interessante assinalar o fato de que enquanto a produção de proteínas e carboidratos insolúveis é duas vezes maior no intervalo 4ºP — 5ºP em relação ao 3ºP — 4ºP, a produção de CaCO₃ é 20 vezes maior. Isso sugere uma independência entre os processos de produção de CaCO₃ e aqueles de produção de proteínas e carboidratos insolúveis. Entretanto, a velocidade de produção de CaCO₃, proteínas e carboidratos insolúveis é aumentada de maneira idêntica ao se passar do intervalo 4ºP — 5ºP para 5ºP — pupa farata.

C. Aspectos químicos e fisiológicos durante o 4º estágio de R. americana

1. Massa corpórea e volume de hemolinfa

A larva de R. americana aumenta rapidamente de peso até alguns dias depois da 3ª muda, isto é, até cerca de 26 dias de idade (Figura 8). Em seguida ainda cresce logaritmicamente até ficar madura, isto é, atingir o máximo desenvolvimento larval. A partir de então o inseto para de comer e começa a produzir o casulo e a perder massa até a emergência do adulto (70 dias de idade). Uma inspeção na figura 8 mostra que os desvios das médias de massas medidas em larvas com menos do que 48 dias (com uma exceção) são pequenos. Esse fato torna possível a utilização da presente curva para a estimativa da idade fisiológica de larvas, a partir da medida de sua massa. Essa estimativa é muito útil, especialmente para insetos recolhidos na natureza, porque antes dos 48 dias de idade existe apenas um marcador da idade fisiológica larval: a mudança de cor da larva, que ocorre em torno dos 32 dias de idade.

TOKUMARU, FERRI e WORSMANN (1968) obtiveram resultados muito discrepantes dos aqui apresentados, chegando a pensar indivíduos ainda na fase larval com 80 dias de idade, em contraste também com as observações de outros autores (Cf. GUARACIABA e TOLEDO, 1969). Essas diferenças encontradas por TOKUMARU, FERRI e WORSMANN, podem ser explicados por uma má termoestatização do ambiente de criação das larvas.

A determinação dos volumes de hemolinfa presente nas larvas e pupas de R. americana foi sempre realizado pelo método de exanguinação (Tabela XVI). Isto justifica-se pelo fato (ver comentários em Métodos) de que os resultados obtidos por esta técnica e pela técnica de diluição de corante serem semelhantes em larvas com idades inferiores a 35 dias (Tabela XVII).

Figura 8 - Crescimento em massa de fêmeas de *R. americana* a 20°C. Os traços verticais representam o desvio padrão das médias indicadas, obtidas em 3 grupos independentes de insetos, após um mínimo de 5 determinações em cada. Embaixo são indicados, além da idade em dias após a eclosão, os intervalos correspondentes aos períodos do 4º estágio; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, pré-pupal (PP), assim como do período pupal (ver detalhes em Métodos).

TABELA XVI

Volume, proteína, α -amino-N ácido solúvel e densidade na hemolinfa de R. americana durante o desenvolvimento larval*

Estádio	Período	Idade (dias)	Volume de hemolinfa μ l/larva	Massa de proteína μ g/larva	α -amino N μ moles/larva	Densidade da hemolinfa g/ml
III	-	20	3,28	18	0,32	1,013
	1 φ P	22	6,0**	32	0,53	-
	1 φ P	27	9,5	54	0,91	1,023
	1 φ P	30	13,6**	-	-	-
	2 φ P	32	14,8	96	-	-
	2 φ P	34	16,8**	151	2,02	-
	2 φ P	35	17,2**	201	-	-
	2 φ P	38	16,7	267	-	-
IV	2 φ P	41	19,2	542	1,53	1,026
	2 φ P	44	20,6	-	1,89	-
	2 φ P	45	20,6	887	2,00	1,032
	2 φ P	48	24,6	1700	2,31	1,043
	3 φ P	49	17,9	1790	2,29	1,037
	4 φ P	54	14,3	1890	1,30	1,058
	5 φ P	57	9,4	1190	0,93	1,057
pupa	-	64	4,0	488	-	1,025

* - A metodologia empregada está descrita em Métodos.

** - Volumes estimados usando a razão $\frac{\text{volume de hemolinfa}}{\text{massa da larva}}$ (ver texto).

TABELA XVII

Volumes de hemolinfa em larvas de R. americana
usando duas técnicas diferentes*

Idade (dias)	Volume (μ l/larva)	
	Exanguinação	Diluição de corante
27	9,5	9,3
32	14,8	17,7

* Detalhes em Métodos.

A razão volume de hemolinfa e massa de larva é constante ($0,401 \pm 0,009 \mu\text{l/mg}$) durante considerável parte do 4º estágio, isto é, de larvas com 22 dias até 42 dias de idade. Esse fato permite a estimativa rápida do volume de hemolinfa de larvas não maduras, conhecendo sua massa.

A razão volume de hemolinfa e massa corpórea de larvas maduras é de $0,31 - 0,39 \mu\text{l/mg}$, durante os períodos 3º, 4º e 5º ela é de $0,24 - 0,32 \mu\text{l/mg}$ e na pupa $0,11 - 0,15 \mu\text{l/mg}$. Pode-se concluir então que o volume de hemolinfa diminui mais rapidamente do que o peso-sêco do animal em pelo menos duas oportunidades. Isso indica que de larvas maduras para 3ºP e de 5ºP para pupa deve haver transferência de água da hemolinfa para os tecidos. Essa interpretação está de acordo com a hipótese levantada abaixo da hemolinfa servir como importante reservatório de água para o animal.

TABELA XVIII

Pêso-sêco e conteúdo de água das larvas de R. americana imediatamente antes do início e após o término do casulo

Determinação *	Período e idade (dias)	
	29P, 48	pré-pupal, 63
Pêso-sêco da larva	10,7	6,5
Água, total **	58,7	22,4
Água, hemolinfa **	22,9	3,7

* - Média de duas determinações. Resultados expressos em mg/larva.

** - Calculado a partir da diferença entre pêso-fresco e pêso-sêco da larva ou hemolinfa.

Os resultados apresentados na Tabela XVIII permitem calcular que a hemolinfa é responsável por 37% do pêso-fresco e 26% do pêso-sêco de larvas maduras, o que lhe garante uma importância, pelo menos quantitativa, na vida do inseto. Além disso, êsses resultados levam à conclusão de que a hemolinfa é importante reservatório de água para o animal, pois contém 39% da água das larvas maduras e contribui com 53% da água perdida pela larva durante a produção do casulo, isto é, entre o fim do 2º período e o período pré-pupal.

2. Determinações químicas na hemolinfa

Os resultados das determinações de proteína, carboidratos e α -amino-N ácido solúvel e densidade da hemolinfa encontram-se na Tabela XVI e Tabela XIX. Êsses mesmos resultados estão também representados na figura 9.

Figura 9 - Proteína, α -amino-N-ácido solúvel e carboidratos na hemolinfa de R. americana. Ver texto.

TABELA XIX

Conteúdo de carboidratos na hemolinfa durante o desenvolvimento de R. americana

Período	Idade (dias)	µg/indivíduo		
		Carboidrato	Trealose	Glicogênio
1ºP	30	13,1	11,4	0,0
2ºP	32	32,3	26,2	0,2
2ºP	48	49,4	34,4	0,3
3ºP	49	35,8	24,4	0,3
4ºP	54	46,5	28,2	0,2
5ºP	57	47,5	29,4	0,3
Pupa	64	34,6	27,6	-

Durante o 3º estágio e 4º estágio até a idade de 48 dias ocorre um acúmulo generalizado de compostos na hemolinfa, resultando em um aumento de sua densidade. Após o início da produção do casulo ocorre ainda um ligeiro aumento na massa de proteínas, seguido de uma queda grande até o fim do período estudado (pupa). Os compostos ninhidrina-positivos ácido solúveis (α -amino-N ácido solúvel) diminuem em massa desde o início da produção do casulo até a fase de pupa. Carboidrato total cai no início da produção do casulo (3ºP), em seguida retorna ao valor inicial e se mantém estável até a transformação em pupa quando cai novamente. Trealose é o carboidrato predominante na hemolinfa de R. americana durante todo o desenvolvimento larval, enquanto que glicogênio ocorre em massa insignificante.

O início da elevação do conteúdo de proteínas na hemolinfa (cêrca de 30 dias de idade), coincide com a acentuação da cor avermelhada das larvas o que marca o início do 2º período do 4º estágio.

TABELA XX

Composição de aminoácidos e peptídeos na hemolinfa de larvas de R. americana em vários períodos do 4º estágio*

Componente	μ moles. 10^{-2} /larva		
	3ºP (49 dias)**	4ºP (54 dias)**	5ºP (57 dias)**
Arginina	1,38	0,86	0,75
Ácido aspártico	0,52	0,26	0,32
Treonina	24,28	12,60	8,35
Serina	7,13	2,54	0,85
Prolina	8,75	4,31	2,85
Ácido glutâmico	1,33	3,69	6,92
Glicina	2,70	2,09	1,36
Alanina	1,97	1,03	0,56
Valina	6,54	3,82	2,28
Metionina	0,38	0,22	0,17
Isoleucina	1,75	0,59	0,56
Leucina	2,68	1,13	1,04
Tirosina	5,26	3,68	3,06
Fenilalanina	0,39	0,30	1,37
Glutamina + Asparagina	5,60	5,42	2,71
Amônia	43,80	21,60	24,60
Lisina	4,09	2,56	3,44
Histidina	7,16	4,96	5,20
Triptofano	2,18	2,32	1,23
Fosfoetanolamina	0,49	0,18	0,37
Cistationina	0,30	0,57	0,57
Fosfoserina	0,24	0,12	0,15
Ornitina	4,55	2,45	1,47
Peptídeos	29,60	25,80	18,90
Total de aminoácidos	89,18	55,52	45,21
Total geral	163,07	103,10	89,08

* Os valores apresentados são médias de 3 determinações.

** Os números entre parênteses representam a idade cronológica em dias após a eclosão.

Os aminoácidos e peptídeos encontrados nos períodos 3º, 4º e 5º são os mesmos encontrados em larvas do 2º período com 45-48 dias. Nenhuma modificação qualitativa importante foi verificada.

Uma inspeção na Tabela XX permite a certificação de que a queda de α -amino N ácido solúvel observada durante a produção do casulo (figura 9) realmente correspondam a uma queda na massa de aminoácidos e peptídeos.

Os aminoácidos cuja massa mais cai entre 3ºP e 5ºP, são: treonina, prolina, serina e valina. Juntos estes aminoácidos respondem por 70% da queda total dos aminoácidos (em moles) nesse intervalo de tempo. É interessante notar que os referidos quatro aminoácidos, correspondem juntos a 29% em moles da proteína insolúvel do casulo III.

Os metais diminuem continuamente em massa durante o final da vida larva, como pode ser observado na Tabela XXI.

TABELA XXI

Massa de metais na hemolinfa de *R. americana* em várias fases do desenvolvimento larval*

Período	Idade (dias)	$\mu\text{g/larva}$						
		Mg	Ca	Cu	Zn	Fe	Na	K
3ºP	49	6,57	3,46	0,103	-	-	12,40	9,92
4ºP	54	4,86	2,47	0,049	0,086	0,272	11,51	8,08
5ºP	57	2,90	1,63	0,036	0,057	0,152	7,45	5,20
Pré-pupal	63	1,06	0,59	0,045	0,032	0,081	-	-

* Todos os valores apresentados representam médias de três determinações.

Os resultados da Tabela XXII mostram que a despeito de alterações na composição química da hemolinfa de *R. americana* durante o final do desenvolvimento larval, a osmolaridade permanece contante. As variações de pH estão dentro das variações in-

dividuais, com a possível exceção daquela do 4º P, cujo pH parece realmente ser ligeiramente mais baixo que dos demais períodos.

Os valores para cloreto e amônia sofrem alterações durante o desenvolvimento.

TABELA XXII

Osmolaridade, pH, cloreto e amônia na hemolinfa de R. americana em diferentes idades*

Período	Idade (dias)	Concentração (mM)		Osmolaridade (m. osmoles)	pH
		Cloreto	NH ₃		
3ºP	49	18,3	24,5	217	7,31
4ºP	54	25,0	15,1	216	7,18
5ºP	57	23,0	26,2	209	7,28

* Todos os valores da Tabela representam médias de três determinações com exceção de pH, que corresponde a apenas uma determinação realizada a 25°C.

3. Pêso-sêco e glicogênio no corpo gorduroso

O corpo gorduroso de R. americana é formado por duas porções principais: uma central bastante volumosa e outra periférica disposta em pequenos aglomerados laterais organizados segmentarmente. Essa porção periférica apresenta massa muito pequena em relação ao corpo gorduroso central e é de dissecação difícil em larvas jovens. Devido a isso, somente o corpo gorduroso central foi pesquisado. Esse aumenta em pêso-sêco durante o desenvolvimento da larva até essa atingir a maturidade, quando então passa a corresponder a 38% do pêso-sêco da larva (Tabela XXIII). Valores dessa magnitude são comuns em Holometabola (WIGGLESWORTH, 1965).

O conteúdo de glicogênio do corpo gorduroso é apreciável, crescendo até atingir um máximo no 4º período, quando corresponde a 18% do pêso-sêco do corpo gorduroso, declinando em seguida até pupa (Tabela XXIII).

TABELA XXIII

Pêso-sêco e glicogênio do corpo gorduroso central durante o desenvolvimento de *R. americana**

Período	Idade (dias)	µg/indivíduo	
		Pêso-sêco	Glicogênio
1ºP	30	610	-
2ºP	32	1170	85
2ºP	44	2400	-
2ºP	48	4100	578
3ºP	49	4060	678
4ºP	54	4100	756
5ºP	57	3820	602
Pupal	64	3200	266

* Os resultados apresentados são médias de três determinações. Maiores informações, ver Métodos.

4. Pêso-sêco e metais nos túbulos de Malpighi

Os túbulos de Malpighi ocorrem em número de 4, desembocam dois a dois no tubo digestivo de *R. americana* e apresentam um conteúdo branco na sua porção proximal. Esse conteúdo aumenta durante o desenvolvimento larval, atingindo um máximo na larva madura (2ºP, 48 dias de idade) e a partir daí começa a diminuir. Por ocasião da última apólise larval (início do período pré-pupal, cerca de 59 dias de idade) os túbulos de Malpighi apresentam-se completamente vazios.

TABELA XXIV

Pêso-sêco dos túbulos de Malpighi antes e após a formação do casulo

Período	Idade (dias)	mg/indivíduo	
		Pêso-sêco	CaCO ₃ *
2ºP	48	1,39	1,35
Pré-pupal	53	0,09	-

* Calculado a partir do conteúdo de Ca apresentado na Tabela XXV.

A Tabela XXIV mostra o pêso-sêco dos túbulos de Malpighi repletos com o conteúdo branco na larva madura, e após o seu total esvaziamento, depois da última apólise larval. A diferença entre os dois valores permite estimar a massa do conteúdo branco: 1,30 mg/indivíduo.

O conteúdo branco dos túbulos de Malpighi torna-se efervescente em ácido acético 10%, o que sugere a presença de carbonatos. A ocorrência de carbonato de cálcio em túbulos de Malpighi já foi documentada em larvas de numerosos insetos, inclusive Diptera (CLARK, 1958).

A massa de cálcio presente nos túbulos de Malpighi é bastante grande, como pode ser vista na Tabela XXV. A partir dessa determinação de Ca pode-se estimar a massa de CaCO₃, presente nos túbulos de Malpighi: 1,35 mg/indivíduo. A concordância dêsse valor com a massa de conteúdo dos túbulos de Malpighi referido (Tabela XXIV), reforça a hipótese de que o conteúdo é realmente CaCO₃.

A massa de Ca presente no casulo III é similar àquela presente nos túbulos de Malpighi e muito superior à queda no conteúdo de Ca verificada na hemolinfa durante a produção do casulo (Tabela XXV). A semelhança entre o conteúdo de Ca no casulo III e nos túbulos de Malpighi deve ser ainda maior que a determinada experimentalmente, devido à impossibilidade de se remover os túbulos de Malpighi sem perda de uma pequena fração de seu conteúdo.

TABELA XXV

Determinação de metais nos túbulos de Malpighi em larvas maduras de R. americana e comparação com o conteúdo de metais do casulo III e com a queda desses verificada na hemolinfa durante a produção do casulo

Metais	$\mu\text{g}/\text{indivíduo}$		
	Hemolinfa ¹	Malpighi ²	Casulo III ³
Zn	-	1,30	0,83
Cu	0,058	0,17	0,056
Ca	2,61	540	660
K	-	36	0,031
Mg	5,51	76	0,056
Fe	-	5,0	3,75

1. Queda durante a produção do casulo. Calculado a partir das Tabelas V, XVI e XXI.
2. Determinado em animais do 2º período, 48 dias de idade. Maiores informações, ver Métodos.
3. Calculado a partir das Tabelas IX e XII.

DISCUSSÃO

A. Química da hemolinfa

1. Extensão da análise realizada

A Tabela XXVI apresenta uma compilação de resultados já apresentados, porém agora na forma adequada para se estimar a extensão coberta pela análise realizada da hemolinfa de larvas maduras de R. americana. Como se vê, a análise abrangeu cerca de 88% do peso-seco da hemolinfa, o que coloca R. americana entre os insetos de hemolinfa melhor conhecida, próximo a Bombyx mori e Hyalophora cecropia cujas hemolinfas são conhecidas em cerca de 96 e 92% de seu peso-seco, respectivamente (WYATT, 1961).

A fração não identificada da hemolinfa de R. americana deve corresponder, entre possíveis outros compostos, a ácidos orgânicos (ver abaixo, item 3) e a carboidratos ligados às proteínas. Esta última suposição está baseada no fato de que proteínas conjugadas a carboidratos ocorrem em concentrações elevadas em insetos (SIAKOTOS, 1960a). Tais carboidratos parecem ser responsáveis por parte dos componentes determinados usualmente como glicogênio (WYATT, 1961) e pela observação de TOLEDO FILHO (1969) que encontrou reação PAS positiva nas 9 bandas proteicas separadas por eletroforese em gel de agar da hemolinfa de larvas de R. americana.

TABELA XXVI

Composição porcentual em massa do resíduo seco da hemolinfa de
larvas maduras de R.americana*

Composto	mg/ml	% pêso-sêco
Proteína	69,00	61,5
Aminoácidos	8,22	7,3
Lipídeos	5,20	4,6
Peptídeos	4,23	3,8
Citrato	3,91	3,5
Compostos fosforilados orgânicos não identificados	2,77	2,5
Metais	2,71	2,4
Carboidratos	2,01	1,8
Cloreto	0,48	0,4
Ortofosfato	0,30	0,3
Fosfoetanolamina	0,18	0,2
Glicogênio	0,01	0,0
Total	99,02	88,3
Pêso-sêco	112,30	100,0

* Os valores apresentados foram calculados a partir das tabelas II e V. A concentração dos compostos fosforilados orgânicos não identificados foi calculada a partir de determinação de P-orgânico ácido solúvel (P-ácido solúvel-P-inorgânico) da Tabela V, assumindo que este representa 15% em pêso dos referidos compostos, seguido da subtração do título de fosfoetanolamina e fosfoserina. Ver discussão no texto.

2. Componentes orgânicos da hemolinfa

TUNDISI et alii (1964) em uma análise qualitativa dos aminoácidos livres da hemolinfa de R. americana utilizando cromatografia em papel, identificaram 15 aminoácidos e 2 peptídeos. Seus resultados estão de acordo com aqueles apresentados na figura 1, embora nenhuma correlação possa ser feita entre os peptídeos por eles identificados e aqueles apresentados na referida figura. O fato dos referidos autores não terem encontrado metionina, fenilalanina, triptofano, arginina, fosfoserina, cistationina além de 11 outros compostos ninhidrina-positivos, certamente se deve à menor resolução e sensibilidade de seu sistema analítico em relação ao utilizado nesta tese.

O conteúdo de aminoácidos na hemolinfa de R. americana é bastante elevado, como foi indicado em Resultados e vários deles merecem uma discussão particular.

Cistationina acumula-se na hemolinfa de R. americana em concentrações superiores até que a metionina, enquanto que não se detecta nem mesmo traços de cisteína ou cistina (Tabela II). Isso poderia ser explicado admitindo-se que a cistationina deriva-se da metionina e que ela não é clivada em cisteína e homoserina devido a ausência da enzima apropriada, como parece ser o caso de Bombyx mori (GILMOUR, 1965). Isso indicaria que cisteína é um aminoácido essencial para R. americana como já foi demonstrado no Diptera Nematocera Aedes (GOLDBERG e De MEILLON, 1948).

Arginina é requerida na dieta de todos insetos estudados, podendo ser substituída parcialmente por citrulina, mas não por ornitina, o que levou a se propor a não ocorrência do passo ornitina —> citrulina e conseqüentemente de um ciclo da ornitina completo em insetos (GILMOUR, 1961). Os resultados obtidos por INOKUCHI, HORIE e ITO (1969) usando marcadores radioativos dão uma evidência direta de que o referido passo não ocorre, pelo menos em Bombyx mori. A presença de ornitina e uréia poderia ser explicada, entretanto, pela ação da arginase sobre a arginina exôgena, porque arginase (EC 3.5.3.1) ocorre nos corpos gordurosos de vários insetos pesquisados (GILMOUR, 1965). A uréia poderia ser formada ainda a partir de ácido alantóico sob ação da

alantoicase (EC 3.5.3.4), como ocorre com o grilo Acheta domestica (GILMOUR, 1965). Nenhuma informação existe sobre a possibilidade da ornitina se derivar do ácido glutâmico ou prolina, como ocorre em vários animais (Cf. GILMOUR, 1965).

A partir do exposto acima, pode-se admitir que o acúmulo de ornitina verificado na hemolinfa de R. americana e a ausência de traços de citrulina seja consequência da formação de ornitina a partir da arginina exógena e sua impossibilidade de poder dar origem à arginina, devido a inexistência do passo ornitina $\longrightarrow$ citrulina. A uréia presente em traços de hemolinfa poderia ter surgido pela arginase (EC 3.5.3.1) ou, menos provavelmente, pela alantoicase (EC 3.5.3.4), como descrito acima.

As concentrações de tirosina na hemolinfa de R. americana são bastante elevadas, chegando a 3,26 mM no 5º período, que corresponde aproximadamente ao limite de solubilidade da tirosina em água a 25°C (0,05% P/P). Entretanto, concentrações ainda mais elevadas foram encontradas na hemolinfa de larvas de outros Diptera como Calliphora augur (7,41 mM, segundo HACKMAN, 1956) e na larva inteira de Phormia regina, onde a concentração da tirosina livre é tão elevada, cerca de 10 vezes o limite de solubilidade da tirosina em água, que LEVENBOOK e DINAMARCA (1966) propuseram que "in vivo" a tirosina deve ocorrer no estado sólido. Essas concentrações elevadas de tirosina devem estar relacionadas com o papel desse aminoácido como precursor dos fenóis que intervêm na formação do pupário e/ou de nova cutícula (GILMOUR, 1965). Como Calliphora e Phormia produzem um pupário, enquanto que R. americana não o faz, seria mesmo de se esperar que as primeiras possuíssem um conteúdo maior de tirosina em relação a essa última.

Taurina é encontrada frequentemente na hemolinfa de insetos e deve-se originar a partir da descarboxilação do derivado oxidado da cisteína, o ácido cisteico, e não possui nenhuma função conhecida em insetos (GILMOUR, 1965). Recentemente vários experimentos tem sugerido a possibilidade de taurina atuar como um neurotransmissor semelhante ao ácido γ -amino butírico em mamíferos (Cf. DAVISON e KACZMAREK, 1971). É possível que o mesmo ocorra em insetos, embora ainda não exista nenhum estudo a respeito.

O ácido α -amino-n-butiírico deve originar-se da alimentação vegetal, embora possa surgir a partir da degradação da metionina (GILMOUR, 1965).

O ácido γ -amino-n-butiírico, resulta da descarboxilação do ácido glutâmico, enquanto que nenhum dado existe a respeito da biossíntese da β -alanina; ambos devem ser substâncias transmissoras do sistema nervoso central em insetos (GILMOUR, 1965) e β -alanina tem sido implicada também nos processos de esclerotização de cutículas (HACKMAN e GOLDBERG, 1971).

Fosfoetanolamina e possivelmente fosfoserina também devem estar relacionados com a síntese e degradação de fosfatídeos. É interessante notar que fosfatidiletanolamina é o fosfatídeo predominante em Diptera, como por exemplo: Phormia regina (BIEBER et alii, 1961) e Musca domestica (CRONE e BRIDGES, 1963).

A função dos aminoácidos livres presentes em tão elevadas concentrações na hemolinfa ainda não está bem esclarecida (CHEN, 1966), exceptuando-se aquela de alguns aminoácidos particulares como tirosina, como já foi comentado. Algumas funções foram, entretanto, atribuídas aos aminoácidos livres da hemolinfa e, segundo CHEN (1966), são: precursores de síntese protéica, participação em mecanismos de detoxificação, tamponamento e osmorregulação. O caso mais conhecido da utilização dos aminoácidos livres da hemolinfa como precursores de síntese protéica é na biossíntese da sêda por Bombyx (WYATT, 1961). O papel dos aminoácidos na osmorregulação parece estar relacionado com o fato dos insetos possuírem uma baixa concentração de íons inorgânicos (FLORKIN e JEUNIAUX, 1964; ver também ítem A3, abaixo). Adiante, ítem B2, será apresentada alguma evidência indireta de que os aminoácidos livres da hemolinfa de R. americana participam na síntese do seu casulo.

A ocorrência de peptídeos na hemolinfa de larvas de insetos é fenômeno generalizado (CHEN, 1966). Entre os Diptera existem, entretanto, diferenças quanto aos tipos de peptídeos presentes. Enquanto que em Drosophila os peptídeos são geralmente ácidos, de cadeia relativamente longa (Cf. MITCHELL e SIMMONS, 1962), aqueles presentes em Phormia regina são de carã-

ter básico ou neutro e predominantemente compostos de dois aminoácidos (Cf. LEVENBOOK, 1966).

Os peptídeos presentes na hemolinfa de R. americana são do tipo observado em Phormia regina, isto é, predominantemente básicos ou neutros e compostos de pequeno número de resíduos de aminoácidos.

O significado bioquímico dos peptídeos da hemolinfa não é conhecido com segurança. LEVENBOOK (1966) a partir da observação do desaparecimento desses peptídeos em Phormia regina por ocasião da pupação sugeriu a possibilidade destes funcionarem como uma reserva de aminoácidos, que seriam utilizados nos processos de histogênese na pupa. É possível, entretanto, que esses peptídeos tenham também funções mais específicas, como por exemplo o peptídeo sexual de Drosophila melanogaster, que é produzido nas glândulas acessórias do macho e transferido para as fêmeas na cópula, aumentando a ovoposição nessas (CHEN e BÜHLER, 1970).

As proteínas da hemolinfa são sintetizadas principalmente pelo corpo gorduroso (SHIGEMATSU, 1958; 1960; PRICE e BOSMAN, 1966), embora outros órgãos como o intestino aparentemente sejam também responsáveis pela síntese de pelo menos parte dessas proteínas (ROTH e PORTER, 1964; CHIPPENDALE, 1970).

Várias funções tem sido atribuídas às proteínas da hemolinfa. Segundo SIAKOTOS (1960a, b) as proteínas da hemolinfa transportam carboidratos e lipídeos dos sítios que os armazenam para outros em que serão utilizados. Pelo menos em alguns insetos, as proteínas da hemolinfa funcionam como fornecedoras de aminoácidos para a manutenção da osmolaridade da hemolinfa (WYATT, 1961).

De acordo com LEVENBOOK (1950b) as proteínas da hemolinfa são responsáveis por cerca de 62% do poder tamponante total da hemolinfa de Gastrophilus.

A presença de numerosas enzimas entre as bandas proteicas separadas por eletroforese de amostras de hemolinfa foi demonstrada primeiramente por LAUFER (1960a, b), embora atividades enzimáticas já tivessem sido detectadas na hemolinfa por numero-

so os outros investigadores anteriores (Cf. FLORKIN e JEUNIAUX, 1964; CHEN, 1966). Mais recentemente foi detectado e purificado um complexo multienzimático da hemolinfa de mariposas, que parece ser tomado intacto por tecidos em histólise, contribuindo ali para a degradação do DNA (RIECHERS, MEYERS e BERRY, 1969). Entretanto, uma das funções das proteínas da hemolinfa que mais tem atraído a atenção dos pesquisadores recentemente é a de servirem como precursoras diretas ou indiretas das proteínas tissulares durante a metamorfose, para a constituição do adulto, além de contribuírem na formação do vitelo dos ovócitos em desenvolvimento, conforme já foi comentado na Introdução.

Em R. americana a função melhor estabelecida para as proteínas da hemolinfa é sua participação na produção do casulo, que será discutida em detalhe, no item 2B, abaixo. Os resultados de BIANCHI (1972) sugerem ainda a possibilidade de uma das proteínas da hemolinfa de R. americana participar na vitelogênese, como ocorre com grande número de insetos. Por outro lado a demonstração por TOLEDO FILHO (1969) de que as 9 bandas protéicas da hemolinfa de R. americana separáveis por eletroforese em gel de agar dão reações positivas para carboidratos poderiam indicar uma participação no transporte de carboidratos, como sugerido por SIAKOTOS (1960a, b) em Periplaneta americana.

Os lipídeos encontram-se na hemolinfa de insetos associados a proteínas, através de ligações específicas principalmente na forma de diglicerídeos (CHINO e GILBERT, 1965; GILBERT, 1967a), embora ocorra exceções onde os lipídeos são transportados principalmente como triglicerídeos (MARTIN, 1969). Os resultados desta tese não permitem concluir qual é a forma lipídica predominante na hemolinfa de R. americana, embora uma estimativa de fosfolipídeos e lipídeos neutros possa ser feita.

Os fosfatídeos são de regra responsáveis pela maior parte do P-lipídico em Diptera (GILBY, 1965) e como eles contêm aproximadamente 4% em peso de fósforo é possível estimar a massa de fosfolipídeos presentes na hemolinfa de R. americana, simplesmente multiplicando o conteúdo de P-lipídico determinado (Tabela V) por 25. Esse cálculo resulta em 2,55 mg de fosfolipídeos/ml de hemolinfa.

A concentração de lipídeos neutros por sua vez, pode ser calculada a partir do conteúdo lipídico total (Tabela v) e da estimativa de fosfolipídeos feita acima, resultando em 2,05 mg de lipídeos neutros/ml de hemolinfa.

Os compostos fosforilados presentes na hemolinfa de larvas maduras de R. americana são fosfolipídeos (discutidos acima), ortofosfato, fosfoproteínas e componentes da fração orgânica ácido solúvel. Nesta fração somente dois compostos fosforilados foram identificados e quantificados nesta tese; fosfo serina e fosfoetanolamina (Tabela II). Os compostos orgânicos fosforilados ácidos solúveis não identificados podem ser, entre tanto, estimados se for assumido que eles possuem um conteúdo médio de P similar ao observado em compostos dessa fração em outros insetos, isto é, 15% em peso (WYATT, 1961). O resultado desse cálculo é apresentado na Tabela XXVI.

Os compostos fosforilados orgânicos e ácido solúveis são muito importantes para o tamponamento da hemolinfa de insetos (LEVENBOOK, 1950b) e para o seu balanço ânion-câtion (WYATT, LOUGHHEED e WYATT, 1956; LEVENBOOK, 1950a). A importância desses compostos no balanço ânion-câtion da hemolinfa de R. americana pode ser apreciada na Tabela XXVIII uma vez que fosfato ácido solúvel é um dos principais ânions da hemolinfa e é constituído principalmente de compostos orgânicos como pode ser demonstrado a partir da Tabela V.

A concentração de citrato na hemolinfa de larvas de R. americana é bastante elevada e este ânion corresponde a cerca de 47% de todos ânions detectados na hemolinfa deste inseto (Tabela XXVIII). Concentrações elevadas de citrato na hemolinfa foram observadas em vários outros insetos e trabalhos realizados em Prodenia eridania indicam que o citrato é de origem endógena e que seria acumulado juntamente com outros ácidos orgânicos devido a uma desproporção entre a biossíntese e a oxidação e/ou utilização desses ácidos (LEVENBOOK e HOLLIS, 1961; LEVENBOOK, 1961).

3. Composição molar da hemolinfa e seus componentes inorgânicos

A composição molar da hemolinfa permite estimar a contribuição porcentual de cada componente para a osmolaridade total da hemolinfa. A Tabela XXVII mostra os resultados calculados para a hemolinfa de R. americana.

TABELA XXVII

Composição molar da hemolinfa de larvas maduras de R. americana¹

Composto	mM	% do total
Aminoácidos	62,62	26,2
Mg	45,30	19,0
Na	33,70	14,1
Ácido cítrico	18,60	7,8
K	17,30	7,2
Cloreto	13,40	5,6
Compostos fosforilados orgânicos não identificados ²	13,32	5,5
Peptídeos	12,78	5,4
HCO ₃ ⁻	6,90	2,9
Trealose	4,10	1,7
Carboidratos não identificados ³	3,39	1,4
Ca	3,23	1,4
Ortofosfato	3,13	1,3
Fosfoetanolamina	1,31	0,5
Total	239,08	100,0
Osmolaridade (miliosmoles)	216	-

1. Os valores apresentados foram calculados a partir das tabelas II e V, com as exceções indicadas. Ver discussão no texto.

2. Calculado a partir da Tabela XXVI.

3. Calculado como glicose, a partir da diferença entre as concentrações de carboidrato total e trealose, apresentadas na Tabela V.

Amônia não se encontra representada na Tabela XXVII, devido à possibilidade de que o seu elevado título seja um artefato (ver Tabela II e comentários a ela referente em Resultados). Similarmente ali não se encontram os valores para Fe, Cu e Zn, por ocorrerem em concentrações muito baixas (ver Tabela V). As proteínas, embora presentes em elevada concentração, quando expressas em massa por volume, são osmoticamente de efeito desprezível, em relação aos componentes representados na Tabela XXVII e por isto também não foram ali apresentadas.

A soma das concentrações molares dos componentes da hemolinfa é maior do que a sua osmolaridade total. Essa diferença deve ser real, porque possíveis superestimativas dos compostos não determinados diretamente, como os compostos fosforilados orgânicos não identificados e os carboidratos não identificados, não seriam suficientes para corresponder à diferença observada. Além disso, se amônia ocorrer realmente na concentração determinada, ou o seu eventual precursor, a diferença entre a concentração molar total e a osmolaridade da hemolinfa seria ainda maior. A explicação mais simples para essa diferença é admitir que alguns componentes não sejam osmoticamente ativos por estarem complexados a outros. Essa possibilidade voltará a ser explorada abaixo ao se discutir o balanço ânion-câtion da hemolinfa.

A contribuição osmótica dos íons inorgânicos e aminoácidos da hemolinfa pode ser analisada com maior facilidade através da figura 10. Nesta figura A, B, e D representam os principais padrões iônicos inorgânicos nos insetos Pterygota, segundo SUTCLIFFE, conforme citado por FLORKIN e JEUNIAUX (1964). Segundo esse mesmo autor, A representa o tipo considerado mais primitivo, caracterizado por concentração elevada de íons inorgânicos e baixa concentração de aminoácidos; D é considerado o tipo mais evoluído, apresentando elevada concentração de aminoácidos e baixa concentração de íons inorgânicos e, finalmente, B é um tipo intermediário que é usual nas ordens: Megaloptera, Neuroptera, Mecoptera, Trichoptera e Diptera. R. americana representada por C, possui um padrão bem de acordo com aquele usual para Diptera (B) isto é, quase 50% da pressão osmótica é devido a cations inorgânicos, cloreto é um ânion de importância relativamente pequena e o papel osmótico dos aminoácidos é elevado.

Figura 10 - Efeitos osmóticos de componentes inorgânicos ilustrados como porcentagens da concentração molar total da hemolinfa de insetos Pterygota. Cada bloco na figura é visualizado como duas seções verticais, cada uma destas correspondendo a 50% da concentração molar total. As contribuições percentuais dos cátions são ilustrados na seção à esquerda, enquanto que os ânions à direita. Os aminoácidos são representados, na medida do possível em igual proporção em ambas seções. As áreas em branco correspondem a componentes não indicados. A, B e D estão representados de acordo com SUTCLIFFE segundo FLORKIN e JEUNIAUX (1964). C foi calculado a partir da Tabela XXVII.

Algumas diferenças notáveis existem, entretanto, entre R. americana e o padrão de Diptera apresentado. São elas: um nível muito elevado de Mg e K, e um nível relativamente baixo de Na. Segundo BONÉ (1944), insetos carnívoros tenderiam a ter um conteúdo elevado de Na, enquanto que os insetos fitófagos, um conteúdo elevado de K e Mg em sua hemolinfa de tal forma que a razão molar Na/K nos insetos fitófagos é menor ou próximo de 1, e nos carnívoros bem acima de 1 (cêrca de 5 a 15 de regra). Essa explicação dietética para os diferentes padrões catiônicos existentes encontra, entretanto, várias exceções, conforme ressaltado pelo próprio BONÉ. Apesar disso, essa hipótese é aplicável a numerosos insetos e é possível que o alto conteúdo de K e Mg na hemolinfa de R. americana, em relação ao padrão de Diptera apresentado (figura 10,B), seja devido aos seus hábitos fitófagos, enquanto que a maioria dos insetos utilizados para a elaboração do padrão de Diptera apresentado são carnívoros (Cf. FLORKIN e JEUNIAUX, 1964).

A razão molar Na/K na hemolinfa de larvas maduras de R. americana é de 1,95, que é relativamente próximo da unidade, como seria de se esperar para um inseto fitófago.

A elevada concentração de K presente na hemolinfa de muitos insetos parece incompatível com uma função neuromuscular normal, especialmente porque, segundo CARRINGTON e TENNEY (1959), todo K encontra-se na forma livre e fisiologicamente ativo na hemolinfa. Experimentos electrofisiológicos indicaram, entretanto, que a bainha em tórno das fibras nervosas dos insetos atua como eficiente barreira de difusão, fazendo com que o fluído imediatamente em contacto com as fibras nervosas possua uma composição iônica diferente daquela da hemolinfa (Cf. NARAHASHI, 1963). Mais tarde foi demonstrado que essa diferente composição era mantida pela bainha não por ser esta impermeável aos íons, mas por ser capaz de manter um equilíbrio dinâmico adequado entre os íons da hemolinfa e do fluído circundante das fibras nervosas (Cf. NARAHASHI, 1963). Entretanto, mesmo a existência dessa bainha não explica a insensibilidade de certos insetos a variações iônicas extremas (GILMOUR, 1965).

A figura 10 permite observar que a maior parte dos cátions presentes na hemolinfa de R. americana devem ser neutrali-

zados por ânions orgânicos, porque a contribuição de ânions inorgânicos é muito pequena. O balanço ânion-câtion pode ser, entretanto, melhor analisado pela Tabela XXVIII.

TABELA XXVIII

Balanço ânion-câtion na hemolinfa de larvas maduras de R.americana¹

Câtions			Ânions		
Composto	meq/l	% total	Composto	meq/l	% total
Mg ⁺⁺	91	61	Citrato ⁻⁻⁻	56	47
Na ⁺	34	23	Fosfato ácido solúvel ²	27	23
K ⁺	17	11	Proteinato ³	16	13
Ca ⁺⁺	6	4	Cloreto ⁻	13	11
Fe ⁺⁺	1	1	HCO ₃ ⁻	7	6
Total	149	100	Total	119	100

1. Os valores apresentados foram calculados a partir da Tabela XXVII e arredondados para o número inteiro mais próximo.
2. Calculado assumindo uma dissociação primária de 100% e uma secundária de 50%.
3. Estimado assumindo que a carga líquida por mol das proteínas da hemolinfa fôsse igual à albumina plasmática bovina no pH da hemolinfa e que seu peso molecular fôsse idêntico ao desta. Nos cálculos foram utilizados os dados revistos por FOSTER (1960), para albumina bovina plasmática.

As estimativas de fosfato e proteinato devem ser consideradas apenas aproximativas. Amônia, que no pH da hemolinfa estaria na forma de NH₄⁺, não foi incluída na Tabela pelas mesmas razões que não o foi na Tabela XXVII, isto é, pela possibilidade da alta concentração encontrada ser um artefato. A Tabela XXVIII mostra claramente que o principal ânion é constituído por ácidos orgânicos, principalmente citrato. É interessante notar que

há um excesso de cátions em relação ao de ânions, que poderia ser explicado pela ocorrência de cátions ligados a proteínas ou aminoácidos e pela ocorrência de compostos ácidos não determinados. Os aminoácidos poderiam contribuir muito pouco no valor do pH da hemolinfa. Essa contribuição seria para os cátions, não para os ânions. A demonstração de que 15-20% do cálcio e magnésio da hemolinfa estão ligados a proteínas em Telea polyphemus (CARRINGTON e TENNEY, 1959) favorece à idéia de que o desbalanço iônico observado é devido principalmente a uma fração dos cátions que não estaria livre.

Se fôr admitido que a diferença observada entre cátions e ânions da Tabela XXVIII corresponde a cátions que não estão livres, seria possível explicar também a discrepância entre a concentração molar total estimada da hemolinfa e sua determinação direta, apresentada na Tabela XXVII.

A osmolaridade da hemolinfa permanece constante durante a produção do casulo, embora haja uma queda generalizada em massa por indivíduo dos componentes da hemolinfa (Tabela XXII). Essa constância parece ser consequência da pequena variação, que é ainda mutuamente compensada, da concentração molar dos componentes que juntos perfazem cerca de 80% da osmolaridade total da hemolinfa (Tabela XXIX). Deve-se notar, entretanto, que os metais sofrem uma redução, não balanceada pelo aumento de outros componentes da hemolinfa, entre o 2ºP e 3ºP sem haver uma queda correspondente na osmolaridade da hemolinfa. Este resultado está de acordo com a hipótese levantada acima de que parte dos cátions não está na forma livre, mas ligada a outras moléculas e seria explicado se o decréscimo no conteúdo de metais ocorrer devido à perda dos cátions ligados.

TABELA XXIX

Osmolaridade e concentração milimolar dos componentes osmôticamente mais ativos da hemolinfa de larvas de *R. americana* durante o desenvolvimento*

Período	Idade (dias)	mM				miliomosmoles
		Metais	Aminoácidos	Peptídeos	Cloreto	Osmolaridade
2º P	48	100,0	62,6	12,8	13,4	216
3º P	49	64,3	56,1	16,5	18,3	217
4º P	54	68,3	38,8	18,0	25,0	216
5º P	57	66,2	48,1	20,1	23,0	209

* Valores reproduzidos ou calculados das Tabelas II, V, XX, XXI e XXII.

4. Coagulação e escurecimento

A hemolinfa de larvas de *R. americana* não coagula espontaneamente. Esse comportamento é semelhante ao padrão IV de reações observadas na hemolinfa após a sua retirada do inseto descrito por GRÉGOIRE (1951). Esse padrão é comum em Hemiptera Heteroptera, alguns Coleoptera, alguns Hymenoptera e em Diptera adultos, embora as poucas larvas de Diptera estudadas apresentem outro padrão, envolvendo coagulação da hemolinfa (Cf. GRÉGOIRE e TAGNON, 1962).

A hemostasia no padrão IV de insetos é realizada principalmente pela formação de hemócitos aglutinados na ferida, de forma aparentemente análoga àquela verificada na hemostasia de mamíferos através da aglutinação de plaquetas (GRÉGOIRE e TAGNON, 1962).

O escurecimento e floculação da hemolinfa após diluição com água destilada, similar ao observado em larvas maduras de *R. americana*, foi reportado em *Choristoneura* (SCHMIDT e YOUNG, 1971), mas o fenômeno permanece obscuro. Uma hipótese explica

tiva, pelo menos para o escurecimento, é admitir a ocorrência em condições normais de um inibidor da tirosinase (EC 1.10.3.1) que deixaria de ser efetivo após a diluição, de forma análoga ao inibidor de trealase (EC 3.2.1.28) da hemolinfa da Phormia regina por FRIEDMAN (1961).

5. Pigmentos

A hemolinfa de larvas de R. americana maduras possuem pelo menos 7 pigmentos ligados a proteínas. Os mais importantes quantitativamente são: uma cromoglicoproteína de cor limão, cujo pigmento fluorescente de natureza desconhecida está fortemente ligado à proteína e dois carotenóides presos por ligações fracas a proteínas. Um desses carotenóides parece ser o β -caroteno e o outro, mais abundante, possui um espectro similar, mas não idêntico, ao do astaceno. TUNDISI et alii (1964) propuseram baseando-se em resultados cromatográficos, e espectrográficos que o principal pigmento da hemolinfa de larvas maduras seria astaxantina e outro pigmento também importante seria um similar ao β -caroteno. A presença desse último foi confirmado no presente trabalho, enquanto que a ocorrência de astaxantina não foi observada. Uma explicação possível para a discrepância poderia ser uma má interpretação dos resultados por TUNDISI et alii (1964), como consequência de ter feito os espectros em dissulfeto de carbono, onde astaxantina e astaceno apresentam espectros similares de uma única banda e não em piridina, onde astaceno apresenta um único pico de absorção, enquanto que astaxantina apresenta três (KUHN e SÖRENSEN, 1938). Uma outra possibilidade seria da astaxantina ter sido oxidada a astaceno nas condições usadas de extração e cromatografia nesta tese, o mesmo não ocorrendo com os citados autores. Esta possibilidade, entretanto, é muito remota porque a oxidação da astaxantina pelo ar é favorecida somente em meio alcalino e, com exceção das experiências em que as amostras foram previamente saponificadas os meios usados eram sempre neutros.

BASILE et alii (1970) identificaram três pigmentos na hemolinfa de larvas selvagens de R. americana, usando eletroforese em agarose, cujas cores eram: limão, tijolo e violeta. Isolou também um mutante recessivo, ligado ao sexo que apresen-

tava apenas o pigmento cor de limão da hemolinfa. O pigmento cor de limão observado deve corresponder à cromoglicoproteína cor de limão descrita nesta tese, enquanto que o pigmento cor de tijolo e violeta devem corresponder, respectivamente, a proteínas associadas ao β -caroteno e ao carotenóide similar ao astaceno. A referida associação deve ser específica, porque BASILE et alii (1970) encontraram os pigmentos distribuídos em bandas discretas e com migração reproduzível na eletroforese.

Os carotenóides de insetos são derivados do alimento diretamente, ou após ligeiras alterações na molécula (GOODWIN, 1954; CROMARTIE, 1959). O β -caroteno de hemolinfa de R. americana provavelmente deve provir da dieta, enquanto que o carotenóide similar ao astaceno poderia ser derivado do β -caroteno, de maneira análoga à astaxantina que, segundo GOODWIN (1949), é derivada do β -caroteno em Schistocerca gregaria ou como os ceto-carotenóides de Leptinotarsa decemlineata que são todos derivados do β -caroteno recebido na dieta (LEUENBERGER e THOMMEN, 1970). A partir desses fatos, três interpretações são possíveis para a mutação limão de R. americana, referida acima. A primeira interpretação pode ser imaginada admitindo-se que a mutação tenha afetado a capacidade da larva de absorver os dois pigmentos carotenóides. Entretanto, como essa absorção é geralmente específica (GOODWIN, 1954) é pouco provável que uma única mutação tenha causado essa situação. A segunda interpretação possível é admitir que se trate de uma dupla mutação afetando a capacidade da larva de absorver os dois carotenóides do alimento. Por fim, a terceira interpretação é considerá-la consequência de uma mutação afetando a capacidade da larva absorver β -caroteno, admitindo ainda, que o carotenóide similar ao astaceno seja derivado do β -caroteno. Esta última interpretação tem a seu favor o fato de admitir apenas uma mutação para explicar toda a situação encontrada, o que está mais de acordo com o comportamento de fator mendeliano simples dessa mutação.

Os carotenóides não tem nenhuma função específica conhecida em insetos, embora seja admitido um papel na reprodução, devido a sua presença nos ovos (GOODWIN, 1954). Esse papel é de valor duvidoso em R. americana, porque no mutante limão, os ovos são amarelo-limão (BASILE, 1970), denunciando a ausência de caro

tenóides (os ovos de fêmeas selvagens são alaranjados).

A origem e função do pigmento fluorescente de cor limão é completamente obscura, principalmente porque a sua natureza química é desconhecida. É interessante notar que a sua presença foi detectada na secreção salivar de larvas de R. americana (BIANCHI, 1972) e é possível que se encontre também nos ovos, a julgar pela coloração destes no mutante limão.

B. Produção do casulo coletivo por larvas de R. americana

1. Química do casulo

A fiação do casulo inicia-se com a formação de filamentos bem definidos junto aos quais a larva deposita um material semelhante a fezes. Mais tarde o espaço entre fios são preenchidos por um material amorfo, membranoso, visível mesmo depois da retirada de CaCO_3 por ácido acético. Este material membranoso, juntamente com o filamentar fazem parte, portanto, do que tem sido chamado fração insolúvel do casulo. Esta fração corresponde à sêda de R. americana (ver item 2 abaixo), e a Tabela XI representa a sua composição aminoacídica. BIANCHI (1972) fez a determinação da composição aminoacídica da secreção salivar da larva madura de R. americana. Esta secreção é responsável pela origem dos filamentos que são formados logo no início da produção do casulo, referidos acima. Como os seus resultados são similares àqueles obtidos com o casulo terminado isso sugere que a parte fibrosa e membranosa da fração insolúvel do casulo tem a mesma composição ou que a parte fibrosa predomina de tal forma sobre a amorfa que mascara a eventual composição peculiar desta última.

Os tipos principais de sêda conhecidos são constituídos principalmente de fibroína, colágeno, quitina, cuticulina ou poliglicina (RUDALL e KENCHINGTON, 1971). A composição da sêda de R. americana, representada pela composição da fração insolúvel do casulo, é principalmente protéica, não podendo portanto, ser do tipo cuticulina ou quitina. A Tabela XI mostra que a sêda

de R. americana não pode ser do tipo poliglicina, pois tem muito menos do que 66% dos aminoácidos como glicina, bem como não pode ser também do tipo fibroína ou colágeno. É notável, entretanto, a semelhança de sua composição com aquela de proteínas cuticulares, a julgar pela sua semelhança com a composição aminoacídica do pupário de Lucilia cuprina (Tabela XI). Como se sabe o pupário de Diptera Cyclorrhapha é derivado da epicutícula e endocutícula externa da larva madura (WHITEN, 1957). Parece, portanto, que a sêda de R. americana representa um tipo ainda não descrito de sêda, embora guarde semelhanças com a porção protéica das sêdas quitinosas, as quais segundo RUDALL (1962) estariam associadas com proteínas similares àsquelas da cutícula. O fato da sêda de R. americana apresentar um conteúdo relativamente elevado de hexosaminas aumenta estas semelhanças, embora a hexosamina presente seja galactosamina e não N-acetilglicosamina e deva ainda ser levado em consideração o seu conteúdo relativamente elevado de carboidratos neutros.

A sêda de Camptochironomus possui uma composição aminoacídica muito diferente daquela de R. americana (Tabela XI), embora os dois gêneros estejam relativamente próximos taxonomicamente. Isso talvez esteja relacionado com o fato de Camptochironomus não produzir um casulo sedoso verdadeiro e possuir hábitos aquáticos bem distintos, portanto, daqueles de R. americana. Segundo LUCAS, SHAW e SMITH (1960) é possível que o tipo de ambiente em que o inseto pupe e suas características peculiares explique a diversidade das sêdas.

A função dos casulos de insetos formados por ocasião da pupação é a de oferecer proteção à pupa contra choques mecânicos, variações de temperatura, dessecação e ataques de predadores (IMMS, 1957). DREYFUS et alii (1951) puseram em dúvida a função do casulo em R. americana como um protetor contra o dessecação, baseando-se no ambiente úmido em que são normalmente encontradas as larvas deste inseto. Entretanto, a sua objeção parece não ter procedência, porque embora as larvas sejam encontradas em ambientes úmidos, os casulos muitas vezes têm sido encontrados no campo em locais secos.

2. Origem dos componentes do casulo

A produção do casulo exige um enorme esforço da larva de R. americana, pois durante a sua produção essa perde 62% de seu conteúdo aquoso e 39% de seu peso-sêco. Sômente a constituição do casulo em si consome cêrca de 29% de seu peso-sêco. Resultados surpreendentes como êsse foram observados também em outros insetos, como Bombyx mori, em que cêrca da metade das proteínas da larva madura é usada para fazer o casulo (WIGGLESWORTH, 1965).

Uma consequência do expôsto acima é que a observação das alterações químicas na hemolinfa e em vários órgãos da larva deve permitir a identificação dos precursores dos componentes do casulo. Essa identificação seria dificultada se a maior parte das secreções formadoras do casulo fôsem sintetizadas e armazenadas durante o período de alimentação da larva. Entretanto, como será mostrado abaixo, e já foi brevemente referido na Introdução, êsse não é o caso em R. americana.

Os componentes hidrossolúveis do casulo devem provir, pelo menos em parte, de contaminações pelo fluído exuvial e/ou hemolinfa das larvas durante a coleta dos casulos, além das fezes eliminadas pelo animal durante o feitio do casulo, conforme já comentado em Resultados. Devido a isto, êsses componentes não mais serão considerados aqui. Os principais componentes do casulo cuja origem deve então ser traçada são: CaCO_3 e as proteínas e carboidratos insolúveis.

A hipótese formulada em Resultados de que o composto efervescente, contendo cálcio, observado nos túbulos de Malpighi deve ser CaCO_3 , encontrou confirmação nos estudos histoquímicos de MARQUES (informação pessoal). Esta mostrou a ocorrência de cristais de carbonato de cálcio no lúmen da porção proximal dos túbulos de Malpighi das larvas de R. americana. A ocorrência dêsses cristais e com essa mesma localização já havia sido demonstrada em outros insetos, inclusive em Diptera (CLARK, 1958). A partir dessa demonstração e uma inspeção nas Tabelas XXIV e XXV, torna-se possível admitir com segurança que o CaCO_3 do casulo provém dos túbulos de Malpighi. O acúmulo de carbonato de cálcio nos túbulos de Malpighi durante o desenvolvimento larval e a sua posterior eliminação encontra paralelo em vários in-

setos e tem sido interpretado como um mecanismo de excreção de cálcio. (CLARK, 1958).

As cinzas insolúveis, determinadas no casulo devem provir também dos túbulos de Malpighi. É possível que sejam compostos de cálcio diferentes de CaCO_3 . Essa hipótese é levantada com base no excesso de CaCO_3 calculado a partir do conteúdo de Ca do casulo quando comparado com o CaCO_3 calculado a partir do material hidroinsolúvel e ácido acético solúvel do casulo (Tabela VIII e IX e texto correspondente). O composto de cálcio mais provável a corresponder às cinzas insolúveis é fosfato de cálcio, que já foi encontrado nos túbulos de Malpighi de várias larvas de insetos (CLARK, 1958).

A fração insolúvel do casulo corresponde à sêda de R. americana, produzida pelas glândulas salivares. Essa conclusão resulta da observação direta de que o casulo é feito por uma sêda produzida por essas glândulas salivares (labiais) e um material similar a fezes. Este material similar a fezes deve corresponder pelo menos em parte, ao CaCO_3 , que provém dos túbulos de Malpighi, enquanto que a sêda deve corresponder ao restante da composição do casulo, isto é, à fração insolúvel. Uma evidência a favor disto é o fato do casulo I, que apresenta pouco material similar a fezes e é quase que somente feito por fios de sêda, ser formado principalmente pela fração insolúvel (Tabela XIII). Além do mais, a composição da sêda, obtida a partir de determinações químicas da secreção salivar colhida pouco antes do início do processo de fiação (fim do 2º período do 4º estágio) mostra que ela é rica em proteínas com composição aminoacídica similar àquela das proteínas insolúveis do casulo III (BIANCHI, 1972). Além disso, a massa média de proteínas secretadas pela glândula salivar, por dia, em vários períodos da produção do casulo, concorda bastante bem com os incrementos médios diários da proteína do casulo, medidos nos mesmos períodos. Esses incrementos para os intervalos de 3ºP — 4ºP, 4ºP — 5ºP e 5ºP — Pupa farata são: 54, 117 e 276 $\mu\text{g}/\text{dia}/\text{larva}$, respectivamente (Tabela XV), enquanto que as massas de secreção protéica, produzidas por dia, pela glândula salivar nos mesmos intervalos são: 42, 102 e 90 $\mu\text{g}/\text{dia}/\text{larva}$, respectivamente (BIANCHI, 1972). A discrepância nos resultados correspondentes ao último intervalo seguramente é inferior à apre-

sentada, porque o resultado obtido no casulo pode estar superestimado (Tabela XV) enquanto que aquêle da glândula salivar deve estar subestimado (BIANCHI, 1972).

O conteúdo de carboidratos da secreção é, entretanto, bem inferior ao determinado no casulo III (BIANCHI, 1972). Essa discrepância parece ser consequência de uma mudança na composição da fração insolúvel durante o desenvolvimento, no sentido de aumentar o seu conteúdo de carboidratos (Tabela XIII e texto correspondente). Uma outra hipótese para explicar a diferença no conteúdo de carboidratos encontrada entre o casulo e secreção salivar seria admitir que a larva de R. americana produzisse sêda também pelo túbulo de Malpighi. Esse fenômeno ocorre em vários Coleoptera e Neuroptera (WIGGLESWORTH, 1965) e está relacionado com modificações do túbulo de Malpighi e no reto, como as descritas por MAZZI e BACCETTI (1956) para Donus crinitus (Coleoptera). Como essas modificações não ocorrem em R. americana (MARQUES informação pessoal), o túbulo de Malpighi em R. americana não deve ter nenhuma atividade secretora de compostos para o casulo, além do CaCO_3 e, portanto, toda a sêda deve ser produzida nas glândulas salivares.

Segundo BIANCHI (1972) a glândula salivar no início do processo de fiação possui no máximo 136 μg de proteínas de secreção acumulada por larva. Como o casulo produzido por larva contém cerca de 1170 μg de proteínas na fração insolúvel (Tabela XIV) pode-se concluir que o animal acumula apenas cerca de 10% de toda a sêda que vai utilizar para fazer o casulo antes de parar de comer e iniciar a fiar. A larva de B. mori comporta-se de maneira radicalmente diferente, a maior parte da secreção de sua sêda (cerca de 70%) é sintetizada e armazenada antes do animal parar de comer (FUKUDA et alii, 1959). Esse comportamento diferencial deve estar ligado, pelo menos em parte, às diferenças anatômicas entre as glândulas labiais dos dois insetos. Enquanto que as glândulas labiais (sericígenas) de B. mori apresentam na sua porção mediana um reservatório considerável para a secreção (LUCAS, SHAW e SMITH, 1958), as glândulas labiais (salivares) de R. americana apresentam apenas um lúmen relativamente estreito e de diâmetro pouco variável ao longo da glândula (DREYFUS et alii, 1951).

O fato de 90% da sêda de R. americana ser sintetizada após o animal parar de comer, torna razoável procurar identificar a origem de seus componentes através de análises químicas na hemolinfa e em vários órgãos durante a sua produção. O intervalo mais adequado para esse estudo é entre o 4ºP e o 5ºP. Antes do 4ºP os resultados tendem a ser prejudicados pela existência de reserva de secreção na glândula e após o 5ºP devem surgir alterações químicas relacionadas com a apólise e transformação do animal em uma pupa farata.

A Tabela XXX mostra o balanço de proteínas ou seus precursores na hemolinfa e em órgãos de R. americana que juntos correspondem a 71% do pêso-sêco total da larva madura. Como os túbulos de Malpighi correspondem a 13% do pêso-sêco da larva e são formados quase que exclusivamente de CaCO_3 (Tabela XXIV e discussão acima), pode-se dizer que o balanço de proteínas ou seus precursores é conhecido em 84% do pêso-sêco da larva. Os 16% do pêso-sêco da larva não estudados correspondem principalmente a cutículas, traquéias, parede muscular e tubo digestivo. Entretanto, como as cutículas moles de larvas de Diptera apresentam cerca de 50-60% em quitina (RUDALL, 1963; HACKMAN, 1964), e as traquéias e o revestimento do intestino contêm quitina (WIGGLESWORTH, 1965), a porcentagem do pêso-sêco larval não estudada que pode fornecer precursores de proteínas desce abaixo de 16%. Dessa forma a Tabela XXX pode ser considerada como representando um balanço bem completo das proteínas e seus precursores entre os períodos indicados.

A Tabela XXX e a argumentação acima tornam muito difícil admitir que as proteínas insolúveis do casulo não derivem, pelo menos em parte, das proteínas da hemolinfa. O decréscimo de todos precursores, excluído as proteínas da hemolinfa é de 199 μg /larva, enquanto que nesse período são sintetizados 350 μg /larva de proteínas insolúveis do casulo.

Se cisteína for aminoácido essencial para R. americana, como foi sugerido no item A2 acima, sua presença nas proteínas insolúveis do casulo (Tabela XI) só poderia ser explicada adequadamente, admitindo-se que essas proteínas são feitas, pelo

menos parcialmente, a partir das proteínas da hemolinfa. Isso é necessário porque a hemolinfa não possui cisteína livre (Tabela II) e nem ligada a peptídeos (Tabela III).

TABELA XXX

Balanco dos possíveis contribuintes de precursores das proteínas insolúveis do casulo e incremento dessas, no intervalo do 4ºP ao 5ºP do 4º estágio de R. americana¹

Possível contribuinte ou Proteínas do casulo	µg/larva	
	decrêscimo	incremento
Proteína da glândula salivar ²	0	-
Aminoácidos da glândula salivar ³	38	-
Aminoácidos da hemolinfa ⁴	12	-
Peptídeos da hemolinfa ⁴	23	-
Corpo gorduroso ⁵	126	-
Proteínas da hemolinfa ⁶	700	-
Proteínas insolúveis do casulo ⁷	-	350

1. Discussão no texto.

2. Segundo BIANCHI (1972).

3. Calculado a partir da hipótese de que a concentração de aminoácidos livres da glândula salivar é a mesma da hemolinfa e que a densidade dessa glândula é 1,00.

4. Calculado a partir da Tabela XX.

5. Decréscimo do peso-seco do corpo gorduroso, após subtração do decréscimo do conteúdo de glicogênio no mesmo período. Calculado a partir da Tabela XXIII.

6. Calculado a partir da Tabela XVI.

7. Retirado da Tabela XIV.

BIANCHI (1972) propôs a partir de eletroferogramas da secreção salivar e da glândula salivar "in vivo" e "in vitro", em diferentes períodos larvais, assim como a partir de cinéticas de incorporação de aminoácidos marcados em proteínas da glândula salivar em diferentes circunstâncias, que cerca de 60% das proteínas da secreção salivar (que corresponde à fração insolúvel do casulo, ver acima) provêm diretamente das proteínas da hemolinfa, enquanto que os outros 40% são sintetizados na própria glândula. Esta síntese utilizaria os aminoácidos livres da glândula salivar e/ou hemolinfa ou as proteínas da hemolinfa após a sua hidrólise.

Se parte da síntese de proteínas da secreção salivar é feita a partir dos aminoácidos da hemolinfa, seria de se esperar um reflexo dessa síntese na composição aminoacídica da hemolinfa. Em Resultados foi ressaltado o fato de que aqueles aminoácidos cuja queda em moles, ao passar do 3ºP ao 5ºP correspondem a 70% do total da queda dos aminoácidos da hemolinfa são justamente aqueles que perfazem 29% da proteína insolúvel do casulo III. Se fôrem considerados apenas os aminoácidos essenciais, os resultados tornam-se ainda mais reveladores. Os aminoácidos essenciais que mais diminuem em moles, por ordem decrescente de grandeza, na hemolinfa entre o 3ºP e 5ºP são: treonina, valina, isoleucina, leucina (Tabela XX); enquanto que aqueles aminoácidos essenciais que ocorrem em maior quantidade no casulo são, por ordem decrescente: treonina, leucina, valina e isoleucina (Tabela XI). Como se vê, os resultados são indicativos de que pelo menos parte da síntese de proteínas do casulo é feita a partir de aminoácidos livres da hemolinfa, enquanto que a outra parte deriva das proteínas da hemolinfa.

A ocorrência de uma concentração protéica na hemolinfa das larvas de R. americana maior do que a apresentada pela maioria das larvas de insetos (Tabela V), talvez seja consequência de uma adaptação desse animal, pelo fato dessas proteínas serem utilizadas em parte na produção do casulo.

A síntese dos carboidratos insolúveis do casulo pela glândula salivar tem que utilizar, como precursores imediatos, carboidratos presentes na glândula salivar ou na hemolinfa. Os demais carboidratos antes de poderem ser utilizados na síntese

tem que ser primeiro liberados na hemolinfa. Os carboidratos que podem ser liberados na hemolinfa após hidrólise incluem a quitina cuticular e o glicogênio presente nos vários tecidos como corpo gorduroso, musculatura e células do tubo digestivo. A quitina cuticular, entretanto, só é hidrolizada sob a ação do fluido exuvial e seus produtos transferidos para a hemolinfa, nas vésperas da muda pupal (BADE e WYATT, 1961), enquanto que o glicogênio que é mais facilmente mobilizado para a hemolinfa na forma de trealose, pertence ao corpo gorduroso (KILBY, 1963).

TABELA XXXI

Balanco dos possíveis contribuintes de precursores dos carboidratos insolúveis do casulo e incremento desses no intervalo do 4ºP ao 5ºP do 4º estágio de R.americana¹

Possível contribuinte ou Carboidratos do casulo	µg/larva	
	decréscimo	incremento
Glândula salivar ²	18	-
Hemolinfa ³	-	10,7
Glicogênio do corpo gorduroso ⁴	154	-
Carboidratos insolúveis do casulo ⁵	-	106

1. Ver discussão.
2. Segundo BIANCHI (1972)
3. Calculado a partir da Tabela XIX
4. Calculado a partir da Tabela XXIII
5. Retirado da Tabela XIV

A Tabela XXXI mostra o balanço dos possíveis contribuintes de precursores dos carboidratos insolúveis do casulo. Conforme pode-se concluir da Tabela XXXI e da argumentação acima, o glicogênio do corpo gorduroso é o grande fornecedor de precursores de carboidratos.

O corpo gorduroso é capaz de sintetizar trealose e liberá-la para a hemolinfa na mesma velocidade com que essa é

gasta, mantendo constante a concentração de carboidratos na hemolinfa (Cf. HORIE, 1960). Essa conversão está sob controle de um hormônio da "corpora cardíaca" que é capaz de aumentar a concentração de trealose na hemolinfa às custas do glicogênio do corpo gorduroso (STEELE, 1961) e cujos efeitos são similares àqueles do glucagon em fígado de mamíferos (STEELE, citado em KILBY, 1965; WIENS e GILBERT, 1967).

A utilização da trealose da hemolinfa pelos tecidos é facilitada pela ocorrência generalizada da trealase (EC3.2.1.28) enzima que cliva a trealose em duas moléculas de glicose (KILBY, 1963).

3. Mecanismo e regulação da produção do casulo

A fiação da sêda em R. americana ocorre de forma similar àquela descrita para Bombyx (LUCAS, SHAW e SMITH, 1958). A liberação da secreção da sêda é feita por pressão hidrostática da hemolinfa sobre a glândula salivar como consequência de contração da musculatura corporal da larva. Isso pode ser facilmente demonstrado pela constatação da inexistência de musculatura na glândula salivar (MARQUES, informação pessoal), e obtenção de secreção por compressão do corpo da larva (BIANCHI, 1972). A secreção da sêda de R. americana apresenta propriedades similares àquelas da sêda de Bombyx (LUCAS, SHAW e SMITH, 1958), isto é, a secreção é expelida como um fluído esverdeado solúvel em vários solventes, mas que após ser submetido a tensões torna-se altamente insolúvel.

Estudos realizados com glândulas sericígenas de Hymenoptera mostraram que a secreção da sêda encontra-se ali altamente organizada, na forma de filamentos dispostos em fileiras paralelas (RUDALL, 1965). Segundo esse mesmo autor, a transformação no fio de sêda insolúvel seria consequência do deslizamento desses filamentos, uns sobre os outros, sob ação de forças hidrodinâmicas e tensões permitindo o contato de extremidades relativas e produzindo novas ligações entre os filamentos. O autor levanta ainda a possibilidade de ocorrer o mesmo na produção da sêda por Bombyx mori, embora não exista estudos nesse animal sobre a estrutura da sêda dentro das glândulas sericígenas e o con

ceito mais aceito para a transformação da secreção da sêda em fio insolúvel nêsse animal seja baseado na alteração da conformação das moléculas protéicas, de uma forma dobrada, para outra completamente distendida.

Observações preliminares realizadas, durante a elaboração desta tese, com microscópio de fase na glândula salivar de R. americana, indicaram a presença ali de uma certa organização do material, embora não no nível observado em Hymenoptera (Cf. RUDALL, 1965). Essas observações sugerem que a transformação da secreção da sêda em um fio insolúvel em R. americana pode ocorrer segundo o mesmo mecanismo descrito por RUDALL (1965).

A regulação hormonal do processo de fiação é pouco conhecida, embora haja evidências em Lepidoptera de que ecdisterona (20-hidroxi-ecdisona) seja um fator importante para a promoção e manutenção da síntese de fibroína na divisão posterior da glândula sericígena no período larval (SHIGEMATSU e MORIYAMA, 1970) e de que o início da fiação dependa de um baixo título de hormônio juvenil (WIGGLESWORTH, 1970).

A liberação de CaCO_3 pelos túbulos de Malpighi de R. americana poderia ocorrer pela conjugação de dois fatores: pressão hidrostática da hemolinfa sobre os túbulos como consequência de contrações corporais da larva e ação da musculatura presente nos dutos comuns de cada par de túbulos de Malpighi. Este tipo de musculatura é comum entre os Diptera (PATTON, 1953) e R. americana não é exceção (MARQUES, informação pessoal). No início da fiação, os dutos comuns dos túbulos de Malpighi estariam fechados, impedindo que a pressão hidrostática da hemolinfa, consequente de contrações corporais da larva, ocasionasse a liberação de CaCO_3 . Posteriormente, os dutos se abririam, permitindo a saída de cristais de CaCO_3 , sob ação da pressão hidrostática da hemolinfa. Este mecanismo é perfeitamente compatível com os resultados apresentados na Tabela XV, que mostram uma liberação de CaCO_3 muito pequena no início da fiação, seguido de um grande aumento alguns dias depois. A Tabela mostra também que a produção da sêda é intensa durante toda a fiação, o que indica a ocorrência de elevada pressão hidrostática durante todo este período, devido ao fato de que essa pressão é necessária para a liberação da secreção da sêda (ver acima).

A regulação da musculatura dos dutos comuns de cada par de túbulos de Malpighi poderia ser nervosa ou hormonal. O estado atual dos conhecimentos em R.americana não permite a escolha entre nenhum dos dois processos de regulação. Contudo, é interessante notar que a regulação da musculatura dos túbulos de Malpighi de alguns insetos é feita por um hormônio produzido nas "corpora allata", similar à adrenalina, como ocorre, por exemplo, em Locusta migratoria (CAMERON, 1953).

WATERHOUSE (1950) propôs que os grânulos presentes nos túbulos de Malpighi de Lucilia cuprina seriam descarregados no intestino como consequência de um aumento na tomada de fluídos pelos túbulos de Malpighi no estágio pupal. Um mecanismo similar também poderia explicar a liberação de CaCO_3 pelos túbulos de Malpighi de R. americana.

A opção entre os dois mecanismos propostos deverá aguardar, entretanto, a expansão dos estudos de fisiologia dos túbulos de Malpighi em R. americana.

RESUMO

Os resultados obtidos nesta tese podem ser distribuídos em três grandes grupos: composição química da hemolinfa e do casulo coletivo e determinação química de alguns componentes principais do corpo gorduroso e túbulos de Malpighi ao longo do desenvolvimento.

Os principais resultados referentes à química da hemolinfa de larvas maduras são:

1) A hemolinfa possui uma densidade = 1,043, pH = 7,27, osmolaridade = 216 miliosmoles e corresponde a 37% do peso-úmido do animal e 26% de seu peso-sêco. A hemolinfa não se coagula e possui um volume de células correspondente a 0,3% de seu volume total.

2) A análise química realizada deu conta de 88% do peso-sêco total da hemolinfa e revelou que entre os componentes presentes mais importantes em massa estão as proteínas, seguidas dos aminoácidos livres, enquanto que os osmoticamente mais ativos são os aminoácidos livres seguido de Mg^{++} e Na^{+} . Entre os aminoácidos é notável a presença de ornitina e cistationina em concentrações relativamente elevadas e a ausência, mesmo em traços, de cisteína e/ou cistina e citrulina.

3) Os peptídeos ocorrem em concentrações elevadas, mas em pequeno número, e são compostos de 2 a 3 resíduos de aminoácidos em média; o mais abundante dos quais deve ser um dipeptídeo de histidina e ácido aspártico.

4) Citrato é o ânion mais importante da hemolinfa, seguido dos fosfatos orgânicos, enquanto que trealose é o principal carboidrato presente.

5) Existem pelo menos 6 carotenóides ligados de forma não covalente a proteínas da hemolinfa e uma cromoglicoproteína, de cor amarelo-limão, fluorescente, de natureza desconhecida. Os

carotenóides mais importantes quantitativamente são: β -caroteno e um similar ao astaceno.

A composição em massa do casulo coletivo na véspera da muda pupal é a seguinte, em números inteiros: 44% de CaCO_3 ; 34% de proteínas e 10% de carboidratos, ambos insolúveis em todos os solventes utilizados (SDS 10%, uréia 6M, ácido fórmico 50%, HCl 2N, KOH 1M e Na HCO_3 1M); 10% de material hidrossolúvel e 4% de cinzas não identificadas. O material hidrossolúvel foi parcialmente identificado como: proteína (4%), carboidratos (2%), enquanto que 4% ainda permanece desconhecido.

O correlacionamento da análise química da hemolinfa, casulo, túbulos de Malpighi e corpo gorduroso ao longo do desenvolvimento, possibilitou ainda as seguintes conclusões:

1) A fração insolúvel do casulo (proteínas e carboidratos) corresponde à sêda secretada pelas glândulas salivares da larva, enquanto que o CaCO_3 presente provém dos túbulos de Malpighi.

2) As proteínas do casulo devem originar-se, pelo menos em parte, das proteínas da hemolinfa, enquanto que seus carboidratos devem provir do glicogênio do corpo gorduroso.

Os resultados são considerados em termos de seus possíveis significados metabólicos e eventualmente fisiológicos. Ênfase é dada na discussão do papel metabólico dos componentes orgânicos e inorgânicos da hemolinfa, assim como dos mecanismos de secreção da sêda e CaCO_3 e sua possível regulação hormonal.

ABSTRACT

The results of this thesis are concerned to three main lines of research: the chemical composition of the hemolymph, of the communal cocoon, and the chemical determination of some components in the fat body and Malpighian tubules along larval development.

The chief results on the hemolymph chemistry of mature larvae are:

1) The hemolymph has a density = 1.043, pH = 7.27, osmolarity = 216 miliosmols and corresponds to 37% of the larva (Wet-Weight) or to 26% of the larva (dry weight). The hemolymph does not clott and the volume of the hemocytes is 0.3% of blood total volume.

2) The chemical analysis dealt with 88% (dry-weight) of the hemolymph and showed that proteins are the most important component in mass, while free amino acids, Mg^{++} and Na^{+} are the most osmotically active substances. Among the amino acids is remarkable the titres of ornithine and cystathionine, and the complete absence of cysteine and/or cystine and citrulline.

3) There are few peptides, but present in high titres. They are built of two to three amino acids residues, and the most concentrated of them must be a dipeptide of histidine and aspartic acid.

4) Citrate and organic phosphates are the most important anions in the hemolymph. Trehalose is the chief carbohydrate present.

5) There are at least 6 non-covalently protein-bound carotenoids and one lemon-yellow, fluorescent chromoglycoprotein of unknown nature.

The chemical composition of the communal cocoon of R. americana expressed in percentage of its total dry weight

(numbers rounded to the nearest unity) are: 44% of CaCO_3 ; 34% of proteins and 10% of carbohydrates both insoluble in all solvents used (10% SDS, 6M urea, 50% formic acid, 2N HCl, 1M KOH and 1M NaHCO_3); 10% of water soluble material and 4% of ashes of unknown nature. The water soluble material was identified in part as: protein (4%) and carbohydrates (2%), while 4% remained unknown.

The interrelationship among the results of the chemical analysis of the hemolymph, cocoon, Malpighian tubules and fat body during larval development was used to draw the conclusions:

1) The insoluble fraction of the cocoon (proteins and carbohydrates) corresponds to the silk produced by the larval salivary glands, while CaCO_3 comes from Malpighian tubules.

2) The cocoon proteins must come, at least in part, from the hemolymph proteins, while its carbohydrates must come from the fat body glycogen.

The results are discussed in terms of its possible metabolic and eventually physiological meanings. Emphasis is given in the discussion of the metabolic role of the inorganic and organic components of the hemolymph, as yet in the mechanisms of the silk secretion and CaCO_3 deposition and their possible hormonal regulation.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS^{*}

- ADITYODI, K.G. - The nature of haemolymph proteins in relation to the ovarian cycle in the viviparous cockroach, Nauphoeta cinerea. J. Insect Physiol., 13: 1189-1195, 1967.
- AGRELL, I. - Physiological and biochemical changes during insect development. In: ROCKSTEIN, M., ed. The physiology of Insecta, New York, Academic Press, 1964, v.1, p. 91-148.
- ALBANESE, A.A. & ORTO, I.A. - Proteins and amino acids. In: ALBANESE, A.A., ed. Newer Methods of nutritional biochemistry, New York, Academic Press, 1963, v.1, p. 1-112.
- AMABIS, J.M. & CABRAL, D. - RNA and DNA puffs in polytene chromosomes of Rhynchosciara: inhibition by extirpation of prothorax. Science, 169: 692-694, 1970.
- ARMELIN, H.A.; MENECHINI, R. & LARA, F.J.S. - Extraction and characterization of newly synthesized RNA from whole cells and cellular fractions of Rhynchosciara angelae salivary glands. Biochim. biophys. Acta, 190: 358-367, 1969.
- BADE, M.L. & WYATT, G.R. - Metabolic conversions during pupation of the cecropia silkworm. I. Deposition and utilization of nutrient reserves. Biochem. J., 83: 470-478, 1961.
- BALMAIN, J.H.; BIGGERS, J.D. & CHARINGBOLD, P.J. - Micromethod for the estimation of glycogen in the genital organs of the mouse. Aust. J. biol. Sci., 9: 139-146, 1956.
- BASILE, R.; TOLEDO FILHO, S.A.; CUNHA, A.B. da; MORGANTE, J.S. & MARQUES, J. - Análises da mutação que afeta a pigmentação de larvas de Rhynchosciara angelae Nonato & Pavan, 1951 (Diptera Sciaridae). Rev. bras. Biol., 30: 471-475, 1970.

* De acordo com as normas preconizadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Abreviaturas dos títulos de periódicos de acordo com World Medical Periodical, 3^a ed, London, 1961.

- BECKER, H.J. - Die Puffs der Speicheldrüsenchromosomen von Drosophila melanogaster. II. Mitteilung. Die Auslösung der Puffbildung, ihre Spezifität und ihre Beziehung zur Funktion der Ringdrüse. Chromosoma, 13: 341-384, 1962.
- BEEERMAN, W. - Nuclear differentiation and functional morphology of chromosomes. Cold Spr. Harb. Symp. quant. Biol., 21: 217-232, 1956.
- BEEERMAN, W. - Cytological aspects of information transfer in cellular differentiation. Amer. Zool., 3: 23-32, 1963.
- BELL, D.J. & YOUNG, F.G. - Observations on the chemistry of liver glycogen. Biochem. J., 28: 882-889, 1934.
- BIANCHI, A.G. de - Bioquímica da secreção salivar de Rhynchosciara americana, São Paulo, 1972 [Tese de doutoramento a ser apresentada ao Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP].
- BIEBER, L.L.; HODGSON, E.; CHELDELIN, V.H.; BROOKES, V.J. & NEWBURGH, R.W. - Phospholipids patterns in the blowfly Phormia regina (Meigen). J. biol. Chem., 236: 2590-2595, 1961.
- BOAS, N.F. - Method for the determination of hexosamines in tissues. J. biol. Chem., 204: 553-563, 1953.
- BONÉ, G.J. - Le rapport sodium/potassium dans le liquide coelomiques des insectes. Ann. Soc. roy. Zool. Belg., 75: 123-132, 1944.
- BOYD, J.B. & MITCHELL, H.K. - Turnover of the hemolymph proteins in Drosophila. Arch. Biochem., 117: 310-319, 1966.
- BREUER, M.E. - Revision of the genus Rhynchosciara Rubsaamen (Diptera, Sciaridae) in the neotropical region. Arch. Zool. S. Paulo, 17: 167-198, 1969.
- BREUER, M.E. & PAVAN, C. - Behaviour of polytene chromosomes of R. angelae at different stages of larval development. Chromosoma, 7: 317-386, 1955.

- BUCK, J.B. - Physical properties and chemical composition of insect blood. In: ROEDER, K.D., ed. Insect physiology. New York, John Wiley, 1953, p. 147-190.
- CAMERON, M.L. - Secretion of an orthodiphenol in the corpus cardiacum of the insect. Nature, 172: 349-350, 1953.
- CARRINGTON, C.B. & TENNEY, S.M. - Chemical constituents of haemolymph and tissue in Telea polyphemus Cram. with particular reference to the question of ion binding. J. Insect Physiol., 3: 402-413, 1959.
- CHEN, P.S. - Amino acid and protein metabolism in insect development. Advanc. Insect Physiol., 3: 53-131, 1966.
- CHEN, P.S. & BÜHLER, R. - Paragonial substance (sex peptide) and other free ninhydrin-positive components in male and female adults of Drosophila melanogaster. J. Insect Physiol., 16: 615-627, 1970.
- CHEN, P.S. & LEVENBOOK, L. - Studies on the haemolymph proteins of the blowfly Phormia regina. II. Synthesis and breakdown as revealed by isotopic labelling. J. Insect Physiol., 12: 1611-1627, 1966.
- CHEN JUNIOR, P.S.; TORIBARA, T.Y. & WARNER, H. - Microdetermination of phosphorus. Analyt. Chem., 28: 1756-1758, 1956.
- CHINO, H. & GILBERT, L.I. - Lipid release and transport in insects. Biochim. biophys. Acta, 98: 94-110, 1965.
- CHIPPENDALE, G.M. - Metamorphic changes in haemolymph and midgut proteins of the southwestern corn borer, Diatraea grandiosella. J. Insect Physiol., 16: 1909-1920, 1970.
- CHIPPENDALE, G.M. & KILBY, B.A. - Relationship between the proteins of the haemolymph and fat body during development of Pieris brassicae. J. Insect Physiol., 15: 905-926, 1969.
- CLARK, E.W. - A review of literature on calcium and magnesium in insects. Ann. entomol. Soc. Amer., 51: 142-154, 1958.

- CLEVER, U. & KARLSON, P. - Induction von Puff-Veränderung in den Speicheldrüsenchromosomen von Chironomus tentans durch Ecdyson. Exp. Cell Res., 20: 623-626, 1960.
- COLLINS, J.V. - The hormonal control of fat body development in Calpodes ethlius (Lepidoptera, Hesperiidae). J. Insect Physiol., 15: 341-352, 1969.
- CRAIG, R. - The physiology of excretion in insects. Ann. Rev. Entomol., 5: 53-68, 1960.
- CROMARTIE, R.I.T. - Insect pigments. Ann. Rev. Entomol., 4: 59-76, 1959.
- CRONE, H.D. & BRIDGES, R.G. - The phospholipids of the housefly, Musca domestica. Biochem. J., 89: 11-12, 1963.
- CRUICKSHANK, P.A. & PALMERE, R.M. - Terpenoid amines as insect juvenile hormones. Nature, 233: 488-489, 1971.
- DAHM, K.H.; TROST, B.M. & RÖLLER, H. - The juvenile hormone. V. Synthesis of the racemic juvenile hormone. J. Am. chem. Soc., 89: 5292-5294, 1967.
- DAVENPORT, H.W. - The ABC of acid-basic chemistry. 4th ed., Chicago, University Press, 1958, 118p.
- DAVISON, A.N; & KACZMAREK, L.K. - Taurine - a possible neurotransmitter ? Nature, 234: 107-108, 1971.
- DE LOOF, A. & DE WILDE, J. - The relation between haemolymph proteins and vitellogenesis in the colorado beetle, Lentiniotarsa decemlineata. J. Insect Physiol., 16: 157-169, 1970.
- DINAMARCA, M.L. & LEVENBOOK, L. - Oxidation, utilization and incorporation into protein of alanine and lysine during metamorphosis of the blowfly Phormia regina (Meigen). Arch. Biochem., 117: 110-119, 1966.
- DOYLE, D. & LAUFER, H. - Sources of larval salivary gland secretion in the Dipteran Chironomus tentans. J. Cell Biol., 40: 61-78, 1969.

- DREYFUS, A.; NONATO, E.; BREUER, M.E. & PAVAN, C. - Cromosomas politênicos em vários órgãos de "Rhynchosciara angelae" Nonato & Pavan (Diptera). Rev. bras. Biol., 11: 439-450, 1951.
- DUBOIS, M.; GILLES, K.A.; HAMILTON, J.K.; REBERS, P.A. & SMITH, F.- Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analyt. Chem., 28: 350- 356, 1956.
- ELLIS, G.P. - The Maillard reaction. Advanc. Carbohyd. Chem., 14: 63-134, 1959.
- ENGLE JUNIOR, R.L. & WOODS, K.R. - Comparative biochemistry and embriology. In: PUTNAM, F.W., ed. The plasma proteins. New York, Academic Press, 1960, v.2, p. 183-265.
- ETTINGER, R.H.; GOLDBAUM, L.R. & SMITH JUNIOR, L.H. - A simplified photometric method for the determination of citric acid in biological fluids. J. biol. Chem., 199: 531-536, 1952.
- FLORKIN, M. & JEUNIAUX, C. - Hemolymph: composition. In: ROCKSTEIN, M., ed. The physiology of Insecta, New York, Academic Press, 1964, v.3, p. 109-152.
- FOLCH, J.; LEES, M. & SLOANE-STANLEY, G.H. - A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. biol. Chem., 226: 497-509, 1957.
- FOSTER, J.E. - Plasma albumin. In: PUTNAM, F.W., ed., The plasma proteins. New York, Academic Press, 1960, v.1, p.179-239.
- FRIEDMAN, S. - Inhibition of trehalase activity in the hemolymph of Phormia regina Meig. Arch. Biochem., 93: 550-554, 1961.
- FUKUDA, T.; SUDO, M.; MATUDA, M.; HAYASHI, T.; KUROSE, T.; HORIUCHI, Y. & FLORKIN, M. - Formation of the silkproteins during the growth of the silkworm larva (Bombyx mori). In: LEVENBOOK, L. ed. Biochemistry of insects. London, Pergamon Press, 1959.
- GALAMBOS, J.T. - The reaction of carbazole with carbohydrates. I. Effect of borate and sulfamate on the carbazole color of sugars. Analyt. Biochem., 19: 119-132, 1967.

- GAMBINO, S.R. - Determination of blood pCO_2 . Clin. Chem., 7:336-345, 1961.
- GILBERT, L.I. - Physiology of growth and development: endocrine aspects. In: ROCKSTEIN, M., ed. The physiology Insecta. New York, Academic Press, 1964. v.1, p. 194-225.
- GILBERT, L.I. - Lipid metabolism and function in insects. Advanc. Insect Physiol., 4: 69-211, 1967a.
- GILBERT, L.I. - Biochemical correlations in insect metamorphosis. In: FLORKIN, M. & STOTZ, E.H., eds. Comprehensive biochemistry. Amsterdam, Elsevier, 1967. v.28, p. 199-252.
- GILBY, A.R. - Lipids and their metabolism in insects. Ann. Rev. Entomol., 10: 141-160, 1965.
- GILBY, A.R. & MCKELLAR, S.W. - The composition of the empty puparia of a blowfly. J. Insect Physiol., 16: 1517-1529, 1970.
- GILMOUR, D. - The biochemistry of insects. New York, Academic Press, 1961, 343 p.
- GILMOUR, D. - The metabolism of insects. London, Oliver and Boyd, 1965, 215 p.
- GOLBERG, L. & DE MEILLON, B. - The nutrition of the larva of Aedes aegypti Linnaeus. 4. Protein and amino-acid requirements. Biochem. J., 43: 379-387, 1948.
- GOODWIN, T.W. - The biochemistry of locust. 2. Carotenoid distribution in solitary and gregarious phases of the African migratory locust (Locusta migratoria migratorioides R & F) and the desert locust (Schistocerca gregaria Forsk). Biochem. J., 45: 472-479, 1949.
- GOODWIN, T.W. - The comparative biochemistry of the carotenoids. New York, Chemical Publishing, 1954, 356 p.
- GOODWIN, T.W. & SRISUKH, S. - The biochemistry of locust. I. The carotenoids of the integument of two locust species (Locusta migratoria migratorioides R. and F and Schistocerca gregaria Forsk.) . Biochem. J., 45: 263- 268, 1949.

- GRÉGOIRE, C. - Blood coagulation in arthropods. II. Phase contrast microscopic observations on hemolymph coagulation in sixty-one species of insects. *Blood*, 6: 1173-1198, 1951.
- GRÉGOIRE, C. & TAGNON, H.J. - Blood coagulation. In: FLORKIN, M. & MASON, H.S., eds. Comparative biochemistry. New York, Academic Press, 1962. v.4, p. 435-482.
- GROSSBACH, U. - Chromosomen-Aktivität und biochemische Zelldifferenzierung in den Speicheldrüsen von Camptochironomus. *Chromosoma*, 28: 136-187, 1969.
- GUARACIABA, H.L. & TOLEDO, L.F.A. - Age determination of "Rhynchosciara angelae" larvae. *Rev. bras. Biol.*, 27: 321-332, 1967.
- HACKMAN, R.H. - Changes in the free amino acids of the blood of blowfly larvae at metamorphosis. *Aust. J. biol. Sci.*, 9: 400-405, 1956.
- HACKMAN, R.H. - Chemistry of the insect cuticle. In: ROCKSTEIN, M., ed. The physiology of Insecta. New York, Academic Press, 1964. v.3, p. 471-506.
- HACKMAN, R.H. & GOLDBERG, M. - Studies on the hardening and darkening of insect cuticles. *J. Insect Physiol.*, 17: 335-347, 1971.
- HAMILTON, P.B. - Ion exchange chromatography of aminoacids, a single column, high resolving, fully automatic procedure. *Analyt. Chem.*, 35: 2055- 2064, 1963.
- HERMAN, W.S. - Control of hormone production in insects. In: ETKIN, W. & GILBERT, L.I., eds. Metamorphosis: a problem in development biology. New York, Appleton Century-Crofts, 1968, p. 107-141.
- HILL, L. - Neurosecretory control of hemolymph protein concentration during ovarian development in the desert locust. *J. Insect Physiol.*, 8: 609-621, 1962.
- HINTON, H.E. - Concealed phases in the metamorphosis of insects. *Nature*, 157: 552-553, 1946.
- HIRS, M.W.; STEIN, W.H. & MOORE, S. - The amino acid composition of ribonuclease. *J. biol. Chem.*, 211: 941-950, 1954.

- HORIE, Y. - Blood trehalose and fat body glycogen in the silkworm, Bombyx mori. Nature, 188: 583-584, 1960.
- IMMS, A.D. - A general textbook of entomology. 9th ed. Rev. by O. W. Richards and R. G. Davies. New York, Methuen, 1957, 886 p.
- INOKUCHI, T.; HORIE, Y. & ITO, T. - Urea cycle in the silkworm, Bombyx mori: Biochem. biophys. Res. Commun., 35: 783-787, 1969.
- JACOB, S. - The determination of nitrogen in biological materials. Meth. biochem. Anal., 13: 241-263, 1965.
- JENKIN, P.M. & HINTON, H.E. - Apolysis in arthropod moulting cycles. Nature, 211: 871, 1966.
- JOHNSON, W.S. & SCHNEIDER, W.P. - 8-carbethoxy- γ,γ -diphenylvinyl acetic acid. Org. synth. Rev. ed., 4: 132-136, 1963.
- KARLSON, P. & SEKERIS, C.E. - Ecdysone, an insect steroid hormone, and its mode of action. Recent. Progr. Hormone Res., 22: 473-502, 1966.
- KARRER, P. & JUCKER, E. - Carotenoids. New York, Elsevier, 1950, 384 p.
- KILBY, B.A. - The biochemistry of the insect fat body. Advanc. Insect Physiol., 1: 111-174, 1963.
- KILBY, B.A. - Intermediary metabolism and the insect fat body. In: GOODWIN, T.W., ed. Aspects of Insect biochemistry. New York, Academic Press, 1965, p. 39-48.
- KUHN, R. & SØRENSEN, N.A. "Über Astaxanthin und Ovoverdin. Chem. Ber., 71: 1879-1888, 1938.
- LARA, F.J.S.; TAMAKI, H. & PAVAN, C. - Laboratory culture of R. angelae. Amer. Natur., 99: 189-191, 1965.
- LAUFER, H. - Studies of changes in enzymatic activities of blood proteins in the developing silk moth. Proc. Int. Congr. Entomol., 11th, Vienna, 1960. Proc. Pavia, 1960a. v.3, p. 194-200.

- LAUFER, H. - Blood proteins in insect development. Ann. N.Y.Acad. Sci., 89: 490-515, 1960b.
- LAUFER, H. & NAKASE, Y. - Developmental studies of the Dipteran salivary gland. II. DNase activity in Chironomus thummi. J. Cell Biol., 25: 97-102, 1965.
- LAW, J.H. & REGNIER, F.E. - Pheromones. Ann. Rev. Biochem., 40: 533-548, 1971.
- LEA, C.H.; HANNAN, R.S. & GREAVES, R.I.N. - The reaction between proteins and reducing sugars in the "dry" state. Biochem. J., 47: 626-629, 1950.
- LEE, R.M. - The variation of blood volume with age in the desert locust. (Schistocerca gregaria Forsk.). J. Insect Physiol., 6: 36-51, 1961.
- LEUENBERGER, F. & TOMMEN, H. - Keto-carotenoids in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. J. Insect Physiol., 16: 1855-1858, 1970.
- LEVENBOOK, L. - The composition of horse bot fly (Gastrophilus intestinalis) larva blood. Biochem. J., 47: 336-346, 1950a.
- LEVENBOOK, L. - The physiology of carbon dioxide transport in insect blood. III. The buffer capacity of Gastrophilus blood. J. exp. Biol., 27: 184-191, 1950b.
- LEVENBOOK, L. - Organic acids in insects. II. Tricarboxylic acid cycle and related enzymes in the larva of the southern armyworm, Prodenia eridania. Arch. Biochem., 92: 114-121, 1961.
- LEVENBOOK, L. - Hemolymph aminoacids and peptides during larval growth of the blowfly, Phormia regina. Comp. Biochem. Physiol., 18: 341-351, 1966.
- LEVENBOOK, L. & DINAMARCA, M.L. - Free amino acids and related compounds during metamorphosis of the blowfly Phormia regina. J. Insect Physiol., 12: 1343-1362, 1966.
- LEVENBOOK, L. & HOLLIS JUNIOR, V.W. - Organic acid in insects. I. Citric acid. J. Insect Physiol., 6: 52-61, 1961.

- LOCKE, M. & COLLINS, J.V. - Sequestration of protein by the fat body of an insect. *Nature*, 210: 552-553, 1966.
- LOCKE, M. & COLLINS, J.V. - Protein uptake in multivesicular bodies in the molt-intermolt cycle of an insect. *Science*, 155: 467-469, 1967.
- LOUGHTON, B.G. & WEST, A.S. - The development and distribution of haemolymph proteins in Lepidoptera. *J. Insect Physiol.*, 11: 919-932, 1965.
- LOWRY, O.H.; ROSEBROUGH, N.S.; FARR, A.L. & RANDAL, R.J. - Protein measurement with the folin phenol reagent. *J. biol.Chem.*, 193: 265-275, 1951.
- LUCAS, F. & RUDALL, K. - Extracellular fibrous proteins: the silks. In: FLORKIN, M. & STOTZ, E.H., eds. Comprehensive biochemistry. Amsterdam, Elsevier, 1968. v. 26B, p. 475-558.
- LUCAS, F.; SHAW, J.T.B. & SMITH, S.G. - The silk fibroins. *Advanc. Protein Chem.*, 13: 107-242, 1958.
- LUCAS, F.; SHAW, J.T.B. & SMITH, S.G. - Comparative studies of fibroins. I. The aminoacid composition of various fibroins and its significance in relation to their crystal structure and taxonomy. *J. molec. Biol.*, 2: 339-349, 1960.
- MARSH, R.E.; COREY, R.B. & PAULING, L. - The structure of Tussah silk fibroin (with a note on the structure of β -poly-L-alanine). *Acta Cryst.*, 8: 710-715, 1955a.
- MARSH, R.E.; COREY, R.B. & PAULING, L. - An investigation of the structure of silk fibroin. *Biochim. biophys. Acta*, 16: 1-34, 1955b.
- MARTIN, J.S. - Studies on assimilation, mobilization and transport of lipids by the fat body and haemolymph of Pyrrhocoris apterus. *J. Insect Physiol.*, 15: 2319-2344, 1969.
- MAZZI, V. & BACCETTI, B. - I tubi Malpighiani e la secrezione della seta nelle larve di Donus crinitus Boheman (Coleoptera, Curculionidae, Hyperini) *Redia*, 41: 315-341, 1956.

- MEYER, K.H. & MARK, H. - "Über den Aufbau des Seiden-Fibroins.
Chem. Ber., 61: 1932-1936, 1928.
- MITCHELL, H.K. & SIMMONS, J.R. - Amino acids and derivatives in
Drosophila. In: HOLDEN, J.T., ed. Amino acid pools. Amsterdam,
Elsevier, 1962, p. 136-146.
- MOKRASCH, L.C. - Analysis of hexose phosphates and sugar mixtures
with the anthrone reagent. J. biol. Chem., 208: 55-59, 1954.
- MOORE, S. & STEIN, W.H. - Procedures for the chromatographic de-
termination of amino acids on four per cent cross-linked sul-
fonated polystyrene resins. J. biol. Chem., 211: 893-906,
1954.
- MUNN, E.A.; FEINSTEIN, A. & GREVILLE, G.D. - A major protein
constituent of pupae of the blowfly Calliphora erythrocephala
(Diptera). Biochem. J., 102: 5P-6P, 1967.
- MUNN, E.A. & GREVILLE, G.D. - The soluble proteins of developing
Calliphora erythrocephala, particularly calliphorin, and simi-
lar proteins in other insect. J. Insect Physiol., 15: 1935-
1950, 1969.
- MUNN, E.A.; PRICE, G.M. & GREVILLE, G.D. - The synthesis "in vi-
tro" of the protein calliphorin by fat body from the larva of
the blowfly, Calliphora erythrocephala. J. Insect Physiol., 15:
1601-1605, 1969.
- NARAHASHI, T. - The properties of insect axons. Advanc. Insect
Physiol., 1: 175-256, 1963.
- NIELSEN, D.J. & MILLS, R.R. - Changes in electrophoretic proper-
ties of haemolymph and terminal oocyte proteins during vitello-
genesis in the american cockroach. J. Insect Physiol., 14:
163-170, 1968.
- NONATO, E. & PAVAN, C. - A new species of "Rhynchosciara" Rubsaa-
men, 1894 (Diptera, Mycetophilidae). Rev. bras. Biol., 11:
435-437, 1951.
- NOVÁK, V.J.A. - Insect hormones. London, Methuen, 1966. 478p.

- OHNISHI, E.; TAKAHASHI, S.Y.; SONOBE, H. & HAYASHI, T. - Crystal from cocoon of Malacosoma neustria testacea. Science, 160: 783-784, 1968.
- ORR, C.W.M. - The influence of nutritional and hormonal factors on egg development in the blowfly Phormia regina (meig.). J. Insect Physiol., 10: 53-64, 1964a.
- ORR, C.W.M. - The influence of nutritional and hormonal factor on the chemistry of the fat body, blood and ovaries of the blowfly, Phormia regina, Meig. J. Insect Physiol., 10: 103-119, 1964b.
- PARKER, K.D. & RUDALL, K.M. - The silk of the egg-stalk of the green lace-wing fly. Nature, 179: 905-906, 1957.
- PARTRIDGE, S.M. & WESTALL, R.G. - Filter-paper partition chromatography of sugars. I. General description and application to the qualitative analysis of sugars in apple juice, egg white and foetal blood of sheep. Biochem. J., 42: 238-248, 1948.
- PATTON, R.L. - Excretion. In: ROEDER, K.D., ed. Insect physiology. New York, John Wiley, 1953, p. 387-403.
- PRICE, G.M. - Some aspects of amino acid metabolism in the adult house fly, Musca domestica. Biochem. J., 80: 420-428, 1961.
- PRICE, G.M. & BOSMAN, T. - The electrophoretic separation of proteins isolated from the larva of the blowfly, Calliphora erythrocephala. J. Insect Physiol., 12: 741-745, 1966.
- PROSSER, C.L. & BROWN JUNIOR, F.A. - Comparative animal physiology. 2nd ed., Philadelphia, Saunders, 1961, 688p.
- RICHARDSON, C.H.; BURDETTE, R.C. & EAGLESON, C.W. - Blood volume larval. Ann. entomol. Soc. Amer., 24: 503-506, 1931.
- RIECHERS, L.A.; MEYERS, F.W. & BERRY, S.J. - DNase as a component of "multi-enzyme complexes" in the blood of saturniid moths. J. Insect Physiol., 15: 743-753, 1969.
- RÖLLER, H.; DAHM, K.H.; SWEeley, C.C. & TROST, B.M. - The structure of the juvenile hormone. Angew. Chem., 6: 179-180, 1967.

- ROSEN, H. - A modified ninhydrin colorimetric analysis for amino acids. *Arch. Biochem.*, 67: 10-15, 1957.
- ROSS, H.H. - A textbook of entomology. New York, John Wiley, 1965, 539 p.
- ROTH, T.F. & PORTER, R.K. - Yolk protein uptake in oocyte of the mosquito Aedes aegypti L. *J. Cell Biol.*, 20: 313-332, 1964.
- RUDALL, K.M. - Silk and other cocoon proteins. In: FLORKIN, M. & MASON, H.S., eds. Comparative biochemistry. New York, Academic Press, 1962. v. 4, p. 397-433.
- RUDALL, K.M. - The chitin protein complexes of insect cuticles. *Advanc. insect Physiol.*, 1: 257-313, 1963.
- RUDALL, K.M. - Skeletal structure in insects. In: GOODWIN, T.W., ed. Aspects of insect biochemistry. London, Academic Press, 1965. p. 83-92.
- RUDALL, K.M. & KENCHINGTON, W. - Arthropod silks: the problem of fibrous proteins in animal tissues. *Ann. Rev. entomol.*, 16: 73-96, 1971.
- SCHMIDT, F.H. & YOUNG, C.L. - Larval coloration in Choristoneura spp. (Lepidoptera; Tortricidae). Bile pigment in haemolymph *J. Insect Physiol.*, 17: 843-855, 1971.
- SCHNEIDERMAN, H.A. & GILBERT, L.I. - Control of growth and development in insects. *Science*, 143: 325-333, 1964.
- SÉGUY, E. - Ordre des diptères. In: GRASSÉ, P.P., ed. Traité de zoologie: anatomie, systématique, biologie. Paris, Masson, 1951, v. 10, p. 448-744.
- SEIFTER, S. & GALLOP, P.M. - The structure proteins. In: NEURATH, H., ed. The proteins. New York, Academic Press, 1966. v. 4, p. 155-458.
- SHALES, O.S. & SHLAES, S.S. - A simple and accurate method for the determination of chloride in biological fluids. *J. biol. Chem.*, 140: 879-884, 1941.

- SHIGEMATSU, H. - Synthesis of blood proteins by the fat body in the silkworm, Bombyx mori. Nature, 182: 880-882, 1958.
- SHIGEMATSU, H. - Protein metabolism in the fat body of the silkworm, Bombyx mori L. Bull. Seric. Exp. Stn. Japan, 16: 141-170, 1960.
- SHIGEMATSU, H. & MORIYAMA, H. - Effect of ecdysterone on fibroin synthesis in the posterior division of the silk gland of the silkworm, Bombyx mori. J. Insect Physiol., 16: 2015 - 2022, 1970.
- SIKOTOS, A.N. - The conjugated plasma proteins of the American cockroach I. The normal state. J. gen. Physiol., 43: 999 - 1013, 1960a.
- SIKOTOS, A.N. - The conjugated plasma proteins of the American cockroach. II. Changes during the moulting and clotting processes. J. gen. Physiol., 43: 1015-1030, 1960b.
- SINNOT, E.W.; DUNN, L.C. & DOBZHANSKY, T. - Principles of genetics. 5th ed. New York, McGraw Hill, 1958, 581p.
- SLAMA, K. - Insect juvenile hormone analogues. Ann. Rev. Biochem., 40: 1079-1102, 1971.
- SMITH JUNIOR, J.G. & CLARK, R.D. - Hexosamine in Bombyx mori silk. Nature, 207: 860-861, 1965.
- SPACKMAN, D.H.; STEIN, W.H. & MOORE, S. - Automatic recording apparatus for use in the chromatography of amino acids. Analyt. Chem., 30: 1190-1206, 1958.
- STEELE, J.E. - Occurrence of a hyperglycemic factor in the corpus cardiacum of an insect. Nature, 192: 680-681, 1961.
- STRANGWAYS-DIXON, J. - The relationship between nutrition, hormones and reproduction in the blowfly Calliphora erythrocephala (Meig.) III. The corpus allatum in relation to nutrition, the ovaries, innervation and the corpus cardiacum. J. exp. Biol., 39: 293-306, 1962.

- TELFER, W.H. - Immunological studies of insect metamorphosis. II. The role of a sex-limited female protein in egg formation by the cecropia silkworm. J. gen. Physiol., 37: 539-558, 1954.
- TELFER, W.H. - The mechanism and control of yolk formation. Ann. Rev. Entomol., 10: 161-184, 1965.
- TOBE, S.S. & LOUGHTON, B.G. - An autoradiographic study of haemolymph protein uptake by the tissues of the fifth instar locust. J. Insect Physiol., 15: 1331-1346, 1969.
- TOKUMARU, M.; FERRI, M.D.G. & WORSMANN, T.U. - Pressão osmótica da hemolinfa da "Rhynchosciara angelae" Nonato & Pavan, 1951 (Diptera, Mycetophilidae). Rev. bras. Biol., 28: 439 - 445, 1968.
- TOLEDO FILHO, S.A. - Differentiation of sibling species of "Rhynchosciara" by hemolymph electrophoresis (Diptera, Sciaridae). Rev. bras. Biol., 29: 289-294, 1969.
- TUNDISI, J.; KOKROM, M.I.; DIAZ, G.; MAGALDI, J.B. & LARA, F.J.S. Composição da hemolinfa de "Rhynchosciara angelae" Cienc. e Cult., 16: 185, 1964.
- VAN SLYKE, D.D. & HAWKINS, J.A. - A gasometric method for determination of reducing sugars, and its application to analysis of blood and urine. J. biol. Chem., 79: 739-767, 1928.
- WATERHOUSE, D.F. - Studies of the physiology and toxicology of blowflies. XIV. The composition, formation and fate of the granules in the Malpighian tubules of Lucilia cuprina larvae. Aust. J. Sci. Res. B, 3: 75-112, 1950.
- WEINER, B.A. - A microelectrode to measure dissolved oxygen in insect larvae. J. Insect Physiol., 11: 817-830, 1965.
- WHITTEN, J.M. - The supposed pre-pupa in cyclorrhaphous Diptera. Quart. J. micr. Sci., 98: 241-250, 1957.
- WIENS, A.W. & GILBERT, L.I. - Regulation of carbohydrate mobilization and utilization in Leucophaea maderae. J. Insect Physiol., 13: 779-794, 1967.

- WIGGLESWORTH, V.B. - Croonian lecture: the insect as a medium for the study of physiology. Proc. roy. Soc. B, 135: 430 - 446, 1948.
- WIGGLESWORTH, V.B. - The hormonal regulation of growth and reproduction in insects. Advanc. Insect Physiol., 2: 244-332, 1964.
- WIGGLESWORTH, V.B. - The principles of insect physiology. 6th ed. London, Methuen, 1965, 741 p.
- WIGGLESWORTH, V.B. - Insect hormones. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1970, 159 p.
- WYATT, G.R. - The biochemistry of insect hemolymph. Ann. Rev. Entomol., 6: 75 - 102, 1961.
- WYATT, G.R. - Biochemistry of insect metamorphosis. In: ETKIN, W. & GILBERT, L.I., eds. Metamorphosis: a problem in developmental biology. New York, Appleton Century-Crofts, 1968. p. 143-184.
- WYATT, G.R. & KALF, G.F. - The chemistry of insect hemolymph. II. Trehalose and other carbohydrates. J.gen.Physiol., 40: 833-847, 1957.
- WYATT, G.R.; LOUGHHEED, T.C. & WYATT, S.S. - The chemistry of insect hemolymph. Organic components of the hemolymph of the silkworm, Bombyx mori, and two other species. J.gen. Physiol., 39: 853-868, 1956.
- ZACHARIUS, R.M. & TALLEY, E.A. - Elution pattern of naturally occurring ninhydrin positive compounds during ion exchange chromatography. Analyt. Chem., 34: 1551-1556, 1962.