Pedro Soares de Araujo

VIAS DE TRANSPORTE DE
ELÉTRONS EM MICROSSOMOS
E A ATIVIDADE AZO-REDUTÁSICA

Tese de Doutorado apresentada
ao Departamento de Bioquímica
do Instituto de Química da
Universidade de São Paulo

1971

PARA ISAIAS RAW

E LIGIA

*Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
nella miseria...*

(Dante - Inferno, Canto n° 5, Verso 121)

AGRADECIMENTOS

A ISAIAS RAW , amigo e mestre, pelo seu exemplo de dedicação irrestrita à Pesquisa e ao Ensino. Seu apoio e estímulo durante todos os anos em que orientou nossa formação científica foram inestimáveis. Sua obra educacional cujas raízes são sólidas, porque honesta e realista, há de frutificar amplamente, apesar de todos os percalços, cumprindo o seu destino original de diminuir nosso atraso tecnológico.

A LÉLIA MENNUCCI que, quando ainda éramos acadêmicos, nos incutiu o método e o rigor científicos durante anos de trabalho conjunto.

A WALTER COLLI que substituiu a ISAIAS RAW na orientação desta pesquisa, pelo auxílio profissional, sugestões e discussões tão fecundas.

A HERNAN CHAIMOVICH pelas sugestões e críticas minuciosas deste trabalho.

A APARECIDA YOSCHIKO HASHIKAWA pela colaboração prestada na parte técnica.

A CARMINHA pelo esmero e exatidão com que datilografou esta tese.

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO pelo apoio financeiro que tornou possível a execução deste trabalho.

ÍNDICE

	Pág.
1. Introdução	13
2. Material e métodos	25
2.1. Material	25
2.2. Animais	26
2.2.1. Tratamento com fenobarbital	26
2.2.2. Tratamento com 3-metilcolantreno	27
2.2.3. Tratamento com DAB	27
2.3. Métodos	27
2.3.1. Preparação de microsossomos de fígado	27
2.3.2. Fracionamento dos microsossomos com DOC	29
2.3.3. Fracionamento dos microsossomos com Nagarse	30
2.3.4. Fracionamento dos microsossomos com Lipase	30
2.3.5. Dosagem das atividades enzimáticas	31
2.3.6. Espectros do citocromo P-450	34
2.3.7. Cromatografia em camada fina dos produtos de reação	36
2.3.8. Hidroxilação de anilina	38
2.3.9. Preparação de lípidos de microsossomos	39
2.3.10. Dosagem de proteína	40
3. Resultados	41
3.1. Espectros do DAB	41
3.2. Características gerais do sistema de azo-redutase	44
3.2.1. Requisitos para a clivagem redutiva do DAB	44
3.2.2. Efeito de CO e etanol	45

	Pág.
3.2.3. Efeito de pirofosfato	47
3.2.4. Efeito de NADH e NADPH, adicionados simultaneamente	48
3.2.5. Estequiometria da reação de redução do DAB	49
3.2.6. Determinação de constantes cinéticas da reação	50
3.2.7. Determinação da energia de ativação da reação	50
3.2.8. Efeito de KCN	54
3.2.9. Efeito de mersalil	55
3.2.10. Efeito de anilina	56
3.3. Indução da atividade azo-redutásica e caracterização dos produtos de reação	57
3.3.1. Efeito do tratamento com 3-MC	58
3.3.2. Efeito do tratamento com PB	59
3.3.3. Efeito do tratamento com DAB	60
3.3.4. Análise dos produtos de reação	62
3.3.5. Hidroxilação de anilina	63
3.4. Espectros absolutos do citocromo P-450	68
3.5. Fracionamento dos microsossomos	76
3.5.1. Fracionamento com DOC	76
3.5.2. Fracionamento com Nagarse	78
3.5.3. Fracionamento com Lipase	79
4. Discussão	81
5. Resumo e perspectivas	99
6. Bibliografia	101

ABREVIATURAS

DAB - 4-dimetilamino-azobenzeno
NAD - nicotinamida adenina dinucleotídeo
NADH (NADH₂) - forma reduzida de NAD
NADP - nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato
NADPH (NADPH₂) - forma reduzida do NADP
G6PD - glicose-6-fosfato desidrogenase (EC 1.1.1.49)
G6P - glicose-6-fosfato
PB - fenobarbital
3-MC - 3-metilcolantreno
EDTA - etileno diamino tetraacetato de sódio
TCA - ácido tricloroacético
Tris - tris (hidroximetil) aminometano
DOC - desoxicolato de sódio
PPDA - N,N-dimetil-p-fenilenodiamina
PAF - p-aminofenol

1. INTRODUÇÃO

O citoplasma celular é uma estrutura morfológicamente organizada. Os seus diferentes componentes permitem à célula viver e funcionar como tal, e representam subunidades de um sistema altamente complexo porém organizado.

Entre estes componentes, o sistema de citomembranas que delimita compartimentos celulares, penetrando profusamente no citoplasma, constitui uma das mais complexas estruturas do ponto de vista morfológico e fisiológico (DALLNER, 1963).

Foram os estudos de microscopia eletrônica que revelaram que todas as porções do citoplasma das células animais nucleadas contêm estruturas tubulares e vesiculares limitadas por uma membrana simples (PORTER & BLUM, 1953; BANG & BANG, 1957).

Além de membranas, o retículo endoplasmático contém grânulos, ricos em RNA, que atualmente são conhecidos como ribossomos (PALADE & SIEKEVITZ, 1956).

Portanto, o retículo endoplasmático é constituído por túbulos e vesículas de paredes "lisas" ou "rugosas" dependendo da presença de ribossomos associados às membranas (PALADE, 1956).

Estudando o fracionamento celular por centrifugação diferencial, CLAUDE (1943) verificou a presença no sobrenadante pós-mitocondrial de pequenas partículas cujo tamanho estimou entre 60 e 200 μ m às quais denominou microssomos.

Com o trabalho de HOGEBROOM, SCHNEIDER & PALADE (1948) foi estabelecido, definitivamente, um método para fracionar a célula usando centrifugação diferencial em meio isotônico de sacarose. A fração isolada, após a precipitação das mitocôndrias, contém o material solúvel do citoplasma e fragmentos do retículo endoplasmático, quando se trabalha com célula hepática. Estes fragmentos colhidos por ultracentrifugação, compostos de membranas lisas e rugosas, são denominados de microssomos (PALADE & SIEKEVITZ, 1956).

A existência de enzimas associadas aos microssomos de células de fígado foi evidenciada por HOGEBROOM & SCHNEIDER (1950) que demonstraram a presença das atividades de NADH e NADPH citocromo c redutase.

Desde o trabalho pioneiro de KEILIN & HARTREE (1940), vários autores (SLATER, 1949 e YOSHIKAWA, 1951), além de observarem a presença, em vários tecidos, de um citocromo do tipo B verificaram que suas propriedades espectrais diferiam daquelas do citocromo b. Em 1952, STRITTMATTER & BALL descreveram a presença em microssomos, de uma hemoproteína com as características de um citocromo do tipo B e que foi

denominado citocromo b_5 (PAPPENHEIMER & WILLIAMS, 1954; CHANCE & WILLIAMS, 1954).

Os microsossomos de fígado contêm outra hemoproteína que, quando reduzida, pode formar um complexo com CO (KLINGENBERG, 1958; GARFINKEL, 1958) que apresenta no espectro diferencial contra microsossomos reduzidos e não tratados com CO um pico de absorção em 450 nm (OMURA & SATO, 1962). Este citocromo é facilmente diferenciável do citocromo b_5 pois este não se combina com CO (STRITTMATTER & VELICK, 1956). O citocromo que forma um complexo com CO e que apresenta um pico de absorção em 450 nm foi chamado de citocromo P-450 por OMURA & SATO (1964).

Evidências acumuladas nos últimos anos de demonstraram que o transporte de elétrons nos microsossomos envolve o citocromo b_5 e o citocromo P-450 (SATO, OMURA & NISHIBAYASHI, 1965).

O citocromo b_5 foi isolado e caracterizado em suas propriedades físicas e químicas por uma série de autores, a partir de microsossomos de fígado de boi (STRITTMATTER & VELICK, 1956; STRITTMATTER & OZOLS, 1966), de coelho (KAJIHARA & HAGIHARA, 1967), de rato (SARGENT & VADLAMUDI, 1968), de porco (GARFINKEL, 1957 e 1957a; RAW, MOLINARI, AMARAL & MAHLER, 1958; POLTORATSKY-BOIS & CHAIX, 1964), de galinha, de macaco e de homem (NÓBREGA, ARAUJO, PASETTO & RAW, 1969), conhecendo-se numerosos dados acerca de sua estrutura e reatividade.

Considerava-se que o citocromo b_5 fôsse uma proteína típica de microsossomos. Entretanto, RAW & MAHLER (1959) demonstraram a sua existência em mitocôndrias, apesar dos trabalhos anteriores de STRITTMATTER & BALL (1954) e de CHANCE & WILLIAMS (1955) indicarem que este citocromo não existia nas mitocôndrias. SOTTOCASA, KUILENSTIERNA, ERNSTER & BERGSTRAND (1967) confirmaram o trabalho de RAW & MAHLER (1959) verificando a existência de citocromo b_5 associado à membrana externa das mitocôndrias.

STRITTMATTER & VELICK (1956a) isolaram de microsossomos de fígado a NADH-citocromo b_5 redutase (EC 1.6.2.2) cujas propriedades foram bem estudadas (STRITTMATTER, 1963).

STRITTMATTER & VELICK (1957) já haviam demonstrado que essa enzima é capaz de reduzir citocromo c desde que quantidades catalíticas de citocromo b_5 sejam adicionadas ao meio de reação. Esse resultado sugere uma transferência direta de elétrons do citocromo b_5 reduzido ao citocromo c, o que foi demonstrado pela adição "in vitro" de citocromo c oxidado a uma solução de citocromo b_5 , previamente reduzido (STRITTMATTER & VELICK, 1956). Portanto, é possível medir quantitativamente a atividade da NADH-citocromo b_5 redutase (EC 1.6.2.2) pelo seguimento da redução de citocromo c adicionado. Essa atividade é denominada NADH-citocromo c redutase (EC 1.6.2.1). MAHLER, RAW, MOLINARI & AMARAL (1958) demonstraram que esta atividade enzimática também existe nas mitocôndrias.

Apesar do amplo conhecimento existente a respeito do citocromo b_5 e da sua redutase específica, a função deste citocromo que representa 30% das hemoproteínas presentes nos microsossomos (MASON, NORTH & VANNESTE, 1965) permaneceu por muito tempo totalmente obscura. OSHINO, IMAI & SATO (1966) e HOLLOWAY E WAKIL (1970) apresentaram evidências de que a dessaturação de ácidos graxos é dependente de NADH e envolve o citocromo b_5 e sua redutase. Essas evidências constituem-se num caminho para a elucidação da função do citocromo b_5 .

Mais recentemente HILDEBRANDT & ESTABROOK (1971) apresentaram evidências de que o citocromo b_5 participa das reações de oxidação de função mista em microsossomos de fígado. A conclusão de que o citocromo b_5 participa destas reações é baseada na observação de que há uma re-oxidação parcial do citocromo b_5 na presença de excesso de NADH e substrato (etil morfina e aminopirina), quando reações de oxidação de função mista são iniciadas pela adição de NADPH. As variações do estado estacionário dos níveis de citocromo b_5 reduzido, nas condições supra-citadas, são dependentes da formação de produto e do consumo de oxigênio.

MASON (1957) definiu as oxidases de função mista como sendo "enzimas com duas atividades catalíticas interdependentes: a redução de um átomo de uma molécula de oxigênio acoplada a uma oxigenação ou hidroxilação com o outro átomo."

O citocromo P-450 dos microsossomos tem sido indicado como a oxidase terminal para certas reações de oxidação de função mista envolvidas no metabolismo de drogas, hidrocarbonetos carcinogênicos e hormônios esteróides (ESTABROOK, COOPER & ROSENTHAL, 1963; COOPER, LEVIN, NARASIMHULU, ROSENTHAL & ESTABROOK, 1965) e está bem estabelecido que a flavoproteína NADPH-citocromo c redutase (EC 1.6.2.3) é necessária para o transporte de equivalentes redutores do NADPH para o citocromo P-450 (ORRENIUS & ERNSTER, 1964).

A NADPH-citocromo c redutase foi isolada de microsossomos de fígado e caracterizada por WILLIAMS & KAMIN (1962) e por PHILLIPS & LANGDON (1962); KURIYAMA, OMURA, SIEKEVITZ & PALADE (1969) demonstraram, usando técnicas imunológicas, a identidade entre a enzima isolada de ratos controle e a enzima induzida após tratamento de ratos com fenobarbital.

O tratamento de ratos com fenobarbital induz o aumento nos microsossomos da NADPH-citocromo c redutase e do citocromo P-450 coincidindo com o aumento da atividade das oxidases de função mista (ERNSTER & ORRENIUS, 1965). Esta evidência foi considerada pelos autores como indicativa da participação das duas enzimas nas reações de oxidação de função mista.

O citocromo P-450 considerado como importante componente das oxidases de função mista é muito lábil a uma série de tratamentos durante os quais é convertido na sua forma chamada P-420 (espectralmente diferente), que mantém a capacidade de combinar-se com CO, dando um complexo cujo pico de absorção está em 420 nm (OMURA & SATO, 1964 e 1964a; MASON, NORTH & VANNESTE, 1965 e ICHIKAWA & YAMANO, 1967) perdendo por êm a atividade de hidroxilação (OMURA & SATO, 1962; GILLETTE, 1966).

Por causa dessa labilidade, os esforços no sentido de isolar e purificar o citocromo P-450 na sua forma nativa foram mal sucedidos (OMURA & SATO, 1964a). LU, JUNK & COON (1969) obtiveram citocromo P-450 "solubilizado" a partir de microsossomos de fígado de rato usando DOC em um meio contendo glicerol. Entretanto, as tentativas de purificá-lo foram infrutíferas.

Em bactérias como Rhizobium japonicum (APPLEBY, 1969 e 1969a) e Pseudomonas putida (DUS, KATAGIRI, YU, ERBES & GUNSALUS, 1970) o citocromo P-450 é uma hemoproteína solúvel, podendo ser facilmente isolado e purificado. YU & GUNSALUS (1970) obtiveram a cristalização do citocromo P-450 de Pseudomonas.

A importância da solubilização do citocromo P-450 está no fato de que permitiria a recomposição dos sistemas de elétrons a êle ligados possibilitando o estudo de

seus mecanismos. LU, JUNK & COON (1969) relataram a resolução do sistema responsável pela ω -hidroxilação de ácidos graxos em microssomos, obtendo três componentes: citocromo P-450, NADPH-citocromo c redutase e um fator termo-estável, de natureza lipídica, que posteriormente foi identificado como sendo fosfatidil-colina (STROBEL, LU, HEIDEMA & COON, 1970).

A correlação do efeito indutivo de certas drogas, das quais as mais usadas são PB e 3-MC (CONNEY, 1967), com os níveis de citocromo P-450, tem sido utilizada como argumento para implicar a participação desse citocromo e da NADPH-citocromo c redutase nas reações de oxidação de função mista (GILLETTE, 1966).

Em virtude das dificuldades encontradas para solubilizar o citocromo P-450, a espectrofotometria diferencial das suspensões de microssomos tem sido usada amplamente no estudo deste citocromo (NISHIBAYASHI & SATO, 1967). O espectro absoluto do citocromo P-450 apresenta muito interesse por causa da evidência de que existem duas formas desse citocromo o que depende do tipo de drogas usadas na sua indução. Esse fato foi descrito pela primeira vez por HILDEBRANDT, REMMER & ESTABROOK (1968) que compararam suspensões de microssomos de coelhos tratados e não tratados com 3-MC por espectrometria diferencial.

Os estudos de IMAI & SATO (1966) e SLADEK & MANNERING (1966) baseados na banda Soret dupla obtida com o complexo do citocromo P-450 com isocianeto de etila já haviam sugerido a existência de duas formas diferentes deste citocromo.

SLADEK & MANNERING (1969) sugeriram que em vez de duas formas de citocromo P-450, existiriam duas espécies moleculares diferentes, conclusões estas baseadas na aparente seletividade da indução de uma das formas usando hidrocarbonetos policíclicos (ALVARES, SCHILLING, LEVIN & KUNTZMAN, 1967 e HILDEBRANDT, REMMER & ESTABROOK, 1968) e na indução seletiva da atividade de oxidase de função mista (SLADEK & MANNERING, 1969 e CONNEY, 1967).

Os estudos de SCHENCKMAN (1970) e de JEFFCOATE, GAYLOR & CALABRESE (1969) mostraram que as alterações espectrais obtidas por interação de substratos do tipo I (por exemplo, fenobarbital) ou do tipo II (por exemplo, anilina) com o citocromo P-450 refletem a existência de duas formas desse citocromo. O citocromo P-450 tipo II é induzido por 3-MC apresentando no espectro de ressonância eletrônica paramagnética um novo sinal. Este novo sinal é um sinal de alta energia ($g=6,6$) sugerindo a presença de uma hemoproteína com ferro de "spin" alto. MASON, NORTH & VANNESTE (1965) haviam demonstrado que o espectro de ressonância eletrônica paramagnética de microsossomos de fígados de ratos tratados com PB ou de ratos controle exibia sempre três linhas anisotrópicas ($g=2,41$,

2,25 e 1,91) que são típicas para ferro (Fe^{+++}) com um elétron não compartilhado (ferro de "spin" baixo). Esses resultados confirmam definitivamente a existência de duas formas do citocromo P-450 provavelmente dependentes do tipo de interação entre o ferro e a apoproteína.

Uma grande variedade de azo~~r~~corantes são clivados redutivamente no organismo formando aminas primárias (GILLETE, 1966).

STEVENSON, DOBRINER & RHOADS (1942) mostraram que o DAB, administrado a ratos era metabolizado em grande parte pela redução da ligação azo, pois encontraram na urina desses animais os derivados acetilados do p-aminofenol e p-fenilenodiamina.

Foram entretanto, os trabalhos do casal MILLER, discutidos em uma ampla revisão (MILLER & MILLER, 1953) que apresentaram uma série de dados a respeito do metabolismo deste carcinogênico.

MUELLER & MILLER (1950) demonstraram que o fígado contém enzimas dependentes de NADPH que formam aminas primárias a partir de DAB e localizaram esta atividade na fração microssômica.

HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967) mostraram que a atividade azo-redutásica, usando neoprontosil como substrato, podia ser solubilizada de microsossomos pelo tratamento com lipase, identificando-a como a NADPH-citocromo c redutase. HERNANDEZ, MAZEL & GILLETTE (1967) verificaram entretanto, que embora a atividade da NADPH-citocromo c redutase não fôsse inibida por CO, a redução de neoprontosil era parcialmente inibida por CO. Além do mais o tratamento com 3-MC, embora não induzisse aumento da NADPH-citocromo c redutase, induzia um aumento do citocromo P-450 acompanhado de um aumento da azo-redutase. Baseados nestes dados, os autores propuseram que o neoprontosil seria reduzido por três vias:

(a) uma via dependente do citocromo P-450, sensível a CO, e destruída por solubilização com lipase;

(b) uma via dependente só de NADPH-citocromo c redutase, insensível a CO, e que não é destruída por solubilização com lipase;

(c) uma via indutível com 3-MC que é sensível à solubilização por lipase e insensível a CO.

CONNEY, MILLER & MILLER (1956) e von der DECKEN & HULTIN (1960) mostraram que o tratamento de ratos com 3-MC induz um aumento da atividade azo-redutásica usando DAB como substrato.

NÓBREGA (1965) e WADA, HIGASHI, ICHIKAWA, TADA & SAKAMOTO (1964) mostraram que a administração oral de DAB a ratos promove um aumento no citocromo b_5 em microsossomos de fígado.

Esses dois últimos trabalhos levantaram a interessante possibilidade da participação do citocromo b_5 na redução do DAB, embora alguns controles fundamentais não tivessem sido feitos na época como, por exemplo, a análise do estado de proliferação do retículo endoplasmático que poderia estar sendo induzido indiscriminadamente pela administração dessa substância, com o conseqüente aumento dos níveis gerais das enzimas a ele associados.

Em face da potencialidade do problema passamos a fazer um estudo sistemático da redução do DAB por microsossomos. Ao contrário do que postulamos, foram obtidas evidências da participação do citocromo P-450 no processo de redução, embora não tivesse sido possível excluir a participação do citocromo b_5 .

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. MATERIAL

NAD, NADH, NADP e NADPH, albumina do sêro bovino (fração V) citocromo c (tipo III - de coração equino), glicose-6-fosfato, mersalil e 3-metil-colantreno foram comprados de Sigma Chemical Co.

Fenobarbital foi ofertado por Rhodia Indústrias Químicas e Textéis S/A - Divisão Farmacêutica.

Lipase (EC 3.1.1.3 - de pâncreas bovino, bruta) foi adquirida de Sigma Chemical Co.

Glicose-6-fosfato desidrogenase (EC 1.1.1.49) foi obtida de Calbiochem Co. DTT foi comprado do mesmo laboratório.

Nagarse (proteínase cristalina de Bacillus subtilis, EC 3.4.4.16) foi comprada de Nagarse Co.

Desoxicolato de sódio foi obtido de Difco Labs. Todos os outros reagentes usados possuíam grau analítico.

Todos os solventes usados foram redistilados em nosso laboratório: PPDA ressublimado em "dedo-frio", foi generosamente ofertado pelo Prof. Dr. G. CILENTO; PAF foi recristalizado a partir de uma solução aquosa obtendo-se cristais orto-rômnicos com p.f. 190°C (TOSCANO, V.G., 1971).

DAB foi comprado de Fischer Co. e recristalizado a partir de uma solução etanólica a quente (TOSCANO, 1970). A solução saturada a quente foi filtrada sob vácuo e deixada cristalizar a 4°C. Os cristais foram recolhidos e lavados com etanol-água 1:1. O processo foi repetido por duas vezes e ao final, determinou-se o ponto de fusão que foi de 117°C Lit. (B 16², 151).

2.2. ANIMAIS

Foram utilizados ratos da raça Wistar, fornecidos pelo biotério da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O peso médio dos animais empregados foi de 200 g, a não ser nos casos especificados. Os ratos utilizados foram sempre machos.

Após serem recebidos do biotério, os ratos foram mantidos por duas semanas em uma dieta contendo 20% de caseína, antes de serem sacrificados.

2.2.1. Tratamento com Fenobarbital.

Os ratos receberam diariamente uma dose de PB dissolvido em solução salina (80 mg/kg de peso) por via intraperitoneal. Os ratos controle receberam também por via intraperitoneal, 0,5 ml de solução salina isotônica (CONNEY, 1967).

O tratamento prolongou-se por 8 dias sendo sacrificados nos dias 0, 2, 4, 6 e 8, lotes de 3 animais tratados

e de 3 animais controle. Os microsossomos foram preparados como descrito em Métodos 2.3.1.

2.2.2. Tratamento com 3-Metilcolantreno.

Os animais foram tratados essencialmente como descrito por HERNANDEZ, MAZEL & GILLETTE (1967). Foram usados ratos machos, da raça Wistar pesando 100 g. 3-MC foi dissolvido em óleo de milho com ligeiro aquecimento para uma concentração de 7 mg/ml e foi administrado por via intraperitoneal (35 mg/kg) cada 24 horas durante 4 dias. O grupo controle recebeu diariamente 0,5 ml de óleo de milho, intraperitoneal.

2.2.3. Tratamento com DAB.

Os animais receberam misturados à dieta DAB na proporção de 0,6% (p/p) (MILLER & MILLER, 1953) por 18 e 33 dias. Os animais controle receberam a mesma dieta sem DAB.

2.3. MÉTODOS

2.3.1. Preparação de Microsossomos de Fígado.

Para a preparação de microsossomos, os ratos foram deixados em jejum alimentar, fornecendo-se água à vontade durante 24 horas anteriores ao sacrifício. Este foi feito por concussão cerebral, e os fígados perfundidos "in situ", pela veia porta, com 100 ml de uma solução gelada de cloreto de potássio 0,15 M. Os fígados foram em seguida removidos e colocados em um banho de gelo, e picados com uma tesoura de pontas finas.

Em tôdas as preparações, as etapas subsequentes foram efetuadas em câmara fria, constantemente a 4°C. O método usado foi o descrito por MITOMA, POSNER, REITZ & UDENFRIEND (1956), com ligeiras modificações.

Os fígados foram homogeneizados com 3 volumes de sacarose 0,25 M (contendo 1 mM Tris-HCl pH 7,5) com o auxílio de um homogeneizador tipo Potter, equipado com um pistilo de teflon, adaptado a um motor elétrico de baixa rotação. Nunca foram feitos mais de 3 movimentos com o instrumento a fim de não danificar as estruturas que se pretendia isolar.

Esta suspensão foi a seguir centrifugada em uma centrífuga International, modelo PR-2, a 900xg por 10 minutos para remover núcleos e restos celulares. Após a centrifugação o sobrenadante foi filtrado em gaze, dobrada 4 vezes, e desprezou-se o precipitado. O sobrenadante obtido foi centrifugado em uma centrífuga Sorvall RC-2B a 12.000xg por 20 minutos e o sobrenadante coletado após filtração em gaze dobrada 4 vezes. O precipitado foi novamente desprezado.

O pH do sobrenadante foi verificado e caso necessário ajustado a 7,5 pela adição cuidadosa de NaOH 2N. Em seguida foi centrifugado na centrífuga Spinco, modelo L, rotor 50 Ti, a 105.000xg, por 60 minutos, ou no caso das preparações mais volumosas no rotor 30, a 78.000xg por 120 minutos.

O precipitado obtido foi suspenso em uma solução de cloreto de potássio 0,15 M contendo 1 mM EDTA pH 7,5, de modo que o volume final fôsse de 120 ml, capacidade máxima do rotor 50 Ti, e novamente centrifugado a 105.000xg por 60 minutos.

O precipitado obtido foi suspenso, manualmente, em um tampão fosfato de potássio 0,1 M contendo glicerol 30% (v/v), DTT 1 mM e EDTA 0,1 mM, pH 7,6 (Meio I) (NISHIKAWA & SATO, 1968) ou em um tampão citrato de sódio 0,1 M contendo 0,1 M de cloreto de potássio, glicerol 30% (v/v) e DTT 1 mM (Meio II) como descrito por LU, JUNK, COON (1969).

Após a determinação da quantidade de proteína a suspensão de microssomos foi guardada a -20°C , dividida em alíquotas pequenas para serem descongeladas uma única vez no momento do uso.

2.3.2. Fracionamento dos Microssomos com DOC.

Microssomos foram fracionados com DOC usando essencialmente o método descrito por LU & COON (1968).

A uma suspensão de microssomos em Meio II (vide Métodos 2.3.1.) contendo aproximadamente 15 mg/ml de proteína foi adicionado DOC (solução recente a 10% (p/v)) até uma concentração final de 0,66%. A suspensão foi agitada a 4°C por 20 minutos e depois centrifugada a 105.000xg por 2 horas.

Separado o sobrenadante, límpido, o precipitado foi suspenso em Meio II, manualmente, em um homogeneizador tipo Potter equipado com pistilo de teflon.

2.3.3. Fracionamento dos Microsossomos com Nagarse.

O fracionamento dos microsossomos usando Nagarse foi executado essencialmente de acôrdo com o que foi descrito por NISHIBAYASHI & SATO (1968).

A uma suspensão de microsossomos em Meio II (5 a 10 mg/ml) foi adicionada Nagarse, dissolvida no mesmo tampão para uma concentração final de 1,5 mg de enzima por 10 mg de proteína. A mistura foi colocada em anaerobiose repetindo-se vários ciclos de evacuação e preenchimento com N_2 e incubada a $0^{\circ}C$ por 15 horas.

Após a incubação, a mistura foi centrifugada por 2 horas a 150.000xg sem ter sido diluída para reduzir a viscosidade (JEFCOATE & GAYLOR, 1969).

O sobrenadante, límpido, foi separado por cuidadosa aspiração e o precipitado foi ressuspenso em Meio II.

2.3.4. Fracionamento dos Microsossomos com Lipase.

O fracionamento dos microsossomos foi feito essencialmente de acôrdo com o método de NÔBREGA, ARAUJO, PASETTO & RAW (1969).

A uma suspensão de microsossomos contendo entre 10,0 e 15,0 mg/ml de proteína, em Meio II, foi adicionada lipase (EC 3.1.1.3) bruta, de pâncreas bovino (Sigma lote nº 30C-2800), suspensa em Meio II para atingir concentrações finais de 0,7; 2,0; 5,0; 7,0 e 10,0 mg por 100 mg de proteína dos microsossomos.

A mistura foi homogeneizada manualmente em um homogeneizador tipo Potter, com pistilo de teflon; colocada em anaerobiose por repetidos ciclos de evacuação e preenchimento com N_2 , e foi incubada a 30°C por 1 hora com agitação ocasional.

Após o término da incubação foi imediatamente resfriada em gelo fundente e centrifugada a 150.000xg por 60 minutos. O sobrenadante, límpido, obtido foi separado por aspiração cuidadosa e o precipitado ressuspense em Meio II.

2.3.5. Dosagens das Atividades Enzimáticas.

2.3.5.1. Atividade Azo-Redutásica.

A atividade azo-redutásica foi medida pelo decrêscimo da absorbância a 415 nm em um espectrofotômetro Cary modelo 14. A não ser nos casos especificados, tódas as reações foram feitas a 37°C em Meio I ou Meio II.

A mistura de reação continha num volume final de 3 ml de 1,65 μ Moles de NADPH ou 1,5 μ Moles de NADP mais um sistema gerador de NADPH e a não ser nos casos especificados 100 nMoles de DAB.

O sistema gerador de NADPH continha em 1 ml 15 μ Moles de $MgCl_2$, G6P 30 μ Moles e 2 U de G6PD (1 U reduz 1 μ Mol de NADP por minuto a 25°C em pH 7,4 (HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL, 1967)). Quando o sistema gerador foi usado o meio de reação foi pré-incubado a 37°C por 5 minutos. A reação foi iniciada pela adição do DAB. A atividade da azo-redutase que produzia a redução de 1 nMol de DAB por minuto, nas condições do ensaio, foi definida como 1 U.

2.3.5.2. NADH-Citocromo c Redutase (EC 1.6.2.1).

A atividade de NADH-citocromo c redutase foi determinada em um espectrofotômetro Cary modelo 14 pelo incremento da absorbância a 550 nm a 25°C como descrito por STRITTMATTER (1967).

As cubetas de 1 cm de caminho ótico continham: 125 μ Moles de NADH (a cubeta de referência sem NADH), 40 nMoles de citocromo c, enzima, 940 μ Moles de tampão fosfato pH 7,5 contendo 0,94 μ Moles de KCN em um volume final de 1 ml. A reação foi iniciada pela adição de NADH. 1 U de atividade foi definida como a redução de 1 μ Mol de citocromo c por minuto nas condições do ensaio.

Para o cálculo do citocromo c reduzido usou-se um coeficiente de extinção milimolar (red-ox) = 20,5 $cm^{-1}mM^{-1}$ (MARGOLIASH, FROHWIRT & WIERNER, 1959). As soluções dos nucleotídeos piridínicos foram padronizadas espectrofotometricamente a 340 nm, usando o coeficiente de extinção de 6,2 $cm^{-1}.mM^{-1}$ (BERGMEYER, 1963).

2.3.5.3. NADPH-Citocromo c Redutase (EC 1.6.2.3).

A atividade de NADPH-citocromo c redutase foi determinada em um espectrofotômetro Cary modelo 14 pelo incremento da absorbância a 550 nm a 25°C como descrito por WILLIAMS & KAMIN (1962). As cubetas de 1 cm de caminho ótico continham 100 nMoles de NADPH (a cubeta de referência sem NADPH), 40 nMoles de citocromo c, enzima, 940 µMoles de tampão fosfato pH 7,5 contendo 0,94 µMoles de KCN, em um volume final de 1 ml. A reação foi iniciada pela adição de NADPH.

A atividade da redutase que produzia a redução de 1 µMol de citocromo c por minuto foi definida como 1 U, nas condições de ensaio (OMURA, SIEKEVITZ & PALADE, 1967).

2.3.5.4. Citocromo P-450.

O citocromo P-450 foi determinado pelo seu espectro diferencial com monóxido de carbono após tratamento dos microsossomos com ditionito de sódio a temperatura ambiente, usando um coeficiente de extinção para o incremento de absorbância entre 490 nm e 450 nm de $91 \text{ cm}^{-1} \text{ mM}^{-1}$ (OMURA & SATO, 1964). Pequenas quantidades de hemoglobina, presentes na preparação dos microsossomos, não afetam apreciavelmente esta determinação (NISHIBAYASHI & SATO, 1967).

A quantidade de hemoglobina contaminante presente nos microsossomos foi determinada como descrito por NISHIBAYASHI & SATO (1967), a partir do espectro diferencial após tratamento com CO de microsossomos tratados com $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$, medindo-se a altura do ombro formado a 420 nm, usando-se um $\Delta\epsilon$ de $93 \text{ cm}^{-1} \text{ mM}^{-1}$. As preparações efetuadas segundo Métodos 2.3.1. revelaram-se essencialmente livres de hemoglobina contaminante.

2.3.5.5. Citocromo b_5 .

O citocromo b_5 dos microsossomos foi determinado pelo espectro diferencial obtido após redução da amostra pela adição de 13,7 nMoles de NADH, em um espectrofotômetro Cary modelo 14. A existência de redução completa foi confirmada tratando-se a amostra em seguida com $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ e medindo-se o incremento de absorbância em 424 nm.

A quantidade de citocromo b_5 presente foi calculada usando-se um $\epsilon = 181 \text{ cm}^{-1} \text{ mM}^{-1}$ para o pico em 424 nm (NÖBREGA, ARAUJO, PASETTO & RAW, 1969).

2.3.6. Espectros do Citocromo P-450.

Os espectros do citocromo P-450 foram obtidos usando-se as partículas resultantes do tratamento dos microsossomos com Nágarse (Métodos 2.3.3.). O citocromo b_5 que interferiria na determinação do citocromo P-450 e a NADPH-citocromo c reductase (EC 1.6.2.3) são totalmente removidos pelo tratamento

(NISHIBAYASHI & SATO, 1968). Estes espectros foram medidos em um espectrofotômetro Cary modelo 14, especialmente calibrado, à temperatura ambiente (22°C), em partículas obtidas de microsossomos de fígados de ratos normais e tratados com PB, 3-MC e DAB. Desde que as suspensões eram turvas foram usadas nas cubetas de referência suspensões descoradas de partículas que foram preparadas por uma modificação do método de HORIE, KINOSHITA & SIMAZONO (1966).

As suspensões de partículas resultantes do tratamento com Nagarse (5 a 10 mg/ml) foram adicionados peróxido de hidrogênio até uma concentração final de 0,44 M e azoto de sódio até uma concentração final de 10 mM para evitar a decomposição do peróxido de hidrogênio. As suspensões foram mantidas à temperatura ambiente por 3 horas até ficarem totalmente descoradas. Estas suspensões foram diluídas com H₂O ao dobro do volume inicial e centrifugadas por 45 minutos a 150.000xg.

Os precipitados foram ressuspensos em Meio II e não apresentaram picos de absorção na região entre 340 e 750 nm com exceção de um aumento gradual de absorção devido à turvação, próximo aos menores comprimentos de onda.

Estas suspensões assim obtidas foram cuidadosamente diluídas para apresentarem uma absorção de 0,140 a 700 nm tal que o espectro de absorção do complexo do citocromo P-450

com CO na região entre 620 e 650 nm não apresentasse absorção tornando-se horizontal (NISHIBAYASHI & SATO, 1968).

2.3.7. Cromatografia em Camada Fina dos Produtos de Reação Obtidos pela Incubação dos Microsossomos com DAB e Anilina.

O método utilizado para incubar suspensões de microsossomos com DAB e anilina foi uma modificação do que foi descrito por PETERS & FOUTS (1970).

O meio de incubação continha microsossomos suspensos em Meio II (10 mg de proteína), $MgCl_2$ 15 μ Moles, G6P 30 μ Moles, NADP 1,5 μ Moles, 2 U de G6PD, 0,5 μ Moles de DAB ou 2,5 μ Moles de anilina e tampão de tris-HCl 50 mM pH 7,5 q.s.p. 5 ml.

Este meio de reação foi incubado em um agitador de Dubnoff por 15 minutos a 37°C com oxigênio do ar como fase gasosa ou com CO após ter sido saturado com CO por 5 minutos. A velocidade de agitação foi de 100 r.p.m. e um caco de porcelana foi colocado em cada frasco para assegurar agitação eficiente.

Em todos os experimentos foram utilizados 2 tipos de controles simultaneamente. O controle nº 1 não continha o sistema gerador de NADPH. O controle nº 2 não continha substratos; após a paralização da reação foi adicionada uma mistura de padrões contendo 10 nMoles de DAB, 25 nMoles de PPDA,

25 nMoles de PAF e 50 nMoles de anilina.

Após a incubação, a reação foi paralisada pela adição de 0,6 ml de TCA 50% (p/v). O material foi centrifugado a 1.000xg por 10 minutos. O sobrenadante foi separado por decantação e o precipitado foi desprezado.

O pH do sobrenadante foi acertado a 7,5-8,0 com a adição de NaOH 2 N e logo em seguida extraído por 3 vezes com 2 ml de clorofórmio-metanol 99:1. Após cada extração, o material foi centrifugado a 1.000xg por 5 minutos e a fase orgânica separada por aspiração.

Os extratos foram reunidos e evaporados até a secagem sob um fino jato de N₂. O resíduo então foi suspenso em 50 µl de etanol e utilizado para a cromatografia em camada fina.

Em placas de vidro de 20x20 cm, recobertas com uma camada de 0,25 mm de espessura de Silica Gel G, foram aplicados 2 µl de soluções alcoólicas de padrões contendo 50 nMoles de PPDA, PAF ou anilina e 10 nMoles de DAB. Dos resíduos suspensos em etanol foram aplicados 10 µl.

A cromatografia ascendente foi desenvolvida usando-se butanol-ácido acético-H₂O 8:2:10, sistema de solventes descrito por RANDERATH (1966). O tempo de desenvolvimento foi de aproximadamente 90 minutos. Após a cromatografia, as

placas foram secas à temperatura ambiente e depois a 60°C por 15 minutos e foram reveladas usando o método descrito por RANDERATH (1966): as placas foram inicialmente aspergidas com uma solução recém-preparada de NaNO_2 a 5% (p/v) em HCl 0,2 N, e secas à temperatura ambiente por 10 minutos. Foram então aspergidas com uma solução de α naftol a 5% (p/v) em metanol e aquecidas por 10 minutos a 100°C. Depois deste tratamento as manchas se revelaram coradas: DAB apresentou-se como uma mancha amarela, PAF purpúrea, PPDA azul e anilina, rósea.

2.3.8. Hidroxilação de Anilina.

A reação de hidroxilação enzimática do anel aromático da anilina foi executada essencialmente de acordo com o que foi descrito por GRAM, ROGERS & FOUTS (1967).

Uma suspensão de microsossomos obtidos a partir de fígados de ratos normais ou tratados com PB, 3-MC e DAB (contendo 5 mg de proteína) foi incubada em um meio contendo MgCl_2 15 μMoles , G6P 30 μMoles , NADP 1,5 μMoles , 2 U de G6PD; anilina 10 μMoles e tampão de tris- HCl 0,1 M pH 7,4 q.s.p. 2,5 ml. O sistema foi incubado em um agitador de Dubnoff por 30 minutos a 37°C com oxigênio do ar como fase gasosa. A velocidade de agitação foi de 100 r.p.m. Em todos os experimentos foram incluídos 2 controles: um não contendo substrato e outro ao qual após a paralisação da reação foram adicionados 250 nMoles de PAF. Após o término da incubação, a reação foi paralisada em gelo fundente.

A dosagem de PAF formado foi feita segundo mêtodo descrito por KATO & GILLETTE (1965) modificado por GRAM, ROGERS & FOUTS (1967).

O meio de incubação foi saturado com NaCl, até a formação de um corpo de fundo e extraído 3 vezes com 3 ml de éter livre de peróxido. Após cada extração, a mistura foi centrífuga a 1.000xg por 10 minutos para promover a separação de fases. A fase etérea foi coletada por aspiração. Os extratos etéreos foram reunidos e agitados com 3 ml de tampão KH_2PO_4 - K_2HPO_4 0,5 M pH 12,5 contendo 1% de fenol destilado. Após repousar para separação das fases, a fase etérea foi aspirada e desprezada. A fase aquosa foi mantida por 30 minutos à temperatura ambiente e a absorbância determinada a 620 nm. Os resultados expressos em nMoles de PAF formado foram determinados por meio de uma curva padrão construída pela adição de uma solução padrão de PAF a 3 ml de tampão fosfato 0,5 M pH 12,5 contendo 1% de fenol e que foi uma reta até 1.000 nMoles de PAF.

2.3.9. Preparação de Lípidos de Microsossomos.

Lípidos totais de microsossomos foram preparados de acordo com o que foi descrito por VANCE & SWEELEY (1967). Uma suspensão de microsossomos (200 mg de proteína) foi centrifugada a 105.000xg por 60 minutos. O precipitado foi suspenso em 60 ml de clorofórmio-metanol 2:1, a mistura foi agitada por 15 minu-

tos à temperatura ambiente, filtrada em papel Whatman nº 1 e o resíduo foi lavado com 6 ml de clorofórmio-metanol 2:1. Ao filtrado foram adicionados 15 ml de água. Uma vez agitada, a mistura foi deixada por 15 horas a 4°C para a separação de fases.

A fase clorofórmica foi coletada por aspiração e evaporada sob vácuo até a secagem. Os lípidos obtidos foram ressuspensos em tampão fosfato 0,1 M pH 7,4 contendo 30% (v/v) de glicerol,

2.3.10. Dosagem de Proteína.

As dosagens de proteína foram feitas pelo método de LOWRY, ROSEBROUGH, FARR & RANDALL (1951) usando albumina do sêro bovino como padrão.

3. RESULTADOS

3.1. Espectros do DAB.

A Figura 1 mostra os espectros do DAB em vários meios. Na Tabela I se encontram os valores dos coeficientes de extinção e os comprimentos de onda correspondentes aos máximos de absorção.

As polaridades dos solventes variaram desde a do éter de petróleo até a do tampão fosfato 0,1 M. Observou-se que em Meio II contendo microsossomos quer com 1 mg/ml de proteína quer com 2 mg/ml o coeficiente de extinção foi o mesmo. Esse foi usado para o cálculo das unidades da azo-redutase ao longo deste trabalho.

Comparando-se os coeficientes de extinção do DAB em tampão fosfato (com ou sem glicerol) e em suspensão de microsossomos, observa-se uma diferença que reflete a adsorção do DAB às membranas lipo-proteicas do retículo endoplasmático.

Quando se precipita, por centrifugação, uma suspensão de microsossomos contendo 2 mg/ml de proteína à qual foi adicionado DAB até uma concentração final de 50 μ M, o sobrenadante é incolor, permanecendo todo o corante adsorvido ao precipitado, confirmando os dados de WU & SMUCKLER (1969).

Evidentemente, aumentando-se a concentração de DAB pode-se saturar os microsossomos com o corante, permanecendo o DAB no sobrenadante.

Nestas condições o coeficiente de extinção tende a diminuir dependendo da quantidade de DAB não adsorvido aos microsossomos.

Neste trabalho a concentração do DAB foi mantida sempre dentro de limites em que não ocorria a saturação dos microsossomos. As suspensões de microsossomos, nas determinações da atividade azo-redutásica, sempre contiveram 1,0-2,0 mg/ml de proteína.

TABELA I
Coeficientes de Extinção e Picos de Absorção
do DAB em Vários Meios

MEIO	λ MÁXIMO nm	ϵ cm ⁻¹ mM ⁻¹
Etanol Anidro. Bidestilado	406	30,0
Eter. de Petróleo. Destilado p.e. 40-60°C	396	34,4
Tampão Fosfato de Potássio 0,1 M pH 7,4	450	12,0
Tampão Fosfato de Potássio 0,1 M pH 7,4 contendo glicerol 25% (v/v)	450	12,0
Suspensão de microsossomos em Meio II - Proteína 1 mg/ml	415	18,0
Suspensão de microsossomos em Meio II - Proteína 2 mg/ml	415	18,0

Fig. 1 - Espectros do DAB em vários meios. 25 nMoles de DAB em um volume final de 1 ml de cada meio. Temperatura ambiente (20°C). (a) éter de petróleo; (b) etanol; (c) suspensão de microssomos em Meio II - 1,0 e 2,0 mg/ml de proteína (concentração final); (d) tampão fosfato 0,1 M - pH 7,4 com e sem glicerol (25% - v/v).

3.2. Características Gerais do Sistema de Azo-Redutase.

3.2.1. Requisitos para a Clivagem Redutiva do DAB.

A clivagem redutiva do DAB leva à formação de anilina e N,N-dimetil-p-fenilenodiamina (MILLER & MILLER,

TABELA II

Requisitos da Azo-Redutase em Microsossomos

ADIÇÕES AO SISTEMA MÍNIMO	AZO-REDUTASE (U/mg)
Nada	0,0
NADH	0,08
NADH + sobrenadante 0,22 mg	0,11
NADH + sobrenadante 0,56 mg	0,17
NADH + CO (40 seg.)	0,07
NADH + sobrenadante 0,56 mg (congelado e descongelado)	0,04
NADH + citocromo b ₅ 9,2 nMoles	0,09
NADPH	3,17
NADPH + CO (40 seg.)	4,70
NADPH + sobrenadante 0,56 mg	3,20
NADPH + citocromo b ₅ 9,2 nMoles	3,41

O sistema mínimo contém suspensão de microsossomos (1 mg/ml de proteína) em Meio I. A atividade azo-redutásica foi dosada como em Métodos (2.3.5.). O sobrenadante é aquele obtido após a precipitação dos microsossomos a 105.000xg contendo a fração solúvel do citoplasma. A concentração dos nucleotídeos piridínicos foi de : NADH 625 μ M e NADPH 550 μ M.

O citocromo b₅ usado foi preparado a partir de fígado de rato usando-se o método descrito por NÖBREGA, ARAUJO, PASETTO & RAW (1969).

1953) que não apresentam espectro na região visível entre 340 nm e 700 nm. Assim esta reação pode ser acompanhada es-
petrofotomêtricamente pelo decréscimo da absorbância do DAB.
A Tabela II apresenta os resultados do uso de NADH e de NADPH
como doadores de elétrons para a redução do DAB por microosso-
mos.

Como se pode observar pela inspeção da Ta-
bela II o sistema é totalmente dependente de NADPH como fonte
de elétrons.

A adição do sobrenadante obtido durante a
preparação dos microssomos, após a centrifugação a 105.000xg
(Métodos 2.3.1.) e que contém a fração solúvel do citoplasma,
não estimula a redução do DAB. O uso do citocromo b_5 externo
aos microssomos tem o mesmo efeito. Monóxido de carbono não
é inibidor para a reação dependente de NADPH.

3.2.2. Efeito de CO e Etanol sobre a Azo-Redutase.

A Tabela III mostra os resultados do uso
de NADPH ou de um sistema gerador de NADPH frente ao pré-tra-
tamento de microssomos por monóxido de carbono em aero ou
anaerobiose. Nos casos em que no sistema foram omitidos os
microssomos, para se verificar a existência de redução não en-
zimática do DAB, o tempo de reação foi aumentado para 30 minu-
tos. Investigou-se também o efeito da adição de etanol aos
microssomos uma vez que este foi o solvente usado no preparo
de soluções de DAB e que pode ser oxidado por um sistema de-
pendente de NADPH (RUBIN, GANG & LIEBER, 1971).

TABELA III

Efeito de Aerobiose, Anaerobiose, CO e Etanol
sobre a Atividade da Azo-Redutase

ENSAIO	AZO-REDUTASE (U/mg)			
	AEROBIOSE	+ CO	ANAEROBIOSE	+ CO
DAB	-	0,0	-	-
Microsossomos + DAB	0,0	0,0	0,0	-
NADPH + DAB	0,0	0,0	0,0	-
Sistema gerador de NADPH + DAB	0,0	0,0	-	-
Microsossomos + NADPH + DAB	4,4	4,6	4,3	4,65
Microsossomos + sistema gerador de NADPH + DAB	4,6	4,8	4,25	-
Idem + 50 μ l etanol	4,62	-	-	-
Idem + 200 μ l etanol	4,50	-	-	-
Idem + 500 μ l etanol	3,80	-	-	-

Os ensaios foram realizados em um volume final de 3 ml de Meio II a 37°C como descrito em Métodos. Suspensão de microsossomos 2 mg/ml de proteína; DAB 33 μ M; NADPH 550 μ M.

Sistema gerador de NADPH como descrito em Métodos (2.3.5.1.). Os ensaios em anaerobiose foram realizados em uma cubeta de Thumberg com repetidos ciclos de evacuação e preenchimento com N₂. Nos ensaios em que se utilizou CO o meio de reação foi saturado com CO (por borbulhamento durante 1 minuto).

3.2.3. Efeito de Pirofosfato sôbre a Atividade Azo Redutásica.

O ensaio da atividade azo-redutásica em presença de pirofosfato de sódio nas concentrações de 10 e 20 mM final revelou uma atividade de 2,64 U/mg de proteína enquanto na ausência de pirofosfato o ensaio revelou uma atividade de 2,52 U/mg.

SASAME & GILLETTE (1970) referiram que a pirofosfatase presente nos microsossomos, converte o NADP a produtos que inibem a atividade de NADPH-citocromo c redutase, inibindo consequentemente a atividade oxidásica de drogas pelos microsossomos. Referem êstes autores que aproximadamente 50% da atividade pirofosfatásica de um homogenato de fígado de rato está contida na fração microssômica. Esta atividade pirofosfatásica pode ser inibida por pirofosfato (10 a 20 mM) resultando em máximo efeito estimulatório para a hidroxilação de drogas como anilina e hexobarbital.

A falta de estimulação da atividade azo-redutásica por pirofosfato indica que, em nosso sistema, os níveis de pirofosfatase são pouco importantes.

Provavelmente isso possa ser explicado pelo trabalho de SASAME & GILLETTE (1970) que atribuem à atividade pirofosfatásica uma grande variabilidade, não só entre animais de uma mesma espécie como entre as várias espécies por êles estudadas.

Verificou-se também que a redução do citocromo b_5 dos microsossomos por NADH foi inibida em 60% pela adição de pirofosfato 20 mM ao meio de reação. Isto confirma os resultados de STRITTMATTER & VELICK (1957) mostrando que a NADH-citocromo b_5 redutase purificada é inibida em 47% na presença de pirofosfato 10 mM e 67% em presença de 20 mM.

A redução do citocromo P-450 por NADPH em presença de pirofosfato 20 mM não foi afetada.

3.2.4. Efeito de NADH e NADPH, Adicionados Simultaneamente, sobre a Atividade Azo-Redutásica.

Usando o ensaio para a atividade azo-redutásica como descrito em Métodos (2.3.5.) (experimentos em triplicata), com duas preparações diferentes obtivemos os seguintes resultados (expressos como média dos valores obtidos): atividade azo-redutásica em presença de somente sistema gerador de NADPH (NADP - 500 μ M final) - 2,78 U/mg; e em presença de 125 μ M final de NADH mais sistema gerador de NADPH - 2,95 U/mg.

COHEN & ESTABROOK(1971a) demonstraram o efeito sinérgico de NADH e NADPH na demetilação oxidativa de aminopirina. O uso simultâneo dos dois nucleotídeos piridínicos apresentou uma estimulação desta reação de aproximadamente 100% (que não se devia à atividade de transdesidrogenase), em relação aos valores obtidos quando NADPH era usado

exclusivamente como doador de equivalentes redutores.

COHEN & ESTABROOK (1971b) verificaram o mesmo efeito sinérgico pela adição de NADH ao meio de reação usando um sistema gerador de NADPH.

Entretanto, OSHINO, IMAI & SATO (1966) usando concentrações iguais de NADH e NADPH, simultaneamente, não verificaram estimulação na reação de hidroxilação de anilina.

3.2.5. Estequiometria da Reação de Redução do DAB.

A estequiometria da reação de redução da ligação azo do DAB foi feita em anaerobiose para impedir o consumo

TABELA IV
Estequiometria da Redução de DAB

EXPERIMENTO Nº	CONSUMO DE NADPH nMoles/ min	ATIVIDADE AZO-REDUTÁSICA U	nMoles NADPH/ nMoles DAB
1	8,5	2,5	3,4
2	12,5	3,75	3,35

A atividade azo-redutásica foi medida como descrito em Métodos (2.3.5.1.). O meio de reação continha: microsossomos 2 mg/ml, NADPH 550 μ M, DAB 33 μ M. O consumo de NADPH foi medido pelo decréscimo da absorbância em 340 nm. (BERGMEYER, 1963). A reação foi iniciada pela adição do DAB. O meio de reação foi mantido em anaerobiose recobrimdo-o com uma camada de aproximadamente 2 mm de espessura de Nujol. O consumo de NADPH pelos microsossomos utilizando o oxigênio dissolvido no meio de reação foi acompanhado até cessar completamente, indicando ter sido atingida a anaerobiose. O experimento foi então iniciado pela adição do DAB ao meio usando-se uma micro-seringa (Hamilton).

mo de NADPH pelos microsossomos em presença de oxigênio.

A Tabela IV apresenta os resultados de dois experimentos com preparações diferentes. As determinações foram feitas em duplicata. Como se conclui pela observação da tabela há um consumo de 3 moles de NADPH por mol de DAB reduzido.

3.2.6. Determinação de Constantes Cinéticas da Reação.

A Figura 2 mostra a determinação do $K_{m_{ap}}$ do DAB usando-se o método gráfico de LINEWEAVER & BURK (1934). O $K_{m_{ap}}$ encontrado foi $19,4 \mu M$ e a $V_{max_{ap}}$ nas condições do experimento foi de $6,25 U/mg$ de proteína.

3.2.7. Determinação da Energia de Ativação da Reação.

A Figura 3 apresenta os resultados da determinação da atividade azo-redutásica em várias temperaturas. O gráfico de Arrhenius mostra um evidente ponto de inflexão que corresponde à temperatura de $22,2^{\circ}C$ como temperatura de transição.

As energias de ativação foram calculadas usando-se a equação de Arrhenius $E_a = -2,303 R d\left(\frac{\log K}{T-1}\right)$ em que R é a constante dos gases perfeitos, K a velocidade de reação e T a temperatura.

Fig. 2 - Determinação de K_{map} do DAB. O gráfico foi construído usando-se os recíprocos da atividade azo redutásica em ordenadas $((U/mg)^{-1} \times 10^3)$, contra os recíprocos das concentrações de DAB em abscissas $(\mu M^{-1} \times 10^3)$. Os meios de reação continham: microsossomos (2 mg/ml) em Meio II, NADP 500 μM e sistema gerador de NADPH como descrito em Métodos. A reação foi iniciada pela adição do DAB. Temperatura 37°C.

Fig. 3 - Determinação da atividade azo-redutásica em várias temperaturas. O gráfico foi construído usando-se o log da atividade azo-redutásica em ordenadas contra os recíprocos da temperatura ($T^{-1} \times 10^5$) em abcissas. Os meios de reação continham: microsossomos (2 mg/ml) em Meio II, NADP 500 μ M, sistema gerador de NADPH como descrito em Métodos e DAB 33 μ M. A reação foi iniciada pela adição do DAB. Temperaturas: 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 37°C e 45°C.

Para temperaturas abaixo de 22°C o valor de $E_a = 7.100 \text{ cal/mol}$ e para temperaturas acima de 22°C o valor de $E_a = 22.100 \text{ cal/mol}$.

3.2.8. Efeito de KCN.

A Tabela V apresenta os resultados obtidos nas determinações da atividade azo-redutásica quando foi adicionado KCN ao meio de reação. Como se evidencia pelo exame desta tabela com uma concentração de 1 mM de KCN obtem-se 50% de inibição da atividade azo-redutásica e com 3 mM de KCN, esta inibição é de 90%.

TABELA V

Inibição da Azo-Redutase por KCN

ADIÇÕES AO SISTEMA	AZO-REDUTASE (U/mg)
Nada	2,84
1 mM KCN	1,39
2 mM KCN	0,55
3 mM KCN	0,28

A atividade azo-redutásica foi medida como descrito em Métodos (2.3.5.1.). O sistema de reação continha microsossomos (2 mg/ml), NADPH 550 μM e DAB 33 μM . A reação foi iniciada pela adição de DAB.

3.2.9. Efeito de Mersalil.

FRANKLIN & ESTABROOK (1971) verificaram que mersalil é inibidor da atividade de NADPH-citocromo c re dutase, da atividade de NADPH-citocromo P-450 redutase e da demetilação de etilmorfina em microsossomos de fígado de rato. 50% da inibição das três atividades citadas foi obtida quando o meio de incubação continha mersalil em concentrações de aproximadamente 25 nMoles/mg de proteína.

O K_i do mersalil indenpendia das condições de reação, ou seja, se a atividade da reação de hidroxi

TABELA VI.

Inibição da Azo-Redutase por Mersalil

MERSALIL ADICIONADO nMoles/mg DE PROTEÍNA	AZO-REDUTASE U/mg
0	2,2
5	1,9
10	1,6
25	1,3
35	1,1
50	zero
70	zero

A atividade azo-redutásica foi medida em Meio I não contendo DTT. O meio de reação continha microsossomos (2 mg/ml) em Meio I sem DTT, 500 μ M NADP e um sistema gerador de NADPH. Os mi crossomos foram incubados por 1 minuto com mersalil nas con-cen-trações indicadas antes da adição de NADP. A reação foi iniciada pela adição de DAB (33 μ M).

lação tinha sido estimulada por NADH, ou por um aumento da força iônica do meio ou inibida por CO.

A Tabela VI apresenta os resultados da inibição da azo-redutase por mersalil.

Os dados apresentados mostram uma inibição de 50% da azo-redutase por mersalil em uma concentração de 35 nMoles/mg, próxima ao valor obtido por FRANKLIN & ESTABROOK (1971). Os dados da Tabela VI mostram, da mesma forma que para os autores citados, uma fase inicial resistente à ação de mersalil.

Também foi verificado que ao término da reação da azo-redutase em presença de mersalil (35 nMoles/mg) o citocromo P-450 se encontrava 50% reduzido e a atividade de NADPH-citocromo c redutase estava 50% inibida.

3.2.10. Efeito de Anilina.

A Tabela VII apresenta os resultados da determinação da azo-redutase em presença de anilina.

A anilina é hidroxilada a p-aminofenol por microsossomos numa reação dependente de NADPH e oxigênio (OSHINO, IMAI & SATO, 1966). O citocromo P-450 é considerado como importante componente das oxidases de função mista envolvidas na hidroxilação de esteróides e xenobióticos (ESTABROOK, COOPER ROSENTHAL, 1963; COOPER, LEVIN, NARASIMHULU, ROSENTHAL & ESTABROOK, 1965).

TABELA VII

Azo-Redutase em Presença de Anilina

ANILINA ADICIONADA AO SISTEMA (μ M)	AZO-REDUTASE (U/mg)
0,0	2,64
8,3	2,50
25,0	2,15
100,0	2,15

A atividade azo-redutásica foi medida como em Métodos(2.3.5.1.). O meio de reação continha: microsossomos (2 mg/ml) em Meio II, NADPH 550 μ M e DAB 33 μ M. A reação foi iniciada pela adição de DAB.

Como se pode observar pela inspeção da Tabela VII o máximo de inibição obtido é de 18% com uma concentração de anilina de 25 μ M. Este valor não se altera mesmo quando esta concentração é aumentada de quatro vezes. Nas condições do ensaio, no qual a concentração de NADPH não é limitante para ambas as reações, os resultados não revelam um padrão de inibição competitiva.

3.3. Indução da Atividade Azo-Redutásica e Caracterização dos Produtos da Reação.

A indução das atividades enzimáticas dos sistemas responsáveis pela transformação de drogas, localizados nos microsossomos tem sido obtida por diversos autores quando animais são tratados com várias drogas, inseticidas e carcinogênicos e

tem sido utilizada como uma arma para os estudos dos componentes d'este sistema (CONNEY, 1967).

Os estudos realizados por CONNEY, MILLER & MILLER (1956) e por von der DECKEN & HULTIN (1960) mostram que o tratamento dos ratos com 3-MC induz o aumento da atividade das enzimas de microsossomos de fígado responsáveis pela redução da ligação azo de amino azo corantes.

3.3.1. Efeito do Tratamento com 3-MC.

A Tabela VIII mostra os resultados do tratamento de ratos com 3-MC como descrito em Material e Métodos. Foram utilizados lotes de quatro animais recebendo o grupo controle somente o diluente de 3-MC por via intraperitoneal.

TABELA VIII
Efeito de Tratamento com 3-MC

	CONTROLES	RATOS TRATADOS COM 3-MC
Azo-redutase (U/mg)	2,30	4,85
Citocromo P-450 (nMoles/mg)	1,07	2,58
Citocromo b ₅ (nMoles/mg)	0,60	0,72
NADPH-citocromo c redutase (U/mg)	0,106	0,071
NADH-citocromo c redutase (U/mg)	0,51	0,49

As atividades foram dosadas como em Métodos (2.3.5.). Os valores apresentados representam o valor médio de três experimentos. Os valores individuais não apresentaram uma variação maior que 15% do valor médio.

Como se pode verificar pela inspeção da Tabela VIII o aumento percentual da atividade azo-redutásica acompanha o aumento do citocromo P-450. Não houve indução das atividades de NADPH e NADH-citocromo c redutase concordando com os dados de von der DECKEN & HULTIN (1960).

3.3.2. Efeito do Tratamento com Fenobarbital.

A Tabela IX mostra os resultados obtidos pelo tratamento de ratos com PB como descrito em Material e Métodos.

TABELA IX
Efeito do Tratamento com PB

DIAS DE TRATAMENTO	AZO-REDUTASE (U/mg)	NADPH-CIT. c RED. (U/mg)	NADH-CIT. c RED. (U/mg)	CIT. b ₅ (nMoles/mg)	CIT. P-450 (nMoles/mg)
0	2,22	0,082	0,42	0,56	0,88
2 < Contrôles	2,78	0,108	0,55	0,59	1,23
2 < Tratados	2,80	0,131	0,50	0,55	1,94
4 < Contrôles	2,50	0,101	0,59	0,59	1,20
4 < Tratados	2,50	0,143	0,55	0,68	2,25
6 < Contrôles	2,38	0,098	0,55	0,52	1,18
6 < Tratados	3,06	0,168	0,46	0,90	2,65
8 < Contrôles	2,34	0,094	0,57	0,60	1,22
8 < Tratados	2,23	0,195	0,50	0,97	2,80

CIT. = citocromo; RED. = redutase

As atividades foram medidas como descrito em Métodos (2.3.5.).

dos. Como se pode observar pelo tratamento com PB há um aumento do citocromo P-450 e da atividade de NADPH-citocromo c redutase não acompanhado pelo aumento da atividade azo-reduutásica.

O aumento observado nos n $\bar$ veis de citocromo b_5 parece corresponder à proliferação do ret $\bar$ culo endoplas $\bar$ mático (KURIYAMA, OMURA, SIEKEVITZ & PALADE, 1969).

Contrôles feitos por microscopia eletrônica e a comparação do p $\bar$ eso m $\bar$ edio dos f $\bar$ gados de ratos tratados (com 6 dias de tratamento; 7,9 g de f $\bar$ gado por 100 g de p $\bar$ eso corp $\bar$ oreo para o lote de ratos tratados contra 6,1 g de f $\bar$ gado por 100 g de p $\bar$ eso corp $\bar$ oreo para o lote dos ratos contr $\bar$ ole) corroboram os dados dos autores citados.

Estes mesmos autores verificaram por estudos da vida m $\bar$ edia dos componentes do ret $\bar$ culo endoplasmático que o aumento de citocromo b_5 se deve à diminuição da velocidade de degradação d $\bar$ este citocromo durante o tratamento com PB.

3.3.3. Efeito do Tratamento com DAB.

A Tabela X mostra os resultados dos tratamentos de dois lotes de ratos com DAB na dieta por 18 e 33 dias como descrito em Material e M $\bar$ etodos.

TABELA X

Efeito do Tratamento com DAB

	18 DIAS		33 DIAS	
	NORMAIS	TRATADOS	NORMAIS	TRATADOS
Azo-redutase (U/mg)	4,6	0,125	2,42	0,062
NADPH-citocromo c redutase (U/mg)	0,075	0,052	0,067	0,056
NADH-citocromo c redutase (U/mg)	0,48	0,49	0,56	0,55
Consumo de NADPH (nMoles/min/mg)	2,21	2,02	1,13	1,16
Citocromo P-450 (nMoles/mg)	1,11	1,08	0,94	1,22
Citocromo b ₅ (nMoles/mg)	0,55	0,70	0,63	0,83

O consumo de NADPH pelos microsossomos em presença de oxigênio do ar foi medido pelo decrêscimo da absorbância a 340 nm (BERGMEYER, 1963). O meio de reação continha microsossomos (2 mg/ml) em Meio II e NADPH 183 μ M. Temperatura 37°C. As demais atividades foram dosadas como em Métodos (2.3.5.) O número de dias refere-se ao período de tratamento com DAB, misturado à dieta (0,6% p/p).

Os dados de WADA, HIGASHI, ICHIKAWA, TADA & SAKAMOTO (1964) e os de NÖBREGA (1965), indicam que há um aumento dos níveis de citocromo b_5 pelo tratamento oral com DAB. Os resultados apresentados confirmam este dado. Com 18 dias de tratamento o nível do citocromo b_5 em ratos tratados é 1,25 vezes maior que nos controles e com 33 dias 1,35 vezes.

Entretanto, os controles feitos com microscopia eletrônica juntamente com o aumento do peso médio dos fígados dos ratos tratados indicam que tal aumento se deve a uma proliferação do retículo endoplasmático. Com 33 dias de tratamento o peso médio dos fígados dos ratos tratados foi de 10 g/100 g de peso corpóreo contra 5,5 g/100 g para os controles.

Pelo tratamento oral com DAB há um nítido efeito de inibição da atividade azo-redutásica, entretanto, o consumo de NADPH pelo microsossomos manteve-se inalterado. Os níveis das demais atividades não apresentaram variações de monta.

3.3.4. Análise dos Produtos de Reação.

A demonstração dos produtos reação de redução da ligação azo do DAB, empregando-se cromatografia em camada fina, foi executada com dois objetivos:

(a) a comprovação de que realmente o método empregado para a determinação da atividade azo-redutásica (decrêscimo da absorbância a 415 nm) refletia a redução do DAB com a formação de aminas primárias ou seus derivados;

(b) a comprovação pelo uso de anilina, cuja hidroxilação foi amplamente demonstrada na literatura (PETERS & FOUTS, 1970; HOLTZMAN, GRAM, GIGON & GILLETTE, 1968; GILLETTE, 1966), que o sistema das oxidases de função mista dos microssomos era ativo nas preparações em que a azo-redutase era ativa.

As Figuras 4 e 5 mostram o resultado típico de cromatografias em presença de oxigênio do ar (Fig. 4) ou em presença de CO saturante (Fig. 5).

3.3.5. Hidroxilação de Anilina.

Também com o objetivo de verificar a atividade de do sistema responsável pela hidroxilação de drogas em micros

TABELA XI
Hidroxilação de Anilina

EXPERIMENTOS Nº	CONTRÔLES	3-MC	DAB	PB
1	16,2	25,2	7,45	19,4
2	13,1	23,4	7,8	18,7
3	16,1	28,6	6,95	20,8
Citocromo P-450 nMoles/mg)	0,94	2,58	1,22	2,65

As atividades de hidroxilação de anilina por microssomos foram determinadas como descrito em Métodos. As atividades são expressas em nMoles de PAF formado/30 min/mg de proteína. O meio de reação continha microssomos (5 mg), NADP 500 μ M e sistema gerador de NADPH como descrito em Métodos; anilina 10 μ Moles e tampão fosfato 0,1 M pH 7,4 q.s.p. 2,5 ml. A reação foi iniciada pela adição de anilina.

Fig. 4 - A incubação, extração e cromatografia dos produtos da redução do DAB e da hidroxilação de anilina foram feitas como descrito em Métodos. Os números ao lado direito de cada mancha indicam os valores dos Rfs. A fase gasosa foi oxigênio do ar.

(1) DAB 10 nMoles; (2) PPDA 25 nMoles; (3) PAF 25 nMoles; (4) Anilina 50 nMoles; (5) mistura de padrões: DAB 10 nMoles, PPDA 25 nMoles, PAF 25 nMoles e anilina 50 nMoles; (6) Controle II - ao meio de reação foi adicionada a mistura de padrões (como em 5) após a paralisação da reação - 10 µl de resíduo da extração; (7) Amostra - microssomos incubados com DAB - 10 µl do resíduo da extração; (8) Controle I - microssomos incubados com anilina sem sistema gerador de NADPH - 10 µl do resíduo da extração; (9) Amostra - microssomos incubados com anilina - 10 µl do resíduo de extração; (10) Controle I - microssomos incubados com DAB sem sistema gerador de NADPH - 10 µl do resíduo da extração.

Fig. 5 - A incubação, extração e cromatografia dos produtos da redução do DAB e da hidroxilação de anilina foram feitas como descrito em Métodos. Os números ao lado direito de cada mancha indicam os valores dos Rfs. A fase gasosa foi CO com o meio de reação saturado com CO.

(1) DAB 10 nMoles; (2) PPDA 25 nMoles; (3) PAF 25 nMoles; (4) Anilina 50 nMoles; (5) Mistura de padrões: DAB 10 nMoles, PPDA 25 nMoles, PAF 25 nMoles e anilina 50 nMoles; (6) Contrôlo II - ao meio de reação foi adicionada a mistura de padrões (como em 5) após a paralisação da reação - 10 μ l de resíduo da extração; (7) Amostra - microssomos incubados com DAB - 10 μ l do resíduo da extração; (8) Contrôlo I - microssomos incubados com anilina sem sistema gerador de NADPH - 10 μ l do resíduo da extração; (9) Amostra - microssomos incubados com anilina - 10 μ l do resíduo de extração; (10) Contrôlo I - microssomos incubados com DAB sem sistema gerador de NADPH - 10 μ l do resíduo da extração.

somos, foram determinadas as atividades de hidroxilação de anilina em microsossomos obtidos de fígados de ratos normais e tratados com PB (6 dias), 3-MC (4 dias) e DAB (18 dias). Os resultados são apresentados na Tabela XI.

A inspeção da Tabela XI mostra a existência de atividade de oxidase de função mista nos microsossomos normais e tratados e que esta atividade é induzida pelo tratamento com 3-MC ou PB, sendo inibida pelo tratamento com DAB.

Apesar da indução existente com PB o efeito mais evidente é com 3-MC, o que seria de esperar uma vez que a anilina é um substrato do tipo II e o tratamento com 3-MC induz a síntese de citocromo P-450 tipo II (JEFCOATE & GAYLOR, 1969).

3.4. Espectros Absolutos do Citocromo P-450.

As Figuras 6, 7, 8 e 9 mostram os espectros absolutos do citocromo P-450 obtidos usando-se subpartículas de microsossomos preparados pelo tratamento com Nagarse como descrito em Métodos (2.3.6.).

Os resultados obtidos confirmam os dados apresentados por NISHIBAYASHI & SATO (1968) para o espectro do citocromo P-450 obtido com subpartículas de microsossomos tratados com Nagarse, preparados de fígados de ratos pré-tratados com PB.

Fig. 6 - Espectro de citocromo P-450 obtido com subpartículas de microsossomos obtidos de ratos normais como descrito em Métodos. Proteína 2 mg/ml (—) oxidado, (---) reduzido, (-·-·-) reduzido tratado com CO.

Fig. 7 - Espectro de citocromo P-450 obtido com partículas de microsossomos obtidos de fígados de ratos pré-tratados com PB. Proteína 2 mg/ml (—) oxidado, (---) reduzido, (---) reduzido tratado com CO.

Fig. 8 - Espectro do citocromo P-450 obtido com partículas de microsossomos obtidos de fígados de ratos pré-tratados com 3-MC. Proteína 2 mg/ml (—) oxidado, (---) reduzido, (-·-·-) reduzido tratado com CO.

Fig. 9 - Espectro do citocromo P-450 obtido com partículas de microsossomos obtidos de fígado de ratos pré-tratados com DAB. Proteína 2 mg/ml (—) oxidado, (---) reduzido, (----) reduzido tratado com CO.

Também são confirmados os resultados de JEFCOATE & GAYLOR (1969) para os espectros do citocromo P-450 obtidos com subpartículas de microssomos, quer tratados com Lubrol quer tratados com Nagarse, preparados de fígados de ratos pré-tratados com PB e com 3-MC.

É interessante observar que o espectro do citocromo P-450 obtido com subpartículas de microssomos de fígados de ratos pré-tratados com DAB apresenta as mesmas características daquele obtido a partir do pré-tratamento com PB.

Os espectros apresentados representam resultados típicos de experimentos executados em triplicata e confirmados em cada caso em duas preparações diferentes.

3.5. Fracionamento dos Microssomos.

Com o objetivo de obter uma fração de microssomos que contivesse a atividade azo-redutásica e que permitisse a separação de seus componentes e sua identificação, foi tentado o fracionamento dos microssomos.

Os resultados foram todos negativos demonstrando a grande labilidade do sistema da azo-redutase.

3.5.1. Fracionamento dos Microssomos com DOC.

A Tabela XII apresenta um resultado típico do tratamento de microssomos com DOC descrito em Métodos (2.3.2.). O experimento foi realizado por três vezes com coincidência de resultados.

TABELA XII

Fracionamento dos Microsossomos com DOC

	MICROSSOMOS	SOBR.	PPT.	SOBR. + PPT.
Azo-redutase U/mg	4,86	0,0	0,0	0,0
NADPH-citocromo c redutase (U/mg)	0,073	0,047	0,025	-
Citocromo P-450 nMoles/mg	1,04	0,29	0,62	-
Citocromo b ₅ nMoles/mg	0,62	0,57	0,10	-

SOBR. = sobrenadante; PPT. = precipitado

O fracionamento dos microsossomos e a medida das atividades enzimáticas foi feito como descrito em Métodos (2.3.2.e 2.3.5.).

LU, JUNK & COON (1969) referiram que o sobrenadante obtido após o tratamento dos microsossomos com DOC continha de 30 a 50% da atividade de ω -hidroxilação de ácidos graxos originalmente presente nos microsossomos. Este sobrenadante podia ser separado (por cromatografia em DEAE-celulose) em três componentes: NADPH-citocromo c redutase, citocromo P-450 e uma fração termoestável de natureza lipídica. Pela combinação destas 3 frações recompunha-se a atividade de hidroxilação de ácidos graxos que nenhuma das três frações isoladas apresentava.

Entretanto, aplicando o mesmo método de fracionamento, não se recupera a atividade azo-redutásica no sobrenadante dos microsossomos tratados com DOC. A adição de lípides totais de microsossomos preparados como em Métodos (2.3.9.) também não faz recuperar a atividade perdida pelo tratamento com DOC, quer no sobrenadante, quer no precipitado (resíduo de microsossomos).

3.5.2. Fracionamento dos Microsossomos com Nagarse.

Microsossomos foram tratados com Nagarse de acordo com o que foi descrito em Métodos (2.3.3.). A Tabela XIII apresenta um resultado típico deste experimento.

TABELA XIII

Fracionamento dos Microsossomos com Nagarse

	MICROSSOMOS	MICROSSOMOS APÓS NAGARSE	SOBR.	PPT.
Azo-redutase (U/mg)	2,84	0,0	0,0	0,0
NADPH-citocromoc redutase (U/mg)	0,065	0,043	0,045	0,097
Citocromo P-450 (nMoles/mg)	1,03	0,55	0,0	0,42
Citocromo b ₅ (nMoles/mg)	0,55	0,54	0,44	0,05

SOBR. = sobrenadante, PPT. = precipitado

O fracionamento com Nagarse e as medidas das atividades enzimáticas foram feitos como descrito em Métodos (2.3.3. e 2.3.5.).

3.5.3. Fracionamento dos Microsossomos com Lipase.

Microsossomos suspensos em Meio II foram tratados com lipase, bruta, como descrito em Métodos (2.3.4.).

A Tabela XIV apresenta os resultados dêste tratamento.

Os sobrenadantes obtidos apõs o tratamento com lipase, adicionados de lípides totais de microsossomos (2 mg de proteína com 10 mg de lípides) também não recuperaram a atividade azo-redutâsica.

Sobrenadante de microsossomos (8 ml) trata-dos com lipase contendo 49 mg de proteína e NADPH-citocromo c redutase 0,118 U/mg foram liofilizados para reduzir o volume e dialisados para reduzir a concentração de glicerol contra Meio II sem glicerol. Foram obtidos 1,5 ml de solução contendo 38,0 mg de proteína e NADPH-citocromo c redutase 0,098 U/mg (3,7 U totais). Esta solução foi incubada com DAB 100 nMoles e sistema gerador de NADPH num volume final de 3 ml como descrito em Métodos (2.3.5.1.), e não apresentou atividade azo-redutâsica num ensaio em que o tempo de incubação a 37°C foi de 30 minutos.

Este experimento foi feito em duplicata com sobrenadante, apõs tratamento com lipase de microsossomos de três preparações diferentes.

TABELA XIV

Fracionamento de Microsossomos com Várias Concentrações de Lipase^(a)

	PROTEÍNA (mg)	AZO- REDUTASE	NADPH-CIT.c REDUTASE	NADH-CIT.c REDUTASE	CITOCROMO b ₅ nM TOTAIS	CITOCROMO P-450 nM TOTAIS
Microsossomos	113,0	277,98	5,91	38,05	66,67	150,29
Sobr. 0,7 mg%	26,40	0,0	2,94	9,96	8,37	14,52
Ppt. 0,7 mg%	46,25	145,94	2,75	20,12	15,72	38,62
Sobr. 2,0 mg%	34,30	0,0	3,92	11,27	11,66	26,75
Ppt. 2,0 mg%	38,00	96,73	1,21	14,60	15,96	52,82
Sobr. 5,0 mg%	34,20	0,0	3,51	7,62	13,00	21,89
Ppt. 5,0 mg%	35,28	56,43	1,08	10,13	11,99	37,04
Sobr. 7,0 mg%	39,20	0,0	5,81	15,68	21,56	29,40
Ppt. 7,0 mg%	42,16	0,0	0,60	22,38	14,33	48,06
Sobr. 10,0 mg%	44,10	0,0	5,28	12,97	28,22	29,33
Ppt. 10,0 mg%	34,65	0,0	0,46	16,17	7,97	7,69

Sobr. = sobrenadante; CIT. = citocromo; Ppt. = precipitado
(a) as atividades enzimáticas estão expressas em U totais.

O números ao lado dos nomes das frações indicam a concentração de lipase usada. O fracionamento e a dosagem das atividades enzimáticas foram feitas como descrito em Métodos(2.3.4.e 2.3.5.).

4. DISCUSSÃO

Uma grande variedade de azo-corantes é clivada redutivamente "in vivo" levando à formação de amins primárias aromáticas. Alguns exemplos clássicos deste tipo de via metabólica foram descobertos por TRÉFONEL, TRÉFONEL, NITTI & BOVET (1935) mostrando que prontosil é reduzido formando sulfanilamida, que azobenzeno (ELSON & WARREN, 1944) e DAB (STEVENSON, DOBRINER & RHOADS, 1942) são reduzidos dando origem a anilina e p-fenilenodiamina no primeiro caso e a anilina e N,N-dimetil-p-fenilenodiamina no segundo.

Seria, entretanto, incorrer em erro supor que todos os azo-corantes sofrem redução no organismo. GILLETTE (1966) cita exemplos de azo-corantes que não são metabolizados através da redução da ligação azo, como a tartrazina, corante usado correntemente para colorir produtos alimentícios e que não sofre clivagem quando administrada a ratos por via intraperitoneal. Após administração oral, entretanto, observa-se a excreção dos produtos da clivagem redutiva da ligação azo, mas foi sugerido que esta redução seria devida a ação de azo-redutases das bactérias presentes no trato digestivo (GILLETTE, 1966).

Usando homogenatos de fígado, foi demonstrada a existência de um sistema enzimático, dependente de NADPH, que reduz a ligação azo do DAB (MUELLER & MILLER, 1950), do prontossil e do azobenzeno (FOUTS, KAMM & BRODIE, 1957).

Embora, FOUTS, KAMM & BRODIE (1957) tenham indicado que este sistema se localiza na fração solúvel do citoplasma, hoje está estabelecido que ele se localiza no retículo endoplasmático (GILLETTE, 1966).

FOUTS, KAMM & BRODIE (1957) verificaram a presença da atividade azo-redutásica em outros órgãos além do fígado como no rim e pulmão, mas em menores quantidades.

Em microsossomos de fígado de rato, o sistema da azo-redutase é completamente dependente de NADPH (Tabela II), o que está de acordo com os dados de WU & SMUCKLER (1969) e os de HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967).

A adição do sobrenadante obtido após a precipitação dos microsossomos a 105.000xg não apresenta nenhum efeito estimulatório sobre a atividade azo-redutásica como se verifica na Tabela II. Entretanto, HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967) usando neoprontossil como substrato verificaram que a adição do sobrenadante fervido, dobrava a atividade azo-redutásica, e concluíram que no sobrenadante existe um fator não identificado necessário para se obter a atividade ótima. Porém estes

mesmos autores verificaram que a adição de EDTA para uma concentração final de 10^{-3} M, apresentava o mesmo efeito, o que indica a presença de traços de metais pesados contaminando o meio de reação e inibindo a atividade azo-redutásica.

Por outro lado, a presença de um fator desconhecido no sobrenadante fervido, como foi indicado por HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967), nos parece muito duvidosa, pois no processo de preparação dos microsossomos, o tampão usado contém EDTA 10^{-3} M e, portanto, o sobrenadante obtido após a precipitação dos microsossomos a 105.000xg também conterá EDTA. O efeito estimulatório obtido por esses autores com sobrenadante fervido, leva à conclusão de que o fator desconhecido é o próprio EDTA, e que o efeito observado não reflete uma estimulação da atividade azo-redutásica e sim proteção contra uma inibição por metais.

A verificação de que a adição de citocromo b_5 ao meio de reação não estimula a azo-redutase (Tabela II), não significa necessariamente que o citocromo b_5 não participe do sistema. O citocromo b_5 usado foi preparado a partir de fígados de rato usando o método descrito por NÓBREGA, ARAUJO, PASETTO & RAW (1969), em que o citocromo solubilizado representa a porção da molécula resistente ao tratamento com tripsina, denominada por STRITTMATTER & OZOLS (1966), de heme-peptídeo central.

SATO, NISHIBAYASHI & ITO (1969) mostraram que, usando detergentes, o citocromo b_5 podia ser isolado sem quebra de ligações peptídicas, e que este citocromo exibia propriedades físico-químicas bem diferentes das do heme-peptídeo central.

O citocromo b_5 obtido por solubilização com detergentes é insolúvel em água, pelo fato de conter fosfolípidos associados, e uma vez libertado dos lípidos por tratamento com acetona tende a formar polímeros cujo peso molecular foi estimado em torno de 120.000 (SATO, NISHIBAYASHI & ITO, 1969), enquanto o heme-peptídeo central do citocromo b_5 tem um peso molecular estimado em torno de 13.000 (NÖBREGA, ARAUJO, PASETTO & RAW, 1969).

Interessante é notar que o potencial de redox do citocromo b_5 obtido por solubilização com detergentes (forma monomérica, após remoção de fosfolípidos, peso molecular estimado 25.000) não difere praticamente do valor encontrado para o citocromo b_5 solubilizado por tratamento dos microssomos com tripsina (SATO, NISHIBAYASHI & ITO, 1969).

VELICK & STRITTMATTER (1956) determinaram o potencial de redox do citocromo b_5 por vários métodos, encontrando um valor de + 0,02 volt a pH 7,0, o que é mais de 0,1 volt maior que o valor referido para esse citocromo quando ligado aos microssomos (STRITTMATTER & BALL, 1952 e YOSHIKAWA, 1951).

VELICK & STRITTMATTER (1956) sugerem que esta diferença encontrada nos valores do potencial de redox do citocromo b_5 pode ser devida a uma interação desse citocromo com algum componente de microsomas.

Em vista dos dados apontados acima e considerando o trabalho em que HILDEBRANDT & ESTABROOK (1971) apresentam uma série de evidências da participação do citocromo b_5 juntamente com o citocromo P-450 em reações de hidroxilação de drogas, os nossos resultados (Tabela II), que não revelam uma estimulação da atividade azo-redutásica em presença de citocromo b_5 , não afastam completamente a possibilidade de que esse citocromo participe do sistema da azo-redutase.

A evidência definitiva da participação ou não do citocromo b_5 na atividade azo-redutásica só poderá ser obtida quando esse sistema for resolvido nas suas espécies moleculares, o que permitirá a recomposição da atividade azo-redutásica.

A inibição de uma série de reações dependentes de NADPH por CO tem sido utilizada como indicação da participação do citocromo P-450 nestas reações.

Reações de hidroxilação como a hidroxilação de anilina e de hexobarbital são inibidas por CO (GILLETTE, 1966). ESTABROOK, COOPER & ROSENTHAL (1963) demonstraram, de maneira elegante, que a inibição da hidroxilação de esteróides

por CO pode ser revertida pela ação fotoquímica de luz monocromática de comprimento de onda de 450 nm.

GILLETTE & GRAM (1969) mostraram que a inibição da atividade azo-redutásica por CO é de apenas 35%, usando prontossil como substrato. HERNANDEZ, MAZEL & GILLETTE (1967) mostraram que apenas a atividade azo-redutásica, cujo aumento era induzido por pré-tratamento dos ratos com PB, era inibida por CO. Os mesmos autores mostraram que a azo-redutase, cujo aumento era induzido por 3-MC, não era inibida por CO.

A atividade azo-redutásica dos microsossomos, usando DAB como substrato, mostrou-se completamente insensível à ação de CO, em condições de saturação do meio de reação por CO (Tabela III). Mesmo em anaerobiose, em que o efeito complexante do CO passa a não depender da relação CO/O₂ (ESTABROOK, COOPER & ROSENTHAL, 1963 e OMURA, SATO, COOPER, ROSENTHAL & ESTABROOK, 1965), a atividade azo-redutásica mostrou-se completamente insensível à ação de CO. Entretanto, KIESE (1965) mostrou que CO não inibe a N-hidroxilação de anilina e GILLETTE (1966) refere que a sulfo-oxidação de diamino-difenil sulfeto não é inibida por CO.

A constatação de que a atividade azo-redutásica (usando DAB como substrato) não é inibida por CO não exclui necessariamente a participação do citocromo P-450 nesta reação.

Condiserando-se os dados obtidos por HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967) (usando neoprontosil como substrato) e comparando-os com os dados obtidos quando usamos DAB, uma série de diferenças podem ser apontadas.

O DAB não é reduzido não enzimaticamente por NADPH e nem por NADH. Entretanto, quando se verificam os resultados desses autores, pode-se constatar uma redução não enzimática do neoprontosil por NADPH, que chega até a 20% da atividade azo-redutásica total. Também deve-se notar que HERNANDEZ, MAZEL & GILLETTE (1967) relatam a redução de neoprontosil por NADH em presença de NADH-citocromo b_5 redutase, em presença ou ausência de citocromo b_5 .

Ora, esse efeito, quando considerado juntamente com a constatação de que a atividade azo-redutásica descrita por esses autores pode ser solubilizada de microssomos, pela incubação com lipase, e purificada, atividade essa que os autores identificaram como sendo a NADPH-citocromo c redutase, sugere que a redução de neoprontosil seja uma reação inespecífica, mormente quando se considera o valor de $K_{m_{ap}}$ de 4mM obtido por estes autores. O $K_{m_{ap}}$ para a redução de DAB por microssomos foi de 19,4 μ M (Fig. 2), que é cerca de duzentas vezes menor que o valor citado.

Por outro lado, a inexistência de efeito sobre a azo-redutase da adição de pirofosfato ao meio de reação, não só sugere que a atividade pirofosfatásica de nossas

preparações era baixa, bem como que a inibição observada na redução do citocromo b_5 dos microssomos em presença de pirofosfato corresponde ao dado de STRITTMATTER & VELICK (1957) que mostram que a NADH-citocromo b_5 redutase é inibida por pirofosfato.

Essa inibição sugere que a atividade azo-redutásica não seja dependente de NADH-citocromo b_5 redutase.

Considerando a inibição da azo-redutase por KCN (Tabela V), a possibilidade de que essa atividade nos microssomos possa depender exclusivamente de NADPH-citocromo c redutase como foi sugerido por HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967) tem que ser posta em dúvida. Prova isso o experimento realizado com sobrenadante de microssomos tratados com lipase contendo 3,7 U de NADPH-citocromo c redutase (Resultados 3.5.3.), que mostra que a atividade azo-redutásica, usando DAB como substrato, não pode depender exclusivamente dessa enzima. Entretanto, HERNANDEZ, GILLETTE & MAZEL (1967) haviam indicado a NADPH-citocromo c redutase como uma das enzimas responsáveis pela atividade azo-redutásica. Sõ podemos atribuir as discrepâncias entre os resultados dêsses autores e os nossos aos diferentes substratos utilizados.

Como se pode verificar pela Tabela V há uma inibição da atividade azo-redutásica de 50% para 1 mM KCN e de 90% para 3 mM KCN.

PHILLIPS & LANGDON (1962) e WILLIAMS & KAMIN (1962) mostraram que a NADPH-citocromo c redutase não é inibida por KCN o que confirmamos em nossas preparações, não só dosando a atividade NADPH-citocromo c redutásica em presença de KCN (vide Métodos), bem como pela verificação de que não havia inibição dessa atividade no ensaio em que a atividade azo-redutásica estava inibida por KCN.

Portanto, o efeito da adição de KCN, bloqueando a atividade azo-redutásica, deve ser em algum ponto da via de transporte de elétrons posterior à NADPH-citocromo c redutase.

OSHINO, IMAI & SATO (1966), comparando a des saturação de ácidos graxos com a hidroxilação de anilina, verificaram uma série de dados muito interessantes:

(a) a hidroxilação de anilina é dependente de NADPH e o citocromo P-450 certamente está envolvido nessa reação pois ela é inibida por CO e por isocianeto de etila. A hidroxilação de anilina não é inibida por KCN. Pelo uso de um anti-sôro preparado contra a NADPH-citocromo c redutase de microsossomos de rato foi possível inibir a reação de hidroxilação de anilina nesses microsossomos (OMURA, 1969), evidenciando a participação dessa enzima na reação.

(b) a dessaturação de esteáril-CoA é dependente de NADH ou de NADPH indiferentemente; não é inibida por CO quer com NADH ou com NADPH como doadores de elétrons e o mesmo acontece com isocianeto de etila.

(c) comparando o efeito inibidor de menadiona sobre a dessaturação dependente de NADPH com o efeito inibidor sobre a hidroxilação de anilina, os autores concluem que a mesma flavoproteína específica para NADPH age em ambos os casos. Já na dessaturação dependente de NADH o efeito inibidor da menadiona é insignificante.

(d) ambas as reações de dessaturação, tanto a dependente de NADH como a de NADPH, são completamente inibidas por cianeto na concentração de 1 mM.

Em face dos fatos acima expostos OSHINO, IMAI & SATO (1966) concluíram que a dessaturação de ácidos graxos é um processo dependente de NADH ou NADPH, com consumo de oxigênio e que provavelmente não depende de citocromo P-450, postulando a existência de um fator sensível a cianeto.

HOLLOWAY & WAKIL (1970) verificaram que a dessaturação de estearil-CoA, dependente de NADH, podia ser solubilizada pelo uso de DOC e demonstraram que essa via era composta pela NADH-citocromo b_5 redutase, pelo citocromo b_5 e pela enzima "dessaturase", que provavelmente continha o fator sensível a cianeto de OSHINO, IMAI & SATO (1966).

Porém GAYLOR, MOIR, SEIFREID, JEFCOATE (1970) isolaram de microsossomos de fígado de ratos uma proteína que chamaram de proteína de ligação com cianeto que pelas características espectrais assemelha-se ao citocromo P-450.

Foi possível a estes autores separarem essa proteína dos citocromos b_5 e P-450 por tratamento com Nagarse e solubilização com DOC, a qual exibia uma constante de associação com cianeto de 0,5 mM.

Pelo ensaio das atividades de metil-esterol oxidase e de estearil-CoA dessaturase (ambas inibidas por cianeto) foi possível a estes autores indicar uma correlação entre o fator sensível a cianeto e a proteína de ligação com cianeto.

Infelizmente, como referem os autores, esta proteína exibe uma extrema labilidade, tendo uma vida média (medida espectralmente) de cerca de 3 horas.

Os fatos apontados acima apresentam uma série de semelhanças com os dados obtidos para a azo-redutase de microsossomos de fígado.

A azo-redutase é inibida por cianeto em concentrações similares às reportadas para a dessaturação de estearil-CoA e não é inibida por monóxido de carbono, exibindo também uma extrema labilidade comprovada nos tratamentos com DOC, lipase ou Nagarse.

A estequiometria da reação de redução da ligação azo do DAB revelou uma relação de 3 para 1 entre o NADPH consumido e DAB reduzido (Tabela IV).

Teoricamente o esperado para reduzir a ligação azo seria uma relação de 2 para 1. Duas são as possibilidades para explicar este resultado:

(a) apenas 2 NADPH seriam utilizados na reação de redução do DAB e o outro seria gasto em reações desconhecidas;

(b) apesar das medidas terem sido feitas em anaerobiose, as reações de hidroxilação da anilina formada e de demetilação do DAB podem ter ocorrido simultaneamente, levando a um aumento do NADPH consumido, o que é muito pouco provável porque em vista dessa possibilidade as condições de anaerobiose foram rigorosamente controladas.

Nossos resultados não permitem saber qual o destino do par de elétrons excedente. É interessante lembrar, entretanto, que COHEN & ESTABROOK (1971) estudando a demetilação de aminopirina encontraram uma estequiometria igualmente discrepante e comprovaram a participação do citocromo b₅ nas reações de oxidação de função mista como aceptor dos elétrons excedentes na estequiometria da reação (COHEN & ESTABROOK, 1971a e 1971b; HILDEBRANDT & ESTABROOK, 1971).

A análise do efeito da temperatura sobre a reação da azo-redutase mostra que há uma temperatura de transição em torno de 22°C, havendo uma variação considerável na energia de ativação do sistema acima desta temperatura. Tratando-se de um sistema complexo como o que é estudado, não só do ponto de

vista estrutural, como pela falta de conhecimento exato dos seus constituintes, fica realmente difícil interpretar possíveis alterações conformacionais face a um número desconhecido de variáveis existentes.

A inibição por mersalil da atividade azo-redutásica sugere a existência de grupos SH na reação. O valor obtido para 50% de inibição é próximo do valor obtido por FRANKLIN & ESTABROOK (1971) para a reação de demetilação de etilmorfina. A verificação de que a redução do citocromo P-450 ao término da reação da azo-redutase (em presença de 35 nMoles de mersalil por mg de proteína) também estava 50% inibida, enquanto a redução do citocromo b_5 estaria 50% inibida em concentrações superiores (42 nMoles/ml -FRANKLIN & ESTABROOK, 1971) sugere a participação do citocromo P-450, entendido como uma ou mais formas desse citocromo na reação da azo-redutase.

A inibição da atividade azo-redutásica por anilina não revelou um padrão de inibição competitiva, o que se ria de se esperar se o mesmo citocromo P-450 estivesse envolvido na reação. Na possibilidade de tal hipótese ser uma realidade de esta discrepância fica esclarecida quando se compara o $K_{m_{ap}}$ para a hidroxilação da anilina, 40 μ M, (SCHENCKMAN, BALL & ESTABROOK, 1967) com o $K_{m_{ap}}$ para a redução do DAB, 19,4 μ M.

O resultado mais sugestivo para a participação do citocromo P-450 na atividade azo-redutásica foi obtido após o tratamento dos ratos com 3-MC indicando uma indução da

atividade azo-redutásica paralela à indução do citocromo P-450 (Tabela VIII). Esses resultados ampliam os de CONNEY, MILLER & MILLER (1956) e os de von der DECKEN & HULTIN (1960), que verificaram um aumento da atividade azo-redutásica em microssomos pelo tratamento de ratos com 3-MC.

Verifica-se pelos espectros obtidos com subpartículas de microssomos que o citocromo P-450 induzido pelo tratamento com 3-MC (Fig. 8) corresponde ao citocromo P-450 tipo II (JEFCOATE & GAYLOR, 1969). Isto sugere fortemente a possibilidade de que a atividade azo-redutásica dependa desta forma de citocromo P-450.

Os resultados obtidos, quando foi medida a reação de hidroxilação de anilina, tipicamente um substrato do tipo II, obtendo-se a máxima atividade de hidroxilação com microssomos de fígados de ratos tratados com 3-MC (Tabela XI), vêm reforçar essa indicação. Ao mesmo tempo, se considerados juntamente com os resultados da cromatografia dos produtos das reações de azo-redução e hidroxilação de anilina, vêm mostrar que o citocromo P-450 era funcionalmente ativo em nossas preparações.

O tratamento dos animais com PB, que induz um aumento do citocromo P-450 do tipo I, (SLADEK & MANNERING, 1969) não induz nenhuma alteração sobre a atividade azo-redutásica (Tabela IX). O espectro absoluto obtido para o citocromo P-450 com partículas obtidas por tratamento com Nāgar-se de mi-

crossomos após pré-tratamento com PB, corresponde aos espectros apresentados por JEFEOATE & GAYLOR (1969) e por NISHIBAYASHI & SATO (1968).

O tratamento dos ratos com DAB demonstrou que DAB não funciona como substância indutora da atividade azo-redutásica e que ao contrário houve uma marcada inibição da azo-reductase, e esta inibição foi específica (Tabela X). O aumento observado nos níveis do citocromo b_5 paralelamente à inibição da atividade azo-redutásica sugerem que esse citocromo não participa da reação. Por outro lado, o aumento dos níveis do citocromo b_5 , provavelmente, corresponde à proliferação do retículo endoplasmático. KURIYAMA, OMURA, SIEKEVITZ & PALADE (1969) mostraram que o aumento nos níveis de citocromo b_5 , durante o tratamento de ratos com PB, corresponde à proliferação do retículo endoplasmático e é devido à diminuição da velocidade de degradação desse citocromo. O resultado desses autores sugere uma explicação para os nossos resultados obtidos com o tratamento com DAB.

O tipo de espectro obtido (Fig. 9) com partículas de microssomos de ratos pré-tratados com DAB, semelhante ao obtido para o citocromo P-450, tipo I, ao lado da constatação de que durante o tratamento com DAB não houve variação nos níveis de citocromo P-450, leva à especulação sobre a possibilidade de ter havido uma inibição de um terceiro composto, não identificado, que participaria da atividade azo-redutásica.

Por outro lado, o efeito inibidor do tratamento com DAB sobre a azo-redutase vem fornecer mais uma indicação sobre o efeito carcinogênico deste composto.

MILLER & MILLER (1953) mostraram que o efeito carcinogênico do DAB é menor que o do N-monometil p-amino-azobenzeno (MAB) e seus estudos pela análise dos produtos do metabolismo de azo-corantes "in vivo" sugerem que a reação de demetilação precede a reação de clivagem da ligação azo.

WU & SMUCKLER (1969) em um sistema "in vitro", usando microsossomos em um meio de reação muito semelhante ao usado neste trabalho, mostraram que a reação de demetilação é muito mais lenta que a de redução.

Reunindo estes dados, surge a possibilidade de que o efeito carcinogênico do DAB se manifeste graças à inibição da azo-redutase permitindo o acúmulo de N-monometil p-amino-azobenzeno ou de seus derivados que exibiriam o efeito carcinogênico.

Analisando o espectro obtido em subpartículas de microsossomos de fígados de ratos pré-tratados com DAB, verifica-se que o citocromo P-450 mostra espectralmente um padrão que se aproxima muito do citocromo P-450 tipo I cujo aumento foi induzido pelo pré-tratamento com PB.

Se a inibição da azo-redutase ocorresse pela inibição da síntese do citocromo P-450 tipo II, este efeito seria explicável, juntamente com o resultado espectral obtido, desde que existissem ao lado de mecanismos de indução seletiva (SLADEK & MANNERING, 1969), mecanismos de inibição seletiva.

Os resultados totalmente negativos obtidos nas tentativas de fracionamento dos microsossomos com DOC mostram que a labilidade da atividade azo-redutásica deve ser maior que outras atividades de oxidases de função mista já obtidas em frações dos microsossomos como o que foi descrito por LU, JUNK & COON (1969).

Entretanto, se considerarmos as semelhanças da atividade azo-redutásica com a dessaturação de ácidos graxos e a existência de um novo tipo de citocromo "P-450" descrito por GAYLOR, MOIR, SEIFREID & JEFEOATE (1970), extremamente lábil, teremos uma explicação para o nosso insucesso.

Recentemente LU, KUNTZMAN, WEST & CONNEY (1971) publicaram uma nova modificação do método de fracionamento dos microsossomos usando DOC e que chegou a nossas mãos quando este trabalho já estava sendo redigido.

O novo método preconizado emprega a desintegração dos microsossomos por ultra-som, e a concentração final de DOC é muito menor que a do método de LU, JUNK & COON (1969) e portanto poderá vir a ser uma preciosa indicação de como fracio

nar o sistema da azo-redutase no prosseguimento dêsse trabalho.

Em resumo, as evidências obtidas nesse trabalho indicam com bastante probabilidade que o citocromo P-450 está envolvido na redução do DAB mas não afastam definitivamente a possibilidade da participação do citocromo b_5 neste processo.

De qualquer forma, foi possível demonstrar uma reação em microsossomos que apresenta uma característica até agora não relatada, qual seja, a redução de um composto exógeno totalmente independente de oxigênio que provávelmente utiliza enzimas de oxidação de função mista.

Essa reação tem como características interessantes o fato de ser altamente específica e ser inibida por KCN.

O estudo dessa reação levantou a possibilidade da participação de substâncias ainda não identificadas nos processos de transporte de elétrons no retículo endoplasmático.

5. RESUMO E PERSPECTIVAS

Verificou-se que microsossomos de fígado apresentam uma atividade azo-redutásica completamente dependente de NADPH, usando DAB como substrato.

Ao contrário de outros sistemas já descritos, a atividade azo-redutásica não pode ser identificada com a NADPH-citocromo c redutase, embora nossos resultados indiquem que esta enzima participa da reação.

Não se pode excluir definitivamente a participação do citocromo b_5 apesar de uma série de observações afastando essa possibilidade.

Verificou-se que a atividade azo-redutásica pode ser induzida por tratamento com 3-MC, paralelamente à indução do citocromo P-450 tipo II. Isto sugere fortemente a participação desse citocromo na reação apesar desta não ser inibida por CO.

O citocromo P-450 induzido por tratamento com 3-MC era funcionalmente ativo.

A atividade azo-redutásica foi inibida especificamente pelo tratamento oral com DAB, possibilitando a formulação de uma hipótese sobre a ação carcinogênica deste composto.

Uma série de resultados mostra que a azo-redutase estudada é altamente específica podendo ser inibida por KCN e por mersalil.

Face aos fatos expostos acima, as perspectivas do sistema parecem muito interessantes.

A possibilidade do uso de novos métodos de fracionamento dos microsossomos pode levar à resolução do sistema da azo-redutase.

As semelhanças com a dessaturação de ácidos graxos, aliadas às indicações da existência de um novo tipo de citocromo P-450 que se combina com KCN, permitem descortinar maior amplitude para os limites do sistema da azo-redutase.

Enfim, trata-se de uma reação de redução de um composto exógeno, com características até agora não relatadas, envolvendo processos biológicos de importância e cujo estudo terã prosseguimento.

6. BIBLIOGRAFIA

1. APPLEBY, C.A. (1969) Biochim. Biophys. Acta: 172, 71
2. APPLEBY, C.A. (1969a) Biochim. Biophys. Acta: 172, 88
3. ALVARES, A.P., SCHILLING, G., LEVIN, W. & KUNTZMAN, R.
(1967) Biochem. Biophys. Res. Commun.: 29, 521
4. BANG, B.G. & BANG, F.B. (1957). J. Ultrastruct. Res.:
1, 138
5. BERGMAYER, H.C. (1963) in Methods of Enzymatic Analysis
p. 1030, Verlag-Chemie-Acad. Press, New York
6. CHANCE, B. & WILLIAMS, G.R. (1954) J. Biol. Chem.: 209,
945
7. CHANCE, B. & WILLIAMS, G.R. (1955) J. Biol. Chem.: 217,
395
8. CLAUDE, A. (1943) Science : 97, 451
9. COHEN, B.S. & ESTABROOK, R.W. (1971) Arch. Biochem.
Biophys. : 143, 37
10. COHEN, B.S. & ESTABROOK, R.W. (1971a) Arch. Biochem.
Biophys. 143, 46
11. COHEN, B.S. & ESTABROOK, R.W. (1971b) Arch. Biochem.
Biophys. : 143, 54
12. CONNEY, A.H. (1967) Pharmacol. Rev. : 19, 317
13. CONNEY, A.H., MILLER, E.C. & MILLER, J.A. (1956) Cancer
Res. : 16, 450
14. COOPER, D.Y., LEVIN, S., NARASIMHULU, S., ROSENTHAL, O.
& ESTABROOK, R.W. (1965) Science : 147, 400

15. DALLNER, G. (1963) Acta Pathol. et Microbiol. Scand.:
(suppl) 166
16. von der DECKEN, A. & HULTIN, T. (1960) Arch. Biochem.
Biophys.: 90, 201
17. DUS, K., KATAGIRI, M., YU, C.A., ERBES, D.L. & GUNSALUS,
I.C. (1970) Biochem. Biophys. Res. Commun.:
40, 1423
18. ELSON, L.A. & WARREN, F.L. (1944) Biochem. J.: 38, 217
19. ERNSTER, L. & ORRENIUS, S. (1965) Fed. Proc.: 24, 1190
20. ESTABROOK, R.W., COOPER, D.Y. & ROSENTHAL, O. (1963)
Biochem. Z.: 338, 741
21. FOUTS, J.R., KAMM, J.J. & BRODIE, B.B. (1957) J. Pharmacol.
Exptl. Therap. : 120, 291
22. FRANKLIN, M.E. & ESTABROOK, R.W. (1971) Arch. Biochem.
Biophys. : 143, 318
23. GARFINKEL, D. (1957) Arch. Biochem. Biophys.: 71, 100
24. GARFINKEL, D. (1957a) Arch. Biochem. Biophys. : 71, 111
25. GARFINKEL, D. (1958) Arch. Biochem. Biophys. : 77, 493
26. GAYLOR, J.L., MOIR, N.J., SEIFREID, H.J. & JEFFCOATE, C.R.E
(1970) J. Biol. Chem. : 245, 5511
27. GILLETTE, J.R. (1966) Advan. Pharmacol. : 4, 219
28. GILLETTE, J.R. & GRAM, T.E. (1969) in Microsomes and Drug
Oxidations p. 134, Acad. Press, New York
29. GRAM, T.E., ROGERS, L.A. & FOUTS, J.R. (1967) J. Pharmacol.
Exptl. Therap. : 155, 479
30. HERNANDEZ, P.H., GILLETTE, J.R. & MAZEL, P. (1967) Biochem
Pharmacol. : 16, 1859
31. HERNANDEZ, P.H., MAZEL, P. & GILLETTE, J.R. (1967) Biochem
Pharmacol. : 16, 1877

32. HILDEBRANDT, A. & ESTABROOK, R.W. (1971) Arch. Biochem. Biophys. : 143, 66
33. HILDEBRANDT, A., REMMER, H. & ESTABROOK, R.W. (1968) Biochem. Biophys. Res. Commun. : 30, 607
34. HOGEBOOM, G.H., SCHNEIDER, W.C. & PALADE, G.E. (1948) J. Biol. Chem. : 172, 619
35. HOGEBOOM, G.H. & SCHNEIDER, W.C. (1950) Nature : 166, 302
36. HOLLOWAY, P.W. & WAKIL, S.J. (1970) J. Biol. Chem. : 245, 1862
37. HOLTZMAN, J.L., GRAM, T.E., GIGON, P.L. & GILLETTE, J.R. (1968) Biochem. J. : 110, 407
38. HORIE, S., KINOSHITA, T. & SIMAZONO, J. (1966) J. Biochem. Tokyo : 60, 660
39. ICHIKAWA Y. & YAMANO, T. (1967) Biochim. Biophys. Acta : 147, 518
40. IMAI, Y. & SATO, R. (1966) Biochem. Biophys. Res. Commun.: 23, 5
41. JEFEOATE, C.R.E., GAYLOR, J.L. & CALABRESE, R.L. (1969) Biochemistry : 8, 3455
42. JEFEOATE, C.R.E. & GAYLOR, J.L. (1969) Biochemistry : 8, 3464
43. KAJIHARA, T. & HAGIHARA, B. (1967) in Symposium on Cytochromes : Structural and Chemical Aspects of cytochromes p. 297, University of Tokyo Press
44. KATO, R. & GILLETTE, J.R. (1965) J. Pharmacol. Exptl. Therap.: 150, 279
45. KEILIN, D. & HARTREE, E.F. (1940) Proc. Roy. Soc. B. : 129, 277
46. KIESE, M. (1965) Ann. N.Y. Acad. Sci. : 123, 141
47. KLINGENBERG, M. (1958) Arch. Biochem. Biophys. : 75, 376

48. KURIYAMA, Y. OMURA T., SIEKEVITZ, P. & PALADE, G.E.
(1969) J. Biol. Chem. : 244, 2017
49. LINEWEAVER, H. & BURK, D. (1934) J. Amer. Chem. Soc.:
56, 658
50. LOWRY, O.H., ROSEBROUGH, N.J., FARR, A.L. & RANDALL, R.J.
(1951) J. Biol. Chem. : 193, 265
51. LU, A.Y.H. & COON, M.J. (1968) J. Biol. Chem. : 243, 1331
52. LU, A.Y.H., JUNK, K.W. & COON, M.J. (1969) J. Biol. Chem.:
244, 3714
53. LU, A.Y.H., KUNTZMAN, R., WEST, S. & CONNEY, A.H. (1971)
Biochem. Biophys. Res. Commun. 42, 1200
54. MAHLER, H.R., RAW, I., MOLINARI, R. & AMARAL, D.F. (1958)
J. Biol. Chem. : 233, 230
55. MARGOLIASH, E., FROHWIRT, N. & WIENER, E. (1959) Biochem.
71, 570
56. MASON, H.S. (1957) Advan. Enzymol. : 19, 79
57. MASON, H.S., NORTH, J.C. & VANNESTE, M. (1965) Fed. Proc.,
24, 1172
58. MILLER, J.A. & MILLER, E.C. (1953) Advan. Cancer Res.:
1, 340
59. MITOMA, C., POSNER, H.S., REITZ, H.C. & UDENFRIEND, S.
(1956) Arch. Biochem. Biophys.: 61, 431
60. MUELLER, G.C. & MILLER, J.A. (1950) J. Biol. Chem. :
185, 145
61. NISHIBAYASHI, H. & SATO, R. (1967) J. Biochem., Tokyo :
61, 491
62. NISHIBAYASHI, H. & SATO, R. (1968) J. Biochem., Tokyo :
63, 766
63. NÖBREGA, F.G. (1965) resultados não publicados

64. NÖBREGA, F.G., ARAUJO, P.S., PASETTO, M. & RAW, I.(1969)
Biochem. J. : 115, 849
65. OSHINO, N., IMAI, Y. & SATO, R. (1966) Biochim. Biophys.
Acta. : 128, 13
66. OMURA, T. (1969) in Microsomes and Drug Oxidations p.161,
Acad. Press, New York
67. OMURA, T. & SATO, R. (1962) J. Biol. Chem. : 237, 1375
68. OMURA, T. & SATO, R. (1964) J. Biol. Chem. : 239, 2370
69. OMURA, T. & SATO, R. (1964a) J. Biol. Chem. : 239, 2379
70. OMURA, T., SATO, R., COOPER, D.Y., ROSENTHAL, O. &
ESTABROOK, R.W. (1965) Fed. Proc. : 24, 1181
71. OMURA, T., SIEKEVITZ, P. & PALADE, G.E. (1967) J. Biol.
Chem. : 242, 2389
72. ORRENIUS, S. & ERNSTER, L. (1964) Biochem. Biophys, Res.
Commun. : 16, 60
73. PALADE, G.E. (1956) J. Biophys. Biochem. Cytol. :(suppl)
2, 85
74. PALADE, G.E. & SIEKEVITZ, P. (1956) J. Biophys. Biochem.
Cytol. : 2, 171
75. PAPPENHEIMER, A.M. & WILLIAMS, C.M. (1954) J. Biol. Chem.:
209, 915
76. PETERS, M.A. & FOUTS, J.R. (1970) Biochem. Pharmacol. :
19, 533
77. PHILLIPS, A.H. & LANGDON, R.G. (1962) J. Biol. Chem.:
237, 2652
78. POLTORATSKY-BOIS, R. & CHAIX, P. (1964) Bull. Soc. Chim.
Biol., Paris : 46, 867
79. PORTER, K. & BLUM, J. (1953) Anat. Rec. : 117, 685
80. RANDERATH, K. (1966) in Thin Layer Chromatography p. 106,
Verlag-Chemie-Acad. Press, New York

81. RAW, I. & MAHLER, H.R. (1959) J. Biol. Chem. : 234, 1867
82. RAW, I., MOLINARI, R., AMARAL, D.F. & MAHLER, H.R. (1958)
J. Biol. Chem. : 233, 225
83. RUBIN, E., GANG, H. & LIEBER, C.S. (1971) Biochem. Biophys.
Res. Commun. : 42, 1
84. SARGENT, J.R. & VADLAMUDI, B.P. (1968) Biochem. J. : 107,
839
85. SASAME, H.A. & GILLETTE, J.R. (1970) Arch. Biochem.
Biophys. : 140, 113
86. SATO, R., NISHIBAYASHI, H. & ITO, A. (1969) in Microsomes
and Drug Oxidations p. 111, Acad. Press, New York
87. SATO, R., OMURA, T. & NISHIBAYASHI, H. (1965) in Oxidases
and Related Redox Systems vol. 2, p. 861, J. Wiley,
New York
88. SCHENCKMAN, J.B., BALL, J.A. & ESTABROOK, R.W. (1967) Biochem.
Pharmacol. : 16, 1071
89. SCHENCKMAN, J.B. (1970) Biochemistry : 9, 2081
90. SLADEK, N.E. & MANNERING, G.J. (1966) Biochem. Biophys. Res.
Commun. : 24, 668
91. SLADEK, N.E. & MANNERING, G.J. (1969) Mol. Pharmacol. : 5,
186
92. SLATER, E.C. (1949) Biochem. J. : 45, 1
93. SOTTOCASA, G.L., KUILENSTIERNA, B., ERNSTER, L. & BERGSTRAND
A. (1967) J. Cell. Biol. : 32, 415
94. STEVENSON, E.S., DOBRINER, K. & RHOADS, C.P. (1942) Cancer
Res. : 2, 160
95. STRITTMATTER, C.F. & BALL, E.G. (1952) Proc. Nat. Acad. Sci.
U.S. : 38, 19

96. STRITTMATTER, C.F. & BALL, E.G. (1954) J. Cellular Comp. Physiol. : 43, 57
97. STRITTMATTER, P. (1963) in The Enzymes, vol. 8, p. 113, 2nd. ed. Acad. Press, New York
98. STRITTMATTER, P. (1967) in Methods in Enzymology, vol.10, p. 561, Acad. Press, New York
99. STRITTMATTER, P. & OZOLS, J. (1966) J. Biol. Chem. : 241, 4787
100. STRITTMATTER, P. & VELICK, S.F. (1956) J. Biol. Chem.: 221, 253
101. STRITTMATTER, P. & VELICK, S.F. (1956a) J. Biol. Chem.: 221, 277
102. STRITTMATTER, P. & Velick, S.F. (1957) J. Biol. Chem.: 228, 785
103. STROBEL, H.W., LU, A.Y.H., HEIDEMA, J. & COON, M.J. (1970) J. Biol. Chem. : 245, 4851
104. TOSCANO, V.G. (1970) comunicação pessoal
105. TOSCANO, V.G. (1971) comunicação pessoal
106. TRÉFONEL, J., TRÉFONEL, Mme. J., NITTI, F. & BOVET, D. (1935) Compt. Rend. Soc. Biol. : 120, 765
107. VANCE, D.E. & SWEeley, C.C. (1967) J. Lipid Res. : 8, 622
108. VELICK, S.F. & STRITTMATTER, P. (1956) J. Biol. Chem.: 221, 265
109. WADA, F., HIGASHI, T., ICHIKAWA, Y., TADA, K. & SAKAMOTO, Y. (1964) Biochim. Biophys. Acta : 88, 654
110. WILLIAMS, C.H. & KAMIN, H. (1962) J. Biol. Chem.: 237, 587
111. WU, S-Y. & SMUCKLER, E.A. (1969) in Microsomes and Drug Oxidations p. 189, Acad. Press, New York

- 112. YOCHIKAWA. H. (1951) J. Biochem., Tokyo: 38, 1
- 113. YU, C-A. & GUNSALUS, I.C. (1970) Biochem. Biophys.
Res. Commun. : 40, 1431