**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PSICOLOGIA**

**MANUTENÇÃO DE RESPOSTAS DE
OBSERVAÇÃO EM POMBOS**

GERSON YUKIO TOMANARI

Trabalho apresentado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo como parte dos requisitos para a obtenção do grau de doutor em Psicologia.

Área de Concentração: *Psicologia Experimental*

Orientadoras:

Dra. Ligia Maria de C. M. Machado

Dra. Maria Amélia Matos

**SÃO PAULO
1997**

Você já se viu procurando a que/quem agradecer pela ocorrência de um fato muito especial na sua vida?

Pois é assim que eu tenho estado ultimamente...

Não sei a que/quem me dirigir para dizer MUITO OBRIGADO pela oportunidade que me foi dada de conviver com a Lígia. Ter aprendido tantas e tantas coisas com ela... Assuntos acadêmicos, assuntos de VIDA, assuntos de morte.

Em uma relação de muito carinho, dedicação, respeito, competência, foi a Lígia quem semeou e cultivou a Análise do Comportamento em mim. Quanto a isso, sei bem que é a ela quem devo agradecer.

Este trabalho, quero dedicá-lo totalmente à sua memória, Lígia. Nele, tem um pouco do que você me ensinou.

Agradecimentos

Eu gostaria de fazer um agradecimento às pessoas que me apoiaram -- das mais diversas formas -- durante a realização deste trabalho.

À Silvia, que é minha esposa, que é mãe do meu filho, que estou louco para conhecer.

A meus pais, Geny e Takayuki, e a minha irmã, Giani, pelo força incondicional.

À Maria Amélia, por ter aceitado me acompanhar neste trabalho.

Aos amigos, por estarem dividindo comigo os momentos fáceis e difíceis da vida. Um obrigado muito especial para a Lígia Amaral, para a Lurdinha, para a Kátia, para a Elói, para o Flávio, para a Maria Teresa Araújo, para o David Eckerman, para o Sérgio Cirino.

Ao Altair, pela dedicada coleta de dados.

Ao William Dube, por estar me recebendo no E. K. Shriver Center, dedicando o seu tempo em trabalhos conjuntos e oferecendo a oportunidade de me desenvolver como pesquisador.

Ao Murray Sidman, pelos seus valiosos comentários sobre este trabalho.

Aos órgãos que financiaram e possibilitaram a sua realização,

a FAPESP (95/6752-4), sob a forma de bolsa de doutorado no país;

e o CNPq (20.0552/96-1), sob a forma de bolsa de doutorado sanduíche no exterior.

ÍNDICE

Resumo.....	5
Abstract.....	6
Zusammenfassung.....	7

Introdução Geral.....	8
-----------------------	---

Experimento 1

Introdução.....	23
Método.....	25
Resultados.....	30
Discussão.....	71

Experimento 2

Introdução.....	82
Método.....	84
Resultados.....	87
Discussão.....	102

Discussão Geral.....	110
----------------------	-----

Referências.....	125
------------------	-----

Anexos

1 - Respostas de observação em diferentes espécies de sujeitos....	132
2 - Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza.....	139
3 - Complemento da Figura 3-1.....	143
4 - Complemento da Figura 4-1.....	144
5 - Complemento da Figura 7 - Painei A.....	145
6 - Tabelas de dados brutos - Experimento 1.....	146
7 - Tabelas de dados brutos - Experimento 2.....	149

Tomanari, G. Y. (1997). Manutenção de respostas de observação em pombos. *Tese de Doutorado apresentada no Instituto de Psicologia -USP*. 153 páginas.

Resumo

O objetivo geral da presente investigação foi avaliar o valor reforçador condicionado de estímulos sinalizadores de reforçamento (S+) e extinção (S-) na manutenção de respostas de observação em pombos. O procedimento básico dos dois experimentos que formam esta investigação submeteu pombos privados de comida a sessões compostas por tentativas discretas separadas por intervalos entre tentativas. Apresentadas em seqüência aleatória, metade das tentativas terminava com a apresentação de comida independentemente de qualquer resposta do sujeito e metade sem. Sinalizando o início das tentativas, o único disco de respostas disponível na caixa operante era iluminado pela cor branca. Durante uma tentativa, respostas ao disco branco podiam torná-lo vermelho ou verde dependendo do tipo da tentativa em vigor. Em linha de base, uma resposta, em intervalo variável, produzia a alteração na cor do disco até o final da tentativa. As condições experimentais, inseridas entre duas condições de linha de base, eram diferentes para cada experimento. No Experimento 1, a produção de uma das cores, ora a vermelha ora a verde, era contingente à emissão de 15 ou 24 respostas, adicionalmente às exigências de linha de base. Os resultados mostraram, basicamente, que o comportamento dos pombos se ajustou às exigências da condição experimental para a produção de ambas as cores do disco. Todavia, a cor associada às tentativas que terminavam sem a apresentação do comedouro foi freqüentemente mais produzida. No Experimento 2, as exigências para a alteração na cor do disco foram mantidas sempre como em linha de base. Entretanto, na condição experimental, o tempo máximo de permanência das cores verde ou vermelha no disco de respostas passou a ser de 10 s por apresentação. Passado este tempo, a cor branca retornava ao disco de respostas e as exigências para a produção das cores verde ou vermelha eram reestabelecidas. Deste modo, em uma mesma tentativas, era possível ocorrer uma ou mais apresentações do estímulo sinalizador. Os resultados do Experimento 2 revelaram que a freqüência de reapresentações da cor associada às tentativas que terminavam sem a apresentação do comedouro era maior do que a cor alternativa. O conjunto geral dos resultados da presente investigação parece indicar que S-, no procedimento empregado, atuou como um estímulo reforçador condicionado na manutenção de respostas de observação. Diferindo de estudos prévios em respostas de observação com pombos, estes resultados mostram que, as variáveis envolvidas no processo de reforçamento condicionado são ainda parcialmente conhecidas. Portanto, conclusões sobre o valor reforçador condicionado de estímulos sinalizadores devem, no momento, ser relativizadas.

Tomanari, G. Y. (1997). Maintenance of observing responses in pigeons. *Doctoral Dissertation presented at the Instituto de Psicologia -USP*. 153 pages.

Abstract

The present investigation assessed the conditioned reinforcing value of stimuli that signal reinforcement (S+) and extinction (S-) in the maintenance of pigeons' observing responses. In the basic procedure employed in the two experiments of this investigation, food-deprived pigeons were given a series of discrete trials. Half of the trials ended with response-independent food presentation and half without food presentation; the sequence of food and no-food trials was random. At the beginning of each trial, the single response key available in the operant chamber was illuminated with white light. During the trial, pecking the key could change key color from white to red or green, according to whether the current trial was scheduled to end with food or no food. Thus, pecking the white key functioned as an observing response because it produced signaling stimuli (the red and green key colors). In baseline conditions, pecking the white key produced color change on a variable-interval schedule; once changed, keys remained either red or green until the end of the trial. Baseline and experimental conditions alternated, and the experimental conditions differed in the two experiments: In Experiment 1, red or green presentations were contingent upon 15 or 24 pecks in addition to the variable-interval requirement. Results showed that pigeons' observing behavior adjusted to the experimental condition requirements so that both key colors were produced. The S- key color was produced more often than the S+ color. In Experiment 2, the variable-interval requirements to produce key-color changes were the same in baseline and experimental conditions. However, in the experimental condition, the duration of each green or red illumination was limited to a maximum of 10 s. The white light resumed after 10 s, and the key-color change could be repeated within the same trial (if the subject again met the variable-interval schedule requirement). Results showed that the frequency of re-presentation of the S- color was higher than that of the S+ color. The results of both experiments suggest that S- may function as conditioned reinforcer, at least in the present procedure. These results diverge from the data in the existing literature with pigeons, and they indicate that the variables that control pigeons' observing responses are only partially known at present. Therefore, current conclusions about the reinforcing value of signaling stimuli should be qualified.

Zusammenfassung

Das Ziel der vorhandenen Forschung war der konditionierten verstärkern Wert der Reize die Korrelation mit Verstärkung (S+) und Löschung (S-) für die Aufrechterhalten die Taubens Reaktionen der Beobachtung zu überprüfung. Es wurde zwei Experimente gemacht, die haben benachteiligte Tauben benutzt. Das Grundverfahren benutzte Proben die mit Interproben-Abstand gesondert wuden. Unabhängig an der Taube Verhalten beendete Hälfte der Proben mit Futter und Häfte ohne ($p=0,5$). Wann eine Probe angefangt hat, war der Knopf, wo die Taube hacken konnte, Weiss. Während einer Probe würden die Küßchen der Taube die Farbe dem Knopf von Weiss zu Rot oder grün abhängig von den Art der Probe wechseln. In Grundphase war eine Küßchen die Farbe dem Knopf bis das Ende der Probe in variable Abständen gewechselt. Experimentelle Phasen waren zwischen zwei Grundphasen geschehente und sie waren verschieden in der zwei Experimente. In der Experiment 1 hängt die Vorlage der roten oder grünen Farben davon ab, daß die Tauben 15 oder 24 Küßchen außer der Bedarf der GrundPhase gegeben haben (in zwei verschiedene Phasen). In der Experiment 2 war das Wechseln die Farbe wie die Grundphase geblieben. Aber jeder Vorlage der roten oder grünen Farbe war nicht länger als 10 sekunden. Deshalb konnte ein Reiz zweimal oder mehr in einer gleichen Probe präsentieren werden. Das Hauptresultat der Experiment 1 hat gezeigt daß, das Verhalten der Beobachtung der Tauben auf das Erfordernis der experimentelle Phase eingestellt war. In dieser Phase wurden beide S+ und S- hervorgeholt obwohl die Häufigkeit des Hervorholen der S- höher war. Ähnlich hat das Hauptresultat der Experiment 2 auch gezeigt daß, die Häufigkeit des Hervorholen der S- (außer dem ersten Hervorholen) auch höher war. Diese Forschung zeigt Daten die verschiedene vom Informationsmaterial sind. In dem vorhandenen Verfahren sieht es aus, daß S- war ein konditionierter verstärkender Reiz, die Reaktionen der Beobachtung aufrechterhalten konnte. In Experimente 1 und 2 war S- ein stärkerer verstärkerender Reiz als S+. Die Variable, daß die Reaktionen der Beobachtung der Tauben kontrollieren, nur zum Teil gewissen sind. Deshalb kann man im Moment nicht zu weiterem Schluß an dem konditionierten Wert des S- kommen.

Em 1952, Wyckoff demonstrou experimentalmente que, dada a oportunidade, animais emitem respostas que produzem estímulos sinalizadores dos esquemas de reforçamento em vigor (Wyckoff, 1952). Wyckoff pretendia estudar como respostas que permitem a orientação do organismo em relação a estímulos -- respostas de observação -- são adquiridas, ao longo do estabelecimento de uma discriminação.

No procedimento pioneiro de Wyckoff (1952, 1969), pombos eram expostos a esquemas em que se alternavam componentes em que ocorria reforçamento (FI 30 s) e componentes em que não havia reforçamento (Extinção). Um pedal próximo aos discos era o manipulando que, se acionado, produzia a apresentação dos estímulos relacionados aos componentes em vigor. Os dados de Wyckoff mostraram que os pombos mantinham o pedal pressionado por mais tempo quando o estímulo produzido se correlacionava com reforçamento do que com ausência de reforçamento. A resposta que produzia os estímulos foi chamada de resposta de observação porque colocava o sujeito em contato com os estímulos discriminativos, permitindo que ele pudesse observar tais estímulos.

A resposta de observação desempenha papel importante em qualquer situação na qual se exige que o sujeito se comporte sob controle de estímulos. Vários procedimentos experimentais são planejados de forma tal que uma resposta a um estímulo é exigida apenas para garantir que o sujeito olhe para ou ouça o estímulo (Dinsmoor, 1995a, 1995b; Sidman, 1994). Este é o caso, por exemplo, do procedimento de escolha de acordo com o modelo, em que pombos devem bicar o disco onde o modelo é apresentado antes que os estímulos de comparação sejam apresentados (Cumminge e Berryman, 1961; Ferster, 1960).

Uma característica importante em relação às respostas de observação é o fato de que elas não alteram a programação de reforços atribuída a respostas na

chave de reforçamento principal. Sua única consequência é a produção de estímulos sinalizadores. Em função disto, o procedimento foi eleito como a "melhor técnica disponível para demonstrar a legitimidade e a importância do próprio conceito de reforçamento secundário ou condicionado" (Dinsmoor, 1983, pag.696).

Basicamente, três diferentes tipos de procedimentos de respostas de observação têm sido empregados pelos estudos na área. Diferentes espécies de sujeitos foram submetidas a estes procedimentos que, de modo geral, podem ser agrupados de acordo com o número de manipulandos usados e a função designada a cada um deles.

Um dos procedimentos utiliza apenas uma chave de respostas. Nele, os sujeitos são submetidos a tentativas discretas que, em igual probabilidade, podem ou não terminar com apresentação de comida independentemente de qualquer resposta. Respostas ao único manipulando disponível na caixa operante podem produzir estímulos discriminativos correlacionados com o tipo de tentativa em vigor. Este procedimento foi utilizado por Blanchard (1975), Kendall (1973, 1973b) e Tomanari (1995)¹ com pombos; Tomanari (1996)² com ratos e Schrier e col. (1980) com macacos.

Um segundo tipo de procedimento que tem sido utilizado para se estudar respostas de observação é, basicamente, aquele descrito originalmente por Wyckoff (1952). Neste procedimento, são utilizados dois manipulandos. Inicialmente, o sujeito é submetido a uma situação de discriminação de contingências sob controle de estímulos. Para isso, utiliza-se um esquema

¹ Dissertação de mestrado apresentada em congresso:

Tomanari, G. Y. e Machado, L.M.C.M. (1995). Observing responses: maintained by conditioned reinforcer or informative stimulus. *Annual Meeting of the Association for Behavior Analysis*. Washington, DC.

² Tomanari, G. Y. e Machado, L.M.C.M. (1996). Observing responses in rats: effects of different contingencies of reinforcement. *Annual Meeting of the Association for Behavior Analysis*. São Francisco.

múltiplo, em que vigoram dois componentes de esquemas distintos, diferentemente sinalizados. Em um dos manipulandos, programam-se alterações aleatórias de ambos os componentes; no outro manipulando não há, durante o múltiplo, conseqüências programadas. Após ter-se estabilizado o desempenho dos sujeitos nos esquemas, transforma-se o esquema múltiplo em esquema misto. O manipulando inoperante na fase de múltiplo passa a ter, no misto, uma função: respostas a ele produzem, por um determinado período de tempo, a apresentação dos estímulos sinalizadores dos esquemas em vigor, transformando o esquema misto em múltiplo. Este é o procedimento que tem sido mais freqüentemente utilizado nos estudos em respostas de observação. Além de Wyckoff (1952, 1959), foi usado por Allen e Lattal (1989); Auye (1973); Branch (1970); Branch (1973); Dinsmoor, Browne, Lawrence (1972); Dinsmoor, Bowe, Green e Hanson (1988); Dinsmoor, Mulvaney e Jwaideh, (1981); Hirota (1972); Jenkins e Boakes (1973); Kendal (1974); Mueller e Dinsmoor (1984, 1986); Tomanari e Machado (1992)³, com pombos. Carvalho e Machado (1992); Preston (1985), com ratos. Mulvaney, Hughes, Jwaideh e Dinsmoor (1981); Case e Fantino (1981) com sujeitos humanos.

Um terceiro procedimento comumente empregado nos estudos em respostas de observação apresenta três manipulandos aos sujeitos. Em um deles, o manipulando principal, vigoram alterações de componentes diferentemente relacionados com reforçamento através de, por exemplo, diferentes probabilidades de reforçamento ou diferentes magnitudes de reforço. Após passarem por uma fase de treino discriminativo, em que dois diferentes estímulos sinalizam as duas diferentes condições de reforçamento, os sujeitos são submetidos a uma fase de observação. Nesta fase, vigora, no manipulando

³ Tomanari, G. Y. e Machado, L.M.C.M. (1992). Avaliação da função de estímulos sinalizadores de reforçamento e extinção. Anais da XXII Reunião Anual da SBP.

principal, um esquema misto que pode ser transformado em múltiplo através de respostas nos outros dois manipulandos, os manipulandos de observação. Nestes dois manipulandos, é separada espacialmente a produção de cada um dos estímulos sinalizadores, isto é, a cada um deles, é associada a produção de apenas um dos estímulos. Neste procedimento, a medida do valor reforçador condicionado dos estímulos discriminativos é obtido através da proporção de respostas relacionada a cada um dos manipulandos. Este procedimento foi inicialmente proposto por Mulvaney, Hughes, Jwaideh e Dinsmoor (1974) e utilizado, posteriormente por Jwaideh, Mulvaney (1976), ambos os estudos com pombos. No entanto, foi Fantino e sua equipe quem o utilizou largamente em estudos com sujeitos humanos (Fantino e Case, 1983; Fantino, Case e Altus, 1983; Case, Fantino e Wixted, 1985; Case e Fantino, 1989; Case, Ploog e Fantino, 1990) além de Perone e Baron (1980) e Perone e Kaminski (1992).

A partir dos resultados obtidos, basicamente, através da utilização destes 3 procedimentos de resposta de observação, uma das conclusões a que os pesquisadores e teóricos têm sido levados é que os estímulos que sinalizam presença (versus ausência) ou frequência maior (versus frequência menor) de reforçadores positivos incondicionados são capazes de manter as respostas que os produzem -- as respostas de observação (Allen e Lattal, 1989; Case e Fantino, 1981; Case e Fantino, 1989; Case e col., 1985; Case e col., 1990; Dinsmoor e col., 1988; Dinsmoor e col., 1972; Dinsmoor e col., 1981; Jenkins e Boakes, 1973; Fantino e Case, 1983; Fantino e col., 1983; Mueller e Dinsmoor, 1984, 1986; Preston, 1985; Tomanari, 1995). Isto é, que o estímulo associado com maior probabilidade de reforçamento (S+) adquire função reforçadora condicionada, tem sido consenso na área. No entanto, é em relação ao papel exercido pelo estímulo associado à menor probabilidade de reforçamento (S-) que surgem as divergências. A descrição de alguns trabalhos experimentais, exemplificando os

três diferentes procedimentos em resposta de observação anteriormente citados, em diferentes espécies de sujeitos, vai possibilitar uma colocação clara das questões que predominam na área.

Tomanari (1995) procurou avaliar as variáveis envolvidas no reforçamento por estímulos sinalizadores de tentativas que terminavam com ou sem a apresentação livre de comida. O procedimento empregado replicou aquele utilizado por Blanchard (1975), com pombos, e por Schrier e col., (1980), com macacos. O procedimento básico submeteu pombos privados de comida a sessões compostas por tentativas discretas separadas por intervalos entre tentativas. Em igual probabilidade de apresentação, metade das tentativas terminava com apresentação livre de comida e metade sem. Durante ambos os tipos de tentativas, o único disco de respostas presente na caixa experimental permanecia iluminado por luz branca a não ser que ocorressem respostas de observação. Neste caso, a cor do disco era alterada para vermelha (S+) ou verde (S-) de acordo com o tipo de tentativa em vigor. O esquema de respostas de observação era VI 15 s para a produção de S+ e S- nas condições de linha de base. Em duas condições experimentais diferentes, o esquema DRL 6 s foi superposto ao VI para a produção de um dos estímulos sinalizadores (esquema tand VI DRL), enquanto o estímulo alternativo continuava sendo produzido em VI. Todos os sujeitos foram submetidos às duas condições, tendo a ordem de exposição invertida. Uma condição experimental foi sempre inserida entre duas condições de linha de base. Os resultados deste estudo mostraram que, em esquema tand VI DRL, S+ e S- controlaram diferentemente o desempenho dos sujeitos. Quando este esquema estava associado à produção de S+, houve uma diminuição na frequência de respostas ao disco que resultou na manutenção da produção deste estímulo como em linha de base, em VI 15 s. Quando associado à produção de S-, ao contrário, houve um aumento na frequência de respostas que

resultou em uma baixa produção de S-. Aparentemente, portanto, S+ adquiriu propriedades reforçadoras condicionadas e S- adquiriu propriedades aversivas condicionadas.

A investigação de Preston (1985) também procurou avaliar a função reforçadora condicionada de S+ e de S- na manutenção das respostas de observação. Para isso, ratos foram submetidos a um procedimento de duas barras de respostas, uma fixa (barra de reforçamento primário) e outra móvel (respostas de observação). Para a barra fixa, estavam em vigor alternações de esquemas múltiplo e misto formados por componentes de razão randômica (RR 32⁴) e Extinção para a produção de reforço primário. Durante o esquema múltiplo, dois diferentes estímulos eram associados a cada um dos componentes. Durante o esquema misto, uma resposta na barra de observação produzia 5 segundos de apresentação do estímulo sinalizador correspondente ao componente em vigor. Tanto em esquema múltiplo quanto em esquema misto, respostas na barra de observação produziam sua retração por 5 segundos, impedindo a ocorrência de respostas nos 5 segundos seguintes. Foram programadas três condições. Em uma delas, a condição de linha de base, os sujeitos podiam produzir S+ e S- na barra de observação; em cada uma das outras duas condições, podiam produzir somente S+ ou somente S-. Os resultados deste estudo mostraram que houve um maior número de respostas de observação na condição em que era produzido somente S+ em relação à condição em que eram produzidos S+ e S-; na qual, por sua vez, houve maior número de respostas em relação à condição em que era produzido somente S-. Estes resultados apontam que S-, não apenas não revelou propriedades reforçadoras condicionadas, como mostrou propriedades aversivas condicionadas.

⁴ RR: Esquema de razão no qual intervalos entre dois reforçamentos consecutivos são estabelecidos por números aleatórios e imprevisíveis de resposta.

Fantino, Case e Altus (1983) trabalharam com crianças de diferentes idades e Fantino e Case (1983), com adultos, em um procedimento semelhante no qual os sujeitos ganhavam pontos em esquema misto VT EXT. Em um procedimento de dois manipulandos de observação, mediu-se a probabilidade relativa de respostas entre eles quando diferentes estímulos, em diferentes condições, eram associados a cada um dos manipulandos. Em uma condição, S+ era produzido em um manipulando e S- no outro. Em outra, S+ foi substituído por um estímulo não-correlacionado. Em ambas as condições, os resultados mostraram que o manipulando associado a S- sempre recebeu um menor número de respostas relativamente ao manipulando alternativo. Baseado nestes resultados, os autores concluíram que, tanto em crianças quanto em adultos, respostas de observação seriam mantidas por S+ mas não por S-.

A descrição dos estudos realizados por Fantino e col. (1983), Fantino e Case (1983), Preston (1985) e Tomanari (1995) permitem exemplificar diferentes procedimentos de respostas de observação e a utilização de diferentes espécies de sujeitos. Estes estudos, assim como a maioria dos trabalhos na área, mostram que o estímulo sinalizador associado à maior probabilidade de reforçamento principal (comida, água ou, em sujeitos sumanos, pontos ou fichas) torna-se um estímulo reforçador condicionado capaz de manter respostas de observação que o produzem (Case e Fantino, 1989; Dinsmoor, 1983). Clara e unanimemente, a resposta de observação é seletiva, isto é, ocorre com frequência maior e/ou dura mais tempo e/ou apresenta menor latência quando produz o estímulo sinalizador do componente em que a frequência de reforços é maior. Esta conclusão considera que S- não apenas não contribui para manter respostas de observação como pode, até mesmo, manter respostas que evitam a sua apresentação (Blanchard, 1975; Dinsmoor e col., 1972; Jwaideh e Mulvaney, 1976; Tomanari, 1995).

Poucos dados disponíveis na literatura parecem se contrapor a esta constatação. Isto é, poucos dados parecem mostrar que S- pode contribuir para manter as respostas de observação. No entanto, apesar de escassos, estes dados existem (Perone e Baron, 1980; Lieberman, 1972; Lieberman, Cathro, Nichol e Watson, 1997; Shrier, Thompson e Spector, 1980) e não têm sido facilmente incorporados à maior parte dos estudos que tem investigado o assunto. Além disso, estes dados têm levantado um outra questão na área. Trata-se da possibilidade de que a função reforçadora de S- seja espécie-específica. Como será exposto a seguir, os dados obtidos com primatas (sujeitos humanos e macacos) parecem diferir, com certa sistematicidade, daqueles obtidos com não-primatas (ratos e pombos)⁵.

A investigação que gerou o primeiro dado mostrando a possibilidade de S- manter respostas de observação foi realizada por Lieberman (1972). Neste estudo, após terem passado por um treino discriminativo correspondente, macacos *rhesus* foram submetidos a esquema misto VR 50 EXT, em vigor em uma chave de resposta. Em uma condição, respostas de observação, emitidas em uma outra chave, podiam produzir, por 6 segundos, a sinalização correspondente ao componente do misto em vigor, S+ ou S-. Em uma condição posterior a esta, foi eliminada a possibilidade dos sujeitos de produzirem S-. Respostas que anteriormente produziam S- não eram mais conseqüenciadas. Nesta condição, em relação à antecedente, observou-se uma diminuição na frequência de respostas de observação. Aparentemente, portanto, parte das respostas de observação eram mantidas pela apresentação de S-.

Este trabalho de Lieberman (1972) gerou algumas críticas na área. Segundo Dinsmoor (1983), Lieberman (1972) teria demonstrado o valor reforçador de S-

⁵ Em Anexo 1, encontra-se um resumo dos resultados que vêm sendo obtidos, em trabalhos em respostas de observação, envolvendo diferentes espécies.

indiretamente, ou seja, através de uma diminuição na frequência de respostas de observação quando S- deixava de ser apresentado. Uma demonstração de que S-, por si próprio, seria capaz de manter as respostas de observação, não foi conduzida naquele estudo.

O estudo conduzido por Schrier e col. (1980) evitou crítica semelhante de Dinsmoor e apresentou dados mais claros em relação à possibilidade de S- manter respostas de observação. Schrier e col. (1980) utilizaram macacos como sujeitos (*Macaca arctoides*) em um procedimento de tentativas (semelhante àquele usado por Blanchard, 1975 e por Tomanari, 1995, descrito anteriormente) que podia terminar com ou sem a apresentação de comida independentemente de qualquer resposta do sujeito. No único manipulando disponível na caixa experimental, os sujeitos podiam produzir, em esquema tand VI 15 s DRL 6 s, em diferentes condições, S+ ou S-. Enquanto isso, a produção do estímulo alternativo era mantida em VI 15 s. Os resultados deste estudo mostraram que, com a introdução do esquema tand VI DRL, houve uma diminuição inicial na frequência de produção dos estímulos sinalizadores (em relação à linha de base) seguida, no decorrer das sessões, por um aumento progressivo na frequência de produção, tanto de S+ quanto de S-.

Perone e Baron (1980), trabalhando com sujeitos humanos, também obtiveram resultados nesta mesma direção. Estes autores, usando um procedimento com dois manipulandos de observação, trabalharam com sujeitos adultos em esquema misto VI VI em que os componentes eram definidos por diferentes exigências quanto à força empregada para responder na chave principal. Nesta condição, a frequência de respostas de observação foi maior quando ambos os estímulos, S+ e S-, podiam ser produzidos do que quando apenas S+ podia ser produzido. Ou seja, S- pareceu ser, em parte, responsável pela manutenção de respostas de observação.

Em estudo recente, Lieberman e col. (1997) também investigaram respostas de observação em sujeitos humanos. Estes pesquisadores realizaram uma reavaliação dos estudos de Fantino e sua equipe (Fantino e Case, 1983; Case e col., 1985; Case e Fantino, 1989; Case e col., 1990) e perceberam que o procedimento por eles usado podia propiciar que os sujeitos se comportassem sob controle de uma possível crença de que respostas de observação alteravam a probabilidade de ganhar pontos (o que, em termos de procedimento, não era possível). Para testar esta possibilidade, Lieberman e col. (1997) realizaram uma série de experimentos comparáveis àqueles usados por Fantino e sua equipe. No entanto, os autores procuraram garantir que os sujeitos reconheçam a independência entre a produção de estímulos sinalizadores e a obtenção de pontos. Para isso, a liberação de pontos seguiu um modelo lotérico que, segundo os autores, seria bem estabelecido pelos sujeitos como sendo um modelo randômico de geração de números. Com esta alteração no procedimento, ao contrário dos resultados relatados por Fantino e colaboradores, os sujeitos de Lieberman e col. (1997) mostraram uma clara preferência por produzir S- a estímulos não correlacionados.

Como acaba de mostrar esta rápida revisão de literatura, a grande maioria dos resultados que parecem revelar o valor reforçador condicionado de S- na manutenção de respostas de observação foi obtida com macacos (Lieberman, 1972; Schrier e col., 1980) e com humanos (Lieberman e col., 1997; Perone e Baron, 1980). A partir desta constatação, muitos autores têm sugerido que o valor reforçador condicionado de S- seja específico da espécie estudada (Lieberman, 1972; Lieberman e col., 1997; Perone e Baron, 1980; Schrier e col., 1980). Mais especificamente, sugerem que os primatas (sujeitos humanos e macacos) seriam susceptíveis a reforçamento por S-, enquanto que os sujeitos não-primatas (pombos e ratos, por exemplo) não seriam.

Esta suposição envolvendo diferenças entre espécies poderia incorporar os dados divergentes na literatura em relação ao valor reforçador condicionado de S-. No entanto, a busca de explicações filogenéticas pode não ser uma via parcimoniosa. Considerando-se que esta suposição é, em grande parte, baseada em resultados de estudos que empregaram, basicamente, três diferentes procedimentos e, muitas vezes, diferentes parâmetros, o caminho mais cuidadoso para se procurar esclarecer a questão do valor reforçador condicionado de S- seria através da realização de investigações sistemáticas em termos de procedimentos e espécies.

Alguns estudos foram, de fato, encaminhados utilizando a estratégia de se tentar replicar um procedimento de respostas de observação semelhante em diferentes espécies. Replicando o estudo de Lieberman (1972) com macacos, foram conduzidos o de Mueller e Dinsmoor (1984) com pombos e o de Preston (1985) com ratos. Usando o procedimento de tentativas de Blanchard (1975) com pombos, seguiram-se os estudos de Schier e col. (1980) com macacos, o de Tomanari (1995) com pombos e o de Tomanari e Machado (1996) com ratos. Ao contrário de Lieberman (1972), com macacos, Mueller e Dinsmoor (1984) concluíram que S- não foi responsável por manter respostas de observação em pombos. Conclusões semelhantes foram obtidas por Preston (1985) com ratos. Os experimentos de Schier e col. (1980), com macacos, e de Blanchard (1975) e Tomanari (1995), com pombos, mostraram, também, resultados divergentes. Schier e col. (1980) observaram um aumento, ao longo das sessões, na frequência de produção de S- quando foi acrescentado o esquema de DRL ao VI para a produção deste estímulo. Ao contrário, Blanchard (1975) e Tomanari (1995) verificaram uma clara diminuição. Utilizando ratos como sujeitos, Tomanari e Machado (1996) verificaram que, neste procedimento, ambos os estímulos

sinálistas adquiriram fraco valor reforçador condicionado e mantiveram poucas respostas de observação.

A utilização desta estratégia de se comparar o desempenho de sujeitos de diferentes espécies em procedimentos semelhantes não tem resultado, até o momento, em respostas claras aos problemas que pretende esclarecer. Todavia, tem gerado algumas contribuições para a área. Uma delas é a disponibilidade de dados mais diretamente comparáveis entre si; ou seja, os estudos em respostas de observação têm adquirido uma melhor organização. Outra contribuição, esta bastante importante, tem sido a identificação e o refinamento de um maior número de variáveis relevantes para a manutenção das respostas de observação (Tomanari e Machado, 1996). Variáveis que são, como apontam Case e col., (1990) e Liebman e col. (1997), múltiplas e têm sido fracamente controladas. Um fraco controle experimental, sobre as variáveis críticas na área, poderia estar se refletindo na significativa variabilidade de resultados (Sidman, 1960).

Uma ampla compreensão das funções reforçadoras condicionadas de estímulos discriminativos, portanto, ainda não foi atingida. Todavia, duas importantes hipóteses têm sido extensivamente avaliadas quanto a capacidade de identificar as variáveis responsáveis por tornar estímulos inicialmente neutros em reforçadores condicionados. São elas a Hipótese da redução-do-atraso (Fantino e Logan, 1979) e a Hipótese da redução-da-incerteza (Berlyne, 1957; Hendry, 1969; Hendry, 1983)⁶.

Resumidamente, a Hipótese da redução-do-atraso prevê que um estímulo neutro se torne um reforçador condicionado tanto mais forte quanto mais reduzir (em termos relativos) a distância temporal em relação ao reforçador incondicionado (Fantino e Logan, 1979). A Hipótese da redução-da-incerteza,

⁶ Uma descrição detalhada sobre as Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza encontra-se em Anexo 2.

diferentemente, sustenta que o valor reforçador condicionado de um estímulo depende do quanto ele informa sobre a disponibilidade ou a ausência do reforçador incondicionado (Berlyne, 1957; Hendry, 1969; Hendry, 1983). Segundo Berlyne (1957), a produção de informação seria reforçadora na medida em que a incerteza seria aversiva para os organismos (Berlyne, 1957)⁷. De acordo com estas duas hipóteses, há consenso de que S+ seja um estímulo reforçador condicionado e, como têm confirmado os estudos na área, mantenha respostas de observação que o produzem. No entanto, em relação a função reforçadora condicionada de S-, estas hipóteses fazem previsões opostas. Segundo a Hipótese da redução-da-incerteza, mas não a da redução-do-atraso, S- seria um estímulo reforçador condicionado e manteria, assim como S+, respostas de observação.

Dentro da investigação em respostas de observação, as Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza têm sido amplamente investigadas e discutidas. Alguns delineamentos experimentais, inclusive, foram planejados em função de contrapor as previsões de cada uma delas em relação ao valor reforçador condicionado de S-. Seria o caso, por exemplo, dos estudos que empregaram o procedimento de dois manipulandos de observação. Em um deles, os sujeitos podiam produzir S- (estímulo informativo não associado ao reforçador primário) e, no outro, um estímulo não correlacionado com os esquemas em vigor (estímulo não informativo, mas algumas vezes associado com reforçamento). Uma maior frequência de respostas ao manipulando em que S- podia ser produzido favoreceria a Hipótese da redução-da-incerteza enquanto que, uma maior frequência de respostas no manipulando alternativo, favoreceria a Hipótese da redução-do-atraso.

⁷ Segundo a análise de Dinsmoor (1983), a Hipótese da redução-da-incerteza se vincula à teoria da informação (Cantor, 1979), que seria de inspiração cognitivista. Dinsmoor atribui o prestígio desta hipótese a seu apelo intuitivo, bem como ao *revival* cognitivista das duas últimas décadas.

Reverendo os estudos em respostas de observação, dados que suportam a Hipótese da redução-da-incerteza existem em menor número em relação aos dados que suportam a Hipótese da redução-do-atraso. No entanto, as poucas evidências quanto a força de S- como reforçador condicionado ou deveriam ser explicadas pela Hipótese da redução-do-atraso ou os vínculos desta hipótese com estes resultados deveriam ser descritos. Nenhuma das hipóteses, portanto, parece ser capaz de descrever, ampla e precisamente, o processo de reforçamento condicionado. As variáveis responsáveis pela manutenção de respostas de observação, principalmente aquelas relacionadas a S-, ainda estão para ser especificadas.

Considerando que a preocupação existente deva ser com os dados e não com as hipóteses que pretendem explicá-los, a presente investigação foi conduzida com o objetivo de avaliar a função reforçadora dos estímulos sinalizadores de reforçamento e extinção procurando identificar as variáveis envolvidas na manutenção de respostas de observação. Segundo tem mostrado o desenvolvimento das pesquisas na área, uma maior compreensão das variáveis responsáveis pela manutenção destas respostas possibilitaria descrever o reforçamento por S- como uma relação de contingência. Desta forma, explicações filogenéticas para as diferenças de desempenho entre primatas e não-primatas poderiam ser reavaliadas em termos de especificidades de procedimento. Como afirma Perone, "A Hipótese da redução-do-atraso pode, eventualmente, ser confirmada como uma descrição de reforçamento condicionado ao nível humano, mas não antes que se preste maior atenção a algumas diferenças de

procedimento na pesquisa com humanos e animais e até termos identificado e controlado variáveis importantes ainda desconhecidas" (Perone, 1995)⁸.

A presente investigação é formada por dois experimentos que utilizaram pombos como sujeitos em procedimento de tentativas discretas com reforçamento independente de respostas. Este procedimento foi escolhido, basicamente, por utilizar apenas um manipulando de respostas e, com isso, evitar que respostas de observação sofressem interferências das respostas associadas à produção de comida. Além disso, procedimento semelhante foi anteriormente empregado em outros estudos (Blanchard, 1975 e Tomanari, 1995, com pombos; Tomanari e Machado, 1996, com ratos; e Schrier e col., 1980, com macacos), o que aumenta a comparabilidade dos resultados obtidos em diferentes espécies. Na presente investigação, o controle exercido por S+ e S- sobre as respostas de observação de pombos foi avaliado nas seguintes situações:

1. Quando a produção de S+ e S- envolvia diferentes custos de resposta. Para isso, foi empregado esquema tandem VI FR para produzir o estímulo associado, ora às tentativas que terminavam com apresentação de comida, ora às tentativas que terminavam sem a apresentação de comida (Experimento 1).
2. Quando as respostas de observação dos pombos podiam estar, não apenas sob controle reforçador mas, também, sob controle discriminativo dos estímulos sinalizadores das tentativas. Para isso, o tempo de apresentação dos estímulos sinalizadores foi reduzido de modo a permitir que S+ e S- pudessem, em uma mesma tentativa, ser reapresentados (Experimentos 2).

⁸ Perone, M. (1995). Conditioned reinforcement by stimuli correlated and uncorrelated with schedules of reinforcement: comparative research with people and pigeons. *Annual Meeting of the Association for Behavior Analysis*. Washington, D.C.

EXPERIMENTO1

Nos estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995), os pombos podiam produzir, em diferentes condições, os estímulos sinalizadores das tentativas que terminavam com (TS+) ou sem (TS-) apresentação de comida em esquema de VI 15 s ou tand VI 15 s DRL 6 s. Ao produzi-los, o estímulo sinalizador do esquema misto (disco iluminado por luz branca) era substituído pelo estímulo sinalizador da tentativa correspondente em vigor (disco iluminado por cores verde ou vermelha), que permanecia presente no disco de resposta até o final da tentativa.

Nestes estudos, foram observados diferentes desempenhos dos sujeitos, em esquema tand VIDRL, em função de qual estímulo estava a ele associado, S+ ou S-. Conforme mostrou Tomanari (1995), quando S- era produzido neste esquema, a taxa de respostas na presença do estímulo do esquema misto sistematicamente maior do que nas tentativas TS- do que nas tentativas TS+. Ao longo da condição experimental, este desempenho resultou em uma diminuição marcante nos índices de produção de S-. Em contrapartida, quando o esquema tand VIDRL foi empregado para produzir S+, houve uma diminuição nos índices de produção desse estímulo, no início da condição experimental, seguida de recuperação, ao longo da condição, até atingir valores próximos aos de linha de base. A conclusão dos autores, obtida a partir destes resultados, foi que S+ exerceu função reforçadora condicionada enquanto S- exerceu função aversiva (Blanchard, 1975 e Tomanari, 1995).

Um dado especialmente interessante nestes resultados foi o aumento gerado pelo esquema tand VI DRL -- em relação ao VI -- na frequência de respostas (Tomanari, 1995). Esse aumento foi claramente maior quando S- (versus S+) estava associado a tand VI DRL, o que reforça a conclusão de que essas respostas tinham a função de evitar a apresentação de S-. Entretanto, uma outra consequência dessas respostas foi o prolongamento da duração das

tentativas que terminavam sem a apresentação de comida (TS-). Devido a contingência de DRO vigente nos 3 últimos segundos das tentativas, qualquer resposta emitida neste intervalo prolongava a sua duração por 3 s.

A alta frequência de respostas nas tentativas TS-, dado que estas duas conseqüências estavam associadas a ela, parece apontar para uma aparente contradição. Ao mesmo tempo em que as respostas dos pombos evitavam a apresentação de S-, a duração das tentativas com as quais este estímulo estava associado (TS-) era marcadamente prolongada. Uma análise molar das contingências envolvidas nesta situação mostra que o prolongamento das tentativas podia aumentar a distância temporal entre a tentativa corrente e o início de tentativa seguinte, possivelmente uma tentativa TS+. Portanto, a conclusão de que S- adquiriu propriedades aversivas condicionadas nos estudos de Tomanari (1995) e Blanchard (1975) precisaria ser melhor analisada. Baseado no desempenho dos sujeitos nas tentativas TS-, é possível que outras contingências, além da esquiva de S-, tivessem controlado as respostas ao disco.

O Experimento 1 tem o objetivo de avaliar o possível controle aversivo condicionado de S- sobre o desempenho de observação de pombos. Particularmente, este experimento foi delineado de modo a procurar avaliar o papel relativo exercido pelo esquema tand VI DRL na manutenção das respostas de observação nas tentativas TS- (Blanchard, 1975 e Tomanari 1995). Basicamente, a estratégia utilizada foi a de substituir o esquema tand VI DRL por esquema tand VIFR. A idéia fundamental seria a de que, a manutenção de a alta frequência de respostas que, em esquema tand VI DRL, resultou na esquiva de S-, resultaria, em tand VIFR, na sua apresentação. Desta forma, para se confirmar o controle aversivo de S-, o desempenho dos pombos em esquema tand VI FR deveria revelar uma baixa frequência de respostas. Caso contrário, aumentaria-se a suspeita de que o controle exercido por S- sobre as respostas em esquema tand VIDRL não tenha sido um controle preponderante.

Método

(Experimento 1)

Sujeitos

Foram utilizados 6 pombos (*Columbia livia*), variedade correio, obtidos de criadores particulares. Os animais foram alojados em gaiolas individuais e mantidos no biotério do Departamento de Psicologia Experimental do IPUSP. Durante o experimento, foram submetidos a regime de restrição a comida de modo a terem seus pesos mantidos a 85% do peso *ad libitum*. Acesso a água era livre. Os animais tiveram experiência prévia em esquemas encadeados concorrentes e participaram do estudo de Tomanari (1995).

Equipamento

Foi utilizada uma câmara padrão de condicionamento operante para pombos, fabricada pela Lehigh Valley, com isolamento acústico, luz ambiente (*house light*) e um circulador de ar que gerava um som contínuo enquanto a sessão estava em andamento. Na câmara, havia um comedouro que, normalmente, permanecia fora do alcance dos pombos mas que, quando acionado, era iluminado e permitia acesso a grãos. Logo acima do comedouro, na mesma parede da caixa, havia um disco de respostas que podia ser transiluminado por três lâmpadas de diferentes cores, branca, vermelha ou verde. Como equipamento de controle e registro, foi usado um conjunto de relés, temporizadores, formadores de pulsos elétricos e marcadores de passos localizado em uma sala adjacente à sala onde ocorriam as sessões experimentais.

Procedimento básico

Os 6 pombos utilizados no presente experimento tinham participado, imediatamente antes do início deste estudo, da investigação de Tomanari (1995). O procedimento básico de ambos os estudos é semelhante. Portanto, o presente procedimento excluiu a necessidade de treinos prévios, como treino ao comedouro e modelagem da resposta de bicar o disco. No presente experimento, os sujeitos foram submetidos diretamente à Fase 1, que será descrita

posteriormente. A seguir, estão relatadas as características básicas a todas as sessões, nas diferentes fases do Experimento 1.

As sessões eram realizadas diariamente, cinco dias por semana. Durante as sessões, a luz ambiente da caixa operante (*house light*) e o ventilador permaneciam ligados. Cada sessão era formada, basicamente, por 32 tentativas de duração mínima de 50 segundos. Independentemente do comportamento dos sujeitos, metade dessas tentativas -- 16 -- terminava com a apresentação do comedouro por 4 segundos (tentativas TS+); a outra metade -- 16 -- era encerrada sem a apresentação do comedouro (tentativas TS-). O comedouro permanecia, normalmente, apagado e fora do alcance dos pombos. A apresentação de comida consistia na sua iluminação e na disponibilidade de acesso aos grãos. A sequência de apresentação das 32 tentativas foi randomizada, por sorteio, respeitando-se os critérios de que um mesmo tipo de tentativa não se repetisse mais do que 3 vezes consecutivas e de que houvesse o mesmo número de tentativas TS+ e TS- ao final de cada sessão.

Iniciando as sessões e intercalando-se com as 32 tentativas havia intervalos entre tentativas (IETs) de 60 segundos de duração. Durante os IETs, o disco de respostas permanecia apagado. Ao fim dos IETs, iniciava-se uma tentativa. Cada tentativa era iniciada com a iluminação do disco com luz branca (estímulo do esquema misto). Nesse momento, entrava em vigor o esquema usado para a resposta de mudança estimulatória (resposta de observação). Ao longo das fases experimentais deste estudo, os esquemas utilizados para a produção dos estímulos sinalizadores foram manipulados (relatados posteriormente, fase por fase). Entretanto, a primeira bicada que satisfizesse os critérios do esquema em vigor para a resposta de observação era seguida por mudança na cor do disco que, de branco, tornava-se vermelho ou verde. Para os Pombos 27, 31 e 34, o disco tornava-se vermelho, se a tentativa fosse terminar com a apresentação do comedouro, e verde, se fosse terminar sem apresentação do comedouro. Para os Pombos 35, 36 e 37, as cores foram invertidas. As cores associadas às tentativas TS+ e TS-, daqui em diante, poderão ser referidas, respectivamente, como S+ e S-.

Uma vez produzido um dos estímulos sinalizadores, este permanecia presente no disco até o final da tentativa e, no caso das tentativas TS+, estendia-se até o final dos 4 segundos de apresentação do comedouro. O término de uma tentativa e o início do IET só aconteciam após terem transcorridos 50 segundos da tentativa e de ter havido um intervalo mínimo de 3 segundos sem uma única

resposta ao disco. Independentemente do estímulo presente no disco de respostas (luz branca, vermelha ou verde) ou do tipo de tentativa em vigor (TS+ ou TS-), uma resposta ao disco, nos 3 segundos finais da tentativa, provocava o prolongamento da sua duração por 3 segundos contados a partir da resposta. Desta forma, procurou-se evitar que ocorressem relações acidentais entre respostas ao disco e o término das tentativas ou, no caso das tentativas TS+, e a liberação de comida. Na vigência desta contingência, desde que fossem cumpridas as exigências dos esquemas de mudança estimulatória, era mantida a possibilidade de produção dos estímulos sinalizadores. Durante uma tentativa, quando não ocorriam respostas ao disco ou quando as respostas não satisfaziam os critérios para a produção dos estímulos sinalizadores, a tentativa era finalizada na presença do disco iluminado pela luz branca.

Procedimento específico

O procedimento básico descrito anteriormente foi utilizado, sem alterações, ao longo de todo o experimento. Nas diferentes fases experimentais realizadas, foram manipulados os esquemas para a produção dos estímulos sinalizadores. Estas fases estão descritas a seguir.

Fase 1 - VIS1 - VIS2 (Condição VIS1/S2, Linha de base 1). Nesta fase, respostas ao disco, em ambos os tipos de tentativas, TS+ e TS-, produziam a mudança na cor do disco em esquema de VI 15 s. Os intervalos do VI (2, 5, 11, 18 e 39 s, Fleshler and Hoffman, 1962) eram apresentados em seqüência determinada por sorteio e começavam a vigorar assim que tivesse início uma tentativa. Para cada tipo de tentativa, havia uma programação de VI sendo executada independentemente. Ao término de uma tentativa, o funcionamento do programador de VI era interrompido e só era reestabelecido novamente no início da tentativa seguinte do mesmo tipo.

Fase 2 - VIS1 - tand VIFR S2 (Condição tand VI FR S2). Não houve, nesta fase, modificações no esquema de produção do estímulo sinalizador em um dos tipos de tentativas (TS- para os Pombos 27, 31 e 34 e TS+ para os Pombos 35, 36 e 37). Para o outro tipo de tentativa, no entanto, o esquema de VI foi substituído por esquema tand VI 15 s FR 15. Neste, após completado o esquema de VI 15 s

(programado como na Fase 1), sem qualquer sinalização externa, a mudança na cor do disco era contingente à emissão de um número fixo de respostas (FR). Nesta fase, dois valores de FR foram empregados. Inicialmente, utilizou-se o esquema tand VI 15 s FR 15 (Condição tand VIFR 15 S2, Fase 2a). Na sequência, o valor do esquema de FR foi alterado para FR 24 (Condição tand VI FR 24 S2, Fase 2b).

Fase 3 - VI S1 - VI S2 (Condição VI S1/S2, Linha de base 2). Foram replicadas as mesmas condições programadas para a Fase 1. Assim, para todos os sujeitos, respostas ao disco produziam a mudança estimulatória coerentemente com o tipo de tentativa em vigor, de acordo com esquema de VI 15 s. Após a 5ª sessão desta fase, foi reprogramada, através de sorteio, a sequência de apresentação das tentativas.

Fase 4 - tand VI FR S1 - VI S2 (Condição tand VI FR S1). Nesta fase, foi empregado o mesmo procedimento usado na Fase 2, modificando-se a atribuição dos sujeitos. Assim, os 3 pombos que, na Fase 2, foram submetidos a esquema tand VIFR para a produção de S+ (Pombos 27, 31 e 34) tiveram, agora, tand VI FR para a produção de S-; e os sujeitos que tiveram tand VI FR para a produção de S- (Pombos 35, 36 e 37) passaram a ter, na presente fase, tand VI FR para produção de S+. Da mesma forma que na Fase 2, dois valores de FR foram utilizados. Inicialmente, foi empregado o esquema tand VI 15 s FR 15 (Condição tand VI FR 15 S1, Fase 4a) e, posteriormente, o valor do esquema de FR foi alterado para FR 24 (Condição tand VIFR 24 S1, Fase 4b).

Neste experimento, ao término de cada sessão, foram registrados, em intervalos consecutivos de 5 segundos nas tentativas TS+ e TS-, separadamente, o número de respostas ao disco na presença da luz branca (estímulo do esquema misto) e o número de estímulos sinalizadores produzidos. Mudanças de fases ocorriam quando o número de estímulos sinalizadores produzidos por sessão não apresentasse variação maior do que 10% em 3 sessões consecutivas e, no mínimo, tivessem sido realizadas 10 sessões nas Fases 1, 3 e 5, e cerca de 15 sessões nas Fases 2 e 4. Na Fase 2a, foram realizadas entre 28 e 35 sessões.

O Quadro I, apresentado a seguir, resume as fases realizadas no Experimento 1. O Quadro II, na sequência, mostra o número de sessões em cada uma delas.

Quadro I - Esquemas utilizados para a resposta de observação em cada uma das 4 fases do Experimento 1, para todos os sujeitos. As cores vermelhas e verdes no quadro indicam a cor do disco associada aos respectivos esquemas. Observe que estas cores separam os 6 sujeitos, em dois trios, de acordo com a sequência das fases em que o esquema tand VI FR foi introduzido, ora para produzir S+, ora para produzir S-. No quadro, VI representa o esquema VI 15 s e, VI-FR, o esquema tand VI FR.

Sj	Fases							
	1		2		3		4	
	S+	S-	S+	S-	S+	S-	S+	S-
27	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI	VI	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24
31	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI	VI	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24
34	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI	VI	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24
35	VI	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI
36	VI	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI
37	VI	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI	VI	VI-FR 15 VI-FR 24	VI

Quadro II - Número de sessões realizadas em cada uma das 4 fases do Experimento 1, para todos os sujeitos.

Sj	Fases					
	1	2		3	4	
	VI	VI-FR 15	VI-FR 24	VI	VI-FR 15	VI-FR 24
27	16	35	17	11	16	15
31	17	34	15	11	15	15
34	16	33	17	11	16	15
35	22	32	14	11	16	15
36	19	31	16	11	16	14
37	18	28	15	11	16	15

Resultados

(Experimento 1)

Os resultados do Experimento 1 estão sendo apresentados em 3 diferentes análises de dados. Em todas elas, são mostrados a frequência de respostas na presença do estímulo do esquema misto e o número de estímulos sinalizadores (S+ e S-) produzidos em cada tipo de tentativa (TS+ e TS-), para cada um dos 6 sujeitos. A primeira análise está representada nas Figuras 1-x e se refere à média das 5 últimas sessões de todas as fases realizadas. Estas figuras permitem obter uma visão geral do experimento. A segunda análise de dados mostra, no decorrer de blocos de sessões, as fases em que o esquema *tand VI FR* esteve em vigor (Figuras 2-x). A terceira análise mostra o desempenho dos sujeitos no decorrer de intervalos de 5 segundos nas tentativas TS+ e TS- (Figuras 3-x e 4-x). As Figuras 3-x referem-se à frequência acumulada de produção de estímulos sinalizadores e, as Figuras 4-x, à distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto (disco branco). Ao final de cada conjunto de figuras (1-x, 2-x, 3-x e 4-x), os dados são sumarizados e as figuras do mesmo conjunto são relacionadas entre si.

A **Figura 1-1** mostra a frequência média de produção de S+ e S- (colunas vermelhas e verdes, respectivamente), nas 5 últimas sessões de todas as fases do Experimento 1, para todos os 6 sujeitos. As colunas cheias e hachuradas referem-se, respectivamente, às tentativas em que os esquemas *VI 15 s* e *tand VI FR* (*FR 15* nas Fases 2a e 4a e *FR 24* nas Fases 2b e 4b) estiveram em vigor. Note que o número máximo de estímulos produzidos por sessão, para cada tipo de tentativa, era 16.

Figura 1-1 - Frequência média de produção de S+ e S- (colunas vermelhas e verdes, respectivamente), nas 5 últimas sessões de todas as fases do Experimento 1, para todos os 6 sujeitos. As colunas cheias e hachuradas referem-se, respectivamente, às tentativas em que os esquemas VI 15 s e tand VI FR (FR 15 nas Fases 2a e 4a e FR 24 nas Fases 2b e 4b) estiveram em vigor. Para cada tipo de tentativa, o número máximo de estímulos produzidos por sessão era 16.

Comparando-se as frequências de produção de S+ e de S- (colunas cheias vermelhas versus verdes, respectivamente) em cada uma das fases de linha de base (Fases 1 e 3) nota-se, nos dados de todos os sujeitos, que S+ e S- são produzidos em frequências bastante semelhantes. Para todos os 6 sujeitos, exceto para o Pombo 37 na Fase 1, ambos os estímulos são produzidos em praticamente todas as tentativas possíveis.

Observando-se as tentativas TS+ na condição em que o esquema tand VI FR 15 esteve em vigor (colunas vermelhas hachuradas, Fase 2a para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 4a para os Pombos 35, 36 e 37) pode-se verificar, nos dados de todos os sujeitos, uma diminuição na produção de S+ em relação à produção deste estímulo na fase anterior de linha de base. Esta diminuição é clara para os Pombos 27, 34, 35 e 37 e sutil para os Pombos 31 e 36. Com o aumento no valor do FR de FR 15 para FR 24 (colunas vermelhas hachuradas, Fase 2b para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 4b para os Pombos 35, 36 e 37), esta diminuição acentua-se para os Pombos 27, 35, 36 e 37, mas não para os Pombos 31 e 34. Ainda nesta mesma condição, a frequência de produção de S- (em VI, colunas verdes cheias), quando foi empregado FR 15 nas tentativas TS+, quase não se modifica em relação à linha de base para os Pombos 31, 35 e 36. Mas, por outro lado, diminui para os Pombos 27, 34 e 37. Com o aumento do valor do FR, a frequência de produção de S- mantém-se praticamente constante para os Pombos 31, 34 e 35, diminui para os Pombos 36 e 37 e aumenta para o Pombo 27.

A introdução do esquema tand VI FR 15 nas tentativas TS- (colunas verdes hachuradas, Fase 4a para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 2a para os Pombos 35, 36 e 37) praticamente não altera (Pombos 31, 34, 36 e 37) ou produz uma leve diminuição (Pombos 27 e 35) na frequência de produção de S- em relação à linha de base anterior. Com o aumento no valor do FR (colunas verdes hachuradas, Fase 4b para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 2b para os Pombos 35, 36 e 37), a

freqüência de produção deste estímulo mantém-se praticamente como em FR 15, para todos os sujeitos, apesar de que, para os Pombos 27 e 35, ocorre um pequeno aumento e, para o Pombo 36, uma pequena diminuição. Nesta mesma condição, a freqüência de produção de S+ (em VI, colunas vermelhas cheias), tanto em FR 15 quanto em FR 24, não se altera marcadamente em relação à linha de base, principalmente em relação aos Pombos 27, 31, 34 e 36. Nos dados do Pombo 35, há uma pequena diminuição em FR 15 seguida de um aumento em FR 24. Nos dados do Pombo 37, ocorre um aumento já em FR 15 que se acentua visivelmente em FR 24.

Comparando-se a freqüência de produção de S+ e de S- em esquema tand VI FR nas Fases 2 e 4 (colunas hachuradas, vermelhas versus verdes), pode-se verificar que, para todos os sujeitos, S- é sempre mais produzido do que S+, independentemente do valor do FR.

A **Figura 1-2** mostra a freqüência média de respostas emitidas na presença do disco branco nas 5 últimas sessões de todas as fases realizadas no Experimento 1, para todos os 6 sujeitos, nas tentativas TS+ (colunas vermelhas) e TS- (colunas verdes). As colunas cheias e hachuradas referem-se, respectivamente, às tentativas em que os esquemas VI 15 s e tand VI FR (FR 15 nas Fases 2a e 4a e FR 24 nas Fases 2b e 4b) estiveram em vigor.

Observando-se os dados de todos os sujeitos nas condições de linha de base (Fases 1 e 3), é possível verificar que, em ambas, a freqüência de respostas nas tentativas TS+ e TS- (colunas cheias, vermelhas e verdes respectivamente) é bastante semelhante.

Analisando-se a Condição tand VI FR 15 S+ (Fase 2a para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 4a para os Pombos 35, 36 e 37), observa-se um aumento na freqüência de respostas nas tentativas TS+ (colunas vermelhas hachuradas) em

Fases do Experimento 1

Figura 1-2 - Frequência média de respostas emitidas na presença do disco branco, nas 5 últimas sessões de todas as fases realizadas no Experimento 1, para todos os 6 sujeitos. As colunas vermelhas representam as tentativas TS+ e, as colunas verdes, as tentativas TS-. As colunas cheias e hachuradas referem-se, respectivamente, às tentativas em que os esquemas VI 15 s e tand VI FR (FR 15 nas Fases 2a e 4a e FR 24 nas Fases 2b e 4b) estiveram em vigor.

relação às fases de linha de base respectivamente anteriores (colunas vermelhas cheias) para os Pombos 31, 34, 35 e 36. Para os Pombos 27 e 37, diferentemente, quase não há alteração. A mudança de FR 15 para FR 24 (Fase 2b para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 4b para os Pombos 35, 36 e 37) produz efeitos diversos entre os sujeitos. Um aumento no número de respostas para os Pombos 31 e 34, uma diminuição para o Pombo 37 e praticamente nenhuma alteração para os Pombos 27, 35 e 36. Nesta mesma condição, nas tentativas TS- (em VI, colunas verdes cheias), há, em tand VI FR 15, uma diminuição no número de respostas em relação à linha de base, para os Pombos 27, 34 e 37; praticamente nenhuma alteração para os Pombos 35 e 36; e um aumento para o Pombo 31. Com a mudança no valor do FR, a frequência de respostas nas tentativas TS- diminui para os Pombos 35, 36 e 37 e quase não se altera para os Pombos 27, 31 e 34.

Observando-se a Condição tand VI FR 15 S- (Fase 4a para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 2a para os Pombos 35, 36 e 37), nota-se um claro aumento no número de respostas nas tentativas TS- (colunas verdes hachuradas), em relação a fases de linha de base imediatamente anterior, para todos os 6 sujeitos. Este aumento é sistematicamente acentuado com o aumento no valor do FR (Fase 4b para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 2b para os Pombos 35, 36 e 37). Nesta mesma condição, o número de respostas nas tentativas TS+ (em VI, colunas vermelhas cheias), em relação à linha de base, diminui para os Pombos 27, 31 e 34; aumenta para os Pombos 36 e 37; e praticamente não se altera para o Pombo 35. Com o aumento no valor do FR, a frequência de respostas nas tentativas TS+ mantém-se quase inalterada para a maioria dos sujeitos. Para os Pombos 36 e 37, excepcionalmente, ocorre um aumento.

Comparando-se o número de respostas em esquema tand VI FR 15 nas tentativas TS+ (colunas vermelhas hachuradas, Fase 2a para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 4a para os Pombos 35, 36 e 37) e TS- (colunas verdes hachuradas, Fase

4a para os Pombos 27, 31 e 34 e Fase 2a para os Pombos 35, 36 e 37), pode-se verificar que, nos dados de todos os sujeitos, a frequência de respostas nas tentativas TS- é sempre maior do que nas tentativas TS+. Esta constatação se repete para a condição em que o valor do FR foi alterado para FR 24, para todos os sujeitos exceto o Pombo 31, para o qual o número de respostas nas tentativas TS+ é levemente maior do que nas tentativas TS-.

As **Figuras 1 e 2** permitem visualizar os dados de todos os 6 sujeitos nas 5 últimas sessões de todas as fases do Experimento 1. Na frequência de produção dos estímulos sinalizadores e, mais sensivelmente, na frequência de respostas nas tentativas, podem ser observados os efeitos dos esquemas utilizados neste estudo. O desempenho dos sujeitos, em relação aos estímulos sinalizadores, não mostrou ser controlado pelas cores verde ou vermelha no disco de resposta, mas sim, pela função exercida por elas. Efeitos da ordem de exposição dos pombos às diferentes condições experimentais (Condição tand VI FR S+ ou S-) também não foram marcantes.

Nas fases de linha de base, em esquema de VI para a produção de ambos os estímulos sinalizadores, o número de respostas nas tentativas TS+ e TS- é bastante semelhante, assim como a frequência de produção dos estímulos sinalizadores.

A introdução do esquema tand VI FR para a produção de um dos estímulos sinalizadores provoca diferentes efeitos sobre as frequências de respostas e de estímulos produzidos em função de qual estímulo sinalizador está associado a este esquema. De forma geral, para todos os sujeitos, a frequência de respostas nas tentativas TS- é claramente maior do que nas tentativas TS+. O número de S- produzidos nas sessões, apesar de menos evidentemente, também

é sempre maior do que o número de S+. Para a maior parte dos sujeitos, o aumento no valor do FR, de FR 15 a FR 24, acentua esta diferença.

Mais especificamente, de forma bastante sistemática e regular entre os sujeitos, a introdução do esquema tand VI FR nas tentativas TS-, seja em FR 15 ou FR 24, produz pouca alteração na produção de S- em relação à linha de base. A introdução do FR 15 ao VIe, na seqüência, o aumento no valor do FR para FR 24 são acompanhados por aumento constante na freqüência de respostas. Por outro lado, quando introduzido nas tentativas TS+, o esquema tand VI FR produz uma maior variação no desempenho dos sujeitos. Há, de modo geral, um aumento na freqüência de respostas nas tentativas TS+ (exceto Pombos 27 e 37) em relação à linha de base que, entretanto, não se reflete, necessariamente, na manutenção da freqüência de produção S+. Ao contrário, o que ocorre é uma diminuição observada para todos os sujeitos (menos acentuadamente para o Pombo 31). Em FR 24, o número de respostas praticamente não sofre alteração (Pombos 27, 35 e 36), aumenta (Pombos 31 e 34) ou então diminui (Pombo 37) em relação a FR 15. Estes diferentes padrões de desempenho resulta, para a maioria dos sujeitos, em uma diminuição no número de S+ produzidos (Pombos 27, 35, 36 e 37).

A **Figura 2-1** mostra a freqüência média de produção de S+ (quadrados vermelhos) e de S- (quadrados verdes) em blocos de sessões em que os esquemas tand VI FR (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor (Condição tand VI FR S+, gráficos à esquerda na figura e Condição tand VI FR S-, gráficos à direita). Cada bloco de sessões refere-se à aproximadamente um quarto de sessões em cada uma das condições. Nas condições em que o número de sessões não era múltiplo de 4, as sessões excedentes foram distribuídas, uma a uma, consecutivamente, a partir do 1º quarto. Em todos os gráficos, o eixo da

Figura 2-1 - Frequência média de produção de S+ (quadrados vermelhos) e de S- (quadrados verdes) em blocos de sessões em que os esquemas tand VI FR (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor (Condição tand VI FR S+, gráficos à esquerda na figura e Condição tand VI FR S-, gráficos à direita). Cada bloco de sessões refere-se à aproximadamente um quarto de sessões das diferentes condições. Em todos os gráficos, o eixo da abcissa, da esquerda para a direita, mostra o último quarto de sessões na fase de linha de base imediatamente anterior à Condição tand VI 15 FR 15 (primeira dupla isolada de quadrados vazios, às vezes sobrepostos); os 4 quartos relativos à Condição tand VI 15 FR 15 (primeiro conjunto de 4 quartos de sessões); e, finalmente, os 4 quartos relativos à condição tand VI 15 FR 24 (segundo conjunto de 4 quartos de sessões). Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 6 sujeitos.

Condição tand VI FR S+

Condição tand VI FR S-

Frequência de produção de S+ e S-

FR 15

FR 24

FR 15

FR 24

Quartos de sessões

□ TS+ em VI
 □ TS- em VI
 ■ TS+ em tand VI FR 15
 ■ TS- em tand VI FR 15

abscissa, da esquerda para a direita, mostra o último quarto da fase de linha de base imediatamente anterior à Condição tand VI 15 FR 15 (primeira dupla isolada de quadrados vazios, às vezes sobrepostos); os 4 quartos relativos à condição tand VI 15 FR 15 (primeiro conjunto de 4 quartos de sessões); e, finalmente, os 4 quartos relativos à Condição tand VI 15 FR 24 (segundo conjunto de 4 quartos de sessões). São mostrados, na figura, os dados individuais de todos os 6 sujeitos.

Observando-se as condições de linha de base no gráfico de cada um dos sujeitos (quadrados vazios, quartos de sessões anteriores às Condições tand VI FR S+/S-, gráficos à direita e esquerda na figura, respectivamente), verifica-se que os estímulos sinalizadores das tentativas são produzidos em frequências bastante semelhantes. Note, na figura, que os quadrados praticamente se sobrepõem e que ambos os estímulos são produzidos em quase todas as 16 tentativas (de cada tipo) apresentadas.

Comparando-se a Condição tand VI FR 15 S+ (gráficos à esquerda da figura, primeiro conjunto de quartos de sessões) entre todos os sujeitos, pode-se verificar que a frequência de produção de S- (em VI, quadrados verdes vazios) e S+ (em tand VI FR, quadrados vermelhos cheios) é relativamente semelhante, para a maior parte dos sujeitos, em praticamente todos os quartos de sessões. Note que as curvas, muitas vezes, se sobrepõem. Para todos os sujeitos, exceto o Pombo 37, a mudança de esquema de VI para tand VI FR quase não alterou a frequência de produção de S+ no 1º quarto desta condição em relação ao quarto anterior, fase de linha de base. Para o Pombo 37, diferentemente dos outros 5 sujeitos, as curvas de produção de S+ e S- são marcadamente distintas e, logo no 1º quarto da Condição tand VI FR 15 S+ observa-se, em relação ao quarto anterior, uma diminuição abrupta na frequência de produção de S+ e uma diminuição menos acentuada na de S-.

No decorrer dos quartos de sessões desta condição (Condição tand VI FR 15 S+), os sujeitos apresentam diferentes tendências na produção dos estímulos sinalizadores. Para os Pombos 27 e 34 (no caso de S+ e de S-) e 35 (somente S+), a frequência de produção deste(s) estímulo(s) diminui lenta e gradativamente ao longo da condição. Para o Pombo 31, esta permanece constante até o 3º quarto da condição e diminui, levemente, apenas no último quarto. Para os Pombos 35 (no caso de S-) e 36 (S+ e S-), há uma relativa estabilidade durante toda a condição. E, finalmente, para o Pombo 37, observa-se uma diminuição na frequência de produção de ambos os estímulos entre o 1º e o 2º quartos, seguida de um aumento constante e gradual no caso do S+, e de uma relativa estabilidade, no caso de S-.

Ainda na Condição tand VI FR S+, mas agora em FR 24 (gráficos à esquerda da figura, segundo conjunto de quartos de sessões), pode-se observar que, para a maioria dos sujeitos, acentua-se a distinção entre as frequências de produção de S+ e de S-, no decorrer desta condição, em relação à condição descrita anteriormente, em FR 15. Para todos os sujeitos, exceto o Pombo 31, a frequência de produção de S+ é menor do que a de S- em todos os quartos desta condição. Além disso, podem ser observadas diferentes tendências na produção de cada um desses estímulos. A frequência de produção de S+ no 1º quarto desta condição, comparada com o quarto anterior (em FR 15), praticamente não se altera (Pombos 31, 34, 35 e 36) ou claramente diminui (Pombos 27 e 37). No decorrer da condição, há uma clara e gradual diminuição na produção de S+ para os Pombos 35 e 36, mas não para os Pombos 27, 34 e 37, cujas frequências se mantiveram praticamente constantes. No caso específico do Pombo 37, S+ nunca é produzido. Para o Pombo 31, após uma diminuição inicial entre o 1º e o 2º quarto de sessões, observa-se um aumento gradual e progressivo até o último quarto. A produção de S-, em VI (quadrados verdes vazios), basicamente acompanha a

tendência descrita para S+ nos dados dos Pombos 31 e 36. Para os Pombos 34 e 37, há uma clara tendência de diminuição no número de S- produzidos ao longo dos quartos de sessões. Para o Pombo 35, por outro lado, a produção de S- mantém-se praticamente constante e, para o Pombo 27, aumenta.

Passando-se agora a observar a Condição tand VI FR 15 S- (gráficos à direita na figura, primeiro conjunto de quartos de sessões) e comparando-se os dados de todos os sujeitos, pode-se constatar que, excluindo os Pombos 27 e 37, todos eles mantêm-se produzindo S+ (em VI, quadrados vermelhos vazios) e S- (em tand VI FR, quadrados cheios verdes) basicamente como em linha de base, sem apresentar tendências marcantes ao longo dos quartos desta condição. Para os Pombos 27 e 35, nota-se uma maior variabilidade na frequência de produção de S- ao longo da condição em comparação com os outros sujeitos. Para o Pombo 37, observa-se um aumento lento e constante na frequência de produção de S- no decorrer da condição. Em relação à S+ (em VI, quadrados vermelhos vazios), para este sujeito, há um aumento entre o 1º e o 2º quarto da condição seguido de estabilidade até o quarto final.

Ainda na Condição tand VI FR S-, mas agora em FR 24 (gráficos à direita na figura, segundo bloco de quartos de sessões), pode-se observar que, para todos os sujeitos, a produção de S+ (em VI, quadrados vermelhos vazios) foi mantida, ao longo dos blocos de sessões, em valores próximos aos de linha de base. A frequência de produção de S- (em tand VI FR 24, quadrados verdes cheios), para o Pombo 31, também mantém-se praticamente inalterada em relação à linha de base. Para os outros 5 sujeitos, entretanto, ela diminui no primeiro quarto desta condição em relação ao último quarto da condição anterior, em FR 15 e, na sequência, é seguida por uma tendência de aumento ao longo dos quartos de sessões. No último quarto desta condição, todos os sujeitos produzem S+ e S- como em linha de base.

A **Figura 2-2** mostra a frequência de respostas na presença do estímulo do esquema misto nas tentativas TS+ (quadrados vermelhos) e TS- (quadrados verdes) ao longo de quartos de sessões nas condições em que os esquemas tand VI FR (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor para a produção de um dos estímulos sinalizadores. Esta figura é semelhante à figura anterior, exceto que a frequência de produção dos estímulos sinalizadores foi substituída por frequência de respostas. Novamente, os gráficos à esquerda representam a Condição tand VI FR S+ e os gráficos, à direita, a Condição tand VI FR S-. São mostrados os dados individuais para todos os 6 sujeitos.

Observando-se as fases de linha de base no quarto de sessões anterior às Condições tand VI FR S+ (gráficos à esquerda na figura) e tand VI FR S- (gráficos à direita), pode-se verificar que, para 5 dos 6 sujeitos, a frequência de respostas nas tentativas TS+ e TS- é bastante semelhante (note como os quadrados na curva quase sempre se sobrepõem). Para o Pombo 36, como única exceção, a frequência de respostas nas tentativas TS- é maior do que nas tentativas TS+.

Na Condição tand VI FR S+, em FR 15 (gráficos à esquerda, primeiro conjunto de quartos de sessões), comparando-se os dados de todos os sujeitos, pode-se observar que a introdução do esquema tand VI FR nas tentativas TS+ (quadrados vermelhos cheios) produz um aumento na frequência de respostas logo no 1º quarto de sessões desta condição em relação ao quarto anterior em linha de base. No decorrer desta condição, pode-se observar, para a maior parte dos sujeitos, uma tendência de diminuição no número de respostas. Esta diminuição, para os Pombos 27 e 36, foi mais evidente enquanto que, para os Pombos 31, 34 e 35, foi mais sutil. Para o Pombo 37, em contraste com os outros sujeitos, ocorre uma diminuição entre o 1º e o 2º quarto de sessões seguida por um aumento lento e gradual até o final da condição. Para todos os sujeitos, mais evidentemente para os Pombos 27, 31 e 34, o número de respostas nas tentativas

Figura 2-2 - Frequência de respostas na presença do estímulo do esquema misto nas tentativas TS+ (quadrados vermelhos) e TS- (quadrados verdes) ao longo de quartos de sessões nas condições em que os esquemas tand VI FR (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor para a produção de um dos estímulos sinalizadores (Condição tand VI FR S+, gráficos à esquerda na figura e Condição tand VI FR S-, gráficos à direita). Esta figura é semelhante à figura anterior, exceto que a frequência de produção dos estímulos sinalizadores foi substituída por frequência de respostas. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 6 sujeitos.

Condição tand VI FR S+

Condição tand VI FR S-

Freqüência de respostas nas tentativas TS+ e TS-

Pomba 27

Pomba 31

Pomba 34

Pomba 35

Pomba 36

Pomba 37

FR 15

FR 24

FR 15

FR 24

Quartos de sessões

TS+ em VI TS- em VI TS+ em tand VI FR 15 TS- em tand VI FR 15

TS- (em VI, quadrados verdes vazios) é sempre menor do que nas tentativas TS+ (em tand VI FR, quadrados vermelhos cheios), exceto para o Pombo 36, no 4º quarto. Para todos os sujeitos, as tendências das curvas nas tentativas TS- são basicamente semelhantes às observadas nas tentativas TS+. Como exceções, para o Pombo 37, a frequência de respostas em TS- mantém-se praticamente constante ao longo dos quartos desta condição. Para o Pombo 36, observa-se um claro aumento entre o 3º e 4º quartos desta condição.

Observando-se a Condição tand VI FR S+ quando estava em vigor FR 24 (gráficos à esquerda da figura, segundo conjunto de quartos de sessões), verifica-se que a mudança no valor do FR, para 4 sujeitos (Pombos 31, 34, 35 e 36) é acompanhada por um aumento no número de respostas nas tentativas TS+ (quadrados vermelhos cheios), logo no 1º quarto desta condição, em relação ao quarto anterior, em FR 15. Para os outros dois sujeitos, não há alteração (Pombo 27) ou ocorre uma diminuição (Pombo 37). No decorrer desta condição, os sujeitos revelam diferentes padrões na frequência de respostas. O padrão observado nos dados dos Pombos 35 e 36 é uma tendência geral de diminuição no decorrer da condição. Para os Pombos 27, 34 e 37, praticamente não se observa nenhuma tendência e, apenas para o Pombo 31, verifica-se uma tendência de aumento constante. Em relação às tentativas TS- (em VI, quadrados verdes vazios), pode-se observar, nos dados de todos os sujeitos, que o número de respostas mantém-se abaixo do obtido nas tentativas TS+, em todos os quartos desta condição. No entanto, as tendência das curvas nas tentativas TS+ e TS-, no decorrer das sessões, se assemelham. Exceto para o Pombo 27, verifica-se um aumento lento e gradual na frequência de respostas em TS-.

Na Condição tand VI FR S-, em FR 15 (gráficos à direita do painel, primeiro conjunto de quartos de sessões), é possível verificar, para todos os sujeitos, um aumento na frequência de respostas nas tentativas TS-, em tand VI FR

(quadrados verdes cheios), logo no 1º quarto de sessões desta condição, em relação ao quarto anterior em linha de base. No decorrer desta condição, os dados de 3 sujeitos (Pombos 27, 36 e 37) mostram uma tendência geral de aumento no número de respostas nas tentativas TS-. Para os outros três sujeitos (Pombos 31, 34 e 35), não se verifica uma tendência clara. Quanto às respostas nas tentativas TS+, em VI (quadrados vermelhos vazios), estas são menos freqüentes do que nas tentativas TS-, para todos os sujeitos, em todos os quartos desta condição. De modo geral, o número de respostas em TS+ apresenta uma leve tendência de diminuição no decorrer da condição (Pombos 31, 34, 36 e 37). Para os Pombos 27 e 35, no entanto, tendência semelhante não é observada.

Nesta mesma Condição tand VI FR S-, porém quando esteve em vigor FR 24 (gráficos à direita na figura, segundo conjunto de quartos de sessões), podem-se verificar poucas alterações no número de respostas nas tentativas TS-, em tand VI FR (quadrados verdes cheios), logo no primeiro quarto desta condição, em relação ao quarto anterior, em FR 15. No decorrer da condição, observa-se, sistematicamente para todos os sujeitos, uma tendência de aumento no número de respostas nas tentativas TS-. Nas tentativas TS+, em VI (quadrados vermelhos vazios), o aumento no valor do FR não produz alterações marcantes na freqüência de respostas em relação à condição anterior, em FR 15. Para a maioria dos sujeitos, o número de respostas manteve-se próximo aos valores de linha de base. Para os Pombos 36 (a partir do 2º quarto da condição) e 37 (entre o 3º e 4º quartos), no entanto, observa-se uma tendência de aumento no número de respostas nas tentativas TS+.

As **Figuras 2-1 e 2-2** mostram o desempenho dos sujeitos no decorrer de blocos de sessões nas condições em que o esquema tand VI FR 15 esteve em

vigor em um dos tipos de tentativas. Observando-se a Figura 2-1, notam-se poucas diferenças na produção de S+ ou de S- em relação à linha de base. As que podem ser observadas limitam-se aos dados de alguns pombos que, em tand VIFR 15, mostram uma tendência geral de diminuição na frequência de produção de S+ (por exemplo, os Pombos 27, 34, 35) não observada na condição em que este esquema esteve em vigor para a produção de S-. Diferenças nas frequências de respostas nas tentativas TS+ e TS- (Figura 2-2), no entanto, revelam os efeitos do esquema tand VIFR 15 mais claramente e com maior sistematicidade entre os sujeitos. Nesta figura, para a maioria deles, houve uma tendência geral de diminuição no número de respostas nas tentativas TS+ (em tand VI FR 15) ao longo dos blocos de sessões. Por outro lado, nas tentativas TS- (também em tand VI FR 15), as frequências de respostas não revelam tendências marcantes (Pombos 31, 34 e 35) ou apresentam uma tendência de aumento (Pombos 27, 36 e 37).

Com o aumento do valor do FR, de FR 15 para FR 24, as diferenças entre as frequências de produção de S+ e de S- tornam-se mais claras. Em tand VI FR 24, para a maioria dos sujeitos, S- é gradualmente mais produzido ao longo das sessões. Ao final da condição neste esquema, consistentemente para todos os pombos, S- é produzido praticamente tanto quanto S+ (em VI). Por outro lado, quando S+ está associado a tand VI FR 24, observa-se uma maior variabilidade de desempenho entre os sujeitos. Um sujeito deixa absolutamente de produzir S+ (Pombo 37); dois sujeitos o produzem gradualmente menos no decorrer das sessões (Pombos 35 e 36); dois outros não mostram tendências claras (Pombos 27 e 34); e, apenas para o Pombo 31, ocorre uma tendência de aumento na produção de S+ comparável ao observado na condição em que S- é produzido neste esquema.

Os dados do Pombo 37, entre os de todos os sujeitos, mostram as diferenças mais marcantes entre as frequências de produção de S+ e S-, em tand VI FR 24, no decorrer dos blocos de sessões. Por um lado, a frequência de produção de S+, neste esquema, mantém-se igual a zero em todos os blocos de sessões desta condição. Por outro, a frequência de produção de S- mostra uma tendência acentuada de aumento. O Pombo 31, também diferentemente dos outros sujeitos, mostra um desempenho bastante semelhante em relação à produção de S+ e de S- em esquema tand VI FR. Para este sujeito, ambos os estímulos, em ambos os valores de FR, são produzidos tanto quanto em VI. Este sujeito é o único que, em tand VI FR 24, apresenta tendência de aumento na frequência de respostas que produzem a apresentação de S+.

A **Figura 3-1** mostra a frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) ao longo de intervalos de 5 segundos nas tentativas. Os dados mostrados referem-se à média das 5 últimas sessões nas Fases 1 e 3 em que ambos os estímulos eram produzidos em esquema de VI 15 s. Nesta figura, são mostrados os dados do Pombo 27 (gráficos à esquerda na figura), por serem representantes fiéis dos dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36 nestas mesmas fases e do Pombo 37 (gráficos à direita), por se diferenciarem dos dados obtidos com os outros 5 sujeitos. Em Anexo 3, encontram-se os gráficos dos outros 4 pombos.

Nesta figura, comparando-se os gráficos do Pombo 27 em ambas as fases mostradas, pode-se verificar que as frequências acumuladas de produção de S+ e de S- são bastante semelhantes em todos os intervalos de 5 s. Em todas as fases, nota-se um padrão similar e sistemático de linha de base para 5 dos 6 sujeitos. De modo geral, cerca de 3/4 do número máximo de produção dos estímulos ocorre

Figura 3-1 - Frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) ao longo de intervalos de 5 segundos nas tentativas. Os dados mostrados referem-se à média das 5 últimas sessões nas Fases 1 e 3 nas quais ambos os estímulos eram produzidos em esquema de VI 15 s. Nesta figura, são mostrados os dados do Pombo 27 (gráficos à esquerda na figura), por serem representantes fiéis dos dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36 (cujos dados estão sendo mostrados em Anexo 3) nestas mesmas fases e do Pombo 37 (gráficos à direita), por se diferenciarem dos dados obtidos com os outros 5 sujeitos.

- Case, D.A. e Fantino, E. (1981). The delay-reduction hypothesis of conditioned reinforcement and punishment: observing behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 35, 93-108.
- Case, D.A. e Fantino, E. (1989). Instructions and reinforcement in the observing behavior of adults and children. *Learning and Motivation*, 20, 373-412.
- Case, D.A., Fantino, E. e Wixted, J. (1985). Human observing maintained by negative informative stimuli only if correlated with improvement in response efficiency. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 43, 289-300.
- Case, D.A., Ploog, B.O. e Fantino, E. (1990). Observing behavior in a computer game. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 54, 185-199.
- Cumming, W. W. e Berryman, R. (1961). Some data on matching behavior in the pigeon. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 4, 281-284.
- Daly, H.B. (1985). Observing response acquisition: preference for unpredictable appetitive rewards obtained under conditions predicted by DMOD. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes*, 11, 294-316.
- Dinsmoor, J.A. (1983). Observing response and conditioned reinforcement. *The Behavioral and the Brain Sciences*, 6, 693-704.
- Dinsmoor, J.A. (1995a). Observing response and conditioned reinforcement. *The Behavior Analyst*, 18, 51-68.
- Dinsmoor, J.A. (1995b). Observing response and conditioned reinforcement. *The Behavior Analyst*, 18, 253-269.
- Dinsmoor, J.A., Bowe, C.A., Dout, D.L., Martin, L.T., Mueller, K.L., e Workman, J.D. (1983). Separating the effects of salience and disparity on the rate of observing. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 40, 253-264.
- Dinsmoor, J.A., Bowe, C.A., Green, L. e Hanson, J. (1988). Information on response requirements compared with information on food density as a reinforcer of observing in pigeons. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 49, 229-237.
- Dinsmoor, J.A., Browne, M.P. e Lawrence, C.E. (1972). A test of the negative discriminative stimulus as a reinforcer of observing. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 18, 79-85.

- Dinsmoor, J.A., Mueller, K.L., Martin, L.T. e Bowe, C.A. (1982). The acquisition of observing. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 38, 249-263.
- Dinsmoor, J.A., Mulvaney, D.E. e Jwaideh, A.R. (1981). Conditioned reinforcement as a function of duration of stimulus. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 36, 41-49.
- Dinsmoor, J.A., Sears, G.W. e Douthett, D.L. (1976). Observing as a function of stimulus difference. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes*, 2, 154-162.
- Egger, M.D. e Miller, N.E. (1962). Secondary reinforcement in rats as a function of information value and reliability of the stimulus. *Journal of Experimental Psychology*, 64 (2), 97-104.
- Fantino, E. e Case, D.A. (1983). Human observing: maintained by stimuli correlated with reinforcement but not extinction. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 40, 193-210.
- Fantino, E., Case, D.A. e Altus, D. (1983). Observing reward-informative and uninformative stimuli by normal children of different ages. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 36, 437-452.
- Fantino, E. e Logan, C.A. (1979). *The experimental analysis of behavior: a biological perspective*. San Francisco: Freeman.
- Ferster, C. B. (1960). Intermittent reinforcement of matching to sample in the pigeon. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 3, 259-272.
- Fleshler, M. e Hoffman, H.S. (1962). A progression for generating variable-interval schedules. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 5, 529-530.
- Hendry, D.P. (1969). Introduction. Em D.P. Hendry (Ed.), *Conditioned reinforcement*. Homewood, IL: Dorsey.
- Hendry, D.P. (1983). Uncertainty, information, observing. *Behavioral and Brain Sciences*, 6, 708-709.
- Hirota, T.T. (1972). The Wychoff observing response -- A reappraisal. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 18, 263-276.

- Hirota, T.T. (1974). The relationship between observing behavior and food-key response rates under mixed and multiple schedules of reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 21, 259-266.
- Jenkins, H.M. e Boakes, R.A. (1973). Observing stimulus sources that signal food or no food. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 197-207.
- Jwaideh, A.R. e Mulvaney, D.E. (1976). Punishment of observing by a stimulus associated with the lower of two reinforcement densities. *Learning and Motivation*, 7, 211-222.
- Kaminski, B.J. e Moore, J. (1990). A fading procedure facilitates the maintenance of observing responses when the more valued stimulus is not produced. *Animal Learning and Behavior*, 18 (4), 423-433.
- Kendall, S.B. (1973a). Redundant information in an observing-response procedure. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 19, 81-92.
- Kendall, S.B. (1973b). Effects of two procedures for varying information transmission on observing responses. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 73-83.
- Kendall, S.B. (1974). Preference for intermittent reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 21, 463-473.
- Kendall, S.B e Gibson, D.A . (1965). The effects of discriminative stimulus removal on observing behavior. *Psychological Record*, 261-280.
- Kelleher, R.T., Riddle, W.C. e Cook, L. (1962). Observing responses in pigeons. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 5, 3-13.
- Kish, G.B. (1966). Studies of sensory reinforcement. Em W.K. Honig (Ed.), *Operant behavior: areas of research and application* . New York: Appleton-Century-Crofts.
- Levis, D.J. e Perkins, C.C. (1965). Acquisition of observing responses with water reward. *Psychological Reports*, 16, 114.
- Lieberman, D.A. (1972). Secondary reinforcement and information as determinants of observing behavior in monkeys (*Macaca mulatta*). *Learning and Motivation*, 3, 341-358.

- Lieberman, D.A; Cathro, S.S., Nichol, K. e Watson, E.(1997). The role of S- in human observing behavior: bad news is sometimes better than no news. *Learning and Motivation*, 28, 20-42.
- Lutz, R.E. e Perkins, C.C.Jr. (1960). A time variable in the acquisition of observing response. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 53 (2), 180-182.
- Mitchell, K.M., Perkins, N.P. e Perkins, C.C. (1965). Conditions affecting acquisition of observing responses in the absence of differential reward. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 60, 435-467.
- Mueller, K.L. e Dinsmoor, J.A. (1984). Testing the reinforcement properties of S-: a replication of Lieberman's procedure. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 41, 17-25.
- Mueller, K.L. e Dinsmoor, J.A. (1986). The effect of negative stimulus presentations on observing-response rates. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 46, 281-291.
- Mulvaney, D.E., Dinsmoor, J.A., Jwaideh, A.R. e Hughes, L.H. (1974). Punishment of observing by the negative discriminative stimulus. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 21, 37-44.
- Mulvaney, D.E., Hughes, L.H., Jwaideh, A.R. e Dinsmoor, J.A. (1981). Differential production of positive and negative discriminative stimuli by normal and retarded children. *Journal of Experimental Psychology*, 32, 389-400.
- Nevin, J.A. (1973): Conditioned reinforcement. In: *The study of behavior*. Em , J.A. Nevin. e G.S. Reynolds (org.). Glenview: Scott Foresman, 155-198.
- Ohta, A. (1987). Observing responses maintained by conditional discriminative stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 48, 355-366.
- Perkins, C.C.Jr. (1968) An analysis of concept of reinforcement. *Psychological Review*, 75, 155-172.
- Perone, M. e Baron, A. (1980). Reinforcement of human observing behavior by stimulus correlated with extinction or increased effort. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 34, 239-261.

- Perone, M. e Kaminski, B.J. (1992). Conditioned reinforcement of human observing behavior by descriptive and arbitrary verbal stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 58, 557-575.
- Preston, G.C. (1985). Observing responses in rats: support for the secondary reinforcement hypothesis. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 37B, 23-31.
- Prokasy, W.F. (1956). The acquisition of observing responses in the absence of differential external reinforcement. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 49, 131-134.
- Schaub, R. E. (1969). Response-cue contingency and cue effectiveness. Em D.P. Hendry (Ed.), *Conditioned Reinforcement*. Homewood, IL: Dorsey Press.
- Schaub, R.E. e Honig, W.K. (1967). Reinforcement of behavior with cues correlated with extinction. *Psychonomic Science*, 7 (1), 15-16.
- Schrier, A.M., Thompson, C.R. e Spector, N.R. (1980). Observing behavior in monkeys (*Macaca arctoides*): support for the information hypothesis. *Learning and Motivation*, 11, 355-365.
- Sidman, M. (1960). Tactics of scientific research. New York: Basic Books.
- Sidman, M. (1994). Equivalence relations and behavior: a research story. Authors Cooperative, Inc., Boston, MA.
- Tomanari, G. Y. (1995). Variáveis determinantes da resposta de observação. *Dissertação de mestrado apresentada no IP-USP*.
- Wehling, H.E. e Prokasy, W.F. (1962). Role of food deprivation in the acquisition of the observing response. *Psychological Reports*, 10, 399-407.
- Wilton e Clements (1971a). Observing responses and informative stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 15, 199-204.
- Wilton e Clements (1971b). The role of information in the emission of observing responses: a test of two hypotheses. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 16, 161-166.
- Wyckoff, L.B.Jr. (1952). The role of observing responses in discrimination learning - Part I. *Psychological Review*, 59, 431-442.

Wyckoff, L.B.Jr. (1969). The role of observing responses in discrimination learning. Em
D.P. Hendry (Ed.). Conditioned Reinforcement. Homewood, IL: Dorsey Press.

Anexo 1:

Respostas de observação em diferentes espécies de sujeitos

1) Sujeitos Humanos

Os estudos envolvendo respostas de observação em sujeitos humanos têm utilizado, geralmente, o procedimento de escolha entre dois manipulandos de observação. De modo geral, os dados têm mostrado que, em humanos, o estímulo correlacionado com maior taxa de reforçamento é preferido ao estímulo correlacionado com menor ou nula taxa de reforçamento. Contudo, há condições em que a preferência é pelo estímulo correlacionado com o evento não/menos reforçador:

1. Quando a produção deste estímulo propicia, aos sujeitos, maior eficiência no desempenho no esquema básico de reforçamento ou economia de esforço (Fantino e Case, 1985);
2. Quando outros tipos importantes de reforçamento estão envolvidos (Case, Ploog e Fantino, 1990);
3. Quando instruções verbais estabelecem os estímulos como reforçadores ou punidores condicionados (Case e Fantino, 1989).

Além disso, outros dados têm sido revelados pelas pesquisas em respostas de observação em humanos:

1. a preferência pelo estímulo não-correlacionado (que mantém alguma associação com reforçamento, porém não é informativo) não varia com a idade, seja em diferentes estágios de desenvolvimento de crianças ou em adultos (Fantino e Case, 1983 e Case e Fantino, 1989);
2. Crianças com retardo mental apresentam um desempenho em observação similar ao obtido com pombos (Mulvaney e col. 1981);
3. Aumento na magnitude do reforço (dinheiro) não aumenta a importância do evento menos reforçador a ele associado de modo que as respostas que produzem o estímulo correlacionado a este evento sejam mantidas (Case e Fantino, 1989);
4. As instruções verbais fornecidas aos sujeitos pelo experimentador, assim como as regras pré-experimentais que os acompanham, têm assumido um importante papel na determinação das respostas de observação em humanos (Perone e Kaminski, 1992)¹⁹.
5. A crença dos sujeitos de que as respostas de observação alteram a probabilidade de reforçamento na chave principal parecem alterar o valor reforçador condicionado de S- (Lieberman e col., 1997).

¹⁹ Recentemente, Case (1997) replicou este estudo porém não chegou a resultados semelhantes.

Case, D. A. (1997) Human observing behavior inconsistent with uncertainty-reduction and a second failure to replicate Perone and Kaminski (1992). *Annual Meeting of the Association for the Behavior Analysis*, Chicago.

2) Sujeitos Macacos

Os trabalhos com macacos mostram as maiores evidências na área de que, pelo menos em algumas circunstâncias, S- mantém propriedades reforçadoras condicionadas:

1. Ao se descontinuar a produção de S- ou ao se introduzir fontes alternativas de sinalização, observou-se uma queda no número de respostas de observação (Lieberman, 1972).
2. Alterando-se diferencialmente a exigência no esquema de reforçamento para a produção de S+ e de S-, observou-se uma adaptação gradual às contingências quando as respostas de observação eram conseqüenciadas por qualquer um dos estímulos (Schrier e col., 1980).

3) Sujeitos Pombos

Os dados obtidos com pombos em procedimentos de resposta de observação têm confirmado a proposição de Wyckoff (1952, 1959) de que estímulos discriminativos adquirem propriedades reforçadoras condicionadas. Após uma série inicial de trabalhos que calibraram e inovaram o procedimento de resposta de observação (Wilton e Clements, 1971a,b; Kendal, 1973a; Kelleher, Riddle e Cook, 1962; Kendal, 1965; Kendal e Gibson, 1965), outras investigações executaram estudos mais precisos quanto a avaliação dos efeitos dos estímulos sinalizadores na manutenção das respostas de observação (Hirota, 1972,1974; Browne e Dinsmoor, 1974). Estes estudos separaram o número de respostas que produziam, ou o tempo gasto para produzir os estímulos associados com

reforçamento (S+) e extinção (S-). Como resultado, foram reveladas propriedades reforçadoras condicionadas de S+, mas não de S-.

Utilizando diferentes procedimentos, outros autores chegaram a conclusões semelhantes: Jenkins e Boakes (1973), utilizando as respostas de olhar para (ou se orientar para) fontes de estímulos como respostas de observação; Kendal (1973b), utilizando procedimento de tentativas nos quais as respostas de observação podiam produzir estímulos redundantes; Auge (1973), utilizando componentes dos esquemas múltiplo e misto diferenciados pela magnitude de reforço; e Dinsmoor, Browne e Lawrence (1972), eliminando do procedimento a possibilidade dos sujeitos produzirem S+ ou S-.

O estudo de Dinsmoor e col., (1972), aliás, acabou sugerindo, através de seus resultados, que S-, além de não manter as respostas de observação, poderia adquirir propriedades aversivas. Estudos subseqüentes a este, como os de Mulvaney, Dinsmoor, Jwaideh e Hughes (1974), Jwaideh e Mulvaney (1976) e Blanchard (1975), acabaram reforçando esta sugestão.

Poucos estudos realizados com pombos mostraram dados em que S- seria produzido pelas respostas de observação. Os estudos de Schaub e Honig (1967) e Schaub (1969), apesar de o terem feito, são descartados por problemas metodológicos. Ohta (1987) mostrou respostas fragilmente mantidas por estímulos condicionais (portanto, não associado a reforçamento). Tomanari e Machado (1992) mostraram a manutenção de respostas de observação, tanto por S+ quanto por S-. No entanto, para um único sujeito.

Vários estudos na área manipularam variáveis dentro do paradigma de respostas de observação:

1. *Esquemas dependentes e independentes de reforçamento.* Dinsmoor, Bowe, Green e Hanson (1988) mostraram que, esquemas dependente e independente

de respostas parecem não afetar diferencialmente as respostas de observação. As diferenças na taxa de reforçamento entre os esquemas, isto sim, afetam-nas substancialmente.

2. *Aspectos físicos dos estímulos sinalizadores.* Dinsmoor, Sears e Dout (1976), Dinsmoor, Mueller, Martin e Bowe (1982) e Dinsmoor, Bowe, Dout, Martin, Mueller e Workman (1983) realizaram um série de estudos para verificar os efeitos da discrepância e saliência dos estímulos sobre as respostas de observação. Observaram que, quanto maior a saliência entre os estímulos discriminativos e o estímulo do misto, maior a taxa de respostas de observação. A discrepância entre os estímulos discriminativos entre si não pareceu exercer influência tão marcante.
3. *Natureza da discriminação.* Bowe e Dinsmoor (1983) mostraram que dois estímulos, que sinalizam diferentes relações temporais de reforçamento, mantêm respostas de observação. Enquanto que, estímulos que sinalizam diferentes relações espaciais de reforçamento (onde o reforço está disponível) não mantêm.
4. *Duração do tempo de apresentação dos estímulos.* Dinsmoor, Mulvaney e Jwaideh (1981) mostraram que a taxa de respostas de observação descreve uma função crescente, de aceleração negativa, em relação ao aumento do tempo de apresentação dos estímulos sinalizadores.
5. *Duração dos componentes.* Branch (1973) mostrou que diferentes durações de componentes de reforçamento e extinção não afetam o número de respostas de observação.

6. *Valor dos esquemas de reforçamento.* Case e Fantino (1981) mostraram que a frequência de respostas de observação varia diretamente com o aumento na densidade de reforçamento proporcionada pelos valores dos esquemas. Sugerem que o valor reforçador condicionado de um estímulo seja determinado pela redução do atraso, do início da apresentação do estímulo até o reforço, proporcionado por este estímulo. Apontam, ainda, que outros fatores, como reforçamento sensorial (Kish, 1966) ou a informação proporcionada pelo estímulo podem alterar o valor reforçador dos estímulos sinalizadores.

4) Sujeitos Ratos

Os estudos sobre resposta de observação em ratos podem ser agrupados em dois conjuntos. Um deles foi realizado entre as décadas de 50 e 60 e teve como base o procedimento de Prokasy (1956). Uma série de estudos seguiram-se a este testando variações de procedimento. Foram investigados o tempo de exposição aos estímulos (Lutz e Perkins, 1960), o grau de privação dos sujeitos (Wehling e Prokasy, 1962), a magnitude de reforço (Mitchell, Perkins e Perkins, 1965) e a natureza (água) e magnitude de reforço (Levis e Perkins, 1965) sobre a preferência adquirida pelos sujeitos, ao longo das sessões, pelo lado de um labirinto em que eram apresentados estímulos que discriminavam entre as tentativas com e sem reforço (versus o lado alternativo em que não discriminavam). Excepcionalmente, este resultado não foi observado quando a magnitude de reforço foi de 1 pelota de ração (0,045g) (Mitchell e col., 1965) e quando o atraso de reforço era igual a zero (Lutz e Perkins, 1960). Daly (1985) retoma esta linha de investigação e fortalece estes dados.

Estes estudos mostraram com regularidade que, quando permitido, ratos escolhem situações em que produzem estímulos discriminativos das contingências em vigor (versus os que não produzem). A explicação dos autores a este fenômeno, na época, baseava-se na hipótese de respostas preparatórias de Perkins (1968). Segundo esta hipótese, os estímulos discriminativos adquiririam valor reforçador condicionado porque permitiriam aos sujeitos otimizar as respostas preparatórias envolvidas no consumo do reforço.

Outra linha de investigação que se seguiu à de Prokasy (1956) procurou compreender a manutenção das respostas de observação através do procedimento proposto por Wyckoff (1952). No entanto, em comparação com outras espécies, o número de estudos que compararam o valor reforçador condicionado de S+ e S- em ratos é pequeno e tem apontado divergências em seus resultados (Carvalho e Machado, 1992; Preston, 1985; Tomanari e Machado, 1996).

Anexo 2:

Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza

Segundo a Hipótese do reforçamento condicionado, um estímulo se tornará reforçador quando for associado, por pareamento seletivo, com o reforço incondicionado. Basicamente, a maior probabilidade de ocorrência do reforço primário na presença de um estímulo do que na sua ausência determinaria seu valor reforçador condicionado (Dinsmoor, 1983). Uma derivação desta hipótese é a Hipótese da redução-do-atraso (Fantino e Logan, 1979), que afirma que um estímulo neutro se tornará um reforçador condicionado tanto mais forte quanto mais reduzir a distância temporal em relação ao reforçador incondicionado. Tecnicamente, essa redução pode ser especificada em termos da razão entre dois intervalos médios: o intervalo entre o início do estímulo que precede o reforçador e o próprio reforçador e o intervalo entre dois reforçamentos sucessivos. Esta razão especifica o quanto o estímulo que precede o reforçador sinaliza a redução no tempo a transcorrer até a liberação do reforçador. Portanto, reduzir, como usado por Fantino e Logan (1979), significa que um estímulo sinaliza maior proximidade temporal com a liberação do reforçador incondicionado, em relação a um outro estímulo, temporalmente mais distante. Não se refere, portanto, a uma diminuição, de fato, no tempo até o reforçamento.

Exemplificando: no caso de um esquema de intervalo fixo de 100 segundos (FI 100 s), o intervalo entre dois reforçadores incondicionados é de 100 segundos. Um estímulo S1 que seja apresentado no 30º segundo após a liberação do último reforçador estaria sinalizando uma redução de 30% no tempo até o próximo reforçador. Um estímulo S2, que seja apresentado no 70º segundo após o

último reforçador, indicaria uma redução de 70% no intervalo entre reforços (figura a seguir).

Esquema exemplificando o estabelecimento de estímulos neutros, S1 e S2, como reforçadores condicionados, segundo a Hipótese da redução-do-atraso (supor apresentação não coincidente de S1 e S2).

Segundo a Hipótese da redução-do-atraso, o estímulo S2 adquiriria um valor de reforçador condicionado mais forte, se comparado com S1, uma vez que estaria sinalizando uma maior redução no atraso do reforço, ou seja, sinalizaria maior proximidade em relação ao reforço incondicionado.

No caso específico do procedimento em respostas de observação, quando a resposta produz o estímulo sinalizador do componente que libera maior frequência de reforços (S+), estaria ocorrendo uma diminuição, em relação ao estímulo anteriormente presente, no intervalo (médio) entre a até a sua apresentação e a liberação do reforço. Por outro lado, quando a resposta de

observação produz o estímulo sinalizador do componente em que ocorre menor frequência (ou frequência zero) de apresentação do reforçador incondicionado (S^-), estaria ocorrendo um aumento no intervalo (médio) até o próximo S^R . Isso significa que a resposta de observação seria mantida quando produz (e porque produz) S^+ e não quando produz S^- . Dinsmoor (1983) afirma que, na situação em que produz tanto S^+ quanto S^- (dependendo do componente em vigor no misto), a resposta se mantém porque produz S^+ , ainda que intermitentemente. Nas condições experimentais em que a resposta de observação produz apenas S^- , ela não se manteria, segundo o modelo de redução do atraso.

A Hipótese da redução-da-incerteza sustenta que o valor reforçador condicionado de um estímulo depende do quanto ele informa sobre a disponibilidade ou sobre a ausência do reforçador incondicionado (Berlyne, 1957; Hendry, 1969; Hendry, 1983). Considerem-se, por exemplo, dois estímulos, $S1$ e $S2$, sendo apresentados imediatamente antes do reforçador incondicionado, como ilustra a figura a seguir (Nevin, 1973).

Esquema exemplificando, em dois casos distintos, o estabelecimento de dois estímulos neutros, $S1$ e $S2$, como reforçadores condicionados, segundo a Hipótese da redução-da-incerteza.

Segundo a Hipótese da redução-da-incerteza, o estímulo neutro S1 deveria adquirir propriedades reforçadoras condicionadas em ambos os casos. No Caso 1, S2 é redundante, já que a informação acerca do reforço incondicionado já teria sido fornecida pelo estímulo S1. No Caso 2, S2 não seria um preditor confiável da chegada do reforçador incondicionado; nem todas as vezes que é apresentado, ele estaria informando sobre a chegada do reforço. Segundo esta hipótese, um estímulo é informativo e, portanto, deverá adquirir valor reforçador condicionado, dependendo de quanto ele prediz sobre a probabilidade de ocorrência do reforçador incondicionado.

Em relação ao procedimento de resposta de observação, de acordo com a Hipótese da redução-da-incerteza, S- seria, também, capaz de manter as respostas que o produzem, uma vez que qualquer estímulo informativo, independentemente de informar sobre maior ou menor probabilidade de reforçamento, seria um reforçador condicionado. É importante notar, portanto, que em relação à produção do estímulo que sinaliza a maior probabilidade de reforçamento (S+), as Hipóteses da redução-do-atraso e redução-da-incerteza prevêm, igualmente, que esse estímulo deva adquirir propriedades reforçadoras condicionada. As divergências surgem, no entanto, na previsão em relação à produção do estímulo que sinaliza a menor probabilidade de reforçamento (S-).

Anexo 3 - Complemento da Figura 3-1: Frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e de S- (quadrados verdes) ao longo de intervalos de 5 s nas tentativas. Os dados mostrados referem-se à média das 5 últimas sessões das Fases 1 e 3 nas quais ambos os estímulos sinalizadores eram produzidos em esquema de VI 15 s. Nesta figura são apresentados os dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36 excluídos da Figura 3-1, Experimento 1.

Intervalos de 5 s

TS+ em VI
 TS- em VI

Anexo 4 - Complemento da Figura 4-1: Distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto ao longo de intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (1º bloco de 11 intervalos, colunas vermelhas) e TS- (2º bloco, colunas verdes). Os dados referem-se à média das 5 últimas sessões das Fases 1 e 3 em que S+ e S- eram produzidos em VI 15 s. Nesta figura, são mostrados os dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36, excluídos da Figura 4-1, Experimento 1.

Anexo 5 - Complemento da Figura 7 - Painel A: Distribuição de respostas ao disco, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas, 1º conjunto de 11 intervalos) e TS- (colunas verdes, 2º conjunto). Este painel refere-se à Condição PS (Fases 1 e 3) e mostra os dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36. Os dados mostrados foram calculados a partir da média nas 5 últimas sessões de cada fase.

Anexo 6-1: Frequência de produção de S+ e S- em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS-, separadamente, para todos os 6 sujeitos, em média nas 5 últimas sessões de todas as 4 fases do Experimento 1.

Suj	F	Produção de estímulos																							
		TS+												TS-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
P27	1	4.2	1.8	3.4	2.2	0.4	0.6	1	2.2	0	0	0	16	3.4	2.6	2.6	4	0.2	0	0.6	2.6	0	0	0	16
	2a	0.4	0.8	1.8	2.2	1	1.2	0.4	1.2	0.4	1	1	11.4	1.2	1.8	1.4	1.8	0.8	0.4	0.2	1	0.6	0	0.4	9.6
	2b	0	0	1.2	0.8	1.2	1.2	0.8	0.2	0.4	0.2	0.6	6.6	1.6	2.2	0.6	2.8	0.2	0	0.8	2	0.2	1.4	0.2	12
	3	3	2.4	4.2	3.2	0	0	0.4	2.6	0.2	0	0	16	2.6	4.2	1.8	3.8	0.2	0	0	3.4	0	0	0	16
	4a	7	1.8	3	1.8	0.4	0	0.4	0.6	0.4	0	0.2	15.6	0	0	1	0.2	1.8	1.6	2.2	1.6	0.8	0.8	3	13
P31	4b	9	1.2	2	1	0.2	0	0.4	1.4	0.4	0.2	0	15.8	0	0	0	0.4	1.4	1.2	1.6	1.6	2.6	1.2	4.4	14.4
	1	5.4	2	3	3	0	0.2	0	2.4	0	0	0	16	3.4	3.2	2.6	3.8	0	0.2	0	2.8	0	0	0	16
	2a	0.4	1.8	4	2.8	2.2	0.4	0.2	0.8	1.6	0.6	0	14.8	1.8	3.2	3.2	3.8	0.6	0.2	0	1.8	0.6	0	0	15.2
	2b	0	0	2.6	3.6	2.8	2.6	0.2	0	0	2.8	0.4	15	2.8	3	2.6	3.4	0	0.2	0.2	3	0.2	0	0	15.4
	3	4.4	1.8	4.4	2	0.2	0	0.2	2.8	0	0	0	15.8	2.8	3.4	2.2	4	0.2	0	0	3.4	0	0	0	16
P34	4a	8.4	2.4	1.8	0.4	0	0	0.4	1.8	0	0	0	15.2	0	0.2	1.6	3.8	4	3.2	0.2	0	1	2	0	16
	4b	9.6	2.4	2	0.2	0	0	1.4	0.4	0	0	0	16	0	0	0	1.6	3.8	4.2	2.6	0.6	0.2	1	2	16
	1	3.8	2.2	3.6	3.2	0	0	0.2	3	0	0	0	16	2.6	3.4	2.2	3.8	0.2	0	0.4	3.4	0	0	0	16
	2a	0	1	2	3.2	2.4	1.6	0.8	0	0.2	0.8	0	12	2.2	2.8	2.6	3.4	0.6	0	0.2	1.6	0	0	0.2	13.6
	2b	0	0	0.6	2.2	2.6	1.4	2.8	0.6	0	0	1.6	11.8	3	3.4	1.8	2.2	0	0.6	0.2	1.8	0	0	0.2	13.2
P35	3	4	2.6	3.2	2.2	0.4	0	0.4	2	0	0	0	14.8	3.4	3	2.4	4	0	0	0	2.2	0.2	0.2	0	15.4
	4a	6.8	2.8	3.2	1	0	0	0.4	1.6	0.2	0	0	16	0	0	1.2	1.8	2.2	3.4	1.6	0.8	1.2	1.4	1.6	15.2
	4b	9.2	1	2.8	1	0	0	0.4	1.6	0	0	0	16	0	0	0	1.4	1.8	3	2.4	2	1	1	2.4	15
	1	1.8	3	2.8	3.8	0.8	0.2	0	2.8	0.2	0.2	0	15.6	2.6	2.2	3.8	2.6	0.4	0.4	0.8	1.4	1.4	0.2	0	15.8
	2a	2.2	2.2	3.6	2.8	0.4	0	0.6	2	0.2	0	0	14	0	0.6	3	2.4	2	1.2	1.4	0.4	0.6	1.2	0.6	13.4
P36	2b	2.2	3.8	3.8	3.4	0	0	0.4	1.8	0.4	0.2	0	16	0	0.8	0.6	2	2.8	2.8	1.2	1.2	0.8	0.8	1.2	14.2
	3	3.4	3.4	3.6	2.6	0	0	0.2	2.6	0.2	0	0	16	2.4	4	2.2	3.8	0.4	0	0	2.6	0.6	0	0	16
	4a	0	3	4	2	2	0.8	0.2	0.4	0.4	0	0	12.8	2.4	2.2	2.8	3.6	0.4	0.2	0	1.8	0.8	0.6	0.6	15.4
	4b	0	0	0.2	1.8	1.8	1.6	0.6	0.4	0.8	0.6	0.2	8	1.2	2.8	2.6	3.4	0.8	0.8	0.2	0.8	2.8	0.2	0	15.6
	1	2.8	2.8	2.6	3.4	0.6	0	0	2.8	0.6	0	0	15.6	5	2	2.8	2.4	0.4	0	0.6	1.8	1	0	0	16
P37	2a	7.2	1	1.6	2.2	0	0	0.4	1.2	0	0	0	13.6	0	4	2	2.6	3.2	1.6	0	0	1.6	1	0	16
	2b	2.6	2.8	2.6	3.2	0	0.2	0.2	2.6	0.2	0.2	0	14.6	0	0.2	1.6	2.6	4.2	1.8	2	0	0.4	0.8	1.2	14.8
	3	5.2	1.6	4.2	1.4	0	0	0.4	2.2	0.2	0	0	15.2	3.6	2.6	2.2	4.4	0	0	0	3	0.2	0	0	16
	4a	0	5.2	3	2	1.2	0.8	0	0	1.4	0.4	0.2	14.2	3.2	3.6	2.4	3.8	0	0	0	2.4	0.2	0.2	0	15.8
	4b	0	0.2	4.8	3.6	1	1	0	0.2	0.2	0.2	0	11.2	3.2	3.8	1.4	3.4	0.2	0.2	0	1.4	0.6	0.2	0	14.4
P37	1	4.2	2.8	1	1.4	0.2	0	0	0.6	0	0	0	10.2	5.6	2	1.6	0.6	0.6	0	0.2	0.2	0.2	0	0	11
	2a	8.4	0.6	1.6	1	0.2	0	0.2	1.4	0	0	0.2	13.6	0	0	0.2	1.4	1.8	2.4	1.2	1.4	1.4	0.6	1.2	11.6
	2b	3.8	3.2	3.4	2.4	0.2	0	0	2.8	0.2	0	0	16	0	0.2	0.2	0.6	0.2	0.8	2	1.4	1.8	1	3	11.2
	3	3.8	2.8	3.2	2.4	0.8	0	0	1.2	0.6	0.2	0	15	3.4	2.8	2.4	3.4	0.8	0.2	0	1.4	1.2	0	0	15.6
	4a	0	1	1.2	1	0.6	0.2	0.2	0	0	0	0	4.2	4.4	1.8	2.6	1.2	0.2	0	0	0	0	0	0	10.2
P37	4b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4	2.4	1	1.4	0	0	0	0.2	0	0	0	7.4

Anexo 6-2: Frequência de respostas nas tentativas TS+ e TS-, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s, para todos os 6 sujeitos, em média nas 5 últimas sessões de todas as 4 fases do Experimento 1.

Suji	F	Respostas na presença do estímulo do esquema misto																							
		TS+											TS-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
P27	1	74.2	62.6	44.2	26.8	14.8	14.2	13	9	2.4	1.6	0	262.8	85.8	72.8	45.4	27.4	13.4	15.4	15.2	8.2	0	0	0	283.6
	2a	14	33.6	39.6	34.6	23.8	22	19	14.2	11.4	10	6.4	228.6	13.4	24.2	20.6	16.8	13.4	10.2	9.6	5.2	2.4	1.8	6.6	124.2
	2b	20.8	28.4	35	32.4	29.6	19	13.6	11.2	7.8	8	17.2	223	23.8	31.2	31.6	21.4	12.2	11.6	12.2	6	0.4	1.4	0.2	152
	3	52.2	60.6	54.8	30.6	19.8	19	18.2	9	0.2	0	0	264.4	49.6	61.4	53.4	36.4	22.4	23	22.2	12.4	0	0	0	280.8
	4a	37	26.2	22.8	11.2	5.4	5.8	5.8	2.6	0.4	0.2	0.2	117.6	58.2	65.4	59.8	60.6	49.4	42.4	39	30	25.2	17.4	31.6	479
4b	43.6	28.4	24.6	12.2	9.2	8.2	8	3.8	0.4	0.2	0	138.6	83.2	80.6	79.6	76.4	65.4	65.2	54.2	46	32.4	30	56.4	669.4	
P31	1	61.2	51.8	46.8	27.4	17.4	17.2	16.8	9	0	0	0	247.6	69.6	59.8	47.2	35.4	21.2	20.8	20	14	0	0	0	288
	2a	68	101.4	92.8	69.4	45.2	30.6	32.4	26	17.4	0.8	0.2	484.2	52.6	86.8	71.8	50.4	31.2	26	26.2	17.8	4.6	0	0	367.4
	2b	91.2	147.4	152.4	113.8	80.6	52.2	35	32.4	33.2	16.8	4.2	759.2	70.2	98	75.8	51.4	32.6	32.8	32.8	17.2	0.2	0	0	411
	3	87	81.2	68.8	37.6	30	29.6	29.2	9.6	0	0	0	373	82.6	96.4	77.6	54.4	34.6	33.2	31.6	19.6	0	0	0	430
	4a	49.8	35.2	28.4	21.2	20	20.8	19	4.8	0	0	0	199.2	67.8	93	111.6	99	74.2	39.6	27.6	25.4	24.6	8.6	0	571.4
4b	47.6	36	23.6	17	15.4	15.4	13.2	2.4	0	0	0	170.6	73.8	92.2	116.6	121.4	109.6	79.4	41.2	30.2	28.6	24.4	23.6	741	
P34	1	68.4	61	47.2	31.4	18.6	18.2	20	10.8	0.2	0	0	275.8	49.6	49.4	43.4	29.4	18.4	18.4	20.6	13	0	0	0	242.2
	2a	42.8	71.4	64	49.4	34.2	18.4	13	9	8.4	2	0	312.6	23.6	37.4	28.8	19	12.8	13	13.6	9	0	0	0	157.2
	2b	61.4	94.4	90.2	75.8	56.6	40.6	23	15.6	14	10.2	9	490.8	37.4	44.6	35.8	20	12.6	12.8	13.4	5.8	0	0	0	182.4
	3	64.4	63	48.6	25.2	16.4	18.8	18.4	6.4	0	0	0	261.2	60.6	70.6	46	33	17.6	18	16.8	12.6	0.6	0.2	0	276
	4a	49	32.2	25.2	14.8	9.4	10.8	10.6	4.6	0.2	0	0	156.8	59.2	73	75.6	68.2	62	41.2	28	25.8	22	14	8.8	477.8
4b	59.25	72.45	62.5	45.45	31.5	24	18.6	10.5	5.65	3.05	2.25	335.1	42.8	50.5	38.5	25.35	15.35	15.55	16.1	10.1	0.15	0.05	0	0	214.5
P35	1	26.8	56.6	47.2	27	22	23.4	20.2	10	2.2	1.2	0	236.6	29.2	54.2	49.8	37.8	25.2	22	25.8	13.6	0.2	0	0	257.8
	2a	28.6	51.8	54.2	33.2	21.8	17.4	15.2	7	0.2	0	0	229.4	28.8	78.6	71.8	54.2	37.8	31.4	20.8	17.8	16.2	5.6	3.4	366.4
	2b	43	74.8	53.4	25.8	17.8	14.6	12	5.6	0.4	0.2	0	247.6	50.4	101.8	95	96.2	77	56.4	27.4	24.4	15.2	14	15.2	573
	3	48.2	55.4	44.4	24.4	18	16.4	18.2	8.4	0.2	0	0	233.6	46.2	64.4	46.4	34.2	21.8	18.2	18	11.8	0.6	0	0	261.6
	4a	35.8	102.4	76.4	48.6	25.6	13	10.2	4.8	2.4	2	2.4	323.6	19.2	65.4	58.2	36	25.4	20.4	24.4	11.2	0.8	0.4	0	261.4
4b	17	54	67.2	71	46.6	36.6	16.8	15.8	9.4	5.8	3.4	343.6	7.8	28	24.8	17.6	10.2	8.6	4.2	2.2	2.6	0.2	0	106.2	
P36	1	63	43	33.8	21	11.2	15	13.6	5	0.6	0	0	206.2	85	61.2	42.2	29.4	15.4	17	16	8.6	0.6	0	0	275.4
	2a	76.2	58.8	39.4	23.4	15.4	15.6	18	4.2	0	0	0	251	127	119	90	73.4	55.8	32	27.2	26.8	22.2	3.2	0	576.6
	2b	26.25	30.1	23.2	15.05	9	9.75	10.25	4.15	1.4	0.95	0.75	130.9	31.6	35.2	26.45	19.1	13.05	12.6	10.9	6	1.35	1	1	158.2
	3	109.4	81.8	54	30.4	25	22.6	22	9	0.2	0	0	354.4	120.2	93.4	66	43	26	25	28.2	16.2	0.2	0	0	418.2
	4a	105.6	125	70.2	46	27.2	18	15.8	15.2	9	2.8	0.4	435.2	104	118.6	82	48.8	27.8	25.6	25.2	13.8	0.2	0.2	0	446.2
4b	59.6	121.4	113.8	57.4	30.4	19.6	14.4	10.2	5	1	0.6	433.4	50	72	58	34.2	22	21.4	14.4	6.6	0.6	0.2	0	279.4	
P37	1	26.8	8.6	5.8	6.6	1.6	5.4	2.2	0.4	0	0	0	57.4	31.4	19	7.8	4.4	1.4	1.8	0.6	0	0	0	0	67
	2a	36	20.2	11.4	6	5.4	5.4	4.4	2.2	0	0	0	91	55.2	52	50.6	41	37.2	31.8	20.8	20.6	14	12	12.6	347.8
	2b	71.8	43	24	15.2	7.8	10.4	6.6	5.2	0.2	0	0	184.2	66.8	61.2	48.2	44.8	42.4	40.8	37.2	29.6	26	19.4	29.8	446.2
	3	56.4	42.6	29	11.6	7.2	6.2	5	3.8	0.6	0.2	0	162.6	50.6	34	21.6	13.8	7	6.8	5.8	4.6	1.2	0	0	145.4
	4a	36.8	47	28.6	19.2	11.2	5.2	1	0.6	0.2	0.2	0	150	24.4	23.4	12.6	5	0.4	0	0	0	0	0	0	65.8
4b	9.6	15.8	15	8.4	2.8	1.6	0.4	0	0	0	0.2	0	53.8	6.4	5.8	3.2	1.4	0	0	0	0	0.2	0	0	17

Anexo 6-3: Frequência média de produção de S+ e de S- e frequência de respostas nas tentativas TS+ e TS- (na presença do estímulo do esquema misto), em quartos de sessões em todas as fases do Experimento 1, para todos os 6 sujeitos.

Fase	Qt	Pombo 27				Pombo 31				Pombo 34				Pombo 35				Pombo 36				Pombo 37			
		S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-
1	1º	16.0	16.0	309.5	310.0	16.0	16.0	431.6	417.4	16.0	16.0	228.3	211.3	15.2	15.0	251.3	258.8	13.4	15.2	315.8	365.8	7.8	8.2	26.0	25.2
	2º	16.0	16.0	356.5	346.8	16.0	16.0	385.3	420.0	16.0	16.0	266.8	265.5	15.4	15.4	324.4	244.4	14.2	14.8	291.4	322.4	10.6	11.0	63.4	74.8
	3º	16.0	16.0	347.8	356.5	15.8	15.8	296.5	302.0	16.0	16.0	260.8	229.3	14.8	15.2	195.8	185.6	15.4	15.0	203.0	263.4	10.5	12.3	67.3	81.0
	4º	15.8	16.0	240.8	267.3	16.0	16.0	259.5	239.8	16.0	16.0	267.3	243.5	15.6	15.8	236.6	257.8	15.5	16.0	221.8	263.8	9.8	10.0	57.8	59.5
2a	1º	15.6	16.0	500.2	280.9	15.8	15.9	574.0	410.2	15.7	16.6	422.2	228.0	15.8	14.9	302.5	460.1	15.1	14.8	373.4	505.9	10.1	9.6	83.9	188.3
	2º	11.9	14.8	369.1	193.5	15.7	16.0	603.4	337.1	14.4	15.8	425.0	215.1	14.3	9.3	179.0	328.6	15.6	15.9	413.0	610.9	14.1	9.9	163.4	275.1
	3º	12.6	14.5	352.9	190.9	15.6	16.0	491.8	336.5	15.4	16.1	436.3	262.4	16.0	16.5	328.8	616.6	15.6	15.8	352.5	718.8	14.6	10.4	142.7	314.0
	4º	11.5	10.4	252.0	128.5	14.6	15.3	509.9	329.5	12.5	14.0	330.6	166.6	13.5	12.9	201.8	360.3	13.1	16.0	265.9	605.7	14.1	11.6	101.4	344.7
2b	1º	6.2	9.0	231.6	108.4	13.5	15.3	575.8	340.8	11.8	17.8	481.8	230.5	15.8	10.3	198.8	446.5	14.8	12.3	297.3	595.0	15.8	6.5	170.5	373.8
	2º	6.8	9.5	224.8	143.3	12.3	13.0	587.0	313.5	12.3	15.0	470.8	253.0	16.0	15.5	332.3	593.0	14.3	10.5	221.0	507.8	15.0	6.5	160.0	365.5
	3º	6.3	9.8	249.5	151.3	14.0	14.7	654.0	383.7	14.8	16.5	628.0	274.5	16.0	12.7	243.7	558.3	14.8	13.0	318.3	589.8	16.0	7.5	143.0	403.8
	4º	6.8	12.3	236.5	178.3	15.7	15.7	796.0	427.3	11.5	12.5	488.8	179.0	16.0	15.0	255.7	578.7	14.5	14.8	389.5	676.8	16.0	13.3	205.0	466.7
3	1º	15.0	16.0	216.0	274.7	16.0	15.7	448.0	417.3	14.3	15.3	275.0	265.7	15.3	16.0	264.7	235.3	14.0	16.0	339.7	417.0	15.3	16.0	287.0	212.7
	2º	16.0	16.0	323.7	337.3	16.0	16.0	460.7	515.7	16.0	16.0	322.7	293.7	16.0	15.7	205.0	203.0	16.0	16.0	378.3	441.0	15.7	15.7	210.3	202.0
	3º	16.0	16.0	271.3	276.0	15.7	16.0	396.7	479.0	14.7	15.3	278.0	265.0	16.0	16.0	244.0	292.7	15.0	16.0	360.3	382.7	15.7	15.7	165.3	146.7
	4º	16.0	16.0	254.0	288.0	16.0	16.0	337.5	336.5	15.0	15.5	236.0	292.5	16.0	16.0	218.0	215.0	15.5	16.0	345.5	471.5	14.0	15.5	158.5	143.5
4a	1º	14.8	12.3	112.0	374.8	16.0	15.8	281.0	596.5	15.8	15.5	216.5	461.0	15.5	14.8	360.3	308.5	13.8	16.0	542.3	424.3	3.0	12.3	177.3	79.3
	2º	14.3	7.8	81.8	248.8	16.0	16.0	208.5	542.0	16.0	15.5	228.3	510.5	14.5	15.8	370.8	279.8	13.3	15.8	431.3	377.0	1.8	10.5	95.0	62.5
	3º	15.5	13.3	125.0	481.3	16.0	15.8	200.3	612.8	16.0	15.8	166.5	509.3	14.0	15.3	359.3	338.8	13.8	14.8	412.3	337.3	3.0	10.5	134.8	67.3
	4º	15.5	12.3	118.0	454.3	14.7	16.0	178.0	533.3	16.0	15.0	156.0	469.0	12.5	15.5	311.3	253.8	13.8	16.0	448.5	473.5	5.0	10.8	157.3	75.3
4b	1º	15.8	9.8	110.5	465.5	16.0	16.0	190.3	692.0	16.0	12.5	125.5	494.5	10.8	15.5	396.5	204.3	14.0	16.0	610.0	451.0	0.5	10.0	97.0	46.8
	2º	14.0	6.3	62.3	338.8	15.3	16.0	185.0	739.8	15.8	12.8	167.8	611.8	12.0	16.0	437.0	186.5	12.5	15.8	515.8	373.8	0.3	7.8	81.5	30.5
	3º	16.0	14.0	135.3	645.0	16.0	16.0	194.0	768.8	16.0	14.8	196.0	723.5	10.8	15.8	390.0	134.5	12.3	14.0	412.7	312.3	0.3	9.3	74.3	30.3
	4º	15.7	14.7	130.0	659.0	16.0	16.0	157.0	716.0	16.0	15.3	187.3	724.3	7.0	15.7	322.0	91.7	10.7	14.3	457.3	251.7	0.0	7.0	60.0	17.7

Anexo 7-1: Frequência de produção de S+ e S-, em intervalos de 5 s nas tentativas, durante a 1ª exposição do esquema misto, para todos os 8 sujeitos, em todas as condições do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Produção de S+ e S- (1ª apresentação na tentativa)																							
			tentativas TS+											tentativas TS-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-
P27	1	PS	5.2	0.8	3.8	2.6	0.2	0	0	2.6	0.2	0.2	0.2	15.8	3.2	3.4	2.4	3.6	0	0	0	3.4	0	0	0	16
	2	PM	6.4	2.4	2.6	2	0.4	0.8	0.2	1.2	0	0	0	16	3.8	4.6	4.6	2.6	0.2	0	0	0.2	0	0	0	16
	3	PS	4	1	3	3	0	0	0	3	0	0	2	16	3	4	2	4	0	0	1	2	0	0	0	16
P31	1	PS	3.8	1.4	4.2	3.4	0	0	0	2.8	0.2	0	0	15.8	2.2	3.8	2.4	4.4	0	0	0	3.2	0	0	0	16
	2	PM	10.4	1.8	1.6	0.8	0.6	0	0.4	0.4	0	0	0	16	2.6	5.6	5	2.4	0	0.2	0.2	0	0	0	0	16
	3	PS	2	3	3	3	0	0	0	3	0	0	2	16	4	3	3	4	0	0	0	2	0	0	0	16
P34	1	PS	3.6	1	3.8	3.6	0.2	0	0	2.8	0.8	0	0	15.8	2.6	3.2	2.4	3.4	0.4	0	0	3	0.6	0.2	0.2	16
	2	PM	9.2	2.8	3.4	0.4	0	0	0.2	0	0	0	0	16	3.2	4.8	3.2	3	0.2	0	0.2	1.2	0	0	0	15.8
	3	PS	4	2	3.5	3.5	0	0	0	3	0	0	0	16	2.5	4	2	4	0	0	0	3.5	0	0	0	16
P35	1	PS	3.8	1.4	4.4	3.2	0.2	0	0	2.4	0.4	0	0.2	16	2.6	3.4	2.6	3.6	0.4	0	0	2.8	0.4	0	0	15.8
	2	PM	5.4	3.6	2	1.2	1	0.6	1.8	0	0	0	0.2	15.8	2.4	3.6	5	2.6	0.4	0.2	0.2	1	0	0.2	0	15.6
	3	PS	1.5	3	3.25	3.75	0.75	0.25	0	2.75	0.25	0.25	0	15.75	4.5	2.75	2.5	2	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.5	16
P36	1	PS	3.8	1.4	3.4	2.6	0.6	0.2	0.2	3.2	0.4	0	0	15.8	2.8	3.2	2.6	3.6	0	0.2	0	3	0.6	0	0	16
	2	PM	11.4	0.6	1.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0	0	0	15	2.8	4.4	3.8	2.2	0.2	0.4	0.2	0.8	0	0	0	14.8
	3	PS	3	3.33	2.33	3	0.67	0	0	2.67	0	0	0	15	7.667	1	2.33	1.67	0	0	0.67	0.67	0.33	0	1.33	15.67
P37	1	PS	4.6	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	6.4	5.8	1	1	0.8	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	9.2
	2	PM	5.2	1.8	0.6	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	8.2	5.8	1.6	0.4	0	0.4	0.2	0	0	0	0	0	8.4
	3	PS	4.5	2.75	0.75	1.25	0	0	0	0.5	0	0	0	9.75	5.75	1	1.25	0.5	0.5	0	0	0.25	0	0	0.75	10
P63	0	PS	15.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.8	15.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	15.6
	1	PS	3.8	2.6	3	2.4	0.4	0.2	0	2	0.4	0.2	0	15	4	1.6	3.4	2.8	0.4	0	0	2.6	0.2	0	0	15
	2	PM	12.8	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	13.4	9.6	0.8	0.6	1.4	0.6	0	0.2	0	0.4	0.2	0	13.8
	3	PS	9.8	1.6	1.4	1.6	0.2	0	0.4	1	0	0	0	16	3.2	2.4	4.2	3	0	0	0	2.4	0.2	0	0	15.4
	4	PM	11	0.4	0.4	0.6	0	0.4	0	0.2	0	0.2	0	13.2	8.4	0.6	1.2	1.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0	0	0	12.6
P64	5	PS	5.4	3	2	1.2	0.2	0.2	0	2	0.6	0.2	0	14.8	2.8	1.8	2.4	3.6	0.6	0.6	0.4	2.4	0.4	0.2	0	15.2
	0	PS	9	1.8	0.8	0.6	0.2	0.6	0.2	0	0.2	0	0	13.4	9.4	1.4	0.2	0.2	0.4	0	0	0.4	0.2	0.2	0	12.4
	1	PS	6.2	1.2	3	2.2	0.4	0.2	0	1.4	0.4	0.2	0.2	15.4	1.8	2.6	3.6	3.6	0.2	0.2	0.6	2.4	0	0.2	0	15.2
	2	PM	11.6	1.2	0.4	1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0	0	15.8	5.8	1.8	3.2	1.4	0.6	0.4	1	0.4	0.2	0	0.4	15.2
	3	PS	8.6	1.4	2.6	0.6	0	0	0.6	0.6	0.2	0.2	0	14.8	2.8	2.2	3.4	2.8	0.2	0	0.2	3.4	0.4	0.2	0	15.6
	4	PM	10.8	1.6	1.6	1	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	15.8	6	2	2.4	2.2	0.8	0.4	0.4	1.2	0	0	0	15.4
	5	PM	10.4	0.8	1.2	1.4	0	0.2	0.2	0.4	0.6	0	0	15.2	2.4	2.6	4	3.2	0.2	0.2	0.4	3	0	0	0	16

Anexo 7-2: Frequência de respostas, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS-, na 1ª apresentação dos estímulos sinalizadores, para todos os 8 sujeitos, em todas as condições do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Respostas ao disco na 1ª exposição do estímulo do esquema misto																							
			tentativas TS+											tentativas TS-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-
P27	1	PS	96.4	68.2	46.2	27.2	16.4	16.2	18.4	12	0.2	0.2	0.4	301.8	95	71	49.8	31.8	18.8	18.2	19.2	13	0	0	0.2	317
	2	PM	65.8	43	21.6	15.4	11.2	9.6	5.4	4	0	0	0	176	68.8	46.8	20.2	7.8	2.4	0.2	0.4	0.6	0	0	0	147.2
	3	PS	87	63	48	31	14	14	17	11	0	0	0	285	105	71	45	29	8	13	13	7	0	0	0	291
P31	1	PS	92	86	64	42.6	26.8	26.2	25.8	15.2	0.2	0	0	378.8	86.2	94.6	71.8	45.6	29	27.8	27.4	17.2	0	0	0	399.6
	2	PM	56	36.6	25	18	11	8	5.8	3	0	0	0.2	163.6	86.4	70	32	13	4.2	2.2	1.6	0	0	0	0.2	209.6
	3	PS	90	78	61	37	21	22	19	12	0	0	0	340	78	72	54	36	18	16	18	12	0	0	0	304
P34	1	PS	54.2	60	31.6	27.3	16.4	17.2	15.8	12	0.8	0	0.2	236	51.2	53.2	40	34.6	16.2	16.8	16.4	9.2	0.4	0.2	0	238.2
	2	PM	27.2	25.2	13.2	3	0.8	0.8	0.2	0	0	0	0	70.4	37	45.4	30.4	17.4	7.6	6.4	6.2	3.2	0	0	0	153.6
	3	PS	68.5	57	49.5	32	19.5	18.5	17.5	12	0	0	0	274.5	53.5	50.5	53	35	21	21	23.5	15.5	0	0	0	273
P35	1	PS	40.8	59.4	40	30.2	21.4	21.6	19.2	16	0.4	0	0.2	249.2	43	58	47.4	30.4	23.4	21.2	19.8	14.6	0.4	0	0	258.2
	2	PM	23.2	32.2	28.8	22.6	14.2	11	4	0	0	0	0	136	26.6	39	29	13.4	8.8	8.6	9.8	3	0	0.2	0	138.4
	3	PS	20.75	43	38.3	22.5	19.5	23	17	8.75	2.5	1.75	0.5	197.5	26.5	64	53.3	42.5	26.8	19.5	25	16.5	0.25	0.25	0	274.5
P36	1	PS	84.2	65.2	49.8	30.4	20.2	21.2	19.8	14.2	0.4	0	0	305.4	90.6	73.6	48.4	28.6	21.8	21	19.2	12.8	0.6	0	0	316.6
	2	PM	37	20.8	12.2	9.8	6.8	6	5.8	2.6	0	0	0	101	71.2	49.2	25.6	15.2	7	8	6	4.8	0	0	0	187
	3	PS	52	33.7	25.7	17.3	10.3	14.7	12.7	3.67	0.33	0	0	170.33	94.33	61.7	42.3	30	18	18.3	19	12	0	0	0	295.7
P37	1	PS	25.2	13.2	8.6	1.6	1.6	0.2	0.6	0	0	0.2	0	51.2	44.2	18.4	10.2	3.6	0.6	0.2	1.8	0.4	0	0	0	79.4
	2	PM	6.2	1.8	0.6	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	9.2	12.8	3.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0	0	0	0	0	18
	3	PS	28	10.8	5.5	5	1.5	4.75	2	0.25	0	0	0	57.75	29.5	18	6	4	0.75	0.75	0	0.5	0	0	0	59.5
P63	0	PS	15.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.8	15.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	15.6
	1	PS	50.2	34.4	25	12.4	10	8.6	6.6	4	0.4	0.2	0	151.8	51	39.8	29.4	10.8	7.6	5.2	4	4.2	0.2	0	0	152.2
	2	PM	13.2	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	13.8	20.4	4.2	2	1.8	0.6	0.2	0.6	0	0.4	0.2	0	30.4
P64	3	PS	30	15.6	10.4	5.6	3.8	3.2	3.2	1.4	0	0	0	73.2	46.4	33.2	24.8	13.6	6.6	6.2	6.4	3.4	0.2	0	0	140.8
	4	PM	12.8	0.8	0.6	0.6	0	0.4	0	0.2	0	0.2	0	15.6	17	4.4	2.6	1.6	0.8	0.4	0.4	0.2	0	0	0	27.4
	5	PS	40.6	26.2	17.2	10.8	9.2	8.2	8	3	0.6	0.2	0	124	50.4	38.8	29.8	18.4	12.4	14	11.2	6.4	0.4	0.2	0	182
P64	0	PS	9	2	0.4	0.6	0.2	0.6	0.2	0	0.2	0	0	13.2	9.4	1.4	0.2	0.2	0.4	0	0	0.4	0.2	0	0	12.4
	1	PS	61.2	34.8	29.2	13.8	9.4	12.2	12	6	2.4	0.2	0.2	181.4	69.8	50.4	39.6	23.6	16.8	16.2	14.4	7.6	0	0.2	0	238.6
	2	PM	35.2	13	7.6	5.2	2.8	1.4	1.4	0.8	0.2	0	0	67.6	55.8	25.4	14.4	8.2	4.4	3.6	2.6	1	0.2	0	0	115.6
	3	PS	52	38.4	26	9.4	6.2	7.6	7.2	2	0.2	0.2	0	149.2	99.2	67.4	47.6	30.2	23.4	19.2	18	8.2	0.4	0.2	0	313.8
	4	PM	25.4	9.8	5	2	1	1.4	0.2	0	0	0.2	0	45	54.2	37.4	24.8	11.6	10	5.6	4.8	1.6	0	0	0	150
	5	PM	38	23.8	18.4	13.4	9	8.4	8	4.2	0.6	0	0	123.8	106.8	87.8	60.6	29.8	21.2	20.2	20.4	9	0	0	0	355.8

Anexo 7-3: Frequência de representações de S+ e S- em intervalos de 5 s nas tentativas, para todos os 8 sujeitos na Condição PM do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Reapresentações de S+ e S-																								
			tentativas TS+											tentativas TS-													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-	
P27	2		PM	0	0	1	0.8	1.4	2.2	1.8	2.2	2	2	3.2	16.6	0	0	0.4	3.8	2.6	2.8	1.2	2	0.6	2.6	9.4	25.4
P31	2		PM	0	0	0.8	2.4	1.6	2.8	1.6	0.8	0.2	1.6	1.4	13.2	0	0	0	3	1.8	3.2	1	2.4	0.6	1.6	12.6	26.2
P34	2		PM	0	0	0	3	1	2.4	1	0.4	0.2	0.6	2.8	11.4	0	0	0	1.6	3.8	1.8	3.2	2	1.2	2.2	7.6	23.4
P35	2		PM	0	0	0.4	1.2	1.6	1.4	2.4	2.8	1.4	0.4	1	12.6	0	0	0	2.2	1.2	3	1.8	2.8	2	2.2	7	22.2
P36	2		PM	0	0	0.4	2.2	1.2	1	1	1	0.8	0.6	0.2	8.4	0	0	0.2	2.6	1.6	2.6	1.4	1.8	1	2.2	9.6	23
P37	2		PM	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.4	0.4	0.4	0.8	1.4	1.2	0.6	0.6	0.4	6.2
P63	2		PM	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0.8	1.6	1.4	1	1.8	0.4	0.8	0.8	8.6
	4		PM	0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0.4	0.6	1.2	1.6	0.8	1.2	0.8	1.2	0.4	8.2
P64	2		PM	0	0	2	2.4	1.4	2	1.8	0.6	1.6	1	1	13.8	0	0	0.8	1	1.2	2	2	2.2	2.4	1.6	3.6	16.8
	4		PM	0	0	1.4	1.6	3	1.6	1.2	0.4	0.2	0.2	0.6	10.2	0	0	0.2	1.2	1.6	1.8	2	2.4	1.8	1.6	4.4	17

Anexo 7-4: Frequência de respostas em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS-, na presença do estímulo do esquema misto, após a 1ª apresentação do estímulo sinalizador, para os 8 sujeitos, na Condição PM do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Respostas ao disco na presença do estímulo do esquema misto (após 1ª oportunidade)																							
			tentativas TS+											tentativas TS-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-
P27	2	PM	0	0	10.2	14	18.2	15.8	10.2	12.4	13.6	12	13.2	119.6	0	0	9	17.2	22	24.4	39.8	46.2	51.2	44.4	134	388.6
P31	2	PM	0	0	21.4	45.6	49.2	41.4	27.8	28.2	23	19.4	15	271	0	0	2.4	21.8	29.4	32.4	52	70.4	78.8	91.6	271	649.8
P34	2	PM	0	0	10.6	34.6	33.8	26.4	16.8	16.4	15.2	11	10.2	175	0	0	4	21.2	32.4	29	30.6	39.8	40.2	50.6	132	379.8
P35	2	PM	0	0	5	14.6	16.4	20.4	11.2	9.2	6.2	2.2	2.4	87.6	0	0	0.2	5.4	10.6	18.2	31.8	33.8	41.2	37.6	147	325.8
P36	2	PM	0	0	11.8	8.6	5.8	4	4.8	2.8	1.6	1.8	0.8	42	0	0	5.6	21	22.2	36.6	50.8	55.8	62.8	64	179	497.4
P37	2	PM	0	0	0.6	0.8	0.4	0.2	0	0	0	0	0	2	0	0	3.2	8.2	4.6	4.4	5.6	2.8	2	3.2	4	38
P63	2	PM	0	0	0.4	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0.8	0	0	4.8	3.4	4.6	3.2	5.6	4.2	3.2	3.6	2.6	35.2
	4	PM	0	0	1.4	0.8	0.4	0	0	0	0	0	0	2.6	0	0	8.8	6.4	6.6	5	3.8	4.4	2	4.2	3.4	44.6
P64	2	PM	0	0	12	12	6.8	4.2	3.8	3.6	2.4	1.8	1	47.6	0	0	19.4	19.6	23.8	30.4	28.2	26.6	27	30.8	32.6	238.4
	4	PM	0	0	21.6	19.6	11.8	8.8	4	2.2	2.6	2.8	1.2	74.6	0	0	10.6	18	25.8	27.6	30	27.4	23.4	26.8	39	228.6

Anexo 7-5: Frequência média de produção de S+ e S- e número de respostas nas tentativas TS+ e TS- em blocos de 5 sessões (BI), em todas as fases (F) do Experimento 2, para todos os 8 sujeitos (P). Os dados apresentados estão separados em primeira (e única, nas Fases 1, 3 e 5) apresentação do estímulo do esquema misto (1ª ap.) e apresentações posteriores (p).

Pb	F	BI	S+ 1ª	S- 1ª	TS+ 1ª	TS- 1ª	S+ p	S- p	TS+ p	TS- p	Pb	F	BI	S+ 1ª	S- 1ª	TS+ 1ª	TS- 1ª	S+ p	S- p	TS+ p	TS- p
27	1	1	15.7	16.0	301.0	356.2					34	1	1	11.8	13.2	135.4	128.6				
		2	15.8	16.0	329.8	338.0							2	15.8	15.8	265.4	274.4				
		3	16.0	16.0	309.6	328.8							3	15.8	15.6	251.2	262.6				
		4	15.8	16.0	301.8	317.0							4	15.8	16.0	236.0	238.2				
	2	1	16.0	16.0	152.4	153.2	15.4	24.0	180.8	400.6		2	1	16.0	16.0	83.3	123.5	10.5	17.8	148.0	381.5
		2	15.8	16.0	106.6	114.4	13.0	18.2	97.2	236.8			2	16.0	16.0	53.4	114.6	9.8	20.6	138.6	260.2
		3	16.0	16.0	176.0	147.2	16.6	25.4	119.6	388.6			3	16.0	15.8	70.4	153.6	11.4	23.4	175.0	379.8
	3	1	16.0	16.0	315.0	331.2						3	1	16.0	16.0	245.2	231.0				
		2	16.0	16.0	356.0	356.2							2	16.0	16.0	248.4	240.2				
		3	16.0	16.0	264.4	283.6							3	16.0	16.0	278.2	242.2				
31	1	1	15.8	15.7	281.2	278.5					35	1	1	13.3	13.8	113.5	127.5				
		2	16.0	15.8	319.8	312.3							2	14.8	15.6	223.2	190.4				
		3	16.0	16.0	388.0	345.8							3	15.8	16.0	198.0	189.8				
		4	15.8	16.0	378.8	399.6							4	16.0	15.8	249.2	258.2				
	2	1	16.0	16.0	136.0	212.0	11.4	27.8	224.8	698.6		2	1	15.3	15.3	98.8	145.3	11.5	18.8	132.3	318.3
		2	16.0	15.8	159.2	192.6	12.8	27.4	189.8	580.2			2	16.0	15.5	120.0	135.5	12.8	21.0	97.0	345.3
		3	16.0	16.0	163.6	209.6	13.2	26.2	271.0	649.8			3	15.8	15.6	136.0	138.4	12.6	22.2	87.6	325.8
	3	1	16.0	16.0	423.3	420.7						3	1	15.2	15.0	251.3	258.8				
		2	15.8	15.8	361.2	368.3							2	15.4	15.4	324.4	244.4				
		3	16.0	16.0	247.6	288.0							3	14.8	15.2	195.8	185.6				
													4	15.6	16.0	201.0	266.8				

Pb	F	BI	S+1 ^a	S-1 ^a	TS+1 ^a	TS-1 ^a	S+p	S-p	TS+p	TS-p
36	1	1	13.4	13.4	242.2	229.0				
	2		11.6	12.6	206.6	204.6				
	3		14.6	15.8	292.2	284.8				
	4		15.8	16.0	305.4	316.6				
	2	1	15.5	15.3	109.3	177.5	9.0	22.7	66.7	498.3
	2		14.8	14.7	98.7	177.8	9.0	22.3	54.0	469.8
	3	1	13.0	15.0	295.0	347.8				
	2		14.8	15.2	304.2	337.0				
	3		15.2	14.8	185.2	262.6				
37	1	1	7.0	7.2	41.0	49.2				
	2		9.0	9.0	50.8	59.0				
	3		9.0	10.2	53.0	63.0				
	4		6.4	9.2	51.2	79.4				
	2	1	10.3	8.8	13.0	34.5	0.5	7.8	6.0	61.5
	2		11.8	10.3	14.5	39.0	0.3	5.3	1.0	38.8
	3		8.2	8.4	9.2	18.0	0.2	6.2	2.0	38.0
	3	1	7.8	8.2	26.0	25.2				
	2		10.4	11.0	71.4	68.6				
	3		10.6	12.0	71.0	86.8				
	4		10.2	11.0	57.4	67.0				
63	1	1	9.7	9.8	49.8	50.0				
	2		13.2	13.8	94.8	124.6				
	3		15.0	15.0	151.8	173.2				
	2	1	13.5	13.0	24.3	57.2	3.5	12.0	18.2	98.7
	2		12.8	12.8	15.2	38.6	0.6	9.6	2.4	44.2
	3		13.2	13.2	13.6	23.6	0.2	6.8	0.6	24.0
	3	1	10.0	10.2	25.4	33.6				
	2		13.4	12.2	40.0	72.4				
	3		16.0	15.4	73.2	140.8				
	4	1	14.0	13.3	17.0	56.0	4.2	14.5	22.2	81.3
	2		14.0	13.7	22.3	30.3	3.2	8.8	11.3	48.2
	3		12.6	11.2	15.6	21.4	2.0	6.8	7.6	36.8
	4		13.2	12.6	15.6	27.4	0.6	8.2	2.6	44.6
	5	1	14.5	14.0	119.5	133.3				
	2		14.8	15.4	107.8	173.0				
	3		14.8	15.2	124.0	182.0				
64	1	1	15.3	15.5	269.8	287.3				
	2		16.0	16.0	264.2	284.0				
	3		15.4	15.2	181.4	238.6				
	2	1	15.3	15.0	64.7	108.7	12.7	17.2	45.3	193.2
	2		16.0	16.0	69.8	110.6	15.2	18.0	57.6	222.8
	3		15.4	14.4	62.0	99.4	12.0	14.6	43.4	198.8
	3	1	14.6	14.8	99.4	170.6				
	2		13.2	15.0	150.6	256.6				
	3		14.8	15.6	149.2	313.8				
	4	1	15.0	15.2	71.3	152.7	15.2	18.2	88.0	294.8
	2		14.2	14.3	105.7	115.5	13.2	14.7	86.5	220.2
	3		13.8	14.2	114.7	132.0	14.8	17.0	101.3	208.7
	4		15.8	15.4	45.0	150.0	10.2	17.0	74.6	228.6
	5	1	15.0	15.8	268.6	361.4				
	2		15.8	14.8	271.6	384.0				
	3		15.2	16.0	123.8	355.8				

os sujeitos exceto os Pombos 37, 63 e 64, há uma concentração de 100 a 150 respostas por sessão no 11º intervalo das tentativas TS-. Para estes sujeitos, o número de respostas no 11º intervalo corresponde, aproximadamente, ao triplo de respostas emitidas no intervalo imediatamente anterior, o 10º intervalo. Para os Pombos 37 e 63, o número de respostas ao longo dos intervalos das tentativas TS- é, além de menor em relação aos outros sujeitos, praticamente constante do 3º ao 11º intervalo (para o Pombo 63, na Fase 4, pode-se observar uma tendência muito sutil de diminuição na frequência de respostas ao longo dos intervalos das tentativas TS-).

Discussão

(Experimento2)

O objetivo central do Experimento 2 foi, basicamente, avaliar o valor reforçador condicionado adquirido por estímulos discriminativos de tentativas que terminavam com ou sem a apresentação de comida independentemente de qualquer resposta do sujeito. Mais especificamente, foi investigada a hipótese de que um estímulo, perfeitamente correlacionado com as tentativas que terminavam sem a apresentação do comedouro (S-), pudesse adquirir valor reforçador condicionado tal que os sujeitos emitissem respostas de observação mantidas pela sua produção. No presente experimento, a função reforçadora condicionada de S+ e S- foi avaliada, com pombos, em uma condição em que estes estímulos podiam exercer controle discriminativo sobre as próprias respostas de observação que os produziam.

O Experimento 2 empregou um procedimento que permitiu que as respostas de observação produzissem estímulos correlacionados com a apresentação ou não do comedouro por um tempo limitado. Desta forma, em uma mesma tentativa, os sujeitos podiam produzir uma apresentação do estímulo sinalizador seguida por sua(s) reapresentação(ões). As comparações entre as frequências de reapresentações de S+ e S- permitiram avaliar o valor reforçador condicionado destes estímulos após os sujeitos terem sido expostos a uma apresentação prévia dos mesmos. Ou seja, em função da possibilidade de que os estímulos sinalizadores tenham exercido controle discriminativo sobre as respostas de observação que produziam suas reapresentações.

Em síntese, os resultados do Experimento 2 mostraram que, na primeira exposição do estímulo do esquema misto nas tentativas, tanto na Condição PS quanto na Condição PM, as respostas de observação dos sujeitos nas tentativas

TS+ e TS- foram semelhantes. Entretanto, na Condição PM, em que podiam ocorrer múltiplas apresentações de estímulos na mesma tentativa, os dados mostraram, com bastante sistematicidade e regularidade entre os sujeitos, diferenças relacionadas às reapresentações de S+ e S-. Para todos os sujeitos, as frequências de reapresentações de S- foram claramente maiores do que as de S+, em todos os blocos de sessões em que a Condição PM esteve em vigor. Apesar desta regularidade, entretanto, as tendências das frequências de reapresentações de S+ e S- ao longo desta condição foram as mais diversas entre os sujeitos

A análise dos padrões de distribuição de respostas em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS- revelaram dados convergentes com a análise por blocos de sessões. Comparando-se o desempenho dos sujeitos ao longo dos intervalos das tentativas, pode-se observar que o número de respostas tendeu a aumentar após uma primeira apresentação de S- e a diminuir, ou a permanecer relativamente constante, após uma primeira apresentação de S+. A partir desta análise, foi também possível observar que, nas tentativas TS-, houve uma concentração de respostas no 11º intervalo. Este dado foi obtido para a maior parte dos sujeitos com história experimental prévia e mostra que, para eles, a duração das tentativas TS- foi frequentemente prolongada. Para estes sujeitos, durante períodos de re-exposição do estímulo do esquema misto posteriores a uma apresentação de S-, verificou-se, não apenas uma tendência de aumento na frequência de respostas de observação, mas também um responder contínuo e, aparentemente, ininterrupto. Apesar de não se dispor destes dados, é possível que, para estes pombos, as tentativas TS- tenham terminado, frequentemente, na presença de S-.

Durante as fases em que a Condição PS esteve em vigor, praticamente todas as tentativas terminavam com e sem a apresentação do comedouro na presença de S+ e S-, respectivamente. Ambos os estímulos eram produzidos em quase todas as tentativas (Figura 1) e permaneciam expostos até o início do IET.

Nas fases em que esteve em vigor a Condição PM, entretanto, o pareamento entre as conseqüências programadas ao final das tentativas e os seus respectivos estímulos sinalizadores pode ter-se enfraquecido. Nesta condição, a possibilidade de que as tentativas fossem encerradas na presença do estímulo do esquema misto era maior e variava em função das diferentes freqüência de reapresentações de S+ e S- (Figura 1, Painel C). Na medida em que os pombos produziam as reapresentações de S+ menos freqüentemente do que S-, a probabilidade de que as tentativas TS+ terminassem na presença do estímulo do esquema misto era maior do que as tentativas TS-.

Em função desta observação, portanto, é possível imaginar que, no decorrer da Condição PM, a configuração entre estímulos sinalizadores (S+ e S-) e as conseqüências programadas ao final das tentativas (liberação ou não de comida) tenha se alterado em relação à Condição PS. Nesta nova configuração, pode-se presumir que as tentativas TS- eram freqüentemente encerradas na presença de S- enquanto que as tentativas TS+ eram encerradas, tanto na presença tanto de S+ quanto na presença do estímulo do esquema misto. Este enfraquecimento na relação entre S+ e a liberação de comida pode ter sido um dos fatores responsáveis por parte do menor número de reapresentações de S+ em relação a S- e a diminuição, no decorrer das sessões, na freqüência de reapresentações de S+ para alguns sujeitos (Pombos 31, 63 e 64, Figura 2, Painel B).

Um outro fator que poderia contribuir para a compreensão da menor freqüência de reapresentações de S+ em relação a S- seria a contingência de DRO vigente no final das tentativas. Segundo esta contingência, o encerramento de uma tentativa ocorria, somente, se nenhuma resposta ao disco fosse emitida nos seus 3 s finais. Durante este período, a emissão de uma resposta prolongava a duração da tentativa por 3 s. No caso das tentativas TS+, respostas ao disco

durante a vigência da contingência de DRO atrasava, além do encerramento da tentativa, a liberação de comida. Portanto, sob controle desta contingência, respostas nas tentativas TS+, durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, podem ter sido menos freqüentes do que nas tentativas TS- e contribuído para o menor número de reapresentações de S+ em relação a S-.

O conjunto de resultados relatado no Experimento 2, fortalecido, em parte, pela sua sistematicidade, apresenta um dado inédito na literatura em respostas de observação. Utilizando pombos como sujeitos, ainda não havia sido descrito um procedimento em que respostas fossem mantidas pela produção exclusiva de S-. E, segundo Dinsmoor (1983), isto seria fundamental para se demonstrar o valor reforçador condicionado deste estímulo.

Esta colocação de Dinsmoor (1983), na verdade, reflete a ausência de dados na literatura que mostrem, com clareza, propriedades reforçadoras condicionadas de S-. Por exemplo, o estudo de Lieberman (1972), apresentado como uma das maiores evidências da função reforçadora de S-, não demonstrou que este estímulo, por si próprio, fosse capaz de manter as respostas de observação. Neste trabalho, Lieberman (1972) comparou uma condição em que os macacos podiam produzir a apresentação de S+ e S- na chave de observação com outra em que somente S+ podia ser produzido. Desta comparação, o autor observou que, quando era eliminada a possibilidade de produção de S- na chave de observação, havia uma diminuição na freqüência de respostas. Na seqüência, a retomada da primeira condição era acompanhada por aumento na freqüência de respostas. Sua conclusão, portanto, foi a de que S- mantinha parte do responder no manipulando de observação.

O presente trabalho, diferentemente do estudo de Lieberman (1972), demonstrou condições em que respostas de observação foram mantidas

exclusivamente por S-. Estes dados foram sistemáticos e claros para 8 sujeitos, 2 dos quais ingênuos.

Inicialmente, o Experimento 2 envolveu seis pombos (Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37) que haviam participado, anteriormente, de dois estudos em procedimento de respostas de observação (Tomanari, 1995 e o Experimento 1 da presente investigação). Neste dois estudos, havia sido utilizado um procedimento de tentativas semelhante ao empregado no presente experimento, com exceção dos esquemas de produção dos estímulos sinalizadores e da duração máxima de apresentação destes estímulos.

No desenvolvimento do presente experimento, assim que estes 6 pombos foram submetidos à condição de produção múltipla de estímulos, os resultados de todos eles mostraram, logo nas primeiras sessões, que a frequência de reapresentação de S- era claramente maior do que a de S+. Tendo em vista a história experimental prévia destes 6 pombos, suspeitou-se que este desempenho tivesse sido propiciado pelas suas experiências anteriores. Por este motivo, e para se terem respostas claras às questões experimentais em investigação, os dois sujeitos, experimentalmente ingênuos, foram adicionados ao experimento.

Os dados destes dois pombos (Pombo 63 e 64) replicaram, de modo geral, os resultados dos outros 6 sujeitos quanto a maior frequência de reapresentações de S- em relação a S+ no decorrer da Condição PM. No entanto, os dados dos Pombos 63 e 64 não repetiram a regularidade obtida com a maioria dos pombos não-ingênuos (Pombos 27, 31, 34, 35 e 36) e podem estar refletindo as diferenças na história experimental dos sujeitos. Quando se descreveu o padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS- (Condição PM, Figura 3, Painel C), pode-se observar que apenas os sujeitos não-ingênuos emitiram um acentuado número de respostas no 11º intervalo das tentativas TS-, apesar de tendências semelhantes entre todos os 8 sujeitos terem sido mantidas no

decorrer dos intervalos. Além disso, o Pombo 64 foi o sujeito que manteve as menores diferenças entre as frequências de reapresentações de S+ e S- nos blocos de sessões e, o Pombo 63, foi o que apresentou uma clara tendência de diminuição na frequência de reapresentações de ambos os estímulos. Estas particularidades de desempenho, obtidas nos dados dos pombos experimentalmente ingênuos, portanto, podem sugerir que a história experimental dos Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37¹⁷ afetaram a sistematicidade dos resultados entre os sujeitos. Entretanto, eles não afetaram os resultados que mostram que, para todos os 8 pombos, a frequência de reapresentações de S- foi maior do que de S+.

Uma possibilidade de se tentar compreender as variáveis envolvidas na alta frequência de reapresentações de S- seria imaginar que, a cada re-exposição do estímulo do esquema misto, os sujeitos estariam se comportando como se tivesse iniciado uma nova tentativa. Isto é, as respostas de observação, durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, não estariam sob controle discriminativo da apresentação anterior do estímulo sinalizador da tentativa. Ou, dito de outra forma, o comportamento de observação dos sujeitos, durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, estaria sob controle de uma igual probabilidade de produção de S+ e S- ($p=0,5$), tal como ocorria na primeira exposição.

No entanto, os dados de todos os sujeitos, em relação às reapresentações de S-, parecem descartar esta possibilidade. Comparando-se o padrão de desempenho dos sujeitos no decorrer de intervalos das tentativas TS- na Condição PM, antes e depois da 1ª apresentação de S- (Figura 3, Painéis B e C,

¹⁷ Os dados do Pombo 37, normalmente, se diferenciam dos dados dos outros pombos não-ingênuos. Não apenas na presente investigação, mas na história experimental deste sujeito, há registros de que este pombo apresenta, normalmente, uma frequência de respostas geralmente mais baixa do que a dos outros pombos (veja Experimento 1 da presente investigação e Tomanari, 1995).

respectivamente), podem ser observadas claras diferenças. Durante a 1ª apresentação do estímulo do esquema misto, há uma tendência de diminuição na frequência de respostas. Após uma apresentação anterior de S-, a tendência é oposta, é de aumento. Portanto, quanto às reapresentações de S-, parece claro que os sujeitos não se comportaram durante as re-exposições do esquema misto como se estivesse em vigor a 1ª exposição.

Esta mesma constatação permite discutir a afirmação de Dinsmoor (1983) de que as respostas de observação que produzem S- seriam, na verdade, mantidas pela produção intermitente de S+. Durante a primeira exposição do estímulo do esquema misto na Condição PM (Fases 2 e 4), a probabilidade de que, a cada tentativa, as respostas de observação produzissem S+ ou S-, era igual a 0,5. A sequência de tentativas TS+ e TS- era aleatória e um mesmo tipo de tentativa não se repetia mais do que três vezes seguidas. Nesta situação, conforme mostraram os resultados, as frequências de respostas (assim como a frequência de produção de ambos os estímulos sinalizadores), nos dois tipos de tentativas, eram muito semelhantes até que S+ ou S- fosse produzido. Neste caso, conforme sugere Dinsmoor, teria sido possível que as respostas nas tentativas TS- (assim como a produção de S-) tivessem sido mantidas pela produção de S+ em metade das tentativas.

Esta sugestão de Dinsmoor, no entanto, não parece ser facilmente aplicada às respostas de observação mantidas pelas reapresentações de S-. Após uma primeira apresentação de S-, as respostas de observação produziam, invariavelmente, a sua reapresentação e nunca S+. Por isso, para se afirmar que uma possível produção de S+ teria mantido as respostas que produziam as reapresentações de S-, o desempenho dos sujeitos, em todas as exposições do estímulo do esquema misto de uma mesma tentativa, deveria ser semelhante. No entanto, conforme foi exposto anteriormente, isto não se verificou.

Em síntese, os resultados do Experimento 2 parecem revelar que, na presente preparação experimental, 1) respostas de observação foram mantidas pela apresentação de S- e 2) a produção deste estímulo não dependeu, necessariamente, de respostas mantidas pela produção intermitente de S+. Baseado nestas constatações, este estudo parece ser uma forte evidência de que S- pode manter respostas de observação, pelo menos dentro do contexto do procedimento utilizado.

Além disso, os dados do presente trabalho mostram que as reapresentações de S- mantiveram um número de respostas de observação maior do que S+. Em uma tentativa de se compreender este dado, duas possibilidades podem ser levantadas. Uma delas foi apontada anteriormente e trata da observação de que, em função do próprio desempenho dos pombos na Condição PM, as funções discriminativas de S+ e do estímulo do esquema misto podem ter-se modificado em relação àquelas exercidas na Condição PS. Ou seja, na Condição PM, S+ pode ter perdido parte de sua força como estímulo reforçador condicionado uma vez que um maior número de tentativas TS+ terminavam na presença do estímulo do esquema misto. A outra possibilidade retoma o que foi discutido na ocasião do Experimento 1 e sugere que o comportamento de observação dos sujeitos pode ter interagido com variáveis não previstas neste procedimento de observação. Uma destas variáveis poderia ser, por exemplo, a ocorrência de respostas preparatórias direcionadas ao comedouro. Estas respostas, sob controle discriminativo da 1ª apresentação de S+, seriam concorrentes com as respostas de bicar o disco e poderiam estar ocorrendo durante reapresentações do estímulo do esquema misto. Esta hipótese será melhor explorada, a seguir, na Discussão Geral.

Discussão Geral

Com o objetivo de avaliar o valor reforçador condicionado de S+ e S- na manutenção de respostas de observação em pombos, foram realizados os Experimentos 1 e 2 da presente investigação. O Experimento 1 submeteu 6 pombos a duas condições experimentais em que, em cada uma delas, ora S+ ora S- era produzido em esquema tand VI 15 s FR 15 (ou FR 24) enquanto o estímulo alternativo permanecia em VI 15 s. Os principais resultados deste estudo mostraram que os efeitos da introdução do esquema tand VI FR sobre as respostas de observação dos pombos variaram em função de qual estímulo sinalizador era produzido neste esquema. Em geral, S- manteve um número de respostas de observação maior do que S+. Estes resultados parecem nos levar à conclusão de que S- não apenas atuou como um estímulo reforçador condicionado como também se mostrou um reforçador mais forte do que S+. No Experimento 1, o único dado que pareceu apontar para conclusões contrárias a essas foi aquele que mostrou que, em esquema tand VI FR 15, grande parte da produção de S+ se concentrava no início das tentativas enquanto que a produção de S- se distribuía em intervalos mais distantes temporalmente.

No Experimento 2, a função reforçadora de estímulos sinalizadores foi investigada na situação em que as respostas de observação que os produziam podiam estar sob controle discriminativo destes mesmos estímulos. Isto é, em termos de procedimento, os estímulos sinalizadores podiam ser apresentados e reapresentados em uma mesma tentativa. Os resultados deste estudo mostraram que a primeira apresentação dos estímulos sinalizadores determinaram, na seqüência, diferentes freqüências de respostas de observação. Dada aos sujeitos a oportunidade de reapresentarem S+ e S- eles, sistematicamente, produziam S- mais freqüentemente do que S+.

Os Experimentos 1 e 2, portanto, revelaram resultados de certa forma semelhantes. Em ambos os estudos, S- não apenas manteve respostas de observação como manteve mais respostas do que S+. Estes resultados, surpreendentes quando comparados com os dados descritos na literatura, merecem uma análise ampla das contingências envolvidas. Em uma tentativa de se compreender, inicialmente, a menor frequência de produção de S+ em relação a S-, será revista, a seguir, a possibilidade apontada na discussão do Experimento 1 de que respostas dirigidas ao comedouro teriam competido com as respostas que produziam S+. Assim como no Experimento 1, esta variável pode ter contribuído para uma maior frequência de produção de S-, em relação a S+, também no Experimento 2.

Baseado em observações assistemáticas do comportamento de um dos pombos, durante algumas sessões do Experimento 1, verificou-se a ocorrência de respostas bem definidas durante a apresentação de S+ mas não na de S-. Estas respostas eram dirigidas ao comedouro e apresentavam as características de respostas preparatórias como relatadas por Perkins (1968). Apenas na presença de S+, os sujeitos abaixavam frequentemente a cabeça próximo à abertura do comedouro localizada logo abaixo do disco de respostas. Durante a ocorrência destas respostas preparatórias, não havia possibilidade de ocorrerem respostas ao disco.

Aplicadas à análise dos resultados dos Experimentos 1 e 2, as respostas preparatórias podem ter estado, supostamente, sob controle discriminativo de estímulos correlacionados com os dois tipos de tentativas (que terminavam com e sem a apresentação de comida) e interferido na emissão de respostas de observação. No Experimento 1, estes estímulos (ou estimulação) podem ter sido gerados pelo próprio desempenho dos sujeitos no esquema tand VI FR e, no Experimento 2, pela primeira apresentação de S+ e de S-. Sob controle de S+,

pode ter havido um aumento na probabilidade de ocorrência das respostas preparatórias que, por competirem com as respostas ao disco, resultaram na menor frequência de produção de S+, em relação a S-, observada em ambos os experimentos. Além disso, outros fatores podem ter contribuído para este dado. Um seria o enfraquecimento de S+ como um estímulo reforçador condicionado. A diminuição na frequência de produção de S+, tanto nas condições em que o esquema tandem VIFR esteve em vigor (Experimento 1) quanto nas condições em que podiam ocorrer suas reapresentações (Experimento 2), pode ter sido acompanhada por um aumento no número de tentativas TS+ encerradas na ausência de S+ (e na presença do estímulo do esquema misto). Um outro fator seria a possibilidade de que as respostas de observação tenham estado sob controle da contingência de DRO vigente nos 3 s finais das tentativas. Respostas neste período prolongavam a duração das tentativas e, nas tentativas TS+, atrasavam a liberação de comida. Por isso, respostas nas tentativas TS+ podem ter diminuído de frequência.

A análise envolvendo a emissão de respostas preparatórias sugere um caminho para se compreender a maior frequência de respostas de observação associada à produção de S- (em relação a S+) observada nos Experimentos 1 e 2. Utilizando um procedimento semelhante aos destes dois experimentos, estudos prévios na literatura (Blanchard, 1975; Schrier e col., 1980; Tomanari, 1995) parecem sustentar esta possibilidade de análise. Análise que, no entanto, não contribui para a compreensão do dado fundamental de ambos os estudos que foi a ocorrência de respostas de observação mantidas pela produção de S-. Este dado diverge, essencialmente, dos estudos anteriores em respostas de observação com pombos que têm mostrado, basicamente, que S- não mantém respostas de observação (Auge, 1973; Branch, 1970; Branch, 1973; Case e Fantino, 1981; Dinsmoor e col., 1983; Dinsmoor e col. 1988; Mueller e Dinsmoor,

1984, 1986; entre outros) ou mantêm respostas que evitam a sua apresentação (Blanchard, 1975; Dinsmoor e col., 1972; Jwaideh e Mulvaney, 1976; Mulvaney e col., 1974; Tomanari, 1995).

A maior parte destes estudos com pombos, entretanto, utilizaram procedimentos diferentes daquele usado pela presente investigação (ver Introdução). Portanto, parte das diferenças em seus resultados pode ter-se originado em diferenças de procedimento. Para listar algumas delas, na presente investigação, 1) foi utilizado um procedimento de tentativas discretas, separadas por intervalos entre tentativas, em vez de um procedimento em operante-livre (como, por exemplo, Wyckoff, 1952; Fantino e Case, 1983; Mueller e Dinsmoor, 1984, 1986; Preston, 1985); 2) foi empregado um esquema de liberação de comida independente de respostas dos sujeitos em intervalo originalmente fixo em vez de intervalos variáveis (como Dinsmoor e col., 1988, por exemplo) e, 3) por utilizar um esquema independente de respostas para a liberação de comida, não existiam, no presente procedimento, respostas para a produção do reforçador principal – água, pontos, comida --, diferentemente da maior parte dos estudos na área (Branch, 1970; Branch, 1973; Bowe e col., 1983; Case e Fantino, 1981; Kendal, 1973; Kendal, 1974; Mueller e Dinsmoor, 1984, 1986; Wyckoff, 1952; entre outros).

Em futuras investigações, o controle destas (e outras) variáveis de procedimento podem ajudar a compreender as diferenças de resultados entre a presente investigação e outros estudos relatados na literatura. Por exemplo, o papel do DRO na manutenção das respostas que prolongaram a duração das tentativas TS- seria uma variável a ser melhor investigada. É possível que estas respostas tenham sido mantidas, em parte, porque atrasavam o início do intervalo entre tentativas. Isto seria possível caso o IET tenha se tornado um período mais

aversivo para os sujeitos do que a própria produção de S- e o prolongamento das tentativas TS-.

Diferenças de procedimento podem ter contribuído, como foi apontado anteriormente, para parte das diferenças entre os resultados da presente investigação e os resultados de outros estudos na área. Neste contexto, o presente estudo, principalmente o Experimento 1, poderia ser mais diretamente comparado com os estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995) por terem, todos, utilizado um procedimento basicamente semelhante e pombos como sujeitos.

Um dos objetivos do Experimento 1 foi servir de controle ao estudo de Tomanari (1995) cujos resultados revelaram a ocorrência de um número curiosamente acentuado de respostas, em tand VI DRL, que evitavam a apresentação de S-. Estas respostas, que aparentemente serviam à esquiva de S-, expuseram uma suposta contradição. Ao mesmo tempo em que os sujeitos evitavam a apresentação de S-, a duração das tentativas TS- era marcadamente prolongada (contingência de DRO 3 s vigente no final das tentativas). Para se investigar melhor esta questão e se ter claro o controle das respostas de observação pelos estímulos discriminativos -- em vez de ter sido gerado por um artefato do procedimento, por exemplo--, foi exigido dos sujeitos, no Experimento 1, que confirmassem o valor punidor condicionado adquirido por S- através de um padrão de desempenho diferente -- e de certa forma oposto -- ao exigido por Blanchard (1975) e Tomanari (1995). No Experimento 1, os sujeitos produziam o estímulo sinalizador respondendo mais freqüentemente no disco (FR) em vez de espaçarem suas respostas no tempo (em DRL, Blanchard, 1975 e Tomanari, 1995).

Os resultados do Experimento 1 da presente investigação e os obtidos por Blanchard (1975) e Tomanari (1995) apontaram para conclusões opostas quanto à função reforçadora de S-. Em todos os três experimentos, obteve-se uma alta

freqüência de respostas nas tentativas TS-, tanto em esquema tand VI DRL quanto em esquema tand VI FR. Este desempenho dos sujeitos em tand VI DRL resultou na esquiva de S- (gerando a conclusão de uma suposta função punidora) enquanto que, em tand VI FR, resultou na sua produção (gerando a conclusão, oposta, de uma função reforçadora). Portanto, quando estes dois estudos são comparados, esta aparente indiferença no desempenho dos sujeitos nos dois esquemas pode estar sugerindo um fraco controle por S- e a possibilidade de que outra variável tenha controlado as respostas de observação relacionadas a S-. Apesar de que, analisando os resultados de cada um dos estudos, individualmente, as diferenças de desempenho nas tentativas TS+ e TS- foram muito claras e o desempenho dos sujeitos, tanto em tand VI DRL (Tomanari, 1995) quanto em tand VI FR (Experimento 1), mostrou-se bastante sistemático e regular.

Desempenho claro e sistemático entre os sujeitos também foi verificado nos resultados do Experimento 2. Neste estudo, obteve-se uma evidente distinção entre as respostas de observação mantidas por S+ e S- tanto em pombos não-ingênuos quanto ingênuos. No entanto, uma alta freqüência de respostas nas tentativas TS- foi também observada. Esta constatação pode fortalecer, em função da semelhança com a alta freqüência de respostas obtida em esquemas tand VI DRL (Tomanari, 1995) e tand VI FR (Experimento 1), a sugestão de que o controle das respostas de observação por S- não era um controle preponderante.

Os resultados dos Experimentos 1 e 2 da presente investigação revelam a existência de dois procedimentos em que pombos emitem respostas que produzem a apresentação de S- sem que, para isso, tivessem sido empregados artifícios como contingenciar a produção de S- a um aumento na probabilidade de obtenção de comida (Allen e Lattal, 1989) ou técnicas de *fading* (Kaminski e

Moore, 1990). Além disso, os resultados da presente investigação parecem estar imunes à afirmação de Dinsmoor (1983) de que, na situação em que produz tanto S+ quanto S- (dependendo do componente em vigor no misto), as respostas de observação se manteria porque produz S+, ainda que intermitentemente. Este não seria o caso, entretanto, da presente investigação, cujos resultados do Experimento 2, particularmente, mostram que respostas que produziam reapresentações de S- foram emitidas mesmo na situação em que nunca haviam produzido reapresentações de S+.

Os dados da presente investigação parecem nos levar, portanto, à conclusão de que S- adquiriu valor reforçador condicionado. Todavia, restrições a esta conclusão se aplicam quando eles são comparados com os resultados obtidos por Blanchard (1975) e Tomanari (1995) -- que utilizaram, com pombos, basicamente o mesmo procedimento. As diferenças entre os resultados destes estudos sugerem que afirmações mais definitivas sobre os efeitos reforçadores ou punidores de S- devem aguardar até que futuras investigações sejam realizadas. Por exemplo, um estudo que identifique a(s) variável(is) que controlou(laram) a alta frequência de respostas de observação que resultou, ora na apresentação de S- (tand VI FR), ora na sua esquiva (tand VI DRL). No momento, pelo menos parcialmente, estes resultados podem contribuir para as discussões sobre 1) as especificidades entre espécies quanto ao valor reforçador condicionado de S- e 2) as Hipóteses da redução-do-atraso versus redução-da-incerteza.

Diferenças entre espécies

Como foi apontado na Introdução, alguns autores sugerem que diferentes espécies, mais especificamente, primatas versus não-primatas, seriam diferentemente susceptíveis ao reforçamento por S-. Ou seja, humanos e macacos produziram respostas mantidas pela apresentação de S- enquanto pombos e ratos, por exemplo, não. Esta possibilidade quanto a especificidade da espécie no reforçamento por S- é mantida, por estes autores, baseada no fato de que, com pombos e ratos como sujeitos, ao contrário de humanos (Perone e Baron, 1980; Lieberman, 1997) e macacos (Lieberman, 1972; Schrier e col., 1980), nenhum estudo havia mostrado, até o momento, qualquer evidência conclusiva de que este estímulo fosse capaz de manter respostas de observação. Entretanto, a partir dos resultados da presente investigação, as possíveis diferenças entre espécies em relação ao reforçamento por S-, caso existam, parecem menores. Assim como humanos e macacos, agora existem evidências de que pombos podem emitir respostas que produzem S-.

Na verdade, alguns estudos anteriores já haviam sugerido que o reforçamento por S- não seria exclusivo de primatas. Tomanari (1995) sugeriu ser possível que, dentro de um mesmo procedimento, pombos emitissem respostas mantidas pela esquiva de S- ao mesmo tempo em que obtinham uma sinalização correlacionada com este estímulo. Allen e Lattal (1989) e Kaminski e Moore (1990) realizaram uma análise experimental de procedimentos que poderiam gerar um controle fidedigno de respostas de observação pela produção de S- apenas. Kaminski e Moore (1990) realizaram um experimento com pombos em que procederam a retirada de S+ através de um *fading-out*. Com este recurso, as respostas de observação foram mantidas quando produziam apenas S-. Allen e Lattal (1989) usaram um procedimento engenhoso em que respostas no

componente de extinção (em esquema misto VI EXT) diminuía a frequência de reforços no componente seguinte de VI. Nesta situação específica, respostas de observação que produziam S- foram mantidas.

Os estudos que envolveram as respostas de observação em sujeitos humanos revelaram algumas especificidades relacionadas a estes sujeitos. Nestes estudos, têm-se verificado que, além das variáveis identificadas nos procedimentos com não-humanos, outras coexistem e aumentam a complexidade da análise. Por exemplo, as instruções, sejam aquelas fornecidas pelo experimentador antes da sessão (Fantino e Case, 1983; Case, Fantino e Wixted, 1995) ou aquelas geradas pelos próprios sujeitos (Perone e Kaminski, 1992), parecem desempenhar um papel importante na determinação do valor reforçador dos estímulos discriminativos. Papel igualmente importante também parece ter a história passada dos sujeitos com instruções. No estudo de Perone e Kaminski (1992), quando S- era a frase “o *status* do programa agora é ausência de pontos”, a frequência de respostas de observação dos sujeitos humanos diminuía drasticamente; quando era a frase “o *status* do programa agora é B” (previamente definido como ausência de pontos), as respostas de observação se mantinham. Recentemente, este trabalho foi replicado por Case (1997)¹⁸ sem que, no entanto, resultados semelhantes tivessem sido obtidos.

¹⁸ Case, D. A. (1997) Human observing behavior inconsistent with uncertainty-reduction and a second failure to replicate Perone and Kaminski (1992). *Encontro Anual da Association for the Behavior Analysis*, Chicago.

Hipótese da Redução-do-atraso versus Hipótese da Redução-da-incerteza

Existem duas hipóteses que procuram explicar o valor reforçador condicionado de estímulos discriminativos. Uma delas, a Hipótese da redução-do-atraso, afirma que um estímulo inicialmente neutro se torna um reforçador condicionado em função do quanto este estímulo sinaliza uma redução temporal entre a sua apresentação e a liberação do reforçador incondicionado (Fantino e Logan, 1979). Na Hipótese da redução-da-incerteza, diferentemente, o elemento fundamental na determinação de um reforçador condicionado é o quanto este estímulo prediz (ou informa) sobre a liberação do reforçador incondicionado (Berlyne, 1957; Hendry, 1969; Hendry, 1983). Ambas as hipóteses prevêem, portanto, que um estímulo correlacionado com apresentação do reforçador primário deve se tornar um reforçador condicionado. Entretanto, em relação ao estímulo correlacionado com uma baixa ou nula probabilidade de apresentação de comida, as duas hipóteses prevêem resultados opostos. No procedimento de respostas de observação, a Hipótese da redução-do-atraso afirma que S- não adquire função reforçadora condicionada ou adquire função punidora porque a apresentação de S- sinaliza, em relação ao estímulo do esquema misto, uma maior distância temporal até a liberação do reforço. Por outro lado, a Hipótese da redução-da-incerteza afirma que S-, por diminuir a incerteza acerca das contingências em vigor adquire, sim, função reforçadora condicionada.

Na presente investigação, os resultados parecem suportar a Hipótese da redução-da-incerteza na medida em que os pombos emitem respostas de observação mantidas, aparentemente, pela produção de S-, um estímulo correlacionado com ausência de comida. Entretanto, existem alguns dados obtidos nesta investigação que não parecem ser satisfatoriamente suportados por esta hipótese.

No Experimento 2, os sujeitos podiam apresentar e reapresentar os estímulos sinalizadores em uma mesma tentativa. De acordo com a Hipótese da redução-da-incerteza, durante a primeira exposição do estímulo do esquema misto, a incerteza sobre o tipo de tentativa em vigor, para os pombos, era máxima. Respostas de observação, nesta situação, podiam produzir S+ ou S- em igual probabilidade ($p=0,5$). Após esta primeira produção, entretanto, a incerteza sobre a disponibilidade de liberação do comedouro na tentativa foi anulada. Portanto, as respostas de observação durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, tanto as que produziam S+ quanto as que produziam S-, levantam a questão se estas respostas podiam ter sido mantidas pela produção de informação.

Esta aparente divergência, no mesmo experimento, entre os dados que suportam e os parecem não suportar a Hipótese da redução-da-incerteza, parecem revelar as limitações desta hipótese em propiciar uma ampla descrição do processo de reforçamento condicionado. Por este motivo, pode ser cauteloso se optar por tentar compreender os resultados da presente investigação sem se remeter a hipóteses, pelo menos no presente momento. A compreensão do processo de reforçamento condicionado, em procedimento de respostas de observação, parece exigir uma avaliação ampla das variáveis envolvidas. Estudos como aqueles relatados na literatura e que utilizaram procedimentos em que as Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza eram comparadas diretamente (Case, Fantino e Wixted, 1985; Fantino e Case, 1983; Fantino e col., 1983; Mulvaney, Dinsmoor, Jwaideh e Hughes, 1974), aparentemente, restringem a análise. Limitar os estudos em respostas de observação à demonstração de dados que suportem uma ou outra hipótese desconsidera a possibilidade de que outras variáveis, além daquelas previstas originalmente por elas, possam atuar no comportamento de observação dos sujeitos. Por exemplo, as Hipóteses da

redução-do-atraso e da redução-da-incerteza não consideram a possibilidade de que respostas preparatórias possam interferir nas respostas de observação. Portanto, a identificação de variáveis deste tipo, independentemente das previsões feitas por hipóteses, pode colaborar para a maior compreensão das variáveis determinantes das respostas de observação e, por extensão, ao processo de reforçamento condicionado.

Tomanari (1995) obteve indícios apontando para o fato de que nenhuma das duas hipóteses parece dar conta de descrever o processo de reforçamento condicionado completamente. Neste trabalho, o autor mostrou que dados que suportavam ambas as hipóteses podiam coexistir no mesmo procedimento. Na presente investigação, há dados nesta mesma direção. Nos resultados do Experimento 1, há evidências de que, em diferentes níveis de análise de dados, S+ e S- se revelaram diferentemente reforçadores. Observando-se a frequência de produção de cada um dos estímulos por sessão, por exemplo, S- era mais frequentemente produzido do que S+. No entanto, observando o momento nas tentativas, em esquema tand VI FR 15, em que os estímulos sinalizadores eram apresentados, verificou-se que S+ era produzido próximo ao início das tentativas enquanto que S-, ao contrário, era produzido posteriormente.

Em resumo

Os resultados dos dois experimentos relatados na presente investigação mostraram que os estímulos sinalizadores das tentativas que terminavam com e sem a apresentação de comida, S+ e S-, respectivamente, controlaram diferentemente as respostas de observação dos pombos. Basicamente, no Experimento 1, as respostas de observação, em esquema tand VI 15 s FR 15 (ou FR 24), aumentavam de frequência (em relação à linha de base, em VI) quando produziam S- mas não, necessariamente, quando produziam S+. No Experimento

2, dada aos sujeitos a oportunidade de produzirem reapresentações dos estímulos sinalizadores, observou-se que a frequência de reapresentações de S- foi clara e sistematicamente maior do que a de S+.

Os resultados comuns aos dois experimentos mostraram que S- foi capaz, não apenas de manter respostas de observação como manteve mais respostas do que S+. Em uma tentativa de se compreender a menor frequência de produção de S+ em relação à S-, levantou-se a possibilidade de que respostas concorrentes e incompatíveis com as respostas ao disco (respostas preparatória, Perkins, 1968) teriam ocorrido sob controle de estímulos correlacionados com o tipo de tentativa em vigor (o próprio desempenho dos sujeitos no esquema tand VIFR, no Experimento 1 e a 1ª apresentação dos estímulos discriminativos, no Experimento 2).

Quanto à manutenção de respostas de observação pela produção de S-, os resultados da presente investigação, diferentemente do que tem sido relatado por estudos na área, sugerem que S-, pelo menos dentro das condições estudadas, seria um estímulo reforçador condicionado. No entanto, em uma comparação com os estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995) que utilizaram, com pombos, um procedimento de observação semelhante ao aqui empregado, levantou-se a possibilidade de que as respostas de observação que resultaram na produção de S- podem não ter estado, necessariamente, sob controle deste estímulo. Esta sugestão teve origem na verificação de uma alta frequência de respostas de observação nas tentativas TS- quando S- era produzido em esquemas tand VIFR e tand VI DRL. Esta aparente indiferenciação de desempenho nestes dois esquemas apontam para conclusões opostas em relação à função reforçadora ou punidora condicionada de S-. Quando foi empregado o esquema tand VI DRL para produção de S-, a alta frequência de respostas resultou na esquiva de S- (função punidora condicionada de S-) mas,

em tand VIFR, quando os estímulos podiam ser reapresentados, resultou na sua apresentação (função reforçadora condicionada).

A partir dos resultados da presente investigação, portanto, não é possível tirar conclusões definitivas em relação a função reforçadora condicionada de S-. Entretanto, algumas contribuições foram dadas para o aumento na compreensão das variáveis envolvidas na manutenção das respostas de observação. Entre elas, a presente investigação:

- 1) mostrou que pombos, dentro das condições do presente estudo, emitem respostas de observação que produzem a apresentação de um estímulo correlacionado com ausência de comida (S-). De acordo com os seus resultados, S- adquiriu valor reforçador condicionado.
- 2) discutiu seus resultados comparativamente a outros estudos que utilizaram procedimentos semelhantes (Blanchard, 1975, Tomanari, 1995). A constatação de diferenças entre os resultados destes estudos mostrou que são necessários dados complementares para que se possa afirmar mais conclusivamente sobre a função reforçadora ou punidora (Blanchard, 1975 e Tomanari, 1995) condicionada de S-.
- 3) sugeriu a existência de possíveis contingências, relacionadas ao presente procedimento, que podem ter interferido nas respostas de observação (por exemplo, as respostas preparatórias). Para futuras investigações, a coleta de dados empíricos e a análise mais apurada de relações de contingências deste tipo devem permitir uma maior compreensão das variáveis responsáveis pelo estabelecimento de reforçadores condicionados. Neste trabalho, é sugerido, portanto, que a manutenção de respostas de observação envolve múltiplos

fatores que, no momento, ainda estão fracamente controlados. Uma satisfatória compreensão do fenômeno se dará com a identificação e o controle de cada um deles.

- 4) sugeriu que as Hipóteses da redução-da-incerteza e da redução-do-atraso podem limitar a compreensão do processo de reforçamento condicionado, pelo menos dentro do procedimento empregado no presente estudo. Estas hipóteses não incluem, em suas proposições, a possibilidade de que outras variáveis, além do grau de incerteza e a proximidade temporal ao reforçamento, estejam envolvidas no processo de reforçamento condicionado. Como foi visto nos resultados aqui apresentados, este processo parece ser multi-determinado. Na utilização e testes destas hipóteses, pesquisadores não têm considerado, por exemplo, a possibilidade de que ambas possam contribuir para a compreensão de um mesmo conjunto de dados.
- 5) contribuiu para a discussão que envolve a diferença entre espécies como determinante no estabelecimento de S- como um estímulo reforçador condicionado (primatas versus não-primatas). Os resultados da presente investigação, ao revelarem que pombos, assim como humanos e macacos, emitem respostas mantidas pela apresentação de S-, sugerem que a função reforçadora deste estímulo não depende, necessariamente, da espécie envolvida. Em vez disso, variáveis de procedimento parecem desempenhar um papel importante nesta determinação. Tendo em vista as diferenças entre os resultados da presente investigação e aqueles obtidos por Blanchard (1975) e Tomanari (1995), no entanto, comparações mais conclusivas entre espécies dependem, em parte, de futuras investigações sobre a função reforçadora de S- nos próprios pombos.

Referências

- Allen, K.D. e Lattal, K.A. (1989). On conditional reinforcing effects of negative discriminative stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 52, 335-339.
- Auge, R.J. (1973). Effects of stimulus duration on observing behavior maintained by differential reinforcement magnitude. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 429-438.
- Berlyne, D.E. (1957). Uncertainty and conflict: A point of contact between information theory and behavior concepts. *Psychological Review*, 64, 329-333.
- Branch, M.N. (1970). The distribution of observing responses during two VI schedules. *Psychonomic Science*, 20, 5-6.
- Branch, M.N. (1973). Observing responses in pigeons: Effects of schedule component duration and schedule value. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 417-428.
- Blanchard, R. (1975). The effect of S- on observing behavior. *Learning and Motivation*, 6, 1-10.
- Bowe, C.A., e Dinsmoor, J.A. (1983). Spatial and temporal relations in conditioned reinforcement and observing behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 39, 227-240.
- Brown, P.L. e Jenkins, H.M. (1968). Auto-shaping of the pigeon's key-peck. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 11, 1-8.
- Browne, M.P. e Dinsmoor, J.A. (1974). Wyckoff's observing response: pigeons learn to observe stimuli for free food but not for extinction. *Learning and Motivation*, 5, 165-173.
- Cantor, M.B. (1979). A solution to two big problems in the analysis of behavior. Em *Predictability, correlation and contiguity*. Harzem, P. e Zeiler, M.D. (orgs.). John Willey and Sons Ltd.
- Carvalho, S.G. e Machado, L.M.C.M. (1992). Esquemas mistos e múltiplos concorrentes: uma reavaliação da resposta de observação. *Acta Comportamentalia*, 0, 109-144.

tempo nas tentativas TS+ (em tand VI FR) avançava, a probabilidade de que respostas de observação fossem emitidas diminuía. Portanto, a maior concentração de produção de S+ ocorria, normalmente, nos intervalos iniciais.

Quando em vigor nas tentativas TS-, entretanto, diminuição semelhante na frequência de respostas ao longo dos intervalos destas tentativas não foi observada. Pelo contrário, o padrão, para todos os sujeitos, foi de frequência de respostas relativamente alta e constante ao longo de todos intervalos das tentativas sem apresentar tendências acentuadas de aumento ou diminuição. Além disto, respostas no 11º intervalo ocorreram mais frequentemente nas tentativas TS- do que nas tentativas TS+. Neste intervalo, eram registradas as respostas emitidas após os 50 s regulares de duração das tentativas (durante a vigência da contingência de DRO 3 s). Conseqüentemente, as tentativas TS- foram frequentemente mais prolongadas do que as tentativas TS+. Este padrão de desempenho dos pombos, a manutenção de uma frequência de respostas relativamente alta no transcorrer das tentativas TS-, se refletiu em uma produção maior de S- do que de S+, principalmente ao final das tentativas e no 11º intervalo.

A distribuição de produção dos estímulos sinalizadores ao longo dos intervalos das tentativas, em esquema tand VI FR, revelou diferenças claras no padrão de produção de cada um destes estímulos. Estas diferenças foram notadas em pelo menos dois aspectos destas distribuições e parecem refletir – com uma aparente contradição -- a função reforçadora condicionada de S+ e S-.

O primeiro aspecto se refere aos dados que mostram que, em esquema tand VI FR 15, houve uma maior concentração de produção de S+ do que de S- nos intervalos iniciais das tentativas. Ou seja, neste esquema, iniciada uma tentativa TS+, a produção de S+ ocorria prontamente enquanto que a produção de S- ocorria mais tardiamente.

O segundo aspecto trata da constatação de que, em esquema tand VI FR 15 e, mais marcadamente, em FR 24, a produção de S- era maior do que a de S+ ao final das sessões, para todos os sujeitos, exceto os Pombos 31 e 34. Especificamente na condição em que se empregou FR 15, apesar de ocorrer uma concentração de produção de S+ nos intervalos iniciais das tentativas (1º aspecto levantado anteriormente), a frequência de produção de S- passou a ser aceleradamente maior do que a de S+ no decorrer da tentativa. Coerentemente com esta distribuição de produção dos estímulos sinalizadores, a distribuição de respostas mostrou, claramente, uma tendência de diminuição na frequência de respostas de observação na medida em que passavam os intervalos das tentativas TS+ mas não os das tentativas TS-.

Estes dois aspectos observados na análise de distribuição de produção de S+ e S-, em esquema tand VI FR, descreveram diferentes controles exercidos por estes estímulos sobre o desempenho dos sujeitos. Estes controles, sob uma certa perspectiva, parecem ser contraditórios em relação a função reforçadora condicionada adquirida por eles. Por um lado, em tand VI FR, S- foi sistematicamente mais produzido do que S+. Mas, por outro lado, a produção de S+, em esquema tand VI FR 15, ocorria logo no início das tentativas. Como mostrou Mulvaney e col. (1981), medidas de latência podem ser correlacionadas com o valor reforçador condicionado de um estímulo.

A fim de se buscar compreender estes resultados aparentemente contraditórios, algumas variáveis que poderiam estar interagindo com o comportamento de observação dos pombos (além daquelas já analisadas até o momento) poderiam ser apontadas e a interação entre elas e o desempenho dos sujeitos descrita. Esta análise mais ampla poderia propiciar uma maior compreensão de pelo menos parte dos resultados do presente estudo,

particularmente aquela que se refere ao fato de que S- manteve mais respostas de observação do que S+.

Algumas características específicas dos esquemas utilizados no presente procedimento podem ter contribuído na determinação de algumas destas variáveis que possivelmente controlaram o desempenho de observação dos pombos. Em tand VI FR, a produção do estímulo sinalizador exigia um maior número de respostas do que em VI simples e, portanto, a produção do estímulo sinalizador associado a este esquema acontecia mais tardiamente nas tentativas. Segundo mostraram os resultados, nas tentativas em VI, os estímulos sinalizadores eram produzidos nos primeiros 20 segundos das tentativas em cerca de 80% do total delas na sessão. Por outro lado, em tand VI FR, produção comparável ocorria apenas em intervalos posteriores.

Devido a esta diferença na distribuição de apresentação dos estímulos sinalizadores nas tentativas em esquema tand VI FR e em VI, uma estimulação discriminativa destas tentativas passou a estar disponível aos sujeitos. Ou seja, a passagem do tempo nas tentativas, sem que ocorresse mudança na cor do disco de respostas (dado que as respostas de observação eram emitidas), indicava que era maior a probabilidade de que o esquema tand VI FR, não o VI, estivesse em vigor. No caso do comportamento dos pombos ter estado sob controle desta estimulação discriminativa, isto significa que, em esquema tand VIFR, os sujeitos tiveram acesso, ainda na presença do estímulo do esquema misto, a uma estimulação alta e diretamente correlacionada com o tipo de tentativa associado a este esquema⁹.

A estimulação gerada pelo desempenho dos sujeitos em esquema tand VI FR e os estímulos sinalizadores das tentativas (S+ e S-) deveriam compartilhar

⁹ De acordo com esta análise, o desempenho dos sujeitos nas tentativas que permaneceram em VI, principalmente nos intervalos mais longos, deveria se assemelhar ao desempenho em esquema tand VI FR.

funções discriminativas semelhantes¹⁰. Em ambos os casos, a correlação entre os estímulos discriminativos e o tipo de tentativa em vigor era alta (quando gerados pelo desempenho em *tand VI FR*) ou perfeita (quando eram apresentados os estímulos sinalizadores no disco de respostas)¹¹. Portanto, assim como S+ e S- (cores do disco) exerceram um claro e diferente controle sobre as respostas de observação, seria esperado que uma estimulação similarmente discriminativa exercesse um controle comparável sobre o comportamento dos sujeitos. Segundo a hipótese a ser discutida a seguir, o controle exercido por esta estimulação estaria atuando, não apenas sobre as respostas ao disco (respostas de observação), mas também sobre outras respostas, como respostas preparatórias dirigidas ao comedouro (Perkins, 1968). Segundo Perkins (1968), respostas preparatórias seriam mantidas pela otimização no consumo do reforço (por exemplo, a salivação facilitando o comer) ou pela minimização da exposição a estímulos aversivos (por exemplo, enrijecimento muscular quando o sujeito é exposto ao choque).

Esta possibilidade, de que possam ter ocorrido respostas preparatórias no presente procedimento, foi originada a partir de observações assistemáticas de algumas sessões experimentais. Uma destas sessões, uma sessão de linha de base, foi registrada em fita de vídeo. A observação desta gravação permitiu verificar a existência de um padrão claro e sistematicamente diferente no comportamento do pombo quando S+ e S- eram apresentados no disco de respostas. Na presença de S+, ocorria uma alta frequência de respostas dirigidas

¹⁰ Devido ao fato da presente análise envolver dois conjuntos de estímulos discriminativos, um originado pelo próprio desempenho dos pombos no esquema *tand VI FR* e o outro apresentado pelo experimentador como consequência das respostas ao disco, o primeiro conjunto será tratado com estimulação discriminativa e o segundo continuará como estímulos sinalizadores das tentativas TS+ e TS-.

¹¹ O desempenho dos sujeitos em esquema *tand VI FR* pode ter permitido a discriminação das tentativas associadas a este esquema daquelas em VI. No entanto, o desempenho em VI não propiciava dicas semelhantes. Por esta razão, estas dicas não ofereciam uma discriminação completamente segura até que, no mínimo, o maior intervalo do VI (39 s) tivesse transcorrido.

ao comedouro que, basicamente, consistiam em respostas de abaixar a cabeça nas proximidades da sua abertura. Estas respostas se repetiam, freqüentemente, até que o comedouro fosse apresentado. Na presença de S-, por outro lado, estas respostas não ocorriam.

Esta observação assistemática do comportamento deste sujeito na presença de S+ e de S- pode contribuir na compreensão da maior freqüência de produção de S- em relação a S+ em esquema tand VI FR. A idéia básica seria a de que, da mesma forma que a apresentação de S+ no disco de respostas aumentava a probabilidade de emissão de respostas ao comedouro, uma estimulação produzida pelo desempenho dos sujeitos, em esquema tand VI FR, poderia ter exercido controle semelhante. Isto é, as respostas de se aproximar ou se afastar do comedouro teriam sido controladas pela ocorrência desta estimulação ainda na presença do estímulo do esquema misto. Quando o esquema tand VI FR esteve em vigor nas tentativas que terminariam com a apresentação de comida, a freqüência de respostas preparatórias dirigidas ao comedouro aumentava e, por serem respostas concorrentes e incompatíveis, a freqüência de respostas ao disco diminuía. Em FR 24 (em comparação a FR 15), era exigido um maior número de respostas para produzir S+. Portanto, as conseqüências das respostas preparatórias sobre a freqüência de respostas ao disco, neste caso, foram ainda mais acentuadas. Por outro lado, na condição em que o esquema tand VI FR esteve em vigor nas tentativas TS-, a estimulação derivada do desempenho dos pombos neste esquema estava associada às tentativas que terminavam sem a apresentação de comida. Portanto, a probabilidade de emissão de respostas preparatórias era baixa e não interferia na emissão de respostas ao disco que iriam produzir S-.

Como foi apontado anteriormente, esta análise, envolvendo as respostas preparatórias concorrendo com as respostas de observação, pode sugerir fatores

que tenham influenciado a menor frequência de produção de S+ em relação a S- no presente experimento. Além deles, outras variáveis podem, também, ter contribuído para este dado. Basicamente, uma seria os efeitos da contingência de DRO, vigente no final das tentativas. Uma outra variável poderia ser o enfraquecimento de S+ como reforçador condicionado. Em esquema tand VI FR, verificou-se um aumento no número de tentativas que terminavam na ausência de S+ e na presença do estímulo do esquema misto. Estes fatores serão discutidos mais amplamente na Discussão Geral.

Quanto ao resultado mais evidente do presente experimento, que é o aparente valor reforçador condicionado adquirido por S- na manutenção de respostas de observação, parece ser reforçada pela análise de que os sujeitos tiveram acesso, ainda na presença do estímulo do esquema misto, a uma estimulação correlacionada com as tentativas que terminavam sem a apresentação de comida. Esta estimulação, caso fosse uma estimulação aversiva, tal como descreveram alguns estudos anteriores (Blanchard, 1975; Tomanari, 1995), deveria sinalizar uma diminuição na frequência das respostas de observação que iriam produzir S- (assim como a estimulação associada a S+ teria sido discriminativa para respostas preparatórias). No entanto, o que se observou no presente experimento, foi que o controle das respostas de observação por esta possível estimulação negativa ocorreu no sentido de produzir S- e não de evitá-lo.

EXPERIMENTO 2

Nos estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995), dada a oportunidade aos sujeitos, eles evitaram a apresentação de S-, mas não a de S+. Em uma análise de dados detalhada, Tomanari (1995) observou que, apesar de S- estar sendo evitado, o próprio desempenho dos sujeitos em esquema tandem VI 15 s DRL 6 s podia indicar, ao longo da tentativa TS-, que esta terminaria sem liberação de comida. Observação semelhante foi feita em relação aos resultados do Experimento 1 da presente investigação. Em esquema tandem VI 15 s FR 15 (ou FR 24), os sujeitos puderam ter acesso, na presença do estímulo do esquema misto, a uma estimulação altamente correlacionada com as tentativas em que este esquema esteve em vigor.

O contato dos sujeitos com esta possível estimulação, de certa forma substituta de S+ e S-, pareceu controlar, diferentemente, o comportamento de observação dos pombos ainda na presença do estímulo do esquema misto; conseqüentemente, pareceu controlar, também, as respostas que produziam os próprios estímulos sinalizadores. Conforme mostraram os resultados do Experimento 1, comparando-se as frequências de produção de S+ e S- após a suposta produção da estimulação gerada pelo desempenho dos sujeitos em esquema tandem, observou-se uma diminuição na frequência de produção de S+ mas não na de S-. Isto é, as respostas de observação pareceram sofrer diferentes efeitos da produção anterior de uma estimulação diretamente correlacionada com S+ ou S-. Esta configuração, envolvendo um controle discriminativo dos estímulos sinalizadores sobre as respostas de observação -- e não apenas um controle reforçador -- poderia ser explicitada em termos de procedimento.

O objetivo do presente experimento foi avaliar, em pombos, o valor reforçador condicionado de estímulos sinalizadores de reforçamento e extinção

em uma condição em que estes estímulos poderiam exercer controle discriminativo sobre as próprias respostas de observação que os produziam. Para isto, a estratégia utilizada pelo presente estudo foi a de manter, basicamente, o procedimento de tentativas utilizado no Experimento 1 desta investigação e empregado anteriormente por Blanchard (1975) e Tomanari (1995). No entanto, diferentemente destes estudos, foi manipulado, neste Experimento 2, a duração máxima de apresentação dos estímulos sinalizadores. Terminada uma apresentação de estímulo, a condição de esquema misto era reestabelecida de modo que, na mesma tentativa, o estímulo sinalizador podia ser reapresentado. Desta forma, a ocorrência de respostas nas tentativas que terminavam com e sem a apresentação de comedouro seria igualmente provável durante a primeira exposição do estímulo do esquema misto. No entanto, em exposições posteriores, as respostas de observação podiam estar sob controle discriminativo da apresentação anterior de S+ ou S- e seriam mantidas pelas suas reapresentações.

Método

(Experimento 2)

Sujeitos

Foram utilizados 8 pombos correio (*Columbia livia*) obtidos de criadores particulares. Inicialmente, foram sujeitos os seis pombos (Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37) previamente submetidos ao Experimento 1 da presente investigação. Na sequência, foram adicionados, ao experimento, dois pombos experimentalmente ingênuos (Pombos 63 e 64). Todos os sujeitos foram mantidos nas mesmas condições de alojamento e privação descritas no Experimento 1.

Equipamento

Foi utilizado o mesmo equipamento descrito no Experimento 1.

Procedimento

O procedimento empregado no Experimento 2 foi semelhante ao procedimento básico descrito no Experimento 1 (veja item Procedimento Básico, Método, Experimento 1), exceto por alterações no tempo de apresentação dos estímulos sinalizadores e pela manutenção do esquema de VI 15 s ao longo de todas as fases realizadas. Excluindo estas duas alterações, as contingências programadas no Experimento 1 continuaram vigorando no Experimento 2.

Devido à experiência prévia dos Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37 neste procedimento de respostas de observação, estes sujeitos foram submetidos diretamente à Fase 1. Os Pombos 63 e 64, entretanto, passaram, anteriormente ao procedimento experimental propriamente dito, por uma sessão de treino ao comedouro e auto-modelagem da resposta de bicar o disco (Brown e Jenkins,

1968). Na sequência, foram submetidos a uma sessão de reforçamento contínuo das respostas de bicar o disco, iluminado por cor azul, até que tivessem ocorridas 100 apresentações do comedouro. Instalado o comportamento de bicar o disco, os Pombos 63 e 64 foram submetidos à Fase 0 como treino prévio ao procedimento de observação.

A seguir, estão descritas as diferentes fases empregadas no Experimento 2.

Fase 0 - Condição de Produção Simples de Estímulos (PS) - Nesta fase, respostas ao disco produziam a apresentação do estímulo sinalizador correspondente ao tipo de tentativa em vigor em esquema de FR 1. Uma vez apresentado, semelhantemente ao realizado no Experimento 1, o estímulo sinalizador permanecia no disco de respostas até o final da tentativa. Somente os Pombos 63 e 64 foram submetidos a esta fase.

Fases 1, 3 e 5 - Condição de Produção Simples de Estímulos (PS) - Nestas fases, foram programadas contingências semelhantes à Fase 0 exceto que S+ e S- eram produzidos em esquema de VI 15 s. O objetivo básico desta condição foi estabelecer as diferentes cores dos discos, vermelha ou verde, como discriminativas das conseqüências programadas ao final das tentativas, apresentação ou não de comedouro.

Fases 2 e 4 - Condição de Produção Múltipla de Estímulos (PM). Nestas fases, uma vez produzido o estímulo sinalizador, S+ ou S-, em esquema de VI 15 s, este permanecia exposto no disco de respostas por, no máximo, 10 segundos¹². Transcorrido este tempo, desde que a tentativa ainda estivesse em vigor, era

¹² O tempo de apresentação do estímulo sinalizador podia ser menor do que 10 s caso a tentativa terminasse antes de se completar este tempo.

reinstalada a condição de esquema misto (disco branco) e, novamente, na mesma tentativa, os estímulos sinalizadores, em VI 15 s, podiam ser reapresentados. O término da tentativa interrompia a apresentação de qualquer que fosse o estímulo presente no disco de resposta (sinalizadores do esquema misto, S+ ou S-), independentemente do tempo que estes estímulos tenham estado expostos, e dava início ao intervalo entre tentativas.

O Quadro III, a seguir, mostra, para cada um dos sujeitos, a sequência de fases empregada, o número de sessões realizadas em cada uma delas e as cores utilizadas para sinalizar os diferentes tipos de tentativas.

Quadro III: Condições experimentais -- Produção Simples (PS) ou Produção Múltipla (PM) -- empregadas em cada uma das fases do Experimento 2, para cada um dos 8 sujeitos. As cores utilizadas como estímulos sinalizadores das tentativas TS+ e TS- (S+ e S-, respectivamente) estão indicadas por Vm (disco vermelho) ou Vd (disco verde). Os números em parênteses indicam o número de sessões realizadas em cada fase.

Pombo	S+	S-	Condições Experimentais					
			Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
27	Vm	Vd	-	PS (21)	PM (15)	PS (17)	-	-
31	Vm	Vd	-	PS (21)	PM (15)	PS (20)	-	-
34	Vm	Vd	-	PS (20)	PM (14)	PS (16)	-	-
35	Vd	Vm	-	PS (21)	PM (13)	PS (21)	-	-
36	Vd	Vm	-	PS (20)	PM (12)	PS (16)	-	-
37	Vd	Vm	-	PS (21)	PM (13)	PS (20)	-	-
63	Vd	Vm	PS (10)	PS (16)	PM (16)	PS (15)	PM (22)	PS (14)
64	Vd	Vm	PS (10)	PS (16)	PM (16)	PS (15)	PM (23)	PS (15)

Resultados

(Experimento 2)

A seção de resultados do Experimento 2, semelhantemente à do Experimento 1, apresenta os dados em três diferentes níveis de análise em que são comparadas as frequências de produção de S+ e S- (Figuras 5 e 6) ou de respostas de observação nas tentativas TS+ e TS- (Figura 7). Inicialmente, é mostrada a frequência média de produção dos estímulos sinalizadores nas 5 últimas sessões de todas as fases do Experimento 2 (Figura 5). Na sequência, é apresentada a frequência de produção de S+ e S- ao longo de blocos de sessões na(s) fase(s) em que a Condição PM esteve em vigor (Figura 6). E, finalmente, é mostrada a distribuição de respostas de observação em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS- (Figura 7). Para cada uma das figuras, em diferentes painéis, são mostrados os dados relativos à 1) Condição PS, 2) Condição PM: 1ª (oportunidade de) produção do estímulo sinalizador e 3) Condição PM: após a 1ª produção do estímulo sinalizador. Em todas as figuras, são apresentados dados individuais dos sujeitos.

A **Figura 5** mostra a frequência média de produção de S+ (colunas vermelhas) e S- (colunas verdes) nas 5 últimas sessões de cada uma das fases do Experimento 2, para todos os sujeitos, individualmente. O Painel A refere-se à Condição PS, em que os estímulos podiam ser produzidos apenas uma vez em cada tentativa. Os Painéis B e C referem-se à Condição PM, em que S+ e S- podiam ser produzidos mais de uma vez. O Painel B, particularmente, descreve a frequência em que S+ e S- foram apresentados pela primeira vez nas tentativas. O Painel C mostra a frequência de reapresentações de cada um dos estímulos. O número máximopossível de estímulos produzidos na Condição PS e na Condição

Figura 5: Frequência média de produção de S+ (colunas vermelhas) e S- (colunas verdes) nas 5 últimas sessões de cada uma das fases do Experimento 2, para todos os sujeitos, individualmente. O Painel A refere-se à Condição PS, em que os estímulos podiam ser produzidos apenas uma vez em cada tentativa. Os Painéis B e C referem-se à Condição PM, em que S+ e S- podiam ser produzidos mais de uma vez. O Painel B, particularmente, descreve a frequência em que S+ e S- foram apresentados pela primeira vez nas tentativas. O Painel C mostra a frequência de reapresentações de cada um dos estímulos. O número máximo possível de estímulos produzidos na Condição PS e na Condição PM (apenas como 1ª apresentação - Painel B), era equivalente ao número máximo de tentativas por sessão, isto é, 32 (16 tentativas TS+ e 16 TS-).

PM (apenas como 1ª apresentação - Painei B), era equivalente ao número máximo de tentativas por sessão, isto é, 32 (16 tentativas TS+ e 16 TS-).

Analisando-se a frequência de produção de S+ e de S- na Condição PS (Painei A) e na 1ª apresentação do estímulo do esquema misto da Condição PM (Painei B), é possível observar que, para todos os 8 sujeitos, em todas as fases, ambos os estímulos sinalizadores (colunas vermelhas versus verdes) são produzidos em frequências bastante próximas entre si. Tanto nas Fases 1, 3 e 5 (Painei A) quanto nas Fases 2 e 4 (Painei B), todos os sujeitos, exceto os Pombos 37 (nas Fases 1, 2 e 3) e 63 (nas Fases 2 e 4), produziram S+ e S- em praticamente todas as tentativas possíveis.

Em relação ao Painei C, verifica-se que, para todos os 8 pombos, as frequências de produção de S+ (colunas vermelhas) e S- (colunas verdes) se diferem. Na Condição PM, para todos os sujeitos e em todas as fases, a frequência de reapresentações de S- é clara e sistematicamente maior do que a de S+. Com uma relativa regularidade, os dados dos Pombos 27, 31, 34, 35 e 36 mostram que S+ é reapresentado nas tentativas entre cerca de 8 e 16 vezes enquanto que S- é reapresentado entre 23 e 25 vezes, em média, por sessão. Para os outros três sujeitos (Pombos 37, 63 e 64), a frequência geral de produção dos estímulos sinalizadores é comparativamente menor, especialmente para os Pombos 37 e 63 (cerca de 1 reapresentação de S+ e 7 de S-). Entre todos os sujeitos, o Pombo 64 é o que mantém a menor diferença entre as frequências de produção de S+ e S- (cerca de 17 reapresentações de S- e 13 de S+ na Fase 2 e 10 na Fase 4). A frequência de reapresentações de S+ para este sujeito, diferentemente do Pombo 63, apresentou uma diminuição na Fase 4 em relação à Fase 2. Por outro lado, a frequência de reapresentações de S-, para ambos os sujeitos, se manteve relativamente constante nas duas fases.

A **Figura 6** mostra a frequência de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) no decorrer de blocos de 5 (ou 6) sessões¹³ nas fases em que a Condição PM esteve em vigor (Fase 2 para todos os pombos e Fase 4 apenas para os Pombos 63 e 64). O Painel A descreve a frequência em que cada um dos estímulos sinalizadores foi apresentado pela primeira vez nas tentativas. O Painel B se refere a frequência de reapresentações dos estímulos. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 8 sujeitos.

Como pode ser observado no Painel A desta figura, todos os 8 sujeitos, na primeira exposição do estímulo do esquema misto nas tentativas (1ª oportunidade de produção dos estímulos sinalizadores), produziram S+ e S- em frequências bastante semelhantes, em todos os blocos de sessões das Fases 2 (para todos os sujeitos) e 4 (apenas para os Pombos 63 e 64). Note que as curvas de produção de S+ e S- geralmente se sobrepõem, com exceção de alguns blocos específicos, para alguns sujeitos, em que a frequência de produção de S- é maior do que a de S+ (Pombo 37, Blocos 1 e 2; Pombo 63, Fase 4, Blocos 1 e 3 e Pombo 64, Fase 2, Bloco 3). Para os Pombos 27, 31, 34 e 35, S+ e S- são produzidos, em todos os blocos de sessões, em praticamente todas as tentativas possíveis (isto é, nas 16 tentativas TS+ e 16 nas tentativas TS-). Para os sujeitos restantes, Pombos 36, 63, 64 e, principalmente, para o Pombo 37, a frequência máxima de produção dos estímulos sinalizadores é raramente verificada. Para estes sujeitos, ocorrem cerca de 8 a 12 produções de estímulos por bloco de sessões no caso do Pombo 37; de 12 a 14 para o Pombo 63; e de 14 a 16 para o Pombo 64. Para todos os sujeitos, as frequências da primeira produção dos estímulos sinalizadores nas tentativas mantêm-se relativamente estáveis ao longo dos blocos de sessões da

¹³ Nas fases em que a divisão do número de sessões por 5 gerava resto, as sessões excedentes foram distribuídas, uma a uma, aos blocos de sessões mais próximos do início da fase. Portanto, há blocos de sessões formados por 6 sessões em vez de 5.

Figura 6: Frequência de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) no decorrer de blocos de 5 (ou 6, ver texto) sessões nas fases em que a Condição PM esteve em vigor (Fase 2 para todos os pombos e Fase 4 apenas para os Pombos 63 e 64). O Painel A descreve a frequência em que cada um dos estímulos sinalizadores foi apresentado pela primeira vez nas tentativas. O Painel B se refere a frequência de reapresentações dos estímulos. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 8 sujeitos.

Condição PM, isto é, não se observam tendências claras de aumento ou diminuição.

Passando-se a analisar o Pannel B, pode-se observar que, após a 1ª apresentação dos estímulos sinalizadores, a frequência de produção de S- (frequência de reapresentações) é claramente maior do que a de S+, para todos os sujeitos, em todos os blocos de sessões das fases mostradas (note como os quadrados verdes se localizam acima dos quadrados vermelhos). Para parte dos sujeitos, Pombos 27, 36 e 37, não se observa tendência marcante de aumento ou diminuição na frequência de produção dos estímulos sinalizadores ao longo dos blocos de sessões. Para alguns sujeitos, entretanto, podem-se observar algumas tendências. Para o Pombo 31, observa-se uma tendência sutil de aumento na frequência de reapresentações de S+ e de diminuição na de S- (respectivamente, de 11 a 13 e de 28 a 26 produções de S+ e S-, do 1º ao 3º bloco de sessões). Para os Pombos 34 e 35, verificam-se tendências mais marcantes nas frequências de reapresentações de S-. Ocorre um aumento claro no número de S- produzidos (de 18 reapresentações no 1º bloco de sessões a 23 no 3º bloco) enquanto as frequências de reapresentações de S+ permanecem relativamente constantes (em torno de 10 a 13 produções por bloco de sessões). Os Pombos 63 e 64 mostram uma tendência clara de diminuição na frequência de reapresentações de ambos os estímulos (Pombo 63, nas Fases 2 e 4) ou de apenas S+ (Pombo 64, na Fase 4). Para o Pombo 63, nos dois últimos blocos de sessões da Fase 2 e, para o Pombo 37, em todos os blocos de sessões, a frequência de reapresentações de S+ é praticamente nula. Os dados do Pombo 64, em contraste com os dos outros 7 sujeitos, revelam as menores diferenças entre as frequências de reapresentações de S+ e de S- no decorrer dos blocos de sessões.

A **Figura 7** mostra a distribuição de respostas ao disco, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas, 1º conjunto de 11 intervalos) e TS- (colunas verdes, 2º conjunto). O Painel A refere-se à Condição PS e mostra os dados dos Pombos 27 (cujos dados são representativos dos Pombos 31, 34, 35 e 36, ver Anexo 5), Pombo 37 (cujos dados diferem dos outros 7 sujeitos) e Pombos 63 e 64 (os dois sujeitos sem história experimental prévia). Os Painéis B e C referem-se à Condição PM e apresentam os dados de todos os sujeitos, individualmente. O Painel B mostra as respostas ocorridas durante a primeira apresentação do estímulo do esquema misto na tentativa. O Painel C mostra as respostas ocorridas após a primeira produção do estímulo sinalizador. Os dados desta figura foram calculados a partir da média nas 5 últimas sessões de cada fase.

Comparando-se, no Painel A desta figura, os dados dos os 4 sujeitos mostrados, pode-se verificar que o padrão de distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto, no decorrer dos intervalos da tentativas, é bastante semelhante entre 1) os sujeitos; 2) as Fases 1, 3 e 5; e, 3) as tentativas TS+ (conjunto de colunas vermelhas) e TS- (conjunto de colunas verdes). O padrão de distribuição de respostas, de modo geral, consiste em um maior número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas que, nos intervalos seguintes, vai gradal e lentamente diminuindo¹⁴. Após o 8º intervalo¹⁵, praticamente não ocorrem mais respostas. Entre os sujeitos, pode-se observar que, apesar das semelhanças no padrão de distribuição de respostas, as frequências com que estas ocorrem se diferem. O Pombo 37, por exemplo,

¹⁴ A comparação entre os intervalos de um mesmo tipo de tentativa deve considerar que, para cada intervalo de 5 s em uma tentativa, havia diferentes oportunidades de ocorrência de respostas em função da presença ou ausência do estímulo do esquema misto. A ocorrência destas oportunidades era determinada pela apresentação dos estímulos sinalizadores.

¹⁵ O 8º intervalo das tentativas corresponde ao maior intervalo do VI 15 s empregado, isto é, 39 s.

Figura 7: Distribuição de respostas ao disco, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas, 1º conjunto de 11 intervalos) e TS- (colunas verdes, 2º conjunto). O Painel A refere-se à Condição PS e mostra os dados dos Pombos 27 (cujos dados são representativos dos Pombos 31, 34, 35 e 36, ver Anexo 5), Pombo 37 (cujos dados diferem dos outros 7 sujeitos) e Pombos 63 e 64 (os dois sujeitos sem história experimental prévia). Os Painéis B e C referem-se à Condição PM e apresentam os dados de todos os sujeitos, individualmente. O Painel B mostra as respostas ocorridas durante a primeira apresentação do estímulo do esquema misto na tentativa. O Painel C mostra as respostas ocorridas após a primeira produção do estímulo sinalizador. Os dados mostrados foram calculados a partir da média nas 5 últimas sessões de cada fase.

Fig 7 Painei A

destaca-se dos outros sujeitos por uma menor frequência de respostas em todos os intervalos.

No Painel B, é possível analisar o padrão de distribuição de respostas durante a 1ª apresentação do estímulo do esquema misto, na Condição PM, nos dados de todos os pombos. Este padrão, assim como foi descrito para a Condição PS (Painel A desta figura), é semelhante para todos os sujeitos, em todas as fases da Condição PM e em ambos os tipos de tentativas (tentativas TS+ e TS-). Basicamente, o padrão observado, tal como descrito no Painel A, consiste em um maior número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas seguido por uma diminuição constante e gradual nos intervalos seguintes. Os dados dos Pombos 37 e 63 mostram que, para estes dois sujeitos, as respostas ocorrem em frequências bastante baixas após o 1º intervalo nas tentativas e normalmente deixam de ocorrer antes do 8º intervalo.

No Painel C desta figura, pode-se analisar o padrão de distribuição de respostas durante as re-exposições do estímulo do esquema misto nas tentativas -- isto é, após ter ocorrido pelo menos uma apresentação anterior do estímulo sinalizador. Nesta figura, pode-se observar que existem diferenças claras no padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS+ e TS-, diferentemente das semelhanças descritas na Condição PS (Painel A) e na 1ª exposição do estímulo do esquema misto na Condição PM (Painel B).

Notadamente, observando-se os gráficos de todos os sujeitos, pode-se verificar que o número de respostas nos intervalos das tentativas TS- é geralmente maior do que o número de respostas no intervalos das tentativas TS+ (observe como as barras verdes são, normalmente, mais altas do que as vermelhas). No entanto, em uma observação mais detalhada, pode-se notar que o número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas TS+ é maior do que nos mesmos intervalos das tentativas TS-. No decorrer dos intervalos, todavia,

TS-

Fig 7 Painel C

Respostas ao disco branco - Condição PM - após 1ª oport.

Intervalos de 5 s

TS+

TS-

esta situação se inverte e o número de respostas nos intervalos das tentativas TS- passa a ser maior do que nos intervalos das tentativas TS+. Para os Pombos 37 (Fase 2) e 63 (Fases 2 e 4), a frequência geral de respostas em ambos os tipos de tentativas é claramente mais baixa do que o observado para os outros sujeitos.

Além de um número de respostas geralmente maior nos intervalos das tentativas TS- em às tentativas TS+, o Painel C desta figura permite observar diferentes tendências, no decorrer de cada um dos tipos de tentativas.

Nas tentativas TS+ (barras vermelhas), observando os dados dos Pombos 27 e 36, pode-se notar que a frequência de respostas mantém-se relativamente constante ao longo dos intervalos (entre o 3º¹⁶ e o 11º intervalos). Quanto aos Pombos 31, 34, 35 e 64 (para o Pombo 64, Fases 2 e 4), o padrão de distribuição de respostas na tentativas TS+ se assemelha ao observado nos Painéis A e B desta figura. Isto é, ocorre um maior número de respostas nos intervalos mais próximos do início das tentativas que é acompanhado por uma diminuição lenta e gradual nos intervalos seguintes. Os Pombos 37 e 63, diferentemente dos outros sujeitos, emitem poucas respostas durante as re-exposições do estímulo do esquema misto quando estas ocorrem nas tentativas TS+ (note a ausência de barras vermelhas para estes dois sujeitos).

Em relação às tentativas TS-, para todos os sujeitos, o padrão de distribuição de respostas durante as re-exposições do estímulo do esquema misto é marcadamente diferente do padrão observado nas tentativas TS+. Nas tentativas TS-, sistematicamente para os Pombos 27, 31, 34, 35, 36 (na Fase 2) e 64 (em ambas as fases), observa-se uma clara tendência de aumento na frequência de respostas no decorrer dos intervalos. Com bastante regularidade entre todos

¹⁶ O 3º intervalo das tentativas (10 a 15 s) é o menor intervalo em que podia ocorrer uma primeira re-exposição do estímulo do esquema misto.

até o 4º intervalo das tentativas. Segue-se um período entre o 4º e o 7º intervalos de ausência de produção e, normalmente, no 8º intervalo, a maioria dos estímulos remanescentes é produzida.

Como exceção a este padrão normalmente observado nas fases de linha de base, o Pombo 37, na Fase 1, produz cerca de metade dos estímulos possíveis até o 4º intervalo e praticamente deixa de produzir estímulos na sequência. Na Fase 3, este sujeito basicamente reproduz o padrão dos outros sujeitos.

A **Figura 3-2** mostra a frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) no decorrer de intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS- das Fases 2 e 4, em que os esquemas **tand VI FR 15** (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor. Esta figura refere-se à média das 5 últimas sessões e mostra os dados de todos os 6 sujeitos, individualmente.

Observando-se os gráficos dos Pombos 31, 34, 35 e 36 na Condição **tand VI FR S+** (gráficos à esquerda na figura), é possível verificar que, para estes sujeitos, as curvas acumuladas de produção de S+ (quadrados vermelhos cheios, em **tand VI FR 15**) e S- (quadrados verdes vazios, em VI), no decorrer dos intervalos, descrevem padrões bastante semelhantes entre si. Normalmente, entre os sujeitos, a curva de produção de S+ se mantém um pouco abaixo da curva de produção de S-. Até os intervalos finais das tentativas, os pombos produzem perto do número máximo possível de ambos os estímulos por sessão (isto é, 16 para cada tipo de tentativa). O Pombo 27, apesar de produzir S+ e S- também em frequências praticamente semelhantes, mantém uma produção mais lenta e gradual ao longo das tentativas e não produz os estímulos em todas as tentativas possíveis. Para o Pombo 37, a frequência de produção de S+, em todos os intervalos, é claramente menor do que a de S-. No início das tentativas, constata-

Figura 3-2 - Frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) no decorrer de intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS- das Fases 2 e 4, em que os esquemas tandem VI FR 15 (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor. Esta figura refere-se à média das 5 últimas sessões e mostra os dados de todos os 6 sujeitos, individualmente.

Condição tand VI FR 15 S+

Condição tand VI FR 15 S-

Freqüência acumulada de produção de S+ e S-

Intervalos de 5 s

□ TS+ em VI
 □ TS- em VI
 ■ TS+ em tand VI FR 15
 ■ TS- em tand VI FR 15

se uma aceleração no número de estímulos produzidos até aproximadamente o 4º ou 5º intervalo que não se mantém nos intervalos seguintes. Para este sujeito, ocorre cerca de metade do número máximopossível por sessão de apresentações de S- e de um quarto de S+ por sessão.

Passando-se, agora, para a condição **tand VIFR 15 S-** (gráficos à direita na figura), pode-se verificar que as curvas referentes à produção de S- (quadrados verdes cheios, em **tand VIFR 15**) e S+ (quadrados vermelhos vazios, em **VI**) são, normalmente, bem diferentes entre si a partir do 1º intervalo das tentativas. Comparando-se os dados entre todos os sujeitos, pode-se constatar que, para todos eles, ocorre um aumento constante na produção de S- no decorrer da condição. Este aumento é mais acelerado para os Pombos 31, 35 e 36 e mais lento e gradual para os outros três sujeitos. As curvas referentes à produção de S+ (quadrados vermelhos vazios, em **VI**), para todos os sujeitos, são semelhantes às curvas descritas nas condições de linha de base exceto pelo fato de que, excluindo o Pombo 35, se observa um maior número de estímulos sendo produzidos no 1º intervalo. Nesta condição, todos os sujeitos, exceto o Pombo 37, produzem S+ e S- em praticamente todas as tentativas apresentadas.

A **Figura 3-3** mostra a frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) ao longo de intervalos de 5 s nas tentativas das Fases 2 e 4 em que os esquemas **tand VI FR 24** (quadrados cheios) e **VI** (quadrados vazios) estiveram em vigor. Esta figura refere-se à média das 5 últimas sessões e mostra os dados de todos os 6 sujeitos, individualmente.

Observando-se a Condição **tand VI FR 24 S+** (gráficos à esquerda na figura) nota-se, em relação à produção de S+ em **tand VI FR 15** (Figura 3-2), diferenças mais marcantes entre as curvas de produção de S+ (quadrados vermelhos cheios, em **tand VIFR 24**) e S- (quadrados verdes vazios, em **VI**). Em

Figura 3-3 - Frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) ao longo de intervalos de 5 s nas tentativas das Fases 2 e 4 em que os esquemas tand VI FR 24 (quadrados cheios) e VI (quadrados vazios) estiveram em vigor. Esta figura refere-se à média das 5 últimas sessões e mostra os dados de todos os 6 sujeitos, individualmente.

Condição tand VI FR 24 S+

Condição tand VI FR 24 S-

Frequência acumulada de produção de S+ e S-

Intervalos de 5 s

□ TS+ em VI
 □ TS- em VI
 ■ TS+ em tand VI FR 15
 ■ TS- em tand VI FR 15

tand VI FR 24 S+, para todos os sujeitos, praticamente não ocorre produção de S+ até o 2º ou 3º intervalo. A partir daí, para os Pombos 31, 34 e 36, há uma aceleração na produção de S+ de modo que, até o 6º ou 7º intervalo, as frequências acumuladas de produção de S- e de S+ praticamente se igualam. Para os Pombos 27 e 35, ocorre um aumento lento e uniforme na frequência de produção de S+ no decorrer dos intervalos. No 11º intervalo, S- é claramente mais produzido do que de S+. Para o Pombo 37, S+ nunca é produzido em qualquer um dos intervalos. As curvas de produção de S- (quadrados verdes vazios), em VI, mantêm o padrão semelhante ao de linha de base para os Pombos 31, 34, 35 e 36. O Pombo 27 produz S- lenta e uniformemente ao longo dos intervalos das tentativas e o Pombo 37 produz S- apenas até o 4º intervalo.

O padrão de produção de S-, em tand VI FR 24 (quadrados verdes cheios, gráficos à direita na figura), é bastante semelhante ao observado na figura anterior, em tand VI FR 15. Ocorrem poucas produções de S- até o 3º ou 4º intervalo quando, na seqüência, ocorre um aumento constante. Este aumento é relativamente mais acelerado para os Pombos 31, 35 e 36 e mais lento e gradual para os outros 3 sujeitos. Ao final das tentativas, ambos S+ e S- são produzidos quase que em todas as oportunidades, exceto para o Pombo 37. As curvas de produção de S+ (quadrados vermelhos vazios), em VI, são similares às de linha de base, para todos os sujeitos, exceto que, como foi observado na figura anterior, ocorre novamente um maior número de respostas no 1º intervalo para os Pombos 27, 31 e 34.

Em relação às **Figuras 3-1, 3-2 e 3-3**, pode-se observar que, na média das 5 últimas sessões das fases de linha de base, as frequências acumuladas de produção de S+ e S- ao longo de intervalos de 5 segundos nas tentativas são, em geral, bastante semelhantes. Para todos os sujeitos exceto o Pombo 37, as curvas

normalmente se confundem e, de modo geral, descrevem o padrão de linha de base como uma concentração de estímulos sendo produzidos até o 4º intervalo, seguida por um período de ausência de produção de estímulos entre o 5º e o 7º intervalos e novas produções acontecendo no 8º intervalo.

O padrão de linha de base é reproduzido, semelhantemente, nas tentativas em VI, na Condição tand VI FR 15/24 S+. Na Condição tand VI FR 15/24 S-, por outro lado, o padrão consiste em uma concentração de S- produzidos no 1º intervalo das tentativas (referente à cerca de metade do número máximo de produção de S- por sessão) e um aumento lento e constante nos intervalos seguintes. Este padrão alternativo ocorre, em FR 15, para todos os sujeitos exceto o Pombo 35 e, em FR 24, para os Pombos 27, 31 e 34.

Na Condição tand VI FR 15 S+, as distribuições acumuladas de produção de S+ (em tand VI FR 15) e S- (em VI) nos intervalos das tentativas se mantêm como em linha de base, exceto pelo fato de que as curvas de produção de S+ situam-se um pouco abaixo das curvas de S-. Por outro lado, na Condição tand VI FR 15 S-, as curvas de produção de S+ e S- tornam-se visivelmente diferentes entre si. Para a maior parte dos sujeitos, poucos S- são produzidos até o 3º ou 4º intervalo. Entretanto, na seqüência, ocorre uma aceleração na produção de S- e, semelhantemente à Condição tand VI FR 15 S+, todos sujeitos acabam produzindo S+ e S- em freqüências bastante próximas ao máximo possível por sessão.

Com o aumento no valor do FR, a distribuição da produção de S+, em esquema tand VI FR 24, deixa de ser semelhante à distribuição em VI e aumenta-se a variabilidade de desempenho entre os sujeitos. Para todos eles, praticamente não há produção de S+ até o 2º ou 3º intervalo. Na seqüência, há um aumento na freqüência de produção de S+ que se estende até o 11º intervalo e resulta, para três sujeitos (Pombos 27, 31 e 34), em S+ sendo produzido em praticamente todas

as oportunidades possíveis. Para os outros 3 sujeitos, entretanto, S+ é produzido em menos da metade do número total de tentativas. A distribuição de produção de S-, por outro lado, não se altera marcadamente com o aumento no valor do FR. Em FR 24, exceto pelo fato de que se aumenta -- em relação a FR 15 -- o número de intervalos iniciais das tentativas TS- em que poucos (ou nenhum) S- são produzidos, o desempenho observado em FR 15 praticamente se repete. Em esquema tandem VIFR 24, sistematicamente para todos os sujeitos, S- é produzido em quase todas as tentativas apresentadas.

A **Figura 4-1** mostra a distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto ao longo de intervalos de 5 segundos nas tentativas TS+ (1º bloco de 11 intervalos, colunas vermelhas) e TS- (2º bloco, colunas verdes). Os dados mostrados referem-se à média das 5 últimas sessões das Fases 1 e 3, em que S+ e S- eram ambos produzidos em esquema de VI 15 s, e referem-se ao Pombo 27 (gráficos à esquerda na figura, representantes fiéis dos dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36 nestas mesmas condições) e ao Pombo 37 (gráficos à direita, diferentes dos outros 5 pombos). Em Anexo 4, encontram-se os gráficos referentes aos dados dos 4 pombos não mostrados nesta figura.

Os dados apresentados nesta figura foram corrigidos pela oportunidade de ocorrência do estímulo do esquema misto em cada um dos intervalos nas tentativas. Os estímulos sinalizadores das tentativas TS+ e TS-, após terem sido produzidos, substituíam o estímulo do esquema misto (disco branco) e permaneciam presentes no disco de respostas até o final das tentativas. Ou seja, após a apresentação de qualquer um dos estímulos, a possibilidade de ocorrência de outras respostas ao disco branco, na mesma tentativa, era eliminada. Sendo assim, o total de respostas em cada um dos intervalos das 16 tentativas TS+ e 16 tentativas TS- de uma mesma sessão se refere a um número variável de intervalos

Intervalos de 5 s

TS+ em VI TS- em VI

Figura 4-1 - Distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto ao longo de intervalos de 5 segundos nas tentativas TS+ (1o. bloco de 11 intervalos, colunas vermelhas) e TS- (2o. bloco, colunas verdes). Os dados referem-se à média das 5 últimas sessões das Fases 1 e 3 em que S+ e S- eram ambos produzidos em esquema de VI 15 s. Nesta figura, são mostrados os dados do Pomba 27 (gráficos à esquerda na figura) por serem representantes fiéis dos dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36 nestas mesmas condições, e do Pomba 37 (gráficos à direita), por se diferenciarem dos outros 5 pombos.

em que, de fato, houve oportunidade para que essas respostas tivessem ocorrido. Para facilitar as comparações entre as frequências de respostas nos intervalos das tentativas, o número de respostas em cada um deles foi dividido pelo número de vezes em que o disco branco esteve presente. Para esta correção, assumiu-se que a apresentação dos estímulos sinalizadores ocorria na metade do intervalo.

Comparando-se o padrão de distribuição de respostas ao longo dos intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas) e TS- (colunas verdes), pode-se verificar que, nos dois tipos de tentativas, o padrão é bastante semelhante, para ambos os sujeitos, nas duas fases mostradas. Para o Pombo 27, o número de respostas não revela tendências claras e sistemáticas de aumento ou diminuição no decorrer dos intervalos. Para o Pombo 37, diferentemente do Pombo 27 e dos sujeitos por ele representado, nota-se um número relativamente alto de respostas no início das tentativas seguido por uma tendência clara de diminuição. Esta diminuição é mais lenta na Fase 3 em relação à Fase 1. Para ambos os sujeitos, em ambas as fases, não ocorrem respostas a partir do 9º ou 10º intervalo das tentativas.

A **Figura 4-2** mostra a distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto nas tentativas TS+ (1º bloco de 11 tentativas, colunas vermelhas) e TS- (2º bloco, colunas verdes), ao longo de intervalos de 5 segundos. Nesta figura, os dados referem-se à média das 5 últimas sessões na condição em que o esquema **tand VI FR 15** esteve em vigor para a produção de S+ (gráficos à esquerda da figura) e de S- (gráficos à direita). As colunas hachuradas e cheias representam, respectivamente, as tentativas em que os esquemas **tand VI FR 15** e **VI 15 s** estiveram em vigor. Novamente, os dados apresentados foram corrigidos pela oportunidade de ocorrência do estímulo do

Figura 4-2 - Distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto nas tentativas TS+ (1o. bloco de 11 intervalos, colunas vermelhas) e TS- (2o. bloco, colunas verdes), ao longo de intervalos de 5 segundos na condição em que o esquema tand VI FR 15 esteve em vigor para a produção de S+ (gráficos à esquerda da figura) ou de S- (gráficos à direita). As colunas hachuradas e cheias representam, respectivamente, as tentativas em que os esquemas tand VI FR 15 e VI 15 s estiveram em vigor. O dados apresentados foram corrigidos pela oportunidade de ocorrência do estímulo do esquema misto em cada intervalo nas tentativas (ver texto) e referem-se à média das 5 últimas sessões. São mostrados os dados individuais de todos 6 sujeitos.

Condição tand VI FR 15 S+

Condição tand VI FR 15 S-

Intervalos de 5 s

esquema misto em cada intervalo nas tentativas. São mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 6 sujeitos.

Analisando os gráficos referentes à Condição tand VIFR 15 S+ (gráficos à esquerda na figura) e comparando os padrões de respostas nas tentativas TS+ (em tand VI FR 15, colunas vermelhas hachuradas) entre todos os 6 sujeitos, pode-se verificar que, para todos eles, há um aumento no número de resposta nos intervalos iniciais das tentativas, do 1º ao 2º ou 3º intervalos. A partir deste aumento inicial, para todos os sujeitos exceto o Pombo 31, observa-se uma tendência geral de diminuição na frequência de respostas, no decorrer dos intervalos, que se estende até o final das tentativas. A frequência geral de respostas para os Pombos 27 e 37 é claramente menor do que a dos outros sujeitos. Além disso, o Pombo 37 deixa de emitir respostas por volta do 6º intervalo. Para o Pombo 31, a frequência de respostas mantém-se relativamente estável, sem tendências claras de aumento ou diminuição, entre o 2º e 9º intervalos.

Nesta mesma condição, o padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS- (em VI, colunas verdes cheias) para os Pombos 31, 34 e 35 é semelhante ao de linha de base. Após um aumento inicial, o número de respostas nos intervalos seguintes permanece relativamente estável, sem apresentar tendências claras de aumento ou diminuição, até o 8º ou 9º intervalo quando, então, cai drasticamente. Para os Pombos 27, 37 e, mais sutilmente, para o Pombo 36, entretanto, verifica-se uma diminuição na frequência de respostas, ao longo dos intervalos das tentativas TS-, comparável ao padrão observado nas tentativas TS+. Para os Pombos 27 e 37, a frequência geral de resposta é menor do que a dos outros pombos.

Passando-se agora à análise dos dados da Condição tand VI FR 15 S- (gráficos à direita na figura), e comparando os padrões de distribuição de

respostas nas tentativas em *tand VI FR S-* (colunas verdes hachuradas) entre todos os sujeitos, pode-se verificar, para os Pombos 31, 34 e 35, um aumento na frequência de respostas nos intervalos iniciais das tentativas (em geral do 1º ao 2º ou 3º intervalos). A partir do 3º ou do 4º intervalo, para estes sujeitos, e desde o início das tentativas para os outros 3, o número de respostas em *tand VI FR S-* não apresenta tendências claras ou acentuadas de aumento ou diminuição ao longo dos intervalos (exceto para o Pombo 35). A ocorrência de respostas se estende por toda a tentativa e, para a maioria dos sujeitos, atinge o 11º intervalo. Este último intervalo se refere às respostas que prolongaram a duração das tentativas. Para o Pombo 27, verifica-se, claramente, um aumento no número de respostas no 11º intervalo em relação ao anterior. Para os Pombos 31 e 36, ao contrário, observa-se um diminuição abrupta. Para os Pombos 34 e 37, praticamente não há alteração. E, finalmente, para o Pombo 35, nota-se uma diminuição entre o 9º e 10º intervalos que se mantém constante no 11º intervalo.

Nesta mesma condição, a distribuição de respostas nas tentativas *TS+* (em *VI*, colunas vermelhas cheias), para a maioria dos sujeitos, mantém-se basicamente como nas fases de linha de base (Figura 4-1). Para dois sujeitos, os Pombos 35 e 37, verifica-se uma diminuição gradual na frequência de respostas no decorrer dos intervalos. No caso do Pombo 37, este padrão assemelha-se ao que este mesmo sujeito mostrou na Fase 3.

A **Figura 4-3** mostra a distribuição de respostas, na presença do estímulo do esquema misto, nas tentativas *TS+* (1º bloco de tentativas, colunas vermelhas) e *TS-* (2º bloco, colunas verdes), ao longo de intervalos de 5 segundos. Esta figura se refere à condição em que o esquema ***tand VI FR 24*** esteve em vigor para a produção de *S+* (gráficos à esquerda na figura) ou de *S-* (gráficos à direita). As tentativas em esquema *tand VIFR* e *VI* estão

Figura 4-3 - Distribuição relativa de respostas na presença do estímulo do esquema misto nas tentativas TS+ (1o. bloco de 11 intervalos, colunas vermelhas) e TS- (2o. bloco, colunas verdes), ao longo de intervalos de 5 segundos. Esta figura se refere à condição em que o esquema tand VI FR 24 esteve em vigor para a produção de S+ (gráficos à direita na figura) ou de S- (gráficos à esquerda). As tentativas em esquema tand VI FR e VI estão representadas por colunas hachuradas e cheias, respectivamente. Como nas figuras anteriores, as frequências de respostas em cada um dos intervalos foram corrigidas pela oportunidade de ocorrência do esquema misto. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 6 sujeitos segundo a média das 5 últimas sessões.

Condição tand VI FR 24 S+

Condição tand VI FR 24 S-

Frequência de respostas por oportunidade

tentativas TS+

tentativas TS-

tentativas TS+

tentativas TS-

Intervalos de 5 s

TS+ em VI TS- em VI TS+ em tand VI FR TS- em tand VI FR

representadas por colunas hachuradas e cheias, respectivamente. Como nas figuras anteriores, as frequências de respostas em cada um dos intervalos foram corrigidas pela oportunidade de ocorrência do esquema misto. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 6 sujeitos segundo a média das 5 últimas sessões.

Observando-se os gráficos referentes à Condição tand VI FR 24 S+ (gráficos à esquerda na figura), pode-se notar que o padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS+ (colunas vermelhas hachuradas), comparado entre todos os sujeitos, consiste em um aumento no número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas (do 1º ao 4º intervalo) seguido por uma tendência de diminuição gradual nos intervalos seguintes. Esta diminuição se estende até o 11º intervalo para todos os sujeitos exceto o Pombo 37, para o qual se estende até o 7º intervalo. No caso específico do Pombo 27, observa-se um claro aumento no número de respostas no 11º intervalo em relação ao anterior. Em relação às tentativas TS- (em VI, colunas verdes cheias), o padrão de distribuição de respostas acompanha o padrão verificado nas tentativas TS+ para 5 sujeitos dos 6 sujeitos. Para o Pombo 31, como exceção, as respostas mantêm-se em frequência relativamente estável, sem apresentar tendências claras de aumento ou diminuição, em todos os intervalos. Como nas fases de linha de base, as respostas nas tentativas TS-, em VI, deixam de ocorrer por volta do 9º ou 10º intervalo. No caso específico do Pombo 37, as respostas deixam de ocorrer por volta do 6º intervalo. Tal como foi observado na figura anterior, a frequência geral de respostas dos Pombos 27 e 37, na Condição tand VI FR S+, é menor do que a dos outros 4 sujeitos.

Na Condição tand VI FR 24 S- (gráficos à direita na figura), comparando a distribuição de respostas nas tentativas TS- (em tand VI FR 24, colunas verdes hachuradas) entre todos os sujeitos, pode-se verificar que, para os Pombos 27,

34, 35, 36 e 37, o número de respostas no decorrer das tentativas permanece relativamente estável, isto é, sem mostrar uma tendência clara de aumento ou diminuição, do 1º ao 10º intervalo (8º para o Pombo 34). Para o Pombo 31, observa-se uma sutil tendência de aumento no número de respostas no decorrer dos intervalos. No 11º intervalo, ocorrem respostas que prolongaram a duração das tentativas TS-. Para os Pombos 27, 31, 35 e 37, há um claro aumento no número de respostas no 11º intervalo em relação ao anterior. Para o Pombo 34, as respostas nas tentativas TS- deixam de ocorrer no 9º intervalo. Em relação às tentativas TS+ (em VI, colunas vermelhas cheias), nos dados de todos os sujeitos exceto o Pombo 35 (para o qual se observa uma gradual diminuição na frequência de respostas no decorrer dos intervalos), o padrão de distribuição de respostas basicamente se assemelha ao padrão de linha de base.

Em relação às **Figuras 4-1, 4-2 e 4-3**, pode-se verificar que o padrão de distribuição de respostas nos intervalos das tentativas TS+ e TS-, em linha de base, é bastante semelhante para todos os sujeitos exceto o Pombo 37. Este padrão consiste basicamente em um aumento no número de respostas entre o 1º e 2º ou 3º intervalos e, a partir daí, na manutenção de uma frequência de respostas relativamente constante, isto é, sem uma clara tendência de aumento ou diminuição, até o 8º intervalo. Após uma queda brusca no número de respostas no 9º intervalo, as respostas praticamente deixam de ocorrer até o final das tentativas. No caso específico do Pombo 37, há uma diminuição mais rápida no número de respostas.

Em comparação à linha de base, o esquema tand VI FR, tanto em FR 15 quanto em FR 24, produz diferentes alterações no padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS+ ou TS-. Nas tentativas TS+, o padrão observado, para a maioria dos sujeitos, é de aumento no número de respostas entre o 1º e 2º

ou 3º intervalos seguido por uma tendência geral de diminuição até o final das tentativas. Como exceção a este padrão, o Pombo 31, em tand VI FR 24 S+, não mostra uma tendência de aumento ou diminuição definida. Quando em vigor nas tentativas TS-, o padrão, para todos os sujeitos, é de frequência de respostas relativamente alta e constante ao longo dos intervalos das tentativas, sem a presença de tendências marcantes de aumento ou diminuição. Em esquema tand VI FR, uma concentração de respostas no 11º intervalo ocorre mais freqüentemente e com maior amplitude nas tentativas TS- em comparação com as tentativas TS+, principalmente quando FR 24 (versus FR 15) estava em vigor.

A distribuição de respostas nas tentativas mantidas em VI, comparando os dados entre os sujeitos e entre as condições empregadas (tand VI FR 15/24 S+/S-), não se altera, pelo menos clara e sistematicamente, em relação ao padrão observado em linha de base.

Discussão

(Experimento 1)

O objetivo geral do presente experimento, resumidamente, foi investigar a função reforçadora/aversiva condicionada de estímulos sinalizadores de tentativas que terminavam com ou sem a apresentação de comida independentemente de qualquer resposta do sujeito. Para isso, foi empregada uma situação experimental em que, em diferentes esquemas (VI ou tand VI FR), pombos podiam produzir a apresentação de um estímulo correlacionado com o tipo de tentativa em vigor. No presente procedimento, estes esquemas foram manipulados, em diferentes condições, de forma que o esquema tand VI FR estivesse e vigor, ora para a produção de S+, ora para a produção de S-. A comparação entre o desempenho dos sujeitos nestas condições permitiu avaliar as funções exercidas pelos estímulos sinalizadores na manutenção das respostas de observação. Em diferentes níveis de análise de dados, foram avaliadas as frequências de respostas de observação e de produção de cada um dos estímulos sinalizadores.

Nas fases de linha de base, em que o esquema de VI 15 s esteve em vigor nas tentativas TS+ e TS-, o desempenho de todos os 6 sujeitos foi bastante semelhante nos dois tipos de tentativas. Nas 5 últimas sessões das fases de linha de base, S+ e S- foram geralmente produzidos em frequências semelhantes e praticamente em todas as tentativas possíveis, isto é, nas 16 tentativas de cada tipo apresentadas por sessão. Coerentemente, o número de respostas na presença do estímulo do esquema misto, nos dois tipos de tentativas, também foi semelhante.

Similaridades entre o desempenho dos sujeitos em linha de base (Fases 1 e 3) também foram observadas ao longo de intervalos de 5 s nos dois tipos de

tentativas. Tanto a distribuição de produção dos estímulos sinalizadores, como a distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto, foram semelhantes nas tentativas TS+ e TS- e geralmente refletiram a programação do VI 15 s utilizado (para todos os sujeitos, exceto o Pombo 37).

A manipulação experimental fundamental do presente estudo referiu-se à introdução do esquema tand VI FR para a produção de S+ ou de S-, em duas condições independentes, subsequente a uma condição em que os dois estímulos eram produzidos em esquema de VI (linha de base). Como resultado desta manipulação, o desempenho de todos os sujeitos, tanto nas tentativas TS+ quanto nas tentativas TS-, foi claramente alterado em relação à linha de base. Estas alterações foram diferentes em função de qual estímulo estava associado ao esquema tand VI FR, S+ ou S-. Isto é, em esquema tand VI FR, S+ e S- controlaram diferentemente o comportamento de observação dos pombos.

Quando o esquema tand VIFR (inicialmente em FR 15 e, na sequência, em FR 24) foi empregado nas tentativas TS-, segundo a média das 5 últimas sessões desta condição, a frequência de produção de S- praticamente se manteve como em linha de base. Para a maior parte dos sujeitos, tanto S- (em tand VIFR) quanto S+ (em VI) foram produzidos em frequências semelhantes e praticamente em todas as tentativas apresentadas. Na medida em que foram aumentadas as exigências do esquema de FR para a produção de S- (de FR 15 para FR 24), observou-se um aumento progressivo na frequência de respostas na presença do estímulo do esquema misto.

Em contrapartida, quando a apresentação de S+ foi submetida ao esquema tand VI FR, não foram verificados resultados semelhantes: para todos os sujeitos, exceto os Pombos 31 (em ambos os valores de FR) e 36 (apenas em FR 15), houve uma clara diminuição na frequência de produção de S+, em relação à linha de base. Esta diminuição foi ainda maior com o aumento no valor do FR. Ao

contrário do aumento na frequência de respostas observado quando o esquema tand VI FR 15/24 esteve em vigor nas tentativas TS-, nas tentativas TS+, a frequência de respostas foi mantida basicamente como em linha de base para a maior parte dos sujeitos.

Estes resultados descreveram o comportamento dos sujeitos nas 5 últimas sessões das condições em que o esquema tand VI FR esteve em vigor, ou seja, após o desempenho dos sujeitos ter adquirido relativa estabilidade. Eles, isoladamente, mostram que, no presente procedimento, tanto S+ quanto S- foram capazes de manter respostas de observação. Quando o esquema de VI 15 s estava em vigor em ambos os tipos de tentativas, o desempenho dos sujeitos era indiferenciado. Entretanto, quando a produção de S+ ou S- estava submetida ao esquema tand VI FR, S- foi frequentemente mais produzido do que S+. Estes resultados foram independentes das cores associadas a S+ e S- (verde ou vermelha) e da ordem de exposição dos pombos às condições experimentais (Condições tand VI FR S+/S-).

Adicionalmente aos resultados relativos à média das 5 últimas sessões de cada fase, o desempenho dos pombos também foi avaliado no decorrer das sessões em que o esquema tand VI FR esteve presente. Nesta análise, foram descritos o impacto inicial da introdução do esquema tand VI FR 15/24 sobre o desempenho dos sujeitos (em relação à condição antecedente) e as tendências observadas no decorrer de blocos de sessões.

Esta análise dos resultados mostrou que a introdução do esquema tand VI FR 15 nas tentativas TS- foi acompanhada por um aumento, em relação à linha de base, na frequência de respostas de observação nas sessões iniciais desta condição. Após este aumento inicial, a frequência de respostas não apresentou tendências claras de alteração e a frequência de produção de S-, no decorrer da condição, praticamente permaneceu como em linha de base. Com o aumento no

valor do FR, de FR 15 para FR 24, houve, sistematicamente para todos os sujeitos, uma diminuição inicial na frequência de produção de S- seguida, no decorrer das sessões, por uma tendência geral de recuperação.

Este padrão de desempenho ao longo das sessões foi observado nos dados de todos os sujeitos e confirma os dados relativos à média das 5 últimas sessões desta condição. Ou seja, com o passar das sessões, o comportamento de observação dos pombos se conformou às exigências dos esquemas (tand VI FR 15 ou 24) para a produção de S-. Especialmente em FR 24, em comparação com FR 15, verificou-se um processo gradativo de adaptação ao novo esquema ao longo das sessões. Esta curva de aprendizagem reforça a constatação de que S- atuou como um estímulo reforçador condicionado sobre as respostas de observação dos pombos.

Em contrapartida, quanto a produção de S+ ao longo das sessões, em esquema tand VI FR, não foram observados resultados sistematicamente semelhantes entre os sujeitos. Ao contrário, nesta condição, observou-se uma grande variabilidade de desempenhos. Para alguns sujeitos (Pombos 27, 34 e 35), apesar da introdução do esquema tand VI FR 15 não ter alterado, a frequência de produção de S+ logo nas primeiras sessões, verificou-se, na sequência, uma tendência geral de diminuição na produção deste estímulo. Para dois outros sujeitos (Pombos 31 e 36), a produção de S+ manteve-se um pouco abaixo da frequência observada em linha de base e não apresentou uma clara tendência de aumento ou diminuição ao longo das sessões. Apenas para o Pombo 37, observou-se uma tendência de aumento. Com o aumento no valor do FR, manteve-se a variabilidade de desempenho entre os sujeitos. Apenas para o Pombo 35, a tendência verificada em FR 15 se repetiu em FR 24.

Em esquema tand VI FR, a frequência de produção de S+ ao longo das sessões, em relação à produção de S-, apresentou, claramente, uma maior

variabilidade entre os sujeitos. O aumento no valor do FR, de FR 15 para FR 24, resultou em desempenhos assistemáticos. Apenas para um sujeito, o Pombo 31, S+ e S- se mantiveram sendo produzidos praticamente em todas as tentativas em que o esquema tand VIFR esteve em vigor, independentemente do valor do FR.

Apesar desta notada variabilidade no desempenho dos sujeitos em relação à produção de S+ em esquema tand VI FR, um dado evidente para a maioria deles é que a probabilidade de ocorrência de respostas de observação nas tentativas TS+ era normalmente menor do que nas tentativas TS- (neste mesmo esquema). O aumento nas exigências do esquema de FR para a produção de S+, diferentemente de S-, não foi acompanhado por um aumento na frequência de respostas tal que a produção deste estímulo fosse mantida como em linha de base. Para alguns sujeitos, a introdução do esquema tand VI FR nas tentativas TS+ provocou, até mesmo, uma tendência geral de diminuição na frequência de respostas e de produção de S+ ao longo das sessões. Desenhando uma curva de extinção, o desempenho destes pombos mostrou que, apesar de S+ ter sido produzido em esquema tand VI FR nas primeiras sessões logo após a sua introdução, este estímulo foi lentamente menos produzido a cada sessão. Portanto, os dados que descrevem apenas as 5 últimas sessões da condição em que o esquema tand VI FR esteve em vigor nas tentativas TS+ refletem um desempenho estabelecido gradualmente.

No prosseguimento da análise dos dados, o desempenho dos sujeitos foi avaliado no decorrer de intervalos de 5 s nas tentativas. O padrão de distribuição de respostas no decorrer das tentativas TS+, em esquema tand VI FR (em FR 15 ou FR 24), revelou similaridades no desempenho de todos os sujeitos, exceto o Pombo 31. Este padrão consistiu, de modo geral, em um aumento gradual no número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas seguido por uma clara tendência de diminuição nos intervalos seguintes. Isto é, na medida em que o

tempo nas tentativas TS+ (em tand VI FR) avançava, a probabilidade de que respostas de observação fossem emitidas diminuía. Portanto, a maior concentração de produção de S+ ocorria, normalmente, nos intervalos iniciais.

Quando em vigor nas tentativas TS-, entretanto, diminuição semelhante na frequência de respostas ao longo dos intervalos destas tentativas não foi observada. Pelo contrário, o padrão, para todos os sujeitos, foi de frequência de respostas relativamente alta e constante ao longo de todos intervalos das tentativas sem apresentar tendências acentuadas de aumento ou diminuição. Além disto, respostas no 11º intervalo ocorreram mais frequentemente nas tentativas TS- do que nas tentativas TS+. Neste intervalo, eram registradas as respostas emitidas após os 50 s regulares de duração das tentativas (durante a vigência da contingência de DRO 3 s). Conseqüentemente, as tentativas TS- foram frequentemente mais prolongadas do que as tentativas TS+. Este padrão de desempenho dos pombos, a manutenção de uma frequência de respostas relativamente alta no transcorrer das tentativas TS-, se refletiu em uma produção maior de S- do que de S+, principalmente ao final das tentativas e no 11º intervalo.

A distribuição de produção dos estímulos sinalizadores ao longo dos intervalos das tentativas, em esquema tand VI FR, revelou diferenças claras no padrão de produção de cada um destes estímulos. Estas diferenças foram notadas em pelo menos dois aspectos destas distribuições e parecem refletir – com uma aparente contradição -- a função reforçadora condicionada de S+ e S-.

O primeiro aspecto se refere aos dados que mostram que, em esquema tand VI FR 15, houve uma maior concentração de produção de S+ do que de S- nos intervalos iniciais das tentativas. Ou seja, neste esquema, iniciada uma tentativa TS+, a produção de S+ ocorria prontamente enquanto que a produção de S- ocorria mais tardiamente.

O segundo aspecto trata da constatação de que, em esquema tand VI FR 15 e, mais marcadamente, em FR 24, a produção de S- era maior do que a de S+ ao final das sessões, para todos os sujeitos, exceto os Pombos 31 e 34. Especificamente na condição em que se empregou FR 15, apesar de ocorrer uma concentração de produção de S+ nos intervalos iniciais das tentativas (1º aspecto levantado anteriormente), a frequência de produção de S- passou a ser aceleradamente maior do que a de S+ no decorrer da tentativa. Coerentemente com esta distribuição de produção dos estímulos sinalizadores, a distribuição de respostas mostrou, claramente, uma tendência de diminuição na frequência de respostas de observação na medida em que passavam os intervalos das tentativas TS+ mas não os das tentativas TS-.

Estes dois aspectos observados na análise de distribuição de produção de S+ e S-, em esquema tand VI FR, descreveram diferentes controles exercidos por estes estímulos sobre o desempenho dos sujeitos. Estes controles, sob uma certa perspectiva, parecem ser contraditórios em relação a função reforçadora condicionada adquirida por eles. Por um lado, em tand VI FR, S- foi sistematicamente mais produzido do que S+. Mas, por outro lado, a produção de S+, em esquema tand VI FR 15, ocorria logo no início das tentativas. Como mostrou Mulvaney e col. (1981), medidas de latência podem ser correlacionadas com o valor reforçador condicionado de um estímulo.

A fim de se buscar compreender estes resultados aparentemente contraditórios, algumas variáveis que poderiam estar interagindo com o comportamento de observação dos pombos (além daquelas já analisadas até o momento) poderiam ser apontadas e a interação entre elas e o desempenho dos sujeitos descrita. Esta análise mais ampla poderia propiciar uma maior compreensão de pelo menos parte dos resultados do presente estudo,

particularmente aquela que se refere ao fato de que S- manteve mais respostas de observação do que S+.

Algumas características específicas dos esquemas utilizados no presente procedimento podem ter contribuído na determinação de algumas destas variáveis que possivelmente controlaram o desempenho de observação dos pombos. Em tand VI FR, a produção do estímulo sinalizador exigia um maior número de respostas do que em VI simples e, portanto, a produção do estímulo sinalizador associado a este esquema acontecia mais tardiamente nas tentativas. Segundo mostraram os resultados, nas tentativas em VI, os estímulos sinalizadores eram produzidos nos primeiros 20 segundos das tentativas em cerca de 80% do total delas na sessão. Por outro lado, em tand VI FR, produção comparável ocorria apenas em intervalos posteriores.

Devido a esta diferença na distribuição de apresentação dos estímulos sinalizadores nas tentativas em esquema tand VI FR e em VI, uma estimulação discriminativa destas tentativas passou a estar disponível aos sujeitos. Ou seja, a passagem do tempo nas tentativas, sem que ocorresse mudança na cor do disco de respostas (dado que as respostas de observação eram emitidas), indicava que era maior a probabilidade de que o esquema tand VI FR, não o VI, estivesse em vigor. No caso do comportamento dos pombos ter estado sob controle desta estimulação discriminativa, isto significa que, em esquema tand VIFR, os sujeitos tiveram acesso, ainda na presença do estímulo do esquema misto, a uma estimulação alta e diretamente correlacionada com o tipo de tentativa associado a este esquema⁹.

A estimulação gerada pelo desempenho dos sujeitos em esquema tand VI FR e os estímulos sinalizadores das tentativas (S+ e S-) deveriam compartilhar

⁹ De acordo com esta análise, o desempenho dos sujeitos nas tentativas que permaneceram em VI, principalmente nos intervalos mais longos, deveria se assemelhar ao desempenho em esquema tand VI FR.

funções discriminativas semelhantes¹⁰. Em ambos os casos, a correlação entre os estímulos discriminativos e o tipo de tentativa em vigor era alta (quando gerados pelo desempenho em *tand VI FR*) ou perfeita (quando eram apresentados os estímulos sinalizadores no disco de respostas)¹¹. Portanto, assim como S+ e S- (cores do disco) exerceram um claro e diferente controle sobre as respostas de observação, seria esperado que uma estimulação similarmente discriminativa exercesse um controle comparável sobre o comportamento dos sujeitos. Segundo a hipótese a ser discutida a seguir, o controle exercido por esta estimulação estaria atuando, não apenas sobre as respostas ao disco (respostas de observação), mas também sobre outras respostas, como respostas preparatórias dirigidas ao comedouro (Perkins, 1968). Segundo Perkins (1968), respostas preparatórias seriam mantidas pela otimização no consumo do reforço (por exemplo, a salivação facilitando o comer) ou pela minimização da exposição a estímulos aversivos (por exemplo, enrijecimento muscular quando o sujeito é exposto ao choque).

Esta possibilidade, de que possam ter ocorrido respostas preparatórias no presente procedimento, foi originada a partir de observações assistemáticas de algumas sessões experimentais. Uma destas sessões, uma sessão de linha de base, foi registrada em fita de vídeo. A observação desta gravação permitiu verificar a existência de um padrão claro e sistematicamente diferente no comportamento do pombo quando S+ e S- eram apresentados no disco de respostas. Na presença de S+, ocorria uma alta frequência de respostas dirigidas

¹⁰ Devido ao fato da presente análise envolver dois conjuntos de estímulos discriminativos, um originado pelo próprio desempenho dos pombos no esquema *tand VI FR* e o outro apresentado pelo experimentador como consequência das respostas ao disco, o primeiro conjunto será tratado com estimulação discriminativa e o segundo continuará como estímulos sinalizadores das tentativas TS+ e TS-.

¹¹ O desempenho dos sujeitos em esquema *tand VI FR* pode ter permitido a discriminação das tentativas associadas a este esquema daquelas em VI. No entanto, o desempenho em VI não propiciava dicas semelhantes. Por esta razão, estas dicas não ofereciam uma discriminação completamente segura até que, no mínimo, o maior intervalo do VI (39 s) tivesse transcorrido.

ao comedouro que, basicamente, consistiam em respostas de abaixar a cabeça nas proximidades da sua abertura. Estas respostas se repetiam, freqüentemente, até que o comedouro fosse apresentado. Na presença de S-, por outro lado, estas respostas não ocorriam.

Esta observação assistemática do comportamento deste sujeito na presença de S+ e de S- pode contribuir na compreensão da maior freqüência de produção de S- em relação a S+ em esquema tand VI FR. A idéia básica seria a de que, da mesma forma que a apresentação de S+ no disco de respostas aumentava a probabilidade de emissão de respostas ao comedouro, uma estimulação produzida pelo desempenho dos sujeitos, em esquema tand VI FR, poderia ter exercido controle semelhante. Isto é, as respostas de se aproximar ou se afastar do comedouro teriam sido controladas pela ocorrência desta estimulação ainda na presença do estímulo do esquema misto. Quando o esquema tand VI FR esteve em vigor nas tentativas que terminariam com a apresentação de comida, a freqüência de respostas preparatórias dirigidas ao comedouro aumentava e, por serem respostas concorrentes e incompatíveis, a freqüência de respostas ao disco diminuía. Em FR 24 (em comparação a FR 15), era exigido um maior número de respostas para produzir S+. Portanto, as conseqüências das respostas preparatórias sobre a freqüência de respostas ao disco, neste caso, foram ainda mais acentuadas. Por outro lado, na condição em que o esquema tand VI FR esteve em vigor nas tentativas TS-, a estimulação derivada do desempenho dos pombos neste esquema estava associada às tentativas que terminavam sem a apresentação de comida. Portanto, a probabilidade de emissão de respostas preparatórias era baixa e não interferia na emissão de respostas ao disco que iriam produzir S-.

Como foi apontado anteriormente, esta análise, envolvendo as respostas preparatórias concorrendo com as respostas de observação, pode sugerir fatores

que tenham influenciado a menor frequência de produção de S+ em relação a S- no presente experimento. Além deles, outras variáveis podem, também, ter contribuído para este dado. Basicamente, uma seria os efeitos da contingência de DRO, vigente no final das tentativas. Uma outra variável poderia ser o enfraquecimento de S+ como reforçador condicionado. Em esquema tand VI FR, verificou-se um aumento no número de tentativas que terminavam na ausência de S+ e na presença do estímulo do esquema misto. Estes fatores serão discutidos mais amplamente na Discussão Geral.

Quanto ao resultado mais evidente do presente experimento, que é o aparente valor reforçador condicionado adquirido por S- na manutenção de respostas de observação, parece ser reforçada pela análise de que os sujeitos tiveram acesso, ainda na presença do estímulo do esquema misto, a uma estimulação correlacionada com as tentativas que terminavam sem a apresentação de comida. Esta estimulação, caso fosse uma estimulação aversiva, tal como descreveram alguns estudos anteriores (Blanchard, 1975; Tomanari, 1995), deveria sinalizar uma diminuição na frequência das respostas de observação que iriam produzir S- (assim como a estimulação associada a S+ teria sido discriminativa para respostas preparatórias). No entanto, o que se observou no presente experimento, foi que o controle das respostas de observação por esta possível estimulação negativa ocorreu no sentido de produzir S- e não de evitá-lo.

EXPERIMENTO 2

Nos estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995), dada a oportunidade aos sujeitos, eles evitaram a apresentação de S-, mas não a de S+. Em uma análise de dados detalhada, Tomanari (1995) observou que, apesar de S- estar sendo evitado, o próprio desempenho dos sujeitos em esquema tandem VI 15 s DRL 6 s podia indicar, ao longo da tentativa TS-, que esta terminaria sem liberação de comida. Observação semelhante foi feita em relação aos resultados do Experimento 1 da presente investigação. Em esquema tandem VI 15 s FR 15 (ou FR 24), os sujeitos puderam ter acesso, na presença do estímulo do esquema misto, a uma estimulação altamente correlacionada com as tentativas em que este esquema esteve em vigor.

O contato dos sujeitos com esta possível estimulação, de certa forma substituta de S+ e S-, pareceu controlar, diferentemente, o comportamento de observação dos pombos ainda na presença do estímulo do esquema misto; conseqüentemente, pareceu controlar, também, as respostas que produziam os próprios estímulos sinalizadores. Conforme mostraram os resultados do Experimento 1, comparando-se as frequências de produção de S+ e S- após a suposta produção da estimulação gerada pelo desempenho dos sujeitos em esquema tandem, observou-se uma diminuição na frequência de produção de S+ mas não na de S-. Isto é, as respostas de observação pareceram sofrer diferentes efeitos da produção anterior de uma estimulação diretamente correlacionada com S+ ou S-. Esta configuração, envolvendo um controle discriminativo dos estímulos sinalizadores sobre as respostas de observação -- e não apenas um controle reforçador -- poderia ser explicitada em termos de procedimento.

O objetivo do presente experimento foi avaliar, em pombos, o valor reforçador condicionado de estímulos sinalizadores de reforçamento e extinção

em uma condição em que estes estímulos poderiam exercer controle discriminativo sobre as próprias respostas de observação que os produziam. Para isto, a estratégia utilizada pelo presente estudo foi a de manter, basicamente, o procedimento de tentativas utilizado no Experimento 1 desta investigação e empregado anteriormente por Blanchard (1975) e Tomanari (1995). No entanto, diferentemente destes estudos, foi manipulado, neste Experimento 2, a duração máxima de apresentação dos estímulos sinalizadores. Terminada uma apresentação de estímulo, a condição de esquema misto era reestabelecida de modo que, na mesma tentativa, o estímulo sinalizador podia ser reapresentado. Desta forma, a ocorrência de respostas nas tentativas que terminavam com e sem a apresentação de comedouro seria igualmente provável durante a primeira exposição do estímulo do esquema misto. No entanto, em exposições posteriores, as respostas de observação podiam estar sob controle discriminativo da apresentação anterior de S+ ou S- e seriam mantidas pelas suas reapresentações.

Método

(Experimento 2)

Sujeitos

Foram utilizados 8 pombos correio (*Columbia livia*) obtidos de criadores particulares. Inicialmente, foram sujeitos os seis pombos (Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37) previamente submetidos ao Experimento 1 da presente investigação. Na sequência, foram adicionados, ao experimento, dois pombos experimentalmente ingênuos (Pombos 63 e 64). Todos os sujeitos foram mantidos nas mesmas condições de alojamento e privação descritas no Experimento 1.

Equipamento

Foi utilizado o mesmo equipamento descrito no Experimento 1.

Procedimento

O procedimento empregado no Experimento 2 foi semelhante ao procedimento básico descrito no Experimento 1 (veja item Procedimento Básico, Método, Experimento 1), exceto por alterações no tempo de apresentação dos estímulos sinalizadores e pela manutenção do esquema de VI 15 s ao longo de todas as fases realizadas. Excluindo estas duas alterações, as contingências programadas no Experimento 1 continuaram vigorando no Experimento 2.

Devido à experiência prévia dos Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37 neste procedimento de respostas de observação, estes sujeitos foram submetidos diretamente à Fase 1. Os Pombos 63 e 64, entretanto, passaram, anteriormente ao procedimento experimental propriamente dito, por uma sessão de treino ao comedouro e auto-modelagem da resposta de bicar o disco (Brown e Jenkins,

1968). Na sequência, foram submetidos a uma sessão de reforçamento contínuo das respostas de bicar o disco, iluminado por cor azul, até que tivessem ocorridas 100 apresentações do comedouro. Instalado o comportamento de bicar o disco, os Pombos 63 e 64 foram submetidos à Fase 0 como treino prévio ao procedimento de observação.

A seguir, estão descritas as diferentes fases empregadas no Experimento 2.

Fase 0 - Condição de Produção Simples de Estímulos (PS) - Nesta fase, respostas ao disco produziam a apresentação do estímulo sinalizador correspondente ao tipo de tentativa em vigor em esquema de FR 1. Uma vez apresentado, semelhantemente ao realizado no Experimento 1, o estímulo sinalizador permanecia no disco de respostas até o final da tentativa. Somente os Pombos 63 e 64 foram submetidos a esta fase.

Fases 1, 3 e 5 - Condição de Produção Simples de Estímulos (PS) - Nestas fases, foram programadas contingências semelhantes à Fase 0 exceto que S+ e S- eram produzidos em esquema de VI 15 s. O objetivo básico desta condição foi estabelecer as diferentes cores dos discos, vermelha ou verde, como discriminativas das conseqüências programadas ao final das tentativas, apresentação ou não de comedouro.

Fases 2 e 4 - Condição de Produção Múltipla de Estímulos (PM). Nestas fases, uma vez produzido o estímulo sinalizador, S+ ou S-, em esquema de VI 15 s, este permanecia exposto no disco de respostas por, no máximo, 10 segundos¹². Transcorrido este tempo, desde que a tentativa ainda estivesse em vigor, era

¹² O tempo de apresentação do estímulo sinalizador podia ser menor do que 10 s caso a tentativa terminasse antes de se completar este tempo.

reinstalada a condição de esquema misto (disco branco) e, novamente, na mesma tentativa, os estímulos sinalizadores, em VI 15 s, podiam ser reapresentados. O término da tentativa interrompia a apresentação de qualquer que fosse o estímulo presente no disco de resposta (sinalizadores do esquema misto, S+ ou S-), independentemente do tempo que estes estímulos tenham estado expostos, e dava início ao intervalo entre tentativas.

O Quadro III, a seguir, mostra, para cada um dos sujeitos, a sequência de fases empregada, o número de sessões realizadas em cada uma delas e as cores utilizadas para sinalizar os diferentes tipos de tentativas.

Quadro III: Condições experimentais -- Produção Simples (PS) ou Produção Múltipla (PM) -- empregadas em cada uma das fases do Experimento 2, para cada um dos 8 sujeitos. As cores utilizadas como estímulos sinalizadores das tentativas TS+ e TS- (S+ e S-, respectivamente) estão indicadas por Vm (disco vermelho) ou Vd (disco verde). Os números em parênteses indicam o número de sessões realizadas em cada fase.

Pombo	S+	S-	Condições Experimentais					
			Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
27	Vm	Vd	-	PS (21)	PM (15)	PS (17)	-	-
31	Vm	Vd	-	PS (21)	PM (15)	PS (20)	-	-
34	Vm	Vd	-	PS (20)	PM (14)	PS (16)	-	-
35	Vd	Vm	-	PS (21)	PM (13)	PS (21)	-	-
36	Vd	Vm	-	PS (20)	PM (12)	PS (16)	-	-
37	Vd	Vm	-	PS (21)	PM (13)	PS (20)	-	-
63	Vd	Vm	PS (10)	PS (16)	PM (16)	PS (15)	PM (22)	PS (14)
64	Vd	Vm	PS (10)	PS (16)	PM (16)	PS (15)	PM (23)	PS (15)

Resultados

(Experimento 2)

A seção de resultados do Experimento 2, semelhantemente à do Experimento 1, apresenta os dados em três diferentes níveis de análise em que são comparadas as frequências de produção de S+ e S- (Figuras 5 e 6) ou de respostas de observação nas tentativas TS+ e TS- (Figura 7). Inicialmente, é mostrada a frequência média de produção dos estímulos sinalizadores nas 5 últimas sessões de todas as fases do Experimento 2 (Figura 5). Na sequência, é apresentada a frequência de produção de S+ e S- ao longo de blocos de sessões na(s) fase(s) em que a Condição PM esteve em vigor (Figura 6). E, finalmente, é mostrada a distribuição de respostas de observação em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS- (Figura 7). Para cada uma das figuras, em diferentes painéis, são mostrados os dados relativos à 1) Condição PS, 2) Condição PM: 1ª (oportunidade de) produção do estímulo sinalizador e 3) Condição PM: após a 1ª produção do estímulo sinalizador. Em todas as figuras, são apresentados dados individuais dos sujeitos.

A **Figura 5** mostra a frequência média de produção de S+ (colunas vermelhas) e S- (colunas verdes) nas 5 últimas sessões de cada uma das fases do Experimento 2, para todos os sujeitos, individualmente. O Painel A refere-se à Condição PS, em que os estímulos podiam ser produzidos apenas uma vez em cada tentativa. Os Painéis B e C referem-se à Condição PM, em que S+ e S- podiam ser produzidos mais de uma vez. O Painel B, particularmente, descreve a frequência em que S+ e S- foram apresentados pela primeira vez nas tentativas. O Painel C mostra a frequência de reapresentações de cada um dos estímulos. O número máximopossível de estímulos produzidos na Condição PS e na Condição

Figura 5: Frequência média de produção de S+ (colunas vermelhas) e S- (colunas verdes) nas 5 últimas sessões de cada uma das fases do Experimento 2, para todos os sujeitos, individualmente. O Painel A refere-se à Condição PS, em que os estímulos podiam ser produzidos apenas uma vez em cada tentativa. Os Painéis B e C referem-se à Condição PM, em que S+ e S- podiam ser produzidos mais de uma vez. O Painel B, particularmente, descreve a frequência em que S+ e S- foram apresentados pela primeira vez nas tentativas. O Painel C mostra a frequência de reapresentações de cada um dos estímulos. O número máximo possível de estímulos produzidos na Condição PS e na Condição PM (apenas como 1ª apresentação - Painel B), era equivalente ao número máximo de tentativas por sessão, isto é, 32 (16 tentativas TS+ e 16 TS-).

PM (apenas como 1ª apresentação - Painei B), era equivalente ao número máximo de tentativas por sessão, isto é, 32 (16 tentativas TS+ e 16 TS-).

Analisando-se a frequência de produção de S+ e de S- na Condição PS (Painei A) e na 1ª apresentação do estímulo do esquema misto da Condição PM (Painei B), é possível observar que, para todos os 8 sujeitos, em todas as fases, ambos os estímulos sinalizadores (colunas vermelhas versus verdes) são produzidos em frequências bastante próximas entre si. Tanto nas Fases 1, 3 e 5 (Painei A) quanto nas Fases 2 e 4 (Painei B), todos os sujeitos, exceto os Pombos 37 (nas Fases 1, 2 e 3) e 63 (nas Fases 2 e 4), produziram S+ e S- em praticamente todas as tentativas possíveis.

Em relação ao Painei C, verifica-se que, para todos os 8 pombos, as frequências de produção de S+ (colunas vermelhas) e S- (colunas verdes) se diferem. Na Condição PM, para todos os sujeitos e em todas as fases, a frequência de reapresentações de S- é clara e sistematicamente maior do que a de S+. Com uma relativa regularidade, os dados dos Pombos 27, 31, 34, 35 e 36 mostram que S+ é reapresentado nas tentativas entre cerca de 8 e 16 vezes enquanto que S- é reapresentado entre 23 e 25 vezes, em média, por sessão. Para os outros três sujeitos (Pombos 37, 63 e 64), a frequência geral de produção dos estímulos sinalizadores é comparativamente menor, especialmente para os Pombos 37 e 63 (cerca de 1 reapresentação de S+ e 7 de S-). Entre todos os sujeitos, o Pombo 64 é o que mantém a menor diferença entre as frequências de produção de S+ e S- (cerca de 17 reapresentações de S- e 13 de S+ na Fase 2 e 10 na Fase 4). A frequência de reapresentações de S+ para este sujeito, diferentemente do Pombo 63, apresentou uma diminuição na Fase 4 em relação à Fase 2. Por outro lado, a frequência de reapresentações de S-, para ambos os sujeitos, se manteve relativamente constante nas duas fases.

A **Figura 6** mostra a frequência de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) no decorrer de blocos de 5 (ou 6) sessões¹³ nas fases em que a Condição PM esteve em vigor (Fase 2 para todos os pombos e Fase 4 apenas para os Pombos 63 e 64). O Painel A descreve a frequência em que cada um dos estímulos sinalizadores foi apresentado pela primeira vez nas tentativas. O Painel B se refere a frequência de reapresentações dos estímulos. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 8 sujeitos.

Como pode ser observado no Painel A desta figura, todos os 8 sujeitos, na primeira exposição do estímulo do esquema misto nas tentativas (1ª oportunidade de produção dos estímulos sinalizadores), produziram S+ e S- em frequências bastante semelhantes, em todos os blocos de sessões das Fases 2 (para todos os sujeitos) e 4 (apenas para os Pombos 63 e 64). Note que as curvas de produção de S+ e S- geralmente se sobrepõem, com exceção de alguns blocos específicos, para alguns sujeitos, em que a frequência de produção de S- é maior do que a de S+ (Pombo 37, Blocos 1 e 2; Pombo 63, Fase 4, Blocos 1 e 3 e Pombo 64, Fase 2, Bloco 3). Para os Pombos 27, 31, 34 e 35, S+ e S- são produzidos, em todos os blocos de sessões, em praticamente todas as tentativas possíveis (isto é, nas 16 tentativas TS+ e 16 nas tentativas TS-). Para os sujeitos restantes, Pombos 36, 63, 64 e, principalmente, para o Pombo 37, a frequência máxima de produção dos estímulos sinalizadores é raramente verificada. Para estes sujeitos, ocorrem cerca de 8 a 12 produções de estímulos por bloco de sessões no caso do Pombo 37; de 12 a 14 para o Pombo 63; e de 14 a 16 para o Pombo 64. Para todos os sujeitos, as frequências da primeira produção dos estímulos sinalizadores nas tentativas mantêm-se relativamente estáveis ao longo dos blocos de sessões da

¹³ Nas fases em que a divisão do número de sessões por 5 gerava resto, as sessões excedentes foram distribuídas, uma a uma, aos blocos de sessões mais próximos do início da fase. Portanto, há blocos de sessões formados por 6 sessões em vez de 5.

Figura 6: Frequência de produção de S+ (quadrados vermelhos) e S- (quadrados verdes) no decorrer de blocos de 5 (ou 6, ver texto) sessões nas fases em que a Condição PM esteve em vigor (Fase 2 para todos os pombos e Fase 4 apenas para os Pombos 63 e 64). O Painel A descreve a frequência em que cada um dos estímulos sinalizadores foi apresentado pela primeira vez nas tentativas. O Painel B se refere a frequência de reapresentações dos estímulos. Estão sendo mostrados, nesta figura, os dados individuais de todos os 8 sujeitos.

Condição PM, isto é, não se observam tendências claras de aumento ou diminuição.

Passando-se a analisar o Pannel B, pode-se observar que, após a 1ª apresentação dos estímulos sinalizadores, a frequência de produção de S- (frequência de reapresentações) é claramente maior do que a de S+, para todos os sujeitos, em todos os blocos de sessões das fases mostradas (note como os quadrados verdes se localizam acima dos quadrados vermelhos). Para parte dos sujeitos, Pombos 27, 36 e 37, não se observa tendência marcante de aumento ou diminuição na frequência de produção dos estímulos sinalizadores ao longo dos blocos de sessões. Para alguns sujeitos, entretanto, podem-se observar algumas tendências. Para o Pombo 31, observa-se uma tendência sutil de aumento na frequência de reapresentações de S+ e de diminuição na de S- (respectivamente, de 11 a 13 e de 28 a 26 produções de S+ e S-, do 1º ao 3º bloco de sessões). Para os Pombos 34 e 35, verificam-se tendências mais marcantes nas frequências de reapresentações de S-. Ocorre um aumento claro no número de S- produzidos (de 18 reapresentações no 1º bloco de sessões a 23 no 3º bloco) enquanto as frequências de reapresentações de S+ permanecem relativamente constantes (em torno de 10 a 13 produções por bloco de sessões). Os Pombos 63 e 64 mostram uma tendência clara de diminuição na frequência de reapresentações de ambos os estímulos (Pombo 63, nas Fases 2 e 4) ou de apenas S+ (Pombo 64, na Fase 4). Para o Pombo 63, nos dois últimos blocos de sessões da Fase 2 e, para o Pombo 37, em todos os blocos de sessões, a frequência de reapresentações de S+ é praticamente nula. Os dados do Pombo 64, em contraste com os dos outros 7 sujeitos, revelam as menores diferenças entre as frequências de reapresentações de S+ e de S- no decorrer dos blocos de sessões.

A **Figura 7** mostra a distribuição de respostas ao disco, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas, 1º conjunto de 11 intervalos) e TS- (colunas verdes, 2º conjunto). O Painel A refere-se à Condição PS e mostra os dados dos Pombos 27 (cujos dados são representativos dos Pombos 31, 34, 35 e 36, ver Anexo 5), Pombo 37 (cujos dados diferem dos outros 7 sujeitos) e Pombos 63 e 64 (os dois sujeitos sem história experimental prévia). Os Painéis B e C referem-se à Condição PM e apresentam os dados de todos os sujeitos, individualmente. O Painel B mostra as respostas ocorridas durante a primeira apresentação do estímulo do esquema misto na tentativa. O Painel C mostra as respostas ocorridas após a primeira produção do estímulo sinalizador. Os dados desta figura foram calculados a partir da média nas 5 últimas sessões de cada fase.

Comparando-se, no Painel A desta figura, os dados dos os 4 sujeitos mostrados, pode-se verificar que o padrão de distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto, no decorrer dos intervalos da tentativas, é bastante semelhante entre 1) os sujeitos; 2) as Fases 1, 3 e 5; e, 3) as tentativas TS+ (conjunto de colunas vermelhas) e TS- (conjunto de colunas verdes). O padrão de distribuição de respostas, de modo geral, consiste em um maior número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas que, nos intervalos seguintes, vai gradal e lentamente diminuindo¹⁴. Após o 8º intervalo¹⁵, praticamente não ocorrem mais respostas. Entre os sujeitos, pode-se observar que, apesar das semelhanças no padrão de distribuição de respostas, as frequências com que estas ocorrem se diferem. O Pombo 37, por exemplo,

¹⁴ A comparação entre os intervalos de um mesmo tipo de tentativa deve considerar que, para cada intervalo de 5 s em uma tentativa, havia diferentes oportunidades de ocorrência de respostas em função da presença ou ausência do estímulo do esquema misto. A ocorrência destas oportunidades era determinada pela apresentação dos estímulos sinalizadores.

¹⁵ O 8º intervalo das tentativas corresponde ao maior intervalo do VI 15 s empregado, isto é, 39 s.

Figura 7: Distribuição de respostas ao disco, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas, 1º conjunto de 11 intervalos) e TS- (colunas verdes, 2º conjunto). O Painei A refere-se à Condição PS e mostra os dados dos Pombos 27 (cujos dados são representativos dos Pombos 31, 34, 35 e 36, ver Anexo 5), Pombo 37 (cujos dados diferem dos outros 7 sujeitos) e Pombos 63 e 64 (os dois sujeitos sem história experimental prévia). Os Painéis B e C referem-se à Condição PM e apresentam os dados de todos os sujeitos, individualmente. O Painei B mostra as respostas ocorridas durante a primeira apresentação do estímulo do esquema misto na tentativa. O Painei C mostra as respostas ocorridas após a primeira produção do estímulo sinalizador. Os dados mostrados foram calculados a partir da média nas 5 últimas sessões de cada fase.

Fig 7 Painei A

destaca-se dos outros sujeitos por uma menor frequência de respostas em todos os intervalos.

No Painel B, é possível analisar o padrão de distribuição de respostas durante a 1ª apresentação do estímulo do esquema misto, na Condição PM, nos dados de todos os pombos. Este padrão, assim como foi descrito para a Condição PS (Painel A desta figura), é semelhante para todos os sujeitos, em todas as fases da Condição PM e em ambos os tipos de tentativas (tentativas TS+ e TS-). Basicamente, o padrão observado, tal como descrito no Painel A, consiste em um maior número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas seguido por uma diminuição constante e gradual nos intervalos seguintes. Os dados dos Pombos 37 e 63 mostram que, para estes dois sujeitos, as respostas ocorrem em frequências bastante baixas após o 1º intervalo nas tentativas e normalmente deixam de ocorrer antes do 8º intervalo.

No Painel C desta figura, pode-se analisar o padrão de distribuição de respostas durante as re-exposições do estímulo do esquema misto nas tentativas -- isto é, após ter ocorrido pelo menos uma apresentação anterior do estímulo sinalizador. Nesta figura, pode-se observar que existem diferenças claras no padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS+ e TS-, diferentemente das semelhanças descritas na Condição PS (Painel A) e na 1ª exposição do estímulo do esquema misto na Condição PM (Painel B).

Notadamente, observando-se os gráficos de todos os sujeitos, pode-se verificar que o número de respostas nos intervalos das tentativas TS- é geralmente maior do que o número de respostas no intervalos das tentativas TS+ (observe como as barras verdes são, normalmente, mais altas do que as vermelhas). No entanto, em uma observação mais detalhada, pode-se notar que o número de respostas nos intervalos iniciais das tentativas TS+ é maior do que nos mesmos intervalos das tentativas TS-. No decorrer dos intervalos, todavia,

Fig 7 Painei B

Respostas ao disco branco - Condição PM - 1ª oport.

Intervalos de 5 s

TS+

TS-

Fig 7 Painel C

Respostas ao disco branco - Condição PM - após 1ª oport.

esta situação se inverte e o número de respostas nos intervalos das tentativas TS- passa a ser maior do que nos intervalos das tentativas TS+. Para os Pombos 37 (Fase 2) e 63 (Fases 2 e 4), a frequência geral de respostas em ambos os tipos de tentativas é claramente mais baixa do que o observado para os outros sujeitos.

Além de um número de respostas geralmente maior nos intervalos das tentativas TS- em às tentativas TS+, o Painel C desta figura permite observar diferentes tendências, no decorrer de cada um dos tipos de tentativas.

Nas tentativas TS+ (barras vermelhas), observando os dados dos Pombos 27 e 36, pode-se notar que a frequência de respostas mantém-se relativamente constante ao longo dos intervalos (entre o 3º¹⁶ e o 11º intervalos). Quanto aos Pombos 31, 34, 35 e 64 (para o Pombo 64, Fases 2 e 4), o padrão de distribuição de respostas na tentativas TS+ se assemelha ao observado nos Painéis A e B desta figura. Isto é, ocorre um maior número de respostas nos intervalos mais próximos do início das tentativas que é acompanhado por uma diminuição lenta e gradual nos intervalos seguintes. Os Pombos 37 e 63, diferentemente dos outros sujeitos, emitem poucas respostas durante as re-exposições do estímulo do esquema misto quando estas ocorrem nas tentativas TS+ (note a ausência de barras vermelhas para estes dois sujeitos).

Em relação às tentativas TS-, para todos os sujeitos, o padrão de distribuição de respostas durante as re-exposições do estímulo do esquema misto é marcadamente diferente do padrão observado nas tentativas TS+. Nas tentativas TS-, sistematicamente para os Pombos 27, 31, 34, 35, 36 (na Fase 2) e 64 (em ambas as fases), observa-se uma clara tendência de aumento na frequência de respostas no decorrer dos intervalos. Com bastante regularidade entre todos

¹⁶ O 3º intervalo das tentativas (10 a 15 s) é o menor intervalo em que podia ocorrer uma primeira re-exposição do estímulo do esquema misto.

os sujeitos exceto os Pombos 37, 63 e 64, há uma concentração de 100 a 150 respostas por sessão no 11º intervalo das tentativas TS-. Para estes sujeitos, o número de respostas no 11º intervalo corresponde, aproximadamente, ao triplo de respostas emitidas no intervalo imediatamente anterior, o 10º intervalo. Para os Pombos 37 e 63, o número de respostas ao longo dos intervalos das tentativas TS- é, além de menor em relação aos outros sujeitos, praticamente constante do 3º ao 11º intervalo (para o Pombo 63, na Fase 4, pode-se observar uma tendência muito sutil de diminuição na frequência de respostas ao longo dos intervalos das tentativas TS-).

Discussão

(Experimento2)

O objetivo central do Experimento 2 foi, basicamente, avaliar o valor reforçador condicionado adquirido por estímulos discriminativos de tentativas que terminavam com ou sem a apresentação de comida independentemente de qualquer resposta do sujeito. Mais especificamente, foi investigada a hipótese de que um estímulo, perfeitamente correlacionado com as tentativas que terminavam sem a apresentação do comedouro (S-), pudesse adquirir valor reforçador condicionado tal que os sujeitos emitissem respostas de observação mantidas pela sua produção. No presente experimento, a função reforçadora condicionada de S+ e S- foi avaliada, com pombos, em uma condição em que estes estímulos podiam exercer controle discriminativo sobre as próprias respostas de observação que os produziam.

O Experimento 2 empregou um procedimento que permitiu que as respostas de observação produzissem estímulos correlacionados com a apresentação ou não do comedouro por um tempo limitado. Desta forma, em uma mesma tentativa, os sujeitos podiam produzir uma apresentação do estímulo sinalizador seguida por sua(s) reapresentação(ões). As comparações entre as frequências de reapresentações de S+ e S- permitiram avaliar o valor reforçador condicionado destes estímulos após os sujeitos terem sido expostos a uma apresentação prévia dos mesmos. Ou seja, em função da possibilidade de que os estímulos sinalizadores tenham exercido controle discriminativo sobre as respostas de observação que produziam suas reapresentações.

Em síntese, os resultados do Experimento 2 mostraram que, na primeira exposição do estímulo do esquema misto nas tentativas, tanto na Condição PS quanto na Condição PM, as respostas de observação dos sujeitos nas tentativas

TS+ e TS- foram semelhantes. Entretanto, na Condição PM, em que podiam ocorrer múltiplas apresentações de estímulos na mesma tentativa, os dados mostraram, com bastante sistematicidade e regularidade entre os sujeitos, diferenças relacionadas às reapresentações de S+ e S-. Para todos os sujeitos, as frequências de reapresentações de S- foram claramente maiores do que as de S+, em todos os blocos de sessões em que a Condição PM esteve em vigor. Apesar desta regularidade, entretanto, as tendências das frequências de reapresentações de S+ e S- ao longo desta condição foram as mais diversas entre os sujeitos

A análise dos padrões de distribuição de respostas em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS- revelaram dados convergentes com a análise por blocos de sessões. Comparando-se o desempenho dos sujeitos ao longo dos intervalos das tentativas, pode-se observar que o número de respostas tendeu a aumentar após uma primeira apresentação de S- e a diminuir, ou a permanecer relativamente constante, após uma primeira apresentação de S+. A partir desta análise, foi também possível observar que, nas tentativas TS-, houve uma concentração de respostas no 11º intervalo. Este dado foi obtido para a maior parte dos sujeitos com história experimental prévia e mostra que, para eles, a duração das tentativas TS- foi frequentemente prolongada. Para estes sujeitos, durante períodos de re-exposição do estímulo do esquema misto posteriores a uma apresentação de S-, verificou-se, não apenas uma tendência de aumento na frequência de respostas de observação, mas também um responder contínuo e, aparentemente, ininterrupto. Apesar de não se dispor destes dados, é possível que, para estes pombos, as tentativas TS- tenham terminado, frequentemente, na presença de S-.

Durante as fases em que a Condição PS esteve em vigor, praticamente todas as tentativas terminavam com e sem a apresentação do comedouro na presença de S+ e S-, respectivamente. Ambos os estímulos eram produzidos em quase todas as tentativas (Figura 1) e permaneciam expostos até o início do IET.

Nas fases em que esteve em vigor a Condição PM, entretanto, o pareamento entre as conseqüências programadas ao final das tentativas e os seus respectivos estímulos sinalizadores pode ter-se enfraquecido. Nesta condição, a possibilidade de que as tentativas fossem encerradas na presença do estímulo do esquema misto era maior e variava em função das diferentes freqüência de reapresentações de S+ e S- (Figura 1, Painel C). Na medida em que os pombos produziam as reapresentações de S+ menos freqüentemente do que S-, a probabilidade de que as tentativas TS+ terminassem na presença do estímulo do esquema misto era maior do que as tentativas TS-.

Em função desta observação, portanto, é possível imaginar que, no decorrer da Condição PM, a configuração entre estímulos sinalizadores (S+ e S-) e as conseqüências programadas ao final das tentativas (liberação ou não de comida) tenha se alterado em relação à Condição PS. Nesta nova configuração, pode-se presumir que as tentativas TS- eram freqüentemente encerradas na presença de S- enquanto que as tentativas TS+ eram encerradas, tanto na presença tanto de S+ quanto na presença do estímulo do esquema misto. Este enfraquecimento na relação entre S+ e a liberação de comida pode ter sido um dos fatores responsáveis por parte do menor número de reapresentações de S+ em relação a S- e a diminuição, no decorrer das sessões, na freqüência de reapresentações de S+ para alguns sujeitos (Pombos 31, 63 e 64, Figura 2, Painel B).

Um outro fator que poderia contribuir para a compreensão da menor freqüência de reapresentações de S+ em relação a S- seria a contingência de DRO vigente no final das tentativas. Segundo esta contingência, o encerramento de uma tentativa ocorria, somente, se nenhuma resposta ao disco fosse emitida nos seus 3 s finais. Durante este período, a emissão de uma resposta prolongava a duração da tentativa por 3 s. No caso das tentativas TS+, respostas ao disco

durante a vigência da contingência de DRO atrasava, além do encerramento da tentativa, a liberação de comida. Portanto, sob controle desta contingência, respostas nas tentativas TS+, durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, podem ter sido menos freqüentes do que nas tentativas TS- e contribuído para o menor número de reapresentações de S+ em relação a S-.

O conjunto de resultados relatado no Experimento 2, fortalecido, em parte, pela sua sistematicidade, apresenta um dado inédito na literatura em respostas de observação. Utilizando pombos como sujeitos, ainda não havia sido descrito um procedimento em que respostas fossem mantidas pela produção exclusiva de S-. E, segundo Dinsmoor (1983), isto seria fundamental para se demonstrar o valor reforçador condicionado deste estímulo.

Esta colocação de Dinsmoor (1983), na verdade, reflete a ausência de dados na literatura que mostrem, com clareza, propriedades reforçadoras condicionadas de S-. Por exemplo, o estudo de Lieberman (1972), apresentado como uma das maiores evidências da função reforçadora de S-, não demonstrou que este estímulo, por si próprio, fosse capaz de manter as respostas de observação. Neste trabalho, Lieberman (1972) comparou uma condição em que os macacos podiam produzir a apresentação de S+ e S- na chave de observação com outra em que somente S+ podia ser produzido. Desta comparação, o autor observou que, quando era eliminada a possibilidade de produção de S- na chave de observação, havia uma diminuição na freqüência de respostas. Na seqüência, a retomada da primeira condição era acompanhada por aumento na freqüência de respostas. Sua conclusão, portanto, foi a de que S- mantinha parte do responder no manipulando de observação.

O presente trabalho, diferentemente do estudo de Lieberman (1972), demonstrou condições em que respostas de observação foram mantidas

exclusivamente por S-. Estes dados foram sistemáticos e claros para 8 sujeitos, 2 dos quais ingênuos.

Inicialmente, o Experimento 2 envolveu seis pombos (Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37) que haviam participado, anteriormente, de dois estudos em procedimento de respostas de observação (Tomanari, 1995 e o Experimento 1 da presente investigação). Neste dois estudos, havia sido utilizado um procedimento de tentativas semelhante ao empregado no presente experimento, com exceção dos esquemas de produção dos estímulos sinalizadores e da duração máxima de apresentação destes estímulos.

No desenvolvimento do presente experimento, assim que estes 6 pombos foram submetidos à condição de produção múltipla de estímulos, os resultados de todos eles mostraram, logo nas primeiras sessões, que a frequência de reapresentação de S- era claramente maior do que a de S+. Tendo em vista a história experimental prévia destes 6 pombos, suspeitou-se que este desempenho tivesse sido propiciado pelas suas experiências anteriores. Por este motivo, e para se terem respostas claras às questões experimentais em investigação, os dois sujeitos, experimentalmente ingênuos, foram adicionados ao experimento.

Os dados destes dois pombos (Pombo 63 e 64) replicaram, de modo geral, os resultados dos outros 6 sujeitos quanto a maior frequência de reapresentações de S- em relação a S+ no decorrer da Condição PM. No entanto, os dados dos Pombos 63 e 64 não repetiram a regularidade obtida com a maioria dos pombos não-ingênuos (Pombos 27, 31, 34, 35 e 36) e podem estar refletindo as diferenças na história experimental dos sujeitos. Quando se descreveu o padrão de distribuição de respostas nas tentativas TS- (Condição PM, Figura 3, Painel C), pode-se observar que apenas os sujeitos não-ingênuos emitiram um acentuado número de respostas no 11º intervalo das tentativas TS-, apesar de tendências semelhantes entre todos os 8 sujeitos terem sido mantidas no

decorrer dos intervalos. Além disso, o Pombo 64 foi o sujeito que manteve as menores diferenças entre as frequências de reapresentações de S+ e S- nos blocos de sessões e, o Pombo 63, foi o que apresentou uma clara tendência de diminuição na frequência de reapresentações de ambos os estímulos. Estas particularidades de desempenho, obtidas nos dados dos pombos experimentalmente ingênuos, portanto, podem sugerir que a história experimental dos Pombos 27, 31, 34, 35, 36 e 37¹⁷ afetaram a sistematicidade dos resultados entre os sujeitos. Entretanto, eles não afetaram os resultados que mostram que, para todos os 8 pombos, a frequência de reapresentações de S- foi maior do que de S+.

Uma possibilidade de se tentar compreender as variáveis envolvidas na alta frequência de reapresentações de S- seria imaginar que, a cada re-exposição do estímulo do esquema misto, os sujeitos estariam se comportando como se tivesse iniciado uma nova tentativa. Isto é, as respostas de observação, durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, não estariam sob controle discriminativo da apresentação anterior do estímulo sinalizador da tentativa. Ou, dito de outra forma, o comportamento de observação dos sujeitos, durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, estaria sob controle de uma igual probabilidade de produção de S+ e S- ($p=0,5$), tal como ocorria na primeira exposição.

No entanto, os dados de todos os sujeitos, em relação às reapresentações de S-, parecem descartar esta possibilidade. Comparando-se o padrão de desempenho dos sujeitos no decorrer de intervalos das tentativas TS- na Condição PM, antes e depois da 1ª apresentação de S- (Figura 3, Painéis B e C,

¹⁷ Os dados do Pombo 37, normalmente, se diferenciam dos dados dos outros pombos não-ingênuos. Não apenas na presente investigação, mas na história experimental deste sujeito, há registros de que este pombo apresenta, normalmente, uma frequência de respostas geralmente mais baixa do que a dos outros pombos (veja Experimento 1 da presente investigação e Tomanari, 1995).

respectivamente), podem ser observadas claras diferenças. Durante a 1ª apresentação do estímulo do esquema misto, há uma tendência de diminuição na frequência de respostas. Após uma apresentação anterior de S-, a tendência é oposta, é de aumento. Portanto, quanto às reapresentações de S-, parece claro que os sujeitos não se comportaram durante as re-exposições do esquema misto como se estivesse em vigor a 1ª exposição.

Esta mesma constatação permite discutir a afirmação de Dinsmoor (1983) de que as respostas de observação que produzem S- seriam, na verdade, mantidas pela produção intermitente de S+. Durante a primeira exposição do estímulo do esquema misto na Condição PM (Fases 2 e 4), a probabilidade de que, a cada tentativa, as respostas de observação produzissem S+ ou S-, era igual a 0,5. A sequência de tentativas TS+ e TS- era aleatória e um mesmo tipo de tentativa não se repetia mais do que três vezes seguidas. Nesta situação, conforme mostraram os resultados, as frequências de respostas (assim como a frequência de produção de ambos os estímulos sinalizadores), nos dois tipos de tentativas, eram muito semelhantes até que S+ ou S- fosse produzido. Neste caso, conforme sugere Dinsmoor, teria sido possível que as respostas nas tentativas TS- (assim como a produção de S-) tivessem sido mantidas pela produção de S+ em metade das tentativas.

Esta sugestão de Dinsmoor, no entanto, não parece ser facilmente aplicada às respostas de observação mantidas pelas reapresentações de S-. Após uma primeira apresentação de S-, as respostas de observação produziam, invariavelmente, a sua reapresentação e nunca S+. Por isso, para se afirmar que uma possível produção de S+ teria mantido as respostas que produziam as reapresentações de S-, o desempenho dos sujeitos, em todas as exposições do estímulo do esquema misto de uma mesma tentativa, deveria ser semelhante. No entanto, conforme foi exposto anteriormente, isto não se verificou.

Em síntese, os resultados do Experimento 2 parecem revelar que, na presente preparação experimental, 1) respostas de observação foram mantidas pela apresentação de S- e 2) a produção deste estímulo não dependeu, necessariamente, de respostas mantidas pela produção intermitente de S+. Baseado nestas constatações, este estudo parece ser uma forte evidência de que S- pode manter respostas de observação, pelo menos dentro do contexto do procedimento utilizado.

Além disso, os dados do presente trabalho mostram que as reapresentações de S- mantiveram um número de respostas de observação maior do que S+. Em uma tentativa de se compreender este dado, duas possibilidades podem ser levantadas. Uma delas foi apontada anteriormente e trata da observação de que, em função do próprio desempenho dos pombos na Condição PM, as funções discriminativas de S+ e do estímulo do esquema misto podem ter-se modificado em relação àquelas exercidas na Condição PS. Ou seja, na Condição PM, S+ pode ter perdido parte de sua força como estímulo reforçador condicionado uma vez que um maior número de tentativas TS+ terminavam na presença do estímulo do esquema misto. A outra possibilidade retoma o que foi discutido na ocasião do Experimento 1 e sugere que o comportamento de observação dos sujeitos pode ter interagido com variáveis não previstas neste procedimento de observação. Uma destas variáveis poderia ser, por exemplo, a ocorrência de respostas preparatórias direcionadas ao comedouro. Estas respostas, sob controle discriminativo da 1ª apresentação de S+, seriam concorrentes com as respostas de bicar o disco e poderiam estar ocorrendo durante reapresentações do estímulo do esquema misto. Esta hipótese será melhor explorada, a seguir, na Discussão Geral.

Discussão Geral

Com o objetivo de avaliar o valor reforçador condicionado de S+ e S- na manutenção de respostas de observação em pombos, foram realizados os Experimentos 1 e 2 da presente investigação. O Experimento 1 submeteu 6 pombos a duas condições experimentais em que, em cada uma delas, ora S+ ora S- era produzido em esquema tand VI 15 s FR 15 (ou FR 24) enquanto o estímulo alternativo permanecia em VI 15 s. Os principais resultados deste estudo mostraram que os efeitos da introdução do esquema tand VI FR sobre as respostas de observação dos pombos variaram em função de qual estímulo sinalizador era produzido neste esquema. Em geral, S- manteve um número de respostas de observação maior do que S+. Estes resultados parecem nos levar à conclusão de que S- não apenas atuou como um estímulo reforçador condicionado como também se mostrou um reforçador mais forte do que S+. No Experimento 1, o único dado que pareceu apontar para conclusões contrárias a essas foi aquele que mostrou que, em esquema tand VI FR 15, grande parte da produção de S+ se concentrava no início das tentativas enquanto que a produção de S- se distribuía em intervalos mais distantes temporalmente.

No Experimento 2, a função reforçadora de estímulos sinalizadores foi investigada na situação em que as respostas de observação que os produziam podiam estar sob controle discriminativo destes mesmos estímulos. Isto é, em termos de procedimento, os estímulos sinalizadores podiam ser apresentados e reapresentados em uma mesma tentativa. Os resultados deste estudo mostraram que a primeira apresentação dos estímulos sinalizadores determinaram, na seqüência, diferentes freqüências de respostas de observação. Dada aos sujeitos a oportunidade de reapresentarem S+ e S- eles, sistematicamente, produziam S- mais freqüentemente do que S+.

Os Experimentos 1 e 2, portanto, revelaram resultados de certa forma semelhantes. Em ambos os estudos, S- não apenas manteve respostas de observação como manteve mais respostas do que S+. Estes resultados, surpreendentes quando comparados com os dados descritos na literatura, merecem uma análise ampla das contingências envolvidas. Em uma tentativa de se compreender, inicialmente, a menor frequência de produção de S+ em relação a S-, será revista, a seguir, a possibilidade apontada na discussão do Experimento 1 de que respostas dirigidas ao comedouro teriam competido com as respostas que produziam S+. Assim como no Experimento 1, esta variável pode ter contribuído para uma maior frequência de produção de S-, em relação a S+, também no Experimento 2.

Baseado em observações assistemáticas do comportamento de um dos pombos, durante algumas sessões do Experimento 1, verificou-se a ocorrência de respostas bem definidas durante a apresentação de S+ mas não na de S-. Estas respostas eram dirigidas ao comedouro e apresentavam as características de respostas preparatórias como relatadas por Perkins (1968). Apenas na presença de S+, os sujeitos abaixavam freqüentemente a cabeça próximo à abertura do comedouro localizada logo abaixo do disco de respostas. Durante a ocorrência destas respostas preparatórias, não havia possibilidade de ocorrerem respostas ao disco.

Aplicadas à análise dos resultados dos Experimentos 1 e 2, as respostas preparatórias podem ter estado, supostamente, sob controle discriminativo de estímulos correlacionados com os dois tipos de tentativas (que terminavam com e sem a apresentação de comida) e interferido na emissão de respostas de observação. No Experimento 1, estes estímulos (ou estimulação) podem ter sido gerados pelo próprio desempenho dos sujeitos no esquema tand VI FR e, no Experimento 2, pela primeira apresentação de S+ e de S-. Sob controle de S+,

pode ter havido um aumento na probabilidade de ocorrência das respostas preparatórias que, por competirem com as respostas ao disco, resultaram na menor frequência de produção de S+, em relação a S-, observada em ambos os experimentos. Além disso, outros fatores podem ter contribuído para este dado. Um seria o enfraquecimento de S+ como um estímulo reforçador condicionado. A diminuição na frequência de produção de S+, tanto nas condições em que o esquema tandem VIFR esteve em vigor (Experimento 1) quanto nas condições em que podiam ocorrer suas reapresentações (Experimento 2), pode ter sido acompanhada por um aumento no número de tentativas TS+ encerradas na ausência de S+ (e na presença do estímulo do esquema misto). Um outro fator seria a possibilidade de que as respostas de observação tenham estado sob controle da contingência de DRO vigente nos 3 s finais das tentativas. Respostas neste período prolongavam a duração das tentativas e, nas tentativas TS+, atrasavam a liberação de comida. Por isso, respostas nas tentativas TS+ podem ter diminuído de frequência.

A análise envolvendo a emissão de respostas preparatórias sugere um caminho para se compreender a maior frequência de respostas de observação associada à produção de S- (em relação a S+) observada nos Experimentos 1 e 2. Utilizando um procedimento semelhante aos destes dois experimentos, estudos prévios na literatura (Blanchard, 1975; Schrier e col., 1980; Tomanari, 1995) parecem sustentar esta possibilidade de análise. Análise que, no entanto, não contribui para a compreensão do dado fundamental de ambos os estudos que foi a ocorrência de respostas de observação mantidas pela produção de S-. Este dado diverge, essencialmente, dos estudos anteriores em respostas de observação com pombos que têm mostrado, basicamente, que S- não mantém respostas de observação (Auge, 1973; Branch, 1970; Branch, 1973; Case e Fantino, 1981; Dinsmoor e col., 1983; Dinsmoor e col. 1988; Mueller e Dinsmoor,

1984, 1986; entre outros) ou mantêm respostas que evitam a sua apresentação (Blanchard, 1975; Dinsmoor e col., 1972; Jwaideh e Mulvaney, 1976; Mulvaney e col., 1974; Tomanari, 1995).

A maior parte destes estudos com pombos, entretanto, utilizaram procedimentos diferentes daquele usado pela presente investigação (ver Introdução). Portanto, parte das diferenças em seus resultados pode ter-se originado em diferenças de procedimento. Para listar algumas delas, na presente investigação, 1) foi utilizado um procedimento de tentativas discretas, separadas por intervalos entre tentativas, em vez de um procedimento em operante-livre (como, por exemplo, Wyckoff, 1952; Fantino e Case, 1983; Mueller e Dinsmoor, 1984, 1986; Preston, 1985); 2) foi empregado um esquema de liberação de comida independente de respostas dos sujeitos em intervalo originalmente fixo em vez de intervalos variáveis (como Dinsmoor e col., 1988, por exemplo) e, 3) por utilizar um esquema independente de respostas para a liberação de comida, não existiam, no presente procedimento, respostas para a produção do reforçador principal – água, pontos, comida --, diferentemente da maior parte dos estudos na área (Branch, 1970; Branch, 1973; Bowe e col., 1983; Case e Fantino, 1981; Kendal, 1973; Kendal, 1974; Mueller e Dinsmoor, 1984, 1986; Wyckoff, 1952; entre outros).

Em futuras investigações, o controle destas (e outras) variáveis de procedimento podem ajudar a compreender as diferenças de resultados entre a presente investigação e outros estudos relatados na literatura. Por exemplo, o papel do DRO na manutenção das respostas que prolongaram a duração das tentativas TS- seria uma variável a ser melhor investigada. É possível que estas respostas tenham sido mantidas, em parte, porque atrasavam o início do intervalo entre tentativas. Isto seria possível caso o IET tenha se tornado um período mais

aversivo para os sujeitos do que a própria produção de S- e o prolongamento das tentativas TS-.

Diferenças de procedimento podem ter contribuído, como foi apontado anteriormente, para parte das diferenças entre os resultados da presente investigação e os resultados de outros estudos na área. Neste contexto, o presente estudo, principalmente o Experimento 1, poderia ser mais diretamente comparado com os estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995) por terem, todos, utilizado um procedimento basicamente semelhante e pombos como sujeitos.

Um dos objetivos do Experimento 1 foi servir de controle ao estudo de Tomanari (1995) cujos resultados revelaram a ocorrência de um número curiosamente acentuado de respostas, em tand VI DRL, que evitavam a apresentação de S-. Estas respostas, que aparentemente serviam à esquiva de S-, expuseram uma suposta contradição. Ao mesmo tempo em que os sujeitos evitavam a apresentação de S-, a duração das tentativas TS- era marcadamente prolongada (contingência de DRO 3 s vigente no final das tentativas). Para se investigar melhor esta questão e se ter claro o controle das respostas de observação pelos estímulos discriminativos -- em vez de ter sido gerado por um artefato do procedimento, por exemplo--, foi exigido dos sujeitos, no Experimento 1, que confirmassem o valor punidor condicionado adquirido por S- através de um padrão de desempenho diferente -- e de certa forma oposto -- ao exigido por Blanchard (1975) e Tomanari (1995). No Experimento 1, os sujeitos produziam o estímulo sinalizador respondendo mais freqüentemente no disco (FR) em vez de espaçarem suas respostas no tempo (em DRL, Blanchard, 1975 e Tomanari, 1995).

Os resultados do Experimento 1 da presente investigação e os obtidos por Blanchard (1975) e Tomanari (1995) apontaram para conclusões opostas quanto à função reforçadora de S-. Em todos os três experimentos, obteve-se uma alta

freqüência de respostas nas tentativas TS-, tanto em esquema tand VI DRL quanto em esquema tand VI FR. Este desempenho dos sujeitos em tand VI DRL resultou na esquiva de S- (gerando a conclusão de uma suposta função punidora) enquanto que, em tand VI FR, resultou na sua produção (gerando a conclusão, oposta, de uma função reforçadora). Portanto, quando estes dois estudos são comparados, esta aparente indiferença no desempenho dos sujeitos nos dois esquemas pode estar sugerindo um fraco controle por S- e a possibilidade de que outra variável tenha controlado as respostas de observação relacionadas a S-. Apesar de que, analisando os resultados de cada um dos estudos, individualmente, as diferenças de desempenho nas tentativas TS+ e TS- foram muito claras e o desempenho dos sujeitos, tanto em tand VI DRL (Tomanari, 1995) quanto em tand VI FR (Experimento 1), mostrou-se bastante sistemático e regular.

Desempenho claro e sistemático entre os sujeitos também foi verificado nos resultados do Experimento 2. Neste estudo, obteve-se uma evidente distinção entre as respostas de observação mantidas por S+ e S- tanto em pombos não-ingênuos quanto ingênuos. No entanto, uma alta freqüência de respostas nas tentativas TS- foi também observada. Esta constatação pode fortalecer, em função da semelhança com a alta freqüência de respostas obtida em esquemas tand VI DRL (Tomanari, 1995) e tand VI FR (Experimento 1), a sugestão de que o controle das respostas de observação por S- não era um controle preponderante.

Os resultados dos Experimentos 1 e 2 da presente investigação revelam a existência de dois procedimentos em que pombos emitem respostas que produzem a apresentação de S- sem que, para isso, tivessem sido empregados artifícios como contingenciar a produção de S- a um aumento na probabilidade de obtenção de comida (Allen e Lattal, 1989) ou técnicas de *fading* (Kaminski e

Moore, 1990). Além disso, os resultados da presente investigação parecem estar imunes à afirmação de Dinsmoor (1983) de que, na situação em que produz tanto S+ quanto S- (dependendo do componente em vigor no misto), as respostas de observação se manteria porque produz S+, ainda que intermitentemente. Este não seria o caso, entretanto, da presente investigação, cujos resultados do Experimento 2, particularmente, mostram que respostas que produziam reapresentações de S- foram emitidas mesmo na situação em que nunca haviam produzido reapresentações de S+.

Os dados da presente investigação parecem nos levar, portanto, à conclusão de que S- adquiriu valor reforçador condicionado. Todavia, restrições a esta conclusão se aplicam quando eles são comparados com os resultados obtidos por Blanchard (1975) e Tomanari (1995) -- que utilizaram, com pombos, basicamente o mesmo procedimento. As diferenças entre os resultados destes estudos sugerem que afirmações mais definitivas sobre os efeitos reforçadores ou punidores de S- devem aguardar até que futuras investigações sejam realizadas. Por exemplo, um estudo que identifique a(s) variável(is) que controlou(laram) a alta frequência de respostas de observação que resultou, ora na apresentação de S- (tand VI FR), ora na sua esquiva (tand VI DRL). No momento, pelo menos parcialmente, estes resultados podem contribuir para as discussões sobre 1) as especificidades entre espécies quanto ao valor reforçador condicionado de S- e 2) as Hipóteses da redução-do-atraso versus redução-da-incerteza.

Diferenças entre espécies

Como foi apontado na Introdução, alguns autores sugerem que diferentes espécies, mais especificamente, primatas versus não-primatas, seriam diferentemente susceptíveis ao reforçamento por S-. Ou seja, humanos e macacos produziram respostas mantidas pela apresentação de S- enquanto pombos e ratos, por exemplo, não. Esta possibilidade quanto a especificidade da espécie no reforçamento por S- é mantida, por estes autores, baseada no fato de que, com pombos e ratos como sujeitos, ao contrário de humanos (Perone e Baron, 1980; Lieberman, 1997) e macacos (Lieberman, 1972; Schrier e col., 1980), nenhum estudo havia mostrado, até o momento, qualquer evidência conclusiva de que este estímulo fosse capaz de manter respostas de observação. Entretanto, a partir dos resultados da presente investigação, as possíveis diferenças entre espécies em relação ao reforçamento por S-, caso existam, parecem menores. Assim como humanos e macacos, agora existem evidências de que pombos podem emitir respostas que produzem S-.

Na verdade, alguns estudos anteriores já haviam sugerido que o reforçamento por S- não seria exclusivo de primatas. Tomanari (1995) sugeriu ser possível que, dentro de um mesmo procedimento, pombos emitissem respostas mantidas pela esquiva de S- ao mesmo tempo em que obtinham uma sinalização correlacionada com este estímulo. Allen e Lattal (1989) e Kaminski e Moore (1990) realizaram uma análise experimental de procedimentos que poderiam gerar um controle fidedigno de respostas de observação pela produção de S- apenas. Kaminski e Moore (1990) realizaram um experimento com pombos em que procederam a retirada de S+ através de um *fading-out*. Com este recurso, as respostas de observação foram mantidas quando produziam apenas S-. Allen e Lattal (1989) usaram um procedimento engenhoso em que respostas no

componente de extinção (em esquema misto VI EXT) diminuía a frequência de reforços no componente seguinte de VI. Nesta situação específica, respostas de observação que produziam S- foram mantidas.

Os estudos que envolveram as respostas de observação em sujeitos humanos revelaram algumas especificidades relacionadas a estes sujeitos. Nestes estudos, têm-se verificado que, além das variáveis identificadas nos procedimentos com não-humanos, outras coexistem e aumentam a complexidade da análise. Por exemplo, as instruções, sejam aquelas fornecidas pelo experimentador antes da sessão (Fantino e Case, 1983; Case, Fantino e Wixted, 1995) ou aquelas geradas pelos próprios sujeitos (Perone e Kaminski, 1992), parecem desempenhar um papel importante na determinação do valor reforçador dos estímulos discriminativos. Papel igualmente importante também parece ter a história passada dos sujeitos com instruções. No estudo de Perone e Kaminski (1992), quando S- era a frase “o *status* do programa agora é ausência de pontos”, a frequência de respostas de observação dos sujeitos humanos diminuía drasticamente; quando era a frase “o *status* do programa agora é B” (previamente definido como ausência de pontos), as respostas de observação se mantinham. Recentemente, este trabalho foi replicado por Case (1997)¹⁸ sem que, no entanto, resultados semelhantes tivessem sido obtidos.

¹⁸ Case, D. A. (1997) Human observing behavior inconsistent with uncertainty-reduction and a second failure to replicate Perone and Kaminski (1992). *Encontro Anual da Association for the Behavior Analysis*, Chicago.

Hipótese da Redução-do-atraso versus Hipótese da Redução-da-incerteza

Existem duas hipóteses que procuram explicar o valor reforçador condicionado de estímulos discriminativos. Uma delas, a Hipótese da redução-do-atraso, afirma que um estímulo inicialmente neutro se torna um reforçador condicionado em função do quanto este estímulo sinaliza uma redução temporal entre a sua apresentação e a liberação do reforçador incondicionado (Fantino e Logan, 1979). Na Hipótese da redução-da-incerteza, diferentemente, o elemento fundamental na determinação de um reforçador condicionado é o quanto este estímulo prediz (ou informa) sobre a liberação do reforçador incondicionado (Berlyne, 1957; Hendry, 1969; Hendry, 1983). Ambas as hipóteses prevêem, portanto, que um estímulo correlacionado com apresentação do reforçador primário deve se tornar um reforçador condicionado. Entretanto, em relação ao estímulo correlacionado com uma baixa ou nula probabilidade de apresentação de comida, as duas hipóteses prevêem resultados opostos. No procedimento de respostas de observação, a Hipótese da redução-do-atraso afirma que S- não adquire função reforçadora condicionada ou adquire função punidora porque a apresentação de S- sinaliza, em relação ao estímulo do esquema misto, uma maior distância temporal até a liberação do reforço. Por outro lado, a Hipótese da redução-da-incerteza afirma que S-, por diminuir a incerteza acerca das contingências em vigor adquire, sim, função reforçadora condicionada.

Na presente investigação, os resultados parecem suportar a Hipótese da redução-da-incerteza na medida em que os pombos emitem respostas de observação mantidas, aparentemente, pela produção de S-, um estímulo correlacionado com ausência de comida. Entretanto, existem alguns dados obtidos nesta investigação que não parecem ser satisfatoriamente suportados por esta hipótese.

No Experimento 2, os sujeitos podiam apresentar e reapresentar os estímulos sinalizadores em uma mesma tentativa. De acordo com a Hipótese da redução-da-incerteza, durante a primeira exposição do estímulo do esquema misto, a incerteza sobre o tipo de tentativa em vigor, para os pombos, era máxima. Respostas de observação, nesta situação, podiam produzir S+ ou S- em igual probabilidade ($p=0,5$). Após esta primeira produção, entretanto, a incerteza sobre a disponibilidade de liberação do comedouro na tentativa foi anulada. Portanto, as respostas de observação durante as re-exposições do estímulo do esquema misto, tanto as que produziam S+ quanto as que produziam S-, levantam a questão se estas respostas podiam ter sido mantidas pela produção de informação.

Esta aparente divergência, no mesmo experimento, entre os dados que suportam e os parecem não suportar a Hipótese da redução-da-incerteza, parecem revelar as limitações desta hipótese em propiciar uma ampla descrição do processo de reforçamento condicionado. Por este motivo, pode ser cauteloso se optar por tentar compreender os resultados da presente investigação sem se remeter a hipóteses, pelo menos no presente momento. A compreensão do processo de reforçamento condicionado, em procedimento de respostas de observação, parece exigir uma avaliação ampla das variáveis envolvidas. Estudos como aqueles relatados na literatura e que utilizaram procedimentos em que as Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza eram comparadas diretamente (Case, Fantino e Wixted, 1985; Fantino e Case, 1983; Fantino e col., 1983; Mulvaney, Dinsmoor, Jwaideh e Hughes, 1974), aparentemente, restringem a análise. Limitar os estudos em respostas de observação à demonstração de dados que suportem uma ou outra hipótese desconsidera a possibilidade de que outras variáveis, além daquelas previstas originalmente por elas, possam atuar no comportamento de observação dos sujeitos. Por exemplo, as Hipóteses da

redução-do-atraso e da redução-da-incerteza não consideram a possibilidade de que respostas preparatórias possam interferir nas respostas de observação. Portanto, a identificação de variáveis deste tipo, independentemente das previsões feitas por hipóteses, pode colaborar para a maior compreensão das variáveis determinantes das respostas de observação e, por extensão, ao processo de reforçamento condicionado.

Tomanari (1995) obteve indícios apontando para o fato de que nenhuma das duas hipóteses parece dar conta de descrever o processo de reforçamento condicionado completamente. Neste trabalho, o autor mostrou que dados que suportavam ambas as hipóteses podiam coexistir no mesmo procedimento. Na presente investigação, há dados nesta mesma direção. Nos resultados do Experimento 1, há evidências de que, em diferentes níveis de análise de dados, S+ e S- se revelaram diferentemente reforçadores. Observando-se a frequência de produção de cada um dos estímulos por sessão, por exemplo, S- era mais frequentemente produzido do que S+. No entanto, observando o momento nas tentativas, em esquema tand VI FR 15, em que os estímulos sinalizadores eram apresentados, verificou-se que S+ era produzido próximo ao início das tentativas enquanto que S-, ao contrário, era produzido posteriormente.

Em resumo

Os resultados dos dois experimentos relatados na presente investigação mostraram que os estímulos sinalizadores das tentativas que terminavam com e sem a apresentação de comida, S+ e S-, respectivamente, controlaram diferentemente as respostas de observação dos pombos. Basicamente, no Experimento 1, as respostas de observação, em esquema tand VI 15 s FR 15 (ou FR 24), aumentavam de frequência (em relação à linha de base, em VI) quando produziam S- mas não, necessariamente, quando produziam S+. No Experimento

2, dada aos sujeitos a oportunidade de produzirem reapresentações dos estímulos sinalizadores, observou-se que a frequência de reapresentações de S- foi clara e sistematicamente maior do que a de S+.

Os resultados comuns aos dois experimentos mostraram que S- foi capaz, não apenas de manter respostas de observação como manteve mais respostas do que S+. Em uma tentativa de se compreender a menor frequência de produção de S+ em relação à S-, levantou-se a possibilidade de que respostas concorrentes e incompatíveis com as respostas ao disco (respostas preparatória, Perkins, 1968) teriam ocorrido sob controle de estímulos correlacionados com o tipo de tentativa em vigor (o próprio desempenho dos sujeitos no esquema tand VIFR, no Experimento 1 e a 1ª apresentação dos estímulos discriminativos, no Experimento 2).

Quanto à manutenção de respostas de observação pela produção de S-, os resultados da presente investigação, diferentemente do que tem sido relatado por estudos na área, sugerem que S-, pelo menos dentro das condições estudadas, seria um estímulo reforçador condicionado. No entanto, em uma comparação com os estudos de Blanchard (1975) e Tomanari (1995) que utilizaram, com pombos, um procedimento de observação semelhante ao aqui empregado, levantou-se a possibilidade de que as respostas de observação que resultaram na produção de S- podem não ter estado, necessariamente, sob controle deste estímulo. Esta sugestão teve origem na verificação de uma alta frequência de respostas de observação nas tentativas TS- quando S- era produzido em esquemas tand VIFR e tand VI DRL. Esta aparente indiferenciação de desempenho nestes dois esquemas apontam para conclusões opostas em relação à função reforçadora ou punidora condicionada de S-. Quando foi empregado o esquema tand VI DRL para produção de S-, a alta frequência de respostas resultou na esquiva de S- (função punidora condicionada de S-) mas,

em tand VIFR, quando os estímulos podiam ser reapresentados, resultou na sua apresentação (função reforçadora condicionada).

A partir dos resultados da presente investigação, portanto, não é possível tirar conclusões definitivas em relação a função reforçadora condicionada de S-. Entretanto, algumas contribuições foram dadas para o aumento na compreensão das variáveis envolvidas na manutenção das respostas de observação. Entre elas, a presente investigação:

- 1) mostrou que pombos, dentro das condições do presente estudo, emitem respostas de observação que produzem a apresentação de um estímulo correlacionado com ausência de comida (S-). De acordo com os seus resultados, S- adquiriu valor reforçador condicionado.
- 2) discutiu seus resultados comparativamente a outros estudos que utilizaram procedimentos semelhantes (Blanchard, 1975, Tomanari, 1995). A constatação de diferenças entre os resultados destes estudos mostrou que são necessários dados complementares para que se possa afirmar mais conclusivamente sobre a função reforçadora ou punidora (Blanchard, 1975 e Tomanari, 1995) condicionada de S-.
- 3) sugeriu a existência de possíveis contingências, relacionadas ao presente procedimento, que podem ter interferido nas respostas de observação (por exemplo, as respostas preparatórias). Para futuras investigações, a coleta de dados empíricos e a análise mais apurada de relações de contingências deste tipo devem permitir uma maior compreensão das variáveis responsáveis pelo estabelecimento de reforçadores condicionados. Neste trabalho, é sugerido, portanto, que a manutenção de respostas de observação envolve múltiplos

fatores que, no momento, ainda estão fracamente controlados. Uma satisfatória compreensão do fenômeno se dará com a identificação e o controle de cada um deles.

- 4) sugeriu que as Hipóteses da redução-da-incerteza e da redução-do-atraso podem limitar a compreensão do processo de reforçamento condicionado, pelo menos dentro do procedimento empregado no presente estudo. Estas hipóteses não incluem, em suas proposições, a possibilidade de que outras variáveis, além do grau de incerteza e a proximidade temporal ao reforçamento, estejam envolvidas no processo de reforçamento condicionado. Como foi visto nos resultados aqui apresentados, este processo parece ser multi-determinado. Na utilização e testes destas hipóteses, pesquisadores não têm considerado, por exemplo, a possibilidade de que ambas possam contribuir para a compreensão de um mesmo conjunto de dados.
- 5) contribuiu para a discussão que envolve a diferença entre espécies como determinante no estabelecimento de S- como um estímulo reforçador condicionado (primatas versus não-primatas). Os resultados da presente investigação, ao revelarem que pombos, assim como humanos e macacos, emitem respostas mantidas pela apresentação de S-, sugerem que a função reforçadora deste estímulo não depende, necessariamente, da espécie envolvida. Em vez disso, variáveis de procedimento parecem desempenhar um papel importante nesta determinação. Tendo em vista as diferenças entre os resultados da presente investigação e aqueles obtidos por Blanchard (1975) e Tomanari (1995), no entanto, comparações mais conclusivas entre espécies dependem, em parte, de futuras investigações sobre a função reforçadora de S- nos próprios pombos.

Referências

- Allen, K.D. e Lattal, K.A. (1989). On conditional reinforcing effects of negative discriminative stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 52, 335-339.
- Auge, R.J. (1973). Effects of stimulus duration on observing behavior maintained by differential reinforcement magnitude. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 429-438.
- Berlyne, D.E. (1957). Uncertainty and conflict: A point of contact between information theory and behavior concepts. *Psychological Review*, 64, 329-333.
- Branch, M.N. (1970). The distribution of observing responses during two VI schedules. *Psychonomic Science*, 20, 5-6.
- Branch, M.N. (1973). Observing responses in pigeons: Effects of schedule component duration and schedule value. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 417-428.
- Blanchard, R. (1975). The effect of S- on observing behavior. *Learning and Motivation*, 6, 1-10.
- Bowe, C.A., e Dinsmoor, J.A. (1983). Spatial and temporal relations in conditioned reinforcement and observing behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 39, 227-240.
- Brown, P.L. e Jenkins, H.M. (1968). Auto-shaping of the pigeon's key-peck. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 11, 1-8.
- Browne, M.P. e Dinsmoor, J.A. (1974). Wyckoff's observing response: pigeons learn to observe stimuli for free food but not for extinction. *Learning and Motivation*, 5, 165-173.
- Cantor, M.B. (1979). A solution to two big problems in the analysis of behavior. Em *Predictability, correlation and contiguity*. Harzem, P. e Zeiler, M.D. (orgs.). John Willey and Sons Ltd.
- Carvalho, S.G. e Machado, L.M.C.M. (1992). Esquemas mistos e múltiplos concorrentes: uma reavaliação da resposta de observação. *Acta Comportamentalia*, 0, 109-144.

- Case, D.A. e Fantino, E. (1981). The delay-reduction hypothesis of conditioned reinforcement and punishment: observing behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 35, 93-108.
- Case, D.A. e Fantino, E. (1989). Instructions and reinforcement in the observing behavior of adults and children. *Learning and Motivation*, 20, 373-412.
- Case, D.A., Fantino, E. e Wixted, J. (1985). Human observing maintained by negative informative stimuli only if correlated with improvement in response efficiency. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 43, 289-300.
- Case, D.A., Ploog, B.O. e Fantino, E. (1990). Observing behavior in a computer game. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 54, 185-199.
- Cumming, W. W. e Berryman, R. (1961). Some data on matching behavior in the pigeon. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 4, 281-284.
- Daly, H.B. (1985). Observing response acquisition: preference for unpredictable appetitive rewards obtained under conditions predicted by DMOD. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes*, 11, 294-316.
- Dinsmoor, J.A. (1983). Observing response and conditioned reinforcement. *The Behavioral and the Brain Sciences*, 6, 693-704.
- Dinsmoor, J.A. (1995a). Observing response and conditioned reinforcement. *The Behavior Analyst*, 18, 51-68.
- Dinsmoor, J.A. (1995b). Observing response and conditioned reinforcement. *The Behavior Analyst*, 18, 253-269.
- Dinsmoor, J.A., Bowe, C.A., Dout, D.L., Martin, L.T., Mueller, K.L., e Workman, J.D. (1983). Separating the effects of salience and disparity on the rate of observing. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 40, 253-264.
- Dinsmoor, J.A., Bowe, C.A., Green, L. e Hanson, J. (1988). Information on response requirements compared with information on food density as a reinforcer of observing in pigeons. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 49, 229-237.
- Dinsmoor, J.A., Browne, M.P. e Lawrence, C.E. (1972). A test of the negative discriminative stimulus as a reinforcer of observing. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 18, 79-85.

- Dinsmoor, J.A., Mueller, K.L., Martin, L.T. e Bowe, C.A. (1982). The acquisition of observing. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 38, 249-263.
- Dinsmoor, J.A., Mulvaney, D.E. e Jwaideh, A.R. (1981). Conditioned reinforcement as a function of duration of stimulus. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 36, 41-49.
- Dinsmoor, J.A., Sears, G.W. e Douthett, D.L. (1976). Observing as a function of stimulus difference. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes*, 2, 154-162.
- Egger, M.D. e Miller, N.E. (1962). Secondary reinforcement in rats as a function of information value and reliability of the stimulus. *Journal of Experimental Psychology*, 64 (2), 97-104.
- Fantino, E. e Case, D.A. (1983). Human observing: maintained by stimuli correlated with reinforcement but not extinction. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 40, 193-210.
- Fantino, E., Case, D.A. e Altus, D. (1983). Observing reward-informative and uninformative stimuli by normal children of different ages. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 36, 437-452.
- Fantino, E. e Logan, C.A. (1979). *The experimental analysis of behavior: a biological perspective*. San Francisco: Freeman.
- Ferster, C. B. (1960). Intermittent reinforcement of matching to sample in the pigeon. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 3, 259-272.
- Fleshler, M. e Hoffman, H.S. (1962). A progression for generating variable-interval schedules. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 5, 529-530.
- Hendry, D.P. (1969). Introduction. Em D.P. Hendry (Ed.), *Conditioned reinforcement*. Homewood, IL: Dorsey.
- Hendry, D.P. (1983). Uncertainty, information, observing. *Behavioral and Brain Sciences*, 6, 708-709.
- Hirota, T.T. (1972). The Wychoff observing response -- A reappraisal. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 18, 263-276.

- Hirota, T.T. (1974). The relationship between observing behavior and food-key response rates under mixed and multiple schedules of reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 21, 259-266.
- Jenkins, H.M. e Boakes, R.A. (1973). Observing stimulus sources that signal food or no food. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 197-207.
- Jwaideh, A.R. e Mulvaney, D.E. (1976). Punishment of observing by a stimulus associated with the lower of two reinforcement densities. *Learning and Motivation*, 7, 211-222.
- Kaminski, B.J. e Moore, J. (1990). A fading procedure facilitates the maintenance of observing responses when the more valued stimulus is not produced. *Animal Learning and Behavior*, 18 (4), 423-433.
- Kendall, S.B. (1973a). Redundant information in an observing-response procedure. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 19, 81-92.
- Kendall, S.B. (1973b). Effects of two procedures for varying information transmission on observing responses. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 20, 73-83.
- Kendall, S.B. (1974). Preference for intermittent reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 21, 463-473.
- Kendall, S.B e Gibson, D.A . (1965). The effects of discriminative stimulus removal on observing behavior. *Psychological Record*, 261-280.
- Kelleher, R.T., Riddle, W.C. e Cook, L. (1962). Observing responses in pigeons. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 5, 3-13.
- Kish, G.B. (1966). Studies of sensory reinforcement. Em W.K. Honig (Ed.), *Operant behavior: areas of research and application* . New York: Appleton-Century-Crofts.
- Levis, D.J. e Perkins, C.C. (1965). Acquisition of observing responses with water reward. *Psychological Reports*, 16, 114.
- Lieberman, D.A. (1972). Secondary reinforcement and information as determinants of observing behavior in monkeys (*Macaca mulatta*). *Learning and Motivation*, 3, 341-358.

- Lieberman, D.A; Cathro, S.S., Nichol, K. e Watson, E.(1997). The role of S- in human observing behavior: bad news is sometimes better than no news. *Learning and Motivation*, 28, 20-42.
- Lutz, R.E. e Perkins, C.C.Jr. (1960). A time variable in the acquisition of observing response. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 53 (2), 180-182.
- Mitchell, K.M., Perkins, N.P. e Perkins, C.C. (1965). Conditions affecting acquisition of observing responses in the absence of differential reward. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 60, 435-467.
- Mueller, K.L. e Dinsmoor, J.A. (1984). Testing the reinforcement properties of S-: a replication of Lieberman's procedure. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 41, 17-25.
- Mueller, K.L. e Dinsmoor, J.A. (1986). The effect of negative stimulus presentations on observing-response rates. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 46, 281-291.
- Mulvaney, D.E., Dinsmoor, J.A., Jwaideh, A.R. e Hughes, L.H. (1974). Punishment of observing by the negative discriminative stimulus. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 21, 37-44.
- Mulvaney, D.E., Hughes, L.H., Jwaideh, A.R. e Dinsmoor, J.A. (1981). Differential production of positive and negative discriminative stimuli by normal and retarded children. *Journal of Experimental Psychology*, 32, 389-400.
- Nevin, J.A. (1973): Conditioned reinforcement. In: *The study of behavior*. Em , J.A. Nevin. e G.S. Reynolds (org.). Glenview: Scott Foresman, 155-198.
- Ohta, A. (1987). Observing responses maintained by conditional discriminative stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 48, 355-366.
- Perkins, C.C.Jr. (1968) An analysis of concept of reinforcement. *Psychological Review*, 75, 155-172.
- Perone, M. e Baron, A. (1980). Reinforcement of human observing behavior by stimulus correlated with extinction or increased effort. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 34, 239-261.

- Perone, M. e Kaminski, B.J. (1992). Conditioned reinforcement of human observing behavior by descriptive and arbitrary verbal stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 58, 557-575.
- Preston, G.C. (1985). Observing responses in rats: support for the secondary reinforcement hypothesis. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 37B, 23-31.
- Prokasy, W.F. (1956). The acquisition of observing responses in the absence of differential external reinforcement. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 49, 131-134.
- Schaub, R. E. (1969). Response-cue contingency and cue effectiveness. Em D.P. Hendry (Ed.), *Conditioned Reinforcement*. Homewood, IL: Dorsey Press.
- Schaub, R.E. e Honig, W.K. (1967). Reinforcement of behavior with cues correlated with extinction. *Psychonomic Science*, 7 (1), 15-16.
- Schrier, A.M., Thompson, C.R. e Spector, N.R. (1980). Observing behavior in monkeys (*Macaca arctoides*): support for the information hypothesis. *Learning and Motivation*, 11, 355-365.
- Sidman, M. (1960). *Tactics of scientific research*. New York: Basic Books.
- Sidman, M. (1994). *Equivalence relations and behavior: a research story*. Authors Cooperative, Inc., Boston, MA.
- Tomanari, G. Y. (1995). Variáveis determinantes da resposta de observação. *Dissertação de mestrado apresentada no IP-USP*.
- Wehling, H.E. e Prokasy, W.F. (1962). Role of food deprivation in the acquisition of the observing response. *Psychological Reports*, 10, 399-407.
- Wilton e Clements (1971a). Observing responses and informative stimuli. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 15, 199-204.
- Wilton e Clements (1971b). The role of information in the emission of observing responses: a test of two hypotheses. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 16, 161-166.
- Wyckoff, L.B.Jr. (1952). The role of observing responses in discrimination learning - Part I. *Psychological Review*, 59, 431-442.

Wyckoff, L.B.Jr. (1969). The role of observing responses in discrimination learning. Em
D.P. Hendry (Ed.). Conditioned Reinforcement. Homewood, IL: Dorsey Press.

Anexo 1:

Respostas de observação em diferentes espécies de sujeitos

1) Sujeitos Humanos

Os estudos envolvendo respostas de observação em sujeitos humanos têm utilizado, geralmente, o procedimento de escolha entre dois manipulandos de observação. De modo geral, os dados têm mostrado que, em humanos, o estímulo correlacionado com maior taxa de reforçamento é preferido ao estímulo correlacionado com menor ou nula taxa de reforçamento. Contudo, há condições em que a preferência é pelo estímulo correlacionado com o evento não/menos reforçador:

1. Quando a produção deste estímulo propicia, aos sujeitos, maior eficiência no desempenho no esquema básico de reforçamento ou economia de esforço (Fantino e Case, 1985);
2. Quando outros tipos importantes de reforçamento estão envolvidos (Case, Ploog e Fantino, 1990);
3. Quando instruções verbais estabelecem os estímulos como reforçadores ou punidores condicionados (Case e Fantino, 1989).

Além disso, outros dados têm sido revelados pelas pesquisas em respostas de observação em humanos:

1. a preferência pelo estímulo não-correlacionado (que mantém alguma associação com reforçamento, porém não é informativo) não varia com a idade, seja em diferentes estágios de desenvolvimento de crianças ou em adultos (Fantino e Case, 1983 e Case e Fantino, 1989);
2. Crianças com retardo mental apresentam um desempenho em observação similar ao obtido com pombos (Mulvaney e col. 1981);
3. Aumento na magnitude do reforço (dinheiro) não aumenta a importância do evento menos reforçador a ele associado de modo que as respostas que produzem o estímulo correlacionado a este evento sejam mantidas (Case e Fantino, 1989);
4. As instruções verbais fornecidas aos sujeitos pelo experimentador, assim como as regras pré-experimentais que os acompanham, têm assumido um importante papel na determinação das respostas de observação em humanos (Perone e Kaminski, 1992)¹⁹.
5. A crença dos sujeitos de que as respostas de observação alteram a probabilidade de reforçamento na chave principal parecem alterar o valor reforçador condicionado de S- (Lieberman e col., 1997).

¹⁹ Recentemente, Case (1997) replicou este estudo porém não chegou a resultados semelhantes.

Case, D. A. (1997) Human observing behavior inconsistent with uncertainty-reduction and a second failure to replicate Perone and Kaminski (1992). *Annual Meeting of the Association for the Behavior Analysis*, Chicago.

2) Sujeitos Macacos

Os trabalhos com macacos mostram as maiores evidências na área de que, pelo menos em algumas circunstâncias, S- mantém propriedades reforçadoras condicionadas:

1. Ao se descontinuar a produção de S- ou ao se introduzir fontes alternativas de sinalização, observou-se uma queda no número de respostas de observação (Lieberman, 1972).
2. Alterando-se diferencialmente a exigência no esquema de reforçamento para a produção de S+ e de S-, observou-se uma adaptação gradual às contingências quando as respostas de observação eram conseqüenciadas por qualquer um dos estímulos (Schrier e col., 1980).

3) Sujeitos Pombos

Os dados obtidos com pombos em procedimentos de resposta de observação têm confirmado a proposição de Wyckoff (1952, 1959) de que estímulos discriminativos adquirem propriedades reforçadoras condicionadas. Após uma série inicial de trabalhos que calibraram e inovaram o procedimento de resposta de observação (Wilton e Clements, 1971a,b; Kendal, 1973a; Kelleher, Riddle e Cook, 1962; Kendal, 1965; Kendal e Gibson, 1965), outras investigações executaram estudos mais precisos quanto a avaliação dos efeitos dos estímulos sinalizadores na manutenção das respostas de observação (Hirota, 1972,1974; Browne e Dinsmoor, 1974). Estes estudos separaram o número de respostas que produziam, ou o tempo gasto para produzir os estímulos associados com

reforçamento (S+) e extinção (S-). Como resultado, foram reveladas propriedades reforçadoras condicionadas de S+, mas não de S-.

Utilizando diferentes procedimentos, outros autores chegaram a conclusões semelhantes: Jenkins e Boakes (1973), utilizando as respostas de olhar para (ou se orientar para) fontes de estímulos como respostas de observação; Kendal (1973b), utilizando procedimento de tentativas nos quais as respostas de observação podiam produzir estímulos redundantes; Auge (1973), utilizando componentes dos esquemas múltiplo e misto diferenciados pela magnitude de reforço; e Dinsmoor, Browne e Lawrence (1972), eliminando do procedimento a possibilidade dos sujeitos produzirem S+ ou S-.

O estudo de Dinsmoor e col., (1972), aliás, acabou sugerindo, através de seus resultados, que S-, além de não manter as respostas de observação, poderia adquirir propriedades aversivas. Estudos subseqüentes a este, como os de Mulvaney, Dinsmoor, Jwaideh e Hughes (1974), Jwaideh e Mulvaney (1976) e Blanchard (1975), acabaram reforçando esta sugestão.

Poucos estudos realizados com pombos mostraram dados em que S- seria produzido pelas respostas de observação. Os estudos de Schaub e Honig (1967) e Schaub (1969), apesar de o terem feito, são descartados por problemas metodológicos. Ohta (1987) mostrou respostas fragilmente mantidas por estímulos condicionais (portanto, não associado a reforçamento). Tomanari e Machado (1992) mostraram a manutenção de respostas de observação, tanto por S+ quanto por S-. No entanto, para um único sujeito.

Vários estudos na área manipularam variáveis dentro do paradigma de respostas de observação:

1. *Esquemas dependentes e independentes de reforçamento.* Dinsmoor, Bowe, Green e Hanson (1988) mostraram que, esquemas dependente e independente

de respostas parecem não afetar diferencialmente as respostas de observação. As diferenças na taxa de reforçamento entre os esquemas, isto sim, afetam-nas substancialmente.

2. *Aspectos físicos dos estímulos sinalizadores.* Dinsmoor, Sears e Dout (1976), Dinsmoor, Mueller, Martin e Bowe (1982) e Dinsmoor, Bowe, Dout, Martin, Mueller e Workman (1983) realizaram um série de estudos para verificar os efeitos da discrepância e saliência dos estímulos sobre as respostas de observação. Observaram que, quanto maior a saliência entre os estímulos discriminativos e o estímulo do misto, maior a taxa de respostas de observação. A discrepância entre os estímulos discriminativos entre si não pareceu exercer influência tão marcante.
3. *Natureza da discriminação.* Bowe e Dinsmoor (1983) mostraram que dois estímulos, que sinalizam diferentes relações temporais de reforçamento, mantêm respostas de observação. Enquanto que, estímulos que sinalizam diferentes relações espaciais de reforçamento (onde o reforço está disponível) não mantêm.
4. *Duração do tempo de apresentação dos estímulos.* Dinsmoor, Mulvaney e Jwaideh (1981) mostraram que a taxa de respostas de observação descreve uma função crescente, de aceleração negativa, em relação ao aumento do tempo de apresentação dos estímulos sinalizadores.
5. *Duração dos componentes.* Branch (1973) mostrou que diferentes durações de componentes de reforçamento e extinção não afetam o número de respostas de observação.

6. *Valor dos esquemas de reforçamento.* Case e Fantino (1981) mostraram que a frequência de respostas de observação varia diretamente com o aumento na densidade de reforçamento proporcionada pelos valores dos esquemas. Sugerem que o valor reforçador condicionado de um estímulo seja determinado pela redução do atraso, do início da apresentação do estímulo até o reforço, proporcionado por este estímulo. Apontam, ainda, que outros fatores, como reforçamento sensorial (Kish, 1966) ou a informação proporcionada pelo estímulo podem alterar o valor reforçador dos estímulos sinalizadores.

4) Sujeitos Ratos

Os estudos sobre resposta de observação em ratos podem ser agrupados em dois conjuntos. Um deles foi realizado entre as décadas de 50 e 60 e teve como base o procedimento de Prokasy (1956). Uma série de estudos seguiram-se a este testando variações de procedimento. Foram investigados o tempo de exposição aos estímulos (Lutz e Perkins, 1960), o grau de privação dos sujeitos (Wehling e Prokasy, 1962), a magnitude de reforço (Mitchell, Perkins e Perkins, 1965) e a natureza (água) e magnitude de reforço (Levis e Perkins, 1965) sobre a preferência adquirida pelos sujeitos, ao longo das sessões, pelo lado de um labirinto em que eram apresentados estímulos que discriminavam entre as tentativas com e sem reforço (versus o lado alternativo em que não discriminavam). Excepcionalmente, este resultado não foi observado quando a magnitude de reforço foi de 1 pelota de ração (0,045g) (Mitchell e col., 1965) e quando o atraso de reforço era igual a zero (Lutz e Perkins, 1960). Daly (1985) retoma esta linha de investigação e fortalece estes dados.

Estes estudos mostraram com regularidade que, quando permitido, ratos escolhem situações em que produzem estímulos discriminativos das contingências em vigor (versus os que não produzem). A explicação dos autores a este fenômeno, na época, baseava-se na hipótese de respostas preparatórias de Perkins (1968). Segundo esta hipótese, os estímulos discriminativos adquiririam valor reforçador condicionado porque permitiriam aos sujeitos otimizar as respostas preparatórias envolvidas no consumo do reforço.

Outra linha de investigação que se seguiu à de Prokasy (1956) procurou compreender a manutenção das respostas de observação através do procedimento proposto por Wyckoff (1952). No entanto, em comparação com outras espécies, o número de estudos que compararam o valor reforçador condicionado de S+ e S- em ratos é pequeno e tem apontado divergências em seus resultados (Carvalho e Machado, 1992; Preston, 1985; Tomanari e Machado, 1996).

Anexo 2:

Hipóteses da redução-do-atraso e da redução-da-incerteza

Segundo a Hipótese do reforçamento condicionado, um estímulo se tornará reforçador quando for associado, por pareamento seletivo, com o reforço incondicionado. Basicamente, a maior probabilidade de ocorrência do reforço primário na presença de um estímulo do que na sua ausência determinaria seu valor reforçador condicionado (Dinsmoor, 1983). Uma derivação desta hipótese é a Hipótese da redução-do-atraso (Fantino e Logan, 1979), que afirma que um estímulo neutro se tornará um reforçador condicionado tanto mais forte quanto mais reduzir a distância temporal em relação ao reforçador incondicionado. Tecnicamente, essa redução pode ser especificada em termos da razão entre dois intervalos médios: o intervalo entre o início do estímulo que precede o reforçador e o próprio reforçador e o intervalo entre dois reforçamentos sucessivos. Esta razão especifica o quanto o estímulo que precede o reforçador sinaliza a redução no tempo a transcorrer até a liberação do reforçador. Portanto, reduzir, como usado por Fantino e Logan (1979), significa que um estímulo sinaliza maior proximidade temporal com a liberação do reforçador incondicionado, em relação a um outro estímulo, temporalmente mais distante. Não se refere, portanto, a uma diminuição, de fato, no tempo até o reforçamento.

Exemplificando: no caso de um esquema de intervalo fixo de 100 segundos (FI 100 s), o intervalo entre dois reforçadores incondicionados é de 100 segundos. Um estímulo S1 que seja apresentado no 30º segundo após a liberação do último reforçador estaria sinalizando uma redução de 30% no tempo até o próximo reforçador. Um estímulo S2, que seja apresentado no 70º segundo após o

último reforçador, indicaria uma redução de 70% no intervalo entre reforços (figura a seguir).

Esquema exemplificando o estabelecimento de estímulos neutros, S1 e S2, como reforçadores condicionados, segundo a Hipótese da redução-do-atraso (supor apresentação não coincidente de S1 e S2).

Segundo a Hipótese da redução-do-atraso, o estímulo S2 adquiriria um valor de reforçador condicionado mais forte, se comparado com S1, uma vez que estaria sinalizando uma maior redução no atraso do reforço, ou seja, sinalizaria maior proximidade em relação ao reforço incondicionado.

No caso específico do procedimento em respostas de observação, quando a resposta produz o estímulo sinalizador do componente que libera maior frequência de reforços (S+), estaria ocorrendo uma diminuição, em relação ao estímulo anteriormente presente, no intervalo (médio) entre a até a sua apresentação e a liberação do reforço. Por outro lado, quando a resposta de

observação produz o estímulo sinalizador do componente em que ocorre menor frequência (ou frequência zero) de apresentação do reforçador incondicionado (S^-), estaria ocorrendo um aumento no intervalo (médio) até o próximo S^R . Isso significa que a resposta de observação seria mantida quando produz (e porque produz) S^+ e não quando produz S^- . Dinsmoor (1983) afirma que, na situação em que produz tanto S^+ quanto S^- (dependendo do componente em vigor no misto), a resposta se mantém porque produz S^+ , ainda que intermitentemente. Nas condições experimentais em que a resposta de observação produz apenas S^- , ela não se manteria, segundo o modelo de redução do atraso.

A Hipótese da redução-da-incerteza sustenta que o valor reforçador condicionado de um estímulo depende do quanto ele informa sobre a disponibilidade ou sobre a ausência do reforçador incondicionado (Berlyne, 1957; Hendry, 1969; Hendry, 1983). Considerem-se, por exemplo, dois estímulos, $S1$ e $S2$, sendo apresentados imediatamente antes do reforçador incondicionado, como ilustra a figura a seguir (Nevin, 1973).

Esquema exemplificando, em dois casos distintos, o estabelecimento de dois estímulos neutros, $S1$ e $S2$, como reforçadores condicionados, segundo a Hipótese da redução-da-incerteza.

Segundo a Hipótese da redução-da-incerteza, o estímulo neutro S1 deveria adquirir propriedades reforçadoras condicionadas em ambos os casos. No Caso 1, S2 é redundante, já que a informação acerca do reforço incondicionado já teria sido fornecida pelo estímulo S1. No Caso 2, S2 não seria um preditor confiável da chegada do reforçador incondicionado; nem todas as vezes que é apresentado, ele estaria informando sobre a chegada do reforço. Segundo esta hipótese, um estímulo é informativo e, portanto, deverá adquirir valor reforçador condicionado, dependendo de quanto ele prediz sobre a probabilidade de ocorrência do reforçador incondicionado.

Em relação ao procedimento de resposta de observação, de acordo com a Hipótese da redução-da-incerteza, S- seria, também, capaz de manter as respostas que o produzem, uma vez que qualquer estímulo informativo, independentemente de informar sobre maior ou menor probabilidade de reforçamento, seria um reforçador condicionado. É importante notar, portanto, que em relação à produção do estímulo que sinaliza a maior probabilidade de reforçamento (S+), as Hipóteses da redução-do-atraso e redução-da-incerteza prevêm, igualmente, que esse estímulo deva adquirir propriedades reforçadoras condicionada. As divergências surgem, no entanto, na previsão em relação à produção do estímulo que sinaliza a menor probabilidade de reforçamento (S-).

Anexo 3 - Complemento da Figura 3-1: Frequência acumulada de produção de S+ (quadrados vermelhos) e de S- (quadrados verdes) ao longo de intervalos de 5 s nas tentativas. Os dados mostrados referem-se à média das 5 últimas sessões das Fases 1 e 3 nas quais ambos os estímulos sinalizadores eram produzidos em esquema de VI 15 s. Nesta figura são apresentados os dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36 excluídos da Figura 3-1, Experimento 1.

Anexo 4 - Complemento da Figura 4-1: Distribuição de respostas na presença do estímulo do esquema misto ao longo de intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (1º bloco de 11 intervalos, colunas vermelhas) e TS- (2º bloco, colunas verdes). Os dados referem-se à média das 5 últimas sessões das Fases 1 e 3 em que S+ e S- eram produzidos em VI 15 s. Nesta figura, são mostrados os dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36, excluídos da Figura 4-1, Experimento 1.

Anexo 5 - Complemento da Figura 7 - Painel A: Distribuição de respostas ao disco, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ (colunas vermelhas, 1º conjunto de 11 intervalos) e TS- (colunas verdes, 2º conjunto). Este painel refere-se à Condição PS (Fases 1 e 3) e mostra os dados dos Pombos 31, 34, 35 e 36. Os dados mostrados foram calculados a partir da média nas 5 últimas sessões de cada fase.

Anexo 6-1: Frequência de produção de S+ e S- em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS-, separadamente, para todos os 6 sujeitos, em média nas 5 últimas sessões de todas as 4 fases do Experimento 1.

Suj	F	Produção de estímulos																							
		TS+												TS-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
P27	1	4.2	1.8	3.4	2.2	0.4	0.6	1	2.2	0	0	0	16	3.4	2.6	2.6	4	0.2	0	0.6	2.6	0	0	0	16
	2a	0.4	0.8	1.8	2.2	1	1.2	0.4	1.2	0.4	1	1	11.4	1.2	1.8	1.4	1.8	0.8	0.4	0.2	1	0.6	0	0.4	9.6
	2b	0	0	1.2	0.8	1.2	1.2	0.8	0.2	0.4	0.2	0.6	6.6	1.6	2.2	0.6	2.8	0.2	0	0.8	2	0.2	1.4	0.2	12
	3	3	2.4	4.2	3.2	0	0	0.4	2.6	0.2	0	0	16	2.6	4.2	1.8	3.8	0.2	0	0	3.4	0	0	0	16
	4a	7	1.8	3	1.8	0.4	0	0.4	0.6	0.4	0	0.2	15.6	0	0	1	0.2	1.8	1.6	2.2	1.6	0.8	0.8	3	13
P31	4b	9	1.2	2	1	0.2	0	0.4	1.4	0.4	0.2	0	15.8	0	0	0	0.4	1.4	1.2	1.6	1.6	2.6	1.2	4.4	14.4
	1	5.4	2	3	3	0	0.2	0	2.4	0	0	0	16	3.4	3.2	2.6	3.8	0	0.2	0	2.8	0	0	0	16
	2a	0.4	1.8	4	2.8	2.2	0.4	0.2	0.8	1.6	0.6	0	14.8	1.8	3.2	3.2	3.8	0.6	0.2	0	1.8	0.6	0	0	15.2
	2b	0	0	2.6	3.6	2.8	2.6	0.2	0	0	2.8	0.4	15	2.8	3	2.6	3.4	0	0.2	0.2	3	0.2	0	0	15.4
	3	4.4	1.8	4.4	2	0.2	0	0.2	2.8	0	0	0	15.8	2.8	3.4	2.2	4	0.2	0	0	3.4	0	0	0	16
P34	4a	8.4	2.4	1.8	0.4	0	0	0.4	1.8	0	0	0	15.2	0	0.2	1.6	3.8	4	3.2	0.2	0	1	2	0	16
	4b	9.6	2.4	2	0.2	0	0	1.4	0.4	0	0	0	16	0	0	0	1.6	3.8	4.2	2.6	0.6	0.2	1	2	16
	1	3.8	2.2	3.6	3.2	0	0	0.2	3	0	0	0	16	2.6	3.4	2.2	3.8	0.2	0	0.4	3.4	0	0	0	16
	2a	0	1	2	3.2	2.4	1.6	0.8	0	0.2	0.8	0	12	2.2	2.8	2.6	3.4	0.6	0	0.2	1.6	0	0	0.2	13.6
	2b	0	0	0.6	2.2	2.6	1.4	2.8	0.6	0	0	1.6	11.8	3	3.4	1.8	2.2	0	0.6	0.2	1.8	0	0	0.2	13.2
P35	3	4	2.6	3.2	2.2	0.4	0	0.4	2	0	0	0	14.8	3.4	3	2.4	4	0	0	0	2.2	0.2	0.2	0	15.4
	4a	6.8	2.8	3.2	1	0	0	0.4	1.6	0.2	0	0	16	0	0	1.2	1.8	2.2	3.4	1.6	0.8	1.2	1.4	1.6	15.2
	4b	9.2	1	2.8	1	0	0	0.4	1.6	0	0	0	16	0	0	0	1.4	1.8	3	2.4	2	1	1	2.4	15
	1	1.8	3	2.8	3.8	0.8	0.2	0	2.8	0.2	0.2	0	15.6	2.6	2.2	3.8	2.6	0.4	0.4	0.8	1.4	1.4	0.2	0	15.8
	2a	2.2	2.2	3.6	2.8	0.4	0	0.6	2	0.2	0	0	14	0	0.6	3	2.4	2	1.2	1.4	0.4	0.6	1.2	0.6	13.4
P36	2b	2.2	3.8	3.8	3.4	0	0	0.4	1.8	0.4	0.2	0	16	0	0.8	0.6	2	2.8	2.8	1.2	1.2	0.8	0.8	1.2	14.2
	3	3.4	3.4	3.6	2.6	0	0	0.2	2.6	0.2	0	0	16	2.4	4	2.2	3.8	0.4	0	0	2.6	0.6	0	0	16
	4a	0	3	4	2	2	0.8	0.2	0.4	0.4	0	0	12.8	2.4	2.2	2.8	3.6	0.4	0.2	0	1.8	0.8	0.6	0.6	15.4
	4b	0	0	0.2	1.8	1.8	1.6	0.6	0.4	0.8	0.6	0.2	8	1.2	2.8	2.6	3.4	0.8	0.8	0.2	0.8	2.8	0.2	0	15.6
	1	2.8	2.8	2.6	3.4	0.6	0	0	2.8	0.6	0	0	15.6	5	2	2.8	2.4	0.4	0	0.6	1.8	1	0	0	16
P37	2a	7.2	1	1.6	2.2	0	0	0.4	1.2	0	0	0	13.6	0	4	2	2.6	3.2	1.6	0	0	1.6	1	0	16
	2b	2.6	2.8	2.6	3.2	0	0.2	0.2	2.6	0.2	0.2	0	14.6	0	0.2	1.6	2.6	4.2	1.8	2	0	0.4	0.8	1.2	14.8
	3	5.2	1.6	4.2	1.4	0	0	0.4	2.2	0.2	0	0	15.2	3.6	2.6	2.2	4.4	0	0	0	3	0.2	0	0	16
	4a	0	5.2	3	2	1.2	0.8	0	0	1.4	0.4	0.2	14.2	3.2	3.6	2.4	3.8	0	0	0	2.4	0.2	0.2	0	15.8
	4b	0	0.2	4.8	3.6	1	1	0	0.2	0.2	0.2	0	11.2	3.2	3.8	1.4	3.4	0.2	0.2	0	1.4	0.6	0.2	0	14.4
P37	1	4.2	2.8	1	1.4	0.2	0	0	0.6	0	0	0	10.2	5.6	2	1.6	0.6	0.6	0	0.2	0.2	0.2	0	0	11
	2a	8.4	0.6	1.6	1	0.2	0	0.2	1.4	0	0	0.2	13.6	0	0	0.2	1.4	1.8	2.4	1.2	1.4	1.4	0.6	1.2	11.6
	2b	3.8	3.2	3.4	2.4	0.2	0	0	2.8	0.2	0	0	16	0	0.2	0.2	0.6	0.2	0.8	2	1.4	1.8	1	3	11.2
	3	3.8	2.8	3.2	2.4	0.8	0	0	1.2	0.6	0.2	0	15	3.4	2.8	2.4	3.4	0.8	0.2	0	1.4	1.2	0	0	15.6
	4a	0	1	1.2	1	0.6	0.2	0.2	0	0	0	0	4.2	4.4	1.8	2.6	1.2	0.2	0	0	0	0	0	0	10.2
P37	4b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4	2.4	1	1.4	0	0	0	0.2	0	0	0	7.4

Anexo 6-2: Frequência de respostas nas tentativas TS+ e TS-, na presença do estímulo do esquema misto, em intervalos de 5 s, para todos os 6 sujeitos, em média nas 5 últimas sessões de todas as 4 fases do Experimento 1.

Suj	F	Respostas na presença do estímulo do esquema misto																							
		TS+											TS-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
P27	1	74.2	62.6	44.2	26.8	14.8	14.2	13	9	2.4	1.6	0	262.8	85.8	72.8	45.4	27.4	13.4	15.4	15.2	8.2	0	0	0	283.6
	2a	14	33.6	39.6	34.6	23.8	22	19	14.2	11.4	10	6.4	228.6	13.4	24.2	20.6	16.8	13.4	10.2	9.6	5.2	2.4	1.8	6.6	124.2
	2b	20.8	28.4	35	32.4	29.6	19	13.6	11.2	7.8	8	17.2	223	23.8	31.2	31.6	21.4	12.2	11.6	12.2	6	0.4	1.4	0.2	152
	3	52.2	60.6	54.8	30.6	19.8	19	18.2	9	0.2	0	0	264.4	49.6	61.4	53.4	36.4	22.4	23	22.2	12.4	0	0	0	280.8
	4a	37	26.2	22.8	11.2	5.4	5.8	5.8	2.6	0.4	0.2	0.2	117.6	58.2	65.4	59.8	60.6	49.4	42.4	39	30	25.2	17.4	31.6	479
4b	43.6	28.4	24.6	12.2	9.2	8.2	8	3.8	0.4	0.2	0	138.6	83.2	80.6	79.6	76.4	65.4	65.2	54.2	46	32.4	30	56.4	669.4	
P31	1	61.2	51.8	46.8	27.4	17.4	17.2	16.8	9	0	0	0	247.6	69.6	59.8	47.2	35.4	21.2	20.8	20	14	0	0	0	288
	2a	68	101.4	92.8	69.4	45.2	30.6	32.4	26	17.4	0.8	0.2	484.2	52.6	86.8	71.8	50.4	31.2	26	26.2	17.8	4.6	0	0	367.4
	2b	91.2	147.4	152.4	113.8	80.6	52.2	35	32.4	33.2	16.8	4.2	759.2	70.2	98	75.8	51.4	32.6	32.8	32.8	17.2	0.2	0	0	411
	3	87	81.2	68.8	37.6	30	29.6	29.2	9.6	0	0	0	373	82.6	96.4	77.6	54.4	34.6	33.2	31.6	19.6	0	0	0	430
	4a	49.8	35.2	28.4	21.2	20	20.8	19	4.8	0	0	0	199.2	67.8	93	111.6	99	74.2	39.6	27.6	25.4	24.6	8.6	0	571.4
4b	47.6	36	23.6	17	15.4	15.4	13.2	2.4	0	0	0	170.6	73.8	92.2	116.6	121.4	109.6	79.4	41.2	30.2	28.6	24.4	23.6	741	
P34	1	68.4	61	47.2	31.4	18.6	18.2	20	10.8	0.2	0	0	275.8	49.6	49.4	43.4	29.4	18.4	18.4	20.6	13	0	0	0	242.2
	2a	42.8	71.4	64	49.4	34.2	18.4	13	9	8.4	2	0	312.6	23.6	37.4	28.8	19	12.8	13	13.6	9	0	0	0	157.2
	2b	61.4	94.4	90.2	75.8	56.6	40.6	23	15.6	14	10.2	9	490.8	37.4	44.6	35.8	20	12.6	12.8	13.4	5.8	0	0	0	182.4
	3	64.4	63	48.6	25.2	16.4	18.8	18.4	6.4	0	0	0	261.2	60.6	70.6	46	33	17.6	18	16.8	12.6	0.6	0.2	0	276
	4a	49	32.2	25.2	14.8	9.4	10.8	10.6	4.6	0.2	0	0	156.8	59.2	73	75.6	68.2	62	41.2	28	25.8	22	14	8.8	477.8
4b	59.25	72.45	62.5	45.45	31.5	24	18.6	10.5	5.65	3.05	2.25	335.1	42.8	50.5	38.5	25.35	15.35	15.55	16.1	10.1	0.15	0.05	0	214.5	
P35	1	26.8	56.6	47.2	27	22	23.4	20.2	10	2.2	1.2	0	236.6	29.2	54.2	49.8	37.8	25.2	22	25.8	13.6	0.2	0	0	257.8
	2a	28.6	51.8	54.2	33.2	21.8	17.4	15.2	7	0.2	0	0	229.4	28.8	78.6	71.8	54.2	37.8	31.4	20.8	17.8	16.2	5.6	3.4	366.4
	2b	43	74.8	53.4	25.8	17.8	14.6	12	5.6	0.4	0.2	0	247.6	50.4	101.8	95	96.2	77	56.4	27.4	24.4	15.2	14	15.2	573
	3	48.2	55.4	44.4	24.4	18	16.4	18.2	8.4	0.2	0	0	233.6	46.2	64.4	46.4	34.2	21.8	18.2	18	11.8	0.6	0	0	261.6
	4a	35.8	102.4	76.4	48.6	25.6	13	10.2	4.8	2.4	2	2.4	323.6	19.2	65.4	58.2	36	25.4	20.4	24.4	11.2	0.8	0.4	0	261.4
4b	17	54	67.2	71	46.6	36.6	16.8	15.8	9.4	5.8	3.4	343.6	7.8	28	24.8	17.6	10.2	8.6	4.2	2.2	2.6	0.2	0	106.2	
P36	1	63	43	33.8	21	11.2	15	13.6	5	0.6	0	0	206.2	85	61.2	42.2	29.4	15.4	17	16	8.6	0.6	0	0	275.4
	2a	76.2	58.8	39.4	23.4	15.4	15.6	18	4.2	0	0	0	251	127	119	90	73.4	55.8	32	27.2	26.8	22.2	3.2	0	576.6
	2b	26.25	30.1	23.2	15.05	9	9.75	10.25	4.15	1.4	0.95	0.75	130.9	31.6	35.2	26.45	19.1	13.05	12.6	10.9	6	1.35	1	1	158.2
	3	109.4	81.8	54	30.4	25	22.6	22	9	0.2	0	0	354.4	120.2	93.4	66	43	26	25	28.2	16.2	0.2	0	0	418.2
	4a	105.6	125	70.2	46	27.2	18	15.8	15.2	9	2.8	0.4	435.2	104	118.6	82	48.8	27.8	25.6	25.2	13.8	0.2	0.2	0	446.2
4b	59.6	121.4	113.8	57.4	30.4	19.6	14.4	10.2	5	1	0.6	433.4	50	72	58	34.2	22	21.4	14.4	6.6	0.6	0.2	0	279.4	
P37	1	26.8	8.6	5.8	6.6	1.6	5.4	2.2	0.4	0	0	0	57.4	31.4	19	7.8	4.4	1.4	1.8	0.6	0.6	0	0	0	67
	2a	36	20.2	11.4	6	5.4	5.4	4.4	2.2	0	0	0	91	55.2	52	50.6	41	37.2	31.8	20.8	20.6	14	12	12.6	347.8
	2b	71.8	43	24	15.2	7.8	10.4	6.6	5.2	0.2	0	0	184.2	66.8	61.2	48.2	44.8	42.4	40.8	37.2	29.6	26	19.4	29.8	446.2
	3	56.4	42.6	29	11.6	7.2	6.2	5	3.8	0.6	0.2	0	162.6	50.6	34	21.6	13.8	7	6.8	5.8	4.6	1.2	0	0	145.4
	4a	36.8	47	28.6	19.2	11.2	5.2	1	0.6	0.2	0.2	0	150	24.4	23.4	12.6	5	0.4	0	0	0	0	0	0	65.8
4b	9.6	15.8	15	8.4	2.8	1.6	0.4	0	0	0.2	0	53.8	6.4	5.8	3.2	1.4	0	0	0	0	0.2	0	0	17	

Anexo 6-3: Frequência média de produção de S+ e de S- e frequência de respostas nas tentativas TS+ e TS- (na presença do estímulo do esquema misto), em quartos de sessões em todas as fases do Experimento 1, para todos os 6 sujeitos.

Fase	Qt	Pombo 27				Pombo 31				Pombo 34				Pombo 35				Pombo 36				Pombo 37			
		S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-	S+	S-	TS+	TS-
1	1º	16.0	16.0	309.5	310.0	16.0	16.0	431.6	417.4	16.0	16.0	228.3	211.3	15.2	15.0	251.3	258.8	13.4	15.2	315.8	365.8	7.8	8.2	26.0	25.2
	2º	16.0	16.0	356.5	346.8	16.0	16.0	385.3	420.0	16.0	16.0	266.8	265.5	15.4	15.4	324.4	244.4	14.2	14.8	291.4	322.4	10.6	11.0	63.4	74.8
	3º	16.0	16.0	347.8	356.5	15.8	15.8	296.5	302.0	16.0	16.0	260.8	229.3	14.8	15.2	195.8	185.6	15.4	15.0	203.0	263.4	10.5	12.3	67.3	81.0
	4º	15.8	16.0	240.8	267.3	16.0	16.0	259.5	239.8	16.0	16.0	267.3	243.5	15.6	15.8	236.6	257.8	15.5	16.0	221.8	263.8	9.8	10.0	57.8	59.5
2a	1º	15.6	16.0	500.2	280.9	15.8	15.9	574.0	410.2	15.7	16.6	422.2	228.0	15.8	14.9	302.5	460.1	15.1	14.8	373.4	505.9	10.1	9.6	83.9	188.3
	2º	11.9	14.8	369.1	193.5	15.7	16.0	603.4	337.1	14.4	15.8	425.0	215.1	14.3	9.3	179.0	328.6	15.6	15.9	413.0	610.9	14.1	9.9	163.4	275.1
	3º	12.6	14.5	352.9	190.9	15.6	16.0	491.8	336.5	15.4	16.1	436.3	262.4	16.0	16.5	328.8	616.6	15.6	15.8	352.5	718.8	14.6	10.4	142.7	314.0
	4º	11.5	10.4	252.0	128.5	14.6	15.3	509.9	329.5	12.5	14.0	330.6	166.6	13.5	12.9	201.8	360.3	13.1	16.0	265.9	605.7	14.1	11.6	101.4	344.7
2b	1º	6.2	9.0	231.6	108.4	13.5	15.3	575.8	340.8	11.8	17.8	481.8	230.5	15.8	10.3	198.8	446.5	14.8	12.3	297.3	595.0	15.8	6.5	170.5	373.8
	2º	6.8	9.5	224.8	143.3	12.3	13.0	587.0	313.5	12.3	15.0	470.8	253.0	16.0	15.5	332.3	593.0	14.3	10.5	221.0	507.8	15.0	6.5	160.0	365.5
	3º	6.3	9.8	249.5	151.3	14.0	14.7	654.0	383.7	14.8	16.5	628.0	274.5	16.0	12.7	243.7	558.3	14.8	13.0	318.3	589.8	16.0	7.5	143.0	403.8
	4º	6.8	12.3	236.5	178.3	15.7	15.7	796.0	427.3	11.5	12.5	488.8	179.0	16.0	15.0	255.7	578.7	14.5	14.8	389.5	676.8	16.0	13.3	205.0	466.7
3	1º	15.0	16.0	216.0	274.7	16.0	15.7	448.0	417.3	14.3	15.3	275.0	265.7	15.3	16.0	264.7	235.3	14.0	16.0	339.7	417.0	15.3	16.0	287.0	212.7
	2º	16.0	16.0	323.7	337.3	16.0	16.0	460.7	515.7	16.0	16.0	322.7	293.7	16.0	15.7	205.0	203.0	16.0	16.0	378.3	441.0	15.7	15.7	210.3	202.0
	3º	16.0	16.0	271.3	276.0	15.7	16.0	396.7	479.0	14.7	15.3	278.0	265.0	16.0	16.0	244.0	292.7	15.0	16.0	360.3	382.7	15.7	15.7	165.3	146.7
	4º	16.0	16.0	254.0	288.0	16.0	16.0	337.5	336.5	15.0	15.5	236.0	292.5	16.0	16.0	218.0	215.0	15.5	16.0	345.5	471.5	14.0	15.5	158.5	143.5
4a	1º	14.8	12.3	112.0	374.8	16.0	15.8	281.0	596.5	15.8	15.5	216.5	461.0	15.5	14.8	360.3	308.5	13.8	16.0	542.3	424.3	3.0	12.3	177.3	79.3
	2º	14.3	7.8	81.8	248.8	16.0	16.0	208.5	542.0	16.0	15.5	228.3	510.5	14.5	15.8	370.8	279.8	13.3	15.8	431.3	377.0	1.8	10.5	95.0	62.5
	3º	15.5	13.3	125.0	481.3	16.0	15.8	200.3	612.8	16.0	15.8	166.5	509.3	14.0	15.3	359.3	338.8	13.8	14.8	412.3	337.3	3.0	10.5	134.8	67.3
	4º	15.5	12.3	118.0	454.3	14.7	16.0	178.0	533.3	16.0	15.0	156.0	469.0	12.5	15.5	311.3	253.8	13.8	16.0	448.5	473.5	5.0	10.8	157.3	75.3
4b	1º	15.8	9.8	110.5	465.5	16.0	16.0	190.3	692.0	16.0	12.5	125.5	494.5	10.8	15.5	396.5	204.3	14.0	16.0	610.0	451.0	0.5	10.0	97.0	46.8
	2º	14.0	6.3	62.3	338.8	15.3	16.0	185.0	739.8	15.8	12.8	167.8	611.8	12.0	16.0	437.0	186.5	12.5	15.8	515.8	373.8	0.3	7.8	81.5	30.5
	3º	16.0	14.0	135.3	645.0	16.0	16.0	194.0	768.8	16.0	14.8	196.0	723.5	10.8	15.8	390.0	134.5	12.3	14.0	412.7	312.3	0.3	9.3	74.3	30.3
	4º	15.7	14.7	130.0	659.0	16.0	16.0	157.0	716.0	16.0	15.3	187.3	724.3	7.0	15.7	322.0	91.7	10.7	14.3	457.3	251.7	0.0	7.0	60.0	17.7

Anexo 7-1: Frequência de produção de S+ e S-, em intervalos de 5 s nas tentativas, durante a 1ª exposição do esquema misto, para todos os 8 sujeitos, em todas as condições do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Produção de S+ e S- (1ª apresentação na tentativa)																							
			tentativas TS+											tentativas TS-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-
P27	1	PS	5.2	0.8	3.8	2.6	0.2	0	0	2.6	0.2	0.2	0.2	15.8	3.2	3.4	2.4	3.6	0	0	0	3.4	0	0	0	16
	2	PM	6.4	2.4	2.6	2	0.4	0.8	0.2	1.2	0	0	0	16	3.8	4.6	4.6	2.6	0.2	0	0	0.2	0	0	0	16
	3	PS	4	1	3	3	0	0	0	3	0	0	2	16	3	4	2	4	0	0	1	2	0	0	0	16
P31	1	PS	3.8	1.4	4.2	3.4	0	0	0	2.8	0.2	0	0	15.8	2.2	3.8	2.4	4.4	0	0	0	3.2	0	0	0	16
	2	PM	10.4	1.8	1.6	0.8	0.6	0	0.4	0.4	0	0	0	16	2.6	5.6	5	2.4	0	0.2	0.2	0	0	0	0	16
	3	PS	2	3	3	3	0	0	0	3	0	0	2	16	4	3	3	4	0	0	0	2	0	0	0	16
P34	1	PS	3.6	1	3.8	3.6	0.2	0	0	2.8	0.8	0	0	15.8	2.6	3.2	2.4	3.4	0.4	0	0	3	0.6	0.2	0.2	16
	2	PM	9.2	2.8	3.4	0.4	0	0	0.2	0	0	0	0	16	3.2	4.8	3.2	3	0.2	0	0.2	1.2	0	0	0	15.8
	3	PS	4	2	3.5	3.5	0	0	0	3	0	0	0	16	2.5	4	2	4	0	0	0	3.5	0	0	0	16
P35	1	PS	3.8	1.4	4.4	3.2	0.2	0	0	2.4	0.4	0	0.2	16	2.6	3.4	2.6	3.6	0.4	0	0	2.8	0.4	0	0	15.8
	2	PM	5.4	3.6	2	1.2	1	0.6	1.8	0	0	0	0.2	15.8	2.4	3.6	5	2.6	0.4	0.2	0.2	1	0	0.2	0	15.6
	3	PS	1.5	3	3.25	3.75	0.75	0.25	0	2.75	0.25	0.25	0	15.75	4.5	2.75	2.5	2	0.25	0.5	0.75	1	0.75	0.5	0.5	16
P36	1	PS	3.8	1.4	3.4	2.6	0.6	0.2	0.2	3.2	0.4	0	0	15.8	2.8	3.2	2.6	3.6	0	0.2	0	3	0.6	0	0	16
	2	PM	11.4	0.6	1.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0	0	0	15	2.8	4.4	3.8	2.2	0.2	0.4	0.2	0.8	0	0	0	14.8
	3	PS	3	3.33	2.33	3	0.67	0	0	2.67	0	0	0	15	7.667	1	2.33	1.67	0	0	0.67	0.67	0.33	0	1.33	15.67
P37	1	PS	4.6	0.4	1.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	6.4	5.8	1	1	0.8	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	9.2
	2	PM	5.2	1.8	0.6	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	8.2	5.8	1.6	0.4	0	0.4	0.2	0	0	0	0	0	8.4
	3	PS	4.5	2.75	0.75	1.25	0	0	0	0.5	0	0	0	9.75	5.75	1	1.25	0.5	0.5	0	0	0.25	0	0	0.75	10
P63	0	PS	15.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.8	15.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	15.6
	1	PS	3.8	2.6	3	2.4	0.4	0.2	0	2	0.4	0.2	0	15	4	1.6	3.4	2.8	0.4	0	0	2.6	0.2	0	0	15
	2	PM	12.8	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	13.4	9.6	0.8	0.6	1.4	0.6	0	0.2	0	0.4	0.2	0	13.8
	3	PS	9.8	1.6	1.4	1.6	0.2	0	0.4	1	0	0	0	16	3.2	2.4	4.2	3	0	0	0	2.4	0.2	0	0	15.4
	4	PM	11	0.4	0.4	0.6	0	0.4	0	0.2	0	0.2	0	13.2	8.4	0.6	1.2	1.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0	0	0	12.6
P64	5	PS	5.4	3	2	1.2	0.2	0.2	0	2	0.6	0.2	0	14.8	2.8	1.8	2.4	3.6	0.6	0.6	0.4	2.4	0.4	0.2	0	15.2
	0	PS	9	1.8	0.8	0.6	0.2	0.6	0.2	0	0.2	0	0	13.4	9.4	1.4	0.2	0.2	0.4	0	0	0.4	0.2	0.2	0	12.4
	1	PS	6.2	1.2	3	2.2	0.4	0.2	0	1.4	0.4	0.2	0.2	15.4	1.8	2.6	3.6	3.6	0.2	0.2	0.6	2.4	0	0.2	0	15.2
	2	PM	11.6	1.2	0.4	1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0	0	15.8	5.8	1.8	3.2	1.4	0.6	0.4	1	0.4	0.2	0	0.4	15.2
	3	PS	8.6	1.4	2.6	0.6	0	0	0.6	0.6	0.2	0.2	0	14.8	2.8	2.2	3.4	2.8	0.2	0	0.2	3.4	0.4	0.2	0	15.6
	4	PM	10.8	1.6	1.6	1	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	15.8	6	2	2.4	2.2	0.8	0.4	0.4	1.2	0	0	0	15.4
	5	PM	10.4	0.8	1.2	1.4	0	0.2	0.2	0.4	0.6	0	0	15.2	2.4	2.6	4	3.2	0.2	0.2	0.4	3	0	0	0	16

Anexo 7-2: Frequência de respostas, em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS-, na 1ª apresentação dos estímulos sinalizadores, para todos os 8 sujeitos, em todas as condições do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Respostas ao disco na 1ª exposição do estímulo do esquema misto																							
			tentativas TS+											tentativas TS-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-
P27	1	PS	96.4	68.2	46.2	27.2	16.4	16.2	18.4	12	0.2	0.2	0.4	301.8	95	71	49.8	31.8	18.8	18.2	19.2	13	0	0	0.2	317
	2	PM	65.8	43	21.6	15.4	11.2	9.6	5.4	4	0	0	0	176	68.8	46.8	20.2	7.8	2.4	0.2	0.4	0.6	0	0	0	147.2
	3	PS	87	63	48	31	14	14	17	11	0	0	0	285	105	71	45	29	8	13	13	7	0	0	0	291
P31	1	PS	92	86	64	42.6	26.8	26.2	25.8	15.2	0.2	0	0	378.8	86.2	94.6	71.8	45.6	29	27.8	27.4	17.2	0	0	0	399.6
	2	PM	56	36.6	25	18	11	8	5.8	3	0	0	0.2	163.6	86.4	70	32	13	4.2	2.2	1.6	0	0	0	0.2	209.6
	3	PS	90	78	61	37	21	22	19	12	0	0	0	340	78	72	54	36	18	16	18	12	0	0	0	304
P34	1	PS	54.2	60	31.6	27.3	16.4	17.2	15.8	12	0.8	0	0.2	236	51.2	53.2	40	34.6	16.2	16.8	16.4	9.2	0.4	0.2	0	238.2
	2	PM	27.2	25.2	13.2	3	0.8	0.8	0.2	0	0	0	0	70.4	37	45.4	30.4	17.4	7.6	6.4	6.2	3.2	0	0	0	153.6
	3	PS	68.5	57	49.5	32	19.5	18.5	17.5	12	0	0	0	274.5	53.5	50.5	53	35	21	21	23.5	15.5	0	0	0	273
P35	1	PS	40.8	59.4	40	30.2	21.4	21.6	19.2	16	0.4	0	0.2	249.2	43	58	47.4	30.4	23.4	21.2	19.8	14.6	0.4	0	0	258.2
	2	PM	23.2	32.2	28.8	22.6	14.2	11	4	0	0	0	0	136	26.6	39	29	13.4	8.8	8.6	9.8	3	0	0.2	0	138.4
	3	PS	20.75	43	38.3	22.5	19.5	23	17	8.75	2.5	1.75	0.5	197.5	26.5	64	53.3	42.5	26.8	19.5	25	16.5	0.25	0.25	0	274.5
P36	1	PS	84.2	65.2	49.8	30.4	20.2	21.2	19.8	14.2	0.4	0	0	305.4	90.6	73.6	48.4	28.6	21.8	21	19.2	12.8	0.6	0	0	316.6
	2	PM	37	20.8	12.2	9.8	6.8	6	5.8	2.6	0	0	0	101	71.2	49.2	25.6	15.2	7	8	6	4.8	0	0	0	187
	3	PS	52	33.7	25.7	17.3	10.3	14.7	12.7	3.67	0.33	0	0	170.33	94.33	61.7	42.3	30	18	18.3	19	12	0	0	0	295.7
P37	1	PS	25.2	13.2	8.6	1.6	1.6	0.2	0.6	0	0	0.2	0	51.2	44.2	18.4	10.2	3.6	0.6	0.2	1.8	0.4	0	0	0	79.4
	2	PM	6.2	1.8	0.6	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	9.2	12.8	3.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0	0	0	0	0	18
	3	PS	28	10.8	5.5	5	1.5	4.75	2	0.25	0	0	0	57.75	29.5	18	6	4	0.75	0.75	0	0.5	0	0	0	59.5
P63	0	PS	15.6	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.8	15.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	15.6
	1	PS	50.2	34.4	25	12.4	10	8.6	6.6	4	0.4	0.2	0	151.8	51	39.8	29.4	10.8	7.6	5.2	4	4.2	0.2	0	0	152.2
	2	PM	13.2	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	13.8	20.4	4.2	2	1.8	0.6	0.2	0.6	0	0.4	0.2	0	30.4
P64	3	PS	30	15.6	10.4	5.6	3.8	3.2	3.2	1.4	0	0	0	73.2	46.4	33.2	24.8	13.6	6.6	6.2	6.4	3.4	0.2	0	0	140.8
	4	PM	12.8	0.8	0.6	0.6	0	0.4	0	0.2	0	0.2	0	15.6	17	4.4	2.6	1.6	0.8	0.4	0.4	0.2	0	0	0	27.4
	5	PS	40.6	26.2	17.2	10.8	9.2	8.2	8	3	0.6	0.2	0	124	50.4	38.8	29.8	18.4	12.4	14	11.2	6.4	0.4	0.2	0	182
P64	0	PS	9	2	0.4	0.6	0.2	0.6	0.2	0	0.2	0	0	13.2	9.4	1.4	0.2	0.2	0.4	0	0	0.4	0.2	0	0	12.4
	1	PS	61.2	34.8	29.2	13.8	9.4	12.2	12	6	2.4	0.2	0.2	181.4	69.8	50.4	39.6	23.6	16.8	16.2	14.4	7.6	0	0.2	0	238.6
	2	PM	35.2	13	7.6	5.2	2.8	1.4	1.4	0.8	0.2	0	0	67.6	55.8	25.4	14.4	8.2	4.4	3.6	2.6	1	0.2	0	0	115.6
	3	PS	52	38.4	26	9.4	6.2	7.6	7.2	2	0.2	0.2	0	149.2	99.2	67.4	47.6	30.2	23.4	19.2	18	8.2	0.4	0.2	0	313.8
	4	PM	25.4	9.8	5	2	1	1.4	0.2	0	0	0.2	0	45	54.2	37.4	24.8	11.6	10	5.6	4.8	1.6	0	0	0	150
	5	PM	38	23.8	18.4	13.4	9	8.4	8	4.2	0.6	0	0	123.8	106.8	87.8	60.6	29.8	21.2	20.2	20.4	9	0	0	0	355.8

Anexo 7-3: Frequência de representações de S+ e S- em intervalos de 5 s nas tentativas, para todos os 8 sujeitos na Condição PM do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Reapresentações de S+ e S-																								
			tentativas TS+											tentativas TS-													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-	
P27	2		PM	0	0	1	0.8	1.4	2.2	1.8	2.2	2	2	3.2	16.6	0	0	0.4	3.8	2.6	2.8	1.2	2	0.6	2.6	9.4	25.4
P31	2		PM	0	0	0.8	2.4	1.6	2.8	1.6	0.8	0.2	1.6	1.4	13.2	0	0	0	3	1.8	3.2	1	2.4	0.6	1.6	12.6	26.2
P34	2		PM	0	0	0	3	1	2.4	1	0.4	0.2	0.6	2.8	11.4	0	0	0	1.6	3.8	1.8	3.2	2	1.2	2.2	7.6	23.4
P35	2		PM	0	0	0.4	1.2	1.6	1.4	2.4	2.8	1.4	0.4	1	12.6	0	0	0	2.2	1.2	3	1.8	2.8	2	2.2	7	22.2
P36	2		PM	0	0	0.4	2.2	1.2	1	1	1	0.8	0.6	0.2	8.4	0	0	0.2	2.6	1.6	2.6	1.4	1.8	1	2.2	9.6	23
P37	2		PM	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.4	0.4	0.4	0.8	1.4	1.2	0.6	0.6	0.4	6.2
P63	2		PM	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0.8	1.6	1.4	1	1.8	0.4	0.8	0.8	8.6
	4		PM	0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0.4	0.6	1.2	1.6	0.8	1.2	0.8	1.2	0.4	8.2
P64	2		PM	0	0	2	2.4	1.4	2	1.8	0.6	1.6	1	1	13.8	0	0	0.8	1	1.2	2	2	2.2	2.4	1.6	3.6	16.8
	4		PM	0	0	1.4	1.6	3	1.6	1.2	0.4	0.2	0.2	0.6	10.2	0	0	0.2	1.2	1.6	1.8	2	2.4	1.8	1.6	4.4	17

Anexo 7-4: Frequência de respostas em intervalos de 5 s nas tentativas TS+ e TS-, na presença do estímulo do esquema misto, após a 1ª apresentação do estímulo sinalizador, para os 8 sujeitos, na Condição PM do Experimento 2.

Pombo	Fase	Cond	Respostas ao disco na presença do estímulo do esquema misto (após 1ª oportunidade)																							
			tentativas TS+											tentativas TS-												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TS-
P27	2	PM	0	0	10.2	14	18.2	15.8	10.2	12.4	13.6	12	13.2	119.6	0	0	9	17.2	22	24.4	39.8	46.2	51.2	44.4	134	388.6
P31	2	PM	0	0	21.4	45.6	49.2	41.4	27.8	28.2	23	19.4	15	271	0	0	2.4	21.8	29.4	32.4	52	70.4	78.8	91.6	271	649.8
P34	2	PM	0	0	10.6	34.6	33.8	26.4	16.8	16.4	15.2	11	10.2	175	0	0	4	21.2	32.4	29	30.6	39.8	40.2	50.6	132	379.8
P35	2	PM	0	0	5	14.6	16.4	20.4	11.2	9.2	6.2	2.2	2.4	87.6	0	0	0.2	5.4	10.6	18.2	31.8	33.8	41.2	37.6	147	325.8
P36	2	PM	0	0	11.8	8.6	5.8	4	4.8	2.8	1.6	1.8	0.8	42	0	0	5.6	21	22.2	36.6	50.8	55.8	62.8	64	179	497.4
P37	2	PM	0	0	0.6	0.8	0.4	0.2	0	0	0	0	0	2	0	0	3.2	8.2	4.6	4.4	5.6	2.8	2	3.2	4	38
P63	2	PM	0	0	0.4	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0.8	0	0	4.8	3.4	4.6	3.2	5.6	4.2	3.2	3.6	2.6	35.2
	4	PM	0	0	1.4	0.8	0.4	0	0	0	0	0	0	2.6	0	0	8.8	6.4	6.6	5	3.8	4.4	2	4.2	3.4	44.6
P64	2	PM	0	0	12	12	6.8	4.2	3.8	3.6	2.4	1.8	1	47.6	0	0	19.4	19.6	23.8	30.4	28.2	26.6	27	30.8	32.6	238.4
	4	PM	0	0	21.6	19.6	11.8	8.8	4	2.2	2.6	2.8	1.2	74.6	0	0	10.6	18	25.8	27.6	30	27.4	23.4	26.8	39	228.6

Anexo 7-5: Frequência média de produção de S+ e S- e número de respostas nas tentativas TS+ e TS- em blocos de 5 sessões (BI), em todas as fases (F) do Experimento 2, para todos os 8 sujeitos (P). Os dados apresentados estão separados em primeira (e única, nas Fases 1, 3 e 5) apresentação do estímulo do esquema misto (1ª ap.) e apresentações posteriores (p).

Pb	F	BI	S+ 1ª	S- 1ª	TS+ 1ª	TS- 1ª	S+ p	S- p	TS+ p	TS- p	Pb	F	BI	S+ 1ª	S- 1ª	TS+ 1ª	TS- 1ª	S+ p	S- p	TS+ p	TS- p
27	1	1	15.7	16.0	301.0	356.2					34	1	1	11.8	13.2	135.4	128.6				
		2	15.8	16.0	329.8	338.0							2	15.8	15.8	265.4	274.4				
		3	16.0	16.0	309.6	328.8							3	15.8	15.6	251.2	262.6				
		4	15.8	16.0	301.8	317.0							4	15.8	16.0	236.0	238.2				
	2	1	16.0	16.0	152.4	153.2	15.4	24.0	180.8	400.6		2	1	16.0	16.0	83.3	123.5	10.5	17.8	148.0	381.5
		2	15.8	16.0	106.6	114.4	13.0	18.2	97.2	236.8			2	16.0	16.0	53.4	114.6	9.8	20.6	138.6	260.2
		3	16.0	16.0	176.0	147.2	16.6	25.4	119.6	388.6			3	16.0	15.8	70.4	153.6	11.4	23.4	175.0	379.8
	3	1	16.0	16.0	315.0	331.2						3	1	16.0	16.0	245.2	231.0				
		2	16.0	16.0	356.0	356.2							2	16.0	16.0	248.4	240.2				
		3	16.0	16.0	264.4	283.6							3	16.0	16.0	278.2	242.2				
31	1	1	15.8	15.7	281.2	278.5					35	1	1	13.3	13.8	113.5	127.5				
		2	16.0	15.8	319.8	312.3							2	14.8	15.6	223.2	190.4				
		3	16.0	16.0	388.0	345.8							3	15.8	16.0	198.0	189.8				
		4	15.8	16.0	378.8	399.6							4	16.0	15.8	249.2	258.2				
	2	1	16.0	16.0	136.0	212.0	11.4	27.8	224.8	698.6		2	1	15.3	15.3	98.8	145.3	11.5	18.8	132.3	318.3
		2	16.0	15.8	159.2	192.6	12.8	27.4	189.8	580.2			2	16.0	15.5	120.0	135.5	12.8	21.0	97.0	345.3
		3	16.0	16.0	163.6	209.6	13.2	26.2	271.0	649.8			3	15.8	15.6	136.0	138.4	12.6	22.2	87.6	325.8
	3	1	16.0	16.0	423.3	420.7						3	1	15.2	15.0	251.3	258.8				
		2	15.8	15.8	361.2	368.3							2	15.4	15.4	324.4	244.4				
		3	16.0	16.0	247.6	288.0							3	14.8	15.2	195.8	185.6				
													4	15.6	16.0	201.0	266.8				

Pb	F	BI	S+1 ^a	S-1 ^a	TS+1 ^a	TS-1 ^a	S+p	S-p	TS+p	TS-p
36	1	1	13.4	13.4	242.2	229.0				
	2		11.6	12.6	206.6	204.6				
	3		14.6	15.8	292.2	284.8				
	4		15.8	16.0	305.4	316.6				
	2	1	15.5	15.3	109.3	177.5	9.0	22.7	66.7	498.3
	2		14.8	14.7	98.7	177.8	9.0	22.3	54.0	469.8
	3	1	13.0	15.0	295.0	347.8				
	2		14.8	15.2	304.2	337.0				
	3		15.2	14.8	185.2	262.6				
37	1	1	7.0	7.2	41.0	49.2				
	2		9.0	9.0	50.8	59.0				
	3		9.0	10.2	53.0	63.0				
	4		6.4	9.2	51.2	79.4				
	2	1	10.3	8.8	13.0	34.5	0.5	7.8	6.0	61.5
	2		11.8	10.3	14.5	39.0	0.3	5.3	1.0	38.8
	3		8.2	8.4	9.2	18.0	0.2	6.2	2.0	38.0
	3	1	7.8	8.2	26.0	25.2				
	2		10.4	11.0	71.4	68.6				
	3		10.6	12.0	71.0	86.8				
	4		10.2	11.0	57.4	67.0				
63	1	1	9.7	9.8	49.8	50.0				
	2		13.2	13.8	94.8	124.6				
	3		15.0	15.0	151.8	173.2				
	2	1	13.5	13.0	24.3	57.2	3.5	12.0	18.2	98.7
	2		12.8	12.8	15.2	38.6	0.6	9.6	2.4	44.2
	3		13.2	13.2	13.6	23.6	0.2	6.8	0.6	24.0
	3	1	10.0	10.2	25.4	33.6				
	2		13.4	12.2	40.0	72.4				
	3		16.0	15.4	73.2	140.8				
	4	1	14.0	13.3	17.0	56.0	4.2	14.5	22.2	81.3
	2		14.0	13.7	22.3	30.3	3.2	8.8	11.3	48.2
	3		12.6	11.2	15.6	21.4	2.0	6.8	7.6	36.8
	4		13.2	12.6	15.6	27.4	0.6	8.2	2.6	44.6
	5	1	14.5	14.0	119.5	133.3				
	2		14.8	15.4	107.8	173.0				
	3		14.8	15.2	124.0	182.0				
64	1	1	15.3	15.5	269.8	287.3				
	2		16.0	16.0	264.2	284.0				
	3		15.4	15.2	181.4	238.6				
	2	1	15.3	15.0	64.7	108.7	12.7	17.2	45.3	193.2
	2		16.0	16.0	69.8	110.6	15.2	18.0	57.6	222.8
	3		15.4	14.4	62.0	99.4	12.0	14.6	43.4	198.8
	3	1	14.6	14.8	99.4	170.6				
	2		13.2	15.0	150.6	256.6				
	3		14.8	15.6	149.2	313.8				
	4	1	15.0	15.2	71.3	152.7	15.2	18.2	88.0	294.8
	2		14.2	14.3	105.7	115.5	13.2	14.7	86.5	220.2
	3		13.8	14.2	114.7	132.0	14.8	17.0	101.3	208.7
	4		15.8	15.4	45.0	150.0	10.2	17.0	74.6	228.6
	5	1	15.0	15.8	268.6	361.4				
	2		15.8	14.8	271.6	384.0				
	3		15.2	16.0	123.8	355.8				