Sumário

LISTA DE ABREVIATURAS	III
RESUMO	IV
SUMMARY	V
INTRODUÇÃO	1
OBJETIVOS	5
REVISÃO DA LITERATURA	7
HISTÓRICO DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA	8
CONSIDERAÇÕES GENÉTICAS	11
<i>O cromossomo Philadelphia</i>	11
<i>Anormalidades gênicas</i>	17
<i>Ativação das etapas de sinalização da tirosina quinase BCR-ABL</i>	19
<i>A biologia celular da leucemia mielóide crônica</i>	20
DIAGNÓSTICO	21
<i>Quadro clínico e laboratorial</i>	21
Fase crônica	21
Fase acelerada	24
Crise blástica	25
ESTUDO DE FATORES DE PROGNÓSTICO	27
TRATAMENTO DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA	29
<i>Histórico</i>	29
<i>Bussulfano e hydroxiurea</i>	31
<i>Interferon alfa</i>	32
<i>Interferon e cytarabina</i>	36
<i>Transplante de medula óssea alogênico</i>	38
<i>Mesilato de Imatinib-STI571</i>	39
Farmacodinâmica do mesilato de imatinib	41
Farmacocinética	42
Desenvolvimento do modelo clínico	43
Programa de Acesso Expandido	47
MÉTODOS	49
CASUÍSTICA	50
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	50
<i>Critérios para definição de fase crônica</i>	51
<i>Critérios para definição da fase acelerada</i>	52
<i>Critérios para definição da crise blástica</i>	53
METODOLOGIA	53
ENSAIO CLÍNICO E TRATAMENTO	53
<i>Evolução dos pacientes</i>	54
<i>Modificação da dose por efeitos colaterais</i>	54
Toxicidade hematológica	54
Toxicidade não hematológica definida pelo NIH-NCI	55
AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA	55
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA	58
OBTENÇÃO DO MATERIAL PARA ESTUDO DO CARIÓTIPO	58
<i>Preparação dos cromossomos</i>	59
Cultura celular	59

<u>Incubação com colchicina</u>	59
<u>Solução hipotônica</u>	60
<u>Fixação do material</u>	60
<u>Preparação da lâmina</u>	61
<u>Bandamento</u>	61
<u>Cariotipagem</u>	62
<u>METODOLOGIA ESTATÍSTICA</u>	62
<u>RESULTADOS</u>	63
<u>FASE CRÔNICA</u>	64
<u>Características da amostra</u>	64
<u>Avaliação da eficácia</u>	65
<u>Resposta hematológica completa</u>	66
<u>Resposta citogenética maior</u>	67
<u>Fatores de prognóstico para progressão hematológica</u>	68
<u>Fatores de prognóstico para resposta citogenética</u>	73
<u>Efeitos adversos mais comumente encontrados no estudo de fase crônica</u>	75
<u>Toxicidade hematológica</u>	75
<u>Toxicidade não hematológica</u>	76
<u>FASE ACELERADA</u>	78
<u>Característica da amostra</u>	78
<u>Avaliação da eficácia</u>	79
<u>Resposta hematológica completa</u>	79
<u>Resposta citogenética maior</u>	81
<u>Fatores de prognóstico para progressão hematológica</u>	82
<u>Fatores de prognóstico estudados para resposta citogenética na fase acelerada</u>	84
<u>Anormalidades cromossômicas adicionais encontradas no estudo</u>	86
<u>Efeitos adversos mais comumente encontrados no estudo de fase acelerada</u>	88
<u>Toxicidade hematológica</u>	88
<u>Toxicidade não hematológica</u>	89
<u>CRISE BLÁSTICA</u>	90
<u>Características da amostra</u>	90
<u>Avaliação da eficácia</u>	92
<u>Fatores de prognóstico</u>	93
<u>Efeitos adversos mais comumente encontrados no estudo de crise blástica</u>	93
<u>Toxicidade hematológica</u>	93
<u>Toxicidade não hematológica</u>	94
<u>DISCUSSÃO</u>	96
<u>AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA</u>	97
<u>Avaliação da eficácia</u>	97
<u>Fase crônica</u>	97
<u>Fase acelerada</u>	99
<u>Crise blástica</u>	99
<u>Fatores de prognóstico</u>	100
<u>Fase crônica</u>	100
<u>Fase acelerada</u>	103
<u>Avaliação da segurança</u>	105
<u>CONSIDERAÇÕES FINAIS</u>	107
<u>CONCLUSÕES</u>	109
<u>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</u>	111
<u>ANEXOS</u>	126

Lista de abreviaturas

- Ara-C - Cytarabina
- BU - Bussulfano
- FDA - Food and Drug Administration
- FISH - Hibridação in situ por fluorescência
- HLA - Antígenos leucocitários humanos
- HY - Hidroxiurea
- IFN- α - Interferon alfa
- ISCN - International System for Human Cytogenetics Nomenclature
- LMC - Leucemia mieloide crônica
- LSN - Limite superior da normalidade
- NCI-CTC - National Câncer Institute-Common Toxicity Criteria
- PCR - Reação em cadeia da polimerase
- Ph - Cromossomo philadelphia
- RCC - Resposta citogenética completa
- RCM - Resposta citogenética maior
- RCm - Resposta citogenética menor
- RHC - Resposta hematológica completa
- SLP - Sobrevida livre de progressão
- STI - Signal transduction inhibitor
- TMOalo - Transplante de medula óssea alogênico

Resumo

Mello, MCR. Avaliação da resposta clínica e citogenética em portadores de leucemia mielóide crônica, tratados com inibidor da tirosina quinase (imatinib). São Paulo, 2004. Tese de doutorado-Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A tirosina quinase BCR-ABL, uma proteína gerada pelo cromossomo Philadelphia, é responsável pela patogênese da leucemia mielóide crônica. O imatinib (STI571, Glivec) é um potente competidor seletivo inibidor desta proteína BCR-ABL. Com o objetivo de avaliarmos a eficácia e a segurança deste novo composto, foram tratados 112 pacientes com leucemia mielóide crônica na fase crônicas intolerantes ou refratários ao interferon alfa, na fase acelerada e na crise blástica, entre dezembro de 2000 e setembro de 2003, no Serviço de Hematologia da FMUSP. Dos 50 pacientes na fase crônica, a resposta hematológica completa foi observada em 98% e a resposta citogenética maior em 70%. A sobrevida livre de progressão hematológica em 18 meses foi atingida por 89% dos pacientes. Dos 44 pacientes na fase acelerada, a resposta hematológica completa foi observada em 93% e a resposta citogenética maior em 39%. A sobrevida livre de progressão hematológica em 18 meses foi atingida por 64% dos pacientes. Na análise multivariada, a resposta citogenética foi o único fator de prognóstico associado com menor probabilidade de progressão nas fases crônica e acelerada. Na crise blástica, 11% dos 18 pacientes estavam vivos com resposta hematológica e citogenética completa. Nas três fases, o imatinib foi bem tolerado com pouca toxicidade grau 3 ou 4. Apenas 2% pacientes descontinuaram por toxicidade relacionada ao tratamento.

Summary

Mello, MCR. Clinic and cytogenetic responses in chronic myeloid leukemia patients treated with inhibitor of tyrosine kinase (imatinib) São Paulo, 2004. Tese de doutorado-Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

The BCR-ABL tyrosine kinase, a product of the Philadelphia chromosome, is a protein with central role in the pathogenesis of chronic myelogenous leukemia. Imatinib (STI571, Glivec) is a potent and selective competitive inhibitor of the BCR-ABL protein tyrosine kinase. The purpose of this study was to analyze the efficacy and safety of this new compound. A total of 112 patients with chronic myelogenous leukemia in chronic phase who failed or were intolerant to interferon, accelerated phase and blastic crisis were treated with imatinib from December 2000 and September 2003, at the Department of Hematology of FMUSP. Among the 50 patients in chronic phase, complete hematologic response was observed in 98% and major cytogenetic response in 70%. The estimated rate of progression-free survival at 18 months was 89%. Among the 44 patients in accelerated phase, complete hematologic response was observed in 94% and major cytogenetic response in 39%. The estimated rate of progression-free survival at 18 months was 64%. According to the multivariate analyses, the major cytogenetic response was the only prognostic factor associated with less probability of progression in both, chronic and accelerated phase. Among the 18 patients in blastic crisis, 11% were alive with complete hematologic and cytogenetic response. Imatinib was well tolerated and toxic effects grade 3 or 4 were infrequent. Only 2% of patients discontinued treatment because of drug-related adverse event.

Introdução

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa clonal, responsável por 15% a 20% das leucemias, com uma incidência de um a dois casos em cada 100.000 habitantes. É caracterizada pela presença do cromossomo Philadelphia (Ph) em células primordiais e suas descendentes (Fardel et al., 1999). Essa anormalidade genética característica da LMC, o cromossomo Ph, resulta de uma translocação recíproca e equilibrada entre os braços longos dos cromossomos 9q34 e 22q11 (Nowell e Hungerford, 1960; Nowell e Hungerford, 1961; Rowley, 1973). A consequência molecular desta translocação é a geração de uma proteína híbrida BCR-ABL de 210-kD, com atividade tirosina-quinase aumentada, presente em todos os casos de LMC. A atividade da proteína BCR-ABL é necessária e suficiente para a atividade oncogênica da fase inicial da LMC (Daley et al., 1990; Pasternak et al., 1998; Fardel et al., 1999; Gordon et al., 1999; Goldman, 2004).

A doença evolui em três fases. Durante a fase crônica ocorre uma expansão clonal maciça de células mielóides, as quais mantêm a capacidade de diferenciação e que são bem controladas com terapias citorredutoras, como o bussulfano (BU) e a hidroxiureia (HY). Entretanto, com o passar do tempo, este clone perde essa capacidade, e a doença progride inexoravelmente para uma leucemia aguda denominada de crise blástica, incrivelmente resistente à terapia quimioterápica (Cortes et al., 1996; Fardel et al., 1999).

A terapia com interferon alfa (IFN- α) aumenta a sobrevida em até 2 anos, quando comparado à terapia com HY, e ainda pode reduzir o número de células Ph positivas, o que está claramente associado a uma maior sobrevida (Silver et al., 2003). Entretanto, mesmo quando associado à terapia com cytarabina (Ara-C), não foi observada remissão molecular, ou seja, a eliminação dos transcritos BCR-ABL detectados pela técnica da reação da polimerase em cadeia (PCR) (Kantarjian et al., 2003). Por isso, o transplante de medula óssea alogênico (TMOalo) tem sido considerado o único tratamento curativo para LMC. Provavelmente, 65% dos pacientes transplantados com medula de doador relacionado e completamente compatível vão ser curados. Entretanto, a toxicidade relacionada ao TMOalo e a alta mortalidade aumentam com a idade. Apenas 45% dos pacientes com LMC têm menos do que 60 anos ao diagnóstico. Destes pacientes, apenas 30% tem doador aparentado HLA compatível (Peggs et al., 2003).

O grande avanço no tratamento da LMC foi a introdução do mesilato de imatinib (Glivec[®], Basel, Suíça), um agente oral bem tolerado. O imatinib ocupa o local de ligação do ATP de várias moléculas de tirosina quinase e previne a fosfoliração de substratos que são envolvidos na regulação do ciclo celular (Druker et al., 1996; Deininger et al., 1997; Gambacorti-Passerini et al., 1997). Um maior conhecimento da atividade desses agentes contra a oncoproteína levou a estudos de fase I e II envolvendo pacientes com LMC resistentes ao IFN- α ou em fases avançadas da doença. A resposta, tanto hematológica como

citogenética, foi maior do que outras modalidades terapêuticas até então disponíveis (Druker et al., 2001a,b).

Nós acompanhamos 112 pacientes portadores de LMC fase crônica intolerantes ou resistentes ao IFN- α , em fase acelerada e em crise blástica, que foram tratados com imatinib, e avaliamos a resposta clínica e citogenética destes pacientes, bem como efeitos colaterais.

Objetivos

1. Avaliar a eficácia do tratamento do imatinib na leucemia mielóide crônica nas fases crônica, acelerada e crise blástica, por meio da resposta hematológica, resposta citogenética, sobrevida livre de progressão;
2. Avaliar a segurança do tratamento com imatinib na leucemia mielóide crônica por meio do monitoramento dos eventos adversos;
3. Avaliar a sobrevida global.

Revisão da literatura

Histórico da leucemia mielóide crônica

A seqüência de eventos dos primeiros relatos da LMC foi descrita com detalhes em uma revisão publicada por Geary (2000).

Os primeiros relatos de pacientes portadores da LMC foram observados quase ao mesmo tempo por dois jovens médicos, John Hugues Bennet, em 1845 em Edimburgo e Robert Virchow, em 1858 em Berlin. Apesar de algumas observações terem sido feitas desde 1825 sobre pacientes com aumento do volume do baço e sangue espesso, o marco relevante na descrição surgiu a partir das publicações feitas por esses dois médicos, nas quais combinaram detalhes clínicos e *post-mortem* com detalhes microscópicos, além de noções de fisiopatologia. Em 1847, Virchow utilizou o termo “sangue branco”, ou “leukäemie” para descrever a aparência pouco característica do sangue de seu paciente, e a inversão da proporção usual de células brancas e vermelhas. Entretanto, essa denominação não obteve uma maior aprovação. Bennett propôs, então, o termo leucocitemia, tendo feito uma revisão de um trabalho composto por 37 casos, publicados em uma monografia em Edimburgo em 1852 (Figura 1).

FIGURA 1. Monografia do Dr Hughes Bennet sobre leucocitemia, publicado em 1852, na qual ele descreve seus próprios casos estudados

Nos 10 anos seguintes, Virchow publicou inúmeros estudos com especulações a respeito da patologia da doença. Segundo essas rudimentares observações, porém de grande importância, a leucocitose aparecia de maneira autônoma, progressiva, caracterizada não apenas pelo aumento do número de células brancas, mas também pela diminuição do número de células vermelhas, associadas a mudanças no baço e fígado. A causa da doença, segundo ele, estaria no tecido responsável pela produção de células brancas. Em 1870, a medula óssea passou a ser reconhecida como um importante local para produção de células sanguíneas. Esta observação foi feita por meio da autópsia de uma paciente que havia morrido com leucemia, pois a medula óssea mostrava um aspecto amarelo-esverdeado escuro, muito diferente da aparência vermelha normal. Em 1878, o mesmo pesquisador alemão Newmann publicou uma nota na qual ele acreditava que a produção de células vermelhas era independente da produção das células brancas. O próximo passo importante na classificação das leucemias foi a introdução de métodos de coloração a partir de 1879, por Paul Ehrlich. A partir da identificação do mieloblasto como precursor da série granulocítica em 1900, do intenso uso de esfregaço de sangue periférico e da introdução da coloração com peroxidase, o diferencial dos elementos da LMC ficou mais consistente. Em 1920, já se sabia que a doença cursava com basofilia e trombocitose. Muitos estudos foram publicados entre 1900 e 1930, com séries relativamente grandes de pacientes portadores de LMC. A mediana de sobrevida destes casos era de três anos sem nenhum tratamento, embora houvesse relatos de sobrevida maior do que 10 anos. Por

volta de 1930, tinha-se a impressão de que o aumento do número de mieloblastos estava relacionado com a morte no final da doença, embora ainda não se falasse em crise blástica. Esta fase dramática foi chamada de “metamorfose” até 1959, um ano antes da descoberta do cromossomo Ph. Praticamente nada se sabia sobre a etiologia da LMC, apenas alguns relatos de exposição ao benzeno e à irradiação e de trabalhadores da área de saúde expostos ao raio-X nos anos 20, até à seqüela hematológica das duas bombas atômicas no Japão. A LMC foi uma das conseqüências daquela catástrofe (Geary, 2000).

Considerações Genéticas

O CROMOSSOMO PHILADELPHIA

No final de 1960, dois cientistas, Nowell e Hungerford, que trabalhavam na cidade de Philadelphia, EUA, descreveram um cromossomo muito pequeno em células cultivadas a partir de sangue de sete pacientes com LMC (Nowell e Hungerford, 1960) (Figura 2). Esse achado, o que parecia uma deleção do braço longo do cromossomo 22 (22q-) foi prontamente confirmado por outros pesquisadores, e este cromossomo anormal se tornou conhecido como cromossomo Philadelphia (Figura 3). Em princípio, foi chamado de Ph¹ porque eles achavam que este seria o primeiro de uma série de anomalias encontradas em diferentes tipos de leucemia. Entretanto, por mais de uma década, este foi o

único cromossomo anormal correlacionado a uma específica neoplasia (Geary, 2000).

FIGURA 2. Nowell e Hungerford e o cromossomo Philadelphia, 1960

FIGURA 3. Identificação do cromossomo Ph a partir de preparado de aspirado medular de um homem de 33 anos portador de leucemia mielóide crônica, 1960

Em 1973, Janet Rowley mostrou que, na verdade, essa deleção do 22 era uma translocação recíproca e equilibrada entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22 (Rowley, 1973). Técnicas de sincronização e bandamento de alta resolução permitiram, por fim, a identificação dos “pontos de quebra” cromossômicos, sendo o cromossomo Ph caracterizado como $t(9;22)(q34.1;q11.21)$ (Sawers, 1999) (Figura 4).

FIGURA 4. Translocação equilibrada entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22

A suposição de Rowley de que a $t(9;22)(q34;q11)$ era recíproca foi confirmada em 1982 por meio da demonstração de que o cromossomo Ph representava, em nível gênico, a transposição do oncogene C-ABL de sua

posição normal no cromossomo 9q34 para o cromossomo 22q11, em uma região de DNA, de 5 a 6 kd, chamado de *breakpoint cluster region* (BCR) gene (de Klein et al., 1982). O mecanismo pelo qual ocorre esta translocação e o tempo necessário para a transformação na doença propriamente dita é desconhecido. A radiação pode ter um papel em alguns casos, já que pessoas expostas a altas doses de irradiação têm um aumento significativo do risco de desenvolvimento da leucemia. Tem sido proposto, também, que a proximidade dos genes BCR-ABL nas células hematopoéticas na interfase pode favorecer translocações entre estes dois genes (Huntly et al., 2001). O gene BCR-ABL no cromossomo Ph é expresso em todos os pacientes com LMC. Já o ABL-BCR, que se encontra no braço longo do cromossomo 9 (9q+), é expresso em apenas 70% dos casos. Grandes deleções no cromossomo derivativo 9q+ têm sido reportadas recentemente. Estudo feito com hibridação *in situ* por fluorescência (FISH) mostrou que esta deleção pode ser fator de prognóstico. Em uma série de 253 pacientes, a frequência das deleções foi similar ao diagnóstico e na progressão, mas foi significativamente maior em pacientes com variante Ph. A mediana de sobrevida dos pacientes com e sem deleção foi de 38 e 88 meses, respectivamente ($P=0.0001$). É provável que esta alteração ocorra concomitantemente à formação do cromossomo Ph, e seu reconhecimento poderia ser um fator de prognóstico (Goldman e Melo, 2003).

Além do cromossomo Ph, outra característica citogenética dos portadores de LMC é a presença de anormalidades clonais adicionais. As anormalidades clonais ou citogenéticas adicionais são alterações

cromossômicas outras que não o cromossomo Ph, presentes em 10-30% dos pacientes com LMC em fase crônica e em cerca de 80% dos portadores de LMC agudizada (Johansson et al., 2002). Duas cópias do cromossomo 22q- ou duplo Ph, trisomia do cromossomo 8, isocromossomo 17q, trissomia do cromossomo 19, são consideradas anormalidades mais comuns, ou maiores. Alterações menos comuns são perda do cromossomo Y, t(3;21)(q26;q22), monossomia do 7, monossomia e trissomia do 17 e trissomia do 21 (Maloisel et al., 1999). Frequentemente é atribuído um prognóstico reservado à presença de uma dessas alterações, principalmente o duplo cromossomo Ph e anormalidades do cromossomo 17 (Martelel et al., 2003). Entretanto, elas não parecem encerrar um pior prognóstico quando são evidenciadas ao diagnóstico (Johansson et al., 2002). Aparentemente, esta influência só se manifesta negativamente quando acompanhado de outros sinais clínicos e laboratoriais de aceleração, como o aumento do número de blastos, por exemplo (O'Dwyer et al., 2002). Na crise blástica, o valor prognóstico é menos claro, estando relativamente bem estabelecido que não existe diferença prognostica entre pacientes agudizados que apresentam ou não anormalidades citogenéticas adicionais. Provavelmente, o ponto principal na interpretação da existência das anormalidades citogenéticas adicionais seja o fato delas determinarem uma vantagem seletiva a um clone geneticamente instável, fazendo com que apenas as células que possuem a nova alteração sobrevivam (Deininger, 2003).

ANORMALIDADES GÊNICAS

A primeira evidência de envolvimento de mecanismo molecular em leucemia humana foi a formação de um gene híbrido, no caso o BCR-ABL no cromossomo 22q- (Owen, 2001). O gene normal *abl* (*c-abl*) localizado no cromossomo 9 é homólogo ao um oncogene viral, encontrado em leucemias murinas (Abelson murine leukemia vírus, *v-abl*). Posteriormente, foi demonstrado que o gene híbrido BCR-ABL no cromossomo Ph tinha a capacidade de transformar células em cultura e de ser oncogênico em experimentos de transfecção em ratos (Melo, 1999). O gene ABL normal codifica uma tirosina quinase, que é ativa na transdução de sinais. O gene quimérico BCR-ABL codifica uma tirosina quinase aberrante de alto peso molecular maior do que a codificada pelo ABL (Figura 5) (Bain, 2002).

FIGURA 5. Fusão dos genes BCR-ABL com conseqüente produção da proteína BCR- ABL com atividade tirosina quinase alterada

Na LMC, a clássica fusão dos gene BCR-ABL é a b2a2 ou b3a3, na qual se funde o exon 2 (b2) ou o exon 3 (b3) do BCR ao exon 2 (a2) do ABL, gerando uma oncoproteína de peso molecular de 210 kd (p210). Nos caso de leucemia linfóide aguda Ph positiva, ocorre uma fusão com produção de uma oncoproteína de menor peso molecular, a p190. O terceiro tipo de translocação gera uma oncoproteína de 230 kd (p230), associada a uma rara leucemia neutrofílica, com poucas células jovens circulantes (Bain, 2002; Sattler e Griffin, 2003) (Tabela 1).

TABELA 1. Variantes moleculares do BCR-ABL e associações clínico-patológicas

PROTEÍNA	PONTO DE QUEBRA	ASSOCIAÇÃO CLÍNICA
p210BCR-ABL	M-bcr	a grande maioria é de casos típicos de LMC aproximadamente um terço dos casos são LLA Ph positivo
p190	m-bcr	a minoria dos casos é LMC, freqüentemente com monocitose ou displasias aproximadamente dois terços dos casos de LLA Ph positivas
p230	μ-bcr	raros casos de LMA LMC variante neutrofílica ou com marcada trombocitose

M-bcr=major breakpoint cluster region; m-bcr=minor breakpoint cluster region;
 μ-bcr=micro breakpoint cluster region; LMC=leucemia mielóide crônica;
 LLA=leucemia linfóide aguda; LMA=leucemia mielóide aguda

ATIVACÃO DAS ETAPAS DE SINALIZAÇÃO DA TIROSINA QUINASE BCR-ABL

A ativação constante da tirosina quinase, por meio de uma oligomerização da proteína BCR-ABL, causa ativação constante de várias etapas de sinalização. Apesar da identificação de muitas destas etapas, tem sido difícil correlacionar um específico evento sinalizador com um específico evento biológico. Entre as etapas de sinalização, as mais importantes ativadas cronicamente pelo BCR-ABL são: RAS, P13K (*phosphatidylinositol-3 kinase*), ROS (*reactive oxygen species*) e STAT (*signal transducer and activator of transcription*). O BCR-ABL também induz expressão de proteínas anti-

apoptóticas mitocondriais, tipo BCLx (Sattler M e Griffin JD, 2003; Goldman e Melo, 2003).

A BIOLOGIA CELULAR DA LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA

A LMC é uma doença mieloproliferativa clonal. Progenitores mielóides se expandem em vários estágios de maturação, são liberados prematuramente no sangue periférico e podem alojar-se em sítios extra medulares. A expansão desordenada das células progenitores mielóides parece ser resultado de alterações na sua capacidade proliferativa e no balanço entre auto-renovação e diferenciação, aumentando o número de células progenitoras e reduzindo o número de células tronco. As células tronco tornam-se parte do compartimento proliferativo, fazendo com que a população de células neoplásicas se expanda exponencialmente na maturação final, tornando-se menos responsivo a sinais reguladores de crescimento tanto das citocinas como do micro ambiente da medula óssea (Faderl, 1999; Kohl, Daley, 2001; Eaves, Eaves, 2001). Um defeito na aderência das células hematopoieticas imaturas ao estroma medular pode facilitar a liberação destas células no sangue periférico. Células progenitoras hematopoieticas normais se aderem à matriz extracelular ou são imobilizadas por citocinas reguladoras de crescimento. A ligação é mediada por receptores de superfície celular, especialmente as integrinas, que são glicoproteínas de superfície celular compostas por duas subunidades, α e β . Enquanto a cadeia α determina a especificidade da ligação, a cadeia β inicia as

etapas da transdução de sinais. O defeito na citoadesão das células da LMC pode ser restaurado pela incubação de células Ph positivas com oligonucleotídeos antisense contra a p210, inibidores da tirosina quinase e com interferon alpha. A supressão de etapas da apoptose tem sido implicada na patogênese da LMC. Células progenitoras hematopoieticas que expressam a p210 são capazes de escapar da dependência de fatores de crescimento (Bhatia, 2001).

Diagnóstico

QUADRO CLÍNICO E LABORATORIAL

Fase crônica

A LMC é uma doença progressiva que evolui em fases, sendo o diagnóstico usualmente feito na fase crônica, que é comumente caracterizada por um curso indolente e por um fácil controle terapêutico. O principal achado do exame clínico é a esplenomegalia ou hepatomegalia, presente em cerca de 80% dos pacientes ao diagnóstico (Faderl et al., 1999). Os sintomas típicos apresentados ao diagnóstico são letargia e outros relacionados à anemia e ainda aumento do volume e desconforto abdominal devidos à esplenomegalia. Sudorese e perda de peso não são raras, enquanto que febre é menos comum nesta fase, bem como sintomas relacionados à disfunção plaquetária, tais como sangramentos ou trombozes. Da mesma maneira, manifestações relacionadas

a hiperviscosidade, como priapismo e distúrbios visuais, são raros. Contudo, em cerca de 20% a 30% dos casos, o diagnóstico é feito em indivíduos assintomáticos, após exames laboratoriais de rotina. A característica fundamental dos exames laboratoriais no diagnóstico é a leucocitose com desvio escalonado encontrada no hemograma. A contagem de leucócitos geralmente está entre 100.000 e 300.000/mm³, podendo chegar a 500.000/mm³. Plaquetas acima de 700.000/mm³ é encontrada em cerca de 30% dos casos. A anemia, resultado de uma eritropoese ineficiente e sobrevida eritróide diminuída por seqüestro esplênico, pode ser discreta com padrão normocrômico e normocítico. Raramente observa-se aumento da massa eritrocitária semelhante à vista na policitemia vera. O exame citológico do sangue periférico permite verificar a presença de células da linhagem mielóide em todos os estágios de diferenciação, com predomínio de mielócitos e neutrófilos segmentados. É típico também o encontro de basofilia e eosinofilia. Na análise citológica, a medula óssea exibe uma densa população de células mielóides, com diferenciação preservada, e uma relação mielóide:eritróide média de 25:1. Os megacariócitos estão presentes em número elevado e com certo grau de displasia. Na biópsia, observa-se intensa hiper celularidade com vários graus de proliferação reticulínica e fibrose (Sawyers, 1999) (Tabelas 2 e 3).

TABELA 2. Achados laboratoriais de sangue periférico da leucemia mielóide crônica na fase crônica

Elevado número de leucócitos (>25.000/mm ³)
Elevado número de plaquetas
Elevado número de basófilos
Reduzida atividade da fosfatase alcalina leucocitária
Todos os estágios de diferenciação granulocítica visível em esfregaço de sangue periférico

TABELA 3. Achados de medula óssea da leucemia mielóide crônica na fase crônica

Hipercelularidade
Reduzida gordura intramedular
Aumento do número de megacariócitos
Menos de 10% de blastos e promielócitos
Aumento da relação de células mielóides em relação as eritróides

Em aproximadamente 90% dos casos de LMC, a translocação 9;22 pode ser detectada através da análise do cariótipo através da citogenética convencional. Esta técnica é o teste diagnóstico de escolha para LMC, pois é o

único método capaz de detectar anormalidades cariotípicas adicionais. Entretanto, esta técnica requer tempo, é trabalhosa e apenas 20 a 25 células podem ser examinadas (Kaeda et al, 2002). Além do mais, em cerca de 5% dos casos, o cariótipo pode ser normal e o paciente ser classificado como Ph negativo. Nestes casos, a fusão BCR-ABL pode ser detectada por meio de técnicas moleculares, tais como FISH e PCR (Sawyers, 1999).

Fase acelerada

A fase acelerada é um estágio intermediário no qual os pacientes apresentam sinais de progressão da doença sem, no entanto mostrarem critérios de leucemia aguda. Esta fase é caracterizada por um agravamento de sintomas constitucionais, esplenomegalia progressiva, refratariedade ao tratamento com progressiva leucocitose e/ou trombocitose. Anemia e trombocitopenia também são freqüentemente observadas. Acompanhando essa proliferação celular, observa-se um aumento da porcentagem de blastos, promielócitos e basófilos na medula óssea e/ou no sangue periférico. Os pacientes podem desenvolver cariótipos com anormalidades citogenéticas adicionais (O'Dwyer et al., 2002). Definições expandidas de fase acelerada podem permitir a inclusão de pacientes que estariam na verdade na fase crônica, e o aparente aumento de sobrevida ser erroneamente atribuído ao tratamento (Kantarjian et al., 2002; Fardel, 1999) (Tabela 4).

TABELA 4. Critérios para diagnóstico da leucemia mielóide crônica na fase acelerada

CRITÉRIOS COMUMENTE USADOS NA PRÁTICA CLÍNICA
Blastos na MO ou SP >10%
Basófilos e eosinófilos na MO ou SP >20%
Freqüente pseudo Pelger-Huet em neutrófilos, células vermelhas nucleadas ou fragmentos nucleares
Aumento de colágeno ou reticulina em MO
Leucocitose acima de 50.000 mm ³
Anemia (hematócrito <25%)
Trombocitopenia (<100.000 mm ³) não controlada por terapia antileucêmica
Marcada leucocitose (>1.000.000/mm ³)
Progressiva esplenomegalia não responsiva ao tratamento
Febre e dor óssea sem causa
Aumento da dosagem do medicamento em questão
CRITÉRIOS DERIVADOS DE ANÁLISE MULTIVARIADA
Blastos periféricos >15%
Blastos e promielócitos periféricos >30%
Basofilia periférica >20%
Trombocitopenia (<100.000/mm ³) não relacionada à terapêutica
Evolução citogenética clonal

Crise blástica

Em algum momento durante o curso da LMC, após um intervalo médio de 3 a 6 anos, ocorre uma mudança relativamente abrupta no curso da doença. Observa-se um acúmulo progressivo de elementos celulares imaturos (mieloblastos e promielócitos) no sangue periférico ou na medula óssea.

Quando o número de blastos é superior a 30%, ou evidencia-se a

presença de um sarcoma granulocítico, o diagnóstico de fase aguda ou crise blástica é estabelecido. Os blastos podem apresentar fenótipo mielóide (60% a 70% dos casos, incluindo as raras agudizações megacariocíticas, eritróide e basofílicas), linfóide (25% a 30%) ou mesmo serem bifenotípicas (5% a 10%) (Silver, 2003). Cerca de 30% dos pacientes desenvolvem a crise blástica de maneira súbita, diretamente, a partir da fase crônica. Diferentemente da fase crônica, a crise blástica encerra prognósticos extremamente reservados, apresentando uma resposta precária às diversas manobras terapêuticas utilizadas (Sureda et al., 2003). Apesar de, virtualmente, todos os portadores de LMC evoluírem para agudização, verifica-se uma grande heterogeneidade no tempo que se leva para atingi-la, ou seja, na duração da fase crônica. A completa caracterização deste fenômeno se deu com a estratificação dos pacientes em vários grupos prognósticos, de acordo com os achados clínicos e laboratoriais apresentadas ao diagnóstico (Fardel et al, 1999).

Estudo de fatores de prognóstico

A despeito de vários pesquisadores terem se proposto a fazer tal determinação, o trabalho que primeiro definiu estes subgrupos foi o Grupo Internacional de Estudo Prognóstico da LMC (Sokal et al., 1984). Dados clínicos, laboratoriais e evolutivos de 678 pacientes portadores de LMC Ph positivo, em fase crônica, formaram a base para a criação desta classificação prognostica, que mostrou ser altamente reproduzível. Uma análise estatística multivariada regressiva desses dados permitiu a identificação de quatro variáveis de importância prognostica: idade, tamanho do baço, contagem de plaquetas e percentual de blastos no sangue periférico, com as quais foi construído um modelo matemático. Este modelo, atribuindo peso contínuo a cada uma das variáveis, permitiu a classificação dos portadores de LMC em três grupos: pacientes de baixo, intermediário e alto risco que apresentam uma sobrevida média em dois anos de 93%, 80% e 65%, respectivamente. A estimativa de mediana de sobrevida calculada pelo método de Kaplan-Meier foi de 30 meses para pacientes de alto risco e 60 meses para os de baixo risco. O escore de Sokal que foi utilizado até os anos 90 foi baseado em dados estatísticos de pacientes que receberam BU e HY, sendo, portanto, pouco reproduzível quando aplicados a pacientes tratados com IFN- α , já que esta droga, por si só, melhorava a curva de sobrevida. Por esta razão, o Grupo Internacional Colaborativo de Fatores de Prognóstico para LMC, desenvolveu e

validou um novo escore, por meio da análise de 1.300 pacientes tratados com IFN- α provenientes de vários estudos prospectivos (Hasford et al., 1998). Esse novo escore, também conhecido como Escore Europeu, utiliza: idade, tamanho do baço (medido desde a margem costal esquerda), basófilos, plaquetas, eosinófilos e blastos, todas essas variáveis observadas ao diagnóstico. Três grupos foram identificados: o grupo de baixo risco (escore ≤ 780), compreendendo cerca de 41% dos pacientes, mostrou uma mediana de tempo de sobrevida de 96 meses e a probabilidade de sobrevida, em 9 anos de 41%. O grupo de risco intermediário (escore > 780 e ≤ 1.480), compreendendo cerca de 45% dos pacientes, apresentava mediana de sobrevida de 65 meses e a sobrevida em 9 anos de 0.16%. O grupo de alto risco (escores ≥ 1.480) com 14% dos pacientes, apresentou uma mediana de sobrevida de 42 meses; nenhum paciente permaneceu vivo no final de 9 anos (Hasford et al., 2003) (Figura 6).

FIGURA 6. Escore Europeu ampliado para 1414 pacientes com leucemia mielóide crônica na fase crônica, tratados com interferon alfa (m.s., mediana de sobrevida)

Tratamento da leucemia mielóide crônica

HISTÓRICO

Segundo a revisão histórica da LMC publicada por Geary em 2000, o primeiro caso de “leucocitemia” foi tratado com ferro e quinina, sem nenhum resultado. Em 1865, uma paciente com o mesmo diagnóstico foi tratada com arsênico em baixas doses, combinado com iodo e cloreto de potássio. Em relatos da época, houve grande melhora do estado da paciente, como

diminuição do tamanho do baço, diminuição do número de células brancas e melhora da anemia por alguns meses. O arsênico, introduzido por Thomas Fowler em 1786, foi utilizado em medicina em concentrações baixas de 1% para febres, dores de cabeça e como tônico. Cutler e Bradford, no Hospital de Boston, foram os primeiros pesquisadores a estudarem cientificamente os efeitos do arsênico em amostras de sangue de controles normais e de doentes. Essas preparações com arsênico foram utilizadas no tratamento de LMC até 1903, época da introdução da radioterapia. O benzeno também foi utilizado, particularmente por médicos alemães, de 1912 até 1935, quando teve seus primeiros relatos comparados à radioterapia. Em 1903, o valor terapêutico dos raios-X em esplenomegalia foi demonstrado pelo professor Nicholas Senn, um cirurgião em Chicago, em um paciente portador de LMC. Sean notou uma rápida diminuição no tamanho do baço e uma pequena queda no número de leucócitos. Os pacientes começaram, então, a ser tratados com radioterapia e a melhora clínica era tão evidente que pela primeira vez começou a ser utilizado o termo “remissão”. Entretanto, facilmente se notou que a evolução fatal era inexorável, apesar do tratamento. Em 1950, foram publicados trabalhos nos quais os relatos mostravam uma mediana de duração da doença de três anos. Esse tempo de sobrevida não era modificado pela radioterapia. A esplenectomia foi descrita pela primeira vez em 1863, tendo sido um desastre, pois o controle do sangramento pós-operatório tornava a cirurgia fatal. Mais tarde, a cirurgia era indicada em pacientes tratados previamente com radioterapia, e as complicações pós-operatórias melhoraram significativamente.

Após 40 anos, este tipo de tratamento provou ser pouco justificável, já que não prolongava a vida do paciente, sendo definitivamente abandonada no final dos anos 60. A primeira droga citotóxica utilizada em LMC foi a mostarda nitrogenada, desenvolvida na época da Primeira Guerra Mundial. Em 1947, foi demonstrada uma enorme queda no número de leucócitos, por meio de infusão intravenosa. Em princípio, oito pacientes com LMC foram tratados com mostarda e, apesar da melhora clínica, não houve impacto na sobrevida (Geary, 2000).

BUSSULFANO E HYDROXIUREA

Em 1953, o BU, um agente alquilante, foi a primeira droga efetiva no controle da LMC, demonstrando uma ação mais seletiva no tecido hematopoiético e, particularmente na série granulocítica. Os efeitos colaterais incluíam uma mielossupressão prolongada em até 10% dos pacientes tratados com BU, além de fibrose pulmonar. Apesar da mielotoxicidade, o BU era relativamente seguro e com melhores resultados do que a radioterapia, apesar de não retardar a crise blástica. O BU foi utilizado por 35 anos, até a introdução da HY na década de 70 (Osarogiagbon, Mc Glave, 1999).

Em 1972, a HY foi introduzida para o tratamento da LMC, tornando-se a droga de escolha para o controle da doença com taxas de reposta hematológica completa de até 80%. O composto é um inibidor específico da síntese de DNA, bem menos tóxico do que o BU não produzindo mielotoxicidade irreversível. A

droga é bem tolerada, com poucos efeitos colaterais tais como anemia megaloblástica, úlceras de mucosa e úlceras de perna, que só regredem com a suspensão da droga (Osarogiagbon, Mc Glave, 1999).

Apesar do Grupo de Estudo Alemão de LMC ter demonstrado a superioridade da HY na sobrevida quando comparada ao BU, ambas as terapias não induzem resposta citogenética ou previnem a progressão para transformação de crise blástica (Hehlmann et al., 1993).

INTERFERON ALFA

Os interferons são glicoproteínas produzidas por células eucarióticas em resposta a estímulos antigênicos como aqueles que ocorrem em infecções virais e doenças malignas. Primeiramente foram descritos como um potente agente retroviral. Mais tarde foi demonstrado que este agente promovia um efeito no controle da proliferação celular e na modulação do sistema imune (Faderl et al., 1999). A descoberta de que os interferons inibiam o crescimento de células normais e malignas do tecido hematopoético in vitro e in vivo levaram a um estudo piloto utilizando-se INF- α . O real mecanismo de envolvimento no controle da proliferação de células malignas pelo IFN- α na LMC ainda permanece obscuro. O IFN- α pode exibir efeitos diretamente antiproliferativos em uma variedade de tipos celulares. Os mecanismos incluem controle da transição do ciclo celular, modulação da apoptose e indução de genes interferons-dependentes envolvidos diretamente no controle de crescimento.

Além do mais, em células hematopoiéticas precursoras, o IFN- α tem mostrado efeitos inibitórios no crescimento clonogênico e é profundamente envolvido na regulação de moléculas de adesão (Faderl et al., 1999).

O IFN- α foi introduzido no tratamento de LMC no início dos anos 80. Os resultados do M.D.Anderson Cancer Center, Houston, entre 1982 e 1990, mostraram que quando o IFN- α era utilizado na fase inicial da doença na dose de 5 milhões U/m²/d, as taxas de resposta hematológica completa (RHC) e resposta citogenética completa (RCC) eram de 80% e 25% de respectivamente (Talpaz, 2001).

Vários estudos comparativos demonstraram que as taxas de resposta citogenética eram significativamente mais altas em pacientes tratados com IFN- α do que com quimioterapia convencional (Hehlman et al., 1994; Allan et al., 1995; Ohnishi et al., 1995; Benelux CML Study Group, 1998; Italian Cooperative Study Group on CML, 1998). O tratamento com IFN- α modificou a história da LMC pois, pela primeira vez, uma droga poderia prolongar a vida e induzir ao desaparecimento do cromossomo Ph (Baccarani et al, 2003).

Apesar dos resultados promissores do tratamento, pouco se sabia a respeito do prognóstico daqueles pacientes que tinham resposta citogenética e se esta resposta tinha um real impacto na sobrevida. Recentemente, Kantarjian publicou uma série na qual são analisados 512 pacientes LMC Ph positivos que foram tratados com IFN- α , entre 1981 e 1995. Cento e quarenta pacientes (27%) atingiram RCC, e a sobrevida deste grupo com resposta completa em 10 anos foi de 78%. A análise do RT-PCR em 78 pacientes em RCC mostrou que

46 apresentaram pelo menos um episódio de resposta molecular ao longo do seguimento. Esses dados mostraram que pacientes com resposta citogenética e/ou molecular podem ter uma sobrevida bem maior mesmo sem transplante (Kantarjian, 2003).

Entretanto, a terapia com IFN- α leva a efeitos colaterais constitucionais em praticamente todos os pacientes. A frequência da toxicidade com IFN- α é maior do que com BU e HY. A taxa de toxicidade causada pelo IFN- α levando à suspensão do tratamento pode chegar a quase 20% (Ozer et al, 1993). Um grande número de pacientes tem sintomas de gripe, dores musculares, fadiga, perda de peso. Além desses efeitos, podem ocorrer alterações neuropsiquiátricas e auto-imunes, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Muitas vezes esse tratamento leva a um sério comprometimento da qualidade de vida (Hahn e Glendenning, 2003).

O principal objetivo do tratamento é a obtenção da resposta hematológica seguida da resposta citogenética. Entretanto, esses dois parâmetros podem ser afetados por algumas variáveis, tais como: risco prognóstico, tempo do diagnóstico até o início do tratamento, dose, duração do tratamento e uso de terapia coadjuvante. Após todos esses anos de experiência com o tratamento com IFN- α , pode-se afirmar que (Shepard, 2001):

- As taxas de resposta hematológica e citogenética são mais altas quanto mais cedo o paciente for tratado;
- As taxas de resposta hematológica e citogenética são mais altas em pacientes de baixo risco do que em pacientes com alto risco;

- A resposta citogenética é precedida pela resposta hematológica;
- Geralmente, os pacientes que apresentam resposta citogenética têm o número de leucócitos inferior a $4 \times 10^9/l$;
- Resposta citogética maior (RCM) (< 35% de células Ph positivas) e RCC geralmente são observadas após 12 meses ou mais;
- Pacientes que apresentam RCM têm uma sobrevida maior quando comparados àqueles com respostas menores ou aos que não responderam;
- A RCC e a RCM deve ser sustentada por mais de 6 a 12 meses para que seja observado algum impacto na sobrevida;
- A monitorização da doença residual mínima por meio de técnicas quantitativas de PCR em pacientes com RCC vai delinear aqueles que vão recidivar;
- Pacientes que não obtêm resposta hematológica com dose total de IFN- α tem um prognóstico ruim e pouco a ganhar com a continuidade do tratamento.

A melhora da expectativa de vida para pacientes que receberam IFN- α quando comparada com a dos que foram tratados com HY ou BU, aumenta em torno de 20 meses. Quanto maior a resposta citogenética, maior é a expectativa de vida. Ou seja, a resposta citogenética é considerada um marcador de sobrevida (Baccarini et al, 2003).

INTERFERON E CYTARABINA

A droga que foi mais investigada na associação com IFN α foi o Ara-C. Este agente antineoplásico é um nucleosídeo arabinosídeo que pertence à classe dos antimetabólicos. O efeito antineoplásico do Ara-C é maximizado durante a fase de síntese do ciclo celular, sendo seu espectro de atividade restrito às células em divisão. O Ara-C, além de ser uma droga potente no tratamento da leucemia mieloide aguda, demonstrava, em ensaios laboratoriais, uma inibição na formação de colônias granulocíticas-macrofágicas. Essas observações levaram ao desenvolvimento de projetos clínicos envolvendo associações do Ara-C com IFN- α no tratamento da LMC (Rosti et al., 2001). O primeiro resultado clínico do emprego do Ara-C em LMC foi reportado por Sokal em dois pacientes com 100% de células Ph positivas. Após dois ciclos de Ara-C, o número de metáfases positivas caiu para 8% no primeiro paciente e para 44% no segundo paciente; após quatro ciclos, um dos pacientes obteve RCC e o outro obteve RCM. Neste momento, o Ara-C foi suspenso e os pacientes passaram a receber HY em doses altas. Logo após, o número de células Ph positivas começou a aumentar, e o estudo concluiu que a droga específica para LMC era o Ara-C, e não a HY (Sokal, 1988).

Estudos não comparativos começaram a utilizar diferentes doses de IFN- α associado ao Ara-C no tratamento da LMC, mostrando que estas combinações eram bastante efetivas (Kantarjian et al., 1992). Em 1995, Guilhot

publicou um trabalho randomizado onde 237 pacientes receberam IFN- α 5 milhões U/m² e 237 pacientes receberam essa mesma dose de IFN- α mais Ara-C 10mg/m²/dia por 10 dias por um mês. A resposta hematológica ficou em torno de 83%, e foi a mesma nos dois braços. A taxa de resposta citogenética, embora não tenha sido estatisticamente significativa, foi de 23% nos pacientes tratados com a combinação, contra 15% dos pacientes tratados apenas com apenas com IFN- α . Em 1997, o mesmo grupo francês ampliou o estudo, e desta vez randomizou 721 pacientes em fase crônica precoce. Neste estudo, eles aumentaram a dose de Ara-C para 40mg/dia, também por 10 dias, podendo ser aumentado para 15 dias nos casos de resposta hematológica não completa. Aqueles pacientes que estavam no braço do IFN- α e que não obtiveram resposta hematológica completa após seis meses ou menos do que 33% de Ph negativo após 12 meses, podiam ir para o braço da combinação com Ara-C. Resposta hematológica completa foi atingida por 66% dos pacientes no grupo da combinação, contra 55% dos pacientes só com IFN- α . A superioridade do tratamento combinado também foi evidente na resposta citogenética. Quarenta e um por cento dos pacientes tratados com IFN- α e Ara-C atingiram RCC, enquanto que 21% dos pacientes tratados apenas com IFN- α apresentaram RCC. A sobrevida global foi maior, 85,7% em 3 anos contra 79,1%, $P=0,03$ (Guilhot et al., 1997).

Entretanto, um grande trabalho conduzido pelo grupo italiano não mostrou um melhor resultado na resposta citogenética e sobrevida quando o Ara-C era adicionado ao tratamento com IFN- α . Com um grupo de 538

pacientes randomizados para tratamento com IFN- α ou IFN- α mais Ara-C, as diferenças na sobrevida global e na RCM entre os dois grupos e nos diferentes grupos de risco (alto, intermediário e baixo), não foram estatisticamente significantes (Baccarini, 2002).

Os efeitos positivos da combinação do Ara-C e IFN- α têm que ser comparados à toxicidade que os mesmos produzem. Nenhum dos estudos publicados foi específico na avaliação de qualidade de vida. Quando os efeitos colaterais são avaliados, é difícil saber qual droga é responsável por qual efeito, já que as reações adversas se sobrepõem (Baccarini et al, 2003).

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO

Até 1970, a LMC era invariavelmente uma doença fatal. Essa realidade foi modificada após a introdução, com sucesso, do TMOalo, em 1986. Apesar dos pacientes serem mais velhos do que a idade ideal para transplante, essa modalidade terapêutica ainda é considerada o único tratamento curativo para a LMC (Goldman e Druker, 2001). O potencial curativo do TMOalo de células tronco parece ser dependente de um efeito imunológico da doença do enxerto contra o hospedeiro, sendo bem demonstrado esse mecanismo nas infusões de linfócitos que induzem a nova remissão pacientes que recaíram após TMOalo em LMC. Por mais de 20 anos, esta modalidade terapêutica tem sido utilizada como prática freqüente no tratamento da LMC. O registro internacional de 5.816 pacientes com LMC transplantados entre 1994 e 1999 mostrou uma sobrevida

de $69\% \pm 2\%$ pacientes transplantados em fase crônica com um ano de diagnóstico e $57\% \pm 3\%$ para fase crônica com mais de um ano de diagnóstico (Barret, 2003). Entretanto, a toxicidade do transplante de células tronco e associação com o risco de morte aumentam com a idade. Apenas 45% dos pacientes com LMC têm abaixo de 60 anos ao diagnóstico. Destes pacientes, apenas 30% têm doador aparentado HLA compatível. Portanto, o transplante é uma opção terapêutica para aproximadamente 40% dos pacientes com LMC. Doador não aparentado, idade superior a 40 anos, fase avançada da doença, demora entre o diagnóstico e o transplante de mais de um ano e par doador feminino e receptor masculino são fatores de pior prognóstico na evolução do TMOalo (Gratwohl, 2003).

MESILATO DE IMATINIB-STI571

A partir de estudos em modelo animal, ficou bem estabelecido que o gene híbrido BCR-ABL funciona como um oncogene leucêmico. Este oncogene funciona como um ativador natural de tirosina quinase, sendo essa atividade absolutamente essencial para todas as funções de transformação da proteína. A tirosina quinase liga-se ao ATP e transfere fosfato do ATP para resíduos de tirosina em proteínas específicas. Essas proteínas, agora fosforiladas, tornam-se responsáveis por toda uma série de etapas que levam aos defeitos fisiopatológicos observados na LMC. Por essa razão, se a ligação do ATP com essa tirosina quinase for bloqueada, toda a série de etapas envolvida também

será bloqueada. Este mecanismo foi essencial para o desenvolvimento de uma terapia efetiva e seletiva para a LMC (Druker, 2000, Fardel et al, 2000). Em 1988, Yaish e col. publicaram uma série de componentes conhecidos como tyrfostinas, as quais demonstraram que eram inibidores específicos da tirosina quinase em desenvolvimento (Yaish et al., 1988). Com base nessas premissas, em 1993, Brian J Druker e col. testaram vários inibidores da tirosina quinase que haviam sido sintetizadas por um grupo de farmacêuticos da Novartis Pharmaceuticals (Capdeville et al., 2002). A partir destes testes, o STI571 (mesilato de imatinib) surgiu como o melhor composto capaz de especificamente matar as células da LMC (Goldman, 2000). Basicamente, o imatinib funciona como um inibidor competitivo do ATP, pois ele se liga nos sítios de fosforilação do BCR-ABL, bloqueando a atividade tirosina quinase (Savage e Antman, 2002) (Figura 7).

Figura 7. Mecanismo de ação do BCR-ABL e a sua inibição pelo imatinib, através do bloqueio no sítio de fosforilação da tirosina quinase BCR-ABL

Farmacodinâmica do mesilato de imatinib

Em ensaios laboratoriais, a proliferação de células que expressavam o BCR-ABL foram inibidas pelo imatinib *in vitro*. A concentração do imatinib requerida para inibir a fosforilação da tirosina celular a 50% (IC_{50}) foi de $0.25\mu M$ em linhagens celulares que expressavam BCR-ABL. A inibição foi progressiva e dose dependente. A incubação com imatinib na concentração de $1\mu M$ resultou em uma diminuição de 92 a 98% no número de colônias positivas formadas em amostras de sangue periférico ou medula óssea de culturas de pacientes com LMC. Esta droga inibe a proliferação de células leucêmicas que expressam

ambas as proteínas p210 e p190, mas tem mínima atividade na proliferação de células BCR-ABL negativas. O imatinib inibe três tirosina quinases: ABL, c-kit e o receptor do fator de crescimento plaquetário (PDGF). Todas as formas conhecidas do oncogene ABL (*BCR-ABL*, *TEL-ABL* e *v-ABL*) também são inibidas pela droga. (Lyseng-Williamson e Jarvis, 2001).

Farmacocinética

A absorção do imatinib é rápida, com concentração plasmática máxima atingida em 2 a 4 horas, e biodisponibilização de 98% na formula capsular. A meia-vida é de aproximadamente 18 horas. A maior enzima responsável pelo metabolismo do imatinib é o citocromo P450 (CYP3A4), ainda que outras isoenzimas (CYP102, CYP2D6, CYP2C9 E CYP2C19) desempenhem um papel menor. Ao fim de sete dias, 81% da dose marcada é eliminada nas fezes (68%) e na urina (13%). A concentração plasmática do imatinib pode ser alterada quando a droga é administrada com inibidores ou indutores da atividade da CYP3A4. Quando o imatinib é administrado com drogas que inibem a atividade da CYP3A4 (ketoconazol, itraconazole, eritromicina, claritromicina), o metabolismo pode ser diminuído. Drogas que induzem a atividade da CYP3A4 (dexametasona, fenitoína, carbamazapina, rifampicina, fenobarbital) podem aumentar o metabolismo do imatinib. Substratos da CYP3A4 (sinvastatina, ciclosporina) podem ter suas concentrações plasmáticas aumentadas pelo imatinib (Lyseng-Williamson e Jarvis, 2001).

Desenvolvimento do modelo clínico

Em 1998, os testes clínicos de fase I começaram, e o grupo escolhido para o tratamento com o imatinib foram pacientes com LMC na fase crônica que eram refratários ou intolerantes ao IFN- α . Logo em seguida, o estudo foi expandido para pacientes em crise blástica. Os pacientes foram tratados com imatinib com doses que variavam de 25 mg até 1.000 mg diariamente, mas foi com a dose de 300 mg/d ou mais que se observou resposta clínica. Entre os pacientes de fase crônica que haviam falhado com IFN- α , 53 de 54 (98%) atingiam RHC. Em pacientes com crise blástica mielóide, 21 de 38 (55%) apresentaram resposta clínica. Um modelo matemático foi aplicado, relacionando dose e resposta hematológica, até se chegar na dose ideal de 400 mg/d ou mais. Com base nestes resultados, a dose diária de 400 mg ou mais foi recomendada para estes pacientes em fase crônica (Druker, 2001).

Como os resultados de fase I foram excepcionais, rapidamente iniciaram-se estudos de fase II em seis países. Três grandes estudos de fase II foram realizados com 532 pacientes em fase crônica tardia que não responderam ao tratamento com IFN- α , 235 pacientes na fase acelerada e 260 pacientes em crise blástica mielóide. Noventa e cinco por cento dos pacientes na fase crônica que falharam com a terapia com IFN- α atingiram RHC e 60% tiveram resposta citogenética, definida como redução na porcentagem de células Ph positivas para menos do que 35%. As análises mostravam que na medida em que se alcançava resposta hematológica e/ou citogenética, aumentava a sobrevida global e sobrevida livre de progressão. No estudo de fase crônica, no qual a

mediana de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento com imatinib foi de 32 meses, a estimativa de sobrevida livre de progressão em 18 meses foi de 89.2%. Apenas 13% dos pacientes em fase crônica recidivaram. Os resultados de fase II na fase acelerada foram bem promissores. Dos 235 pacientes na fase acelerada, 34% apresentaram RHC, 24% atingiram RCM com 17% de RCC. O tratamento com imatinib também se mostrou promissor em pacientes que evoluíram para crise blástica. Dos 260 pacientes na crise blástica acompanhados, 52% apresentaram resposta hematológica e 31% sustentaram esta resposta por 4 semanas. Resposta citogenética maior foi observada em 16% e RCC em 7%. Vinte por cento dos pacientes estavam vivos aos 18 meses. Os efeitos colaterais foram facilmente manejados e poucos efeitos adversos graves ocorreram, tais como retenção hídrica e toxicidade hepática (Ottmann et al., 2002).

Em Dezembro de 1999, em um encontro da American Society of Hematology, pesquisadores decidiram criar o Programa de Acesso Expandido, já que os estudos de fase II seriam encerrados em Maio de 2000 e os dados encaminhados para o Food and Drug Administration (FDA) (Druker, 2001b).

Com esses dados de alta resposta e baixa toxicidade, em 10 de março de 2001, o FDA aprovou a terapia com imatinib em pacientes com LMC em todos os estágios (Deninger, 2003).

Quase que concomitantemente ao estudo de acesso expandido, o imatinib foi aprovado no Estados Unidos e logo depois em vários países como tratamento de primeira linha para todos os pacientes com LMC. A partir de

então foi iniciado estudo IRIS (International Randomized IFN vs. STI571), um ensaio clínico randomizado comparando IFN- α e Ara-C ao imatinib com 1.106 pacientes com LMC na fase crônica recém diagnosticados. Não houve diferença significativa nos fatores de prognóstico pré-tratamento nos dois braços. Com uma mediana de seguimento de 19 meses, os pacientes que foram randomizados para o imatinib tiveram resultados significativamente melhores do que os tratados com IFN- α + Ara-C em todos os parâmetros utilizados, incluindo taxas de RHC (97% v 56%, $P<0.001$), RCM e RCC (85% e 75% v 22% e 8%, $P<0.001$). Com imatinib, mais de 50% dos pacientes obtiveram RCC em 3 meses (DRUKER JCO, 2003). A partir deste estudo, todos os pacientes que obtiveram RCC, mas não resposta molecular, foram submetidos a medidas seriadas de transcriptos, por meio da técnica de *real time* PCR para BCR-ABL. A proporção de pacientes que tiveram uma redução significativa de mais de três logaritmos ao final de três meses foi muito maior no grupo do imatinib do que no grupo com IFN- α + Ara-C. Conseqüentemente, este primeiro grupo teve um risco de progressão desprezível (Hughes et al, 2003).

Após estes resultados promissores, o grupo do M.D.Anderson, liderado por Kantargian e Cortes, resolveu investigar o papel do aumento de dose de imatinib na resposta hematológica e citogenética. Foram incluídos neste estudo 36 pacientes com LMC fase crônica que falharam anteriormente ao tratamento com IFN- α . Todos receberam 800 mg de imatinib. Noventa por cento atingiram RCM e 89% atingiram RCC. Quarenta e um por cento apresentaram resposta

molecular, ou seja, não foi detectado transcritos BCR-ABL. Não houve aumento da toxicidade (Cortes, 2003).

Apesar dos resultados fantásticos do tratamento da LMC com imatinib, 10% dos pacientes se tornam resistentes ao tratamento. Uma das mais úteis categorizações dos mecanismos de recaída tem sido separar os pacientes em duas categorias, aqueles com inibição persistente da quinase BCR-ABL e aqueles com reativação persistente da quinase BCR-ABL na recaída. Pacientes com inibição persistente são mais propensos a adquirirem anormalidades moleculares adicionais além do BCR-ABL. Por outro lado, pacientes com atividade persistente da BCR-ABL são mais propensos a mecanismos de insensibilidade ao imatinib. A primeira categoria está ligada a mecanismos de efluxo de droga e a segunda com mutações no BCR-ABL, que fazem com que esta proteína se torne não responsiva ao imatinib. Métodos que examinam a proteína fosforilada têm mostrado que a maioria dos pacientes que respondem ao imatinib e depois recaem têm reativação da tirosina quinase BCR-ABL (Melo, 2002). Nestes estudos, mais do que 50% dos pacientes que recaem (talvez estes números sejam bem mais altos, chegando a 90%) apresentam mutações pontuais (*point mutations*) em pelo menos 13 amino ácidos diferentes no sítio de domínio da ABL. Já em pacientes com resistência primária, ou seja, pacientes que não respondem desde o início da terapêutica com imatinib, o mais provável é que tenham anormalidades independentes ao BCR-ABL (Gorre, 2001; Tipping, 2001; Druker, 2003, Rotheberg, 2003, Mohamed, 2003, Goldman, 2004).

Estudos experimentais têm sugerido que o imatinib como droga única pode não ser suficiente para erradicar todo o clone Ph positivo. Portanto, novas estratégias terapêuticas têm sido investigadas, tais como aumento da dose de imatinib ou a adição de outra droga, com o Ara-C. Em um estudo muito recente, publicado em dezembro de 2003, de fase I, mostrou que a combinação de imatinib com Ara-C em baixas doses naqueles pacientes refratários ao IFN era de baixa toxicidade, bem tolerada, com taxas altas de resposta citogenética maior (83%). Cem por cento destes pacientes apresentaram resposta hematológica completa (Gardembas, 2003).

Programa de Acesso Expandido

O desenvolvimento deste programa, criado no início de 2000, teve como objetivos principais:

- 1) definir melhor o papel do imatinib no tratamento dos vários estágios da LMC avaliando-se a eficácia, por meio da análise do cariótipo, e a segurança, através de uma rigorosa coleta de dados de efeitos adversos;
- 2) proporcionar um maior acesso a pacientes sem alternativas de tratamento; e
- 3) explorar o papel da atividade do c-Kit e do PDGFR em outras doenças. Cento e quinze centros em 38 países participaram deste estudo, onde o Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) fez parte.

Em Maio de 2002, o imatinib foi registrado no Brasil (Glivec®) como tratamento de segunda linha e o estudo de acesso expandido encerrado. A partir desta data, o imatinib vem sendo custeado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Apresentamos neste trabalho os resultados da resposta clínica e citogenética do tratamento com imatinib de 112 pacientes com LMC na fase crônica intolerantes ou resistente ao IFN- α , na fase acelerada e na crise blástica.

MÉTODOS

Casuística

Foram acompanhados 112 pacientes com LMC, sendo 50 na fase crônica, 44 na fase acelerada e 18 na crise blástica.

Todos foram acompanhados no Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre 1º de dezembro de 2000 e 30 de Setembro de 2003.

Durante o estudo de acesso expandido, era permitida a inclusão de dois pacientes em fase crônica por mês. O número de pacientes na fase acelerada e blástica era livre e de acordo com a disponibilidade de aceitação de cada centro.

Critérios de inclusão

Pacientes com mais de 18 anos, com LMC Ph positivo, ou negativo mas BCR-ABL positivo, com consentimento informado, voluntário, assinado, eram incluídos no estudo de acordo com a fase da doença. Os critérios clínicos e laboratoriais de cada fase foram definidos previamente pelo Estudo de Acesso Expandido de Fase II (STI571 Expanded Access

Programme Protocols 113, 114 and 115, Novartis Clinical Oncology, Basileia, Suíça), desenvolvido e liderado pelo médico John M. Ford. Os prontuários eram auditados pelos monitores da empresa Novartis semanalmente.

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE FASE CRÔNICA

- Resistência hematológica: falha para atingir RHC, com duração de pelo menos um mês após três ou mais meses de tratamento com IFN- α ou
- Recaída hematológica: aumento da contagem leucocitária de mais de 100% ou número absoluto de mais de 20.000/mm³ confirmado por duas contagens com intervalo de 2 semanas durante o tratamento com IFN- α após RHC ou
- Recaída citogenética: cariótipo da medula óssea mostrando mais de 65% de células Ph positivas após uma RCM ou
- resistência citogenética: cariótipo da medula óssea mostrando mais de 65% de células Ph positivas após 1 ano de tratamento ou
- Pacientes com severa intolerância ao IFN- α definido como toxicidade não hematológica grau 3 ou 4, que persistiram com os sintomas por mais de 2 semanas definido pelo National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (NCICTC)
- Todos deveriam:

- Ter menos do que 10% de blastos em sangue periférico (SP) ou medula óssea (MO)
- Ter menos do que 20% de basófilos em SP ou MO
- Ter menos do que 30% de blastos mais promielócitos em SP ou MO
- Ter contagem plaquetária de pelo menos 100.000/mm³
- Ter enzimas hepáticas, bilirrubinas séricas, níveis de creatinina e uréia menor do que duas vezes o limite superior de normalidade (LSN)
- Ter teste de gravidez negativo para mulheres em idade fértil
- Estar sem tratamento com HY há pelo menos 7 dias
- Estar sem tratamento com INF- α ou Ara-C há pelo menos 14 dias

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA FASE ACELERADA

- Presença de mais de 10% e menos de 30% de blastos em SP ou MO ou
- Mais de 20% de blastos e promielócitos em SP ou MO ou
- Mais de 20% de basófilos em SP ou MO ou
- Menos do que 100.000 plaquetas em sangue periférico, não relacionado ao tratamento ou

- esplenomegalia progressiva com mais de 10 cm abaixo do rebordo costal esquerdo ou
- Evolução cariotípica de qualquer anormalidade cromossômica além de cromossomo Ph único, inclusive cromossomo Ph variante e perda do cromossomo Y

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA CRISE BLÁSTICA

- mais de 30% de blastos em SP ou MO ou
- doença extramedular que não fosse baço, linfonodo ou fígado

Metodologia

Ensaio clínico e tratamento

Todos os pacientes receberam imatinib via oral, sob a forma de cápsulas, diariamente. Todos eram orientados a tomar o medicamento após uma refeição reforçada, que poderia ser desjejum ou almoço, acompanhado de dois copos de água.

Todos na fase crônica foram tratados com 400 mg e na fase acelerada ou crise blástica com 600 mg de imatinib.

Foi permitido um aumento da dose até 800 mg dividido em duas vezes ao dia em pacientes cuja RHC não tivesse sido atingida em 3 meses de tratamento ou naqueles pacientes com recaída hematológica após RHC.

Nenhuma outra droga antineoplásica foi permitida como tratamento coadjuvante.

EVOLUÇÃO DOS PACIENTES

No primeiro mês, os pacientes eram submetidos a uma consulta médica com avaliação de hemograma, enzimas hepáticas e função renal semanalmente. A partir do segundo mês as consultas passaram a ser mensais e o acompanhamento laboratorial quinzenal.

A medula óssea era avaliada por meio de aspirado medular e submetida a um mielograma e citogenética convencional a cada seis meses, ou a critério médico. Não fazia parte do protocolo a biópsia de medula óssea.

Os efeitos colaterais eram avaliados a cada consulta e graduados de acordo com o NIH-NCI (*Common Terminology Criteria for Adverse Events*).

MODIFICAÇÃO DA DOSE POR EFEITOS COLATERAIS

Toxicidade hematológica

Se um paciente apresentasse toxicidade grau 3 ou 4 (neutrófilos < 1.000/mm³, plaquetas < 50.000/mm³ na fase crônica e neutrófilos < 500/mm³ e

plaquetas $< 10.000/ \text{mm}^3$ na fase acelerada e na crise blástica) a terapia era interrompida até a melhora para grau 2 e a mesma dose era instituída. Se essa toxicidade permanecesse por mais de 2 semanas ou se houvesse recorrência, a dose era diminuída como descrita para toxicidade não hematológica grau 3 ou 4.

Pacientes com anemia recebiam transfusões a critério médico e poderiam ser submetidos a leucoaférese nas primeiras quatro semanas.

Toxicidade não hematológica definida pelo NIH-NCI

Se ocorresse toxicidade grau 2, a terapia era interrompida até que a toxicidade abaixasse para grau 1. Após este intervalo, a dose original era reinstituída. Se a toxicidade grau 2 recorresse, o tratamento era novamente interrompido até os efeitos baixarem para grau 1. Neste caso de recorrência, a dose era diminuída para 300 mg na fase crônica e para 400 mg na fase acelerada ou crise blástica. Se ocorresse toxicidade grau 3 ou 4, a terapia era interrompida até os efeitos melhorarem para grau 1 e a dose era diminuída como descrita acima.

Avaliação de eficácia

Para avaliação da eficácia do tratamento com imatinib nas três fases, nós utilizamos como parâmetros as taxas de resposta hematológica (Tabela 5), taxas de resposta citogenética (Tabela 6), curva de sobrevida livre de progressão (Tabela 7) e curva de sobrevida global (data do início do tratamento até a data do óbito).

TABELA 5. Critérios para classificação da resposta hematológica completa (Guilhot et al., 1997)

Contagem normal de leucócitos: <10.000/UI
Contagem normal de plaquetas: <450.000/UI
Diferencial normal (ausência de formas imaturas)
Desaparecimento de todos os sintomas e sinais da LMC

TABELA 6. Critérios para classificação da resposta citogenética (Druker et al,2001)

Resposta citogenética maior:
Resposta citogenética completa: 0% de células Ph positivas ou
Resposta citogenética parcial: 1 a 34% de células Ph positivas
Ausência de resposta citogenética:
100% de células Ph positivas ou
Resposta citogenética menor: 35 a 99% de células Ph positivas ou
Pacientes que apresentaram progressão hematológica e que não tiveram análise do cariótipo

TABELA 7. Critérios para construção da curva de sobrevida livre progressão (Kantarjian et al., 2002; O'Dwyer et al., 2004)

Data do início do tratamento com imatinib até um dos seguintes eventos:
Data da perda da RHC (dois hemogramas com intervalo de um mês) ou
Data da retirada do protocolo (para aqueles que não apresentaram RHC, ou seja, resistentes primários) ou
Data do desenvolvimento de fase acelerada definido em critérios de inclusão ou
Data do desenvolvimento de crise blástica definido em critérios de inclusão ou
Data da perda da resposta citogenética ou
Data da retirada do protocolo por efeito não satisfatório do imatinib (toxicidade) ou
Data do óbito por qualquer causa durante o tratamento

Avaliação da segurança

As avaliações de segurança consistiam no monitoramento de todos os eventos adversos e eventos adversos sérios. Foram monitorados semanalmente, durante o primeiro mês, o hemograma completo, as provas de função hepática (Glutamina transpeptidase [GGT], transaminase oxaloacética [TGO/AST], transaminase pirúvia [TGP/ALT], fosfatase alcalina e bilirrubinas), uréia, creatinina, ácido úrico, sódio, potássio, amilase. A partir do segundo mês, os exames laboratoriais passaram a ser quinzenal. O evento adverso foi considerado qualquer sinal, sintoma ou condição médica indesejável ocorrida após o início do imatinib. As condições médicas ou doenças presentes antes do início do tratamento foram consideradas eventos adversos se piorassem após o início do imatinib. Todos esses eventos eram anotados e, na medida do possível, eram classificados de acordo com o NCI.

Obtenção do material para estudo do cariótipo

A obtenção do material era feita por meio de punção esternal ou em crista ilíaca pósterio-superior, sob anestesia local (lidocaína a 5% sem vasoconstritor). A agulha era utilizada era a mesma para o mielograma. O material foi coletado antes do início do tratamento com o imatinib e depois a

cada 6 meses ou quando necessário (suspeita de recaída, pancitopenia prolongada, falta de resposta hematológica).

PREPARAÇÃO DOS CROMOSSOMOS

Cultura celular

O material aspirado era colocado em frascos de cultura (Falcon-Becton Dickison NJ, USA), meio composto de RPMI 1640 (Sigma, St. Louis, USA) quantidade suficiente para 5 mL, 20% de soro fetal bovino (Gibco-BRL, NY, USA), 1% de L-glutamina (Gibco -BRL, NY, USA) e 1% de antibiótico (penicilina/estreptomocina, preparada com 5.000U/mL de penicilina G sódica e 5.000µg/mL de sulfato de estreptomicina em 0.85% de solução salina, Gibco-BRL, NY, USA) e incubadas em estufa (Hepa Filtered, IR Incubator, Forma Scientific) a 37°C.

Incubação com colchicina

Após o tempo proposto de incubação, os frascos eram retirados da incubadora e o material transferido para tubos cônicos de 15 mL para centrifuga (Cornig, Cambridge, USA), e adicionado 0.1 mL de colchicina (Sigma, Saint Louis, USA). Os frascos foram fechados novamente e homogeneizados suavemente. Depois foram incubados a 37°C em banho-maria (Fanem-modelo 100, São Paulo, Brasil) por aproximadamente uma hora. Depois centrifugados

(Eppendorf-5403) a 2000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado com auxílio de pipeta pasteur descartável (1.9 mL, Sigma, Saint Louis, USA) e o precipitado ressuspenso.

Solução hipotônica

Ao material ressuspenso, geralmente um a dois mL, acrescentou-se uma quantidade de solução hipotônica (0.075M de cloreto de potássio, Merck, Rio de Janeiro, Brasil) até completar 10 mL. Os frascos foram incubados a 37⁰C em o banho-maria por 20 minutos, e centrifugados, sendo o sobrenadante desprezado. Esta etapa tem como finalidade o rompimento ou apenas a fragilização da membrana citoplasmática.

Fixação do material

As amostras eram lavadas três a cinco vezes com solução fixadora (solução de Carnoy), que consiste em três partes de metanol (Synth, São Paulo, Brasil) para uma parte de ácido acético glacial (Merck, São Paulo, Brasil). A primeira lavagem foi realizada em solução gelada (2 a 8⁰C) visando-se boa separação do material nuclear. Após essas lavagens, o sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi ressuspenso em um volume final de um a dois mL e estocado -20⁰C.

Preparação da lâmina

A partir do material fixado, antes de ser congelado, uma gota era pingada sobre uma lâmina limpa (Perfecta, São Paulo, Brasil). Rapidamente esta lâmina era exposta a uma chama de bico de Bunsen (Fireboy, Tecnimicra). Se as células não estão suficientemente dispersas, os cromossomos não vão se separar adequadamente. Se a diluição for muito grande, um tempo maior vai ser gasto na procura de metáfases de boa qualidade, sem muitas sobreposições. As gotas foram lançadas de uma pipeta pasteur (Fisher, Alabana, USA) a uma distância relativamente curta em relação à lâmina (aproximadamente 15 cm) pois, para esses casos, onde foi efetuada à estimulação através de agentes mitógenos, os cromossomos se dispersam com muita facilidade.

Bandamento

Após o gotejamento do material nas lâminas, essas foram embrulhadas em papel Flor Post (Ripel, São Paulo, Brasil) e permaneceram assim por três a 10 dias. Esta espera é sempre necessária para o envelhecimento da lâmina, o que ajuda o bandamento dos cromossomos e a melhor visualização das bandas. Algumas vezes as lâminas foram colocadas por 30 minutos a 100°C em placa aquecida (agitador magnético com aquecimento, Cole Parmer, Chicago, USA) com o objetivo de acelerar o envelhecimento.

CARIOTIPAGEM

Para cada amostra 20 metáfases foram estudadas de acordo com as normas da Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética Humana (ISCN) de 1995.

Metodologia estatística

As probabilidades de cada um dos eventos óbito, resposta hematológica, resposta citogenética, recidiva e progressão hematológica foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier. O teste de log-rank foi adotado para o estudo univariado de variáveis associado a cada uma dos eventos. O modelo de Cox foi utilizado no estudo multivariado para a identificação dos fatores de risco mais importantes associados aos eventos.

Resultados

Fase crônica

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Entre os 50 pacientes na fase crônica avaliados imediatamente antes do início do tratamento com imatinib, 27 (54%) eram do sexo masculino e 23 (46%) do sexo feminino (a relação foi de 1.2:1.0). A mediana de idade foi de 45 anos (21 a 77). Todos os pacientes haviam recebido IFN- α , sendo 37 (74%) resistentes e 17 (34%) intolerantes. Vinte e nove pacientes (58%) encontravam-se em fase crônica tardia (mais de um ano em tratamento com IFN- α) (Tabela 8).

TABELA 8. Características dos pacientes portadores de leucemia mielóide na fase crônica

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Sexo	no (%)
Masculino	27 (54)
Feminino	23 (46)
Idade	anos
Mediana	45
Variação	21-77
História da doença	
Resistência hematológica/citogenética ao IFN- α	37 (74)
Intolerância ao IFN- α	17 (34)
Tempo de tratamento com IFN-α anos	anos
> 1 ano	29 (58)
< 1 ano	21 (42)

IFN- α : interferon alfa

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

A mediana de duração do tratamento com imatinib foi de 17 meses (variação entre 3 e 32 meses).

Ao final do estudo, 49 pacientes (98%) estavam vivos. O único óbito (2%) durante o tratamento foi secundário a hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago (o paciente era portador de cirrose hepática secundária a hepatite B) (Figura 8). Do total da amostra, 43 (86%) estavam recebendo imatinib e 6 (12%) haviam descontinuado o tratamento: 3 (6%) por progressão hematológica e 2 (4%) por efeitos adversos graves (toxicidade hepática grau 3), 1 (2%) por resistência primária.

FIGURA 8. Sobrevida global dos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase crônica

Resposta hematológica completa

Dos 50 pacientes estudados, 49 (98%) apresentaram RHC e 1 (2%) foi refratário primário. A mediana de tempo para atingir a RHC foi de 1.1 meses.

A taxa de sobrevida livre de progressão (SLP) hematológica em 18 meses foi de 89,06% ($\pm 4,65\%$) (Figura 9). A mediana de tempo para progressão hematológica foi de 15.5 meses (1.5 a 34.4 meses).

FIGURA 9. Sobrevida livre de progressão dos pacientes com leucemia mielóide crônica na em fase crônica

Resposta citogenética maior

Dos 50 pacientes na fase crônica, 35 (70%) obtiveram RCM, sendo que 24 (48% do total) atingiram RCC. A taxa de RCM em 18 meses foi de 53,42% ($\pm 7,25\%$) e a mediana de tempo para a obtenção de RCM foi de 7,7 meses (Figura 10). Dos 35 pacientes que atingiram RCM, 33 (94,3%) permaneceram com a mesma resposta, enquanto que 2 (5,7%) perderam esta resposta.

FIGURA 10. Tempo para obtenção da resposta citogenética maior nos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase crônica

FATORES DE PROGNÓSTICO PARA PROGRESSÃO HEMATOLÓGICA

Foram feitas associações entre algumas características clínicas e laboratoriais identificadas classicamente como possíveis fatores de prognóstico com progressão hematológica. As variáveis estudadas na fase crônica foram o tempo de tratamento com IFN- α , resistência ou intolerância ao IFN- α , idade, sexo, presença de esplenomegalia, tempo de doença diagnosticada, hemoglobina, número de leucócitos, número de plaquetas, porcentagem de

basófilos e blastos em SP ou MO, e resposta citogenética. Todas essas características foram observadas no início do tratamento com imatinib, e não ao diagnóstico de LMC (Tabela 9). De acordo com análise univariada, as seguintes variáveis foram estatisticamente significantes para maior probabilidade de progressão hematológica: tempo de tratamento com IFN- α menor do que um ano ($P=0,0473$) (Figura 11), presença de esplenomegalia ($P=0,0204$) (Figura 12), menor tempo de doença diagnosticada ($P<0,0001$) (Figura 13) e resposta citogenética ($P=0,0002$). Na análise multivariada, apenas o menor tempo de doença diagnosticada foi estatisticamente significativa na associação com progressão hematológica. A variável resposta citogenética não entrou neste modelo porque nenhum paciente com resposta citogenética progrediu.

TABELA 9. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas, laboratoriais e progressão hematológica em pacientes com leucemia mielóide crônica em fase crônica

	N TOTAL DE PACIENTES	N DE PACIENTES COM PROGRESSÃO	P
Tempo de IFN-α			
< 1 ano	21	5	0,0473
> 1 ano	29	2	
Resistência ao IFN-α			
não	13	1	0,5155
sim	37	6	
Intolerância ao IFN-α			
não	33	4	0,4957
sim	17	3	
Idade			
< 60 a	43	5	0,6390
> 60 a	7	2	
Sexo			
masculino	27	4	0,9905
feminino	23	3	
Esplenomegalia			
não	45	5	0,0204
sim	5	2	
Tempo de doença diagnosticada			
< 1 ano	4	3	< .0001
> 1 ano	46	4	
Hemoglobina			
< 12 g/dl	23	3	0,8985
> 12 g/dl	27	4	
Leucócitos			
< 10.000/mm ³	25	2	0,2912
10.000-49.999/mm ³	18	3	
> 50.000/mm ³	7	2	
Plaquetas			
< 450.000/mm ³	43	6	0,7531
> 450.000/mm ³	7	1	
Basófilos			
< 7%	42	5	0,2265
> 7%	8	2	
Blastos em SP ou MO			
não	45	6	0,8993
sim	5	1	
Resposta citogenética			
não	17	7	0,0002
sim	33	0	

IFN- α =interferon alfa; SP=sangue periférico; MO=medula óssea

FIGURA 11. Sobrevida livre de progressão em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica que receberam IFN- α por mais ou menos de 1 ano

FIGURA 12. Sobrevida livre de progressão em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica com e sem esplenomegalia

FIGURA 13. Sobrevida livre de progressão em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica com mais ou menos de 1 ano de doença diagnosticada

FATORES DE PROGNÓSTICO PARA RESPOSTA CITOGÉNÉTICA

Todas as características clínicas e laboratoriais que foram utilizadas na análise univariada para progressão hematológica foram também estudadas para resposta citogenética. Nenhuma destas variáveis foi estatisticamente significativa neste estudo (Tabela 10).

TABELA 10. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas, laboratoriais e resposta citogenética em pacientes com leucemia mielóide crônica na fase crônica

	N TOTAL DE PACIENTES	N DE PACIENTES COM RESPOSTA	P
Tempo de IFN-α			
< 1 ano	21	12	0,5616
> 1 ano	29	21	
Resistência ao IFN-α			
Não	13	10	0,3447
Sim	37	23	
Intolerância ao IFN-α			
Não	33	21	0,5231
Sim	17	12	
Idade			
< 60 a	43	30	0,0895
> 60 a	7	3	
Sexo			
Masculino	27	18	0,9167
Feminino	23	15	
Esplenomegalia			
Não	45	31	0,7292
Sim	5	2	
Tempo de doença diagnosticada			
< 1 ano	4	1	0,3743
1-2 anos	22	15	
> 3 anos	24	17	
Hemoglobina			
< 12 g/dl	23	15	0,9877
> 12 g/dl	27	18	
Leucócitos			
< 10.000/mm ³	25	15	0,5102
10.000-49.999/mm ³	18	13	
> 50.000/mm ³	7	5	
Plaquetas			
< 450.000/mm ³	43	29	0,9403
> 450.000/mm ³	7	4	
Basófilos			
< 7%	42	28	0,7870
> 7%	8	5	
Blastos em SP ou MO			
não	45	31	0,3557
sim	5	2	

IFN- α =interferon alfa; SP=sangue periférico; MO=medula óssea

**EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO ESTUDO DE
FASE CRÔNICA**

Toxicidade hematológica

Dos 50 pacientes estudados na fase crônica, 31 (62%) apresentaram pelo menos um episódio de mielossupressão grau 3 ou 4 durante a terapia com imatinib; 23 (46%) tiveram neutropenia (neutrófilos $< 1000/\text{mm}^3$), 8 (16%) trombocitopenia (plaquetas $< 50.000/\text{mm}^3$) e 5 (10%) anemia (que precisaram de transfusão de concentrado de hemácias) (Tabela 11).

TABELA 11. Toxicidade hematológica observada nos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica durante o tratamento com imatinib

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Evento	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Neutropenia	6 (12)	23 (46)
Trombocitopenia	9 (18)	8 (16)
Anemia	1 (2)	5 (10)

Toxicidade não hematológica

Os efeitos colaterais ou eventos adversos mais comuns observados foram aumento de peso, edema superficial (periorbitário e pré-tibial), reações cutâneas tipo exantemas, náuseas, câibras, diarreia, cefaléia e cansaço (Tabela 12). Evento adverso grave relacionado ao tratamento que levou à suspensão definitiva ocorreu em 2 pacientes (4%), ambos por hepatotoxicidade grau 4, diagnosticado por aumento das transaminases hepáticas TGO e TGP. Aproximadamente 2% dos pacientes tiveram alterações na bilirrubina indireta e na amilase (Tabela 13). Todos os pacientes com amilase acima do limite superior da normalidade foram submetidos a um ultrassom de abdome, não sendo evidenciado nenhuma anormalidade pancreática. Não houve morte relacionada ao tratamento.

TABELA 12. Eventos adversos não-hematológicos mais comuns observados nos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica durante o tratamento com imatinib

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Evento	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Aumento de peso	32 (64)	0
Edema superficial	27 (54)	0
Dermatite/exantema	14 (28)	0
Náusea	14 (28)	0
Cãibras musculares	13 (26)	0
Diarreia	12 (24)	0
Cefaléia	12 (24)	1 (2)
Fadiga/cansaço	10 (20)	1 (2)
Vômitos	8 (16)	0
Prurido	5 (10)	0
Artralgias	4 (8)	0
Dor abdominal	3 (6)	0
Derrame pleural	1 (2)	0

TABELA 13. Alterações laboratoriais observadas nos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase crônica durante o tratamento com imatinib

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Alteração	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Alteração de TGO/TGP/GGT/FA	7 (14)	2 (4)
Bilirrubinas	3 (6)	2 (4)
Alteração de amilase	1 (2)	2 (4)

Fase acelerada

CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA

Entre os 44 pacientes na fase acelerada avaliados imediatamente antes do início do tratamento com imatinib, 27 (61,4%) eram do sexo masculino e 17 (38,6%) do sexo feminino (a relação foi de 1.6:1.0). A mediana de idade foi de 41.5 anos (20 a 82) (Tabela 14).

TABELA 14. Características de pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase acelerada

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Sexo	no (%)
Masculino	27 (61,4)
Feminino	17 (38,6)
Idade	anos
Mediana	45
Variação	20-82

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Resposta hematológica completa

A mediana de duração do tratamento com imatinib foi de 17.4 meses (variação entre 1 a 33 meses).

Ao final do estudo, dos 44 pacientes estudados, 41 (93,2%) apresentaram RHC e 3 (6,8%) foram resistentes primários. A mediana de tempo para atingir a RHC foi de 1.3 meses. Dos 41 pacientes que atingiram RHC, 15 (36,6%) progrediram para crise blástica ou recaíram para a fase acelerada. A taxa estimada de SLP hematológica em 18 meses foi de 63,89% ($\pm 7,57\%$). A mediana de tempo para progressão hematológica foi de 15 meses (Figura 14). Do total da amostra, 12 pacientes (27,3%) foram a óbito (Figura 15). Onze pacientes (25%) foram a óbito por progressão para crise blástica e 1 paciente (2,3%) por toxicidade hematológica grau 4.

FIGURA 14. Sobrevida livre de progressão dos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase acelerada

FIGURA 15. Sobrevida global dos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase acelerada

Resposta citogenética maior

Dos 44 pacientes na fase acelerada, 17 (38,6%) obtiveram RCM sendo 12 (27,3% do total) RCC. A taxa de RCM em 18 meses foi de 40,57% ($\pm 8,84\%$) e a mediana de tempo para obtenção da RCM foi de 10,6 meses (Figura 16). Dos 17 pacientes que atingiram RCM, 14 (82,4%) permaneceram com a mesma resposta, enquanto que 3 (17,6%) perderam esta resposta. Todos os pacientes que perderam resposta citogenética também perderam resposta clínica.

FIGURA 16. Tempo para obtenção da resposta citogenética maior nos pacientes com leucemia mielóide crônica na fase acelerada

FATORES DE PROGNÓSTICO PARA PROGRESSÃO HEMATOLÓGICA

Características clínicas e laboratoriais com importância prognóstica reconhecida foram avaliadas quanto à possível associação com progressão hematológica. As variáveis estudadas na fase acelerada foram idade, sexo, presença de esplenomegalia, tempo de doença diagnosticada, presença de anormalidade citogenética adicional, resposta citogenética, hemoglobina, número de leucócitos, número de plaquetas e porcentagem de basófilos e blastos em SP ou MO. Assim como na fase crônica, todas essas características foram observadas no início do tratamento com imatinib, e não ao diagnóstico de LMC. (Tabela 15). De acordo com a análise univariada, somente a RCM foi estatisticamente significativa para uma maior probabilidade de progressão hematológica, ou seja, os pacientes que obtiveram RCM tiveram menor chance de progressão ($P=0,0003$).

TABELA 15. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas, laboratoriais e progressão hematológica em pacientes com leucemia mielóide crônica na fase acelerada

	N TOTAL DE PACIENTES	N DE PACIENTES COM PROGRESSÃO	P
Idade			
< 60 a	36	16	0,3504
> 60 a	8	2	
Sexo			
masculino	27	13	0,4867
feminino	17	5	
Esplenomegalia			
sim	24	7	0,4265
não	20	11	
Tempo de doença diagnosticada			
< 1 ano	5	2	0,9785
> 1 ano	39	16	
Hemoglobina			
< 12 g/dl	29	14	0,1755
> 12 g/dl	15	4	
Leucócitos			
< 10.000/mm3	19	7	0,5102
10.000-49.999/mm3	18	6	
> 50.000/mm3	7	5	
Plaquetas			
< 450.000/mm3	28	11	0,6920
> 450.000/mm3	16	7	
Basófilos			
< 7%	23	9	0,6458
> 7%	21	9	
Blastos em SP ou MO			
não	21	7	0,2228
sim	23	11	
Resposta citogenética			
sim	14	0	0,0003
não	30	18	
Anormalidade citogenética adicional			
sim	25	8	0,2111
não	19	10	

SP=sangue periférico; MO=medula óssea

FATORES DE PROGNÓSTICO ESTUDADOS PARA RESPOSTA CITOGENÉTICA NA**FASE ACELERADA**

Todas as características clínicas e laboratoriais que foram utilizadas na análise para progressão hematológica foram também estudadas para resposta citogenética. Nenhuma destas variáveis foi estatisticamente significativa neste estudo (Tabela 16).

TABELA 16. Correlação (análise univariada) entre as características clínicas, laboratoriais e resposta citogenética em pacientes com leucemia mielóide crônica na fase acelerada

	N TOTAL DE PACIENTES	N DE PACIENTES COM PROGRESSÃO	P
Idade			
< 60 a	38	11	0,9614
> 60 a	8	3	
Sexo			
masculino	27	11	0,1622
feminino	17	3	
Esplenomegalia			
sim	24	6	0,2751
não	20	8	
Tempo de doença diagnosticada			
< 1 ano	5	2	0,9821
> 1 ano	39	12	
Hemoglobina			
< 12 g/dl	29	7	0,1038
> 12 g/dl	15	7	
Leucócitos			
< 10.000/mm ³	19	7	0,5102
10.000-49.999/mm ³	18	3	
> 50.000/mm ³	7	4	
Plaquetas			
< 450.000/mm ³	28	11	0,3040
> 450.000/mm ³	16	3	
Basófilos			
< 7%	23	9	0,3146
> 7%	21	5	
Blastos em SP ou MO			
não	23	7	0,8927
sim	21	7	
Anormalidade citogenética adicional			
sim	25	9	0,4219
não	19	5	

Anormalidades cromossômicas adicionais encontradas no estudo

Vinte e cinco dos 44 pacientes (56,8%) na fase acelerada apresentavam anormalidades cromossômicas adicionais além do cromossomo Ph único antes do início do tratamento com imatinib, sendo que alguns pacientes apresentavam mais de uma anormalidade adicional. As anormalidades adicionais clonais mais freqüentemente observadas no estudo foram: duplo cromossomo Ph (6), anormalidades (iso, add ou del) do braço curto do 17 (5), trissomia do cromossomo 8 (5) e cromossomo Ph variante (5). Ao final do estudo, dos 25 cariótipos com anormalidade adicional, 9 (28%) não tiveram alteração no cariótipo 8 (32%) haviam normalizado, 4 (16%) não puderam ser avaliados, 3 (12%) haviam eliminado o clone adicional mas mantinham o clone Ph, 1 (4%) eliminou o clone Ph mas manteve a anormalidade adicional (Tabela 17).

TABELA 17. Relação das anormalidades citogenéticas adicionais na fase acelerada

CARIÓTIPO PRÉ-TRATAMENTO COM IMATINIB	CARIÓTIPO NO FINAL DO ESTUDO
46,XX,t(9;19;22)(q34;p11;q11)	46,XX,t(9;19;22)(q34;p11;q11)
46,XY,t(9;12;22)(q34;q13;q22)	46,XY,t(9;12;22)(q34;q13;q22)
47,XY,+8,t(9;22)(q34;q11)	46,XY,+8
46,XX,inv(3)(p12q22),t(9;22)(q34;q11)	Não avaliado
46,XY,del(7)(p15), t(9;22)(q34;q11)	46,XY,del(7)(p15), t(9;22)(q34;q11)
48,XX,+8,t(9;22)(q34;q11),+der(22) t(9;22)(q34;q11)	46,XX,t(9;22)(q34;q11)
46,XY,inv(8)(p22q22),t(9;22)(q34;q11),add(17)(p12)	46,XY,inv(8)(p22q22),t(9;22)(q34;q11),add(17)(p12)
47,XY, t(9;22)(q34;q11),+der(22) t(9;22)(q34;q11)	46,XY
47,XX, t(9;22)(q34;q11),add(17)(p11),+21	46,XX, t(9;22)(q34;q11)
46,XY,t(9;19;22)(q34;q34;q11)	46,XY,t(9;19;22)(q34;q34;q11)
47,XY,+8, t(9;22)(q34;q11)	46,XY
47,XY,+8, t(9;22)(q34;q11)	46,XY
46,XY, t(9;22)(q34;q11),i(17)(q10)	46,XY
47,XY, t(9;22)(q34;q11),+der(22) t(9;22)(q34;q11)	46,XY, t(9;22)(q34;q11)
46,XY,t(10;10)(p12;q25) BCR/ABL+	46,XY,t(10;10)(p12;q25) BCR/ABL+
47,XY, t(9;22)(q34;q11),+der(22) t(9;22)(q34;q11)	47,XY, t(9;22)(q34;q11),+der(22) t(9;22)(q34;q11)
47,XY,+8,t(9;22)(q34;q11)	46,XY
46,XX, t(9;22)(q34;q11),t(12;15)(p12;q23)	46,XX, t(9;22)(q34;q11),t(12;15)(p12;q23)
45,XX, t(9;22)(q34;q11),del(17)(p11),-18	Não avaliada
46,XX,t(9;22)(q34;q11),i(17)(q10)	Não avaliada
46,XX,t(7;22)(q35;q11)	46,XX,t(7;22)(q35;q11)
46,XX,t(X;2;9;22)(?;?;q34;q11)	46,XX
45,X,-Y, t(9;22)(q34;q11)	46,XY
47,XY,t(9;22)(q34;q11),add(10)(p13),+der(22)t(9;22)(q34;q11)	Não avaliado
47,XX, t(9;22)(q34;q11),+der(22) t(9;22)(q34;q11)	46,XX,

EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO ESTUDO DE FASE

ACELERADA

Toxicidade hematológica

Dos 44 pacientes estudados na fase acelerada, 29 (65,9%) apresentaram pelo menos um episódio de mielossupressão grau 3 ou 4 durante a terapia com imatinib; 17 (38,6%) apresentaram neutropenia (neutrófilos $< 500/\text{mm}^3$), 12 (27,3%) trombocitopenia (plaquetas $< 10.000/\text{mm}^3$) e 7 (15,9%) anemia (com necessidade de transfusão de concentrado de hemácias) (Tabela 18). Um paciente foi a óbito por mielossupressão e sepsis.

TABELA 18. Toxicidade hematológica observada durante o tratamento com imatinib nos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase acelerada

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Evento	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Neutropenia	7 (15,9)	17 (38,6)
Trombocitopenia	7 (15,9)	12 (27,3)
Anemia	4 (9,0)	7 (15,9)

Toxicidade não hematológica

Os eventos adversos não hematológicos mais comuns observados foram aumento de peso, edema superficial (periorbitário e pré-tibial), cefaléia, fadiga/cansaço, câibras musculares, diarreia, dermatite/exantema, vômitos e dor abdominal (Tabela 19). Aproximadamente 11% dos pacientes apresentaram alteração nas transaminases hepáticas e 4% nas bilirrubinas grau 3 ou 4 (Tabela 20). Não houve nenhuma morte por efeito adverso não hematológico.

TABELA 19. Eventos adversos observados durante o tratamento com imatinib nos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase acelerada

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Evento	Grau 1e 2	Grau 3 e 4
Aumento de peso	34 (77,3)	0
Edema superficial	19 (43,2)	1 (2,3)
Dermatite/exantema	13 (29,5)	1 (2,3)
Náusea/vômitos	12 (27,3)	0
Câibras musculares	14 (31,8)	0
Diarreia	13 (29,5)	0
Cefaléia	15 (34,1)	0
Fadiga/cansaço	14 (31,8)	0
Artralgias	8 (18,2)	0
Dor abdominal	8 (18,2)	0

TABELA 20. Alterações laboratoriais mais comuns observadas durante o tratamento com imatinib em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na fase acelerada

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Alteração	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Alteração de TGO/TGP/GGT/FA	12 (27,3)	5 (11,4)
Bilirrubinas	11 (25,0)	2 (4,5)
Alteração de amilase	3 (6,8)	0

Crise blástica

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Entre os 18 pacientes que iniciaram o estudo em crise blástica, 13 (72,2%) eram do sexo masculino e 5 (27,8%) eram do sexo feminino (a relação foi de 2.6:1.0). A mediana de idade foi de 47,5 anos (27 a 80). Em 13 (72,2%) a crise blástica era mielóide (Tabela 21).

Tabela 21. Característica dos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na crise blástica

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Sexo	no (%)
Masculino	13 (72,2)
Feminino	5 (27,8)
Idade	anos
Mediana	47,5
Variação	27-80
Linhagem celular	
Mielóide	13 (72,2)
Linfóide	5 (27,8)

Apenas 2 (11,1%) estão vivos, em remissão hematológica completa e com resposta citogenética completa. Mesmo aqueles que atingiram remissão hematológica, recaíram em poucas semanas.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Resposta hematológica completa e citogenética completa

Dos 18 pacientes acompanhados na crise blástica, 8 (44,4%) apresentaram RHC. Destes, 2 pacientes (25%; 11,1% do total) estão vivos em RHC e RCC. Os 16 pacientes (88,9%) foram a óbito por progressão da doença (Figura 17).

Figura 17. Sobrevida global dos pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na crise blástica

FATORES DE PROGNÓSTICO

Devido ao alto número de óbitos, não foi possível, do ponto de vista estatístico, estudar as associações de fatores de prognóstico e resposta hematológica e citogenética.

EFEITOS ADVERSOS MAIS COMUMENTE ENCONTRADOS NO ESTUDO DE CRISE

BLÁSTICA

Toxicidade hematológica

Dos 18 pacientes estudados na crise blástica, a maioria apresentou episódios de mielotoxicidade grau 3 ou 4 durante a terapia com imatinib; 13 (72.2%) apresentaram neutropenia (neutrófilos $< 500/\text{mm}^3$), 8 (44.4%) trombocitopenia (plaquetas $< 10.000/\text{mm}^3$) e 4 (22.2%) anemia (necessidade transfusional) (Tabela 22).

TABELA 22. Toxicidade hematológica observada durante o tratamento com imatinib nos pacientes com leucemia mielóide crônica na crise blástica

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Evento	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Neutropenia	2 (11,1)	13 (72,2)
Trombocitopenia	3 (16,6)	8 (44,4)
Anemia	1 (5,6)	4 (22,2)

Toxicidade não hematológica

Os eventos adversos mais comuns observados foram semelhantes aos observados nas fases crônica e acelerados. O aumento de peso e edemas peri-orbitários e pré-tibiais foram os mais comuns, seguido por cefaléia, dores musculares ou ósseas, febre, câibras, náuseas, vômitos e diarreia (Tabela 23). Não houve suspensão da droga por efeito colateral nem morte associada ao tratamento. Apenas 2 pacientes (11,1%) apresentaram aumento da transaminases hepáticas e da bilirrubina indireta grau 3 ou 4 (Tabela 24).

TABELA 23 – Eventos adversos mais comuns observados durante o tratamento com imatinib em pacientes portadores de leucemia mielóide crônica na crise blástica

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Evento	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Aumento de peso/edema	11 (61,1)	1 (5,6)
Dermatite/exantema	4 (22,2)	0
Náusea/vômitos	5 (27,8)	1 (5,6)
Cãibras musculares	6 (33,3)	0
Diarréia	5 (27,8)	0
Cefaleia	10 (55,5)	0
Fadiga/cansaço	9 (50,0)	0
Dor abdominal	1 (5,6)	1 (5,6)
Febre	7 (38,8)	1 (5,6)
Dores musculares/ósseas	6 (33,3)	0

TABELA 24. Alterações laboratoriais mais comuns observadas durante o tratamento com imatinib nos pacientes com leucemia mielóide crônica na crise blástica

NÚMERO DE PACIENTES COM EVENTO (%)		
Alteração	Grau 1 e 2	Grau 3 e 4
Alteração de TGO/TGP/GGT/FA	7 (38,9)	1 (5,6)
Bilirrubinas	1 (5,6)	1 (5,6)

Discussão

Avaliação da eficácia

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

Fase crônica

Neste estudo de fase II com imatinib, a taxa de resposta hematológica nos pacientes com LMC fase crônica tardia foi de 96%, sendo atingida em uma mediana de 1.1 meses. A taxa de sobrevida livre de progressão em 18 meses foi em torno de 89%. Esses resultados correspondem exatamente aos publicados pelo grupo internacional de LMC para o STI571. Neste estudo definitivo de fase II (Kantarjian et al., 2002b), mostrou que pacientes em fase crônica tardia tratados previamente com IFN- α obtiveram taxas de resposta hematológica completa de 98%, e o tempo para se atingir esta resposta foi de 0.7 meses. A taxa de sobrevida livre de progressão em 18 meses foi de 89%. As taxas de resposta citogenética maior também foram muito semelhantes. Sessenta e seis por cento dos nossos pacientes em fase crônica obtiveram RCM, sendo que destes, 72.7% apresentaram RCC. Apenas dois pacientes (6%) perderam a resposta citogenética. No estudo de Kantarjian (2002b), 60% atingiram RCM, e destes, 69% RCC. Dezesesseis por cento destes pacientes perderam a resposta citogenética ao longo do estudo. As taxas de resposta hematológica e citogenética foram semelhantes provavelmente por ser o nosso estudo extremamente parecido com o de Kantarjian. Nós utilizamos os mesmos

critérios de suspensão de dose, aumento de dose, frequência de exames laboratoriais e de visitas, que foram adotados no estudo de acesso expandido.

As taxas de RCM e RCC nossa série na fase crônica foram mais altas das que tem sido reportadas em pacientes tratados com IFN- α (15% e 5 a 7% respectivamente) (Talpaz et al., 2001). Kantarjian e col. (2003), compararam os resultados do tratamento com imatinib como segunda linha (na fase crônica tardia pós IFN- α) com um grupo histórico de 293 pacientes tratados apenas com IFN- α que não tiveram acesso ao imatinib com taxas de RCC de 29%. De 201 pacientes que estavam sendo tratados com IFN- α , 159 (79%) passaram a receber imatinib, sendo que 101 (64%) obtiveram RCC. A sobrevida estimada de cinco anos foi de 86%. Através de análise multivariada com diferentes grupos de risco e características clínicas e laboratoriais, a terapia com imatinib foi o único fator independente de prognóstico favorável neste grupo (Kantarjian et al, 2003b).

O mesmo grupo em outro trabalho comparou as respostas clínica e citogenética de um grupo que falhou ao tratamento com IFN- α , semelhante à nossa casuística, e que foi “resgatado” com imatinib com o grupo histórico (só tratados com IFN- α). Os resultados do grupo que recebeu imatinib foram superiores. A RCM foi de 62% (contra 19% de RCM no grupo do IFN- α) (Kantarjian et al, 2004). Nossos resultados demonstraram que o imatinib é eficaz mesmo como tratamento de segunda linha e reforçam os resultados já publicados por outros.

Fase acelerada

Na fase acelerada, o imatinib vem promovendo resultados extremamente promissores. Na nossa série, a RHC foi observada em 93% e a RCM em 34% (27% com RCC), enquanto que a taxa estimada de sobrevida livre de progressão em 18 meses foi de 64%. Esses dados são semelhantes aos da literatura. No grupo do M.D. Anderson, em um grupo de 200 pacientes na fase acelerada, a RHC foi de 80%, enquanto que as taxas de RCM e a RCC foram exatamente iguais aos nossos resultados (34% de RCM e 24% de RCC) e taxa de sobrevida livre de progressão em 18 meses de 68% (Kantarjian et al., 2002a). Esses resultados são superiores aos publicados envolvendo tratamentos com IFN- α em fase acelerada cuja taxa de RHC é em torno 20%, enquanto que a resposta citogenética não ultrapassa 5% (Kantarjian et al., 1992).

Crise blástica

Os resultados na crise blástica continuam desanimadores. Dos 18 pacientes do nosso grupo, 8 (44%) apresentaram resposta hematológica completa. Apenas dois estão vivos (11%), e ambos com resposta citogenética completa. Todos os outros pacientes recaíram ou não obtiveram resposta clínica nem citogenética. Esses resultados são semelhantes aos publicados al., embora a nossa resposta hematológica tenha sido menor. Em um estudo com 30 pacientes em crise blástica, 18 (60%) apresentaram resposta hematológica

completa, e 4 (13%) obtiveram resposta citogenética, embora não seja especificado neste trabalho se a resposta foi completa ou não (Sureda, 2003).

FATORES DE PROGNÓSTICO

Fase crônica

Fatores de prognóstico em LMC têm permitido a identificação de diferentes grupos de risco, acompanhamento de efeitos de novos tratamentos em determinados grupos de risco e conseqüente reorientação do tratamento (Kantarjian, 2003). Dos fatores de prognóstico por nós estudados para progressão hematológica na fase crônica, o tempo de tratamento com IFN- α e o tempo de doença diagnosticada foram inversamente proporcionais à progressão, ou seja, quanto menor o tempo destas duas variáveis, maior foi a chance de progressão. Esses dados diferem da literatura, onde o intervalo de menos do que um ano desde o diagnóstico da LMC até o início do tratamento com imatinib é um fator favorável para respostas citogenéticas (Kantarjian et al., 2002b). No início do Estudo de Acesso Expandido, nós podíamos incluir na fase crônica apenas dois pacientes por mês para o início do tratamento com imatinib. Nós então optamos por incluí-los de acordo com a duração da fase crônica, ou seja, os pacientes com maior tempo de doença foram incluídos primeiro. Essa escolha selecionou, portanto, pacientes que já tinham muito tempo de história, e que talvez tivessem uma biologia da doença menos agressiva.

A idade não foi estatisticamente significativa nem para progressão hematológica nem para resposta citogenética. Este dado nos chamou a atenção porque a idade avançada é considerada pior prognóstico em pacientes com LMC (Sokal et al., 1984; Hasford et al., 1998). O pior prognóstico associado à idade avançada de pacientes com LMC aparece em todas as modalidades terapêuticas, incluindo BU, HY, IFN- α e TMOalo (Gratwohl et al., 2003; Cortes et al., 2003). Se este dado está relacionado a uma biologia intrínseca adversa da doença, a uma pior biodisponibilidade da droga, à presença de comorbidades, a uma toxicidade relacionada ao tratamento, não se sabe (Cortes et al., 2003b). Entretanto, após o início dos trabalhos com imatinib, a idade acima de 60 anos parece não ter tido mais impacto no prognóstico em pacientes na fase crônica (Kantatjian et al., 2003c). Em um estudo realizado no M.D.Anderson, onde foram avaliados 180 pacientes com LMC recém diagnosticados, 49 (26%) eram pacientes com mais de 60 anos. De acordo com este trabalho, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos acima de 60 anos e abaixo de 60 anos quando foram comparados resposta clínica, resposta citogenética e sobrevida global (Cortes et al, 2003c).

Nossos resultados mostraram que a obtenção de resposta citogenética após o tratamento com imatinib foi associado a uma maior sobrevida livre de progressão, e este fator de prognóstico foi estatisticamente significativo tanto na análise univariada como na multivariada. A resposta citogenética completa tem sido reportada como um fator de prognóstico independente, sendo associada a um baixo risco de progressão. Em uma série de 56 pacientes que atingiram

RCC após terapia com IFN- α , 15 descontinuaram o tratamento por causas diversas (efeitos adversos, escolha do paciente e negatização do PCR). Esses 15 pacientes foram comparados aos 41, que continuaram com IFN- α apesar da RCC. Não houve diferença significativa na sobrevida entre estes dois grupos, que ficou em torno de 70% em 10 anos (Mahon et al., 2002). Foi demonstrado em uma série de pacientes de fase crônica tardia pós IFN- α que foram tratados com imatinib, que a persistência de células Ph positivas após 6 meses ou mais de tratamento era associado com baixas taxas de resposta citogenética (9 a 13% de RCM e 0 a 4% de RCC) (Kantarjian et al, 2003b).

Em um estudo muito recente, um grupo analisou prospectivamente 117 pacientes tratados com imatinib, com LMC fase crônica ou acelerada, e avaliou o cariótipo e o PCR quantitativo (PCR-Q), método largamente utilizado para detecção de transcritos BCR-ABL, principalmente para seguimento de pacientes após TMOalo. Altos níveis de PCR-Q nos primeiros seis meses pós-transplante estão associados com alto risco de recaída (Hughes et al., 2003). Foi feita uma análise para determinar o impacto prognóstico do PCR-Q e da citogenética durante o tratamento com imatinib como primeira linha na resposta citogenética e na sobrevida. Esta análise incluía, além de fatores de prognóstico pré-estabelecidos, a resposta citogenética aos três meses. Baixo valor do PCR-Q após três meses de terapia foi correlacionado com RCM. Entretanto, em análise multivariada, a resposta citogenética aos três meses apareceu como o único parâmetro preditivo independente de resposta citogenética maior aos 6 meses e SLP aos 2 anos. Esses dados sugerem que o cariótipo deveria ser

mantido como método de escolha no seguimento de pacientes tratados com imatinib, pelo menos durante as fases iniciais de tratamento (Lange et al., 2004). A nossa taxa de RCM em 18 meses foi de 53.4%, e a mediana de tempo para a obtenção de RCM foi de 7.7 meses. Estes resultados refletem a importância de manutenção do tratamento mesmo sem resposta citogenética, pois ela poderá acontecer ao longo do primeiro e do segundo ano, como mostrou nosso trabalho. Outro fator interessante é que a maioria dos pacientes apresentaram RCM em torno do 7º mês. Entretanto, primeira citogenética era realizada em torno do 6º mês. Isso significa que talvez essa taxa de resposta fosse atingida antes, se a citogenética fosse realizada aos três meses, por exemplo.

Fase acelerada

Na fase acelerada, quando as variáveis clínicas e laboratoriais foram estudadas como possíveis fatores de prognóstico, apenas a presença de resposta citogenética foi estatisticamente significativa para menor probabilidade de progressão hematológica. Como acontece na fase crônica, a resposta citogenética tem sido um fator de prognóstico favorável na sobrevida também na fase acelerada (Deininger, 2003; Rosti et al., 2003). Anormalidades citogenéticas adicionais, que foram encontradas em 52% dos pacientes, não foram estatisticamente significantes, e este resultado tem sido controverso na literatura. No trabalho do grupo do M.D.Anderson, onde foram estudados 237 pacientes em fase crônica, 41% apresentavam anormalidade citogenética

adicional, e esta variável foi estatisticamente significativa para pior sobrevida (Kantarjian, 2002b). Outros estudos não têm encontrado os mesmos resultados. Com o objetivo de analisar o impacto que a evolução clonal tem na resposta ao imatinib, um grupo de 71 pacientes na fase acelerada tratados com 600 mg de imatinib foram analisados. O primeiro grupo com 15 pacientes apresentava apenas anormalidade adicional como critério de aceleração, o segundo grupo com 32 pacientes tinha outros critérios, mas sem anormalidade adicional, e o terceiro grupo com 24 pacientes tinha anormalidade adicional e outros critérios de aceleração. O primeiro grupo apresentou taxas de RCM de 73% (60% de RCC), enquanto que o segundo grupo teve 31% de RCM (31% de RCC) e o terceiro grupo 12.5% (8% de RCC). Este trabalho sugere que pacientes com anormalidade adicional como único critério de aceleração respondem muito bem ao imatinib (O'Dawyer et al., 2002). Em outro estudo, a presença de anormalidades adicionais em 31 pacientes não teve influência na resposta ao tratamento com imatinib (Schoch et al, 2003). Estes resultados têm confirmado uma série recente com 498 pacientes com LMC na fase crônica ou acelerada que foram tratados com imatinib. Destes 498, 121 (24%) tinham anormalidade citogenética adicional. Em uma análise multivariada, a perda da resposta citogenética e não a presença de anormalidade citogenética adicional foi fator de prognóstico negativo na sobrevida (Cortes et al, 2003). Nossos resultados juntamente com os estudos reportados (Marcucci et al., 2003) sugerem que anormalidades citogenéticas adicionais não são necessariamente fator de pior

prognóstico em pacientes sem outros comemorativos de fase acelerada, com boas respostas clínica e citogenética ao imatinib

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA

O imatinib tem sido bem tolerado em todos os estudos clínicos. Os eventos adversos mais comuns observados no nosso trabalho foi a retenção hídrica, câibras, rash cutâneo, náuseas, vômitos e dores articulares. Tanto o edema superficial como o aumento de peso foi amplamente observado nos nossos pacientes, mas apenas um paciente (2%) na fase acelerada e um (5%) na crise blástica esta toxicidade foi severa (grau 3 ou 4). Nos estudos prévios de toxicidade, o número de pacientes com retenção hídrica é muito alta, em torno de 50% (Deininger et al., 2003), entretanto, a incidência de toxicidade de grau 3 ou 4 é de 5% (Hensley e Ford, 2003). De toda a nossa série, incluindo as três fases, dois pacientes (2%) apresentaram toxicidade hepática grau 4. Esses pacientes foram excluídos do protocolo, já que houve reincidência da toxicidade após reintrodução do imatinib. No estudo de Hensley e Ford, a toxicidade hepática grau 3 ou 4 durante o tratamento com imatinib foi observada em 4% (esta toxicidade pode ser observada em 7% dos pacientes durante o tratamento com IFN- α). A incidência de mielossupressão no nosso trabalho foi maior na crise blástica. Mais de 70% destes pacientes apresentaram pelo menos um episódio de neutropenia, e 45% trombocitopenia. Nas fases crônica e acelerada, a incidência de mielossupressão foi menor. A neutropenia grau 3 ou 4 variou de 38% na fase acelerada a 46% na fase crônica. A mielossupressão,

em geral, tem sido observada em pacientes com LMC, tratados com imatinib, em fases mais avançadas da doença. Em pacientes na fase crônica recém diagnóstica, a incidência de mielossupressão tem sido bem mais baixa, entre 2 e 10% dos pacientes. Entretanto, essa incidência aumenta para 20 a 30% em pacientes na fase crônica tardia (pós IFN- α). Nas fases mais avançadas da doença, essa incidência chega a 60-70% (Deininger et al., 2003). Apesar da alta incidência de neutropenia, as complicações infecciosas tem sido raras (Deininger et al., 2003). Na nossa casuística, uma paciente na fase crônica foi a óbito por complicação infecciosa por aplasia após o uso do imatinib, apesar do uso de fatores de crescimento.

Em geral, a experiência clínica tem mostrado que o imatinib é geralmente bem tolerado. A maioria dos efeitos adversos são leves a moderados e geralmente autolimitados (Deininger et al., 2003). A monitorização da mielossupressão deve ser muito cuidadosa, principalmente nas fases mais avançadas da doença.

Considerações finais

Até o final da década de 70, pouco ou nada tinha para se fazer quando um paciente recebia o diagnóstico de LMC. Após um controle da leucocitose e da plaquetose por alguns anos com BU ou HY, a agudização era certa e absolutamente resistente à quimioterapia. Esta história começou a mudar quando o IFN- α , o qual levava ao desaparecimento do cromossomo Ph em alguns pacientes, mostrou que a resposta citogenética estava relacionada com maior sobrevida. Em 1980, ficou claro que o transplante de medula óssea alogênico, ainda que acompanhado de altas taxas de morbidade e de mortalidade, podia induzir altas taxas de remissão, inclusive molecular, falando-se pela primeira vez em cura da doença.

Desde 1998, a história da LMC começou a mudar novamente. Os primeiros resultados pré-clínicos do imatinib já demonstravam a eficácia deste novo agente. Rapidamente aprovado em vários países e com altas taxas de resposta citogenética, o imatinib tornou-se primeira opção terapêutica para a LMC. Entretanto, as taxas de respostas moleculares ainda são baixas e aproximadamente 10% dos pacientes tratados com imatinib, tornam-se resistentes.

Por isso hoje, após 4 anos de experiência clínica e resultados publicados, temos algumas certezas e alguma dúvidas. Sabemos que o melhor tratamento para pacientes sem doador aparentado é o imatinib como primeira linha, em doses mais altas. Mas quando associar outros agentes para evitar a

resistência? Qual agente? Para o paciente jovem, com doador aparentado, com baixo risco para o transplante, deve ser oferecido o TMOalo como primeira escolha? Ou devemos acompanhar a diminuição do número de transcritos BCR-ABL por 6 meses? São questões sem respostas claras e que dependem, por hora, da experiência e da infra estrutura de cada Instituição que abriga estes pacientes.

O que temos certeza é que, nos próximos anos, as opções terapêuticas e o acompanhamento da LMC se tornarão cada vez mais eficazes, melhorando ainda mais a sobrevida destes pacientes.

Conclusões

1. Eficácia

- a) Fase crônica: a resposta hematológica completa foi de 98%, a resposta citogenética maior foi de 70% e a sobrevida livre de progressão hematológica foi de 89%.
- b) Fase acelerada: a resposta hematológica completa foi de 93%, a resposta citogenética maior foi de 39% e a sobrevida livre de progressão hematológica foi de 64%.
- c) Crise blástica: a resposta hematológica e citogenética completa foi de 11%.

2. Toxicidade: menos do que 5% apresentaram toxicidade não hematológica relacionada ao tratamento. Dois pacientes (1,8%) foram excluídos do protocolo. A toxicidade hematológica foi observada em 46% na fase crônica, 38% na fase acelerada e em 70% na crise blástica. Houve 1 óbito (1%) por mielossupressão relacionado ao tratamento.

Referências Bibliográficas

ALLAN NC, Richards SM, Shepard PCA. UK Medical Research Council randomized, multicentre trial of interferon- α for chronic myeloid leukemia: Improved survival irrespective of cytogenetics response. *Lancet* 1995;354:1392-7

BACCARINI M, Rosti G, de Vivo A, Bonifazi F, Russo D, Martinelli G, Testoni N, Amabile M, Fiacchini M, Montefusco E, Saglio G, Tura S. A randomized study of interferon- α versus interferon- α and low-dose arabinosyl cytosine in chronic myeloid leukemia. *Blood* 2002;99:1527-34

BACCARANI M, Russo D, Rosti G, Martinelli G. Interferon-alfa for chronic myeloid leukemia. *Seminars in Hematology* 2003;40:22-3

BAIN JB. An overview of translocation-related oncogenesis in the chronic myeloid leukaemias. *Acta Haematologica* 2002;107:57-63

BARRETT J. Allogeneic stem cell transplantation for chronic myeloid leukemia. *Seminars in Hematology* 2003;40:59-71

BENELUX CML Study Group: Randomized study on hydroxyurea alone versus hydroxyurea combined with low-dose interferon- α 2b for chronic myeloid leukemia. *Blood* 1998;91:2713-21

BOLUFER P, Sanz GF, Barragan E, Sanz MA, Cervera J, Lerma E, Senent L, Moreno I, Planelles MD. Rapid quantitative detection of BCR-ABL transcripts in chronic myeloid leukemia patients by real-time reverse transcriptase polymerase-chain reaction using fluorescently labeled probes. *Haematologica* 2000;85:1248-54

CAPDEVILLE R, Buchdunger E, Zimmerman J. Imatinib (STI571, imatinib), a rationally developed target anticancer drug. *National Review Drug Discovery* 1:493-501, 2002 apud Capdeville R and Silberman S. Imatinib: a target clinical drug development. *Seminars in Hematology* 2003;40:15-20

CARELLA AM, Daley AM, Eaves CJ, Goldman JM, Hehlmann R. Chronic Myeloid Leukemia, biology and treatment. Martin Dunitz, 2001

CORTES JE, Talpaz M, Kantarjian H. Chronic myelogenous leukemia: a review. *American Journal of Medicine* 1996;100:555-57

CORTES JE, Giles F, O'Brien S, Thomas D, Garcia-Manero G, Rios MB, Faderl S, Verstovsek A, Freireich EJ, Talpaz M, Kantarjian H. Result of high-dose imatinib mesylate in patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia after failure of interferon- α . *Blood* 2003;102: 83-6

CORTES JE, Talpaz M, O'Brien S, Giles F, Rios MB, Shan J, Faderl S, Garcia-Manero G, Ferrajoli A, Wierda W, Kantarjian H. Effects of age on prognosis with imatinib mesylate therapy for patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia. *Cancer* 2003;98:1105-13

CORTES JE, Talpaz M, Giles F, O'Brien S, Rios MB, Shan J, Garcia-Manero G, Faderl S, Thomas DA, Wierda W, Ferrajoli A, Jeha S, Kantarjian HM. Prognostic significance of cytogenetic clonal evolution in patients with chronic leukemia on imatinib mesylate therapy. *Blood* 2003;

DALEY GQ, Van Etten RA, Baltimore D. Induction of chronic myelogenous leukemia in mice by the P210 gene of the Philadelphia chromosome. *Science* 1990;247:824-30

DE KLEIN A, van Kessel GA, Grosveld. A cellular oncogene is translocated to the Philadelphia chromosome in chronic myeloid leukemia. *Nature* 1982;300:765-7

DEININGER MWN, Goldman JM, Lydon N. The tyrosine kinase inhibitor CGP571148B selectively inhibits the growth of BCR-ABL positive cells. *Blood* 1997;90:3691-98

DEININGER MWN. Cytogenetics studies in patients on imatinib. *Seminars in Hematology* 2003;40, 50-55

DEININGER MWN, O'Brien SG, Ford JM, Druker BJ. Practical management of patients with chronic myeloid leukemia receiving imatinib. *Journal of Clinical Oncology* 2003;21:1637-47

DRUKER BJ, Tamura S, Buchdunger E. Effects of selective inhibitor of the Abl tyrosine kinase on the growth of Bcr-Abl positive cells. *Nat Med* 1996;2:561-66

DRUKER BJ, Lydon N B. Lesson learned from the development of an Abl tyronine kinase inhibitor for chronic myelogenous leukemia. *The Journal of Clinical Investigation* 2000;105:1

DRUKER BJ. Signal transduction inhibition: results from phase I clinical trials in chronic myeloid leukemia. *Seminars in Hematology* 2001;38:9-14

DRUKER BJ, Sawyers CL, Capdeville R, Ford JM, Baccarani M, Goldman JM. Chronic myelogenous leukemia. *Education Program Book*, ASH, 2001

DRUKER BJ, Swyers CL, Kantarjian H. Activity of specifit inhibit of the BCR-ABL tyrosine kinase in the blast crises of chronic myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia with the Philadelphia chromosome. *New England Journal of Medicine* 2001a;344:1038-42

DRUKER BJ, Talpaz M, Resta DJ. Efficacy and safety of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 2001b;344:1031-37

DRUKER BJ, O'Brien SG, Cortes J, Radich J. Chronic myelogenous leukemia. *Education Program Book*, ASH, 2002

DRUKER BJ. Imatinib as a paradigm of target therapies. *Journal of Clinical Oncology* 2003;21:239-45

EPSTEIN FH. The biology of chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 1999;341; 3, 164-72

FARDEL S, Kantarjian HM, Talpaz M. Chronic myelogenous leukemia: update on biology and treatment. *Oncology* 1999;13:169-80

FARDEL S, Talpaz M, Estrov Z. Chronic myelogenous leukemia: biology and therapy. *Annals of Internal Medicine* 1999;131:207-19

FARDEL S, Talpaz M, Estrov Z. The biology of chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 1999;341:164-72

FARDEL S, Kantarjian HM, Talpaz M, O'Brien S. New treatment approaches for chronic myelogenous leukemia. *Seminars in Oncology* 2000;27:578-86

GAMBACORTI-PASSERINI C, Le Coutre P, Mologni L. Inhibition of the ABL kinase activity blocks the proliferation of BCR-ABL + leukemic cells and induces apoptosis. *Blood Cells Molecular Disease* 1997;23:380-94

GARDEMBAS M, Rousselot P, Tulliez M, Vigier M, Buzyn A, Rigal-Huguet F, Legros L, Michallet M, Berthou C, Cheron N, Maloisel F, Mahon FX, Facon T, Berthaud P, Guilhot F. Results of a prospective phase 2 study combining imatinib mesylate and cytarabine for the treatment of Philadelphia-positive patients with chronic myelogenous leukemia in chronic phase. *Blood* 2003;102:4298-4305

GEARY CG. The story of chronic myeloid leukemia. *British Journal of Haematology* 2000;110:2-11

GOLDMAN JM. Tyrosine-kinase inhibitor in treatment of chronic myeloid leukemia. *Lancet* 2000;355:1031-32

GOLDMAN JM and Druker BJ. Chronic myeloid leukemia: current treatment options. *Blood* 2001;98:2039-42

GOLDMAN JM and Melo JV. Chronic myeloid leukemia-advances in biology and new approaches to treatment. *New England Journal of Medicine* 2003;349; 15, 1451-64

GOLDMAN JM. Chronic myeloid leukemia-still a few questions. *Experimental Hematology* 2004;32:2-10

GORDON MY, Dazzi F, Marley SB. Cell biology of CML cells. *Leukemia* 1999;13(sup 1):S65-S71

GORRE ME, Mohammed M, Ellwood K, Hsu N, Paquette R, Rao PN, Sawyers CH. Clinical resistance to STI-571 cancer therapy caused by BCR-ABL gene mutation or amplification. *Science* 2001;21:1-10

GRATWOHL A, Hermans J, Niederwieser D. Bone marrow transplantation for chronic myeloid leukemia: long-term results. Chronic Leukemia Working Party of the European Group for Bone Marrow Transplant. 1993;12:509-16

GUILHOT F, Chastang C, Michallet M. Interferon alfa-2a combined with cytarabine versus interferon alone in chronic myelogenous leukemia. *New England Journal of Medicine* 337:223-29, 1997

HAHN EA, Glendenning GA. Quality of life on imatinib. *Seminars in Hematology* 2003;40:31-6

HASFORD J, Pfirrmann M, Hehlmann R, Allan NC, Baccarani M, Kluin-Nelemans JC, Alimena G, Steegmann JL, Ansari H. A new prognostic score for survival of patients with chronic myeloid leukemia treated with interferon alfa. *Journal of the National Cancer Institute* 1998;90:850-58

HASFORD J, Pfirrmann M, Hehlmann R, Baccarani M, Guilhot F, Mahon FX, Kluin-Nelemans JC, Ohnishi K, Thaler J, Steegmann JL. Prognosis and prognostic factors for

patients with chronic myeloid leukemia: nontransplant therapy. *Seminars in Hematology* 2003;40:4-12

HEHLMANN R, Heimpel H, Hasford J and the German CML Study Group, Randomized comparison of busulfan and hydroxyurea in chronic myelogenous leukemia: prolongation of survival by hydroxyurea. *Blood* 1993;82:398-407

HEHLMANN R, Heimpel H, Hasford J. Randomized comparison of interferon- α with busulfan and hydroxyurea in chronic myelogenous leukemia. *Blood* 1994;84:4064-77

HENSLEY ML, Ford JM. Imatinib treatment: specific issues related to safety, fertility and pregnancy. *Seminars in Hematology* 2003;40:21-5

HUGHES T P, Kaeda J, Brandford S, Rudzki Z, Hochhaus A, Hensley M L, Gathmann I, Bolton A E, Hoomissen I, Goldman J M, Radich J. Frequency of major molecular response to imatinib or interferon alpha plus cytarabine in newly diagnosed chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 2003;349; 15:1423-32

HUNTLY BJP, Reid AG, Campbell LJ, Telford N, Sheperd P, Szer J, Prince M, Turner P, Grace C, Nacheva EP, Green AR. Deletions of the derivative chromosome 9 occur at the time of the Philadelphia translocation and provide a powerful and independent prognostic indicator in chronic myeloid leukemia. *Blood* 2001;98:1732-38

ITALIAN COOPERATIVE STUDY GROUP on Chronic Myeloid Leukemia: Long-term follow-up of the Italian trial of interferon- α versus conventional chemotherapy in chronic myeloid leukemia. *Blood* 1998;92:1541-8

JOHANSSON B, Fioretos T, Felix M. Cytogenetic and molecular genetic evolution of chronic myeloid leukemia. *Acta Haematologica* 2002;107:76-94

KAEDA J, Chase A, Goldman JM. Cytogenetics and molecular monitoring of residual disease in chronic myeloid leukemia. *Acta Haematologica* 2002;107:64-75

KANTARJIAN HM, Keating MJ, Estey EH, O'Brien S, Pierce S, Beran M, Koller C, Feldman E, Talpaz M. Treatment of advanced stages of Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia with interferon-alpha and low-dose cytarabine. *Journal of Clinical Oncology* 1992;10:772-89

KANTARJIAN HM. Prolonged survival in chronic myelogenous leukemia after cytogenetics response to interferon therapy. *Annals of Internal Medicine* 1995;122:254-61

KANTARJIAN HM, Melo J V, Tura S, Giralt S, Talpaz M. Chronic myelogenous leukemia: disease biology and current and future therapeutic strategies. *Education Program, American Society of Hematology*, 2000

KANTARJIAN HM, O'Brien S, Cortes JE, Smith TL, Rios MB, Shan J, Yang Y, Giles FJ, Thomas DA, Fardel S, Garci-Manero G, Jeha S, Wierda W, Issa JPJ, Kornblau SM, Keating M, Resta D, Capdeville R, Talpaz M. Treatment of Philadelphia chromosome-positive, accelerated-phase chronic myelogenous leukemia with imatinib mesylate. *Clinical Cancer Research* 2002a;8:2167-76

KANTARJIAN HM, Sawyers C, Hocchaus A, Guilhot F, Schiffer C, Gambacorti-Passerini I C, Niederwieser D, Resta D, Capdeville R, Zoellner U, Talpaz M, Druker B. Hematologic and cytogenetic response to imatinib mesylate in chronic myelogenous leukemia. *New England Journal of Medicine* 2002;346:645-52

KANTARJIAN HM, Cortes J, O'Brien S, Giles FJ, Albitar M, Rios MB. Imatinib mesylate (STI571) therapy for Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia in blast phase. *Blood* 2002;99:3547-53

KANTARJIAN HM, Cortes JE, O'Brien S, Giles F, Garcia-Manero G, Faderl S, Thomas D, Jeha S, Rios MB, Letvak, Bochinski K, Arlinghaus R, Talpaz M. Imatinib mesylate therapy in newly diagnosed patients with Philadelphia chromosome-positive chronic

myelogenous leukemia: high incidence of early complete and major cytogenetics responses. *Blood* 2003;101:97-100

KANTARJIAN HM, Talpaz M, O'Brien S, Giles F, Rios MB, White K, Garcia-Manero G, Ferrajoli A, Verstovsek S, Wierda W, Kornblau S, Cortes JE. Prediction of initial cytogenetic response for subsequent major and complete cytogenetic response to imatinib mesylate therapy in patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia. *Cancer* 2003;97:2225-28

KANTARJIAN HM, O'Brien S, Cortes J E, Shan J, Giles F, Rios MB, Fardel SH, Wierda W G, , Verstovsek S, Keating M, Freireich E J, Talpaz M. Complete cytogenetics and molecular responses to interferon- α -based therapy for chronic myelogenous leukemia are associated with excellent long-term prognosis. *Cancer* 2003;15:1033-41

KANTARJIAN HM, O'Brien S, Cortes, J, Shan J, Giles, F, Garcia-Manero G, Verstovsek S, Faderl S, Rios MB, Talpaz M. Analysis of the impact of imatinib mesylate therapy on the prognosis of patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia treated with interferon- α regimes for early chronic phase. *Cancer* 2003;98:1430-37

KANTARJIAN HM, O'Brien S, Cortes, J, Giles, F, Rios MB, Shan J, Faderl S, Garcia-Manero G, Ferrajoli A, Verstovsek S, Wierda W, Keating M, Talpaz M. Imatinib mesylate therapy improves survival in patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous leukemia in the chronic phase. *Cancer* 2003;98:2636-42

KANTARJIAN HM, O'Brien S, Cortes J, Giles, F, Shan J, Rios MB, Faderl S, Verstovsek S, Garcia-Manero G, Wierda W, Kornblau S, Ferrajoli A, Talpaz M. Survival advantages with imatinib mesylate therapy in chronic-phase myelogenous leukemia (CML-CP) after IFN- α failure and in late CML-CP, comparison with historical controls. *Clinical Cancer Research* 2004;10:68-75

KOWALCZYK J, Gaworczyk A, Winnicka D, Lejman M, Babicz M. Fluorescence in situ hybridization BCR/ABL fusion signal rate in interphase nuclei of healthy volunteer donors: a test study for establishing false positive rate. *Cancer Genetics and Cytogenetics* 2003;142:51-5

LANGE T, Bumm T, Otto S, Al-Ali HK, Kovacs I, Krug D, Kohler T, Krahel R, Niederwieser D, Deininger MW. Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction should not replace conventional cytogenetics for monitoring patients with chronic myeloid leukemia during early phase of imatinib therapy.

LE COUTRE P, Mologni L, Cleris M. In vivo eradication of human BCR-ABL positive leukemia cells with an ABL kinase inhibitor. *Journal of National Cancer Institute* 1999;91:163-68

LYSENG-WILLIAMSON K, Jarvis B. Imatinib. *Adis New Drug Profile* 2001;61:1765-74

MAHON F, Delbrel X, Cony-Makhoul P. Follow-up of complete cytogenetic remission in patients with chronic myeloid leukemia after cessation of interferon- α . *Journal of Clinical Oncology* . 2002;20:214-20

MALOISEL F, Uetwiller F, Laplace A, Lioure B, Herbrecht R, Mark M, Dufour P. Emergence of unusual cytogenetic abnormalities under interferon-alpha therapy in patients with chronic myelogenous leukemia. *Cancer Genetic and Cytogenetics* 1999;113:172-76

MARKTEL S, Marin D, Foot N, Szydlo R, Marco B, Karadimitris A, Mello VAS, et al. Chronic myeloid leukemia in chronic phase responding to imatinib: the occurrence of additional cytogenetic abnormalities predicts disease progression. *Haematologica* 2003;88:260-7

MARCUCCI G, Perrotti D, Caligiuri MA. Understanding the molecular basis of imatinib mesylate therapy in chronic myelogenous leukemia and the related mechanisms of resistance. *Clinical Cancer Research* 2003;9:1248-52

MELLO JV. Chronic myeloid leukemia. *Education Program, American Society of Hematology*, 1999

MELLO JV. Imatinib: can one outwit chronic myeloid leukemia? *Haematologica* 2002;87:898-901

MOHAMED AN, Pemberton P, Zonder J, Schiffer CA. The effect of imatinib mesylate on patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia with secondary chromosomal aberrations. *Clinical Cancer Research*, 9:1333-1337, 2003

NOWELL PC, Hungerford DA. A minute chromosome in human chronic granulocytic leukemia. *Science* 1960;132:1497

NOWELL PC, Hungerford DA. Chromosome studies human leukemia. *Journal of National Cancer Institute* 1961;27: 1013-34

O'BRIEN SG, Guilhot F, Larson RA, Gathmann I, Baccarani M, Cervantes F, Cornelissen JJ, Fischer T, Hochhaus A, Hughes T, Lechner K, Nielsen JL, Rousselot P, Reiffers J, Saglio G, Sheperd J, Simonsson B, Gratwohl A, Goldman JM, Kantarjian H, Taylor K, Verhoef G, Bolton AE, Capdeville R, Druker BJ. Imatinib compared with interferon and low-dose of cytarabine for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 2003;348:994-1004

O'DAWYER ME, Druker B. Status of bcr-abl tyrosine kinase inhibitor in chronic myelogenous leukemia. *Current Opinion in Oncology* 2000;12:594-97

O'DAWYER ME, Mauro MJ, Kurilik G, Mori M, Balleisen S, Olson S, Magenis E, Capdeville R, Druker BJ. The impact of clonal evolution on response to imatinib mesylate (STI571) in accelerated phase CML. *Blood* 2002;100:1628-33

O'DAWYER ME, Mauro MJ, Blasdel C, Farnsworth M, Kurilik G, Hsieh YC, Mori M, Druker BJ. Clonal evolution and lack of cytogenetic response are adverse prognostic factors for hematologic relapse of chronic phase CML patients treated with imatinib mesylate. *Blood* 2004;103:451-56

OHNISHI K, Ohno R, Tomonaga M. A randomized trial comparing interferon- α with busulfan for newly diagnosed chronic myelogenous leukemia in chronic phase. *Blood* 1995;86:906-16

OSAROGIAGBON UR, McGlave PB. Chronic myelogenous leukemia. *Current Opinion in Hematology* 1999;6:241-46

OTTMANN OG, Druker BJ, Sawyers CL. A phase II study of imatinib (Gleevec) in patients with relapse or refractory Philadelphia chromosome positive acute lymphoid leukemias. *Blood* 2002;100:1965-71

OZER H, George SL, Schiffer CA. Prolonged subcutaneous administration of recombinant alpha2b interferon with previously untreated Philadelphia chromosome-positive chronic-phase chronic myelogenous leukemia: effect on remission duration and survival. Cancer and Leukemia Group B Study 8583. *Blood* 1993;82:2975-84

PASTERNAK G, Hochhaus A, Schutheis B. Chronic myelogenous leukemia: molecular and cellular aspects. *Journal of Cancer Research and Clinical Oncology* 1998;124:643-60

PEGGS K, Mackinnon S. Imatinib mesylate-the new gold standard for treatment of chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 2003;35:1048-50

ROSTI G, Testoni N, Martinelli G, Baccarani M. The cytogenetic response as a surrogate marker of survival. *Seminars in Hematology* 2003;40:56-61

ROSTI G, Trabacchi E, Bonifasi F, de Vivo A, Bassi S, Tura S. Interferon- α e Ara-C. In: Carella AM, Daley GQ, Eaves CJ, Goldman JM, Hehlmann R, editores. *Chronic myeloid leukemia biology and treatment*. United Kingdom: Martin Dunitz; 2001. p. 191-204

ROTHBERG PG. Imatinib. Resisting the resistance. *Leukemia research* 2003;27:977-78

ROWLEY JD. Letter: A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenous leukemia identified by quinacrine fluorescence and Giensa stainig. *Nature* 1973;243:290-93

SAVAGE DG, Antman KH. Imatinib-a new oral target therapy. *New England Journal of Medicine* 2002;346:683-93

SATTLER M and Griffin JD. Molecular mechanisms of transformation by the BCR-ABL oncogene. *Seminars in Hematoly* 2003;40:4-10

SAWYERS CL. Chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 1999;340:1330-38

SAWYERS CL. Molecular studies in chronic myeloid leukemia patients treated with tyrosine kinase inhibitors. *Seminars in Hematology* 2001;38:15-21

SAWYERS CL, Hochhaus A, Feldman E, Goldman JM, Miller CB, Ottmann OG. Imatinib induces hematologic and cytogenetic responses in patients with chronic myelogenous leukemia in myeloid blast crises: results of a phase II study. *Blood* 2002;99:3530-39

SCHOCH C, Haferlach T, Kern W, Schmittger S, Berger U, Helmann R, Hiddemann W, Hochhaus A. Occurrence of addicional chromosome aberrations in chronic myeloid leukemia patients treted with imatinibmesylate. *Leukemia* 2003;17:461-63

SILVER RT. An evidence-based analysis of the effect of busulfan, hydroxyurea, interferon and allogeneic bone marrow transplantation in treating the chronic phase of chronic myeloid leukemia: developed for the American Society of Hematology. *Blood* 1999;94:1517-36

SILVER RT. Chronic myeloid leukemia. *Hematology Oncology Clinics of North America* 2003;17:1159-73

SOKAL JE, Cox EB, Baccarani M, Tura S, Gomez GA, Robertson JE. Prognostic discrimination in “good-risk” chronic granulocytic leukemia. *Blood* 1984;63:789-99

SOKAL J E, Gockerman J P, Bigner S H. Evidence for a selective antileukemic effect of cytosine arabinoside in chronic granulocytic leukemia. *Leukemia Research* 1988;12:453-58

SUREDA A, Carrasco M, de Miguel M, Martinez JA, Conde E, Sanz MA, Diaz-Mediavilla J, Sierra J. Imatinib mesylate as treatment fo blastic transformation of Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukemia. *Haematologica* 2003;88:1213-20

TALPAZ M. Interferon-alpha-based treatment of chronic myeloid leukemia and implications of signal transduction inhition. *Seminars in Hematology* 2001;38:22-27

The Italian Group Study Group on chronic myeloid leukemia. Interferon alpha-2a as compared with conventional chemotherapy for the treatment of chronic myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine* 1994;330:820-25

TIPPING AJ, Mahon FX, Lagarde V, Goldman JM, Melo JV. Restoration of sensitivity to STI571 in STI571-resistant chronic myeloid leukemia cells. *Blood* 2001;98:3864-67

YASHI P, Gazit A, Gilon C, Levitzki A. Blocking of EGF-dependent cell proliferation by EGF receptor kinase inhibitors. *Science* 1988;242:933-5

WITTE O. The role of Bcr-Abl in chronic myeloid leukemia and stem cell biology.
Seminars in Hematology 2001;38:3-8

Anexos