MARCOS ANTONIO LOPES

**Estudo epidemiológico de
prevalência de demência em Ribeirão Preto**

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo para obtenção do
título de Doutor em Ciências

Área de concentração: Psiquiatria
Orientador: Prof. Dr. Cássio Machado de
Campos Bottino

São Paulo
2006

MARCOS ANTONIO LOPES

**Estudo epidemiológico de
prevalência de demência em Ribeirão Preto**

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo para obtenção do
título de Doutor em Ciências

Área de concentração: Psiquiatria
Orientador: Prof. Dr. Cássio Machado de
Campos Bottino

São Paulo
2006

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Lopes, Marcos Antonio
Estudo epidemiológico de prevalência de demência em Ribeirão Preto / Marcos
Antonio Lopes. -- São Paulo, 2006.
Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Departamento de Psiquiatria.
Área de concentração: Psiquiatria.

Orientador: Cássio Machado de Campos Bottino.

Descritores: 1.Demência/epidemiologia 2.Prevalência 3.Envelhecimento
4.Idoso 5.Cognição

USP/FM/SBD-155/06

Quando a idade
Dos reflexos rápidos inconscientes
Cede lugar à idade das reflexões
-Terá sido a sabedoria que chegou?
Não! Foi apenas a velhice!

Mário Quintana

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Cássio Machado de Campos Bottino, pela forma séria, segura e tranqüila de coordenar e orientar este trabalho, sempre manifestando uma incomparável compreensão diante das dificuldades apresentadas.

Ao Prof. Dr. Júlio Litvoc, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pela orientação técnica precisa em determinados pontos da pesquisa.

Ao Prof. Dr. Erikson Felipe Furtado, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pelos constantes incentivos e pelo apoio administrativo.

Ao Prof. Dr. Eduardo Ferrioli, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pela contribuição às discussões diagnósticas.

À Profa. Dra. Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pela colaboração na seleção e no treinamento dos entrevistadores da primeira fase.

Aos entrevistadores da primeira fase.

Ao Sr. Pedro Mathias, coordenador dos entrevistadores da primeira fase.

À Sra. Ângela Maria Reinaldi de Oliveira e à Sra. Sandra Regina Ignácio, auxiliares de enfermagem responsáveis por parte das coletas de sangue da primeira fase.

Ao Dr. Fausto Pompeu Reiff, ao Dr. Leonardo Mendes, ao Dr. Charlys Barbosa Nogueira e à Dra. Fabiana Penedo Leme, entrevistadores médicos da segunda fase.

À Sra. Regina Imaculada de Oliveira Silva, secretária da segunda fase.

À Dra. Sonia E. Zevallos Bustamante, ao Dr. Sergio Ricardo Hototian, ao Dr. Dionísio Azevedo, à Dra. Mariana Tatsch e ao Dr. Mário César Bazzarella, pesquisadores do PROTER (Projeto Terceira Idade, Instituto de Psiquiatria, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

À Sra. Luciana Cardoso de Almeida e à Sra. Alessandra Rodrigues Vieira de Moraes, secretárias do PROTER, e à Sra. Maria Lúcia Nacaratto Trevilato, secretária do Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo).

Aos idosos do município de Ribeirão Preto, que concordaram em colaborar com esta pesquisa e contribuíram de forma significativa para a sua realização.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Auxílio à Pesquisa 2001/05959-7), instituição responsável pelo apoio financeiro desta pesquisa.

SUMÁRIO

Lista de tabelas	
Lista de gráficos	
Resumo	
Summary	
1 -	
INTRODUÇÃO.....	1
1.1 - Envelhecimento da população brasileira.....	1
1.2 - Transição epidemiológica.....	2
1.3 - Envelhecimento e Saúde Mental.....	2
1.4 - Epidemiologia de demência.....	3
1.5 - Pesquisa de Prevalência de Demência.....	14
1.6 - Demência no Brasil.....	29
2 - OBJETIVOS.....	34
3 - CASUÍSTICA E MÉTODOS.....	35
3.1- População.....	35
3.2 - Métodos.....	35
3.3 - Considerações éticas.....	47
4 - RESULTADOS.....	48
4.1 - 1ª fase (comunitária).....	48
4.2 - 2ª fase (hospitalar).....	54
5 - DISCUSSÃO.....	63
6 - CONCLUSÕES.....	71
7 - ANEXOS.....	73
8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	113

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estudos de prevalência de demência, no período de 1994-2000. Os estudos foram inicialmente agrupados por continente e em seguida por idade.....	4
Tabela 2 - Efeito da idade sobre as taxas mundiais de prevalência de demência.....	5
Tabela 3 - Distribuição da população idosa do município, entre os três estratos sócio-econômicos (excluindo os setores de mesma pontuação).....	38
Tabela 4 - Seleção dos setores nos três estratos sócio-econômicos.....	39
Tabela 5 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas, na 1ª fase, entre os estratos sócio-econômicos.....	48
Tabela 6 - Amostra total e sua distribuição com relação às características sócio-demográficas.....	49
Tabela 7 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação à faixa etária, por sexo.....	50
Tabela 8 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação às características sócio-demográficas.....	51
Tabela 9 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação às características clínicas.....	52
Tabela 10 - Análise multivariada. Efeito das variáveis sóciodemográficas e clínicas sobre as taxas de CCF.....	53
Tabela 11 - Distribuição dos sujeitos selecionados para a 2ª fase, segundo sua participação.....	55
Tabela 12 - Distribuição dos tipos de perdas na 2ª fase, entre os estratos sócio-econômicos.....	55
Tabela 13 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas (total), na 2ª fase, entre os estratos sócio-econômicos.....	55
Tabela 14 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas, na 2ª fase, entre as variáveis sócio-demográficas e clínicas.....	56

Tabela 15 - Diagnóstico sindrômico dos sujeitos entrevistados.....	57
Tabela 16 - Diagnóstico etiológico dos pacientes com demência.....	57
Tabela 17 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação à faixa etária, por sexo.....	58
Tabela 18 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação às características sócio-demográficas.....	59
Tabela 19 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação às características clínicas.....	60
Tabela 20 - Análise multivariada. Efeito das variáveis sócio-demográficas e clínicas sobre as taxas de demência.....	61
Tabela 21 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação à atividade física e aos hábitos culturais.....	62
Tabela 22 - Análise multivariada. Efeito das variáveis “idade”, “atividade física” e “hábitos” sobre as taxas de demência.....	62

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Crescimento da população com idade maior ou igual a 60 anos, no Brasil, no período 1960-2000.....	1
Gráfico 2 - Diagnóstico etiológico de demência.....	57

RESUMO

Lopes MA. Estudo epidemiológico de prevalência de demência em Ribeirão Preto (tese). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 139p.

INTRODUÇÃO: O acentuado envelhecimento da população brasileira nos últimos 40 anos torna imprescindível o melhor conhecimento dos quadros de demência no Brasil. Estudos mundiais de prevalência observaram algumas diferenças na distribuição de demência entre os idosos, no que diz respeito à idade, sexo, escolaridade e procedência (urbana ou rural). Outros levantamentos epidemiológicos mundiais apontaram determinados fatores que se associaram a essa doença, tais como atividade física, uso de anti-inflamatórios, uso de álcool e hipertensão arterial. A despeito dos vários estudos de prevalência de demência em todo o mundo, há poucos estudos deste tipo no Brasil e na América Latina. **OBJETIVO:** estimar a prevalência de demência e de comprometimento cognitivo e funcional (CCF), em amostra idosa comunitária, em Ribeirão Preto, avaliando sua distribuição com relação a diversos fatores sócio-demográficos e clínicos. **CASUÍSTICA E MÉTODOS:** A população selecionada foi uma amostra representativa, de três áreas distintas com relação ao nível sócio-econômico, do município de Ribeirão Preto, com idade maior ou igual a 60 anos. O processo de amostragem foi por conglomerado. A coleta dos dados foi realizada em duas fases. Os instrumentos utilizados na primeira fase (detecção dos casos de comprometimento cognitivo e funcional) foram: “Mini Mental State Examination” (MMSE), “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME), “Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly” (IQCODE) , e entrevista clínica. Os instrumentos empregados na segunda fase (detecção dos casos de demência) foram: “Cambridge Examination” (CAMDEX), “Clinical Dementia Rating” (CDR), e “Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living-International Scale” (B-ADL / ADL-IS). Os dados foram submetidos a análise univariada e multivariada. **Resultados:** Foram avaliados 1.145 idosos. A amostra apresentou média de idade de 70,9 anos (60-100; DP: 7,7), e foi predominantemente feminina (63,4%), casada (57,6%) e com até 4 anos de escolaridade (52,8%). Comprometimento cognitivo e funcional foi diagnosticado em 217 sujeitos; a taxa de prevalência na população com idade maior ou igual a 60 anos foi 18,9% (IC 95%: 16,6-21,1). Na população com idade maior ou igual a 65 anos a taxa foi 21,9% (IC 95%: 19,5-24,2). Após a análise multivariada “idade” elevada, “escolaridade” baixa, “AVC”, “epilepsia” e “depressão” se mostraram associadas a CCF. “Sexo” feminino, “estado civil” viúvo, “nível sócio-econômico” baixo e “TCE” se apresentaram associadas apenas na análise univariada. Demência foi diagnosticada em 69 sujeitos; a taxa de prevalência de demência na população com idade maior ou igual a 60 anos foi 6,0% (IC 95%: 4,6-7,3) e na população com idade maior ou igual a 65 anos foi 7,2% (IC 95%: 5,7-8,6). Após a análise multivariada “idade” elevada, “AVC”, “epilepsia” e “artrite” (esta com relação inversa) se apresentaram associadas significativamente à demência. “Escolaridade” exibiu uma tendência de associação

na categoria “analfabetos”. “Escaridade” baixa (analfabetos), “nível sócio-econômico” baixo e “estado civil” viúvo apresentaram-se associadas apenas na análise univariada. DISCUSSÃO: A alta taxa de comprometimento cognitivo e funcional (CCF) foi bastante semelhante aos estudos conduzidos no Brasil, em Porto Rico e na Malásia. Com relação à demência, a variável “idade” apresentou um dado bastante consolidado, a variável “sexo” exibiu dados contraditórios, a variável “escolaridade” corroborou a observação de outros estudos como um fator associado à demência, e a variável “nível sócio-econômico” mostrou-se influenciada por outras variáveis. CONCLUSÕES: A taxa de prevalência de demência deste estudo se situou em uma faixa intermediária entre os estudos mundiais. Comprometimento cognitivo e funcional se apresentou como uma condição bastante heterogênea, associada a várias condições clínicas do idoso.

Descritores: demência, epidemiologia, prevalência, envelhecimento, idoso, cognição.

SUMMARY

Lopes MA. Epidemiological survey of prevalence of dementia in Ribeirão Preto (thesis). São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2006. 139p.

INTRODUCTION: The pronounced ageing in Brazilian population makes the knowledge about dementia in Brazil fundamental. Worldwide studies of prevalence noticed some differences in distribution of dementia among elderly people, in regard to age, sex, education and provenance (urban or rural). Other worldwide epidemiological surveys observed certain associated factors to this disease, such as physical activity, anti-inflammatory drug use, alcohol drinking and hypertension. In spite of several surveys estimating prevalence of dementia around the world, there are few studies investigating the prevalence of dementia in Brazil and Latin America. **OBJECTIVE:** To estimate prevalence of dementia and cognitive and functional impairment (CFI), in an elderly community sample, in Ribeirão Preto, evaluating its distribution on several social-demographic and clinical factors. **METHODS:** The population was drawn from three different social areas representing the dwelling subjects living at the city of Ribeirão Preto, aged 60 years or older. Cluster sampling was applied. Data were obtained in two phases. The instruments used in first phase (selection of cognitive and functional impairment 'cases') were: "Mini Mental of State Exam" (MMSE), "Fuld Object Memory Evaluation" (FOME), "Informant Questionnaire on cognitive decline in the elderly" (IQCODE), "Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living- International Scale" (B-ADL / ADL-IS)" and a clinical interview. The instruments used in second phase (selection of dementia) were "Cambridge Examination" (CAMDEX), "Clinical Dementia Rating" (CDR), and "Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living-International Scale" (B-ADL / ADL-IS). The data obtained were submitted to univariate and logistic regression analysis. **RESULTS:** 1.145 elderly persons were evaluated. The sample showed a mean age of 70,9 years (60-100; SD: 7,7); 63,4% of the subjects were female, 57,6% were married and 52,8% had up to 4 years of schooling. 217 subjects presented CFI; prevalence rate in elderly aged 60 years or older was 18,9% (95% CI: 16,6-21,1). Prevalence rate in elderly aged 65 years or older was 21,9% (95% CI: 19,5-24,2). Following logistic regression analysis, higher "age", low "education", "stroke", "epilepsy" and "depression" were associated with CFI. Female "sex", "widowed", low "social class" and "head trauma" were associated with CFI only on univariate analysis. 69 subjects presented dementia; prevalence rate in elderly aged 60 years or older was 6,0% (95% CI: 4,6-7,3). Prevalence rate in elderly aged 65 years or older was 7,2% (95% CI: 5,7-8,6). Following logistic regression analysis, higher "age", "stroke", "epilepsy" and "arthritis" (inverse relation) were associated with dementia. "Education" showed a

tendency of association on category “illiterate”. Low “education”, low “social class” and “widowed” were associated only on univariate analysis. **DISCUSSION:** The high CFI rate was very similar to those found by studies in Brazil, Puerto Rico and Malaysia. In respect of dementia, the variable “age” presented a well-known associated factor, the variable “sex” exhibited contradictory data, the variable “education” corroborated other studies as an associated factor and the variable “social class” was influenced by other variables. **CONCLUSION:** The prevalence of dementia rate of this study was in an intermediary level between worldwide studies. Cognitive and functional impairment is a rather heterogeneous condition which may be associated with various clinical conditions found in the elderly population.

Descriptors: dementia, epidemiology, prevalence, ageing, elderly, cognition.

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Envelhecimento da população brasileira

A população brasileira, a exemplo do que vem acontecendo em todo mundo, está envelhecendo. A faixa da população com idade maior ou igual a 60 anos, que correspondia a 4,7% em 1960 (IBGE, 1965)¹, aumentou para 6,1% em 1980 (FIBGE, 1983)², e saltou para 8,5% em 2000 (FIBGE, 2002)³(Gráfico 1). No entanto, a distribuição populacional é distinta entre as regiões e os estados. A região mais “envelhecida” é a região sudeste, com 9,3% de idosos, e a mais “jovem” é a região norte, com 5,5%. Os estados mais “velhos” são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraíba, com 10,7, 10,5 e 10,2% de idosos, respectivamente, e os estados mais “novos” estão todos na região norte, Roraima, Amapá e Amazonas, com 4,0, 4,1 e 4,9% de idosos, respectivamente (FIBGE, 2002)³. Não obstante este envelhecimento desigual, a projeção para 2025 é que o país será o 6º país em população idosa, com 32 milhões de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos (RAMOS et al., 1987)⁴.

Gráfico 1 - Crescimento da população com idade maior ou igual a 60 anos, no Brasil, no período 1960-2000

FONTE: FIBGE

1.2 - Transição epidemiológica

Esta mudança de alta fecundidade/alta mortalidade para baixa fecundidade/baixa mortalidade, chamada de “transição epidemiológica”, guarda diferenças entre os países. Nos países desenvolvidos, esta transformação ocorreu lentamente, em uma população mais homogênea e através da aquisição de modernas tecnologias da medicina, que se somaram às adequadas condições de vida pré-existent (urbanização adequada, melhoria nutricional, melhores condições sanitárias). Por outro lado, nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, ela se dá numa população heterogênea, ainda sem as condições adequadas para um bom padrão de vida, e ocorrendo principalmente devido à modernização da medicina (KALACHE et al., 1987)⁵.

1.3 - Envelhecimento e Saúde Mental

Enquanto a frequência da grande maioria das doenças mentais diminui ou se mantém na mesma proporção entre os mais idosos, quando comparados à população mais jovem (GURLAND, 1996)⁶, os quadros demenciais caminham no sentido oposto. A demência figura como a doença mental que mais sofre influência da idade. As revisões de JORM et al. (1987)⁷ e de RITCHIE et al. (1992)⁸, encontraram uma relação fortemente positiva entre idade e demência, detectando o aumento de 2 vezes da taxa de prevalência de demência a cada 5,1 anos e 5,7 anos, respectivamente. JORM E JOLLEY (1998)⁹, em uma metanálise recente, encontraram um aumento considerável da incidência de demência até a idade de 90 anos. Os quadros

demenciais, desta forma, têm recebido especial destaque nos últimos anos. Sobretudo, se considerarmos o comprometimento funcional que causam e a irreversibilidade da maior parte dessas doenças.

1.4 - Epidemiologia de demência

1.4.1 - Estudos de prevalência

Outras duas revisões também observaram o aumento das taxas de prevalência com o avanço da idade: a de ROCCA et al. (1991)¹⁰, avaliando estudos europeus, e a de FRATIGLIONI et al. (1999)¹¹, examinando descritivamente estudos em todo mundo. No entanto, as revisões de RITCHIE E KILDEA (1995)¹² e a de LOPES (2002)¹³, utilizando métodos estatísticos apropriados, encontraram uma queda do aumento das taxas de prevalência nas faixas etárias mais altas. Este resultado levou à conclusão, por fim, de que a demência “estaria relacionada à idade e não ao envelhecimento”.

Procurando avaliar melhor a distribuição destes quadros na população idosa, em todo o mundo, nós vamos nos deparar com resultados variados, muitas vezes semelhantes, mas às vezes opostos, como pode ser demonstrado nos dados apresentados a seguir, extraídos e adaptados da revisão de LOPES (2002)¹³, de estudos de prevalência de demência publicados no período de 1994 a 2000 (Tabela 1).

O que se observou nos estudos foi uma taxa de prevalência de demência, a partir dos 65 anos, em torno de 6%, com tendência de elevação com a idade, como se vê na Tabela 2.

Tabela 1 - Estudos de prevalência de demência, no período de 1994-2000. Os estudos foram inicialmente agrupados por continente e em seguida por idade

AUTOR	ANO	PAÍS	N	IDADE	PREVALÊNCIA (%)	DIAGNÓSTICO [†]
Ott et al. ¹⁴	1995	Holanda	7528	> 55	6,3	a c
Prencipe et al. ¹⁵	1996	Itália	1022	> 64	8	a c f h
Boersma et al. ¹⁶	1998	Holanda	2191	> 65	6,5	a d
Brayne et al. ¹⁷	1998	Inglaterra	2622	> 65	6,6	e k
Andersen et al. ¹⁸	1997	Dinamarca	3346	> 65	7,1	a c f
Roelands et al. ¹⁹	1994	Bélgica	1736	> 65	9	a d
Lobo et al. ²⁰	1995	Espanha	1134	> 65	5,5	a e
Pousa et al. ²¹	1995	Espanha	273	> 65	13,9	d
Pi et al. ²²	1996	Espanha	516	> 65	14,9	a g
Manubens et al. ²³	1995	Espanha	1127	> 70	17,7	a c d e
Wernicke and Reischies ²⁴	1994	Alemanha	156	> 70	11,7	a
DAlessandro et al. ²⁵	1996	Itália	365	> 74	21,9	a e f
Azzimondi et al. ²⁶	1998	Itália	773	> 74	28,4	a e f
Strauss et al. ²⁷	1999	Suécia	1848	> 77	19,3 [‡]	a e f
Fichter et al. ²⁸	1995	Alemanha	402	> 85	27,8	a b
Ravaglia et al. ²⁹	1999	Itália	154	> 100	61,9	a b c f
Shaji et al. ³⁰	1996	Índia	2067	> 60	3,1	a b
Yamada et al. ³¹	1999	Japão	2934	> 60	7,2	a c e f
Komahashi et al. ³²	1994	Japão	2778	> 65	6,1	a e
Kiyohara et al. ³³	1994	Japão	1189	> 65	5,5 [‡]	a
Ogura et al. ³⁴	1995	Japão	3524	> 65	6,7	a c e
Shiba et al. ³⁵	1999	Japão	201	> 65	8,5	a c e
Chandra et al. ³⁶	1998	Índia	536	> 65	1,3	f i
Park et al. ³⁷	1994	Coreia	766	> 65	10,8	a e
Woo et al. ³⁸	1998	Coreia	2171	> 65	9,5	a c e
Liu et al. ³⁹	1996	Taiwan	1200	> 65	4,4	a c h
Lin et al. ⁴⁰	1998	Taiwan	4015	> 65	3,7	b c e h i
Liu et al. ⁴¹	1995	Taiwan	5297	> 65	2	a
Chiu et al. ⁴²	1998	Hong Kong	1034	> 70	6,1	a d
Asada et al. ⁴³	1996	Japão	47	> 100	70,2	a b c
Hendrie et al. ⁴⁴	1995	EUA	4812	> 65	4,8	a b c
Beard et al. ⁴⁵	1995	EUA	§ REP	> 65	5,7	j
Graves et al. ⁴⁶	1996	EUA	1985	> 65	6,3	a c f
Fillenbaum et al. ⁴⁷	1998	EUA	4236	> 65	7 - 7,2	a c
Breitner et al. ⁴⁸	1999	EUA	5677	> 65	9,6	a c h i
McDowell et al. ⁴⁹	1994	Canadá	10263	> 65	4,2	a b c
Ebly et al. ⁵⁰	1994	Canadá	4510	> 85	28,5	a b c e
Powell ⁵¹	1994	EUA	40	> 100	57,5	f
Farrag et al. ⁵²	1998	Egito	2000	> 60	4,5	a c e
Ogunniyi et al. ⁵³	1997	Nigéria	2494	> 65	2,2	a b c
Herrera Jr. et al. ⁵⁴	1998	Brasil	1660	> 65	7,1	a c e f h
Henderson et al. ⁵⁵	1994	Australia	1377	> 70	7,3 [‡]	a b

[†] Critérios e/ou Instrumentos Diagnósticos: (a) "Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd ed. rev" (DSM-III-R)(APA, 1987)⁵⁶ or "Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed." (DSM-IV)(APA, 1994)⁵⁷; (b) Classification of Mental and Behavioural Disorders - ICD -10 (WHO, 1992)⁵⁸; (c)

“National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)” (McKHANN et al., 1984)⁵⁹; (d) “Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination” (CAMDEX) (ROTH et al., 1986)⁶⁰; (e) Escala Isquêmica de Hachinski (HIS) (HACHINSKI et al., 1975)⁶¹; (f) “Clinical Dementia Rating” (CDR) (HUGHES et al., 1982)⁶²; (g) “Blessed Dementia Scale” (BDS) (BLESSED et al., 1968)⁶³; (h) “National Institute of Neurological Disorders and Stroke and Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences (NINDS-AIREN) (ROMAN et al., 1993)⁶⁴; (i) “The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease” (CERAD) (MORRIS et al., 1989)⁶⁵; (j) “Rochester Epidemiologic Project” (REP)⁶⁶; (k) AGE CAT (COPELAND et al., 1986)⁶⁷.

‡ Taxa bruta

§ Projeção a partir dos dados dos censos de 1970 a 1990

Tabela 2 - Efeito da idade sobre as taxas mundiais de prevalência de demência

FAIXA ETÁRIA	N (ESTUDOS AVALIADOS)	TAXA MÉDIA (%) [†]	(IC 95%)	AUMENTO DAS TAXAS [‡]
65-69	17	1,2	(0,8 – 1,5)	
70-74	19	3,7	(2,6 – 4,7)	3,0
75-79	21	7,9	(6,2 – 9,5)	2,1
80-84	20	16,4	(13,8 – 18,9)	2,0
85-89	16	24,6	(20,5 – 28,6)	1,5
90-94	6	39,9	(34,4 – 45,3)	1,6
= 95	6	54,8	(45,6 – 63,9)	1,3

[†] taxa média de prevalência de demência

[‡] aumento das taxas, em comparação com a taxa anterior

Houve um número maior de casos no sexo feminino em 75% dos estudos (chegando à razão de 2:1), embora não tenha sido constatada diferença estatisticamente significativa entre os sexos.

Com relação à etiologia, a proporção Doença de Alzheimer:Demência Vascular (DA:DV) ficou acima de 4:1 nos países ocidentais, destacando-se o estudo sul-americano (Brasil) (HERRERA et al., 1998)⁵⁴ que encontrou uma razão DA:DV 2 a 3 vezes maior do que a das outras regiões (comparação entre os continentes). No continente asiático houve uma inversão desta relação em 25% dos estudos, com taxas maiores de Demência Vascular do que de Doença de Alzheimer, e no Japão

observou-se uma mudança histórica, com taxas decrescentes de demência vascular. FOLSTEIN et al. (1985)⁶⁸ também encontraram taxas maiores de demência por múltiplos infartos (2.8%) do que de Doença de Alzheimer (2.0%), na população norte-americana. Uma explicação para este resultado baseia-se no fato de que esta amostra tinha uma alta proporção de indivíduos da raça negra, corroborando os achados de HEYMAN et al. (1991)⁶⁹, que detectaram uma proporção maior de demência vascular em indivíduos da raça negra, do que em indivíduos de raça branca.

A procedência (rural ou urbana) apresentou-se como uma variável a ser melhor investigada como fator de risco para demência. A maior taxa no Japão (SHIBA et al., 1999)³⁵, a maior taxa no continente asiático (PARK et al., 1994)³⁷, e as maiores taxas européias (POUSA et al., 1995; PI et al., 1996)^{21,22} foram obtidas em populações rurais ou rurais/urbanas. No entanto, tanto na análise univariada quanto na análise multivariada observaram-se taxas maiores de prevalência de demência entre os estudos que investigaram pessoas da zona urbana.

Baixa escolaridade apresentou-se associada a taxas maiores de demência nos estudos de OTT et al. (1995)¹⁴, PRENCIPE et al. (1996)¹⁵ e YAMADA et al. (1999)³¹, sinalizando um potencial efeito protetor da educação. Neste sentido, três hipóteses procuram explicar este efeito: a hipótese da “reserva cerebral”, segundo a qual a educação aumentaria a densidade sináptica neocortical (KATZMAN, 1993)⁷⁰; a hipótese da “reserva cognitiva”, que defende a idéia de que a educação forma uma reserva que retarda o início das manifestações da demência (STERN et al., 1999)⁷¹; e a hipótese da “lesão cerebral” (“brain battering”), que procura demonstrar a

associação entre baixa educação e demência através de uma ocorrência maior de pequenas lesões cérebro-vasculares entre as pessoas de baixa escolaridade (DEL SER et al., 1999)⁷². No entanto, comparando duas comunidades com diferentes níveis sócio-culturais e de escolaridade, AZZIMONDI et al. (1998)²⁶ observaram uma taxa maior de prevalência na comunidade de maior nível sócio-cultural e escolaridade. A ressalva que pode ser feita a este trabalho é o fato da baixa escolaridade ter sido inferida a partir da população geral da comunidade e não da amostra de idosos.

A respeito do fator genético, BREITNER et al. (1999)⁴⁸ encontraram um risco de 70% dos portadores do alelo apoE e4 desenvolverem DA, confirmando os achados de HENDERSON et al. (1995)⁷³, que destacaram a influência parcial do alelo e4 sobre o desenvolvimento de DA. ASADA et al. (1996)⁴³ não observaram a influência do alelo apoE e4 no surgimento de DA entre os centenários.

1.4.2 - Fatores associados

Além dos fatores descritos na seção de estudos de prevalência, outros fatores merecem consideração no entendimento de como os quadros de demência se distribuem na população. Uso de anti-inflamatórios, uso de álcool, epilepsia, fatores associados a doença cérebro-vascular (hipertensão, diabetes mellitus, colesterol aumentado) e atividade física são variáveis que têm sido investigadas na associação aos quadros de demência.

Em uma revisão sistemática de estudos observacionais (transversais e longitudinais), SZEKELY et al. (2004)⁷⁴ encontraram uma diminuição do risco de desenvolvimento de Doença de Alzheimer em pessoas que fizeram uso de anti-

inflamatórios não esteróides. Possíveis mecanismos para o efeito protetor de tais medicações foram destacados por estes autores: diminuição do processo inflamatório cerebral, redução da morte celular devido à excitotoxicidade glutamatérgica e redução da formação de placas de beta-amilóide, pela redução da porção de beta-amilóide circulante que provem das plaquetas. No entanto, em uma meta-análise semelhante, CRAEN et al. (2005)⁷⁵ contestaram os benefícios encontrados no uso destas medicações em estudos prospectivos, atribuindo-os a vários tipos de vieses (por exemplo: publicação e prescrição), e alertaram para a necessidade de se identificar padrões específicos no processo inflamatório associado aos quadros de demência antes de se cogitar o uso de intervenções medicamentosas.

O uso de álcool não exibe uma relação linear com os quadros de demência em estudos epidemiológicos, como observaram HULSE et al. (2005)⁷⁶. MUKAMAL et al. (2003)⁷⁷, em um estudo caso-controle, observaram um risco menor de demência entre os que consumiram de 1 a 6 doses de álcool por semana, quando comparados aos abstinentes, e um risco maior entre os que consumiram uma quantidade superior a 14 doses por semana, quando comparados aos outros dois grupos. Ademais, o efeito protetor do uso moderado de álcool foi mais pronunciado entre os apoE e4 negativos. Na mesma direção, THOMAS E ROCKWOOD (2001)⁷⁸, em um estudo de coorte com 10.268 idosos, encontraram um risco aumentado para demência entre os abusadores de álcool (prováveis e definidos). ANTILLA et al. (2004)⁷⁹, também em um estudo prospectivo, com 1.464 adultos de meia idade seguidos por 23 anos, encontraram associação entre aumento do uso de álcool e demência, apenas entre os apoE e4 positivos. Com relação ao desenvolvimento de

comprometimento cognitivo leve, estes autores encontraram um risco duas vezes maior entre os “abstinentes” e “bebedores freqüentes”, quando comparados com os “bebedores infreqüentes”. Se por um lado, o efeito protetor do uso moderado de álcool sobre os quadros de demência pode estar correlacionado a uma menor ocorrência de lesões vasculares (MUKAMAL et al., 2001; den HEIJER et al., 2004)^{77,80}, o uso excessivo provavelmente aumentaria o risco de demência apenas quando associado a outros fatores, tais como deficiência de vitamina B1, B12 e folatos, doença hepática crônica com comprometimento cerebral, predisposição genética e estilo de vida sedentário (HULSE et al., 2005)⁷⁶.

A presença de comprometimento cognitivo nos quadros de epilepsia é conhecida e pode estar associada a vários motivos: doença cerebral primária, convulsões e uso de anticonvulsivantes. No entanto, esta relação é controversa quando se considera a relação entre epilepsia “crônica” e o desenvolvimento de deterioração cognitiva (CARAMELLI E CASTRO, 2005)⁸¹. BRETELER et al. (1995)⁸², em estudo prospectivo de 8 anos, com pessoas de 50-75 anos de idade, encontraram um risco aumentado de demência em pessoas com epilepsia, porém baixo (RR: 1.5; IC95%: 1.4-1.7).

Com relação aos fatores cérebro-vasculares, os estudos observacionais apontam para uma forte associação com demência e Demência Vascular, e resultados controversos no caso da Doença de Alzheimer. O estudo comparativo de caso clínico de MORTEL et al. (1993)⁸³ observou um aumento do risco de “demência vascular isquêmica”, e não de Doença de Alzheimer, entre os pacientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus. LANDIN et al. (1993)⁸⁴, em estudo de desenho

semelhante, não somente encontraram taxas significativamente maiores de pressão arterial e glicose sanguínea entre os pacientes com Demência Vascular, quando comparados com os pacientes com Doença de Alzheimer, mas também observaram taxas menores destes parâmetros nos pacientes com Doença de Alzheimer, quando comparados com a população de referência “saudável”. Esses achados levaram os autores a formularem a hipótese da “síndrome hipometabólica” na Doença de Alzheimer. TATEMACHI et al. (1993)⁸⁵, contestando os estudos que procuravam distinguir clínica e laboratorialmente doença cérebro-vascular e Doença de Alzheimer, compararam pacientes pós AVC, com demência e sem demência, com o propósito de entender melhor porque alguns pacientes com AVC desenvolviam demência. Utilizando observações transversais, os autores encontraram uma associação de demência com AVC prévio e diabetes mellitus, e não com hipertensão arterial e doença cardíaca. Ademais, destacaram que embora fosse assumido que hipertensão arterial tinha um papel importante na patogênese da demência relacionada a AVC, esta doença formalmente não vinha sendo estudada em estudos clínicos. Neste sentido, SKOOG et al. (1996)⁸⁶, em estudo longitudinal de 15 anos com pacientes de 70 anos de idade no início do seguimento, observaram uma associação entre hipertensão arterial na idade de 70 anos e o desenvolvimento de demência 15 anos depois. Este resultado incluiu tanto Doença de Alzheimer quanto Demência Vascular, separadamente, havendo uma importante diferença entre os idosos com DA, os quais apresentaram uma queda dos níveis pressóricos com o passar dos anos. No entanto, POSNER et al. (2002)⁸⁷ encontraram em hipertensos um risco maior de Demência Vascular, mas não de Doença de Alzheimer. Em artigo

de revisão descritiva, HANON E FORETTE (2005)⁸⁸ exibiram 23 estudos longitudinais que investigaram a associação entre pressão arterial e declínio cognitivo ou demência, com os seguintes resultados: tendo declínio cognitivo como referência, correlação positiva foi encontrada em 10 estudos, correlação negativa em 2, e curva em “J” em 3; tendo demência como referência, correlação positiva foi observada em 3 estudos, dos quais 2 exibiram este resultado tanto para Doença de Alzheimer quanto para Demência Vascular; com a Doença de Alzheimer como referência, resultados opostos foram encontrados em 2 estudos, e ausência de correlação em 1 estudo; e, finalmente, tendo Demência Vascular como referência, correlação positiva foi exibida no único estudo apresentado. Os autores ainda destacaram que a redução da pressão arterial em idosos demenciados talvez possa explicar resultados contraditórios em estudos transversais. A mesma revisão apresentou 7 ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, avaliando o efeito de drogas anti-hipertensivas sobre o declínio cognitivo ou demência: 5 encontraram redução do risco de demência (7 a 55%), dos quais 3 com significância estatística; 1 observou redução do risco de declínio cognitivo relacionado a AVC (41%), e 1 encontrou efeito não significativo sobre a função cognitiva. Apesar da controvérsia apontada por FUJISHIMA E TSUCHIHASHI (1999)⁸⁹, a respeito da relação entre hipertensão arterial e DA, e à luz dos dados apresentados acima, são muito fortes as evidências associando hipertensão arterial a demência. Ademais, com o propósito de esclarecer porque hipertensão arterial levaria à demência, van DIJK et al. (2004)⁹⁰, reunindo 10 estudos de coorte europeus, que avaliaram no total 1.805 idosos não demenciados de 65 a 75 anos de idade, que haviam feito ressonância

magnética de crânio 5 a 20 anos antes, observaram um risco aumentado de graves lesões de substância branca em idosos hipertensos.

Além dos dois estudos de caso-controle (MORTEL et al., 1993; LANDIN et al., 1993)^{83,84} e do estudo transversal (TATEMICHII et al., 1993)⁸⁵, apresentados anteriormente, dois estudos de coorte também demonstraram associação entre diabetes mellitus e demência (os estudos de caso-controle encontraram associação apenas com Demência Vascular e não com Doença de Alzheimer). Avaliando 6.370 idosos por 2,1 anos (média), OTT et al. (1999)⁹¹ observaram um risco quase duas vezes maior de demência e de Doença de Alzheimer entre os pacientes com diabetes mellitus. No entanto, os autores alertaram para a existência de fatores vasculares influenciando a associação com Doença de Alzheimer. Embora não tenha havido diferença relevante no risco relativo entre Doença de Alzheimer com e sem doença cérebro-vascular, e entre os casos de Doença de Alzheimer com e sem exame de ressonância magnética, os autores não descartaram a possibilidade de AVC e pequenos infartos estarem envolvidos na associação entre Doença de Alzheimer e diabetes mellitus. Em outro estudo prospectivo, no qual 824 idosos com idade acima de 55 anos foram acompanhados por 5,5 anos (média), ARVANITAKIS et al. (2004)⁹² observaram um risco 65% maior de desenvolvimento de Doença de Alzheimer entre os sujeitos com diabetes mellitus, quando comparados com os sujeitos sem esta doença. Além de fatores vasculares envolvidos na patogênese da Doença de Alzheimer, e que portanto poderiam explicar a associação com diabetes mellitus, os autores dos dois últimos estudos destacaram o papel de mecanismos bioquímicos, tais como a enzima de degradação da insulina participando da

regulação de beta-amilóide e da fosforilação da proteína tau e os produtos “advanced glycation end” (presentes nas placas senis e nos emaranhados neurofibrilares; formados pelo excesso de glicose no sangue).

A influência dos níveis séricos de colesterol sobre os quadros de demência e Doença de Alzheimer também é controversa entre os estudos epidemiológicos. Três estudos de prevalência demonstraram associação com demência ou Doença de Alzheimer: o estudo de NOTKOLA et al. (1998)⁹³ observou uma chance quase três vezes maior de ter Doença de Alzheimer entre os indivíduos com alto nível de colesterol sérico (OR: 3,1; IC 95%: 1,2-8,5); o estudo de WOLOZIN et al. (2000)⁹⁴ encontrou uma prevalência menor de Doença de Alzheimer entre os indivíduos que usaram medicamentos para redução dos níveis de colesterol sérico (estatinas); e o estudo de DUFOIL et al. (2005)⁹⁵ observou associação entre “hiperlipidemia” (nível de colesterol total alto) e taxas maiores de “demência do tipo não Alzheimer”, e entre uso de “medicação redutora de lipídio” e taxas menores de demência. No entanto, estudos de coorte encontraram resultados divergentes. O “Framingham Study” (TAN et al., 2003)⁹⁶ investigou o desenvolvimento de Doença de Alzheimer em 1.026 indivíduos, os quais haviam sido monitorados quanto aos “níveis totais de colesterol sérico” nos últimos 50 anos, e não encontrou associação estatisticamente significativa. LI et al. (2005)⁹⁷, em estudo de desenho semelhante ao anterior, acompanharam 2.356 sujeitos com pelo menos uma dose prévia de “colesterol sérico total”, e não encontraram associação nem com Doença de Alzheimer e nem tampouco com demência. Apesar do papel do colesterol na formação de beta-amilóide (FREARS et al., 1999)⁹⁸, o que teoricamente suportaria a associação entre

colesterol sérico e Doença de Alzheimer, os estudos epidemiológicos ainda são inconclusivos para tal afirmação.

Atividade física tem sido associada a risco menor de desenvolvimento de comprometimento cognitivo e demência em estudos populacionais prospectivos. LAURIN et al. (2001)⁹⁹, avaliando 4.615 idosos em um período de 5 anos, observaram associação entre “níveis altos de atividade física” e “riscos” reduzidos de comprometimento cognitivo, Doença de Alzheimer e “demência de qualquer tipo”. ROVIO et al. (2005)¹⁰⁰, examinando 1.449 idosos de 65-79 anos, após um tempo médio de seguimento de 21 anos, encontraram associação entre “atividade física em hora de lazer” na meia vida (pelo menos duas vezes por semana) e um risco reduzido de demência e Doença de Alzheimer, especialmente entre os apoE e4 positivos. PODEWILS et al. (2005)¹⁰¹, examinando 3.375 idosos por um período de 5,4 anos, observaram um risco menor de demência entre os idosos mais envolvidos em atividades físicas (= 4 atividades), quando comparados aos menos envolvidos (0-1 atividade). A principal diferença em relação ao estudo anterior foi a ausência de associação entre os apoE e4 positivos.

1.5 - Pesquisa de Prevalência de Demência

1.5.1 - Princípios Gerais

A prevalência é uma medida de frequência que se refere à proporção de pessoas afetadas por uma determinada doença, em uma população definida, em um determinado ponto do tempo. Os estudos epidemiológicos descritivos, transversais, usados para investigar em uma determinada população as taxas de prevalência da

doença em questão e a relação desta com vários fatores sócio-demográficos, são úteis para levantar hipóteses causais (MANN, 1997)¹⁰². Ademais, são extremamente importantes para o planejamento das ações de saúde, visando o atendimento mais racional para uma determinada população.

Estes estudos têm sido realizados tradicionalmente em duas etapas, como destacam NEWMAN et al. (1990)¹⁰³, e como pode ser observado na revisão de LOPES (2002)¹³. As duas etapas geralmente se caracterizam por: uma etapa de “screening”, e outra de aprofundamento diagnóstico. As desvantagens do estudo feito em uma etapa são a necessidade de entrevistadores especializados e a extensa duração das entrevistas em uma grande amostra. Por outro lado, no estudo feito em duas etapas deve-se atentar para a possibilidade de abandono entre as etapas, o que pode ocorrer por mudança de endereço ou por morte (MANN, 1997)¹⁰². Neste sentido, a sobrevivência do idoso e a possibilidade de sua institucionalização têm um papel importante.

Alguns requisitos precisam ser cumpridos quando se faz uma pesquisa deste tipo. Inicialmente é preciso definir as características da população estudada - população total ou selecionada por faixa etária, população da comunidade ou de instituições - para que se possa, sobretudo, realizar comparações com outras pesquisas. Outro cuidado deve ser a escolha da estratégia adequada para a captação da população - registro eleitoral, registro de serviços de saúde, registro de serviços sociais - para permitir que os indivíduos com a condição estudada tenham a mesma probabilidade de serem incluídos do que os outros (MANN, 1997)¹⁰².

Definida a população a ser estudada, o passo seguinte será a definição do “caso”. A maior parte dos estudos de prevalência de demência, listada na revisão descrita acima, selecionou seus casos, como já dito anteriormente, em duas etapas. Na primeira etapa, geralmente foram utilizados instrumentos para a avaliação da performance cognitiva, os quais não definem os casos de demência, mas selecionam uma amostra provável de indivíduos com uma determinada probabilidade de ter a doença pesquisada. Na segunda etapa, foram utilizados procedimentos para a definição do diagnóstico, através de critérios diagnósticos bem estabelecidos.

1.5.2 - Instrumentos para “screening” de demência

Existe uma grande diversidade de instrumentos que podem ser utilizados como “screening” em estudos de prevalência de demência. Na revisão de LOPES (2002)¹³ observou-se que 29 procedimentos diferentes foram empregados para selecionar os prováveis casos de demência, na maioria das vezes havendo combinação de mais de um instrumento.

Dos 42 estudos desta revisão, 23 utilizaram o “Mini Mental State Examination” (MMSE) (FOLSTEIN et al., 1975)¹⁰⁴, um instrumento de “screening” largamente usado e aceito internacionalmente, porém com limitações, sobretudo em indivíduos de baixa escolaridade; ademais, 12 destes estudos tiveram o complemento de outro instrumento (LOPES, 2002)¹³. Segundo os seus criadores, o MMSE foi elaborado para estimar quantitativamente a gravidade do prejuízo cognitivo. Porém, o MMSE também tem sido empregado para classificar demência em níveis de gravidade: leve, moderada e grave (TOMBAUGH E MCINTYRE, 1992)¹⁰⁵. Este

instrumento consiste de várias questões, agrupadas em sete categorias de funções cognitivas, totalizando 30 pontos: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), evocação de três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e construção visual (1 ponto). A pontuação menor ou igual a 23 tem sido reconhecida, pela maior parte dos estudos, como indicativa de prejuízo cognitivo. No entanto, a partir do estudo do “Epidemiologic Catchment Area” (ECA), de 1991, criou-se uma tendência de classificar a gravidade do prejuízo em três níveis: 24-30 = sem prejuízo cognitivo, 18-23 = prejuízo cognitivo leve, e 0-17 = prejuízo cognitivo grave. TOMBAUGH E MCINTYRE (1992)¹⁰⁵, em uma importante revisão, examinaram as informações acumuladas ao longo de 26 anos acerca das propriedades psicométricas e a utilidade do MMSE. No aspecto confiabilidade, com relação à consistência interna, níveis maiores (nível alfa) de confiabilidade foram encontrados em um grupo misto de pacientes clínicos (0,96), e níveis mais modestos em amostras comunitárias (0,68 e 0,77). Níveis maiores de confiabilidade também foram encontrados em amostra comunitária com menor nível de escolaridade, quando comparada com outra de maior nível de escolaridade. No aspecto confiabilidade teste-reteste, os coeficientes se situaram entre 0,80 e 0,95, em intervalo inferior a dois meses, tanto em sujeitos intactos quanto em não-intactos cognitivamente. No entanto, quando o intervalo teste-reteste foi maior (1-2 anos), os coeficientes foram bem menores (menor do que 0,50), em amostra intacta cognitivamente, sugerindo cautela na interpretação de pequenas alterações em estudos longitudinais. ANTHONY et al. (1982)¹⁰⁶, em amostra hospitalar examinada através do DSM-III para a detecção de delirium e

demência, encontraram níveis de 87% de sensibilidade. Amostra hospitalar e gravidade do prejuízo cognitivo correlacionaram-se, em determinados estudos, com níveis maiores de sensibilidade. Em sujeitos com doenças psiquiátricas e neurológicas, a sensibilidade atingiu níveis menores (21-76%). No aspecto especificidade, a maior parte dos estudos encontrou níveis moderados a altos de especificidade. O grau de correlação com outros testes de performance cognitiva (testes de “screening” cognitivo, inteligência, memória e testes neuropsicológicos) mostrou-se consistente, ressaltando que na avaliação das atividades da vida diária, as atividades instrumentais (culinária, finanças) tiveram maior correlação do que as atividades básicas da vida diária (vestir-se, alimentar-se). O grau de escolaridade pode produzir erros de classificação, como foi observado em alguns estudos: enquanto na amostra de baixa escolaridade pode haver um aumento dos falso-positivos, na amostra de alta escolaridade pode haver um aumento dos falso-negativos. BERKMAN (1986)¹⁰⁷, no entanto, sugeriu não ajustar o ponto de corte conforme o grau de escolaridade, para não interferir na investigação da educação como fator de risco para demência. Com relação à idade, os estudos demonstram que sujeitos mais idosos apresentaram uma tendência para pontuações mais baixas. No entanto, como a idade parece ser um fator de risco para demência, esta tendência não pode ser vista apenas como um fator de viés psicométrico. Os fatores sexo e raça não causaram diferenças significativas nos resultados. Os ítems, quando analisados individualmente, tiveram o seguinte comportamento: os ítems evocação das três palavras, atenção e cálculo, construção visual e orientação espacial, tanto em sujeitos “normais” quanto em sujeitos com demência, foram os mais sensíveis, sendo que nos

sujeitos com demência os itens de linguagem, nomeação de dois objetos e repetição de frase foram os menos sensíveis. No item atenção e cálculo, soletrar a palavra de trás para frente teve pontuações maiores do que a série de subtrações de 7. Os autores finalizaram a revisão com algumas sugestões de modificação para ajustar o teste às condições de cada pesquisa ou amostra populacional: mudar o ponto de corte, estratificar níveis de educação com respectivos pontos de corte (ambas podendo alterar a sensibilidade e a especificidade), usar procedimentos para diferenciar o valor dos itens, modificar o conteúdo do MMSE (excluindo ou incluindo questões), e incluir o MMSE dentro de uma bateria de testes.

BERTOLUCCI et al. (1994)¹⁰⁸, ao estratificar níveis de escolaridade com os respectivos pontos de corte (13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade, e 26 para alta escolaridade), encontraram elevados níveis de sensibilidade e especificidade. CRUM et al. (1993)¹⁰⁹, procurando avaliar a distribuição do MMSE com relação à idade e à educação, encontraram os seguintes resultados: correlação positiva entre baixa pontuação, baixa escolaridade e progressão da idade; maior variação das pontuações finais entre os sujeitos de menor escolaridade, supostamente pela maior prevalência de transtornos do desenvolvimento e de condições patológicas neste grupo. Os autores enfatizaram o uso do MMSE para identificar dificuldades cognitivas, sobretudo para situar um determinado paciente dentro de um percentil na população, ao invés de simplesmente enquadrá-lo como normal ou patológico. Neste sentido, a mediana foi 29 para os indivíduos na faixa de 18-24 anos, e 25 para os indivíduos acima de 80 anos. Quanto à escolaridade, a mediana foi 29 para indivíduos com escolaridade acima de 9 anos, 26 para indivíduos com 5-8

anos de escolaridade, e 22 para aqueles com 0-4 anos de escolaridade. BRUCKI et al. (2003)¹¹⁰, ao avaliar os escores médios do MMSE em indivíduos normais de 16 a 92 anos de idade (média de 58,9 anos), com vários níveis de escolaridade, encontraram os seguintes resultados: 20, para analfabetos; 25, para 1-4 anos de escolaridade; 27, para 5-8 anos de escolaridade; e 28, para = 9 anos de escolaridade.

Outro instrumento para “screening” utilizado foi o “Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination” - CAMDEX (ROTH et al., 1986)⁶⁰, um instrumento bastante extenso, desenvolvido para a elaboração do diagnóstico de demência. Desta forma, nos 4 estudos em que foi utilizado para “screening”, apenas uma, do total de oito seções que o compõem, foi empregada: em 3 estudos foi empregada a seção cognitiva, denominada CAMCOG (“Cognitive Section of the CAMDEX”), e em 1 estudo foi empregada a seção correspondente à entrevista estruturada com familiar ou informante.

Outros instrumentos utilizados para “screening” foram: o “Geriatric Mental State Examination” (GMS)¹¹¹, em 4 estudos, usado por MCCracken et al. (1997)¹¹² por evitar sérios problemas quando se avalia doença mental em indivíduos de várias culturas, e considerado por COPELAND E DEWEY (1991)¹¹³ um instrumento com alta sensibilidade e alta especificidade para distúrbios orgânicos e depressivos; o “National Adult Reading Test” (NART)^{114,115}, em 2 estudos, usado por HENDERSON et al. (1994)⁵⁵ para estimar performance cognitiva pré-mórbida; o “Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly” (IQCODE)¹¹⁶, em 2 estudos, usado para informantes, e destacado por THOMASSEN et al. (1998)¹¹⁷ pela sua capacidade de detectar alterações cognitivas em um período de 10 anos.

JORM e JACOMB (1989)¹¹⁶, utilizando o IQCODE em uma amostra comunitária e em outra de indivíduos com demência, encontraram os seguintes resultados: alta confiabilidade interna na amostra comunitária ($\alpha:0,95$); alta confiabilidade teste-reteste, após 1 ano, em amostra de indivíduos com demência ($r:0,75$); boa capacidade de discriminação entre a amostra comunitária e amostra com demência; baixa correlação com educação, indicando baixa influência da habilidade pré-mórbida.

Outros dois instrumentos que têm sido citados na literatura como instrumentos capazes de identificar possíveis casos de demência são a escala “Bayer Activities of Daily Living Scale / “Activities of Daily Living-International Scale” (B-ADL / ADL-IS)¹¹⁸ e o teste “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME)¹¹⁹.

A escala “Bayer Activities of Daily Living Scale” / “Activities of Daily Living-International Scale” (B-ADL / ADL-IS) foi desenvolvida para tentar quantificar as mudanças nas atividades diárias, nos primeiros estágios de demência. Patrocinada pelo Laboratório Farmacêutico Bayer, tinha como objetivo ser um instrumento de aplicação internacional na avaliação dos déficits funcionais de pacientes com demência leve a moderada. A escala foi desenvolvida usando 141 critérios empíricos, os quais foram testados em 4 países (EUA, Alemanha, Rússia e Grécia). Destes, apenas 40 itens foram selecionados para ser incluídos no estudo piloto da ADL-IS (LEHFELD et al., 1997)¹²⁰. Dos 40 itens selecionados, somente 25 fazem parte da versão final, que tem demonstrado ser sensível às mudanças observadas em etapas precoces de demência, sem apresentar um viés cultural significativo (LEHFELD et al., 1997)¹²⁰. A B-ADL/ADL-IS compreende 13

domínios da vida diária. As duas primeiras perguntas avaliam atividades do dia a dia, as perguntas 3-20 avaliam diretamente os problemas em relação a tarefas específicas da vida diária, e os 5 itens finais avaliam aspectos relacionados às funções cognitivas (LEHFELD et al., 1999)¹²¹. A pontuação em cada um dos itens vai de 1-10, pedindo-se ao cuidador ou a um informante, suficientemente familiarizado com o paciente, que avalie o desempenho do indivíduo que está sob seus cuidados. O escore total é feito pela soma de todos os escores parciais, dividida pelo número de itens respondidos, com a pontuação final variando de 1,00 a 10,00. Essa escala tem a vantagem de ser breve e facilmente aplicável por clínicos gerais (e no contexto de atenção primária), tanto para "screening", quanto para documentação dos efeitos do tratamento e a progressão da demência (HINDMARCH et al., 1998)¹¹⁸. A versão em português para o Brasil foi feita pelo "MAPI Research Institute" e está disponível desde Maio de 1999, existindo versões em espanhol, francês e alemão, além da versão inglesa original. Na versão em português, o processo de tradução e adaptação incluiu testes pilotos de aplicação da escala em cuidadores brasileiros de pacientes com doença de Alzheimer. Os testes tinham como objetivo avaliar a clareza, propriedade das palavras e aceitabilidade do questionário adaptado (MAPI Research Institute, 1999)¹²².

O teste "Fuld Object Memory Evaluation" (FOME) é um instrumento que surgiu tentando minimizar os vieses culturais dos testes cognitivos (FULD et al., 1980)¹¹⁹. Foi desenhado para avaliar alguns aspectos do processo de aprendizagem e evocação nos idosos, assim como para prover informação acerca do reconhecimento tátil, discriminação direita - esquerda, e fluência verbal. É constituído por material

corriqueiro (10 objetos comuns, como bola, chave, xícara, pente) que são identificados pela palpação, dentro de um saco. O procedimento envolve: identificar e nomear os objetos pelo tato (mãos direita e esquerda intercaladas), retirá-los e conferir se a resposta estava correta. Em seguida, iniciam-se provas intercaladas de fluência verbal e evocação seletiva das listas (4 provas de fluência e 5 de evocação). As tarefas de fluência incluem dizer "coisas que fazem as pessoas felizes"; frutas; comidas; nomes próprios; e "coisas que fazem as pessoas tristes". Após 15 minutos é solicitada nova evocação. O teste foi desenvolvido para uso em idosos da comunidade e casas de repouso, e as normas de avaliação estão disponíveis para dois grupos de idades (70-79 anos e 80-89 anos). O teste de fluência verbal pode contribuir para a discriminação da "pseudodemência" de um processo real de demência, particularmente quando o paciente está deprimido, sendo que a produção verbal diminuída é um dos achados mais comuns na doença de Alzheimer (FULD, 1980)¹¹⁹. LA RUE (1989)¹²³, em estudo feito com 80 pacientes idosos (60-90 anos) hospitalizados, demonstrou que os pacientes com demência tinham uma pior performance do que os sujeitos deprimidos em todos os itens do teste. Por outro lado, os pacientes deprimidos, em todos os itens, tiveram scores mais próximos dos idosos normais do que os pacientes com doença de Alzheimer (LA RUE, 1989)¹²³. A fluência verbal foi avaliada também isoladamente por HEUN et al. (1998)¹²⁴, que utilizaram nomes de pessoas e de animais, atingindo um elevado poder de discriminação entre idosos com demência e idosos sem deficiências cognitivas. Esses autores (HEUN et al., 1998)¹²⁴ não encontraram nenhuma diferença com relação ao tipo de lista (nomes de pessoas ou de animais). O poder preditivo do FOME para

identificar pessoas idosas com risco de desenvolver demência no futuro foi investigado por FULD et al. (1990)¹¹⁹, que descreveram, com um ponto de corte de 5 ou menos itens evocados, um valor preditivo positivo de 59% e um valor preditivo negativo de 94%. Esse teste está sendo utilizado na investigação de pacientes com suspeita de demência, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, desde 1996. A sua tradução e adaptação para o português foi elaborada pela neuropsicóloga Cândida H.P. Camargo¹²⁵. Os resultados preliminares sugeriram que a versão em português do FOME constitui um dos instrumentos mais sensíveis (comparado a outros de uma extensa bateria neuropsicológica), para detectar casos de Doença de Alzheimer e de Transtorno Cognitivo Leve também em nosso meio (CID et al., 1998)¹²⁵.

1.5.3 - Uso de testes combinados para o “screening” de demência

Muitos dos testes citados anteriormente surgiram como alternativas para evitar os vieses educacionais e culturais, em contraposição aos testes clássicos tais como o MMSE ou o GMS. Por outro lado, sabe-se que não existe um único teste que combine 100% de especificidade e 100% de sensibilidade na detecção de casos de demência. Entretanto, algumas alternativas vêm sendo empregadas para aprimorar a acurácia do "screening", e dentre essas modalidades existe a estratégia de combinar os testes. HOOIJER et al. (1993)¹²⁶ combinaram vários testes cognitivos (MMSE, MSQ e SPMSQ), obtendo uma maior eficácia na detecção dos casos, do que quando os testes foram empregados isoladamente. Especialmente nos casos de demência moderada a grave, foram obtidos taxas de sensibilidade e especificidade de 100%. Os

pares de testes que continham o AMTS resultaram em uma sensibilidade maior (detecção de mais casos), enquanto que a combinação contendo o MMSE resultou em uma maior especificidade para casos moderados a graves de demência (detectando casos avançados de demência a um custo menor). Isto foi explicado pelas características dos itens de cada teste. Todos os instrumentos possuíam itens de orientação e conhecimento geral, que aparentemente detectariam melhor os casos de demência avançada. Além disso, o MMSE contém o item nomeação de objetos (relógio e caneta), que só se alteraria em casos mais avançados, e a série de 7, que pode alterar-se por outras circunstâncias diferentes da demência, o que aparentemente não acontece, por exemplo, com a contagem regressiva de 20 a 1 do AMTS (HOOIJER et al., 1993)¹²⁶.

Em outro estudo mais recente, HEUN et al. (1998)¹²⁴ compararam diversos instrumentos e testes cognitivos, aplicados a 287 indivíduos da comunidade, para investigar sua validade com relação ao “screening” e diagnóstico de demência. Esses autores concluíram que a validade dos escores “compostos” por vários testes foi maior do que a dos testes individuais, mas que alguns testes cognitivos como a fluência verbal e a evocação de palavras obtiveram alta validade, demonstrando serem alternativas úteis e breves que podem ser utilizadas como instrumentos para o “screening” de demência.

MACKINNON E MULLIGAN (1998)¹²⁷ combinaram um teste cognitivo e um teste de avaliação funcional, o MMSE e o IQCODE. Esses autores demonstraram que estes instrumentos são complementares na avaliação de demência, e que quando usados em conjunto trazem mais informação do que usados isoladamente. Essa

complementaridade era esperada porque os testes cognitivos, quando usados isoladamente, podem ser afetados pela educação e as habilidades pré-mórbidas. Assim, pacientes com baixa escolaridade podem ser classificados erroneamente como demenciados, enquanto pacientes com alta escolaridade, porém demenciados, podem não ser corretamente diagnosticados. Os testes cognitivos, além disso, requerem a integridade das habilidades lingüísticas e sensório-motoras dos sujeitos avaliados. Os relatos dos informantes, por outro lado, não são contaminados pela inteligência, pela educação, ou pelas habilidades pré-mórbidas, mas podem ser influenciadas por fatores "não-cognitivos", tais como o estado afetivo, a personalidade, e a qualidade da relação afetiva entre o informante e o paciente (MACKINNON & MULLIGAN, 1998)¹²⁷. Os autores tentaram três estratégias de avaliação de seus resultados: (1) uma em que era necessário apenas um dos testes alterados para o diagnóstico de demência; (2) outra em que os dois testes deveriam estar alterados para se fazer o diagnóstico; e (3) um terceiro método combinando os valores dos dois testes para obter um novo escore. A análise feita confirmou que os testes são complementares na avaliação da demência e que usados em conjunto fornecem mais informação do que isolados, o que melhora a avaliação e o diagnóstico. Dentre os três métodos de avaliação, aquele que combinou os valores de ambos os testes, apresentou uma melhor performance do que os testes isolados, aumentando tanto os níveis de sensibilidade quanto os de especificidade. Por outro lado, o método que usava só um dos testes alterados aumentou a sensibilidade em detrimento da especificidade, enquanto que o método que precisava dos dois testes

positivos, dada a alta especificidade do MMSE, não teve nenhuma vantagem com relação ao uso isolado deste instrumento.

Outro instrumento de rastreamento de demência, desenvolvido nos últimos anos, é o “Community Screening Interview for Dementia” (CSI-D), que foi criado para ser utilizado em estudos trans-culturais. O CSI-D é constituído por dois componentes, um teste cognitivo para indivíduos analfabetos e outro para indivíduos “letrados”, e uma entrevista com um informante sobre desempenho do paciente em atividades da vida diária. Os resultados da aplicação deste instrumento, em 5 centros de países diferentes, mostraram que a combinação do escore cognitivo e do informante aumentou a sensibilidade e a especificidade para demência (HALL et al., 2000)¹²⁸.

O uso de testes combinados tem se mostrado promissor para aumentar a precisão do diagnóstico de demência leve em todas as situações, tanto na combinação de testes cognitivos (HOOIJER et al., 1993; HEUN et al., 1998)^{126,124}, quanto na combinação de um teste cognitivo com um teste de avaliação funcional, sendo estes instrumentos complementares (MACKINNON E MULLIGAN, 1998; HALL et al., 2000, BUSTAMANTE et al., 2003)^{127,128,129}.

1.5.4 - Treinamento de entrevistadores para o “screening” de demência em estudos de prevalência

Outra questão relevante, considerando a aplicação dos instrumentos de “screening”, diz respeito ao treinamento de entrevistadores utilizados na primeira etapa da pesquisa, os quais não precisam ser necessariamente psiquiatras. Além de

receberem treinamento específico e apropriado para a aplicação do instrumento de “screening”, os entrevistadores devem ser advertidos sobre a existência de sujeitos com dificuldades cognitivas que apresentam dificuldades para o preenchimento de questionários, e que, desta forma, podem requerer um tempo maior e/ou o auxílio de um informante.

1.5.5 - Instrumentos e critérios para o diagnóstico de demência

O critério diagnóstico mais empregado nos estudos de prevalência de demência, nos últimos 20 anos, é o “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. Dos trabalhos revisados por LOPES (2000)¹³, 85% empregaram a terceira edição revisada, DSM-III-R (APA, 1987)⁵⁶ ou a quarta edição, DSM-IV (APA, 1994)⁵⁷, dos quais 55% também empregaram os critérios do “National Institute of Neurologic, Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association”, NINCDS-ADRDA (MCKHANN et al., 1984)⁵⁹, 27% os critérios do “International Classification of Diseases”, 10ª edição, ICD-10 (WHO, 1992)⁵⁸, 25% os critérios do “Clinical Dementia Rating Scale”, CDR (HUGHES et al., 1982)⁶², e 11% os critérios do “Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination”, CAMDEX (ROTH et al., 1986)⁶⁰.

Entre os critérios diagnósticos descritos destacam-se os critérios do DSM-IV e do ICD-10, ao incluírem os subtipos etiológicos de demência, os critérios do NINCDS-ADRDA (para doença de Alzheimer) e os critérios do CAMDEX (para demência e seus subtipos etiológicos).

O CAMDEX (ROTH et al., 1986)⁶⁰ é uma entrevista estruturada, que além da avaliação clínica também inclui a aplicação de escalas padronizadas, testes

psicológicos para a detecção de prejuízo cognitivo, testes laboratoriais, e exames de imagem. As vantagens do CAMDEX, sobre outros instrumentos de avaliação diagnóstica estruturados ou semi-estruturados, seriam sua capacidade de avaliar o estado mental e físico prévios do paciente, além de fornecer dados sobre o início e a progressão dos déficits cognitivos (ROTH et al., 1986)⁶⁰. O CAMDEX foi concebido pelos seus autores com a finalidade de diagnosticar e quantificar os quadros de demência (ROTH et al., 1986)⁶⁰. Trata-se de uma entrevista estruturada, composta de 8 seções: A- investigação do estado atual do paciente (mental e físico), seus antecedentes pessoais e sua história familiar; B- teste cognitivo com 67 ítems (CAMCOG), que inclui o MMSE, e avalia orientação, linguagem, memória, praxia, atenção, pensamento abstrato, percepção e cálculo; C- observações do examinador sobre o estado do paciente; D- exame físico e neurológico; E- resultados de exames laboratoriais e radiológicos; F-registro de medicações atualmente em uso; G- informações adicionais relevantes, sobre o paciente, obtidas no curso da entrevista; H- entrevista com familiar ou informante. Os critérios operacionais originalmente utilizados no CAMDEX foram os do DSM-III (APA,1980)¹³⁰, mas, como destacam BOTTINO et al. (1997)¹³¹, as informações fornecidas pela entrevista permitem classificar os pacientes segundo os critérios do NINCDS-ADRDA Work Group (MCKHANN et al., 1984)⁵⁹, ICD-10 (WHO, 1992)⁵⁸ e DSM-IV (APA, 1994)⁵⁷. O CAMDEX foi traduzido e adaptado para o português por BOTTINO et al. (1999)¹³², e tem sido utilizado em diversos serviços e centros de pesquisa no Brasil.

1.6 - Demência no Brasil

1.6.1 - Estudos de prevalência

No Brasil, VERAS E MURPHY (1994)¹³³, estudando “síndrome cerebral orgânica” e depressão no município do Rio de Janeiro, em três bairros distintos com relação ao nível sócio-econômico, encontraram uma alta prevalência de “síndrome cerebral orgânica” no bairro de classe baixa, 29,7%, muito acima das taxas encontradas nos bairros de classe alta e média, de 5,9% e 9,8%, respectivamente. Vale destacar, neste estudo, a utilização de um critério diagnóstico bastante abrangente (síndrome cerebral orgânica), e a alta prevalência desta condição no bairro de classe baixa, achado supostamente influenciado pelo efeito da baixa escolaridade no instrumento de “screening”.

Em outro estudo brasileiro, na cidade de São Paulo, ANDRADE et al. (1999)¹³⁴, usando o diagnóstico “transtorno cerebral orgânico”, encontraram uma prevalência de 1,2% na população com idade maior ou igual a 60 anos.

Em estudo realizado em cidade de pequeno-médio porte do interior de São Paulo, HERRERA et al. (2002)¹³⁵ encontraram resultados semelhantes à maior parte dos estudos mundiais: prevalência de demência em idosos com idade maior ou igual a 65 anos de 7,1%, sendo de 1,6% na faixa etária dos 65 aos 69 anos e 38,9% nos idosos com idade maior ou igual a 85 anos; sexo feminino mais acometido na proporção de 2:1; correlação negativa com a escolaridade (12,2% em analfabetos e 3,5% em indivíduos com escolaridade superior a oito anos), e proporção DA:DV de 6:1.

1.6.2 - Perspectivas para pesquisa

A heterogeneidade da população brasileira demanda cuidadosa atenção na investigação de fatores associados aos quadros demenciais. Dois aspectos são de extrema relevância: a escolaridade e o nível sócio-econômico. Sobretudo se considerarmos a possível associação entre baixa escolaridade e o aparecimento de quadros demenciais, tanto como fator de risco quanto como um possível viés metodológico.

Ademais, são necessários mais estudos para melhor conhecer as particularidades brasileiras que estão associadas com estes quadros. Conhecer, inclusive, a população dos centros urbanos de porte médio-grande, fazendo um contraponto com os outros estudos brasileiros, dois dos quais realizados em cidades populosas e outro em cidade de pequeno porte.

Um exemplo é Ribeirão Preto, uma cidade voltada para a agricultura e para a prestação de serviços, e que do ano de 1980 a 2000 teve um crescimento da população idosa (maior ou igual a 60 anos) cerca de 4,5 vezes maior do que a da população jovem (0 a 14 anos). Dados do último censo, de 2000, apontavam uma população total de 504.923 habitantes, basicamente urbana, com uma proporção do sexo feminino discretamente maior (51,86%), e uma proporção de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos de 10,1%, o que equivale a 50.997 idosos (FIBGE, 2000)³. Na área de atenção ao idoso, nos últimos anos, os serviços de saúde locais tiveram um expressivo desenvolvimento. No âmbito municipal, contamos com o Programa de Saúde do Idoso e com o Núcleo Municipal da Terceira Idade, onde funciona o Centro de Convivência. Também contamos, em atenção secundária, com um Ambulatório de Geriatria. A atenção terciária, a nível regional, tem como principal

representante o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, onde funcionam as unidades de Psiquiatria Geriátrica, Neurologia Comportamental e Geriatria.

Paralelamente à crescente estruturação da assistência aos idosos, o município de Ribeirão Preto desperta para a necessidade de conhecê-los. Este trabalho visa realizar um levantamento da prevalência de demência desta população, tendo em vista as suas importantes implicações sobre os cuidadores, familiares, “casas de apoio” e serviços de saúde. Visa também avaliar a distribuição destes casos com relação a diversos fatores, investigar possíveis fatores associados aos quadros de demência e traçar um perfil cognitivo da população estudada.

Justificativa

O envelhecimento da população em todo mundo é evidente. O crescimento do número percentual e absoluto de indivíduos idosos, que vem ocorrendo nos últimos anos, ilustra bem este processo. O que antes era específico dos países desenvolvidos, agora tornou-se uma realidade para os países em desenvolvimento. A sociedade, como um todo, percebe a demanda das pessoas idosas por serviços apropriados, incluindo os serviços de saúde para idosos.

O envelhecer traz consigo modificações globais na vida do indivíduo, deixando-o mais susceptível a determinadas doenças. Na esfera da saúde mental, o exemplo mais marcante é a demência. Marcante pela sua prevalência, e também pelas consequências sobre a vida do idoso, limitando a sua capacidade de “processar” o que lhe acontece e reduzindo sua qualidade de vida.

Estudiosos de vários países têm se empenhado em conhecer melhor esta doença. Que fatores levam um indivíduo a apresentar demência? Esta é uma das questões fundamentais levantadas. Estudos epidemiológicos de prevalência são o primeiro passo neste sentido, descrevendo em que proporção se distribuem os quadros de demência na população geral. Diferenças sócio-demográficas foram observadas em determinados estudos, muitas vezes acompanhando as diferenças culturais nos países estudados.

E o que dizer do Brasil - um país com dimensões continentais, com tantas influências raciais, e tanta diversidade cultural? Existem poucos estudos epidemiológicos de prevalência de demência ou transtornos cognitivos em nosso meio. A complexidade deste tipo de estudo começa pela definição dos critérios e dos instrumentos para identificar os possíveis casos de demência em grandes estudos epidemiológicos. Dois estudos (VERAS E MURPHY, 1994; ANDRADE et al., 1999)^{133,134}, dos três estudos brasileiros destacados na introdução, utilizaram diagnósticos sindrômicos, que são muito abrangentes para os conceitos atuais de demência, dificultando as comparações com outros estudos mundiais.

Ao estudar a distribuição dos casos de demência e o perfil cognitivo da população idosa de uma cidade brasileira de porte médio-grande, a partir de um levantamento epidemiológico de prevalência, esperamos conhecer a nossa realidade, comparando nossos achados com resultados de estudos internacionais. Esta investigação pode levar à identificação de fatores específicos associados à esta doença em nosso meio, permitindo que os serviços de saúde organizem-se melhor

para atender à demanda crescente de sujeitos com demência e para que sejam planejadas ações visando a prevenção desta doença em nosso meio.

2 - OBJETIVOS

2.1 - estimar a prevalência de comprometimento cognitivo e funcional, em amostra comunitária representativa da população de Ribeirão Preto, em indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos;

2.2 - avaliar a distribuição dos casos de comprometimento cognitivo e funcional com relação a fatores sócio-demográficos e clínicos;

2.3 - estimar a prevalência de demência na população idosa estudada;

2.4 - avaliar a distribuição dos casos de demência com relação a fatores sócio-demográficos e clínicos, atividade física e hábitos culturais;

2.5 - descrever a distribuição das principais etiologias de demência na amostra estudada;

2.6 - investigar possíveis fatores associados ao diagnóstico de demência.

3- CASUÍSTICA E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado dentro das seguintes características:

3.1- População

- Amostra representativa da comunidade;
- habitantes do município de Ribeirão Preto;
- moradores de três regiões:
 - uma de melhor nível sócio-econômico (nível alto),
 - uma de nível sócio-econômico intermediário (nível médio),
 - outra de pior nível sócio-econômico (nível baixo),
 - de acordo com dados obtidos do IBGE;
- faixa etária: maior ou igual a 60 anos de idade;
- captação: contagem populacional do censo de 1996, agregado por setor censitário - FIBGE¹³⁶.

3.4 - Métodos

3.2.1- Estratégia de amostragem e tamanho da amostra

Para esta finalidade foram utilizados os dados da FIBGE, referentes ao Censo Demográfico de 1991¹³⁷ e Contagem Populacional de 1996¹³⁶. Os dados do Censo Demográfico de 2000³ começaram a ser disponibilizados durante a execução do presente projeto de pesquisa, o que permitiu a realização de algumas adaptações à análise que será explanada a seguir (por exemplo: mudança do número dos setores).

A população do município de Ribeirão Preto, segundo dados da FIBGE de 1996, era de 456.252 pessoas, sendo 42.865 (9,39%) com 60 anos ou mais. Em 2000 alcançava em torno de 500.000 pessoas, sendo 10,1 % com 60 anos ou mais.

O município, de modo semelhante a São Paulo e outros municípios brasileiros, apresenta áreas com desenvolvimento sócio-econômico desigual. Este quadro pode ser constatado se observarmos algumas características de cada um dos 406 setores nos quais o município está subdividido. Com relação à proporção de chefes de família com “alta” escolaridade, teremos 89% no setor de n. 108, e 3% no setor de n. 123. Citamos a heterogeneidade dos setores como indicador das desigualdades do município, porque este será o nosso critério fundamental para identificar diferentes estratos sócio-econômicos em Ribeirão Preto. Iremos utilizar ainda outra variável do Censo, referente à renda do chefe de família.

Utilizando como referencial a heterogeneidade do município, iniciamos a operacionalização do nosso processo de amostragem calculando o tamanho da amostra. Para tanto, definimos os seguintes parâmetros: estimativa de prevalência de 7%, baseada na pesquisa de HERRERA et al. (2002)¹³⁵; precisão ou erro de amostragem (d) de 2,0%; e nível de confiança de 95%.

Com esses parâmetros, calculamos o tamanho da amostra com a utilização do Programa Epi-Info-6¹³⁸, o que resultou em uma amostra de 617 indivíduos. Utilizamos ainda um fator de correção de 1,5 (efeito do desenho), multiplicando-o por 617, e acrescentamos 20% para compensar possíveis futuras perdas. Este cálculo resultou em uma amostra final de 1.110 idosos. Cabe aqui destacar que o procedimento foi exatamente igual ao utilizado para o cálculo da amostra no município de São Paulo (HOTOTIAN et al., 2005)¹³⁹, onde foi realizada pesquisa semelhante, a não ser pelo valor de d (precisão ou erro da amostragem). Em Ribeirão Preto, optamos por utilizar 2,0% e não 1,5% (como foi feito em São Paulo) para reduzir o tamanho da amostra a ser examinada neste município, onde os recursos em termos de infra-estrutura e equipe de atendimento eram menores do que aqueles disponíveis no Instituto de Psiquiatria do HC FMUSP, em São Paulo.

Uma vez calculado o tamanho da amostra, optamos por obtê-la de um modo probabilístico, escolhendo para isso a estratégia da amostragem por conglomerados.

Acreditamos ser necessário explicitar uma característica do nosso processo amostral, também presente na pesquisa de RAMOS e GOIHMAN (1989)¹⁴⁰ e na pesquisa de VERAS E MURPHY (1994)¹³³, os quais estudaram populações idosas em São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo em suas pesquisas problemas de Saúde Mental. Essa característica consiste em garantir que a amostra contenha representantes dos diferentes estratos sócio-econômicos do município. Mais especificamente, garantir que na constituição da amostra estejam presentes setores dos diferentes estratos sócio-econômicos do município.

Para garantir essa premissa, elaboramos um procedimento semelhante ao efetuado pelos autores acima, com uma adaptação que se fez necessária pelo fato de haver apenas 2 distritos no município de Ribeirão Preto, o que torna inviável o uso de distritos para identificar áreas sócio-econômicas distintas. Desta forma, ordenamos os 406 setores em ordem decrescente, segundo a “pontuação” sócio-econômica de cada setor, sendo que o de melhor situação ficou em primeiro lugar. Em seguida, dividimos o conjunto em tercís, ficando o tercil de melhor situação com pontuação de 2 a 53 pontos, o de situação intermediária, 55 a 104 pontos, e o de pior situação, 108 a 156 pontos. Entre os setores que apresentaram a mesma pontuação escolhemos aleatoriamente apenas um representante e excluímos o restante, ficando o conjunto constituído por 120 setores. Consideramos que o uso de setores semelhantes, com relação à pontuação sócio-econômica, não traria contribuição para a representatividade da amostra. A população destes 120 setores foi distribuída nos três estratos, segundo a Tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição da população idosa do município, entre os três estratos sócio-econômicos (excluindo os setores de mesma pontuação)

ESTRATOS	IDOSOS	IDOSOS	SETORES
	N	%	N
Melhor situação (alto)	3083	26,7	30
Situação intermediária (médio)	4736	41,0	42
Pior situação (baixo)	3711	32,1	48

A partir desse ponto, selecionamos um conjunto de setores de cada estrato que pudesse compor a amostra final de idosos. Esta seleção obedeceu aos seguintes critérios: a) manutenção na amostra, da proporção de idosos existentes em cada

estrato sócio-econômico; b) posição estratégica nos tercis, ou seja, conjunto de setores situados na primeira parte do tercil de melhor situação sócio-econômica, e assim por diante; c) aspectos operacionais que facilitassem o encaminhamento dos casos, ao final da pesquisa, para os serviços de saúde de referência; e d) uma população de idosos e uma densidade populacional dos mesmos que favorecessem o trabalho de campo (Tabela 4).

Tabela 4 - Seleção dos setores nos três estratos sócio-econômicos

ESTRATOS	SETORES	IDOSOS N	IDOSOS %	SETORES N
Alto	57, 58, 59, 107 e 108	521	26,7	5
Médio	17, 18, 19, 41, 42 e 43	801	41,0	6
Baixo	70, 125, 126, 127, 128 e 129	628	32,2	6

A soma de idosos dos três estratos foi 11.530. A percentagem 26,7%, por exemplo, do estrato com melhor situação, foi obtida pela divisão de 3.083 por 11.530. A soma dos idosos dos três grupos de setores é 1.950. A percentagem 26,7%, por exemplo, do grupo de setores de melhor situação, foi obtida pela divisão de 521 por 1950.

A fração amostral foi calculada, dividindo-se a amostra a ser estudada (1.110) pelo número total de idosos dos 3 estratos (11.530), o que resultou em 9,6%.

Com o propósito de obter um número de idosos maior do que o estipulado, procuramos incluir um número maior de setores em cada conjunto, preservando a sua representatividade. A seguir, em cada quadra, dentro de cada setor, definimos como ponto de partida a esquina à direita, e os domicílios foram selecionados alternadamente.

Desta forma, finalizamos a composição da amostra de acordo com o número de idosos calculado e a sua proporção nos três estratos sócio-econômicos diferentes.

3.2.2 - Seleção dos instrumentos de “screening”

Os instrumentos selecionados para compor a bateria de testes de “screening” foram os seguintes:

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental)¹⁰⁴;
- “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME)¹¹⁹: teste neuropsicológico para avaliação de linguagem, atenção, memória (fixação e aprendizagem), fluência verbal e reconhecimento verbal e tátil;
- IQCODE (“Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly”)¹¹⁶: escala com questões sobre o funcionamento cognitivo prévio do paciente, perguntadas a um informante que o conheça bem;
- B-ADL / ADL-IS (“Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living - International Scale”)¹¹⁸: escala desenvolvida para tentar quantificar as mudanças nas atividades diárias, nos primeiros estágios de demência;

- Questionário sócio-demográfico;
- Inventário clínico;
- Inventário de antecedentes pessoais e hábitos;
- Inventário de antecedentes familiares;
- Levantamento da utilização de serviços de saúde;
- Atividades instrumentais e físicas;
- Classificação sócio-econômica (ABIPEME).

O MEEM foi escolhido por ser um teste amplamente utilizado em todo o mundo e largamente estudado, com bons níveis de especificidade, e razoáveis níveis de sensibilidade para o diagnóstico de casos de demência leve.

O FOME, outro teste cognitivo a ser aplicado, foi escolhido por ser um teste que avalia principalmente aspectos de memória, sobretudo a memória episódica, que sabidamente é uma das primeiras alterações a aparecer em pacientes com demência, avaliando também a evocação tardia e a fluência verbal. O desempenho no FOME pode ser um importante preditor de aparecimento de demência no futuro e os resultados deste teste, aparentemente, não sofrem tanto a influência da escolaridade, característica psicométrica importante em uma população heterogênea como a brasileira.

O IQCODE é um dos testes de avaliação funcional que mostrou bons resultados na detecção de casos de demência, sobretudo os casos leves, os quais provavelmente serão encontrados em maior número na comunidade.

A B-ADL/IADL-IS foi escolhida por ser uma escala desenhada para ser aplicada em várias culturas, por ser sensível às alterações observadas nos casos de

demência leve, e por medir diferentes aspectos funcionais do indivíduo, o que é fundamental para o diagnóstico de demência.

Portanto, acreditamos que a combinação desses testes e escalas permitiria a criação de um instrumento com sensibilidade e especificidade adequadas para o rastreamento de indivíduos com demência, em uma população heterogênea do ponto de vista social e educacional, como a brasileira.

3.2.3 - Validação da bateria de testes de “screening”¹²⁹

Os quatro instrumentos de “screening” - MEEM, FOME, IQCODE e B-ADL-IADL-IS - foram testados em uma amostra de 93 indivíduos, sendo 34 com demência leve a moderada e 59 controles idosos, divididos em 3 grupos, de acordo com seu nível sócio-econômico e escolaridade (alta, média e baixa), procurando a melhor combinação para identificar os possíveis casos de demência. A triagem dos 59 controles foi realizada no Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial do Serviço de Geriatria do HC FMUSP (GAMIA), através da aplicação dos instrumentos: SRQ-20 (escala para avaliar morbidade psiquiátrica geral), AMTS (teste cognitivo breve, com 10 questões), e classificação social (Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado – ABIPEME). Os 34 sujeitos com diagnóstico de demência leve a moderada, de acordo com os critérios da ICD - 10 (WHO, 1992)⁵⁸ e DSM-IV (APA, 1994)⁵⁷ foram triados no ambulatório do PROTER-IPQ HC FMUSP.

Utilizando-se a regressão logística, a combinação dos 4 instrumentos obteve um resultado melhor do que a utilização do MEEM isolado: acurácia de 95,7%,

sensibilidade de 94,1% e especificidade de 96,6%. Com o uso da curva ROC foram obtidos os melhores pontos de corte para cada instrumento. Utilizando-se outra estratégia para combinar os instrumentos, a ‘regra mista’ (MEEM ou FOME e IQCODE ou B-ADL-IADL-IS), chegou-se ao resultado de 100% de especificidade e sensibilidade. Esta estratégia combinou os instrumentos da seguinte forma: qualquer dos dois testes cognitivos alterados mais qualquer dos dois testes funcionais alterados. Os pontos de corte definidos para MEEM, FOME, IQCODE e B-ADL-IADL-IS foram, respectivamente: <27, <35, >3,40 e >3,19 (BUSTAMANTE et al., 2003)¹²⁹. No presente estudo, foi utilizada a mesma estratégia (regra mista), com os pontos de corte citados anteriormente, mas foram definidos pontos de corte diferenciados para o MEEM, conforme os diferentes níveis de escolaridade da amostra: analfabetos: 20; 1-4 anos de escolaridade: 25; 5-8 anos de escolaridade: 27; e maior ou igual a 9 anos de escolaridade: 28 (adaptados a partir do estudo de BRUCKI et al., 2003)¹¹⁰.

3.2.4 - Treinamento dos entrevistadores: estudantes de enfermagem e de psicologia, e entrevistadores do Instituto de Pesquisa Toledo e Associados, foram treinados para a aplicação da bateria de testes de “screening”.

3.2.5 - Aplicação da bateria de testes de “screening” na comunidade (1ª fase ou fase comunitária).

3.2.6 - Seleção dos sujeitos com possível diagnóstico de demência (sujeitos que apresentaram comprometimento cognitivo e funcional na testagem de “screening”).

3.2.7 - Entrevista dos sujeitos com possível diagnóstico de demência, e de familiares de convívio próximo (cuidadores), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (2ª fase ou fase hospitalar), para a realização das seguintes atividades:

- Anamnese psiquiátrica e exame físico neurológico;
- Aplicação da versão em português da entrevista estruturada “Cambridge Examination” (CAMDEX), e do teste cognitivo CAMCOG (BOTTINO et al., 1999)¹³², visando a elaboração do diagnóstico clínico de demência, e os seus principais subtipos etiológicos;
- Aplicação da escala “Clinical Dementia Rating” (CDR)⁶², para quantificar a gravidade dos quadros de demência;
- Aplicação da escala B-ADL/IADL-IS¹¹⁸, para quantificar o grau de comprometimento funcional.

Para a determinação dos escores de cada uma das cinco categorias da escala CDR, foram utilizadas todas as informações obtidas com os outros instrumentos desta fase (fase hospitalar), descritos acima.

As entrevistas foram realizadas por médicos (psiquiatras, neurologista e geriatra), os quais solicitaram exames complementares de rotina para a investigação de síndromes demenciais (hemograma completo; dosagem sanguínea de sódio, potássio, uréia, creatinina, glicose, enzimas hepáticas, hormônios tireoidianos, vitamina B12,

folato e colesterol; sorologia para sífilis no sangue; Tomografia Computadorizada de crânio). Em 3 consultas foi possível estabelecer os diagnósticos sindrômico e etiológico, com posterior encaminhamento para tratamento no serviço de saúde correspondente (encaminhamentos feitos segundo critério clínico). Com o objetivo de conseguir a menor taxa de recusa possível, além de oferecer diversos horários para atendimento dos médicos nos hospitais e re-embolso das despesas de transporte dos sujeitos que não podiam pagar seu transporte até os hospitais ou que não podiam se locomover, agendamos consultas médicas no domicílio para diversos idosos que não aceitaram nenhuma das alternativas anteriores.

Os critérios diagnósticos utilizados foram os da CID-10 (WHO, 1992)⁵⁸, e os do DSM-IV (APA, 1994)⁵⁷, associados a critérios específicos para cada uma das principais etiologias de demência (P.ex: Doença de Alzheimer: NINCDS-ADRDA; Demência Vascular: NINDAS-AIREN; Demência Fronto-Temporal: Critérios de Lund e Manchester).

Cinco por cento dos “screen-negatives” e seus familiares/cuidadores foram convidados a comparecer ao hospital para aplicação dos instrumentos citados acima, exceto a realização dos exames laboratoriais e radiológico.

3.2.8 - Discussão diagnóstica dos casos entrevistados na 2ª fase

Dois especialistas com reconhecida experiência na área de demência, um psiquiatra e um geriatra, e mais três psiquiatras e um geriatra, participaram da discussão diagnóstica dos casos entrevistados na 2ª fase.

3.2.9 - Apresentação dos resultados e análise dos dados

Análise univariada: comparação da frequência de casos (sujeitos com comprometimento cognitivo e funcional, portanto com possível diagnóstico de demência, na 1ª fase; sujeitos com diagnóstico de demência, na 2ª fase) e controles, com relação às diversas variáveis sócio-demográficas e clínicas, através da utilização do “qui-quadrado” (X^2) e do correspondente valor de p (significância estatística). Na 2ª fase também foram investigadas as variáveis “atividade física” e “hábitos culturais”. No exame das variáveis clínicas, “atividade física” e “hábitos culturais” foi avaliada a associação, através do odds-ratio (OR) e do intervalo de confiança de 95% (IC 95%). Na 1ª fase foram considerados “controles” os sujeitos que não apresentaram comprometimento cognitivo e funcional e nem síndrome depressiva. Na 2ª fase foram considerados “controles”, os controles da 1ª fase e os sujeitos que na 2ª fase receberam outro diagnóstico (foram excluídos os casos de demência e os casos de CCND - Comprometimento Cognitivo Não Demência). As variáveis clínicas, as variáveis referentes aos hábitos culturais (por exemplo: ouvir rádio) e a variável “atividade física” foram obtidas através do relato verbal do idoso, após indagação direta sobre a existência de determinado diagnóstico, o uso de determinada substância (para a investigação de alcoolismo, tabagismo e uso de benzodiazepínico) e a realização de atividade física e de determinado hábito cultural. As variáveis referentes aos hábitos culturais foram inicialmente obtidas em categorias de frequência, e em seguida agrupadas em “poucas vezes” e muitas “vezes”. “Poucas vezes” reuniu as categorias “não”, “uma vez ao ano ou menos” e

várias vezes por ano”; “muitas vezes” reuniu as categorias “várias vezes por mês”, “várias vezes por semana” e “todos os dias, ou quase todos os dias”.

Análise multivariada: para estudar a relação entre as variáveis independentes (sócio-demográficas e clínicas) na associação com a variável dependente (comprometimento cognitivo e funcional, na 1ª. fase; demência, na 2ª.fase) foi utilizada a técnica de regressão logística binária. Também foi utilizada a regressão logística binária para avaliar a relação entre as variáveis independentes sócio-demográficas, “atividade física” e “hábitos culturais” na associação com a variável dependente “demência”. A escolha deste método estatístico levou em consideração o fato da variável dependente ser dicotômica.

Os dados foram digitados utilizando-se o programa Epidata¹⁴¹ e analisados através do Programa Estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 10.0 for Windows¹⁴².

3.3 - Considerações éticas

Este projeto foi aprovado pelos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Todos os idosos e familiares entrevistados concordaram em participar desta pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

4- RESULTADOS

4.1- 1ª fase (comunitária)

A aplicação da bateria de testes de “screening” na comunidade foi realizada em 1.145 idosos (participação de 62,6%; houve recusa por parte de 683 idosos, correspondendo a uma perda de 37,3%;), distribuídos entre os estratos sócio-econômicos da seguinte forma: estrato alto: 369 idosos (32,2%); estrato médio: 439 idosos (38,3%); estrato baixo: 332 idosos (29%); dados inexistentes em 5 sujeitos (ver Tabela 5).

A amostra apresentou média de idade de 70,9 anos (60-100; DP: 7,7) e foi composta, em sua maioria, por pessoas do gênero feminino, estado civil casado, com até 4 anos de escolaridade (ver Tabela 6).

Tabela 5 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas, na 1ª fase, entre os estratos sócio-econômicos

ESTRATO SÓCIO-ECONÔMICO	ENTREVISTAS REALIZADAS		PERDAS	
	N	%[†]	N	%[‡]
Alto	369	66,0	190	33,9
Médio	439	64,7	239	32,5
Baixo	332	56,6	254	43,3
Dados inexistentes	5			
TOTAL	1145		683	

[†] percentagem de entrevistas realizadas dentro de cada estrato

[‡] percentagem de perdas dentro de cada estrato

Tabela 6 - Amostra total e sua distribuição com relação às características sócio-demográficas

VARIÁVEIS	N	%
Faixa etária		
60-64	269	23,7
65-69	272	23,8
70-74	251	21,9
75-79	170	14,8
80-84	102	8,9
85-89	40	3,5
=90	21	1,8
Sexo		
Masculino	419	36,6
Feminino	726	63,4
Estado Civil		
Solteiro	90	7,9

Casado	660	57,6
Separado	64	5,6
Viúvo	315	27,5
Escolaridade		
0 (analfabeto)	116	10,1
1-4	489	42,7
5-8	108	9,4
=9	415	36,2
Nível sócio-econômico (ABIPEME)		
A	123	10,7
B	383	33,4
C	346	30,2
D	203	17,7
E	72	6,3

4.1.1 - Seleção dos sujeitos com possível diagnóstico de demência (sujeitos que apresentaram comprometimento cognitivo e funcional - CCF - na testagem de “screening”)

- 217 sujeitos apresentaram comprometimento cognitivo e funcional, correspondendo à taxa de prevalência de 18,9% (IC 95%: 16,63 – 21,16) na população com idade maior ou igual a 60 anos. Se considerarmos a população com idade maior ou igual a 65 anos, a taxa de prevalência foi 21,9% (IC 95%: 19,50 – 24,29). A média de idade de controles e sujeitos com CCF foi, respectivamente, 69,6 (DP: 6,7) e 76,2 (DP: 8,6). Observou-se associação entre CCF e as variáveis “idade” elevada, “sexo”

feminino, “estado civil” viúvo, “escolaridade” baixa, “nível sócio- econômico” baixo, “AVC”, “TCE”, “Depressão” e “uso de álcool” (relação negativa: uso de álcool associado a taxas menores de CCF) (ver Tabelas 7, 8 e 9).

Após a análise multivariada, as variáveis “idade” elevada, “escolaridade” baixa, “AVC”, “epilepsia” e “depressão” mantiveram-se associadas significativamente às taxas de CCF (ver Tabela 10).

Tabela 7 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação à faixa etária, por sexo

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO					FEMININO				
	Casos		Controles		TOTAL	Casos		Controles		TOTAL
	N	%	N	%		N	%	N	%	
60-64	11	(11,8)	82	(88,2)	93	13	(10,3)	113	(89,7)	126
65-69	12	(12,6)	83	(87,4)	95	19	(13,5)	122	(86,5)	141
70-74	9	(10,8)	74	(89,2)	83	27	(21,1)	101	(78,9)	128
75-79	14	(28,0)	36	(72,0)	50	34	(36,2)	60	(63,8)	94
80-84	10	(34,5)	19	(65,5)	29	27	(43,5)	35	(56,5)	62
85-89	5	(45,5)	6	(54,5)	11	20	(76,9)	6	(23,1)	26
=90	5	(71,4)	2	(28,6)	7	7	(63,6)	4	(36,4)	11
TOTAL	66	(17,9)	302	(82,1)	368	147	(25,0)	441	(75,0)	588
	$p<0,001 / X^2: 35,11$					$p<0,001 / X^2: 89,29$				

Tabela 8 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação às características sócio-demográficas

VARIÁVEIS	CASOS		CONTROLES		OR (IC 95%)	X ²	p
	N	%	N	%			
Faixa etária							
60-64	23	10,6	193	89,4	1,00		
65-69	29	12,4	205	87,6	1,19 (0,64-2,21)	X ² =0,33	p=0,56
70-74	36	17,1	174	82,9	1,74 (0,96-3,16)	X ² =3,76	p=0,052
75-79	47	32,9	96	67,1	4,11 (2,28-7,44)	X ² =27,06	p<0,001
80-84	37	40,7	54	59,3	5,75 (3,02-10,98)	X ² =36,67	p<0,001
85-89	22	64,7	12	35,3	15,38 (6,28-38,35)	X ² =58,16	p<0,001
=90	12	66,7	6	33,3	16,78 (5,20-56,36)	X ² =40,99	p<0,001
Sexo [†]							
Feminino	149	25,2	443	74,8	1,50 (1,08-2,10)	X ² =6,22	p=0,012
Masculino	68	18,3	304	81,7	1,00		

Estado Civil							
Solteiro	21	28,4	53	71,6	<u>2,25 (1,24-4,06)</u>	$X^2=8,53$	$p=0,003$
Casado	83	15,0	472	85,0	1,00		
Separado	12	22,2	42	77,8	<u>1,62 (0,77-3,36)</u>	$X^2=1,97$	$p=0,16$
Viúvo	90	33,8	176	66,2	<u>2,91 (2,03-4,17)</u>	$X^2=38,54$	$p<0,001$
Escolaridade							
0 (analfabeto)	37	42,5	50	57,5	<u>6,66 (3,72-11,94)</u>	$X^2=54,26$	$p<0,001$
1-4	109	26,6	301	73,4	<u>3,26 (2,13-5,01)</u>	$X^2=34,5$	$p<0,001$
5-8	19	21,1	71	78,9	<u>2,41 (1,25-4,62)</u>	$X^2=8,2$	$p=0,003$
=9	36	10,0	324	90,0	1,00		
Nível sócio-econômico							
A	16	15,0	91	85,0	1,03 (0,53-1,97)	$X^2=0,3$	$p=0,56$
B	48	14,6	281	85,4	1,00		
C	66	22,8	224	77,2	<u>1,72 (1,12-2,66)</u>	$X^2=6,8$	$p=0,008$
D	51	32,1	108	67,9	<u>2,76 (1,72-4,46)</u>	$X^2=20,2$	$p<0,001$
E	26	41,3	37	58,7	<u>4,11 (2,19-7,71)</u>	$X^2=24,5$	$p<0,001$

Tabela 9 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação às características clínicas

VARIÁVEIS	CASOS		CONTROLES		p	OR (IC 95%)
	N	(%)	N	(%)		
AVC						
Não	182	(20,1)	724	(79,9)		
Sim	22	(48,9)	23	(51,1)	<u><0,001</u>	<u>3,80 (2,07-6,98)</u>
TCE						
Não	185	(20,8)	706	(79,2)		
Sim	22	(36,1)	39	(63,9)	<u>0,005</u>	<u>2,15 (1,24-3,72)</u>
Epilepsia						
Não	189	(20,5)	734	(79,5)		
Sim	11	(47,8)	12	(52,2)	<u>0,002</u>	<u>3,56 (1,54-8,19)</u>
Depressão						
Não	140	(18,5)	615	(81,5)		
Sim	63	(33,5)	125	(66,5)	<u><0,001</u>	<u>2,21 (1,55-3,15)</u>

<hr/>					
Diabetes Mellitus					
Não	166 (21,2)	618 (78,8)			
Sim	39 (24,5)	120 (75,5)	0,350	1,21 (0,81-1,80)	
Hipertensão					
Não	104 (19,9)	418 (80,1)			
Sim	101 (23,6)	327 (76,4)	0,171	1,24 (0,91-1,69)	
Colesterol					
Não	140 (20,4)	547 (79,6)			
Sim	55 (24)	174 (76)	0,244	1,23 (0,86-1,76)	
Artrite					
Não	154 (20,7)	591 (79,3)			
Sim	45 (24,3)	140 (75,7)	0,278	1,23 (0,84-1,80)	
Tabagismo					
Não	183 (21,8)	656 (78,2)			
Sim	23 (20,4)	90 (79,6)	0,724	0,91 (0,56-1,49)	
Alcoolismo					
Não	114 (25,1)	341 (74,9)			
Sim	94 (18,8)	405 (81,2)	<u>0,020</u>	<u>0,69 (0,51-0,94)</u>	
Benzodiazepínicos					
Não	184 (21,9)	657 (78,1)			
Sim	23 (20,5)	89 (79,5)	0,746	0,923 (0,56-1,50)	
<hr/>					

Tabela 10 - Análise multivariada. Efeito das variáveis sócio-demográficas e clínicas sobre as taxas de CCF

VARIÁVEIS	WALD	p	OR	IC 95%	
Sexo	0,78	0,376	1,20	0,79	1,82
AVC	12,72	<u><0,001</u>	<u>3,82</u>	<u>1,83</u>	<u>8,00</u>
TCE	2,46	0,117	1,74	0,87	3,49
Epilepsia	9,95	<u>0,002</u>	<u>4,65</u>	<u>1,79</u>	<u>12,09</u>
Depressão	21,61	<u><0,001</u>	<u>2,75</u>	<u>1,79</u>	<u>4,21</u>
Uso de álcool	0,23	0,626	1,10	0,74	1,61
Escolaridade					
=9	10,17	0,017			
0	5,70	<u>0,017</u>	<u>2,41</u>	<u>1,17</u>	<u>4,97</u>
1-4	9,51	<u>0,002</u>	<u>2,26</u>	<u>1,34</u>	<u>3,81</u>
5-8	4,23	<u>0,040</u>	<u>2,11</u>	<u>1,03</u>	<u>4,31</u>
Faixa etária					
60-64	75,92	<0,001			
65-69	0,02	0,877	1,05	0,55	1,99
70-74	2,40	0,121	1,62	0,87	3,01
75-79	14,62	<u><0,001</u>	<u>3,37</u>	<u>1,80</u>	<u>6,28</u>
80-84	20,56	<u><0,001</u>	<u>4,82</u>	<u>2,44</u>	<u>9,52</u>
85-89	33,25	<u><0,001</u>	<u>14,80</u>	<u>5,92</u>	<u>36,98</u>
=90	27,24	<u><0,001</u>	<u>22,35</u>	<u>6,96</u>	<u>71,77</u>
Nível sócio-econômico					
A	7,64	0,105			
B	0,16	0,682	0,86	0,41	1,77
C	0,02	0,874	1,06	0,50	2,23
D	1,02	0,312	1,51	0,67	3,38
E	2,76	0,096	2,17	0,87	5,41

4.2 - 2ª fase (hospitalar)

- 217 sujeitos foram selecionados para a 2ª fase (fase hospitalar), conforme critérios previamente apresentados.
- 135 sujeitos foram entrevistados na 2ª fase (62,2% de participação) (ver Tabela 11).
- 82 sujeitos selecionados para a 2ª fase não foram entrevistados (perda de 37,8%) (ver Tabelas 12, 13, e 14). Através de telefonemas observamos, de forma não sistematizada, motivos para a recusa nos dois extremos: pessoas “muito bem de saúde” e que “não precisavam de atendimento médico”, e pessoas com “muitos problemas de saúde” e “indisponíveis para serem avaliadas”.
- 69 sujeitos (51,1% dos sujeitos entrevistados na 2ª fase) receberam o diagnóstico de demência (ver Tabelas 15 e 16 e Gráfico 2). A taxa de prevalência de demência na população com idade maior ou igual a 60 anos foi 6,0% (IC 95%: 4,6-7,3) e na população com idade maior ou igual a 65 anos foi 7,2% (IC 95%: 5,7-8,6).
- 44 (4,7%) dos “screen-negatives” foram entrevistados, dos quais 4 tiveram o diagnóstico de demência.
- a bateria de instrumentos de screening apresentou sensibilidade de 94,5%, especificidade de 37,7%, valor preditivo positivo de 51,1%, valor preditivo negativo de 90,9% e acurácia de 60,8%.

Tabela 11 - Distribuição dos sujeitos selecionados para a 2ª fase, segundo sua participação

PARTICIPAÇÃO	N	%
Não encontrados	6	2,7
Óbito	18	8,2
Recusa	54	24,8
Entrevistados	135	62,2
Não convocados	4	1,8
TOTAL	217	99,7

Tabela 12 - Distribuição dos tipos de perdas na 2ª fase, entre os estratos sócio-econômicos

TIPOS DE PERDAS	ESTRATO ALTO	ESTRATO MÉDIO	ESTRATO BAIXO	TOTAL	%
Não encontrados	2	3	1	6	7,3
Óbito	5	6	7	18	22
Recusa	15	23	16	54	65,9
Não convocados	0	0	4	4	4,9
TOTAL	22	32	28	82	100

Tabela 13 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas (total), na 2ª fase, entre os estratos sócio-econômicos

ESTRATO SÓCIO-ECONÔMICO	ENTREVISTAS REALIZADAS		PERDAS	
	N	%[†]	N	%[‡]
Alto	25	53,1	22	46,8
Médio	52	61,9	32	38,0
Baixo	53	65,4	28	34,5
Dados inexistentes	5			
TOTAL	135		82	

[†] percentagem de entrevistas realizadas dentro de cada estrato

[‡] percentagem de perdas dentro de cada estrato

Tabela 14 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas, na 2ª fase, entre as variáveis sócio-demográficas e clínicas[†]

VARIÁVEIS	ENTREVISTAS REALIZADAS		PERDAS	
	N	%	N	%
Faixa etária				
60-64	17	70,8	7	29,2
65-69	24	77,4	7	22,6
70-74	22	61,1	14	38,9
75-79	31	64,6	17	35,4
80-84	19	51,4	18	48,6
85-89	10	40,0	15	60,0
=90	8	67,7	4	33,3
p=0,088 / X^2 : 11,02				
Sexo				
Feminino	92	61,7	57	38,3
Masculino	43	63,2	25	36,8
p=0,834 / X^2 : 0,04				
Escolaridade				
0 (analfabeto)	26	66,7	13	33,3
1-4	68	60,7	44	39,3
5-8	11	57,9	8	42,1
=9	21	58,3	15	41,7
p=0,870 / X^2 : 0,71				
AVC				
Não	112	61,5	70	38,5
Sim	14	63,6	8	36,4
p=0,158 / X^2 : 3,68				
Epilepsia				
Não	116	61,4	73	38,6
Sim	6	54,5	5	45,5
p=0,041 / X^2 : 6,41				
Artrite				
Não	96	62,3	58	37,7
Sim	26	57,8	19	42,2
p=0,040 / X^2 : 6,43				

† variáveis associadas, ou com tendência de associação, na análise multivariada, mais a variável sexo

Tabela 15 - Diagnóstico sindrômico dos sujeitos entrevistados

DIAGNÓSTICO SINDRÔMICO	N	% (2ª FASE)	PREVALÊNCIA[†] (IC 95%)
Demência	69	51,1	6,0 (4,7-7,3)
CCND	15	11,1	1,3 (0,6-1,9)
Outros [‡]	51	37,7	4,5 (3,4-5,6)
TOTAL	135	99,9	11,8 (10,0-13,6)

[†] amostra total

[‡] T. Depressivo, Uso Abusivo de Álcool, deficiência sensorial

Tabela 16 - Diagnóstico etiológico dos pacientes com demência

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO	N	%[†]	PREVALÊNCIA[‡] (IC 95%)
Doença de Alzheimer (DA)	31	44,9	2,7 (2,0-3,4)
Demência Vascular (DV)	14	20,2	1,2 (0,7-1,7)
Demência mista (DA + DV)	11	15,9	0,9 (0,5-1,2)
Demência não especificada	5	7,2	0,4
Demência Alcoólica	3	4,3	0,2
Demência por outras causas	2	2,8	0,1
Demência Fronto-temporal	2	2,8	0,1
Demência por TCE	1	1,4	0,08
TOTAL	69	99,9	5,68

[†] percentagem dos quadros de demência

[‡] amostra total

Gráfico 2 - Diagnóstico etiológico de demência

Com relação às variáveis sócio-demográficas, demência se associou a “idade” elevada, “escolaridade” baixa, “nível sócio-econômico” baixo e “estado civil” viúvo (ver Tabela 17 e 18).

Com relação às variáveis clínicas, demência se associou a “AVC”, “epilepsia” e “artrite” (este apresentou relação inversa) (ver Tabela 19).

Após a análise multivariada com as variáveis sócio-demográficas e clínicas, “idade” elevada, “AVC”, “epilepsia” e “artrite” (esta com relação inversa) se mantiveram associadas significativamente. “Escolaridade” exibiu uma tendência de associação na categoria “analfabetos” (ver Tabela 20).

Demência apresentou uma relação inversa com “exercício físico”, “ver tv”, “ler jornal”, “ler livro”, “jogar” e “ir ao cinema” (ver Tabela 21).

Após a análise multivariada com as variáveis “idade”, “atividade física” e “hábitos culturais”, mantiveram-se associadas significativamente as variáveis “idade” elevada e “ler livro”. As variáveis “ver TV” e “ler jornal” apresentaram uma forte tendência de associação com as taxas de demência (ver Tabela 22).

Tabela 17 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação à faixa etária, por sexo

FAIXA ETÁRIA	MASCULINO					FEMININO				
	Casos		Controles		TOTAL	Casos		Controles		TOTAL
	N	%	N	%		N	%	N	%	
60-64	3	(3,1)	93	(96,9)	96	2	(1,2)	167	(98,8)	169
65-69	2	(1,9)	104	(98,1)	106	4	(2,5)	157	(97,5)	161
70-74	5	(5,3)	89	(94,7)	94	9	(6,3)	135	(93,8)	144
75-79	7	(13,5)	45	(86,5)	52	8	(8,6)	85	(91,4)	93
80-84	3	(11,5)	23	(88,5)	26	10	(17,5)	47	(82,5)	57
85-89	1	(12,5)	7	(87,5)	8	5	(31,3)	11	(68,8)	16
>90	3	(50,0)	3	(50,0)	6	5	(45,5)	6	(54,5)	11
TOTAL	24	(6,2)	364	(93,8)	388	43	(6,6)	608	(93,4)	651

<u>p<0,001/X²: 31,47</u>					<u>p<0,001/X²: 66,83</u>		
Tabela 18 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação às características sócio-demográficas							
VARIÁVEIS	CASOS		CONTROLES		OR (IC 95%)	X ²	p
	N	%	N	%			
Faixa etária							
60-64	5	1,9	260	98,1	1,00		
65-69	6	2,2	261	97,8	1,20 (0,32-4,57)	X ² =0,09	p=0,77
70-74	14	5,9	224	94,1	3,25 (1,07-10,50)	X ² =5,51	p=0,018
75-79	15	10,3	130	89,7	6,00 (1,99-19,35)	X ² =14,45	p<0,001
80-84	13	15,7	70	84,3	9,66 (3,07-32,25)	X ² =24,45	p<0,001
85-89	6	25,0	18	75,0	17,33 (4,15-74,30)	X ² =32,11	p<0,001
=90	8	47,1	9	52,9	46,22 (10,82-210,48)	X ² =74,13	p<0,001
Sexo							
Feminino	44	6,7	612	93,3	1,06 (0,62-1,81)	X ² =0,04	p=0,83
Masculino	25	6,4	367	93,6	1,00		
Estado Civil							
Solteiro	6	7,1	78	92,9	4,54 (0,52-102,75)	X ² =2,27	p=0,23
Casado	26	4,2	596	95,8	2,57 (0,36-51,87)	X ² =0,91	p=0,50
Separado	1	1,7	59	98,3	1,00		
Viúvo	30	11,2	238	88,8	7,44 (1,05-149,54)	X ² =5,20	p=0,022
Escolaridade							
0 (analfabeto)	19	18,6	83	81,4	7,38 (3,26-16,90)	X ² =34,14	p<0,001
1-4	27	6,1	413	93,9	2,11 (1,01-4,40)	X ² =4,62	p=0,031
5-8	5	5,1	93	94,9	1,73 (0,52-5,47)	X ² =1,04	p=0,34
=9	12	3,0	387	97,0	1,00		
Nível sócio-econômico							
A	8	6,8	109	93,2	1,96 (0,72-5,22)	X ² =2,18	p=0,13
B	13	3,6	347	96,4	1,00		
C	19	6,1	295	93,9	1,72 (0,79-3,76)	X ² =2,21	p=0,13
D	14	7,8	166	92,2	2,25 (0,97-5,22)	X ² =4,39	p=0,036
E	9	15,0	51	85,0	4,71 (1,75-12,53)	X ² =13,44	p<0,001

Tabela 19 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação às características clínicas

VARIÁVEIS	CASOS		CONTROLES		p	OR (IC 95%)
	N	(%)	N	(%)		
AVC						
Não	54	(5,4)	942	(94,6)		
Sim	11	(25,6)	32	(74,4)	<u>0,001</u>	<u>5,99 (2,86-12,54)</u>
Epilepsia						
Não	57	(5,6)	953	(94,4)		
Sim	4	(16,7)	20	(83,3)	<u>0,023</u>	<u>3,34 (1,10-10,10)</u>
Artrite						
Não	56	(7,0)	744	(93,0)		
Sim	5	(2,3)	210	(97,7)	<u>0,010</u>	<u>0,31 (0,12-0,80)</u>
TCE						
Não	63	(6,5)	911	(93,5)		
Sim	2	(3,2)	61	(96,8)	0,296	0,47 (0,11-1,98)
Depressão						
Não	46	(5,8)	744	(94,2)		
Sim	19	(8,0)	219	(92,0)	0,230	1,40 (0,80-2,44)
Diabetes Mellitus						
Não	59	(6,9)	798	(93,1)		
Sim	7	(4,0)	167	(96,0)	0,160	0,56 (0,25-1,26)
Hipertensão						
Não	33	(5,9)	529	(94,1)		
Sim	31	(6,5)	443	(93,5)	0,656	1,12 (0,67-1,86)
Colesterol						
Não	45	(6,1)	688	(93,9)		
Sim	17	(6,3)	255	(93,8)	0,948	1,01 (0,57-1,81)
Tabagismo						
Não	39	(6,1)	601	(93,9)		
Sim	25	(6,4)	365	(93,6)	0,838	1,05 (0,62-1,77)
Alcoolismo						
Não	36	(7,2)	462	(92,8)		
Sim	30	(5,5)	512	(94,5)	0,263	0,75 (0,45-1,24)
Benzodiazepínicos						
Não	57	(6,4)	840	(93,6)		
Sim	6	(4,3)	135	(95,7)	0,332	0,65 (0,27-1,54)

Tabela 20 - Análise multivariada. Efeito das variáveis sócio-demográficas e clínicas sobre as taxas de demência

VARIÁVEIS	WALD	p	OR	IC 95%	
Faixa etária					
60-64	43,72	<0,001	1,00		
65-69	0,22	0,634	0,71	0,18	2,79
70-74	2,56	0,110	2,42	0,81	7,19
75-79	5,30	<u>0,021</u>	<u>3,75</u>	<u>1,21</u>	<u>11,56</u>
80-84	11,93	<u>0,001</u>	<u>7,39</u>	<u>2,37</u>	<u>22,99</u>
85-89	9,81	<u>0,002</u>	<u>12,77</u>	<u>2,59</u>	<u>62,89</u>
=90	25,23	<u><0,001</u>	<u>40,71</u>	<u>9,58</u>	<u>172,91</u>
Escolaridade					
=9	3,61	0,306	1,00		
0	3,47	0,063	2,70	0,94	7,72
1-4	1,20	0,272	1,62	0,68	3,87
5-8	0,96	0,327	1,80	0,55	5,86
AVC	18,35	<u><0,001</u>	<u>7,14</u>	<u>2,90</u>	<u>17,57</u>
Epilepsia	4,20	<u>0,040</u>	<u>4,29</u>	<u>1,06</u>	<u>17,32</u>
Artrite	6,63	<u>0,010</u>	<u>0,27</u>	<u>0,10</u>	<u>0,73</u>
Nível sócio-econômico					
A	5,26	0,261	1,00		
B	2,08	0,149	0,46	0,16	1,31
C	1,00	0,317	0,58	0,20	1,67
D	0,69	0,406	0,60	0,18	1,96
E	0,23	0,629	1,36	0,38	4,85

Tabela 21 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação à atividade física e aos hábitos culturais

VARIÁVEIS	CASOS	CONTROLES	p	OR (IC 95%)
	N (%)	N (%)		
Exercício físico				
Não	39 (8,8)	403 (91,2)		
Sim	23 (3,9)	569 (96,1)	<u>0,001</u>	<u>2,39 (1,40-4,07)</u>
Ver TV				
Poucas vezes	7 (26,9)	19 (73,1)		
Muitas vezes	55 (5,4)	956 (94,6)	<u><0,001</u>	<u>6,40 (5,58-15,88)</u>
Ouvir rádio				
Poucas vezes	24 (6,3)	355 (93,7)		
Muitas vezes	38 (5,8)	620 (94,2)	0,715	1,10 (0,65-1,86)
Ler jornal				
Poucas vezes	44 (9,8)	407 (90,2)		
Muitas vezes	17 (2,9)	561 (97,1)	<u><0,001</u>	<u>3,56 (2,00-6,33)</u>
Ler livro				
Poucas vezes	52 (9,4)	504 (90,6)		
Muitas vezes	9 (1,9)	463 (98,1)	<u><0,001</u>	<u>5,30 (2,58-10,89)</u>
Jogar				
Poucas vezes	54 (7,0)	715 (93,0)		
Muitas vezes	8 (3,0)	259 (97,0)	<u>0,017</u>	<u>2,44 (1,14-5,20)</u>
Cinema				
Poucas vezes	62 (6,6)	878 (93,4)		
Muitas vezes	0	97 (100)	<u>0,009</u>	

Tabela 22 - Análise multivariada. Efeito das variáveis “idade”, “atividade física” e “hábitos culturais” sobre as taxas de demência

VARIÁVEIS	WALD	p	OR	IC 95%	
Faixa etária					
60-64	37,52	<0,001	1,00		
65-69	0,22	0,637	0,72	0,19	2,75
70-74	3,98	<u>0,046</u>	<u>2,91</u>	<u>1,01</u>	<u>8,31</u>
75-79	6,22	<u>0,013</u>	<u>3,91</u>	<u>1,34</u>	<u>11,43</u>
80-84	9,32	<u>0,002</u>	<u>5,60</u>	<u>1,85</u>	<u>16,94</u>
85-89	8,66	<u>0,003</u>	<u>8,75</u>	<u>2,06</u>	<u>37,13</u>
≥90	22,70	<u><0,001</u>	<u>27,79</u>	<u>7,07</u>	<u>108,74</u>
Atividade física	1,34	0,247	1,41	0,78	2,56
Ver TV	3,79	0,051	3,13	0,99	9,90

Ler jornal	3,73	0,053	1,87	0,99	3,52
Ler livro	9,41	<u>0,002</u>	<u>3,30</u>	<u>1,54</u>	<u>7,09</u>
Jogar	0,76	0,381	1,43	0,64	3,21

5 - DISCUSSÃO

A alta taxa de comprometimento cognitivo e funcional (CCF), estimada na presente pesquisa, foi bastante semelhante aos estudos conduzidos no Brasil (LAKS et al., 2005; HOTOTIAN et al. 2005)^{143,139}, com taxas de comprometimento cognitivo e funcional de 19,2% e 16%, respectivamente, em Porto Rico (SERRA et al., 1995)¹⁴⁴, que encontrou taxas de prevalência de “disfunção cognitiva” e “disfunção funcional” de 18,5% e 18,4%, respectivamente, e na Malásia (SHERINA et al., 2004)¹⁴⁵, com taxa de comprometimento cognitivo de 22,4%. Três estudos encontraram taxas inferiores de comprometimento cognitivo: o estudo brasileiro no município de São Paulo (LEBRÃO E DUARTE, 2003)¹⁴⁶, encontrou taxa de “deterioração cognitiva” de 6,9% (idade acima de 60 anos); o estudo de Singapura (LIM et al., 2003)¹⁴⁷ encontrou taxas de 7,7% e 13,2%, estimadas utilizando-se dois instrumentos diferentes, ECAQ (Elderly Cognitive Assessment Questionnaire) e IQCODE (Informant Questionnaire on the Cognitive Decline of the Elderly), respectivamente; e o estudo norte-americano com população Amish (JOHNSON et al., 1997)¹⁴⁸ observou taxa de 6,4%. A associação com idade e sexo feminino também foi encontrada tanto no estudo de Porto Rico quanto em um estudo da Coreia (PARK E HA, 1988)¹⁴⁹, que avaliou prejuízo cognitivo em população rural. Estas semelhanças e diferenças, no entanto, guardam algumas variações

metodológicas. Exceto os estudos brasileiros, que combinaram a presença de comprometimento cognitivo “mais” comprometimento funcional, a exemplo do presente estudo, os demais optaram por avaliações separadas ou apenas avaliação cognitiva, dificultando a realização de comparações mais precisas. Considerando que a maioria destes casos de CCF apresentou diagnóstico de demência, como ficou evidenciado na 2ª fase, é provável que o efeito das variáveis sócio-demográficas sobre os casos de CCF tenha sido muito influenciado pelos sujeitos com demência. Ademais, destaca-se também a presença de outras condições médicas que se associaram à ocorrência de CCF na população idosa, compondo um grupo de doenças bastante heterogêneas: AVC, TCE e epilepsia (variáveis associadas significativamente aos casos de CCF na 1ª fase); alcoolismo e deficiência sensorial (diagnósticos da 2ª fase); e depressão (variável associada na 1ª fase e diagnóstico da 2ª fase). A relação inversa entre “uso de álcool” e CCF, na análise univariada, provavelmente reflete a existência de CCF levando a um consumo menor de álcool, ou talvez ilustre uma redução do risco de demência associado ao consumo moderado de álcool, como descrevem HULSE et al. (2005)⁷⁶.

O instrumento de “screening” revelou um resultado surpreendente, se considerarmos a sua performance no estudo para a sua validação. Sabíamos que na comunidade não alcançaríamos os excelentes níveis de sensibilidade e especificidade do estudo piloto, quando se fez a comparação de populações marcadamente distintas do ponto de vista saúde/doença. Ademais, de maneira semelhante ao estudo de HERRERA et al. (2002)¹³⁵, usamos um ponto de corte para o MEEM mais alto do que o proposto por BERTOLUCCI et al. (1994)¹⁰⁸, na expectativa de aumentar a

sensibilidade e a probabilidade de detecção de casos iniciais. No entanto, o balanço entre a sensibilidade e a especificidade inclinou-se demais para uma alta sensibilidade, o que é bastante positivo para um estudo de prevalência, em detrimento da baixa especificidade. Além do alto ponto de corte do MEEM, outra razão pode ter contribuído para este resultado: a estratégia de exigir apenas um teste comprometido em cada domínio avaliado (cognitivo e funcional), para a identificação do “caso”, a exemplo do que MACKINNON E MULLIGAN (1998)¹²⁷ observaram na combinação de dois testes para o diagnóstico de demência.

Como se esperava em uma pesquisa com idosos em duas fases, houve uma parcela razoável de perda por óbito, embora não tenha havido registro de perda por institucionalização. A taxa de perda se manteve alta, a exemplo dos estudos de HENDERSON et al.(1994)⁵⁵, com 31,4% de perda, ANDERSEN et al. (1997)¹⁸, com 35,5% e YAMADA et al. (1999)³¹ com 24,3%.

Os resultados referentes aos quadros de demência foram bastante semelhantes ao estudo brasileiro de HERRERA et al. (2002)¹³⁵, sobretudo no que diz respeito à taxa de prevalência e à associação com a escolaridade na análise univariada. Pequenas diferenças foram observadas na distribuição dos diagnósticos etiológicos, porém uma diferença expressiva foi encontrada na associação com o sexo. Com relação ao estudo realizado simultaneamente em São Paulo (BOTTINO et al., 2005)¹⁵⁰, que praticamente usou a mesma metodologia (exceto a amostragem), a taxa de prevalência de demência foi muito próxima (6,0% na presente pesquisa e 6,8% em São Paulo), e as variáveis “idade” elevada e “AVC” também exibiram associação estatisticamente significativa com os quadros de demência. Em

comparação com estudos mundiais, a taxa de prevalência de demência se situou em uma faixa intermediária, a variável “sexo” corroborou os achados de ausência de diferenças significativas entre os sexos, observada na revisão de LOPES (2002)¹³, e a inclusão da categoria “demência mista” adicionou uma nova e importante categoria diagnóstica à distribuição dos diagnósticos etiológicos mais frequentes de demência nos grandes estudos populacionais (apenas 4 dos 42 estudos avaliados pela revisão descrita acima consideraram este subtipo etiológico).

O uso da categoria diagnóstica “Demência Mista”, definido tradicionalmente como a combinação de Doença de Alzheimer com doença cérebro-vascular (DCV) (ROCKWOOD, 2003)¹⁵¹, justifica-se neste estudo por uma série de motivos: a percepção da prática clínica, a idéia de que representa uma grande população clínica (ROCKWOOD, 2002)¹⁵², a observação de que DA e DV dividem os mesmos fatores (idade, educação, hipertensão, diabetes mellitus, aterosclerose, dislipidemia), aspectos clínicos, e mecanismos patogênicos (morte neuronal *a posteriori* e apoptose) (ROCKWOOD, 2002)¹⁵², a convergência de resultados de neuroimagem (presença de infartos cerebrais, doença de pequenos vasos e lesões de substância branca em até 64% de pacientes com DA) (NAGGA et al., 2004)¹⁵³ e de exame histopatológico (doença cerebrovascular em autópsia de 60-90% de pacientes com DA) (OLICHNEY et al., 1996)¹⁵⁴. Por outro lado, com poucos estudos populacionais mundiais considerando esta entidade diagnóstica, talvez pela falta de exames de imagem na maior parte deles, torna-se difícil a comparação com os nossos resultados. A impressão que se tem, conforme CORRADA et al. (1995)¹⁵⁵ observaram a respeito do uso de tomografia computadorizada “diminuindo” as taxas

de Doença de Alzheimer, é que parte dos casos de Doença de Alzheimer do nosso estudo “transferiu-se” para a categoria diagnóstica Demência Mista.

Com relação à influência das variáveis sócio-demográficas sobre as taxas de prevalência de demência, a “idade” confirmou um dado bastante consolidado na literatura médica, e o “nível sócio econômico” apareceu como uma variável influenciada por outros fatores (“escolaridade”, que foi avaliada neste estudo, e possivelmente outros fatores como nutrição, e acesso a serviços de saúde). A “escolaridade” apresentou um resultado muito semelhante ao do estudo de HERRERA et al. (2002)¹³⁵, na análise univariada, com taxas muito altas nos analfabetos e taxas menores e similares nas outras categorias. Embora o efeito da escolaridade tenha constituído apenas uma tendência na análise multivariada, o resultado retoma a hipótese de que esta variável é um fator intrínseco e não meramente um viés de método.

A variável “sexo”, por sua vez, apresentou dados contraditórios: resultados diferentes entre a 1ª e a 2ª fase, grande diferença na 2ª fase com o outro estudo brasileiro (HERRERA et al. 2002)¹³⁵, diferença com a maior parte dos estudos mundiais recentes, que estimaram prevalência de demência na comunidade, e semelhança com os resultados obtidos na revisão sistemática feita por LOPES (2002)¹³. Desta forma, este resultado retoma os questionamentos acerca da influência deste fator na relação com os quadros de demência. Haveria algum fator intrínseco ligado ao sexo feminino aumentando o risco para demência ou a diferença das taxas de mortalidade entre os sexos explicaria as eventuais diferenças epidemiológicas? (HEBERT et al., 2001)¹⁵⁶

A falta de associação de demência e CCF com os fatores de risco potenciais para doença cérebro-vascular, os quais têm sido associados à demência de origem vascular e também à Doença de Alzheimer, merece confirmação através de estudos controlados com detecção criteriosa dos mesmos, para se concluir quanto à sua influência sobre o comprometimento cognitivo em nosso meio. Exceção ao fator “AVC”, que se apresentou fortemente associado, tanto ao CCF quanto à demência, confirmando os achados da literatura mundial^{157,158}.

A associação das taxas de demência com a variável “artrite” reforça a hipótese do efeito protetor dos anti-inflamatórios, a exemplo do que foi observado por SZEKELY et al. (2004)⁷⁴.

Apesar do conhecimento de que a Epilepsia, e drogas associadas, afetam a cognição (CARAMELLI e CASTRO, 2005)⁸¹, os resultados obtidos no presente estudo sugerem que sua influência sobre os quadros de demência deveria ser melhor estudada.

Se não é possível afirmar em um estudo de prevalência como este, que a atividade física e os hábitos culturais possam ter proporcionado um efeito protetor, como tem sido valorizado por determinados estudos que investigaram fatores associados à redução do risco de demência (ROVIO et al., 2005; LAURIN et al., 2001)^{100,99}, ao menos pode-se destacar que, também em países em desenvolvimento, como o Brasil, estes são fatores com potencial para contribuir no futuro para a redução do risco de desenvolvimento de demência na população idosa.

Duas importantes limitações deste estudo merecem destaque. Embora semelhante a outros estudos, a taxa de perda foi bastante expressiva, tanto na 1ª

quanto na 2ª fase, contribuindo para algum nível de imprecisão dos resultados, como apontam NORTON et al. (1994)¹⁵⁹, ao observarem maior comprometimento cognitivo entre os “não respondedores”. Não obstante, três condições podem ter diminuído a ocorrência de interferência das perdas sobre os resultados: as perdas não foram uniformes nas duas fases, entre os estratos sócio-econômicos (na 1ª fase foi maior no estrato baixo, enquanto na 2ª fase foi maior no estrato alto); na 2ª fase as perdas podem ter sofrido uma “compensação” entre as variáveis sócio-demográficas e clínicas que apresentaram relação oposta com a variável de desfecho (houve proporção maior de perdas nas idades mais avançadas e nas faixas de escolaridade mais altas, e entre os que tinham antecedente de epilepsia e artrite); e as respostas às tentativas de convocação para a 2ª fase, entre os que se recusaram a participar, se situaram nos dois extremos (os que estavam “bem” e os que estavam “mal”). Outra limitação foi a forma de detecção das variáveis clínicas, como por exemplo “hipertensão arterial”, diabetes mellitus” e “colesterol”: através do relato direto do idoso (e cuidador) ao ser indagado sobre a sua existência. Neste sentido, a precisão da resposta dependeu de um grau mínimo de compreensão e conhecimento acerca das doenças pesquisadas, o que pode ter sido bastante variável em função da heterogeneidade cultural da população estudada.

Considerações finais

Embora o envelhecer *per si* contribua para o desenvolvimento de problemas cognitivos, não se pode superestimar o efeito da idade em detrimento de outros fatores presentes no cotidiano das pessoas. Percebe-se, a partir deste estudo, que

agentes externos, certas doenças (ligadas a outros determinantes) e estilos de vida também interferem significativamente nas habilidades cognitivas da população idosa. Neste sentido, as idéias de ROWE e KAHN (1987)¹⁶⁰, enfatizando a “heterogeneidade” do envelhecer, devem servir de alerta para que determinadas condições de vida sejam modificadas pela sociedade e conseqüentemente as pessoas possam caminhar na direção de um “envelhecimento bem sucedido”.

6 - CONCLUSÕES

A taxa de prevalência de demência nos idosos de Ribeirão Preto foi bastante expressiva, situando-se na média entre os resultados mundiais e apresentando uma distribuição semelhante à encontrada na literatura médica mundial.

A categoria sindrômica “comprometimento cognitivo e funcional”, embora englobando os quadros de demência na maioria dos casos, representou uma diversidade de condições clínicas bastante prevalente.

Neste estudo, os transtornos cognitivos apresentaram-se como sendo multifatoriais, associados à influência de agentes externos (medicamentos e álcool), determinadas doenças (AVC, depressão, epilepsia e artrite), atividade mental (escolaridade e hábitos culturais) e atividade física.

As alterações cérebro-vasculares pareceram contribuir significativamente para o desenvolvimento de demência, tanto na forma isolada quanto na forma mista. Esta influência foi reforçada pelas taxas de prevalência encontradas, mas este achado não foi plenamente corroborado pelo resultado referente aos fatores de risco potenciais para doença cérebro-vascular.

Os resultados da presente pesquisa corroboraram a controvérsia acerca da influência de fatores específicos ligados ao sexo feminino nas taxas de prevalência dos quadros de demência.

7 - ANEXOS

Instrumento de “screening”

RUA (Av.)		
NÚMERO	COMPLEMENTO	
BAIRRO		
CIDADE	ESTADO	
CEP	PONE	
CÓDIGO IDOSO (A)		

NOME DO ENTREVISTADOR		
DATA ENTREVISTA	/	/
HORA DE INÍCIO		
HORA DE TÉRMINO		
PRECISOU RETORNAR PARA COMPLEMENTAR ENTREVISTA?	() SIM	() NÃO
DATA DO RETORNO	/	/
MOTIVO	Anotar	
COLHEU SANGUE?	() SIM NO TUBO	() SIM NO MATA-BORRÃO
	() NÃO	
MOTIVO DA NÃO COLETA DO SANGUE	Anotar	
CÓDIGO ENTREVISTADOR		

REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

1. justificativa e os objetivos da pesquisa; 2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.
1. O objetivo principal desta pesquisa é investigar quantos casos de um determinado distúrbio de memória, chamado Demência, existem entre as pessoas idosas, nas cidades de Ribeirão Preto e São Paulo. Outro objetivo é identificar se alguns genes causam esta doença.
2. Se você concordar em participar da pesquisa, você terá que responder a uma série de perguntas, em seu domicílio, para um entrevistador devidamente treinado; esta fase compreende uma visita do entrevistador, e a coleta de 5 ml de sangue. Será necessária a presença de um acompanhante seu (provavelmente um familiar) de convívio bastante próximo. Se for selecionado nesta fase, você será convidado a comparecer ao Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto ou de São Paulo, para ser examinado pelo médico e para fazer exames de laboratório. Você terá que responder várias perguntas, terá que fazer exames de sangue, e, caso o médico considere necessário, terá que fazer um exame radiológico, chamado Tomografia Computadorizada de Crânio. Durante a aplicação do questionário será necessária, novamente, a presença de um acompanhante que tenha um convívio bastante próximo. Estes procedimentos serão feitos em no máximo 3 visitas aos Hospitais.
3. Nesta pesquisa, algum desconforto pode surgir no momento da coleta de sangue ou da realização do exame radiológico, mas qualquer procedimento poderá ser suspenso no caso de você não suportar a sua realização. Caso ocorram eventuais danos à sua saúde decorrentes dos procedimentos realizados nesta pesquisa, você poderá ser atendido no Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto ou de São Paulo.
4. Benefícios incluem o seu encaminhamento para tratamento, nos Hospitais das Clínicas ou em outros serviços de saúde de Ribeirão Preto ou São Paulo, caso você tenha o distúrbio de memória pesquisado e, também, a descoberta de informações necessárias para o desenvolvimento de serviços de saúde mais adequados para atender outras pessoas com este distúrbio.
5. Considerando o tipo de pesquisa, não existem procedimentos alternativos que lhe possam ser vantajosos.

INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

Em São Paulo:
Dr. Cássio M. C. Bottino
Instituto de Psiquiatria do HC FMUSP
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos S/N,
3º andar, sala 4035
São Paulo/SP CEP 05403-010
Tel: (11) 3069-6973

Em Ribeirão Preto:
Dr. Marcos Antonio Lopes
HC FMRPUSP
Campus Universitário – Monte Alegre
Ribeirão Preto/SP
CEP 14048-900
Tel: (16) 602-2727

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.

São Paulo, de de 20 .

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

assinatura do pesquisador
Dr. Cássio M. C. Bottino
CRM 51.025

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO, AVALIAÇÃO COGNITIVA E FUNCIONAL

SEÇÃO A – INFORMAÇÕES PESSOAIS DO IDOSO

A.1 Colher as informações direto com o (a) idoso (a)	Nome _____ Idade _____
A.2 Sexo	Masculino 1 Feminino 2 NR 99
A.3 Qual destas opções o(a) descreve melhor?	BRANCO 1 PARDO (combinação de branco e negro) 2 NEGRO 3 ASIÁTICO 4 NS 88 NR 99
A.4 Cor <i>ANOTAR QUE COR DE PELE A PESSOA PARECE TER</i>	BRANCO 1 PARDO (combinação de branco e negro) 2 NEGRO 3 ASIÁTICO 4
A.5 Qual o seu estado civil?	SOLTEIRO (A) 1 CASADO (A) 2 DIVORCIADO/DESQUITADO (A) 3 SEPARADO (A) 4 VIÚVO (A) 5 OUTRO 6 NR 99
A.6 Qual a sua escolaridade? <i>REGISTRAR ATÉ QUE ANO CURSOU, E ATÉ QUE GRAU</i> <i>Por exemplo: 2º ano do primário; 3º ano do ginásio; 1º ano do colegial/clássico/científico/2º grau; 3º ano da faculdade/superior</i> <i>CODIFICAR DE ACORDO COM AS OPÇÕES DISPONÍVEIS</i>	Escolaridade _____ anotar NENHUM ANO ESTUDADO 1 Primário 2 Ginásio 3 Colegial (clássico, científico) 4 Magistério 5 Técnico 6 Superior 7 Pós-graduação 8 NS 88 NR 99

<p>A.7a</p> <p>Qual a sua profissão?</p> <p>ANOTAR A PROFISSÃO QUE A PESSOA EXERCE OU EXERCEU NA MAIOR PARTE DE SUA VIDA.</p> <p>VÁ PARA A.7b</p>	<p>PROFISSÃO _____</p> <p>anotar _____</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>A.7b</p> <p>Qual a sua profissão?</p> <p>CLASSIFICAR A PROFISSÃO REFERIDA EM A.7b</p>	<p>DIRIGENTES E GERENTES DE ORGANIZAÇÕES, EMPRESAS, E MEMBROS SUPERIORES DO PODER PÚBLICO 1</p> <p>PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES 2</p> <p>TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 3</p> <p>TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4</p> <p>TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS 5</p> <p>TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, CAÇA E PESCA 6</p> <p>TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS 7</p> <p>TRABALHADORES DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 8</p> <p>MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES 9</p> <p>PRENDAS DOMÉSTICAS 10</p> <p>NUNCA TRABALHO 11</p>
<p>A.7c</p> <p>O Sr.(a) ainda está trabalhando(a)? Se não, está inativo há quanto tempo?</p> <p>SE SIM, VÁ PARA A.7d.</p>	<p>NÃO 1</p> <p>DESDE (MESES) _____</p> <p>SIM 2</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>A.7d</p> <p>Qual sua situação atual de trabalho?</p>	<p>Trabalho 20 horas por semana ou + 1</p> <p>Trabalho menos de 20 horas por semana 2</p> <p>Faço trabalho voluntário 3</p> <p>OUTRA 4</p> <p>Anotar _____</p> <p>NR 99</p>
<p>A.8</p> <p>Qual a sua religião?</p>	<p>CATÓLICA 1</p> <p>PROTESTANTE OU EVANGÉLICA 2</p> <p>ESPÍRITA 3</p> <p>JUDÁICA 4</p> <p>MUÇULMANA 5</p> <p>OUTRA 6</p> <p>Anotar _____</p> <p>NENHUMA 7</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>

A.9 Onde o (a) Sr (a) nasceu? ANOTAR O NOME DO LOCAL (CIDADE E ESTADO) ONDE NASCEU E ONDE TEM MORADO NOS ÚLTIMOS TEMPOS.	NATURALIDADE
	PROCEDÊNCIA
	NS 88
	NR 99

SEÇÃO B – INFORMAÇÕES PESSOAIS DO FAMILIAR / CUIDADOR

B.1 Colher as informações direto com o familiar/cuidador <i>(IMPORTANTE: O CUIDADOR NÃO PODE SER UMA PESSOA QUE É PAGA PARA CUIDAR DO(A) IDOSO(A))</i>	NOME
	IDADE
	RUA (Av.)
	NÚMERO
	COMPLEMENTO
	BAIRRO
	CIDADE
	ESTADO CEP
FONE	
B.2 Sexo	Masculino 1
	Feminino 2
B.3 Qual destas opções o(a) descreve melhor?	BRANCO 1
	PARDO (combinação de branco e negro) 2
	NEGRO 3
	ASIÁTICO 4
	NS 88
	NR 99
B.4 Cor ANOTAR QUE COR DE PELE PARECE TER A PESSOA	BRANCO 1
	PARDO (combinação de branco e negro) 2
	NEGRO 3
	ASIÁTICO 4
B.5 Qual o seu estado civil?	SOLTEIRO (A) 1
	CASADO (A) 2
	DIVORCIADO/DESQUITADO (A) 3
	SEPARADO (A) 4
	VIÚVO (A) 5
	OUTRO 6

<p>B.6</p> <p>Qual a sua escolaridade?</p> <p>REGISTRAR ATÉ QUE ANO CURSOU, E ATÉ QUE GRAU</p> <p>Por exemplo: 2º ano do primário; 3º ano do ginásio; 1º ano do colégio/clássico/científico/2º grau; 3º ano da faculdade/superior</p> <p>CODIFICAR DE ACORDO COM AS OPÇÕES DISPONÍVEIS</p>	<p>Escolaridade _____</p> <p>Anotar _____</p> <p>NENHUM ANO ESTUDADO 1</p> <p>Primário 2</p> <p>Ginásio 3</p> <p>Colégio (clássico, científico) 4</p> <p>Magistério 5</p> <p>Técnico 6</p> <p>Superior 7</p> <p>Pós-graduação 8</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>B.7a</p> <p>Qual a sua profissão?</p> <p>ANOTAR A PROFISSÃO QUE A PESSOA EXERCE OU EXERCEU NA MAIOR PARTE DE SUA VIDA. VÁ PARA B.7b</p>	<p>PROFISSÃO _____</p> <p>Anotar _____</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>B.7b</p> <p>Qual a sua profissão?</p> <p>CLASSIFICAR A PROFISSÃO REFERIDA EM B.7 a</p>	<p>DIRIGENTES E GERENTES DE ORGANIZAÇÕES, EMPRESAS, E MEMBROS SUPERIORES DO PODER PÚBLICO 1</p> <p>PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES 2</p> <p>TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 3</p> <p>TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4</p> <p>TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS 5</p> <p>TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, CAÇA E PESCA 6</p> <p>TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS 7</p> <p>TRABALHADORES DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 8</p> <p>MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES 9</p> <p>PRENDAS DOMÉSTICAS 10</p> <p>NUNCA TRABALHOU 11</p>
<p>B.7c</p> <p>O Sr. (a) ainda está trabalhando(a)? Se não, está inativo há quanto tempo?</p> <p>SE SIM, VÁ PARA B.7d</p>	<p>NÃO 1</p> <p>DESDE (MESES) _____</p> <p>SIM 2</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>B.7d</p> <p>Qual sua situação atual de trabalho?</p>	<p>Trabalho 20 horas por semana ou + 1</p> <p>Trabalho menos de 20 horas por semana 2</p> <p>Faço trabalho voluntário 3</p> <p>OUTRA 4</p> <p>Anotar _____</p> <p>NR 99</p>

<p>B.8</p> <p>Qual a sua religião?</p>	<p>CATÓLICA 1</p> <p>PROTESTANTE OU EVANGÉLICA 2</p> <p>ESPIRITA 3</p> <p>JUDÁICA 4</p> <p>MUÇULMANA 5</p> <p>OUTRA 6</p> <p style="text-align: center;">Anotar</p> <p>NENHUMA 7</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>B.9</p> <p>Qual o seu parentesco com o idoso?</p>	<p>CÔNJUGE 1</p> <p>FILHO (A) 2</p> <p>NORA / GENRO 3</p> <p>OUTRO 4</p> <p style="text-align: center;">Anotar</p> <p>NÃO É PARENTE 5</p> <p style="text-align: center;">Especificar</p>
<p>B.10</p> <p>O Sr.(a) mora junto com o idoso?</p>	<p>NÃO 1</p> <p>SIM 2</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>B.11</p> <p>Com que frequência encontra o idoso?</p>	<p>DIÁRIA 1</p> <p>SEMANAL 2</p> <p>QUINZENAL 3</p> <p>MENSAL 4</p> <p>OUTRO 5</p> <p style="text-align: center;">Especificar</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>

Seção C - Avaliação Cognitiva

- Apresente-se e tente obter a confiança do indivíduo. Antes de iniciar, consiga a permissão do paciente para fazer perguntas (p.ex.: Está tudo bem se eu lhe fizer algumas perguntas sobre sua memória?).
- Antes dos testes serem aplicados, tente fazer com que o paciente se sinta à vontade para você. Avalie a capacidade do indivíduo em ouvir e entender a partir de questões iniciais muito simples (p.ex.: Qual o seu nome?). Se o paciente utiliza prótese auditiva ou visual, peça para que ele a(s) coloque antes de iniciar.
- Se o paciente responde incorretamente, não pontue ou dê escore 0. Não dê sugestão, lembrete ou forneça qualquer dica. Não faça a pergunta novamente.
- Se o indivíduo responde "O que você disse?", não inicie uma conversa. Simplesmente repita a questão, ou se for o caso explique em linguagem simples e com poucas palavras, repetindo no máximo três vezes.
- Se o paciente interromper, com perguntas como "para que serve isso?", responda apenas: "Eu vou explicar em poucos minutos, quando terminarmos. Agora se pudessemos continuar, por favor..."
- Se o indivíduo exceder o limite de tempo, mas parecer estar lutando com uma resposta, não o interrompa. Permita que ele responda à questão, mas pontue de forma apropriada, p.ex.: pontue 0 por não respondido dentro do limite de tempo permitido.

I. FULD OBJECT MEMORY EVALUATION (FOME)

Material Necessário: Um saquinho escuro contendo os dez objetos pré-determinados. Dez cartões resposta.

C1. Reconhecimento dos objetos

Agora vamos avaliar a sua memória. Eu tenho aqui um saquinho e vou pedir que o sr(a) vá pegando os objetos um a um, de olhos fechados. Tente reconhecer dentro do saquinho que objeto é. Assim que souber o nome diga-o em voz alta e logo em seguida abra os olhos e confira sua resposta.

Objetos	Reconhecimento Tátil	Reconhecimento visual
Bola		
Botão		
Caixa de fósforos		
Chupeta		
Colher		
Escova de dente		
Lápis		
Panela		
Pregador		
Xicara		
Total	C1a.	C1b.

O sujeito não poderá olhar para o objeto antes de nomear o mesmo. Deve-se pedir que ele vá pegando os objetos alternando as mãos (primeiro a direita, depois a esquerda, direita, esquerda, e assim por diante).

C2. Fluência Verbal

Você deverá alternar uma tarefa de fluência com uma de recuperação.
Nesta primeira tarefa o sujeito dispõe de 1 minuto.

Agora eu vou lhe pedir para me dizer o nome de quantos animais o se(a) puder lembrar. Podem ser selvagens ou domésticos.

Lista de Animais (60")

1.	11.
2.	12.
3.	13.
4.	14.
5.	15.
6.	16.
7.	17.
8.	18.
9.	19.
10.	20.

Total C2: _____

Anotar somente as respostas corretas. Animais de uma mesma espécie só podem ser anotados uma vez (ex. vaca – boi – bura). Passado um minuto, ir para a folha de registro do FOME.

C3. Registro de Objetos 1ª série

O sr(a) pode me dizer que objetos retirou do saquinho?

Ir para folha de registro do FOME. O paciente terá um tempo de aproximadamente 1 minuto e meio para lembrar dos 10 objetos. Passado esse tempo o avaliador completará somente os objetos faltantes.

C4. Fluência Verbal 2ª tarefa

Agora vou pedir para o sr(a) me dizer que coisas ou situações (critério do sr(n)) poderiam deixar uma pessoa feliz.

Lista de coisas que trazem felicidade (30")

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Total C4: _____

C5. Registro de Objetos 2ª Série

O sr(a) pode me dizer novamente que objetos retirou do saquinho ?

Ir para folha de registro do FCME. O sujeito terá um tempo de aproximadamente 1 minuto e meio para lembrar os 10 objetos. Caso não o fizer, o avaliador completará somente os objetos faltantes.

C6. Fluência Verbal 3ª Tarefa

Agora vou pedir para o sr(a) me dizer nomes de frutas, todas as frutas que o sr(a) for capaz de lembrar.

O sujeito dispõe de 30 segundos para completar a tarefa.

Lista de frutas (30")

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Total C6: _____

C7. Registro de Objetos 3ª Série

O sr(a) pode me dizer mais uma vez que objetos retirou do saquinho?

Ir para folha de registro do FCME. O sujeito terá aproximadamente 1 minuto e meio para lembrar os 10 objetos. Caso não o fizer, o avaliador completará somente os objetos faltantes.

C8. Fluência Verbal 4ª Tarefa

Eu vou lhe pedir agora para o sr(a) me dizer nomes de pessoas. Não podem ser apelidos nem diminutivos.

O sujeito dispõe de 30 segundos para completar a tarefa. Não serão permitidos a repetição de nomes, nem os apelidos ou diminutivos dos mesmos. Os nomes devem ser do mesmo sexo que o paciente.

Lista de nomes (30")

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Total C8: _____

C9. Registro de Objetos 4ª Série

O sr(a) pode me dizer mais uma vez que objetos retirou do saquinho?

ir para folha de registro do FOME. O sujeito tem aproximadamente 1 minuto e meio para lembrar os 10 objetos. Caso não o fizer o avaliador completará somente os objetos faltantes.

C10. Fluência Verbal 5ª Tarefa

Agora eu vou lhe pedir que me diga coisas ou situações que podem ao critério do sr (a) deixar uma pessoa triste.

O sujeito dispõe de 30 segundos para completar a tarefa. Podem ser coisas concretas, ou situações que normalmente deixam uma pessoa entristecida, como por ex. a morte, falta de carinho dos familiares, falta de dinheiro, etc.

Lista de coisas que trazem tristeza (30")

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Total C10: _____

C11. Registro de Objetos 5ª Série

O sr. (a) pode me dizer mais uma vez que objetos retirou do saquinho?

Ir para folha de registro do FOME. O sujeito terá um tempo de aproximadamente 1 minuto e meio para lembrar os 10 objetos. Caso não o fizer o avaliador completará somente os objetos faltantes.

AGORA PASSE PARA OUTRA SEÇÃO D. PÁGINA 26 DO QUESTIONÁRIO. APÓS 15 MINUTOS VOLTE PARA AVALIAR A EVOCAÇÃO TARDIA .

C12. Evocação Tardia

Agora voltemos para o saquinho. O sr(a) lembra que objetos tirou do saquinho?

O sujeito tem 1 minuto para lembrar dos objetos. O avaliador dispõe de 10 cartões resposta para mostrar ao paciente por cada objeto esquecido, somente nesses casos. Quando o paciente precisar de ajuda para lembrar do objeto em questão, pontuar na coluna ao lado, "com dica".

FOME – FOLHA DE REGISTRO EVOCAÇÃO TARDIA (APÓS 15 MINUTOS)

Objeto	Evocação Espontânea	Evocação Com dica
Bola		
Botão		
Caixa de Fósforo		
Chupeta		
Colher		
Escova de Dentes		
Lápis		
Pente		
Pregador		
Xícara		
Total ET	C12a.	C12b.

REGISTRAR AS INTRUSÕES:
(objetos que não constam da
lista original)

FOME - FOLHA DE REGISTRO GERAL

Objetos	1ª Série (60")	2ª Série (60")	3ª Série (60")	4ª Série (60")	5ª Série (60")	Total
Bola						
Botão						
Caixa de fósforos						
Chupeta						
Colher						
Escova de dente						
Lápis						
Perce						
Pregador						
Xicara						
Recuperação Consistente						
Storage						
Total						C12c.

Registrar os objetos segundo a ordem em que o sujeito os lembrou. Numerar os registros de 1 a 10 em cada série. Totalizar a quantidade de objetos lembrados ao final de cada linha, ao final de cada coluna, e o total final de todas as séries. Não preencher os campos de recuperação consistente e nem de Storage.

II. MEEM (Mini Exame do Estado Mental)

Material Necessário: Você precisará de uma caneta esferográfica, um relógio de pulso, uma folha de papel e os cartões impressos 1 e 2.

Dê 10 segundos para cada resposta. Marque 1 ponto para cada resposta correta e 0 para as incorretas. Diga "Eu vou fazer algumas perguntas e dar alguns problemas para serem resolvidos. Por favor, tente responder da melhor forma que puder".

Orientação

C13.

Por favor, me diga a data de hoje

Pergunte mês, dia, ano e dia da semana, assim como semestre ou metade do ano ao qual o mês corresponde. Dê um ponto em cada resposta correta. Em caso de dúvida, registre a resposta dada ao lado e contate o supervisor.

- Qual é a data de hoje? (_)
- Em que mês do ano estamos? (_)
- Em que ano estamos? (_)
- Que dia da semana é hoje? (_)
- Em que semestre estamos? (_)

PONTUAÇÃO
PARCIAL C13

C14.

Em que país nós estamos?

Escore

Aceite apenas a resposta exata

Em que estado estamos?

Escore

Aceite apenas a resposta exata

Em que cidade estamos?

Escore

Aceite apenas a resposta exata

Em que bairro estamos?

Escore

Alternativamente pode ser usada a questão "Em que rua estamos?"

Em que estado estamos?

Escore

Em qual andar nós estamos? Escore

Aceite apenas a resposta exata. No caso de casa térrea, pode ser usada a alternativa "Em que quarto estamos?"

PONTUAÇÃO
PARCIAL C14

C15. Registro de dados

Agora vou lhe dar o nome de três objetos. Quando eu terminar lhe pedirei que os repita em voz alta, em qualquer ordem. Guarde quais são, porque eu vou perguntar o nome deles de novo em alguns minutos.

Leia os nomes dos objetos devagar e de forma clara somente uma vez. O sujeito deve repeti-los em até 20". Dê um ponto por cada objeto lembrado e zero para os não lembrados, apenas na primeira tentativa. Se o sujeito não conseguir repetir todos os objetos:

- 1) Repita todos os objetos até que o entrevistado os aprenda (máximo de repetições: 5 vezes).
- 2) Anote o número de repetições que teve que fazer.
- 3) Nunca corrija a primeira tentativa.

CARRO

VASO

JANELA

Número de repetições

PONTUAÇÃO
PARCIAL C15

C16. Atenção e cálculo

Agora subtraia 7 de 100 e continue subtraindo 7 do restante.

Quando o indivíduo começar – não interrompa – permita que ele prossiga até que tenham sido feitas cinco subtrações. Se o indivíduo parar antes que cinco subtrações tenham sido feitas, repita a instrução original "por favor, continue subtraindo sete do restante" (máximo 3 vezes). Se o entrevistado errar algumas das subtrações, não o corrija.

Resposta do indivíduo					
Resposta correta	93	86	79	72	65

Total de respostas corretas C16a

Como tarefa alternativa, pode-se pedir que o indivíduo solestre a palavra "MUNDO" de trás para frente. Dar-se-á um ponto para cada letra soletrada corretamente.

Resposta do indivíduo					
Resposta correta	O	D	N	U	M

Total de respostas corretas C16b

Registre o total de respostas corretas C16a ou C16b abaixo.
Registrar apenas a letra de maior escore.

PONTUAÇÃO
PARCIAL C16

C17. Memória / evocação

Agora me diga: Quais foram os três objetos que eu pedi para repetir agora há pouco?

Dê 10 segundos para cada resposta. Marque um ponto para cada resposta correta independentemente da ordem.

CARRO

VASO

JANELA

PONTUAÇÃO
PARCIAL C17

Linguagem, Compreensão e Habilidade Construtiva

C18. MOSTRE O RELÓGIO DE PULSO

Como é o nome disso?

Dê 10 segundos para a resposta. Marque um ponto para a resposta correta. Aceite apenas "relógio de pulso", "relógio" ou "cronômetro".

Pontuação C18

☐

C19. MOSTRE A CANETA

Como é o nome disto?

Dê 10 segundos para a resposta. Marque um ponto para a resposta correta. Aceite apenas "caneta".

Pontuação C19

☐

C20.

Agora quero que o sr (a) repita esta frase depois de mim:
"nem aqui, nem ali, nem lá".

Fale as palavras com clareza. Dê dez segundos para a resposta. Marque um ponto para a repetição correta, que deve ser exata.

Pontuação C20

☐

C21.

DÊ AO INDIVÍDUO O CARTÃO 1 COM A AFIRMAÇÃO "FECHE OS OLHOS"

Por favor, leia essa frase e faça o que está sendo pedido.

Dê 10 segundos. Repita as instruções até três vezes se necessário. Marque um ponto apenas se o indivíduo fechar os olhos.

Pontuação C21

☐

C22.

DÊ AO INDIVÍDUO UM LÁPIS E UM PAPEL

Escreva uma frase completa, de sua escolha, nesse pedaço de papel.

Dê 30 segundos. Marque um ponto se a frase fizer sentido, isto é, tiver sujeito, verbo e objeto. Ignore os erros de ortografia.

Pontuação C22

☐

20

C23.

APRESENTE PARA O INDIVÍDUO O CARTÃO 2

Por favor, copie este desenho

Permita várias tentativas até que o indivíduo tenha terminado (no máximo um minuto). Marque um ponto se o indivíduo desenhou duas figuras com 5 lados, formando na intersecção destas uma figura de 4 lados (diamante, losango).

Pontuação C23

C24.

Observe com que mão o indivíduo segurou a caneta ou pergunte se ele é destro ou canhoto. Pegue um pedaço de papel em branco, segure-o na frente do indivíduo. Peça para o indivíduo prestar muita atenção. Você só poderá dar a instrução uma vez. Não é permitido repetir durante o transcurso da tarefa.

Eu vou lhe dar esta folha de papel. Quando eu o fizer o sr(a) vai pegar esta folha com sua mão direita/ esquerda (mão oposta à que ele costuma usar), dobrar uma vez ao meio com as duas mãos, e colocar no chão.

Dê 30 segundos. Marque um ponto para cada instrução executada de forma correta, máximo de 3 pontos.

- Pega com a mão direita/esquerda

- Dobra ao meio com as duas mãos

- Coloca no chão

**PONTUAÇÃO
PARCIAL C24**

**PONTUAÇÃO TOTAL
MEEM C25 (C13 A C24)**

 A pontuação máxima é de
30 pontos.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL

Alguma outra pessoa que mora nesta casa poderia ajudar-nos a responder algumas outras perguntas?

Se a resposta for negativa, comunique o supervisor que a entrevista inicial foi feita só com a pessoa entrevistada, e peça o nome e telefone de algum parente ou conhecido que possa responder por telefone o questionário. (Deve conhecer o sujeito no mínimo há 10 anos para responder o IQCODE. Não pode ser um cuidador remunerado). Circule a resposta adequada.

SIM 1

Preencha os dados do informante e aplique as escalas.

NÃO 2

SE SIM, VÁ PARA A SEÇÃO DO INFORMANTE – B1 PÁGINA 5

III- IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly)

Agora nós queremos que você se lembre como o seu familiar estava há 10 anos atrás, e compare com o estado em que ele(a) está agora. As questões abaixo são situações nas quais esta pessoa usa sua memória, ou inteligência e nós queremos que você indique se estas situações melhoraram, pioraram ou se permaneceram do mesmo jeito, nos últimos dez anos. Por exemplo, se há 10 anos atrás esta pessoa sempre se esquecia onde guardava suas coisas, e ainda se esquece, isto seria considerado como "não muito alterado".

Marque com um "x" na resposta apropriada. Se a pessoa nunca fez determinada função ou tarefa, marque "não se aplica". Se o familiar não tem certeza ou desconhece alguma informação, marque "não sabe".

Comparada há 10 anos atrás, como essa pessoa está em:	Muito melhor	Melhor	Não muito alterado	Pior	Muito pior	Não se aplica	Não sabe
1. Reconhecer familiares e amigos							
2. Lembrar-se do nome dos familiares amigos							
3. Lembrar-se de coisas sobre os familiares							
4. Lembrar-se de coisas que aconteceram há pouco tempo							
5. Lembrar-se de conversas dos últimos dias							
6. Esquecer o que ele(a) queria dizer no meio da conversa							
7. Lembrar-se do seu endereço e telefone							

8. Lembrar-se em que dia e mês estamos							
9. Lembrar onde as coisas são guardadas usualmente (ex. roupa, talheres, etc)							
10. Lembrar onde achar coisas que foram guardadas em lugar diferente do de que de costume (ex. óculos, dinheiro, chaves)							
11. Adaptar-se a mudanças em sua rotina diária							
12. Saber usar aparelhos domésticos que já conhece							
13. Aprender a usar um aparelho doméstico novo							
14. Aprender novas coisas em geral							
15. Lembrar-se de coisas que aconteceram quando ele (a) era jovem							
16. Lembrar-se de coisas que ele(a) aprendeu quando era jovem							
17. Entender o significado de palavras pouco comuns							
18. Entender artigos de revista e de jornal							
19. Acompanhar uma história em um livro ou na televisão (ex. novelas, seriados, filmes)							
20. Escrever uma carta para amigos ou para negócios							
21. Conhecer fatos históricos importantes do passado							
22. Tomar decisões em questões do dia-a-dia							
23. Lidar com dinheiro para fazer compras							
24. Lidar com suas finanças, por exemplo, pensão, coisas de banco							

25. Lidar com outros problemas concretos do dia-a-dia, como por exemplo, saber quanta comida comprar, quanto tempo transcorreu entre as visitas de familiares ou amigos							
26. Compreender o que se passa a sua volta							
Sub-Total (soma dos itens assinalados nas colunas)							
Total (multiplicar o sub-total de cada coluna pelo número indicado)	X 1=	X 2=	X 3=	X 4=	X 5=		
Total geral (soma dos resultados das 7 colunas)							

OBS: Nas colunas Não se aplica ou Não sabe, o sub-total não deve ser multiplicado por nenhum valor e, portanto, é igual ao total. Faça os cálculos com calma, depois de ter terminado a entrevista.

O cálculo do Escore final do IQCODE deve ser feito dividindo o total geral pelo número de perguntas respondidas (excluindo-se as questões assinaladas como Não se aplica ou Não sabe):

$$\text{Escore IQCODE} = \frac{\text{Total geral}}{\text{Número de Itens respondidos}}$$

ESCORE FINAL IQCODE C26

IV- Escala Internacional de Atividades da Vida Diária (ADL-IS)

As perguntas seguintes abordam atividades diárias que a pessoa sobre a qual estamos falando poderia ter dificuldade. Estas perguntas devem ser respondidas por familiar/informante que conheça bem o sujeito. Por favor, indique o quão frequentemente estas dificuldades ocorrem, marcando os números apropriados. Quanto maior o número, mais dificuldade a pessoa tem para fazer a atividade em questão. Se a dificuldade nunca ocorre marque 1. Se ocorre sempre, marque 10.

A pessoa tem dificuldade para ...	pontuação	Não se aplica	Não sei	Escore
1...fazer suas atividades diárias	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
2...cuidar de si própria	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
3...tomar remédio sem supervisão	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
4...cuidar de sua higiene pessoal	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
5...lembrar de datas, acontecimentos e compromissos importantes	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
6...concentrar-se na leitura	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
7...descrever o que ela acabou de ver ou ouvir	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
8...participar de uma conversa	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
9...usar o telefone	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
10...dar um recado a outra pessoa	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
11...sair para uma caminhada sem se perder	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
12...fazer compras	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
13...preparar comida	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
14...contar o dinheiro sem errar	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
15...lidar com suas contas	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			

16...ensinar o caminho, se perguntado	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
17...usar eletrodomésticos	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
18...orientar-se em lugar não familiar	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
19...usar sozinho meios de transporte	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
20...participar em atividades de lazer	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
21...continuar com a mesma atividade depois de uma breve interrupção	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
22...fazer duas coisas ao mesmo tempo	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
23...lidar com situações não familiares	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
24...fazer as coisas com segurança e sem se machucar	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
25...realizar uma tarefa quando sob pressão	Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sempre			
Total (soma da coluna score)				

O cálculo do *Escore* final da escala ADL-IS deve ser feito dividindo o total pelo número de perguntas respondidas (excluindo-se as questões assinaladas como Não se aplica ou Não sei):

Escore ADL-IS = $\frac{\text{Total}}{\text{Número de itens respondidos}}$

ESCORE FINAL ADL-IS C27

D - INVENTÁRIO CLÍNICO

PERGUNTAS REFERENTES A MEMÓRIA

D.1. Tem apresentado problema de memória ultimamente?	NÃO 0 SIM 1 Ha Quanto tempo? (meses) NS 88 NR 99
D.2. Tem tido dificuldade para se lembrar de fatos recentes?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.3. Tem tido dificuldade para se lembrar de compromissos, encontros?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.4. Tem esquecido onde guardou objetos?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.5. Tem esquecido o nome de pessoas conhecidas?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.6. Tem se perdido em locais conhecidos?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.7. Tem tido dificuldade para conversar?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.8. Tem tido dificuldade para fazer contas, lidar com dinheiro?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.9. Tem tido dificuldade para manter a atenção nas coisas que faz?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99

PERGUNTAS REFERENTES AO ESTADO DE ÂNIMO

D.10. Está satisfeito (a) com sua vida?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.11. Sente-se frequentemente chateado ou desanimado?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.12. Sente-se frequentemente sem esperança?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.13. Prefere ficar em casa do que sair ou fazer coisas novas?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.14. Sente-se sem valor ou inútil?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.15. Tem sentido pouco prazer nas coisas?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.16. Tem se sentido mais "nervoso"?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.17. Tem se preocupado mais ultimamente?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.18. Tem apresentado emagrecimento?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.19. Tem tido dificuldade para dormir?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99

ALGUMAS PESSOAS TÊM SENSações ESTRANHAS. EM ALGUM MOMENTO ISTO JÁ LHE ACONTECEU?

D.20. Tem ouvido vozes que outras pessoas não ouvem?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.21. Tem apresentado visões, sentido cheiros estranhos, ou notado sensações estranhas?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
D.22. Tem apresentado idêia de que está sendo perseguido, ou de que alguém lhe quer fazer mal, ou outros pensamentos estranhos, fora do habitual?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99

E- INVENTÁRIO DE ANTECEDENTES PESSOAIS E HÁBITOS

(as doenças que não contém opções entre parênteses devem ser perguntadas da forma como estão escritas, enfatizando-se se foram diagnosticadas por médicos)

E1 AVC (derrame)	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E2 Doença de Parkinson	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E3 TCE (batida na cabeça com desmalo)	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E4 Epilepsia (ataque, convulsão)	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E5 Outra doença neurológica	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99

E6	NÃO 0
Depressão	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E7	NÃO 0
Esquizofrenia	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E8	NÃO 0
Outra doença Psiquiátrica	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E8a Qual?	
E9	NÃO 0
Diabetes ("açúcar no sangue")	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E10	NÃO 0
Hipertensão (Pressão alta)	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E11	NÃO 0
Colesterol (Gordura no sangue)	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E12	NÃO 0
Infarto do coração	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E13	NÃO 0
Sífilis	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E14	NÃO 0
AIDS	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E15	NÃO 0
Hepatite	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E16	NÃO 0
Doença de Chagas	SIM 1
	NS 88
	NR 99
E17	NÃO 0
Artrite reumatóide ("reumatismo diagnosticado por médico)	SIM 1
	NS 88
	NR 99

E18 Tumor (Câncer)	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E18a Em que parte do corpo e há quanto tempo?	
E19 Cirurgias	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E19a Em que parte do corpo e há quanto tempo?	
E20 Tabagismo: Faz uso de cigarro?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E20a Quantos maços por dia e há quanto tempo?	
E21 Tabagismo: Fez uso de cigarro no passado?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E21a Quantos maços por dia e por quanto tempo?	
E22 Faz atualmente, ou fez uso de álcool no passado?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99 Período:
E22a Alguma vez sentiu que deveria cortar o consumo de álcool?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E22b Alguém já o aborreceu por criticar seu hábito de beber?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E22c Alguma vez já sentiu-se culpado por fazer uso de álcool?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
E22d Alguma vez bebeu nas primeiras horas da manhã para curar uma ressaca?	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99

PEDIR PARA VER AS CAIXAS DE MEDICAÇÕES EM USO.

<p>E23</p> <p>Psicotrópicos: Faz (fez) uso de calmantes, tranquilizantes, remédios para dormir?</p> <p>E23a</p> <p>Caso a resposta seja SIM:</p> <p>P.ex: Uso pregresso</p> <p>Nome: Diazepam 10 mg Dose: 1 comp.</p> <p>Tempo de uso: 10 anos Período: dos 40 aos 60</p> <p>ou</p> <p>Uso atual</p> <p>Nome: Diazepam 10 mg Dose: 1 comp.</p> <p>Tempo de uso: 1 ano</p>	<p>NÃO 0</p> <p>SIM 1</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p>
<p>E24</p> <p>Anti-inflamatórios: Faz (fez) uso regular/constante de medicamentos anti-inflamatórios, para aliviar alguma dor, ou para tratar artrite ou artrose?</p> <p>E24a</p> <p>Caso a resposta seja SIM:</p>	<p>NÃO 0</p> <p>SIM 1</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p>
<p>E25</p> <p>Vitaminas: Faz (fez) uso de vitaminas, ou de complexos vitamínicos?</p> <p>E25a</p> <p>Caso a resposta seja SIM:</p>	<p>NÃO 0</p> <p>SIM 1</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p>
<p>E26</p> <p>Reposição hormonal (somente para sexo feminino): Faz (fez) reposição hormonal, ou tomou hormônios?</p> <p>E26a</p> <p>Caso a resposta seja SIM:</p>	<p>NÃO 0</p> <p>SIM 1</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p> <p>Nome</p> <p>Dose</p> <p>Tempo de uso</p> <p>Período de uso</p>

<p>E27</p> <p>Medicamentos: Faz (faz) uso de medicamentos para alguma outra doença?</p> <p>E27a</p> <p>Caso a resposta seja SIM:</p>	<p>NÃO 0</p> <p>SIM 1</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p> <p>Nome Dose</p> <p>Tempo de uso Período</p>
<p>E28</p> <p>Exercícios Físicos: Faz (faz) algum tipo de exercício físico (p.ex: esporte, caminhada, dança, hábito de andar regularmente)?</p> <p>E28a</p> <p>Caso a resposta seja SIM, codifique a frequência da prática de cada tipo de exercício como:</p> <p>1 - Uma vez ao ano ou menos</p> <p>2 - Várias vezes por ano</p> <p>3 - Várias vezes por mês</p> <p>4 - Várias vezes por semana</p> <p>5 - Todos os dias, ou quase todos os dias</p> <p>Ex: Tipo __ Caminhada __</p> <p>Frequência: 2 Período: dos 50 aos 60 anos</p>	<p>NÃO 0</p> <p>SIM 1</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p> <p>Tipo</p> <p>Frequência Período</p> <p>Tipo</p> <p>Frequência Período</p> <p>Tipo</p> <p>Frequência Período</p> <p>Tipo</p> <p>Frequência Período</p>
<p>E29</p> <p>Com que frequência o(a) assiste televisão?</p>	<p>NÃO 0</p> <p>Uma vez ao ano ou menos 1</p> <p>Várias vezes por ano 2</p> <p>Várias vezes por mês 3</p> <p>Várias vezes por semana 4</p> <p>Todos os dias, ou quase todos os dias 5</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>
<p>E30</p> <p>Com que frequência o(a) ouve/escuta rádio?</p>	<p>NÃO 0</p> <p>Uma vez ao ano ou menos 1</p> <p>Várias vezes por ano 2</p> <p>Várias vezes por mês 3</p> <p>Várias vezes por semana 4</p> <p>Todos os dias, ou quase todos os dias 5</p> <p>NS 88</p> <p>NR 99</p>

E31 Com frequência o sr(a) lê jornais?	NÃO 0 Uma vez ao ano ou menos 1 Várias vezes por ano 2 Várias vezes por mês 3 Várias vezes por semana 4 Todos os dias, ou quase todos os dias 5 NS 88 NR 99
E32 Com que frequência o sr(a) lê livros?	NÃO 0 Uma vez ao ano ou menos 1 Várias vezes por ano 2 Várias vezes por mês 3 Várias vezes por semana 4 Todos os dias, ou quase todos os dias 5 NS 88 NR 99
E33 Com que frequência o sr(a) joga jogos, como cartas, damas, palavras cruzadas, jogos com problemas ou outros?	NÃO 0 Uma vez ao ano ou menos 1 Várias vezes por ano 2 Várias vezes por mês 3 Várias vezes por semana 4 Todos os dias, ou quase todos os dias 5 NS 88 NR 99
E34 Com que frequência o sr(a) vai a museus?	NÃO 0 Uma vez ao ano ou menos 1 Várias vezes por ano 2 Várias vezes por mês 3 Várias vezes por semana 4 Todos os dias, ou quase todos os dias 5 NS 88 NR 99
E35 Com que frequência o sr(a) vai a cinema, shows, teatro?	NÃO 0 Uma vez ao ano ou menos 1 Várias vezes por ano 2 Várias vezes por mês 3 Várias vezes por semana 4 Todos os dias, ou quase todos os dias 5 NS 88 NR 99

F - INVENTÁRIO DE ANTECEDENTES FAMILIARES:

As seguintes questões dizem respeito à doença de familiares, no presente ou no passado. Se a sua resposta for "SIM", por favor, registre quantos são na parte anterior à barra e coloque, de acordo com a legenda, entre os parênteses.

Exemplo: 2 mães e 1 filho com a doença: (2/33; 1/55)

Legenda:

Pai	/11
Mãe	/22
Irão	/33
Irã	/44
Filho	/55
Filha	/66

F1 Esquecimento grave na velhice (esclerose, demência)	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F2 AVC (derame)	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F3 Parkinson (tremores importantes)	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F4 Epilepsia (ataque, convulsão)	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F5 Outra doença neurológica	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F6 Depressão	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F7 Esquizofrenia	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F8 Outra doença psiquiátrica (ex.: alcoolismo, ansiedade, fobias, retardo mental)	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F9 Diabetes ("açúcar no sangue")	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99
F10 Hipertensão (Pressão alta)	NÃO 0 SIM (.....) 1 NS 88 NR 99

F11 Colesterol (Gordura no sangue)	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
F12 Infarto do coração	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
F13 Outras doenças	NÃO 0 SIM 1 (Qual?) NS 88 NR 99
F14 Tumor (Câncer)	NÃO 0 SIM 1 (Aonde?) NS 88 NR 99
F15 Síndrome de Down (mongolismo)	NÃO 0 SIM 1 NS 88 NR 99
F16 Os pais nasceram em outro país?	NÃO 0 SIM 1 (Qual?) NS 88 NR 99
F17 Os avós nasceram em outro país?	NÃO 0 SIM 1 (Qual?) NS 88 NR 99

G - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE:

G1 Que tipo de serviço de saúde tem utilizado mais, ultimamente?	Não utilizo 0 Privado-particular 1 Privado-convênio 2 Público 3 NS 88 NR 99
G1a CASO SIM, CODIFIQUE O TIPO DE SERVIÇO QUE TEM UTILIZADO MAIS (Pode ser assinalada mais de 1 opção)	Hospitalar 1 Ambulatorial (posto de saúde ou consultório) 2 Outro
G2 Com que frequência?	Não utilizo 0 1x/semana 1 2-3x/semana 2 1x/mês 3 menos de 1x/mês 4 NS 88 NR 99

G3	Rum 1
Como avalia a qualidade do serviço Utilizado?	Regular 2
	Bom 3
	Muito bom 4
	Excelente 5
	NS 88
	NR 99

Agora gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia, coisas que nós todos necessitamos fazer como parte da rotina diária. Estamos interessados em saber se o(a) sr(a) consegue fazer estas atividades sem nenhuma necessidade de auxílio ou se precisa de alguma ajuda, ou ainda se já não consegue fazer tais atividades de forma nenhuma.

H – ATIVIDADES INSTRUMENTAIS

H.1 O sr(a) telefona quando precisa, sozinho(a)?	Sem ajuda inclusive para localizar o n.º desejado 0 Com ajuda - consegue atender o telefone numa emergência 1 Completamente incapaz de fazer uso do telefone 2 NR 99
H.2 O(a) sr(a) vai sozinho(a) a lugares que exigem condução? Ex: ônibus, taxi, dirigir carro próprio...	Sem nenhuma ajuda 0 Com alguma ajuda 1 Incapaz de viajar a menos que arranjos emergência sejam feitos para arrumar algo como uma ambulância 2 NR 99
H.3 O(a) sr(a) faz suas compras de alimentos ou roupas?	Sem nenhuma ajuda (toma conta das compras) 0 Com alguma ajuda (alguém que acompanha nas compras) 1 Incapaz de fazer compras sozinho 2 NR 99
H.4 O(a) sr(a) prepara suas próprias refeições?	Sem nenhuma ajuda (planeja e cozinha) 0 Com alguma ajuda (cozinha alguma coisa mas não prepara uma refeição completa) 1 Incapaz de cozinhar o que quer que seja 2 Nunca cozinhou (homens) 3
H.5 O(a) sr(a) faz trabalho de casa?	Sem nenhuma ajuda (inclusive para varrer o chão) 0 Com alguma ajuda (somente é capaz de fazer o serviço leve) 1 Incapaz de cuidar da casa 2 Nunca fez trabalho de casa 3 NR 88

H.6 O(a) sr(a) toma sozinho(a) seus remédios?	Sem nenhuma ajuda 0 Com alguma ajuda (alguém que prepare o remédio ou lembre a hora certa de tomá-lo) 1 Incapaz de tomar seus próprios remédios 2 NR 88
H.7 O(a) sr(a) controla sozinho(a) as suas finanças?	Sem nenhuma ajuda 0 Com alguma ajuda (controla as compras diárias mas precisa de alguém para controlar o talão de cheques ou o pagamento de contas) 1 Incapaz de controlar as próprias finanças 2 NR 99

I – ATIVIDADES FÍSICAS

I.1 COMER O(a) Sr(a) come sozinho(a)?	Sim, sem necessidade de ajuda 0 Consegue comer desde que a comida tenha sido previamente cortada 1 Não consegue comer adequadamente se não for ajudado 2 NR 99
I.2 VESTIR-SE O(a) sr(a) se veste sozinho(a)?	Veste-se sem ajuda 0 Consegue vestir-se com alguma supervisão ou auxílio 1 Necessita sempre de outra pessoa para vestir-se 2 NR 99
I.3 CUIDAR DA APARÊNCIA O(a) sr(a) cuida sozinho(a) da própria aparência? Ex: pentear os cabelos, fazer a barba, etc.	Penteia-se, barbeia-se sem ajuda 0 Consegue-se pentear-se/barbear-se com alguma ajuda 1 Completamente incapaz de cuidar da própria aparência sozinho(a) 2 NS 88 NR 99
I.4 ANDAR NO PLANO O(a) sr(a) anda no plano (pequenas distâncias)?	Sem dificuldade (inclui uso de bengala) 0 Com ajuda de outra pessoa ou auxílio mecânico 1 Completamente incapaz de sentar-se ou deitar-se e levantar-se 2 NS 88 NR 99
I.5 DORMIR O(a) sr(a) levanta ou deita na cama sozinho(a)?	Sem ajuda de pessoas ou auxílio mecânico 1 Com alguma ajuda de pessoas ou auxílio mecânico 2 Completamente incapaz de sentar-se ou deitar-se ou de levantar-se sem ajuda de outra pessoa 3 NS 88 NR 99

I.6 BANHAR-SE O(a) sr(a) toma banho sozinho?	Sem ajuda 0 Necessita de supervisão e auxílio 1 Só consegue banhar-se com a ajuda de outra(s) pessoa(s) 2 Não consegue banhar-se com a ajuda de outra(s) pessoa(s) 3 NR 99
I.7 USO DO WC O(a) sr(a) faz uso de WC sozinho(a)? I.7a E freqüente o(a) sr(a) ficar molhado ou assado por liberação de urina?	Serve-se sem qualquer auxílio 0 Necessita de supervisão (alguém que lembre e auxilie no uso) 1 Não consegue utilizar o WC 2 NR 99 Nunca 0 1 a 2 vezes por semana 1 3 vezes ou mais 2 NR 99
I.8 O(a) sr(a) manteve relações sexuais no último mês?	NÃO 0 SIM 1 NR 99

J- CLASSIFICAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA (ABIPEME)
J.1 Quem é o chefe-de-família na sua casa?

() o próprio entrevistado () outrem _____

J.2 Qual foi o grau de instrução mais alto que _____ o (CHEFE-DE-FAMÍLIA) obteve?
Qual o último ano de escola que o (CHEFE-DE-FAMÍLIA) cursou?

	PONTOS ABIPEME
Não estudou	
Primário incompleto	0
Primário completo	
Ginásial incompleto	5
Ginásial completo	
Colegial incompleto	10
Colegial completo	
Universitário incompleto	15
Universitário completo	21

J.3 Na sua casa tem..... (CADA ÍTEM ABAIXO)

	NÃO	SIM
Aparelho de vídeo cassete/VCR	()	10
Máquina de lavar roupa	()	8
Geladeira	()	7
Aspirador de pó	()	6

J.4 Quantos (CADA ÍTEM ABAIXO) existem em sua casa?

Número de itens possuídos/pontos

	nenhum	1	2	3	4	5	6	e mais
Carro	0	4	9	13	18	22	26	
TV a cores	0	4	7	11	14	18	22	
Banheiros	0	2	5	7	10	12	15	
Empregada mensalista	0	5	11	16	21	26	32	
Rádios	0	2	3	5	6	8	9	

J.5 Total

J.6 Classificação ABIPME

CLASSES:

A (89 pontos ou mais)	()
B (58 pontos ou mais)	()
C (35 a 58 pontos)	()
D (20 a 34 pontos)	()
E (0 a 19 pontos)	()

K. PRESSÃO ARTERIAL E PULSO

MEDIR A PRESSÃO AO FINAL DA ENTREVISTA, COM O IDOSO SENTADO.

K.1 PA (sentado): ____ X ____ K.1a P: ____

MEDIR A PRESSÃO, EM SEQUIDA, PEDINDO AO IDOSO QUE FIQUE EM PÉ (ESPERE 1 MINUTO).

K.2 PA (em pé): ____ X ____ K.2a P: ____

L. OBSERVAÇÕES FINAIS DO ENTREVISTADOR

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Anuário Estatístico do Brasil. Brasília, 1965.
2. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico – famílias e domicílios. IBGE, Brasília, 1983.
3. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2000. IBGE, Brasília, 2002.
4. RAMOS LR, VERAS RP, KALACHE A . Envelhecimento populacional: uma realidade brasileira. Revista de Saúde Pública 1987; 21(3):211-24.
5. KALACHE A, VERAS RP, RAMOS LR. O envelhecimento da população mundial. Um desafio novo. Revista de Saúde Pública 1987; 21(3):200-10.
6. GURLAND B. Epidemiology of Psychiatric Disorders. In: SADAVOY J, LAZARUS LW, JARVIK LF et al. eds. Comprehensive Review of Geriatric Psychiatry. 2. ed. Washington DC and London: American Psychiatric Press, 1996:3-39.

7. JORM AF, KORTEN AE, HENDERSON AS. The prevalence of dementia: a quantitative integration of the literature. *Acta Psychiatr Scand* 1987; 76:465-79.
8. RITCHIE K, KILDEA D, ROBINE JM. The Relationship between Age and the Prevalence of Senile Dementia: A Meta-Analysis of Recent Data. *International Journal of Epidemiology* 1992; 21:763-9.
9. JORM AF, JOLLEY D. The incidence of dementia. A meta-analysis. *American Academy of Neurology* 1998; 51:728-33.
10. ROCCA WA, HOFMAN A, BRAYNE C et al. Frequency and Distribution of Alzheimer's Disease in Europe: A Collaborative Study of 1980-1990 Prevalence Findings. *Ann. Neurol* 1991; 30:381-90.
11. FRATIGLIONI L, RONCHI D, AGÜERO-TORRES H. Worldwide Prevalence and Incidence of Dementia. *Drugs and Aging* 1999; 15(5):365-75
12. RITCHE K, KILDEA D. Is senile dementia "age-related" or "ageing-related"? evidence from meta-analysis of dementia prevalence in the oldest old. *Lancet* 1995; 346:931-4.
13. LOPES MA. Revisão sistemática dos estudos de prevalência de demência: período de 1994 a 2000. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.

14. OTT A, BRETELER MMB, HASKAMP F et al. Prevalence of Alzheimer's disease and vascular dementia: association with education. The Rotterdam Study. *BMJ* 1995; 310:970-3.

15. PRENCIPE M, CASINI AR, FERRETTI C, LATTANZIO MT, FIORELLI M, CULASSO F. Prevalence of dementia in a elderly rural population: effects of age, sex, and education. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1996; 60:628-33.

16. BOERSMA F, EEFTING JA, VAN DEN BRINK W, KOETER M, VAN TILBURG W. Prevalence of dementia in a rural netherlands population and the influence of DSM-III-R and CAMDEX criteria for the prevalence of mild and more severe forms. *J Clin Epidemiol* 1998; 51(3):189-97.

17. BRAYNE C, NICKSON J, McCRAKEN C, GILL C, JOHNSON AL. Cognitive function and dementia in six areas of England and Wales: distribution of MMSE and prevalence of GMS organicity level in the MRC CFA Study. *Psychol Med* 1998; 28:319-35.

18. ANDERSEN K, LOLK A, NIELSEN H, ANDERSEN J, OLSEN C, KRAGH-SØRENSEN P. Prevalence of very mild to severe dementia in Denmark. *Acta Neurol Scand* 1997; 96:82-7.

19. ROELANDS M, WOSTYN P, DOM H, BARO F. The Prevalence of Dementia in Belgium: A Population-Based Door-to-Door Survey in a Rural Community. *Neuroepidemiology* 1994; 13:155-61.
20. LOBO A, SAZ P, MARCOS G, DIA JL, DE-LA-CAMARA C. The prevalence of dementia and depression in the elderly community in a southern european population. The Zaragoza Study. *Arch Gen Psychiatry* 1995; 52:497-506.
21. POUSA SL, REGLA JL, FRANCH V, PINEDO LF. The prevalence of dementia in Girona. *Neurologia* 1995; 10(5):189-93.
22. PI J, OLIVÉ JM, ROCA J, MASANA L. Prevalence of dementia in a semi- rural population of Catalunya, Spain. *Neuroepidemiology* 1996; 15:33-41
23. MANUBENS JM, MARTINEZ-LAGE JM, LACRUZ F et al. Prevalence of Alzheimer's Disease and other dementia disorders in Pamplona, Spain. *Neuroepidemiology* 1995; 14:155-64.
24. WERNICKE TF, REISCHIES FM. Prevalence of dementia in old age: clinical diagnoses in subjects aged 95 years and older. *Neurology* 1994; 44: 250-3.

25. D'ALESSANDRO R, PANDOLFO G, AZZIMONDI G, FERUGLIO FS. Prevalence of dementia among elderly people in Troina, Sicily. *Eur J Epidemiol* 1996; 12:595-9.
26. AZZIMONDI G, D'ALESSANDRO R, PANDOLFO G, FERUGLIO FS. Comparative study of the prevalence of dementia in two Sicilian communities with different psychosocial backgrounds. *Neuroepidemiology* 1998; 17:199-209.
27. STRAUSS E, VIITANEN M, RONCHI D, WINBLAD B, FRATIGLIONI L. Aging and the Occurrence of Dementia. Findings From a Population-Based Cohort With a Large Sample of Nonagenarians. *Arch Neurol* 1999; 56:587-92.
28. FICHTER MM, MELLER I, SCHRÖPPEL H, STEINKIRCHNER R. Dementia and cognitive impairment in the oldest old in the community. Prevalence and comorbidity. *Br J Psychiatry* 1995; 166:621-9.
29. RAVAGLIA G, FORTI P, RONCHI D et al. Prevalence and severity of dementia among northern Italian centenarians. *Neurology* 1999; 53:416-8.
30. SHAJI S, PROMODU K, ABRAHAM T, ROY KJ, VERGHESE A. An epidemiological study of dementia in a rural community in Kerala, India. *Br J Psychiatry* 1996; 168:745-9.

31. YAMADA M, SASAKI H, MIMORI Y et al. Prevalence and Risks of Dementia in the Japanese Population: RERF'S Adult Health Study Hiroshima Subjects. *J Am Geriatr Soc* 1999; 47:189-95.

32. KOMAHASHI T, OHMORI K, NAKANO T et al. Epidemiological survey of dementia and depression. *Jpn J Psychiatry Neurol* 1994; 48(3):517-26.

33. KIYOHARA Y, YOSHITAKE T, KATO I et al. Changing Patterns in the Prevalence of Dementia in a Japanese Community: The Hisayama Study. *Gerontology* 1994; 40(suppl. 2): 229-35.

34. OGURA C, NAKAMOTO H, UEMA T et al. COSEOUP GROUP. Prevalence of Senile Dementia in Okinawa, Japan. *Int J Epidemiol* 1995; 24(2):373-80.

35. SHIBA M, SHIMOGAITO J, KOSE A et al. Prevalence of Dementia in the Rural Village of Hanazono-mura, Japan. *Neuroepidemiology* 1999; 18:32-6.

36. CHANDRA V, GANGULI M, PANDAV R, JOHNSTON J, BELLE S, DE KOSKY ST. Prevalence of Alzheimer's Disease and other dementias in rural India. The Indo-US study. *Neurology* 1998; 51:1000-8.

37. PARK J, KO HJ, PARK YN, JUNG C. Dementia among the Elderly in a Korean Community. *Br J Psychiatry* 1994; 164:796-801.

38. WOO JI, LEE JH, YOO K, KIM C, KIM Y, SHIN YS. Prevalence Estimation of Dementia in a Rural Area of Korea. *J Am Geriatr Soc* 1998; 46:983-7.

39. LIU C, LIN R, CHEN Y, TAI C, YEN Y, HOWNG S. Prevalence of Dementia in a Urban Area in Taiwan. *J Formos Assoc* 1996; 95(10): 762-8.

40. LIN R, LAI C, TAI C, LIU C, YEN Y, HOWNG S. Prevalence and subtypes of dementia in southern Taiwan: Impact of age, sex, education, and urbanization. *Journal of Neurological Sciences* 1998; 160:67-75.

41. LIU H, LIN K, TENG EL et al. Prevalence and Subtypes of Dementia in Taiwan: A Community Survey of 5297 Individuals. *J Am Geriatr Soc* 1995; 43:144-9.

42. CHIU HFK, LAM LCW, CHI I et al. Prevalence of dementia in chinese elderly in Hong Kong. *Neurology* 1998; 50:1002-9.

43. ASADA T, YAMAGATA Z, KINOSHITA T et al. Prevalence of dementia and distribution of apoE alleles in japanese centenarians: an almost-complete survey in Yamanashi Prefecture, Japan. *J Am Geriatr Soc* 1996; 44:151-6.

44. HENDRIE HC, OSUNTOKUN B, HALL K et al. Prevalence of Alzheimer's Disease and Dementia in two Communities: Nigerian Africans and African Americans. *Am J Psychiatry* 1995; 152:1485-92.

45. BEARD CM, KOKMEN E, O'BRIEN PC, KURLAND LT. The prevalence of dementia is changing over time in Rochester, Minnesota. *Neurology* 1995; 45:75-9.

46. GRAVES AB, LARSON EB, EDLAND SD et al. Prevalence of dementia and its subtypes in the japanese american population of King County, Washington State. The Kame Project. *Am J Epidemiol* 1996; 144(8):760-71.

47. FILLENBAUM GG, HEYMAN A, HUBER MS et al. The Prevalence and 3-Year Incidence of Dementia in Older Black and White Community Residents. *J Clin Epidemiol* 1998; 51(7):587-95.

48. BREITNER JCS, WYSE BW, ANTHONY JC et al. APOE-e4 count predicts age when prevalence of AD increases, then declines. The Cache County Study. *Neurology* 1999; 53:321-31.

49. MCDOWEL I, HILL G, LINDSAY J et al. Canadian Study of Health and Aging: study methods and prevalence of dementia. *Can Med Assoc J* 1994; 150(6):899-913.

50. EBLY EM, PARHAD IM, HOGAN DB, FUNG TS. Prevalence and types of dementia in the very old: Results from the Canadian Study of Health and Aging. *Neurology* 1994; 44:1593-600.

51. POWELL A. Senile Dementia of Extreme Aging: A Common Disorder of Centenarians. *Dementia* 1994; 5:106-9.
52. FARRAG AF, FARWIZ HM, KHEDR EH, MAHFOUZ RM, OMRAN SM. Prevalence of Alzheimer's Disease and Other Dementing Disorders: Assiut-Upper Egypt Study. *Dement Geriatr Cogn Disord* 1998; 9:323-8.
53. OGUNNIYI A, GUREJE O, BAIYEWU O et al. Profile of Dementia in a Nigerian Community - Types, Pattern of Impairment, and Severity Rating. *J Natl Med Assoc* 1997; 89:392-6.
54. HERRERA JR E, CARAMELLI P, NITRINI R. Estudo epidemiológico populacional de demência na cidade de Catanduva - estado de São Paulo – Brasil. *Rev Psiquiatr Clín* 1998; 25(2):70-3.
55. HENDERSON AS, JORM AF, MACKINNON A et al. A survey of dementia in the Canberra population: experience with ICD-10 and DSM-III-R criteria. *Psychol Med* 1994; 24:473-82.
56. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd ed. rev. Washington DC: American Psychiatric Association, 1987.

57. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington DC: American Psychiatric Association, 1994.
58. WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Classification of Diseases, 10th ed. Mental and behavioral disorders. Geneva: World Health Organization, 1987.
59. McKHANN G, DRACHMAN D, FOLSTEIN M, KATZMAN R, PRICE D, STADLAN EM. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: Report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspice of the department of health and human services task force on Alzheimer's disease. *Neurology* 1984; 34:939-44.
60. ROTH M, TYM E, MOUNTJOY CQ et al. CAMDEX A Standardised Instrument for the Diagnosis of Mental Disorders in the Elderly with Special Reference to the Early Detection of Dementia. *Br J Psychiatry* 1986; 149:698-709.
61. HACHINSKI VC, ILIFF LD, ZIHKLA E et al. Cerebral Blood Flow in Dementia. *Arch Neurol* 1975; 32:632-7.
62. HUGHES CP, BERG L, DANZIGER WL. A New Clinical Scale for the Stating of Dementia. *Br J Psychiatry* 1982; 140:566-72.

63. BLESSED G, TOMLINSON B, ROTH M. The Association between Quantitative Measures of Dementia and of Senile Change in the Cerebral Grey Matter of Elderly Subjects. *Br J Psychiatry* 1968; 114:797-811.
64. ROMÁN GC, TATEMACHI TK, ERKINJUNTTI T et al. Vascular Dementia: Diagnostic Criteria for Research Studies Report of the NINDS-AIREN International Workshop. *Neurology* 1993; 43:250-60.
65. MORRIS JC, HEYMAN A, MOHS RC et al. The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease (CERAD). Part I. Clinical and Neuropsychological assessment of Alzheimer's disease. *Neurology* 1989; 39:1159-65.
66. KURLAND LT, MOLGAARD CA. The patient record in epidemiology. *Sci Am* 1981; 245:54-63.
67. COPELAND JRM, DEWEY ME, GRIFFITHS-JONES HM. Computerised Psychiatric diagnostic system and case nomenclature for elderly subjects: GMS and AGE CAT. *Psychol Med* 1986; 16:89-99.
68. FOLSTEIN MF, ANTHONY JC, PARHAD I et al. The meaning of cognitive impairment in the elderly. *Journal American Geriatric Society* 1985; 33:228-35.

69. HEYMAN A, WILKINSON WE, HURWITZ BJ et al. Alzheimer's disease: genetic aspects and associated clinical disorders. *Annals of Neurology* 1983; 14:507-15.
70. KATZMAN R. Education and the prevalence of dementia and Alzheimer's disease. *Neurology*. 1993; 43:13-20.
71. STERN Y, ALBERT S, TANG MX, TSAI WY. Rate of memory decline in AD is related to education and occupation: cognitive reserve? *Neurology* 1999; 53:1942-47.
72. DEL SER T, HACHINSKI V, MERSKEY H, MUNOZ DG. An autopsy-verified study of the effect of education on degenerative dementia. *Brain* 1999; 122(12):2309-19.
73. HENDERSON AS, EASTEAL S, JORM AF et al. Apolipoprotein E allele e4, dementia, and cognitive decline in a population sample. *Lancet* 1995; 346:1387-90.
74. SZEKELY CA, THORNE JE, ZANDI PP et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for the prevention of Alzheimer's disease: a systematic review. *Neuroepidemiology* 2004; 23(4):159-69.

75. CRAEN AJ, GUSSEKLOO J, VRIJSEN B, WESTENDORP RG. Meta-analysis of nonsteroidal antiinflammatory drug use and risk of dementia. *Am J Epidemiol* 2005; 161(2):114-20.
76. HULSE GK, LAUTENSCHLAGER NT, TAIT RJ, ALMEIDA OP. Dementia associated with alcohol and other drug use. *Int Psychogeriatr*. 2005;17 Suppl 1:S109-27.
77. MUKAMAL KJ, LONGSTRETH WT JR, MITTLEMAN MA, CRUM RM, SISCOVICK DS. Alcohol consumption and subclinical findings on magnetic resonance imaging of the brain in older adults: the cardiovascular health study. *Stroke* 2001; 32:1939–46
78. THOMAS VS, ROCKWOOD KJ. Alcohol abuse, cognitive impairment, and mortality among older people. *J Am Geriatr Soc*. 2001 Apr;49(4):415-20.
79. ANTTILA T, HELKALA EL, VIITANEN M ET AL. Alcohol drinking in middle age and subsequent risk of mild cognitive impairment and dementia in old age: a prospective population based study. *BMJ*. 2004 Sep 4;329(7465):539. Epub 2004 Aug 10.

80. den HEIJER T, VERMEER SE, van DIJK EJ et al. Alcohol intake in relation to brain magnetic resonance imaging findings in older persons without dementia. *American Journal of Clinical Nutrition* 2004; 80(4):992-7.

81. CARAMELLI P, CASTRO LH. Dementia associated with epilepsy. *Int Psychogeriatr*. 2005;17 Suppl 1:S195-206.

82. BRETELER MM, DE GROOT RR, VAN ROMUNDE LK, HOFMAN A. Risk of dementia in patients with Parkinson's disease, epilepsy, and severe head trauma: a register-based follow-up study. *Am J Epidemiol*. 1995 Dec 15;142(12):1300-5.

83. MORTEL KF, WOOD S, PAVOL MA, MEYER JS, REXER JL. Analysis of Familial and Individual Risk Factors Among Patients with Ischemic Vascular Dementia and Alzheimer's Disease. *Angiology* 1993; 44:599-605.

84. LANDIN K, BLENNOWK, WALLIN A, GOTTFRIES CG. Low blood pressure and blood glucose levels in Alzheimer's disease. Evidence for a hypometabolic disorder? *J Intern Med* 1993; 233:357-63.

85. TATEMACHI TK, DESMOND DW, PAIK M et al. Clinical determinants of dementia related to stroke. *Ann Neurol* 1993; 33:568-75.

86. SKOOG I, LERNFELT B, LANDAHL S et al. 15-year longitudinal study of blood pressure and dementia. *Lancet* 1996; 347:1141-45.
87. POSNER HB, TANG MX, LUCHSINGER J, LANTIGUA R, STERN Y, MAYEUX R. The relationship of hypertension in the elderly to AD, vascular dementia, and cognitive function. *Neurology*. 2002 Apr 23;58(8):1175-81.
88. HANON O, FORETTE F. Treatment of hypertension and prevention of dementia. *Alzheimer's E Dementia* 2005; 1:30-37.
89. FUJISHIMA M, TSUCHIHASHI T. Hypertension and dementia. *Clin Exp Hypertens*. 1999 Jul-Aug;21(5-6):927-35.
90. van DIJK EJ, BRETELER MM, SCHMIDT R et al. CASCADE Consortium The association between blood pressure, hypertension, and cerebral white matter lesions: cardiovascular determinants of dementia study. *Hypertension*. 2004 Nov;44(5):625-30. Epub 2004 Oct 4.
91. OTT A, STOLK RP, VAN HARSKAMP F, POLS HA, HOFMAN A, BRETELER MM. Diabetes mellitus and the risk of dementia: the Rotterdam Study. *Neurology* 1999; 53:1937-42.

92. ARVANITAKIS Z, WILSON RS, BIENIAS JL, EVANS DA, BENNETT DA. Diabetes Mellitus and Risk of Alzheimer Disease and Decline in Cognitive Function. Arch Neurol 2004; 61:661-6.
93. NOTKOLA IL, SULKAVA R, PEKKANEN J et al. Serum total cholesterol, apolipoprotein E epsilon 4 allele, and Alzheimer's disease. Neuroepidemiology 1998; 17(1):14-20.
94. WOLOZIN B, KELLMAN W, RUOSSEAU P, CELESIA GG, SIEGEL G. Decreased prevalence of Alzheimer disease associated with 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors. Arch Neurol 2000; 57:1439-1443.
95. DUFOUIL C, RICHARD F, FIEVET N et al. APOE genotype, cholesterol level, lipid-lowering treatment, and dementia: the Three-City Study. Neurology 2005 May 10; 64(9):1531-8.
96. TAN ZS, SESHADRI S, BEISER A et al. Plasma total cholesterol level as a risk factor for Alzheimer disease: the Framingham Study. Arch Intern Med 2003 May 12; 163(9):1053-7.
97. LI G, SHOFER JB, KUKULL WA et al. Serum cholesterol and risk of Alzheimer disease: a community-based cohort study. Neurology 2005 Oct 11; 65(7):1045-50.

98. FREARS ER, STEPHENS DJ, WALTERS CE, DAVIES H, AUSTEM BM. The role of cholesterol in the biosynthesis of beta-amyloid. *Neuroreport* 1999; 10:1699-1705.

99. LAURIN D, VERREAULT R, LINDSAY J, MACPHERSON K, ROCKWOOD K Physical activity and risk of cognitive impairment and dementia in elderly persons. *Arch Neurol*. 2001 Mar;58(3):498-504.

100. ROVIO S, KAREHOLT I, HELKALA EL, et al. Leisure-time physical activity at midlife and the risk of dementia and Alzheimer's disease. *Lancet Neurol*. 2005 Nov;4(11):705-11.

101. PODEWILS LJ, GUALLAR E, KULLER LH et al. Physical activity, APOE genotype, and dementia risk: findings from the Cardiovascular Health Cognition Study. *Am J Epidemiol*. 2005 Apr 1;161(7):639-51.

102. MANN A . Epidemiology. In: JACOBY R.; OPPNHEIMER C, ed. *Psychiatry in the Elderly*. Oxford University Press, 1997:63-77.

103. NEWMAN SC, SHROUT PE, BLAND RC. The efficiency of two-phase designs in prevalence surveys of mental disorders. *Psychological Medicine* 1990; 20:183-93.

104. FOLSTEIN MF, FOLSTEIN SE, MCHUGH PR. Mini Mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res* 1975; 12:189-98.
105. TOMBAUGH TN, MCINTYRE NJ. The Mini-mental State Examination: a comprehensive review. *American Geriatrics Society* 1992; 40:922-35.
106. ANTHONY JC, LARESCHE L, NIAZ U et al. Limits of the 'Mini-Mental State' as a screening test for dementia and delirium among hospital patients. *Psychol Med* 1982; 12:397-408.
107. BERKMAN LF. The association between educational attainment and mental status examinations: Of etiologic significance for senile dementias or not? *Journal of Chronic Diseases* 1986; 39:171-4.
108. BERTOLUCCI PHF, BRUCKI SMD, CAMPACCI SR, JULIANO YO. Mini-Exame do Estado Mental em uma população geral. Impacto da escolaridade. *Arquivos de Neuropsiquiatria* 1984; 52(S1):1-7.
109. CRUM RM, ANTHONY JC, BASSET SS, FOLSTEIN MF. Population-based norms for the Mini-Mental State Examination by age and educational level. *JAMA* 1993; 269:2386-91.

110. BRUCKI SMD, NITRINI R, CARAMELLI P, BERTOLUCCI PHF, OKAMOTO IH. Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. *Arq Neuro-Psiquiatr* 2003; 61(3B):777-81.
111. COPELAND JRM, KELLEHER MJ, KELLET JM et al. A semi-structured clinical interview for the assessment of diagnosis and mental state in the elderly: the Geriatric Mental State Schedule: I. Development and reliability. *Psychol Med* 1976; 6:439-49.
112. MCCRAKEN CFM, BONEHAM MA, COPELAND JRM et al. Prevalence of dementia and depression among elderly people in Black and ethnic minorities. *British Journal of Psychiatry* 1997; 171:269-73.
113. COPELAND JRM, DEWEY ME. Neuropsychological diagnosis (GMS-HAS-AGECAT package). *International Psychogeriatrics* 1991; S3: 43-9.
114. BLAIR JR, SPREEN O. Predicting premorbid IQ: a revision of the National Adult Reading Test (NART). *The Clin Neuropsychol* 1989; 3:129-36.
115. NELSON HE. National adult reading test (NART) manual. Windsor: NFER-Nelson, 1982.

116. JORM AF, JACOMB PA .The Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): socio-demographic correlates, reliability, validity and some norms. Psychol Med 1989; 19:1015-22.
117. THOMASSEN R, SCHAICK HW, BLANSJAAR BA . Prevalence of dementia over age 100. American Academy of Neurology 1998; 50:283-6.
118. HINDMARCH I, LEHFELD H, JORGH P, ERZIGKEIT H. The Bayer Activities of Daily Scale (B-ADL). Dementia 1998; 9(2):20-6.
119. FULD PA. Guaranteed stimulus-processing in the evaluation of memory and learning. Cortex 1980; 16:255-72.
120. LEHFELD H, REISBERG GB, FINKEL S et al. Informant-rated activities-of-daily-living (ADL): results of a study of 141 items in the USA, Germany, Russia, and Greece from the International ADL Scale Development Project. Alzheimer Dis Assoc Disord 1997; 11(S4):39-44.
121. LEHFELD H, REISBERG B, ERZIGKEIT H. The ADL-IS: A New ADL Scale Developed for International Usage In Pharmacological Trials. Int Psychogeriatr 1999; 11(S1):23.

122. MAPI Research Institute. Cultural adaptation of the Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL) into Brazilian Portuguese. Report. Lyon-France: Mapi Research Institute; 1999;1-19.

123. LA RUE A. Patterns of Performance on the Fuld Object Memory Evaluation in Elderly Inpatients with Depression or Dementia. *J Clin Exp Neuropsychology* 1989; 11(4):409-22.

124. HEUN R, PAPASSOTIROPOULOS A, JENSSEN F. The Validity of Psychometric Instrument for Detection of Dementia in the Elderly General Population. *Int J Geriatr Psychiatry* 1998; 13:368-80.

125. CID CG, RUMI DO, CAMARGO CHP, BOTTINO CMC. Neuropsychological assessment of memory complainers in São Paulo, Brazil: One-year results of a memory clinic. *Neurobiol Aging* 1998; 19:S10.

126. HOOIJER C, JONKER C, LINDERBOOM J. Cases of Mild Dementia in the Community: Improving Efficacy of Case Findings by Concurrent Use of Pairs of Screening Tests. *Int J Geriatr Psychiatry* 1993; 8:561-4.

127. MACKINNON A, MULLIGAN R. Combining cognitive testing and informant report to increase accuracy in screening for dementia. *American Journal of Psychiatry* 1998; 155:1529-35.
128. HALL KS, GAO S, EMSLEY CL, OGUNNIYI AO, MORGAN O, HENDRIE HC. Community screening interview for dementia (CSID); performance in five disparate study sites. *Int J Geriatr Psychiatry* 2000; 15(6):521-31.
129. BUSTAMANTE SEZ, BOTTINO CMC, LOPES MA et al. Instrumentos combinados na avaliação de demência em idosos. Resultados Preliminares. *Arq Neuropsiquiatr* 2003; 61(3-A):601-6.
130. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3rd ed. Washington DC: American Psychiatric Association, 1980.
131. BOTTINO CMC, CID CG, CAMARGO CHP. Avaliação Neuropsicológica. In.: FORLENZA OV, ALMEIDA OP. ed. Depressão e demência no idoso. Editora Lemos, São Paulo, 1997:121-40.
132. BOTTINO CMC, ALMEIDA OP, TAMAI S, FORLENZA OV, SCALCO MZ, CARVALHO IAM. The Cambridge examination for mental disorders of the elderly. São Paulo: edição brasileira; 1999.

133. VERAS RP, MURPHY E. The ageing of the third world: tackling the problems of community surveys. *Int. J. Geriatr. Psychiatry* 1991; 6:619-27.

134. ANDRADE LHSG, LOLIO CA, GENTIL FILHO V, LAURENTI R. Epidemiologia dos transtornos mentais em uma área definida de captação da cidade de São Paulo, Brasil / Epidemiology of mental disorders in a catchment area in Sao Paulo, Brazil. *Rev Psiquiatr Clín* 1999; 26(5):257-61.

135. HERRERA E JR, CARAMELLI P, SILVEIRA AS, NITRINI R. Epidemiologic survey of dementia in a community-dwelling Brazilian population. *Alzheimer Dis Assoc Disord* 2002; 16(2):103-8.

136. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contagem populacional. IBGE, Brasília, 1996.

137. FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico – famílias e domicílios. IBGE, Brasília, 1991.

138. DEAN AG. Epi-Info 5.1: a word processor, database and statistics program for epidemiology on micro-computers. Georgia: Center for Disease Control; 1990.

139. HOTOTIAN S, LOPES MA, BUSTAMANTE SEZ et al. Identification of dementia suspects subjects in three districts of São Paulo city, Brazil. *Int Psychogeriatr* 2005; 17(S2):271-2.
140. RAMOS LR, GOIHMANN S. Geographical Stratification by Socio-Economic Status: Methodology from a Household Survey with Elderly People in São Paulo, Brazil. *Revista de Saúde Pública* 1989; 23(6):478-92.
141. LAURITSEN J. EpiData Software, version 1.2. Odense, 2000.
142. SPSS. Statistical Package for the Social Sciences, version 10.0 for Windows. Chicago, 1999.
143. LAKS J, BATISTA EM, GUILHERME ER et al. Prevalence of cognitive and functional impairment in community-dwelling elderly: importance of evaluating activities of daily living. *Arq Neuropsiquiatr*. 2005 Jun;63(2A):207-12.
144. SERRA MLA, CONDE JG, ANDINO R, MENDOZA MM. Prevalence of Cognitive and Functional Impairment in an Elderly Puerto Rican Population. *P R Health Sci J*. 1995;14(4):279-83.
145. SHERINA MS, RAMPA L, MUSTAQUIM A. Cognitive impairment among elderly in a rural community in Malaysia. 2004 Jun;59(2):252-7.

146. LEBRÃO ML, DUARTE YAO. SABE - Saúde , Bem-estar e Envelhecimento – O Projeto Sabe no município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2003.
147. LIM HJ, LIM JP, ANTHONY P, YEO DH, SAHADEVAN S. Prevalence of cognitive impairment amongst Singapore's elderly Chinese: a community-based study using the ECAQ and the IQCODE. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2003 Feb;18(2):142-8.
148. JOHNSON CC, RYBICKI BA, BROWN G et al. Cognitive Impairment in the Amish: A Four County Survey. *Int J Epidemiol*. 1997;26(2):387-94.
149. PARK JH, HA JC. Cognitive impairment among the elderly in a Korean rural community. *Acta Psychiatr Scand* 1988;77:52-7.
150. BOTTINO CMC, LOPES MA, MORENO MPQ et al. Prevalence of dementia and MCI in São Paulo, Brazil. *Int Psychogeriatr* 2005; 17(S2):80.
151. ROCKWOOD K. Mixed dementia: Alzheimer's and cerebrovascular disease. *Int Psychogeriatr* 2003; 15(S1):39-46.
152. ROCKWOOD K. Vascular cognitive and vascular dementia. *Journal of the Neurological Sciences* 2002; 203-204:23-7.

153. NAGGA K, RADBERG C, MARCUSSON J. CT brain findings in clinical dementia investigation - underestimation of mixed dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord* 2004; 18(1):59-66. Epub 2004
154. OLICHNEY JM, HANSEN LA, HOFFSTETTER FR, GRUNDMAN M, KATZMAN R, THAL LJ. The apolipoprotein epsilon 4 allele is associated with increased neuritic plaques and CAA in Alzheimer's disease and Lewy body variant. *Neurology* 1996; 47:190-6.
155. CORRADA M, BROOKMEYER R, KAWAS C. Sources of Variability in Prevalence Rates of Alzheimer's Disease. *Int J Epidemiol* 1995; 24:1000-5.
156. HEBERT LE, SCHERR PA, MCCANN JJ et al. Is the Risk of Developing Alzheimer's Disease Greater for Women than for Men? *Am J Epidemiol* 2001; 153:132-6.
157. UNVERZAGT FW, GAO S, BAIYEWU O et al. Prevalence of cognitive impairment: Data from the Indianapolis Study of Health and Aging. *Neurology* 2001;57:1655-62.
158. ZHU L, FRATIGLIONI L, GUO Z et al. Association of stroke with dementia, cognitive impairment, and functional disability in the very old: A population-based study. *Stroke* 1998;29:2094-9.

159. NORTON MC, BREITNER JC, WELSH KA, WYSE BW. Characteristics of nonresponders in a community survey of the elderly. *J Am Geriatr Soc* 1994; 42(12):1252-6.
160. ROWE JW, KAHN RL. Human Aging: Usual and Successful. *Science* 1987; 10 (237): 143-9.