Aos meus pais ***ISRAEL e IRENE***

Pelo despertar da curiosidade científica e por
me ensinarem a ter sempre coragem,
perseverança, otimismo e amor pelo trabalho.

Aos pacientes transplantados de medula óssea,

Doutores na arte da vida

*que incansáveis, tornam o desejo de luta maior que o próprio medo
que sedentos de vida, assumem por ela todos os riscos ,
o risco mesmo de perdê-la.*

*Com vocês estamos sempre aprendendo
que a luta, nem sempre seguida de vitória,
é o que importa e torna preciosa nossa
efêmera existência*

Aos que vitoriosos alcançaram o seu objetivo

Aos que persistentes continuam lutando

*Aos que perderam a batalha mas engrandeceram seu espírito
e deixaram em nossa memória a lembrança de sua coragem*

A **DEUS**,

pela vida,

dom maior

Agradeço a todos que contribuíram direta ou indiretamente na elaboração deste trabalho e de modo especial:

- ❖ Ao Dr. Gil Benard, orientador deste trabalho, pela oportunidade, por partilhar comigo neste período seu conhecimento, sua experiência e seus projetos nesta linha de pesquisa, tornando-se para mim um exemplo de pesquisador pela sua dedicação, criatividade e ética.
- ❖ Ao Dr. Raimundo Azevedo, que generosamente abriu-me as portas da Pós Graduação no Departamento de Patologia (FMUSP), tornando real o sonho deste trabalho. Agradeço sua atenção, presença sincera e amiga em vários momentos e conselhos com retorno quase que imediato às minhas indagações
- ❖ Ao Dr. Alberto José da Silva Duarte, que me acolheu no Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56), para o desafio deste trabalho, mostrando-se sempre atento aos rumos por ele tomados.
- ❖ Ao Dr. Frederico Luiz Dulley (FMUSP) e ao Dr. José Carlos Antonio Barros (Santa Casa-SP), que me acolheram no Programa de Transplante de Medula Óssea, possibilitando a execução deste trabalho e para ele contribuindo com sugestões fundamentais.
- ❖ À Dra. Leila Antonangelo (HC-FMUSP), Dra. Clarisse Martins Machado (IMT-USP) e ao Dr. Niels Olsen Saraiva Câmara (UNIFESP) pelas valiosas sugestões na qualificação deste trabalho, tornando-o mais claro e preciso.
- ❖ A toda equipe do Laboratório de Virologia (IMT-SP), pela amizade e cooperação inigualáveis, em especial, à bióloga Lucy Santos Vilas Boas, que com interesse, disponibilidade e competência, fundamentou o sucesso deste trabalho. A cada um, o meu agradecimento e afeto.

- ❖ A toda equipe médica do Ambulatório de Transplante de Medula Óssea (HC-FMUSP), Dr. Ulisses A. Filho, Dra Maria Cristina A. Macedo, Dr. Roberto L. Silva, Dr. Hélio A. Lotério, Dra Rosaura Saboya e Dra Leila, e da Unidade de aférese e criopreservação (HC-FMUSP), Dra Cíntia, Dr. Alfredo, Dr. Nelson, pelo acolhimento, pela amizade, pela assistência criteriosa na organização das coletas, e pelo esclarecimento de informações clínicas necessárias à elaboração deste trabalho.
- ❖ A toda equipe médica da Unidade de Transplante de Medula Óssea (Santa Casa-SP), Dr. Nelson, Dra Paula na enfermaria, e Dra Ana Cinira na aférese, também pelo auxílio na organização das coletas e esclarecimento de dados clínicos dos pacientes.
- ❖ A toda equipe de enfermagem e de farmácia do Transplante de Medula Óssea (HC-FMUSP), Isamara F. da Rocha, Lélia T.S., Maria F. Moraes, Andréa A. Ferreira, Elizabete M.A., Jaci R. Paraíso, Tina AD Lobo, Edilene N Rigueira, Meluzina Gama, Daniel Sturaro e às estagiárias que por lá passaram, pelo exemplo de atenção despretenciosa e generosa a cada paciente e pela boa vontade em cooperar em meio a toda sobrecarga de trabalho.
- ❖ A toda equipe de enfermagem da Unidade de Transplante de Medula Óssea (Santa Casa-SP), Anair, Karen, Rose, Silvana, também pelo exemplo de atenção despretenciosa a cada paciente e pela paciência e boa vontade em cooperar com a organização das informações e coletas.
- ❖ A toda equipe da Unidade de Criopreservação (HC-FMUSP), Katsue, Luiza, Sueli, e Márcia, pela atenção e paciência na organização das coletas em meio ao extenso trabalho da rotina.

- ❖ A toda equipe médica, médicos residentes e de enfermagem, auxiliares das Enfermarias do Transplante de Medula Óssea (FMUSP e Santa Casa-SP), das Unidades de Aférese e do Centro Cirúrgico, pelo auxílio nas coletas e esclarecimento de dados clínicos dos pacientes.
- ❖ Aos funcionários administrativos do Transplante de Medula Óssea (HC-FMUSP), Patrícia, “Mirandinha”, Rita, Michele, Giseleine, Terezinha, Edmundo, Ricardo, Paulo, Landri, que incansavelmente também me auxiliaram na organização das coletas e na localização dos prontuários.
- ❖ Aos funcionários administrativos do Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56), Olivete, Paulo, Odair, Priscila, Edna, Lucio, Luis, Gustavo, Thomas, Daniel, Celeste, que com paciência me acolheram e se dispuseram a esclarecer dúvidas em informática e relacionadas a organização de documentos imprescindíveis deste trabalho. Agradeço-lhes a atenção.
- ❖ Aos colegas pesquisadores do Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56), Dr. Dewton, Dra Anete, Dra Maria, Dr. Jorge, Analice, pela cordialidade, incentivo, e amizade.
- ❖ A todos amigos do Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56), Funcionários, Pós-Graduandos das diferentes linhas de pesquisa, do Aprimoramento e estagiários, em particular Noemia, Rosângela, Maury, Camila, Soraya, Maurício, Vagner, pela paciência, assistência, amizade e solidariedade. A cada um meu sincero agradecimento e meu afeto.
- ❖ Aos funcionários da Secretaria do Departamento de Patologia, da Pós-Graduação, Liduvina, Vera, do Comitê de Ética e Pesquisa, e da Biblioteca Central da FMUSP em particular, a colega Sônia que conheci cursando uma das disciplinas, pelo auxílio e amizade.

Este trabalho foi realizado com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e desenvolvido no Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56), Instituto de Medicina Tropical, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (FMUSP).

Ao Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ao Departamento de Patologia pelo acolhimento e oportunidade de desenvolver a Tese ampliando fronteiras importantes do conhecimento na área.

Ao Departamento de Dermatologia, mais especificamente ao Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56), pela contribuição científica e metodológica, possibilitando a execução deste trabalho.

Ao Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, ao Programa de Transplante de Medula Óssea do Instituto Central (HC-FMUSP), Fundação Pró-Sangue do Hemocentro de São Paulo, e a Unidade de Transplante de Medula Óssea da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pela cooperação de toda Equipe sem a qual inviabilizaria este trabalho.

E, em especial, ao Prof. **Dr. GIL BENARD** por propor esta linha de pesquisa, aceitar a orientação e partilhar seus conhecimentos, experiências e projetos.

A ciência é apenas o resultado
do querer poético
em salvar da morte
preciosas vidas

Do mudo desespero
provém poderosa fé
que concretiza os sonhos
e questiona
o mistério dos milagres

Patrícia Mendes

FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Ferrari, Valeria

Avaliação da reconstituição imunológica e da resposta anti-citomegalovírus nos receptores de transplante de medula óssea / Valeria Ferrari. -- São Paulo, 2004.

Tese (doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Departamento de Patologia.

Área de concentração: Patologia.

Orientador: Gil Benard.

Descritores: 1.TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA/imunologia
2.IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES 3.INFECCÕES POR
CITOMEGALOVÍRUS/imunologia 4. INFECCÕES POR
CITOMEGALOVÍRUS/virologia 5.IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITO
6.LINFÓCITOS T CD8-POSITIVOS/imunologia 7.SUB-POPULAÇÕES DE
LINFÓCITOS T/imunologia 8.LINFÓCITOS T CITOTÓXICOS/imunologia.

USP/FM/SBD-380/04

Lista de Abreviaturas

Lista de Tabelas

Lista de Figuras

Resumo

Summary

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. INFECÇÃO PELO CITOMEGALOVÍRUS (CMV) E TRANSPLANTE	1
♦ Importância da infecção por CMV no TMO	7
1.2. A DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO AGUDA (DECHA)	9
1.3. A RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA EM RECEPTORES DE TMO	11
♦ Função dos linfócitos T pós-TMO	13
♦ Subpopulações de linfócitos T CD8+ na resposta anti-viral	14
♦ Imunidade específica para CMV em receptores de TMO	31
♦ Transferência da imunidade específica anti-CMV	33
2. OBJETIVOS	37
3. CASUÍSTICA E MÉTODOS	39
3.1. DELINEAMENTO E DESCRIÇÃO DO ESTUDO	39
3.2. CASUÍSTICA	39
♦ Características clínicas dos doadores e pacientes	42
♦ Regimes de condicionamento	42
♦ Seguimento e evolução	45
♦ Profilaxia antiviral	45
♦ Outras profilaxias anti-infecciosas	45
♦ Profilaxia da DECH	46

3.3. DEFINIÇÕES	49
♦ Infecção ativa e doença por CMV	49
♦ Vigilância da infecção pelo CMV	50
3.4. COLETA DO ENXERTO E REINFUSÃO	50
♦ Amostras biológicas	51
3.5. METODOLOGIA	51
♦ Anticorpos monoclonais e análise por citometria de fluxo	52
⇒ Fenótipos da superfície linfocitária	52
⇒ Expressão de granzima B intracelular	75
♦ Contagem das células	79
♦ Imunidade das células T específica para o CMV	79
⇒ Ensaio linfoproliferativo	80
⇒ ELISA para determinação da produção de IFN- γ	81
3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA	82
4. RESULTADOS -----	84
4.1. ANÁLISE FENOTÍPICA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS	84
♦ Infusão de células hematopoéticas no dia do TMO (D0)	85
♦ Expressão de marcadores de ativação das células T no D0	104
♦ Contagem das células hematopoéticas 30 dias pós-TMO (D+30)	107
♦ Contagem das células hematopoéticas 90 dias pós-TMO (D+90)	121
♦ Expressão de granzima B (GB) intracelular	135
♦ Correlação entre o número de células T que expressam granzima B e as subpopulações memória efetora e efetora (ME+E) de linfócitos T CD8+	141
♦ Determinação das subpopulações de linfócitos T CD8+ utilizando outros marcadores de superfície e correlação com o CD28	142
♦ Cinética da reconstituição imunológica após o TMO: I.Comparação entre os grupos..	152
♦ Cinética da reconstituição imunológica após o TMO: II.Comportamento geral	157

4.2. REATIVAÇÃO DO CITOMEGALOVÍRUS - ANTIGENEMIA +	160
♦ Produção de interferon-gama (IFN- γ) em resposta ao CMV	161
♦ Resposta linfoproliferativa ao CMV	166
♦ Casos ilustrativos da reconstituição imunológica específica para o CMV	170
5. DISCUSSÃO -----	173
5.1. O TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E AS INFECÇÕES	173
5.2. SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E IMUNIDADE PROTETORA	175
5.3. SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E TRANSPLANTES	177
5.4. RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA APÓS O TMO	178
6. CONCLUSÕES -----	191
7. ANEXOS -----	193
8. REFERÊNCIAS -----	221

AAS – anemia aplásica grave

Ag – Antígeno

AICD – *activation induced cell death*

AIDS - *acquired immunodeficiency syndrome*

Alo-MO – modalidade de transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea

Alo-SP – modalidade de transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico

APC – *antigen presenting cell*

Auto-SP - modalidade de transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico

Bcl-2 – proteína sintetizada pela célula, reguladora da apoptose (anti-apoptótica)

BEAM – regime de condicionamento com associação de quimioterápicos: BCNU carmustina-CVB, etoposide-VP16, Aracytin-Ara-c, Melfalano- Mel

BSA – albumina sérica bovina

CD – *cluster of differentiation* - grupo de diferenciação de moléculas expressas na superfície celular identificado por imunofenotipagem

CMV - citomegalovírus

Con A – *concanavalin A*

CyA ou CSA – ciclosporina A

Cy – regime de condicionamento com ciclofosfamida

DECH – doença do enxerto contra o hospedeiro

DH – doença de Hodgkin

E - subpopulação efetora de linfócitos T CD8+

EBV – Epstein Barr vírus

EVL - enxerto versus leucemia (GVL – *graft versus leukemia*)

Fas-FasL – proteína sintetizada pela célula, reguladora da apoptose (pró-apoptótica)

Fludarabina-Mel – regime de condicionamento com Fludarabina-melfalano

GB – granzima B

G-CSF – *granulocyte–colony stimulating factor*

GCV – ganciclovir

HIV- *human immunodeficiency virus*

HLA – *human leukocyte antigen*

HPN – hemoglobinúria paroxística noturna

HSC – *hematopoietic stem cell*

IFN – interferon

Ig – imunoglobulina

IL – interleucina

Kbp –*kilobase pairs*

Ki-67 – antígeno expesso relacionado à proliferação celular

LLA- leucemia linfocítica aguda

LMA – leucemia mielóide aguda

LMC – leucemia mielóide crônica

LNH – linfoma não Hodgkin

LT – linfócitos T

mAc – anticorpo monoclonal

MCP - *major capsid protein*

MHC – *major histocompatibility complex*

MiCP - *minor capsid protein*

MM – mieloma múltiplo

MTX - metotrexate

N – subpopulação *naive* de linfócitos T CD8+

NK – *natural killer*

PBMC – *peripheral blood mononuclear cells*

PBS - solução tampão de salina e fosfato

PHA – *phytohemagglutinin*

PDN - prednisona

PPD – *purified protein derivative*

PWM – *pokeweed*

RHR – resposta de hipersensibilidade tardia

SCSP - *stem Cells* células tronco procedentes do sangue periférico

SK-SD – estreptoquinase-estreptodornase

SMD – síndrome mielodisplásica

SMX-TMP – sulfametoxazol-trimetoprin

TBI – *total body irradiation*

TCR – *T cell receptor*

T_{MC} – subpopulação de linfócitos T CD8+ de memória central

T_{ME} - subpopulação de linfócitos T CD8+ de memória efetora

TMO – transplante de medula óssea

TNF – *tumoral necrosis factor*

INTRODUÇÃO -----	18
TABELA 1 - Identificação das subpopulações de linfócitos T CD8+ através de marcadores mais frequentemente utilizados na análise por citometria de fluxo	18
CASUÍSTICA E MÉTODOS -----	40
TABELA 2 - Número de pacientes receptores de transplante de medula óssea acompanhados em diferentes períodos no pós-transplante (D0, D30, D90)	40
TABELA 3 - Características clínicas, modalidade de TMO, doença de base, regime de condicionamento e estado sorológico para CMV no pré-TMO	43
TABELA 4 - Características clínicas dos doadores e receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea	44
TABELA 5 - Estadiamento da DECH aguda	47
TABELA 6 - Gradação clínica da DECH aguda	47
TABELA 7 - Incidência da DECH aguda nas diferentes modalidades de TMO.....	48
RESULTADOS -----	92
TABELA 8 – Descrição das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (CD28)	92
TABELA 9 - Análise comparativa da contagem das células T CD3+ CD8 ^{hi} CD45RA+ CD69+ infundidas em receptores de transplante autólogo antes (AC) e depois (DC) da criopreservação	106
TABELA 10 – Descrição das células no D+30 pós-TMO (protocolo do CD28)	109
TABELA 11 – Descrição das células no D+90 pós-TMO (protocolo do CD28)	123
TABELA 12 - Descrição dos linfócitos T CD3 ⁺ CD8 ⁺ que expressam granzima B nas diferentes modalidades de transplante no D0, D+30 e D+90	137
TABELA 13 – Descrição das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (CD62L).	143
TABELA 14 – Descrição das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (CD11b).	144
TABELA 15 – Descrição das células no D+30 pós-transplante (CD62L)	145
TABELA 16 – Descrição das células no D+30 pós-transplante (CD11b)	146
TABELA 17 – Descrição das células no D+90 pós-transplante (CD62L)	147
TABELA 18 – Descrição das células no D+90 pós-transplante (CD11b)	148

TABELA 19 – Correlação entre os diversos marcadores de moléculas da superfície celular na identificação das subpopulações linfocitárias no D0	149
TABELA 20 – Correlação entre os diversos marcadores de moléculas da superfície celular na identificação das subpopulações linfocitárias no D+30.....	150
TABELA 21 – Correlação entre os diversos marcadores de moléculas da superfície celular na identificação das subpopulações linfocitárias no D+90	151
ANEXOS -----	202
ANEXO E: DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D0 (PERCENTIS 25-75) -----	202
TABELA 8A – Descrição percentual das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (*CD28)	202
TABELA 8B – Contagem das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (*CD28)	203
TABELA 13A – Descrição percentual das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (*CD62L)	204
TABELA 13B – Contagem das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (*CD62L)	205
TABELA 14A – Descrição percentual das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (*CD11b)	206
TABELA 14B – Contagem das células hematopoéticas transferidas no momento da infusão para os receptores de diferentes modalidades de transplante (D0) (*CD11b)	207
ANEXO F: DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 (PERCENTIS 25-75) -----	208
TABELA 10A – Descrição percentual das células no D+30 pós-transplante (CD28)	208
TABELA 10B – Contagem das células no D+30 pós- transplante (CD28)	209
TABELA 15A – Descrição percentual das células no D+30 pós-transplante (CD62L)	210
TABELA 15B– Contagem das células no D+30 pós-transplante (CD62L)	211
TABELA 16A– Descrição percentual das células no D+30 pós-transplante (CD11b)	212
TABELA 16B– Contagem das células no D+30 pós-transplante (CD11b)	213

ANEXO G: DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 (PERCENTIS 25-75) -----	214
TABELA 11A – Descrição percentual das células no D+90 pós-transplante (CD28)	214
TABELA 11B – Contagem das células no D+90 pós- transplante (CD28)	215
TABELA 17A – Descrição percentual das células no D+90 pós-transplante (CD62L)	216
TABELA 17B– Contagem das células no D+90 pós-transplante (CD62L)	217
TABELA 18A– Descrição percentual das células no D+90 pós-transplante (CD11b)	218
TABELA 18B– Contagem das células no D+90 pós-transplante (CD11b)	219

CASUÍSTICA E MÉTODOS -----	54
FIGURA 1 - Resumo das etapas sucessivas da metodologia utilizada na imunofenotipagem dos linfócitos	54
FIGURA 2 - Separação das subpopulações de células por imunofenotipagem. (A) Total de leucócitos (B) Linfócitos T CD3+CD8+ (C) Linfócitos T CD8 ^{hi}	56
FIGURA 3 - Imunofenotipagem de linfócitos do sangue periférico e seleção das subpopulações linfocitárias	58
FIGURA 4 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+CD8+ encontrados no sangue periférico de um indivíduo controle	59
FIGURA 5 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD28+/ CD45RA+ encontrados no sangue periférico de um indivíduo controle	60
FIGURA 6 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD62L+/ CD45RA+ encontrados no sangue periférico de um indivíduo controle	61
FIGURA 7 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD11b+/ CD45RA+ encontrados no sangue periférico de um indivíduo controle	62
FIGURA 8 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+ transferidos para receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP)	63
FIGURA 9 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+ / CD28+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP)	64
FIGURA 10 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD62L+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP)	65
FIGURA 11 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD11b+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP)	66
FIGURA 12 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+ transferidos para receptores de transplante alogênico de medula óssea (Alo-MO)	67
FIGURA 13 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+ / CD28+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante alogênico de medula óssea (Alo-MO)	68
FIGURA 14 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD62L+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante alogênico de medula óssea (Alo-MO)	69

FIGURA 15 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD11b+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante alogênico de medula óssea (Alo-MO)	70
FIGURA 16 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+ transferidos para receptores de transplante autólogo de sangue periférico (Auto-SP)	71
FIGURA 17 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+ / CD28+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante autólogo de sangue periférico (Auto-SP)	72
FIGURA 18 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD62L+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante autólogo de sangue periférico (Auto-SP)	73
FIGURA 19 - Análise fenotípica quantitativa da subpopulação de linfócitos T CD3+/CD8+/ CD11b+ / CD45RA+ transferidos para receptores de transplante autólogo de sangue periférico (Auto-SP)	74
FIGURA 20 - Análise fenotípica quantitativa da expressão de granzima B na subpopulação de linfócitos T CD3+ / CD8 ^{HI} transferidos para receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP).....	75
FIGURA 21 - Análise fenotípica quantitativa da expressão de granzima B na subpopulação de linfócitos T CD3+ / CD8 ^{HI} transferidos para receptores de transplante alogênico de medula óssea (Alo-MO)	76
FIGURA 22 - Análise fenotípica quantitativa da expressão de granzima B na subpopulação de linfócitos T CD3+ / CD8 ^{HI} transferidos para receptores de transplante autólogo de sangue periférico (Auto-SP)	77
RESULTADOS -----	85
FIGURA 23 - Análise fenotípica quantitativa do total de células transferidas para os receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea.....	85
FIGURA 24 - Análise fenotípica quantitativa do total de linfócitos T CD3+ CD8+ CD45RA+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea	87
FIGURA 25 - Análise fenotípica quantitativa das subpopulações de linfócitos T CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea	89
FIGURA 26 - DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO DIA DO TMO (D0) -----	93
GRÁFICO 1. Total de leucócitos transferidos para os receptores de diferentes modalidades de TMO	93
GRÁFICO 2A. Percentual de linfócitos totais transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	93

GRÁFICO 2B. Total de linfócitos transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	93
GRÁFICO 3A. Percentual de linfócitos TCD3+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	94
GRÁFICO 3B. Total de linfócitos TCD3+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	94
GRÁFICO 4A. Percentual de linfócitos TCD3+CD4+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	94
GRÁFICO 4B. Total de linfócitos TCD3+CD4+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	94
GRÁFICO 5A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	95
GRÁFICO 5B. Total de linfócitos TCD3+CD8+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	95
GRÁFICO 6A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8 ^{HI} transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	95
GRÁFICO 6B. Total de linfócitos TCD3+CD8 ^{HI} transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	95
GRÁFICO 7A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ CD45RA+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	96
GRÁFICO 7B. Total de linfócitos TCD3+ CD8+ CD45RA+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	96
GRÁFICO 8. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ CD28+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	96
GRÁFICO 8B. Total de linfócitos TCD3+CD8+ CD28+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	96
GRÁFICO 9A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ CD45RA+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	97
GRÁFICO 9B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	97
GRÁFICO 10A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ CD28+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	97
GRÁFICO 10B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	97
FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE	98
GRÁFICO 11A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) naive transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	98

GRÁFICO 11B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) naive transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO...	98
GRÁFICO 12A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) MC transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO....	98
GRÁFICO 12B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) MC transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO.....	98
GRÁFICO 13A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) ME transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO...	99
GRÁFICO 13B.Total da subpopulação de linfócitos TCD8+(CD28) ME transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	99
GRÁFICO 14A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) efetora transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	99
GRÁFICO 14B.Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) efetora transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	99
GRÁFICO 15A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ transferidos para receptores do transplante alogênico procedente de sangue periférico (Alo-SP)	100
GRÁFICO 15B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ transferidos para receptores do transplante alogênico procedente de sangue periférico (Alo-SP)	100
GRÁFICO 16A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ transferidos para receptores do transplante alogênico procedente de medula óssea (Alo-MO)	100
GRÁFICO 16B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ transferidos para receptores do transplante alogênico procedente de medula óssea (Alo-MO)	100
GRÁFICO 17A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ transferidos para receptores do transplante autólogo procedente de sangue periférico (Auto-SP)	101
GRÁFICO 17B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ transferidos para receptores do transplante autólogo procedente de sangue periférico (Auto-SP)	101
GRÁFICO 18A. Frequência relativa das subpopulações de linfócitos T CD3+ CD8+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de transplante	102
GRÁFICO 18B. Total de subpopulações de linfócitos T CD3+ CD8+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de transplante	102
GRÁFICO 19A. Percentual das subpopulações de linfócitos T CD8+ (CD28) ME+Efetora transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	103
GRÁFICO 19B. Total das subpopulações de linfócitos T CD8+ (CD28) ME+Efetora transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	103
GRÁFICO 20A. Percentual de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	138
GRÁFICO 20B. Total de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	138
GRÁFICO 21A. Percentual de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	138

GRÁFICO 21B. Total de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ transferidos para receptores de diferentes modalidades de TMO	138
FIGURA 27 - Análise fenotípica quantitativa da expressão de CD69 na subpopulação de linfócitos T CD3+ CD8 ^{HI} transferidos para receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea	104
FIGURA 28. Correlação entre as subpopulações de linfócitos TCD8+ memória efetora e efetora e a expressão de CD69 e Granzima B nos receptores de transplante autólogo.....	105
FIGURA 29. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+30 -----	110
GRÁFICO 1. Total de leucócitos em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	110
GRÁFICO 2A. Percentual de linfócitos totais em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	110
GRÁFICO 2B. Total de linfócitos em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	110
GRÁFICO 3A. Percentual de linfócitos TCD3+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	111
GRÁFICO 3B. Total de linfócitos TCD3+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	111
GRÁFICO 4A. Percentual de linfócitos TCD3+CD4+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	111
GRÁFICO 4B. Total de linfócitos TCD3+CD4+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	111
GRÁFICO 5A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	112
GRÁFICO 5B. Total de linfócitos TCD3+CD8+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	112
GRÁFICO 6A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8 ^{HI} em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	112
GRÁFICO 6B. Total de linfócitos TCD3+CD8 ^{HI} em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	112
GRÁFICO 7A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	113
GRÁFICO 7B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	113
GRÁFICO 8A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	113
GRÁFICO 8B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	113

GRÁFICO 9A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	114
GRÁFICO 9B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	114
GRÁFICO 10A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	114
GRÁFICO 10B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	114
FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE -----	115
GRÁFICO 11A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) naive em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	115
GRÁFICO 11B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) naive em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	115
GRÁFICO 12A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) MC em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	115
GRÁFICO 12B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) MC em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	115
GRÁFICO 13A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) ME em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	116
GRÁFICO 13B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) ME em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	116
GRÁFICO 14A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	116
GRÁFICO 14B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	116
GRÁFICO 15A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de sangue periférico no D+30	117
GRÁFICO 15B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de sangue periférico no D+30 ...	117
GRÁFICO 16A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de medula óssea no D+30	117
GRÁFICO 16B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de medula óssea no D+30....	117
GRÁFICO 17A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante autólogo procedente de sangue periférico no D+30 .	118
GRÁFICO 17B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante autólogo procedente de sangue periférico no D+30 .	118
GRÁFICO 18A. Frequência relativa das subpopulações de linfócitos T CD3+CD8+ em receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 .	119

GRÁFICO 18B. Total de subpopulações de linfócitos T CD3+CD8+ em receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30	119
GRÁFICO 19A. Percentual das subpopulações de linfócitos T CD8+(CD28) ME+Efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	120
GRÁFICO 19B. Total das subpopulações de linfócitos T CD8+ (CD28) ME+Efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	120
GRÁFICO 20A. Percentual de linfócitos T CD3+CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	139
GRÁFICO 20B. Total de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30.....	139
GRÁFICO 21A. Percentual de linfócitos T CD3+CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	139
GRÁFICO 21B. Total de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+30	139
FIGURA 30. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+90 -----	124
GRÁFICO 1. Total de leucócitos em receptores de diferentes modalidades de TMO noD+90.....	124
GRÁFICO 2A. Percentual de linfócitos totais em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	124
GRÁFICO 2B. Total de linfócitos em receptores de diferentes modalidades de TMO noD+90	124
GRÁFICO 3A. Percentual de linfócitos TCD3+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	125
GRÁFICO 3B. Total de linfócitos TCD3+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	125
GRÁFICO 4A. Percentual de linfócitos TCD3+CD4+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	125
GRÁFICO 4B.Total de linfócitos TCD3+CD4+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	125
GRÁFICO 5A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	126
GRÁFICO 5B.Total de linfócitos TCD3+CD8+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	126
GRÁFICO 6A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8 ^{HI} em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	126
GRÁFICO 6B. Total de linfócitos TCD3+CD8 ^{HI} em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	126
GRÁFICO 7A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	127

GRÁFICO 7B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	127
GRÁFICO 8A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	127
GRÁFICO 8B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	127
GRÁFICO 9A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	128
GRÁFICO 9B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD45RA+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	128
GRÁFICO 10A. Percentual de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	128
GRÁFICO 10B. Total de linfócitos TCD3+CD8+CD28+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	128
FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE -----	129
GRÁFICO 11A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) naive em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	129
GRÁFICO 11B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) naive em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	129
GRÁFICO 12A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) MC em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	129
GRÁFICO 12B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) MC em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	129
GRÁFICO 13A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) ME em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	130
GRÁFICO 13B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) ME em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	130
GRÁFICO 14A. Percentual da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	130
GRÁFICO 14B. Total da subpopulação de linfócitos T CD8+ (CD28) efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	130
GRÁFICO 15A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de sangue periférico no D+90	131
GRÁFICO 15B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de sangue periférico no D+90	131
GRÁFICO 16A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de medula óssea no D+90	131

GRÁFICO 16B. Total de subpopulações de LT CD3+ CD8+ em receptores de transplante alogênico procedente de medula óssea no D+90	131
GRÁFICO 17A. Percentual das subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante autólogo procedente de sangue periférico no D+90	132
GRÁFICO 17B. Total de subpopulações de LT CD3+CD8+ em receptores de transplante autólogo procedente de sangue periférico no D+90	132
GRÁFICO 18A. Frequência relativa das subpopulações de linfócitos T CD3+ CD8+ em receptores de diferentes modalidades de transplante no D+90	133
GRÁFICO 18B. Total de subpopulações de linfócitos T CD3+ CD8+ em receptores de diferentes modalidades de transplante no D+90	133
GRÁFICO 19A. Percentual das subpopulações de linfócitos T CD8+ (CD28) ME+Efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	134
GRÁFICO 19B. Total das subpopulações de linfócitos T CD8+ (CD28) ME+Efetora em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	134
GRÁFICO 20A. Percentual de linfócitos T CD3+CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	140
GRÁFICO 20B. Total de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	140
GRÁFICO 21A. Percentual de linfócitos T CD3+CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	140
GRÁFICO 21B. Total de linfócitos T CD3+ CD8+ Granzima B+ em receptores de diferentes modalidades de TMO no D+90	140
FIGURA 31. Análise fenotípica quantitativa da expressão de Granzima B nas subpopulações de linfócitos T CD3+ CD8 ^{HI} transferidos nas diferentes modalidades de TMO (D0)	135
FIGURA 32. Correlação entre os números absolutos de células TCD8+ que coexpressam Granzima B e as subpopulações memória efetora e efetora de linfócitos infundidos no D0 (a) (n=44) e presentes no D+30 pós transplante (b) (n=36) nas três diferentes modalidades de transplante (Alo-MO, Alo-SP e Auto-SP)	141
GRÁFICO 22 - Frequência relativa das subpopulações de LT CD3+CD8+ nos receptores de transplante alogênico (SP) em diferentes períodos	154
GRÁFICO 23 - Frequência relativa das subpopulações de LT CD3+CD8+ nos receptores de transplante alogênico (MO) em diferentes períodos	154
GRÁFICO 24 - Frequência relativa das subpopulações de LT CD3+CD8+ nos receptores de transplante autólogo em diferentes períodos	155
GRÁFICO 25 - Frequência relativa das subpopulações ME+E de LT CD3+CD8+ nos receptores de diferentes modalidades de TMO em diferentes períodos	155
GRÁFICO 26 - Frequência relativa das subpopulações de LT CD3+CD8+ Granzima B+ nos receptores das diferentes modalidades de TMO em diferentes períodos	156

GRÁFICO 27 - Frequência relativa das subpopulações de LT CD3+CD8+ nos receptores de diferentes modalidades de TMO em diferentes períodos	156
GRÁFICO 28 – Percentual das subpopulações de linfócitos TCD3+CD8+ nos receptores de diferentes modalidades de TMO em diferentes períodos	158
GRÁFICO 29 – Percentual das subpopulações ME+E de linfócitos TCD3+CD8+ nos receptores de diferentes modalidades de TMO em diferentes períodos	159
GRÁFICO 30 – Percentual das subpopulações de linfócitos TCD3+CD8+ que expressam Granzima B nos receptores de diferentes modalidades de TMO em diferentes períodos	159
FIGURA 33. Determinação da produção de IFN- γ para o antígeno CMV nos sobrenadantes de cultura de células mononucleadas do sangue periférico dos pacientes receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 (a) e D+90 (b) após o transplante.	163
FIGURA 34. Determinação da produção de IFN- γ para o antígeno CMA nos sobrenadantes de cultura de células mononucleadas do sangue periférico dos pacientes receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 (a) e D+90 (b) após o transplante.	164
FIGURA 35. Determinação da produção de IFN- γ em resposta ao PWM nos sobrenadantes de cultura de células mononucleadas do sangue periférico dos pacientes receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 (a) e D+90 (b) após o transplante.	165
FIGURA 36. Determinação das respostas proliferativas ao antígeno CMV das células mononucleadas do sangue periférico dos pacientes receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 (a) e no D+90 (b) após o transplante periférico (respostas positivas IE>3)	167
FIGURA 37. Determinação das respostas proliferativas ao antígeno CMA das células mononucleadas do sangue periférico dos pacientes receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 (a) e no D+90 (b) após o transplante periférico (respostas positivas IE>3)	168
FIGURA 38. Determinação das respostas proliferativas ao mitógeno PWM das células mononucleadas do sangue periférico dos pacientes receptores de diferentes modalidades de transplante no D+30 (a) e no D+90 (b) após o transplante periférico (respostas positivas IE>8)	169

FERRARI, V. *Avaliação da reconstituição imunológica e da resposta anti-citomegalovírus em receptores de transplante de medula óssea*. São Paulo, 2004. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

O citomegalovírus (CMV) é uma séria ameaça aos receptores de transplante de medula óssea. A reativação está associada com uma imunidade mediada por células TCD8+ defeituosa. Nosso objetivo foi correlacionar as diferentes subpopulações de células TCD8+ com a reconstituição imunológica dos pacientes, especificamente a imunidade anti-CMV, analisando as subpopulações de células T infundidas nas diferentes modalidades de transplante de medula óssea. Receptores de transplante alogênico de células tronco mobilizadas para o sangue periférico (n=16) ou coletadas diretamente da medula óssea (n=28) e receptores de transplante autólogo de células tronco mobilizadas para o sangue periférico (n=22) foram avaliados. Verificamos que as transferências de células mobilizadas para o sangue periférico dos doadores, tanto nos transplantes alogênicos como autólogos, são proporcionalmente enriquecidas por subpopulações de células memória efetora e efetora, comparadas às transferências de células procedentes diretamente da medula óssea. Este enriquecimento por subpopulações de células TCD8+ mais diferenciadas foi também correlacionado com maior número de células contendo altos níveis de granzima B, considerado um marcador para linfócitos citotóxicos, sendo também encontrado em maior número nas transferências de células do sangue periférico. Entretanto, no pós-transplante, observou-se que somente os receptores de transplante autólogo de células tronco mobilizadas para o sangue periférico, e não os das outras modalidades de transplante, exibiam números elevados de células T CD8+ de memória-efetora e efetora. Ao mesmo tempo, estes receptores apresentaram menos freqüentemente episódios de reativação pelo CMV, e mais freqüentemente produziram IFN- γ em resposta ao CMV. Portanto, a transferência de células do sangue periférico, desde que em ambiente autólogo, está associada não só com a transferência de células TCD8+ com um fenótipo mais maduro, mas também com uma persistência mais prolongada das mesmas, podendo proporcionar uma resposta imunológica antiviral mais rápida e eficiente, como esperado para as células de memória versus naïve.

Descritores: 1. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA/ imunologia 2. IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES 3. INFECÇÕES POR CITOMEGALOVIRUS/ imunologia 4. INFECÇÕES POR CITOMEGALOVIRUS/ virologia 5. IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITO 6. LINFÓCITOS T CD8-POSITIVOS/ imunologia 7. SUB-POPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T/ imunologia 8. LINFÓCITOS T CITOTÓXICOS/ imunologia

FERRARI, V. *Anti-cytomegalovirus immunity reconstitution following autologous and allogeneic stem cell and bone marrow transplantation as assessed by CD8+ T cell phenotyping and function*. São Paulo, 2004. Doctoral Thesis – Department of Dermatology (LIM-56), University of São Paulo Medical School.

Cytomegalovirus (CMV) is a serious threat to the recipients of bone marrow transplantation. Reactivation is associated with defective CD8+ T cell-mediated immunity. We aimed to correlate the different subsets of CD8+ T cells with the patients' immune reconstitution, specifically anti CMV immunity, by analyzing the CD8+ T cell subsets infused in the different types of bone marrow transplantation. Recipients of allogeneic transplant of peripheral blood stem cells (n=16) or bone marrow (n=28) and recipients of autologous transplant of peripheral blood stem cells (n=22) were evaluated. We show that infusions of stem cells derived from donor's peripheral blood, either allogeneic or autologous, are proportionally enriched for the memory-effector and effector phenotypes, compared to the infusions of stem cells of bone marrow origin. This increased number of more differentiated subsets of CD8+ T cells was also correlated with an increased number of cells containing high levels of granzyme B, which is another reliable marker of cytotoxic lymphocyte, and which was also more evident in autologous recipients. However, post-transplant, we observed that only the recipients of autologous peripheral blood cells, and not the recipients of the other transplant modalities, exhibited very high numbers of memory-effector and effector TCD8+ cells. At the same time, they less frequently presented CMV reactivation, and more frequently produced IFN- γ in response to CMV antigens. Thus, transfer of stem cells from peripheral blood, provided in an autologous setting, is associated with transfer and prolonged survival of CD8+ T cells with a more mature phenotype, which may provide a more rapid and efficient anti-viral immune response, as expected for memory versus naïve cells.

Keywords: 1. BONE MARROW TRANSPLANTATION/ immunology 2. TRANSPLANTATION IMMUNOLOGY 3. CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS/ immunology 4. CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS/ virology 5. LYMPHOCYTE IMMUNOPHENOTYPING/ immunology 6. CD8-POSITIVE T-LYMPHOCYTES/ immunology 7. T-LYMPHOCYTE SUBSETS/ immunology 8. T-LYMPHOCYTES, CYTOTOXIC/ immunology

1.1. INFECÇÃO PELO CITOMEGALOVÍRUS E TRANSPLANTE

As infecções virais constituem uma das complicações mais graves do período pós-transplante. Em receptores de transplante de medula óssea (TMO), a infecção pelo citomegalovírus (CMV) destaca-se em importância pela morbidade e mortalidade significantes, especialmente nos primeiros três meses após o transplante.

O CMV é membro da família *Herpesviridae*, situa-se na sub-família *beta-herpesvirinae* juntamente com o Epstein-Barr vírus (EBV), os herpes simplex vírus tipos 1 e 2, o Vírus da Varicela Zoster e os Herpesvirus 6 e 7 humanos (HHV-6 e 7) e é um DNA-vírus com tamanho que varia de 120 a 200 nm. As principais características desta sub-família são número restrito de células-alvo, transformação da célula infectada numa forma arredondada típica, ciclo reprodutivo longo, latência em tecidos diferentes e replicação lenta em meio de cultura (Mocarski, 1996; Roizman, 1996). Para o CMV, os fibroblastos são as únicas células que admitem grande replicação *in vitro*.

O CMV é o responsável por infecção mundialmente difundida acometendo 60-100% da população. A infecção natural pode ocorrer em várias células do organismo como as células epiteliais, os fibroblastos, macrófagos, células endoteliais e células musculares lisas. Os sítios de latência conhecidos são as células do endotélio vascular, os monócitos e as células precursoras do sistema hematopoiético. A supressão, deficiência ou imaturidade do sistema imunológico, como a ocorre em receptores de TMO, favorece a reativação da replicação viral e sua conseqüente morbi-mortalidade (Dengler et al., 2000).

O CMV é constituído por um genoma que é o maior entre os herpesvírus com 230-240 pares de Kilobase (kbp). Seu DNA de dupla fita é linear durante a infecção ativa e torna-se circular nos períodos de latência. Este DNA já foi totalmente seqüenciado e subdividido em duas regiões, uma longa (UL) e outra curta (US), sendo os seus principais produtos de codificação assim classificados:

1. Proteínas do capsídeo (estrutura que envolve o material genético): Major Capsid Protein (MCP) e Minor Capsid Protein (MiCP). Têm baixa imunogenicidade e pouca contribuição para o diagnóstico.

2. Proteínas do envelope: camada externa do vírus constituída de proteínas virais e lipídeos do hospedeiro. As principais são a gB ou UL 55, mais abundante e a gH, menos abundante. As funções destas proteínas relacionam-se com a penetração do vírus na célula do hospedeiro, a transmissão intercelular do mesmo e a fusão das células infectadas. Têm alto potencial imunogênico e são os alvos principais para os anticorpos neutralizantes.
3. Proteínas do tegumento (matriz): estrutura localizada entre o capsídeo e o envelope, composta principalmente de fosfoproteínas. As mais abundantes são a pp150 e a pp65. A pp65 representa 95% das proteínas do tegumento e tem importância fundamental na regulação de genes envolvidos na replicação viral. Além disso, é alvo de um dos métodos diagnósticos na detecção da infecção ativa pelo CMV, a antigenemia, que detecta esta proteína em neutrófilos do sangue periférico, utilizando anticorpos monoclonais (Mocarski, 1996).

As respostas imunes celular e humoral têm um importante papel no controle das infecções virais crônicas em humanos como as causadas pelo CMV e EBV. No hospedeiro imunocompetente, a resposta imunológica resulta na contenção viral em estágio de latência muito mais que a sua erradicação e as infecções primárias e reativações da infecção pelo CMV são geralmente assintomáticas. Já nos indivíduos imunocomprometidos, como receptores de TMO, terapias imunossupressoras após o transplante levam a uma ampla ablação das respostas imunes incluindo a imunidade mediada por células T aos patógenos virais crônicos podendo levar a reativação do CMV. O CMV permanece como a principal causa de morbidade e mortalidade em receptores de TMO, apesar do recente progresso na detecção precoce (Broers et al., 2000) e tratamento da infecção ativa (Schmidt et al., 1991; Einsele et al., 1995; Boeckh et al., 1996). O principal responsável por isto neste período é a deficiência da imunidade celular e mais especificamente da imunidade citotóxica nestes pacientes (Reusser et al., 1991 e 1997; Li et al., 1994). Em decorrência desta deficiência imunitária, o CMV passa de um agente benigno para um vírus causador de danos teciduais intensos e potencialmente fatais, especialmente nos receptores de TMO alogênico, decorrentes de sua ação direta e de desarranjos imunológicos a ele relacionados (Aubert et al., 2001; Mendes, 2001; Mendes et al., 2002).

Portanto, apesar da introdução de medidas de vigilância mais exequíveis e sensíveis como a detecção de antígenos do CMV (antigenemia), e a pesquisa do DNA viral pela PCR e outras técnicas moleculares que favoreceram o diagnóstico e a terapêutica precoces, além de outras medidas profiláticas terem sido aventadas na última década, desde a utilização mais segura de hemoderivados até a instituição indiscriminada de profilaxia primária com ganciclovir, que levaram a uma redução da morbi-mortalidade por este agente, este vírus continua ocupando o primeiro lugar entre os agentes infecciosos virais que acometem os transplantados de medula óssea (Ljungman, 1996; Machado, 1996; Reusser et al., 1997; Gor et al., 1998).

Tem-se demonstrado que a ausência de imunidade CMV específica três meses após o transplante está significativamente associada com a sua reativação tardia (após 100 dias) e aumento da mortalidade principalmente por pneumonite viral (Boeckh et al., 1996 e 2003). Neste período, a maioria dos pacientes está recuperando suficientes contagens linfocitárias, permitindo análise significativa desta recuperação imunológica funcional (Hakki et al., 2003). Embora pacientes submetidos a TMO alogênico tem um risco aumentado de morbidade (Boeckh et al., 1996; Goodrich et al., 1991; Reusser et al., 1991; Ljungman, 1996; Reusser et al., 1997; Gor et al., 1998), a taxa de mortalidade é similar em receptores alogênicos e autólogos (Bilgrami et al., 1999).

Os mecanismos de doença, envolvidos na infecção pelo citomegalovírus, podem ser didaticamente classificados em um efeito citopático direto do vírus e em uma citotoxicidade indireta decorrente da resposta imune exacerbada (Bruggeman et al., 1995). Na citotoxicidade direta, o dano celular é causado pelo CMV, sendo especialmente observado em imunodeficientes ou em recém-nascidos infectados congenitamente e de forma mais importante na infecção primária.

A resposta citotóxica imunologicamente mediada tem um papel bem estabelecido em certas manifestações da doença causada pelo CMV como a hepatite, miocardite, pneumonia intersticial e arteriosclerose. Os fatores envolvidos neste mecanismo relacionam-se com a intensidade da resposta inflamatória desencadeada contra o CMV e podem ser decorrentes do efeito de citocinas, como o fator de

necrose tumoral-alfa (TNF- α) e o interferon-gama (IFN- γ) ou da ação de células T, especialmente linfócitos T CD8+.

Além disso, tem sido descrito um fenômeno auto-imune envolvendo o CMV na medida em que este vírus produz uma proteína semelhante a uma aminopeptidase produzida pelas células do hospedeiro e presente na superfície celular conhecida como CD13. A infecção pelo CMV induz, então, a produção de anticorpos anti-CD13, desencadeando um fenômeno auto-imune e contribuindo para o dano tecidual e, possivelmente, para a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) (Duncombe et al., 1990; Bruggeman et al., 1995; Giugni et al., 1996; Scholz et al., 1996; Söderberg et al., 1996).

Na pneumonite intersticial por CMV, observada em transplantados de medula óssea, há uma ativação celular policlonal, inclusive de linfócitos T CD4+ que promovem a ativação de linfócitos T citotóxicos (CD8+) aloespecíficos, favorecendo a DECH, com possível participação de citocinas como a Interleucina 2 (IL-2) (Bruggeman et al., 1995).

Desta forma, o CMV pode, por um lado, favorecer a ocorrência de DECH pela ativação acentuada de células T citotóxicas e, por outro, causar dano tecidual importante e até levar a rejeição do enxerto nos transplantes de órgãos sólidos.

A citotoxicidade dos linfócitos T CD8+ tem uma importante função em interromper o progresso da replicação do CMV proporcionando imunidade protetora (Quinnan et al., 1982; Bruggeman et al., 1995). Entretanto, a eficácia deste mecanismo é também dependente de interações CD4+/CD8+, com a participação da Interleucina-2 (IL-2) e do Interferon-gama (IFN- γ), ambos aumentando a atividade citotóxica das células T CD8+ (Duncombe et al., 1990; Grundy et al., 1993; Grundy e Downes, 1993; Humar et al., 1999). A função precisa da célula T na susceptibilidade e resistência as infecções pós-transplante pode ser difícil de ser estabelecida devido à presença de outros fatores como a DECH e drogas utilizadas na sua profilaxia e tratamento, as portas de entrada criadas pelo condicionamento ou por complicações a ele relacionadas difíceis de ser precisamente monitoradas (Morecki

et al., 2001). Porém, qualquer atraso na recuperação qualitativa ou quantitativa destas populações de células pode levar a um maior risco de infecção e doença pelo CMV.

Os fatores solúveis primeiramente descritos na infecção pelo CMV foram TNF- α e IFN- γ . Altos índices de TNF- α foram detectados em órgãos infectados pelo CMV e podem explicar alguns fenômenos como plaquetopenia, hepatite, coagulação intravascular disseminada e pneumonite. Em estudos experimentais, estes altos níveis foram observados predominantemente seis a sete dias após a infecção. O IFN- γ , por sua vez, acarreta o aumento de expressão das moléculas do *Major Histocompatibility Complex (MHC)* ou complexo de histocompatibilidade principal, classe 1 e 2 (MHC-I e MHC-II), nas células apresentadoras de antígeno, o aumento da ação citotóxica dos linfócitos e da destruição de antígenos intracelulares no interior dos macrófagos (Duncombe et al., 1990; Grundy et al., 1993; Grundy e Downes, 1993; Humar et al., 1999).

A interleucina-1 (IL-1), especialmente a IL-1 β , citocina produzida por monócitos infectados, é capaz de induzir aumento na expressão de moléculas de adesão e tem sua produção aumentada. (Moses e Garnett, 1990; Scholz et al., 1996; Dengler et al., 2000). A Interleucina-8 (IL-8), uma quimocina (citocina envolvida nos processos quimiotáticos) do grupo das α -quimocinas, também produzida por células infectadas, tem papel importante na quimiotaxia de neutrófilos para o sítio de infecção, fenômeno que pode estar envolvido no balanço entre os benefícios e malefícios da resposta imune desencadeada pelo CMV (Murayama et al., 1994; Craigen et al., 1997; Humar et al., 1999). Por fim, a Interleucina-6 (IL-6), igualmente pró-inflamatória, tem sua produção e excreção aumentadas pelo CMV por um mecanismo independente do TNF- α (Scholz et al., 1996; Carlquist et al., 1999).

Além da indução de produção e excreção de citocinas, o CMV induz a expressão de receptores de superfície celular como o MHC-I, o MHC-II e de moléculas de adesão. Nos transplantados de órgãos sólidos, o MHC-II expresso em abundância no endotélio vascular do órgão transplantado (alvo preferencial do CMV), favorece o fenômeno de rejeição do enxerto, já que é diverso do MHC-II do receptor. As células deste órgão são, então, reconhecidas como “não próprias” e

destruídas pelos linfócitos T CD8+, também ativados de forma indiscriminada pelo CMV (Grundy et al., 1988; Waldman et al., 1993; Humar et al., 1999).

As moléculas de adesão, essenciais para os fenômenos de co-ativação celular e de transmigração endotelial dos leucócitos rumo ao sítio de infecção, podem ter sua expressão aumentada, mesmo em células não infectadas pelo CMV, por meio de uma ação parácrina da IL-1 β (Dengler et al., 2000). Várias destas moléculas de adesão já foram descritas na patogênese da infecção pelo CMV, dentre elas destacam-se o CD2, ICAM-1 (CD54), LFA-3 (CD58), VCAM-1(CD106), CD29 (β -1 Integrina), LFA-1/Mac-1 (β -2 Integrina) e CD44 (Grundy et al., 1993; Grundy e Downes, 1993; Koskinen, 1993; Sedmak et al., 1994; Ito et al., 1995a; Ito et al., 1995b; Craigen et al., 1996; Dengler et al., 2000).

Finalmente, o CMV é capaz de induzir uma ativação policlonal de linfócitos B, independente das células T e que pode levar à produção de auto-anticorpos e induzir gamopatias monoclonais (Hebart et al., 1996).

Quanto às células envolvidas na resposta específica contra o CMV, têm sido descritas subpopulações de linfócitos T CD8+ com oligoclonalidade marcante, baixo potencial citotóxico e características fenotípicas de células de memória que parecem relacionar-se com a modulação da resposta imune exacerbada observada em pacientes imunocomprometidos infectados pelo CMV (Labalette et al., 1994; Wang e Borysiewicz, 1995; Wang et al., 1995; Hazzan et al., 1997; Hooper et al., 1999). A identificação quantitativa e qualitativa, fenotípica e funcional das subpopulações de células TCD8+ no processo de reconstituição imunológica nos receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea, soropositivos para CMV, é o objetivo principal do nosso trabalho.

Estudos avaliando não apenas a resposta citotóxica específica anti-CMV *in vitro* mas também a resposta linfoproliferativa ao antígeno CMV têm sido realizados em receptores de TMO alogênico e autólogo (Reusser et al., 1991; Reusser et al., 1997; Li et al., 1994; Ljungmann et al., 1986 e 1993; Krause et al., 1997). Entretanto, poucos trabalhos têm prospectiva e comparativamente analisado estes eventos em receptores de TMO alogênico e autólogo ou temporariamente correlacionado *in vitro*

a reconstituição das subpopulações CD4⁺ e CD8⁺ e ocorrência da infecção ativa pelo CMV (Mendes, 2001). Além disso, a produção de IFN- γ induzida pelo antígeno CMV como marcador da resposta de células T específicas tem sido investigada somente em receptores de TMO alogênico, mas não em autólogos (Bowden et al., 1990).

“ Importância da Infecção pelo Citomegalovírus no TMO

A maior parte dos dados referentes à infecção e doença pelo CMV em transplantados de medula óssea diz respeito ao transplante alogênico. Na população de receptores de transplante autólogo, a sua importância é significativa, porém menor. Estima-se que entre os receptores de TMO alogênico previamente soropositivos, 47% podem apresentar infecção ativa até o 100^o dia, detectada pelo isolamento do CMV em cultura de fibroblastos ou detecção de antígeno em cultura usando anticorpos monoclonais. Utilizando-se técnicas mais sensíveis como a detecção de peptídeo pp-65 em neutrófilos do sangue periférico (antigenemia) este valor alcança 79%. Entre pacientes soronegativos com doadores soropositivos, aproximadamente 44% podem apresentar infecção ativa (Goodrich et al., 1991; Boeckh et al., 1996; Machado et al., 2000 e 2001). Embora existam variações nos dados encontrados, em decorrência dos diferentes métodos laboratoriais utilizados, é consensual a importância do CMV (Meyers, 1989; Meyers et al., 1986 e 1990).

A importância do CMV em transplantados de medula óssea não se detém na morbidade e mortalidade diretamente relacionadas a este agente. A este fato, soma-se a consensual correlação estreita entre CMV e a DECH (Meyers et al., 1986; Ljungman, 1996; Gor et al., 1998) na medida em que se observa nestes pacientes que linfócitos TCD4⁺ e CD8⁺ do doador atuam simultaneamente contra o CMV e contra os tecidos do receptor. No entanto, não está claro se a imunossupressão decorrente da DECH é que predispõe à infecção pelo CMV, ou, se este vírus é que favorece a DECH por induzir alterações diversas da imunidade celular, tais como inversão da relação de linfócitos TCD4⁺/CD8⁺, alteração da ativação das células T CD8⁺ e natural killer e conseqüentemente na produção e secreção de citocinas pró-inflamatórias e aumento na expressão de marcadores de superfície, nortando assim a maior exposição das células apresentadoras de antígenos (APCs) aos linfócitos

citotóxicos, colaborando para o fenômeno de reconhecimento de antígenos “não próprios” e desta forma, favorecendo a DECH (Miller et al., 1986; Grundy et al., 1988; Waldman et al., 1993; Ljungman, 1996; Humar et al., 1999).

Além disso, há relatos de que os antígenos virais apresentados por APCs do paciente funcionam como antígenos menores (miHAgS) na indução de DECH, explicando ainda mais a forte interação entre os dois eventos (Burt et al., 1996).

Provavelmente DECH e CMV se correlacionam de forma bidirecional, de modo que a prevenção de um reduz o risco do outro e a ocorrência de um favorece a ocorrência de outro. E, como a DECH geralmente precede a infecção pelo CMV, é provável que a imunossupressão induzida por ela seja mais importante nesta relação do que a terapêutica utilizada no seu controle (Miller et al., 1986). Em resumo, DECH e infecção pelo CMV são fortemente imbricadas quanto a imunopatogênese, explicando sua estreita relação temporal.

Recentemente, diversas hipóteses têm sido levantadas, sugerindo que o desarranjo imunológico causado pela DECH com grande ativação de linfócitos T CD8+ por si só favorece a infecção pelo CMV por causar um mecanismo de “desvio” destas células para o fenômeno de alo-reatividade e a isso se soma o incremento da imunodepressão com ação direta no funcionamento da defesa inata e adaptativa. Também têm sido descritas semelhanças fenotípicas em subpopulações específicas de linfócitos T CD8+ envolvidos nestes dois processos. Na DECH aguda, descreveu-se um aumento de linfócitos T CD8+/CD28-, sendo esta subpopulação responsável pelo incremento de CD8+ observada neste fenômeno (Garin et al., 1995; Lee et al., 1997). Por outro lado, inúmeros trabalhos têm também observado aumento acentuado de linfócitos T CD8+/CD28- na infecção pelo CMV especialmente em imunocomprometidos (Labalette et al., 1994; Wang e Borysiewicz, 1995; Wang et al., 1995; Hazzan et al., 1997; Hooper et al., 1999). É possível que um mesmo mecanismo, nortado por grande estímulo antigênico, explique o aumento destas subpopulações linfocitárias nos dois eventos (Gorochov et al., 1994; Morley et al., 1995; Kubo et al., 1996; Khan et al., 2002a), que têm em comum a perda da expressão de CD28.

1.2. A DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO AGUDA

Além das infecções, outra importante e grave complicação do período pós-transplante no grupo alogênico é a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) que segundo os critérios de Billingham, ocorre por infusão de células imunocompetentes (linfócitos T) do doador, pela impossibilidade do hospedeiro de rejeitar as células infundidas (receptor imunoincompetente) e também pela disparidade antigênica entre o hospedeiro e o doador (células T aloreativas do doador reconhecem antígenos de histocompatibilidade menor e/ou maior do hospedeiro) (Korngold e Sprent, 1987). A DECH pode ser classificada clinicamente em aguda e crônica. A aguda pode comprometer a pele, fígado, trato gastro intestinal (TGI) e órgãos linfóides, podendo ser graduada de 0 a IV, dependendo do local, extensão e intensidade do comprometimento clínico (estadiamento). A crônica assemelha-se a doença autoimune e pode ser limitada, acometendo um único órgão ou extensa, acometendo maior extensão de um único órgão ou múltiplos órgãos.

Dentro da reconstituição imunológica, é importante se considerar ainda que a DECH aguda após TMO histocompatível tem pouco efeito no tempo da reconstituição linfóide, como é mensurada pela contagem absoluta de linfócitos ou número absoluto de linfócitos TCD3+. Depressão transitória da contagem absoluta de linfócitos e células CD3+ ocorre após a administração de imunossuppressores anti linfócitos T especialmente globulina anti-timócitos e anticorpos monoclonais anti linfócitos T (anti-CD3). As anormalidades aparentes devido a DECH são vistas na fase crônica desta doença com diminuição da capacidade de desenvolver resposta de linfócitos T antígeno-específica e produzir anticorpos específicos particularmente para antígenos polissacarídeos, enquanto tem-se um aumento da incidência de autoanticorpos (Burt et al., 1996). A análise *in vitro* da base celular da imunodeficiência presente nos pacientes com DECH crônica tem mostrado uma variedade de defeitos celulares. Uma diminuição no número e função dos linfócitos TCD4+ têm sido descritos (Bengtsson et al., 1989; Storek et al., 1995 e 1997; Ottinger et al., 1996; Talmadge et al., 1997; Mackall et al., 2000) além da presença de linfócitos TCD4+ e CD8+ ativados expressando HLA-DR (Raaphorst, 1999; Milosevits et al., 1995). Defeitos na função dos linfócitos B que resultam em resposta anormal à estimulação por linfócitos T têm sido identificados (Witherspoon

et al., 1986; Forman et al., 1993; Storek et al., 1995; Milosevits et al., 1995). Porém, nenhum defeito isolado pode explicar a imunodeficiência associada a DECH crônica (Paloczi, 2000).

Um maior risco de DECH crônica tem sido relatado após o transplante Alogênico originado da coleta de sangue periférico (Alo-SP). Diversos episódios de hemólise aguda, resultantes de anticorpos anti-A e anti-B do doador direcionados contra antígenos presentes nas células vermelhas do sangue do receptor (incompatibilidade ABO menor) têm sido descritos após esta modalidade de transplante. Os receptores de Alo-SP exibem significativo aumento dos títulos de anticorpos anti-A e/ou anti-B após o transplante, particularmente na condição de incompatibilidade ABO menor. Além disso, a frequência de anticorpos anti-HLA precoces após Alo-SP é significativamente maior (apesar da redução dos requerimentos de transfusão de plaquetas). Números elevados de células B ativadas e/ou células T CD4⁺ e monócitos no transplante Alo-SP e/ou destas células circulantes associam-se à produção favorecida de Alo-anticorpos. O padrão de citocinas TH2 de células T presentes no transplante, induzidas pelo G-CSF pode também contribuir. Recentes estudos têm determinado que os receptores de transplante Alo-SP têm um elevado número de células dendríticas do tipo 2, associadas com altas frequências de células T CD4⁺ TH2. Uma vez que a DECH crônica está associada com a ocorrência parecida de síndromes auto-imunes mediadas por anticorpos, especula-se que sua maior incidência no Alo-SP pode resultar destes achados (Robinet et al., 2003). Portanto, não apenas a quantidade, mas também a qualidade das células T e outras células do sistema imunológico dos doadores presentes no enxerto podem ser parâmetros cruciais na determinação da aloreatividade pós-transplante (Tayebi et al., 2001).

1.3. A RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA EM RECEPTORES DE TMO

Para compreender melhor a causa e expressão clínico-laboratorial da infecção pelo citomegalovírus em receptores de transplante de medula óssea, faz-se necessário relembrar os processos de ablação e reconstituição imunitária que ocorrem nestes pacientes.

A quimioterapia e radioterapia utilizadas no condicionamento dos receptores de transplante visam destruir elementos imuno-hematopoéticos anormais, mas acabam levando a uma inevitável ablação também dos elementos normais e a uma imunossupressão grave e prolongada. Tal imunossupressão pode ainda complicar-se na fase pós-transplante com uma série de discordâncias imunológicas que geram DECH aguda ou crônica cuja prevenção e tratamento exigem uma ampla utilização de drogas imunossupressoras. A ocorrência de DECH e seu tratamento são fundamentais na rapidez e no grau de recuperação imunológica destes pacientes (Keever et al., 1989). Visando a redução na incidência e gravidade da DECH, tem sido proposto um procedimento de depleção seletiva ou não seletiva de células T, com eficácia satisfatória, mas com consequências desastrosas no âmbito das infecções (Keever et al., 1989; Archimbaud, 1997; Podlech et al., 1998) e também de recaída da doença de base, devido à perda do efeito enxerto-versus-leucemia (EVL) (Horowitz et al., 1990; Kolb e Holler, 1997; Kolb et al., 1995). A separação dos efeitos desastrosos e benéficos das células T dos doadores presentes no enxerto permanece como um dos principais objetivos do transplante alogênico (Tayebi et al., 2001).

Todos estes fatores considerando o aumento da realização de transplantes alogênicos, incluindo os não aparentados, têm aumentado a probabilidade do acometimento dos receptores por agentes infecciosos diversos, dentre os quais o CMV ocupa papel de grande relevância (Goodrich et al., 1991; Hunter et al., 1995). As infecções são as principais causas de morbi-mortalidade, especialmente nos seis primeiros meses após o TMO (De Vries et al., 2000). A prevenção só se faz possível com o uso de antibióticos, antivirais e antifúngicos ou de medidas de vigilância severas e ainda assim, com eficácia parcial.

O acompanhamento da reconstituição da imunidade celular e humoral é importante na medida em que implica na instituição de métodos preventivos determinando o momento ideal de iniciá-los e o tempo que devem ser mantidos.

A reconstituição imunológica após TMO tem sido alvo de muitos estudos em décadas anteriores (Zintl et al., 1989; De Vries et al., 2000). Tais estudos analisaram periodicamente os pacientes transplantados (transplante alogênico ou autólogo), quanto aspectos fundamentais da resposta imune, visando delinear o processo de recuperação imunológica na sequência em que este ocorre. Para atingir este objetivo, os principais parâmetros avaliados pelos autores foram: contagem total de linfócitos T e B, subpopulações de linfócitos (TCD3+, TCD4+, TCD8+), relação dos linfócitos TCD4+/CD8+, atividade de células natural killer (NK), resposta linfocítica blastogênica, dosagem sérica de IgA, IgM, IgG e reatividade cutânea a antígenos definidos. Também foi observado que a recuperação da imunidade inata, constituída principalmente por fagócitos, é rápida e ocorre nas primeiras semanas após o TMO (De Vries et al., 2000). Ainda no estudo clássico de Zintl et al., 1989 as principais conclusões foram:

- a) Uma intensa imunodepressão ocorre nos primeiros 3-6 meses pós-transplante e a maioria dos pacientes sobrevive às infecções graças à quimioprofilaxia ampla neste período;
- b) A contagem total de linfócitos cai profundamente após o TMO retornando aos níveis normais após seis meses em média. O mesmo ocorre na população de linfócitos B, quando analisada separadamente;
- c) A subpopulação TCD4 + cai significativamente durante os primeiros 180 dias. Processo inverso acomete os linfócitos T CD8+, que não mudam seus níveis nos primeiros seis meses e aumentam após este período atingindo valores acima do normal. Isto faz com que a relação CD4+/CD8+ atinja inicialmente baixas cifras (0,4-0,2) e permaneça em torno de 0,8 até 48 meses após o transplante. É possível que a lenta recuperação dos linfócitos TCD4+ em adultos se deva à diminuição das funções do timo com a idade. Esta hipótese é compatível com a observação de que linfócitos TCD4+/CD45RO+

(células de memória) têm frequência alta após TMO por serem originadas do enxerto transplantado e não do timo, de onde seria originada a população de CD4⁺/CD45RA⁺, chamada de "naive" (De Vries et al., 2000);

- d) A atividade das células NK encontra-se aumentada inicialmente e, em geral, seu decréscimo está relacionado à evolução da DECH;
- e) Quanto aos níveis séricos de imunoglobulinas, a sequência de recuperação dá-se de IgM para IgA, passando pela IgG, em períodos de 3, 6 e 18 meses respectivamente;
- f) A resposta linfocítica blastogênica para antígenos ou mitógenos clássicos como a phytohemagglutinin (PHA), concanavalin A (ConA) e pokeweed (PWM) encontra-se comprometida até 6-12 meses após TMO;
- g) Na avaliação da resposta imunológica de hipersensibilidade tardia (RHR) observou-se que resposta cutânea a antígenos como PPD (purified protein derivative), antígeno estreptocócico (SK-SD), candidina, caxumba ou vírus mortos não se encontra positiva antes do primeiro ano pós-transplante.

“ Função dos Linfócitos T Pós-TMO

Corroborando com os estudos já mencionados sobre reconstituição imunológica, Keever et al., 1989 observaram que em receptores de TMO alogênico, a primeira função *in vitro* detectável de 2 a 6 meses após o transplante, na presença de IL-2 exógena, é a proliferação ao estímulo policlonal (phytohemagglutinin -PHA e anticorpo anti CD3). Antes disso, a capacidade proliferativa dos linfócitos pode estar atrasada indicando defeito na produção de IL-2 secundário a uma diminuição dos linfócitos TCD4⁺ (Welte et al.,1984). Portanto, a reativação dos linfócitos T diante de estímulo antigênico pode ser usada para se avaliar a reconstituição da imunidade celular pós-transplante. A aquisição temporal *in vitro* desta resposta é paralela ao aparecimento sequencial das infecções clínicas.

Ainda, segundo Meyers et al., 1980abc, a resposta linfocítica proliferativa *in vitro* a um estímulo antigênico específico (HSV, VZV, CMV) pode já ser detectada no segundo mês pós-transplante. De fato, são diversos fatores que podem contribuir

para uma maior ou menor velocidade de recuperação da resposta imunológica neste grupo de pacientes, que merecem discussão: a administração profilática de antivirais como aciclovir pode atrasar o aparecimento da reatividade aos antígenos citados (Ljungman et al., 1986) e uma diminuição no número de linfócitos T produtores de IL-2 resulta em inabilidade de detectar *in vitro* esta resposta. Neste último aspecto, tem sido observado que linfócitos T dependentes de IL-2 surgem mais precocemente do que aqueles produtores desta citocina e que proteção clínica parece se correlacionar muito mais com o aparecimento de linfócitos T produtores da mesma (Reusser et al., 1991).

A presença de proliferação normal *in vitro* ao estímulo antigênico específico (CMV) não significa uma função imunológica normal. Defeitos tanto na produção de IFN- γ , como na produção de linfócitos T citotóxicos têm sido demonstrados em receptores de transplante que tem uma resposta proliferativa normal ao CMV (Quinnan et al., 1982; Levin et al., 1997). Paralelamente, receptores com resposta linfoproliferativa normal ao herpes virus *in vitro* podem desenvolver infecções ameaçadoras à vida secundárias a defeitos na produção de citocinas ou capacidade citolítica. Estes defeitos são acentuados nos receptores com DECH crônica (Noel et al., 1978; Lum et al., 1981). Ainda, apesar de estimulação crônica por infecção recorrente pelo CMV, alguns destes pacientes não desenvolvem respostas linfocitárias antígeno-específicas mesmo na presença de IL-2 talvez por uma diminuição na capacidade de produzir linfócitos T *naïve*. Tem-se observado que a resposta dos linfócitos T *in vitro* à antígenos de vacinas é detectável apenas se estes pacientes forem reimunizados (Shiobara et al., 1985; Ljungman et al., 1989).

“ Subpopulações de Linfócitos T CD8+ na Resposta Anti-Viral

Nas infecções causadas por vírus e outros patógenos intracelulares, tem-se observado que as respostas imunológicas são predominantemente celulares e freqüentemente caracterizadas por uma intensa ativação e expansão das subpopulações de memória e efectoras dos linfócitos T CD8+, importantes na erradicação destes agentes através de sua habilidade em produzir vários fatores envolvidos na supressão da replicação dos mesmos (Ahmed e Gray, 1996; Pantaleo

et al., 1994; Borrow et al., 1997; Li et al., 1994; Reusser et al., 1997; Murali-Krishna et al., 1998; Butz e Bevan, 1998; Callan et al., 1998; Podlech et al., 1998; Blattman et al., 2000).

Os estudos sobre a caracterização das diferentes subpopulações de linfócitos T CD8⁺ humanos, particularmente as de memória são importantes para o desenvolvimento e identificação de vacinas que possam efetivamente induzir a diferenciação, ativação e persistência desta subpopulação de forma a prevenir infecções por diferentes patógenos, incluindo vírus, bactérias e parasitas. Entretanto, apesar da importância clínica, a diferenciação e caracterização destas subpopulações ainda não estão suficientemente claras tanto em humanos quanto nos estudos experimentais em camundongos (Hamann et al., 1997; Tomiyama et al., 2002).

São as alterações nos marcadores de superfície, denominadas alterações fenotípicas e a habilidade das células T de memória responderem rapidamente nas re-exposições aos antígenos (alterações funcionais) que formam a base para a distinção entre as células T *naive*, células T efectoras e de memória já apresentadas a antígenos (Bruno et al., 1996; Di Rosa et al., 1999; Sprent et al., 1999; Murali-Krishna et al., 2000).

Na rotina de vigilância imunológica, em indivíduos com infecções latentes, os linfócitos T CD8⁺ de memória, específicos para viroses latentes assintomáticas como as causadas pelo EBV e CMV, mostram uma heterogeneidade tanto fenotípica como funcional (Catalina et al., 2002; Tussey et al., 2000; Gamadia et al., 2001). Como uma consequência do processo de diferenciação celular, assim que a infecção se resolve, linfócitos T CD8⁺, deixam de expressar alguns de seus marcadores de superfície, passando a expressar outros (Hamann et al., 1999). Entretanto, os fatores determinantes dos fenótipos das células de memória nas infecções latentes ainda não estão totalmente claros. Entre eles, são apontados: a carga viral inicial e a expansão clonal dos linfócitos T, a virulência de certas cepas e o tropismo viral requerendo diferentes propriedades migratórias ou de redirecionamento (*homing*) das células com resposta específica ao vírus apresentado (Gamadia et al., 2003; Hislop et al., 2002).

Em resumo, neste processo, ao lado das moléculas de adesão, citocinas e receptores têm funções vitais na recirculação de linfócitos durante a rotina da vigilância imunológica e inflamação (Campbell et al., 1999; Zabel et al., 1999; Campbell e Butcher, 2000). Pelo significado biológico funcional aparente destas moléculas, é de grande importância a completa caracterização da sua expressão em linfócitos T durante todas as fases identificáveis de diferenciação, ativação e recirculação destas células (Campbell et al., 2001).

Estudos recentes sobre memória imunológica têm se apoiado fortemente, e em alguns casos, exclusivamente, em marcadores da superfície celular para identificar as diversas subpopulações de linfócitos T CD8⁺ fenotípica e funcionalmente distintas (Akbar et al., 1988; Sanders et al., 1988; Sohen et al., 1990; De Jong et al., 1991; Picker et al., 1993; Okumura et al., 1993; Roederer et al., 1995; Murali-Krishna e Ahmed, 2000). A razão tem sempre sido que estes marcadores definem as células T já apresentadas aos antígenos.

Em condições patológicas de persistência viral, especificamente na infecção pelo HIV, tem sido sugerido que uma falha tanto na maturação como na função efetora dos linfócitos T CD8⁺ é a causa principal da inabilidade do sistema imunológico de controlar a replicação viral e subsequente doença (Appay et al., 2000; Champagne et al., 2001; Gamadia et al., 2003). Tem-se mostrado que a análise das subpopulações de células T CD8⁺ é relevante não somente em pacientes com infecções virais crônicas pelo HIV, CMV ou hepatite B, mas também em pacientes ativamente imunizados com antígenos tumorais e após recepção de alo-transplante, de forma a se monitorar o sistema imunológico determinando as habilidades funcionais e entendendo as interações co-estimulatórias das células em diversas situações clínicas (Hamann et al., 1997).

Portanto, na procura pela caracterização fenotípica dos linfócitos T CD8⁺ alguns dos marcadores de moléculas da superfície celular ou antígenos das membranas celulares expressos e identificados nos estudos por citometria de fluxo até o momento, aparecendo como sinalizadores de subpopulações celulares dos linfócitos T CD8⁺ com características peculiares são mostrados resumidamente na TABELA 1 (Morley et al., 1995; Rabin et al., 1995; Roederer et al., 1995; Wang et

al., 1995; Hamann et al., 1997; Kern et al., 1999; Harrington et al., 2000; Tussey et al., 2000; Ahmadzadeh et al., 2001; Campbell et al., 2001; Fiorentini et al., 2001).

A análise fenotípica dos linfócitos por citometria de fluxo, também conhecida como imunofenotipagem, foi um dos maiores avanços da imunobiologia nas duas últimas décadas (Janeway, 2000; Blessing e Fleisher, 2001ab; Voltarelli et al., 2000; Marti et al., 2001). Trata-se de um método rápido e dinâmico que permite a análise de múltiplos parâmetros, considerando cada célula individualmente (Marti et al., 2001).

Desta forma, tem sido usada na identificação, quantificação e caracterização de diversas subpopulações celulares. Na população dos linfócitos (que à microscopia pode ser considerada uniforme), este método foi fundamental para descrever a presença de diversas subpopulações, ultrapassando a antiga classificação a qual diferenciava os linfócitos simplesmente em T e B (Janeway, 2000).

Atualmente, graças a este método, conhecem-se as subpopulações de linfócitos T CD4⁺ e CD8⁺, tão bem definidas com o advento da infecção pelo HIV/aids (Blessing et al., 2001ab) e já é possível identificar uma infinidade de receptores de superfície celular que torna a classificação destas células e suas diversas subpopulações cada vez mais complexas (Janeway, 2000) como é resumidamente apresentado na TABELA 1.

No Brasil, o primeiro citômetro de fluxo foi introduzido em 1988 ao nosso armamentário laboratorial e deu suas primeiras contribuições no esclarecimento de aspectos imunitários da infecção pela *Leishmania*, além do seu uso extenso na infecção pelo HIV (Coutinho et al., 2000).

TABELA 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+ ATRAVÉS DE MARCADORES MAIS FREQUENTEMENTE UTILIZADOS NA ANÁLISE POR CITOMETRIA DE FLUXO (*adaptado e ampliado de HAMANN et al., 1997 e TUSSEY et al., 2000*)

MARCADORES	SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+		
	NAIVE	MEMÓRIA	EFETORA
CD3	+	+	+
CD8	+	+	+
CD45RA	++	-	+
CD45RO	-	+	±
CD27	+	+	-
CD28	+	+	-
CD62L	+	±	-
CD11a	-	±	+
CD11b	-	-	+
CD57	±	±	+
CD69	-	±	+
CCR7	+	+	-

A disponibilidade de novos marcadores laboratoriais que permitissem prever o desenvolvimento da viremia pelo CMV, e progressão para ou recuperação da doença por este agente melhoraria muito a conduta clínica e terapêutica da infecção pelo CMV nos pacientes transplantados. Nesta condição, métodos funcionais direcionados ao estabelecimento da reconstituição da imunidade específica das células TCD8+ e CD4+ contra CMV, parecem ser particularmente apropriados (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994; Aubert et al., 2001; Cwynarski et al., 2001; Gratama et al., 2001). Entretanto, eles são trabalhosos e de custo elevado, tornando inviável sua implementação nos laboratórios de rotina no momento atual. A análise imunofenotípica dos linfócitos do sangue periférico por citometria de fluxo constitui uma abordagem simples embora não específica, de custo relativamente baixo para estabelecer todos os graus da recuperação imunológica após o transplante. Como observado na TABELA 1, diferentes marcadores de superfície dos linfócitos TCD8+ como CD45RA, CD45RO, CD62L, CD27, CD28, CD11b, CCR7, e também intracelulares como perforina e granzimas têm sido amplamente utilizados para caracterizar o fenótipo e função das células do sistema imunológico, usando as

técnicas de citometria de fluxo (Hamann et al., 1997 e 1999; Fiorentini et al., 2001; Campbell et al., 2001; Kern et al., 1999; Tussey et al., 2000 e 2003; Roederer et al., 1995; Sallusto et al., 1999; Tomiyama et al., 2002; Roos et al., 2000; Dunne et al., 2002; Esser et al., 2003; Masopust et al., 2001; Tough, 2003; Cwynarski et al., 2001; Appay et al., 2002; Appay e Rowland-Jones, 2004; Zhang et al., 2003; Hebib et al., 1999).

As células originadas da expansão de um único clone de linfócito TCD8+ apresentado a um antígeno são muito heterogêneas no fenótipo *in vivo*, refletindo muitos estágios de ativação/diferenciação (Wills et al., 1999 e 2002; Weekes et al., 1999; Hamann et al., 1997).

Em humanos, diferentes isoformas estruturais comuns da molécula antigênica leucocitária (CD45) têm sido usadas originalmente e historicamente para discriminar entre células T *naive* (CD45RA) e de memória (CD45RO) (Akbar et al., 1988; Merkenschlager e Beverley, 1989; de Jong et al., 1991; Michie et al., 1992; Okumura et al., 1993ab; Young et al., 1997; Dutton et al., 1998), as quais têm sido confirmadas pelo uso da marcação por tetrâmeros de peptídeos do MHC (Pittet et al., 1999). Entretanto, estudos longitudinais mais recentes examinando as células T CD8+ citotóxicas, durante as fases de ativação, apoptose e memória em infecções virais agudas e crônicas como as causadas pelo Herpes vírus em humanos têm sugerido que as células de memória específicas para alguns antígenos virais também podem expressar CD45RA (Hamann et al., 1997; Callan et al., 1998; Hislop et al., 2001; Wills et al., 1999; Tan et al., 1999; Champagne et al., 2001; Faint et al., 2001). Não está claro se este fenótipo não convencional pode ser devido a persistência do patógeno e consequente estimulação crônica, e se estas são células de memória propriamente ditas (Zimmermann et al., 1996). Infelizmente, não há marcadores de superfície celular que identificam de forma não ambígua as células T citotóxicas efetoras (Chen et al., 2001). Alguns estudos têm mostrado que durante a fase de ativação, células TCD8+ circulantes são CD27+, enquanto, quando terminalmente diferenciadas, já expressando perforina, as células T citotóxicas são CD27- (Hamann et al., 1997; Roos et al., 2000), sugerindo que a perda da expressão de CD27 pode ser um marcador para as subpopulações de células T de memória efetora e efetora (Hamann et al., 1997; Campbell et al., 2001). A presença ou ausência de CD27

correlaciona-se estreitamente com a expressão de CD28 (Gamadia et al., 2001). O CD28 é uma molécula dissulfídica expressa na superfície das células T (Azuma et al., 1993ab; De Rosa et al., 2001; Appay et al., 2002) e constitui um ligante de moléculas co-estimulatórias da família B-7 (CD80 e CD86) expressas nas células apresentadoras de antígenos (APCs). Quando estas moléculas ligam-se ao CD28, promovem co-estimulação para a ativação das células T (June et al., 1994; Weekes et al., 1999b; De Rosa et al., 2001; Horiuchi et al., 2001; Appay et al., 2002). Em humanos, ao nascimento, todos os timócitos (linfócitos em estágios precoces de desenvolvimento) e a grande maioria das células T (*naive*) do sangue periférico expressam CD28 (Looney et al., 1999; Weeks et al., 1999b). As células T CD8+ *naive*, quando ativadas, passam a exibir outros receptores para as moléculas das APCs, o CTLA-4 ou CD152, com avidéz 20 vezes maior que moléculas co-estimulatórias (CD28 e CD27). A ligação com estes receptores emite um sinal inibitório à célula T ativada, com finalidade possivelmente moduladora (Janeway et al., 2000). Assim, à medida que se diferenciam e/ou tornam ativadas, os linfócitos passam a diminuir a expressão de CD28. A perda da expressão de CD27 e CD28 caracteriza populações de células altamente diferenciadas persistentes (Khan et al., 2002b). A expressão da CD28 é, na maioria das vezes, excludente em relação a outra molécula de superfície, como a CD57 descrita como um marcador de diferenciação tardia ou terminal das CD8+ (Wang e Borysiewicz et al., 1995; Morley et al., 1995; Mollet et al., 1998). As células T CD8+ oligoclonais expressam CD57 que como CD11b, é expresso em células CD3+CD28- (Yamada et al., 1985, Morishita et al., 1989; Azuma et al., 1993a; Monteiro et al., 1996). A molécula CD11b é uma β_2 -integrina de cadeia α . As β_2 -integrina tem por função mediar a adesão dos linfócitos às células endoteliais e a saída destas células dos vasos sanguíneos (Springer, 1994; Hamann et al., 1997), bem como o redirecionamento destas células para os tecidos inflamados (Issekutz, 1993). Em modelos experimentais (McFarland et al., 1992) e humanos (Fiorentini et al., 2001; Cavers et al., 2002; Chapman et al., 1996), comparativamente às células TCD4+, sua expressão é maior na superfície da maioria dos clones das células TCD8+ citotóxicas efectoras. Estas células suprimem a proliferação das células T (Gane et al., 1992), favorecem a citólise na medida que possibilitam a formação de um conjugado entre células efectoras e células alvo (Keizer et al., 1987). Portanto, é bem conhecido que quase todas as células CD28-

são CD11b+ (Yamada et al., 1985). A coexpressão destes marcadores pode auxiliar na discriminação das subpopulações de células TCD8+ e de fenótipos intermediários com propriedades funcionais distintas no processo de diferenciação celular. Um melhor entendimento dos mecanismos que governam a transição de células imaturas (proliferantes) para maduras (não proliferantes) pode permitir pesquisas de manipulação da memória imunológica para propósitos de vacinação e imunoterapia adotiva (Fiorentini et al., 2001).

A proporção de células TCD8+ que deixa de expressar a molécula CD28 aumenta com a progressão da estimulação antigênica (variação, intensidade e persistência) e também com a idade, tanto que, em adultos, aproximadamente 30% destas células tem expressão CD28- (Labalette et al., 1994; Hazzan et al., 1997; Merino et al., 1998; Azuma et al., 1993ab). Sua principal função está relacionada à regulação da ativação das células T CD8+ e à geração de linfócitos T antígeno-específicos (Lenschow et al., 1996; Appay et al., 2002).

Pelo menos dois tipos de células T de memória têm sido descritas dentro das populações CD4+ e CD8+ com base nas características fenotípicas, expressão de moléculas de redirecionamento e funções efectoras. São elas: memória central (T_{MC}) e memória efetora (T_{ME}). Em humanos, as células T_{MC} e T_{ME} diferem funcionalmente e nas propriedades migratórias e podem ser distinguidas com base na coexpressão de moléculas como o CD62L e o CCR7. As células T_{MC} expressam CCR7 e CD62L, enquanto as células T_{ME} não expressam estas moléculas (Sallusto et al., 1999). Portanto, a discriminação entre células *naive* e memória com base apenas na expressão das isoformas de CD45 provavelmente não tem sido verdadeira (Zimmermann et al., 1996), uma vez que populações CD45RA+ contêm células que dividem um certo número de características fenotípicas com células já apresentadas a antígenos, como baixa expressão de CD62L (Roederer et al., 1995) e alta expressão de CD11a/CD18 (Okumura et al., 1993b).

Além disso, uma parte das células CD45RA+ deixa de expressar CD27 (Hintzen et al., 1993 e 1994), uma característica considerada como resultado da estimulação antigênica persistente *in vivo* (De Jong et al., 1992; Baars et al., 1995). A ausência de CD28 e, eventualmente de outras moléculas coestimulatórias como a de

CD27, provavelmente proporciona a estas células uma menor capacidade de submeterem-se a extensiva expansão clonal e correlaciona-se bem com a observação que o potencial mitogênico *in vitro* de células T CD28- de indivíduos controles saudáveis normais é baixo (Hamann et al., 1997; Borthwick et al., 1994; Brinchmann et al., 1994; Azuma et al., 1993a). Uma vez que a regulação da expressão da isoforma parece ser estreitamente regulada pela ativação de células T mitogênicas, esta inabilidade de participar novamente do ciclo celular pode explicar bem a reexpressão da isoforma CD45RA na maioria das células efetoras bem diferenciadas (Hamann et al., 1997). Portanto, a expressão da isoforma CD45 pode ser um marcador imperfeito por também não diferenciar subpopulações T_{ME} e efetora, particularmente em condições inflamatórias como as relacionadas a infecção pelo HIV (Chen et al., 2001).

Como já mencionado, a análise da coexpressão de moléculas como o CD45RA e o CD62L, tem sido proposta para distinção mais refinada das subpopulações de células T *naïve*, memória e efetoras (Roederer et al., 1995). As subpopulações de células T CD8+ que coexpressam CD45RA, CD62L e CD28 foram consideradas como genuínas células *naïve*, enquanto células T CD8+ remanescentes, incluindo as que expressam CD45RO, CD45RA sem a coexpressão de CD62L e CD27, foram consideradas como linfócitos de memória (Roos et al., 2000).

Modelos de infecção viral foram usados para confirmar que a análise da coexpressão de moléculas distingue subpopulações efetoras daquelas de memória, e recentemente, também subpopulações ativadas e que o estágio de maturação pode proporcionar uma medida do grau de controle sobre o vírus (Tussey et al., 2003).

CD69 é um dos marcadores indicativos de ativação bem precoce das células T. É uma molécula rapidamente expressa após sinalização mediada pelo receptor TCR, mas sua expressão é transitória e depende da ativação contínua da célula por este receptor (Testi et al., 1989 e 1994). A expressão deste marcador, entretanto, não está associado com funções efetoras, ou seja, células efetoras citotóxicas que expressam altos níveis de perforina e não se encontram em ciclo celular sendo não proliferantes (reduzida expressão de Ki-67), apresentam alta expressão de Bcl-2 e baixos níveis da expressão de CD69 (Azuma et al., 1993a; Monteiro et al., 1996). Ou seja, a maioria

das células TCD8+ CMV-específicas são células T de memória-efetora, bem diferenciadas, embora não ativadas (Khan et al., 2002b). Ainda, todas células apresentadas a um antígeno recebem a princípio um sinal de ativação, uma vez que são CD69+, entretanto, apenas uma proporção destas células produz IFN- γ (Tussey et al., 2000; Sallusto et al., 1999). Subpopulações *naive*/memória sintetizam principalmente IL-2 e menos frequentemente IFN- γ que é uma característica típica das células T efetoras (Lalvani et al., 1997). Estas células aparentemente de fenótipo não responsivo, que são incapazes de elaborar quaisquer funções efetoras antivirais (como produção de citocinas antivirais e/ou lise das células infectadas por vírus), podem ser encontradas predominantemente em condições de deficiência de células TCD4+, documentando a importância das células TCD4+ na manutenção das respostas das células T CD8+ no controle de infecções virais persistentes (Zajac et al., 1998).

A citólise mediada por grânulos é sem dúvida a mais importante função efetora das células TCD8+ e NK (Lieberman, 2003). A granzima B é uma serina protease parecida a caspase que é liberada pelos linfócitos citotóxicos para lisar células alvo infectadas por vírus e células tumorais. Os genes que codificam interferon-gama (IFN- γ) e moléculas citotóxicas, como perforina e granzima B não são expressos nas células TCD8+ *naive*, mas são constitutivamente expressos nas células TCD8+ de memória e efetoras (Bachmann et al., 1999; Veiga-Fernandes et al., 2000; Kaech et al., 2002). As funções que estas moléculas mediadoras pró-apoptóticas têm em inúmeras patologias humanas tais como na rejeição de transplantes, na imunidade viral, e particularmente na vigilância imunológica tumoral, permanecem como tópicos de vigorosos debates e conjecturas (Trapani e Sutton, 2003). A transferência de células alogênicas com capacidade citotóxica pode resultar em dano tecidual no receptor (Van Den Brink e Burakoff, 2002). Embora muitos modelos de DECH indicam que a via Fas-FasL é de primária importância (Schmaltz et al., 2001), as granzimas A e B mostraram-se ser essenciais para os efeitos letais da DECH induzida pela transferência alogreativa de células TCD8+ (Shresta et al., 1999).

A habilidade da granzima B (e de outras granzimas) de acessar o citoplasma da célula alvo, e desencadear a apoptose, depende de uma segunda proteína também

contida em grânulos citoplasmáticos dos linfócitos citotóxicos, a perforina, cuja função é perfurar as membranas lipídicas e desorganizar os transportes endossômicos das células alvo (Trapani e Smyth, 2002). Entretanto, a granzima B pode entrar no citoplasma da célula alvo de uma forma autônoma, através de receptores de membrana expressos, antes mesmo de entrar em vesículas endocíticas que contêm esta proteína (Berthou et al., 1998).

Portanto, a capacidade citolítica dos linfócitos efetores *ex vivo* é primeiramente devido a ação de proteínas formadoras de poros (perforina) e serina proteases (granzimas) contidas em grânulos citoplasmáticos e liberadas nas proximidades das membranas das células alvo, desencadeando a apoptose (Smyth e Trapani, 1995). Assim, a presença de linfócitos T CD8+ que contêm elevadas quantidades de perforina e granzima B pode corresponder aos linfócitos efetores funcionais (Pittet et al., 2000) podendo auxiliar também na caracterização desta subpopulação.

Após todas estas informações, pode-se concluir que a aplicação da citometria de fluxo ultrapassa os limites da simples caracterização fenotípica das células e tem sido cada vez mais utilizada para definir aspectos funcionais como síntese e excreção de citocinas e proteínas celulares ou estágios da evolução celular, envolvendo os processos de ativação e apoptose, de vida e morte (Blessing et al., 2001ab; Darzynkiewicz et al., 2001; Marti et al., 2001). Nas duas últimas décadas esta tecnologia tem proporcionado muitos avanços no conhecimento das subpopulações de células permitindo várias classificações. Foi observado que dentro de cada uma das subpopulações existiam respostas diferentes refletidas no grau de ativação, no tipo e quantidade de citocinas liberadas e na capacidade de proliferação e propagação ao estímulo imunitário (Janeway, 2000). Os primeiros conceitos de células *naive* e células de memória foram também fundamentados nas diferenças de marcadores de moléculas da superfície celular, como o HLA-DR, CD95, CD45RA, CD45R0, CD27 (Janeway, 2000).

Nos dias atuais, a imunofenotipagem nos fornece uma verdadeira impressão digital dos linfócitos, dividindo-os em diferentes subpopulações. Pretende-se elucidar progressivamente a correspondência entre a expressão de determinados marcadores de superfície e os aspectos funcionais destas subpopulações, a fim de esclarecer

questões como oligoclonalidade, perfil de citocinas preferencialmente produzidas, capacidade de proliferação *in vitro* em resposta aos diversos tipos de antígeno e comportamento predominante *naive versus* células de memória.

As moléculas marcadoras de diferenciação celular possibilitaram a subdivisão das células TCD8⁺ humanas em quatro subpopulações com base na coexpressão de alguns destes marcadores: CD28⁺ CD27⁺ CD62L (CCR7)⁺ CD11b-CD45RA⁺ como subpopulação *naive* (N), CD28⁺ CD27⁺ CD62 (CCR7)⁺ CD11b- CD45RO⁺ como células de memória central (TMC), CD28⁻ CD27⁻ CD62L (CCR7)⁻ CD11b⁺ CD45RO⁺ como células de memória efetora (TME), CD28⁻ CD27⁻ CD62L (CCR7)⁻ CD11b⁺ CD45RA⁺ como células efetoras (E) (Esser et al., 2003; Tough, 2003).

Entretanto, é questionável se tais marcadores isoladamente podem ser vistos como verdadeiros marcadores das subpopulações de linfócitos T CD8⁺ ou se refletem diferentes fases de ativação e diferenciação celular (Michie et al., 1992; Bell e Sparshott, 1990).

Como já discutido, a expressão destes marcadores pode ser gradual, transitória e bastante heterogênea após a infecção viral ou bacteriana, caracterizando apenas um padrão de ativação, capacidade proliferativa e cinética de ativação distintos (Ahmadzadeh et al., 2001). Portanto, uma análise unidimensional das células T CD8⁺ subestima a complexidade das subpopulações em humanos o que pode resultar em sub/superestimação quantitativa da subpopulação em estudo. Daí a importância da identificação de mais marcadores (marcação combinada ou análise da coexpressão) para proporcionar uma ferramenta não apenas de distinção das subpopulações de células não estimuladas das estimuladas mas também para se acompanhar a dinâmica e expansão da população de células T nos diferentes estágios das doenças (Hamann et al., 1997).

Paralelamente a esta transformação dos fenótipos das células há aquisição de várias funções biológicas (Fiorentini et al., 1999 e 2001) a serem levadas em consideração, sugerindo um padrão normal de maturação funcional das células T CD8⁺.

A coexpressão de marcadores caracterizando a função predominante de uma subpopulação pode identificar um fenótipo intermediário no processo de diferenciação das células T CD8+. Fenótipos intermediários encontrados durante infecções virais, por antígenos persistentes, apontam para uma modulação sequencial na expressão de moléculas coestimulatórias durante a diferenciação das células T pós-tímica. Segundo Roederer (1995), a combinação de marcadores usados nos estudos até então seria controversa e não teria sido suficiente para distinguir as subpopulações. Uma hipótese que poderia explicar a heterogeneidade de expressão de receptores pelas células T seria que células recentemente ativadas não expressariam receptores necessários para direcioná-las para órgãos linfóides secundários. Isto poderia ser considerado um mecanismo de defesa evitando-se que células ativadas, secretoras de citocinas entrem nos órgãos linfóides onde potencialmente poderiam causar então a ativação não controlada de um grande número de células. Neste sentido, tem sido proposto que a modulação das respostas às citocinas pode mediar a localização das células (Cyster, 1999). Esta modulação se faz pela expressão de receptores nas células. A responsividade aos diversos padrões de citocinas varia nas distintas subpopulações de linfócitos, um mecanismo que pode orquestrar a complexa interação entre as células apresentadoras, células T e B nos órgãos linfóides. Em suma, a regulação na expressão de receptores pode marcar uma ativação prévia desconhecida, ou estágios de desenvolvimento dos linfócitos que infiltram os diferentes tecidos, locais com níveis muito diferentes de atividade imunológica (Campbell et al., 2001). Entretanto, tem-se demonstrado que embora se considere a coexpressão de marcadores como o CD27 e CCR7 nas células TCD8+, populações podem ser encontradas expressando apenas um destes marcadores. Isto pode não ser surpreendente pois, as moléculas expressas pelas células tem propósitos e funções distintas e estão freqüentemente sendo reguladas de forma independente (Gamadia et al., 2001).

Nos estudos em humanos a análise de subpopulações de células tem sido mais extensiva, devido ao grande número de ferramentas disponíveis, tais como anticorpos monoclonais contra uma variedade de moléculas intra ou extracelular. Diversos estudos (Morley et al., 1995; Rabin et al., 1995; Roederer et al., 1995; Wang et al., 1995; Hamann et al., 1997; Kern et al., 1999; Harrington et al., 2000;

Tussey et al., 2000; Ahmadzadeh et al., 2001; Campbell et al., 2001; Fiorentini et al., 2001) têm proposto caracterização funcional, e também utilizado diferentes combinações de marcadores de superfície celular (caracterização fenotípica) para diferenciar as subpopulações de linfócitos T CD8+. As características chaves da subpopulação *naive* estão de acordo por todos. As células *naive* caracterizam-se pela expressão de CD45RA, receptores de *homing* para linfonodos como CCR7 e CD62L, e receptores coestimulatórios como CD28 e CD27, baixa expressão da integrina CD11a, e ausência da expressão de marcadores como CD11b, CD57, granzimas e perforinas (Appay e Rowland-Jones, 2004). Funcionalmente, estas células caracterizam-se pela proliferação à estimulação mitogênica e produção de IL-2 *in vitro* (Fiorentini et al., 2001). Quando se trata das subpopulações de células diferenciadas, o cenário é mais complexo. Por muitos anos as isoformas CD45R foram utilizadas como marcadores fundamentais das células *naive* (CD45RA+/CD45RO-) e células de memória (CD45RA-/CD45RO+). Entretanto, recentemente, este conceito já não é mais aceito, uma vez que células apresentadas aos antígenos podem (e freqüentemente o fazem) re-expressar a molécula CD45RA (Hamann et al, 1997; Catalina et al., 2002): recentes trabalhos sugerem que o fenótipo CD45RA-/CD45RO+ pode indicar melhor um estado de ativação das células, de forma que as células recentemente ativadas expressariam CD45RO, e a expressão de CD45RA poderia melhor refletir um estado de quiescência (Dunne et al., 2002). Apesar do extenso uso deste conceito por aproximadamente mais de 20 anos, realmente ainda não conhecemos a melhor forma de interpretar a expressão das isoformas da molécula CD45R.

Mais recentemente, a expressão de CCR7 foi sugerida como uma forma de dividir as células apresentadas a antígenos em células de memória central (CCR7+) e células efetoras (CCR7-) (Sallusto et al., 1999); o termo central, pois estas células podem migrar para os linfonodos (recrutadas pelo ligante da molécula CCR7, a quimocina SLC), e efetora, pois estas células têm uma melhor capacidade para produzirem citocinas como IFN- γ . Embora estes termos sejam agora amplamente empregados (Janeway et al., 2001), estudos mais recentes têm questionado esta distinção, contestando as diferenças funcionais entre as subpopulações de células CCR7+ e CCR7- (Unsoeld et al., 2002; Ravkov et al., 2003) ou referindo a presença

de células T apresentadas a antígenos CCR7- (específicas para HIV e CMV) nos linfonodos (Che net al., 2001; Ellefsen et al., 2002). A dificuldade maior é que a expressão da molécula CCR7 pode ser induzida após ativação das células (Sallusto et al., 1999). Tem se designado duas subpopulações de células de memória analisando a coexpressão das moléculas CCR7 e CD62L. A perda da expressão deste último marcador associa-se com a função efetora / memória. As células CCR7-CD62L[±] são designadas como células de memória-efetoras (T_{ME}) pela rápida cinética de ativação enquanto as CCR7⁺CD62L^{HI} como de memória central (T_{MC}) “em repouso” pela cinética de ativação mais lenta. Estes linfócitos residem no interior dos órgãos linfóides (Sallusto et al., 1999; Esser et al., 2003; Masopust et al., 2001) e necessitam ser re-estimulados para readquirirem a função efetora citotóxica atribuída a expressão de perforina e secreção de interferon-gama (IFN- γ) (Masopust et al., 2001). A maioria destas células (T_{MC}) exibem características funcionais similares à subpopulação *naive*, produzindo IL-2 e proliferando à estimulação mitogênica *in vitro*. As células que compõe a subpopulação memória efetora residem nos tecidos periféricos e exibem secreção imediata de citocinas como IFN- γ e TNF- α e atividade citotóxica pela elevada expressão de perforina e granzima (Sallusto et al., 1999; Masopust et al., 2001; Fiorentini et al., 2001; Esser et al., 2003).

Em resumo, as células T_{ME} proporcionariam proteção imediata contra reinfecção ou reativação da doença nos sítios de infecção, enquanto as células T_{MC} residem primariamente nos tecidos linfóides onde poderiam expandir rapidamente e se diferenciar para suprir as células efetoras nos sítios periféricos (Esser et al., 2003). Na definição das subpopulações de células T tem sido analisado também a expressão das moléculas co-estimulatórias CD28 e CD27 que se mostraram muito úteis ao marcarem as etapas da diferenciação das células T com sequencial perda da expressão na superfície à medida que estas se diferenciam (Hamann et al., 1999; Appay et al., 2002). Diversos modelos atuais têm sido propostos e tentam explicar os caminhos de diferenciação das células T e geração das células de memória (linear, divergente, modificado) (Ahmed e Gray, 1996; Hamman et al., 1999; Champagne et al., 2001; Sallusto e Lanzavecchia, 2001; Kaech et al., 2002; Tussey et al., 2003; Wherry et al., 2003; Seder e Ahmed, 2003; Appay et al., 2004).

O modelo linear propõe a geração de células T de memória diretamente das células efetoras que tenham revertido para o estado de repouso. O modelo divergente propõe a geração de células efetoras e de memória diretamente de precursores de células T *naive*. O modelo modificado propõe que as duas subpopulações de memória teriam origem distinta de um efetor intermediário ou pré-efetor intermediário (Ahmadzadeh et al., 2001). Outras duas possibilidades que não devem ser desconsideradas é que as células de memória em "repouso" poderiam derivar de células efetoras persistentes e por sua vez, estas células efetoras persistentes poderiam derivar da subpopulação memória intermediária (Sallusto et al., 1999).

Estes modelos são sustentados por dados fenotípicos *ex vivo* (nas infecções virais humanas) (Gamadia et al., 2003), mensuração de comprimento do telômero e dados *in vitro* seguindo a estimulação de células T *naive*. Entretanto, a complexidade da diferenciação das células T pode não permitir um esquema simples e assim como pode haver muitas subpopulações, podem existir a coexpressão de muitas moléculas. Apesar disso, a expressão da maioria dos marcadores (os quais incluem moléculas co-estimulatórias, de adesão, citotoxicidade, e receptores de quimocinas, e *NK-like*) parecem seguir um padrão comum no processo de diferenciação (Appay e Rowland-Jones, 2004). Embora muito conveniente, o modelo baseado na expressão de CD28 e CD27 pode não estar livre de tal complexidade. Em um estudo recente demonstrou-se que a expressão de CD28 pode ser reinduzida nas células T CD4+ após o tratamento com IL-12 (Warrington et al., 2003). A recuperação da capacidade funcional neste caso não foi demonstrada ainda, embora a restauração da expressão de CD28 por transdução parece reconstituir a funcionalidade original nas células T CD8+ (Topp et al., 2003).

A importância de se determinar as subpopulações, elucidar e compreender a geração e manutenção *in vivo* bem como sua função na imunidade protetora, está relacionada ao desenvolvimento de estratégias profiláticas e terapêuticas, conhecendo-se o tipo de resposta de memória mais adequada almejada. É factível que cada subpopulação proporcione um único papel na resposta imune na proteção do organismo conforme o tipo de células apresentadoras encontradas ou ativadas (Ahmadzadeh et al., 2001). O significado *in vivo* de cada uma destas inúmeras subpopulações de células T ainda não está claro. Por enquanto, não há um acordo

sobre a função das células T CD8⁺ diferenciadas. Tem-se referido a estas células como células efetoras, com base nos seus altos níveis de perforina e intensa atividade lítica nos ensaios *ex vivo* de liberação de crômio. Entretanto, estes achados têm sido questionados por relatos que não mostram diferença na atividade citolítica entre estas e as células menos diferenciadas (Hislop et al., 2001; Mueller et al., 2001), especialmente pela observação de que células de todas as subpopulações podem ter algum nível de expressão de perforina (baixo ou alto) após serem apresentadas a antígenos (Appay et al., 2002).

Recentemente, sugeriu-se que os ensaios de liberação de crômio, os quais podem refletir níveis de perforina, não são um reflexo verdadeiro das capacidades citotóxicas *in vivo*, e estas mensurações poderiam portanto, conduzir a erros de interpretação do que constitui uma célula efetora protetora (Barber et al., 2003). De modo alternativo, outros pesquisadores (Appay et al., 2004) consideram estas células extensivamente diferenciadas como células atingindo a senescência (uma vez que elas possuem características de senescência replicativa, como reduzida capacidade proliferativa e curto comprimento do telômero) (Papagno et al., 2004; Effros e Pawelec, 1997), ou como células T CD8⁺ regulatórias/ supressoras (Sadat-Sowti et al., 1994; Effros RB, 2003). Neste contexto, o processo de diferenciação das células descrito acima pode ser visto simplesmente como desenvolvimento pós-tímico das células T, sem atribuir propriedades protetoras particulares para as células. Por esta razão, alguns autores preferem usar termos como estágios de diferenciação inicial, intermediário ou tardio ao se referirem a estas subpopulações com base na posição em que se encontram no caminho de diferenciação (Appay et al., 2002).

As questões de definição das subpopulações memória efetora e efetora de interesse teórico podem eventualmente tornar-se de interesse prático. Tem-se demonstrado que o monitoramento de certas subpopulações de células por imunofenotipagem proporciona informações clinicamente úteis durante a infecção pelo CMV nos receptores de Alo-transplante renal (Van Den Berg et al., 1992; Nordoy et al., 1999). Entretanto, pouco é conhecido sobre o valor potencial desta abordagem no acompanhamento dos pacientes receptores de transplante alogênico de medula (Alo-MO), ou alogênico de sangue periférico (Alo-SP) e autólogo (Auto-SP) (Gratama et al., 1987; Einsele et al., 1993; Nishio et al., 2001; Storek et al., 2001).

Imunidade Específica para o CMV em Receptores de TMO

O CMV induz uma resposta imunológica predominantemente celular e especificamente dependente de células T CD8+ (Li et al., 1994; Reusser et al., 1997; Podlech et al., 1998).

Em indivíduos sadios soropositivos para CMV, os linfócitos CD4+ e CD8+, específicos para CMV em parte se tornam células de memória que evitam recidivas ou cronificação da infecção ativa. Nestes indivíduos, a infecção pelo CMV resulta, em última análise em uma linfocitose de células CD8+ citotóxicas, principais efetores responsáveis pela eliminação de infecção ativa e indução da imunidade protetora (De Vries et al., 2000). Por outro lado, indivíduos com a imunidade comprometida como os receptores TMO, apresentam risco de desenvolver doença pelo CMV a partir da recidiva (reativação), infecção primária ou reinfecção (Li et al., 1994) e, este risco relaciona-se com a reconstituição do sistema imune e hematopoético (Podlech et al., 1998).

No caso dos receptores de TMO, mesmo os previamente soropositivos para o CMV, a memória imunológica específica é completamente abolida, quer pela quimioterapia e radioterapia pré-TMO, quer pelo esquema medicamentoso profilático de DECH ou das consequências imunológicas da mesma (Miller et al., 1986). Assim, se o doador for soropositivo para o CMV, nova resposta específica deverá ser montada no período pós-TMO a partir de estímulos antigênicos endógenos ou da medula transplantada. No caso de doadores soronegativos, o estímulo antigênico para isso é quase sempre proveniente de hemoderivados. Estima-se que o risco de infecção pelo CMV é de 2,5 a 5% por unidade de sangue transfundida. Nas duas situações para que a resposta se dê de maneira eficaz, depende principalmente dos linfócitos T CD8+ citotóxicos específicos que por sua vez necessitam das células CD4+, fundamentais na apresentação dos antígenos virais e nos estímulos humorais para os linfócitos T citotóxicos (Li et al., 1994).

O reestabelecimento da capacidade de resposta imunológica para o CMV sofre influências de diversos fatores que vão desde o grau de imunossupressão ao qual é submetido o paciente até esquemas de profilaxia para o CMV utilizados. Está bem

estabelecida que a profilaxia indiscriminada com ganciclovir retarda a reconstituição da resposta imunológica específica para o CMV, favorecendo o adoecimento no período que segue à retirada do mesmo. Em um estudo realizado por Li et al., em 1994, observou-se que aproximadamente 50% dos pacientes transplantados de medula, que não utilizaram profilaxia recuperaram resposta citotóxica CMV específica entre 80-90 dias após o transplante. Em contrapartida, somente 11% dos que receberam a profilaxia tiveram esta resposta detectada na mesma época. A importância deste achado se torna relevante pela relação estreita que há entre a recuperação da imunidade específica e o não adoecimento por CMV. Além do adoecimento tardio, o uso prolongado de profilaxia pode levar à emergência de cepas resistentes (Reusser et al., 1997).

O papel protetor das células T CD8+ citotóxicas específicas para o CMV contra doença grave foi demonstrado na década passada em pacientes submetidos a TMO alogênico, pela observação de que os pacientes que apresentavam atraso no desenvolvimento desta resposta *in vitro* eram mais susceptíveis à doença grave pelo CMV e à recidiva da infecção. Estes achados fundamentaram medidas terapêuticas alternativas como a transferência de linfócitos T CD8+ específicos para CMV, do doador para o receptor (Reusser et al., 1991 e 1997; Boland et al., 1992; Einsele et al., 1993; Van Den Berg et al., 1993; Li et al., 1994; Schoppel et al., 1998). Além disso, possibilitaram a monitorização da ativação celular na seleção dos pacientes que mais necessitam de terapia antiviral, na previsão do risco de recidiva e na determinação da dose máxima e segura das drogas imunossupressoras (Van Den Berg et al., 1993). É provável que o único empecilho para isso seja a dificuldade de padronização e execução destes ensaios em larga escala.

A ação efetora eficaz dos linfócitos T citotóxicos específicos para o CMV depende, em parte, de uma ativação das células TCD4+ auxiliares e a presença desta ativação pode predizer indiretamente, a ocorrência da infecção ativa (Boland et al., 1992; Schoppel et al., 1998). Para demonstrar esta afirmativa, Ljungman et al., em 1993, avaliaram a resposta linfoproliferativa *in vitro* ao antígeno de CMV e sua relação com viremia e com o adoecimento. Neste estudo, nenhum paciente que desenvolveu pneumonia intersticial apresentou resposta linfoproliferativa específica concomitantemente a viremia. Em contrapartida, esta resposta foi observada em 42%

dos pacientes com outros focos de adoecimento pelo CMV e em 75% dos pacientes sem doença documentada, comprovando a importância da imunidade celular específica como preditor de adoecimento pelo CMV. Corroborando estes achados, Einsele et al., em 1993, evidenciaram que a linfopenia da subpopulação de linfócitos CD4+ constitui um indicador de risco para a doença pelo CMV. Da mesma forma que para pacientes submetidos a TMO alogênico, Reusser et al., em 1997 demonstraram que, entre receptores de TMO autólogo soropositivos, as respostas CMV específicas das células CD8+ citotóxicas e das células CD4+ auxiliares induzem uma proteção contra a infecção por CMV.

No contexto da resposta celular contra o CMV, aparecem, ao lado dos linfócitos T CD8+ e CD4+ CMV específicos, as células NK (CD3-CD8+CD56+) como membros que contribuem na recuperação da infecção e na prevenção das recidivas, graças ao seu papel de citotoxicidade no contexto da resposta imunológica inata. Van Den Berg et al., em 1993, demonstraram o papel destas células em pacientes submetidos a TMO alogênico, especialmente em se tratando de infecção primária pelo CMV, onde a proliferação celular foi mais exuberante.

O CMV é aventado como um dos principais estímulos antigênicos indutores de proliferação dos linfócitos T CD8+ após o TMO. Estes linfócitos podem atingir níveis superiores aos encontrados em indivíduos normais, por volta do terceiro mês após o TMO, sustentando a conhecida inversão CD4+/CD8+ (Miller et al., 1986; Li et al., 1994).

“ Transferência da Imunidade Específica Anti-CMV

A possível transferência imunitária do doador para o receptor de TMO baseia-se nas observações de que os receptores de TMO soropositivos para o CMV, que recebem a medula de doadores soronegativos apresentam doença mais grave do que quando ambos são CMV positivos. Este fato decorre provavelmente da capacidade do doador soropositivo em transmitir sua imunidade CMV específica ao receptor. Corroborando com estas observações, Boland et al., em 1992 detectaram *in vitro*, maior resposta linfoproliferativa a antígenos do CMV e maior resposta IgG sem IgM associada, em receptores CMV positivos com doadores também CMV positivos do

que naqueles, cujo doador era CMV negativo. Acredita-se assim, que ocorre transferência de imunidade não só a partir de linfócitos T do doador específicos para o CMV, que proliferam em resposta a este vírus como também de linfócitos B, que aumentam os títulos de IgG nesta circunstância.

A transferência imunitária também foi documentada em receptores de transplante alogênico depletado de células T. Nestes pacientes, como nos receptores de TMO alogênico convencional a gravidade da doença por CMV foi menor quando doador e receptor eram soropositivos para CMV do que quando somente o receptor era soropositivo. Postula-se então, que tal proteção seria devida, neste caso, basicamente à imunidade humoral transferida a partir de linfócitos B CMV específicos do doador soropositivo (Grob et al., 1987; Roy et al., 1993), pois apesar de saber-se que anticorpos CMV específicos não são capazes de impedir a reativação viral, os mesmos parecem ter um papel modulatório no curso da infecção (Schoppel et al., 1998).

Os achados de transferência imunitária abrem perspectivas para uso de vacina anti-CMV no doador da medula óssea, quando a mesma se mostrar eficaz e segura (Grob et al., 1987; Roy et al., 1993).

Tem-se alcançado um progresso considerável no entendimento da imunologia das infecções virais associadas aos transplantes, como infecções pelo CMV e EBV. Estes conhecimentos têm sido usados para designar novas estratégias para imunoterapia, as quais têm aumentado o armamentário terapêutico e especialmente preventivo no controle destas infecções em situações de imunossupressão pós-transplante. Entretanto, ainda existem desafios intrigantes na compreensão da resposta imunológica para elaboração de uma conduta mais apropriada para as infecções virais nos receptores de transplante (Addo e Rosemberg, 2000).

Neste sentido, estudos prospectivos que permitam o reconhecimento e elucidação quantitativa e qualitativa, fenotípica e funcional caracterizando as diferentes subpopulações dos linfócitos T CD8+ podem proporcionar uma melhor compreensão dos diversos estágios de proliferação, diferenciação, maturação e ativação destas células durante a reconstituição imunológica dos receptores de TMO

ou mesmo em outras situações clínicas. Nos receptores de TMO, em que é essencial o equilíbrio entre a resposta citotóxica específica para o CMV e o dano tecidual dela decorrente, o conhecimento funcional e da cinética das subpopulações celulares na reconstituição imunológica é fundamental e necessário.

Para ampliar nossos conhecimentos nesta questão, a cinética da reconstituição das subpopulações de células TCD8⁺ foi avaliada comparativamente por imunofenotipagem nos receptores das diferentes modalidades de transplante de medula óssea. Para estabelecer a função destas subpopulações celulares, investigamos por citometria de fluxo a expressão de granzima B e também comparamos as respostas linfoproliferativas e produção de IFN- γ para o antígeno específico do CMV nos pacientes receptores de transplante Alo-MO, Alo-SP e Auto-SP, durante os primeiros 90 dias após o transplante. Uma melhor compreensão das diferenças entre a reconstituição imunológica específica para o CMV nas diferentes modalidades de transplante de medula óssea pode apontar para estratégias adicionais no controle da infecção pelo CMV após o transplante. Uma vez que é bem conhecido que os receptores de transplante autólogo procedente de sangue periférico apresentam menos complicações secundárias a reativação do CMV que os receptores de transplante alogênico, e que nós temos previamente mostrado que os receptores de transplante Auto-SP reconstituem mais precocemente sua imunidade anti-CMV (Mendes et al., 2002), nós então primeiramente questionamos se isto se deve a diferenças quantitativas e qualitativas, fenotípicas e funcionais nas subpopulações de células TCD8⁺ infundidas nos receptores de TMO.

Uma vez que:

1. ainda pouco se sabe a respeito da reconstituição imunológica de pacientes receptores de transplante de medula óssea, especialmente em relação a resposta anti-citomegalovírus, mediada por células CD8+ efectoras
2. os receptores de transplante alogênico e autólogo têm mostrado diferentes susceptibilidades à infecção pelo citomegalovírus e diferentes cinéticas de reconstituição imunológica e de resposta anti-citomegalovírus
3. novos marcadores fenotípicos têm sido sugeridos para identificar as subpopulações de células TCD8+ naive, de memória e efectoras

A proposta deste trabalho foi avaliar comparativamente a reconstituição imunológica e resposta específica para o citomegalovírus nos receptores de diferentes modalidades de transplante de medula óssea (alogênico, autólogo; procedente do sangue periférico ou da medula óssea), desde o momento em que as células são infundidas até 30 e 90 dias após o transplante, por meio:

1. da análise das subpopulações de linfócitos TCD8+
2. da sua correlação com o ensaio de linfoproliferação
3. e produção de interferon-gama (IFN- γ).

E desta forma, tentar compreender melhor por que os receptores de transplante alogênico têm mais reativação e doença por citomegalovírus que os receptores de transplante autólogo.

3.1. DELINEAMENTO E DESCRIÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo prospectivo, desenvolvido em colaboração com o Programa de Transplante de Medula Óssea da Fundação Pró-Sangue do Hemocentro de São Paulo, Disciplina de Hematologia e Hemoterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), a Unidade de Transplante de Medula Óssea da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o Laboratório de Investigação Médica em Virologia (Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, LIM-48, Departamento de Moléstias Infecciosas da FMUSP) e o Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56, Departamento de Dermatologia da FMUSP).

3.2. CASUÍSTICA

De maio de 2002 a maio de 2004, 94 pacientes foram acompanhados, 88 destes pertencentes ao Programa de TMO da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) (Alo-MO: n=39, Alo-SP: n=24, Auto-SP: n=25) e 06 à Unidade de Transplante de Medula Óssea da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (Alo-SP: n=06).

Dos 94, 66 receptores consecutivos adultos foram analisados. Destes 66 pacientes, 44 foram submetidos ao transplante alogênico HLA-idêntico relacionado, sendo 28 do grupo de receptores de transplante alogênico de origem da medula óssea (Alo-MO: n=28), 16 do grupo de receptores de transplante alogênico procedente da coleta por aférese de células tronco hematopoéticas (*HSC*) no sangue periférico após serem mobilizadas (Alo-SP: n=16) e 22 do grupo de receptores de transplante autólogo também originado da coleta periférica (Auto-SP: n=22).

Os 66 pacientes foram prospectivamente envolvidos no estudo conduzido com o objetivo de se comparar a reconstituição imunológica nas três modalidades de transplante, alogênico de medula versus alogênico e autólogo de sangue periférico após mobilização das células tronco hematopoéticas pelo fator estimulador de colônia de granulócitos (G-CSF), em condição de compatibilidade (identidade HLA) no caso dos alogênicos.

A reconstituição imunológica foi acompanhada pela caracterização das células do sistema imunológico no enxerto (no momento da coleta e infusão, conhecido como “Dia zero”, D0) e no sangue periférico dos receptores aos 30, 90-120 dias (D+30, D+90) após o transplante.

Entretanto, dos 66 pacientes estudados inicialmente no D0, apenas 54 (Alo-MO: n=22, Alo-SP: n=12, Auto-SP: n=20) e 42 (Alo-MO: n=15, Alo-SP: n=10, Auto-SP: n=17) mostraram-se respectivamente avaliáveis aos 30 e 90-120 dias após o transplante, período este de reconstituição das células do sistema imunológico a partir de células remanescentes mas principalmente das células recebidas dos doadores (TABELA 2).

TABELA 2 – NÚMERO DE PACIENTES RECEPTORES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ACOMPANHADOS EM DIFERENTES PERÍODOS NO PÓS-TRANSPLANTE (D0, D30, D90)

TMO	D0	D+30	D+90
ALO-MO	28	22	15
ALO-SP	16	12	10
AUTO-SP	22	20	17
TOTAL	66	54	42

O grupo Auto-MO (n=31), apresentando-se em nosso serviço como uma modalidade de transplante bem menos freqüente, indicado na maioria das vezes aos pacientes que à princípio não conseguiram mobilização adequada das células tronco hematopoéticas para o sangue periférico após uso de G-CSF, não foi incluído em nossos objetivos nem em nossas avaliações iniciais, sendo apenas posteriormente analisado de forma retrospectiva alguns dados clínicos (obtidos dos prontuários) e laboratoriais (exames de rotina realizados no período) à título de comparação com o grupo Auto-SP.

Apesar do Alo-SP estar relacionado a uma menor sobrevida no serviço de transplante da Fundação Pró-Sangue, pelo fato desta modalidade de transplante ser indicada para pacientes com doenças de base mais agressivas ou recidivadas, este grupo (n=16) apresentou sobrevida comparável (62,5%) em relação aos outros dois grupos, Alo-MO (60,7%) e Auto-SP (86,4%), neste período mais crítico (30 e 90 dias pós-transplante), provavelmente pelo fato de terem sido incluídos pacientes desta modalidade de transplante provenientes da Santa Casa de São Paulo, onde esta modalidade não inclui necessariamente pacientes mais graves.

Dos 94, os 28 pacientes remanescentes analisados foram excluídos no D0 pelos seguintes critérios: idade do doador ou receptor (Alo-MO: n=03 crianças), transplante mal sucedido sem “pega medular” ou principalmente pela falha de mobilização das células para o sangue periférico tendo como conduta clínica a realização precoce de um segundo transplante na mesma modalidade, porém de procedência distinta (Alo-SP: n=03), problemas técnicos relacionados ao preparo e marcação das amostras (Alo-MO: n=03, Alo-SP: n=04 , Auto-SP: n=04), resultados não prospectivamente analisáveis devido as amostras terem sido utilizadas numa fase inicial apenas na padronização metodológica dos ensaios (Alo-MO: n=08, Auto-SP: n=03). Nesta fase de padronização, além destes 11 pacientes, foram analisados também 12 indivíduos controles adultos na faixa etária dos 22 aos 48 anos, aparentemente saudáveis e também uma amostra de sangue de cordão umbilical.

O termo de consentimento após informação (ANEXO A) foi obtido de todos os participantes, doadores e receptores, de acordo com as normas do Ministério da Saúde Brasileiro e o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética local do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ANEXO B) e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (ANEXO C).

As amostras derivadas dos doadores e receptores foram centralizadas e analisadas no Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56) da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

“ Características clínicas dos doadores e pacientes

Os doadores incluídos neste estudo foram 44 indivíduos adultos saudáveis que serviram como doadores de *stem cells*, HLA idênticos aos seus familiares submetidos aos transplantes alogênicos. A idade, sexo, sorologia para CMV dos doadores são apresentados na TABELA 3. As características dos pacientes também são mostradas na TABELA 3. Todos os pacientes tiveram uma ficha de avaliação clínica individual (ANEXO D) que foi preenchida com dados dos prontuários no final do estudo.

Para serem elegíveis, os pacientes tinham que ser portadores de doenças hematológicas, independente da fase ou estadiamento clínico das mesmas, incluindo doença de Hodgkin (DH), linfoma não Hodgking (LNH), leucemia mielóide aguda (LMA) e crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA), mieloma múltiplo (MM), anemia aplástica grave (AAG) e outras como mielodisplasia (SMD)/ hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), disceratose congênita e mielofibrose. Tinha que ser candidatos ao TMO e realizar acompanhamento ambulatorial nos Centros envolvidos no estudo. Além disso, tinham que ter um HLA A,B e DR compatível, idêntico ao doador familiar relacionado. A inclusão dos pacientes foi realizada de forma consecutiva de acordo com o registro dos pacientes nos referidos centros.

“ Regime de Condicionamento

Dependendo do estadiamento clínico da doença, da idade, dos protocolos dos centros envolvidos, diferentes regimes convencionais mielo-ablativos foram utilizados para os 66 pacientes. Dos 66, 43 receptores foram preparados com regime de condicionamento tendo por base o Bussulfano (BU-associado). Onze pacientes receberam o esquema alternativo BCNU ou Carmustina (CVB) - Etoposide (VP16) - Citarabina - Melfalano (BEAM). Sete pacientes foram preparados com regime de condicionamento tendo por base a Irradiação Corporal Total (TBI-associada). E os cinco pacientes restantes não foram nem tratados com TBI nem com Bussulfano ou BEAM, mas ao invés disso, receberam outras quimioterapias associativas como Fludarabina-Melfalano (Flu-Mel) ou apenas Ciclofosfamida (Cy).

Todas as características clínicas dos doadores e receptores separadas por modalidade de transplante são mostradas na TABELA 4.

TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, MODALIDADE DE TMO, DOENÇA DE BASE, REGIME DE CONDICIONAMENTO E ESTADO SOROLÓGICO PARA CMV NO PRÉ-TMO

CARACTERÍSTICAS	VARIÁVEIS	VALORES
	Gênero (Doadores e Pacientes)	N (%)
Masculino		34 (51,5%)
Feminino		32 (48,5%)
	Idade (Mediana)	Anos
Pacientes (n=66)		31
Doadores (n=44)		33
	Tipo de TMO	N (%)
Alogênico		44 (66,7%)
Medula Óssea		28 (42,5%)
Sangue periférico		16 (24,2%)
Autólogo		22 (33,3%)
Sangue periférico		22 (33,3%)
	Doença de Base	N (%)
Leucemia Mielóide Crônica		12 (18,1%)
Leucemia Mielóide Aguda		12 (18,1%)
Mieloma Múltiplo		10 (15,2%)
Anemia Aplástica Grave		09 (13,6%)
Doença de Hodgkin		09 (13,6%)
Leucemia Linfocítica Aguda		06 (9,2%)
Linfoma não Hodgkin		05 (7,6%)
Outras (a)		03 (4,6%)
	Regime de Condicionamento	N (%)
Bussulfano associado (BU)		43 (65,1%)
BEAM (BCNU carmustina-CVB, etoposide-VP16, Ara-c, Mel)		11 (16,7)
Irradiação corporal total associada (TBI)		07 (10,6%)
Outros (b)		05 (7,6%)
	Sorologia para o CMV pré-TMO	N (%)
Positivo		63 (95,5%)
Negativo		03 (4,5%)
	Sorologia para CMV do doador	N (%)
Positivo		41 (93,2%)
Negativo		03 (6,8%)
	Antigenemia	N (%)
Positivo		24 (36,4%)
Negativo		42 (63,6%)

(a) Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) / Síndrome mielodisplásica (SMD) (01-1,5%), Disceratose Congênita (01-1,5%), Mielofibrose (01-1,5%).

(b) Fludarabina-Mel (04-6,1%), Cy – ciclofosfamida (01-1,5%)

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS DOADORES E RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

	Alo-MO (n=28)	Alo-SP (n=16)	Auto-SP (n=22)
Doadores			
Idade (mediana)	31,0	36,5	42,5
M/F	13/15	11/5	10/12
Receptores			
Idade (mediana)	27,0	31,0	42,5
M/F	16/12	8/8	10/12
Diagnóstico			
LMA	04	05	03
LMC	12	00	00
MM	00	02	08
AAG	09	00	00
DH	00	01	08
LNH	00	02	03
LLA	02	04	00
Outro (a)	01	02	00
Condicionamento			
TBI associada	03	04	00
Bussulfano associado	23	08	12
BEAM	00	01	10
Outro (b)	02	03	00
Sorologia CMV (D/R)			
Positiva	26/26 (92,9%)	15 (93,7%) / 16 (100%)	21 (95,5%)
Negativa	02/02 (7,1%)	01 (6,25%) / 00	01 (4,5%)
Antigenemia			
Positiva	15 (53,6%)	07 (43,7%)	02 (9,1%)
Negativa	13 (46,4%)	09 (56,3%)	20 (90,9%)
DECH aguda			
0-I	11 (39,3%)	05 (31,3%)	-
II-IV	17 (60,7%)	11 (68,7%)	-
Sobrevida	17 (60,7%)	10 (62,5%)	19 (86,4%)

(a) Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) / Síndrome mielodisplásica (SMD) (01 Alo-SP-1,5%), Disceratose Congênita (01 Alo-MO -1,5%), Mielofibrose (01 Alo-SP-1,5%).

(b) Fludarabina-Mel (03 Alo-SP-4,5% e 01 Alo-MO - 1,5%), Cy - ciclofosfamida (01 Alo-SP-1,5%)

“ *Seguimento e Evolução* ”

Os pacientes foram acompanhados após o transplante por um período que variou entre 25 e 147 dias. No período de seguimento (em média 120 dias), 46 pacientes (69,7%) sobreviveram ao TMO e 20 morreram (30,3%) sendo que em nenhum destes, embora com reativação da infecção (antigenemia positiva) a doença pelo CMV foi a responsável pelo óbito. No grupo Auto-SP, a sobrevida entre os 22 pacientes no período considerado foi de 86,4% (n=19), no grupo Alo-MO, entre os 28 pacientes neste mesmo período foi de 60,7% (n=17), e no grupo Alo-SP, entre os 16 pacientes avaliados no período a sobrevida foi de 62,5% (n=10).

“ *Profilaxia Antiviral* ”

Aciclovir (10 mg/kg/dia) foi administrado para todos os pacientes do condicionamento até o dia +40 pós-TMO para profilaxia do vírus herpes simples. Terapia pré-emptiva com ganciclovir (GCV) guiada pela antigenemia era iniciada (5 mg/kg endovenosa cada 12 horas por 14 a 21 dias) nos receptores de transplante de medula sempre que a antigenemia de duas ou mais células era detectada.

Nos dois centros, profilaxias indiscriminadas para o CMV com GCV e/ou imunoglobulina hiperimune não foram instituídas, sendo o controle da infecção pelo CMV nesta população realizado principalmente por meio de vigilância viral e instituição de terapêutica pré-sintomática com base nos resultados da antigenemia para CMV.

“ *Outras profilaxias anti infecciosas* ”

Conforme protocolos pré-estabelecidos aplicados na rotina dos centros envolvidos, os receptores das diferentes modalidades de transplante receberam também profilaxia antibacteriana (Cefepime, Maxcef) e antifúngica (Anfotericina B na dose de 05 mg/kg, Fluconazol), ambas indicadas na presença de granulocitopenia (< 500 neutrófilos/mm³) no período pós-transplante imediato. A profilaxia para o *Pneumocystis carinii* foi realizada com sulfametoxazol-trimetoprin (SMX-TMP ou Bactrin) do condicionamento até o D+1, sendo reintroduzido posteriormente após a “pega medular” sólida, consistente por volta do D+20.

“ Profilaxia da Doença Enxerto contra o Hospedeiro (DECH)

Todos receptores alogênicos receberam imunossupressão no período pós-transplante consistindo de breve curso de metotrexate (MTX – dias +1,+3,+6 e +11, nas doses 15 mg/m² no D+1 e de 10 mg/m² nos dias +3,+6,+11) e ciclosporina A (CSA ou CyA) ou corticosteróides (prednisona – PDN) para a profilaxia da DECH. A ciclosporina A endovenosa foi iniciada no dia +1 na dose de 2 a 3 mg/kg e trocada pela formulação oral assim que a ingestão oral estivesse apropriada. A dose foi adaptada para níveis sanguíneos e função renal. Pacientes alogênicos foram acompanhados para o desenvolvimento de DECH e classificados de acordo com a gradação clínica padrão (Przepiorka et al., 1995). Na avaliação da DECH aguda, o estadiamento prévio baseou-se na intensidade (extensão) das alterações cutâneas confirmadas histologicamente, do comprometimento do trato gastrointestinal (pelo volume diário de diarreia) e do fígado (pelos níveis séricos das bilirrubinas) (TABELAS 5 e 6) (Thomas et al., 1975).

TABELA 5- ESTADIAMENTO DA DECH AGUDA

ESTADIO	PELE	FÍGADO	TRATO DIGESTIVO
+	Eritema máculo-papular < 25%	Bilirrubinas 2-3 mg/dL	Diarréia 500-1000 mL/dia
++	Eritema máculo-papular 25%-50%	Bilirrubinas 3-6 mg/dL	Diarréia 1000- 1500 mL/dia
+++	Eritrodermia generalizada	Bilirrubinas 6-15 mg/dL	Diarréia > 1500 mL/dia
++++	Descamação e bolhas	Bilirrubinas > 15mg/dL	Dor ou íleo paralítico

Nota: Retirado de Thomas et al., 1975

TABELA 6- GRADAÇÃO CLÍNICA DA DECH AGUDA

GRADAÇÃO	PELE	FÍGADO	TRATO DIGESTIVO
0 (ausente)	0	0	0
I (leve)	+ a ++	0	0
II (moderado)	+ a +++	+	+
III (grave)	++ a +++	++ a +++	++ a +++
IV (fatal)	++ a ++++	++ a ++++	++ a ++++

Nota: Retirado de Thomas et al., 1975

A DECH aguda de grau I-IV ocorreu em 36 (81,8%) dos 44 pacientes submetidos ao transplante alogênico sendo 22 (78,6%) dos 28 pacientes do Alo-MO e 14 (87,5%) dos 16 receptores de Alo-SP (TABELA 7).

TABELA 7- INCIDÊNCIA DA DECH AGUDA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE TMO.

Gradação	Incidência	
	Alo-MO	Alo-SP
Ausente	06 (21,4%)	02 (12,5%)
Grau I	05 (17,9%)	03 (18,7%)
Grau II	11 (39,3%)	07 (43,8%)
Grau III	03 (10,7%)	02 (12,5%)
Grau IV	03 (10,7%)	02 (12,5%)

60,7% { } 68,7%

* Grau I a IV, $p=0,0024$

A consideração da presença da DECH aguda de grau maior ou igual a II está associada a uma maior probabilidade de acerto no diagnóstico clínico, uma vez que o grau I pode ser confundido com outros eventos presentes no pós-TMO, como reações transfusionais, alergia a drogas, mucosite do trato gastrointestinal secundária ao regime de condicionamento, infecções etc. Desta forma, a DECH aguda foi considerada presente quando ocorreu nos primeiros 90 dias do transplante e teve gradação $\geq$ II. Os demais pacientes, com DECH aguda grau 0-I e/ou ocorrência muito tardia, foram considerados como não tendo este evento para evitar confusões com a DECH crônica que pode aparecer um pouco mais precocemente do que 100 dias ou com outras causas mencionadas de alterações sutis semelhantes a DECH grau 0-I que são comuns no período inicial do pós-transplante.

A mediana de tempo para o diagnóstico de DECH aguda foi de 23 dias precedendo a positividade da antigenemia com mediana de 40 dias. Três pacientes apresentaram um intervalo menor que sete dias entre o diagnóstico de DECH aguda e a positividade da antigenemia. No grupo Alo-MO, cinco pacientes apresentaram

apenas DECH aguda sem antigenemia e no grupo Alo-SP o mesmo foi observado em quatro pacientes. Dos 28 pacientes com DECH aguda $\geq$ II, em 13 este evento precedeu a positividade da antigenemia (07 Alo-MO e 06 Alo-SP), em quatro do grupo Alo-MO foi mais tardio que a antigenemia e dois pacientes apresentaram concomitantemente os dois eventos (01 Alo-MO e 01 Alo-SP).

Dos 16 (36,4%) pacientes em que a DECH aguda foi considerada como um fenômeno ausente [11 (39,3%) do grupo Alo-MO e 05 do grupo Alo-SP (31,3%)], 08 (18,2%) apresentavam graduação zero [06 (21,4%) do grupo Alo-MO e 02 (12,5%) do grupo Alo-SP], e 08 (18,2%) [05 (17,9%) do grupo Alo-MO e 03 (18,7%) do grupo Alo-SP] tiveram relato clínico de DECH grau I, após os 90 dias de transplante (02 pacientes do grupo Alo-MO e 02 do Alo-SP) ou um relato isolado de DECH grau I nos primeiros 30 dias de transplante (03 do grupo Alo-MO e 01 do Alo-SP).

3.3. DEFINIÇÕES

“ Infecção ativa e doença por CMV

Infecção Ativa: Neste trabalho, como o principal interesse era avaliar precocemente a influência do estímulo antigênico específico na reconstituição imunológica destes pacientes, infecção ativa pelo CMV secundária a infecção primária ou reativação foi definida pela presença de pelo menos um episódio de antigenemia positiva (detecção da pp65 em neutrófilos do sangue periférico), pela alta sensibilidade e especificidade desta técnica (Machado, 1996). Antigenemia positiva foi definida pela detecção de uma ou mais células peroxidase positivas em 300.000 leucócitos polimorfonucleares. Somente um receptor Alo-MO era soronegativo para o CMV antes do transplante bem como seu doador. Este paciente permaneceu negativo através do seguimento e foi portanto excluído de nossas análises porém foi usado como controle negativo para os testes imunológicos.

Doença: De acordo com Ljungman e Plotkin (1995) e Ljungman et al. (2002), a doença por CMV pressupõe o diagnóstico de infecção pelo CMV e pode ser manifestada com as seguintes síndromes clínicas: Pneumonite (CMV-PI); Doença Gastrointestinal (CMV-GI); Hepatite; Doença do Sistema Nervoso Central (SNC); Retinite; Nefrite; Cistite; Miocardite; Pancreatite.

As técnicas diagnósticas utilizadas para detecção do CMV em lavado broncoalveolar ou material de biópsia pulmonar ou digestiva foram: isolamento do CMV em fibroblastos humanos segundo técnica descrita por Machado et al. (1991), anátomo-patológico com presença de corpúsculos de inclusão citomegálica ou detecção de antígenos do CMV com anticorpos monoclonais em tecido (imunohistoquímica) ou em células de fluido de lavado broncoalveolar (imunocitoquímica), de acordo com Cathomas et al. (1993) com pequenas modificações.

“ Vigilância da Infecção pelo CMV

A detecção da fosfoproteína pp-65 da matriz do CMV em neutrófilos do sangue periférico (Antigenemia) foi realizada semanalmente do condicionamento até o dia + 120. Quando uma antigenemia positiva era detectada, o teste era repetido em dias alternados até sua negatificação. Amostras foram colhidas em tubo com EDTA, encaminhadas ao Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IMT-FMUSP) e foram processadas de acordo com a técnica padronizada por Machado em 1996, com base em técnicas pré-estabelecidas (Van Der Bij et al., 1988; Halwachs et al., 1993) e modificadas por Pannuti et al. em 1996.

3.4. COLETA DO ENXERTO E REINFUSÃO

O dia da infusão de células foi designado como dia zero (D0). No grupo de *stem cells* coletadas no sangue periférico por aférese, a mobilização consistiu da administração subcutânea diária de G-CSF na dose de 10µl/Kg. O tratamento iniciava no dia -5 e terminava no dia -1. Seguindo o protocolo, realizou-se a coleta em 2 ou 4 citoaférese, de pelo menos $2,5 \times 10^6$ CD34/Kg para o grupo autólogo (Auto-SP) e $5,0 \times 10^6$ CD34/Kg para o grupo alogênico periférico (Alo-SP). No grupo Alo-SP, a primeira citoaférese era realizada e infundida no mesmo dia. Já no grupo Auto-SP, o produto da aférese era criopreservado para ser infundido posteriormente nos próximos 07 a 15 dias da coleta. No grupo alogênico de medula (Alo-MO), a coleta de pelo menos $2,0 \times 10^8$ de células nucleadas por Kg do receptor era requerida e a transfusão de sangue coletado da medula, de modo semelhante ao grupo Alo-SP, geralmente era realizada no dia da coleta (Infusão à fresco).

“ Amostras Biológicas

Amostras de células hematopoéticas, em volume de 1-2 ml foram coletadas da medula óssea e de cada produto de aférese e anticoaguladas com citrato (Vacutainer; Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France). As amostras foram obtidas da medula óssea dos doadores no momento da coleta realizada no centro cirúrgico, e do sangue periférico dos doadores de células tronco mobilizadas após utilização de fator de crescimento (G-CSF), na primeira aférese. O uso de citrato como anticoagulante de sangue foi escolhido por ser homogêneo com os enxertos de medula e do sangue periférico, os quais foram coletados em bolsas contendo citrato. Ainda, amostras de 2ml e 8ml de sangue periférico, anticoaguladas com EDTA e Heparina respectivamente foram obtidas dos receptores das três modalidades de transplante nos dias +30 e +90 pós-transplante para realização dos exames laboratoriais (hemograma, imunofenotipagem linfocitária; ensaios linfoproliferativos e IFN- γ).

3.5. METODOLOGIA

As metodologias desenvolvidas e padronizadas para avaliar comparativamente a reconstituição imunológica dos pacientes receptores das três modalidades de transplante (Alo-SP, Alo-MO e Auto-SP) no período considerado (D0, D+30, D+90) foram:

- 1) Imunofenotipagem na caracterização das subpopulações de Linfócitos TCD8+ por citometria de fluxo (avaliação quantitativa)
- 2) Ensaios de linfoproliferação para avaliação da resposta imunológica específica para o citomegalovírus (avaliação funcional)
- 3) Determinação da produção de interferon-gama (IFN- γ) nos sobrenadantes dos ensaios de linfoproliferação por ELISA (avaliação funcional)

.. ANTICORPOS MONOCLONAIS E ANÁLISE DO FENÓTIPO DOS LINFÓCITOS T CD8+ POR CITOMETRIA DE FLUXO

Amostras de sangue (1-2ml) foram colhidas dos doadores em tubos com citrato no D0 e dos receptores em tubos com EDTA no D+30 e D+90 (medianas: 30 e 96), transportadas ao Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM-56) e processadas no mesmo dia da coleta.

Tubos de prolipropileno foram rotulados apropriadamente antes de cada experimento, recebendo as seguintes combinações de anticorpos monoclonais (mAc), caracterizando diversos protocolos em único painel (1).

Tubo 1: Controles Isotípicos (Immunotech, BC, Marseille, France)

IgG1-FITC, IgG1-PE, IgG1-PERCP (frascos com tripla marcação), ou
IgG1-FITC, IgG1-PE (frascos com dupla marcação),
ambos com complementação de IgG1-ECD

Tubo 2: Teste Lise (Immunotech, BC, Marseille, France)

CD4-FITC, CD8-PE, CD3-PERCP (frascos com tripla marcação)

Caracterização do fenótipo da membrana linfocitária e subpopulações dos LTCD8+

Tubo 3: CD8-FITC, CD28-PE, CD45RA-ECD (Immunotech)

Tubo 4: CD8-FITC, CD62L-PE, CD45RA-ECD (Immunotech)

Tubo 5: CD8-FITC, CD11b-PE, CD45RA-ECD (Immunotech)

Para ensaios de marcação intracelular na pesquisa da expressão de granzima B (GB) em linfócitos auxiliando a caracterização das subpopulações dos LTCD8+, outro painel complementar (2) foi elaborado separadamente com dois protocolos conforme é mostrado a seguir e as amostras foram processadas segundo técnica padronizada e previamente descrita (Vasconcelos, 1988; Weiss et al., 1999) com pequenas modificações.

Tubo 1: Controles Isotípicos (Immunotech, BC, Marseille, France)

IgG1-FITC, IgG1-PE, IgG1-ECD

Tubo 2: *Identificação intracelular da molécula citotóxica GB em LTCD8+*
CD8-FITC, CD45RA-ECD (Immunotech),
GB-PE (Caltag Laboratories, Burlingame, CA, EUA)

Amostras de células hematopoéticas do grupo Alo-SP foram previamente diluídas 10-20 vezes em 0.9% de cloreto de sódio (NaCl) antes da marcação dos receptores de superfície das células com os anticorpos monoclonais mencionados conjugados com diferentes fluorocromos reveladores como o Fluorescein Isothiocyanate (FITC), R-Phycoerythrin (PE), Phycoerythrin-Texas Red (ECD) e Peridinin Chlorophyll Protein (PERCP), para acertar a concentração de células da amostra e viabilizar a leitura nos equipamentos Cell-Dyn 1400 e no citômetro.

Foram adicionados a cada tubo alíquotas dos doadores de aproximadamente 20-40ul de sangue (da medula ou do hemoconcentrado da bolsa, produto da aférese já diluído) no D0 ou de 150ul de sangue dos receptores no D+30 e D+90 pós-TMO de acordo com o número relativo e percentual de células mostrados no hemograma realizado no dia. Estas alíquotas foram então misturadas e incubadas no escuro por 20 minutos em temperatura ambiente com 2,5-10ul dos anticorpos monoclonais (05ul de CD62L; 2,5ul de CD45RA; demais anticorpos: 10ul), de acordo com a padronização estabelecida inicialmente no estudo através da titulação dos mesmos utilizando-se amostras de sangue de indivíduos controles. Posteriormente, ao término da incubação, as amostras foram colocadas em dispositivo automatizado, o Multi-Q-Prep (Coulter, Fullerton, CA, EUA) onde após serem homogenizadas com uma solução de lise contendo ácido fórmico em pH2 para lise das hemácias, foram ressuspensas em uma solução tampão de cloreto de sódio e fosfato, NaCl/Fosfato em pH 10 e fixadas em solução de paraformolaldeído (PFA) a 01%, todas soluções previamente preparadas e integrantes deste equipamento (Immunoprep). Após todas estas etapas sucessivas resumidas na FIGURA 1, as células foram então submetidas à aquisição e análise por citometria de fluxo.

FIGURA 1. RESUMO DAS ETAPAS SUCESSIVAS DA METODOLOGIA UTILIZADA NA IMUNOFENOTIPAGEM DOS LINFÓCITOS

As aquisições e análises foram realizadas em um citômetro de fluxo Coulter Epics-XL2-MCL (Coulter, Fullerton, CA, EUA) equipado com laser de argônio de 488nm. O citômetro foi acoplado à unidade constituída por microcomputador que permitiu o controle da aquisição de seis parâmetros descritos para cada evento (dispersão frontal [FSC] e lateral [SSC] de luz, emissão de cores verde [FL1], vermelho [FL2], azul [FL3] e magenta [FL4]) com armazenamento dos dados em arquivos tanto no disco rígido, como em discos flexíveis modelo ZIP 100 (Iomega, Roy, UT, EUA).

Tanto a aquisição dos eventos, como a análise dos resultados foram realizados com o auxílio do programa Coulter Epics-XL2 (Coulter, Fullerton, CA,EUA) e os dados obtidos foram armazenados em arquivos e em cópias impressas. As reanálises foram feitas utilizando este mesmo programa ou um outro similar Dako Cytomation (Summit). A aquisição inicial de eventos, cada um correspondendo a uma célula, foi realizada usando as dispersões frontal e lateral de luz incidente sobre as células em suspensão nas amostras, captadas pelos sensores do equipamento, que representam, respectivamente, o tamanho e a complexidade

(granulosidade) das células. Desta forma, foi possível a separação do total de células (leucócitos) contido na amostra nas diferentes populações conhecidas de linfócitos, monócitos e granulócitos (FIGURA 2a). Para isso, foram obtidos 10.000 eventos de cada amostra por protocolo, utilizando-se gráfico contendo respectivamente os dois parâmetros (FSC e SSC) e com área de aquisição sobre a população de linfócitos, localizada em região com baixa dispersão lateral e moderada dispersão frontal de luz (Gate A).

Após esse processo, as voltagens das fluorescências equivalentes a cada canal de cor foram previamente ajustadas, inicialmente utilizando-se amostras não marcadas com anticorpos monoclonais conjugados com fluorocromos de 12 voluntários saudáveis como controles, sendo realizada posterior compensação dos valores mediante a interferência dos comprimentos de onda dos diferentes detectores de cores do aparelho, utilizando-se para este fim amostras não marcadas dos mesmos indivíduos controles, amostras marcadas somente com cada uma das cores e amostras contendo a mistura delas. As condições durante a padronização para determinação precisa da área de aquisição de interesse (Gate A) bem como dos quadrantes dela dependentes foram estabelecidas com base nos controles isotípicos das amostras destes voluntários (protocolo 1, painéis 1 e 2).

A análise (no protocolo 2 do painel 1) consistiu na distribuição dos linfócitos CD3+/CD8+ em gráficos, contendo os parâmetros FL2 e FL4, com estabelecimento de quadrantes nas amostras marcadas com imunoglobulinas-controle (controles isotípicos) e amostras marcadas para CD3+, CD4+, CD8+. Assim, as células CD4+ e CD8+ foram determinadas a partir dos linfócitos que coexpressavam a molécula CD3+ (FIGURA 2b). Além da identificação e quantificação dos linfócitos T CD4+ e CD8+, esta análise permitiu adicionalmente a determinação da pequena parcela de linfócitos T CD4+/CD8+ (duplo-positivos) e CD4-/CD8- (duplo-negativos).

Nos protocolos consecutivos 3, 4 e 5 do painel 1 e também nos do painel 2 para determinação específica dos fenótipos de superfície e intracelular respectivamente, foi utilizada imunofluorescência de apenas três cores. Neste caso, para não serem consideradas outras células como linfócitos T CD4+ ou células Natural Killers (NK) com expressão de CD8+ em intensidade de fluorescência baixa ou intermediária, a

análise consistiu na inferência aproximada dos valores percentuais obtidos anteriormente no protocolo 2 (nos quadrantes CD3+/CD8+) para a distribuição em gráficos dos linfócitos T com expressão de CD8+ em alta intensidade de fluorescência (CD8^{High}, CD8^{HI} selecionados pelo Gate H) (FIGURA 2c), contendo os parâmetros SSC e FL1.

FIGURA 2. SEPARAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE CÉLULAS POR IMUNOFENOTIPAGEM. (A) TOTAL DE LEUCÓCITOS (B) LINFÓCITOS T CD3+CD8+ (C) LINFÓCITOS T CD8^{HI}

Além disso, nestes protocolos foram elaborados quadrantes para análise da coexpressão de marcadores, contendo os parâmetros FL2 e FL3 e histogramas contendo a contagem e intensidade de fluorescência individual destes parâmetros. Alguns destes quadrantes e histogramas dependentes do Gate A e outros dependentes do Gate H foram analisados durante a aquisição ou posteriormente por reanálise dos dados, considerando o limite do programa na construção de até 08 gráficos por aquisição.

Em todos os protocolos foram utilizadas amostras marcadas com imunoglobulinas-controle (controles isotípicos) e amostras marcadas para CD45RA e CD28 ou CD62L ou CD11b (dependendo do protocolo em análise).

As marcações feitas com os anticorpos monoclonais conjugados com fluorocromos nestes protocolos sucessivos, permitiram identificar e quantificar as subpopulações de linfócitos TCD8+ *naive*, de memória central, memória efetora e efetora.

As subpopulações linfocitárias foram analisadas pela percentagem de células (LTCD8^{HI}) que expressavam diferentes combinações de marcadores de superfície. Para definição das células *naive*: CD3+/CD8+/CD28(CD62L)+/CD11b-/ CD45RA+; memória central (T_{MC}): CD3+/CD8+/CD28(CD62L)+/ CD11b-/ CD45RA-; memória efetora (T_{ME}): CD3+/ CD8+/ CD28(CD62L)-/ CD11b+/ CD45RA-; e efetora: CD3+/ CD8+/ CD28(CD62L)-/ CD11b+/ CD45RA+ (FIGURA 3).

Os dados foram expressos como percentagem de células positivas, sendo os respectivos valores percentuais transferidos para planilhas de análise de dados nos programas Excel XP (Microsoft Corporation, Seattle, WA, EUA) e GraphPad Prism 3.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). O número absoluto das subpopulações linfocitárias foi calculado usando a percentagem de cada subpopulação e o número total de células determinado no hemograma realizado por um contador automático de células (Cell-Dyn 1400) simultaneamente à fenotipagem por citometria de fluxo.

FIGURA 3. IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO E SELEÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS

As FIGURAS 4 a 7 correspondem a representação da aplicação metodológica na caracterização das subpopulações linfocitárias a partir da amostra de um indivíduo controle.

Após a padronização, amostras da suspensão de células infundidas nos receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP, n=16) ou de medula óssea (Alo-MO, n=28), e nos receptores de transplante autólogo procedente do sangue periférico (Auto-SP, n=22) foram avaliadas por esta metodologia permitindo a comparação dos diferentes padrões fenotípicos (para o CD28, CD62L, CD11b e CD45RA) encontrados durante a aquisição das células na caracterização das diferentes subpopulações linfocitárias (respectivamente FIGURAS: 8 a 11; FIGURAS: 12 a 15; FIGURAS 16 a 19). A mesma forma de avaliação foi utilizada no D+30 e D+90 do período pós-transplante para a avaliação da reconstituição imunológica destes pacientes.

FIGURA 4. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ ENCONTRADOS NO SANGUE PERIFÉRICO DE UM INDIVÍDUO CONTROLE

FIGURA 5. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ ENCONTRADOS NO SANGUE PERIFÉRICO DE UM INDIVÍDUO CONTROLE

FIGURA 6. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+/ CD8+/ CD62L+/ CD45RA+ ENCONTRADOS NO SANGUE PERIFÉRICO DE UM INDIVÍDUO CONTROLE

FIGURA 7. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+/ CD8+/ CD11B+/ CD45RA+ ENCONTRADOS NO SANGUE PERIFÉRICO DE UM INDIVÍDUO CONTROLE

FIGURA 8. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3⁺ / CD8⁺ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

FIGURA 9. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

FIGURA 10. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD62L+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

FIGURA 11. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD11B+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

FIGURA 12. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3⁺ / CD8⁺ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

FIGURA 13. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

FIGURA 14. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD62L+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

FIGURA 15. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD11B+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

FIGURA 16. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

FIGURA 17. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

FIGURA 18. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD62L+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

FIGURA 19. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ / CD11B+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

“ Expressão de Granzima B intracelular

Os ensaios de marcação intracelular foram realizados como previamente descritos (Vasconcelos, 1988; Weiss et al., 1999). A marcação das moléculas da superfície linfocitária ocorreu após incubação no escuro da amostra com anticorpos monoclonais conjugados com fluorocromos (CD8-FITC, CD45RA-ECD) em temperatura a -4°C por 20 minutos. Após esta etapa, as alíquotas de células já marcadas na superfície foram lavadas duas vezes em 2ml de solução tampão de salina e fosfato (PBS) suplementada com 0,2% de azida sódica (NaN_3) e 0,2% de albumina sérica bovina (BSA) em pH 7,4; ressuspensas em 100ul de meio de fixação (PBS/BSA/ NaN_3 contendo 4% v/v de formaldeído – Sigma) e incubadas por 10 minutos em temperatura ambiente. Após repetir mais 2 lavagens das células com a mesma solução tampão utilizada anteriormente, 100ul de solução de permeabilização (PBS contendo 0,5% de saponina e 0,5% de BSA-Sigma) e 0,5ul de mAc para granzima B conjugado com phycoerythrin-PE (Caltag Laboratories, Burlingame, CA, EUA) (no protocolo 2 do painel 2), ou com 0,5ul de imunoglobulina-controle (controle isotípico, no protocolo 1 do painel 2) foram misturados e incubados no escuro por mais 20 minutos em temperatura ambiente. Após mais 2 lavagens e ressuspensão em 1ml de solução tampão (PBS), as amostras foram então submetidas a aquisição e análise por citometria de fluxo para a identificação das células T CD8+ que co-expressavam granzima B.

Os resultados da mesma forma daqueles obtidos com a utilização do painel 1 foram expressos em percentagens de células positivas. Após a padronização com amostras de indivíduos controles e controles isotípicos, amostras da suspensão de células infundidas nos receptores das três modalidades de transplante (Alo-SP, Alo-MO, e Auto-SP) foram avaliadas por esta metodologia permitindo a comparação dos diferentes padrões fenotípicos (para o CD8, CD45RA e GB) encontrados durante a aquisição das células no painel 2, contribuindo também para a identificação e quantificação das subpopulações linfocitárias de memória efetora e efetora (respectivamente FIGURAS 20-22).

FIGURA 20. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NA SUBPOPLAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3⁺ / CD8^{HI} TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

FIGURA 21. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3⁺ / CD8^{HI} TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

FIGURA 22. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T $CD3^+$ / $CD8^{HI}$ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

“ CONTAGEM DAS CÉLULAS

A contagem das células em todas as amostras foi realizada por um contador de células automático (Cell-Dyn 1400). As amostras com células tronco hematopoéticas periféricas (*HSC*) foram previamente diluídas 10 a 20 vezes em solução de cloreto de sódio (NaCl) 0.9%. Os números absolutos de células no sangue periférico do paciente no D+30 e D+90 e de células do doador infundidas por quilo do receptor (expressos na unidade de $10^8/\text{Kg}$, levando em consideração também o volume total infundido) no D0, foram calculados a partir da percentagem de cada subpopulação celular identificada após-análise por citometria e a contagem total das células determinada no hemograma realizado também no dia da coleta.

“ IMUNIDADE DA CÉLULA T ESPECÍFICA PARA O CMV

Nos pacientes também foi analisado o estado imunológico das células T específicas para o CMV imediatamente após o transplante de medula (mediana do tempo: 29 dias), concomitantemente à positivação da antigenemia (mas antes da introdução do GCV) e ao final do seguimento (mediana do tempo: 90 dias). Para isto, em cada etapa da avaliação imunológica, foram realizadas determinações de ambas respostas linfoproliferativas e produção de interferon-gama ($\text{INF-}\gamma$) no Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

“ Ensaio Linfoproliferativo

Células mononucleares (PBMC) foram isoladas do sangue periférico heparinizado por centrifugação em gradiente de densidade Ficoll-Hypaque (Pharmacia, Uppsala, Suíça) e ressuspensas em meio RPMI suplementado com gentamicina (40ug/mL) e 10% do pool de soro AB humano normal (Sigma, EUA), como previamente descrito (Kallas et al., 1998). Brevemente, as células mononucleares ($2,5 \times 10^5$ / “well” ou por alvéolo) foram cultivadas em placas de microcultura de 96 alvéolos em triplicata (Corning- Costar, Cambridge, Mass, EUA) à 37° C com 5% de CO₂ na presença somente de meio de cultura, do mitógeno Pokeweed (PWM, 5.0 ug/mL, na diluição final de 1:10), antígeno de *Candida albicans* (CMA-Ag, na diluição final também de 1:10) e antígeno CMV (CMV-Ag). O antígeno CMV foi preparado a partir de sobrenadantes de fibroblastos de pele humana infectados pela cepa do CMV AD169 como descrito anteriormente (Benard et al., 2001; Mendes et al., 2001) e usado na diluição final padronizada de 1:100. As células foram incubadas por 6 dias. A resposta proliferativa foi avaliada pela incorporação de timidina triciada (1,0 uCi/well [³H] thymidina, Radiochemical Center, Amersham, NEN, UK) adicionada 18 h antes do fim do cultivo e a radioatividade das células foi medida em um contador de cintilação beta (1205 Betaplate Wallac Oi, Turquia, Finlândia). Os resultados foram expressos como índice de estimulação (IE) obtido pela divisão da média de contagens por minuto da triplicata dos alvéolos estimulados com PWM, CMA ou CMV (Δ c.p.m / “wells”) pela média de Δ c.p.m da triplicata dos alvéolos com o meio de cultura sozinho. Um índice de estimulação de três ou mais foi considerado como uma resposta positiva ao antígeno CMV. Esta definição foi baseada na média $\pm$ 1 desvio padrão (DP) dos IE obtidos de 29 doadores saudáveis soropositivos para CMV (48.7 ± 39.2 , variando de 3.5-159.3).

“ ELISA para determinação de INF- γ ”

As culturas de células mononucleares do sangue periférico (*PBMC*) foram processadas como descrito acima e os sobrenadantes foram coletados no 5^o dia, como determinado pelos ensaios preliminares para a ótima produção de INF- γ induzida pelo antígeno CMV. Os sobrenadantes foram congelados a -80°C até que os ensaios fossem realizados. Os anticorpos e respectivos padrões para as reações foram adquiridos da Endogen (Cambridge, Mass., EUA) e usados segundo as recomendações dos fabricantes, como previamente descrito (Kallas et al.,1998). Brevemente, microplacas de poliestireno com 96 alvéolos (de alta ligação, Costar, Cambridge, MA) foram sensibilizadas com anticorpo monoclonal anti-IFN- γ humano (2,5 $\mu\text{g/mL}$, M-700A-E, Endogen, EUA) à 4°C “overnight”. As microplacas foram bloqueadas com tampão fosfato (PBS, pH 7,6) com 4% de soro albumina bovina (BSA) por 2 horas a temperatura ambiente e lavadas com Tris HCl 5 mM, 0,1 % Tween. No ensaio, os sobrenadantes, curva padrão (10 – 2000 pg/mL) e anticorpo monoclonal anti-IFN γ humanos biotinizados (1 $\mu\text{g/mL}$, M-701-B, Endogen Cambridge, EUA) foram adicionados e as placas permaneceram 2hs à temperatura ambiente. Após nova lavagem com Tris HCl 5 mM 0,1% Tween (M96V, Titertek 520 Staker, EUA) foi adicionada streptavidina - peroxidase (1/1000 Genzyme; Cambridge, Mass, EUA) por 15 min à 37°C . A revelação foi realizada com tetrametilbenzidina (TMB - Organon, Durham, N.C., EUA) e a reação enzimática interrompida com ácido sulfúrico 1N. As densidades ópticas foram medidas em filtro de 450nm no leitor de microplacas de ensaios de ELISA (Biorad, modelo 3550; Hercules, Califórnia, EUA) e a concentração da proteína foi determinada pela relação densidade óptica versus curva padrão utilizando o programa GraphPad Prisma 3.0 (Microsoft Corporation, Seattle, WA). As unidades de densidade óptica foram correlacionadas com a concentração de proteína usando o IFN- γ humano padrão recombinante. O limite de detecção dos ensaios para IFN γ foi 32 pg/mL.

3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram transferidos para planilhas de análise de dados nos programas Microsoft Excel XP (Microsoft Corporation, Seattle, WA, EUA) e GraphPad Prisma 3.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA).

O Teste não paramétrico de Mann-Whitney foi usado para comparar dados contínuos não pareados entre os grupos de transplante ou entre os diferentes períodos de acompanhamento, pois testes paramétricos não se mostraram adequados, uma vez que a distribuição empírica dos dados foi assimétrica e não se aproximou de uma normal, Gaussiana. Para comparações de três condições avaliadas entre os grupos ou entre os diferentes períodos, foi utilizado o teste One-way ANOVA não paramétrico de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn que possibilitou comparar todos os pares de colunas.

Os testes qui-quadrado e exato de Fisher foram usados para analisar a associação de variáveis dicotômicas entre os grupos, sob a forma de tabelas de contingência 2X2.

A correlação não paramétrica de Spearman foi usada para analisar a relação entre os níveis de citocina (IFN- γ) e respostas proliferativas e também a relação entre o número de linfócitos T CD8+ que expressavam granzima B com o número dos que coexpressavam marcadores de superfície característicos das subpopulações memória efetora e efetora (ME+E). Foram consideradas fortes as correlações com coeficiente “r” de Spearman igual ou maior a 0,7; moderadas com este valor entre 0,5 e 0,69 e fracas quando menor que 0,5 (Rothman e Greenland, 1998).

Foram consideradas estatisticamente significantes as diferenças com p crítico, p value menor que 0.05 ($p < 0,05$). Todos os resultados foram apresentados como medianas dos valores obtidos e também nos percentis 25 e 75. A apresentação dos percentis para cada um dos marcadores utilizados por período encontra-se em tabelas nos ANEXOS E (D0), F (D+30), G (D+90).

4.1. ANÁLISE FENOTÍPICA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS

O fenótipo da superfície celular foi estudado usando imunofluorescência de três cores. Conforme foi explicado na padronização desta metodologia, após a aquisição dos eventos na área de interesse correspondente a população de linfócitos vivos usando as propriedades do citômetro de distribuição das células pelo tamanho e pela complexidade ou granulosidade (Gate A), os linfócitos T CD3+/CD8+ foram selecionados e representados em um novo histograma (Gate H: CD8^{HI}) para excluir outras células CD8+ como as células “natural Killers” (NK) e possibilitar assim a análise dos quadrantes elaborados em cada protocolo, de CD28 e CD45RA, CD62L e CD45RA, CD11b e CD45RA para caracterização das subpopulações de células T CD8+ nos três grupos (Alo-SP, Alo-MO e Auto-SP), em diferentes períodos (D0, D+30 e D+90) após o transplante.

Desta forma, foi avaliada a distribuição dos números relativos e absolutos de células T nos seus vários estágios de diferenciação e maturação nos contextos de transplante de medula óssea e de infecção pelo citomegalovírus. Os resultados foram expressos de forma comparativa entre os três grupos e sucessiva no tempo para o D0, D+30 e D+90 pós-transplante, inicialmente para um dos marcadores, o CD28 (protocolo 3 do painel 1) e posteriormente para os demais marcadores de moléculas de superfície selecionados, o CD62L, CD11b (protocolos 4 e 5 do painel 1) e intracelular (protocolo 2 do painel 2). Os gráficos, formas mais apropriadas para mostrar tendências pronunciadas dos resultados, proporcionando assim uma visão rápida da dinâmica da reconstituição imunológica dos pacientes foram apresentados em conjunto após serem descritos no texto e foram agrupados de acordo com o período pós-transplante. Estes, como melhores elementos de ilustração dos dados percentuais observados, auxiliam na medida que tornam claros fatos que poderiam passar despercebidos nos dados apenas tabulados. De forma similar e complementar, as tabelas foram utilizadas como a melhor forma de ilustração para mostrar os valores absolutos observados nos três períodos (D0, D+30, D+90) pós-transplante. As figuras apresentadas ilustram diferenças observadas entre os grupos conforme a metodologia utilizada, que no caso da determinação das subpopulações linfocitárias por imunofenotipagem, tornaram-se logo evidentes durante sua realização.

“ Infusão de Células Hematopoéticas no D0

Durante a aquisição de eventos na análise fenotípica realizada, foram observadas diferenças notáveis já na distribuição por tamanho (FS) e granulosidade (SS) do total de células recebidas entre os três grupos como pode ser visualizado na FIGURA 23, representativa da análise de três pacientes por grupo no D0.

FIGURA 23. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DO TOTAL DE CÉLULAS TRANSFERIDAS PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Estas diferenças foram significativas entre os três grupos ao avaliarmos os números absolutos do total de células infundidas por quilo do receptor ($p < 0,0001$). Como nos trabalhos anteriores (Tayebi et al., 1998 e 2001), estes números foram significativamente maiores nos grupos de transplantes provenientes da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico que aqueles originados da coleta de células diretamente da medula óssea. As diferenças percentuais e na contagem observadas entre os grupos no D0 encontram-se na TABELA 8 e na FIGURA 26 (GRÁFICOS 1 a 21). As contagens de leucócitos infundidos foram 6,5 vezes maiores no Alo-SP e 2,3 vezes maiores no Auto-SP que no Alo-MO ($p < 0,001$) (GRÁFICO 1).

Os valores percentuais do total de linfócitos infundidos foram determinados e houve diferença estatística entre os três grupos ($p < 0,0001$). Estes foram também significativamente maiores nos grupos de transplante procedentes do sangue periférico que aqueles procedentes da medula óssea (29,7% no grupo Alo-SP, 23,9% no Auto-SP e 9,9% no Alo-MO). Não houve diferença estatística entre os grupos

Alo-SP e Auto-SP. A tendência pronunciada da transferência de um maior número de linfócitos nos grupos Alo-SP e Auto-SP pode ser observada no GRÁFICO 2A.

Analisando as subpopulações linfocitárias, não houve diferenças estatísticas nos valores percentuais para células CD3+ transferidas entre os grupos ($p=0,0756$) (64,5% no grupo Alo-SP, 53,7% no Alo-MO e 43,3% no grupo Auto-SP) (GRÁFICO 3A). Já para as células CD4+, houve diferença estatisticamente significativa entre os três grupos ($p=0,0042$) sendo estas células transferidas em quantidades percentuais significativamente maiores no grupo Alo-SP (35,9%) comparadas as do grupo Auto-SP (21,3%) ($p<0,01$). E, no grupo Alo-MO representaram 25,7% do total de células T CD3+ (GRÁFICO 4A). Diferentemente para as células CD8+, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p=0,8357$) (20,8% no Alo-SP, 20,5% no Alo-MO e 19,0% no Auto-SP) (GRÁFICO 5A) nem para as células CD8+ com expressão desta molécula em alta intensidade de fluorescência (CD8^{HI}) ($p=0,7911$) (21,05% no Alo-SP, 20,75% no Alo-MO e 18,7% no Auto-SP) (GRÁFICO 6A).

Na análise fenotípica quantitativa do total de linfócitos T CD3+CD8+CD45RA+ (selecionados do Gate A) infundidos nos receptores das diferentes modalidades de transplante, houve diferença estatística entre os grupos ($p<0,0001$), estando presentes em maior percentual no transplante realizado no grupo Alo-MO (47,85% vs 25,30% no grupo Alo-SP e vs 19,35% no grupo Auto-SP) (GRÁFICO 7A). Porém a expressão isolada deste marcador de superfície não define uma subpopulação específica devendo para isto ser avaliado em conjunto com outros (coexpressão de marcadores). As FIGURAS 24a e 24b obtidas durante a aquisição pelo protocolo 3 do painel 1 (CD28), são representativas da análise comparativa da expressão de CD45RA nas células provenientes de amostras de três pacientes por grupo no D0. Na primeira, os gráficos são dependentes da área de aquisição total dos linfócitos (Gate A) e na segunda, que também mostra diferença notável entre os grupos, os gráficos são dependentes da área de aquisição de linfócitos com alta expressão da molécula CD8+ (CD8^{HI}) (Gate H).

(a)

(b)

FIGURA 24. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DO TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+CD8+CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA (a) GATE A (b) GATE H

Da mesma forma que para o CD45RA, avaliamos as células CD3+CD8+ presentes no Gate A que coexpressavam a molécula CD28 e também observamos diferença estatística entre os grupos ($p=0,0117$). O grupo Alo-MO recebeu maior infusão destas células que o grupo Alo-SP (52,80% vs 31,50%) ($p<0,05$) e Auto-SP (40,30%), apesar desta última diferença não ser estatisticamente significativa. Não houve diferença estatística entre os grupos Alo-SP e Auto-SP na coexpressão de nenhum dos dois marcadores analisados (GRÁFICO 8A).

Quando as células CD3+CD8+CD45RA+ no Gate H foram quantificadas em valores percentuais, também houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p<0,0001$) (54,90% das células no grupo Alo-SP, 54,85% no grupo Alo-MO e 23,10% no grupo Auto-SP) (GRÁFICO 9A). De maneira similar, ao analisar as células no Gate H que coexpressavam a molécula de CD28 também notamos diferença estatística entre os grupos ($p=0,0003$), mais pronunciada para o grupo Alo-MO (96,0%) em relação aos grupos Alo-SP (86,2%) e Auto-SP (86,9%) ($p<0,01$) provavelmente sugerindo maior proporção de células *naive* na medula (GRÁFICO 10A).

Em relação as subpopulações de linfócitos T CD8+ transferidos no D0 para os receptores das três modalidades de transplante foram observadas diferenças percentuais estatisticamente significantes ($p<0,05$). Estas diferenças por grupo foram quantificadas e representadas em gráficos, GRAFICO 11A para subpopulação *naive*, GRAFICO 12A para subpopulação memória central, GRÁFICO 13A para subpopulação de memória efetora e GRÁFICO 14A para a subpopulação efetora. Através da análise comparativa detalhada e simples de cada um destes gráficos isoladamente e após agrupá-los de diferentes formas (todas subpopulações por grupo - GRÁFICO 15A a 17A - e todos os grupos - GRÁFICO 18A) aumentando o grau de complexidade da análise, um dos aspectos observados foi que os receptores de transplantes procedentes do sangue periférico (allogênico e autólogo) receberam no transplante mais células T CD8+ da subpopulação de memória central (T_{MC}) (52,65%) que células da subpopulação *naive* (20,05%) ($p<0,0001$). Esta diferença foi estatisticamente mais evidente para o grupo de transplante autólogo de sangue periférico (67,75% de células T_{MC} , *versus* 15,70% de células *naive*, $p<0,001$). Este grupo também recebeu mais células da subpopulação memória central (T_{MC}) que o

grupo Alo-MO (67,75% *versus* 42,1% respectivamente, $p<0,05$) Em relação ao grupo Alo-MO, a subpopulação de células TCD8+ *naive* foi estatisticamente predominante (52,65% *versus* 33,75% no grupo Alo-SP, $p<0,01$ e *versus* 15,70% no grupo Auto-SP, $p<0,001$).

Estas diferenças percentuais foram percebidas inicialmente durante a aquisição de eventos na imunofenotipagem de todas as amostras. Exemplos ilustrativos por grupo encontram-se na FIGURA 25.

FIGURA 25. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+CD8+CD28+CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Os números absolutos também foram calculados para todas as células infundidas por quilo dos receptores (TABELA 8). Houve diferença estatística entre os grupos ($p<0,0001$). Na análise, além do maior número de leucócitos infundidos aproximadamente, 6,5 vezes maior no grupo Alo-SP e 2,3 vezes maior no grupo Auto-SP que no grupo Alo-MO ($p<0,001$) (GRÁFICO 1), observou-se também que o total de linfócitos infundidos foi 18,5 vezes maior no grupo Alo-SP e 5,9 vezes maior no grupo Auto-SP que no grupo Alo-MO ($p<0,001$) (GRÁFICO 2B). Os números absolutos das células CD3+, CD4+ e CD8+ foram também maiores nos transplantes alogênico e autólogo procedentes da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico comparado ao grupo que realizou transplante alogênico procedente da coleta de células diretamente da medula óssea: respectivamente, 11 e 3,2 vezes maior

em relação às células CD3+ ($p<0,001$ e $p<0,01$) (GRÁFICO 3B), 17,5 e 4 vezes maior em relação às células CD4+ ($p<0,001$ e $p<0,01$) (GRÁFICO 4B) e 11 vezes maior e 3,5 vezes maior em relação às células CD8+ ($p<0,001$ e $p<0,01$) (GRÁFICO 5B). Os linfócitos com expressão de CD8 em alta intensidade de fluorescência (CD8^{HI}, Gate H) foram encontrados 17,9 vezes mais nos receptores do transplante Alo-SP e 3,9 vezes mais no grupo Auto-SP que nos pacientes do grupo Alo-MO ($p<0,001$ e $p<0,01$) (GRÁFICO 6B).

A expressão do marcador de superfície CD45RA no total de linfócitos (Gate A) foi 12,5 vezes maior no grupo Alo-SP e 2,3 vezes maior no grupo Auto-SP em comparação ao grupo Alo-MO ($p<0,001$ e $p>0,05$) (GRÁFICO 7B). Este mesmo marcador analisado em linfócitos CD8^{HI}, selecionados no Gate H, também estava presente em maior número de células nos grupos Alo-SP e Auto-SP que no grupo Alo-MO, respectivamente 18,1 e 2,1 vezes ($p<0,001$ e $p>0,05$) (GRÁFICO 9B). De forma similar o total de linfócitos encontrados no Gate A que expressavam a molécula de CD28+ foi mais freqüente nos grupos Alo-SP e Auto-SP que no grupo Alo-MO, respectivamente, 16,2 e 3,97 vezes ($p<0,001$ e $p<0,05$) (GRÁFICO 8B). Quando analisada a expressão deste marcador sobre a área de aquisição de linfócitos CD8^{HI}, no Gate H, foi observado também que os grupos Alo-SP e Auto-SP receberam respectivamente 16,4 e 3,2 vezes mais células CD28+ que o grupo Alo-MO ($p<0,001$ e $p<0,01$) (GRÁFICO 10B).

Até onde vai nosso conhecimento, a identificação e quantificação das subpopulações de linfócitos TCD8+ *naive*, memória central, memória efetora e efetora realizadas de forma simultânea e comparativa entre os três grupos são inéditas na literatura. As discrepâncias entre os grupos foram ainda maiores nos transplantes procedentes do sangue periférico, alogênicos e autólogos em relação ao transplante originado da medula óssea, particularmente com respeito as subpopulações de linfócitos TCD8+ de memória transferidos aos receptores: respectivamente, 27,1 e 6,95 vezes mais células da subpopulação de memória central ($p<0,001$) (GRÁFICO 12B); 181,3 e 28,7 vezes mais linfócitos da subpopulação de memória efetora ($p<0,001$) (GRÁFICO 13B), e 68,3 e 9,75 vezes mais células da subpopulação efetora ($p<0,001$) (GRÁFICO 14B). Os pacientes do grupo Alo-MO receberam 1,2 vezes mais células *naive* que o grupo Auto-SP ($p>0,05$) mas 12,1

vezes menos que o grupo Alo-SP ($p<0,001$) (GRÁFICO 11B). Desta forma, os resultados indicaram que os receptores de transplante de células tronco hematopoéticas procedentes do sangue periférico após serem mobilizadas, tanto do grupo alogênico ou autólogo, são altamente enriquecidos pela transferência de subpopulações de linfócitos TCD8+ de memória, especialmente os fenótipos das subpopulações de linfócitos T de memória efetora e efetora, comparados aos receptores de transplante Alo-MO (GRÁFICOS 15B a 18B). Estas notáveis diferenças na frequência relativa e na contagem das subpopulações entre os grupos, mais evidentes se consideradas conjuntamente as subpopulações de linfócitos TCD8+ memória efetora e efetora ($11,35 \times 10^6/\text{kg}$ no grupo Alo-SP vs $1,427 \times 10^6/\text{kg}$ no grupo Auto-SP vs $0,098 \times 10^6/\text{kg}$ no grupo Alo-MO, $p<0,001$), podem ser observadas na TABELA 8 e nos GRÁFICOS 19A e 19B.

TABELA 8 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (Protocolo do CD28)

(%) (*x10 ⁶ /kg)	Alo-MO (n=28)	Alo-SP (n=16)	Auto-SP (n=22)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*x10⁶/kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	9,88 (15,19)	29,70 (281,5)	23,90 (88,98)	0.0001
CD45RA+	47,85 (1,546)	25,30 (19,31)	19,35 (3,510)	0.0001
CD28+	52,80 (1,852)	31,50 (30,06)	40,30 (7,344)	0.0001
Linfócitos TCD3+	53,70 (30,0)	64,50 (330,0)	43,30 (95,0)	0.0001
CD4+	25,70 (10,0)	35,90 (175,0)	21,25 (40,0)	0.0001
CD8+	20,50 (10,0)	20,80 (110,0)	19,00 (35,0)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	20,75 (3,108)	21,05 (55,64)	18,70 (12,11)	0.0001
CD45RA+	54,85 (1,665)	54,90 (30,23)	23,10 (3,535)	0.0001
CD28+	96,00 (2,814)	86,20 (46,21)	86,90 (9,079)	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	52,65 (1,594)	33,75 (19,25)	15,70 (1,367)	0.0001
Memória Central (T _{MC})	42,10 (1,035)	40,15 (28,02)	67,75 (7,196)	0.0001
Memória Efetora (T _{ME})	1,11 (0,024)	8,93 (4,352)	7,70 (0,688)	0.0001
Efetora (E)	0,83 (0,053)	6,29 (3,620)	6,16 (0,517)	0.0001
ME+E	3,41 (0,098)	21,44 (11,35)	12,08 (1,427)	0.0001

D0= Dia zero do transplante (Protocolo: CD28) ; *total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

GRÁFICO 1.

TOTAL DE LEUCÓCITOS TRANSFERIDOS PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

MODALIDADES DE TRANSPLANTE

ALO-SP = Alogênico procedente do sangue periférico

ALO-MO = Alogênico procedente da medula óssea

AUTO-SP = Autólogo procedente do sangue periférico

GRÁFICO 2A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TOTAIS TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 2B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO D0

GRÁFICO 3A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 3B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 4A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD4+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 4B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD4+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO D0

GRÁFICO 5A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 5B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 6A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8^{HI} TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 6B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8^{HI} TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO D0

GRÁFICO 7A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 7B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+ CD8+ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 8A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ CD28+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 8B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ CD28+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO D0

GRÁFICO 9A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 9B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 10A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 10B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO D0

GRÁFICO 11A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) NAIVE TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 11B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) NAIVE TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 12A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) MC TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 12B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) MC TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 13A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 13B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 14A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) EFETORA TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 14B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) EFETORA TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 15A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

GRÁFICO 15B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)

GRÁFICO 16A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

GRÁFICO 16B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 17A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

GRÁFICO 17B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)

SUBPOPULAÇÕES

N = NAIVE

MC = MEMÓRIA CENTRAL

ME = MEMÓRIA EFETORA

E = EFETORA

MODALIDADES DE TRANSPLANTE

ALO-SP = Alogênico procedente do sangue periférico

ALO-MO = Alogênico procedente da medula óssea

AUTO-SP = Autólogo procedente do sangue periférico

MARCADORES FENOTÍPICOS

N = CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA+

MC = CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA-

ME = CD3+ CD8+ CD28- CD45RA-

E = CD3+ CD8+ CD28- CD45RA+

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 18A.

FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE

GRÁFICO 18B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 19A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME+EFETORA TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 19B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME+EFETORA TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

“ Expressão de Marcadores de Ativação das Células T no D0

A marcação com CD69 foi conduzida para determinar se as células infundidas nos três grupos tinham também um fenótipo associado com células T ativadas recentemente. Durante a realização da imunofenotipagem, observou-se que sua expressão era maior no grupo Auto-SP que nos grupos Alo-SP e Alo-MO como pode ser notado nos três exemplos representativos por grupo na FIGURA 27.

FIGURA 27. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE CD69 NA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3⁺ CD8^{HI} TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Como observado pelos protocolos anteriores, o grupo Auto-SP recebeu uma grande quantidade de linfócitos T diferenciados, maduros, das subpopulações ME e E, com uma tendência para maiores níveis de ativação precoce analisados pela maior expressão do marcador de superfície CD69⁺ nas células durante a aquisição de eventos na imunofenotipagem (Gate A: 41,51% no grupo Auto-SP vs 7,92% no grupo Alo-MO vs 4,73% no grupo Alo-SP, $p=0,0084$ e no Gate H: 92,3%; 21,7% e

6,2%, $p=0,0051$). A análise da expressão deste marcador neste grupo mostrou correlação estatisticamente significativa com o total de células T CD8+ diferenciadas (ME+E) identificadas pelos protocolos dos marcadores CD11b e CD28 (respectivamente $r= 0,7088$, $p= 0,0067$ e $r= 0,6703$, $p= 0,0122$). Esta correlação também foi encontrada quando analisadas estas subpopulações separadamente através do protocolo CD11b (ME: $r= 0,6868$, $p= 0,0095$ e E: $r= 0,7253$, $p= 0,0050$) e também com a expressão nas células da molécula citotóxica granzima B ($r= 0,7527$, $p= 0,0030$) (FIGURA 28).

FIGURA 28. CORRELAÇÃO ENTRE AS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD8+ MEMÓRIA EFETORA E EFETORA E A EXPRESSÃO DE CD69 E GRANZIMA B NOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO.

Nos treze pacientes autólogos avaliados para CD69, a análise pelo protocolo de CD11b mostrou terem recebido 26,3% ($3,0 \times 10^6/\text{kg}$ receptor) de linfócitos das subpopulações memória efetora e efetora (ME+E) sendo respectivamente 15,6% ($2,0 \times 10^6/\text{kg}$) da primeira subpopulação e 11,9% ($1,0 \times 10^6/\text{kg}$) da segunda. Além disso, do total de linfócitos recebidos (Gate A), 29,4% ($3,0 \times 10^6/\text{kg}$) expressavam a molécula citotóxica granzima B (GB) e, dos linfócitos T com expressão da molécula CD8+ em alta intensidade de fluorescência (CD8^{HI} no Gate H), 14,7% ($2,0 \times 10^6/\text{kg}$) das células expressavam esta molécula (GB).

Ainda neste mesmo grupo de receptores, interessante foi a observação de que a expressão percentual deste marcador de ativação celular (CD69) nos linfócitos T

CD8^{HI} (Gate H) não aumentou com o procedimento de criopreservação, o que sugere que os resultados encontrados não foram reflexo da manipulação das células mas sim primordialmente relacionados à modalidade de transplante (TABELA 9).

TABELA 9. ANÁLISE COMPARATIVA DA CONTAGEM DAS CÉLULAS T CD3+ CD8^{HI} CD45RA+ CD69+ INFUNDIDAS EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO ANTES (AC) E DEPOIS (DC) DA CRIOPRESERVAÇÃO.

TMO D0	Expressão de CD69
	H:VR
Auto-SP n=02 (*AC)	90,7
Auto-SP n=02 (**DC)	88,7

* AC=antes da criopreservação ** DC=após a criopreservação

H: Gate H (CD8^{HI}); VR: valores relativos (%)

Modalidade de transplante (TMO):

Autólogo procedente de sangue periférico (Auto-SP)

Contagem das Células Hematopoéticas 30 Dias Após o Transplante

Um mês após o transplante, foram analisadas as contagens das células hematopoéticas no sangue periférico dos receptores de transplante de medula óssea por mm^3 , expressando os mesmos marcadores de superfície descritos na análise das células infundidas. A descrição dos valores percentuais e dos valores absolutos do total de células encontradas na análise das amostras do D+30 do transplante encontra-se na TABELA 10 e FIGURA 29 (GRÁFICOS 1 a 21).

A contagem total de leucócitos realizada por milímetro cúbico (mm^3), embora inferior aos valores de normalidade, diferiu entre 02 modalidades de transplante, sendo a do grupo Auto-SP significativamente maior que a do grupo Alo-MO ($p<0,01$) (5850 vs 3600 células/ mm^3), com nenhuma diferença entre os grupos Alo-SP (3600 células/ mm^3) e Alo-MO ($p>0,05$) (GRÁFICO 1).

As contagens em números absolutos foram ainda maiores 30 dias após os transplantes procedentes do sangue periférico nos grupos alogênico e autólogo comparadas às do grupo alogênico originado da medula óssea, para o total de linfócitos (respectivamente 2,6 e 7,1 vezes, $p>0,05$ e $p<0,001$) (GRÁFICO 2B) e linfócitos T CD3+ (respectivamente 1,8 e 4,9 vezes, $p>0,05$ e $p<0,001$) (GRÁFICO 3B). Entretanto, estas diferenças foram menos intensas que aquelas encontradas no dia do transplante (D0) e ainda, observou-se que as contagens de células no grupo Auto-SP foram superiores as do grupo Alo-SP, principalmente as dos linfócitos totais, 1823 vs 679,6 ($p<0,05$) e as dos linfócitos TCD3+, 1768 vs 650,8 ($p<0,05$) (respectivamente GRÁFICOS 2B e 3B). O mesmo foi observado com o total de linfócitos CD3+CD4+, sendo 2,7 vezes maior no grupo Alo-SP e 2,4 vezes maior no grupo Auto-SP comparado ao do grupo Alo-MO ($p<0,01$) (GRÁFICO 4B) e também com o total de linfócitos T CD3+CD8+, sendo respectivamente 1,5 e 7,4 vezes maior, $p>0,05$ e $p<0,001$ (GRÁFICO 5B). Como esperado (Bengtsson et al., 1989; Storek et al., 1995 e 1997; Ottinger et al., 1996; Talmadge et al., 1997; Mackall et al., 2000), o número de células TCD4+ foi baixo em todas as modalidades de transplante (352,4 no grupo Alo-SP, 310,7 no grupo Auto-SP e 128,3 células por mm^3 no grupo Alo-MO, com diferença estatisticamente significativa entre os grupos Alo-SP e Alo-MO e entre os grupos Auto-SP e Alo-MO, $p<0,01$) (GRÁFICO 4B).

Por outro lado, o número de células CD8+ no grupo Auto-SP foi maior que o normal, porém reduzido nos grupos Alo-MO e Alo-SP (respectivamente, 1274, 173 e 257,4 células/mm³, com diferença estatística entre os grupos Auto-SP e Alo-SP e entre os grupos Auto-SP e Alo-MO, $p<0,001$) (GRÁFICO 5B).

Quando as subpopulações foram analisadas, a mesma tendência foi observada: contagens baixas no grupo Alo-MO, entretanto desta vez, o grupo Alo-SP apresentou contagens mais próximas do grupo Alo-MO enquanto no grupo Auto-SP as contagens foram muito maiores (GRÁFICO 18B). Os grupos Alo-SP e Auto-SP apresentavam respectivamente 1,2 e 42,7 vezes mais células da subpopulação memória efetora ($p>0,05$ e $p<0,001$) (GRÁFICO 13B), 2,9 e 22,7 vezes mais células efetoras ($p>0,05$ e $p<0,01$) (GRÁFICO 14B) e 1,3 e 4,9 vezes mais linfócitos da subpopulação memória central ($p>0,05$ e $p<0,001$) (GRÁFICO 12B). Interessantemente, ambas modalidades de transplante tiveram 3,6 vezes mais células *naive* que o grupo Alo-MO ($p>0,05$) (GRÁFICO 11B). A distribuição das 04 subpopulações por modalidade de transplante encontra-se nos GRAFICOS 15B a 17B. É importante mencionar que o total de células T CD8+ diferenciadas (ME+E) no grupo Auto-SP teve uma expansão bem evidente e provavelmente muito maior que a encontrada em indivíduos normais ($n=13$), respectivamente 256 células destas subpopulações/mm³ vs 30 células/mm³ ($p=0,014$) (dados não mostrados). Além disso, houve diferença estatística entre os grupos Auto-SP e Alo-MO (256 vs 9,6 células destas subpopulações/mm³, $p<0,001$) e entre os grupos Auto-SP e Alo-SP (256 vs 23,4 células destas subpopulações/mm³, $p<0,05$) (GRÁFICO 19B).

TABELA 10 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (Protocolo do CD28)

(%) (*mm ³)	Alo-MO (n=22)	Alo-SP (n=12)	Auto-SP (n=20)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*mm³)	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	10,00 (258,2)	14,15 (679,6)	32,60 (1823)	0.0001
CD45RA+	25,15 (20,50)	32,65 (71,56)	16,55 (217,1)	0.0001
CD28+	48,90 (60,61)	53,85 (82,22)	31,10 (352,9)	0.0001
Linfócitos TCD3+	62,30 (362,2)	63,00 (650,8)	75,45 (1768)	0.0001
CD4+	25,60 (128,3)	31,00 (352,4)	14,15 (310,7)	0.0004
CD8+	34,90 (173,0)	23,15 (257,4)	57,60 (1274)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	36,80 (85,97)	23,05 (146,5)	62,15 (1124)	0.0001
CD45RA+	23,55 (11,76)	29,00 (50,89)	10,40 (109,7)	0.0001
CD28+	82,55 (69,80)	86,00 (91,16)	29,50 (249,0)	0.0008
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	10,76 (7,23)	22,35 (26,11)	2,83 (25,86)	0.0441
Memória Central (T _{MC})	51,80 (50,49)	55,65 (66,15)	23,40 (249,1)	0.0004
Memória Efetora (T _{ME})	5,13 (5,37)	4,19 (6,63)	57,65 (229,5)	0.0001
Efetora (E)	3,01 (2,67)	7,57 (7,72)	5,70 (60,72)	0.0103
ME+E	21,77 (9,61)	13,20 (23,40)	67,25 (255,5)	0.0003

D+30= 30 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

GRÁFICO 1.

TOTAL DE LEUCÓCITOS EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

MODALIDADES DE TRANSPLANTE

ALO-SP = Alogênico procedente do sangue periférico

ALO-MO = Alogênico procedente da medula óssea

AUTO-SP = Autólogo procedente do sangue periférico

GRÁFICO 2A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TOTAIS EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 2B.

TOTAL DE LINFÓCITOS EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+30

GRÁFICO 3A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 3B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 4A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD4+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 4B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD4+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+30

GRÁFICO 5A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 5B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 6A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8^{HI} EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 6B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8^{HI} EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+30

GRÁFICO 7A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 7B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 8A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 8B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+30

GRÁFICO 9A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 9B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 10A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 10B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+30

GRÁFICO 11A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) NAIVE EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 11B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) NAIVE EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 12A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) MC EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 12B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) MC EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 13A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 13B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 14A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) EFETORA EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 14B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) EFETORA EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 15A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+30

GRÁFICO 15B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+30

GRÁFICO 16A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE MEDULA ÓSSEA NO D+30

GRÁFICO 16B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE MEDULA ÓSSEA NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 17A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+30

GRÁFICO 17B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+30

SUBPOPULAÇÕES

N = NAIVE

MC = MEMÓRIA CENTRAL

ME = MEMÓRIA EFETORA

E = EFETORA

MODALIDADES DE TRANSPLANTE

ALO-SP = Alogênico procedente do sangue periférico

ALO-MO = Alogênico procedente da medula óssea

AUTO-SP = Autólogo procedente do sangue periférico

MARCADORES FENOTÍPICOS

N = CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA+

MC = CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA-

ME = CD3+ CD8+ CD28- CD45RA-

E = CD3+ CD8+ CD28- CD45RA+

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 18A.

FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30

GRÁFICO 18B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

Contagem das Células Hematopoéticas 90 Dias após o Transplante

Três meses após o transplante, foram analisadas as contagens das células/mm³ no sangue periférico dos receptores de transplante de medula óssea, utilizando os mesmos marcadores de superfície descritos. As medianas dos valores percentuais e absolutos obtidos neste período por grupo encontram-se na TABELA 11, FIGURA 30 (GRÁFICOS 1 a 21).

O total de células em números absolutos, de leucócitos, linfócitos T CD3+, T CD4+ foi similar para os três grupos ($p>0,05$), mas ainda inferior aos valores de normalidade ou de referência (GRÁFICOS 1, 3B e 4B). O total de células CD4+ foi de 338,1 para o grupo Alo-SP, 235,4 no grupo Auto-SP e 279,7 células/mm³ no grupo Alo-MO ($p>0,05$). Por outro lado, o total de células T CD8+ nos receptores do grupo Auto-SP, apesar de apresentar uma discreta redução neste período, persistiu elevado, superior aqueles dos demais grupos, enquanto para os pacientes dos grupos Alo-MO e Alo-SP esta população se recuperou, atingindo valores dentro da faixa de normalidade (respectivamente, de 931,3 de 598,2 e de 451,6 células/mm³, $p=0,07$) (GRÁFICO 5B).

Quando as subpopulações foram analisadas, desta vez foram observadas contagens mais próximas entre os grupos ($p>0,05$), entretanto o grupo Auto-SP continuou apresentando contagens das subpopulações de memória efetora e efetora muito maiores em relação aos outros 02 grupos (respectivamente $p=0,0067$ e $p=0,0578$) (GRÁFICO 18B). A análise das subpopulações de células TCD8+ revelou que o grupo Alo-MO apresentava ainda 4,5 vezes mais linfócitos T da subpopulação *naive* que o grupo Auto-SP (respectivamente 55,04 vs 12,23 células/mm³) (GRÁFICO 11B). Esta diferença analisada entre os dois grupos pelo teste t não paramétrico de Mann Whitney foi estatisticamente significativa ($p=0,0454$). Em relação aos linfócitos da subpopulação memória central não houve diferença estatística entre os três grupos (um total de 112,8 células/mm³ no grupo Alo-SP, 142,4 no Alo-MO e 148,8 no Auto-SP, $p>0,05$) (GRÁFICO 12B). A análise quantitativa de linfócitos da subpopulação memória efetora demonstrou diferenças significativas entre os grupos, mais evidentes em particular no grupo Auto-SP, porém menos evidentes no grupo Alo-MO em relação ao grupo Alo-SP (respectivamente

44,7 vezes, $p < 0,01$ e 1,8 vezes mais, $p > 0,05$) (GRÁFICO 13B). As contagens das subpopulações de linfócitos efetores para ambas modalidades de transplante Auto-SP e Alo-SP foram maiores que as encontradas para o grupo Alo-MO, mas não atingiram diferença estatística (respectivamente 8,6 e 2,1 vezes maiores, $p > 0,05$) (GRÁFICO 14B). A distribuição das 04 subpopulações por modalidade de transplante encontra-se nos GRAFICOS 15B a 17B. É importante mencionar ainda que o total de células T CD8+ diferenciadas das subpopulações ME+E no grupo Auto-SP teve uma ascensão significativa mantendo-se da mesma forma que no D+30 bem acima do total observado nos outros 02 grupos. ($p = 0.0119$) (GRÁFICO 19B).

TABELA 11 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (Protocolo do CD28)

(%) (*mm ³)	Alo-MO (n=15)	Alo-SP (n=10)	Auto-SP (n=17)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*mm³)	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	21,90 (991,8)	24,10 (932,2)	34,90 (1522)	0.0151
CD45RA+	31,00 (152,0)	36,45 (182,4)	33,60 (275,7)	0.0895
CD28+	45,00 (203,8)	39,70 (149,3)	24,00 (158,4)	0.7520
Linfócitos TCD3+	69,60 (1018)	69,25 (925,3)	70,60 (1232)	0.3895
CD4+	18,40 (279,7)	26,00 (338,1)	14,00 (235,4)	0.1197
CD8+	45,20 (598,2)	37,50 (451,6)	49,70 (931,3)	0.0695
Linfócitos TCD8^{HI}	43,20 (386,9)	34,90 (292,8)	50,30 (877,1)	0.0197
CD45RA+	25,50 (115,3)	37,90 (148,4)	20,40 (159,0)	0.1947
CD28+	84,30 (183,8)	68,20 (171,5)	27,90 (159,0)	0.8940
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	11,10 (55,04)	15,05 (46,76)	2,08 (12,23)	0.1907
Memória Central (T _{MC})	51,50 (142,4)	39,90 (112,8)	25,80 (148,8)	0.4619
Memória Efetora (T _{ME})	6,29 (17,25)	10,22 (9,77)	49,80 (436,7)	0.0067
Efetora (E)	5,71 (12,74)	16,30 (27,35)	14,00 (109,0)	0.0578
ME+E	20,01 (43,64)	29,77 (49,52)	72,20 (490,8)	0.0119

D+90= 90 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico

Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

GRÁFICO 1.

TOTAL DE LEUCÓCITOS EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

MODALIDADES DE TRANSPLANTE

ALO-SP = Alogênico procedente do sangue periférico

ALO-MO = Alogênico procedente da medula óssea

AUTO-SP = Autólogo procedente do sangue periférico

GRÁFICO 2A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TOTAIS EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 2B.

TOTAL DE LINFÓCITOS EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+90

GRÁFICO 3A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 3B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 4A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD4+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 4B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD4+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+90

GRÁFICO 5A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 5B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 6A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8^{HI} EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 6B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8^{HI} EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+90

GRÁFICO 7A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 7B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 8A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 8B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+90

GRÁFICO 9A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 9B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD45RA+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 10A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 10B.

TOTAL DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+CD28+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS NO D+90

GRÁFICO 11A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) NAIVE EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 11B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) NAIVE EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 12A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) MC EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 12B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) MC EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 13A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 13B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 14A.

PERCENTUAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) EFETORA EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 14B.

TOTAL DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) EFETORA EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 15A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+90

GRÁFICO 15B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+90

GRÁFICO 16A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE MEDULA ÓSSEA NO D+90

GRÁFICO 16B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO PROCEDENTE DE MEDULA ÓSSEA NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 17A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+90

GRÁFICO 17B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO PROCEDENTE DE SANGUE PERIFÉRICO NO D+90

SUBPOPULAÇÕES

N = NAIVE

MC = MEMÓRIA CENTRAL

ME = MEMÓRIA EFETORA

E = EFETORA

MODALIDADES DE TRANSPLANTE

ALO-SP = Alogênico procedente do sangue periférico

ALO-MO = Alogênico procedente da medula óssea

AUTO-SP = Autólogo procedente do sangue periférico

MARCADORES FENOTÍPICOS

N = CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA+

MC = CD3+ CD8+ CD28+ CD45RA-

ME = CD3+ CD8+ CD28- CD45RA-

E = CD3+ CD8+ CD28- CD45RA+

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 18A.

FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+90

GRÁFICO 18B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 19A.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME+EFETORA EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 19B.

TOTAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME+EFETORA EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

“ Expressão de Granzima B Intracelular

A presença da molécula citotóxica granzima B nas diversas subpopulações de células T CD8⁺ identificadas nas amostras dos doadores e receptores das diferentes modalidades de transplante também foi determinada por citometria de fluxo. A presença de células TCD8⁺ contendo elevadas quantidades de perforina e granzima B pode corresponder funcionalmente a subpopulação de linfócitos efetores. Portanto, a avaliação da expressão desta molécula pode auxiliar na caracterização das subpopulações de linfócitos T CD8⁺ de memória efetora e efetora.

Nossos resultados foram concordantes com aqueles obtidos pelo protocolo de avaliação da coexpressão dos marcadores de moléculas da superfície CD28⁺/CD45RA⁺. Foram observados números percentuais e absolutos elevados das subpopulações de linfócitos T CD8⁺ de memória efetora e efetora com conteúdo alto de granzima B nas amostras dos receptores de transplantes procedentes do sangue periférico, tanto autólogo como alogênico (FIGURA 31) (TABELA 12).

FIGURA 31. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3⁺CD8^{HI} TRANSFERIDOS NAS DIFERENTES MODALIDADES DE TMO (D0)

As contagens das células TCD3+CD8^{HI} (Gate H) infundidas que coexpressam granzima B foram significativamente maiores nos grupos Alo-SP e Auto-SP que no grupo Alo-MO (78,5 vezes maior para o grupo Alo-SP, $p<0,001$ e 14,2 vezes maior no grupo Auto-SP, $p<0,01$) (TABELA 12) (FIGURA 26: Gráfico 21B).

Trinta dias após o transplante, a diferença entre os grupos alogênicos foi menor (somente 1,9 vezes maior no grupo Alo-SP, $p>0,05$) porém ainda mais pronunciada quando comparado o grupo Auto-SP aos grupos Alo-MO (59,7 vezes maior, $p<0,001$) e Alo-SP (31,8 vezes maior, $p<0,05$) (TABELA 12) (FIGURA 29: Gráfico 21B).

Três meses após o transplante esta diferença apresentou-se reduzida quando comparado os dois grupos de transplante procedentes de sangue periférico com o grupo alogênico de medula (2,1 vezes maior para o grupo Alo-SP, $p>0,05$ e 4,2 vezes maior no grupo Auto-SP, $p<0,05$) (TABELA 12) (FIGURA 30: Gráfico 21B).

Os números absolutos de células GB+ (Gate A) nos receptores de transplante autólogo (Auto-SP) foram maiores que nos 13 indivíduos normais avaliados no D+30 (350 vs 31 células/mm³, $p=0,05$) e no D+90 após o transplante (239 vs 31 células/mm³, $p=0,02$). Para os valores percentuais destas subpopulações de células T também foram notadas diferenças estatísticas entre os dois grupos nestes dois períodos (D+30=68,1% vs 13,2% e no D+90=59,3% vs 13,2% sendo todas as comparações significantes, $p<0,05$).

TABELA 12 - DESCRIÇÃO DOS LINFÓCITOS TCD3⁺CD8⁺ QUE EXPRESSAM GRANZIMA B NAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D0, D+30 E D+90

Gate A –VR (VA)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
D0 (x10 ⁶ /kg)	10,50 (0,277) ^a	21,60 (21,96) ^b	30,05 (4,174) ^c	0.0001
D30 (cél/s/mm ³)	29,64 (13,86) ^d	35,15 (29,85) ^e	68,10 (350,0) ^f	0.0002
D90 (cél/s/mm ³)	49,98 (70,33) ^g	54,76 (116,2) ^h	59,25 (238,5) ⁱ	0.0527

Gate H –VR (VA)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
D0 (x10 ⁶ /kg)	4,580 (0,114) ^a	9,660 (8,950) ^b	10,72 (1,622) ^c	0.0001
D30 (cél/s/mm ³)	15,58 (5,599) ^d	19,49 (10,50) ^e	56,03 (334,0) ^f	0.0002
D90 (cél/s/mm ³)	35,20 (44,2) ^g	47,77 (93,7) ^h	47,59 (183,8) ⁱ	0.0233

a) n=17, b) n=09, c) n=18; d) n=12, e) n=08, f) n=16; g) n=08, h) n=07, i) n=13

Períodos do transplante (TMO):

D0 = Dia zero ou dia da coleta e/ou infusão;

VA= valores absolutos apresentados x10⁶/kg do receptor

VR= valores relativos (%)

D+30 e D+90 = 30 e 90 dias pós-TMO;

VA= valores absolutos calculados por milímetro cúbico no hemograma

VR= valores relativos (%)

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP):

ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados significantes

GRÁFICO 20A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 20B.

TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 21A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

GRÁFICO 21B.

TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO

FIGURA 26. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ INFUNDIDOS NO D0 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 20A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 20B.

TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 21A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

GRÁFICO 21B.

TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+30

FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+30 DO TRANSPLANTE

GRÁFICO 20A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 20B.

TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 21A.

PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

GRÁFICO 21B.

TOTAL DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ GRANZIMA B+ EM RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO NO D+90

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NO D+90 DO TRANSPLANTE

“ *Correlação Entre o Número de Células T que Expressam Granzima B e as Subpopulações Memória Efetora e Efetora de Linfócitos T CD8+* ”

Receptores de células hematopoéticas procedentes do sangue periférico, tanto do grupo alogênico como do grupo autólogo foram proporcionalmente enriquecidos por fenótipos que caracterizaram as subpopulações de linfócitos T CD8+ de memória efetora e efetora, comparados aos transferidos para receptores do grupo alogênico procedente da medula óssea ($p < 0,0001$). Com o objetivo de se determinar a existência de correlação entre o número de células T infundidas que coexpressavam granzima B e marcadores de moléculas da superfície característicos das subpopulações de memória efetora e efetora (protocolo CD28), foi realizado o teste estatístico de correlação de dados (em valores absolutos) não paramétricos de Spearman, no período considerado das análises (D0, D+30 e D+90 pós-transplante) para as três modalidades de transplante. Observou-se uma correlação positiva e significativa nas amostras dos 66 pacientes avaliados no D0 ($r = 0,7793$, $p < 0,0001$, $n = 44$) (FIGURA 32a). Esta correlação foi também observada no D+30 ($r = 0,7076$, $p < 0,0001$, $n = 36$) (FIGURA 32b). No D+90 a correlação encontrada foi pouco intensa ($r = 0,5304$, $p = 0,0037$, $n = 28$).

FIGURA 32. CORRELAÇÃO ENTRE OS NÚMEROS ABSOLUTOS DE CÉLULAS TCD8+ QUE COEXPRESSAM GRANZIMA B E AS SUBPOPULAÇÕES MEMÓRIA EFETORA E EFETORA DE LINFÓCITOS INFUNDIDOS NO D0 (a) ($n = 44$) E PRESENTES NO D+30 PÓS-TRANSPLANTE (b) ($n = 36$) NOS RECEPTORES DAS TRÊS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (ALO-MO, ALO-SP E AUTO-SP)

“ Determinação das Subpopulações de Linfócitos T CD8+ Utilizando Outros Marcadores de Superfície e Correlação com o CD28

As subpopulações também foram avaliadas pelos outros protocolos de marcadores de superfície propostos, além do CD28 (CD62L e CD11b) uma vez que tem sido demonstrado que a utilização de múltiplos marcadores em combinação pode levar a achados clinicamente relevantes que podem estar sendo perdidos através de uma única análise. Esta forma de análise combinada garante suficiente flexibilidade e poder para adquirir aspectos necessários e importantes na determinação das respostas imunológicas, e também proporciona informações adicionais que no futuro podem ser avaliadas e correlacionadas com a eficácia da análise realizada (Roederer et al., 2004). Os resultados percentuais e em números absolutos obtidos pelos diferentes protocolos aplicados no período considerado de avaliação (D0, D+30, D+90) encontram-se nas TABELAS 13 a 18.

Com o objetivo de se determinar a existência de correlação entre os marcadores de moléculas da superfície celular avaliados (CD28, CD62L e CD11b), foi realizado o teste estatístico de correlação de dados não paramétricos de Spearman, no período considerado (D0, D+30 e D+90 pós-transplante) para as três modalidades de transplante. Foram encontradas correlações positivas e estatisticamente significantes em todo o período de avaliação principalmente entre os marcadores CD28 e CD62L. No D+90 a correlação observada foi pouco intensa e não significativa entre os marcadores CD28 e CD11b. Todas as correlações encontradas indicaram que todos os protocolos elaborados foram precisos, porém não exatos e puderam contribuir de modo muito parecido na caracterização das diferentes subpopulações de linfócitos TCD8+ transferidos no momento da infusão e presentes nas amostras dos receptores de TMO no D+30 e D+90. (TABELAS 19 a 21).

TABELA 13 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (CD62L)

(%) (*x10 ⁶ /kg)	Alo-MO (n=28)	Alo-SP (n=15)	Auto-SP (n=22)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA*)
Leucócitos (* x10⁶/kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	9,91 (15,21)	31,80 (295,7)	23,75 (86,79)	0.0001
CD45RA+	47,70 (1,632)	26,30 (18,99)	19,95 (3,678)	0.0001
CD62L+	44,05 (19,05)	25,80 (17,82)	22,95 (4,439)	0.0001
Linfócitos TCD3+	53,70 (30,0)	64,50 (330,0)	43,30 (95,0)	0.0001
CD4+	25,70 (10,0)	35,90 (175,0)	21,25 (40,0)	0.0001
CD8+	20,50 (10,0)	20,80 (110,0)	19,00 (35,0)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	21,40 (3,144)	20,40 (60,80)	18,60 (11,78)	0.0001
CD45RA+	48,50 (1,503)	55,25 (33,75)	23,50 (4,813)	0.0001
CD62L+	86,15 (2,204)	89,40 (47,34)	91,20 (9,88)	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	39,05 (1,327)	31,00 (18,23)	19,10 (1,812)	0.0001
Memória Central (T _{MC})	23,75 (0,522)	39,10 (17,95)	68,45 (6,707)	0.0001
Memória Efetora (T _{ME})	11,20 (0,265)	11,40 (6,932)	6,29 (0,445)	0.0018
Efetora (E)	6,41 (0,212)	2,09 (0,983)	1,12 (0,136)	0.0326
ME+E	26,01 (0,597)	18,40 (8,888)	8,89 (0,730)	0.0032

D0= Dia zero do transplante (Protocolo: CD62L); *total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

TABELA 14 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (CD11b)

(%) (*x10 ⁶ /kg)	Alo-MO (n=28)	Alo-SP (n=15)	Auto-SP (n=22)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA*)
Leucócitos (* x10⁶/kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	9,71 (16,11)	30,40 (288,3)	23,30 (86,0)	0.0001
CD45RA+	47,70 (1,784)	25,80 (21,61)	18,40 (3,592)	0.0001
CD11b+	14,70 (0,544)	18,35 (12,63)	26,20 (4,523)	0.0001
Linfócitos TCD3+	53,70 (30,0)	64,50 (330,0)	43,30 (95,0)	0.0001
CD4+	25,70 (10,0)	35,90 (175,0)	21,25 (40,0)	0.0001
CD8+	20,50 (10,0)	20,80 (110,0)	19,00 (35,0)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	21,10 (3,171)	20,35 (58,49)	19,00 (11,86)	0.0001
CD45RA+	52,10 (1,518)	58,10 (37,34)	22,20 (4,435)	0.0001
CD11b+	14,40 (0,488)	29,90 (18,18)	30,35 (3,355)	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	42,15 (1,214)	14,40 (10,68)	7,25 (1,141)	0.0114
Memória Central (T _{MC})	40,55 (1,014)	25,40 (11,65)	42,60 (5,489)	0.0001
Memória Efetora (T _{ME})	5,15 (0,102)	11,90 (6,430)	14,20 (1,725)	0.0001
Efetora (E)	7,21 (0,237)	17,60 (8,677)	10,77 (1,149)	0.0001
ME+E	5,15 (0,442)	32,90 (17,20)	26,46 (3,362)	0.0001

D0= Dia zero do transplante (Protocolo: CD11b); *total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

TABELA 15– DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD62L)

(%) (*mm ³)	Alo-MO (n=22)	Alo-SP (n=11)	Auto-SP (n=20)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*mm³)	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	9,73 (248,5)	14,40 (696,5)	31,55 (1775)	0.0001
CD45RA+	28,95 (26,70)	30,50 (56,94)	17,35 (233,8)	0.0001
CD62L+	48,35 (54,18)	60,90 (99,36)	23,30 (203,4)	0.0007
Linfócitos TCD3+	62,30 (362,2)	63,00 (650,8)	75,45 (1768)	0.0001
CD4+	25,60 (128,3)	31,00 (352,4)	14,15 (310,7)	0.0004
CD8+	34,90 (173,0)	23,15 (257,4)	57,60 (1274)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	36,85 (84,40)	29,48 (196,6)	62,25 (1111)	0.0001
CD45RA+	28,70 (13,90)	28,20 (52,87)	10,00 (111,4)	0.0001
CD62L+	55,00 (22,17)	89,20 (158,2)	13,50 (98,75)	0.0055
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naïve (N)	18,10 (8,51)	28,40 (52,08)	2,77 (19,87)	0.0029
Memória Central (T _{MC})	27,65 (20,09)	53,60 (74,95)	14,30 (111,7)	0.0006
Memória Efetora (T _{ME})	44,45 (17,23)	6,05 (8,534)	64,65 (340,8)	0.0007
Efetora (E)	7,415 (4,445)	3,510 (5,882)	4,250 (67,05)	0.0049
ME+E	53,14 (21,68)	9,180 (13,22)	80,22 (367,4)	0.0010

D+30= 30 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

TABELA 16– DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD11b)

(%) (*mm ³)	Alo-MO (n=22)	Alo-SP (n=11)	Auto-SP (n=20)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*mm³)	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	9,80 (255,8)	13,90 (657,5)	31,25 (1782)	0.0001
CD45RA+	27,80 (31,70)	33,50 (75,92)	15,95 (215,4)	0.0001
CD11b+	34,90 (35,86)	44,50 (81,88)	68,30 (626,5)	0.0001
Linfócitos TCD3+	62,30 (362,2)	63,00 (650,8)	75,45 (1768)	0.0001
CD4+	25,60 (128,3)	31,00 (352,4)	14,15 (310,7)	0.0004
CD8+	34,90 (173,0)	23,15 (257,4)	57,60 (1274)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	38,50 (94,52)	24,40 (150,5)	61,80 (1094)	0.0001
CD45RA+	22,95 (16,03)	28,15 (35,83)	8,08 (95,26)	0.0032
CD11b+	26,25 (22,37)	36,90 (25,76)	58,50 (276,3)	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naïve (N)	12,75 (6,974)	22,40 (34,75)	2,17 (17,52)	0.0637
Memória Central (T _{MC})	67,15 (38,35)	48,20 (51,64)	18,00 (139,4)	0.0251
Memória Efetora (T _{ME})	2,50 (2,106)	21,20 (22,50)	63,20 (467,3)	0.0001
Efetora (E)	2,765 (2,467)	12,70 (11,69)	5,295 (59,80)	0.0001
ME+E	6,420 (7,050)	30,86 (27,34)	74,42 (600,8)	0.0001

D+30= 30 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico

Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

TABELA 17 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO(CD62L)

(%) (*mm ³)	Alo-MO (n=15)	Alo-SP (n=10)	Auto-SP (n=17)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*mm³)	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	21,20 (957,0)	24,20 (915,3)	33,50 (1555)	0.0142
CD45RA+	32,00 (145,3)	36,55 (170,4)	35,50 (273,7)	0.0991
CD62L+	49,80 (159,8)	51,80 (151,2)	21,20 (149,0)	0.9467
Linfócitos TCD3+	69,60 (1018)	69,25 (925,3)	70,60 (1232)	0.3895
CD4+	18,40 (279,7)	26,00 (338,1)	14,00 (235,4)	0.1197
CD8+	45,20 (598,2)	37,50 (451,6)	49,70 (931,3)	0.0695
Linfócitos TCD8^{HI}	45,30 (433,5)	34,35 (286,4)	48,50 (872,4)	0.0229
CD45RA+	20,40 (125,1)	35,30 (132,5)	20,10 (126,9)	0.3826
CD62L+	45,90 (153,0)	77,40 (169,8)	16,80 (119,2)	0.9946
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	7,930 (33,47)	20,80 (50,45)	4,550 (30,57)	0.6934
Memória Central (T _{MC})	47,40 (128,0)	43,60 (113,9)	13,70 (119,6)	0.8743
Memória Efetora (T _{ME})	34,50 (49,12)	10,65 (12,72)	61,60 (461,6)	0.0099
Efetora (E)	6,390 (20,50)	11,30 (19,18)	13,90 (89,55)	0.1865
ME+E	42,21 (57,88)	26,38 (45,08)	80,90 (543,4)	0.0271

D+90= 90 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

TABELA 18 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO(CD11b)

(%) (*mm ³)	Alo-MO (n=15)	Alo-SP (n=10)	Auto-SP (n=17)	<i>p value</i>
	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VR) (VA*)	(VA)
Leucócitos (*mm³)	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	22,70 (948,3)	23,30 (935,0)	33,30 (1493)	0.0181
CD45RA+	31,20 (159,1)	37,80 (185,1)	35,40 (294,8)	0.0805
CD11b+	38,70 (138,3)	38,80 (168,9)	67,80 (463,7)	0.0036
Linfócitos TCD3+	69,60 (1018)	69,25 (925,3)	70,60 (1232)	0.3895
CD4+	18,40 (279,7)	26,00 (338,1)	14,00 (235,4)	0.1197
CD8+	45,20 (598,2)	37,50 (451,6)	49,70 (931,3)	0.0695
Linfócitos TCD8^{HI}	48,10 (434,8)	36,25 (289,9)	49,70 (854,1)	0.0213
CD45RA+	21,90 (106,4)	34,90 (166,0)	20,50 (140,0)	0.2158
CD11b+	20,20 (71,74)	19,70 (53,54)	92,10 (566,6)	0.0048
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naïve (N)	10,50 (33,36)	16,90 (46,71)	1,220 (11,10)	0.2069
Memória Central (T _{MC})	45,80 (165,3)	51,45 (125,7)	4,520 (42,20)	0.7992
Memória Efetora (T _{ME})	20,50 (63,36)	11,85 (30,32)	68,20 (455,9)	0.0036
Efetora (E)	6,050 (21,74)	9,895 (18,83)	17,60 (90,77)	0.0343
ME+E	22,41 (83,80)	19,13 (53,47)	93,30 (566,6)	0.0077

D+90= 90 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: medianas. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

TABELA 19. CORRELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MARCADORES DE MOLÉCULAS DA SUPERFÍCIE CELULAR NA IDENTIFICAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS NO D0

CD28	CD62L		CD11B	
	<i>r</i>	<i>pvalue</i>	<i>r</i>	<i>pvalue</i>
Linfócitos (*A)	0,9851	0.0001	0,9783	0.0001
CD45RA+	0,9757	0.0001	0,9729	0.0001
CD62L+	0,9392	0.0001	-	-
CD11b+	-	-	0,8337	0.0001
LTCD8^{HI} (*H)	0,9808	0.0001	0,9807	0.0001
CD45RA+	0,9716	0.0001	0,9666	0.0001
CD62L+	0,9288	0.0001	-	-
CD11b+	-	-	0,7924	0.0001
Subpopulações				
Naive (N)	0,8489	0.0001	0,6986	0.0001
MC (T _{MC})	0,8395	0.0001	0,8324	0.0001
ME (T _{ME})	0,6597	0.0001	0,7103	0.0001
Efetora (E)	0,7177	0.0001	0,5259	0.0001
ME+E	0,6113	0.0001	0,7417	0.0001

* A: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate A
H: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate H
Estatística: Correlação não paramétrica de Spearman

TABELA 20. CORRELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MARCADORES DE MOLÉCULAS DA SUPERFÍCIE CELULAR NA IDENTIFICAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS NO D+30

CD28	CD62L		CD11B	
	<i>r</i>	<i>pvalue</i>	<i>r</i>	<i>pvalue</i>
Linfócitos (*A)	0,9931	0.0001	0,9951	0.0001
CD45RA+	0,9702	0.0001	0,9851	0.0001
CD62L+	0,9157	0.0001	-	-
CD11b+	-	-	0,7600	0.0001
LTCD8^{HI} (*H)	0,9908	0.0001	0,9957	0.0001
CD45RA+	0,9789	0.0001	0,9766	0.0001
CD62L+	0,7958	0.0001	-	-
CD11b+	-	-	0,4661	0,0036
Subpopulações				
<i>Naive</i> (N)	0,7878	0.0001	0,6737	0.0001
MC (T _{MC})	0,7796	0.0001	0,6433	0.0001
ME (T _{ME})	0,7486	0.0001	0,6576	0.0001
Efetora (E)	0,7591	0.0001	0,6463	0.0001
ME+E	0,7221	0.0001	0,6219	0.0001

* A: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate A
H: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate H
Estatística: Correlação não paramétrica de Spearman

TABELA 21. CORRELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MARCADORES DE MOLÉCULAS DA SUPERFÍCIE CELULAR NA IDENTIFICAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS NO D+90

CD28	CD62L		CD11B	
	<i>r</i>	<i>pvalue</i>	<i>r</i>	<i>pvalue</i>
Linfócitos (*A)	0,9892	0.0001	0,9857	0.0001
CD45RA+	0,9621	0.0001	0,9391	0.0001
CD62L+	0,7509	0.0001	-	-
CD11b+	-	-	0,2169	0.1676
LTCD8^{HI} (*H)	0,9812	0.0001	0,9720	0.0001
CD45RA+	0,9504	0.0001	0,9538	0.0001
CD62L+	0,7404	0.0001	-	-
CD11b+	-	-	-0,2083	0.1855
Subpopulações				
<i>Naive</i> (N)	0,6958	0.0001	0,6239	0.0001
MC (T _{MC})	0,7626	0.0001	0,4997	0.0008
ME (T _{ME})	0,8582	0.0001	0,7540	0.0001
Efetora (E)	0,8175	0.0001	0,7982	0.0001
ME+E	0,8537	0.0001	0,7791	0.0001

* A: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate A
H: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate H
Estatística: Correlação não paramétrica de Spearman

**“ Cinética da Reconstituição Imunológica Após o TMO
I. Comparação entre os Grupos**

Para se ter uma idéia evolutiva da dinâmica da reconstituição imunológica dos pacientes transplantados de medula óssea, as subpopulações de linfócitos TCD8+ caracterizadas foram analisadas por grupo no decorrer do período pós-transplante (D0, D+30 e D+90) e representadas nos GRÁFICOS 22 a 26.

Comparando os resultados percentuais obtidos no momento da infusão (D0), com aqueles do pós-transplante imediato (D+30) e do pós-transplante mais tardio (D+90) observou-se que no grupo Alo-SP a subpopulação de linfócitos *naive* apresentou uma queda percentual (33,75% no D0, 22,35% no D+30 e 15,05% no D+90, $p=0,0583$). A subpopulação de linfócitos memória central não apresentou variações estatisticamente significantes no período (40,15% no D0, 55,65% no D+30 e 39,90% no D+90, $p=0,5465$). As subpopulações de linfócitos memória efetora e efetora apresentaram uma ascensão percentual não estatisticamente significativa (respectivamente 8,925% no D0, 4,195% no D+30 e 10,22% no D+90, $p=0,8794$ e 6,290% no D0, 7,565% no D+30 e 16,30% no D+90, $p=0,6129$) (GRÁFICO 22). Analisando em conjunto estas duas subpopulações (ME+E) foi observado que não existiram variações estatisticamente significantes (21,44% no D0, 13,20% no D+30 e 29,77% no D+90, $p=0,9044$) (GRÁFICO 25). A pesquisa da expressão da molécula citotóxica intracelular tanto no total de linfócitos selecionados para análise no Gate A como na subpopulação com expressão da molécula de superfície CD8+ em alta intensidade de fluorescência (CD8^{HI}, Gate H) evidenciou uma ascensão percentual estatisticamente significativa (respectivamente no Gate A: 21,60% no D0, 35,15% no D+30 e 54,76% no D+90, $p=0,0007$ e no Gate H: 9,660% no D0, 19,49% no D+30 e 47,77% no D+90, $p=0,0003$) (GRÁFICO 26).

Para o grupo Alo-MO, a comparação dos resultados obtidos no período mostrou que a subpopulação de linfócitos *naive* apresentou uma queda percentual estatisticamente significativa (52,65% no D0, 10,76% no D+30 e 11,10% no D+90, $p<0,0001$). A subpopulação de linfócitos memória central, de forma similar a do grupo Alo-SP também não apresentou variações estatisticamente significantes no decorrer do período (42,10% no D0, 51,80% no D+30 e 51,50% no D+90, $p=0,1029$). Já diferentemente do que foi observado no grupo Alo-SP, as

subpopulações de linfócitos memória efetora e efetora apresentaram uma ascensão percentual significativa (respectivamente 1,110% no D0, 5,135% no D+30 e 6,290% no D+90, $p=0,0001$ e 0,8350% no D0, 3,010% no D+30 e 5,710% no D+90, $p=0,0354$) (GRÁFICO 23). Da mesma forma, analisando em conjunto as duas subpopulações (ME+E) foi observado uma ascensão percentual estatisticamente significativa (3,405% no D0, 21,77% no D+30 e 20,01% no D+90, $p=0,0017$) (GRÁFICO 25). A análise da expressão da molécula citotóxica intracelular tanto no total de linfócitos do Gate A como na subpopulação de linfócitos TCD8^{HI} no Gate H evidenciou uma ascensão percentual estatisticamente significativa da mesma forma que no grupo Alo-SP, acompanhando a elevação percentual das subpopulações ME e efetora neste grupo (respectivamente no Gate A: 10,50% no D0, 29,64% no D+30 e 49,98% no D+90, $p<0,0001$ e no Gate H: 4,580% no D0, 15,58% no D+30 e 35,20% no D+90, $p<0,0001$) (GRÁFICO 26).

Já para o grupo Auto-SP observou-se pela análise que a subpopulação de linfócitos *naive* de modo similar a do grupo Alo-MO apresentou uma queda percentual estatisticamente significativa (15,70% no D0, 2,825% no D+30 e 2,080% no D+90, $p=0,0006$). A subpopulação de linfócitos memória central, diferentemente do que foi observado nos grupos anteriores (Alo-SP e Alo-MO) apresentou uma queda percentual estatisticamente significativa no período (67,75% no D0, 23,40% no D+30 e 25,80% no D+90, $p=0,0323$). Enquanto para a subpopulação de linfócitos de memória efetora foi observado uma ascensão percentual significativa (7,700% no D0, 57,65% no D+30 e 49,80% no D+90, $p=0,0243$), para a subpopulação de linfócitos efetores não houve diferença estatística (6,160% no D0, 5,700% no D+30 e 14,00% no D+90, $p=0,0735$) (GRÁFICO 24). As duas subpopulações (ME+E) analisadas em conjunto tiveram um acréscimo percentual estatisticamente significativo no período (12,08% no D0, 67,257% no D+30 e 72,70% no D+90, $p=0,0277$) (GRÁFICO 25). A análise da expressão da molécula citotóxica intracelular em linfócitos selecionados na área de aquisição correspondente ao Gate A e ao Gate H evidenciou uma ascensão percentual estatisticamente significativa da mesma forma que a observada nos grupos anteriores (Alo-SP e Alo-MO) (respectivamente no Gate A: 30,05% no D0, 68,10% no D+30 e 59,25% no D+90, $p<0,0001$ e no Gate H: 10,72% no D0, 56,03% no D+30 e 47,59% no D+90, $p<0,0001$) (GRÁFICO 26).

Resumidamente a distribuição percentual das quatro subpopulações de linfócitos TCD8+ (*naive*, memória central, memória efetora e efetora) observada no período considerado para análise das amostras dos pacientes receptores das diferentes modalidades de transplante de medula óssea encontra-se no GRÁFICO 27.

GRÁFICO 22 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO (SP) EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 23 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO (MO) EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 24 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 25. FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES ME+E DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 26 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ GRANZIMA B+ NOS RECEPTORES DAS DIFERENTES MODALIDADES DE TMO EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 27 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT CD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO EM DIFERENTES PERÍODOS

**“ Cinética da Reconstituição Imunológica Após o TMO:
II. Comportamento Geral**

No âmbito geral, independente da consideração dos resultados percentuais obtidos e analisados separadamente por grupo, observou-se que no período pós-transplante a reconstituição imunológica caracteriza-se por uma queda percentual consecutiva estatisticamente significativa na subpopulação de linfócitos *naive* (40,0% no D0, 9,745% no D+30 e 7,040% no D+90, $p<0,0001$) (GRÁFICO 28a) e uma ascensão percentual nas subpopulações memória efetora e efetora também significativa (respectivamente, 4,105% no D0, 6,905% no D+30 e 30,50% no D+90, $p=0,0005$ e 3,790% no D0, 6,305% no D+30 e 13,40% no D+90, $p=0,0177$). (GRÁFICO 28d e 28b) Não houve diferença estatisticamente significativa na análise da subpopulação de linfócitos de memória central (43,80% no D0, 51,80% no D+30 e 33,00% no D+90, $p=0,2656$) (GRÁFICO 28c).

Na análise conjunta das subpopulações memória efetora e efetora (ME+E) foi observado da mesma forma que na avaliação isolada destas subpopulações uma ascensão percentual estatisticamente significativa durante o período pós-transplante (8,595% no D0, 22,03% no D+30 e 55,85% no D+90, $p=0,0006$) (GRÁFICO 29).

A análise da expressão da molécula citotóxica intracelular no total de linfócitos selecionados tanto pelo Gate A como pelo Gate H evidenciou uma ascensão percentual estatisticamente significativa (respectivamente no Gate A: 20,65% no D0, 37,64% no D+30 e 55,63% no D+90, $p<0,0001$ e no Gate H: 8,615% no D0, 28,91% no D+30 e 45,08% no D+90, $p<0,0001$) (GRÁFICO 30).

GRÁFICO 28 – PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 29 – PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES ME+E DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO EM DIFERENTES PERÍODOS

GRÁFICO 30 – PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+ QUE EXPRESSAM GRANZIMA B NOS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TMO EM DIFERENTES PERÍODOS

4.2. REATIVAÇÃO DO CITOMEGALOVÍRUS

Durante os primeiros 90 dias pós-transplante, a infecção pelo citomegalovírus diagnosticada pela antigenemia foi detectada em 2 dos 22 receptores do grupo Auto-SP (9,1%), em 15 dos 28 receptores do grupo Alo-MO (53,6%) e em 7 dos 16 receptores do grupo Alo-SP (43,8%). As diferenças dos valores percentuais entre o grupo Auto-SP e as outras duas modalidades de transplante foram estatisticamente significantes ($p < 0,05$). A data de diagnóstico de infecção ativa pela antigenemia variou no grupo autólogo entre 15 e 16 dias, sendo a mediana de ocorrência de 15,5 dias após o transplante, no grupo Alo-SP variou entre 28 e 62 dias sendo a mediana de 35 dias, e no grupo Alo-MO variou de 27 a 71 dias sendo a mediana de 41 dias.

Estes resultados estão de acordo com as análises fenotípicas, que indicam que a modalidade de transplante que por volta dos 30 dias está proporcionalmente enriquecida pelos fenótipos linfocitários que caracterizam as subpopulações de memória efetora e efetora, também apresenta menos frequentemente reativação do citomegalovírus durante os primeiros 90 dias pós-transplante.

“ Produção de Interferon-gama (IFN- γ) em Resposta ao Citomegalovírus

A marcação dos fenótipos de superfície das células pode determinar a frequência das subpopulações de células T CD8+, mas não proporciona informação sobre as funções destas células (Khan et al., 2002b). Uma destas funções é a produção de IFN- γ , que pode ser determinada utilizando a metodologia dos ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Por outro lado, as análises por estas metodologias que determinam apenas a secreção de citocinas (ELISA, ELISpot) têm sido extremamente úteis na avaliação da imunogenicidade, embora sejam essencialmente equivalentes aos ensaios limitados de imunofenotipagem que utilizam apenas uma cor, um marcador (Roederer et al., 2004) e portanto na avaliação do sistema imunológico devem ser realizadas em conjunto, de forma complementar.

Os genes que codificam tanto IFN- γ como as moléculas citotóxicas perforina e granzima B, não são expressos nas células TCD8+ *naive*, mas são constitutivamente expressos nas células TCD8+ efectoras e de memória (Bachmann et al., 1999; Veiga-Fernandes et al., 2000; Kaech et al., 2002).

Nós conduzimos os ensaios imunoenzimáticos (ELISA) usando células mononucleadas obtidas do sangue periférico de receptores de TMO incubadas com o mitógeno *pokeweed* (PWM), antígenos do citomegalovírus e de *Candida sp* (CMA). A produção precoce de IFN- γ no pós-transplante imediato (D+30) foi detectada em sobrenadantes de culturas de células estimuladas pelo antígeno do CMV de 11 dos 16 receptores do grupo Auto-SP (69%) (FIGURA 33a), em comparação a apenas 2 de 10 pacientes do grupo Alo-SP (20%) e somente 3 de 14 receptores do grupo Alo-MO (21%). Esta diferença nos valores percentuais encontrados entre o grupo Auto-SP e as outras duas modalidades de transplante foi estatisticamente significativa ($p < 0,05$). Os níveis secretados pelas células dos receptores do grupo Auto-SP foram notáveis e comparáveis àqueles do grupo controle (respectivamente, 878 vs 1203 pg/mL, $p > 0,05$). IFN- γ foi detectado nos sobrenadantes de cultura de células estimuladas pelo antígeno de CMA de apenas 3 dos 16 pacientes do grupo Auto-SP (19%), 2 dos 10 receptores avaliados do grupo Alo-SP (20%) e 01 dos 14 pacientes do grupo Alo-MO (7%) (FIGURA 34a) ($p > 0,05$). Os níveis de IFN- γ secretados por qualquer um dos receptores dos três diferentes grupos foram inferiores aqueles observados no

grupo controle (32 vs 1132 pg/mL, $p<0,01$). IFN- γ foi detectado em sobrenadantes de cultura de células estimuladas pelo mitógeno PWM de todos os pacientes e neste caso não houve diferenças estatisticamente significantes nem entre as modalidades de transplante, nem destas em relação ao grupo controle (2188 pg/mL no grupo Auto-SP, 2432 pg/mL no grupo Alo-SP, 2122 pg/mL no grupo Alo-MO, 2208 pg/mL no grupo controle, $p>0,05$) (FIGURA 35a). No período pós-transplante mais tardio (D+90), a produção de IFN- γ induzida pelo antígeno do CMV foi observada em 9 dos 13 receptores do grupo Auto-SP (69%), em 4 dos 7 do grupo Alo-SP (57%) e em 4 dos 10 do grupo Alo-MO (40%) ($p>0,05$) (FIGURA 33b). Neste período, não houve diferença estatisticamente significativa entre as três modalidades de transplante no que se refere as medianas dos níveis produzidos, as quais foram muito reduzidas (respectivamente, 255 vs 56 vs 32 pg/mL, $p>0,05$). Os níveis secretados de IFN- γ por qualquer um dos grupos de pacientes receptores de transplante foram também inferiores aqueles observados para o grupo controle (1203 pg/mL, com $p<0,01$ para o grupo Auto-SP e $p<0,01$ para os grupos alogênicos). A produção de IFN- γ induzida pelo antígeno de *Candida sp* foi observada em 7 dos 13 pacientes do grupo Auto-SP (53,9%), em 2 dos 7 pacientes do grupo Alo-SP (28,6%), e em 4 dos 10 receptores do grupo Alo-MO (40%) ($p>0,05$) (FIGURA 34b). Além disso, os níveis de IFN- γ secretados pelos receptores das três modalidades de transplante, foram inferiores aqueles observados no grupo controle (respectivamente, 93 pg/mL vs 32 pg/mL vs 32 pg/mL vs 1132 pg/mL, $p=0,037$). Já a produção de IFN- γ induzida pelo mitógeno PWM foi similar para os três grupos e também em relação ao grupo controle (2353 pg/mL no grupo Auto-SP, 2361 pg/mL no grupo Alo-SP e 2353 pg/mL no grupo Alo-MO, 2208 pg/mL no grupo controle, $p>0,05$) (FIGURA 35b).

a) D+30

b) D+90

FIGURA 33. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN- γ PARA O ANTÍGENO CMV NOS SOBRENADANTES DE CULTURA DE CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30 (a) E D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE.

FIGURA 34. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN- γ PARA O ANTÍGENO CMA NOS SOBRENADANTES DE CULTURA DE CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30 (a) E D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE.

a) D+30

b) D+90

FIGURA 35. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN- γ EM RESPOSTA AO PWM NOS SOBRENADANTES DE CULTURA DE CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30 (a) E D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE.

Resposta Linfoproliferativa ao Citomegalovírus

No D+30 foi observado que 8 dos 16 pacientes avaliados do grupo Auto-SP (50%) apresentaram respostas proliferativas linfocitárias positivas para o antígeno do citomegalovírus em comparação a apenas 2 dos 10 receptores do grupo Alo-SP (20%, $p>0,05$) e 01 dos 14 pacientes do grupo Alo-MO (7,1%, $p<0,05$) (FIGURA 36a). As medianas dos índices de estimulação (IE) foram similares nos três grupos (1,7 no grupo Alo-SP, 3,2 no grupo Auto-SP e 1,2 no grupo Alo-MO, $p>0,05$). Não houve diferença significativa entre as medianas dos IE para o antígeno CMA dos três grupos analisados (IE de 6,3 para o grupo Alo-SP, 4,7 para o grupo Auto-SP e 3,1 para o grupo Alo-MO, $p>0,05$) (FIGURA 37a). As respostas para o mitógeno PWM foram maiores porém não estatisticamente significantes no grupo Alo-SP em comparação as observadas para os grupos Auto-SP e Alo-MO (respectivamente os IE de 55,2 vs 27,1 vs 21,9, $p>0,05$) (FIGURA 38a). A avaliação no D+90 revelou uma resposta induzida pelo antígeno do CMV positiva em 9 dos 13 receptores do grupo Auto-SP (69,2%), em 2 dos 7 pacientes analisados do grupo Alo-SP (28,6%) e em 3 dos 8 receptores do grupo Alo-MO (37,5%) ($p>0,05$). Embora os índices de estimulação foram maiores no grupo Auto-SP em relação aos observados nas outras duas modalidades de transplante (respectivamente, 8,3 vs 2,5 vs 1,6), esta diferença não foi estatisticamente significativa, provavelmente devido ao pequeno número de pacientes avaliados (FIGURA 36b). As medianas dos IE para as respostas proliferativas ao antígeno CMA foram maiores nos grupos Alo-SP e Auto-SP em comparação as observadas no grupo Alo-MO (respectivamente, 28,7 vs 17,4 vs 4,6, $p=0,054$) (FIGURA 37b). Ainda, os IE referentes as respostas ao PWM foram maiores no grupo Auto-SP e Alo-SP em relação aos observados para o grupo Alo-MO (respectivamente 50 vs 43,8 vs 16,4) no final do período de acompanhamento. Entretanto, esta diferença também não foi estatisticamente significativa ($p>0,05$) (FIGURA 38b).

A correlação entre as respostas proliferativas induzidas pelo antígeno do CMV e a produção de IFN- γ não foi encontrada nos três grupos de pacientes nem no D+30 nem no +90.

FIGURA 36. DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS PROLIFERATIVAS AO ANTÍGENO CMV DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30 (a) E NO D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE (RESPOSTAS POSITIVAS IE>3)

a) D+30

b) D+90

FIGURA 37. DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS PROLIFERATIVAS AO ANTÍGENO CMA DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30 (a) E NO D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE (RESPOSTAS POSITIVAS $IE > 3$)

a) D+30

b) D+90

FIGURA 38. DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS PROLIFERATIVAS AO MITÓGENO PWM DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30 (a) E NO D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE (RESPOSTAS POSITIVAS $IE > 8$)

“ Casos Ilustrativos da Reconstituição Imunológica Específica para o CMV

São aqui descritos de forma detalhada dois pacientes que potencialmente ilustram nossa hipótese inicial de que no transplante alogênico há a necessidade de um segundo desafio antigênico para o paciente reconstituir a resposta imunológica contra o vírus CMV. Neste trabalho, foi observado que os pacientes do grupo alogênico contrastam com os do grupo Auto-SP, na medida que apenas dois receptores deste grupo tiveram reativação do CMV e em ambos esta reativação ocorreu em um período pós-transplante muito precoce, no D+15 e D+16, portanto antes que a reconstituição imunológica pudesse ter completamente ocorrido.

Amostras de um receptor do grupo Alo-SP (WFF) com uma sorologia pré-transplante positiva para o CMV e com reativação no D+29 (antigenemia positiva em 2 células) foram avaliadas no D+26 e D+47. No D+26, este paciente estava ainda linfopênico (apresentando 325 células TCD4⁺/mm³ e 66 células TCD8⁺/mm³), resultando em números extremamente baixos de células TCD8⁺ diferenciadas por mm³: 37 linfócitos da subpopulação de memória central (MC), 05 da subpopulação de memória efetora (ME) e 04 células efetoras (E). Somente 04 células TCD8⁺/mm³ coexpressavam granzima B (GB). No dia 47 pós-transplante, 18 dias após a reativação do CMV, para a qual o tratamento pré-emptivo com o ganciclovir foi bem sucedido, observou-se que as quantidades de células TCD3⁺, CD4⁺ e CD8⁺ aumentaram, atingindo níveis de normalidade (648 células TCD4⁺/mm³ e 810 células TCD8⁺/mm³) com as subpopulações de linfócitos TCD8⁺ de memória central atingindo 131 células/mm³ e de memória efetora 231 células/mm³ e 50 células efetoras/mm³. Além disso, um total de 187 células TCD8⁺/mm³ coexpressavam GB. Em concordância com estas análises fenotípicas, as células do paciente nem proliferaram nem produziram IFN- γ em resposta ao antígeno do CMV no D+26, mas no D+47, após o sistema imunológico do paciente ter sido desafiado pelo CMV, houve uma forte resposta com intensa produção de IFN- γ (1584 pg/mL).

Um fenômeno similar ocorreu com um paciente receptor do grupo Alo-MO (GBS). Amostras deste paciente que também possuía uma sorologia anterior, pré-transplante positiva para o CMV e que apresentou reativação do CMV no período pós-transplante correspondente ao D+55 e D+61, foram avaliadas no D+28 e D+82.

No D+28, este paciente ainda estava também linfopênico (apresentando um total de 462 células TCD3+/mm³; 212 células TCD4+/mm³ e 244 células TCD8+/mm³), resultando em quantidades muito baixas de células TCD8+ diferenciadas/mm³: apenas 93 células/mm³ identificadas como pertencentes a subpopulação de memória central, 27 células/mm³ a subpopulação de memória efetora, e 04 células efetoras/mm³. Apenas 06 células TCD8+ que coexpressavam a molécula citotóxica GB/mm³ foram identificadas. Após a reativação do CMV, evidenciou-se que todas as contagens de células T aumentaram significativamente para 1281 células TCD3+/mm³ e 489 células TCD4+/mm³. Neste momento havia 773 células TCD8+/mm³, das quais 102 células/mm³ eram da subpopulação de memória central, 408 células/mm³ identificadas como pertencentes a subpopulação de memória efetora e 150 células efetoras/mm³. Também foi observado uma ascensão no número de linfócitos TCD8+ que coexpressavam a molécula GB para um total de 56 células GB+/mm³. A ausência da resposta linfoproliferativa induzida pelo antígeno do CMV e da produção de IFN- γ no D+28 foi revertida para intensas respostas imunológicas positivas no D+82 (apresentando na resposta linfoproliferativa um IE de 21,7 e a produção de IFN- γ de 1742 pg/mL) após a reativação do CMV.

5.1. O TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E AS INFECÇÕES

O TMO foi introduzido na prática médica na década de 70 e, desde então, suas indicações vêm se tornando cada vez mais ampliadas (IBMTR, 2000; Sullivan, 1989). É um tratamento amplamente aceito para muitas doenças neoplásicas, incluindo leucemias, mielodisplasias, linfomas, mieloma múltiplo e tumores sólidos e também indicado para doenças não neoplásicas como aplasia de medula óssea, imunodeficiências congênitas, doenças de depósito, hemoglobinopatias e doenças autoimunes (Horowitz, 1995; Thomas et al., 1999; Atkinson, 2000). O TMO pode ser classificado em singênico, quando doador e receptor são gêmeos idênticos, autólogo, quando a medula transplantada vem do próprio receptor e alogênico, quando o doador é selecionado tendo como base a compatibilidade dos loci HLA-A, B e DR, do sistema dos antígenos leucocitários humanos. Quando a compatibilidade no sistema HLA não é encontrada na família, a busca da mesma passa a ser feita através de bancos de medula óssea, originando o termo transplante alogênico não relacionado (Machado, 1996). Também pode ser classificado quanto à origem das células tronco hematopoéticas (Stem Cells) como procedente da medula óssea ou do sangue periférico por aférese.

Nos últimos anos, as Stem Cells procedentes do sangue periférico (SCSP), mobilizadas pela administração do fator recombinante estimulador da colônia de granulócitos humanos têm amplamente substituído as procedentes da medula óssea como fonte preferida no transplante autólogo devido a relativa facilidade de coleta, cinética de enxertia (“pega medular”) rápida e durável, com reconstituição de neutrófilos e plaquetas, e vantagens econômicas (Hartmann et al., 1997; Faucher et al., 1994; Jerjis et al., 1999). Entretanto, a adoção das SCSP como uma abordagem alternativa para os transplantes alogênicos procedentes de medula óssea em doadores saudáveis HLA-idênticos tem sido lenta. A adoção com cautela desta técnica resulta da observação que o transplante de SCSP tipicamente transfere uma dose significativamente maior de células T maduras, imunocompetentes, sendo relacionada a um aumento proporcional no desenvolvimento de Doença Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH). Apesar desta enorme quantidade de células T (10 vezes mais do que nas coletas da medula óssea) (Dreger et al., 1994; Weaver et al., 1994; Korbling et al., 1995a; Ottinger et al., 1996; Storek et al., 1997b e 2001;

Guillaume et al., 1998, Singhal et al., 2000), os resultados clínicos iniciais indicam que a incidência de DECH aguda não é maior que a do transplante alogênico de medula óssea (Korbling et al., 1995ab; Bensinger et al., 1995 e 1996; Schmitz et al., 1995; Russell et al., 1996; Mahmoud et al., 1999; Blaise et al., 2000). Poderia também ser esperado que uma maior quantidade de linfócitos nos produtos obtidos por aférese pudesse levar a um efeito enxerto versus leucemia mais pronunciado e subseqüentes menores taxas de recaídas das doenças de base, ou pudesse permitir uma melhor imunidade protetora contra infecções (Schmitz et al., 1995; Lickliter et al., 2000; Nivison-Smith et al., 2001; Appelbaum, 1999; Trenchel et al., 2000; Tayebi et al., 2001; Storek et al., 2001; Robinet et al., 2003). As infecções constituem uma das complicações mais importantes no período pós-transplante. Neste período, de maior susceptibilidade em que portas de entrada são criadas pelo próprio regime de condicionamento ou por complicações relacionadas, tais como a mucosite; os pacientes encontram-se neutropênicos; ainda não reconstituíram sua imunidade; podem estar mais imunossuprimidos pela própria DECH ou pelas drogas usadas na sua profilaxia e tratamento com corticosteróides, ou por tratamentos complementares da doença de base, como radioterapias, as infecções são causadas por uma ampla variedade de agentes, como fungos (*Aspergillus sp*, *Candida sp*), bactérias (Gram positivas e negativas; micobactérias e bactérias encapsuladas), protozoários (*Toxoplasma Gondii*), e vírus (Citomegalovírus, Herpes simplex – VHS, Polyomavírus-VBK, Adenovirus, Vírus Sincicial Respiratório-VSR, Varicela Zoster – VVZ, Epstein-Barr vírus – EBV). Tanto em receptores de órgãos sólidos como nos de medula, as infecções virais contribuem significativamente para evolução pós-transplante (Addo e Rosemberg, 2002).

5.2. SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E IMUNIDADE PROTETORA

A confusão em torno da diferenciação das células T e definição das subpopulações de células efetoras e de memória pode em alguma extensão refletir problemas semânticos entre imunologistas clínicos e experimentais. Nos estudos em humanos, muitos esforços tem sido focados nas análises fenotípicas e funcionais das várias subpopulações de células nas infecções virais persistentes. A interpretação destes dados é que todos eles sustentam um caminho linear de diferenciação da célula T, ou desenvolvimento pós-tímico, e que o uso contínuo dos termos memória e efetora na diferenciação das subpopulações de células pode confundir e portanto ser inadequado e conduzir a potenciais erros de interpretação (Appay et al., 2004). Evidências sugerem que as células T CD8+ altamente diferenciadas que expressam elevadas quantidades de perforina podem não ser células que conferem imunidade protetora. Primeiro porque células T CD8+ vírus-específicas analisadas durante infecção viral primária em humanos, as quais poderiam legitimamente serem consideradas como células efetoras, são encontradas em estádios iniciais de diferenciação. Segundo, células T CD8+ altamente diferenciadas mostraram intrigantes semelhanças às células T CD4+ citotóxicas altamente diferenciadas. A função fisiológica destas células não está clara, e alguns autores questionam se elas merecem o termo “efetora” quando comparadas às células menos diferenciadas T CD4+ auxiliares clássicas. Ambas as subpopulações, apesar de exibirem forte capacidade citotóxica, mostram aumento das características de senescência replicativa geralmente associada com ativação crônica e reduzida competência das células T. Por fim, estudos experimentais e em humanos mais recentes sugerem que a imunidade protetora está associada a células com potente capacidade proliferativa, melhor definida como inicialmente diferenciada. O processo de diferenciação da célula T, como o descrito em humanos pode estar relacionado ao processo normal de envelhecimento linfocitário, conforme proposto previamente por Globerson e Effros (2000): este pode ser direcionado, pelo menos em parte, pela ativação imunológica. Este caminho parece ser independente de como nós atualmente entendemos as células efetoras e de memória. Mesmo nos modelos experimentais, a definição das células efetoras e de memória não parece tão clara como originalmente proposto. O modelo linear *naive* > efetora > memória-efetora > memória-central não é sustentado pelos relatos que mostram longos telômeros nas células de memória central

comparadas as células memória efetora. (Sallusto et al., 1999; Papagno et al., 2004), a menos que a atividade da telomerase seja revertida na subpopulação de memória central durante esta fase de diferenciação. Além disso, tem sido demonstrado recentemente que as células na fase de memória parecem aproximadamente tão eficientes na atividade lítica *in vivo* quanto as células na fase efetora (Barber et al., 2003), portanto minimizando qualquer distinção entre as células de memória e efetoras. No contexto das infecções virais, as células efetoras podem simplesmente representar células apresentadas a antígenos submetidas à estimulação na presença de replicação viral ativa, enquanto células de memória são células “em repouso” já apresentadas a antígenos. Não há um consenso em relação à relevância funcional de aumento da capacidade citotóxica adquirida pelas células T nos seus estágios mais tardios de diferenciação. Alguns trabalhos atribuem a imunidade protetora às células mais diferenciadas no controle de doenças como HIV-1 (Van Baarle et al., 2002) enquanto outros correlacionam estas células à sua progressão (Heintel et al., 2002). Células TCD8+ com diferenciação mais tardia podem simplesmente acumular ao longo de um período prolongado de estimulação crônica, porém sem nenhuma função particular no atraso da progressão de doenças. O aumento do número das subpopulações de células T CD8+ altamente diferenciadas, com fenótipo consistente com funções “efetoras” maduras poderia ser atribuído a várias condições clínicas infecciosas (Weekes et al., 1999b; Gamadia et al., 2001b) ou não infecciosas tais como desordens hematológicas (Kook et al., 2001), autoimunes (Crucian et al., 1995), genéticas (Giovannetti et al., 2002), imunodeficiências relacionadas à idade em indivíduos saudáveis (Fagnoni et al., 1996; Rufer et al., 1999; Nociari et al., 1999) ou adquiridas como na infecção HIV-1 (Appay et al., 2000; Papagno et al., 2004) e no transplante renal (Gamadia et al., 2001). Não está claro quais sinais específicos dirigem a diferenciação das células T *naive* em células TCD8+ efetoras e de memória. O antígeno e fatores a ele relacionados como a carga viral, a compartimentalização, persistência, localização anatômica, forma de apresentação às células, mecanismos ou estratégias de imuno evasão viral, podem não ser os únicos fatores na determinação da heterogeneidade do fenótipo das células CD8+. Sinais co-estimulatórios proporcionados pelas citocinas liberadas (por exemplo, IL-15) (Alves et al., 2003) ou ligantes das membranas das células podem especificamente regular este processo. Interessante neste sentido é que ambos receptores coestimulatórios

CD27 e CD28 aumentam as funções efectoras e deixam de ser expressos da superfície das células após interagirem com seus específicos ligantes (Gamadia et al., 2001b). Além disso, podem influenciar neste processo fatores relacionados ao hospedeiro como a especificidade antigênica das células (Appay et al., 2002; Tussey et al., 2003), a intensidade variável de ativação e coestimulação das mesmas que variam nas diferentes infecções e a participação de células T regulatórias (Appay et al., 2004). Provavelmente a imunidade protetora pode ser melhor proporcionada pelas células T que tem sido sensibilizadas em circunstâncias de ativação mínima (por exemplo, no final da fase de infecção primária) e portanto permanece em estádios iniciais de diferenciação, tornando-se células de memória “em repouso” (mantendo vantajosas características fenotípicas e funcionais, notavelmente a capacidade proliferativa) (Migueles et al., 2002). São necessários mais trabalhos para entender a relação entre a dinâmica das respostas das células T às infecções virais e doenças neoplásicas e o desenvolvimento pós-tímico (Appay et al., 2004).

5.3. SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E TRANSPLANTES

No transplante renal, tem-se observado que a maioria dos doadores e pacientes no período pré-transplante apresentam relativamente baixos percentuais de células TCD8+ específicas para o CMV tendo a maioria destas fenótipo de memória. Após o transplante, nos pacientes sob terapia imunossupressora por um longo período (30 meses), foi observado que aproximadamente quase todas as células CMV-específicas apresentavam fenótipo CD27- ou seja, um aumento percentual de células efectoras por todo o período enquanto o número de células CD8+ permaneceu constante. Alguns fatores podem explicar estas diferenças. A imunossupressão, causada pela droga imunossupressora freqüentemente proporciona uma vigilância contra viroses persistentes menos eficiente *in vivo*. A ciclosporina A interfere diretamente com os sinais de ativação gerados via receptores das células T (TCR) (Noble e Markham, 1995; Addo e Rosemberg 2000). Conseqüentemente, ciclos de replicação viral podem ocorrer que apesar da imunossupressão estimulam a expansão de células TCD4+ e CD8+. Na presença de células TCD4+ auxiliares competentes, o compartimento de células TCD8+ se diferencia em células efectoras que por sua vez devido às contínuas reativações virais subclínicas se acumulam ao longo do tempo (Appay et al., 2000; Gamadia et al., 2001).

Estes dados inferem que apesar da imunossupressão para se evitar a rejeição do enxerto mediada por células T alo-específicas, o sistema imunológico é capaz de montar uma resposta adaptativa às viroses persistentes como as do CMV. Na maioria dos indivíduos saudáveis, um equilíbrio no controle do vírus é atingido com um predomínio de células T CD8+ com fenótipos de memória. Entretanto, em resposta a fatores virais ou do hospedeiro, as respostas CD8+ podem ser desviadas para células com fenótipos efetores. Além disso, tem-se observado também que em alguns doadores normais podem predominar células com fenótipos efetores. Estes indivíduos analisados eram saudáveis, e não tinham sinais de replicação viral *in vivo*. Neste contexto, como já mencionado, não deve ser esquecido que as células TCD8+ com fenótipos efetores se acumulam com a idade (Fagnoni et al., 1996; Rufer et al., 1999; Gamadia et al., 2001). Este processo natural pode ser acelerado nos indivíduos imunocomprometidos que devido à imunossupressão farmacoterapêutica, podem ser menos capazes de reprimirem suficientemente a replicação viral. Com o auxílio adequado de células TCD4+ vírus-específicas, estes indivíduos podem aumentar quantitativa e qualitativamente o compartimento de células TCD8+ efectoras adquirindo portanto um novo equilíbrio com as viroses persistentes. Entretanto, quando este balanço falha para ser estabelecido, a doença clínica pode então se desenvolver (Gamadia et al., 2001).

5.4. RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA APÓS O TMO

A reconstituição imunológica após o TMO tem sido uma área de intensa pesquisa, especialmente o estudo de reconstituição da resposta imunológica ao CMV, a principal causa de complicações infecciosas nos receptores de TMO (Podlech et al., 1998). Estudos da cinética de aparecimento da resposta imunológica antígeno-específica pode proporcionar informações valiosas para melhorar a abordagem atual de prevenção ou tratamento da infecção pelo CMV nesta condição clínica. Nossos estudos confirmam sugestões anteriores de que a presença de resposta proliferativa específica para o CMV é indicativa de imunidade efetiva anti-CMV e também mostra que a produção de IFN- γ é um marcador adicional de tal imunidade nos receptores de TMO alogênico e autólogo (Ljungman et al., 1985, 1986 e 1993, Krause et al., 1997, Bowden et al., 1990 e Mendes et al., 2002).

Demonstrou-se que a reconstituição da resposta imunológica anti-CMV é um evento precoce no Auto-TMO e atrasado no Alo-TMO. Estas diferenças podem ajudar a explicar as taxas contrastantes de infecção e doença pelo CMV entre os pacientes de Alo e Auto-TMO (Mendes et al., 2002).

Também foi demonstrado previamente que linfócitos TCD8+ CMV-específicos são responsáveis pela eliminação da infecção ativa e pela imunidade protetora em ambos pacientes não imunocomprometidos (Quinnan et al., 1982 e Borysiewicz et al., 1983) e pacientes do TMO (Reusser et al., 1991 e 1997). Neste sentido, recentes dados têm sugerido que pacientes receptores de TMO alogênico depletado de células T tem um risco aumentado de desenvolver doença por CMV grave e morte e isto é devido a eliminação específica dos clones de células T maduras reativas ao CMV do enxerto que conferem imunidade a este vírus durante os primeiros meses pós-transplante (Reusser et al., 1991; Boeckh e Ljungman 1995; Couriel et al., 1996; Hertenstein et al., 1995; Podlech et al., 1998; Manteiga et al., 1998).

É bem conhecido que o fato do Auto-TMO estar associado com baixas taxas de infecção e doença pelo CMV em relação ao Alo-TMO (Winston et al., 1979, Boeckh et al., 1996, Goodrich et al., 1991, Reusser et al., 1991 e 1997, Ljungman 1996, Gor et al., 1998) tem sido atribuído em parte ao desenvolvimento da doença enxerto contra o hospedeiro (DECH) um importante fator de risco para infecção e doença pelo CMV nos pacientes do Alo-TMO (Martin et al., 1990; Ochs et al., 1995, Manteiga et al., 1998; Boeckh e Ljungman, 1995), ao levar por si uma imunossupressão mais pronunciada além do uso de drogas imunossupressoras para seu tratamento ou profilaxia (Boland et al., 1992). Uma alta probabilidade de infecção pelo CMV tem sido observada nos receptores de transplante com seleção positiva de células CD34+ que desenvolveram DECH de grau moderado a grave (Martino et al., 2001). Além disso, tem sido demonstrado que a DECH e seu tratamento têm um profundo impacto negativo na reconstituição imunológica após os transplantes procedentes do sangue periférico (Parkman e Weinberg, 1999). No presente estudo, foi observado no grupo Alo-MO que, dos 28 pacientes analisados inicialmente, 17 pacientes tiveram DECH grau $\geq$ II sendo que 16 deles receberam corticosteróides ($\geq$ 1mg/kg). Dos 17 pacientes, enquanto apenas 05 pacientes apresentaram unicamente DECH, os outros 12 reativaram o CMV, sendo que em 7

deles a DECH precedeu a detecção de antigenemia positiva para o CMV, em 4 pacientes a DECH surgiu posteriormente à reativação do CMV e para um paciente o aparecimento da DECH e positivação da antigenemia para o CMV foram simultâneos. Em 11 pacientes não houve diagnóstico de DECH durante o período estudado. No grupo Alo-SP, dos 16 pacientes analisados inicialmente, 11 tiveram DECH grau $\geq$ II e receberam corticosteróides. Dos 16 pacientes, 4 apresentaram apenas este evento e em 5 pacientes este evento foi considerado ausente. Seis pacientes desenvolveram previamente DECH grau $\geq$ II e reativaram o CMV e em um paciente os dois eventos foram simultâneos.

A gênese da imunodeficiência que segue o TMO, não pode ser confinada apenas a DECH ou seu tratamento. Outros fatores também podem repercutir na reconstituição imunológica destes pacientes como aqueles que atribuem as células T CD8+ extensivamente diferenciadas o papel de células regulatórias e supressoras (Sadat-Sowti, 1994), a maior susceptibilidade a apoptose dos linfócitos hiperativados que também geralmente acompanha a elevada linfopoese nestes pacientes (Donnenber et al., 1995; Brugnoli et al., 1999) e como muito bem observado recentemente em pacientes infectados pelo HIV, contribui para a depressão da imunidade CMV-específica (Weinberg et al., 2004).

Os estudos sugerem que os diferentes riscos de morbidade para o CMV estão relacionados às diferentes cinéticas da reconstituição imunológica antígeno-específica entre as diferentes modalidades de TMO. Neste sentido, um mês após o transplante, tem sido observado que receptores do Auto-TMO apresentam grande número de células TCD8+ e que a expansão inicial das células TCD8+ após o Auto-TMO é constituída principalmente de células TCD8+ de memória transferidas dos doadores incluindo aquelas que são CMV-específicas (De Gast et al., 1985; De Vries et al., 2000; Gamadia et al., 2001). A expansão preferencial das células de memória sobre as células TCD8+ *naive* pode ser explicada pela habilidade de proliferar relativamente independente da atividade das células TCD4+ auxiliares (Tough et al., 1996; Dai et al., 2000).

Isto está de acordo com a observação que a expansão das subpopulações de células TCD8+ maduras são mais evidentes nos pacientes previamente infectados

pelo CMV (De Gast et al., 1985; De Vries et al., 2000), assim como uma substancial e precoce produção de IFN- γ antes dos 30 dias no Auto-TMO (Mendes et al., 2002). O IFN- γ é uma citocina crucial nas respostas imunológicas antivirais, a qual é predominantemente secretada pelas células T CD8+ de memória. Tem sido recentemente demonstrado que a expressão de IFN- γ é um marcador para linfócitos CD8+ citotóxicos na infecção pelo CMV (Ghanekar et al., 2001). Portanto a secreção de IFN- γ poderia ser considerada um marcador inicial adicional da reconstituição imunológica anti-CMV no Auto-TMO. Além disso, a secreção de IFN- γ tem sido positivamente correlacionada com os resultados dos ensaios linfoproliferativos mostrando que as respostas induzidas pelo CMV foram observadas no D+30 na maioria dos receptores de Auto-TMO (Reusser et al., 1997; De Gast et al., 1985; Mendes et al., 2002), enquanto estas respostas foram freqüentemente atrasadas para o D+100 ou mais tardias no grupo Alo-TMO. Não somente a reconstituição imunológica não específica como a específica ocorreu mais precocemente no grupo Auto-TMO que no grupo Alo-TMO como demonstrado pelas elevadas respostas proliferativas induzidas pelo PWM e produção de IFN- γ (Mendes et al., 2002).

Estudos anteriores nos pacientes de Alo-TMO têm mostrado uma recuperação mais lenta das respostas imunológicas anti-CMV, incluindo a citotoxicidade mediada pelas células TCD8+ (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994), respostas linfoproliferativas (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994; Krause et al., 1997; Boland et al., 1992) e secreção de IFN- γ e IL-2 (Bowden et al., 1990). A restauração das funções proliferativas e citotóxicas tem sido geralmente associada com baixa incidência de reativação ou doença pelo CMV (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994; Ljungman et al., 1993). O desenvolvimento das respostas linfoproliferativas foi freqüentemente apontado como um marcador de reativação ou infecção pelo CMV (Ljungman et al., 1986 e Meyer et al., 1980), o qual reforçou a interpretação que neste grupo de pacientes, a recuperação das respostas imunológicas anti-CMV depende de uma nova exposição viral (Boland et al., 1992). Além disso, em contraste com o Auto-TMO, a ausência de reconstituição imunológica inicial das subpopulações de células TCD8+ nos pacientes Alo-TMO indica a necessidade de um novo desafio viral para induzir reatividade imunológica anti-CMV. A mesma linha de raciocínio poderia ser aplicada aos pacientes receptores das diferentes

modalidades de transplante infundidos com enxertos selecionados com células CD34+, para os quais associa-se uma reconstituição imunológica tardia comparada a dos receptores de transplantes de células não selecionadas, e uma alta incidência de reativação e doença pelo CMV (Holmberg et al., 1999; Michallet et al., 2000; Sica et al., 2000; Keever et al., 1989; Daley et al., 1987; Roux et al., 1996; Small et al., 1997 e 1999; Martinez et al., 1999; Behringer et al., 1999). O desenvolvimento desta nova resposta imunológica depende do número adequado de células TCD4+ com atividade auxiliar (Reusser et al., 1991; Kalams et al., 1999; Kalams e Walker, 1998; Rosenberg et al., 1997; Waldrop et al., 1997; Appay et al., 2000; Hasenkrug 1998; Addo e Rosenberg 2002; Sun et al., 2004) as quais são afetadas pela grave imunossupressão inicial pós-TMO, causada nos transplantes alogênicos tanto pela DECH ou seu tratamento/profilaxia como pelos outros fatores mencionados anteriormente.

Neste contexto, o presente estudo foi conduzido para elucidar a questão sobre quais fatores estariam relacionados a menor incidência de reativação e doença pelo CMV observadas nos receptores de transplante autólogo em comparação aos receptores de transplante alogênico. Considera-se que o transplante Alo-SP esteja associado à reconstituição imunológica acelerada comparada à do Alo-MO. As razões para estes achados não são completamente compreendidas. Dois aspectos apontam para estas diferenças: a qualidade e quantidade das células infundidas, e/ou disparidade genética entre doador e receptor. Prévios estudos têm mostrado que o estado sorológico pré-transplante se positivo ou negativo, do doador e receptor também influencia a taxa e consequência da reativação do CMV. Este parâmetro freqüentemente não exerce o principal papel em nossos pacientes uma vez que quase todos pares de doadores e receptores e também os receptores de transplante autólogo apresentavam anticorpos anti-CMV, denotando infecção prévia e um estado de portador do CMV.

Uma vez que uma melhor imunidade anti-CMV requer respostas de linfócitos TCD8+, tanto atividade citotóxica como liberação do IFN- γ e, até onde vai nosso conhecimento, não há estudos detalhados sobre a cinética e participação das subpopulações de células de memória recentemente descritas, na reconstituição imunológica de pacientes transplantados de medula óssea, nos propusemos a

identificar, quantificar e determinar a expansão destas subpopulações desde o *pool* de células infundidas até os primeiros três meses pós-transplante, período crucial para reativação do CMV. Estas análises foram então correlacionadas com a recuperação (ou não) das capacidades funcionais específicas para o CMV do sistema imunológico, isto é linfoproliferação e produção de IFN- γ induzida por uma preparação antigênica de CMV já padronizada em nosso laboratório.

Nossos resultados podem contribuir para um melhor entendimento da reconstituição imunológica no transplante ao revelar diferenças substanciais na quantidade de células infundidas de acordo com a modalidade de transplante, não somente nas subpopulações principais (como as células T CD3+, CD4+ e CD8+), já observadas em estudos prévios (Tayebi et al., 1998 e 2001; Ottinger et al., 1996; Guillaume et al., 1998; Weaver et al., 1994; Robinet et al., 2003; De Vries et al., 2000; Zintl et al., 1989), mas também em subpopulações mais discretas, como as subpopulações TCD8+ de memória. Esta observação é realçada pelo fato de incluir a comparação entre três diferentes modalidades de transplante. De particular interesse é a observação de que o enriquecimento de células não foi uniforme, predominando subpopulações de memória comparado à subpopulação *naïve*. No momento da infusão os pacientes nos grupos Alo-SP e Auto-SP recebiam, respectivamente, 12,1 e 0,86 vezes mais células *naïve*, 27,1 e 6,95 vezes mais células de memória central, 181,3 e 28,7 vezes mais células de memória efetora, e 68,3 e 9,75 vezes mais células efetoras, do que no grupo Alo-MO. Estas diferenças certamente têm implicação na evolução clínica dos pacientes, como será discutido a seguir.

Com a finalidade de se confirmar o aumento não proporcional da subpopulação de células T CD8+ mais diferenciadas, nós estabelecemos em paralelo o protocolo de marcação intracelular para a enzima granzima B, a qual, como a perforina, é um excelente marcador para células CD8+ citotóxicas (Gamadia et al., 2001; Kaech et al., 2002). Esta marcação teve por finalidade certificar a quantificação de células citotóxicas, uma vez que há ainda, segundo alguns autores, ceticismo em relação à acuidade da utilização da coexpressão de marcadores de moléculas da superfície celular para a identificação das subpopulações de células CD8+ de memória (Tussey et al., 2000; Sallusto et al., 1999; Tough, 2003; Appay et al., 2002; Appay e Rowland-Jones, 2004). Com a utilização deste protocolo, confirmamos o

enriquecimento para subpopulações de células mais diferenciadas nos grupos Auto-SP e Alo-SP. Além disso, houve uma forte correlação no D0 do transplante entre os dois modos de identificar as subpopulações de células de memória efetora e efetora ($r=0,78$, $p<0.0001$). A correlação entre quantificação de células CD8+ citotóxicas por expressão de granzima B e por moléculas de superfície também não havia, até onde vai nosso conhecimento, sido reportada na literatura. Entretanto, é importante notar que houve pacientes em que os resultados não foram concordantes.

Para examinar a evolução destas células no pós-transplante, os mesmos testes foram realizados no D+30. Para nossa surpresa, não houve uma estreita correlação entre as avaliações do D0 e do D+30. Nos pacientes do grupo Auto-SP, as subpopulações de células de memória-efetora e efetora estiveram muito acima que as dos outros grupos, e também acima dos valores normalmente observados em indivíduos saudáveis (nossos dados não mostrados e Gamadia et al., 2001), apesar destes pacientes terem recebido infusão de células com quantidades menores das respectivas subpopulações se comparados com os receptores de transplante Alo-SP. Ressalte-se ainda que os receptores do grupo Alo-SP apresentavam no D+30 somente 2 a 3 vezes mais células efetoras e memória-efetoras que os receptores do grupo Alo-MO, embora tenham sido infundidos com 20 vezes mais destas células no momento do transplante. Além disso, estes resultados foram corroborados por aqueles observados nos ensaios para determinação de células T CD8+ ricas em granzima B (células T CD8+ citotóxicas). Esta quantificação apresentou uma boa correlação com os dados obtidos por fenotipagem da superfície das células também no D+30 ($r=0,71$, $p<0.0001$). Já no D+90 a correlação encontrada foi menos intensa, porém ainda estatisticamente significativa ($r=0,53$, $p=0,0037$).

A análise evolutiva destas subpopulações, do momento da infusão (D0) a 90 dias pós-transplante (D+90) mostra de forma geral nos três grupos uma tendência à diminuição da subpopulação *naïve*, manutenção da subpopulação memória central, e aumento progressivo das subpopulações memória-efetora e efetora, paralelamente também ao progressivo aumento de células com alto teor de granzima B. Esta progressão para um maior número de células bem diferenciadas ao longo dos três primeiros meses pós-transplante deve refletir, entre outras razões, a contínua exposição a diversos estímulos antigênicos, principalmente de natureza infecciosa,

particularmente vírus e fungos. É possível especular que as células *naïve* estivessem sendo ativadas, eventualmente se diferenciando diretamente para células ME e E, sendo então recrutadas para os sítios de infecção, lá permanecendo até exercerem suas atividades seguidas de provável morte por apoptose (Ahmadzadeh et al., 2001; Kaech et al., 2002). Ou alternativamente, como sugerem outros autores, as células *naïve* se diferenciariam primeiro em células de memória central, e deste *pool*, se originariam as células ME e E (Sallusto et al., 1999; Appay et al., 2004). Nossos achados de estabilidade do compartimento de células de memória central, enquanto o de células *naïve* diminui e o de células mais diferenciadas aumenta são condizentes com ambas as hipóteses.

As razões para a falta de correlação observada entre as células infundidas no D0 e o número de células circulantes no D+30 não são ainda conhecidas. Alguns autores têm especulado que haveria limite de “espaço” disponível para a expansão das células no grupo Alo-SP comparado ao grupo Alo-MO, uma vez que o primeiro já receberia enxerto com quantidades de células próximas ao nível máximo de expansão para o “espaço” disponível (Tayebi et al., 2001; Robinet et al., 2003). Nossos resultados sugerem que esta hipótese é pouco provável, pois a mesma não explicaria as diferenças observadas entre as modalidades de transplante Auto-SP e Alo-MO, que receberam quantidades menores e mais próximas de células, porém apresentaram expansões celulares distintas.

Outra observação que gostaríamos de ressaltar em nosso estudo em nosso estudo foi a que resultou da comparação entre diferentes protocolos de marcadores de superfície utilizados (selecionados entre os vários previamente descritos na literatura), especificamente CD8^{HI}/CD45/CD28, CD8^{HI}/CD45/CD62L, e CD8^{HI}/CD45/CD11b. As análises realizadas verificaram com frequência fortes e significativas correlações ($r > 0,7$; $p < 0,05$) entre os três protocolos, tanto no D0, D+30 e D+90. Este resultado reforça a validade destas determinações na caracterização das diferentes subpopulações de células T CD8+, ainda que alguns autores a considerem inapropriada, pois poderiam simplesmente refletir mais particularmente os diversos estádios ou fases de diferenciação e ativação celular, conforme anteriormente discutido (Appay et al., 2002 e 2004).

Além dos aspectos de fenotipagem, de determinação quantitativa da reconstituição do sistema imunológico nos pacientes transplantados de medula, procuramos também verificar se tais diferenças numéricas de células correspondiam a diferentes reatividades imunológicas celulares. Para este fim, estudamos as respostas imunológicas específicas para o CMV durante a reconstituição imunológica, considerado a principal ameaça viral nos primeiros três meses pós-transplante. Optamos por analisar a resposta imunológica a este vírus pela sua importância no transplante e pela nossa experiência prévia no estudo deste mesmo vírus em transplantados de medula óssea (Mendes et al., 2002).

Nossos resultados demonstraram uma marcante diferença na reconstituição imunológica anti-CMV inicial entre as modalidades de transplante. Esta diferença foi evidenciada pela análise da produção de IFN- γ e da resposta linfoproliferativa induzidas pelo antígeno específico do CMV. Observamos que, de acordo com nossas prévias observações (Mendes et al., 2002) e de outros autores (Bowden et al., 1990), a maioria dos receptores Auto-SP, porém quase nenhum dos receptores das outras modalidades de transplante, responderam ao CMV secretando altos níveis de IFN- γ . Esta citocina tem sido considerada como um mecanismo efetor crucial no combate ou controle do CMV (Khan et al., 2002b). Contudo, este aumento não se acompanhou de respostas linfoproliferativas positivas. No presente trabalho, foi observado no grupo Alo-SP que dos 10 pacientes analisados no D+30, 07 não apresentaram respostas proliferativas ao CMV, nem produziram IFN- γ ; 02 produziram IFN- γ , sendo que em apenas 01 deles esta produção foi acompanhada pela resposta linfoproliferativa ao CMV; e 01 paciente apresentou resposta linfoproliferativa específica ao CMV mas não produziu IFN- γ . No grupo Alo-MO, dos 13 pacientes analisados aos 30 dias, 10 não apresentaram nenhuma das respostas; 03 produziram IFN- γ porém em apenas 01 deles esta resposta foi acompanhada pela resposta linfoproliferativa. No grupo Auto-SP, dos 18 pacientes analisados neste período, apenas 03 não apresentaram nenhuma das respostas; 13 produziram IFN- γ , sendo que em 06 destes pacientes esta resposta não foi acompanhada pela resposta linfoproliferativa ao CMV; 02 pacientes apresentaram respostas linfoproliferativas porém não produziram IFN- γ . Aos 90 dias pós-TMO, no grupo Alo-SP dos 07 pacientes analisados, 03 não apresentaram nenhuma das duas respostas; 04

produziram IFN- γ , sendo que 02 não tiveram respostas proliferativas. No grupo Alo-MO neste período, dos 09 pacientes analisados, 05 ainda continuaram sem apresentar as duas respostas; 04 produziram IFN- γ porém em apenas 01 destes pacientes esta resposta não foi acompanhada pela linfoproliferativa. No grupo Auto-SP, dos 13 pacientes analisados no D+90, apenas 01 não apresentou ambas as respostas; 09 produziram IFN- γ , porém apenas 03 destes pacientes não apresentaram respostas linfoproliferativas ao CMV; dos pacientes remanescentes, 03 apresentaram respostas linfoproliferativas, mas não acompanhada da produção de IFN- γ . Portanto, discordâncias entre as duas respostas têm sido notadas por nós em estudos prévios (Mendes et al., 2002) e por outros grupos (Zintl et al., 1989; Zajac et al., 1998; Ozdemir et al., 2002; Engstrand et al., 2003; Zhang et al., 2003), e pode ser explicada pela razão que a linfoproliferação está mais relacionada à atividade proliferativa de células T CD4+ que de células T CD8+, sendo que as primeiras encontram-se com número e função bastante reduzidos em relação ao normal (e de forma não marcadamente diferente entre as modalidades de transplante). Este defeito funcional das células CD4+ já foi demonstrado persistir por pelo menos um ano após o transplante (Bengtsson et al., 1989; Storek et al., 1995 e 1997a; Ottinger et al., 1996; Talmadge et al., 1997; Mackall et al., 2000), como exemplificado pela recuperação das respostas imunológicas de memória (*recall*) somente após este período. Por outro lado, as células T CD8+ de memória, as quais no TMO derivam principalmente das células infundidas, originárias do sangue periférico dos doadores (grupos Alo-SP ou Auto-SP) são conhecidas por serem menos dependentes das células CD4+ T auxiliares. Embora tenha sido demonstrado que as respostas proliferativas *in vitro* de linfócitos T para o CMV são mediadas predominantemente pelas células T CD4+ (Ljungman et al., 1986a; Borysiewicz et al., 1983), *in vivo*, a expansão majoritária das subpopulações de células T CD8+ antígeno-específicas no grupo Auto-SP poderia ser resultante de uma estimulação “bystander”, mediada tanto por IFN- α/β , provavelmente secretados por células infectadas por vírus (Tough e Sprent, 1994), como por IL-15, cuja secreção é por sua vez induzida por IFN- α/β (Zhang et al., 1998). Portanto, a expansão de células T maduras pode ser relativamente independente da atividade de células T CD4+ auxiliares. Em consonância com esta hipótese, evidenciou-se que nem a persistência destas células por longo prazo, nem as respostas imunes de memória (*recall*) das subpopulações de células T CD8+ de

memória, dependeriam da IL-2 produzida pelas células T CD4+ auxiliares (Dai et al., 2000), e que a expansão das células T CD8+ era mais evidente nos pacientes previamente infectados pelo CMV (sorologia positiva no pré-transplante) (De Vries et al., 2000; De Gast et al., 1985), o qual é um potente indutor da produção de IFN- α/β pelas células infectadas. Portanto, sugerimos que na modalidade de transplante autólogo, mas não de transplante alogênico, há persistência de células T CD8+ antígeno-específicas bem diferenciadas para o CMV, derivadas do enxerto, em número considerável, suficiente para exercer vigilância anti-CMV, ou alternativamente, após sofrerem nova expansão induzida por reativação transitória do CMV em sítios restritos, poderiam exercer esta vigilância. Estas observações permitiriam explicar porque especificamente células T CD8+ diferenciadas teriam maior sobrevida que células CD8+ não diferenciadas, permitindo o desenvolvimento mais precoce de uma resposta imunológica aparentemente efetiva contra o vírus. Esta hipótese, fundamentada essencialmente em resultados *in vitro*, foi aparentemente corroborada pelos dados *in vivo*, ou seja, pela demonstração de um número significativamente menor de reativação do CMV em nossa coorte de receptores autólogos.

Adicionalmente, nossa hipótese pôde ser exemplificada pela descrição de dois receptores alogênicos (WFF e GBS) cujo seguimento imunológico foi descrito em maiores detalhes. Ambos pacientes, um do grupo de transplante procedente do sangue periférico (WFF), outro da medula óssea (GBS), puderam somente exibir respostas anti-CMV após a reativação do vírus, provavelmente pela ativação de células do *pool* de células *naive*. É viável especular que no contexto alogênico, independente da quantidade de células CD8+ de memória infundidas, há uma progressiva perda destas células, provavelmente mediada pela morte celular programada (ou AICD, do inglês “Activation Induced Cell Death”) conseqüente à intensa ativação imunológica destas células induzidas por antígenos de histocompatibilidade menores, ainda não bem definidos. A alta incidência de doença enxerto contra o hospedeiro (DECH) descrita em nosso meio (72%) (Macedo, 1998) na condição dos alogênicos corrobora nossa hipótese. Estudos já têm demonstrado intensa ativação imunológica nas células dos pacientes não apenas com diferentes graus de DECH, mas também em receptores alogênicos sem DECH clinicamente

detectável (Jaksch et al., 2003). Novos estudos estão atualmente sendo desenvolvidos para avaliarem as taxas de morte celular induzida por apoptose nas diferentes modalidades de transplante. Esta possibilidade é reforçada pela observação que nos pacientes autólogos, onde este tipo de ativação imunológica não ocorre, a reconstituição do *pool* de células T CD8+ foi um evento precoce, e em nossa coorte, houve apenas dois episódios de reativação, os quais, provavelmente não por mera coincidência, ocorreram antes que houvesse plena reconstituição imunológica, nos dias +13 e +15 pós-transplante.

A comparação entre as cinéticas de reconstituição da resposta imunológica nos receptores de diferentes modalidades de TMO, desde a infusão de células até 30 e 90 dias pós- transplante, por meio de imunofenotipagem, resposta linfoproliferativa e produção de IFN- γ , permitiu concluir que:

1) Apesar de no transplante Alo-SP haver transferência de quantidades significativamente maiores de leucócitos, particularmente células TCD8+ bem diferenciadas (memória efetora e efetora), que em relação aos transplantes Auto-TMO e Alo-MO, são os receptores de transplante autólogo que no D+30 apresentaram quantidades maiores (eventualmente dezenas de vezes maiores), de leucócitos, linfócitos totais e suas subpopulações, em particular as TCD8+ de memória-efetora e efetora. Estas diferenças foram menos exuberantes, mas ainda presentes aos 90 dias. Em relação à subpopulação TCD4+, os valores estiveram uniformemente abaixo dos valores normais.

2) As observações acima permitem entender melhor as alterações funcionais da resposta imune celular dos pacientes pós-transplante, fundamentando a diminuição da resposta proliferativa ao CMV nos 3 grupos no D+30 e +90, e ao mitógeno PWM, principalmente no D+30, e a produção aumentada de IFN- γ induzida pelo CMV no Auto-SP e diminuída nos outros 2 grupos, enquanto a resposta ao PWM estava preservada.

No conjunto, estas observações permitiram compreender melhor por que os receptores de transplante alogênico têm mais reativação e doença por CMV que os receptores de transplante autólogo. Assim, a transferência de células hematopoéticas do sangue periférico está associada à transferência de células T CD8+ com um fenótipo mais maduro. Entretanto, esta transferência somente irá proporcionar uma resposta imunológica anti-viral mais rápida e eficiente, como esperado para células de memória versus células naïve, nos receptores de transplante autólogo, e não nos alogênicos.

Resultados preliminares, não incluídos neste estudo, permitem sugerir que apoptose das células ativadas, predominante no transplante em condição alogênica, seria, pelo menos em parte, responsável pela grande perda de subpopulações de células TCD8+ diferenciadas que observamos.

ANEXO A. CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO

O Laboratório de Investigação Médica nº 56 da Faculdade de Medicina da USP, está desenvolvendo uma pesquisa para melhor entender a recuperação do sistema imunológico depois que o paciente passa pelo transplante de medula óssea. Este estudo poderá ajudar no futuro a melhor combater as infecções graves que podem ocorrer após o transplante. Para isto, será necessário a coleta de 1ml de sangue periférico ou da medula óssea do doador e de 1 a 10ml de sangue periférico de pacientes no 30º, 120º e 180º dias após o transplante para realização de exames laboratoriais específicos.

Você não tem nenhuma obrigação de contribuir para este ou outro estudo e sua recusa não ocasionará nenhum prejuízo em seu atendimento médico. Se você concordar em participar desta pesquisa será coletado de 1 a 10 ml de sangue de seu braço. Em nenhum momento seu nome será divulgado em publicações, relatórios, ou em quaisquer outros meios de comunicação, sendo portanto o resultado desta pesquisa, se divulgado, anônimo e confidencial.

Caso alguma informação obtida a partir dessa pesquisa possa ser útil ao paciente, faremos todo o possível para repassá-la o mais rápido possível à sua equipe médica. Como em qualquer coleta de sangue pode haver desconforto local. As medidas habituais para com a coleta de sangue serão tomadas para que isto não aconteça. Sempre que possível esta coleta será junto com os exames de rotina evitando assim uma coleta extra.

Após a leitura do texto acima concordei em participar deste estudo.

Nome:

Assinatura: _____

Testemunha

1: _____

Testemunha

2: _____

Data: ____/____/____.

Quaisquer dúvidas favor contatar Dra Valeria / Dr. Gil Benard no fone 011-30667457 ou 7499, horário comercial ou por FAX 011-30817190.

ANEXO B. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA MÉDICA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAIXA POSTAL 3671
SÃO PAULO - BRASIL

DIRETORIA CLÍNICA

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa

APROVAÇÃO

A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em sessão de 27.09.01, APROVOU do Protocolo de Pesquisa nº 599/01, intitulado: "Avaliação da reconstituição imunológica e da resposta anti citomegalovírus (CMV) nos receptores de transplante de medula óssea (TMO, do Departamento de Patologia, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Pesquisador Responsável: Dr. Gil Benard

Pesquisador Executante: Dra. Valéria Ferrari

CAPPesq, 01 de Outubro de 2001.

PROF. DR. JORGE KALIL FILHO
Presidente da Comissão Ética para Análise
de Projetos de Pesquisa

OBSERVAÇÃO: Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar à CAPPesq, os relatórios parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10.10.1996, inciso IX.2, letra "c").

ANEXO C. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA MÉDICA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS
 APROVADO PELA CONEP/MS EM 30/04/97-REF: CNS/CARTA 32 DOC.
 Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112 Santa Cecília CEP 01277900 São Paulo -SP
 PABX (11) 32240122 Ramal: 5502 - Fax- Ramal: 5710 E-mail: eticamed@sentacasasp.org.br

São Paulo ,21 de outubro de 2002.

Projeto nº208/02
 Informe este número para identificar
 seu projeto no CEP

Ilmo.(a).Sr.(a)
Dr.(a).José Carlos Barros
 Departamento de Medicina-Hemocentro

O Comitê de Ética em Pesquisa da ISCMSP, reunido no dia **16/10/2002** e no cumprimento de suas atribuições, após revisão do seu projeto de pesquisa: **"Avaliação da reconstituição imunológica e da resposta anti-citomegalovírus (CMV) nos receptores de transplante de medula óssea (TMO)"**, emitiu parecer enquadrando-o na seguinte categoria:

- ☒ **Aprovado inclusive o TCLE;**
- ☐ **Com pendência** modificações ou informação relevante a serem atendidas em 60 dias ;
- ☐ **Retirado**, por não ser reapresentado no prazo determinado;
- ☐ **Não aprovado:** e
- ☐ **Aprovado inclusive o TCLE** (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e encaminhado para apreciação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa- MS-CONEP, a qual deverá emitir parecer no prazo de 60 dias. Informamos, outrossim, que, segundo os termos da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde a pesquisa só poderá ser iniciada após o recebimento do parecer de aprovação da CONEP.

Prof. Dr. Daniel R. Muñoz
 Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa-
 ISCMSP

ANEXO D. FICHA DE AVALIAÇÃO E SEGUIMENTO DOS PACIENTES E DOADORES**1. DOADOR****1.1. IDENTIFICAÇÃO**

Nome _____ RG: _____

Data de Nasc. _____ Sexo: M () F () Parentesco: _____

1.2. ESTADO SOROLÓGICO / IMUNOLÓGICO:

CMV : Sorologia positiva () Negativa () Indeterminada - desconhecida () Data: _____

HSV : Sorologia positiva () Negativa () Indeterminada – desconhecida () Data: _____

Outros: _____

1.3. PERFIL FENOTÍPICO DOS LINFÓCITOS: (“Dia zero” – coleta da medula óssea)

Data: _____

Leucócitos totais _____ Linfócitos totais _____

%CD3 _____ % CD3+CD4-CD8- _____

%CD3+CD4+ _____ % CD3+CD4+CD8+ _____

%CD3+CD8+ _____

Subpopul.	{	Naive: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28+ _____
		CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L+ _____
		CD3+ CD8+ CD45RA+ CD11b- _____
		Granzima B - _____
LT	{	Memória: CD3+ CD8+ CD45RA- CD28+ _____
		CD3+ CD8+ CD45RA- CD62L+ _____
		CD3+ CD8+ CD45RA-CD11b- _____
		Granzima B + _____
		Efetora: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28- _____
		CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L- _____
		CD3+ CD8+ CD11b+ CD11b+ _____
		Granzima B + _____

2. PACIENTE**2.1. IDENTIFICAÇÃO**

Nome _____

Data de Nasc. _____ RG: _____ Sexo: M () F ()

2.2. DADOS DO TRANSPLANTE

Doença de Base: AAG () LMA () LMC () LLA () DH () LNH () MM ()

Mielodisplasia () Mielofibrose () APSV () ALD () Outros _____

Tipo de Tx: Alogênico () { TMO () Autólogo () { SCSP () Singênico () { TMO ()
SCSP () { TMO () Mini TMO () { SCSP ()

Data Tx: _____ Instituição: _____

Doença / estágio da doença no Tx: Alto risco () Baixo risco ()

2.3. ESTADO SOROLÓGICO ANTES DO TX:

CMV : Sorologia positiva () Negativa () Indeterminada - desconhecida () Data: _____

HSV : Sorologia positiva () Negativa () Indeterminada – desconhecida () Data: _____

Outros: _____

Esplenectomia S () N () Data: _____

2.4. CONDICIONAMENTO MIELOABLATIVO: S () N () Quimioterapia - QT ()

Drogas _____

Radiação: S () N () Qual _____

Data início: _____ Término: _____ dose: _____

2.5. PROFILAXIA DE DECH AGUDA: S () N () Data início: _____

Drogas: Methotrexate S () N () Data início: _____ Término: _____ dose: _____

Cyclosporina S () N () Data início: _____ Término: _____ dose: _____

Outras: _____ Data início: _____ Término: _____ dose: _____

Outras: _____ Data início: _____ Término: _____ dose: _____

2.6. DECH AGUDA: Classificação: Grau 0-1 S () N () Grau 2-4 S () N ()

Grau: _____ Local _____ Data _____

Grau: _____ Local _____ Data _____

Grau: _____ Local _____ Data _____

Grau: _____ Local _____ Data _____

2.7. TRATAMENTO:

Prednisona S () N () Data início: _____ Término : _____ dose: _____

Outras drogas: _____ Data início: _____ Término: _____ dose: _____

2.8. DECH CRÔNICA: S () N ()

Época de diagnóstico – dias pós Tx ()

Clínica: Nenhuma () Limitada () Extensa ()

Não aplicável (recidiva da doença de base ou óbito antes do 100º dia) ()

Classif. _____ Local _____ Data: _____

Classif. _____ Local _____ Data: _____

Classif. _____ Local _____ Data: _____

2.9. TRATAMENTO DE DECH CRÔNICA: S () N ()

Drogas: Prednisona () Data início: _____ Término: _____ dose: _____

Ciclosporina () Data início: _____ Término: _____ dose: _____

Outras: _____ Data início: _____ Término: _____ dose: _____

2.10. QUIMERISMO:Quimerismo total (Origem de $\geq 90\%$ células da medula do doador no 120º dia) () I/D ()Intervalo médio em dias de recuperação quantitativa de neutrófilos – “pega” - ($>0.5 \times 10^9/L$): _____Episódios de *neutropenia* ($<0.5 \times 10^9/L$) entre dias 30 e 180º () Inf. Viral assoc. () Duração (dias)**2.11. GLICOCORTICOIDES** entre dias 15 e 180º S () N ()

Data início: _____ Término: _____ dose (1-2 mg/kg): _____

2.12. PROFILAXIA PARA CMV: S () N () I/D ()

Ganciclovir se antigenemia pp-65 positiva ()

Data início: _____ Término: _____ dose: _____

2.13. PROFILAXIA VIRAL com Aciclovir: S () N () I/D () Outras: _____

Data início: _____ Término: _____ dose: _____

2.14. Profilaxia com Imunoglobulina intravenosa: S () N () I/D ()

Data início: _____ Término: _____ dose (mg/kg): _____

2.15. Medula pré-TMO & Doença de Base – Biópsias (AP): Fibrose S () N () Intensidade (%): _____

Data: _____ Descrição do ambiente medular: _____

Outras observações relevantes de protocolos / condutas: _____

AValiação EVOLUTIVA CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES VISITA:**3.CLÍNICA****3.1.INFECCÃO PELO CMV:** S () N () Data: _____

AG + S () N () N° células: _____ Data início: _____ Término: _____

Sorologia + S () N () Título: _____ Data: _____

Cultura - S () N () Data: _____

PCR - S () N () Data: _____

3.2.TRATAMENTO PREEMPTIVO: S () N ()

Droga(s) _____ Data início: _____ Término: _____ Dose: _____

Droga(s) _____ Data início: _____ Término: _____ Dose: _____

3.4.ADOECIMENTO PELO CMV: S () N ()

CMV-TGI () Data: _____ Forma de diagnóstico: _____

CMV-SNC() Data: _____ Forma de diagnóstico: _____

CMV-Pulmonar () Data: _____ Forma de diagnóstico: _____

CMV disseminado () Data: _____ Forma de diagnóstico: _____

3.5.TRATAMENTO DA DOENÇA PELO CMV: S () N ()

Droga(s) _____ Data início: _____ Término: _____ Dose: _____

Droga(s) _____ Data início: _____ Término: _____ Dose: _____

3.6.PROFILAXIA SECUNDÁRIA PARA CMV: S () N ()

Droga(s) _____ Data início: _____ Término: _____ Dose: _____

Droga(s) _____ Data início: _____ Término: _____ Dose: _____

3.7.OUTRAS INFECCÕES ENTRE OS DIAS 30 E 180º: S () N () vírus/bactérias/parasitas

Dx: _____ Forma Dx - Clínico () Laboratorial (): _____ Data: _____

Dx: _____ Forma Dx - Clínico () Laboratorial (): _____ Data: _____

3.8.TRATAMENTO:

Drogas _____ Data início: _____ Término: _____

Drogas _____ Data início: _____ Término: _____

3.9.PROFILAXIA: _____ Data início: _____ Término: _____

AValiação EVOLUTIVA CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES VISITA:**4. LABORATORIAL****SOROLOGIA X ANTIGENEMIA PARA CMV X TRATAMENTO X DOENÇA:**

Data TMO	Sorologia	Antigenemia	Tratamento	Doença

Perfil fenotípico dos linfócitos

Data: _____

Leucócitos totais _____ Linfócitos totais _____

% CD3 _____

% CD3+ CD4- CD8- _____

% CD3+ CD4+ CD8+ _____

% CD3+ CD4+ _____

% CD3+ CD8+ _____

Subpopul.

LT

Naive: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28+ _____

CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L+ _____

CD3+ CD8+ CD45RA+ CD11b- _____

Granzima B - _____

Memória: CD3+ CD8+ CD45RA- CD28+ _____

CD3+ CD8+ CD45RA- CD62L+ _____

CD3+ CD8+ CD45RA-CD11b- _____

Granzima B ± _____

Efetora: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28- _____

CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L- _____

CD3+ CD8+ CD11b+ CD11b+ _____

Granzima B+ _____

ENSAIO DE LINFOPROLIFERAÇÃO: Δ cpm e IE _____

BASAL _____ Fibroblasto _____

PWM _____ CMV _____

PRODUÇÃO IFN- γ (ELISA) 5° d _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

ANEXO E:**TABELA 8A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD28)**

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=28	(P25-75) n=16	(P25-75) n=22	
Leucócitos ($\times 10^6/\text{kg}$)	166 (104,0-201,5)	1075 (882,5-1795)	375 (231,0-707,5)	0.0001
Linfócitos totais	9,88 (6,41-15,10)	29,70 (15,25-44,05)	23,90 (13,65- 33,45)	0.0001
CD45RA+	47,85 (37,25-58,10)	25,30 (21,10-40,50)	19,35 (7,80-25,90)	0.0001
CD28+	52,80 (39,35-64,35)	31,50 (25,00-58,65)	40,30 (30,70-54,10)	0.0269
Granzima B	10,50 (6,55-13,30) ^a	21,60 (17,75-24,60) ^b	30,05 (21,85-38,75) ^c	0.0001
Linfócitos TCD3+	53,70 (40,50-60,00)	64,50 (56,20-66,75)	43,30 (34,30-61,80)	0.0756
CD4+	25,70 (20,40-30,25)	35,90 (27,15-43,50)	21,25 (12,85-30,90)	0.0042
CD8+	20,50 (16,35-26,25)	20,80 (16,15-25,30)	19,00 (6,35-33,70)	0.8357
Linfócitos TCD8^{HI}	20,75 (17,50-23,95)	21,05 (15,75-23,70)	18,70 (6,21-32,20)	0.7911
CD45RA+	54,85 (50,30-65,50)	54,90 (38,25-63,80)	23,10 (15,75-42,55)	0.0001
CD28+	96,00 (92,25-99,05)	86,20 (73,45-91,95)	86,90 (69,50-93,05)	0.0003
Granzima B	4,580 (2,65-8,61) ^a	9,660 (8,17-12,41) ^b	10,72 (5,81-23,96) ^c	0.0017
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	52,65 (47,00-64,80)	33,75 (22,65-49,20)	15,70 (5,79-30,85)	0.0001
Memória Central (T _{MC})	42,10 (30,80-48,60)	40,15 (29,15-69,35)	67,75 (34,25-77,25)	0.0134
Memória Efetora (T _{ME})	1,11 (0,23-2,77)	8,93 (5,34-14,40)	7,70 (3,09-15,35)	0.0001
Efetora (E)	0,83 (0,25-4,53)	6,29 (1,29-17,9)	6,16 (1,84-12,20)	0.0136
ME+E	3,41 (0,66-7,13)	21,44 (9,39-30,52)	12,08 (7,69-30,35)	0.0001

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD28) ; total de leucócitos $\times 10^6/\text{kg}$ do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=17; b) n=09; c) n=18

ANEXO E:**TABELA 8B – CONTAGEM DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD28)**

(x10 ⁶ /kg receptor)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=28	(P25-75) n=16	(P25-75) n=22	
Leucócitos	166,0 (104,0-201,5)	1075 (882,5-1795)	375,0 (231,0-707,5)	0.0001
Linfócitos totais	15,19 (8,772-19,75)	281,5 (216,4-526,7)	88,98 (49,44-144,0)	0.0001
CD45RA+	1,546 (1,170-2,681)	19,314 (14,85-34,79)	3,510 (0,652-11, 14)	0.0001
CD28+	1,852 (1,136-3,156)	30,06 (15,03-36,1)	7,344 (1,581-17,18)	0.0001
Granzima B	0,277 (0,16-0,64) ^a	21,96 (8,10-31,16) ^b	4,174 (1,19-7,39) ^c	0.0001
Linfócitos TCD3+	30,0 (20,0-37,5)	330,0 (245,0-400,0)	95,0 (45,0-193,5)	0.0001
CD4+	10,0 (08,0-20,0)	175,0 (135,0-260,0)	40,0 (17,5-81,5)	0.0001
CD8+	10,0 (7,0-20,0)	110,0 (80,0-160,0)	35,0 (11,0-80,0)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	3,108 (2,042-4,02)	55,641 (47,48-78,09)	12,111 (4,403-35,08)	0.0001
CD45RA+	1,665 (1,057-2,528)	30,232 (17,36-42,95)	3,535 (0,953-8,109)	0.0001
CD28+	2,814 (1,929-3,768)	46,211 (35,96-70,01)	9,079 (3,443-21,28)	0.0001
Granzima B	0,114 (0,07-0,21) ^a	8,950 (3,19-11,34) ^b	1,622 (0,20-3,82) ^c	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	1,594 (0,995-2,427)	19,255 (13,03-32,09)	1,367 (0,645-3,459)	0.0001
Memória Central (T _{MC})	1,035 (0,774-1,615)	28,020 (11,01-38,15)	7,196 (2,074-16,81)	0.0001
Memória Efetora (T _{ME})	0,024 (0,007-0,072)	4,352 (2,513-7,610)	0,688 (0,226-3,957)	0.0001
Efetora (E)	0,053 (0,007-0,099)	3,620 (1,310-7,603)	0,517 (0,132-3,171)	0.0001
ME+E	0,098 (0,013-0,215)	11,35 (4,436-12,88)	1,427 (0,531-4,758)	0.0001

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD28) ; valores apresentados x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=17; b) n=09; c) n=18

ANEXO E:**TABELA 13A** – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD62L)

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=28	(P25-75) n=15	(P25-75) n=22	
Leucócitos (* x10 ⁶ /kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	9,91 (5,96-14,75)	31,80 (24,05-48,00)	23,75 (13,90-33,35)	0.0001
CD45RA+	47,70 (38,25-57,10)	26,30 (21,10-43,20)	19,95 (6,93-26,55)	0.0001
CD62L+	44,05 (32,70-58,65)	25,80 (17,55-36,90)	22,95 (16,50-42,55)	0.0009
Linfócitos TCD3+	53,70 (40,50-60,00)	64,50 (56,20-66,75)	43,30 (34,30-61,80)	0.0756
CD4+	25,70 (20,40-30,25)	35,90 (27,15-43,50)	21,25 (12,85-30,90)	0.0042
CD8+	20,50 (16,35-26,25)	20,80 (16,15-25,30)	19,00 (6,35-33,70)	0.8357
Linfócitos TCD8^{HI}	21,40 (17,60-25,40)	20,40 (17,35-23,60)	18,60 (5,655-31,70)	0.5287
CD45RA+	48,50 (42,60-57,55) ^a	55,25 (39,10-67,65) ^b	23,50 (16,30-37,80) ^c	0.0009
CD62L+	86,15 (58,15-95,60) ^a	89,40 (52,05-97,50) ^b	91,20 (79,80-96,00) ^c	0.8580
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	39,05 (33,90-54,90)	31,00 (15,50-57,95)	19,10 (13,05-32,15)	0.0068
Memória Central (T _{MC})	23,75 (7,870-44,00)	39,10 (18,80-51,60)	68,45 (23,35-74,45)	0.0011
Memória Efetora (T _{ME})	11,20 (1,830-43,85)	11,40 (4,765-34,00)	6,29 (1,705-17,40)	0.5033
Efetora (E)	6,410 (1,455- 17,10)	2,09 (0,620-26,85)	1,120 (0,270-10,42)	0.2943
ME+E	26,01 (3,845-57,95)	18,40 (6,075-57,50)	8,89 (2,220-23,05)	0.5348

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD62L) ; total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

a) n=20; b) n=12; c) n=21

ANEXO E:**TABELA 13B – CONTAGEM DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD62L)**

(x10 ⁶ /kg receptor)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=28	(P25-75) n=15	(P25-75) n=22	
Leucócitos (* x10⁶/kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	15,21 (8,695-20,28)	295,7 (247,7- 632,6)	86,79 (49,32-150,0)	0.0001
CD45RA+	1,632 (1,014-3,113)	18,99 (15,72-37,53)	3,678 (0,661-11,12)	0.0001
CD62L+	1,905 (0,929-2,653)	17,82 (9,556-31,50)	4,439 (0,967-10,60)	0.0001
Linfócitos TCD3+	30,0 (20,0-37,5)	330,0 (245,0-400,0)	95,0 (45,0-193,5)	0.0001
CD4+	10,0 (08,0-20,0)	175,0 (135,0-260,0)	40,0 (17,5-81,5)	0.0001
CD8+	10,0 (7,0-20,0)	110,0 (80,0-160,0)	35,0 (11,0-80,0)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	3,144 (1,845-4,008)	60,80 (49,92-94,55)	11,78 (4,637-35,12)	0.0001
CD45RA+	1,503 (0,826-2,363) ^a	33,75 (19,83-47,92) ^b	4,813 (1,363-8,019) ^c	0.0001
CD62L+	2,204 (1,357-2,767) ^a	47,34 (23,96-63,32) ^b	9,88 (4,146-20,29) ^c	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	1,327 (0,661-2,235)	18,23 (8,511-34,12)	1,812 (1,227- 6,523)	0.0001
Memória Central (T _{MC})	0,522 (0,246-1,027)	17,95 (8,762-35,01)	6,707 (1,910-14,15)	0.0001
Memória Efetora (T _{ME})	0,265 (0,048-1,105)	6,932 (0,620-21,41)	0,445 (0,161-3,023)	0.0018
Efetora (E)	0,212 (0,026-0,675)	0,983 (0,339-18,31)	0,136 (0,022-0,601)	0.0326
ME+E	0,597 (0,081-1,659)	8,888 (1,109-38,37)	0,730 (0,278-5,066)	0.0032

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD62L) ; total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

a) n=20; b) n=12; c) n=21

ANEXO E:**TABELA 14A** – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD11b)

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=28	(P25-75) n=16	(P25-75) n=22	
Leucócitos (* x10⁶/kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	9,71 (5,830-16,10)	30,40 (19,15-42,95)	23,30 (12,35-35,70)	0.0001
CD45RA+	47,70 (39,00-59,25)	25,80 (21,65-44,25)	18,40 (7,470-27,35)	0.0001
CD11b+	14,70 (9,530-22,20)	18,35 (7,115-32,45)	26,20 (15,95-51,75)	0.0662
Linfócitos TCD3+	53,70 (40,50-60,00)	64,50 (56,20-66,75)	43,30 (34,30-61,80)	0.0756
CD4+	25,70 (20,40-30,25)	35,90 (27,15-43,50)	21,25 (12,85-30,90)	0.0042
CD8+	20,50 (16,35-26,25)	20,80 (16,15-25,30)	19,00 (6,35-33,70)	0.8357
Linfócitos TCD8^{HI}	21,10 (17,40-24,90)	20,35 (15,90-22,80)	19,00 (6,645-32,50)	0.8173
CD45RA+	52,10 (41,15-63,35) ^a	58,10 (25,05-66,40) ^b	22,20 (12,10-54,65) ^c	0.0116
CD11b+	14,40 (10,75-17,55) ^a	29,90 (9,930-86,80) ^d	30,35 (16,90-74,55) ^c	0.0202
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	42,15 (30,75-53,85)	14,40 (2,125-50,65)	7,25 (2,160-20,60)	0.0004
Memória Central (T _{MC})	40,55 (22,65-47,35)	25,40 (14,20-50,40)	42,60 (16,55-73,60)	0.1849
Memória Efetora (T _{ME})	5,145 (0,885-10,64)	11,90 (6,550-53,35)	14,20 (5,025-49,80)	0.0092
Efetora (E)	7,205 (4,905-14,05)	17,60 (6,410-29,95)	10,77 (5,060-21,60)	0.4804
ME+E	5,151 (0,886-10,64)	32,90 (12,51-89,14)	26,46 (13,94-75,82)	0.0001

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD11b) ;; total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

a) n=17; b) n=09; c) n=18 d) n=10

ANEXO E:**TABELA 14B** – CONTAGEM DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD11b)

(x10 ⁶ /kg receptor)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=28	(P25-75) n=16	(P25-75) n=22	
Leucócitos (* x10⁶/kg)	166	1075	375	0.0001
Linfócitos totais	16,11 (9,103-20,07)	288,3 (229,3-542,3)	86,0 (43,14-152,7)	0.0001
CD45RA+	1,784 (1,110-3,061)	21,61 (15,48-35,80)	3,592 (0,669-12,48)	0.0001
CD11b+	0,544 (0,251-1,159)	12,63 (4,858-27,75)	4,523 (0,974-17,77)	0.0001
Linfócitos TCD3+	30,0 (20,0-37,5)	330,0 (245,0-400,0)	95,0 (45,0-193,5)	0.0001
CD4+	10,0 (08,0-20,0)	175,0 (135,0-260,0)	40,0 (17,5-81,5)	0.0001
CD8+	10,0 (7,0-20,0)	110,0 (80,0-160,0)	35,0 (11,0-80,0)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	3,171 (2,216-4,071)	58,49 (47,94-79,06)	11,86 (3,903-38,50)	0.0001
CD45RA+	1,518 (0,611-2,688) ^a	37,34 (14,45-60,39) ^b	4,435 (1,197-7,632) ^c	0.0001
CD11b+	0,488 (0,211-0,676) ^a	18,18 (7,743-51,70) ^d	3,355 (0,870-20,21) ^c	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	1,214 (0,435-2,158)	10,68 (1,173-27,37)	1,141 (0,207-2,869)	0.0114
Memória Central (T _{MC})	1,014 (0,361-1,761)	11,65 (6,902-39,92)	5,489 (1,412-9,565)	0.0001
Memória Efetora (T _{ME})	0,102 (0,026-0,357)	6,430 (4,606-31,22)	1,725 (0,249-10,87)	0.0001
Efetora (E)	0,237 (0,112-0,491)	8,677 (4,109-20,70)	1,149 (0,242-4,651)	0.0001
ME+E	0,442 (0,156-0,827)	17,20 (8,237-53,24)	3,362 (0,580-15,41)	0.0001

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD11b) ;; total de leucócitos x10⁶/kg do receptor

Modalidades de transplante:

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

a) n=17; b) n=09; c) n=18 d) n=10

ANEXO F:**TABELA 10A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD28)**

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=22	(P25-75) n=12	(P25-75) n=20	
Leucócitos (mm³)	3600 (2250-5700)	3600 (3050-6550)	5850 (4250-6850)	0.0085
Linfócitos totais	10,00 (4,04-15,95)	14,15 (8,25-19,00)	32,60 (20,40-44,20)	0.0001
CD45RA+	25,15 (17,60-39,10)	32,65 (25,45-38,40)	16,55 (13,20-24,60)	0.0298
CD28+	48,90 (35,25-62,20)	53,85 (33,25-63,25)	31,10 (18,75-72,25)	0.6978
Granzima B	29,64 (13,07-37,64) ^a	35,15 (28,04-41,17) ^b	68,10 (43,92-81,20) ^c	0.0004
Linfócitos TCD3+	62,30 (55,20-70,50)	63,00 (50,30-69,35)	75,45 (61,95-84,26)	0.0127
CD4+	25,60 (21,85-31,20)	31,00 (23,55-36,35)	14,15 (9,87-18,20)	0.0003
CD8+	34,90 (17,95-45,80)	23,15 (18,80-31,65)	57,60 (43,95-70,80)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	36,80 (19,50-46,85)	23,05 (17,65-36,05)	62,15 (49,70-70,50)	0.0001
CD45RA+	23,55 (12,80-37,90)	29,00 (25,85-42,25)	10,40 (7,60-18,10)	0.0006
CD28+	82,55 (45,20-97,10)	86,00 (64,70-92,10)	29,50 (16,05-97,75)	0.3219
Granzima B	15,58 (11,50-26,91) ^a	19,49 (17,57-26,96) ^b	56,03 (37,83-70,92) ^c	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	10,76 (4,17-33,20)	22,35 (17,40-26,55)	2,83 (0,66-9,99)	0.0013
Memória Central (T _{MC})	51,80 (36,15-76,10)	55,65 (47,70-69,05)	23,40 (14,90-87,90)	0.5912
Memória Efetora (T _{ME})	5,13 (1,95-44,25)	4,19 (2,89-18,89)	57,65 (1,17-71,35)	0.3052
Efetora (E)	3,01 (1,03-17,85)	7,57 (4,31-15,75)	5,70 (0,27-10,35)	0.5413
ME+E	21,77 (3,55-56,50)	13,20 (6,71-34,09)	67,25 (2,11-83,23)	0.3911

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico

Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Marcadores fenotípicos intracelular (GB= Granzima B): a) n=12; b) n=08; c) n=16

ANEXO F:**TABELA 10B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD28)**

(mm ³)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=22	(P25-75) n=12	(P25-75) n=20	
Leucócitos	3600 (2250-5700)	3600 (3050-6550)	5850 (4250-6850)	0.0085
Linfócitos totais	258,2 (152,1- 576,2)	679,6 (400,2- 828,7)	1823 (1357- 2443)	0.0001
CD45RA+	20,50 (12,77-84,49)	71,56 (26,79-101,4)	217,1 (155,7-330,4)	0.0001
CD28+	60,61 (22,97-128,1)	82,22 (60,98-173,3)	352,9 (164,8-1088)	0.0001
Granzima B	13,86 (4,322-33,81) ^a	29,85 (11,98-48,29) ^b	350,0 (130,4-518,0) ^c	0.0002
Linfócitos TCD3+	362,2 (196,0-599,7)	650,8 (370,6-1173)	1768 (1278-2614)	0.0001
CD4+	128,3 (87,19-216,8)	352,4 (208,7-549,5)	310,7 (211,5-448,4)	0.0004
CD8+	173,0 (99,43-370,7)	257,4 (131,5-483,3)	1274 (833,6-2152)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	85,97 (29,34-224,7)	146,5 (90,74-235,8)	1124 (759,3-1699)	0.0001
CD45RA+	11,76 (7,34-72,76)	50,89 (24,60-96,23)	109,7 (88,05-181,3)	0.0001
CD28+	69,80 (22,15-122,9)	91,16 (66,75-195,0)	249,0 (103,7-1340)	0.0008
Granzima B	5,599 (1,101-14,00) ^a	10,50 (4,256-18,71) ^b	334,0 (141,4-565,3) ^c	0.0002
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	7,23 (2,91-35,22)	26,11 (17,10-63,60)	25,86 (5,94-137,8)	0.0441
Memória Central (T _{MC})	50,49 (14,94-116,9)	66,15 (50,09-119,1)	249,1 (102,1-1204)	0.0004
Memória Efetora (T _{ME})	5,37 (1,15-30,67)	6,63 (4,31-16,75)	229,5 (18,65-577,3)	0.0001
Efetora (E)	2,67 (0,47-10,50)	7,72 (4,47-19,85)	60,72 (2,69-89,37)	0.0103
ME+E	9,61 (2,29-36,85)	23,40 (8,11-32,39)	255,5 (25,47-715,5)	0.0003

D+30= 30 dias após o transplante; valores calculados por milímetro cúbico no hemograma

Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Marcadores fenotípicos intracelular (GB= Granzima B): a) n=12; b) n=08; c) n=16

ANEXO F:**TABELA 15A–** DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD62L)

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=22	(P25-75) n=11	(P25-75) n=20	
Leucócitos (mm³)	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	9,73 (4,23-15,85)	14,40 (10,89-22,80)	31,55 (19,75-44,45)	0.0001
CD45RA+	28,95 (17,85-37,90)	30,50 (26,80-36,30)	17,35 (13,10-25,00)	0.0292
CD62L+	48,35 (42,30-69,30)	60,90 (51,45-69,30)	23,30 (10,60-76,45)	0.2540
Linfócitos TCD3+	62,30 (55,20-70,50)	63,00 (50,30-69,35)	75,45 (61,95-84,26)	0.0127
CD4+	25,60 (21,85-31,20)	31,00 (23,55-36,35)	14,15 (9,87-18,20)	0.0003
CD8+	34,90 (17,95-45,80)	23,15 (18,80-31,65)	57,60 (43,95-70,80)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	36,85 (19,95-46,95)	29,48 (23,55-38,10)	62,25 (50,55-70,85)	0.0001
CD45RA+	28,70 (13,50-34,15)	28,20 (25,30-40,15)	10,00 (6,47-16,60)	0.0021
CD62L+	55,00 (14,75-92,75)	89,20 (86,90-93,45)	13,50 (8,475-95,45)	0.1165
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	18,10 (3,19-23,20)	28,40 (20,30-42,95)	2,77 (0,77-10,42)	0.0006
Memória Central (T _{MC})	27,65 (8,29-67,30)	53,60 (35,60-66,35)	14,30 (5,99-83,50)	0.4666
Memória Efetora (T _{ME})	44,45 (2,95-66,25)	6,05 (4,73-53,35)	64,65 (3,19-81,85)	0.2381
Efetora (E)	7,415 (1,16-12,45)	3,51 (2,49-9,57)	4,25 (0,70-12,50)	0.8402
ME+E	53,14 (6,01-79,58)	9,18 (6,41-65,37)	80,22 (4,03-89,82)	0.2511

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO F:**TABELA 15B– CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD62L)**

(mm ³)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=22	(P25-75) n=11	(P25-75) n=20	
Leucócitos	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	248,5 (155,4-520,8)	696,5 (523,1-1103)	1775 (1351-2469)	0.0001
CD45RA+	26,70 (14,60-79,26)	56,94 (20,37-116,8)	233,8 (156,4-317,8)	0.0001
CD62L+	54,18 (29,28-126,2)	99,36 (40,76-201,4)	203,4 (118,4-1193)	0.0007
Linfócitos TCD3+	362,2 (196,0-599,7)	650,8 (370,6-1173)	1768 (1278-2614)	0.0001
CD4+	128,3 (87,19-216,8)	352,4 (208,7-549,5)	310,7 (211,5-448,4)	0.0004
CD8+	173,0 (99,43-370,7)	257,4 (131,5-483,3)	1274 (833,6-2152)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	84,40 (36,11-227,9)	196,6 (141,4-251,5)	1111 (751,1-1719)	0.0001
CD45RA+	13,90 (7,31-65,16)	52,87 (36,05-92,80)	111,4 (84,09-167,6)	0.0001
CD62L+	22,17 (16,25-101,2)	158,2 (87,62-207,3)	98,75 (50,13-1350)	0.0055
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	8,51 (4,39-20,45)	52,08 (33,11-95,51)	19,87 (6,56-141,5)	0.0029
Memória Central (T _{MC})	20,09 (6,87-61,77)	74,95 (53,27-125,7)	111,7 (50,25-1211)	0.0006
Memória Efetora (T _{ME})	17,23 (2,28-69,68)	8,534 (6,09-122,7)	340,8 (31,49-739,2)	0.0007
Efetora (E)	4,45 (0,418-10,82)	5,88 (3,62-25,93)	67,05 (8,51-91,42)	0.0049
ME+E	21,68 (4,62-74,95)	13,22 (8,18-147,9)	367,4 (70,70-867,4)	0.0010

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
 Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO F:**TABELA 16A–** DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD11b)

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=22	(P25-75) n=11	(P25-75) n=20	
Leucócitos (mm³)	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	9,80 (4,27-15,50)	13,90 (8,25-19,15)	31,25 (19,50-44,30)	0.0001
CD45RA+	27,80 (18,30-37,55)	33,50 (28,10-37,90)	15,95 (12,85-26,05)	0.0141
CD11b+	34,90 (14,45-56,45)	44,50 (39,40-53,20)	68,30 (40,30-85,65)	0.0048
Linfócitos TCD3+	62,30 (55,20-70,50)	63,00 (50,30-69,35)	75,45 (61,95-84,26)	0.0127
CD4+	25,60 (21,85-31,20)	31,00 (23,55-36,35)	14,15 (9,87-18,20)	0.0003
CD8+	34,90 (17,95-45,80)	23,15 (18,80-31,65)	57,60 (43,95-70,80)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	38,50 (20,30-45,80)	24,40 (17,15-36,25)	61,80 (51,70-70,95)	0.0001
CD45RA+	22,95 (15,25-34,75)	28,15 (23,90-39,70)	8,08 (5,61-17,70)	0.0016
CD11b+	26,25 (9,39-62,25)	36,90 (17,40-38,50)	58,50 (15,80-83,20)	0.3538
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	12,75 (3,17-26,60)	22,40 (14,95-30,70)	2,17 (0,88-6,11)	0.0004
Memória Central (T _{MC})	67,15 (43,20-83,60)	48,20 (39,85-64,95)	18,00 (6,75-69,85)	0.0277
Memória Efetora (T _{ME})	2,50 (0,14-20,45)	21,20 (4,76-24,20)	63,20 (19,20-80,50)	0.0001
Efetora (E)	2,77 (1,12-13,60)	12,70 (4,96-19,10)	5,29 (3,29-15,60)	0.1104
ME+E	6,420 (1,67-41,85)	30,86 (8,35-40,70)	74,42 (28,57-90,95)	0.0014

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO F:**TABELA 16B**– CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD11b)

(mm ³)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=22	(P25-75) n=11	(P25-75) n=20	
Leucócitos	3600	3600	5850	0.0085
Linfócitos totais	255,8 (154,9-572,7)	657,5 (386,7-817,8)	1782 (1342-2489)	0.0001
CD45RA+	31,70 (14,50-86,16)	75,92 (44,99-116,0)	215,4 (150,2-328,0)	0.0001
CD11b+	35,86 (12,79-84,16)	81,88 (46,72-132,7)	626,5 (304,7-1122)	0.0001
Linfócitos TCD3+	362,2 (196,0-599,7)	650,8 (370,6-1173)	1768 (1278-2614)	0.0001
CD4+	128,3 (87,19-216,8)	352,4 (208,7-549,5)	310,7 (211,5-448,4)	0.0004
CD8+	173,0 (99,43-370,7)	257,4 (131,5-483,3)	1274 (833,6-2152)	0.0001
Linfócitos TCD8^{HI}	94,52 (34,91-222,5)	150,5 (93,57-237,1)	1094 (756,0-1691)	0.0001
CD45RA+	16,03 (7,868-56,40)	35,83 (23,51-61,90)	95,26 (70,03-161,0)	0.0032
CD11b+	22,37 (5,68-74,05)	25,76 (15,71-72,03)	276,3 (110,0-837,0)	0.0001
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	6,97 (2,34-34,31)	34,75 (20,87-57,41)	17,52 (8,00-68,82)	0.0637
Memória Central (T _{MC})	38,35 (11,47-130,1)	51,64 (46,92-117,0)	139,4 (57,49-652,1)	0.0251
Memória Efetora (T _{ME})	2,11 (0,05-23,53)	22,50 (6,45-46,06)	467,3 (136,3-1104)	0.0001
Efetora (E)	2,47 (1,20-13,44)	11,69 (9,81-47,37)	59,80 (24,01-150,6)	0.0001
ME+E	7,05 (1,43-31,62)	27,34 (14,51-80,81)	600,8 (164,5-1195)	0.0001

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO G:**TABELA 11A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD28)**

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=15	(P25-75) n=10	(P25-75) n=17	
Leucócitos (mm³)	4500 (3650-6950)	3900 (2900-6150)	4700 (4100-5350)	0.5643
Linfócitos totais	21,90 (13,65-30,35)	24,10 (17,25-38,35)	34,90 (26,00-49,40)	0.0242
CD45RA+	31,00 (25,25-39,05)	36,45 (19,75-47,85)	33,60 (23,25-38,50)	0.6927
CD28+	45,00 (23,60-65,00)	39,70 (28,15-67,80)	24,00 (16,15-32,10)	0.0644
Granzima B	49,98 (31,33-58,60) ^a	54,76 (49,85-66,25) ^b	59,25 (44,81-69,75) ^c	0.1703
Linfócitos TCD3+	69,60 (59,95-77,55)	69,25 (57,50-83,40)	70,60 (61,80-73,65)	0.9500
CD4+	18,40 (15,70-25,50)	26,00 (18,65-30,95)	14,00 (8,83-25,05)	0.0099
CD8+	45,20 (38,25-54,50)	37,50 (24,70-58,90)	49,70 (40,45-57,65)	0.3322
Linfócitos TCD8^{HI}	43,20 (38,50-52,35)	34,90 (23,65-60,25)	50,30 (38,55-60,85)	0.2123
CD45RA+	25,50 (16,85-34,85)	37,90 (24,80-49,15)	20,40 (13,15-28,10)	0.0302
CD28+	84,30 (26,20-98,00)	68,20 (30,85-97,95)	27,90 (16,00-63,35)	0.1262
Granzima B	35,20 (17,47-43,53) ^a	47,77 (42,76-55,71) ^b	47,59 (37,34-61,89) ^c	0.0708
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	11,10 (3,90-29,95)	15,05 (4,61-35,05)	2,08 (1,07-12,15)	0.0161
Memória Central (T _{MC})	51,50 (22,60-78,60)	39,90 (22,60-73,80)	25,80 (14,95-50,05)	0.1900
Memória Efetora (T _{ME})	6,29 (1,27-55,05)	10,22 (0,33-40,75)	49,80 (18,69-65,90)	0.0091
Efetora (E)	5,71 (0,93-21,15)	16,30 (1,28-33,70)	14,00 (5,43-24,20)	0.3990
ME+E	20,01 (2,15-82,35)	29,77 (1,73-69,45)	72,20 (35,46-83,15)	0.1272

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=07; b) n=08; c) n=13

ANEXO G:**TABELA 11B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD28)**

(mm ³)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=15	(P25-75) n=10	(P25-75) n=17	
Leucócitos	4500 (3650-6950)	3900 (2900-6150)	4700 (4100-5350)	0.5643
Linfócitos totais	991,8 (710,3-1422)	932,2 (701,6-1250)	1522 (1123-2211)	0.0151
CD45RA+	152,0 (93,75-234,0)	182,4 (109,3-236,5)	275,7 (138,2-434,1)	0.0895
CD28+	203,8 (145,1-367,7)	149,3 (125,4-424,4)	158,4 (129,5-272,3)	0.7520
Granzima B	70,33 (33,58-126,2) ^a	116,2 (80,06-342,8) ^b	238,5 (108,5-444,0) ^c	0.0527
Linfócitos TCD3+	1018 (634,4-1253)	925,3 (701,8-1292)	1232 (909,9-1564)	0.3895
CD4+	279,7 (167,9-529,2)	338,1 (264,2-513,6)	235,4 (165,3-403,3)	0.1197
CD8+	598,2 (378,0-857,7)	451,6 (381,5-898,3)	931,3 (557,0-1262)	0.0695
Linfócitos TCD8^{HI}	386,9 (289,9-700,0)	292,8 (227,4-671,3)	877,1 (439,2-1217)	0.0197
CD45RA+	115,3 (56,14-151,8)	148,4 (62,01-209,2)	159,0 (85,53-250,2)	0.1947
CD28+	183,8 (118,5-419,7)	171,5 (85,68-501,0)	159,0 (126,1-254,1)	0.8940
Granzima B	44,17 (12,42-80,79) ^a	93,72 (42,65-250,8) ^b	183,8 (70,89-294,5) ^c	0.0233
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	55,04 (10,06-128,3)	46,76 (17,58-140,9)	12,23 (8,60-41,63)	0.1907
Memória Central (T _{MC})	142,4 (99,71-358,3)	112,8 (59,82-348,2)	148,8 (107,4-217,7)	0.4619
Memória Efetora (T _{ME})	17,25 (5,85-287,6)	9,77 (1,62-155,1)	436,7 (63,53-610,7)	0.0067
Efetora (E)	12,74 (3,64-73,78)	27,35 (3,92-132,9)	109,0 (30,75-233,9)	0.0578
ME+E	43,64 (9,93-411,3)	49,52 (6,15-273,8)	490,8 (119,7-924,3)	0.0119

D+90= 90 dias após o transplante; valores calculados por milímetro cúbico no hemograma

Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Marcadores fenotípicos intracelular (GB= Granzima B): a) n=07; b) n=08; c) n=13

ANEXO G:**TABELA 17A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD62L)**

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=15	(P25-75) n=10	(P25-75) n=17	
Leucócitos (mm³)	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	21,20 (13,95-32,15)	24,20 (16,60-38,15)	33,50 (26,40-48,50)	0.0461
CD45RA+	32,00 (24,55-38,35)	36,55 (18,50-45,50)	35,50 (23,10-37,95)	0.5992
CD62L+	49,80 (22,25-67,25)	51,80 (19,95-68,25)	21,20 (11,90-41,95)	0.0900
Linfócitos TCD3+	69,60 (59,95-77,55)	69,25 (57,50-83,40)	70,60 (61,80-73,65)	0.9500
CD4+	18,40 (15,70-25,50)	26,00 (18,65-30,95)	14,00 (8,83-25,05)	0.0099
CD8+	45,20 (38,25-54,50)	37,50 (24,70-58,90)	49,70 (40,45-57,65)	0.3322
Linfócitos TCD8^{HI}	45,30 (38,50-55,10)	34,35 (23,35-60,60)	48,50 (39,80-62,25)	0.2718
CD45RA+	20,40 (15,45-35,50)	35,30 (21,10-46,85)	20,10 (13,30-28,50)	0.0656
CD62L+	45,90 (8,71-93,80)	77,40 (17,09-98,50)	16,80 (10,85-66,20)	0.4232
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	7,93 (3,41-19,30)	20,80 (4,63-32,80)	4,55 (2,23-10,87)	0.0373
Memória Central (T _{MC})	47,40 (6,35-80,25)	43,60 (9,13-77,15)	13,70 (8,28-49,60)	0.5563
Memória Efetora (T _{ME})	34,50 (4,81-71,95)	10,65 (0,47-52,25)	61,60 (21,41-72,30)	0.0354
Efetora (E)	6,39 (1,72-23,80)	11,30 (0,76-30,65)	13,90 (2,11-22,85)	0.6602
ME+E	42,21 (5,70-91,65)	26,38 (1,67-82,70)	80,90 (33,02-87,95)	0.4295

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
 Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO G:**TABELA 17B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD62L)**

(mm ³)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=15	(P25-75) n=10	(P25-75) n=17	
Leucócitos	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	957,0 (825,5-1347)	915,3 (696,5-1231)	1555 (1062-2168)	0.0142
CD45RA+	145,3 (113,1-245,1)	170,4 (103,2-232,4)	273,7 (153,6-433,6)	0.0991
CD62L+	159,8 (110,3-441,1)	151,2 (79,44-460,6)	149,0 (100,7-352,2)	0.9467
Linfócitos TCD3+	1018 (634,4-1253)	925,3 (701,8-1292)	1232 (909,9-1564)	0.3895
CD4+	279,7 (167,9-529,2)	338,1 (264,2-513,6)	235,4 (165,3-403,3)	0.1197
CD8+	598,2 (378,0-857,7)	451,6 (381,5-898,3)	931,3 (557,0-1262)	0.0695
Linfócitos TCD8^{HI}	433,5 (365,3-680,1)	286,4 (207,7-675,9)	872,4 (419,3-1203)	0.0229
CD45RA+	125,1 (47,54-166,8)	132,5 (53,79-193,9)	126,9 (90,85-238,4)	0.3826
CD62L+	153,0 (54,55-485,3)	169,8 (44,13-506,8)	119,2 (82,24-330,9)	0.9946
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	33,47 (13,50-135,3)	50,45 (17,76-134,9)	30,57 (14,08-89,59)	0.6934
Memória Central (T _{MC})	128,0 (34,89-423,1)	113,9 (27,42-369,9)	119,6 (53,56-287,7)	0.8743
Memória Efetora (T _{ME})	49,12 (28,17-342,0)	12,72 (2,52-184,2)	461,6 (86,44-708,5)	0.0099
Efetora (E)	20,50 (8,84-122,8)	19,18 (3,34-133,0)	89,55 (18,11-193,8)	0.1865
ME+E	57,88 (31,25-472,5)	45,08 (6,53-298,2)	543,4 (141,3-960,6)	0.0271

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO G:**TABELA 18A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD11b)**

(%)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=15	(P25-75) n=10	(P25-75) n=17	
Leucócitos (mm³)	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	22,70 (13,35-31,15)	23,30 (15,85-38,65)	33,30 (25,95-48,55)	0,0341
CD45RA+	31,20 (25,10-37,85)	37,80 (21,50-47,40)	35,40 (23,90-38,95)	0,4367
CD11b+	38,70 (-)	38,80 (22,75-)	67,80 (-)	
Linfócitos TCD3+	69,60 (59,95-77,55)	69,25 (57,50-83,40)	70,60 (61,80-73,65)	0.9500
CD4+	18,40 (15,70-25,50)	26,00 (18,65-30,95)	14,00 (8,83-25,05)	0.0099
CD8+	45,20 (38,25-54,50)	37,50 (24,70-58,90)	49,70 (40,45-57,65)	0.3322
Linfócitos TCD8^{HI}	48,10 (37,95-54,30)	36,25 (23,80-61,10)	49,70 (40,55-62,70)	0.2583
CD45RA+	21,90 (16,30-34,55)	34,90 (24,65-49,60)	20,50 (13,90-28,20)	0.0151
CD11b+	20,20 (5,99-92,65)	19,70 (6,75-91,85)	92,10 (31,40-98,40)	0.1188
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	10,50 (2,71-17,55)	16,90 (4,43-23,05)	1,22 (0,19-12,80)	0.0232
Memória Central (T _{MC})	45,80 (2,23-74,70)	51,45 (0,97-67,55)	4,52 (1,18-55,05)	0.3236
Memória Efetora (T _{ME})	20,50 (8,75-72,05)	11,85 (3,95-49,95)	68,20 (19,80-77,85)	0.0237
Efetora (E)	6,05 (2,43-23,30)	9,89 (1,96-47,00)	17,60 (7,09-24,85)	0.5738
ME+E	22,41 (14,81-98,65)	19,13 (7,08-92,00)	93,30 (31,95-98,47)	0.1655

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

ANEXO G:**TABELA 18B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD11b)**

(mm ³)	Alo-MO	Alo-SP	Auto-SP	<i>p value</i>
	(P25-75) n=15	(P25-75) n=10	(P25-75) n=17	
Leucócitos	4500	3900	4700	0.5643
Linfócitos totais	948,3 (801,5-1439)	935,0 (657,0-1227)	1493 (1063-2174)	0.0181
CD45RA+	159,1 (107,7-220,9)	185,1 (107,9-236,9)	294,8 (163,2-451,9)	0.0805
CD11b+	138,3 (74,88-513,4)	168,9 (62,89-316,5)	463,7 (341,6-869,4)	0.0036
Linfócitos TCD3+	1018 (634,4-1253)	925,3 (701,8-1292)	1232 (909,9-1564)	0.3895
CD4+	279,7 (167,9-529,2)	338,1 (264,2-513,6)	235,4 (165,3-403,3)	0.1197
CD8+	598,2 (378,0-857,7)	451,6 (381,5-898,3)	931,3 (557,0-1262)	0.0695
Linfócitos TCD8^{HI}	434,8 (378,8-735,3)	289,9 (215,0-682,6)	854,1 (440,2-1248)	0.0213
CD45RA+	106,4 (44,66-149,3)	166,0 (59,54-221,8)	140,0 (87,84-250,7)	0.2158
CD11b+	71,74 (29,53-440,9)	53,54 (26,32-344,2)	566,6 (287,6-966,9)	0.0048
Subpopulações TCD8^{HI}				
Naive (N)	33,36 (7,14-94,38)	46,71 (6,58-154,7)	11,10 (1,43-38,14)	0.2069
Memória Central (T _{MC})	165,3 (8,99-349,5)	125,7 (3,66-319,6)	42,20 (6,23-264,4)	0.7992
Memória Efetora (T _{ME})	63,36 (32,96-401,2)	30,32 (15,53-156,8)	455,9 (204,6-688,3)	0.0036
Efetora (E)	21,74 (10,48-126,0)	18,83 (13,10-187,1)	90,77 (48,34-238,6)	0.0343
ME+E	83,80 (45,37-556,9)	53,47 (32,01-343,8)	566,6 (288,1-979,0)	0.0077

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):

Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.

Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.

Estatística:

Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis

Resultados: mediana. Valores com *p value* < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes

P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75

Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA

CD8^{HI}: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Addo MM, Rosenberg ES. Cellular immune responses in transplantation-associated chronic viral infections. *Transpl Infect Dis*. 2002. 4: 31-40.

Ahmadzadeh M, Hussain SF, Farber DL. Heterogeneity of the memory CD4 T cell response: persisting effectors and resting memory T cells. *J. Immunol*. 2001. 166: 926-35.

Ahmed R, Gray D. Immunological memory and protective immunity: understanding their relation. *Science*. 1996. 272 (5258): 54-60.

Akbar AN, Beverley PCL, Salmon M. Will telomere erosion lead to a loss of T-cell memory? *Nat. Rev. Immunol*. 2004. 4:737-43.

Akbar AN, Terry L, Timms A, Beverley PC, Janossy G. Loss of CD45R and gain of UCHL1 reactivity is a feature of primed T cells. *J. Immunol*. 1988. 140: 2171-8.

Alves NL, Hooibrink B, Arosa FA, Van Lier RA. IL-15 induces antigen-independent expansion and differentiation of human naïve CD8+ T cells in vitro. *Blood*. 2003. 102:2541-6.

Appay V, Nixon DF, Donahoe SM, Gillespie GM, Dong T, King A, et al. HIV specific CD8(+) T Cells produce antiviral cytokines but are impaired in cytolytic function. *J.Exp Med*.2000.192(1):63-76.

Appay V, Rowland-Jones S. Lessons from the study of T-cell differentiation in persistent human virus infection. *Seminars in Immunol*. 2004. 16: 205-12.

Appay V, Dunbar PR, Callan M, Klenerman P, Gillespie GMA, Papagno L, et al. Memory CD8+ T cells vary in differentiation phenotype in different persistent virus infections. *Nature Med*. 2002. 8: 379-85.

Appelbaum FR. Choosing the source of stem cells for allogeneic transplantation: no longer a peripheral issue. *Blood* 1999. 94: 381-83.

Archimbaud E. Immune reconstitution following transplantation of selected hematopoietic stem cells. *Hematol Cell Ther*. 1997. 39: 264-8.

* De acordo com:

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Serviço de Biblioteca e Documentação. Guia de apresentação de dissertações e teses da FMUSP. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha et al., São Paulo: Serviço de Biblioteca e Documentação; 2003.

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com LIST OF JOURNALS INDEXED IN INDEX MEDICUS.

Atkinson K. *Clinical Bone Marrow and Blood Stem Cell Transplantation*. 2nd ed. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press; 2000.

Aubert G, Hassas-Walker A, Madrigal AJ, Emery VC, Morte C, Grace S, et al.. Cytomegalovirus-specific cellular immune responses and viremia in recipients of allogeneic stem cell transplants. *J Infect Dis*. 2001 184: 955-63.

Azuma M, Cayabyab M, Phillips JH, Lanier LL. CD28-T lymphocytes. Antigenic and functional proprieties. *J. Immunol*. 1993a. 150: 1147-59.

Azuma M, Cayabyab M, Phillips JH, Lanier LL. Requirements for CD28-dependent T cell-mediated cytotoxicity. *J. Immunol*. 1993b. 150: 2091-101.

Baars PA, Maurice MM, Rep M, Hooibrink B, Van Lier RAW. Heterogeneity of circulating human CD4⁺ T cell population: further evidence that the CD4⁺ CD45RA-CD27⁻ T cell subset contains specialized primed T cells. *J. Immunol*. 1995. 154:17-25.

Bachmann MF, Barner M, Viola A, Kopf M. Distinct kinetics of cytokine production and cytolysis in effector and memory T cells after viral infection. *Eur. J. Immunol*. 1999. 29: 291-99.

Barber DL, Wherry EJ, Ahmed R. Cutting edge: rapid in vivo killing by memory CD8 T cells. *J. Immunol*. 2003. 171:27-31.

Behringer D, Bertz H, Schmoor C, Berger C, Dwenger A, Finke J. Quantitative lymphocyte subset reconstitution after allogeneic hematopoietic transplantation from matched related donors with CD34⁺ selected PBPC grafts unselected PBPC grafts or BM grafts. *Bone Marrow Transplant*. 1999. 24: 295-302.

Bell EB, Sparshott SM. Interconversion of CD45R subsets of CD4T cells in vivo. *Nature (Lond.)*. 1990. 348: 163-6.

- Bengtsson M, Totterman TH, Smedmyr B, Festin R, Oberg G, Simonsson B. Regeneration of functional and activated NK and T subset cells in the marrow and blood after autologous bone marrow transplantation: A prospective phenotypic study with 2/3 color FACS analysis. *Leukemia* 1989. 3 (1): 68-75.
- Bensinger WI, Clift R, Martin P, Appelbaum FR, Demirer T, Gooley T, et al. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in patients with advanced hematologic malignancies: a retrospective comparison with marrow transplantation. *Blood*. 1996. 88(7): 2794-800.
- Bensinger WI, Weaver CH, Appelbaum FR, Rowley S, Demirer T, Sanders J, et al. Transplantation of allogeneic peripheral blood stem cells mobilized by recombinant human granulocyte colony stimulating factor. *Blood* 1995. 85(6): 1655-58.
- Berthou C, Zhang Y, Sasportes M. Le Granzyme B: une protease essentielle de la response inflammatoire. *Path Biol*. 1998. 46(8): 617-24.
- Beverley PC. CD45 isoform expression: implications for recirculation of naïve and memory cells. *Immunol. Res*. 1991. 10: 196-8.
- Bilgrami S, Aslanzadeh J, Feingold JM, Bona RD, Clive J, Dorsky D, et al. Cytomegalovirus viremia, viruria and disease after autologous peripheral blood stem cell transplantation: no need for surveillance. *B.M. Transplant*. 1999. 24: 69-73.
- Blaise D, Kuentz M, Fortanier C et al. Randomized trial of bone marrow versus lenograstim-primed blood cell allogeneic transplantation in patients with early-stage leukemia: a report from the Société Française de greffe de Moelle. *J. Clin. Oncol*. 2000. 18 (3): 537-46.
- Blattman JN, Sourdiv DJD, Murali-Krishna K, Ahmed R, Altman JD. Evolution of the T cell repertoire during primary, memory, and recall responses to viral infection. *J. Immunol*. 2000. 165: 6081-90.
- Blessing JJH, Fleisher TA. Cell function-bases flow cytometry. *Semin. Hematol*. 2001b. 38: 169-78.

- Blessing JJH, Fleisher TA. Immunophenotyping. *Semin. Hematol.* 2001a.38: 100-10.
- Boeckh M, Gooley TA, Myerson D, Cunningham T, Schoch G, Bowden RA. Cytomegalovirus pp65 antigenemia guided early treatment with ganciclovir versus ganciclovir at engraftment after allogeneic marrow transplantation: a randomized double-blind study. *Blood.* 1996. 88: 4063-71.
- Boeckh M, Leisenring W, Riddell SR, Bowden RA, Huang ML, Myerson D, et al. Late cytomegalovirus disease and mortality in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplants: importance of viral load and T-cell immunity. *Blood.* 2003. 101(2):407-14.
- Boeckh MJ, Ljungman P. Cytomegalovirus infections after BMT. In: Bowden RA, Ljungman P, Paya CV, editors. *Transplant infections*. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven Publishers. 1995. 215-27.
- Boland GJ, Vlieger AM, Ververs C, De Gast GC. Evidence for transfer of cellular and humoral immunity to cytomegalovirus from donor to recipient in allogeneic bone marrow transplantation. *Clin. Exp. Immunol.* 1992. 88: 506-11.
- Borrow P, Lewicki H, Wei X, Horwitz MS, Peffer N, Meyers H, et al. Antiviral pressure exerted by HIV-1-specific cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) during primary infection demonstrated by rapid selection of CTL escape virus. *Nat. Med.* 1997.3 (2): 205-11.
- Borthwick NJ, Bofill M, Gombert WM, Akbar AN, et al. Lymphocyte activation in HIV-1 infection. II Functional defects of CD28- T cells. *AIDS.* 1994. 8: 431-41.
- Borysiewicz LK, Morris S, Page J, Sissons JG. Human cytomegalovirus-specific cytotoxic T lymphocytes: Requirements for in vitro generation and specificity. *Euro J Immunol.* 1983. 13:804-9.
- Bowden RA, Dobbs S, Amos D, Meyers JD. Comparison of interleukin-2 and gamma-interferon production by peripheral blood mononuclear cells in response to cytomegalovirus after marrow transplantation. *Transplant.* 1990. 50: 38-52.

- Brinchmann JE, Dobloug JH, Heger BH, Haaheim LL, Sanners M, Egeland T. Expression of costimulatory molecule CD28 on T cells in human immunodeficiency virus type 1 infection: functional and clinical correlations. *J. Infect Dis.* 1994. 169: 730-8.
- Broers AE, Van der Holt R, Van Esser JW, Gratama JW, Henzen-Longmans S, Kuenen-Boumeester V, et al. Increased transplant-related morbidity and mortality in CMV-seropositive patients despite highly effective prevention of CMV disease after allogeneic T-cell depleted stem cell transplantation. *Blood* 2000. 95: 2240-5.
- Bruggeman CA, Li F, Stals FS. Pathogenicity: animal models. *Scand. J. Infect. Dis.* 1995. 99 (Suppl): 43-50.
- Brugnoni D, Airo P, Pennacchio M, Carella G, Malagoli A, Ugazio AG, et al. Immune reconstitution after bone marrow transplantation for combined immunodeficiencies: down-modulation of Bcl-2 and high expression of CD95/Fas account for increased susceptibility to spontaneous and activation-induced lymphocyte cell death. *Bone Marrow Transplant.* 1999. 23: 451-7.
- Bruno L, Von-Boehmer H, Kirberg J. Cell division in the compartment of naive and memory T lymphocytes. *Eur. J. Immunol.* 1996. 26 (12): 3179-84.
- Burt RK, Deeg HJ, Lothian ST, Santos GW. On call in bone marrow transplantation. New York, Chapman e Hall. 1996. 607p.
- Butz EA, Bevan MJ. Massive expansion of antigen-specific CD8T cells during an acute virus infection. *Immunity.* 1998. 8(2): 167-75.
- Callan MF, Tan N, Annels GS, Ogg JD, Wilson CA, O'Callaghan N, et al. Direct visualization of antigen-specific CD8+ T cells during the primary immune response to Epstein-Barr virus in vivo. *J. Exp. Med.* 1998. 187 (9): 1395-402.
- Campbell JJ, Butcher EC. Chemokines in tissue-specific and microenvironment-specific lymphocyte homing. *Curr. Opin. Immunol.* 2000. 12 (3): 336-41.

Campbell JJ, Haraldsen G, Pan J, Rottman J, Qin S, Ponath P, et al. The chemokine receptor CCR4 in vascular recognition by cutaneous but not intestinal memory T cells. *Nature*. 1999. 400 (6746): 776-80.

Campbell JJ., Murphy KE., Kunkel EJ., Brightling CE., Soler D., Shen Z., et al. CCR7 Expression and Memory T Cell Diversity in Humans. *J. Immunol.* 2001. 166: 877-84.

Carlquist JF, Edelman L, Bennion DW, Anderson JL. Cytomegalovirus induction of interleukin-6 lung fibroblasts occurs independently of active infection and involves a G protein and the transcription factor, NF-kappa B. *J. Infect.Dis.* 1999. 179:1094-100.

Catalina MD, Sullivan JL, Brody RM, Luzuriaga K. Phenotypic and functional heterogeneity of EBV epitop-specific CD8+ T Cells. *J. Immunol.* 2002. 168:4184-91.

Cathomas G, Morris P, Pekle K, Cunningham I, Emanuel D. Rapid diagnosis of cytomegalovirus pneumonia in marrow transplant recipients by bronchoalveolar lavage using the polymerase chain reaction, virus culture, and the direct immunostaining of alveolar cells. *Blood*. 1993. 81:1909-14.

Cavers M, Khoshkbigari BA, Macey M, Mc Carthy DA, Irshad S, Brown KA. Differential expression of B1 and B2 integrins and L-selectin on CD4+ and CD8+ T lymphocytes in human blood: comparative analysis between isolated cells, whole blood samples and cryopreserved preparations. *Clin. Exp. Immunol.* 2002. 127:60-5.

Champagne P, Ogg GS, King AS, et al. Skewed maturation of memory HIV specific CD8+ T lymphocytes. *Nature*. 2001. 410: 106-11.

Chapman A, Stewart SJ, Nepom GT, Green WF, Crowe D, Thomas JW, Miller GG. CD11b+CD28-CD4+ Human T cells. Activation requirements and association with HLA-DR alleles. *J. Immunol.* 1996. 157: 4771-80.

Chen G, Shankar P, Lange C, Valdez H, Skolnik PR, Wu L, et al. CD8 T cells specific for human immunodeficiency virus, Epstein-Barr virus, and cytomegalovirus lack molecules for homing to lymphoid sites of infection. *Blood*. 2001. 98 (1): 156-64.

- Couriel D, Canosa J, Engler H, Collins A, Dunbar C, Barrett AJ. Early reactivation of cytomegalovirus and high risk of interstitial pneumonitis following T-depleted BMT for adults with hematological malignancies. *Bone Marrow Transplant* 1996. 18: 347-53.
- Coutinho SG. The beginning and expansion of flow cytometry in Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 2000. 95: 435-6.
- Craigie JL, Grundy JE. Cytomegalovirus induced up-regulation of LFA-3 (CD58) and ICAM-1 (CD54) is a direct viral effect that is not prevented by ganciclovir or foscarnet treatment. *Transplant*. 1996. 62: 1102-8.
- Craigie JL, Yong KL, Jordan NJ, McCormack LP, Westwick J, Akbar AN, Grundy JE. Human cytomegalovirus infection up-regulates interleukin-8 gene expression and stimulates neutrophil transendothelial migration. *Immunol*. 1997. 92: 138-45.
- Crucian B, Dunne P, Friedman H, Ragsdale R, Pross S, Widen R. Alterations in levels of CD28-/CD8+ suppressor cell precursor and CD45RO+/CD4+ memory T lymphocytes in the peripheral blood of multiple sclerosis patients. *Clin. Diagn Lab Immunol* 1995. 2 (2):249-52.
- Cwynarski K, Ainsworth J, Cobbold M, Wagner S, Mahendra P, Apperley J, et al. Direct visualization of cytomegalovirus-specific T-cell reconstitution after allogeneic stem cell transplantation. *Blood*. 2001. 97: 1232-40.
- Cyster JG. Chemokines and cell migration in secondary lymphoid organs. *Science*. 1999. 286 (5447): 2098-102.
- Dai Z, Konieczny BT, Lakkis FG. The dual role of IL-2 in the generation and maintenance of CD8+ memory T cells. *J. Immunol*. 2000. 165:3031-6.
- Daley JP, Rozans MK, Smith BR, Burakoff SJ, Rapoport JM, Miller RA. Retarded recovery of functional T cell frequencies in T cell-depleted bone marrow transplant recipients. *Blood*. 1987. 70. 960-4.

Darzynkiewicz Z, Bedner E, Smolewski P. Flow cytometry in analysis of cell cycle and apoptosis. *Semin. Hematol.* 2001. 38: 179-93.

De Gast GC, Verdonck LF, Middeldorp JM, The TH, Hekker AVD, Linden JA, et al. Recovery of T cell subsets after autologous bone marrow transplantation is mainly due to proliferation of mature T cells in the graft. *Blood.* 1985. 6(2):428-31.

De Jong R, Brouwer M, Hooibrink B, Van Der Pouw-Kraan T, Miedema F, Van-Lier RAW. The CD27- subset of peripheral blood memory CD4+ lymphocytes contains functionally differentiated T lymphocytes that develop by persistent antigenic stimulation in vivo. *Eur. J. Immunol.* 1992. 22: 993-9.

De Jong R, Brouwer M, Miedema F, Van-Lier RAW. Human CD8 T lymphocytes can be divided into CD45RA and CD45RO cells with different requirements for activation and differentiation. *J. Immunol.* 1991. 146: 2088-94.

De Rosa SC, Herzenberg LA, Roederer M. 11-color, 13-parameter flow cytometry: identification of human naive T cells by phenotype, function, and T-cell receptor diversity. *Nat. Med.* 2001.7: 245-8.

De Vries E, Van Tol MJD, Van Den Bergh RL, Waaijer JLM, Ten Dam MM, Hermans J, Vossen JM. Reconstitution of lymphocyte subpopulations after paediatric bone marrow transplantation. *Bone Marrow Transpl.* 2000. 25: 267-75.

Dengler TJ, Raftery MJ, Werle M, Zimmermann R, Schönrich G. Cytomegalovirus infection of vascular cells induces expression of pro-inflammatory adhesion molecules by paracrine action of secreted interleukin-1 beta. *Transplant.* 2000. 69: 1160-8.

Di Rosa F, Ramaswamy S, Rodge JP, Matzinger P. On the life span of virgin T lymphocytes. *J. Immunol.* 1999. 163 (3): 1253-7.

Donnenberg AD, Margolick JB, Beltz LA, Donnenberg VS, Rinaldo CR Jr. Apoptosis parallels lymphopoiesis in bone marrow transplantation and HIV disease. *Res. Immunol.* 1995. 146: 11-21.

Dreger P, Haferlach T, Eckstein V, Jacobs S, Suttorp M, Loffler H, et al. G-CSF-mobilized peripheral blood progenitor cells for allogeneic transplantation. safety, kinetics of mobilization, and composition of the graft. *Br J Haematol.* 1994. 87(3): 609-13.

Duncombe AS, Meager A, Prentice HG, Grundy JE, Heslop HE, Hoffbrand AV, Brenner MK. Gama-interferon and tumor necrosis factor production after bone marrow transplantation is augmented by exposure to marrow fibroblasts infected with cytomegalovirus. *Blood.* 1990. 76 (5): 1046-53.

Dunne PJ, Faint JM, Gudgeon NH, Fletcher JM, Plunkett FJ, Soares MVD, et al. Epstein-Barr virus specific CD8+ T cells that re-express CD45RA are apoptosis-resistant memory cells that retain replicative potential. *Blood.* 2002. 100: 933-40.

Dutton RW, Bradley LM, Swain SL. T cell memory. *Annu. Rev. Immunol.* 1998. 16: 201-23.

Effros RB, Pawelec G. Replicative senescence of T cells: does the Hayflick limit lead to immune exhaustion? *Immunol. Today* 1997. 18: 450-4.

Effros RB. Replicative senescence : the final stage of memory T cell differentiation ? *Curr HIV Res* 2003. 1:131-52.

Einsele H, Ehninger G, Hebart H, Wittkowsk KM, Schuller U, Jahn G, et al. Polymerase chain reaction monitoring reduces the incidence of cytomegalovirus disease and the duration and side effects of antiviral therapy after bone marrow transplantation. *Blood* 1995 86: 2815-20.

Einsele H, Ehninger G, Steidle M, Fisher I, Bihler S, Gerneth F, et al. Lymphocytopenia as an unfavorable prognostic factor in patients with cytomegalovirus infection after bone marrow transplantation. *Blood.* 1993. 82: 1672-8.

Ellefsen K, Harari A, Champagne P, Bart PA, Sekali RP, Pantaleo G. Distribution and functional analysis of memory antiviral CD8 T cell responses in HIV-1 and cytomegalovirus infections. *Eur. J. Immunol.* 2002. 32: 3756-64.

Engstrand M, Lidehall AK, Totterman TH, Herrman B, Eriksson BM, Korsgren O. Cellular responses to cytomegalovirus in immunosuppressed patients: circulating CD8+ T cells recognizing CMVpp65 are presented but display functional impairment. *Clin. Exp. Immunol.* 2003. 132:96-104.

Esser MT, Marchese RD, Kierstead LS, Tussey LG, Wang F, Chirmule N, Washabaugh MW. Memory T cells and vaccines. *Vaccine.* 2003. 21: 419-30.

Fagnoni FF, Vescovini R, Mazzola M et al. Expansion of cytotoxic CD8+CD28- T cells in healthy aging people, including centenarians. *Immunology.* 1996. 88:501-7.

Faint JM, Annels NE, Curnow SJ, Shields P, Pilling D, Hislop AD, et al. Memory T cells constitute a subset of the human CD8+ CD45RA+ pool with distinct phenotypic and migratory characteristics. *J. Immunol.* 2001. 167: 212-20.

Faucher C, Le Corroller AG, Blaise D, Novakovitch G, Manonni P, Moatti JP, Maraninchi D. Comparison of G-CSF-primed peripheral blood progenitor cells and bone marrow auto transplantation; clinical assessment and cost-effectiveness. *Bone Marrow Transplant.* 1994. 14 (6): 895-901.

Fiorentini S, Licenziati S, Alessandri G, Castelli F, Caligaris S, Bonafede M, et al. CD11b Expression Identifies CD8+CD28+ T Lymphocytes with Phenotype and Function of Both Naive/Memory and Effector Cells. *J. Immunol.* 2001. 166: 900-7.

Fiorentini S, Malacarne F, Ricotta D, Licenziati S, Solis AA, Ausenda S, et al. Generation of CD28- cells from long-term-stimulated CD8+CD28+ T cells: a possible mechanism accounting for the increased number of CD8+CD28- T cells in HIV-1 infected patients. *J. Leukoc. Biol.* 1999. 65(5): 641-8.

Forman SJ, Blume KG, Thomas ED. *Bone marrow transplantation.* Blackwell, Boston. 1993. pp.504-12.

Gamadia LE, Remmerswaal EBM, Weel JF, Bemelman F, Van Lier RAW, Ten Berge IJM. Primary immune response to human cytomegalovirus. A critical role for IFN- γ producing CD4+ T Cells in protection against CMV disease. *Blood.* 2003. 101: 2686-92.

- Gamadia LE, Rentenaar RJ, Baars PA, Remmerswaal EBM, Surachno S, Well JFL, et al. Differentiation of cytomegalovirus-specific CD8⁺ T cells in healthy and immunosuppressed virus carriers. *Blood*. 2001b. 98:754-61.
- Gamadia LE, Rentenaar RJ, Remmerswaal EBM, Surachno S, Weel JFL, Toebe M, et al. CMV-specific CD8⁺ T lymphocyte differentiation in latent CMV infection. *Transplant. Proc.* 2001a. 33: 1802-3.
- Gane P, Fain O, Mansour I, Roquin H, Rouger P. Expression of CD11b (Leu 15) antigen on CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺, CD16⁺ peripheral lymphocytes. Estimation of CD3⁺8⁺11b⁺ and CD3⁺4⁺8⁺11b⁻ T-cell subsets using a single laser flow cytometer. *Scand J. Immunol.* 1992. 36 (3): 394-404.
- Garin L, Rigal D, Souillet G, Nemoz C, Bernaud J, Merieux Y, Philippe N. Allogeneic BMT in children: differential lymphocyte subset reconstitution according to the occurrence of acute GVHD. *Clin. Immunol. Immunopathol.* 1995. 77: 139-48.
- Ghanekar AS, Nomura LE, Suni MA, Picker LJ, Maecker HT, Maino VC. Gamma-IFN expression in CD8⁺ T cells is a marker for circulating cytotoxic T lymphocytes that recognize a HLA-A2 restricted epitope of human cytomegalovirus phosphoprotein pp65. *Clin. Diagn Lab. Immunol.* 2001. 8: 628-31.
- Giovannetti A, Mazzetta F, Caprini E, Aiuti A, Marziani M, Pierdominici M et al. Skewed T-cell receptor repertoire decreased thymic output, and predominance of terminally differentiated T cells in ataxia telangiectasia. *Blood*. 2002. 100:4082-9.
- Giugni TD, Söderberg C, Ham DJ, Bautista RM, Hedlund KO, Möller E, Zaia JA. Neutralization of human cytomegalovirus by human CD13-specific antibodies. *J. Infect. Dis.* 1996. 173: 1062-71.
- Globerson A, Effros RB. Ageing of lymphocytes and lymphocytes in the aged. *Immunol. Today* 2000. 21: 515-21.
- Goodrich JM, Mori M, Gleaves CA, Du Mond C, Cays M, Ebeling D, et al. Early treatment with ganciclovir to prevent cytomegalovirus disease after allogeneic bone marrow transplantation. *N. Engl. J. Med.* 1991. 325 (23): 1601-7.

Gor D, Sabin C, Pretince HG, Vyas N, Man S, Griffiths PD, Emery VC. Longitudinal fluctuations in cytomegalovirus load in bone marrow transplant patients: relationship between peak virus load, donor/recipient serostatus, acute GVHD and CMV disease. *Bone Marrow Transplant*. 1998. 21:597-605.

Gorochov G, Debre P, Leblond V, Sadat-Sowti B, Sigaux F, Autran B. Oligoclonal expansion of CD8⁺ CD57⁺ T cells with restricted T-cell receptor beta chain variability after bone marrow transplantation. *Blood*. 1994. 83(2): 587-95.

Gratama JW, Van Esser JWJ, Lamers CJH, Tournay C, Lowenberg B, Bolhuis RL, Cornelissen JJ. Tetramer-based quantification of cytomegalovirus (CMV)-specific CD8 T lymphocytes in T-cell depleted stem cell grafts and after transplantation may identify patients at risk for progressive CMV-infection. *Blood*. 2001. 98: 1358-64.

Gratama JW, Van Loon AM, Oosterveer MA, Naipal AM, D'Amaro J, De Witte TJ. Effect of cytomegalovirus infection on T-lymphocytes after lymphocyte-depleted bone marrow transplantation. *Exp Hematol*. 1987. 15: 803-8.

Grob JP, Grundy JE, Prentice HG, Griffiths PD, Hoffbrand AV, Hughes MD, et al. Immune donors can protect marrow-transplant recipients from severe cytomegalovirus infections. *Lancet*. 1987. 1(8536):774-6.

Grundy JE, Ayles HM, Mckeating JA, Butcher RG, Griffiths PD, Poulter LW. Enhancement of Class I HLA antigen expression by cytomegalovirus: role in amplification of virus infection. *J Med Virol*. 1988. 25(4): 483-95.

Grundy, JE, Downes KL. Up-regulation of LFA-3 and ICAM-1 on the surface of fibroblasts infected with cytomegalovirus. *Immunology* 1993. 78: 405-12.

Grundy, JE, Pahal GS, Akbar NA. Increased adherence of CD2 peripheral blood lymphocytes to cytomegalovirus-infected fibroblasts is blocked by anti-LFA-3 antibody. *Immunology* 1993. 78: 413-20.

Guillaume T, Rubinstein DB, Symann M. Immune reconstitution and immunotherapy after autologous hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 1998. 92(5):1471-90.

- Hakki M, Riddell SR, Storek J, Carter RA, Stevens-Ayers T, Sudour P, et al. Immune reconstitution to cytomegalovirus after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: impact of host factors, drug therapy, and subclinical reactivation. *Blood*. 2003. 102(8):3060-7.
- Halwachs G, Zach R, Pogglitsch H, Holzer H, Tiran A, Iberer F, et al. A rapid immunocytochemical assay for CMV1 detection in peripheral blood of organ-transplanted patients in clinical practice. *Transplantation*. 1993. 56: 338-42.
- Hamann D, Baars PA, Rep MH, Hooibrink B, Kerkhof-Garde SR, Klein MR, Van Lier RA. Phenotypic and functional separation of memory and effector human CD8+ T cells. *J. Exp. Med.* 1997. 186 (9): 1407-18.
- Hamann D, Roos, MT, Van Lier RA. Faces and phases of human CD8 T cell development. *Immunol. Today*. 1999. 20: 177-9.
- Harrington LE, Galvan M, Baum LG, Altman JD, Ahmed R. Differentiating between memory and effector CD8 T cells by altered expression of cell surface O-Glucans. *J. Exp. Med.* 2000. 191(7): 1241-6.
- Hartmann O, Le Corroller AG, Blaise D, Michon J, Philip I, Norol F, et al. Peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation for solid tumors and lymphomas: Hematologic recovery and costs – A randomized, controlled trial. *Ann Intern Med*. 1997. 126(8): 600-7.
- Hasenkrug KJ, Brooks DM, Dittmer U. Critical role for CD4(+) T cells in controlling retrovirus replication and spread in persistently infected mice. *J. Virol.* 1998. 72: 6559-64.
- Hazzan M, Labalette M, Noel C, Lelievre G, Dessaint JP. Recall response to cytomegalovirus in allograft recipients: mobilization of CD57+, CD28+ cells before expansion of CD57+, CD28- within the CD8+ T lymphocyte compartment. *Transplant*. 1997. 63: 693-8.

Hebart H, Einsele H, Klein R, Fischer I, Bühler S, Dietz K, et al. CMV infection after allogeneic bone marrow transplantation is associated with occurrence of various auto antibodies and monoclonal gammopathies. *Br. J. Haematol.* 1993. 95: 138-44.

Hebib NC, Déas O, Rouleau M, Durrbach A, Charpentier B, Beaujean F, et al. Peripheral Blood T cells generated after allogeneic bone marrow transplantation: lower levels of Bcl-2 protein and enhanced sensitivity to spontaneous and CD95-mediated apoptosis in vitro. Abrogation of the apoptotic phenotype coincides with the recovery of normal naive/primed T-cell profiles. *Blood.* 1999. 94:1803-13.

Heintel T, Sester M, Rodrigues MM, Krieg C, Sester U, Wagner R et al. The fraction of perforin-expressing HIV-specific CD8 T cells is a marker for disease progression in HIV infection. *Aids.* 2002. 16:1497-501.

Hertenstein B, Hampl W, Bunjes D, et al. In vivo/ex vivo T cell depletion for GVHD prophylaxis influences onset and course of active cytomegalovirus infection and disease after BMT. *Bone Marrow Transplant* 1995. 15: 387-93.

Hintzen RQ, De Jong R, Lens SM, Brouwer M, Baars P, Van Lier RAW. Regulation of CD27 expression on subsets of mature T-lymphocytes. *J. Immunol.* 1993. 151 (5): 2426-35.

Hintzen RQ, De Jong R, Lens SM, Van Lier RAW. CD27: marker and mediator of T-cell activation? *Immunol. Today.* 1994. 15: 307-11.

Hislop AD, Annels NE, Gudgeon NH, Leese AM, Rickinson AB. Epitope-specific evolution of human CD8+T cell responses from primary to persistent phases of Epstein Barr virus infection. *J. Exp. Med.* 2002. 195: 893-905.

Hislop AD, Gudgeon NH, Callan MF, et al. EBV-specific CD8+ T cell memory: relationships between epitope specificity, cell phenotype, and immediated effector function. *J. Immunol.* 2001. 167: 2019-29.

Holmberg LA, Boeckh M, Hooper H et al. Increased incidence of cytomegalovirus disease after autologous CD34-selected peripheral blood stem cell transplantation. *Blood.* 1999. 94 (12): 4029-35.

- Hooper M, Kallas EG, Coffin D, Campbel D, Evans TG, Looney RJ. Cytomegalovirus seropositivity is associated with the expansion of CD4+CD28- and CD8+CD28- T cells in rheumatoid arthritis. *J. Rheumatol.* 1999. 26: 1452-7.
- Horiuchi T, Hirokawa M, Kawabata Y, Kitabayashi A, Matsutani T, Yoshioka T, et al. Identification of T cell clones expanding within both CD8+CD28+ and CD8+CD28- T cell subsets in recipients of allogeneic hematopoietic cell grafts and its implication in post-transplant skewing of T cell receptor repertoire. *Bone Marrow Transplant.* 2001. 27: 731-9.
- Horowitz MM, Gale RP, Sondel PM, et al. Graft-versus-leukemia reactions after bone-marrow transplantation. *Blood.* 1990. 75 (3): 555-62.
- Horowitz MM. New IBMTR/ABMTR slides summarize current use and outcome of allogeneic and autologous transplants. *IBMTR News Lett.* 1995. 2 :1.
- Humar A, St Louis P, Mazzuli T, Mcgeer A, Lipton J, Messner H, Macdonald KS. Elevated serum cytokines are associated with cytomegalovirus infection and disease in bone marrow transplant recipients. *J Infect Dis.* 1999. 179: 484-8.
- Hunter AE, Haynes AP, Russel NH. Bone Marrow Transplantation: Current situation, complications and prevention. *J. Antimicrob.Chemother.*1995. 3: 119-33.
- International Bone Marrow Transplant Registry: *Report on State of the Art in Blood and Marrow Transplantation.* 2000. Available at: <http://www.ibmtr.org/infoserv/info-sums.html>.
- Issekutz TB. Dual inhibition of VLA-4 and LFA-1 maximally inhibits cutaneous delayed-type hypersensitivity-induced inflammation. *Am J Pathol.*1993.143: 1286-93.
- Ito M, Watanabe M, Ihara T, Kamiya H, Sakurai M. Increased expression of adhesion molecules (CD54, CD29 and CD44) on fibroblasts infected with cytomegalovirus. *Microbiol Immunol.* 1995a. 39 (2):129-33.

Ito M, Watanabe M, Kamiya H, Sakurai M. Changes of adhesion molecule (LFA-1, ICAM-1) expression on memory T cells activated with cytomegalovirus antigen. *Cell. Immunol.* 1995b. 160: 8-13.

Jaksch M, Uzunel M, Cangana GM, Remberger M, Mattsson J. Increased levels of immune transcript in patients with acute GvHD after allogeneic stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2003. 31: 183-90.

Janeway CA, Travers P, Walport M, Capra JD. Imunidade mediada por células T, In: *Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença*. 4 ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. p.270-71 e 282-83.

Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. *Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença*. 5th ed. Oxford, UK: Blackwell Publishers; 2001.

Jerjis S, Croockewit S, Muus P, Schaap N, Preijers F, de Witte T. Cost analysis of autologous peripheral stem cell transplantation versus autologous bone marrow auto transplantation for patients with non-Hodgkin's lymphoma and acute lymphoblastic leukaemia. *Leuk Lymphoma.* 1999. 36(1-2): 33-43.

June CH, Bluestone JA, Nadler LM, Thompson CB. The B7 and CD28 receptor families. *Immunol. Today.* 1994. 15: 321-31.

Kaech SM, Wherry EJ, Ahmed R. Effector and Memory T-cell differentiation: implications for vaccine development. *Nature Reviews Immunol.* 2002. 2: 251-62.

Kalams SA, Buchbinder SP, Rosenberg ES, Billingsley JM, Colbert DS, et al. Association between virus-specific cytotoxic T-lymphocyte and helper responses in human immunodeficiency virus type 1 infection. *J. Virol.* 1999. 73. 6715-20.

Kalams SA, Walker BD. The critical need for CD4 help in maintaining effective cytotoxic T lymphocyte responses. *J. Exp. Med.* 1998. 188: 2199-204.

Kallas EG, Reynolds K, Andrews J, Treanor JJ, Evans TJ. Cytomegalovirus-specific IFN- γ and IL-4 are produced by antigen expanded human blood lymphocytes from seropositive volunteers. *Immunol. Lett.* 1998. 64 (2-3): 63-9.

Keever CA, Small TN, Flomenberg N, Heller G, Pekle K, Black P, et al. Immune reconstitution following bone marrow transplantation: comparison of recipients of T-cell depleted marrow with recipients of conventional marrow grafts. *Blood*. 1989. 73(5): 1340-50.

Keizer GD, Borst J, Visser W et al. Membrane glycoprotein p150,95 of human cytotoxic T cell clone is involved in conjugate formation with target cells. *J Immunol*. 1987. 138: 3130-6.

Kern F, Khatamzas E, Sural I, Frömel C, Reinke P, Waldrop SL, et al. Distribution of human CMV-specific memory T cells among the CD8+ subsets defined by CD57, D27, and CD45 isoforms. *Eur. J. Immunol*. 1999. 29: 2908-15.

Khan N, Cobbold M, Keenan R, Moss PAH. Comparative analyses of CD8+ T cell response against human cytomegalovirus proteins pp-65 and immediate early 1 shows similarities in precursor frequency, oligoclonality and phenotype. *J. Infect. Dis*. 2002a. 185: 1025-34.

Khan N, Shariff N, Cobbold M, Bruton R, Ainsworth JA, Sinclair AJ, et al. Cytomegalovirus seropositivity drives the CD8 T cell repertoire toward greater clonality in the healthy elderly individuals. *J. Immunol*. 2002b. 169: 1984-92.

Kolb HJ, Holler E. Adoptive immunotherapy with donor lymphocyte transfusions. *Curr Opin Oncol* 1997. 9: 139-45.

Kolb HJ, Schattenberg A, Goldman JM, et al., Graft-versus-leukemia effect of donor lymphocyte transfusions in marrow grafted patients. European Group for Blood and Marrow Transplantation Working Party Chronic Leukemia. *Blood* 1995. 86:2041-50.

Kook H, Zeng W, Chen G, Kirby M, Young NS, Maciejewski JP. Increased cytotoxic T cells with effector phenotype in aplastic anemia and myelodysplasia. *Exp. Hematol*. 2001. 29:1270-7.

Korbling M, Huh YO, Durett A, Mirza N, Miller P, Engel H, et al. Allogeneic blood stem cell transplantation: peripheralization and yield of donor-derived primitive hematopoietic progenitor cells (CD34+ Thy1) and lymphoid subsets, and possible predictors of engraftment and graft-versus-host disease. *Blood* 1995a. 86(7): 2842-48.

Korbling M, Przepiorka D, Huh YO, Engel H, Van Besien K, Giralt S, et al. Allogeneic blood stem cell transplantation for refractory leukaemia and lymphoma: potential advantage of blood over marrow graft. *Blood* 1995b. 85(6): 1659-65.

Korngold R, Sprent J. T-cell subsets in graft-vs.-host disease. In: Burakoff SJ, Deeg HJ, Ferrara JLM, Atkinson K eds. *Graft-vs-Host Disease*. Marcel Dekker: New York. 1990. pp. 31-49.

Koskinen, P.K. The association of the induction of vascular cell adhesion molecule-1 with cytomegalovirus antigenemia in human heart allografts. *Transplant*. 1993. 56: 1103-8.

Krause H, Hebart H, Jahn G, Muller CA, Einsele, H. Screening for CMV-specific T cell proliferation to identify patients at risk of developing late onset CMV disease. *Bone Marrow Transplant*. 1997. 19:1111-16.

Kubo K, Yamanaka K, Kiyoi H, Fukutani H, Ito M, Hayakawa R, et al. Different T-cell receptor repertoires between lesions and peripheral blood in acute graft-versus-host disease after allogeneic bone marrow transplantation. *Blood*. 1996. 87:3019-26.

Labalette M, Salez F, Pruvot FR, Noel C, Dessaint JP. CD8 lymphocytosis in primary cytomegalovirus (CMV) infection of allograft recipients: expansion of a uncommon CD8+ CD57- subset and its progressive replacement by CD8+ CD57+ T cells. *Clin. Exp. Immunol*. 1994. 95: 465-71.

Lalvani A, Brookes R, Hambleton S, Britton WJ, Hill AVS, McMichael AJ. Rapid effector function in CD8+ memory T cells. *J. Exp. Med*. 1997. 186: 859-65.

Lee S, Chong SY, Lee JW, Kim SC, Min YH, Hahn JS, Ko YW. Difference in the expression of Fas/Fas-ligand and the lymphocyte subset reconstitution according to the occurrence of acute GVHD. *Bone Marrow Transplant*. 1997. 20: 883-8.

Lenschow DJ, Walunas TL, Bluestone JA. CD28/B7 system of T cell costimulation. *Annu. Rev. Immunol.* 1996. 14: 233-58.

Levin MJ, Parkman R, Oxman MN, Rapoport JM, Simpson M, Leary PL. Proliferative and interferon responses following transplantation in man. *Int. Immunol.* 1997. 20: 678-84.

Li C, Greenberg PD, Gilbert MJ, Goodrich JM, Riddell SR. Recovery of HLA-restricted cytomegalovirus (CMV)-specific T-cell responses after allogeneic bone marrow transplant: correlation with CMV disease and effect of ganciclovir prophylaxis. *Blood.* 1994. 83: 1971-9.

Lickliter JD, McGlave PB, De For TE, Miller JS, Ramsay NK, Verfaillie CM, et al. Matched-pair analysis of peripheral blood stem cells compared to marrow for allogeneic transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2000. 26:273-8.

Lieberman J. Mechanisms of granule-mediated cytotoxicity. *Curr. Opin. Immunol.* 2003. 15:1-3.

Ljungman P, Aschan J, Azinge JN, Brandt L, Ehrnst A, Hammarström V, et al. Cytomegalovirus viraemia and specific T-helper cell responses as predictors of disease after allogeneic marrow transplantation. *British J. Haematol.* 1993. 83:118-24.

Ljungman P, Fridell E, Lonnqvist B, Bolme P, Bottinger M, Gahrton G, et al. Efficacy and safety of vaccination of marrow transplant recipients with a live attenuated measles mumps, and rubella vaccine. *J. Infect. Dis.* 1989. 159: 610-5.

Ljungman P, Griffiths P, Paya C. Definitions of cytomegalovirus infection and disease in transplant recipients. *Clin. Infect. Dis.* 2002. 34: 1094-7.

Ljungman P, Lonnqvist B, Gahrton G, Ringdén O, Wahren B. Cytomegalovirus-specific lymphocyte proliferation and in vitro cytomegalovirus IgG synthesis for diagnostic of cytomegalovirus infections after bone marrow transplantation. *Blood.* 1986a. 68:108-112.

Ljungman P, Lonnqvist B, Wahren B, Ringdén O, Gahrton G. Lymphocyte responses after cytomegalovirus infection in bone marrow transplant recipients. A one year follow-up. *Transplantation*. 1985. 40: 515-20.

Ljungman P, Plotkin AS. Workshop on CMV Disease; definitions, clinical severity scores and nem syndromes. *Scan J Infect Dis Suppl*. 1995. 99:87-9.

Ljungman P. Cytomegalovirus infections in transplant patients. *Scand. J. Infect. Dis*. 1996. 100 (Supl.): 59-63.

Ljungman P. Immune reconstitution and viral infections after stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*. 1998. 21(S2): S72-4.

Ljungman P, Wilczec H, Gahrton G, Gustavsson A, Lundgren G, Lonnqvist B, et al. Long-term acyclovir prophylaxis in bone marrow transplant recipients and lymphocyte proliferation responses to herpes virus antigens in vitro. *B.M. Transplant*. 1986b. 1: 185-92.

Looney RJ, Falsey A, Campbell D, Torres A, Kolassa J, Brower C, et al. Role of cytomegalovirus in the t cell changes seen in elderly individuals. *Clin. Immunol*. 1999. 90: 213-9.

Lum LG, Seigneuret MC, Storb R, Witherspoon RP, Thomas ED. *In vitro* regulation of immunoglobulin synthesis after marrow transplantation. I.T-cell and B-cell deficiencies in patients with and without chronic graft-versus-host disease. *Blood*. 1981. 58 : 431-9.

Macedo MCMA. *Doença do enxerto contra o hospedeiro aguda e crônica no transplante de medula óssea: análise de 167 pacientes* [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 1998.

Machado CM, Dulley FL, Boas LS, Castelli JB, Macedo MC, Silva RL, et al. CMV pneumonia in allogeneic BMT recipients undergoing early treatment of pre-emptive ganciclovir therapy. *Bone Marrow Transplant*. 2000; 26: 413-17.

Machado CM, Fink MC, Villas Boas LS, Sumita LM, Weinberg A, Shiguematsu K, et al. Infecção perinatal pelo citomegalovírus em hospital público do município de São Paulo: Estudo prospectivo. *Rev. Inst. Med. Trop.* 1991. 33 (2): 159-66.

Machado CM, Menezes RX, Macedo MC, Mendes AVM, Villas Boas LS, Casteli JB, et al. Extended antigenemia surveillance and late cytomegalovirus infection after allogeneic BMT. *Bone Marrow Transplant.* 2001. 28: 1053-9.

Machado CM. *Baixas doses de ganciclovir na profilaxia da doença pelo citomegalovírus pós-transplante de medula óssea* [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 1996.

Mackall CL, Stein D, Fleisher TA, Brown MR, Hakin FT, Bare CV, et al. Prolonged CD4 depletion after sequential autologous peripheral blood progenitor cell infusions in children and young adults. *Blood.* 2000. 96 (15): 754-62.

Mahmoud HK, Fahmy OA, Kamel M, El-Haddad A, El-Kadi D. Peripheral blood vs bone marrow as source for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 1999. 24 (4):355-8.

Manteiga R, Martino R, Sureda A, Labeaga R, Brunet S, Sierra J, Rabella N. Cytomegalovirus pp65 antigenemia-guided pré-emptive treatment with ganciclovir after allogeneic stem transplantation: a single-center experience. *Bone Marrow Transplant.* 1998. 22 (9):899-904.

Marti GE, Stetler-Stevenson M, Bleesing JJH, Fleisher TA. Introduction to flow cytometry. *Semin. Hematol.* 2001. 38: 93-9.

Martin PJ, Schoch G, Fisher L, Byers V, Anasetti C, Appelbaum FR, et al. A retrospective analysis of therapy for acute graft-versus-host disease: initial treatment. *Blood.* 1990. 76(8): 1464-72.

Martinez C, Urbano-Ispizua A, Rozman C, Marin P, Rovira M, Sierra J, et al. Immune reconstitution following allogeneic peripheral blood progenitor cell transplantation: comparison of recipients of positive CD34+ selected grafts with recipients of unmanipulated grafts. *Exp. Hematol.* 1999. 27 (3): 561-8.

Martino R, Rovira M, Carreras E, Solano C, Sierra J, De La Rubia J, et al. Severe infections after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: a matched-pair comparison of unmanipulated and CD34+ cell-selected transplantation. *Haematologica*. 2001. 86: 1075-86.

Masopust D, Vezys V, Marzo AL, Lefrancois L. Preferential localization of effector memory cells in non-lymphoid tissue. *Science*. 2001. 291 (5512): 2413-17.

McFarland HI, Nahill SR, Maciaszc JW, Welsh RM. CD11b (Mac-1): a marker for CD8+ cytotoxic T cell activation and memory in virus infection. *J. Immunol*. 1992. 149(4): 1326-33.

Mendes AVA, Benard G, Pereira CB, Kallas EG, Duarte AJS, Pannuti CS, et al. Different kinetics in anti-cytomegalovirus immunity reconstitution evaluated by lymphocyte proliferation and IFN- γ production in allogeneic and autologous bone marrow transplantation. *Acta Haematol.* 2002. 107: 187-94.

Mendes AVA. *Expansão da subpopulação de linfócitos T CD8+/CD28+/CD57- e CD8+/CD28-/CD57+ e sua relação com a infecção pelo citomegalovírus em receptores de transplante de medula óssea* [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2001.

Merino J, Martínez-González MA, Rubio M, Inogès S, Sánchez-Barrola A, Subirá ML. Progressive decrease of CD8+ high CD28+ CD57+ cells with ageing. *Clin. Exp. Immunol*. 1998. 112: 48-51.

Merkenschlager M, Beverley PC. Evidence for differential expression of CD45 isoforms by precursor for memory-dependent and independent cytotoxic responses: human CD8 memory CTLp selectively express CD45RO (UCHL1). *Int. Immunol*. 1989. 1:450-9.

Meyers J.D. Prevention of cytomegalovirus after marrow transplantation. *Rev. Infect. Dis*. 1989. 11 (S7): S1691-705.

Meyers JD, Flournoy N, Thomas ED. Infection with herpes simplex virus and cell-mediated immunity after marrow transplant. *J. Infect. Dis*. 1980a. 142: 338-46.

Meyers JD, Flournoy N, Thomas ED. Cell-mediated immunity to varicella-zoster virus after allogeneic marrow transplant. *J. Infect. Dis.* 1980b. 141: 479-87.

Meyers JD, Flournoy N, Thomas ED. Cytomegalovirus infection and specific cell-mediated immunity after marrow transplant. *J. Infect. Dis.* 1980c. 142: 816-24.

Meyers JD, Flournoy N, Thomas ED. Risk factors for cytomegalovirus infection after human marrow transplantation. *J. Infect. Dis.* 1986. 153 (3): 478-88.

Meyers JD, Ljungman P, Fisher LD. Cytomegalovirus excretion as a predictor of cytomegalovirus disease after marrow transplantation: importance of cytomegalovirus viremia. *J. Infect. Dis.* 1990. 162: 373-80.

Michallet M, Philip T, Philip I, Godinot H, Sebban C, Salles G, et al., Transplantation with selected autologous peripheral blood CD34+ Thy+ hematopoietic stem cells (HSCs) in multiple mieloma: impact of HSC dose on engraftment, safety, and immune reconstitution. *Exp. Hematol.* 2000. 28: 858-70.

Michie CA, Mclean A, Alcock C, Beverley PC. Life span of human lymphocyte subsets defined by CD45 isoforms. *Nature (Lond.)*. 1992. 360: 264-5.

Migueles SA, Laborico AC, Shupert WL, Sabbaghian MS, Rabin R, Hallahan CW et al., HIV-specific CD8+ T cell proliferation is coupled to perforin expression and is maintained in nonprogressors. *Nat. Immunol.* 2002. 3:1061-8.

Miller W, Flynn P, McCullough J, Balfour HH, Goldman A, Haake R, et al. Cytomegalovirus infection after bone marrow transplantation: an association with acute graft-vs-host disease. *Blood*. 1986. 67(4): 1162-7.

Milosevits J, Pócsik E, Schmidt B, Reményi P, Intödi Z, Réti M, et al. *Scand. J. Immunol.* 1995. 42: 493-500.

Mocarski ES. Cytomegalovirus and their replication. In: Fields BN, Knipe DM, Howley PM eds. *Virology*. 3th ed. Philadelphia, New-York: Lippincott-Raven, 1996. p.2221-46.

Mollet L, Sadat-Sowti B, Duntze J, Lebrond V, Bergeron F, Calvez V, et al. CD8^{hi}+CD57+ T lymphocytes are enriched in antigen-specific T cells capable of down-modulating cytotoxic activity. *Int. Immunol.* 1998. 10 (3): 311-23.

Monteiro J, Batliwalla F, Ostrer H, Gregersen PK. Shortened telomeres in clonally expanded CD28- CD8+ T cells imply a replicative history that is distinct from their CD28+CD8+ counterparts. *J. Immunol.* 1996. 156(10):3587-90.

Morecki S, Gelfand Y, Nagler A, Or R, Naparstek E, Varadi G, et al. Immune reconstitution following allogeneic stem cell transplantation in recipients conditioned by low intensity vs myeloablative regimen. *Bone Marrow Transplantation.* 2001. 28: 243-9.

Morishita Y, Sao H, Hansen JA, Martin PJ. A distinct subset of human CD4+ T cells with a limited alloreactive T cell repertoire. *J. Immunol.* 1989. 143(9): 2783-9.

Morley JK, Batliwalla FM, Hingorani R, Gregersen PK. Oligoclonal CD8+T cells are preferentially expanded in the CD57+ subset. *J. Immunol.* 1995. 154 (11):6182-90.

Moses AV, Garnett HM. The effect of cytomegalovirus on the production and biologic action of interleukin-1. *J. Infect. Dis.* 1990. 162: 381-8.

Mueller YM, De Rosa SC, Hutton JA, Witek J, Roederer M, Altman JD, et al. Increased CD95/Fas-induced apoptosis of HIV-specific CD8(+) T cells. *Immunity.* 2001. 15:871-82.

Murali-Krishna K, Ahmed R. Cutting Edge: Naive T cells masquerading as memory cells. *J. Immunol.* 2000. 165: 1733-7.

Murali-Krishna K, Altman JD, Suresh M, Sourdive DJ, Zajac AC, Miller JD, et al. Counting antigen-specific CD8T cells: reevaluation of bystander activation during viral infection. *Immunity.* 1998. 8(2):177-87.

Murayama T, Kuno K, Jisaki F, Obuchi M, Sakamuro D, Furukawa T, et al. Enhancement of human cytomegalovirus replication in a human lung fibroblast cell line by interleukin-8. *J. Virol.* 1994. 68: 7582-5.

Nishio M, Koizumi K, Endo T, Fujimoto K, Koike T, Sawada KI. Diminished T-cell recovery after CD34+ selected autologous peripheral blood stem cell transplantation increases the risk of cytomegalovirus infection. *Haematologica*. 2001. 86: 667-8.

Nivison-Smith I, Bradstock KF, Szer J, Durrant S, Dodds A, Hermann R, et al. Allogeneic haemopoietic cell transplants in Australia, 1996 – a multi-centre retrospective comparison of the use of peripheral blood stem cells with bone marrow. *Bone Marrow Transplant*. 2001. 28: 21-7.

Noble S, Markham A. Cyclosporin. A review of the pharmacokinetic properties, clinical efficacy and tolerability of a microemulsion-based formulation (Neoral). *Drugs*. 1995. 50:924-41.

Nociari MM, Telford W, Russo C. Postthymic development of CD28-CD8+ T cell subset: age-associated expansion and shift from memory to naïve phenotype. *J. Immunol*. 1999. 162:3327-35.

Noel DR, Witherspoon RP, Storb R, Atkinson K, Doney K, Michelson EM, et al. Does graft-versus-host disease influence the tempo of immunologic recovery after allogeneic human marrow transplantation? An observation on 56 long-term survivors. *Blood*. 1978. 51(6): 1087-105.

Nordoy I, Muller F, Nordal KP, Rollag H, Lien E, Aukrust P, Froland SS. Immunologic parameters as predictive factors of cytomegalovirus disease in renal allograft recipients. *J. Infect Dis*. 1999. 180: 195-8.

Ochs L, Shu XO, Miller J, Enright H, Wagner J, Filipovich A, et al. Late infections after allogeneic bone marrow transplantation: comparison of incidence in related and unrelated donor transplant recipients. *Blood*. 1995. 86: 3979-86.

Okumura M, Fujii Y, Inada K, Nakahara K, Matsuda H. Both CD45RA+ and CD45RA- subpopulations of CD8+ T cells contain cells with high levels of lymphocyte function-associated antigen-1 expression, a phenotype of primed T cells. *J. Immunol*. 1993b.150: 429-37.

Okumura M, Fujii Y, Takeuchi Y, Inada K, Nakahara K, Matsuda H. Age-related accumulation of LFA-1^{high} cells in a CD8 CD45RA^{high} T cell population. *Eur. J. Immunol.* 1993a. 23: 1057-63.

Ottinger HD, Beelen DW, Scheulen B, Schaefer UW, Grosse-Wilde H. Improved immune reconstitution after allotransplantation of peripheral blood stem cell instead of bone marrow. *Blood.* 1996. 88(7): 2275-9.

Ozdemir E, John LSSt, Gillespie G, Rowland-Jones S, Champlin RE, Molldrem JJ, Komanduri KV. Cytomegalovirus reaction following allogeneic stem cell transplantation is associated with the presence of dysfunctional antigen-specific CD8⁺ T cells. *Blood.* 2002. 100: 3690-7.

Paloczi, K. Immune reconstitution: an important component of a successful allogeneic transplantation. *Immunol. Lett.* 2000. 74: 177-81.

Pannuti CS, Kallas EG, Muccioli C, Roland RK, Ferreira EC, Bueno SM, et al. Cytomegalovirus antigenemia in acquired immunodeficiency syndrome patients with untreated cytomegalovirus retinitis. *Am J Ophthalmol* 1996. 122: 847-52.

Pantaleo G, Demarest JF, Soudeyns H, Graziosi C, Denis F, Adelsberger JW, et al. Major expansion of CD8 T cells with a predominant V β usage during the primary immune response to HIV. *Nature.* 1994. 370(6489): 463-7.

Papagno L, Spina C, Marchant A, Salio M, Rufer N, Little S, et al. Immune activation and CD8⁺ T cell differentiation towards senescence in HIV-1 infection. *PLoS Biol.* 2004. 2(2):173-85.

Parkman R, Weinberg Kl. Immunological reconstitution following hematopoietic stem cell transplantation. In: Thomas ED, Blume KG, Forman SJ, editors. *Hematopoietic cell transplantation*. 2nd edition. Boston, MA: Blackwell Scientific Publications. 1999. 704-11.

Picker LJ, Treer JR, Ferguson DB, Collins PA, Buck D, Terstappen LW. Control of lymphocyte recirculation in man. I. Differential regulation of peripheral lymph node homing receptor L-selectin on T cells during the virgin to memory cell transition. *J. Immunol.* 1993. 150: 1105-21.

Pittet MJ, Speiser DE, Valmory D, Cerottini JC, Romero P. Cutting Edge. Cytolytic Effector Function in Human Circulating CD8+ T Cells Closely Correlates with CD56 Surface Expression. *J. Immunol.* 2000. 164: 1148-52.

Pittet MJ, Valmori D, Dunbar PR, Speiser DE, Lienard D, Lejeune F, et al. High frequencies of naïve Melan-A/MART-1-specific CD8+ T cells in a large proportion of human histocompatibility leukocyte antigen (HLA)-A2 individuals. *J. Exp. Med.* 1999. 190: 705-15.

Podlech J, Holtappels R, Wirtz N, Steffens H, Reddehase M. Reconstitution of CD8 T cells is essential for the prevention of multiple-organ cytomegalovirus histopathology after bone marrow transplantation. *Journal of Virology.* 1998. 79: 2099-104.

Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED. 1994 Consensus Conference on Acute GVHD Grading. *Bone Marrow Transplant.* 1995. 15(6): 825-8.

Quinnan GV, Kitrmani N, Rook AH, Manischewitz JF, Jackson L, Moreschi G, et al. Cytotoxic T cells in cytomegalovirus infection: HLA-restricted T-lymphocyte and non-T-lymphocyte cytotoxic responses correlate with recovery from cytomegalovirus infection in bone marrow transplant recipients. *N. Engl. J. Med.* 1982. 307: 6-13.

Raaphorst FM. Reconstitution of the B cell repertoire after bone marrow transplantation does not recapitulate human fetal development. *Bone Marrow Transplant.* 1999. 24 (12): 1267-72.

Rabin RI, Roederer M, Maldonado Y, Petru A, Herzenberg La, Herzenberg La. Altered representation of naive and memory CD8 T cell subsets in HIV-infected children. *J. Clin. Invest.* 1995. 95: 2054-60.

Ravkov EV, Myrick CM, Altman JD. Immediate early effector functions of virus-specific CD8⁺ CCR7⁺ memory cells in humans defined by HLA and CC chemokine ligand 19 tetramers. *J. Immunol* 2003. 170: 2461-8.

Reusser P, Attenhofer R, Hebart H, Helg C, Chapuis B, Einsele H. Cytomegalovirus-specific T-cell immunity in recipients of autologous peripheral blood stem cell or bone marrow transplants. *Blood*. 1997. 89 (10): 3873-9.

Reusser P, Riddell SR, Meyers JD, Greenberg PD. Cytotoxic T-lymphocyte response to cytomegalovirus after human allogeneic bone marrow transplantation: pattern of recovery and correlation with cytomegalovirus infection and disease. *Blood*. 1991 78: 1373-80.

Robinet E, Lapierre V, Tayebi H, Kuentz M, Blaise D, Tiberghien P. Blood versus marrow hematopoietic allogeneic graft. *Transfusion and Apheresis Science*. 2003. 29: 53-9.

Roederer M, Brenchley JM, Betts MR, De Rosa SC. Flow cytometric analysis of vaccine responses: how many colors are enough? *Clin Immunol*. 2004. 110: 199-205.

Roederer M, Dubs JG, Anderson MT, Raju PA, Herzenberg LA. CD8 naive T cell counts decrease progressively in HIV-Infected adults. *J.Clin.Invest*.1995. 95: 2061-6.

Roizman B. Herpesviridae. In: Fields BN, Knipe DM, Howley PM eds. *Virology*. 3th ed., Philadelphia, New-York: Lippincott-Raven, 1996, p.2221- 46.

Roos MThL, Van Lier RAW, Hamman D, Knol GJ, Verhoofstad I, Van Baarle D, et al. Changes in the composition of circulating CD8⁺ T cell subsets during acute Epstein-Barr and Human Immunodeficiency Virus infections in humans. *J. Inf. Dis*.2000. 182: 451-8.

Rosenberg ES, Billingsley JM, Caliendo AM, Boswell SL, Sax PE, Kalams SA, Walker BD. Vigorous HIV-1-specific CD4⁺ T cell responses associated with control of viremia. *Science*. 1997. 278(5342): 1447-50.

Rothman KJ, Greenland S. Modern Epidemiology. In: Williams & Wilkins Publishers *Correlation and Regression Models*. 2nd ed., Philadelphia, New-York: Lippincott-Raven, 1998.

Roux E, Helg C, Dumont-Girard F, Chapuis B, Jeannet M, Roosnek E. Analysis of T-cell repopulation after allogeneic bone marrow transplantation: significant differences between recipients of T-cell depleted and unmanipulated grafts. *Blood*. 1996. 87: 3984-92.

Roy DM, Brener MK, Cook D, Duncan RI, Griffiths PD, Grundy JE. Transfer of humoral immunity against cytomegalovirus proteins following transplantation of T-cell-depleted allogeneic bone marrow from seropositive donors. *J. Med. Virol.* 1993. 41:150-8.

Rufer N, Brummendorf TH, Kolvraa S, Bischoff C, Christensen K, Wadsworth L, et al. Telomere fluorescence measurements in granulocytes and T lymphocyte subsets point to a high turnover of hematopoietic stem cells and memory T cells in early childhood. *J. Exp. Med.* 1999. 190:157-67.

Russell JA, Brown C, Bowen T, Luider J, Ruether JD, Stewart D, et al. Allogeneic blood cell transplants for hematological malignancy: preliminary comparison of outcomes with bone marrow transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 1996. 17(5):703-8.

Rutella S, Pierelli L, Bonanno G, Mariotti A, Sica S, Sora F, et al. Immune reconstitution after autologous peripheral blood progenitor cell transplantation: Effect of interleukin-15 on T-cell survival and effector functions. *Exp. Hematol.* 2001. 29(12): 1503-16.

Sadat-Sowti B, Debre P, Mollet L, Quint L, Hadida F, Leblond V, et al. An inhibitor of cytotoxic functions produced by CD8+ CD57+ T lymphocytes from patients suffering from AIDS and immunosuppressed bone marrow recipients. *Eur. J. Immunol.* 1994. 24:2882-8.

Sallusto F, Kremmer E, Palermo B, Hoy A, Ponath P, Qin S, et al. Switch in chemokine receptor expression upon TCR stimulation reveals novel homing potential for recently activated T cells. *Eur. J. Immunol.* 2002. 32: 3756-64.

Sallusto F, Lanzavecchia A. Exploring pathways for memory T cell generation. *J. Clin. Invest* 2001. 108: 805-6.

Sallusto F, Lenig R, Foster ML, Lanzavecchia A. Two subsets of memory T lymphocytes with distinct homing potentials and effector functions. *Nature.* 1999.401: 708-12.

Sanders ME, Makgoba MW, Shaw S. Human naive and memory T cells. *Immunol. Today.* 1988. 9: 195-9.

Schmaltz C, Alpdogan O, Horndasch KJ, Muriglan SJ, Kappel BJ, Teshima T, et al. Differential use of Fas ligand and perforin cytotoxic pathways by donor T cells in graft-versus-host disease and graft-versus-leukemia effect. *Blood.* 2001. 97: 2886-95.

Schmidt GM, Horak DA, Niland JC, Duncan SR, Forman SJ, Mathieu D, Bismuth H. A randomized, controlled trial of prophylactic ganciclovir for cytomegalovirus pulmonary infection in recipients of allogeneic bone marrow transplants. *N Engl J Med.* 1991. 324: 1005-11.

Schmitz N, Dreger P, Suttorp M, Rohwedder EB, Haferlach T, Loffler H, et al. Primary transplantation of allogeneic peripheral blood stem cells mobilized by filgrastim (granulocyte colony-stimulating factor) *Blood.* 1995. 85(6): 1666-72.

Scholz M, Cinatl J, Gross V, Vogel Ju, Blaheta RA, Freisleben HJ, et al. Impact of oxidative stress on human cytomegalovirus replication and on cytokine-mediated stimulation of endothelial cells. *Transplant.* 1996. 61 (12): 1763-70.

Schoppel K, Schimidt C, Einsele H, Hebart H, Mach M. Kinetics of the antibody response against human cytomegalovirus-specific proteins in allogeneic bone marrow transplant recipients. *J. Infect. Dis.* 1998. 178: 1233-43.

- Seder RA, Ahmed R. Similarities and differences in CD4+ and CD8+ effector and memory T cell generation. *Nat. Immunol.* 2003. 4:835-42.
- Sedmak DD, Knight DA, Vook NC, Waldman JW. Divergent patterns of ELAM-1, ICAM-1, and VCAM-1 expression on cytomegalovirus-infected endothelial cells. *Transplant.* 1994. 58: 1379-85.
- Shiobara S, Lum LG, Witherspoon RP, Storb R. Antigen-specific antibody responses of lymphocytes to tetanus toxoid after human marrow transplantation. *Transplant.* 1985. 41: 587-92.
- Shresta S, Graubert TA, Thomas DA, Raptis SZ, Ley TJ. Granzyme A initiates an alternative pathway for granule-mediated apoptosis. *Immunity.* 1999. 10: 595-605.
- Sica S, Sora F, Chiusolo P, Laurenti L, Cattani P, Giordano G, et al. Early viral complications after autologous CD34-selected peripheral blood stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2000. 26(5). 587-8.
- Singhal S, Powles R, Kulkarni S, Treleaven J, Sirohi B, Millar B, et al. Comparison of marrow and blood cell yields from the same donors in a double-blind, randomized study of allogeneic marrow vs blood stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2000. 25(5): 501-5.
- Small TN, Avigan D, Dupont B, Smith K, Black P, Heller G, et al. Immune reconstitution following T-cell depleted bone marrow transplantation: effect of age and posttransplant graft rejection prophylaxis. *Biol. Blood Marrow Transplant.* 1997. 3(2):65-75.
- Small TN, Papadopoulos EB, Boulad F, Black P, Castro-Malaspina H, Childs BH, et al. Comparison of immune reconstitution after unrelated and related T-cell-depleted bone marrow transplantation: effect of patient age and donor leukocyte infusions. *Blood.* 1999. 93 (2):467-80.
- Smyth MJ, Trapani JA. Granzymes: exogenous proteinases that induce target cell apoptosis. *Immunol. Today.* 1995. 16(4): 202-6.

- Söderberg C, Larsson S, Rozell BL, Sumitran-Karuppan S, Ljungman P, Möller E. Cytomegalovirus-induced CD13-specific autoimmunity - a possible cause of chronic graft-versus-host disease. *Transplant.* 1996. 61: 600-9.
- Sohen S, Rothstein D, Tallman T, Gaudette D, Schlossman S, Morimoto C. The functional heterogeneity of CD8 cells defined by anti CD45RA (2H4) and anti-CD29 (4B4) antibodies. *Cell. Immunol.* 1990. 128: 314-28.
- Sprent J, Zhang X, Tough D. T cell turnover in vivo and the role of cytokines. *Immunol. Lett.* 1999. 65(1-2):21-5.
- Springer TA. Traffic signals for lymphocyte recirculation and leukocyte emigration: the multistep paradigm. *Cell.* 1994. 76(2): 301-14.
- Storek J, Gooley T, Witherspoon RP, Sullivan KM, Storb R. Infectious morbidity in long-term survivors of allogeneic marrow transplantation is associated with low CD4 T cells counts. *Am J Hematol.* 1997a. 54: 131-8.
- Storek J, Witherspoon RP, Maloney DJ, Chainecey TR, Storb R. Improved reconstitution of CD4 T cells and B cells but worsened reconstitution of serum IgG levels after allogeneic transplantation of blood stem cells instead of marrow [letter]. *Blood.* 1997b. 89: 3891-3.
- Storek J, Witherspoon RP, Storb R. T cell reconstitution after bone marrow transplantation into adult patients does not resemble T cell development in early life. *Bone Marrow Transplant.* 1995. 16: 413-25.
- Storek, J, Dawson MA, Storer B, Stevens-Ayers T, Maloney DG, Marr KA, et al. Immune reconstitution after allogeneic marrow transplantation compared with blood stem cell transplantation. *Blood.* 2001. 97 (11): 3380-9.
- Sullivan KM. Intravenous imune globulin prophylaxis in recipients of a marrow transplant. *J. Allergy Clin. Immunol.* 1989. 84: 632-9.

Sun JC, Williams MA, Bevan MJ. CD4+ T cells are required for the maintenance, not programming, of memory CD8+ T cells after acute infection. *Nature Immunol.* Advance Online Publication. 2004. 1-7.

Talmadge JE, Reed E, Ino K, Kessinger A, Kuszynski C, Heimann D, et al. Rapid immunologic reconstitution following transplantation with mobilized peripheral blood stem cells as compared to bone marrow. *Bone Marrow Transplant.* 1997. 19(2):161-72.

Tan LC, Gudgeon N, Annels NE, Hansasuta P, O'Callaghan CA, Rowland-Jones S, et al. A re-evaluation of the frequency of cD8+ T cells specific for EBV in healthy virus carriers. *J. Immunol.* 1999. 162: 1827-35.

Tayebi H, Tiberghien P, Ferrand C, Lienard A, Duperrier A, Cahn JY, et al. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation results in less alteration of early T cell compartment homeostasis than bone marrow transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2001. 27(2): 167-75.

Tayebi H, Tiberghien P, Kuentz M et al. Comparison of HLA-identical allogeneic bone marrow (BM) versus peripheral blood stem cell (PBSC) transplantation: phenotypical and functional study of donor T cells in the graft and after hematopoietic reconstitution. *Blood* 1998. 92: 140a (Abstr.).

Testi R, D' Ambrosio A, De Maria R, Santoni A. The CD69 receptor: a multipurpose cell-surface trigger for hematopoietic cells. *Immunol. Today.* 1994. 15: 479-83.

Testi R, Philips JH, Lanier LL. T cell activation via Leu-23 (CD69). *J. Immunol.* 1989.143 (4): 1123-8.

Thomas ED, Blume KG, Forman SJ. *Hematopoietic Cell Transplantation.* 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Science, 1999.

Thomas ED, Storb R, Clift RA, Fefer A, Johnson FL, Neiman PE, et al. Bone Marrow Transplantation. Part 2. *N Engl J Med* .1975. 292: 295-902.

- Tomiyama H, Matsuda T, Takiguchi M. Differentiation of human CD8T cells from a memory / effector phenotype. *J. Immunol.* 2002. 168: 5538-50.
- Topp MS, Riddell SR, Akatsuka Y, Jensen MC, Blattman JN, Greenberg PD. Restoration of CD28 expression in CD28- CD8+ memory effector T cells reconstitutes antigen-induced IL-2 production. *J. Exp. Med.* 2003. 198:947-55.
- Tough DF, Borrow P, Sprent J. Induction of bystander T cell proliferation by viruses and type I interferon in vivo. *Science.* 1996. 272: 1947-50.
- Tough DF. Deciphering the relationship between central and effector memory CD8+ T cells. *Trends Immunol.* 2003. 24: 404-7.
- Tough DF, Sprent J. Turnover of naive and memory-phenotype T cells. *J Exp Med* 1994. 179(4):1127-35.
- Trapani JA, Smyth MJ. Functional significance of the perforin/granzyme cell death pathway. *Nat Rev Immunol.* 2002. 2:735-47.
- Trapani JA, Sutton VR. Granzyme B: pro-apoptotic, antiviral and antitumor functions. *Curr. Opin. Immunol.* 2003. 15: 1-11.
- Trenschel R, Ross S, Husing J, Ottinger H, Elmaagacli A, Roggendorf M, et al. Reduced risk of persisting cytomegalovirus pp65 antigenemia and cytomegalovirus interstitial pneumonia following allogeneic PBSCT. *Bone Marrow Transplant.* 2000. 25(6):665-72.
- Tussey L, Speller S, Gallimore AE, Vessey R. Functionally distinct CD8 memory Tcell subsets in persistent EBV infection are differentiated by migratory receptor expression. *Eur. J. Immunol.* 2000. 30: 1823-9.
- Tussey LG, Nair US, Bachinsk M, Edwards BH, Bakari J, Grimm K, et al. Antigen Burden is a major determinant of human immunodeficiency virus-specific CD8+ T cell maturation state: potential implications for therapeutic immunization. *J. Infect. Dis.* 2003. 187: 364-74.

Unsoeld H, Krautwald S, Voehringer D, Kunzendorf U, Pircher H. Cutting edge: CCR7+ e CCR7- memory T cells do not differ in immediate effector cell function. *J. Immunol.* 2002. 169: 638-41.

Van Baarle D, Kostense S, Hovenkamp E, Ogg G, Nanlohy N, Callan MF, et al. Lack of Epstein-Barr virus and HIV-specific CD27- CD8+ T cells is associated with progression to viral disease in HIV-infection. *Aids* 2002; 16:2001-11.

Van Den Berg AP, Van Son WJ, Janssen RAJ, Brons NH, Heyn AA, Scholten-Sampson A, et al. Recovery of cytomegalovirus infection is associated with activation of peripheral blood lymphocytes. *J. Infect Dis.* 1992. 166:1228-365.

Van Den Berg AP, Van Son WJ, Tegzess AM, The TH. Cellular immune activation reflects antiviral immunity and is a favorable prognostic marker in patients with cytomegalovirus infection. *Transplantation Proceedings.* 1993. 25 (1): 1419-20.

Van Den Brink MR, Burakoff SJ. Cytolytic pathways in haematopoietic stem-cell transplantation. *Nature Rev. Immunol.* 2002. 2: 273-81.

Van Der BIJW, Torensma R, Van Son WJ, Anema J, Schirm J, Tegzess AM, The TH. Rapid immunodiagnosis of active cytomegalovirus infection by monoclonal, antibody staining of blood leucocytes. *J. Med. Virol.* 1988.25: 179-88.

Vasconcelos, DM. *Caracterização da competência imunológica de pacientes portadores de candidíase mucocutânea crônica.* [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 1998.

Veiga-Fernandes H, Walter U, Bourgeois C, McLean A, Rocha B. Response of naïve and memory CD8 T cells to antigen stimulation in vivo. *Nature Immunol.* 2000. 1: 47-63.

Voltarelli JC. Applications of flow cytometry to hematopoietic stem cell transplantation. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 2000. 95: 403-14.

Waldman WJ, Knight DA, Adams PW, Orosz CG, Sedmak DD. *In vitro* induction of endothelial HLA Class II antigen expression by cytomegalovirus-activated CD4+ T cells. *Transplant*. 1993. 56 (6):1504-12.

Waldrop SL, Pitcher CJ, Peterson DM, Maino VC, Picker LJ. Determination of antigen-specific memory-effector CD4+ T cell frequencies by flow cytometry: evidence for a novel, antigen-specific homeostatic mechanism in HIV-associated immunodeficiency. *J. Clin. Invest*. 1997. 99: 1739-50.

Wang EC, Borysiewicz LK. The role of CD8+ CD57+ in human cytomegalovirus and other viral infections. *Scan. J. Infect. Dis*. 1995. Suppl. 99: 69-77.

Wang EC, Moss PA, Frodsham P, Lehner PJ, Bell JI, Borysiewicz LK. CD8 high CD57+ T lymphocytes in normal, healthy individuals are oligoclonal and respond to human cytomegalovirus. *J. Immunol*. 1995. 155: 5046-56.

Warrington KJ, Vallejo AN, Weyand CM, Goronzy JJ. CD28 loss in senescent CD4+ T cells: reversal by interleukin-12 stimulation. *Blood*. 2003. 101: 3543-9.

Weaver CH, Longin K, Buckner CD, Bensinger W. Lymphocyte content in peripheral blood mononuclear cells collected after the administration of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor. *Bone Marrow Transplant*. 1994. 13(4):411-5.

Weekes MP, Carmichael AJ, Wills MR, Mynard K, Sissons P. Human CD28-CD8+ T cells contain greatly expanded functional virus-specific memory CTL clones. *J. Immunol*. 1999b. 162: 7569-77.

Weekes MP, Wills MR, Mynard K, Carmichael AJ, Sissons JG. The memory cytotoxic T-lymphocyte (CTL) response to human cytomegalovirus infection contains individual peptide-specific CTL clones that have undergone extensive expansion *in vivo*. *J. Virol*. 1999a. 73(3): 2099-108.

Weinberg A, Jesser RD, Edelstein CL, Bill JR, Wohl DA. Excess apoptosis of mononuclear cells contributes to the depressed cytomegalovirus-specific immunity in HIV-infected patients on HAART. *Virology*. 2004. 330: 313-21.

Weiss L, Ancuta P, Girard PM, Bouhlal H, Roux A, Cavaillon NH, Kazatchkine MD. Restoration of normal interleukin-2 production by CD4⁺ T cells of human immunodeficiency virus infected patients after 9 months of highly active antiretroviral therapy. *J. Infect. Dis.* 1999. 180: 1057-63.

Welte K, Liobanu N, Moore MAS, Gulati S, O'Reilly RJ, Mertelsmann R. Defective interleukin-2 production in patients after bone marrow transplantation and in vitro restoration of defective T-lymphocyte proliferation by highly purified interleukin-2. *Blood.* 1984. 64: 380-5.

Wherry EJ, Teichgraber V, Becker TC, Masopust D, Kaech SM, Antia R, et al. Lineage relationship and protective immunity of memory CD8 T cell subsets. *Nat. Immunol.* 2003. 4: 225-34.

Wills MR, Carmichael AJ, Weekes MP, Mynard K, Okecha G, Hicks R, Sissons JG. Human virus-specific CD8⁺ CTL clones revert from CD45RO^{high} to CD45RA^{high} *in vivo*: CD45RA^{high} CD8⁺ T cells comprise both naïve and memory cells. *J. Immunol.* 1999. 162(12): 7080-7.

Wills MR, Okecha G, Weekes MP, Gandhi MK, Sissons PJG, Carmichael AJ. Identification of naïve or antigen-experienced human CD8⁺ T cells by expression of costimulation and chemokine receptors: Analysis of the human cytomegalovirus-specific CD8⁺ T cell response. *J. Immunol.* 2002. 168: 5455-64.

Winston DJ, Gale RP, Meyer DV, Young LS. Infectious complications of human bone marrow transplantation. *Medicine.* 1979. 58:1-31.

Witherspoon RP, Goehle S, Kretschmer M, Storb R. Regulation of immunoglobulin production after human marrow grafting. The role of helper and suppressor T cells in acute graft-versus-host disease. *Transplant.* 1986. 41(3): 328-35.

Yamada H, Martin PJ, Bean MA, Braun MP, Beatty PG, Sadamoto K, Hansen JA. Monoclonal antibody 9.3 and anti-CD11 antibodies define reciprocal subsets of lymphocytes. *Eur. J. Immunol.* 1985. 15(12): 1164-8.

Young, JL, Ramage JM, Gaston, JS, Beverley PC. In vitro responses of human CD45RObrightRA- and CD45RO-RA- bright T cell subsets and their relationship to memory and naïve T cells. *Eur. J. Immunol.* 1997. 27. 2383-90.

Zabel BA, Agace WW, Campbell JJ, Heath H.M, Parent D, Roberts AI, et al. Human G protein-coupled receptor GPR-9-6/CC chemokine receptor 9 is selectively expressed on intestinal homing T lymphocytes, mucosal lymphocytes, and thymocytes and is required for thymus-expressed chemokine-mediated chemotaxis. *J. Exp. Med.* 1999.190(9): 1241-56.

Zajac AJ, Blattman JN, Muralli-Krishina K, Sourdive DJD, Suresh M, Altman JD, Ahmed R. Viral Immune Evasion due to persistence of activated T cells without effector function. *J.Exp.Med.*1998. 188(12): 2205-13.

Zhang D, Shankar P, Xu Z, Harnisch B, Chen G, Lange C, et al. Most antiviral CD8 T cells during chronic viral infection do not express high levels of perforin and are not directly cytotoxic. *Blood.* 2003. 101: 226-35.

Zhang X, Sun S, Hwang I, Tough DF, Sprent J. Potent and selective stimulation of memory-phenotype CD8+ T cells in vivo by IL-15. *Immunity.* 1998. 8:591-99.

Zimmermann C, Brduscha-Riem K, Blaser C, Zinkernagel RM, Pircher H. Visualization, characterization, and turnover of CD8+ memory T cells in virus-infected hosts. *J. Exp. Med.* 1996. 183: 1367-75.

Zintl F, Prager J, Sauerbrey A, Metzner G, Hermann J, Fuchs D. Immune reconstitution after human bone marrow transplantation. *Folia Haematol Int Klin Morphol. Blutforsch.* 1989. 116(3-4): 519-26.