ROSENY DOS REIS RODRIGUES

**Avaliação da aeração e edema pulmonar por meio de
tomografia computadorizada em pacientes submetidos a
revascularização do miocárdio**

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo para obtenção do título de
Doutor em Ciências

Programa de: Anestesiologia

Orientador: Dr. Luiz Marcelo Sá Malbouisson

São Paulo

2010

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Rodrigues, Roseny dos Reis

Avaliação da aeração e edema pulmonar por meio de tomografia
computadorizada em pacientes submetidos a revascularização do miocárdio /
Roseny do Reis Rodrigues. -- São Paulo, 2010.

Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Programa de Anestesiologia.

Orientador: Luiz Marcelo Sá Malbouisson.

Descritores: 1.Atelectasia pulmonar 2.Tomografia computadorizada helicoidal
3.Cirurgia cardíaca 4.Hipoxemia

USP/FM/DBD-237/10

DEDICATÓRIA

Ao meu esposo, Wilson, pela paciência e incentivo nesta jornada.

Aos meus pais, por compreenderem minhas ausências.

A Deus, por permitir a conclusão deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Ao meu amigo e orientador, Dr. Luiz Marcelo Sá Malbouisson, por ter apontado o caminho da ciência e a quem devo grande parte de minha formação científica.

Ao Prof. Dr. José Otávio Costa Auler Júnior, por me proporcionar inúmeras oportunidades ao longo da vida profissional.

A Prof^a. Dr^a. Maria José Carmona, por ser exemplo de médica, professora, mãe, conseguindo desempenhar todas as funções com sucesso, pelo estímulo à pesquisa clínica.

Aos colegas Dr^a. Kátia Beck Le Bihan, Dr. Luiz Guilherme, Dr^a. Luciana Moraes e Dr^a. Marilde Albuquerque, pela colaboração neste projeto.

À equipe da radiologia do Instituto do Coração, pela valiosa ajuda durante a fase de coleta de dados.

Aos colegas do Serviço de Anestesiologia e Terapia Intensiva Cirúrgica do InCor - HCFMUSP, pela ajuda nas diversas fases deste estudo e auxílio em todas as horas.

Aos pacientes e seus familiares, por entenderam o objetivo desta pesquisa e autorizarem sua realização.

SUMÁRIO

SUMÁRIO

Lista de Abreviaturas e Siglas

Lista de Tabelas

Lista de Figuras

Resumo

Summary

1.	INTRODUÇÃO	21
2.	OBJETIVOS	25
3.	REVISÃO DE LITERATURA	27
3.1.	Avaliação pulmonar com tomografia computadorizada.....	28
3.1.1	Contribuições da tomografia computadorizada na avaliação pulmonar de pacientes com insuficiência respiratória.....	30
3.1.2	Contribuição da TC para avaliação pulmonar em pacientes submetidos à anestesia geral.....	33
4.	MÉTODOS	36
4.1.	Pacientes.....	37
4.2.	Desenho de estudo.....	40
4.3.	Técnica anestésica, monitorização e cuidados pós-operatórios.....	42
4.4.	Protocolo de estudo por tomografia computadorizada.....	45
4.4.1	Aquisição das tomografias computadorizadas.....	45
4.4.2	Avaliação do volume pulmonar de gás, tecido e total.....	46
4.4.3	Análise da aeração pulmonar de acordo com a distribuição do coeficiente CT.....	49
4.5.	Análise estatística.....	50
4.5.1	Cálculo amostral.....	50

5.	RESULTADOS	51
5.1.	Dados hemodinâmicos e trocas gasosas durante o período de estudo.....	55
5.2.	Avaliação pulmonar pré e pós-operatória por meio de tomografia computadorizada.....	60
5.3.	Correlações entre as alterações observadas na morfologia pulmonar, trocas gasosas e duração da circulação extracorpórea.....	65
6.	DISCUSSÃO	67
7.	CONCLUSÕES	78
8.	REFERÊNCIAS	80

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACP	Analgesia controlada pelo paciente
ASA	American Society Anesthesia
Bpm	Batimento por minuto
CEC	Circulação extracorpórea
CRF	Capacidade residual funcional
CM ²	Centímetros quadrados
CO ₂	Gás carbônico
DPOC	Doença pulmonar obstrutiva crônica
ECG	Eletrocardiograma
Fc	Frequência cardíaca
FiO ₂	Fração inspirada de oxigênio
FEVE	Fração de ejeção do ventrículo esquerdo
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
G	Grama
lpm	Inspirações por minuto
H	Hora(s)
H ₂ O	Água
IMC	Índice de massa corpórea
IC	Índice Cardíaco
IS	Índice Sistólico
IRVS	Índice de Resistência vascular sistêmica
IRVP	Índice de resistência vascular pulmonar
Kv	Kilovolt
Kg	Kilograma
Mas	Miliamperes
Min.	Minuto
µg	Microgramas
MG	Miligramas
ML	Mililitros
MmHg	Milímetros de mercúrio
PAM	Pressão Arterial Média

PAPm	Pressão de Artéria Pulmonar Média
PaO ₂	Pressão parcial arterial de oxigênio
PaCO ₂	Pressão parcial arterial de gás carbônico
PvCO ₂	Pressão parcial venosa de gás carbônico
PEEP	Pressão positiva expiratória final
PVC	Pressão venosa central
POAP	Pressão de Oclusão de Artéria Pulmonar
RM	Revascularização miocárdica
SaO ₂	Saturação arterial de oxigênio
SvO ₂	Saturação venosa de oxigênio
SARA	Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto
TC	Tomografia Computadorizada
UH	Unidades Hounsfield
UI	Unidade Internacional
UTI	Unidade de terapia intensiva
USP	Universidade de São Paulo
TCLE	Termo de consentimento Livre e Esclarecido
VPH	Vasoconstrição pulmonar hipóxica
VNI	Ventilação não-invasiva

LISTA DE TABELAS

--	--

LISTA DE TABELAS

Tabela I	Dados demográficos e clínicos dos pacientes estudados.....	53
Tabela II	Dados relacionados ao tempo de CEC, duração da cirurgia, volume total de diurese e volume infundido no intraoperatório.....	54
Tabela III	Dados hemodinâmicos durante a cirurgia e nas primeiras 24 horas pós-operatórias.....	56
Tabela IV	Perfil metabólico durante a cirurgia e nas primeiras 48 horas pós-operatórias.....	57

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Fluxograma do número total de pacientes.....	39
Figura 2 -	Cronograma do estudo.....	40
Figura 3 -	Comportamento da relação PaO_2/FiO_2 durante o estudo.....	59
Figura 4 -	Imagens de TC na altura do ápice, hilo vascular pulmonar e 2 cm acima do diafragma obtidas no pré-operatório e o primeiro dia pós-operatório.....	60
Figura 5 -	Volume pulmonar total, de tecido e gás computados em reconstruções volumétricas a partir de tomografias computadorizadas de pulmão inteiro no pré-operatório e no pós-operatório.....	62
Figura 6 -	Figura demonstrando aumento significativo do peso total do parênquima pulmonar no período pós-operatório de 19% ($p < 0,001$).....	64
Figura 7 -	Correlação entre a variação percentual da fração de gás (redução percentual da CRF) e a variação percentual do parênquima pulmonar com aeração reduzida.....	66

RESUMO

Rodrigues RR. ***Avaliação da aeração e edema pulmonar por meio de tomografia computadorizada em pacientes submetidos a revascularização do miocárdio*** [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010.

Introdução: A disfunção respiratória é uma das complicações de maior prevalência no período pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) com circulação extracorpórea (CEC), mesmo na ausência de doença pulmonar prévia¹. Por meio de tomografia computadorizada, foram investigadas as alterações pulmonares pós-operatórias e o seu impacto na oxigenação. **Métodos:** vinte pacientes não hipoxêmicos em programação de cirurgia eletiva de revascularização do miocárdio com CEC foram estudados. Medidas hemodinâmicas, e amostras sanguíneas seriadas foram obtidas antes da cirurgia, após a intubação orotraqueal, após a CEC, na UTI, 12h, 24h e 48h após a cirurgia. Tomografias volumétricas pré e pós-operatórias foram adquiridas em condições de apneia após uma expiração espontânea. Os dados foram analisados usando teste de t Student; o comportamento temporal dos dados hemodinâmicos e outras variáveis fisiológicas foi analisado ao longo do tempo, usando análise de variância de uma via para repetidas medidas, seguido pelo teste de Student-Neumann-Keuls, quando necessário. **Resultados:** a relação PaO_2/FiO_2 diminuiu de forma significativa após a indução da anestesia, atingindo o seu nadir após a saída de CEC. Comparando-se com a TC pré-operatória, foi observada uma redução de 31% no volume de gás pulmonar ($p < 0,001$), ao passo que foi observado um aumento do volume de tecido de 19% ($p < 0,001$). A área não aerada dos pulmões aumentou de 253 ± 97 g ($p < 0.001$), de 3 % a 27 %, após a cirurgia; e a área pobremente aerada pulmonar apresentou aumento de 72 ± 68 g ($p < 0.001$), de 24 % to 27 %, enquanto a área normalmente aerada pulmonar reduziu de 147 ± 119 g ($p < 0.001$), que representa 72 % to 46%. Não foram observadas correlações entre a relação PO_2/FiO_2 ou na fração de *shunt* nas primeiras 24 horas pós-operatórias. **Conclusões:** A estrutura pulmonar está profundamente modificada após a cirurgia de RM com CEC. Associadas a outros fatores, essas alterações são responsáveis pela ocorrência de hipoxemia resultantes de atelectasias.

Descritores: atelectasia pulmonar, tomografia computadorizada helicoidal, cirurgia cardíaca, hipoxemia

SUMMARY

Rodrigues RR. *Evaluation of the aeration and edema pulmonary by means of computed tomography in patients undergoing coronary artery bypass graft* [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010.

Introduction: Hypoxemia is a frequent complication after coronary artery bypass graft (CABG) with cardiopulmonary bypass (CPB), usually attributed to atelectasis. Using computed tomography (CT), we investigated pulmonary alterations postoperatively and its impact on oxygenation. **Methods:** Twenty non-hypoxemic patients with normal cardiac function scheduled to CABG under CPB were studied. Hemodynamic measurements and blood samples were obtained before surgery, after intubation, after CPB, at ICU admission, 12h, 24h and 48h after surgery. Pre and postoperative volumetric thoracic CT scans were acquired in apnea conditions after a spontaneous expiration. Data was analyzed using paired Student t test and two-way repeated measures analysis of variance followed by SNK test when indicated. **Results:** $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ratio was significantly reduced after anesthesia induction, reaching its nadir after CPB and partially ameliorating 12h after surgery. Compared to preoperative CT, there was a postoperative 31 % reduction in pulmonary gas volume ($p < 0.001$) while tissue volume increased by 19 % ($p < 0.001$). Non-aerated lung increased by 253 ± 97 g ($p < 0.001$), from 3 % to 27 %, after surgery and poorly-aerated lung by 72 ± 68 g ($p < 0.001$), from 24 % to 27 % while normally-aerated lung was reduced by 147 ± 119 g ($p < 0.001$), from 72 % to 46 %. No correlations were observed between $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ratio or shunt fraction at 24 h postoperatively and postoperative lung alterations. **Conclusions:** Lung structure is profoundly modified after CABG with CPB. Taken together, these multiple alterations occurring in the lungs are responsible for postoperative hypoxemia instead of atelectasis alone.

Descriptors: pulmmonary atelectasis; tomography helicoidal; cardiac surgery; Hipoxemia

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A disfunção respiratória é uma das complicações de maior prevalência no período pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) com circulação extracorpórea (CEC), mesmo na ausência de doença pulmonar prévia¹. Esta entidade é conhecida por cirurgiões cardíacos, anesthesiologistas e intensivistas desde os primórdios da cirurgia cardíaca². A magnitude dos distúrbios respiratórios manifestados no pós-operatório varia de alterações funcionais subclínicas, que ocorrem em uma fração considerável dos pacientes, até a síndrome de angústia respiratória do adulto (SARA), que ocorre em 2% dos casos após CEC³. Em uma série de 461 pacientes consecutivos submetidos à RM no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi observado que 54,2% dos pacientes apresentaram a relação PO_2/FiO_2 menor que 200⁴.

Atelectasias, levando a aumento da fração de *shunt*, são consideradas o principal mecanismo causador de hipoxemia pós-operatória². O colapso pulmonar desenvolve-se logo após a indução da anestesia e pode persistir por até alguns dias no período de recuperação pós-operatória^{3,5,6,7}. Estima-se que 50 a 90% dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca apresentem atelectasias no período pós-operatório^{8,9,10}. Diferentes mecanismos têm sido propostos para explicar esta incidência: a) deslocamento cefálico do diafragma após o relaxamento muscular pela

pressão do conteúdo abdominal ¹¹; b) resposta inflamatória sistêmica induzida pela CEC, que leva a aumento da permeabilidade vascular com consequente edema intersticial pulmonar. Como consequência do edema intersticial, ocorre aumento do peso do parênquima pulmonar, promovendo compressão do parênquima subjacente ¹²; c) manipulação cirúrgica intratorácica e d) uso de frações inspiradas de oxigênio em concentrações elevadas na indução anestésica e no perioperatório ¹³.

Do ponto de vista fisiopatológico, as consequências imediatas da perda de aeração pulmonar e do edema pulmonar são aumento da mistura venosa de sangue oxigenado na artéria pulmonar, com consequente hipoxemia ^{14,15}. Isto contribui para o aumento do tempo em ventilação mecânica e maior necessidade de cuidados fisioterápicos no pós-operatório ¹⁶. Na circulação pulmonar, devido à vasoconstrição pulmonar hipóxica, pode ocorrer elevação das pressões da artéria pulmonar ¹⁷ e disfunção cardíaca direita em alguns pacientes ¹⁸. Além disso, considera-se que o parênquima pulmonar colapsado pode possibilitar a formação de sítios propícios para o desenvolvimento de infecções.

Analisando imagens justadiafragmáticas de tomografia computadorizada (TC) torácica, alguns investigadores observaram que o colapso pulmonar pós-operatório pode comprometer até 20% da área dos pulmões ^{10,19}. Estas atelectasias distribuem-se principalmente nas regiões pulmonares dependentes ²⁰. Contudo, até o presente momento, nenhum estudo quantificou o volume total e a massa das atelectasias pulmonares pós-operatórias que ocorrem em todo o pulmão. Conforme a técnica descrita

por Puybasset et al ²¹, é possível, utilizando tomografia computadorizada helicoidal, quantificar os volumes pulmonares de gás e tecido (parênquima, sangue e água extravascular pulmonar) e computar a quantidade de parênquima pulmonar hiperinsuflado, definidos como compartimentos pulmonares com densidade radiológica < -900 unidades Hounsfield (UH), normalmente aerado (-900 a -500UH), pouco aerado (-500 a -100HU) e atelectasiado (> -100 UH) (18-20). Por meio desta técnica, é possível quantificar os efeitos combinados da anestesia, manipulação cirúrgica e circulação extracorpórea sobre a perda de aeração na distribuição de gás e tecido em todo o pulmão.

Além da avaliação da quantidade de gás, a análise de tomografias computadorizadas volumétricas permite a quantificação do componente de tecido pulmonar, que engloba o parênquima pulmonar propriamente dito, os fluidos fisiológicos intrapulmonares (sangue e linfa) e a água extravascular pulmonar. Comparando tomografias pré e pós-operatórias, é também possível quantificar a variação do volume e peso do tecido pulmonar, que, em última instância, reflete o aparecimento de edema pulmonar.

Este estudo foi desenhado para avaliar as alterações na morfologia do parênquima pulmonar após cirurgia de revascularização do miocárdio com CEC, e não apenas em uma região próxima ao diafragma ou em regiões supostamente representativas de todo o pulmão, por meio de análise de tomografias computadorizadas volumétricas de tórax realizados em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca.

OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi:

- 1) Avaliar as alterações na morfologia do parênquima pulmonar que ocorrem após cirurgia de revascularização do miocárdio com CEC.

Os objetivos secundários foram:

- 2) Quantificar o edema pulmonar pós-operatório (água extravascular pulmonar);
- 3) Correlacionar as alterações na morfologia pulmonar com alterações nas trocas gasosas.

REVISÃO DE LITERATURA

3. REVISÃO DE LITERATURA

Tem-se demonstrado, de forma consistente, que pacientes submetidos a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea apresentam frequentemente disfunção pulmonar de graus variáveis, cujas causas não são completamente esclarecidas^{22,23}. Dentre as manifestações clínicas da disfunção pulmonar pós-operatória, a hipoxemia é um evento bastante comum, mesmo em pacientes com função cardiopulmonar prévia normal no contexto do perioperatório^{24,25} e a formação de atelectasias tem sido apontada como principal causa. Os métodos de imagem à beira do leito são poucos sensíveis e específicos para avaliação das alterações morfológicas pulmonares pós-operatórias, em comparação com a avaliação pulmonar por tomografia computadorizada.

Esta revisão de literatura discorrerá sobre o uso da tomografia computadorizada como método de avaliação pulmonar.

3.1. Avaliação pulmonar com tomografia computadorizada

Desde o início dos anos 80, a tomografia computadorizada (TC) de tórax tem sido utilizada para avaliar o comprometimento do parênquima pulmonar. A introdução da TC de tórax representou um grande salto qualitativo em relação à radiografia convencional de tórax na análise dos pulmões de pacientes com insuficiência respiratória aguda, como decorrência de dois atributos fundamentais: 1) resolução do problema da

superposição de estruturas inerente à radiografia de tórax e 2) aumento da definição das estruturas anatômicas, isto é, 0,5% de alteração na atenuação aos raios X podem ser detectados pela TC, enquanto para a radiografia convencional de tórax é necessária uma alteração de 10% na atenuação aos raios X.

Em 1982, Breiman e colaboradores descreveram uma técnica que possibilitava a determinação de maneira não-invasiva e acurada do volume de estruturas corporais *in vivo*, a partir de imagens contíguas obtidas através de tomografia computadorizada²⁶. Nesse estudo, imagens tomográficas de 1cm e 2cm de espessura foram obtidas de fantasmas para calibração, de rins caninos e baços humanos antes da esplenectomia. O volume total de determinada estrutura foi obtido somando-se os volumes parciais das áreas de interesse delineados nas imagens tomográficas contíguas de onde a estrutura aparecia. O cálculo do volume das diversas estruturas através da tomografia computadorizada foi comparado à mensuração do volume determinado pelo deslocamento da água. A percentagem média de erro do cálculo de volume através da TC foi de 4,95% para os fantasmas de calibração, 3,86% para os rins caninos e 3,59% para baços humanos com cortes tomográficos contíguas com 1 cm de espessura e 3,65% com 2cm de espessura. A partir destes resultados iniciais, a TC começou a ser utilizada para análise volumétrica de estruturas corporais *in vivo*. As dificuldades no reconhecimento visual e no contorno das áreas de interesse pareciam ser para os autores fontes de erro mais significantes que os fatores relacionados às estruturas estudadas.

Com a introdução dos equipamentos de tomografia computadorizada helicoidal de segunda geração na prática clínica, com velocidades de aquisição de imagem muito superiores à geração anterior, tornou-se possível estudar as alterações morfológicas e estruturais pós-cirúrgicas em todo o pulmão ²⁷. Utilizando este método de avaliação quantitativa do parênquima pulmonar inteiro através de TC helicoidal, Puybasset e colaboradores, em 1998, descreveram uma perda do volume pulmonar total em pacientes com SARA em torno de 27% quando comparado a voluntários sadios ²¹.

De acordo com Tagliabue e colaboradores, que compararam o impacto do uso de TC de tórax com a radiografia de tórax convencional no curso da avaliação diagnóstica de pacientes com insuficiência respiratória aguda, foi observado que a tomografia computadorizada forneceu informações complementares em 22% dos casos, influenciando diretamente o curso do tratamento²⁷.

Por estes motivos citados acima, a visualização dos cortes pulmonares em toda a extensão dos pulmões é de fundamental importância para a melhor compreensão dos mecanismos de colapso e hipoxemia em pacientes com disfunção pulmonar de qualquer origem²⁸.

3.1.1. Contribuições da tomografia computadorizada na avaliação pulmonar de pacientes com insuficiência respiratória

A tomografia computadorizada, por sua superior definição de imagem, capacidade de diferenciação de estruturas intratorácicas e

possibilidade de análise de dados quantitativos gerados pelos algoritmos de análise computadorizada, tem sido amplamente utilizada como ferramenta para o entendimento das alterações pulmonares em diversas situações clínicas e, em particular, na insuficiência respiratória.

Em 1988, Gattinoni e colaboradores²⁹ estudaram 20 pacientes com insuficiência respiratória aguda submetidos à CT de tórax em ventilação mecânica com PEEP de 5, 10 e 15 cmH₂O, com o objetivo de investigar as relações entre a morfologia e a função pulmonar. Estes autores observaram que as densidades pulmonares concentravam-se basicamente nas regiões dependentes do pulmão. Ainda segundo eles, o peso do tecido pulmonar estava aumentado em duas vezes e o edema pulmonar de alta permeabilidade, descrito como excesso de peso do tecido pulmonar, estava correlacionado à pressão média da artéria pulmonar. O *shunt* pulmonar estava correlacionado ao volume de parênquima pulmonar não inflado. O aumento dos níveis de PEEP causou desaparecimento progressivo das densidades radiológicas e aumentou a massa de tecido pulmonar normalmente inflado, enquanto o *shunt* pulmonar foi reduzido. Os autores concluíram neste estudo que as densidades pulmonares e as eficiências da troca de oxigênio estavam correlacionadas e o efeito principal do aumento da PEEP era o de recrutar as unidades alveolares perfundidas que estavam previamente colapsadas.

Em 1991, Gattinoni e colaboradores descreveram a influência do posicionamento corporal na distribuição das densidades pulmonares em pacientes com insuficiência respiratória aguda³⁰. Dez pacientes foram

submetidos à TC de tórax em posição supina e prona e cada corte tomográfico foi dividido em 10 níveis da região dorsal para a região ventral, constituindo cada nível 10% da altura do pulmão. Foi observado que, em posição supina, o excesso de peso do tecido pulmonar distribuíu-se independentemente da gravidade e de maneira homogênea no parênquima pulmonar. Contudo, o coeficiente CT médio de cada nível aumentava em direção à região dependente do pulmão, sugerindo deflação dos alvéolos ao longo de um eixo vertical. Achados similares foram observados na posição prona, concluindo-se que o pulmão de pacientes com insuficiência respiratória aguda comporta-se como uma estrutura elástica com a massa difusamente aumentada e as regiões dependentes comprimidas pelas estruturas sobrejacentes³⁰.

Estes estudos possibilitaram o entendimento do comportamento da distribuição da aeração e colapso pulmonar, que foi posteriormente traduzido no conceito “pulmão de bebê”, proposto por Gattinoni na população de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Segundo este autor, apenas uma pequena parte do pulmão estaria disponível para a ventilação corrente, enquanto outra parte do parênquima pulmonar estaria indisponível à ventilação devido a colapso, edema alveolar e consolidações pneumônicas³¹. Baseado no princípio estabelecido por Gattinoni e colaboradores, Amato e colaboradores propuseram uma estratégia ventilatória com volumes correntes reduzidos para pacientes com insuficiência respiratória aguda, o que, em última instância, promoveu redução da mortalidade^(32,33).

Mais recentemente, Terragni e colaboradores realizaram um estudo no qual observaram por meio de análise de tomografias computadorizadas em pausa inspiratória ao final da inspiração com volume corrente de 06 mL.kg^{-1} do peso ideal e pressão de platô para $30 \text{ cmH}_2\text{O}$, que havia hiperinsuflação do ápice pulmonar em 33% dos pacientes estudados, sugerindo que mesmo a estratégia protetora ainda pode não ser adequada em pacientes com comprometimento pulmonar extenso ⁽³⁴⁾.

3.1.2. Contribuição da TC para avaliação pulmonar em pacientes submetidos à anestesia geral

Alguns estudos relatam que o aparecimento de atelectasias pode ocorrer já nos primeiros cinco minutos após anestesia geral ^{35,36,37}. A reabsorção de gás causada por uso de elevadas frações inspiradas de oxigênio, o uso de medicamentos que promovem relaxamento da musculatura, o deslocamento em direção cefálica do diafragma sob o peso das estruturas abdominais têm sido apontados como mecanismos responsáveis pelo colapso pulmonar observado nos períodos intra e pós-operatórios.

Os primeiros estudos, descrevendo de maneira quantitativa, foram realizados por Hedenstierna e colaboradores, que mostraram a dinâmica da formação das atelectasias durante o período intraoperatório, assim como o impacto do uso de frações elevadas de oxigênio³⁸, do tempo cirúrgico³⁹ e do uso de manobras de hiperinsuflação pulmonar sobre o colapso alveolar⁴⁰. A eficiência da tomografia computadorizada torácica na avaliação de

atelectasias permite detectar colapso pulmonar, mesmo que este não seja clinicamente significativo. Em um estudo realizado por Lundh e colaboradores, avaliando oxigenação sanguínea e tomografias de tórax no pós-operatório imediato em 20 pacientes submetidos a cirurgias abdominais de pequeno porte, os autores descreveram o aparecimento de áreas de atelectasias, sobretudo nas regiões posteriores e nas basais dos pulmões, apesar de não ter havido alterações na oxigenação⁴¹. A crítica a esse estudo, no entanto, deve-se ao fato de que todos os pacientes eram classificados de risco anestésico-cirúrgico baixo, de acordo com os critérios propostos pela Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA - American Society Anesthesiology), além de que as cirurgias foram de pequeno porte e com o tempo cirúrgico curto.

A tomografia computadorizada de tórax permite ainda avaliar o efeito de estratégias ventilatórias, como o uso de pressão positiva ao final da inspiração e manobras de hiperinsuflação pulmonar sobre a morfologia pulmonar em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Em um estudo avaliando a relação entre atelectasias e oxigenação arterial, observou-se que, embora houvesse melhora das densidades pulmonares na tomografia computadorizada de tórax, 10cm H₂O de PEEP não exerciam impactos adicionais sobre a oxigenação. Esse estudo evidenciou que o PEEP altera a relação de *shunt* pulmonar e atelectasias por distribuição do fluxo sanguíneo em direção a regiões atelectasiadas e *shunt* dependentes²⁰. Rothen e colaboradores observaram, por meio de imagens de tomografia computadorizada da base pulmonar obtida a cada 1 segundo, que ocorria a

reversão quase completa do colapso pulmonar em torno de 7 segundos, quando era aplicada uma pressão de 40 cm H₂O nas vias aéreas de pacientes submetidos à anestesia geral ¹³.

As atelectasias são seis vezes mais frequentes após cirurgia cardíaca do que após cirurgias abdominais ²⁰. A parada da circulação e ventilação pulmonar durante a circulação extracorpórea também pode contribuir para a formação de atelectasias e, sobretudo, para o aparecimento de reação inflamatória do parênquima pulmonar^{33, 35, 36,37}.

MÉTODOS

4. MÉTODOS

4.1. Pacientes

Após a aprovação do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pacientes com indicação de cirurgia para revascularização do miocárdio com CEC foram selecionados para participar do estudo. O projeto de pesquisa foi financiado a partir de recursos oriundos da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), processo número 2005/0174-7.

O termo de consentimento pós-informado, livre e esclarecido (TCLE) foi obtido no dia anterior à cirurgia, após a apresentação e prestação de esclarecimentos sobre o estudo.

Os critérios de inclusão foram: 1) indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea; 2) ausência de insuficiência cardíaca esquerda, definida como fração de ejeção do ventrículo esquerdo $< 50\%$ estimada por ecocardiografia ou ventriculografia. Os critérios de exclusão foram: 1) presença de doença pulmonar obstrutiva crônica; 2) insuficiência respiratória pré-operatória, caracterizada como necessidade de oxigênio suplementar pré-operatório; 3) congestão pulmonar pré-operatória; 4) índice de massa corpórea (IMC) maior que 30 kg/cm^2 ; 5) necessidade de transfusão de mais que 03 unidades de qualquer hemocomponente; 6) insuficiência respiratória pós-operatória; e 7) instabilidade hemodinâmica, definida como necessidade de dobutamina em

dose superior a $5 \mu\text{g.kg}^{-1}.\text{min}$, uso de fármaco vasopressor em qualquer dose ou necessidade de assistência ventricular mecânica pré ou pós-operatória necessidade de sedação no pós-operatório por quaisquer motivos.

Um total de 40 pacientes foi selecionado e incluído no estudo desde o início do piloto do projeto, cuja coleta iniciou-se em novembro de 2005 (figura 01- painel superior).

Destes, 20 pacientes foram excluídos desde o início da coleta, em respeito aos critérios de inclusão ou exclusão. Os motivos que causaram a exclusão de 20 pacientes do projeto foram: dez pacientes permaneceram em ventilação mecânica por julgamento clínico, devido à necessidade de adequação hemodinâmica no primeiro dia pós-operatório, o que inviabilizou a realização da tomografia pós-operatória. Três pacientes cursaram com infarto agudo do miocárdio transoperatório e outros três pacientes evoluíram com instabilidade hemodinâmica já no intraoperatório, com necessidade de fármacos vasopressores em altas doses. Dois pacientes receberam mais de 03 unidades de hemocomponentes durante o intraoperatório. Um paciente recusou-se a realizar a tomografia pós-operatória e um paciente necessitou de ventilação não-invasiva com pressão positiva logo após a extubação (figura 01- painel inferior).

Figura 1 – Total de pacientes selecionados **Pacientes excluídos do estudo**

- Obs: Após a execução do estudo, 02 (dois) pacientes do grupo de incluídos, saíram do protocolo, por falha na reconstrução perfeita das imagens tomográficas (artefatos). Desta forma, o total da amostra final foi reduzido para 18 pacientes.

4.2. Desenho de estudo

Como pode ser observado na figura 02 (cronograma), segue o delineamento experimental nos diversos momentos do estudo:

Figura 02

1. ADMISSÃO – DIA ANTERIOR À CIRURGIA

2. DIA DA CIRURGIA

3. UTI

No dia anterior à cirurgia, após a explicação do estudo aos pacientes e obtenção do TCLE, os selecionados foram transportados por meio de cadeira de rodas para o setor de Radiologia do Instituto do Coração, para realização de TC helicoidal pré-operatória. As TC foram obtidas em ventilação espontânea, na condição de pausa expiratória, após uma expiração normal. Para alcançar esta exata condição respiratória, cada paciente foi treinado a realizar apneia após uma expiração normal durante 15 segundos necessários para obtenção das imagens da TC. Esse exercício foi repetido pelo menos 10 vezes após a assinatura do termo de consentimento. O mesmo exercício foi realizado mais duas vezes na sala de radiologia, antes da realização da TC. O objetivo desta manobra era obter as imagens de TC em condição respiratória próxima à capacidade residual funcional (CRF).

No primeiro dia pós-operatório, uma segunda tomografia computadorizada em torno de 24 horas após a admissão à UTI foi realizada,

com os pacientes hemodinamicamente estáveis, extubados e sem necessidade de ventilação não-invasiva (VNI), de forma que todos os critérios de exclusão foram respeitados.

Os parâmetros hemodinâmicos durante o estudo foram obtidos de maneira padronizada, conforme descrito na literatura médica, usando cateter de artéria pulmonar e monitor hemodinâmico que permitiam a mensuração contínua do débito cardíaco. Estas medidas foram realizadas após a indução anestésica, após a saída de CEC e na UTI pós-operatória nos seguintes momentos: admissão, 12h, 24h de chegada à UTI. No momento 24 horas após a admissão à UTI, foi calculado o *shunt* intrapulmonar de maneira padrão.

Em cada paciente, uma gasometria arterial pré-operatória foi obtida no momento da admissão à sala de operações. Gasometrias arteriais e venosas foram colhidas após a intubação, após a saída de CEC e na UTI pós-operatória nos seguintes momentos: admissão, 12h, 24h e 48h. As TC torácicas pós-operatórias foram obtidas no máximo até 24 horas após a cirurgia. Em cada momento, a fração inspirada de oxigênio foi registrada conforme ajuste do ventilador ou computada como 4% por litro de oxigênio acima de 21% (ar ambiente) nos pacientes em uso de cateter de oxigênio ⁴².

4.3. Técnica anestésica, monitorização e cuidados pós-operatórios

No dia da cirurgia, cada paciente recebeu medicação pré-anestésica 0,2 mg.kg⁻¹ de midazolam por via oral até o máximo de 15 mg 30 minutos antes da admissão na sala de cirurgia. A monitorização

hemodinâmica consistiu de eletrocardiograma contínuo (ECG) de 05 cabos (derivações DII e V5), capnografia, oximetria de pulso, temperatura esofágica e pressão arterial invasiva. A anestesia foi induzida com fentanil $10 \mu\text{g.kg}^{-1}$, etomidato $0,3 \text{ mg.kg}^{-1}$ e pancurônio $0,1$ a $0,2 \text{ mg.kg}^{-1}$ e mantida com isoflurano inalatório a 1%. Doses suplementares de midazolan ($0,3 \text{ mg.Kg}^{-1}$) e pancurônio ($0,08 \text{ mg.Kg}^{-1}$) foram administradas imediatamente após o início da CEC, com a finalidade de manter a hipnose intraoperatória e evitar movimentos involuntários, respectivamente. Após a indução anestésica, um cateter de artéria pulmonar (CCO/SvO₂, VIPTMTD cateter - Edwards lifesciences, Irvine, CA, USA) foi inserido pela veia jugular interna direita. Para todos os pacientes, o volume corrente foi ajustado em 08 mL.kg^{-1} de acordo com o peso ideal⁴³, e a frequência respiratória foi ajustada para manter a PaCO₂ entre 30 e 35mmHg. A relação inspiração/expiração foi de 1:2 do tempo total do ciclo respiratório e uma fração inspirada de oxigênio de 0,60 foi mantida durante todo o procedimento. Pressão positiva expiratória final (PEEP) de 05 cm/H₂O foi aplicada após intubação orotraqueal e mantida durante todo o procedimento.

Após a abertura do tórax e dissecação das estruturas vasculares, foi administrado heparina 500 UI.kg^{-1} e inseridas cânulas cirúrgicas na aorta e nas veias cavas superior e inferior. A circulação extracorpórea foi realizada usando circuito de circulação extracorpórea e oxigenador de membrana (Braile, São José do Rio Preto, Brasil), preenchido com 1500 mL de solução de Ringer Lactato, manitol 1 g.kg^{-1} e heparina 10000 UI. Como rotina, a ventilação pulmonar foi interrompida imediatamente após o início da CEC,

para facilitar a exposição cirúrgica das estruturas intratorácicas. Após o final da revascularização do miocárdio e imediatamente antes de reiniciar a ventilação mecânica, uma manobra de expansão pulmonar com 30 cmH₂O de pressão durante 20 segundos foi aplicada para reverter o colapso pulmonar relacionado à manipulação intratorácica, à desconexão ao circuito respiratório e à pausa ventilatória. Fármacos vasoativos e inotrópicos foram infundidos, quando necessário, ao final da CEC.

A hidratação no intraoperatório fora uniformizada de forma a repor o jejum (02 ml.Kg.h⁻¹), as perdas insensíveis (08ml.Kg.h⁻¹)⁴⁴, diurese e perdas eventuais do intraoperatório, baseada em avaliação de aspiradores e peso de compressas. As pressões de enchimento do cateter de artéria pulmonar e lactato séricos também foram avaliadas de forma que foram objetivados os valores referência de normalidade⁴⁵.

Após a cirurgia, os pacientes foram transportados para a UTI de pós-operatório. Após a reconexão ao ventilador mecânico na UTI, uma segunda manobra de expansão pulmonar com 30 cmH₂O de pressão durante 20 segundos foi realizada e mantido PEEP de 5 cmH₂O. Os pacientes permaneceram sem sedação, e, tão logo conscientes, foram extubados, desde que apresentassem os seguintes critérios: 1) estabilidade hemodinâmica (definida como pressão arterial média maior ou igual a 70 mmHg, saturação venosa central maior que 70%, frequência cardíaca menor que 120 bpm, sem sinais de isquemia miocárdica); 2) adequada função pulmonar (PaO₂ > 80mmHg e PaCO₂ <45 mmHg e FiO₂ < 0,4, frequência respiratória espontânea menor que 30 ipm.min⁻¹, volume corrente maior que

05 ml.kg⁻¹); 3) força muscular preservada (ventilação espontânea, habilidade de sustentar a cabeça elevada por mais de 5 segundos); 4) consciência (capacidade de obedecer comandos verbais simples) e 5) ausência de complicações cirúrgicas.

Após a extubação, os pacientes receberam oxigênio sob cateter nasal, de maneira que a oximetria de pulso fosse superior a 92%. Não foi aplicado suporte ventilatório não-invasivo após a extubação

Analgesia pós-operatória foi instituída tão logo os pacientes referiam dor ou imediatamente após a extubação. Os fármacos usados para a analgesia foram tramadol 400mg.dia⁻¹ e dipirona sódica 08 gramas.dia⁻¹. Resgates com 02 mg de morfina foram usados nos casos de dor refratária a terapia adotada. Apenas 04 pacientes necessitaram de doses suplementares de morfina, num total estimado em 3,8mg/dia. Nenhum paciente necessitou de instalação de bomba de ACP (Analgesia Controlada pelo Paciente). No momento da realização das tomografias pós-operatórias, nenhum paciente referia dor na inspiração profunda.

4.4. Protocolo de estudo por tomografia computadorizada

4.4.1. Aquisição das tomografias computadorizadas.

Cada paciente foi transportado ao departamento de radiologia por um médico participante do estudo. No primeiro dia pós-operatório, os pacientes foram monitorizados durante o transporte e na sala de tomografia computadorizada usando ECG, oximetria de pulso e pressão arterial invasiva

com o monitor de transporte Philips M3 (Philips, Eindhoven, The Netherlands).

As aquisições das tomografias volumétricas helicoidais do tórax foram realizadas por um tomógrafo Toshiba de 16 canais. As exposições foram feitas a 120 kV e 250 mAs. O tempo de rotação foi 1 segundo, colimação 10 mm. As imagens contínuas axiais foram reconstruídas usando o algoritmo de reconstrução do equipamento de tomografia computadorizada, com espessura de 10 mm, a partir dos dados volumétricos. As imagens foram registradas em uma janela para parênquima pulmonar (largura da janela = 1400 UH e centro da janela = -400 UH).

As imagens reconstruídas foram gravadas no sistema de armazenamento de imagem do hospital e recuperadas em um computador pessoal compatível com a plataforma IBM-PC, para posterior análise. A análise das imagens reconstruídas foi realizada em um computador, usando um programa concebido para medidas quantitativas a partir de imagens de tomografia computadorizada (Osiris 4.19, Hospital Universitário de Geneva, Geneva, Suíça).

4.4.2. Avaliação do volume pulmonar de gás, tecido e total.

O volume pulmonar total foi computado como o número total de vóxeis (unidade elementar volumétrica da tomografia computadorizada), cujas dimensões são conhecidas. Os volumes de gás e tecido foram medidos conforme o método descrito por Puybasset et al ^{46,47,48}, baseado na correlação linear entre o coeficiente de atenuação de um determinado material aos raios X (coeficiente CT) e a densidade física ⁴⁹. O coeficiente

CT caracterizando cada vóxel é definido como o coeficiente de atenuação dos raios X pelo material estudado menos o coeficiente de atenuação dos raios X pela água, dividido pelo coeficiente de atenuação dos raios X pela água, expresso em unidades Hounsfield (UH). Por convenção, o coeficiente CT da água é 0 UH e o coeficiente CT de gás é -1000 UH. Um vóxel pulmonar caracterizado por uma densidade radiológica de -500 UH é constituído de 50% de gás e 50% de tecido. Um vóxel caracterizado por uma densidade radiológica de -200 UH é constituído de 20% de gás e 80% de tecido. Usando esta análise, é possível computar o volume de gás e tecido presente no pulmão.

Inicialmente, os vóxels com densidade radiológica entre -1200 UH e +200 UH foram distribuídos em 1200 compartimentos com intervalo de 1 UH. Para cada compartimento com um número de vóxels conhecido, o volume total, o volume de gás e o volume de tecido foram computados usando as fórmulas seguintes:

(1) Volume do vóxel = (área do píxel) x espessura da seção, sendo que a área do píxel é fornecida para cada estudo tomográfico;

(2) Volume total do compartimento = número de vóxels x volume do vóxel para cada faixa de coeficiente CT;

(3) Volume de gás = (- coeficiente CT / 1000) x volume total do compartimento, se o compartimento considerado tem densidade radiológica entre -1000 UH e 0 UH, (3') volume de gás = 0, se o compartimento considerado tem coeficiente CT maior 0 UH e (3'') volume de gás = volume total do compartimento, se o tem coeficiente CT menor que -1000 UH;

(4) Volume de tecido = $(1000 + \text{coeficiente CT} / 1000) \times \text{volume total do compartimento}$, se o compartimento considerado tem densidade radiológica entre -1000 UH e 0 UH, (4') volume de tecido = número de vóxeis $\times$ volume do vóxel, se o compartimento considerado tem coeficiente CT maior 0 UH e (4'') volume de tecido = 0, se o compartimento considerado tem coeficiente CT menor que -1000 UH;

(5) Peso do parênquima pulmonar = volume de tecido, se o compartimento considerado tem coeficiente CT menor que 0 UH e (5') peso do parênquima pulmonar = $(1000 + \text{coeficiente CT} / 1000) \times \text{volume total do compartimento}$, se o compartimento considerado tem coeficiente CT maior que 0 UH.

Num segundo tempo, o volume total de gás, de tecido e o peso do parênquima pulmonar de uma determinada região de interesse foram computados somando os volumes e o peso respectivos dos compartimentos analisados nesta região. A capacidade residual funcional, o volume de tecido pulmonar total e o volume pulmonar total foram computados, somando os volumes parciais de gás, tecido e o volume total de todos os compartimentos contidos no pulmão.

O volume de tecido mensurado a partir de tomografia computadorizada representa a soma dos volumes do parênquima pulmonar, sangue e seus elementos figurados e água extravascular pulmonar.

4.4.3. Análise da aeração pulmonar de acordo com a distribuição dos coeficientes CT.

Paralelamente à determinação dos volumes de gás e tecido do pulmão, a tomografia computadorizada permite estudar o parênquima pulmonar em função do seu grau de aeração. Este tipo de análise permite classificar o parênquima pulmonar de acordo com seu coeficiente.

1) Região com parênquima pulmonar hiperinsuflado: coeficientes CT compreendidos entre -1000 UH e -900 UH.

2) Região com parênquima pulmonar normalmente aerado: coeficientes CT compreendidos entre -900 UH e -500 UH.

3) Região com parênquima pulmonar mal aerado: coeficientes CT compreendidos entre -500 UH e -100 UH.

4) Região com parênquima pulmonar não aerado (atelectasiado): coeficientes CT compreendidos entre -100 UH e +100 UH.

Estes limites indicam que a “região hiperinsuflada” contém mais de 90% de gás; a “região normalmente aerada” entre 50% e 90% de gás; a “região mal aerada” entre 50% e 10% e a “região não aerada” menos de 10% de gás. Contudo, para evitar erros de análise das regiões pulmonares quanto ao grau de aeração, foi considerado o peso do parênquima pulmonar, ao invés do volume total da região.

4.5. Análise estatística

4.5.1. Cálculo amostral

Uma amostra de pelo menos 17 pacientes era necessária para encontrar o aumento de volume de colapso pulmonar pós-operatório de 15%, comparado com as TC pré-operatórias, considerando um desvio padrão de 10% pelo teste pareado de T Student, com um valor p menor que 0,05 e um poder de estudo de 0,9. O tamanho da amostra foi calculado usando o programa G*Power versão 3 (Heinrich-Heine-universitat Dusseldorf, Dusseldorf, Germany).

As análises estatísticas foram realizadas usando SPSS 15.0 (SSPS Inc., Chicago, IL,EUA) e SIGMASTAT (Systat Software Inc, San Jose, CA, EUA). A distribuição normal dos dados passou pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. O comportamento temporal dos dados hemodinâmicos e outras variáveis fisiológicas foram analisados ao longo do tempo, usando análise de variância de uma via para repetidas medidas, seguidos pelo teste de Student-Neumann-Keuls, quando necessário. Dados volumétricos e de peso pulmonar foram obtidos a partir das análises tomográficas, sendo comparados por meio de teste T de Student pareado. As correlações entre os dados obtidos a partir da análise de tomografias computadorizadas e dados fisiológicos foram realizadas por meio de análise de regressão linear ou teste de correlação ordinal de Spearman. Todos os dados estão apresentados como média $\pm$ SD, valores medianos (min-máx) ou conforme descrito quando apresentado de outro modo. O nível de significância foi fixado em 5%.

RESULTADOS

5. RESULTADOS

Dos 20 pacientes selecionados para o estudo, que assinaram o termo de consentimento e completaram a coleta de dados, 02 pacientes foram excluídos, porque a tomografia computadorizada de tórax pós-operatória apresentava muitos artefatos de movimento que impediram a adequada análise das imagens da TC pós-operatório (esses pacientes não conseguiram manter apneia).

As características demográficas dos 18 pacientes estudados estão apresentadas na Tabela I. A média de idade foi 63 ± 9 anos, com um peso de 77 ± 12 kg. A média de duração da cirurgia foi 420 ± 47 minutos e a média de duração da CEC foi 90 ± 20 minutos Tabela II. Os pacientes receberam 4227 ± 1039 ml de solução cristaloide, 909 ± 202 ml de solução de hidroxietilamido a 6% durante o período intraoperatório e o volume de diurese intraoperatório foi 1016 ± 562 ml. Do total de líquido infundido durante a cirurgia, 2433 ± 1806 ml foram administrados durante a CEC. O volume de sangramento estimado foi 345 ± 248 ml, e nove pacientes receberam uma unidade de concentrado de hemácias. A dobutamina foi infundida em 15 pacientes, para facilitar o desmame da CEC, sendo empregada em dose média $8 \pm 3 \mu\text{g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}$. Todos os pacientes evoluíram com estabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato, permitindo a suspensão dos fármacos vasoativos nas primeiras 24 horas. O tempo médio

para extubação foi 435 ± 182 minutos. Infusão de fluidos no pós-operatório foi 1550 ± 257 ml.

Tabela I - Dados demográficos e clínicos dos pacientes estudados

Paciente	Idade (anos)	Peso (kg)	Altura (cm)	FEVE (%)	Hb (g.dL ⁻¹)	Cr (g.dL ⁻¹)	Reoperação	DPOC	Hipertensão	DM
DRB	48	66	162	62	14.7	0.9	N	N	N	N
MMF	51	78	175	55	13.7	0.8	N	N	S	S
LFG	62	112	185	50	12.9	1.3	N	N	S	S
JA	77	70	170	73	14	1.1	N	N	S	N
RFFS	65	90	171	70	13.7	0.9	N	N	S	S
OP	58	72	170	57	14.5	1	N	N	S	S
ACPF	62	81	170	50	14.6	0.8	N	N	S	S
ORC	74	74	154	55	13	1.1	S	N	S	N
AO	74	89	180	50	13.4	1.2	N	N	S	S
MNM	62	75	165	78	13.5	0.9	N	N	N	S
DPC	72	62	164	50	15.8	0.9	N	N	S	N
MC	62	83	165	55	11.2	1.3	S	N	S	N
AJF	71	72	172	60	14.9	1	N	N	S	N
JBM	52	74	172	69	16.2	1.1	N	N	S	N
JC	67	63	158	58	13.6	1	N	N	S	N
IS	56	63	153	57	12.8	1.3	N	N	N	N
AC	73	70	167	70	15.9	1.2	N	N	S	S
GAT	50	84	160	61	13.5	1.3	N	N	S	N

Legenda: FEVE – fração de ejeção do ventrículo esquerdo; Hb – hemoglobina; Cr – creatinina; DPOC – doença pulmonar obstrutiva crônica; DM – diabetes melitus; N – não e S – sim.

Tabela II - Dados relacionados ao tempo de CEC, duração da cirurgia, volume total de diurese e volume infundido no intraoperatório

	Duração da CEC (minutos)	Tempo de cirurgia (minutos)	Diurese intraoperatória (ml)	Volume (ml) infundido intraoperatório (cristaloides)	Volume (ml) infundido intraoperatório (coloides)
DRB	110	450	1500	3000	1000
MMF	96	390	800	4500	0
LFG	100	360	500	3000	1000
JÁ	125	370	500	4500	1000
RFFS	100	330	1500	2000	1000
OP	142	350	1500	4500	1000
ACPF	82	315	1400	4000	0
ORC	80	350	2000	4700	1000
AO	75	330	1000	3000	0
MNM	45	375	1400	5600	1000
DPC	110	360	450	6000	0
MC	90	415	2000	5500	0
AJF	50	325	300	4000	1000
JBM	95	318	800	4500	0
JC	93	420	1000	4000	0
IS	78	360	1200	4500	0
AC	100	330	400	4600	0
GAT	98	370	450	5000	0

Nenhum dos 18 pacientes evoluiu com falha de extubação ou necessidade de ventilação não-invasiva no pós-operatório. Todos os pacientes receberam alta da UTI sem complicações, com tempo de permanência que variou de 38 a 48 horas.

5.1. Dados hemodinâmicos e trocas gasosas durante o período de estudo

A Tabela III mostra o comportamento temporal dos dados hemodinâmicos, desde a indução da anestesia até 24 horas após a admissão a UTI, e a Tabela IV os dados respiratórios desde a indução da anestesia até 48 horas do pós-operatório.

Como pode ser observado na Tabela III, durante todo o período de observação, o índice cardíaco permaneceu acima de $2,5 \text{ l.min}^{-1}.\text{m}^2$. A pressão de artéria pulmonar atingiu seu valor máximo após a CEC ($27 \pm 7 \text{ mmHg}$), retornando aos valores normais, contudo sem alterações estatisticamente significativas. A média da pressão de oclusão da artéria pulmonar permaneceu abaixo de 18 mmHg durante todo o estudo, apesar da infusão de fluidos realizadas no perioperatório. Houve aumento significativo da frequência cardíaca e redução nos valores do índice de resistência vascular sistêmica após a saída de CEC, que persistiram até o final do período de estudo. Não foram observadas variações significativas na pressão venosa central, no índice de resistência vascular pulmonar e no índice sistólico.

Tabela III – Dados hemodinâmicos durante a cirurgia e nas primeiras 24 horas pós-operatórias

	Após indução	Após CEC	Admissão UTI	UTI 12 h	UTI 24 h	valor p
FC (BPM)	69 ± 20	98 ± 17*	98 ± 20*	95 ± 16*	98 ± 15*	<0.001
PAM (mmHg)	74 ± 9	66 ± 8*	84 ± 15	76 ± 9	81 ± 9	<0.001
PAPm (mmHg)	25 ± 6	27 ± 7	25 ± 7	23 ± 7	23 ± 6	NS
PVC (mmHg)	14 ± 6	16 ± 6	14 ± 5	11 ± 4	12 ± 4	NS
POAP (mmHg)	16 ± 4	17 ± 5	15 ± 5	14 ± 5	15 ± 4	NS
IC (L.min ⁻¹ .m ²)	2.5 ± 0.8	3.9 ± 1.4*	3.2 ± 1.1*	3.3 ± 0.9*	3.9 ± 0.7*	0.003
IS (mL.m ⁻²)	38 ± 12	40 ± 13	34 ± 13	35 ± 11	41 ± 10	NS
IRVS (din.s.cm ⁻⁵ .m ²)	2090 ± 667	1255 ± 627*	1944 ± 676	1707 ± 442*	1499 ± 323*	<0.001
IRVP (din.s.cm ⁻⁵ .m ²)	312 ± 220	225 ± 158	239 ± 129	241 ± 124	168 ± 93	NS

Legenda: FC – frequência cardíaca; PAM – pressão arterial média; PAPm – pressão de artéria pulmonar média; PVC- pressão venosa central; POAP- pressão de oclusão de artéria pulmonar; IC- índice cardíaco; IS- índice sistólico; IRVS- índice de resistência vascular sistêmica; IRVP- índice de resistência vascular pulmonar. Os dados estão expressos como média ± desvio padrão. As variáveis foram analisadas pela análise de variância de uma via para repetidas medidas. (*) significa $p < 0.05$, quando comparado com o momento após indução.

Todos os pacientes atingiram a estabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato, permitindo o desmame de fármacos vasoativos dentro das primeiras 24 horas.

Foi observada uma redução da saturação venosa mista para valores abaixo de 70% após 12 horas de admissão a UTI (Tabela IV), porém sem evidências clínicas e hemodinâmicas de disfunção miocárdica. O lactato arterial atingiu seus valores mais altos após o desmame da CEC, retornando

aos níveis normais dentro das primeiras 12 horas de pós-operatório. Nenhuma alteração significativa foi observada quanto à diferença venoarterial da pressão parcial de CO₂ e ao excesso de bases.

Tabela IV – Perfil metabólico durante a cirurgia e nas primeiras 48 horas pós-operatórias

	Pré-indução	Após indução	Após CEC	Admissão UTI	UTI 12 h	UTI 24 h	UTI 48 h	valor p
PaCO ₂ (mmHg)	38 ± 5	35 ± 5	38 ± 5	40 ± 7	35 ± 4	37 ± 4	38 ± 5	NS
pH Arterial	7.44 ± 0.05	7.43 ± 0.05	7.33 ± 0.08*	7.33 ± 0.07*	7.38 ± 0.04	7.4 ± 0.05	7.39 ± 0.05	0.001
Excesso de bases (mEq.L)	0.1 ± 1.4	0 ± 1.6	-4.5 ± 3.3*	-4.2 ± 4.05*	-3 ± 2*	-0.9 ± 2.4	-0.7 ± 2.1	0.003
Lactato Arterial (mg.dL ⁻¹)	13 ± 3	14 ± 3	36 ± 20*	35 ± 26*	19 ± 7	16 ± 6	14 ± 6	0.004
PvCO ₂ -PaCO ₂ (mmHg)	-	5 ± 2	3 ± 4	4 ± 5	4 ± 4	2 ± 3	5 ± 4	NS
SvO ₂ (%)	-	80 ± 6	78 ± 10	74 ± 11	65 ± 9!	69 ± 7!	65 ± 9!	0.004

Legenda: PvCO₂-PaCO₂ – diferença venoarterial da pressão parcial de CO₂. Os dados estão expressos como média ± desvio padrão. As variáveis foram analisadas pela análise de variância de uma via para repetidas medidas. (*) significa p < 0.05, quando comparado com o momento pré-indução. (!) significa p < 0.05, quando comparado com o momento após indução.

Quando analisado o comportamento da oxigenação arterial, como apresentado na Figura 03, foi observado que a relação PaO₂/FiO₂ diminuiu de forma significativa após a indução da anestesia, atingindo o seu nadir após a saída de CEC. Uma melhora significativa da relação PaO₂/FiO₂ foi observada após 12 horas da admissão a UTI, em comparação com os valores pós-CEC e se manteve até o final do estudo. Contudo, os valores da relação PaO₂/FiO₂ computados nas 24 e 48 horas de pós-operatório foram

26,1% e 17,7% menores que os valores de relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ observados antes da indução anestésica ($p < 0,05$) respectivamente.

O *shunt* intrapulmonar médio computado nas primeiras 24 horas pós-operatórias foi $13 \pm 5\%$. Foi encontrada uma fraca correlação negativa entre *shunt* intrapulmonar e relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ($r = -0,47$, $p = 0,04$) obtida nas primeiras 24 horas. Nenhuma alteração foi observada na pressão parcial arterial de dióxido de carbono durante todo o estudo, como pode ser observado na Tabela IV.

FIGURA 3

Figura 3 – Comportamento da relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ durante o estudo. Os dados estão expressos como média $\pm$ erro padrão. As variáveis foram analisadas pela análise de variância de uma via para repetidas medidas. (*) significa $p < 0.05$, quando comparado com o momento pré-indução. (!) significa $p < 0.05$, quando comparado com o momento após indução.

5.2. Avaliação pulmonar pré e pós-operatória por meio de tomografia computadorizada

Figura 4: Imagens tomográficas representativas obtidas no ápice pulmonar (coluna da esquerda), no hilo pulmonar (coluna do meio) e próximo ao diafragma (coluna da direita) obtidas no pré-operatório (painel superior) e no primeiro dia pós-operatório (painel inferior). Observa-se a formação de imagens compatíveis com atelectasias nas regiões dependentes da TC do pós-operatório. Flechas mostram as áreas de colapsos pulmonares.

A Figura 4 mostra imagens de TC na altura do ápice, hilo vascular pulmonar e 2 cm acima do diafragma obtidas no pré-operatório e o primeiro dia pós-operatório. No pré-operatório, foi observado que o volume pulmonar total era 3086 ± 790 mL, sendo composto por 71% de gás (2226 ± 860 mL), representando a capacidade residual funcional e 29% de tecidual pulmonar (862 ± 180 mL).

O peso do parênquima pulmonar foi 863 ± 180 gramas. Quando o volume do parênquima pulmonar foi avaliado em função da distribuição da aeração, o peso do compartimento de parênquima pulmonar não-aerado foi de 27 ± 19 g ($3 \pm 2\%$ do peso total do parênquima pulmonar). O peso do parênquima pulmonar mal-aerado foi de 201 ± 58 g ($24 \pm 5\%$ do peso total do parênquima pulmonar). O peso do parênquima normalmente-aerado foi de 617 ± 133 g ($72 \pm 6\%$ do peso total do parênquima pulmonar).

Como se mostrou na Figura 5, no primeiro dia pós-operatório foi observada uma redução média do volume pulmonar total de 17%, quando comparado com os valores da TC pré-operatórios ($p = 0,007$). Esta diminuição do volume pulmonar total foi secundária a uma redução no volume pulmonar pós-operatório de gás em 31% ($p < 0,001$), enquanto foi observado um aumento no volume de tecido de 19% em comparação aos dados pré-operatórios ($p < 0,001$).

FIGURA 5

Figura 5: Volume pulmonar total de tecido e gás, computados em reconstruções volumétricas a partir de tomografias computadorizadas de pulmão inteiro no pré-operatório (barras brancas) e no pós-operatório (barras pretas). Dados expressos como média $\pm$ erro padrão.

Como mostrado na Figura 6, houve um aumento significativo do peso total do parênquima pulmonar no período pós-operatório de 19% ($p < 0,001$). A distribuição relativa do parênquima pulmonar de acordo com a aeração altera-se de maneira significativa no pós-operatório, quando comparada com as tomografias pré-operatórias. Foi observado que o peso global do compartimento de parênquima pulmonar não-aerado aumentou em $253 \pm 97\text{g}$ ($p < 0,001$). Este aumento do compartimento pulmonar colapsado foi observado nos 18 pacientes estudados e compreendia 27,1% do peso do parênquima pulmonar total. O parênquima pulmonar mal-aerado médio apresentou um pequeno aumento de $72 \pm 68\text{g}$ ($p < 0,001$), representando 26,4% do peso total do parênquima. Por outro lado, o peso do compartimento de parênquima pulmonar normalmente-aerado diminuiu $147 \pm 119\text{g}$ em comparação com os valores pré-operatórios ($p < 0,001$), com este compartimento representando 46,5% do peso total do parênquima pulmonar.

FIGURA 6

Figura 06: aumento significativo do peso total do parênquima pulmonar no período pós-operatório de 19% ($p < 0,001$). Quanto à distribuição foi observado que o peso global do compartimento de parênquima pulmonar não-aerado aumentou em $253 \pm 97\text{g}$ ($p < 0,001$). O parênquima pulmonar mal-aerado médio apresentou um pequeno aumento de $72 \pm 68\text{g}$ ($p < 0,001$), representando 26,4% do peso total do parênquima. O peso do compartimento de parênquima pulmonar normalmente-aerado diminuiu $147 \pm 119\text{g}$ em comparação com os valores pré-operatórios ($p < 0,001$), com este compartimento representando 46,5% do peso total do parênquima pulmonar.

5.3. Correlações entre as alterações observadas na morfologia pulmonar, trocas gasosas e duração da circulação extracorpórea.

Não foram observadas correlações significativas entre a duração da CEC e a quantidade de parênquima pulmonar não-aerado ou com o aumento do volume de tecido pulmonar. Como foi mostrado na Figura 7, uma correlação significativa negativa foi encontrada entre a redução percentual da fração entre o volume de gás e o volume pulmonar total (redução percentual da CRF) e a variação do parênquima pulmonar com aeração reduzida (aumento percentual no peso dos compartimentos não-aerados e mal-aerado computados conjuntamente). Contudo, nem a variação na fração de parênquima pulmonar não-aerado e nem a variação na fração de parênquima pulmonar mal-aerado foram associadas de maneira independente à redução da CRF.

Nenhuma correlação foi encontrada entre a relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ calculada no momento da aquisição da TC pós-operatória e o aumento do peso do parênquima pulmonar não-aerado, a diminuição do peso do parênquima pulmonar normalmente-aerado, a variação do parênquima pulmonar com aeração reduzida (- 500 UH a + 200 UH) ou à diminuição percentual da CRF.

FIGURA 7

Figura 7: Correlação entre a variação percentual da fração de gás (redução percentual da CRF) e a variação percentual do parênquima pulmonar com aeração reduzida.

DISCUSSÃO

6. DISCUSSÃO

É de amplo conhecimento que ocorre piora da função pulmonar após cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea, caracterizada por desenvolvimento de hipoxemia pós-operatória², mesmo em pacientes sem doença pulmonar pré-operatória^{4,14,27}. Neste estudo, foi observada uma importante redução na relação PaO_2/FiO_2 durante a cirurgia, atingindo seus valores mínimos após a CEC. Apesar do retorno da relação PaO_2/FiO_2 para valores próximos aos níveis observados após a indução anestésica no momento 12 horas de pós-operatório, esta permaneceu em torno de 25% mais baixa que os valores pré-operatórios até a conclusão do estudo, 48 horas após a realização da cirurgia.

O aumento da fração de *shunt* intrapulmonar secundário às atelectasias tem sido apontado como o principal mecanismo para explicar a piora observada na oxigenação sanguínea durante a cirurgia cardíaca com CEC, tanto no contexto clínico como experimental^{10,14,19}. Em diversos estudos, o desenvolvimento de atelectasias nas regiões pulmonares dependentes tem sido consistentemente observado após anestesia geral. Magnusson e colaboradores observaram extensa formação de atelectasias em porcos submetidos à anestesia geral para toracotomia e circulação extracorpórea, representando 35% da área pulmonar em imagem de tomografia computadorizada justadiafragmática. Contudo, nos animais do

grupo-controle, submetidos à anestesia geral isolada, sem realização de esternotomia ou circulação extracorpórea, a área de atelectasia representou apenas 1% da superfície pulmonar. Estes autores relataram uma boa correlação entre a extensão do colapso pulmonar observado na tomografia computadorizada e a fração de *shunt* intrapulmonar¹⁴. Hachenberg e colaboradores relataram uma correlação significativa entre a superfície de áreas hiperdensas observadas em tomografias computadorizadas e o *shunt* intrapulmonar em 11 pacientes evoluindo com disfunção respiratória após cirurgia para revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea¹⁹. Tenling e colaboradores descreveram densidades pulmonares bilaterais em regiões dependentes dos pulmões, que correspondiam a $8 \pm 8\%$ da área pulmonar total em 3 seções de tomografias computadorizadas torácicas posicionadas 1cm acima do diafragma, no hilo pulmonar e no ápice pulmonar em tomografias torácicas obtidas no primeiro dia pós-operatório em 17 de 18 pacientes submetidos à cirurgia para revascularização do miocárdio ou cirurgia para troca de valva mitral. De acordo com estes autores, estas áreas pulmonares hiperdensas correspondiam a 20% do volume total do parênquima pulmonar. Não encontraram correlação entre a extensão do colapso pulmonar observado em todos os pacientes e a magnitude do *shunt* intrapulmonar. Contudo, quando foi realizada a análise de subgrupos, uma correlação significativa foi achada entre a extensão das atelectasias e o *shunt* ($\rho = 0,95$, $p < 0,01$), no subgrupo submetido à cirurgia valvar mitral, mas não no grupo submetido à revascularização miocárdica¹⁰.

Neste estudo, foi observado na análise das tomografias computadorizadas torácicas pós-operatórias um aumento em 24% no peso do parênquima pulmonar colapsado, o que correspondia a 27% do peso total do parênquima pulmonar. Contudo, não foram observadas correlações entre a extensão das atelectasias quantificadas em todo o parênquima pulmonar e o *shunt* intrapulmonar ou com a relação PAO_2/FiO_2 mensurados 24 horas após a cirurgia, no momento da aquisição da tomografia computadorizada pós-operatória.

Possivelmente, após 24 horas da admissão à unidade de terapia intensiva, outros fatores estão relacionados à piora persistente observada na oxigenação arterial em pacientes submetidos à cirurgia para revascularização do miocárdio em adição à perfusão de regiões pulmonares não aeradas. Usando este método de análise das tomografias computadorizadas torácicas volumétricas, foram observadas alterações na estrutura pulmonar além do aparecimento de extensas atelectasias, e que provavelmente contribuem para a manutenção desta hipoxemia pós-operatória persistente: 1) importante redução do volume pulmonar de gás em 31%; 2) aumento no peso do parênquima pulmonar, secundário ao aumento de água extravascular pulmonar; 3) redução da massa de parênquima pulmonar normalmente aerado.

O primeiro ponto a ser discutido é que o método utilizado para analisar as estruturas pulmonares nas tomografias computadorizadas torácicas neste estudo é diferente das técnicas utilizadas em estudos prévios avaliando as alterações pulmonares através de tomografia computadorizada

após cirurgia cardíaca^{10,14,19,50,51}. Nestes estudos, a quantidade de parênquima pulmonar colapsado foi computada como a área da região pulmonar hiperdensa em um corte tomográfico justadiafragmático ou em três cortes tomográficos no ápice, hilo e bases pulmonares (imagens bidimensionais), que supostamente representam a totalidade do parênquima pulmonar ou pela realização de cálculos baseados no coeficiente CT médio da região de interesse^{10,14,19,50,51}. No estudo, foi utilizado o método descrito por Puybasset e colaboradores, que permite a computação do volume pulmonar de gás e de tecido, assim como a distribuição da aeração em cortes tomográficos contíguos e múltiplos obtidos durante curtos períodos de apneia²¹. Utilizando este método, é possível quantificar a massa e volume de parênquima pulmonar colapsado, ao invés de estimá-los a partir de medidas de área de superfície de zonas hiperdensas em uma ou três seções tomográficas. A inferência sobre a quantidade de parênquima pulmonar atelectasiado a partir de superfícies hiperdensas pode ainda hiperestimar a real extensão do colapso pulmonar, por não excluir o volume de gás contido nestas áreas, e que corresponde a 10% do parênquima pulmonar colapsado. Além do mais, eventos mecânicos, como o deslocamento cefálico do diafragma induzido pela pressão intra-abdominal^{11,52} e a compressão dos lobos inferiores dos pulmões pelo coração⁵³, causam elevação regional da pressão pleural nas regiões caudais e dependentes da cavidade torácica, regiões analisadas nas seções tomográficas justadiafragmáticas. Esta elevação regional da pressão pleural promove aumento localizado da extensão do colapso pulmonar, o que poderia limitar a validade da

quantificação de atelectasias num corte tomográfico basal como representativo de todo o pulmão. Estudando o recrutamento alveolar induzido pela PEEP em pacientes com insuficiência respiratória, Lu e colaboradores observaram que a avaliação do colapso pulmonar em uma seção tomográfica justadiafragmática ou em três seções tomográficas no ápice, hilo e base do pulmão é espuriamente elevada, e não refletia de forma acurada o mesmo evento avaliado em tomografias torácicas volumétricas do pulmão inteiro⁵⁴. Infelizmente, não comparamos a concordância desses métodos intrinsecamente diferentes neste estudo.

Outro mecanismo que poderia explicar a ausência de correlação entre a quantidade de parênquima pulmonar colapsado e a hipoxemia é que a quantificação do colapso pulmonar foi realizada no primeiro dia pós-operatório. Nesse momento, nenhum dos pacientes estava recebendo fármacos anestésicos ou vasoativos capazes de modular o tônus vascular ou impedir o fenômeno de vasoconstrição pulmonar hipóxica (VPH), habitualmente observado em pacientes anestesiados. Seria esperado que a VPH fosse mais efetiva em desviar sangue das regiões atelectasiadas do parênquima pulmonar (hipóxia regional mais intensa) para regiões do parênquima pulmonar caracterizadas por melhor acoplamento da ventilação à perfusão. Esta hipótese é parcialmente suportada pela fraca correlação observada entre o *shunt* pulmonar e a relação PaO_2/FiO_2 computados no momento da aquisição da tomografia pós-operatória. Contudo, não é possível neste estudo prever o comportamento da VPH no momento da

tomografia computadorizada, sabendo que uma considerável fração de parênquima pulmonar (53,5%) encontra-se com alteração da ventilação.

Em associação ao aumento do compartimento de parênquima pulmonar não-aerado, foi observado um aumento no compartimento pulmonar pouco-aerado, enquanto a massa de pulmão normalmente-aerada foi reduzida. Apesar de não correlacionado à relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ observada no momento da tomografia computadorizada pós-operatória, o compartimento de parênquima pulmonar pouco-aerado, onde existe um predomínio de baixa relação ventilação/perfusão ao invés de *shunt* intrapulmonar verdadeiro, engloba 27% do parênquima pulmonar. Essa região é perfundida por uma considerável fração do fluxo sanguíneo pulmonar e por isto poderia contribuir para a ineficiência da oxigenação arterial. Experimentalmente, Henzler e colaboradores acharam que a PAO_2 era correlacionada ao parênquima pulmonar pouco-aerado, mas não ao compartimento não-aerado em modelo de lesão pulmonar aguda em porcos submetidos à anestesia geral⁵⁵. Em seres humanos, os resultados são conflitantes sobre a influência da extensão do parênquima pulmonar, onde predomina o desacoplamento da relação ventilação/perfusão (mistura venosa) e a oxigenação sanguínea após cirurgia cardíaca. Kjærgaard e colaboradores avaliou o *shunt* pulmonar e alterações na relação ventilação/perfusão em 14 pacientes após cirurgia cardíaca por meio da construção de curva entre fração inspirada de oxigênio e saturação de oxigênio arterial. Estes autores observaram que os valores de *shunt* estavam discretamente aumentados e promoviam apenas uma pequena contribuição,

na maioria dos casos, para a redução da oxigenação sanguínea, enquanto a redução da relação ventilação/perfusão (efeito shunt) tinha um papel preponderante na hipoxemia pós-operatória⁵⁶.

No presente estudo, é possível propor a hipótese de que o aumento na massa de parênquima pouco-aerado contribui para a gênese da hipoxemia pós-operatória pela redução da superfície do parênquima pulmonar normalmente aerado, onde são processadas as trocas gasosas com máxima eficiência. Assim, podemos observar que, neste estudo, houve grande redução na fração do parênquima normalmente-aerado de 72% para 46% do parênquima pulmonar total. Contudo, como não foi observada a correlação entre a massa de parênquima pulmonar normalmente-aerado ou a sua variação percentual em relação à TC pré-operatória com a relação PaO_2/FiO_2 , a redução deste compartimento de parênquima pulmonar não pode ser considerada de maneira isolada como mecanismo crucial, para explicar a piora da oxigenação sanguínea pós-operatória, visto que mecanismos inflamatórios também podem estar envolvidos⁵⁷

Foi observado na tomografia computadorizada pós-operatória um aumento de $2,2 \pm 1,2 \text{ mL.kg}^{-1}$ no peso total do parênquima pulmonar, secundário a edema pulmonar por permeabilidade vascular aumentada, uma vez que todos os pacientes tinham uma função ventricular esquerda pré-operatória normal e as pressões de enchimento foram menores que 18 mmHg durante todo o estudo. O uso de circulação extracorpórea promove inflamação sistêmica pela exposição dos elementos do sangue à superfície não endotelizada do circuito extracorpóreo e oxigenador de membrana⁵⁸,

seguido de subsequente aprisionamento de leucócitos na circulação pulmonar ^{59,60}. O processo inflamatório é agravado pelo fenômeno de isquemia e reperfusão associado à pausa ventilatória e o desvio do fluxo sanguíneo da circulação pulmonar através do circuito extracorpóreo, que resulta em aumento adicional na permeabilidade endotelial pulmonar ⁶¹. Massoudy e colaboradores observaram que o aumento da água extravascular pulmonar medido usando o método térmico de $4,8 \pm 0,2$ mL.kg⁻¹ para $6,7 \pm 0,4$ mL.kg⁻¹ em 10 pacientes submetidos à circulação extracorpórea átrio-aórtica, persistiu por pelo menos 4 horas no pós-operatório ⁶². Boldt e colaboradores encontraram um aumento significativo, porém transitório, na água extravascular pulmonar computada, medida pela técnica de termodiluição com duplo indicador com verde de indocianina e solução de dextrose gelada em pacientes com função ventricular esquerda normal submetidos à RM com CEC bicaval. De acordo com estes autores, o excesso de água extravascular pulmonar observado na saída de assistência circulatória desapareceu 5 horas após o término da CEC ⁶³. Diferentemente destes relatos, neste estudo, foi observado que o excesso de água extravascular pulmonar permaneceu no tecido pulmonar pelo menos por 24 horas após a saída de circulação extracorpórea, quando a tomografia computadorizada foi realizada. Estas disparidades entre os diversos estudos são possivelmente relacionadas aos diferentes métodos utilizados para mensurar a água extravascular pulmonar. O método de análise da tomografia computadorizada volumétrica de tórax utilizado neste estudo tem alta acurácia para avaliar água extravascular pulmonar com precisão de 7

gramas, quando comparado à medida por meio de balança eletrônica⁶⁴. O edema inflamatório pode contribuir para a gênese da hipoxemia pós-operatória pelo aumento da tendência ao colapso das regiões pulmonares dependentes e pelo peso aumentado do parênquima pulmonar sobrejacente^{15,65}. Outro mecanismo pelo qual o edema pulmonar poderia contribuir para a piora da oxigenação seria o aumento da distância entre o espaço alveolar e os capilares.

Limitações do método

Todas as tomografias computadorizadas foram obtidas em pacientes respirando espontaneamente. Apesar do treinamento dos pacientes no sentido de segurarem a respiração após uma expiração normal durante o período de 15 segundos necessários para aquisição da tomografia, não foi possível garantir que todas as imagens tenham sido adquiridas em condições estritas de capacidade residual funcional e, portanto, podem acontecer variações na medida do volume de gás pulmonar, que deveria representar a CRF. Contudo, a maioria dos estudos que avaliou as alterações pulmonares através de tomografia computadorizada de tórax no pós-operatório de cirurgia cardíaca foi realizada em pacientes respirando espontaneamente, além de que a manutenção de sedação nos pacientes para a realização de estudos clínicos seria antiética, e não representaria a realidade. Por tais razões, a obtenção de imagens em pacientes respirando espontaneamente pareceu-nos a técnica mais apropriada.

Embora o tamanho da população estudada possa permitir a adequada apreciação das alterações na estrutura pulmonar, que ocorrem em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, o número relativamente pequeno de pacientes está subdimensionado para a detecção de correlações fisiológicas entre as alterações na estrutura pulmonar e a oxigenação sanguínea.

CONCLUSÕES

7. CONCLUSÕES

1) A estrutura pulmonar está profundamente alterada no 1º dia pós-operatório após revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea, caracterizada por aumento significativo das regiões pulmonares não-aeradas e pouco-aeradas, enquanto ocorre a redução do compartimento pulmonar normalmente-aerado. Foi detectada a redução de 31% no volume de gás pulmonar, enquanto o peso do parênquima pulmonar aumentou em 19%, secundário a edema pulmonar pós-operatório;

2) Ocorre significativo edema pulmonar inflamatório, que persiste até, pelo menos, o primeiro dia pós-operatório;

3) Não foram observadas correlações entre a extensão das alterações na estrutura pulmonar e as trocas gasosas.

REFERÊNCIAS

8. REFERÊNCIAS

1. Daganou M, Dimopoulou I, Michalopoulos N, Papadopoulos K, Karakatsani A, Geroulanos S, et al. Respiratory complications after coronary artery bypass surgery with unilateral or bilateral internal mammary artery grafting. *Chest*. 1998 May;113(5):1285-9.
2. Kolff WJ, Effler DB, Groves LK, Hughes CR, Mc CL. Pulmonary complications of open-heart operations: their pathogenesis and avoidance. *Cleve Clin Q*. 1958 Apr; 25(2): 65-83.
3. Asimakopoulos G, Smith PL, Ratnatunga CP, Taylor KM. Lung injury and acute respiratory distress syndrome after cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg*. 1999 Sep;68(3):1107-15.
4. Szeles TF, Yoshinaga EM, Alencar W, Brudniewski M, Ferreira FS, Auler Jr JOC, et al. Hypoxemia after myocardial revascularization: Analysis of risk factors. *Rev Bras Anesthesiol*. 2008;58(2):124-36.
5. Vargas FS, Cukier A, Terra-Filho M, Hueb W, Teixeira LR, Light RW. Influence of atelectasis on pulmonary function after coronary artery bypass grafting. *Chest*. 1993 Aug;104(2):434-7.

6. Vargas FS, Terra-Filho M, Hueb W, Teixeira LR, Cukier A, Light RW, Pulmonary function after coronary artery bypass surgery. *Respir Med*. 1997 Nov;91(10):629-33.
7. Vargas FS, Uezumi KK, Janete FB, Terra-Filho M, Hued W, Cukier A, et al. Acute pleuropulmonary complications detected by computed tomography following myocardial revascularization. *Rev. Hosp Clin Fac Med São Paulo*. 2002 Jul-Aug;57(4):135-42.
8. Gale GD, Teasdale SJ, Sanders DE, Bradwell PJ, Russell A, Solaric B. Pulmonary atelectasis and other respiratory complications after cardiopulmonary bypass and investigation of aetiological factors. *Can Anaesth Soc J*. 1979 Jan;26(1):15-21.
9. Lindberg P, Gunnarsson L, Tokics L, Secher E, Lundquist H, Brismar B, et al. Atelectasis and lung function in the postoperative period. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1992 Aug;36(6):546-53.
10. Tenling A, Hachenberg T, Tyden H, Wegenius G, Hedenstierna G. Atelectasis and gas exchange after cardiac surgery. *Anesthesiology*. 1998 Aug;89(2):371-8.
11. Froese AB, Bryan AC. Effects of anesthesia and paralysis on diaphragmatic mechanics in man. *Anesthesiology*. 1974;41:242-54.

12. Pelosi P, D'andrea L, Vitale G, Pesenti A, Gattinoni L. Vertical gradient of regional lung inflation in adult respiratory distress syndrome. *Am J Respir Crit Care Med*. 1994;149(1):8-13.
13. Rothen HU, Sporre B, Engberg G, Wegenius G, Hogman M, Hedenstierna G. Influence of gas composition on recurrence of atelectasis after a reexpansion maneuver during general anesthesia. *Anesthesiology*. 1995 Apr;82(4):832-42.
14. Magnusson L, Zemgulis V, Wicky S, Tyden H, Thelin S, Hedenstierna G. Atelectasis is a major cause of hypoxemia and shunt after cardiopulmonary bypass: an experimental study. *Anesthesiology*. 1997 Nov;87(5):1153-63.
15. Singh NP, Vargas FS, Cukier A, Terra-Filho M, Teixeira LR, Light RW. Arterial blood gases after coronary artery bypass surgery. *Chest*. 1992 Nov;102(5):1337-41.
16. Nozawa E, Kobayashi E, Matsumoto ME, Feltrim MI, Carmona MJ, Auler JJ. Assessment of factors that influence weaning from long-term mechanical ventilation after cardiac surgery. *Arq Bras Cardiol*. 2003 Mar;80(3):301-10.
17. Marshall BE. Importance of hypoxic pulmonary vasoconstriction with atelectasis. *Adv Shock Res*. 1982;8:1-12.

18. Villar J, Blazquez MA, Lubillo S, Quintana J, Manzano JL. Pulmonary hypertension in acute respiratory failure. *Crit Care Med*. 1989 Jun;17(6):523-6.
19. Hachenberg T, Brussel T, Roos N, Lenzen H, Mollhoff T, Gockel B, et al. Gas exchange impairment and pulmonary densities after cardiac surgery. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1992 Nov;36(8):800-5.
20. Hedenstierna G. Atelectasis formation and gas exchange impairment during anaesthesia. *Monaldi Arch Chest Dis*. 1994 Sep;49(4):315-22.
21. Puybasset L, Cluzel P, Chao N, Slutsky AS, Coriat P, Rouby JJ, et al. A computed tomography scan assessment of regional lung volume in acute lung injury. *Am J Respir Crit Care Med*. 1998;158(5 Pt 1):1644-55.
22. Yeden S, Wunderik R. Causes of prolonged mechanical ventilation after coronary artery bypass surgery. *Chest*. 2002; 122: 245-252.
23. Weissmann C. Pulmonary complications after cardiac surgery. *Semin cardiothor Vasc Anesth*. 2004; 8:185-213.
24. Møller JT, Wittrup M, Johansen SH. Hypoxemia in the postanesthesia care unit: an observer study. *Anesthesiology* 1990; 73: 890–895.

25. Reeder MK, Goldman MD, Loh L et al. Postoperative hypoxaemia after major abdominal vascular surgery. *Br J Anaesth* 1992; 68: 23–26.
26. Breiman RS, Beck JW, Korobkin M, Glennly R, Akwari OE, Heaston DK, Moore AV, Ram PC. Volume determinations using computed tomography. *Am J Roentgenol*. 1982; 138: 329-33.
27. Tagliabue M, Casella TC, Zincone GE, Fumagalli R, Salvini E. CT and chest radiography in the evaluation of adult respiratory distress syndrome. *Acta Radiol*. 1994; 35:230-4.
28. Hedenstierna G. Gas exchange during anaesthesia. *Br J Anaesth*. 1990; 64: 507–514.
29. Gattinoni I, Pesenti A, Bombino M, Baglioni S, Rivolta M, Rossi F, Rossi G, Fumagalli R, Marcolin R, Mascheroni D et al. Relationships between lung computed tomographic density, gas exchange, and PEEP in acute respiratory failure. *Anesthesiology*. 1988; 69:824-32.
30. Gattinoni L, Pelosi P, Vitale G, Pesenti AL, DA, Mascheroni D. Body position changes redistribute lung computed-tomographic density in patients with acute respiratory failure. *Anesthesiology*. 1991; 74:15-23.

31. Gattinoni L, Pesenti A. The concept of baby lung. *Intensive Care Medicine*. 2005; 31(6): 776-784.
32. Amato MBP, Barbas CSV, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GPP, Lorenzi-Filho G, Kairalla RA, Deheinzelin D, Munoz C, Oliveira R, Takagaki TY, Carvalho CRR. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. *The New England Journal of Medicine*. 1998; 338(6): 347-54.
33. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The acute respiratory distress syndrome network. *New England Journal of Medicine*. 342 (18): 1301-08
34. Terragni PP, Rosboch G, Tealdi A, Corno E, Menaldo E, Davini O, Gandini G, Herrmann P, Mascia L, Quintel M, Slutsky AS, Gattinoni L, and Ranieri MV. Tidal Hyperinflation during Low Tidal Volume Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2007; 175:160-6.
35. Lachmann B. Open up the lung and keep the lung open. *Intensive Care Med* 1992;18:319 –21

36. Hachenberg T, Tenling A, Nystrom SO, et al. Ventilation perfusion equality in patients undergoing cardiac surgery. *Anesthesiology*. 1994; 80:509 –19
37. Odenstedt H, Aneman A, Karason S, et al. Acute hemodynamic change during lung recruitment in lavage and endotoxin induced ALI. *Intensive Care Med*. 2005; 31:112-20.
38. Hedenstierna G, Strandberg A, Brismar B et al. - Functional residual capacity, thoracoabdominal dimensions, and central blood volume during general anesthesia with muscle paralysis and mechanical ventilation. *Anesthesiology*. 1985;62:247-54
39. Hedenstierna G. Brismar B, Strandberg A et al. - New aspects on atelectasis during anaesthesia. *Clin Physiol*. 1985;5 Suppl 3:127-31.
40. Cabrera MR, Nakamura GE, Montague DA, Cole RP. Effect of airway pressure on pericardial pressure. *Am Rev Respir Dis*. 1989; 140:659-67.
41. Lundh R, Hedenstierna G. Ventilation-perfusion relationships during anaesthesia and abdominal surgery. *Acta Anaesthesiol Scand* 1983; 27: 167-73.

42. O'Donohue W.J, Baker JP. Controlled Low-Flow Oxygen in the Management of Acute Respiratory Failure; *Chest*. 1973; 63:818-20
43. Robinson JD, Lupkiewicz SM, Palenik L, Lopez LM, Ariet M. Determination of ideal body weight for drug dosage calculations. *Am J Hosp* 1983;40:1016–9.
44. Goepfert MSG, Reuter DA. Akyol D, Lamm P, Kilger E; Goetz EA. Goal-directed fluid management reduces vasopressor and catecholamine use in cardiac surgery patients. *Intensive Care Medicine*. 2007; 33(1).
45. Davies AR, Bellomo R, Raman JS, Gutteridge GA, Buxton BF. High lactate predicts the failure of intraaortic balloon pumping after cardiac surgery. *Ann Thorac Surg*. 2001; 71:1415-20.
46. Puybasset L, Gusman P, Muller JC, Cluzel P, Coriat P, Rouby JJ. Regional distribution of gas and tissue in acute respiratory distress syndrome. III. Consequences for the effects of positive end-expiratory pressure. CT Scan ARDS Study Group. Adult Respiratory Distress Syndrome. *Intensive Care Med*. 2000; 26: 1215-27.
47. Vieira SR, Puybasset L, Richecoeur J, Lu Q, Cluzel P, Gusman PB, et al. A lung computed tomographic assessment of positive end-expiratory pressure-induced lung overdistension. *Am J Respir Crit Care Med*. 1998; 158: 1644-1655

48. Vieira SR, Puybasset L, Lu Q, Richecoeur J, Cluzel P, Coriat P, et al. A scanographic assessment of pulmonary morphology in acute lung injury. Significance of the lower inflection point detected on the lung pressure-volume curve. *Am J Respir Crit Care Med*. 1999 May;159 (5 Pt 1):1612-23.
49. Mull RT. Mass estimates by computed tomography: physical density from CT numbers. *Am J Roentgenol*. 1984 Nov;143(5):1101-4.
50. Hachenberg T, Lundquist H, Tokics L, Brismar B, Hedenstierna G. Analysis of lung density by computed tomography before and during general anaesthesia. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1993 Aug;37(6):549-55.
51. Magnusson L, Zemgulis V, Tenling A, Wernlund J, Tyden H, Thelin S, et al. Use of a vital capacity maneuver to prevent atelectasis after cardiopulmonary bypass: an experimental study. *Anesthesiology*. 1998; 88(1):134-42.
52. Malbrain ML, Chiumello D, Pelosi P, Bihari D, Innes R, Ranieri VM, et al. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study. *Crit Care Med*. 2005 Feb; 33(2):315-22.

53. Malbouisson LM, Busch CJ, Puybasset L, Lu Q, Cluzel P, Rouby JJ. Role of the heart in the loss of aeration characterizing lower lobes in acute respiratory distress syndrome. CT Scan ARDS Study Group. *Am J Respir Crit Care Med*. 2000 Jun;161(6):2005-12.
54. Lu Q, Malbouisson LM, Mourgeon E, Goldstein I, Coriat P, Rouby JJ. Assessment of PEEP-induced reopening of collapsed lung regions in acute lung injury: are one or three CT sections representative of the entire lung? *Intensive Care Med*. 2001 Sep;27(9):1504-10.
55. Henzler D, Pelosi P, Dembinski R, Ullmann A, Mahnken A, Rossaint R, et al. Respiratory compliance but not gas exchange correlates with changes in lung aeration after a recruitment maneuver: an experimental study in pigs with saline lavage lung injury. *Critical Care*. 2005; 9(5):R471 - R82.
56. Kjaergaard S, Rees SE, Gronlund J, Nielsen EM, Lambert P, Thorgaard P, et al. Hypoxaemia after cardiac surgery: clinical application of a model of pulmonary gas exchange. *Eur J Anaesthesiol*. 2004 Apr; 21(4):296-301
57. Guillermo L, Roberto C, Jorge U. Renal preservation in cardiac surgery. *Current Opinion in Anaesthesiology*: February 1998 - Volume 11 - Issue 1 - pp 9-13

58. de Vroege R, Rutten PM, Kalkman C, Out TA, Jansen PG, Eijssman L, et al. Biocompatibility of three different membrane oxygenators: effects on complement, neutrophil and monocyte activation. *Perfusion*. 1997 Nov;12(6):369-75.
59. Massoudy P, Zahler S, Becker BF, Braun SL, Barankay A, Richter JA, et al. Significant leukocyte and platelet retention during pulmonary passage after declamping of the aorta in CABG patients. *Eur J Med Res*. 1999 May 26; 4(5):178-82.
60. Massoudy P, Zahler S, Becker BF, Braun SL, Barankay A, Meisner H. Evidence for inflammatory responses of the lungs during coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass. *Chest*. 2001 Jan; 119(1):31-6.
61. Schlensak C, Doenst T, Beyersdorf F. Lung ischemia during cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg*. 2000 Jul; 70(1): 337-8.
62. Massoudy P, Piotrowski JA, van de Wal HC, Giebler R, Marggraf G, Peters J, et al. Perfusing and ventilating the patient's lungs during bypass ameliorates the increase in extravascular thermal volume after coronary bypass grafting. *Ann Thorac Surg*. 2003 Aug; 76(2): 516-21; discussion 21-2.

63. Boldt J, Zickmann B, Dapper F, Hempelmann G. Does the technique of cardiopulmonary bypass affect lung water content? *Eur J Cardiothorac Surg.* 1991;5(1):22-6.
64. Malbouisson LM, Preteux F, Puybasset L, Grenier P, Coriat P, Rouby JJ. Validation of a software designed for computed tomographic (CT) measurement of lung water. *Intensive Care Med.* 2001 Mar; 27(3): 602-8.
65. Auler-Junior JO, Saldiva PH. Pulmonary structure and extravascular lung water after cardiopulmonary bypass. *Braz J Med Biol Res.* 1986;19(6):707-14.