Beatriz Ercolin

**Caracterização da deglutição em portadores de distrofia miotônica de
Steinert**

Dissertação apresentada à
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Mestre em Ciências

Programa de: Ciências da Reabilitação
Área de Concentração: Comunicação Humana

Orientadora: Dra. Fernanda Chiarion Sassi

SÃO PAULO
2012

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Ercolin, Beatriz

Caracterização da deglutição em portadores de distrofia miotônica de Steinert
/ Beatriz Ercolin. -- São Paulo, 2012.

Dissertação(mestrado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Programa de Ciências da Reabilitação. Área de concentração: Comunicação Humana.

Orientadora: Fernanda Chiarion Sassi.

Descritores: 1.Disfagia 2.Distrofia miotônica 3.Eletromiografia de superfície
4.Deglutição 5.Transtornos de deglutição

USP/FM/DBD-344/12

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos
os portadores de Distrofia Miotônica, expressando o
meu desejo de melhor qualidade de vida a esses pacientes.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a **Deus e ao meu Anjo da Guarda**, pela permissão concedida e por me guiarem durante todo o percurso para a realização e término deste trabalho.

Aos meus pais, **Roberto e Magali** pelo amor incondicional e por me incentivarem ao estudo.

Aos meus irmãos **Rafael e Renato** pelo apoio e pelos momentos de descontração.

Ao meu marido **Tiago**, o grande amor da minha vida, pelo incentivo às minhas realizações profissionais.

À querida **Dra Fernanda Sassi**, pelo imenso aprendizado, pela confiança depositada, carinho e atenção que me foi dispensada.

Aos **pacientes deste estudo e seus familiares**, que são o maior sentido da realização deste trabalho.

Às médicas neurologistas **Dra Suely Kazue Nagahashi Marie e Dra Mary Souza de Carvalho** pelos ensinamentos e viabilização deste estudo.

Aos **funcionários do ambulatório de Miopatias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo**, pela ajuda, simpatia e agradável convívio durante esta etapa.

À **Profa. Dra Claudia Regina Furquim de Andrade**, pela exemplar conduta e seriedade na construção da ciência da Fonoaudiologia, pelos seus ensinamentos e conquistas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

As fonoaudiólogas e lindas amigas, **Laura Davison Mangilli, Fabiola S. Juste, Gisele C. de Medeiros e Danielle P. Moraes**, pela cumplicidade, auxílio e carinho.

Ao **Aristide Correia**, pela disponibilidade e atenção com a análise estatística do estudo.

À **Dra Lucia Iracema Zanotto de Mendonça**, à **Profa. Suely Cecília Olivan Limongi** e à **Profa. Dra Claudia Regina Furquim de Andrade**, pela participação na minha banca de qualificação, que contribuíram brilhantemente para melhor compreensão da amplitude deste estudo.

‘Aprenda como se você fosse viver para sempre.

Viva como se você fosse morrer amanhã’

Mahatma Gandhi

NORMALIZAÇÃO ADOTADA

Esta dissertação ou tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta publicação:

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver).

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index Medicus.

SUMÁRIO

Lista de figuras	
Lista de tabelas	
Lista de abreviaturas e siglas	
RESUMO	
SUMMARY/ABSTRACT	
1 APRESENTAÇÃO.....	01
2 INTRODUÇÃO.....	06
3 OBJETIVO.....	09
4 MÉTODOS.....	10
4.1 Participantes.....	10
4.2 Critérios de inclusão para G1.....	10
4.3 Critérios de inclusão para G2.....	11
4.4 Material.....	12
4.5 Procedimentos.....	13
4.6 Avaliação Clínica Fonoaudiológica.....	13
4.7 Avaliação Instrumental – EMGs.....	15
4.8 Análise da Eletromiografia.....	18
4.9 Análise de Dados.....	21
4.9.1 Confiabilidade.....	21
5 RESULTADOS.....	22
6 DISCUSSÃO.....	27
7 CONCLUSÃO.....	33
8 ANEXOS.....	34
8.1 Anexo 1.....	34

8.2 Anexo 2.....	35
9 REFERÊNCIAS.....	39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AMIOFE - *Protocol of orofacial myofunctional evaluation with scores*

ASHA NOMS - *American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System*

CAPPesq HCFMUSP Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas

CTG - Citosina, Timina e Guanina

DM1 - Distrofia Miotônica tipo 1

DMPK – Gene da Proteína Quinase

DMS – Doença miotônica de Steinert

DP – Desvio Padrão

EMGs – Eletromiografia de Superfície

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

FMUSP – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

GC – Grupo Controle

GP – Grupo Pesquisa

HCFMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

ICHHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas

LIF-FFFD - Laboratório de Investigação Fonoaudiológica da Fluência, Funções da Face e Disfagia

µV – Microvolts

MEL - Musculatura extrínseca da laringe

MS – Músculo masseter

OO – Músculo orbicular da boca

RMS - *root mean square*

SH - Musculatura suprahioidea

TTIII - Treinamento Técnico III

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Posicionamento dos eletrodos.....	17
Figura 2 - Sinal eletromiográfico retificado da deglutição de 16,5ml – G1....	19
Figura 3 - Sinal eletromiográfico retificado da deglutição de 16,5ml – G2....	20

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Caracterização dos grupos quanto a idade.....	22
Tabela 2 – Comparação entre grupos para o AMIOFE.....	23
Tabela 3 – Comparação entre grupos para amplitude e duração da ativação muscular.....	24
Tabela 4 - Comparação intragrupos para amplitude e duração da ativação muscular nos diferentes volumes ofertados.....	26

RESUMO

ERCOLIN, B. *Caracterização da deglutição em portadores de distrofia miotônica de Steinert* [dissertação]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2012.

INTRODUÇÃO: A disfagia orofaríngea e os distúrbios de motilidade esofágica são considerados as mais importantes causas de pneumonia aspirativa em pacientes com distrofia miotônica. O objetivo deste estudo foi avaliar as características clínicas da motricidade orofacial e a deglutição de indivíduos com distrofia miotônica (DM1), utilizando um protocolo clínico padronizado e eletromiografia de superfície (EMGs). **MÉTODO:** Os participantes foram divididos em dois grupos: G1-composto por 20 adultos com DM1; G2-composto por 20 voluntários saudáveis, os participantes foram pareados por idade e gênero com G1 para a análise estatística. Foi realizada a avaliação das estruturas e funções orofaciais, utilizando um protocolo clínico padronizado, e mensurada a atividade mioelétrica da deglutição por meio da EMGs, com eletrodos localizados em quatro grupos musculares: (1) orbicular da boca, (2) masseter, (3) musculatura suprahióidea e (4) extrínseca da laringe. A atividade mioelétrica foi medida durante o repouso muscular e durante a deglutição de saliva e de 16,5ml e 20ml de água. Os traçados da EMGs foram avaliados durante o início (onset), pico e o término (offset), dos eventos da deglutição. A análise estatística incluiu a ANOVA de duplo fator para intragrupos e intergrupos e o teste de Bonferroni para correções de comparações múltiplas. **RESULTADOS:** Pacientes com DM1 apresentaram déficits em posição, postura e mobilidade dos órgãos miofuncionais orofaciais, e nas funções de mastigação e deglutição. Além disso, os resultados da EMGs para diferentes tarefas de deglutição indicaram maior atividade muscular do orbicular da boca e maior duração da ativação muscular para os músculos: orbicular da boca, masseter e extrínseco de laringe. Não foi observado aumento significativo na amplitude da EMGs, nos pacientes com DM1, quando comparado aos resultados obtidos no teste de deglutição normal com o teste de estresse. **CONCLUSÕES:** A maior duração da deglutição na EMGs no grupo DM1, possivelmente está relacionada a miotonia e/ou incoordenação dos músculos envolvidos no processo da deglutição ou pode estar relacionado a uma adaptação fisiológica para uma deglutição segura. A identificação precoce dos distúrbios da deglutição permite reabilitação precoce oral, o que poderia diminuir o risco de pneumonia por aspiração nesta população.

Descritores: Disfagia; Distrofia Miotônica; Eletromiografia de Superfície; Deglutição; Transtornos de deglutição.

SUMMARY/ABSTRACT

ERCOLIN, B. *Characterization of swallowing in patients with myotonic dystrophy of Steinert* [dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2012.

INTRODUCTION: Oropharyngeal dysphagia and oesophageal motility disorders were found to be the most important reasons causing aspiration pneumonia in patients with myotonic dystrophy. The purpose of this report was to evaluate clinical characteristics of the oral motor movements and swallowing of individuals with myotonic dystrophy type 1 (DM1), using a standardized clinical protocol and surface electromyography (sEMG). **METHOD:** Participants were 40 individuals divided in two groups: G1- composed by 20 adults with DM1; G2- composed by 20 healthy volunteers paired by age and gender to individuals in G1. Participants of all groups underwent clinical assessment of the orofacial structures and functions using a standardized clinical protocol. The myoelectric activity of swallowing was measured using sEMG. Four muscle groups were examined: (1) the orbicularis oris superior and inferior; (2) the masseter; (3) the submental muscle group; and (4) the laryngeal strap muscles. Muscle activity was measured during rest, during dry swallows and during the swallowing of 16.5ml and 20ml of water. Surface EMG traces were evaluated for onset, peak and offset of activity during swallow events. The statistical analysis included the one-way ANOVA with two factors for within and between group comparisons and the Bonferroni correction for multiple comparisons. **RESULTS:** Patients with DM1 presented deficits in posture, position and mobility of the oral motor organs, as well as compromised mastication and deglutition. Moreover, sEMG results for different swallowing tasks indicated higher muscle activity for the orbicularis oris and longer durations of muscle activation for the orbicularis oris, masseter and laryngeal strap muscles. When considering within group comparisons, DM1 patients did not present a significant increase of sEMG amplitude during the stress test in comparison with the normal swallow test. **CONCLUSION:** Compared to healthy individuals, patients with DM1 presented longer times to pass a bolus from the oral cavity to the esophagus. The larger duration of sEMG in the DM1 group is possibly related to myotonia and/or incoordination of the muscles involved in the swallowing process or could reflect a physiological adaptation for safe swallowing. Early identification of swallowing disorders enables early oral rehabilitation, which in turn could decrease the risk of aspiration pneumonia in this population.

Keywords: Dysphagia – Myotonic dystrophy – Surface electromyography – Deglutition – Deglutition disorders.

APRESENTAÇÃO

Tenho interesse pelos distúrbios da deglutição desde a minha graduação em Fonoaudiologia (2001-2004), principalmente naqueles decorrentes de patologias de base progressiva e com prognósticos incertos.

Em 2005, cursei o Aprimoramento em Fonoaudiologia Hospitalar no Instituto de Infectologia Emilio Ribas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP onde vivenciei maior proximidade com os pacientes hospitalizados e possibilitando aprimorar meu conhecimento na área da disfagia.

No ano seguinte, me candidatei para vaga no Curso de Especialização em Fonoaudiologia, com Núcleo Específico em Processamento Neuromotor da Fala e da Deglutição, do Curso de Fonoaudiologia da FMUSP. Essa especialização seria desenvolvida no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica da Fluência, Funções da Face e Disfagia (LIF-FFFD) do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP, coordenado pela Professora Claudia Regina Furquim de Andrade. No dia da entrevista para a seleção do curso, a Profa. Claudia Andrade, disse a todos em voz alta: “Pelo fato de vocês virem até aqui já são profissionais diferenciados. Aos que não forem selecionados, não desistam do caminho, e aos selecionados, parabéns e vamos seguir em mais uma jornada”. Neste momento eu tive a certeza de que queria fazer

parte daquela história. No LIF-FFFD tive a oportunidade de conhecer a Fonoaudióloga Assistente, a então Doutora Fernanda Chiarion Sassi.

A Dra Fernanda Chiarion Sassi estava iniciando sua pesquisa de Pós-Doutorado pela FAPESP (Processo nº 03/13526-9) intitulado: A efetividade da realimentação no tratamento da gagueira de desenvolvimento: estudos comparativos. Interessei-me por sua pesquisa, pois nela seria utilizado o exame de eletromiografia de superfície (EMGs). Naquela época a EMGs era um instrumento ainda pouco utilizado na Fonoaudiologia brasileira. O LIF-FFFD sempre teve como característica marcante a seriedade em suas pesquisas e a preocupação com a construção da Fonoaudiologia Baseada em Evidências. Esse novo projeto seria mais uma importante contribuição para a Fonoaudiologia. Ao perceber meu interesse, a Dra Fernanda Chiarion Sassi me incentivou a pleitear uma bolsa de Treinamento Técnico III (TTIII) da FAPESP, na qual seria desenvolvido todo o treinamento necessário. Meu pedido foi aceito.

A especialização teve seu término no início do ano de 2007, e a bolsa de Treinamento Técnico III em julho de 2007. Durante esse período, aprendi com mais propriedade sobre o processamento neuromotor da deglutição, sobre as peculiaridades do exame de EMGs nas funções estomatognáticas, e ainda sobre metodologia científica.

Desde 2005 a Profa. Dra. Cláudia Regina Furquim de Andrade assumiu o Serviço de Fonoaudiologia no Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC) da FMUSP. Nesta época foi iniciado um mapeamento da necessidade de profissionais fonoaudiólogos em todo o ICHC. O Serviço começou a ser ampliado, estruturado e conhecido pelo profissionalismo da equipe.

No ano de 2009, a médica neurologista Dra Suely Kazue Nagahashi Marie, sugeriu a inserção de um profissional fonoaudiólogo no Ambulatório de Miopatias do ICHC, para fins de pesquisa e atuação multidisciplinar junto aos portadores dessas patologias. A Profa Dra Cláudia Regina Furquim de Andrade me direcionou para fazer a parceria entre o Ambulatório de Miopatias e o Serviço de Fonoaudiologia.

O Ambulatório de Miopatias apresentava uma grande demanda de pacientes com distúrbios de mastigação, deglutição e voz, com patologias de base progressiva, e com prognósticos incertos, despertando assim, meu intenso empenho em compreender e buscar soluções para os distúrbios fonoaudiológicos que os pacientes apresentavam. Iniciei um estudo piloto envolvendo a avaliação da deglutição em portadores da Distrofia Miotônica de Steinert (DMS). Percebemos que poderia ser um estudo mais aprofundado por ser um tema tão pouco explorado pela Fonoaudiologia. Pacientes com DMS apresentam, dentre outras características, maior risco

de broncoaspiração de alimentos, sendo o fonoaudiólogo um dos responsáveis por tratar essa sintomatologia.

Após estudo aprofundado sobre a temática e conhecendo melhor as características da doença, comecei a me questionar até que ponto o fenômeno miotônico, presente nesses pacientes, poderia comprometer a deglutição, visto que esses indivíduos apresentam maior propensão à aspiração bronco pulmonar. Como pode o fenômeno miotônico atuar na musculatura envolvida na deglutição? A deglutição está prejudicada ou será adaptada?

Ingressei no mestrado em 2010, pelo programa de Ciências da Reabilitação do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP, com o projeto intitulado: ‘Caracterização da deglutição em portadores de distrofia miotônica de Steinert’.

Com este trabalho, espero contribuir para melhor compreensão da relação entre a distrofia miotônica de Steinert e a deglutição, orientando os profissionais da saúde sobre as peculiaridades, dificuldades e adequações da deglutição destes indivíduos.

Esta dissertação é apresentada na forma de um artigo científico, sendo que este já foi submetido a um periódico internacional arbitrado da área. O artigo submetido é intitulado: “Oral motor movements and swallowing

in patients with Myotonic Dystrophy Type 1". Por esse motivo, o título do artigo não corresponde ao título da dissertação, uma vez que os dados apresentados e discutidos representam um recorte do projeto de pesquisa original. Optamos pela não mudança de título da dissertação porque entendemos que o texto aqui apresentado é abrangido pelo título original. Os dados obtidos ao longo do estudo, permitirão desdobramentos tanto em novos artigos quanto para a continuidade na pesquisa de doutoramento.

MOVIMENTOS OROFACIAIS E DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES COM DISTROFIA MIOTÔNICA TIPO 1

INTRODUÇÃO

A Distrofia Miotônica de Steinert ou Distrofia Miotônica Tipo 1 (DM1), é uma miopatia genética multisistêmica, transmitida por herança autossômica dominante. O mecanismo molecular responsável pela DM1, cujo gene foi mapeado em 19q, é uma expansão do trinucleotídeo: Citosina, Timina e Guanina (CTG), no gene da proteína quinase (DMPK)^{1,2}. O tamanho da expansão do trinucleotídeo está relacionado com a idade de início da doença e com a severidade do fenótipo. Sendo assim, nas gerações sucessivas, a doença apresenta seus sintomas mais precocemente e se torna progressivamente mais grave (fenômeno de antecipação)³.

A DM1 é considerada a mais comum das distrofias em adultos, com uma prevalência estimada entre 2,1 e 14,3 por 100.000 habitantes em todo o mundo^{2,4-6}. Clinicamente, a DM1 é caracterizada pela miotonia (atraso ou dificuldade do relaxamento do músculo após contração), fraqueza muscular progressiva e atrofia, sobretudo na face (com manifestações orais e maxilofaciais) e pescoço, ptose palpebral, partes distais de membros, problemas gastrointestinais, insuficiência respiratória e distúrbios cardíacos⁷⁻

A fraqueza muscular e a miotonia são responsáveis por alterações na produção da fala de alguns pacientes (por exemplo: disartria flácida)^{10,13}. A qualidade da fala depende da condição e gravidade da doença. Geralmente, esses pacientes apresentam alterações na fala como: monotonia, hipernasalidade, rouquidão, velocidade de fala lentificada, incoordenação pneumofonoarticulatória e inteligibilidade diminuída^{14, 15}.

A pneumonia aspirativa é uma das causas de morte mais comuns nos pacientes com DM1¹⁶. De acordo com a literatura, estudos radiográficos e de manometria, constataram que as principais causas da pneumonia aspirativa são: disfagia orofaríngea e distúrbios de motilidade esofágica¹⁷⁻²⁰. A avaliação eletrofisiológica da deglutição orofaríngea (combinação da eletromiografia de superfície dos músculos suprahióideos e eletromiografia com agulhas do músculo cricofaríngeo) indica que indivíduos com DM1 apresentam o reflexo de deglutição e tempo de elevação de laringe significativamente aumentados²¹. A avaliação da nasofibrolaringoscopia da deglutição também indicou alterações no processo de deglutição para todas as consistências, evidenciando episódios de penetração e aspiração traqueal de alimentos²².

Na DM1, medidas preventivas globais de saúde são imprescindíveis. Considerando os pacientes com distrofia miotônica, o sintoma de disfagia geralmente não é percebido até os estágios mais avançados da doença²⁰. Embora não exista cura, o gerenciamento efetivo da doença pode reduzir

significativamente a morbidade e mortalidade desses pacientes²³. O videodeglutograma é considerado o exame padrão-ouro de avaliação da deglutição²⁴. Porém, este exame tem um alto custo e não pode ser realizado com frequência²⁵. Dado este fato, alguns autores, sugerem a eletromiografia de superfície (EMGs) como um teste não-invasivo, de baixo custo e de fácil realização para avaliação da deglutição²⁶⁻²⁹.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar as características clínicas da motricidade orofacial e a deglutição de indivíduos com distrofia miotônica (DM1), utilizando um protocolo clínico padronizado e eletromiografia de superfície (EMGs).

MÉTODOS

Trata-se de um estudo caso-controle, transversal prospectivo. Essa pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética da Instituição (CAPPesq HCFMUSP 0350/10 – ANEXO 1). Os participantes somente deram início aos procedimentos da pesquisa após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2). O período de coleta dos dados foi de junho de 2010 a julho de 2011.

Participantes

Fizeram parte desse estudo 40 participantes, de ambos os sexos. Foram divididos em dois grupos distribuídos da seguinte forma: G1 composto por 20 portadores de DM1, que freqüentavam o ambulatório de Miopatias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), selecionados de forma randômica, 8 do gênero masculino e 12 do gênero feminino, com média de idade de 36,05 anos; G2 composto por 20 indivíduos normais, sendo 8 do gênero masculino e 12 do gênero feminino, com média de idade de 34,75 anos.

Critérios de inclusão para G1:

Foram considerados critérios de inclusão para participantes de G1:

- a) indivíduos com diagnóstico de DM1. O diagnóstico foi obtido por método clínico e molecular realizado no ambulatório de Miopatias do HCFMUSP;

- b) não apresentar quaisquer déficits cognitivos ou auditivos, conforme prontuário médico;
- c) adultos maiores de 18 anos;
- d) não ter sido submetido a qualquer procedimento cirúrgico de cabeça e pescoço;
- e) não ter sido submetido a qualquer procedimento cirúrgico de esôfago;
- f) não ter realizado tratamento fonoaudiológico prévio.
- g) apresentar pontuação de 6 ou 7 na escala do nível da deglutição da *American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System* (ASHA NOMS), ou seja, pontuação indicativa de que o indivíduo apresenta uma deglutição segura e que se alimenta de forma independente^{30,31}.

Critérios de inclusão para G2:

Foram considerados critérios de inclusão para participantes de G2:

- a) indivíduos que voluntariamente aceitaram participar da pesquisa;
- b) não apresentar histórico familiar para DM1;
- c) não apresentar quaisquer déficits comunicativos, neurológicos, cognitivos ou auditivos;
- c) não apresentar queixa e/ou alteração das funções orofaciais;
- d) não ter sido submetido a qualquer tipo de procedimento cirúrgico de cabeça e pescoço;
- e) não ter sido submetido a qualquer procedimento cirúrgico de esôfago;
- f) ausência de mal oclusão severa;

- g) sem uso de aparatologia ortodôntica;
- h) não ter realizado tratamento fonoaudiológico prévio.

Material

Para realização da EMGs foi utilizado aparelho Eletromiógrafo - Miotool 400 com 4 canais, calibrados em 500 microvolts (mV) com filtro do tipo passa banda (20-500 Hz) e ganho de 100 vezes, com baixo nível de ruído (< 5µV RMS) considerado pela *THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROPHYSIOLOGICAL KINESIOLOGY - ISEK* (s.d.) como o recomendável³².

O software utilizado para a captação e processamento do exame de EMGs foi o aplicativo Miograph 2.0 do fabricante Miotec® Equipamentos Biomédicos que faz aquisição, armazenamento e processamento on-line de sinais e é executado sob o sistema operacional Windows XP. Os sinais da atividade elétrica dos movimentos musculares foram captados por eletrodos bipolares de superfície Ag/AgCl descartáveis, modelo SDS500, duplos, fixados com fita transpore (fabricante 3M). Foram utilizados gaze, álcool 70%, água filtrada, copos e seringas descartáveis de 20 ml. Cabe ressaltar, que a água utilizada estava em temperatura ambiente a fim de evitar a indução ao fenômeno miotônico das estruturas envolvidas na deglutição.

Foi utilizado para a avaliação das estruturas e funções orofaciais, o *Protocol of orofacial myofunctional evaluation with scores – AMIOFE*³³ e pão

francês. Para a gravação das imagens da avaliação clínica, foi utilizada uma câmera digital Panasonic DMC-FS3LB-P.

Procedimentos

Todos os participantes foram submetidos à avaliação fonoaudiológica das funções orofaciais em dois dias, em sessões de 40 minutos. A metodologia e procedimentos adotados para a avaliação dos participantes deste estudo encontram-se descritos abaixo:

Avaliação Clínica Fonoaudiológica

Os indivíduos foram examinados, enquanto sentado em uma cadeira em uma sala com iluminação apropriada, e aplicado o protocolo padronizado *Protocol of orofacial myofunctional evaluation with scores – AMIOFE*³³. Este protocolo foi construído com base em modelos anteriores de avaliação, com a adição de escalas numéricas que refletem as características físicas e comportamentos orofaciais dos indivíduos.

A avaliação foi realizada, de acordo com o protocolo, e os componentes do sistema estomatognático, ou seja, lábios, língua, mandíbula e bochechas, foram avaliados em termos de mobilidade e desempenho durante as funções de deglutição e de mastigação. Os indivíduos foram avaliados individualmente por inspeção visual e complementada pelas imagens gravadas na câmera digital. Para a avaliação da mobilidade, os indivíduos foram solicitados a realizar movimentos isolados dos lábios,

língua, mandíbula e bochechas. Na análise é considerado normal movimentos isolados de cada componente, precisos e sem tremor. Deve ser considerado como alteração: falta de precisão no movimento, tremor, movimentos associados de outros componentes (exemplo, lábios que acompanham os movimentos da língua), e ainda, a incapacidade para realizar o movimento. O examinador atribuiu escores utilizando uma escala de 3 pontos: 3 = normal, 2 = capacidade insuficiente e 1 = ausência de capacidade ou de ser incapaz de executar a tarefa. Na deglutição o padrão é considerado normal, quando a língua estiver contida na cavidade oral, ocorrendo contração dos músculos elevadores e vedamento anterior da cavidade oral sem esforço.

Para a mastigação, o sujeito foi instruído a mastigar os alimentos de forma habitual. Na análise de imagens gravadas em vídeo, os seguintes parâmetros foram considerados: mastigação alternada bilateral, simultânea bilateral, crônica unilateral (95% do tempo no mesmo lado da cavidade), ou anterior; preferência de mastigação unilateral (66% do tempo no mesmo lado) ou anterior, e o tempo total necessário para consumir o alimento foi medido com um cronômetro digital (Nike, WR0016-001P - 10 LAP). Tal como descrito no protocolo específico, de mastigação e função de deglutição foram pontuados como normal (3), disfunção leve (2), ou disfunção grave (1). Outros comportamentos (por exemplo, movimento e/ou alteração da postura da cabeça e de outras partes do corpo, escape de alimentos, e movimentos mandibulares descoordenados) foram definidos como normal

quando eles receberam uma pontuação de 2 e alterados quando eles receberam uma pontuação de 1.

Todos os participantes foram avaliados por dois fonoaudiólogos experientes. Os examinadores foram devidamente treinados na avaliação miofuncional orofacial e apresentariam um alto nível de concordância (> 0,89).

Avaliação instrumental – EMGs:

Todos os exames de EMGs foram realizados pelo Serviço de Fonoaudiologia do Instituto Central do HCFMUSP e pelo mesmo fonoaudiólogo com experiência na área, nas mesmas condições ambientais. Previamente à coleta dos dados o equipamento foi calibrado conforme normas estabelecidas pela *THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROPHYSIOLOGICAL KINESIOLOGY ISEK*³². O posicionamento dos eletrodos obedeceu à técnica de colocação do ponto médio do ventre muscular na direção longitudinal do feixe muscular na posição mesodistal do músculo conforme sugerido por Soderberg e Cook³⁴; onde se observa maior amplitude de sinal para este tipo de eletrodo. Para garantir o correto posicionamento dos eletrodos, foi realizada a identificação dos músculos por meio da palpação durante o repouso e na contração máxima – foi solicitada a máxima intercuspidação dentária e deglutição. Após esta etapa, a função muscular foi testada para a verificação de possíveis erros de posicionamento e realizada nova colocação do eletrodo, quando necessário.

Para a coleta dos dados eletromiográficos, todos participantes estavam confortavelmente sentados em uma cadeira, com as costas apoiadas, pés apoiados no chão, mãos apoiadas nos membros inferiores, cabeça posicionada adequadamente (Plano de Frankfurt paralelo ao chão), olhos abertos e buscando um ponto fixo pré-determinado. Todos os indivíduos foram orientados quanto ao teste. A pele da face foi preparada utilizando gaze embebida em álcool 70% para remover a oleosidade e as células mortas presentes no local e realizada tricotomia local, ambos para garantir adequada impedância durante a realização do exame. Os sinais captados foram analisados em *root mean square* (RMS) e expressos em microvolts (μV). O cabo de referência (cabo terra) foi conectado ao eletrodo e fixado sobre o pulso direito.

De acordo com a metodologia proposta por Vaiman et al. (2004), foi verificada a atividade mioelétrica dos seguintes músculos: (1) orbicular da boca (OO); (2) masseter (MS); (3) musculatura suprahioidea (SH) que inclui os músculos digástrico, milohioideo e geniohioideo; e (4) musculatura extrínseca da laringe (MEL) incluindo os músculos infrahioideo e tirohioideo. Estes músculos foram selecionados por serem superficiais e por estarem envolvidos nas fases oral e faríngea da deglutição.

A posição dos eletrodos pode ser observada na Figura 1: (1) dois eletrodos de superfície no ângulo direito da boca, um acima do lábio superior

e outro abaixo do lábio inferior (localização OO); (2) dois eletrodos paralelos às fibras do músculo masseter no lado esquerdo da face (localização MS); (3) dois eletrodos abaixo do queixo na linha mediana para gravar a atividade mioelétrica da musculatura SH; (4) dois eletrodos na lateral esquerda da cartilagem tireóide para gravar a atividade mioelétrica dos músculos da laringe (MEL).

Fig. 1. Posicionamento dos eletrodos

A avaliação eletromiográfica foi realizada em duas etapas:

- a) Repouso - cada participante foi instruído a permanecer o mais relaxado possível durante 1 minuto. Após esse tempo foram gravados 30 segundos de atividade muscular dos músculos OO, MS, SH e MEL;
- b) Avaliação da deglutição: três testes de deglutição foram solicitados por três vezes: 1) Deglutição voluntária de saliva: O participante

recebeu a seguinte instrução - “Engula a saliva que está agora na sua boca”; 2) Oferta de água no copo de 16,5 ml de água. O participante recebeu a seguinte instrução “Beba toda a água em apenas um gole”; 3) Oferta de 20 ml de água no copo. O participante recebeu a seguinte instrução: “Beba toda a água em apenas um gole”. Este último teste visa verificar a habilidade de deglutição de um maior volume de bolo.

Desta forma, foram obtidas um total de 9 deglutições por participante, perfazendo um total de 360 análises.

Análise da eletromiografia de superfície

Para a análise dos resultados da EMGs foi utilizado a análise do domínio temporal. Neste caso, a informação obtida descreve em que momento o evento ocorreu e qual a amplitude (indicador da magnitude da atividade muscular) de sua ocorrência. Na situação de repouso, os valores obtidos representam a média (RMS) da atividade eletromiográfica observada em 30 segundos. A duração da atividade muscular durante as tarefas de deglutição foi obtida pela seleção do trecho representativo da ativação muscular (situação *on*, *pico* e *off*). Esse trecho foi selecionado com o cursor do próprio programa de eletromiografia e convertido em microvolts (μV).

Fig. 2. Sinal eletromiográfico retificado da deglutição de 16,5ml – G1.

Legenda: A - trecho de análise do músculo orbicular da boca.
 B - trecho de análise do músculo masseter.
 C - trecho de análise da musculatura supraioidea
 D - trecho de análise da musculatura extrínseca da laringe.

Fig. 3. Sinal eletromiográfico retificado da deglutição de 16,5ml – G2.

Legenda: A - trecho de análise do músculo orbicular da boca.
 B - trecho de análise do músculo masseter.
 C - trecho de análise da musculatura suprahióidea
 D - trecho de análise da musculatura extrínseca da laringe.

Confiabilidade

Com base na literatura relacionada, que aponta subjetividade na leitura das medidas da EMGs, foi realizada análise de confiabilidade a fim de determinar o índice de concordância entre os examinadores e assim garantir maior fidedignidade das medidas. Para tanto, foram selecionadas randomicamente 30 amostras eletromiográficas de um total de 360. Essas amostras foram analisadas, independentemente, por dois pesquisadores com experiência na área, cegos ao estudo. O coeficiente de correlação mostrou-se alto para todas as comparações (intervalo de confiança de 95% [IC] = 0.9345-0.9768), indicando alta consistência entre os examinadores.

Análise dos Dados

As análises estatísticas descritivas e inferenciais foram executadas com o software SPSS versão 17.0. Os pressupostos da distribuição normal em cada grupo e a homogeneidade das variâncias entre os grupos foram avaliados, respectivamente, com o teste de Shapiro-Wilk e com o teste de Levene. Para as variáveis quantitativas dependentes onde foram analisados dois fatores foi utilizada ANOVA de duplo fator com medidas repetidas para um fator. Quando foi necessário realizar comparações múltiplas de médias, utilizou-se do teste de Bonferroni, foi usado para assegurar um nível de significância 0,05. O teste t de Student foi utilizado para as variáveis onde foi analisado um fator.

RESULTADOS

A Tabela 1, se refere a caracterização da idade dos participantes. A análise estatística demonstra que não houve diferenças significativas entre os grupos quanto a idade.

Tabela 1 - Caracterização dos grupos quanto a idade

	MÉDIAS(DP) IDADE	F	<i>p</i>
GP	36,05(8,32)	0,32	0,564
GC	34,55(7,95)	0,32	0,564

Legenda: DP: Desvio Padrão; GP: Grupo de Pesquisa; GC: Grupo Controle.

A Tabela 2 apresenta a descrição dos dados encontrados na avaliação fonoaudiológica clínica, de acordo com o protocolo AMIOFE³³. Conforme o esperado, todos os itens avaliados apresentaram diferença significativa na comparação entre os grupos. A mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios foi o item que mostrou maior diferença entre os grupos. De maneira geral, o grupo pesquisa apresentou menor pontuação para todos os itens, demonstrando que há alteração na postura e posição, mobilidade, funções de respiração, mastigação e deglutição do sistema estomatognático.

Tabela 2 - Comparação entre grupos para o AMIOFE

	MÉDIAS (DP)			
	GP	GC	F	<i>p</i>
POSTURA E POSIÇÃO	11,90(2,24)	15,70(1,49)	4,22	<0,001*
MOBILIDADE	43,05(8,02)	52,65(3,51)	17,04	<0,001*
FUNÇÕES	14,40(2,80)	21,80(2,57)	0,09	<0,001*
TOTAL	69,35(10,15)	90,15(3,91)	25,08	<0,001*

* *p*-valores considerados estatisticamente significantes

Legenda: DP: Desvio Padrão; GP: Grupo de Pesquisa; GC: Grupo Controle.

Na Tabela 3 está apresentada a análise comparativa entre os grupos para a amplitude da EMGs e duração (tempo) da contração muscular. Quanto a amplitude da EMGs não foi evidenciado diferença estatisticamente significativa entre os grupos para nenhuma das tarefas de deglutição com água. Apenas na tarefa de deglutição de saliva, o músculo orbicular do GC apresentou maior ativação muscular que o GP.

De acordo com a Tabela 3, GP apresenta um tempo significativamente maior para a realização dos movimentos da deglutição quando comparado ao GC em todas as tarefas de deglutição. A única ressalva foi para a deglutição de saliva, que para todos os músculos, exceto a musculatura extrínseca da laringe, não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos.

Tabela 3 - Comparação entre grupos para amplitude e duração da ativação muscular

			MÉDIAS (DP) EMGs		F	p
			GP	GC		
EMGs (RMS)	OO	SALIVA	2,70(1,32)	4,46(3,64)	4,12	0,049*
		16,5 ML	4,17(2,18)	5,69(3,63)	2,57	0,117
		20 ML	4,06(1,86)	5,77(3,45)	3,79	0,059
	MS	SALIVA	1,90(0,62)	2,37(1,49)	1,68	0,203
		16,5 ML	2,08(0,87)	2,91(2,81)	1,57	0,218
		20 ML	2,10(0,81)	2,72(2,05)	1,60	0,213
	SH	SALIVA	2,74(1,20)	4,00(2,73)	3,55	0,067
		16,5 ML	3,34(1,35)	4,46(2,51)	3,04	0,089
		20 ML	3,42(1,87)	4,43(2,22)	2,38	0,131
	MEL	SALIVA	1,86(0,52)	2,07(0,68)	1,18	0,284
		16,5 ML	2,60(1,85)	2,36(0,72)	0,29	0,592
		20 ML	2,39(1,59)	2,28(0,64)	0,09	0,770
TEMPO (em segundos)	OO	SALIVA	2,02(0,68)	1,81(0,32)	1,46	0,234
		16,5 ML	3,43(1,06)	2,20(0,76)	17,89	< 0,001*
		20 ML	3,64(1,16)	2,21(0,75)	21,15	< 0,001*
	MS	SALIVA	1,87(0,55)	1,74(0,37)	0,81	0,372
		16,5 ML	2,61(0,73)	1,91(0,57)	10,95	0,002*
		20 ML	2,48(0,62)	1,79(0,39)	17,07	< 0,001*
	SH	SALIVA	1,75(0,42)	1,79(0,25)	0,12	0,730
		16,5 ML	2,12(0,61)	1,82(0,37)	3,32	0,076
		20 ML	2,04(0,59)	1,79(0,42)	2,28	0,139
	MEL	SALIVA	1,88(0,59)	1,57(0,31)	4,38	0,043*
		16,5 ML	2,34(0,84)	1,66(0,32)	11,19	0,002*
		20 ML	2,17(0,60)	1,62(0,40)	11,43	0,002*

* p-valores considerados estatisticamente significantes

Legenda: DP: Desvio Padrão; GP: Grupo de Pesquisa; GC: Grupo Controle; RMS: *root mean square*.

OO:músculo orbicular da boca; MS: músculo masseter; SH: musculatura supraioidea; MEL: musculatura extrínseca da laringe

Na Tabela 4 são apresentados os resultados da análise estatística para a comparação intragrupos das variáveis da EMGs e do tempo de duração da ativação muscular. Quanto a amplitude da ativação muscular do

grupo GP, observou-se diferença significativa para o músculo orbicular e para os músculos extrínsecos da laringe. Em ambos os casos, a ativação muscular foi menor durante a deglutição da saliva (OO: Saliva x 16,5ml – $p=0,016^*$; Saliva x 20ml – $p=0,45^*$; 16,5ml x 20ml – $p=1,000$; MEL: Saliva x 16,5ml – $p=0,019^*$; Saliva x 20ml – $p=0,071$; 16,5ml x 20ml – $p=0,137$), ou seja, houve diferença na ativação muscular de OO e MEL na comparação da performance da saliva em relação ao primeiro volume. Na comparação entre os volumes de água, não foram observadas diferenças significantes. Quando comparados os diferentes volumes na ativação dos músculos testados, não foram encontradas diferenças significantes para GC.

Quanto ao tempo de duração da ativação muscular, foram observadas diferenças significantes para GP em todas as tarefas de deglutição para todos os músculos. De maneira geral, GP apresentou maior duração da atividade muscular durante a deglutição de água se comparada a deglutição de saliva (OO: Saliva x 16,5ml – $p<0,001^*$; Saliva x 20ml – $p<0,001^*$; 16,5ml x 20ml – $p=0,612$; MS: Saliva x 16,5ml – $p<0,001^*$; Saliva x 20ml – $p<0,001^*$; 16,5ml x 20ml – $p=1,000$; SH - Saliva x 16,5ml – $p=0,025^*$; Saliva x 20ml – $p=0,087$; 16,5ml x 20ml – $p=1,000$; MEL: Saliva x 16,5ml – $p=0,001^*$; Saliva x 20ml – $p=0,39^*$; 16,5ml x 20ml – $p=0,494$). Não foram encontradas nenhuma diferença significativa para GC na duração da ativação muscular quando comparados os diferentes volumes.

Tabela 4 - Comparação intragrupos para amplitude e duração da ativação muscular nos diferentes volumes ofertados

			MÉDIAS(DP)				
			SALIVA	16,5 ML	20 ML	F	p
EMGs (RMS)	GP	OO	2,70(1,32)	4,17(2,18)	4,06(1,86)	4,27	0,021*
		MS	1,90(0,62)	2,08(0,87)	2,10(0,81)	0,34	0,717
		SH	2,74(1,20)	3,34(1,35)	3,42(1,87)	2,43	0,102
		MEL	1,86(0,52)	2,60(1,85)	2,39(1,59)	4,35	0,020*
	GC	OO	4,46(3,64)	5,69(3,63)	5,77(3,45)	3,09	0,057
		MS	2,37(1,42)	2,91(2,81)	2,72(2,05)	1,48	0,240
		SH	4,00(2,73)	4,46(2,51)	4,43(2,22)	1,31	0,282
		MEL	2,07(0,68)	2,36(0,72)	2,28(0,64)	0,68	0,512
TEMPO (em segundos)	GP	OO	2,02(0,68)	3,43(1,06)	3,64(1,16)	43,11	<0,001*
		MS	1,87(0,55)	2,61(0,73)	2,48(0,62)	14,04	<0,001*
		SH	1,75(0,42)	2,12(0,61)	2,04(0,59)	4,02	0,026*
		MEL	1,88(0,59)	2,34(0,84)	2,17(0,60)	7,61	0,002*
	GC	OO	1,81(0,32)	2,20(0,76)	2,21(0,75)	2,92	0,066
		MS	1,74(0,37)	1,91(0,57)	1,79(0,39)	0,71	0,495
		SH	1,79(0,25)	1,82(0,37)	1,79(0,42)	0,04	0,961
		MEL	1,57(0,31)	1,66(0,32)	1,62(0,40)	0,33	0,721

* p-valores considerados estatisticamente significantes

Legenda: DP: Desvio Padrão; GP: Grupo de Pesquisa ; GC: Grupo Controle ; RMS: *root mean square*.

OO:músculos orbicular da boca ; MS: músculo masseter; SH: musculatura suprahioidea; MEL: musculatura extrínseca da laringe

DISCUSSÃO

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar as características clínicas da motricidade orofacial e da deglutição de pacientes com DM1 que apresentavam deglutição segura, de acordo com a escala de deglutição ASHA NOMS. A deglutição é um processo complexo, que exige a coordenação precisa de mais de 25 músculos³⁶, envolve a contração de vários músculos orofaciais, faringe, laringe, vias respiratórias, esôfago³⁷ além de seis pares de nervos cranianos e lóbulo frontal³⁸. Nossos resultados sugerem que pacientes com DM1 apresentam déficits significativos relacionados à posição, postura e mobilidade dos órgãos orais miofuncionais e no desempenho relacionado à deglutição e a mastigação. Além disso, os resultados da EMGs para diferentes tarefas de deglutição indicaram maior atividade muscular do orbicular da boca e maior duração da ativação muscular para os músculos: orbicular da boca, masseter e musculatura extrínseca da laringe.

De acordo com o exame clínico (AMIOFE)³³, os resultados do presente estudo confirmam o que já foi descrito na literatura^{6,13,21,22,39-41}, ou seja, a fraqueza muscular como tendo um impacto sobre o sistema miofuncional orofacial e, conseqüentemente, sobre as funções orais como mastigação e deglutição. É importante ressaltar, que no presente estudo a mobilidade dos órgãos motores orais foi a característica clínica que se mostrou mais comprometida. De acordo com a metodologia de aplicação do

AMIOFE³³, a mobilidade é avaliada por meio de movimentos isolados dos lábios, língua, mandíbula e bochechas. Os movimentos são classificados como adequados somente se eles forem precisos e realizados sem qualquer tremor³³. No presente estudo, vários indivíduos portadores de DM1 apresentaram o fenômeno miotônico durante a realização dos movimentos solicitados. Embora os pacientes fossem capazes de realizar a maioria desses movimentos, esses foram classificados como inadequados devido a dificuldades em executá-los consecutivamente e com a coordenação necessária (ou seja, os movimentos eram lentos e descoordenados).

O protocolo AMIOFE³³ não foi especificamente desenvolvido para avaliar pacientes com DM1, mas sim para investigar déficits de motricidade orofacial da população em geral. Por esta razão, não foi realizada uma avaliação específica das características neurológicas, incluindo miotonia. Até recentemente, não existiam escalas funcionais disponíveis para explorar a DM1⁴². Vários testes têm sido relatados na literatura, no entanto, estes apresentam aspectos específicos para quantificar de forma global as diferentes doenças e suas características neurológicas específicas⁴³⁻⁴⁷. Contardi et al. (2012)⁴² apresentaram uma primeira proposta de escala de avaliação clínica e funcional para DM1. A escala proposta pelos autores inclui a avaliação da função neuromuscular e estado de incapacidade de pacientes com DM1. O protocolo envolve a avaliação da força muscular dos dedos, pescoço e músculos distais dos membros superiores e inferiores; densidade dos músculos intercostal e dos principais músculos dos membros

inferiores; função neuropsicológica e algumas escalas de desabilidades relacionadas a atividades de vida diária e a qualidade do sono. Embora esta seja uma ferramenta muito promissora, ainda não inclui a avaliação do sistema miofuncional oral, e, mais especificamente do impacto da fraqueza muscular e miotonia na deglutição.

Quanto aos resultados da EMGs, pôde ser observado que, durante a deglutição de saliva, o músculo orbicular da boca dos portadores de DM1 apresentou menor ativação que a normalidade. Uma possível explicação para esse resultado é a fraqueza muscular facial generalizada apresentada por esses indivíduos^{6,13,22,39-41}. A literatura^{13,22,39-41,48} aponta que as características marcantes dos portadores de DM1 são: face alongada, respiração oral e lábios entreabertos. Essas características craniofaciais podem contribuir para a diminuição da ativação do músculo orbicular da boca durante a sua funcionalidade e na ativação muscular⁴⁹. Para os demais músculos testados, não se observou diferença na ativação elétrica.

A duração da deglutição na EMGs refere-se ao tempo necessário para completar um ciclo de ativação de um músculo ou de um grupo muscular para a realização do evento. Uma doença que aumenta a duração da atividade do músculo e/ou distúrbios sequenciais na ativação dos vários músculos envolvidos na deglutição podem aumentar a duração do evento na EMGs⁵⁰. As fases da deglutição podem ser detectadas com sucesso somente se os registros forem feitos com EMGs e com investigação

radiográfica simultânea³⁵. De acordo com a literatura^{25,26,35,53} os eletrodos posicionados em OO e MS representam a fase oral da deglutição, os eletrodos em MS e SH representam a fase orofaríngea e em MS, SH e MEL correspondem a fase faríngea, SH e MEL representam a fase inicial esofágica. No presente estudo, para os eletrodos localizados em OO, MS e MEL, a duração de EMGs foi significativamente maior em pacientes com DM1 quando comparados ao grupo controle, quando considerando os volumes de água testados. Estes resultados sugerem que pacientes com DM1 necessitam de maior tempo para passar um bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago. A maior duração da EMGs no grupo DM1 pode estar relacionado a miotonia e/ou incoordenação dos músculos envolvidos no processo da deglutição ou ainda pode refletir uma possível adaptação fisiológica para a deglutição segura.

A amplitude na EMGs é um aspecto importante na relação entre a força muscular e a atividade elétrica⁵². Considerando todos os diferentes tipos de distúrbios neuromusculares, a amplitude é uma das características mais informativas⁵³. Não foi observado aumento significativo na amplitude da EMGs, nos pacientes com DM1, quando comparando os resultados obtidos no teste de água com 16,5 ml e com 20ml (deglutição com estresse). Diferenças significativas foram observadas apenas para os eletrodos localizados em OO e MEL quando comparadas a deglutição de saliva com os diferentes volumes de água. Diferenças significativas foram igualmente observadas para a duração da EMGs, para todos os locais de eletrodos

testados, quando comparada a deglutição de saliva e os diferentes volumes de água.

A característica marcante da miotonia é a dificuldade de relaxamento do músculo após a contração. Contrações musculares repetidas podem reduzir a miotonia, um recurso conhecido como fenômeno de "aquecimento"⁵⁴. Esse fenômeno poderia explicar o fato de não ter sido encontrada diferença entre os testes de deglutição com 16,5ml e 20 ml de água. Apesar de ter sido respeitado um intervalo entre os testes para evitar a possível fadiga muscular, este intervalo de tempo pode não ter sido suficiente para cancelar as capacidades de acomodação.

O comprometimento da deglutição na DM1 é conhecido desde a descrição da doença por Steinert em 1909⁵⁶. A disfagia é um sintoma frequentemente encontrado e tem sido relatada com uma prevalência entre 25% e 80% dos indivíduos^{20, 56-59}. De acordo com os achados do presente estudo, utilizando critérios clínicos e eletrofisiológicos, pacientes com DM1 considerados como tendo uma deglutição segura, apresentam alterações fisiológicas da deglutição. As publicações sobre disfagia nesta população são escassas, principalmente em nosso país. Apesar da disfagia ser um dos sintomas apresentados por pacientes com DM1, pouca ênfase é dada à identificação precoce de alterações da deglutição; a atenção é dada apenas quando a deglutição do paciente já está gravemente comprometida. O tratamento da DM1 envolve modificações de estilo de vida. A identificação

precoce dos distúrbios da deglutição nessa população permitiria a reabilitação miofuncional oral nos estágios iniciais da patologia (ou seja, o uso de estratégias compensatórias). Acredita-se que a reabilitação precoce poderia diminuir o risco de pneumonia aspirativa.

Estudos futuros se fazem necessários para a investigação do processo de deterioração da deglutição nesta população e de que forma os processos de reabilitação poderiam manter esta função saudável por um maior período de tempo.

CONCLUSÃO

Em comparação com indivíduos saudáveis, os pacientes com DM1 apresentaram déficits em posição, postura e mobilidade dos órgãos miofuncionais orais, bem como mastigação e deglutição comprometidas. Em relação aos resultados da EMGs, estes pacientes apresentaram maior duração de tempo para realizar o trajeto do bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago. A maior duração da deglutição na EMGs no grupo DM1, possivelmente está relacionada a miotonia e/ou incoordenação dos músculos envolvidos no processo da deglutição ou pode estar relacionado a uma adaptação fisiológica para uma deglutição segura.

ANEXOS

ANEXO1

APROVAÇÃO

A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em sessão de 07/07/2010, **APROVOU** o Protocolo de Pesquisa nº **0350/10**, intitulado: "**CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES OROFACIAISEM PORTADORES DE DISTROFIA MIOTÔNICA DE STEINERT**" apresentado pelo Departamento de **FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL**, inclusive o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar à CAPPesq, os relatórios parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10/10/1996, inciso IX.2, letra "c").

Pesquisador (a) Responsável: **Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de Andrade**

Pesquisador (a) Executante: **Beatriz Ercolin**

CAPPesq, 07 de Julho de 2010

PROF. DR. CLAUDIO LEONE
Vice-Presidente da Comissão Ética para Análise
de Projetos de Pesquisa

ANEXO 2**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP****MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO****DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL**

1. NOME: :.....

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : SEXO : .M ☐ F ☐

DATA NASCIMENTO:/...../.....

ENDEREÇO Nº APTO:

BAIRRO: CIDADE

CEP:..... TELEFONE: DDD (.....)

2. RESPONSÁVEL LEGAL

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.....SEXO: M ☐ F ☐

DATA NASCIMENTO.:/...../.....

ENDEREÇO: Nº APTO:

BAIRRO: CIDADE:

CEP: TELEFONE: DDD

(.....).....

DADOS SOBRE A PESQUISA1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES OROFACIAIS EM
PORTADORES DE DISTROFIA MOTÔNICA DE STEINERT

PESQUISADOR :Claudia Regina Furquim de Andrade.

CARGO/FUNÇÃO: Professor Titular INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRFa/SP
2936.....

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Fonoaudiologia do Instituto Central .

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO X

RISCO MÉDIO ☐RISCO BAIXO ☐RISCO MAIOR ☐

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP

Esta pesquisa tem como objetivo verificar se existe alguma dificuldade/alteração na sua forma de mastigar, engolir, respirar e o funcionamento de todos os músculos do seu rosto e da sua boca. Esta avaliação é importante para que as dificuldades em engolir sejam melhor compreendidas e com isso possa ser oferecido o tratamento mais adequado. Esta pesquisa é importante porque não existem muitos estudos nessa área, principalmente aqui no Brasil.

Cada pessoa que participar da pesquisa fará uma avaliação de todos os músculos do rosto e da boca. Esta avaliação será realizada em dois dias. Você deverá realizar alguns movimentos com a sua boca e língua conforme as instruções dadas pela pesquisadora. No primeiro dia, para verificar como você mastiga e engole, será pedido que você coma meio pão francês. No segundo dia, para avaliar como você engole, será utilizado um equipamento especial. Para isso serão colados no seu rosto oito bolinhas de metal (eletrodos) com o objetivo de verificar como seus músculos estão funcionando enquanto você bebe água. Esse exame não dói e não provoca qualquer tipo de desconforto.

Além de ajudar no trabalho com pessoas com dificuldade para mastigar, engolir ou, respirar, a pessoa que participar da pesquisa e apresentar qualquer alteração dos músculos do rosto ou na forma de mastigar e engolir receberá atendimento fonoaudiológico específico, oferecido pelo Serviço de Fonoaudiologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O participante da pesquisa poderá, a qualquer momento, ter acesso aos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa. Poderá, também, solicitar qualquer esclarecimento à pesquisadora sobre dúvidas que venham a surgir durante a realização da pesquisa.

Poderá retirar o consentimento de participação na pesquisa a qualquer momento e assim, deixar de participar do estudo. Esta atitude não trará nenhum tipo de prejuízo à continuidade de assistência que o participante possa vir a necessitar. O principal investigador é a Dra. Fernanda Chiarion Sassi que pode ser encontrada no endereço Rua Cipotânea, 51- Cidade Universitária – São Paulo/SP, CEP. 05360-160 Telefone(s) 3091-7453. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br

Todos os dados obtidos, bem como a identidade de cada participante da pesquisa, serão mantidos em sigilo e somente a pesquisadora responsável pelo estudo terá acesso aos dados para análise e discussão.

Acredito ter sido suficientemente clara a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo "CARACTERIZAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO EM PORTADORES DE DISTROFIA MOTÔNICA DE STEINERT". Eu discuti com a Profa. Dra. Claudia Regina Furquim de Andrade e/ou a Fonoaudióloga Beatriz Ercolin sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

Assinatura do paciente/representante
legal

Data ____/____/____

Assinatura da testemunha

Data ____/____/____

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual.

(Somente para o responsável do projeto)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

Assinatura do responsável pelo estudo

Data ____/____/____

REFERÊNCIAS

1. Harley HC, Brook JD, Rundle SA, et al (1992) Expansion of an unstable DNA region and phenotypic variation in myotonic dystrophy. *Nature* 355(6360):545-6.
2. Shaw DJ, Harper PS (1989) Myotonic dystrophy: developments in molecular genetics. *BR Med Bull* 45(3):745-59.
3. Harley HG, Rundle SA, MacMillan JC, et al (1993) Size of the unstable CTG repeat sequence in relation to phenotype and parental transmission in myotonic dystrophy. *Am J Hum Genet* 52(6):1164-74.
4. Mathieu J, Allard P, Potvin L, et al (1999) A 10 year study of mortality in a cohort of patients with myotonic dystrophy. *Neurology* 52(8):1658-62.
5. Yotova V, Labuda D, Zietkiewicz E, et al (2005) Anatomy of a founder effect: myotonic dystrophy in Northeastern Quebec. *Hum Genet* 117(2-3):177-87.
6. Gagnon C, Chouinard MC, Laberge L, et al (2010) Health supervision and anticipatory guidance in adult myotonic dystrophy type 1. *Neuromuscul Disord* 20(12):847-51. doi:10.1016/j.nmd.2010.08.006.
7. Peñarrocha M, Bagan JV, Vilchez et al (1990) Oral alterations in Steinert's myotonic dystrophy: a presentation of two cases. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 69(6):698-700.
8. Mercier J, Bennani F, Ferri J, et al (1995) Maxillofacial manifestations of Steinert's myotonic dystrophy. *Rev Stomatol Chir Maxillofac* 96(2):74-82.

9. Sovari AA, Bodine CK, Farokin F (2007) Cardiovascular manifestation of myotonic dystrophy-1. *Cardiol Rev* 15(4):191-4. doi: 10.1097/CRD.0b013e318070d1a7.
10. Ramig LA, Scherer RC, Titze IR, et al (1988) Acoustic analysis of voice of patients with neurologic disease: rationale and preliminary data. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 97(2 Pt 1):164-72.
11. Salomonson J, Kawamoto H, Wilson J (1988) Velopharyngeal incompetence as the presenting symptom of myotonic dystrophy. *Cleft Palate J* 25(3):296-300.
12. Weinberg B, Bosma JF, Shanks JC, et al (1968) Myotonic dystrophy initially manifested by speech disability. *J Speech Hear Disord* 33(1):51-9.
13. deSwart BJ, van Engelen BG, van de Kerkhof JP, et al (2004) Myotonia and flaccid dysarthria in patients with adult onset myotonic dystrophy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 75(10):1480-02. doi:10.1136/jnnp.2003.032151.
14. Darley FL, Aronson AE, Brown JR (1975) Motor speech disorders. WB Saunders Co, Philadelphia.
15. McNeil MR (1997) Clinical management of sensorimotor speech disorders. Thieme, Stuttgart.
16. de Die Smulders CE, Höweler CJ, Thijs C et al (1998) Age and causes of death in adult-onset myotonic dystrophy. *Brain* 121:1557-63.
17. Garret JM, DuBose TD Jr, Jackson JE, et al (1969) Esophageal and pulmonary disturbance in myotonia dystrophica. *Arch Intern Med* 123(1):26-32.

18. Hughes DT, Swann JC, Gleeson JA, et al (1965) Abnormalities in swallowing associated with dystrophica myotonica. *Brain* 88(5):1037-42.
19. Gillarn PM, Heaf PJ, Kaufman L, et al (1964) Respiration in dystrophia myotonica. *Thorax* 19:112-20.
20. Harvey JC, Sherbourne DH, Siegel CI (1965) Smooth muscle involvement in myotonic dystrophy. *Am J Med* 39:81-90.
21. Ertekin C, Yüceyar N, Aydogdu I, et al (2001) Electrophysiological evaluation of oropharyngeal swallowing in myotonic dystrophy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 70(3):363-371. doi: 10.1136/jnnp.70.3.363.
22. Chiappetta AL, Oda AL, Zanoteli E, et al (2001) Oropharyngeal dysphagia in the myotonic dystrophy: phonoaudiological evaluation and nasofibrolaryngoscopic analysis. *Arq Neuropsiquiatr* 59(2-B):394-400.
23. Turner C, Hilton-Jones D (2010) The myotonic dystrophies: diagnosis and management. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 81(4):358-67. doi: 10.1136/jnnp.2008.158261.
24. Eisenhuber E, Schima W, Schober E, et al (2002) Videofluoroscopic assessment of patients with dysphagia: pharyngeal retention is a predictive factor for aspiration. *AJR Am J Roentgenol* 178(2):393-8.
25. Ertekin C, Aydogdu I, Yüceyar N (1996) Piecemeal deglutition and dysphagia limit in normal subjects and in patients with swallowing disorders. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 61(5):491-6.
26. Vaiman M (2007) Standardization of surface electromyography utilized to evaluate patients with dysphagia. *Head Face Med* 3:26. doi:10.1186/1746-160X-3-26.

27. Ertekin C, Aydogdu I, Yüceyar N, et al (1988) Electrodiagnostic methods for neurogenic dysphagia. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 109(4):331-40.
28. Alfonsi E, Veríssimo M, Merlo IM, et al (2007) Electrophysiologic patterns of oral-pharyngeal swallowing in parkinsonian syndromes. *Neurology* 68(8):583-90.
29. Coriolano MD, Belo LR, Carneiro D, et al (2012) Swallowing in patients with Parkinson's disease: a surface electromyography study. *Dysphagia* [epub ahead of print]. doi 10.1007/s00455.012-9406-0.
30. Rockville, MD (1998) American Speech-Language-Hearing Association National Outcome Measurement System (NOMS). Adult Speech-Language Pathology training manual, ASHA.
31. Wesling M, Brady S, Jensen M, et al (2003) Dysphagia outcomes in patients with brain tumors undergoing inpatient rehabilitation. *Dysphagia* 18:203-210. doi: 10.1007/s00455-002-0098-8.
32. Merletti R. Standards for Reporting EMG data. *Journal of Electromyography and Kinesiology*. 1999;9(1):III-IV
33. Felício CM, Ferreira CL (2008) Protocol of orofacial myofunctional evaluation with scores. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 72(3):367-75. doi:10.1016/j.ijporl.2007.11.012.
34. Soderberg GL, Cook MT. Electromyography in biomechanics. *Phys Ther*. 64(12):1813-20, 1984.

35. Vaiman M, Eviatar E, Segal S (2004) Evaluation of normal deglutition with the Help of Rectified surface electromyography records. *Dysphagia* 19:125-132. doi:10.1007/s00455-003-0504-x.
36. Bordon A, Bokhari R, Sperry J, et al (2011) Swallowing dysfunction after prolonged intubation: analysis of risk factors in trauma patients. *Am J Surg* 202:679-682. doi: 10.1016/j.amjsurg.2011.06.030.
37. Klahn MS, Perlman AI (1999) Temporal and durational patterns associating respiration and swallowing. *Dysphagia* 14:131-138. doi: 10.1007/PL00009594.
38. Brown CV, Hejl K, Mandaville AD, et al (2011) Swallowing dysfunction after mechanical ventilation in trauma patients. *J Crit Care* 26:108.e9-108.e13. doi: 10.1016/j.jere.2010.05.036.
39. Conravey A, Santana-Gould L (2010) Myotonia congenita and myotonic dystrophy: surveillance and management. *Curr Treat Options Neurol* 12(1):16-28. doi: 10.1007/s11940-009-0055-z.
40. Araújo FS, Bessa Júnior RC, Castro CH, et al (2006) Anesthesia in a patient with Steinert disease: case report. *Rev Bras Anesthesiol* 56(6):649-53.
41. Buchholz DW (1994) Dysphagia associated with neurological disorders. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 48(2):143-55.
42. Contardi S, Pizza F, Falzoni F, et al (2012) Development of a disability scale for myotonic dystrophy type 1. *Acta Neurol Scand* 125:431-438. doi:10.1111/j.1600-0404.2011.01587.x.
43. Hammarén E, Kjellby-Wendt G, Linderberg C (2005) Quantification of mobility impairment and self-assessment of stiffness in patients with

myotonia congenita by the physiotherapist. *Neuromuscul Disord* 15(9-10):610-7. doi:10.1016/j.nmd.2005.07.002.

44. Kierkegaard M, Tollbäck A (2007) Reliability and feasibility of the six minute walk test in subjects with myotonic dystrophy. *Neuromuscul Disord* 17(11-12):943-9. doi:10.1016/j.nmd.2007.08.003.

45. Moxley RT3rd, Logigian EL, Martens WB, et al (2007) Computerized hand grip myometry reliably measures myotonia and muscle strength in myotonic dystrophy (DM1). *Muscle Nerve* 36(3):320-8. doi: 10.1002/mus.20822.

46. Sansone V, Marinou K, Salvucci J, et al (2000) Quantitative myotonia assessment: an experimental protocol. *Neurol Sci* 21(5 Suppl):S971-4.

47. Vincent KA, Carr AJ, Walburn J, et al (2007) Construction and validation of a quality of life questionnaire for neuromuscular disease (INQoL). *Neurology* 68(13):1051-7.

48. Fu YH, Pizzuti A, Fenwick RG Jr et al (1992) An unstable triplet repeat in a gene related to myotonic muscular dystrophy. *Science* 255(5049):1256-8.

49. Ambrosio AR, Trevilato PC, Martins, et al (2009) Electromyography evaluation of the upper lip according to the breathing mode: a longitudinal study. *Braz Oral Res* 23(4):415-23.

50. Vaiman M, Gabriel C, Eviatar E, et al (2005) Surface electromyography of continuous drinking in healthy adults. *Laryngoscope* 115(1):68-73. doi: 10.1097/01.mlg.0000150673.53107.20

51. Ertekin C, Tarlaci S, Aydoglu I, et al (2002) Electrophysiological evaluation of pharyngeal phase of swallowing in patients with Parkinson's disease. *Mov Disord.* 17(5):942-9. doi: 10.1002/mds.10240
52. Isley MR, Krams GL, Levin KH, et al (1993) Electromyography/Electroencephalography. SpaceLab Medical, Redford, WA.
53. Wilbourn AJ, Ferrante MA (2000) Clinical electromyography. In: Joynt RJ, Griggs RC (eds) Baker's clinical neurology (book on CD-ROM). WB Saunders, Philadelphia.
54. Cooper RG, Stokes MJ, Edwards RH (1988) Physiological characterization of the "warm-up" effect of activity in patients with myotonic dystrophy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 51(9):1134-41.
55. Harper PS (1989) Myotonic dystrophy, 2nd ed. WB Saunders, London, UK.
56. Schuman BM, Rinaldo JAJr, Darnley JD (1965) Visceral changes in myotonic dystrophy. *Ann Intern Med* 63(5):793-9.
57. Pruzanski W, Profis A (1966) Dysfunction of alimentary tract in myotonic dystrophy. *J Med Sci* 2(1):59-64.
58. Willig TN, Paulus J, Lacau Saint Guily J, et al (1994) Swallowing problems in neuromuscular disorders. *Arch Phys Med Rehabil* 75(11):1175:81.
59. Rönnblom A, Forsberg H, Danielsson A (1996) Gastrointestinal symptoms in myotonic muscular dystrophy. *Scan J Gastroenterol* 31(7):654-7.