Diego Gomes Candido Reis

**Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT,
POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário
de sistema nervoso central**

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção de título de
Doutor em Ciências

Programa de Ciências Médicas
Área de concentração: Distúrbios do
Crescimento Celular, Hemodinâmicos e
da Hemostasia
Orientadora: Prof^a. Dr^a Juliana Pereira

**São Paulo
2019**

Diego Gomes Candido Reis

Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de sistema nervoso central

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção de título de
Doutor em Ciências

Programa de Ciências Médicas
Área de concentração: Distúrbios do
Crescimento Celular, Hemodinâmicos e
da Hemostasia
Orientadora: Prof^a. Dr^a Juliana Pereira

São Paulo
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Reis, Diego Gomes Candido

Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LM02, MGMT, OCT1, PD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de sistema nervoso central / Diego Gomes Candido Reis. -- São Paulo, 2019.

Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Programa de Ciências Médicas. Área de Concentração: Distúrbios do Crescimento Celular, Hemodinâmicos e da Hemostasia.

Orientadora: Juliana Pereira.

Descritores: 1.Linfoma não Hodgkin 2.Neoplasias encefálicas 3.Expressão gênica 4.Biomarcadores 5.Estudos retrospectivos 6.Estudos de coortes 7.Imuno-histoquímica 8.Análise de sobrevida

USP/FM/DBD-113/19

Responsável: Erinalva da Conceição Batista, CRB-8 6755

DEDICATÓRIA

Aos amores (vividos, passados, presentes e futuros)

Aos meus pacientes,

Às amizades,

Aos meus avós,

Aos meus pais, Sérgio Eduardo e Maura Gomes, pelo árduo trabalho de educar, ensinar, amar e compreender aquilo que fui, sou e serei.

A Sander Palte, *liefde van mijn leven*.

AGRADECIMENTOS

Sou imensamente grato por ter tido a professora Juliana Pereira como minha orientadora! O conhecimento que eu adquiri com ela vai muito além desta tese: seu profissionalismo, competência, ética, leveza e confiança foram fundamentais para conduzirmos este projeto em harmonia, de forma agradável e com grande troca de conhecimento. Uma pessoa forte, determinada e extremamente construtiva, ciente de sua função social como professora, educadora, médica e cidadã!

Nosso país, nossas universidades precisam de jovens cientistas críticos, contestadores e motivados! Dentre tantos que conheci, a Dra Débora Levy se destaca de maneira excepcional, tornando-se um exemplo para mim, reafirmando a importância de um trabalho em equipe, alinhado e íntegro. Sorte imensa tê-la tido como coorientadora, e sorte maior ainda tê-la agora como amiga!

Dr Hebert Culler foi fundamental neste projeto. Sua precisão em técnicas moleculares, seu olhar crítico e sua perspectiva do projeto muito me ajudaram. Muito obrigado, Hebert!

Graças ao LIM-31 (Laboratório de Genética e Hematologia Molecular), coordenado pelo Prof. Sérgio Bydlowski, este projeto pôde ser concluído. Ele não apenas me proporcionou as condições técnicas para realizarmos a pesquisa, mas também me motivou pelas conversas com os colegas, pela visão da importância da universidade e suas pesquisas em prol da ciência, da busca de respostas.

Se eu já amava hematologia, oncologia e pesquisa translacional, hoje posso afirmar minha paixão pela patologia, adquirida pelo contato com a Profa Maria Cláudia Zerbini. Um dos maiores exemplos de dedicação à vida acadêmica que eu já conheci, de uma gentileza ímpar e uma educação ímpar. Seus olhos, através das análises histopatológicas, iluminaram em muito este projeto. O meu “muitíssimo obrigado”!

Um projeto de doutorado é um pouco como uma orquestra: tantos instrumentos utilizados, tanto material humano, cada qual no seu tempo, porém num ritmo comum. A Universidade de São Paulo foi minha orquestra neste período, e serviços como o Departamento de Anatomia Patológica, Laboratório de Imunohistoquímica (Ângela Batista Gomes dos Santos), Bloco do HC-FMUSP, ICESP, CAPPesq, Arquivo Médico, Departamento de Hematologia, entre tantos outros, muito me ajudaram. Mais ainda: me fizeram perceber a grandeza da instituição, o compromisso de cada serviço, departamento, recursos humanos na pesquisa, na extensão acadêmica! Ter estudado aqui foi um privilégio!

Aos meus colegas da Hematologia e ao corpo de enfermagem que, de alguma forma, contribuíram com esse projeto e cuidaram dos pacientes que estudamos. Lendo os prontuários, os relatórios, tive a certeza da qualidade do atendimento que estes pacientes receberam dos profissionais de saúde, o que apenas aumentou minha admiração.

Aos pacientes e seus familiares, sem os quais essa pesquisa não seria possível. Vocês são nossa principal motivação para qualquer pesquisa médica, para os plantões extenuantes, ambulatorios lotados e todas dificuldades que encontramos nas nossas profissões.

É preciso agradecer aos meus colegas da UFRJ, da UFPR, da UNIFESP, do INCa, e de tantos outros centros acadêmicos pelos quais passei. Ambientes repletos de mentes brilhantes, que são contagiantes. Levo todos no coração e no cérebro!

Aos colegas que conheci na Bayer- em especial à Dra Paula Tanaka, uma amiga vibrante, enérgica, focada. Além disto tudo, ela me apresentou a Dra Juliana Pereira onde a história começou... Espero tê-la honrado pela confiança em mim depositada!

Tantas pessoas, lugares, professores, escolas, músicas, livros passaram em minha vida para que eu chegasse até aqui, me ajudando a tornar aquilo que sou. De tudo fica um pouco- como diria o poeta Carlos Drummond... E, a este pouco (que é o meu tudo), eu finalizo meu agradecimento, o meu muito obrigado. De toda minh'alma!

“Amar o perdido,
deixa confundido
este coração

Nada pode o olvido
contra o sentido
apelo do Não

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão

Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
estas sim ficarão”

Carlos Drummond de Andrade

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta publicação:

Referências: adaptado de *International Committee of Medical Journals Editors* (Vancouver).

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e Documentação. *Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias*. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com *List of Journals Indexed in Index Medicus*.

SUMÁRIO

LISTA DE SÍMBOLOS

LISTA DE SIGLAS

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

RESUMO

ABSTRACT

1	INTRODUÇÃO	1
2	REVISÃO DE LITERATURA	5
2.1	Epidemiologia	5
2.2	Diagnóstico	6
2.2.1	<i>Biópsia/Líquor</i>	6
2.2.2	<i>Imagem</i>	8
2.3	Prognóstico	11
2.3.1	<i>Fatores clínicos de prognóstico</i>	11
2.3.2	<i>Fatores histopatológicos de prognóstico</i>	13
2.4	Tratamento	16
2.4.1	<i>Radioterapia</i>	17
2.4.2	<i>Monoterapia ou Poliquimioterapia baseado em MTX</i>	18
2.4.3	<i>Imunoterapia e Imunoquimioterapia com Rituximabe</i>	19
2.4.4	<i>Quimioterapia intraventricular</i>	20
2.4.5	<i>Terapia de manutenção com agente quimioterápico</i>	21
2.4.6	<i>Transplante de Medula Óssea Autólogo (ASCT)</i>	21
2.4.7	<i>Tratamento de resgate</i>	22
2.4.8	<i>Estudos de Pesquisa Clínica Fase 1/2 em pacientes com LPSNC recidivadas</i>	22
2.5	Fisiopatologia molecular do LPSNC	27
2.5.1	<i>Genes selecionados para o estudo</i>	30
2.6	Justificativa	37
3	OBJETIVOS	39
3.1	Objetivo primário	39
3.2	Objetivos secundários	39
4	CASUÍSTICAS E METODOS	40
4.1	Pacientes selecionados	41
4.1.1	<i>Critérios de inclusão</i>	41
4.1.2	<i>Critérios de exclusão</i>	42
4.2	Diagnóstico anatomopatológico	43
4.3	Estadiamento	44

4.4	Tratamento	44
4.5	Avaliação de resposta	45
4.6	Seguimento dos pacientes	45
4.7	Reações de IHQ	46
4.7.1	<i>Obtenção das amostras</i>	46
4.7.2	<i>Técnica da reação de IHQ</i>	47
4.8	Método molecular	49
4.8.1	<i>Obtenção das amostras</i>	49
4.8.2	<i>Extração de RNA de amostras fixadas em formol e incluídas em parafina</i>	49
4.8.3	<i>Preparação do cDNA</i>	50
4.8.4	<i>Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real</i>	51
4.8.5	<i>Eficiência gênica avaliada</i>	52
4.9	Análise estatística	52
5	RESULTADOS	56
5.1	Casuística	56
5.2	Características clínico-laboratoriais ao diagnóstico	57
5.3	Tratamentos oncológicos e resposta clínica	59
5.3.1	<i>Primeira Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo</i>	61
5.3.2	<i>Segunda Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo</i>	62
5.4	Expressão Proteica	63
5.5	Expressão Gênica	65
5.6	Construção de Curvas de ROC (<i>receiver operator characteristic curve</i>, em inglês)	67
5.6.1	<i>Curvas de ROC para expressão proteica</i>	67
5.6.2	<i>Curvas de ROC para expressão gênica normalizada</i>	68
5.7	Curvas de Sobrevida	69
5.7.1	<i>Sobrevida Global</i>	69
5.7.2	<i>Sobrevida Livre de Doença (1ª linha de tratamento)</i>	71
5.7.3	<i>Sobrevida Livre de Progressão (1ª linha de tratamento)</i>	72
5.8	Fatores de Prognóstico para SG, SG 2 anos, SLD e SLP	73
5.8.1	<i>Análise Univariada para SG e SG em 24 meses</i>	73
5.8.2	<i>Análise Univariada para SLD</i>	76
5.8.3	<i>Análise Univariada para SLP</i>	77
5.8.4	<i>Testes de Log-Rank: gráficos por variáveis analisadas</i>	79
5.9	Fatores de Prognóstico para Mortalidade até a data de censura e Mortalidade em 2 anos após o diagnóstico	86
5.9.1	<i>Análise Univariada</i>	86
5.10	Fatores de Prognóstico para Risco de Recaída e Refratariedade na primeira linha de tratamento	88
5.10.1	<i>Análise Univariada</i>	88
5.11	Correlação entre expressão gênica e expressão proteica	90
6	DISCUSSÃO	92
7	CONCLUSÕES	105

8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	106
9 ANEXOS	107
ANEXO A - Características clínico-laboratoriais por paciente	108
ANEXO B - Informações sobre a primeira linha de tratamento oncológico	114
ANEXO C - Valores da expressão normalizada dos genes MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1 por paciente	115
ANEXO D - Comparação entre amostra total e a subamostra	117
ANEXO E - Curvas de ROC para expressão da proteína MYC	123
ANEXO F - Curva de ROC para expressão da proteína BCL2	127
ANEXO G - Curva de ROC para expressão da proteína LMO2	131
ANEXO H - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MYC	132
ANEXO I - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MGMT	134
ANEXO J - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene PDCD1	136
ANEXO K - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL2	137
ANEXO L - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene LMO2	140
ANEXO M - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene POU2F1	142
ANEXO N - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL6	144
ANEXO O - Construção das curvas de SG, SLP e SLD (método de Kaplan-Meier)	146
ANEXO P - Expressão dos genes de interesse em relação à sua respectiva expressão proteica	147
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	149

LISTA DE SÍMBOLOS

$\alpha\beta$	Alfa/beta
$\gamma\delta$	Gama/delta
cm	Centímetro
dL	Decilitro
g	Gramma
°C	Graus Celsius
xg	Gravidade
Gy	Gray
K	Kappa
λ	Lambda
L	Litro
$\geq$	Maior ou igual a
$>$	Maior que
+/-	Mais ou menos
+	Mais ou positivo
$\leq$	Menor ou igual a
$<$	Menor que
-	Menos ou hífen
m ²	Metro quadrado
μ g	Micrograma
μ L	Microlitro
μ m	Micrômetro
μ M	Micromol
mg	Miligrama
mm ³	Milímetros cúbicos
mM	Milimol
ng	Nanograma
nM	Nanômetro
N	Número absoluto
pmol	Picomol
%	Porcentagem
^{TM}	<i>Trademark</i> ou marca registrada
log	Unidade de escala logarítmica
U	Unidades
x	Vezes

LISTA DE SIGLAS

SIGLA	ABREVIACAO
1ºq	Primeiro quartil
3ºq	Terceiro quartil
A20	<i>Tumor Necrosis Factor, Alpha-Induced Protein 3 (em inglês)</i>
ABC	<i>Activated B-Cell Like (em inglês)</i>
Ac	Anticorpos
AKT	Proteína Quinase B
ALK	Quinase do Linfoma Anaplásico
ARP	<i>Actin-related protein (em inglês)</i>
ASCT	Transplante Autólogo de Células Tronco
AUC	Área sob a Curva
BCAP	<i>B cell adaptor for PI3k (em inglês)</i>
BCL6 –	<i>B-cell CLL/Lymphoma 6 (em inglês)</i>
BCL2	<i>B-cell Lymphoma 2 (em inglês)</i>
BCNU	Carmustina
BCR	Receptor de Células B
BHE	Barreira Hematoencefálica
BIM	<i>BCL-2 interacting mediator of cell death (em inglês)</i>
BTK	<i>Bruton's Tyrosine Kinase (em inglês)</i>
CAAE	Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
CAPPesq	Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
CAR-T	<i>Chimeric Artificial T-cell Receptor (em inglês)</i>
CARD11	<i>Caspase Recruitment Domain Family Member 11 (em inglês)</i>
CD	<i>Cluster of differentiation (em inglês)</i>
CD10	<i>Common acute lymphocytic leukemia agent (em inglês)</i>
CD20	Antígeno de Linfócito B CD20
CDC2 ou CDK1	Quinase dependente de ciclina 1
cDNA	Ácido desoxirribonucleico complementar
CG	Centro germinativo
CN	<i>Calcineurin (em inglês)</i>
CNS	<i>Central Nervous System (em inglês)</i>
COO	Célula de Origem
Ct	<i>Cycle threshold</i> ou ciclo limiar

CXCL13	<i>B lymphocyte chemoattractant (em inglês)</i>
DAG	diacilglicerol
D11	Décimo Primeiro Dia
D7	Sétimo Dia
DE	Doença Estável
Del	Deleção
DFS	<i>Disease-free survival (em inglês)</i>
DHL	Desidrogenase Láctica
dNTP	Desoxirribonucleotídeos Fosfatados
Dp	Desvio Padrão
EBV	<i>Epstein Barr Virus (em inglês)</i>
ECOG	<i>Eastern Cooperative Oncology Group (status performance) (em inglês)</i>
EV	Via Endovenosa
FDG	Fluorodeoxiglicose
FFPE	Fixado em Formalina e Incluído em Parafina
FLAIR	<i>Fluid Attenuated Inversion Recovery (em inglês)</i>
G	Gravidade
GADPH	<i>Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase (em inglês)</i>
GCB	célula de origem centro germinativo
	Receptor 2 do fator de Crescimento Derivado de Proteínas
GSK	<i>Glycogen synthase kinase (em inglês)</i>
GUSB	Glucoronidase Beta
Gy	Gray
H&E	Hematoxilina & Eosina
HC-FMUSP	Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
HD	Alta dose
HD-MTX	Metotrexate em Altas Doses
HGAL	<i>Germinal Center Specific Gene (em inglês)</i>
HIC	Hipertensão Intracraniana
HIV	Vírus da Imunodeficiência Adquirida Humana
HR	<i>Hazard Ratio (em inglês)</i>
IC	Intervalo de Confiança
ICESP	Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Ig	Imunoglobulina
IgG4	Imunoglobulina G
IGH	Cadeia Pesada da Imunoglobulina
IHQ	Imuno-histoquímica
IKB	<i>Inhibitor of kB (em inglês)</i>

IKK	<i>Inhibitor of NF-κB kinase (em inglês)</i>
IL	Interleucina
IPI	Índice Prognóstico Internacional
IP3	Inositol trifosfato
IP3R	Receptor de IP3
IRAK	Receptor Associado à Kinase IL1
ITAM	Imunorreceptor do Motivo Ativador Baseado em Tirosina
IV	Intraventricular
JAK/STAT	<i>Tirosina Kinase Janu/signal Transducer and Activator of Transcription (em inglês)</i>
Ki67	Proteína Ki67
KPS	<i>Karnofsky Performance Status (em inglês)</i>
LCR	Líquor Cefalorraquidiano
LDGCB	Linfoma Difuso de Grandes Células B
LF	Linfoma Folicular
LIM	Laboratório de Investigação Médica
LLA	Leucemia Linfocítica Aguda
LMO2	LIM Domínio Único 2
LNH	Linfoma não Hodgkin
LPSNC	Linfoma Primário de Sistema Nervoso Central
MALT1	<i>Mucosa-associated lymphoid tissue (em inglês)</i>
Max	Máximo
MBVP	Methotrexate, VP16, BCNU, Prednisone
MEK1/2	Proteína Quinase Ativada por Mitogeno/Quinase Reguladora do Sinal Extracelular
MGMT	<i>O-6-methylguanine-DNA-methyltransferase (em inglês)</i>
Min	Mínimo
miR	microRNA
MRI	<i>Magnetic Resonance Imaging (em inglês)</i>
mTOR	<i>Mammalian Target of Rapamycin (em inglês)</i>
MTX	Metotrexate
MUM1	<i>Multiple Myeloma oncogene 1 / Oncogene Mieloma Múltiplo 1 (em inglês)</i>
MYC	Fator de Transcrição bHMH
MYD88	<i>Myeloid Differentiation Primary Response 88 (em inglês)</i>
N	Número
NA	Não Avaliável
NCG	Não Centro Germinativo
NFκB	Fator Nuclear kappa B
NK	<i>Natural Killer (em inglês)</i>
NPD	Ausência de Progressão de Doença documentada

núm	Número
POU2F1	<i>POU Class 2 Homeobox 1 (em inglês)</i>
OMS	OMS – Organização Mundial de Saúde
OR	<i>Odd Ratio (em inglês)</i>
OS	<i>Overall survival (em inglês)</i>
p21	<i>Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 1 (em inglês)</i>
p53	Proteína tumoral p53
Pac	Paciente
PCR	Reação em Cadeia de Polimerase
PD	Progressão de Doença
PK1	<i>3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1</i>
PD-L1	<i>Programmed Cell Death Ligand 1 (em inglês)</i>
PD-L2	<i>Programmed Cell Death Ligand 2 (em inglês)</i>
PDCD1	<i>Programmed Cell Death 1 (em inglês)</i>
PEG	Perfil de Expressão Gênica
PET	Tomografia por Emissão de Pósitrons
PET-TC	Tomografia Computadorizada com Emissão de Pósitrons
PFS	<i>Progression-free survival (em inglês)</i>
pH	Potencial de Ânion Hidrogênio
PI3k	<i>Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase (em inglês)</i>
PIC	Pressão Intracraniana
PIM	Proto-Oncogene Serina/Treonina Proteína Kinase
PKC	Proteína Kinase C
POZ	<i>Poxvirus and Zinc Finger Domain (em inglês)</i>
PRDM1	<i>PR Domain-Containing Protein 11 (em inglês)</i>
PS	<i>Performance Status (em inglês)</i>
PTPRK	<i>Receptor-type Tyrosine-Protein Phosphatase kappa (em inglês)</i>
R/R	Recaída/Refratário
RASGRP3	<i>RAS guanyl-releasing protein 3 (em inglês)</i>
RC	Resposta Completa ou Remissão Completa
RGS	<i>Regulator of G-Protein Signaling (em inglês)</i>
RT	Radioterapia
RG	Resposta Global
RL	Regressão Logística
RMN	Ressonância Magnética Nuclear
RNA	Ácido Ribonucleico
ROC	Característica de Operação do Receptor
RP	Resposta Parcial
RPLPO	<i>Ribosomal Protein Lateral Stalk Subunit P0 (em inglês)</i>

RT-qPCR	Reação em Cadeia da Polimerase da Transcrição Reversa em Tempo Real quantitativo
RV-	Razão de verossimilhança negativa
RV+	Razão de verossimilhança positiva
SD	Doença Estável
SG	Sobrevida Global
SLD	Sobrevida Livre de Doença
SLP	Sobrevida Livre de Progressão
SNC	Sistema Nervoso Central
STAT3	Transdutor de Sinal e Ativador de Transcrição 3
SYK	<i>Spleen tyrosine kinase (em inglês)</i>
TC	Tomografia Computadorizada
TEDDi-R	Temozolamida, Etoposídeo, Doxorubicina Lipossomal, Dexametasona, Ibrutinibe, Rituximabe
ThBuCTX	Thiotepa, Busulfan, e Ciclofosfamida -3 and -2
TIL	<i>Tumour Infiltrating Lymphocyte (em inglês)</i>
TMO	Transplante de Medula Óssea
TNF	Fator de Necrose Tumoral
TR	Taxa de Resposta
TTO1	Primeira Linha de Tratamento
TTO2	Segunda Linha de Tratamento
VO	Via Oral
WBRT	Radioterapia de Todo o Crânio
XBP1	<i>X-box binding protein 1(em inglês)</i>
¹⁸ F-FDG	¹⁸ F-fluorodeoxyglucose

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Tipo de Célula de Origem conforme Critérios de Hans para IHQ.	14
Figura 2 -	Sinalização celular via BTK.....	24
Figura 3 -	Via do NFkB-.....	28
Figura 4 -	Fluxograma da exclusão	56
Figura 5 -	Número de linhas de tratamento oncológico	60

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1 -	Taxas de Resposta à Primeira Linha de Tratamento Oncológico	62
Gráfico 2 -	Curva de Sobrevida Global nos pacientes com LPSNC.....	70
Gráfico 3 -	Curva de Sobrevida livre de doença nos pacientes com LPSNC	71
Gráfico 4 -	Curva de Sobrevida livre de progressão nos pacientes com LPSNC	72
Gráfico 5 -	Teste de Log-rank – Variável: Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	79
Gráfico 6 -	Teste de Log-rank – Variável: IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1).....	80
Gráfico 7 -	Teste de Log-rank – Variável: Performance Status (3+4 vs 0+1+2)	81
Gráfico 8 -	Teste de Log-rank – Variável: Radioterapia (Não realizada vs Realizada)	82
Gráfico 9 -	Teste de Log-rank – Variável: Anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%).....	83
Gráfico 10 -	Teste de Log-rank – Variável: anti-LMO2 (0-25% vs ≥26%).....	83
Gráfico 11 -	Teste de Log-rank – Variável: Gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041).....	84
Gráfico 12 -	Teste de Log-rank – Variável: Gene <i>LMO2</i> (<0,689232 vs ≥0,689232)	85
Gráfico 13 -	Teste de Log-rank – Variável: Gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	85

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Avaliação de resposta clínica	10
Quadro 2 -	Estudos de fase 1 e fase 2 em andamento	26
Quadro 3 -	Padronização dos marcadores de IHQ utilizados	48
Quadro 4 -	Definições das Curvas de Sobrevida, Refratariedade e Recidiva	54

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Sensibilidade e especificidade de biomarcadores CXCL13 e IL-10 (LCR) e aplicação diagnóstica de LPSNC	8
Tabela 2 -	Sobrevida Global (SG 2 anos) de acordo com o escore de prognóstico IPI modificado para LPSNC	12
Tabela 3 -	Orçamento detalhado.....	40
Tabela 4 -	Eficiências gênicas avaliadas.....	52
Tabela 5 -	Classificação Subjetiva por Kappa.....	55
Tabela 6 -	Tempos de seguimento.....	57
Tabela 7 -	Características clínico-laboratoriais dos pacientes selecionados	58
Tabela 8 -	Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à primeira linha de tratamento oncológico	61
Tabela 9 -	Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à segunda linha de tratamento oncológico.....	62
Tabela 10 -	Descrição das revisões das reações de imuno-histoquímica disponíveis	63
Tabela 11 -	Resultados das reações de imuno-histoquímica das proteínas de interesse.....	64
Tabela 12 -	Amplificação normalizada dos genes de interesse	65
Tabela 13 -	Revisão bibliográfica dos pontos de corte da reação de imuno-histoquímica das proteínas de interesse e pontos de corte selecionados neste estudo.....	68
Tabela 14 -	Pontos de corte da expressão normalizada dos genes de interesse.....	69
Tabela 15 -	Análise univariada de Cox para SG	74
Tabela 16 -	Análise univariada de Cox para SG em 2 anos.....	75
Tabela 17 -	Análise univariada de Cox para SLD.....	76
Tabela 18 -	Análise univariada de Cox para SLP.....	78
Tabela 19 -	Análise univariada para Mortalidade Global e Mortalidade em 2 Anos	87
Tabela 20 -	Análise univariada para Refratariedade e Recaída	89
Tabela 21 -	Correlação entre IHQ proteína MYC e expressão gênica MYC.....	90
Tabela 22 -	Correlação entre IHQ proteína BCL2 e expressão gênica BCL2	91
Tabela 23 -	Correlação entre IHQ proteína LMO2 e expressão gênica LMO2	91

RESUMO

Reis DGC. *Análise do perfil da expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de sistema nervoso central* [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.

Introdução: Linfoma primário de sistema nervoso central (LPSNC) é um linfoma não-Hodgkin (LNH) extranodal com origem no SNC e a ele restrito, incidência de 0,7/100.000 pessoas-ano e mediana de idade de 65 anos. Apresenta comportamento biológico agressivo, alta morbimortalidade, sobrevida global em 5 anos de 30% e pior prognóstico em relação ao linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) sistêmico. O tratamento consiste em quimioterapia de indução com altas doses de metotrexate, seguido de consolidação, porém com alta taxa de recorrência (50%) e refratariedade (30%). Estudos genéticos têm permitido melhor compreensão de sua patogênese, como a hiperativação da via do NFkB e da via da sinalização do BCR; o papel do microambiente tumoral, entre outros. Estudos preliminares com LPSNC e LDGCB indicam valor prognóstico favorável da hiperexpressão dos genes BCL6 e LMO2 e desfavoráveis nos casos de suprarregulação dos genes *BCL2, MYC, MGMT, POU2F1* e *PDCD1*. **Objetivo:** Avaliar o impacto da expressão dos genes *MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1* e *BCL6* e suas respectivas proteínas em pacientes com LPSNC e suas correlações com os desfechos clínicos de sobrevida global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP). **Métodos:** Estudo de coorte retrospectiva, unicêntrico, não intervencionista. Pacientes imunocompetentes com LPSNC histopatologia LDGCB CD20+ foram incluídos, dados clínicos coletados e material histopatológico obtido. A expressão gênica foi analisada por RT-qPCR de amostras fixadas e emblocadas em parafina; seus valores foram normalizados pelo controle endógeno *GUSB* e transformados em variáveis categóricas para posterior correlação com variáveis clínicas e de desfecho. Devido ao pequeno tamanho amostral, apenas análises univariadas foram realizadas. Análise da expressão proteica dos genes selecionados também foi realizada. **Resultados:** Trinta e cinco pacientes foram incluídos; a expressão gênica foi avaliável em 21 pacientes (60%). A mediana de tempo de seguimento foi de 41 meses. As medianas de SG, SLD e SLP foram de 42,6 meses, 59,2 meses e 41 meses, respectivamente. Mediana de expressão dos genes *MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1* e *BCL6* foram respectivamente 0,201; 0,564; 1,636; 0,000; 1,448; 0,000 e 2,716. Idade >60 anos, índice prognóstico International (IPI) modificado ≥ 2 , performance status (PS) ≥ 3 , expressão de *MYC* $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, ausência de tratamento radioterápico, refratariedade ao tratamento e progressão de doença (PD) após a primeira linha de tratamento foram associados à pior SG ($p \leq 0,1$). Idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , PS ≥ 3 e ausência de tratamento radioterápico estiveram associados à pior SLD ($p \leq 0,1$). Idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão de *MYC* $\geq 0,201041$, anti-

BCL2 $\geq 51\%$, expressão gênica de *LMO2* $< 0,689232$, expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$, refratariedade à primeira linha de tratamento e PD após a primeira linha de tratamento estiveram associados à pior SLP ($p \leq 0,1$). Expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, expressão gênica de *PDCD1* $\geq 2,00938$ estiveram associados a maior risco de recaída após a primeira linha de tratamento ($p \leq 0,1$). Houve correlação moderada entre a expressão gênica do *MYC* ($< 0,201041$ x $\geq 0,201041$) e sua respectiva proteína ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,596 e valor $p=0,022$) e entre a expressão gênica do *BCL2* ($< 0,3516$ x $\geq 0,3516$) e sua respectiva proteína ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,426 e valor $p=0,042$). **Conclusão:** Em análise univariada, expressão de *MYC* $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, expressão gênica de *LMO2* $< 0,689232$, expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$ e expressão gênica de *PDCD1* $\geq 2,00938$ estiveram associados a prognósticos desfavoráveis.

Descritores: Linfoma não Hodgkin; Neoplasias Encefálicas; Expressão Gênica; Biomarcadores; Estudos Retrospectivos; Estudos de Coortes; Imuno-Histoquímica; Análise de Sobrevida.

ABSTRACT

Reis DGC. *Gene expression and protein profiles of MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1, BCL6 in primary central nervous system lymphoma* [tese]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2019.

Introduction: Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) is a rare extranodal NHL restricted to the CNS, with annual incidence of 0.7 per 100,000 people and mean age at diagnosis of 65 years old. It has an aggressive biological behavior, with poor prognosis (overall survival at 5 years of 30%). Treatment consists of induction immunochemotherapy with high-dose methotrexate followed by consolidation regimen, with a high rate of relapsed and refractory disease (50% and 30%, respectively). Tumorigenesis has been associated with hyperactivation of NFkB pathway and BCR downstream pathway; tumoral microenvironment, among others. Recent studies suggest that hyperexpression of the genes *BCL6* and *LMO2* may be associated with better prognosis and hyperexpression of the genes *BCL2*, *MYC*, *MGMT*, *POU2F1* and *PDCD1* may be associated with worse prognosis in patients with PCNSL.

Objective: To measure the normalized gene expression of *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* and *BCL6* and its respective proteins in patients with PCNSL and its correlation with clinical outcomes of overall survival (OS) and progression-free survival (PFS). **Methods:** Retrospective cohort study. Immunocompetent patients from a Brazilian single center with PCNSL and confirmed histopathology DLBCL CD20+ were included, their clinical data and archival histopathological material were retrieved. Gene expression (RT-qPCR) was performed and its values were normalized to internal control gene *GUSB*, then categorized and correlated with clinical outcomes. Only univariate analysis was performed due to small sample size. **Results:** Thirty-five patients were included, gene expression was evaluable in 21 patients (60%). Median duration of follow-up was 41 months. Median OS, DFS, PFS were, respectively, 42.6 months, 59.2 months and 41 months. Median expression of genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* and *BCL6* were, respectively, 0.201; 0.564; 1.636; 0.000; 1.448; 0.000 and 2.716. Age at diagnosis >60 years, modified international prognosis index (IPI) ≥ 2 , *performance status* (PS) ≥ 3 , *MYC* expression $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, absence of radiotherapical treatment, refractoriness to treatment and disease progression after 1st line of treatment were associated with worse OS ($p \leq 0,1$). Age at diagnosis >60 years, modified IPI ≥ 2 , PS ≥ 3 and absence of radiotherapical treatment were associated with worse DFS ($p \leq 0,1$). Age >60 years, modified IPI ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , absence of radiotherapical treatment, *MYC* gene expression $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, *LMO2* gene expression $< 0,689232$, *MGMT* gene expression $\geq 0,335666$, refractoriness to treatment and progressive disease were associated with a worse PFS ($p \leq 0,1$). *MYC* gene expression $\geq 0,201041$, *PDCD1* gene expression $\geq 2,00938$ were associated with risk of disease relapse ($p \leq 0,1$). A moderate correlation was found between *MYC* gene expression ($< 0,201041$ x $\geq 0,201041$) and its protein ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,596, $p=0,022$); and also

between *BCL2* gene expression ($<0,3516$ x $\geq 0,3516$) and its protein ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,426, p=0,042). **Conclusion:** In a univariate analysis, *MYC* gene expression $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, *LMO2* gene expression $<0,689232$, *MGMT* gene expression $\geq 0,335666$ and *PDCD1* gene expression $\geq 2,00938$ were prognostic markers associated with unfavorable clinical outcomes.

Descriptors: Lymphoma, Non-Hodgkin; Brain Neoplasms; Gene Expression; Biomarkers; Retrospective Studies; Cohort Studies; Immunohistochemistry; Survival Analysis.

1 INTRODUÇÃO

Os Linfomas não-Hodgkin (LNH) compreendem um grupo heterogêneo de neoplasias de origem linfóide cuja etiologia é multifatorial ¹. Correspondem a 4,3% de todos os cânceres nos EUA, com aumento de incidência entre 1975 e 2015 (de 12 para 19,91/100.000 pessoas/ano) e Sobrevida Global (SG) estimada em 5 anos de 74,1% ^{2,3}. Os LNH podem ser de origem linfóide B, T e *natural killer* (NK) ⁴⁻⁶. Para o Brasil, estimam-se 5.370 casos novos de LNH em homens e 4.810 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019, com risco estimado de óbito de 2,8 a cada 100 mil habitantes ⁷.

Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B (LDGCB) sistêmico é o subtipo de LNH mais frequente, o qual representa 40% de todos os LNH de origem linfóide B e apresenta comportamento clínico agressivo bem como incidência de mais de 25.000 casos/ano nos EUA. É uma doença heterogênea dos pontos de vista genético, morfológico e imunofenotípico. Pode ser classificado de acordo com a célula de origem e as características moleculares determinadas por técnicas de Perfil de Expressão Gênica (PEG) em Células B do Centro Germinativo (GCB) ou células B ativadas (ABC). Esta classificação reflete o estágio de desenvolvimento da Célula B originalmente comprometida^{8,9}. A célula de origem também pode ser classificada de acordo com suas características de expressão proteica por IHQ em GCB ou de não-GCB, em concordância com o GEP em 86% ¹⁰. Pacientes com LDGCB GCB e ABC apresentam prognósticos distintos, com SG em 5 anos de 76% e 34% respectivamente. No entanto, 50% dos pacientes não conseguem atingir remissão duradoura ^{9,11-14}.

Linfoma primário de SNC é um LNH extranodal com origem no SNC e restrito a este órgão. O subtipo LDGCB é o mais frequente, entre 75% a 90% dos casos ^{5,15}. Outros subtipos incluem o linfoma de célula T, linfoma de Burkitt, linfoma linfoplasmocítico e linfoma da zona marginal. Neste texto, ao descrevermos LPSNC, consideraremos apenas os linfomas de histopatologia LDGCB CD20+ de indivíduos imunocompetentes. Trata-se de doença rara,

agressiva e de mau prognóstico ¹⁶. Diferente do LDGCB sistêmico, o LPSNC tem origem em uma célula B em fase terminal de diferenciação, com características de ambas GCB e pós-CG ⁶.

LPSNC corresponde a 2% dos tumores primários do SNC, com mediana de idade de 65 anos ao diagnóstico. Anatomicamente se encontra limitado ao encéfalo, olhos, medula espinhal e leptomeninges. Possui comportamento biológico mais agressivo e menor SG quando comparado ao LDGCB sistêmico¹⁷. Sua incidência é de 0,7 caso por 100.000 pessoas/ano nos EUA ¹⁸, porém nas últimas décadas tem aumentado a uma taxa de 1,6% ao ano ¹⁹.

Tratamento com intuito curativo ou paliativo é indicado de acordo com as condições clínicas do paciente. Podem ser usados agentes isolados ou combinados, associados ou não à radioterapia, assim como radioterapia isolada e transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo (ASCT). Devido à alta morbidade e pouco benefício clínico, procedimentos cirúrgicos estão limitados à biópsia diagnóstica, geralmente estereotáxica. O tratamento com quimioterapia é dificultado pela presença da barreira hematoencefálica, o que limita a penetração dos fármacos. O fato de a maioria dos pacientes ser idosa, com maior prevalência de comorbidades, reduz a tolerância ao tratamento.

Tratamento de indução seguido de consolidação apresenta melhores taxas de resposta global (TRG). A maior parte dos esquemas terapêuticos para o LPSNC tem como base altas doses de metotrexato (HD-MTX), variando de 1g/m² a 8 g/m² . O MTX pode ser associado ou não a outros fármacos, como agentes alquilantes ou à radioterapia de crânio total. A resposta global (RG) ao tratamento inicial é usualmente alta, porém as taxas de recidiva após 2 anos são muito altas. Cerca de 15% das recidivas ocorrem no mesmo local anatômico da lesão inicial primária e 85% ocorrem distantes do sítio primário, mas dentro do SNC ²⁰⁻²².

Com melhores técnicas diagnósticas e novas opções terapêuticas, houve aumento da SG em 5 anos de 19,1% (1992-1994) para 30,1% (2004-2006) nas últimas décadas ¹⁹. Entretanto, as taxas de recidiva precoce ainda são elevadas (20% a 30%) ²³.

Estudos genéticos têm evidenciado o papel da hiperativação da via do

NFkB na tumorigênese em decorrência de mutações de genes da via de sinalização do receptor de células B (BCR). O microambiente por ação imunossupressora local pode interferir na progressão e no crescimento tumoral²⁴.

Há carência de dados clínicos e moleculares na literatura médica referente a esta doença devido à sua raridade e à dificuldade de obtenção de material representativo. Estudos genéticos e moleculares podem auxiliar no entendimento da tumorigênese, por meio da identificação de fatores de prognóstico, preditores de resposta, além de novos alvos terapêuticos.

Estudos preliminares com LPSNC e LDGCB descreveram prognóstico favorável da hiperexpressão dos genes *BCL6* e *LMO2*, e desfavoráveis relacionados à suprarregulação dos genes *BCL2*, *MYC*, *MGMT*, *POU2F1* e *PDCD1*.

O gene *BCL2* é um proto-oncogene com papel na regulação da apoptose, e sua hiperexpressão está associada à tumorigênese de linfomas^{25,26}.

O gene *MYC* é um proto-oncogene associado à expressão de vários outros genes envolvidos no controle do crescimento e da proliferação celular. Está associado à tumorigênese de certos tumores, incluindo o LDGCB. Sua assinatura genética está associada a genes envolvidos no metabolismo e resistência aos agentes antifolatos, incluindo o metotrexate ²⁷.

O gene *LMO2* atua na regulação de expressão de outros genes, pode estar hiperregulado em LNH derivados do Centro Germinativo e é considerado um indicador prognóstico favorável de LDGCB ²⁸.

O gene *MGMT* codifica uma enzima reparadora de DNA silenciada por meio da metilação da sua região promotora. Sua hiperexpressão de *MGMT* parece estar associada a um pior prognóstico, e a metilação de sua região promotora é um biomarcador de bom prognóstico em pacientes portadores de glioma tratados com agentes alquilantes e um fator preditor de resposta ao tratamento com temozolamida, a qual vem sendo estudada como opção terapêutica no LPSNC ²⁹.

O gene *POU2F1* (*OCT1*) pode estar hiperexpresso em linfoma. Sua presença aumenta a suscetibilidade tumoral a irinotecano, paclitaxel, assim

como o transporte intracelular de antraciclícos. Desta forma, sugere-se que alterações de *POU2F1* possam causar resistência das células tumorais aos quimioterápicos ^{30,31}. No entanto, a hipexpressão de *POU2F1* está elevada em carcinomas epiteliais de estômago, cólon, pulmão, mas, nestes caso, está associado a um pior prognóstico ³².

O gene *PDCD1* (*PD1*) pode estar hiperexpresso em 65% dos LPSNC, juntamente com o *PD-L1* e *PD-L2* e possui papel na evasão imune tumoral. Estudos recentes têm demonstrado atividade do bloqueio de PD-1 com nivolumabe em pacientes com LPSNC refratário ou com recaída ^{33,34}.

O gene *BCL6* é considerado um gene supressor tumoral, que atua como um repressor e um modulador transcricional. Quando hipermutado, translocado e, conseqüentemente, inativado, pode associar-se à tumorigênese, inclusive no LDGCB ³⁵.

2 REVISÃO DE LITERATURA

LPSNC é um subtipo de LNH extranodal que acomete o encéfalo, leptomeninge, olho ou medula espinhal sem evidência de envolvimento sistêmico. Ao contrário do LDGCB sistêmico, o LPSNC se desenvolve em órgão desprovido de tecido linfóide ¹⁴. Pela classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) ^{6,36}, critérios de exclusão para definição de LPSNC incluem envolvimento de dura-máter, linfoma intravascular de grandes células B e linfoma secundário ^{13,37}. Podem-se apresentar como lesão intracraniana solitária ou múltipla, periventricular e leptomeníngea difusa, de medula ou neurolinfomatose ^{6,38,39}. Os sítios primários mais acometidos são o cérebro (79,5%), medula espinhal (6,7%), meninges e nervos cranianos (2%) e outros (11,8%) ¹⁵. No linfoma primário ocular, os achados mais frequentes incluem infiltração vítrea e sub-retinianas, sendo o diagnóstico estabelecido por vitrectomia ou biópsia coriorretiniana ⁴⁰.

Os principais fatores de risco para desenvolvimento de LPSNC incluem imunodeficiência primária ou adquirida, sendo esta iatrogênica ou pela infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) ^{39,41}. Os sintomas incluem déficit neurológico focal (70%), alterações neuropsiquiátricas (43%) e aumento de pressão intracraniana (PIC) (33%). Sintomas B são raros, e pacientes com acometimento ocular podem apresentar dor ocular, visão turva e escotomas visuais. Acometimento secundário do líquido cefalorraquidiano (LCR) e ocular ocorrem em 15-20% e 5-20% dos pacientes, respectivamente ^{38,39}.

2.1 Epidemiologia

LPSNC tem incidência entre 0,47 a 0,7 caso por 100.000 pessoas/ano, corresponde a 2,2% de todos os tumores do SNC, 1% dos LNH, e a maioria dos casos (90%) apresenta histopatologia LDGCB ^{16,17,42-45}. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer disponibiliza incidência de LNH e neoplasias primárias de SNC (5,2/100.000 pessoas/ano e 5,6/100.000 pessoas/ano,

respectivamente), porém não há dados sobre incidência anual de LPSNC ⁷.

A maioria dos casos é esporádica, e sua incidência aumenta com a idade, com mediana de idade ao diagnóstico de 65 anos e razão homem/mulher de 1,2/1 a 1,7/1 ¹⁵. A incidência anual em população entre 30-69 anos e >70 anos é de 0,08/100.000 e 4,32/100.000, respectivamente ⁴⁶. Usualmente, os pacientes apresentam índice de comorbidade de Charlson-Deyo de 0 (65,9%) e ausência de sintomas B (79,6%) ^{17,22,47}.

Apesar da baixa incidência de LPSNC em pacientes imunocompetentes, dados do SEER demonstram aumento de sua incidência (1,6% ao ano) em população > 65 anos entre 1992 e 2011 ¹⁹. A realização mais frequente de exames imagenológicos de SNC e o aumento de uso de medicamentos imunossupressores em população idosa poderiam justificar o aumento da incidência observado nas últimas décadas ^{48,49}.

2.2 Diagnóstico

2.2.1 Biópsia/Líquor

O diagnóstico geralmente é estabelecido por análise histopatológica e IHQ de biópsia estereotáxica. Biópsia estereotáxica permite diagnóstico histopatológico entre 80% e 99% dos pacientes, porém a quantidade de material obtido, de três a dez fragmentos medindo entre 5 e 10 mm de comprimento por 1 mm de espessura, muitas vezes é insuficiente para realizar todos os procedimentos anátomo-patológicos e moleculares ⁵⁰.

O diagnóstico também pode ser realizado por análise de LCR ou aspirado vítreo em pacientes com acometimento ocular quando há restrição de acesso ao tumor ²². A análise líquórica deve ser preferencialmente realizada por citometria de fluxo e citologia oncótica. A presença de acometimento extraneural exclui o diagnóstico de LPSNC, sendo recomendada investigação ativa por meio de exames de imagem por tomografia com emissão de pósitron com 18-fluorodeoxiglicose (18-FDG-PET/CT) de corpo inteiro ou tomografia computadorizada (TC) de pescoço, tórax, abdômen e pélvis. A biópsia de medula óssea unilateral é recomendada para os casos que não são estadiados

com 18-FDG-PET/CT. Para o estadiamento, recomendam-se também hemograma completo, perfil metabólico, dosagem de DHL e sorologia para HIV⁵¹.

À histologia, o LPSNC é caracterizado por agrupamentos de centroblastos ou imunoblastos no espaço perivascular, com linfócitos reacionais, macrófagos e células microgliais entre as células tumorais ^{5,6,52}. Na maioria dos casos, as células malignas expressam antígenos de células B, como CD79b, CD19, CD20 e CD22. A ausência de imunoexpressão para CD138 corrobora os achados morfológicos centroblásticos sem características plasmocíticas ⁵³.

Há dois padrões de disseminação tumoral: o primeiro corresponde ao padrão de crescimento angiotrópico, com células neoplásicas que aparentemente migram pelo espaço perivascular ou espaço de Virchow-Robin. Nestes casos, interfere na barreira hematoencefálica e eventualmente permite a captação de contraste na RNM. O segundo padrão é o de invasão ao longo das raízes nervosas através da substância branca do corpo caloso ou do espaço meníngeo. O crescimento e a proliferação tumoral em direção ao espaço subependimal podem levar à invasão do espaço periventricular e à disseminação pelo SNC. ^{5,54}. Geralmente observa-se padrão de atividade proliferativa, com expressão de BCL6 em 60-80%, MUM1+ em 90% e CD10 em 10% dos casos ⁴². Resposta inflamatória secundária pode estar presente no LPSNC, com macrófagos ativados e células T reativas, o que pode estar associado a melhor prognóstico ⁵⁵.

O antígeno quimiotático para linfócitos B CXCL13 está associado ao tropismo das células neoplásicas para SNC, incluindo neoplasias linfoides. Os biomarcadores CXCL13 e IL-10 podem estar elevados no LCR de pacientes com LPSNC. CXCL13 (AUC 0,841) tem sensibilidade e especificidade para diagnóstico de LPSNC de 71% e 95%, e IL-10 (AUC 0,851) tem sensibilidade e especificidade de 64% e 93,4%, respectivamente. Tal sensibilidade é duas vezes maior do que citologia de LCR ou de citometria de fluxo para diagnóstico de LPSNC (Tabela 1). Altas concentrações de CXCL13 no LCR estão associadas a pior prognóstico ⁵⁵.

Tabela 1 - Sensibilidade e especificidade de biomarcadores CXCL13 e IL-10 (LCR) e aplicação diagnóstica de LPSNC ⁵⁵

Biomarcador	Sensibilidade	Especificidade	AUC	IC95%
CXCL13	71%	95%	0,841	0,779-0,892
IL-10	64%	94,10%	0,851	0,789-0,901
CXCL13 ou IL-10	84,20%	90,50%	0,974	0,815-0,919
CXCL13 e IL-10	50%	99,30%	0,746	0,675-0,809
Citologia	14%	-	-	-
Citometria de fluxo	20%	-	-	-

Com relação ao microambiente tumoral, pode se observar resposta inflamatória local com infiltrado de macrófagos e células T reativas. Infiltração de células T perivasculares podem estar associadas a melhor prognóstico, além de ser um alvo para terapias que potencializam resposta imune mediada por células T ⁵⁶.

2.2.2 Imagem

No Serviço de Neurocirurgia, comumente os pacientes eram submetidos à RNM com injeção de contraste gadolínio por ser o método radiológico mais sensível para diagnóstico de tumores em SNC, assim como de avaliação de resposta clínica ^{57,58}. A maioria dos pacientes apresenta massa cerebral isolada, isointensa ou hiperintensa em T1-*weighted* (RMN) com hipercaptação homogênea nas sequências pós-contraste, pouco edema e sem necrose. Na maioria dos casos, há lesão única (70%), sendo o hemisfério cerebral (66%), gânglio basal (27%) e o corpo caloso (24%) os sítios anatômicos mais acometidos ⁵⁹. A TC com contraste apresenta achados equivalentes, porém nenhum método de imagem é patognomônico do LPSNC. O principais diagnósticos diferenciais incluem glioblastoma multiforme, metástases cerebrais entre outras ⁶⁰.

Aproximadamente 25% dos tumores têm outras lesões multicêntricas, não captantes de contraste, hiperintensas em T2-FLAIR (*fluid attenuated inversion recovery*), sendo estes achados consistentes com a disseminação

linfomatosa no cérebro que pode ocorrer na ausência de captação de contraste na RNM. T2-FLAIR tem maior sensibilidade para diagnóstico de lesões subclínicas, porém com menor especificidade. Alterações em T2-FLAIR podem ser secundárias à quimioterapia, à radioterapia de crânio total ou ao envelhecimento. Numa série analisada, porém, foi demonstrado que 88% das lesões em T2-FLAIR em LPSNC foram resolvidas após tratamento com HD-MTX, o que sugere tratar-se de lesões neoplásicas ⁶¹.

A *Diffusion-weighted imaging* analisa o coeficiente de difusão aparente de água em tumores hipercelulares como o LPSNC, com maior diferenciação entre tumores hipercelulares que se apresentam hiperintensos (LPSNC ou doença residual) e lesões com menor celularidade (gliomas malignos), o que aumenta a especificidade do método. Coeficientes de difusão muito baixos estão associados ao LPSNC ^{62,63}.

O *International PCNSL Collaborative Group* (IPCG) desenvolveu um sistema para avaliar a extensão da doença e a resposta clínica ao tratamento oncológico a fim de se obter uma padronização ⁵¹, conforme demonstrado no Quadro 1.

O exame de ¹⁸F-FDG PET apresenta maior sensibilidade e especificidade na detecção de acometimento nodal e extranodal de linfomas de alto grau, incluindo o LPSNC, além de avaliação de massas residuais no reestadiamento^{58,64,65}. O LPSNC apresenta celularidade densa com alto metabolismo e consumo de glicose. No achado do PET, encontra-se alta concentração do FDG, o que pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre LPSNC e outros tumores. Numa meta-análise incluindo 129 pacientes imunocompetentes com LPSNC, tal exame teve sensibilidade de 0,88 (IC95% 0,8- 0,94), especificidade de 0,86 (IC95% 0,73- 0,94), quando comparados à RNM e à biópsia estereotáxica (IC95% 0,04- 0,32) ⁶⁰. Num estudo retrospectivo com 34 pacientes, a mediana de SUV (*standardized uptake value*) máxima foi de 22,17 ($\pm 5,03$), geralmente com valores superiores aos encontrados no glioblastoma multiforme ⁶⁶.

Resposta	Imagem encefálica	Dose corticoide	Avaliação oftalmológica	Citologia LCR
Resposta completa	Sem lesão com captação de contraste	Nenhuma	Normal	Negativo
Resposta Completa Não Confirmada	Sem lesão com captação de contraste	Qualquer	Normal	Negativo
	Lesão com pequena captação de contraste		Pequena alteração no epitélio retiniano pigmentar	Negativo
Resposta Parcial	Diminuição de 50% na captação de contraste	Não disponível	Normal ou pequena alteração no epitélio retiniano pigmentar	Negativo
	Lesão sem captação de contraste		Diminuição de células vítreas ou infiltrado retiniano	Persistente ou Suspeito
PD	Aumento em 25% da captação de contraste	Não disponível	Recorrente ou novo acometimento	Recorrente ou positivo
	Surgimento de qualquer outra lesão			
Doença Estável	Qualquer outra situação não descrita acima			

Quadro 1 - Avaliação de resposta clínica ⁵¹

2.3 Prognóstico

LPSNC tem pior prognóstico em relação ao LDGCB sistêmico ^{14,39}. A SG mediana é inferior a 12 meses em pacientes tratados apenas com WBRT e de 30 a 40 meses em pacientes tratados com quimioterapia à base de HD-MTX^{12,41}.

Em dados do *National Cancer Data Base*, 9.165 casos de LPSNC tratados entre 2004 e 2013 demonstraram SG em 3 anos de 37,7% (IC95% 36,6-38,8) para todos os pacientes; 51,8% para aqueles tratados com poliquimioterapia; 37,7% com monoquimioterapia e 14,1% para os casos tratados somente com radioterapia. Após análise dos fatores confundidores, tratamento com monoterapia e radioterapia isolada estiveram associados à pior SG em relação à poliquimioterapia, com HR de 1,32 (IC95% 1,22- 1,44) e HR= 2,32 (IC 2,07- 2,59), respectivamente ⁶⁷. Em análise do banco de dados do *SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results)*, 4.142 casos com LPSNC evidenciaram SG em 1 ano de 47,8% (IC 46,2- 49,3) e SG em 3 anos de 38,2% (IC 37,8-38,6) ¹⁷. Estudo CALGB 50202 demonstrou SG mediana de 4 anos, porém novas linhas terapêuticas foram necessárias para 50% dos pacientes devido à alta taxa de recaída ²³.

2.3.1 Fatores clínicos de prognóstico

O Índice Prognóstico Internacional (IPI) é utilizado em outros tipos de linfoma por avaliação de SG e com algumas modificações para LPSNC. Em análise retrospectiva de 378 pacientes, foram identificados cinco fatores associados a pior prognóstico ^{68,69} (IPI modificado), conforme demonstrado a seguir:

- Idade > 60 anos;
- DHL elevada;
- Alta concentração de proteína no LCR (acima do limite da normalidade);
- Acometimento de regiões profundas do cérebro (periventriculares, gânglio basal, tronco cerebral e cerebelo) e

- Performance Status 2, 3 ou 4 *

(* PS 0= paciente ativo, sem restrições; PS 1 = paciente com restrição a atividades físicas extenuantes, porém paciente ambulatorial capaz de realizar atividades físicas leves/moderadas e autocuidado); PS 2= paciente sintomático, acamado <50% do dia, auto-cuidados preservados; PS 3= paciente sintomático, restrito ao leito >50% do dia, carente de cuidados mais intensivos; PS 4= paciente completamente dependente e restrito ao leito⁷⁰)

Considerando 1 ponto para cada um dos fatores descritos acima, a SG em 2 anos pode ser estimada conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Sobrevida Global (SG 2 anos) de acordo com o escore de prognóstico IPI modificado para LPSNC ⁶⁸

Pontos	SG (±SD)
0 ou 1	80% (±8%)
2 ou 3	48% (±7%)
4 ou 5	15% (±7%)

Uma meta-análise com 783 pacientes avaliou o prognóstico e os efeitos do tratamento em primeira linha em pacientes com LPSNC maiores que 60 anos. Nesta população, KPS≥70% foi fator prognóstico para mortalidade (HR=0,5; IC95% 0,41-0,62) ⁷¹. A maioria dos pacientes com LPSNC foram idosos e, consequentemente, com maior risco de neurotoxicidade à WBRT e com maior morbimortalidade. Por este motivo, muitas vezes é utilizada apenas quimioterapia isolada nesta população ⁷². O estudo prospectivo MATRix com 227 pacientes demonstrou SLP e SG inferiores em pacientes acima de 65 anos em comparação aos indivíduos com idade inferior a 65 anos tratados com metotrexato, citarabina, tiotepa e rituximab ⁷³. Tais dados são endossados por uma análise retrospectiva de dados do SEER com 5138 pacientes entre 1973 e 2014, cuja análise multivariada para SG demonstrou que idade >60 anos (HR= 1,834; IC95% 1,692- 2,004; p<0,001) foi associada à pior sobrevida. Tratamento com quimioterapia (HR=0,442; IC95% 0,407-0,480; p<0,001) foi associado à maior sobrevida ¹⁵.

Início de tratamento precoce também tem impacto no prognóstico. Num

estudo de fase 2 com 44 pacientes com LPSNC virgens de tratamento submetidos à imunoquimioterapia, indivíduos com início de tratamento acima de um mês do diagnóstico tiveram pior SLP em relação aos que iniciaram tratamento mais precoce (SLP 3 anos 20% x 59%, $p=0,05$) ²³.

2.3.2 Fatores histopatológicos de prognóstico

No LDGCB sistêmico, biomarcadores para recaída incluem *double hit* MYC+BCL2+. Duplo expressor (DE) MYC+BCL2+ e célula de origem ABC parecem também estar correlacionados com prognóstico. Com o critério de positividade a IHQ para MYC+ $\geq 40\%$ / BCL2+ $\geq 50\%$, é possível identificar o subtipo DE em 30% dos LDGCB, dos quais $> 50\%$ são do subtipo ABC. Estes pacientes apresentam SLP 5 anos de 44% e SG 5 anos de 39%. No entanto, dados no LPSNC ainda são inconclusivos ⁷⁴. No LDGCB sistêmico, imunoexpressão de BCL2, MYC, LMO2 e p53 são considerados de valor prognóstico ⁷⁵.

O tipo de célula de origem pelos critérios de Hans é estudado como fator de prognóstico, porém com resultados inconclusivos. A presença CD10+ e/ou BCL6+ e a negatividade para MUM1 por IHQ caracterizam o subtipo GCB e o oposto o subtipo não-GCB ¹⁰, conforme Figura 1. O ponto de corte para as reações de IHQ é de $\geq 30\%$. Teste de expressão genética de 20 genes foi validado para identificar COO em amostras parafinadas de LDGCB, facilitando sua caracterização ⁷⁶. Num estudo com 77 pacientes com LPSNC, foi observado concordância entre os critérios de Hans e LST assay de 83% ⁷⁷.

Figura 1 - Tipo de Célula de Origem conforme Critérios de Hans¹⁰ para IHQ (2004). BCL6 e CD10 são marcadores de Centro Germinativo de Células B. MUM1 é expresso em plasmócitos e no desenvolvimento tardio de Células B e está associado a subgrupo ABC em estudos de perfil de expressão genética. Se CD10 ou ambos CD10 e BCL6 forem positivos, a COO é do subgrupo GCB. Se ambos BCL6 e CD10 são negativos, a COO é do subgrupo Não-GCB. Se BCL6 for positivo e CD10 for negativo, a expressão de MUM define o subgrupo da COO: se MUM1 é negativo, a COO é subgrupo GCB; se MUM1 é positivo, a COO é subgrupo Não-GCB

No LPSNC, a imunoexpressão de MUM1 e BCL6 é de 95% e 60%, respectivamente, e a maioria dos casos apresenta COO não-GCB ^{41,53,78}. Num estudo com 82 pacientes com LPSNC, 79 (96,3%) foram classificados como não-GCB, 42 (51,2%) expressavam BCL6⁺ e MUM1⁺ sugerindo “não-GCB”. Trinta e três (40,2%) expressavam exclusivamente MUM1, o que sugere sobreposição entre *late GC* e *early post-GC*, justificando o fenótipo não-GCB e o pior prognóstico ⁵³. Contudo, a classificação da COO pelos critérios de Hans não teve valor prognóstico numa coorte retrospectiva de 115 pacientes com LPSNC ⁷⁹.

Num estudo retrospectivo com 31 casos de LPSNC tratados com HD-MTX, 26 (84%) pacientes foram caracterizados como não-GCB, a sobrevida mediana foi de 2,5 meses (0-6,6 meses) e 7,4 meses (4,4-10 meses) para os grupos GCB e não-GCB, porém não significante estatisticamente ¹². É importante ressaltar que o perfil transcricional das células neoplásicas do LPSNC é distinto do LDGCB sistêmico, mesmo quando a COO (GCB x ABC) é

a mesma, o que pode justificar o pior prognóstico e o comportamento mais agressivo do LPSNC. Pacientes com LPSNC ABC apresentam hiperexpressão e ativação da via do *Fibroblast Growth Factor*, associado à sobrevida e proliferação celulares, diferentemente do LDGCB sistêmico ABC ⁸⁰.

Alguns estudos evidenciaram que a expressão de BCL6 (IHQ) foi associada a melhor prognóstico ¹³. A análise imuno-histoquímica dos pacientes do CALGB50202 demonstrou que a hiperexpressão de BCL6 estava associada à menor SG ²³. Este resultado foi ratificado por um estudo prospectivo ⁸¹, porém outros evidenciaram o contrário: que a hiperexpressão de BCL6 estaria associada a melhor prognóstico ⁴¹. Uma das possibilidades para esta discrepância poderia ser que o significado prognóstico do BCL6 seja dependente da coexpressão do MYC ou BCL2 ou devido ao tipo de tratamento que os pacientes receberam nestes estudos.

A expressão de CD3 é um marcador de células T e não é frequente em linfomas de célula B, porém pode estar presente em LNHDBC EBV+, possivelmente devido à inativação do PAX5 que atua na diferenciação da célula B, o que permite a expressão do CD3 ⁸²⁻⁸⁴. É uma proteína com domínio extracelular, transmembrana e intracelular. A IHQ apresenta-se na membrana e citoplasma principalmente de células T normais e neoplásicas ^{85,86}.

Tumour Infiltrating Lymphocyte (TIL) é caracterizado pela presença de pelo menos um vaso de pequeno a médio calibre circundado por pelo menos duas camadas de células T à IHQ pela positividade de CD3 (linfócito T), FOXP3 (linfócito T regulador) e TIA-1 (células citotóxicas). É um fator de prognóstico positivo para sobrevida global, resposta tumoral ao tratamento em vários tipos de câncer (carcinoma ductal de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio, entre outros), tanto como variável categórica (presença ou ausência) como variável qualitativa numérica (contagem de TIL) ⁸⁷⁻⁸⁹. Num estudo retrospectivo com 62 pacientes com LPSNC, TIL esteve presente em 32% dos casos e foi associado à melhor resposta e sobrevida global ⁹⁰.

Num estudo retrospectivo, multicêntrico, com 100 LPSNC, necrose tumoral foi observada em 24% e TIL em 36%. O padrão de necrose tumoral observado foi do tipo coagulativo, caracterizado por coleções de células neoplásicas fantasmas que ocupam espaço na biópsia, além da presença de

células apoptóticas. TIL foi analisado em campo de pequeno a médio aumento, analisando os vasos ao redor do tumor ou das células tumorais, com fenótipo de células T presente e acumuladas em múltiplas camadas próximas à parede vascular ou entre a parede vascular e as células tumorais. Presença de TIL foi associada à melhor SG na análise multivariada quando comparada à ausência de TIL (SG: 59% $\pm$ 14% vs. 42% $\pm$ 9%, $P=0.02$, respectivamente). No entanto, a presença de necrose tumoral não foi considerada fator prognóstico em pacientes com LPSNC ⁵⁶. Num estudo com 30 pacientes do *International Extranodal Lymphoma Study Group*, um colar de CD3 perivascular reativo foi observado em 23% dos pacientes, todos com IPI modificado de risco baixo a intermediário ⁹¹.

2.4 Tratamento

O tratamento é composto de uma fase de indução seguida pela consolidação ⁹². A escolha do tratamento na fase de indução depende de características clínicas, tais como idade, *performance status* (PS), comorbidade e IPI.

A indução pode ser realizada com HD-MTX, imunoquimioterapia associada a HD-MTX, WBRT, entre outras. Não se recomenda tratamento isolado com corticosteroides devido à alta taxa de recidiva e à interferência no diagnóstico histopatológico se administrado antes da realização da biópsia. A escolha do tratamento de consolidação depende da resposta clínica obtida na fase da indução, da tolerabilidade do paciente e da toxicidade. Opções da fase da consolidação incluem observação, citarabina em altas doses, RT, ASCT, entre outras. Os agentes quimioterápicos precisam ter boa penetração pela BHE. Agentes alquilantes e esteroides têm boa penetração em doses convencionais; MTX e araC têm baixa penetração, porém em doses altas conseguem atravessar a BHE. Agentes antracíclicos, alcalóides da vinca têm baixa penetração e baixa disponibilidade no SNC, os quais necessitam de doses tóxicas para serem efetivas em tumores no SNC ⁹².

Apesar de avanços no tratamento do LPSNC, a taxa de recorrência em 2 anos é de 50% e um terço dos pacientes são refratários ao tratamento

inicial^{21,93}.

Devido ao risco de neurotoxicidade induzido pelo tratamento, recomenda-se realização de testes neuropsicológicos para as funções de execução, atenção, memória e velocidade psicomotora antes, durante e após o tratamento ^{21,94}.

2.4.1 Radioterapia

WBRT como terapia isolada era o tratamento de escolha no passado. Doses entre 36 a 45Gy apresentavam RC de 60% a 90%, porém com recidiva precoce e SG mediana 12-18 meses e alta morbi-mortalidade, incluindo neurotoxicidade precoce e tardia ⁹⁵. A neurotoxicidade é ainda mais prevalente quando associada à quimioterapia. Por estes motivos, além de o LPSNC ser uma doença multifocal e infiltrativa, radioterapia focal ou radiocirurgia não são recomendadas atualmente como primeira escolha terapêutica, porém pacientes que não respondem à quimioterapia podem se beneficiar desta terapia como resgate ^{16,94,95}.

O benefício da WBRT como consolidação também é questionado. Um estudo multicêntrico, randomizado, fase 3, com 581 pacientes, comparou quimioterapia baseada em HD-MTX com ou sem consolidação com RT, sem evidência de melhora na SG apesar do aumento da PFS no braço com RT ²².

Estudo prospectivo e observacional demonstrou que radiocirurgia com *gamma knife* associado à quimioterapia aumentou a SG de 27 meses para 48 meses em pacientes submetidos à radiocirurgia *versus* aqueles submetidos apenas à quimioterapia, com RC de todas as lesões e sem declínio neurológico. No entanto, trata-se de estudo não randomizado, e a análise dos dados encontra-se em andamento ⁹⁶.

Doses menores de radioterapia foram associadas a menor risco de perda neurocognitiva. Num estudo de fase 2, pacientes em RC foram submetidos à consolidação com citarabina e WBRT em doses menores (23,4 Gy) após indução com HD-MTX, sem perda de função cognitiva ⁹⁷. Tais dados, no entanto, devem ser analisados com cautela, devido ao risco de neurotoxicidade tardia ⁹⁸. Radioterapia foi associada a maior risco de toxicidade

neurológica tardia (OR 5,23, IC95% 2,33-11,74) ⁷¹.

Sintomas tardios associados à neurotoxicidade por WBRT incluem déficit de atenção, alterações de memória e de marcha, ataxia, incontinência, entre outros. Achados radiográficos incluem alteração de substância branca, aumento ventricular e atrofia cortical. Achados anátomo-patológicos incluem demielinização, perda neuronal hipocampal e aterosclerose de grandes vasos⁹⁹. Não há tratamento efetivo para estas complicações ¹⁰⁰.

2.4.2 Monoterapia ou Poliquimioterapia baseado em MTX

MTX em altas doses é o agente antineoplásico mais usado na fase de indução, pois possui boa penetração na BHE e depuração plasmática trifásica. Esquemas habituais incluem infusão rápida em 3 horas em ciclos de 14 ou 21 dias na dosagem $\geq 3 \text{ g/m}^2$. Doses $\geq 1 \text{ g/m}^2$ alcançam nível terapêutico no cérebro e doses $\geq 3 \text{ g/m}^2$ atingem nível terapêutico no LCR ¹⁰¹. Infusões contínuas em 24 horas não são mais eficientes; administração de mais de seis ciclos de HD-MTX está associada à maior taxa de RC ^{97,102}. Doses até $3,5 \text{ g/m}^2$ têm boa tolerabilidade, sendo as principais toxicidades: disfunção renal, mucosite, citopenias e raramente hepatite, esta ocorrendo principalmente em pacientes idosos ¹⁰³.

Uma meta-análise com 783 pacientes avaliou prognóstico e efeitos do tratamento em primeira linha em pacientes com LPSNC maiores que 60 anos. Nesta população, o tratamento baseado em HD-MTX aumentou a sobrevida quando comparado a WBRT (HR 0,70, IC95% 0,53-0,93). Não houve diferença entre HD-MTX associado à quimioterapia oral e outras terapias agressivas baseadas em HD-MTX (HR 1,39, IC 95% 0,90-2,15).

Estudo de fase 2 randomizado com 79 pacientes comparou HD-MTX ($3,5 \text{ g/m}^2$, D1) associado à citarabina (2 g/m^2) com HD-MTX isolado na dose de $3,5 \text{ g/m}^2$ a cada 21 dias, seguido de RT de consolidação. HD-MTX associado à citarabina ofereceu maior taxa de RC (46% x 18%, $p=0,06$) e de RG (69% x 40%, $p=0,009$), porém com maior incidência de neutropenia (90% x 15%, $p=0,00001$), anemia (46% x 10%, $p=0,00001$), complicações infecciosas (23% x 3%, $p=0,0002$), trombocitopenia (92% x 8%, $p=0,0001$) e hepatotoxicidade

(10% x 3%, $p=0,05$) ¹⁰⁴.

2.4.3 Imunoterapia e Imunoquimioterapia com Rituximabe

Rituximabe é um anticorpo monoclonal contra o antígeno CD20 presente em linfócitos B. Tem penetração limitada em SNC atingindo nível em LCR de 0,1% a 4,4% em relação ao nível sérico, porém a monoterapia com rituximabe levou à resposta radiológica em pacientes com LPSNC recidivados ¹⁰⁵. A meta-análise para avaliar o benefício do uso de rituximabe evidenciou que esse anticorpo levou a ganho de SLP 5 anos, com OR (*odds ratio*) 2,54 (IC95% 1,64-3,93, $p=0,0001$), e ganho de SG com OR 2,87 (IC 95% 2,02-4,08, $p=0,00001$) ¹⁰⁶. Desta forma, a adição de anti-CD20 tem sido recomendada como padrão no tratamento de LPSNC.

O benefício da adição de rituximabe a HD-MTX associado a um agente alquilante também foi avaliado em estudos clínicos. Num estudo de fase 2 com 52 pacientes expostos à indução com rituximabe, MTX, procarbazina e vincristina seguida de consolidação com WBRT em dose baixa, constatou-se a taxa de resposta de 79% e SLP 2 anos 57% ⁹⁷. Num estudo com 33 pacientes maiores de 65 anos submetidos à indução com rituximabe, MTX, procarbazina e vincristina seguida de consolidação com ASCT, obteve-se RG 94% e SLP 2 anos 79% ¹⁰⁷. Em outro estudo com 44 pacientes tratados com HD-MTX 8g/m² (D1), rituximabe 375mg/m² (D3) e temozolamida 150mg/m² (D7 a D11) seguida de consolidação com etoposídeo 5mg/kg em infusão contínua por 96 horas e citarabina a 2g/m² a cada 12 horas por 8 doses, obteve-se RG 77%, RC 68% e SLP 4 anos, semelhante aos resultados obtidos com esquemas que incluem WBRT ²³. Num estudo com 53 pacientes com população predominantemente idosa (62% acima de 60 anos), avaliou-se a terapia de indução com rituximabe, MTX e temozolamida seguida de consolidação com WBRT hiperfracionado e temozolamida de manutenção, obtendo-se RG 57% e SLP 64% ¹⁰⁸.

Num estudo de fase 2 (IELSG32), 219 pacientes LPSNC virgens de tratamento foram randomizados (1:1:1) para terapia de indução em três braços: braço A (MTX 3,5g/m² d1, araC 2g/m² d2-3, a cada 3 semanas), braço B (rituximabe 375mg/m² d5, MTX 3,5g/m² d1, araC 2g/m² d2-3, a cada 3

semanas) e braço C (rituximabe 375mg/m² d5, MTX 3,5g/m² d1, araC 2g/m² d2-3, tiotepa 30mg/m² d4 a cada 3 semanas) seguido de consolidação de acordo com a resposta clínica com radioterapia 36 Gy mais *boost* (reforço) de 9Gy ou BCNU 400mg/m² d1, tiotepa 5mg/kg d2-3 mais ASCT em caso de RC ou resposta parcial (RP) ou doença estável (DE); e em caso de PD, radioterapia com 40Gy mais *boost* (reforço) de 9Gy. A mediana de *follow-up* foi de 40 meses (24-76). Em termos de SLP, A x B (RC 0,68, IC95% 0,45-1,02, p=0,06), A x C (RC 0,66, IC95% 0,53-0,81, p=0,0001) e B x C (RC 0,63, IC95% 0,40-0,99, p=0,04). Em termos de SG, A x B (RC=0,73, IC95% 0,48-1,11, p=0,14), A x C (RC=0,65, IC95% 0,52-0,83, p=0,0004) e B x C (RC 0,57, IC95% 0,35-0,93, p=0,02). Tais dados sugerem o benefício da adição de rituximabe ao tratamento oncológico ⁷³.

Estudo prospectivo randomizado comparou MTX e temozolamida (braço A) *versus* MTX, procarbazina, vincristina e citarabina (braço B) em pacientes maiores de 60 anos com LPSNC virgens de tratamento. Braço B *versus* Braço A teve SLP de 9,5 meses (IC95% 5,3-13,8) *versus* 6,1 meses (IC95% 3,8-11,9), SG de 31 meses (IC95% 12,2-35,8 meses) *versus* 14 meses (IC95% 8,1-28,4 meses) e RG de 82% *versus* 71% (p=0,023), respectivamente, o que favorece o segundo esquema ¹⁰⁹.

O estudo Alliance/CALGB 50202 avaliou 44 pacientes expostos à quimioterapia não mieloablativa com MTX, rituximabe e temozolamida por 8 ciclos, seguida de consolidação com araC e infusão contínua de etoposídeo em 96 horas. Com mediana de seguimento de 4,9 anos, a SLP foi maior que 2 anos e a SG, superior a 5 anos, sem neurotoxicidade ²³.

2.4.4 Quimioterapia intraventricular

Quimioterapia intratecal via reservatório de Ommaya aumenta a concentração com maior duração no LCR em relação à quimioterapia intravenosa, pois a barreira hematoencefálica não interferiria na penetração das macromoléculas no LCR. Quimioterapia intraventricular com rituximabe e MTX em LPSNC apresentou TR 75% ¹¹⁰, porém análises retrospectivas não demonstraram benefício da adição de quimioterapia intratecal à HD-MTX, além

de maior risco de infecção e meningite ¹¹¹⁻¹¹³.

2.4.5 Terapia de manutenção com agente quimioterápico

Lenalidomida possui atividade em LPSNC tanto como agente único como combinado a outros quimioterápicos. Manutenção com lenalidomida aumentou a SLP, com perfil de toxicidade aceitável em pacientes com recaída de LPSNC ¹¹⁴. Estudos de fase 2 demonstraram perfil de segurança e atividade da lenalidomida aceitável em LPSNC. Manutenção com lenalidomida na dose de 5mg a 10mg após terapia de resgate foi associada à resposta durável em 5 de 10 pacientes com LPSNC. Foram detectados níveis terapêuticos de lenalidomida no LCR por 2 a 15 horas após uma dose 20mg ¹¹⁵.

2.4.6 Transplante de Medula Óssea Autólogo (ASCT)

Consolidação com HD-ASCT após quimioterapia parece aumentar a SG e SLP ¹¹⁶ devido à penetração no SNC ^{116,117}, porém outros estudos sugerem que regimes de consolidação com ASCT estão associados à piora da função cognitiva ⁹².

Num estudo de fase 2, uma população de 79 pacientes LPSNC virgens de tratamento foi submetida à indução com HD-MTX, citarabina, rituximabe e tiotepa, seguida de condicionamento pré-HD-ASCT com carmustina e tiotepa, obtendo TR 91%, SG 2 anos 87%. O tratamento foi considerado tolerável, pois, durante a fase de indução, 47% dos pacientes tiveram anemia grau 3, e 63%, trombocitopenia grau 4. Durante a fase de HD-ASCT, 50% apresentaram febre grau 3, e 93%, leucopenia grau 4, de acordo com o CTCAE v4.0 (*Common Terminology Criteria for Adverse Events*) ¹¹⁸.

O estudo randomizado PRECIS, em andamento, com 140 pacientes está comparando radioterapia (40Gy) ou ThBuCTX/ASCT como regime de consolidação após indução com R-MBVP-AraC. Dados preliminares demonstraram que ambas RT e ASCT foram associadas a SLP em 2 anos de 63% e 86%, SG 2 anos de 64% e 65% nas coortes da RT e HD-ASCT, respectivamente ¹¹⁵.

2.4.7 Tratamento de resgate

Apesar da alta taxa de resposta inicial, a maioria dos pacientes apresenta PD em algum momento após tratamento inicial baseado em HD-MTX. O emprego de HD-MTX após PD pode ser efetivo, principalmente em pacientes que tiveram resposta prévia a este agente. Num estudo retrospectivo com 22 pacientes com recaída retratados com HD-MTX, obteve-se RG de 91% na primeira recaída e de 100% na segunda recaída ¹¹⁹. Num estudo de fase 2 com 27 pacientes avaliados, o tratamento em segunda linha com citarabina e etoposídeo seguido de ASCT com condicionamento baseado em tiotepa, busulfan e ciclofosfamida apresentou RC de 90%, com SLP 41,1 meses e SG 58,6 meses ¹²⁰. A WBRT pode ser utilizada como terapia de resgate, com RG de até 74% e SG 10,6 meses num estudo com 27 pacientes ¹²¹.

2.4.8 Estudos de Pesquisa Clínica Fase 1/2 em pacientes com LPSNC recidivadas

2.4.8.1 Ibrutinib

Ibrutinib é um inibidor oral do *Bruton tirosina kinase* (BTK), o qual reduz a proliferação celular e induz apoptose. Além disso, potencializa a resposta da célula B via mecanismo independente da BTK ^{78,122}. Como pacientes com LPSNC podem ter alta taxa de mutação do receptor da célula B (BCR) e da via do MYD88, há plausibilidade biológica no uso de ibrutinibe em LPSNC. Estudo de fase 1 com 13 pacientes com LPSNC refratários demonstrou penetração suficiente do Ibrutinib em SNC, sendo bem tolerado em doses de 560mg e 840mg, com Resposta Global de 75% e SLP de 4,6 meses. Apenas um paciente teve aspergilose pulmonar e resistência ao ibrutinibe associada à mutação CARD11 (R179Q), CD79B e/ou A20 (TNFAIP3) ^{123,124}.

Ibrutinib é um antagonista *in vitro* ao efeito dos agentes antifolatos em linhagem celular de LDGCB sistêmico ABC, por isso os estudos de fase 1/2 não associam ibrutinibe a metotrexato. Ele parece atuar como sensibilizador à quimioterapia e confere resposta superior à do HD-MTX. Estudo de fase 1 com

o esquema TEDDi-R (Temozolamida, Etoposídeo, Doxorubicina Lipossomal, Dexametasona, Ibrutinib, rituximabe incluindo ibrutinibe monoterapia durante 2 semanas) em pacientes virgens de tratamento e com recaída teve RG de 94% e RC 86%, porém com alta toxicidade: 94% de neutropenia grau 4 e 39% de aspergilose invasiva pulmonar ou cerebral, com mortalidade de 28%; bastante alta se comparada à taxa de mortalidade de 2-10% em pacientes tratados com quimioterapia baseada em HD-MTX ^{124,125}.

Ratos *knocked-out* para BTK (BTK^{-/-}) inoculados com aspergilos apresentaram maior mortalidade quando comparados a ratos BTK^{+/+}. Isso demonstra o papel do BTK na imunidade a esta infecção ¹²⁵. A resposta das células mieloides aos esporos fúngicos depende de sinalização via BTK para induzir expressão de TNF-alfa e o recrutamento de neutrófilo ¹²⁴. A Figura 2 ilustra a sinalização celular via BTK.

FONTE: Hendriks *et al.*, 2014 ¹²⁶

Figura 2 - Sinalização celular via BTK ¹²⁶. A ativação do Receptor de Célula B (BCR) leva à sinalização intracelular e à formação de *micro-signalosome*, que é composto de VAK, PI3K, BTK, SLP65 e phospholipase PLCγ2. BTK é o principal responsável pela ativação de PLCγ2, levando a influxo de Cálcio e ativação de receptores de fatores nucleares de transcrição de células T ativadas (NFAT) e NF-κB, além da ativação de ERF1 e ERF2. A ativação de BTK também leva à ativação da proteína da síndrome de Wiskott-Aldrich (AWASP), o que induz a mudança no citoesqueleto associada à ativação de BCR. AKT é ativado também pelo PI3K, que fosforila fatores de transcrição FOXO, inativando-os. AKT também bloqueia proteínas apoptóticas, como BH3, BAD, liberando o BCL-X L e estabilizando o MCL1

2.4.8.2 Temsirolimus

Temsirolimus é um inibidor do mTOR, importante na via do PI3-K/AKT/mTOR e em várias vias de sinalização *pro-survival*, pois regula a síntese proteica e o crescimento celular. Num estudos de fase 1/2 em pacientes com LPSNC recidivados, a monoterapia com temsirolimus obteve RG 54%, SLP 2,1 meses, porém com mortalidade de 13,5% (principalmente pneumonia) ¹²⁷.

2.4.8.3 *Imunoterapia*

Imunoterapia pode ter um papel promissor no futuro do tratamento do LPSNC. Células T e macrófagos ativados levam à resposta inflamatória local e podem estar associados a melhor prognóstico. Isso sugere que a potencialização do sistema imune mediado por células T pode ser efetiva ⁵⁵. É frequente o ganho do número de cópias do 9p24,1/*PD-L1* e *PD-L2* (*programmed death ligands 1* e *2*) e o aumento de expressão de proteínas PDCD1, PD-L1 e PD-L2 em LPSNC. Nivolumabe é um anticorpo humano IgG4 cujo alvo é a proteína PDCD1, o qual impede a ligação do PD-L1 presente no LPSNC com o PDCD1 do linfócito. Estudo de fase 1 (LPSNC refratários ou com recidiva) avaliou monoterapia com nivolumabe em quatro pacientes. Em seguimento de 13 meses, todos os pacientes obtiveram RC em 2 meses ³³. Estudo de fase 2 com Nivolumabe em LPSNC recidivados encontra-se em andamento.

2.4.8.4 *Lenalidomida*

Lenalidomida é um agente imunomodulador oral com efeito tumoral pleotrópico que inclui estimulação de célula T e expansão de células NK. Ele possui ação antagonista ao IRF4 e MYC, com efeito pró-sobrevivência ^{128,129}. Num estudo de fase 1, 14 pacientes com recaída foram expostos a lenalidomida EV e rituximabe endovenoso e intraventricular, com RG de 64% e SLP mediana 6 meses, sem mortalidade relacionada ao tratamento, sendo recomendada dose de 15mg/dia ¹³⁰. Num estudo retrospectivo com 8 pacientes com LPSNC R/R com última linha de resgate incluindo MTX, rituximabe, radioterapia ou ressecção subtotal, a manutenção com lenalidomida na dose de 5 a 10mg/d) evidenciou alta RG. Cinco pacientes obtiveram RC em até 2 anos após início de tratamento. Desta forma, sugeriu-se que a manutenção com lenalidomida poderia ser uma opção para terapia de resgate ¹³⁰. Estudo de fase 2 com lenalidomida e rituximabe em pacientes com recaída teve taxa de resposta de 63% e SLP 8,9 meses (ASH2016). O Quadro 2 demonstra alguns estudos de fase 1/2 em andamento.

Molécula	Desenho	Taxa de resposta	SLP	Comentários
Ibrutinib	fase 1 MSKCC em recaída LPSNC	75%	4,6 meses	um caso de aspergilose pulmonar, resistência ao ibrutinib com mutação CARD11
Ibrutinib	fase 2 em recaída LPSNC e linfoma intraocular	56%		um caso de aspergilose pulmonar, análise final pendente
DA-TEDDi-R com monoterapia com ibrutinibe	fase 1 em pacientes com recaída LPSNC	94% ibrutinib, 84% RC com TEDDiR		39% taxa de aspergilose invasiva nos pulmões e cérebro, mortalidade relacionada ao tratamento em 28%
Temsirolimus	fase 1/2 em recaída LPSNC	54%	2,1 meses	mortalidade relacionada ao tratamento: 13,5%
Nivolumabe	fase 2 em recaída LPSNC, linfoma testicular			em andamento
Lenalidomida/rituximab	fase 1 em recaída LPSNC	64%	6 meses	coorte retrospectiva: aumento em 12 vezes da duração de resposta com manutenção de lenalidomida
Lenalidomida/rituximab	fase 2 em recaída LPSNC	63%	8,9 meses	análise final pendente
Pomalidomida/dexametasona	fase 1 em recaída LPSNC ou recaída linfoma intraocular			em andamento

Quadro 2 - Estudos de fase 1 e fase 2 em andamento

2.5 Fisiopatologia molecular do LPSNC

A fisiopatologia molecular do LPSNC ainda não se encontra completamente definida. Porém o avanço das técnicas de biologia molecular, em especial o sequenciamento de todo o exoma, a hibridização genômica comparativa e a análise de perfil de transcrição, do microambiente tumoral e de perfil de expressão gênica têm permitido a identificação de genes alvo envolvidos na sua patogênese ^{24,131,132}.

EBV não está associado à fisiopatologia do LPSNC em pacientes imunocompetentes. Num estudo com 70 pacientes imunocompetentes, a hibridização *in situ* para EBV foi negativa em todas as biópsias ⁵³.

A ativação da via NFκB parece estar diretamente associada à patogênese do LPSNC. Esta via atua de modo a facilitar a transcrição de genes associados à sobrevivência, proliferação e invasão celular, como *IRF-4*, *RSGS13*, *Ciclina D2*, *BCL2*, *BCL2A1* e *XBP-1* (Figura 3). A ativação crônica da via do BCR, principalmente decorrente de mutações do *MYD88/IRAK* e do *B-cell antigen receptor-associated protein cluster of differentiation* (*CD79B*), coopera para ativar a via NFκB ^{24,34}. Num estudo com 30 pacientes, mutações no *CD79b* foram associadas à melhor SLP em até 2 anos ¹³³. A Figura 3 - ilustra a via no NFκB.

MYD88 é uma proteína adaptadora usada pela maioria dos receptores do tipo Toll-like e do receptor da Interleucina-1 (*IL1*) para ativar a via NFκB por meio do receptor associado à cinase *IL1* (*IRAKs*). Mutações no domínio citosólico do *MYD88* por substituição de leucina por prolina na posição 265-*L265P* ocorrem em 55% dos pacientes com LPSNC ¹³¹. Mutações do *MYD88 L265P* promovem desenvolvimento de LDGCB em ratos ¹³⁴. Estas mutações também são frequentes no linfoma ocular ¹³⁵. Interessantemente, mutações no *MYD88* e *CD79B* são raras no LDGCB sistêmico com envolvimento de SNC, o que sugere patogênese molecular distinta entre as duas doenças ¹³⁶. Num estudo com 80 pacientes com LPSNC, mutações no *MYD88* foram associadas a melhor prognóstico ⁷⁷. No LDGCB sistêmico ABC, mutações do gene *MYD88* são menos frequentes, com ocorrência em 39% dos casos ¹³¹. A mutação concomitante de *MYD88 L265P* e *CD79B ITAM* foi encontrada em 37% do

LPSNC e em apenas 10% no LDGCB sistêmico do subtipo ABC ¹²⁵.

Mutações no ITAM (*immunoreceptor tyrosine-based activation motif*) associado ao BCR/CD79B ocorrem em 40% do LPSNC, e em 20% no LDGCB sistêmico do subtipo ABC ¹³¹. Mutações no *CARD11* também podem ativar a via NFkB, sendo encontradas em 16% do LPSNC. Por outro lado, o TNFAIP3 (A20) é um regulador negativo do NFkB, e mutações somáticas neste linfoma estão presentes em 3% a 15% dos casos ¹³⁷.

FONTE: Rubenstein, 2017 ²⁴

Figura 3 - Via do NFkB- A ativação transcripcional do NFkB é regulada por múltiplos sinais no LPSNC, incluindo o complexo MYD88/IRAK e o complexo BCR, constituído pelo CD79A e B. A ativação das kinases IRAK via mutação oncogênica do MYD88 e L265P ocorre em aproximadamente 55% do LPSNC. Ativação crônica da via de sinalização do BCR envolvendo o BTK interage com a via do MYD88/IRAK na ativação do NFkB. Sinalização via PIM kinases, PI3K/mTOR, JAK/STAT também estimula a sobrevivência celular. Genes alvos do NFkB (incluindo *IRF-4*, *BCL2*, *ciclina D2*, *RGS-13*, *XPB-1*) também potencializam a sobrevivência, a proliferação e a invasão.

Pesquisa do número de cópias de DNA por sequenciamento de todo o exoma evidenciou ativação da via do NFkB, com mutações genômicas

significativas no cromossomo 6q. Além disso, observou-se deleção do 6q21-23 em 40% a 60% dos LPSNC, associado a pior prognóstico. Prováveis genes envolvidos nesta deleção incluem o A20 (*TNFAIP3*), um regulador de diferenciação da célula B, *PRDM1* e uma tirosina fosfatase, *PTPRK* ^{131,138}. Sequenciamento de todo o genoma e estudos de hibridização demonstraram redução do número de cópias no 9p21.3 em até 80% dos casos. Esta anormalidade foi associada a alterações do regulador de ciclo celular *CDKN2A* ³⁴. Identificou-se também que maior número de cópias da protease inativadora de *TNFAIP3* e *MALT1* promove ativação da via do NFkB ¹³⁸

Estudos de PEG concluíram que o LPSNC é uma entidade heterogênea, com espectro de ABC associada à ativação da via NFkB e GCB. ^{41,53}. A expressão de *BCL2* não relacionada à t(14;18)(q32;q21) é frequente ^{13,37}. Há evidência de hipermutação somática, rearranjos e mutações de genes de Ig e preservação de sítios *open reading frame* sugestivas de passagem pelo centro germinativo, assim como presença de morfologia do tipo centroblastica e ausência de correlação com EBV ^{14,37,39}. Assim como o LDGCB sistêmico, o LPSNC pode apresentar translocações envolvendo o gene *BCL6*, deleções 6q, hipermutação somática em proto-oncogenes, tais como *MYC* e *PAX5*, e inativação do *CDKN2A*. Porém, diferentemente do linfoma sistêmico, o PEG demonstrou que o LPSNC é caracterizado por expressão gênica de genes relacionados à adesão à matriz extracelular, como *MUM1*, *CXCL13* e *CHI3L1*. Hipermutação somática de segmentos do gene da cadeia pesada de Ig (IgV_H) sugere presença de proliferação celular dependente de antígeno. Consequentemente a patogênese tumoral depende da ativação de células B circulantes de maneira dependente de antígenos, as quais migram e colonizam o SNC devido à expressão de genes relacionados à adesão celular e à matriz extracelular. Contudo, os mecanismos responsáveis pelo tropismo pelo SNC ainda não são conhecidos ^{54,131,139}.

Outros genes possivelmente associados à patogênese do LPSNC incluem *JAK-1* e kinase PIM ¹³². PIM1 parece cooperar com *MYC* na linfomagenese, sendo frequentemente hipermutado no LPSNC ¹²⁴. A ativação do PIM kinases, das vias PI3K/mTOR e de JAK/STAT favorecem a sobrevivência celular. Podem estar hiper-reguladas tanto em nível transcricional como

proteico no LPSNC ^{24,132}.

2.5.1 Genes selecionados para o estudo

2.5.1.1 *Gene MYC (Fator de Transcrição bHLH)*

O gene *MYC*, conhecido como Fator de Transcrição bHLH, está localizado no cromossomo 8q24,21. A proteína codificada por esse gene atua como proto-oncogene. Trata-se de uma fosfoproteína nuclear com função na proliferação celular, apoptose, crescimento celular, atividade da telomerase, metabolismo energético por meio da biogênese ribossomal e diferenciação celular, conhecido como padrão de assinatura do *MYC* ^{27,35,140,141}. A proteína *MYC* forma um heterodímero com o fator de transcrição *MAX*, o qual se liga a uma sequência *E box* de DNA, regulando a transcrição de vários genes. Sua hiperexpressão está associada a vários tipos tumorais. A t(8;14)(q24;q32) promove a fusão do gene *MYC* e a porção promotora do gene da IgVh está associada ao linfoma de Burkitt ^{140,142}.

Rearranjos envolvendo o gene *MYC* ocorrem em 10%-15% dos LDGCB sistêmicos, estando associados a pior prognóstico independentemente do tipo do gene parceiro envolvido ^{143,144}. Rubenstein demonstrou maior expressão mRNA *MYC* em LPSNC comparado com LNHDGCB sistêmico através de PEG e RT-PCR ¹⁴⁵. A ativação da via NFkB pode de forma alternativa desregular a expressão do *MYC* ^{146,147}.

A expressão de *MYC* é desregulada em tumores por diversos mecanismos, como translocação cromossômica, mutações, reprogramação epigenética, aumento de estabilidade proteica e translação aumentada, entre outros ¹⁴⁸⁻¹⁵⁰. Mutações hipersomáticas aberrantes do proto-oncogene *MYC* também têm sido observadas em estudos de expressão gênica com LPSNC^{34,131}. PIM1, que interage com o *MYC* na linfomagenese, também é frequentemente identificado como um alvo de hipermutação somática aberrante no LPSNC, o que demonstra possível papel da ativação do *MYC* no LPSNC ¹³⁸. Hiperregulação de microRNAs (miRNAs) associados com a via do *MYC* também foi demonstrada em LPSNC ¹²³.

No estudo CALCG 50202, evidenciou-se hiperexpressão de *MYC*, *PIM-1* e genes induzidos por IL-4, como *XBP1* em LPSNC ²³. Superregulação dos microRNAs miR-17-5-p, miR-20a, miR-9 que estão associados à hiperexpressão de *MYC* também foi encontrada no LPSNC ¹⁵¹.

Num estudo com 75 pacientes LPSNC HIV negativos, a prevalência de del(6)(q22) e de translocação dos genes *BCL6*, *IGH* e *MYC* foi de 45%, 17%, 13% e 3%, respectivamente. A presença de del(6)(q22) e/ou translocação de *BCL6* foi associada à pior SG ($p=0,0097$), independentemente de acometimento cerebral profundo ou uso de HD-MTX ⁶⁹.

2.5.1.2 Gene *BCL2* (*B-cell lymphoma 2*)

BCL2 é um gene localizado no cromossoma 18q21,33 que codifica uma proteína antiapoptótica de mesmo nome. Encontra-se expresso na maioria dos tecidos, mas não no CG, onde sua transcrição é suprimida pelo gene *BCL6* ³⁵. A translocação de *BCL2* para o *locus* da IgVh na t(14;18) produz ativação constitucional de *BCL2*, favorecendo a formação de clones de linfócitos de longa sobrevida suscetíveis a defeitos moleculares adicionais. Esta anormalidade favorece a tumorigênese no linfoma folicular principalmente quando associado à desregulação do *MYC* ^{35,148,152}. A t(14;18) está presente em 10% a 40% do LDGCB ^{153,154}. A hiperexpressão de *BCL2* está associada a maior número de cópias do 18q21,33 ³⁴. A proteína codificada usualmente está ausente ou expressa em baixos níveis no CG dos folículos secundários ^{9,155}.

Em linfócitos B de murinos com mutação MYD88 L265P, observa-se ativação da via NFkB e hiperproliferação celular. Entretanto, a expressão de *BCL2* é necessária para sustentar a sinalização dependente do MYD88 L265P ^{156,157}.

Na era pré-rituximabe, a hiperexpressão do gene *BCL2* foi associada a pior prognóstico no LDGCB sistêmico ^{154,158}. Na era pós-rituximabe, sua hiperexpressão deixou de ter impacto prognóstico na SG no LDGCB ¹⁵⁹⁻¹⁶¹. O rituximabe melhorou a SLP em pacientes *BCL2*-positivos (56% versus 25%, $p=0,0001$) e *BCL2* negativos (59% versus 33%, $p=0,02$). Rituximabe também melhorou a SG nos pacientes *BCL2* positivos (56% versus 42%, $p=0,01$) e

BCL2 negativos (58% versus 52%, $p=06$) ¹⁵⁹. Este imunoterápico induz apoptose por diversas vias de sinalização intracelular, incluindo a via do gene *BCL2* e do *B-cell lymphoma extra large* (BCL-xL). Também induz regulação reacional de IL-10 e fosforilação da via do transdutor de sinal de ativador de transcrição 3 (STAT3). Em outro estudo, a hiperexpressão de BCL2 não foi associada à pior SG, independente da célula de origem ^{160,162}.

2.5.1.3 Gene *LMO2* (*LIM domain only 2*)

O gene LIM domínio único 2, conhecido como Rombotina 2 ou *Transparent Testa Glabra* está localizado no cromossomo 11p13 ¹⁶³. Codifica uma proteína rica em cisteína altamente conservada, com dois domínios-LIM, e um domínio curto amino-terminal com atividade de transativação e de transcrição; com papel crucial na hematopoese, estando geralmente hiperconservado ^{148 164}. Está expressa normalmente em células do centro germinativo, nas células precursoras hematopoiéticas e atuam no desenvolvimento do timo e na angiogênese ^{163,165,166}. Apresenta papel importante na leucemia linfoblástica T, sendo encontrada em tumores derivados de células do CG como LF, e LDGCB. Pode auxiliar na diferenciação entre LF e outros linfomas de células B pequenas ¹⁶⁴ e de tumores sólidos, como câncer de próstata ¹⁶⁷.

LMO2 regula a expressão gênica pela formação de complexos ligantes no DNA, como LDB1, E2A, HEB, Lyl1, ETO2, and SP1. Sua hiperexpressão em LDGCB sistêmico está associada ao maior número de centrômeros, podendo levar à separação cromossômica incorreta, contribuindo para a oncogênese. Além disso, pode interferir na expressão de transcriptoma composto de 311 genes de modo a contribuir para a hiperexpressão ou hipoexpressão de outros genes específicos ²⁸. Em LDGCB, a ausência de expressão do LMO2 está associada à presença de translocações do MYC ¹⁶⁸.

O anticorpo anti-LMO2 foi validado para avaliar expressão do *LMO2* por IHQ. Num estudo, a expressão de LMO2 foi observada nos CG normais. No LDGCB se correlacionou com a expressão de marcadores de CG (BCL6 e CD10) e a ausência de expressão de marcadores não-CG (MUM1/IRF4 ou

BCL2)¹⁶⁹. A LMO2 é uma proteína nuclear e seu ponto de corte de positividade à IHQ é de 30%¹⁶⁴. Numa análise retrospectiva com 49 pacientes LPSNC, foi observada expressão proteica de LMO2, HGAL e BCL6 em 52%, 65% e 56% dos casos. A expressão de LMO2 foi associada à melhor SLP (25 x 8 meses, $p=0,071$) e SG (34 x 11 meses, $p=0,027$), e a expressão de *BCL6*, à maior SG (39 x 13 meses, $p=0,055$) e SLP (24 x 8 meses, $p=0,006$)¹⁷⁰.

2.5.1.4 Gene *MGMT* (O-6-methylguanine-DNA-methyltransferase)

O gene *MGMT*, localizado no cromossomo 10q26.3, codifica uma proteína reparadora de DNA envolvida na defesa celular contra mutagênese e toxicidade contra agentes alquilantes. A proteína catalisa a transferência de grupos metil da posição O-6-alkilguanina e outras metilações do DNA para sua própria molécula, reparando rupturas do DNA¹⁷¹. Em ratos *knocked-out* p53, não há transcrição desta proteína, o que sugere sua expressão dependente de p53¹⁷².

A proteína *MGMT* é uma enzima reparadora de DNA que protege a célula de agentes alquilantes ao remover grupos alkyl da posição O⁶ da guanina¹⁷³. Sua ausência à IHQ, utilizando ponto de corte de 5% a 15%, foi correlacionada com metilação da região promotora do gene *MGMT*^{174,175}. Esta hipermetilação mostrou-se um biomarcador de bom prognóstico em LDGCB e glioblastoma multiforme e câncer de mama tratados com agentes alquilantes^{29,176}.

Num estudo com 24 pacientes com LPSNC, a metilação do *MGMT* e a ausência de expressão proteica estavam presentes em 54% dos casos, sendo que a metilação de *MGMT* tinha alta correlação com a perda de expressão proteica (ponto de corte da IHQ: 10%) possivelmente devido à maior homogeneidade celular do LPSNC (coeficiente de correlação= -0,49; Teste Exato de Fischer: $p<0,01$). Neste estudo, a hipermetilação da região promotora parece estar associada à maior taxa de SG e ocorre principalmente em pacientes maiores que 60 anos de idade²⁹.

2.5.1.5 Gene *POU2F1* (*POU class 2 homeobox 1*)

O gene *POU2F1*, conhecido como OCT1 e localizado no cromossomo 1q24,2, codifica uma proteína com função de fator de transcrição da superfamília POU. Além de membro de proteínas transmembrana superfamília carreadora de solutos, é responsável pelo transporte e captação de nutrientes, metabólitos, drogas e toxinas. Os membros desta superfamília contêm uma região de 160 aminoácidos pela qual se ligam ao DNA em outra região específica com sequência de oito bases nitrogenadas ATGCAAAT^{177,178}. Esse gene atua na diferenciação e proliferação das células B, e a hiperexpressão de OCT1 está associada à maior sobrevivência celular em linfomas com t(14, 18)¹⁷⁶. A expressão de *OCT1* está elevada em linhagem celular de linfoma e aumentou a suscetibilidade tumoral aos agentes quimioterápicos irinotecano e paclitaxel, possivelmente por facilitar o transporte dos antineoplásicos do meio extracelular para o meio intracelular³⁰. Porém, estudos com tumores com linhagem epitelial demonstraram que a hiperexpressão de OCT1 se associou a pior prognóstico¹⁷⁹.

POU2F1 é necessário para transformação oncogênica e promoção de linfoma em modelos de ratos *knocked-out* para Tp53¹⁸⁰. A ablação de *POU2F1* está associada com metabolismo oxidativo, elevação de expressão de ROS, aumento de sensibilidade a estresse oxidativo e genotóxico e diminuição de iniciação tumoral em modelos xenográficos¹⁸⁰.

2.5.1.6 Gene *PDCD1* (*Programmed cell death-1*)

O gene *PDCD1*, conhecido como *PD1* e localizado no cromossomo 2q37.3, codifica uma proteína de superfície de membrana celular da superfamília das Ig¹⁸¹. Outros membros da família CD28 incluem o antígeno associado a linfócito citotóxico T (CTLA-4) e coestimulador induzível ICOS com papel na resposta celular imune. *PD1* é pouco expresso em células B^{182,183}. Sua proteína geralmente é expressa em células do CG e atua como um ponto de checagem em linfócitos e na diferenciação celular. Hiperexpressão de PD1 foi considerada fator de prognóstico positivo em pacientes com LF¹⁸⁴. O gene

é expresso em célula pró-B com papel na diferenciação celular, bem como em várias células imunes, como células T ^{75,148}.

Foi identificado ganho do número de cópias do 9p24,1/*PD-L1*/*PD-L2* em pacientes com LPSNC, com concomitante hiperexpressão das proteínas *PD-L1*/*PD-L2* ³⁴. Esta hiperexpressão funciona como mecanismo de escape das células neoplásicas do sistema imune, sendo um possível alvo terapêutico ³⁴. Num estudo com 24 pacientes, 13% (3/24) apresentaram translocação envolvendo o *PD-1* ^{34,185}.

Alteração do número de cópias de *PD-L1* e *PD-L2* está associada a aumento de expressão de *PD-L1* e *PD-L2* no LPSNC. Estas proteínas interagem com o receptor *PD1* presente nas células T, ativando a sinalização celular via *PD1*. Em consequência, há diminuição da ativação do receptor da célula T (*TCR*), proliferação e sobrevivência de fatores de transcrição, o que causa redução da resposta imune antitumoral ³⁴.

A presença de TIL com imunoexpressão de *PDCD1* está diretamente relacionada à imunoexpressão de *PDL1* na célula tumoral em vários tumores, inclusive LPSNC ^{75,186}. A hiperregulação de *PDCD1* é consequência de exaustão imune e é um marcador de célula T disfuncional, o que facilita a tumorigênese ⁷⁵. A hiperexpressão de *PDL1* é considerada um marcador de alta resposta imune antitumoral, sendo consequência à infiltração tumoral de células T. ¹⁸⁷. O bloqueio da via mediada pelo *PDCD1* leva à reversão do fenótipo da *exhausted T-cell* e à normalização da resposta antitumoral, sendo um racional para o tratamento com imunoterapia contra o câncer ¹⁸⁸⁻¹⁹⁰.

No LPSNC, o ganho do número de cópias do 9p24.1/*PDL1*/*PDL2* está associado ao aumento da expressão proteica do *PDL1*/*PDL2*, atuando como um mecanismo de escape imune. Isso sugere que drogas anti-*PDCD1* poderiam ter um papel no tratamento ³⁴. A imunoexpressão de *PDCD1* está associada à pior SG ⁷⁵.

2.5.1.7 Gene *BCL6* (*B-cell lymphoma 6*)

O gene *BCL6*, localizado no cromossomo 3q27,3, codifica uma proteína fator transcrição *zinc finger* com um domínio N-terminal POZ. Esse gene atua

como um repressor de transcrição de sequência específica e modula a transcrição de células B IL4 dependente de STAT. O domínio POZ interage com outras proteínas, causando repressão tumoral. No LDGCB o gene *BCL6* pode estar translocado e hipermutado o que favorece a tumorigênese ¹⁹¹. Em 30 pacientes com LPSNC e grupo controle LDGCB sistêmico estudados, a expressão de *BCL6* foi maior em indivíduos com LPSNC quando comparados com LDGCB sistêmico COO ABC ($p=0,02$). Isso sugere a importância do *BCL6* no LPSNC ¹⁹².

O gene *BCL6* codifica uma proteína repressora de transcrição de sequência específica, formando um complexo com diferentes corepressores e com histona. Assim, reprime-se a transcrição de diferentes genes alvos por meio de sua ligação direta com o DNA ou indiretamente com repressão de atividade transcricional ^{148 192}.

Encontra-se usualmente expresso em centroblastos, na maioria dos centrócitos e em células T CD4+ do CG. Por outro lado, encontra-se inativado durante a diferenciação de centrócito para células B de memória ou plasmócitos ^{193,194}.

O gene *BCL6* inibe o gene supressor do ciclo celular p21, inibidor da quinase dependente de ciclina, bem como o programa antiapoptótico ao suprimir a expressão de *BCL2*. Atua na resposta ao dano do DNA quando da regulação dos genes *p53*, *ATR* e *CHEK1* e impede a ativação prematura de centroblastos ao inibir os genes ativadores de linfócitos B *CD69*, *STAT1* (transdutor de sinal e ativador de transcrição 1) e *CD80* ^{35,194}. A desregulação de *BCL6* pode provocar o bloqueio da diferenciação de células pós-CG e determinar o acúmulo de células hipermutadas, o que facilita a tumorigênese¹⁹⁵.

A proteína repressora *transcricional zinc-finger* é necessária para formação de CG. Sua correlação com prognóstico é contraditória em alguns estudos ^{41,170}. Sua hiperexpressão está associada à melhor SG em pacientes tratados com CHOP-símile ¹⁹⁶.

Alterações cromossômicas envolvendo o gene *PRDM1* são relativamente comuns (23% a 37%), levando a bloqueio da diferenciação de células pós-CG e acúmulo de células hipermutadas, o que contribui para a

linfomagênese. A maioria das translocações envolvendo *BCL6* no LPSNC envolvem parceiros distintos do gene da Ig, ao contrário do observado no LDGCB sistêmico ⁶⁹. Segundo Winter *et al.* ¹⁹⁷, pacientes sem expressão de *BCL6* por IHQ beneficiam-se mais da adição de rituximabe à quimioterapia (SG 42% x 76%, CHOP x R-CHOP) do que pacientes *BCL6* positivo (SG 73% x 74%, CHOP x R-CHOP), provavelmente devido à supressão da via NFkB pelo rituximabe ¹⁹⁷. O estudo CALGB 50202 também correlacionou hiperexpressão de *BCL6* à IHQ com pior SG ²³. Estudos retrospectivos, porém, correlacionaram hiperexpressão *BCL6* com melhor SG ^{41,198}.

2.6 Justificativa

O aumento de incidência do LPSNC, associado à alta morbimortalidade, justifica a maior necessidade de pesquisas clínicas e moleculares, a fim de buscar melhores opções terapêuticas e de qualidade de vida.

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva unicêntrico. Seu desenho foi selecionado por tratar-se de uma doença rara, objetivando a maior obtenção possível de dados clínicos e material histopatológico confiáveis. Trata-se do maior estudo disponível, por meio do qual se descrevem as características clínico-epidemiológicas de LPSNC na população brasileira, e o único que avalia expressão gênica e correlação prognóstica.

É importante a realização de pesquisas genéticas em diferentes etnias e populações. A população brasileira é considerada um modelo para estudos genéticos e fenotípicos em mistura étnicorracial e pode apresentar características genotípicas distintas de populações não miscigenadas, bem como biomarcadores distintos ¹⁹⁹. Estudos evidenciam diferentes expressões gênicas entre diferentes populações com mesmo tipo tumoral. Num estudo retrospectivo em LPSNC, análise de genética de DNA e RNA através de *Next Generation Sequencing*, foi realizada em 18 pacientes hispânicos e 11 pacientes brancos. Nele, evidenciou-se que a população hispânica teria frequentemente mais de 3 mutações comparada à população branca (89% x 55%, $p=0.03$), porém sem correlação prognóstica, com SG 2 anos de 60% e 36%, respectivamente ($p=0.23$) ¹³³. Tais dados sugerem heterogeneidade nas

mutações encontradas no LPSNC, podendo ser relacionadas à etnicidade. Num estudo com o uso do banco de dados do SEER, foi evidenciada uma diferença de incidência entre as populações idosas negra e branca, sendo maior nesta última ⁴⁸.

Estudos unicêntricos são valiosos por gerarem hipóteses que podem servir de base para estudos multicêntricos e com maior população. Eles têm como vantagens menor custo, maior facilidade na coleta de dados, uma população menos heterogênea com menos fatores confundidores. No entanto, a principal desvantagem é a limitação na validação dos dados em outras populações ²⁰⁰.

Estudos retrospectivos permitem analisar múltiplos desfechos por um longo período, com a identificação de fatores de risco e suas associações, sendo geralmente conduzidos em doenças raras. As principais desvantagens são a ausência de uniformidade de dados entre os indivíduos, a presença de fatores confundidores que levam à dificuldade na avaliação temporal entre os fatores analisados e o desfecho observado, além da causalidade entre eles ²⁰¹.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo primário

Avaliar o impacto da expressão dos genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* em pacientes com LPSNC e suas correlações com os desfechos de SLP e SG em pacientes tratados no Serviço de Hematologia do HC-FMUSP e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Brasil.

3.2 Objetivos secundários

- a) Descrever as características clínicas epidemiológicas destes pacientes de um grande centro universitário brasileiro, informação atualmente indisponível na literatura médica nacional, com objetivo de melhorar o conhecimento e a caracterização destas neoplasias em população de área geográfica adstrita.
- b) Avaliar o impacto prognóstico da expressão das proteínas MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1 e PDCD1, mensuradas semiquantitativamente por técnica de IHQ, em portadores de LPSNC, para os desfechos de SG, SLP e SLD.
- c) Avaliar a correlação da expressão molecular de RNA (RT-qPCR) e a expressão proteica por meio da reação de IHQ.

4 CASUÍSTICAS E METODOS

O projeto foi submetido ao CAPPesq por meio da Plataforma Brasil, CAAE 48989315.0.0000.0068; Número do Parecer: 1.266.854; aprovado em 07 de outubro de 2015 e anuência do ICESP sob Registro: NP597/2015. Somente após a aprovação, foi iniciado o projeto de pesquisa. Relatórios parciais sobre o andamento do projeto foram entregues semestralmente à CAPPesq por meio da Plataforma Brasil.

A Tabela 3 descreve os custos do projeto, referentes aos itens de consumo de material básico de imuno-histoquímica, PCR e kits necessários para a realização de ensaios propostos. O custo estimado foi de R\$39.040,00. O projeto foi custeado pelo Serviço de Hematologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com verbas provenientes dos projetos de pesquisa clínica patrocinada do grupo de linfoma não-Hodgkin. Os ensaios clínicos foram realizados no Laboratório de Imunopatologia, atualmente vinculado ao LIM31.

Tabela 3 - Orçamento detalhado

Material	Valor Total
Anticorpos para IHQ	R\$16.500,00
Serviços gerais de cortes e laboratório de IHQ e lâminas salinizadas	R\$2.500,00
Kit extração RecoverALL Total Nucleic Acid Isolation- Ambion	R\$3.040,00
Kit Rneasy FFPE- Qiagen	R\$3.000,00
Kit cDNA applied high capacity	R\$3.500,00
Sonda TaqMan (5 sequências)	R\$5.000,00
PCR MasterMix	R\$2.500,00
Placa	R\$1.000,00
Selante	R\$2.000,00
TOTAL	R\$39.040,00

4.1 Pacientes selecionados

Devido à raridade do LPSNC, optou-se pela pesquisa de todos os pacientes cujos materiais anátomo-patológicos estivessem disponíveis nos arquivos do HC-FMUSP e no ICESP. Apenas biópsias realizadas a partir de 01/01/1995 encontravam-se disponíveis. Foi gerada uma primeira lista de pacientes cujos diagnósticos relatavam histopatologia “linfoma” e região anatômica “acometimento em sistema nervoso central”, diagnosticados entre 01/01/1995 e 31/12/2016, para posterior confirmação de diagnóstico de LPSNC e análise dos critérios de inclusão para este estudo. O ponto de corte de coleta de dados estabelecido foi 01/12/2017 para garantir um período de seguimento mínimo de aproximadamente 12 meses e objetivar análise de SG, com base em artigos que avaliavam mortalidade de 35% neste período ¹⁹.

Trata-se de um estudo de coorte unicêntrico retrospectivo. Estudos unicêntricos são valiosos por gerarem hipóteses que podem servir de base para estudos multicêntricos e com maior população. Eles têm como vantagens menor custo, maior facilidade na coleta de dados, uma população menos heterogênea com menos fatores confundidores. No entanto, a principal desvantagem é a limitação na validação dos dados em outras populações ²⁰⁰.

Estudos retrospectivos permitem analisar múltiplos desfechos por um longo período com a identificação de fatores de risco e suas associações, sendo geralmente conduzidos em doenças raras. As principais desvantagens são a ausência de uniformidade de dados entre os indivíduos, a presença de fatores confundidores – o que leva à dificuldade na avaliação temporal entre os fatores analisados e o desfecho observado – e a causalidade entre eles ²⁰¹.

Uma lista inicial destes pacientes foi obtida pelos Serviços de Hematologia do HC-FMUSP e do ICESP, bem como pelos Serviços de Anatomia Patológica do HC-FMUSP e do ICESP.

4.1.1 Critérios de inclusão

- Idade ao diagnóstico maior ou igual a 18 anos e
- LPSNC com histopatologia LNHDGCB CD20+, a qual foi revista e

confirmada prospectivamente por hematopatologista do Departamento de Patologia da FMUSP.

4.1.2 Critérios de exclusão

- Imunodeficiências congênitas ou adquiridas (por exemplo: infecção por HIV, pós transplante de órgão);
- Linfoma primário ocular;
- Envolvimento secundário em SNC de linfoma sistêmico;
- Sorologia positiva para o vírus HIV (com ou sem Síndrome da Imunodeficiência Adquirida);
- Desenvolvimento de outro subtipo de linfoma até a data de censura;
- História prévia ou concorrente de linfoma de células B indolente;
- Indisponibilidade de amostra tecidual;
- Prontuário médico não recuperado e
- Laudo histopatológico divergente entre o diagnóstico retrospectivo e a nova análise histopatológica retrospectiva.

Os dados clínico-epidemiológicos, laboratoriais e de imagem foram obtidos a partir da análise de prontuários médicos manuais ou informatizados, nos quais se destacaram variáveis clínicas e demográficas, como: data de nascimento; sexo; raça; data de diagnóstico; número de linhas de tratamento; datas de início e de término de tratamento; tipos de tratamento oncológico realizados; tipo de resposta clínica ao tratamento; data de obtenção de remissão, progressão e recidiva; data de óbito e da última avaliação clínica; situação atual do linfoma na data de censura; IPI modificado, estágio clínico ao diagnóstico, presença de sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, alteração de comportamento, alteração de memória, déficit neurológico focal, localização do tumor, PS na primeira consulta no Serviço de Hematologia; PS após término de cada linha de tratamento. Dados laboratoriais histopatológicos, padrão de infiltração perivascular, proteinorraquia e glicorraquia, outros marcadores no CSF, sorologia para HIV e EBV, exames de imagem de TC e RMN, bioquímica geral e hematológica também foram coletados quando disponíveis.

Foi feito contato telefônico com pacientes e/ou familiares em casos de perda de seguimento para identificar a situação atualizada do paciente. Em pacientes cujo contato telefônico não foi possível, realizou-se prospecção ativa no site da Receita Federal pelo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), permitindo-se avaliar se o paciente estava registrado como vivo até o ano fiscal anterior ao da pesquisa. Quando disponível, a *causa mortis* foi coletada. A coleta dos dados clínicos foi realizada até 01 de dezembro de 2017 (data de censura de coleta).

4.2 Diagnóstico anatomopatológico

O diagnóstico de LPSNC foi obtido por biópsia incisional estereotáxica ou aberta do tecido acometido. O produto da biópsia foi analisado por coloração de hematoxilina-eosina (H&E) e IHQ para pesquisar os antígenos linfoides B (CD20, CD22 ou CD79a), T (CD3) e Ki67 no Serviços de Anatomia Patológica do HC/ICESP-FMUSP. Nos casos em que o paciente foi submetido a mais de um procedimento diagnóstico, foi considerada apenas a biópsia mais representativa da lesão em estudo.

As lâminas disponíveis dos casos inicialmente selecionados foram disponibilizadas para revisão central realizada por hematopatologista no Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Caso necessário, lâminas extras foram confeccionadas para auxiliar no diagnóstico conforme orientações da hematopatologista.

Os critérios da OMS foram utilizados para confirmação histopatológica. As células neoplásicas foram positivas para os marcadores da linhagem B (CD20, CD22 ou CD79a) ^{5,36,52}. Pacientes com indisponibilidade amostral ou com diagnóstico final discordante do original foram excluídos.

Em algumas amostras, foi realizado no momento do diagnóstico inicial painel de IHQ para Linfoma B e Linfomas T, sendo analisado também IHQ anti-CD3 nas células tumorais e linfócitos reacionais infiltrativos (TIL). TIL foi analisado em campo de pequeno a médio aumento com atenção para os vasos que circundavam o tumor e para as células tumorais. A expressão de CD3 foi

analisada como variável categórica como 0% ou $\geq 1\%$.

Não foram realizadas novas reações de IHQ anti-CD3 por carência de material histopatológico.

4.3 Estadiamento

História e exame físico fazem parte da rotina do serviço de hematologia, assim como avaliação laboratorial com hemograma completo, contagem de reticulócitos, bioquímica, função renal, avaliação hepática, dosagem sérica de ácido úrico, DHL, $\beta 2$ microglobulina, sorologia para HIV, hepatite B e C. A presença de sintomas B foi definida mediante perda de peso superior a 10% do peso corpóreo basal em período inferior a seis meses e/ou febre persistente acima de 38°C sem caracterização de infecção e/ou sudorese noturna recorrente ²⁰².

Os pacientes eram estadiados de acordo com a época de entrada no serviço com TC ou ressonância nuclear magnética de crânio. Para excluir doença sistêmica, realizaram-se TCs de pescoço, tórax, abdômen e pelve além de biópsia de medula óssea. Punção lombar com análise bioquímica e morfológica incluindo citologia oncótica, proteinorraquia, glicorraquia e citometria de fluxo também foram realizadas. Os dados foram coletados conforme sua disponibilidade e registrados numa tabela de coleta de dados, sendo posteriormente categorizados.

4.4 Tratamento

Os pacientes incluídos no estudo receberam intenção curativa com protocolo Abrey, constituído por indução com cinco ciclos de HD-MTX $3,5 \text{ g/m}^2$, procarbazine $100 \text{ mg/m}^2/\text{d}$ e vincristine 1.4 mg/m^2 endovenoso, ²⁰³. Ocorreram algumas variações conforme o ano de tratamento ou condições clínicas dos pacientes. O metotrexate foi administrado por via endovenosa em 3 horas, com ciclos de 21 dias. Não foi realizado ajuste da dose do metotrexate de acordo com o clearance de creatinina. Hidratação, resgate com leucovorina e prescrição de G-CSF profilático foram realizados de acordo com as rotinas do

serviço presentes à época. Pacientes que obtiveram RC receberam regime de consolidação com WBRT (30 a 40Gy em até 20 frações) ou 2 ciclos de 28 dias com citarabina em altas doses (2 g/m²/12 horas D1 até D4). Pacientes com RP receberam até mais 2 ciclos de tratamento de indução conforme descrito previamente. Pacientes com doença estável ou PD foram submetidas a WBRT.

Em 2018, uma nova rotina foi discutida no Serviço de Hematologia, incluindo tratamento com Anti-CD20 (rituximab), ainda a ser implementada.

4.5 Avaliação de resposta

Até o ano de 2005, as definições de RC, RP, PD e DE eram estabelecidas de acordo com a interpretação do médico assistente ou radiologista. Imagens anteriores a 2005 não estavam mais disponíveis, o que impediu a reavaliação de forma retrospectiva. Os dados foram coletados conforme registrados no prontuário dos pacientes à época e dos laudos radiológicos disponíveis.

A partir de 2005, adotaram-se critérios de resposta clínica para LPSNC conforme diretriz publicada ⁵¹. A resposta terapêutica foi determinada por critérios clínicos e imagenológicos avaliados por TC, RNM, assim como punção lombar, avaliação oftalmológica, se disponíveis. Tais dados foram coletados conforme o prontuário e laudos radiológicos disponíveis.

4.6 Seguimento dos pacientes

Os pacientes foram acompanhados após término do tratamento com história e exame físico, exames laboratoriais e de imagem a cada dois meses no primeiro ano de remissão; a cada três meses no segundo ano; a cada quatro meses no terceiro ano; a cada seis meses no quarto ano e anualmente a partir do quinto ano de remissão.

4.7 Reações de IHQ

Todas as lâminas disponíveis e as reações de IHQ previamente realizadas pelos pacientes no Departamento de Patologia da FMUSP e HC FMUSP foram recuperadas e analisadas novamente no Departamento de Patologia da FMUSP. Para inclusão no estudo, todos os pacientes precisavam ter suas lâminas/biópsias novamente avaliadas, confirmando o diagnóstico de LPSNC, independentemente do laudo inicial. Novas lâminas e colorações poderiam ser realizadas a partir das biópsias para se poder confirmar o diagnóstico de LPSNC, caso necessário.

Reações de IHQ para as proteínas de interesse foram realizadas conforme descritos nesta Seção 4.7.2 . A padronização da técnica encontra-se no Quadro 3.

4.7.1 Obtenção das amostras

Os blocos correspondentes às biópsias dos pacientes foram procurados nos dos blocários do HC-FMUSP e do ICESP. Pacientes sem biópsia/bloco disponível para a realização das técnicas de IHQ e moleculares foram excluídos do estudo.

As biópsias tinham sido fixadas em formalina e incluídas em parafina. Os blocos selecionados correspondiam às lâminas utilizadas para confirmar o diagnóstico anatomopatológico de LPSNC. Todos os pacientes com diagnóstico revisto e confirmado de LPSNC com critério de inclusão foram selecionados para reações de IHQ adicionais para pesquisa das proteínas MYC, BCL2, OCT1, MGM1, LMO2 e PD1. As reações foram realizadas em cortes de 3-4 μ dos blocos de parafina no Laboratório de IHQ do Departamento de Patologia da FMUSP. Devido à escassez de material, os primeiros cortes obtidos foram separados para extração de RNA e o restante, para a IHQ. Portanto, alguns pacientes não tiveram material suficiente para realizar todas as reações de IHQ das proteínas de interesse.

As técnicas descritas da reação de IHQ encontram-se na seção 4.7.2 , conforme a rotina do Departamento de Patologia da FM-USP. Não foram

realizadas reações de IHQ para BCL6 devido à escassez do material e porque a pesquisa de expressão gênica do *BCL6* foi adicionada posteriormente ao estudo.

4.7.2 Técnica da reação de IHQ

A IHQ foi realizada pela técnica convencional para material fixado em formol e incluído em parafina para as proteínas relacionadas aos genes em estudo (MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1).

Utilizaram-se os Ac monoclonais anti-c-MYC (clone Y69, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA), anti-BCL2 (clone 124, Cell Marque, Rocklin, California, EUA), anti-LMO2 (clone SP51, Cell Marque, Rocklin, California, EUA), anti-MGMT (clone MT3,1, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA), anti-OCT-1 (clone AB151, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA) e anti-PDCD1 (clone NAT105, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA).

As reações de IHQ foram padronizadas por meio de diluições seriadas dos anticorpos primários e diferentes pH antes do processamento das amostras dos pacientes. Controles positivos e negativos (omissão do anticorpo primário) foram realizados para todas as amostras. O resultado da padronização encontra-se no Quadro 3.

Os cortes de biópsia de Sistema Nervoso Central de 3-4 µm de espessura foram dispostos em lâminas salinizadas (Sigma Chemical Co, St. Louis, Missouri, EUA) em suporte adequado. O processo de desparafinação foi feito por exposição das lâminas ao xilol aquecido em estufa à temperatura de 60-65°C por 5 minutos com subseqüentes lavagens rápidas em três banhos de xilol frio.

Para hidratação, as lâminas foram colocadas em dois banhos de álcool absoluto, um banho de álcool a 95°C e outro de álcool a 70°C. Em seguida, foram lavadas em água corrente, em água deionizada e deixadas em tampão fosfato pH 7,4. A recuperação dos sítios antigênicos foi realizada em alta temperatura em Tris-EDTA pH9. O bloqueio da peroxidase endógena das hemácias foi realizado com peróxido de hidrogênio 10v (3%). Em seguida, as lâminas foram lavadas em água corrente, água destilada e deixadas em

tampão tris-fosfato pH 7.4 (TBS). Os anticorpos foram utilizados nas concentrações conforme Quadro 3. As lâminas foram incubadas *overnight* a 4°C em câmara úmida. Posteriormente foram incubadas com o anticorpo secundário Polímero Novolink (Leica Biosystems Newcastle, UK) por 30 minutos em estufa a 37 graus. Foi utilizado o cromógeno Diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Alemanha). Posteriormente efetuou-se a contracoloração com Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha).

As lâminas foram analisadas em microscópio convencional. A leitura das lâminas foi feita estimando-se 200 células por campo quando possível, em um total de vinte campos de 40x. Foi utilizada análise semiquantitativa por dois observadores distintos, estabelecendo-se valor de consenso para cada caso. A análise semiquantitativa foi padronizada em escala de percentual de células atípicas, positivas para as proteínas interesse em intervalos de 25% (0%-totalmente ausência-, 1 a 25%, 26% a 50%, 51% a 75%, 76% a 100%).

Ac Monoclonais	Diluição final e pH*	Tecido	Marca	Código
MYC (rabbit Clone Y69)	1:100 pH9	Linfoma de Burkitt	Abcam	ab 32072
BCL2 (clone 124)	1:100 pH9	Amígdala	Cell Marque	226M-96
LMO2 (rabbit clone SP51)	1:50 pH9	Amígdala	Cell Marque	370R-16
MGMT (clone MT3.1)	1:400 pH9	Amígdala	Abcam	ab 39253
POU2F1 (rabbit Clone AB151)	1:200 pH9	Amígdala	Abcam	ab 15112
PDCD1 (clone NAT 105)	1:100 pH9	Amígdala	Abcam	ab 52587

*do tampão de recuperação antigênica

Quadro 3 - Padronização dos marcadores de IHQ utilizados

4.8 Método molecular

4.8.1 Obtenção das amostras

Para este estudo, foram realizados cortes de 5 μ M de espessura em micrótomos manuais disponibilizados em tubos de 1,7 mL. As lâminas do micrômetro foram higienizadas com RNase para evitar contaminação entre os pacientes e os cortes foram realizados no Departamento de Patologia da FMUSP. A extração de RNA foi realizada em até uma semana após obtenção dos cortes.

4.8.2 Extração de RNA de amostras fixadas em formol e incluídas em parafina

O processo de extração de RNA das amostras fixadas em formol e incluídas em parafina (FFPE) foi realizado no Laboratório de Genética e Hematologia Molecular – LIM 31 do HC-FMUSP.

A cada tubo de 1.7 ml contendo cortes 5 μ m, foi adicionado 1,5 ml do reagente xilol a 100% para a desparafinização. Os tubos foram agitados em vórtex vigorosamente por 10 segundos, incubados a 37°C por dez minutos e centrifugados durante dois minutos a 20.000 x g em temperatura ambiente, para obtenção de botão celular.

Posteriormente, removeu-se o sobrenadante por pipetagem cuidadosa, para não remover do botão celular. Em seguida, as células foram lavadas com 1,5 ml de etanol a 100%, nova agitação em vórtex por 10 segundos, novamente centrifugação a 20.000 x g por dois minutos, em temperatura ambiente e posterior remoção do sobrenadante. Após repetição do procedimento, as células foram incubadas por dez minutos à temperatura ambiente até evaporar totalmente o etanol residual.

Em seguida, as células foram ressuspensas em 150 μ L de tampão PKD® (Qiagen) adicionados 10 μ L de proteinase K. A amostra foi incubada a 55°C por quinze minutos e, após isso, a 80°C por mais quinze minutos. Adicionaram-se 320 μ L do tampão RBC (*Red Blood Cell Lysis Buffer*), para otimização de lise de hemácias numa suspensão celular única com efeito mínimo nos leucócitos.

O lisado foi homogeneizado e transferido para coluna eliminadora de gDNA e centrifugado por trinta segundos, a 8000 x g. Em seguida, descartou-se a coluna, adicionaram-se 720 µL de etanol a 100% e transferiram-se imediatamente 700 µL da amostra para a coluna *MinElute ENeasy*. Ocluiu-se a tampa do tubo, centrifugou-se por mais quinze segundos a 8000 x g, descartando-se o sobrenadante. Em seguida, adicionaram-se 500 µL do tampão RPE® (Qiagen) à coluna *MinElute ENeasy*, fechando-se delicadamente a tampa. Procedeu-se à centrifugação por quinze segundos a 8.000 x g, descartando-se o líquido. Adicionaram-se mais 500 µL do tampão RPE à coluna *MinElute ENeasy*, ocluiu-se a tampa e centrifugou-se por mais quinze segundos, a 8000 x g, descartando-se o líquido. Em seguida, transferiu-se a coluna *MinElute ENeasy* para novo tubo coletor de 2 ml, o qual foi centrifugado com a tampa aberta por cinco minutos, à velocidade de 20.000 x g.

Então foi descartado o tubo coletor, transferindo-se a coluna *MinElute Eneasy* para outro tubo, agora de 1,7 ml. Adicionaram-se 30 µL de água livre de RNase à coluna, centrifugando-se por um minuto à velocidade de 20.000 x g. Ao final da eluição, obteve-se o RNA, o qual foi estocado em temperatura igual ou inferior a -20°C até o momento do uso.

A concentração de RNA de cada amostra foi determinada no equipamento *NanoDrop Spectrophotometer ND-1000*, e sua integridade foi analisada no *RNA Nano Chip 2100 Bioanalyzer*, da Agilent.

4.8.3 Preparação do cDNA

A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada a partir de 1,0 µg do RNA total. A preparação foi realizada conforme orientações do fabricante *Thermo Fisher* para o *High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit*. O cDNA foi obtido da reação contendo 1µg de RNA total, 0,8 µL de 25X dNTP Mix (100 mM), 2,0 µL de RT Buffer (10 X tampão de reação), 2 µL de RT Randon Primers (10X), 1 µL *MultiScribe Reverse Transcriptase* (transcriptase reversa) e H₂O tratada com dietilpirocarbonato (DPEC), com a obtenção do volume final de 20 µL. As amostras foram submetidas às temperaturas de 25°C por dez minutos, 37°C por 120 minutos e 85°C por cinco minutos no termociclador *Veriti*

Thermo Cycler da *Thermo Fisher* para obtenção do cDNA. Em seguida, foram adicionados 180 µL de H₂O tratada com DPEC.

4.8.4 Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real

A RT-qPCR foi realizada para os genes *MYC* (Hs 202453, ref.158378085), *BCL2* (Hs 0060823, ref. 158378081), *LMO2* (Hs 00277106, ref. 158378089), *MGMT* (Hs 501522, ref. 158378073), *POU2F1* (Hs 283402, ref. 158378077), *PDCD1* (Hs 158297, ref. 158378093) e *BCL6* (Hs 478588, ref. 19673829) – todos da *IDT technologies* (Coralville, Iowa, EUA). Como controle endógeno, foram utilizados os genes *GUSB* (*Catalog number*: 4310888E), *GAPDH* (*Catalog number*: 4352934E) e *RPLPO* (*Catalog number*: 4326314E) da *Applied Biosystems* (Foster City, CA, EUA). Foi utilizado o *TaqMan Universal PCR Master Mix* (*Applied Biosystems*, Foster City, CA, EUA) e sua análise foi executada no equipamento 7500 *FAST Real Time PCR Systems* da *Thermo Fisher*.

Os valores quantitativos relativos foram obtidos a partir do ciclo limiar (*cycle threshold* [Ct]). O Ct é o ponto de referência no qual a elevação do sinal fluorescente corresponde ao crescimento exponencial dos produtos da PCR²⁰⁴. As curvas de eficiência e quantificação gênica foram obtidas a partir de diluições seriadas.

A quantificação relativa baseou-se na construção de curva padrão a partir de quantidades conhecidas do cDNA do gene de interesse, diluídos dez vezes em triplicata com objetivo de obter quatro pontos na referida curva, totalizando-se quatro pontos na curva. Esta curva foi feita de cDNA total de um *pool* contendo 5 linfonodos normais²⁰⁵. Esta estratégia permitiu obter a quantidade relativa do gene de interesse em cada amostra pela disposição em gráfico contruído, colocando-se no eixo y o número de ciclos necessários para amplificação e, no eixo x, a quantidade correspondente de cDNA na curva padrão. A água sempre foi utilizada como controle negativo.

Ao final, os valores relativos de expressão gênica *BCL2*, *MYC*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* foram normalizados em relação ao mRNA do gene endógeno *GUSB*, *GADPH* e *RPLPO*. O gene *GUSB* foi selecionado para

normalização por ser o mais discriminativo das amostras.

4.8.5 Eficiência gênica avaliada

A eficiência gênica encontra-se na Tabela 4.

Tabela 4 - Eficiências gênicas avaliadas

Genes	R2	Eficiência (%)
<i>MYC</i>	0.99	98,70%
<i>BCL2</i>	0.99	94,10%
<i>LMO2</i>	0.99	96,40%
<i>MGMT</i>	0.99	95,20%
<i>POU2F1</i>	0.99	96,80%
<i>PDCD1</i>	0.99	103,50%
<i>BCL6</i>	0.99	102,90%
<i>GUSB</i>	0.99	97,30%
<i>GAPDH</i>	0.99	95,33%
<i>RPLPO</i>	0.99	98,25%

4.9 Análise estatística

As análises estatísticas foram elaboradas por meio do aplicativo *Statistical Package for Social Sciences* – SPSS, versão 11.0 para Windows (Chicago, Il- USA). As variáveis quantitativas podem ser discretas quando determinadas por números inteiros ou contínuas quando representadas por qualquer valor de variação em escala numérica infinita. As variáveis categóricas ou qualitativas não são quantificáveis, mas medidas por meio de sua classificação em categorias, sendo apresentadas como frequências absolutas e porcentagens ²⁰⁶.

Neste estudo, utilizaram-se variáveis quantitativas contínuas (por exemplo, expressão gênica de *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6*) e variáveis qualitativas categóricas (por exemplo: sexo, raça, entre outras). Variáveis contínuas, como idade inferior a 60 anos e expressão gênica

menor que a mediana ou o ponto de corte estabelecido por Curva de ROC, foram transformadas em categóricas.

A análise univariada para medir associação entre as variáveis categóricas/qualitativas foi realizada pelo Teste Exato de Fischer. O Teste *T-Student* foi utilizado para as comparações entre as variáveis quantitativas e os desfechos selecionados ^{207,208}. Na análise univariada, foram considerados estatisticamente significantes valores até $p \leq 0,100$, ou seja, com no máximo de 10% de chance de rejeitar a hipótese de igualdade quando ela é verdadeira. Devido ao pequeno tamanho amostral, optou-se por não realizar análise multivariada. Refratariedade, recaída e suas relações estatísticas foram avaliadas apenas na primeira linha de tratamento.

A análise da sobrevida é uma medida frequentemente utilizada para avaliar grupos com neoplasia. As curvas de SG, SLD e SLP foram estimadas pelo Método de Kaplan-Meier. No Método de Kaplan-Meier, os intervalos de tempo não são fixos, mas determinados pelo aparecimento de uma “falha”, e os sobreviventes ao longo do tempo são ajustados pela censura (os casos censurados entram no cálculo da função da probabilidade de sobrevida acumulada até o momento da perda) ²⁰⁹. O Teste de Log-Rank foi utilizado para comparar as curvas de sobrevida particionadas por variáveis categóricas, porém os testes de Breslow e Tahone-Ware também foram calculados ²¹⁰. Estes testes são particularmente importantes quando as curvas não apresentam riscos proporcionais. O teste de Log-Rank tem peso maior no início e no meio de seguimento, o teste de Breslow tem peso maior no início do seguimento e o teste de Tahone-Ware tem peso maior no final do seguimento. Não foi realizada análise multivariada por regressão de Cox devido ao pequeno tamanho amostral ²¹¹. As definições das Curvas de Sobrevida, Refratariedade e Recidiva encontram-se Quadro 4.

Pontos de interesse	Definição
SG	Intervalo entre a data do diagnóstico e a data do último seguimento* (em meses) ou óbito, considerando-se como evento o óbito por qualquer etiologia. Razões para censura incluem: término do seguimento (paciente vivo) ou perda de seguimento.
SLD	Intervalo entre a data da RC e a data da recidiva (em meses), último seguimento ou óbito, considerando-se eventos a recidiva. Razões para censura incluem: término do seguimento (paciente vivo e sem progressão de doença) ou perda de seguimento. Esta curva só pôde ser calculada em pacientes que tenham obtido RC na primeira linha de tratamento.
SLP	Calculada como o tempo transcorrido entre o diagnóstico e o momento da progressão, recidiva, o último seguimento ou óbito (em meses), considerando-se como eventos PD ou recidiva. Esta curva só pôde ser calculada em pacientes que receberam pelo menos algum tipo de tratamento oncológico. Razões para censura incluem: término do seguimento (paciente vivo e sem progressão de doença) ou perda de seguimento.
Refratariedade	Definida como ausência de resposta (completa ou parcial) à primeira linha de tratamento.
Recidiva	Definida como PD após uma RC na primeira linha de tratamento.

*Se a última data de seguimento conforme registro no prontuário foi inferior à data de censura de coleta de dados (01/12/2017), os pacientes tiveram seus status (vivo/morto) confirmados por via telefônica, quando possível, o mais próximo possível da data de censura. ^{212,213}

Quadro 4 - Definições das Curvas de Sobrevida, Refratariedade e Recidiva

Para determinar o melhor ponto de corte de positividade de expressão proteica por IHQ, utilizaram-se estimativa de sensibilidade e especificidade nos pontos de cortes previamente estabelecidos de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% por Curvas de ROC (*Receiver Operator Characteristic Curve*) ^{214,215}.

Algumas amostras apresentaram expressão gênica normatizada de valor zero considerando-se até cinco casas decimais, o que correspondeu a ausência absoluta de expressão. Estas amostras tiveram reações de rt-PCR repetidas, confirmando-se os resultados iniciais. Por tratar-se de ausência absoluta de expressão gênica, tornou-se impossível proceder ao cálculo logarítmico, dado que $\log 0 = \text{menos infinito}$, para estas amostras. Desta forma,

a categorização da expressão gênica em variável quantitativa levaria à exclusão de várias amostras, diminuindo ainda mais o tamanho amostral, além de excluírem-se pacientes com expressão gênica ausente, o que poderia influenciar na interpretação das associações. Para evitar a exclusão destas amostras nas análises, optou-se por transformar a expressão gênica em variável categórica ao determinar o melhor ponto de corte de positividade da expressão gênica normalizada com o uso de estimativas de sensibilidade e especificidade por Curvas de ROC (*Receiver Operator Characteristic Curve*)^{214,215}.

Baseado nos pontos de corte estabelecidos obtidos através das Curvas de ROC, foi feito um teste de concordância (correlação) entre a expressão gênica e a expressão proteica (relacionados ao RT-qPCR e IHQ, respectivamente). O Coeficiente de Youden permite avaliar a performance dos testes diagnósticos. Coeficiente de Youden com valor zero corresponde à mesma proporção de testes positivos no grupo controle e no grupo com doença; Coeficiente de Youden com valor de 1 corresponde à ausência de Falsos Positivos e Falsos Negativos. O Coeficiente de Youden, porém, ignora a associação entre a sensibilidade e a especificidade do teste, podendo levar a achados errôneos ²¹⁶. O Coeficiente de Kappa é mais frequentemente utilizado e permite avaliar o desempenho dos testes diagnósticos com maior acurácia^{217,218}. A classificação subjetiva por Kappa encontra-se na Tabela 5.

Tabela 5 - Classificação Subjetiva por Kappa

Valor	Interpretação da Associação
<0,00	pobre (<i>poor</i>)
0,01 < valor < 0,20	ligeira (<i>slight</i>)
0,21 < valor < 0,40	fraca (<i>fair</i>)
0,41 < valor < 0,60	moderada (<i>moderate</i>)
0,61 < valor < 0,80	substancial (<i>substantial</i>)
0,81 < valor < 1,00	quase perfeita (<i>almost perfect</i>)
1,00	perfeita (<i>perfect</i>)

5 RESULTADOS

5.1 Casuística

Entre 01 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2016, 51 pacientes tiveram registro de “linfoma com acometimento em SNC” conforme demonstrado na Figura 4. Dois pacientes não tinham blocos teciduais disponíveis. Após a revisão histopatológica, catorze pacientes 14/49 (28,5%) foram excluídos por não apresentarem diagnóstico compatível com LPSNC LNHDGCB CD20+. Trinta e cinco (68,2%) do total de pacientes foram incluídos no estudo.

51 pacientes com diagnóstico de Linfoma com “acometimento em SNC”

Figura 4 - Fluxograma da exclusão

A data de censura de coleta dos dados foi 01 de dezembro de 2017 com mediana de tempo de seguimento de 41 meses (1,1- 171,8). O tempo de seguimento foi calculado entre a data de diagnóstico e a data de óbito (em meses) ou a última data de seguimento (conforme registro em prontuário médico).

A mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos (26,2-83,9). Vinte e

seis (74,2%) pacientes evoluíram a óbito até a data da censura. A *causa mortis* não se encontrava disponível nos prontuários, portanto não pode ser coletada.

A mediana de tempo de seguimento entre os pacientes vivos foi de 69,4 meses (16,1- 171,8 meses) e dos pacientes que evoluíram a óbito foi de 26,6 meses (1,1- 92,4 meses), conforme demonstrado na Tabela 6.

Tabela 6 - Tempos de seguimento

Variável	Geral (%/n)	Status em 01/12/2017	
		Vivo (%/n)	Óbito (%/n)
Número Total de Pacientes			
% (n)	100 (35)	25,71 (9)	74,2 (26)
Tempo de Seguimento (meses)			
média (dp)	43,8 (39,18)	77,5 (50,11)	32,2 (27,10)
1ºq;mediana;3ºq	7,7 : 41,0 : 66,3	38,1 : 69,4 : 111,3	6,2 : 26,6 : 53,7
mín ; máx	1,1 : 171,8	16,1 : 171,8	1,1 : 92,4
Intervalo de Tempo entre Diagnóstico e Óbito (meses)			
média (dp)	-	-	32,2 (27,10)
1ºq;mediana;3ºq	-	-	6,2 : 26,6 : 53,7
mín ; máx	-	-	1,1 : 92,4
Intervalo de Tempo entre Diagnóstico e Última Consulta (meses)			
média (dp)	-	77,5 (50,11)	-
1ºq;mediana;3ºq	-	38,1 : 69,4 : 111,3	-
mín ; máx	-	16,1 : 171,8	-

5.2 Características clínico-laboratoriais ao diagnóstico

A mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos (26,2 a 83,9 anos). A maioria dos pacientes era do sexo feminino (57,1%), apresentava acometimento de regiões profundas de SNC (77,1%), citologia oncológica negativa no LCR (91,4%) e PS inicial 0,1 ou 2 na primeira consulta no Serviço de Hematologia (57,2%). Com relação ao IPI modificado, 20% apresentavam IPI baixo (0+1), 48,6% apresentavam IPI intermediário (2+3) e 31,4%

apresentavam alto risco (4+5). As características clínicas dos pacientes encontram-se na Tabela 7.

As características clínico-laboratoriais por paciente encontram-se no Anexo A.

Tabela 7 - Características clínico-laboratoriais dos pacientes selecionados
(continua)

Variável	Geral (%/n)
Número total de pacientes	100% (35)
Idade ao Diagnóstico (anos)	
média (dp)	60,1 (15,22)
1ºq;mediana;3ºq	49,8 : 62,0 : 72,9
mín ; máx	26,2 : 83,9
≤ 60 anos	45,7% (16)
>60 anos	54,3% (19)
Sexo	
masculino	42,9% (15)
feminino	57,1% (20)
Acometimento de Regiões Profundas	
não	22,9% (8)
sim	77,1% (27)
Citologia LCR	
citologia negativa	91,4% (32)
citologia positiva	5,7% (2)
desconhecido	2,9% (1)
Presença de HIC ao Diagnóstico	
não	71,4% (25)
sim	28,6% (10)
P.S. Inicial	
0	8,6% (3)
1	25,7% (9)
2	22,9% (8)
3	37,1% (13)
4	5,7% (2)

Tabela 7 - Características clínico-laboratoriais dos pacientes selecionados
(conclusão)

Variável	Geral (%/n)
Número total de pacientes	100% (35)
RISCO IPI Modificado para LPSNC	
Baixo (0+1)	20% (7)
intermediário (2+3)	48,6% (17)
alto (4+5)	31,4% (11)

5.3 Tratamentos oncológicos e resposta clínica

Com relação às linhas de tratamento oncológico com intuito curativo, observou-se que (Figura 5):

- 94,3% receberam pelo menos uma linha de tratamento (33/35);
- 28,6% receberam uma segunda linha de tratamento (10/35);
- 14,3% receberam uma terceira linha de tratamento (5/35);
- 5,7% receberam uma quarta linha de tratamento (2/35) e
- 2,9% receberam uma quinta linha de tratamento oncológico (1/35).

A maioria dos pacientes (51,4%;18/35) apresentou PD em algum momento da sua história clínica, porém apenas 28,6% submeteram-se a nova linha de tratamento. As características da primeira e da segunda linha de tratamento oncológico encontram-se nas Seções 5.3.1 e 5.3.2. A maioria dos pacientes (61%;21/35) recebeu radioterapia, em especial como consolidação (76%;16/21) ou terapia única (24%;5/21). Nenhum paciente foi submetido a TMO.

Legenda: Pac= Paciente/ / TTO 1= Primeira Linha de Tratamento/ TTO 2= Segunda Linha de Tratamento/ TTO 3= Terceira Linha de Tratamento/ TTO 4 =Quarta Linha de Tratamento/ TTO 5= Quinta Linha de Tratamento PD 1= Primeira Progressão de Doença/ PD 2= Segunda Progressão de Doença/ PD 3= Terceira Progressão de Doença/ PD 4= Quarta Progressão de Doença/ PD 5= Quinta Progressão de Doença / NPD 1= Ausência de Progressão de Doença após a Primeira Linha de Tratamento/ NPD 2= Ausência de Progressão de Doença após a Segunda Linha de Tratamento/ NPD 3= Ausência de Progressão de Doença após a Terceira Linha de Tratamento/ NPD 4= Ausência de Progressão de Doença após a Quarta Linha de Tratamento/ NPD 5= Ausência de Progressão de Doença após a Quinta Linha de Tratamento

Figura 5 - Número de linhas de tratamento oncológico

5.3.1 Primeira Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo

Quase todos os pacientes foram submetidos à primeira linha de tratamento oncológico (94,3%;33/35), sendo a quimioterapia baseada em HD-MTX a opção terapêutica mais utilizada (84%;28/33), seguida de radioterapia isolada (16%;5/33), com mediana de duração de tratamento de 4 meses e taxa de resposta global (TRG) de 72,8%. Dois pacientes não foram submetidos a nenhuma linha de tratamento, pois não tinham condições clínicas. Assim, para estes foi realizado tratamento paliativo. Nenhum paciente recebeu tratamento oncológico com anti-CD20 (rituximab) em primeira linha, pois não estava disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS).

A maioria dos pacientes obteve RC (45,5%;15/33) à terapia de primeira linha, 27,3% (9/33) obtiveram RP e 27,3% (9/33) apresentaram PD. A taxa de refratariedade foi de 27,3% (9/33) (Tabela 8 e Gráfico 1). Apesar da alta taxa de resposta, a maioria dos pacientes apresentou PD em algum momento após a primeira linha de tratamento (54,5%;18/33). O Anexo B apresenta informações sobre a primeira linha de tratamento oncológico.

Tabela 8 - Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à primeira linha de tratamento oncológico

Variável	Número de pacientes	Taxa
Taxa de Resposta Completa	15/33	45,5%
Taxa de Resposta Parcial	9/33	27,3%
Taxa de Resposta Global ¹	24/33	72,8%
Taxa de Refratariedade ²	9/33	27,3%
Taxa de Recaída após RC	3/15	20%

⁽¹⁾ corresponde à soma da RP + RC;

⁽²⁾ corresponde à fração de pacientes submetidos ao tratamento que apresentaram PD ou DE durante ou ao término do tratamento;

Gráfico 1 - Taxas de Resposta à Primeira Linha de Tratamento Oncológico

5.3.2 Segunda Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo

Dos 18 pacientes que apresentaram PD, a maioria (55,55%;10/18) foi submetida a uma segunda linha de tratamento, com mediana de duração de tratamento de dois meses. Aos pacientes sem condições clínicas de tratamento curativo, foi oferecido tratamento paliativo. Apesar da alta taxa de resposta após término do tratamento (60%;6/10), a maioria dos pacientes evoluiu com PD em algum momento (80%;8/10), conforme Tabela 9.

Tabela 9 - Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à segunda linha de tratamento oncológico

Variável	Número de pacientes	Taxa
Taxa de Resposta Completa	2/10	20,00%
Taxa de Resposta Parcial	4/10	40,00%
Taxa de Resposta Global	6/10	60,00%
Taxa de Refratariedade	4/10	40,00%

5.4 Expressão Proteica

Os resultados obtidos para a pesquisa de expressão proteica por IHQ estão disponibilizados na Tabela 10. A célula de origem (COO) foi classificada de acordo com os critérios de Hans ¹⁰. Apenas 34% (12/35) dos casos puderam ser caracterizados, sendo 75% (9/12) classificados como não-GCB. Anti-CD3 foi realizado em 91,4% (32/35) dos casos, sendo a maioria (87,5%) positivo em linfócitos reacionais infiltrativos. A pesquisa de Ki67 foi realizada em 82,9% (29/35) dos casos e todos apresentaram índice de positividade > 70%. Não foi possível realizar reações de IHQ adicionais devido à escassez do material.

Tabela 10 - Descrição das revisões das reações de imuno-histoquímica disponíveis

Variável		Geral (%/n)
Número Total de Pacientes		
		100% (35)
anti-CD20	negativo	0% (0)
	positivo	100% (35)
anti-CD3	negativo	80% (28)
	positivo	11,4% (4)
	não avaliado	8,6% (3)
anti-BCL6	negativo	22,9% (8)
	positivo	17,1% (6)
	não avaliado	60% (21)
anti-MUM1	negativo	8,6% (3)
	positivo	25,7% (9)
	não avaliado	65,7% (23)
COO Subtipo		
	GCB	11,4% (4)
	não -GCB	31,4% (11)
	não avaliado	57,1% (20)

Os resultados disponíveis encontram-se na Tabela 11.

A pesquisa da proteína MYC foi realizada em 94,3% (33/35) dos pacientes, dos quais a maioria apresentou valor > 50% (21/33;63,6%). BCL2 foi pesquisado em 91,4% (32/35), com resultado > 50% na maioria dos casos (27/32;84,5%). A proteína LMO2 foi pesquisada em 91,4% (32/35), em cuja maioria resultou não reativa (13/32;40,6%). A proteína MGMT foi realizada em 88,6% (31/35), sendo negativo em todos os casos. A expressão proteica de POU2F1 foi realizada em 94,3% (33/35), com resultado > 75% na maioria dos casos (30/33;93,9%). A proteína PDCD1 foi pesquisada em 94,3%(33/35), sendo a maioria não reativa (30/33;90,9%).

Tabela 11 - Resultados das reações de imuno-histoquímica das proteínas de interesse

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	100% (35)
anti-MYC	
0%-50%	34,2% (12)
51%-100%	60% (21)
não disponível	5,8% (2)
anti-BCL2	
0%-50%	14,2% (5)
51%-100%	80% (28)
não disponível	5,8% (2)
anti-LMO2	
0%-25%	40% (14)
26%-100%	51,4% (18)
não disponível	8,6% (3)
anti-MGMT	
negativo	88,6% (31)
positivo	0,0%
não disponível	11,4% (4)
anti-POU2F1	
negativo	0,0%
positivo	94,2% (33)
não disponível	5,8% (2)
anti-PDCD1	
negativo	85,7% (30)
positivo	8,6% (3)
não disponível	5,7% (2)

5.5 Expressão Gênica

A expressão absoluta gênica dos genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* foi avaliável em, respectivamente, 60%, 60%, 60%, 60%, 65,7%, 60% e 65,7% dos casos (Tabela 12). Os resultados da expressão normalizada dos genes de interesse por paciente encontram-se no Anexo C. Foram realizados testes comparativos para todas as variáveis entre a amostra total (n=35) e a subamostra contendo apenas pacientes com expressão gênica avaliável. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a amostra total e a subamostra (Anexo D).

Tabela 12 - Amplificação normalizada dos genes de interesse
(continua)

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	
	100% (35)
GENE <i>MYC</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	0,201 (0,1778)
1ºq;mediana;3ºq	0,015 : 0,201 : 0,322
mín ; máx	0,000 : 0,641
<0,201041 (n)	47,6% (10)
≥0,201041 (n)	52,4% (11)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>BCL2</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	0,906 (1,2381)
1ºq;mediana;3ºq	0,110 : 0,564 : 1,192
mín ; máx	0,000 : 5,566
<0,3516 (n)	38,0% (8)
≥0,3516 (n)	62,0% (13)
TOTAL (n)	100% (21)

Tabela 12 - Amplificação normalizada dos genes de interesse
(continuação)

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	100% (35)
GENE <i>LMO2</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	3,877 (5,0025)
1ºq;mediana;3ºq	0,296 : 1,636 : 6,850
mín ; máx	0,000 : 17,506
<0,689232 (n)	33,3% (7)
≥0,689232 (n)	66,7% (14)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>MGMT</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	0,760 (2,2315)
1ºq;mediana;3ºq	0,000 : 0,000 : 0,277
mín ; máx	0,000 : 10,072
<0,335666 (n)	76,2% (16)
≥0,335666 (n)	23,8% (5)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>POU2F1</i>	
número de amostras amplificadas	23
média (dp)	1,748 (2,0030)
1ºq;mediana;3ºq	0,000 : 1,448 : 2,828
mín ; máx	0,000 : 6,301
<1,44819 (n)	47,8% (11)
≥1,44819 (n)	52,2% (12)
TOTAL (n)	100% (23)

Tabela 12 - Amplificação normalizada dos genes de interesse
(conclusão)

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	100% (35)
GENE <i>PDCD1</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	1,324 (2,4693)
1ºq;mediana;3ºq	0,000 : 0,000 : 1,870
mín ; máx	0,000 : 9,215
<2,00938 (n)	76,2% (16)
≥2,00938 (n)	23,8% (5)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>BCL6</i>	
número de amostras amplificadas	23
média (dp)	2,899 (2,6369)
1ºq;mediana;3ºq	0,648 : 2,716 : 3,787
mín ; máx	0,000 : 9,091
<2,73477 (n)	47,8% (11)
≥2,73477 (n)	52,2% (12)
TOTAL (n)	100% (23)

5.6 Construção de Curvas de ROC (*receiver operator characteristic curve*, em inglês)

5.6.1 Curvas de ROC para expressão proteica

Os resultados de IHQ para as proteínas de interesse foram quantificadas em quartis. Curvas de ROC puderam ser construídas para as proteínas MYC, BCL2 e LMO2 em relação à SG e à SLP. Para as demais proteínas, não foi possível construir curvas de ROC devido ao excesso de ausência de expressão (MGMT e PD1) ou excesso de positividade (OCT1). Após revisão da literatura para estas proteínas, optou-se por determinar como ponto de corte a ausência ou a presença de expressão. Os pontos de corte selecionados foram aqueles

com maior RV+ e menor RV-, podendo-se então transformar os resultados das IHQ em variáveis categóricas dicotômicas (menor ou maior / igual ao ponto de corte). A Tabela 13 - apresenta os pontos de corte da IHQ utilizados com base na construção das Curvas de ROC, conforme descrito na Seção 4.9. As Curvas de ROC para as proteínas MYC, BCL2 e LMO2 encontram-se, respectivamente, nos Anexos E, F e G.

Tabela 13 - Revisão bibliográfica dos pontos de corte da reação de imunohistoquímica das proteínas de interesse e pontos de corte selecionados neste estudo

Proteína de interesse	Ponto de corte ¹	Ponto de corte selecionado ²
MYC	50% ²¹⁹	50%
BCL2	40% ²¹⁹ ; 50% ²²⁰	50%
LMO2	30% ¹⁶⁴	25%
MGMT	5-10% ^{29,175,221}	Positivo versus Negativo ⁴
POU2F1	Positivo versus Negativo ³²²²	Positivo versus Negativo ⁴
PDCD1	<1%; 1-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%, ≥76% ²²³	Positivo versus Negativo ^{4, 5}

(¹) de acordo com os artigos descritos; (²) de acordo com a metodologia da curva de ROC; (³) presença ou ausência de imunofixação nas células tumorais; (⁴) >0 versus ≤0; (⁵) analisado na membrana celular e citoplasma

5.6.2 Curvas de ROC para expressão gênica normalizada

Conforme descrito na Seção 4.9, utilizaram-se as curvas de ROC para selecionar pontos de corte da expressão gênica normalizada a fim de transformar esta variável numérica em categórica dicotômica. Desta forma, os pacientes com ausência absoluta de expressão gênica puderam ser incluídos nas análises, pois não existe logaritmo de zero em qualquer base. Curvas de ROC foram construídas para todos os genes normalizados para os desfechos de SG e SLP, sendo selecionados os pontos de corte com maior RV+ e menor

RV (Tabela 14). As curvas de ROC para a expressão gênica normalizada dos genes *MYC*, *MGMT*, *PDCD1*, *BCL2*, *LMO2*, *POU2F1* e *BCL6* encontram-se nos Anexos H, I, J, K, L, M e N.

Tabela 14 - Pontos de corte da expressão normalizada dos genes de interesse

Variável	Ponto de Corte	Metodologia
<i>MYC</i>	$\geq 0,201041$ vs $< 0,201041$	Curva de ROC
<i>BCL2</i>	$\geq 0,3516$ vs $< 0,3516$	Curva de ROC
<i>LMO2</i>	$\geq 0,689232$ vs $< 0,689232$	Curva de ROC
<i>MGMT</i>	$\geq 0,335666$ vs $< 0,335666$	Curva de ROC
<i>POU2F1</i>	$\geq 1,44819$ vs $< 1,44819$	Curva de ROC
<i>PDCD1</i>	$\geq 2,00938$ vs $< 2,00938$	Curva de ROC
<i>BCL6</i>	$\geq 2,73477$ vs $< 2,73477$	Curva de ROC

5.7 Curvas de Sobrevida

Conforme descrito na Tabela 6, a mediana de acompanhamento de toda a coorte foi de 41 meses (mínimo de 1,1 e máximo de 171,8 meses). A mediana do intervalo de tempo entre o diagnóstico e o óbito foi de 26,6 meses (mínimo de 1,1 e máximo de 92,4 meses). Até a data da censura, 26/35 pacientes tinham evoluído a óbito. As construções das curvas de SG, SLP e SLD pelo método de Kaplan-Meier encontram-se no Anexo O.

5.7.1 Sobrevida Global

A SG mediana foi de 42,6 meses (IC95% 26,6-58,6 meses). A probabilidade de SG em 24 meses foi 65,5%; a probabilidade de SG em 48 meses foi de 43,8% e a probabilidade de SG em 60 meses foi de 40,4% (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Curva de Sobrevida Global nos pacientes com LPSNC

5.7.2 Sobrevida Livre de Doença (1ª linha de tratamento)

A SLD mediana foi de 59,2 meses (IC95% 31,9- 86,6 meses). A curva de Kaplan-Meier (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Curva de Sobrevida livre de doença nos pacientes com LPSNC

5.7.3 Sobrevida Livre de Progressão (1ª linha de tratamento)

A SLP mediana foi de 41 meses (IC95% 19,7-62,4 meses). A probabilidade de SLP em 24 meses foi de 63,6%, a probabilidade de SLP em 48 meses foi de 37,1% e a probabilidade de SLP em 60 meses foi de 25,9% (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Curva de Sobrevida livre de progressão nos pacientes com LPSNC

5.8 Fatores de Prognóstico para SG, SG 2 anos, SLD e SLP

5.8.1 Análise Univariada para SG e SG em 24 meses

Até a última data de coleta de dados (01/12/2017), 74,3% (26/35) evoluíram a óbito e 25,7% (9/35) estavam vivos. Nove pacientes evoluíram a óbito em até 1 ano após o diagnóstico e 12 pacientes evoluíram a óbito em até 2 anos após o diagnóstico.

Com relação à Sobrevida Global, as variáveis idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *BCL2* $\geq 51\%$, refratariedade à primeira linha de tratamento e progressão de doença após a primeira linha de tratamento estiveram associadas a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 15.

Com relação à SG em 2 anos, a P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *LMO2* $\leq 25\%$, refratariedade à primeira linha de tratamento e progressão de doença após a primeira linha de tratamento estiveram associadas a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 16.

Tabela 15 - Análise univariada de Cox para SG

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	2,466 (1,091;5,573)	0,025
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	3,564 (1,055;12,036)	0,029
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	7,005 (2,671;18,37)	<0,001
Radioterapia (Não vs Sim)	3,413 (1,516;7,683)	0,002
COO (não-GCB vs GCB)	1,877 (0,397;8,882)	0,417
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	4,464 (0,6;33,229)	0,109
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,186 (0,502;2,802)	0,696
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	3,559 (0,833;15,196)	0,067
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1,67 (0,736;3,793)	0,215
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	0,516 (0,12;2,215)	0,364
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene MYC ($\geq 0,201041$ vs $< 0,201041$)	6,117 (1,617;23,149)	0,003
gene BCL2 ($\geq 0,3516$ vs $< 0,3516$)	1,934 (0,652;5,739)	0,227
gene LMO2 ($< 0,689232$ vs $\geq 0,689232$)	2,099 (0,747;5,895)	0,151
gene MGMT ($\geq 0,335666$ vs $< 0,335666$)	1,793 (0,546;5,894)	0,331
gene POU2F1 ($< 1,44819$ vs $\geq 1,44819$)	1,179 (0,453;3,067)	0,735
gene PDCD1 ($< 2,00938$ vs $\geq 2,00938$)	1,539 (0,34;6,965)	0,573
gene BCL6 ($< 2,73477$ vs $\geq 2,73477$)	0,952 (0,356;2,543)	0,922
Refratariedade (Sim vs Não)	28,272 (5,823;137,272)	<0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	3,248 (1,33;7,932)	0,006

Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

* Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$

*** Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.

Tabela 16 - Análise univariada de Cox para SG em 2 anos

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	2,025 (0,609;6,742)	0,239
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	3,388 (0,437;26,273)	0,214
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	5,851 (1,568;21,83)	0,003
Radioterapia (Não vs Sim)	2,874 (0,908;9,095)	0,060
COO (não-GCB vs GCB)	0,973 (0,196;4,832)	0,973
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	1,616 (0,207;12,636)	0,643
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	0,473 (0,152;1,478)	0,187
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	2,087 (0,269;16,182)	0,470
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	8,131 (1,737;38,068)	0,002
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	0,877 (0,113;6,803)	0,900
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene MYC (≥0,201041 vs <0,201041)	3,597 (0,723;17,888)	0,095
gene BCL2 (≥0,3516 vs <0,3516)	2,187 (0,44;10,863)	0,326
gene LMO2 (<0,689232 vs ≥0,689232)	2,173 (0,542;8,704)	0,261
gene MGMT (≥0,335666 vs <0,335666)	2,958 (0,689;12,704)	0,127
gene POU2F1 (<1,44819 vs ≥1,44819)	1,528 (0,41;5,7)	0,523
gene PDCD1 (<2,00938 vs ≥2,00938)	2,354 (0,289;19,145)	0,409
gene BCL6 (<2,73477 vs ≥2,73477)	1,294 (0,347;4,821)	0,699
Refratariedade (Sim vs Não)	20,955 (4,349;100,967)	<0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	4,053 (0,859;19,116)	0,055

Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

* Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$

*** Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.

5.8.2 Análise Univariada para SLD

Até a última data de coleta de dados (01/12/2017), a maioria dos pacientes recebeu algum tipo de primeira linha de tratamento oncológico (94%; 33/35), com taxa de resposta completa de 45,5% (15/33) e de recaída após resposta completa de 20% (2/15). Com relação à SLD, a idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia estiveram associados a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 17.

Tabela 17 - Análise univariada de Cox para SLD

(continua)

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	3,333 (0,773;14,376)	0,088
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	0,177 (0,021;1,489)	0,076
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	10,272 (1,807;58,393)	0,002
Radioterapia (Não vs Sim)	4,126 (0,966;17,623)	0,039
COO (não-GCB vs GCB)	*	NA
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	0,894 (0,105;7,573)	0,918
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,392 (0,279;6,935)	0,687
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	***	NA
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	***	NA
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	***	NA
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene <i>MYC</i> ($\geq 0,201041$ vs $< 0,201041$)	2,924 (0,26;32,934)	0,364
gene <i>BCL2</i> ($\geq 0,3516$ vs $< 0,3516$)	1,423 (0,126;16,043)	0,774
gene <i>LMO2</i> ($< 0,689232$ vs $\geq 0,689232$)	0,237 (0,021;2,674)	0,207
gene <i>MGMT</i> ($\geq 0,335666$ vs $< 0,335666$)	***	NA
gene <i>POU2F1</i> ($< 1,44819$ vs $\geq 1,44819$)	1,732 (0,235;12,783)	0,586
gene <i>PDCD1</i> ($< 2,00938$ vs $\geq 2,00938$)	***	NA

Tabela 17 - Análise univariada de Cox para SLD

(conclusão)

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
gene <i>BCL6</i> (<2,73477 vs ≥2,73477)	4,472 (0,279;71,807)	0,247
Refratariedade (Sim vs Não)		NA
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	2,697 (0,489;14,86)	0,236

Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

* Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$ *** *Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.*

5.8.3 Análise Univariada para SLP

Até a última data de coleta de dados (01/12/2017), a maioria dos pacientes recebeu algum tipo de primeira linha de tratamento oncológico (94%; 33/35), com taxa de resposta global de 72,7% (24/33), porém a maioria dos pacientes apresentou PD em algum momento após RP ou RC (75%; 18/24).

Com relação à SLP, idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *BCL2* $\geq 51\%$, expressão gênica de *LMO2* $< 0,689232$, expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$, refratariedade à primeira linha de tratamento e progressão de doença após a primeira linha de tratamento estiveram associados a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 18.

Tabela 18 - Análise univariada de Cox para SLP

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	2,857 (1,239;6,589)	0,010
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	4,151 (1,193;14,446)	0,001
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	3,951 (1,651;9,454)	0,001
Radioterapia (Não vs Sim)	2,281 (1,027;5,067)	0,037
COO (não-GCB vs GCB)	3,225 (0,391;26,588)	0,248
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	4,386 (0,588;32,746)	0,115
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,519 (0,6;3,85)	0,374
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	3,376 (0,784;14,534)	0,083
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1,677 (0,715;3,935)	0,229
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	0,838 (0,196;3,583)	0,811
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	3,96 (1,192;13,147)	0,016
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	1,98 (0,651;6,021)	0,221
gene <i>LMO2</i> (<0,689232 vs ≥0,689232)	2,718 (0,87;8,493)	0,073
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	3,749 (0,879;15,993)	0,056
gene <i>POU2F1</i> (<1,44819 vs ≥1,44819)	0,909 (0,334;2,477)	0,852
gene <i>PDCD1</i> (<2,00938 vs ≥2,00938)	1,762 (0,389;7,979)	0,456
gene <i>BCL6</i> (<2,73477 vs ≥2,73477)	0,815 (0,301;2,211)	0,687
Refratariedade (Sim vs Não)	75,672 (8,96;638,734)	<0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	5,425 (2,094;14,053)	<0,001

#Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

*Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$

*** Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.

5.8.4 Testes de Log-Rank: gráficos por variáveis analisadas

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 2,466 (1,091; 5,573)

b) Teste de Log-Rank para SLD
HR (IC95%)= 3,33 (0,773; 14,376)

c) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 2,857 (1,239; 6,589)

Gráfico 5 - Teste de Log-rank – Variável: Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 3,564 (1,055; 12,036)

b) Teste de Log-Rank para SLD
HR (IC95%)= 0,177 (0,21; 1,489)

c) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)=4,151 (1,193; 14,446)

Gráfico 6 - Teste de Log-rank – Variável: IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 7,005 (2,671; 18,37)

b) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
HR (IC95%)= 5,851 (1,568; 21,83)

c) Teste de Log-Rank para SLD
HR (IC95%)= 10,272 (1,807; 58,393)

d) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 3,951 (1,651; 9,454)

Gráfico 7 - Teste de Log-rank – Variável: Performance Status (3+4 vs 0+1+2)

a) Teste de Log-Rank para SG
 HR (IC95%)= 3,413 (1,516; 7,683)

b) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
 HR (IC95%)= 2,874 (0,908; 9,095)

c) Teste de Log-Rank para SLD
 HR (IC95%)= 4,126 (0,966; 17,623)

d) Teste de Log-Rank para SLP
 HR (IC95%)= 2,281 (1,027; 5,067)

Gráfico 8 - Teste de Log-rank – Variável: Radioterapia (Não realizada vs Realizada)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 3,559 (0,833; 15,196)

b) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 3,376 (0,784; 14,534)

Gráfico 9 - Teste de Log-rank – Variável: Anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)

a) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
HR (IC95%)=8,131 (1,737; 38,068)

Gráfico 10 - Teste de Log-rank – Variável: anti-LMO2 (0-25% vs ≥26%)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 6,117 (1,617; 23,149)

b) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
HR (IC95%)= 3,597 (0,723; 17,888)

c) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 3,96 (1,192; 13,147)

Gráfico 11 - Teste de Log-rank – Variável: Gene *MYC* ($\geq 0,201041$ vs $< 0,201041$)

a) Teste de Log-Rank para SLP

HR (IC95%)= 2,718 (0,87; 8,493)

Gráfico 12 - Teste de Log-rank – Variável: Gene *LMO2* (<0,689232 vs ≥0,689232)

a) Teste de Log-Rank para SLP

HR (IC95%)=3,749 (0,879; 15,993)

Gráfico 13 - Teste de Log-rank – Variável: Gene *MGMT* (≥0,335666 vs <0,335666)

5.9 Fatores de Prognóstico para Mortalidade até a data de censura e Mortalidade em 2 anos após o diagnóstico

5.9.1 Análise Univariada

Análises univariadas para Mortalidade Global e Mortalidade em 2 anos foram realizadas para as variáveis estudadas, conforme demonstrado na Tabela 19.

Com relação à Mortalidade Global, Idade >60 anos IPI modificado ≥ 2 , PS ≥ 3 , ausência de tratamento radioterápico, CD3 negativo, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *BCL2* >51%, expressão gênica de *PD1* $\geq 2,00938$, PD após a 1ª linha de tratamento estiveram associados com aumento de risco de óbito durante o seguimento em análise univariada ($p \leq 0,1$).

Com relação à Mortalidade em até 2 anos após o diagnóstico, ausência de tratamento radioterápico, LMO2 $\leq 25\%$ e refratariedade à primeira linha de tratamento ($p=0,001$) estiveram associados com maior risco de óbito (risco de morte em até 2 anos após diagnóstico) em análise univariada ($p \leq 0,1$).

Tabela 19 - Análise univariada para Mortalidade Global e Mortalidade em 2 Anos

Variáveis	Óbito global		Óbito em até 24 meses após o diagnóstico	
	OR (IC 95%)	valor p	OR (IC 95%)	valor p
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	6,61 (1,13-38,70)	0,027	2,18 (0,51-9,33)	0,295
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	6,13 (1,03-36,45)	0,036	3,88 (0,41-36,79)	0,219
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	9,33 (1,02-85,70)	0,028	8,5 (1,71-42,28)	0,006
Radioterapia (Não vs Sim)	8,00 (0,87-73,40)	0,043	2,74 (0,62-12,08)	0,182
COO (não-GCB vs GCB)	4,50 (0,37-54,16)	0,234	1,20 (0,12-11,87)	0,880
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	13,80 (1,18-161,72)	0,015	1,67 (0,15-18,22)	0,678
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	2,13 (0,42-10,75)	0,364	2,50 (0,57-10,93)	0,225
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	9,00 (1,13-71,96)	0,023	2,25 (0,47-10,78)	0,312
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1,05 (0,19-5,69)	0,958	14,4 (2,31-89,94)	0,002
anti-MGMT (Positivo x Negativo)	NA	NA	NA	
anti-PDCD1 (Positivo x Negativo)	0,25 (0,01-4,60)	0,328	NA	
anti-POU2F1 (Positivo x Negativo)	NA	NA	NA	
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	10,00 (0,91-110,29)	0,043	4,80 (0,68-33,80)	0,112
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	2,00 (0,29-13,74)	0,488	2,57 (0,37-17,83)	0,344
gene <i>LMO2</i> (≥0,689232 vs <0,689232)	NA	0,046	0,30 (0,05-1,99)	0,215
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	1,82 (0,16-20,71)	0,635	3,3 (0,41-26,37)	0,259
gene <i>POU2F1</i> (≥1,44819 vs <1,44819)	1,13 (0,17-7,24)	0,903	0,60 (0,11-3,25)	0,561
gene <i>PDCD1</i> (≥2,00938 vs <2,00938)	0,15 (0,02-1,70)	0,082	0,32 (0,03-3,56)	0,352
gene <i>BCL6</i> (≥2,73477 vs <2,73477)	0,44 (0,06-3,11)	0,419	0,60 (0,11-3,25)	0,561
Refratariedade (Sim vs Não)	NA	0,034	88,00 (6,99-1108,27)	0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	19,43 (2,03-185,73)	0,003	5,20 (0,9-30,08)	0,057

5.10 Fatores de Prognóstico para Risco de Recaída e Refratariedade na primeira linha de tratamento

5.10.1 Análise Univariada

Em análise univariada, Idade > 60 anos foi associado a maior risco de refratariedade à primeira linha de tratamento oncológico com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Idade >60 anos, IPI ≥ 2 , CD3 negativo, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, expressão gênica de *PD1* $\geq 2,00938$ estiveram associados a maior risco de recaída após a primeira linha de tratamento com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$), conforme demonstrado na Tabela 20.

Tabela 20 - Análise univariada para Refratariedade e Recaída

Variáveis	Refratariedade		Recaída	
	OR (IC 95%)	valor p	OR (IC 95%)	valor p
Idade (>60 anos vs ≤ 60 anos)	9 (0,76-106,01)	0,067	12,44 (1,31-117,93)	0,012
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	6,75 (0,53-86,56)	0,127	7,33 (1,17-46,05)	0,024
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	NA	0,031	NA	NA
Radioterapia (Não vs Sim)	NA	0,031	5,5 (0,59-51,52)	0,112
COO (não-GCB vs GCB)	NA	NA	2 (0,11-34,82)	0,644
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	4 (0,27-58,56)	0,309	12,62 (1,97-148,13)	0,021
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,17 (0,13-10,22)	0,893	4 (0,69-23,23)	0,115
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	NA	0,008	5,75 (0,62-54,43)	0,102
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1(0,07-14,64)	1	1,67 (0,28-10,09)	0,583
anti-MGMT (1-100% vs 0%)	NA		NA	
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	NA		NA	
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)	NA		NA	
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	4,5 (0,25-80,57)	-0,322	7,2 (0,62-83,35)	0,098
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	4,5 (0,25-80,57)	0,322	1,2 (0,15-9,77)	0,868
gene <i>LMO2</i> (≥0,689232 vs <0,689232)	NA	0,024	NA	0,085
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	NA	0,371	1,09 (0,09-13,78)	0,948
gene <i>POU2F1</i> (≥1,44819 vs <1,44819)	3 (0,19-47,96)	0,453	0,86 (0,11-6,62)	0,885
gene <i>PDCD1</i> (≥2,00938 vs <2,00938)	NA	0,264	0,11 (0,01-1,15)	0,052
gene <i>BCL6</i> (≥2,73477 vs <2,73477)	0,20 (0,01-3,66)	0,285	0,86 (0,11-6,62)	0,885
Refratariedade (Sim vs Não)	NA	0,403	NA	0,127
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	4 (0,34-47,11)	0,267	NA	0,001

5.11 Correlação entre expressão gênica e expressão proteica

As Tabelas 21, 22 e 23 apresentaram as correlações entre as expressões gênicas (RT-qPCR normatizadas de *MYC*, *BCL2* e *LMO2*) e suas proteínas correspondentes (anti-MYC, anti-BCL2 e anti-LMO2). Teste de concordância para BCL6 não pode ser realizado, pois não foram realizadas reações de IHQ prospectivamente neste estudo. Os outros genes/proteínas de interesse (PD1, MGMT e OCT1) não puderam ser calculados devido à ausência ou ao excesso de expressão gênica ou proteica.

Houve correlação moderada entre a expressão gênica de *MYC* ($<0,201041$ vs $\geq 0,201041$) e sua respectiva proteína (0/1/2 vs 3/4), com coeficiente de Kappa=0,596 e valor $p=0,022$. O mesmo ocorreu entre a expressão gênica de *BCL2* ($<0,3516$ vs $\geq 0,3516$) e sua respectiva proteína (0/1/2 vs 3/4), com coeficiente de Kappa=0,426 e valor $p=0,042$.

O Anexo P demonstra as médias e medianas de expressão gênica normatizada em cada quartil de IHC da proteína correspondente.

Tabela 21 - Correlação entre IHQ proteína MYC e expressão gênica *MYC*

MYC		expressão gênica		
		<0.201041	≥0.201041	total %(n)
IHQ Anti-MYC	0%-50%	35 % (7)	10 % (2)	45 % (9)
	51%-100%	10 % (2)	45 % (9)	55 % (11)
	total %(n)	45 % (9)	55 % (11)	100 % (20)
Porcentagem de concordância		80,0%		Acurácia Geral
Porcentagem de discordância		20,0%		
Coeficiente de Kappa		0,596 p = 0,022		classificação** moderada rejeita H0
valor teste hipótese	H0: igual a zero			
sensibilidade		0,778		
especificidade		0,818		
valor preditivo positivo		0,778		
valor preditivo negativo		0,818		
Coef de Youden		0,596		
Eficiência		0,798		

* considerando expressão gênica como teste gold (ouro)

** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa

Tabela 22 - Correlação entre IHQ proteína BCL2 e expressão gênica *BCL2*

BCL2		expressão gênica		
		<0.3516	≥0.3516	total %(n)
IHQ Anti-BCL2	0%-50%	14,3 % (3)	0 % (0)	14,3 % (3)
	51%-100%	23,8 % (5)	61,9 % (13)	85,7 % (18)
	total %(n)	38,1 % (8)	61,9 % (13)	100 % (21)
Porcentagem de concordância		76,2%		Acurácia Geral
Porcentagem de discordância		23,8%		
Coeficiente de Kappa				classificação**
valor		0,426		
teste hipótese	H0: igual a zero	p = 0,042		moderada
				rejeita H0
sensibilidade		0,375		
especificidade		1,000		
valor preditivo positivo		1,000		
valor preditivo negativo		0,722		
Coef de Youden		0,375		
Eficiência		0,688		

* considerando expressão gênica como teste gold (ouro)

** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa

Tabela 23 - Correlação entre IHQ proteína LMO2 e expressão gênica *LMO2*

LMO2		expressão gênica		
		<2.57603	≥2.57603	total %(n)
IHQ Anti-LMO2	0%-25%	33,3 % (7)	14,3 % (3)	47,6 % (10)
	26%-100%	23,8 % (5)	28,6 % (6)	52,4 % (11)
	total %(n)	57,1 % (12)	42,9 % (9)	100 % (21)
Porcentagem de concordância		61,9%		Acurácia Geral
Porcentagem de discordância		38,1%		
Coeficiente de Kappa				classificação**
Valor teste hipótese	H0: igual a zero	0,243 p = 0,387		
sensibilidade		0,583		
especificidade		0,667		
valor preditivo positivo		0,700		
valor preditivo negativo		0,545		
Coef de Youden		0,250		
Eficiência		0,625		

* considerando expressão gênica como teste gold (ouro)

** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa

6 DISCUSSÃO

Este estudo foi desenhado como uma coorte unicêntrica retrospectiva. Apesar das limitações deste tipo de estudo, na literatura se encontram disponíveis principalmente estudos de coorte unicêntricos, retrospectivos com amostras populacionais pequenas em LPSNC (menores que 50) ^{24,131,224,225}. O número de pacientes obtido foi levado em consideração no plano de análises estatísticas, sendo planejadas apenas estatística descritiva e análises univariadas. Análises multivariadas, regressões logísticas e de Cox são geralmente utilizadas para identificação de fatores de risco e biomarcadores, porém apresentam resultados menos tangíveis e confiáveis quando o número de observações é pequeno e múltiplos fatores confundidores precisam ser ajustados. Portanto, não elas não foram realizadas ²²⁶. Estudos com amostras pequenas podem limitar as análises estatísticas, principalmente quando múltiplas variáveis são analisadas e comparadas, apresentando maiores margem de erro, intervalos de confiança, resultados falso positivos, podendo hiperestimar a magnitude da associação, com menor precisão dos resultados e conclusões que precisam ser interpretadas com cautela ²²⁶. O tamanho do efeito esperado também tem impacto no cálculo do tamanho amostral, por exemplo. Estudos que analisam biomarcadores com baixo OR ou HR esperados precisam de amostras maiores para que o efeito real possa ser diferenciado de uma variação aleatória ²²⁷.

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes era do sexo feminino (57,1%) e a mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos, similar à literatura. Houve predomínio do sexo feminino, com mediana de idade entre 65 e 67 anos em aproximadamente 51% dos pacientes ^{19,228}.

Dez pacientes tiveram diagnóstico de LPSNC com 70 anos ou mais, representando 29% dos casos. O acometimento de população idosa tem sido verificado no LPSNC. Segundo dados do *Central Brain Tumor Registry of the United States* and SEER, foi evidenciado um aumento de incidência de LPSNC acima de 70 anos entre 1973 e 2013 (de 0,2 para 2,1/100.000 pessoas) ⁴⁶. Apesar de idade não ser o melhor biomarcador para tolerabilidade ao

tratamento ou preditor de toxicidade, pacientes acima de 70 anos apresentam mais frequentemente redução de suas funções fisiológicas, que impactam na farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos utilizados no tratamento oncológico, o que colabora para o aumento do risco de toxicidade e morbi-mortalidade ²²⁹. Como discutido posteriormente, o tratamento oncológico na população estudada foi individualizado, e a idade dos pacientes foi um dos determinantes na escolha terapêutica, a fim de minimizar a toxicidade e proporcionar melhor qualidade de vida.

Vários fatores clínicos são considerados na decisão do tratamento oncológico, incluindo o *performance status*. Neste estudo, apesar de a maioria (22/35; 65,7%) dos pacientes apresentar inicialmente PS ≥ 2 , quase a totalidade (33/35; 94,2%) foi submetida a alguma linha de tratamento oncológico. Dados semelhantes foram demonstrados num estudo retrospectivo com 378 pacientes, em que 58% dos pacientes apresentavam PS ≥ 2 e 98% foram submetidos a algum tipo de tratamento oncológico ²³⁰. *Performance status* está associado à sobrevida global em pacientes com LDGCB e LPSNC, assim como em outros tumores. Geralmente um PS avançado está associado a doença em estágio mais avançado, com pior prognóstico e menor tolerabilidade ao tratamento oncológico, limitando opções terapêuticas. Ainda que contribuísse para o incremento de suas toxicidades, conforme demonstrado, não foi impeditivo de tratamento oncológico na presente coorte.

Conforme previamente exposto, a maioria dos pacientes apresentava idade >60 anos e PS ≥ 2 . Estes foram os primeiros fatores de mau prognósticos identificados em pacientes com LPSNC, corroborado por diversos estudos independentemente da escolha terapêutica ^{95,230-232}. Em nosso estudo, idade >60 anos foi associada a piores SG, SLD, SLP e refratariedade ao tratamento e P.S. ≥ 3 foram associados a piores SG, SG 2 anos, SLD e SLP (valor $p \leq 0,1$), alinhados com dados da literatura. Tais dados demonstram a necessidade de novas opções terapêuticas para esta população para que causem menor morbi-mortalidade.

Apesar de punção lombar ser contraindicada em pacientes com LPSNC em até 42% dos pacientes ²³³, nesta coorte foi realizada em quase a totalidade dos pacientes (97%). No entanto, a maioria (91%) apresentou citologia oncológica

negativa, similar a dados da literatura. Dados publicados evidenciam citopatologia oncótica positiva em apenas 13% dos casos (quando associado à citometria de fluxo) ^{234,235}. A pesquisa de células neoplásicas como citologia é um método de baixa sensibilidade e com alta taxa de resultados falso negativos, mesmo em pacientes com evidência de extensa infiltração meníngea, o que poderia justificar os resultados encontrados ^{230,236}. Apesar disso, há relatos de diagnóstico de LPSNC pela associação de citologia oncótica e citometria de fluxo, demonstrando que tal procedimento possui valor clínico e prognóstico e foi factível nesta população ²³⁴.

A localização topográfica do LPSNC no SNC tem importante papel prognóstico, além de ter impacto na realização do procedimento de biópsia esterotáxica. Diferentemente do estudo conduzido por Ferreri *et al.*, no qual apenas 36% dos pacientes apresentavam acometimento de regiões profundas em SNC (regiões periventriculares, gânglios da base, corpo caloso, tronco cerebral e cerebelo), neste estudo a maioria (77%) apresentava acometimento de regiões profundas do SNC evidenciado por exames de imagem ²³⁰.

Considerando os fatores prognósticos já descritos, como idade, PS e acometimento de regiões profundas, a maioria dos pacientes apresentava risco IPI modificado de risco intermediário e alto (80%), o que demonstra a alta prevalência de fatores de mau prognóstico na população estudada. É descrito que pacientes com IPI modificado de risco intermediário e alto estão associados a pior prognóstico, com SG em 2 anos entre 48%-57% e 17%-24%, respectivamente, independentemente do tratamento utilizado, similares aos encontrados no presente estudo ²³⁰. Em nosso estudo, em análise univariada, o IPI modificado ≥ 2 foi associado a pior SG, SLD, SLP e maior recaída ($p \leq 0,1$). Desta forma, confirma-se tratar de um fator de prognóstico adverso na nossa população, corroborando dados de Ferreri *et al.* e Cady *et al.* ^{68,69}. A análise de IPI modificado é de fácil execução, o que permite a identificação precoce de pacientes com mau prognóstico, que muitas vezes necessitam de acompanhamento médico mais frequente e tratamentos mais agressivos. Portanto, deve ser realizado assim que possível nos pacientes com LPSNC.

O tipo de acesso e o fluxo de sistema público de saúde também pode ter impacto prognóstico, ao retardar o diagnóstico e na escolha terapêutica. Neste

estudo, os pacientes eram referenciados de serviços primários e secundários de saúde por suspeita de tumores em SNC ao Serviço de Neurocirurgia do HC-FMUSP para realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Após suspeita de linfoma em SNC, os pacientes eram então encaminhados ao Serviço de Hematologia do HC-FMUSP para acompanhamento e tratamento. Portanto, a data de confirmação diagnóstica na nossa população dependia de variáveis como demora para obtenção de acesso aos serviços de saúde e à inespecificidade dos sintomas clínicos iniciais do LPSNC, o que comumente pode levar à demora diagnóstica. Diagnósticos tardios podem levar à deterioração clínica dos pacientes, o que interfere na escolha do tratamento e tolerância ao mesmo e causa impacto no prognóstico, na SG e nas taxas de resposta, conforme demonstrado num estudo brasileiro com pacientes com LDGCB sistêmico tratados no HC-FMUSP ²³⁷. Além disso, a infiltração do linfoma no SNC por longo período pode levar a dano tecidual, o que dificulta o diagnóstico e piora piorar o PS (com menor tolerabilidade ao tratamento), levando à perda de autonomia, a danos neurológicos com sintomas debilitantes muitas vezes irreversíveis apesar da obtenção de RC e ao tratamento, com alta morbidade da patologia ²³⁸. No presente estudo, não foi possível calcular o intervalo entre o início de sintomas e o procedimento diagnóstico realizado. No entanto, conforme discutido posteriormente, as taxas de SG observadas neste estudo foram semelhantes às dos principais estudos realizados em países desenvolvidos ^{22,23,68}. Isso sugere que este intervalo pode ter sido semelhante. É provável que a maioria dos pacientes em todo o mundo tenha alguma demora diagnóstica devido aos diagnósticos diferenciais nesta população.

Considerando os dados obtidos e alinhados com boas práticas clínicas, pôde-se observar individualização na escolha terapêutica baseada nas condições clínicas dos pacientes. Alinhada com literatura médica, a maioria dos pacientes foi submetida à quimioterapia baseada em HD-MTX (63,6%). Monoquimioterapia ou WBRT isolada foram indicadas principalmente para pacientes isosos, com mediana etária de 69 anos devido à maior tolerabilidade e menor toxicidade aguda, apesar de proporcionarem taxas de resposta inferiores e menos duradouras ^{57,98,239}. A taxa de resposta global encontrada após a primeira linha de tratamento foi de 72,8%, semelhante a dados

publicados por Ferreri *et al.* (RG 69%) em pacientes tratados com HD-MTX ²³⁰. Estes dados confirmam a qualidade de tratamento oferecido no complexo HC-FMUSP, similar a dados apresentados internacionalmente.

WBRT foi prescrita como consolidação de tratamento ou tratamento isolado. A maioria dos pacientes (9/12; 75%) recebeu radioterapia como regime de consolidação após indução, por apresentarem melhores condições clínicas satisfatórias e bom PS. Radioterapia isolada foi prescrita principalmente para pacientes sem condições clínicas de tolerar tratamentos oncológicos com maior toxicidade. Em nosso estudo, tratamento com radioterapia foi associado com melhores SG, SLD, SLP (valor $p \leq 0,1$). Como a análise multivariada não foi realizada, a interpretação de radioterapia como fator de bom prognóstico deve ser considerada com cautela, principalmente porque a radioterapia isolada e a radioterapia como regime de consolidação não foram analisadas separadamente como fator prognóstico, devido ao baixo número de pacientes. No entanto, o potencial benefício da radioterapia é discutido na literatura, principalmente como tratamento isolado, por exemplo. Em um estudo retrospectivo com 82 pacientes, a radioterapia isolada foi associada à melhor SG quando comparada a tratamento suportivo em pacientes com LPSNC e PS ruim, incluindo em pacientes idosos, podendo ser utilizada como terapia em pacientes com condições clínicas limítrofes ²⁴⁰. O benefício da radioterapia como regime de consolidação é questionável, principalmente em face de novas opções terapêuticas e risco de neurotoxicidade ²².

Apesar de um possível ganho de SG com WBRT, é importante ressaltar que, de modo geral, os pacientes submetidos à radioterapia não apresentavam dados/acompanhamento neurológico ou cognitivo progressivos registrados no prontuário, de forma que a neurotoxicidade tardia não pôde ser analisada neste estudo. Isso é de extrema importância na nossa coorte, por se tratar majoritariamente de população idosa e pelo fato de a maioria dos pacientes ter sido submetida a tratamento radioterápico. Dessa forma, dados sobre opções terapêuticas e neurotoxicidade neste estudo necessitam ser interpretados com cautela. Num estudo conduzido por Ferreri *et al.*, WBRT foi associado a declínio neurológico de funções executivas e de aprendizado em 50% dos pacientes em até 2 anos ²⁰.

Apesar da alta taxa de resposta global aos tratamentos oncológicos e radioterápicos descritos na literatura, existe uma alta taxa de recorrência e refratariedade (50% e 30%, respectivamente). A recaída e refratariedade após tratamento oncológico estão associadas a pior prognóstico⁹³. Em nosso estudo, a taxa de refratariedade (27,30%) foi similar à literatura médica. Refratariedade à primeira linha de tratamento e PD após a primeira linha de tratamento estiveram associados a pior prognóstico, incluindo piores SG, SG 2 anos, SLP (valor $p \leq 0,1$), conforme esperado.

Novos estudos clínicos e novas opções terapêuticas têm surgido no LPSNC. Em nosso estudo, nenhum paciente foi submetido a tratamento com rituximabe ou TMO, o qual tem sido adicionado ao serviço do HC-FMUSP em 2018, após a data limite de seleção dos pacientes.

Resseção neurocirúrgica não foi recomendada como opção terapêutica em nenhum dos pacientes desta coorte, por não fazer parte do arsenal terapêutico e pelo fato de LPSNC ser uma patologia multifocal²⁴¹. Isso também demonstra possivelmente o alto grau de suspeição de LPSNC em exames de imagem, com indicação do procedimento cirúrgico correto.

O presente estudo confirmou a alta mortalidade do LPSNC, com SG mediana de 42,6 meses (IC95% 26,6-58,6 meses), semelhante aos dados da literatura, cuja SG mediana varia entre 20,6 meses (IC95% 12,4 a 33,4 meses) e 60 meses em pacientes tratados com radioterapia isolada e HD-MTX, respectivamente^{198,203,231}. As SG em 24 e 48 meses (65,5% e 43,8%, respectivamente) também foram semelhantes aos dados da literatura médica, na qual pacientes são submetidos a tratamento baseado em HD-MTX (52 $\pm$ 4% e 43,8%, respectivamente)^{242,243}⁵³. Dados do SEER têm demonstrado ganho de SG em 5 anos entre os períodos de 1992-1994 e 2004-2006 de 19,1% (IC95%: 14,8-23,8) e 30,1% (IC95%: 24,2-28,1%), respectivamente, devido às novas opções terapêuticas disponíveis¹⁹. Contudo, tal ganho de sobrevidas não pode ser analisado no presente estudo, pois os pacientes não foram separados por período de inclusão devido ao baixo tamanho amostral.

Com uma mediana de tempo de seguimento de 41 meses (1,1- 171,8), foi evidenciada uma alta taxa de mortalidade (74%), semelhante à maioria dos estudos disponíveis. Essa elevada mortalidade pode ser explicada pela

associação de diversos fatores que, em conjunto, conferiram prognóstico adverso. Destacamos características clínico-laboratoriais desfavoráveis, como elevado IPI ao diagnóstico, idade ao diagnóstico e PS inicial >2 , entre outras. Tais dados demonstram a necessidade de diagnóstico mais precoce do LPSNC, antes da deterioração clínica, tratamento individualizado e o uso de novas opções terapêuticas, como *target therapies*.

Apesar de todos os pacientes terem sido acompanhados clinicamente durante ou após o tratamento oncológico, dados sobre a *causa mortis* não se encontravam disponíveis. A maioria dos pacientes (21/26; 80,7%) apresentava doença em atividade documentada na última consulta médica, sugerindo que a *causa mortis* poderia estar relacionada à progressão tumoral. Tais dados estão alinhados com um grande estudo retrospectivo com 370 pacientes tratados com quimioterapia e/ou radioterapia, em que a maioria (70,1%) evoluiu a óbito após 24 meses de seguimento, sendo as principais causas de óbito relacionadas ao linfoma (87%), à toxicidade do tratamento (8%), entre outros fatores ²³⁰.

Biomarcadores moleculares também foram selecionados e estudados, objetivando melhor compreensão da patogênese tumoral e identificação de fatores prognósticos. No presente estudo, a expressão gênica foi estudada utilizando o qRT-PCR, por ser considerado um método rápido, de alta sensibilidade e especificidade para a quantificação de expressão gênica ²⁴⁴. Em nosso estudo, os *guidelines* MIQE (*Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments*) foram utilizados seguindo padronização internacional da técnica e dos descritores ²⁰⁴. Foi observada ausência de amplificação gênica entre 34,3% e 40% das amostras. Os estudos foram realizados em amostras parafinadas, algumas delas bastante antigas. Vários fatores podem justificar a ausência de amplificação, como a possível degradação do RNA, a condição de emblocamento das amostras em parafina das amostras e a reduzida quantidade de tecido tumoral emblocado, pois, na maioria das biópsias, havia escassa quantidade amostral. Dentre outros fatores que podem ter interferido na qualidade do RNA extraído de amostras FFPE, estão a demora na fixação do material após a realização da biópsia, levando à degradação do RNA induzido por autólise e a fixação do tecido com formalina

não tamponada, levando à degradação ácida do RNA ^{245,246}. Tais fatores podem ter ocorrido na nossa população. Apesar disso, não foi evidenciada diferença estatisticamente significativa das características clínicas e laboratoriais entre os pacientes da coorte analisada para expressão gênica e os que foram excluídos. Assim, afasta-se qualquer suspeição de seleção de pacientes de melhor ou pior prognóstico do ponto de vista clínico e laboratorial, já que os pacientes avaliados são representativos da amostra total.

A curva de amplificação das eficiências gênicas confirmam a qualidade das reações de RT-qPCR. O gene de referência *GUSB* foi selecionado como gene de referência/controle endógeno para controle e verificação das possíveis variações ou interferentes da reação de RT-qPCR e para análise da eficiência e da quantidade de RNA total ^{245,247}. Neste estudo, os dados quantitativos obtidos no RT-qPCR foram transformados em variáveis qualitativas pelo estabelecimento de pontos de corte obtidos em curvas de ROC. Isso foi necessário para a inclusão de pacientes com ausência absoluta de expressão dos genes selecionados. Estas amostras apresentaram amplificação do gene de referência e tiveram suas reações de RT-qPCR com expressão do gene de interesse indetectável. Estes resultados foram confirmados (resultado do *Ct* como indeterminado). É importante ressaltar que estas amostras tiveram reações com valor zero em até 5 dígitos decimais, apesar de realização da reação até o número máximo de ciclos. O significado deste resultado é que tais genes não eram expressos ou expressos em poucas células em baixo nível de maneira não detectável. Portanto, não podem ser excluídas de análises estatísticas e precisaram ser convertidas em variáveis categóricas ²⁴⁸.

A expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$ foi associada a piores SG, SG2 anos, SLP, óbito global e risco de recaída após tratamento (valor $p \leq 0,1$), sendo considerado um biomarcador de mau prognóstico, o que corrobora dados da literatura médica. É sabido que hiperexpressão de *MYC* está associada à iniciação, à progressão e à manutenção tumoral, além de diversas neoplasias, como linfoma de Burkitt e Mieloma Múltiplo, o que confere um pior prognóstico ^{148,150}.

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes ficou acima dos pontos de corte estabelecidos para imunoexpressão proteica (60%) de *MYC*, porém sem

correlação prognóstica. Tal dado corrobora dados de Rubenstein *et al.*, em cujo estudo prospectivo com 44 pacientes, a expressão gênica e proteica elevada de MYC (positividade nuclear >50%) foi identificada em 54% dos pacientes, porém sem correlação prognóstica ²³. O papel da expressão proteica de MYC também foi avaliado num estudo com 14 pacientes, onde a sua hipexpressão esteve associada à pior SG. No entanto, o ponto de corte utilizado foi de apenas 20%, diferentemente daquele utilizado em nosso estudo e no estudo de Rubenstein *et al.* ²⁴⁹. Portanto, nosso estudo apresenta resultados alinhados com a literatura médica, demonstrando o papel prognóstico de MYC no LPSNC⁷⁵.

O gene *BCL2* regula a morte celular programada inclusive em linfócitos, e, quando hiperexpressa, pode bloquear a apoptose. Está associado à resistência à quimioterapia e à radioterapia, conferindo mau prognóstico^{154,220,250,251}. Em nosso estudo, a maioria dos pacientes ficou acima dos pontos de corte estabelecidos para a expressão proteica de BCL2 (80%), similar a dados da literatura ^{252,253}. Sua hiperexpressão foi associada a piores SG e SLP (valor $p \leq 0,1$), corroborando dados da literatura ²⁵²⁻²⁵⁴.

Tais dados precisam ser considerados conjuntamente com o tratamento recebido, pois nenhum paciente foi submetido à terapia com rituximabe. No LDGCB sistêmico, imunoexpressão de BCL2 é considerado um biomarcador de mau prognóstico, principalmente em estudos conduzidos na era pré-rituximabe^{154,255}. Na era pós-rituximabe, o impacto prognóstico de hipexpressão de BCL2 parece ser reduzido. Num estudo com 399 pacientes, foi demonstrado que a adição de rituximabe ao esquema CHOP foi capaz de evitar a falha à quimioterapia em pacientes com hiperimunoexpressão de BCL2 ²²⁰. Expressão gênica de *BCL2* $\geq 0,3516$ não foi associada a nenhum dos desfechos clínicos estudados.

Em nosso estudo, o teste de correlação entre expressão gênica e expressão proteica pôde ser realizado apenas para MYC, BCL2 e LMO2. Não foi possível estabelecer ponto de corte para correlação de outros genes estudados devido ao excesso de expressão gênica indetectável (MGMT e PDCD1) ou excesso de hiperexpressão (POU2F1) ²⁵⁶.

Observamos correlação moderada (kappa entre 0,41-0,60) entre

expressão gênica e proteica de MYC, bem como de BCL2. Dados similares são encontrados na literatura médica, na qual a correlação entre expressão gênica e proteica é de apenas 40% (classificada como moderada). Isso deve-se a fatores como estabilidade proteica, taxa de transcrição e translação, taxa de degradação do mRNA, atividade do micRNA, regulação pós-transcricional e de modificação pós-translacional ²⁵⁷. De modo geral, o nível de transcriptoma não é diretamente proporcional ao nível de proteína, sendo insuficiente para explicar a relação entre genótipo e seu fenótipo ²⁵⁷. A meia vida de uma proteína pode variar de minutos a dias, enquanto a taxa de degradação do mRNA fica em torno de 2-7 horas em mamíferos. Outro fator a ser considerado é que, nos mamíferos, há uma baixa taxa de transcrição de mRNA, quando comparado com a translação ²⁵⁸. É comum a falta de proporcionalidade entre a expressão proteica e a expressão gênica de proteínas que não são controladas pela expressão gênica, mas por sua ativação, como é o caso das proteínas kinases cuja expressão gênica é constante, mas sua ativação varia ao longo do tempo ²⁵⁹. Em estudos com células de câncer de mama, foi observada hiperexpressão proteica de POU2F1 sem concomitante hiperexpressão gênica (mRNA) possivelmente devido a alterações na metabolização e na degradação de POU2F1 ²⁶⁰. Tais motivos podem explicar a ausência de correlação entre expressão gênica e proteica dos outros genes de interesse estudados e o fato de ter sido encontrada apenas correlação moderada para MYC e BCL2.

O gene *LMO2* e sua respectiva proteína possui papel crucial na hematopoiese e vem sendo estudado em tumores hematológicos, incluindo LPSNC ¹⁴⁸. Em nosso estudo, a maioria dos pacientes ficou acima dos pontos de corte para imunoexpressão proteica (51,4%) de *LMO2*. Alguns estudos têm demonstrado hiperexpressão de *LMO2* em LPSNC quando comparados a LDGCB sistêmico. Num estudo com 32 pacientes com LPSNC, apenas 37% apresentavam imunoexpressão de *LMO2*, inferior ao nosso resultado ⁷⁵. No entanto, o ponto de corte utilizado por Four *et al.* foi de 30%, superior ao ponto de corte selecionado (25%) ⁷⁵.

No nosso estudo, tanto a hiperexpressão proteica de *LMO2* >25% quanto a gênica de *LMO2* $\geq 0,689232$ estiveram associadas a melhor prognóstico (SG 2 anos e SLP, respectivamente, valor $p \leq 0,1$). Tais dados

estão alinhados com dados da literatura médica, incluindo não apenas tumores hematológicos, mas outros como câncer de pâncreas, pulmão, entre outros^{261,262}.

O gene *MGMT* e sua proteína são frequentemente estudados em neoplasias devido ao seu impacto prognóstico e preditor de resposta a agentes alquilantes, usualmente utilizados no tratamento do LPSNC. Em nosso estudo, a mediana de expressão gênica do *MGMT* foi zero e nenhum paciente apresentou expressão proteica. É sabido que a metilação da região promotora de *MGMT* leva à ausência de expressão gênica e proteica, estando associada à patogênese de vários tumores, como carcinoma colorretal, carcinoma de pulmão, linfoma e glioblastoma¹⁷⁹. Neste estudo, não foi realizada a análise de metilação da região promotora, porém a ausência de expressão proteica bem como a baixa expressão gênica poderiam ser secundárias à metilação da região promotora, com impacto prognóstico e talvez preditor de resposta a tratamentos com regimes alquilantes.

A expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$ foi associada a pior prognóstico (SLP, valor $p=0,056$). No entanto, tais dados precisariam ser confirmados por análise multivariada conjuntamente com o tipo de tratamento recebido pelos pacientes e sua expressão proteica. O gene *MGMT* codifica uma proteína reparadora de DNA, que está associada na defesa celular contra mutagênese e toxicidade celular induzida por agentes alquilantes. Seu silenciamento genético está associado a melhor prognóstico (SG) nos pacientes que receberam quimioterapia com base em HD-MTX^{29,176,252}.

É sabido que o gene *POU2F1* (OCT1) codifica uma proteína com efeitos tumorigênicos¹⁷⁹. Por esse motivo, as expressões gênica e proteica de *POU2F1* (OCT1) foram analisadas, porém não foram associadas a nenhum dos desfechos clínicos estudados. O papel prognóstico de tal gene é conflitante entre diferentes estudos publicados. Em alguns estudos, a expressão proteica de *POU2F1* foi associada à maior agressividade tumoral e pior prognóstico em tumores gástrico, de cólon, de próstata, de pulmão, de mama, entre outros³². Em outros estudos, a expressão gênica de *POU2F1* não foi considerada um biomarcador prognóstico²⁶⁰.

Células cancerígenas apresentam mecanismos de escape ao sistema

imune, os quais têm sido considerados alvos terapêuticos e pesquisados também no LPSNC. A imunoexpressão de PDCD1 e PDL1 tem sido estudada como fator preditor de resposta e prognóstico em diferentes tumores ^{263,264}. Em nosso estudo, a mediana de expressão gênica de *PDCD1* foi zero, e a maioria dos pacientes (85%) não apresentou imunoexpressão proteica de PDCD1 nas células tumorais. Tais dados são discordantes da literatura. Num estudo com 32 pacientes com LPSNC, a imunoexpressão de PDCD1 no TIL e PDL1 nas células tumorais foi de 53% e de 37%, respectivamente. Num estudo com 20 pacientes, 60% apresentavam imunoexpressão de PDCD1 no TIL intratumoral²⁶⁵.

No nosso estudo, a hipexpressão gênica de *PDCD1* $\geq 2,00938$ foi associada a maior risco de recaída após tratamento e mortalidade global (valor $p \leq 0,1$). No entanto, a expressão proteica de PDCD1 não foi associada a nenhum dos desfechos clínicos estudados, o que sugere não se tratar de um biomarcador prognóstico na nossa população. Num estudo retrospectivo com 76 pacientes conduzido por Cho *et al.*, a expressão proteica de PDCD1 foi associada a piores SG e SLP, o que evidencia papel do microambiente tumoral no prognóstico destes pacientes ²⁶⁶. Entretanto, o tamanho amostral e o ponto de corte para expressão proteica de PD1 foram diferentes (≥ 70 células/HPF) entre o nosso estudo e o estudo conduzido por Cho *et al.*

O papel do microambiente tumoral e a presença de TIL também foram estudados na nossa coorte, pela análise das reações de IHQ anti-CD3 previamente disponíveis. O CD3 é um complexo de proteínas transmembrana presente em linfócitos T, importante na ativação de linfócitos T citotóxicos e células T helper. Em nosso estudo, a imunoexpressão de CD3 foi pesquisada retrospectivamente em 92,4% dos pacientes (32/35), resultando ausente na maioria (28/32, 87,5%), conforme esperado no LPSNC subtipo LDCGB. A ausência de imunoexpressão de CD3 foi associada a maior risco de recaída após tratamento e maior mortalidade global (valor $p \leq 0,1$). O complexo de proteínas CD3 é considerado um marcador de linhagem de células T e atua como um correceptor que se associa ao receptor de células T, com papel fundamental na resposta imune adaptativa ²⁶⁷. Esse complexo está expresso em infiltração perivascular reativa de células T (TIL), sendo caracterizado

também por linfócitos reativos T isolados ou localizados entre parede vascular e as células neoplásicas ⁹⁰.

Tais dados estão alinhados com a literatura, na qual a presença de infiltrado perivascular reativo de células T é considerado um biomarcador histopatológico de bom prognóstico. Num estudo com 73 pacientes com LPSNC, a presença de infiltrado perivascular de linfócitos T foi associada à melhor SG, independentemente do risco IPI modificado ⁵⁶. Importante ressaltar que *Ponzoni et al* realizou a análise qualitativa de TIL, e não quantitativa.

A expressão gênica de *BCL6* não foi associada a nenhum dos desfechos clínicos estudados, e sua expressão proteica não pôde ser estudada devido à falta de material histopatológico. O *BCL6* é um importante regulador do sistema imune. Translocações cromossômicas de *BCL6* e de genes da cadeia de imunoglobulina são frequentes no LPSNC, com a ativação constitutiva do *BCL6*, levando à hiperexpressão gênica e proteica com consequente efeito tumorigênico ^{148,252,268,269}. Apesar de a imunoexpressão de *BCL6* estar presente em aproximadamente 55% do LPSNC ²⁷⁰, sua importância prognóstica ainda é tema de discussão. Alguns estudos evidenciaram que a alta imunoexpressão de *BCL6* (positividade nuclear >60%) foi associada a piores prognósticos (SG, SLP)^{23,81}. Entretanto, estudos retrospectivos evidenciaram que a imunoexpressão de *BCL6* estaria associada a melhor prognóstico (SG) ⁴¹.

7 CONCLUSÕES

- Com relação à expressão gênica normatizada temos que (em análise univariada): *MYC* $\geq 0,201041$ foi associada a pior prognóstico (piores SG, SG em 2 anos e SLP; maior mortalidade global e risco de recaída); *BCL2* $\geq 0,3516$ não foi considerada fator prognóstico; *LMO2* $\geq 0,689232$ foi associada a melhor prognóstico (melhor SLP); *MGMT* $\geq 0,335666$ foi associada a pior prognóstico (pior SLP); *PDCD1* $\geq 2,00938$ foi associada a pior prognóstico (maior mortalidade global e risco de recaída); *POU2F1* $\geq 1,44819$ e *BCL6* $\geq 2,73477$ não foram consideradas fatores prognósticos;
- As características clínico-laboratoriais e de prognóstico desta coorte foram similares aos da literatura médica disponível. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos, 77% apresentavam acometimento de regiões profundas de SNC ao diagnóstico e 80% apresentavam IPI modificado intermediário-alto. A SG mediana foi de apenas 42,6 meses (IC95% 26,6-58,6 meses), SLP mediana, de 41 meses (IC95% 19,7-62,4 meses) e SLD mediana, de 59,2 meses (IC95% 31,9-86,6 meses);
- Com relação à imunoexpressão proteica, temos que (em análise univariada): *MYC* >50% não foi considerada fator prognóstico; *BCL2* >50% foi associada a pior prognóstico (piores SG e SLP; maior mortalidade global); *LMO2* >25% foi associada a melhor desfecho clínico (melhor SG em 2 anos e menor mortalidade em 2 anos); expressão de *MGMT*, *POU2F1* e *PDCD1* não foram considerados fatores prognósticos e
- Houve correlação moderada entre a imunoexpressão proteica e a expressão gênica de *MYC*, bem como de *BCL2*.

8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

- 1- Criação de banco de dados de pacientes do Serviço de Hematologia da FMUSP;
- 2- Realização de estudos retrospectivos multicêntricos em população brasileira, com uma coorte maior e realização de análises multivariadas e
- 3- Validação dos resultados encontrados em estudos prospectivos com LPSNC.

9 ANEXOS

ANEXO A - Características clínico-laboratoriais por paciente

(continua)

pacientes			Pacientes que Evoluíram a Óbito			Pacientes vivos		Características Clínicas					
	sexo	idade diagnóstico (anos)	óbito (a)	idade óbito (anos)	tempo entre diagnóstico e óbito meses	idade última consulta (anos)	tempo entre diagnóstico e última consulta (meses)	RISCO IPI modificado (b)	P.S inicial (c)	P.S inicial ≥2? (a)	Acometimento de regiões profundas em SNC? (a)	Citologia LCR positiva? (a)	Presença de HIC? (a)
P1	0	47,2	0			58,8	139,7	1	1	0	1	0	0
P2	0	54,0	1	54,6	7,3			2	4	1	1	0	1
P3	0	75,5	1	81,0	66,3			1	1	0	0	0	0
P4	0	67,9	1	75,6	92,4			1	1	0	1	0	0
P6	1	62,0	0			68,1	73,8	2	2	1	1	1	1
P7	1	82,2	1	82,4	2,4			2	4	1	1	0	1
P8	0	49,9	1	51,9	24,1			1	3	1	1	0	0
P9	0	72,9	1	79,3	76,6			0	1	0	1	0	0
P10	1	61,1	1	61,2	1,1			2	3	1	0	2	1
P11	1	78,7	1	81,1	28,5			1	1	0	1	1	0
P13	1	49,8	1	53,2	41,0			2	3	1	1	0	1
P14	1	76,9	1	80,0	36,2			2	3	1	1	0	1
P15	1	77,5	1	78,1	6,7			2	3	1	1	0	1
P16	1	64,6	1	68,2	42,6			1	1	0	1	0	0
P17	1	59,9	0			65,5	67,8	1	2	1	1	0	1
P18	1	76,6	1	80,4	45,5			2	3	1	1	0	0
P19	1	49,3	1	54,8	66,1			1	0	0	0	0	0
P21	1	45,7	1	45,9	2,4			1	2	1	1	0	0
P22	0	42,3	1	47,5	62,4			1	2	1	1	0	1
P24	0	59,7	1	64,7	60,7			1	3	1	1	0	0
P25	1	56,5	1	60,8	51,4			0	2	1	0	0	1
P26	1	28,0	0			34,9	82,8	0	1	0	0	0	0
P27	1	53,1	0			67,4	171,8	0	1	0	1	0	0
P28	0	29,7	0			35,5	69,4	0	0	0	0	0	0
P30	1	66,9	1	69,0	24,7			1	3	1	0	0	0
P31	0	62,1	1	66,1	48,0			2	2	1	1	0	0
P32	1	66,2	1	67,6	17,2			1	2	1	1	0	0
P36	0	41,2	0			45,3	49,2	0	0	0	0	0	0
P37	1	65,9	1	66,9	12,6			0	1	0	1	0	0
P40	0	83,9	1	84,2	3,7			2	3	1	1	0	0
P41	0	26,2	0			28,4	27,0	2	2	1	1	0	0
P42	1	73,6	0			74,9	16,1	1	3	1	1	0	0
P43	1	69,0	1	69,3	3,7			1	3	1	1	0	0
P44	0	72,5	1	72,9	4,7			1	3	1	1	0	0
P51	0	56,6	1	57,2	7,7			1	3	1	1	0	0

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Imuno-histoquímica das Proteínas de Interesse						Imuno-histoquímica de Outras Proteínas Disponíveis (conforme disponibilidade e realização prévia)							Célula de Origem
pacientes	anti-MYC (d)	anti-MGMT (d)	anti-PDCD1 (d)	anti-BCL2 (d)	anti-LMO2 (d)	anti-POU2F1 (d)	anti-CD20 (e)	anti-CD3 (e)	anti-CD56 (e)	Ki67 (e)	anti-BCL6 (e)	anti-CD10 (e)	anti-MUM1 (e)	COO SUBTIPO (f)
P1	2	0	0	4	2	4	1	0	0	1	2	2	2	2
P2	1	5	0	4	4	3	1	1	2	1	0	0	1	1
P3	5	0	0	3	3	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P4	2	0	1	4	0	2	1	2	2	2	2	2	2	2
P6	3	0	0	1	4	4	1	2	2	1	1	1	1	0
P7	3	0	0	4	1	4	1	0	2	1	1	1	2	0
P8	4	0	0	4	0	4	1	0	2	1	2	0	0	1
P9	4	0	0	4	3	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P10	0	0	0	4	4	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P11	4	0	0	3	3	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P13	3	0	0	4	2	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P14	4	0	0	4	3	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P15	4	0	4	4	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P16	1	0	0	3	4	4	1	0	0	1	2	2	2	2
P17	2	0	1	2	2	4	1	0	2	1	0	0	1	1
P18	4	0	0	4	2	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P19	4	0	0	4	2	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P21	4	0	0	4	0	4	1	0	0	1	0	0	2	1
P22	3	0	0	4	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1
P24	4	0	0	4	3	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P25	4	0	0	1	4	4	1	0	2	1	1	0	1	1
P26	1	0	0	4	0	4	1	1	0	1	0	2	2	2
P27	4	0	0	2	0	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P28	5	5	5	5	5	5	1	1	2	1	1	1	0	0
P30	3	5	0	4	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P31	3	0	0	3	3	4	1	0	0	1	1	0	1	1
P32	4	0	0	4	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P36	3	5	5	5	5	5	1	0	2	1	2	2	2	2
P37	2	0	0	4	0	4	1	0	0	1	0	0	1	1
P40	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	2	0	1	1
P41	3	0	0	4	4	4	1	1	2	1	1	0	2	1
P42	0	0	0	3	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P43	4	0	0	4	0	4	1	0	2	1	0	0	1	1
P44	1	0	0	3	0	4	1	0	2	1	0	1	1	0
P51	1	0	0	3	5	4	1	2	2	2	2	2	2	2

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Expressão Normalizada dos Genes de Interesse						
pacientes	MYC média (g) (i)	MGMT média (g) (i)	PDCD1 média (g) (i)	BCL2 média (g) (i)	LMO2 média (g) (i)	POU2F1 média (g) (i)	BCL6 média (g) (i)
P1	0,110	0,000	0,000	0,091	0,689	0,000	1,203
P2							
P3	0,000	0,000	0,000	0,130	2,576	4,386	4,923
P4	0,000	0,336	0,000	0,645	0,157	1,568	1,703
P6	0,000	0,000	0,000	0,197	7,140	0,000	3,297
P7	0,341	0,000	0,000	1,842	0,138	1,722	3,277
P8	0,235	0,000	0,000	2,205	0,000	0,000	0,648
P9							
P10	0,202	1,418	1,035	0,766	4,078	1,033	3,787
P11	0,235	0,000	9,215	0,352	10,973	0,000	8,337
P13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,122	0,000
P14	0,304	0,000	0,000	0,081	1,636	6,141	2,716
P15	0,412	0,000	0,000	0,528	0,947	2,783	2,735
P16							
P17	0,030	0,011	0,000	0,079	1,991	1,448	0,639
P18	0,371	0,000	0,000	1,472	0,451	0,000	1,113
P19						0,000	0,000
P21						0,000	0,000
P22	0,475	0,000	1,730	5,566	17,506	1,683	7,376
P24							
P25							
P26	0,000	0,000	6,405	1,159	1,051	6,301	9,091
P27							
P28							
P30							
P31							
P32							
P36							
P37	0,070	0,218	0,000	0,324	0,065	4,481	1,640
P40	0,214	0,000	0,000	0,000	0,436	0,000	0,271
P41	0,641	0,070	4,159	0,652	7,785	0,000	5,446
P42	0,198	2,524	2,663	1,189	13,780	2,828	3,346
P43	0,201	10,072	2,009	0,564	6,560	2,134	3,427
P44	0,178	1,318	0,592	1,194	3,463	0,568	1,705
P51							

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

#o valor 0,000 corresponde à ausência absoluta de expressão gênica, portanto um valor a ser considerado.

##NA- corresponde a reações de RT-qPCR que foram consideradas como não avaliáveis.

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Informações sobre Primeira Linha de Tratamento									Informações sobre Segunda Linha de Tratamento						
pacientes	TTO 1 Linha (a)	idade no TTO1 (anos)	Recebeu HD-MTX? (a)	duração TTO1 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo entre final TTO 1 e PD (meses)	Recaída? (a)	Refratariedade? (a)	TTO 2 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO2 (anos)	duração TTO2 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo entre final TTO 2 e PD (meses)
P1	1	47,3	1	9,13	0	0		0	0							
P2	1	54,1	1	2,03	0	0		0	0							
P3	1	75,6	1	3,97	1	1	32,7		0	1	1	78,7	2,5	1	1	11,9
P4	1	67,9	1	5,00	1	1	21,0		0	1	1	70,0	8,7	1	1	15,3
P6	1	62,2	1	5,30	0	1	60,2	1	0	1	1	67,7	2,8	0	0	
P7	1	82,3	1	0,70	2	1	1,0		1							
P8	1	50,0	1	4,00	2	1	1,1		1	1	0	50,4	1,0	0	1	10,8
P9	1	73,0	0	5,00	0	0		0	0							
P10	1	61,2	1	0,13	2	1	0,0		1							
P11	1	78,8	1	5,50	1	1	17,8		0	1	0	80,8	1,5	2	1	0,0
P13	1	49,9	1	8,73	0	0		0	0							
P14	1	77,0	1	3,20	0	0		0	0							
P15	1	77,6	0	1,00	2	1	5,0		1							
P16	1	64,7	1	3,83	0	1	37,9	1	0							
P17	1	60,1	1	5,97	0	0		0	0							
P18	1	76,8	1	0,60	0	1	42,4	1	0							
P19	1	49,4	1	6,33	0	0		0	0							
P21	1	45,8	0	0,73	2	1	0,0		1							
P22	1	42,3	1	11,00	1	1	42,4		0	1	1	46,9	4,5	2	1	0,8
P24	1	59,8	1	5,80	1	1	49,0		0	1	0	64,5	0,7	2	1	2,2
P25	1	56,7	1	5,50	1	1	8,6		0	1	1	58,1	4,2	1	1	20,0
P26	1	28,1	1	2,27	1	0			0							
P27	1	53,2	1	7,00	0	0		0	0							
P28	1	29,9	1	6,40	0	0		0	0							
P30	1	67,0	1	1,73	2	1	1,3		1	1	0	67,2	1,0	2	1	0,9
P31	1	62,1	1	7,47	0	0		0	0							
P32	1	66,3	1	2,20	2	1	0,4		1	1	0	66,5	1,2	1	0	
P36	1	41,4	1	6,90	0	0		0	0							
P37	1	66,1	0	2,37	1	0			0							
P40	0															
P41	1	26,3	1	6,87	0	0		0	0							
P42	1	73,7	1	0,47	1	0			0							
P43	1	69,2	0	1,07	2	1	0,0		1							
P44	0															
P51	1	56,7	1	3,27	2	1	3,4		1							

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Informações sobre Terceira Linha de Tratamento							Informações sobre Quarta Linha de Tratamento						
pacientes	TTO 3 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO3 (anos)	duração TTO3 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo entre final TTO 3 e PD (meses)	TTO 4 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO4 (anos)	duração TTO4 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo final TTO 4 e PD (meses)
P1														
P2														
P3	1	1	79,9	6,2	1	1	6,9							
P4	1	1	72,0	6,0	1	1	13,0	1	1	73,1	9,0	0	1	6,8
P6														
P7														
P8	1	1	51,4	4,4	2	1	0,6	1	0	51,8	0,4	2	1	0,3
P9														
P10														
P11														
P13														
P14														
P15														
P16														
P17														
P18														
P19														
P21														
P22	1	1	47,3	1,4	2	1	0,3							
P24														
P25	1	0	60,3	8,1	2	1	0,2							
P26														
P27														
P28														
P30														
P31														
P32														
P36														
P37														
P40														
P41														
P42														
P43														
P44														
P51														

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(conclusão)

	Informações sobre Quarta Linha de Tratamento						
pacientes	TTO 5 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO5 (anos)	duração TTO5 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Recebeu algum tratamento radioterápico? (a)	TMO? (a)
P1						1	0
P2						0	0
P3						1	0
P4	1	1	74,4	5,0	0	1	0
P6						1	0
P7						0	0
P8						1	0
P9						0	0
P10						0	0
P11						1	0
P13						1	0
P14						0	0
P15						1	0
P16						0	0
P17						1	0
P18						0	0
P19						1	0
P21						0	0
P22						1	0
P24						0	0
P25						1	0
P26						1	0
P27						1	0
P28						1	0
P30						0	0
P31						1	0
P32						0	0
P36						1	0
P37						1	0
P40						0	0
P41						1	0
P42						0	0
P43						1	0
P44						0	0
P51						1	0

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

ANEXO B - Informações sobre a primeira linha de tratamento oncológico

Número Total de Pacientes		
	% (n)	100% (35)
Recebeu 1 linha de tratamento?		
não	(n)	5,7% (2)
sim	(n)	94,3% (33)
total	(n)	100% (35)
IDADE (anos)		
	n	33
	média (dp)	59,2 (14,91)
	1ºq;mediana;3ºq	49,7 : 61,2 : 71,1
	mín ; máx	26,3 : 82,3
MTX Altas Doses		
não	(n)	15,2% (5)
sim	(n)	84,8% (28)
total	(n)	100% (33)
Duração TTO1 (meses)		
	n	33
	média (dp)	4,3 (2,83)
	1ºq;mediana;3ºq	1,9 : 4,0 : 6,4
	mín ; máx	0,1 : 11,0
Melhor Resposta Clínica Durante o Tratamento		
RC	(n)	45,5% (15)
RP	(n)	27,3% (9)
PD	(n)	27,3% (9)
total	(n)	100% (33)
Apresentou PD em algum momento?		
não	(n)	45,5% (15)
sim	(n)	54,5% (18)
total	(n)	100% (33)
Recaída Após RC		
não	(n)	80% (12)
sim	(n)	20% (3)
total	(n)	100% (15)
Refratariedade à Primeira Linha de Tratamento		
não	(n)	72,7% (24)
sim	(n)	27,3% (9)
total	(n)	100% (33)
Intervalo entre Final de Tratamento e PD (meses)		
	n	18
	média (dp)	18,0 (20,53)
	1ºq;mediana;3ºq	0,8 : 6,8 : 39,1
	mín ; máx	0,0 : 60,2

ANEXO C - Valores da expressão normalizada dos genes MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1 por paciente

(continua)

Amostra	MYC	PDCD1	01/out	MGMT	BCL2	BCL6	LMO2
P1	0,1103834	0	0	0	0,09072	1,20327293	0,68923207
P2†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P3†	0	0	4,385562	0	0,13021	4,92333543	2,57602771
P4†	0	0	1,567702	0,335666	0,64488	1,70344228	0,15703952
P6*	0	0	0	0	0,19728	3,29719402	7,14032912
P7#†	0,3405111	0	1,72209	0	1,84167	3,27660241	0,13764646
P8#†	0,2351414	0	0	0	2,2052	0,64762351	0
P9†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P10#†	0,2017973	1,0351888	1,033221	1,417807	0,7658	3,787009	4,07845604
P11†	0,2351788	9,2146338	0	0	0,3516	8,3368464	10,9727002
P13†	0	0	3122,622	0	0	0	0
P14†	0,3040957	0	6,14149	0	0,08092	2,715904	1,6358415
P15#†	0,412259	0	2,783416	0	0,52765	2,73477377	0,94713051
P16*†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P17	0,0301969	0	1,448191	0,010951	0,07898	0,63889135	1,99124978
P18*†	0,371486	0	0	0	1,47173	1,11302554	0,45144126
P19†	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
P21#†	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
P22†	0,4745787	1,729677	1,682568	0	5,56582	7,37556864	17,5060425
P24†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P25†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Valores da expressão normalizada dos genes MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1 por paciente

(conclusão)

Amostra	MYC	PDCD1	01/out	MGMT	BCL2	BCL6	LMO2
P26	0	6,4048083	6,30088	0	1,15876	9,09111926	1,05112574
P27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P30#†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P31†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P32#†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P37†	0,0701626	0	4,481112	0,218243	0,32391	1,63956511	0,06489237
P40†	0,214366	0	0	0	0	0,2707965	0,43562553
P41	0,6413885	4,158813	0	0,070006	0,65164	5,446246	7,78468333
P42	0,1977622	2,6626342	2,827798	2,524375	1,18919	3,3456055	13,7798915
P43#†	0,2010405	2,0093818	2,134024	10,07229	0,56432	3,42655195	6,55950292
P44†	0,1775013	0,5917454	0,567903	1,31804	1,19433	1,70547543	3,4625705
P51#†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Média	0,20085	1,3241373	137,3782	0,760352	0,90641	2,89908039	3,87721089
Mediana	0,2010405	0	1,448191	0	0,56432	2,715904	1,6358415

A numeração das amostras seguiu o número original atribuído para a realização desse trabalho, que partir de uma casuística de 51 pacientes.

Casos refratários primários. *Recaída tardia (>6 meses). † Óbitos durante o tratamento. NA: corresponde a amostras não amplificadas

ANEXO D - Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continua)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Número de pacientes			
n	100% (35)	60% (21)	
Idade ao diagnóstico (anos)			
			teste t- student**
media (dp)	60,1 (15,22)	63,2 (16,87)	0,493
≤ 60 anos (n)	45,7% (16)	33,3% (7)	0,412
> 60 anos (n)	54,3% (19)	66,7% (14)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Sexo			
			teste de independência *
frequência			0,785
masculino (n)	42,9% (15)	38,1% (8)	
feminino (n)	57,1% (20)	61,9% (13)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Anti-MYC			
			teste de independência *
frequência			
0%-50% (n)	36,4% (12)	45% (9)	0,573
51%-100% (n)	63,6% (21)	55% (11)	
total (n)	100% (33)	100% (20)	
Anti-MGMT			
frequência			
negativo (n)	88,6% (31)	100% (21)	
positivo (n)	0% (0)	0% (0)	
total (n)	88,6% (31)	100% (21)	
Anti-PDCD1			
			teste de independência *
frequência			0,823
negativo (n)	90,9% (30)	85,7% (18)	
positivo (n)	9,1% (3)	14,3% (3)	
total (n)	100% (33)	100% (21)	
Anti-BCL2			
			teste de independência *
frequência			
0%-50% (n)	15,2% (5)	14,3% (3)	1,000
51%-100% (n)	84,8% (28)	85,7% (18)	
total (n)	100% (33)	100% (21)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

\(continuação

Variável		População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Anti-LMO2		teste de independência *		
frequência				
0%-25%	(n)	43,8% (14)	47,6% (10)	1,000
26%-100%	(n)	56,3% (18)	52,4% (11)	
total	(n)	100% (32)	100% (21)	
Anti-POU2F1		teste de independência *		
frequência				1,000
negativo	(n)	0% (0)	0% (0)	
positivo	(n)	94,4% (33)	100% (21)	
Anti-CD20				
frequência				
negativo (0)	(n)	0% (0)	0% (0)	
positivo (1)	(n)	100% (35)	100% (21)	
total	(n)	100% (35)	100% (21)	
Anti-CD3		teste de independência *		
frequência				1,000
negativo (0)	(n)	87,5% (28)	89,5% (17)	
positivo (1)	(n)	12,5% (4)	10,5% (2)	
total	(n)	100% (32)	100% (19)	
Anti-CD56				
frequência				
negativo (0)	(n)	100% (6)	100% (3)	
positivo (1)	(n)	0% (0)	0% (0)	
total	(n)	100% (6)	100% (3)	
Ki67				
frequência				
negativo (0)	(n)	0% (0)	0% (0)	
positivo (1)	(n)	100% (29)	100% (19)	
total	(n)	100% (29)	100% (19)	
Anti-BCL6		teste de independência *		
frequência				1,000
negativo (0)	(n)	57,1% (8)	66,7% (6)	
positivo (1)	(n)	42,9% (6)	33,3% (3)	
total	(n)	100% (14)	100% (9)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continuação)

Variável		População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Anti-CD10				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo (0)	(n)	73,3% (11)	70% (7)	
positivo (1)	(n)	26,7% (4)	30% (3)	
total	(n)	100% (15)	100% (10)	
Anti-MUM1				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo (0)	(n)	25% (3)	25% (2)	
positivo (1)	(n)	75% (9)	75% (6)	
total	(n)	100% (12)	100% (8)	
COO Subtipo				teste de independência *
	frequência			1,000
GCB	(n)	26,7% (4)	30% (3)	
não-GCB	(n)	73,3% (11)	70% (7)	
total	(n)	100% (15)	100% (10)	
Acometimento de regiões profundas SNC				teste de independência *
	frequência			0,508
não	(n)	22,9% (8)	14,3% (3)	
sim	(n)	77,1% (27)	85,7% (18)	
total	(n)	100% (35)	100% (21)	
LCR				teste de independência *
	frequência			0,622
citologia negativa	(n)	94,1% (32)	90% (18)	
sim	(n)	5,9% (2)	10% (2)	
total	(n)	100% (34)	100% (20)	
HIC				teste de independência *
	frequência			0,558
não	(n)	71,4% (25)	61,9% (13)	
sim	(n)	28,6% (10)	38,1% (8)	
total	(n)	100% (35)	100% (21)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continuação)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Idade ao óbito (anos)			teste t- student**
media (dp)	67,5 (11,63)	71,0 (12,25)	0,356
frequência			teste de independência *
≤ 50 anos (n)	26,9% (7)	20% (3)	0,458
50 a 69 anos (n)	34,6% (9)	20% (3)	
≥ 70 anos (n)	38,5% (10)	60% (9)	
total (n)	100% (26)	100% (15)	
Tempo entre diagnóstico e óbito (meses)			teste t- student**
media (dp)	32,2 (27,10)	28,8 (28,20)	0,705
frequência			teste de independência *
≤ 12 meses (n)	34,6% (9)	40% (6)	0,916
12 a 36 meses (n)	19,2% (5)	20% (3)	
≥ 36 anos (n)	46,2% (12)	40% (6)	
total (n)	100% (26)	100% (15)	
Idade na última consulta (anos)			teste t- student**
media (dp)	53,2 (17,34)	55,1 (19,00)	0,844
Tempo entre diagnóstico e última consulta (meses)			teste t- student**
media (dp)	77,5 (50,11)	67,9 (44,21)	0,709
Tempo de seguimento (meses)			teste t- student**
media (dp)	43,8 (39,18)	39,9 (37,06)	0,715
P.S. inicial1			teste t- student**
frequência			teste de independência *
0+1+2 (n)	57,1% (20)	47,6% (10)	0,584
3+4 (n)	42,9% (15)	52,4% (11)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Risco IPI			teste de independência *
frequência			0,572
baixa (0+1) (n)	20% (7)	9,5% (2)	
intermediário (2+3) (n)	48,6% (17)	47,6% (10)	
alto (4+5) (n)	31,4% (11)	42,9% (9)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
frequência			teste de independência *
baixa (0+1) (n)	20% (7)	9,5% (2)	0,459
não baixa (2+3+4+5) (n)	80% (28)	90,5% (19)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continuação)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Tratamento com RDT			teste de independência *
frequência			0,777
não (n)	40% (14)	33,4 (7)	
sim (n)	60% (21)	66,6% (14)	
total (n)	100% (35)	100% (9)	
Realização DE TMO			teste de independência *
frequência			
não (n)	100% (35)	100% (21)	
sim (n)	0% (0)	0% (0)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Neurotoxicidades?			teste de independência *
frequência			0,786
não (n)	57,1% (20)	52,4% (11)	
sim (n)	42,9% (15)	47,6% (10)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO			
RECEBEU 1ª LINHA?			teste de independência *
frequência			0,626
não (n)	5,7% (2)	9,5% (2)	
sim (n)	94,3% (33)	90,5% (19)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Idade TTO1 (anos)			teste t- student**
n	33	19	
media (dp)	59,2 (14,91)	61,7 (16,88)	0,576
HD-MTX 1			teste de independência *
frequência			1,000
não (n)	15,2% (5)	15,8% (3)	
sim (n)	84,8% (28)	84,2% (16)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Duração TTO1 (meses)			teste t- student**
n	33	19	
media (dp)	4,3 (2,83)	4,1 (3,24)	0,799
frequência			teste de independência *
≤ 4 meses (n)	51,5% (17)	57,9% (11)	0,775
> 4 meses (n)	48,5% (16)	42,1% (8)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(conclusão)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Resposta à primeira linha de tratamento			teste de independência *
frequência			0,715
RC (n)	45,5% (15)	36,8% (7)	
RP (n)	27,3% (9)	36,8% (7)	
PD (n)	27,3% (9)	26,3% (5)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Apresentou PD?			teste de independência *
frequência			1,000
não (n)	45,5% (15)	42,1% (8)	
sim (n)	54,5% (18)	57,9% (11)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Recaída?			teste de independência *
frequência			1,000
não (n)	80% (12)	71,4% (5)	
sim (n)	20% (3)	28,6% (2)	
total (n)	100% (15)	100% (7)	
Refratariedade?			teste de independência *
frequência	0% ( )	0% ( )	1,000
não (n)	72,7% (24)	73,7% (14)	
sim (n)	27,3% (9)	26,3% (5)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Se teve pd depois tto1, tempo entre final tratamento e pd 1 (meses)			teste t- student**
n	18	11	
media (dp)	18,0 (20,53)	20,3 (21,29)	0,774

1ºq med 3ºq - 1ºquartil mediana 3ºquartil ; dp - desvio padrão

* **Teste de independência (teste exato de Fisher)**

HIPÓTESES DO TESTE

Ho: há independência entre grupo e variável

HA: há associação entre grupo e variável

** **Teste T-student**

HIPÓTESES DO TESTE

Ho: as médias dos grupos são iguais

HA: as médias dos grupos são diferentes

ANEXO E - Curvas de ROC para expressão da proteína MYC

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 1)	0.00%	100.00%	78.57%		10
(≥ 2)	33.33%	63.64%	57.14%	0.9167	10,476
(≥ 3)	66.67%	27.27%	35.71%	0.9167	12,222
(≥ 4)	66.67%	9.09%	21.43%	0.7333	36,667

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	29.03%	1.0000	
(≥ 1)	88.89%	4.55%	29.03%	0.9312	24,444
(≥ 2)	77.78%	18.18%	35.48%	0.9506	12,222
(≥ 3)	77.78%	36.36%	48.39%	1.2222	0.6111
(≥ 4)	55.56%	63.64%	61.29%	1.5278	0.6984
(> 4)	0.00%	100.00%	70.97%		10

Considerando óbito

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	75.76%	1.0000	
(≥ 1)	92.00%	12.50%	72.73%	1.0514	0.6400
(≥ 2)	76.00%	25.00%	63.64%	1.0133	0.9600
(≥ 3)	68.00%	50.00%	63.64%	1.3600	0.6400
(≥ 4)	48.00%	87.50%	57.58%	3.8400	0.5943
(> 4)	0.00%	100.00%	24.24%		1.0000

Considerando progressão da doença

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	54.84%	1.0000	
(≥ 1)	94.12%	7.14%	54.84%	1.0136	0.8235
(≥ 2)	82.35%	21.43%	54.84%	1.0481	0.8235
(≥ 3)	76.47%	42.86%	61.29%	1.3382	0.5490
(≥ 4)	52.94%	71.43%	61.29%	1.8529	0.6588
(> 4)	0.00%	100.00%	45.16%		10

ANEXO F - Curva de ROC para expressão da proteína BCL2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 1)	0.00%	100.00%	76.92%		10
(≥ 2)	33.33%	30.00%	30.77%	0.4762	22,222
(≥ 3)	66.67%	20.00%	30.77%	0.8333	16,667
(≥ 4)	66.67%	0.00%	15.38%	0.6667	
(> 4)	100.00%	0.00%	23.08%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 1)	100.00%	0.00%	29.03%	1.0000	
(≥ 2)	100.00%	9.09%	35.48%	1.1000	0.0000
(≥ 3)	100.00%	18.18%	41.94%	1.2222	0.0000
(≥ 4)	88.89%	40.91%	54.84%	1.5043	0.2716
(> 4)	0.00%	100.00%	70.97%	1.0000	

Considerando óbito

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	78.79%	1.0000	
(≥ 1)	96.15%	0.00%	75.76%	0.9615	
(≥ 2)	92.31%	14.29%	75.76%	1.0769	0.5385
(≥ 3)	92.31%	42.86%	81.82%	1.6154	0.1795
(≥ 4)	69.23%	57.14%	66.67%	1.6154	0.5385
(> 4)	0.00%	100.00%	21.21%		10

Considerando progressão de doença

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-

(≥ 1)	0.00%	100.00%	41.94%		10
(≥ 2)	66.67%	30.77%	51.61%	0.9630	10.833
(≥ 3)	88.89%	15.38%	58.06%	1.0505	0.7222
(≥ 4)	88.89%	0.00%	51.61%	0.8889	
(> 4)	100.00%	0.00%	58.06%	1.0000	

ANEXO G - Curva de ROC para expressão da proteína LMO2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	23.08%	10.000	
(≥ 2)	100.00%	10.00%	30.77%	11.111	0.0000
(≥ 3)	66.67%	50.00%	53.85%	13.333	0.6667
(≥ 4)	66.67%	80.00%	76.92%	33.333	0.4167
(≥ 4)	0.00%	100.00%	76.92%		10

ANEXO H - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MYC

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
($\geq .030197$)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
($\geq .110383$)	50.00%	80.00%	71.43%	2.5000	0.6250
($\geq .304096$)	50.00%	60.00%	57.14%	1.2500	0.8333
($\geq .371486$)	50.00%	40.00%	42.86%	0.8333	12.500
($\geq .641388$)	50.00%	20.00%	28.57%	0.6250	25.000
($> .641388$)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	
($\geq .030197$)	100.00%	35.71%	52.63%	1.5556	0.0000
($\geq .070163$)	100.00%	42.86%	57.89%	1.7500	0.0000
($\geq .110383$)	100.00%	50.00%	63.16%	2.0000	0.0000
($\geq .197762$)	100.00%	57.14%	68.42%	2.3333	0.0000
($\geq .201041$)	100.00%	64.29%	73.68%	2.8000	0.0000
($\geq .201797$)	80.00%	64.29%	68.42%	2.2400	0.3111
($\geq .235141$)	60.00%	64.29%	63.16%	1.6800	0.6222
($\geq .235179$)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
($\geq .304096$)	40.00%	71.43%	63.16%	1.4000	0.8400
($\geq .340511$)	40.00%	78.57%	68.42%	1.8667	0.7636
($\geq .371486$)	20.00%	78.57%	63.16%	0.9333	10.182
($\geq .412259$)	20.00%	85.71%	68.42%	1.4000	0.9333
($\geq .474579$)	0.00%	85.71%	63.16%	0.0000	11.667
($\geq .641388$)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
($> .641388$)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000

ANEXO I - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MGMT

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
($\geq .010951$)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
($\geq .070006$)	0.00%	60.00%	42.86%	0.0000	16.667
($> .070006$)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	
($\geq .010951$)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
($\geq .070006$)	40.00%	71.43%	63.16%	1.4000	0.8400
($\geq .218243$)	40.00%	78.57%	68.42%	1.8667	0.7636
($\geq .335666$)	40.00%	85.71%	73.68%	2.8000	0.7000
(≥ 1.41781)	40.00%	92.86%	78.95%	5.6000	0.6462
(≥ 2.52437)	20.00%	92.86%	73.68%	2.8000	0.8615
(≥ 10.0723)	20.00%	100.00%	78.95%		0.8000
(> 10.0723)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000

ANEXO J - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene PDCD1

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
(≥ 4.15881)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(> 4.15881)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000
(≥ 1.03519)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
(≥ 1.72968)	0.00%	85.71%	63.16%	0.0000	11.667
(≥ 2.00938)	0.00%	78.57%	57.89%	0.0000	12.727
(≥ 2.66263)	0.00%	71.43%	52.63%	0.0000	14.000
(≥ 4.15881)	20.00%	71.43%	57.89%	0.7000	11.200
(≥ 6.40481)	20.00%	64.29%	52.63%	0.5600	12.444
(≥ 9.21463)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
(> 9.21463)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	

ANEXO K - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	
($\geq .078983$)	100.00%	20.00%	42.86%	1.2500	0.0000
($\geq .080915$)	100.00%	40.00%	57.14%	1.6667	0.0000
($\geq .090718$)	100.00%	60.00%	71.43%	2.5000	0.0000
($\geq .197275$)	100.00%	80.00%	85.71%	5.0000	0.0000
($\geq .651635$)	50.00%	80.00%	71.43%	2.5000	0.6250
(≥ 1.47173)	50.00%	100.00%	85.71%		0.5000
(> 1.47173)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	
($\geq .078983$)	100.00%	7.14%	31.58%	1.0769	0.0000

(>= .080915)	100.00%	14.29%	36.84%	1.1667	0.0000
(>= .090718)	100.00%	21.43%	42.11%	1.2727	0.0000
(>= .130212)	100.00%	28.57%	47.37%	1.4000	0.0000
(>= .197275)	100.00%	35.71%	52.63%	1.5556	0.0000
(>= .32391)	100.00%	42.86%	57.89%	1.7500	0.0000
(>= .3516)	100.00%	50.00%	63.16%	2.0000	0.0000
(>= .527652)	100.00%	57.14%	68.42%	2.3333	0.0000
(>= .564317)	80.00%	57.14%	63.16%	1.8667	0.3500
(>= .64488)	60.00%	57.14%	57.89%	1.4000	0.7000
(>= .651635)	60.00%	64.29%	63.16%	1.6800	0.6222
(>= .7658)	60.00%	71.43%	68.42%	2.1000	0.5600
(>= 1.15876)	40.00%	71.43%	63.16%	1.4000	0.8400
(>= 1.18919)	40.00%	78.57%	68.42%	1.8667	0.7636
(>= 1.47173)	40.00%	85.71%	73.68%	2.8000	0.7000
(>= 1.84167)	40.00%	92.86%	78.95%	5.6000	0.6462
(>= 2.2052)	20.00%	92.86%	73.68%	2.8000	0.8615
(>= 5.56582)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
(> 5.56582)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000

ANEXO L - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene LMO2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	
($\geq .451441$)	100.00%	20.00%	42.86%	1.2500	0.0000
($\geq .689232$)	50.00%	20.00%	28.57%	0.6250	25.000
(≥ 1.63584)	50.00%	40.00%	42.86%	0.8333	12.500
(≥ 1.99125)	50.00%	60.00%	57.14%	1.2500	0.8333
(≥ 7.14033)	50.00%	80.00%	71.43%	2.5000	0.6250
(≥ 7.78468)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(> 7.78468)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000
($\geq .064892$)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
($\geq .137646$)	0.00%	85.71%	63.16%	0.0000	11.667
($\geq .15704$)	0.00%	78.57%	57.89%	0.0000	12.727
($\geq .451441$)	0.00%	71.43%	52.63%	0.0000	14.000
($\geq .689232$)	0.00%	64.29%	47.37%	0.0000	15.556
($\geq .947131$)	20.00%	64.29%	52.63%	0.5600	12.444
(≥ 1.05113)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
(≥ 1.63584)	40.00%	57.14%	52.63%	0.9333	10.500
(≥ 1.99125)	40.00%	50.00%	47.37%	0.8000	12.000
(≥ 2.57603)	40.00%	42.86%	42.11%	0.7000	14.000
(≥ 4.07846)	40.00%	35.71%	36.84%	0.6222	16.800
(≥ 6.5595)	60.00%	35.71%	42.11%	0.9333	11.200
(≥ 7.14033)	60.00%	28.57%	36.84%	0.8400	14.000
(≥ 7.78468)	60.00%	21.43%	31.58%	0.7636	18.667
(≥ 10.9727)	60.00%	14.29%	26.32%	0.7000	28.000
(≥ 13.7799)	80.00%	14.29%	31.58%	0.9333	14.000
(≥ 17.506)	80.00%	7.14%	26.32%	0.8615	28.000
(> 17.506)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	

ANEXO M - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene POU2F1

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	75.00%		10.000
(≥ 1.44819)	0.00%	83.33%	62.50%	0.0000	12.000
(≥ 3.122)	0.00%	66.67%	50.00%	0.0000	15.000
(≥ 6.14149)	0.00%	50.00%	37.50%	0.0000	20.000
(> 6.14149)	100.00%	0.00%	25.00%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
(≥ 1.03322)	0.00%	93.33%	66.67%	0.0000	10.714
(≥ 1.44819)	0.00%	86.67%	61.90%	0.0000	11.538
(≥ 1.5677)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(≥ 1.68257)	0.00%	73.33%	52.38%	0.0000	13.636
(≥ 1.72209)	0.00%	66.67%	47.62%	0.0000	15.000
(≥ 2.13402)	0.00%	60.00%	42.86%	0.0000	16.667
(≥ 2.78342)	16.67%	60.00%	47.62%	0.4167	13.889
(≥ 2.8278)	33.33%	60.00%	52.38%	0.8333	11.111
(≥ 3.122)	50.00%	60.00%	57.14%	1.2500	0.8333
(≥ 4.38556)	50.00%	53.33%	52.38%	1.0714	0.9375
(≥ 4.48111)	50.00%	46.67%	47.62%	0.9375	10.714
(≥ 6.14149)	50.00%	40.00%	42.86%	0.8333	12.500
(≥ 6.30088)	66.67%	40.00%	47.62%	1.1111	0.8333
(> 6.30088)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

ANEXO N - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL6

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	25.00%	1.0000	
($\geq .638891$)	100.00%	33.33%	50.00%	1.5000	0.0000
(≥ 1.11303)	100.00%	50.00%	62.50%	2.0000	0.0000
(≥ 1.20327)	50.00%	50.00%	50.00%	1.0000	10.000
(≥ 2.7159)	50.00%	66.67%	62.50%	1.5000	0.7500
(≥ 3.29719)	50.00%	83.33%	75.00%	3.0000	0.6000
(≥ 5.44625)	0.00%	83.33%	62.50%	0.0000	12.000
(> 5.44625)	0.00%	100.00%	75.00%		10.000

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
($\geq .638891$)	0.00%	93.33%	66.67%	0.0000	10.714
($\geq .647623$)	0.00%	86.67%	61.90%	0.0000	11.538
(≥ 1.11303)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(≥ 1.20327)	0.00%	73.33%	52.38%	0.0000	13.636
(≥ 1.63957)	0.00%	66.67%	47.62%	0.0000	15.000
(≥ 1.70344)	16.67%	66.67%	52.38%	0.5000	12.500
(≥ 2.7159)	33.33%	66.67%	57.14%	1.0000	10.000
(≥ 2.73477)	33.33%	60.00%	52.38%	0.8333	11.111
(≥ 3.2766)	33.33%	53.33%	47.62%	0.7143	12.500
(≥ 3.29719)	50.00%	53.33%	52.38%	1.0714	0.9375
(≥ 3.34561)	66.67%	53.33%	57.14%	1.4286	0.6250
(≥ 3.42655)	66.67%	46.67%	52.38%	1.2500	0.7143
(≥ 3.78701)	66.67%	40.00%	47.62%	1.1111	0.8333
(≥ 4.92334)	66.67%	33.33%	42.86%	1.0000	10.000
(≥ 5.44625)	66.67%	26.67%	38.10%	0.9091	12.500
(≥ 7.37557)	66.67%	20.00%	33.33%	0.8333	16.667
(≥ 8.33685)	83.33%	20.00%	38.10%	1.0417	0.8333
(≥ 9.09112)	83.33%	13.33%	33.33%	0.9615	12.500
(> 9.09112)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

ANEXO O - Construção das curvas de SG, SLP e SLD (método de Kaplan-Meier)

Variável	SG (meses)	SLP (meses)	SLD (meses)
Número de pacientes			
n	100% (35)	100% (33)	100% (15)
Tempo de sobrevida depois diagnóstico *			
média (ep)	56,8 (10,34)	53,8 (10,71)	76,86 (16,58)
IC95% média	36,5 ; 77,0	32,8 ; 74,8	44,36 ; 109,36
mediana (ep)	42,6 (8,18)	41,0 (10,90)	59,2 (13,93)
IC95% mediana	26,6 ; 58,6	19,7 ; 62,4	31,94 ; 86,58
limitado por frequência	171,8	171,8	163,4
óbito (n)	74,3% (26)	75,8% (25)	53,3% (8)
vivos (n)	25,7% (9)	24,2% (8)	46,6% (7)
total	100,0% (35)	100,0% (33)	100,0% (15)
Probabilidade de sobrevida			
em 1 meses	1,000	1,000	1,000
em 2 meses	0,971	0,970	1,000
em 4 meses	0,857	0,848	0,933
em 6 meses	0,829	0,818	0,933
em 8 meses	0,743	0,697	0,933
em 12 meses	0,734	0,697	0,933
em 18 meses	0,685	0,636	0,933
em 24 meses	0,655	0,636	0,933
em 36 meses	0,579	0,573	0,790
em 48 meses	0,438	0,371	0,565
em 60 meses	0,404	0,259	0,485
em 90 meses	0,215	0,162	0,258
em 150 meses	0,144	0,162	0,258
em 170 meses	0,144	0,162	

ANEXO P - Expressão dos genes de interesse em relação à sua respectiva expressão proteica

(continua)

Gene/Proteína de Interesse	IHQ 0%	IHQ 1%-25%	IHQ 26%-50%	IHQ 51%-75%	IHQ 76%-100%
MYC					
n	3	2	4	5	6
média (dp)	0,205 (0,0087)	0,089 (0,1255)	0,053 (0,0480)	0,291 (0,2865)	0,293 (0,0844)
mediana	0,202	0,089	0,050	0,341	0,270
min ; max	0,198 : 0,214	0,000 : 0,178	0,000 : 0,110	0,000 : 0,641	0,201 : 0,412
MGMT					
n	21	0	0	0	0
média (dp)	0,760 (2,2315)				
mediana	0,000				
min ; max	0,000 : 10,072				
PDCD1					
n	18	2	0	0	1
média (dp)	1,545 (2,6101)	0,000 (0,0000)			0,000 (.)
mediana	0,000	0,000			
min ; max	0,000 : 9,215	0,000 : 0,000			
BCL2					
n	1	1	1	4	14
média (dp)	0,000 (.)	0,197 (.)	0,079 (.)	0,716 (0,5564)	1,135 (1,4370)
mediana				0,770	0,648
min ; max				0,130 : 1,194	0,000 : 5,566

ANEXO P - Expressão dos genes de interesse em relação à sua respectiva expressão proteica

(conclusão)

Gene/Proteína de Interesse	IHQ 0%	IHQ 1%-25%	IHQ 26%-50%	IHQ 51%-75%	IHQ 76%-100%
LMO2					
n	9	1	4	3	4
média (dp)	2,940 (4,6009)	0,138 (.)	0,783 (0,8547)	5,062 (5,1408)	9,127 (5,8151)
mediana	0,947		0,570	2,576	7,463
min ; max	0,000 : 13,780		0,000 : 1,991	1,636 : 10,973	4,078 : 17,506
POU2F1					
n	0	1	0	0	22
média (dp)		1,568 (.)			1,756 (2,0497)
mediana					1,241
min ; max					0,000 : 6,301

dp - desvio padrão

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Foon KA, Litchman MA. General considerations of lymphoma: epidemiology, etiology, heterogeneity and primary extranodal disease. Williams Hematology. 8th ed: McGraw Hill Medical; 2010. p. 1497-507.
2. Surveillance EaERP. Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) program. <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/nhl/html2015> [cited 2015 06/16].
3. Noone AM HN, Krapcho M, Miller D, Brest A, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2015,. https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/; National Cancer Institute; 2018 [cited November 2017 10/27/2018]; Available from: https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/.
4. Rizvi MA, Evens AM, Nelson BP. T-cell lymphoma. In: Marcus R, editor. Lymphoma: Pathology, Diagnosis and Treatment. 1st ed: Cambridge; 2007. p. 215-32.
5. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. WHO Classification of Tumours of the Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2008.
6. Swerdlow SH CE, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Revised Fourth Edition. WHO Classification of Tumours V, editor: IARC/WHO; 2017. 586 p.
7. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil Rio de Janeiro: Fox Print; 2018. 130 p.
8. Quintanilla-Martinez L. The 2016 updated WHO classification of lymphoid neoplasias. Hematol Oncol. 2017;35 Suppl 1:37-45.
9. Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE, Ma C, Lossos IS, Rosenwald A, et al. Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling. Nature. 2000;403(6769):503-11.
10. Hans CP, Weisenburger DD, Greiner TC, Gascoyne RD, Delabie J, Ott G, et al. Confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue microarray. Blood. 2004;103(1):275-82.
11. Rosenwald A, Wright G, Chan WC, Connors JM, Campo E, Fisher RI, et al. The use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002;346(25):1937-47.
12. Hattab EM, Martin SE, Al-Khatib SM, Kupsky WJ, Vance GH, Stohler RA, et al. Most primary central nervous system diffuse large B-cell lymphomas occurring in immunocompetent individuals belong to the nongerminal center subtype: a retrospective analysis of 31 cases. Mod Pathol. 2010;23(2):235-43.

13. Deckert M, Brunn A, Montesinos-Rongen M, Terreni MR, Ponzoni M. Primary lymphoma of the central nervous system--a diagnostic challenge. *Hematol Oncol*. 2014;32(2):57-67.
14. Mahadevan A, Rao CR, Shanmugham M, Shankar SK. Primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma in the immunocompetent: Immunophenotypic subtypes and Epstein-Barr virus association. *J Neurosci Rural Pract*. 2015;6(1):8-14.
15. Shan Y, Hu Y. Prognostic Factors and Survival in Primary Central Nervous System Lymphoma: A Population-Based Study. *Dis Markers*. 2018;2018:7860494.
16. Korfel A, Schlegel U. Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma. *Nat Rev Neurol*. 2013;9(6):317-27.
17. Dolecek TA, Propp JM, Stroup NE, Kruchko C. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2005-2009. *Neuro Oncol*. 2012;14 Suppl 5:v1-49.
18. O'Neill BP, Decker PA, Tieu C, Cerhan JR. The changing incidence of primary central nervous system lymphoma is driven primarily by the changing incidence in young and middle-aged men and differs from time trends in systemic diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma. *Am J Hematol*. 2013;88(12):997-1000.
19. Shiels MS, Pfeiffer RM, Besson C, Clarke CA, Morton LM, Nogueira L, et al. Trends in primary central nervous system lymphoma incidence and survival in the U.S. *Br J Haematol*. 2016;174(3):417-24.
20. Citterio G, Reni M, Gatta G, Ferreri AJM. Primary central nervous system lymphoma. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2017;113:97-110.
21. Hoang-Xuan K, Bessell E, Bromberg J, Hottinger AF, Preusser M, Ruda R, et al. Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma in immunocompetent patients: guidelines from the European Association for Neuro-Oncology. *Lancet Oncol*. 2015;16(7):e322-32.
22. Thiel E, Korfel A, Martus P, Kanz L, Griesinger F, Rauch M, et al. High-dose methotrexate with or without whole brain radiotherapy for primary CNS lymphoma (G-PCNSL-SG-1): a phase 3, randomised, non-inferiority trial. *Lancet Oncol*. 2010;11(11):1036-47.
23. Rubenstein JL, Hsi ED, Johnson JL, Jung SH, Nakashima MO, Grant B, et al. Intensive chemotherapy and immunotherapy in patients with newly diagnosed primary CNS lymphoma: CALGB 50202 (Alliance 50202). *J Clin Oncol*. 2013;31(25):3061-8.
24. Rubenstein JL. Biology of CNS lymphoma and the potential of novel agents. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017;2017(1):556-64.
25. Vaux DL. Immunology. Ways around rejection. *Nature*. 1998;394(6689):133.
26. Otake Y, Soundararajan S, Sengupta TK, Kio EA, Smith JC, Pineda-Roman M, et al. Overexpression of nucleolin in chronic lymphocytic leukemia cells induces stabilization of bcl2 mRNA. *Blood*. 2007;109(7):3069-75.

27. Stine ZE, Walton ZE, Altman BJ, Hsieh AL, Dang CV. MYC, Metabolism, and Cancer. *Cancer Discov.* 2015;5(10):1024-39.
28. Cubedo E, Gentles AJ, Huang C, Natkunam Y, Bhatt S, Lu X, et al. Identification of LMO2 transcriptome and interactome in diffuse large B-cell lymphoma. *Blood.* 2012;119(23):5478-91.
29. Toffolatti L, Scquizzato E, Cavallin S, Canal F, Scarpa M, Stefani PM, et al. MGMT promoter methylation and correlation with protein expression in primary central nervous system lymphoma. *Virchows Arch.* 2014;465(5):579-86.
30. Gupta S, Wulf G, Henjakovic M, Koepsell H, Burckhardt G, Hagos Y. Human organic cation transporter 1 is expressed in lymphoma cells and increases susceptibility to irinotecan and paclitaxel. *J Pharmacol Exp Ther.* 2012;341(1):16-23.
31. Andreev E, Brosseau N, Carmona E, Mes-Masson AM, Ramotar D. The human organic cation transporter OCT1 mediates high affinity uptake of the anticancer drug daunorubicin. *Sci Rep.* 2016;6:20508.
32. Vazquez-Arreguin K, Tantin D. The Oct1 transcription factor and epithelial malignancies: Old protein learns new tricks. *Biochim Biophys Acta.* 2016;1859(6):792-804.
33. Nayak L, Iwamoto FM, LaCasce A, Mukundan S, Roemer MGM, Chapuy B, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed/refractory primary central nervous system and testicular lymphoma. *Blood.* 2017;129(23):3071-3.
34. Chapuy B, Roemer MG, Stewart C, Tan Y, Abo RP, Zhang L, et al. Targetable genetic features of primary testicular and primary central nervous system lymphomas. *Blood.* 2016;127(7):869-81.
35. Pasqualucci L, Dalla-Favera R. Genetics of diffuse large B-cell lymphoma. *Blood.* 2018;131(21):2307-19.
36. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. *Blood.* 2016;127(20):2375-90.
37. Deckert M, Montesinos-Rongen M, Brunn A, Siebert R. Systems biology of primary CNS lymphoma: from genetic aberrations to modeling in mice. *Acta Neuropathol.* 2014;127(2):175-88.
38. Chan CC, Rubenstein JL, Coupland SE, Davis JL, Harbour JW, Johnston PB, et al. Primary vitreoretinal lymphoma: a report from an International Primary Central Nervous System Lymphoma Collaborative Group symposium. *Oncologist.* 2011;16(11):1589-99.
39. Phillips EH, Fox CP, Cwynarski K. Primary CNS lymphoma. *Curr Hematol Malig Rep.* 2014;9(3):243-53.
40. Grimm SA, Pulido JS, Jahnke K, Schiff D, Hall AJ, Shenkier TN, et al. Primary intraocular lymphoma: an International Primary Central Nervous System Lymphoma Collaborative Group Report. *Ann Oncol.* 2007;18(11):1851-5.

41. Braaten KM, Betensky RA, de Leval L, Okada Y, Hochberg FH, Louis DN, et al. BCL-6 expression predicts improved survival in patients with primary central nervous system lymphoma. *Clin Cancer Res*. 2003;9(3):1063-9.
42. Riemersma SA, Jordanova ES, Schop RF, Philippon K, Looijenga LH, Schuurin E, et al. Extensive genetic alterations of the HLA region, including homozygous deletions of HLA class II genes in B-cell lymphomas arising in immune-privileged sites. *Blood*. 2000;96(10):3569-77.
43. Wong SF, Gan HK, Cher L. A single centre study of the treatment of relapsed primary central nervous system lymphoma (PCNSL) with single agent temozolomide. *J Clin Neurosci*. 2012;19(11):1501-5.
44. Bromberg JE, Doorduijn JK, Illerhaus G, Jahnke K, Korfel A, Fischer L, et al. Central nervous system recurrence of systemic lymphoma in the era of stem cell transplantation--an International Primary Central Nervous System Lymphoma Study Group project. *Haematologica*. 2013;98(5):808-13.
45. Mappa S, Marturano E, Licata G, Frezzato M, Frungillo N, Ilariucci F, et al. Salvage chemoimmunotherapy with rituximab, ifosfamide and etoposide (R-IE regimen) in patients with primary CNS lymphoma relapsed or refractory to high-dose methotrexate-based chemotherapy. *Hematol Oncol*. 2013;31(3):143-50.
46. Mendez JS, Ostrom QT, Gittleman H, Kruchko C, DeAngelis LM, Barnholtz-Sloan JS, et al. The elderly left behind--changes in survival trends of primary central nervous system lymphoma over the past 4 decades. *Neuro Oncol*. 2018;20(5):687-94.
47. Batchelor T, Loeffler JS. Primary CNS lymphoma. *J Clin Oncol*. 2006;24(8):1281-8.
48. Villano JL, Koshy M, Shaikh H, Dolecek TA, McCarthy BJ. Age, gender, and racial differences in incidence and survival in primary CNS lymphoma. *Br J Cancer*. 2011;105(9):1414-8.
49. Abrey LE. Primary central nervous system lymphoma. *Curr Opin Neurol*. 2009;22(6):675-80.
50. Pitelle JEH. Stereotactic biopsy in the diagnosis of brain tumors and non-neoplastic lesions: prescription, accuracy and diagnostic difficulties. *J Bras Patol Med Lab*. 2008;44(5):11.
51. Abrey LE, Batchelor TT, Ferreri AJ, Gospodarowicz M, Pulczynski EJ, Zucca E, et al. Report of an international workshop to standardize baseline evaluation and response criteria for primary CNS lymphoma. *J Clin Oncol*. 2005;23(22):5034-43.
52. Sabattini E, Bacci F, Sagranso C, Pileri SA. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues in 2008: an overview. *Pathologica*. 2010;102(3):83-7.
53. Camilleri-Broet S, Criniere E, Broet P, Delwail V, Mokhtari K, Moreau A, et al. A uniform activated B-cell-like immunophenotype might explain the poor prognosis of primary central nervous system lymphomas: analysis of 83 cases. *Blood*. 2006;107(1):190-6.

54. Ponzoni M, Issa S, Batchelor TT, Rubenstein JL. Beyond high-dose methotrexate and brain radiotherapy: novel targets and agents for primary CNS lymphoma. *Ann Oncol*. 2014;25(2):316-22.
55. Rubenstein JL, Wong VS, Kadoch C, Gao HX, Barajas R, Chen L, et al. CXCL13 plus interleukin 10 is highly specific for the diagnosis of CNS lymphoma. *Blood*. 2013;121(23):4740-8.
56. Ponzoni M, Berger F, Chassagne-Clement C, Tinguely M, Jouvet A, Ferreri AJ, et al. Reactive perivascular T-cell infiltrate predicts survival in primary central nervous system B-cell lymphomas. *Br J Haematol*. 2007;138(3):316-23.
57. Batchelor TT. Primary central nervous system lymphoma. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2016;2016(1):379-85.
58. Maza S, Buchert R, Brenner W, Munz DL, Thiel E, Korfel A, et al. Brain and whole-body FDG-PET in diagnosis, treatment monitoring and long-term follow-up of primary CNS lymphoma. *Radiol Oncol*. 2013;47(2):103-10.
59. Kuker W, Nagele T, Korfel A, Heckl S, Thiel E, Bamberg M, et al. Primary central nervous system lymphomas (PCNSL): MRI features at presentation in 100 patients. *J Neurooncol*. 2005;72(2):169-77.
60. Zou Y, Tong J, Leng H, Jiang J, Pan M, Chen Z. Diagnostic value of using 18F-FDG PET and PET/CT in immunocompetent patients with primary central nervous system lymphoma: A systematic review and meta-analysis. *Oncotarget*. 2017;8(25):41518-28.
61. Tabouret E, Houillier C, Martin-Duverneuil N, Blonski M, Soussain C, Ghesquieres H, et al. Patterns of response and relapse in primary CNS lymphomas after first-line chemotherapy: imaging analysis of the ANOCEF-GOELAMS prospective randomized trial. *Neuro Oncol*. 2017;19(3):422-9.
62. Wieduwilt MJ, Valles F, Issa S, Behler CM, Hwang J, McDermott M, et al. Immunochemotherapy with intensive consolidation for primary CNS lymphoma: a pilot study and prognostic assessment by diffusion-weighted MRI. *Clin Cancer Res*. 2012;18(4):1146-55.
63. Zhang Y, Zhang Q, Wang XX, Deng XF, Zhu YZ. Value of pretherapeutic DWI in evaluating prognosis and therapeutic effect in immunocompetent patients with primary central nervous system lymphoma given high-dose methotrexate-based chemotherapy: ADC-based assessment. *Clin Radiol*. 2016.
64. Isasi CR, Lu P, Blafox MD. A metaanalysis of 18F-2-deoxy-2-fluoro-D-glucose positron emission tomography in the staging and restaging of patients with lymphoma. *Cancer*. 2005;104(5):1066-74.
65. Soares Jr J, Fonseca RP, Cerci JJ, Buchpiguet CA, Cunha MLd, Mamed M, et al. Recommendations on the use of 18F-FDG PET/CT in Oncology. Consensus between the Brazilian Society of Cancerology and the Brazilian Society of Biology, Nuclear Medicine and Molecular Imaging. *Radiol Bras*. 2010;43(4):255-9.
66. Kosaka N, Tsuchida T, Uematsu H, Kimura H, Okazawa H, Itoh H. 18F-FDG PET of common enhancing malignant brain tumors. *AJR Am J Roentgenol*. 2008;190(6):W365-9.

67. Fallah J, Qunaj L, Olszewski AJ. Therapy and outcomes of primary central nervous system lymphoma in the United States: analysis of the National Cancer Database. *Blood Adv*. 2016;1(2):112-21.
68. Ferreri AJ, Abrey LE, Blay JY, Borisch B, Hochman J, Neuwelt EA, et al. Summary statement on primary central nervous system lymphomas from the Eighth International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano, Switzerland, June 12 to 15, 2002. *J Clin Oncol*. 2003;21(12):2407-14.
69. Cady FM, O'Neill BP, Law ME, Decker PA, Kurtz DM, Giannini C, et al. Del(6)(q22) and BCL6 rearrangements in primary CNS lymphoma are indicators of an aggressive clinical course. *J Clin Oncol*. 2008;26(29):4814-9.
70. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol*. 1982;5(6):649-55.
71. Kasenda B, Ferreri AJ, Marturano E, Forst D, Bromberg J, Ghesquieres H, et al. First-line treatment and outcome of elderly patients with primary central nervous system lymphoma (PCNSL)--a systematic review and individual patient data meta-analysis. *Ann Oncol*. 2015;26(7):1305-13.
72. Nayak L, Batchelor TT. Recent advances in treatment of primary central nervous system lymphoma. *Curr Treat Options Oncol*. 2013;14(4):539-52.
73. Ferreri AJ, Cwynarski K, Pulczynski E, Ponzoni M, Deckert M, Politi LS, et al. Chemoimmunotherapy with methotrexate, cytarabine, thiotepe, and rituximab (MATRix regimen) in patients with primary CNS lymphoma: results of the first randomisation of the International Extranodal Lymphoma Study Group-32 (IELSG32) phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2016;3(5):e217-27.
74. Johnson NA, Slack GW, Savage KJ, Connors JM, Ben-Neriah S, Rogic S, et al. Concurrent expression of MYC and BCL2 in diffuse large B-cell lymphoma treated with rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone. *J Clin Oncol*. 2012;30(28):3452-9.
75. Four M, Cacheux V, Tempier A, Platero D, Fabbro M, Marin G, et al. PD1 and PDL1 expression in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma are frequent and expression of PD1 predicts poor survival. *Hematol Oncol*. 2017;35(4):487-96.
76. Scott DW, Wright GW, Williams PM, Lih CJ, Walsh W, Jaffe ES, et al. Determining cell-of-origin subtypes of diffuse large B-cell lymphoma using gene expression in formalin-fixed paraffin-embedded tissue. *Blood*. 2014;123(8):1214-7.
77. Bodor C, Alpár D, Marosvári D, Rajnai H, Dudela B, Kajtár B, et al. Cell of origin and genomic profile of primary central nervous system lymphoma determined using the nanostring 1st assay and ultra deep targeted next generation sequencing. *Blood*. 2017;130(Suppl 1):4009-.
78. Wilson WH, Young RM, Schmitz R, Yang Y, Pittaluga S, Wright G, et al. Targeting B cell receptor signaling with ibrutinib in diffuse large B cell lymphoma. *Nat Med*. 2015;21(8):922-6.

79. Villa D, Slack GW, Al-Moosawi M, Ben-Neriah S, Shenkier T, Connors JM, et al. Molecular Features of Primary Central Nervous System Lymphoma in a Large Tissue Microarray. *Blood*. 2018;132(Suppl 1):348.
80. Maguire A, Hilal T, Chen X, Rosenthal AC, Rimsza LM. Enhanced Expression of FGF Signaling in Primary Central Nervous System Lymphoma. *Blood*. 2018;132(suppl 1):2847.
81. Kreher S, Johrens K, Strehlow F, Martus P, Borowiec K, Radke J, et al. Prognostic impact of B-cell lymphoma 6 in primary CNS lymphoma. *Neuro Oncol*. 2015;17(7):1016-21.
82. Oliveira JL, Grogg KL, Macon WR, Dogan A, Feldman AL. Clinicopathologic features of B-Cell lineage neoplasms with aberrant expression of CD3: a study of 21 cases. *Am J Surg Pathol*. 2012;36(9):1364-70.
83. Wang J, Chen C, Lau S, Raghavan RI, Rowsell EH, Said J, et al. CD3-positive large B-cell lymphoma. *Am J Surg Pathol*. 2009;33(4):505-12.
84. Lazzi S, Bellan C, Onnis A, De Falco G, Sayed S, Kostopoulos I, et al. Rare lymphoid neoplasms coexpressing B- and T-cell antigens. The role of PAX-5 gene methylation in their pathogenesis. *Hum Pathol*. 2009;40(9):1252-61.
85. Campana D, Thompson JS, Amlot P, Brown S, Janossy G. The cytoplasmic expression of CD3 antigens in normal and malignant cells of the T lymphoid lineage. *J Immunol*. 1987;138(2):648-55.
86. Chetty R, Gatter K. CD3: structure, function, and role of immunostaining in clinical practice. *J Pathol*. 1994;173(4):303-7.
87. Rathore AS, Kumar S, Konwar R, Makker A, Negi MP, Goel MM. CD3+, CD4+ & CD8+ tumour infiltrating lymphocytes (TILs) are predictors of favourable survival outcome in infiltrating ductal carcinoma of breast. *Indian J Med Res*. 2014;140(3):361-9.
88. Tomsova M, Melichar B, Sedlakova I, Steiner I. Prognostic significance of CD3+ tumor-infiltrating lymphocytes in ovarian carcinoma. *Gynecol Oncol*. 2008;108(2):415-20.
89. Cermakova P, Melichar B, Tomsova M, Zoul Z, Kalabova H, Spacek J, et al. Prognostic significance of CD3+ tumor-infiltrating lymphocytes in patients with endometrial carcinoma. *Anticancer Res*. 2014;34(10):5555-61.
90. He M, Zuo C, Wang J, Liu J, Jiao B, Zheng J, et al. Prognostic significance of the aggregative perivascular growth pattern of tumor cells in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma. *Neuro Oncol*. 2013;15(6):727-34.
91. Kumari N, Krishnani N, Rawat A, Agarwal V, Lal P. Primary central nervous system lymphoma: prognostication as per international extranodal lymphoma study group score and reactive CD3 collar. *J Postgrad Med*. 2009;55(4):247-51.
92. Ferreri AJM. Therapy of primary CNS lymphoma: role of intensity, radiation, and novel agents. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017;2017(1):565-77.

93. Langner-Lemerrier S, Houillier C, Soussain C, Ghesquieres H, Chinot O, Taillandier L, et al. Primary CNS lymphoma at first relapse/progression: characteristics, management, and outcome of 256 patients from the French LOC network. *Neuro Oncol*. 2016;18(9):1297-303.
94. Correa DD, Maron L, Harder H, Klein M, Armstrong CL, Calabrese P, et al. Cognitive functions in primary central nervous system lymphoma: literature review and assessment guidelines. *Ann Oncol*. 2007;18(7):1145-51.
95. Nelson DF, Martz KL, Bonner H, Nelson JS, Newall J, Kerman HD, et al. Non-Hodgkin's lymphoma of the brain: can high dose, large volume radiation therapy improve survival? Report on a prospective trial by the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG): RTOG 8315. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 1992;23(1):9-17.
96. Alvarez-Pinzon AM, Wolf AL, Swedberg H, Coy SR, Valerio JE. Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL): Analysis of Treatment by Gamma Knife Radiosurgery and Chemotherapy in a Prospective, Observational Study. *Cureus*. 2016;8(7):e697.
97. Morris PG, Correa DD, Yahalom J, Raizer JJ, Schiff D, Grant B, et al. Rituximab, methotrexate, procarbazine, and vincristine followed by consolidation reduced-dose whole-brain radiotherapy and cytarabine in newly diagnosed primary CNS lymphoma: final results and long-term outcome. *J Clin Oncol*. 2013;31(31):3971-9.
98. Doolittle ND, Korfel A, Lubow MA, Schorb E, Schlegel U, Rogowski S, et al. Long-term cognitive function, neuroimaging, and quality of life in primary CNS lymphoma. *Neurology*. 2013;81(1):84-92.
99. Lai R, Abrey LE, Rosenblum MK, DeAngelis LM. Treatment-induced leukoencephalopathy in primary CNS lymphoma: a clinical and autopsy study. *Neurology*. 2004;62(3):451-6.
100. Correa DD, DeAngelis LM, Shi W, Thaler HT, Lin M, Abrey LE. Cognitive functions in low-grade gliomas: disease and treatment effects. *J Neurooncol*. 2007;81(2):175-84.
101. Ferreri AJ. How I treat primary CNS lymphoma. *Blood*. 2011;118(3):510-22.
102. Batchelor T, Carson K, O'Neill A, Grossman SA, Alavi J, New P, et al. Treatment of primary CNS lymphoma with methotrexate and deferred radiotherapy: a report of NABTT 96-07. *J Clin Oncol*. 2003;21(6):1044-9.
103. Zhu JJ, Gerstner ER, Engler DA, Mrugala MM, Nugent W, Nierenberg K, et al. High-dose methotrexate for elderly patients with primary CNS lymphoma. *Neuro Oncol*. 2009;11(2):211-5.
104. Ferreri AJ, Reni M, Foppoli M, Martelli M, Pangalis GA, Frezzato M, et al. High-dose cytarabine plus high-dose methotrexate versus high-dose methotrexate alone in patients with primary CNS lymphoma: a randomised phase 2 trial. *Lancet*. 2009;374(9700):1512-20.
105. Batchelor TT, Grossman SA, Mikkelsen T, Ye X, Desideri S, Lesser GJ. Rituximab monotherapy for patients with recurrent primary CNS lymphoma. *Neurology*. 2011;76(10):929-30.

106. Song Y, Wen Y, Xue W, Zhang Y, Zhang M. Effect of rituximab on primary central nervous system lymphoma: a meta-analysis. *Int J Hematol*. 2017;106(5):612-21.
107. Omuro A, Correa DD, DeAngelis LM, Moskowitz CH, Matasar MJ, Kaley TJ, et al. R-MPV followed by high-dose chemotherapy with TBC and autologous stem-cell transplant for newly diagnosed primary CNS lymphoma. *Blood*. 2015;125(9):1403-10.
108. Glass J, Won M, Schultz CJ, Brat D, Bartlett NL, Suh JH, et al. Phase I and II Study of Induction Chemotherapy With Methotrexate, Rituximab, and Temozolomide, Followed By Whole-Brain Radiotherapy and Postirradiation Temozolomide for Primary CNS Lymphoma: NRG Oncology RTOG 0227. *J Clin Oncol*. 2016;34(14):1620-5.
109. Omuro A, Chinot O, Taillandier L, Ghesquieres H, Soussain C, Delwail V, et al. Methotrexate and temozolomide versus methotrexate, procarbazine, vincristine, and cytarabine for primary CNS lymphoma in an elderly population: an intergroup ANOCEF-GOELAMS randomised phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2015;2(6):e251-9.
110. Rubenstein JL, Li J, Chen L, Advani R, Drappatz J, Gerstner E, et al. Multicenter phase 1 trial of intraventricular immunochemotherapy in recurrent CNS lymphoma. *Blood*. 2013;121(5):745-51.
111. Khan RB, Shi W, Thaler HT, DeAngelis LM, Abrey LE. Is intrathecal methotrexate necessary in the treatment of primary CNS lymphoma? *J Neurooncol*. 2002;58(2):175-8.
112. Rubenstein JL, Fridlyand J, Abrey L, Shen A, Karch J, Wang E, et al. Phase I study of intraventricular administration of rituximab in patients with recurrent CNS and intraocular lymphoma. *J Clin Oncol*. 2007;25(11):1350-6.
113. Sierra Del Rio M, Ricard D, Houillier C, Navarro S, Gonzalez-Aguilar A, Idbaih A, et al. Prophylactic intrathecal chemotherapy in primary CNS lymphoma. *J Neurooncol*. 2012;106(1):143-6.
114. Ferreri AJ, Sassone M, Zaja F, Re A, Spina M, Rocco AD, et al. Lenalidomide maintenance in patients with relapsed diffuse large B-cell lymphoma who are not eligible for autologous stem cell transplantation: an open label, single-arm, multicentre phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2017;4(3):e137-e46.
115. Houillier C, Taillandier L, Lamy T, Chinot O, Molucon-Chabrot C, Soubeyran P, et al. Whole Brain Radiotherapy (WBRT) Versus Intensive Chemotherapy with Haematopoietic Stem Cell Rescue (IC + HCR) for Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL) in Young Patients: An Intergroup Anocef-Goelams Randomized Phase II Trial (PRECIS). *Blood*. 2016;128(22):782.
116. Ferreri AJ, Illerhaus G. The role of autologous stem cell transplantation in primary central nervous system lymphoma. *Blood*. 2016;127(13):1642-9.
117. Kasenda B, Ihorst G, Schroers R, Korfel A, Schmidt-Wolf I, Egerer G, et al. High-dose chemotherapy with autologous haematopoietic stem cell support for relapsed or refractory primary CNS lymphoma: a prospective

- multicentre trial by the German Cooperative PCNSL study group. *Leukemia*. 2017;31(12):2623-9.
118. Illerhaus G, Kasenda B, Ihorst G, Egerer G, Lamprecht M, Keller U, et al. High-dose chemotherapy with autologous haemopoietic stem cell transplantation for newly diagnosed primary CNS lymphoma: a prospective, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2016;3(8):e388-97.
  119. Plotkin SR, Betensky RA, Hochberg FH, Grossman SA, Lesser GJ, Nabors LB, et al. Treatment of relapsed central nervous system lymphoma with high-dose methotrexate. *Clin Cancer Res*. 2004;10(17):5643-6.
  120. Soussain C, Hoang-Xuan K, Taillandier L, Fourme E, Choquet S, Witz F, et al. Intensive chemotherapy followed by hematopoietic stem-cell rescue for refractory and recurrent primary CNS and intraocular lymphoma: Societe Francaise de Greffe de Moelle Osseuse-Therapie Cellulaire. *J Clin Oncol*. 2008;26(15):2512-8.
  121. Nguyen PL, Chakravarti A, Finkelstein DM, Hochberg FH, Batchelor TT, Loeffler JS. Results of whole-brain radiation as salvage of methotrexate failure for immunocompetent patients with primary CNS lymphoma. *J Clin Oncol*. 2005;23(7):1507-13.
  122. Sagiv-Barfi I, Kohrt HE, Czerwinski DK, Ng PP, Chang BY, Levy R. Therapeutic antitumor immunity by checkpoint blockade is enhanced by ibrutinib, an inhibitor of both BTK and ITK. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2015;112(9):E966-72.
  123. Grommes C, Pastore A, Palaskas N, Tang SS, Campos C, Scharzt D, et al. Ibrutinib Unmasks Critical Role of Bruton Tyrosine Kinase in Primary CNS Lymphoma. *Cancer Discov*. 2017;7(9):1018-29.
  124. Grommes C, Younes A. Ibrutinib in PCNSL: The Curious Cases of Clinical Responses and Aspergillosis. *Cancer Cell*. 2017;31(6):731-3.
  125. Lionakis MS, Dunleavy K, Roschewski M, Widemann BC, Butman JA, Schmitz R, et al. Inhibition of B Cell Receptor Signaling by Ibrutinib in Primary CNS Lymphoma. *Cancer Cell*. 2017;31(6):833-43 e5.
  126. Hendriks RW, Yuvaraj S, Kil LP. Targeting Bruton's tyrosine kinase in B cell malignancies. *Nat Rev Cancer*. 2014;14(4):219-32.
  127. Korfel A, Schlegel U, Herrlinger U, Dreyling M, Schmidt C, von Baumgarten L, et al. Phase II Trial of Temsirolimus for Relapsed/Refractory Primary CNS Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2016;34(15):1757-63.
  128. Lopez-Girona A, Mendy D, Ito T, Miller K, Gandhi AK, Kang J, et al. Cereblon is a direct protein target for immunomodulatory and antiproliferative activities of lenalidomide and pomalidomide. *Leukemia*. 2012;26(11):2326-35.
  129. Kronke J, Udeshi ND, Narla A, Grauman P, Hurst SN, McConkey M, et al. Lenalidomide causes selective degradation of IKZF1 and IKZF3 in multiple myeloma cells. *Science*. 2014;343(6168):301-5.
  130. Rubenstein JL, Fraser E, Formaker P, Lee JC-C, Chen N, Kock M, et al. Phase I investigation of lenalidomide plus rituximab and outcomes of lenalidomide

- maintenance in recurrent CNS lymphoma. In: American Society of Clinical O, editor. ASCO 2016; Chicago, IL2016.
131. Braggio E, Van Wier S, Ojha J, McPhail E, Asmann YW, Egan J, et al. Genome-Wide Analysis Uncovers Novel Recurrent Alterations in Primary Central Nervous System Lymphomas. *Clin Cancer Res*. 2015;21(17):3986-94.
  132. Rubenstein JL, Fridlyand J, Shen A, Aldape K, Ginzinger D, Batchelor T, et al. Gene expression and angiotropism in primary CNS lymphoma. *Blood*. 2006;107(9):3716-23.
  133. Barakat M, Albitar M, Whitney RL, Chen C, Kuo Y-H, Silveira W, et al. Diversity of genetic alterations of primary central nervous system lymphoma in Hispanic versus non-Hispanic population. *J Clin Oncol*. 2019;37(15_suppl):7535-.
  134. Knittel G, Liedgens P, Korovkina D, Seeger JM, Al-Baldawi Y, Al-Maarri M, et al. B-cell-specific conditional expression of Myd88p.L252P leads to the development of diffuse large B-cell lymphoma in mice. *Blood*. 2016;127(22):2732-41.
  135. Bonzheim I, Giese S, Deuter C, Susskind D, Zierhut M, Waizel M, et al. High frequency of MYD88 mutations in vitreoretinal B-cell lymphoma: a valuable tool to improve diagnostic yield of vitreous aspirates. *Blood*. 2015;126(1):76-9.
  136. Kersten MJ, Kraan W, Doorduijn J, Bromberg J, Lam K, Kluin PM, et al. Diffuse large B cell lymphomas relapsing in the CNS lack oncogenic MYD88 and CD79B mutations. *Blood Cancer J*. 2014;4:e266.
  137. Montesinos-Rongen M, Schmitz R, Brunn A, Gesk S, Richter J, Hong K, et al. Mutations of CARD11 but not TNFAIP3 may activate the NF-kappaB pathway in primary CNS lymphoma. *Acta Neuropathol*. 2010;120(4):529-35.
  138. Schwindt H, Vater I, Kreuz M, Montesinos-Rongen M, Brunn A, Richter J, et al. Chromosomal imbalances and partial uniparental disomies in primary central nervous system lymphoma. *Leukemia*. 2009;23(10):1875-84.
  139. Grommes C, DeAngelis LM. Primary CNS Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2017;35(21):2410-8.
  140. (NCBI) BcDdNCfBI. MYC MYC proto-oncogene, bHLH transcription factor. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4609>.
  141. Knoepfler PS. Myc goes global: new tricks for an old oncogene. *Cancer Res*. 2007;67(11):5061-3.
  142. Pfreundschuh M. Growing importance of MYC/BCL2 immunohistochemistry in diffuse large B-cell lymphomas. *J Clin Oncol*. 2012;30(28):3433-5.
  143. Brunn A, Nagel I, Montesinos-Rongen M, Klapper W, Vater I, Paulus W, et al. Frequent triple-hit expression of MYC, BCL2, and BCL6 in primary lymphoma of the central nervous system and absence of a favorable MYC(low)BCL2 (low) subgroup may underlie the inferior prognosis as

- compared to systemic diffuse large B cell lymphomas. *Acta Neuropathol.* 2013;126(4):603-5.
144. Gill KZ, Iwamoto F, Allen A, Hoehn D, Murty VV, Alobeid B, et al. MYC protein expression in primary diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system. *PLoS One.* 2014;9(12):e114398.
  145. Vater I, Montesinos-Rongen M, Schlesner M, Haake A, Purschke F, Sprute R, et al. The mutational pattern of primary lymphoma of the central nervous system determined by whole-exome sequencing. *Leukemia.* 2015;29(3):677-85.
  146. Gonzalez-Aguilar A, Idbaih A, Boisselier B, Habbita N, Rossetto M, Laurence A, et al. Recurrent mutations of MYD88 and TBL1XR1 in primary central nervous system lymphomas. *Clin Cancer Res.* 2012;18(19):5203-11.
  147. Bruno A, Boisselier B, Labreche K, Marie Y, Polivka M, Jouvet A, et al. Mutational analysis of primary central nervous system lymphoma. *Oncotarget.* 2014;5(13):5065-75.
  148. National Institute of Health. 2019 [cited 2019 06/24/2019]; Available from: <https://ghr.nlm.nih.gov/gene/MYC#normalfunction>
  149. Bhatia K, Huppi K, Spangler G, Siwarski D, Iyer R, Magrath I. Point mutations in the c-Myc transactivation domain are common in Burkitt's lymphoma and mouse plasmacytomas. *Nat Genet.* 1993;5(1):56-61.
  150. Nguyen L, Papenhausen P, Shao H. The Role of c-MYC in B-Cell Lymphomas: Diagnostic and Molecular Aspects. *Genes (Basel).* 2017;8(4).
  151. Fischer L, Hummel M, Korfel A, Lenze D, Joehrens K, Thiel E. Differential micro-RNA expression in primary CNS and nodal diffuse large B-cell lymphomas. *Neuro Oncol.* 2011;13(10):1090-8.
  152. (NCBI) BcDdNCfBI. BCL2 BCL2, apoptosis regulator [Homo sapiens (human)]. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/596>.
  153. Hill ME, MacLennan KA, Cunningham DC, Vaughan Hudson B, Burke M, Clarke P, et al. Prognostic significance of BCL-2 expression and bcl-2 major breakpoint region rearrangement in diffuse large cell non-Hodgkin's lymphoma: a British National Lymphoma Investigation Study. *Blood.* 1996;88(3):1046-51.
  154. Gascoyne RD, Adomat SA, Krajewski S, Krajewska M, Horsman DE, Tolcher AW, et al. Prognostic significance of Bcl-2 protein expression and Bcl-2 gene rearrangement in diffuse aggressive non-Hodgkin's lymphoma. *Blood.* 1997;90(1):244-51.
  155. Alizadeh AA, Staudt LM. Genomic-scale gene expression profiling of normal and malignant immune cells. *Curr Opin Immunol.* 2000;12(2):219-25.
  156. Yang Y, Shaffer AL, 3rd, Emre NC, Ceribelli M, Zhang M, Wright G, et al. Exploiting synthetic lethality for the therapy of ABC diffuse large B cell lymphoma. *Cancer Cell.* 2012;21(6):723-37.

157. Wang JQ, Jeelall YS, Beutler B, Horikawa K, Goodnow CC. Consequences of the recurrent MYD88(L265P) somatic mutation for B cell tolerance. *J Exp Med*. 2014;211(3):413-26.
158. Colomo L, Lopez-Guillermo A, Perales M, Rives S, Martinez A, Bosch F, et al. Clinical impact of the differentiation profile assessed by immunophenotyping in patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Blood*. 2003;101(1):78-84.
159. Mounier N, Briere J, Gisselbrecht C, Reyes F, Gaulard P, Coiffier B, et al. Estimating the impact of rituximab on bcl-2-associated resistance to CHOP in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Haematologica*. 2006;91(5):715-6.
160. Fu K, Weisenburger DD, Choi WW, Perry KD, Smith LM, Shi X, et al. Addition of rituximab to standard chemotherapy improves the survival of both the germinal center B-cell-like and non-germinal center B-cell-like subtypes of diffuse large B-cell lymphoma. *J Clin Oncol*. 2008;26(28):4587-94.
161. Wilson WH, Dunleavy K, Pittaluga S, Hegde U, Grant N, Steinberg SM, et al. Phase II study of dose-adjusted EPOCH and rituximab in untreated diffuse large B-cell lymphoma with analysis of germinal center and post-germinal center biomarkers. *J Clin Oncol*. 2008;26(16):2717-24.
162. Amoroso A, Hafsi S, Militello L, Russo AE, Soua Z, Mazzarino MC, et al. Understanding rituximab function and resistance: implications for tailored therapy. *Front Biosci (Landmark Ed)*. 2011;16:770-82.
163. (NCBI) BcDdNCfBI. LMO2 LIM domain only 2 [Homo sapiens (human)]. [02/10/2017]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4005>.
164. Natkunam Y, Zhao S, Mason DY, Chen J, Taidi B, Jones M, et al. The oncoprotein LMO2 is expressed in normal germinal-center B cells and in human B-cell lymphomas. *Blood*. 2007;109(4):1636-42.
165. Nam CH, Rabbitts TH. The role of LMO2 in development and in T cell leukemia after chromosomal translocation or retroviral insertion. *Mol Ther*. 2006;13(1):15-25.
166. Younes SF, Beck AH, Lossos IS, Levy R, Warnke RA, Natkunam Y. Immunoarchitectural patterns in follicular lymphoma: efficacy of HGAL and LMO2 in the detection of the interfollicular and diffuse components. *Am J Surg Pathol*. 2010;34(9):1266-76.
167. Jiang CY, Yu JJ, Ruan Y, Wang XH, Zhao W, Wang XJ, et al. LIM domain only 2 over-expression in prostate stromal cells facilitates prostate cancer progression through paracrine of Interleukin-11. *Oncotarget*. 2016;7(18):26247-58.
168. Colomo L, Vazquez I, Papaleo N, Espinet B, Ferrer A, Franco C, et al. LMO2-negative Expression Predicts the Presence of MYC Translocations in Aggressive B-Cell Lymphomas. *Am J Surg Pathol*. 2017;41(7):877-86.
169. Alizadeh AA, Gentles AJ, Alencar AJ, Liu CL, Kohrt HE, Houot R, et al. Prediction of survival in diffuse large B-cell lymphoma based on the expression of 2 genes reflecting tumor and microenvironment. *Blood*. 2011;118(5):1350-8.

170. Lossos C, Bayraktar S, Weinzierl E, Younes SF, Hosein PJ, Tibshirani RJ, et al. LMO2 and BCL6 are associated with improved survival in primary central nervous system lymphoma. *Br J Haematol*. 2014;165(5):640-8.
171. (NCBI) BcDdNCfBI. MGMT O-6-methylguanine-DNA methyltransferase [Homo sapiens (human)]. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4255>.
172. Brady CA, Jiang D, Mello SS, Johnson TM, Jarvis LA, Kozak MM, et al. Distinct p53 transcriptional programs dictate acute DNA-damage responses and tumor suppression. *Cell*. 2011;145(4):571-83.
173. Isono S, Fujishima M, Azumi T, Hashimoto Y, Komoike Y, Yukawa M, et al. O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase as a prognostic and predictive marker for basal-like breast cancer treated with cyclophosphamide-based chemotherapy. *Oncol Lett*. 2014;7(6):1778-84.
174. Brell M, Ibanez J, Tortosa A. O6-Methylguanine-DNA methyltransferase protein expression by immunohistochemistry in brain and non-brain systemic tumours: systematic review and meta-analysis of correlation with methylation-specific polymerase chain reaction. *BMC Cancer*. 2011;11:35.
175. Preusser M. MGMT analysis at DNA, RNA and protein levels in glioblastoma tissue. *Histol Histopathol*. 2009;24(4):511-8.
176. Ohno T, Hiraga J, Ohashi H, Sugisaki C, Li E, Asano H, et al. Loss of O6-methylguanine-DNA methyltransferase protein expression is a favorable prognostic marker in diffuse large B-cell lymphoma. *Int J Hematol*. 2006;83(4):341-7.
177. Sturm RA, Cassady JL, Das G, Romo A, Evans GA. Chromosomal structure and expression of the human OTF1 locus encoding the Oct-1 protein. *Genomics*. 1993;16(2):333-41.
178. (NCBI) BcDdNCfBI. POU2F1 POU class 2 homeobox 1. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5451>.
179. Vazquez-Arreguin K, Maddox J, Kang J, Park D, Cano RR, Factor RE, et al. BRCA1 through Its E3 Ligase Activity Regulates the Transcription Factor Oct1 and Carbohydrate Metabolism. *Mol Cancer Res*. 2018;16(3):439-52.
180. Shakya A, Cooksey R, Cox JE, Wang V, McClain DA, Tantin D. Oct1 loss of function induces a coordinate metabolic shift that opposes tumorigenicity. *Nat Cell Biol*. 2009;11(3):320-7.
181. (NCBI) BcDdNCfBI. PDCD1 programmed cell death 1. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5133>.
182. Smeltzer JP, Jones JM, Ziesmer SC, Grote DM, Xiu B, Ristow KM, et al. Pattern of CD14+ follicular dendritic cells and PD1+ T cells independently predicts time to transformation in follicular lymphoma. *Clin Cancer Res*. 2014;20(11):2862-72.
183. Waki K, Yamada T, Yoshiyama K, Terazaki Y, Sakamoto S, Matsueda S, et al. PD-1 expression on peripheral blood T-cell subsets correlates with prognosis in non-small cell lung cancer. *Cancer Sci*. 2014;105(10):1229-35.

184. Muenst S, Hoeller S, Willi N, Dirnhofera S, Tzankov A. Diagnostic and prognostic utility of PD-1 in B cell lymphomas. *Dis Markers*. 2010;29(1):47-53.
185. Pauken KE, Wherry EJ. Overcoming T cell exhaustion in infection and cancer. *Trends Immunol*. 2015;36(4):265-76.
186. Taube JM, Klein A, Brahmer JR, Xu H, Pan X, Kim JH, et al. Association of PD-1, PD-1 ligands, and other features of the tumor immune microenvironment with response to anti-PD-1 therapy. *Clin Cancer Res*. 2014;20(19):5064-74.
187. Bertucci F, Finetti P, Colpaert C, Mamessier E, Parizel M, Dirix L, et al. PDL1 expression in inflammatory breast cancer is frequent and predicts for the pathological response to chemotherapy. *Oncotarget*. 2015;6(15):13506-19.
188. Topalian SL, Hodi FS, Brahmer JR, Gettinger SN, Smith DC, McDermott DF, et al. Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. *N Engl J Med*. 2012;366(26):2443-54.
189. Robert C, Ribas A, Wolchok JD, Hodi FS, Hamid O, Kefford R, et al. Anti-programmed-death-receptor-1 treatment with pembrolizumab in ipilimumab-refractory advanced melanoma: a randomised dose-comparison cohort of a phase 1 trial. *Lancet*. 2014;384(9948):1109-17.
190. Robert C, Long GV, Brady B, Dutriaux C, Maio M, Mortier L, et al. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. *N Engl J Med*. 2015;372(4):320-30.
191. (NCBI) bdddNCfBI. BCL6 B cell CLL/lymphoma 6 [Homo sapiens (human)]. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/604>.
192. Barakat M, Albitar M, Xu-Monette Z, Young KH, Abdulhaq H. Molecular profiling of primary central nervous system lymphoma as compared to activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma. *J Clin Oncol*. 2019;37(15 suppl):7549-.
193. Cattoretti G, Chang CC, Cechova K, Zhang J, Ye BH, Falini B, et al. BCL-6 protein is expressed in germinal-center B cells. *Blood*. 1995;86(1):45-53.
194. Klein U, Dalla-Favera R. Germinal centres: role in B-cell physiology and malignancy. *Nat Rev Immunol*. 2008;8(1):22-33.
195. Park HY, Go H, Song HR, Kim S, Ha GH, Jeon YK, et al. Pellino 1 promotes lymphomagenesis by deregulating BCL6 polyubiquitination. *J Clin Invest*. 2014;124(11):4976-88.
196. Lossos IS, Jones CD, Warnke R, Natkunam Y, Kaizer H, Zehnder JL, et al. Expression of a single gene, BCL-6, strongly predicts survival in patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Blood*. 2001;98(4):945-51.
197. Winter JN, Weller EA, Horning SJ, Krajewska M, Variakojis D, Habermann TM, et al. Prognostic significance of Bcl-6 protein expression in DLBCL treated with CHOP or R-CHOP: a prospective correlative study. *Blood*. 2006;107(11):4207-13.

198. Bellesso M, Bizzetto R, Pereira J, Beitler B, Pracchia LF, Chamone DAS. Linfoma primário do sistema nervoso central. *Rev Bras Hematol Hemoter.* 2008;30(1):6.
199. Kehdy FS, Gouveia MH, Machado M, Magalhaes WC, Horimoto AR, Horta BL, et al. Origin and dynamics of admixture in Brazilians and its effect on the pattern of deleterious mutations. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2015;112(28):8696-701.
200. Bellomo R, Warrillow SJ, Reade MC. Why we should be wary of single-center trials. *Crit Care Med.* 2009;37(12):3114-9.
201. Mariani AW, Pego-Fernandes PM. Observational studies: why are they so important? *Sao Paulo Medical Journal.* 2014;132:01-2.
202. Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB, Glatstein E, Canellos GP, Young RC, et al. Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting. *J Clin Oncol.* 1989;7(11):1630-6.
203. Abrey LE, Yahalom J, DeAngelis LM. Treatment for primary CNS lymphoma: the next step. *J Clin Oncol.* 2000;18(17):3144-50.
204. Bustin SA, Benes V, Garson JA, Hellemans J, Huggett J, Kubista M, et al. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. *Clin Chem.* 2009;55(4):611-22.
205. Mitas M, Mikhitarian K, Walters C, Baron PL, Elliott BM, Brothers TE, et al. Quantitative real-time RT-PCR detection of breast cancer micrometastasis using a multigene marker panel. *Int J Cancer.* 2001;93(2):162-71.
206. Hulley SB, Cummings SR, Newman TB. Delineando a pesquisa clínica. Uma abordagem epidemiológica. Artmed, editor: Artmed; 2008.
207. Fischer RA. On the interpretation of χ^2 from contingency tables, and the calculation of P. *Journal of the Royal Statistical Society.* 1922;85(1):8.
208. Fischer RA. *Statistical Methods for Research Workers.*: Oliver and Boyd; 1954.
209. Kaplan EM, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of American Statistical Association.* 1958;53:467-81.
210. Schoenfeld D. The asymptotic properties of nonparametric tests for comparing survival distributions. *Biometrika.* 1981;68(1):316-9.
211. Cox DR. Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological).* 1972;34(2):187-220.
212. Ulm K. Primary endpoints in cancer trials. *J Thorac Dis.* 2011;3(2):82-3.
213. National Cancer Institute at the National Institutes of Health. NCI Dictionary of Cancer Terms. 2019 [cited 2019]; Available from: <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms>.
214. DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics.* 1988;44(3):837-45.
215. Park SH, Goo JM, Jo CH. Receiver operating characteristic (ROC) curve: practical review for radiologists. *Korean J Radiol.* 2004;5(1):11-8.
216. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. *Cancer.* 1950;3(1):32-5.

217. Chen F, Xue Y, Tan MT, Chen P. Efficient statistical tests to compare Youden index: accounting for contingency correlation. *Stat Med*. 2015;34(9):1560-76.
218. Cohen J. A coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educ Psychol Meas*. 1960;20(1):37-46.
219. Hu S, Xu-Monette ZY, Tzankov A, Green T, Wu L, Balasubramanyam A, et al. MYC/BCL2 protein coexpression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The International DLBCL Rituximab-CHOP Consortium Program. *Blood*. 2013;121(20):4021-31; quiz 250.
220. Mounier N, Briere J, Gisselbrecht C, Emile JF, Lederlin P, Sebban C, et al. Rituximab plus CHOP (R-CHOP) overcomes bcl-2--associated resistance to chemotherapy in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). *Blood*. 2003;101(11):4279-84.
221. Uccella S, Cerutti R, Placidi C, Marchet S, Carnevali I, Bernasconi B, et al. MGMT methylation in diffuse large B-cell lymphoma: validation of quantitative methylation-specific PCR and comparison with MGMT protein expression. *J Clin Pathol*. 2009;62(8):715-23.
222. Geier A, Macias RI, Bettinger D, Weiss J, Bantel H, Jahn D, et al. The lack of the organic cation transporter OCT1 at the plasma membrane of tumor cells precludes a positive response to sorafenib in patients with hepatocellular carcinoma. *Oncotarget*. 2017;8(9):15846-57.
223. Cogbill CH, Swerdlow SH, Gibson SE. Utility of CD279/PD-1 immunohistochemistry in the evaluation of benign and neoplastic T-cell-rich bone marrow infiltrates. *Am J Clin Pathol*. 2014;142(1):88-98.
224. Mrugala MM, Rubenstein JL, Ponzoni M, Batchelor TT. Insights into the biology of primary central nervous system lymphoma. *Curr Oncol Rep*. 2009;11(1):73-80.
225. Rubenstein JL, Gupta NK, Mannis GN, Lamarre AK, Treseler P. How I treat CNS lymphomas. *Blood*. 2013;122(14):2318-30.
226. Hackshaw A. Small studies: strengths and limitations. *Eur Respir J*. 2008;32(5):1141-3.
227. Altman DG, Bland JM. Absence of evidence is not evidence of absence. *BMJ*. 1995;311(7003):485.
228. Ostrom QT, Gittleman H, Liao P, Vecchione-Koval T, Wolinsky Y, Kruchko C, et al. CBTRUS Statistical Report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2010-2014. *Neuro Oncol*. 2017;19(suppl_5):v1-v88.
229. Siegal T, Bairey O. Primary CNS Lymphoma in the Elderly: The Challenge. *Acta Haematol*. 2019;141(3):138-45.
230. Ferreri AJ, Blay JY, Reni M, Pasini F, Spina M, Ambrosetti A, et al. Prognostic scoring system for primary CNS lymphomas: the International Extranodal Lymphoma Study Group experience. *J Clin Oncol*. 2003;21(2):266-72.

231. Corry J, Smith JG, Wirth A, Quong G, Liew KH. Primary central nervous system lymphoma: age and performance status are more important than treatment modality. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 1998;41(3):615-20.
232. Schultz C, Scott C, Sherman W, Donahue B, Fields J, Murray K, et al. Preirradiation chemotherapy with cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and dexamethasone for primary CNS lymphomas: initial report of radiation therapy oncology group protocol 88-06. *J Clin Oncol.* 1996;14(2):556-64.
233. Bessell EM, Lopez-Guillermo A, Villa S, Verger E, Nomdedeu B, Petit J, et al. Importance of radiotherapy in the outcome of patients with primary CNS lymphoma: an analysis of the CHOD/BVAM regimen followed by two different radiotherapy treatments. *J Clin Oncol.* 2002;20(1):231-6.
234. Zhao H, Ma M, Zhang L, Zheng G, Lv H, Liu J, et al. Diagnosis of central nervous system lymphoma via cerebrospinal fluid cytology: a case report. *BMC Neurol.* 2019;19(1):90.
235. Chiavazza C, Pellerino A, Ferrio F, Cistaro A, Soffietti R, Ruda R. Primary CNS Lymphomas: Challenges in Diagnosis and Monitoring. *Biomed Res Int.* 2018;2018:3606970.
236. Ferreri AJ, Reni M, Villa E. Primary central nervous system lymphoma in immunocompetent patients. *Cancer Treat Rev.* 1995;21(5):415-46.
237. Xavier FD, Levy D, Pereira J. Time-to-treatment of diffuse large B-cell lymphoma in Sao Paulo. *Clinics (Sao Paulo).* 2014;69(5):367-71.
238. Ferreri AJ. Primary central nervous system lymphoma: three linked questions in the situation puzzle of radiotherapy. *Leuk Lymphoma.* 2015;56(5):1185-7.
239. Juergens A, Pels H, Rogowski S, Fliessbach K, Glasmacher A, Engert A, et al. Long-term survival with favorable cognitive outcome after chemotherapy in primary central nervous system lymphoma. *Ann Neurol.* 2010;67(2):182-9.
240. Song J. Age as an independent predictive factor in survival outcomes of multimodality treatments for primary central nervous system lymphoma: A review from tertiary institution. In: EHA, editor. *European Hematology Association*; 05/16/2019; Amsterdam2019.
241. Bellinzona M, Roser F, Ostertag H, Gaab RM, Saini M. Surgical removal of primary central nervous system lymphomas (PCNSL) presenting as space occupying lesions: a series of 33 cases. *Eur J Surg Oncol.* 2005;31(1):100-5.
242. Bessell EM, Graus F, Lopez-Guillermo A, Lewis SA, Villa S, Verger E, et al. Primary non-Hodgkin's lymphoma of the CNS treated with CHOD/BVAM or BVAM chemotherapy before radiotherapy: long-term survival and prognostic factors. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2004;59(2):501-8.
243. DeAngelis LM, Seiferheld W, Schold SC, Fisher B, Schultz CJ, Radiation Therapy Oncology Group S. Combination chemotherapy and radiotherapy for primary central nervous system lymphoma: Radiation Therapy Oncology Group Study 93-10. *J Clin Oncol.* 2002;20(24):4643-8.

244. Kubista M, Andrade JM, Bengtsson M, Forootan A, Jonak J, Lind K, et al. The real-time polymerase chain reaction. *Mol Aspects Med.* 2006;27(2-3):95-125.
245. von Smolinski D, Leverkus I, von Samson-Himmelstjerna G, Gruber AD. Impact of formalin-fixation and paraffin-embedding on the ratio between mRNA copy numbers of differently expressed genes. *Histochem Cell Biol.* 2005;124(2):177-88.
246. Abrahamsen HN, Steiniche T, Nexø E, Hamilton-Dutoit SJ, Sørensen BS. Towards quantitative mRNA analysis in paraffin-embedded tissues using real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction: a methodological study on lymph nodes from melanoma patients. *J Mol Diagn.* 2003;5(1):34-41.
247. Vandesompele J, De Preter K, Pattyn F, Poppe B, Van Roy N, De Paepe A, et al. Accurate normalization of real-time quantitative RT-PCR data by geometric averaging of multiple internal control genes. *Genome Biol.* 2002;3(7):RESEARCH0034.
248. McCall MN, McMurray HR, Land H, Almudevar A. On non-detects in qPCR data. *Bioinformatics.* 2014;30(16):2310-6.
249. Chang CC, Kampalath B, Schultz C, Bunyi-Teopengco E, Logan B, Esho C, et al. Expression of p53, c-Myc, or Bcl-6 suggests a poor prognosis in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma among immunocompetent individuals. *Arch Pathol Lab Med.* 2003;127(2):208-12.
250. Reed JC. Bcl-2 family proteins: regulators of chemoresistance in cancer. *Toxicol Lett.* 1995;82-83:155-8.
251. Visco C, Tzankov A, Xu-Monette ZY, Miranda RN, d'Amore ESG, Montes-Moreno S, et al. The t(14;18)(q32;q21) Characterizes a Subset of Patients with Diffuse Large-B Cell Lymphoma of Germinal Center Origin with Poor Outcome: Report From the International DLBCL Rituximab-CHOP Consortium Program Study. *Blood.* 2011;21.
252. Cai Q, Fang Y, Young KH. Primary Central Nervous System Lymphoma: Molecular Pathogenesis and Advances in Treatment. *Transl Oncol.* 2019;12(3):523-38.
253. Montesinos-Rongen M, Brunn A, Bentink S, Basso K, Lim WK, Klapper W, et al. Gene expression profiling suggests primary central nervous system lymphomas to be derived from a late germinal center B cell. *Leukemia.* 2008;22(2):400-5.
254. Niparuck P, Boonsakan P, Sutthippingkiat T, Pukiat S, Chantrathammachart P, Phusanti S, et al. Treatment outcome and prognostic factors in PCNSL. *Diagn Pathol.* 2019;14(1):56.
255. Hermine O, Haioun C, Lepage E, d'Agay MF, Briere J, Lavignac C, et al. Prognostic significance of bcl-2 protein expression in aggressive non-Hodgkin's lymphoma. Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte (GELA). *Blood.* 1996;87(1):265-72.
256. Vogel C, Marcotte EM. Insights into the regulation of protein abundance from proteomic and transcriptomic analyses. *Nat Rev Genet.* 2012;13(4):227-32.

257. Liu Y, Beyer A, Aebersold R. On the Dependency of Cellular Protein Levels on mRNA Abundance. *Cell*. 2016;165(3):535-50.
258. Nagaraj N, Wisniewski JR, Geiger T, Cox J, Kircher M, Kelso J, et al. Deep proteome and transcriptome mapping of a human cancer cell line. *Mol Syst Biol*. 2011;7:548.
259. Bujak M, Ratkaj I, Markova-Car E, Jurisic D, Horvatic A, Vucinic S, et al. Inflammatory Gene Expression Upon TGF-beta1-Induced p38 Activation in Primary Dupuytren's Disease Fibroblasts. *Front Mol Biosci*. 2015;2:68.
260. Maddox J, Shakya A, South S, Shelton D, Andersen JN, Chidester S, et al. Transcription factor Oct1 is a somatic and cancer stem cell determinant. *PLoS Genet*. 2012;8(11):e1003048.
261. Nakata K, Ohuchida K, Nagai E, Hayashi A, Miyasaka Y, Kayashima T, et al. LMO2 is a novel predictive marker for a better prognosis in pancreatic cancer. *Neoplasia*. 2009;11(7):712-9.
262. Aly RM, Taalab MM, Abdsalam EM, Elyamany OH, Hasan OE. High expression of LMO2 predicts a favorable outcome in adult patients with BCR/ABL negative B-cell acute lymphoblastic leukemia. *Oncol Lett*. 2016;11(3):1917-22.
263. Bertucci F, Finetti P, Mamessier E, Pantaleo MA, Astolfi A, Ostrowski J, et al. PDL1 expression is an independent prognostic factor in localized GIST. *Oncoimmunology*. 2015;4(5):e1002729.
264. Menter T, Bodmer-Haeckl A, Dirnhofer S, Tzankov A. Evaluation of the diagnostic and prognostic value of PDL1 expression in Hodgkin and B-cell lymphomas. *Hum Pathol*. 2016;54:17-24.
265. Berghoff AS, Ricken G, Widhalm G, Rajky O, Hainfellner JA, Birner P, et al. PD1 (CD279) and PD-L1 (CD274, B7H1) expression in primary central nervous system lymphomas (PCNSL). *Clin Neuropathol*. 2014;33(1):42-9.
266. Cho H, Kim SH, Kim SJ, Chang JH, Yang WI, Suh CO, et al. Programmed cell death 1 expression is associated with inferior survival in patients with primary central nervous system lymphoma. *Oncotarget*. 2017;8(50):87317-28.
267. Smith-Garvin JE, Koretzky GA, Jordan MS. T cell activation. *Annu Rev Immunol*. 2009;27:591-619.
268. Sung CO, Kim SC, Karnan S, Karube K, Shin HJ, Nam DH, et al. Genomic profiling combined with gene expression profiling in primary central nervous system lymphoma. *Blood*. 2011;117(4):1291-300.
269. Basso K, Dalla-Favera R. Roles of BCL6 in normal and transformed germinal center B cells. *Immunol Rev*. 2012;247(1):172-83.
270. Niu H. The proto-oncogene BCL-6 in normal and malignant B cell development. *Hematol Oncol*. 2002;20(4):155-66.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Reis, Diego Gomes Candido

Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LM02, MGMT, OCT1, PD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de sistema nervoso central / Diego Gomes Candido Reis. -- São Paulo, 2019.

Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Programa de Ciências Médicas. Área de Concentração: Distúrbios do Crescimento Celular, Hemodinâmicos e da Hemostasia.

Orientadora: Juliana Pereira.

Descritores: 1.Linfoma não Hodgkin 2.Neoplasias encefálicas 3.Expressão gênica 4.Biomarcadores 5.Estudos retrospectivos 6.Estudos de coortes 7.Imuno-histoquímica 8.Análise de sobrevida

USP/FM/DBD-113/19

Responsável: Erinalva da Conceição Batista, CRB-8 6755

Diego Gomes Candido Reis

**Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT,
POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário
de sistema nervoso central**

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção de título de
Doutor em Ciências

Programa de Ciências Médicas
Área de concentração: Distúrbios do
Crescimento Celular, Hemodinâmicos e
da Hemostasia
Orientadora: Profª. Drª Juliana Pereira

**São Paulo
2019**

Diego Gomes Candido Reis

Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT,
POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de
sistema nervoso central

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção de título de
Doutor em Ciências

Programa de Ciências Médicas
Área de concentração: Distúrbios do
Crescimento Celular, Hemodinâmicos e
da Hemostasia
Orientadora: Prof^a. Dr^a Juliana Pereira

São Paulo
2019

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

© reprodução autorizada pelo autor

Reis, Diego Gomes Candido

Análise do perfil de expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de sistema nervoso central / Diego Gomes Candido Reis. – São Paulo, 2019.

Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Programa de Ciências Médicas. Área de Concentração: Distúrbios do Crescimento Celular, Hemodinâmicos e da Hemostasia.

Orientadora: Juliana Pereira.

Descritores: 1.Linfoma não Hodgkin 2.Neoplasias encefálicas 3.Expressão gênica 4.Biomarcadores 5.Estudos retrospectivos 6.Estudos de coortes 7.Imuno-histoquímica 8.Análise de sobrevida

USP/FM/DBD-113/19

DEDICATÓRIA

Aos amores (vividos, passados, presentes e futuros)

Aos meus pacientes,

Às amizades,

Aos meus avós,

Aos meus pais, Sérgio Eduardo e Maura Gomes, pelo árduo trabalho de educar, ensinar, amar e compreender aquilo que fui, sou e serei.

A Sander Palte, *liefde van mijn leven*.

AGRADECIMENTOS

Sou imensamente grato por ter tido a professora Juliana Pereira como minha orientadora! O conhecimento que eu adquiri com ela vai muito além desta tese: seu profissionalismo, competência, ética, leveza e confiança foram fundamentais para conduzirmos este projeto em harmonia, de forma agradável e com grande troca de conhecimento. Uma pessoa forte, determinada e extremamente construtiva, ciente de sua função social como professora, educadora, médica e cidadã!

Nosso país, nossas universidades precisam de jovens cientistas críticos, contestadores e motivados! Dentre tantos que conheci, a Dra Débora Levy se destaca de maneira excepcional, tornando-se um exemplo para mim, reafirmando a importância de um trabalho em equipe, alinhado e íntegro. Sorte imensa tê-la tido como coorientadora, e sorte maior ainda tê-la agora como amiga!

Dr Hebert Culler foi fundamental neste projeto. Sua precisão em técnicas moleculares, seu olhar crítico e sua perspectiva do projeto muito me ajudaram. Muito obrigado, Hebert!

Graças ao LIM-31 (Laboratório de Genética e Hematologia Molecular), coordenado pelo Prof. Sérgio Bydlowski, este projeto pôde ser concluído. Ele não apenas me proporcionou as condições técnicas para realizarmos a pesquisa, mas também me motivou pelas conversas com os colegas, pela visão da importância da universidade e suas pesquisas em prol da ciência, da busca de respostas.

Se eu já amava hematologia, oncologia e pesquisa translacional, hoje posso afirmar minha paixão pela patologia, adquirida pelo contato com a Profa Maria Cláudia Zerbini. Um dos maiores exemplos de dedicação à vida acadêmica que eu já conheci, de uma gentileza ímpar e uma educação ímpar. Seus olhos, através das análises histopatológicas, iluminaram em muito este projeto. O meu “muitíssimo obrigado”!

Um projeto de doutorado é um pouco como uma orquestra: tantos instrumentos utilizados, tanto material humano, cada qual no seu tempo, porém num ritmo comum. A Universidade de São Paulo foi minha orquestra neste período, e serviços como o Departamento de Anatomia Patológica, Laboratório de Imunohistoquímica (Ângela Batista Gomes dos Santos), Bloco do HC-FMUSP, ICESP, CAPPesq, Arquivo Médico, Departamento de Hematologia, entre tantos outros, muito me ajudaram. Mais ainda: me fizeram perceber a grandeza da instituição, o compromisso de cada serviço, departamento, recursos humanos na pesquisa, na extensão acadêmica! Ter estudado aqui foi um privilégio!

Aos meus colegas da Hematologia e ao corpo de enfermagem que, de alguma forma, contribuíram com esse projeto e cuidaram dos pacientes que estudamos. Lendo os prontuários, os relatórios, tive a certeza da qualidade do atendimento que estes pacientes receberam dos profissionais de saúde, o que apenas aumentou minha admiração.

Aos pacientes e seus familiares, sem os quais essa pesquisa não seria possível. Vocês são nossa principal motivação para qualquer pesquisa médica, para os plantões extenuantes, ambulatorios lotados e todas dificuldades que encontramos nas nossas profissões.

É preciso agradecer aos meus colegas da UFRJ, da UFPR, da UNIFESP, do INCa, e de tantos outros centros acadêmicos pelos quais passei. Ambientes repletos de mentes brilhantes, que são contagiantes. Levo todos no coração e no cérebro!

Aos colegas que conheci na Bayer- em especial à Dra Paula Tanaka, uma amiga vibrante, enérgica, focada. Além disto tudo, ela me apresentou a Dra Juliana Pereira onde a história começou... Espero tê-la honrado pela confiança em mim depositada!

Tantas pessoas, lugares, professores, escolas, músicas, livros passaram em minha vida para que eu chegasse até aqui, me ajudando a tornar aquilo que sou. De tudo fica um pouco- como diria o poeta Carlos Drummond... E, a este pouco (que é o meu tudo), eu finalizo meu agradecimento, o meu muito obrigado. De toda minh'alma!

“Amar o perdido,
deixa confundido
este coração

Nada pode o olvido
contra o sentido
apelo do Não

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão

Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
estas sim ficarão”

Carlos Drummond de Andrade

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta publicação:

Referências: adaptado de *International Committee of Medical Journals Editors* (Vancouver).

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e Documentação. *Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias*. Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011.

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com *List of Journals Indexed in Index Medicus*.

SUMÁRIO

LISTA DE SÍMBOLOS

LISTA DE SIGLAS

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

RESUMO

ABSTRACT

1	INTRODUÇÃO	1
2	REVISÃO DE LITERATURA	5
2.1	Epidemiologia	5
2.2	Diagnóstico	6
2.2.1	<i>Biópsia/Líquor</i>	6
2.2.2	<i>Imagem</i>	8
2.3	Prognóstico	11
2.3.1	<i>Fatores clínicos de prognóstico</i>	11
2.3.2	<i>Fatores histopatológicos de prognóstico</i>	13
2.4	Tratamento	16
2.4.1	<i>Radioterapia</i>	17
2.4.2	<i>Monoterapia ou Poliquimioterapia baseado em MTX</i>	18
2.4.3	<i>Imunoterapia e Imunoquimioterapia com Rituximabe</i>	19
2.4.4	<i>Quimioterapia intraventricular</i>	20
2.4.5	<i>Terapia de manutenção com agente quimioterápico</i>	21
2.4.6	<i>Transplante de Medula Óssea Autólogo (ASCT)</i>	21
2.4.7	<i>Tratamento de resgate</i>	22
2.4.8	<i>Estudos de Pesquisa Clínica Fase 1/2 em pacientes com LPSNC recidivadas</i>	22
2.5	Fisiopatologia molecular do LPSNC	27
2.5.1	<i>Genes selecionados para o estudo</i>	30
2.6	Justificativa	37
3	OBJETIVOS	39
3.1	Objetivo primário	39
3.2	Objetivos secundários	39
4	CASUÍSTICAS E METODOS	40
4.1	Pacientes selecionados	41
4.1.1	<i>Critérios de inclusão</i>	41
4.1.2	<i>Critérios de exclusão</i>	42
4.2	Diagnóstico anatomopatológico	43
4.3	Estadiamento	44

4.4	Tratamento	44
4.5	Avaliação de resposta	45
4.6	Seguimento dos pacientes	45
4.7	Reações de IHQ	46
4.7.1	<i>Obtenção das amostras</i>	46
4.7.2	<i>Técnica da reação de IHQ</i>	47
4.8	Método molecular	49
4.8.1	<i>Obtenção das amostras</i>	49
4.8.2	<i>Extração de RNA de amostras fixadas em formol e incluídas em parafina</i>	49
4.8.3	<i>Preparação do cDNA</i>	50
4.8.4	<i>Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real</i>	51
4.8.5	<i>Eficiência gênica avaliada</i>	52
4.9	Análise estatística	52
5	RESULTADOS	56
5.1	Casuística	56
5.2	Características clínico-laboratoriais ao diagnóstico	57
5.3	Tratamentos oncológicos e resposta clínica	59
5.3.1	<i>Primeira Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo</i>	61
5.3.2	<i>Segunda Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo</i>	62
5.4	Expressão Proteica	63
5.5	Expressão Gênica	65
5.6	Construção de Curvas de ROC (<i>receiver operator characteristic curve</i>, em inglês)	67
5.6.1	<i>Curvas de ROC para expressão proteica</i>	67
5.6.2	<i>Curvas de ROC para expressão gênica normalizada</i>	68
5.7	Curvas de Sobrevida	69
5.7.1	<i>Sobrevida Global</i>	69
5.7.2	<i>Sobrevida Livre de Doença (1ª linha de tratamento)</i>	71
5.7.3	<i>Sobrevida Livre de Progressão (1ª linha de tratamento)</i>	72
5.8	Fatores de Prognóstico para SG, SG 2 anos, SLD e SLP	73
5.8.1	<i>Análise Univariada para SG e SG em 24 meses</i>	73
5.8.2	<i>Análise Univariada para SLD</i>	76
5.8.3	<i>Análise Univariada para SLP</i>	77
5.8.4	<i>Testes de Log-Rank: gráficos por variáveis analisadas</i>	79
5.9	Fatores de Prognóstico para Mortalidade até a data de censura e Mortalidade em 2 anos após o diagnóstico	86
5.9.1	<i>Análise Univariada</i>	86
5.10	Fatores de Prognóstico para Risco de Recaída e Refratariedade na primeira linha de tratamento	88
5.10.1	<i>Análise Univariada</i>	88
5.11	Correlação entre expressão gênica e expressão proteica	90
6	DISCUSSÃO	92
7	CONCLUSÕES	105

8	SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	106
9	ANEXOS	107
	ANEXO A - Características clínico-laboratoriais por paciente	108
	ANEXO B - Informações sobre a primeira linha de tratamento oncológico	114
	ANEXO C - Valores da expressão normalizada dos genes MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1 por paciente	115
	ANEXO D - Comparação entre amostra total e a subamostra	117
	ANEXO E - Curvas de ROC para expressão da proteína MYC	123
	ANEXO F - Curva de ROC para expressão da proteína BCL2	127
	ANEXO G - Curva de ROC para expressão da proteína LMO2	131
	ANEXO H - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MYC	132
	ANEXO I - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MGMT	134
	ANEXO J - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene PDCD1	136
	ANEXO K - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL2	137
	ANEXO L - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene LMO2	140
	ANEXO M - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene POU2F1	142
	ANEXO N - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL6	144
	ANEXO O - Construção das curvas de SG, SLP e SLD (método de Kaplan-Meier)	146
	ANEXO P - Expressão dos genes de interesse em relação à sua respectiva expressão proteica	147
10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	149

LISTA DE SÍMBOLOS

$\alpha\beta$	Alfa/beta
$\gamma\delta$	Gama/delta
cm	Centímetro
dL	Decilitro
g	Grama
°C	Graus Celsius
xg	Gravidade
Gy	Gray
K	Kappa
λ	Lambda
L	Litro
$\geq$	Maior ou igual a
$>$	Maior que
+/-	Mais ou menos
+	Mais ou positivo
$\leq$	Menor ou igual a
$<$	Menor que
-	Menos ou hífen
m ²	Metro quadrado
μ g	Micrograma
μ L	Microlitro
μ m	Micrômetro
μ M	Micromol
mg	Miligrama
mm ³	Milímetros cúbicos
mM	Milimol
ng	Nanograma
nM	Nanômetro
N	Número absoluto
pmol	Picomol
%	Porcentagem
^{TM}	<i>Trademark</i> ou marca registrada
log	Unidade de escala logarítmica
U	Unidades
x	Vezes

LISTA DE SIGLAS

SIGLA	ABREVIACAO
1ºq	Primeiro quartil
3ºq	Terceiro quartil
A20	<i>Tumor Necrosis Factor, Alpha-Induced Protein 3 (em inglês)</i>
ABC	<i>Activated B-Cell Like (em inglês)</i>
Ac	Anticorpos
AKT	Proteína Quinase B
ALK	Quinase do Linfoma Anaplásico
ARP	<i>Actin-related protein (em inglês)</i>
ASCT	Transplante Autólogo de Células Tronco
AUC	Área sob a Curva
BCAP	<i>B cell adaptor for PI3k (em inglês)</i>
BCL6 –	<i>B-cell CLL/Lymphoma 6 (em inglês)</i>
BCL2	<i>B-cell Lymphoma 2 (em inglês)</i>
BCNU	Carmustina
BCR	Receptor de Células B
BHE	Barreira Hematoencefálica
BIM	<i>BCL-2 interacting mediator of cell death (em inglês)</i>
BTK	<i>Bruton's Tyrosine Kinase (em inglês)</i>
CAAE	Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
CAPPesq	Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
CAR-T	<i>Chimeric Artificial T-cell Receptor (em inglês)</i>
CARD11	<i>Caspase Recruitment Domain Family Member 11 (em inglês)</i>
CD	<i>Cluster of differentiation (em inglês)</i>
CD10	<i>Common acute lymphocytic leukemia agent (em inglês)</i>
CD20	Antígeno de Linfócito B CD20
CDC2 ou CDK1	Quinase dependente de ciclina 1
cDNA	Ácido desoxirribonucleico complementar
CG	Centro germinativo
CN	<i>Calcineurin (em inglês)</i>
CNS	<i>Central Nervous System (em inglês)</i>
COO	Célula de Origem
Ct	<i>Cycle threshold</i> ou ciclo limiar

CXCL13	<i>B lymphocyte chemoattractant (em inglês)</i>
DAG	diacilglicerol
D11	Décimo Primeiro Dia
D7	Sétimo Dia
DE	Doença Estável
Del	Deleção
DFS	<i>Disease-free survival (em inglês)</i>
DHL	Desidrogenase Láctica
dNTP	Desoxirribonucleotídeos Fosfatados
Dp	Desvio Padrão
EBV	<i>Epstein Barr Virus (em inglês)</i>
ECOG	<i>Eastern Cooperative Oncology Group (status performance) (em inglês)</i>
EV	Via Endovenosa
FDG	Fluorodeoxiglicose
FFPE	Fixado em Formalina e Incluído em Parafina
FLAIR	<i>Fluid Attenuated Inversion Recovery (em inglês)</i>
G	Gravidade
GADPH	<i>Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase (em inglês)</i>
GCB	célula de origem centro germinativo
	Receptor 2 do fator de Crescimento Derivado de Proteínas
GSK	<i>Glycogen synthase kinase (em inglês)</i>
GUSB	Glucoronidase Beta
Gy	Gray
H&E	Hematoxilina & Eosina
HC-FMUSP	Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
HD	Alta dose
HD-MTX	Metotrexate em Altas Doses
HGAL	<i>Germinal Center Specific Gene (em inglês)</i>
HIC	Hipertensão Intracraniana
HIV	Vírus da Imunodeficiência Adquirida Humana
HR	<i>Hazard Ratio (em inglês)</i>
IC	Intervalo de Confiança
ICESP	Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Ig	Imunoglobulina
IgG4	Imunoglobulina G
IGH	Cadeia Pesada da Imunoglobulina
IHQ	Imuno-histoquímica
IKB	<i>Inhibitor of kB (em inglês)</i>

IKK	<i>Inhibitor of NF-κB kinase (em inglês)</i>
IL	Interleucina
IPI	Índice Prognóstico Internacional
IP3	Inositol trifosfato
IP3R	Receptor de IP3
IRAK	Receptor Associado à Kinase IL1
ITAM	Imunorreceptor do Motivo Ativador Baseado em Tirosina
IV	Intraventricular
JAK/STAT	<i>Tirosina Kinase Janu/signal Transducer and Activator of Transcription (em inglês)</i>
Ki67	Proteína Ki67
KPS	<i>Karnofsky Performance Status (em inglês)</i>
LCR	Líquor Cefalorraquidiano
LDGCB	Linfoma Difuso de Grandes Células B
LF	Linfoma Folicular
LIM	Laboratório de Investigação Médica
LLA	Leucemia Linfocítica Aguda
LMO2	LIM Domínio Único 2
LNH	Linfoma não Hodgkin
LPSNC	Linfoma Primário de Sistema Nervoso Central
MALT1	<i>Mucosa-associated lymphoid tissue (em inglês)</i>
Max	Máximo
MBVP	Methotrexate, VP16, BCNU, Prednisone
MEK1/2	Proteína Quinase Ativada por Mitogeno/Quinase Reguladora do Sinal Extracelular
MGMT	<i>O-6-methylguanine-DNA-methyltransferase (em inglês)</i>
Min	Mínimo
miR	microRNA
MRI	<i>Magnetic Resonance Imaging (em inglês)</i>
mTOR	<i>Mammalian Target of Rapamycin (em inglês)</i>
MTX	Metotrexate
MUM1	<i>Multiple Myeloma oncogene 1 / Oncogene Mieloma Múltiplo 1 (em inglês)</i>
MYC	Fator de Transcrição bHMH
MYD88	<i>Myeloid Differentiation Primary Response 88 (em inglês)</i>
N	Número
NA	Não Avaliável
NCG	Não Centro Germinativo
NF κ B	Fator Nuclear kappa B
NK	<i>Natural Killer (em inglês)</i>
NPD	Ausência de Progressão de Doença documentada

núm	Número
POU2F1	<i>POU Class 2 Homeobox 1 (em inglês)</i>
OMS	OMS – Organização Mundial de Saúde
OR	<i>Odd Ratio (em inglês)</i>
OS	<i>Overall survival (em inglês)</i>
p21	<i>Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 1 (em inglês)</i>
p53	Proteína tumoral p53
Pac	Paciente
PCR	Reação em Cadeia de Polimerase
PD	Progressão de Doença
PK1	<i>3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1</i>
PD-L1	<i>Programmed Cell Death Ligand 1 (em inglês)</i>
PD-L2	<i>Programmed Cell Death Ligand 2 (em inglês)</i>
PDCD1	<i>Programmed Cell Death 1 (em inglês)</i>
PEG	Perfil de Expressão Gênica
PET	Tomografia por Emissão de Pósitrons
PET-TC	Tomografia Computadorizada com Emissão de Pósitrons
PFS	<i>Progression-free survival (em inglês)</i>
pH	Potencial de Ânion Hidrogênio
PI3k	<i>Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase (em inglês)</i>
PIC	Pressão Intracraniana
PIM	Proto-Oncogene Serina/Treonina Proteína Kinase
PKC	Proteína Kinase C
POZ	<i>Poxvirus and Zinc Finger Domain (em inglês)</i>
PRDM1	<i>PR Domain-Containing Protein 11 (em inglês)</i>
PS	<i>Performance Status (em inglês)</i>
PTPRK	<i>Receptor-type Tyrosine-Protein Phosphatase kappa (em inglês)</i>
R/R	Recaída/Refratário
RASGRP3	<i>RAS guanyl-releasing protein 3 (em inglês)</i>
RC	Resposta Completa ou Remissão Completa
RGS	<i>Regulator of G-Protein Signaling (em inglês)</i>
RT	Radioterapia
RG	Resposta Global
RL	Regressão Logística
RMN	Ressonância Magnética Nuclear
RNA	Ácido Ribonucleico
ROC	Característica de Operação do Receptor
RP	Resposta Parcial
RPLPO	<i>Ribosomal Protein Lateral Stalk Subunit P0 (em inglês)</i>

RT-qPCR	Reação em Cadeia da Polimerase da Transcrição Reversa em Tempo Real quantitativo
RV-	Razão de verossimilhança negativa
RV+	Razão de verossimilhança positiva
SD	Doença Estável
SG	Sobrevida Global
SLD	Sobrevida Livre de Doença
SLP	Sobrevida Livre de Progressão
SNC	Sistema Nervoso Central
STAT3	Transdutor de Sinal e Ativador de Transcrição 3
SYK	<i>Spleen tyrosine kinase (em inglês)</i>
TC	Tomografia Computadorizada
TEDDi-R	Temozolamida, Etoposídeo, Doxorubicina Lipossomal, Dexametasona, Ibrutinibe, Rituximabe
ThBuCTX	Thiotepa, Busulfan, e Ciclofosfamida -3 and -2
TIL	<i>Tumour Infiltrating Lymphocyte (em inglês)</i>
TMO	Transplante de Medula Óssea
TNF	Fator de Necrose Tumoral
TR	Taxa de Resposta
TTO1	Primeira Linha de Tratamento
TTO2	Segunda Linha de Tratamento
VO	Via Oral
WBRT	Radioterapia de Todo o Crânio
XBP1	<i>X-box binding protein 1(em inglês)</i>
¹⁸ F-FDG	¹⁸ F-fluorodeoxyglucose

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Tipo de Célula de Origem conforme Critérios de Hans para IHQ.	14
Figura 2 -	Sinalização celular via BTK.....	24
Figura 3 -	Via do NFkB-.....	28
Figura 4 -	Fluxograma da exclusão	56
Figura 5 -	Número de linhas de tratamento oncológico	60

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1 -	Taxas de Resposta à Primeira Linha de Tratamento Oncológico	62
Gráfico 2 -	Curva de Sobrevida Global nos pacientes com LPSNC.....	70
Gráfico 3 -	Curva de Sobrevida livre de doença nos pacientes com LPSNC	71
Gráfico 4 -	Curva de Sobrevida livre de progressão nos pacientes com LPSNC	72
Gráfico 5 -	Teste de Log-rank – Variável: Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	79
Gráfico 6 -	Teste de Log-rank – Variável: IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1).....	80
Gráfico 7 -	Teste de Log-rank – Variável: Performance Status (3+4 vs 0+1+2)	81
Gráfico 8 -	Teste de Log-rank – Variável: Radioterapia (Não realizada vs Realizada)	82
Gráfico 9 -	Teste de Log-rank – Variável: Anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%).....	83
Gráfico 10 -	Teste de Log-rank – Variável: anti-LMO2 (0-25% vs ≥26%).....	83
Gráfico 11 -	Teste de Log-rank – Variável: Gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041).....	84
Gráfico 12 -	Teste de Log-rank – Variável: Gene <i>LMO2</i> (<0,689232 vs ≥0,689232)	85
Gráfico 13 -	Teste de Log-rank – Variável: Gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	85

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Avaliação de resposta clínica	10
Quadro 2 -	Estudos de fase 1 e fase 2 em andamento	26
Quadro 3 -	Padronização dos marcadores de IHQ utilizados	48
Quadro 4 -	Definições das Curvas de Sobrevida, Refratariedade e Recidiva	54

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Sensibilidade e especificidade de biomarcadores CXCL13 e IL-10 (LCR) e aplicação diagnóstica de LPSNC	8
Tabela 2 -	Sobrevida Global (SG 2 anos) de acordo com o escore de prognóstico IPI modificado para LPSNC	12
Tabela 3 -	Orçamento detalhado.....	40
Tabela 4 -	Eficiências gênicas avaliadas.....	52
Tabela 5 -	Classificação Subjetiva por Kappa.....	55
Tabela 6 -	Tempos de seguimento.....	57
Tabela 7 -	Características clínico-laboratoriais dos pacientes selecionados	58
Tabela 8 -	Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à primeira linha de tratamento oncológico	61
Tabela 9 -	Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à segunda linha de tratamento oncológico.....	62
Tabela 10 -	Descrição das revisões das reações de imuno-histoquímica disponíveis	63
Tabela 11 -	Resultados das reações de imuno-histoquímica das proteínas de interesse.....	64
Tabela 12 -	Amplificação normalizada dos genes de interesse	65
Tabela 13 -	Revisão bibliográfica dos pontos de corte da reação de imuno-histoquímica das proteínas de interesse e pontos de corte selecionados neste estudo.....	68
Tabela 14 -	Pontos de corte da expressão normalizada dos genes de interesse.....	69
Tabela 15 -	Análise univariada de Cox para SG	74
Tabela 16 -	Análise univariada de Cox para SG em 2 anos.....	75
Tabela 17 -	Análise univariada de Cox para SLD.....	76
Tabela 18 -	Análise univariada de Cox para SLP.....	78
Tabela 19 -	Análise univariada para Mortalidade Global e Mortalidade em 2 Anos	87
Tabela 20 -	Análise univariada para Refratariedade e Recaída	89
Tabela 21 -	Correlação entre IHQ proteína MYC e expressão gênica MYC.....	90
Tabela 22 -	Correlação entre IHQ proteína BCL2 e expressão gênica BCL2	91
Tabela 23 -	Correlação entre IHQ proteína LMO2 e expressão gênica LMO2	91

RESUMO

Reis DGC. *Análise do perfil da expressão dos genes MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1 e BCL6 e suas respectivas proteínas em linfoma primário de sistema nervoso central* [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.

Introdução: Linfoma primário de sistema nervoso central (LPSNC) é um linfoma não-Hodgkin (LNH) extranodal com origem no SNC e a ele restrito, incidência de 0,7/100.000 pessoas-ano e mediana de idade de 65 anos. Apresenta comportamento biológico agressivo, alta morbimortalidade, sobrevida global em 5 anos de 30% e pior prognóstico em relação ao linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) sistêmico. O tratamento consiste em quimioterapia de indução com altas doses de metotrexate, seguido de consolidação, porém com alta taxa de recorrência (50%) e refratariedade (30%). Estudos genéticos têm permitido melhor compreensão de sua patogênese, como a hiperativação da via do NFkB e da via da sinalização do BCR; o papel do microambiente tumoral, entre outros. Estudos preliminares com LPSNC e LDGCB indicam valor prognóstico favorável da hiperexpressão dos genes BCL6 e LMO2 e desfavoráveis nos casos de suprarregulação dos genes *BCL2*, *MYC*, *MGMT*, *POU2F1* e *PDCD1*. **Objetivo:** Avaliar o impacto da expressão dos genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* e suas respectivas proteínas em pacientes com LPSNC e suas correlações com os desfechos clínicos de sobrevida global (SG) e sobrevida livre de progressão (SLP). **Métodos:** Estudo de coorte retrospectiva, unicêntrico, não intervencionista. Pacientes imunocompetentes com LPSNC histopatologia LDGCB CD20+ foram incluídos, dados clínicos coletados e material histopatológico obtido. A expressão gênica foi analisada por RT-qPCR de amostras fixadas e emblocadas em parafina; seus valores foram normalizados pelo controle endógeno *GUSB* e transformados em variáveis categóricas para posterior correlação com variáveis clínicas e de desfecho. Devido ao pequeno tamanho amostral, apenas análises univariadas foram realizadas. Análise da expressão proteica dos genes selecionados também foi realizada. **Resultados:** Trinta e cinco pacientes foram incluídos; a expressão gênica foi avaliável em 21 pacientes (60%). A mediana de tempo de seguimento foi de 41 meses. As medianas de SG, SLD e SLP foram de 42,6 meses, 59,2 meses e 41 meses, respectivamente. Mediana de expressão dos genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* foram respectivamente 0,201; 0,564; 1,636; 0,000; 1,448; 0,000 e 2,716. Idade >60 anos, índice prognóstico International (IPI) modificado ≥ 2 , performance status (PS) ≥ 3 , expressão de *MYC* $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, ausência de tratamento radioterápico, refratariedade ao tratamento e progressão de doença (PD) após a primeira linha de tratamento foram associados à pior SG ($p \leq 0,1$). Idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , PS ≥ 3 e ausência de tratamento radioterápico estiveram associados à pior SLD ($p \leq 0,1$). Idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão de *MYC* $\geq 0,201041$, anti-

BCL2 $\geq 51\%$, expressão gênica de *LMO2* $< 0,689232$, expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$, refratariedade à primeira linha de tratamento e PD após a primeira linha de tratamento estiveram associados à pior SLP ($p \leq 0,1$). Expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, expressão gênica de *PDCD1* $\geq 2,00938$ estiveram associados a maior risco de recaída após a primeira linha de tratamento ($p \leq 0,1$). Houve correlação moderada entre a expressão gênica do *MYC* ($< 0,201041$ x $\geq 0,201041$) e sua respectiva proteína ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,596 e valor $p=0,022$) e entre a expressão gênica do *BCL2* ($< 0,3516$ x $\geq 0,3516$) e sua respectiva proteína ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,426 e valor $p=0,042$). **Conclusão:** Em análise univariada, expressão de *MYC* $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, expressão gênica de *LMO2* $< 0,689232$, expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$ e expressão gênica de *PDCD1* $\geq 2,00938$ estiveram associados a prognósticos desfavoráveis.

Descritores: Linfoma não Hodgkin; Neoplasias Encefálicas; Expressão Gênica; Biomarcadores; Estudos Retrospectivos; Estudos de Coortes; Imuno-Histoquímica; Análise de Sobrevida.

ABSTRACT

Reis DGC. *Gene expression and protein profiles of MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1, PDCD1, BCL6 in primary central nervous system lymphoma* [tese]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2019.

Introduction: Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) is a rare extranodal NHL restricted to the CNS, with annual incidence of 0.7 per 100,000 people and mean age at diagnosis of 65 years old. It has an aggressive biological behavior, with poor prognosis (overall survival at 5 years of 30%). Treatment consists of induction immunochemotherapy with high-dose methotrexate followed by consolidation regimen, with a high rate of relapsed and refractory disease (50% and 30%, respectively). Tumorigenesis has been associated with hyperactivation of NFkB pathway and BCR downstream pathway; tumoral microenvironment, among others. Recent studies suggest that hyperexpression of the genes *BCL6* and *LMO2* may be associated with better prognosis and hyperexpression of the genes *BCL2*, *MYC*, *MGMT*, *POU2F1* and *PDCD1* may be associated with worse prognosis in patients with PCNSL.

Objective: To measure the normalized gene expression of *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* and *BCL6* and its respective proteins in patients with PCNSL and its correlation with clinical outcomes of overall survival (OS) and progression-free survival (PFS). **Methods:** Retrospective cohort study. Immunocompetent patients from a Brazilian single center with PCNSL and confirmed histopathology DLBCL CD20+ were included, their clinical data and archival histopathological material were retrieved. Gene expression (RT-qPCR) was performed and its values were normalized to internal control gene *GUSB*, then categorized and correlated with clinical outcomes. Only univariate analysis was performed due to small sample size. **Results:** Thirty-five patients were included, gene expression was evaluable in 21 patients (60%). Median duration of follow-up was 41 months. Median OS, DFS, PFS were, respectively, 42.6 months, 59.2 months and 41 months. Median expression of genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* and *BCL6* were, respectively, 0.201; 0.564; 1.636; 0.000; 1.448; 0.000 and 2.716. Age at diagnosis >60 years, modified international prognosis index (IPI) ≥ 2 , *performance status* (PS) ≥ 3 , *MYC* expression $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, absence of radiotherapical treatment, refractoriness to treatment and disease progression after 1st line of treatment were associated with worse OS ($p \leq 0,1$). Age at diagnosis >60 years, modified IPI ≥ 2 , PS ≥ 3 and absence of radiotherapical treatment were associated with worse DFS ($p \leq 0,1$). Age >60 years, modified IPI ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , absence of radiotherapical treatment, *MYC* gene expression $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, *LMO2* gene expression $< 0,689232$, *MGMT* gene expression $\geq 0,335666$, refractoriness to treatment and progressive disease were associated with a worse PFS ($p \leq 0,1$). *MYC* gene expression $\geq 0,201041$, *PDCD1* gene expression $\geq 2,00938$ were associated with risk of disease relapse ($p \leq 0,1$). A moderate correlation was found between *MYC* gene expression ($< 0,201041$ x $\geq 0,201041$) and its protein ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,596, $p=0,022$); and also

between *BCL2* gene expression ($<0,3516$ x $\geq 0,3516$) and its protein ($\leq 50\%$ x $\geq 51\%$), (Kappa=0,426, p=0,042). **Conclusion:** In a univariate analysis, *MYC* gene expression $\geq 0,201041$, anti-BCL2 $\geq 51\%$, *LMO2* gene expression $<0,689232$, *MGMT* gene expression $\geq 0,335666$ and *PDCD1* gene expression $\geq 2,00938$ were prognostic markers associated with unfavorable clinical outcomes.

Descriptors: Lymphoma, Non-Hodgkin; Brain Neoplasms; Gene Expression; Biomarkers; Retrospective Studies; Cohort Studies; Immunohistochemistry; Survival Analysis.

1 INTRODUÇÃO

Os Linfomas não-Hodgkin (LNH) compreendem um grupo heterogêneo de neoplasias de origem linfoide cuja etiologia é multifatorial ¹. Correspondem a 4,3% de todos os cânceres nos EUA, com aumento de incidência entre 1975 e 2015 (de 12 para 19,91/100.000 pessoas/ano) e Sobrevida Global (SG) estimada em 5 anos de 74,1% ^{2,3}. Os LNH podem ser de origem linfoide B, T e *natural killer* (NK) ⁴⁻⁶. Para o Brasil, estimam-se 5.370 casos novos de LNH em homens e 4.810 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019, com risco estimado de óbito de 2,8 a cada 100 mil habitantes ⁷.

Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B (LDGCB) sistêmico é o subtipo de LNH mais frequente, o qual representa 40% de todos os LNH de origem linfoide B e apresenta comportamento clínico agressivo bem como incidência de mais de 25.000 casos/ano nos EUA. É uma doença heterogênea dos pontos de vista genético, morfológico e imunofenotípico. Pode ser classificado de acordo com a célula de origem e as características moleculares determinadas por técnicas de Perfil de Expressão Gênica (PEG) em Células B do Centro Germinativo (GCB) ou células B ativadas (ABC). Esta classificação reflete o estágio de desenvolvimento da Célula B originalmente comprometida^{8,9}. A célula de origem também pode ser classificada de acordo com suas características de expressão proteica por IHQ em GCB ou de não-GCB, em concordância com o GEP em 86% ¹⁰. Pacientes com LDGCB GCB e ABC apresentam prognósticos distintos, com SG em 5 anos de 76% e 34% respectivamente. No entanto, 50% dos pacientes não conseguem atingir remissão duradoura ^{9,11-14}.

Linfoma primário de SNC é um LNH extranodal com origem no SNC e restrito a este órgão. O subtipo LDGCB é o mais frequente, entre 75% a 90% dos casos ^{5,15}. Outros subtipos incluem o linfoma de célula T, linfoma de Burkitt, linfoma linfoplasmocítico e linfoma da zona marginal. Neste texto, ao descrevermos LPSNC, consideraremos apenas os linfomas de histopatologia LDGCB CD20+ de indivíduos imunocompetentes. Trata-se de doença rara,

agressiva e de mau prognóstico ¹⁶. Diferente do LDGCB sistêmico, o LPSNC tem origem em uma célula B em fase terminal de diferenciação, com características de ambas GCB e pós-CG ⁶.

LPSNC corresponde a 2% dos tumores primários do SNC, com mediana de idade de 65 anos ao diagnóstico. Anatomicamente se encontra limitado ao encéfalo, olhos, medula espinhal e leptomeninges. Possui comportamento biológico mais agressivo e menor SG quando comparado ao LDGCB sistêmico¹⁷. Sua incidência é de 0,7 caso por 100.000 pessoas/ano nos EUA ¹⁸, porém nas últimas décadas tem aumentado a uma taxa de 1,6% ao ano ¹⁹.

Tratamento com intuito curativo ou paliativo é indicado de acordo com as condições clínicas do paciente. Podem ser usados agentes isolados ou combinados, associados ou não à radioterapia, assim como radioterapia isolada e transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo (ASCT). Devido à alta morbidade e pouco benefício clínico, procedimentos cirúrgicos estão limitados à biópsia diagnóstica, geralmente estereotáxica. O tratamento com quimioterapia é dificultado pela presença da barreira hematoencefálica, o que limita a penetração dos fármacos. O fato de a maioria dos pacientes ser idosa, com maior prevalência de comorbidades, reduz a tolerância ao tratamento.

Tratamento de indução seguido de consolidação apresenta melhores taxas de resposta global (TRG). A maior parte dos esquemas terapêuticos para o LPSNC tem como base altas doses de metotrexato (HD-MTX), variando de 1g/m² a 8 g/m² . O MTX pode ser associado ou não a outros fármacos, como agentes alquilantes ou à radioterapia de crânio total. A resposta global (RG) ao tratamento inicial é usualmente alta, porém as taxas de recidiva após 2 anos são muito altas. Cerca de 15% das recidivas ocorrem no mesmo local anatômico da lesão inicial primária e 85% ocorrem distantes do sítio primário, mas dentro do SNC ²⁰⁻²².

Com melhores técnicas diagnósticas e novas opções terapêuticas, houve aumento da SG em 5 anos de 19,1% (1992-1994) para 30,1% (2004-2006) nas últimas décadas ¹⁹. Entretanto, as taxas de recidiva precoce ainda são elevadas (20% a 30%) ²³.

Estudos genéticos têm evidenciado o papel da hiperativação da via do

NFkB na tumorigênese em decorrência de mutações de genes da via de sinalização do receptor de células B (BCR). O microambiente por ação imunossupressora local pode interferir na progressão e no crescimento tumoral²⁴.

Há carência de dados clínicos e moleculares na literatura médica referente a esta doença devido à sua raridade e à dificuldade de obtenção de material representativo. Estudos genéticos e moleculares podem auxiliar no entendimento da tumorigênese, por meio da identificação de fatores de prognóstico, preditores de resposta, além de novos alvos terapêuticos.

Estudos preliminares com LPSNC e LDGCB descreveram prognóstico favorável da hiperexpressão dos genes *BCL6* e *LMO2*, e desfavoráveis relacionados à suprarregulação dos genes *BCL2*, *MYC*, *MGMT*, *POU2F1* e *PDCD1*.

O gene *BCL2* é um proto-oncogene com papel na regulação da apoptose, e sua hiperexpressão está associada à tumorigênese de linfomas^{25,26}.

O gene *MYC* é um proto-oncogene associado à expressão de vários outros genes envolvidos no controle do crescimento e da proliferação celular. Está associado à tumorigênese de certos tumores, incluindo o LDGCB. Sua assinatura genética está associada a genes envolvidos no metabolismo e resistência aos agentes antifolatos, incluindo o metotrexate ²⁷.

O gene *LMO2* atua na regulação de expressão de outros genes, pode estar hiperregulado em LNH derivados do Centro Germinativo e é considerado um indicador prognóstico favorável de LDGCB ²⁸.

O gene *MGMT* codifica uma enzima reparadora de DNA silenciada por meio da metilação da sua região promotora. Sua hiperexpressão de *MGMT* parece estar associada a um pior prognóstico, e a metilação de sua região promotora é um biomarcador de bom prognóstico em pacientes portadores de glioma tratados com agentes alquilantes e um fator preditor de resposta ao tratamento com temozolamida, a qual vem sendo estudada como opção terapêutica no LPSNC ²⁹.

O gene *POU2F1* (*OCT1*) pode estar hiperexpresso em linfoma. Sua presença aumenta a suscetibilidade tumoral a irinotecano, paclitaxel, assim

como o transporte intracelular de antraciclícos. Desta forma, sugere-se que alterações de *POU2F1* possam causar resistência das células tumorais aos quimioterápicos ^{30,31}. No entanto, a hipexpressão de *POU2F1* está elevada em carcinomas epiteliais de estômago, cólon, pulmão, mas, nestes caso, está associado a um pior prognóstico ³².

O gene *PDCD1* (*PD1*) pode estar hiperexpresso em 65% dos LPSNC, juntamente com o *PD-L1* e *PD-L2* e possui papel na evasão imune tumoral. Estudos recentes têm demonstrado atividade do bloqueio de PD-1 com nivolumabe em pacientes com LPSNC refratário ou com recaída ^{33,34}.

O gene *BCL6* é considerado um gene supressor tumoral, que atua como um repressor e um modulador transcricional. Quando hipermutado, translocado e, conseqüentemente, inativado, pode associar-se à tumorigênese, inclusive no LDGCB ³⁵.

2 REVISÃO DE LITERATURA

LPSNC é um subtipo de LNH extranodal que acomete o encéfalo, leptomeninge, olho ou medula espinhal sem evidência de envolvimento sistêmico. Ao contrário do LDGCB sistêmico, o LPSNC se desenvolve em órgão desprovido de tecido linfoide ¹⁴. Pela classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) ^{6,36}, critérios de exclusão para definição de LPSNC incluem envolvimento de dura-máter, linfoma intravascular de grandes células B e linfoma secundário ^{13,37}. Podem-se apresentar como lesão intracraniana solitária ou múltipla, periventricular e leptomeníngea difusa, de medula ou neurolinfomatose ^{6,38,39}. Os sítios primários mais acometidos são o cérebro (79,5%), medula espinhal (6,7%), meninges e nervos cranianos (2%) e outros (11,8%) ¹⁵. No linfoma primário ocular, os achados mais frequentes incluem infiltração vítrea e sub-retinianas, sendo o diagnóstico estabelecido por vitrectomia ou biópsia coriorretiniana ⁴⁰.

Os principais fatores de risco para desenvolvimento de LPSNC incluem imunodeficiência primária ou adquirida, sendo esta iatrogênica ou pela infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) ^{39,41}. Os sintomas incluem déficit neurológico focal (70%), alterações neuropsiquiátricas (43%) e aumento de pressão intracraniana (PIC) (33%). Sintomas B são raros, e pacientes com acometimento ocular podem apresentar dor ocular, visão turva e escotomas visuais. Acometimento secundário do líquido cefalorraquidiano (LCR) e ocular ocorrem em 15-20% e 5-20% dos pacientes, respectivamente ^{38,39}.

2.1 Epidemiologia

LPSNC tem incidência entre 0,47 a 0,7 caso por 100.000 pessoas/ano, corresponde a 2,2% de todos os tumores do SNC, 1% dos LNH, e a maioria dos casos (90%) apresenta histopatologia LDGCB ^{16,17,42-45}. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer disponibiliza incidência de LNH e neoplasias primárias de SNC (5,2/100.000 pessoas/ano e 5,6/100.000 pessoas/ano,

respectivamente), porém não há dados sobre incidência anual de LPSNC ⁷.

A maioria dos casos é esporádica, e sua incidência aumenta com a idade, com mediana de idade ao diagnóstico de 65 anos e razão homem/mulher de 1,2/1 a 1,7/1 ¹⁵. A incidência anual em população entre 30-69 anos e >70 anos é de 0,08/100.000 e 4,32/100.000, respectivamente ⁴⁶. Usualmente, os pacientes apresentam índice de comorbidade de Charlson-Deyo de 0 (65,9%) e ausência de sintomas B (79,6%) ^{17,22,47}.

Apesar da baixa incidência de LPSNC em pacientes imunocompetentes, dados do SEER demonstram aumento de sua incidência (1,6% ao ano) em população > 65 anos entre 1992 e 2011 ¹⁹. A realização mais frequente de exames imagenológicos de SNC e o aumento de uso de medicamentos imunossupressores em população idosa poderiam justificar o aumento da incidência observado nas últimas décadas ^{48,49}.

2.2 Diagnóstico

2.2.1 Biópsia/Líquor

O diagnóstico geralmente é estabelecido por análise histopatológica e IHQ de biópsia estereotáxica. Biópsia estereotáxica permite diagnóstico histopatológico entre 80% e 99% dos pacientes, porém a quantidade de material obtido, de três a dez fragmentos medindo entre 5 e 10 mm de comprimento por 1 mm de espessura, muitas vezes é insuficiente para realizar todos os procedimentos anátomo-patológicos e moleculares ⁵⁰.

O diagnóstico também pode ser realizado por análise de LCR ou aspirado vítreo em pacientes com acometimento ocular quando há restrição de acesso ao tumor ²². A análise líquórica deve ser preferencialmente realizada por citometria de fluxo e citologia oncótica. A presença de acometimento extraneural exclui o diagnóstico de LPSNC, sendo recomendada investigação ativa por meio de exames de imagem por tomografia com emissão de pósitron com 18-fluorodeoxiglicose (18-FDG-PET/CT) de corpo inteiro ou tomografia computadorizada (TC) de pescoço, tórax, abdômen e pélvis. A biópsia de medula óssea unilateral é recomendada para os casos que não são estadiados

com 18-FDG-PET/CT. Para o estadiamento, recomendam-se também hemograma completo, perfil metabólico, dosagem de DHL e sorologia para HIV⁵¹.

À histologia, o LPSNC é caracterizado por agrupamentos de centroblastos ou imunoblastos no espaço perivascular, com linfócitos reacionais, macrófagos e células microgliais entre as células tumorais ^{5,6,52}. Na maioria dos casos, as células malignas expressam antígenos de células B, como CD79b, CD19, CD20 e CD22. A ausência de imunoexpressão para CD138 corrobora os achados morfológicos centroblásticos sem características plasmocíticas ⁵³.

Há dois padrões de disseminação tumoral: o primeiro corresponde ao padrão de crescimento angiotrópico, com células neoplásicas que aparentemente migram pelo espaço perivascular ou espaço de Virchow-Robin. Nestes casos, interfere na barreira hematoencefálica e eventualmente permite a captação de contraste na RNM. O segundo padrão é o de invasão ao longo das raízes nervosas através da substância branca do corpo caloso ou do espaço meníngeo. O crescimento e a proliferação tumoral em direção ao espaço subependimal podem levar à invasão do espaço periventricular e à disseminação pelo SNC. ^{5,54}. Geralmente observa-se padrão de atividade proliferativa, com expressão de BCL6 em 60-80%, MUM1+ em 90% e CD10 em 10% dos casos ⁴². Resposta inflamatória secundária pode estar presente no LPSNC, com macrófagos ativados e células T reativas, o que pode estar associado a melhor prognóstico ⁵⁵.

O antígeno quimiotático para linfócitos B CXCL13 está associado ao tropismo das células neoplásicas para SNC, incluindo neoplasias linfoides. Os biomarcadores CXCL13 e IL-10 podem estar elevados no LCR de pacientes com LPSNC. CXCL13 (AUC 0,841) tem sensibilidade e especificidade para diagnóstico de LPSNC de 71% e 95%, e IL-10 (AUC 0,851) tem sensibilidade e especificidade de 64% e 93,4%, respectivamente. Tal sensibilidade é duas vezes maior do que citologia de LCR ou de citometria de fluxo para diagnóstico de LPSNC (Tabela 1). Altas concentrações de CXCL13 no LCR estão associadas a pior prognóstico ⁵⁵.

Tabela 1 - Sensibilidade e especificidade de biomarcadores CXCL13 e IL-10 (LCR) e aplicação diagnóstica de LPSNC ⁵⁵

Biomarcador	Sensibilidade	Especificidade	AUC	IC95%
CXCL13	71%	95%	0,841	0,779-0,892
IL-10	64%	94,10%	0,851	0,789-0,901
CXCL13 ou IL-10	84,20%	90,50%	0,974	0,815-0,919
CXCL13 e IL-10	50%	99,30%	0,746	0,675-0,809
Citologia	14%	-	-	-
Citometria de fluxo	20%	-	-	-

Com relação ao microambiente tumoral, pode se observar resposta inflamatória local com infiltrado de macrófagos e células T reativas. Infiltração de células T perivasculares podem estar associadas a melhor prognóstico, além de ser um alvo para terapias que potencializam resposta imune mediada por células T ⁵⁶.

2.2.2 Imagem

No Serviço de Neurocirurgia, comumente os pacientes eram submetidos à RNM com injeção de contraste gadolínio por ser o método radiológico mais sensível para diagnóstico de tumores em SNC, assim como de avaliação de resposta clínica ^{57,58}. A maioria dos pacientes apresenta massa cerebral isolada, isointensa ou hiperintensa em T1-*weighted* (RMN) com hipercaptação homogênea nas sequências pós-contraste, pouco edema e sem necrose. Na maioria dos casos, há lesão única (70%), sendo o hemisfério cerebral (66%), gânglio basal (27%) e o corpo caloso (24%) os sítios anatômicos mais acometidos ⁵⁹. A TC com contraste apresenta achados equivalentes, porém nenhum método de imagem é patognomônico do LPSNC. Os principais diagnósticos diferenciais incluem glioblastoma multiforme, metástases cerebrais entre outras ⁶⁰.

Aproximadamente 25% dos tumores têm outras lesões multicêntricas, não captantes de contraste, hiperintensas em T2-FLAIR (*fluid attenuated inversion recovery*), sendo estes achados consistentes com a disseminação

linfomatosa no cérebro que pode ocorrer na ausência de captação de contraste na RNM. T2-FLAIR tem maior sensibilidade para diagnóstico de lesões subclínicas, porém com menor especificidade. Alterações em T2-FLAIR podem ser secundárias à quimioterapia, à radioterapia de crânio total ou ao envelhecimento. Numa série analisada, porém, foi demonstrado que 88% das lesões em T2-FLAIR em LPSNC foram resolvidas após tratamento com HD-MTX, o que sugere tratar-se de lesões neoplásicas ⁶¹.

A *Diffusion-weighted imaging* analisa o coeficiente de difusão aparente de água em tumores hipercelulares como o LPSNC, com maior diferenciação entre tumores hipercelulares que se apresentam hiperintensos (LPSNC ou doença residual) e lesões com menor celularidade (gliomas malignos), o que aumenta a especificidade do método. Coeficientes de difusão muito baixos estão associados ao LPSNC ^{62,63}.

O *International PCNSL Collaborative Group* (IPCG) desenvolveu um sistema para avaliar a extensão da doença e a resposta clínica ao tratamento oncológico a fim de se obter uma padronização ⁵¹, conforme demonstrado no Quadro 1.

O exame de ¹⁸F-FDG PET apresenta maior sensibilidade e especificidade na detecção de acometimento nodal e extranodal de linfomas de alto grau, incluindo o LPSNC, além de avaliação de massas residuais no reestadiamento^{58,64,65}. O LPSNC apresenta celularidade densa com alto metabolismo e consumo de glicose. No achado do PET, encontra-se alta concentração do FDG, o que pode auxiliar no diagnóstico diferencial entre LPSNC e outros tumores. Numa meta-análise incluindo 129 pacientes imunocompetentes com LPSNC, tal exame teve sensibilidade de 0,88 (IC95% 0,8- 0,94), especificidade de 0,86 (IC95% 0,73- 0,94), quando comparados à RNM e à biópsia estereotóxica (IC95% 0,04- 0,32) ⁶⁰. Num estudo retrospectivo com 34 pacientes, a mediana de SUV (*standardized uptake value*) máxima foi de 22,17 ($\pm$ 5,03), geralmente com valores superiores aos encontrados no glioblastoma multiforme ⁶⁶.

Resposta	Imagem encefálica	Dose corticoide	Avaliação oftalmológica	Citologia LCR
Resposta completa	Sem lesão com captação de contraste	Nenhuma	Normal	Negativo
Resposta Completa Não Confirmada	Sem lesão com captação de contraste	Qualquer	Normal	Negativo
	Lesão com pequena captação de contraste		Pequena alteração no epitélio retiniano pigmentar	Negativo
Resposta Parcial	Diminuição de 50% na captação de contraste	Não disponível	Normal ou pequena alteração no epitélio retiniano pigmentar	Negativo
	Lesão sem captação de contraste		Diminuição de células vítreas ou infiltrado retiniano	Persistente ou Suspeito
PD	Aumento em 25% da captação de contraste	Não disponível	Recorrente ou novo acometimento	Recorrente ou positivo
	Surgimento de qualquer outra lesão			
Doença Estável	Qualquer outra situação não descrita acima			

Quadro 1 - Avaliação de resposta clínica ⁵¹

2.3 Prognóstico

LPSNC tem pior prognóstico em relação ao LDGCB sistêmico ^{14,39}. A SG mediana é inferior a 12 meses em pacientes tratados apenas com WBRT e de 30 a 40 meses em pacientes tratados com quimioterapia à base de HD-MTX^{12,41}.

Em dados do *National Cancer Data Base*, 9.165 casos de LPSNC tratados entre 2004 e 2013 demonstraram SG em 3 anos de 37,7% (IC95% 36,6-38,8) para todos os pacientes; 51,8% para aqueles tratados com poliquimioterapia; 37,7% com monoquimioterapia e 14,1% para os casos tratados somente com radioterapia. Após análise dos fatores confundidores, tratamento com monoterapia e radioterapia isolada estiveram associados à pior SG em relação à poliquimioterapia, com HR de 1,32 (IC95% 1,22- 1,44) e HR= 2,32 (IC 2,07- 2,59), respectivamente ⁶⁷. Em análise do banco de dados do *SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results)*, 4.142 casos com LPSNC evidenciaram SG em 1 ano de 47,8% (IC 46,2- 49,3) e SG em 3 anos de 38,2% (IC 37,8-38,6) ¹⁷. Estudo CALGB 50202 demonstrou SG mediana de 4 anos, porém novas linhas terapêuticas foram necessárias para 50% dos pacientes devido à alta taxa de recaída ²³.

2.3.1 Fatores clínicos de prognóstico

O Índice Prognóstico Internacional (IPI) é utilizado em outros tipos de linfoma por avaliação de SG e com algumas modificações para LPSNC. Em análise retrospectiva de 378 pacientes, foram identificados cinco fatores associados a pior prognóstico ^{68,69} (IPI modificado), conforme demonstrado a seguir:

- Idade > 60 anos;
- DHL elevada;
- Alta concentração de proteína no LCR (acima do limite da normalidade);
- Acometimento de regiões profundas do cérebro (periventriculares, gânglio basal, tronco cerebral e cerebelo) e

- Performance Status 2, 3 ou 4 *

(* PS 0= paciente ativo, sem restrições; PS 1 = paciente com restrição a atividades físicas extenuantes, porém paciente ambulatorial capaz de realizar atividades físicas leves/moderadas e autocuidado); PS 2= paciente sintomático, acamado <50% do dia, auto-cuidados preservados; PS 3= paciente sintomático, restrito ao leito >50% do dia, carente de cuidados mais intensivos; PS 4= paciente completamente dependente e restrito ao leito⁷⁰)

Considerando 1 ponto para cada um dos fatores descritos acima, a SG em 2 anos pode ser estimada conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Sobrevida Global (SG 2 anos) de acordo com o escore de prognóstico IPI modificado para LPSNC ⁶⁸

Pontos	SG ($\pm$ SD)
0 ou 1	80% ($\pm$ 8%)
2 ou 3	48% ($\pm$ 7%)
4 ou 5	15% ($\pm$ 7%)

Uma meta-análise com 783 pacientes avaliou o prognóstico e os efeitos do tratamento em primeira linha em pacientes com LPSNC maiores que 60 anos. Nesta população, KPS $\geq$ 70% foi fator prognóstico para mortalidade (HR=0,5; IC95% 0,41-0,62) ⁷¹. A maioria dos pacientes com LPSNC foram idosos e, consequentemente, com maior risco de neurotoxicidade à WBRT e com maior morbimortalidade. Por este motivo, muitas vezes é utilizada apenas quimioterapia isolada nesta população ⁷². O estudo prospectivo MATRix com 227 pacientes demonstrou SLP e SG inferiores em pacientes acima de 65 anos em comparação aos indivíduos com idade inferior a 65 anos tratados com metotrexato, citarabina, tiotepa e rituximab ⁷³. Tais dados são endossados por uma análise retrospectiva de dados do SEER com 5138 pacientes entre 1973 e 2014, cuja análise multivariada para SG demonstrou que idade >60 anos (HR= 1,834; IC95% 1,692- 2,004; p<0,001) foi associada à pior sobrevida. Tratamento com quimioterapia (HR=0,442; IC95% 0,407-0,480; p<0,001) foi associado à maior sobrevida ¹⁵.

Início de tratamento precoce também tem impacto no prognóstico. Num

estudo de fase 2 com 44 pacientes com LPSNC virgens de tratamento submetidos à imunoquimioterapia, indivíduos com início de tratamento acima de um mês do diagnóstico tiveram pior SLP em relação aos que iniciaram tratamento mais precoce (SLP 3 anos 20% x 59%, $p=0,05$) ²³.

2.3.2 Fatores histopatológicos de prognóstico

No LDGCB sistêmico, biomarcadores para recaída incluem *double hit* MYC+BCL2+. Duplo expressor (DE) MYC+BCL2+ e célula de origem ABC parecem também estar correlacionados com prognóstico. Com o critério de positividade a IHQ para MYC+ $\geq 40\%$ / BCL2+ $\geq 50\%$, é possível identificar o subtipo DE em 30% dos LDGCB, dos quais $> 50\%$ são do subtipo ABC. Estes pacientes apresentam SLP 5 anos de 44% e SG 5 anos de 39%. No entanto, dados no LPSNC ainda são inconclusivos ⁷⁴. No LDGCB sistêmico, imunoexpressão de BCL2, MYC, LMO2 e p53 são considerados de valor prognóstico ⁷⁵.

O tipo de célula de origem pelos critérios de Hans é estudado como fator de prognóstico, porém com resultados inconclusivos. A presença CD10+ e/ou BCL6+ e a negatividade para MUM1 por IHQ caracterizam o subtipo GCB e o oposto o subtipo não-GCB ¹⁰, conforme Figura 1. O ponto de corte para as reações de IHQ é de $\geq 30\%$. Teste de expressão genética de 20 genes foi validado para identificar COO em amostras parafinadas de LDGCB, facilitando sua caracterização ⁷⁶. Num estudo com 77 pacientes com LPSNC, foi observado concordância entre os critérios de Hans e LST assay de 83% ⁷⁷.

Figura 1 - Tipo de Célula de Origem conforme Critérios de Hans¹⁰ para IHQ (2004). BCL6 e CD10 são marcadores de Centro Germinativo de Células B. MUM1 é expresso em plasmócitos e no desenvolvimento tardio de Células B e está associado a subgrupo ABC em estudos de perfil de expressão genética. Se CD10 ou ambos CD10 e BCL6 forem positivos, a COO é do subgrupo GCB. Se ambos BCL6 e CD10 são negativos, a COO é do subgrupo Não-GCB. Se BCL6 for positivo e CD10 for negativo, a expressão de MUM define o subgrupo da COO: se MUM1 é negativo, a COO é subgrupo GCB; se MUM1 é positivo, a COO é subgrupo Não-GCB

No LPSNC, a imunoexpressão de MUM1 e BCL6 é de 95% e 60%, respectivamente, e a maioria dos casos apresenta COO não-GCB ^{41,53,78}. Num estudo com 82 pacientes com LPSNC, 79 (96,3%) foram classificados como não-GCB, 42 (51,2%) expressavam BCL6⁺ e MUM1⁺ sugerindo “não-GCB”. Trinta e três (40,2%) expressavam exclusivamente MUM1, o que sugere sobreposição entre *late GC* e *early post-GC*, justificando o fenótipo não-GCB e o pior prognóstico ⁵³. Contudo, a classificação da COO pelos critérios de Hans não teve valor prognóstico numa coorte retrospectiva de 115 pacientes com LPSNC ⁷⁹.

Num estudo retrospectivo com 31 casos de LPSNC tratados com HD-MTX, 26 (84%) pacientes foram caracterizados como não-GCB, a sobrevida mediana foi de 2,5 meses (0-6,6 meses) e 7,4 meses (4,4-10 meses) para os grupos GCB e não-GCB, porém não significante estatisticamente ¹². É importante ressaltar que o perfil transcricional das células neoplásicas do LPSNC é distinto do LDGCB sistêmico, mesmo quando a COO (GCB x ABC) é

a mesma, o que pode justificar o pior prognóstico e o comportamento mais agressivo do LPSNC. Pacientes com LPSNC ABC apresentam hiperexpressão e ativação da via do *Fibroblast Growth Factor*, associado à sobrevida e proliferação celulares, diferentemente do LDGCB sistêmico ABC ⁸⁰.

Alguns estudos evidenciaram que a expressão de BCL6 (IHQ) foi associada a melhor prognóstico ¹³. A análise imuno-histoquímica dos pacientes do CALGB50202 demonstrou que a hiperexpressão de BCL6 estava associada à menor SG ²³. Este resultado foi ratificado por um estudo prospectivo ⁸¹, porém outros evidenciaram o contrário: que a hiperexpressão de BCL6 estaria associada a melhor prognóstico ⁴¹. Uma das possibilidades para esta discrepância poderia ser que o significado prognóstico do BCL6 seja dependente da coexpressão do MYC ou BCL2 ou devido ao tipo de tratamento que os pacientes receberam nestes estudos.

A expressão de CD3 é um marcador de células T e não é frequente em linfomas de célula B, porém pode estar presente em LNHDBC EBV+, possivelmente devido à inativação do PAX5 que atua na diferenciação da célula B, o que permite a expressão do CD3 ⁸²⁻⁸⁴. É uma proteína com domínio extracelular, transmembrana e intracelular. A IHQ apresenta-se na membrana e citoplasma principalmente de células T normais e neoplásicas ^{85,86}.

Tumour Infiltrating Lymphocyte (TIL) é caracterizado pela presença de pelo menos um vaso de pequeno a médio calibre circundado por pelo menos duas camadas de células T à IHQ pela positividade de CD3 (linfócito T), FOXP3 (linfócito T regulador) e TIA-1 (células citotóxicas). É um fator de prognóstico positivo para sobrevida global, resposta tumoral ao tratamento em vários tipos de câncer (carcinoma ductal de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio, entre outros), tanto como variável categórica (presença ou ausência) como variável qualitativa numérica (contagem de TIL) ⁸⁷⁻⁸⁹. Num estudo retrospectivo com 62 pacientes com LPSNC, TIL esteve presente em 32% dos casos e foi associado à melhor resposta e sobrevida global ⁹⁰.

Num estudo retrospectivo, multicêntrico, com 100 LPSNC, necrose tumoral foi observada em 24% e TIL em 36%. O padrão de necrose tumoral observado foi do tipo coagulativo, caracterizado por coleções de células neoplásicas fantasmas que ocupam espaço na biópsia, além da presença de

células apoptóticas. TIL foi analisado em campo de pequeno a médio aumento, analisando os vasos ao redor do tumor ou das células tumorais, com fenótipo de células T presente e acumuladas em múltiplas camadas próximas à parede vascular ou entre a parede vascular e as células tumorais. Presença de TIL foi associada à melhor SG na análise multivariada quando comparada à ausência de TIL (SG: 59% $\pm$ 14% vs. 42% $\pm$ 9%, $P=0.02$, respectivamente). No entanto, a presença de necrose tumoral não foi considerada fator prognóstico em pacientes com LPSNC ⁵⁶. Num estudo com 30 pacientes do *International Extranodal Lymphoma Study Group*, um colar de CD3 perivascular reativo foi observado em 23% dos pacientes, todos com IPI modificado de risco baixo a intermediário ⁹¹.

2.4 Tratamento

O tratamento é composto de uma fase de indução seguida pela consolidação ⁹². A escolha do tratamento na fase de indução depende de características clínicas, tais como idade, *performance status* (PS), comorbidade e IPI.

A indução pode ser realizada com HD-MTX, imunoquimioterapia associada a HD-MTX, WBRT, entre outras. Não se recomenda tratamento isolado com corticosteroides devido à alta taxa de recidiva e à interferência no diagnóstico histopatológico se administrado antes da realização da biópsia. A escolha do tratamento de consolidação depende da resposta clínica obtida na fase da indução, da tolerabilidade do paciente e da toxicidade. Opções da fase da consolidação incluem observação, citarabina em altas doses, RT, ASCT, entre outras. Os agentes quimioterápicos precisam ter boa penetração pela BHE. Agentes alquilantes e esteroides têm boa penetração em doses convencionais; MTX e araC têm baixa penetração, porém em doses altas conseguem atravessar a BHE. Agentes antracíclicos, alcalóides da vinca têm baixa penetração e baixa disponibilidade no SNC, os quais necessitam de doses tóxicas para serem efetivas em tumores no SNC ⁹².

Apesar de avanços no tratamento do LPSNC, a taxa de recorrência em 2 anos é de 50% e um terço dos pacientes são refratários ao tratamento

inicial^{21,93}.

Devido ao risco de neurotoxicidade induzido pelo tratamento, recomenda-se realização de testes neuropsicológicos para as funções de execução, atenção, memória e velocidade psicomotora antes, durante e após o tratamento ^{21,94}.

2.4.1 Radioterapia

WBRT como terapia isolada era o tratamento de escolha no passado. Doses entre 36 a 45Gy apresentavam RC de 60% a 90%, porém com recidiva precoce e SG mediana 12-18 meses e alta morbi-mortalidade, incluindo neurotoxicidade precoce e tardia ⁹⁵. A neurotoxicidade é ainda mais prevalente quando associada à quimioterapia. Por estes motivos, além de o LPSNC ser uma doença multifocal e infiltrativa, radioterapia focal ou radiocirurgia não são recomendadas atualmente como primeira escolha terapêutica, porém pacientes que não respondem à quimioterapia podem se beneficiar desta terapia como resgate ^{16,94,95}.

O benefício da WBRT como consolidação também é questionado. Um estudo multicêntrico, randomizado, fase 3, com 581 pacientes, comparou quimioterapia baseada em HD-MTX com ou sem consolidação com RT, sem evidência de melhora na SG apesar do aumento da PFS no braço com RT ²².

Estudo prospectivo e observacional demonstrou que radiocirurgia com *gamma knife* associado à quimioterapia aumentou a SG de 27 meses para 48 meses em pacientes submetidos à radiocirurgia *versus* aqueles submetidos apenas à quimioterapia, com RC de todas as lesões e sem declínio neurológico. No entanto, trata-se de estudo não randomizado, e a análise dos dados encontra-se em andamento ⁹⁶.

Doses menores de radioterapia foram associadas a menor risco de perda neurocognitiva. Num estudo de fase 2, pacientes em RC foram submetidos à consolidação com citarabina e WBRT em doses menores (23,4 Gy) após indução com HD-MTX, sem perda de função cognitiva ⁹⁷. Tais dados, no entanto, devem ser analisados com cautela, devido ao risco de neurotoxicidade tardia ⁹⁸. Radioterapia foi associada a maior risco de toxicidade

neurológica tardia (OR 5,23, IC95% 2,33-11,74) ⁷¹.

Sintomas tardios associados à neurotoxicidade por WBRT incluem déficit de atenção, alterações de memória e de marcha, ataxia, incontinência, entre outros. Achados radiográficos incluem alteração de substância branca, aumento ventricular e atrofia cortical. Achados anátomo-patológicos incluem demielinização, perda neuronal hipocampal e aterosclerose de grandes vasos⁹⁹. Não há tratamento efetivo para estas complicações ¹⁰⁰.

2.4.2 Monoterapia ou Poliquimioterapia baseado em MTX

MTX em altas doses é o agente antineoplásico mais usado na fase de indução, pois possui boa penetração na BHE e depuração plasmática trifásica. Esquemas habituais incluem infusão rápida em 3 horas em ciclos de 14 ou 21 dias na dosagem $\geq 3 \text{ g/m}^2$. Doses $\geq 1 \text{ g/m}^2$ alcançam nível terapêutico no cérebro e doses $\geq 3 \text{ g/m}^2$ atingem nível terapêutico no LCR ¹⁰¹. Infusões contínuas em 24 horas não são mais eficientes; administração de mais de seis ciclos de HD-MTX está associada à maior taxa de RC ^{97,102}. Doses até $3,5 \text{ g/m}^2$ têm boa tolerabilidade, sendo as principais toxicidades: disfunção renal, mucosite, citopenias e raramente hepatite, esta ocorrendo principalmente em pacientes idosos ¹⁰³.

Uma meta-análise com 783 pacientes avaliou prognóstico e efeitos do tratamento em primeira linha em pacientes com LPSNC maiores que 60 anos. Nesta população, o tratamento baseado em HD-MTX aumentou a sobrevida quando comparado a WBRT (HR 0,70, IC95% 0,53-0,93). Não houve diferença entre HD-MTX associado à quimioterapia oral e outras terapias agressivas baseadas em HD-MTX (HR 1,39, IC 95% 0,90-2,15).

Estudo de fase 2 randomizado com 79 pacientes comparou HD-MTX ($3,5 \text{ g/m}^2$, D1) associado à citarabina (2 g/m^2) com HD-MTX isolado na dose de $3,5 \text{ g/m}^2$ a cada 21 dias, seguido de RT de consolidação. HD-MTX associado à citarabina ofereceu maior taxa de RC (46% x 18%, $p=0,06$) e de RG (69% x 40%, $p=0,009$), porém com maior incidência de neutropenia (90% x 15%, $p=0,00001$), anemia (46% x 10%, $p=0,00001$), complicações infecciosas (23% x 3%, $p=0,0002$), trombocitopenia (92% x 8%, $p=0,0001$) e hepatotoxicidade

(10% x 3%, $p=0,05$) ¹⁰⁴.

2.4.3 Imunoterapia e Imunoquimioterapia com Rituximabe

Rituximabe é um anticorpo monoclonal contra o antígeno CD20 presente em linfócitos B. Tem penetração limitada em SNC atingindo nível em LCR de 0,1% a 4,4% em relação ao nível sérico, porém a monoterapia com rituximabe levou à resposta radiológica em pacientes com LPSNC recidivados ¹⁰⁵. A meta-análise para avaliar o benefício do uso de rituximabe evidenciou que esse anticorpo levou a ganho de SLP 5 anos, com OR (*odds ratio*) 2,54 (IC95% 1,64-3,93, $p=0,0001$), e ganho de SG com OR 2,87 (IC 95% 2,02-4,08, $p=0,00001$) ¹⁰⁶. Desta forma, a adição de anti-CD20 tem sido recomendada como padrão no tratamento de LPSNC.

O benefício da adição de rituximabe a HD-MTX associado a um agente alquilante também foi avaliado em estudos clínicos. Num estudo de fase 2 com 52 pacientes expostos à indução com rituximabe, MTX, procarbazina e vincristina seguida de consolidação com WBRT em dose baixa, constatou-se a taxa de resposta de 79% e SLP 2 anos 57% ⁹⁷. Num estudo com 33 pacientes maiores de 65 anos submetidos à indução com rituximabe, MTX, procarbazina e vincristina seguida de consolidação com ASCT, obteve-se RG 94% e SLP 2 anos 79% ¹⁰⁷. Em outro estudo com 44 pacientes tratados com HD-MTX 8g/m² (D1), rituximabe 375mg/m² (D3) e temozolamida 150mg/m² (D7 a D11) seguida de consolidação com etoposídeo 5mg/kg em infusão contínua por 96 horas e citarabina a 2g/m² a cada 12 horas por 8 doses, obteve-se RG 77%, RC 68% e SLP 4 anos, semelhante aos resultados obtidos com esquemas que incluem WBRT ²³. Num estudo com 53 pacientes com população predominantemente idosa (62% acima de 60 anos), avaliou-se a terapia de indução com rituximabe, MTX e temozolamida seguida de consolidação com WBRT hiperfracionado e temozolamida de manutenção, obtendo-se RG 57% e SLP 64% ¹⁰⁸.

Num estudo de fase 2 (IELSG32), 219 pacientes LPSNC virgens de tratamento foram randomizados (1:1:1) para terapia de indução em três braços: braço A (MTX 3,5g/m² d1, araC 2g/m² d2-3, a cada 3 semanas), braço B (rituximabe 375mg/m² d5, MTX 3,5g/m² d1, araC 2g/m² d2-3, a cada 3

semanas) e braço C (rituximabe 375mg/m² d5, MTX 3,5g/m² d1, araC 2g/m² d2-3, tiotepa 30mg/m² d4 a cada 3 semanas) seguido de consolidação de acordo com a resposta clínica com radioterapia 36 Gy mais *boost* (reforço) de 9Gy ou BCNU 400mg/m² d1, tiotepa 5mg/kg d2-3 mais ASCT em caso de RC ou resposta parcial (RP) ou doença estável (DE); e em caso de PD, radioterapia com 40Gy mais *boost* (reforço) de 9Gy. A mediana de *follow-up* foi de 40 meses (24-76). Em termos de SLP, A x B (RC 0,68, IC95% 0,45-1,02, p=0,06), A x C (RC 0,66, IC95% 0,53-0,81, p=0,0001) e B x C (RC 0,63, IC95% 0,40-0,99, p=0,04). Em termos de SG, A x B (RC=0,73, IC95% 0,48-1,11, p=0,14), A x C (RC=0,65, IC95% 0,52-0,83, p=0,0004) e B x C (RC 0,57, IC95% 0,35-0,93, p=0,02). Tais dados sugerem o benefício da adição de rituximabe ao tratamento oncológico ⁷³.

Estudo prospectivo randomizado comparou MTX e temozolamida (braço A) *versus* MTX, procarbazina, vincristina e citarabina (braço B) em pacientes maiores de 60 anos com LPSNC virgens de tratamento. Braço B *versus* Braço A teve SLP de 9,5 meses (IC95% 5,3-13,8) *versus* 6,1 meses (IC95% 3,8-11,9), SG de 31 meses (IC95% 12,2-35,8 meses) *versus* 14 meses (IC95% 8,1-28,4 meses) e RG de 82% *versus* 71% (p=0,023), respectivamente, o que favorece o segundo esquema ¹⁰⁹.

O estudo Alliance/CALGB 50202 avaliou 44 pacientes expostos à quimioterapia não mieloablativa com MTX, rituximabe e temozolamida por 8 ciclos, seguida de consolidação com araC e infusão contínua de etoposídeo em 96 horas. Com mediana de seguimento de 4,9 anos, a SLP foi maior que 2 anos e a SG, superior a 5 anos, sem neurotoxicidade ²³.

2.4.4 Quimioterapia intraventricular

Quimioterapia intratecal via reservatório de Ommaya aumenta a concentração com maior duração no LCR em relação à quimioterapia intravenosa, pois a barreira hematoencefálica não interferiria na penetração das macromoléculas no LCR. Quimioterapia intraventricular com rituximabe e MTX em LPSNC apresentou TR 75% ¹¹⁰, porém análises retrospectivas não demonstraram benefício da adição de quimioterapia intratecal à HD-MTX, além

de maior risco de infecção e meningite ¹¹¹⁻¹¹³.

2.4.5 Terapia de manutenção com agente quimioterápico

Lenalidomida possui atividade em LPSNC tanto como agente único como combinado a outros quimioterápicos. Manutenção com lenalidomida aumentou a SLP, com perfil de toxicidade aceitável em pacientes com recaída de LPSNC ¹¹⁴. Estudos de fase 2 demonstraram perfil de segurança e atividade da lenalidomida aceitável em LPSNC. Manutenção com lenalidomida na dose de 5mg a 10mg após terapia de resgate foi associada à resposta durável em 5 de 10 pacientes com LPSNC. Foram detectados níveis terapêuticos de lenalidomida no LCR por 2 a 15 horas após uma dose 20mg ¹¹⁵.

2.4.6 Transplante de Medula Óssea Autólogo (ASCT)

Consolidação com HD-ASCT após quimioterapia parece aumentar a SG e SLP ¹¹⁶ devido à penetração no SNC ^{116,117}, porém outros estudos sugerem que regimes de consolidação com ASCT estão associados à piora da função cognitiva ⁹².

Num estudo de fase 2, uma população de 79 pacientes LPSNC virgens de tratamento foi submetida à indução com HD-MTX, citarabina, rituximabe e tiotepa, seguida de condicionamento pré-HD-ASCT com carmustina e tiotepa, obtendo TR 91%, SG 2 anos 87%. O tratamento foi considerado tolerável, pois, durante a fase de indução, 47% dos pacientes tiveram anemia grau 3, e 63%, trombocitopenia grau 4. Durante a fase de HD-ASCT, 50% apresentaram febre grau 3, e 93%, leucopenia grau 4, de acordo com o CTCAE v4.0 (*Common Terminology Criteria for Adverse Events*) ¹¹⁸.

O estudo randomizado PRECIS, em andamento, com 140 pacientes está comparando radioterapia (40Gy) ou ThBuCTX/ASCT como regime de consolidação após indução com R-MBVP-AraC. Dados preliminares demonstraram que ambas RT e ASCT foram associadas a SLP em 2 anos de 63% e 86%, SG 2 anos de 64% e 65% nas coortes da RT e HD-ASCT, respectivamente ¹¹⁵.

2.4.7 Tratamento de resgate

Apesar da alta taxa de resposta inicial, a maioria dos pacientes apresenta PD em algum momento após tratamento inicial baseado em HD-MTX. O emprego de HD-MTX após PD pode ser efetivo, principalmente em pacientes que tiveram resposta prévia a este agente. Num estudo retrospectivo com 22 pacientes com recaída retratados com HD-MTX, obteve-se RG de 91% na primeira recaída e de 100% na segunda recaída ¹¹⁹. Num estudo de fase 2 com 27 pacientes avaliados, o tratamento em segunda linha com citarabina e etoposídeo seguido de ASCT com condicionamento baseado em tiotepa, busulfan e ciclofosfamida apresentou RC de 90%, com SLP 41,1 meses e SG 58,6 meses ¹²⁰. A WBRT pode ser utilizada como terapia de resgate, com RG de até 74% e SG 10,6 meses num estudo com 27 pacientes ¹²¹.

2.4.8 Estudos de Pesquisa Clínica Fase 1/2 em pacientes com LPSNC recidivadas

2.4.8.1 Ibrutinib

Ibrutinib é um inibidor oral do *Bruton tirosina kinase* (BTK), o qual reduz a proliferação celular e induz apoptose. Além disso, potencializa a resposta da célula B via mecanismo independente da BTK ^{78,122}. Como pacientes com LPSNC podem ter alta taxa de mutação do receptor da célula B (BCR) e da via do MYD88, há plausibilidade biológica no uso de ibrutinibe em LPSNC. Estudo de fase 1 com 13 pacientes com LPSNC refratários demonstrou penetração suficiente do Ibrutinib em SNC, sendo bem tolerado em doses de 560mg e 840mg, com Resposta Global de 75% e SLP de 4,6 meses. Apenas um paciente teve aspergilose pulmonar e resistência ao ibrutinibe associada à mutação CARD11 (R179Q), CD79B e/ou A20 (TNFAIP3) ^{123,124}.

Ibrutinib é um antagonista *in vitro* ao efeito dos agentes antifolatos em linhagem celular de LDGCB sistêmico ABC, por isso os estudos de fase 1/2 não associam ibrutinibe a metotrexato. Ele parece atuar como sensibilizador à quimioterapia e confere resposta superior à do HD-MTX. Estudo de fase 1 com

o esquema TEDDi-R (Temozolamida, Etoposídeo, Doxorubicina Lipossomal, Dexametasona, Ibrutinib, rituximabe incluindo ibrutinibe monoterapia durante 2 semanas) em pacientes virgens de tratamento e com recaída teve RG de 94% e RC 86%, porém com alta toxicidade: 94% de neutropenia grau 4 e 39% de aspergilose invasiva pulmonar ou cerebral, com mortalidade de 28%; bastante alta se comparada à taxa de mortalidade de 2-10% em pacientes tratados com quimioterapia baseada em HD-MTX ^{124,125}.

Ratos *knocked-out* para BTK (BTK^{-/-}) inoculados com aspergilos apresentaram maior mortalidade quando comparados a ratos BTK^{+/+}. Isso demonstra o papel do BTK na imunidade a esta infecção ¹²⁵. A resposta das células mieloides aos esporos fúngicos depende de sinalização via BTK para induzir expressão de TNF-alfa e o recrutamento de neutrófilo ¹²⁴. A Figura 2 ilustra a sinalização celular via BTK.

FONTE: Hendriks *et al.*, 2014 ¹²⁶

Figura 2 - Sinalização celular via BTK ¹²⁶. A ativação do Receptor de Célula B (BCR) leva à sinalização intracelular e à formação de *micro-signalosome*, que é composto de VAK, PI3K, BTK, SLP65 e phospholipase PLCγ2. BTK é o principal responsável pela ativação de PLCγ2, levando a influxo de Cálcio e ativação de receptores de fatores nucleares de transcrição de células T ativadas (NFAT) e NF-κB, além da ativação de ERF1 e ERF2. A ativação de BTK também leva à ativação da proteína da síndrome de Wiskott-Aldrich (AWASP), o que induz a mudança no citoesqueleto associada à ativação de BCR. AKT é ativado também pelo PI3K, que fosforila fatores de transcrição FOXO, inativando-os. AKT também bloqueia proteínas apoptóticas, como BH3, BAD, liberando o BCL-X L e estabilizando o MCL1

2.4.8.2 Temsirolimus

Temsirolimus é um inibidor do mTOR, importante na via do PI3-K/AKT/mTOR e em várias vias de sinalização *pro-survival*, pois regula a síntese proteica e o crescimento celular. Num estudos de fase 1/2 em pacientes com LPSNC recidivados, a monoterapia com temsirolimus obteve RG 54%, SLP 2,1 meses, porém com mortalidade de 13,5% (principalmente pneumonia) ¹²⁷.

2.4.8.3 *Imunoterapia*

Imunoterapia pode ter um papel promissor no futuro do tratamento do LPSNC. Células T e macrófagos ativados levam à resposta inflamatória local e podem estar associados a melhor prognóstico. Isso sugere que a potencialização do sistema imune mediado por células T pode ser efetiva ⁵⁵. É frequente o ganho do número de cópias do 9p24,1/*PD-L1* e *PD-L2* (*programmed death ligands 1* e *2*) e o aumento de expressão de proteínas PDCD1, PD-L1 e PD-L2 em LPSNC. Nivolumabe é um anticorpo humano IgG4 cujo alvo é a proteína PDCD1, o qual impede a ligação do PD-L1 presente no LPSNC com o PDCD1 do linfócito. Estudo de fase 1 (LPSNC refratários ou com recidiva) avaliou monoterapia com nivolumabe em quatro pacientes. Em seguimento de 13 meses, todos os pacientes obtiveram RC em 2 meses ³³. Estudo de fase 2 com Nivolumabe em LPSNC recidivados encontra-se em andamento.

2.4.8.4 *Lenalidomida*

Lenalidomida é um agente imunomodulador oral com efeito tumoral pleotrópico que inclui estimulação de célula T e expansão de células NK. Ele possui ação antagonista ao IRF4 e MYC, com efeito pró-sobrevivência ^{128,129}. Num estudo de fase 1, 14 pacientes com recaída foram expostos a lenalidomida EV e rituximabe endovenoso e intraventricular, com RG de 64% e SLP mediana 6 meses, sem mortalidade relacionada ao tratamento, sendo recomendada dose de 15mg/dia ¹³⁰. Num estudo retrospectivo com 8 pacientes com LPSNC R/R com última linha de resgate incluindo MTX, rituximabe, radioterapia ou ressecção subtotal, a manutenção com lenalidomida na dose de 5 a 10mg/d) evidenciou alta RG. Cinco pacientes obtiveram RC em até 2 anos após início de tratamento. Desta forma, sugeriu-se que a manutenção com lenalidomida poderia ser uma opção para terapia de resgate ¹³⁰. Estudo de fase 2 com lenalidomida e rituximabe em pacientes com recaída teve taxa de resposta de 63% e SLP 8,9 meses (ASH2016). O Quadro 2 demonstra alguns estudos de fase 1/2 em andamento.

Molécula	Desenho	Taxa de resposta	SLP	Comentários
Ibrutinib	fase 1 MSKCC em recaída LPSNC	75%	4,6 meses	um caso de aspergilose pulmonar, resistência ao ibrutinib com mutação CARD11
Ibrutinib	fase 2 em recaída LPSNC e linfoma intraocular	56%		um caso de aspergilose pulmonar, análise final pendente
DA-TEDDi-R com monoterapia com ibrutinibe	fase 1 em pacientes com recaída LPSNC	94% ibrutinib, 84% RC com TEDDiR		39% taxa de aspergilose invasiva nos pulmões e cérebro, mortalidade relacionada ao tratamento em 28%
Temsirolimus	fase 1/2 em recaída LPSNC	54%	2,1 meses	mortalidade relacionada ao tratamento: 13,5%
Nivolumabe	fase 2 em recaída LPSNC, linfoma testicular			em andamento
Lenalidomida/rituximab	fase 1 em recaída LPSNC	64%	6 meses	coorte retrospectiva: aumento em 12 vezes da duração de resposta com manutenção de lenalidomida
Lenalidomida/rituximab	fase 2 em recaída LPSNC	63%	8,9 meses	análise final pendente
Pomalidomida/dexametasona	fase 1 em recaída LPSNC ou recaída linfoma intraocular			em andamento

Quadro 2 - Estudos de fase 1 e fase 2 em andamento

2.5 Fisiopatologia molecular do LPSNC

A fisiopatologia molecular do LPSNC ainda não se encontra completamente definida. Porém o avanço das técnicas de biologia molecular, em especial o sequenciamento de todo o exoma, a hibridização genômica comparativa e a análise de perfil de transcrição, do microambiente tumoral e de perfil de expressão gênica têm permitido a identificação de genes alvo envolvidos na sua patogênese ^{24,131,132}.

EBV não está associado à fisiopatologia do LPSNC em pacientes imunocompetentes. Num estudo com 70 pacientes imunocompetentes, a hibridização *in situ* para EBV foi negativa em todas as biópsias ⁵³.

A ativação da via NFκB parece estar diretamente associada à patogênese do LPSNC. Esta via atua de modo a facilitar a transcrição de genes associados à sobrevivência, proliferação e invasão celular, como *IRF-4*, *RSGS13*, *Ciclina D2*, *BCL2*, *BCL2A1* e *XBP-1* (Figura 3). A ativação crônica da via do BCR, principalmente decorrente de mutações do *MYD88/IRAK* e do *B-cell antigen receptor-associated protein cluster of differentiation* (*CD79B*), coopera para ativar a via NFκB ^{24,34}. Num estudo com 30 pacientes, mutações no *CD79b* foram associadas à melhor SLP em até 2 anos ¹³³. A Figura 3 - ilustra a via no NFκB.

MYD88 é uma proteína adaptadora usada pela maioria dos receptores do tipo Toll-like e do receptor da Interleucina-1 (*IL1*) para ativar a via NFκB por meio do receptor associado à cinase *IL1* (*IRAKs*). Mutações no domínio citosólico do *MYD88* por substituição de leucina por prolina na posição 265-*L265P* ocorrem em 55% dos pacientes com LPSNC ¹³¹. Mutações do *MYD88 L265P* promovem desenvolvimento de LDGCB em ratos ¹³⁴. Estas mutações também são frequentes no linfoma ocular ¹³⁵. Interessantemente, mutações no *MYD88* e *CD79B* são raras no LDGCB sistêmico com envolvimento de SNC, o que sugere patogênese molecular distinta entre as duas doenças ¹³⁶. Num estudo com 80 pacientes com LPSNC, mutações no *MYD88* foram associadas a melhor prognóstico ⁷⁷. No LDGCB sistêmico ABC, mutações do gene *MYD88* são menos frequentes, com ocorrência em 39% dos casos ¹³¹. A mutação concomitante de *MYD88 L265P* e *CD79B ITAM* foi encontrada em 37% do

significativas no cromossomo 6q. Além disso, observou-se deleção do 6q21-23 em 40% a 60% dos LPSNC, associado a pior prognóstico. Prováveis genes envolvidos nesta deleção incluem o A20 (*TNFAIP3*), um regulador de diferenciação da célula B, *PRDM1* e uma tirosina fosfatase, *PTPRK* ^{131,138}. Sequenciamento de todo o genoma e estudos de hibridização demonstraram redução do número de cópias no 9p21.3 em até 80% dos casos. Esta anormalidade foi associada a alterações do regulador de ciclo celular *CDKN2A* ³⁴. Identificou-se também que maior número de cópias da protease inativadora de *TNFAIP3* e *MALT1* promove ativação da via do NFkB ¹³⁸

Estudos de PEG concluíram que o LPSNC é uma entidade heterogênea, com espectro de ABC associada à ativação da via NFkB e GCB. ^{41,53}. A expressão de *BCL2* não relacionada à t(14;18)(q32;q21) é frequente ^{13,37}. Há evidência de hipermutação somática, rearranjos e mutações de genes de Ig e preservação de sítios *open reading frame* sugestivas de passagem pelo centro germinativo, assim como presença de morfologia do tipo centroblastica e ausência de correlação com EBV ^{14,37,39}. Assim como o LDGCB sistêmico, o LPSNC pode apresentar translocações envolvendo o gene *BCL6*, deleções 6q, hipermutação somática em proto-oncogenes, tais como *MYC* e *PAX5*, e inativação do *CDKN2A*. Porém, diferentemente do linfoma sistêmico, o PEG demonstrou que o LPSNC é caracterizado por expressão gênica de genes relacionados à adesão à matriz extracelular, como *MUM1*, *CXCL13* e *CHI3L1*. Hipermutação somática de segmentos do gene da cadeia pesada de Ig (IgV_H) sugere presença de proliferação celular dependente de antígeno. Consequentemente a patogênese tumoral depende da ativação de células B circulantes de maneira dependente de antígenos, as quais migram e colonizam o SNC devido à expressão de genes relacionados à adesão celular e à matriz extracelular. Contudo, os mecanismos responsáveis pelo tropismo pelo SNC ainda não são conhecidos ^{54,131,139}.

Outros genes possivelmente associados à patogênese do LPSNC incluem *JAK-1* e kinase PIM ¹³². PIM1 parece cooperar com *MYC* na linfomagenese, sendo frequentemente hipermutado no LPSNC ¹²⁴. A ativação do PIM kinases, das vias PI3K/mTOR e de JAK/STAT favorecem a sobrevivência celular. Podem estar hiper-reguladas tanto em nível transcricional como

proteico no LPSNC ^{24,132}.

2.5.1 Genes selecionados para o estudo

2.5.1.1 *Gene MYC (Fator de Transcrição bHLH)*

O gene *MYC*, conhecido como Fator de Transcrição bHLH, está localizado no cromossomo 8q24,21. A proteína codificada por esse gene atua como proto-oncogene. Trata-se de uma fosfoproteína nuclear com função na proliferação celular, apoptose, crescimento celular, atividade da telomerase, metabolismo energético por meio da biogênese ribossomal e diferenciação celular, conhecido como padrão de assinatura do *MYC* ^{27,35,140,141}. A proteína *MYC* forma um heterodímero com o fator de transcrição *MAX*, o qual se liga a uma sequência *E box* de DNA, regulando a transcrição de vários genes. Sua hiperexpressão está associada a vários tipos tumorais. A t(8;14)(q24;q32) promove a fusão do gene *MYC* e a porção promotora do gene da IgVh está associada ao linfoma de Burkitt ^{140,142}.

Rearranjos envolvendo o gene *MYC* ocorrem em 10%-15% dos LDGCB sistêmicos, estando associados a pior prognóstico independentemente do tipo do gene parceiro envolvido ^{143,144}. Rubenstein demonstrou maior expressão mRNA *MYC* em LPSNC comparado com LNHDGCB sistêmico através de PEG e RT-PCR ¹⁴⁵. A ativação da via NFkB pode de forma alternativa desregular a expressão do *MYC* ^{146,147}.

A expressão de *MYC* é desregulada em tumores por diversos mecanismos, como translocação cromossômica, mutações, reprogramação epigenética, aumento de estabilidade proteica e translação aumentada, entre outros ¹⁴⁸⁻¹⁵⁰. Mutações hipersomáticas aberrantes do proto-oncogene *MYC* também têm sido observadas em estudos de expressão gênica com LPSNC^{34,131}. PIM1, que interage com o *MYC* na linfomagenese, também é frequentemente identificado como um alvo de hipermutação somática aberrante no LPSNC, o que demonstra possível papel da ativação do *MYC* no LPSNC ¹³⁸. Hiperregulação de microRNAs (miRNAs) associados com a via do *MYC* também foi demonstrada em LPSNC ¹²³.

No estudo CALCG 50202, evidenciou-se hiperexpressão de *MYC*, *PIM-1* e genes induzidos por IL-4, como *XBP1* em LPSNC ²³. Superregulação dos microRNAs miR-17-5-p, miR-20a, miR-9 que estão associados à hiperexpressão de *MYC* também foi encontrada no LPSNC ¹⁵¹.

Num estudo com 75 pacientes LPSNC HIV negativos, a prevalência de del(6)(q22) e de translocação dos genes *BCL6*, *IGH* e *MYC* foi de 45%, 17%, 13% e 3%, respectivamente. A presença de del(6)(q22) e/ou translocação de *BCL6* foi associada à pior SG ($p=0,0097$), independentemente de acometimento cerebral profundo ou uso de HD-MTX ⁶⁹.

2.5.1.2 Gene *BCL2* (*B-cell lymphoma 2*)

BCL2 é um gene localizado no cromossoma 18q21,33 que codifica uma proteína antiapoptótica de mesmo nome. Encontra-se expresso na maioria dos tecidos, mas não no CG, onde sua transcrição é suprimida pelo gene *BCL6* ³⁵. A translocação de *BCL2* para o *locus* da IgVh na t(14;18) produz ativação constitucional de *BCL2*, favorecendo a formação de clones de linfócitos de longa sobrevida suscetíveis a defeitos moleculares adicionais. Esta anormalidade favorece a tumorigênese no linfoma folicular principalmente quando associado à desregulação do *MYC* ^{35,148,152}. A t(14;18) está presente em 10% a 40% do LDGCB ^{153,154}. A hiperexpressão de *BCL2* está associada a maior número de cópias do 18q21,33 ³⁴. A proteína codificada usualmente está ausente ou expressa em baixos níveis no CG dos folículos secundários ^{9,155}.

Em linfócitos B de murinos com mutação MYD88 L265P, observa-se ativação da via NFkB e hiperproliferação celular. Entretanto, a expressão de *BCL2* é necessária para sustentar a sinalização dependente do MYD88 L265P ^{156,157}.

Na era pré-rituximabe, a hiperexpressão do gene *BCL2* foi associada a pior prognóstico no LDGCB sistêmico ^{154,158}. Na era pós-rituximabe, sua hiperexpressão deixou de ter impacto prognóstico na SG no LDGCB ¹⁵⁹⁻¹⁶¹. O rituximabe melhorou a SLP em pacientes *BCL2*-positivos (56% versus 25%, $p=0,0001$) e *BCL2* negativos (59% versus 33%, $p=0,02$). Rituximabe também melhorou a SG nos pacientes *BCL2* positivos (56% versus 42%, $p=0,01$) e

BCL2 negativos (58% versus 52%, $p=06$) ¹⁵⁹. Este imunoterápico induz apoptose por diversas vias de sinalização intracelular, incluindo a via do gene *BCL2* e do *B-cell lymphoma extra large* (BCL-xL). Também induz regulação reacional de IL-10 e fosforilação da via do transdutor de sinal de ativador de transcrição 3 (STAT3). Em outro estudo, a hiperexpressão de BCL2 não foi associada à pior SG, independente da célula de origem ^{160,162}.

2.5.1.3 Gene *LMO2* (*LIM domain only 2*)

O gene LIM domínio único 2, conhecido como Rombotina 2 ou *Transparent Testa Glabra* está localizado no cromossomo 11p13 ¹⁶³. Codifica uma proteína rica em cisteína altamente conservada, com dois domínios-LIM, e um domínio curto amino-terminal com atividade de transativação e de transcrição; com papel crucial na hematopoese, estando geralmente hiperconservado ^{148 164}. Está expressa normalmente em células do centro germinativo, nas células precursoras hematopoiéticas e atuam no desenvolvimento do timo e na angiogênese ^{163,165,166}. Apresenta papel importante na leucemia linfoblástica T, sendo encontrada em tumores derivados de células do CG como LF, e LDGCB. Pode auxiliar na diferenciação entre LF e outros linfomas de células B pequenas ¹⁶⁴ e de tumores sólidos, como câncer de próstata ¹⁶⁷.

LMO2 regula a expressão gênica pela formação de complexos ligantes no DNA, como LDB1, E2A, HEB, Lyl1, ETO2, and SP1. Sua hiperexpressão em LDGCB sistêmico está associada ao maior número de centrômeros, podendo levar à separação cromossômica incorreta, contribuindo para a oncogênese. Além disso, pode interferir na expressão de transcriptoma composto de 311 genes de modo a contribuir para a hiperexpressão ou hipoexpressão de outros genes específicos ²⁸. Em LDGCB, a ausência de expressão do LMO2 está associada à presença de translocações do MYC ¹⁶⁸.

O anticorpo anti-LMO2 foi validado para avaliar expressão do *LMO2* por IHQ. Num estudo, a expressão de LMO2 foi observada nos CG normais. No LDGCB se correlacionou com a expressão de marcadores de CG (BCL6 e CD10) e a ausência de expressão de marcadores não-CG (MUM1/IRF4 ou

BCL2)¹⁶⁹. A LMO2 é uma proteína nuclear e seu ponto de corte de positividade à IHQ é de 30%¹⁶⁴. Numa análise retrospectiva com 49 pacientes LPSNC, foi observada expressão proteica de LMO2, HGAL e BCL6 em 52%, 65% e 56% dos casos. A expressão de LMO2 foi associada à melhor SLP (25 x 8 meses, $p=0,071$) e SG (34 x 11 meses, $p=0,027$), e a expressão de *BCL6*, à maior SG (39 x 13 meses, $p=0,055$) e SLP (24 x 8 meses, $p=0,006$)¹⁷⁰.

2.5.1.4 Gene *MGMT* (O-6-methylguanine-DNA-methyltransferase)

O gene *MGMT*, localizado no cromossomo 10q26.3, codifica uma proteína reparadora de DNA envolvida na defesa celular contra mutagênese e toxicidade contra agentes alquilantes. A proteína catalisa a transferência de grupos metil da posição O-6-alkilguanina e outras metilações do DNA para sua própria molécula, reparando rupturas do DNA¹⁷¹. Em ratos *knocked-out* p53, não há transcrição desta proteína, o que sugere sua expressão dependente de p53¹⁷².

A proteína *MGMT* é uma enzima reparadora de DNA que protege a célula de agentes alquilantes ao remover grupos alkyl da posição O⁶ da guanina¹⁷³. Sua ausência à IHQ, utilizando ponto de corte de 5% a 15%, foi correlacionada com metilação da região promotora do gene *MGMT*^{174,175}. Esta hipermetilação mostrou-se um biomarcador de bom prognóstico em LDGCB e glioblastoma multiforme e câncer de mama tratados com agentes alquilantes^{29,176}.

Num estudo com 24 pacientes com LPSNC, a metilação do *MGMT* e a ausência de expressão proteica estavam presentes em 54% dos casos, sendo que a metilação de *MGMT* tinha alta correlação com a perda de expressão proteica (ponto de corte da IHQ: 10%) possivelmente devido à maior homogeneidade celular do LPSNC (coeficiente de correlação= -0,49; Teste Exato de Fischer: $p<0,01$). Neste estudo, a hipermetilação da região promotora parece estar associada à maior taxa de SG e ocorre principalmente em pacientes maiores que 60 anos de idade²⁹.

2.5.1.5 Gene *POU2F1* (*POU class 2 homeobox 1*)

O gene *POU2F1*, conhecido como OCT1 e localizado no cromossomo 1q24,2, codifica uma proteína com função de fator de transcrição da superfamília POU. Além de membro de proteínas transmembrana superfamília carreadora de solutos, é responsável pelo transporte e captação de nutrientes, metabólitos, drogas e toxinas. Os membros desta superfamília contêm uma região de 160 aminoácidos pela qual se ligam ao DNA em outra região específica com sequência de oito bases nitrogenadas ATGCAAAT^{177,178}. Esse gene atua na diferenciação e proliferação das células B, e a hiperexpressão de OCT1 está associada à maior sobrevivência celular em linfomas com t(14, 18)¹⁷⁶. A expressão de *OCT1* está elevada em linhagem celular de linfoma e aumentou a suscetibilidade tumoral aos agentes quimioterápicos irinotecano e paclitaxel, possivelmente por facilitar o transporte dos antineoplásicos do meio extracelular para o meio intracelular³⁰. Porém, estudos com tumores com linhagem epitelial demonstraram que a hiperexpressão de OCT1 se associou a pior prognóstico¹⁷⁹.

POU2F1 é necessário para transformação oncogênica e promoção de linfoma em modelos de ratos *knocked-out* para Tp53¹⁸⁰. A ablação de *POU2F1* está associada com metabolismo oxidativo, elevação de expressão de ROS, aumento de sensibilidade a estresse oxidativo e genotóxico e diminuição de iniciação tumoral em modelos xenográficos¹⁸⁰.

2.5.1.6 Gene *PDCD1* (*Programmed cell death-1*)

O gene *PDCD1*, conhecido como *PD1* e localizado no cromossomo 2q37.3, codifica uma proteína de superfície de membrana celular da superfamília das Ig¹⁸¹. Outros membros da família CD28 incluem o antígeno associado a linfócito citotóxico T (CTLA-4) e coestimulador induzível ICOS com papel na resposta celular imune. *PD1* é pouco expresso em células B^{182,183}. Sua proteína geralmente é expressa em células do CG e atua como um ponto de checagem em linfócitos e na diferenciação celular. Hiperexpressão de PD1 foi considerada fator de prognóstico positivo em pacientes com LF¹⁸⁴. O gene

é expresso em célula pró-B com papel na diferenciação celular, bem como em várias células imunes, como células T ^{75,148}.

Foi identificado ganho do número de cópias do 9p24,1/*PD-L1*/*PD-L2* em pacientes com LPSNC, com concomitante hiperexpressão das proteínas *PD-L1*/*PD-L2* ³⁴. Esta hiperexpressão funciona como mecanismo de escape das células neoplásicas do sistema imune, sendo um possível alvo terapêutico ³⁴. Num estudo com 24 pacientes, 13% (3/24) apresentaram translocação envolvendo o *PD-1* ^{34,185}.

Alteração do número de cópias de *PD-L1* e *PD-L2* está associada a aumento de expressão de *PD-L1* e *PD-L2* no LPSNC. Estas proteínas interagem com o receptor *PD1* presente nas células T, ativando a sinalização celular via *PD1*. Em consequência, há diminuição da ativação do receptor da célula T (*TCR*), proliferação e sobrevivência de fatores de transcrição, o que causa redução da resposta imune antitumoral ³⁴.

A presença de TIL com imunoexpressão de *PDCD1* está diretamente relacionada à imunoexpressão de *PDL1* na célula tumoral em vários tumores, inclusive LPSNC ^{75,186}. A hiperregulação de *PDCD1* é consequência de exaustão imune e é um marcador de célula T disfuncional, o que facilita a tumorigênese ⁷⁵. A hiperexpressão de *PDL1* é considerada um marcador de alta resposta imune antitumoral, sendo consequência à infiltração tumoral de células T. ¹⁸⁷. O bloqueio da via mediada pelo *PDCD1* leva à reversão do fenótipo da *exhausted T-cell* e à normalização da resposta antitumoral, sendo um racional para o tratamento com imunoterapia contra o câncer ¹⁸⁸⁻¹⁹⁰.

No LPSNC, o ganho do número de cópias do 9p24.1/*PDL1*/*PDL2* está associado ao aumento da expressão proteica do *PDL1*/*PDL2*, atuando como um mecanismo de escape imune. Isso sugere que drogas anti-*PDCD1* poderiam ter um papel no tratamento ³⁴. A imunoexpressão de *PDCD1* está associada à pior SG ⁷⁵.

2.5.1.7 Gene *BCL6* (*B-cell lymphoma 6*)

O gene *BCL6*, localizado no cromossomo 3q27,3, codifica uma proteína fator transcrição *zinc finger* com um domínio N-terminal POZ. Esse gene atua

como um repressor de transcrição de sequência específica e modula a transcrição de células B IL4 dependente de STAT. O domínio POZ interage com outras proteínas, causando repressão tumoral. No LDGCB o gene *BCL6* pode estar translocado e hipermutado o que favorece a tumorigênese ¹⁹¹. Em 30 pacientes com LPSNC e grupo controle LDGCB sistêmico estudados, a expressão de *BCL6* foi maior em indivíduos com LPSNC quando comparados com LDGCB sistêmico COO ABC ($p=0,02$). Isso sugere a importância do *BCL6* no LPSNC ¹⁹².

O gene *BCL6* codifica uma proteína repressora de transcrição de sequência específica, formando um complexo com diferentes corepressores e com histona. Assim, reprime-se a transcrição de diferentes genes alvos por meio de sua ligação direta com o DNA ou indiretamente com repressão de atividade transcricional ^{148 192}.

Encontra-se usualmente expresso em centroblastos, na maioria dos centrócitos e em células T CD4+ do CG. Por outro lado, encontra-se inativado durante a diferenciação de centrócito para células B de memória ou plasmócitos ^{193,194}.

O gene *BCL6* inibe o gene supressor do ciclo celular p21, inibidor da quinase dependente de ciclina, bem como o programa antiapoptótico ao suprimir a expressão de *BCL2*. Atua na resposta ao dano do DNA quando da regulação dos genes *p53*, *ATR* e *CHEK1* e impede a ativação prematura de centroblastos ao inibir os genes ativadores de linfócitos B *CD69*, *STAT1* (transdutor de sinal e ativador de transcrição 1) e *CD80* ^{35,194}. A desregulação de *BCL6* pode provocar o bloqueio da diferenciação de células pós-CG e determinar o acúmulo de células hipermutadas, o que facilita a tumorigênese¹⁹⁵.

A proteína repressora *transcricional zinc-finger* é necessária para formação de CG. Sua correlação com prognóstico é contraditória em alguns estudos ^{41,170}. Sua hiperexpressão está associada à melhor SG em pacientes tratados com CHOP-símile ¹⁹⁶.

Alterações cromossômicas envolvendo o gene *PRDM1* são relativamente comuns (23% a 37%), levando a bloqueio da diferenciação de células pós-CG e acúmulo de células hipermutadas, o que contribui para a

linfomagênese. A maioria das translocações envolvendo *BCL6* no LPSNC envolvem parceiros distintos do gene da Ig, ao contrário do observado no LDGCB sistêmico ⁶⁹. Segundo Winter *et al.* ¹⁹⁷, pacientes sem expressão de *BCL6* por IHQ beneficiam-se mais da adição de rituximabe à quimioterapia (SG 42% x 76%, CHOP x R-CHOP) do que pacientes *BCL6* positivo (SG 73% x 74%, CHOP x R-CHOP), provavelmente devido à supressão da via NFkB pelo rituximabe ¹⁹⁷. O estudo CALGB 50202 também correlacionou hiperexpressão de *BCL6* à IHQ com pior SG ²³. Estudos retrospectivos, porém, correlacionaram hiperexpressão *BCL6* com melhor SG ^{41,198}.

2.6 Justificativa

O aumento de incidência do LPSNC, associado à alta morbimortalidade, justifica a maior necessidade de pesquisas clínicas e moleculares, a fim de buscar melhores opções terapêuticas e de qualidade de vida.

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva unicêntrico. Seu desenho foi selecionado por tratar-se de uma doença rara, objetivando a maior obtenção possível de dados clínicos e material histopatológico confiáveis. Trata-se do maior estudo disponível, por meio do qual se descrevem as características clínico-epidemiológicas de LPSNC na população brasileira, e o único que avalia expressão gênica e correlação prognóstica.

É importante a realização de pesquisas genéticas em diferentes etnias e populações. A população brasileira é considerada um modelo para estudos genéticos e fenotípicos em mistura étnicorracial e pode apresentar características genotípicas distintas de populações não miscigenadas, bem como biomarcadores distintos ¹⁹⁹. Estudos evidenciam diferentes expressões gênicas entre diferentes populações com mesmo tipo tumoral. Num estudo retrospectivo em LPSNC, análise de genética de DNA e RNA através de *Next Generation Sequencing*, foi realizada em 18 pacientes hispânicos e 11 pacientes brancos. Nele, evidenciou-se que a população hispânica teria frequentemente mais de 3 mutações comparada à população branca (89% x 55%, $p=0.03$), porém sem correlação prognóstica, com SG 2 anos de 60% e 36%, respectivamente ($p=0.23$) ¹³³. Tais dados sugerem heterogeneidade nas

mutações encontradas no LPSNC, podendo ser relacionadas à etnicidade. Num estudo com o uso do banco de dados do SEER, foi evidenciada uma diferença de incidência entre as populações idosas negra e branca, sendo maior nesta última ⁴⁸.

Estudos unicêntricos são valiosos por gerarem hipóteses que podem servir de base para estudos multicêntricos e com maior população. Eles têm como vantagens menor custo, maior facilidade na coleta de dados, uma população menos heterogênea com menos fatores confundidores. No entanto, a principal desvantagem é a limitação na validação dos dados em outras populações ²⁰⁰.

Estudos retrospectivos permitem analisar múltiplos desfechos por um longo período, com a identificação de fatores de risco e suas associações, sendo geralmente conduzidos em doenças raras. As principais desvantagens são a ausência de uniformidade de dados entre os indivíduos, a presença de fatores confundidores que levam à dificuldade na avaliação temporal entre os fatores analisados e o desfecho observado, além da causalidade entre eles ²⁰¹.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo primário

Avaliar o impacto da expressão dos genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* em pacientes com LPSNC e suas correlações com os desfechos de SLP e SG em pacientes tratados no Serviço de Hematologia do HC-FMUSP e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Brasil.

3.2 Objetivos secundários

- a) Descrever as características clínicas epidemiológicas destes pacientes de um grande centro universitário brasileiro, informação atualmente indisponível na literatura médica nacional, com objetivo de melhorar o conhecimento e a caracterização destas neoplasias em população de área geográfica adstrita.
- b) Avaliar o impacto prognóstico da expressão das proteínas MYC, BCL2, LMO2, MGMT, POU2F1 e PDCD1, mensuradas semiquantitativamente por técnica de IHQ, em portadores de LPSNC, para os desfechos de SG, SLP e SLD.
- c) Avaliar a correlação da expressão molecular de RNA (RT-qPCR) e a expressão proteica por meio da reação de IHQ.

4 CASUÍSTICAS E METODOS

O projeto foi submetido ao CAPPesq por meio da Plataforma Brasil, CAAE 48989315.0.0000.0068; Número do Parecer: 1.266.854; aprovado em 07 de outubro de 2015 e anuência do ICESP sob Registro: NP597/2015. Somente após a aprovação, foi iniciado o projeto de pesquisa. Relatórios parciais sobre o andamento do projeto foram entregues semestralmente à CAPPesq por meio da Plataforma Brasil.

A Tabela 3 descreve os custos do projeto, referentes aos itens de consumo de material básico de imuno-histoquímica, PCR e kits necessários para a realização de ensaios propostos. O custo estimado foi de R\$39.040,00. O projeto foi custeado pelo Serviço de Hematologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com verbas provenientes dos projetos de pesquisa clínica patrocinada do grupo de linfoma não-Hodgkin. Os ensaios clínicos foram realizados no Laboratório de Imunopatologia, atualmente vinculado ao LIM31.

Tabela 3 - Orçamento detalhado

Material	Valor Total
Anticorpos para IHQ	R\$16.500,00
Serviços gerais de cortes e laboratório de IHQ e lâminas salinizadas	R\$2.500,00
Kit extração RecoverALL Total Nucleic Acid Isolation- Ambion	R\$3.040,00
Kit Rneasy FFPE- Qiagen	R\$3.000,00
Kit cDNA applied high capacity	R\$3.500,00
Sonda TaqMan (5 sequências)	R\$5.000,00
PCR MasterMix	R\$2.500,00
Placa	R\$1.000,00
Selante	R\$2.000,00
TOTAL	R\$39.040,00

4.1 Pacientes selecionados

Devido à raridade do LPSNC, optou-se pela pesquisa de todos os pacientes cujos materiais anátomo-patológicos estivessem disponíveis nos arquivos do HC-FMUSP e no ICESP. Apenas biópsias realizadas a partir de 01/01/1995 encontravam-se disponíveis. Foi gerada uma primeira lista de pacientes cujos diagnósticos relatavam histopatologia “linfoma” e região anatômica “acometimento em sistema nervoso central”, diagnosticados entre 01/01/1995 e 31/12/2016, para posterior confirmação de diagnóstico de LPSNC e análise dos critérios de inclusão para este estudo. O ponto de corte de coleta de dados estabelecido foi 01/12/2017 para garantir um período de seguimento mínimo de aproximadamente 12 meses e objetivar análise de SG, com base em artigos que avaliavam mortalidade de 35% neste período ¹⁹.

Trata-se de um estudo de coorte unicêntrico retrospectivo. Estudos unicêntricos são valiosos por gerarem hipóteses que podem servir de base para estudos multicêntricos e com maior população. Eles têm como vantagens menor custo, maior facilidade na coleta de dados, uma população menos heterogênea com menos fatores confundidores. No entanto, a principal desvantagem é a limitação na validação dos dados em outras populações ²⁰⁰.

Estudos retrospectivos permitem analisar múltiplos desfechos por um longo período com a identificação de fatores de risco e suas associações, sendo geralmente conduzidos em doenças raras. As principais desvantagens são a ausência de uniformidade de dados entre os indivíduos, a presença de fatores confundidores – o que leva à dificuldade na avaliação temporal entre os fatores analisados e o desfecho observado – e a causalidade entre eles ²⁰¹.

Uma lista inicial destes pacientes foi obtida pelos Serviços de Hematologia do HC-FMUSP e do ICESP, bem como pelos Serviços de Anatomia Patológica do HC-FMUSP e do ICESP.

4.1.1 Critérios de inclusão

- Idade ao diagnóstico maior ou igual a 18 anos e
- LPSNC com histopatologia LNHDGCB CD20+, a qual foi revista e

confirmada prospectivamente por hematopatologista do Departamento de Patologia da FMUSP.

4.1.2 Critérios de exclusão

- Imunodeficiências congênitas ou adquiridas (por exemplo: infecção por HIV, pós transplante de órgão);
- Linfoma primário ocular;
- Envolvimento secundário em SNC de linfoma sistêmico;
- Sorologia positiva para o vírus HIV (com ou sem Síndrome da Imunodeficiência Adquirida);
- Desenvolvimento de outro subtipo de linfoma até a data de censura;
- História prévia ou concorrente de linfoma de células B indolente;
- Indisponibilidade de amostra tecidual;
- Prontuário médico não recuperado e
- Laudo histopatológico divergente entre o diagnóstico retrospectivo e a nova análise histopatológica retrospectiva.

Os dados clínico-epidemiológicos, laboratoriais e de imagem foram obtidos a partir da análise de prontuários médicos manuais ou informatizados, nos quais se destacaram variáveis clínicas e demográficas, como: data de nascimento; sexo; raça; data de diagnóstico; número de linhas de tratamento; datas de início e de término de tratamento; tipos de tratamento oncológico realizados; tipo de resposta clínica ao tratamento; data de obtenção de remissão, progressão e recidiva; data de óbito e da última avaliação clínica; situação atual do linfoma na data de censura; IPI modificado, estágio clínico ao diagnóstico, presença de sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, alteração de comportamento, alteração de memória, déficit neurológico focal, localização do tumor, PS na primeira consulta no Serviço de Hematologia; PS após término de cada linha de tratamento. Dados laboratoriais histopatológicos, padrão de infiltração perivascular, proteinorraquia e glicorraquia, outros marcadores no CSF, sorologia para HIV e EBV, exames de imagem de TC e RMN, bioquímica geral e hematológica também foram coletados quando disponíveis.

Foi feito contato telefônico com pacientes e/ou familiares em casos de perda de seguimento para identificar a situação atualizada do paciente. Em pacientes cujo contato telefônico não foi possível, realizou-se prospecção ativa no site da Receita Federal pelo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), permitindo-se avaliar se o paciente estava registrado como vivo até o ano fiscal anterior ao da pesquisa. Quando disponível, a *causa mortis* foi coletada. A coleta dos dados clínicos foi realizada até 01 de dezembro de 2017 (data de censura de coleta).

4.2 Diagnóstico anatomopatológico

O diagnóstico de LPSNC foi obtido por biópsia incisional estereotáxica ou aberta do tecido acometido. O produto da biópsia foi analisado por coloração de hematoxilina-eosina (H&E) e IHQ para pesquisar os antígenos linfoides B (CD20, CD22 ou CD79a), T (CD3) e Ki67 no Serviços de Anatomia Patológica do HC/ICESP-FMUSP. Nos casos em que o paciente foi submetido a mais de um procedimento diagnóstico, foi considerada apenas a biópsia mais representativa da lesão em estudo.

As lâminas disponíveis dos casos inicialmente selecionados foram disponibilizadas para revisão central realizada por hematopatologista no Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Caso necessário, lâminas extras foram confeccionadas para auxiliar no diagnóstico conforme orientações da hematopatologista.

Os critérios da OMS foram utilizados para confirmação histopatológica. As células neoplásicas foram positivas para os marcadores da linhagem B (CD20, CD22 ou CD79a) ^{5,36,52}. Pacientes com indisponibilidade amostral ou com diagnóstico final discordante do original foram excluídos.

Em algumas amostras, foi realizado no momento do diagnóstico inicial painel de IHQ para Linfoma B e Linfomas T, sendo analisado também IHQ anti-CD3 nas células tumorais e linfócitos reacionais infiltrativos (TIL). TIL foi analisado em campo de pequeno a médio aumento com atenção para os vasos que circundavam o tumor e para as células tumorais. A expressão de CD3 foi

analisada como variável categórica como 0% ou $\geq 1\%$.

Não foram realizadas novas reações de IHQ anti-CD3 por carência de material histopatológico.

4.3 Estadiamento

História e exame físico fazem parte da rotina do serviço de hematologia, assim como avaliação laboratorial com hemograma completo, contagem de reticulócitos, bioquímica, função renal, avaliação hepática, dosagem sérica de ácido úrico, DHL, $\beta 2$ microglobulina, sorologia para HIV, hepatite B e C. A presença de sintomas B foi definida mediante perda de peso superior a 10% do peso corpóreo basal em período inferior a seis meses e/ou febre persistente acima de 38°C sem caracterização de infecção e/ou sudorese noturna recorrente ²⁰².

Os pacientes eram estadiados de acordo com a época de entrada no serviço com TC ou ressonância nuclear magnética de crânio. Para excluir doença sistêmica, realizaram-se TCs de pescoço, tórax, abdômen e pelve além de biópsia de medula óssea. Punção lombar com análise bioquímica e morfológica incluindo citologia oncótica, proteinorraquia, glicorraquia e citometria de fluxo também foram realizadas. Os dados foram coletados conforme sua disponibilidade e registrados numa tabela de coleta de dados, sendo posteriormente categorizados.

4.4 Tratamento

Os pacientes incluídos no estudo receberam intenção curativa com protocolo Abrey, constituído por indução com cinco ciclos de HD-MTX $3,5 \text{ g/m}^2$, procarbazine $100 \text{ mg/m}^2/\text{d}$ e vincristine 1.4 mg/m^2 endovenoso, ²⁰³. Ocorreram algumas variações conforme o ano de tratamento ou condições clínicas dos pacientes. O metotrexate foi administrado por via endovenosa em 3 horas, com ciclos de 21 dias. Não foi realizado ajuste da dose do metotrexate de acordo com o clearance de creatinina. Hidratação, resgate com leucovorina e prescrição de G-CSF profilático foram realizados de acordo com as rotinas do

serviço presentes à época. Pacientes que obtiveram RC receberam regime de consolidação com WBRT (30 a 40Gy em até 20 frações) ou 2 ciclos de 28 dias com citarabina em altas doses (2 g/m²/12 horas D1 até D4). Pacientes com RP receberam até mais 2 ciclos de tratamento de indução conforme descrito previamente. Pacientes com doença estável ou PD foram submetidas a WBRT.

Em 2018, uma nova rotina foi discutida no Serviço de Hematologia, incluindo tratamento com Anti-CD20 (rituximab), ainda a ser implementada.

4.5 Avaliação de resposta

Até o ano de 2005, as definições de RC, RP, PD e DE eram estabelecidas de acordo com a interpretação do médico assistente ou radiologista. Imagens anteriores a 2005 não estavam mais disponíveis, o que impediu a reavaliação de forma retrospectiva. Os dados foram coletados conforme registrados no prontuário dos pacientes à época e dos laudos radiológicos disponíveis.

A partir de 2005, adotaram-se critérios de resposta clínica para LPSNC conforme diretriz publicada ⁵¹. A resposta terapêutica foi determinada por critérios clínicos e imagenológicos avaliados por TC, RNM, assim como punção lombar, avaliação oftalmológica, se disponíveis. Tais dados foram coletados conforme o prontuário e laudos radiológicos disponíveis.

4.6 Seguimento dos pacientes

Os pacientes foram acompanhados após término do tratamento com história e exame físico, exames laboratoriais e de imagem a cada dois meses no primeiro ano de remissão; a cada três meses no segundo ano; a cada quatro meses no terceiro ano; a cada seis meses no quarto ano e anualmente a partir do quinto ano de remissão.

4.7 Reações de IHQ

Todas as lâminas disponíveis e as reações de IHQ previamente realizadas pelos pacientes no Departamento de Patologia da FMUSP e HC FMUSP foram recuperadas e analisadas novamente no Departamento de Patologia da FMUSP. Para inclusão no estudo, todos os pacientes precisavam ter suas lâminas/biópsias novamente avaliadas, confirmando o diagnóstico de LPSNC, independentemente do laudo inicial. Novas lâminas e colorações poderiam ser realizadas a partir das biópsias para se poder confirmar o diagnóstico de LPSNC, caso necessário.

Reações de IHQ para as proteínas de interesse foram realizadas conforme descritos nesta Seção 4.7.2 . A padronização da técnica encontra-se no Quadro 3.

4.7.1 Obtenção das amostras

Os blocos correspondentes às biópsias dos pacientes foram procurados nos dos blocários do HC-FMUSP e do ICESP. Pacientes sem biópsia/bloco disponível para a realização das técnicas de IHQ e moleculares foram excluídos do estudo.

As biópsias tinham sido fixadas em formalina e incluídas em parafina. Os blocos selecionados correspondiam às lâminas utilizadas para confirmar o diagnóstico anatomopatológico de LPSNC. Todos os pacientes com diagnóstico revisto e confirmado de LPSNC com critério de inclusão foram selecionados para reações de IHQ adicionais para pesquisa das proteínas MYC, BCL2, OCT1, MGM1, LMO2 e PD1. As reações foram realizadas em cortes de 3-4 μ dos blocos de parafina no Laboratório de IHQ do Departamento de Patologia da FMUSP. Devido à escassez de material, os primeiros cortes obtidos foram separados para extração de RNA e o restante, para a IHQ. Portanto, alguns pacientes não tiveram material suficiente para realizar todas as reações de IHQ das proteínas de interesse.

As técnicas descritas da reação de IHQ encontram-se na seção 4.7.2 , conforme a rotina do Departamento de Patologia da FM-USP. Não foram

realizadas reações de IHQ para BCL6 devido à escassez do material e porque a pesquisa de expressão gênica do *BCL6* foi adicionada posteriormente ao estudo.

4.7.2 Técnica da reação de IHQ

A IHQ foi realizada pela técnica convencional para material fixado em formol e incluído em parafina para as proteínas relacionadas aos genes em estudo (MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1).

Utilizaram-se os Ac monoclonais anti-c-MYC (clone Y69, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA), anti-BCL2 (clone 124, Cell Marque, Rocklin, California, EUA), anti-LMO2 (clone SP51, Cell Marque, Rocklin, California, EUA), anti-MGMT (clone MT3,1, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA), anti-OCT-1 (clone AB151, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA) e anti-PDCD1 (clone NAT105, Abcam, Cambridge, Massachussets, EUA).

As reações de IHQ foram padronizadas por meio de diluições seriadas dos anticorpos primários e diferentes pH antes do processamento das amostras dos pacientes. Controles positivos e negativos (omissão do anticorpo primário) foram realizados para todas as amostras. O resultado da padronização encontra-se no Quadro 3.

Os cortes de biópsia de Sistema Nervoso Central de 3-4 µm de espessura foram dispostos em lâminas salinizadas (Sigma Chemical Co, St. Louis, Missouri, EUA) em suporte adequado. O processo de desparafinação foi feito por exposição das lâminas ao xilol aquecido em estufa à temperatura de 60-65°C por 5 minutos com subseqüentes lavagens rápidas em três banhos de xilol frio.

Para hidratação, as lâminas foram colocadas em dois banhos de álcool absoluto, um banho de álcool a 95°C e outro de álcool a 70°C. Em seguida, foram lavadas em água corrente, em água deionizada e deixadas em tampão fosfato pH 7,4. A recuperação dos sítios antigênicos foi realizada em alta temperatura em Tris-EDTA pH9. O bloqueio da peroxidase endógena das hemácias foi realizado com peróxido de hidrogênio 10v (3%). Em seguida, as lâminas foram lavadas em água corrente, água destilada e deixadas em

tampão tris-fosfato pH 7.4 (TBS). Os anticorpos foram utilizados nas concentrações conforme Quadro 3. As lâminas foram incubadas *overnight* a 4°C em câmara úmida. Posteriormente foram incubadas com o anticorpo secundário Polímero Novolink (Leica Biosystems Newcastle, UK) por 30 minutos em estufa a 37 graus. Foi utilizado o cromógeno Diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Alemanha). Posteriormente efetuou-se a contracoloração com Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha).

As lâminas foram analisadas em microscópio convencional. A leitura das lâminas foi feita estimando-se 200 células por campo quando possível, em um total de vinte campos de 40x. Foi utilizada análise semiquantitativa por dois observadores distintos, estabelecendo-se valor de consenso para cada caso. A análise semiquantitativa foi padronizada em escala de percentual de células atípicas, positivas para as proteínas interesse em intervalos de 25% (0%-totalmente ausência-, 1 a 25%, 26% a 50%, 51% a 75%, 76% a 100%).

Ac Monoclonais	Diluição final e pH*	Tecido	Marca	Código
MYC (rabbit Clone Y69)	1:100 pH9	Linfoma de Burkitt	Abcam	ab 32072
BCL2 (clone 124)	1:100 pH9	Amígdala	Cell Marque	226M-96
LMO2 (rabbit clone SP51)	1:50 pH9	Amígdala	Cell Marque	370R-16
MGMT (clone MT3.1)	1:400 pH9	Amígdala	Abcam	ab 39253
POU2F1 (rabbit Clone AB151)	1:200 pH9	Amígdala	Abcam	ab 15112
PDCD1 (clone NAT 105)	1:100 pH9	Amígdala	Abcam	ab 52587

*do tampão de recuperação antigênica

Quadro 3 - Padronização dos marcadores de IHQ utilizados

4.8 Método molecular

4.8.1 Obtenção das amostras

Para este estudo, foram realizados cortes de 5 μ M de espessura em micrótomos manuais disponibilizados em tubos de 1,7 mL. As lâminas do micrômetro foram higienizadas com RNase para evitar contaminação entre os pacientes e os cortes foram realizados no Departamento de Patologia da FMUSP. A extração de RNA foi realizada em até uma semana após obtenção dos cortes.

4.8.2 Extração de RNA de amostras fixadas em formol e incluídas em parafina

O processo de extração de RNA das amostras fixadas em formol e incluídas em parafina (FFPE) foi realizado no Laboratório de Genética e Hematologia Molecular – LIM 31 do HC-FMUSP.

A cada tubo de 1.7 ml contendo cortes 5 μ m, foi adicionado 1,5 ml do reagente xilol a 100% para a desparafinização. Os tubos foram agitados em vórtex vigorosamente por 10 segundos, incubados a 37°C por dez minutos e centrifugados durante dois minutos a 20.000 x g em temperatura ambiente, para obtenção de botão celular.

Posteriormente, removeu-se o sobrenadante por pipetagem cuidadosa, para não remover do botão celular. Em seguida, as células foram lavadas com 1,5 ml de etanol a 100%, nova agitação em vórtex por 10 segundos, novamente centrifugação a 20.000 x g por dois minutos, em temperatura ambiente e posterior remoção do sobrenadante. Após repetição do procedimento, as células foram incubadas por dez minutos à temperatura ambiente até evaporar totalmente o etanol residual.

Em seguida, as células foram ressuspensas em 150 μ L de tampão PKD® (Qiagen) adicionados 10 μ L de proteinase K. A amostra foi incubada a 55°C por quinze minutos e, após isso, a 80°C por mais quinze minutos. Adicionaram-se 320 μ L do tampão RBC (*Red Blood Cell Lysis Buffer*), para otimização de lise de hemácias numa suspensão celular única com efeito mínimo nos leucócitos.

O lisado foi homogeneizado e transferido para coluna eliminadora de gDNA e centrifugado por trinta segundos, a 8000 x g. Em seguida, descartou-se a coluna, adicionaram-se 720 µL de etanol a 100% e transferiram-se imediatamente 700 µL da amostra para a coluna *MinElute ENeasy*. Ocluiu-se a tampa do tubo, centrifugou-se por mais quinze segundos a 8000 x g, descartando-se o sobrenadante. Em seguida, adicionaram-se 500 µL do tampão RPE® (Qiagen) à coluna *MinElute ENeasy*, fechando-se delicadamente a tampa. Procedeu-se à centrifugação por quinze segundos a 8.000 x g, descartando-se o líquido. Adicionaram-se mais 500 µL do tampão RPE à coluna *MinElute ENeasy*, ocluiu-se a tampa e centrifugou-se por mais quinze segundos, a 8000 x g, descartando-se o líquido. Em seguida, transferiu-se a coluna *MinElute ENeasy* para novo tubo coletor de 2 ml, o qual foi centrifugado com a tampa aberta por cinco minutos, à velocidade de 20.000 x g.

Então foi descartado o tubo coletor, transferindo-se a coluna *MinElute Eneasy* para outro tubo, agora de 1,7 ml. Adicionaram-se 30 µL de água livre de RNase à coluna, centrifugando-se por um minuto à velocidade de 20.000 x g. Ao final da eluição, obteve-se o RNA, o qual foi estocado em temperatura igual ou inferior a -20°C até o momento do uso.

A concentração de RNA de cada amostra foi determinada no equipamento *NanoDrop Spectrophotometer ND-1000*, e sua integridade foi analisada no *RNA Nano Chip 2100 Bioanalyzer*, da Agilent.

4.8.3 Preparação do cDNA

A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada a partir de 1,0 µg do RNA total. A preparação foi realizada conforme orientações do fabricante *Thermo Fisher* para o *High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit*. O cDNA foi obtido da reação contendo 1µg de RNA total, 0,8 µL de 25X dNTP Mix (100 mM), 2,0 µL de RT Buffer (10 X tampão de reação), 2 µL de RT Randon Primers (10X), 1 µL *MultiScribe Reverse Transcriptase* (transcriptase reversa) e H₂O tratada com dietilpirocarbonato (DPEC), com a obtenção do volume final de 20 µL. As amostras foram submetidas às temperaturas de 25°C por dez minutos, 37°C por 120 minutos e 85°C por cinco minutos no termociclador *Veriti*

Thermo Cycler da *Thermo Fisher* para obtenção do cDNA. Em seguida, foram adicionados 180 µL de H₂O tratada com DPEC.

4.8.4 Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real

A RT-qPCR foi realizada para os genes *MYC* (Hs 202453, ref.158378085), *BCL2* (Hs 0060823, ref. 158378081), *LMO2* (Hs 00277106, ref. 158378089), *MGMT* (Hs 501522, ref. 158378073), *POU2F1* (Hs 283402, ref. 158378077), *PDCD1* (Hs 158297, ref. 158378093) e *BCL6* (Hs 478588, ref. 19673829) – todos da *IDT technologies* (Coralville, Iowa, EUA). Como controle endógeno, foram utilizados os genes *GUSB* (Catalog number: 4310888E), *GAPDH* (Catalog number: 4352934E) e *RPLPO* (Catalog number: 4326314E) da *Applied Biosystems* (Foster City, CA, EUA). Foi utilizado o *TaqMan Universal PCR Master Mix* (*Applied Biosystems*, Foster City, CA, EUA) e sua análise foi executada no equipamento 7500 *FAST Real Time PCR Systems* da *Thermo Fisher*.

Os valores quantitativos relativos foram obtidos a partir do ciclo limiar (*cycle threshold* [Ct]). O Ct é o ponto de referência no qual a elevação do sinal fluorescente corresponde ao crescimento exponencial dos produtos da PCR²⁰⁴. As curvas de eficiência e quantificação gênica foram obtidas a partir de diluições seriadas.

A quantificação relativa baseou-se na construção de curva padrão a partir de quantidades conhecidas do cDNA do gene de interesse, diluídos dez vezes em triplicata com objetivo de obter quatro pontos na referida curva, totalizando-se quatro pontos na curva. Esta curva foi feita de cDNA total de um *pool* contendo 5 linfonodos normais²⁰⁵. Esta estratégia permitiu obter a quantidade relativa do gene de interesse em cada amostra pela disposição em gráfico contruído, colocando-se no eixo y o número de ciclos necessários para amplificação e, no eixo x, a quantidade correspondente de cDNA na curva padrão. A água sempre foi utilizada como controle negativo.

Ao final, os valores relativos de expressão gênica *BCL2*, *MYC*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* foram normalizados em relação ao mRNA do gene endógeno *GUSB*, *GADPH* e *RPLPO*. O gene *GUSB* foi selecionado para

normalização por ser o mais discriminativo das amostras.

4.8.5 Eficiência gênica avaliada

A eficiência gênica encontra-se na Tabela 4.

Tabela 4 - Eficiências gênicas avaliadas

Genes	R2	Eficiência (%)
<i>MYC</i>	0.99	98,70%
<i>BCL2</i>	0.99	94,10%
<i>LMO2</i>	0.99	96,40%
<i>MGMT</i>	0.99	95,20%
<i>POU2F1</i>	0.99	96,80%
<i>PDCD1</i>	0.99	103,50%
<i>BCL6</i>	0.99	102,90%
<i>GUSB</i>	0.99	97,30%
<i>GAPDH</i>	0.99	95,33%
<i>RPLPO</i>	0.99	98,25%

4.9 Análise estatística

As análises estatísticas foram elaboradas por meio do aplicativo *Statistical Package for Social Sciences* – SPSS, versão 11.0 para Windows (Chicago, IL- USA). As variáveis quantitativas podem ser discretas quando determinadas por números inteiros ou contínuas quando representadas por qualquer valor de variação em escala numérica infinita. As variáveis categóricas ou qualitativas não são quantificáveis, mas medidas por meio de sua classificação em categorias, sendo apresentadas como frequências absolutas e porcentagens ²⁰⁶.

Neste estudo, utilizaram-se variáveis quantitativas contínuas (por exemplo, expressão gênica de *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6*) e variáveis qualitativas categóricas (por exemplo: sexo, raça, entre outras). Variáveis contínuas, como idade inferior a 60 anos e expressão gênica

menor que a mediana ou o ponto de corte estabelecido por Curva de ROC, foram transformadas em categóricas.

A análise univariada para medir associação entre as variáveis categóricas/qualitativas foi realizada pelo Teste Exato de Fischer. O Teste *T-Student* foi utilizado para as comparações entre as variáveis quantitativas e os desfechos selecionados ^{207,208}. Na análise univariada, foram considerados estatisticamente significantes valores até $p \leq 0,100$, ou seja, com no máximo de 10% de chance de rejeitar a hipótese de igualdade quando ela é verdadeira. Devido ao pequeno tamanho amostral, optou-se por não realizar análise multivariada. Refratariedade, recaída e suas relações estatísticas foram avaliadas apenas na primeira linha de tratamento.

A análise da sobrevida é uma medida frequentemente utilizada para avaliar grupos com neoplasia. As curvas de SG, SLD e SLP foram estimadas pelo Método de Kaplan-Meier. No Método de Kaplan-Meier, os intervalos de tempo não são fixos, mas determinados pelo aparecimento de uma “falha”, e os sobreviventes ao longo do tempo são ajustados pela censura (os casos censurados entram no cálculo da função da probabilidade de sobrevida acumulada até o momento da perda) ²⁰⁹. O Teste de Log-Rank foi utilizado para comparar as curvas de sobrevida particionadas por variáveis categóricas, porém os testes de Breslow e Tahone-Ware também foram calculados ²¹⁰. Estes testes são particularmente importantes quando as curvas não apresentam riscos proporcionais. O teste de Log-Rank tem peso maior no início e no meio de seguimento, o teste de Breslow tem peso maior no início do seguimento e o teste de Tahone-Ware tem peso maior no final do seguimento. Não foi realizada análise multivariada por regressão de Cox devido ao pequeno tamanho amostral ²¹¹. As definições das Curvas de Sobrevida, Refratariedade e Recidiva encontram-se Quadro 4.

Pontos de interesse	Definição
SG	Intervalo entre a data do diagnóstico e a data do último seguimento* (em meses) ou óbito, considerando-se como evento o óbito por qualquer etiologia. Razões para censura incluem: término do seguimento (paciente vivo) ou perda de seguimento.
SLD	Intervalo entre a data da RC e a data da recidiva (em meses), último seguimento ou óbito, considerando-se eventos a recidiva. Razões para censura incluem: término do seguimento (paciente vivo e sem progressão de doença) ou perda de seguimento. Esta curva só pôde ser calculada em pacientes que tenham obtido RC na primeira linha de tratamento.
SLP	Calculada como o tempo transcorrido entre o diagnóstico e o momento da progressão, recidiva, o último seguimento ou óbito (em meses), considerando-se como eventos PD ou recidiva. Esta curva só pôde ser calculada em pacientes que receberam pelo menos algum tipo de tratamento oncológico. Razões para censura incluem: término do seguimento (paciente vivo e sem progressão de doença) ou perda de seguimento.
Refratariedade	Definida como ausência de resposta (completa ou parcial) à primeira linha de tratamento.
Recidiva	Definida como PD após uma RC na primeira linha de tratamento.

*Se a última data de seguimento conforme registro no prontuário foi inferior à data de censura de coleta de dados (01/12/2017), os pacientes tiveram seus status (vivo/morto) confirmados por via telefônica, quando possível, o mais próximo possível da data de censura. ^{212,213}

Quadro 4 - Definições das Curvas de Sobrevida, Refratariedade e Recidiva

Para determinar o melhor ponto de corte de positividade de expressão proteica por IHQ, utilizaram-se estimativa de sensibilidade e especificidade nos pontos de cortes previamente estabelecidos de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% por Curvas de ROC (*Receiver Operator Characteristic Curve*) ^{214,215}.

Algumas amostras apresentaram expressão gênica normatizada de valor zero considerando-se até cinco casas decimais, o que correspondeu a ausência absoluta de expressão. Estas amostras tiveram reações de rt-PCR repetidas, confirmando-se os resultados iniciais. Por tratar-se de ausência absoluta de expressão gênica, tornou-se impossível proceder ao cálculo logarítmico, dado que $\log 0 = \text{menos infinito}$, para estas amostras. Desta forma,

a categorização da expressão gênica em variável quantitativa levaria à exclusão de várias amostras, diminuindo ainda mais o tamanho amostral, além de excluírem-se pacientes com expressão gênica ausente, o que poderia influenciar na interpretação das associações. Para evitar a exclusão destas amostras nas análises, optou-se por transformar a expressão gênica em variável categórica ao determinar o melhor ponto de corte de positividade da expressão gênica normalizada com o uso de estimativas de sensibilidade e especificidade por Curvas de ROC (*Receiver Operator Characteristic Curve*)^{214,215}.

Baseado nos pontos de corte estabelecidos obtidos através das Curvas de ROC, foi feito um teste de concordância (correlação) entre a expressão gênica e a expressão proteica (relacionados ao RT-qPCR e IHQ, respectivamente). O Coeficiente de Youden permite avaliar a performance dos testes diagnósticos. Coeficiente de Youden com valor zero corresponde à mesma proporção de testes positivos no grupo controle e no grupo com doença; Coeficiente de Youden com valor de 1 corresponde à ausência de Falsos Positivos e Falsos Negativos. O Coeficiente de Youden, porém, ignora a associação entre a sensibilidade e a especificidade do teste, podendo levar a achados errôneos ²¹⁶. O Coeficiente de Kappa é mais frequentemente utilizado e permite avaliar o desempenho dos testes diagnósticos com maior acurácia^{217,218}. A classificação subjetiva por Kappa encontra-se na Tabela 5.

Tabela 5 - Classificação Subjetiva por Kappa

Valor	Interpretação da Associação
<0,00	pobre (<i>poor</i>)
0,01 < valor < 0,20	ligeira (<i>slight</i>)
0,21 < valor < 0,40	fraca (<i>fair</i>)
0,41 < valor < 0,60	moderada (<i>moderate</i>)
0,61 < valor < 0,80	substancial (<i>substantial</i>)
0,81 < valor < 1,00	quase perfeita (<i>almost perfect</i>)
1,00	perfeita (<i>perfect</i>)

5 RESULTADOS

5.1 Casuística

Entre 01 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2016, 51 pacientes tiveram registro de “linfoma com acometimento em SNC” conforme demonstrado na Figura 4. Dois pacientes não tinham blocos teciduais disponíveis. Após a revisão histopatológica, catorze pacientes 14/49 (28,5%) foram excluídos por não apresentarem diagnóstico compatível com LPSNC LNHDGCB CD20+. Trinta e cinco (68,2%) do total de pacientes foram incluídos no estudo.

51 pacientes com diagnóstico de Linfoma com “acometimento em SNC”

Figura 4 - Fluxograma da exclusão

A data de censura de coleta dos dados foi 01 de dezembro de 2017 com mediana de tempo de seguimento de 41 meses (1,1- 171,8). O tempo de seguimento foi calculado entre a data de diagnóstico e a data de óbito (em meses) ou a última data de seguimento (conforme registro em prontuário médico).

A mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos (26,2-83,9). Vinte e

seis (74,2%) pacientes evoluíram a óbito até a data da censura. A *causa mortis* não se encontrava disponível nos prontuários, portanto não pode ser coletada.

A mediana de tempo de seguimento entre os pacientes vivos foi de 69,4 meses (16,1- 171,8 meses) e dos pacientes que evoluíram a óbito foi de 26,6 meses (1,1- 92,4 meses), conforme demonstrado na Tabela 6.

Tabela 6 - Tempos de seguimento

Variável	Geral (%/n)	Status em 01/12/2017	
		Vivo (%/n)	Óbito (%/n)
Número Total de Pacientes			
% (n)	100 (35)	25,71 (9)	74,2 (26)
Tempo de Seguimento (meses)			
média (dp)	43,8 (39,18)	77,5 (50,11)	32,2 (27,10)
1ºq;mediana;3ºq	7,7 : 41,0 : 66,3	38,1 : 69,4 : 111,3	6,2 : 26,6 : 53,7
mín ; máx	1,1 : 171,8	16,1 : 171,8	1,1 : 92,4
Intervalo de Tempo entre Diagnóstico e Óbito (meses)			
média (dp)	-	-	32,2 (27,10)
1ºq;mediana;3ºq	-	-	6,2 : 26,6 : 53,7
mín ; máx	-	-	1,1 : 92,4
Intervalo de Tempo entre Diagnóstico e Última Consulta (meses)			
média (dp)	-	77,5 (50,11)	-
1ºq;mediana;3ºq	-	38,1 : 69,4 : 111,3	-
mín ; máx	-	16,1 : 171,8	-

5.2 Características clínico-laboratoriais ao diagnóstico

A mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos (26,2 a 83,9 anos). A maioria dos pacientes era do sexo feminino (57,1%), apresentava acometimento de regiões profundas de SNC (77,1%), citologia oncológica negativa no LCR (91,4%) e PS inicial 0,1 ou 2 na primeira consulta no Serviço de Hematologia (57,2%). Com relação ao IPI modificado, 20% apresentavam IPI baixo (0+1), 48,6% apresentavam IPI intermediário (2+3) e 31,4%

apresentavam alto risco (4+5). As características clínicas dos pacientes encontram-se na Tabela 7.

As características clínico-laboratoriais por paciente encontram-se no Anexo A.

Tabela 7 - Características clínico-laboratoriais dos pacientes selecionados
(continua)

Variável	Geral (%/n)
Número total de pacientes	100% (35)
Idade ao Diagnóstico (anos)	
média (dp)	60,1 (15,22)
1ºq;mediana;3ºq	49,8 : 62,0 : 72,9
mín ; máx	26,2 : 83,9
≤ 60 anos	45,7% (16)
>60 anos	54,3% (19)
Sexo	
masculino	42,9% (15)
feminino	57,1% (20)
Acometimento de Regiões Profundas	
não	22,9% (8)
sim	77,1% (27)
Citologia LCR	
citologia negativa	91,4% (32)
citologia positiva	5,7% (2)
desconhecido	2,9% (1)
Presença de HIC ao Diagnóstico	
não	71,4% (25)
sim	28,6% (10)
P.S. Inicial	
0	8,6% (3)
1	25,7% (9)
2	22,9% (8)
3	37,1% (13)
4	5,7% (2)

Tabela 7 - Características clínico-laboratoriais dos pacientes selecionados
(conclusão)

Variável	Geral (%/n)
Número total de pacientes	100% (35)
RISCO IPI Modificado para LPSNC	
Baixo (0+1)	20% (7)
intermediário (2+3)	48,6% (17)
alto (4+5)	31,4% (11)

5.3 Tratamentos oncológicos e resposta clínica

Com relação às linhas de tratamento oncológico com intuito curativo, observou-se que (Figura 5):

- 94,3% receberam pelo menos uma linha de tratamento (33/35);
- 28,6% receberam uma segunda linha de tratamento (10/35);
- 14,3% receberam uma terceira linha de tratamento (5/35);
- 5,7% receberam uma quarta linha de tratamento (2/35) e
- 2,9% receberam uma quinta linha de tratamento oncológico (1/35).

A maioria dos pacientes (51,4%;18/35) apresentou PD em algum momento da sua história clínica, porém apenas 28,6% submeteram-se a nova linha de tratamento. As características da primeira e da segunda linha de tratamento oncológico encontram-se nas Seções 5.3.1 e 5.3.2. A maioria dos pacientes (61%;21/35) recebeu radioterapia, em especial como consolidação (76%;16/21) ou terapia única (24%;5/21). Nenhum paciente foi submetido a TMO.

Legenda: Pac= Paciente/ / TTO 1= Primeira Linha de Tratamento/ TTO 2= Segunda Linha de Tratamento/ TTO 3= Terceira Linha de Tratamento/ TTO 4 =Quarta Linha de Tratamento/ TTO 5= Quinta Linha de Tratamento PD 1= Primeira Progressão de Doença/ PD 2= Segunda Progressão de Doença/ PD 3= Terceira Progressão de Doença/ PD 4= Quarta Progressão de Doença/ PD 5= Quinta Progressão de Doença / NPD 1= Ausência de Progressão de Doença após a Primeira Linha de Tratamento/ NPD 2= Ausência de Progressão de Doença após a Segunda Linha de Tratamento/ NPD 3= Ausência de Progressão de Doença após a Terceira Linha de Tratamento/ NPD 4= Ausência de Progressão de Doença após a Quarta Linha de Tratamento/ NPD 5= Ausência de Progressão de Doença após a Quinta Linha de Tratamento

Figura 5 - Número de linhas de tratamento oncológico

5.3.1 Primeira Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo

Quase todos os pacientes foram submetidos à primeira linha de tratamento oncológico (94,3%;33/35), sendo a quimioterapia baseada em HD-MTX a opção terapêutica mais utilizada (84%;28/33), seguida de radioterapia isolada (16%;5/33), com mediana de duração de tratamento de 4 meses e taxa de resposta global (TRG) de 72,8%. Dois pacientes não foram submetidos a nenhuma linha de tratamento, pois não tinham condições clínicas. Assim, para estes foi realizado tratamento paliativo. Nenhum paciente recebeu tratamento oncológico com anti-CD20 (rituximab) em primeira linha, pois não estava disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS).

A maioria dos pacientes obteve RC (45,5%;15/33) à terapia de primeira linha, 27,3% (9/33) obtiveram RP e 27,3% (9/33) apresentaram PD. A taxa de refratariedade foi de 27,3% (9/33) (Tabela 8 e Gráfico 1). Apesar da alta taxa de resposta, a maioria dos pacientes apresentou PD em algum momento após a primeira linha de tratamento (54,5%;18/33). O Anexo B apresenta informações sobre a primeira linha de tratamento oncológico.

Tabela 8 - Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à primeira linha de tratamento oncológico

Variável	Número de pacientes	Taxa
Taxa de Resposta Completa	15/33	45,5%
Taxa de Resposta Parcial	9/33	27,3%
Taxa de Resposta Global ¹	24/33	72,8%
Taxa de Refratariedade ²	9/33	27,3%
Taxa de Recaída após RC	3/15	20%

⁽¹⁾ corresponde à soma da RP + RC;

⁽²⁾ corresponde à fração de pacientes submetidos ao tratamento que apresentaram PD ou DE durante ou ao término do tratamento;

Gráfico 1 - Taxas de Resposta à Primeira Linha de Tratamento Oncológico

5.3.2 Segunda Linha de Tratamento Oncológico com Intuito Curativo

Dos 18 pacientes que apresentaram PD, a maioria (55,55%;10/18) foi submetida a uma segunda linha de tratamento, com mediana de duração de tratamento de dois meses. Aos pacientes sem condições clínicas de tratamento curativo, foi oferecido tratamento paliativo. Apesar da alta taxa de resposta após término do tratamento (60%;6/10), a maioria dos pacientes evoluiu com PD em algum momento (80%;8/10), conforme Tabela 9.

Tabela 9 - Taxas de resposta global, parcial, completa e refratariedade à segunda linha de tratamento oncológico

Variável	Número de pacientes	Taxa
Taxa de Resposta Completa	2/10	20,00%
Taxa de Resposta Parcial	4/10	40,00%
Taxa de Resposta Global	6/10	60,00%
Taxa de Refratariedade	4/10	40,00%

5.4 Expressão Proteica

Os resultados obtidos para a pesquisa de expressão proteica por IHQ estão disponibilizados na Tabela 10. A célula de origem (COO) foi classificada de acordo com os critérios de Hans ¹⁰. Apenas 34% (12/35) dos casos puderam ser caracterizados, sendo 75% (9/12) classificados como não-GCB. Anti-CD3 foi realizado em 91,4% (32/35) dos casos, sendo a maioria (87,5%) positivo em linfócitos reacionais infiltrativos. A pesquisa de Ki67 foi realizada em 82,9% (29/35) dos casos e todos apresentaram índice de positividade > 70%. Não foi possível realizar reações de IHQ adicionais devido à escassez do material.

Tabela 10 - Descrição das revisões das reações de imuno-histoquímica disponíveis

Variável		Geral (%/n)
Número Total de Pacientes		
		100% (35)
anti-CD20		
	negativo	0% (0)
	positivo	100% (35)
anti-CD3		
	negativo	80% (28)
	positivo	11,4% (4)
	não avaliado	8,6% (3)
anti-BCL6		
	negativo	22,9% (8)
	positivo	17,1% (6)
	não avaliado	60% (21)
anti-MUM1		
	negativo	8,6% (3)
	positivo	25,7% (9)
	não avaliado	65,7% (23)
COO Subtipo		
	GCB	11,4% (4)
	não -GCB	31,4% (11)
	não avaliado	57,1% (20)

Os resultados disponíveis encontram-se na Tabela 11.

A pesquisa da proteína MYC foi realizada em 94,3% (33/35) dos pacientes, dos quais a maioria apresentou valor > 50% (21/33;63,6%). BCL2 foi pesquisado em 91,4% (32/35), com resultado > 50% na maioria dos casos (27/32;84,5%). A proteína LMO2 foi pesquisada em 91,4% (32/35), em cuja maioria resultou não reativa (13/32;40,6%). A proteína MGMT foi realizada em 88,6% (31/35), sendo negativo em todos os casos. A expressão proteica de POU2F1 foi realizada em 94,3% (33/35), com resultado > 75% na maioria dos casos (30/33;93,9%). A proteína PDCD1 foi pesquisada em 94,3%(33/35), sendo a maioria não reativa (30/33;90,9%).

Tabela 11 - Resultados das reações de imuno-histoquímica das proteínas de interesse

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	100% (35)
anti-MYC	
0%-50%	34,2% (12)
51%-100%	60% (21)
não disponível	5,8% (2)
anti-BCL2	
0%-50%	14,2% (5)
51%-100%	80% (28)
não disponível	5,8% (2)
anti-LMO2	
0%-25%	40% (14)
26%-100%	51,4% (18)
não disponível	8,6% (3)
anti-MGMT	
negativo	88,6% (31)
positivo	0,0%
não disponível	11,4% (4)
anti-POU2F1	
negativo	0,0%
positivo	94,2% (33)
não disponível	5,8% (2)
anti-PDCD1	
negativo	85,7% (30)
positivo	8,6% (3)
não disponível	5,7% (2)

5.5 Expressão Gênica

A expressão absoluta gênica dos genes *MYC*, *BCL2*, *LMO2*, *MGMT*, *POU2F1*, *PDCD1* e *BCL6* foi avaliável em, respectivamente, 60%, 60%, 60%, 60%, 65,7%, 60% e 65,7% dos casos (Tabela 12). Os resultados da expressão normalizada dos genes de interesse por paciente encontram-se no Anexo C. Foram realizados testes comparativos para todas as variáveis entre a amostra total (n=35) e a subamostra contendo apenas pacientes com expressão gênica avaliável. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a amostra total e a subamostra (Anexo D).

Tabela 12 - Amplificação normalizada dos genes de interesse
(continua)

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	
	100% (35)
GENE <i>MYC</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	0,201 (0,1778)
1ºq;mediana;3ºq	0,015 : 0,201 : 0,322
mín ; máx	0,000 : 0,641
<0,201041 (n)	47,6% (10)
≥0,201041 (n)	52,4% (11)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>BCL2</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	0,906 (1,2381)
1ºq;mediana;3ºq	0,110 : 0,564 : 1,192
mín ; máx	0,000 : 5,566
<0,3516 (n)	38,0% (8)
≥0,3516 (n)	62,0% (13)
TOTAL (n)	100% (21)

Tabela 12 - Amplificação normalizada dos genes de interesse
(continuação)

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	100% (35)
GENE <i>LMO2</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	3,877 (5,0025)
1ºq;mediana;3ºq	0,296 : 1,636 : 6,850
mín ; máx	0,000 : 17,506
<0,689232 (n)	33,3% (7)
≥0,689232 (n)	66,7% (14)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>MGMT</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	0,760 (2,2315)
1ºq;mediana;3ºq	0,000 : 0,000 : 0,277
mín ; máx	0,000 : 10,072
<0,335666 (n)	76,2% (16)
≥0,335666 (n)	23,8% (5)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>POU2F1</i>	
número de amostras amplificadas	23
média (dp)	1,748 (2,0030)
1ºq;mediana;3ºq	0,000 : 1,448 : 2,828
mín ; máx	0,000 : 6,301
<1,44819 (n)	47,8% (11)
≥1,44819 (n)	52,2% (12)
TOTAL (n)	100% (23)

Tabela 12 - Amplificação normalizada dos genes de interesse
(conclusão)

Variável	Geral (%/n)
Número Total de Pacientes	100% (35)
GENE <i>PDCD1</i>	
número de amostras amplificadas	21
média (dp)	1,324 (2,4693)
1ºq;mediana;3ºq	0,000 : 0,000 : 1,870
mín ; máx	0,000 : 9,215
<2,00938 (n)	76,2% (16)
≥2,00938 (n)	23,8% (5)
TOTAL (n)	100% (21)
GENE <i>BCL6</i>	
número de amostras amplificadas	23
média (dp)	2,899 (2,6369)
1ºq;mediana;3ºq	0,648 : 2,716 : 3,787
mín ; máx	0,000 : 9,091
<2,73477 (n)	47,8% (11)
≥2,73477 (n)	52,2% (12)
TOTAL (n)	100% (23)

5.6 Construção de Curvas de ROC (*receiver operator characteristic curve*, em inglês)

5.6.1 Curvas de ROC para expressão proteica

Os resultados de IHQ para as proteínas de interesse foram quantificadas em quartis. Curvas de ROC puderam ser construídas para as proteínas MYC, BCL2 e LMO2 em relação à SG e à SLP. Para as demais proteínas, não foi possível construir curvas de ROC devido ao excesso de ausência de expressão (MGMT e PD1) ou excesso de positividade (OCT1). Após revisão da literatura para estas proteínas, optou-se por determinar como ponto de corte a ausência ou a presença de expressão. Os pontos de corte selecionados foram aqueles

com maior RV+ e menor RV-, podendo-se então transformar os resultados das IHQ em variáveis categóricas dicotômicas (menor ou maior / igual ao ponto de corte). A Tabela 13 - apresenta os pontos de corte da IHQ utilizados com base na construção das Curvas de ROC, conforme descrito na Seção 4.9. As Curvas de ROC para as proteínas MYC, BCL2 e LMO2 encontram-se, respectivamente, nos Anexos E, F e G.

Tabela 13 - Revisão bibliográfica dos pontos de corte da reação de imunohistoquímica das proteínas de interesse e pontos de corte selecionados neste estudo

Proteína de interesse	Ponto de corte ¹	Ponto de corte selecionado ²
MYC	50% ²¹⁹	50%
BCL2	40% ²¹⁹ ; 50% ²²⁰	50%
LMO2	30% ¹⁶⁴	25%
MGMT	5-10% ^{29,175,221}	Positivo versus Negativo ⁴
POU2F1	Positivo versus Negativo ³²²²	Positivo versus Negativo ⁴
PDCD1	<1%; 1-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%, ≥76% ²²³	Positivo versus Negativo ^{4, 5}

(¹) de acordo com os artigos descritos; (²) de acordo com a metodologia da curva de ROC; (³) presença ou ausência de imunofixação nas células tumorais; (⁴) >0 versus ≤0; (⁵) analisado na membrana celular e citoplasma

5.6.2 Curvas de ROC para expressão gênica normalizada

Conforme descrito na Seção 4.9, utilizaram-se as curvas de ROC para selecionar pontos de corte da expressão gênica normalizada a fim de transformar esta variável numérica em categórica dicotômica. Desta forma, os pacientes com ausência absoluta de expressão gênica puderam ser incluídos nas análises, pois não existe logaritmo de zero em qualquer base. Curvas de ROC foram construídas para todos os genes normalizados para os desfechos de SG e SLP, sendo selecionados os pontos de corte com maior RV+ e menor

RV (Tabela 14). As curvas de ROC para a expressão gênica normalizada dos genes *MYC*, *MGMT*, *PDCD1*, *BCL2*, *LMO2*, *POU2F1* e *BCL6* encontram-se nos Anexos H, I, J, K, L, M e N.

Tabela 14 - Pontos de corte da expressão normalizada dos genes de interesse

Variável	Ponto de Corte	Metodologia
<i>MYC</i>	$\geq 0,201041$ vs $< 0,201041$	Curva de ROC
<i>BCL2</i>	$\geq 0,3516$ vs $< 0,3516$	Curva de ROC
<i>LMO2</i>	$\geq 0,689232$ vs $< 0,689232$	Curva de ROC
<i>MGMT</i>	$\geq 0,335666$ vs $< 0,335666$	Curva de ROC
<i>POU2F1</i>	$\geq 1,44819$ vs $< 1,44819$	Curva de ROC
<i>PDCD1</i>	$\geq 2,00938$ vs $< 2,00938$	Curva de ROC
<i>BCL6</i>	$\geq 2,73477$ vs $< 2,73477$	Curva de ROC

5.7 Curvas de Sobrevida

Conforme descrito na Tabela 6, a mediana de acompanhamento de toda a coorte foi de 41 meses (mínimo de 1,1 e máximo de 171,8 meses). A mediana do intervalo de tempo entre o diagnóstico e o óbito foi de 26,6 meses (mínimo de 1,1 e máximo de 92,4 meses). Até a data da censura, 26/35 pacientes tinham evoluído a óbito. As construções das curvas de SG, SLP e SLD pelo método de Kaplan-Meier encontram-se no Anexo O.

5.7.1 Sobrevida Global

A SG mediana foi de 42,6 meses (IC95% 26,6-58,6 meses). A probabilidade de SG em 24 meses foi 65,5%; a probabilidade de SG em 48 meses foi de 43,8% e a probabilidade de SG em 60 meses foi de 40,4% (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Curva de Sobrevida Global nos pacientes com LPSNC

5.7.2 Sobrevida Livre de Doença (1ª linha de tratamento)

A SLD mediana foi de 59,2 meses (IC95% 31,9- 86,6 meses). A curva de Kaplan-Meier (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Curva de Sobrevida livre de doença nos pacientes com LPSNC

5.7.3 Sobrevida Livre de Progressão (1ª linha de tratamento)

A SLP mediana foi de 41 meses (IC95% 19,7-62,4 meses). A probabilidade de SLP em 24 meses foi de 63,6%, a probabilidade de SLP em 48 meses foi de 37,1% e a probabilidade de SLP em 60 meses foi de 25,9% (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Curva de Sobrevida livre de progressão nos pacientes com LPSNC

5.8 Fatores de Prognóstico para SG, SG 2 anos, SLD e SLP

5.8.1 Análise Univariada para SG e SG em 24 meses

Até a última data de coleta de dados (01/12/2017), 74,3% (26/35) evoluíram a óbito e 25,7% (9/35) estavam vivos. Nove pacientes evoluíram a óbito em até 1 ano após o diagnóstico e 12 pacientes evoluíram a óbito em até 2 anos após o diagnóstico.

Com relação à Sobrevida Global, as variáveis idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *BCL2* $\geq 51\%$, refratariedade à primeira linha de tratamento e progressão de doença após a primeira linha de tratamento estiveram associadas a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 15.

Com relação à SG em 2 anos, a P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *LMO2* $\leq 25\%$, refratariedade à primeira linha de tratamento e progressão de doença após a primeira linha de tratamento estiveram associadas a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 16.

Tabela 15 - Análise univariada de Cox para SG

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	2,466 (1,091;5,573)	0,025
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	3,564 (1,055;12,036)	0,029
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	7,005 (2,671;18,37)	<0,001
Radioterapia (Não vs Sim)	3,413 (1,516;7,683)	0,002
COO (não-GCB vs GCB)	1,877 (0,397;8,882)	0,417
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	4,464 (0,6;33,229)	0,109
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,186 (0,502;2,802)	0,696
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	3,559 (0,833;15,196)	0,067
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1,67 (0,736;3,793)	0,215
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	0,516 (0,12;2,215)	0,364
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	6,117 (1,617;23,149)	0,003
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	1,934 (0,652;5,739)	0,227
gene <i>LMO2</i> (<0,689232 vs ≥0,689232)	2,099 (0,747;5,895)	0,151
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	1,793 (0,546;5,894)	0,331
gene <i>POU2F1</i> (<1,44819 vs ≥1,44819)	1,179 (0,453;3,067)	0,735
gene <i>PDCD1</i> (<2,00938 vs ≥2,00938)	1,539 (0,34;6,965)	0,573
gene <i>BCL6</i> (<2,73477 vs ≥2,73477)	0,952 (0,356;2,543)	0,922
Refratariedade (Sim vs Não)	28,272 (5,823;137,272)	<0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	3,248 (1,33;7,932)	0,006

Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

* Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$

*** Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.

Tabela 16 - Análise univariada de Cox para SG em 2 anos

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	2,025 (0,609;6,742)	0,239
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	3,388 (0,437;26,273)	0,214
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	5,851 (1,568;21,83)	0,003
Radioterapia (Não vs Sim)	2,874 (0,908;9,095)	0,060
COO (não-GCB vs GCB)	0,973 (0,196;4,832)	0,973
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	1,616 (0,207;12,636)	0,643
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	0,473 (0,152;1,478)	0,187
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	2,087 (0,269;16,182)	0,470
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	8,131 (1,737;38,068)	0,002
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	0,877 (0,113;6,803)	0,900
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene MYC (≥0,201041 vs <0,201041)	3,597 (0,723;17,888)	0,095
gene BCL2 (≥0,3516 vs <0,3516)	2,187 (0,44;10,863)	0,326
gene LMO2 (<0,689232 vs ≥0,689232)	2,173 (0,542;8,704)	0,261
gene MGMT (≥0,335666 vs <0,335666)	2,958 (0,689;12,704)	0,127
gene POU2F1 (<1,44819 vs ≥1,44819)	1,528 (0,41;5,7)	0,523
gene PDCD1 (<2,00938 vs ≥2,00938)	2,354 (0,289;19,145)	0,409
gene BCL6 (<2,73477 vs ≥2,73477)	1,294 (0,347;4,821)	0,699
Refratariedade (Sim vs Não)	20,955 (4,349;100,967)	<0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	4,053 (0,859;19,116)	0,055

Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

* Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$

*** Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.

5.8.2 Análise Univariada para SLD

Até a última data de coleta de dados (01/12/2017), a maioria dos pacientes recebeu algum tipo de primeira linha de tratamento oncológico (94%; 33/35), com taxa de resposta completa de 45,5% (15/33) e de recaída após resposta completa de 20% (2/15). Com relação à SLD, a idade >60 anos, IPI modificado ≥ 2 , P.S. ≥ 3 , ausência de tratamento com radioterapia estiveram associados a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 17.

Tabela 17 - Análise univariada de Cox para SLD

(continua)

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	3,333 (0,773;14,376)	0,088
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	0,177 (0,021;1,489)	0,076
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	10,272 (1,807;58,393)	0,002
Radioterapia (Não vs Sim)	4,126 (0,966;17,623)	0,039
COO (não-GCB vs GCB)	*	NA
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	0,894 (0,105;7,573)	0,918
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,392 (0,279;6,935)	0,687
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	***	NA
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	***	NA
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	***	NA
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene <i>MYC</i> ($\geq 0,201041$ vs $<0,201041$)	2,924 (0,26;32,934)	0,364
gene <i>BCL2</i> ($\geq 0,3516$ vs $<0,3516$)	1,423 (0,126;16,043)	0,774
gene <i>LMO2</i> ($<0,689232$ vs $\geq 0,689232$)	0,237 (0,021;2,674)	0,207
gene <i>MGMT</i> ($\geq 0,335666$ vs $<0,335666$)	***	NA
gene <i>POU2F1</i> ($<1,44819$ vs $\geq 1,44819$)	1,732 (0,235;12,783)	0,586
gene <i>PDCD1</i> ($<2,00938$ vs $\geq 2,00938$)	***	NA

Tabela 17 - Análise univariada de Cox para SLD

(conclusão)

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
gene <i>BCL6</i> (<2,73477 vs ≥2,73477)	4,472 (0,279;71,807)	0,247
Refratariedade (Sim vs Não)		NA
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	2,697 (0,489;14,86)	0,236

Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

* Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$ *** *Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.*

5.8.3 Análise Univariada para SLP

Até a última data de coleta de dados (01/12/2017), a maioria dos pacientes recebeu algum tipo de primeira linha de tratamento oncológico (94%; 33/35), com taxa de resposta global de 72,7% (24/33), porém a maioria dos pacientes apresentou PD em algum momento após RP ou RC (75%; 18/24).

Com relação à SLP, idade >60 anos, IPI modificado ≥2, P.S. ≥3, ausência de tratamento com radioterapia, expressão gênica de *MYC* ≥ 0,201041, *BCL2* ≥51%, expressão gênica de *LMO2* <0,689232, expressão gênica de *MGMT* ≥0,335666, refratariedade à primeira linha de tratamento e progressão de doença após a primeira linha de tratamento estiveram associados a pior prognóstico, com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Os valores de HR, IC95% e valor P (log-rank) encontram-se na Tabela 18.

Tabela 18 - Análise univariada de Cox para SLP

Variáveis	HR (IC 95%)	valor p**
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	2,857 (1,239;6,589)	0,010
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	4,151 (1,193;14,446)	0,001
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	3,951 (1,651;9,454)	0,001
Radioterapia (Não vs Sim)	2,281 (1,027;5,067)	0,037
COO (não-GCB vs GCB)	3,225 (0,391;26,588)	0,248
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	4,386 (0,588;32,746)	0,115
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,519 (0,6;3,85)	0,374
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	3,376 (0,784;14,534)	0,083
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1,677 (0,715;3,935)	0,229
anti-MGMT (1-100% vs 0%)#		
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	0,838 (0,196;3,583)	0,811
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)*		
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	3,96 (1,192;13,147)	0,016
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	1,98 (0,651;6,021)	0,221
gene <i>LMO2</i> (<0,689232 vs ≥0,689232)	2,718 (0,87;8,493)	0,073
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	3,749 (0,879;15,993)	0,056
gene <i>POU2F1</i> (<1,44819 vs ≥1,44819)	0,909 (0,334;2,477)	0,852
gene <i>PDCD1</i> (<2,00938 vs ≥2,00938)	1,762 (0,389;7,979)	0,456
gene <i>BCL6</i> (<2,73477 vs ≥2,73477)	0,815 (0,301;2,211)	0,687
Refratariedade (Sim vs Não)	75,672 (8,96;638,734)	<0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	5,425 (2,094;14,053)	<0,001

#Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-MGMT 0%

*Não pode ser calculado, pois todos os pacientes tinham anti-POU2F1 100%

** em vermelho: valores com diferença estatisticamente significativa valor $p \leq 0,05$ / em negrito: valores com diferença estatisticamente significativa $0,10 \geq$ valor $p > 0,05$

*** Since coefficients did not converge, no further models will be fitted.

5.8.4 Testes de Log-Rank: gráficos por variáveis analisadas

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 2,466 (1,091; 5,573)

b) Teste de Log-Rank para SLD
HR (IC95%)= 3,33 (0,773; 14,376)

c) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 2,857 (1,239; 6,589)

Gráfico 5 - Teste de Log-rank – Variável: Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 3,564 (1,055; 12,036)

b) Teste de Log-Rank para SLD
HR (IC95%)= 0,177 (0,21; 1,489)

c) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)=4,151 (1,193; 14,446)

Gráfico 6 - Teste de Log-rank – Variável: IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 7,005 (2,671; 18,37)

b) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
HR (IC95%)= 5,851 (1,568; 21,83)

c) Teste de Log-Rank para SLD
HR (IC95%)= 10,272 (1,807; 58,393)

d) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 3,951 (1,651; 9,454)

Gráfico 7 - Teste de Log-rank – Variável: Performance Status (3+4 vs 0+1+2)

a) Teste de Log-Rank para SG
 HR (IC95%)= 3,413 (1,516; 7,683)

b) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
 HR (IC95%)= 2,874 (0,908; 9,095)

c) Teste de Log-Rank para SLD
 HR (IC95%)= 4,126 (0,966; 17,623)

d) Teste de Log-Rank para SLP
 HR (IC95%)= 2,281 (1,027; 5,067)

Gráfico 8 - Teste de Log-rank – Variável: Radioterapia (Não realizada vs Realizada)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 3,559 (0,833; 15,196)

b) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 3,376 (0,784; 14,534)

Gráfico 9 - Teste de Log-rank – Variável: Anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)

a) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
HR (IC95%)=8,131 (1,737; 38,068)

Gráfico 10 - Teste de Log-rank – Variável: anti-LMO2 (0-25% vs ≥26%)

a) Teste de Log-Rank para SG
HR (IC95%)= 6,117 (1,617; 23,149)

b) Teste de Log-Rank para SG 24 meses
HR (IC95%)= 3,597 (0,723; 17,888)

c) Teste de Log-Rank para SLP
HR (IC95%)= 3,96 (1,192; 13,147)

Gráfico 11 - Teste de Log-rank – Variável: Gene *MYC* ($\geq 0,201041$ vs $< 0,201041$)

a) Teste de Log-Rank para SLP

HR (IC95%)= 2,718 (0,87; 8,493)

Gráfico 12 - Teste de Log-rank – Variável: Gene *LMO2* (<0,689232 vs ≥0,689232)

a) Teste de Log-Rank para SLP

HR (IC95%)=3,749 (0,879; 15,993)

Gráfico 13 - Teste de Log-rank – Variável: Gene *MGMT* (≥0,335666 vs <0,335666)

5.9 Fatores de Prognóstico para Mortalidade até a data de censura e Mortalidade em 2 anos após o diagnóstico

5.9.1 Análise Univariada

Análises univariadas para Mortalidade Global e Mortalidade em 2 anos foram realizadas para as variáveis estudadas, conforme demonstrado na Tabela 19.

Com relação à Mortalidade Global, Idade >60 anos IPI modificado ≥ 2 , PS ≥ 3 , ausência de tratamento radioterápico, CD3 negativo, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, *BCL2* >51%, expressão gênica de *PD1* $\geq 2,00938$, PD após a 1ª linha de tratamento estiveram associados com aumento de risco de óbito durante o seguimento em análise univariada ($p \leq 0,1$).

Com relação à Mortalidade em até 2 anos após o diagnóstico, ausência de tratamento radioterápico, LMO2 $\leq 25\%$ e refratariedade à primeira linha de tratamento ($p=0,001$) estiveram associados com maior risco de óbito (risco de morte em até 2 anos após diagnóstico) em análise univariada ($p \leq 0,1$).

Tabela 19 - Análise univariada para Mortalidade Global e Mortalidade em 2 Anos

Variáveis	Óbito global		Óbito em até 24 meses após o diagnóstico	
	OR (IC 95%)	valor p	OR (IC 95%)	valor p
Idade (> 60 anos vs ≤ 60 anos)	6,61 (1,13-38,70)	0,027	2,18 (0,51-9,33)	0,295
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	6,13 (1,03-36,45)	0,036	3,88 (0,41-36,79)	0,219
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	9,33 (1,02-85,70)	0,028	8,5 (1,71-42,28)	0,006
Radioterapia (Não vs Sim)	8,00 (0,87-73,40)	0,043	2,74 (0,62-12,08)	0,182
COO (não-GCB vs GCB)	4,50 (0,37-54,16)	0,234	1,20 (0,12-11,87)	0,880
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	13,80 (1,18-161,72)	0,015	1,67 (0,15-18,22)	0,678
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	2,13 (0,42-10,75)	0,364	2,50 (0,57-10,93)	0,225
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	9,00 (1,13-71,96)	0,023	2,25 (0,47-10,78)	0,312
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1,05 (0,19-5,69)	0,958	14,4 (2,31-89,94)	0,002
anti-MGMT (Positivo x Negativo)	NA	NA	NA	
anti-PDCD1 (Positivo x Negativo)	0,25 (0,01-4,60)	0,328	NA	
anti-POU2F1 (Positivo x Negativo)	NA	NA	NA	
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	10,00 (0,91-110,29)	0,043	4,80 (0,68-33,80)	0,112
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	2,00 (0,29-13,74)	0,488	2,57 (0,37-17,83)	0,344
gene <i>LMO2</i> (≥0,689232 vs <0,689232)	NA	0,046	0,30 (0,05-1,99)	0,215
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	1,82 (0,16-20,71)	0,635	3,3 (0,41-26,37)	0,259
gene <i>POU2F1</i> (≥1,44819 vs <1,44819)	1,13 (0,17-7,24)	0,903	0,60 (0,11-3,25)	0,561
gene <i>PDCD1</i> (≥2,00938 vs <2,00938)	0,15 (0,02-1,70)	0,082	0,32 (0,03-3,56)	0,352
gene <i>BCL6</i> (≥2,73477 vs <2,73477)	0,44 (0,06-3,11)	0,419	0,60 (0,11-3,25)	0,561
Refratariedade (Sim vs Não)	NA	0,034	88,00 (6,99-1108,27)	0,001
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	19,43 (2,03-185,73)	0,003	5,20 (0,9-30,08)	0,057

5.10 Fatores de Prognóstico para Risco de Recaída e Refratariedade na primeira linha de tratamento

5.10.1 Análise Univariada

Em análise univariada, Idade > 60 anos foi associado a maior risco de refratariedade à primeira linha de tratamento oncológico com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$). Idade >60 anos, IPI ≥ 2 , CD3 negativo, expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$, expressão gênica de *PD1* $\geq 2,00938$ estiveram associados a maior risco de recaída após a primeira linha de tratamento com diferença estatisticamente significativa ($p \leq 0,1$), conforme demonstrado na Tabela 20.

Tabela 20 - Análise univariada para Refratariedade e Recaída

Variáveis	Refratariedade		Recaída	
	OR (IC 95%)	valor p	OR (IC 95%)	valor p
Idade (>60 anos vs ≤ 60 anos)	9 (0,76-106,01)	0,067	12,44 (1,31-117,93)	0,012
IPI modificado (2+3+4+5 vs 0+1)	6,75 (0,53-86,56)	0,127	7,33 (1,17-46,05)	0,024
P.S. (3+4 vs 0+1+2)	NA	0,031	NA	NA
Radioterapia (Não vs Sim)	NA	0,031	5,5 (0,59-51,52)	0,112
COO (não-GCB vs GCB)	NA	NA	2 (0,11-34,82)	0,644
anti-CD3 (Negativo vs Positivo)	4 (0,27-58,56)	0,309	12,62 (1,97-148,13)	0,021
anti-MYC (51-100% vs 0-50%)	1,17 (0,13-10,22)	0,893	4 (0,69-23,23)	0,115
anti-BCL2 (51-100% vs 0-50%)	NA	0,008	5,75 (0,62-54,43)	0,102
anti-LMO2 (0-25% vs 26-100%)	1(0,07-14,64)	1	1,67 (0,28-10,09)	0,583
anti-MGMT (1-100% vs 0%)	NA		NA	
anti-PDCD1 (1-100% vs 0%)	NA		NA	
anti-POU2F1 (1-100% vs 0%)	NA		NA	
gene <i>MYC</i> (≥0,201041 vs <0,201041)	4,5 (0,25-80,57)	-0,322	7,2 (0,62-83,35)	0,098
gene <i>BCL2</i> (≥0,3516 vs <0,3516)	4,5 (0,25-80,57)	0,322	1,2 (0,15-9,77)	0,868
gene <i>LMO2</i> (≥0,689232 vs <0,689232)	NA	0,024	NA	0,085
gene <i>MGMT</i> (≥0,335666 vs <0,335666)	NA	0,371	1,09 (0,09-13,78)	0,948
gene <i>POU2F1</i> (≥1,44819 vs <1,44819)	3 (0,19-47,96)	0,453	0,86 (0,11-6,62)	0,885
gene <i>PDCD1</i> (≥2,00938 vs <2,00938)	NA	0,264	0,11 (0,01-1,15)	0,052
gene <i>BCL6</i> (≥2,73477 vs <2,73477)	0,20 (0,01-3,66)	0,285	0,86 (0,11-6,62)	0,885
Refratariedade (Sim vs Não)	NA	0,403	NA	0,127
PD após 1 linha tratamento (Sim vs Não)	4 (0,34-47,11)	0,267	NA	0,001

5.11 Correlação entre expressão gênica e expressão proteica

As Tabelas 21, 22 e 23 apresentaram as correlações entre as expressões gênicas (RT-qPCR normatizadas de *MYC*, *BCL2* e *LMO2*) e suas proteínas correspondentes (anti-MYC, anti-BCL2 e anti-LMO2). Teste de concordância para BCL6 não pode ser realizado, pois não foram realizadas reações de IHQ prospectivamente neste estudo. Os outros genes/proteínas de interesse (PD1, MGMT e OCT1) não puderam ser calculados devido à ausência ou ao excesso de expressão gênica ou proteica.

Houve correlação moderada entre a expressão gênica de *MYC* ($<0,201041$ vs $\geq 0,201041$) e sua respectiva proteína (0/1/2 vs 3/4), com coeficiente de Kappa=0,596 e valor $p=0,022$. O mesmo ocorreu entre a expressão gênica de *BCL2* ($<0,3516$ vs $\geq 0,3516$) e sua respectiva proteína (0/1/2 vs 3/4), com coeficiente de Kappa=0,426 e valor $p=0,042$.

O Anexo P demonstra as médias e medianas de expressão gênica normatizada em cada quartil de IHC da proteína correspondente.

Tabela 21 - Correlação entre IHQ proteína MYC e expressão gênica *MYC*

MYC		expressão gênica		
		<0.201041	≥0.201041	total %(n)
IHQ Anti-MYC	0%-50%	35 % (7)	10 % (2)	45 % (9)
	51%-100%	10 % (2)	45 % (9)	55 % (11)
	total %(n)	45 % (9)	55 % (11)	100 % (20)
Porcentagem de concordância		80,0%		Acurácia Geral
Porcentagem de discordância		20,0%		
Coeficiente de Kappa		0,596 p = 0,022		classificação** moderada rejeita H0
valor teste hipótese	H0: igual a zero			
sensibilidade		0,778		
especificidade		0,818		
valor preditivo positivo		0,778		
valor preditivo negativo		0,818		
Coef de Youden		0,596		
Eficiência		0,798		

* considerando expressão gênica como teste gold (ouro)

** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa

Tabela 22 - Correlação entre IHQ proteína BCL2 e expressão gênica *BCL2*

BCL2		expressão gênica		
		<0.3516	≥0.3516	total %(n)
IHQ Anti-BCL2	0%-50%	14,3 % (3)	0 % (0)	14,3 % (3)
	51%-100%	23,8 % (5)	61,9 % (13)	85,7 % (18)
	total %(n)	38,1 % (8)	61,9 % (13)	100 % (21)
Porcentagem de concordância		76,2%		Acurácia Geral
Porcentagem de discordância		23,8%		
Coeficiente de Kappa				classificação**
valor teste hipótese	H0: igual a zero	0,426 p = 0,042		
sensibilidade		0,375		
especificidade		1,000		
valor preditivo positivo		1,000		
valor preditivo negativo		0,722		
Coef de Youden		0,375		
Eficiência		0,688		

* considerando expressão gênica como teste gold (ouro)

** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa

Tabela 23 - Correlação entre IHQ proteína LMO2 e expressão gênica *LMO2*

LMO2		expressão gênica		
		<2.57603	≥2.57603	total %(n)
IHQ Anti-LMO2	0%-25%	33,3 % (7)	14,3 % (3)	47,6 % (10)
	26%-100%	23,8 % (5)	28,6 % (6)	52,4 % (11)
	total %(n)	57,1 % (12)	42,9 % (9)	100 % (21)
Porcentagem de concordância		61,9%		Acurácia Geral
Porcentagem de discordância		38,1%		
Coeficiente de Kappa				classificação**
Valor teste hipótese	H0: igual a zero	0,243 p = 0,387		
sensibilidade		0,583		
especificidade		0,667		
valor preditivo positivo		0,700		
valor preditivo negativo		0,545		
Coef de Youden		0,250		
Eficiência		0,625		

* considerando expressão gênica como teste gold (ouro)

** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa

6 DISCUSSÃO

Este estudo foi desenhado como uma coorte unicêntrica retrospectiva. Apesar das limitações deste tipo de estudo, na literatura se encontram disponíveis principalmente estudos de coorte unicêntricos, retrospectivos com amostras populacionais pequenas em LPSNC (menores que 50) ^{24,131,224,225}. O número de pacientes obtido foi levado em consideração no plano de análises estatísticas, sendo planejadas apenas estatística descritiva e análises univariadas. Análises multivariadas, regressões logísticas e de Cox são geralmente utilizadas para identificação de fatores de risco e biomarcadores, porém apresentam resultados menos tangíveis e confiáveis quando o número de observações é pequeno e múltiplos fatores confundidores precisam ser ajustados. Portanto, não elas não foram realizadas ²²⁶. Estudos com amostras pequenas podem limitar as análises estatísticas, principalmente quando múltiplas variáveis são analisadas e comparadas, apresentando maiores margem de erro, intervalos de confiança, resultados falso positivos, podendo hiperestimar a magnitude da associação, com menor precisão dos resultados e conclusões que precisam ser interpretadas com cautela ²²⁶. O tamanho do efeito esperado também tem impacto no cálculo do tamanho amostral, por exemplo. Estudos que analisam biomarcadores com baixo OR ou HR esperados precisam de amostras maiores para que o efeito real possa ser diferenciado de uma variação aleatória ²²⁷.

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes era do sexo feminino (57,1%) e a mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos, similar à literatura. Houve predomínio do sexo feminino, com mediana de idade entre 65 e 67 anos em aproximadamente 51% dos pacientes ^{19,228}.

Dez pacientes tiveram diagnóstico de LPSNC com 70 anos ou mais, representando 29% dos casos. O acometimento de população idosa tem sido verificado no LPSNC. Segundo dados do *Central Brain Tumor Registry of the United States* and SEER, foi evidenciado um aumento de incidência de LPSNC acima de 70 anos entre 1973 e 2013 (de 0,2 para 2,1/100.000 pessoas) ⁴⁶. Apesar de idade não ser o melhor biomarcador para tolerabilidade ao

tratamento ou preditor de toxicidade, pacientes acima de 70 anos apresentam mais frequentemente redução de suas funções fisiológicas, que impactam na farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos utilizados no tratamento oncológico, o que colabora para o aumento do risco de toxicidade e morbi-mortalidade ²²⁹. Como discutido posteriormente, o tratamento oncológico na população estudada foi individualizado, e a idade dos pacientes foi um dos determinantes na escolha terapêutica, a fim de minimizar a toxicidade e proporcionar melhor qualidade de vida.

Vários fatores clínicos são considerados na decisão do tratamento oncológico, incluindo o *performance status*. Neste estudo, apesar de a maioria (22/35; 65,7%) dos pacientes apresentar inicialmente PS ≥ 2 , quase a totalidade (33/35; 94,2%) foi submetida a alguma linha de tratamento oncológico. Dados semelhantes foram demonstrados num estudo retrospectivo com 378 pacientes, em que 58% dos pacientes apresentavam PS ≥ 2 e 98% foram submetidos a algum tipo de tratamento oncológico ²³⁰. *Performance status* está associado à sobrevida global em pacientes com LDGCB e LPSNC, assim como em outros tumores. Geralmente um PS avançado está associado a doença em estágio mais avançado, com pior prognóstico e menor tolerabilidade ao tratamento oncológico, limitando opções terapêuticas. Ainda que contribuísse para o incremento de suas toxicidades, conforme demonstrado, não foi impeditivo de tratamento oncológico na presente coorte.

Conforme previamente exposto, a maioria dos pacientes apresentava idade >60 anos e PS ≥ 2 . Estes foram os primeiros fatores de mau prognósticos identificados em pacientes com LPSNC, corroborado por diversos estudos independentemente da escolha terapêutica ^{95,230-232}. Em nosso estudo, idade >60 anos foi associada a piores SG, SLD, SLP e refratariedade ao tratamento e P.S. ≥ 3 foram associados a piores SG, SG 2 anos, SLD e SLP (valor $p \leq 0,1$), alinhados com dados da literatura. Tais dados demonstram a necessidade de novas opções terapêuticas para esta população para que causem menor morbi-mortalidade.

Apesar de punção lombar ser contraindicada em pacientes com LPSNC em até 42% dos pacientes ²³³, nesta coorte foi realizada em quase a totalidade dos pacientes (97%). No entanto, a maioria (91%) apresentou citologia oncótica

negativa, similar a dados da literatura. Dados publicados evidenciam citopatologia oncótica positiva em apenas 13% dos casos (quando associado à citometria de fluxo) ^{234,235}. A pesquisa de células neoplásicas como citologia é um método de baixa sensibilidade e com alta taxa de resultados falso negativos, mesmo em pacientes com evidência de extensa infiltração meníngea, o que poderia justificar os resultados encontrados ^{230,236}. Apesar disso, há relatos de diagnóstico de LPSNC pela associação de citologia oncótica e citometria de fluxo, demonstrando que tal procedimento possui valor clínico e prognóstico e foi factível nesta população ²³⁴.

A localização topográfica do LPSNC no SNC tem importante papel prognóstico, além de ter impacto na realização do procedimento de biópsia esterotáxica. Diferentemente do estudo conduzido por Ferreri *et al.*, no qual apenas 36% dos pacientes apresentavam acometimento de regiões profundas em SNC (regiões periventriculares, gânglios da base, corpo caloso, tronco cerebral e cerebelo), neste estudo a maioria (77%) apresentava acometimento de regiões profundas do SNC evidenciado por exames de imagem ²³⁰.

Considerando os fatores prognósticos já descritos, como idade, PS e acometimento de regiões profundas, a maioria dos pacientes apresentava risco IPI modificado de risco intermediário e alto (80%), o que demonstra a alta prevalência de fatores de mau prognóstico na população estudada. É descrito que pacientes com IPI modificado de risco intermediário e alto estão associados a pior prognóstico, com SG em 2 anos entre 48%-57% e 17%-24%, respectivamente, independentemente do tratamento utilizado, similares aos encontrados no presente estudo ²³⁰. Em nosso estudo, em análise univariada, o IPI modificado ≥ 2 foi associado a pior SG, SLD, SLP e maior recaída ($p \leq 0,1$). Desta forma, confirma-se tratar de um fator de prognóstico adverso na nossa população, corroborando dados de Ferreri *et al.* e Cady *et al.* ^{68,69}. A análise de IPI modificado é de fácil execução, o que permite a identificação precoce de pacientes com mau prognóstico, que muitas vezes necessitam de acompanhamento médico mais frequente e tratamentos mais agressivos. Portanto, deve ser realizado assim que possível nos pacientes com LPSNC.

O tipo de acesso e o fluxo de sistema público de saúde também pode ter impacto prognóstico, ao retardar o diagnóstico e na escolha terapêutica. Neste

estudo, os pacientes eram referenciados de serviços primários e secundários de saúde por suspeita de tumores em SNC ao Serviço de Neurocirurgia do HC-FMUSP para realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Após suspeita de linfoma em SNC, os pacientes eram então encaminhados ao Serviço de Hematologia do HC-FMUSP para acompanhamento e tratamento. Portanto, a data de confirmação diagnóstica na nossa população dependia de variáveis como demora para obtenção de acesso aos serviços de saúde e à inespecificidade dos sintomas clínicos iniciais do LPSNC, o que comumente pode levar à demora diagnóstica. Diagnósticos tardios podem levar à deterioração clínica dos pacientes, o que interfere na escolha do tratamento e tolerância ao mesmo e causa impacto no prognóstico, na SG e nas taxas de resposta, conforme demonstrado num estudo brasileiro com pacientes com LDGCB sistêmico tratados no HC-FMUSP ²³⁷. Além disso, a infiltração do linfoma no SNC por longo período pode levar a dano tecidual, o que dificulta o diagnóstico e piora piorar o PS (com menor tolerabilidade ao tratamento), levando à perda de autonomia, a danos neurológicos com sintomas debilitantes muitas vezes irreversíveis apesar da obtenção de RC e ao tratamento, com alta morbidade da patologia ²³⁸. No presente estudo, não foi possível calcular o intervalo entre o início de sintomas e o procedimento diagnóstico realizado. No entanto, conforme discutido posteriormente, as taxas de SG observadas neste estudo foram semelhantes às dos principais estudos realizados em países desenvolvidos ^{22,23,68}. Isso sugere que este intervalo pode ter sido semelhante. É provável que a maioria dos pacientes em todo o mundo tenha alguma demora diagnóstica devido aos diagnósticos diferenciais nesta população.

Considerando os dados obtidos e alinhados com boas práticas clínicas, pôde-se observar individualização na escolha terapêutica baseada nas condições clínicas dos pacientes. Alinhada com literatura médica, a maioria dos pacientes foi submetida à quimioterapia baseada em HD-MTX (63,6%). Monoquimioterapia ou WBRT isolada foram indicadas principalmente para pacientes isosos, com mediana etária de 69 anos devido à maior tolerabilidade e menor toxicidade aguda, apesar de proporcionarem taxas de resposta inferiores e menos duradouras ^{57,98,239}. A taxa de resposta global encontrada após a primeira linha de tratamento foi de 72,8%, semelhante a dados

publicados por Ferreri *et al.* (RG 69%) em pacientes tratados com HD-MTX ²³⁰. Estes dados confirmam a qualidade de tratamento oferecido no complexo HC-FMUSP, similar a dados apresentados internacionalmente.

WBRT foi prescrita como consolidação de tratamento ou tratamento isolado. A maioria dos pacientes (9/12; 75%) recebeu radioterapia como regime de consolidação após indução, por apresentarem melhores condições clínicas satisfatórias e bom PS. Radioterapia isolada foi prescrita principalmente para pacientes sem condições clínicas de tolerar tratamentos oncológicos com maior toxicidade. Em nosso estudo, tratamento com radioterapia foi associado com melhores SG, SLD, SLP (valor $p \leq 0,1$). Como a análise multivariada não foi realizada, a interpretação de radioterapia como fator de bom prognóstico deve ser considerada com cautela, principalmente porque a radioterapia isolada e a radioterapia como regime de consolidação não foram analisadas separadamente como fator prognóstico, devido ao baixo número de pacientes. No entanto, o potencial benefício da radioterapia é discutido na literatura, principalmente como tratamento isolado, por exemplo. Em um estudo retrospectivo com 82 pacientes, a radioterapia isolada foi associada à melhor SG quando comparada a tratamento suportivo em pacientes com LPSNC e PS ruim, incluindo em pacientes idosos, podendo ser utilizada como terapia em pacientes com condições clínicas limítrofes ²⁴⁰. O benefício da radioterapia como regime de consolidação é questionável, principalmente em face de novas opções terapêuticas e risco de neurotoxicidade ²².

Apesar de um possível ganho de SG com WBRT, é importante ressaltar que, de modo geral, os pacientes submetidos à radioterapia não apresentavam dados/acompanhamento neurológico ou cognitivo progressivos registrados no prontuário, de forma que a neurotoxicidade tardia não pôde ser analisada neste estudo. Isso é de extrema importância na nossa coorte, por se tratar majoritariamente de população idosa e pelo fato de a maioria dos pacientes ter sido submetida a tratamento radioterápico. Dessa forma, dados sobre opções terapêuticas e neurotoxicidade neste estudo necessitam ser interpretados com cautela. Num estudo conduzido por Ferreri *et al.*, WBRT foi associado a declínio neurológico de funções executoras e de aprendizado em 50% dos pacientes em até 2 anos ²⁰.

Apesar da alta taxa de resposta global aos tratamentos oncológicos e radioterápicos descritos na literatura, existe uma alta taxa de recorrência e refratariedade (50% e 30%, respectivamente). A recaída e refratariedade após tratamento oncológico estão associadas a pior prognóstico⁹³. Em nosso estudo, a taxa de refratariedade (27,30%) foi similar à literatura médica. Refratariedade à primeira linha de tratamento e PD após a primeira linha de tratamento estiveram associados a pior prognóstico, incluindo piores SG, SG 2 anos, SLP (valor $p \leq 0,1$), conforme esperado.

Novos estudos clínicos e novas opções terapêuticas têm surgido no LPSNC. Em nosso estudo, nenhum paciente foi submetido a tratamento com rituximabe ou TMO, o qual tem sido adicionado ao serviço do HC-FMUSP em 2018, após a data limite de seleção dos pacientes.

Resseção neurocirúrgica não foi recomendada como opção terapêutica em nenhum dos pacientes desta coorte, por não fazer parte do arsenal terapêutico e pelo fato de LPSNC ser uma patologia multifocal²⁴¹. Isso também demonstra possivelmente o alto grau de suspeição de LPSNC em exames de imagem, com indicação do procedimento cirúrgico correto.

O presente estudo confirmou a alta mortalidade do LPSNC, com SG mediana de 42,6 meses (IC95% 26,6-58,6 meses), semelhante aos dados da literatura, cuja SG mediana varia entre 20,6 meses (IC95% 12,4 a 33,4 meses) e 60 meses em pacientes tratados com radioterapia isolada e HD-MTX, respectivamente^{198,203,231}. As SG em 24 e 48 meses (65,5% e 43,8%, respectivamente) também foram semelhantes aos dados da literatura médica, na qual pacientes são submetidos a tratamento baseado em HD-MTX (52 $\pm$ 4% e 43,8%, respectivamente)^{242,243}⁵³. Dados do SEER têm demonstrado ganho de SG em 5 anos entre os períodos de 1992-1994 e 2004-2006 de 19,1% (IC95%: 14,8-23,8) e 30,1% (IC95%: 24,2-28,1%), respectivamente, devido às novas opções terapêuticas disponíveis¹⁹. Contudo, tal ganho de sobrevidas não pode ser analisado no presente estudo, pois os pacientes não foram separados por período de inclusão devido ao baixo tamanho amostral.

Com uma mediana de tempo de seguimento de 41 meses (1,1- 171,8), foi evidenciada uma alta taxa de mortalidade (74%), semelhante à maioria dos estudos disponíveis. Essa elevada mortalidade pode ser explicada pela

associação de diversos fatores que, em conjunto, conferiram prognóstico adverso. Destacamos características clínico-laboratoriais desfavoráveis, como elevado IPI ao diagnóstico, idade ao diagnóstico e PS inicial >2, entre outras. Tais dados demonstram a necessidade de diagnóstico mais precoce do LPSNC, antes da deterioração clínica, tratamento individualizado e o uso de novas opções terapêuticas, como *target therapies*.

Apesar de todos os pacientes terem sido acompanhados clinicamente durante ou após o tratamento oncológico, dados sobre a *causa mortis* não se encontravam disponíveis. A maioria dos pacientes (21/26; 80,7%) apresentava doença em atividade documentada na última consulta médica, sugerindo que a *causa mortis* poderia estar relacionada à progressão tumoral. Tais dados estão alinhados com um grande estudo retrospectivo com 370 pacientes tratados com quimioterapia e/ou radioterapia, em que a maioria (70,1%) evoluiu a óbito após 24 meses de seguimento, sendo as principais causas de óbito relacionadas ao linfoma (87%), à toxicidade do tratamento (8%), entre outros fatores ²³⁰.

Biomarcadores moleculares também foram selecionados e estudados, objetivando melhor compreensão da patogênese tumoral e identificação de fatores prognósticos. No presente estudo, a expressão gênica foi estudada utilizando o qRT-PCR, por ser considerado um método rápido, de alta sensibilidade e especificidade para a quantificação de expressão gênica ²⁴⁴. Em nosso estudo, os *guidelines* MIQE (*Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments*) foram utilizados seguindo padronização internacional da técnica e dos descritores ²⁰⁴. Foi observada ausência de amplificação gênica entre 34,3% e 40% das amostras. Os estudos foram realizados em amostras parafinadas, algumas delas bastante antigas. Vários fatores podem justificar a ausência de amplificação, como a possível degradação do RNA, a condição de emblocamento das amostras em parafina das amostras e a reduzida quantidade de tecido tumoral emblocado, pois, na maioria das biópsias, havia escassa quantidade amostral. Dentre outros fatores que podem ter interferido na qualidade do RNA extraído de amostras FFPE, estão a demora na fixação do material após a realização da biópsia, levando à degradação do RNA induzido por autólise e a fixação do tecido com formalina

não tamponada, levando à degradação ácida do RNA ^{245,246}. Tais fatores podem ter ocorrido na nossa população. Apesar disso, não foi evidenciada diferença estatisticamente significativa das características clínicas e laboratoriais entre os pacientes da coorte analisada para expressão gênica e os que foram excluídos. Assim, afasta-se qualquer suspeição de seleção de pacientes de melhor ou pior prognóstico do ponto de vista clínico e laboratorial, já que os pacientes avaliados são representativos da amostra total.

A curva de amplificação das eficiências gênicas confirmam a qualidade das reações de RT-qPCR. O gene de referência *GUSB* foi selecionado como gene de referência/controle endógeno para controle e verificação das possíveis variações ou interferentes da reação de RT-qPCR e para análise da eficiência e da quantidade de RNA total ^{245,247}. Neste estudo, os dados quantitativos obtidos no RT-qPCR foram transformados em variáveis qualitativas pelo estabelecimento de pontos de corte obtidos em curvas de ROC. Isso foi necessário para a inclusão de pacientes com ausência absoluta de expressão dos genes selecionados. Estas amostras apresentaram amplificação do gene de referência e tiveram suas reações de RT-qPCR com expressão do gene de interesse indetectável. Estes resultados foram confirmados (resultado do *Ct* como indeterminado). É importante ressaltar que estas amostras tiveram reações com valor zero em até 5 dígitos decimais, apesar de realização da reação até o número máximo de ciclos. O significado deste resultado é que tais genes não eram expressos ou expressos em poucas células em baixo nível de maneira não detectável. Portanto, não podem ser excluídas de análises estatísticas e precisaram ser convertidas em variáveis categóricas ²⁴⁸.

A expressão gênica de *MYC* $\geq 0,201041$ foi associada a piores SG, SG2 anos, SLP, óbito global e risco de recaída após tratamento (valor $p \leq 0,1$), sendo considerado um biomarcador de mau prognóstico, o que corrobora dados da literatura médica. É sabido que hiperexpressão de *MYC* está associada à iniciação, à progressão e à manutenção tumoral, além de diversas neoplasias, como linfoma de Burkitt e Mieloma Múltiplo, o que confere um pior prognóstico ^{148,150}.

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes ficou acima dos pontos de corte estabelecidos para imunoexpressão proteica (60%) de *MYC*, porém sem

correlação prognóstica. Tal dado corrobora dados de Rubenstein *et al.*, em cujo estudo prospectivo com 44 pacientes, a expressão gênica e proteica elevada de MYC (positividade nuclear >50%) foi identificada em 54% dos pacientes, porém sem correlação prognóstica ²³. O papel da expressão proteica de MYC também foi avaliado num estudo com 14 pacientes, onde a sua hipexpressão esteve associada à pior SG. No entanto, o ponto de corte utilizado foi de apenas 20%, diferentemente daquele utilizado em nosso estudo e no estudo de Rubenstein *et al.* ²⁴⁹. Portanto, nosso estudo apresenta resultados alinhados com a literatura médica, demonstrando o papel prognóstico de MYC no LPSNC⁷⁵.

O gene *BCL2* regula a morte celular programada inclusive em linfócitos, e, quando hiperexpressa, pode bloquear a apoptose. Está associado à resistência à quimioterapia e à radioterapia, conferindo mau prognóstico^{154,220,250,251}. Em nosso estudo, a maioria dos pacientes ficou acima dos pontos de corte estabelecidos para a expressão proteica de BCL2 (80%), similar a dados da literatura ^{252,253}. Sua hiperexpressão foi associada a piores SG e SLP (valor $p \leq 0,1$), corroborando dados da literatura ²⁵²⁻²⁵⁴.

Tais dados precisam ser considerados conjuntamente com o tratamento recebido, pois nenhum paciente foi submetido à terapia com rituximabe. No LDGCB sistêmico, imunoexpressão de BCL2 é considerado um biomarcador de mau prognóstico, principalmente em estudos conduzidos na era pré-rituximabe^{154,255}. Na era pós-rituximabe, o impacto prognóstico de hipexpressão de BCL2 parece ser reduzido. Num estudo com 399 pacientes, foi demonstrado que a adição de rituximabe ao esquema CHOP foi capaz de evitar a falha à quimioterapia em pacientes com hiperimunoexpressão de BCL2 ²²⁰. Expressão gênica de *BCL2* $\geq 0,3516$ não foi associada a nenhum dos desfechos clínicos estudados.

Em nosso estudo, o teste de correlação entre expressão gênica e expressão proteica pôde ser realizado apenas para MYC, BCL2 e LMO2. Não foi possível estabelecer ponto de corte para correlação de outros genes estudados devido ao excesso de expressão gênica indetectável (MGMT e PDCD1) ou excesso de hiperexpressão (POU2F1) ²⁵⁶.

Observamos correlação moderada (kappa entre 0,41-0,60) entre

expressão gênica e proteica de MYC, bem como de BCL2. Dados similares são encontrados na literatura médica, na qual a correlação entre expressão gênica e proteica é de apenas 40% (classificada como moderada). Isso deve-se a fatores como estabilidade proteica, taxa de transcrição e translação, taxa de degradação do mRNA, atividade do micRNA, regulação pós-transcricional e de modificação pós-translacional ²⁵⁷. De modo geral, o nível de transcriptoma não é diretamente proporcional ao nível de proteína, sendo insuficiente para explicar a relação entre genótipo e seu fenótipo ²⁵⁷. A meia vida de uma proteína pode variar de minutos a dias, enquanto a taxa de degradação do mRNA fica em torno de 2-7 horas em mamíferos. Outro fator a ser considerado é que, nos mamíferos, há uma baixa taxa de transcrição de mRNA, quando comparado com a translação ²⁵⁸. É comum a falta de proporcionalidade entre a expressão proteica e a expressão gênica de proteínas que não são controladas pela expressão gênica, mas por sua ativação, como é o caso das proteínas kinases cuja expressão gênica é constante, mas sua ativação varia ao longo do tempo ²⁵⁹. Em estudos com células de câncer de mama, foi observada hiperexpressão proteica de POU2F1 sem concomitante hiperexpressão gênica (mRNA) possivelmente devido a alterações na metabolização e na degradação de POU2F1 ²⁶⁰. Tais motivos podem explicar a ausência de correlação entre expressão gênica e proteica dos outros genes de interesse estudados e o fato de ter sido encontrada apenas correlação moderada para MYC e BCL2.

O gene *LMO2* e sua respectiva proteína possui papel crucial na hematopoiese e vem sendo estudado em tumores hematológicos, incluindo LPSNC ¹⁴⁸. Em nosso estudo, a maioria dos pacientes ficou acima dos pontos de corte para imunoexpressão proteica (51,4%) de *LMO2*. Alguns estudos têm demonstrado hiperexpressão de *LMO2* em LPSNC quando comparados a LDGCB sistêmico. Num estudo com 32 pacientes com LPSNC, apenas 37% apresentavam imunoexpressão de *LMO2*, inferior ao nosso resultado ⁷⁵. No entanto, o ponto de corte utilizado por Four *et al.* foi de 30%, superior ao ponto de corte selecionado (25%) ⁷⁵.

No nosso estudo, tanto a hiperexpressão proteica de *LMO2* >25% quanto a gênica de *LMO2* $\geq 0,689232$ estiveram associadas a melhor prognóstico (SG 2 anos e SLP, respectivamente, valor $p \leq 0,1$). Tais dados

estão alinhados com dados da literatura médica, incluindo não apenas tumores hematológicos, mas outros como câncer de pâncreas, pulmão, entre outros^{261,262}.

O gene *MGMT* e sua proteína são frequentemente estudados em neoplasias devido ao seu impacto prognóstico e preditor de resposta a agentes alquilantes, usualmente utilizados no tratamento do LPSNC. Em nosso estudo, a mediana de expressão gênica do *MGMT* foi zero e nenhum paciente apresentou expressão proteica. É sabido que a metilação da região promotora de *MGMT* leva à ausência de expressão gênica e proteica, estando associada à patogênese de vários tumores, como carcinoma colorretal, carcinoma de pulmão, linfoma e glioblastoma¹⁷⁹. Neste estudo, não foi realizada a análise de metilação da região promotora, porém a ausência de expressão proteica bem como a baixa expressão gênica poderiam ser secundárias à metilação da região promotora, com impacto prognóstico e talvez preditor de resposta a tratamentos com regimes alquilantes.

A expressão gênica de *MGMT* $\geq 0,335666$ foi associada a pior prognóstico (SLP, valor $p=0,056$). No entanto, tais dados precisariam ser confirmados por análise multivariada conjuntamente com o tipo de tratamento recebido pelos pacientes e sua expressão proteica. O gene *MGMT* codifica uma proteína reparadora de DNA, que está associada na defesa celular contra mutagênese e toxicidade celular induzida por agentes alquilantes. Seu silenciamento genético está associado a melhor prognóstico (SG) nos pacientes que receberam quimioterapia com base em HD-MTX^{29,176,252}.

É sabido que o gene *POU2F1* (OCT1) codifica uma proteína com efeitos tumorigênicos¹⁷⁹. Por esse motivo, as expressões gênica e proteica de *POU2F1* (OCT1) foram analisadas, porém não foram associadas a nenhum dos desfechos clínicos estudados. O papel prognóstico de tal gene é conflitante entre diferentes estudos publicados. Em alguns estudos, a expressão proteica de *POU2F1* foi associada à maior agressividade tumoral e pior prognóstico em tumores gástrico, de cólon, de próstata, de pulmão, de mama, entre outros³². Em outros estudos, a expressão gênica de *POU2F1* não foi considerada um biomarcador prognóstico²⁶⁰.

Células cancerígenas apresentam mecanismos de escape ao sistema

imune, os quais têm sido considerados alvos terapêuticos e pesquisados também no LPSNC. A imunoexpressão de PDCD1 e PDL1 tem sido estudada como fator preditor de resposta e prognóstico em diferentes tumores ^{263,264}. Em nosso estudo, a mediana de expressão gênica de *PDCD1* foi zero, e a maioria dos pacientes (85%) não apresentou imunoexpressão proteica de PDCD1 nas células tumorais. Tais dados são discordantes da literatura. Num estudo com 32 pacientes com LPSNC, a imunoexpressão de PDCD1 no TIL e PDL1 nas células tumorais foi de 53% e de 37%, respectivamente. Num estudo com 20 pacientes, 60% apresentavam imunoexpressão de PDCD1 no TIL intratumoral²⁶⁵.

No nosso estudo, a hipexpressão gênica de *PDCD1* $\geq 2,00938$ foi associada a maior risco de recaída após tratamento e mortalidade global (valor $p \leq 0,1$). No entanto, a expressão proteica de PDCD1 não foi associada a nenhum dos desfechos clínicos estudados, o que sugere não se tratar de um biomarcador prognóstico na nossa população. Num estudo retrospectivo com 76 pacientes conduzido por Cho *et al.*, a expressão proteica de PDCD1 foi associada a piores SG e SLP, o que evidencia papel do microambiente tumoral no prognóstico destes pacientes ²⁶⁶. Entretanto, o tamanho amostral e o ponto de corte para expressão proteica de PD1 foram diferentes (≥ 70 células/HPF) entre o nosso estudo e o estudo conduzido por Cho *et al.*

O papel do microambiente tumoral e a presença de TIL também foram estudados na nossa coorte, pela análise das reações de IHQ anti-CD3 previamente disponíveis. O CD3 é um complexo de proteínas transmembrana presente em linfócitos T, importante na ativação de linfócitos T citotóxicos e células T helper. Em nosso estudo, a imunoexpressão de CD3 foi pesquisada retrospectivamente em 92,4% dos pacientes (32/35), resultando ausente na maioria (28/32, 87,5%), conforme esperado no LPSNC subtipo LDCGB. A ausência de imunoexpressão de CD3 foi associada a maior risco de recaída após tratamento e maior mortalidade global (valor $p \leq 0,1$). O complexo de proteínas CD3 é considerado um marcador de linhagem de células T e atua como um correceptor que se associa ao receptor de células T, com papel fundamental na resposta imune adaptativa ²⁶⁷. Esse complexo está expresso em infiltração perivascular reativa de células T (TIL), sendo caracterizado

também por linfócitos reativos T isolados ou localizados entre parede vascular e as células neoplásicas ⁹⁰.

Tais dados estão alinhados com a literatura, na qual a presença de infiltrado perivascular reativo de células T é considerado um biomarcador histopatológico de bom prognóstico. Num estudo com 73 pacientes com LPSNC, a presença de infiltrado perivascular de linfócitos T foi associada à melhor SG, independentemente do risco IPI modificado ⁵⁶. Importante ressaltar que *Ponzoni et al* realizou a análise qualitativa de TIL, e não quantitativa.

A expressão gênica de *BCL6* não foi associada a nenhum dos desfechos clínicos estudados, e sua expressão proteica não pôde ser estudada devido à falta de material histopatológico. O *BCL6* é um importante regulador do sistema imune. Translocações cromossômicas de *BCL6* e de genes da cadeia de imunoglobulina são frequentes no LPSNC, com a ativação constitutiva do *BCL6*, levando à hiperexpressão gênica e proteica com consequente efeito tumorigênico ^{148,252,268,269}. Apesar de a imunoexpressão de *BCL6* estar presente em aproximadamente 55% do LPSNC ²⁷⁰, sua importância prognóstica ainda é tema de discussão. Alguns estudos evidenciaram que a alta imunoexpressão de *BCL6* (positividade nuclear >60%) foi associada a piores prognósticos (SG, SLP)^{23,81}. Entretanto, estudos retrospectivos evidenciaram que a imunoexpressão de *BCL6* estaria associada a melhor prognóstico (SG) ⁴¹.

7 CONCLUSÕES

- Com relação à expressão gênica normatizada temos que (em análise univariada): *MYC* $\geq 0,201041$ foi associada a pior prognóstico (piores SG, SG em 2 anos e SLP; maior mortalidade global e risco de recaída); *BCL2* $\geq 0,3516$ não foi considerada fator prognóstico; *LMO2* $\geq 0,689232$ foi associada a melhor prognóstico (melhor SLP); *MGMT* $\geq 0,335666$ foi associada a pior prognóstico (pior SLP); *PDCD1* $\geq 2,00938$ foi associada a pior prognóstico (maior mortalidade global e risco de recaída); *POU2F1* $\geq 1,44819$ e *BCL6* $\geq 2,73477$ não foram consideradas fatores prognósticos;
- As características clínico-laboratoriais e de prognóstico desta coorte foram similares aos da literatura médica disponível. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 62 anos, 77% apresentavam acometimento de regiões profundas de SNC ao diagnóstico e 80% apresentavam IPI modificado intermediário-alto. A SG mediana foi de apenas 42,6 meses (IC95% 26,6-58,6 meses), SLP mediana, de 41 meses (IC95% 19,7-62,4 meses) e SLD mediana, de 59,2 meses (IC95% 31,9-86,6 meses);
- Com relação à imunoexpressão proteica, temos que (em análise univariada): *MYC* >50% não foi considerada fator prognóstico; *BCL2* >50% foi associada a pior prognóstico (piores SG e SLP; maior mortalidade global); *LMO2* >25% foi associada a melhor desfecho clínico (melhor SG em 2 anos e menor mortalidade em 2 anos); expressão de *MGMT*, *POU2F1* e *PDCD1* não foram considerados fatores prognósticos e
- Houve correlação moderada entre a imunoexpressão proteica e a expressão gênica de *MYC*, bem como de *BCL2*.

8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

- 1- Criação de banco de dados de pacientes do Serviço de Hematologia da FMUSP;
- 2- Realização de estudos retrospectivos multicêntricos em população brasileira, com uma coorte maior e realização de análises multivariadas e
- 3- Validação dos resultados encontrados em estudos prospectivos com LPSNC.

9 ANEXOS

ANEXO A - Características clínico-laboratoriais por paciente

(continua)

pacientes			Pacientes que Evoluíram a Óbito			Pacientes vivos		Características Clínicas					
	sexo	idade diagnóstico (anos)	óbito (a)	idade óbito (anos)	tempo entre diagnóstico e óbito meses	idade última consulta (anos)	tempo entre diagnóstico e última consulta (meses)	RISCO IPI modificado (b)	P.S inicial (c)	P.S inicial ≥2? (a)	Acometimento de regiões profundas em SNC? (a)	Citologia LCR positiva? (a)	Presença de HIC? (a)
P1	0	47,2	0			58,8	139,7	1	1	0	1	0	0
P2	0	54,0	1	54,6	7,3			2	4	1	1	0	1
P3	0	75,5	1	81,0	66,3			1	1	0	0	0	0
P4	0	67,9	1	75,6	92,4			1	1	0	1	0	0
P6	1	62,0	0			68,1	73,8	2	2	1	1	1	1
P7	1	82,2	1	82,4	2,4			2	4	1	1	0	1
P8	0	49,9	1	51,9	24,1			1	3	1	1	0	0
P9	0	72,9	1	79,3	76,6			0	1	0	1	0	0
P10	1	61,1	1	61,2	1,1			2	3	1	0	2	1
P11	1	78,7	1	81,1	28,5			1	1	0	1	1	0
P13	1	49,8	1	53,2	41,0			2	3	1	1	0	1
P14	1	76,9	1	80,0	36,2			2	3	1	1	0	1
P15	1	77,5	1	78,1	6,7			2	3	1	1	0	1
P16	1	64,6	1	68,2	42,6			1	1	0	1	0	0
P17	1	59,9	0			65,5	67,8	1	2	1	1	0	1
P18	1	76,6	1	80,4	45,5			2	3	1	1	0	0
P19	1	49,3	1	54,8	66,1			1	0	0	0	0	0
P21	1	45,7	1	45,9	2,4			1	2	1	1	0	0
P22	0	42,3	1	47,5	62,4			1	2	1	1	0	1
P24	0	59,7	1	64,7	60,7			1	3	1	1	0	0
P25	1	56,5	1	60,8	51,4			0	2	1	0	0	1
P26	1	28,0	0			34,9	82,8	0	1	0	0	0	0
P27	1	53,1	0			67,4	171,8	0	1	0	1	0	0
P28	0	29,7	0			35,5	69,4	0	0	0	0	0	0
P30	1	66,9	1	69,0	24,7			1	3	1	0	0	0
P31	0	62,1	1	66,1	48,0			2	2	1	1	0	0
P32	1	66,2	1	67,6	17,2			1	2	1	1	0	0
P36	0	41,2	0			45,3	49,2	0	0	0	0	0	0
P37	1	65,9	1	66,9	12,6			0	1	0	1	0	0
P40	0	83,9	1	84,2	3,7			2	3	1	1	0	0
P41	0	26,2	0			28,4	27,0	2	2	1	1	0	0
P42	1	73,6	0			74,9	16,1	1	3	1	1	0	0
P43	1	69,0	1	69,3	3,7			1	3	1	1	0	0
P44	0	72,5	1	72,9	4,7			1	3	1	1	0	0
P51	0	56,6	1	57,2	7,7			1	3	1	1	0	0

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Imuno-histoquímica das Proteínas de Interesse						Imuno-histoquímica de Outras Proteínas Disponíveis (conforme disponibilidade e realização prévia)							Célula de Origem
pacientes	anti-MYC (d)	anti-MGMT (d)	anti-PDCD1 (d)	anti-BCL2 (d)	anti-LMO2 (d)	anti-POU2F1 (d)	anti-CD20 (e)	anti-CD3 (e)	anti-CD56 (e)	Ki67 (e)	anti-BCL6 (e)	anti-CD10 (e)	anti-MUM1 (e)	COO SUBTIPO (f)
P1	2	0	0	4	2	4	1	0	0	1	2	2	2	2
P2	1	5	0	4	4	3	1	1	2	1	0	0	1	1
P3	5	0	0	3	3	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P4	2	0	1	4	0	2	1	2	2	2	2	2	2	2
P6	3	0	0	1	4	4	1	2	2	1	1	1	1	0
P7	3	0	0	4	1	4	1	0	2	1	1	1	2	0
P8	4	0	0	4	0	4	1	0	2	1	2	0	0	1
P9	4	0	0	4	3	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P10	0	0	0	4	4	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P11	4	0	0	3	3	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P13	3	0	0	4	2	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P14	4	0	0	4	3	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P15	4	0	4	4	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P16	1	0	0	3	4	4	1	0	0	1	2	2	2	2
P17	2	0	1	2	2	4	1	0	2	1	0	0	1	1
P18	4	0	0	4	2	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P19	4	0	0	4	2	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P21	4	0	0	4	0	4	1	0	0	1	0	0	2	1
P22	3	0	0	4	4	4	1	0	2	1	0	0	0	1
P24	4	0	0	4	3	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P25	4	0	0	1	4	4	1	0	2	1	1	0	1	1
P26	1	0	0	4	0	4	1	1	0	1	0	2	2	2
P27	4	0	0	2	0	4	1	0	2	2	2	2	2	2
P28	5	5	5	5	5	5	1	1	2	1	1	1	0	0
P30	3	5	0	4	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P31	3	0	0	3	3	4	1	0	0	1	1	0	1	1
P32	4	0	0	4	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P36	3	5	5	5	5	5	1	0	2	1	2	2	2	2
P37	2	0	0	4	0	4	1	0	0	1	0	0	1	1
P40	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	2	0	1	1
P41	3	0	0	4	4	4	1	1	2	1	1	0	2	1
P42	0	0	0	3	0	4	1	0	2	1	2	2	2	2
P43	4	0	0	4	0	4	1	0	2	1	0	0	1	1
P44	1	0	0	3	0	4	1	0	2	1	0	1	1	0
P51	1	0	0	3	5	4	1	2	2	2	2	2	2	2

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Expressão Normalizada dos Genes de Interesse						
pacientes	MYC média (g) (i)	MGMT média (g) (i)	PDCD1 média (g) (i)	BCL2 média (g) (i)	LMO2 média (g) (i)	POU2F1 média (g) (i)	BCL6 média (g) (i)
P1	0,110	0,000	0,000	0,091	0,689	0,000	1,203
P2							
P3	0,000	0,000	0,000	0,130	2,576	4,386	4,923
P4	0,000	0,336	0,000	0,645	0,157	1,568	1,703
P6	0,000	0,000	0,000	0,197	7,140	0,000	3,297
P7	0,341	0,000	0,000	1,842	0,138	1,722	3,277
P8	0,235	0,000	0,000	2,205	0,000	0,000	0,648
P9							
P10	0,202	1,418	1,035	0,766	4,078	1,033	3,787
P11	0,235	0,000	9,215	0,352	10,973	0,000	8,337
P13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,122	0,000
P14	0,304	0,000	0,000	0,081	1,636	6,141	2,716
P15	0,412	0,000	0,000	0,528	0,947	2,783	2,735
P16							
P17	0,030	0,011	0,000	0,079	1,991	1,448	0,639
P18	0,371	0,000	0,000	1,472	0,451	0,000	1,113
P19						0,000	0,000
P21						0,000	0,000
P22	0,475	0,000	1,730	5,566	17,506	1,683	7,376
P24							
P25							
P26	0,000	0,000	6,405	1,159	1,051	6,301	9,091
P27							
P28							
P30							
P31							
P32							
P36							
P37	0,070	0,218	0,000	0,324	0,065	4,481	1,640
P40	0,214	0,000	0,000	0,000	0,436	0,000	0,271
P41	0,641	0,070	4,159	0,652	7,785	0,000	5,446
P42	0,198	2,524	2,663	1,189	13,780	2,828	3,346
P43	0,201	10,072	2,009	0,564	6,560	2,134	3,427
P44	0,178	1,318	0,592	1,194	3,463	0,568	1,705
P51							

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

#o valor 0,000 corresponde à ausência absoluta de expressão gênica, portanto um valor a ser considerado.

##NA- corresponde a reações de RT-qPCR que foram consideradas como não avaliáveis.

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Informações sobre Primeira Linha de Tratamento									Informações sobre Segunda Linha de Tratamento						
pacientes	TTO 1 Linha (a)	idade no TTO1 (anos)	Recebeu HD-MTX? (a)	duração TTO1 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo entre final TTO 1 e PD (meses)	Recaída? (a)	Refratariedade? (a)	TTO 2 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO2 (anos)	duração TTO2 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo entre final TTO 2 e PD (meses)
P1	1	47,3	1	9,13	0	0		0	0							
P2	1	54,1	1	2,03	0	0		0	0							
P3	1	75,6	1	3,97	1	1	32,7		0	1	1	78,7	2,5	1	1	11,9
P4	1	67,9	1	5,00	1	1	21,0		0	1	1	70,0	8,7	1	1	15,3
P6	1	62,2	1	5,30	0	1	60,2	1	0	1	1	67,7	2,8	0	0	
P7	1	82,3	1	0,70	2	1	1,0		1							
P8	1	50,0	1	4,00	2	1	1,1		1	1	0	50,4	1,0	0	1	10,8
P9	1	73,0	0	5,00	0	0		0	0							
P10	1	61,2	1	0,13	2	1	0,0		1							
P11	1	78,8	1	5,50	1	1	17,8		0	1	0	80,8	1,5	2	1	0,0
P13	1	49,9	1	8,73	0	0		0	0							
P14	1	77,0	1	3,20	0	0		0	0							
P15	1	77,6	0	1,00	2	1	5,0		1							
P16	1	64,7	1	3,83	0	1	37,9	1	0							
P17	1	60,1	1	5,97	0	0		0	0							
P18	1	76,8	1	0,60	0	1	42,4	1	0							
P19	1	49,4	1	6,33	0	0		0	0							
P21	1	45,8	0	0,73	2	1	0,0		1							
P22	1	42,3	1	11,00	1	1	42,4		0	1	1	46,9	4,5	2	1	0,8
P24	1	59,8	1	5,80	1	1	49,0		0	1	0	64,5	0,7	2	1	2,2
P25	1	56,7	1	5,50	1	1	8,6		0	1	1	58,1	4,2	1	1	20,0
P26	1	28,1	1	2,27	1	0			0							
P27	1	53,2	1	7,00	0	0		0	0							
P28	1	29,9	1	6,40	0	0		0	0							
P30	1	67,0	1	1,73	2	1	1,3		1	1	0	67,2	1,0	2	1	0,9
P31	1	62,1	1	7,47	0	0		0	0							
P32	1	66,3	1	2,20	2	1	0,4		1	1	0	66,5	1,2	1	0	
P36	1	41,4	1	6,90	0	0		0	0							
P37	1	66,1	0	2,37	1	0			0							
P40	0															
P41	1	26,3	1	6,87	0	0		0	0							
P42	1	73,7	1	0,47	1	0			0							
P43	1	69,2	0	1,07	2	1	0,0		1							
P44	0															
P51	1	56,7	1	3,27	2	1	3,4		1							

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(continuação)

	Informações sobre Terceira Linha de Tratamento							Informações sobre Quarta Linha de Tratamento						
pacientes	TTO 3 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO3 (anos)	duração TTO3 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo entre final TTO 3 e PD (meses)	TTO 4 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO4 (anos)	duração TTO4 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Apresentou PD? (a)	tempo final TTO 4 e PD (meses)
P1														
P2														
P3	1	1	79,9	6,2	1	1	6,9							
P4	1	1	72,0	6,0	1	1	13,0	1	1	73,1	9,0	0	1	6,8
P6														
P7														
P8	1	1	51,4	4,4	2	1	0,6	1	0	51,8	0,4	2	1	0,3
P9														
P10														
P11														
P13														
P14														
P15														
P16														
P17														
P18														
P19														
P21														
P22	1	1	47,3	1,4	2	1	0,3							
P24														
P25	1	0	60,3	8,1	2	1	0,2							
P26														
P27														
P28														
P30														
P31														
P32														
P36														
P37														
P40														
P41														
P42														
P43														
P44														
P51														

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

Características clínico-laboratoriais por paciente

(conclusão)

	Informações sobre Quarta Linha de Tratamento						
pacientes	TTO 5 Linha (a)	Recebeu HD-MTX? (a)	idade no TTO5 (anos)	duração TTO5 (meses)	melhor resposta clínica (h)	Recebeu algum tratamento radioterápico? (a)	TMO? (a)
P1						1	0
P2						0	0
P3						1	0
P4	1	1	74,4	5,0	0	1	0
P6						1	0
P7						0	0
P8						1	0
P9						0	0
P10						0	0
P11						1	0
P13						1	0
P14						0	0
P15						1	0
P16						0	0
P17						1	0
P18						0	0
P19						1	0
P21						0	0
P22						1	0
P24						0	0
P25						1	0
P26						1	0
P27						1	0
P28						1	0
P30						0	0
P31						1	0
P32						0	0
P36						1	0
P37						1	0
P40						0	0
P41						1	0
P42						0	0
P43						1	0
P44						0	0
P51						1	0

a) 0= não, 1= sim; b) risco IPI modificado- Ferreri et al, 2003; c) PS inicial- Oken et al, 1982; d) 0= 0%, 1= entre 1% e 25%, 2= entre 26% e 50%, 3= entre 51% e 75%, 4= entre 76% e 100%, 5= Não Avaliável; e) 0= negativo, 1= positivo, 2= Não Avaliável; f) conforme critério de Hans, 0= GCB, 1= Não-GCB, 2= Não Avaliável; g) média da expressão gênica normalizada para os genes de interesse; h) 0= Resposta Completa, 1= Resposta Parcial, 2= Progressão de Doença, 3= Não Disponível; i) valores em branco correspondem a amostras não amplificadas

ANEXO B - Informações sobre a primeira linha de tratamento oncológico

Número Total de Pacientes		
	% (n)	100% (35)
Recebeu 1 linha de tratamento?		
não	(n)	5,7% (2)
sim	(n)	94,3% (33)
total	(n)	100% (35)
IDADE (anos)		
	n	33
	média (dp)	59,2 (14,91)
	1ºq;mediana;3ºq	49,7 : 61,2 : 71,1
	mín ; máx	26,3 : 82,3
MTX Altas Doses		
não	(n)	15,2% (5)
sim	(n)	84,8% (28)
total	(n)	100% (33)
Duração TTO1 (meses)		
	n	33
	média (dp)	4,3 (2,83)
	1ºq;mediana;3ºq	1,9 : 4,0 : 6,4
	mín ; máx	0,1 : 11,0
Melhor Resposta Clínica Durante o Tratamento		
RC	(n)	45,5% (15)
RP	(n)	27,3% (9)
PD	(n)	27,3% (9)
total	(n)	100% (33)
Apresentou PD em algum momento?		
não	(n)	45,5% (15)
sim	(n)	54,5% (18)
total	(n)	100% (33)
Recaída Após RC		
não	(n)	80% (12)
sim	(n)	20% (3)
total	(n)	100% (15)
Refratariedade à Primeira Linha de Tratamento		
não	(n)	72,7% (24)
sim	(n)	27,3% (9)
total	(n)	100% (33)
Intervalo entre Final de Tratamento e PD (meses)		
	n	18
	média (dp)	18,0 (20,53)
	1ºq;mediana;3ºq	0,8 : 6,8 : 39,1
	mín ; máx	0,0 : 60,2

ANEXO C - Valores da expressão normalizada dos genes MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1 por paciente

(continua)

Amostra	MYC	PDCD1	01/out	MGMT	BCL2	BCL6	LMO2
P1	0,1103834	0	0	0	0,09072	1,20327293	0,68923207
P2†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P3†	0	0	4,385562	0	0,13021	4,92333543	2,57602771
P4†	0	0	1,567702	0,335666	0,64488	1,70344228	0,15703952
P6*	0	0	0	0	0,19728	3,29719402	7,14032912
P7#†	0,3405111	0	1,72209	0	1,84167	3,27660241	0,13764646
P8#†	0,2351414	0	0	0	2,2052	0,64762351	0
P9†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P10#†	0,2017973	1,0351888	1,033221	1,417807	0,7658	3,787009	4,07845604
P11†	0,2351788	9,2146338	0	0	0,3516	8,3368464	10,9727002
P13†	0	0	3122,622	0	0	0	0
P14†	0,3040957	0	6,14149	0	0,08092	2,715904	1,6358415
P15#†	0,412259	0	2,783416	0	0,52765	2,73477377	0,94713051
P16*†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P17	0,0301969	0	1,448191	0,010951	0,07898	0,63889135	1,99124978
P18*†	0,371486	0	0	0	1,47173	1,11302554	0,45144126
P19†	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
P21#†	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
P22†	0,4745787	1,729677	1,682568	0	5,56582	7,37556864	17,5060425
P24†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P25†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Valores da expressão normalizada dos genes MYC, BCL2, POU2F1, MGMT, LMO2 e PDCD1 por paciente

(conclusão)

Amostra	MYC	PDCD1	01/out	MGMT	BCL2	BCL6	LMO2
P26	0	6,4048083	6,30088	0	1,15876	9,09111926	1,05112574
P27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P30#†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P31†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P32#†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
P37†	0,0701626	0	4,481112	0,218243	0,32391	1,63956511	0,06489237
P40†	0,214366	0	0	0	0	0,2707965	0,43562553
P41	0,6413885	4,158813	0	0,070006	0,65164	5,446246	7,78468333
P42	0,1977622	2,6626342	2,827798	2,524375	1,18919	3,3456055	13,7798915
P43#†	0,2010405	2,0093818	2,134024	10,07229	0,56432	3,42655195	6,55950292
P44†	0,1775013	0,5917454	0,567903	1,31804	1,19433	1,70547543	3,4625705
P51#†	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Média	0,20085	1,3241373	137,3782	0,760352	0,90641	2,89908039	3,87721089
Mediana	0,2010405	0	1,448191	0	0,56432	2,715904	1,6358415

A numeração das amostras seguiu o número original atribuído para a realização desse trabalho, que partir de uma casuística de 51 pacientes.

Casos refratários primários. *Recaída tardia (>6 meses). † Óbitos durante o tratamento. NA: corresponde a amostras não amplificadas

ANEXO D - Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continua)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Número de pacientes			
n	100% (35)	60% (21)	
Idade ao diagnóstico (anos)			
			teste t- student**
media (dp)	60,1 (15,22)	63,2 (16,87)	0,493
≤ 60 anos (n)	45,7% (16)	33,3% (7)	0,412
> 60 anos (n)	54,3% (19)	66,7% (14)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Sexo			
			teste de independência *
frequência			0,785
masculino (n)	42,9% (15)	38,1% (8)	
feminino (n)	57,1% (20)	61,9% (13)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Anti-MYC			
			teste de independência *
frequência			
0%-50% (n)	36,4% (12)	45% (9)	0,573
51%-100% (n)	63,6% (21)	55% (11)	
total (n)	100% (33)	100% (20)	
Anti-MGMT			
frequência			
negativo (n)	88,6% (31)	100% (21)	
positivo (n)	0% (0)	0% (0)	
total (n)	88,6% (31)	100% (21)	
Anti-PDCD1			
			teste de independência *
frequência			0,823
negativo (n)	90,9% (30)	85,7% (18)	
positivo (n)	9,1% (3)	14,3% (3)	
total (n)	100% (33)	100% (21)	
Anti-BCL2			
			teste de independência *
frequência			
0%-50% (n)	15,2% (5)	14,3% (3)	1,000
51%-100% (n)	84,8% (28)	85,7% (18)	
total (n)	100% (33)	100% (21)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

\\(continuação

Variável		População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Anti-LMO2				teste de independência *
	frequência			
0%-25%	(n)	43,8% (14)	47,6% (10)	1,000
26%-100%	(n)	56,3% (18)	52,4% (11)	
total	(n)	100% (32)	100% (21)	
Anti-POU2F1				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo	(n)	0% (0)	0% (0)	
positivo	(n)	94,4% (33)	100% (21)	
Anti-CD20				
	frequência			
negativo (0)	(n)	0% (0)	0% (0)	
positivo (1)	(n)	100% (35)	100% (21)	
total	(n)	100% (35)	100% (21)	
Anti-CD3				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo (0)	(n)	87,5% (28)	89,5% (17)	
positivo (1)	(n)	12,5% (4)	10,5% (2)	
total	(n)	100% (32)	100% (19)	
Anti-CD56				
	frequência			
negativo (0)	(n)	100% (6)	100% (3)	
positivo (1)	(n)	0% (0)	0% (0)	
total	(n)	100% (6)	100% (3)	
Ki67				
	frequência			
negativo (0)	(n)	0% (0)	0% (0)	
positivo (1)	(n)	100% (29)	100% (19)	
total	(n)	100% (29)	100% (19)	
Anti-BCL6				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo (0)	(n)	57,1% (8)	66,7% (6)	
positivo (1)	(n)	42,9% (6)	33,3% (3)	
total	(n)	100% (14)	100% (9)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continuação)

Variável		População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Anti-CD10				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo (0)	(n)	73,3% (11)	70% (7)	
positivo (1)	(n)	26,7% (4)	30% (3)	
total	(n)	100% (15)	100% (10)	
Anti-MUM1				teste de independência *
	frequência			1,000
negativo (0)	(n)	25% (3)	25% (2)	
positivo (1)	(n)	75% (9)	75% (6)	
total	(n)	100% (12)	100% (8)	
COO Subtipo				teste de independência *
	frequência			1,000
GCB	(n)	26,7% (4)	30% (3)	
não-GCB	(n)	73,3% (11)	70% (7)	
total	(n)	100% (15)	100% (10)	
Acometimento de regiões profundas SNC				teste de independência *
	frequência			0,508
não	(n)	22,9% (8)	14,3% (3)	
sim	(n)	77,1% (27)	85,7% (18)	
total	(n)	100% (35)	100% (21)	
LCR				teste de independência *
	frequência			0,622
citologia negativa	(n)	94,1% (32)	90% (18)	
sim	(n)	5,9% (2)	10% (2)	
total	(n)	100% (34)	100% (20)	
HIC				teste de independência *
	frequência			0,558
não	(n)	71,4% (25)	61,9% (13)	
sim	(n)	28,6% (10)	38,1% (8)	
total	(n)	100% (35)	100% (21)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continuação)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Idade ao óbito (anos)			teste t- student**
media (dp)	67,5 (11,63)	71,0 (12,25)	0,356
frequência			teste de independência *
≤ 50 anos (n)	26,9% (7)	20% (3)	0,458
50 a 69 anos (n)	34,6% (9)	20% (3)	
≥ 70 anos (n)	38,5% (10)	60% (9)	
total (n)	100% (26)	100% (15)	
Tempo entre diagnóstico e óbito (meses)			teste t- student**
media (dp)	32,2 (27,10)	28,8 (28,20)	0,705
frequência			teste de independência *
≤ 12 meses (n)	34,6% (9)	40% (6)	0,916
12 a 36 meses (n)	19,2% (5)	20% (3)	
≥ 36 anos (n)	46,2% (12)	40% (6)	
total (n)	100% (26)	100% (15)	
Idade na última consulta (anos)			teste t- student**
media (dp)	53,2 (17,34)	55,1 (19,00)	0,844
Tempo entre diagnóstico e última consulta (meses)			teste t- student**
media (dp)	77,5 (50,11)	67,9 (44,21)	0,709
Tempo de seguimento (meses)			teste t- student**
media (dp)	43,8 (39,18)	39,9 (37,06)	0,715
P.S. inicial1			teste t- student**
frequência			teste de independência *
0+1+2 (n)	57,1% (20)	47,6% (10)	0,584
3+4 (n)	42,9% (15)	52,4% (11)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Risco IPI			teste de independência *
frequência			0,572
baixa (0+1) (n)	20% (7)	9,5% (2)	
intermediário (2+3) (n)	48,6% (17)	47,6% (10)	
alto (4+5) (n)	31,4% (11)	42,9% (9)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
frequência			teste de independência *
baixa (0+1) (n)	20% (7)	9,5% (2)	0,459
não baixa (2+3+4+5) (n)	80% (28)	90,5% (19)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(continuação)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Tratamento com RDT			teste de independência *
frequência			0,777
não (n)	40% (14)	33,4 (7)	
sim (n)	60% (21)	66,6% (14)	
total (n)	100% (35)	100% (9)	
Realização DE TMO			teste de independência *
frequência			
não (n)	100% (35)	100% (21)	
sim (n)	0% (0)	0% (0)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Neurotoxicidades?			teste de independência *
frequência			0,786
não (n)	57,1% (20)	52,4% (11)	
sim (n)	42,9% (15)	47,6% (10)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO			
RECEBEU 1ª LINHA?			teste de independência *
frequência			0,626
não (n)	5,7% (2)	9,5% (2)	
sim (n)	94,3% (33)	90,5% (19)	
total (n)	100% (35)	100% (21)	
Idade TTO1 (anos)			teste t- student**
n	33	19	
media (dp)	59,2 (14,91)	61,7 (16,88)	0,576
HD-MTX 1			teste de independência *
frequência			1,000
não (n)	15,2% (5)	15,8% (3)	
sim (n)	84,8% (28)	84,2% (16)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Duração TTO1 (meses)			teste t- student**
n	33	19	
media (dp)	4,3 (2,83)	4,1 (3,24)	0,799
frequência			teste de independência *
≤ 4 meses (n)	51,5% (17)	57,9% (11)	0,775
> 4 meses (n)	48,5% (16)	42,1% (8)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	

Comparação entre amostra total e a subamostra (incluídos apenas pacientes com amplificações gênicas avaliáveis)

(conclusão)

Variável	População Global (%/n)	Subamostra (%/n)	Comparação entre os Grupos valor - p
Resposta à primeira linha de tratamento			teste de independência *
frequência			0,715
RC (n)	45,5% (15)	36,8% (7)	
RP (n)	27,3% (9)	36,8% (7)	
PD (n)	27,3% (9)	26,3% (5)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Apresentou PD?			teste de independência *
frequência			1,000
não (n)	45,5% (15)	42,1% (8)	
sim (n)	54,5% (18)	57,9% (11)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Recaída?			teste de independência *
frequência			1,000
não (n)	80% (12)	71,4% (5)	
sim (n)	20% (3)	28,6% (2)	
total (n)	100% (15)	100% (7)	
Refratariedade?			teste de independência *
frequência	0% ()	0% ()	1,000
não (n)	72,7% (24)	73,7% (14)	
sim (n)	27,3% (9)	26,3% (5)	
total (n)	100% (33)	100% (19)	
Se teve pd depois tto1, tempo entre final tratamento e pd 1 (meses)			teste t- student**
n	18	11	
media (dp)	18,0 (20,53)	20,3 (21,29)	0,774

1ºq med 3ºq - 1ºquartil mediana 3ºquartil ; dp - desvio padrão

* **Teste de independência (teste exato de Fisher)**

HIPÓTESES DO TESTE

Ho: há independência entre grupo e variável

HA: há associação entre grupo e variável

** **Teste T-student**

HIPÓTESES DO TESTE

Ho: as médias dos grupos são iguais

HA: as médias dos grupos são diferentes

ANEXO E - Curvas de ROC para expressão da proteína MYC

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 1)	0.00%	100.00%	78.57%		10
(≥ 2)	33.33%	63.64%	57.14%	0.9167	10,476
(≥ 3)	66.67%	27.27%	35.71%	0.9167	12,222
(≥ 4)	66.67%	9.09%	21.43%	0.7333	36,667

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	29.03%	1.0000	
(≥ 1)	88.89%	4.55%	29.03%	0.9312	24,444
(≥ 2)	77.78%	18.18%	35.48%	0.9506	12,222
(≥ 3)	77.78%	36.36%	48.39%	1.2222	0.6111
(≥ 4)	55.56%	63.64%	61.29%	1.5278	0.6984
(> 4)	0.00%	100.00%	70.97%		10

Considerando óbito

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	75.76%	1.0000	
(≥ 1)	92.00%	12.50%	72.73%	1.0514	0.6400
(≥ 2)	76.00%	25.00%	63.64%	1.0133	0.9600
(≥ 3)	68.00%	50.00%	63.64%	1.3600	0.6400
(≥ 4)	48.00%	87.50%	57.58%	3.8400	0.5943
(> 4)	0.00%	100.00%	24.24%		1.0000

Considerando progressão da doença

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	54.84%	1.0000	
(≥ 1)	94.12%	7.14%	54.84%	1.0136	0.8235
(≥ 2)	82.35%	21.43%	54.84%	1.0481	0.8235
(≥ 3)	76.47%	42.86%	61.29%	1.3382	0.5490
(≥ 4)	52.94%	71.43%	61.29%	1.8529	0.6588
(> 4)	0.00%	100.00%	45.16%		10

ANEXO F - Curva de ROC para expressão da proteína BCL2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 1)	0.00%	100.00%	76.92%		10
(≥ 2)	33.33%	30.00%	30.77%	0.4762	22,222
(≥ 3)	66.67%	20.00%	30.77%	0.8333	16,667
(≥ 4)	66.67%	0.00%	15.38%	0.6667	
(> 4)	100.00%	0.00%	23.08%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 1)	100.00%	0.00%	29.03%	1.0000	
(≥ 2)	100.00%	9.09%	35.48%	1.1000	0.0000
(≥ 3)	100.00%	18.18%	41.94%	1.2222	0.0000
(≥ 4)	88.89%	40.91%	54.84%	1.5043	0.2716
(> 4)	0.00%	100.00%	70.97%	1.0000	

Considerando óbito

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	78.79%	1.0000	
(≥ 1)	96.15%	0.00%	75.76%	0.9615	
(≥ 2)	92.31%	14.29%	75.76%	1.0769	0.5385
(≥ 3)	92.31%	42.86%	81.82%	1.6154	0.1795
(≥ 4)	69.23%	57.14%	66.67%	1.6154	0.5385
(> 4)	0.00%	100.00%	21.21%		10

Considerando progressão de doença

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-

(≥ 1)	0.00%	100.00%	41.94%		10
(≥ 2)	66.67%	30.77%	51.61%	0.9630	10.833
(≥ 3)	88.89%	15.38%	58.06%	1.0505	0.7222
(≥ 4)	88.89%	0.00%	51.61%	0.8889	
(> 4)	100.00%	0.00%	58.06%	1.0000	

ANEXO G - Curva de ROC para expressão da proteína LMO2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	23.08%	10.000	
(≥ 2)	100.00%	10.00%	30.77%	11.111	0.0000
(≥ 3)	66.67%	50.00%	53.85%	13.333	0.6667
(≥ 4)	66.67%	80.00%	76.92%	33.333	0.4167
(≥ 4)	0.00%	100.00%	76.92%		10

ANEXO H - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MYC

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
($\geq .030197$)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
($\geq .110383$)	50.00%	80.00%	71.43%	2.5000	0.6250
($\geq .304096$)	50.00%	60.00%	57.14%	1.2500	0.8333
($\geq .371486$)	50.00%	40.00%	42.86%	0.8333	12.500
($\geq .641388$)	50.00%	20.00%	28.57%	0.6250	25.000
($> .641388$)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	
($\geq .030197$)	100.00%	35.71%	52.63%	1.5556	0.0000
($\geq .070163$)	100.00%	42.86%	57.89%	1.7500	0.0000
($\geq .110383$)	100.00%	50.00%	63.16%	2.0000	0.0000
($\geq .197762$)	100.00%	57.14%	68.42%	2.3333	0.0000
($\geq .201041$)	100.00%	64.29%	73.68%	2.8000	0.0000
($\geq .201797$)	80.00%	64.29%	68.42%	2.2400	0.3111
($\geq .235141$)	60.00%	64.29%	63.16%	1.6800	0.6222
($\geq .235179$)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
($\geq .304096$)	40.00%	71.43%	63.16%	1.4000	0.8400
($\geq .340511$)	40.00%	78.57%	68.42%	1.8667	0.7636
($\geq .371486$)	20.00%	78.57%	63.16%	0.9333	10.182
($\geq .412259$)	20.00%	85.71%	68.42%	1.4000	0.9333
($\geq .474579$)	0.00%	85.71%	63.16%	0.0000	11.667
($\geq .641388$)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
($> .641388$)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000

ANEXO I - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene MGMT

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
($\geq .010951$)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
($\geq .070006$)	0.00%	60.00%	42.86%	0.0000	16.667
($> .070006$)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	
($\geq .010951$)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
($\geq .070006$)	40.00%	71.43%	63.16%	1.4000	0.8400
($\geq .218243$)	40.00%	78.57%	68.42%	1.8667	0.7636
($\geq .335666$)	40.00%	85.71%	73.68%	2.8000	0.7000
(≥ 1.41781)	40.00%	92.86%	78.95%	5.6000	0.6462
(≥ 2.52437)	20.00%	92.86%	73.68%	2.8000	0.8615
(≥ 10.0723)	20.00%	100.00%	78.95%		0.8000
(> 10.0723)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000

ANEXO J - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene PDCD1

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
(≥ 4.15881)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(> 4.15881)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000
(≥ 1.03519)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
(≥ 1.72968)	0.00%	85.71%	63.16%	0.0000	11.667
(≥ 2.00938)	0.00%	78.57%	57.89%	0.0000	12.727
(≥ 2.66263)	0.00%	71.43%	52.63%	0.0000	14.000
(≥ 4.15881)	20.00%	71.43%	57.89%	0.7000	11.200
(≥ 6.40481)	20.00%	64.29%	52.63%	0.5600	12.444
(≥ 9.21463)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
(> 9.21463)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	

ANEXO K - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	
($\geq .078983$)	100.00%	20.00%	42.86%	1.2500	0.0000
($\geq .080915$)	100.00%	40.00%	57.14%	1.6667	0.0000
($\geq .090718$)	100.00%	60.00%	71.43%	2.5000	0.0000
($\geq .197275$)	100.00%	80.00%	85.71%	5.0000	0.0000
($\geq .651635$)	50.00%	80.00%	71.43%	2.5000	0.6250
(≥ 1.47173)	50.00%	100.00%	85.71%		0.5000
(> 1.47173)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	
($\geq .078983$)	100.00%	7.14%	31.58%	1.0769	0.0000

(>= .080915)	100.00%	14.29%	36.84%	1.1667	0.0000
(>= .090718)	100.00%	21.43%	42.11%	1.2727	0.0000
(>= .130212)	100.00%	28.57%	47.37%	1.4000	0.0000
(>= .197275)	100.00%	35.71%	52.63%	1.5556	0.0000
(>= .32391)	100.00%	42.86%	57.89%	1.7500	0.0000
(>= .3516)	100.00%	50.00%	63.16%	2.0000	0.0000
(>= .527652)	100.00%	57.14%	68.42%	2.3333	0.0000
(>= .564317)	80.00%	57.14%	63.16%	1.8667	0.3500
(>= .64488)	60.00%	57.14%	57.89%	1.4000	0.7000
(>= .651635)	60.00%	64.29%	63.16%	1.6800	0.6222
(>= .7658)	60.00%	71.43%	68.42%	2.1000	0.5600
(>= 1.15876)	40.00%	71.43%	63.16%	1.4000	0.8400
(>= 1.18919)	40.00%	78.57%	68.42%	1.8667	0.7636
(>= 1.47173)	40.00%	85.71%	73.68%	2.8000	0.7000
(>= 1.84167)	40.00%	92.86%	78.95%	5.6000	0.6462
(>= 2.2052)	20.00%	92.86%	73.68%	2.8000	0.8615
(>= 5.56582)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
(> 5.56582)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000

ANEXO L - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene LMO2

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	
($\geq .451441$)	100.00%	20.00%	42.86%	1.2500	0.0000
($\geq .689232$)	50.00%	20.00%	28.57%	0.6250	25.000
(≥ 1.63584)	50.00%	40.00%	42.86%	0.8333	12.500
(≥ 1.99125)	50.00%	60.00%	57.14%	1.2500	0.8333
(≥ 7.14033)	50.00%	80.00%	71.43%	2.5000	0.6250
(≥ 7.78468)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(> 7.78468)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	73.68%		10.000
($\geq .064892$)	0.00%	92.86%	68.42%	0.0000	10.769
($\geq .137646$)	0.00%	85.71%	63.16%	0.0000	11.667
($\geq .15704$)	0.00%	78.57%	57.89%	0.0000	12.727
($\geq .451441$)	0.00%	71.43%	52.63%	0.0000	14.000
($\geq .689232$)	0.00%	64.29%	47.37%	0.0000	15.556
($\geq .947131$)	20.00%	64.29%	52.63%	0.5600	12.444
(≥ 1.05113)	40.00%	64.29%	57.89%	1.1200	0.9333
(≥ 1.63584)	40.00%	57.14%	52.63%	0.9333	10.500
(≥ 1.99125)	40.00%	50.00%	47.37%	0.8000	12.000
(≥ 2.57603)	40.00%	42.86%	42.11%	0.7000	14.000
(≥ 4.07846)	40.00%	35.71%	36.84%	0.6222	16.800
(≥ 6.5595)	60.00%	35.71%	42.11%	0.9333	11.200
(≥ 7.14033)	60.00%	28.57%	36.84%	0.8400	14.000
(≥ 7.78468)	60.00%	21.43%	31.58%	0.7636	18.667
(≥ 10.9727)	60.00%	14.29%	26.32%	0.7000	28.000
(≥ 13.7799)	80.00%	14.29%	31.58%	0.9333	14.000
(≥ 17.506)	80.00%	7.14%	26.32%	0.8615	28.000
(> 17.506)	100.00%	0.00%	26.32%	1.0000	

ANEXO M - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene POU2F1

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	75.00%		10.000
(≥ 1.44819)	0.00%	83.33%	62.50%	0.0000	12.000
(≥ 3.122)	0.00%	66.67%	50.00%	0.0000	15.000
(≥ 6.14149)	0.00%	50.00%	37.50%	0.0000	20.000
(> 6.14149)	100.00%	0.00%	25.00%	1.0000	

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
(≥ 1.03322)	0.00%	93.33%	66.67%	0.0000	10.714
(≥ 1.44819)	0.00%	86.67%	61.90%	0.0000	11.538
(≥ 1.5677)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(≥ 1.68257)	0.00%	73.33%	52.38%	0.0000	13.636
(≥ 1.72209)	0.00%	66.67%	47.62%	0.0000	15.000
(≥ 2.13402)	0.00%	60.00%	42.86%	0.0000	16.667
(≥ 2.78342)	16.67%	60.00%	47.62%	0.4167	13.889
(≥ 2.8278)	33.33%	60.00%	52.38%	0.8333	11.111
(≥ 3.122)	50.00%	60.00%	57.14%	1.2500	0.8333
(≥ 4.38556)	50.00%	53.33%	52.38%	1.0714	0.9375
(≥ 4.48111)	50.00%	46.67%	47.62%	0.9375	10.714
(≥ 6.14149)	50.00%	40.00%	42.86%	0.8333	12.500
(≥ 6.30088)	66.67%	40.00%	47.62%	1.1111	0.8333
(> 6.30088)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

ANEXO N - Curvas de ROC para a expressão normalizada do gene BCL6

Considerando recaída

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	100.00%	0.00%	25.00%	1.0000	
($\geq .638891$)	100.00%	33.33%	50.00%	1.5000	0.0000
(≥ 1.11303)	100.00%	50.00%	62.50%	2.0000	0.0000
(≥ 1.20327)	50.00%	50.00%	50.00%	1.0000	10.000
(≥ 2.7159)	50.00%	66.67%	62.50%	1.5000	0.7500
(≥ 3.29719)	50.00%	83.33%	75.00%	3.0000	0.6000
(≥ 5.44625)	0.00%	83.33%	62.50%	0.0000	12.000
(> 5.44625)	0.00%	100.00%	75.00%		10.000

Considerando refratariedade

Cut point	Sensitivity	Specificity	Classified	RV+	RV-
(≥ 0)	0.00%	100.00%	71.43%		10.000
($\geq .638891$)	0.00%	93.33%	66.67%	0.0000	10.714
($\geq .647623$)	0.00%	86.67%	61.90%	0.0000	11.538
(≥ 1.11303)	0.00%	80.00%	57.14%	0.0000	12.500
(≥ 1.20327)	0.00%	73.33%	52.38%	0.0000	13.636
(≥ 1.63957)	0.00%	66.67%	47.62%	0.0000	15.000
(≥ 1.70344)	16.67%	66.67%	52.38%	0.5000	12.500
(≥ 2.7159)	33.33%	66.67%	57.14%	1.0000	10.000
(≥ 2.73477)	33.33%	60.00%	52.38%	0.8333	11.111
(≥ 3.2766)	33.33%	53.33%	47.62%	0.7143	12.500
(≥ 3.29719)	50.00%	53.33%	52.38%	1.0714	0.9375
(≥ 3.34561)	66.67%	53.33%	57.14%	1.4286	0.6250
(≥ 3.42655)	66.67%	46.67%	52.38%	1.2500	0.7143
(≥ 3.78701)	66.67%	40.00%	47.62%	1.1111	0.8333
(≥ 4.92334)	66.67%	33.33%	42.86%	1.0000	10.000
(≥ 5.44625)	66.67%	26.67%	38.10%	0.9091	12.500
(≥ 7.37557)	66.67%	20.00%	33.33%	0.8333	16.667
(≥ 8.33685)	83.33%	20.00%	38.10%	1.0417	0.8333
(≥ 9.09112)	83.33%	13.33%	33.33%	0.9615	12.500
(> 9.09112)	100.00%	0.00%	28.57%	1.0000	

ANEXO O - Construção das curvas de SG, SLP e SLD (método de Kaplan-Meier)

Variável	SG (meses)	SLP (meses)	SLD (meses)
Número de pacientes			
n	100% (35)	100% (33)	100% (15)
Tempo de sobrevida depois diagnóstico *			
média (ep)	56,8 (10,34)	53,8 (10,71)	76,86 (16,58)
IC95% média	36,5 ; 77,0	32,8 ; 74,8	44,36 ; 109,36
mediana (ep)	42,6 (8,18)	41,0 (10,90)	59,2 (13,93)
IC95% mediana	26,6 ; 58,6	19,7 ; 62,4	31,94 ; 86,58
limitado por frequência	171,8	171,8	163,4
óbito (n)	74,3% (26)	75,8% (25)	53,3% (8)
vivos (n)	25,7% (9)	24,2% (8)	46,6% (7)
total	100,0% (35)	100,0% (33)	100,0% (15)
Probabilidade de sobrevida			
em 1 meses	1,000	1,000	1,000
em 2 meses	0,971	0,970	1,000
em 4 meses	0,857	0,848	0,933
em 6 meses	0,829	0,818	0,933
em 8 meses	0,743	0,697	0,933
em 12 meses	0,734	0,697	0,933
em 18 meses	0,685	0,636	0,933
em 24 meses	0,655	0,636	0,933
em 36 meses	0,579	0,573	0,790
em 48 meses	0,438	0,371	0,565
em 60 meses	0,404	0,259	0,485
em 90 meses	0,215	0,162	0,258
em 150 meses	0,144	0,162	0,258
em 170 meses	0,144	0,162	

ANEXO P - Expressão dos genes de interesse em relação à sua respectiva expressão proteica

(continua)

Gene/Proteína de Interesse	IHQ 0%	IHQ 1%-25%	IHQ 26%-50%	IHQ 51%-75%	IHQ 76%-100%
MYC					
n	3	2	4	5	6
média (dp)	0,205 (0,0087)	0,089 (0,1255)	0,053 (0,0480)	0,291 (0,2865)	0,293 (0,0844)
mediana	0,202	0,089	0,050	0,341	0,270
min ; max	0,198 : 0,214	0,000 : 0,178	0,000 : 0,110	0,000 : 0,641	0,201 : 0,412
MGMT					
n	21	0	0	0	0
média (dp)	0,760 (2,2315)				
mediana	0,000				
min ; max	0,000 : 10,072				
PDCD1					
n	18	2	0	0	1
média (dp)	1,545 (2,6101)	0,000 (0,0000)			0,000 (.)
mediana	0,000	0,000			
min ; max	0,000 : 9,215	0,000 : 0,000			
BCL2					
n	1	1	1	4	14
média (dp)	0,000 (.)	0,197 (.)	0,079 (.)	0,716 (0,5564)	1,135 (1,4370)
mediana				0,770	0,648
min ; max				0,130 : 1,194	0,000 : 5,566

ANEXO P - Expressão dos genes de interesse em relação à sua respectiva expressão proteica

(conclusão)

Gene/Proteína de Interesse	IHQ 0%	IHQ 1%-25%	IHQ 26%-50%	IHQ 51%-75%	IHQ 76%-100%
LMO2					
n	9	1	4	3	4
média (dp)	2,940 (4,6009)	0,138 (.)	0,783 (0,8547)	5,062 (5,1408)	9,127 (5,8151)
mediana	0,947		0,570	2,576	7,463
min ; max	0,000 : 13,780		0,000 : 1,991	1,636 : 10,973	4,078 : 17,506
POU2F1					
n	0	1	0	0	22
média (dp)		1,568 (.)			1,756 (2,0497)
mediana					1,241
min ; max					0,000 : 6,301

dp - desvio padrão

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Foon KA, Litchman MA. General considerations of lymphoma: epidemiology, etiology, heterogeneity and primary extranodal disease. Williams Hematology. 8th ed: McGraw Hill Medical; 2010. p. 1497-507.
2. Surveillance EaERP. Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) program. <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/nhl/html2015> [cited 2015 06/16].
3. Noone AM HN, Krapcho M, Miller D, Brest A, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2015,. https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/: National Cancer Institute; 2018 [cited November 2017 10/27/2018]; Available from: https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/.
4. Rizvi MA, Evens AM, Nelson BP. T-cell lymphoma. In: Marcus R, editor. Lymphoma: Pathology, Diagnosis and Treatment. 1st ed: Cambridge; 2007. p. 215-32.
5. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. WHO Classification of Tumours of the Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2008.
6. Swerdlow SH CE, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Revised Fourth Edition. WHO Classification of Tumours V, editor: IARC/WHO; 2017. 586 p.
7. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil Rio de Janeiro: Fox Print; 2018. 130 p.
8. Quintanilla-Martinez L. The 2016 updated WHO classification of lymphoid neoplasias. Hematol Oncol. 2017;35 Suppl 1:37-45.
9. Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE, Ma C, Lossos IS, Rosenwald A, et al. Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling. Nature. 2000;403(6769):503-11.
10. Hans CP, Weisenburger DD, Greiner TC, Gascoyne RD, Delabie J, Ott G, et al. Confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue microarray. Blood. 2004;103(1):275-82.
11. Rosenwald A, Wright G, Chan WC, Connors JM, Campo E, Fisher RI, et al. The use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002;346(25):1937-47.
12. Hattab EM, Martin SE, Al-Khatib SM, Kupsky WJ, Vance GH, Stohler RA, et al. Most primary central nervous system diffuse large B-cell lymphomas occurring in immunocompetent individuals belong to the nongerminal center subtype: a retrospective analysis of 31 cases. Mod Pathol. 2010;23(2):235-43.

13. Deckert M, Brunn A, Montesinos-Rongen M, Terreni MR, Ponzoni M. Primary lymphoma of the central nervous system--a diagnostic challenge. *Hematol Oncol*. 2014;32(2):57-67.
14. Mahadevan A, Rao CR, Shanmugham M, Shankar SK. Primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma in the immunocompetent: Immunophenotypic subtypes and Epstein-Barr virus association. *J Neurosci Rural Pract*. 2015;6(1):8-14.
15. Shan Y, Hu Y. Prognostic Factors and Survival in Primary Central Nervous System Lymphoma: A Population-Based Study. *Dis Markers*. 2018;2018:7860494.
16. Korfel A, Schlegel U. Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma. *Nat Rev Neurol*. 2013;9(6):317-27.
17. Dolecek TA, Propp JM, Stroup NE, Kruchko C. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2005-2009. *Neuro Oncol*. 2012;14 Suppl 5:v1-49.
18. O'Neill BP, Decker PA, Tieu C, Cerhan JR. The changing incidence of primary central nervous system lymphoma is driven primarily by the changing incidence in young and middle-aged men and differs from time trends in systemic diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma. *Am J Hematol*. 2013;88(12):997-1000.
19. Shiels MS, Pfeiffer RM, Besson C, Clarke CA, Morton LM, Nogueira L, et al. Trends in primary central nervous system lymphoma incidence and survival in the U.S. *Br J Haematol*. 2016;174(3):417-24.
20. Citterio G, Reni M, Gatta G, Ferreri AJM. Primary central nervous system lymphoma. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2017;113:97-110.
21. Hoang-Xuan K, Bessell E, Bromberg J, Hottinger AF, Preusser M, Ruda R, et al. Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma in immunocompetent patients: guidelines from the European Association for Neuro-Oncology. *Lancet Oncol*. 2015;16(7):e322-32.
22. Thiel E, Korfel A, Martus P, Kanz L, Griesinger F, Rauch M, et al. High-dose methotrexate with or without whole brain radiotherapy for primary CNS lymphoma (G-PCNSL-SG-1): a phase 3, randomised, non-inferiority trial. *Lancet Oncol*. 2010;11(11):1036-47.
23. Rubenstein JL, Hsi ED, Johnson JL, Jung SH, Nakashima MO, Grant B, et al. Intensive chemotherapy and immunotherapy in patients with newly diagnosed primary CNS lymphoma: CALGB 50202 (Alliance 50202). *J Clin Oncol*. 2013;31(25):3061-8.
24. Rubenstein JL. Biology of CNS lymphoma and the potential of novel agents. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017;2017(1):556-64.
25. Vaux DL. Immunology. Ways around rejection. *Nature*. 1998;394(6689):133.
26. Otake Y, Soundararajan S, Sengupta TK, Kio EA, Smith JC, Pineda-Roman M, et al. Overexpression of nucleolin in chronic lymphocytic leukemia cells induces stabilization of bcl2 mRNA. *Blood*. 2007;109(7):3069-75.

27. Stine ZE, Walton ZE, Altman BJ, Hsieh AL, Dang CV. MYC, Metabolism, and Cancer. *Cancer Discov.* 2015;5(10):1024-39.
28. Cubedo E, Gentles AJ, Huang C, Natkunam Y, Bhatt S, Lu X, et al. Identification of LMO2 transcriptome and interactome in diffuse large B-cell lymphoma. *Blood.* 2012;119(23):5478-91.
29. Toffolatti L, Scquizzato E, Cavallin S, Canal F, Scarpa M, Stefani PM, et al. MGMT promoter methylation and correlation with protein expression in primary central nervous system lymphoma. *Virchows Arch.* 2014;465(5):579-86.
30. Gupta S, Wulf G, Henjakovic M, Koepsell H, Burckhardt G, Hagos Y. Human organic cation transporter 1 is expressed in lymphoma cells and increases susceptibility to irinotecan and paclitaxel. *J Pharmacol Exp Ther.* 2012;341(1):16-23.
31. Andreev E, Brosseau N, Carmona E, Mes-Masson AM, Ramotar D. The human organic cation transporter OCT1 mediates high affinity uptake of the anticancer drug daunorubicin. *Sci Rep.* 2016;6:20508.
32. Vazquez-Arreguin K, Tantin D. The Oct1 transcription factor and epithelial malignancies: Old protein learns new tricks. *Biochim Biophys Acta.* 2016;1859(6):792-804.
33. Nayak L, Iwamoto FM, LaCasce A, Mukundan S, Roemer MGM, Chapuy B, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed/refractory primary central nervous system and testicular lymphoma. *Blood.* 2017;129(23):3071-3.
34. Chapuy B, Roemer MG, Stewart C, Tan Y, Abo RP, Zhang L, et al. Targetable genetic features of primary testicular and primary central nervous system lymphomas. *Blood.* 2016;127(7):869-81.
35. Pasqualucci L, Dalla-Favera R. Genetics of diffuse large B-cell lymphoma. *Blood.* 2018;131(21):2307-19.
36. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. *Blood.* 2016;127(20):2375-90.
37. Deckert M, Montesinos-Rongen M, Brunn A, Siebert R. Systems biology of primary CNS lymphoma: from genetic aberrations to modeling in mice. *Acta Neuropathol.* 2014;127(2):175-88.
38. Chan CC, Rubenstein JL, Coupland SE, Davis JL, Harbour JW, Johnston PB, et al. Primary vitreoretinal lymphoma: a report from an International Primary Central Nervous System Lymphoma Collaborative Group symposium. *Oncologist.* 2011;16(11):1589-99.
39. Phillips EH, Fox CP, Cwynarski K. Primary CNS lymphoma. *Curr Hematol Malig Rep.* 2014;9(3):243-53.
40. Grimm SA, Pulido JS, Jahnke K, Schiff D, Hall AJ, Shenkier TN, et al. Primary intraocular lymphoma: an International Primary Central Nervous System Lymphoma Collaborative Group Report. *Ann Oncol.* 2007;18(11):1851-5.

41. Braaten KM, Betensky RA, de Leval L, Okada Y, Hochberg FH, Louis DN, et al. BCL-6 expression predicts improved survival in patients with primary central nervous system lymphoma. *Clin Cancer Res.* 2003;9(3):1063-9.
42. Riemersma SA, Jordanova ES, Schop RF, Philippon K, Looijenga LH, Schuurin E, et al. Extensive genetic alterations of the HLA region, including homozygous deletions of HLA class II genes in B-cell lymphomas arising in immune-privileged sites. *Blood.* 2000;96(10):3569-77.
43. Wong SF, Gan HK, Cher L. A single centre study of the treatment of relapsed primary central nervous system lymphoma (PCNSL) with single agent temozolomide. *J Clin Neurosci.* 2012;19(11):1501-5.
44. Bromberg JE, Doorduijn JK, Illerhaus G, Jahnke K, Korfel A, Fischer L, et al. Central nervous system recurrence of systemic lymphoma in the era of stem cell transplantation--an International Primary Central Nervous System Lymphoma Study Group project. *Haematologica.* 2013;98(5):808-13.
45. Mappa S, Marturano E, Licata G, Frezzato M, Frungillo N, Ilariucci F, et al. Salvage chemoimmunotherapy with rituximab, ifosfamide and etoposide (R-IE regimen) in patients with primary CNS lymphoma relapsed or refractory to high-dose methotrexate-based chemotherapy. *Hematol Oncol.* 2013;31(3):143-50.
46. Mendez JS, Ostrom QT, Gittleman H, Kruchko C, DeAngelis LM, Barnholtz-Sloan JS, et al. The elderly left behind--changes in survival trends of primary central nervous system lymphoma over the past 4 decades. *Neuro Oncol.* 2018;20(5):687-94.
47. Batchelor T, Loeffler JS. Primary CNS lymphoma. *J Clin Oncol.* 2006;24(8):1281-8.
48. Villano JL, Koshy M, Shaikh H, Dolecek TA, McCarthy BJ. Age, gender, and racial differences in incidence and survival in primary CNS lymphoma. *Br J Cancer.* 2011;105(9):1414-8.
49. Abrey LE. Primary central nervous system lymphoma. *Curr Opin Neurol.* 2009;22(6):675-80.
50. Pitelle JEH. Stereotactic biopsy in the diagnosis of brain tumors and non-neoplastic lesions: prescription, accuracy and diagnostic difficulties. *J Bras Patol Med Lab.* 2008;44(5):11.
51. Abrey LE, Batchelor TT, Ferreri AJ, Gospodarowicz M, Pulczynski EJ, Zucca E, et al. Report of an international workshop to standardize baseline evaluation and response criteria for primary CNS lymphoma. *J Clin Oncol.* 2005;23(22):5034-43.
52. Sabattini E, Bacci F, Sagranso C, Pileri SA. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues in 2008: an overview. *Pathologica.* 2010;102(3):83-7.
53. Camilleri-Broet S, Criniere E, Broet P, Delwail V, Mokhtari K, Moreau A, et al. A uniform activated B-cell-like immunophenotype might explain the poor prognosis of primary central nervous system lymphomas: analysis of 83 cases. *Blood.* 2006;107(1):190-6.

54. Ponzoni M, Issa S, Batchelor TT, Rubenstein JL. Beyond high-dose methotrexate and brain radiotherapy: novel targets and agents for primary CNS lymphoma. *Ann Oncol*. 2014;25(2):316-22.
55. Rubenstein JL, Wong VS, Kadoch C, Gao HX, Barajas R, Chen L, et al. CXCL13 plus interleukin 10 is highly specific for the diagnosis of CNS lymphoma. *Blood*. 2013;121(23):4740-8.
56. Ponzoni M, Berger F, Chassagne-Clement C, Tinguely M, Jouvet A, Ferreri AJ, et al. Reactive perivascular T-cell infiltrate predicts survival in primary central nervous system B-cell lymphomas. *Br J Haematol*. 2007;138(3):316-23.
57. Batchelor TT. Primary central nervous system lymphoma. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2016;2016(1):379-85.
58. Maza S, Buchert R, Brenner W, Munz DL, Thiel E, Korfel A, et al. Brain and whole-body FDG-PET in diagnosis, treatment monitoring and long-term follow-up of primary CNS lymphoma. *Radiol Oncol*. 2013;47(2):103-10.
59. Kuker W, Nagele T, Korfel A, Heckl S, Thiel E, Bamberg M, et al. Primary central nervous system lymphomas (PCNSL): MRI features at presentation in 100 patients. *J Neurooncol*. 2005;72(2):169-77.
60. Zou Y, Tong J, Leng H, Jiang J, Pan M, Chen Z. Diagnostic value of using 18F-FDG PET and PET/CT in immunocompetent patients with primary central nervous system lymphoma: A systematic review and meta-analysis. *Oncotarget*. 2017;8(25):41518-28.
61. Tabouret E, Houillier C, Martin-Duverneuil N, Blonski M, Soussain C, Ghesquieres H, et al. Patterns of response and relapse in primary CNS lymphomas after first-line chemotherapy: imaging analysis of the ANOCEF-GOELAMS prospective randomized trial. *Neuro Oncol*. 2017;19(3):422-9.
62. Wieduwilt MJ, Valles F, Issa S, Behler CM, Hwang J, McDermott M, et al. Immunochemotherapy with intensive consolidation for primary CNS lymphoma: a pilot study and prognostic assessment by diffusion-weighted MRI. *Clin Cancer Res*. 2012;18(4):1146-55.
63. Zhang Y, Zhang Q, Wang XX, Deng XF, Zhu YZ. Value of pretherapeutic DWI in evaluating prognosis and therapeutic effect in immunocompetent patients with primary central nervous system lymphoma given high-dose methotrexate-based chemotherapy: ADC-based assessment. *Clin Radiol*. 2016.
64. Isasi CR, Lu P, Blafox MD. A metaanalysis of 18F-2-deoxy-2-fluoro-D-glucose positron emission tomography in the staging and restaging of patients with lymphoma. *Cancer*. 2005;104(5):1066-74.
65. Soares Jr J, Fonseca RP, Cerci JJ, Buchpiguet CA, Cunha MLd, Mamed M, et al. Recommendations on the use of 18F-FDG PET/CT in Oncology. Consensus between the Brazilian Society of Cancerology and the Brazilian Society of Biology, Nuclear Medicine and Molecular Imaging. *Radiol Bras*. 2010;43(4):255-9.
66. Kosaka N, Tsuchida T, Uematsu H, Kimura H, Okazawa H, Itoh H. 18F-FDG PET of common enhancing malignant brain tumors. *AJR Am J Roentgenol*. 2008;190(6):W365-9.

67. Fallah J, Qunaj L, Olszewski AJ. Therapy and outcomes of primary central nervous system lymphoma in the United States: analysis of the National Cancer Database. *Blood Adv*. 2016;1(2):112-21.
68. Ferreri AJ, Abrey LE, Blay JY, Borisch B, Hochman J, Neuwelt EA, et al. Summary statement on primary central nervous system lymphomas from the Eighth International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano, Switzerland, June 12 to 15, 2002. *J Clin Oncol*. 2003;21(12):2407-14.
69. Cady FM, O'Neill BP, Law ME, Decker PA, Kurtz DM, Giannini C, et al. Del(6)(q22) and BCL6 rearrangements in primary CNS lymphoma are indicators of an aggressive clinical course. *J Clin Oncol*. 2008;26(29):4814-9.
70. Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol*. 1982;5(6):649-55.
71. Kasenda B, Ferreri AJ, Marturano E, Forst D, Bromberg J, Ghesquieres H, et al. First-line treatment and outcome of elderly patients with primary central nervous system lymphoma (PCNSL)--a systematic review and individual patient data meta-analysis. *Ann Oncol*. 2015;26(7):1305-13.
72. Nayak L, Batchelor TT. Recent advances in treatment of primary central nervous system lymphoma. *Curr Treat Options Oncol*. 2013;14(4):539-52.
73. Ferreri AJ, Cwynarski K, Pulczynski E, Ponzoni M, Deckert M, Politi LS, et al. Chemoimmunotherapy with methotrexate, cytarabine, thiotepe, and rituximab (MATRix regimen) in patients with primary CNS lymphoma: results of the first randomisation of the International Extranodal Lymphoma Study Group-32 (IELSG32) phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2016;3(5):e217-27.
74. Johnson NA, Slack GW, Savage KJ, Connors JM, Ben-Neriah S, Rogic S, et al. Concurrent expression of MYC and BCL2 in diffuse large B-cell lymphoma treated with rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone. *J Clin Oncol*. 2012;30(28):3452-9.
75. Four M, Cacheux V, Tempier A, Platero D, Fabbro M, Marin G, et al. PD1 and PDL1 expression in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma are frequent and expression of PD1 predicts poor survival. *Hematol Oncol*. 2017;35(4):487-96.
76. Scott DW, Wright GW, Williams PM, Lih CJ, Walsh W, Jaffe ES, et al. Determining cell-of-origin subtypes of diffuse large B-cell lymphoma using gene expression in formalin-fixed paraffin-embedded tissue. *Blood*. 2014;123(8):1214-7.
77. Bodor C, Alpár D, Marosvári D, Rajnai H, Dudela B, Kajtár B, et al. Cell of origin and genomic profile of primary central nervous system lymphoma determined using the nanostring 1st assay and ultra deep targeted next generation sequencing. *Blood*. 2017;130(Suppl 1):4009-.
78. Wilson WH, Young RM, Schmitz R, Yang Y, Pittaluga S, Wright G, et al. Targeting B cell receptor signaling with ibrutinib in diffuse large B cell lymphoma. *Nat Med*. 2015;21(8):922-6.

79. Villa D, Slack GW, Al-Moosawi M, Ben-Neriah S, Shenkier T, Connors JM, et al. Molecular Features of Primary Central Nervous System Lymphoma in a Large Tissue Microarray. *Blood*. 2018;132(Suppl 1):348.
80. Maguire A, Hilal T, Chen X, Rosenthal AC, Rimsza LM. Enhanced Expression of FGF Signaling in Primary Central Nervous System Lymphoma. *Blood*. 2018;132(suppl 1):2847.
81. Kreher S, Johrens K, Strehlow F, Martus P, Borowiec K, Radke J, et al. Prognostic impact of B-cell lymphoma 6 in primary CNS lymphoma. *Neuro Oncol*. 2015;17(7):1016-21.
82. Oliveira JL, Grogg KL, Macon WR, Dogan A, Feldman AL. Clinicopathologic features of B-Cell lineage neoplasms with aberrant expression of CD3: a study of 21 cases. *Am J Surg Pathol*. 2012;36(9):1364-70.
83. Wang J, Chen C, Lau S, Raghavan RI, Rowsell EH, Said J, et al. CD3-positive large B-cell lymphoma. *Am J Surg Pathol*. 2009;33(4):505-12.
84. Lazzi S, Bellan C, Onnis A, De Falco G, Sayed S, Kostopoulos I, et al. Rare lymphoid neoplasms coexpressing B- and T-cell antigens. The role of PAX-5 gene methylation in their pathogenesis. *Hum Pathol*. 2009;40(9):1252-61.
85. Campana D, Thompson JS, Amlot P, Brown S, Janossy G. The cytoplasmic expression of CD3 antigens in normal and malignant cells of the T lymphoid lineage. *J Immunol*. 1987;138(2):648-55.
86. Chetty R, Gatter K. CD3: structure, function, and role of immunostaining in clinical practice. *J Pathol*. 1994;173(4):303-7.
87. Rathore AS, Kumar S, Konwar R, Makker A, Negi MP, Goel MM. CD3+, CD4+ & CD8+ tumour infiltrating lymphocytes (TILs) are predictors of favourable survival outcome in infiltrating ductal carcinoma of breast. *Indian J Med Res*. 2014;140(3):361-9.
88. Tomsova M, Melichar B, Sedlakova I, Steiner I. Prognostic significance of CD3+ tumor-infiltrating lymphocytes in ovarian carcinoma. *Gynecol Oncol*. 2008;108(2):415-20.
89. Cermakova P, Melichar B, Tomsova M, Zoul Z, Kalabova H, Spacek J, et al. Prognostic significance of CD3+ tumor-infiltrating lymphocytes in patients with endometrial carcinoma. *Anticancer Res*. 2014;34(10):5555-61.
90. He M, Zuo C, Wang J, Liu J, Jiao B, Zheng J, et al. Prognostic significance of the aggregative perivascular growth pattern of tumor cells in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma. *Neuro Oncol*. 2013;15(6):727-34.
91. Kumari N, Krishnani N, Rawat A, Agarwal V, Lal P. Primary central nervous system lymphoma: prognostication as per international extranodal lymphoma study group score and reactive CD3 collar. *J Postgrad Med*. 2009;55(4):247-51.
92. Ferreri AJM. Therapy of primary CNS lymphoma: role of intensity, radiation, and novel agents. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017;2017(1):565-77.

93. Langner-Lemerrier S, Houillier C, Soussain C, Ghesquieres H, Chinot O, Taillandier L, et al. Primary CNS lymphoma at first relapse/progression: characteristics, management, and outcome of 256 patients from the French LOC network. *Neuro Oncol.* 2016;18(9):1297-303.
94. Correa DD, Maron L, Harder H, Klein M, Armstrong CL, Calabrese P, et al. Cognitive functions in primary central nervous system lymphoma: literature review and assessment guidelines. *Ann Oncol.* 2007;18(7):1145-51.
95. Nelson DF, Martz KL, Bonner H, Nelson JS, Newall J, Kerman HD, et al. Non-Hodgkin's lymphoma of the brain: can high dose, large volume radiation therapy improve survival? Report on a prospective trial by the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG): RTOG 8315. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 1992;23(1):9-17.
96. Alvarez-Pinzon AM, Wolf AL, Swedberg H, Coy SR, Valerio JE. Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL): Analysis of Treatment by Gamma Knife Radiosurgery and Chemotherapy in a Prospective, Observational Study. *Cureus.* 2016;8(7):e697.
97. Morris PG, Correa DD, Yahalom J, Raizer JJ, Schiff D, Grant B, et al. Rituximab, methotrexate, procarbazine, and vincristine followed by consolidation reduced-dose whole-brain radiotherapy and cytarabine in newly diagnosed primary CNS lymphoma: final results and long-term outcome. *J Clin Oncol.* 2013;31(31):3971-9.
98. Doolittle ND, Korfel A, Lubow MA, Schorb E, Schlegel U, Rogowski S, et al. Long-term cognitive function, neuroimaging, and quality of life in primary CNS lymphoma. *Neurology.* 2013;81(1):84-92.
99. Lai R, Abrey LE, Rosenblum MK, DeAngelis LM. Treatment-induced leukoencephalopathy in primary CNS lymphoma: a clinical and autopsy study. *Neurology.* 2004;62(3):451-6.
100. Correa DD, DeAngelis LM, Shi W, Thaler HT, Lin M, Abrey LE. Cognitive functions in low-grade gliomas: disease and treatment effects. *J Neurooncol.* 2007;81(2):175-84.
101. Ferreri AJ. How I treat primary CNS lymphoma. *Blood.* 2011;118(3):510-22.
102. Batchelor T, Carson K, O'Neill A, Grossman SA, Alavi J, New P, et al. Treatment of primary CNS lymphoma with methotrexate and deferred radiotherapy: a report of NABTT 96-07. *J Clin Oncol.* 2003;21(6):1044-9.
103. Zhu JJ, Gerstner ER, Engler DA, Mrugala MM, Nugent W, Nierenberg K, et al. High-dose methotrexate for elderly patients with primary CNS lymphoma. *Neuro Oncol.* 2009;11(2):211-5.
104. Ferreri AJ, Reni M, Foppoli M, Martelli M, Pangalis GA, Frezzato M, et al. High-dose cytarabine plus high-dose methotrexate versus high-dose methotrexate alone in patients with primary CNS lymphoma: a randomised phase 2 trial. *Lancet.* 2009;374(9700):1512-20.
105. Batchelor TT, Grossman SA, Mikkelsen T, Ye X, Desideri S, Lesser GJ. Rituximab monotherapy for patients with recurrent primary CNS lymphoma. *Neurology.* 2011;76(10):929-30.

106. Song Y, Wen Y, Xue W, Zhang Y, Zhang M. Effect of rituximab on primary central nervous system lymphoma: a meta-analysis. *Int J Hematol*. 2017;106(5):612-21.
107. Omuro A, Correa DD, DeAngelis LM, Moskowitz CH, Matasar MJ, Kaley TJ, et al. R-MPV followed by high-dose chemotherapy with TBC and autologous stem-cell transplant for newly diagnosed primary CNS lymphoma. *Blood*. 2015;125(9):1403-10.
108. Glass J, Won M, Schultz CJ, Brat D, Bartlett NL, Suh JH, et al. Phase I and II Study of Induction Chemotherapy With Methotrexate, Rituximab, and Temozolomide, Followed By Whole-Brain Radiotherapy and Postirradiation Temozolomide for Primary CNS Lymphoma: NRG Oncology RTOG 0227. *J Clin Oncol*. 2016;34(14):1620-5.
109. Omuro A, Chinot O, Taillandier L, Ghesquieres H, Soussain C, Delwail V, et al. Methotrexate and temozolomide versus methotrexate, procarbazine, vincristine, and cytarabine for primary CNS lymphoma in an elderly population: an intergroup ANOCEF-GOELAMS randomised phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2015;2(6):e251-9.
110. Rubenstein JL, Li J, Chen L, Advani R, Drappatz J, Gerstner E, et al. Multicenter phase 1 trial of intraventricular immunochemotherapy in recurrent CNS lymphoma. *Blood*. 2013;121(5):745-51.
111. Khan RB, Shi W, Thaler HT, DeAngelis LM, Abrey LE. Is intrathecal methotrexate necessary in the treatment of primary CNS lymphoma? *J Neurooncol*. 2002;58(2):175-8.
112. Rubenstein JL, Fridlyand J, Abrey L, Shen A, Karch J, Wang E, et al. Phase I study of intraventricular administration of rituximab in patients with recurrent CNS and intraocular lymphoma. *J Clin Oncol*. 2007;25(11):1350-6.
113. Sierra Del Rio M, Ricard D, Houillier C, Navarro S, Gonzalez-Aguilar A, Idbaih A, et al. Prophylactic intrathecal chemotherapy in primary CNS lymphoma. *J Neurooncol*. 2012;106(1):143-6.
114. Ferreri AJ, Sassone M, Zaja F, Re A, Spina M, Rocco AD, et al. Lenalidomide maintenance in patients with relapsed diffuse large B-cell lymphoma who are not eligible for autologous stem cell transplantation: an open label, single-arm, multicentre phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2017;4(3):e137-e46.
115. Houillier C, Taillandier L, Lamy T, Chinot O, Molucon-Chabrot C, Soubeyran P, et al. Whole Brain Radiotherapy (WBRT) Versus Intensive Chemotherapy with Haematopoietic Stem Cell Rescue (IC + HCR) for Primary Central Nervous System Lymphoma (PCNSL) in Young Patients: An Intergroup Anocef-Goelams Randomized Phase II Trial (PRECIS). *Blood*. 2016;128(22):782.
116. Ferreri AJ, Illerhaus G. The role of autologous stem cell transplantation in primary central nervous system lymphoma. *Blood*. 2016;127(13):1642-9.
117. Kasenda B, Ihorst G, Schroers R, Korfel A, Schmidt-Wolf I, Egerer G, et al. High-dose chemotherapy with autologous haematopoietic stem cell support for relapsed or refractory primary CNS lymphoma: a prospective

- multicentre trial by the German Cooperative PCNSL study group. *Leukemia*. 2017;31(12):2623-9.
118. Illerhaus G, Kasenda B, Ihorst G, Egerer G, Lamprecht M, Keller U, et al. High-dose chemotherapy with autologous haemopoietic stem cell transplantation for newly diagnosed primary CNS lymphoma: a prospective, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2016;3(8):e388-97.
  119. Plotkin SR, Betensky RA, Hochberg FH, Grossman SA, Lesser GJ, Nabors LB, et al. Treatment of relapsed central nervous system lymphoma with high-dose methotrexate. *Clin Cancer Res*. 2004;10(17):5643-6.
  120. Soussain C, Hoang-Xuan K, Taillandier L, Fourme E, Choquet S, Witz F, et al. Intensive chemotherapy followed by hematopoietic stem-cell rescue for refractory and recurrent primary CNS and intraocular lymphoma: Societe Francaise de Greffe de Moelle Osseuse-Therapie Cellulaire. *J Clin Oncol*. 2008;26(15):2512-8.
  121. Nguyen PL, Chakravarti A, Finkelstein DM, Hochberg FH, Batchelor TT, Loeffler JS. Results of whole-brain radiation as salvage of methotrexate failure for immunocompetent patients with primary CNS lymphoma. *J Clin Oncol*. 2005;23(7):1507-13.
  122. Sagiv-Barfi I, Kohrt HE, Czerwinski DK, Ng PP, Chang BY, Levy R. Therapeutic antitumor immunity by checkpoint blockade is enhanced by ibrutinib, an inhibitor of both BTK and ITK. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2015;112(9):E966-72.
  123. Grommes C, Pastore A, Palaskas N, Tang SS, Campos C, Scharzt D, et al. Ibrutinib Unmasks Critical Role of Bruton Tyrosine Kinase in Primary CNS Lymphoma. *Cancer Discov*. 2017;7(9):1018-29.
  124. Grommes C, Younes A. Ibrutinib in PCNSL: The Curious Cases of Clinical Responses and Aspergillosis. *Cancer Cell*. 2017;31(6):731-3.
  125. Lionakis MS, Dunleavy K, Roschewski M, Widemann BC, Butman JA, Schmitz R, et al. Inhibition of B Cell Receptor Signaling by Ibrutinib in Primary CNS Lymphoma. *Cancer Cell*. 2017;31(6):833-43 e5.
  126. Hendriks RW, Yuvaraj S, Kil LP. Targeting Bruton's tyrosine kinase in B cell malignancies. *Nat Rev Cancer*. 2014;14(4):219-32.
  127. Korfel A, Schlegel U, Herrlinger U, Dreyling M, Schmidt C, von Baumgarten L, et al. Phase II Trial of Temsirolimus for Relapsed/Refractory Primary CNS Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2016;34(15):1757-63.
  128. Lopez-Girona A, Mendy D, Ito T, Miller K, Gandhi AK, Kang J, et al. Cereblon is a direct protein target for immunomodulatory and antiproliferative activities of lenalidomide and pomalidomide. *Leukemia*. 2012;26(11):2326-35.
  129. Kronke J, Udeshi ND, Narla A, Grauman P, Hurst SN, McConkey M, et al. Lenalidomide causes selective degradation of IKZF1 and IKZF3 in multiple myeloma cells. *Science*. 2014;343(6168):301-5.
  130. Rubenstein JL, Fraser E, Formaker P, Lee JC-C, Chen N, Kock M, et al. Phase I investigation of lenalidomide plus rituximab and outcomes of lenalidomide

- maintenance in recurrent CNS lymphoma. In: American Society of Clinical O, editor. ASCO 2016; Chicago, IL2016.
131. Braggio E, Van Wier S, Ojha J, McPhail E, Asmann YW, Egan J, et al. Genome-Wide Analysis Uncovers Novel Recurrent Alterations in Primary Central Nervous System Lymphomas. *Clin Cancer Res*. 2015;21(17):3986-94.
  132. Rubenstein JL, Fridlyand J, Shen A, Aldape K, Ginzinger D, Batchelor T, et al. Gene expression and angiotropism in primary CNS lymphoma. *Blood*. 2006;107(9):3716-23.
  133. Barakat M, Albitar M, Whitney RL, Chen C, Kuo Y-H, Silveira W, et al. Diversity of genetic alterations of primary central nervous system lymphoma in Hispanic versus non-Hispanic population. *J Clin Oncol*. 2019;37(15_suppl):7535-.
  134. Knittel G, Liedgens P, Korovkina D, Seeger JM, Al-Baldawi Y, Al-Maarri M, et al. B-cell-specific conditional expression of Myd88p.L252P leads to the development of diffuse large B-cell lymphoma in mice. *Blood*. 2016;127(22):2732-41.
  135. Bonzheim I, Giese S, Deuter C, Susskind D, Zierhut M, Waizel M, et al. High frequency of MYD88 mutations in vitreoretinal B-cell lymphoma: a valuable tool to improve diagnostic yield of vitreous aspirates. *Blood*. 2015;126(1):76-9.
  136. Kersten MJ, Kraan W, Doorduijn J, Bromberg J, Lam K, Kluin PM, et al. Diffuse large B cell lymphomas relapsing in the CNS lack oncogenic MYD88 and CD79B mutations. *Blood Cancer J*. 2014;4:e266.
  137. Montesinos-Rongen M, Schmitz R, Brunn A, Gesk S, Richter J, Hong K, et al. Mutations of CARD11 but not TNFAIP3 may activate the NF-kappaB pathway in primary CNS lymphoma. *Acta Neuropathol*. 2010;120(4):529-35.
  138. Schwindt H, Vater I, Kreuz M, Montesinos-Rongen M, Brunn A, Richter J, et al. Chromosomal imbalances and partial uniparental disomies in primary central nervous system lymphoma. *Leukemia*. 2009;23(10):1875-84.
  139. Grommes C, DeAngelis LM. Primary CNS Lymphoma. *J Clin Oncol*. 2017;35(21):2410-8.
  140. (NCBI) BcDdNCfBI. MYC MYC proto-oncogene, bHLH transcription factor. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4609>.
  141. Knoepfler PS. Myc goes global: new tricks for an old oncogene. *Cancer Res*. 2007;67(11):5061-3.
  142. Pfreundschuh M. Growing importance of MYC/BCL2 immunohistochemistry in diffuse large B-cell lymphomas. *J Clin Oncol*. 2012;30(28):3433-5.
  143. Brunn A, Nagel I, Montesinos-Rongen M, Klapper W, Vater I, Paulus W, et al. Frequent triple-hit expression of MYC, BCL2, and BCL6 in primary lymphoma of the central nervous system and absence of a favorable MYC(low)BCL2 (low) subgroup may underlie the inferior prognosis as

- compared to systemic diffuse large B cell lymphomas. *Acta Neuropathol.* 2013;126(4):603-5.
144. Gill KZ, Iwamoto F, Allen A, Hoehn D, Murty VV, Alobeid B, et al. MYC protein expression in primary diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system. *PLoS One.* 2014;9(12):e114398.
  145. Vater I, Montesinos-Rongen M, Schlesner M, Haake A, Purschke F, Sprute R, et al. The mutational pattern of primary lymphoma of the central nervous system determined by whole-exome sequencing. *Leukemia.* 2015;29(3):677-85.
  146. Gonzalez-Aguilar A, Idbaih A, Boisselier B, Habbita N, Rossetto M, Laurence A, et al. Recurrent mutations of MYD88 and TBL1XR1 in primary central nervous system lymphomas. *Clin Cancer Res.* 2012;18(19):5203-11.
  147. Bruno A, Boisselier B, Labreche K, Marie Y, Polivka M, Jouvet A, et al. Mutational analysis of primary central nervous system lymphoma. *Oncotarget.* 2014;5(13):5065-75.
  148. National Institute of Health. 2019 [cited 2019 06/24/2019]; Available from: <https://ghr.nlm.nih.gov/gene/MYC#normalfunction>
  149. Bhatia K, Huppi K, Spangler G, Siwarski D, Iyer R, Magrath I. Point mutations in the c-Myc transactivation domain are common in Burkitt's lymphoma and mouse plasmacytomas. *Nat Genet.* 1993;5(1):56-61.
  150. Nguyen L, Papenhausen P, Shao H. The Role of c-MYC in B-Cell Lymphomas: Diagnostic and Molecular Aspects. *Genes (Basel).* 2017;8(4).
  151. Fischer L, Hummel M, Korfel A, Lenze D, Joehrens K, Thiel E. Differential micro-RNA expression in primary CNS and nodal diffuse large B-cell lymphomas. *Neuro Oncol.* 2011;13(10):1090-8.
  152. (NCBI) BcDdNCfBI. BCL2 BCL2, apoptosis regulator [Homo sapiens (human)]. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/596>.
  153. Hill ME, MacLennan KA, Cunningham DC, Vaughan Hudson B, Burke M, Clarke P, et al. Prognostic significance of BCL-2 expression and bcl-2 major breakpoint region rearrangement in diffuse large cell non-Hodgkin's lymphoma: a British National Lymphoma Investigation Study. *Blood.* 1996;88(3):1046-51.
  154. Gascoyne RD, Adomat SA, Krajewski S, Krajewska M, Horsman DE, Tolcher AW, et al. Prognostic significance of Bcl-2 protein expression and Bcl-2 gene rearrangement in diffuse aggressive non-Hodgkin's lymphoma. *Blood.* 1997;90(1):244-51.
  155. Alizadeh AA, Staudt LM. Genomic-scale gene expression profiling of normal and malignant immune cells. *Curr Opin Immunol.* 2000;12(2):219-25.
  156. Yang Y, Shaffer AL, 3rd, Emre NC, Ceribelli M, Zhang M, Wright G, et al. Exploiting synthetic lethality for the therapy of ABC diffuse large B cell lymphoma. *Cancer Cell.* 2012;21(6):723-37.

157. Wang JQ, Jeelall YS, Beutler B, Horikawa K, Goodnow CC. Consequences of the recurrent MYD88(L265P) somatic mutation for B cell tolerance. *J Exp Med*. 2014;211(3):413-26.
158. Colomo L, Lopez-Guillermo A, Perales M, Rives S, Martinez A, Bosch F, et al. Clinical impact of the differentiation profile assessed by immunophenotyping in patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Blood*. 2003;101(1):78-84.
159. Mounier N, Briere J, Gisselbrecht C, Reyes F, Gaulard P, Coiffier B, et al. Estimating the impact of rituximab on bcl-2-associated resistance to CHOP in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Haematologica*. 2006;91(5):715-6.
160. Fu K, Weisenburger DD, Choi WW, Perry KD, Smith LM, Shi X, et al. Addition of rituximab to standard chemotherapy improves the survival of both the germinal center B-cell-like and non-germinal center B-cell-like subtypes of diffuse large B-cell lymphoma. *J Clin Oncol*. 2008;26(28):4587-94.
161. Wilson WH, Dunleavy K, Pittaluga S, Hegde U, Grant N, Steinberg SM, et al. Phase II study of dose-adjusted EPOCH and rituximab in untreated diffuse large B-cell lymphoma with analysis of germinal center and post-germinal center biomarkers. *J Clin Oncol*. 2008;26(16):2717-24.
162. Amoroso A, Hafsi S, Militello L, Russo AE, Soua Z, Mazzarino MC, et al. Understanding rituximab function and resistance: implications for tailored therapy. *Front Biosci (Landmark Ed)*. 2011;16:770-82.
163. (NCBI) BcDdNCfBI. LMO2 LIM domain only 2 [Homo sapiens (human)]. [02/10/2017]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4005>.
164. Natkunam Y, Zhao S, Mason DY, Chen J, Taidi B, Jones M, et al. The oncoprotein LMO2 is expressed in normal germinal-center B cells and in human B-cell lymphomas. *Blood*. 2007;109(4):1636-42.
165. Nam CH, Rabbitts TH. The role of LMO2 in development and in T cell leukemia after chromosomal translocation or retroviral insertion. *Mol Ther*. 2006;13(1):15-25.
166. Younes SF, Beck AH, Lossos IS, Levy R, Warnke RA, Natkunam Y. Immunoarchitectural patterns in follicular lymphoma: efficacy of HGAL and LMO2 in the detection of the interfollicular and diffuse components. *Am J Surg Pathol*. 2010;34(9):1266-76.
167. Jiang CY, Yu JJ, Ruan Y, Wang XH, Zhao W, Wang XJ, et al. LIM domain only 2 over-expression in prostate stromal cells facilitates prostate cancer progression through paracrine of Interleukin-11. *Oncotarget*. 2016;7(18):26247-58.
168. Colomo L, Vazquez I, Papaleo N, Espinet B, Ferrer A, Franco C, et al. LMO2-negative Expression Predicts the Presence of MYC Translocations in Aggressive B-Cell Lymphomas. *Am J Surg Pathol*. 2017;41(7):877-86.
169. Alizadeh AA, Gentles AJ, Alencar AJ, Liu CL, Kohrt HE, Houot R, et al. Prediction of survival in diffuse large B-cell lymphoma based on the expression of 2 genes reflecting tumor and microenvironment. *Blood*. 2011;118(5):1350-8.

170. Lossos C, Bayraktar S, Weinzierl E, Younes SF, Hosein PJ, Tibshirani RJ, et al. LMO2 and BCL6 are associated with improved survival in primary central nervous system lymphoma. *Br J Haematol*. 2014;165(5):640-8.
171. (NCBI) BcDdNCfBI. MGMT O-6-methylguanine-DNA methyltransferase [Homo sapiens (human)]. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4255>.
172. Brady CA, Jiang D, Mello SS, Johnson TM, Jarvis LA, Kozak MM, et al. Distinct p53 transcriptional programs dictate acute DNA-damage responses and tumor suppression. *Cell*. 2011;145(4):571-83.
173. Isono S, Fujishima M, Azumi T, Hashimoto Y, Komoike Y, Yukawa M, et al. O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase as a prognostic and predictive marker for basal-like breast cancer treated with cyclophosphamide-based chemotherapy. *Oncol Lett*. 2014;7(6):1778-84.
174. Brell M, Ibanez J, Tortosa A. O6-Methylguanine-DNA methyltransferase protein expression by immunohistochemistry in brain and non-brain systemic tumours: systematic review and meta-analysis of correlation with methylation-specific polymerase chain reaction. *BMC Cancer*. 2011;11:35.
175. Preusser M. MGMT analysis at DNA, RNA and protein levels in glioblastoma tissue. *Histol Histopathol*. 2009;24(4):511-8.
176. Ohno T, Hiraga J, Ohashi H, Sugisaki C, Li E, Asano H, et al. Loss of O6-methylguanine-DNA methyltransferase protein expression is a favorable prognostic marker in diffuse large B-cell lymphoma. *Int J Hematol*. 2006;83(4):341-7.
177. Sturm RA, Cassady JL, Das G, Romo A, Evans GA. Chromosomal structure and expression of the human OTF1 locus encoding the Oct-1 protein. *Genomics*. 1993;16(2):333-41.
178. (NCBI) BcDdNCfBI. POU2F1 POU class 2 homeobox 1. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5451>.
179. Vazquez-Arreguin K, Maddox J, Kang J, Park D, Cano RR, Factor RE, et al. BRCA1 through Its E3 Ligase Activity Regulates the Transcription Factor Oct1 and Carbohydrate Metabolism. *Mol Cancer Res*. 2018;16(3):439-52.
180. Shakya A, Cooksey R, Cox JE, Wang V, McClain DA, Tantin D. Oct1 loss of function induces a coordinate metabolic shift that opposes tumorigenicity. *Nat Cell Biol*. 2009;11(3):320-7.
181. (NCBI) BcDdNCfBI. PDCD1 programmed cell death 1. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5133>.
182. Smeltzer JP, Jones JM, Ziesmer SC, Grote DM, Xiu B, Ristow KM, et al. Pattern of CD14+ follicular dendritic cells and PD1+ T cells independently predicts time to transformation in follicular lymphoma. *Clin Cancer Res*. 2014;20(11):2862-72.
183. Waki K, Yamada T, Yoshiyama K, Terazaki Y, Sakamoto S, Matsueda S, et al. PD-1 expression on peripheral blood T-cell subsets correlates with prognosis in non-small cell lung cancer. *Cancer Sci*. 2014;105(10):1229-35.

184. Muenst S, Hoeller S, Willi N, Dirnhofera S, Tzankov A. Diagnostic and prognostic utility of PD-1 in B cell lymphomas. *Dis Markers*. 2010;29(1):47-53.
185. Pauken KE, Wherry EJ. Overcoming T cell exhaustion in infection and cancer. *Trends Immunol*. 2015;36(4):265-76.
186. Taube JM, Klein A, Brahmer JR, Xu H, Pan X, Kim JH, et al. Association of PD-1, PD-1 ligands, and other features of the tumor immune microenvironment with response to anti-PD-1 therapy. *Clin Cancer Res*. 2014;20(19):5064-74.
187. Bertucci F, Finetti P, Colpaert C, Mamessier E, Parizel M, Dirix L, et al. PDL1 expression in inflammatory breast cancer is frequent and predicts for the pathological response to chemotherapy. *Oncotarget*. 2015;6(15):13506-19.
188. Topalian SL, Hodi FS, Brahmer JR, Gettinger SN, Smith DC, McDermott DF, et al. Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. *N Engl J Med*. 2012;366(26):2443-54.
189. Robert C, Ribas A, Wolchok JD, Hodi FS, Hamid O, Kefford R, et al. Anti-programmed-death-receptor-1 treatment with pembrolizumab in ipilimumab-refractory advanced melanoma: a randomised dose-comparison cohort of a phase 1 trial. *Lancet*. 2014;384(9948):1109-17.
190. Robert C, Long GV, Brady B, Dutriaux C, Maio M, Mortier L, et al. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. *N Engl J Med*. 2015;372(4):320-30.
191. (NCBI) bdddNCfBI. BCL6 B cell CLL/lymphoma 6 [Homo sapiens (human)]. 2018 [cited 2018 02/10/2018]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/604>.
192. Barakat M, Albitar M, Xu-Monette Z, Young KH, Abdulhaq H. Molecular profiling of primary central nervous system lymphoma as compared to activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma. *J Clin Oncol*. 2019;37(15 suppl):7549-.
193. Cattoretti G, Chang CC, Cechova K, Zhang J, Ye BH, Falini B, et al. BCL-6 protein is expressed in germinal-center B cells. *Blood*. 1995;86(1):45-53.
194. Klein U, Dalla-Favera R. Germinal centres: role in B-cell physiology and malignancy. *Nat Rev Immunol*. 2008;8(1):22-33.
195. Park HY, Go H, Song HR, Kim S, Ha GH, Jeon YK, et al. Pellino 1 promotes lymphomagenesis by deregulating BCL6 polyubiquitination. *J Clin Invest*. 2014;124(11):4976-88.
196. Lossos IS, Jones CD, Warnke R, Natkunam Y, Kaizer H, Zehnder JL, et al. Expression of a single gene, BCL-6, strongly predicts survival in patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Blood*. 2001;98(4):945-51.
197. Winter JN, Weller EA, Horning SJ, Krajewska M, Variakojis D, Habermann TM, et al. Prognostic significance of Bcl-6 protein expression in DLBCL treated with CHOP or R-CHOP: a prospective correlative study. *Blood*. 2006;107(11):4207-13.

198. Bellesso M, Bizzetto R, Pereira J, Beitler B, Pracchia LF, Chamone DAS. Linfoma primário do sistema nervoso central. *Rev Bras Hematol Hemoter.* 2008;30(1):6.
199. Kehdy FS, Gouveia MH, Machado M, Magalhaes WC, Horimoto AR, Horta BL, et al. Origin and dynamics of admixture in Brazilians and its effect on the pattern of deleterious mutations. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2015;112(28):8696-701.
200. Bellomo R, Warrillow SJ, Reade MC. Why we should be wary of single-center trials. *Crit Care Med.* 2009;37(12):3114-9.
201. Mariani AW, Pego-Fernandes PM. Observational studies: why are they so important? *Sao Paulo Medical Journal.* 2014;132:01-2.
202. Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB, Glatstein E, Canellos GP, Young RC, et al. Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting. *J Clin Oncol.* 1989;7(11):1630-6.
203. Abrey LE, Yahalom J, DeAngelis LM. Treatment for primary CNS lymphoma: the next step. *J Clin Oncol.* 2000;18(17):3144-50.
204. Bustin SA, Benes V, Garson JA, Hellemans J, Huggett J, Kubista M, et al. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. *Clin Chem.* 2009;55(4):611-22.
205. Mitas M, Mikhitarian K, Walters C, Baron PL, Elliott BM, Brothers TE, et al. Quantitative real-time RT-PCR detection of breast cancer micrometastasis using a multigene marker panel. *Int J Cancer.* 2001;93(2):162-71.
206. Hulley SB, Cummings SR, Newman TB. Delineando a pesquisa clínica. Uma abordagem epidemiológica. *Artmed*, editor: Artmed; 2008.
207. Fischer RA. On the interpretation of χ^2 from contingency tables, and the calculation of P. *Journal of the Royal Statistical Society.* 1922;85(1):8.
208. Fischer RA. *Statistical Methods for Research Workers.*: Oliver and Boyd; 1954.
209. Kaplan EM, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of American Statistical Association.* 1958;53:467-81.
210. Schoenfeld D. The asymptotic properties of nonparametric tests for comparing survival distributions. *Biometrika.* 1981;68(1):316-9.
211. Cox DR. Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological).* 1972;34(2):187-220.
212. Ulm K. Primary endpoints in cancer trials. *J Thorac Dis.* 2011;3(2):82-3.
213. National Cancer Institute at the National Institutes of Health. NCI Dictionary of Cancer Terms. 2019 [cited 2019]; Available from: <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms>.
214. DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics.* 1988;44(3):837-45.
215. Park SH, Goo JM, Jo CH. Receiver operating characteristic (ROC) curve: practical review for radiologists. *Korean J Radiol.* 2004;5(1):11-8.
216. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. *Cancer.* 1950;3(1):32-5.

217. Chen F, Xue Y, Tan MT, Chen P. Efficient statistical tests to compare Youden index: accounting for contingency correlation. *Stat Med*. 2015;34(9):1560-76.
218. Cohen J. A coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educ Psychol Meas*. 1960;20(1):37-46.
219. Hu S, Xu-Monette ZY, Tzankov A, Green T, Wu L, Balasubramanyam A, et al. MYC/BCL2 protein coexpression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The International DLBCL Rituximab-CHOP Consortium Program. *Blood*. 2013;121(20):4021-31; quiz 250.
220. Mounier N, Briere J, Gisselbrecht C, Emile JF, Lederlin P, Sebban C, et al. Rituximab plus CHOP (R-CHOP) overcomes bcl-2--associated resistance to chemotherapy in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). *Blood*. 2003;101(11):4279-84.
221. Uccella S, Cerutti R, Placidi C, Marchet S, Carnevali I, Bernasconi B, et al. MGMT methylation in diffuse large B-cell lymphoma: validation of quantitative methylation-specific PCR and comparison with MGMT protein expression. *J Clin Pathol*. 2009;62(8):715-23.
222. Geier A, Macias RI, Bettinger D, Weiss J, Bantel H, Jahn D, et al. The lack of the organic cation transporter OCT1 at the plasma membrane of tumor cells precludes a positive response to sorafenib in patients with hepatocellular carcinoma. *Oncotarget*. 2017;8(9):15846-57.
223. Cogbill CH, Swerdlow SH, Gibson SE. Utility of CD279/PD-1 immunohistochemistry in the evaluation of benign and neoplastic T-cell-rich bone marrow infiltrates. *Am J Clin Pathol*. 2014;142(1):88-98.
224. Mrugala MM, Rubenstein JL, Ponzoni M, Batchelor TT. Insights into the biology of primary central nervous system lymphoma. *Curr Oncol Rep*. 2009;11(1):73-80.
225. Rubenstein JL, Gupta NK, Mannis GN, Lamarre AK, Treseler P. How I treat CNS lymphomas. *Blood*. 2013;122(14):2318-30.
226. Hackshaw A. Small studies: strengths and limitations. *Eur Respir J*. 2008;32(5):1141-3.
227. Altman DG, Bland JM. Absence of evidence is not evidence of absence. *BMJ*. 1995;311(7003):485.
228. Ostrom QT, Gittleman H, Liao P, Vecchione-Koval T, Wolinsky Y, Kruchko C, et al. CBTRUS Statistical Report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2010-2014. *Neuro Oncol*. 2017;19(suppl_5):v1-v88.
229. Siegal T, Bairey O. Primary CNS Lymphoma in the Elderly: The Challenge. *Acta Haematol*. 2019;141(3):138-45.
230. Ferreri AJ, Blay JY, Reni M, Pasini F, Spina M, Ambrosetti A, et al. Prognostic scoring system for primary CNS lymphomas: the International Extranodal Lymphoma Study Group experience. *J Clin Oncol*. 2003;21(2):266-72.

231. Corry J, Smith JG, Wirth A, Quong G, Liew KH. Primary central nervous system lymphoma: age and performance status are more important than treatment modality. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 1998;41(3):615-20.
232. Schultz C, Scott C, Sherman W, Donahue B, Fields J, Murray K, et al. Preirradiation chemotherapy with cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and dexamethasone for primary CNS lymphomas: initial report of radiation therapy oncology group protocol 88-06. *J Clin Oncol.* 1996;14(2):556-64.
233. Bessell EM, Lopez-Guillermo A, Villa S, Verger E, Nomdedeu B, Petit J, et al. Importance of radiotherapy in the outcome of patients with primary CNS lymphoma: an analysis of the CHOD/BVAM regimen followed by two different radiotherapy treatments. *J Clin Oncol.* 2002;20(1):231-6.
234. Zhao H, Ma M, Zhang L, Zheng G, Lv H, Liu J, et al. Diagnosis of central nervous system lymphoma via cerebrospinal fluid cytology: a case report. *BMC Neurol.* 2019;19(1):90.
235. Chiavazza C, Pellerino A, Ferrio F, Cistaro A, Soffietti R, Ruda R. Primary CNS Lymphomas: Challenges in Diagnosis and Monitoring. *Biomed Res Int.* 2018;2018:3606970.
236. Ferreri AJ, Reni M, Villa E. Primary central nervous system lymphoma in immunocompetent patients. *Cancer Treat Rev.* 1995;21(5):415-46.
237. Xavier FD, Levy D, Pereira J. Time-to-treatment of diffuse large B-cell lymphoma in Sao Paulo. *Clinics (Sao Paulo).* 2014;69(5):367-71.
238. Ferreri AJ. Primary central nervous system lymphoma: three linked questions in the situation puzzle of radiotherapy. *Leuk Lymphoma.* 2015;56(5):1185-7.
239. Juergens A, Pels H, Rogowski S, Fliessbach K, Glasmacher A, Engert A, et al. Long-term survival with favorable cognitive outcome after chemotherapy in primary central nervous system lymphoma. *Ann Neurol.* 2010;67(2):182-9.
240. Song J. Age as an independent predictive factor in survival outcomes of multimodality treatments for primary central nervous system lymphoma: A review from tertiary institution. In: EHA, editor. *European Hematology Association*; 05/16/2019; Amsterdam2019.
241. Bellinzona M, Roser F, Ostertag H, Gaab RM, Saini M. Surgical removal of primary central nervous system lymphomas (PCNSL) presenting as space occupying lesions: a series of 33 cases. *Eur J Surg Oncol.* 2005;31(1):100-5.
242. Bessell EM, Graus F, Lopez-Guillermo A, Lewis SA, Villa S, Verger E, et al. Primary non-Hodgkin's lymphoma of the CNS treated with CHOD/BVAM or BVAM chemotherapy before radiotherapy: long-term survival and prognostic factors. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2004;59(2):501-8.
243. DeAngelis LM, Seiferheld W, Schold SC, Fisher B, Schultz CJ, Radiation Therapy Oncology Group S. Combination chemotherapy and radiotherapy for primary central nervous system lymphoma: Radiation Therapy Oncology Group Study 93-10. *J Clin Oncol.* 2002;20(24):4643-8.

244. Kubista M, Andrade JM, Bengtsson M, Forootan A, Jonak J, Lind K, et al. The real-time polymerase chain reaction. *Mol Aspects Med.* 2006;27(2-3):95-125.
245. von Smolinski D, Leverkushoe I, von Samson-Himmelstjerna G, Gruber AD. Impact of formalin-fixation and paraffin-embedding on the ratio between mRNA copy numbers of differently expressed genes. *Histochem Cell Biol.* 2005;124(2):177-88.
246. Abrahamsen HN, Steiniche T, Nexø E, Hamilton-Dutoit SJ, Sørensen BS. Towards quantitative mRNA analysis in paraffin-embedded tissues using real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction: a methodological study on lymph nodes from melanoma patients. *J Mol Diagn.* 2003;5(1):34-41.
247. Vandesompele J, De Preter K, Pattyn F, Poppe B, Van Roy N, De Paepe A, et al. Accurate normalization of real-time quantitative RT-PCR data by geometric averaging of multiple internal control genes. *Genome Biol.* 2002;3(7):RESEARCH0034.
248. McCall MN, McMurray HR, Land H, Almudevar A. On non-detects in qPCR data. *Bioinformatics.* 2014;30(16):2310-6.
249. Chang CC, Kampalath B, Schultz C, Bunyi-Teopengco E, Logan B, Eshoa C, et al. Expression of p53, c-Myc, or Bcl-6 suggests a poor prognosis in primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma among immunocompetent individuals. *Arch Pathol Lab Med.* 2003;127(2):208-12.
250. Reed JC. Bcl-2 family proteins: regulators of chemoresistance in cancer. *Toxicol Lett.* 1995;82-83:155-8.
251. Visco C, Tzankov A, Xu-Monette ZY, Miranda RN, d'Amore ESG, Montes-Moreno S, et al. The t(14;18)(q32;q21) Characterizes a Subset of Patients with Diffuse Large-B Cell Lymphoma of Germinal Center Origin with Poor Outcome: Report From the International DLBCL Rituximab-CHOP Consortium Program Study. *Blood.* 2011;21.
252. Cai Q, Fang Y, Young KH. Primary Central Nervous System Lymphoma: Molecular Pathogenesis and Advances in Treatment. *Transl Oncol.* 2019;12(3):523-38.
253. Montesinos-Rongen M, Brunn A, Bentink S, Basso K, Lim WK, Klapper W, et al. Gene expression profiling suggests primary central nervous system lymphomas to be derived from a late germinal center B cell. *Leukemia.* 2008;22(2):400-5.
254. Niparuck P, Boonsakan P, Sutthippingkiat T, Pukiat S, Chantrathammachart P, Phusanti S, et al. Treatment outcome and prognostic factors in PCNSL. *Diagn Pathol.* 2019;14(1):56.
255. Hermine O, Haioun C, Lepage E, d'Agay MF, Briere J, Lavignac C, et al. Prognostic significance of bcl-2 protein expression in aggressive non-Hodgkin's lymphoma. Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte (GELA). *Blood.* 1996;87(1):265-72.
256. Vogel C, Marcotte EM. Insights into the regulation of protein abundance from proteomic and transcriptomic analyses. *Nat Rev Genet.* 2012;13(4):227-32.

257. Liu Y, Beyer A, Aebersold R. On the Dependency of Cellular Protein Levels on mRNA Abundance. *Cell*. 2016;165(3):535-50.
258. Nagaraj N, Wisniewski JR, Geiger T, Cox J, Kircher M, Kelso J, et al. Deep proteome and transcriptome mapping of a human cancer cell line. *Mol Syst Biol*. 2011;7:548.
259. Bujak M, Ratkaj I, Markova-Car E, Jurisic D, Horvatic A, Vucinic S, et al. Inflammatory Gene Expression Upon TGF-beta1-Induced p38 Activation in Primary Dupuytren's Disease Fibroblasts. *Front Mol Biosci*. 2015;2:68.
260. Maddox J, Shakya A, South S, Shelton D, Andersen JN, Chidester S, et al. Transcription factor Oct1 is a somatic and cancer stem cell determinant. *PLoS Genet*. 2012;8(11):e1003048.
261. Nakata K, Ohuchida K, Nagai E, Hayashi A, Miyasaka Y, Kayashima T, et al. LMO2 is a novel predictive marker for a better prognosis in pancreatic cancer. *Neoplasia*. 2009;11(7):712-9.
262. Aly RM, Taalab MM, Abdsalam EM, Elyamany OH, Hasan OE. High expression of LMO2 predicts a favorable outcome in adult patients with BCR/ABL negative B-cell acute lymphoblastic leukemia. *Oncol Lett*. 2016;11(3):1917-22.
263. Bertucci F, Finetti P, Mamessier E, Pantaleo MA, Astolfi A, Ostrowski J, et al. PDL1 expression is an independent prognostic factor in localized GIST. *Oncoimmunology*. 2015;4(5):e1002729.
264. Menter T, Bodmer-Haeckl A, Dirnhofer S, Tzankov A. Evaluation of the diagnostic and prognostic value of PDL1 expression in Hodgkin and B-cell lymphomas. *Hum Pathol*. 2016;54:17-24.
265. Berghoff AS, Ricken G, Widhalm G, Rajky O, Hainfellner JA, Birner P, et al. PD1 (CD279) and PD-L1 (CD274, B7H1) expression in primary central nervous system lymphomas (PCNSL). *Clin Neuropathol*. 2014;33(1):42-9.
266. Cho H, Kim SH, Kim SJ, Chang JH, Yang WI, Suh CO, et al. Programmed cell death 1 expression is associated with inferior survival in patients with primary central nervous system lymphoma. *Oncotarget*. 2017;8(50):87317-28.
267. Smith-Garvin JE, Koretzky GA, Jordan MS. T cell activation. *Annu Rev Immunol*. 2009;27:591-619.
268. Sung CO, Kim SC, Karnan S, Karube K, Shin HJ, Nam DH, et al. Genomic profiling combined with gene expression profiling in primary central nervous system lymphoma. *Blood*. 2011;117(4):1291-300.
269. Basso K, Dalla-Favera R. Roles of BCL6 in normal and transformed germinal center B cells. *Immunol Rev*. 2012;247(1):172-83.
270. Niu H. The proto-oncogene BCL-6 in normal and malignant B cell development. *Hematol Oncol*. 2002;20(4):155-66.