UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA E QUÍMICA DE SÃO CARLOS

Teoria Cinética de Gases Ideais Quânticos

Claudio Henrique Lepienski

Tese apresentada ao Instituto de
Física e Química de São Carlos,
USP, para obtenção do título de
Doutor em Ciências, Física Básica

Orientador: Prof. Gilberto Medeiros, Kremer

São Carlos - São Paulo

1993

Serviço de Biblioteca e Informação - IFQSC
FÍSICA

100

MEMBROS DA COMISSÃO JULGADORA DA TESE DE DOUTORADO DE CLAUDIO HENRIQUE LEPIENSKI APRESENTADA AO
INSTITUTO DE FÍSICA E QUÍMICA DE SÃO CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, EM 27/04/1993

COMISSÃO JULGADORA:

Prof. Dr. Gilberto Medeiros Krezer

Prof. Dr. Sylvia Goulart Rosa Junior

Prof. Dr. Bernhard Joachim Morross

Prof. Dr. José Pedro Rinc

Prof. Dr. Guillermo Gerardo Cabrera Cyancur

Às minhas eternas inspirações:

Dinair

Claudiane e Alisson

À minha família.

Desejo expressar os meus agradecimentos:

Ao professor Gilberto Medeiros Kremer, por seu idealismo, competência, amizade e paciência para com seus orientados.

Ao grupo de pesquisa "Termodinâmica Fenomenológica e Estatística", do qual faço parte, com especial menção aos professores e amigos Suzana e Alcione.

Aos colegas do Instituto de Física e Química de São Carlos pela companhia agradável no período em que convivemos.

Ao meu irmão Maurício e às demais pessoas que de alguma forma contribuíram para realização deste trabalho.

Às pessoas que digitaram e decifraram letras e fórmulas do manuscrito que compõem esta tese: Jose, Ísis e Emir.

A Deus pela força extra que me guia.

Ao Programa Institucional de Capacitação de Docentes (PICD) e à CAPES pelo apoio financeiro, tornando possível a realização deste trabalho.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 1 - GÁS IDEAL - CONCEITOS E FUNDAMENTOS BÁSICOS	
1.1 Introdução	5
1.2 A colisão	6
1.3 Seção transversal diferencial de choque	10
1.4 A equação de Boltzmann	20
1.5 Equação de transferência	25
1.6 A função de distribuição em equilíbrio	28
1.7 A função de distribuição fora do equilíbrio	30
CAPÍTULO 2 - APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS - POTENCIAL DE ESFERAS RÍGIDAS	
2.1 Introdução	33
2.2 Método alternativo para aproximações sucessivas	34
2.3 Integrais de colisão	38
2.4 Diferenças de fase	41

2.5 Seções transversais de choque	42
2.6 Cálculo numérico das integrais $\Omega^{(l,r)}$	44
2.7 Os coeficientes de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica	47

CAPÍTULO 3 - APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS - POTENCIAL DE LENNARD-JONES

3.1 Introdução	52
3.2 O potencial de Lennard-Jones e seus parâmetros σ e ϵ	53
3.3 Diferenças de fase	54
3.4 Seções transversais de choque	61
3.5 Determinação numérica das integrais $\Omega^{(l,r)}$	68
3.6 Coeficientes de transporte	75

CAPÍTULO 4 - MÉTODO DOS MOMENTOS PARA UM GÁS IDEAL QUÂNTICO

4.1 Introdução	88
4.2 Equação de transferência e a função de distribuição em equilíbrio	89
4.3 Estados de equilíbrio	97
4.4 Degenerescência em gases ideais	102
4.5 Integrais de Bose - Einstein e Fermi - Dirac para degenerescência fraca	103
4.6 Método dos momentos para 13 campos	105
4.6.1 Campos básicos e equações de balanço	105

4.6.2 A função de distribuição	107
4.6.3 Equações constitutivas	110
4.6.4 Equações de campo	110
4.6.5 Coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento	112
4.7 A entropia e o fluxo de entropia	114
CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO	
5.1 Introdução	118
5.2 Análises e Conclusões	119
APÊNDICES	
I Integrais	126
II Inversão de série	129
III Determinação de $\alpha^{(r,s)}$ e $\beta^{(r,s)}$	131
IV Seções transversais de choque de ordem l	137
V Método de Runge-Kutta-Nyström	141
VI Cálculo das integrais $\Omega^{(l,r)}$	1144
VII Termos de produção P_{ij} e Q_i	153
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	163

Lista de figuras e tabelas

Fig. 1.2.1 - Diagrama da colisão binária	8
Fig. 1.3.1 - Seção transversal diferencial de choque	11
Fig. 1.3.2 - Colisão entre partículas idênticas	17
Fig. 1.4.1 - Geometria de uma colisão binária que anula pontos no espaço de fase .	22
Fig. 1.4.2 - Colisão direta e de restituição	24
Fig. 2.4.1 - Diferenças de fase - esfera rígida	41
Fig. 2.5.1 - Seções transversais de choque de ordem l - esfera rígida	43
Tabela I - Características dos gases quânticos	44
Fig. 2.6.1 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ (hélio 4)	46
Tabela II - Integrais $\Omega^{(l,r)}$ para 100 e 300 K	45
Fig. 2.6.2 - Integrais omegas em função da temperatura para l par	47
Fig. 2.7.1 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (hélio 4)	49
Fig. 2.7.2 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (para-hidrogênio)	50
Fig. 2.7.3 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (hélio 3)	50
Fig. 2.7.4 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (orto-hidrogênio)	51
Tabela III - Parâmetros σ e ϵ	54
Fig. 3.3.1 - $\sum_{l\text{par}} (2l + 1) \delta_l \times Z$ (hélio 4)	58

Fig. 3.3.2 - $\sum_l (2l+1)\delta_l \times Z$, l par e l ímpar (hélio 3)	58
Fig. 3.3.3 - $\delta_l \times Z$ (hélio 4)	59
Fig. 3.3.4 - $\delta_l \times Z$ (hélio 3)	59
Fig. 3.3.5 - $\delta_l \times Z$ (hidrogênio)	60
Fig. 3.4.1 - $\left(\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (hélio 3)	62
Fig. 3.4.2 - $\left(\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (hélio 4)	63
Fig. 3.4.3 - $\left(\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (orto-hidrogênio)	64
Fig. 3.4.4 - $\left(\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (para-hidrogênio)	64
Fig. 3.4.5 - Curvas simétricas e antissimétricas fora de fase (hélio 3)	65
Fig. 3.4.6 - Curvas simétricas e antissimétricas em fase (hidrogênio)	65
Fig. 3.4.7 - Reprodução de $Q^{(2)*} \times E^*$ do artigo de Imam-Rahajoe [15]	66
Fig. 3.4.8 - $Q^{(2)*} \times E^*$ (hélio, hidrogênio)	66
Fig. 3.4.9 - Comparação com os resultados de Keller [16] (hélio 3, hélio 4)	67
Fig. 3.4.10 - Comparação com os resultados de Cohen [14] (para e orto-hidrogênio)	67
Fig. 3.5.1 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ - potenciais de esfera rígida e Lennard-Jones (hélio 4)....	68
Fig. 3.5.2 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ ($T=1$ K)	69
Fig. 3.5.3 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ ($T=1$ K) (ordenada não logarítmica)	70
Fig. 3.5.4 - Envoltória das curvas de temperaturas abaixo de 100 K	71
Fig. 3.5.5 - $\Omega^{(2,2)} \times T^*$ (muito baixa temperatura)	72

Fig. 3.5.6 - $\Omega^{(2,2)} \times T^*$ ($0,3 < T^* < 10$)	73
Fig. 3.5.7 - $\Omega^{(4,4)*} \times T^*$ ($0,3 < T^* < 10$)	73
Fig. 3.5.8 - $\Omega^{(6,6)*} \times T^*$	74
Fig. 3.5.9 - $\Omega^{(l,r)*} \times T^*$ (hélio 4)	74
Fig. 3.6.1 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (hélio 4)	77
Fig. 3.6.2 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (hélio 3)	78
Fig. 3.6.3 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (para-hidrogênio)	78
Fig. 3.6.4 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (orto-hidrogênio)	79
Fig. 3.6.5 - Viscosidade do hélio	81
Fig. 3.6.6 - Viscosidade do hélio (resultados teóricos)	82
Fig. 3.6.7 - Viscosidade do hélio (Reproduzida do artigo de Monchick [19])	82
Fig. 3.6.8 - Viscosidade do hélio 4 (ER (5a. aproximação))	83
Fig. 3.6.9 - Condutividade térmica do hélio	83
Fig. 3.6.10 - Viscosidade do hidrogênio (estruturas para e orto)	85
Fig. 3.6.11 - Diferenças na viscosidade (estruturas para e orto)	86
Fig. 3.6.12 - Viscosidade do para-hidrogênio	86
Fig. 3.6.13 - Condutividade térmica do para-hidrogênio	87
Fig. 4.6.1 - $(\kappa_1^* - \kappa_1) \times T$ (hélio 3 e hélio 4)	115

Resumo

O objetivo deste trabalho é a determinação dos coeficientes de viscosidade de cisalhamento e condutividade térmica de gases ideais quânticos. No cálculo dos coeficientes de transporte foram considerados dois aspectos: uma estatística clássica com seções transversais quânticas e uma estatística quântica com seções transversais quânticas. No primeiro caso, é utilizado um método alternativo para a determinação das aproximações sucessivas (até a quinta ordem) para os coeficientes de transporte dos gases hélio 4, hélio 3, para-hidrogênio e orto-hidrogênio. No caso de estatística quântica é desenvolvida uma teoria com base no método dos momentos de Grad e na equação de Uehling-Uhlenbeck, com a finalidade de determinar as expressões algébricas para os coeficientes de transporte. Esta teoria é baseada em 13 momentos, de densidade, velocidade, tensor pressão e fluxo de calor. Do conhecimento da função de distribuição em termos dos momentos, as equações constitutivas são determinadas e os coeficientes de transporte seguem de um método iterativo semelhante ao procedimento Maxwelliano.

Abstract

The aim of this work is the determination of the coefficients of shear viscosity and thermal conductivity of quantum ideal gases. In the calculation of the transport coefficients two aspects have been taken into account: a classical statistical with quantum cross-sections and a quantum statistical with quantum cross-sections. In the first case, an alternative method is used for the determination of the successive approximations (up to the fifth order) to the transport coefficients of the gases helium 4, helium 3, para-hydrogen, ortho-hydrogen. In the case of quantum statistical a theory based on the method of moments of Grad and on the Uehling-Uhlenbeck equation is developed in order to determine the algebraic expressions to the transport coefficients. This theory is based on 13 moments of density, velocity, pressure tensor and heat flux. From the knowledge of the distribution function the constitutive equations are determinate and the transport coefficients follow from an iterative method akin to the Maxwellian procedure.

INTRODUÇÃO

Os resultados apresentados neste trabalho dizem respeito a gases a muito baixas temperaturas. Eles são estendidos desde temperaturas, onde não existem praticamente efeitos quânticos (próximas a 100 K), até temperaturas onde se resente de um número maior de resultados experimentais, e que constituem temperaturas que se aproximam de 0,1 K. No desenvolvimento é ressaltada constantemente a transição e a diferença entre aspectos da teoria clássica e quântica, notoriamente quando se analisa a integral denominada integral de colisão, a qual fornece uma proporcionalidade direta com os coeficientes de transporte aqui calculados. Além de serem mostradas melhorias em relação à ordem de determinação destes coeficientes, reconsiderou-se a equação de Boltzmann que inclui estatísticas quânticas em sua forma, desenvolvendo-se uma teoria sob a visão de outro método que o empregado por Uehling e Uhlenbeck [1]; para tanto tratou-se os gases segundo os modelos de potencial de esferas rígidas e de Lennard-Jones.

A teoria cinética dos gases, quando considera um gás ideal clássico, é baseada na equação fundamental de Boltzmann. Através do tratamento desta equação, chega-se às equações de balanço para grandezas macroscópicas por meio de uma descrição microscópica. Com a determinação das equações constitutivas para o tensor pressão e para o fluxo de calor, e a conseqüente comparação com as leis fenomenológicas da termodinâmica, obtém-se os coeficientes de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica. O primeiro é dado através da proporcionalidade existente entre o deviante do tensor pressão e o deviante do gradiente de velocidade (lei de Navier-Stokes) e o segundo pela proporcionalidade entre o fluxo de calor e o gradiente de temperatura (lei de Fourier).

O trabalho aqui desenvolvido é um estudo voltado à determinação dos coeficientes de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica para um gás ideal a baixas temperaturas, considerando os efeitos de origem quântica na descrição do sistema que representa o gás. As mudanças na equação de Boltzmann em razão da análise do fenômeno quântico podem ter duas causas: a primeira deve-se à consideração da natureza ondulatória das partículas, cujo efeito é chamado de difração; a segunda é devida à introdução de estatísticas quânticas para definir a distribuição das partículas dentro do gás e o efeito é denominado efeito de simetria. A equação que engloba todos esses efeitos, reunindo em sua expressão, as estatísticas clássica de Maxwell-Boltzmann e quânticas de Fermi-Dirac e Bose-Einstein é a chamada equação de Uehling e Uhlenbeck [1]. Nesta equação a distinção entre as estatísticas é determinada por um parâmetro, conforme sejam tratadas as partículas como fermions, bosons ou sujeitas à estatística clássica de distribuição.

Inicialmente (no Capítulo I) é dado destaque às idéias gerais sobre a teoria cinética e ao modelo que configura um gás ideal; são discutidas as alterações necessárias à equação de Boltzmann no sentido de adaptá-la ao tratamento de gases ideais quânticos (entre elas a substituição do vetor velocidade pelo vetor número de onda associado à onda que representa uma partícula). É determinada a expressão da seção transversal diferencial de choque em função, do módulo do número de onda e de diferenças de fase entre uma onda espalhada devido à presença de um potencial e uma onda plana, a qual é característica de ausência de qualquer potencial. Também neste Capítulo apresenta-se como se obtém a função de distribuição em equilíbrio e fora dele para o caso de um gás cujas partículas estão sujeitas à estatística clássica.

Em seguida, o Capítulo II trata dos gases hélio 4, hélio 3, para-hidrogênio e e orto-hidrogênio, modelados segundo um potencial de esfera rígida e supondo a estatística de Maxwell-Boltzmann para a distribuição das velocidades das partículas. Pelo método de aproximações sucessivas os coeficientes de transporte, de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica, são determinados numericamente até a quinta ordem de aproximação. Com este objetivo são calculadas até 15 espécies de integrais denominadas integrais de colisão, e por sua vez, para a determinação destas, seções transversais de

choque de segunda, quarta e sexta ordem. A expressão algébrica envolvendo todas essas seções de ordem par também é encontrada. A convergência para resultados clássicos a altas temperaturas, tanto para as seções transversais de choque como para integrais de colisão, é verificada, bem como gráficos de relações envolvendo a razão entre os dois coeficientes de transporte citados, em mesma aproximação, para diferentes ordens de aproximação.

O Capítulo III também considera os mesmos gases, sujeitos à mesma estatística de distribuição como no Capítulo II. Porém o potencial de interação entre as partículas é modelado por um potencial mais realístico, o de Lennard-Jones. As diferenças de fase, que no caso de potencial de esfera rígida são determinadas através da solução algébrica da equação diferencial de Schrödinger radial, são agora encontradas pela solução numérica desta equação. Esta é realizada em ordem decrescente da distância de separação entre as partículas, quer dizer, da solução assintótica para a nulidade da função de onda, quando esta distância tende a zero, e o potencial portanto ao infinito. Com o auxílio das expressões genéricas das integrais de colisão e das seções transversais de choque encontradas no Capítulo II, os coeficientes de transporte também são determinados em quinta ordem de aproximação. Destina-se este Capítulo às comparações com resultados teóricos, como os de esfera rígida e de Lennard-Jones, em quinta aproximação, com os de outros autores para os mesmos gases, além de comparações com resultados experimentais.

O objetivo do Capítulo IV é o desenvolvimento de uma teoria aplicada a um gás ideal quântico baseada em 13 campos escalares (a densidade (1), a velocidade (3), o tensor pressão (6) e o fluxo de calor (3)) através da utilização do método dos momentos de Grad [2]. Com o tratamento da equação de Uehling e Uhlenbeck [1], a equação de transferência ou de transporte é obtida e assim as equações de balanço para os campos básicos que caracterizam esta teoria. Pela maximização da entropia, considerando como vínculo os 13 campos escalares, a função de distribuição fora do equilíbrio é encontrada e empregada no cálculo dos momentos da função de distribuição e nos termos de colisão das equações de balanço. As expressões algébricas para os coeficientes de transporte são determinadas para o caso de um gás fracamente degenerado com qualquer tipo de potencial. A função de distribuição, assim como a entropia e o fluxo de entropia são encontradas

como funções de integrais relacionados às estatísticas de Fermi-Dirac, Bose-Einstein ou Maxwell-Boltzmann, diferenciadas entre si através de um parâmetro (o mesmo da equação de Uehling e Uhlenbeck).

O Capítulo V é reservado a uma série de análises e conclusões a respeito de todo o trabalho.

CAPÍTULO I

GÁS IDEAL - CONCEITOS E FUNDAMENTOS BÁSICOS

1.1 Introdução

O gás ideal, objeto de estudo deste trabalho, é caracterizado por suas partículas possuírem um fraco potencial atrativo a grandes distâncias, o qual pode ser desprezado em relação às suas energias cinéticas. O modelo aqui utilizado considerará que as partículas que compõem o gás possuem apenas movimento de translação e que a força de interação entre as mesmas é dirigida ao longo da reta que une seus centros. Para gases ideais quânticos, um parâmetro para fenômenos desta natureza, é dado através da razão entre o comprimento de onda de de Broglie, associado às partículas, e as dimensões características ligadas a estas (como o diâmetro, quando se trata de um potencial de esfera rígida). Assim, considerando os gases que são formados por átomos e moléculas, estes fenômenos verificam-se com maior intensidade a baixas temperaturas e para gases formados por partículas de massas muito pequenas. Adaptados a esta exigência serão estudados os gases formados de átomos de hélio (o hélio 4 e o hélio 3) e os gases formados de moléculas de hidrogênio (o para e o orto-hidrogênio) que a baixas temperaturas não excitaram seus níveis de rotação

Inicialmente neste capítulo é mostrada a dinâmica da colisão binária com o objetivo principal da determinação das velocidades pós-colisionais em função das velocidades pré-colisionais. A seguir é evidenciada a diferença entre as seções transversais diferenciais de choque obtidas por metodologia clássica e quântica. A partir daí a equação de Boltzmann é demonstrada e as alterações nesta equação devido a efeitos de difração (natureza ondulatória) e de simetria (estatísticas quânticas) são verificadas. Por final determina-se a função de distribuição que caracteriza um estado de equilíbrio, para um gás cujas moléculas estão sujeitas à estatística clássica, e são apresentados os resumos dos métodos de Chapman-Enskog [3] e de Grad [2], na dedução da função de distribuição para estados próximos do equilíbrio.

1.2 A colisão

Na análise da colisão binária o resultado que interessa é a relação entre as velocidades antes e após a colisão. O tempo de colisão é o intervalo de tempo, durante o qual as forças de interação tem ação efetiva entre as partículas, provocando um desvio da trajetória, que era inicialmente de direção fixa definida para uma trajetória final igualmente de direção fixa definida. Neste intervalo de tempo será suposto que a resultante das forças externas são bem menores que a força de interação entre as moléculas, não interferindo portanto em seu movimento.

Sejam duas partículas de massas iguais a m que participam de uma colisão. Sejam $\mathbf{c}$ e $\mathbf{c}_1$ suas velocidades assintóticas pré-colisionais e $\mathbf{c}'$ e $\mathbf{c}'_1$ suas respectivas velocidades assintóticas pós-colisionais. Desprezando a ação de forças externas a equação de movimento para estas moléculas é:

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla\phi(r) \quad \text{e} \quad m\ddot{\mathbf{x}}_1 = -\nabla_1\phi(r) = \nabla\phi(r), \quad (1.2.1)$$

onde $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}_1$ são os vetores de posição das partículas em relação a um sistema de referência inercial, $\mathbf{r} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}$ é o vetor que posiciona a partícula de índice 1 em relação à partícula

que não tem índice e $\phi(r)$ é o potencial de interação que é função da distância $r = |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}|$ que separa estas duas partículas. Segue das equações (1.2.1) que:

$$\ddot{\mathbf{x}} + \ddot{\mathbf{x}}_1 = 0 \quad (1.2.2)$$

e da integração de (1.2.2) nos limites das velocidades assintóticas iniciais e finais, a conservação do momento linear, que para massas iguais se resume em:

$$\mathbf{c} + \mathbf{c}_1 = \mathbf{c}' + \mathbf{c}'_1. \quad (1.2.3)$$

Subtraindo as duas equações em (1.2.1) obtém-se:

$$\mu \ddot{\mathbf{r}} = -\nabla \phi(r) = -\frac{\partial \phi(r)}{\partial r} \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad (1.2.4)$$

onde $\mu = \frac{m}{2}$ é a massa reduzida, sendo o sistema centrado em uma das partículas. A multiplicação escalar por $\dot{\mathbf{r}}$ e vetorial por $\mathbf{r}$ desta equação fornecem as leis de conservação de energia e de momento angular respectivamente dadas por:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\mu}{2} \dot{r}^2 + \phi(r) \right] = 0 \quad (1.2.5)$$

$$\frac{d}{dt} [\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{r}] = 0. \quad (1.2.6)$$

Sejam então agora as velocidades relativas assintóticas antes e após a colisão:

$$\mathbf{g} = \mathbf{c}_1 - \mathbf{c} \quad \text{e} \quad \mathbf{g}' = \mathbf{c}'_1 - \mathbf{c}'. \quad (1.2.7)$$

Explorando a constância no tempo da expressão entre colchetes em (1.2.5) tem-se que no limite em que o potencial $\phi(r) \rightarrow 0$, as velocidades tendem a $\mathbf{g}$ ou $\mathbf{g}'$, logo, pode-se escrever:

$$\frac{\mu}{2} \dot{r}^2 + \phi(r) = \frac{\mu}{2} g^2 = \frac{\mu}{2} g'^2, \quad (1.2.8)$$

de onde se conclui, que os módulos das velocidades relativas para este problema em discussão, são iguais, isto é:

$$g = g'. \quad (1.2.9)$$

Da equação de conservação do momento angular (1.2.6) chega-se também à conclusão que o movimento de uma partícula em relação à outra pode ser descrito em um plano que é

definido pelo vetor posição $\mathbf{r}$ e pelo vetor velocidade $\dot{\mathbf{r}}$. Observa-se também que nos dois limites em que $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{g}$ e $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{g}'$ (1.2.6) leva à seguinte igualdade:

$$g b = g' b' \quad (1.2.10)$$

onde b e b' representam o produto de r pelo seno do ângulo entre o vetor posição $\mathbf{r}$ e $\mathbf{g}$ ou $\mathbf{g}'$, respectivamente.

De (1.2.10) e de (1.2.9) fica claro que:

$$b = b', \quad (1.2.11)$$

o que significa que os parâmetros de colisão são iguais antes e após a colisão.

Com base nestes argumentos representa-se a Figura 1.2.1 a qual mostra em duas dimensões a colisão binária clássica de duas moléculas que estão sujeitas à ação de uma força central e que não possuem rotação .

Fig. 1.2.1 - Diagrama da colisão binária

Nesta figura $\mathbf{e}$ é um versor definido por:

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{g}' - \mathbf{g}}{|\mathbf{g}' - \mathbf{g}|}, \quad (1.2.12)$$

o qual tem a direção da linha apsidal que contém o ponto A, que representa a partícula fixa, e o ponto B onde ocorre a mínima aproximação ($r = r_{\min}$).

Visto que a linha apsidal é a bissetriz do ângulo formado entre $\mathbf{g}$ e $\mathbf{g}'$, isto representa que:

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{e} = -\mathbf{g}' \cdot \mathbf{e}. \quad (1.2.13)$$

Assim da definição de $\mathbf{e}$ vê-se que $\mathbf{g}$ e $\mathbf{g}'$ diferem por duas vezes da componente na direção de $\mathbf{e}$:

$$\mathbf{g}' - \mathbf{g} = [(\mathbf{g}' - \mathbf{g}) \cdot \mathbf{e}] \mathbf{e} = -2\mathbf{e}(\mathbf{g} \cdot \mathbf{e}), \quad (1.2.14)$$

enquanto que da definição de $\mathbf{g}$ e $\mathbf{g}'$ (1.2.7), da conservação do momento linear (1.2.3) e de (1.2.14), encontra-se para as velocidades finais $(\mathbf{c}', \mathbf{c}'_1)$ em função das iniciais $(\mathbf{c}, \mathbf{c}_1)$:

$$\mathbf{c}' = \mathbf{c} - \mathbf{e}(\mathbf{e} \cdot \mathbf{g}) \quad (1.2.15)$$

$$\mathbf{c}'_1 = \mathbf{c}_1 + \mathbf{e}(\mathbf{e} \cdot \mathbf{g}). \quad (1.2.16)$$

O ângulo de espalhamento descrito por χ na Figura 1.2.1 pode ser obtido através de (1.2.8):

$$\frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + \phi(r) = \frac{\mu}{2} g^2, \quad (1.2.17)$$

Considerando $\dot{\mathbf{r}}$ escrito em função das componentes radial e tangencial de versores ξ e $\mathbf{t}$, respectivamente:

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\xi + r\dot{\varphi}\mathbf{t}, \quad (1.2.18)$$

e através de (1.2.6) (conservação do momento linear):

$$r^2 \dot{\varphi} = b g. \quad (1.2.19)$$

Assim, para a determinação de χ , em primeiro lugar divide-se (1.2.17) por $\frac{\mu}{2} g^2$ e em seguida substitui-se o valor de $g = \frac{r^2 \dot{\varphi}}{b}$ nos dois primeiros termos da expressão assim obtida. Em termos da variável $s = b/r$, fica:

$$\left(\frac{ds}{d\varphi} \right)^2 = 1 - s^2 - \frac{2\phi(b/s)}{\mu g^2}. \quad (1.2.20)$$

Os limites de integração para φ e s em (1.2.20) são:

$$s \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty) \quad \varphi \rightarrow 0$$

$$s = s_{\max} \quad (r = r_{\min}) \quad \varphi = \theta$$

Da integração nestes limites de (1.2.20) e da observação que pela Figura 1.2.1 o ângulo de espalhamento $\chi = \pi - 2\theta$, tem-se:

$$\chi = \pi - 2 \int_0^{s_{\max}} \left[1 - s^2 - \frac{2\phi(b/s)}{\mu g^2} \right]^{-\frac{1}{2}} ds, \quad (1.2.21)$$

onde $s_{\max}$ é a raiz positiva da equação (1.2.20) para $\frac{ds}{d\varphi} = 0$.

1.3 Seção transversal diferencial de choque

Na mecânica clássica a seção transversal diferencial de choque é definida como a razão entre o número de partículas espalhadas por unidade de ângulo sólido e por unidade de tempo e o correspondente número de partículas por unidade de área e por unidade de tempo (fluxo de partículas incidentes). Considerando (veja a Figura 1.3.1) que a área infinitesimal de incidência é dada pelo produto $b d\varepsilon db$, onde b é o parâmetro de impacto e ε é o ângulo azimutal de espalhamento, encontra-se:

$$\alpha(\chi, g) = \frac{N/(\Delta t d\Omega)}{N/(\Delta t b db d\varepsilon)} = \frac{b db d\varepsilon}{d\Omega}. \quad (1.3.1)$$

Visto que $d\Omega = \sin \chi d\chi d\varepsilon$, (1.3.1) fica:

$$\alpha(\chi, g) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right| \quad (1.3.2)$$

mostrando que a seção diferencial de choque clássica é obtida a partir do conhecimento do ângulo χ que é dado por (1.2.21).

A transição entre a mecânica clássica e a mecânica quântica no problema de colisão é feita levando-se em conta o comportamento dualístico onda-partícula. Assim a uma partícula que se movimenta com uma velocidade $\mathbf{g}$ em relação a outra sem que esta sofra qualquer desvio devido ao potencial de interação, associa-se um vetor número de onda $\mathbf{k}$

Fig. 1.3.1 - Seção transversal diferencial de choque

que representa a direção desta onda incidente. Esta é representada pela função de onda plana:

$$\varphi_i = e^{ik \cdot r}, \quad (1.3.3)$$

a qual é solução da equação de Schrödinger na ausência de potencial. A relação entre k e g é dada por:

$$k = \frac{\mu}{\hbar} g. \quad (1.3.4)$$

Longe do centro de espalhamento a função de onda assintótica é descrita por:

$$\varphi = e^{ik \cdot r} + f_k(\chi) \frac{e^{ikr}}{r}, \quad (1.3.5)$$

a qual é uma composição da função de onda plana que não sofre perturbação e a função de onda esférica que representa a parte espalhada (refletida), onde $f_k(\chi)$ é a amplitude desta onda emergente do centro de força.

Quanto-mecanicamente exprime-se a seção transversal diferencial de choque através da proporcionalidade com a razão das densidades de corrente de probabilidade da onda espalhada e da onda incidente. A partir da definição desta densidade:

$$S(r, t) = \Re \left(\psi^* \frac{\hbar}{i\mu} \nabla \psi \right), \quad (1.3.6)$$

onde ψ^* é o complexo conjugado de ψ . O equivalente quântico ao fluxo incidente de partículas com velocidade relativa g é:

$$S_I = \frac{\hbar k}{\mu}. \quad (1.3.7)$$

Este resultado vem da substituição de $\psi = e^{ik \cdot r}$ em (1.3.6).

O equivalente quântico ao número de partículas que são refletidas radialmente por unidade de ângulo sólido e por unidade de tempo, é obtido da parte espalhada da função de onda assintótica (1.3.5), resultando em:

$$r^2 S_R = \frac{\hbar k}{\mu} |f_k(\chi)|^2. \quad (1.3.8)$$

Da divisão de (1.3.8) por (1.3.7), tem-se portanto:

$$\alpha(\chi, k) = |f_k(\chi)|^2 \quad (1.3.9)$$

que é a expressão que permite o cálculo da seção transversal diferencial de choque através do conhecimento da amplitude da onda espalhada.

A determinação de $f_k(\chi)$ pode ser feita através do método de ondas parciais. Para tanto é necessário analisar a solução da equação de onda de Schrödinger para o problema de força central no caso em que o potencial é nulo para todo r e no caso em que o potencial não é nulo mas r é muito grande.

A equação de onda de Schrödinger para o problema de força central é

$$H\psi = (T + V(r))\psi = E\psi, \quad (1.3.10)$$

onde H é o operador Hamiltoniano, $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}$ é a energia total e T é o operador energia cinética

$$T = \frac{p^2}{2\mu} = \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \quad (1.3.11)$$

$p = \frac{\hbar}{i} \nabla$ é o operador momento linear e L^2 representa o operador momento angular:

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin^2 \chi} \frac{\partial^2}{\partial \varepsilon^2} + \frac{1}{\sin \chi} \frac{\partial}{\partial \chi} \left(\sin \chi \frac{\partial}{\partial \chi} \right) \right]. \quad (1.3.12)$$

Visto que os operadores L^2 e H comutam (isto é equivalente a dizer que o momento angular é uma constante do movimento) e além disso, que ψ é simultaneamente uma auto função de L^2 e H , obtém-se

$$L^2 \psi = \nu \hbar^2 \psi \quad (1.3.13)$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\nu \hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right] \psi = E\psi. \quad (1.3.14)$$

A solução pode ser escrita como um produto de funções de coordenadas esféricas r , ε e χ , ou devido a simetria azimutal em função de r e χ :

$$\psi = R(r)\Theta(\chi). \quad (1.3.15)$$

Substituindo (1.3.15) em (1.3.13) e observando (1.3.12) obtém-se:

$$\frac{1}{\sin \chi} \frac{\partial}{\partial \chi} \left(\sin \chi \frac{\partial}{\partial \chi} \right) \Theta(\chi) + \nu \Theta(\chi) = 0. \quad (1.3.16)$$

Fazendo-se $\xi = \cos \chi$, a função $\Theta(\chi)$ se torna uma função de ξ de tal forma que:

$$\frac{d}{d\xi} \left[(1 - \xi^2) \frac{d\Theta(\xi)}{d\xi} \right] + \nu \Theta(\xi) = 0. \quad (1.3.17)$$

A solução é $\Theta = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j$ e a relação de recorrência obtida da substituição de $\Theta(\xi)$ em (1.3.17) fornece:

$$a_{j+2} = \frac{[j(j+1) - \nu]}{(j+1)(j+2)} a_j. \quad (1.3.18)$$

Se ν for trocado por $l(l+1)$ as soluções reduzem-se aos polinômios de Legendre e desaparece o problema da divergência para $|\xi| = 1$ ($\chi = 0$ ou π). A solução por conseguinte é :

$$\Theta(\xi) = P_l(\cos \xi). \quad (1.3.19)$$

Considerando o caso particular em que $V(r) = 0$ a equação espacial de Schrödinger para uma partícula livre é:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + k^2 \psi = 0 \quad (1.3.20)$$

e a solução como é conhecida é a função de onda plana e^{ikz} (onde $z = r \cos \chi$), que em termos de funções de χ e de r pode ser escrita:

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(\cos \chi) R_l(r). \quad (1.3.21)$$

Multiplicando ambos os membros desta equação por $P_m(\cos \chi)$ e integrando na variável $t = \cos \chi$ nos limites desta variável (-1 e 1), segue:

$$\int_{-1}^{+1} P_m(t) e^{ikr t} dt = A_l \int_{-1}^{+1} P_m(t) P_l(t) R_l(r) dt. \quad (1.3.22)$$

Isto fornece, devido a ortogonalidade dos polinômios de Legendre,

$$\left[P_l(t) \frac{1}{ikr} e^{ikr t} \right]_{-1}^{+1} - \frac{1}{ikr} \int_{-1}^{+1} e^{ikr t} P_l'(t) dt = \frac{2}{2l+1} A_l R_l(r). \quad (1.3.23)$$

A linha representa derivada em relação a t e da qual é possível concluir que $A_l = (2l+1)i^l$ e que $R_l(r)$ são funções de Bessel de ordem l na variável kr . Resumindo:

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l P_l(\cos \chi) j_l(kr) \quad (1.3.24)$$

onde

$$j_l(kr) = (kr)^l \left(-\frac{1}{kr} \frac{d}{d(kr)} \right)^l j_0(kr), \quad (1.3.25)$$

com $j_0(kr) = \frac{\sin kr}{kr}$. De (1.3.23) ou da expressões tabeladas destas funções, tem-se para a solução assintótica:

$$e^{ikz} \approx \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)i^l P_l(\cos \chi) \frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr}. \quad (1.3.26)$$

Para a equação de onda em que o potencial $V(r)$ é diferente de zero, colocando-se $R_l(r) = r^{-1} G_l(r)$ em (1.3.14) e substituindo-se em (1.3.14), tem-se:

$$\frac{d^2 G_l(r)}{dr^2} + \left[k^2 - U(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] G_l(r) = 0, \quad (1.3.27)$$

onde $U(r) = \frac{2\mu}{\hbar^2} V(r)$.

Para r grande:

$$U(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \rightarrow 0. \quad (1.3.28)$$

$G_l(r)$ deverá ter a forma assintótica:

$$G_l \sim A \sin(kr + \epsilon). \quad A, \epsilon \text{ constantes.} \quad (1.3.29)$$

Para testar que isto é verdadeiro, supõe-se a solução :

$$G_l(r) = u(r) e^{ikr}. \quad (1.3.30)$$

Substituindo agora em (1.3.25) encontra-se:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} + 2ik \frac{du(r)}{dr} - \left[U(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u(r) = 0. \quad (1.3.31)$$

Como $u(r)$ é aproximadamente constante para r grande:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} \ll k \frac{du(r)}{dr} \quad (1.3.32)$$

e assim:

$$2ik \ln u(r) = \int^r \left(U(r) + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) dr. \quad (1.3.33)$$

Percebe-se que o lado direito desta equação tenderá a uma constante, se $U(r)$ tender a zero mais rápido que $1/r$, o que proporciona a solução logarítmica para a integral.

A solução particular, para potenciais que obedeçam esta condição deverá ter a forma assintótica:

$$R_l(r) \sim Cr^{-1} \sin(kr - 1/2l\pi + \delta_l) \quad (1.3.34)$$

onde C é uma constante e δ_l representa a diferença de fase em relação a função de onda plana.

A solução geral toma a forma:

$$\psi = \sum_{l=0} B_l P_l(\cos \chi) R_l(r) \quad (1.3.35)$$

Subtraindo (1.3.24) (função de onda plana) de (1.3.35) e considerando (1.3.5) que dá a forma da função de onda na presença de potencial de interação pode-se escrever para as expressões assintóticas para todo l :

$$B_l R_l(r) - (2l+1)^l i j_l(kr) \sim C_l r^{-1} e^{ikr} \quad (1.3.36)$$

Tomando $R_l(r)$ de (1.3.34) e $j_e(r)$ assintótico como em (1.3.26), no lado esquerdo de (1.3.36), surge para este lado da equação :

$$(kr)^{-1} \left\{ e^{i(kr - \frac{1}{2}l\pi)} [B_l^* e^{i\delta_l} - (2l+1)i^l] - e^{-i(kr - \frac{1}{2}l\pi)} [B_l^* e^{-i\delta_l} - (2l+1)i^l] \right\} \quad (1.3.37)$$

onde B_l^* é diferente de B_l em razão da constante que aparece na expressão de $R_l(r)$.

Da comparação com o lado direito de (1.3.36) pode-se ver que o segundo termo entre colchetes é nulo, fornecendo:

$$B_l^* = (2l+1)i^l e^{i\delta_l} \quad (1.3.38)$$

Com isso a parte que resta em (1.3.37) pode ser comparada com a parte da onda espalhada em (1.3.5), da qual se conclui que:

$$f_k(\chi) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [e^{2i\delta_l} - 1] P_l(\cos \chi), \quad (1.3.39)$$

como consequência de (1.3.9) a seção transversal diferencial de choque tem como resultado final:

$$\alpha(k, \chi) = \frac{1}{4k^2} \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [e^{2i\delta_l} - 1] P_l(\cos \chi) \right|^2 \quad (1.3.40)$$

Quando as partículas não podem ser distinguidas, a colisão pode ser representada graficamente através de duas formas, conforme na Figura 1.3.3.

Fig. 1.3.2 - Colisão entre partículas idênticas

A função de onda associada a estas partículas pode ser simétrica ou antissimétrica em relação à troca entre elas. Sua forma assintótica pode ser representada por:

$$\psi \rightarrow e^{ikz} \pm e^{-ikz} + \frac{1}{r} e^{ikr} [f_k(\chi) \pm f_k(\pi - \chi)] \quad , \quad (1.3.41)$$

resultando para a amplitude da onda espalhada:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}[f_k(\chi) \pm f_k(\pi - \chi)] \quad (1.3.42)$$

Os sinais + e - correspondem à função de onda simétrica ou antissimétrica e o termo $\sqrt{2}$ resulta de nova normalização da função de onda. Como $P_l(\cos \chi) = (-1)^l P_l(-\cos \chi)$ chega-se para as expressões simétricas e antissimétricas de $\alpha(\chi, k)$ a:

$$\alpha^S = \frac{1}{2k^2} \left| \sum_{l \text{ par}}^{\infty} (e^{2i\delta_l} - 1)(2l + 1)P_l(\cos \chi) \right|^2 \quad (1.3.43)$$

$$\alpha^A = \frac{1}{2k^2} \left| \sum_{l \text{ impar}}^{\infty} (e^{2i\delta_l} - 1)(2l + 1)P_l(\cos \chi) \right|^2, \quad (1.3.44)$$

que são expressões que não levam em conta o spin, isto é, consideram o spin nulo para as partículas.

O efeito de spin de duas partículas faz com que a função de onda total seja escrita:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, s_1, s_2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(s_1, s_2) \quad (1.3.45)$$

sendo que $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ e s_1, s_2 são as coordenadas de posição e de spin das partículas 1 e 2 respectivamente (considera-se que as partículas não alteram as coordenadas de spin após a colisão). No caso geral ($-s \leq \frac{s_1}{s_2} \leq s$) existindo assim $(2s + 1)$ autofunções associadas ao spin para uma partícula e portanto $(2s + 1)^2$ funções de spin independentes associadas ao par, o qual é descrito pela função de onda de spin:

$$\chi(s_1, s_2) = \chi_1(s_1)\chi_2(s_2) \quad (1.3.46)$$

Sejam três classes que representam combinações linearmente independentes simétricas e antissimétricas de funções de onda de spin:

$$1) \chi_1(s_1)\chi_2(s_2); \quad s_1 = s_2; \quad (2s + 1) \text{ estados simétricos}$$

$$\begin{aligned}
2) \quad & \chi_1(s_1)\chi_2(s_2) + \chi_1(s_2)\chi_2(s_1); \quad s_1 \neq s_2; \quad s(2s+1) \text{ estados simétricos} \\
3) \quad & \chi_1(s_1)\chi_2(s_2) - \chi_1(s_2)\chi_2(s_1); \quad s_1 = s_2; \quad s(2s+1) \text{ estados antissimétricos}
\end{aligned}
\tag{1.3.47}$$

Assim, para $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, s_1, s_2)$, pode-se ter as seguintes possibilidades:

$$1^\circ) \quad \Psi \text{ é simétrica } \begin{cases} \psi^S(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^S(s_1, s_2) \rightarrow (s+1)(2s+1) \text{ estados} \\ \psi^A(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^A(s_1, s_2) \rightarrow s(2s+1) \text{ estados} \end{cases}
\tag{1.3.48}$$

$$2^\circ) \quad \Psi \text{ é antissimétrica } \begin{cases} \psi^S(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^A(s_1, s_2) \rightarrow s(2s+1) \text{ estados} \\ \psi^A(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi^S(s_1, s_2) \rightarrow (s+1)(2s+1) \text{ estados} \end{cases}
\tag{1.3.49}$$

Disto, chega-se a conclusão que no caso de partículas de spin s que seguem a estatística de Bose-Einstein (Ψ é simétrica) ou Fermi-Dirac (Ψ antissimétrica) a seção transversal diferencial de choque é alterada em relação a (1.3.40), resultando numa combinação linear das expressões simétricas (1.3.43) e antissimétrica (1.3.44) para spin zero, conforme as seguintes equações:

$$[\alpha^{(s)}(k, \chi)]_{B-E} = \left[\frac{s+1}{2s+1} \right] \alpha_{B-E}^{(0)} + \left[\frac{s}{2s+1} \right] \alpha_{F-D}^{(0)}
\tag{1.3.50}$$

$$[\alpha^{(s)}(k, \chi)]_{F-D} = \left[\frac{s+1}{2s+1} \right] \alpha_{F-D}^{(0)} + \left[\frac{s}{2s+1} \right] \alpha_{B-E}^{(0)}
\tag{1.3.51}$$

Com as frações sendo razões do número de estados existentes segundo as situações dadas por (1.3.48) e (1.3.49) e o número de estados possíveis total $(2s+1)^2$.

1.4 A equação de Boltzmann

Em teoria cinética, as partículas que compõem um gás são consideradas distribuídas em cada instante t em elementos de volume do espaço de fase hexadimensional μ definido por $\mathbf{x}$ e $\mathbf{c}$, onde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ é o vetor posição da partícula, $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ é o vetor velocidade associada a esta e $d\mathbf{x}d\mathbf{c}$ é o volume de tal elemento. A função que caracteriza o estado de um gás neste espaço é definida por $f(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ tal que:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)d\mathbf{x}d\mathbf{c} \quad (1.4.1)$$

fornece o número de partículas deste gás que se encontram em posições entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x} + d\mathbf{x}$ com velocidades entre $\mathbf{c}$ e $\mathbf{c} + d\mathbf{c}$ no instante t .

Se estas partículas estão sujeitas à ação da resultante de forças externas (por exemplo a força externa específica $\mathbf{F}$) uma partícula genérica que se encontra no instante t na posição $(\mathbf{x}, \mathbf{c})$, que não sofra nenhuma colisão durante um intervalo de tempo Δt a seguir, após este intervalo, terá velocidade $\mathbf{c} + \mathbf{F}\Delta t$ e posição $\mathbf{x} + \mathbf{c}\Delta t$. Naturalmente:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{c}\Delta t, \mathbf{c} + \mathbf{F}\Delta t, t + \Delta t)d\mathbf{x}d\mathbf{c} \quad (1.4.2)$$

dá o número de partículas em posições entre $\mathbf{x} + \mathbf{c}\Delta t$ e $\mathbf{x} + \mathbf{c}\Delta t + d\mathbf{x}$ com velocidades $\mathbf{c} + \mathbf{F}\Delta t$ e $\mathbf{c} + \mathbf{F}\Delta t + d\mathbf{c}$ no instante $t + \Delta t$.

A diferença entre (1.4.1) e (1.4.2) será nula no caso de ausências de colisões e proporcional ao volume do elemento do espaço de fase, no caso destas existirem. Escrevendo-se:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{c}\Delta t, \mathbf{c} + \mathbf{F}\Delta t, t + \Delta t)d\mathbf{x}d\mathbf{c} - f(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)d\mathbf{x}d\mathbf{c} = \tau d\mathbf{x}d\mathbf{c}\Delta t \quad (1.4.3)$$

com τ significando a taxa de variação na função de distribuição devido às colisões. Dividindo-se por $d\mathbf{x}d\mathbf{c}\Delta t$ e levando-a ao limite de Δt tendendo a zero, chega-se a:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} = \tau, \quad (1.4.4)$$

onde f é a maneira abreviada de se escrever $f(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ e c_i, x_i e F_i com $i = 1, 2, 3$ são as componentes do vetor velocidade, de posição e da força externa específica, respectivamente. As hipóteses que simplificam o cálculo de τ e que demonstram o limite de validade da equação de evolução da função de distribuição (1.4.4), são como segue:

- a) somente são consideradas colisões binárias entre as partículas;
- b) as forças de ação e reação são bem maiores que as forças externas que agem sobre estas durante a colisão;
- c) existe pequena variação da função de distribuição tanto no intervalo de tempo necessário para que a colisão se concretize, quanto ao longo da distância de ação das forças entre as partículas;
- d) não existe correlação entre as velocidades em tempos distintos em uma determinada posição $\mathbf{x}$ para uma partícula (suposição do caos molecular).

Visto que $\tau d\mathbf{x} d\mathbf{c} \Delta t$ dá a diferença entre o número de partículas que saíram do elemento de volume $d\mathbf{x} d\mathbf{c}$ (destruição de pontos de fase) e o número de partículas que entraram neste elemento de volume (criação de pontos de fase) no intervalo de tempo Δt , τ pode ser calculado através da diferença entre o número de colisões que destroem e criam pontos de fase em $d\mathbf{x} d\mathbf{c}$ no intervalo de tempo Δt . Considerando que $\mathbf{c}_1$ representa a velocidade das partículas que colidem com partículas com velocidade $\mathbf{c}$, o número de tais colisões que destroem pontos de fase no espaço μ é dado pelo produto do número de partículas no elemento de volume $g b db d\epsilon dc_1 \Delta t$ (veja Fig. 1.4.1) e o número de partículas em $d\mathbf{x} d\mathbf{c}$. Este número portanto é:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{c}_1, t) f(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t) g b db d\epsilon dc_1 d\mathbf{x} d\mathbf{c} \Delta t \quad (1.4.5)$$

Para encontrar a taxa de densidade do número total de colisões que anulam pontos no espaço de fase com velocidade $\mathbf{c}$ no elemento de volume $d\mathbf{x}d\mathbf{c}$, divide-se (1.4.5) por $d\mathbf{x}d\mathbf{c}\Delta t$ e integra-se em todas as componentes de velocidade $\mathbf{c}_1$ de $-\infty$ a $+\infty$, no ângulo azimutal ε de 0 a 2π e sobre todos os parâmetros de impacto b de 0 a $+\infty$; o que fornece para esta taxa:

$$\tau^- = \int f f_1 g b d\varepsilon d\mathbf{c}_1, \quad (1.4.6)$$

onde f e f_1 são funções abreviadas de $f(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ e $f(\mathbf{x}, \mathbf{c}_1, t)$.

Fig. 1.4.1 - Geometria de uma colisão binária que anula pontos no espaço de fase

A colisão inversa, ou de restituição, consiste no encontro de duas partículas sob certas condições tal que as velocidades relativas iniciais sejam agora dadas por $\mathbf{g}' = \mathbf{c}'_1 - \mathbf{c}'$ e as finais por $\mathbf{g} = \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}$. A Figura 1.4.2 exemplifica esta questão. Desta figura vê-se que estas condições são satisfeitas se:

$$\varepsilon' = \pi + \varepsilon, \quad \mathbf{e}' = -\mathbf{e} \quad \text{e} \quad b' = b \quad (1.4.7)$$

Estas são colisões que criam pontos de fase no elemento de volume $dxdc$. Assim com raciocínio análogo ao de destruição de pontos de fase encontra-se para o número de colisões de partículas com velocidades $\mathbf{c}'_1$ e $\mathbf{c}'$ que levam a velocidades $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}$, o seguinte valor:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{c}', t) f(\mathbf{x}, \mathbf{c}'_1, t) g' b db d\varepsilon d\mathbf{c}'_1 d\mathbf{x} d\mathbf{c}' \Delta t \quad (1.4.8)$$

De (1.2.9) tem-se que $g' = g$, enquanto que o Jacobiano de transformações de velocidades, cujas velocidades são dadas por (1.2.15) e (1.2.16) é unitário, significando que:

$$d\mathbf{c}'_1 d\mathbf{c}' = d\mathbf{c}_1 d\mathbf{c}$$

Voltando-se com estas considerações em (1.4.7) e dividindo-a por $dxdc\Delta t$, obtém-se a seguinte expressão para a taxa por unidade de volume de fase do número total de colisões que criam pontos no espaço de fase com velocidade $\mathbf{c}$ no elemento de volume $dxdc$:

$$\tau^+ = \int f'_1 f' g b db d\varepsilon d\mathbf{c}_1 \quad (1.4.9)$$

onde: $f' = f(\mathbf{x}, \mathbf{c}', t)$ e $f'_1 = f(\mathbf{x}, \mathbf{c}'_1, t)$.

De (1.4.6) e (1.4.9) e do significado de $\tau = \tau^+ - \tau^-$, a equação (1.4.4) toma a forma:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} = \int (f'_1 f' - f f_1) g b db d\varepsilon d\mathbf{c}_1 \quad (1.4.10)$$

a qual é a equação fundamental de Boltzmann clássica obtida pela suposição do número de colisões.

As modificações na equação (1.4.10) para atender ao caso quântico são devidas a efeitos que podem ser classificados em dois tipos:

a) efeito de difração ,

Fig. 1.4.2 - Colisão direta e de restituição

b) efeito de simetria.

O primeiro deve-se a natureza ondulatória do sistema que interage. O segundo diz respeito às estatísticas quânticas a que estão sujeitas estas partículas. O efeito de simetria é principalmente importante a muito baixas temperaturas, e o efeito de difração é estendido a temperaturas mais altas, mas ainda no limite de baixas temperaturas. A magnitude do comprimento de onda de De Broglie, $\lambda_{dB} = \frac{h}{p}$ ($p = \mu g$ é o momento linear da partícula) deve ser da ordem do diâmetro desta para que o efeito de difração se torne importante e da ordem da distância média entre as partículas para que se leve em conta o efeito de simetria [4].

Em termos de alteração na equação (1.4.10), ao se considerar o efeito de difração, deve-se substituir segundo (1.3.1):

$$b d b d \varepsilon = \alpha(\chi, g) d\Omega = \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\varepsilon \quad (1.4.11)$$

e considerar $\alpha(\chi, g)$ dada por sua expressão quântica (1.3.9):

$$\alpha(\chi, g) = |f_k(\chi)|^2, \quad (1.4.12)$$

devendo-se lembrar que g é diretamente proporcional a k (eq.1.3.4).

A equação modificada de Boltzmann que inclui os efeitos de simetria devido às estatísticas quânticas, isto é, ou de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac e ainda engloba a estatística clássica de Maxwell Boltzmann é devida a Uehling e Uhlenbeck [1] e pode ser escrita na forma geral:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} = \int [f'_1 f' (1 + \epsilon f/A)(1 + \epsilon f_1/A) \\ - f_1 f (1 + \epsilon f'/A)(1 + \epsilon f'_1/A)] g \alpha(g, \chi) \sin \chi d\chi d\epsilon dc_1 \end{aligned} \quad (1.4.13)$$

O uso de $\epsilon = +1, -1$ ou 0 significam soluções respectivamente para as estatísticas de Bose-Einstein, Fermi-Dirac e Maxwell-Boltzmann. $A = \omega(\frac{m}{h})^3$ é a densidade de número de estados no espaço de fase e $\omega = 2s+1$ é o peso estatístico que dá o número de possibilidades de ocupação de um estado quântico relacionado ao número de spin. A razão f/A é igual ao número de partículas que se encontram no elemento de volume do espaço de fase ($f dx dc$) dividido pelo número de estados possíveis de serem ocupados neste elemento ($A dx dc$). Torna-se claro no caso de fermions, que se a colisão ocorrer no sentido de criar um ponto de fase em um estado totalmente preenchido ($f'/A = 1$), o princípio de exclusão de Pauli impede esta possibilidade. Isto é manifestado matematicamente através da nulidade do fator $(1 + \epsilon f'/A)$. No caso de bosons ($\epsilon = +1$), em que qualquer estado pode ser preenchido por um número qualquer de partículas (contrário ao caso de fermions em que se verifica uma aparente repulsão), existe uma aparente atração favorecendo a inclusão de mais uma partícula neste estado.

As funções de distribuição em equilíbrio e fora do equilíbrio para a estatística clássica são demonstradas nas Seções 1.6 e 1.7 deste capítulo, enquanto a obtenção destas, considerando também estatísticas quânticas, são apresentadas no Capítulo IV.

1.5 Equação de transferência

Seja uma função arbitrária $Z(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ a qual é multiplicada pela equação de Boltzmann

(1.4.10) e integrada sobre todas as velocidades $\mathbf{c}$. Do produto de Z pelo lado esquerdo desta equação resulta:

$$\begin{aligned} \int \frac{\partial f}{\partial t} Z d\mathbf{c} + \int c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} Z d\mathbf{c} + \int F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} Z d\mathbf{c} &= \frac{\partial}{\partial t} \int Z f d\mathbf{c} + \frac{\partial}{\partial x_i} \int Z c_i f d\mathbf{c} \\ &- \int \left[\frac{\partial Z}{\partial t} + c_i \frac{\partial Z}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial Z}{\partial c_i} \right] f d\mathbf{c}, \end{aligned} \quad (1.5.1)$$

em cuja equação considerou-se que as coordenadas t, x_i e c_i para $i = 1, 2, 3$ são mutuamente independentes. A integral que não aparece em (1.5.1):

$$\int \frac{\partial(Z F_i f)}{\partial c_i} d\mathbf{c} = \oint Z F_i f s_i ds \quad (1.5.2)$$

é nula por motivos da aplicação do teorema da divergência e em razão da função de distribuição tender a zero para velocidades muito grandes (nesta equação s_i é o vetor unitário de um elemento de área ds de uma superfície, no espaço das velocidades, localizada no infinito).

O produto de Z pelo lado direito de (1.4.10) leva a:

$$\begin{aligned} \int Z(f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon dc_1 d\mathbf{c} &= \int Z(f'_1 f' - f_1 f) g' b' db' d\varepsilon' dc'_1 d\mathbf{c}' \\ &= \int Z'(f_1 f - f'_1 f') g b db d\varepsilon dc_1 d\mathbf{c} = \frac{1}{2} \int (Z - Z')(f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon d\mathbf{c} dc_1, \end{aligned} \quad (1.5.3)$$

as quais são resultantes das equações válidas para a colisão de restituição :

$$g' = g, \quad d\varepsilon' = d\varepsilon, \quad b' = b, \quad dc'_1 d\mathbf{c}' = dc_1 d\mathbf{c}, \quad (1.5.4)$$

seguido da troca das velocidades $(\mathbf{c}, c_1)$ por $(\mathbf{c}', c'_1)$.

Semelhantemente, da troca da função das moléculas que colidem, ou seja, $(\mathbf{c}, \mathbf{c}')$ por $(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}'_1)$ tem-se:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \int (Z - Z')(f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon dc_1 dc &= \frac{1}{2} \int (Z_1 - Z'_1)(f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon dc_1 dc \\
&= \frac{1}{4} \int (Z_1 + Z - Z'_1 - Z')(f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon dc_1 dc
\end{aligned} \tag{1.5.5}$$

Como resultado final a equação de transferência é escrita:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t} \int Z f dc + \frac{\partial}{\partial x_1} \int Z c_1 f dc - \int \left[\frac{\partial Z}{\partial t} + c_i \frac{\partial Z}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial Z}{\partial c_i} \right] f dc \\
= \frac{1}{4} \int (Z_1 + Z - Z'_1 - Z')(f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon dc_1 dc
\end{aligned} \tag{1.5.6}$$

É fácil de ver que outra forma para o termo de colisão pode ser:

$$\int (Z' - Z) f_1 f g b db d\varepsilon dc_1 dc \tag{1.5.7}$$

Como antes, em todas as expressões $Z = Z(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ e Z' , Z_1 e Z'_1 tem as formas abreviadas como as da função de distribuição .

Se Z representa a massa m , a velocidade c_i ou a energia cinética $\frac{1}{2} m c^2$, o termo em (1.5.6) devido às colisões será nulo em razão da lei de conservação da massa, do momento linear e da energia cinética, respectivamente. Assim uma expressão para Z que seja combinação linear destas grandezas, isto é:

$$Z = \alpha + \beta_i c_i + \gamma c^2, \tag{1.5.8}$$

α , β_i e γ funções que não dependem da velocidade, constitui um invariante de soma, o qual se traduz por:

$$Z + Z_1 = Z' + Z'_1. \tag{1.5.9}$$

1.6 A função de distribuição em equilíbrio

Fazendo-se $Z = \ln f$ na equação de transferência (1.5.6) obtém-se:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int (f \ln f) d\mathbf{c} + \frac{\partial}{\partial x_i} \int (f \ln f) c_i d\mathbf{c} - \int \left[\frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} \right] d\mathbf{c} \\ = \frac{1}{4} \int \ln \frac{ff_1}{f'f'_1} (f'_1 f' - f_1 f) g b db d\varepsilon d\mathbf{c}_1 d\mathbf{c} \end{aligned} \quad (1.6.1)$$

na qual o terceiro termo é nulo pois este integrando é igual ao termo de colisão na equação de Boltzmann (1.4.10). *

A expressão:

$$(f'f'_1 - ff_1) \ln \frac{ff_1}{f'f'_1} \quad (1.6.2)$$

é sempre menor ou igual a zero, sendo nula quando:

$$\ln f + \ln f_1 = \ln f' + \ln f'_1 \quad (1.6.3)$$

o que significa dizer que $Z = \ln f$ é um invariante de soma e conforme (1.5.8):

$$\ln f = \alpha + \beta \cdot \mathbf{c} + \gamma c^2 \quad (1.6.4)$$

ou numa forma mais apropriada:

* É o mesmo que escrever utilizando (1.5.7):

$$\int Z(f'f'_1 - f_1 f) g b db d\varepsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 = \int [Z' - Z] f_1 f g b db d\varepsilon d\mathbf{c}_1 d\mathbf{c}$$

com $Z = 1$.

$$f = a e^{-b(\mathbf{c}-\mathbf{u})^2} \quad (1.6.5)$$

onde foi considerado:

$$\alpha = \ln a - bu^2, \quad \beta = 2bu \quad \text{e} \quad \gamma = -b \quad (1.6.6)$$

Sejam as definições das grandezas macroscópicas locais:

$$\rho = \int m f d\mathbf{c} \quad (\text{densidade de massa}) \quad (1.6.7)$$

$$\rho v_i = \int m c_i f d\mathbf{c} \quad (\text{densidade de momento linear}) \quad (1.6.8)$$

$$T = \frac{m}{k\rho} p = \frac{2m}{3k} u = \frac{2m}{3k\rho} \int \frac{m}{2} C^2 f d\mathbf{c} \quad (\text{temperatura}) \quad (1.6.9)$$

onde k é a constante de Boltzmann, $u = \frac{3}{2} \frac{p}{\rho}$ é a energia interna específica, $p = \frac{k}{m} \rho T$ é a pressão de um gás ideal e $\mathbf{C} = \mathbf{c} - \mathbf{v}$ é a velocidade peculiar e $\mathbf{v}$ é a velocidade do gás.

Substituindo-se a função f (1.6.5) nestas três expressões cujas integrais podem ser calculadas como no apêndice I chega-se a:

$$f = f_M = \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(\mathbf{c}-\mathbf{v})^2} \quad (1.6.10)$$

a qual é denominada função de distribuição Maxwelliana. Esta função zera o termo devido às colisões na equação de Boltzmann representando portanto a função de distribuição que define o equilíbrio para o gás.

1.7 A função de distribuição fora do equilíbrio

O que é possível encontrar é a função de distribuição nas proximidades do equilíbrio. No método de Chapman-Enskog [3] na determinação de coeficientes de transporte a obtenção da função de distribuição fora do equilíbrio é feita considerando 5 campos básicos que são ρ , v_i (3 componentes) e T . Esta função é escrita na forma:

$$f = f^{(0)} (1 + \phi^{(1)}) \quad (1.7.1)$$

onde $f^{(0)}$ é a Maxwelliana e $\phi^{(1)}$ é o desvio.

As quantidades como a densidade ρ , a velocidade v_i e a temperatura são definidas a partir da função em equilíbrio, assim conclui-se que:

$$\int Z f^{(0)} \phi^{(1)} dc = 0 \quad (1.7.2)$$

para Z invariante de soma.

A função fora do equilíbrio é determinada a partir da equação de Boltzmann (1.4.10) da qual mantendo apenas os termos lineares de $\phi^{(1)}$ (teoria linearizada) no lado direito e somente as derivadas $f^{(0)}$ no lado esquerdo vem:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial t} + c_i \frac{\partial}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial}{\partial c_i} \right) f^{(0)} \\ &= \int f^{(0)} f_1^{(0)} (\phi_1^{(1)'} + \phi^{(1)'} - \phi_1^{(1)} - \phi^{(1)}) g b db d\varepsilon dc_1 \end{aligned} \quad (1.7.3)$$

Assim o problema neste caso é o da solução de uma equação integral não homogênea. Sua resolução é realizada com auxílio de polinômios de Sonine, sendo que os detalhes dos cálculos não são importantes neste momento. Por este método f fora do equilíbrio é encontrado como função do gradiente de temperatura e do gradiente de velocidade.

No método de Grad [2] que envolve 13 campos escalares, a saber:

$$\rho = \int m f d\mathbf{c} \quad (\text{densidade de massa}) \quad (1.7.4)$$

$$v_i = \frac{1}{\rho} \int m c_i f d\mathbf{c} \quad (\text{velocidade}) \quad (1.7.5)$$

$$p_{ij} = \int m C_i C_j f d\mathbf{c} \quad (\text{tensor pressão}) \quad (1.7.6)$$

$$q_i = \int \frac{m}{2} C^2 C_i f d\mathbf{c} \quad (\text{fluxo de calor}) \quad (1.7.7)$$

a função de distribuição fora do equilíbrio pode ser obtida considerando uma expansão em séries de derivadas da velocidade (ou série de polinômios de Hermite) da função de distribuição em equilíbrio, ou seja:

$$f = \left[a + a_i \frac{\partial}{\partial c_i} + a_{ij} \frac{\partial^2}{\partial c_i \partial c_j} + a_{ijk} \frac{\partial^3}{\partial c_i \partial c_j \partial c_k} \right] f^{(0)}$$

onde a , a_i , a_{ij} e a_{ijk} podem depender de $\mathbf{x}$ e t mas não de $\mathbf{c}$.

Substituindo esta nos campos básicos (1.7.4) - (1.7.7) as funções incógnitas são determinadas e desta forma obtém-se para a função de distribuição de Grad:

$$f = f^{(0)} \left[1 + \frac{p_{\langle ij \rangle}}{2\rho} \left(\frac{m}{kT} \right)^2 C_i C_j + \frac{q_i}{\rho} \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \left(\frac{mC^2}{5kT} - 1 \right) C_i \right]$$

onde: $p_{\langle ij \rangle} = p_{ij} - \frac{1}{3} p_{rr} \delta_{ij} = p_{ij} - p \delta_{ij}$ é o deviante do tensor pressão. Portanto esta função foi agora obtida como função do deviante do tensor pressão e do fluxo de calor.

Com estes dois resumos destes métodos é possível acompanhar o método alternativo de aproximações sucessivas o qual é descrito no capítulo II com o objetivo de obtenção de ordens sucessivas de aproximação para os coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento.

CAPÍTULO II

APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS - POTENCIAL DE ESFERAS RÍGIDAS

2.1 Introdução

A proposta deste capítulo é a determinação através de cálculo numérico, de integrais, denominadas integrais de colisão, com a finalidade de obtenção dos coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento. Este procedimento será realizado para os gases para-hidrogênio, orto-hidrogênio, hélio 4 e hélio 3 que apresentam comportamentos quânticos predominantes em relação a outros gases. O potencial de interação para as moléculas será o de esfera rígida e a distribuição estatística considerada, a de Maxwell-Boltzmann. A característica essencial que diferencia o caso quântico do clássico aqui tratado reside na metodologia empregada no cálculo das secções transversais de choque, enquanto a característica principal que diferencia este de outros trabalhos refere-se à determinação de aproximações de ordens superiores (até a 5^a ordem) para estes coeficientes de transporte. As expressões gerais, como funções de integrais de colisão para a viscosidade de cisalhamento e a condutividade térmica podem ser determinadas através do método de Chapman-Enskog [3] ou do método dos momentos de Grad [2], ou ainda através de um método alternativo [5], o qual será apresentado neste capítulo. Por estes métodos

observa-se que os coeficientes são proporcionais à razão de determinantes cujos termos (Apêndice III) são combinações lineares das integrais de colisão $\Omega^{(l,r)}$ (no caso de quinta ordem $l = (2, 4, 6) \leq r \leq (10, 8, 6)$, respectivamente correspondendo a 15 integrais).

2.2 Método alternativo para aproximações sucessivas

Para explicar de maneira simples e direta, como chegar às aproximações sucessivas para os coeficientes de transporte que serão tratados, neste e no próximo capítulo, será utilizado um método, o qual reúne características dos métodos de Chapman-Enskog e dos momentos de Grad. Neste método, a função de distribuição fora do equilíbrio que no método dos momentos de Grad (seção 1.7) era resultado de uma expansão em derivadas da velocidade (ou polinômios de Hermite) é representada agora como função dos polinômios de Sonine. Sua expressão, a partir da função Maxwelliana (1.6.10) é:

$$f = f^{(0)}(1 + \phi^{(1)}) = f^{(0)} \left\{ 1 + \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{1}{2\rho} \sum_{s=0}^{\infty} S_{\frac{s}{2}}^{(s)} p_{<\dot{y}>}^{(s)} C_i C_j - \frac{2}{5} \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{1}{\rho} \sum_{s=1}^{\infty} S_{\frac{s}{2}}^{(s)} q_i^{(s)} C_i \right\} \quad (2.2.1)$$

a qual é escrita com base nos seguintes campos que caracterizam esta teoria:

$$\rho = \int m f d\mathbf{c} = \int m f^{(0)} d\mathbf{c} \quad (\text{densidade}) \quad (2.2.2)$$

$$v_i = \frac{1}{\rho} \int m c_i f d\mathbf{c} = \frac{1}{\rho} \int m c_i f^{(0)} d\mathbf{c} \quad (\text{velocidade}) \quad (2.2.3)$$

$$T = \frac{2m}{3k\rho} \int \frac{1}{2} m C^2 f d\mathbf{c} = \frac{2m}{3k\rho} \int \frac{1}{2} m C^2 f^{(0)} d\mathbf{c} \quad (\text{temperatura}) \quad (2.2.4)$$

$$p_{<\dot{y}>}^{(s)} = 15 \frac{2^s s!}{(2s+5)!!} \int m S_{\frac{s}{2}}^{(s)} C_{< i} C_{j>} f d\mathbf{c} \quad (s = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.2.5)$$

$$q^{(s)} = -\frac{15 k T}{2 m} \frac{2^s s!}{(2s+3)!!} \int m S_{\frac{s}{2}}^{(s)} C_i f d\mathbf{c} \quad (s = 1, 2, 3, \dots) \quad (2.2.6)$$

onde os polinômios de Sonine, funções de $\frac{mC^2}{2kT}$, são:

$$S_{l+\frac{1}{2}}^{(n)} \left(\frac{m}{2kT} C^2 \right) = \sum_{j=0}^n \frac{\Gamma(n+l+\frac{3}{2})}{j!(n-j)!\Gamma(j+l+\frac{3}{2})} \left(-\frac{m}{2kT} C^2 \right)^j \quad (2.2.7)$$

É possível verificar de (2.2.5) que:

$$p_{<\dot{y}\dot{y}>}^{(0)} = p_{\dot{y}\dot{y}}^{(0)} - \frac{1}{3} p_{rr} \delta_{\dot{y}\dot{y}} = p_{\dot{y}\dot{y}} - p \delta_{\dot{y}\dot{y}} \quad (2.2.8)$$

é o deviante do tensor pressão, e de (2.2.6) que $q_i^{(1)}$ é o fluxo de calor no gás.

Com a substituição de f (equação (2.2.1)) em (1.4.13) com $\epsilon = 0$, com a manutenção de somente termos lineares em $\phi^{(1)}$ no lado direito e levando em conta unicamente a função em equilíbrio $f^{(0)}$ no lado esquerdo, como é típico da resolução pelo método de Chapman-Enskog, obtém-se:

$$\begin{aligned} f^{(0)} \left\{ \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial t} \left(\frac{mC^2}{2kT} - \frac{3}{2} \right) + \frac{m}{kT} C_i \frac{\partial v_i}{\partial t} \right. \\ \left. + (C_i + v_i) \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x_i} + \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial x_i} \left(\frac{mC^2}{2kT} - \frac{3}{2} \right) + \frac{m}{kT} C_j \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right] \right. \\ \left. - \frac{m}{kT} F_i C_i \right\} = I [\phi^{(1)}] \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

onde o operador $I [\phi^{(1)}]$ representa a integral definida por:

$$I [\phi^{(1)}] = \int f^{(0)} f_1^{(0)} \left(\phi_1^{(1)'} + \phi^{(1)'} - \phi_1^{(1)} - \phi^{(1)} \right) g \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\epsilon dc \quad (2.2.10)$$

Multiplicando-se (2.2.9) por m , mc_i e $m \frac{C^2}{2}$ e integrando em todas as velocidades $\mathbf{c}$, encontra-se respectivamente:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_i}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{balanço de massa}) \quad (2.2.11)$$

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + \rho v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = \rho F_i \quad (\text{balanço de momento linear}) \quad (2.2.12)$$

$$\frac{3}{2} \frac{k}{m} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{3}{2} \frac{k}{m} v_i \frac{\partial T}{\partial x_i} + p \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{balanço de energia interna}) \quad (2.2.13)$$

em que foi considerada que a temperatura está relacionada à energia interna através de (1.6.9). Estas equações representam as equações de balanço para um fluido de Euler ($p_{\dot{y}\dot{y}} = p \delta_{\dot{y}\dot{y}}$ e $q_i = 0$) com as quais elimina-se a dependência nas derivadas temporais em

(2.2.9). Com este procedimento acrescido da substituição do termo fora do equilíbrio (o desvio $\phi^{(1)}$ em (2.2.1)), (2.2.9) toma a seguinte forma:

$$f^{(0)} \left\{ \frac{m}{kT} S_{\frac{5}{2}}^{(0)} C_k C_l \frac{\partial v_{\langle k}}{\partial x_{\rangle l}} - \frac{1}{T} S_{\frac{5}{2}}^{(1)} C_k \frac{\partial T}{\partial x_k} \right\} = \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{1}{2\rho} \sum_{s=0}^{\infty} p_{\langle kl \rangle}^{(s)} I \left[S_{\frac{5}{2}}^{(s)} C_k C_l \right] - \frac{2}{5} \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{1}{\rho} \sum_{s=1}^{\infty} q_k^{(s)} I \left[S_{\frac{5}{2}}^{(s)} C_k \right] \quad (2.2.14)$$

onde:

$$\frac{\partial v_{\langle k}}{\partial x_{\rangle l}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_k}{\partial x_l} + \frac{\partial v_l}{\partial x_k} \right) - \frac{1}{3} \frac{\partial v_r}{\partial x_r} \delta_{kl} \quad (2.2.15)$$

é a parte simétrica sem traço do gradiente de velocidade.

A ortogonalidade dos polinômios de Sonine é traduzida por:

$$\int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} C^2} C^{2l+2} S_{l+\frac{1}{2}}^{(n)} S_{l+\frac{1}{2}}^{(p)} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{l+\frac{3}{2}} dC = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(n+l+\frac{3}{2})}{n!} \delta_{np} \quad (2.2.16)$$

onde $\Gamma(i + \frac{1}{2}) = \frac{(2i-1)!!}{2^i} \sqrt{\pi}$.

A multiplicação de (2.2.14) por $\frac{m}{kT} S_{\frac{5}{2}}^{(r)} C_{\langle i} C_{\rangle j}$ com integração em todos os valores de $\mathbf{C}$ fornece:

$$-2\rho \frac{5}{4} \delta^{(0,r)} \frac{\partial v_{\langle i}}{\partial x_{\rangle j}} = \sum_{s=0}^{\infty} b_{(r,s)} p_{\langle ij \rangle}^{(s)} \quad (2.2.17)$$

enquanto que, a multiplicação de (2.2.14) por $\frac{m}{kT} S_{\frac{5}{2}} C_i$ com mesmos limites de integração resulta em:

$$-\frac{75}{16} \rho \frac{k}{m} \delta^{(1,r)} \frac{\partial T}{\partial x_i} = \sum_{s=1}^{\infty} a_{(r,s)} q_i^{(s)} \quad (2.2.18)$$

Nestas duas últimas expressões:

$$b_{(r,s)} = - \left(\frac{m}{kT} \right)^3 \frac{m}{\rho} \int S_{\frac{5}{2}}^{(r)} C_{\langle k} C_{\rangle l} I \left[S_{\frac{5}{2}}^{(s)} C_{<k} C_{>l} \right] d\mathbf{c} \quad (2.2.19)$$

$$a_{(r,s)} = - \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{m}{4\rho} \int S_{\frac{3}{2}}^{(r)} C_i I \left[S_{\frac{3}{2}}^{(s)} C_i \right] dc \quad (2.2.20)$$

Resolvendo (2.2.17) para $p_{\langle ij \rangle}^{(0)}$ (o deviante do tensor pressão) obtém-se que:

$$p_{\langle ij \rangle} = -2 [\mu]_s \frac{\partial v_{\langle i}}{\partial x_{j \rangle}} \quad (2.2.21)$$

a qual expressa a lei de Navier-Stokes, sendo $[\mu]_s$ o coeficiente de viscosidade de cisalhamento encontrado na s-ésima ordem de aproximação sucessiva. Seu valor é dado por:

$$[\mu]_s = \frac{5}{4} \rho (b^{-1})^{(0,0)} \quad (2.2.22)$$

na qual $(b^{-1})^{(0,0)}$ é o primeiro elemento referente à primeira linha e primeira coluna da inversa da matriz de $b(rs)$.

Resolvendo (2.2.18) para $q_i^{(1)}$ (o fluxo de calor) obtém-se:

$$q_i = - [\lambda]_s \frac{\partial T}{\partial x_i} \quad (2.2.23)$$

que representa a lei de Fourier, e em cuja expressão $[\lambda]_s$ é a s-ésima aproximação para o coeficiente de condutividade térmica dado por:

$$[\lambda]_s = \frac{75}{16} \rho \frac{k}{m} (a^{-1})^{(1,1)} \quad (2.2.24)$$

$(a^{-1})^{(1,1)}$ é o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz inversa de $a(r,s)$.

2.3 Integrais de colisão

Conforme o Apêndice III os termos da matriz de $a(r, s)$ (eq (2.2.20)) e de $b(r, s)$ (2.2.19) são funções de integrais do tipo:

$$\omega^{(l,r)} = \frac{\rho}{2\pi} \left(\frac{\pi}{mkT} \right)^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty e^{-\gamma^2} \gamma^{2r+3} Q^{(l)}(\gamma) d\gamma \quad (2.3.1)$$

onde $\gamma = \left(\frac{m}{4kT} \right)^{\frac{1}{2}} g$ e $Q^{(l)}$ é a seção transversal de ordem l :

$$Q^{(l)}(\gamma) = 2\pi \int_0^\pi (1 - \cos^l \chi) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi \quad (2.3.2)$$

ou considerando integrais adimensionais, são funções de :

$$\Omega^{(l,r)} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{mkT}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sigma^2} \omega^{(l,r)} \quad (2.3.3)$$

onde σ é uma distância característica do potencial em estudo. Portanto em teoria cinética dos gases os coeficientes de transporte são funções exclusivamente de integrais que resultam de uma integração na velocidade relativa entre as partículas g e uma integração no ângulo de espalhamento χ . Assim, classicamente:

$$\Omega^{(l,r)} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_0^\infty \int_0^\pi e^{-\gamma^2} \gamma^{2r+3} (1 - \cos^l x) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\gamma \quad (2.3.4)$$

No caso de potencial de esfera rígida, σ é o diâmetro das partículas do gás.

A análise do fenômeno quântico em uma colisão faz com que esta equação se modifique, sendo introduzido no lugar da velocidade, o vetor número de onda associado a onda que representa a partícula, isto é, $k = \frac{\mu}{\hbar} g$. Fazendo-se $\gamma = k\lambda$, onde $\lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{mkT}}$ é o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula de massa reduzida μ com energia $E = 4\pi^2 kT$, obtém-se para o caso quântico:

$$\Omega^{(l,r)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\lambda}{\sigma} \right)^{2r+4} \int_0^\infty e^{-\left(\frac{\lambda}{\sigma}\right)^2 Z^2} Z^{2r+3} \Theta^{(l)}(Z) dZ \quad (2.3.5)$$

sendo:

$$\Theta^{(l)} = \frac{2\pi}{\sigma^2} \int_0^\pi |f(\chi, Z)|^2 (1 - \cos^l \chi) \sin \chi d\chi \quad (2.3.6)$$

a seção transversal de choque de ordem l em termos de σ^2 e $Z = k\sigma$ a variável de integração em (2.3.5). Considerou-se que a seção transversal diferencial de choque $\alpha(\chi, g)$ é igual ao quadrado do módulo da amplitude da onda espalhada $f(\chi, Z)$.

Conforme a teoria quântica, apresentada no capítulo I, $f(\chi, z)$ é dada por:

$$f(\chi, z) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \left[e^{2i\delta_l(Z)} - 1 \right] P_l(\cos \chi) \quad (2.3.7)$$

Considerando-se o efeito de simetria para partículas idênticas:

$$f(\chi, z) = \frac{1}{\sqrt{2}} [f(\chi) \pm f(\pi - \chi)] \quad (2.3.8)$$

onde os sinais $+$ e $-$ representam respectivamente se as funções de onda são simétricas ou antisimétricas e $\sqrt{2}$ é o fator de normalização. Em (2.3.7), $\delta_l(Z)$ é a diferença de fase entre duas funções de onda, isto é, a função de onda assintótica perturbada por um potencial (neste caso o de esfera rígida) e a função de onda plana. Para determiná-la é necessário resolver a equação de Schrödinger radial para $G_l(r)$ (1.3.27), acrescida da condição que a função de onda deve se anular em $r = \sigma$.

A solução para $r > \sigma$ (onde o potencial é zero) é dada por

$$G_l(r) = Akrj_l(kr) + Bkr(-1)^{l+1}n_l(kr) \quad (2.3.9)$$

onde $j_l(kr)$ é a função esférica de Bessel e $n_l(kr)$ é a função esférica de Newmann, as quais possuem as seguintes expressões assintóticas:

$$j_l(kr) \approx \frac{\sin(kr - \frac{1}{2}l\pi)}{kr} \quad (2.3.10)$$

$$n_l(kr) \approx -\frac{\cos(kr - \frac{1}{2}l\pi)}{kr} \quad (2.3.11)$$

De (1.3.34) e observando que $G_l(r) = rR_l(r)$, a expressão assintótica para função de onda assintótica pode ser escrita na forma:

$$G_l(r) \sim C \sin\left(kr - \frac{1}{2}l\pi + \delta_l\right) \quad (2.3.12)$$

Comparando (2.3.9) envolvendo funções assintóticas com (2.3.12) conclui-se que:

$$\delta_l = \arctan(-1)^l \frac{B}{A} \quad (2.3.13)$$

e da condição de anulamento de (2.3.9) em $r = \sigma$:

$$\delta_l = \arctan \frac{j_l(k\sigma)}{n_l(k\sigma)} \quad (2.3.14)$$

Para se determinar as seções transversais de choque deve-se integrar (2.3.6) considerando (2.3.7), (2.3.8) e relações de recorrência para os polinômios de Legendre (vide Apêndice IV). Com este procedimento obtém-se para $\Theta^{(l)}(Z)$:

$$\begin{aligned} \Theta^{(l)}(Z) = & \frac{8\pi}{Z^2} \sum_j \frac{(j+l)!(2j+1)!!}{(2j+2l-1)!!j!} \left\{ \sin^2(\delta_{j+l} - \delta_j) \right. \\ & + \left[\prod_{i=1}^2 (1 - \delta_{2i}) \right] \frac{l(2j+2l-3) \left[j^2 + (l-1)j - \frac{(l-1)}{2} \right]}{(j+l)(j+l-1)(2j-1)} \sin^2(\delta_{j+l-2} - \delta_j) \\ & + \left[\prod_{i=1}^4 (1 - \delta_{2i}) \right] \frac{5(l-3)(2j+2l-1)(2j+2l-7)}{(j+l)(j+l-1)(j+l-2)(j+l-3)(2j-3)(2j-1)} \\ & \times \left[j^4 + 2(l-3)j^3 + (3l-17)j^2 - 12(l-4)j + \frac{9(l-4)}{2} \right] \sin^2(\delta_{j+l-4} - \delta_j) \left. \right\} \quad (2.3.15) \end{aligned}$$

válidas para $l=2,4,6$. Para funções de onda simétricas j é escolhido como um número par e para funções de onda antissimétricas como ímpar. Estas concordam com a expressão geral, independente de simetria, dadas por Massey e Mohr [6] para $l=2$ e com Fox [7] que as obteve para $l=0,1,2,3$ e 4. No caso dos gases para-hidrogênio e hélio 4 suas partículas comportam-se como bosons de spin nulo e portanto $\Theta^{(l)}(Z) = \Theta_{\text{sim}}^{(l)}(Z)$. Já no caso do hélio 3 em que as partículas se comportam como fermions podendo ter spin $\pm \frac{1}{2}$ (observando (1.3.51)), tem-se:

$$\Theta^{(l)}(Z) = \frac{3}{4} \Theta_{\text{sim}}^{(l)}(Z) + \frac{1}{4} \Theta_{\text{antis}}^{(l)}(Z) \quad (2.3.16)$$

Em se tratando de orto-hidrogênio pode-se encontrar 9 estados quase degenerados provenientes de três possíveis valores diferentes da componente z do spin nuclear total

$s=1$ e três da componente z do número quântico rotacional $j=1$. Isto perfaz um total de 9^2 prováveis estados finais após colisões entre moléculas orto, dos quais $(36+9)$ (36 colisões entre moléculas em estados diferentes e 9 colisões entre moléculas em estados iguais) são descritas por funções de onda simétricas e 36 por funções de onda antissimétricas. Assim $\Theta^{(l)}$ para o estado de orto-hidrogênio apresenta-se como:

$$\Theta^{(l)} = \frac{5}{9} \Theta_{\text{sim}}^{(l)} + \frac{4}{9} \Theta_{\text{antis}}^{(l)} \quad (2.3.17)$$

2.4 Diferenças de fase

Conforme (2.3.14) as diferenças de fase são determinadas independentes do gás estudado e como funções apenas da variável Z . Na Figura 2.4.1, apresenta-se a variação de $\delta_l(Z)$ com Z para $l=0,1,2,3,5$ e 10.

A medida que l cresce, as derivadas $\frac{d\delta_l(Z)}{dZ}$ tendem a zero para o mesmo Z , evidenciando que para l maior que $2Z$, $\delta_l(Z)$ torna-se totalmente desprezível em relação às diferenças de fase com número quântico momento angular menores que l .

FIG. 2.4.1 - Diferenças de fase - esfera rígida

2.5 Seções transversais de choque

Visto que as diferenças de fase são funções apenas de Z , o mesmo ocorre para as seções transversais de choque de ordem l descritas por (2.3.15). Quando $Z \rightarrow 0$ em (2.3.16) o arco tangente da razão entre as expansões das funções esféricas de Bessel e Newmann para Z pequeno levam a:

$$\delta_l(Z) = - \left[\frac{l!}{(2l)!} \frac{(2Z)^{2l+1}}{2(2l+1)} \right] \quad (2.5.1)$$

Isto prova que no caso de bosons em que:

$$\Theta^{(2)}(Z) = \frac{8\pi}{Z^2} \sum_{l=0,2,4,\dots} \frac{(l+1)(l+2)}{(2l+3)} \sin^2(\delta_{l+2} - \delta_l) \quad (2.5.2)$$

o limite de (2.5.2) quando $Z \rightarrow 0$ fica:

$$\lim_{Z \rightarrow 0} \Theta^{(2)}(Z) = \frac{8\pi}{Z^2} \sum_{l=0,2,4,\dots} \frac{(l+1)(l+2)}{(2l+3)} \left\{ \left[\frac{l!}{(2l)!} \right]^2 \frac{(2Z)^{2l+1}}{2(2l+1)} [1 + O(Z^4)] \right\}^2 \quad (2.5.3)$$

resultando que só o termo de ordem $l=0$ deva ser considerado, isto é:

$$\lim_{Z \rightarrow 0} \Theta^{(2)}(Z) = \frac{8\pi}{Z^2} \frac{2}{3} Z^2 \quad (2.5.4)$$

sendo que para $Z = 0$:

$$\Theta_{\text{sim}}^{(2)}(0) = \frac{16\pi}{3} \quad (2.5.5)$$

Procedendo-se de forma idêntica, isto é, considerando apenas os termos de ordem $j = 0$ na somatória (2.3.15), obtém-se:

$$\Theta_{\text{sim}}^{(4)}(0) = \frac{32\pi}{5} \quad (2.5.6)$$

e

$$\Theta_{\text{sim}}^{(6)}(0) = \frac{48\pi}{7} \quad (2.5.7)$$

Estes valores correspondem a 8 vezes os valores clássicos cujos resultados são:

$$Q^{(l)} = \frac{\pi}{2} \left[2 - \frac{1 + (-1)^l}{l+1} \right] \quad (2.5.8)$$

No caso de seções transversais de choque antissimétricas, em virtude da somatória em (2.3.15) iniciar-se em $j=1$, tem-se:

$$\Theta_{\text{antis}}^{(2)}(0) = \Theta_{\text{antis}}^{(4)}(0) = \Theta_{\text{antis}}^{(6)}(0) = 0 \quad (2.5.9)$$

A Figura 2.5.1 mostra o comportamento das seções transversais de choque de ordem l em função de $\alpha = \arctan(Z)$. Quando $Z \rightarrow \infty$ e portanto $\alpha \rightarrow \frac{\pi}{2}$, percebe-se que tanto as expressões simétricas como as antissimétricas tendem ao valor clássico como é esperado no limite de altas energias.

Também é possível observar da Fig. 2.5.1 que a diferença entre os valores das seções transversais de choque de ordem l para um mesmo α , é maior para o par ($l=2$ e $l=4$) que para o par ($l=4$ e $l=6$).

Tendo-se obtido as diferenças de fase, as seções transversais de choque e analisados seus limites, o próximo passo é a determinação das integrais $\Omega^{(l,r)}$ através do método de Simpson de integração numérica (Apêndice VI) cujos detalhes necessários ao cálculo são descritos a seguir.

FIG. 2.5.1 Seções transversais de choque de ordem l - esfera rígida

2.6 Cálculo numérico das integrais $\Omega^{(l,r)}$

A integração de:

$$\Omega^{(l,r)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\lambda}{\sigma} \right)^{2r+4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\lambda^2}{\sigma^2} Z^2} Z^{2r+3} (1 + Z^2)^l \Theta^{(l)}(Z) d\alpha \quad (2.6.1)$$

onde $Z = \tan \alpha$, é realizada tomando por base os valores para os diâmetros σ das moléculas, obtidos através da equação clássica da viscosidade de cisalhamento em primeira aproximação :

$$[\mu]_1 = \frac{5}{16\sigma^2} \left(\frac{mkT}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.6.2)$$

cujos resultados experimentais são extraídos de Kestin et al.[8] no caso de hélio e de Chapman-Cowling [3] para o hidrogênio, dados estes obtidos à temperatura de 273,15 K.

Como um critério de medida de ocorrência de fenômenos da natureza quântica, analisa-se a relação entre o comprimento de onda de De Broglie e o diâmetro de uma molécula no caso de potencial de esfera rígida. Considerando que:

$$\frac{\lambda}{\sigma} = \frac{\hbar}{\sigma(mkT)^{\frac{1}{2}}} \quad (2.6.3)$$

observa-se que esta razão é maior para os gases que terão seu estudo desenvolvido neste trabalho, em relação a outros gases que também podem manifestar efeitos quânticos. A Tabela I apresenta os valores desta razão, da massa molecular e de diâmetro para os gases hélio 4, hélio 3, hidrogênio, neônio e argônio.

Tabela I - Características dos gases quânticos

gás	$\sqrt{T} \frac{\lambda}{\sigma}$	$\sigma(\text{\AA})$	M(g/mol)
hélio 3	1.85	2.166	3.016
hidrogênio	1.80	2.723	2.016
hélio 4	1.61	2.166	4.0026
neônio	0.60	2.565	20.179
argônio	0.30	3.637	39.948

Tabela II - Integrais $\Omega^{(l,r)}$ para 100 e 300 K

(l, r)	Clássico	H ₂ (100 K)	He ⁴ (100 K)	Ne(100 K)	Ar(100 K)	H ₂ (300 K)	He ⁴ (300 K)
(2,2)	1	1,227	1,201	1,069	1,031	1,126	1,111
(2,3)	4	4,787	4,699	4,236	4,106	4,433	4,385
(2,4)	20	23,52	23,12	21,04	20,47	21,93	21,71
(2,5)	120	139,2	137,0	125,7	122,5	130,5	129,3
(2,6)	840	964,0	950,1	876,5	856,3	907,7	900,1
(2,7)	6720	7645	7541	6991	6840	7223	7167
(2,8)	60480	68301	67420	62765	61491	64731	64523
(2,9)	604800	678738	670408	626322	614301	644915	640411
(2,10)	6652800	7425599	7338521	6877021	6751605	7071382	7024447
(4,4)	24	29,30	28,71	25,66	24,77	26,98	26,64
(4,5)	144	173,1	169,8	153,1	148,2	160,3	158,4
(4,6)	1008	1196	1175	1067	1035	1113	1101
(4,7)	8064	9472	9313	8500	8264	8851	8759
(4,8)	72576	84515	83162	76260	74269	79235	78459
(6,6)	1080	1315	1289	1155	1115	1213	1198

O integrando em (2.6.1) dividido por 2π é igual a:

$$Y[\Omega^{(l,r)}] = e^{-(\frac{\lambda}{\sigma})Z^2} Z^{2r+3} \Theta^{(l)}(Z) \frac{(1+Z^2)}{2\pi} \quad (2.6.4)$$

Da observação da variação deste integrando com a temperatura T (com o objetivo de verificar limites de integração) em um gráfico de $Y[\Omega^{(1,2)}]$ em função de $\alpha = \arctan k\sigma$ notou-se que a curva para um dado valor de T sempre tangencia as curvas correspondentes a um menor valor, e que os pontos de máximo destas curvas distanciam-se cada vez mais da origem em direção a $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (Fig. 2.6.1). Quanto maior é a temperatura (menor $\frac{\lambda}{\sigma}$), mais próximo o resultado das integrais $\Omega^{(l,r)}$ tendem aos valores clássicos. O resultado clássico é caracterizado por uma função integrando cujo pico está exatamente localizado em $\alpha = \frac{\pi}{2}$. A Figura 2.6.1 para $Y[\Omega^{(2,2)}]$ conjuntamente com a Tabela II de dados numéricos para as integrais $\Omega^{(l,r)}$ esclarecem este comportamento.

Fig. - 2.6.1 $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ (hélio 4)

Para $T = 0.1$ K nota-se uma simetria na curva que representa a variação do integrando com α (Fig. 2.6.1), com o aumento de T esta simetria desaparece, apresentando quedas rápidas da função em direção a $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Com o aumento de T os valores dos integrandos tendem ao infinito no limite de $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

A Tabela II verifica a aproximação para os resultados clássicos (2ª coluna) na temperatura de 100 e 300 K. Os gases Neônio(7ª coluna) e Argônio(8ª coluna) exemplificam que o decréscimo de $\frac{\lambda}{\sigma}$ acarreta uma tendência mais rápida a estes valores (efeito de suas grandes massas). Isto é reforçado quando se observa os resultados de hélio 4 e do para-hidrogênio a 300K (efeito de alta temperatura), mas com certeza os efeitos quânticos são totalmente sem importância nesta temperatura.

Visto que não existe um limite exato entre o regime quântico e o regime clássico os cálculos para os coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento

Fig. 2.6.2 - Integrais omegas em função da temperatura para l par.

a nosso critério serão apresentados desde baixas temperaturas, por exemplo 0,1K, região de poucos resultados experimentais, até a temperatura de 100 K onde estipulamos ainda válidos (embora pequenos) os efeitos quânticos.

A invariância das integrais Omegas com a natureza do gás caracterizam um modelo de esfera rígida clássico (2ª coluna da Tabela II). A Figura 2.6.2 esquematiza graficamente a variação e a tendência para a unidade da razão das integrais $\Omega^{(l,r)}$ de ordem l par, calculadas de maneira quântica, para as clássicas, determinadas para o gás hélio 4. $\Omega^{(l,r)}$. Na Figura 2.6.2 $\Omega^{(l,r)*} = \frac{\Omega^{(l,r)}}{\Omega^{(l,r)}_{\text{classico}}}$.

Para r 's iguais a bem baixas temperaturas os resultados das integrais seguem a mesma curva como pode ser visto para $\Omega^{(2,6)*}$, $\Omega^{(4,6)*}$, $\Omega^{(6,6)*}$, $\Omega^{(2,4)*}$ e $\Omega^{(4,4)*}$.

2.7 Os coeficientes de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica

Em primeira aproximação estes coeficientes aparecem como funções apenas da integral

$\Omega^{(2,2)}$ enquanto que calculados na quinta aproximação, são funções de 15 integrais $\Omega^{(l,r)}$, com $l=(2,4,6)$ e $(2,4,6) \leq r \leq (10,8,6)$ respectivamente. A expressão geral para qualquer ordem é como segue:

$$[\mu]_n = \frac{5}{4\sigma^2} \left(\frac{mkT}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{\det U_{nn}}{\det A_{nn}} \quad (2.7.1)$$

que é o coeficiente de viscosidade de cisalhamento, enquanto:

$$[\lambda]_n = \frac{75}{16\sigma^2} \left(\frac{mkT}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{k \det L_{nn}}{m \det B_{nn}} \quad (2.7.2)$$

é o coeficiente de condutividade térmica. Nestas expressões tem-se:

$$U_{nn} = \begin{pmatrix} 1 & \beta_{01} & \dots & \beta_{0n} \\ 0 & \beta_{11} & \dots & \beta_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta_{n1} & \dots & \beta_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A_{nn} = \begin{pmatrix} \beta_{00} & \beta_{01} & \dots & \beta_{0n} \\ \beta_{10} & \beta_{11} & \dots & \beta_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta_{n1} & \dots & \beta_{nn} \end{pmatrix} \quad (2.7.3)$$

$$L_{nn} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

$$B_{nn} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \quad (2.7.4)$$

onde $\alpha_{11} = \beta_{00} = 4\Omega^{(2,2)}$ e os demais coeficientes são encontrados no Apêndice III.

Pode-se concluir que a razão de coeficientes de 1ª aproximação (em ambos os casos clássico e quântico) entre os coeficientes dados por (2.7.1) e (2.7.2) multiplicados por $\frac{m}{k}$ é uma constante dada por:

$$\kappa_1 = \frac{[\lambda]_1}{[\mu]_1} \frac{m}{k} = \frac{15}{4} \quad (2.7.5)$$

No caso de aproximações superiores, isto não se verifica, e, a diferença entre

$$\kappa_n = \frac{[\lambda]_n}{[\mu]_n} \frac{m}{k} \quad (2.7.6)$$

e κ_1 , apresenta diferentes aspectos para cada gás, conforme representado, nas Figuras 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.4 para os casos de 2ª e 5ª ordem de aproximação.

No gráfico da diferença $\kappa_n - \kappa_1$ (para $n=2$ e $n=5$) para os gases hélio 4, hélio 3, para-hidrogênio e orto-hidrogênio, observou-se uma semelhança entre os resultados do para-hidrogênio e hélio 4, cujas razões $\frac{\lambda}{\sigma}$ se assemelham e cujas seções diferenciais de choque de ordem l são as de um boson com spin nulo.

No sentido de não se repetir resultados, os gráficos da variação dos coeficientes $[\mu]_5$ e $[\lambda]_5$ com a temperatura, para o caso de esfera rígida, além da comparação com o caso de um potencial mais realístico, o de Lennard-Jones, serão mostrados no capítulo a seguir.

Fig. 2.7.1 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (hélio 4)

Fig. 2.7.2 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (para-hidrogênio) Fig. 2.7.3 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (hélio 3)

Fig. 2.7.4 - $(\kappa_n - \kappa_1) \times T$ (orto-hidrogênio)

CAPÍTULO III

APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS - POTENCIAL DE LENNARD - JONES

3.1 Introdução

As aproximações sucessivas para os coeficientes de transporte, tratados no capítulo anterior, são agora determinadas considerando que a interação entre as partículas do gás é regida por um potencial de Lennard-Jones. O potencial LJ(6-12) com aplicação neste capítulo, contém um valor atrativo ($-r^{-6}$) e um repulsivo (r^{-12}). Como visto, a base na avaliação destes coeficientes, sustenta-se no cálculo das diferenças de fase que são determinadas através da resolução da equação de Schrödinger radial. A solução apresentada neste trabalho, utilizando o método de Runge- Kutta-Nystron de 4ª ordem [10], teve ponto de partida a expressão assintótica para a função de onda que descreve o sistema interagente, com a integração sendo realizada em sentido decrescente. Isto diferencia das demais soluções que tem sempre início nas condições de contorno em $r = 0$ onde o potencial é infinito.

Estas diferenças de fase, bem como as seções transversais de choque são representadas neste capítulo, sendo que neste caso (potencial de Lennard-Jones) de maneira diferente do que ocorre para um potencial de esfera rígida, a cada gás corresponde uma curva

característica. A razão das integrais $\Omega^{(l,r)}$, para os valores constantes dessas integrais clássicas no caso de um potencial de esfera rígida, também são mostradas, e verificada sua tendência aos valores clássicos relativos a um potencial de Lennard- Jones. Por último, os coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento são determinados em quinta ordem de aproximação e os resultados para os gases hélio 4, hélio 3, para- hidrogênio e orto-hidrogênio comparados com os teóricos em outras ordens de aproximação, considerando os mesmos ou outros potenciais, e com resultados experimentais.

3.2 O potencial de Lennard-Jones e seus parâmetros σ e ϵ

O potencial de Lennard-Jones (6-12) pode ser expresso na forma:

$$V(R) = 4\epsilon \left(\frac{1}{R^{12}} - \frac{1}{R^6} \right) \quad (3.2.1)$$

onde: $R = \frac{r}{\sigma}$, σ é a distância finita em que o potencial se anula, ϵ é a profundidade do poço de potencial. σ e ϵ são obtidos através de um método de aproximações sucessivas e ajuste aos valores do segundo coeficiente virial. Um valor quantitativo para o fenômeno quântico pode ser encontrado da equação deste coeficiente expressa em sua fórmula quântica, a qual é dada por (vide De Boer [11])

$$B = \frac{2\pi N\sigma^3}{3} \left\{ \sum_i c_i \left(\frac{4\epsilon}{kT} \right)^{\frac{1}{4} + \frac{i}{2}} + \left(\frac{h^2}{m\epsilon\sigma^2} \right) \sum_i C_i^{(1)} \left(\frac{4\epsilon}{kT} \right)^{\frac{13}{12} + \frac{i}{2}} - \left(\frac{h^2}{m\epsilon\sigma^2} \right)^2 \sum_i C_i^{(2)} \left(\frac{4\epsilon}{kT} \right)^{\frac{23}{12} + \frac{i}{2}} + \dots \right\}. \quad (3.2.2)$$

O primeiro termo refere-se ao resultado clássico e a expansão apresenta-se como polinômio de ordem par no parâmetro $\Lambda^* = \frac{h}{\sqrt{m\epsilon\sigma}}$, denominado parâmetro quântico de De Boer.

Para os cálculos desse trabalho utilizou-se para os parâmetros σ e ϵ , característicos de cada gás, os seguintes valores * dados na Tabela III.

Tabela III - Parâmetros σ e ϵ

gás	$\sigma(\text{\AA})$	$\epsilon/k(K)$
Hélio 4 Hélio 3	2,556	10,22
para-Hidrogênio orto-Hidrogênio	2,928	37,00

3.3 Diferenças de fase

Considerando que $r = \sigma R$ e que o potencial $V(R)$ é dado por (3.2.1) é possível escrever a equação diferencial de Schrödinger (1.3.27) em função do parâmetro quântico A' na forma:

$$\frac{d^2(R\psi)}{dR^2} = \left[\frac{l(l+1)}{R^2} + \frac{16\pi^2}{A'^2} \left(\frac{1}{R^{12}} - \frac{1}{R^6} \right) - Z^2 \right] R\psi \quad (3.3.1)$$

na qual ψ é a função de onda radial.

As condições de contorno em $R = 0$ que regem este problema ($R\psi = 0$ e $\frac{dR\psi}{dR} = 0$) na prática devem ser deslocadas para um valor $R \neq 0$. Se a resolução da equação (3.3.1) for iniciada tomando por base estas condições deve-se antecipadamente pesquisar este valor. Este foi o procedimento realizado por De Boer [11] e Kilpatrick [12]. De Boer, para o hélio 3, colocou $R\psi$ igual a unidade em $R = 0,9$ (provado por ele ser um valor conveniente por método de tentativa e erro) e a partir deste ponto integrou em sentido inverso até atingir $R\psi = 0$. Tendo determinado a inclinação em $R = 0,9$, a integração prosseguiu para valores de R maiores que este. Kilpatrick realizando integração pelo método de Milne

* Os resultados foram extraídos de Hirschfelder, Curtiss e Bird (4) e são os de utilização mais comum nas referências que tratam com o LJ (6-12) na teoria quântica.

provou que a integração para o hélio 3 a partir das proximidades de $R = 0,6$, independia das condições de contorno neste ponto inicial. A verificação deu-se através das seguintes escolhas em $R = 0,625$ e $R = 0,625 + \frac{1}{128}$, que levaram aos mesmos resultados para as diferenças de fase com a mesma precisão. As integrações eram realizadas até que o potencial ficasse desprezível em relação aos outros termos da equação (3.3.1), isto é:

$$\left| \frac{16\pi^2}{A^{*2}} (R^{-12} - R^{-6}) \right| \ll \left| Z^2 - \frac{l(l+1)}{R^2} \right| \quad (3.3.2)$$

Nesta situação a solução é dada pela forma assintótica:

$$R\psi = A^* \omega j_l(\omega) + B^* \omega (-1)^{(l+1)} n_l(\omega) \quad (3.3.3)$$

onde $\omega = ZR = K\sigma R$, A^* e B^* são constantes. Derivando (3.3.3), encontra-se:

$$\frac{dR\psi}{dR} = A^* Z \left[j_l(\omega) + \omega \frac{dj_l(\omega)}{d\omega} \right] + B^* (-1)^{l+1} Z \left[n_l(\omega) + \omega \frac{dn_l(\omega)}{d\omega} \right] \quad (3.3.4)$$

Considerando que o método de Runge-Kutta-Nyström para resolução da equação diferencial é linear na função $R\psi$ (vide Apêndice V) a solução foi desenvolvida com objetivo de obter os valores que multiplicam A^* e B^* para um mínimo valor de R possível de ser atingido. Como visto no primeiro capítulo quando $R \rightarrow \infty$:

$$R\psi \approx C \sin \left(k\sigma R - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right) \quad (3.3.5)$$

e portanto de (3.3.3):

$$\delta_l = \arctan(-1)^l \frac{B^*}{A^*} \quad (3.3.6)$$

Quando $R \rightarrow 0$ a razão $\frac{B^*}{A^*}$ é obtida do anulamento da função de onda $R\psi$ dando como resultado o valor negativo da razão entre os valores cujos coeficientes são B^* e A^* , respectivamente. O erro em $\delta_l(Z)$ por iniciar a solução em determinado R finito é encontrado supondo que a solução nesta condição é dada por:

$$R\psi = C \operatorname{sen} \left(k\sigma R - \frac{l\pi}{2} + \delta_l(\text{aparente}) \right) \quad (3.3.7)$$

onde:

$$\delta_l(\text{aparente}) = \delta_l - E(R) \quad (3.3.8)$$

$E(R)$ sendo o erro em não considerar $R = \infty$.

Para grandes valores de R a equação diferencial (3.3.1) é reduzida a:

$$\frac{d^2 R\psi}{dR^2} = \left(- \left(\frac{4\pi}{\Lambda^*} \right)^2 R^{-6} - Z^2 \right) \left(1 - \frac{l(l+1)R^4}{\left[\left(\frac{4\pi}{\Lambda^*} \right)^2 + Z^2 R^6 \right]} \right) R\psi \quad (3.3.9)$$

Derivando (3.3.7) duas vezes em relação a R , obtém-se:

$$\frac{d^2 R\psi}{dR^2} = \left[-Z^2 + 2Z \frac{dE(R)}{dR} - \frac{d^2 E(R)}{dR^2} \right] R\psi \quad (3.3.10)$$

Agora, comparando (3.3.9) e (3.3.10) e desconsiderando a segunda derivada de $E(R)$ em (3.3.10), bem como o termo subtraído da unidade em (3.3.9) por serem pequenos, chega-se a uma relação entre a derivada de $E(R)$ e R , assim expressa:

$$\frac{dE(R)}{dR} = - \frac{\left(\frac{4\pi}{\Lambda^*} \right)^2}{2Z} R^{-6} \quad (3.3.11)$$

Realizando a integração de (3.3.11), vem:

$$E(R) = \int_{E(R_{\max})}^0 dE(R) = \frac{\left(\frac{4\pi}{\Lambda^*} \right)^2}{10Z R_{\max}^5} \quad (3.3.12)$$

onde $R_{\max}$ é o máximo valor a ser considerado na resolução, logo:

$$\delta_l = \delta_l(\text{aparente}) + \frac{\left(\frac{4\pi}{\Lambda^*} \right)^2}{10Z R_{\max}^5} \quad (3.3.13)$$

Esta é a expressão mostrada em Kilpatrick [12] que corrige os $\delta_l(Z)$ em função do valor máximo de R tomado. Na integração numérica aqui realizada baseou-se na idéia que o erro deveria estar na quarta casa decimal ($E(R_{max}) = 10^{-4}$) podendo desta forma determinar-se o valor de R_{max} correspondente para cada gás em cada $Z = k\sigma$.

Na evolução dos cálculos foi observado que a medida que R tendia a valores cada vez menores (próximos a $R = 0,6$) testando-se a solução nula de $R\psi$ nestes pontos, os $\delta_l(Z)$ modificavam muito pouco, ocorrendo somente variações em suas casas decimais de ordens cada vez maiores. Isto demonstrava uma tendência ao resultado final o qual foi também confirmado testando-se o anulamento da derivada da função de onda nestes mesmos pontos, isto é, a resolução tanto da função de onda como da derivada da função de onda levaram aos mesmos $\delta_l(Z)$. A partir do ponto em que não existiram mais mudanças, até a casa decimal desejada, configurou-se o resultado de δ_l (aparente), o qual, a seguir, foi adicionado ao erro pré- estabelecido, fornecendo δ_l (real). Os valores assim obtidos concordaram com os de Kilpatrick obtidos pelo método de Milne, sendo que, a região de R em que valores de condições de contorno iniciais eram arbitrárias em [12] assemelha-se à região de tendência a um resultado cada vez mais preciso de δ_l nos cálculos aqui realizados. Os resultados foram confrontados com os de De Boer para o hélio 4 [11] e para o hélio 3 [13]. Graficamente, com $\sum_{l_{par}} (2l + 1) \delta_l$ nas ordenadas e $k\sigma$ nas abscissas, a curva para o hélio 4 é traçada na Figura 3.3.1 enquanto as curvas do hélio 3 para a mesma somatória em l par e ímpar em função de $k\sigma$ na 3.3.2.

As Figuras 3.3.1 e 3.3.2 exemplificam a divergência entre os resultados de De Boer e os deste trabalho sendo maior a diferença quando se trata do hélio 3. Novamente os resultados concordaram com os de Kilpatrick coincidindo com os por ele apresentados.

As diferenças de fase em função de $k\sigma$, para os gases hélio 4, hélio 3 e hidrogênio, envolvendo ambas as estruturas para e orto, estão representadas nas Figuras 3.3.4 e 3.3.5, respectivamente. Diferentemente do mostrado para esfera rígida existe uma diferença nos três casos.

Fig. 3.3.1 - $\sum_{l\text{par}}(2l+1)\delta_l \times Z$ (hélio 4)

Fig. 3.3.2 - $\sum_l(2l+1)\delta_l \times Z$, l par e l ímpar (hélio 3).

Fig. 3.3.5 - $\delta_l \times Z$ (Hidrogênio)

As figuras resultam da integração da equação radial de Schrödinger com R decrescente.* Os limites para energia igual a zero mostram que apenas o hidrogênio apresenta níveis discretos de energia (valor π de $\delta_l(0)$) para os números quânticos momento angular $l=0$ e 1. Fora estes casos, as demais diferenças de fase crescem a partir de zero até um valor máximo decrescendo em seguida com o aumento do número de onda k . Fixando-se determinado valor de $Z = k\sigma$, os $\delta_l(Z)$ vão se tornando desprezíveis a medida que l cresce. Isto fornece informação sobre o parâmetro limite de l no cálculo das somatórias das seções transversais de choque de ordens 2, 4 e 6. Dimensionando os gráficos 3.3.3 e 3.3.4 com as medidas e valores limites dos eixos encontrados em [12] observou-se exatidão entre ambos resultados; o mesmo conclui-se da Figura 3.3.5 e a figura apresentada em [14] para o hidrogênio.

* Todas as diferenças de fase, foram calculadas desta maneira e sem qualquer tipo de aproximação, quer semi-clássica quer via aproximação de Bohr.

3.4 Seções transversais de choque

Quando se trata de um potencial que não seja o de esfera rígida, obtém-se diferentes gráficos para as seções transversais simétricas e antissimétricas devido aos diferentes comportamentos das diferenças de fase para cada gás, como foi mostrado na seção 3.3. A influência do parâmetro quântico pode ser percebida na análise das Figuras 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4 representativas do hélio 3, hélio 4 e orto e para-hidrogênio, respectivamente, nos quais estão representadas $\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}$ ($l=2, 4$ e 6) em função de $E^* = \frac{\hbar^2 k^2}{\epsilon m} = \left(\frac{\Lambda^*}{2\pi}\right)^2 Z^2$. Para o hélio 3 cujo parâmetro quanto mecânico de De Boer é $\Lambda^* = 3,08$ o maior de todos entre estes gases, pode-se ver com o auxílio da Figura 3.4.5 que as curvas que correspondem às partes simétrica e antissimétrica estão em fases contrárias, com uma elevação em uma delas correspondendo exatamente a uma depressão na outra. Por esta razão a Figura 3.4.1 que representa a solução dada a partir das expressões (2.3.1) e (2.3.15), não apresenta um pico acentuado em sua curva. Comportamento semelhante pode ser comprovado no caso do hélio 4 ($\Lambda^* = 2,68$) cuja expressão simétrica (2.3.15) representada na Figura 3.4.3 mostra uma queda acentuada da função para valores pequenos de E^* , seguindo-se uma pequena elevação. Referindo-se às duas estruturas do hidrogênio ($\Lambda^* = 1,73$) repara-se que na Figura 3.4.4 do para-hidrogênio, cuja expressão é simétrica pura são verificados picos. No orto-hidrogênio em virtude das curvas das seções simétricas e antissimétricas apresentarem elevações em fase (Fig. 3.4.6) os picos também ficam caracterizados no mesmo ponto que o para-hidrogênio. Estes picos tem valores muito mais altos que o mais alto valor verificado para as elevações que surgem nos gráficos do hélio 3 e 4. Esta questão pode ser melhor observada com a análise da variação de $Q^{(2)*}$ dado por:

$$Q^{(2)*}(E^*) = \frac{3}{2} \left| Q_{\text{sim}}^{(2)}(E^*) + Q_{\text{antis}}^{(2)}(E^*) \right| \quad (3.4.1)$$

através da Figura 3.4.7, reproduzida do artigo [15] de Imam - Rahajoe, Curtiss e Bernstein, que apresenta um gráfico para $\Lambda^* = 0, 1, 2$ e 3 . Em (3.4.1), as expressões simétrica e antissimétrica de $Q^{(2)}$ correspondem as de $\frac{\Theta^{(2)}}{2\pi}$ simétrica e antissimétrica, respectivamente. Quando Λ^* está próximo do zero (resultado clássico), no caso $\Lambda^* = 1$, notam-se vários

picos de origem simétrica e antissimétrica alternadamente, enquanto no caso $\Lambda^* = 3$ os picos somem dando lugar a uma curva bem mais suave abaixo do resultado clássico, até onde estes dados foram estimados.

No caso de $\Lambda^* = 2$, existe uma queda acentuada na função com o crescimento de E^* , não existindo nenhum pico. As curvas para $\Lambda^* = 1$ e $\Lambda^* = 2$ cortam a clássica de $\Lambda^* = 0$ enquanto que para $\Lambda^* = 3$ isto não ocorre na região considerada.

Resume-se então o comportamento do hidrogênio (Fig. 3.4.8) entre aqueles de $\Lambda^* = 1$, de vários picos, e de $\Lambda^* = 2$ de queda cortando a curva clássica. O comportamento do hélio 4 apresenta uma grande queda ($\Lambda^* = 2$) em sua função simétrica e pequena elevação a seguir que não caracteriza um pico ($\Lambda^* = 3$). O resultado do hélio 3 (Fig. 3.4.3) por Λ^* ser aproximadamente igual a três, enquadra-se no anulamento de picos devido a defasagem encontrada.

Fig. 3.4.1 - $\left(\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (hélio 3)

Os resultados obtidos para $l = 2, 4$ e 6 , com semelhança ao caso de esfera rígida, apresentam formas muito parecidas, com diferenças percentuais decrescendo com o acréscimo de βl , isto é, as curvas para $l = 4$ e $l = 6$ estão mais próximas que aquelas para $l = 2$ e $l = 4$ (Figuras: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4).

Para E^* grande, a diferença diminui consideravelmente em valor absoluto devendo todas tender ao resultado clássico de Lennard-Jones para as mesmas. A concordância de $\frac{\Theta^{(2)}}{2\pi}$ com Keller [16] onde calcula com o auxílio de dados de Kilpatrick [12], a viscosidade dos gases hélio 3, hélio 4, e com Cohen (14) na determinação das propriedades de transporte do para e do orto- hidrogênio, é verificada nas Figuras 3.4.9 e 3.4.10.

Fig. 3.4.2 - $\left(\frac{\Theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (hélio 4)

Fig. 3.4.3 - $\left(\frac{\theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (orto-hidrogênio)

Fig. 3.4.4 - $\left(\frac{\theta^{(l)}}{2\pi}\right) \times E^*$ (para-hidrogênio)

Fig. 3.4.5 - Curvas simétricas e antissimétricas fora de fase (hélio 3)

Fig. 3.4.6 - Curvas simétricas e antissimétricas em fase (hidrogênio)

Fig. 3.4.7 - reprodução de $Q^{(2)*} \times E^*$ do artigo de Imam-Rahajoe [15]

Fig. 3.4.8 - $Q^{(2)*} \times E^*$ (hélio 3, hidrogênio)

Fig. 3.4.9 - Comparação com os resultados de Keller [16](hélio 3, hélio 4)

Fig. 3.4.10 - Comparação com os resultados de Cohen [14](para e orto-hidrogênio)

3.5 Determinação numérica das integrais omegas

Nesta seção são apresentados e comparados em várias temperaturas os resultados das integrais omegas, necessários nos cálculos dos coeficientes de transporte obtidos para um potencial $LJ(6-12)$. Os efeitos do valor de σ e das seções transversais de choque também são verificados no integrando $Y(\Omega^{(l,r)})$ dado pela equação (2.6.4) e desta maneira na própria função $Y(\Omega^{(l,r)})$ (eq.(2.6.4)).

Fig. 3.5.1 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ para os potenciais de esfera rígida e de Lennard-Jones (hélio 4)

Uma análise dos integrandos $Y(\Omega^{(2,2)})$ dos gases sujeitos ao potencial de Lennard-Jones mostra algumas características interessantes. Devido ao maior valor de σ para este potencial em comparação com o diâmetro de esfera rígida dos mesmos gases, o fator exponencial na equação (2.6.4) faz com que esta função cresça e seja em geral maior que o valor da esfera rígida. A exceção ocorre quando se trata do hélio 4 onde a queda nas seções transversais a valores abaixo dos de esfera rígida (Fig. 3.4.2) provoca também uma queda na função $Y(\Omega^{(2,2)})$ (abaixo do valor de esfera rígida) (Fig. 3.5.1) caracterizando-a, por exemplo para $T=1 \text{ K}$, por dois pontos de máximo (Figuras 3.5.2 e 3.5.3). Este novo

ponto de máximo não se manifesta nos gráficos dos demais gases: hélio 3, para e orto-hidrogênio. A envoltória da família de curvas em várias temperaturas até 100 K dadas pela própria curva a esta temperatura (Fig. 3.5.3) também confirma o caráter distinto do hélio 4 em relação a outros gases estudados.

Fig. 3.5.2 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ ($T=1K$)

Da Figura 3.5.1 nota-se que para obter a integração de $Y(\Omega^{(l,r)})$ em relação a α , no caso de LJ (6-12), deve-se tomar valores menores dos limites de α à esquerda e valores maiores à direita da curva representativa do gás de esfera rígida. Porém na integração de $(\frac{\lambda}{\sigma})^{2r+4} Y(\Omega^{(l,r)})$, a qual leva ao valor de $\Omega^{(l,r)}$, o intervalo efetivo para α em uma dada temperatura sofre uma redução, a qual é maior no caso de esfera rígida, para $\frac{\lambda}{\sigma} < 1$, e um acréscimo, menor no caso de esfera rígida, quando $\frac{\lambda}{\sigma} > 1$, pois $\sigma(ER) < \sigma(LJ(6-12))$.

O procedimento, aqui realizado, com o objetivo de simplificar o programa computacional, levou em conta a obtenção simultânea dos $Y[\Omega^{(l,r)}]$ para todas as temperaturas num mesmo α , desde $\alpha = 0,01$ útil na integração de baixas temperaturas até $\alpha = 1,56$ (necessário na integração de altas temperaturas). Os passos seguidos na integração de

$\Omega^{(l,r)}$ podem ser encontrados no Apêndice VII.

Os gráficos anteriores referem-se somente aos integrandos de $\Omega^{(2,2)}$, os $Y(\Omega^{(2,r)})$ com $r = 3, 4, \dots, 10$ podem ser vistos como $Z^{2r-4} Y(\Omega^{(2,2)})$ enquanto $Y(\Omega^{(4,r)})$ e $Y(\Omega^{(6,6)})$ não devem ter comportamento muito diferente em razão das seções transversais de ordens $l=4$ e $l=6$ terem formas parecidas com a de $l=2$ como já foi visto na última seção.

Fig. 3.5.3 - $Y[\Omega^{(2,2)}] \times \alpha$ ($T=1K$) (ordenada não logarítmica)

Apresenta-se a seguir na variação das funções $\Omega^{(l,r)*}$ com T^* seguindo Hirschfelder, Curtiss e Bird [4] e Imam- Rahajoe, Curtiss e Bernstein [15]. As definições para $\Omega^{(l,r)}$ e T^* são seguintes:

$$\Omega^{(l,r)*} = \frac{\Omega^{(l,r)}}{\Omega_{(\text{esfera rígida-clássico})}^{(l,r)}} \quad (3.5.1)$$

$$T^* = \frac{T}{\epsilon/k} = \frac{kT}{\epsilon} \quad (3.5.2)$$

Do Capítulo II pode ser visto que os coeficientes de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica em primeira aproximação são funções apenas de $\Omega^{(2,2)}$, por esta razão na literatura é dada maior ênfase a estas integrais no que se refere a resultados numéricos. Elas são aqui representadas em função de T^* para os gases em estudo a baixas e a mais altas temperaturas (Fig. 3.5.5) e (Fig. 3.5.6), respectivamente, com comparação com $\Omega^{(2,2)}$ (clássico). As integrais $\Omega^{(4,4)*}$ e $\Omega^{(6,6)*}$ aparecem representados a partir de $T^* = 0,3$ (até onde existem resultados clássicos para $\Omega^{(4,4)*}$ em Hirschfelder [4]) nas Figuras 3.5.7 e 3.5.8, respectivamente.

Fig. 3.5.4 - Envoltória das curvas de temperaturas abaixo de 100 K

A Figura 3.5.4 engloba todas as integrais com índices l e r pares. Pode-se verificar as superposições entre os $\Omega^{(l,r)*}$'s com r 's idênticos, que divergem um pouco a altas temperaturas. As integrais com r 's ímpares, que não são encontradas na Figura, tem valores

aproximadamente entre aqueles de índices $r - 1$ e $r + 1$.

Visto que a curva dos resultados quânticos toca a curva dos clássicos em aproximadamente $T^* = 10$ para $\Omega^{(2,2)}$ (Fig. 3.5.7), $T^* = 4$ para $\Omega^{(4,4)}$, $T^* < 10$ para $\Omega^{(6,6)}$ e qualquer outro $\Omega^{(l,r)}$ não citado, pode-se concluir desta Figura em razão dos valores de ϵ/k (Tabela III) que a correspondência dos coeficientes de transporte com os resultados clássicos ocorrerá em mais altas temperaturas para os "hidrogênios" que para os "hélios". A Figura de $\Omega^{(2,2)*} \times T^*$ ainda mostra, como era esperado, que devido ao maior valor de Λ^* para o hélio 3 seguido do hélio 4 e hidrogênios, suas curvas apresentam-se mais afastadas da clássica seguindo esta mesma ordem.

Fig. 3.5.5 - $\Omega^{(2,2)} \times T^*$ (muito baixa temperatura)

Fig. 3.5.6 - $\Omega^{(2,2)} \times T^*$ ($0,3 < T^* < 10$) Fig. 3.5.7 - $\Omega^{(4,4)} \times T^*$ ($0,3 < T^* < 10$)

Fig. 3.5.8 - $\Omega^{(6,6)} \times T^*$ Fig. 3.5.9 - $\Omega^{(l,r)} \times T^*$ (hélio 4)

3.6 Coeficientes de transporte

Este capítulo será concluído considerando a análise gráfica dos coeficientes de viscosidade e de condutividade térmica, calculados até a quinta aproximação, cujas funções em termos de integrais de colisão são dadas pelas equações (2.7.1) e (2.7.2).

Comumente na literatura o coeficiente de condutividade térmica é considerado como um resultado estendido da viscosidade de cisalhamento, dada a proporcionalidade entre estes coeficientes, a qual fornece um valor constante, em primeira aproximação, conforme a equação (2.7.5). Em uma aproximação de ordem n , a razão entre estes coeficientes não é mais constante e $[\lambda]_n$ em qualquer aproximação pode ser visto da seguinte forma :

$$[\lambda]_n = \kappa_1 \left[1 + \frac{(\Delta\kappa)_n}{\kappa_1} \right] \frac{k}{m} [\mu]_n \quad (3.6.1)$$

onde:

$$\kappa_1 = \frac{15}{4}$$

e

$$(\Delta\kappa)_n = \kappa_n - \kappa_1$$

com κ_n sendo proporcional à razão entre estes coeficientes em uma aproximação de ordem n (eq. 2.7.6).

Neste trabalho é mostrada a validade da obtenção destas aproximações com ordens superiores a 1ª para os coeficientes já citados. As Figuras (2.7.1 e 2.7.4) para um potencial de esfera rígida além das Figs.(3.6.1 - 3.6.4) no caso de Lennard-Jones (6-12) explicam o exposto acima. São comparadas as aproximações de 1ª ordem para $(\Delta\kappa)$ que significam uma reta coincidente com o eixo das temperaturas $(\Delta\kappa_1) = 0$ com resultados de 2ª e 5ª ordens de aproximação. Constata-se para todos os gases que o maior valor de $\Delta\kappa$, verificado para um potencial LJ(6-12) para um determinado gás, é maior que o de esfera rígida para o mesmo gás. Estes valores máximos são observados a baixas temperaturas, localizando-se para todos os gases estudados abaixo de $T = 4K$.

Para o hélio 4, que possui em média os maiores valores de $(\Delta\kappa)$ o máximo valor é encontrado em torno de $T = 0,3$ K. Nesta temperatura em particular, no caso de um potencial de Lennard-Jones , tem-se para a condutividade térmica através da equação (3.6.1) :

$$\begin{aligned} [\lambda]_1 &= \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_1 \\ [\lambda]_2 &\approx 1,075 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_2 \\ [\lambda]_5 &\approx 1,080 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_5 \end{aligned}$$

Já para o para-hidrogênio cujo $(\Delta\kappa)$ máximo localiza-se em torno de 3K tem-se para esta temperatura :

$$\begin{aligned} [\lambda]_2 &\approx 1,008 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_2 \\ [\lambda]_5 &\approx 1,009 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_5 \end{aligned}$$

Para o hélio 3 com máximo também próximo a 3K:

$$\begin{aligned} [\lambda]_2 &\approx 1,017 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_2 \\ [\lambda]_5 &\approx 1,021 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_5 \end{aligned}$$

O valor máximo de $\Delta\kappa$ do orto-hidrogênio localiza-se um pouco abaixo de 0,4 K, fornecendo para este valor de T:

$$\begin{aligned} [\lambda]_2 &\approx 1,008 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_2 \\ [\lambda]_5 &\approx 1,010 \kappa_1 \frac{k}{m} [\mu]_5 \end{aligned}$$

Como é possível conferir (Figs.3.6.1 e 3.6.2), a muito baixas temperaturas (mais claramente abaixo de 1K), as discrepâncias em relação à aproximação de 1ª ordem são maiores para o hélio 4 que para o hélio 3. Quando é considerado o intervalo de 1 a 10K o quadro se inverte, surgindo que as maiores diferenças em média são retratadas na Figura 3.6.2 do hélio 3. A temperaturas acima de 10K até 100K as diferenças praticamente se equivalem.

O para-hidrogênio e orto-hidrogênio cuja divergência refere-se apenas às seções transversais de choque (de simplesmente simétrica para uma composição fracional de simétricas e anti-simétricas mostram valores máximos de $\Delta\kappa$ em regiões distintas. No orto- hidrogênio esta localiza-se abaixo de 1 K enquanto no para- hidrogênio a região está compreendida entre 1 e 10 K. Em ambos verifica-se um ponto de mínimo entre 1 e 1,5 K (além do hélio 3) e semelhança de comportamento acima de 10K Figs. 3.6.3 e 3.6.4.

Enquanto os hidrogênios apresentam um ponto de mínimo seguido de um crescimento acentuado de $\Delta\kappa$ a partir de aproximadamente $T=25$ K, os "hélios" tendem a mostrar um valor praticamente constante nesta região.

Fig. 3.6.1 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (hélio 4)

Fig. 3.6.2 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (hlio 3) Fig. 3.6.3 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (para-hidrognio)

Fig. 3.6.4 - $(\Delta\kappa)_n \times T$ (orto-hidrogênio)

Os gráficos dos coeficientes de transporte a seguir produzem uma comparação entre os resultados teóricos de esfera rígida e os de Lennard-Jones que foram aqui calculados. Contém comparações destes com os desenvolvidos teoricamente por outros pesquisadores, com mesmos ou outros potenciais de interação, bem como comparações com resultados provenientes de experimentos.

A principal fonte de comparação com resultados deste trabalho no caso do hélio 4 e hélio 3 foi a de Aziz [17] cujos resultados numéricos foram reproduzidos por Kestin [8]. Aziz, Nain, Carley, Taylor e McConville [17] desenvolveram um potencial levando em conta a dispersão Hartree-Fock que se origina na repulsão entre sistemas de camadas fechadas. Este potencial foi denominado HFDHE2. Seguindo Aziz [17], os resultados para a viscosidade foram representados considerando a função $10^{11/2} \mu (MT)^{-1/2}$ em relação à temperatura. Num gráfico desta natureza a aproximação clássica de esfera rígida de ordem n representa uma reta paralela ao eixo T cujo valor constante da ordenada é :

$$10^{11/2} \mu (M T)^{-1/2} = \frac{5 \times 10^7}{4\sigma^2 \sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{k}{N_A}} \frac{\det U_{nn}^c}{\det A_{nn}^c}$$

onde U_{nn}^c e A_{nn}^c são as matrizes como definidas no Capítulo II (2.7.3) como funções de constantes $\Omega^{(l,r)}$ clássicas (Tabela II coluna 2), N_A é o número de Avogrado, M é a massa molecular e σ é o diâmetro.

A curva de viscosidade tanto para o hélio 4 como para o hélio 3 ((Fig. 3.6.5) tem valores acima dos dados de Aziz [17], mas nem por isso caracterizaram-se por mais distantes dos experimentais. Principalmente quando se trata do hélio 4, os valores obtidos de LJ(6-12) (5ª aproximação) na região entre 1 e 10 K encontram-se mais próximos dos experimentais que os de Aziz com o potencial HFDHE2. Para o hélio 3 nesta mesma região de temperatura os pontos experimentais encontram-se entre as duas curvas com maior proximidade para a curva de Aziz. Os resultados experimentais acima destas temperaturas como apresentados em [17] são provenientes propriamente do gás hélio e necessitam de uma teoria de misturas para validar uma melhor comparação. Entretanto seguindo o mesmo procedimento lá apresentado eles são representados, com maior semelhança com os resultados do hélio 4 o qual possui a mesma massa que o hélio e cuja concentração é bem mais alta que a do hélio 3. *

A união entre as curvas do hélio 4 e hélio 3 ocorre em uma temperatura inferior para LJ(6-12) (5ª aproximação) em relação ao HFDHE2. Observando a Figura 3.6.6 onde aparecem conjuntamente LJ(6-12) (5ª aproximação) e esfera rígida (5ª aproximação) nota-se que a muito baixas temperaturas (< 1 K) o comportamento diverge consideravelmente quanto à forma da curva, quando a temperatura cresce (1 - 10 K), as duas curvas se aproximam para o hélio 4 continuando a divergir para o hélio 3. Neste intervalo existe o cruzamento das duas curvas para esfera rígida e a partir daí os valores destas funções mantêm uma pequena diferença para todas as temperaturas até 100 K, distinto do que ocorre nos outros dois casos LJ(6-12) (5ª aproximação) e HFDHE2 que mostram uma

* A ocorrência na natureza é de 99,999862% para o hélio 4 e 0,00014% para o hélio 3 conforme [18].

convergência para um só resultado a partir de uma temperatura entre 10 e 100 K. Em Monchick, Mason, Mun e Smith [19] encontra-se que a convergência do resultado clássico para o hélio, com um potencial de Lennard-Jones, verifica-se em aproximadamente 100 K e abaixo desta temperatura os valores clássicos estão abaixo dos quânticos e bem distantes dos experimentais (Fig. 3.6.7).

Desde que o hélio 3 não apresenta resultados satisfatórios no que diz respeito à esfera rígida, serão considerados apenas os resultados para o hélio 4 para este potencial que por sinal traduzem muito bem os resultados experimentais, como pode ser comprovado na Figura 3.6.8.

Fig. 3.6.5 - Viscosidade do hélio

Fig. 3.6.6 - Viscosidade do hélio (resultados teóricos)

Fig. 3.6.7 - Viscosidade do hélio (Reproduzida do artigo de Monchick [19])

Fig.3.6.8 - Viscosidade do hélio 4 (potencial de esferas rígidas) (5ª aproximação))

Fig. 3.6.9 - Condutividade térmica do hélio

Na Figura 3.6.9 da condutividade é importante notar a coincidência no formato e na proximidade das curvas teóricas de Aziz, Powell [17] e as deste trabalho para LJ(6-12) (5ª aproximação). As de esfera rígida (ER- 5ª aproximação) apresentam coincidência de forma e aproximações com os outros valores teóricos a partir de $T \approx 2K$ para o hélio 4 e $T \approx 10K$ para o hélio 3. Estas também não apresentam a característica das elevações (lombadas) que se verificam abaixo de 2K para o hélio 4 e entre 1 e 10K para o hélio 3. Os resultados experimentais são os de Ubbink e De Haas [20].

As referências de comparação envolvendo viscosidade de cisalhamento dos gases para-hidrogênio e orto-hidrogênio foram os artigos de Cohen [14], de Hanley [21] e de Kamal [22]. Cohen e De Boer [14] fizeram uso do potencial LJ (6-12) com os mesmos $\frac{\epsilon}{k}$ e σ que os deste trabalho; Hanley e colaboradores, consideraram valores diferentes para estes parâmetros quânticos, embora o mesmo potencial a baixas temperaturas e Kamal e El Shimy [22] investigaram as propriedades de transporte através de um potencial de Buckingham com modificações. Tendo em vista que Cohen[14] e Kamal[22] apresentaram unicamente resultados para algumas temperaturas e em razão da proximidade destes com os resultados deste trabalho, estes foram apresentados por símbolos centrados na Figura 3.6.11.

Só é possível a distinção clara da estrutura para da orto se o eixo das abcissas (T) for logarítmico como demonstrado na Fig. 3.6.10. Nesta Figura percebe-se uma separação entre as curvas do para e do orto-hidrogênio, sendo que no caso do potencial de Lennard-Jones (6- 12) (5ª aproximação), abaixo de 5K e abaixo de 45 K para o caso de esfera rígida (5ª aproximação), há uma diferença mais visível entre estas, com o orto-hidrogênio mostrando valores acima do para-hidrogênio. Os resultados experimentais contradizem este ponto, no entanto para temperaturas maiores que as estipuladas no texto acima existe uma inversão com os valores do para- hidrogênio levemente superiores aos do orto-hidrogênio. A Figura 3.6.11 revela as diferenças entre as duas estruturas focalizando os resultados de LJ (6-12) (5ª aproximação), esfera rígida (5ª aproximação), LJ (6-12) (Cohen 1ª aproximação) e de Buckingham modificado (Kamal 1ª aproximação). O gráfico (Fig. 3.6.12) para a viscosidade de cisalhamento da estrutura para do hidrogênio, considera os resulta-

dos experimentais de Coremans [23] e de Roder e de Diller [24]. Nesta Figura é possível verificar que os resultados de Hanley estão mais próximos dos experimentais. A curva que representa resultados de um LJ (6-12)(5ª aproximação) está um pouco acima da de Hanley e ainda é satisfatória, enquanto a de esfera rígida não é adequada para a maior parte dos pontos. Esta última somente a partir de aproximadamente 60 K apresenta uma convergência para a de Hanley, quase tangenciando a mesma na temperatura de 100 K.

Finalizando, a condutividade térmica do para e do orto-hidrogênio é analisada e os resultados para o para-hidrogênio comparados com os experimentais de Roder e Diller [24] e de Johnston [25].

Fig. 3.6.10 - Viscosidade do hidrogênio (estruturas para e orto)

Fig. 3.6.11 - Diferenças na viscosidade (estruturas para e orto)

Fig. 3.6.12 - Viscosidade do para-hidrogênio

A Figura 3.6.13 compara os resultados deste trabalho (para um potencial LJ (6-12) (5ª aproximação) e de esferas rígidas (5ª aproximação)) com resultados experimentais e com os teóricos de Hanley e colaboradores (em 2ª aproximação). Em relação às curvas de Hanley e às correspondentes a um LJ (6-12) (5ª aproximação) pode-se dizer que estas correspondem a resultados bem próximos dos experimentais predominando a de Hanley em relação a estes resultados. Os resultados de esfera-rígida (5ª aproximação) aproximam-se dos valores experimentais, e portanto, dos teóricos representados pelas outras curvas, em uma faixa pequena de temperatura (de 60 a 80 K aproximadamente). Enquanto na Figura 3.6.12 da viscosidade, a curva de Hanley não cruzava com as curvas dos resultados deste trabalho, na condutividade térmica (Fig. 3.6.13), em razão das aproximações utilizadas serem maiores que a primeira, elas apresentam o cruzamento, e este ocorre em torno de 70 K.

Fig. 3.6.13 Condutividade Térmica do para-hidrogênio

CAPÍTULO 4

MÉTODO DOS MOMENTOS PARA UM GÁS IDEAL QUÂNTICO

4.1 Introdução

O estudo dos gases ideais quânticos será complementado com o tratamento neste capítulo da equação modificada de Boltzmann (1.4.13), a de Uehling e Uhlenbeck [1], que reúne em sua expressão além dos efeitos de difração, os efeitos de simetria devido à consideração de estatísticas quânticas. Antes de entrar no método dos momentos propriamente dito, é mostrado como se obtém a equação de transferência para um gás ideal quântico, e com a utilização desta, a expressão da função de distribuição de equilíbrio. As equações que caracterizam um estado de equilíbrio também são encontradas por intermédio da substituição da função de distribuição neste estado na equação de Uehling e Uhlenbeck.

Na seção 4.6 o método dos momentos de Grad [2] é aplicado ao caso de um gás ideal quântico caracterizado por 13 campos básicos: a densidade, a velocidade, o tensor pressão e o fluxo de calor. As equações de balanço para estes campos são encontradas por meio da equação de transferência e a seguir, após a dedução da função de distribuição fora do equilíbrio por maximização da entropia, as equações de campo referentes a estas. Por um método de iteração Maxwelliana os coeficientes de condutividade térmica e de viscosidades

de cisalhamento são determinadas para o caso de um gás fracamente degenerado.

Assim como a função de distribuição fora do equilíbrio, a entropia e o fluxo de entropia são obtidas como funções de integrais que representam as três estatísticas aqui tratadas: a de Fermi-Dirac, a de Bose-Einstein e a clássica de Maxwell-Boltzmann.

4.2 Equação de transferência e a função de distribuição em equilíbrio

Seja a equação (1.4.13) de Uehling e Uhlenbeck para tratamento de gases quânticos que envolvam efeitos conjuntamente de difração e de simetria como citados na seção 1.4:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} = \int \left[f'_1 f' \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right) \right. \\ \left. - f_1 f \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right) \right] \alpha(\chi, g) g \sin \chi d\chi d\epsilon dc_1 \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

onde $A = (2s + 1) \left(\frac{m}{h} \right)^3$ (com s sendo o número de spin) é a densidade de números de estados e $\epsilon = (-1, +1, 0)$ distingue as partículas como férmions, bosons ou sujeitas à estatística clássica, respectivamente.

Seguindo o mesmo procedimento do primeiro capítulo na determinação da equação de transferência (Seção 1.5), multiplica-se a equação (4.2.1) por uma função arbitrária $Z(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ e integra-se em todas as velocidades $\mathbf{c}$

Repetindo os passos da Seção 1.5 decorre que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int Z f d\mathbf{c} + \frac{\partial}{\partial x_i} \int Z f c_i d\mathbf{c} - \int \left[\frac{\partial Z}{\partial t} + c_i \frac{\partial Z}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial Z}{\partial c_i} \right] f d\mathbf{c} = \\ \int Z \left[f'_1 f' \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right) - f_1 f \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right) \right] \alpha(\chi, g) g \sin \chi d\chi d\epsilon dc dc_1 \end{aligned} \quad (4.2.2)$$

e por semelhança ainda ao que foi efetuado nessa seção, o segundo membro de (4.2.2) pode ser escrito como:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} \int [Z + Z_1 - Z' - Z'_1] \left[f'_1 f' \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right) \right. \\ & \left. - f_1 f \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right) \right] \alpha(\chi, g) g \sin \chi d\chi d\epsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \end{aligned} \quad (4.2.3)$$

ou mesmo:

$$\int (Z' - Z) f_1 f \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right) \alpha(\chi, g) g \sin \chi d\chi d\epsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \quad (4.2.4)$$

A equação (4.2.2) representa a equação de transferência, ou também chamada equação de transporte, para um gás ideal quântico.

Se for escolhida a função arbitrária

$$Z = -k \left[\ln \frac{f}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon f} + 1 \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \right] \quad (4.2.5)$$

definidas as grandezas ϱ , h e h_i como

$$\varrho h = -k \int \left[f \ln \frac{f}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon} + f \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \right] d\mathbf{c} \quad (4.2.6)$$

$$h_i = -k \int \left[f \ln \frac{f}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon} + f \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \right] C_i d\mathbf{c} \quad (4.2.7)$$

a substituição de (4.2.5) em (4.2.2), conjuntamente com o termo devido às colisões (4.2.3), fornece:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \varrho h}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\varrho h v_i + h_i) = - \int \frac{k}{f} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} \right] f d\mathbf{c} \\ & - k \int \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \frac{A}{\epsilon f^2} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} \right] f d\mathbf{c} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +k \int \left(\frac{A}{\epsilon f} + 1 \right) \frac{\frac{\epsilon}{A}}{\left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + c_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial c_i} \right] f d\mathbf{c} \\
& + \frac{k}{4} \int \ln \frac{f f_1 \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right)}{f' f'_1 \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right)} \\
& \times \left[f'_1 f' \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right) - f_1 f \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right) \right] g \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\epsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \\
& + k \int \frac{A}{\epsilon f} \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left[f'_1 f' \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right) \right. \\
& \left. - f_1 f \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right) \right] \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\epsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \tag{4.2.8}
\end{aligned}$$

Desde que as somas, da primeira com a terceira e da segunda com a quinta das integrais, no lado direito de (4.2.8) se anulam, a equação resultante define a seguinte desigualdade:

$$\frac{\partial \rho h}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho h v_i + h_i) \geq 0 \tag{4.2.9}$$

O lado direito de (4.2.8), resumido à quarta integral, será nulo se

$$\frac{f f_1 \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right)}{f' f'_1 \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right)} = 1 \tag{4.2.10}$$

ou o que significa o mesmo:

$$\ln \frac{\frac{f}{A}}{\left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right)} + \ln \frac{\frac{f_1}{A}}{\left(1 + \frac{\epsilon f_1}{A} \right)} = \ln \frac{\frac{f'}{A}}{\left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} \right)} + \ln \frac{\frac{f'_1}{A}}{\left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A} \right)} \tag{4.2.11}$$

O termo genérico da soma em (4.2.11), a qual é válida para a função de distribuição em equilíbrio, em razão de igualar o número de colisões que criam e destroem pontos de fase, configura-se como um invariante de soma (vide Seção 1.5), e como tal pode ser expresso por:

$$\ln \frac{\frac{f_E}{A}}{\left(1 + \frac{\epsilon f_E}{A}\right)} = a + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + d c^2 \quad (4.2.12)$$

onde os termos a , $\mathbf{b}$ e d são funções independentes da velocidade que serão determinadas em seguida através das equações que definem a densidade, a densidade de momento linear, a densidade de energia interna, a densidade de entropia, a pressão e a entalpia livre específica. Reescrevendo as funções em (4.2.12) como:

$$a = -\alpha - \beta u^2$$

$$\mathbf{b} = 2\beta \mathbf{u}$$

e

$$d = -\beta \quad (4.2.13)$$

obtém-se:

$$\frac{f_E/A}{\left(1 + \epsilon f_E/A\right)} = e^{-\alpha - \beta(\mathbf{c} - \mathbf{u})^2} \quad (4.2.14)$$

e para a função de distribuição em equilíbrio a seguinte expressão:

$$f_E = \frac{A}{e^{\alpha + x^2} - \epsilon} \quad (4.2.15)$$

com

$$x^2 = \beta(\mathbf{c} - \mathbf{u})^2$$

Da definição da densidade de momento linear (1.6.8), encontra-se que:

$$\rho v_i = \int m c_i f_E d\mathbf{c} = \int m(c_i - u_i) f^E d(\mathbf{c} - \mathbf{u}) + \int m u_i f_E d\mathbf{c} = \rho u_i \quad (4.2.16)$$

a qual demonstra que a função vetorial u é igual ao vetor velocidade do gás $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ e portanto $(\mathbf{c} - \mathbf{u}) = (\mathbf{c} - \mathbf{v})$ é a da velocidade peculiar do gás C.

Para a definição das grandezas que vem a seguir será utilizada a seguinte integral:

$$I_n^\epsilon(\alpha) = \int_0^\infty \frac{x^n dx}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \quad (4.2.17)$$

que também representa as três estatísticas de distribuição diferenciadas por $\epsilon = (-1, 1 \text{ ou } 0)$. Através destas integrais a densidade ρ (1.6.7) e a densidade de energia interna u (1.6.9) tomam a seguinte forma:

$$\rho = \frac{4\pi mA}{\beta^{3/2}} I_2^\epsilon(\alpha) \quad (4.2.18)$$

$$\rho u = \frac{2\pi mA}{\beta^{5/2}} I_4^\epsilon(\alpha) \quad (4.2.19)$$

Dividindo (4.2.19) por (4.2.18) encontra-se para a energia interna específica:

$$u = \frac{1}{2\beta} \frac{I_4^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)} \quad (4.2.20)$$

A equação (4.2.9) é conhecida na termodinâmica como desigualdade entrópica:

$$\frac{\partial \rho \eta}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho \eta v_i + \phi_i) \geq 0 \quad (4.2.21)$$

logo $h = \eta$ é a entropia específica e $h_i = \phi_i$ é o fluxo de entropia. Identifica-se a densidade de entropia e o fluxo desta grandeza em equilíbrio por meio das seguintes expressões:

$$\rho \eta_E = \rho h_E = -k \int \left[f_E \ln \frac{f_E}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon} + f_E \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f_E}{A} \right) \right] d\mathbf{c} \quad (4.2.22)$$

$$\phi_i^E = h_i^E = -k \int [f_E \ln \frac{f_E}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon} + f_E \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f_E}{A} \right)] C_i dc \quad (4.2.23)$$

sendo ϕ_i^E obviamente nulo visto que f_E é uma função par da velocidade peculiar.

Considerando (4.2.14) e que $dC = dc = (\beta)^{-3/2} 4\pi x^2 dx$, $\rho\eta_E$ fica:

$$\rho\eta_E = -4\pi\beta^{-3/2}k \int [f_E(-\alpha) - f_E x^2 - \frac{A}{\epsilon} \ln(1 + \epsilon f_E/A)] x^2 dx \quad (4.2.24)$$

e desta segue, de acordo com as definições da densidade de massa e de energia interna, que:

$$\rho\eta_E = \frac{k}{m}\rho\alpha + 2\beta\frac{k}{m}\rho u + \frac{4\pi Ak}{\epsilon} \left(\frac{1}{\beta}\right)^{3/2} \int_0^\infty \ln(1 + \frac{\epsilon f_E}{A}) x^2 dx \quad (4.2.25)$$

A integração do último termo do lado direito em (4.2.25), resulta em:

$$\left[\ln(1 + \frac{\epsilon f_E}{A}) \frac{x^3}{3} \right]_0^\infty - \int_0^\infty \frac{x^3}{3} \frac{1}{(1 + \frac{\epsilon f_E}{A})} \frac{\epsilon (-A) 2x e^{(\alpha+x^2)}}{A (e^\alpha + x^2 - \epsilon)^2} dx \quad (4.2.26)$$

No termo entre os colchetes a substituição do limite inferior leva a resultado claramente nulo, enquanto que, da análise do termo com limite tendendo ao infinito e levantando-se a indeterminação conclui-se que esta também é zero. Novamente da observação de (4.2.14) e da equação de f_E (4.2.15) pode-se representar a integral em (4.2.26) como função de ρu (4.2.19), de tal forma que (4.2.25) pode ser reescrita na forma:

$$\rho\eta_E = \frac{k}{m}\rho\alpha + \frac{10}{3} \frac{k}{m}\beta\rho u \quad (4.2.27)$$

ou com base nas integrais $I_n^\epsilon(\alpha)$:

$$\rho\eta_E = \frac{k}{m}\rho\alpha + \frac{5}{3} \frac{k}{m}\rho \frac{I_4^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)} \quad (4.2.28)$$

Dividindo-se (4.2.27) por ρ e diferenciando-se obtém-se:

$$d\eta_E = \frac{k}{m}d\alpha + \frac{10}{3} \frac{k}{m}(\beta du + u d\beta) \quad (4.2.29)$$

A definição das integrais $I_n^\epsilon(\alpha)$ leva à seguinte relação de reconcorrência para suas derivadas:

$$\frac{dI_n^\epsilon(\alpha)}{d\alpha} = -\frac{(n-1)}{2} I_{n-2}^\epsilon(\alpha) \quad (4.2.30)$$

o que permite escrever, considerando a diferenciação de (4.2.20):

$$dI_4^\epsilon(\alpha) = 2u\beta dI_2^\epsilon(\alpha) + 2uI_2^\epsilon(\alpha)d\beta + 2\beta I_2^\epsilon(\alpha)du = -\left(\frac{3}{2}\right) I_2^\epsilon(\alpha)d\alpha \quad (4.2.31)$$

Da qual se extrai que:

$$d\alpha = -\frac{4u}{3I_2^\epsilon(\alpha)}\beta dI_2^\epsilon(\alpha) - \frac{4u}{3}d\beta - \frac{4\beta}{3}du \quad (4.2.32)$$

Com a substituição de (4.2.32) em (4.2.29), tem-se:

$$d\eta_E = 2\frac{k}{m}\beta du + 2\frac{k}{m}u d\beta - \frac{4}{3}\frac{k}{m}\beta u \frac{dI_2^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)} \quad (4.2.33)$$

Diferenciando ρ (eq.(4.2.18)) e escrevendo em termos do próprio ρ tem-se:

$$d\rho = -\left(\frac{3}{2}\right)\frac{1}{\beta}\rho d\beta + \frac{\rho}{I_2}dI_2 \quad (4.2.34)$$

retirando-se então $\frac{dI_2}{I_2}$ de (4.2.34) e substituindo em (4.2.33), encontra-se após as devidas simplificações:

$$d\eta_E = 2\frac{k}{m}\beta[du - \frac{2}{3}\frac{u}{\rho}d\rho] \quad (4.2.35)$$

Visto a pressão ser definida através de:

$$p = \frac{1}{3}p_{rr} = \frac{1}{3} \int m C^2 f d\mathbf{c} = \frac{2}{3}\rho u \quad (4.2.36)$$

(4.2.35) fica:

$$d\eta_E = 2\frac{k}{m}\beta[du - \frac{p}{\rho^2}d\rho] \quad (4.2.37)$$

Comparada à equação de Gibbs da termodinâmica:

$$d\eta_E = \frac{1}{T}[du_E - \frac{p}{\rho^2}d\rho] \quad (4.2.38)$$

ela proporciona a identificação de β como:

$$\beta = \frac{m}{2kT} \quad (4.2.39)$$

A determinação de α é feita através da definição de entalpia livre específica ou a energia livre de Gibbs:

$$g = u - T\eta - \frac{p}{\rho} = \frac{5}{3}u - T\eta = \frac{5}{2}\frac{p}{\rho} - T\eta \quad (4.2.40)$$

Com a substituição de u e η pelas suas expressões (4.2.20) e (4.2.28) , respectivamente, e de (4.2.39), esta torna-se:

$$g = \frac{5}{3}\frac{k}{m}T\frac{I_4^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)} - T[\frac{k}{m}\alpha + \frac{5}{3}\frac{k}{m}\frac{I_4^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)}] \quad (4.2.41)$$

a qual conduz a:

$$g = -\frac{kT}{m}\alpha \quad (4.2.42)$$

e assim o valor de α :

$$\alpha = -\frac{\zeta}{kT}H \quad (4.2.43)$$

onde $\zeta = mg$ é a entalpia livre do gás ideal em consideração .

Portanto a função de distribuição em equilíbrio tem a forma dada em (4.2.15):

$$f_E = \frac{A}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \quad (4.2.44)$$

Com: $A = (2s+1)\left(\frac{m}{h}\right)^3$, $\alpha = -\frac{\zeta}{kT}$ e $x^2 = \frac{m}{2kT}C^2$.

No caso clássico $\epsilon = 0$ e a correspondência entre expressões clássica (1.6.10) e quântica (4.2.44) é:

$$Ae^{\frac{\zeta}{kT}} = \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (4.2.45)$$

4.3 Estados de equilíbrio

No equilíbrio a equação de Uehling e Uhlenbeck toma a forma simples:

$$\frac{\partial f_E}{\partial t} + c_i \frac{\partial f_E}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f_E}{\partial c_i} = 0 \quad (4.3.1)$$

em razão do anulamento do termo de colisão.

Substituindo-se f_E (4.2.44) em (4.3.1) obtém-se:

$$\frac{\partial f_E}{\partial \alpha} \left\{ \left[\frac{\partial \alpha}{\partial t} - \frac{mC^2}{2kT^2} \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{m}{kT} C_r \frac{\partial v_r}{\partial t} \right] + (C_i + v_i) \left[\frac{\partial \alpha}{\partial x_i} \right] \right\}$$

$$\left. -\frac{m}{2kT} C^2 \frac{\partial T}{\partial x_i} - \frac{m}{kT} C_r \frac{\partial v_r}{\partial x_i} \right] + F_i \frac{m}{kT} C_i \Big\} = 0 \quad (4.3.2)$$

A equação (4.3.2) é uma equação polinomial em C . Logo o termo que não possui a velocidade, o coeficiente de C_i , o coeficiente de $C_i C_j$ e o coeficiente de $C^2 C_i$ devem se anular. Assim:

$$\dot{\alpha} = 0 \quad (4.3.3)$$

$$\dot{v}_i - \frac{kT}{m} \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} - F_i = 0 \quad (4.3.4)$$

$$\frac{\dot{T}}{T} \delta_{ij} + \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) = 0 \quad (4.3.5)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x_i} = 0 \quad (4.3.6)$$

nas quais foi considerada a definição de derivada material:

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = \frac{\partial a}{\partial t} + v_s \frac{\partial a}{\partial x_s} \quad (4.3.7)$$

Tomando o traço e a parte sem traço em (4.3.5) resulta também:

$$\frac{\dot{T}}{T} + \frac{2}{3} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0 \quad (4.3.8)$$

$$\frac{\partial v_{\langle i}}{\partial x_{j \rangle}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) - \frac{1}{3} \frac{\partial v_r}{\partial x_r} \delta_{ij} = 0 \quad (4.3.9)$$

em que $\frac{\partial v_{\langle i}}{\partial x_{j \rangle}}$ é o deviante da parte simétrica do gradiente da velocidade.

A equação (4.3.3) pode ser desenvolvida em termos das funções ρ e T , tal que:

$$\dot{\alpha} = \left(\frac{\partial \alpha}{\partial \rho} \right)_T \dot{\rho} + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial T} \right)_\rho \dot{T} = 0 \quad (4.3.10)$$

Das equações (4.2.40) e (4.2.42) pode-se expressar α por:

$$\alpha = -\frac{m}{kT} \left[\frac{5}{2} \frac{p}{\rho} - T\eta \right] \quad (4.3.11)$$

e assim:

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial \rho} \right)_T = -\frac{m}{kT} \left[\frac{5}{2} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial \rho} - \frac{p}{\rho^2} \right) - T \frac{\partial \eta}{\partial \rho} \right] \quad (4.3.12)$$

e

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial T} \right)_\rho = \frac{m}{kT^2} \left[\frac{5}{2} \frac{p}{\rho} - T\eta \right] - \frac{m}{kT} \left[\frac{5}{2} \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial T} - \eta - T \frac{\partial \eta}{\partial T} \right] \quad (4.3.13)$$

Da equação de Gibbs (4.3.37) e da consideração da entropia como função de ρ e T ($\eta = \eta(\rho, T)$), nota-se que:

$$\left(\frac{\partial \eta}{\partial T} \right)_\rho = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_\rho = \frac{1}{T} \frac{3}{2} \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial T} \quad (4.3.14)$$

$$\left(\frac{\partial \eta}{\partial \rho} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \right)_T - \frac{p}{\rho^2} = \frac{1}{T} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial \rho} - \frac{p}{\rho^2} \right) - \frac{p}{\rho^2} \right] \quad (4.3.15)$$

voltando com estas expressões em (4.3.12) e (4.3.13), tem-se:

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial \rho} \right)_T = -\frac{m}{kT} \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial \rho} \quad (4.3.16)$$

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial T} \right)_\rho = \frac{m}{kT^2} \left[\frac{5}{2} \frac{p}{\rho} - \frac{T}{\rho} \frac{\partial p}{\partial T} \right] \quad (4.3.17)$$

Mas da condição de diferencial exata para a entropia específica $\left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\partial \eta}{\partial T}\right)_\rho = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial \eta}{\partial \rho}\right)_T\right]$ determina-se a seguinte relação entre $\frac{\partial p}{\partial \rho}$ e $\frac{\partial p}{\partial T}$:

$$T \frac{\partial p}{\partial T} + \frac{3}{2} \rho \frac{\partial p}{\partial \rho} - \frac{5}{2} p = 0 \quad (4.3.18)$$

o que conduz a:

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial T}\right)_\rho = \frac{3}{2} \frac{m}{k T^2} \frac{\partial p}{\partial \rho} \quad (4.3.19)$$

Agora, de (4.3.16) e (4.3.19) substituídos em (4.3.10), resulta:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = \frac{3}{2} \frac{\dot{T}}{T} \quad (4.3.20)$$

e de (4.3.8):

$$\dot{\rho} + \rho \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0 \quad (4.3.21)$$

que é a equação que traduz a conservação de massa para o gás.

Tomando-se:

$$\frac{\partial \alpha}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial \alpha}{\partial \rho}\right)_T \frac{\partial \rho}{\partial x_i} + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial T}\right)_\rho \frac{\partial T}{\partial x_i} \quad (4.3.22)$$

com $\left(\frac{\partial \alpha}{\partial \rho}\right)_T$ dado por (4.3.16) e $\frac{\partial T}{\partial x_i} = 0$ equação (4.3.6), substituindo em (4.3.4), chega-se a equação de conservação do momento linear:

$$\rho v_i + \frac{\partial p}{\partial x_i} = \rho F_i \quad (4.3.23)$$

Considerando a relação existente entre α , u e η , que pode ser observada a partir das equações (4.3.11) e (4.2.36), decorre que:

$$u = \frac{3}{5} \left(T\eta - \frac{kT}{m} \alpha \right) \quad (4.3.24)$$

A derivada em relação ao tempo desta equação fornece:

$$\dot{u} = \frac{3}{5} \left(\dot{T}\eta + T\dot{\eta} - \frac{k}{m} \dot{T}\alpha - \frac{kT}{m} \dot{\alpha} \right) \quad (4.3.25)$$

onde $\dot{\alpha} = 0$, $\dot{\eta}$ é dado por:

$$\dot{\eta} = \frac{1}{T} \left(\dot{u} - \frac{p}{\rho^2} \dot{\rho} \right) \quad (4.3.26)$$

e η através de (4.3.24). Logo:

$$\dot{u} = \frac{\dot{T}}{T} u + \frac{3}{5} \left(\dot{u} - \frac{p}{\rho^2} \dot{\rho} \right) \quad (4.3.27)$$

a qual com auxílio de (4.3.8), (4.3.21) e (4.3.26) transforma-se na equação:

$$\rho \dot{u} + p \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0 \quad (4.3.28)$$

Desta forma as expressões que caracterizam o equilíbrio podem ser resumidas em dois conjuntos completos equivalentes de equações:

$$\dot{\alpha} = 0 \quad \text{ou} \quad \dot{\rho} + \rho \frac{\partial v_r}{\partial x_r} = 0$$

$$\dot{v}_i - \frac{\partial \alpha}{\partial x_i} - F_i = 0 \quad \text{ou} \quad \rho \dot{v}_i + \frac{\partial \rho}{\partial x_i} = \rho F_i$$

$$\dot{T} = -\frac{2}{3} \frac{\partial v_i}{\partial x_r} \quad \text{ou} \quad \rho \dot{u} + \rho \frac{\partial v_r}{\partial x_r} = 0$$

$$\frac{\partial v_{<i}}{\partial x_j} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{\partial v_{<i}}{\partial x_j} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial x_i} = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{\partial T}{\partial x_i} = 0$$

4.4 Degenerescência em gases ideais

Considere-se a função de distribuição clássica de Maxwell (1.6.10) que fornece a densidade de número de partículas por determinado volume dx com determinada velocidade entre c e $c + dc$:

$$f_M = \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mc^2}{2kT}} \quad (4.4.1)$$

A máxima densidade do número de partículas ocorre quando a velocidade peculiar C é nula, vindo a ser $\frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2}$. Se esta densidade for muito menor que a densidade de número de estados A , f_M/A será baixo e não existirá degenerescência observável. Entretanto no limite oposto, o valor máximo de $f_M \gg A$, o emprego das estatísticas de Fermi-Dirac e Bose-Einstein passa a ser importante nos cálculos. O nível de degenerescência nestes casos pode ser avaliado como função da densidade e da temperatura através do parâmetro de degenerescência de Sommerfeld $\lambda^3 \frac{\rho}{W}$, onde $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}}$ é o comprimento da onda de De Broglie de uma partícula com energia da ordem de kT e W é o número de possibilidade associado ao estado quântico (igual a $(2s + 1)$ no caso de s ser o número de spin).^{*} Assim se:

$$\frac{\lambda^3 \rho}{W} \gg 1 \quad (4.4.2)$$

isto representa que no limite de altas densidades (considerando a temperatura T fixa) ou baixas temperaturas (considerando a densidade ρ fixa) os efeitos de simetria associados às estatísticas quânticas tornam-se importantes. Tratando-se de gases ideais formados por átomos ou moléculas a análise reduz-se aos casos de muito baixas temperaturas.

A seção seguinte admite as estatísticas de Fermi-Dirac e Bose-Einstein e apresenta a determinação de integrais $I_n^{\epsilon}(\alpha)$ que foram utilizadas nas Seções anteriores.

^{*} A obtenção deste parâmetro é melhor explicada na próxima Seção quando da análise da pressão para gases ideais quânticos fracamente degenerados

4.5 Integrais de Bose-Einstein e Fermi-Dirac para degenerescência fraca

Tendo em vista que o método dos momentos de Grad para 13 campos, a ser desenvolvido na Seção seguinte, terá como aplicação a determinação de coeficientes de transporte para o caso de um gás fracamente degenerado, esta seção trata principalmente da particularização dos resultados das integrais $I_n^\epsilon(\alpha)$ para este caso. Também é realizada a identificação do parâmetro de degenerescência através da observação da equação de estado.

As integrais $I_n^\epsilon(\alpha)$ são definidas por:

$$I_n^\epsilon(\alpha) = \int_0^\infty \frac{x^n}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} dx, \quad (4.5.1)$$

onde:

$$\left(e^{\alpha+x^2} - \epsilon\right)^{-1} = \frac{f_E}{A} \quad (4.5.2)$$

fornece a razão entre o número de estados ocupados e o número de estados existentes em determinado volume do espaço de fase.

Para o cálculo destas integrais no caso fracamente degenerado deve-se inicialmente multiplicar numerador e o denominador de (4.5.2) pela exponencial $e^{-\alpha}e^{-x^2}$. Com este procedimento e substituindo-se o resultado em (4.5.1) com sua conseqüente integração, decorre que:

$$I_n^\epsilon(\alpha) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) e^{-\alpha} \left[1 + \frac{\epsilon e^{-\alpha}}{2^{\frac{n+1}{2}}} + \frac{\epsilon^2 e^{-2\alpha}}{3^{\frac{n+1}{2}}} + \frac{\epsilon^3 e^{-3\alpha}}{4^{\frac{n+1}{2}}} + \dots\right] \quad (4.5.3)$$

Em função dos resultados destas integrais, a densidade (função de $I_2^\epsilon(\alpha)$) e a pressão (função $I_4^\epsilon(\alpha)$) são escritas:

$$\rho = 4\pi A m \left(\frac{2kT}{m}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{-\alpha} \left[1 + \epsilon \frac{e^{-\alpha}}{2^{\frac{3}{2}}} + \epsilon^2 \frac{e^{-2\alpha}}{3^{\frac{3}{2}}} + \dots\right] \quad (4.5.4)$$

$$p = \frac{4}{3} \pi A \left(\frac{2kT}{m} \right)^{\frac{5}{2}} \frac{1}{2} \Gamma \left(\frac{5}{2} \right) e^{-\alpha} \left[1 + \epsilon \frac{e^{-\alpha}}{2^{\frac{5}{2}}} + \epsilon^2 \frac{e^{-2\alpha}}{3^{\frac{5}{2}}} + \dots \right] \quad (4.5.5)$$

Considerando a inversão da série em (4.5.4), conforme realizado no apêndice II, determina-se $e^{-\alpha}$ em função de ρ :

$$e^{-\alpha} = \frac{\lambda^3}{Wm} \rho \left[1 - \frac{\lambda^3}{Wm} \frac{\epsilon}{2^{\frac{5}{2}}} \rho + \frac{\lambda^6}{W^2 m^2} \epsilon^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3^{\frac{5}{2}}} \right) \rho^2 + \dots \right] \quad (4.5.6)$$

sendo $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}$ e $W = 2s + 1$ é o grau de degenerescência.

Substituindo-se em seguida na expressão (4.5.5) e simplificando, tem-se:

$$p = \frac{k}{m} \rho T \left[1 - \frac{\lambda^3}{Wm} \frac{\epsilon}{2^{\frac{5}{2}}} \rho + \frac{\lambda^6}{W^2 m^2} \epsilon^2 \left(\frac{1}{8} - \frac{2}{3^{\frac{5}{2}}} \right) \rho^2 + \dots \right] \quad (4.5.7)$$

onde se identifica o parâmetro de degenerescência

$$\Delta = \frac{\lambda^3}{Wm} \rho = \frac{1}{Wm} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{\frac{3}{2}} \rho \quad (4.5.8)$$

que no caso de ser muito menor que 1 admite a validade de estatística clássica de Maxwell Boltzmann, recaindo na expressão clássica da pressão para um gás ideal:

$$p = \frac{k}{m} \rho T. \quad (4.5.9)$$

No caso de gases de Bose completamente degenerado:

$$I_2^{+1}(0) \approx 1,16$$

e

$$I_4^{+1}(0) \approx 0,89 \quad (4.5.10)$$

mostrando que a pressão e a densidade são funções somente de $T^{5/2}$ e $T^{3/2}$, respectivamente, ou seja:

$$\rho \approx 4\pi Am \left(\frac{2k}{m} \right)^{\frac{3}{2}} (1, 16) T^{3/2} \quad (4.5.11)$$

$$p \approx \frac{4\pi}{3} Am \left(\frac{2k}{m} \right)^{\frac{5}{2}} (0, 89) T^{5/2} \quad (4.5.12)$$

Quando se trata de gases de Fermi completamente degenerados em que:

$$I_n^{-1}(\alpha) = \frac{1}{n+1} (-\alpha)^{\frac{n+1}{2}} \quad (4.5.13)$$

A proporcionalidade se modifica, encontrando-se da substituição de $I_2^{-1}(\alpha)$ e $I_4^{-1}(\alpha)$ em (4.5.4) e (4.5.5) que:

$$p \propto \rho^{5/2} \quad (4.5.14)$$

isto é, neste caso desaparece a dependência da temperatura.

4.6 Método dos momentos para 13 campos

O gás ideal quântico a ser analisado será caracterizado através dos campos de: densidade, velocidade, tensor pressão e fluxo de calor. Estes campos foram definidos na seção 1.7 através das equações (1.7.4)-(1.7.7) e são chamados momentos da função de distribuição .

4.6.1 Campos básicos e equações de balanço

Em virtude de serem 13 os campos básicos desta teoria, serão necessárias também 13 equações de balanço par estes campos. Estas equações são obtidas substituindo-se a função arbitrária $Z(\mathbf{x}, \mathbf{c}, t)$ em (4.2.2), respectivamente por:

a) $Z = m$ (equação de balanço de massa)

$$\dot{\rho} + \rho \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0 \quad (4.6.1)$$

b) $Z = mc_i$ (equação de balanço do momento linear)

$$\rho \dot{v}_i + \frac{\partial p_{ij}}{\partial x_j} = \rho F_i \quad (4.6.2)$$

c) $Z = mC_iC_j$ (equação de balanço do tensor pressão)

$$\dot{p}_{ij} + \frac{\partial p_{ijk}}{\partial x_k} + p_{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} + p_{ki} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} + p_{kj} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} = P_{ij} \quad (4.6.3)$$

onde:

$$p_{ijk} = \int mC_iC_jC_k f d\mathbf{c} \quad (4.6.4)$$

$$P_{ij} = \int m(C'_iC'_j - C_iC_j) f f_1 \left(1 + \epsilon \frac{f'}{A}\right) \left(1 + \epsilon \frac{f'_1}{A}\right) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\varepsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \quad (4.6.5)$$

são termos constitutivos sendo que P_{ij} é chamado produção do tensor pressão.

d) $Z = \frac{m}{2} C^2 C_i$ (equação de balanço de fluxo de calor)

$$\dot{q}_i + \frac{\partial q_{ij}}{\partial x_j} + p_{ijk} \frac{\partial v_j}{\partial x_k} + q_i \frac{\partial v_j}{\partial x_j} + q_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{p_{ki}}{\rho} \frac{\partial p_{kj}}{\partial x_j} - \frac{p_{rr}}{2\rho} \frac{\partial p_{ik}}{\partial x_k} = Q_i \quad (4.6.6)$$

onde:

$$q_{ij} = \int \frac{m}{2} C^2 C_i C_j f d\mathbf{c} \quad (4.6.7)$$

$$Q_i = \int \frac{m}{2} (C^2 C'_i - C^2 C_i) f f_1 \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A}\right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A}\right) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi d\epsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \quad (4.6.8)$$

são termos constitutivos e Q_i é denominado produção de fluxo de calor.

4.6.2 A função de distribuição

Com a meta de encontrar a função de distribuição nas proximidades do equilíbrio, será realizada a maximização da entropia:

$$\rho \eta = -k \int \left[f \ln \frac{f}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon} + f \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \right] d\mathbf{c} \quad (4.6.9)$$

sujeita aos seguintes vínculos:

$$\rho = \int m f d\mathbf{c} \quad (4.6.10)$$

$$0 = \int m C_i f d\mathbf{c} \quad (4.6.11)$$

$$p_{ij} = \int m C_i C_j f d\mathbf{c} \quad (4.6.12)$$

$$q_i = \int \frac{m}{2} C^2 C_i f d\mathbf{c} \quad (4.6.13)$$

Maximizar a entropia é equivalente a encontrar o extremo do seguinte funcional que não está sujeito a nenhum vínculo:

$$F = \int \left\{ -k \left[\ln \frac{f}{A} - \left(\frac{A}{\epsilon f} + 1 \right) \ln \left(1 + \frac{\epsilon f}{A} \right) \right] - \Lambda m \right. \\ \left. - \Lambda_i m C_i - \Lambda_{ij} m C_i C_j - \lambda_i \frac{m}{2} C^2 C_i \right\} f d\mathbf{c} \quad (4.6.14)$$

nesta expressão, Λ , Λ_i , Λ_{ij} e λ_i são multiplicadores de Lagrange.

Fazendo-se $\frac{\partial F}{\partial f} = 0$, encontra-se:

$$\begin{aligned} & -k \left[\ln \frac{f}{A} - \ln \left(1 + \epsilon \frac{f}{A} \right) + 1 - f \left(\frac{A}{\epsilon f} + 1 \right) \frac{\epsilon/A}{1 + \epsilon f/A} \right] - \wedge m \\ & - \wedge_i m C_i - \wedge_{ij} m C_i C_j - \lambda_i \frac{m}{2} C^2 C_i = 0 \end{aligned} \quad (4.6.15)$$

Separando-se a parte do traço de $\wedge_{ij}$, vem:

$$\ln \frac{f/A}{1 + \epsilon f/A} = \left(-\frac{m}{k} \right) \left[\wedge + \frac{1}{3} \wedge_{rr} C^2 + \wedge_i C_i + \wedge_{\langle ij \rangle} C_i C_j + \lambda_i \frac{C^2}{2} C_i \right] \quad (4.6.16)$$

levando a seguinte forma para f :

$$f = \frac{A}{e^{\xi+\nu} - \epsilon} \quad (4.6.17)$$

onde:

$$\xi = \frac{m}{k} \left(\wedge + \frac{1}{3} \wedge_{rr} C^2 \right) \quad (4.6.18)$$

$$\nu = \frac{m}{k} \left(\wedge_i C_i + \wedge_{\langle ij \rangle} C_i C_j + \lambda_i \frac{C^2}{2} C_i \right) \quad (4.6.19)$$

Pretende-se obter uma função de distribuição nas proximidades do equilíbrio, ou seja:

$$f = f_E(1 + \phi) \quad (4.6.20)$$

onde ϕ é o desvio, o qual é muito pequeno comparado a um.

Assim, reescrevendo (4.6.17):

$$f = \frac{A}{e^{\xi} - \epsilon} \left(\frac{e^{-\nu}}{1 + \epsilon \frac{1 - e^{-\nu}}{e^{\xi} - \epsilon}} \right) \quad (4.6.21)$$

e considerando ν muito pequeno, tal que $e^{-\nu}$ pode ser aproximado por $(1 - \nu)$, obtém-se:

$$f = \frac{A}{e^{\xi} - \epsilon} (1 - \nu) \left(1 - \epsilon \frac{\nu}{e^{\xi} - \epsilon} \right) \quad (4.6.22)$$

Desprezando os termos ν^2 como na passagem anterior, encontra-se:

$$f = \frac{A}{e^{\xi} - \epsilon} \left(1 - \frac{e^{\xi}}{e^{\xi} - \epsilon} \nu \right) \quad (4.6.23)$$

Identificando ($\xi = \alpha + x^2$) por comparação com (4.6.20) e (4.2.44), e substituindo ν por seu valor (equação (4.6.19)), a função de distribuição fora do equilíbrio em função dos demais multiplicados de Lagrange é:

$$f = \frac{A}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \left[1 - \frac{e^{\alpha+x^2}}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \frac{m}{k} \left(\Lambda_i C_i + \Lambda_{<ij>} C_i C_j + \lambda_i \frac{C^2}{2} C_i \right) \right] \quad (4.6.24)$$

Da substituição de (4.6.24) em (4.6.11), tem-se:

$$\Lambda_i = - \frac{5 I_4^\epsilon(\alpha)}{6 I_2^\epsilon(\alpha)} \frac{2kT}{m} \lambda_i \quad (4.6.25)$$

enquanto, da substituição de (4.2.24) em (4.6.13) e a utilização de (4.6.25), vem:

$$\lambda_i = - \left(\frac{k}{m} \right) \frac{9 (I_2^\epsilon(\alpha))^2}{\rho} q_i \left(\frac{m}{kT} \right)^3 \frac{1}{21 I_2^\epsilon(\alpha) I_6^\epsilon(\alpha) - 25 (I_4^\epsilon(\alpha))^2} \quad (4.6.26)$$

Nestas determinações foi levado em conta: que a função de distribuição f_E é par na variável $x = \sqrt{\frac{m}{2kT}} C$; a relação de recorrência para as integrais $I_n^\epsilon(\alpha)$ (eq. 4.2.30), a definição de ρ em termos destas integrais (eq. 4.2.18) com $\beta = \frac{m}{2kT}$, e que a derivada de f_E em relação a variável α é dada por:

$$\frac{\partial f_E}{\partial \alpha} = - \frac{e^{\alpha+x^2}}{(e^{\alpha+x^2} - \epsilon)^2} \quad (4.6.27)$$

Da expressão que define o deviante do tensor pressão:

$$p_{<ij>} = \int m C_{<i} C_{j>} f d\mathbf{c} \quad (4.6.28)$$

das considerações feitas anteriormente e da substituição de (4.4.24) nesta expressão segue que:

$$\Lambda_{<ij>} = - \left(\frac{k}{m} \right) \frac{3 I_2^\epsilon(\alpha)}{4 I_4^\epsilon(\alpha)} \frac{p_{<ij>}}{\rho} \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \quad (4.6.29)$$

Conseqüentemente, a partir da substituição dos multiplicadores de Lagrange, acima determinados, na equação (4.2.24), a forma para a função de distribuição fica:

$$f = \frac{A}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \left\{ 1 + \frac{e^{\alpha+x^2}}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \left[\frac{3 I_2^\epsilon(\alpha)}{4 I_4^\epsilon(\alpha)} \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{p_{<ij>}}{\rho} C_i C_j + \left(\frac{m}{2kT} C^2 \right) \right] \right\}$$

$$\left. -\frac{5}{3} \frac{I_4^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)} \right) \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{9 (I_2^\epsilon(\alpha))^2}{21 I_2^\epsilon(\alpha) I_6^\epsilon(\alpha) - 25 (I_4^\epsilon(\alpha))^2} \frac{q_i}{\rho} C_i \Bigg] \Bigg\} \quad (4.6.30)$$

a qual é a expressão da função de distribuição para um gás ideal quântico nas proximidades do equilíbrio e que considera as três estatísticas (Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac e Bose-Einstein). No caso de um gás de Fermi completamente degenerado (eq.4.5.13) o denominador $(21 I_2^\epsilon(\alpha) I_6^\epsilon(\alpha) - 25 (I_4^\epsilon(\alpha))^2)$ é nulo e invalida sua utilização. A expressão (4.6.30) também expressa a função de distribuição em equilíbrio, visto que neste estado $p_{<ij>}$ e q_i são nulos.

4.6.3 Equações constitutivas

Da substituição da função de distribuição (4.6.30) nas equações dos termos constitutivos (4.4.4), (4.4.5), (4.4.7) e (4.4.8) e da subsequente integração, encontra-se, respectivamente:

$$p_{ijk} = \frac{2}{5} (q_i \delta_{jk} + q_j \delta_{ik} + q_k \delta_{ij}) \quad (4.6.31)$$

$$P_{ij} = -\frac{16}{5} \sqrt{\frac{\pi k T}{m}} \sigma^2 \frac{\rho}{m} \Omega^{(2,2)} \left[1 - \epsilon \frac{\Delta}{2^{5/2}} \left(3 - \frac{3^{5/2}}{4} \right) \right] p_{<ij>} \quad (4.6.32)$$

$$q_{ij} = \frac{2}{3} \rho \left(\frac{k T}{m} \right)^2 \frac{I_6^\epsilon(\alpha)}{I_2^\epsilon(\alpha)} \delta_{ij} + \frac{7}{5} \frac{k T}{m} \frac{I_6^\epsilon(\alpha)}{I_4^\epsilon(\alpha)} p_{<ij>} \quad (4.6.33)$$

$$Q_i = -\frac{32}{15} \sqrt{\frac{\pi k T}{m}} \sigma^2 \frac{\rho}{m} \Omega^{(2,2)} \left\{ 1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{9/2}} \left[15 - \frac{3^{3/2}}{4} \left(\frac{\Omega^{(2,3)}}{\Omega^{(2,2)}} + 8 \right) \right] \right\} q_i \quad (4.6.34)$$

O esquema dos cálculos dos termos de produção P_{ij} e Q_i realizados para o caso de um gás fracamente degenerado, podem ser encontrados no Apêndice VII. Os termos p_{ijk} e q_{ij} estão determinados de maneira geral, sendo q_{ij} função das integrais $I_n^\epsilon(\alpha)$ que valem para as três estatísticas já citadas anteriormente.

4.6.4 Equações de campo

As equações de campo relativas aos campos básicos desta teoria são determinadas através da substituição das equações constitutivas (4.6.31) -(4.6.34) nas equações de balanço obtidas para estes (4.6.1), (4.6.2), (4.6.3) e (4.6.6).

Realizando estas substituições encontra-se:

$$\dot{\rho} + \rho \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0 \quad (4.6.35)$$

$$\rho \dot{v}_i + \frac{\partial p_{ij}}{\partial x_j} = \rho F_i \quad (4.6.36)$$

$$\dot{p} + \frac{5}{3} p \frac{\partial v_i}{\partial x_i} + \frac{2}{3} \frac{\partial q_i}{\partial x_i} + \frac{2}{3} p_{<ij>} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = 0 \quad (4.6.37)$$

$$\begin{aligned} \dot{p}_{<ij>} + \frac{5}{3} p_{<ij>} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} + \frac{4}{5} \frac{\partial q_{<i}}{\partial x_{j>}} + 2 p_{<k<i>} \frac{\partial v_{<j>}}{\partial x_k} \\ + p_{<ki>} \frac{\partial v_{j>}}{\partial x_{k]} + p_{<kj>} \frac{\partial v_{i>}}{\partial x_{k]} + 2 p_{\langle ij \rangle} \frac{\partial v_{\langle i}}{\partial x_j \rangle} = -\frac{1}{\tau_p} p_{<ij>} \end{aligned} \quad (4.6.38)$$

$$\begin{aligned} \dot{q}_i + \frac{7}{5} q_i \frac{\partial v_j}{\partial x_j} + \frac{2}{5} q_j \frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{7}{5} q_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{21 I_6 I_2 - 25 I_4^2}{6 I_4 I_2} p \frac{k}{m} \frac{\partial T}{\partial x_i} \\ + \frac{21 I_6 I_2 - 25 I_4^2}{15 I_4 I_2} \frac{k}{m} T \frac{\partial p_{\langle ij \rangle}}{\partial x_j} - \frac{p_{\langle ki \rangle}}{\rho} \frac{\partial p_{\langle kj \rangle}}{\partial x_j} \\ + 7 \frac{k}{m} \frac{21 I_6 I_2 - 25 I_4^2}{30 I_4 I_2} \frac{\partial T}{\partial x_j} p_{\langle ij \rangle} - \frac{21 I_6 I_2 - 25 I_4^2}{10 I_4 I_2} \frac{1}{\rho} p_{\langle ki \rangle} \frac{\partial p}{\partial x_k} = -\frac{1}{\tau_q} q_i \end{aligned} \quad (4.6.39)$$

Nestas equações, a equação de campo para o tensor peressão foi desdobrada em duas partes: o traço (eq. 4.6.37) e a parte sem traço (eq. 4.6.38). Esta última está representada também em função da parte antissimétrica do gradiente de velocidade:

$$\frac{\partial v_{[i}}{\partial x_{j]}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right). \quad (4.6.40)$$

As grandezas com dimensão de tempo em (4.6.38) e (4.6.39), no lado direito de suas equações, são dadas respectivamente por:

$$\tau_p = \frac{5}{16} \frac{m \sqrt{m}}{\sigma^2 \sqrt{\pi k T \rho} \Omega^{(2,2)}} \left[1 + \frac{\epsilon \Delta}{2^{5/2}} \left(3 - \frac{3^{5/2}}{4} \right) \right] \quad (4.6.41)$$

$$\tau_q = \frac{15}{32} \frac{m \sqrt{m}}{\sigma^2 \sqrt{\pi k T \rho} \Omega^{(2,2)}} \left\{ 1 + \frac{\epsilon \Delta}{2^{9/2}} \left[15 - \frac{3^{3/2}}{4} \left(\frac{\Omega^{(2,3)}}{\Omega^{(2,2)}} + 8 \right) \right] \right\} q_i \quad (4.6.42)$$

$$\rho = 4 \pi m A \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} I_2^\epsilon(\Delta) = \pi m A \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} \sqrt{\pi}(\Delta) \quad (4.6.43)$$

4.6.5 Coeficientes de condutividade térmica de viscosidade de cisalhamento

Por um método de iteração Maxwelliana [26] em que se considerou o lado esquerdo das equações de campo em equilíbrio e o lado direito fora do equilíbrio, foram obtidas as equações que permitiram a identificação dos coeficientes de transporte. Fazendo-se $p_{<ij>} = 0$ e $q_i = 0$ nas equações (4.6.38) e (4.6.39), encontra-se respectivamente:

$$-2\tau_p p \frac{\partial v_{<i}}{\partial x_{j>}} = p_{<ij>} \quad (4.6.44)$$

onde:

$$p = \frac{4\pi}{3} m A \left(\frac{2kT}{m} \right)^{5/2} I_4^\epsilon(\Delta) = \frac{k}{m} \rho T \left(1 - \frac{\epsilon\Delta}{2^{5/2}} \right) \quad (4.6.45)$$

e

$$-\tau_q \left(\frac{2kT}{m} \right)^{5/2} \frac{2\pi}{3} k A \frac{(21I_2I_6 - 25I_4^2)}{3I_2} \frac{\partial T}{\partial x_i} = q_i \quad (4.6.46)$$

onde :

$$\frac{(21I_2I_6 - 25I_4^2)}{3I_2} = \frac{15}{8} \sqrt{\pi} \Delta \left(1 - \frac{\epsilon\Delta}{2^{9/2}} \right)$$

Da equação (4.6.44) em comparação com a equação que representa a lei de Navier-Stokes:

$$p_{<ij>} = -2\mu \frac{\partial v_{<i}}{\partial x_{j>}} \quad (4.6.47)$$

o coeficiente de viscosidade de cisalhamento é dado através de:

$$\mu = \tau_p p \quad (4.6.48)$$

e assim (observando 4.6.41):

$$\mu = \frac{5}{16} \frac{\sqrt{mkT}}{\sqrt{\pi}\sigma^2 \Omega^{(2,2)}} \left[1 + \frac{\epsilon\Delta}{2^{3/2}} \left(1 - \frac{3^{5/2}}{8} \right) \right] \quad (4.6.49)$$

é a expressão da viscosidade de cisalhamento para um gás ideal fracamente degenerado com qualquer potencial, onde σ é uma medida característica deste potencial e $\Delta = \frac{h^3}{(2\pi kT)^{3/2}} \frac{\rho}{Wm^{5/2}}$ é o parâmetro de degenerescência.

Comparando a equação (4.6.6) com a que representa a lei de Fourier:

$$q_i = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x_i} \quad (4.6.50)$$

o coeficiente de condutividade térmica é encontrado de:

$$\lambda = \tau_q \left(\frac{2kT}{m} \right)^{5/2} \frac{5\pi}{4} kA\sqrt{\pi}\Delta \left(1 - \frac{\epsilon\Delta}{2^{9/2}} \right) = \tau_q \left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{k}{m} \right)^2 T\rho \left(1 - \frac{\epsilon\Delta}{2^{9/2}} \right) \quad (4.6.51)$$

e considerando o valor de τ_q (eq.4.6.42), chega-se a :

$$\lambda = \frac{75}{64} \frac{k}{m} \frac{\sqrt{mkT}}{\sqrt{\pi}\sigma^2 \Omega^{(2,2)}} \left\{ 1 + \frac{\epsilon\Delta}{2^{7/2}} \left[7 - \frac{3^{3/2}}{8} \left(\frac{\Omega^{(2,3)}}{\Omega^{(2,2)}} + 8 \right) \right] \right\} \quad (4.6.52)$$

Este é o coeficiente de condutividade térmica para um gás ideal fracamente degenerado cuja relação com viscosidade de cisalhamento é igual a:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{4} \frac{k}{m} \left\{ 1 + \frac{\epsilon\Delta}{2^{7/2}} \left[3 - \frac{3^{3/2}}{8} \left(4 - \frac{\Omega^{(2,3)}}{\Omega^{(2,2)}} \right) \right] \right\} \quad (4.6.53)$$

Os coeficientes de viscosidade de cisalhamento (4.6.49) e de condutividade térmica (4.6.52) concordam com os obtidos por Uehling [9]. A razão entre κ e η (onde κ é a condutividade térmica e η a viscosidade de cisalhamento encontrados nesse artigo), considerando a estatística de Bose-Einstein e spin nulo, é:

$$\frac{\kappa}{\eta} = \frac{15}{4} \frac{k}{m} \left\{ 1 + \epsilon \frac{\pi^{3/2}}{4} n \lambda^3 \left[3 - \frac{128}{3^{3/2}} \frac{P_{(4/3)}^{(2,9)} - 3P_{(4/3)}^{(2,7)}}{9P_{(1)}^{(2,7)}} \right] \right\} \quad (4.6.54)$$

A correspondência com (4.6.53) segue das seguintes considerações sobre as definições em (4.6.54):

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{mkT}} \quad (\text{comprimento de onda de De Broglie})$$

$$n = \frac{\rho}{m} \quad (\text{densidade de número de partículas})$$

$$P^{(l,p)}(\alpha) = \int_0^\infty e^{-\alpha\gamma^2} \gamma^p \Theta^{(l)}(\gamma) d\gamma \quad \text{onde:} \quad \Theta^{(l)}(\gamma) = \frac{1}{s^2} \int_0^\pi [1 - P_l(\cos v)] I(v\gamma) \sin v dv$$

e das conseqüentes equivalências:

$$n\lambda^3 = \frac{\lambda_{dB}^3}{(2s+1)m} \rho = \Delta$$

$$P^{(2,p)}(\alpha) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{\alpha} \right)^{\frac{p+1}{2}} \Omega^{(2, \frac{p-3}{2})}$$

visto que a seção transversal de choque de ordem 2 deste trabalho é (3/2) daquela definida no artigo de Uehling.

Observa-se, através da Figura 4.6.1, que a razão do coeficiente de condutividade térmica para o de viscosidade de cisalhamento, é significativa apenas em uma região a muito baixas temperaturas, a qual corresponde para o hélio 4 a temperaturas que se encontram já abaixo da temperatura crítica de condensação de Bose-Einstein.

4.7 A entropia e o fluxo de entropia

Uma vez determinada a função de distribuição fora do equilíbrio (4.6.30) é possível encontrar a correspondente expressão geral para a entropia e o fluxo de entropia, também nas proximidades do equilíbrio.

Fig. 4.6.1 - $(\kappa_1^* - \kappa_1) \times T$ (hélio 3 e hélio 4)

Da forma da função fora de equilíbrio (4.6.20) onde ϕ é uma função cuja ordem de grandeza é muito menor que 1, tomando-se o logaritmo desta expressão obtém-se:

$$\ln f \approx \ln f_E + \phi - \frac{\phi^2}{2} \quad (4.7.1)$$

$$\begin{aligned} \ln(1 + \epsilon f/A) + \ln[1 + \epsilon \frac{f_E}{A}(1 + \phi)] &= \ln\left\{(1 + \epsilon \frac{f_E}{A})\left[1 + \frac{\epsilon f_E \phi/A}{1 + \epsilon f_E/A}\right]\right\} \approx \ln(1 + \epsilon f_E/A) \\ &+ \frac{\epsilon f_E \phi/A}{1 + \epsilon f_E/A} - \frac{1}{2} \frac{\epsilon^2 f_E^2 \phi^2/A^2}{(1 + \epsilon f_E/A)^2} \end{aligned} \quad (4.7.2)$$

Justifica-se a expressão até a segunda ordem em ϕ , pois como será visto a seguir, a expressão em primeira ordem na densidade de entropia é nula.

Sejam as definições abaixo para a densidade de entropia e o fluxo de densidade de entropia:

$$\rho\eta = -k \int [f \ln(f/A) - \left(\frac{A}{\epsilon} + f\right) \ln(1 + \epsilon f/A)] d\mathbf{c} \quad (4.7.3)$$

$$\phi_i = -k \int [f \ln(f/A) - \left(\frac{A}{\epsilon} + f\right) \ln(1 + \epsilon f/A)] C_i d\mathbf{c} \quad (4.7.4)$$

Das considerações feitas nas equações (4.7.1) e (4.7.2) e tomando-se termos até segunda ordem em ϕ , este procedimento leva a encontrar:

$$\begin{aligned} \rho\eta = -k \int \{ & f_E \ln(f_E/A) - \left(\frac{A}{\epsilon} + f_E\right) \ln(1 + \epsilon f_E/A) + \phi [f_E \ln(f_E/A) \\ & - f_E \ln\left(1 + \epsilon \frac{f_E}{A}\right)] + \frac{\phi^2}{2} \frac{f_E}{(1 + f_E/A)^2} \} d\mathbf{c} \end{aligned} \quad (4.7.5)$$

na qual, a integral em ϕ é nula pois f_E é uma função par e ϕ é uma função ímpar na velocidade peculiar, e ϕ^2 (observe (4.6.30)) é igual a:

$$\begin{aligned} \phi^2 = & \left(\frac{e^{\alpha+x^2}}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \right)^2 \left[\frac{9}{16} \left(\frac{I_2^\epsilon}{I_4^\epsilon} \right)^2 \left(\frac{m}{kT} \right)^4 \frac{p_{<ij>}}{\rho} \frac{p_{<kl>}}{\rho} C_i C_j C_k C_l \right. \\ & + \left(\frac{m^2 C^4}{4k^2 T^2} + \frac{25}{9} \left(\frac{I_4^\epsilon}{I_2^\epsilon} \right)^2 - \frac{mC^2}{2kT} \frac{10}{3} \frac{I_4^\epsilon}{I_2^\epsilon} \right) \left(\frac{m}{kT} \right)^4 \frac{81 I_2^{\epsilon 4}}{(21 I_2^\epsilon I_6^\epsilon - 25 I_4^{\epsilon 2})^2} \frac{q_i}{\rho} \frac{q_j}{\rho} C_i C_j \\ & \left. + \frac{3}{2} \frac{I_2^\epsilon}{I_4^\epsilon} \left(\frac{mC^2}{2kT} - \frac{5}{3} \frac{I_4^\epsilon}{I_2^\epsilon} \right) \left(\frac{m}{kT} \right)^4 \frac{9 I_2^{\epsilon 2}}{21 I_2^\epsilon I_6^\epsilon - 25 I_4^{\epsilon 2}} \frac{p_{<ij>}}{\rho} \frac{q_k}{\rho} C_i C_j C_k \right] \end{aligned} \quad (4.7.6)$$

Efetuada a substituição de (4.7.6) em (4.7.5), realizando a integração no termo em ϕ^2 com auxílio do Apêndice I e separando a parte do equilíbrio, resulta:

$$\rho\eta = \rho\eta_E - \frac{3}{8} \frac{I_2^\epsilon}{I_4^\epsilon} \frac{m}{kT^2 \rho} p_{<ij>} p_{<ij>} - \frac{9}{2} \left(\frac{m}{k} \right)^2 \frac{1}{T^3 \rho} \frac{(I_2^\epsilon)^2}{(21 I_2^\epsilon I_6^\epsilon - 25 (I_4^\epsilon)^2)} q_i q_i \quad (4.7.7)$$

a qual é a expressão final para a densidade de entropia no caso de um gás ideal, reduzindo-se no caso de equilíbrio a $\rho \eta_E$ pois o deviante do tensor pressão $p_{<j>}$ e o fluxo de calor q_i são nulos no equilíbrio.

Para o fluxo de entropia, através de procedimento semelhante ao anterior:

$$\begin{aligned} \phi_i = -k \int \{ f_E \ln(f_E/A) - \left(\frac{A}{\epsilon} + f_E \right) \ln(1 + \epsilon f_E/A) + \phi [f_E \ln(f_E/A) \\ - f_E \ln \left(1 + \epsilon \frac{f_E}{A} \right)] + \frac{\phi^2}{2} \frac{f_E}{(1 + f_E/A)^2} \} C_i d\mathbf{c} \end{aligned} \quad (4.7.8)$$

o termo que sobra é apenas o termo em ϕ que multiplicado por c_i e por expressões que envolvem a função em equilíbrio, resulta em uma função par. Observando-se que:

$$\begin{aligned} f_E \ln f_E/A - f_E \ln(1 + \epsilon f_E/A) = \frac{A}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \{ \ln \left[\frac{1}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \right] \\ - \ln \left[\frac{e^{\alpha+x^2}}{e^{\alpha+x^2} - \epsilon} \right] \} = -f_E (\alpha + x^2) \end{aligned} \quad (4.7.9)$$

e da substituição de ϕ em (4.5.10), vem:

$$\phi_i = \frac{q_i}{T} - \frac{3}{5} \frac{I_2^\epsilon}{I_4^\epsilon} \frac{m}{k T^2 \rho} p_{<j>} q_j \quad (4.7.10)$$

Esta é a expressão geral do fluxo de densidade de entropia, para um gás ideal considerando as três estatísticas envolvidas (Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac e Bose-Einstein) e que confirma o resultado nulo para o caso de equilíbrio.

CAPÍTULO 5

CONCLUSÃO

5.1 Introdução

A proposta a que se destinou este trabalho visou abranger o estudo de fenômenos quânticos, isto é, o estudo dos efeitos de difração e os de simetria, no cálculo dos coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento. Nos Capítulos II e III foi levado em conta a alteração na seção transversal diferencial de choque, enquanto no Capítulo IV desenvolveu-se uma teoria a qual incluiu também as estatísticas quânticas para a distribuição das velocidades das moléculas, englobando assim todos os efeitos. Através de um método de aproximações sucessivas, no Capítulo II foi tratado o potencial de esfera rígida, enquanto no Capítulo III o de Lennard-Jones. Nestes foram determinados, além dos coeficientes de transporte, as diferenças de fase, seções transversais de choque e integrais de colisão e verificadas as variações destas grandezas por intermédio de gráficos e tabelas. No Capítulo IV, utilizando-se o método dos momentos de Grad [2] foi desenvolvida uma teoria para 13 campos a qual foi concluída com a aplicação ao caso de um gás fracamente degenerado. Foram encontradas não só as expressões algébricas para os coeficientes de transporte por um método distinto do utilizado por Uehling e Uhlenbeck [1], mas ainda

a função de distribuição , a entropia e o fluxo de entropia decorrentes da aplicação do método.

Na sequência são apresentadas algumas análises e conclusões a respeito do trabalho.

5.2 Análises e Conclusões

1- Os métodos da teoria cinética que propiciam a determinação dos coeficientes de transporte, de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento conduzem a expressão para estes que são funções de razões de determinantes de matrizes de mesma ordem. A ordem em que são calculados estes determinantes também representa a ordem de aproximação para os coeficientes. Nos trabalhos apresentados na literatura, no que se refere a gases ideais quânticos, a maior aproximação encontrada no caso de potenciais de esfera rígida e de Lennard-Jones é a segunda ordem e em relação a outros potenciais, como o de Aziz (HFDHE2)[17] é a terceira ordem.

Este trabalho representa uma melhoria em relação a ordem de determinação dos coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento para gases ideais quânticos, pois os determina em quinta ordem de aproximação .

2- A razão entre os coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento multiplicada pela razão da massa da partícula pela constante de Boltzmann, expresso no texto por κ_n (2.7.6), produz um resultado adimensional. Quando estes coeficientes são obtidos em primeira aproximação este resultado (κ_1) é constante com a temperatura e igual a 3,75. Quando, porém, são encontrados em ordens de aproximação superiores (κ_n com $n > 1$) isto não mais se verifica. A variação $\Delta\kappa_n = \kappa_n - \kappa_1$ em função da temperatura foi explorada neste trabalho e mostrada graficamente para $n = 2$ e $n = 5$ para os gases hélio 3, hélio 4, para hidrogênio e orto-hidrogênio no caso dos potenciais de esfera rígida e de Lennard-Jones (6-12) e $n=3$ no caso de um potencial (HFDHE2) de Aziz para o hélio 3 e o hélio 4. Para se tornar mais clara a análise, os gráficos dos Capítulos II e III mostram $\Delta\kappa_2$ e $\Delta\kappa_5$ em função de T .

A diferença entre os valores de $\Delta\kappa_2$ e $\Delta\kappa_5$ em função da temperatura e a ordem de grandeza desta diferença foi verificada nas Figuras 2.7.1 a 2.7.4 para um gás de esfera rígida e nas Figuras 3.6.1 a 3.6.4 para o potencial de Lennard-Jones para os gases hélio 3, hélio 4, para hidrogênio e orto-hidrogênio. Nas Figuras 3.6.1 e 3.6.2, respectivamente do hélio 4 e hélio 3, também é mostrada a variação $\Delta\kappa_3$ de um potencial distinto dos aqui apresentados, onde foi possível verificar a forma semelhante com as curvas $\Delta\kappa_2$ $\Delta\kappa_5$ deste trabalho.

3- Aziz [17] ao apresentar um gráfico para baixas temperaturas, de viscosidade em função da temperatura, cita diversos potenciais que se aproximam dos resultados experimentais para o hélio 3 e hélio 4, não incluindo entre eles o de Lennard-Jones. Através dos resultados de Aziz em terceira aproximação (encontrados com valores numéricos em Kestin [8]) foi possível comparar com os que foram obtidos neste trabalho fazendo uso de um potencial LJ(6-12), em 5a. aproximação . A expectativa foi também em relação aos valores experimentais mostrados no artigo para os dois gases.

A partir da comparação dos resultados da viscosidade de cisalhamento para um potencial de Lennard-Jones (5a. aproximação) e dos resultados de Aziz (potencial HFDHE2) (3a. aproximação) conclui-se analisando a Figura 3.6.5 que:

- a) Os gráficos tem semelhança de forma, com os valores do primeiro maiores que os do segundo em relação aos dois gases.
- b) No intervalo de temperatura de 1 a 10 K os resultados originários do primeiro são melhores que os do segundo para o hélio 4, mas não o são para o hélio 3.
- c) Nas temperaturas de 10 a 100 K a concordância com os resultados experimentais se equivalem.

4- O estudo do gás de esfera rígida aqui realizado considerou para a determinação do diâmetro das moléculas, a referência do próprio valor do coeficiente de viscosidade de cisalhamento à alta temperatura. Como o diâmetro é um parâmetro que não deve mudar

em qualquer temperatura, o valor encontrado para este através da expressão do coeficiente de viscosidade à temperatura de 273 K também deve valer para propósitos de cálculos no intervalo de $0,1\text{ K}$ até 100 K estudados no texto. Os resultados para os dois coeficientes de transporte foram apresentados no Capítulo III para os gases hélio 4, hélio 3, para hidrogênio e orto-hidrogênio tomando o valor de diâmetro conforme este procedimento.

Os valores dos coeficientes de transporte, obtidos para um gás de esfera rígida em quinta aproximação, permitiram chegar às seguintes conclusões:

- a) De todos os gases estudados no trabalho os melhores resultados foram para o hélio 4, como ficou comprovado através da verificação das Figuras 3.6.8 e 3.6.9, respectivamente para a viscosidade e condutividade térmica, onde observou-se grande concordância com os resultados experimentais.
- b) A curva para os dois coeficientes, no caso do hélio 4, diferiu consideravelmente de forma em relação às curvas cujos resultados são oriundos de potenciais mais realísticos, abaixo de aproximadamente 2 K , a partir desta temperatura assemelha-se a destes resultados, com valores muito próximos.
- c) Em relação às duas estruturas do hidrogênio (para e orto)
 - c_1 - Em temperaturas menores que 45 K , os valores da estrutura orto são maiores que os da estrutura para (no caso de um potencial de Lennard-Jones isto ocorre abaixo de aproximadamente $5,5\text{ K}$).
 - c_2 - As diferenças (pró estrutura orto) entre os valores das duas estruturas são maiores que as registradas para um potencial $LJ(6 - 12)$ a bem baixas temperaturas (Figs. 3.6.10 e 3.6.11).
 - c_3 - As diferenças, pró estrutura para, que se manifestam a partir de 45 K , são de magnitude muito pequena em comparação com as do potencial de Lennard-Jones (a partir de $5,5\text{ K}$), como pode ser verificado na Figura 3.6.11.

5- A maior parte dos resultados que se observa na literatura dizem respeito ao gás hélio, encontrando-se um número menor de trabalhos que tratam do gás hidrogênio. Nas referências aqui citadas, os trabalhos de Cohen e colaboradores [14] para um potencial de Lennard-Jones (6-12) (primeira aproximação e os de Kamal e El Shimy [22] que trata de potencial de Buckingham modificado também em primeira aproximação mostram resultados somente em algumas temperaturas na faixa de $1,85K$ até $22,20K$ enquanto os de Hanley [21] apresentam resultados apenas a partir de $15K$. Não se encontram trabalhos de autores que tenham mostrado temperaturas abaixo de $1 K$.

Os resultados que são apresentados neste trabalho no intervalo de $0,1 K$ até $100 K$ para os potenciais de esfera rígida e de Lennard- Jones (5a. aproximação) representaram uma faixa de temperatura ampliada, para baixas temperaturas, em relação a outros resultados para gases ideais quânticos quando se refere às estruturas do para-hidrogênio e do orto-hidrogênio.

6- Para o cálculo das diferenças de fase utilizou-se o método de Runge-Kutta-Nyström de quarta ordem aplicado em ordem decrescente de $R = \frac{r}{\sigma}$ (r e σ : distâncias entre as partículas e onde o potencial é nulo, respectivamente) na resolução da equação de Schrödinger radial com potencial de Lennard-Jones (6-12). Os passos que caracterizam o método tratam com funções que são lineares em relação à função que inicializa o processo (vide Apêndice V). Isto permitiu calcular a partir da função de onda assintótica (3.3.3), simultaneamente a evolução dos valores cujos coeficientes são A^* e B^* , os quais inicialmente são proporcionais às funções de Bessel e de Neumann, respectivamente. Como a diferença de fase é dada (vide seção 3.3) pelo arco tangente da razão $((-1)^l B^*/A^*)$ (eq.3.3.6) esta pode ser obtida pelo anulamento da função de onda ou da derivada da mesma quando $R \rightarrow 0$, isto é, quando o potencial tende ao infinito. As diferenças de fase que foram obtidas pelo método de Runge-Kutta-Nyström de quarta ordem com resolução em ordem decrescente de R concordam com os resultados de Kilpatrick e colaboradores [12] que utilizam o método de Milne. Os métodos desenvolvidos por estes e por outros pesquisadores [11], [13], como estão exemplificados na seção (3.3) consistiam na resolução da equação de onda radial em ordem crescente de R e tinham a necessidade de uma pesquisa anterior para a determinação do

ponto inicial onde era possível considerar a função de onda como nula.

O método de resolução aqui desenvolvido necessitou apenas da determinação das funções de Bessel e de Neumann de ordem l (como realizado também para esfera rígida, por meio de relações de recorrência) e de um teste introduzido no programa computacional para observar a tendência na precisão das diferenças de fase até a casa decimal desejada.

7- Sendo os coeficientes de transporte funções exclusivas das integrais omegas (2.2.5), a convergência destas integrais aos valores clássicos também mostra uma tendência dos coeficientes a seus valores igualmente clássicos. No caso de esfera rígida estes resultados são valores constantes fixos para cada uma das integrais independente da temperatura. Tomando-se a razão das integrais omegas obtidas para o caso quântico e dividindo-as pelas respectivas integrais clássicas, observou-se os valores desta razão para todas as temperaturas. A tendência ao resultado clássico deve-se a dois fatores, o fator de temperatura e o fator de massa, os quais influem na razão de λ_{dB}/σ onde $\lambda_{dB} = \frac{h}{\sqrt{\pi mkT}}$. A Tabela II mostra além do resultado do hélio (3 e 4) e das estruturas de hidrogênio (para e orto) nas temperaturas de 100 e de 300 K a confrontação com resultados do neônio e do argônio à temperatura de 100 K.

Concluiu-se através da Tabela II para as integrais de colisão para potenciais de esfera rígidas que os valores das integrais omegas e assim dos coeficientes de transporte no caso do neônio e argônio tem maior tendência aos clássicos que os dos gases hélio 3, hélio 4, para e orto-hidrogênio, em razão de suas maiores massas.

8- A análise em relação às seções transversais de choque é interessante quando se refere à composição das mesmas a partir de suas partes simétricas e antissimétricas. O parâmetro que fornece uma medida quantitativa da posição que um gás ocupa em relação à presença de fenômenos quânticos é o chamado parâmetro de De Boer. No artigo de Imam-Rahajoe, Curtiss e Bernstein é exemplificada a influência do parâmetro quântico em relação à seção transversal de choque no caso de não haver consideração dos efeitos de simetria na seção transversal diferencial de choque $\alpha(\chi, g)$ (eq.1.3.40), isto é, esta seção é uma composição de metade da parte simétrica (eq.1.3.43) e metade da parte antissimétrica (eq.1.3.44).

A confrontação com os resultados de Imam-Rahajoe e colaboradores [15], para seções transversais de choque sem efeitos de simetria, os quais foram obtidos sem consideração específica do gás mas em função do parâmetro quântico de De Boer para os valores 1,2 e 3 (Fig. 3.4.7), deram consistência aos aqui encontrados, reforçando que os picos de ressonância eram verificados quando as partes simétricas e antissimétricas se encontravam em fase, enquanto uma curva mais suave aparecia quando estas estavam em fases contrárias (isto pode ser verificado para o hélio 3 e orto-hidrogênio na Fig. 3.4.8).

9- Na obtenção dos coeficientes de transporte em quinta ordem de aproximação foram necessários os cálculos de 15 integrais $\Omega^{(l,r)}$ ($l = 2, 4, 6 \leq r \leq (10, 8, 6)$), respectivamente, e em razão disto a obtenção de seções transversais de choque de ordem par até a sexta ordem. O cálculo clássico destas seções fornece valores constantes para as mesmas e que crescem com o acréscimo do valor de l . Com a determinação das seções transversais de choque de ordens 2,4,6, utilizando-se metodologia quântica a expectativa foi de observar como seria sua variação para baixas e altas energias. A expressão para as seções transversais de choque de ordem l (com l par) está representada em forma geral, em função do número de onda e de diferenças de fase, para o caso simétrico e antissimétrico na equação (2.3.15) até a sexta ordem (ordem superior às encontradas em trabalhos anteriores).

Observou-se que a baixas energias (pequenos valores do $\arctan(K\sigma)$) as seções calculadas quanticamente tenderam a oito vezes seus valores clássicos, enquanto as antissimétricas tenderam para zero (como era esperado pelo limite realizado na seção (2.5)); para muito altas energias os resultados simétricos como os antissimétricos atingiram os seus valores clássicos (as curvas para estas seções são apresentadas na Fig. 2.5.1).

10- Os integrandos para as integrais de colisão $\Omega^{(2,2)}$ nos mostram alguns aspectos interessantes e importantes na forma de suas curvas. A curva de $Y(\Omega^{(l,r)})$ (eq.2.6.4) com $l = 2$ e $r = 2$) a baixas temperaturas como no caso de $T = 0,1K$ apresenta uma certa simetria. Com o acréscimo de T além de ser perdida a simetria todas as curvas tangenciam a curva de menor temperatura. Além disso observa-se para esfera rígida (Fig.2.6.1) e para Lennard-Jones (Fig.3.5.1) que o valor máximo de $Y(\Omega^{(2,2)})$ cresce com o aumento de T e

se distancia na direção de $\alpha = \pi/2$.

O valor clássico para os coeficientes de transporte de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento é alcançado quando o valor máximo do integrando tender ao infinito exatamente em $\pi/2$.

11- No capítulo I é demonstrada a diferença (para o caso específico da função de distribuição) entre dois métodos de teoria cinética que levam à determinação dos coeficientes de transporte em teoria cinética: o método de Chapman-Enskog [3] e o método dos momentos de Grad [2]. Estes métodos determinam a função de distribuição fora do equilíbrio como função de dois diferentes pares de grandezas e conduzem às expressões dos coeficientes de condutividade térmica e de viscosidade de cisalhamento também por meios distintos.

Com o uso do método dos momentos de Grad para 13 campos escalares com aplicação ao caso de um gás ideal quântico obteve-se a função de distribuição fora do equilíbrio em termos do deviante do tensor pressão e do fluxo de calor. Isto a diferencia da função de distribuição obtida por Uehling e Uhlenbeck que através do método de Chapman-Enskog a encontraram como função do gradiente de temperatura e do gradiente de velocidade. Além disso, neste trabalho a função de distribuição (eq.4.6.30), a entropia (eq.4.7.7) e o fluxo de entropia (eq.4.7.10) foram determinadas como função explícita das integrais que representam as distribuições estatísticas de Fermi-Dirac, Bose-Einstein e a clássica de Maxwell-Boltzmann. Os coeficientes de viscosidade de cisalhamento e de condutividade térmica no caso de um gás fracamente degenerado concordaram com os obtidos por Uehling [9], comprovando a validade da teoria.

APÊNDICE I

Integrais

Neste trabalho, comumente são empregadas as seguintes integrais:

$$\int x^n e^{-\alpha x^2} dx = 4\pi \int x^{n+2} e^{-\alpha x^2} dx = 2\pi \Gamma\left(\frac{n+3}{2}\right) \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{n+3}{2}} \quad (I.1)$$

onde α é constante e $\Gamma(n)$ é a função gama tal que:

$$\Gamma(1) = 1 \quad , \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \quad \text{e} \quad \Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$$

As seguintes fórmulas, que consideram que a função de distribuição é função da velocidade peculiar ao quadrado, também são utilizadas:

$$\int C_i C_j f(C^2) d\mathbf{c} = \frac{1}{3} \delta_{ij} \int C^2 f(C^2) d\mathbf{c} \quad (I.2)$$

$$\int C_i C_j C_r C_s f(C^2) d\mathbf{c} = \frac{1}{15} (\delta_{ij} \delta_{rs} + \delta_{ir} \delta_{js} + \delta_{is} \delta_{jr}) \int C^4 f(C^2) d\mathbf{c} \quad (I.3)$$

$$\begin{aligned}
\int C_i C_j C_k C_l C_m C_n f(C^2) d\mathbf{c} = & \frac{1}{105} (\delta_{ij} \delta_{kl} \delta_{mn} + \delta_{ij} \delta_{km} \delta_{ln} \\
& + \delta_{ij} \delta_{kn} \delta_{lm} + \delta_{ik} \delta_{jl} \delta_{mn} + \delta_{ik} \delta_{jm} \delta_{ln} + \delta_{ik} \delta_{jn} \delta_{lm} + \delta_{il} \delta_{jk} \delta_{mn} \\
& + \delta_{il} \delta_{jn} \delta_{km} + \delta_{im} \delta_{jk} \delta_{ln} + \delta_{im} \delta_{jl} \delta_{kn} + \delta_{im} \delta_{jn} \delta_{kl} + \delta_{in} \delta_{jk} \delta_{lm} \\
& + \delta_{in} \delta_{jl} \delta_{km} + \delta_{in} \delta_{jm} \delta_{kl}) \int C^6 f(C^2) d\mathbf{c}
\end{aligned} \tag{I.4}$$

onde a velocidade peculiar é $\mathbf{C} = \mathbf{c} - \mathbf{v}$ e portanto:

$$d\mathbf{c} = d\mathbf{C} \tag{I.5}$$

No cálculo das produções são necessárias as seguintes integrais que relacionam as velocidades pós-colisionais e pré-colisionais:

$$\int_0^{2\pi} y'_i d\varepsilon = 2\pi y_i \cos \chi \tag{I.6}$$

$$\int_0^{2\pi} y'_i y'_j d\varepsilon = \pi y^2 \sin^2 \chi \delta_{ij} + \pi (3 \cos^2 \chi - 1) y_i y_j \tag{I.7}$$

$$\int_0^{2\pi} y'_i y'_j y'_k d\varepsilon = \pi \sin^2 \chi \cos \chi y^2 (y_i \delta_{jk} + y_j \delta_{ik} + y_k \delta_{ij}) + \pi (5 \cos^3 \chi - 3 \cos \chi) y_i y_j y_k \tag{I.8}$$

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} y'_i y'_j y'_k y'_l d\varepsilon = & \frac{\pi}{4} y^2 \sin^2 \chi (4 - 5 \sin^2 \chi) [y_i y_j \delta_{kl} + \\
& + y_i y_k \delta_{jl} + y_i y_l \delta_{kj} + y_i y_k \delta_{ik} + y_j y_l \delta_{ik} + y_k y_l \delta_{ij}] \\
& + \frac{\pi}{4} y^4 \sin^4 \chi (\delta_{ij} \delta_{kl} + \delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}) + \\
& + \frac{\pi}{4} (8 - 40 \sin^2 \chi + 35 \sin^4 \chi) y_i y_j y_k y_l
\end{aligned} \tag{I.9}$$

Os resultados para estas integrais, foram obtidos considerando que o vetor y_i tem coordenadas $(0,0,y)$ e o vetor y'_i $(y \sin \chi \cos \varepsilon, y \sin \chi \sin \varepsilon, y \cos \chi)$, pois $|y'| = |y| = y$.

Para efetuar estes cálculos utiliza-se um artifício de realizar um produto escalar de y' por vetores arbitrários, seguindo de uma derivação parcial em relação às componentes destes vetores. Assim:

$$\int_0^{2\pi} y'_i d\varepsilon = \frac{\partial}{\partial a_i} \int_0^{2\pi} a_j y'_j d\varepsilon$$

Em componentes cartesianas a integral no lado direito representa:

$$\int_0^{2\pi} a_x y \sin \chi \cos \varepsilon d\varepsilon + \int_0^{2\pi} a_y \sin \chi \sin \varepsilon d\varepsilon +$$

$$+ \int_0^{2\pi} a_z y \cos \chi d\varepsilon = 2\pi a_z y \cos \chi$$

e sendo z a única componente não nula de y , é possível escrever:

$$\int_0^{2\pi} y'_i d\varepsilon = \frac{\partial}{\partial a_i} [2\pi a_j y_j \cos \chi] = 2\pi y_i \cos \chi$$

As demais expressões são encontradas seguindo procedimento semelhante.

APÊNDICE II

Inversão de série

Deseja-se inverter a série:

$$y = ax + bx^2 + cx^3 + \dots \quad (II.1)$$

de modo que:

$$x = a'y + b'y^2 + c'y^3 + \dots \quad (II.2)$$

De (II.1) pode-se escrever:

$$x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a}x^2 - \frac{c}{a}x^3 + \dots \quad (II.3)$$

Substituindo x por seu valor dado em (II.3) no lado direito desta mesma equação, obtém-se:

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{1}{a}y - \frac{b}{a} \left(\frac{1}{a}y - \frac{b}{a}x^2 \right)^2 - \frac{c}{a} \frac{1}{a^3}y^3 + \dots \\
 &= \frac{1}{a}y - \frac{b}{a} \left(\frac{1}{a^2}y^2 - 2\frac{b}{a^2}x^2y \right) - \frac{c}{a} \frac{1}{a^3}y^3 + \dots
 \end{aligned} \tag{II.4}$$

Repetindo o procedimento que levou à equação (II.4), a série invertida até a terceira ordem em y , fica:

$$x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a^3}y^2 + \frac{1}{a^5}(2b^2 - ac)y^3 + \dots \tag{II.5}$$

que leva a seguinte identificação:

$$a' = \frac{1}{a} \quad , \quad b' = -\frac{b}{a^3} \quad \text{e} \quad c' = \frac{1}{a^5}(2b^2 - ac) \tag{II.6}$$

APÊNDICE III

Determinação de $\alpha^{(r,s)}$ e $\beta^{(r,s)}$

As integrais $a^{(r,s)}$ e $b^{(r,s)}$ foram definidas no texto como:

$$a^{(r,s)} = - \left(\frac{m}{kT} \right)^2 \frac{m}{4\rho} \int S_{3/2}^{(r)} C_i I[S_{3/2}^{(s)} C_i] d\mathbf{c} \quad (III.1)$$

$$b^{(r,s)} = - \left(\frac{m}{kT} \right)^3 \frac{m}{\rho} \int S_{5/2}^{(r)} C_{\langle k} C_{l \rangle} I[S_{5/2}^{(s)} C_{\langle k} C_{l \rangle}] d\mathbf{c} \quad (III.2)$$

onde: $S_{l+1/2}^{(n)} \left(\frac{m}{2kT} C^2 \right)$ é dada por (2.2.7), $C_{\langle k} C_{l \rangle} = C_k C_l - \frac{1}{3} C^2 \delta_{kl}$ e as integrais $I[\phi]$ por (2.2.10):

$$I[\phi] = \int f^{(0)} f_1^{(0)} (\phi_1'^{(1)} + \phi'^{(1)} - \phi_1^{(1)} - \phi^{(1)}) g \alpha(\chi, g) d\chi d\varepsilon d\mathbf{c}_1 \quad (III.3)$$

onde $f^{(0)}$ é a função Maxwelliana (1.6.10).

Para se chegar às expressões dadas no final deste Apêndice, será demonstrado como se calculam os primeiros elementos $a^{(1,1)}$ e $b^{(0,0)}$ de suas respectivas matrizes.

Para calcular $a^{(1,1)}$ deve-se adotar novas variáveis de integração, a velocidade relativa e a velocidade do centro de massa, dadas por:

$$\mathbf{g} = \mathbf{C}_1 - \mathbf{C} \quad \text{e} \quad \mathbf{G} = \frac{\mathbf{C}_1 + \mathbf{C}}{2} \quad (III.4)$$

Da lei de conservação do momento linear $\mathbf{G}' = \mathbf{G}$, assim:

$$\mathbf{C} = \mathbf{G} - \frac{1}{2}\mathbf{g}, \quad \mathbf{C}_1 = \mathbf{G} + \frac{1}{2}\mathbf{g} \quad (III.5)$$

$$\mathbf{C}' = \mathbf{G} - \frac{1}{2}\mathbf{g}', \quad \mathbf{C}'_1 = \mathbf{G} + \frac{1}{2}\mathbf{g}' \quad (III.6)$$

O Jacobiano da transformação de velocidades é unitário, portanto:

$$d\mathbf{C} d\mathbf{C}_1 = d\mathbf{g} d\mathbf{G} \quad (III.7)$$

Isto simplifica as expressões no integrando de $I[S_{3/2}^{(s)} C_i]$ como pode ser observado:

$$(S_{3/2}^{(1)} C_i)^{1'} + (S_{3/2}^{(1)} C_i)' - (S_{3/2}^{(1)} C_i)^1 - (S_{3/2}^{(1)} C_i) = -\frac{m}{2kT} G_j (g'_i g'_j - g_i g_j) \quad (III.8)$$

Disto segue que:

$$a^{(1,1)} = \left(\frac{m}{2kT} \right)^3 \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2kT\pi} \right)^3 \int e^{-\frac{m}{kT} G^2} e^{-\frac{m}{4kT} g^2} \left[\frac{5}{2} - \frac{m}{2kT} \left(G^2 - G_s g_s + \frac{1}{4} g^2 \right) \right] \left(G_i - \frac{1}{2} g_i \right) G_j (g'_i g'_j - g_i g_j) g b db d\varepsilon d\mathbf{G} d\mathbf{g} \quad (III.9)$$

Integrando em relação a $\mathbf{G}$ com auxílio das integrais no Apêndice I, obtém-se:

$$a^{(1,1)} = - \left(\frac{m}{4kT} \right)^{9/2} \frac{\rho}{m} \frac{1}{\pi^{3/2}} \int e^{-\frac{m}{4kT} g^2} g_i g_j (g'_i g'_j - g_i g_j) g b db d\varepsilon dg \quad (III.10)$$

Da integração em relação aos ângulos, considerando que o produto escalar $g'_i g_i = g'_j g_j = g^2 \cos \chi$ (χ ângulo de espalhamento definido no primeiro capítulo), vem:

$$a^{(1,1)} = 8\pi^{(1/2)} \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{4kT} \right)^{9/2} \int e^{-\frac{m}{4kT} g^2} g^7 (1 - \cos^2 \chi) b db dg \quad (III.11)$$

Considerando então a definição das integrais $\omega^{(l,r)}$:

$$\begin{aligned} \omega^{(l,r)} &= \rho \left(\frac{\pi}{mkT} \right)^{1/2} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\gamma^2} \gamma^{2r+3} (1 - \cos^l \chi) \chi b db d\gamma \\ &= \rho \left(\frac{\pi}{mkT} \right)^{1/2} \int_0^\infty \int_0^\pi e^{-\gamma^2} \gamma^{2r+3} (1 - \cos^l \chi) \alpha(\chi, \gamma) \sin \chi d\chi d\gamma \end{aligned} \quad (III.12)$$

onde as duas formas de escrita da integral provém da definição da seção transversal diferencial de choque (1.3.1), as integrais $a^{(1,1)}$ são resumidas por:

$$a^{(1,1)} = 4\omega^{(2,2)} \quad (III.13)$$

Procedendo de forma parecida para $b^{(0,0)}$, obtém-se:

$$\begin{aligned} b^{(0,0)} &= - \left(\frac{m}{2kT} \right)^3 \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2kT\pi} \right)^{3/2} \int e^{-\frac{m}{2kT} g^2} e^{-\frac{m}{4kT} g^2} \frac{1}{2} \\ &\quad \times (g'_i g'_j - g_i g_j) (G'_i G'_j - G_i G_j + \frac{1}{4} g_i g_j) g b db d\varepsilon dg dG \end{aligned} \quad (III.14)$$

e realizando a integração semelhante a $a^{(1,1)}$ obtém-se também:

$$b^{(0,0)} = 4\omega^{(2,2)} \quad (III.15)$$

Observação: preferiu-se trabalhar com integrais adimensionais $\Omega^{(l,r)}$, sendo que a relação entre elas é dada por:

$$\Omega^{(l,r)} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{mkT}{\pi} \right)^{1/2} \frac{1}{\sigma^2} \omega^{(l,r)} \quad (III.16)$$

com σ definindo o diâmetro para um potencial de esfera rígida, e a distância finita em que o potencial é nulo, no caso de potencial de Lennard-Jones.

A seguir são apresentadas as expressões para os demais elementos matriciais $\alpha^{(r,s)}$ e $\beta^{(r,s)}$ que são proporcionais ao $a^{(r,s)}$ e $b^{(r,s)}$ da mesma forma que as integrais de colisão, ou seja:

$$\alpha^{(1,1)} = 4\Omega^{(2,2)} \quad \text{e} \quad \beta^{(0,0)} = 4\Omega^{(2,2)} \quad (III.17)$$

Tabela dos coeficientes $\alpha^{(r,s)}$ e $\beta^{(r,s)}$

$$\alpha^{(1,1)} = 4\Omega^{(2,2)},$$

$$\alpha^{(1,2)} = 7\Omega^{(2,2)} - 2\Omega^{(2,3)},$$

$$\alpha^{(1,3)} = \frac{63}{8}\Omega^{(2,2)} - \frac{9}{2}\Omega^{(2,3)} + \frac{1}{2}\Omega^{(2,4)},$$

$$\alpha^{(1,4)} = \frac{231}{32}\Omega^{(2,2)} - \frac{99}{16}\Omega^{(2,3)} + \frac{11}{8}\Omega^{(2,4)} - \frac{1}{12}\Omega^{(2,5)},$$

$$\alpha^{(1,5)} = \frac{3003}{512}\Omega^{(2,2)} - \frac{429}{64}\Omega^{(2,3)} + \frac{143}{64}\Omega^{(2,4)} - \frac{13}{48}\Omega^{(2,5)} + \frac{1}{96}\Omega^{(2,6)},$$

$$\alpha^{(2,2)} = \frac{77}{4}\Omega^{(2,2)} - 7\Omega^{(2,3)} + \Omega^{(2,4)},$$

$$\alpha^{(2,3)} = \frac{945}{32}\Omega^{(2,2)} - \frac{261}{16}\Omega^{(2,3)} + \frac{25}{8}\Omega^{(2,4)} - \frac{1}{4}\Omega^{(2,5)},$$

$$\alpha^{(2,4)} = \frac{4389}{128}\Omega^{(2,2)} - \frac{429}{16}\Omega^{(2,3)} + \frac{55}{8}\Omega^{(2,4)} - \frac{5}{6}\Omega^{(2,5)} + \frac{1}{24}\Omega^{(2,6)},$$

$$\alpha^{(2,5)} = \frac{69069}{2048}\Omega^{(2,2)} - \frac{35607}{1024}\Omega^{(2,3)} + \frac{3003}{256}\Omega^{(2,4)} - \frac{715}{384}\Omega^{(2,5)} + \frac{59}{384}\Omega^{(2,6)} - \frac{1}{192}\Omega^{(2,7)},$$

$$\alpha^{(3,3)} = \frac{14553}{256}\Omega^{(2,2)} - \frac{1215}{32}\Omega^{(2,3)} + \frac{313}{32}\Omega^{(2,4)} - \frac{9}{8}\Omega^{(2,5)} + \frac{1}{16}\Omega^{(2,6)} + \frac{1}{6}\Omega^{(4,4)},$$

$$\begin{aligned}
\alpha^{(3,4)} &= \frac{81081}{1024} \Omega^{(2,2)} - \frac{34155}{512} \Omega^{(2,3)} + \frac{2717}{128} \Omega^{(2,4)} - \frac{211}{64} \Omega^{(2,5)} + \frac{17}{64} \Omega^{(2,6)} - \frac{1}{96} \Omega^{(2,7)} \\
&\quad + \frac{11}{24} \Omega^{(4,4)} - \frac{1}{12} \Omega^{(4,5)}, \\
\alpha^{(3,5)} &= \frac{1486485}{16384} \Omega^{(2,2)} - \frac{389961}{4096} \Omega^{(2,3)} + \frac{150293}{4096} \Omega^{(2,4)} - \frac{3653}{512} \Omega^{(2,5)} + \frac{779}{1024} \Omega^{(2,6)} - \frac{35}{768} \Omega^{(2,7)} \\
&\quad + \frac{1}{768} \Omega^{(2,8)} + \frac{143}{192} \Omega^{(4,4)} - \frac{13}{48} \Omega^{(4,5)} + \frac{1}{48} \Omega^{(4,6)}, \\
\alpha^{(4,4)} &= \frac{525525}{4096} \Omega^{(2,2)} - \frac{127413}{1024} \Omega^{(2,3)} + \frac{48323}{1024} \Omega^{(2,4)} - \frac{1155}{128} \Omega^{(2,5)} + \frac{247}{256} \Omega^{(2,6)} - \frac{11}{192} \Omega^{(2,7)} \\
&\quad + \frac{1}{576} \Omega^{(2,8)} + \frac{77}{48} \Omega^{(4,4)} - \frac{11}{24} \Omega^{(4,5)} + \frac{1}{24} \Omega^{(4,6)}, \\
\alpha^{(4,5)} &= \frac{10975965}{65536} \Omega^{(2,2)} - \frac{6239805}{32768} \Omega^{(2,3)} + \frac{1378663}{16384} \Omega^{(2,4)} - \frac{157651}{8192} \Omega^{(2,5)} + \frac{10391}{4096} \Omega^{(2,6)} \\
&\quad - \frac{1229}{6144} \Omega^{(2,7)} + \frac{85}{9216} \Omega^{(2,8)} - \frac{1}{4608} \Omega^{(2,9)} + \frac{2431}{768} \Omega^{(4,4)} - \frac{169}{128} \Omega^{(4,5)} + \frac{37}{192} \Omega^{(4,6)} - \frac{1}{96} \Omega^{(4,7)}, \\
\alpha^{(5,5)} &= \frac{257041785}{1048576} \Omega^{(2,2)} - \frac{20383935}{65536} \Omega^{(2,3)} + \frac{10212345}{65536} \Omega^{(2,4)} - \frac{673803}{16384} \Omega^{(2,5)} \\
&\quad + \frac{210763}{32768} \Omega^{(2,6)} - \frac{2561}{4096} \Omega^{(2,7)} + \frac{1409}{36864} \Omega^{(2,8)} - \frac{13}{9216} \Omega^{(2,9)} + \frac{1}{36864} \Omega^{(2,10)} + \frac{15015}{2048} \Omega^{(4,4)} \\
&\quad - \frac{2873}{768} \Omega^{(4,5)} + \frac{571}{768} \Omega^{(4,6)} - \frac{13}{192} \Omega^{(4,7)} + \frac{1}{384} \Omega^{(4,8)} + \frac{1}{480} \Omega^{(6,6)}.
\end{aligned}$$

$$\beta^{(0,0)} = 4\Omega^{(2,2)},$$

$$\beta^{(0,1)} = 7\Omega^{(2,2)} - 2\Omega^{(2,3)},$$

$$\beta^{(0,2)} = \frac{63}{8} \Omega^{(2,2)} - \frac{9}{2} \Omega^{(2,3)} + \frac{1}{2} \Omega^{(2,4)},$$

$$\beta^{(0,3)} = \frac{231}{32} \Omega^{(2,2)} - \frac{99}{16} \Omega^{(2,3)} + \frac{11}{8} \Omega^{(2,4)} - \frac{1}{12} \Omega^{(2,5)},$$

$$\beta^{(0,4)} = \frac{3003}{512} \Omega^{(2,2)} - \frac{429}{64} \Omega^{(2,3)} + \frac{143}{64} \Omega^{(2,4)} - \frac{13}{48} \Omega^{(2,5)} + \frac{1}{96} \Omega^{(2,6)},$$

$$\beta^{(1,1)} = \frac{301}{12} \Omega^{(2,2)} - 7\Omega^{(2,3)} + \Omega^{(2,4)},$$

$$\beta^{(1,2)} = \frac{1365}{32} \Omega^{(2,2)} - \frac{321}{16} \Omega^{(2,3)} + \frac{25}{8} \Omega^{(2,4)} - \frac{1}{4} \Omega^{(2,5)},$$

$$\beta^{(1,3)} = \frac{6699}{128} \Omega^{(2,2)} - \frac{297}{8} \Omega^{(2,3)} + \frac{385}{48} \Omega^{(2,4)} - \frac{5}{6} \Omega^{(2,5)} + \frac{1}{24} \Omega^{(2,6)},$$

$$\beta^{(1,4)} = \frac{109109}{2048} \Omega^{(2,2)} - \frac{52767}{1024} \Omega^{(2,3)} + \frac{11869}{768} \Omega^{(2,4)} - \frac{2405}{1152} \Omega^{(2,5)} + \frac{59}{384} \Omega^{(2,6)} - \frac{1}{192} \Omega^{(2,7)},$$

$$\beta^{(2,2)} = \frac{25137}{256} \Omega^{(2,2)} - \frac{1755}{32} \Omega^{(2,3)} + \frac{381}{32} \Omega^{(2,4)} - \frac{9}{8} \Omega^{(2,5)} + \frac{1}{16} \Omega^{(2,6)} + \frac{1}{2} \Omega^{(4,4)},$$

$$\beta^{(2,3)} = \frac{155925}{1024} \Omega^{(2,2)} - \frac{56727}{512} \Omega^{(2,3)} + \frac{3795}{128} \Omega^{(2,4)} - \frac{249}{64} \Omega^{(2,5)} + \frac{17}{64} \Omega^{(2,6)} - \frac{1}{96} \Omega^{(2,7)}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{11}{8} \Omega^{(4,4)} - \frac{1}{4} \Omega^{(4,5)}, \\
\beta^{(2,4)} &= \frac{3072069}{16384} \Omega^{(2,2)} - \frac{719433}{4096} \Omega^{(2,3)} + \frac{237237}{4096} \Omega^{(2,4)} - \frac{4901}{512} \Omega^{(2,5)} + \frac{891}{1024} \Omega^{(2,6)} - \frac{35}{768} \Omega^{(2,7)} \\
& + \frac{1}{768} \Omega^{(2,8)} + \frac{143}{64} \Omega^{(4,4)} - \frac{13}{16} \Omega^{(4,5)} + \frac{1}{16} \Omega^{(4,6)}, \\
\beta^{(3,3)} &= \frac{1168167}{4096} \Omega^{(2,2)} - \frac{245025}{1024} \Omega^{(2,3)} + \frac{236005}{3072} \Omega^{(2,4)} - \frac{1573}{128} \Omega^{(2,5)} + \frac{859}{768} \Omega^{(2,6)} - \frac{11}{192} \Omega^{(2,7)} \\
& + \frac{1}{576} \Omega^{(2,8)} + \frac{1463}{288} \Omega^{(4,4)} - \frac{11}{8} \Omega^{(4,5)} + \frac{1}{8} \Omega^{(4,6)}, \\
\beta^{(3,4)} &= \frac{26951925}{65536} \Omega^{(2,2)} - \frac{13505349}{32768} \Omega^{(2,3)} + \frac{7661797}{49152} \Omega^{(2,4)} - \frac{738569}{24576} \Omega^{(2,5)} + \frac{41005}{12288} \Omega^{(2,6)} \\
& - \frac{4175}{18432} \Omega^{(2,7)} + \frac{85}{9216} \Omega^{(2,8)} - \frac{1}{4608} \Omega^{(2,9)} + \frac{23881}{2304} \Omega^{(4,4)} - \frac{4745}{1152} \Omega^{(4,5)} + \frac{37}{64} \Omega^{(4,6)} - \frac{1}{32} \Omega^{(4,7)}, \\
\beta^{(4,4)} &= \frac{711736025}{1048576} \Omega^{(2,2)} - \frac{50053575}{65536} \Omega^{(2,3)} + \frac{64969619}{196608} \Omega^{(2,4)} - \frac{3630289}{49152} \Omega^{(2,5)} \\
& + \frac{953681}{98304} \Omega^{(2,6)} - \frac{29393}{36864} \Omega^{(2,7)} + \frac{4699}{110592} \Omega^{(2,8)} - \frac{13}{9216} \Omega^{(2,9)} + \frac{1}{36864} \Omega^{(2,10)} + \frac{470041}{18432} \Omega^{(4,4)} \\
& - \frac{28223}{2304} \Omega^{(4,5)} + \frac{5341}{2304} \Omega^{(4,6)} - \frac{13}{64} \Omega^{(4,7)} + \frac{1}{128} \Omega^{(4,8)} + \frac{1}{96} \Omega^{(6,6)}.
\end{aligned}$$

APÊNDICE IV

Seções transversais de choque de ordem l

As seções transversais de choque de ordem l em termos de σ^2 (σ distância característica relativa ao potencial) são determinadas por intermédio da seguinte expressão:

$$\Theta^{(l)} = \frac{2\pi}{\sigma^2} \int_0^\pi (1 - \cos^l \chi) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\chi \quad (I\ V.1)$$

onde χ é o ângulo de espalhamento e $\alpha(\chi, g)$ a seção transversal diferencial de choque que é igual a:

$$\alpha(\chi, g) = |f(\chi, g)|^2 = \frac{1}{4k^2} \left| \sum_{j=0}^{\infty} (2j-1) [e^{2i\delta_j} - 1] P_j(\cos \chi) \right|^2 \quad (I\ V.2)$$

para partículas distinguíveis, e

$$\alpha(\chi, g) = \frac{1}{2k^2} \left| \sum_j (e^{2i\delta_j} - 1) (2j+1) P_j(\cos \chi) \right|^2 \quad (I\ V.3)$$

para partículas indistinguíveis, sendo $j=\text{par}$ para o caso em que a função de onda é simétrica e $j=\text{ímpar}$ para o caso em que a função de onda que descreve o sistema é antisimétrica em relação a troca entre elas.

Fazendo a troca da variável $\cos \chi$ por x tem-se:

$$\Theta^{(l)} = \int_{-1}^{+1} (1-x^l) \alpha(x, g) dx \quad (I\ V4)$$

Da ortogonalidade dos polinômios de Legendre:

$$\int_{-1}^{+1} P_j(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2j+1} \delta_{jm} \quad (I\ V5)$$

considerando a relação de recorrência para estes:

$$\begin{aligned} x^2 P_m(x) &= \frac{(m+2)(m+1)}{(2m+3)(2m+1)} P_{m+2}(x) + \frac{4m^3 + 6m^2 - 1}{(2m+1)(2m-1)(2m+3)} P_m(x) \\ &+ \frac{m(m-1)}{(2m+1)(2m-1)} P_{m-2}(x) \end{aligned} \quad (I\ V6)$$

e que:

$$e^{2i\delta_j} - 1 = 2e^{i\delta_j} \sin \delta_j \quad (I\ V7)$$

e substituindo (IV.3) em (IV.4), para $l = 2$, obtém-se inicialmente:

$$\begin{aligned} \Theta^{(2)} &= \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\substack{j \text{ par ou} \\ \text{ímpar}}}^{\infty} \left\{ \frac{4j^3 + 4j^2 - 2j - 2}{(2j-1)(2j+3)} \sin^2 \delta_j \right. \\ &\quad \left. - 2 \frac{(j+2)(j+1)}{2j+3} \cos(\delta_j - \delta_{j+2}) \sin(\delta_j - \delta_{j+2}) \right\} = \\ &= \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\substack{j \text{ par ou} \\ \text{ímpar}}}^{\infty} \left\{ \left[\frac{j(j-1)}{(2j-1)} + \frac{(j+1)(j+2)}{(2j+3)} \right] \sin^2 \delta_j \right\} \end{aligned}$$

$$\left. -2 \frac{(j+2)(j+1)}{2j+3} \cos(\delta_j - \delta_{j+2}) \sin \delta_j \sin \delta_{j+2} \right\} \quad (IV.8)$$

Visto que a primeira somatória é zero tanto para $j = 0$, como para $j = 1$, (IV.8) pode ser escrita como:

$$\sum_{j \text{ par ou impar}}^{\infty} \frac{(j+2)(j+1)}{2j+3} \sin^2 \delta_{j+2} \quad (IV.9)$$

levando assim à expressão final aqui utilizada:

$$\Theta_{s_A}^{(2)} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{j \text{ par ou impar}}^{\infty} \frac{(j+1)(j+2)}{(2j+3)} \sin^2(\delta_{j+2} - \delta_j) \quad (IV.10)$$

Seguindo procedimentos semelhantes, como a fatoração do coeficiente em $\sin^2 \delta_j$ levando às relações abaixo as quais possuem mesmo coeficiente:

$$\sin^2 \delta_j + \sin^2 \delta_{j+n} - 2 \cos(\delta_j - \delta_{j+n}) \sin \delta_j \sin \delta_{j+n} = \sin^2(\delta_{j+n} - \delta_j) \quad (IV.11)$$

obtém-se com adequada utilização das relações de recorrência:

para $l = 4$:

$$\begin{aligned} \Theta_{s_A}^{(4)} &= \frac{8\pi}{k^2 \sigma^2} \sum_{j \text{ par ou impar}} \frac{(j+4)(j+3)(j+2)(j+1)}{(2j+7)(2j+5)(2j+3)} \\ &\times \left\{ \sin^2(\delta_{j+4} - \delta_j) + \frac{2(2j+5)(2j^2+6j-3)}{(j+4)(j+3)(2j-1)} \sin^2(\delta_{j+2} - \delta_j) \right\} \end{aligned} \quad (IV.12)$$

e para $l = 6$:

$$\Theta_{s_A}^{(6)} = \frac{8\pi}{k^2 \sigma^2} \sum_{j \text{ par ou impar}} \frac{(j+6)(j+5)(j+4)(j+3)(j+2)(j+1)}{(2j+11)(2j+9)(2j+7)(2j+5)(2j+3)}$$

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \operatorname{sen}^2(\delta_{j+6} - \delta_j) + \frac{3(2j+9)(2j^2+10j-5)}{(j+6)(j+5)(2j-1)} \operatorname{sen}^2(\delta_{j+4} - \delta_j) \right. \\
& \left. + \frac{15(2j+11)(2j+5)(2j^4+12j^3+2j^2-48j+18)}{2(j+6)(j+5)(j+4)(j+3)(2j-3)(2j-1)} \operatorname{sen}^2(\delta_{j+2} - \delta_j) \right\} \quad (I\,V.13)
\end{aligned}$$

APÊNDICE V

Método de Runge-Kutta-Nyström

Este é um método de resolução numérica de quarta ordem para equações diferenciais. Seja a equação:

$$y'' = f(x, y, y')$$

sujeita às condições iniciais: $y(x_0) = y_0$ e $y'(x_0) = y'_0$. Para sua solução inicialmente são computados (com h como passo para resolução) os seguintes valores (conforme apresentado em [10]).

$$A_n = \frac{h}{2} f(x_n, y_n, y'_n)$$

$$B_n = \frac{h}{2} f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \beta_n, y'_n + A_n) \quad \text{onde} \quad \beta_n = \frac{h}{2} (y'_n + \frac{A_n}{2})$$

$$C_n = \frac{h}{2} f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \beta_n, y'_n + A_n\right) \quad \text{onde} \quad \beta_n = \frac{h}{2} \left(y'_n + \frac{A_n}{2}\right)$$

$$D_n = \frac{h}{2} f\left(x_n + h, y_n + \delta_n, y'_n + 2C_n\right) \quad \text{onde} \quad \delta_n = h(y'_n + C_n)$$

e a seguir o novo valor de y :

$$y_{n+1} = y_n + h(y'_n + K_n) \quad \text{onde} \quad K_n = \frac{1}{3}(A_n + B_n + C_n)$$

como aproximação para $y(x_{n+1})$, e

$$y'_{n+1} = y'_n + K_n^* \quad \text{onde} \quad K_n^* = \frac{1}{3}(A_n + 2B_n + C_n)$$

como aproximação para $y'(x_{n+1})$. Após obter y_{n+1} e y'_{n+1} repete-se o processo.

No problema aqui tratado:

$$x = R$$

$$y = R\Psi$$

$$y' = \frac{d(R\Psi)}{dR} = (R\Psi)'$$

$$y'' = \frac{d^2(R\Psi)}{dR^2} = (R\Psi)''$$

as condições iniciais tem as formas:

$$x_0 = R_0 = R_{max}$$

$$y_0 = (R\Psi)_0 = A^* f_1(R_0) + B^* f_2(R_0)$$

$$y'_0 = (R\Psi)'_0 = A^* f_3(R_0) + B^* f_4(R_0)$$

e a equação a ser resolvida é a equação diferencial de Schrödinger radial:

$$(R\Psi)'' = \left(\frac{l(l+1)}{R^2} + \left(\frac{4\pi}{\Lambda^*} \right)^2 \left(\frac{1}{R^4} - \frac{1}{R^6} \right) - (K\sigma)^2 \right) R\Psi$$

Em razão dos passos que fornecem A_0, B_0, C_0 e D_0 serem lineares em relação a função do lado direito na equação acima, as soluções podem ser separadas em duas partes com coeficientes A^* e B^* .

APÊNDICE VI

Cálculo das integrais omegas

Os $\Omega^{(l,r)}$ foram obtidos por métodos de integração da segunda regra de Simpson que permite encontrar o resultado através da seguinte expressão que relaciona os integrandos numerados passo a passo ($Y_0, Y_1, Y_2 \dots Y_n$):

$$Y = \frac{3h}{8} (Y_0 + 3Y_1 + 3Y_2 + 2Y_3 + 3Y_4 + 3Y_5 + 2Y_6 + \dots 3Y_{n-2} + 3Y_{n-1} + Y_n) \quad (VI.1)$$

onde h é o passo dado por:

$$h = \frac{X_n - X_0}{n} \quad (VI.2)$$

sendo X_n e X_0 , limites das abscissas superior e inferior onde são tomados os integrandos Y_n e Y_0 , e n é o número de integrações realizadas.

O erro em tal integração é determinado por

$$E = -\frac{(X_n - X_0)}{80n^4} Y^{IV}(\epsilon) \quad (\text{VI.3})$$

com $X_0 \leq \epsilon \leq X_n$; Y^{IV} é a derivada de 4a. ordem da função integrando no ponto $X = \epsilon$.

Para minimizar o erro foi utilizado o método de extrapolação de Richardson quando da realização da integração para dois n 's diferentes. Caracterizando por exemplo as integrais $Y_{(1)}$ e $Y_{(2)}$, o resultado é como segue:

$$Y_{(1)} = Y_{(2)} + \frac{n_1^p}{n_2^p - n_1^p} (Y_{(2)} - Y_{(1)}) \quad (\text{VI.4})$$

onde $p = 4$ para o caso de regra de Simpson e n_1 e n_2 são o número de subintervalos para determinar $Y_{(1)}$ e $Y_{(2)}$, respectivamente ($n_2 > n_1$). Neste trabalho utilizou-se $n_1 = 1560$ e $n_2 = 3n_1$.

Segue o programa LJ1.BAS para a obtenção das integrais omegas no caso de um potencial de Lennard-Jones.

O programa é composto dos seguintes arquivos:

1) Características dos gases (GASES.)

dados: MM, DS, FD, FS, NM, AQ

MM: massa molecular

DS: σ

FD: Fator que diferencia os gases em relação à seção transversal de choque

FD=0 (para hidrogênio e hélio 4)

FD=1 (hélio 3)

FD=2 (orto-hidrogênio)

FS: Fator de simetria

1: seções simétricas

2: para composições de simétricas e antissimétricas

NM: fornece o número correspondente a cada gás para fins de arquivos de saída.

AQ $\rightarrow$ parâmetro quântico de De Boer

2) Variação da temperatura (TEMPRA.)

variáveis: T, TEP T: temperatura ; TEP: número de ordem

ARQUIVO DE SEGURANÇA

ARQUEIRO.BAS - Assegura a continuidade do programa após qualquer interrupção, mudando-se apenas a variável inicial XT, de 0 para 1.

ARQUIVOS DE SAÍDA

HELJ4.DAT (hélio 4)

HELJ3.DAT (hélio 3)

H2OLJ.DAT (orto-hidrogênio)

H2PLJ.DAT (para-hidrogênio)

com as seguintes mensagens:

temperatura, σ , massa

(l, r) , $Y(n_1)$, $Y(n_2)$, Y (corrigido pelo método de extrapolação de Richardson)

INTEGRAIS OMEGAS (LENNARD-JONES)
PROGRAMA 1j1.BAS

```
CLS
DIM J(1000), N(1000), D(1000), DJ(1000), DN(1000), TS(10),
TA(10), TT(10), TV(10), THE3(10), TH2(10), IDM(250, 64),
I1(250, 64), I2(250, 64), P(250, 64)
OPEN "GASes." FOR INPUT AS #1
'MUDA AQUI (XT=0 OU XT=1)
XT = 0
MAX = 1560
INTG = 1
ERO = .0001
PI = 3.14159265#
HC = 6.626176E-34 / 2 / PI
KB = 1.380662E-23
NA = 6.022045E+23
2 IF EOF(1) = -1 THEN 500
3 INPUT #1, MM, DS, FD, FS, FT, nm, AQ
in = .05
fim = 1.56
MASSA = (MM / NA) * .001
DT = 1000
FC = 0
H = (fim - in) / MAX
NX = 0
7 TP = 5
FOR NS = 1 TO 63
FOR NN = 0 TO 210
P(NN, NS) = 0
NEXT NN
NEXT NS
J = 0
KX = 0
IF XT <> 1 OR FC = 1 THEN 1000
OPEN "ARQUEIRO.BAS" FOR INPUT AS #15
INPUT #15, KX, FC, nm, J, NX, I1
PRINT KX, FC, nm, J, NX, I1
FOR I = I1 TO 63
FOR IO = 1 TO 15
INPUT #15, TEP, V, VV, P(VV, TEP), I1(V, TEP), I2(V, TEP)
NEXT IO
305 NEXT I
CLOSE #15
IF FC = 0 THEN NX = 0
1000 NMAX = MAX * (1 - FC) + NX * FC * 3
FOR K = KX + XT TO NMAX
NT = 0
IF J = TP THEN GOTO 85
IF K <> 0 THEN IF K / 3 = INT(K / 3) THEN J = 2 ELSE J = 3
ELSE J = 1
ALFA = in + K * H * (1 - 2 * FC / 3)
KZ = TAN(ALFA)
IF TP = 1 AND J = 2 THEN J = 1
PRINT ALFA, K, nm, "30"
```

```

Q = 16 * (PI ^ 2) / (AQ ^ 2)
EN = KZ ^ 2
REFIN = (Q / 10 / KZ / .0001) ^ .2
HH = -REFIN / 1000
NXR = INT(KZ) + 3
TT(2) = 0
TT(4) = 0
TT(6) = 0
TV(2) = 0
TV(4) = 0
TV(6) = 0
FOR NY = 2 TO 6 STEP 2
LX = 0
X = 0
MX = 6
IF NY <> 2 THEN 27
B LMAX = (2 * NXR + 4) + 6 * X
FOR L = LX TO LMAX STEP FT
LR = L * (L + 1)
COR = 0
FOR NR = 0 TO 1000
IF COR = 1 THEN 11
RE = REFIN + NR * HH
IF NR <> 0 THEN 9
Z = KZ * RE
J(0) = SIN(Z) / Z
N(0) = -COS(Z) / Z
J(1) = J(0) / Z + N(0)
N(1) = N(0) / Z - J(0)
DJ(0) = -J(1)
DN(0) = -N(1)
FOR LL = 0 TO L
L2 = LL + 2
L1 = LL + 1
J(L2) = (2 * L1 + 1) * J(L1) / Z - J(LL)
N(L2) = (2 * L1 + 1) * N(L1) / Z - N(LL)
DJ(L1) = (1 / (2 * L1 + 1)) * (L1 * J(LL) - (L1 + 1) * J(L2))
DN(L1) = (1 / (2 * L1 + 1)) * (L1 * N(LL) - (L1 + 1) * N(L2))
NEXT LL
YA = RE * J(L)
YB = RE * N(L) * ((-1) ^ (L + 1))
DYA = (J(L) + Z * DJ(L))
DYB = (N(L) + Z * DN(L)) * ((-1) ^ (L + 1))
IF L <> 0 THEN 9
9 E = (LR / (RE ^ 2) + Q * (1 / (RE ^ 6) - 1) /
(RE ^ 6) - EN) * (HH / 2)
AA = E * YA
AB = E * YB
R1 = RE + HH / 2
BETAA = (HH / 2) * (DYA + AA / 2)
BETAB = (HH / 2) * (DYB + AB / 2)
YA1 = YA + BETAA
YB1 = YB + BETAB
E1 = (LR / (R1 ^ 2) + Q * (1 / (R1 ^ 6) - 1) /

```



```

(R1 ^ 6) - EN) * (HH / 2)
BA = E1 * YA1
BB = E1 * YB1
R3 = RE + HH
DELTA A = HH * (DYA + BA)
DELTA B = HH * (DYB + BB)
YA3 = YA + DELTA A
YB3 = YB + DELTA B
E3 = (LR / (R3 ^ 2) + Q * (1 / (R3 ^ 6) - 1) /
(R3 ^ 6) - EN) * (HH / 2)
DA = E3 * YA3
DB = E3 * YB3
KA1 = (1 / 3) * (AA + 2 * BA)
KB1 = (1 / 3) * (AB + 2 * BB)
KA2 = (1 / 3) * (AA + 4 * BA + DA)
KB2 = (1 / 3) * (AB + 4 * BB + DB)
B1 = -(YA / YB)
D1 = ATN(B1) * ((-1) ^ L)
IF ABS(YA) > 1E+20 OR ABS(YB) > 1E+20 THEN ALF = 1E-20
ELSE ALF = 1
YA = (YA + HH * (DYA + KA1)) * ALF
YB = (YB + HH * (DYB + KB1)) * ALF
DYA = (DYA + KA2) * ALF
DYB = (DYB + KB2) * ALF
BSA = -(YA / YB)
DF = ATN(BSA) * ((-1) ^ L)
DIA = 1
IF RE > .7 THEN 11
DIA = DF - D1
IF DIA < ERO THEN 10 ELSE 11
10 COR = 1
DL = CINT(DF * 10000!) * ERO
D(L) = DL + ERO
IF ABS(DF) < ERO THEN D(L) = 0
11 NEXT NR
NEXT L
27 FOR M = MX TO LMAX STEP 2
LM = M - 6
LT = M - 5
FOR P = 1 TO FS
IF P = 1 THEN LV = LM ELSE LV = LT
A = LV + NY
B = LV + NY - 2
IF NY = 2 THEN 12
C = LV + NY - 4
12 D1 = D(A) - D(LV)
D2 = D(B) - D(LV)
D3 = D(C) - D(LV)
FAT = A
DFATO = 2 * LV + 2 * NY - 1
DFAT = DFATO
FOR S = 1 TO NY - 1
S1 = A - S
SN = S1 * FAT

```

```

FAT = SN
NEXT S
IF NY = 2 THEN 15
FOR XA = 2 TO 2 * NY - 4 STEP 2
S2 = DFATO - XA
XN = S2 * DFAT
DFAT = XN
NEXT XA
15 C1 = 0
C2 = 0
IF NY = 2 THEN 20 ELSE 16
16 IF NY = 4 THEN 19 ELSE 18
18 C2 = 5 * (NY - 3) * (2 * LV + 2 * NY - 1) *
(2 * LV + 2 * NY - 7) * (2 * LV ^ 4 + 4 * (NY - 3)
* LV ^ 3 + 2 * (3 * NY - 17) * LV ^ 2 - 24 * (NY - 4)
* LV + 9 * (NY - 4)) / 2 / (LV + NY) / (LV + NY - 1) / (LV
+ NY - 2) / (LV + NY - 3) / (2 * LV - 3) / (2 * LV - 1)
19 C1 = NY * (2 * LV + 2 * NY - 3) * (2 * LV ^ 2 + 2 *
(NY - 1) * LV - (NY - 1)) / 2 / (LV + NY) / (LV + NY - 1)
/ (2 * LV - 1)
20 IF P = 2 THEN 30
TS(NY) = TT(NY) + 4 * (FAT / DFAT) * (SIN(D1) ^ 2 + C1 *
SIN(D2) ^ 2 + C2 * SIN(D3) ^ 2)
IF D(LMAX) = 0 THEN 23 IF L < 2 * KZ THEN 25
DT = ABS(TS(NY) - TT(NY))
GOTO 25
23 DT = 0
25 TT(NY) = TS(NY)
GOTO 40
30 TA(NY) = TV(NY) + 4 * (FAT / DFAT) * (SIN(D1) ^ 2
+ C1 * SIN(D2) ^ 2 + C2 * SIN(D3) ^ 2)
35 TV(NY) = TA(NY)
40 NEXT P
NEXT M
X = X + 1
MX = M
LX = L
IF DT > .00001 THEN 8
NEXT NY
T = 0
OPEN "TEMPRA." FOR INPUT AS #2
41 IF T = 300 THEN 45 ELSE 46
45 CLOSE #2
IF NT = 1 THEN CLOSE #15
GOTO 81
46 INPUT #2, T, TEP
42 MS = (MASSA ^ .5) * (T ^ .5) * (KB ^ .5)
LSF = HC / MS LS = (LSF / DS) * 1E+10
ZEST = (14 ^ .5) / 2 / LS
FOR N = 2 TO 6 STEP 2
IF N <> 2 THEN IF N = 4 THEN W = 4 ELSE W = 0 ELSE W = 8
TESTE = -1
50 FOR R = N TO N + W STEP 1
IF K = NMAX THEN J = 1

```

```

V = 10 * N + R
IF V = 30 THEN V = 210
VV = V - 10
CTE = 3 * (1 - 2 * FC / 3) * H * (LS ^ (2 * R + 4)) / 8
IF FD = 1 THEN 68 IF FD = 2 THEN 65
INTG = CTE * (KZ ^ R) * EXP(-(LS * KZ) ^ 2) * TS(N) *
(1 + KZ ^ 2) * (KZ ^ R) * KZ
60 P(V, TEP) = P(VV, TEP) + INTG * J
P(VV, TEP) = P(V, TEP)
IF FC = 0 THEN 62 ELSE 64
62 I1(V, TEP) = P(V, TEP)
GOTO 75
64 I2(V, TEP) = P(V, TEP)
GOTO 80
65 TH2(N) = (5 / 9) * TS(N) + (4 / 9) * TA(N)
INTG = CTE * (KZ ^ R) * EXP(-(LS * KZ) ^ 2) * TH2(N) *
(1 + KZ ^ 2) * (KZ ^ R) * KZ
P(V, TEP) = P(VV, TEP) + INTG * J
P(VV, TEP) = P(V, TEP)
IF FC = 0 THEN 66 ELSE 67
66 I1(V, TEP) = P(V, TEP)
GOTO 75
67 I2(V, TEP) = P(V, TEP)
GOTO 80
68 THE3(N) = (3 / 4) * TA(N) + (1 / 4) * TS(N)
INTG = CTE * (KZ ^ R) * EXP(-(LS * KZ) ^ 2) * THE3(N) *
(1 + KZ ^ 2) * (KZ ^ R) * KZ
P(V, TEP) = P(VV, TEP) + INTG * J
P(VV, TEP) = P(V, TEP)
IF FC = 0 THEN 69 ELSE 70
69 I1(V, TEP) = P(V, TEP)
GOTO 75
70 I2(V, TEP) = P(V, TEP)
GOTO 80
75 IF KZ < ZEST THEN 80
IF V = 210 AND TEP = 63 THEN 79 ELSE 80
79 IF INTG < .0000001 THEN TESTE = 1 ELSE TESTE = 0
78 PRINT T, V, INTG, I1(V, TEP)
80 IF K = 0 THEN 83
IF INT(K / 30) <> K / 30 THEN 83
IF NT = 1 THEN 82 OPEN "ARQUEIRO.BAS" FOR OUTPUT AS #15
NT = 1
I1 = TEP
PRINT #15, K, FC, nm, J, NX, I1
82 PRINT #15, TEP, V, VV, P(VV, TEP), I1(V, TEP), I2(V, TEP)
83 NEXT R
NEXT N
GOTO 41
81 IF FC = 1 THEN 85
IF TESTE = 1 THEN TP = 1 ELSE TP = 0
NX = K
85 NEXT K
XT = 0
OPEN "HELJ4.DAT" FOR OUTPUT AS #6

```

```

OPEN "HELJ3.DAT" FOR OUTPUT AS #7
OPEN "H20LJ.DAT" FOR OUTPUT AS #10
OPEN "H2PLJ.DAT" FOR OUTPUT AS #11
T = 0
OPEN "TEMPRA." FOR INPUT AS #2
94 IF T = 300 THEN 95 ELSE 96
95 CLOSE #2
CLOSE #nm
GOTO 200
96 INPUT #2, T, TEP
92 PRINT #nm, T, DS, MASSA, NX
PRINT T, DS, MASSA, NX
FOR U = 22 TO 30
IF U = 30 THEN UV = 210 ELSE UV = U
IOM(UV, TEP) = I2(UV, TEP) + (NX ^ 4) * (I2(UV, TEP) -
I1(UV, TEP)) / ((3 * NX) ^ 4 - NX ^ 4)
PRINT #nm, UV, I1(UV, TEP), I2(UV, TEP), IOM(UV, TEP)
PRINT UV, I1(UV, TEP), I2(UV, TEP), IOM(UV, TEP)
NEXT U
FOR B = 44 TO 48
IOM(B, TEP) = I2(B, TEP) + (NX ^ 4) * (I2(B, TEP) -
I1(B, TEP)) / ((3 * NX) ^ 4 - NX ^ 4)
PRINT #nm, B, I1(B, TEP), I2(B, TEP), IOM(B, TEP)
PRINT B, I1(B, TEP), I2(B, TEP), IOM(B, TEP)
NEXT B
IOM(66, TEP) = I2(66, TEP) + (NX ^ 4) * (I2(66, TEP) -
I1(66, TEP)) / ((3 * NX) ^ 4 - NX ^ 4)
ABC = 66
PRINT #nm, ABC, I1(66, TEP), I2(66, TEP), IOM(66, TEP)
PRINT ABC, I1(66, TEP), I2(66, TEP), IOM(66, TEP)
GOTO 94
200 FC = FC + 1
IF FC = 1 THEN 7
GOTO 2
500 CLOSE #1
END

```

APÊNDICE VII

Termos de produção: P_{ij} e Q_i

As expressões que representam estes termos a serem calculados são dadas por:

$$P_{ij} = \int m(C'_i C'_j - C_i C_j) f f_1 \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A}\right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A}\right) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\Gamma \quad (VII.1)$$

$$Q_i = \int \frac{m}{2} (C'^2 C'_i - C^2 C_i) f f_1 \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A}\right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A}\right) \alpha(\chi, g) \sin \chi d\Gamma \quad (VII.2)$$

onde:

$$d\Gamma = d\chi d\epsilon d\mathbf{c} d\mathbf{c}_1 \quad (VII.3)$$

Inicialmente será considerada uma modificação nas integrais $I_n^e(\alpha)$ com o objetivo de colocá-las como função do parâmetro de degenerescência do gás

$$\Delta = \frac{\lambda_{dB}^3}{\omega m} \rho \quad (VII.4)$$

definido na seção (4.5). Da equação (4.5.6) tem-se até a primeira ordem em Δ :

$$e^{-\alpha} = \Delta \left(1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{3/2}} \right) \quad (VII.5)$$

e substituindo-se este valor em (4.5.3)

$$I_n^\epsilon(\Delta) = \frac{1}{2} \Gamma \left(\frac{n+1}{2} \right) \Delta \left[1 + \epsilon \Delta \left(\frac{1}{2^{(n+1)}} - \frac{1}{2^{3/2}} \right) \right] \quad (VII.6)$$

A função de distribuição em equilíbrio para o caso fracamente degenerado até a primeira ordem $\epsilon e^{-\alpha}$ é:

$$f_E = A e^{-\alpha} e^{-x^2} [1 + \epsilon e^{-\alpha} e^{-x^2}] \quad (VII.7)$$

e em termos de Δ , considerando a definição deste parâmetro e visto que $A = \omega m^3 / h^3$:

$$f_E = \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} e^{-x^2} \left[\left(1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{3/2}} \right) + \epsilon \Delta e^{-x^2} \right] \quad (VII.8)$$

sendo: $x = \sqrt{\frac{m}{2kT}} C$.

A parte com termos exponenciais na expressão fora do equilíbrio também pode ser reescrita como:

$$\frac{A e^{\alpha+x^2}}{(e^{\alpha+x^2} - \epsilon)^2} = -\frac{\partial f_E}{\partial \alpha} = \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} e^{-x^2} \left[1 + \epsilon \Delta \left(2e^{-x^2} - \frac{1}{2^{3/2}} \right) \right] \quad (VII.9)$$

Logo, a função de distribuição fora do equilíbrio pode ser escrita para o caso de gás fracamente degenerado na forma:

$$f = e^{-x^2} \left[1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{3/2}} \right] \left[a_1 + a_2 p_{\langle ij \rangle} x_i x_j + a_3 \left(x^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) q_i x_i \right] +$$

$$+ e^{-2x^2} \epsilon \Delta \left[a_1 + 2a_2 p_{\langle ij \rangle} x_i x_j + 2a_3 \left(x^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) q_i x_i \right] \quad (VII.10)$$

na qual:

$$a_1 = \frac{\rho}{m} \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} \quad (VII.11)$$

$$a_2 = \frac{3}{2} \frac{1}{k T} \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} \frac{I_2^\epsilon}{I_4^\epsilon} \quad (VII.12)$$

$$a_3 = \frac{1}{k T} \left(\frac{2m}{k T} \right)^{1/2} \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} \frac{9(I_2^\epsilon)^2}{21I_2^\epsilon I_6^\epsilon - 25(I_4^\epsilon)^2} \quad (VII.13)$$

Cálculo dos produtos entre funções de distribuição:

$$f f_1 = e^{-(x^2+x_1^2)} \left[1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{1/2}} \right] \left\{ a_1^2 + a_1 a_2 p_{\langle ij \rangle} (x_i x_j + x_i^1 x_j^1) \right.$$

$$+ a_1 a_3 q_i \left[\left(x^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) x_i + \left(x_1^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) x_i^1 \right] \left. \right\}$$

$$+ e^{-(x^2+2x_1^2)} \epsilon \Delta \left\{ a_1^2 + a_1 a_2 p_{\langle ij \rangle} (x_i x_j + 2x_i^1 x_j^1) \right.$$

$$+ a_1 a_3 q_i \left[\left(x^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) x_i + 2 \left(x_1^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) x_i^1 \right] \left. \right\}$$

$$+ e^{-(2x^2+x_1^2)} \epsilon \Delta \left\{ a_1^2 + a_1 a_2 p_{\langle ij \rangle} (2x_i x_j + x_i^1 x_j^1) \right.$$

$$+ a_1 a_3 q_i \left[2 \left(x^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) x_i + \left(x_1^2 - \frac{5 I_4^\epsilon}{3 I_2^\epsilon} \right) x_i^1 \right] \left. \right\} \quad (VII.14)$$

Em (VII.14) não foram considerados os termos de segunda ordem envolvendo $p_{\langle ij \rangle}$ e q_i .

Por outro lado, tomando apenas os termos em primeira ordem em ϵ , resulta:

$$\begin{aligned}
 & \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A}\right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A}\right) \approx \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A} + \frac{\epsilon f'_1}{A}\right) \\
 & = \left\{ 1 + \frac{\epsilon(2\pi k T)^{3/2}}{m^{1/2}\rho} \Delta e^{-x'^2} \left[a_1 + a_2 p_{\langle ij \rangle} x'_i x'_j + a_3 \left(x'_2 - \frac{5}{3} \frac{I_4^\epsilon}{I_2^\epsilon} \right) q_i x'_i \right] \right. \\
 & \quad \left. + \frac{\epsilon(2\pi k T)^{3/2}}{m^{1/2}\rho} \Delta e^{-x_1'^2} \left[a_1 + a_2 p_{\langle ij \rangle} x'_i x'_j + a_3 \left(x_1'^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4^\epsilon}{I_2^\epsilon} \right) q_i x_1'^i \right] \right\} \quad (VII.15)
 \end{aligned}$$

E assim o produto de (VII.14) por (VII.15) fornece:

$$\begin{aligned}
 f f_1 \left(1 + \frac{\epsilon f'}{A}\right) \left(1 + \frac{\epsilon f'_1}{A}\right) &= e^{-(x^2+x_1^2)} \left[1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{1/2}} \right] \left\{ a_1^2 + a_1 a_2 p_{\langle ij \rangle} (x_i x_j + x_i^1 x_j^1) \right. \\
 &+ a_1 a_3 q_i \left(x^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i + \left(x_1^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i^1 \left. \right\} + e^{-(x^2+2x_1^2)} \epsilon \Delta \left\{ a_1^2 + a_1 a_2 p_{\langle ij \rangle} (x_i x_j + 2x_i^1 x_j^1) \right. \\
 &+ a_1 a_3 q_i \left[\left(x^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i + 2 \left(x_1^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i^1 \right] \left. \right\} + e^{-(2x^2+x_1^2)} \epsilon \Delta \left\{ a_1^2 \right. \\
 &+ a_1 a_2 p_{\langle ij \rangle} (2x_i x_j + x_i^1 x_j^1) + a_1 a_3 q_i \left[2 \left(x^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i + \left(x_1^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i^1 \right] \left. \right\} \\
 &+ \frac{\epsilon(2\pi k T)^{3/2}}{m^{1/2}\rho} \Delta e^{-(x^2+x_1^2+x'^2)} \left\{ a_1^3 + a_1^2 a_2 p_{\langle ij \rangle} (x_i x_j + x_i^1 x_j^1 + x'_i x'_j) \right. \\
 &+ a_1^2 a_3 q_i \left[\left(x^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i + \left(x_1^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i^1 + \left(x'^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x'_i \right] \left. \right\} \\
 &+ \frac{\epsilon(2\pi k T)^{3/2}}{m^{1/2}\rho} \Delta e^{-(x^2+x_1^2+x_1'^2)} \left\{ a_1^3 + a_1^2 a_2 p_{\langle ij \rangle} (x_i x_j + x_i^1 x_j^1 + x_i^1 x_j^1) \right. \\
 &+ a_1^2 a_3 q_i \left[\left(x^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i + \left(x_1^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i^1 + \left(x_1'^2 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} \right) x_i^1 \right] \left. \right\} \quad (VII.16)
 \end{aligned}$$

As exponenciais em (VII.16) tornam necessária uma mudança nas variáveis de integração em (VII.1) e (VII.2). Sabe-se inicialmente que

$$x_i = \sqrt{\frac{m}{2kT}} C_i \quad \text{com} \quad C_i = c_i - v_i \quad (\text{VII.17})$$

e que assim:

$$dc dc_1 = dC dC_1 = \frac{2kT}{m} dx dx_1 \quad (\text{VII.18})$$

Pode-se mudar a integração em x e x_1 para uma integração em termos das velocidades do centro de massa $\mathbf{Y}$ e da velocidade relativa $\mathbf{y}$, tal que:

$$\mathbf{Y} = \left(\frac{m}{2kT} \right)^{1/2} \mathbf{G} \quad \text{e} \quad \mathbf{y} = \left(\frac{m}{2kT} \right)^{1/2} \mathbf{g} \quad (\text{VII.19})$$

onde $\mathbf{G}$ é a velocidade do centro de massa e $\mathbf{g}$ é a velocidade relativa definidas no Apêndice III (eq.III.4). É fácil verificar que:

$$\mathbf{x} = \mathbf{Y} - \frac{1}{2}\mathbf{y} \quad , \quad \mathbf{x}_1 = \mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{y} \quad (\text{VII.20})$$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{Y} - \frac{1}{2}\mathbf{y}' \quad , \quad \mathbf{x}'_1 = \mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{y}' \quad (\text{VII.21})$$

e como o Jacobiano de transformação de coordenadas é unitário:

$$dx dx_1 = dy dY \quad (\text{VII.22})$$

As somas nas exponenciais em (VII.16) podem então ser escritas em função de $\mathbf{Y}$ e $\mathbf{y}$ da seguinte forma:

$$x^2 + x_1^2 = 2Y^2 + \frac{1}{2}y^2$$

$$x^2 + x_1^2 + x'^2 = 3Y^2 + \frac{3}{4}y^2 - \mathbf{Y} \cdot \mathbf{y}'$$

$$x^2 + x_1^2 + x_1'^2 = 3Y^2 + \frac{3}{4}y^2 + \mathbf{Y} \cdot \mathbf{y}'$$

$$x^2 + 2x_1^2 = 3Y^2 + \mathbf{Y} \cdot \mathbf{y} + \frac{3}{4}y^2$$

$$2x^2 + x_1^2 = 3Y^2 - \mathbf{Y} \cdot \mathbf{y} + \frac{3}{4}y^2 \quad (VII.23)$$

Representando a segunda e a terceira equações em função de:

$$\mathbf{z} = \mathbf{Y} - \frac{1}{6}\mathbf{y}' \quad \text{e} \quad \mathbf{Z} = \mathbf{Y} + \frac{1}{6}\mathbf{y}' \quad (VII.24)$$

encontra-se:

$$x^2 + x_1^2 + x'^2 = 3z^2 + \frac{2}{3}y^2$$

$$x^2 + x_1^2 + x_1'^2 = 3Z^2 + \frac{2}{3}y^2 \quad (VII.25)$$

e a quarta e a quinta, em função de

$$\mathbf{w} = \mathbf{Y} - \frac{1}{6}\mathbf{y} \quad \text{e} \quad \mathbf{W} = \mathbf{y} + \frac{1}{6}\mathbf{y} \quad (VII.26)$$

também vem:

$$x^2 + 2x_1^2 = 3W^2 + \frac{2}{3}y^2$$

$$2x^2 + x_1^2 = 3Y^2 + \frac{2}{9}y^2 \quad (VII.27)$$

Com isto as expressões que aparecem multiplicando as exponenciais em (VII.16) devem então ser escritas como função de (Y e y) ou (z e y) ou (Z e y) ou (w e y) ou W e y) conforme a exponencial seja função destas variáveis.

Portanto estas expressões ficam:

$$x_i x_j + x_i^1 x_j^1 = 2 Y_i Y_j + \frac{1}{2} y_i y_j$$

$$x^2 x_i + x_1^2 x_i^1 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} (x_i + x_i^1) = 2 Y^2 Y_i + Y_r y_r y_i + \frac{1}{2} y^2 Y_i - \frac{10}{3} \frac{I_4}{I_2} Y_i$$

$$x_i x_j + 2x_i^1 x_j^1 = 3 W_i W_j + \frac{2}{3} y_i y_j$$

$$x^2 x_i + 2x_1^2 x_i^1 - \frac{5}{3} (x_i - 2x_i^1) = 3 W^2 W_i + \frac{4}{3} W_r y_r y_i + \frac{2}{3} y^2 W_i - \frac{2}{9} y^2 y_i - 5 \frac{I_4}{I_2} W_i$$

$$2x_i x_j + x_i^1 x_j^1 = 3 \omega_i \omega_j + \frac{2}{3} y_i y_j$$

$$2x^2 x_i + x_1^2 x_i^1 - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} (2x_i + x_i^1) = 3 \omega^2 \omega_i + \frac{4}{3} \omega_r y_r y_i +$$

$$\frac{2}{3} y^2 \omega_i + \frac{2}{9} y^2 y_i - 5 \frac{I_4}{I_2} \omega_i$$

$$x_i x_j + x_i^1 x_j^1 + x_i' x_j' = 3 z_i z_j + \frac{1}{6} y_i' y_j' + \frac{1}{2} y_i y_j$$

$$\begin{aligned}
x^2 x_i + x_1^2 x_i^1 + x'^2 x_i' - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} (x_i + x_i^1 + x_i') = 3z^2 z_i + \\
+ \frac{1}{3} z_r y_r' y_i' + \frac{2}{3} y^2 z_i + \frac{1}{18} y^2 y_i' + z_r y_r y_i + \\
+ \frac{1}{6} y_r' y_r y_i - 5 \frac{I_4}{I_2} z_i
\end{aligned}$$

$$x_i x_j + x_i^1 x_j^1 + x_i^{1'} x_j^{1'} = 3Z_i Z_j + \frac{1}{2} y_i y_j + \frac{1}{6} y_i' y_j'$$

$$\begin{aligned}
x^2 x_i + x_1^2 x_i^1 + x'^2 x_i' - \frac{5}{3} \frac{I_4}{I_2} (x_i + x_i^1 + x_i^{1'}) = \\
3Z^2 Z_i + \frac{1}{3} Z_r y_r' y_i' + \frac{2}{3} y^2 Z_i - \frac{1}{18} y^2 y_i' + \\
+ Z_r y_r y_i - \frac{1}{6} y_r' y_r y_i - 5 \frac{I_4}{I_2} Z_i
\end{aligned} \tag{VII.28}$$

O último passo de transformações de coordenadas para a integração das produções é escrever as diferenças:

$$C_i' C_j' - C_i C_j = \frac{2kT}{m} (x_i' x_j' - x_i x_j) \tag{VII.29}$$

$$C'^2 C_i' - C^2 C_i = \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} (x'^2 x_i - x^2 x_i) \tag{VII.30}$$

em termos das variáveis já citadas. Seguem então estas mudanças:

a) em função de (Y, y):

$$\begin{aligned}
x_i' x_j' - x_i x_j &= \frac{1}{2} Y_i (y_j - y_j') + \frac{1}{2} Y_j (y_i - y_i') + \frac{1}{4} (y_i' y_j' - y_i y_j) \\
x'^2 x_i' - x^2 x_i &= \frac{1}{2} Y^2 (y_i - y_i') + Y_i Y_r (y_r - y_r') - \frac{1}{2} Y_r (y_i y_r - y_i' y_r') +
\end{aligned}$$

$$+\frac{1}{8}y^2(y_i - y'_i) \quad (VII.31)$$

b) em função de $(\mathbf{w}, \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned} x'_i x'_j - x_i x_j &= \frac{1}{2} w_i (y_j - y'_j) + \frac{1}{2} w_j (y_i - y'_i) - \\ &\quad - \frac{1}{12} (y'_i y'_j + y'_j y_i + y_i y_j - 3 y'_i y'_j) \\ x'^2_i x'_i - x^2_i x_i &= \frac{1}{2} (w^2 + \frac{1}{3} w_r y_r + \frac{1}{36} y^2) (y_i - y'_i) + \\ &\quad + (w_i w_r + \frac{1}{6} w_i y_r + \frac{1}{6} w_r y_i + \frac{1}{36} y_i y_r) (y_r - y'_r) - \\ &\quad - \frac{1}{2} (w_r + \frac{1}{6} y_r) (y_i y_r - y'_i y'_r) + \frac{1}{8} y^2 (y'_i - y_i) \end{aligned} \quad (VII.32)$$

c) em função de $(\mathbf{z}, \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned} x'_i x'_j - x_i x_j &= \frac{1}{2} z_i (y_j - y'_j) + \frac{1}{2} z_j (y_i - y'_i) + \\ &\quad + \frac{1}{12} (y'_i y'_j + y'_j y_i + y'_i y'_j - 3 y_i y_j) \\ x'^2_i x'_i - x^2_i x_i &= \frac{1}{2} (z^2 + \frac{1}{3} z_r y_r + \frac{1}{36} y^2) (y_i - y'_i) + \\ &\quad + (z_i z_r + \frac{1}{6} z_i y'_r + \frac{1}{6} z_r y'_i + \frac{1}{36} y'_i y'_r) (y_r - y'_r) \\ &\quad - \frac{1}{2} (z_r + \frac{1}{6} y'_r) (y_i y_r - y'_i y'_r) + \frac{1}{8} y^2 (y_i - y'_i) \end{aligned} \quad (VII.33)$$

d) em função de $(\mathbf{W}, \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned} x'_i x'_j - x_i x_j &= \frac{1}{2} W_i (y_j - y'_j) + \frac{1}{2} W_j (y_i - y'_i) + \\ &\quad + \frac{1}{12} (y'_i y'_j + y'_j y_i - 5 y_i y_j + 3 y'_i y'_j) \\ x'^2_i x'_i - x^2_i x_i &= \frac{1}{2} (W^2 - \frac{1}{3} W_r y_r + \frac{1}{36} y^2) (y_i - y'_i) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + (W_i W_r - \frac{1}{6} W_i y_r - \frac{1}{6} W_r y_i + \frac{1}{36} y_i y_r)(y_r - y'_r) - \\
& - \frac{1}{2} (W_r - \frac{1}{6} y_r)(y_i y_r - y'_i y'_r) + \frac{1}{8} y^2 (y_i - y'_i)
\end{aligned} \tag{VII.34}$$

e) em função de $(\mathbf{Z}, \mathbf{y})$:

$$\begin{aligned}
x'_i x'_j - x_i x_j &= \frac{1}{2} Z_i (y_j - y'_j) + \frac{1}{2} Z_j (y_i - y'_i) - \frac{1}{12} (y'_i y_j + y'_j y_i - 5 y'_i y'_j + 3 y_i y_j) \\
x'^2 x'_i - x^2 x_i &= \frac{1}{2} (Z^2 - \frac{1}{3} Z_r y'_r + \frac{1}{36} y^2) (y_i - y'_i) + (Z_i Z_r - \frac{1}{6} Z_i y'_r - \\
& - \frac{1}{6} Z_r y'_i + \frac{1}{36} y'_i y'_r) (y_r - y'_r) - \frac{1}{2} (Z_r - \frac{1}{6} y'_r) (y_i y_r - y'_i y'_r) + \frac{1}{8} y^2 (y_i - y'_i)
\end{aligned} \tag{VII.35}$$

Com esta descrição para as modificações de variáveis, a integração de (VII.1) e (VII.2) pode ser efetuada levando em conta: as integrais que aparecem no Apêndice I, que integrações para funções ímpares nas componentes destas variáveis ($\mathbf{y}$, $\mathbf{Y}$, $\mathbf{z}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{w}$ e $\mathbf{W}$) são nulas, que termos do tipo $p_{\langle ij \rangle} \delta_{ij}$ também são nulos e a definição das integrais $\Omega^{(l,r)}$ na Seção 3.3.

Com este procedimento, verifica-se que os resultados de P_{ij} envolvem apenas termos proporcionais ao deviante do tensor pressão $p_{\langle ij \rangle}$, enquanto Q_i , termos proporcionais ao fluxo de calor q_i . Os resultados são os seguintes:

$$P_{ij} = -\frac{16}{5} \sqrt{\frac{\pi k T}{m}} \sigma^2 \frac{\rho}{m} \Omega^{(2,2)} \left[1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{5/2}} \left(3 - \frac{3^{5/2}}{4} \right) \right] p_{\langle ij \rangle} \tag{VII.36}$$

$$Q_i = -\frac{32}{15} \sqrt{\frac{\pi k T}{m}} \sigma^2 \frac{\rho}{m} \Omega^{(2,2)} \left\{ 1 - \frac{\epsilon \Delta}{2^{9/2}} \left[15 - \frac{3^{3/2}}{4} \left(\frac{\Omega^{(2,3)}}{\Omega^{(2,2)}} + 8 \right) \right] \right\} q_i \tag{VII.37}$$

Referências Bibliográficas

- 1) E.A.Uehling and G.E.Uhlenbeck, Transport Phenomena in Einstein -Bose and Fermi-Dirac Gases.I, Phys. Rev., 43, 552 (1933)
- 2) H.Grad, On the Kinetic Theory of Rarefied Gases. Commun. Pure. Appl. Math., 2, 331-407 (1949)
- 3) S.Chapman and T.G.Cowling, The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases., Cambridge University Press, Cambridge (1970)
- 4) J.O.Hirschfelder, C.F.Curtiss and R.B.Bird, Molecular Theory of Gases and Liquids, Wiley, New York, (1967)
- 5) S.Reinecke and G.M.Kremer, Alternative Method for Kinetic Theory of Gases, submetido à publicação
- 6) H.S.W.Massey and C.B.O.Mohr, Free Paths and Transport Phenomena in Gases and the Quantum Theory of Collision, Proc. Roy. Soc. (London), A141, 434 (1933)
- 7) R.L.Fox, Calculation of Low-Energy Electron-Atom Transport Cross Sections from Total Cross-Section Measurements, Phys. Rev. 168, 1 (1968)
- 8) J.Kestin, K.Knierim, E.A.Mason, B.Najafi, S.T.Ro and M.Waldman, Equilibrium and Transport Properties of the Noble Gases and their Mixtures at Low Density, J. Phys. Chem. Ref. Data, 13, 229 (1984)
- 9) E.A.Uehling, Transport Phenomena in Einstein-Bose and Fermi- Dirac Gases.II, Phys. Rev. 46, 971 (1934)
- 10) E.Kreyszig, Advance Engineering Mathematics, Wiley, New York (1967)
- 11) J.De Boer and A.Michels, Quantum-Mechanical Calculation of the Second Virial-Coeff

- cient of Helium at Low Temperatures, *Physica* 6, 409 (1939)
- 12) J.E.Kilpatrick, E.Keller, E.F.Hammel and N.Metropolis, Second Virial Coeficients of He^3 and He^4 , *Phys. Rev.* 94, 1103 (1954)
 - 13) J.De Boer and E.G.D.Cohen, The Viscosity of Gaseous He^3 at Low Temperatures, *Physica* 17, 993 (1951); J.De Boer, J.Van Kranendonk and K.Compaan, The Equation of Estate of Gaseous He^3 , *Physica* 16 545 (1950)
 - 14) E.G.D.Cohen, M.J.Offerhaus, J.M.J.Van Leewen, B.W.Roos and J.De Boer, The Transport Properties and the Equation of State of Gaseous Para- and Ortho-Hydrogen and their Mixtures below 40 K, *Physica* 22, 791 (1956)
 - 15) S.Imam-Rahajoe, C.F.Curtiss and R.B.Bernstein, Numerical Evaluation of Quantum Effects on Transport Cross Sections, *J. Chem. Phys.* 42, 530 (1965)
 - 16) W.E.Keller, Calculation of Viscosity of Gaseous He^3 and He^4 at Low Temperatures, *Phys. Rev.* 105, 41 (1957)
 - 17) R.A.Aziz, V.P.S.Naim, J.S.Carley, W.L.Taylor and G.T.McConville, An Accurate Intermolecular Potencial for Helium, *J. Chem. Phys.* 70(9), 4330 (1979)
 - 18) R.C.Weast, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 70. ed. Boca Raton: CRC Press, (1989)
 - 19) L.Monchick, E.A.Mason, R.J.Munn and Francis J.Smith, Transport Properties of Gaseous He^3 and He^4 , *Phys. Rev.* 139, 1076 (1965)
 - 20) J.B.Ubbink and W.J.De Haas, Thermal Conductivity of Gaseous Helium, *Physica* 10, 465 (1943)
 - 21) H.J.M.Hanley, R.D.McCarty and H.Intemann, The Viscosity and Thermal Conductivity of Dilute Gaseous Hydrogen from 15 to 5000 K, *J. Res. NBS* 74, 331 (1970)
 - 22) M.T.E.A.Kamal, A.Mohamed and M.El-Shimy, Quantum Transport Properties of Ga

seous Para and Ortho-Hydrogen at Low Temperatures, *Fizika* 19, 121 (1987)

- 23) J.M.J.Coremans, A.Van Itterbeek, J.J.M.Beenakker, H.F.P.Knaaps and P. Zandbergen, The Viscosity of Gaseous He, Ne, H₂ and D₂ Below 80 K, *Physica* 24, 557 (1958)
- 24) D.E.Diller and H.M.Roder, Cryogenic Engineering Conference 15th, Los Angeles, Calif. (junho 16-18, 1969) (vide referência 21); D.E.Diller, Measurements of the Viscosity of Para Hydrogen, *J. Chem. Phys.* 42, 2089 (1965)
- 25) H.L.Johnston and E.R.Grilly, The Thermal Conductivities of Eight Common Gases between 80 and 380 K, *J. Chem. Phys.* 14, 233 (1946)
- 26) H.Ikenberry and C.A.Truesdell, On the Pressures and the Flux of Energy in a Gas according to Maxwell's Kinetic Theory I, *J. Rational Mech. Anal.* 5, 1-54 (1956)
- 27) E.W.Becker, R.Misenta, Die Zähigkeit von Hd und He³ zwischen 14 K und 20 K, *Zeitschrift für Physik* 140, 535 (1955)
- 28) E.W.Becker, R.Misenta and F.Schmeissner, Die Zähigkeit von Gasförmigem He³ und He⁴ zwischen 1,3 K und 4,2 K, *Zeitschrift für Physik*, 137, 126 (1954)
- 29) A.Van Itterbeek, F.W.Schapink, G.J.Van den Berg, H.J.M.Van Beek, Commun. N^o 294b, *Physica* 19, 1158 (1953)