UMA NOVA EXTENSÃO
DA
SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII

Venício Veloso Borges

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Vieira de Carvalho

Tese apresentada ao Instituto de
Ciências Matemáticas de São Car-
los, da Universidade de São Pau-
lo, para obtenção do título de
Doutor em Ciências (Matemática).

São Carlos - SP

1 9 8 8

Aos meus pais

DOMÍCIO E VENITA,

que perderam a vida prematuramente, enquanto eu me preparava para escrever esta tese. Este fato é triste, mas estou convencido de que foram bons exemplos de respeito ao próximo e dedicação ao trabalho.

A G R A D E C I M E N T O S

Em primeiro lugar, quero expressar o meu agradecimento ao Prof. Dr. Luiz Antonio Vieira de Carvalho, meu orientador, pela orientação segura e objetiva que recebi.

Também desejo agradecer aos(as) professores(as) e funcionários(as) tanto da Pós-Graduação do ICMSC-USP quanto do Departamento de Matemática do IMF-UFG, que de alguma forma contribuíram para que eu realizasse este trabalho.

Finalmente, agradeço à UFG e à CAPES-PICD pelo apoio financeiro recebido.

A B S T R A C T

In the Šarkovskii's sequence

$$1 \prec 2 \prec 4 \prec \dots \prec 2^2 \cdot 5 \prec 2^2 \cdot 3 \prec \dots \prec 2 \cdot 5 \prec 2 \cdot 3 \prec \dots \prec 7 \prec 5 \prec 3,$$

$\prec$ is a special order defined upon the positive integers, which represent periods of orbits. This sequence has been recently extended to

$$1 \prec 2 \prec 4 \prec \dots \prec 7 \prec 5 \prec 3 \prec 4_e \prec 5_e \prec \dots \prec n_e \prec \dots,$$

where n_e represents the period of one typical and different n -periodic orbit.

Our principal result is an extension of this new sequence, in which we inserted, between any two of its periods, except among the harmonics

$$1 \prec 2 \prec 4 \prec \dots \prec 2^k \prec \dots,$$

infinitely many sequences of new orbit's periods.

Í N D I C E

INTRODUÇÃO	i
CAPÍTULO I - A SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII	01
1. Introdução	01
2. Definições e Idéias Básicas	02
3. A Ordem $(N^*, \leq)$ de Šarkovskii	04
CAPÍTULO II - OS MINI-MAX E A SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII	07
1. Itinerários de Aplicações Unimodais	07
2. Relação entre Mini-Max, Órbita Minimaximal e Órbita Simples	18
CAPÍTULO III - ALGUNS ASPECTOS DE FAMÍLIAS UNIMODAIS	24
1. Sobre o Número de Órbitas Periódicas Está- veis de uma Aplicação Unimodal	24
2. O Harmônico e o Anti-Harmônico	31
CAPÍTULO IV - EXTENSÃO DA SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII (ANTES DO 3)	40
1. Alguns Resultados	40
2. Um teorema que Estende S (Antes do 3)	45
CAPÍTULO V - EXTENSÃO DA SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII (APÓS 3) ...	62
1. Alguns Resultados Preliminares ...	62
2. Extensão entre as Órbitas n-Escada	67
3. A Extensão Acumulada por LJ-Translações ...	79
CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES	83
1. A Eficiência da Extensão Cumulativa	83
2. Adaptação Contínua da Extensão Unimodal	86
3. Comportamento Assintótico dos Números $F(n)$..	92
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	95

I N T R O D U Ç Ã O

Em 1964, Šarkovskii - [24] estabeleceu a sequência

$$S = (1, 2, 4, \dots, 2^2 \cdot 5, 2^2 \cdot 3, \dots, 2 \cdot 5, 2 \cdot 3, \dots, 7, 5, 3),$$

onde todos os inteiros positivos estão especialmente ordenados e representam períodos de órbitas periódicas que surgem, na mesma ordem, em decorrência do comportamento dinâmico de uma família de aplicações contínuas $f_\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ou $f_\lambda: I \rightarrow I$, onde I é qualquer intervalo não degenerado da reta.

Este resultado representou um marco importante no desenvolvimento da moderna teoria do caos [8, 14, 24] e serviu para esclarecer várias questões referentes ao comportamento de certos sistemas dinâmicos discretos e contínuos [8, 16, 23]. Foi Stéfan - [27] quem divulgou o teorema de Šarkovskii no ocidente, apresentando uma versão modificada do trabalho original, mas Guckenheimer - [11] já havia feito uma prova considerando aplicações unimodais. Depois Guckenheimer [12] e Collet-Eckmann - [8] apresentaram novas e semelhantes provas, independentemente. A prova mais recente foi dada por B, G, M, Y - [3], com generalização para aplicações da circunferência em si mesma. Esta última prova foi reapresentada de forma semelhante por Nitecki - [23].

Recentemente, em 1984, numa versão anterior de [6], Carvalho estendeu a sequência de Šarkovskii S para a sequência

$$S_e = S, (4_e, 5_e, 6_e, \dots) = (1, 2, \dots, 5, 3, 4_e, 5_e, \dots),$$

onde n_e representa, para todo inteiro $n \geq 4$, o período de um tipo especial de órbita n -periódica chamada n -escada, que é diferente daquela órbita que corresponde ao período $n \in S$. Esta extensão, segundo a mesma ordem de S , foi obtida inici-

almente para funções fracamente unimodais, mas em [6] foi adaptada para funções contínuas de I em I . Naturalmente, podemos extrair de S_e a subsequência $1, 2, 3, 4_e, 5_e, \dots, n_e, \dots$, onde a ordem dos períodos coincide com a ordem usual dos números naturais.

Neste trabalho obtivemos uma extensão mais ampla, inserindo entre dois períodos quaisquer (exceto quando o segundo é um harmônico do primeiro) de S_e , e ainda com a mesma ordem de S , infinitas sequências de períodos. Conseguimos este resultado para aplicações unimodais $f: I \rightarrow I$, usando o teorema III.2.6 devido a M, S, S - [21], em combinação com o teorema II.1.4, cuja parte recíproca obtivemos aqui, enquanto a outra parte foi estabelecida por C, E - [8]. Depois, adaptamos a nossa extensão para aplicações contínuas de I em I , adotando em $C^0(I, I)$ a topologia da convergência uniforme.

Dos diversos resultados obtidos, destacamos os teoremas II.1.4, IV.1.3, V.1.1, IV.2.1, V.2.1 e V.3.1, dos quais os três últimos garantem a nossa extensão de S_e .

Na seção 1 do capítulo VI, procuramos mostrar a eficiência da extensão feita, apresentando o número de períodos $p \geq 5$ que são inseridos entre os períodos de S_e . E na seção 3, mostramos que a razão $r_n = F(n+1)/F(n)$, onde $F(n)$ (que é calculado pela fórmula de Fine - [10]), dá o número de órbitas unimodais de período $n \geq 1$, tende assintoticamente para 2.

C A P I T U L O I

A SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII

1. INTRODUÇÃO.

É de grande importância o estudo do comportamento assintótico, sob iteração, de aplicações do intervalo nele próprio. No estudo de fenômenos físicos, biológicos, econômicos ou sociais pode-se adaptar modelos matemáticos que possibilitem medir uma determinada quantidade em intervalos regulares (ano, mês, minuto, etc.) de tempo.

Em biologia populacional, por exemplo, usa-se tais aplicações para entender o comportamento dinâmico de populações que têm gerações discretas e periódicas. Assim, se $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ é uma função conveniente, a relação funcional

$$(1) \quad x_{n+1} = f(x_n)$$

permite estimar o tamanho da população em um período quando se conhece o seu tamanho no período anterior. Esta relação não depende do tempo $n \geq 0$. A equação (1) é uma equação diferença não linear de primeira ordem.

Os exemplos de modelos contínuos do sistema dinâmico discreto (1) mais frequentemente usados em biologia populacional, são as famílias de funções a um parâmetro

$$f_\lambda, g_\lambda : [0,1] \rightarrow [0,1]$$

definidas respectivamente por

$$f_{\lambda}(x) = \lambda x(1-x), \quad 0 \leq \lambda \leq 4$$

e

$$g_{\lambda}(x) = x \exp(\lambda(1-x)), \quad \lambda \geq 0.$$

Uma abordagem detalhada do primeiro exemplo pode ser encontrada em [16] ou [20]. Um farto catálogo destes modelos é fornecido por [19]. Principalmente no contexto do comportamento dinâmico do crescimento de populações, existe uma tendência a que de uma geração para a próxima, a variável cresça quando é pequena e decresça quando é grande. Isto é, os modelos $y = f(x)$ usados têm frequentemente as seguintes propriedades: $f(0) = 0$, e existe $c \in (0,1)$ tal que f cresce em $[0,c]$ e decresce em $[c,1]$, monotonamente, atingindo o valor máximo $f(c)$.

2. DEFINIÇÕES E IDÉIAS BÁSICAS

O objetivo desta seção é fazer com que este trabalho fique autosuficiente.

Seja $C^0(I,I)$ o conjunto das aplicações contínuas do intervalo fechado não degenerado $I = [a,b] \subset \mathbb{R}$, nele próprio. Se $f \in C^0(I,I)$ definimos para todo $n \in \mathbb{N} = \{0,1,2,3, \dots\}$, a função iterada $f^n \in C^0(I,I)$, indutivamente, por

$$f^0(x) = x \quad \text{e} \quad f^{n+1}(x) = f(f^n(x)),$$

para todo $x \in I$. A órbita de qualquer $x \in I$ é então a sequência $O_f(x) = (f^n(x); n=0, 1, 2, \dots)$ consistindo de x e de suas sucessivas iterações sob a ação de f . Fazendo $x = x_1$, obtemos $x_{i+1} = f(x_i) = f^i(x)$ onde $i \in \mathbb{N}^* = \{1,2,3, \dots\}$ e podemos escrever $O_f(x_1) = (x_1, x_2, x_3, \dots)$. Um ponto $x \in I$ é um ponto periódico de f se $f^n(x) = x$ para algum $n \in \mathbb{N}^*$. Neste caso, o menor destes n é o período de x , a órbita $O_f(x)$ é também periódica e seu período é o período de x . Se x é n -periódico então cada um dos n pontos de $O_f(x)$ é também

um ponto n -periódico de f , e $O_f(x)$ é ainda chamado um ciclo de período n .

Seja $P(n, f)$ o conjunto de todos os pontos n -periódicos de f , isto é,

$$P(n, f) = \{x \in I; f^n(x) = x, f^k(x) \neq x \text{ se } k = 1, 2, \dots, n-1\}.$$

Indicando por $F(f)$ o conjunto dos pontos fixos de f , temos claramente:

- (a) $P(1, f) = F(f)$;
- (b) $P(n, f) = F(f^n)$ para todo $n \geq 1$;
- (c) Se $x, y \in P(n, f)$, então $O_f(x) = O_f(y)$ se e somente se $y = f^k(x)$ para algum $0 \leq k < n$.
- (d) $x \in F(f^k)$ se e somente se $O_f(x)$ é periódica e seu período divide k .

É fácil ver que um ponto periódico de f é sempre um ponto periódico de f^n , para todo $n \in \mathbb{N}^*$, embora os períodos possam ser diferentes. Por exemplo, se $f \in C^0(I, I)$ contém uma órbita 6-periódica do tipo

$$P = (x_1, x_2, \dots, x_6), a < x_1 < x_5 < x_2 < x_4 < x_3 < x_6 < b$$

então

$$x \in P(6, f), P(3, f^2), P(6, f^5), P(2, f^9), P(1, f^{12}), \text{ etc, para todo } x \in P.$$

Seja $x \in P(n, f)$. Então, considerando a órbita n -periódica

$$O_f(x) = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$$

pode-se obter, pela regra da cadeia de derivação, a fórmula

$$(f^n)'(x) = \prod_{k=0}^{n-1} f'(f^k(x)).$$

É claro que $(f^n)'(y) = (f^n)'(x)$, para todo $y \in O_f(x)$. Assim,

uma condição necessária para que x (e por extensão $O_f(x)$) seja estável (instável) é que $|(f^n)'(x)| \leq 1$ ($|(f^n)'(x)| \geq 1$). Uma condição suficiente para garantir a estabilidade (instabilidade) de x (e portanto de $O_f(x)$) é que $|(f^n)'(x)| < 1$ ($|(f^n)'(x)| > 1$). O caso $|(f^n)'(x)| = 1$ exige um estudo especial. Uma consequência da condição suficiente para a estabilidade da órbita n -periódica $O_f(x)$ é que existe para cada $y \in O_f(x)$ uma vizinhança atrativa $V(y)$ tal que para todo $z \in V(y)$ a sequência de iterados $f^{kn}(z)$ converge para y quando $k \rightarrow \infty$. Para maiores detalhes, pode-se consultar [8, 17, 24].

Uma questão básica da teoria dos sistemas dinâmicos é descrever o comportamento da órbita $O_f(x)$, sob o ponto de vista de determinar o conjunto dos pontos limites do ponto inicial $x \in I$, que é o conjunto dos pontos limites da órbita. As órbitas mais comuns (e talvez as mais importantes) são as periódicas e as assintoticamente periódicas. Um ponto $x \in I$ é ([17], p. 987) assintoticamente periódico se existe um ponto periódico p para o qual $f^n(x) - f^n(p) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$.

Além das órbitas periódicas (estáveis ou instáveis) e assintoticamente periódicas, existem aquelas que possuem um comportamento "caótico" ou pontos qualificados como "atratores estranhos". Novamente, veja [8, 14, 17, 24]. Em [16, 17, 18] podem ser encontrados vários exemplos de modelos físicos exibindo uma rica estrutura de comportamento caótico.

3. A ORDEM $(\mathbb{N}^*, \leq)$ DE ŠARKOVSKII

Seja $P(f)$ o subconjunto de $\mathbb{N}^*$ tal que $n \in P(f)$ se f tem uma órbita periódica de período n . Consideremos em

$\mathbb{N}^*$ a relação " $\prec$ " assim definida: dados $m, n \in \mathbb{N}^*$ dizemos que $m \prec n$ (m precede n ou n segue m) se, e somente se, para cada $f \in C^0(I, I)$, a existência de uma órbita n -periódica de f implica a existência para ela de uma órbita m -periódica [6]. Claramente, esta relação é reflexiva e transitiva. A simetria é satisfeita por vacuidade.

A relação de ordem " $\prec$ " ordena $\mathbb{N}^*$ segundo a sequência (ou ordem) de Šarkovskii:

$$1 \prec 2 \prec 4 \prec 8 \prec \dots \prec 4.7 \prec 4.5 \prec 4.3 \prec \dots \prec 2.7 \prec 2.5 \prec 2.3 \prec \dots \prec 7 \prec 5 \prec 3.$$

Stefan [27] descreveu formalmente esta ordenação dos períodos $p \in \mathbb{N}^*$ como segue: $\mathbb{N}^* = A \cup B$ onde

$$A = \{p = 2^m; m \geq 0\}, \text{ ordenado com } m \text{ crescente, precede}$$

$$B = \{p = 2^n \ell; n \geq 0, \ell \geq 3 \text{ ímpar}\} \text{ ordenado lexicograficamente com } n \text{ e } \ell \text{ decrescentes.}$$

A sequência de Šarkovskii, muito diferente da ordenação natural de $\mathbb{N}^*$, fundamenta-se no

Teorema 1 (Šarkovskii - [25]). Seja $f \in C^0(I, I)$ tal que $n \in P(f)$. Então $m \in P(f)$, para todo $m \in \mathbb{N}^*$ tal que $m \prec n$.

À luz do teorema (e da sequência) de Šarkovskii temos que $m \prec n$ ou $n \prec m$, para todos $m, n \in \mathbb{N}^*$. Neste sentido, o par $(\mathbb{N}^*, \prec)$ é uma estrutura totalmente ordenada. É a Š-ordenação de $\mathbb{N}^*$.

No estudo das órbitas periódicas de aplicações $f \in C^0(I, I)$, o famoso teorema de Šarkovskii ocupa um lugar de destaque. Resultado fundamental na moderna teoria de caos [8, 14, 24], ele foi muito útil para esclarecer várias questões referentes ao comportamento complexo de certos siste-

mas dinâmicos discretos e contínuos [8, 16, 23].

Este teorema foi demonstrado originalmente por Šarkovskii (1964) - [25] para qualquer $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mas continua válido, naturalmente, quando se restringe f a qualquer intervalo não degenerado da reta. Stefan (1977) - [27] fez uma versão análoga. Também Guckenheimer (1977) - [11] fez uma prova para aplicações unimodais. Depois, Guckenheimer (1978) - [12] e Collet-Eckmann (1980) - [8] apresentaram novas (e semelhantes entre si) provas. A prova mais recente foi dada por Block-Guckenheimer-Misiurewicz-Young (1980) - [3], com generalização para aplicações da circunferência em si mesma. Esta última prova foi reapresentada por Nitecki (1982) - [23].

O teorema de Šarkovskii nada assegura sobre a estabilidade das órbitas periódicas. Mas Block - [4] provou que a sequência de Šarkovskii é estruturalmente estável para perturbações de $f \in C^0(I, I)$ através do seguinte

Teorema 2. Seja $f \in C^0(I, I)$ e suponhamos que $n \in P(f)$. Existe uma vizinhança N de f em $C^0(I, I)$ tal que para toda $g \in N$ e todo inteiro positivo k com $k < n$, $k \in P(g)$.

Este teorema nos permite observar que embora $n \in P(f)$ pode acontecer que $n \notin P(g)$, onde g é uma perturbação de f .

Voltando à sequência de Šarkovskii, podemos interpretar que para todos $m, n \in \mathbb{N}^*$ tais que $m < n$, existe uma aplicação $f \in C^0(I, I)$ tal que $m \in P(f)$ e $n \notin P(f)$. Em Li-Yorke - [17] é exibido um exemplo de aplicação $f \in C^0(I, I)$, onde $5 \in P(f)$ e $3 \notin P(f)$. É fácil obter outros exemplos. Do teorema (ou da sequência) de Šarkovskii pode-se concluir diretamente que se $3 \in P(f)$, onde $f \in C^0(I, I)$, então $P(f) = \mathbb{N}^*$. Li-Yorke - [16] também obteve este resultado em "Período três

C A P Í T U L O I I

OS MINI-MAX E A SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII

1. ITINERÁRIOS DE APLICAÇÕES UNIMODAIS

Grande parte dos resultados desta e da próxima seção são cópias, variações ou adaptações de resultados descritos em II. 2,3 de Collet-Eckmann - [8], que por sua vez são combinações de idéias de outras referências especializadas tais como Milnor-Thurston - [22], Metrópolis-Stein-Stein - [21], Stefan - [27], Guckenheimer - [11], etc. Esta seção é de importância fundamental para o nosso trabalho.

Dizemos que uma aplicação $f : I = [0,1] \rightarrow [0,1]$ é unimodal se:

- (a) f é contínua;
- (b) Existe $c \in [0,1]$ tal que f é estritamente crescente em $[0,c]$ e estritamente decrescente em $[c,1]$.

Dizemos que f é C^1 -unimodal se, além disso, satisfaz a condição

- (c) $f \in C^1(I,I)$

e c é o seu único ponto crítico. Neste caso, se $c=0$ ou $c=1$, tomamos a derivada lateral respectiva.

Nas definições acima, tomamos o intervalo $I = [0,1]$ por conveniência mesmo porque esta escolha não envolve perda de generalidade. De fato, se f é uma função unimodal de $[a,b] = J$ em $[a,b]$, isto é, tal que $f \in C^0(J,J)$, $f|_{[a,c]}$ é estritamente crescente e $f|_{[c,b]}$ é estritamente

te decrescente para algum $c \in [a, b]$, podemos definir uma função unimodal g de $[0, 1]$ em $[0, 1]$ por

$$g(x) = \frac{f(z) - a}{b - a}, \text{ onde } z = (1-x)a + xb \in J, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Esta transformação de variáveis é linear e realiza uma deformação contínua, preservando as propriedades de f .

Seja f uma aplicação unimodal fixa. Se $x \in [0, 1]$, dizemos que um iterado particular $f^j(x)$ ($j = 0, 1, 2, \dots$) é do "tipo L (left)" ou do "tipo C (center)" ou do "tipo R (right)" se $f^j(x) < c$ ou $f^j(x) = c$ ou $f^j(x) > c$, respectivamente.

Para a função unimodal fixa f , o itinerário de $x \in I$ é a sequência $I_f(x)$ de símbolos L, C, R associados aos f -iterados de x e definida assim: $I_f(x)$ é uma sequência infinita de L's e R's ou é uma sequência finita (possivelmente vazia) de L's e R's seguida de C. Formalmente, esta sequência é da forma

$$I_f(x) = I_0(x) I_1(x) I_2(x) \dots,$$

onde o j -ésimo elemento $I_j(x)$ ($j \in \mathbb{N}$) é representado pela letra L ou C ou R, segundo a posição relativa do iterado $f^j(x)$ com relação ao ponto de máximo c , já descrita. Escrevemos $I(x)$ no lugar de $I_f(x)$ quando não é necessário especificar a função envolvida.

Uma sequência I de símbolos L, C, R é chamada admissível se ou é uma sequência infinita de L's e R's ou é uma sequência finita (ou vazia) de L's e R's seguida de C. Então todo itinerário representa uma órbita unimodal e é uma sequência admissível. Entretanto, uma sequência admissível nem sempre representa uma órbita unimodal. Como exemplos citemos LLC e RLRLC. Representamos por $I\underline{J}$ a concatenação das sequências I e $\underline{J}$. Assim, podemos ter as concatenações

$$\underline{I}^n = \underline{I} \underline{I} \dots \underline{I} \quad \text{e} \quad \underline{I}^\infty = \underline{I} \underline{I} \dots$$

de $\underline{I}$ com $\underline{I}$ n vezes e infinitas vezes, respectivamente. A cardinalidade (ou o comprimento) da sequência $\underline{I}$ é representada por $|\underline{I}|$.

Dado o itinerário $\underline{I}(x)$, o itinerário estendido $\underline{I}_E(x)$ é:

- (a) $\underline{I}(x)$ se $\underline{I}(x)$ é infinito;
- (b) $\underline{I}(x) \underline{I}(f(c))$ se $\underline{I}(x)$ é finito e $\underline{I}(f(c))$ é infinito;
- (c) $\underline{I}(x) (\underline{I}(f(c)))^\infty$ se $\underline{I}(x)$ e $\underline{I}(f(c))$ são finitos.

O itinerário $\underline{I}(f(c))$ é chamado sequência costurante.

Indicando por Λ o conjunto de todas as sequências formadas pelos símbolos L, C, R , a operação "shift"

$\psi : \Lambda \setminus \{C\} \rightarrow \Lambda$ é definida por

$$\psi(\underline{I}) = I_1 I_2 I_3 \dots, \quad \text{se} \quad \underline{I} = I_0 I_1 I_2 \dots$$

Aplicando ψ^k (a k -iterada de ψ) à sequência

$$\underline{I} = I_0 I_1 I_2 \dots I_{k-1} I_k I_{k+1} \dots$$

obtemos

$$\psi^k(\underline{I}) = I_k I_{k+1} \dots$$

No caso de itinerários, temos então

$$\psi(\underline{I}(x)) = \underline{I}(f(x)) \quad \text{se} \quad x \neq c$$

e

$$\psi(\underline{I}_E(x)) = \underline{I}_E(f(x)), \quad \forall x \in I.$$

Com o objetivo de definir uma ordem " $<$ " no conjunto Λ' das sequências admissíveis, é natural estabelecer inicialmente que $L < C < R$. Se $\underline{A}, \underline{B} \in \Lambda'$ são distintas, seja i o primeiro índice para o qual $A_i \neq B_i$. A existência deste índice é clara em qualquer um dos casos $|\underline{A}| < |\underline{B}|$ ($|\underline{A}|$ finito) ou $|\underline{A}| = |\underline{B}|$. Dizemos que

$\underline{A} \prec \underline{B}$ se ocorrer um dos casos:

(a) Existe um número par de R's em

$$A_0 A_1 \dots A_{i-1} = B_0 B_1 \dots B_{i-1} \text{ e } A_i \prec B_i$$

(b) Existe um número ímpar de R's em

$$A_0 A_1 \dots A_{i-1} = B_0 B_1 \dots B_{i-1} \text{ e } B_i \prec A_i.$$

Dizemos que $\underline{B} \prec \underline{A}$ se nenhum destes casos ocorre. Naturalmente, podemos também usar as notações $\underline{A} \preceq \underline{B}$ ou $\underline{A} \succeq \underline{B}$ ou $\underline{A} \succ \underline{B}$ ou $\underline{B} \succ \underline{A}$ nos casos apropriados. É claro que o par $(\Lambda', \preceq)$ define então uma estrutura de ordem total. Uma sequência finita de L's, R's e C é par se possui um número par de R's, e é ímpar em caso contrário.

Como o itinerário $\underline{I}(x)$ está associado ao ponto $x \in [0,1]$, é natural que a ordem usual $<$ em $[0,1]$ reflita na ordem " $\prec$ " em Λ' . De fato, para uma aplicação unimodal f , tem-se (Collet-Eckmann - [8] estes dois importantes resultados:

Teorema 1. Se $\underline{I}(x) \prec \underline{I}(y)$ então $x < y$.

Teorema 2. Se $x < y$ então $\underline{I}(x) \preceq \underline{I}(y)$.

Sob determinadas condições, a saber que f seja S-unimodal e não tenha órbita periódica estável, tem-se (Collet-Eckmann - [8], pág. 69): $x < y$ implica que $\underline{I}(x) \prec \underline{I}(y)$.

Consideremos uma órbita n -periódica $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ de uma aplicação unimodal fixa f . Cada um dos pontos $f^j(x)$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$) tem um itinerário periódico estendido $\underline{I}_E(f^j(x))$. Num certo sentido, todos estes itinerários são equivalentes, pois representam a mesma órbita periódica. Pelo teorema 2, podemos escolher o maior deles segundo a ordem " $\prec$ ". Ele é $\underline{I}_E(y)$, onde

$y = \max_{0 \leq j \leq n-1} \{f^j(x)\}$ será a sua coordenada (ou da órbita). Todos os "shifts" $\psi^k(I_E(y))$ satisfazem $\psi^k(I_E(y)) \dot{\leq} I_E(y)$.

Isto motiva a seguinte definição: uma sequência I é maximal se é admissível e se $\psi^k(I) \dot{\leq} I$ para $k=1,2,\dots, |I|-1$ ou para $k=1,2,\dots$ quando I é respectivamente finita ou infinita. É claro que se f é unimodal, então $I_f(1)$ é sempre maximal. Quando I é finita e maximal então $\psi^k(I) \dot{<} I$ para $k=1,2,\dots, |I|-1$.

O seguinte resultado (Collet-Eckmann - [8], pág. 71) é óbvio.

Teorema 3. As únicas sequências maximais que não começam com RL... são L^∞ , R^∞ , RC e C.

Pelo que vimos acima, é sempre possível obter em correspondência a uma órbita n -periódica de uma função unimodal fixa f , o itinerário periódico maximal estendido $I_E(y)$. Devido às características de f e ao modo como o y foi escolhido, temos (quando $n \geq 3$ e $0 < c < 1$) que $y > c$ e $f(y) < c$ são os pontos da órbita mais afastados de c para a direita e para a esquerda, respectivamente. No itinerário $I_E(y)$, ao y corresponde um R enquanto ao $f(y)$ está associado um L. Assim, todo itinerário n -periódico maximal tem a forma

$$\begin{aligned} I_E(y) &= I_0(y) I_1(y) I_2(y) \dots I_{n-1}(y) I_n(y) I_{n+1}(y) I_{n+2}(y) \dots \\ &= RL I_2(y) \dots I_{n-1}(y) RL I_2(y) \dots I_{n-1}(y) \dots \\ &= (RL I_2(y) \dots I_{n-1}(y))^\infty \end{aligned}$$

Pelo teorema 2, $I_E(f^j(y)) \dot{\leq} I_E(y)$ para $j=0,1,\dots, n-1$. Em particular, se ocorrer $f^{n-1}(y) = c$ então $I_{n-1}(y) = C$, e o itinerário periódico maximal associado à órbita de y , que chamaremos de palavra, toma a forma finita

$I_C(y) = R L I_2(y) \dots I_{n-2}(y) C$. Temos também os casos particulares $I_C(y) = C$ (se $y = c$) e $I_C(y) = RC$ (se $y > c$, $f(y) = c$). Quando $f^{n-1}(y) \neq c$, só pode ocorrer um dos casos $I_{n-1}(y) = L$ (se $f^{n-1}(y) < c$) ou $I_{n-1}(y) = R$ (se $f^{n-1}(y) > c$), e o itinerário periódico estendido correspondente é

$$I_L(y) = (R L I_2(y) \dots I_{n-2}(y) L)^\infty$$

ou

$$I_R(y) = (R L I_2(y) \dots I_{n-2}(y) R)^\infty.$$

Analisando $I_L(y)$, $I_C(y)$ e $I_R(y)$ como sequências admissíveis (lembrando que só uma delas representa o itinerário de y), temos que

$$I_L(y) \prec I_C(y) \prec I_R(y) \text{ se } I_C(y) \text{ é par e } \dots$$

$$I_R(y) \prec I_C(y) \prec I_L(\tilde{y}) \text{ se } I_C(y) \text{ é ímpar.}$$

Por outro lado, vamos mostrar que uma palavra (sequência maximal finita da forma $I = R L I_2 \dots I_{n-2} C$) representa uma órbita unimodal de período $n \geq 3$. Para começar, podemos distribuir entre $L \prec C$ e entre $C \prec R$ as letras

$$I_j \in \{L, R\} \quad (j = 2, 3, \dots, n-2),$$

ordenando-as através da ordem $\prec$ aplicada ao conjunto dos "shifts"

$$\psi^0(I) = I = R L I_2 I_3 \dots I_{n-2} C$$

$$\psi^1(I) = L I_2 I_3 \dots I_{n-2} C$$

$$\psi^2(I) = I_2 I_3 \dots I_{n-2} C$$

$\vdots$

$$\psi^{n-2}(I) = I_{n-2} C$$

$$\psi^{n-1}(I) = C,$$

identificados respectivamente com a sua primeira letra, isto é, $\psi^k(\underline{I}) \equiv I_k$ (L, R ou C) onde $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. De fato, como a palavra $\underline{I} = R L I_2 I_3 \dots I_{n-2} C$ possui i L's, 1 C e j R's, onde $1 \leq i, j \leq n-2$ e $i + j = n-1$, é sempre possível (com as identificações acima) $\dot{<}$ -ordenar as suas letras segundo a cadeia

$$L \dot{<} L_1 \dot{<} L_2 \dot{<} \dots \dot{<} L_{i-1} \dot{<} C \dot{<} R_1 \dot{<} R_2 \dot{<} \dots \dot{<} R_{j-1} \dot{<} R$$

Em geral, como

$$\underline{I} = R L I_2 \dots I_{n-2} C \equiv \psi^0(\underline{I}) \psi^1(\underline{I}) \psi^2(\underline{I}) \dots \psi^{n-2}(\underline{I}) \psi^{n-1}(\underline{I}),$$

a cadeia acima é equivalente à cadeia

$$(*) \quad \psi^1(\underline{I}) \dot{<} (\psi^2(\underline{I}))' \dot{<} (\psi^3(\underline{I}))' \dot{<} \dots \dot{<} (\psi^i(\underline{I}))' \dot{<} \psi^{n-1}(\underline{I}) \\ \dot{<} (\psi^1(\underline{I}))'' \dot{<} (\psi^2(\underline{I}))'' \dot{<} \dots \dot{<} (\psi^{j-1}(\underline{I}))'' \dot{<} \psi^0(\underline{I})$$

onde a $\dot{<}$ -ordenação dos shifts ψ' e ψ'' (em relação aos shifts $\psi^1(\underline{I}) \equiv L$, $\psi^{n-1}(\underline{I}) \equiv C$ e $\psi^0(\underline{I}) \equiv R$) depende da palavra considerada. Esta cadeia permite escrever (e desenhar) a órbita periódica

$$(\psi^0(\underline{I}), \psi^1(\underline{I}), \psi^2(\underline{I}), \dots, \psi^{n-1}(\underline{I})) \equiv (R, L, I_2, \dots, I_{n-2}, C),$$

a qual vamos em seguida mostrar que é unimodal. Basta mostrar que ψ é $\dot{<}$ -estritamente crescente em

$$(*)' \quad \psi^1(\underline{I}) \dot{<} (\psi^2(\underline{I}))' \dot{<} \dots \dot{<} (\psi^i(\underline{I}))' \dot{<} \psi^{n-1}(\underline{I})$$

e $\dot{<}$ -estritamente decrescente em

$$(*)'' \quad \psi^{n-1}(\underline{I}) \dot{<} (\psi^1(\underline{I}))'' \dot{<} \dots \dot{<} (\psi^{j-1}(\underline{I}))'' \dot{<} \psi^0(\underline{I}).$$

De fato, se $\psi_1'(\underline{I})$ e $\psi_2'(\underline{I})$ estão em $(*)'$ e são tais que $\psi_1' \dot{<} \psi_2'$, então $\psi(\psi_1') \dot{<} \psi(\psi_2')$ porque a retirada de um L em ψ_1' e em ψ_2' não altera as suas R-paridades. Por outro lado, se $\psi_1''(\underline{I}) \dot{<} \psi_2''(\underline{I})$ estão em $(*)''$, então $\psi(\psi_2'') \dot{<} \psi(\psi_1'')$ devido a inversão da R-paridade dos shifts ψ_1'' e ψ_2'' quando um R é retirado de cada um deles.

Para ver que a palavra $\underline{I}$ vista como a órbita periódica $(R, L, I_2, \dots, I_{n-2}, C)$ realmente representa uma órbita unimodal, é só considerá-la sob a forma da ψ -permutação dos shifts $\psi^i(\underline{I})$ ($i=0, 1, 2, \dots, n-1$) definida por

$$\begin{bmatrix} L, L_1, L_2, \dots, L_{i-1}, C, R_1, R_2, \dots, R_{j-1}, R \\ \psi(L), \psi(L_1), \psi(L_2), \dots, \psi(L_{i-1}), \psi(C)=R, \psi(R_1), \psi(R_2), \dots, \psi(R_{j-1}), \psi(R)=L \end{bmatrix}$$

A unimodalidade desta órbita pode ser vista pelo aspecto de crescer e depois decrescer em

$$\psi(L) < \psi(L_1) < \dots < \psi(L_{i-1}) < \psi(C) > \psi(R_1) > \dots > \psi(R_{j-1}) > \psi(R).$$

A nossa argumentação é baseada formalmente na seguinte definição.

Definição 1: Sejam $x_1, x_2, \dots, x_n \in I = [0, 1]$ tais que $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ e seja $f: I \rightarrow I$ uma aplicação contínua. Os pontos x_i formam uma órbita unimodal de período n segundo f se, e somente se, a f -permutação

$$\begin{bmatrix} x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_{n-1}, x_n \\ f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{k-1}), f(x_k)=x_n, f(x_{k+1}), \dots, f(x_{n-1}), f(x_n)=x_1 \end{bmatrix},$$

onde $x_2 \leq x_k \leq x_{n-1}$ e $f^j(x_i) \neq x_i$ (para $1 \leq j \leq n-1$ e $i=1, 2, \dots, n$) satisfaz a dupla cadeia

$$f(x_1) < f(x_2) < \dots < f(x_{k-1}) < f(x_k) > f(x_{k+1}) > \dots > f(x_{n-1}) > f(x_n).$$

Podemos então obter uma função unimodal que serve de suporte para a órbita unimodal $\underline{I} = R L I_2 \dots I_{n-2} C$. Primeiramente, associemos a R um ponto $x_n \in (0, 1)$ suficientemente perto de 1 que será a coordenada da órbita. A L associemos um ponto $x_1 \in (0, 1)$, suficientemente perto de 0, que será o pon

to da órbita mais afastado pela esquerda, e a C associemos o ponto $c \in (x_1, x_n)$. Logo $x_1 < c < x_n$ corresponde a $L \prec C \prec R$. E assim sucessivamente, associemos x_i a $\psi^i(I)$ para $i = 2, 3, \dots, n-2$. Temos portanto a órbita numérica $(x_n, x_1, x_2, \dots, x_{n-2}, c)$ identificada com a órbita literal $(R, L, I_2, \dots, I_{n-2}, C)$ que por sua vez se identifica com $(\psi^0(I), \psi^1(I), \dots, \psi^{n-1}(I))$. Considerando a cadeia $(*)$ e a órbita $(x_n, x_1, \dots, x_{n-2}, c)$ podemos obter a sequência de pontos $((x_1, x_2), \dots, (c, x_n), \dots, (x_n, x_1))$ cuja ordem usual das abscissas satisfaz $(*)$. Em seguida liguemos estes pontos sucessivamente por arcos contínuos, de "forma unimodal". Igualmente de forma unimodal, liguemos os pontos $(0, r)$ a (x_1, x_2) e (x_n, x_1) a $(1, s)$ onde $0 \leq r < x_2$ e $0 \leq s < x_1$. Portanto encontramos uma função unimodal que serve de suporte à órbita unimodal $(R, L, I_2, \dots, I_{n-2}, C)$ representada pela palavra $RLI_2I_3\dots I_{n-2}C$.

Vamos dar um exemplo de aplicação. Consideremos a palavra $\underline{I} = RLLRRRLC$. Para maior comodidade, vamos ainda escrevê-la sob a forma indexada $\underline{I} = RLL_aR_bR_cR_dL_eC$. Ordenando os os shifts $\psi^0(\underline{I}), \psi^1(\underline{I}), \dots, \psi^7(\underline{I})$ pela ordem $\prec$ obtemos a cadeia

$$\psi^1 \prec \psi^6 \prec \psi^2 \prec \psi^7 \prec \psi^4 \prec \psi^3 \prec \psi^5 \prec \psi^0$$

ou seja

$$LL_aR_bR_cR_dL_eC \prec L_eC \prec L_aR_bR_cR_dL_eC \prec C \prec R_cR_dL_eC \prec R_bR_cR_dL_eC \prec R_dL_eC \prec RLL_aR_bR_cR_dL_eC;$$

que se identifica com

$$L \prec L_e \prec L_a \prec C \prec R_c \prec R_b \prec R_d \prec R.$$

Fazendo $a = b = 2, c = e = 1$ e $d = 3$, temos a cadeia

$$L \prec L_1 \prec L_2 \prec C \prec R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R.$$

Portanto, a palavra $\underline{I}$ representa a órbita unimodal de período 8

$$(R, L, L_2, R_2, R_1, R_3, L_1, C) \equiv (x_8, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, C),$$

cujo gráfico é

Consideremos agora a sequência maximal periódica (de comprimento infinito)

$$\underline{I} = (RLI_2I_3 \dots I_{n-1})^\infty = RLI_2 \dots I_{n-1}RLI_2 \dots I_{n-1} \dots$$

onde $I_j \in \{L, R\}$, $j = 2, 3, \dots, n-1$. Para mostrar que ela representa uma órbita unimodal n -periódica, vamos considerar "o período" $\underline{J} = RLI_2I_3 \dots I_{n-1}$ de $\underline{I}$. Basta ordenar as letras R, L e I_j do período $\underline{J}$, em correspondência à $\prec$ -ordenação dos shifts $\psi^0(\underline{J}), \psi^1(\underline{J}), \dots, \psi^{n-1}(\underline{J})$ e proceder como no caso finito. Só que, neste caso, temos $x < c < x_{n-1}$ se $I_{n-1} = R$ ou $x_{n-1} < c < x'$ se $I_{n-1} = L$, onde $x = \max \{x_i : i = 2, 3, \dots, n-2 \text{ e } x_i < x_{n-1}\}$ e $x' = \min \{x_i > x_{n-1} : i = 2, 3, \dots, n-2\}$. Como exemplo consideremos a sequência maximal periódica

$$\underline{I} = (RLLRRLR)^\infty = RLLRRLR RLLRRLR \dots$$

Ordenando as letras do período

$$\underline{J} = RLLRRLR = RLL_a R_b R_c L_d R_e,$$

obtemos

$$L \prec L_d \prec L_a \prec R_e \prec R_b \prec R_c \prec R$$

Fazendo $d=e=1$, $a=b=2$, e $c=3$ conseguimos a cadeia $L \prec L_1 \prec L_2 \prec R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R$. Então temos $L_2 \prec C \prec R_1$ o que equivale a $x_2 < c < x_6$, porque

$$\underline{J} = (R, L, L_2, R_2, R_3, L_1, R_1) \equiv (x_7, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6).$$

O gráfico de $\underline{J}$ é

Reunindo as considerações feitas e os resultados obtidos nesta seção, podemos estabelecer o seguinte

Teorema 4. Toda órbita unimodal periódica contendo c pode ser representada por uma palavra e, reciprocamente, toda palavra representa uma órbita unimodal periódica contendo c .

A primeira parte do teorema acima é uma consequência direta da definição de sequência periódica maximal. A parte recíproca é um resultado novo.

2. RELAÇÃO ENTRE MINI-MAX, ÓRBITA MINI-MAXIMAL E ÓRBITA SIMPLES.

Dada uma sequência $\underline{A}$ (finita e não vazia) de L 's e R 's e uma sequência admissível $\underline{B}$, definimos $\underline{A} * \underline{B}$ (o produto $*$ de $\underline{A}$ por $\underline{B}$) como segue:

(a) Se $\underline{A}$ é par e $\underline{B} = B_0 B_1 B_2 \dots$ é infinita, então $\underline{A} * \underline{B} = \underline{A} B_0 \underline{A} B_1 \underline{A} B_2 \dots$

(b) Se $\underline{A}$ é par e $\underline{B} = B_0 B_1 \dots B_{n-1} C$ é finita, então

$$\underline{A} * \underline{B} = \underline{A} B_0 \underline{A} B_1 \underline{A} B_2 \dots \underline{A} B_{n-1} \underline{A} C$$

(c) Se $\underline{A}$ é ímpar e $\underline{B}$ é infinita, então $\underline{A} * \underline{B} = \underline{A} \tilde{B}_0 \underline{A} \tilde{B}_1 \underline{A} \tilde{B}_2 \dots$,
 onde $\tilde{L} = R$, $\tilde{R} = L$ e $\tilde{C} = C$

(d) Se $\underline{A}$ é ímpar e $\underline{B}$ é finita, então $\underline{A} * \underline{B} = \underline{A} \tilde{B}_0 \underline{A} \tilde{B}_1 \underline{A} \dots$

$$\dots \underline{A} \tilde{B}_{n-1} \underline{A} C.$$

O produto $*$ serve para descrever relações entre itinerários de funções unimodais. Destacamos três importantes resultados (pág. 75 - [8]) sobre o produto $*$, que são empregados na ordenação de itinerários, que são:

Teorema 1. Se $\underline{A}$ é ímpar e $I_i \neq C$, $i \leq n$, então $\underline{A} \tilde{I}_0 \underline{A} \tilde{I}_1 \dots \underline{A} \tilde{I}_n$ é par se, e somente se, $I_0 I_1 \dots I_n$ é par.

Teorema 2. Se $\underline{A}C$ e $\underline{B}$ são maximais, então $\underline{A} * \underline{B}$ é maximal.

É fácil extrair destes teoremas a seguinte consequência especial: se P é uma palavra, então $R_* P$ é uma palavra que tem R -paridade contrária à de P .

Teorema 3. Se $\underline{A}C$ é maximal então a aplicação $\underline{A} * : \underline{B} \rightarrow \underline{A} * \underline{B}$ do conjunto dos itinerários maximais em si mesmo, preserva a ordem $\prec$.

Observamos que $\underline{A} * \underline{C} = \underline{AC}$, $\emptyset * \underline{B} = \underline{B}$ e $\underline{A}^{*n}$ é a n -iteração de $\underline{A}$ via produto $*$.

Vamos ordenar as sequências maximais infinitas de período $p \geq 2$ segundo a ordem $\dot{<}$. Para p fixo, existem no máximo 2^p delas (nº de arranjos com repetição de dois elementos tomados p a p). Seja $r \leq 2^p$ o número destas sequências que têm período p . Então

$$\underline{B}_1^\infty, p \dot{<} \underline{B}_2^\infty, p \dot{<} \dots \dot{<} \underline{B}_r^\infty, p$$

é a $\dot{<}$ -ordenação destas sequências, onde $|\underline{B}_i, p| = p$ para $i = 1, 2, \dots, r$.

O mini-max de período p é definido por $\underline{P}_p = \underline{B}_1, p$.

O teorema seguinte (pág. 78 - [8]) fornece o "tipo" de mini-max para cada período.

Teorema 4. Os mini-max $\underline{P}_p$ são da seguinte forma:

- (a) Se $p \geq 3$ é ímpar, $\underline{P}_p = R L R^{p-2}$
- (b) Se $p = 2^n \cdot k$, onde $k \geq 3$ é ímpar, então $\underline{P}_p = R^{*n} * R L R^{k-2}$
- (c) Se $p = 2^n$, $n > 0$, então $\underline{P}_p = R^{*n} * R$ e $\underline{P}_1 = L$.

Pelo teorema 1, $\underline{P}_p$ é par para todo p da forma $2^n \cdot k$, $k \geq 3$ ímpar, e é ímpar para $p = 2^n$, $n \geq 1$.

Do teorema 4 segue (pág. 78 - [8]) o chamado teorema Pré-Šarkovskii, que é

Teorema 5. Sejam s, t dois inteiros. Se $s < t$ no sentido da ordem de Šarkovskii

$$1 < 2 < 4 < \dots < 2^2. 5 < 2^2. 3 < \dots < 2. 5 < 2. 3 < \dots < 7 < 5 < 3, \dots$$

então $\underline{P}_s \dot{<} \underline{P}_t$ (ou $\underline{P}_s^\infty \dot{<} \underline{P}_t^\infty$).

Os dois teoremas acima, permitem escrever a ordem de Sarkovskii em termos dos mini-max correspondentes aos períodos que nela aparecem. De fato, podemos escrever

$$\begin{aligned}
 L^\infty &\prec (R^{*1} * R)^\infty \prec (R^{*2} * R)^\infty \prec (R^{*3} * R)^\infty \prec \dots \\
 &\vdots \\
 &\prec (R^{*2} * RLR^5)^\infty \prec (R^{*2} * RLR^3)^\infty \prec (R^{*2} * RLR)^\infty \prec \dots \\
 &\prec (R^{*1} * RLR^5)^\infty \prec (R^{*1} * RLR^3)^\infty \prec (R^{*1} * RLR)^\infty \prec \dots \\
 &\prec (RLR^5)^\infty \prec (RLR^3)^\infty \prec (RLR)^\infty .
 \end{aligned}$$

Adaptamos de Coppel - [9] a seguinte definição.

Definição 1. Uma órbita n -periódica de $f \in C^0(I, I)$ é Sarkovskii-maximal, ou S-maximal, se não existe $m \in P(f)$ tal que $n < m$ e $1 < m < n$.

A sequência de Sarkovskii contém cada período $n \in \mathbb{N}^*$ só uma vez, não considerando os diversos tipos de órbitas n -periódicas existentes. Mesmo para funções unimodais, existem, conforme [8, 11, 20, 21], vários tipos. Ainda de acordo estas referências e para funções unimodais, existe um só tipo (é óbvio) de órbita de período 1, 2 e 3, existem dois tipos de período 4, três de período 5, cinco de período 6, etc. . O número de órbitas unimodais n -periódicas pode ser calculado através da fórmula de Fine - [10]

$$F(n) = \frac{1}{2n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ ímpar}}} \mu(d) 2^{n/d},$$

onde $\mu : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ é a função de Möbius que é definida assim:
 $\mu(1) = 1$, $\mu(x) = (-1)^r$ se x é um produto de r primos distintos e $\mu(x) = 0$ nos outros casos.

No caso de funções unimodais, a órbita n -periódica maximal a que se refere a definição acima, é a menor (segundo a ordem $\prec$) órbita n -periódica, como veremos adiante. Esta órbita é chamada de mini-maximal.

Em [1], Alsedà, Llibre e Serra demonstraram que para funções unimodais, os mini-max essencialmente descrevem o comportamento das órbitas periódicas mini-maximais.

Vejamos quando uma órbita n -periódica de $f \in C^0(I, I)$ é uma órbita simples. Se $n = 2^s$, $s \geq 0$ temos a seguinte

Definição 2. (Block - [2,5]). Todo ponto fixo é uma órbita simples, e uma órbita de f com período 2^s , onde $s > 0$, é simples se suas metades esquerda e direita são órbitas simples de f^2 com período 2^{s-1} .

Por exemplo, as órbitas unimodais de período 4

são tais que a primeira é simples mas a segunda não o é. Um exemplo de órbita simples de período 8, não unimodal, é

Definição 3. (Stefan - [27]). Uma órbita de período $n \geq 3$ ímpar com ponto médio x é simples se seus pontos têm a ordem $f^{n-1}(x) < f^{n-3}(x) < \dots < f^2(x) < x < f(x) < \dots < f^{n-2}(x)$, ou a ordem oposta.

e

exemplificam órbitas simples de períodos 5 e 7 respectivamente. Notamos que a segunda órbita é unimodal e a primeira é "unimodal invertida".

Definição 4. (Block - [5]). Uma órbita de período $n = 2^s q$, onde $q \geq 3$ é ímpar e $s \geq 1$, é simples se consiste de 2^s blocos de q pontos consecutivos, cada bloco formando uma órbita simples de f^{2^s} (com período q), e os blocos são eles próprios permutados por f como uma órbita simples de período 2^s .

Esta definição é análoga à que foi dada anteriormente por ALS - [1]. As figuras seguintes (onde $g = f|_{\text{órbita}}$)

$$g \equiv (1, 7, 6, 10, 3, 9, 4, 11, 2, 8, 5, 12)$$

$$g \equiv (1, 7, 3, 9, 4, 6, 2, 10, 5, 8)$$

mostram, respectivamente, uma órbita simples (unimodal) de período 12 e uma órbita simples (não unimodal) de período 10.

Alsedà-Llibre-Serra - [1] provaram a equivalência, para funções unimodais, entre órbita n -periódica mini-maximal, itinerário mini-max de período n e órbita simples n -periódica. Uma importante consequência disto é que os períodos n em S referem-se às menores (no sentido da $\prec$ -ordenação) órbitas de períodos n .

Isto mostra a compatibilidade entre a ordem $\prec$ de Sarkovskii e a ordem $\prec$ dos itinerários. Então, de agora em diante, adotaremos o símbolo $\prec$ em ambos os casos. Ou o símbolo $\succ$ para representar o sentido oposto.

CAPÍTULO III

ALGUNS ASPECTOS DE FAMÍLIAS UNIMODAIS

1. SOBRE O NÚMERO DE ÓRBITAS PERIÓDICAS ESTÁVEIS DE UMA APLICAÇÃO UNIMODAL.

O tipo de função unimodal $f: I \rightarrow I$ que analisaremos com mais detalhes tem as seguintes propriedades:

- (1) $f \in C^{k \geq 3}(I, I)$
- (2) $f(0) = f(1) = 0$
- (3) f tem um único ponto crítico $c \in [0, 1]$
- (4) $f|_{[0, c]}$ é estritamente crescente e $f|_{[c, 1]}$ é estritamente decrescente.

Uma das famílias de aplicações do intervalo em si próprio que têm sido mais frequentemente estudadas é a família de funções quadráticas

$$(1) \quad f_{\lambda}(x) = \lambda x(1-x), \quad 0 \leq \lambda \leq 4.$$

Esta família só possui comportamento dinâmico não trivial se $1 < \lambda < 4$. Se $0 \leq \lambda < 1$ todas as órbitas de $x \in I$ são atraídas para $x=0$. Se $\lambda=1$, o único ponto fixo $x=0$ é apenas unilateralmente estável. Se $\lambda=4$, o ponto fixo $x=0,75$ é instável. Além disso, conforme Preston - [24], a órbita de todo ponto $x \in (0, 1)$ é completamente "caótica", no sentido de possuir sensibilidade com relação às condições iniciais. Uma definição precisa, devida a Guckenheimer [13] é:

uma função contínua $f: I \rightarrow I$ tem sensibilidade com relação às condições iniciais, se existe um conjunto $Y \subset I$ com medida de Lebesgue positiva e um $\varepsilon > 0$ tal que para todo $x \in Y$ e toda vizinhança U de x , existe um $y \in U$ e um inteiro $n \geq 0$ tal que

$$|f^n(x) - f^n(y)| > \varepsilon.$$

Isto significa que a órbita de um ponto $y \in V(x)$ onde $V(x)$ é uma vizinhança de x arbitrariamente pequena, é muito diferente da órbita de x . Esta conceituação de sensibilidade é bastante informal. O termo "caos" inventado por Li-Yorke - [17], sugere uma imagem de trajetórias dinâmicas em verdadeira desordem. Sobre "caos" e "dependência sensível" existem os excelentes trabalhos de Kadanoff - [16] e Guckenheimer - [13], respectivamente. O ponto fixo $x_* = (\lambda - 1) / \lambda$ é estável (atraindo todas as órbitas de $x \in (0, 1)$), se, e somente se, $1 < \lambda < 3$. Notamos assim que o comportamento dinâmico desta família é mais interessante quando $3 < \lambda < 4$. Para todo $\lambda \in (3, 4)$, os dois pontos fixos 0 e x_* de f_λ são instáveis porque $f'_\lambda(0) = \lambda > 1$ e $f'_\lambda(x_*) = 2 - \lambda < -1$. Ainda conforme [17], para $\lambda < 4$ suficientemente perto de 4, existem ciclos (estáveis ou instáveis) com todo período inteiro ≥ 4 , bem como um número incontável de órbitas que não são assintoticamente periódicas.

Se $f \in C^3(I, I)$, a derivada schwarziana de f em x , é definida por

$$Sf(x) = \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2.$$

Julia - [15] provou que cada elemento da família logística (1) tem no máximo uma órbita periódica estável. Na literatura especializada, temos May - ([20] - pág. 462), sugerindo que é

plausível conjecturar que para todas as funções satisfazendo as condições (1,2,3) e (4) $f''(x) < 0$, $\forall x \in I$, o resultado de Julia é válido. Porém Singer-[26] provou que esta conjectura só é verdadeira sob a hipótese da função satisfazer (1,2,3) e (5) $Sf(x) < 0$, $\forall x \in I$.

Também em [26], Singer exibiu a função

$$f(x) = 7,86x - 23,31x^2 + 28,75x^3 - 13,3x^4$$

que satisfaz as condições (1,2,3,5) dadas acima, mas possui duas órbitas periódicas estáveis. Neste caso temos, por exemplo, que $Sf(0,6) = 32,75 \dots$

Existem funções unimodais satisfazendo as condições (1,2,3,6) que não têm órbitas periódicas estáveis. Temos o exemplo clássico $f(x) = 1 - 2x^2$ dado por Ulam e V. Newmann (1947), onde f é uma função unimodal de $[-1,1]$ em $[-1,1]$. Neste caso, temos $Sf(x) = (-3/2x^2) < 0$, se $x \neq 0$. Além disso f satisfaz as condições (1,3,4,5) (e também (2) se considerarmos $I = [-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$). Se f tiver uma órbita periódica estável, esta deverá atrair o único ponto crítico $c=0$, pelo teorema de Singer, que enunciaremos abaixo. Mas a órbita de 0 é $(0,1,-1,-1,-1\dots)$ que converge para -1, e -1 é um ponto fixo instável, pois $f'(-1) = 4$.

Os teoremas abaixo, que apenas enunciaremos, são muito semelhantes.

Teorema 1. (Julia - [15]). Se $f_\lambda(x)$ é a restrição a $[0,1]$ de alguma função analítica no plano complexo tendo só um ponto crítico c_λ no intervalo, então a única órbita periódica estável possível é aquela que possui a propriedade J, isto é, que possui um ponto cuja vizinhança atrativa inclui o ponto $x = c_\lambda$.

Teorema 2. (Singer - [26]). Seja G o conjunto de todas as funções satisfazendo as condições (1,2,3) acima, tais que $S_f(x) < 0$, $\forall x \in I$. Então para toda $f \in G$ existe no máximo uma órbita periódica estável em $(0,1)$. Se existir, ela é o ω -limite de c .

Cada função da família logística satisfaz a ambos os teoremas.

Em virtude dos teoremas de Julia e Singer, enunciados acima, podemos considerar as soluções λ da equação $f_\lambda^n(c_\lambda) = c_\lambda$. Então as órbitas periódicas correspondentes são estáveis (ou melhor, super-estáveis), porque $(f_\lambda^n)'(c_\lambda) = 0$. A estas órbitas associamos o itinerário maximal correspondente

$$\underline{I}(f(c_\lambda)) = I_0(f(c_\lambda))I_1(f(c_\lambda)) \dots I_{n-2}(f(c_\lambda))I_{n-1}(f(c_\lambda)),$$

representado pela palavra

$$RLI_2I_3 \dots I_{n-2}C$$

onde $I_j \in \{L,R\}$ para $j=2,3, \dots, n-2$.

Segundo C, E - ([8] - Seções I.4 e II.2), May [20] e M,S,S - [21], quando ocorre uma λ -bifurcação (tangente) para $\lambda = \lambda_1$, e "nasce" pela primeira vez uma órbita n -periódica estável, o seu tipo é dado pelo mini-max de período n . Já mostramos que se $RLI_2 \dots I_{n-1}$ é o min-max de período n , então

$$RLI_2 \dots I_{n-1} < RLI_2 \dots I_{n-2}C < RLI_2 \dots I_{n-2}\tilde{I}_{n-1}$$

onde $\tilde{I}_{n-1}$ é tal que $\tilde{R} = L$ e $\tilde{L} = R$. A sequência

$$RLI_2 \dots I_{n-2}\tilde{I}_{n-1}$$

representa o mesmo tipo de órbita quando ela "morre" (perdendo a estabilidade), através de uma nova λ -bifurcação (harmônica), para $\lambda = \lambda_2 > \lambda_1$. A "janela" (termo introduzido por May [20])

correspondente a uma órbita periódica, é o intervalo (λ_1, λ_2) onde ela permanece estável. Após cada bifurcação tangente, segue (conforme [8, 20, 21]) uma infinidade de sucessivas bifurcações harmônicas, de modo que na janela de uma órbita, nenhum valor do parâmetro pode corresponder a outro tipo de órbita. As janelas ficam cada vez mais estreitas quando os períodos crescem. Por exemplo, para a família logística a janela do ponto fixo x_* é $(1, 3)$ e a da órbita de período 2 é $(3, 236 \dots; 3, 498 \dots)$. Portanto, de agora em diante usaremos sempre uma palavra do tipo $P = RL I_2 \dots I_{n-2} C$, para representar uma órbita unimodal de período $n \geq 3$ em seu estágio super-estável. Lembramos que a recíproca também é verdadeira, pelo teorema II.1.4. Observe-mos ainda que $P = C$ se $n = 1$ e $P = RC$ se $n = 2$. Se f_λ é uma família bem comportada (por exemplo satisfazendo as condições (a, b, c)) de funções unimodais, sejam $\lambda_1 < \lambda_2$ soluções de $f_{\lambda_1}^m(c_{\lambda_1}) = c_{\lambda_1}$ e $f_{\lambda_2}^n(c_{\lambda_2}) = c_{\lambda_2}$ respectivamente, onde podemos ter $m = n \geq 4$ ou $m \neq n$ (com $m, n \geq 1$). Para esta família, podemos estabelecer o seguinte

Teorema 3. Sejam duas órbitas periódicas unimodais distintas, representadas pelas palavras

$$X_{\lambda_1} = RL X_1 X_2 \dots X_{m-3} C \quad \text{e} \quad Y_{\lambda_2} = RL Y_1 Y_2 \dots Y_{n-3} C$$

tais que $X < Y$. Então, temos

$$X_L^\infty = (RL X_1 X_2 \dots X_{m-3} L)^\infty < Y \quad \text{e} \quad X_R^\infty = (RL X_1 X_2 \dots X_{m-3} R)^\infty < Y.$$

Prova. Quando X "nasce" (para $\lambda = \lambda'_1$) tem a forma X_L (ou X_R), e tem a forma X_R (ou X_L) quando "morre" (para $\lambda = \lambda''_1$), onde $\lambda'_1 < \lambda_1 < \lambda''_1$. Como $\lambda'_1 < \lambda_2$, isto é, λ_2 está à direita da janela $(\lambda'_1, \lambda''_1)$ da órbita X_{λ_1} , concluimos que $X_L^\infty, X_R^\infty < Y$.

várias famílias a um parâmetro de aplicações f_λ , e obtiveram para todas elas, a mesma sequência de períodos $n(\lambda)$ correspondentes às órbitas periódicas estáveis (quando existem) associadas a λ . A cada valor particular de λ (quando λ evolui em seu intervalo de definição) está associada no máximo uma órbita atratora de período $n(\lambda)$. Esta sequência de períodos $n(\lambda)$, que tem a mesma ordenação dos λ correspondentes, descreve a ordem de um conjunto de λ -bifurcações. Esta ordem comum de bifurcações com relação ao parâmetro descrita em [21], sugeriu um comportamento universal, isto é, o mesmo para todas as famílias de aplicações satisfazendo as condições (1, 2, 3, 5). Por isso, em [21] a sequência λ -ordenada de períodos $n(\lambda)$ (ou das palavras correspondentes), foi chamada de U-sequência, que é formada apenas pelas órbitas unimodais n -periódicas estáveis que têm a propriedade J. Foi Guckenheimer - [11] quem provou que a ordem dos $n(\lambda)$ independe da família f_λ que satisfaz as condições (1, 2, 3) e (7) $f_{\lambda_{\min}} \equiv 0$ e $f_{\lambda_{\max}}(c_{\lambda_{\max}}) = 1$.

As condições acima e $S_f(x) < 0$ são muito restritivas, mas servem para eliminar certas órbitas periódicas que embora estáveis, são anômalas, no sentido de que não possuem a propriedade J. Tais órbitas existem, conforme [21] - seção 6. A vantagem de se considerar famílias de funções que satisfazem as condições (1, 2, 3, 6), é que neste caso todas as órbitas periódicas estáveis têm, conforme [21, 26], a propriedade J. E a U-sequência é tão somente formada por elas.

Então as condições impostas (1, 2, 3, 4) e $S_f(x) < 0$ não são estritamente necessárias, desde que admitamos certas transformações que possuam outras órbitas periódicas estáveis, além

das que compõem a U-sequência. A existência e estrutura das órbitas anômalas (que não têm a propriedade J) vai depender da particular família de aplicações considerada.

M, S, S - [21] obtiveram, por meio de computação eletrônica, a mesma U-sequência para as seguintes famílias de aplicações unimodais:

$$(a) \quad f_{\lambda}(x) = \lambda x(1-x), \quad 1 < \lambda < 4$$

$$(b) \quad f_{\lambda}(x) = \lambda \sin \pi x, \quad 0,71 < \lambda < 1$$

$$(c) \quad f_{\lambda}(x) = \lambda y(3-3y+y^2), \quad y = 3x(1-x), \quad 0,872 < \lambda < 64/63$$

$$(d) \quad f_{\lambda}(x) = \begin{cases} \lambda x/a, & 0 \leq x \leq a \\ \lambda, & a \leq x \leq 1-a \\ \lambda(1-x)/a, & 1-a \leq x \leq 1 \end{cases}$$

com $1-a < \lambda < 1$ e $0 < a < 0,5$. Aqui a permanece fixo enquanto λ varia, e diferentes escolhas de λ levam a transformações distintas.

É fácil mostrar que quando o parâmetro λ cresce, também cresce o valor máximo de f_{λ} , que é atingido no ponto crítico correspondente. Ou seja, se $\lambda_1 < \lambda_2$ então

$$f_{\lambda_1}(c_{\lambda_1}) < f_{\lambda_2}(c_{\lambda_2}),$$

onde c_{λ_1} e c_{λ_2} são os únicos pontos críticos de f_{λ_1} e f_{λ_2} respectivamente. Consideremos, por exemplo, as aplicações $f_{\lambda}(x) = \lambda x(1-x)$. Neste caso, o único ponto crítico de f_{λ} é $c_{\lambda} = 1/2$ para todo $0 < \lambda \leq 4$, e temos

$$f_{\lambda_1}(\frac{1}{2}) = \frac{\lambda_1}{4} < \frac{\lambda_2}{4} = f_{\lambda_2}(\frac{1}{2}).$$

2. O HARMÔNICO E O ANTI-HARMÔNICO.

Extraímos de M, S, S - [21] as definições e o teorema 6 e 7 desta seção.

Definição 1. Seja P a palavra que corresponde a alguma solução de $f_{\lambda}^n(c_{\lambda}) = c_{\lambda}$, onde $\{f_{\lambda}\}$ é uma família de funções unimodais. Então o Harmônico de P é $H(P) = P'XP$, onde P' é P sem C , $X = L$ se P é ímpar e $X = R$ se P é par.

A construção do harmônico pode ser iterada, de modo que se pode falar do segundo, terceiro, ..., n -ésimo harmônico, etc. O j -ésimo harmônico de P , para $j \in \mathbb{N}^*$, será denotado por $H^j(P)$. Convencionemos que $H^0(P) = P$.

Os exemplos abaixo servem para visualizar o fato de que o primeiro harmônico de P , $H^1(P)$, representa a órbita proveniente de P por bifurcação harmônica. Aqui $\lambda_1 < \lambda_2 = \text{bif}(\lambda_1)$.

$$P = RLR^2C \rightarrow H(P) = RLR^2LRLR^2C, \quad P = RL^2RC \rightarrow H(P) = RL^2RRRL^2RC$$

Quando o parâmetro em $f_{\lambda}(x)$ varia, e surge por bifurcação tangente um ciclo estável de período $k \geq 1$, então em seguida existe uma sequência infinita de ciclos estáveis de pe

ríodo $2^j k (j \rightarrow \infty)$ que surgem sucessivamente por bifurcação harmônica. Uma simples e lúcida exposição deste fenômeno pode ser encontrada em May - [20]. Neste paper May mostra claramente que a "janela" dos valores do parâmetro na qual todo ciclo harmônico é estável diminui progressivamente, de modo que o processo inteiro é convergente, sendo limitado acima por um valor crítico do parâmetro. Se $k=1$ e $f_\lambda(x)$ é a família logística, este valor crítico é 3,5700 Além deste valor, nenhum ciclo de período 2^j é estável. É oportuno observar que no intervalo $(\lambda(k), \lambda_c)$ (onde $\lambda(k)$ é o valor do "nascimento do ciclo básico de período k e λ_c é o valor crítico de convergência), não existe região aperiódica. Entretanto, no paper consta a advertência de que aquele valor limite nem sempre existe, exemplificando com uma função $f: I \rightarrow I$, a dois parâmetros, definida por $f(x) = \lambda x(1+x)^{-\beta}$.

Tendo em vista estas considerações, podemos destacar os dois seguintes resultados óbvios:

Teorema 1. Para qualquer palavra P , $P \prec H^1(P)$.

Prova. Podemos exibir uma prova direta. Se $P = C$ ou $P = RC$, temos respectivamente $H^1(P) = RC$ ou $H^1(P) = RLRC$. Também, se $P = RLC$ temos $P \prec H^1(P) = RLLRLC$. Suponhamos que $P = RLX_1X_2 \dots X_k C = P'C$. Se P é par então $H^1(P) = RLX_1 \dots X_k RRLX_1 \dots X_k C = P'RP$, onde $P \prec H^1(P)$. Se P é ímpar temos que $P \prec H^1(P) = P'LP$.

Segue imediatamente deste resultado que $H^j(P) \prec H^{j+1}(P)$, para todo $j \in \mathbb{N}$.

Teorema 2. Se P_1 e P_2 são palavras tais que $P_1 \prec P_2$ mas $P_2 \neq H^j(P_1)$ para todo $j \in \mathbb{N}^*$, então $H^j(P_1) \prec P_2$ para todo

$j \in \mathbb{N}$. Se $P_2 = H^k(P_1)$ para algum $k \in \mathbb{N}^*$, então $H^j(P_1) \triangleleft P_2$ para $j = 0, 1, \dots, k-1$ mas $P_2 \not\triangleleft H^j(P_1)$ para $j \geq k+1$.

Definição 2. O anti-harmônico $A(P)$ de uma palavra P é construído analogamente ao harmônico $H(P)$ exceto que agora $X=L$ se P é par e $X=R$ se P é ímpar.

É fácil ver que o anti-harmônico mantém a R -paridade de uma palavra P , enquanto o harmônico altera-a. A construção do anti-harmônico pode também ser iterada, de modo a obter-se o j -ésimo anti-harmônico de P , $A^j(P)$, para $j = 1, 2, 3, \dots$.

Convencionemos que $A^0(P) = P$.

Os exemplos abaixo ilustram o fato de que o anti-harmônico é uma construção puramente formal e nunca corresponde a uma palavra que represente uma órbita unimodal periódica.

Seja $P = RLR^2C$. Então $A(P) = RLR^2RRLR^2C$, donde $\psi^5(A(P)) = RLR^2C \triangleright A(P)$ implica que $A(P)$ não é maximal. Pelo teorema II.1.4, não é unimodal. Se $P = RLRC$, temos que $A(P) = RLRLRLRC$ e $\psi^4(A(P)) = RLRC \triangleright A(P)$ também conduzem à não unimodalidade de $A(P)$. Em geral, seja $P = P'C$ uma palavra de comprimento $n \geq 1$ ($P = C$ se $n=1$). Então, pela definição de anti-harmônico, temos que $A^1(P) = P'LP$ se P é par e que $A^1(P) = P'RP$ se P é ímpar. Em qualquer destes casos temos que $\psi^n(A^1(P)) = P = P'C \triangleright A^1(P)$, donde $A^1(P)$ não é maximal, e, pelo teorema II.1.4 também não é unimodal.

Definição 3. A H -extensão de uma palavra P é a sequência maximal gerada pela iteração da construção harmônica aplicada j vezes a P , onde j é arbitrariamente grande.

Definição 4. A A -extensão de uma palavra P é a sequência $A^j(P)$, onde j cresce indefinidamente. Na A -extensão temos $A^j(P) = A^{kj}(P)$ para $k = 1, 2, 3, \dots$.

Se P é uma palavra, sejam P_L e P_R as sequências obtidas de P pela substituição de C por L e R respectivamente. Então é fácil ver que

$$\begin{aligned} P_L < P < P_R & \text{ se } P \text{ é par} \\ P_R < P < P_L & \text{ se } P \text{ é ímpar.} \end{aligned}$$

Por exemplo, se $P = RLLRC$, então

$$P_L = RLLRL \quad \text{e} \quad P_R = RLLRR.$$

Com estas representações de P_L e P_R , podemos estabelecer os dois seguintes teoremas:

Teorema 3. Seja P uma palavra. Então, para todo $n \in \mathbb{N}^*$, temos que

$$H^n(P) = A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} P,$$

onde os A_k 's são dados sucessivamente por

$$A_{k+1} = A_{k-1}^2 A_k,$$

sendo que

$$\begin{aligned} A_0 &= P_R, \quad A_1 = P_L P_R & \text{ se } P \text{ é par} \\ A_0 &= P_L, \quad A_1 = P_R P_L & \text{ se } P \text{ é ímpar.} \end{aligned}$$

Prova. Suponhamos que a palavra P seja ímpar. Então temos, sucessivamente, que

$$\begin{aligned} H^1(P) &= P_L P = A_0 P & \text{ é par,} \\ H^2(P) &= P_L P_R P_L P = A_0 A_1 P & \text{ é ímpar,} \\ H^3(P) &= P_L P_R P_L P_L P_L P_R P_L P = A_0 A_1 A_2 P & \text{ é par.} \end{aligned}$$

Isto deixa claro que $H^n(P)$ é par se $n \geq 1$ é ímpar e é ímpar se $n \geq 2$ é par. Suponhamos, por indução finita sobre n , que

$$H^n(P) = A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} P.$$

Então, se $n \geq 1$ é ímpar, temos

$$H^{n+1}(P) = H^1(H^n(P)) = (H^n(P))_R H^n(P) = A_0 A_1 \dots A_{n-1} P A_0 A_1 \dots A_{n-1} P.$$

Neste caso, se provarmos que $P_R A_0 A_1 \dots A_{n-1} = A_n$, teremos

$$H^{n+1}(P) = A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n P = A_0 A_1 \dots A_{(n+1)-1} P.$$

Ora, se $n \geq 1$ é ímpar, então temos que

$$P_R A_0 = A_1 \quad \text{se} \quad n = 1$$

e

$$P_R A_0 A_1 A_2 = A_1^2 A_2 = A_3 \quad \text{se} \quad n = 3,$$

donde, por indução (supondo $P_R A_0 A_1 \dots A_{n-1} = A_n$) obtemos

$$P_R A_0 A_1 \dots A_{n-1} A_n A_{n+1} = A_n^2 A_{n+1} = A_{n+2}.$$

Agora provaremos por indução finita sobre $n \geq 2$ par, que

$P_L A_0 A_1 \dots A_{n-1} = A_n$. De fato, temos que

$$P_L A_0 A_1 = A_0^2 A_1 = A_2 \quad \text{se} \quad n = 2$$

e

$$P_L A_0 A_1 A_2 A_3 = A_2^2 A_3 = A_4 \quad \text{se} \quad n = 4,$$

donde

$$P_L A_0 A_1 \dots A_{n-1} A_n A_{n+1} = A_n^2 A_{n+1} = A_{n+2}.$$

Logo, quando $n \geq 2$ é par temos

$$\begin{aligned} H^{n+1}(P) &= H^1(H^n(P)) = (H^n(P))_L H^n(P) = A_0 A_1 \dots A_{n-1} P A_0 A_1 \dots A_{n-1} P = \\ &= A_0 A_1 \dots A_{n-1} A_n P = A_0 A_1 A_2 \dots A_{(n+1)-1} P. \end{aligned}$$

Vamos omitir a prova para o caso onde P é uma palavra par, porque ela é, mutatis-mutandis, inteiramente análoga a esta, onde consideramos P ímpar.

Teorema 4. Seja P uma palavra. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$ temos

que

$$A^n(P) = P_L^{2^{n-1}} P \quad \text{se } P \text{ é par}$$

e

$$A^n(P) = P_R^{2^{n-1}} P \quad \text{se } P \text{ é ímpar.}$$

Prova. Suponhamos que a palavra P seja par. Então temos que

$$A^1(P) = P_L P = P_L^{2^1-1} P$$

e

$$A^2(P) = P_L P_L P_L P = (P_L)^3 P = P_L^{2^2-1} P,$$

pela definição de anti-harmônico. Agora suponhamos por indução que a fórmula é verdadeira para $n = k \geq 1$, isto é, que

$$A^k(P) = P_L^{2^{k-1}} P.$$

Afirmamos que ela é válida também para $n = k + 1 \geq 2$. De fato, temos

$$\begin{aligned} A^{k+1}(P) &= A^1(A^k(P)) = (A^k(P))_L A^k(P) = P_L^{2^{k-1}} P_L P_L^{2^{k-1}} P \\ &= P_L^{2^{k+1}-1} P. \end{aligned}$$

Portanto, a fórmula é verdadeira para todo $n \geq 1$. Em particular, notamos que $A^0(P) = P$. Quando P é ímpar, a prova é inteiramente análoga e por isso vamos omiti-la.

Podemos relacionar os harmônicos e os anti-harmônicos na forma do seguinte teorema.

Teorema 5. Sejam P e Q palavras tais que $P \triangleleft Q$, representando órbitas periódicas de funções unimodais bem comportadas (como por exemplo satisfazendo as condições $(L, 2, 3, 4)$). Então temos as cadeias

$$P \triangleleft H^1(P) \triangleleft H^2(P) \triangleleft \dots \triangleleft A^2(Q) \triangleleft A^1(Q) \triangleleft Q$$

e

$$\dots \triangleleft A^2(P) \triangleleft A^1(P) \triangleleft P \triangleleft Q \triangleleft H^1(P) \triangleleft H^2(P) \triangleleft \dots$$

Prova. Já sabemos que a sequência de harmônicos

$$P \triangleleft H^1(P) \triangleleft H^2(P) \triangleleft \dots$$

não admite a intercalação entre eles de outro tipo de órbitas, e que é convergente, no sentido de que as janelas tendem a zero quando $n \rightarrow \infty$ em $H^n(P)$. É fácil ver que $H^j(P) \triangleleft A^k(Q)$, $\forall j, k \in \mathbb{N}$.

Basta então mostrarmos que $A^{n+1}(Q) \triangleleft A^n(Q)$

para todo $n \in \mathbb{N}$, no caso da primeira cadeia do enunciado. Se Q é par, temos, em vista do teorema 4, que

$$A^n(Q) = Q_L^{2^n-1} Q = Q_L Q_L \dots Q_L Q$$

e

$$A^{n+1}(Q) = Q_L^{2^{n+1}-1} Q = Q_L Q_L \dots Q_L Q_L \dots Q_L Q,$$

donde $A^{n+1}(Q) \triangleleft A^n(Q)$, pois o anti-harmônico mantém a R-variabilidade sob sucessivas iterações. Se Q é ímpar, o raciocínio é análogo. Assim, os harmônicos progridem e os anti-harmônicos regridem, no sentido da ordenação $\triangleleft$. Agora, a segunda cadeia enunciada fica óbvia.

Na prática, não é necessário que $j \rightarrow \infty$, mas apenas que j seja suficientemente grande em $H^j(P)$ e em $A^j(P)$. Isto fica claro com o seguinte teorema.

Teorema 6. Seja $k \geq 1$ um inteiro. Consideremos a sequência ordenada completa de soluções de $f_\lambda^n(c_\lambda) = c_\lambda$ e suas palavras associadas para $1 \leq n \leq k$. Seja λ_1 qualquer destas soluções, com palavra P_1 e comprimento n_1 , e seja $\lambda_2 > \lambda_1$ a solução "adjacente" (isto é, a próxima na ordem usual de $\mathbb{R}$), com palavra P_2 e comprimento n_2 . Formemos a H-extensão de P_1 e a A-extensão de P_2 . Lendo da esquerda para a direita, as duas extensões $H^j(P_1)$ e $A^j(P_2)$ terão uma subsequência comum P^* de maior comprimento $n^* - 1 \geq 1$, de modo que podemos escrever

$$H^j(P_1) = P^* X_1 \dots, \quad A^j(P_2) = P^* X_2 \dots,$$

onde $X_1 \neq X_2$ e X_1 é uma das letras L ou R .

Caso 1. $n^* \geq 2n_1$. Então a solução λ^* de menor ordem tal que

$\lambda_1 < \lambda^* < \lambda_2$ é o harmônico de P_1 .

Caso 2. $n^* < 2n_1$. Então a solução λ^* de menor ordem tal que $\lambda_1 < \lambda^* < \lambda_2$ corresponde à palavra P^*C de comprimento n^* ($n^* > k$ necessariamente).

Uma simples consequência deste teorema é o

Teorema 7. Seja $|n_1 - n_2| = 1$ no teorema 6. Então a solução de menor ordem λ^* , com $\lambda_1 < \lambda^* < \lambda_2$, tem comprimento

$$n^* = 1 + \max \{n_1, n_2\}.$$

Damos em seguida alguns exemplos de aplicação do teorema 6 e 7 acima.

(1). Sejam as palavras $P_1 = RLC$ e $P_2 = RL^2RLR^2LC$, onde

$P_1 < P_2$. Neste caso $k = 9$ e comparamos

$$H^3(P_1) = RL^2RLR^2L^2RL^2RLRLRLR^2L^2RLC \text{ com}$$

$$A(P_2) = RL^2RLR^2L^2RL^2RLRLRLC. \text{ Na posição de discordância}$$

$n^* = 15$, temos $X_1 = L$ e $X_2 = R$. Estamos no caso

1, pois $n^* > 2n_1$. Temos então

$$P^*C = RL^2RLR^2L^2RL^2RLC \text{ e como}$$

$P_1 < H(P_1) = RL^2RLC < P^*C < P_2$, a solução λ^* de menor ordem tal que $\lambda_1 < \lambda^* < \lambda_2$ é representada por $H(P_1)$.

(2). Se $P_1 = RLR^3LRC < P_2 = RLR^3C$, temos $k = 8$ e comparando

$$H(P_1) = RLR^3LRLRLRL^3LRC \text{ com}$$

$$A(P_2) = RLR^3LRLRLRLC,$$

obtemos $n^* = 10$. Mas como $n^* < 2n_1$, então pelo caso 2,

a solução λ^* corresponde à palavra

$$P^*C = RLR^3LRLRC \text{ tal que } P_1 < P^*C < P_2.$$

(3) Sejam $P_1 = RLR^5C$ e $P_2 = RLR^6C$, onde $n_1 = 8$, $n_2 = 9$ e $P_1 \triangleleft P_2$. É a situação descrita pelo teorema 7. Comparando as sequências

$$H(P_1) = RLR^5 RRL \underline{L} R^5 C$$

e

$$A(P_2) = RLR^6 R \underline{R} LR^6 C ,$$

obtemos $n^* = 10$. Então a solução λ^* de menor ordem tal que $\lambda_1 < \lambda^* < \lambda_2$, corresponde à palavra $P^*C = RLR^7C$, que satisfaz $P_1 \triangleleft P^*C \triangleleft P_2$.

Devemos fazer uma observação. A definição 1 afirma que o harmônico da palavra $P = P'C$ é a palavra $H(P) = P'XP$, onde $X = L$ ou $X = R$ conforme P seja ímpar ou par respectivamente. De fato, é fácil ver que $H(P)$ é maximal pois P é maximal. Daí, $H^j(P)$ também o é, para todo $j \geq 1$, inteiro. Portanto, a sequência admissível P^*C construída pelo teorema 6 é maximal, donde, pelo teorema II.1.4, representa uma órbita unimodal.

EXTENSÃO DA SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII (ANTES DO 3)

1. ALGUNS RESULTADOS

Para qualquer família a um parâmetro de funções unimodais, vamos indicar por n_r o r -ésimo período $n \geq 1$ segundo a ordenação

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_{F(n)},$$

onde

$$F(n) = \frac{1}{2n} \sum_{\substack{d|n \\ d \text{ ímpar}}} \mu(d) 2^{n|d}$$

é a fórmula de Fine - [10]. Desta, podemos facilmente extrair as fórmulas

$$F(n) = \frac{1}{n} (2^{n-1} - 1) \quad \text{e} \quad F(n = 2^k) = 2^{k-k-1}$$

nos casos especiais onde $n \geq 3$ é primo e $n \geq 1$ é uma potência de 2, respectivamente.

Quando a ordem não for essencial, indicaremos n_r apenas por n .

À luz dos teoremas III.1.1 (Julia) e III.1.2 (Singer), podemos fazer a seguinte adaptação do teorema II.2.4.

Teorema 1. A órbita de período n_1 , onde $n = 2^j \cdot k$ ($k \geq 1$ é ímpar e $j \in \mathbb{N}$), é representada pela palavra:

$$(a) \quad R^*j * R L R^{k-3} C \quad \text{se} \quad j \geq 0 \quad \text{e} \quad k \geq 3;$$

$$(b) \quad R^*j * C \quad \text{se} \quad j \geq 0 \quad \text{e} \quad k = 1.$$

Frequentemente indicaremos por $P(n_r)$ a palavra que corresponde ao período n_r . Se não houver risco de confusão,

ela será denotada por $P(n)$ ou simplesmente por P .

De acordo com as considerações acima, podemos extrair do teorema II.2.5 (Šarkovskii) (que é uma consequência dos teoremas II.2.1,2,3,4) o seguinte

Teorema 2. Se $k \geq 3$ é ímpar e $j \in \mathbb{N}$, então temos:

- (a) $(2^j)_1 < (2^{j+1})_1$ (ou $R^*j * C < R^*j * RC$)
- (b) $(2^j(k+2))_1 < (2^j k)_1$ (ou $R^*j * R L R^{k-1} C < R^*j * R L R^{k-3} C$)
- (c) $(2^j)_1 < (2^j k)_1$ (ou $R^*j * C < R^*j * R L R^{k-3} C$).

Como um corolário deste teorema, temos o

Teorema 3. Os períodos n_r onde $n \geq 4$ e $r \geq 2$, satisfazem:

- (a) $(2^{j+1})_1 < (2^j)_r$, se $j \geq 2$;
- (b) $(2^j k)_1 < (2^j(k+2))_r$, se $j = 0, 1, 2$ e $k \geq 3$

é ímpar:

- (c) $(2^j 3)_1 < (2^j)_r$, se $j \geq 2$.

Prova. A parte (a) é óbvia, porque a palavra $R^*j * RC$ representa a órbita obtida de $R^*j * C$ por bifurcação harmônica, e nenhum outro tipo de órbita pode existir entre elas.

Para provar a parte (c), escrevemos

$$P_1((2^j)_1) = R^*j * C = P_1' C$$

e

$$P_2((2^j 3)_1) = R^*j * R L C = P_1' X_1 X_2 \dots X_{2j+1} C,$$

onde $X_i \in \{L, R\}$ para $i = 1, 2, \dots, 2j+1$. Como $P_1 < P_2$, então $X_1 = R$ se P_1 é par (para $j \geq 2$ par) e $X_1 = L$ se P_1 é ímpar (para $j \geq 3$ ímpar). É claro que $(2^j)_1 < (2^j)_r$. Qualquer palavra $P((2^j)_r)$ só pode estar entre P_1 e P_2 se, pos

sui a parte comum P_1' de P_1 e P_2 , o que não é possível se $r \geq 2$.

Quanto à prova da parte (b), é suficiente mostrar que não existe órbita unimodal com palavra do tipo $P((2^j(k+2))_r)$ entre as órbitas cujas palavras são $P_1((2^j(k+2))_1)$ e $P_2((2^j.k)_1)$. Temos que

$$P_1 = R * j * R L R^{k-3} R R C = P_2' X_1 X_2 \dots X_{2j+1} C$$

e

$$P_2 = R * j * R L R^{k-3} C = P_2' C,$$

onde P_2' é P_2 sem C . Então P só poderá estar entre P_1 e P_2 se for do tipo $P_2' Y_1 Y_2 \dots Y_{2j+1} C$. É fácil ver que P_2 é ímpar se $j \geq 0$ é par e que P_2 é par se $j \geq 1$ é ímpar, pois conforme a observação feita após o teorema II.2.2, o $*$ -produto de R por uma palavra, inverte a sua R -paridade. Nestes casos temos que $Y_1 = X_1 = R$ e $Y_1 = X_1 = L$, respectivamente.

Como $P \neq P_1$, então para cada $j \geq 0$ inteiro, $2^{2^{j+1}-1}-1$ é o número (menos 1) de arranjos com repetição das letras L e R tomadas $2^{j+1}-1$ a $2^{j+1}-1$, e dá o número de sequências admissíveis P a serem consideradas na comparação com P_1 e P_2 .

Se $j = 0$, temos

$$P_1 = R L R^{k-3} R R C,$$

$$P = R L R^{k-3} R Y_2 C$$

e

$$P_2 = R L R^{k-3} C,$$

onde só é preciso analisar o caso $Y_2 = L$, no qual $P < P_1$. E terminamos este caso.

Se $j = 1$, temos

$$P_1 = RLR^2(RL)^{k-3}RLRLRC,$$

$$P = RLR^2(RL)^{k-3}RLY_2Y_3Y_4C$$

e

$$P_2 = RLR^2(RL)^{k-3}RC,$$

onde devemos considerar os casos $X_2X_3X_4 = LLL, LLR, LRL, RLL, LRR, RRL$ e RRR . Ora, se $X_2 = L$ então $P < P_1$ e daí só nos resta analisar os casos onde $X_2 = R$ que são RLL, RRL e RRR . Daí, se $X_3 = R$ também temos $P < P_1$, restando apenas o caso RLL . Agora temos $P_1 < P < P_2$, mas como $\psi^{2k}(P) = RLLC > P$, então P não é maximal e pelo teorema II.1.4 não é unimodal. Logo não existe órbita unimodal do tipo $P((2(k+2))_r)$ cuja palavra P satisfaz $P_1 < P < P_2$.

Se $j = 2$, então devemos comparar

$$P_1 = RLR^2(RL)^2(RLR^2)^{k-3}RLRLRLRLRRRLRLC,$$

$$P = RLR^2(RL)^2(RLR^2)^{k-3}RLRLRLY_2Y_3Y_4Y_5Y_6Y_7Y_8C$$

e

$$P_2 = RLR^2(RL)^2(RLR^2)^{k-3}RLRLC.$$

É necessário que $Y_2Y_3 = RL$ porque $P < P_1$ se $Y_2 = L$ e se $Y_2Y_3 = RR$. Se agora $Y_4 = L$, então $\psi^{4k}(P) = RLL...C > P$, embora $P_1 < P < P_2$. Já temos $Y_2Y_3Y_4 = RLRL$. Se $Y_5 = L$ então $P < P_1$ e não é o que buscamos. Logo $Y_5 = R$. Se $Y_6 = L$ temos $P_1 < P < P_2$ e devemos considerar os casos $Y_7Y_8 = LL, RL$ e RR , para decidir. Continuando, se $Y_7 = L$ então $\psi^{4k+3}(P) = RLLY_8C > P$ e se $Y_7Y_8 = RL$ temos $\psi^{4k+5}(P) = RLCL > P$. Também, se $Y_7Y_8 = RR$ então $\psi^{4k+3}(P) = RLRLRLC > P$. Agora já temos $Y_2Y_3Y_4Y_5Y_6 = RLRLRL$. Se $Y_7 = R$ temos $P_1 < P < P_2$, mas os casos $X_8 = R$ e $X_8 = L$ dão respectivamente $\psi^{4k}(P) = RLRLRLRLRLC > P$ e $\psi^{4k+5}(P) = RLCL > P$. Logo $X_7 = L$. Finalmente, se

$Y_8 = L$ então $P \prec P_1$. Mostramos que não existe órbita unimodal do tipo $P((2^2(k+2))_r)$ cuja palavra P seja tal que $P_1 \prec P \prec P_2$.

Queremos observar que mesmo no caso do teorema 3.(b) continuar valendo para $j \geq 3$, a prova por este processo é muito exaustiva.

Teorema 4. Se $k \geq 7$ é ímpar, então a órbita unimodal de período k_2 é representada pela palavra

$$P(k_2) = R L R^{k-5} L R C .$$

Prova. Já sabemos que $P(k_1) = R L R^{k-3} C$. Está claro que a segunda órbita unimodal de período k , $P(k_2)$, é a órbita de período k mais próxima de $P(k_1)$ tal que $P(k_1) \prec P(k_2)$. Precisamente, isto significa que para toda órbita $P(k_r) \neq P(k_1)$, temos $P(k_1) \prec P(k_2) \leq P(k_r)$. Por causa do comportamento dinâmico de uma família de funções unimodais a um parâmetro, e da dependência contínua destas funções com relação às condições iniciais, aquela maior proximidade significa que a primeira letra em $P(k_2)$ que difere da correspondente letra em $P(k_1)$, está o mais próximo possível de C . Isto é, as palavras $P(k_1)$ e $P(k_2)$ devem ter o máximo possível de letras (L ou R) coincidentes a partir do início.

Seja $P(k) = R L R^{k-4} L C$ uma sequência admissível. Como $P(k) \prec P(k_1)$, então $P(k)$ não é uma palavra, isto é, não representa uma órbita unimodal de período k . Seja a sequência admissível dada por $P(k) = R L R^{k-5} L X C$, onde $X \in \{L, R\}$. Se $X = L$, temos que $P(k_1) \prec P(k)$, mas como

$$\psi^{k-4}(P(k)) = R L L C \succ P(k) ,$$

$P(k)$ não é unimodal pelo teorema II.1.4. Se $X=R$ temos ainda $P(k_1) \triangleleft P(k)$, mas agora

$$\psi^{k-4}(P(k)) = R L R C \triangleleft P(k).$$

Portanto, encontramos a órbita procurada $P(k_2)$, cuja palavra é $P(k_2) = R L R^{k-5} L R C$.

Se $k=5$, então $P(5_2) = R L L R C$, pois as palavras das três órbitas unimodais de período 5 têm a ordenação

$$P(5_1) = R L R^2 C \triangleleft P(5_2) = R L^2 R C \triangleleft P(5_3) = R L^3 C.$$

2. UM TEOREMA QUE ESTENDE S (ANTES DO 3).

Usaremos especialmente o teorema III.2.6 (combinado com o teorema II.1.4), para obter uma extensão (antes do 3 no sentido da $\triangleleft$ -ordenação) da sequência original de Sarkovskii S .

Cada elemento (período) $n \in S$ deve ser entendido como n_1 , conforme ficou estabelecido no capítulo II e no teorema IV.1.3.

A nossa extensão de S consistirá em intercalar $n_r \notin S$ entre (no sentido de $\triangleleft$) dois períodos adjacentes quaisquer (exceto em $1 \triangleleft 2 \triangleleft 4_1 \triangleleft 8_1 \triangleleft \dots$) $m_1, n_1 \in S$ tais que $m_1 \triangleleft n_1$. Então ficará $m_1 \triangleleft n_r \triangleleft n_1$. Da mesma forma, intercalaremos períodos n_r entre n_r e n_1 , n_r'' entre n_r e n_1 , etc., e em seguida intercalaremos outros períodos entre n_r e n_r , entre n_r e n_r'' , etc..

Vamos começar a extensão intercalando períodos $n_r \notin S$

entre 5_1 e 3_1 , mantendo a ordem $\triangleleft$ acima. Temos que

$$P(5_1) = R L R^2 C$$

e

$$P(3_1) = R L C.$$

Comparando

$$H(P(5_1)) = R L R^2 L R \underline{L} R^2 C$$

com

$$A^2(P(3_1)) = R L R^2 L R \underline{R} L R^2 L R C ,$$

obtemos a sequência finita comum de maior comprimento

$$P^* = R L R^2 L R ,$$

que compõe a palavra

$$P(7) = R L R^2 L R C$$

tal que

$$H(P(5_1)) \triangleleft P(7) \triangleleft A^2(P(3_1)).$$

Como

$$P(5_1) \triangleleft H(P(5_1)) \text{ e } A^2(P(3_1)) \triangleleft P(3_1) ,$$

então pelo teorema III.2.6 temos que

$$P(5_1) \triangleleft P(7) \triangleleft P(3_1).$$

Assim, obtivemos a palavra $P(7)$ que representa uma órbita de período $7_r (r > 1)$ tal que $5_1 \triangleleft 7_r \triangleleft 3_1$.

Em seguida, vamos $\triangleleft$ -intercalar um período entre 7_r e 3_1 , que não está em S , comparando

$$H(P(7_r)) = R L R^2 L R^2 \underline{R} L R^2 L R C$$

com

$$A^2(P(3_1)) = R L R^2 L R^2 \underline{L} R^2 L R C.$$

Obtemos então a palavra $P(8) = R L R^2 L R^2 C$ tal que

$$H(P(7_r)) \triangleleft P(8) \triangleleft A^2(P(3_1)) ,$$

representando uma órbita de período $8_{r'}$ ($r' > 1$) que satisfaz $7_r \triangleleft 8_{r'} \triangleleft 3_1$, ou seja, uma órbita de período 8 tal que $7 \triangleleft 8 \triangleleft 3$.

Continuando desta forma, podemos obter as $\triangleleft$ -intercalações das palavras

$$P(10) = RLR^2LR^2LRC = R(LR^2)^2LRC \quad \text{entre } P(8) \text{ e } P(3),$$

$$P(11) = RLR^2LR^2LR^2C = R(LR^2)^3C \quad \text{entre } P(10) \text{ e } P(3),$$

$$P(13) = RLR^2LR^2LR^2LRC = R(LR^2)^3LRC \quad \text{entre } P(11) \text{ e } P(3),$$

$$P(14) = R(LR^2)^4C \quad \text{entre } P(13) \text{ e } P(3),$$

$$P(16) = R(LR^2)^4LRC \quad \text{entre } P(14) \text{ e } P(3),$$

etc. Observemos que se $X_i \in \{L, R\}$, então

$(X_1 X_2 \dots X_n)^r$ significa $X_1 X_2 \dots X_n X_1 X_2 \dots X_n \dots X_1 X_2 \dots X_n$
 (r fatores $X_1 X_2 \dots X_n$) e nunca $X_1^r X_2^r \dots X_n^r$.

As palavras acima representam, respectivamente, órbitas unimodais de períodos 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, Temos portanto a sequência <-ordenada de períodos

$$5_1 < 7 < 8 < 10 < 11 < 13 < 14 < 16 < \dots < 3_1,$$

correspondente à sequência de palavras

$$P(5_1) < P(7) < P(8) < P(10) < P(11) < P(13) < \dots < P(3_1).$$

Claramente, podemos observar a regularidade dos pares

$$(7 + 3s < 8 + 3s)$$

onde $s \in \mathbb{N}$, na sequência

$$(7 < 8) < (10 < 11) < (13 < 14) < (16 < 17) < \dots$$

Prosseguindo com a extensão, vamos agora intercalar períodos $n \notin S$ entre 7 e 8. Sempre usando o método fornecido pelo teorema III.2.6, obtemos sucessivamente

$$7 < 9 < 8; \quad P(9) = RLR^2LR^3C,$$

$$7 < 9 < 10 < 8; \quad P(10) = RLR^2LR^4C,$$

$$7 < 9 < 11 < 10 < 8; \quad P(11) = RLR^2LR^5C,$$

$$7 \triangleleft 9 \triangleleft 11 \triangleleft 12 \triangleleft 10 \triangleleft 8 ; \quad P(12) = R L R^2 L R^6 C,$$

⋮

$$7 \triangleleft 9 \triangleleft 11 \triangleleft \dots \triangleleft 7+2(i-1) \triangleleft \dots \triangleleft 8+2(i-1) \triangleleft \dots \triangleleft 12 \triangleleft 10 \triangleleft 8 ;$$

onde $i \in \mathbb{N}^*$,

$$P(7+2(i-1)) = R L R^2 L R^{2i-1} C,$$

e

$$P(8+2(i-1)) = R L R^2 L R^{2i} C = R(L R^2)^2 R^{2(i-1)} C.$$

Convencionemos que quando ocorrer a expressão R^0 , esta deverá ser ignorada.

Analogamente, entre $10, 11 \notin S$, podemos também intercalar períodos $n \notin S$ segundo a sequência

$$10 \triangleleft 12 \triangleleft 14 \triangleleft \dots \triangleleft 10+2(i-1) \triangleleft \dots \triangleleft 11+2(i-1) \triangleleft \dots \triangleleft 15 \triangleleft 13 \triangleleft 11,$$

onde

$$P(10+2(i-1)) = R(L R^2)^2 L R^{2i-1} C$$

e

$$P(11+2(i-1)) = R(L R^2)^3 R^{2(i-1)} C.$$

E assim por diante, podemos $\triangleleft$ -intercalar entre $5_1, 3_1 \in S$, a sequência genérica $E_{3,k}$ dada por

$$3k-2 \triangleleft 3k \triangleleft 3k+2 \triangleleft \dots \triangleleft 3k+2(i-2) \triangleleft \dots$$

$$\dots \triangleleft 3k+2i-3 \triangleleft \dots \triangleleft 3k+3 \triangleleft 3k+1 \triangleleft 3k-1,$$

onde $k \geq 3$ é inteiro, na qual

$$P(3k+2(i-2)) = R(L R^2)^{k-2} L R^{2i-1} C$$

e

$$P(3k+2i-3) = R(L R^2)^{k-1} R^{2(i-1)} C.$$

É notável o aspecto da sequência $E_{3,k}$ onde os períodos da forma $3k+2(i-2)$ (na metade esquerda) crescem quando i

cresce, enquanto os períodos da forma $3k + 2i - 3$ (na metade direita) decrescem quando i decresce. Assim, podemos representá-la mais comodamente sob a forma

$$E_{3,k} = (3k + 2(i - 2))_{i=1}^{\infty} \triangleleft (3k + 2i - 3)_{i=\infty}^1,$$

onde temos para $i' = i + 1$,

$$3k + 2(i - 2) \triangleleft 3k + 2(i' - 2) \quad \text{e} \quad 3k + 2i' - 3 \triangleleft 3k + 2i - 3.$$

Além disso, temos que $E_{3,k} \triangleleft E_{3,k+1}$. Todas estas afirmações serão provadas no teorema 1 desta seção. Explicitamente, as sequências

$$E_{3,3} = 7 \triangleleft 9 \triangleleft 11 \triangleleft \dots \triangleleft 12 \triangleleft 10 \triangleleft 8,$$

$$E_{3,4} = 10 \triangleleft 12 \triangleleft 14 \triangleleft \dots \triangleleft 15 \triangleleft 13 \triangleleft 11,$$

$$E_{3,5} = 13 \triangleleft 15 \triangleleft 17 \triangleleft \dots \triangleleft 18 \triangleleft 16 \triangleleft 14,$$

$$E_{3,6} = 16 \triangleleft 18 \triangleleft 20 \triangleleft \dots \triangleleft 21 \triangleleft 19 \triangleleft 17,$$

⋮

estão ordenadas do modo

$$5_1 \triangleleft E_{3,3} \triangleleft E_{3,4} \triangleleft E_{3,5} \triangleleft E_{3,6} \triangleleft \dots \triangleleft E_{3,k} \triangleleft \dots \triangleleft 3_1,$$

e descrevem uma extensão de S entre $5_1 \triangleleft 3_1$.

Com um procedimento semelhante, podemos intercalar entre 7_1 , $5_1 \in S$ a sequência genérica $E_{5,k}$ dada por

$$5k - 6 \triangleleft 5k - 4 \triangleleft 5k - 2 \triangleleft \dots \triangleleft 5k + 2(i - 4) \triangleleft \dots$$

$$\dots \triangleleft 5k + 2i - 5 \triangleleft \dots \triangleleft 5k + 1 \triangleleft 5k - 1 \triangleleft 5k - 3,$$

ou por

$$E_{5,k} = (5k + 2(i - 4))_{i=1}^{\infty} \triangleleft (5k + 2i - 5)_{i=\infty}^1$$

na qual temos $E_{5,k} \triangleleft E_{5,k+1}$ e, para $i' = i + 1$,

$$5k + 2(i - 4) \triangleleft 5k + 2(i' - 4) \quad \text{e} \quad 5k + 2i' - 5 \triangleleft 5k + 2i - 5.$$

As palavras referentes aos períodos em $E_{5,k}$ são

$$P(5k + 2(i - 4)) = R(LR^4)^{k-2} LR^{2i-1} C$$

e

$$P(5k + 2i - 5) = R(LR^4)^{k-1} R^{2(i-1)} C.$$

Agora, temos uma extensão de S entre 7_1 e 5_1 dada por

$$7_1 \triangleleft E_{5,3} \triangleleft E_{5,4} \triangleleft E_{5,5} \triangleleft \dots \triangleleft E_{5,k} \triangleleft \dots \triangleleft 5_1,$$

onde

$$E_{5,3} = 9 \triangleleft 11 \triangleleft 13 \triangleleft \dots \triangleleft 16 \triangleleft 14 \triangleleft 12,$$

$$E_{5,4} = 14 \triangleleft 16 \triangleleft 18 \triangleleft \dots \triangleleft 21 \triangleleft 19 \triangleleft 17,$$

$$E_{5,5} = 19 \triangleleft 21 \triangleleft 23 \triangleleft \dots \triangleleft 26 \triangleleft 24 \triangleleft 22,$$

$\vdots$

Para percebermos melhor o processo indutivo desta extensão de S , vamos repetir o método mais uma vez para intercalar a sequência de períodos

$$E_{7,k} = (7k + 2(i-6))_{i=1}^{\infty} \triangleleft (7k + 2i - 7)_{i=\infty}^1,$$

cujas forma explícita é (para $k \geq 3$)

$$7k - 10 \triangleleft 7k - 8 \triangleleft \dots \triangleleft 7k + 2(i - 6) \triangleleft \dots$$

$$\dots \triangleleft 7k + 2i - 7 \triangleleft \dots \triangleleft 7k - 3 \triangleleft 7k - 5,$$

entre 9_1 , $7_1 \in S$. Assim também temos que $E_{7,k} \triangleleft E_{7,k+1}$ e, para $i' = i + 1$,

$$7k + 2(i - 6) \triangleleft 7k + 2(i' - 6) \quad \text{e} \quad 7k + 2i' - 7 \triangleleft 7k + 2i - 7$$

As sequências $E_{7,k}$ são

$$E_{7,3} = 11 \triangleleft 13 \triangleleft 15 \triangleleft \dots \triangleleft 20 \triangleleft 18 \triangleleft 16 ,$$

$$E_{7,4} = 18 \triangleleft 20 \triangleleft 22 \triangleleft \dots \triangleleft 27 \triangleleft 25 \triangleleft 23 ,$$

$$E_{7,5} = 25 \triangleleft 27 \triangleleft 29 \triangleleft \dots \triangleleft 34 \triangleleft 32 \triangleleft 30 ,$$

$\vdots$

Portanto, em geral, podemos intercalar entre os períodos $(2\ell + 3)_1, (2\ell + 1)_1 \in S$ da subsequência de S formada pelos períodos ímpares n_1 onde $n = 2\ell + 1$ e $\ell \in \mathbb{N}^*$,

$$\dots \triangleleft (2\ell + 3)_1 \triangleleft (2\ell + 1)_1 \triangleleft \dots \triangleleft 9_1 \triangleleft 7_1 \triangleleft 5_1 \triangleleft 3_1 ,$$

a sequência genérica

$$(2\ell + 1)k - 2(2\ell - 1) \triangleleft (2\ell + 1)k - 2(2\ell - 2) \triangleleft \dots \triangleleft (2\ell + 1)k - 2(2\ell - i) \triangleleft \dots$$

$$\dots \triangleleft (2\ell + 1)k + 2i - (2\ell + 1) \triangleleft \dots \triangleleft (2\ell + 1)k - (2\ell - 3) \triangleleft (2\ell + 1)k - (2\ell - 1),$$

ou

$$\begin{aligned} E_{2\ell+1,k} &= \left[(2\ell + 1)k - 2(2\ell - 1) \right]_{i=1}^{\infty} \triangleleft \left[(2\ell + 1)k + 2i - (2\ell + 1) \right]_{i=\infty}^1 \\ &= \left[2\ell(k - 2) + k + 2i \right]_{i=1}^{\infty} \triangleleft \left[2\ell(k - 1) + k + 2i - 1 \right]_{i=\infty}^1 , \end{aligned}$$

cujas palavras são

$$P(2\ell(k - 2) + k + 2i) = R(LR^{2\ell})^{k-2} LR^{2i-1} C .$$

e

$$P(2\ell(k - 1) + k + 2i - 1) = R(LR^{2\ell})^{k-1} R^{2(i-1)} C .$$

As sequências $E_{2\ell+1,k}$ são tais que

$$E_{2\ell+1,k} \triangleleft E_{2\ell+1,k+1} ,$$

e em cada uma delas (onde $2\ell + 1$ é fixo) temos

$$2\ell(k - 2) + k + 2i \triangleleft 2\ell(k - 2) + k + 2i' ,$$

e

$$2\ell(k-1) + k + 2i - 1 < 2\ell(k-1) + k + 2i .$$

Escrevendo-as, uma por uma, fica

$$E_{2\ell+1,3} = 2\ell+5 < 2\ell+7 < 2\ell+9 < \dots < 4\ell+8 < 4\ell+6 < 4\ell+4 ,$$

$$E_{2\ell+1,4} = 4\ell+6 < 4\ell+8 < 4\ell+10 < \dots < 6\ell+9 < 6\ell+7 < 6\ell+5 ,$$

$$E_{2\ell+1,5} = 6\ell+7 < 6\ell+9 < 6\ell+11 < \dots < 8\ell+10 < 8\ell+8 < 8\ell+6 ,$$

$$\vdots$$

Está completa a extensão que pretendíamos fazer na subseqüência de S formada pelos períodos ímpares n_1 tais que $n = 2^0(2\ell+1) \geq 3$.

Fazendo o mesmo com relação à subsequência dos $n_1 \in S$ tais que $n = 2^1(2\ell+1)$, $\ell \in \mathbb{N}^*$, ou seja, em

$$\dots < (2^1(2\ell+3))_1 < (2^1(2\ell+1))_1 < \dots < (2^1 7)_1 < (2^1 5)_1 < (2^1 3)_1 ,$$

obtemos a seqüência genérica

$$2^1(2\ell+1)k - 2^2(2\ell-1) < 2^1(2\ell+1)k - 2^2(2\ell-2) < \dots < 2^1(2\ell+1)k - 2^2(2\ell-i) < \dots$$

$$\dots < 2^1(2\ell+1)k + 2^1 - 2^1(2\ell+1) < \dots < 2^1(2\ell+1)k - 2^1(2\ell+3) < 2^1(2\ell+1)k - 2^1(2\ell-1),$$

ou

$$E_{2^1(2\ell+1),k} = 2^1[2\ell(k-2) + k + 2i]_{i=1}^{\infty} < 2^1[2\ell(k-1) + k + 2i - 1]_{i=\infty}^1$$

entre $(2^1(2\ell+3))_1$, $(2^1(2\ell+1))_1 \in S$,

cujas palavras são

$$P(2^1(2\ell(k-2) + k + 2i)) = A_0 A_1 (A_2 A_1^{2\ell-1})^{k-2} A_2 A_1^{2(i-1)} C$$

e

$$P(2^1(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)) = A_0 A_1 (A_2 A_1^{2\ell-1})^{k-1} A_1^{2(i-1)} C ,$$

onde

$$A_0 = R, \quad A_1 = LR \quad e \quad A_2 = R^2LR = A_0^2 A_1 .$$

Convencionemos que A_1^0 deve ser ignorado.

Para as seqüências $E_{2^1(2\ell+1),k}$ ($2^1(2\ell+1)$ é fixo)

$$E_{2^1(2\ell+1),3} = 2^1(2\ell+5) \triangleleft 2^1(2\ell+7) \triangleleft \dots \triangleleft 2^1(4\ell+6) \triangleleft 2^1(4\ell+4) ,$$

$$E_{2^1(2\ell+1),4} = 2^1(4\ell+6) \triangleleft 2^1(4\ell+8) \triangleleft \dots \triangleleft 2^1(6\ell+7) \triangleleft 2^1(6\ell+5) ,$$

$$E_{2^1(2\ell+1),5} = 2^1(6\ell+7) \triangleleft 2^1(6\ell+9) \triangleleft \dots \triangleleft 2^1(8\ell+8) \triangleleft 2^1(8\ell+6) ,$$

$\vdots$

valem as relações

$$E_{2^1(2\ell+1),k} \triangleleft E_{2^1(2\ell+1),k+1},$$

$$2^1(2\ell(k-2) + k + 2i) \triangleleft 2^1(2\ell(k-2) + k + 2i')$$

e

$$2^1(2\ell(k-1) + k + 2i' - 1) \triangleleft 2^1(2\ell(k-1) + k + 2i - 1) .$$

Analogamente, podemos intercalar entre os períodos

$$(2^2(2\ell+3))_1 \text{ e } (2^2(2\ell+1))_1$$

da subsequência de S formada pelos períodos n_1 tais que $n = 2^2(2\ell+1)$, a seqüência arbitrária

$$2^2(2\ell+1)k - 2^3(2\ell-1) \triangleleft 2^2(2\ell+1)k - 2^3(2\ell-2) \triangleleft \dots \triangleleft 2^2(2\ell+1)k - 2^3(2\ell-i) \triangleleft \dots$$

$$\dots \triangleleft 2^2(2\ell+1)k + 2^3i - 2^2(2\ell+1) \triangleleft \dots \triangleleft 2^2(2\ell+1)k - 2^2(2\ell-3) \triangleleft 2^2(2\ell+1)k - 2^2(2\ell-1)$$

ou

$$E_{2^2(2\ell+1),k} = 2^2[2\ell(k-2) + k + 2i]_{i=1}^{\infty} \triangleleft 2^2[2\ell(k-1) + k + 2i - 1]_{i=\infty}^1 ,$$

tal que

$$E_{2^2(2\ell+1),k} \triangleleft E_{2^2(2\ell+1),k+1}$$

e cujas palavras de seus períodos são.

$$P(2^2(2\ell(k-2) + k + 2i)) = A_0 A_1 A_2 (A_3 A_2^{2\ell-1})^{k-2} A_3 A_2^{2(i-1)} C$$

$$P(2^2(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)) = A_0 A_1 A_2 (A_3 A_2^{2\ell-1})^{k-1} A_2^{2(i-1)} C$$

onde $A_0 = R$, $A_1 = LR$, $A_2 = A_0^2 A_1$ e $A_3 = A_1^2 A_2$.

Estas sequências $E_{2^2(2\ell+1),k}$, que estendem a subsequência dos períodos $n_1 = (2^2(2\ell+1))_1 \in S$,

$$\dots \triangleleft (2^2(2\ell+3))_1 \triangleleft (2^2(2\ell+1))_1 \triangleleft \dots \triangleleft (2^2 \cdot 7)_1 \triangleleft (2^2 \cdot 5)_1 \triangleleft (2^2 \cdot 3)_1,$$

são

$$E_{2^2(2\ell+1),3} = 2^2(2\ell+5) \triangleleft 2^2(2\ell+7) \triangleleft \dots \triangleleft 2^2(4\ell+6) \triangleleft 2^2(4\ell+4),$$

$$E_{2^2(2\ell+1),4} = 2^2(4\ell+6) \triangleleft 2^2(4\ell+8) \triangleleft \dots \triangleleft 2^2(6\ell+7) \triangleleft 2^2(6\ell+5),$$

⋮

e satisfazem

$$2^2(2\ell(k-2) + k + 2i) \triangleleft 2^2(2\ell(k-2) + k + 2i')$$

e

$$2^2(2\ell(k-1) + k + 2i' - 1) \triangleleft 2^2(2\ell(k-1) + k + 2i - 1).$$

Generalizando, podemos intercalar a sequência genérica

$$E_{2^j(2\ell+1),k} = 2^j [2\ell(k-2) + k + 2i]_{i=1}^{\infty} \triangleleft 2^j [2\ell(k-1) + k + 2i - 1]_{i=\infty}^1$$

dada por

$$2^j(2\ell+1)k - 2^{j+1}(2\ell-1) \triangleleft 2^j(2\ell+1)k - 2^{j+1}(2\ell-2) \triangleleft \dots$$

$$\triangleleft 2^j(2\ell+1)k - 2^{j+1}(2\ell-1) \triangleleft \dots$$

$$\dots \triangleleft 2^j(2\ell+1)k - 2^j(2\ell-(2i-1)) \triangleleft \dots \triangleleft 2^j(2\ell+1)k - 2^j(2\ell-3) \triangleleft 2^j(2\ell+1)k - 2^j(2\ell-1),$$

entre os períodos $(2^j(2\ell+3))_1$ e $(2^j(2\ell+1))_1$ da subsequência de S formada pelos períodos n_1 tais que $n = 2^j(2\ell+1)$, $j \in \mathbb{N}^*$. Esta subsequência de S é

$$\dots \triangleleft (2^j(2\ell+3))_1 \triangleleft (2^j(2\ell+1))_1 \triangleleft \dots \triangleleft (2^j \cdot 7)_1 \triangleleft (2^j \cdot 5)_1 \triangleleft (2^j \cdot 3)_1,$$

As palavras correspondentes aos períodos de $E_{2^j(2\ell+1),k}$ são

$$P(2^j(2\ell(k-2) + k + 2i)) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} C$$

e

$$P(2^j(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2(i-1)} C,$$

onde $A_0 = R$, $A_1 = LR$ e $A_{j+1} = A_{j-1}^2 A_j$, com a convenção de que A_j^0 deve ser ignorado. Temos ainda que

$$E_{2^j(2\ell+1), k} \triangleleft E_{2^j(2\ell+1), k+1},$$

$$2^j(2\ell(k-2) + k + 2i) \triangleleft 2^j(2\ell(k-2) + k + 2i'),$$

$$2^j(2\ell(k-1) + k + 2i' - 1) \triangleleft 2^j(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)$$

e as seqüências $E_{2^j(2\ell+1), k}$ são

$$E_{2^j(2\ell+1), 3} = 2^j(2\ell+5) \triangleleft 2^j(2\ell+7) \triangleleft \dots \triangleleft 2^j(4\ell+6) \triangleleft 2^j(4\ell+4),$$

$$E_{2^j(2\ell+1), 4} = 2^j(4\ell+6) \triangleleft 2^j(4\ell+8) \triangleleft \dots \triangleleft 2^j(6\ell+7) \triangleleft 2^j(6\ell+5),$$

⋮

É fácil ver que esta generalização ainda vale quando $j=0$, isto é, o caso dos períodos ímpares $n = 2^0(2\ell+1)$ enquadra-se neste caso geral. De fato, temos que

$$P(2^0(2\ell(k-2) + k + 2i)) = A_0 (A_1 A_0^{2\ell-1})^{k-2} A_1 A_0^{2(i-1)} C =$$

$$= R(LR R^{2\ell-1})^{k-2} L R R^{2(i-1)} C$$

$$= R(LR^{2\ell})^{k-2} L R^{2i-1} C$$

e

$$P(2^0(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)) = A_0 (A_1 A_0^{2\ell-1})^{k-1} A_0^{2(i-1)} C$$

$$= R(LR^{2\ell})^{k-1} R^{2(i-1)} C,$$

são as palavras relativas aos períodos de

$$E_{2^0(2\ell+1),k} = 2^0 \left[(2\ell(k-2) + k + 2i) \right]_{i=1}^{\infty} < 2^0 \left[(2\ell(k-1) + k + 2i - 1) \right]_{i=\infty}^1.$$

Portanto, em resumo, a nossa extensão de S antes do 3 fica assim: entre dois períodos (não incluídos os harmônicos 2^j) quaisquer $2^j(2\ell + 3) < 2^j(2\ell + 1)$ de S , onde $j \in \mathbb{N}$ e $\ell \in \mathbb{N}^*$, intercalamos sucessivamente infinitas sequências do tipo cresce-decresce (em relação ao tamanho dos períodos)

$$\{1\} E_{2^j(2\ell+1),k} = 2^j \left[2\ell(k-2) + k + 2i \right]_{i=1}^{\infty} < 2^j \left[2\ell(k-1) + k + 2i - 1 \right]_{i=\infty}^1$$

onde $k = 3, 4, 5, \dots$ e $i \in \mathbb{N}^*$,

cujas palavras são

$$\{2\} P(2^j(2\ell(k-2) + k + 2i)) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} C$$

e

$$\{3\} P(2^j(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2(i-1)} C,$$

com a convenção de que devemos ignorar a expressão A_j^0 .

Para simplificar as notações adotadas nas expressões {1}, {2} e {3} acima, vamos representá-las, respectivamente, por

$$\{1\}' E_{j,\ell,k} = (E_{j,\ell,k,i}^e)_{i=1}^{\infty} < (E_{j,\ell,k,i}^d)_{i=\infty}^1,$$

$$\{2\}' P(E_{j,\ell,k,i}^e) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} C,$$

e

$$\{3\}' P(E_{j,\ell,k,i}^d) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2(i-1)} C,$$

onde o e significa esquerda e o d direita. Explicitamente,

cada $E_{j,\ell,k}$ (ou $E_{j,\ell,k,i}$) tem a forma ,

$$E_{j,\ell,k,1}^e \prec E_{j,\ell,k,2}^e \prec \dots \prec E_{j,k,\ell,2}^d \prec E_{j,\ell,k,1}^d .$$

A nossa extensão de S antes do 3 pode agora ser representada pela matriz infinita

$$E_S = (E_{j,\ell,k}) ,$$

cujos índices $j \geq 0$, $\ell \geq 1$, $k \geq 3$ e $i \geq 1$ (implícito) estão ordenados lexicograficamente. Assim, temos

$$E_S = \begin{bmatrix} \begin{matrix} 5_1 \prec \\ 7_1 \prec \end{matrix} \begin{bmatrix} E_{0,1,3} \prec E_{0,1,4} \prec \dots \prec E_{0,1,k} \prec \dots \\ E_{0,2,3} \prec E_{0,2,4} \prec \dots \prec E_{0,2,k} \prec \dots \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} \prec 3_1 \\ \prec 5_1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 10_1 \prec \\ 14_1 \prec \end{matrix} \begin{bmatrix} E_{1,1,3} \prec E_{1,1,4} \prec \dots \prec E_{1,1,k} \prec \dots \\ E_{1,2,3} \prec E_{1,2,4} \prec \dots \prec E_{1,2,k} \prec \dots \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} \prec 6_1 \\ \prec 10_1 \end{matrix} \\ \dots \\ \begin{matrix} 20_1 \prec \\ 28_1 \prec \end{matrix} \begin{bmatrix} E_{2,1,3} \prec E_{2,1,4} \prec \dots \prec E_{2,1,k} \prec \dots \\ E_{2,2,3} \prec E_{2,2,4} \prec \dots \prec E_{2,2,k} \prec \dots \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} \prec 12_1 \\ \prec 20_1 \end{matrix} \\ \dots \\ \begin{matrix} (2^j.5)_1 \prec \\ (2^j.7)_1 \prec \end{matrix} \begin{bmatrix} E_{j,1,3} \prec E_{j,1,4} \prec \dots \prec E_{j,1,k} \prec \dots \\ E_{j,2,3} \prec E_{j,2,4} \prec \dots \prec E_{j,2,k} \prec \dots \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} \prec (2^j.3)_1 \\ \prec (2^j.5)_1 \end{matrix} \\ \dots \\ (2^j(2\ell+3))_1 \prec \begin{bmatrix} E_{j,\ell,3} \prec E_{j,\ell,4} \prec \dots \prec E_{j,\ell,k} \prec \dots \\ \vdots \end{bmatrix} \prec (2^j(2\ell+1))_1 \end{bmatrix}$$

Precisamos de um mecanismo para determinar a R-paridade das palavras $\{2\}'$ e $\{3\}'$. Mas isto é fácil. De fato, como os A_j 's

$$A_0 = R, \quad A_1 = LR, \quad A_2 = R^2(LR) = A_0^2 A_1, \quad \dots, \quad A_{j+1} = A_{j-1}^2 A_j$$

são todos ímpares, então basta notar que a expressão $A_0 A_1 \dots A_j$

é par se $j \geq 1$ é ímpar e é ímpar se $j \geq 0$ é par. Isto porque é óbvia a R-paridade das expressões restantes em ambas as palavras. Além disso, notamos que A_j começa com R se j é par e começa com L se j é ímpar.

Agora vamos escrever as palavras de $2^j(2\ell + 3)_1$, $2^j(2\ell + 1)_1 \in S$ em função dos A_j 's para obtermos maior comodidade na demonstração do teorema 1. Ora, já temos que

$$P((2^j(2\ell + 1))_1) = R^*j * R L R^{2(\ell-1)} C.$$

Neste caso, P é par se j é ímpar e é ímpar se j é par. Se $j = 0$, então

$$P((2\ell + 1)_1) = R L R^{2(\ell-1)} C = R(L R)^{2\ell-3} C = A_0 A_1 A_0^{2\ell-3} C.$$

Se $j = 1$, temos

$$\begin{aligned} P((2^1(2\ell + 1))_1) &= R L R R (R L)^{2(\ell-1)} R C = R(L R) (R^2 L R) (L R)^{2\ell-3} C \\ &= A_0 A_1 A_2 A_1^{2\ell-3} C. \end{aligned}$$

E em geral, podemos obter por indução

$$\{4\} \quad P((2^j(2\ell + 1))_1) = A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-3} C,$$

$$\text{e daí, } \{5\} \quad P((2^j(2\ell + 3))_1) = A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-1} C.$$

Finalmente, podemos estabelecer o seguinte teorema, que garante a extensão E_S de S .

Teorema 1. Sejam os períodos $(2^j(2\ell + 3))_1$, $(2^j(2\ell + 1))_1 \in S$, representados pelas palavras $\{5\}$ e $\{4\}$ respectivamente. Então, entre eles podemos intercalar períodos de E_S numa ordenação dada por :

$$(1) \quad (2^j(2\ell + 3))_1 \prec E_{j,\ell,3,1}^e;$$

- (2) $E_{j,\ell,k,i}^e < E_{j,\ell,k,i+1}^e$;
 (3) $E_{j,\ell,k,i \rightarrow \infty}^e < E_{j,\ell,k,i \rightarrow \infty}^d$;
 (4) $E_{j,\ell,k,i+1}^d < E_{j,\ell,k,i}^d$;
 (5) $E_{j,\ell,k,1}^d < E_{j,\ell,k+1,1}^e$;
 (6) $E_{j,\ell,k \rightarrow \infty,1}^d < (2^j(2\ell + 1))_1$

Prova.

(1) Devemos comparar

$$P((2^j(2\ell + 3))_1) = A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-1} C$$

com

$$P(E_{j,\ell,3,1}^e) = A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-1} A_{j+1} C.$$

Se $j \geq 0$ for par, $j+1$ será ímpar e então

$$P'((2^j(2\ell + 3))_1) = A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-1}$$

será ímpar e $A_{j+1} = L \dots$. Neste caso, teremos $C > L$ na $2^j(2\ell + 3)$ -ésima posição. Daí, $(2^j(2\ell + 3))_1 < E_{j,\ell,3,1}^e$. Por outro lado, se $j \geq 1$ for ímpar, $j+1 \geq 2$ será par e então $P'((2^j(2\ell + 3))_1)$ será par e $A_{j+1} = R \dots$. Na $2^j(2\ell + 3)$ -ésima posição teremos $C < R$, donde $(2^j(2\ell + 3))_1 < E_{j,\ell,3,1}^e$.

(2) Agora a comparação é entre as palavras

$$P(E_{j,\ell,k,i}^e) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} C$$

e

$$\begin{aligned} P(E_{j,\ell,k,i+1}^e) &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2i} C = \\ &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} A_j^2 C. \end{aligned}$$

Ora, $(A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2}$ é sempre par para todo terno (j, ℓ, k) admissível. Se j for par então $P'(E_{j, \ell, k, i}^e)$ será par e $A_j = R \dots$. Logo teremos $C < R$ na $2^j(2\ell(k-2) + k + 2i)$ -posição. Por outro lado, se j for ímpar, $P'(E_{j, \ell, k, i}^e)$ será ímpar e $A_j = L \dots$. Daí teremos $C > L$ na $2^j(2\ell(k-2) + k + 2i)$ -ésima posição. Em qualquer dos casos concluímos que (2) é uma asserção verdadeira.

(3) Temos

$$P(E_{j, \ell, k, i}^e) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} C$$

e

$$\begin{aligned} P(E_{j, \ell, k, i}^d) &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2(i-1)} C = \\ &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} A_{j+1} A_j^{2(i-1)} A_j^{2\ell-1} C. \end{aligned}$$

Como $A_j^{2(i-1)}$ é sempre par quando $i \rightarrow \infty$ (isto é, quando i é arbitrariamente grande), segue pelas mesmas argumentações da parte (2), que $E_{j, \ell, k, i \rightarrow \infty}^e < E_{j, \ell, k, i \rightarrow \infty}^d$.

(4) Vamos comparar

$$\begin{aligned} P(E_{j, \ell, k, i+1}^d) &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2i} C \\ &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2(i-1)} A_j^2 C \end{aligned}$$

com

$$P(E_{j, \ell, k, i}^d) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_j^{2(i-1)} C.$$

Quando j é par temos que $P'(E_{j, \ell, k, i}^d)$ é ímpar, $A_j = R \dots$ e $R > C$ na posição $2^j(2\ell(k-1) + k + 2i - 1)$ -ésima. Se j é ímpar temos que $P'(E_{j, \ell, k, i}^d)$ é par, $A_j = L \dots$ e $L < C$ na mesma posição acima.

Em qualquer dos casos,

$$E_{j,\ell,k,i+1}^d < E_{j,\ell,k,i}^d.$$

(5) Temos

$$P(E_{j,\ell,k,1}^d) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} C$$

e

$$P(E_{j,\ell,k+1,1}^e) = A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} A_{j+1} C.$$

Se j é par, então $P'(E_{j,\ell,k,1}^d)$ é ímpar e temos $C > L$ na $2^j(2\ell(k-1) + k + 1)$ -ésima posição. Por outro lado, se j é ímpar, temos que $P'(E_{j,\ell,k,1}^d)$ é par e $C < R$ na mesma posição. Em ambos os casos,

$$E_{j,\ell,k,1}^d < E_{j,\ell,k+1,1}^e.$$

(6) Comparando

$$\begin{aligned} P(E_{j,\ell,k,1}^d) &= A_0 A_1 \dots A_j (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-1} C = \\ &= A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-3} A_j^2 (A_{j+1} A_j^{2\ell-1})^{k-2} C \end{aligned}$$

com

$$P((2^j(2\ell+1))_1) = A_0 A_1 \dots A_j A_{j+1} A_j^{2\ell-3} C,$$

obtemos $R > C$ na $2^j(2\ell+1)$ -ésima posição se j é par e $L < C$ na mesma posição se j é ímpar. Como $P'((2^j(2\ell+1))_1)$ é ímpar quando j é par e é par quando j é ímpar, então em qualquer dos casos temos que

$$P(E_{j,\ell,k,1}^d) < P((2^j(2\ell+1))_1).$$

Mas como este resultado permanece quando $k \rightarrow \infty$, então é verdade que

$$E_{j,\ell,k \rightarrow \infty,1}^d < (2^j(2\ell+1))_1.$$

CAPÍTULO V

EXTENSÃO DA SEQUÊNCIA DE ŠARKOVSKII (APÓS 3)

1. ALGUNS RESULTADOS PRELIMINARES.

Em [6], Carvalho obteve uma extensão da sequência de Šarkovskii

$$S = (1_1 \prec 2_1 \prec 4_1 \prec \dots \prec 20_1 \prec 12_1 \prec \dots \prec 10_1 \prec 6_1 \prec \dots \prec 7_1 \prec 5_1 \prec 3_1),$$

à qual acrescentou após 3_1 e em $\prec$ -ordenação, os períodos $n_{F(n)}$ tais que $n \geq 4$. Adotando como modelo a equação logística

$$f_a(x) = ax(1-x), \quad 0 \leq a \leq 4,$$

Carvalho em [7] também demonstrou que as órbitas unimodais correspondentes aos períodos $n_{F(n)}$, por ele denominadas de órbitas n -escada, são as últimas órbitas estáveis para cada $n \geq 4$. Para maior comodidade, vamos indicar os períodos $n_{F(n)}$ por n_e . Com o acréscimo das órbitas (ou períodos) n -escada, n_e , a sequência de Šarkovskii ficou assim estendida

$$S \prec 4_e \prec 5_e \prec 6_e \prec \dots \prec n_e \prec \dots$$

Esta sequência será indicada por S_e .

As órbitas n -escada são representadas pelas palavras

$$P(n_e) = R L^{n-2} C.$$

Sugerimos consultar Carvalho - [6,7] e M, S, S - [21] para obter maiores detalhes.

Podemos agora apresentar o seguinte teorema.

Teorema 1. As palavras das sete últimas órbitas unimodais de período $n \geq 7$ segundo a ordem $\prec$, são

$$\begin{aligned} & RL^{n-5}RLRC \prec RL^{n-5}R^3C \prec RL^{n-5}R^2LC \prec \\ & \prec RL^{n-4}RLC \prec RL^{n-4}R^2C \prec RL^{n-3}RC \prec RL^{n-2}C. \end{aligned}$$

Prova. Para cada um dos casos abaixo, consideremos uma sequência admissível da forma

$$P = RLX_1X_2 \dots X_{n-3}C, \text{ onde } X_i \in \{L, R\}.$$

$$(1) P_7 = P(n_{F(n)}) = RL^{n-2}C \text{ é a última.}$$

Se $P \neq P_7$, seja j o primeiro índice tal que $X_j = R$. Então $P \prec P_7$, pois temos $R \succ L$ na posição $j+2$, antes da qual só existe um R .

$$(2) P_6 = P(n_{F(n)}-1) = RL^{n-3}RC \text{ é a penúltima.}$$

Temos que $P_6 \prec P_7$. Se $P \neq P_6, P_7$ então $X_i = R$ para algum $i=1, 2, \dots, n-4$. Neste caso, $P \prec P_6$ pela mesma razão exposta em (1).

$$(3) P_5 = P(n_{F(n)}-2) = RL^{n-4}R^2C \text{ é a antepenúltima.}$$

Temos que $P_5 \prec P_6$. Se $P \neq P_5, P_6, P_7$ então $X_i = R$ para algum $i=1, 2, \dots, n-4$ ou $X_{n-4}X_{n-3} = RL$. De qualquer forma $P \prec P_5$. Os outros casos onde $X_{n-4}X_{n-3} = LL, LR$ e RR já foram considerados em P_5, P_6 e P_7 respectivamente.

$$(4) P_4 = P(n_{F(n)}-3) = RL^{n-4}RLC \text{ é a maior órbita menor que } P_5.$$

É claro que $P_4 \prec P_5$. Se $P \neq P_4, P_5, P_6, P_7$ então $X_i = R$ para algum $i=1, 2, \dots, n-5$. Neste caso, $P \prec P_4$.

(5) $P_3 = P(n_{F(n)-4}) = RL^{n-5} R^2 LC$ é a maior órbita menor que P_4 .

$P_3 \triangleleft P_4$ e, se $P \neq P_3, P_4, \dots, P_7$ então temos os seguintes casos: $X_i = R$ para algum $i=1, 2, \dots, n-6$ ou $X_{n-5} X_{n-4} X_{n-3} = RLL$ ou RLR ou RRR . Mas em qualquer deles, $P \triangleleft P_3$.

(6) $P_2 = P(n_{F(n)-5}) = RL^{n-5} R^3 C$ é a maior órbita menor que P_3 .

Temos $P_2 \triangleleft P_3$. Se $P \neq P_2, P_3, \dots, P_7$ temos que considerar os casos onde $X_i = R$ para algum $i=1, 2, \dots, n-6$ ou $X_{n-5} X_{n-4} X_{n-3} = RLL$ ou RLR . Em todos eles, $P \triangleleft P_2$.

(7) $P_1 = P(n_{F(n)-6}) = RL^{n-5} RLRC$ é a maior órbita menor que P_2 .

De fato, $P_1 \triangleleft P_2$ e se $P \neq P_1, P_2, \dots, P_7$ então $X_i = R$ para algum $i=1, 2, \dots, n-6$ ou $X_{n-5} X_{n-4} X_{n-3} = RLL$. Em ambos os casos, $P \triangleleft P_1$.

É oportuno observar que a cadeia

$$P_1 \triangleleft P_2 \triangleleft \dots \triangleleft P_7$$

exibida neste teorema, inclui da direita para a esquerda, todas as órbitas unimodais nos casos particulares $n=2, 3, 4, 5$, e 6 onde temos, respectivamente,

$$P(2_1) = RC,$$

$$P(3_1) = RLC,$$

$$P(4_1) = RLRC \triangleleft P(4_2) = RL^2 C,$$

$$P(5_1) = RL R^2 C \triangleleft P(5_2) = RL^2 RC \triangleleft P(5_3) = RL^3 C,$$

e

$$P(6_1) = RL R^3 C \triangleleft P(6_2) = RL^2 RLC \triangleleft P(6_3) = RL^2 R^2 C \triangleleft$$

$$\triangleleft P(6_4) = RL^3 RC \triangleleft P(6_5) = RL^4 C.$$

Se $n=1$, então $P(l_1) = C$.

Teorema 2. Toda sequência admissível entre

$$P_1 = RL^k C \quad \text{e} \quad P_2 = RL^{k+1} C,$$

onde $k \geq 0$, é da forma

$$P = RL^{k+1} R \dots C.$$

Prova. Basta ver que toda sequência admissível P da forma

$$RL^k R \dots C \quad \text{ou} \quad RL^{k+2} \dots C,$$

é tal que

$$P \triangleleft P_1 \quad \text{ou} \quad P_2 \triangleleft P,$$

respectivamente.

Seja $P = RL^k \dots C$ uma sequência admissível, onde $k \geq 0$. Ao acrescentarmos (ou eliminarmos quando possível) j L's após o primeiro R , obtemos a nova sequência admissível

$$P (+) L^j = RL^{k+j} \dots C,$$

onde $j \geq -k$. Isto permite-nos estabelecer o seguinte teorema.

Teorema 3. Se P_1 e P_2 são sequências admissíveis tais que $P_1 \triangleleft P_2$, então

$$P_1 (+) L^j \triangleleft P_2 (+) L^j.$$

Prova. Sejam as sequências

$$P_1 = RL^{k_1} \dots C \quad \text{e} \quad P_2 = RL^{k_2} \dots C$$

tais que $P_1 \triangleleft P_2$, onde k_1 e k_2 são respectivamente o número máximo de L's logo após o primeiro R em P_1 e P_2 . Então é claro que $0 \leq k_1 \leq k_2$. Se $j \geq -k_1$, o resultado segue claramente, pois o acréscimo (ou a eliminação quando possível) de j L's a

põe o primeiro R em cada uma das sequências P_1 e P_2 , apenas translada de j posições para diante (ou para trás) a primeira letra que não coincide, sem afetar a R -paridade da parte comum que fica antes dela.

Os teoremas 2 e 3 acima valem para o caso de palavras, em particular.

Teorema 4. Quando $n \geq 2$, o menor período entre

$${}_n F(n) \quad \text{e} \quad (n+1) F(n+1)$$

é

$$(n+2) F(n+2) - 1,$$

que também é o único período $n+2$ entre eles.

Prova. A existência e a localização do período $n+2$ é uma consequência imediata dos teoremas 2 e 1. Para uma prova direta, consideremos as palavras

$$P(n) = RL^{n-2}C \quad \text{e} \quad P(n+1) = RL^{n-1}C.$$

Temos respectivamente

$$H(P(n)) = RL^{n-2}LRL^{n-2}C = RL^{n-1}RLL^{n-3}C$$

e

$$A(P(n+1)) = RL^{n-1}RRL^{n-1}C = RL^{n-1}RRL^{n-1}C.$$

Então, pelos teoremas III.2.6 e 1, obtemos

$$P((n+2)F(n+2)-1) = RL^{n-1}RC,$$

entre $P(n)$ e $P(n+1)$. Agora vamos provar a unicidade. Já sabemos que

$${}_n F(n) \leq (n+2)F(n+2)-1 \leq (n+1)F(n+1),$$

donde

$$RL^{n-2}C \leq RL^{n-1}RC \leq RL^{n-1}C$$

ou

$$RL^{n-2}C \triangleleft RL^{n-2}LRC \triangleleft RL^{n-2}LC.$$

Seja $P(n+2) = RL^{n-2}XYC$ onde $X, Y \in \{L, R\}$, tal que

$$P(n_{F(n)}) \triangleleft P(n+2) \triangleleft P((n+1)_{F(n+1)}).$$

Se $X=R$ então $RL^{n-2}RYC \triangleleft RL^{n-2}C$. Logo, $X=L$. Daí, se $Y=L$, temos

$$RL^{n-2}LC \triangleleft RL^{n-2}LLC. \text{ Logo } Y=R.$$

Portanto,

$$P(n+2) = P((n+2)_{F(n+1)-1}).$$

2. EXTENSÃO ENTRE AS ÓRBITAS N-ESCALADA.

Nesta seção também usaremos fortemente o teorema III.

2.6 combinado com o teorema II.1.4 para obter a extensão pretendida.

Vamos obter períodos $n_r \notin S_e$ entre $3_1 = 3_e$ e 4_e , segundo a ordem $\triangleleft$. Sejam as órbitas unimodais periódicas representadas pelas palavras

$$P(3_e) = RL C \quad \text{e} \quad P(4_e) = RL^2 C.$$

Comparando o harmônico de $P(3_e)$

$$H(P(3_e)) = RLLRLC,$$

com o anti-harmônico de $P(4_e)$

$$A(P(4_e)) = RL^2RRL^2C,$$

obtemos a palavra $P(5) = RL^2RC$ de período 5 tal que $P(3_e) \triangleleft P(5) \triangleleft P(4_e)$. Temos então $5 \notin S_e$ tal que $3_e \triangleleft 5 \triangleleft 4_e$.

Em seguida, comparando

$$H(P(5)) = RL^2RRRL^2RC \quad \text{com} \quad A(P(4_e)) = RL^2R^2L^2C$$

obtemos $P(6) = RL^2R^2C$ tal que $P(5) \prec P(6) \prec P(4_e)$, ou seja, obtemos $6 \notin S_e$ tal que $5 \prec 6 \prec 4_e$. E assim sucessivamente, obtemos

$$P(7) = RL^2R^2L C \quad \text{entre } P(6) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(8) = RL^2R^2LRC \quad \text{entre } P(6) \text{ e } P(7),$$

$$P(9) = RL^2R^2L^2RC \quad \text{entre } P(7) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(10) = RL^2R^2L^2R^2C \quad \text{entre } P(9) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(11) = RL^2R^2L^2R^2LC \quad \text{entre } P(10) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(12) = RL^2R^2L^2R^2LRC \quad \text{entre } P(10) \text{ e } P(11),$$

$$P(13) = RL^2R^2L^2R^2L^2RC \quad \text{entre } P(11) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(14) = RL^2R^2L^2R^2L^2R^2C \quad \text{entre } P(13) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(15) = RL^2R^2L^2R^2L^2R^2LC \quad \text{entre } P(14) \text{ e } P(4_e),$$

$$P(16) = RL^2R^2L^2R^2L^2R^2LRC \quad \text{entre } P(14) \text{ e } P(15),$$

$$P(17) = RL^2R^2L^2R^2L^2R^2L^2RC \quad \text{entre } P(15) \text{ e } P(4_e),$$

etc. As palavras acima representam, respectivamente, órbitas u nimodais de períodos

$$5, 6, 8, 7, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 16, 15, 17 \dots$$

Então, temos a sequência de períodos

$$3_e \prec 5 \prec 6 \prec 8 \prec 7 \prec 9 \prec 10 \prec 12 \prec 11 \prec 13 \prec 14 \prec 16 \prec 15 \prec 17 \prec \dots \prec 4_e,$$

correspondente à sequência de palavras

$$P(3_e) \prec P(5) \prec P(6) \prec P(8) \prec P(7) \prec P(9) \prec P(10) \prec P(12) \prec P(11) \prec P(13) \prec$$

$$P(14) \prec P(16) \prec P(15) \prec P(17) \prec \dots \prec P(4_e).$$

Da sequência de períodos acima vamos eliminar 5, 6 e 8 porque as palavras $P(5)$, $P(6)$ e $P(8)$ representam tipos de ór-

bitas que são obtidas por um simples acréscimo de um L após o primeiro R das palavras $P(4_1)$, $P(5_1)$ (correspondentes a $4_1, 5_1 \in S$) e $P(7_2)$ (correspondente a $7_2 \in E_S$). Ou seja

$$P(5) = RL^2 RC = RLR C (+) L = P(4_1) (+) L,$$

$$P(6) = RL^2 R^2 C = RLR^2 C (+) L = P(5_1) (+) L,$$

e

$$P(8) = RL^2 R^2 L R C = RLR^2 L R C (+) L = P(7_2) (+) L.$$

As figuras seguintes podem esclarecer melhor esta situação.

Neste caso, dizemos que $P(5)$, $P(6)$ e $P(8)$ são L -herdadas ou L -transladadas de $P(4_1)$, $P(5_1)$ e $P(7_2)$ respectivamente. Todos os períodos provenientes de L -herança serão considerados na extensão, oportunamente. Então, aquela sequência de períodos entre 3_e e 4_e após a eliminação de 5, 6 e 8 fica

$$3_e \triangleleft 7 \triangleleft 9 \triangleleft 10 \triangleleft 12 \triangleleft 11 \triangleleft 13 \triangleleft 14 \triangleleft 16 \triangleleft 15 \triangleleft 17 \triangleleft \dots \triangleleft 4_e,$$

onde é fácil observar a regularidade das quadras $\triangleleft$ -ordenadas

$$E(4_e, k) = (4k - 5 \triangleleft 4k - 3 \triangleleft 4k - 2 \triangleleft 4k),$$

onde $k \geq 3$ é um inteiro. Pelo teorema 1.1 e considerando que

$F(7) = 9$, o 7 que aparece na sequência acima refere-se no período 75. Este fato será usado na demonstração do teorema 3.1.

Da mesma forma, podemos $\triangleleft$ -intercalar entre 4_e , 5_e e S_e , períodos $n \notin S_e$, sempre usando o método fornecido pelo teorema III.2.6. Neste caso, obtemos sucessivamente

$$4_e \triangleleft 6 \triangleleft 5_e, \quad P(6) = RL^3RC,$$

$$6 \triangleleft 7 \triangleleft 5_e, \quad P(7) = RL^3R^2C,$$

$$7 \triangleleft 8 \triangleleft 5_e, \quad P(8) = RL^3R^2LC,$$

$$8 \triangleleft 9 \triangleleft 5_e, \quad P(9) = RL^3R^2L^2C,$$

$$8 \triangleleft 10 \triangleleft 9 \triangleleft 5_e, \quad P(10) = RL^3R^2L^2RC,$$

$$9 \triangleleft 11 \triangleleft 5_e, \quad P(11) = RL^3R^2L^3RC,$$

$$11 \triangleleft 12 \triangleleft 5_e, \quad P(12) = RL^3R^2L^3R^2C,$$

$$12 \triangleleft 13 \triangleleft 5_e, \quad P(13) = RL^3R^2L^3R^2LC,$$

$$13 \triangleleft 14 \triangleleft 5_e, \quad P(14) = RL^3R^2L^3R^2L^2C,$$

$$13 \triangleleft 15 \triangleleft 14 \triangleleft 5_e, \quad P(15) = RL^3R^2L^3R^2L^2RC,$$

$$14 \triangleleft 16 \triangleleft 5_e, \quad P(16) = RL^3R^2L^3R^2L^3RC,$$

$$16 \triangleleft 17 \triangleleft 5_e, \quad P(17) = RL^3R^2L^3R^2L^3R^2C,$$

$$17 \triangleleft 18 \triangleleft 5_e, \quad P(18) = RL^3R^2L^3R^2L^3R^2LC,$$

$$18 \triangleleft 19 \triangleleft 5_e, \quad P(19) = RL^3R^2L^3R^2L^3R^2L^2C,$$

$$18 \triangleleft 20 \triangleleft 19 \triangleleft 5_e, \quad P(20) = RL^3R^2L^3R^2L^3R^2L^2RC,$$

etc. Agora, da sequência $\triangleleft$ -ordenada de períodos

$$4_e \triangleleft 6 \triangleleft 7 \triangleleft 8 \triangleleft 10 \triangleleft 9 \triangleleft 11 \triangleleft 12 \triangleleft 13 \triangleleft 15 \triangleleft 14 \triangleleft 16 \triangleleft 17 \triangleleft 18 \triangleleft 20 \triangleleft 19 \triangleleft \dots \triangleleft 5_e,$$

vamos eliminar 6, 7, 8 e 10 porque estes correspondem às palavras;

$P(6)$ que é L-herdada de $P(5) = RL^2 RC$, $P(3_e) \triangleleft P(5) \triangleleft P(4_e)$ ou L^2 -herdada de $P(4_1) = RLRC$, $P(2_1) \triangleleft P(4_1) \triangleleft P(3_1)$;

$P(7)$ que é L-herdada de $P(6) = RL^2 R^2 C$, $P(3_1) \triangleleft P(6) \triangleleft P(4_e)$ ou L^2 -herdada de $P(5_1) = RL R^2 C$, $P(2_1) \triangleleft P(5_1) \triangleleft P(3_1)$;

$P(8)$ que é L-herdada de $P(7) = RL^2 R^2 L C$, $P(3_1) \triangleleft P(7) \triangleleft P(4_e)$;

$P(10)$ que é L-herdada de $P(9) = RL^2 R^2 L^2 RC$, $P(3_1) \triangleleft P(9) \triangleleft P(4_e)$.

Esta eliminação é provisória, pois os períodos serão ainda considerados na extensão que faremos. Então, a sequência de períodos fica

$$4_e \triangleleft 9 \triangleleft 11 \triangleleft 12 \triangleleft 13 \triangleleft 15 \triangleleft 14 \triangleleft 16 \triangleleft 17 \triangleleft 18 \triangleleft 20 \triangleleft 19 \triangleleft \dots \triangleleft 5_e ,$$

da qual extraímos a quina genérica

$$E(5_e, k) = (5k - 6 \triangleleft 5k - 4 \triangleleft 5k - 3 \triangleleft 5k - 2 \triangleleft 5k) ,$$

onde $k \geq 3$ é inteiro.

Para perceber melhor o esquema iterativo desta extensão, vamos repetir mais uma vez o processo e obter novos períodos $n \notin S_e$ tais que $5_e \triangleleft n \triangleleft 6_e$. Aqui, temos sucessivamente

$$5_e \triangleleft 7 \triangleleft 6_e , \quad P(7) = RL^4 RC ,$$

$$7 \triangleleft 8 \triangleleft 6_e , \quad P(8) = RL^4 R^2 C ,$$

$$8 \triangleleft 9 \triangleleft 6_e , \quad P(9) = RL^4 R^2 L C ,$$

$$9 \triangleleft 10 \triangleleft 6_e , \quad P(10) = RL^4 R^2 L^2 C ,$$

$$10 \triangleleft 11 \triangleleft 6_e , \quad P(11) = RL^4 R^2 L^3 C ,$$

$$10 \triangleleft 12 \triangleleft 11 , \quad P(12) = RL^4 R^2 L^3 RC ,$$

$$11 \triangleleft 13 \triangleleft 6_e , \quad P(13) = RL^4 R^2 L^4 RC ,$$

$$13 \triangleleft 14 \triangleleft 6_e , \quad P(14) = RL^4 R^2 L^4 R^2 C ,$$

$$\begin{aligned}
14 \triangleleft 15 \triangleleft 6_e, & \quad P(15) = RL^4 R^2 L^4 R^2 L C, \\
15 \triangleleft 16 \triangleleft 6_e, & \quad P(16) = RL^4 R^2 L^4 R^2 L^2 C, \\
16 \triangleleft 17 \triangleleft 6_e, & \quad P(17) = RL^4 R^2 L^4 R^2 L^3 C, \\
16 \triangleleft 18 \triangleleft 17, & \quad P(18) = RL^4 R^2 L^4 R^2 L^3 R C, \\
17 \triangleleft 19 \triangleleft 6_e, & \quad P(19) = RL^4 R^2 L^4 R^2 L^4 R C, \\
& \quad \vdots
\end{aligned}$$

Da sequência ordenada

$$\begin{aligned}
& 5_e \triangleleft 7 \triangleleft 8 \triangleleft 9 \triangleleft 10 \triangleleft 12 \triangleleft 11 \triangleleft 13 \triangleleft 14 \triangleleft 15 \triangleleft 16 \triangleleft 18 \triangleleft 17 \triangleleft 19 \triangleleft 20 \triangleleft 21 \triangleleft 22 \triangleleft \\
& \triangleleft 24 \triangleleft 23 \triangleleft \dots \triangleleft 6_e,
\end{aligned}$$

vamos eliminar provisoriamente os períodos 7,8,9,10 e 12 porque:

$P(7)$ é L-herdada de $P(6) = RL^3 R C$ que é L-herdada de $P(5) = RL^2 R C$ que é L-herdada de $P(4_1) = RL R C$;

$P(8)$ que é L-herdada de $P(7) = RL^3 R^2 C$ que é L-herdada de $P(6) = RL^2 R^2 C$ que é L-herdada de $P(5_1) = RL R^2 C$;

$P(9)$ que é L-herdada de $P(8) = RL^3 R^2 L C$ ou L^2 -herdada de $P(7) = RL^2 R^2 L C$;

$P(10)$ que é L-herdada de $P(9) = RL^3 R^2 L^2 C$;

$P(12)$ que é L-herdada de $P(11) = RL^3 R^2 L^3 R C$.

Então a sequência $\triangleleft$ -ordenada de períodos entre 5_e , 6_e e S_e fica sendo

$$5_e \triangleleft 11 \triangleleft 13 \triangleleft 14 \triangleleft 15 \triangleleft 16 \triangleleft 18 \triangleleft 17 \triangleleft 19 \triangleleft 20 \triangleleft 21 \triangleleft 22 \triangleleft 24 \triangleleft 23 \triangleleft \dots \triangleleft 6_e,$$

da qual extraímos as senas

$$E(6_e, k) = (6k - 7 \triangleleft 6k - 5 \triangleleft 6k - 4 \triangleleft 6k - 3 \triangleleft 6k - 2 \triangleleft 6k),$$

onde $k \geq 3$ é inteiro.

Em geral, se $n \geq 4$ e $k \geq 3$ são inteiros, podemos inserir entre $(n-1)_e$, $n_e \in S_e$ e segundo a ordem $\leftarrow$, uma sequência infinita de cadeias finitas (cada uma com n períodos) também $\leftarrow$ -ordenadas da forma

$$E(n_e, k) = (nk - (n+1) \leftarrow nk - (n-1) \leftarrow nk - (n-2) \leftarrow \dots \leftarrow nk - 3 \leftarrow nk - 2 \leftarrow \dots \leftarrow nk).$$

Preferimos escrevê-la sob a forma

$$E(n_e, k) = (n(k-1) - 1 \leftarrow n(k-1) + 1 \leftarrow n(k-1) + 2 \leftarrow \dots \leftarrow n(k-1) + n - 3 \leftarrow \dots \leftarrow n(k-1) + n - 2 \leftarrow nk),$$

que resumimos em

$$E(n_e, k) = (n(k-1) - 1 \leftarrow n(k-1) + 1 \leftarrow [n(k-1) + j]_{j=2}^{n-2} \leftarrow nk).$$

Agora vamos obter as fórmulas das palavras correspondentes aos períodos de $E(n_e, k)$. Para facilitar as coisas, vamos inicialmente escrever de um modo mais cômodo as palavras já obtidas. Assim é que entre $P(3_e)$ e $P(4_e)$ temos

$$P(7) = R(L^2 R^2) L C$$

$$P(11) = R(L^2 R^2)^2 L C$$

$$P(9) = R(L^2 R^2) L^2 R C$$

$$P(13) = R(L^2 R^2)^2 L^2 R C, \dots$$

$$P(10) = R(L^2 R^2)^2 C$$

$$P(14) = R(L^2 R^2)^3 C$$

$$P(12) = R(L^2 R^2)^2 L R C.$$

$$P(16) = R(L^2 R^2)^3 L R C$$

$$k = 3$$

$$k = 4$$

Entre $P(4_e)$ e $P(5_e)$ temos

$$P(9) = R(L^3 R^2) L^2 C$$

$$P(14) = R(L^3 R^2)^2 L^2 C$$

$$P(11) = R(L^3 R^2) L^3 R C$$

$$P(16) = R(L^3 R^2)^2 L^3 R C$$

$$P(12) = R(L^3 R^2)^2 C$$

$$P(17) = R(L^3 R^2)^3 C, \dots$$

$$P(13) = R(L^3 R^2)^2 L C$$

$$P(18) = R(L^3 R^2)^3 L C$$

$$P(15) = R(L^3 R^2)^2 L^2 R C$$

$$P(20) = R(L^3 R^2)^3 L^2 R C$$

$$k = 3$$

$$k = 4$$

Entre $P(5_e)$ e $P(6_e)$ temos

$$P(11) = R(L^4 R^2) L^3 C$$

$$P(17) = R(L^4 R^2)^2 L^3 C$$

$$P(13) = R(L^4 R^2) L^4 R C$$

$$P(19) = R(L^4 R^2)^2 L^4 R C$$

$$P(14) = R(L^4 R^2)^2 C, \dots$$

$$P(20) = R(L^4 R^2)^3 C, \dots$$

$$P(15) = R(L^4 R^2)^2 L C$$

$$P(21) = R(L^4 R^2)^3 L C$$

$$P(16) = R(L^4 R^2)^2 L^2 C$$

$$P(22) = R(L^4 R^2)^3 L^2 C$$

$$P(18) = R(L^4 R^2)^2 L^3 R C$$

$$P(24) = R(L^4 R^2)^3 L^3 R C$$

$$k = 3$$

$$k = 4$$

Em geral, entre $P((n-1)_e)$ e $P(n_e)$ temos

$$P(2n-1) = R(L^{n-2} R^2) L^{n-3} C$$

$$P(3n-1) = R(L^{n-2} R^2)^2 L^{n-3} C$$

$$P(2n+1) = R(L^{n-2} R^2) L^{n-2} R C$$

$$P(3n+1) = R(L^{n-2} R^2)^2 L^{n-2} R C$$

$$P(2n+2) = R(L^{n-2} R^2)^2 C$$

$$P(3n+2) = R(L^{n-2} R^2)^3 C$$

$$P(2n+3) = R(L^{n-2} R^2)^2 L C$$

$$P(3n+3) = R(L^{n-2} R^2)^3 L C$$

$$P(2n+4) = R(L^{n-2} R^2)^2 L^2 C,$$

$$P(3n+4) = R(L^{n-2} R^2)^3 L^2 C,$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$P(2n+j) = R(L^{n-2} R^2)^2 L^{j-2} C$$

$$P(3n+j) = R(L^{n-2} R^2)^3 L^{j-2} C$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$P(2n+n-3) = R(L^{n-2} R^2)^2 L^{n-5} C$$

$$P(3n+n-3) = R(L^{n-2} R^2)^3 L^{n-5} C$$

$$P(2n+n-2) = R(L^{n-2} R^2)^2 L^{n-4} C$$

$$P(3n+n-2) = R(L^{n-2} R^2)^3 L^{n-4} C$$

$$P(3n) = R(L^{n-2}R^2)^2 L^{n-3} RC$$

$$P(4n) = R(L^{n-2}R^2)^3 L^{n-3} RC$$

$$k = 3$$

$$k = 4$$

$$P(n(k-1) - 1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2} L^{n-3} C$$

$$P(n(k-1) + 1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2} L^{n-2} RC$$

$$P(n(k-1) + 2) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} C$$

$$P(n(k-1) + 3) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L C$$

$$P(n(k-1) + 4) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^2 C$$

...,

⋮

$$P(n(k-1) + j) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^{j-2} C ,$$

⋮

$$P(n(k-1) + n-3) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^{n-5} C$$

$$P(n(k-1) + n-2) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^{n-4} C$$

$$P(nk) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^{n-3} RC$$

$$k = k$$

⋮

Em resumo, as palavras correspondentes aos períodos de $E(n_e, k)$ (ou $E(n_e, k, j)$) são :

$$P(n(k-1) - 1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2} L^{n-3} C ;$$

$$P(n(k-1) + 1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2} L^{n-2} RC ;$$

$$P(n(k-1) + j) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^{j-2} C , j=2,3,\dots, n-2 ;$$

e

$$P(nk) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1} L^{n-3} RC .$$

Então, finalmente, a nossa extensão de S_e após o 3 e S pode ser representada pela matriz infinita.

$$E_{S_e} = (E(n_e, k)) ,$$

cujos índices $n \geq 4$, $k \geq 3$ e $2 \leq j \leq n-2$ (j implícito) estão ordenados lexicograficamente. Portanto temos a matriz que estende S_e entre os períodos-escada $n \geq 3$:

$$E_{S_e} = \begin{matrix} & & & & \vdots & & \\ (n-1)_e \triangleleft & E(n,3) & \triangleleft E(n,4) & \triangleleft \dots \triangleleft E(n,k) & \triangleleft \dots & \triangleleft n_e \\ (n-2)_e \triangleleft & E(n-1,3) & \triangleleft E(n-1,4) & \triangleleft \dots \triangleleft E(n-1,k) & \triangleleft \dots & \triangleleft (n-1)_e \\ & & & & \vdots & & \\ 4_e \triangleleft & E(5,3) & \triangleleft E(5,4) & \triangleleft \dots \triangleleft E(5,k) & \triangleleft \dots & \triangleleft 5_e \\ 3_e \triangleleft & E(4,3) & \triangleleft E(4,4) & \triangleleft \dots \triangleleft E(4,k) & \triangleleft \dots & \triangleleft 4_e \end{matrix}$$

Tudo que fizemos nesta seção pode ser reunido no teorema seguinte, que garante a extensão entre os períodos n_e e S_e , $n \geq 3$.

Teorema 1. Sejam $(n-1)_e$ e n_e os períodos de S_e cujas órbitas unimodais escadas correspondentes são representadas pelas palavras

$$P((n-1)_e) = R L^{n-3} C \quad \text{e} \quad P(n_e) = R L^{n-2} C ,$$

onde $n \geq 4$. Então, se $k \geq 3$ e $j = 2, 3, \dots, n-2$ são inteiros, entre os períodos acima podemos intercalar períodos de E_{S_e} numa ordenação dada por:

$$(1) \quad (n-1)_e \triangleleft n(3-1) - 1 = 2n - 1 ;$$

$$(2) \quad n(k-1) - 1 \triangleleft n(k-1) + 1 ;$$

$$(3) \quad n(k-1) + 1 \triangleleft n(k-1) + 2 ;$$

$$(4) \quad n(k-1) + j \triangleleft n(k-1) + j + 1, \quad j = 2, 3, \dots, n-3 ;$$

$$(5) \quad n(k-1) + n - 2 = nk - 2 \triangleleft nk ;$$

$$(6) \quad nk \leq n(k+1-1) - 1 = nk - 1 ;$$

$$(7) \quad \text{quando } k \rightarrow \infty, \quad nk \leq n_e .$$

Prova.

(1) Comparando

$$P((n-1)_e) = R L^{n-3} C$$

com

$$P(2n-1) = R L^{n-2} R^2 L^{n-3} C = R L^{n-3} L R^2 L^{n-3} C ,$$

notamos que $P((n-1)_e) \leq P(2n-1)$, pois $C \geq L$ na $(n-2)$ -ésima posição, que é precedida de um só R . Logo, $(n-1)_e \leq 2n-1$.

(2) Temos que

$$P(n(k-1)-1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2}L^{n-3}C$$

e

$$P(n(k-1)+1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2}L^{n-3}LRC .$$

Então $P(n(k-1)-1) \leq P(n(k-1)+1)$, porque existem $2k-3$ R 's antes da $(n(k-1)-1)$ -ésima posição, onde $C \geq L$. Logo

$$n(k-1)-1 \leq n(k-1)+1 .$$

(3) Temos que

$$P(n(k-1)+1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-2}L^{n-2}RC$$

e

$$P(n(k-1)+2) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}C = R(L^{n-2}R^2)^{k-2}L^{n-2}RRC .$$

Como existem $2(k-1)$ R 's precedendo a posição $(n(k-1)+1)$ -ésima, na qual $C \leq R$, então $P(n(k-1)+1) \leq P(n(k-1)+2)$. Logo , $n(k-1)+1 \leq n(k-1)+2$.

(4) Agora vamos comparar

$$P(n(k-1)+j) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{j-2}C$$

com

$$P(n(k-1)+j+1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{j-1}C = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{j-2}LC ,$$

Então $P(n(k-1) + j) < P(n(k-1) + j + 1)$, pois antes da $(n(k-1) + j)$ -ésima posição na qual $C > L$, existem $2k-1$ R's. Daí, $n(k-1) + j < n(k-1) + j + 1$.

(5) Comparando

$$P(nk-2) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{n-4}C$$

com

$$P(nk) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{n-3}RC = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{n-4}LRC,$$

concluimos que $P(nk-2) < P(nk)$, pois existem $2k-1$ R's antes da $(nk-2)$ -ésima posição, na qual $C > L$. Então $nk-2 < nk$.

(6) Temos que

$$P(nk) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{n-3}RC$$

e

$$P(nk-1) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{n-3}C.$$

Como existem $2k-1$ R's precedendo a $(nk-1)$ -ésima posição, na qual $R > C$, segue que $P(nk) < P(nk-1)$. Então $nk < nk-1$.

(7) Temos que

$$P(nk) = R(L^{n-2}R^2)^{k-1}L^{n-3}RC = RL^{n-2}RR(L^{n-2}R^2)^{k-2}L^{n-3}RC$$

e

$$P(n_e) = RL^{n-2}C.$$

Como existe só um R antes da n -ésima posição, na qual $R > C$, segue que $P(nk) < P(n_e)$. É fácil notar que esta conclusão não se altera quando $k \rightarrow \infty$. Logo, quando $k \rightarrow \infty$ temos que $nk < n_e$.

Reunindo as matrizes de extensão antes do 3, E_S , e de extensão após o 3, E_{S_e} , temos a matriz

$$E = E_S \cup E_{S_e},$$

que explicitamente é

$$\begin{array}{l}
 (n-1)_e \leftarrow \\
 (n-2)_e \leftarrow \\
 \vdots \\
 4_e \leftarrow \\
 3_e \leftarrow \\
 5_1 \leftarrow \\
 7_1 \leftarrow \\
 \\
 E = \\
 10_1 \leftarrow \\
 14_1 \leftarrow \\
 \vdots \\
 20_1 \leftarrow \\
 28_1 \leftarrow \\
 \vdots
 \end{array}
 \left[
 \begin{array}{c}
 \vdots \\
 E(n,3) \leftarrow E(n,4) \leftarrow E(n,5) \leftarrow \dots \\
 E(n-1,3) \leftarrow E(n-1,4) \leftarrow E(n-1,5) \leftarrow \dots \\
 \vdots \\
 E(5,3) \leftarrow E(5,4) \leftarrow E(5,5) \leftarrow \dots \\
 E(4,3) \leftarrow E(4,4) \leftarrow E(4,5) \leftarrow \dots \\
 E_{0,1,3} \leftarrow E_{0,1,4} \leftarrow E_{0,1,5} \leftarrow \dots \\
 E_{0,2,3} \leftarrow E_{0,2,4} \leftarrow E_{0,2,5} \leftarrow \dots \\
 \\
 \vdots \\
 E_{1,1,3} \leftarrow E_{1,1,4} \leftarrow E_{1,1,5} \leftarrow \dots \\
 E_{1,2,3} \leftarrow E_{1,2,4} \leftarrow E_{1,2,5} \leftarrow \dots \\
 \vdots \\
 E_{2,1,3} \leftarrow E_{2,1,4} \leftarrow E_{2,1,5} \leftarrow \dots \\
 E_{2,2,3} \leftarrow E_{2,2,4} \leftarrow E_{2,2,5} \leftarrow \dots \\
 \vdots
 \end{array}
 \right]
 \begin{array}{l}
 \leftarrow n_e \\
 \leftarrow (n-1)_e \\
 \\
 \leftarrow 5_e \\
 \leftarrow 4_e \\
 \leftarrow 3_1 \\
 \leftarrow 5_1 \\
 \\
 \\
 \leftarrow 6_1 \\
 \leftarrow 10_1 \\
 \\
 \leftarrow 12_1 \\
 \leftarrow 20_1
 \end{array}$$

Observemos que nesta matriz cada linha é menor, no sentido da ordem $\leftarrow$, que a linha imediatamente superior a ela.

3. A EXTENSÃO ACUMULADA POR L^j -TRANSLAÇÕES.

Consideremos a sequência $\leftarrow$ -ordenada de Šarkovskii

$$S = [1_1, 2_1, 4_1, 8_1, \dots, 28_1, 20_1, 12_1, \dots, 14_1, 10_1, 6_1, \dots, 7_1, 5_1, 3_1].$$

Desta, vamos extrair a sequência

$$S_1 = S - \{1_1, 2_1\},$$

ou seja

$$S_1 = [4_1, 8_1, 16_1, \dots, 28_1, 20_1, 12_1, \dots, 14_1, 10_1, 6_1, \dots, 7_1, 5_1, 3_e].$$

Aos períodos $n \geq 2$ correspondem palavras que representam órbitas unimodais n -periódicas, e a $\leftarrow$ -ordem destas palavras (que é a mesma dos períodos correspondentes) é preservada por L^j -translações, conforme o teorema 1.3. Por simplicidade na representação dos harmônicos de $P(n)$, $H^j(P(n))$, vamos escrevê-los sob a forma $H^j(n)$. Portanto, podemos obter sucessivamente as seguintes sequências:

$$S_2 = (3_e, 6, 12, 24, \dots, 5, 9, 17, \dots, 29, 21, 13, \dots, 15, 11, 7, \dots, 8, 6, 4_e]$$

com a identificação

$$S_2 \equiv (H^1(3_e))_{i=1}^{\infty}; S_1(+L);$$

$$S_3 = (4_e, 8, 16, 32, \dots, 7, 13, 25, \dots, 6, 10, 18; \dots, 30, 22, 14, \dots, 16, 12, 8, \dots, 9, 7, 5_e]$$

tal que

$$S_3 \equiv (H^1(4_e))_{i=1}^{\infty}, (H^1(3_e)(+L))_{i=1}^{\infty}; S_1(+L)^2;$$

$$S_4 = (5_e, 10, 20, 40, \dots, 9, 17, 33, \dots, 8, 14, 26, \dots, 7, 11, 19; \dots, 31, 23, 15, \dots, 17, 13, 9, \dots, 10, 8, 6_e]$$

tal que

$$S_4 \equiv (H^1(5_e))_{i=1}^{\infty}, (H^1(4_e)(+L))_{i=1}^{\infty}; (H^1(3_e)(+L)^2)_{i=1}^{\infty}; S_1(+L)^3;$$

⋮

Em geral, para qualquer inteiro $k \geq 2$, temos

$$S_k = ((k+1)_e, 2(k+1), 4(k+1), \dots, 2k+1, 4k+1, 8k+1, \dots, 2(k-1)+2, 4(k-1)+2, 8(k-1)+2, \dots)$$

$\dots, 2.3+k-2, 4.3+k-2, 8.3+k-2, \dots, 2.2+k-1, 4.2+k-1, \dots,$
 $8.2+k-1;$
 $\dots, 14+k-1, 10+k-1, 6+k-1, \dots, 7+k-1, 5+k-1, (3+k-1)_e],$

ou sob a forma mais simples

$S_k = ((k+1)_e, 2(k+1), 4(k+1), \dots, 2k+1, 4k+1, 8k+1,$
 $\dots, 2k, 4k-2, 8k-6, \dots, k+4, k+10, k+22,$
 $\dots, k+3, k+7, k+15; \dots, k+13, k+9, k+5,$
 $\dots, k+6, k+4, (k+2)_e].$

Identificamos

$S_k \equiv (H^1((k+1)_e))_{i=1}^{\infty}, (H^1(k_e)(+)L)_{i=1}^{\infty}, (H^1((k-1)_e)(+)L^2)_{i=1}^{\infty},$
 $\dots, (H^1(4_e)(+)L^{k-3})_{i=1}^{\infty}, (H^1(3_e)(+)L^{k-2})_{i=1}^{\infty}; S_1(+)\dots L^{k-1}$

ou, de forma resumida,

$$S_k = \left\{ \left[H^1((k+1-j)_e)(+)L^j \right]_{j=0}^{k-2} \right\}_{i=1}^{\infty}; S_1(+)\dots L^{k-1}.$$

É fácil perceber, para todo inteiro $k \geq 1$, que

$$1, 2, 3, \dots, k, k+1 \notin S_k,$$

isto é, os períodos de S_k são maiores ou iguais a $k+2$. Também é fácil perceber que todas as palavras correspondentes aos períodos de S_k começam por $RL^k R \dots$, exceto a palavra de $(k+2)_e$, que é $RL^k C$.

Completamos a nossa extensão da sequência S de Šarkovskii, estabelecendo o seguinte teorema.

Teorema 1. Para todo inteiro $n \geq 4$, os períodos (só os novos acrescentados) da extensão entre $(n-1)_e$ e n_e , são $\leq$ maiores que os períodos L -herdados daqueles que formam a sequência eS .

tendida entre $(n-2)_e$ e $(n-1)_e$.

Prova. Basta mostrar que:

$$(1) E_{0,1,k \rightarrow \infty,1}^d (+) L \equiv 3k < 7_5;$$

$$(2) \text{ Quando } k \rightarrow \infty, nk (+) L \equiv nk + 1 < (n+1)(3-1) - 1 = 2n + 1.$$

Para mostrar (1), devemos comparar as palavras

$$\begin{aligned} P(E_{0,1,k,1}^d (+) L) &= A_0 (A_1 A_0)^{k-1} A_0^0 C (+) L = \\ &= R(LRR)^{k-1} C (+) L = RL^2 R^2 LRR(LR^2)^{k-3} C \end{aligned}$$

e

$$P(7_5) = RL^2 R^2 LC.$$

Como $R > C$ na 7ª posição, temos que $P(3k) < P(7_5)$, ...

onde $3k < 7_5$. É claro que esta conclusão é mantida quando $k \rightarrow \infty$.

Quanto à prova de (2), vamos comparar

$$\begin{aligned} P(nk) (+) L &= R(L^{n-2} R^2)^{k-1} L^{n-3} RC (+) L = \\ &= RL^{n-1} R^2 L^{n-2} RR (L^{n-2} R^2)^{k-3} L^{n-3} RC. \end{aligned}$$

com

$$P(2n+1) = RL^{n-1} R^2 L^{n-2} C.$$

Temos que $P(nk+1) < P(2n+1)$ pois $R > C$ na $(2n+1)$ -ésima posição, que é precedida de 3 R's. Isto não se altera quando $k \rightarrow \infty$. Logo $nk+1 < 2n+1$, quando $k \rightarrow \infty$.

Este teorema juntamente com o teorema 1.3, garantem que a sequência estendida é cumulativa, via L^j -translações, da extensão entre $(n-2)_e$ e $(n-1)_e$ para a extensão entre $(n-1)_e$ e n_e , para todo inteiro $n \geq 4$.

CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

1. A EFICIÊNCIA DA EXTENSÃO CUMULATIVA.

Queremos saber quantos períodos $p \geq 5$ (correspondentes a órbitas unimodais p -periódicas) são incluídos na extensão acumulada de S , como foi descrita na seção 3 do capítulo anterior.

Os períodos $p \geq 7$ da extensão E_S são dados pelas fórmulas

$$(((2^j(2\ell(k-2) + k + 2i))_{j=0}^{\infty})_{\ell=1}^{\infty})_{k=3}^{\infty})_{i=1}^{\infty} \quad (1)$$

$$e \quad (((2^j(2\ell(k-1) + k + 2i - 1))_{j=0}^{\infty})_{\ell=1}^{\infty})_{k=3}^{\infty})_{i=\infty}^1, \quad (2)$$

que fornecem, respectivamente, os períodos da parte crescente e da parte decrescente de cada sequência $E_{j,\ell,k,i}$, como ficou estabelecido na seção 2 do capítulo IV. Então, o número $E_S(p)$ de tais períodos que são através de sucessivas inter-relações acrescentados à sequência S antes do 3, é dado pelo número de quadras (j,ℓ,k,i) que produzem p por meio das fórmulas (1) e (2). Logo, considerando $7 \leq p \leq 32$, temos a tabela

p	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$E_S(p)$	1	1	2	2	4	3	6	6	7	8	10	10	13	12

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
14	17	17	18	20	23	22	25	26	28	29	33

Por outro lado, os períodos $p \geq 7$ que são diretamente (sem translações por L 's) acrescentados à sequência S_e após o 3, são dados pelas fórmulas (conforme seção 2 do capítulo V)

$$(n(k-1)_{n=4}^{\infty})_{k=3}^{\infty} - 1, \quad (3)$$

$$(n(k-1)_{n=4}^{\infty})_{k=3}^{\infty} + 1, \quad (4)$$

$$((n(k-1)_{n=4}^{\infty})_{k=3}^{\infty} + j)_{j=2}^{n-2} \quad (5)$$

e

$$((nk)_{n=4}^{\infty})_{k=3}^{\infty}. \quad (6)$$

O número $Es_e(p)$ destes períodos é dado pelo número de pares (n,k) e de ternos (n,k,j) que produzem p através das fórmulas (3), (4), (5) e (6). Então, se $7 \leq p \leq 32$, temos a tabela

p	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$Es_e(p)$	1	0	2	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
8	7	9	8	10	9	11	10	12	11	13	12

Neste caso, é fácil obter explicitamente o número $Es_e(p)$, por meio da fórmula

$$Es_e(p) = \begin{cases} (p-5)/2 & \text{se } p \geq 7 \text{ é ímpar} \\ (p-8)/2 & \text{se } p \geq 8 \text{ é par.} \end{cases}$$

Em resumo, toda a sistemática de obtenção dos períodos da nossa extensão cumulativa, pode ser descrita por meio da

tabela

p	D(p)	Lh(p)	B(p)	E(p)	$S_e H(p)$	T(p)
1	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	2	2
5	0	1	0	1	2	3
6	0	2	0	2	3	5
7	2	4	0	6	2	8
8	1	7	0	8	3	11
9	4	10	0	14	2	16
10	3	15	1	19	4	23
11	7	22	0	29	2	31
12	5	30	2	37	5	42
13	10	41	0	51	2	53
14	9	52	6	67	4	71
15	12	70	0	82	2	84
16	12	83	8	103	4	107
17	16	106	0	122	2	124
18	15	123	14	152	4	156
19	20	155	0	175	2	177
20	18	176	19	213	6	219
21	22	218	0	240	2	242
22	24	241	29	294	4	298
23	26	297	0	323	2	325
24	26	324	37	387	7	394
25	30	393	0	423	2	425
26	32	424	51	507	4	511
27	33	510	0	543	2	545
28	35	544	67	646	6	652
29	38	651	0	689	2	691
30	39	690	82	811	4	815
31	42	814	0	856	2	858
32	45	857	103	1.005	5	1.010

.....

As expressões literais da tabela acima estão inter-relacionadas e têm os seguintes significados:

- $D(p)$ — Número de períodos p que são obtidos diretamente das fórmulas (1), (2), ..., (6), e não por L-herança de períodos $p-1$ ou pelo 1º harmônico de $p/2$ (se p é par). Temos $D(p) = E_s(p) + E_{s_e}(p)$
- $S_e H(p)$ — Número de períodos p obtidos de S_e ou pelos harmônicos (quando p é par e $2^j | p$) $H^j(p/2^j)$, onde $(p/2^j) \in S_e$;
- $Lh(p)$ — Número de períodos p , exceto p_e , que são obtidos por L-herança dos períodos $p-1$ de $T(p-1)$. É claro que $Lh(p) = T(p-1) - 1$;
- $T(p)$ — Número total de períodos p que compõem a extensão acumulada, onde temos que $T(p) = E(p) + S_e H(p)$;
- $E(p)$ — Número de períodos p obtidos de $D(p)$, $Lh(p)$ e do 1º harmônico dos períodos $p/2$ de $E(p/2)$ quando $p \geq 10$ é par. Então temos $E(p) = D(p) + Lh(p) + B(p)$;
- $B(p)$ — Número de períodos p dados pelo 1º harmônico dos períodos $p/2$ obtidos de $E(p/2)$. Aqui, temos $B(p) = E(p/2)$ quando $p \geq 10$ é par e $B(p) = 0$ nos outros casos.

Observando a tabela acima, notamos que o número de novos períodos p dados pela coluna $D(p)$ ou pela coluna $E(p)$, tende a aumentar quando p cresce.

2. ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DA EXTENSÃO UNIMODAL.

É claro que, dada uma órbita periódica unimodal, existem infinitas funções contínuas (não necessariamente unimodais)

cujos gráficos servem de suporte para aquela órbita. Por outro lado, se o gráfico de uma função contínua $f: I \rightarrow I$ contém uma órbita periódica unimodal, então esta também está contida no gráfico da "função companheira" $\hat{f} \in C^0(I, I)$ de f associada à órbita. A função $\hat{f}$ será definida adiante.

Seja $f \in C^0(I, I)$. Lembramos que $P(f) = \{n \in \mathbb{N}^*; f \text{ tem uma órbita de período } n\}$. Suponhamos que $n_e \in P(f)$, isto é, que o gráfico de f contém a órbita periódica unimodal n -escada

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n,$$

com $n-1$ degraus, cuja palavra é

$$P(n_e) = R L^{n-2} C,$$

onde $n \geq 2$ é um inteiro. Se $n=1$, então $P(n) = C$. O gráfico de f com a órbita n -escada é, por exemplo, dado por

Para facilitar a leitura, extraímos de Carvalho-[6] a definição da "função companheira" $\hat{f}$ de f , relativa à órbita de período n_e . Temos que

$$\hat{f}(x) = \left\{ \begin{array}{ll} x_2 & \text{se } x \leq x_1 \\ x_2 & \text{se } x_1 \leq x \leq x_2 \text{ e } f(x) \leq x_2 \\ f(x) & \text{se } x_1 \leq x \leq x_2 \text{ e } x_2 \leq f(x) \leq x_3 \\ x_3 & \text{se } x_1 \leq x \leq x_2 \text{ e } f(x) \geq x_3 \\ x_3 & \text{se } x_2 \leq x \leq x_3 \text{ e } f(x) \leq x_3 \\ f(x) & \text{se } x_2 \leq x \leq x_3 \text{ e } x_3 \leq f(x) \leq x_4 \\ x_4 & \text{se } x_2 \leq x \leq x_3 \text{ e } f(x) \geq x_4 \\ \vdots & \\ x_{n-1} & \text{se } x_{n-2} \leq x \leq x_{n-1} \text{ e } f(x) \leq x_{n-1} \\ f(x) & \text{se } x_{n-2} \leq x \leq x_{n-1} \text{ e } x_{n-1} \leq f(x) \leq x_n \\ x_n & \text{se } x_{n-2} \leq x \leq x_{n-1} \text{ e } f(x) \geq x_n \\ x_n & \text{se } x_{n-1} \leq x \leq \bar{x}, \text{ onde} \\ & \bar{x} = \max \{ x \geq x_{n-1}; f(x) = x_n \} \\ f(x) & \text{se } \bar{x} \leq x \leq x_n \\ x_1 & \text{se } x \geq x_n, \end{array} \right.$$

cujo gráfico é

Carvalho demonstrou em [6], para todo inteiro $n \geq 3$,

que

$$(n+1)_e \in P(f) \Rightarrow (n+1)_e \in P(\hat{f}) \Rightarrow n_e \in P(\hat{f}) \Rightarrow n_e \in P(f).$$

Este resultado pode ser aplicado, com as devidas adaptações é claro, à família de órbitas obtidas por L^j -translações, de um tipo básico qualquer de órbita periódica unimodal. Por exemplo, a órbita de período 4_1 dada por $P(4_1) = RLRC$, gera a família de órbitas

$$P(4_1(+)) L^j = RL^{j+1}RC$$

onde $j \geq 0$, tais que

$$P(4_1(+)) L^j \ll P(4_1(+)) L^{j+1}.$$

Se $4_1 + j \in P(f)$ para $j \geq 1$, podemos obter, imitando o método descrito em [6], um ponto fixo de f^{4+j-1} (via teorema do valor intermediário de Bolzano), onde $i = 1, 2, 3, \dots, j$. Desse modo, obtemos

$$4_1(+) L^{j-1} \equiv 4 + j - 1 \ll 4 + j \equiv 4_1(+) L^j,$$

ou seja, a órbita

$$P(4_1(+)) L^{j-1} = RL^{j-1+1}RC$$

pode ser inscrita na órbita

$$P(4_1(+)) L^j = RL^{j+1}RC$$

no sentido de que têm o mesmo tipo desta, mas com i degraus a menos. Neste caso, temos que

$$\max \{ 4_1(+) L^{j-1} \} < \max \{ 4_1(+) L^j \}.$$

e

$$\min \{ 4_1(+) L^j \} < \min \{ 4_1(+) L^{j-1} \}.$$

A figura seguinte ilustra os dois casos dados por $j = 3$ e $i = 1$

3 tais que

$$RLRC \prec RL^3 RC \prec RL^4 RC ,$$

ou, na forma dinâmica

$$(RLR^2)^\infty \prec (RL^3 R^2)^\infty \prec RL^4 RC .$$

Dai, segue que o teorema III.2.6 estabelecido apenas para funções unimodais, pode ser adaptado para funções $f \in C^0(I, I)$ restritas às órbitas periódicas unimodais $\prec$ -ordenadas. Podemos então enunciar-lo na seguinte forma

Teorema 1. Sejam $m, n \in P(f)$ tais que $m \neq n$.

Se p é tal que

$$P(m) \prec P(p) \prec P(n),$$

então

$$p \in P(f) \quad \text{e} \quad m \prec p \prec n.$$

É neste sentido que a nossa extensão de $\mathcal{S}$, considerando apenas funções unimodais, e portanto apenas órbitas unimodais, pode ser adaptada para funções contínuas.

Está claro que se o teorema 1 não fosse válido, então não poderíamos ter, por exemplo, a cadeia $7_1 \triangleleft 5_1 \triangleleft 3_1$, extraída da sequência de Sarkovskii. Ou seja, o próprio teorema de Sarkovskii estaria sendo contrariado, pois ele estabelece que para todos $m, n \in \mathbb{N}^*$, tem-se $m \triangleleft n \iff (n \in P(f) \implies m \in P(f))$.

Podemos ilustrar a aplicação do teorema 1 com os seguintes exemplos.

Exemplo 1. A órbita de período 7 obtida na extensão E_S é representada pela palavra

$$P(7) = RLR^2LRC,$$

coexiste para uma função $f \in C^0(I, I)$ com as órbitas dadas por

$$P(5_1) = RLR^2C \quad \text{e} \quad P(3_1) = RLC,$$

para $P(5_1) \triangleleft P(7) \triangleleft P(3_1)$. Temos que $m = 5_1$, $n = 3_1$ e $p = 7$. Então $7 \in P(f)$ e $5_1 \triangleleft 7 \triangleleft 3_1$. A figura abaixo esclarece esta situação.

Exemplo 2. Na extensão E_{S_e} obtivemos a órbita de período 9 dada pela palavra

$$P(9) = RL^2R^2L^2RC,$$

tal que $P(3_e) \triangleleft P(9) \triangleleft P(4_e)$. Temos que, $m = 3_e$, $n = 4_e$ e

$p = 9$. Logo, concluímos que $9 \in P(f)$ e $3_e \prec 9 \prec 4_e$. Ou seja, $P(3_e)$, $P(9)$ e $P(4_e)$ coexistem para uma mesma função $f \in C^0(I, I)$. A figura é esclarecedora.

3. COMPORTAMENTO ASSINTÓTICO DOS NÚMEROS $F(n)$.

Vamos mostrar que a razão $r_n = F(n+1) / F(n)$ tende para 2 quando n cresce arbitrariamente, onde $F(n)$ é o número de órbitas unimodais de período $n \geq 1$ dado pela fórmula de Fine - [10], exibida no início do capítulo IV.

Usando a fórmula de Fine, podemos estabelecer a seguinte tabela dos $F(n)$

$F(1) = 1$	$F(10) = 51$	$F(19) = 13.797$
$F(2) = 1$	$F(11) = 93$	$F(20) = 26.214$
$F(3) = 1$	$F(12) = 170$	$F(21) = 49.929$
$F(4) = 2$	$F(13) = 315$	$F(22) = 95.325$
$F(5) = 3$	$F(14) = 585$	$F(23) = 182.361$
$F(6) = 5$	$F(15) = 1.091$	$F(24) = 349.520$
$F(7) = 9$	$F(16) = 2.048$	$F(25) = 671.088$
$F(8) = 16$	$F(17) = 3.855$	$F(26) = 1.290.555$
$F(9) = 28$	$F(18) = 7.280$	$F(27) = 2.485.504$

$F(28) = 4.793.490$	$F(32) = 67.108.864$	$F(36) = 954.437.120$
$F(29) = 9.256.395$	$F(33) = 130.150.493$	$F(37) = 1.857.283.155$
$F(30) = 17.895.679$	$F(34) = 252.645.135$	$F(38) = 3.616.814.564$
$F(31) = 34.636.833$	$F(35) = 490.853.403$	$F(39) = 7.048.151.354,$

e desta a tabela com valores aproximados de r_n

$r_1 = 1$	$r_{14} \approx 1,8649$	$r_{27} \approx 1,9286$
$r_2 = 1$	$r_{15} \approx 1,8772$	$r_{28} \approx 1,9310$
$r_3 = 2$	$r_{16} \approx 1,8823$	$r_{29} \approx 1,9333$
$r_4 = 1,5$	$r_{17} \approx 1,8884$	$r_{30} \approx 1,9355$
$r_5 \approx 1,6666$	$r_{18} \approx 1,8952$	$r_{31} \approx 1,9375$
$r_6 = 1,8$	$r_{19} \approx 1,8999$	$r_{32} \approx 1,9394$
$r_7 \approx 1,7777$	$r_{20} \approx 1,9047$	$r_{33} \approx 1,9412$
$r_8 \approx 1,7500$	$r_{21} \approx 1,9092$	$r_{34} \approx 1,9428$
$r_9 \approx 1,8214$	$r_{22} \approx 1,9130$	$r_{35} \approx 1,9444$
$r_{10} \approx 1,8235$	$r_{23} \approx 1,9166$	$r_{36} \approx 1,9459$
$r_{11} \approx 1,8279$	$r_{24} \approx 1,9200$	$r_{37} \approx 1,9474$
$r_{12} \approx 1,8529$	$r_{25} \approx 1,9231$	$r_{38} \approx 1,9487$
$r_{13} \approx 1,8571$	$r_{26} \approx 1,9259$	

A última tabela sugere que $r_n \rightarrow 2$ quando $n \rightarrow \infty$. Para mostrar isto com maior precisão, consideremos a fórmula

$$(1) \quad F(n) = (2^{n-1} - 1) / n, \quad n \geq 3 \text{ primo},$$

que foi extraída da fórmula geral de Fine. Se n é primo, seja $k \geq 2$ o menor inteiro tal que $n+k$ também é primo. Ou seja, $n+k$ é o menor primo maior que n , onde k é um dos pares $2, 4, \dots$. Continuando, tomemos a razão

$$r'_n = \frac{1}{2^{k-1}} \cdot \frac{F(n+k)}{F(n)},$$

onde a presença do fator 2^{1-k} é devida ao fato de que exis-

tem $k-1$ números inteiros entre n e $n+k$. Da expressão de r'_n e da fórmula (1) acima, obtemos sucessivamente

$$\begin{aligned} r'_n &= \frac{1}{2^{k-1}} \cdot \frac{(2^{n+k-1} - 1) / (n+k)}{(2^{n-1} - 1) / n} \\ &= \frac{1}{2^{k-1}} \cdot \frac{n}{n+k} \cdot \frac{2^k (2^{n-1} - 1) + 2^k - 1}{2^{n-1} - 1} \\ &= \frac{1}{2^{k-1}} \cdot \left(1 - \frac{k}{n+k}\right) \left(2^k + \frac{2^k - 1}{2^{n-1} - 1}\right). \end{aligned}$$

Fazendo $n \rightarrow \infty$, chegamos ao resultado

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = \frac{2^k}{2^{k-1}} = 2.$$

Como uma consequência natural desta conclusão, podemos dizer que o número 2 é uma constante de unimodalidade, e escrever

$$F(n+1) \approx 2 F(n)$$

quando n é arbitrariamente grande.

R E F E R Ê N C I A S

- [1] Alseda, L.; Llibre, J. and Serra, R.: "Minimal periodic orbits for continuous maps of the interval"-Trans. Amer. Math. Soc., vol. 286 (1984) , pp. 595-627.

- [2] Block, L.: "Simple periodic orbits of mappings of the interval" - Trans. Amer. Math. Soc., vol. 254 (1979), pp. 391-398.

- [3] Block, L.; Guckenheimer, J.; Misiurewicz, M. and Young, L.S.: "Periodic points and topological entropy of one dimensional maps"- Lecture Notes in Math., vol. 819 (1980), pp 18-34, Springer-Verlag.

- [4] Block, L.: "Stability of periodic orbits in the theorem of Sarkovskii" - Proc. Amer. Math. Soc., vol. 81 (1981), pp 333 - 336.

- [5] Block, L.: "Dynamical complexity of maps of the interval" - Preprint, Depart. of Math. - Univ. of Florida, Gainesville - FL, 1986.

- [6] Carvalho, L.A.V.: "On an extension of Sarkovskii's order" - Preprint, Inst. de Ciências Matemáticas de São Carlos - USP, 1986.

- [7] Carvalho, L.A.V.: "On the last (stable) periodic orbit

ts of the scalar discrete logistic equation" - Preprint, Inst. de Ciências Matemáticas de São Carlos - USP, 1987.

- [8] Collet, P. and Eckmann, J.P.: "Iterated maps on the interval as dynamical systems" - Progress in Physics, vol. 1 (1980), Birkhäuser-Boston.
- [9] Coppel, W.A.: "Sarkovskii-minimal orbits" - Math. Proc. Camb. Phil. Soc., vol. 93 (1983), 397-408.
- [10] Fine, N.J.: "Classes of periodic sequences" - Illinois J. Math., vol. 2 (1958), pp. 285-302.
- [11] Guckenheimer, J.: "On the bifurcation of maps of interval" - Invent. Math., vol. 39 (1977), pp. 165 - 178.
- [12] Guckenheimer, J.: "Bifurcation of dynamical systems" Progress in Mathematics, vol. 8 (1978), pp. 115 - 231, CIME, Lectures, Birkhäuser-Boston
- [13] Guckenheimer, J.: "Sensitive dependence to initial conditions for one dimensional maps" - Commun. Math. Phys., vol. 70 (1979), pp.133-160.
- [14] Guckenheimer, J. and Holmes, P.: "Nonlinear oscillations, dynamical systems and bifurcation of vector fields" - Appl. Math. Sci., vol. 42 (1983), Springer-Verlag.

- [23] Nitecki, Z.: "Topological dynamics on the interval"-
Progress in Math., vol. 21 (1982), pp. 1-73, Birkh
häuser-Boston.

- [24] Preston, C.: "Iterates of maps on an interval" - Lecu
ture Notes in Math., vol. 999, Springer-Verlag ,
1983.

- [25] Sarkovskii, A.N.: "Coexistence of cycles of a conti-
nuous map of the line into itself" Ukranian Math.
J., vol. 16 (I) (1964), pp. 61-71.

- [26] Singer, D.: "Stable orbits and bifurcation of maps '
the interval" - SIAM J. Appl. Math., vol. 35 '
(1978), pp. 260-267.

- [27] Stefan, P.: "A theorem of Sarkovskii on the existen-
ce of periodic orbits of continuous endomorphisms
of the real line" - Commun. Math. Phys., vol. 54
(1977), pp. 237-248.