Invariantes Cohomológicos e Decomposição de Grupos

Erminia de Lourdes Campello Fanti

orientador

Prof. Dr. Janey Antonio Daccach

Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos - USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de "Doutor em Ciências - Área Matemática - Geometria e Topologia".

USP - São Carlos

Dezembro - 1992

Agradecimentos

Ao Professor Janey Antonio Daccach, pela dedicada e atenciosa orientação.

Ao meu esposo, pelo amor, compreensão e apoio nos momentos difíceis.

À Gorete, pela amizade e participação nesta caminhada.

Aos Professores do ICMSC - USP, pela acolhida, formação e estímulo.

Ao Departamento de Matemática da UNESP - São José do Rio Preto que me proporcionou condições adequadas para à dedicação ao Programa de Doutorado.

À Capes, pelo auxílio financeiro.

Aos meus Professores do curso de graduação (UNESP - SJRP) e Mestrado (IMPA) pela formação e incentivo.

À todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho, em particular aos meus pais por iniciar-me nos estudos, à vó Bel pelo carinho dedicado à Aline e Gabriela durante minha ausência e ao amigo Toninho pelo excelente trabalho de digitação.

À Deus, por tudo.

Dedico ao
Dinho
Aline e
Gabriela

Abstract

In this work we define a cohomological invariant $E(G, \mathcal{S}, M)$ where G is a group, $\mathcal{S} = \{S_i\}_{i \in I}$ is a family of infinite index subgroups of G and M a $\mathbf{Z}_2G$ -module. The case where $\mathcal{S} = \{S\}$ is investigated. We verify that $E(G, \{S\}, M)$ has a interpretation in terms of derivations and principal derivations, and so in certain cases computation is available. Also we give a topological interpretation for $E(G, \{S\}, M)$ in terms of relative cohomology of complexes (X, Y) if (X, Y) is an Eilenberg-MacLane pair realizing (G, S) . This invariant is closely related to the classical end $e(G)$ for a group G , and the ends $e(G, S)$, $\tilde{e}(G, S)$ for a group pair. We denote $E(G, \{S\}, \mathbf{Z}_2(G/S))$ and $E(G, \{S\}, \mathbf{Z}_2G \otimes_{\mathbf{Z}_2S} PS)$ by $E(G, S)$ and $\tilde{E}(G, S)$ respectively. We have that $E(G, \{1\}) = \tilde{E}(G, \{1\}) = e(G)$ and in some cases $E(G, S) = e(G, S)$ and $\tilde{E}(G, S) = \tilde{e}(G, S)$. However we give examples where they are distinct. Some results are obtained in the case where G and S have certain property of duality. We relate $\tilde{E}(G, S)$ with decomposition of groups like HNN-extensions and free amalgamated product.

Resumo

Neste trabalho definimos um invariante cohomológico $E(G, \mathcal{S}, M)$ onde G é um grupo, $\mathcal{S} = \{S_i\}_{i \in I}$ é uma família de subgrupos de G de índice infinito e M é um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo. O caso onde $\mathcal{S} = \{S\}$ é investigado. Verificamos que $E(G, \{S\}, M)$ têm uma interpretação em termos de derivações e derivações principais, e deste modo em certos casos a computação deste invariante é possível. Também apresentamos uma interpretação topológica para $E(G, S, M)$ em termos de cohomologia relativa de complexos (X, Y) se (X, Y) é um par Eilenberg-MacLane realizando (G, S) . Este invariante está intimamente relacionado com o end clássico $e(G)$ para um grupo G , e os ends $e(G, S)$ e $\hat{e}(G, S)$ para um par grupo (G, S) . Denotamos $E(G, \{S\}, \mathbb{Z}_2(G/S))$ e $E(G, \{S\}, \mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}_2 S} PS)$ por $E(G, S)$ e $\hat{E}(G, S)$ respectivamente. Temos que $E(G, \{1\}) = \hat{E}(G, \{1\}) = e(G)$ e em alguns casos $E(G, S) = e(G, S)$ e $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$. Entretanto damos exemplos onde eles são distintos. Alguns resultados são obtidos no caso onde G e S têm certas propriedades de dualidade. Relacionamos $\hat{E}(G, S)$ com decomposições de grupos tais como HNN-extensões e produto livre amalgamado.

ÍNDICE

Introdução	i
Capítulo I. Preliminares	1
1. Homologia e Cohomologia de Grupos	2
2. H^* e H_* como funtores do módulo coeficiente e funtores de duas variáveis	8
3. Módulos Induzidos e Coinduzidos	10
4. $H^1(G, M)$ e extensões de grupos	21
5. Grupos de Dualidade	23
Capítulo II. Um Invariante cohomológico para par grupos	33
1. Cohomologia Relativa	34
2. O Invariante $E(G, S, M)$	38
3. $E(G, S)$ e Dualidade	46
4. $E(G, S)$ e o invariante $\text{end } e(G, S)$	53
5. Uma interpretação para $E(G, S, M)$ em termos de cohomologia relativa de complexos	67
Capítulo III. O Invariante $\hat{E}(G, S)$	71
1. O Invariante $\hat{E}(G, S)$	71
2. Propriedades	77
3. $\hat{E}(G, S)$ e o invariante $\text{end } \hat{e}(G, S)$	82
Capítulo IV. $\hat{E}(G, S)$ e decomposição de grupos	90
1. Decomposição de grupos	91
2. $\hat{E}(G, S)$ e decomposição de grupos segundo Kropholler e Roller	93
Bibliografia	105

INTRODUÇÃO

Sabemos da existência de invariantes denominados ends (mais precisamente número de ends) para X , um espaço topológico: $e(X)$; para G um grupo: $e(G)$ e para pares (G, S) : $e(G, S)$ e $\tilde{e}(G, S)$.

A teoria de ends de espaços topológicos foi introduzida por Freudenthal em [13] (1931).

A teoria de ends de grupos foi introduzida por Hopf [16] (1943) para grupos finitamente gerados e foi modelada na teoria de ends de espaços.

Posteriormente Specker [30] (1949) deu uma definição puramente algébrica para $e(G)$, para todo grupo G (não necessariamente finitamente gerado). Se G é infinito então

$$e(G) = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} H^1(G; \mathbf{Z}_2 G) = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} \frac{Der(G, \mathbf{Z}_2 G)}{P(G, \mathbf{Z}_2 G)}. \quad (1)$$

O end $e(G, S)$ foi introduzido por Houghton [17] (1974) para grupos topológicos, e Scott [26] (1977) explorou este invariante no caso discreto. Para $e(G, S)$ não existe uma fórmula cohomológica do tipo (1) quando $[G : S] = \infty$.

Quanto ao invariante end $\tilde{e}(G, S)$, foi definido por Kropholler e Roller em [2] (1989), e se $[G : S] = \infty$ então

$$\tilde{e}(G, S) = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} H^1(G; \mathcal{F}_S G) = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} \frac{Der(G, \mathcal{F}_S G)}{P(G, \mathcal{F}_S G)} \quad (2)$$

onde $\mathcal{F}_S G = \{A \subseteq G \mid A \subseteq F.S \text{ para algum subconjunto finito } F \text{ de } G\}$.

Com base na teoria de cohomologia relativa de grupos, nós definimos um invariante "end" generalizado $E(G, S, M)$ para G um grupo, $S = \{S_i, i \in I\}$ uma família de subgrupos de G com $[G : S_i] = \infty, \forall i \in I$ e M um $\mathbf{Z}_2 G$ -módulo qualquer.

A definição deste invariante (e parte do capítulo II deste trabalho) foi obtida em colaboração com Maria Gorete Carreira Andrade [2], e surgiu da tentativa de se obter

para $e(G, S)$ uma fórmula do tipo (1) envolvendo cohomologia relativa de grupos.

Neste trabalho estamos interessados no caso em que S consiste de um único subgrupo S , isto é, $S = \{S\}$. O caso genérico $E(G, S, M)$ é explorado por Maria Gorete Carreira Andrade em [1].

Relacionaremos os invariantes $E(G, \{S\}, \mathbb{Z}_2(G/S))$ e $E(G, \{S\}, \mathcal{F}_S G)$ com $e(G, S)$ e $\tilde{e}(G, S)$, respectivamente. Veremos que em certos casos eles coincidem. Porém, nossos invariantes dão uma condição necessária para que (G, S) seja um D^n -par, o que não ocorre com os demais.

Além disto, $E(G, \{S\}, \mathcal{F}_S G)$ nos dá informações a respeito do subgrupo S quando $e(G) = \infty$, o que não acontece com $\tilde{e}(G, S)$ pois, se $e(G) = \infty$ então $\tilde{e}(G, S) = \infty$ para qualquer subgrupo S .

Veremos também que sob algumas hipóteses $E(G, \{S\}, \mathcal{F}_S G)$ mede exatamente quando G se decompõe sobre subgrupo comensurável com S , o que não é verdade para $\tilde{e}(G, S)$.

Este Trabalho está dividido em 4 capítulos.

No capítulo I recordamos alguns resultados de (co)homologia de grupos e dualidade. O propósito deste capítulo é de fixar notação e evitar ao leitor frequentes consultas às referências.

No capítulo II, introduzimos o invariante $E(G, S, M)$ para $S = \{S_i\}_{i \in I}$, com $[G : S_i] = \infty$, $\forall i \in I$ e M um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo, ou seja,

$$E(G, S, M) = 1 + \dim_{\mathbb{Z}_2} \text{Ker } \text{res}_{S, M}^G$$

onde $\text{res}_{S, M}^G : H^1(G; M) \rightarrow \prod_{i \in I} H^1(S_i; M)$ é a aplicação restrição (II.2.1).

No caso em que $S = \{S\}$, nós denotamos $E(G, \{S\}, M)$ simplesmente por $E(G, S, M)$.

Algumas caracterizações deste invariante foram apresentadas.

A primeira é em termos de característica de Euler parcial (II.2.4), isto é, "Se a dimensão (em $\mathbb{Z}_2$) de $H^0(G; M)$, $H^0(S; M)$ e $H^1(G, S; M)$ é finita então

$$E(G, S, M) = 1 + \dim_{\mathbb{Z}_2} H^0(G; M) - \dim H^0(S; M) + \dim H^1(G, S; M)." \quad (3)$$

(Esta caracterização nos foi sugerida pelo Prof. Alejandro Adem).

A segunda é em termos de derivações e derivações principais (II.2.5), a saber

$$E(G, S, M) = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} \frac{H^1(G, S; M)}{P(G, S, M)} = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} \frac{Der(G, S, M)}{P(G, S, M)}. \quad (4)$$

A terceira é em termos de cohomologia relativa de complexos (II.5.2), ou seja, se (X, Y) é um par Eilenberg-MacLane realizando (G, S) então

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y; M)}{M^S/M^G}, \quad (5)$$

onde a cohomologia é tomada com coeficientes locais.

Neste capítulo nos dedicamos de modo especial ao invariante $E(G, \{S\}, \mathbf{Z}_2(G/S))$ que denotamos por $E(G, S)$.

Provamos que: Dado (G, S) com $[G : S] = \infty$, se (G, S) é um D^n -par então $E(G, S) = 1$ ou equivalentemente, se $E(G, S) \neq 1$ então (G, S) não é um D^n -par (II.3.6). (Este resultado é uma generalização do existente para um grupo, a saber, se G é um D^n -grupo, $n > 1$, então $e(G) = 1$).

Como aplicação deste resultado concluímos que um determinado par (G, S) não é de dualidade. Isto é obtido computando $E(G, S)$ em termos de derivações e derivações principais (II.3.8).

Também verificamos, por exemplo, que se G é um PD^n -grupo e S um PD^{n-1} -subgrupo então $E(G, S) \leq 2$.

Em II.4 relacionamos $E(G, S)$ com os ends $e(G)$ e $e(G, S)$. Verificamos (em II.4.24) que

$$E(G, S) \leq e(G, S)$$

e estabelecemos uma condição necessária e suficiente para se obter a igualdade (II.4.25). Nos casos em que a igualdade é válida (por exemplo quando S é normal em G (II.4.24 e II.4.30)) teremos para $e(G, S)$ uma fórmula do tipo (1) envolvendo cohomologia relativa, ou seja,

$$e(G, S) = 1 + \dim_{\mathbf{Z}_2} \frac{H^1(G, S; \mathbf{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbf{Z}_2(G/S))}.$$

Também nestes casos $e(G, S)$ terá uma interpretação topológica em termos de pares Eilenberg-MacLane (II.5.3).

No capítulo III, dados (G, S) com $[G : S] = \infty$, estudamos o invariante

$E(G, \{S\}, M)$ para $M = \mathcal{F}_S G \simeq \mathbb{Z}_2 G \otimes_{\mathbb{Z}_2 S} PS$, que denotamos por $\hat{E}(G, S)$.

Para este invariante conseguimos (III.1.6) uma definição equivalente que inclui o caso em que $[G : S] < \infty$ (isto não foi possível para $E(G, S)$).

Várias propriedades de $\hat{E}(G, S)$ são apresentadas. Por exemplo, provamos que $E(G, S) \leq \hat{E}(G, S)$ (III.2.1) e concluímos que a igualdade nem sempre ocorre (III.2.3).

Também observamos que não existe relação entre os invariantes $\hat{E}(G, S)$ e $e(G, S)$ (III.2.4).

Verificamos que $\hat{E}(G, S)$ preserva propriedades de dualidade análogas às obtidas para $E(G, S)$ embora seja um majorante de $E(G, S)$ (III.2.8). Usando estas propriedades concluímos, por exemplo, que $\hat{E}(\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}_n, \mathbb{Z} * \mathbb{Z}) = 2$ (III.2.10)(ii).

Por último (III.3) comparamos $\hat{E}(G, S)$ com $\tilde{e}(G, S)$. Temos que $\hat{E}(G, S) \leq \tilde{e}(G, S)$, mas a igualdade nem sempre ocorre pois, por exemplo, a propriedade: "se (G, S) é um D^n -par então $\hat{E}(G, S) = 1$ " não é verdadeira para $\tilde{e}(G, S)$ (III.3.6). Uma condição necessária (no caso em que os invariantes são finitos) e suficiente para se obter a igualdade é que $\text{res}_{S, \mathcal{F}_S G}^G$ seja a aplicação nula. Apresentamos certos casos em que a igualdade ocorre. Por exemplo, se S é normal e finitamente gerado (III.3.9) ou se S é um PD^n -grupo e $\{g \in G \mid cd(S^g \cap S) = n - 1\} = \emptyset$ (III.3.11). Como aplicação deste último resultado computamos $\hat{E}(G, S)$ em um exemplo específico (III.3.12).

Finalizando observamos que por (5) $\hat{E}(G, S)$ tem uma interpretação topológica em termos de pares Eilenberg-MacLane. Daí, $\tilde{e}(G, S)$ também terá tal interpretação se a igualdade $\tilde{e}(G, S) = \hat{E}(G, S)$ for válida (III.3.16).

No último capítulo analisamos alguns dos resultados de Kropholler e Roller sobre decomposição de grupos [21] em termos de nosso invariante $\hat{E}(G, S)$.

Em todos os resultados de [21] é suposto que $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ ($\iff \tilde{e}(G, S) = 2$ por (2)). Se G e S são finitamente gerados, os autores apresentaram uma condição necessária e (sob certas restrições) suficiente, para G se decompor sobre um subgrupo comensurável com S . A condição é que a obstrução $\text{sing}_G(S)$ (introduzida pelos autores), seja nula.

Verificamos que $\hat{E}(G, S)$ substitui a obstrução $\text{sing}_G(S)$ (que está definida

somente quando $\hat{e}(G, S) = 2$). Por exemplo, adaptando um dos resultados de [21] em termos de $\hat{E}(G, S)$ temos: "se G é um PD^n -grupo e S um PD^{n-1} -subgrupo então G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S se e somente se $\hat{E}(G, S) = 2$."

Nosso objetivo é obter resultados similares aos de [21], porém substituindo $\text{sing}_G(S)$ por $\hat{E}(G, S)$, e sempre que possível, retirar a hipótese $\hat{e}(G, S) = 2$.

Neste sentido verificamos que o seguinte resultado é válido sem tal hipótese. "Se G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S então $\hat{E}(G, S) \geq 2$ " (IV.2.6). Daí concluímos que: "Se (G, S) é um D^n -par então G não se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S " (IV.2.7).

Com isto temos exemplos de pares (G, S) tais que $\hat{e}(G, S) \neq 2$ (e portanto $\text{sing}_G(S)$ não está definida) mas no entanto, usando $\hat{E}(G, S)$ podemos concluir que G não se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S (IV.2.8).

Em outro resultado analisado verificamos que a hipótese $\hat{e}(G, S) = 2$ é consequência das outras, portanto não é possível retirá-la. Também verificamos que uma das condições imposta neste resultado pode ser enfraquecida (IV.2.11).

CAPÍTULO I

Preliminares

O objetivo deste capítulo é recordar alguns resultados da teoria de (co)homologia de grupos envolvendo a teoria de dualidade, que serão úteis no desenvolvimento deste trabalho.

Para as secções 1 à 4 nossa referência básica será [8]. Queremos observar que em [8] a (co)homologia de um grupo G é definida sobre o anel $\mathbb{Z}$ dos inteiros, com coeficientes em um $\mathbb{Z}G$ -módulo M , porém pode-se considerar, no lugar de $\mathbb{Z}$, qualquer anel com unidade R .

Aqui consideraremos o caso em que R é o anel $\mathbb{Z}$ ou o corpo $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ de dois elementos. Porém nosso interesse (nos capítulos seguintes) é no caso em que $R = \mathbb{Z}_2$. Portanto nos restringiremos, sempre que for conveniente, somente a este caso.

Para a secção 5 nossa referência básica será as notas de R. Bieri [4].

A seguir damos uma breve descrição do conteúdo deste capítulo: Primeiro introduzimos o conceito de homologia e cohomologia de grupos, via resoluções projetivas de R sobre RG , e apresentamos a interpretação topológica de $H_*(G; M)$ e $H^*(G; M)$ para todo RG -módulo M (secção 1). A seguir (na secção 2) vemos H_* e H^* como funtores covariantes do módulo coeficiente, e mais geralmente, como funtores de duas variáveis.

Na secção 3 estudamos os $\mathbb{Z}_2G$ -módulos do tipo $Ind_S^G M$ e $Coind_S^G M$, onde S é um subgrupo qualquer de G e M é um $\mathbb{Z}_2S$ -módulo. Esta secção é fundamental para os próximos capítulos. Nela recordamos propriedades básicas que serão muitas vezes utilizadas em nossos resultados, dentre elas destacamos a *Fórmula de Mackey* e o *Lema de*

Shapiro. Na secção 4 apresentamos a interpretação de $H^1(G; M)$ em termos de extensões cindidas de grupos.

Finalmente, na secção 5, recordamos o conceito de dimensão (co)homológica, grupos de dualidade e suas propriedades mais relevantes.

Notações especiais: Conforme observamos acima, nos restringiremos quase sempre ao caso em que $R = \mathbb{Z}_2$. Assim, por conveniência, em todos os capítulos, denotaremos $-\otimes_{\mathbb{Z}_2 G} -, Hom_{\mathbb{Z}_2 G}(-, -), -\otimes_{\mathbb{Z}_2} -, Hom_{\mathbb{Z}_2}(-, -)$ e $dim_{\mathbb{Z}_2}$ respectivamente por $-\otimes_G -, Hom_G(-, -), -\otimes -, Hom(-, -)$ e dim .

1. Homologia e Cohomologia de Grupos

Para nós G sempre denotará um grupo, R o anel $\mathbb{Z}$ ou o corpo $\mathbb{Z}_2$, e RG o anel grupo de G sobre R : Os elementos de RG são somas formais $\sum r_g g$ com $r_g \in R$, $g \in G$ onde $r_g = 0$ para quase todo g (portanto RG é o R -módulo livre gerado pelos elementos de G) e, as operações são dadas por

$$\begin{aligned}(\sum r_g g) + (\sum s_g g) &= \sum (r_g + s_g) g \\ (\sum r_g g) \cdot (\sum s_g g) &= \sum t_g g, \quad \text{onde } t_g = \sum_{xy=g} r_x s_y.\end{aligned}$$

A unidade de RG é o elemento $1 = 1 \cdot \epsilon$ onde ϵ é o elemento neutro de G . O elemento $1g \in RG$ será denotado por g .

Para qualquer grupo G podemos definir o homomorfismo de anéis

$$\epsilon : RG \rightarrow R, \quad \text{tal que } \epsilon(g) = 1, \quad \text{para todo } g \in G.$$

Este homomorfismo é denominado *aplicação aumentação*.

1.1: Neste trabalho, a menos que se especifique o contrário, trabalharemos na categoria de RG -módulos à esquerda.

É interessante observar que todo RG -módulo à esquerda N ($R = \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_2$) pode ser considerado como um RG -módulo à direita por definir $n \cdot (rg) = (rg^{-1})n$, para

$r \in R$, $g \in G$ e $n \in N$. De modo análogo, todo RG -módulo à direita pode ser considerado como um RG -módulo à esquerda.

1.2 Observações: (a) Se M é um RG -módulo (à esquerda) então:

(i) M é um R -módulo (à esquerda) pois basta definir $r.m := (re)m$ onde e é o elemento neutro de G , e

(ii) Existe uma ação (à esquerda) de G em M dada por $g.m = (1g)m$.

Reciprocamente, se M é um R -módulo e existe uma ação de G em M então podemos dar a M uma estrutura de RG -módulo, definindo $(rg).m := r(gm)$ e estendendo por linearidade.

Assim, para que M seja um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo é necessário, e suficiente, que M seja um $\mathbb{Z}_2$ -módulo (isto é, um grupo abeliano em que todo elemento tem ordem 2 e portanto $m = -m$) e que exista uma ação de G sobre M .

Logo, se M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo então obviamente M é um $\mathbb{Z}G$ -módulo.

(b) O anel R será sempre considerado um RG -módulo com a G -ação trivial, isto é, $g.r = r$, para todo $r \in R$ e $g \in G$. Assim, $(\sum r_g g).r = \sum r_g (g.r) = \sum r_g r$.

No caso em que $R = \mathbb{Z}_2$ esta é a única estrutura de $\mathbb{Z}_2G$ -módulo possível, pois $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2) = \{id\}$.

(c) *A ação diagonal:* Sejam M e N RG -módulos (à esquerda). Nós podemos dar a $M \otimes_R N$ (respectivamente $\text{Hom}_R(M, N)$) uma estrutura de RG -módulo induzida pela G -ação diagonal

$$g.(m \otimes n) = gm \otimes gn, \quad \forall g \in G, m \in M \text{ e } n \in N$$

$$(\text{resp. } (g.f)(m) = gf(g^{-1}m), \quad \forall g \in G, m \in M \text{ e } f \in \text{Hom}_R(M, N)).$$

Uma *resolução projetiva* de R sobre RG é uma sequência exata de RG -módulos

$$\cdots \rightarrow F_n \xrightarrow{\partial_n} F_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow F_1 \xrightarrow{\partial_1} F_0 \xrightarrow{\epsilon} R \rightarrow 0 \quad (*)$$

em que cada F_i é RG -projetivo.

Tal resolução sempre existe pois podemos tomar $F_0 = RG$, ϵ a aplicação

aumentação, e se $F_1, \dots, F_n$ são definidos, tomamos para F_{n+1} qualquer módulo livre aplicado sobre $K_n := \text{Ker}(F_n \rightarrow F_{n-1})$ e para ∂_{n+1} a aplicação correspondente $F_{n+1} \twoheadrightarrow K_n \hookrightarrow F_n$. Note que esta construção nos dá uma resolução livre de R .

Por conveniência às vezes denotamos uma resolução $(*)$ simplesmente por $\epsilon : F \twoheadrightarrow R$.

1.3 Definição: *Sejam $F \xrightarrow{\epsilon} R$ uma resolução projetiva de R sobre RG e M um RG -módulo (à esquerda). Consideremos os complexos*

$$F \otimes_{RG} M : \cdots \rightarrow F_2 \otimes_{RG} M \rightarrow F_1 \otimes_{RG} M \rightarrow F_0 \otimes_{RG} M \rightarrow 0 \quad e$$

$$\text{Hom}_{RG}(F, M) : 0 \rightarrow \text{Hom}_{RG}(F_0, M) \rightarrow \text{Hom}_{RG}(F_1, M) \rightarrow \cdots$$

Os grupos de (co)homologia de G com coeficientes em M são definidos por

$$H^j(G; M) = H^j(\text{Hom}_{RG}(F, M)) ,$$

$$H_j(G; M) = H_j(F \otimes_{RG} M), \quad j = 0, 1, \dots$$

Quando $M = \mathbb{Z}$ com a G -ação trivial é usual denotar $H^*(G; M)$ (resp. $H_*(G; M)$) por $H^*(G)$ (resp. $H_*(G)$). Neste caso os grupos são denominados *grupos de cohomologia de G* (resp. *grupos de homologia de G*).

1.4 Observações: (a) Estamos levando em conta 1.1 quando usamos a mesma resolução F para definir os grupos de homologia e cohomologia, pois em $F_n \otimes_{RG} M$, F_n é considerado como RG -módulo à direita enquanto que em $\text{Hom}_{RG}(F_n, M)$, F_n é visto como RG -módulo à esquerda.

(b) Pode-se verificar que a definição acima independe da resolução projetiva escolhida (cf. [8, 1.7.5]).

(c) Para qualquer grupo G podemos construir uma resolução bastante importante no estudo dos grupos de (co)homologia denominada *resolução Bar* (cf. [8, 1.5]). Ela é dada por:

$$\cdots \rightarrow F_n \xrightarrow{\partial} F_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \xrightarrow{\epsilon} R$$

onde F_n é o RG -módulo livre gerado pelos símbolos $[g_1 | g_2 | \dots | g_n]$, $g_i \in G$. Se $n = 0$, existe somente um tal elemento básico, denotado por $[\]$, assim F_0 pode ser identificado com RG se identificamos $[\]$ com 1. O operador bordo é dado por

$$\partial[g_1 | \dots | g_n] = \sum_{i=1}^n (-1)^i d_i[g_1 | \dots | g_n], \text{ onde } d_i \text{ é o } RG\text{-homomorfismo}$$

dado por:

$$d_i[g_1 | \dots | g_n] = \begin{cases} g_1[g_2 | \dots | g_n] & \text{se } i = 0 \\ [g_1 | \dots | g_{i-1} | g_i g_{i+1} | g_{i+2} | \dots | g_n] & \text{se } 0 < i < n \\ [g_1 | \dots | g_{n-1}] & \text{se } i = n. \end{cases}$$

Em dimensões baixas, esta resolução tem a forma

$$F_2 \xrightarrow{\partial_2} F_1 \xrightarrow{\partial_1} RG \xrightarrow{\epsilon} R \rightarrow 0,$$

onde

$$\begin{cases} \partial_2[g | h] = g[h] - [gh] + [g], \\ \partial_1([g]) = g[\] - [\] = g - 1, \text{ e} \\ \epsilon(1) = 1. \end{cases}$$

(Se exigirmos que em $[g_1 | g_2 | \dots | g_n]$ tenhamos $g_i \neq 1$, para todo $1 \leq i \leq n$ então nós temos a chamada *resolução bar normalizada*).

Se $F \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_2$ é a resolução bar de $\mathbb{Z}_2$ sobre $\mathbb{Z}_2 G$, vamos denotar $\text{Hom}_G(F_n, M)$ por $C^n(G, M)$. Um elemento de $C^n(G, M)$ pode ser considerado como uma função $f : G^n \rightarrow M$, isto é, uma função de n variáveis de G a M onde identificamos $[g_1 | g_2 | \dots | g_n]$ com $(g_1, \dots, g_n)$. O operador cobordo $\delta : C^{n-1}(G, M) \rightarrow C^n(G, M)$ é dado por

$$(\delta f)(g_1, \dots, g_n) = g_1 f(g_2, \dots, g_n) - f(g_1 g_2, \dots, g_n) + \dots + (-1)^n f(g_1, \dots, g_{n-1}).$$

Em particular, $\delta : C^0(G, M) \rightarrow C^1(G, M)$ é tal que $(\delta f)(g) = gf[\] - f[\]$.

1.5: Sejam G um grupo e M um RG -módulo. O grupo das derivações de G em M é definido por

$$\text{Der}(G, M) = \{f : G \rightarrow M \mid f(gh) = gf(h) + f(g), \forall g, h \in G\},$$

e o subgrupo das derivações principais por

$$P(G, M) = \{d_m : G \rightarrow M, m \in M \mid d_m(g) = gm - m, \forall g \in G\}.$$

Observe que, no caso em que $R = \mathbb{Z}_2$, temos por 1.2 (a),

$$P(G, M) = \{d_m : G \rightarrow M, m \in M \mid d_m(g) = gm + m, \forall g \in G\}.$$

Usando a resolução bar obtem-se facilmente a seguinte interpretação de $H^1(G, M)$ em termos de derivações e derivações principais:

1.6 Lema: *Se G é um grupo e M é um RG -módulo, então*

$$H^1(G, M) = \frac{Der(G, M)}{P(G, M)}. \quad \square$$

O resultado abaixo nos diz que, na categoria de $\mathbb{Z}_2G$ -módulos, os grupos de (co)homologia sobre $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}$ são equivalentes. Nós apresentamos aqui um esboço da prova deste resultado, visto que ele não se encontra em nossa referência básica [8].

1.7 Proposição: *Se M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo então temos um isomorfismo natural de $H^*(G; M)$ com M visto como $\mathbb{Z}_2G$ -módulo e $H^*(G; M)$ para M considerado como $\mathbb{Z}G$ -módulo. Analogamente para $H_*(G; M)$.*

Demonstração: Seja $F \twoheadrightarrow \mathbb{Z}$ uma resolução projetiva de $\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Z}G$. Então $F' = F \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_2$ é uma $\mathbb{Z}_2G$ -resolução projetiva de $\mathbb{Z}_2$ (cf. [9, p.6]). Agora nós temos isomorfismos naturais

$$\begin{aligned} \phi : Hom_G(F', M) &\rightarrow Hom_{\mathbb{Z}G}(F, M) \\ \psi : F' \otimes_G M &\rightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}G} M \end{aligned}$$

dados por $\phi(f)(x) = f(x \otimes 1)$, $\psi((x \otimes r) \otimes m) = x \otimes rm$, $\forall f \in Hom_G(F', M)$, $x \in F$, $r \in \mathbb{Z}_2$ e $m \in M$; o que produz, levando em conta a definição 1.3, o resultado desejado. $\square$

1.8 Interpretação Topológica: Finalizando esta secção veremos (na proposição abaixo) que a (co)homologia de G está relacionada com complexos $K(G, 1)$.

Recordemos que se Y é um CW -complexo então Y é denominado *complexo de Eilemberg-MacLane de tipo $(G, 1)$* ou simplesmente um *complexo $K(G, 1)$* se Y satisfaz as seguintes condições:

- (i) Y é conexo
- (ii) $\pi_1(Y) = G$
- (iii) O recobrimento universal de Y é contráctil (ou equivalentemente, $\pi_i(Y) = 0$ para todo $i \geq 2$).

Dado um grupo G é sempre possível construir um complexo $K(G, 1)$ [35, 2.10].

Também, dado um $\mathbb{Z}G$ -módulo M e Y um complexo $K(G, 1)$ podemos construir o sistema de coeficientes locais $\mathcal{M}$ sobre Y associado ao $\mathbb{Z}G$ -módulo M [36, cap. VI].

Para a demonstração da proposição nos referimos [8, II.4.1] para o caso em que $M = R$ com a G -ação trivial e [15, teor. 10.7.14c] para o caso geral, sempre levando em consideração a proposição anterior.

1.9 Proposição: *Sejam G um grupo, M um RG -módulo e Y um complexo $K(G, 1)$. Então*

- (i) $H_*(G; M) \simeq H_*(Y; \mathcal{M})$ e,
- (ii) $H^*(G; M) \simeq H^*(Y; \mathcal{M})$,

onde $\mathcal{M}$ é o sistema de coeficientes locais sobre Y associado ao $\mathbb{Z}G$ -módulo M . □

Note que se M é um RG -módulo trivial (isto é, $g.m = m$, $\forall g \in G$) então

$$H_*(G; M) \simeq H_*(Y, M) \quad \text{e} \quad H^*(G; M) \simeq H^*(Y, M),$$

em particular

$$H_*(G) = H_*(Y) \quad \text{e} \quad H^*(G) = H^*(Y).$$

2. H^* e H_* como funtores do módulo coeficiente e funtores de duas variáveis

2.1: Uma vez que $F \otimes_{RG} -$ e $\text{Hom}_{RG}(F, -)$ são funtores covariantes, é claro que $H_*(G; -)$ e $H^*(G; -)$ serão também funtores covariantes da categoria de RG -módulos na categoria dos grupos abelianos. Se $f : M \rightarrow M'$ é um RG -homomorfismo a aplicação induzida $H_*(G; f) : H_*(G; M) \rightarrow H_*(G; M')$ ($H^*(G; f) : H^*(G; M) \rightarrow H^*(G; M')$) será denotada, caso não haja confusão, simplesmente por f_* (resp. f^*).

Na proposição abaixo apresentamos algumas propriedades básicas dos funtores $H_*(G; -)$ e $H^*(G; -)$. Antes introduziremos algumas notações.

Seja M um RG -módulo. Denotemos por

$$M^G = \{m \in M \mid gm = m, \forall g \in G\} \quad \text{e,}$$

$$M_G = M / \langle gm - m; g \in G, m \in M \rangle \quad (\text{o quociente de } M \text{ pelo subgrupo aditivo gerado pelos elementos da forma } gm - m, m \in M, g \in G).$$

Pode-se verificar, facilmente, que

$$M^G \simeq \text{Hom}_{RG}(R, M) \quad \text{e} \quad M_G \simeq R \otimes_{RG} M.$$

2.2 Proposição:[8, III.6.1] *Seja M um RG -módulo:*

(i) *Existe um isomorfismo natural $H_0(G; M) \simeq M_G$*

(i)' *Existe um isomorfismo natural $H^0(G; M) \simeq M^G$*

(ii) *Para qualquer sequência exata $0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{j} M'' \rightarrow 0$ de RG -módulos e qualquer inteiro n existe uma aplicação natural $\partial : H_n(G; M'') \rightarrow H_{n-1}(G; M')$ tal que a sequência*

$$\dots \rightarrow H_1(G; M) \xrightarrow{j_*} H_1(G; M'') \xrightarrow{\partial} H_0(G; M') \xrightarrow{i_*} H_0(G; M) \xrightarrow{j_*} H_0(G; M'') \rightarrow 0$$

é exata.

(ii)' *Para qualquer sequência exata como em (ii) e qualquer inteiro n existe uma aplicação natural $\delta : H^n(G; M'') \rightarrow H^{n+1}(G; M')$ tal que a sequência*

$$0 \rightarrow H^0(G; M') \xrightarrow{i^*} H^0(G; M) \xrightarrow{j^*} H^0(G; M'') \xrightarrow{\delta} H^1(G; M') \xrightarrow{i^*} H^1(G; M) \rightarrow \dots$$

é exata. □

Podemos mais geralmente ver H_* e H^* como funtor de duas variáveis como segue:

2.3: Vejamos H_* como um funtor de duas variáveis. Seja $\mathcal{C}_0$ a seguinte categoria: Um objeto de $\mathcal{C}_0$ é um par (G, M) onde G é um grupo e M um RG -módulo; uma aplicação de (G, M) em (G', M') é um par (α, f) onde $\alpha : G \rightarrow G'$ é uma aplicação de grupos e $f : M \rightarrow M'$ é uma aplicação de grupos abelianos tal que $f(gm) = \alpha(g)f(m)$, para $g \in G$, $m \in M$ (isto é, f é um homomorfismo de RG -módulos se M' é considerado como RG -módulo via α (ver secção seguinte)). Dado (α, f) seja F (resp. F') uma resolução projetiva de R sobre RG (resp. RG') e seja $\tau : F \rightarrow F'$ uma aplicação de cadeia compatível com α como em [8, II.6], (isto é, $\tau(gx) = \alpha(g)\tau(x)$, para $g \in G$ e $x \in F$). Então existe uma aplicação de cadeia

$$\tau \otimes f : F \otimes_{RG} M \rightarrow F' \otimes_{RG} M',$$

e $\tau \otimes f$ induz uma aplicação bem definida

$$(\alpha, f)_* : H_*(G; M) \rightarrow H_*(G'; M').$$

Deste modo H_* torna-se um funtor covariante sobre $\mathcal{C}_0$. No caso em que $M = M'$ e $f = id$, nós às vezes simplesmente escrevemos α_* para $(\alpha, id_{M'})_* : H_*(G; M') \rightarrow H_*(G'; M')$.

Note que a aplicação geral $(\alpha, f)_*$ pode ser escrita como a composta

$$H_*(G; M) \xrightarrow{H_*(G; f)} H_*(G; M') \xrightarrow{\alpha_*} H_*(G'; M'),$$

onde $H_*(G; f)$ faz sentido porque f é uma aplicação de RG -módulos.

2.4: Para a cohomologia a situação é semelhante. Seja $\mathcal{C}_1$ a categoria com os mesmos objetos que $\mathcal{C}_0$, mas onde uma aplicação de (G, M) em (G', M') é agora um par $(\alpha : G \rightarrow G', f : M' \rightarrow M)$. Como antes nós exigimos que f seja uma aplicação de RG -módulos via α , isto é, $f(\alpha(g)m') = gf(m')$ para $g \in G$, $m' \in M'$. Se F e F' são

resoluções para G e G' e $\tau : F \rightarrow F'$ é uma aplicação de cadeia compatível com α , existe uma aplicação de cadeia

$$Hom(\tau, f) : Hom_{RG}(F', M') \rightarrow Hom_{RG}(F, M),$$

que induz

$$\begin{aligned} (\alpha, f)^* : H^*(G'; M') &\rightarrow H^*(G; M). \\ [k] &\rightarrow [f \circ k \circ \tau] \end{aligned}$$

Assim H^* é um funtor contravariante sobre $\mathcal{C}_1$. No caso em que $M = M'$, escrevemos α^* para $(\alpha, id_{M'})^*$; note que a aplicação geral $(\alpha, f)^*$ é a composta

$$H^*(G'; M') \xrightarrow{\alpha^*} H^*(G; M') \xrightarrow{H^*(G; f)} H^*(G; M).$$

3. Módulos Induzidos e Coinduzidos

Seja $\alpha : \Lambda \rightarrow \Gamma$ um homomorfismo de anéis unitários. Então qualquer Γ -módulo (à esquerda) N pode ser considerado como um Λ -módulo (à esquerda) via α , definindo

$$a.n = \alpha(a)n, \quad \forall a \in \Lambda, \quad n \in N.$$

Neste caso dizemos que N é um Λ -módulo por *restrições de escalares*. (Vale construção análoga para módulos à direita).

Por outro lado, dado um Λ -módulo (à esquerda) M podemos obter, a partir de M , dois Γ -módulos (à esquerda) bastante relacionados com M :

1. Considere, por restrição de escalares, Γ como um Λ -módulo à direita, então podemos definir o produto tensorial $\Gamma \otimes_{\Lambda} M$. Este produto pode ser visto como Γ -módulo (à esquerda) definindo $x.(x' \otimes m) = xx' \otimes m$, $\forall x, x' \in \Gamma$ e $m \in M$ (onde xx' é o produto em Γ). $\Gamma \otimes_{\Lambda} M$ com esta estrutura de Γ -módulos é denominado o *módulo obtido de M por extensão de escalares de Λ à Γ* (via α).

2. Analogamente, considere, por restrição de escalares, Γ como um Λ -módulo à esquerda. Então podemos definir $\text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)$. $\text{Hom}_\Gamma(\Gamma, M)$ pode ser visto como Γ -módulo (à esquerda) definindo $(x.f)(x') = f(x'x)$, $\forall x, x' \in \Gamma$ e $f \in \text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)$. Este Γ -módulo é denominado o *módulo obtido de M por co-extensão de escalares* (via α).

O lema a seguir será utilizado na construção 3.2 abaixo. Embora seja elementar, o demonstraremos aqui para familiarizar o leitor com as muitas ações envolvidas.

3.1 Lema: *Seja M um Λ -módulo. Se $\Gamma \otimes_\Lambda M$ e $\text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)$ são os Γ -módulos obtidos de M por extensão e co-extensão de escalares, então as aplicações naturais*

$$1) i : M \rightarrow \Gamma \otimes_\Lambda M \text{ dada por } i(m) = 1 \otimes m, \text{ e}$$

$$2) \pi : \text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M) \rightarrow M \text{ dada por } \pi(f) = f(1) \quad (1 \in \Gamma)$$

são Λ -homomorfismos se vemos os Γ -módulos $\Gamma \otimes_\Lambda M$ e $\text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)$ como Λ -módulos por restrição de escalares via α .

Demonstração:

1) $i(am) = 1 \otimes am = 1.a \otimes m = 1\alpha(a) \otimes m = \alpha(a)1 \otimes m = \alpha(a)(1 \otimes m) = a.i(m)$, para todo $a \in \Lambda$ e $m \in M$.

2) $\pi(a.f) = \pi(\alpha(a)f) = (\alpha(a)f)(1) = f(1\alpha(a)) = f(\alpha(a)1) = f(a.1) = af(1) = a\pi(f)$, para todo $a \in \Lambda$ e $f \in \text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)$. $\square$

3.2: [8, III.3.3 e 3.6] Sejam $\alpha : \Lambda \rightarrow \Gamma$ um homomorfismo de anéis (unitários), M um Λ -módulo e N um Γ -módulo. Então:

1. Dado uma aplicação de Λ -módulos $f : M \rightarrow N$ (onde N é visto como Λ -módulo via α), existe uma única aplicação de Γ -módulos $\varphi : \Gamma \otimes_\Lambda M \rightarrow N$ tal que $\varphi \circ i = f$. A aplicação φ é dada por $\varphi(x \otimes m) = xf(m)$.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{i} & \Gamma \otimes_\Lambda M \\ \downarrow f & \swarrow \varphi & \\ N & & \end{array}$$

Assim obtemos um isomorfismo

$$\begin{aligned}\rho : \text{Hom}_\Lambda(M, N) &\xrightarrow{\cong} \text{Hom}_\Gamma(\Gamma \otimes_\Lambda M, N) \\ f &\rightarrow \rho(f) = \varphi,\end{aligned}$$

com inverso dado por $\rho^{-1}(\varphi) = \varphi \circ i$.

2. Dada uma aplicação de Λ -módulos $f : N \rightarrow M$, existe uma única aplicação de Γ -módulos $\psi : N \rightarrow \text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)$ tal que $\pi \circ \psi = f$. A aplicação ψ é dada por $\psi(n)(a) = f(an)$.

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M) \\ & \nearrow \psi & \downarrow \pi \\ N & \xrightarrow{f} & M\end{array}$$

Assim obtemos um isomorfismo

$$\begin{aligned}\gamma : \text{Hom}_\Lambda(N, M) &\xrightarrow{\cong} \text{Hom}_\Gamma(N, \text{Hom}_\Lambda(\Gamma, M)) \\ f &\rightarrow \gamma(f) = \psi\end{aligned}$$

com inverso dado por $\gamma^{-1}(\psi) = \pi \circ \psi$.

Sejam G um grupo e S um subgrupo de G . Nosso interesse é aplicar a teoria anterior para o homomorfismo de anéis $\alpha : \Lambda = \mathbb{Z}_2 S \rightarrow \Gamma = \mathbb{Z}_2 G$, induzido da inclusão $S \subset G$.

Notação: Seja N um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo. Denotaremos por $\text{Res}_S^G N$ o $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo obtido de N por restrição de escalares de G a S (via $\alpha : \mathbb{Z}_2 S \rightarrow \mathbb{Z}_2 G$).

3.3 Definição: Seja M um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo. O $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo obtido de M por extensão (resp. co-extensão) de escalares de $\mathbb{Z}_2 S$ a $\mathbb{Z}_2 G$ via α é denominado indução (resp. co-indução) de S em G .

Escreveremos:

$$\begin{aligned}\text{Ind}_S^G M &= \mathbb{Z}_2 G \otimes_S M, \\ \text{Coind}_S^G M &= \text{Hom}_S(\mathbb{Z}_2 G, M).\end{aligned}$$

Observemos que em $\text{Ind}_S^G M$, $\mathbb{Z}_2 G$ é visto como $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo à direita com a S -ação $g.s = g\alpha(s) = gs$ (multiplicação à direita), e em $\text{Coind}_S^G M$, $\mathbb{Z}_2 G$ é visto como $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo com a S -ação multiplicação à esquerda ($s.g = sg$).

$Ind_S^G M$ é visto como $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo com a G -ação dada por $g.(g' \otimes m) = gg' \otimes m$, $\forall g, g' \in G$ e $m \in M$; e $Coind_S^G M$ é visto como $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo com a G -ação $(g.f)(g') = f(g'g)$, $\forall g, g' \in G$, $f \in Hom_S(\mathbb{Z}_2 G, M)$.

Os módulos da forma $Ind_{\{1\}}^G M$ e $Coind_{\{1\}}^G M$ são denominados, respectivamente, *módulos induzidos e co-induzidos*.

Denotaremos o módulo coinduzido $Coind_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2$ por $\overline{\mathbb{Z}_2 G}$.

3.4 Observações: (a) Considerando os $\mathbb{Z}_2 S$ -homomorfismos do lema 3.1, pode-se facilmente verificar que $i : M \rightarrow Ind_S^G M$ ($m \rightarrow 1 \otimes m$) é um $\mathbb{Z}_2 S$ -monomorfismo, e $\pi : Coind_S^G M \rightarrow M$ ($f \rightarrow f(1)$), é um $\mathbb{Z}_2 S$ -epimorfismo.

(b) $\mathbb{Z}_2 G$ é um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo livre, como base podemos tomar qualquer conjunto E de representantes para as classes laterais gS . Assim $\mathbb{Z}_2 G = \bigoplus_{g \in E} g \mathbb{Z}_2 S$.

Segue de (a) que M é canonicamente $\mathbb{Z}_2 S$ -isomorfo a $1 \otimes M$, portanto podemos identificar M com $1 \otimes M$.

Por outro lado, segue de (b), que $\mathbb{Z}_2 G \otimes_S M$ como grupo abeliano admite a decomposição

$$\mathbb{Z}_2 G \otimes_S M = \bigoplus_{g \in G/S} g \otimes M,$$

onde $g \otimes M = \{g \otimes m, m \in M\}$. (Por um abuso de notação estamos indicando um conjunto de representantes para as classes laterais gS por G/S).

Como $g(1 \otimes m) = g \otimes m$, então $g \otimes M$ é simplesmente o transformado de $1 \otimes m$ pela ação de G . Logo podemos identificar $g \otimes m = g(1 \otimes m)$ com gM . Assim temos:

3.5 Proposição: [8, III.5.1] *Seja M um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo.*

(i) *O $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo $Ind_S^G M$ contém M como $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo e admite uma decomposição em soma direta*

$$Ind_S^G M = \bigoplus_{g \in G/S} gM,$$

onde gM é o transformado de M pela ação de G .

Analogamente,

(ii) $\text{Coind}_S^G M$ admite uma decomposição em produto direto, isto é, existe uma família de sobrejeções $\pi_g : \text{Coind}_S^G M \twoheadrightarrow gM$, $g \in G/S$ tal que a aplicação correspondente

$$\text{Coind}_S^G M \rightarrow \prod_{g \in G/S} gM$$

é um isomorfismo. □

Seja M um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo. Consideremos a aplicação

$$\varphi_0 : M \rightarrow \text{Coind}_S^G M \quad \text{onde } m \mapsto \varphi_0(m) \mid \varphi_0(m)(g) = \begin{cases} gm & \text{se } g \in S \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Então φ_0 é claramente um $\mathbb{Z}_2 S$ -homomorfismo, pois

$$\varphi_0(sm)(g) = \begin{cases} g(sm) = gsm & \text{se } g \in S, \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$s\varphi_0(m)(g) = \varphi_0(m)(gs) = \begin{cases} gsm & \text{se } gs \in S, \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases}$$

e, como $s \in S$, temos que $gs \in S$ se e somente se $g \in S$.

Considerando em 3.2 (1), $N = \text{Coind}_S^G M$ e $f = \varphi_0$, existe uma única aplicação de $\mathbb{Z}_2 G$ -módulos $\varphi : \text{Ind}_S^G M \rightarrow \text{Coind}_S^G M$ tal que $\varphi \circ i = \varphi_0$. φ é dada por $\varphi(g_0 \otimes m) = g_0 \varphi_0(m)$ e portanto,

$$\varphi(g_0 \otimes m)(g) = (g_0 \varphi_0(m))(g) = \varphi_0(m)(gg_0) = \begin{cases} gg_0 m & \text{se } gg_0 \in S \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

O resultado seguinte nos diz que podemos sempre ver $\text{Ind}_S^G M$ como um submódulo de $\text{Coind}_S^G M$ (via a aplicação φ).

3.6 Proposição: [8, III.5.9] *Seja M um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo.*

(i) *A $\mathbb{Z}_2 G$ -aplicação $\varphi : \text{Ind}_S^G M \rightarrow \text{Coind}_S^G M$ definida acima é um $\mathbb{Z}_2 G$ -monomorfismo, e se escrevermos $\text{Ind}_S^G M$ como uma soma direta e $\text{Coind}_S^G M$ como um produto direto de cópias de M então φ pode ser identificada com a inclusão canônica da soma no produto.*

(ii) Se $[G : S] < \infty$ então $\varphi : \text{Ind}_S^G M \rightarrow \text{Coind}_S^G M$ é um $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo. $\square$

3.7 Observação: Em particular podemos considerar (através da φ), $\mathbb{Z}_2 G \simeq \text{Ind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2$ como um submódulo do módulo coinduzido $\overline{\mathbb{Z}_2 G} = \text{Coind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2$. Neste caso φ é dada por

$$\varphi(g_0)(g) = \varphi(g_0 \otimes 1)(g) = \begin{cases} gg_0 & \text{se } gg_0 \in \{1\} \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{se } g = g_0^{-1} \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases},$$

para todo $g_0, g \in G$.

As propriedades seguintes são consequências de 3.2 e 3.6 respectivamente. As apresentaremos aqui para facilitar futuras referências.

3.8 Lema: Se S e T são subgrupos de G satisfazendo $G \supset T \supset S$ e M em $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo então:

(a) Existe um $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo natural $\text{Coind}_T^G \text{Coind}_S^T M \xrightarrow{\psi} \text{Coind}_S^G M$.

(b) Existe um $\mathbb{Z}_2 G$ -monomorfismo natural $\text{Ind}_T^G \text{Coind}_S^T M \xrightarrow{\varphi} \text{Coind}_T^G \text{Coind}_S^T M$.

Demonstração: (a) Segue de 3.2 (2) tomando $N = \mathbb{Z}_2 G$, $\Gamma = \mathbb{Z}_2 S$, $\Lambda = \mathbb{Z}_2 T$ e $\psi = \gamma^{-1}$.

(b) Basta considerar, em 3.6, T no lugar de S e o $\mathbb{Z}_2 T$ -módulo $\text{Coind}_S^T M$ no lugar de M . $\square$

Antes de apresentarmos o próximo resultado, que será muito útil nos capítulos seguintes, observamos que, dado um subgrupo T de G e um $\mathbb{Z}_2 T$ -módulo M , o somando gM de $\text{Ind}_T^G M$ é fechado sob a ação de $T^g := gTg^{-1}$ pois $gtg^{-1} \cdot (g \otimes m) = gtg^{-1}g \otimes m = gt \otimes m = g \otimes tm$ (para todo $t \in T$ e $m \in M$).

Assim gM é um $\mathbb{Z}_2 T^g$ -módulo. Em particular, se T é normal em G então gM é um $\mathbb{Z}_2 T$ -módulo.

3.9 Proposição (Fórmula de Mackey): [8, III.5.6(b)] Sejam T e S

subgrupos de G . Seja E um conjunto de representantes para as classes duplas SgT . Para qualquer $\mathbb{Z}_2T$ -módulo M existe um $\mathbb{Z}_2S$ -isomorfismo

$$\text{Res}_S^G \text{Ind}_T^G M \simeq \bigoplus_{g \in E} \text{Ind}_{S \cap T}^S \text{Res}_{S \cap T}^{Tg} gM.$$

Em particular, se T é normal em G , então existe um $\mathbb{Z}_2T$ -isomorfismo

$$\text{Res}_T^G \text{Ind}_T^G M \simeq \bigoplus_{g \in G/T} gM. \quad \square$$

A seguir, apresentaremos dois lemas, que serão frequentemente usados neste trabalho. Como em nossa referência básica [8] eles estão propostos como exercícios, nós os demonstraremos aqui.

3.10 Lema: Se M é um $\mathbb{Z}_2S$ -módulo e N um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo então temos um $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismo

$$N \otimes \text{Ind}_S^G M \simeq \text{Ind}_S^G (\text{Res}_S^G N \otimes M),$$

onde o produto tensorial à esquerda tem a G -ação diagonal e o da direita a S -ação diagonal.

Demonstração: Considere a aplicação

$$\begin{aligned} k : N \otimes (\mathbb{Z}_2G \otimes_S M) &\rightarrow \mathbb{Z}_2G \otimes_S (\text{Res}_S^G N \otimes M), \\ n \otimes (g \otimes m) &\rightarrow g \otimes (g^{-1}n \otimes m), \end{aligned}$$

e estendida por linearidade. Para qualquer $s \in S$ temos

$$\begin{aligned} k(n \otimes (g \otimes sm)) &= g \otimes (g^{-1}n \otimes sm) = g \otimes s(s^{-1}g^{-1}n \otimes m) = \\ &= gs \otimes ((sg)^{-1}n \otimes m) = k(n \otimes (gs \otimes m)), \end{aligned}$$

e portanto k está bem definida. Também, para qualquer $g_0 \in G$, temos

$$\begin{aligned} k(g_0(n \otimes (g \otimes m))) &= k(g_0n \otimes (g_0g \otimes m)) = g_0g \otimes ((g_0g)^{-1}g_0n \otimes m) = \\ &= g_0g \otimes (g^{-1}g_0^{-1}g_0n \otimes m) = g_0(g \otimes (g^{-1}n \otimes m)) = \\ &= g_0k(n \otimes (g \otimes m)), \end{aligned}$$

e assim k é um $\mathbb{Z}_2G$ -homomorfismo. Agora, é fácil ver que a aplicação

$$\begin{aligned} l : \mathbb{Z}_2G \otimes_S (\text{Res}_S^G N \otimes M) &\rightarrow N \otimes (\mathbb{Z}_2G \otimes_S M) \\ g \otimes (n \otimes m) &\rightarrow gn \otimes (g \otimes m) \end{aligned}$$

é a inversa de k . Portanto k é um $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismo, como desejado. $\square$.

3.11 Lema: Se $[G : S] = \infty$ então

$$H^0(G; \text{Ind}_S^G M) = (\text{Ind}_S^G M)^G = 0,$$

para todo $\mathbb{Z}_2S$ -módulo M .

Demonstração: Suponhamos por absurdo que $(\text{Ind}_S^G M)^G \neq 0$, isto é, que existe $u \in \text{Ind}_S^G M$, $u \neq 0$, tal que $gu = u$ para todo $g \in G$.

Sabemos por 3.6 (i), que $\text{Ind}_S^G M = \bigoplus_{g \in E} gM$, onde E é um conjunto de representantes para G/S (com $e \in E$, onde e é o elemento neutro de G). Assim, $u = g_1m_1 + \dots + g_km_k$, com $g_i \in E$, $g_im_i \neq 0$ e $g_im_i \neq g_jm_j$ para todo $i \neq j$ (pois $\bigcap_{g \in E} gM = 0$).

Seja $g \in G$. Como a aplicação $\text{Ind}_S^G M \rightarrow \text{Ind}_S^G M$ ($v \rightarrow gv$) é uma bijeção, segue que $gg_im_i \neq gg_jm_j$ se $i \neq j$.

Afirmção: $m_i = m_j = m$, para todo $i \neq j$.

De fato, para cada i, j , seja $g := g_ig_i^{-1}$. Como $gu = u$, temos que $gg_1m_1 + \dots + gg_im_i + \dots + gg_jm_j + \dots + gg_km_k = g_1m_1 + \dots + g_km_k$. Agora, $g_im_j = gg_jm_j \neq gg_rm_r$ se $j \neq r$, g_im_j é não nulo, e $g_im_j \neq g_rm_r$ se $r \neq i$ (pois $g_i, g_r \in E$ e $\bigcap_{g \in E} gM = 0$). Logo a única possibilidade é que $g_im_j = g_im_i$. Daí, $m_j = m_i$.

Consequentemente, temos que $u = g_1m + \dots + g_km$. Como por hipótese $[G : S] = \infty$, existe $g_0 \in E$, $g_0 \notin \{g_1, \dots, g_k\}$. Seja $g := g_0g_1^{-1}$. Do fato que $gu = u$ segue que $gg_1m + \dots + gg_km = g_1m + \dots + g_km$ e daí, como $gg_1m \neq gg_im$ se $i \neq 1$ e $gg_1m \neq 0$, deve existir algum $j \in \{1, \dots, k\}$ tal que $gg_1m = g_jm$. Logo $g_j^{-1}gg_1m = em \neq 0$ e então $g_j^{-1}gg_1 \in S$ (pois $e \in E$ e $\bigcap_{g \in E} gM = 0$). De onde segue, levando em conta que $g = g_0g_1^{-1}$, que $g_j^{-1}g_0 \in S$ para algum j , mas isto contradiz o fato que $g_0 \in E - \{g_1, \dots, g_k\}$. Logo nossa suposição inicial é falsa, e portanto $(\text{Ind}_S^G M)^G = 0$. $\square$

Agora, se S é um subgrupo de G , consideremos o $\mathbb{Z}_2$ -módulo livre gerado

pelas classes laterais gS , $g \in G$, que denotaremos por $\mathbb{Z}_2(G/S)$.

Existe uma ação natural de G em $\mathbb{Z}_2(G/S)$ induzida pela multiplicação à esquerda ($g_0(gS) = g_0gS$). Daí, $\mathbb{Z}_2(G/S)$ tem uma estrutura de $\mathbb{Z}_2G$ -módulo à esquerda (cf. 1.2 (a)).

Logo, se N é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo, então podemos dar a $\mathbb{Z}_2(G/S) \otimes N$ e $\text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), N)$ a estrutura de $\mathbb{Z}_2G$ -módulo diagonal, como em 1.2 (c).

Sob estas considerações temos:

3.12 Proposição: *Sejam G um grupo, S um subgrupo de G e N um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Então temos $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismos naturais*

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_2(G/S) \otimes N &\xrightarrow{u} \text{Ind}_S^G \text{Res}_S^G N, \\ \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), N) &\xrightarrow{v} \text{Coind}_S^G \text{Res}_S^G N,\end{aligned}$$

onde $\mathbb{Z}_2(G/S) \otimes N \in \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), N)$ são vistos como $\mathbb{Z}_2G$ -módulos como acima.

Demonstração: A aplicação u é definida por $u(gS \otimes n) = g \otimes g^{-1}n$, $g \in G$, $n \in N$ e estendida por linearidade. É fácil ver que u está bem definida e é um $\mathbb{Z}_2G$ -homomorfismo. A inversa de u é dada por $g \otimes n \rightarrow gS \otimes gn$.

Analogamente, v é definida por $v(f)(g) = gf(g^{-1}S)$, $g \in G$ e $f \in \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), N)$, e sua inversa v' por $v'(h)(gS) = gh(g^{-1})$, $g \in G$, $h \in \text{Hom}_S(\mathbb{Z}_2G, \text{res}_S^G N)$. $\square$

3.13 Observações: (a) Se considerarmos no resultado anterior $N = \mathbb{Z}_2$ então temos os $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismos naturais

$$\mathbb{Z}_2(G/S) \xrightarrow{\sim} \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2 \quad \text{e} \quad \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)} := \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\sim} \text{Coind}_S^G \mathbb{Z}_2,$$

e portanto, por 3.6, obtemos o $\mathbb{Z}_2G$ -monomorfismo $\mathbb{Z}_2(G/S) \xrightarrow{\iota} \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}$. Esta "inclusão" tem, como em 3.7, a forma simples

$$\varphi(g_0S)(gS) = \begin{cases} 1 & \text{se } g^{-1}S = g_0S \ (\Leftrightarrow gg_0 \in S) \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases}$$

(b) Se, agora, considerarmos $S = \{1\}$ e N um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo qualquer,

então temos os $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismos

$$\mathbb{Z}_2G \otimes N \xrightarrow{\sim} \text{Ind}_{\{1\}}^G N \quad \text{e} \quad \text{Hom}(\mathbb{Z}_2G, N) \xrightarrow{\sim} \text{Coind}_{\{1\}}^G N,$$

onde os módulos da esquerda são vistos como $\mathbb{Z}_2G$ -módulo com a G -ação diagonal. Note ainda que se N é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo trivial (ex: $N = \mathbb{Z}_2$) então v tem a forma $v(g)(g) = f(g^{-1})$, $\forall g \in G$.

O resultado abaixo é também bastante utilizado nos próximos capítulos. Ele dá a relação entre a (co)homologia de um grupo e de um subgrupo.

3.14 Proposição (Lema de Shapiro): [8, III.6.2] *Se S é um subgrupo de G e M é um $\mathbb{Z}_2S$ -módulo então*

$$H_*(S; M) \simeq H_*(G; \text{Ind}_S^G M) \quad \text{e} \quad H^*(S; M) \simeq H^*(G; \text{Coind}_S^G M). \quad \square$$

Pode se verificar que os isomorfismos do lema de Shapiro são dados por

$$H_*(S; M) \xrightarrow{(\alpha, i)_*} H_*(G; \text{Ind}_S^G M) \quad \text{e} \quad H^*(S; M) \xrightarrow{(\alpha, \pi)^*} H^*(G; \text{Coind}_S^G M),$$

onde $(\alpha, i)_*$ e $(\alpha, \pi)^*$ são (cf. 2.3 e 2.4) as aplicações induzidas, respectivamente, de

$$(\alpha : S \rightarrow G, \quad i : M \rightarrow \text{Ind}_S^G M) \quad \text{e} \quad (\alpha : S \rightarrow G, \quad \pi : \text{Coind}_S^G M \rightarrow M),$$

com $\alpha : S \rightarrow G$ a inclusão, e i e π as $\mathbb{Z}_2S$ -aplicações dadas em 3.4.

3.15: Seja G um grupo. Considere $PG = \{A \mid A \subseteq G\}$ o conjunto das partes de G . PG com a operação diferença simétrica $A + B := A - B \cup B - A = A \cap B^C \cup B \cap A^C$, é um grupo abeliano, em que todo elemento tem ordem 2 (portanto um $\mathbb{Z}_2$ -módulo). Daí, considerando a G -ação (multiplicação à esquerda) $G \times PG \rightarrow PG$ ($(g, A) \rightarrow g.A = \{g.a \mid a \in A\}$), podemos dar a PG uma estrutura de $\mathbb{Z}_2G$ -módulo (cf. 1.2 (a)).

É fácil ver que a aplicação

$$\begin{aligned} \rho : \overline{\mathbb{Z}_2G} = \text{Coind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2 &\rightarrow PG \\ f &\rightarrow \{g \in G \mid f(g^{-1}) = 1\} \end{aligned}$$

é um $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismo. Ela é invariante pela ação pois, dado $g_0 \in G$, temos:

$$\begin{aligned}
\rho(g_0.f) &= \{g_1 \in G \mid (g_0.f)(g_1^{-1}) = 1\} \\
&= \{g_1 \in G \mid f(g_1^{-1}g_0) = 1\} && \text{(pela ação do } \text{Coind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2 \text{)} \\
&= \{g_1 \in G \mid f((g_0^{-1}g_1)^{-1}) = 1\} \\
&= \{g_0g \in G \mid f(g^{-1}) = 1\} && \text{(considerando } g = g_0^{-1}g_1 \text{)} \\
&= g_0 \cdot \{g \in G \mid f(g^{-1}) = 1\} \\
&= g_0 \cdot \rho(f).
\end{aligned}$$

A inversa de ρ é dada por $PG \rightarrow \text{Ind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2$ ($A \rightarrow f_A$) onde,

$$f_A(g) = \begin{cases} 1 & \text{se } g^{-1} \in A \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases}$$

Levando em conta estes fatos tem-se, como consequência da proposição anterior, o seguinte resultado.

3.16 Corolário:

$$H^j(G; PG) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & \text{se } j = 0 \\ 0 & \text{se } j \neq 0. \end{cases}$$

□

Finalizando esta seção, observamos que se M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo (mais do que um $\mathbb{Z}_2S$ -módulo), então podemos usar 3.12 e obter a seguinte versão do lema de Shapiro.

3.17 Proposição: Se S é um subgrupo de G e M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo, então

$$H_*(S; M) \simeq H_*(G; \mathbb{Z}_2(G/S) \otimes M), \quad \epsilon \quad H^*(S; M) \simeq H^*(G; \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), M)),$$

onde $\mathbb{Z}_2(G/S) \otimes M \in \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), M)$ são vistos como $\mathbb{Z}_2G$ -módulos com a G -ação diagonal. □

Nota: Para sermos rigorosos deveríamos escrever na proposição anterior $H_*(S; \text{Res}_S^G M)$ e $H^*(S; \text{Res}_S^G M)$.

4. $H^1(G;M)$ e extensões de grupos.

Esta secção será útil no capítulo II de nosso trabalho, onde apresentamos uma "generalização" (para o caso relativo), do resultado 4.3 abaixo. Tal secção é baseada em [8, cap. IV]. Lá o autor apresenta também uma interpretação de H^2 e H^3 em termos de extensões de grupos, nós estamos interessados somente no caso H^1 . Também ele trabalha sobre $R = \mathbb{Z}$, aqui adaptaremos ao caso $R = \mathbb{Z}_2$.

Inicialmente, observamos que uma extensão de um grupo G por um grupo abeliano M

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{i} E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$$

dá origem à uma ação de G sobre M (Aqui, estamos denotando o elemento neutro de G por 1). Mais precisamente, dados $g \in G$ e $m \in M$, seja $x \in E$ tal que $\pi(x) = g$. Note que $xi(m)x^{-1} \in \text{Im } i = \text{Ker } \pi$ pois $\pi(xi(m)x^{-1}) = \pi(x)\pi(i(m))\pi(x)^{-1} = \pi(x).1.\pi(x)^{-1} = 1$. Então definimos

$$g.m = i^{-1}(xi(m)x^{-1}). \quad (1)$$

Fixemos agora um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M . Seja

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{i} E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1 \quad (2)$$

uma extensão cuja ação de G em M , obtida como em (1), coincide com a G -ação proveniente do fato de M ser um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo.

Dizemos que (2) é uma *extensão cindida* se existe um homomorfismo $l : G \rightarrow E$ tal que $\pi \circ l = id_G$, e um tal homomorfismo é chamado um *levantamento* da extensão.

Dois levantamentos l_1 e l_2 são ditos *M -conjugados* se existe um elemento $m \in M$ tal que $l_1(g) = i(m)l_2(g)i(m)^{-1}$ para todo $g \in G$. (Isto dá origem a uma relação de equivalência e portanto podemos falar em classes de equivalência $[l]$).

4.1 Exemplo: Seja M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Consideremos o grupo $E = M \times G$ com a operação dada por

$$(m_1, g_1) * (m_2, g_2) = (m_1 + g_1.m_2, g_1g_2).$$

Este grupo é denominado o *produto semi-direto de M por G* e é denotado por $M \rtimes G$.

A sequência $0 \rightarrow M \xrightarrow{i'} M \rtimes G \xrightarrow{\pi'} G \rightarrow 1$ onde $i'(m) := (m, 1)$ e $\pi'(m, g) := g$ é uma extensão cindida pois, por exemplo, $l : G \rightarrow M \rtimes G$ ($g \rightarrow (0, g)$) é um levantamento para esta extensão.

O resultado seguinte nos diz que "a menos de equivalência", todas as extensões cindidas são como no exemplo acima.

4.2 Proposição: [8, IV.2.1] *As seguintes condições sobre a extensão (2) são equivalentes:*

(a) (2) é cindida.

(b) (2) é equivalente à extensão $0 \rightarrow M \xrightarrow{i'} M \rtimes G \xrightarrow{\pi'} G \rightarrow 1$, isto é, existe uma aplicação $k : E \rightarrow M \rtimes G$ (isomorfismo) tal que o diagrama

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \rightarrow & M & \begin{array}{c} \xrightarrow{i} \\ \xrightarrow{i'} \end{array} & \begin{array}{c} E \\ M \rtimes G \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\pi} \\ \xrightarrow{\pi'} \end{array} & G & \rightarrow & 1 \\ & & & \searrow & \downarrow k & & & \end{array}$$

comuta.

□

Finalmente, temos a seguinte interpretação de $H^1(G; M)$.

4.3 Proposição: *Para qualquer $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M , as classes de M -conjugação $[l]$ de levantamentos $l : G \rightarrow M \rtimes G$, da extensão cindida $0 \rightarrow M \xrightarrow{i'} M \rtimes G \xrightarrow{\pi'} G \rightarrow 1$ estão em correspondência biunívoca com os elementos de $H^1(G; M)$.*

Demonstração: Por simplicidade denotaremos o conjunto das classes de M -conjugação por $\mathcal{L}$. Sabemos por 1.6 que $H^1(G; M) = \frac{Der(G, M)}{P(G, M)}$.

Agora, os levantamentos $l : G \rightarrow M \rtimes G$ estão em correspondência biunívoca com as derivações $d : G \rightarrow M$, pois um homomorfismo $l : G \rightarrow M \rtimes G$ que satisfaz $\pi \circ l = id_G$ tem a forma $l(g) = (d(g), g)$, onde $d : G \rightarrow M$. Temos ainda $l(g)l(h) = l(gh) \Leftrightarrow (d(g) + gd(h), gh) = (d(gh), gh) \Leftrightarrow d(gh) = d(g) + gd(h) \Leftrightarrow d \in Der(G, M)$.

Por outro lado, dados dois levantamentos $l_1(g) = (d_1(g), g)$ e $l_2(g) = (d_2(g), g)$ temos que l_1 e l_2 são M -conjugados $\Leftrightarrow l_1(g) = i'(m)l_2(g)i'(m)^{-1}$, para algum $m \in M$ e todo $g \in G \Leftrightarrow (d_1(g), g) = (m + d_2(g) - gm, g) \Leftrightarrow d_2(g) - d_1(g) = gm - m = d_m(g) \Leftrightarrow d_2 - d_1 \in P(G, M)$.

Daí, facilmente, verifica-se que a aplicação

$$\frac{\text{Der}(G, M)}{P(G, M)} \rightarrow \mathcal{L}$$

$$d + P(G, M) \rightarrow [l], \quad \text{onde } l(g) = (d(g), g),$$

está bem definida e é uma bijeção. □

5. Grupos de Dualidade

Como foi dito no início deste capítulo, R significará para nós o anel $\mathbb{Z}$ dos inteiros ou o corpo $\mathbb{Z}_2$.

Sabemos, por 1.4 (b), que na definição de $H_*(G; M)$ e $H^*(G; M)$ (para M um RG -módulo qualquer) podemos escolher uma resolução projetiva arbitrária $F = (F_i)_{i \geq 0}$ de R sobre RG .

Analogamente, se considerarmos do ponto de vista topológico (ver 1.9), então podemos computar $H_*(G; M)$ e $H^*(G; M)$ em termos de um complexo $K(G, 1)$ arbitrário Y .

Uma vez que temos esta liberdade de escolha é razoável tentar escolher F (ou Y) como sendo o "menor" possível e isto nos leva a varias condições de finitude sobre G .

Por exemplo, se interpretarmos "pequeno" em termos de comprimento de F então somos levados à noção de *dimensão homológica e cohomológica*. Ou ainda, se interpretamos pequeno por significar que cada F_i seja finitamente gerado então somos levados a assim chamada condição FP .

Nesta secção introduzimos estas condições de finitude sobre um grupo G , recordamos a definição de grupos de dualidade e, em particular, de dualidade de Poincaré, e apresentamos (sem demonstração) alguns resultados relevantes desta teoria que serão

utilizados nos próximos capítulos. Finalizamos com alguns comentários sobre a conjectura de que todo grupo de dualidade de Poincaré sobre $\mathbf{Z}$ é o grupo fundamental de uma variedade asférica fechada.

Nossa referência básica para esta secção será as notas de R. Bieri [4]. Porém, quando for conveniente, referimos também a [5], [6] e [9]. Vale observar que K.S. Brown em [8, cap. VIII] apresenta um interessante tratamento deste assunto, mas somente sobre o anel $\mathbf{Z}$.

5.1 Definição: Dizemos que um grupo G é de tipo $(FP)_n$ sobre R , $n \in \mathbf{N}$, se existe uma resolução projetiva de R sobre RG , $F \twoheadrightarrow R$, com F_i finitamente gerado como RG -módulo, para todo $i \leq n$. Se os módulos F_i são finitamente gerados para todo i então dizemos que G é de tipo $(FP)_\infty$.

Observe que todo grupo G é de tipo $(FP)_0$ sobre R pois, por exemplo, a resolução bar (cf. 1.4 (c)) é uma resolução projetiva de R sobre RG em que F_0 é obviamente finitamente gerado. Para $n = 1$, temos:

5.2 Proposição: [4, Prop. 2.1] G é de tipo $(FP)_1$ sobre R se, e somente se, G é finitamente gerado. $\square$

Um resultado sobre grupos de tipo $(FP)_n$ que utilizaremos algumas vezes, nos casos simples $n = 0, 1$, é o seguinte:

5.3 Proposição: Sejam G um grupo e $(M_i)_{i \in I}$ uma família de RG -módulos. Se G é de tipo $(FP)_n$, então

$$H^k(G; \bigoplus_{i \in I} M_i) \simeq \bigoplus_{i \in I} H^k(G; M_i), \quad \forall k \leq n.$$

Em particular, para qualquer grupo G este isomorfismo é válido no nível $k = 0$; e, se G é finitamente gerado, tal isomorfismo sempre ocorre até o nível $k = 1$. $\square$

5.4 Definição: Um grupo G é denominado grupo de tipo FP sobre R se

existe uma resolução projetiva de R sobre RG de comprimento finito,

$$0 \rightarrow F_n \rightarrow F_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow F_0 \rightarrow R \rightarrow 0$$

com F_i finitamente gerado para todo i .

5.5 Proposição: [9, Prop. 1.2] *Seja G um grupo. As seguintes condições são equivalentes:*

(i) *Se existe uma sequência exata*

$$0 \rightarrow K \rightarrow F_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow F_0 \rightarrow R \rightarrow 0$$

com $F_0, \dots, F_{n-1}$ RG -projetivos, então K é também projetivo.

(ii) *Existe uma resolução projetiva de R sobre RG de comprimento finito n*

$$0 \rightarrow F_n \rightarrow F_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow F_0 \rightarrow R \rightarrow 0.$$

(iii) $H^k(G; M) = 0$ para todo RG -módulo M e todo $k > n$.

(iv) $H^{n+1}(G; M) = 0$ para todo RG -módulo M .

(v) *Para todo epimorfismo $f : M \rightarrow M'$, a aplicação induzida $f^* : H^*(G; M) \rightarrow H^*(G; M')$ é epimorfismo.* □

5.6 Definição: A dimensão cohomológica de G sobre R , denotada por $cd_R G$, é definida como sendo o menor inteiro $n \geq 0$ que satisfaz uma das condições equivalentes (i) a (v) da proposição anterior. Se não existe tal inteiro consideramos $cd_R G = \infty$. Assim

$$\begin{aligned} cd_R G &= \inf \{ n \mid R \text{ admite uma resolução projetiva de comprimento } n \} \\ &= \inf \{ n \mid H^k(G; -) = 0 \text{ para } k > n \} \\ &= \sup \{ n \mid H^n(G; M) \neq 0 \text{ para algum } RG\text{-módulo } M \}. \end{aligned}$$

Vale um resultado análogo à proposição anterior para homologia; porém, por simplicidade, definiremos a *dimensão homológica* de G sobre R , denotada por $hd_R G$, como

$$hd_R G = \sup \{ n; H_n(G; M) \neq 0 \text{ para algum } RG\text{-módulo } M \}.$$

5.7 Observações: (a) Por conveniência, denotaremos $cd_{\mathbb{Z}_2}G$ e $hd_{\mathbb{Z}_2}G$ simplesmente por cdG e hdG .

(b) É fácil ver que G é de tipo FP sobre R se, e somente se, G é de tipo $(FP)_{\infty}$ sobre R e $cd_R G < \infty$.

(c) R. Bieri em [4, cap. II] apresenta uma definição mais geral. Ele define dimensão plana (flat) e projetiva de um Λ -módulo M (Λ anel qualquer com unidade), e então a dimensão homológica (cohomológica) de um grupo G é obtida da dimensão plana (projetiva) quando consideramos o RG -módulo particular $M = R$ com a G -ação trivial.

5.8 Exemplo: Seja G um grupo. Se existe uma variedade compacta Y de dimensão n que tem o mesmo tipo de homotopia de um complexo $K(G, 1)$ então $cd_R G \leq n$. (cf. [8, VIII.8.1])

Apresentamos a seguir algumas das principais propriedades de dimensão homológica e cohomológica.

5.9 Proposição: [4, teor. 4.6] *Seja G um grupo, então*

(i) $hd_R G \leq cd_R G$.

(ii) *Se G é enumerável então $cd_R G \leq hd_R G + 1$.*

(iii) *Se G é de tipo $(FP)_{\infty}$ sobre R , então $cd_R G = hd_R G$.* □

A próxima propriedade é consequência imediata do lema de Shapiro.

5.10 Proposição: [4, Prop. 4.9]) *Se S é um subgrupo de G , então*

(i) $hd_R S \leq hd_R G$.

(ii) $cd_R S \leq cd_R G$. □

5.11 Definição: *Sejam G um grupo e R um anel comutativo com unidade. Dizemos que G não tem R -torção se a ordem de todo elemento em G é infinita ou invertível em R (isto é, a ordem é um inteiro $n > 0$ tal que $n \cdot 1$ é invertível em R onde 1*

é a unidade de R).

Observe que se G não tem $\mathbb{Z}$ -torção (isto é, se G é livre de torção) então obviamente G não tem $\mathbb{Z}_2$ -torção. A recíproca é falsa pois, por exemplo, $G = \mathbb{Z}_3$ não tem $\mathbb{Z}_2$ -torção mas não é $\mathbb{Z}$ -livre de torção.

5.12 Proposição: [4, Props. 4.11 e 4.12]

(i) *Se $hd_R G$ (ou $cd_R G$) é finita então G não tem R -torção.*

(ii) *$cd_R G = 0$ se, e somente se, G é um grupo finito sem R -torção.*

(iii) *$hd_R G = 0$ se, e somente se, G é um grupo localmente finito sem R -torção.* □

O próximo resultado parte (i) é conhecido como Teorema de Serre.

5.13 Teorema: [4, teors. 5.11 e 5.13] *Seja S um subgrupo de índice finito em um grupo G . Se G não tem R -torção, então*

(i) $cd_R S = cd_R G$.

(ii) $hd_R S = hd_R G$. □

Grupos de Dualidade: Agora recordaremos o conceito de grupos de dualidade e suas propriedades mais relevantes. Brevemente falando, um grupo de dualidade de Poincaré G (sobre $\mathbb{Z}$) é um grupo cuja homologia e cohomologia satisfazem relações de dualidade análogas àsquelas válidas para variedades compactas. Estes grupos foram investigados, em vista de seus aspectos algébricos e topológicos, por Bieri em [3], e Johnson e Wall em [19] (1972). Posteriormente, Bieri e Eckmann em [6] (1973), definiram um tipo mais geral de dualidade (sobre $\mathbb{Z}$) que inclui o anterior e leva a novas aplicações em álgebra e topologia; e em [4, cap. III] (1976), Bieri estendeu este conceito por considerar grupos de dualidade sobre um anel qualquer comutativo com unidade R .

Aqui consideraremos somente os casos de interesse.

5.14 Definição: *Um grupo G é denominado grupo de dualidade de dimensão n sobre R , ou simplesmente um D^n -grupo sobre R ($R = \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_2$)*

se existe um RG -módulo (à direita) C , chamado **módulo dualizante de G** , tal que tenhamos isomorfismos naturais

$$H^k(G; M) \simeq H_{n-k}(G; C \otimes_R M),$$

para todo $k \in \mathbb{Z}$ e todo RG -módulo M , onde $C \otimes_R M$ é visto como RG -módulo com a G -ação diagonal.

Se $C \simeq R$ como RG -módulo dizemos que G é um **grupo de dualidade de Poincaré de dimensão n sobre R** , ou simplesmente, um PD^n -grupo sobre R . Neste caso, se a ação de G em C é trivial (isto é, C é, a menos de isomorfismo, o G -módulo trivial R dado em 1.2 (b)) dizemos que G é **orientável**, caso contrário G é dito **G não orientável**.

5.15 Observações: (a) Nos capítulos seguintes consideraremos sempre $R = \mathbb{Z}_2$, a menos que se especifique ao contrário. Assim, por conveniência, se G é D^n -grupo sobre $\mathbb{Z}_2$ (PD^n -grupo sobre $\mathbb{Z}_2$) diremos, simplesmente, que G é um D^n -grupo (PD^n -grupo), sem falar no anel $\mathbb{Z}_2$.

Note que trabalhar com o anel $\mathbb{Z}_2$ tem a vantagem de que todo PD^n -grupo é orientável.

(b) Se G é um grupo de dualidade de dimensão n sobre R , com módulo dualizante C , então pode-se verificar que:

(i) $n = cd_R G$ e portanto G não tem R -torção.

(ii) $C \simeq H^n(G; RG)$ como RG -módulos à direita, onde a estrutura de RG -módulo em $H^n(G; RG)$ é induzida da estrutura natural de RG como RG -módulo à direita, dada pela G -ação multiplicação à direita.

Assim, a dimensão n e o módulo dualizante C são determinados pelo grupo G .

5.16 Exemplo: Se $G = \Pi_1(X)$, onde X é uma variedade fechada (compacta sem bordo), conexa, de dimensão n , asférica (isto é, que tem o mesmo tipo de homotopia de um complexo $K(G, 1)$) então G é um PD^n -grupo sobre $\mathbb{Z}$ (ver [10, p. 135]). Em particular, $G = \Pi_1(X)$, onde X é qualquer superfície fechada diferente de S^2 e $\mathbb{R}P(2)$,

é um PD^2 -grupo sobre $\mathbf{Z}$, e $G = \mathbf{Z}^n = \Pi_1(S^1 \times \dots \times S^1)$ (n -vezes) é um PD^n -grupo sobre $\mathbf{Z}$.

Às vezes é conveniente trabalhar com a seguinte caracterização de grupos de dualidade.

5.17 Proposição: [4, teor. 9.2] *Um grupo G é um grupo de dualidade de dimensão n sobre R se, e somente se, as seguintes condições ocorrem:*

- (i) G é de tipo FP sobre R .
- (ii) $H^k(G; RG) = 0$ para $k \neq n$.
- (iii) $H^n(G; RG) = C$ é plano como R -módulo. □

5.18 Corolário: *Se G é um grupo de dualidade sobre R então G é finitamente gerado.*

Demonstração: Se G é de dualidade então, pela proposição anterior G é de tipo FP , e portanto de tipo FP_1 por 5.7 (b). Daí, o resultado segue de 5.2. □

No teorema abaixo reunimos algumas propriedades de dualidade.

5.19 Teorema: [4, teors. 9.9, 9.10 e 9.11]

(i) *Sejam G um grupo sem R -torção e S um subgrupo de índice finito em G . Então G é um D^n -grupo sobre R se, e somente se, S é, e temos, para os módulos dualizantes, o RS -isomorfismo*

$$H^n(S; RS) \simeq \text{Res}_S^G H^n(G; RG).$$

(ii) *Seja $N \twoheadrightarrow G \xrightarrow{\pi} Q$ uma sequência exata curta de grupos. Se N é um D^n -grupo sobre R e Q é um D^q -grupo sobre R então G é um D^{n+q} -grupo sobre R , e os módulos dualizantes estão assim relacionados*

$$H^{n+q}(G; RG) \simeq H^q(Q; RQ) \otimes_R H^n(N; RN) \quad (\text{como } RG\text{-módulos}),$$

onde G atua diagonalmente no produto tensorial (ver observação abaixo).

(iii) Seja $N \twoheadrightarrow G \xrightarrow{*} Q$ uma sequência exata com $cd_R Q < \infty$ e N de tipo $(FP)_{\infty}$ sobre R ($R = \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_2$). Se G é um grupo de dualidade sobre R então também são N e Q . $\square$

5.20 Observações: (a) Podemos dar uma G -ação à direita em $H^n(N; RN)$ porque N é normal em G . Tal ação pode ser assim descrita: Tomamos uma RG -resolução projetiva de R , $F \twoheadrightarrow R$, que por restrição é uma RN -resolução projetiva de R e definimos em $Hom_{RN}(F, RN)$ a G -ação à direita $(f.g)(x) = g^{-1}f(gx)g$, para todo $f \in Hom_{RN}(F, RN)$, $g \in G$ e $x \in F$. Esta ação induz a G -ação em $H^n(N; RN)$ desejada.

A G -ação em $H^q(Q; RQ)$ é induzida da Q -ação.

(b) Quando consideramos R um anel arbitrário qualquer (não necessariamente $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}_2$), temos que exigir em 5.19 (iii) que R seja um domínio de ideiais principais.

O resultado abaixo, embora simples, é muito importante para nós.

5.21 Lema: Se G é um D^n -grupo sobre $\mathbb{Z}$ com módulo dualizante C então G é um D^n -grupo (sobre $\mathbb{Z}_2$) com módulo dualizante $C' = C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2$. Em particular, se G é um PD^n -grupo sobre $\mathbb{Z}$ então G é um PD^n -grupo.

Demonstração: Segue de 1.7 e do fato que, para todo $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo M , temos $C \otimes_{\mathbb{Z}} M \simeq C \otimes_{\mathbb{Z}} (M \otimes_{\mathbb{Z}_2} \mathbb{Z}_2) \simeq C \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}_2} M) \simeq (C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2) \otimes_{\mathbb{Z}_2} M$. $\square$

Os grupos de dualidade de dimensão 0 e 1 são completamente determinados, como mostra o resultado seguinte.

5.22 Proposição: [4, Prop. 9.17]

(a) G é um D^0 -grupo sobre R se, e somente se, a ordem de G é finita e invertível em R .

(b) G é um D^1 -grupo sobre R se, e somente se, G é finitamente gerado e

$$cd_R G = 1.$$

□

5.23 Exemplos: (a) O grupo trivial $\{1\}$ é o único D^0 -grupo sobre $\mathbb{Z}$.

(b) $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_5$ e mais geralmente todos os grupos finitos de ordem impar, são D^0 -grupos (sobre $\mathbb{Z}_2$).

(c) $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ é um D^1 -grupo sobre $\mathbb{Z}$. Na realidade G é um D^1 -grupo sobre $\mathbb{Z}$ se, e somente se, G é livre finitamente gerado; e $G \simeq \mathbb{Z}$ é o único PD^1 -grupo sobre $\mathbb{Z}$ (ver [6, Prop. 5.1]).

(d) Segue do lema anterior e de 5.16, que se $G = \Pi_1(X)$ onde X é um variedade asférica fechada de dimensão n então G é um PD^n -grupo (sobre $\mathbb{Z}_2$). Em particular, $\mathbb{Z}$ é um PD^1 e, por 5.19 (ii), $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_3$ é um D^1 -grupo.

Estes exemplos mostram claramente que a recíproca do lema anterior é falsa. De fato, o que vale é o seguinte resultado: Seja G um grupo de tipo FP sobre $\mathbb{Z}$. Então G é um D^n -grupo sobre $\mathbb{Z}$ se, e somente se, G é um D^n -grupo sobre todo corpo $\mathbb{Z}_p$ (p primo) e sobre o corpo de frações Q de $\mathbb{Z}$ (cf. [4, Prop. 9.13]).

O resultado seguinte será utilizado por nós no capítulo IV. O enunciaremos aqui somente no caso de interesse, a saber, quando $R = \mathbb{Z}_2$. Para a demonstração ver [5, prop. 5.6 e teor. 5.7].

5.24 Proposição: *Sejam G um grupo com $cdG = n < \infty$ e N um subgrupo normal em G .*

(a) *Se N é um D^n -grupo então G também é, e $Q = G/N$ é finito.*

(b) *Suponhamos que G seja finitamente gerado e N seja de tipo FP sobre $\mathbb{Z}_2$, com $H^k(N; \mathbb{Z}_2 N) = 0$ para $k \leq n - 2$. Se $Q = G/N$ é infinito então $cdN = cdG - 1$ e $\dim H^1(Q; \mathbb{Z}_2 Q) \geq 1$ (ou equivalentemente, Q tem mais de um end (ver cap II, 4.10)).*

□

Finalizando esta secção faremos um breve comentário sobre PD^n -grupos sobre $\mathbb{Z}$.

Conforme vimos no exemplo 5.16, se $G = \Pi_1(X)$, onde X é um variedade

asférica fechada de dimensão n , então G é um PD^n -grupo sobre $\mathbb{Z}$. PD^n -grupos sobre $\mathbb{Z}$ obtidos desta forma são denominados *geométricos*.

Como todos os exemplos conhecidos de PD^n -grupos sobre $\mathbb{Z}$ são assim obtidos foi conjecturado que: *Todo grupo de dualidade de Poincaré de dimensão n sobre $\mathbb{Z}$ é geométrico.*

O caso $n = 1$ é óbvio, pois $G = \mathbb{Z}$ é o único PD^1 -grupo sobre $\mathbb{Z}$, e $G = \Pi_1(S^1)$.

Em uma sequência de artigos B. Eckmann, H. Müller e P. Linnel [11] e [12], provaram que todos os PD^2 -grupos sobre $\mathbb{Z}$ são geométricos, isto é, são grupos fundamentais infinitos de superfícies.

Para $n = 3$, C.B. Thomas em [34] provou que, se G é um PD^3 -grupo sobre $\mathbb{Z}$ solúvel então G é geométrico, de fato, G é o grupo fundamental de uma 3-variedade asférica, orientável.

Não encontramos na literatura a prova da conjectura para o caso geral $n \geq 3$. Assim acreditamos que isto esteja ainda em aberto.

CAPÍTULO II

Um Invariante cohomológico para par grupos

A partir deste capítulo trabalharemos sempre na categoria de $\mathbb{Z}_2G$ -módulos.

Nós definiremos aqui um invariante cohomológico $E(G, S, M)$ onde G é um grupo, $S = \{S_i\}_{i \in I}$ é uma família de subgrupos com $[G : S_i] = \infty$, $\forall i \in I$, e M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo.

Na primeira secção deste capítulo recordamos o conceito de (co)homologia relativa para pares (G, S) , introduzido por Bieri e Eckmann em [7], e alguns fatos que serão utilizados por nós.

Na secção 2 introduzimos o invariante $E(G, S, M)$ e em seguida nos restringimos ao caso de interesse, ou seja, $S = \{S\}$. Neste caso denotamos $E(G, S, M)$ simplesmente por $E(G, S, M)$. Provamos que $E(G, S, M)$ é invariante no par $((G, S), M)$. Verificamos que $E(G, S, M)$ tem uma interpretação em termos de derivações (no caso relativo) e derivações principais, o que nos torna possível computar, em alguns casos, tal invariante. Também comparamos os invariantes $E(G, T, M)$, $E(G, S, M)$ e $E(G, S, N)$ quando S e T são subgrupos de G , com $S \leq T$, e M e N são $\mathbb{Z}_2G$ -módulos. Ainda nesta secção (e até a secção 4), nos dedicamos ao invariante $E(G, S) := E(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$ (isto é, tomamos o módulo particular $M = \mathbb{Z}_2(G/S)$). Verificamos que $E(G, S)$ é invariante no par (G, S) e concluímos a partir daí, que não existe isomorfismos de pares para $(G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}, S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle)$ e $(G, K) = (\langle a \rangle * \langle b \rangle, \langle b \rangle)$.

Na secção 3, após recordar o conceito de par de dualidade (D^n -par) provamos o seguinte resultado: Dado um par (G, S) com $[G : S] = \infty$, se (G, S) é um D^n -par então $E(G, S) = 1$. Assim nosso invariante dá uma condição necessária para que (G, S)

seja um D^n -par. Por exemplo, $(G, S) = (< a > * < b >, < b >)$ não é um D^n -par pois $E(G, S) = \infty$. Finalizando, obtemos majorações para $E(G, S)$ quando G, S satisfazem outras propriedades de dualidade e exemplificamos.

Na secção 4, relacionamos o nosso invariante $E(G, S)$ com os invariantes ends $\epsilon(G)$ e $\epsilon(G, S)$. Recordamos inicialmente a definição destes ends e suas propriedades mais relevantes, incluindo a relação com espaços topológicos. Se G é infinito, tem-se que

$$\epsilon(G) = 1 + \dim H^1(G, M) = E(G, \{1\}) = 1 + \dim \frac{H^1(G, \{1\}; M)}{P(G, \{1\}, M)}.$$

Uma vez que $E(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(G, S; M)}{P(G, S, M)}$, nosso objetivo inicial nesta secção era provar que

$$\epsilon(G, S) = E(G, S) \quad (*)$$

e assim obter uma fórmula para $\epsilon(G, S)$ envolvendo cohomologia relativa. No entanto a igualdade $(*)$ nem sempre é verdadeira, pois existem pares (G, S) tais que $\epsilon(G, S)$ é infinito enquanto que $E(G, S)$ é finito. Na realidade, provamos que $E(G, S) \leq \epsilon(G, S)$ e apresentamos alguns casos em que os invariantes coincidem, por exemplo, quando S é normal em G . De fato apresentamos duas provas de que a igualdade é verdadeira no caso em que S é normal em G .

Finalmente, na secção 5, apresentamos uma interpretação topológica para $E(G, S, M)$ (em particular para $E(G, S)$) em termos de pares Eilenberg-MacLane. Daí, o end $\epsilon(G, S)$ terá também tal interpretação topológica sempre que $\epsilon(G, S) = E(G, S)$.

1. Cohomologia Relativa.

Nesta secção nós recordamos a definição de cohomologia relativa e alguns fatos básicos, que serão de grande importância para este trabalho.

A definição de cohomologia relativa para um grupo G e uma família $S = \{S_i\}_{i \in I}$ de subgrupos de G , dada abaixo, foi introduzida por Bieri e Eckmann em

[7] 1978. Tais autores consideraram os coeficientes na categoria de $\mathbb{Z}G$ -módulos, porém, tudo pode ser considerado, de modo análogo, na categoria de $\mathbb{Z}_2G$ -módulos.

R. Ribes introduziu, anteriormente, em [24] 1969, a definição de cohomologia relativa $H^k(G, S; M)$ para G um grupo e S um único subgrupo de G . Nós recordamos aqui este conceito, e provamos, uma vez que não encontramos na literatura a justificativa deste fato, que a definição devido a Ribes coincide (a menos de isomorfismo) com a de Bieri e Eckmann tomando $\mathcal{S} = \{S\}$. Assim, de fato, a definição de cohomologia introduzida por Bieri e Eckmann é uma generalização da apresentada por Ribes.

1.1: Um *par grupo* $(G, \mathcal{S})$ consiste de um grupo G e uma família não vazia $\mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}$ de subgrupos de G (não necessariamente distintos).

Seja $\mathbb{Z}_2(G/\mathcal{S})$ o $\mathbb{Z}_2$ -módulo livre gerado pelas classes gS_i , no qual G atua por multiplicação à esquerda. Assim

$$\mathbb{Z}_2(G/\mathcal{S}) = \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}_2(G/S_i) = \bigoplus_{i \in I} (\mathbb{Z}_2G \otimes_{S_i} \mathbb{Z}_2)$$

Considere $\varepsilon : \mathbb{Z}_2(G/\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{Z}_2$ a aplicação aumentação usual, que aplica todo gerador gS_i em 1. Nós denotamos seu núcleo por Δ , ou mais precisamente por $\Delta_{G/\mathcal{S}}$.

1.2 Definição: *Sejam $(G, \mathcal{S})$ um par grupo, $\mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}$ e M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Os grupos de (co)homologia relativa para $(G, \mathcal{S})$ com coeficientes em M são, para todo $k \in \mathbb{Z}$, assim definidos:*

$$\begin{aligned} H^k(G, \mathcal{S}; M) &= H^{k-1}(G; \text{Hom}(\Delta, M)) \\ H_k(G, \mathcal{S}; M) &= H_{k-1}(G; \Delta \otimes M), \end{aligned}$$

onde o grupo Hom e o produto tensorial são vistos como $\mathbb{Z}_2G$ -módulos com a ação diagonal.

1.3 Observações: (a) A definição de homologia e cohomologia (absoluta) de grupos dada em 1.1.3 pode ser vista como um caso particular da definição anterior se tomamos a família vazia ($\mathcal{S} = \emptyset$) e definimos, para todo $k \in \mathbb{Z}$,

$$H_k(G, \emptyset; M) = H_k(G; M) \quad \text{e} \quad H^k(G, \emptyset; M) = H^k(G; M).$$

(b) Segue, claramente da definição, que para $k \leq 0$,

$$H^k(G, S; M) = 0 \text{ e } H_k(G, S; M) = 0.$$

(c) Se consideramos a definição de cohomologia relativa na categoria de $\mathbb{Z}_2G$ e $\mathbb{Z}G$ -módulos, pode-se provar um resultado análogo ao 1.1.7, isto é, dado um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M , $H^*(G, S; M) \cong (H_*(G, S; M))$ com M visto como $\mathbb{Z}_2G$ -módulo é isomorfo a $H^*(G, S; M) \cong (H_*(G, S; M))$ para M visto como $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Para isto basta observar que, denotando por $\Delta' = \text{Ker}(\epsilon' : \mathbb{Z}(G/S) \rightarrow \mathbb{Z})$, temos os $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismos $\text{Hom}(\Delta, M) \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Delta', M)$ e $\Delta \otimes M \simeq \Delta' \otimes_{\mathbb{Z}} M$, e daí, usar 1.1.7 e a definição de cohomologia relativa (sobre $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}$).

A noção de cohomologia relativa para um par (G, S) constituindo de um grupo G e apenas um subgrupo S , dada por Ribes em [24], usa o conceito de funtor derivado. Precisamente, dado um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M , considere o grupo abeliano

$$\text{Der}(G, S, M) = \{f \in \text{Der}(G, M) \mid f|_S = 0\}.$$

onde $\text{Der}(G, M)$ é como em 1.1.5.

É fácil ver que $\text{Der}(G, S, -)$ é um funtor covariante, exato à esquerda, da categoria dos $\mathbb{Z}_2G$ -módulos à esquerda na categoria dos grupos abelianos. Seja $0 \rightarrow M \rightarrow P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots$ uma resolução injetiva de M (isto é, uma sequência exata de $\mathbb{Z}_2G$ -módulos P_i , que são injetivos para todo i). Temos então

$$0 \rightarrow \text{Der}(G, S, M) \rightarrow \text{Der}(G, S, P_0) \rightarrow \text{Der}(G, S, P_1) \rightarrow \dots$$

Consideremos o complexo de cocadeias:

$$C^* : 0 \rightarrow \text{Der}(G, S, P_0) \rightarrow \text{Der}(G, S, P_1) \rightarrow \dots$$

1.4 Definição: Sejam G um grupo, S um subgrupo e M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Então $H^{n+1}(G, S; M)$ é o n -ésimo funtor derivado à direita de $\text{Der}(G, S, M)$, isto é,

$$H^{n+1}(G, S; M) := H^n(C^*).$$

onde C^* é como acima.

1.5: Do fato que $Der(G, S, -)$ é exato à esquerda, segue que

$$H^1(G, S; M) = Der(G, S, M).$$

1.6 Lema: Sejam G um grupo e S um subgrupo de G . Então $H^k(G, S; M) \simeq H^k(G, \{S\}; M)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ e todo $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M , onde $H^k(G, S; M)$ denota a cohomologia definida em 1.4, e $H^k(G, \{S\}; M)$ é dada em 1.2 tomando $S = \{S\}$.

Demonstração: Por [24, lema 1.1], $Der(G, S, -) \simeq Hom_G(\mathbb{Z}_2, \Gamma(-))$ como funtor na categoria de $\mathbb{Z}_2G$ -módulos à esquerda, onde $\Gamma(M) = \frac{Hom_S(\mathbb{Z}_2G, M)}{Hom_G(\mathbb{Z}_2G, M)}$ e daí

$$H^k(G, S; M) \simeq H^{k-1}(G; \Gamma(M)).$$

Logo para provarmos o lema, é suficiente mostrar que $\Gamma(M)$ é $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfo a $Hom(\Delta, M)$. Isto segue do seguinte diagrama comutativo com linhas exatas:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & Hom_G(\mathbb{Z}_2G, M) & \xrightarrow{j} & Hom_S(\mathbb{Z}_2G, M) & \xrightarrow{\rho} & \Gamma(M) & \rightarrow 0 \\ & \downarrow \psi & & \downarrow \phi & & \downarrow \varphi & \\ 0 \rightarrow & Hom(\mathbb{Z}_2, M) & \xrightarrow{\epsilon^*} & Hom(\mathbb{Z}_2(G/S), M) & \xrightarrow{i^*} & Hom(\Delta, M) & \rightarrow 0. \end{array}$$

As aplicações horizontais i^* e ϵ^* são as aplicações induzidas da sequência exata $0 \rightarrow \Delta \xrightarrow{i} \mathbb{Z}_2(G/S) \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0$; j é a inclusão e ρ é a projeção canônica. É fácil ver que estas aplicações são $\mathbb{Z}_2G$ -homomorfismos. Os $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismos verticais ψ e ϕ são dados por $\psi(f)(1) = f(1)$ e $\phi(f)(gS) = xf(g^{-1})$. (De fato ϕ e ψ são exatamente o $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismo v^{-1} dado em 1.3.12, tomando M no lugar de N e considerando, para obter ψ , $S = G$).

A exatidão da primeira sequência é óbvia. Para a segunda sequência, tem-se que ϵ^* é injetora e $Im \epsilon^* = Ker i^*$ porque o funtor $Hom(-, M)$ é exato à esquerda. Agora, i^* é sobrejetora porque $\mathbb{Z}_2$ é obviamente $\mathbb{Z}_2$ -projetivo, e assim, ϵ tem inversa à direita, ou equivalentemente (cf. [18, 1.5.10]), i tem inversa à esquerda.

Também é fácil verificar que (I) é comutativo, e a aplicação φ é definida de modo que (II) seja comutativo, isto é,

$$\begin{aligned}\varphi : \Gamma(M) &\rightarrow \text{Hom}(\Delta, M) \\ \rho(h) &\rightarrow (i^* \circ \phi)(h).\end{aligned}$$

Daí pelo lema dos cinco ([18, 1.5.13]), φ é um $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismo como desejado. $\square$

Nós finalizamos esta secção com o seguinte resultado, que segue essencialmente do fato que a sequência exata curta de $\mathbb{Z}_2G$ -módulos livres

$$0 \rightarrow \Delta \rightarrow \mathbb{Z}_2(G/S) \rightarrow \mathbb{Z}_2 \rightarrow 0$$

permanece exata quando aplicamos o funtor $\text{Hom}(-, M)$, lembrando ainda que

$$\text{Hom}_G(\bigoplus_i \mathbb{Z}_2(G/S_i), M) \simeq \prod_i \text{Hom}_G(\mathbb{Z}_2(G/S_i), M).$$

1.7 Proposição: [7, Prop.1.1] Se $(G, \mathcal{S})$ é um par grupo, $\mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}$, e M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo então temos a sequência exata longa:

$$0 \rightarrow H^0(G; M) \rightarrow \prod_i H^0(S_i; M) \xrightarrow{\delta} H^1(G, \mathcal{S}; M) \xrightarrow{J} H^1(G; M) \xrightarrow{\text{res}} \prod_i H^1(S_i; M) \rightarrow \dots$$

que é natural no módulo M e no par grupo $(G, \mathcal{S})$. $\square$

Uma consequência imediata da proposição anterior é que, se $\mathcal{S} = \{S\}$ com $S = \{1\}$, então $H^k(G; M) \simeq H^k(G, \{1\}; M)$, para todo $k \geq 2$ e todo $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M .

2. O invariante $E(G, \mathcal{S}, M)$.

Nós definiremos aqui um invariante que, como veremos no desenvolvimento do trabalho, generaliza de certo modo, os invariantes ends já existentes.

2.1 Definição: Seja $(G, \mathcal{S})$ um par grupo, com $\mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}$ e $[G : S_i] = \infty$. Se M é um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo definimos

$$E(G, \mathcal{S}, M) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{\mathcal{S}, M}^G,$$

onde $\text{res}_{\mathcal{S},M}^G : H^1(G;M) \rightarrow \prod_i H^1(S_i;M)$ é a aplicação da sequência exata dada em 1.7.

Podemos observar, da exatidão da sequência 1.7, que $\text{Ker } \text{res}_{\mathcal{S},M}^G = \text{Im } J$ onde $J : H^1(G, \mathcal{S}; M) \rightarrow H^1(G; M)$ e, se denotamos $\prod_i M^{S_i}$ por $M^{\mathcal{S}}$, então

$$\begin{aligned} E(G, \mathcal{S}, M) &= 1 + \dim \text{Im } J \\ &= 1 + \dim \frac{H^1(G, \mathcal{S}; M)}{(M^{\mathcal{S}}/M^G)}. \end{aligned}$$

Seja $\mathcal{C}$ a seguinte categoria: um objeto de $\mathcal{C}$ é um par $((G, \mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}); M)$ onde $(G, \mathcal{S})$ é um par grupo com $[G : S_i] = \infty$ e M é um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo. Uma aplicação em $\mathcal{C}$ de $((G, \mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}); M)$ em $((L, \mathcal{H} = \{H_j, j \in J\}), N)$ é uma tripla (α, π, ϕ) onde, $\alpha : G \rightarrow L$ é um homomorfismo de grupos, $\pi : I \rightarrow J$ é uma aplicação tal que $\alpha(S_i) \subset H_{\pi(i)}$, e $\phi : N \rightarrow M$ é um homomorfismo de grupos abelianos tal que $\phi(\alpha(g).n) = g.\phi(n)$ para $g \in G$, $n \in N$. Em outras palavras, ϕ é um homomorfismo de $\mathbb{Z}_2 G$ -módulos, onde N é visto como $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo por restrição de escalares via α , isto é, $g * n := \alpha(g).n$.

Note que (α, π, ϕ) será um isomorfismo em $\mathcal{C}$ se, além disto, exigirmos que α e ϕ sejam isomorfismos de grupos, π uma bijeção e $\alpha(S_i) = H_{\pi(i)}$, $\forall i \in I$. Podemos provar que $E(G, \mathcal{S}, M)$ é um invariante na categoria $\mathcal{C}$, isto é, se $((G, \mathcal{S}); M)$ e $((L, \mathcal{H}); N)$ são isomorfos na categoria $\mathcal{C}$ então $E(G, \mathcal{S}, M) = E(L, \mathcal{H}, N)$.

Em nosso trabalho estamos interessados somente no caso em que $\mathcal{S} = \{S\}$. Assim, provaremos aqui a invariança de $E(G, \mathcal{S}, M)$ para este caso (ver 2.3 abaixo). A demonstração, no caso genérico, está feita em detalhes em [1] e usa o fato que $H^*(G, \mathcal{S}; M)$ é um funtor contravariante na categoria $\mathcal{C}$.

2.2 Observação: Por conveniência, no caso em que $\mathcal{S} = \{S\}$ denotaremos o par grupo $(G, \{S\})$ por (G, S) (que chamaremos muitas vezes de par de grupos ao invés de par grupo), e se M é um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo, escreveremos $E(G, S, M)$ ao invés de $E(G, \{S\}, M)$. Observemos que neste caso a sequência exata dada em 1.7 tem (levando em conta 1.6) a forma mais simples:

$$0 \rightarrow H^0(G; M) \rightarrow H^0(S; M) \xrightarrow{\delta} H^1(G, S; M) \xrightarrow{j} H^1(G; M) \xrightarrow{\text{res}_{S, M}^G} H^1(S; M) \rightarrow \dots \quad (1)$$

e se $[G : S] = \infty$,

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{S, M}^G, \quad (2)$$

onde $\text{res}_{S, M}^G : H^1(G; M) \rightarrow H^1(S; M)$ é a aplicação restrição. (Quando não houver confusão denotaremos a aplicação $\text{res}_{S, M}^G$ simplesmente por res_S^G).

2.3 Proposição: Se $((G, S); M)$ e $((L, H); N)$ são isomorfos na categoria $\mathcal{C}$ então

$$E(G, S, M) = E(L, H, N).$$

Demonstração: Recordemos que $((G, S); M)$ e $((L, H); N)$ são isomorfos em $\mathcal{C}$ se existem um isomorfismo de grupos $\alpha : G \rightarrow L$ tal que $\alpha(S) = H$, e um isomorfismo de grupos abelianos $\phi : M \rightarrow N$ satisfazendo $\phi(\alpha(g).n) = g.\phi(n)$. Denotemos por α' o isomorfismo restrição $\alpha|_S : S \rightarrow H$.

Consideremos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} H^1(G; M) & \xrightarrow{\text{res}_{S, M}^G} & H^1(S; M) \\ (\alpha, \phi)^* \downarrow & & \downarrow (\alpha', \phi)^* \\ H^1(L; N) & \xrightarrow{\text{res}_{H, N}^L} & H^1(H; N). \end{array}$$

Podemos facilmente verificar que este diagrama é comutativo e consequentemente,

$$(\alpha, \phi)^*(\text{Ker } \text{res}_{S, M}^G) \subset \text{Ker } \text{res}_{H, N}^L$$

pois, se $u \in \text{Ker } \text{res}_{S, M}^G$, ou seja, $\text{res}_{S, M}^G(u) = 0$, então $\text{res}_{H, N}^L((\alpha, \phi)^*(u)) = (\alpha', \phi)^*(\text{res}_{S, M}^G(u)) = 0$.

Portanto temos bem definido o homomorfismo de grupos

$$(\alpha, \phi)_* : \text{Ker } \text{res}_{S, M}^G \rightarrow \text{Ker } \text{res}_{H, N}^L.$$

As aplicações verticais $(\alpha, \phi)^*$ e $(\alpha', \phi)^*$ são isomorfismos uma vez que são induzidas de isomorfismos.

Dai, $(\alpha, \phi)_1^*$ é obviamente injetora, e também sobrejetora pois, dado $v \in \text{Ker } \text{res}_{H,N}^L \subset H^1(L; N)$, existe (do fato que $(\alpha, \phi)^*$ é sobrejetora) $u \in H^1(G; M)$ tal que $(\alpha, \phi)^*(u) = v$. Mas tal $u \in \text{Ker } \text{res}_{S,N}^G$ pois $(\alpha', \phi)^*(\text{res}_{S,M}^G(u)) = \text{res}_{H,N}^L((\alpha, \phi)^*(u)) = \text{res}_{H,N}^L(v) = 0$ e $(\alpha', \phi)^*$ é injetora.

Logo $\text{Ker } \text{res}_{S,M}^G \simeq \text{Ker } \text{res}_{H,N}^L$, e portanto

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{S,M}^G = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{H,N}^L = E(L, H, N). \quad \square$$

Nota: Conforme observação feita por Alejandro Adem, podemos sob certas hipóteses, esprestar nosso invariante $E(G, S, M)$ em termos de característica de Euler parcial (mais 1), como mostra o lema abaixo.

2.4 Lema: *Se os tres primeiros grupos de cohomologia da sequência exata 2.2 (1) tem dimensão finita sobre $\mathbb{Z}_2$ e $[G : S] = \infty$, então*

$$E(G, S, M) = 1 + \dim H^0(G; M) - \dim H^0(S; M) + \dim H^1(G, S; M).$$

Demonstração: Sabemos que, se $T : V_1 \rightarrow V_2$ é um homomorfismo de espaços vetoriais (de dimensão finita), então $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim V_1$. Dai, usando este fato e a exatidão da sequência 2.2 (1), obtemos:

$$\begin{aligned} \dim \text{Ker } \text{res}_S^G &= \dim \text{Im } J = \dim H^1(G, S; M) - \dim \text{Im } \delta \\ &= \dim H^1(G, S; M) - (\dim H^0(S; M) - \dim H^0(G; M)) \quad \square \end{aligned}$$

No resultado seguinte nós mostramos que o invariante $E(G, S, M)$ está relacionado com derivações e derivações principais. Isto é interessante pois torna possível computar $E(G, S, M)$ em muitos casos (ver por exemplo 3.8 e 4.22 abaixo). O subgrupo das derivações principais no caso relativo é dado por

$$\begin{aligned} P(G, S, M) &= \{d_m \in \text{Der}(G, S, M), m \in M \mid d_m(g) = gm + m, \forall g \in G\} \\ &= \{d_m \in P(G, M) \mid d_m|_S = 0\}. \quad (\text{cf. I.1.5}) \end{aligned}$$

2.5 Lema: *Se $\text{res}_S^G : H^1(G; M) \rightarrow H^1(S; M)$ é a aplicação restrição então*

$\text{Ker } \text{res}_S^G \simeq \frac{\text{Der}(G, S, M)}{P(G, S, M)}$. Daí, se $[G : S] = \infty$, então

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \frac{H^1(G, S; M)}{P(G, S, M)} = 1 + \dim \frac{\text{Der}(G, S, M)}{P(G, S, M)}.$$

Demonstração: Uma vez que $H^1(G; M) = \frac{\text{Der}(G, M)}{P(G, M)}$ (por 1.1.6) e $H^1(G, S; M) = \text{Der}(G, S, M)$ (por 1.5), podemos ver a aplicação J da sequência 2.2(1) como sendo a aplicação $\text{Der}(G, S, M) \rightarrow \frac{\text{Der}(G, M)}{P(G, M)}$, dada por $J(f) = f + P(G, M)$. Logo $\text{Ker } J = P(G, S, M)$ e daí, $\text{Ker } \text{res}_S^G = \text{Im } J \simeq \frac{\text{Der}(G, S, M)}{P(G, S, M)}$. $\square$

Sabemos, por 1.4.3, que $\frac{\text{Der}(G, M)}{P(G, M)} = H^1(G; M)$ tem uma interpretação via levantamentos de uma extensão cindida de G por M . Nós observamos que a seguinte generalização pode ser provada de modo análogo.

2.6 Proposição: Para todo $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M , as classes de M -conjugação $[l]$ de levantamentos $l : G \rightarrow M \rtimes G$ satisfazendo $l|_S = (0, \text{Id}_S)$, da extensão cindida

$$0 \rightarrow M \rightarrow M \rtimes G \rightarrow G \rightarrow 1$$

estão em correspondência biunívoca com os elementos de $\frac{\text{Der}(G, S, M)}{P(G, S, M)}$.

Demonstração: Seja $\mathcal{L}'$ o conjunto das classes de M -conjugação $[l]$ tal que $l|_S = (0, \text{id}_S)$.

Claramente, um levantamento l satisfaz $l|_S = (0, \text{id}_S)$ se, e somente se, a derivação correspondente d (ver demonstração 1.4.3) satisfaz $d|_S = 0$, isto é, $d \in \text{Der}(G, S, M)$. Assim, temos bem definida a aplicação

$$\frac{\text{Der}(G, S, M)}{P(G, S, M)} \rightarrow \mathcal{L}'$$

$$d + P(G, S, M) \rightarrow l \quad \text{tal que} \quad l(g) = (d(g), g).$$

e facilmente verifica-se que tal aplicação é bijetora. $\square$

A seguir apresentamos algumas propriedades interessantes do invariante E .

2.7 Proposição:

(i) Sejam S, T subgrupos de G satisfazendo $S \leq T \leq G$. Se $[G : T] = \infty$ então

$$E(G, T, M) \leq E(G, S, M)$$

para todo $\mathbb{Z}_2G$ -módulo M .

(ii) Sejam N, M $\mathbb{Z}_2G$ -módulos. Se existe um $\mathbb{Z}_2G$ -homomorfismo $\phi : N \rightarrow M$ tal que o homomorfismo induzido $\phi^* : H^1(G; N) \rightarrow H^1(G; M)$ é monomorfismo, então

$$E(G, S, N) \leq E(G, S, M)$$

para todo subgrupo S de G satisfazendo $[G : S] = \infty$.

Demonstração: (i) Se $S \leq T \leq G$ então $\text{res}_S^G = \text{res}_S^T \circ \text{res}_T^G$, onde

$$\begin{array}{ccccc} H^1(G; M) & \xrightarrow{\text{res}_T^G} & H^1(T; M) & \xrightarrow{\text{res}_S^T} & H^1(S; M) \\ & \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{res}_S^G} & & & \end{array}$$

Logo, $\text{Ker } \text{res}_T^G \subset \text{Ker } \text{res}_S^G$. Daí

$$E(G, T, M) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_T^G \leq 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G = E(G, S, M).$$

(ii) Consideremos o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} H^1(G; N) & \xrightarrow{\phi^*} & H^1(G; M) \\ \downarrow \text{res}_{S, N}^G & & \downarrow \text{res}_{S, M}^G \\ H^1(S; N) & \xrightarrow{(id_S, \phi)^*} & H^1(S; M) \end{array}$$

Da comutatividade do diagrama, segue que $\phi^*(\text{Ker } \text{res}_{S, N}^G) \subset \text{Ker } \text{res}_{S, M}^G$. Como ϕ^* é monomorfismo temos que $\dim \text{Ker } \text{res}_{S, N}^G = \dim \phi^*(\text{Ker } \text{res}_{S, N}^G)$. Daí,

$$E(G, S, N) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{S, N}^G \leq 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{S, M}^G = E(G, S, M). \quad \square$$

2.8 Proposição: Sejam S, T subgrupos de G satisfazendo $S \leq T \leq G$ e M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Se $[T : S] = \infty$ e

$$\varphi^* : H^1(G; \text{Ind}_T^G(\text{Ind}_S^T M)) \rightarrow H^1(G; \text{Coind}_T^G(\text{Ind}_S^T M))$$

é um monomorfismo, onde φ^* é a aplicação induzida do mergulho natural $\varphi : \text{Ind}_T^G(\text{Ind}_S^T M) \rightarrow \text{Coind}_T^G(\text{Ind}_S^T M)$ dado em 1.3.6 (i), então

$$E(G, S, \text{Ind}_S^G M) \leq E(T, S, \text{Ind}_S^T M).$$

Demonstração: Consideremos as seguintes aplicações

$$\text{Ind}_S^G M \xrightarrow{\psi} \text{Ind}_T^G \text{Ind}_S^T M \xrightarrow{\varphi} \text{Coind}_T^G \text{Ind}_S^T M \xrightarrow{\pi} \text{Ind}_S^T M,$$

onde nos geradores ψ é dada por $\psi(g \otimes m) = g \otimes 1 \otimes m$ e é estendida por linearidade, φ é o $\mathbb{Z}_2 G$ -monomorfismo dado em 1.3.6 (i) e π é o $\mathbb{Z}_2 T$ -epimorfismo como em 1.3.4, isto é, $\pi(\varphi(g \otimes 1 \otimes m)) = \varphi(g \otimes 1 \otimes m)(1)$.

Claramente ψ é um $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo, e portanto $\phi = \pi \circ \varphi \circ \psi$ é um $\mathbb{Z}_2 T$ -homomorfismo.

O par de aplicações $(T \xrightarrow{\phi} G, \phi)$ induz o homomorfismo

$$(\alpha, \phi)^* : H^1(G; \text{Ind}_S^G M) \rightarrow H^1(T; \text{Ind}_S^T M).$$

Como $(\alpha, \phi)^* = (\alpha, \pi)^* \circ \varphi^* \circ \psi^*$, com

$$H^1(G; \text{Ind}_S^G M) \xrightarrow{\psi^*} H^1(G; \text{Ind}_T^G \text{Ind}_S^T M) \xrightarrow{\varphi^*} H^1(G; \text{Coind}_T^G \text{Ind}_S^T M) \xrightarrow{(\alpha, \pi)^*} H^1(T; \text{Ind}_S^T M)$$

onde $(\alpha, \pi)^*$ é o isomorfismo do lema de Shapiro (1.3.14), segue da hipótese da proposição e do fato que ψ^* é obviamente isomorfismo, que $(\alpha, \phi)^*$ é um monomorfismo.

Consideremos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} H^1(G; \text{Ind}_S^G M) & \xrightarrow{\text{res}_S^G} & H^1(S; \text{Ind}_S^G M) \\ \downarrow (\alpha, \phi)^* & & \downarrow \phi^* = (id : S \rightarrow S, \phi)^* \\ H^1(T; \text{Ind}_S^T M) & \xrightarrow{\text{res}_S^T} & H^1(S; \text{Ind}_S^T M) \end{array}$$

Se $[f] \in \text{Ker res}_S^G$ segue, da comutatividade do diagrama, que $(\alpha, \phi)^*([f]) \in \text{ker res}_S^T$. Portanto está bem definida a aplicação

$$(\alpha, \phi)_!^* : \text{Ker res}_S^G \rightarrow \text{Ker res}_S^T.$$

Daí, como $(\alpha, \phi)^*$ é monomorfismo, temos que

$$\begin{aligned} E(G, S, \text{Ind}_S^G M) &= 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G \\ &\leq 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^T = E(T, S, \text{Ind}_S^T M). \end{aligned} \quad \square$$

2.9 Corolário: *Sejam S, T subgrupos de G satisfazendo $S \leq T \leq G$, e M um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo. Se $[G : S] = \infty$ e $[G : T] < \infty$ então*

$$E(G, S, \text{Ind}_S^G M) \leq E(T, S, \text{Ind}_S^T M).$$

Demonstração: Se $[G : T] = \infty$ então temos por 1.3.6(ii), que $\text{Ind}_T^G N \cong \text{Coind}_T^G N$, para todo $\mathbb{Z}_2 T$ -módulo N , em particular, para $N = \text{Ind}_S^T M$. Logo, a aplicação induzida $\varphi^* : H^1(G; \text{Ind}_T^G \text{Ind}_S^T M) \rightarrow H^1(G; \text{Coind}_T^G \text{Ind}_S^T M)$ é um $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo e portanto o resultado segue da proposição anterior. $\square$

O invariante $E(G, S)$:

Seja G é um grupo e S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$. Nós fixaremos, a partir de agora, o $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo particular $M = \mathbb{Z}_2(G/S) \simeq \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2$ (ver 1.3.13(a)). Por simplicidade, $E(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$ será denotado por $E(G, S)$.

2.10 Lema: *$E(G, S)$ é um invariante algébrico para pares de grupos (G, S) com $[G : S] = \infty$, isto é, se $\alpha : (G, S) \rightarrow (L, K)$ é um isomorfismo de pares de grupos, então $E(G, S) = E(L, K)$.*

Demonstração: Seja $\alpha : (G, S) \rightarrow (L, K)$ um isomorfismo de pares de grupos, isto é, $\alpha : G \rightarrow L$ é um isomorfismo de grupos com $\alpha(S) = K$. Por 2.3 é suficiente provar que existe $\phi : \mathbb{Z}_2(L/K) \rightarrow \mathbb{Z}_2(G/S)$, isomorfismo de grupos abelianos, tal que $\phi(\alpha(g).u) = g.\phi(u)$, para $g \in G$ e $u \in \mathbb{Z}_2(L/K)$ em outras palavras, $((G, S); \mathbb{Z}_2(G/S))$ e $((L, K); \mathbb{Z}_2(L/K))$ são isomorfos na categoria $\mathcal{C}$.

Considere $\phi : \mathbb{Z}_2(L/K) \rightarrow \mathbb{Z}_2(G/S)$ definida nos geradores por $\phi(xK) = \alpha^{-1}(x)S$ para $x \in L$, e estendida por linearidade. Claramente ϕ é um isomorfismo de grupos. Além disto, $\phi(\alpha(g).xK) = \phi((\alpha(g)x)K) = \alpha^{-1}(\alpha(g)x)S = (g\alpha^{-1}(x))S = g.\phi(xK)$. Portanto ϕ está nas condições desejada. $\square$

2.11 Observação: A existência de isomorfismos separados $G \rightarrow L$ e $S \rightarrow K$ não implica que $E(G, S) = E(L, K)$.

De fato, seja $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e consideremos os seguintes subgrupos de G :

$$S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle \text{ e } K = \langle b \rangle$$

Temos obviamente que $S \simeq K \simeq \mathbb{Z}$. No entanto, veremos na secção seguinte que, $E(G, S) = 1$ enquanto que $E(G, K) = \infty$ (ver 3.7 e 3.8, respectivamente).

Logo, como uma aplicação do nosso invariante, podemos concluir que não existe isomorfismos de pares de grupos $(\langle a \rangle * \langle b \rangle, \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle) \rightarrow (\langle a \rangle * \langle b \rangle, \langle b \rangle)$.

Concluindo esta secção nós reescreveremos, para facilitar futuras referências, o corolário 2.9 em termos do invariante $E(G, S)$.

2.12 Corolário: Sejam S e T subgrupos de G satisfazendo $S \leq T \leq G$. Se $[G : S] = \infty$ e $[G : T] < \infty$, então

$$E(G, S) \leq E(T, S).$$

Demonstração: Basta considerar, em 2.9, $M = \mathbb{Z}_2$. □

3. $E(G, S)$ e Dualidade.

Nesta secção apresentamos alguns resultados para o invariante $E(G, S)$ quando G , S ou (G, S) satisfazem certas condições de dualidade. Dentre eles destacamos o seguinte: "Se (G, S) é um par de dualidade de dimensão n (D^n -par) então $E(G, S) = 1$ ". Assim, nosso invariante $E(G, S)$ dá uma condição necessária para que (G, S) seja um D^n -par.

Este resultado é uma "generalização" do resultado já existente para um grupo G . A saber, "se G é um D^n -grupo ($n > 1$) então $e(G) = 1$ " (ver 4.11, na secção seguinte).

O conceito de par de dualidade para um par grupo $(G, \mathcal{S})$, $\mathcal{S} = \{S_i\}_{i \in I}$ foi introduzido por Bieri e Eckmann em [7, p. 299] para o anel $R = \mathbb{Z}$. No entanto, tudo pode ser feito de modo análogo para $R = \mathbb{Z}_2$. É neste caso que estamos interessados e na família $\mathcal{S} = \{S\}$. Para facilitar ao leitor, nós recordamos aqui este conceito e suas propriedades mais relevantes. Para maior detalhes ver referência acima.

3.1 Definição: Um par grupo $(G, \mathcal{S})$ é chamado um par de dualidade de dimensão n (sobre $\mathbb{Z}_2$), ou simplesmente um D^n -par, se existe um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo C e isomorfismos naturais:

$$H^k(G; M) \simeq H_{n-k}(G, \mathcal{S}; C \otimes M) \quad \epsilon \quad (1)$$

$$H^k(G, \mathcal{S}; M) \simeq H_{n-k}(G; C \otimes M) \quad (2)$$

para todo $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo M e todo $k \in \mathbb{Z}$.

C é chamado o módulo dualizante de $(G, \mathcal{S})$. Se $C \simeq \mathbb{Z}_2$ como um grupo abeliano, o par de dualidade $(G, \mathcal{S})$ é chamado um par de dualidade de Poincaré, ou simplesmente um PD^n -par (neste caso os isomorfismos (1) e (2) são equivalentes).

3.2 Observações:(a) A definição de D^n -grupos (sobre $\mathbb{Z}_2$) dado em I.5.14, pode ser vista como um caso particular do conceito de D^n -pares se consideramos o par grupo $(G, \mathcal{S})$ com $\mathcal{S} = \emptyset$ (família vazia) e tomamos, como em 1.3(a),

$$H^k(G, \emptyset; M) = H^k(G; M) \text{ e } H_k(G, \emptyset; M) = H_k(G; M).$$

(b) Se $(G, \mathcal{S})$ é um D^n -par com módulo dualizante C então

$$H^n(G, \mathcal{S}; \mathbb{Z}_2 G) \simeq C \quad (\text{como } \mathbb{Z}_2 G\text{-módulos})$$

Daí, C é determinado pelo par $(G, \mathcal{S})$ e, uma vez que $H^k(G, \mathcal{S}; M) = 0$ para todo M e $k > n$, e $H^n(G, \mathcal{S}; \mathbb{Z}_2 G) = C \neq 0$, temos que o inteiro n é também determinado por $(G, \mathcal{S})$ (compare com I.5.15 (b)).

(c) Como em I.5.21 pode-se provar, levando em consideração 1.3(c), que se $(G, \mathcal{S})$ é um D^n -par sobre $\mathbb{Z}$ então $(G, \mathcal{S})$ é um D^n -par sobre $\mathbb{Z}_2$.

3.3 Proposição: [7, teor. 4.2] Se $(G, \mathcal{S})$, $\mathcal{S} = \{S_i, i \in I\} \neq \emptyset$, é um PD^n -par com módulo dualizante C , então

(i) G é um D^{n-1} -grupo com módulo dualizante $\Delta \otimes C$ (com a G -ação diagonal).

(ii) Cada S_i é um D^{n-1} -grupo com módulo dualizante C (considerado como S_i -módulo por restrição).

(iii) $\mathcal{S}$ é uma família finita de subgrupos. □

Antes de estabelecer o próximo resultado, que nos dá exemplos de PD^n -pares, recordamos aqui quando um par grupo $(G, \mathcal{S})$ é realizado topologicamente por um par Eilenberg-MacLane.

3.4: Seja $(G, \mathcal{S})$ um par grupo, onde $\mathcal{S} = \{S_i, i \in I\}$. Dizemos que $(G, \mathcal{S})$ é realizado topologicamente por um par Eilenberg-MacLane $(X, Y) = K(G, \mathcal{S}, 1)$ se:

(i) X é um complexo celular $K(G, 1)$

(ii) Y é um subcomplexo cujas componentes $Y_i, i \in I$, são complexos $K(S_i, 1)$; o que significa que a aplicação $\pi_1(Y_i) \rightarrow \pi_1(X)$, induzida pela inclusão $Y_i \subset X$, é injetiva e aplica $\pi_1(Y_i)$ sobre $S_i \subset G$ (depois de uma conveniente escolha de caminhos conectando pontos base).

3.5 Teorema: [7, teor. 6.3] Se $(G, \mathcal{S})$ é realizado topologicamente por um par Eilenberg-MacLane (X, Y) onde X é uma variedade de dimensão n , com bordo, compacta, orientável e $Y = \partial X$ (não necessariamente conexo), então $(G, \mathcal{S})$ é um PD^n -par. □

Nota: De fato, em [7] conclui-se que, nas hipóteses acima, $(G, \mathcal{S})$ é um PD^n -par sobre $\mathbb{Z}$ mas, por 3.2(c), tem-se que $(G, \mathcal{S})$ é um PD^n -par (sobre $\mathbb{Z}_2$).

Agora estamos em condições de estabelecer e exemplificar o nosso resultado.

3.6 Proposição: Sejam G um grupo e S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$. Se (G, S) é um PD^n -par, então $E(G, S) = 1$. Ou equivalentemente, se

$E(G, S) \neq 1$ então (G, S) não é um D^n -par.

Demonstração: Observemos, inicialmente, que se (G, S) é um D^1 -par então, por 3.3, G e S são D^0 -grupos (sobre $\mathbb{Z}_2$). Portanto são grupos finitos (por 1.5.22). Daí $[G : S] < \infty$. Logo, nas hipóteses acima, temos necessariamente $n > 1$.

Considere a sequência exata 2.2(1) com $M = \mathbb{Z}_2(G/S)$,

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow H^0(S; \mathbb{Z}_2(G/S)) \xrightarrow{\delta} H^1((G, S; \mathbb{Z}_2(G/S))) \xrightarrow{J} \\ \rightarrow H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \xrightarrow{\text{res}_S^G} H^1(S; \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

Seja C o módulo dualizante de (G, S) . Então

$$\begin{aligned} H^1(G, S; \mathbb{Z}_2(G/S)) &\simeq H_{n-1}(G; C \otimes \mathbb{Z}_2(G/S)) && \text{(por 3.1(2))} \\ &\simeq H_{n-1}(G; C \otimes \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) && \text{(por 1.3.13(a))} \\ &\simeq H_{n-1}(G; \text{Ind}_S^G(C \otimes \mathbb{Z}_2)) && \text{(por 1.3.10)} \\ &\simeq H_{n-1}(S; C \otimes \mathbb{Z}_2) && \text{(por Lema de Shapiro: 1.3.14)} \\ &\simeq H^0(S; \mathbb{Z}_2) && \text{(por 3.3(ii))} \\ &\simeq \mathbb{Z}_2 \end{aligned}$$

Agora, observe que $H^0(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) = (\text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2)^G = 0$ uma vez que $[G : S] = \infty$ (ver 1.3.11), e $H^0(S; \mathbb{Z}_2(G/S)) = \mathbb{Z}_2(G/S)^S$ contém $\{0, 1_S\} \simeq \mathbb{Z}_2$. Daí temos $\mathbb{Z}_2 \subset \mathbb{Z}_2(G/S)^S \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}_2$ (com δ monomorfismo), o que nos dá $\mathbb{Z}_2(G/S)^S \simeq \mathbb{Z}_2$. Assim, $\text{Ker res}_S^G = \text{Im } J \simeq \frac{H^1(G, S; \mathbb{Z}_2(G/S))}{\mathbb{Z}_2(G/S)^S} = 0$ e portanto $E(G, S) = 1$. $\square$

3.7 Exemplo: Se $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e $S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle \simeq \mathbb{Z}$ então $E(G, S) = 1$. De fato, seja X um toro dos quais um disco aberto D^2 foi removido como mostra a figura abaixo:

Temos que $\Pi_1(X) = \langle a \rangle * \langle b \rangle = G$, $\Pi_1(\partial X) = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle = S$ e $(X, \partial X)$ é um par Eilenberg-MacLane que realiza (G, S) . Por 3.5, (G, S) é um PD^2 -par. Logo $E(G, S) = 1$, pela proposição anterior.

No exemplo seguinte usamos 3.6 para concluir que um determinado par (G, S) não é de dualidade. Além disto, sabemos por 3.3, que se (G, S) é um D^n -par então G e S são D^{n-1} -grupos. O exemplo abaixo nos mostra que a proposição 3.6 é falsa se nós substituirmos a hipótese " (G, S) é um D^n -par" pela condição mais fraca " G e S são D^{n-1} -grupos". Tal exemplo é computado usando a interpretação de $E(G, S)$ em termos de derivações e derivações principais, dada em 2.5.

3.8 Exemplo: Se $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e $S = \langle b \rangle$ então $E(G, S) = \infty$. Observe que G é um D^1 -grupo, S é um PD^1 -grupo e no entanto, por 3.6, (G, S) não será um D^2 -par.

De fato, todo elemento de G pode ser unicamente escrito na forma $a^{\alpha_1} b^{\beta_2} \dots a^{\alpha_n} b^{\beta_n}$ onde $n \geq 1$, $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{Z}$ e são não nulos, exceto possivelmente para α_1 e β_n .

Seja f um elemento de $Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$. Afirmamos que f depende somente de $f(a)$. Mais precisamente, temos

$$(1) \quad f(a^\alpha) = \sum_{i=0}^{\alpha-1} a^i f(a) \quad \text{e} \quad f(a^{-\alpha}) = \sum_{i=0}^{\alpha} a^{-i} f(a), \quad \forall \alpha > 0.$$

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} f(a^\alpha b^\beta) = a^\alpha f(b^\beta) + f(a^\alpha) = f(a^\alpha) \quad \text{visto que } f|_S = 0, \\ f(a^{\alpha_1} b^{\beta_1} a^{\alpha_2} b^{\beta_2}) = a^{\alpha_1} b^{\beta_1} f(a^{\alpha_2} b^{\beta_2}) + f(a^{\alpha_1} b^{\beta_1}) = a^{\alpha_1} b^{\beta_1} f(a^{\alpha_2}) + f(a^{\alpha_1}) \\ \text{e mais geralmente,} \\ f(a^{\alpha_1} b^{\beta_1} \dots a^{\alpha_n} b^{\beta_n}) = \sum_{j=1}^n a^{\alpha_1} b^{\beta_1} \dots a^{\alpha_{j-1}} b^{\beta_{j-1}} f(a^{\alpha_j}). \end{array} \right.$$

Estes fatos podem ser facilmente provados pelo princípio de indução finita (indução sobre α e n respectivamente). Vejamos por exemplo (1) no caso das potências negativas.

(i) O caso $\alpha = 1$ é verdadeiro, pois $0 = f(1) = f(a^{-1} \cdot a) = a^{-1} f(a) + f(a^{-1})$

e portanto $f(a^{-1}) = a^{-1}f(a)$.

(ii) Suponhamos que a igualdade é válida para α , isto é, $f(a^{-\alpha}) = \sum_{i=1}^{\alpha} a^{-i}f(a)$.

(iii) Provemos que a igualdade é verdadeira para $\alpha + 1$:

$$\begin{aligned} f(a^{-(\alpha+1)}) &= f(a^{-\alpha} \cdot a^{-1}) = a^{-\alpha}f(a^{-1}) + f(a^{-\alpha}) \\ &\stackrel{(i)}{=} a^{-\alpha} \cdot a^{-1}f(a) + f(a^{-\alpha}) \\ &\stackrel{(ii)}{=} a^{-(\alpha+1)}f(a) + \sum_{i=1}^{\alpha} a^{-i}f(a) \\ &= \sum_{i=1}^{\alpha+1} a^{-i}f(a). \end{aligned}$$

Agora, para duas classes laterais de S , nós temos, $g_1S = g_2S$ se, e somente se, $g_1 = g_2b^{\beta}$ para algum $\beta \in \mathbb{Z}$. Daí, $E := \{1\} \cup \{a^{\alpha_1}b^{\beta_1} \dots a^{\alpha_{k-1}}b^{\beta_{k-1}}a^{\alpha_k} \text{ onde } k \geq 1, \alpha_j, \beta_j \in \mathbb{Z} \text{ são não nulos, exceto para } \alpha_1\}$, é um conjunto de representantes para as classes laterais à esquerda de S em G .

Das considerações anteriores temos que todo elemento $u \in \mathbb{Z}_2(G/S)$ dá origem a uma derivação f em $\text{Der}(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$, basta tomarmos $f(a) = u$, $f(b) = 0$ e estender de modo geral usando (1) e (2).

Sejam f_j , $j \in \mathbb{Z}$, as derivações obtidas deste modo considerando $f_j(a) := b^jaS$.

Usando o fato que $\mathbb{Z}_2(G/S)$ é o grupo abeliano livre gerado pelas classes laterais gS , com $g \in E$, podemos verificar que f_j não pertence a $P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$, $\forall j \in \mathbb{Z}$, e $\{f_j + P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S)); j \in \mathbb{Z}\}$ é um conjunto infinito de elementos linearmente independentes de $\frac{\text{Der}(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}$. Logo, por 2.5, $E(G, S) = \infty$.

Nós finalizamos esta secção com um resultado que é útil para computarmos $E(G, S)$ no caso em que G e S satisfazem certas propriedades de dualidade.

3.9 Proposição: *Sejam G um D^n -grupo com módulo dualizante C e S um subgrupo de G .*

(i) *Se S é um D^{n-1} -grupo com módulo dualizante $\text{Res}_S^G C$ (em particular, se G e S são grupos de dualidade de Poincaré) então $E(G, S) \leq 2$.*

(ii) Se $hdS \leq n - 2$ então $E(G, S) = 1$.

Demonstração: Primeiro observamos que, em ambos os casos, $[G : S] = \infty$ e portanto $E(G, S)$ está definido. Isto segue de 1.5.13, 1.5.15(b) e 1.5.9(iii).

$$\begin{aligned}
 (i) \quad H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) &\simeq H_{n-1}(G; C \otimes \mathbb{Z}_2(G/S)) && \text{(por 1.5.14)} \\
 &\simeq H_{n-1}(G; C \otimes \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) && \text{(por 1.3.13(a))} \\
 &\simeq H_{n-1}(G; \text{Ind}_S^G (\text{Res}_S^G C \otimes \mathbb{Z}_2)) && \text{(por 1.3.10)} \\
 &\simeq H_{n-1}(S; \text{Res}_S^G C \otimes \mathbb{Z}_2) && \text{(por 1.3.14)} \\
 &\simeq H^0(S; \mathbb{Z}_2) && \text{(por hipótese (i))} \\
 &\simeq \mathbb{Z}_2
 \end{aligned}$$

Daí, visto que $\text{Ker } \text{res}_S^G$ é um submódulo de $H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S))$, temos que $E(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G \leq 1 + \dim H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \leq 2$.

(ii) Se $hdS \leq n - 2$ então $H_{n-1}(S; M) = 0$ para todo $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo M , em particular $H_{n-1}(S; \text{Res}_S^G C \otimes \mathbb{Z}_2) = 0$. Logo pelo mesmo raciocínio de (i) obtemos que $H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) = 0$ e portanto $E(G, S) = 1$. $\square$

3.10 Exemplos: (a) Seja $G = \mathbb{Z}^k$ e $S = \mathbb{Z}^r$, com $k > r \geq 2$. Por 1.5.23(d), G é um PD^k -grupo e S é um PD^r -subgrupo. Daí, por 3.9, $E(G, S) \leq 2$ se $r = k - 1$ e $E(G, S) = 1$ se $r \leq k - 2$.

(b) Se $G = \Pi_1(KB) = \langle a, b; a^2 b^2 = 1 \rangle$ e $S = \langle a \rangle$, então $E(G, S) \leq 2$.

(c) Seja $G = (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) \rtimes_{\theta} \mathbb{Z}$, onde $\theta : \mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})$ é dada por

$$\theta(c)(a, b) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^c \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = (a, 2ca + b)$$

A operação em G é dada por

$$((a, b), c) + ((a_1, b_1), c_1) = ((a, b) + \theta(c)(a_1, b_1), c + c_1) = (a + a_1, b + b_1 + 2ca_1, c + c_1).$$

Temos que G é um PD^3 -grupo, pois G é o grupo fundamental de uma variedade asférica de dimensão 3 (cf. [23]).

Seja $S = \{((a, b), 0); a, b \in \mathbb{Z}\}$. Temos que S é um subgrupo (normal) de G isomorfo a $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Daí S é um PD^2 -subgrupo e portanto $E(G, S) \leq 2$.

Analogamente, se considerarmos $K = \{((0, b), c); b, c \in \mathbb{Z}\}$, temos que K é um subgrupo (abeliano e normal) de G e portanto também $E(G, K) \leq 2$.

(d) Se G é como no exemplo anterior e $S = \{((0, 0), c); c \in \mathbb{Z}\}$ então S é um subgrupo de G (não normal). Como S é um PD^1 -subgrupo, segue de 3.9 (ii) que $E(G, S) = 1$. Se G' é qualquer extensão finita de G , então também $E(G', S) = 1$ pois, por 2.12, $E(G', S) \leq E(G, S)$.

Nota: De fato, concluiremos (na secção seguinte) que em (a), $E(\mathbb{Z}^k, \mathbb{Z}^{k-1}) = 2$ e em (c), $E(G, S) = E(G, K) = 2$.

4. $E(G, S)$ e o Invariante end $e(G, S)$.

Os principais resultados desta secção surgiram da tentativa em dar uma interpretação para o invariante end $e(G, S)$ de Houghton [17] e Scott [26], em termos de cohomologia relativa. Na realidade grande parte deste trabalho teve sua origem aqui.

Com o propósito de situar o leitor na teoria de ends e evitar frequentes consultas às referências, apresentamos, inicialmente, uma breve revisão dos conceitos e resultados básicos (sem demonstração) da teoria de ends de grupos $e(G)$ e ends de pares de grupos $e(G, S)$. Para maiores detalhes ver [9], [26] e [27].

Ends de Grupos

A teoria de ends de grupos teve sua origem na teoria de ends de espaço. A definição de ends de espaço foi introduzida por Freudenthal [13] (1931). Para um estudo do conjunto de ends de X , onde X é um espaço topológico, nós sugerimos [29]. Aqui estamos interessados somente no número de ends, não necessariamente no conjunto de ends.

4.1 Definição: *Seja X um complexo simplicial localmente finito. Para todo*

subcomplexo K , o número de componentes de $X - K$ é finito. Seja $n(K)$ o número de componentes infinitas (ou equivalentemente, cujo fecho é não compacto), então o número de ends de X é definido por:

$$e(X) = \sup \{n(K), K \subseteq X, K \text{ finito} \}.$$

Nota: Esta definição vale igualmente para um CW -complexo localmente finito, se nós simplesmente trabalharmos com células ao invés de simplexos.

4.2 Exemplos:

(i) $e(X) = 0 \Leftrightarrow X$ é um complexo simplicial finito (ou equivalentemente, X é compacto).

(ii) $e(\mathbb{R}) = 2$ pois, para qualquer compacto K , existe um intervalo fechado I tal que $K \subset I$. Claramente $\mathbb{R} - I$ tem duas componentes C_1, C_2 , ambas infinitas, e uma componente de $\mathbb{R} - K$ que não intercepta nenhuma destas componentes está inteiramente contida em I e portanto é finita.

Nós ilustramos o caso em que K tem duas componentes conexas:

(iii) $e(\mathbb{R}^n) = 1$ se $n \geq 2$.

Hopf em [16] (1943) mostrou que se um grupo finitamente gerado G atua livremente sobre um complexo simplicial $\hat{X}$ tal que o quociente $\hat{X}/G$ é um complexo simplicial finito então $e(\hat{X})$ depende somente de G . Assim, no caso em que G é finitamente gerado, podemos definir o número de ends de G como sendo $e(\hat{X})$.

Foi Specker em [30] (1949) quem apresentou uma definição de número de ends de G , para qualquer grupo G (não necessariamente finitamente gerado). Sua definição é puramente algébrica. Antes de introduzirmos a definição faremos algumas considerações.

4.3: Seja G um grupo. Por 1.3.7, $\mathbb{Z}_2 G$ pode ser considerado como um $\mathbb{Z}_2 G$ -submódulo de $\overline{\mathbb{Z}_2 G} = \text{Coind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2$. Denotemos por EG o $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo quociente $\frac{\overline{\mathbb{Z}_2 G}}{\mathbb{Z}_2 G}$.

Conforme vimos em 1.3.15, existe um $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo $\rho : \overline{\mathbb{Z}_2 G} \rightarrow PG$. Considere $FG = \{A \subset G \mid A \text{ é finito}\}$. É fácil verificar que a imagem do $\mathbb{Z}_2 G$ -monomorfismo

$$\mathbb{Z}_2 G \xhookrightarrow{\varphi} \overline{\mathbb{Z}_2 G} \xrightarrow{\rho} PG$$

é exatamente FG . Em outras palavras, o submódulo $\mathbb{Z}_2 G$ de $\overline{\mathbb{Z}_2 G}$ corresponde via o isomorfismo ρ , ao submódulo FG de PG . Assim temos o $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo

$$EG = \frac{\overline{\mathbb{Z}_2 G}}{\mathbb{Z}_2 G} \simeq \frac{PG}{FG}.$$

4.4 Definição: O número de ends de G é definido como

$$e(G) = \dim H^0(G; EG) = \dim \left(\frac{PG}{FG} \right)^G.$$

No caso em que G é finitamente gerado este número $e(G)$ (obtido de forma algébrica) é igual ao número de ends de um espaço topológico construído a partir de G como segue:

Suponhamos que G é gerado por $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ e seja Γ_U o *diagrama de Cayley* correspondente para G . Isto é, Γ_U tem como vértices os elementos de G e para todo i existe uma aresta ligando os pontos g a $x_i g$. Note que claramente G atua à direita sobre Γ_U .

4.5 Proposição: [27, prop. 5.2] Se G é gerado por $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ então $e(G) = e(\Gamma_U)$. □

4.6 Corolário: (i) $e(\mathbb{Z}) = 2$ pois $U = \{1\}$ gera $\mathbb{Z}$ e $\Gamma_{\{1\}} = \mathbb{R}$.

$$(ii) \epsilon(\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2) = 2.$$

$$(iii) \epsilon(\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) = \infty. \quad \square$$

Esta conexão pode ser estendida.

4.7 Proposição: [26, lema 1.2] *Se G atua livremente sobre um complexo conexo $\hat{X}$, com quociente finito X (equivalentemente, $\hat{X} \rightarrow X$ é um recobrimento regular conexo, com grupo de recobrimento G), então $\epsilon(G) = \epsilon(\hat{X})$.* $\square$

Observe que o quociente X sendo finito implica que G é finitamente gerado, e portanto o resultado anterior confirma que no caso em que G é finitamente gerado, a definição dada por Hopf para o número de ends de G coincide com a definição algébrica dada por Specker.

4.8 Corolário: *Se G atua livremente no $\mathbb{R}^n$, $n > 1$, com quociente compacto então $\epsilon(G) = 1$. Em particular $\epsilon(\mathbb{Z}^k) = 1$ se $k \geq 2$.* $\square$

No lema seguinte nós reunimos algumas propriedades de $\epsilon(G)$.

4.9 Lema: [27]

$$(i) \epsilon(G) = 0 \Leftrightarrow G \text{ é finito.}$$

$$(ii) \text{ Se } S \text{ é um subgrupo de } G \text{ tal que } [G : S] < \infty \text{ então } \epsilon(G) = \epsilon(S).$$

$$(iii) \text{ Se } S \text{ é um subgrupo finito normal de } G \text{ então } \epsilon(G) = \epsilon(G/S). \quad \square$$

Se G é qualquer grupo infinito, nós temos a seguinte interpretação de $\epsilon(G)$ em termos de cohomologia de grupos.

4.10 Proposição: *Se G é um grupo infinito então*

$$\epsilon(G) = 1 + \dim H^1(G; \mathbb{Z}_2 G). \quad \square$$

4.11 Corolário: *Se G é um D^n -grupo, $n > 1$, então $\epsilon(G) = 1$.* $\square$

Um resultado interessante que, no caso em que S é finitamente gerado, pode ser visto em [27, corol. 5.9] é o seguinte:

4.12 Proposição: *Seja G um grupo. Então $e(G) = 0, 1, 2$ ou ∞ .* $\square$

Existe uma classificação completa para grupos com dois ends (devida a Hopf, 1943).

4.13 Teorema: [27, teor. 5.12] *As seguintes condições são equivalentes para grupos finitamente gerados:*

- (i) $e(G) = 2$.
- (ii) G tem um subgrupo cíclico infinito de índice finito.
- (iii) G tem um subgrupo normal K tal que G/K é isomorfo a $\mathbb{Z}$ ou ao grupo diedral infinito $D_\infty = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$. $\square$

O end $e(G, S)$.

O conceito de número de ends $e(G, S)$ de um par grupo (G, S) , onde S é um subgrupo de G , é uma generalização do número de ends de um grupo.

A definição natural de $e(G, S)$ é devida a Houghton [17] (1974) e foi estabelecida para grupos topológicos. Scott em [26] (1977), explorou este invariante para grupos discretos.

De modo similar a 4.3, podemos, por 1.3.13, considerar $\mathbb{Z}_2(G/S)$ como um $\mathbb{Z}_2 G$ -submódulo de $\overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}$, e o $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo quociente $E(G/S) = \frac{\overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}}{\mathbb{Z}_2(G/S)} \simeq \frac{P(G/S)}{F(G/S)}$.

4.14 Definição: *Sejam G um grupo e S um subgrupo de G . Então, por definição,*

$$e(G, S) = \dim H^0(G; E(G/S)) = \dim \left(\frac{P(G/S)}{F(G/S)} \right)^G.$$

No lema seguinte agrupamos algumas propriedades de $e(G, S)$. Elas estão contidas em [26]

4.15 Lema:

- (i) $e(G, \{1\}) = e(G)$.
- (ii) $e(G, S) = 0 \Leftrightarrow [G : S] < \infty$.
- (iii) Se $S \subset T \subset G$, com $[G : T] < \infty$ então $e(G, S) = e(T, S)$.
- (iv) Se S é um subgrupo normal em G , então $e(G, S) = e(G/S)$.
- (v) Sejam A e S grupos não triviais. Se $A = S = \mathbb{Z}_2$ então $e(A * S, S) = 1$, caso contrário $e(A * S, S) = \infty$.
- (vi) Se G é um grupo livre e S é um subgrupo finitamente gerado de G tal que $[G : S] = \infty$ então $e(G, S) = \infty$. $\square$

O invariante $e(G, S)$ também está relacionado com espaços topológicos como nos mostra o resultado abaixo, que é uma extensão das proposições 4.5 e 4.7 (cf. [26, lemas 1.1 e 1.2]).

4.16 Proposição:

- (i) Sejam G um grupo finitamente gerado, S um subgrupo de G e Γ o diagrama de Cayley associado a G como em 4.5. Se Γ/S denota o quociente de Γ pela ação à direita de S então $e(G, S) = e(\Gamma/S)$.
- (ii) Se X é um CW-complexo finito com espaço de recobrimento regular conexo $\tilde{X}$ cujo grupo de recobrimento é G e S é um subgrupo de G , então $e(G, S) = e(\tilde{X}/S)$, onde $\tilde{X}/S$ é o quociente de $\tilde{X}$ pela ação do subgrupo S . $\square$

É válido para (G, S) um resultado similar ao 4.12 acima, porém com alguma restrição.

4.17 Proposição: [17, teor. 4.1] Se G e S são finitamente gerados e $[N_G(S) : S] = \infty$, onde $N_G(S)$ denota o normalizador de S em G , então $e(G, S) = 1, 2$, ou ∞ . $\square$

De modo geral $e(G, S)$ pode assumir qualquer valor $n \in \mathbb{N}$, como nos mostra o resultado seguinte.

4.18 Proposição: [26, lema 2.2] *Seja G o grupo fundamental de uma superfície fechada F e seja S o grupo fundamental de uma subsuperfície compacta incompressível X de F . Então $e(G, S)$ é igual ao número de componentes de bordo de X .* $\square$

Recordamos que um círculo C mergulhado em uma superfície F é incompressível se a aplicação natural $\Pi_1(C) \rightarrow \Pi_1(F)$ é injetiva; e uma subsuperfície compacta X em uma superfície F é incompressível se toda componente de bordo de X é incompressível em F .

4.19 Exemplo: Seja G o grupo fundamental de uma superfície fechada orientável F de genus 3, e seja S o grupo fundamental da subsuperfície incompressível X de F como na figura abaixo. Então $e(G, S) = 5$.

Agora estamos em condições de analisar a relação entre os dois invariantes $E(G, S)$ e $e(G, S)$.

Conforme inicialmente observamos, os resultados desta secção surgiram da tentativa em dar uma interpretação para $e(G, S)$ em termos de cohomologia relativa.

4.20: Seja G um grupo infinito então, por 4.10 e 2.5, temos

$$\begin{aligned} e(G) &= 1 + \dim H^1(G; \mathbb{Z}_2 G) \\ &= 1 + \dim \frac{Der(G, \mathbb{Z}_2 G)}{P(G, \mathbb{Z}_2 G)} = E(G, \{1\}). \end{aligned}$$

Agora uma vez que $e(G, \{1\}) = e(G)$, segue de 2.5, que

$$e(G, \{1\}) = E(G, \{1\}) = 1 + \dim \frac{H^1(G, \{1\}; \mathbb{Z}_2 G)}{P(G, \{1\}, \mathbb{Z}_2 G)}.$$

Nós notamos que para $e(G, S)$ onde S é um subgrupo não trivial de G com $[G : S] = \infty$, não existe uma fórmula análoga (usando cohomologia relativa). Nossa esperança inicial era provar que $e(G, S) = E(G, S)$ e assim, por 2.5, obter uma fórmula similar para $e(G, S)$. Mas isto é falso em geral, como mostra o exemplo seguinte:

4.21 Exemplo: Se $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e $S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle$ então $E(G, S) = 1 < e(G, S) = \infty$.

De fato, que $E(G, S) = 1$ foi visto no exemplo 3.7, e que $e(G, S) = \infty$ segue de 4.15 (vi).

Entretanto, provaremos no teorema 4.24 abaixo, que a desigualdade $E(G, S) \leq e(G, S)$ é sempre verdadeira, e que a igualdade ocorre quando S é normal em G . Isto foi motivado nos seguintes exemplos:

4.22 Exemplo: Se $G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} = \langle (t, 1), (1, s) \rangle$ e $S = \{1\} \oplus \mathbb{Z} = \langle (1, s) \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Então

$$e(G, S) = E(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(G, S; \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))} = 2.$$

Como S é normal em G , segue de 4.15 (iv) e 4.6, que $e(G, S) = e(G/S) = e(\mathbb{Z}) = 2$. Daí temos (por 3.10 (a)) a desigualdade $E(G, S) \leq 2 = e(G, S)$. Para provar a igualdade usamos a interpretação de $E(G, S)$ em termos de derivações e derivações principais (lema 2.5), isto é, mostraremos que

$$\frac{Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))} \simeq \mathbb{Z}_2.$$

Por simplicidade, denotaremos a classe $(t, 1)S$ por t , e assim, $G/S = \langle t \rangle$. Os seguintes passos fornecem a prova.

1- Uma derivação $f \in Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$, somente depende de $f(t, 1)$,

pois, para todo $k > 0$ e $j \in \mathbb{Z}$, nós temos

$$f(t^k, s^j) = f(t^k, 1) = \sum_{i=0}^{k-1} (t^i, 1) f(t, 1), \quad e$$

$$f(t^{-k}, s^j) = f(t^{-k}, 1) = \sum_{i=1}^k (t^{-i}, 1) f(t, 1).$$

(Isto pode ser provado por indução sobre k .)

2- Se $f(t, 1) = t^k + 1$ então $f \in P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$.

De fato, para $k > 0$, temos $f = d_m$ onde $m = t^{k-1} + t^{k-2} + \dots + 1 \in \mathbb{Z}_2(G/S)$.

Para $k = -n < 0$, nós temos $f = d_m$ onde $m = t^{-n} + t^{-n+1} + \dots + t^{-1}$. O caso $k = 0$ é obvio.

3- Suponhamos que $f(t, 1) = t^{i_1} + \dots + t^{i_r}$, com $i_j \neq i_k$, para todo $0 \leq j \neq k \leq r$. Se $r \equiv 0 \pmod{2}$ então $f \in P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$. Se $r \equiv 1 \pmod{2}$ então $f - \psi \in P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$, onde $\psi \in \text{Der}(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$ é dada por $\psi(t, 1) = 1$ e $\psi \notin P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$.

A prova disto usa 1 e 2 notando que $f(t, 1) = (t^{i_1} + 1) + \dots + (t^{i_r} + 1) + r.1 = d_m(t, 1) + r.1$.

4- Finalizando nós definimos o isomorfismo

$$\eta : \frac{\text{Der}(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))} \rightarrow \mathbb{Z}_2$$

$$f + P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow \varepsilon(f(t, 1)),$$

onde $\varepsilon : \mathbb{Z}_2(G/S) \rightarrow \mathbb{Z}_2$ é a aplicação dada no início do capítulo, isto é, que aplica todo gerador gS em 1.

Analogamente, nós temos

4.23 Exemplos:

(i) Se $G = \mathbb{Z}^k$, $S = \mathbb{Z}^{k-1}$, $k \geq 3$ então $E(G, S) = \varepsilon(G, S) = 2$

(ii) Se $G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n$ e $S = \mathbb{Z}_n$, $n > 1$ onde $\mathbb{Z}_n$ é o grupo cíclico de ordem finita n , então $E(G, S) = \varepsilon(G, S) = 2$.

4.24 Teorema: Se G é um grupo e S é um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$, então $E(G, S) \leq e(G, S)$.

Além disto, se S é normal em G , a igualdade ocorre, ou seja,

$$e(G, S) = E(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(G, S; \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S; \mathbb{Z}_2(G/S))}.$$

Para demonstrarmos o teorema necessitamos do seguinte lema elementar, que nos dá uma condição necessária e suficiente para que $e(G, S) = E(G, S)$.

4.25 Lema: Seja (G, S) um par grupo com $[G : S] = \infty$.

(i) Se $\varphi^* : H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow H^1(G; \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)})$ é a aplicação induzida do $\mathbb{Z}_2 G$ -monomorfismo natural $\varphi : \mathbb{Z}_2(G/S) \rightarrow \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}$ (dado em I.3.13), então

$$e(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \varphi^*.$$

(ii) $E(G, S) = e(G, S) \Leftrightarrow \dim \text{Ker } \text{res}_S^G = \dim \text{Ker } \varphi^*$,

onde $\text{res}_S^G : H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow H^1(S; \mathbb{Z}_2(G/S))$ é a aplicação restrição.

Demonstração: (ii) é uma consequência imediata de (i) e da definição de $E(G, S)$. Vejamos (i):

A sequência exata curta

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_2(G/S) \xrightarrow{\varphi} \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)} \rightarrow E(G, S) = \frac{\overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}}{\mathbb{Z}_2(G/S)} \rightarrow 0,$$

induz (ver I.2.2(ii)') a sequência exata longa

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow H^0(G; \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}) \rightarrow H^0(G; E(G/S)) \xrightarrow{\delta} \\ \rightarrow H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \xrightarrow{\varphi^*} H^1(G; \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}) \rightarrow \dots \end{aligned} \quad (1)$$

Agora, $H^0(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) = 0$ visto que $[G : S] = \infty$ (I.3.11) e $H^0(G; \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}) \simeq H^0(S; \mathbb{Z}_2) \simeq \mathbb{Z}_2$ por I.3.17. Daí nós temos a sequência exata curta

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \rightarrow H^0(G; E(G/S)) \rightarrow \text{Ker } \varphi^* \rightarrow 0$$

e portanto (ver I.14), $e(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \varphi^*$, como desejado. $\square$

Demonstração do teorema 4.24: Seja $A = \varphi(\mathbb{Z}_2(G/S))$ onde $\varphi : \mathbb{Z}_2(G/S) \rightarrow \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}$ é como no lema acima. Temos que $\mathbb{Z}_2(G/S)$ é $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfo (via φ) ao submódulo A de $\overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}$ e portanto temos os isomorfismos

$$H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \xrightarrow{\varphi} H^1(G, A), \quad e \quad \frac{Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))} \simeq \frac{Der(G, S, A)}{P(G, S, A)}.$$

Daí

$$E(G, S) = 1 + \dim \frac{Der(G, S, A)}{P(G, S, A)}. \quad (1)$$

Sejam $\alpha : S \hookrightarrow G$ e $k : A \hookrightarrow \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}$ as inclusões (de grupos e módulos, respectivamente), e π' a composição das aplicações $A \xrightarrow{k} \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)} \xrightarrow{v} \text{Coind}_S^G \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_2$, onde v é o $\mathbb{Z}_2G$ -isomorfismo dado em I.3.13 e π é o $\mathbb{Z}_2S$ -epimorfismo dado em I.3.4. Assim $\pi'(l) = v(l)(1) = l(1S)$, $\forall l \in A \subset \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), \mathbb{Z}_2)$.

Consideremos as aplicações induzidas (I, secção 2)

$$\begin{array}{c} \varphi^* \\ \downarrow \\ H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \xrightarrow{\varphi} H^1(G, A) \xrightarrow{k^*} H^1(G; \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}) \xrightarrow{v^*} H^1(G; \text{Coind}_S^G \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{(\alpha, \pi)^*} H^1(S; \mathbb{Z}_2). \\ \uparrow \\ t := (\alpha, \pi')^* \end{array}$$

Como φ^* , v^* e $(\alpha, \pi)^*$ são isomorfismos, temos

$$\text{Ker } \varphi^* \simeq \text{Ker } k^* = \text{Ker } t. \quad (2)$$

Por outro lado, o homomorfismo

$$\psi : \frac{Der(G, S, A)}{P(G, S, A)} \rightarrow \frac{Der(G, A)}{P(G, A)} = H^1(G; A)$$

definido por $\psi(f + P(G, S, A)) = [f] = f + P(G, A)$ é um monomorfismo e daí

$$\frac{Der(G, S, A)}{P(G, S, A)} \simeq \text{Im } \psi = \{[f] \mid f \in Der(G, S, A)\} \quad (3)$$

Logo, para provar a primeira parte do teorema é suficiente provar que

$$\text{Im } \psi \subset \text{Ker } t \quad (4)$$

pois daí, temos:

$$\begin{aligned}
E(G, S) &= 1 + \dim \frac{Der(G, S, A)}{P(G, S, A)} && \text{(por (1))} \\
&= 1 + \dim \text{Im } \psi && \text{(por (3))} \\
&\leq 1 + \dim \text{Ker } t && \text{(por (4))} \\
&= 1 + \dim \text{Ker } \varphi^* && \text{(por (2))} \\
&= e(G, S) && \text{(pelo lema anterior)}
\end{aligned}$$

Provemos então (4): Temos que t é a aplicação induzida de (α, π') . Sejam $P \rightarrow \mathbb{Z}_2$ e $F \rightarrow \mathbb{Z}_2$ as resoluções Bar para S e G respectivamente (como em I.14(c)). Claramente a inclusão $\tau : P \rightarrow F$ é uma aplicação de cadeia compatível com α . Daí temos o seguinte diagrama

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & C^0(G, A) & \xrightarrow{\delta^1} & C^1(G, A) & \xrightarrow{\delta^2} & \dots \\
& & \downarrow & & \downarrow \text{Hom}(\tau, \pi') & & \\
0 & \rightarrow & C^0(S, \mathbb{Z}_2) & \xrightarrow{\bar{\delta}^1} & C^1(S, \mathbb{Z}_2) & \rightarrow & \dots
\end{array}$$

onde $\text{Hom}(\tau, \pi')(f) = \pi' \circ f \circ \tau$ para todo $f \in C^1(G, A)$, e $t : H^1(G; A) \rightarrow H^1(S; \mathbb{Z}_2)$ é tal que $t[f] = (\alpha, \pi')^*([f]) = [\pi' \circ f \circ \tau]$.

Seja $[f] \in \text{Im } \psi \subset H^1(G, A)$. Como $f \in Der(G, S, A)$ temos que $f|_S = 0$. Daí $\pi' \circ f \circ \tau : S \rightarrow \mathbb{Z}_2$ satisfaz $(\pi' \circ f \circ \tau)(s) = \pi'(f(s)) = f(s)(1S) = 0$. Logo $t[f] = [\pi' \circ f \circ \tau] = 0$ e assim $\text{Im } \psi \subset \text{Ker } t$.

Suponhamos agora que S é normal em G . Então a ação de S em $\mathbb{Z}_2(G/S)$ é trivial ($s.gS = sgS = g(g^{-1}sg)S = gS$).

Usando este fato provaremos que

$$\text{Ker } k^* \subset \text{Im } \psi = \{[f] \mid f \in Der(G, S, A)\} \quad (5)$$

daí teremos $e(G, S) \leq E(G, S)$, que junto com a primeira parte do teorema nos fornece a igualdade desejada.

Provemos (5): Seja $F \rightarrow \mathbb{Z}_2$ a resolução Bar para G e considere o seguinte diagrama

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & C^0(G, A) & \xrightarrow{\delta^1} & C^1(G, A) & \xrightarrow{\delta^2} & \dots \\
& & \downarrow & & \downarrow k^\# & & \\
0 & \rightarrow & C^0(G, \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}) & \xrightarrow{\bar{\delta}^1} & C^1(G, \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)}) & \xrightarrow{\bar{\delta}^2} & \dots
\end{array}$$

onde $k^*(f) = k \circ f$. Temos que a induzida $k^* : H^1(G; A) \rightarrow H^1(G; \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)})$ é tal que $k^*[f] = [k^*(f)] = [k \circ f]$.

Seja $[f] \in \text{Ker } k^* \subset H^1(G; A)$. Como $f \in \text{Ker } \delta^2 = \text{Dcr}(G, A)$, para provar (5) basta provar que $f|_S = 0$ ou seja, $f(s) \in A \subset \text{Hom}(\mathbb{Z}_2(G/S), \mathbb{Z}_2)$ é a aplicação nula para todo $s \in S$. Mas $k^*[f] = 0$ implica que $k \circ f \in \text{Im } \bar{\delta}^1$ e portanto existe $u \in C^0(G, \overline{\mathbb{Z}_2(G/S)})$ tal que $k \circ f = \bar{\delta}^1(u)$. Logo $f(g) = (k \circ f)(g) = \bar{\delta}^1(u)(g) = g \cdot u[] - u[]$ para todo $g \in G$, em particular, $f(s) = su[] - u[]$, $\forall s \in S$. Daí, usando o fato que as ações de S em $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_2(G/S)$ são triviais, temos que, para qualquer $\bar{g} = gS \in \mathbb{Z}_2(G/S)$, $f(s)(\bar{g}) = s \cdot u[](\bar{g}) - u[](\bar{g}) = su[](s^{-1}\bar{g}) - u[]\bar{g} = u[](\bar{g}) - u[](\bar{g}) = 0$, isto é, $f|_S = 0$, como queríamos. $\square$

4.26: Sejam G, S e K como no exemplo 3.10(c). Como S e K são subgrupos normais em G segue, do teorema anterior, que $E(G, S) = \epsilon(G, S) = \epsilon(G/S) = \epsilon(\mathbb{Z}) = 2$. Analogamente $E(G, K) = 2$.

4.27 Proposição: Se a aplicação restrição $\text{res}_S^G : H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \rightarrow H^1(S; \mathbb{Z}_2(G/S))$ é trivial e $[G : S] = \infty$ então

$$E(G, S) = \epsilon(G, S).$$

Demonstração: Seja φ^* a aplicação dada em 4.25. Se $\text{res}_S^G = 0$ então $\text{Ker } \text{res}_S^G = H^1(G; \mathbb{Z}_2(G/S)) \supset \text{Ker } \varphi^*$ e daí $\epsilon(G, S) \leq E(G, S)$ (por 4.25).

Pelo teorema anterior, $E(G, S) \leq \epsilon(G, S)$. Logo obtemos a igualdade. $\square$

4.28 Corolário: Sejam G um grupo e S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$. Se S é finito de ordem ímpar então $E(G, S) = \epsilon(G, S)$.

Demonstração: Se $|S|$ é ímpar então $|S|$ é invertível em $\mathbb{Z}_2(G/S)$. Daí, por [8, III.10.2], $H^1(S; \mathbb{Z}_2(G/S)) = 0$.

Logo res_S^G é trivial e portanto o resultado segue da proposição anterior. $\square$

4.29 Observação: Não sabemos se o resultado acima é verdadeiro para $|S|$ par.

A seguir apresentamos uma outra forma (usando derivações) de ver que $E(G, S) = e(G, S)$ se S é subgrupo normal em G .

4.30 Proposição: *Sejam G um grupo e S um subgrupo de G de índice infinito. Se S é um subgrupo normal em G então $e(G, S) = E(G, S)$.*

Demonstração: Como S é normal em G e $[G : S] = \infty$ temos que G/S é um grupo infinito. Daí, por 4.15(iv) e 4.10 temos que

$$\begin{aligned} e(G, S) &= e(G/S) = 1 + \dim H^1(G/S; \mathbb{Z}_2(G/S)) \\ &= 1 + \dim \frac{Der(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))}. \end{aligned}$$

Logo para provar a proposição é suficiente, pelo lema 2.5, mostrar que os grupos $A = \frac{Der(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))}$ e $B = \frac{Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}$ são isomorfos.

Seja $\psi : A \rightarrow B$ definida por

$$\psi(f + P(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))) = \hat{f} + P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S)), \text{ onde } \hat{f}(g) := f(\bar{g}).$$

Claramente $\hat{f}$ é uma derivação (visto que f é uma derivação) e $\hat{f}|_S = 0$ pois $\hat{f}(s) = f(\bar{s}) = f(1) = 0$.

Além disso, se $f \in P(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))$ então $f = d_m$ para algum $m = \bar{g}_1 + \dots + \bar{g}_t \in \mathbb{Z}_2(G/S)$ daí como $\bar{g}m = gm$, temos que $\hat{f}(g) = f(\bar{g}) = d_m(\bar{g}) = \bar{g}m - m = gm - m = d_m(g)$, isto é, $\hat{f} \in P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$.

ψ é um homomorfismo pois $(f + h)(g) := (f + h)(\bar{g}) = f(\bar{g}) + h(\bar{g}) = \hat{f}(g) + \hat{h}(g) = (\hat{f} + \hat{h})(g)$ para todo $g \in G$.

Agora observemos que dado $\hat{f} \in Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))$ podemos definir uma derivação $f : G/S \rightarrow \mathbb{Z}_2(G/S)$ por $f(\bar{g}) := \hat{f}(g)$. Temos que f está bem definida pois se $\bar{g}_1 = \bar{g}_2$ então $g_1^{-1}g_2 \in S$. Daí, como $\hat{f}|_S = 0$ e $\hat{f}$ é derivação temos $0 = \hat{f}(g_1^{-1}g_2) = g_1^{-1}\hat{f}(g_2) + \hat{f}(g_1^{-1})$ e portanto $g_1^{-1}\hat{f}(g_2) = \hat{f}(g_1^{-1}) = g_1^{-1}\hat{f}(g_1)$, de onde segue a igualdade $\hat{f}(g_2) = \hat{f}(g_1)$. Temos então uma aplicação bem definida $\varphi : B \rightarrow A$ dada por $\varphi(\hat{f} + P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))) = f + P(G/S, \mathbb{Z}_2(G/S))$ onde $f(\bar{g}) = \hat{f}(g)$.

É fácil ver que φ é uma inversa para ψ e portanto obtemos o isomorfismo desejado. $\square$

Finalizando esta secção nós observamos que o invariante $E(G, S, M)$ foi definido somente quando $[G : S] = \infty$, mas é interessante observar (compare com o lema 2.5), o seguinte fato:

4.31 Lema: Se $[G : S] < \infty$ então $\frac{Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))} = 0$.

Demonstração: Sabemos que se $[G : S] < \infty$ então $e(G, S) = \dim H^0(G; E(G/S)) = 0$. Logo, da sequência exata (1) (na demonstração de 4.25), obtemos que $\text{Ker } \varphi^* = \text{Im } \delta = 0$. Agora observe que não usamos o fato que $[G : S] = \infty$ para obter (2) e (4) na demonstração de 4.24, logo as afirmações (2) e (4) são também válidas para $[G : S] < \infty$. Daí temos,

$$\dim \frac{Der(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))}{P(G, S, \mathbb{Z}_2(G/S))} = \dim \text{Im } \psi \leq \dim \text{Ker } t = \dim \text{Ker } \varphi^* = 0. \quad \square$$

5. Uma interpretação para $E(G, S, M)$ em termos de cohomologia relativa de complexos.

Sejam G um grupo, S um subgrupo de G e M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo qualquer. Nesta secção apresentamos uma interpretação para $E(G, S, M)$ (em particular para $E(G, S)$) em termos de cohomologia relativa de complexos, mais precisamente, em termos de pares Eilenberg-MacLane $(X, Y) = K(G, S, 1)$. Daí, o invariante $e(G, S)$ também terá tal interpretação sempre que a igualdade $e(G, S) = E(G, S)$ for verdadeira.

Para obter esta interpretação faremos uso de um resultado, devido a Bieri e Eckmann, que nos dá, uma interpretação topológica da sequência exata do par grupo $(G, S = \{S_i\}_{i \in I})$.

5.1 Proposição: [7, teor.1.3] *Sejam (G, S) um par grupo e M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Se (X, Y) é um par Eilenberg-MacLane realizando topologicamente (G, S) então as sequências exatas de cohomologia do par grupo (G, S) (com coeficientes em M)*

e do par (X, Y) (tomada com coeficientes locais $\mathcal{M}$) são isomorfas.

Mais precisamente, temos os seguintes diagramas comutativos (a menos de sinal como indicado)

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow H^k(G, S; M) & \rightarrow & H^k(G; M) & \rightarrow & \prod_i H^k(S_i; M) & \rightarrow & H^{k+1}(G, S; M) \rightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & (-1)^{k+1} \downarrow & & \downarrow & & (-1)^{k+1} \downarrow & & \downarrow \\ \cdots \rightarrow H^k(X, Y; \mathcal{M}) & \rightarrow & H^k(X; \mathcal{M}) & \rightarrow & \prod_i H^k(Y_i; \mathcal{M}) & \rightarrow & H^{k+1}(X, Y; \mathcal{M}) \rightarrow \cdots \end{array}$$

onde as aplicações verticais são todas isomorfismos. $\square$

Nota: Na realidade em [7], os autores apresentam o resultado anterior para $\mathbb{Z}G$ -módulos, mas por 1.3(c), tal resultado é igualmente válido para $\mathbb{Z}_2G$ -módulos.

Vejamos agora a interpretação topológica para $E(G, S, M)$.

5.2 Proposição: Sejam G um grupo, S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$ e M um $\mathbb{Z}_2G$ -módulo. Se (X, Y) é um par Eilenberg-MacLane realizando topologicamente (G, S) então

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y; \mathcal{M})}{M^S / M^G}$$

e em particular,

$$E(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y; \mathbb{Z}_2(G/S))}{(\mathbb{Z}_2(G/S))^S},$$

onde $H^1(X, Y; \mathcal{M}) \in H^1(X, Y; \mathbb{Z}_2(G/S))$ são tomadas com coeficientes locais dados pelos $\mathbb{Z}_2G$ -módulos $M \in \mathbb{Z}_2(G/S)$, respectivamente.

Demonstração: Pela proposição anterior temos o seguinte diagrama comutativo (a menos de sinal) com linhas exatas e isomorfismos verticais

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow H^0(G; M) & \rightarrow & H^0(S; M) & \xrightarrow{\xi} & H^1(G, S; M) & \xrightarrow{J} & H^1(G; M) \xrightarrow{\tau \epsilon \xi_M^G} H^1(S; M) \rightarrow \cdots \\ & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ 0 \rightarrow H^0(X; \mathcal{M}) & \rightarrow & H^0(Y; \mathcal{M}) & \xrightarrow{\xi'} & H^1(X, Y; \mathcal{M}) & \xrightarrow{J'} & H^1(X; \mathcal{M}) \xrightarrow{\tau} H^1(Y; \mathcal{M}) \rightarrow \cdots \end{array}$$

Daí $\text{Ker } J' = \text{Im } \delta' \simeq \text{Im } \delta \simeq M^S/M^G$ e portanto,

$$\text{Ker } \text{res}_{S,M}^G \simeq \text{Ker } r = \text{Im } J' \simeq \frac{H^1(X, Y; \mathcal{M})}{M^S/M^G}$$

onde identificamos $\text{Ker } J'$ com M^S/M^G via o isomorfismo anterior.

$$\text{Logo } E(G, S, M) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_{S,M}^G = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y; \mathcal{M})}{M^S/M^G}. \quad \square$$

5.3 Corolário: *Sejam G um grupo, S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$. Se (X, Y) é um par Eilenberg-MacLane realizando topologicamente (G, S) e $e(G, S) = E(G, S)$ (por exemplo no caso em que S é normal em G) então*

$$e(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y; \mathbb{Z}_2(G/S))}{(\mathbb{Z}_2(G/S))^S},$$

onde $H^1(X, Y; \mathbb{Z}_2(G/S))$ é tomada com coeficientes locais.

Demonstração: É consequência imediata da proposição anterior. O caso S normal em G segue de 4.24. $\square$

5.4 Exemplos:

(1) Sejam $G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ e $S = \{1\} \oplus \mathbb{Z}$. O par (G, S) é realizado topologicamente por $(X, Y) = (S^1 \times S^1, S^1 \times \{1\}) \cong (T^2, S^1)$. Logo, para todo $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo M , temos

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \frac{H^1(T^2, S^1; \mathcal{M})}{M^S/M^G}.$$

Em particular, como S é normal em G , temos por 4.24, que

$$e(G, S) = E(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(T^2, S^1; \mathbb{Z}_2(G/S))}{(\mathbb{Z}_2(G/S))^S} = 2.$$

(2) Consideremos o grupo $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e os subgrupos $S_1 = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle$ e $S_2 = \langle b \rangle$. Seja X um toro T^2 com disco aberto removido. Temos que (G, S_1) e (G, S_2) são realizados topologicamente, respectivamente, pelos pares Eilenberg-MacLane $(X, Y_1 = \partial X)$ (ver 3.7 - figura) e (X, Y_2) onde Y_2 é o subcomplexo, representado pelo gerador b de $\Pi_1(T^2)$. Logo, pela proposição anterior, se M é um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo,

$$E(G, S_1, M) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y_1; \mathcal{M})}{M^{S_1}/M^G} \quad \text{e} \quad E(G, S_2, M) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y_2; \mathcal{M})}{M^{S_2}/M^G}.$$

Em particular, levando em consideração 4.21 e 3.8, temos

$$E(G, S_1) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y_1; \mathbb{Z}_2(G/S_1))}{(\mathbb{Z}_2(G/S_1))^{S_1}} = 1 < e(G, S_1) = \infty \quad \text{e}$$

$$E(G, S_2) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y_2; \mathbb{Z}_2(G/S_2))}{(\mathbb{Z}_2(G/S_2))^{S_2}} = \infty = e(G, S_2).$$

(3) Sejam $G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$ e $S = \{1\} \oplus \mathbb{Z}_2$. O par (G, S) é realizado topologicamente por $(X, Y) = (S^1 \times \mathbb{RP}(\infty), \{1\} \times \mathbb{RP}(\infty))$. Daí

$$E(G, S, M) = 1 + \dim \frac{H^1(S^1 \times \mathbb{RP}(\infty), \mathbb{RP}(\infty); \mathcal{M})}{M^S/M^G},$$

para todo $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo M , e como S é normal em G ,

$$e(G, S) = E(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(S^1 \times \mathbb{RP}(\infty), \mathbb{RP}(\infty); \mathbb{Z}_2(G/S))}{\mathbb{Z}_2(G/S)^S} = 2.$$

(4) Sejam G um grupo infinito e $S = \{1\}$ o subgrupo trivial. Considere X um complexo $K(G, 1)$, e o vértice $v_0 \in X$. O par (X, v_0) é um par Eilenberg-MacLane realizando (G, S) . Logo, se M é um $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo,

$$E(G, \{1\}, M) = 1 + \dim \frac{H^1(X, v_0; \mathcal{M})}{M/M^G}.$$

Em particular,

$$e(G) = 1 + \dim \frac{H^1(X, v_0; \mathbb{Z}_2 G)}{\mathbb{Z}_2 G}.$$

CAPÍTULO III

O Invariante $\hat{E}(G, S)$

Neste capítulo dados (G, S) com $[G : S] = \infty$, estudamos o invariante $E(G, S, M)$ para o $\mathbb{Z}_2G$ -módulo particular $M = \mathcal{F}_S G$ definido abaixo. Por simplicidade $E(G, S, \mathcal{F}_S G)$ será denotado por $\hat{E}(G, S)$. Na secção 1 provamos (uma vez que não encontramos a justificativa deste fato) que $\mathcal{F}_S G$ é isomorfo ao módulo induzido $\text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S} = \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$. Isto é interessante pois em alguns casos é conveniente usar $\mathcal{F}_S G$ e em outros $\text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}$. Também estendemos a definição de $\hat{E}(G, S)$ de modo a incluir o caso em que $[G : S] < \infty$ e verificamos que, considerando esta definição, tem-se: $\hat{E}(G, S) = 0 \iff [G : S] < \infty$. Na secção 2 apresentamos várias propriedades de $\hat{E}(G, S)$. Na secção 3 analisamos a relação entre $\hat{E}(G, S)$ e o invariante $\tilde{e}(G, S)$ definido por Kropholler e Roller [22].

Como veremos (observação 3.6), $\hat{E}(G, S)$ tem certa vantagem em relação a $\tilde{e}(G, S)$ pois $\tilde{e}(G, S)$ fornece alguma informação a respeito de S somente quando $\epsilon(G) = 1$ uma vez que, se $\epsilon(G) = \infty$ então $\tilde{e}(G, S) = \infty$ para todo subgrupo S de G . No entanto para $\hat{E}$ temos exemplos em que $\epsilon(G) = \infty$ e $\hat{E}(G, S) \neq \hat{E}(G, T)$ para subgrupos distintos S e T de G , o que nos mostra que $\hat{E}(G, S)$ nos dá informação a respeito de S também no caso em que $\epsilon(G) = \infty$. Além disto, $\hat{E}(G, S)$ nos dá uma condição necessária para que (G, S) seja um D^n -par, o que não ocorre com $\tilde{e}(G, S)$.

1. O Invariante $\hat{E}(G, S)$

Sejam G um grupo, S um subgrupo de G e

$\mathcal{F}_S G := \{B \subset G \mid B \subset F.S \text{ para algum subconjunto finito } F \text{ de } G\}$.

Claramente $\mathcal{F}_S G$ é um $\mathbb{Z}_2 G$ -submódulo de PG com as operações induzidas.

Consideremos o $\mathbb{Z}_2 G$ -módulo $Ind_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S} = \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ com a G -ação natural de módulo induzido ($g.(g_1 \otimes m) = gg_1 \otimes m$).

Veremos, no lema abaixo, que é natural considerar $Ind_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ como um submódulo de $\overline{\mathbb{Z}_2 G}$, e que este submódulo pode ser identificado, via o isomorfismo $\rho : \overline{\mathbb{Z}_2 G} \rightarrow PG$ (ver em 1.3.15), com o submódulo $\mathcal{F}_S G$ de PG .

1.1 Lema: *Os módulos $\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ e $\mathcal{F}_S G$ são $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfos.*

Demonstração: Consideremos as aplicações

$\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S} = Ind_S^G Coind_{\{1\}}^S \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\varphi} Coind_S^G Coind_{\{1\}}^S \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\psi} Coind_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2 = \overline{\mathbb{Z}_2 G} \xrightarrow{\rho} PG$,
onde ρ é o $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo dado em 1.3.15, e φ e ψ são as $\mathbb{Z}_2 G$ -aplicações dadas em 1.3.8, isto é, se $g_0 \otimes h \in \mathbb{Z}_2 G \otimes_S Hom(\mathbb{Z}_2 S, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$, então

$$\varphi(g_0 \otimes h)(g) = \begin{cases} (gg_0).h & \text{se } gg_0 \in S \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

e se $f \in Hom_S(\mathbb{Z}_2 G, Hom(\mathbb{Z}_2 S, \mathbb{Z}_2))$, $\psi(f)(g) = f(g)(1)$, onde $1 \in \mathbb{Z}_2 S$.

Como φ é $\mathbb{Z}_2 G$ -monomorfismo e ψ é $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo, podemos ver $\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ como um $\mathbb{Z}_2 G$ -submódulo de $\overline{\mathbb{Z}_2 G}$, que será $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfo (via ρ) ao $\mathbb{Z}_2 G$ -submódulo $\rho((\psi \circ \varphi)(\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}))$ de PG .

Logo para concluir o lema, basta provar o seguinte fato:

Afirmção: $\rho((\psi \circ \varphi)(\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S})) = \mathcal{F}_S G$.

Isto segue das seguintes observações:

(i) Um elemento $B \in \mathcal{F}_S G \Leftrightarrow B = g_0 S_0 \cup \dots \cup g_k S_k$, com $g_i \in G$, $S_i \subset S$ e $k \in \mathbb{N}$.

(ii) Da mesma forma que temos o $\mathbb{Z}_2 G$ -isomorfismo $\rho : \overline{\mathbb{Z}_2 G} \rightarrow PG$, podemos também definir o $\mathbb{Z}_2 S$ -isomorfismo $\hat{\rho} : \overline{\mathbb{Z}_2 S} \rightarrow PS$. Se considerarmos a injeção natural $\overline{\mathbb{Z}_2 S} \xrightarrow{j} \overline{\mathbb{Z}_2 G}$, $h \rightarrow \hat{h}$, onde $\hat{h}$ é definida nos geradores por

$$\hat{h}(g) = \begin{cases} h(g) & \text{se } g \in S \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

então temos o seguinte diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} \overline{\mathbb{Z}_2 S} & \xrightarrow{j} & \overline{\mathbb{Z}_2 G} \\ \downarrow \tilde{\rho} & & \downarrow \rho \\ PS & \hookrightarrow & PG. \end{array}$$

(iii) Se $g_0 \otimes h_0$ é um elemento básico de $\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ então

$$(\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0)(g^{-1}) = \begin{cases} [(g^{-1}g_0).h_0](1) = h_0(g^{-1}g_0) & \text{se } g^{-1}g_0 \in S \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Dai

$$\begin{aligned} \rho((\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0)) &= \{g \in G \mid (\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0)(g^{-1}) = 1\} \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}g_0 \in S \text{ e } h_0(g^{-1}g_0) = 1\} \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}g_0 \in S \text{ e } h_0((g_0^{-1}g)^{-1}) = 1\} \\ &= \{g \in G \mid g_0^{-1}g \in \tilde{\rho}(h_0)\} \\ &= \{g \in G \mid g_0^{-1}g = s \in \tilde{\rho}(h_0)\} \\ &= \{g_0.s \mid s \in \tilde{\rho}(h_0)\}, \end{aligned}$$

isto é, $\rho((\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0)) = g_0.S_0 \in \mathcal{F}_S G$, onde $S_0 = \tilde{\rho}(h_0) \subset S$.

Agora se $u = g_0 \otimes h_0 + g_1 \otimes h_1 \in \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ então

$$\begin{aligned} \rho(\psi \circ \varphi)(u) &= \{g \in G \mid \rho(\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0 + g_1 \otimes h_1)(g^{-1}) = 1\} \\ &= \{g \in G \mid \rho(\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0)(g^{-1}) + \rho(\psi \circ \varphi)(g_1 \otimes h_1)(g^{-1}) = 1\} \\ &= \left\{ g \in G \mid \begin{array}{l} \rho(\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes h_0)(g^{-1}) = 1 \text{ ou (exclusivo)} \\ \rho(\psi \circ \varphi)(g_1 \otimes h_1)(g^{-1}) = 1 \end{array} \right\} \\ &= g_0.S_0 \cup g_1.S_1 \in \mathcal{F}_S G, \text{ onde } S_i = \tilde{\rho}(h_i) \subset S, \quad i = 0, 1. \end{aligned}$$

Mais geralmente, se $u = g_0 \otimes h_0 + g_1 \otimes h_1 + \dots + g_k \otimes h_k \in \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$, então $\rho(\psi \circ \varphi)(u) = g_0.S_0 \cup \dots \cup g_k.S_k$, com $S_i = \tilde{\rho}(h_i)$, $i = 0, 1, \dots, k$.

(iv) Se $B = g_0.S_0 \cup \dots \cup g_k.S_k$ é um elemento qualquer de $\mathcal{F}_S G$, então é fácil ver que

$$B = \rho(\psi \circ \varphi)(g_0 \otimes \tilde{\rho}^{-1}(S_0) + \dots + g_k \otimes \tilde{\rho}^{-1}(S_k)) \in \rho((\psi \circ \varphi)(\mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S})).$$

□

O invariante $\hat{E}(G, S)$:

Sejam G um grupo e S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$. Se $M = \mathcal{F}_S G \simeq \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S} \simeq \text{Ind}_S^G P S$ então denotaremos $E(G, S, M)$ por $\hat{E}(G, S)$. Isto é,

$$\hat{E}(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G,$$

onde $\text{res}_S^G : H^1(G; \mathcal{F}_S G) \rightarrow H^1(S; \mathcal{F}_S G)$ é a aplicação restrição.

1.2 Lema: $\hat{E}(G, S)$ é um invariante algébrico para pares de grupos (G, S) com $[G : S] = \infty$.

Demonstração: Seja $\alpha : (G, S) \rightarrow (L, K)$ um isomorfismo de pares de grupos. Vamos provar que existe $\phi : \mathcal{F}_K L \rightarrow \mathcal{F}_S G$, isomorfismo de grupos abelianos, tal que $\phi(\alpha(g).u) = g.\phi(u)$, para $g \in G$ e $u \in \mathcal{F}_K L$. Daí $((G, S), \mathcal{F}_S G)$ e $((L, K), \mathcal{F}_K L)$ são isomorfos na categoria $\mathcal{C}$, definida em II.2, e então, por II.2.3 teremos

$$\hat{E}(G, S) = E(G, S, \mathcal{F}_S G) = E(L, K, \mathcal{F}_K L) = \hat{E}(L, K).$$

Primeiro observemos que o isomorfismo $\alpha|_S : S \rightarrow K$ induz um isomorfismo $\gamma : \overline{\mathbb{Z}_2 K} \rightarrow \overline{\mathbb{Z}_2 S}$, onde nos geradores, $\gamma(f)$ é dado por $\gamma(f)(s) = f(\alpha(s))$ e é estendido por linearidade.

Agora, considere a aplicação $\phi : \mathbb{Z}_2 L \otimes_K \overline{\mathbb{Z}_2 K} \rightarrow \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \overline{\mathbb{Z}_2 S}$, definida nos geradores por $\phi(l \otimes f) = \alpha^{-1}(l) \otimes \gamma(f)$ (e estendida por linearidade). Claramente ϕ é um isomorfismo de grupos abelianos. Além disso,

$$\begin{aligned} \phi(\alpha(g).(l \otimes f)) &= \phi(\alpha(g)l \otimes f) = \alpha^{-1}(\alpha(g)l) \otimes \gamma(f) \\ &= g\alpha^{-1}(l) \otimes \gamma(f) = g.(\alpha^{-1}(l) \otimes \gamma(f)) \\ &= g.\phi(l \otimes f). \end{aligned}$$

Logo, levando em conta 1.1, tem-se o resultado desejado. □

Nota: De acordo com o lema 2.5 do capítulo anterior, para $M = \mathcal{F}_S G$,

$$\text{Ker } \text{res}_S^G \simeq \frac{\text{Der}(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)},$$

e, se $[G : S] = \infty$, então $\hat{E}(G, S)$ tem a seguinte interpretação:

$$\hat{E}(G, S) = 1 + \dim \frac{Der(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)}.$$

É interessante (de modo similar à II.4.31) analisar o quociente $\frac{Der(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)}$ no caso em que $[G : S] < \infty$.

1.3 Lema: Se $[G : S] < \infty$ então $\frac{Der(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)} = 0$.

Demonstração: Se $[G : S] < \infty$ então $\mathcal{F}_S G = PG$. Mas $H^1(G; PG) = 0$ por I.3.16. Logo temos

$$\frac{Der(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)} \simeq \text{Ker } \text{res}_S^G \subset H^1(G; \mathcal{F}_S G) = H^1(G; PG) = 0. \quad \square$$

A proposição seguinte nos dá uma forma de estender a definição de $\hat{E}(G, S)$ de modo a abranger o caso em que $[G : S] < \infty$ (Note que para $E(G, S)$ não conseguimos obter isto). Para demonstrar tal proposição precisamos do resultado abaixo, afirmado em [20, p. 54].

1.4 Lema: Seja $\mathcal{A}_S G = \{A \subset G \mid A + gA \in \mathcal{F}_S G, \forall g \in G\}$. Então a aplicação

$$\begin{aligned} \beta : \mathcal{A}_S G &\rightarrow Der(G, \mathcal{F}_S G) \\ B &\rightarrow \beta(B), \quad \text{onde } \beta(B)(g) := B + gB, \forall g \in G, \end{aligned}$$

é sobrejetora, isto é, $Der(G, \mathcal{F}_S G) = P(G, \mathcal{A}_S G)$.

Demonstração: Como $\frac{Der(G, PG)}{P(G, PG)} = H^1(G; PG) = 0$ e $\mathcal{F}_S G \subset PG$, temos que $Der(G, \mathcal{F}_S G) \subset Der(G, PG) = P(G, PG)$.

Daí, se $f \in Der(G, \mathcal{F}_S G)$ então $f \in P(G, PG)$; logo existe $B \in PG$ tal que $f = d_B$, isto é, $f(g) = B + gB, \forall g \in G$, onde $B \in PG$. Mas do fato que $f(g) \in \mathcal{F}_S G$ para todo g (pois $f \in Der(G, \mathcal{F}_S G)$), segue que $B + gB \in \mathcal{F}_S G, \forall g \in G$, isto é, $B \in \mathcal{A}_S G$.

Portanto $f = \beta(B) \in P(G, \mathcal{A}_S G) = \text{Im } \beta$. $\square$

1.5 Proposição: Se (G, S) é um par de grupos satisfazendo $[G : S] = \infty$, então a sequência

$$0 \rightarrow \{\emptyset, G\} \xrightarrow{\alpha} \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S} \xrightarrow{\hat{\beta}} \frac{\text{Der}(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)} \rightarrow 0,$$

com aplicações α e $\hat{\beta}$ dadas por: $\alpha(A) := [A] = A + \mathcal{F}_S G \cap (PG)^S$ e $\hat{\beta}([B]) := \beta(B) + P(G, S, \mathcal{F}_S G)$, onde β é como no lema anterior, é exata.

Demonstração: A aplicação α é injetora pois, $\alpha(G) = 0 \Rightarrow G \in \mathcal{F}_S G \cap (PG)^S \Rightarrow G \subset F.S$ para algum subconjunto finito F de G . Daí $[G : S] < \infty$, o que é uma contradição.

Vejamos que $\text{Ker } \hat{\beta} = \text{Im } \alpha = \{[\emptyset], [G]\}$.

Claramente $\text{Im } \alpha \subset \text{Ker } \hat{\beta}$ pois, para todo $g \in G$, $\beta(\emptyset)(g) = 0$ e $\beta(G)(g) = G + gG = G + G = 0$ e daí $\hat{\beta}([\emptyset]) = \hat{\beta}([G]) = 0$. Agora, se $[B] \in \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S}$ é um elemento de $\text{Ker } \hat{\beta}$ então $\beta(B) \in P(G, S, \mathcal{F}_S G)$. Logo existe $A \in \mathcal{F}_S G$ satisfazendo $\beta(B) = d_A$, isto é, $B + gB = A + gA$, para todo $g \in G$. Daí $B + A = g(B + A)$, para todo $g \in G$, ou seja, $B + A \in (PG)^G = \{\emptyset, G\}$ e portanto $[B] = [\emptyset] = \alpha(\emptyset)$ (se $B + A = \emptyset$) ou $[B] = [G] = \alpha(G)$ (se $B + A = G$).

Finalmente, para ver que $\hat{\beta}$ é sobrejetora basta usar o lema anterior. $\square$

1.6 Corolário: Se $[G : S] = \infty$, então

$$\hat{E}(G, S) = \dim \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S} = \dim \frac{(\mathcal{A}_S G)^S}{(\mathcal{F}_S G)^S}.$$

Demonstração: Se $[G : S] = \infty$ então, pela proposição anterior,

$$\dim \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S} = 1 + \dim \frac{\text{Der}(G, S, \mathcal{F}_S G)}{P(G, S, \mathcal{F}_S G)} = \hat{E}(G, S). \quad \square$$

Podemos então definir, para qualquer par de grupos (G, S) com $[G : S]$ não necessariamente infinito,

$$\hat{E}(G, S) = \dim \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S}.$$

Nestas condições temos:

1.7 Lema: $\hat{E}(G, S) = 0$ se, e somente se, $[G : S] < \infty$.

Demonstração: $(\Rightarrow)$ Suponhamos por absurdo que $[G : S] = \infty$. Então (por 1.5 ou definição inicial de $\hat{E}(G, S)$) tem-se $\hat{E}(G, S) \geq 1$, o que contradiz a hipótese. Logo $[G : S] < \infty$.

$(\Leftarrow)$ Se $[G : S] < \infty$ então $\mathcal{F}_S G = PG = \mathcal{A}_S G$. Daí $\hat{E}(G, S) = 0$. $\square$

1.8 Lema: $\hat{E}(G, \{1\}) = e(G)$.

Demonstração: Se $S = \{1\}$ então temos que $(PG)^S = PG$, $\mathcal{F}_S G = \{A \subset G \mid A \subseteq F, F \text{ finito de } G\} = FG$, e $\frac{\mathcal{A}_S G}{\mathcal{F}_S G} = \left(\frac{PG}{FG}\right)^G$. Daí $\hat{E}(G, \{1\}) = \dim \left(\frac{PG}{FG}\right)^G = e(G)$. $\square$

2. Propriedades.

Nesta secção apresentaremos algumas propriedades de $\hat{E}(G, S)$.

Inicialmente, estudamos a relação entre os dois invariantes introduzido por nós, $E(G, S)$ e $\hat{E}(G, S)$.

2.1 Proposição: Se (G, S) é um par de grupos com $[G : S] = \infty$ então

$$E(G, S) \leq \hat{E}(G, S).$$

Demonstração: Consideremos a sequência exata de $\mathbb{Z}_2 S$ -módulos

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 = \{\emptyset, S\} \rightarrow PS \rightarrow Q = \frac{PS}{\{\emptyset, S\}} \rightarrow 0.$$

Como $\mathbb{Z}_2 G$ é $\mathbb{Z}_2 S$ -livre obtemos, tensorizando por $\mathbb{Z}_2 G$, a seguinte sequência exata:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 G \otimes_S \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\phi} \mathbb{Z}_2 G \otimes_S PS \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_2 G \otimes_S Q \rightarrow 0.$$

Esta sequência induz a sequência exata longa em cohomologia

$$0 \rightarrow H^0(G; \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) \rightarrow H^0(G; \text{Ind}_S^G PS) \rightarrow H^0(G; \text{Ind}_S^G Q) \rightarrow \\ \rightarrow H^1(G; \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\phi^*} H^1(G; \text{Ind}_S^G PS) \rightarrow H^1(G; \text{Ind}_S^G Q) \rightarrow \dots$$

Uma vez que $[G : S] = \infty$ temos, por 1.3.11, que

$$H^0(G; \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) = H^0(G; \text{Ind}_S^G PS) = H^0(G; \text{Ind}_S^G Q) = 0$$

e portanto $\phi^* : H^1(G; \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) \rightarrow H^1(G; \text{Ind}_S^G PS)$ é um monomorfismo. Daí, aplicando II.2.7(ii) para $N = \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2$ e $M = \text{Ind}_S^G PS$, temos que

$$E(G, S) = E(G, S, \text{Ind}_S^G \mathbb{Z}_2) \leq E(G, S, \text{Ind}_S^G PS) = \hat{E}(G, S)$$

□

2.2 Corolário: Se $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e $S = \langle b \rangle$, então $\hat{E}(G, S) = \infty$.

Demonstração: Vimos no exemplo II.3.8, que $E(G, S) = \infty$, logo o resultado segue da desigualdade acima. □

A igualdade na proposição anterior nem sempre ocorre como mostra o exemplo abaixo.

2.3 Exemplo: Sejam $G = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$ e $S = \mathbb{Z}_2$. Então $E(G, S) = 1 < \hat{E}(G, S) = 2$. De fato, por II.4.15(v), $\epsilon(G, S) = 1$. Logo, pelo teorema II.4.24 também $E(G, S) = 1$. Agora, que $\hat{E}(G, S) = 2$, seguirá de 3.10 (secção seguinte) e do fato que $\epsilon(G) = 2$.

2.4 Observação: Apesar das desigualdades

$$E(G, S) \leq \epsilon(G, S) \quad \text{e} \quad E(G, S) \leq \hat{E}(G, S)$$

serem verdadeiras, não existe nenhuma relação entre $\epsilon(G, S)$ e $\hat{E}(G, S)$ pois, no exemplo acima temos que

$$\epsilon(G, S) = 1 < \hat{E}(G, S) = 2.$$

Agora, se (G, S) é como no exemplo II.3.7 concluiremos por 2.8(i) abaixo que $\hat{E}(G, S) = 1$, pois (G, S) é um PD^2 -par. No entanto $e(G, S) = \infty$ por II.4.15(vi). Logo

$$\hat{E}(G, S) = 1 < e(G, S) = \infty.$$

2.5 Proposição: *Sejam S e T subgrupos de G satisfazendo $S \leq T \leq G$.*

Se $[G : T] = \infty$ então:

- (i) $E(G, T, \mathcal{F}_S G) \leq \hat{E}(G, S) \leq E(G, S, \mathcal{F}_T G)$, e
- (ii) $E(G, T, \mathcal{F}_S G) \leq \hat{E}(G, T) \leq E(G, S, \mathcal{F}_T G)$.

Demonstração: Vejamos apenas (i). A afirmação (ii) prova-se de modo análogo.

A desigualdade $E(G, T, \mathcal{F}_S G) \leq \hat{E}(G, S) = E(G, S, \mathcal{F}_S G)$ é obtida de II.2.7(i) tomando $M = \mathcal{F}_S G$.

Para obter $\hat{E}(G, S) \leq E(G, S, \mathcal{F}_T G)$ nós usamos o fato que a inclusão $\mathcal{F}_S G \subset \mathcal{F}_T G$ induz um monomorfismo $\phi^* : H^1(G; \mathcal{F}_S G) \rightarrow H^1(G; \mathcal{F}_T G)$. Para provarmos este fato (que é afirmado em [20, 4.2(ii)]), raciocinamos como na proposição anterior.

Consideremos a sequência exata

$$0 \rightarrow \text{Ind}_S^T \overline{\mathbb{Z}_2 S} \xrightarrow{i} \overline{\mathbb{Z}_2 T} \rightarrow Q = \frac{\overline{\mathbb{Z}_2 T}}{\text{Ind}_S^T \overline{\mathbb{Z}_2 S}} \rightarrow 0,$$

onde i é a composta $\text{Ind}_S^T \overline{\mathbb{Z}_2 S} \xrightarrow{\varphi} \text{Coind}_S^T \overline{\mathbb{Z}_2 S} \xrightarrow{\psi} \overline{\mathbb{Z}_2 T}$, e φ e ψ são como em I.3.8.

Visto que $\mathbb{Z}_2 G$ é livre como $\mathbb{Z}_2 T$ -módulo, Ind_T^G é um funtor exato. Se aplicarmos este funtor na sequência acima obtemos

$$0 \rightarrow \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S} \simeq \text{Ind}_T^G \text{Ind}_S^T \overline{\mathbb{Z}_2 S} \rightarrow \text{Ind}_T^G \overline{\mathbb{Z}_2 T} \rightarrow \text{Ind}_T^G Q \rightarrow 0.$$

Isto induz a sequência exata longa em cohomologia

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(G; \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}) \rightarrow H^0(G; \text{Ind}_T^G \overline{\mathbb{Z}_2 T}) \rightarrow H^0(G; \text{Ind}_T^G Q) \rightarrow \\ \rightarrow H^1(G; \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}) \xrightarrow{\phi^*} H^1(G; \text{Ind}_T^G \overline{\mathbb{Z}_2 T}) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

Como $[G : S] = \infty$, temos que os tres primeiros termos da sequência são nulos e daí $\phi^* : H^1(G; \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}) \rightarrow H^1(G; \text{Ind}_T^G \overline{\mathbb{Z}_2 T})$ é monomorfismo como queríamos.

Logo, aplicando II.2.7(ii), para $N = \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S} \simeq \mathcal{F}_S G$ e $M = \text{Ind}_T^G \overline{\mathbb{Z}_2 T} \simeq \mathcal{F}_T G$, obtemos

$$\hat{E}(G, S) = E(G, S, \mathcal{F}_S G) \leq E(G, S, \mathcal{F}_T G) \quad \square$$

2.6 Corolário:

(i) Sejam $S \leq T \leq G$ com $[G : T] = \infty$. Se $[T : S] < \infty$ então $\hat{E}(G, T) \leq \hat{E}(G, S)$.

(ii) Se T é um subgrupo finitamente gerado de G , $[G : T] = \infty$ e $e(T) = 1$ então $e(G) \leq \hat{E}(G, T)$.

Demonstração:

(i) Se $[T : S] < \infty$ então $\mathcal{F}_S G = \mathcal{F}_T G$. Daí a desigualdade é consequência imediata da proposição anterior.

(ii) Considerando $S = \{1\}$ na proposição anterior, como $\mathcal{F}_{\{1\}} G = FG \simeq \mathbb{Z}_2 G$ obtemos $E(G, T, \mathbb{Z}_2 G) \leq \hat{E}(G, T)$.

Agora, por I.3.9 (considerando $\{1\}$ no lugar de T , T no lugar de S e $M = \mathbb{Z}_2$), obtemos o $\mathbb{Z}_2 T$ -isomorfismo

$$\mathbb{Z}_2 G \simeq \text{Ind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2 \simeq \bigoplus_{g \in T \setminus G} \text{Ind}_{\{1\}}^T g \mathbb{Z}_2,$$

onde $T \setminus G$ é um conjunto de representantes para as classes laterais à direita de T em G . Daí,

$$\begin{aligned} H^1(T; \mathbb{Z}_2 G) &\simeq H^1(T; \bigoplus_{g \in T \setminus G} \text{Ind}_{\{1\}}^T g \mathbb{Z}_2) \\ &\simeq \bigoplus_{g \in T \setminus G} H^1(T; \text{Ind}_{\{1\}}^T g \mathbb{Z}_2) \quad (\text{por III.5.3, pois } T \text{ é f.g.}) \\ &\simeq \bigoplus_{g \in T \setminus G} H^1(T; \mathbb{Z}_2 T) \\ &= 0 \quad (\text{por II.4.10, pois } e(T) = 1). \end{aligned}$$

Logo, $\text{Ker } \text{res}_{S, \mathbb{Z}_2 G}^G = H^1(G; \mathbb{Z}_2 G)$, e portanto

$$E(G, T, \mathbb{Z}_2 G) = 1 + \dim H^1(G; \mathbb{Z}_2 G) = e(G).$$

Daí o resultado segue. □

Uma vez que $\mathcal{F}_S G \simeq \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ e $\mathcal{F}_S T \simeq \text{Ind}_S^T \overline{\mathbb{Z}_2 S}$, considerando $M = \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ no corolário II.2.9, temos:

2.7 Lema: *Sejam S e T subgrupos de G satisfazendo $S \leq T \leq G$. Se $[G : S] = \infty$ e $[G : T] < \infty$ então*

$$\hat{E}(G, S) \leq \hat{E}(T, S).$$

□

Como último resultado desta secção nós observamos que as propriedades de dualidade obtidas para $E(G, S)$ em II.3 são preservadas para $\hat{E}(G, S)$ embora tenhamos $\hat{E}(G, S) \geq E(G, S)$.

2.8 Proposição: *Seja $(G : S)$ um par de grupos, com $[G : S] = \infty$.*

(i) *Se (G, S) é um D^n -par então $\hat{E}(G, S) = 1$.*

(ii) *Se G é um D^n -grupo com módulo dualizante C e S é um D^{n-1} -subgrupo com módulo dualizante $\text{Res}_S^G C$, então $\hat{E}(G, S) \leq 2$.*

(iii) *Se G é um D^n -grupo ($n > 1$) e $hd\ S \leq n - 2$, então $\hat{E}(G, S) = 1$.*

Demonstração: É análoga às demonstrações das proposições II.3.6 e II.3.9; basta lembrar que $\mathcal{F}_S G = \text{Ind}_S^G \overline{\mathbb{Z}_2 S}$ e então trabalhar com $\overline{\mathbb{Z}_2 S}$ no lugar de $\mathbb{Z}_2$. □

Analizando os exemplos vistos no capítulo II, secção 3, temos

2.9 Exemplos:

(i) Se $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$, $S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle$ e $T = \langle b \rangle$, então $\hat{E}(G, S) = 1$ e $\hat{E}(G, T) = \infty$.

(ii) Se $G = \mathbb{Z}^k$ e $S = \mathbb{Z}^{k-1}$, $k \geq 2$, então $\hat{E}(G, S) = 2$.

(iii) $\hat{E}(\mathbb{Z}^k, \mathbb{Z}^r) = 1$ se $0 \leq r \leq k - 2$.

(iv) $\hat{E}(\langle a, b; a^2b^2 = 1 \rangle, S = \langle a \rangle) \leq 2$.

(v) Se G , S e K são como no exemplo II.3.10(c), então $\hat{E}(G, S) = 2 = \hat{E}(G, K)$.

(vi) Se G e S são como no exemplo II.3.10(d), então $\hat{E}(G, S) = 1$.

Para obter (ii) e (v) recordamos que nestes casos S é normal em G , logo $E(G, S) = e(G, S) = e(G/S) = 2$. Daí, por 2.1 e proposição anterior, temos $2 = E(G, S) \leq \hat{E}(G, S) \leq 2$.

Vejamos outros exemplos:

2.10 Exemplos: (i) Se $X = M^2 - D^2$ onde M^2 é qualquer superfície fechada orientada diferente de S^2 , então $(G = \Pi_1(X), S = \Pi_1(\partial X))$ é um PD^2 -par (por II.3.5) e portanto $\hat{E}(G, S) = 1$.

(ii) Se $G = \mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}_n$, onde $\mathbb{Z}_n$ é o grupo cíclico de ordem $n \geq 2$ e $S = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ então $\hat{E}(G, S) = 2$.

De fato, visto que $\mathbb{Z}$ é um PD^1 -grupo e $S = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ é um D^1 -grupo (com módulo dualizante $C \simeq H^1(S; \mathbb{Z}_2 S)$) temos, por I.5.19, que $T = \mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z} * \mathbb{Z})$ é um D^2 -grupo com módulo dualizante $\mathbb{Z}_2 \otimes C \simeq C$. Daí, segue, de 2.7 e proposição anterior (ii), que

$$\hat{E}(G, S) \leq \hat{E}(T, S) \leq 2.$$

Agora, como S é um subgrupo normal em G temos, por II.4.24, que

$$E(G, S) = e(G, S) = e(G/S) = e(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_n) = e(\mathbb{Z}) = 2.$$

Logo, por 2.21, $2 = E(G, S) \leq \hat{E}(G, S) \leq 2$ e portanto, $\hat{E}(G, S) = 2$.

3. $\hat{E}(G, S)$ e o Invariante $\hat{e}(G, S)$.

Nesta secção analizaremos a relação entre os invariantes $\hat{E}(G, S)$ e $\hat{e}(G, S)$. O invariante $\hat{e}(G, S)$ foi definido por Kropholler e Roller implicitamente em [21] (1988) e explicitamente em [22] (1989).

Com o objetivo de facilitar ao leitor recordamos aqui a definição deste invariante e apresentamos (sem demonstração) algumas de suas propriedades. Para maiores detalhes e resultados adicionais ver [22]

3.1 Definição: *Seja (G, S) um par de grupos (com $[G, S]$ não necessariamente infinito). Então por definição,*

$$\tilde{e}(G, S) = \dim H^0(G; PG/\mathcal{F}_S G) = \dim (PG/\mathcal{F}_S G)^G.$$

3.2 Lema: [22, lema 1.2] *Se $[G : S] = \infty$ então*

$$\tilde{e}(G, S) = 1 + \dim H^1(G; \mathcal{F}_S G).$$

□

3.3 Lema: [22, lema 2.4]

(i) $\tilde{e}(G, \{1\}) = e(G)$ e mais geralmente $\tilde{e}(G, F) = e(G)$ se F é um subgrupo finito de G .

(ii) $\tilde{e}(G, S) = 0$ se, e somente se, $[G : S] < \infty$.

(iii) Se $S \leq T \leq G$ e $[G : T] < \infty$, então $\tilde{e}(G, S) = \tilde{e}(T, S)$.

(iv) Se S é finitamente gerado e normal em G , então $\tilde{e}(G, S) = e(G/S)$.

(v) Se $S \leq T \leq G$ e $[G : T] = \infty$, então $\tilde{e}(G, S) \leq \tilde{e}(G, T)$, em particular, considerando $S = \{1\}$ obtemos $e(G) \leq \tilde{e}(G, T)$. □

3.4 Lema: [22, lema 2.5] $e(G, S) \leq \tilde{e}(G, S)$. □

3.5 Proposição: [22, corol. 4.3] *Seja G um PD^n -grupo e S um D^{n-1} subgrupo. Então $\tilde{e}(G, S) = \infty$, ou S é um PD^{n-1} -grupo e, neste caso, $\tilde{e}(G, S) = 2$ (ou seja, $H^1(G, \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$). □*

Nós podemos observar que algumas propriedades anteriormente obtidas para $\hat{E}(G, S)$ são semelhantes às (respectivas) de $\tilde{e}(G, S)$. Daí uma pergunta natural que surge é: *que relação existe entre estes invariantes?* É claro que eles em geral não são iguais pois, se isto ocorresse, teríamos por 3.4, que $e(G, S) \leq \hat{E}(G, S)$ mas, como observamos em 2.4, não existe nenhuma relação entre estes invariantes. Além disto temos:

3.6 Observação: A proposição 2.8(i), não é válida para $\tilde{e}(G, S)$ pois, para o PD^2 -par $(G = \langle a \rangle * \langle b \rangle, S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle)$ temos que $\tilde{e}(G, S) = \infty$ uma vez que por 3.3(v), $\infty = e(G) \leq \tilde{e}(G, S)$.

Na realidade, segue de 3.3(v), que $\hat{e}(G, S) = \infty$ sempre que $e(G) = \infty$ (independentemente de S). Portanto $\hat{e}(G, S)$ não nos dá nenhuma informação a respeito de S quando $e(G) = \infty$, o que não ocorre para o invariante $\hat{E}(G, S)$. Por exemplo para $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle$, $S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle$ e $T = \langle b \rangle$ temos, por 2.9(i) que $\hat{E}(G, S) = 1 \neq \hat{E}(G, T) = \infty$.

3.7 Observação: A definição 3.1 é equivalente à $\hat{e}(G, S) = \dim \frac{\mathcal{A}_S G}{\mathcal{F}_S G}$, onde $\mathcal{A}_S G$ é como em 1.4. Por outro lado, vimos na secção 1, que

$$\hat{E}(G, S) = \dim \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S}.$$

Logo, temos:

$$\hat{e}(G, S) = \hat{E}(G, S) \quad \text{se, e somente se,} \quad \dim \frac{\mathcal{A}_S G}{\mathcal{F}_S G} = \dim \frac{\mathcal{A}_S G \cap (PG)^S}{\mathcal{F}_S G \cap (PG)^S}.$$

Na proposição seguinte comparamos os dois invariantes sob outro aspecto.

3.8 Proposição: *Seja (G, S) um par de grupos. Então,*

(i) $\hat{E}(G, S) \leq \hat{e}(G, S)$.

(ii) *Suponhamos que $[G : S] = \infty$. Se $\text{res}_S^G : H^1(G; \mathcal{F}_S G) \rightarrow H^1(S; \mathcal{F}_S G)$ é a aplicação nula então $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$. (Em particular, se $H^1(S; \mathcal{F}_S G) = 0$ então isto ocorre). Se $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) < \infty$, vale a recíproca deste fato.*

Demonstração:

(i) Se $[G : S] < \infty$ então, por 1.7 e 3.3(i), $\hat{E}(G, S) = 0 = \hat{e}(G, S)$. Suponhamos $[G : S] = \infty$. Claramente

$$\hat{E}(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G \leq 1 + \dim H^1(G; \mathcal{F}_S G)$$

pois $\text{Ker } \text{res}_S^G \subset H^1(G; \mathcal{F}_S G)$. Daí o resultado segue de 3.2.

(ii) res_S^G é nula $\Leftrightarrow \text{Ker } \text{res}_S^G = H^1(G; \mathcal{F}_S G) \xrightarrow{(1)} \dim \text{Ker } \text{res}_S^G = \dim H^1(G; \mathcal{F}_S G) \Leftrightarrow \hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$. Agora, se $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) < \infty$ então (1) é válida na direção contrária. $\square$

Como consequência deste resultado obtemos:

3.9 Corolário: *Seja (G, S) um par de grupos com $[G : S] = \infty$. Se S é finitamente gerado e normal em G então*

$$\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = e(G/S).$$

Demonstração: Se S é normal em G , temos por 1.3.9 (Fórmula de Mackey - caso particular), o seguinte $\mathbb{Z}_2 S$ -isomorfismo

$$\text{Ind}_S^G PS \simeq \bigoplus_{g \in G/S} gPS.$$

Daí, como S é finitamente gerado temos (por 1.5.3) que

$$H^1(S; \mathcal{F}_S G) = H^1(S; \bigoplus_{g \in G/S} gPS) \simeq \bigoplus_{g \in G/S} H^1(S; gPS).$$

Agora, recordemos (ver comentário anterior à 1.3.9), que gPS é um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo com a S -ação dada por $s * (gA) = gsg^{-1}.gA = gsA$, para todo $s \in S$, $A \in PS$, e PS é um $\mathbb{Z}_2 S$ -módulo com a S -ação dada pela multiplicação à esquerda. Considere

$$\gamma : gPS \rightarrow PS \quad (gA \rightarrow A).$$

Claramente γ é uma bijeção. Além disto, γ é um $\mathbb{Z}_2 S$ -homomorfismo pois $\gamma(s * gA) = \gamma(gSA) = sA = s\gamma(gA)$. Logo, para todo $g \in G/S$, temos:

$$H^1(S; gPS) \simeq H^1(S; PS) = 0 \quad (\text{por 1.3.16}).$$

consequentemente, $H^1(S; \mathcal{F}_S G) = 0$ e então, pela proposição anterior e 3.3(iv) tem-se o resultado desejado. $\square$

Nota: Não sabemos se a igualdade $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$ é verdadeira quando S é normal em G , não necessariamente finitamente gerado.

3.10 Corolário: *Se S é um subgrupo finito de G e $[G : S] = \infty$, então*

$$\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = e(G).$$

Demonstração: Se S é finito temos que $\mathcal{F}_S G = FG \simeq \mathbb{Z}_2 G \simeq \text{Ind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2$.
Aplicando I.3.9 para $T = \{1\}$, obtemos o $\mathbb{Z}_2 S$ -isomorfismo

$$\text{Ind}_{\{1\}}^G \mathbb{Z}_2 \simeq \bigoplus_{g \in S \setminus G} \text{Ind}_{\{1\}}^S g \mathbb{Z}_2.$$

Consequentemente, teremos

$$\begin{aligned} H^1(S; \mathcal{F}_S G) &\simeq H^1(S; \bigoplus \text{Ind}_{\{1\}}^S g \mathbb{Z}_2) \\ &\simeq H^1(S; \bigoplus_{g \in S \setminus G} \text{Coind}_{\{1\}}^S g \mathbb{Z}_2) && (\text{por II.3.6, pois } [S : \{1\}] < \infty) \\ &\simeq \bigoplus_{g \in S \setminus G} H^1(S; \text{Coind}_{\{1\}}^S g \mathbb{Z}_2) && (\text{por III.5.3, pois } S \text{ é f.g.}) \\ &\simeq \bigoplus_{g \in S \setminus G} H^1(\{1\}; g \mathbb{Z}_2) && (\text{por lema de Shapiro - II.3.14}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Logo, pela proposição anterior e 3.3(i), obtemos as igualdades $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = \epsilon(G)$

□

Nota: Se $\epsilon(G) = 2$, pode-se verificar que para todo subgrupo S de G tem-se $[G : S] < \infty$ (e portanto $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = 0$) ou $|S| < \infty$ (e daí, pelo resultado anterior, $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = \epsilon(G) = 2$). Assim no caso em que $\epsilon(G) = 2$, a igualdade $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$ é válida para qualquer subgrupo S .

3.11 Corolário: Seja (G, S) um par de grupos. Se S é um PD^n -grupo, e $\{g \in G \mid cd(S^g \cap S) = n - 1\} = \emptyset$, então $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$.

Demonstração: Por [21, lema 5.3], $H^1(S; \mathcal{F}_S G) = 0$. Daí, basta aplicar a proposição anterior. □

Como uma aplicação deste resultado temos:

3.12 Exemplo: Seja G o PD^3 -grupo $\mathbb{Z} \ltimes (\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}) = \Pi_1(S^1 \times KB)$ onde KB é a superfície da garrafa de Klein. Considere $S = \{(a, 0, c) \mid a, c \in \mathbb{Z}\}$. Então S é um subgrupo de G (não normal) satisfazendo $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = 2$.

De fato, a operação em G é dada por $(a, b, c) + (x, y, z) = (a + x, b + (-1)^c y, c + z)$. Daí, claramente S é um subgrupo de G e portanto $S \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ é um PD^2 -grupo. Vejamos que $\{g \in G \mid cd(S^g \cap S) = 1\} = \emptyset$.

Se $g \in S$ então $cd(S^g \cap S) = 2$ pois $S^g \cap S = S$.

Seja $g = (a, b, c)$ um elemento qualquer de $G - S$ (portanto $b \neq 0$). Podemos ver $S = S_0 \cup S_1$ onde $S_0 = \{(x, 0, 2k) \mid x, k \in \mathbb{Z}\}$ e $S_1 = \{(x, 0, 2k + 1) \mid x, k \in \mathbb{Z}\}$. Daí $S^g \cap S = (S_0 \cup S_1)^g \cap S = S_0^g \cap S \cup S_1^g \cap S$. Se $u = (x, 0, 2k) \in S_0$, então

$$\begin{aligned} g + u + (-g) &= (a, b, c) + (x, 0, 2k) + (-a, -(-1)^c b, -c) \\ &= (a + x, b, c + 2k) + (-a, (-1)^{c+1} b, -c) \\ &= (a + x + (-a), b + (-1)^{c+2k} (-1)^{c+1} b, c + 2k + (-c)) \\ &= (x, 0, 2k) = u \in S_0. \end{aligned}$$

Assim, $S_0^g \cap S = S_0 \cap S = S_0$ se $g \in G - S$.

Por outro lado, se $u = (x, 0, 2k + 1) \in S_1$, então

$$\begin{aligned} g + u + (-g) &= (a, b, c) + (x, 0, 2k + 1) + (-a, -(-1)^c b, -c) \\ &= (a + x, b, c + (2k + 1)) + (-a, -(-1)^{c+1} b, -c) \\ &= (a + x - a, b + (-1)^{c+2k+1} (-1)^{c+1} b, c + 2k + 1 - c) \\ &= (x, b + b, 2k + 1) \\ &= (x, 2b, 2k + 1) \notin S \quad (\text{pois } b \neq 0) \end{aligned}$$

Portanto $S_1^g \cap S = \emptyset$. Logo se $g \in G - S$ então $S^g \cap S = S_0 \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ e daí $cd(S^g \cap S) = cd(S_0) = 2$.

Temos então que G é um PD^3 -grupo, S é um PD^2 -subgrupo e $\{g \in G \mid cd(S^g \cap S) = 1\} = \emptyset$. Pelo corolário anterior e proposição 3.5, obtemos $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = 2$.

3.13 Observação: Uma vez que

$$\hat{E}(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(G, S; \mathcal{F}_S G)}{P(G, S; \mathcal{F}_S G)},$$

sempre que ocorrer a igualdade $\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$, obteremos (compare com II.4.20) uma interpretação para $\hat{e}(G, S)$ em termos de cohomologia relativa.

Nas hipóteses do lema abaixo esta fórmula torna-se mais simples.

3.14 Proposição: *Seja (G, S) um par grupo com $[G : S] = \infty$. Se S é um PD^n -subgrupo com $n > 1$, malnormal em G (isto é, $S^g \cap S = \{1\}$, $\forall g \in G - S$) então*

$$\hat{e}(G, S) = \hat{E}(G, S) = \dim H^1(G, S; \mathcal{F}_S G).$$

Demonstração: Considere a sequência exata 2.2(1) para $M = \mathcal{F}_S G$, onde já estamos levando em conta o fato que $H^0(G; \mathcal{F}_S G) = 0$ pois $[G : S] = \infty$,

$$0 \rightarrow H^0(S; \mathcal{F}_S G) \rightarrow H^1(G, S; \mathcal{F}_S G) \xrightarrow{J} H^1(G; \mathcal{F}_S G) \xrightarrow{res_S^G} H^1(S; \mathcal{F}_S G) \rightarrow \dots \quad (1)$$

Seja E um conjunto de representantes para as classes laterais duplas SgS onde $g \in G$ (com $1 \in E$). Temos

$$\begin{aligned} H^0(S; \mathcal{F}_S G) &\simeq H^0(S; Ind_S^G PS) \\ &\simeq H^0(S; \bigoplus_{g \in E} Ind_{S \cap S^g}^S gPS) \quad (\text{por II.3.9, com } T = S \text{ e } M = PS) \\ &\simeq \bigoplus_{g \in E} H^0(S; Ind_{S \cap S^g}^S gPS) \quad (\text{por I.5.18 e I.5.3}) \end{aligned}$$

Como S é malnormal em G , $S \cap S^g = \{1\}$ para todo $g \in G - S$. Daí, se $g \in E$ e $g \neq 1$, então $H^0(S; Ind_{S \cap S^g}^S gPS) = H^0(S; Ind_{\{1\}}^S gPS) = 0$, pois $[S : \{1\}] = \infty$ (I.3.11). Agora, para $g = 1 \in E$, $H^0(S; Ind_{S \cap S^g}^S gPS) = H^0(S; PS) = \mathbb{Z}_2$. Daí, $H^0(S; \mathcal{F}_S G) = \mathbb{Z}_2$ e portanto obtemos, da sequência (1) acima, a seguinte sequência exata curta:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \rightarrow H^1(G, S; \mathcal{F}_S G) \rightarrow \text{Im } J = \text{Ker } res_S^G \rightarrow 0.$$

Logo, $\dim H^1(G, S; \mathcal{F}_S G) = 1 + \dim \text{Ker } res_S^G = \hat{E}(G, S)$. Para obter a igualdade

$\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S)$, observe que $cd(S^g \cap S) = \begin{cases} n & \text{se } g \in S \\ 0 & \text{se } g \in G - S, \end{cases}$ e consequentemente, $\{g \in G \mid cd(S^g \cap S) = n - 1\} = \emptyset$ (pois $n > 1$). Daí o corolário 3.11 se aplica. $\square$

Podemos notar que em todos os exemplos vistos, $\hat{E}(G, S) = 0, 1, 2$ ou ∞ . Assim, uma questão interessante é: Quais valores $\hat{E}(G, S)$ pode assumir? Para $\hat{e}(G, S)$ vale o seguinte fato "Se G e S são finitamente gerados e $[Comm_G(S) : S] = \infty$,

onde $\text{Comm}_G(S) = \{g \in G \mid (S : S \cap S^g) < \infty \text{ e } (S^g : S \cap S^g) < \infty\}$, então $\hat{e}(G, S) = 1, 2 \text{ ou } \infty$ (cf. [22, teor. 1.3]). Não sabemos se vale um resultado similar para $\hat{E}(G, S)$. No entanto, de acordo com [22, prop. 4.7], existem pares (G, S) para os quais $\hat{e}(G, S)$ toma valores distintos de 0, 1, 2, ou ∞ . Nós observamos que na demonstração deste resultado os autores provaram que $H^1(S; \mathcal{F}_S G) = 0$. Daí, por 3.8(ii), isto também é verdadeiro para $\hat{E}(G, S)$, ou seja:

3.15 Proposição: Se $G = G_1 *_S G_2$ é um produto livre amalgamado (ver def. IV.1.1 (i)) onde

- (a) $(G_1, \{S\})$ é um PD^3 -par.
- (b) S é abeliano livre de posto dois.
- (c) S é malnormal em G_1 .
- (d) G_2 é abeliano livre de posto dois e S tem índice n em G_2 .

então

$$\hat{E}(G, S) = \hat{e}(G, S) = n.$$

□

Finalizando a seção, observamos que, tomando $M = \mathcal{F}_S G$ em II.5.2, obtemos uma interpretação topológica para $\hat{E}(G, S)$ em termos de pares Eilenberg-MacLane e consequentemente $\hat{e}(G, S)$ terá tal interpretação quando a igualdade $\hat{e}(G, S) = \hat{E}(G, S)$ for verdadeira.

3.16 Proposição: Sejam G um grupo, S um subgrupo de G com $[G : S] = \infty$. Se (X, Y) é um par Eilenberg-MacLane que realiza topologicamente (G, S) e $\hat{e}(G, S) = \hat{E}(G, S)$ então

$$\hat{e}(G, S) = 1 + \dim \frac{H^1(X, Y; \mathbb{Z}_2(G/S))}{(\mathbb{Z}_2(G/S))^S},$$

onde $H^1(X, Y; \mathbb{Z}_2(G/S))$ é tomada com coeficientes locais.

□

CAPÍTULO IV

$\hat{E}(G, S)$ e decomposição de grupos

Dados G um grupo e S um subgrupo de G com G e S finitamente gerados, Kropholler e Roller em [21] supondo que $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ ou equivalentemente, $\hat{e}(G, S) = 2$ (cf. III.3.2) apresentaram uma condição necessária e (sob algumas hipóteses) suficiente, para que G admita uma decomposição sobre um subgrupo comensurável com S . A condição é que uma obstrução " $\text{sing}_G(S)$ ", definida pelos autores, seja nula.

Neste capítulo analisamos alguns dos resultados deste artigo em termos do nosso invariante $\hat{E}(G, S)$. Observamos, por exemplo, que nosso invariante $\hat{E}(G, S)$ substitui a obstrução $\text{sing}_G(S)$. Assim, nas hipóteses consideradas, $\hat{E}(G, S)$ é suficiente para decidir se G se decompõe ou não sobre um subgrupo comensurável com S (2.13).

É nosso interesse sempre que possível retirar dos resultados de [21] a hipótese geral de que $\hat{e}(G, S) = 2$. Neste sentido nós verificamos que o seguinte resultado é válido (sem tal hipótese).

"Se G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S então $\hat{E}(G, S) \geq 2$ " (cf. Teorema 2.6).

Como consequência deste fato concluímos (ver 2.7) que se (G, S) é um D^n -par então G não se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S . Isto nos dá exemplos de pares de grupos (G, S) tais que $\epsilon(G, S) = \hat{e}(G, S) = \infty$ e no entanto G não se decompõe sobre subgrupo comensurável com S (ver observação 2.8).

Em um outro resultado analisado, verificamos que a hipótese $H^1(G, \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ é consequência das demais e portanto não é possível suprimi-la (2.11).

Isto tudo é feito na secção 2. Inicialmente na secção 1 nós recordamos algumas definições e resultados (sem demonstrações) existentes para decomposição de grupos envolvendo os invariantes $e(G)$ e $e(G, S)$.

É interessante observar que a recíproca do teorema 2.6 é um problema ainda em aberto.

1. Decomposição de grupos

1.1 Definição: [4, 2.4 e 2.5]

(i) Sejam H e K grupos com subgrupos $S \leq H$, $T \leq K$ e suponhamos que S e T são isomorfos via $\theta : S \xrightarrow{\sim} T$. Então o **produto livre amalgamado de H e K com subgrupo amalgamado $S \simeq T$** é definido por

$$G = H *_S K := \langle H, K; \text{rel}H, \text{rel}K, s = \theta(s), \forall s \in S \rangle.$$

(ii) Seja H um grupo com subgrupos isomorfos S e T e seja $\sigma : S \rightarrow T$ um isomorfismo dado. O **grupo HNN sobre o grupo base H com subgrupo associado $S \simeq T$ e letra estável p** é definido por

$$G = H *_{S, \sigma} = \langle H, p; \text{rel}H, psp^{-1} = \sigma(s), \forall s \in S \rangle.$$

Em (i), dados os homomorfismos $j_1 : H \rightarrow G$ e $j_2 : K \rightarrow G$ induzidos pela inclusão, podemos provar que j_i , $i = 1, 2$ são injetoras e $j_1(H) \cap j_2(K) = j_1(S) = j_2(T)$. Daí, usando j_i como identificação, $i = 1, 2$, podemos considerar H e K como subgrupos de G , com $S = H \cap K = T$.

Analogamente, em (ii), podemos considerar H como subgrupo de G .

1.2 Definição; Dizemos que um grupo G se **decompõe sobre um subgrupo S** se $G = H *_S K$ com $H \neq S \neq K$ ou $G = H *_{S, \sigma}$.

1.3 Exemplos: (i) $\mathbb{Z} = \{1\} *_{\{1\}}$, assim $\mathbb{Z}$ se decompõe sobre o subgrupo trivial.

(ii) Seja G o grupo fundamental da superfície fechada orientada M de genus

2, e seja S o grupo fundamental da sub-superfície X de M como na figura abaixo. Então G se decompõe sobre S , pois $G = \Pi_1(X_1 \cup X) *_S \Pi_1(X \cup X_2)$.

O primeiro resultado de decomposição de grupos envolvendo a teoria de ends foi dado por Stallings [31] (1968) e [32] (1971). Este é um resultado de decomposição sobre subgrupo finito e é conhecido como teorema de estrutura de Stallings.

1.4 Teorema: Se G é finitamente gerado, então $e(G) \geq 2$ se e somente se G se decompõe sobre um subgrupo finito. $\square$

1.5 Observações: (i) De fato, $e(G) = 2 \iff G = S *_S$, com S finito ou $G = H *_S K$, com S finito e $[H : S] = [K : S] = 2$ ([32] ou [27, teor. 5.12]). E, $e(G) = \infty \iff G = H *_S K$ com S finito contido propriamente em ambos os fatores e de índice > 2 em ao menos um deles, ou $G = H *_S$, onde S é finito, mergulhado propriamente em H ([32, 5.A.10]).

(ii) A implicação: " G se decompõe sobre um subgrupo finito $\implies e(G) \geq 2$ ", é válida para G não necessariamente finitamente gerado ([27, lema 6.3]).

No entanto, se por exemplo, estamos interessados em saber quando o grupo fundamental de uma superfície F injeta no grupo fundamental de uma três variedade fechada e conexa M , caímos em um problema de $G = \Pi_1(M)$ se decompõe sobre um subgrupo infinito $S = \Pi_1(F)$.

1.6: Scott em [26] (1977), tentou generalizar o resultado de Stallings acima para grupos que se decompõem sobre subgrupos infinitos. Ele mostrou que: "Se G se decompõe sobre S então $e(G, S) \geq 2$ " (cf [26, lema 1.8]). O problema está na direção

contrária. Scott esperava provar que: " $e(G, S) \geq 2$ se e somente se, G se decompõe sobre alguma extensão finita T de S ". No entanto ele observou que isto era falso em geral. O resultado obtido por Scott foi o seguinte:

1.7 Teorema: [26, teor. 4.1] *Se G e S são grupos finitamente gerados e G é S -residualmente finito (isto é, dado $g \in G - S$, existe um subgrupo G_1 de índice finito em G tal que $G_1 \supset S$ mas $g \notin G_1$). Então $e(G, S) \geq 2$ se e somente se, G tem um subgrupo G_2 de índice finito em G tal que $G_2 \supset S$ e G_2 se decompõe sobre S . $\square$*

Dado (G, S) , estaremos interessados em investigar quando G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S .

1.8 Definição: *Dois subgrupos S e T de G são ditos comensuráveis se $[S : S \cap T] < \infty$ e $[T : S \cap T] < \infty$.*

Finalmente lembramos a correspondência entre decomposição de grupos e ação de grupos sobre árvores (para maiores detalhes sugerimos [28]). Os resultados de Kropholler e Roller sobre decomposição de grupos que iremos analisar na secção seguinte são baseados fortemente neste fato.

1.9 Proposição: *Sejam G um grupo e S um subgrupo de G . Então G se decompõe sobre S se e somente se existe uma G -árvore Y tal que:*

- (i) G atua livre de pontos fixos (isto é, nenhum vértice de Y é fixado por todo o grupo G).
- (ii) G atua transitivamente e sem inversão sobre as arestas de Y , e
- (iii) S é o estabilizador de uma aresta. $\square$

2. $\hat{E}(G, S)$ e decomposição de grupos segundo Kropholler e Roller.

Vejamos inicialmente a definição da obstrução $\text{sing}_G(S)$ introduzida por

Kropholler e Roller em [21].

2.1 Definição: *Seja (G, S) um par grupo. Suponhamos que $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ com gerador u . Consideremos*

$$\text{res}_S^G : H^1(G; \mathcal{F}_S G) \rightarrow H^1(S; \mathcal{F}_S G),$$

a aplicação restrição. Então, por definição,

$$\text{sing}_G(S) = \text{res}_S^G(u).$$

Uma condição necessária para G se decompor sobre um subgrupo comensurável com S provada em [21] é a seguinte:

2.2 Proposição: [21, lema 2.4] *Seja (G, S) um par de grupos satisfazendo $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ ($\Leftrightarrow \hat{e}(G, S) = 2$), com G e S finitamente gerados. Se G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S então $\text{sing}_G(S) = 0$.*

Podemos observar que, nas hipóteses acima, as condições $\text{sing}_G(S) = 0$ e $\text{Ker } \text{res}_S^G \neq 0$ são equivalentes e então temos:

2.3 Lema: *Se (G, S) é um par grupo com $H^1(G; \mathcal{F}_S G) = \mathbb{Z}_2$, então*

- (i) $\text{sing}_G(S) = 0 \Leftrightarrow \hat{E}(G, S) = 2$,
- (ii) $\text{sing}_G(S) \neq 0 \Leftrightarrow \hat{E}(G, S) = 1$.

Demonstração: Se $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ então $[G, S] = \infty$. Daí $\hat{E}(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G$ e portanto temos:

- (i) $\text{sing}_G(S) = 0 \Leftrightarrow \text{Ker } \text{res}_S^G = H^1(G; \mathcal{F}_S G) = \mathbb{Z}_2 \Leftrightarrow \hat{E}(G, S) = 2$.
- (ii) $\text{sing}_G(S) \neq 0 \Leftrightarrow \text{Ker } \text{res}_S^G = 0 \Leftrightarrow \hat{E}(G, S) = 1$. □

Motivados neste lema simples, nós verificamos que, pensando em termos de $\hat{E}(G, S)$ e não em termos de $\text{sing}_G(S)$, o resultado 2.2 é válido sem a suposição de que $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$ (ver proposição abaixo).

Isto é obtido de maneira análoga à demonstração de 2.2 dada em [21], a qual decorre de alguns lemas.

Como as demonstrações destes lemas em [21] estão bastante resumidas e portanto não muito claras, apresentamos aqui, em detalhes, as demonstrações dos lemas, adaptando-as ao invariante $\hat{E}(G, S)$ e retirando a hipótese de que $H^1(G; \mathcal{F}_S G) = \mathbb{Z}_2$.

2.4 Lema: *Seja S um subgrupo de G , com S e G finitamente gerados. As seguintes condições são equivalentes:*

- (i) $\hat{E}(G, S) \geq 2$
- (ii) Existe $[B] = B + \mathcal{F}_S G \in (\frac{PG}{\mathcal{F}_S G})^G$ (isto é, $B + gB \in \mathcal{F}_S G, \forall g \in G$) tal que $[B] \neq [\emptyset], [B] \neq [G]$ e $SB = B$.

Demonstração: Seja $F \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{Z}_2$ uma resolução projetiva de $\mathbb{Z}_2$ sobre $\mathbb{Z}_2 G$. Então $F \rightarrow \mathbb{Z}_2$ é também uma resolução de $\mathbb{Z}_2$ sobre $\mathbb{Z}_2 S$, que é projetiva pelo fato que $\mathbb{Z}_2 G$ é $\mathbb{Z}_2 S$ -livre.

Da sequência exata

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_S G \xrightarrow{k} PG \rightarrow \frac{PG}{\mathcal{F}_S G} \rightarrow 0,$$

obtemos o diagrama comutativo de complexos de cocadeias com linhas exatas:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & Hom_G(F, \mathcal{F}_S G) & \rightarrow & Hom_G(F, PG) & \rightarrow & Hom_G(F, \frac{PG}{\mathcal{F}_S G}) \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & Hom_S(F, \mathcal{F}_S G) & \rightarrow & Hom_S(F, PG) & \rightarrow & Hom_S(F, \frac{PG}{\mathcal{F}_S G}) \rightarrow 0 \end{array}$$

Daí por [8, 1.0.4], aplicando $H^*(-)$, e lembrando o conceito de cohomologia de grupos, obtemos o diagrama comutativo com linhas exatas

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & H^0(G; \mathcal{F}_S G) & \rightarrow & H^0(G; PG) & \rightarrow & H^0(G; \frac{PG}{\mathcal{F}_S G}) \xrightarrow{\delta} H^1(G; \mathcal{F}_S G) \rightarrow \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow i & & \downarrow j & \downarrow res_S^G \\ 0 & \rightarrow & H^0(S; \mathcal{F}_S G) & \rightarrow & H^0(S; PG) & \rightarrow & H^0(S; \frac{PG}{\mathcal{F}_S G}) \xrightarrow{\rho} H^1(S; \mathcal{F}_S G) \rightarrow \dots \end{array}$$

Agora, tanto em (i) com em (ii), temos que $[G : S] = \infty$, e daí $H^0(G; \mathcal{F}_S G) = (\text{Ind}_S^G PS) = 0$ (I.3.11). Também $H^1(G; PG) = 0$ pelo lema de Shapiro (I.3.14). Logo temos:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & (PG)^G & \xrightarrow{\beta} & (\frac{PG}{\mathcal{F}_S G})^G & \xrightarrow{\delta} & H^1(G; \mathcal{F}_S G) \rightarrow 0 \\ & & \downarrow i & & \downarrow j & & \downarrow \text{res}_S^G \\ 0 & \rightarrow & (\mathcal{F}_S G)^S & \hookrightarrow & (PG)^S & \xrightarrow{\alpha} & (\frac{PG}{\mathcal{F}_S G})^S \xrightarrow{\rho} H^1(S; \mathcal{F}_S G) \rightarrow \dots \end{array}$$

Vejamos que (i) $\implies$ (ii).

Se $\hat{E}(G, S) = 1 + \dim \text{Ker } \text{res}_S^G \geq 2$ então existe $u \in H^1(G; \mathcal{F}_S G)$, $u \neq 0$ tal que $\text{res}_S^G u = 0$. Como δ é sobrejetora, existe $[B_0] \in (\frac{PG}{\mathcal{F}_S G})^G$ tal que $u = \delta[B_0]$, com $[B_0] \notin \text{Im } \beta = \{[\emptyset], [G]\}$ pois $\delta[B_0] \neq 0$ e $\text{Im } \beta = \text{Ker } \delta$.

Da comutatividade do diagrama temos $\rho(j[B_0]) = (\text{res}_S^G \circ \delta)[B_0] = \text{res}_S^G u = 0$.

Daí $[B_0] = j[B_0] \in \text{Ker } \rho = \text{Im } \alpha$ e portanto existe $B \in (PG)^S$ tal que $[B] = \alpha(B) = [B_0]$.

É fácil ver que $(PG)^S = \{A \subset G \mid SA = A\}$.

Então temos $SB = B$ (pois $B \in (PG)^S$); $[B] \in (\frac{PG}{\mathcal{F}_S G})^G$ e $[B] \notin \{[\emptyset], [G]\}$ (pois $[B] = [B_0]$ e $[B_0]$ satisfaz estas condições), isto é, obtemos (ii).

Para ver (ii) $\implies$ (i), seja $[B] \in (\frac{PG}{\mathcal{F}_S G})^G$ tal que $[B] \neq [\emptyset]$, $[B] \neq [G]$ e $SB = B$. Então $[B] \notin \text{Im } \beta = \text{Ker } \delta$ e portanto $u := \delta([B]) \neq 0$, com $B \in (PG)^S$. Daí, pela comutatividade do diagrama temos

$\text{res}_S^G u = \text{res}_S^G(\delta[B]) = (\rho \circ j)([B]) = \rho([B]) = \rho(\alpha(B)) = 0$. Logo, $\text{Ker } \text{res}_S^G \neq 0$ de onde segue que $\hat{E}(G, S) \geq 2$. $\square$

2.5 Lema: Se T é comensurável com S então $\hat{E}(G, S) \geq 2$ se e somente se $\hat{E}(G, T) \geq 2$.

Demonstração: É suficiente provar o seguinte fato:

(1) Se H e K são subgrupos de G , com $K \leq H \leq G$ e $[H : K] = n < \infty$, então $\hat{E}(G, K) \geq 2$ implica $\hat{E}(G, H) \geq 2$.

Pois, uma vez provado (1), se T é qualquer subgrupo de G comensurável com S , isto é, $[S : T \cap S] < \infty$ e $[T : T \cap S] < \infty$ então, por corolário III.2.6, $\hat{E}(G, S) \leq \hat{E}(G, S \cap T)$ e $\hat{E}(G, T) \leq \hat{E}(G, S \cap T)$. Daí

$$\hat{E}(G, S) \geq 2 \implies \hat{E}(G, S \cap T) \geq 2 \xrightarrow{(1)} \hat{E}(G, T) \geq 2,$$

e analogamente,

$$\hat{E}(G, T) \geq 2 \implies \hat{E}(G, S \cap T) \geq 2 \xrightarrow{(1)} \hat{E}(G, S) \geq 2.$$

Provemos então (1).

Se $\hat{E}(G, K) \geq 2$ então pelo lema anterior, existe $B \subset G$ tal que $B + gB \in \mathcal{F}_K G$, $\forall g \in G$, $[B] \neq [\emptyset]$, $[B] \neq [G]$ e $KB = B$. Como $[H : K] < \infty$ temos que $\mathcal{F}_K G = \mathcal{F}_H G$. Logo

$$B + gB \in \mathcal{F}_H G, \quad \forall g \in G. \quad (*)$$

Seja $H_0 = \{h_1, \dots, h_n\}$ um conjunto de representantes para as classes laterais à esquerda de K em H .

Temos

$$\begin{aligned} B + H_0 B &= B + (h_1 B \cup \dots \cup h_n B) \subset (B + h_1 B) \cup \dots \cup (B + h_n B) \\ &\subset F_1 H \cup \dots \cup F_n H, \quad \text{com } F_i \in FG, \quad i = 1, \dots, n \quad \text{por } (*) \\ &= (F_1 \cup \dots \cup F_n) H \end{aligned}$$

Portanto $B + H_0 B \in \mathcal{F}_H G$ e daí $[B] = [H_0 B]$.

Seja $B_0 := H_0 B$. Então:

(a) $B_0 + gB_0 \in \mathcal{F}_H G$, $\forall g \in G$, pois

$$\begin{aligned} B_0 + gB_0 &= H_0 B + gH_0 B = (H_0 B + B) + (B + gH_0 B) \\ &= (H_0 B + B) + B + g(h_1 B \cup \dots \cup h_n B) \\ &= (H_0 B + B) + B + (gh_1 B \cup \dots \cup gh_n B) \\ &\subset (B + H_0 B) + (B + gh_1 B) + \dots + (B + gh_n B) \in \mathcal{F}_H G \quad \text{por } (*). \end{aligned}$$

(b) $[B_0] \neq [\emptyset]$ e $[B_0] \neq [G]$ pois $[B_0] = [B]$ e $[B] \neq [\emptyset]$, $[G]$.

(c) $HB_0 = B_0$ pois, claramente $B_0 \subset HB_0$ e, como $HH_0 \subset H$ (pois $H_0 \subset H$), $H = h_1 K \cup \dots \cup h_n K = H_0 K$ e $KB = B$, temos:

$$HB_0 = H(H_0B) \subset HB = H_0KB = H_0B = B_0.$$

Logo B_0 satisfaz as condições do lema 2.4 (ii) para G e H . Portanto $\hat{E}(G, H) \geq 2$. $\square$

Temos então o seguinte resultado:

2.6 Teorema: *Seja (G, S) um par grupo com G e S finitamente gerados. Se G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S então $\hat{E}(G, S) \geq 2$.*

Demonstração: Suponhamos que G se decompõe sobre um subgrupo T comensurável com S . Por 1.9, existe uma G -árvore Y tal que:

- (i) G atua livre de pontos fixos sobre os vértices de Y ,
- (ii) G atua transitivamente e sem inversão sobre as arestas de Y , e
- (iii) T é o estabilizador de uma aresta.

Seja e uma aresta com estabilizador T , isto é, $T = \{g \in G \mid eg = e\}$.

Se e é removida de Y então obteremos dois pedaços disjuntos que denotaremos por Y_0 e Y_1 .

Seja $B = \{g \in G \mid eg \in Y_0\}$. Claramente $TB = B$ pois, se $t \in T$ e $g \in B$ então $e(tg) = (et)g = eg \in Y_0$. Além disso, $B + gB \in \mathcal{F}_T G$, $\forall g \in G$ pois:

$$\begin{aligned} B - gB &= \{y \in G \mid ey \in Y_0 \text{ e } y \notin gB\} \\ &= \{y \in G \mid ey \in Y_0 \text{ e } g^{-1}y \notin B\} \\ &= \{y \in G \mid ey \in Y_0 \text{ e } eg^{-1}y \in Y_1 \cup \{e\}\} \\ &= \{y \in G \mid ey^{-1} \text{ pertence ao menor caminho ligando } e \text{ a } eg^{-1}\} \end{aligned}$$

(a última igualdade é obtida fazendo y^{-1} atuar à direita no caminho que liga ey a $eg^{-1}y$).

Como a ação é transitiva, existem $g_1, \dots, g_k \in G$ tais que as arestas deste caminho são $eg_1, \dots, eg_k$. Logo $\forall y \in B - gB$, $ey^{-1} = eg_i$ para algum $i \in \{1, \dots, k\}$ e assim, $e = eg_i y$, isto é, $g_i y \in T$. Daí, existe $t \in T$ tal que $g_i y = t$ ou seja, $y = g_i^{-1}t$. Logo $B - gB \subseteq g_1^{-1}T \cup \dots \cup g_k^{-1}T$ e portanto $B - gB \in \mathcal{F}_T G$.

Analogamente temos

$$\begin{aligned}
gB - B &= \{y \in G \mid y \in gB \text{ e } y \notin B\} \\
&= \{y \in G \mid g^{-1}y \in B \text{ e } y \notin B\} \\
&= \{y \in G \mid eg^{-1}y \in Y_0 \text{ e } ey \in Y_1 \cup \{e\}\} \\
&= \{y \in G \mid ey^{-1} \text{ pertence ao menor caminho ligando } eg^{-1} \text{ a } e\}
\end{aligned}$$

e pelo mesmo raciocínio acima obtemos que $gB - B \in \mathcal{F}_T G$.

$$\text{Daí } B + gB = B - gB \cup gB - B \in \mathcal{F}_T G.$$

Agora, que $[B] \neq [\emptyset]$ e $[B] \neq [G]$ segue do fato que a ação de G sobre os vértices de Y é livre de pontos fixos.

Portanto B satisfaz a condição (ii) do lema 2.4 e daí $\tilde{E}(G, T) \geq 2$. Como T é comensurável com S , segue do lema anterior, que $\tilde{E}(G, S) \geq 2$. $\square$

Como consequência deste resultado temos:

2.7 Corolário: Se (i) (G, S) é um D^n -par com $[G : S] = \infty$ ou ,
(ii) G é um D^n -grupo e $hdS \leq n - 2$

então G não se decompõe sobre nenhum subgrupo comensurável com S .

Demonstração: Segue de III.2.8 e do teorema anterior. $\square$

2.8 Observação: O teorema 2.6 é bastante interessante pois, por exemplo, para $G = \langle a \rangle * \langle b \rangle \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ e $S = \langle aba^{-1}b^{-1} \rangle$ temos que $\tilde{e}(G, S) = \infty$ e portanto a obstrução $sing_G(S)$ não está definida, mas apesar disto, visto que (G, S) é um PD^2 -par, concluímos do corolário anterior, que G não se decompõe sobre nenhum subgrupo comensurável com S . Em particular, sobre nenhuma extensão finita de S .

Isto também vem confirmar que a idéia inicial de Scott "Se $\epsilon(G, S) \geq 2$ então G se decompõe sobre uma extensão finita de S " (ver 1.6) não é realmente válida pois, neste exemplo, $\epsilon(G, S) = \infty > 2$.

Para analisar quando a condição $sing_G(S) = 0$ é suficiente para G se decompor sobre um subgrupo comensurável com S , em [21] §3, os autores, admitindo as hipóteses gerais

(a) G é um grupo finitamente gerado de dimensão cohomológica no máximo n ,
 (b) S é um PD^{n-1} -subgrupo de G ,
 (c) $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$,
 (d) Todo subgrupo de índice infinito em G tem dimensão cohomológica no máximo $n - 1$,
 provaram o seguinte resultado:

2.9 Proposição: [21, lema 3.2] *Se $[N_G(S) : S] = \infty$, onde $N_G(S)$ denota o normalizador de S em G , então G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S se, e somente se, $\text{sing}_G(S) = 0$. $\square$*

Era nosso interesse retirar a hipótese (c) e generalizar este fato substituindo, como no teorema 2.6, a condição $\text{sing}_G(S) = 0$ por $\hat{E}(G, S) \geq 2$. Porém, nós provamos (Teorema 2.11 abaixo), que se $[N_G(S) : S] = \infty$ então a hipótese (c) é consequência das outras e portanto não faz sentido retirá-la. Além disto, nós verificamos, que a hipótese (b) pode ser enfraquecida, por considerar

(b)': S é um D^{n-1} -subgrupo de G .

Para provar este resultado, nos usamos lema 3.1 de [21]. Para deixar claro que na demonstração deste lema não se faz uso da hipótese (c) e que a hipótese (b) pode ser substituída por (b)', apresentaremos aqui demonstração em detalhes deste lema.

2.10 Lema: *Seja (G, S) um par de grupos satisfazendo as condições (a), (b)' e (d) acima. Se $[N_G(S) : S] = \infty$ então*

- (i) $[G : N_G(S)]$ é finito, e
- (ii) $N_G(S)/S$ tem um subgrupo cíclico infinito L/S de índice finito.

Demonstração: Por simplicidade vamos denotar $N_G(S)$ por N . Provemos inicialmente que:

- (1) N/S tem um subgrupo H/S finitamente gerado, com $\text{cd } H = n$.

De fato: Suponhamos, por absurdo, que para todo subgrupo finitamente

gerado H/S de N/S tenhamos $cd H \neq n$.

Então $cd H = n - 1$ pois, como: $cd S = n - 1$, $cd G \leq n$ e $G \supset H \supset S$, as únicas possibilidades são, em vista de 1.5.10, $cd H = n$ ou $cd H = n - 1$.

Agora, se $cd H = n - 1$, visto que S é normal em H e S é um D^{n-1} -grupo, segue de 1.5.24(a), que H é também um D^{n-1} -grupo e $Q = H/S$ é finito.

Portanto se H/S é um subgrupo finitamente gerado qualquer de N/S então H/S é finito ou seja, N/S é localmente finito. Em particular, como por hipótese do lema N/S não é finito, segue que N/S não é finitamente gerado. Daí, existe N'/S subgrupo de N/S com um número infinito enumerável de geradores, digamos $\overline{x}_1, \overline{x}_2, \dots$. Considere a sequência de subgrupos finitamente gerados de N/S (portanto de ordem finita).

$$H_1/S \leq H_2/S \leq \dots,$$

onde $H_j/S = \langle \overline{x}_1, \dots, \overline{x}_j \rangle$. Como

• H_j é um grupo sem $\mathbb{Z}_2$ -torção (pois $H_j \leq G$ e G não tem $\mathbb{Z}_2$ -torção por 1.5.12(i)),

• $[H_j : S] < \infty$ (pois N/S é localmente finito e H_j/S é finitamente gerado) e,

• S é um D^{n-1} -grupo,

segue de 1.5.19(i), que H_j é um D^{n-1} -grupo para $j = 1, 2, \dots$. Daí, por 1.5.17, $cd H_j = n - 1$, H_j é de tipo FP e $H^k(H_j; \mathbb{Z}_2 H_j) = 0$ para $0 \leq k < n - 1$, e $j = 1, 2, \dots$.

Além disso, a união dos subgrupos $H_1 \leq H_2 \leq H_3 \leq \dots$ é N' (pois $\bigcup_{j=1}^{\infty} H_j/S = N'/S$ e $S \subset H_j$), e $[H_{j+1} : H_j] = [H_{j+1}/S : H_j/S] < \infty$ (pois $|H_j/S| < \infty, \forall j$).

Logo por [14, teor. 3.3], visto que N' não é finitamente gerado (pois N'/S não é finitamente gerado) temos que

$$cd N' = (n - 1) + 1.$$

Portanto $cd N \geq cd N' = n > cd S$. Daí por (d) temos que $[G : N] < \infty$, e então, como G é finitamente gerado (condição (a)) segue que N é finitamente gerado (cf. [25, 1.6.11]). Consequentemente N/S é também finitamente gerado, o que é uma contradição.

Portanto a afirmação (1) é verdadeira, isto é, existe um subgrupo finitamente

gerado H/S de N/S satisfazendo $cdH = n$.

Daí $cdN = n$ (pois $n = cdH \leq cdN \leq cdG \leq n$), e então $[G : N] < \infty$ por (d), o que prova parte (i).

Vejamos (ii).

Como S e H/S são finitamente gerados segue que H é também finitamente gerado.

Do fato que S é um D^{n-1} -grupo segue que S é de tipo FP e $H^j(S; \mathbb{Z}_2 S) = 0$ para $j \leq n - 2$ (1.5.17).

Agora, $Q = H/S$ é infinito pois $n = cdH > cdS = n - 1$. Logo, por 1.5.24(b), temos que H/S tem mais que um end, isto é, $\epsilon(H/S) \geq 2$. Daí H/S deve conter um elemento de ordem infinita (isto segue do teorema Stallings (teorema 1.4) e de [28, 1.1.3]).

Seja L/S o subgrupo cíclico infinito de N/S gerado por este elemento.

Da sequência exata $S \twoheadrightarrow L \twoheadrightarrow L/S \simeq \mathbb{Z}$, concluímos por 1.5.19(i), que L é um grupo de dualidade de dimensão n . Daí $[G : L] < \infty$ (por (d)) e portanto temos $[N/S : L/S] = [N : L] \leq [G : L] < \infty$, com $L/S \simeq \mathbb{Z}$,

o que prova (ii). □

Agora estamos em condições de provar o resultado abaixo:

2.11 Teorema: *Seja (G, S) um par grupo satisfazendo as condições (a), (b)' e (d). Seja C' o módulo dualizante de S . Se $[N_G(S) : S] < \infty$ então G é um D^n -grupo com módulo dualizante C satisfazendo $\text{Res}_S^G C \simeq C'$ e portanto $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$.*

Demonstração: Nas hipóteses acima temos, pelo lema anterior, que $N_G(S)/S$ tem um subgrupo cíclico infinito L/S de índice finito tal que $[G : L] < \infty$.

Consideremos a sequência exata curta

$$0 \rightarrow S \rightarrow L \twoheadrightarrow L/S \simeq \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Como S é um D^{n-1} -grupo com módulo dualizante C' e L/S é um PD^1 -grupo segue que L é um D^n -grupo com módulo dualizante $H^n(L; \mathbb{Z}_2 L) \simeq \mathbb{Z}_2 \otimes C' \simeq$

C' , como $\mathbb{Z}_2 L$ -módulos (I.5.19(ii)).

Daí, como G não tem $\mathbb{Z}_2$ -torção (pois $cdG \leq n$) e $[G : L] < \infty$ temos por I.5.19 que G é também um PD^n -grupo com módulo dualizante $C = H^n(G; \mathbb{Z}_2 G)$ tal que $Res_L^G C \simeq C'$ (como $\mathbb{Z}_2 L$ -módulos). Assim, S é um PD^{n-1} -grupo com módulo dualizante $C' \simeq Res_S^G C$, onde C é o módulo dualizante de G .

Daí $H^1(G; \mathcal{F}_S G) \simeq \mathbb{Z}_2$. (Para ver isto basta, na demonstração II.3.9(i) considerar $\mathcal{F}_S G = Ind_S^G PS$ no lugar de $\mathbb{Z}_2(G/S) = Ind_S^G \mathbb{Z}_2$). $\square$

Observação: Sabemos que se G é um PD^n -grupo então G é finitamente gerado de dimensão cohomológica n (ver I.5.15 e I.5.18), e por um teorema de Strebel [33] todo subgrupo K de índice infinito em G satisfaz $cdK \leq n - 1$. O teorema anterior nos dá uma recíproca parcial deste fato (quando S é um PD^{n-1} -grupo).

Finalizando a secção, recordamos que em [21] §5, supondo que G é um PD^n grupo e S é um PD^{n-1} -subgrupo, os autores provaram o seguinte fato:

2.12 Teorema: [21, teor. A] *Sejam G um PD^n -grupo e S um PD^{n-1} -subgrupo. Então G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S se e somente se $sing_G(S) = 0$.* $\square$

Adaptando este resultado ao nosso invariante temos, analogamente:

2.13 Teorema: *Sejam G um PD^n -grupo e S um PD^{n-1} -subgrupo. Então G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S se e somente se $\hat{E}(G, S) = 2$.*

Demonstração: Consequência imediata do lema 2.3. $\square$

Assim, por exemplo, podemos concluir que $\mathbb{Z}^k$ se decompõe sobre um subgrupo comensurável com $\mathbb{Z}^{k-1}$ ($k \geq 2$) pois $\hat{E}(\mathbb{Z}^k, \mathbb{Z}^{k-1}) = 2$ (III.2.9). Similarmente, se G e S são como em II.3.12 então G se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S .

Combinando 2.13 e 2.6 obtemos o seguinte resultado:

2.14 Proposição: *Sejam G um grupo finitamente gerado e T e S subgrupos de G com $S \leq T \leq G$, $[G : T] < \infty$ e $[T : S] = \infty$. Se*

(i) S e T são finitamente gerados e $\hat{E}(T, S) = 1$ ou

(ii) T é um PD^n -grupo, S um PD^{n-1} -subgrupo, e T não se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S ,

então G não se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S .

Demonstração: (i) Pelo lema III.2.7, $\hat{E}(G, S) \leq \hat{E}(T, S) = 1$. Daí o resultado segue do teorema 2.6. Agora (ii) segue de (i) pois, se T não se decompõe sobre um subgrupo comensurável com S então, pelo teorema anterior, $\hat{E}(T, S) = 1$. $\square$

BIBLIOGRAFIA

- [1] Andrade, M.G.C.; *Tese de Doutorado*, IMECC - Unicamp, Campinas (em preparação).
- [2] Andrade, M.G.C.; Fanti, E.L.C.; *A relative cohomological invariant for pairs of groups*, (em preparação).
- [3] Bieri, R.; *Gruppen Mit Poincaré Dualität*, Comm. Math. Helv. 47 (1972), 373 - 396.
- [4] Bieri, R.; *Homological dimension of discrete groups*, Queen Mary College Math. Notes, Queen Mary College, London, (1976).
- [5] Bieri, R.; *Normal subgroups in duality groups and in groups of cohomological dimension 2*, Journal of Pure and Applied Algebra 7 (1976), 35 - 51.
- [6] Bieri, R.; Eckmann, B.; *Groups with homological duality generalizing Poincaré duality*. Inventiones Math. 20 (1973), 103 - 124.
- [7] Bieri, R.; Eckmann, B.; *Relative homology and Poincaré duality*, Journal of Pure and Applied Algebra 13 (1978), 277 - 319.
- [8] Brown, K.S.; *Cohomology of groups*, G.T.M. 87 Springer-Verlag, New York, (1982).
- [9] Cohen, D.F.; *Groups of cohomological dimension one*, Lectures Notes in Math. 245 Springer-Verlag, Berlin (1972).
- [10] Dicks, W.; Dunwood, M.; *Groups acting on graphs*, Cambridge Unver-

sity Press, (1988).

- [11] Eckmann, B.; Müller, H.; *Poincaré duality groups of dimension two*, Comm. Math. Helvetici 55, (1980), 510 - 520.
- [12] Eckmann, B.; Linell, P.A.; *Poincaré duality groups of dimension two II*, Comm. Math. Helv. 58, (1983), 111 - 114.
- [13] Freudenthal, H; *Über die Enden Topologischer Räume und Gruppen*, Math. Zeit. 33 (1931), 692 - 713.
- [14] Gildenhuys, D.; Strebel, R.; *On the cohomological dimension of soluble groups*, Canad. Math. Bull. Vol. 24(4) (1981), 385 - 392.
- [15] Hilton, P.J.; Wylie, S.; *Homology Theory - An Introduction to Algebraic Topology*, Cambridge Univ. Press (1960).
- [16] Hopf, H.; *Enden offener Räume und unendlicher Gruppen*, Comm. Math. Helv. 16 (1943), 81 - 100.
- [17] Houghton, C.H.; *Ends of locally compact groups and their coset spaces*, J. Aust. Math. Soc. 17 (1974) 274 - 284.
- [18] Hu, S.T.; *Introduction to homological algebra*, Holden-Day series in Mathematics, Holden-Day inc. São Francisco, (1968).
- [19] Johnson F.E.A.: Wall, C.T.C.; *On groups satisfying Poincaré duality*, Annals of Math., 96 (1972), 592 - 598.
- [20] Kropholler, P.H.; *An analogue of the torus decomposition theorem for certain Poincaré duality groups*, Proc. London Math. Soc. 3 (1990), 503 - 529.
- [21] Kropholler, P.H.; Roller, M.A.; *Splittings of Poincaré duality groups*, Math. Z. 97 (1988), 421 - 438.
- [22] Kropholler, P.H.; Roller, M.A.; *Relative ends and duality groups*,

- Journal of Pure and Appl. Algebra, 61 (1989), 197 - 210.
- [23] Raymond, F.; Scott, L.L.; *Failure of Nielsen's theorem in higher dimensions*, Arch. Math., 29(6) (1977), 643 - 654.
 - [24] Ribes, L.; *On a cohomology theory for pairs of groups*, Proc. of the A.M.S. 21 (1969) 230 - 234.
 - [25] Robinson, D.J.S.; *A course in the theory of groups*, G.T.M. 80, Springer-Berlin, (1982).
 - [26] Scott, G.P.; *Ends of pairs of groups*, J. Pure Appl. Algebra 11 (1977), 179 - 198.
 - [27] Scott, G.P.; Wall, C.T.C.; *Topological methods in group theory*, London Math. Soc., Lect. Notes Series 36, Homological Group Theory, (1979) 137 - 203.
 - [28] Serre, J.P.; *Trees*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York (1980).
 - [29] Siebenmann, L.C.; *The obstruction to finding a boundary for an open manifold of dimension greater than five*, PhD Thesis, Princeton Univ. Press (1965).
 - [30] Specker, E.; *Endenverbände von Räumen und Gruppen*, Math. Ann. 122 (1950), 167 - 174.
 - [31] Stallings, J.R.; *On torsion - free groups with infinitely many ends*, Ann. Math. 88 (1968), 321 - 334.
 - [32] Stallings, J.R.; *Groups theory and 3-dimensional manifolds*, Yale Univ. Press, (1971).
 - [33] Strebel, R.; *A remark on subgroups of infinite index in Poincaré duality groups*, Comment. Math. Helvetici 52 (1977), 317 - 324.
 - [34] Thomas, C.B.; *Splittings theorems for certain PD^3 -groups*, Math. Z.

186, (1984), 201 - 209.

[35] Whitehead, G.W.; *Homotopy Theory*, The M.I.T. Press, Massachusetts (1966).

[36] Whitehead, G.W.; *Elements of homotopy theory*, G. T. M. 61, Springer-Verlag, New York, (1978).