MODELOS NÃO-LINEARES: UM ENFOQUE BAYESIANO

Adriana de Cássia Favoretti

Orientador: Prof. Dr. Jorge Alberto Achcar

*Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos - USP,
como parte dos requisitos para obtenção do Título de Mestre em Ciências - Área:
Ciências de Computação e Matemática Computacional".*

USP - São Carlos

Agosto de 1995

Aos Meus Colegas

"Um grão de trigo pode ser insignificativo, mas significa muito para a espiga que o carrega.

Um sucesso ou fracasso insignificante para os terceiros, pode significar uma vitória ou derrota incomparável aos que vivenciaram"

S.M.

Agradecimentos

Ao Ton (prof. Dr. Washington Luiz Marar), meu orientador pela paciência e incentivo durante a elaboração da dissertação.

Um agradecimento especial ao Dide (prof. Dr. Ozírde Manzoli Neto), que sempre esteve disposto a me ajudar, e incentivar, durante todo mestrado. Sem ele, esta dissertação não seria a mesma. Agradeço também, o prof. Dr. Osamu Saeki pelo esclarecimento de algumas dúvidas e prof. Dr. Janey Antônio Daccach pelo apoio. Também agradeço os professores Dr. Aron Simis e Dr. Marcelo Saia os quais fizeram correções cuidadosas nesta dissertação.

Um agradecimento de coração, a Lilian (Lilian Akemi Kato) e Rô (Rosana Satie Takehara) que sempre estiveram presente e foram compreensíveis em todos os momentos, e a Simone (Simone Moraes) que, como Lilian, foi uma colega de estudo inseparável durante o mestrado.

À Claudinha (Claudia Aparecida Martins), Cidinho (Carlos Aparecido), Lenz (Carlos Lenz), Luiza (Luiza Matumoto), Rose (Rosemeire Shibuya) e Zero (Marcelo Siqueira) pela compreensão e pela amizade. Também agradeço a Beleza (Rosana Luvezute), Craveiro, Gaby, Jair, Jan (Jandira da Mecânica), Neuza, Neyva, Persida, Ricardo Ferreira, Sandra, Tchelo (Marcelo Turine), Valdeni, Verinha (Vera Damasceno), à família do professor Dr. Antônio Castelo e a todos aqueles que me fizeram companhia durante este mestrado.

À minha família que compreendeu minha ausência e me apoiaram.

Aos professores e funcionários do ICMSC-USP que me deram todo apoio e também, ao departamento de Matemática da UFSCar pelo acolhimento e incentivo.

À CAPES pelo auxílio financeiro.

Abstract

Given a holomorphic function $f: \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}$, such that $f(0)=0$ and 0 is an isolated singularity, the level hypersurface $f^{-1}(0)$ near 0, $D_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ is homeomorphic to the cone over $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$. Thus, the study of K is essential to understand the level hypersurface near zero, from a topological point of view. The mapping $\phi = f/|f|: S_\varepsilon - K \rightarrow S^1$ is the projection of a locally trivial bundle known as Milnor fibration and the fibre $F_0 = \phi^{-1}(1)$ has the homotopy type of a wedge of spheres $S^{a_1} \vee S^{a_2} \vee \dots \vee S^{a_{n+1}}$. For a specific diffeomorphism $h: F_0 \rightarrow F_0$, the characteristic polynomial $\Delta(t)$ of $h_*: H_n(F_0) \rightarrow H_n(F_0)$ is an invariant of K , and if $n \neq 2$ then K is homeomorphic to the $(2n-1)$ -sphere if, and only if, $\Delta(1) = \pm 1$.

Here we study K when $n=1$ and when f is of the form $f(z_1, z_2, \dots, z_{n+1}) = z_1^{a_1} + z_2^{a_2} + \dots + z_{n+1}^{a_{n+1}}$, where the a_i 's are integers greater than 1 (Brieskorn polynomial). Also we analyse $\Delta(t)$ and $\Delta(1)$ when f is a Brieskorn polynomial or a polynomial f for which there are positive rational numbers $\{w_1, w_2, \dots, w_{n+1}\}$ such that $f(e^{c/w_1} z_1, e^{c/w_2} z_2, \dots, e^{c/w_{n+1}} z_{n+1}) = e^c f(z_1, z_2, \dots, z_{n+1})$, for all $c \in \mathbb{C}$ (quasi-homogeneous polynomial).

Resumo

Dada uma função holomorfa $f: \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}$ com $f(0)=0$ e, 0 é uma singularidade isolada, a hipersuperfície de nível $f^{-1}(0)$ na vizinhança de 0 , $D_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ é homeomorfo ao cone com base $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$. Logo o estudo de K é essencial para o entendimento de hipersuperfície de nível na vizinhança de zero, sob um ponto de vista topológica. A aplicação $\phi = f/|f|: S_\varepsilon - K \rightarrow S^1$, é a projeção de um fibrado localmente trivial denominado de Fibrção de Milnor e a sua fibra $F_0 = \phi^{-1}(1)$ tem o tipo de homotopia de um bouquet de esferas $S^n \vee S^n \vee \dots \vee S^n$. Para um difeomorfismo específico $h: F_0 \rightarrow F_0$, o polinômio característico $\Delta(t)$ de $h_*: H_n(F_0) \rightarrow H_n(F_0)$ é um invariante de K , e se $n \neq 2$ então K é homeomorfo a esfera de dimensão $2n-1$ se, e somente se $\Delta(1) = \pm 1$.

Nesta dissertação, estudaremos K nos casos em que $n=1$ e nos casos em que f é da forma $f(z_1, z_2, \dots, z_{n+1}) = z_1^{a_1} + z_2^{a_2} + \dots + z_{n+1}^{a_{n+1}}$ onde a_i 's são inteiros maiores que 1 (polinômio de Brieskorn). Também analizaremos $\Delta(t)$ e $\Delta(1)$ para o caso em que f seja polinômio de Brieskorn ou um polinômio f para a qual existam racionais positivos $\{w_1, w_2, \dots, w_{n+1}\}$ tal que $f(e^{c/w_1} z_1, e^{c/w_2} z_2, \dots, e^{c/w_{n+1}} z_{n+1}) = e^c f(z_1, z_2, \dots, z_{n+1})$, para todo $c \in \mathbb{C}$ (polinômio quase-homogêneo).

Indice

Introdução	vii
I Preliminares	1
II Singularidades de curvas algébricas planas	6
III Variedades de Brieskorn no caso esférico	19
IV Fibração de Milnor, topologia da fibra e de K	28
V Variedades de Brieskorn	38
VI Polinômios quase-homogêneos	45
Apêndice: $SU(2)$, $SO(3)$ e seus sub-grupos discretos	53
Bibliografia	60

Introdução

Dada uma função diferenciável $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ com $m \geq n$, diremos que $p \in \mathbb{R}^m$ é ponto regular, se $f'(p): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma aplicação sobrejetora (No caso em que $n=1$, $f'(p)$ é sobrejetora, se e somente se $f'(p) \neq 0$). Os pontos que não são pontos regulares de f são denominados pontos singulares ou singularidades. Para cada $c \in \mathbb{R}^n$, o conjunto $f^{-1}(c)$ é denominado conjuntos de nível no nível c (Caso em que $n=1$, $f^{-1}(c)$ é denominado de hipersuperfície de nível). A imagem dos pontos regulares (respectivamente singulares) são denominados valores regulares (respectivamente singulares ou críticos).

Se $c \in \mathbb{R}^n$ for um valor regular então $f^{-1}(c) \subset \mathbb{R}^m$ é uma subvariedade de dimensão $m-n$.

Se c for um valor crítico então $f^{-1}(c)$ pode apresentar configurações mais complicadas. Por exemplo, se $f(x, y, z) = z^2 - yx^2$ então $f^{-1}(0)$ possui auto-intersecção ao longo da parte positiva do eixo y . Notemos que todos os pontos do eixo y são pontos singulares de f , isto é, 0 não é singularidade isolada de f .

Seja $f: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}$ polinomial com 0 singularidade isolada de f . Seja $D \subset \mathbb{C}^m$ um disco suficientemente pequeno de forma que 0 seja o único ponto singular em D . Neste caso, $D \cap f^{-1}(0)$ será um cone de vértice na origem com base $K = S \cap f^{-1}(0)$, onde $S = \partial D$. Desta forma, basta estudar a variedade K de dimensão $2m-3$ para se entender o hipersuperfície de nível na vizinhança do ponto singular (porém, este problema não é simples). Neste texto, estudaremos o caso em que $m=2$ e o caso de f ser uma função polinomial complexa especial denominada polinômio quase-homogêneo. O caso ainda mais particular de polinômio quase-homogêneo denominado polinômio de Brieskorn recebe um capítulo especial.

No capítulo I, veremos que a hipersuperfície de nível citada acima é homeomorfa a um cone. Além disso, faremos alguns comentários sobre conjuntos algébricos, sem entrar em detalhes e apresentaremos sem demonstração, um resultado garantindo que uma função polinomial sobre o sub-conjunto dos valores regulares de um conjunto algébrico possui no máximo, um número finito de valores críticos. Com auxílio

deste, construiremos um campo de vetores especial e demonstraremos que conjuntos algébricos possuem estrutura cônica na vizinhança de um ponto singular isolado.

O capítulo II apresenta um resultado quase independente, mostrando que no caso em que $m=2$, K (denominado de nó algébrico) é um nó iterado no toro. Neste capítulo, não demonstraremos nada, exceto o último teorema que garante que o nó algébrico é totalmente determinado pelo polinômio de Alexander. Para cada função polinomial, a hipersuperfície de nível pode ser parametrizada na vizinhança de um ponto crítico isolado ou simples, desde que o polinômio seja irredutível. Associada à classe de equivalência desta parametrização, existe uma sequência de pares de inteiros denominada sequência de pares de Puiseux na qual determina o tipo de iteração do nó K . K é um nó toral iterado e seu polinômio de Alexander é um invariante total para K . Apresentaremos passo a passo, o algoritmo que permite encontrar a iteração de K , a partir do polinômio f .

O capítulo III analisa um caso especial do polinômio de Brieskorn de dimensão 3, onde f é da forma $f(z_1, z_2, z_3) = z_1^p + z_2^q + z_3^r$ com a condição $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1 > 0$, que é denominado de polinômio de Brieskorn do caso esférico. Inicialmente, construiremos alguns grupos associados ao triângulo elíptico determinado por p , q e r , que serão sub-grupos discretos de $SO(3)$ e $SU(2)$. Vários resultados sobre estes grupos serão apresentados sem demonstração. Analizando o espaço dos polinômios homogêneos invariantes associados a estes grupos, mostraremos que K é homeomorfo ao grupo quociente de $SU(2)$ por um de seus sub-grupos discretos.

O capítulo IV apresenta alguns resultados sobre o Teorema da Fibrção de Milnor e da topologia da fibra e de K . Alguns resultados serão demonstrados, porém outros serão apenas apresentados. A função $\phi = f/|f|: S_\epsilon - K \rightarrow S^1$ é uma projeção de uma fibrção localmente trivial, denominada de fibrção de Milnor. Se 0 for ponto singular isolado de f , F_0 é $(n-1)$ -conexa, onde $n = m-1$ e possui a homologia do bouquet de esferas $S^n \vee \dots \vee S^n$. Além disso, F_0 é difeomorfo a $f^{-1}(c) \cap B_\epsilon$ para c suficientemente próximo de 0. Introduziremos o polinômio característico $\Delta(t)$ da monodromia $h_*: H_n(F_0) \rightarrow H_n(F_0)$ e também veremos que $\Delta(1)$ é um invariante que fornece condição necessária e suficiente para que K seja uma esfera topológica de dimensão $2m-3$, exceto no caso em que $m=3$.

No capítulo V retomaremos o caso da Variedade de Brieskorn, porém no caso de dimensão qualquer. Um polinômio de Brieskorn é o polinômio da forma

$f(z_1, z_2, \dots, z_m) = z_1^{a_1} + z_2^{a_2} + \dots + z_m^{a_m}$, onde $a_1, a_2, \dots, a_m$ são inteiros maiores que 1. Neste caso, K é denominado Variedade de Brieskorn e, é mostrado que ela será um recobrimento cíclico ramificado de k -folhas construído de forma especial. Também teremos a fórmula que associa o polinômio de Brieskorn com o invariante $\Delta(t)$ discutido no capítulo anterior.

O capítulo VI dedica-se aos polinômios quase-homogêneos que são polinômios mais gerais que os de Brieskorn. Dado uma m -upla $w = (w_1, \dots, w_m)$ de racionais positivos, o polinômio f é dito quase-homogêneo do tipo w se for combinação $\mathbb{C}$ -linear dos monômios do tipo $z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_m^{i_m}$ tal que $\sum i_k / w_k = 1$. Se 0 for ponto singular isolado, podemos calcular o invariante $\Delta(t)$ e $\Delta(1)$ a partir de w . Após a introdução de um novo conceito, o divisor Δ , este cálculo fica ainda mais simples.

O apêndice apresenta o $SU(2)$, $SO(3)$, seus sub-grupos discretos e os comutadores destes sub-grupos que são utilizados no capítulo III. Analizando o corpo não abeliano dos quatérnios, demonstraremos que $U(2)$ é isomorfo a $S^3 \times S^1$ e em seguida, mostraremos que $SU(2)$ é isomorfo a S^3 .

I Preliminares

Sejam $V \subset \mathbb{R}^m$, um subconjunto algébrico e $0 \in V$, uma singularidade isolada. Denotamos por D_ε o disco fechado de raio $\varepsilon > 0$ centrado na origem do $\mathbb{R}^m$ e $S_\varepsilon = \partial D_\varepsilon$. Mostraremos neste capítulo que V possui uma estrutura cônica próximo da origem, isto é, $V \cap D_\varepsilon$ é homeomorfo ao cone sobre a variedade diferenciável $K = V \cap S_\varepsilon$.

Neste capítulo, F denota um corpo infinito.

Definição 1.1: O subconjunto $V \subset F^m$ é denominado de *conjunto algébrico* quando V é zeros comuns de uma coleção de funções polinômiais sobre F^m .

Denotamos por $I(V)$ o ideal de $F[x_1, x_2, \dots, x_m]$ gerado pelos polinômios que se anulam em V . O Teorema da base de Hilbert [BRÖCKER&LANDER] garante que qualquer ideal de $F[x_1, x_2, \dots, x_m]$ é finitamente gerado como $F[x_1, x_2, \dots, x_m]$ -módulo e consequentemente, $I(V)$ é finitamente gerado. A variedade algébrica determinado por ideal I (zeros comuns dos geradores de I) é denotado por $V(I)$.

Definição 1.2: Um conjunto algébrico V é dito *irredutível* se não é união de dois conjuntos algébricos próprios.

Proposição 1.1 [BRÖCKER&LANDER]: *Um conjunto algébrico V é irredutível, se, e somente se o ideal $I(V)$ é primo.*

Demonstração: $(\Rightarrow)$ Suponha que V é irredutível e $f, g \in I(V)$. Então $V \subset V(\langle f \rangle) \cup V(\langle g \rangle)$ e como a intersecção de conjuntos algébricos ainda é algébrico, podemos supor, sem perda de generalidade que $V \subset V(\langle f \rangle)$ e consequentemente, $f \in I(V)$. Assim, $I(V)$ é ideal primo.

$(\Leftarrow)$ Suponha por absurdo que V é redutível. Então $V = A \cup B$ com A e B não próprios. Sejam $f \in I(A) - I(B)$ e $g \in I(B) - I(A)$. Como $I(V) \subset I(A) \cap I(B)$, f e g não pertencem a $I(V)$, porém $f, g \in I(V)$ contradizendo a hipótese de que $I(V)$ é primo. ■

Definição 1.3: Se V for irredutível, o corpo das frações sobre o domínio $F[x_1, x_2, \dots, x_m]/I(V)$ é denominado de *corpo das frações racionais* sobre V e seu grau de transcendência sobre F é chamado de *dimensão algébrica* de V sobre F .

Proposição 1.2: *Seja $V = f^{-1}(0)$ onde $f: C^m \rightarrow C$ é uma função polinomial. Então $V(<f>) = V(<f_1>) \cup \dots \cup V(<f_k>)$ onde $f_1, f_2, \dots, f_k$ são fatores irredutíveis distintos de f . Neste caso, $V(<f_1>), V(<f_2>), \dots, V(<f_k>)$ são todos distintos (não necessariamente disjuntos).*

Demonstração: É obvio que $V(<f>) = V(<f_1^{n_1}>) \cup \dots \cup V(<f_k^{n_k}>)$ onde $f_1, f_2, \dots, f_k$ são fatores primos de f e n_i 's são multiplicidade dos fatores f_i 's em f . Como $f_i(z) = 0 \Leftrightarrow f_i^{n_i}(z) = 0$, $V(<f_i>) = V(<f_i^{n_i}>)$ e consequentemente, $V(<f>) = V(<f_1>) \cup \dots \cup V(<f_k>)$.

Para mostrar que $V(<f_1>), V(<f_2>), \dots, V(<f_k>)$ são distintos, basta mostrar que se $V(<f>) = V(<g>)$ então f e g possuem fator comum. De fato, se $V(<f>) = V(<g>)$, pelo teorema Nullstellensatz de Hilbert (teorema 12.4 da pag. 106 de [BRÖCKER&LANDER]), $g^k \in <f>$ pois f e g são polinômios complexos e $g \in I(V(<f>))$. Consequentemente, $f \mid g^k$ o que implica que f e g possuem fator comum. ■

Sejam $f_1, f_2, \dots, f_k$ os geradores do ideal $I(V)$ e considere a matriz jacobiana $Jf = (\partial f_i / \partial x_j)_{k \times m}$ de $f = (f_1, f_2, \dots, f_k)$ e seja ρ o posto máximo desta matriz em V .

Definição 1.4: Um ponto $p \in V$ é dito *não-singular* ou *simples* se a matriz jacobiana no ponto p , $Jf(p) = (\partial f_i(p) / \partial x_j)$ possui o posto máximo ρ . Um ponto $p \in V$ é *singular* se não for simples, isto é, se $\text{posto}(Jf(p)) < \rho$.

Denotamos o conjunto dos pontos singulares de V por $\Sigma(V)$, então $\Sigma(V)$ é um sub-conjunto próprio de V e se F for corpo dos números reais ou corpo dos números complexos, $V - \Sigma(V)$ é uma variedade diferenciável não vazia de dimensão $m - \rho$ com um número finito de componentes (Teorema 2.3 (Whitney) da pag. 11 e corolário 2.6 da pag. 15 de [MILNOR1]). Além disso, se V for irredutível, a dimensão de $V - \Sigma(V)$ é a dimensão algébrica de V sobre F .

Lema 1.3: *Seja V um conjunto algébrico. Então a função polinomial g sobre $V - \Sigma(V)$ possui no máximo, um número finito de valores críticos.*

Demonstração: Veja o Corolário 2.8 (pag. 16) de [MILNOR1]. ■

No caso em que 0 é singular isolado ou simples do conjunto algébrico V , para ε suficientemente pequeno, V intersepta a esfera S_ε sobre uma variedade diferenciável (Corolário 2.9 da pag. 17 de [MILNOR1]).

A configuração do conjunto algébrico na vizinhança do ponto singular isolado é dada pelo seguinte teorema:

Teorema 1.4 [MILNOR1]: *Seja V , um conjunto algébrico tal que 0 seja singularidade isolado. Então, para ε suficientemente pequeno, $V \cap D_\varepsilon$ é homeomorfo ao cone com base $K = V \cap S_\varepsilon$. De fato, o par $(D_\varepsilon, V \cap D_\varepsilon)$ é homeomorfo ao par $(D_\varepsilon, \text{Cone}(K))$.*

Demonstração: Sabemos que $\text{Cone}(K)$ é o conjunto $\{tk: t \in [0,1], k \in K\}$ e $\text{Cone}(S_\varepsilon)$, definido similarmente, é o disco D_ε .

Definimos $r(x) = \|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ e tomemos ε suficientemente pequeno de forma que $D_\varepsilon \cap \Sigma(V) = \{0\}$ e $V \cap D_\varepsilon$ não contenha o ponto singular de r exceto 0. Tal escolha é possível, pois como r é uma função polinomial, pelo Lema 1.2, r possui um número finito de valores críticos sobre $V - \Sigma(V)$ (escolhemos um ε de forma que ε^2 é menor que o mínimo dos valores críticos positivos de r). Agora vamos construir um fluxo no disco furado $D_\varepsilon - \{0\}$ que acompanha o $V - \Sigma(V)$. Para isso, definimos um campo diferenciável sem singularidade com as seguintes características:

- i) O vetor $v(x)$ é voltado para fora, isto é: $\langle v(x), x \rangle > 0$.
- ii) Se $x \in V - \Sigma(V)$, $v(x)$ é tangente a $V - \Sigma(V)$.

Vamos construir um campo local e colar através da partição da unidade.

A construção local é seguinte:

- a) Se $x^\alpha \notin V$, $v^\alpha(x) = x^\alpha$ na vizinhança $U^\alpha \subset \mathbb{R}^m - V$.
- b) Se $x^\alpha \in D_\varepsilon \cap V - \{0\}$, notemos que $V - \Sigma(V)$ é uma subvariedade diferenciável de $\mathbb{R}^m$, e tomemos um sistema de coordenadas $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ da vizinhança $U^\alpha \subset \mathbb{R}^m$ de x^α tal que $U^\alpha \cap V$ corresponde ao lugar geométrico $u_1 = u_2 = \dots = u_\rho = 0$ para algum ρ . Como r não possui ponto singular em $V \cap D_\varepsilon$ exceto 0, uma das derivadas parciais $\partial r / \partial u_{\rho+1}, \dots, \partial r / \partial u_m$ não se anula em x^α (logo na vizinhança U^α suficientemente pequeno). Seja h tal que $\partial r / \partial u_h \neq 0$ em U^α . Definimos:

$$v^\alpha(x) = \begin{cases} \partial x / \partial u_h, & \text{se } \partial r / \partial u_h > 0 \\ -\partial x / \partial u_h, & \text{se } \partial r / \partial u_h < 0 \end{cases}$$

Como a curva coordenada u_h está contida em $V - \Sigma(V)$, $v^\alpha(x)$ é tangente a $V - \Sigma(V)$ em x^α . Temos:

$$\begin{aligned} 0 < \pm \partial r / \partial u_h &= \pm \Sigma \partial r / \partial x_i \cdot \partial x_i / \partial u_h = \pm \Sigma 2x_i \cdot \partial x_i / \partial u_h \\ &= 2 \langle x, \pm \partial x / \partial u_h \rangle = 2 \langle x, v^\alpha(x) \rangle \end{aligned}$$

Agora vamos colar os campos locais, usando a partição da unidade.

Seja $\{\lambda_\alpha\}$, a partição da unidade subordinado a cobertura U^α de $D_\varepsilon - \{0\}$ e $v(x) = \Sigma \lambda_\alpha(x) v^\alpha(x)$. Definimos o campo w como sendo $w(x) = v(x) / \langle 2x, v(x) \rangle$. Neste caso, o campo w satisfaz $\langle w(x), x \rangle = 1/2$ e, é o campo que procurávamos. Agora vamos analisar o fluxo associado ao campo w . Considere a equação diferencial

$$dx/dt = w(t) \quad (1.1)$$

Se $p(t)$ for a curva integral da equação (1.1), a derivada da composta $r \circ p$ satisfaz:

$$dr/dt = \Sigma \partial r / \partial x_i \cdot w_i(x) = \langle 2x, w(x) \rangle = 1.$$

Consequentemente, $\|p(t)\|^2 = r(p(t)) = t + c$, onde c é uma constante. Subtraindo c , podemos supor que $\|p(t)\|^2 = t$. Esta solução $p(t)$ pode ser estendida para $0 < t \leq \varepsilon^2$ e está bem determinado pela condição $p(\varepsilon^2) \in S_\varepsilon$. Seja $P: S_\varepsilon \times (0, \varepsilon^2] \rightarrow D_\varepsilon - \{0\}$, o fluxo associado ao campo $dx/dt = w(x)$, isto é, P é definido como sendo $P(a, t) = p_a(t)$ com $p_a(\varepsilon^2) = a$. Então P leva $S_\varepsilon \times (0, \varepsilon^2]$ difeomorficamente ao disco furado $D_\varepsilon - \{0\}$. Como o campo w é tangente a $V - \Sigma(V)$, a curva solução com ponto final em K está contida em $V - \Sigma(V)$ e logo P leva $K \times (0, \varepsilon^2]$ difeomorficamente à $V \cap D_\varepsilon - \{0\}$. Temos ainda que $P(a, t)$ tende uniformemente a 0 quando $t \rightarrow 0$. Consequentemente, o difeomorfismo P estende-se de forma única para um homeomorfismo $P: \text{Cone}(S_\varepsilon) \rightarrow D_\varepsilon$ que leva $\text{Cone}(K)$ homeomorficamente à $V \cap D_\varepsilon$. Logo o par $(D_\varepsilon, \text{Cone}(K))$ é homeomorfo ao par $(D_\varepsilon, V \cap D_\varepsilon)$, uma vez que $\text{Cone}(S_\varepsilon)$ é homeomorfo ao disco D_ε . ■

Observação 1.1: O resultado acima também é válido no caso analítico (Proposição 2.4 da pag. 23 de [LOOIJENGA]).

fig. 1.1

fig. 1.2

Observação. 1.2: Se $0 \in V$ for ponto regular, K é uma esfera topológica não enodada (Corolário 2.12 da pag. 22 de [MILNOR1]).

Nos próximos capítulos, concentraremos no caso em que V é uma hipersuperfície algébrica, isto é, $V = f^{-1}(0)$, onde $f: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função polinomial, com $f(0)=0$ e 0 é singularidade isolada.

II Singularidades de curvas algébricas planas

O objetivo deste capítulo é mostrar que para todo polinômio irredutível, $f \in C[x, y]$, $K = S_e \cap f^{-1}(0)$ é um nó iterado no toro totalmente determinado pelo seu Polinômio de Alexander. Neste caso, K é denominado de nó algébrico. Veremos o algoritmo passo a passo, para encontrar o tipo de enlaçamento de K , a partir de f .

Seja $C[[t]]$ o anel das séries formais em t . Denotamos por $C((t))$ o corpo das frações de $C[[t]]$. dado um elemento não nulo $f \in C((t))$, f pode ser escrito como $f(t) = a_k t^k + a_{k+1} t^{k+1} + a_{k+2} t^{k+2} + \dots$ com $a_k \neq 0$ para algum inteiro k (Teorema 1.2 da pag. 88 de [WALKER]).

Definição 2.1: A *ordem* de $f \in C((t))$ é definida como sendo menor inteiro $v(h) = k$, tal que $a_k \neq 0$.

Definição 2.2: Uma *substituição* é um C -homomorfismo $\varphi: C((t)) \rightarrow C((t))$ que associa cada $f(t)$ a $f(\varphi(t))$ onde $\varphi(t) \in C((t))$ com $v(\varphi) > 0$. Neste caso, $v(\varphi)$ é denominada *ordem de substituição* por φ .

Definição 2.3: Seja $g \in C[x, y]$ um polinômio irredutível e $V = g^{-1}(0)$ sua superfície de nível, denominada *curva algébrica plana*. Uma *parametrização* de V é $(x, y) \in C[[t]] \times C[[t]] \setminus C^2$ tal que $g(x, y) = 0$. O ponto $(x(0), y(0))$ é denominado *centro* da parametrização (x, y) .

Dado uma parametrização (x, y) , podemos estender a substituição por φ tal que $v(\varphi) > 0$ como sendo $\varphi(x(t), y(t)) = [x(\varphi(t)), y(\varphi(t))]$. Neste caso, $g[\varphi(x(t), y(t))] = g[x(\varphi(t)), y(\varphi(t))] = \varphi(g[x(t), y(t)]) = \varphi(0) = 0$, pois $\varphi(0) = 0$ e consequentemente, $\varphi(x(t), y(t))$ também é uma parametrização de V com mesmo centro, desde que $\varphi[x(0), y(0)] = [x(\varphi(0)), y(\varphi(0))] = [x(0), y(0)]$.

Observação 2.1: Seja $g \in C[x, y]$ e $(x, y) = (x(t), y(t))$, a parametrização de $g^{-1}(0)$. Então $g(x(t), y(t)) \in C((t))$.

Definição 2.4: Duas parametrizações são ditas *equivalentes*, se uma pode ser obtida da outra através de uma substituição de ordem 1.

Definição 2.5: Uma parametrização é dita *redutível* caso possa ser obtida de outra parametrização por substituição de ordem maior que 1. Caso contrário, é dita *irredutível*.

Definição 2.6: Um *ramo* da curva aléblica plana V é uma classe de equivalência das parametrizações irredutíveis. O *centro* do ramo é o centro de qualquer parametrização que o represente.

Exemplo 2.1: $V = \{(x,y) \in \mathbb{C}^2 : x^m - y^n = 0\}$ com $(m,n)=1$ onde (m,n) é o máximo divisor comum entre m e n , possui um único ramo com centro em $(0,0)$ da forma

$$\begin{cases} x = t^n \\ y = t^m \end{cases}$$

Um dos resultados mais importantes é o seguinte:

Proposição 2.1 (Proposição I.1 da pag. 4 de [CARNEIRO&SOARES]): *Seja $V = f^{-1}(0)$ uma curva em $\mathbb{C}^2$ distinta da curva $x=\text{constante}$. Então:*

i) *Toda parametrização de V com centro em (a,b) é equivalente a uma da forma*

$$\begin{cases} x = a + t^r, & r > 0 \\ y = b + b_1 t + b_2 t^2 + \dots \end{cases} \quad (2.1)$$

ii) *Duas tais parametrizações são equivalentes se, e somente se, elas diferem por uma substituição do tipo $t \rightarrow \xi t$, onde $\xi^r = 1$.*

iii) *A parametrização acima é redutível se, e somente se, $\text{m.d.c}\{m: m = r \text{ ou } b_m \neq 0\} > 1$.*

Observação 2.2: A expressão (2.1) é equivalente a

$$y = b + b_1(x-a)^{1/r} + b_2(x-a)^{2/r} + b_3(x-a)^{3/r} + \dots$$

e, é denominada de desenvolvimento de Puiseux de V em torno de (a, b) .

Observação 2.3: Caso a parametrização não precise ser da forma (2.1), podemos fazer por tentativas ou senão prosseguir como se segue: Tome a reta $y=tx$ e substitua em $g(x,y)=0$. Resolva x em relação a t . Então $x=x(t)$, $y=tx(t)$ fornece uma parametrização de $V = g^{-1}(0)$ (o mesmo pode ser feito com a reta $x=ty$).

Agora veremos um procedimento geral que permite encontrar a parametrização da forma (2.1) a partir da equação da curva plana.

Proposição 2.2: *Seja f um polinômio irredutível em $C[x,y]$ e $(a,b) \in V = f^{-1}(0)$, um ponto tal que $\partial f(a,b) / \partial y \neq 0$. Então existe um único ramo de V centrado em (a,b) da forma*

$$\begin{cases} x = a + t \\ y = b + b_1 t + b_2 t^2 + \dots \end{cases} \quad (2.2)$$

A proposição acima é a combinação da proposição II.1 (pag. 14) e Lema II.12 (pag. 41) do [SIMIS].

Uma das formas de encontrar a expressão da proposição acima é substituir x e y na equação $f(x,y)=0$ e tentar encontrar os termos da série y . Caso isso seja difícil, podemos prosseguir como na demonstração do Lema II.12 do [SIMIS]: Inicialmente, tome $y = b + b_1 t$ e substituindo em $f(x,y)$ com $x=a+t$, encontraremos b_1 tal que $v(f(x,y)) > 1$, igualando o coeficiente de t a zero. Ao encontrar b_1 , tome $y = b + b_1 t + b_2 t^2$ e substituindo em $f(x,y)$, encontraremos b_2 tal que $v(f(x,y)) > 2$, igualando os coeficientes de potência 2 a zero. Prosseguindo desta forma, sempre encontraremos o i -ésimo coeficiente de y , substituindo $y = b + b_1 t + \dots + b_{i-1} t^{i-1} + b_i t^i$ em $f(x,y)$ e igualando o coeficiente de i -ésima potência a zero. Assim, podemos encontrar todos os coeficientes de y .

Caso (a,b) seja ponto singular, o método acima não funciona, pois o valor de r na expressão (2.1) não será conhecido. Neste caso, usamos o método conhecido como *método do polígono de Newton* ([SIMIS] e [WALKER]) que reduz o caso com ponto singular ao caso em que não há ponto singular. Este método consiste no seguinte:

Seja $(a,b) \in V = F^{-1}(0)$ um ponto singular onde $F \in C[x,y]$ é um polinômio irredutível e $F(x,y) = \sum_{\alpha,\beta} A_{\alpha,\beta} (x-a)^\alpha (y-b)^\beta$ a expansão em série de Taylor de F em torno de (a,b) . Agora considere o conjunto $\text{ef}(F) = \{(\alpha,\beta) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : A_{\alpha,\beta} \neq 0\}$ dos pares de expoentes de $(x-a)$ e $(y-b)$ tais que seus coeficientes $A_{\alpha,\beta}$ não são nulos.

Plotamos os pontos de $\text{ef}(F)$ no plano $X \times Y$ e consideramos os pontos $(0,q)$ e $(p,0)$, onde q é o menor inteiro tal que $A_{0,q} \neq 0$ e p é o menor inteiro tal que $A_{p,0} \neq 0$.

Agora traçamos uma linha poligonal convexa voltado para cima, começando de $(0,q)$ e terminando em $(p,0)$, sempre passando nos pontos de $\text{ef}(F)$ de forma que não exista ponto de $\text{ef}(F)$ abaixo da linha poligonal. Assim, obtemos a lista de pontos correspondentes aos vértices desta linha poligonal $(0,q) = (\alpha_0, \beta_0), (\alpha_1, \beta_1), (\alpha_2, \beta_2), \dots, (\alpha_n, \beta_n) = (p,0)$. A linha poligonal determinada por estes vértices é denominada de *polígono de Newton* de F relativamente ao ponto (a,b) .

Dado um lado $(\alpha_i, \beta_i)(\alpha_{i+1}, \beta_{i+1})$ do polígono de Newton, a equação da reta passando por esses dois pontos é dado por $r\alpha + s\beta = p$ com $r, s, p \in \mathbb{Z}$ e $(r,s)=1$. Substituindo a expressão $x = a + t^r, y = b + t^s u$ em $f(x,y)$ obtemos $t^p(u^{\beta_2}\phi(u) + tp(t,u))$ tal que $p(t,u)$ é um polinômio e $\phi(u) = \sum A_{\alpha,\beta} u^{\beta-\beta_{i+1}} = u^{-\beta_{i+1}} \sum A_{\alpha,\beta} u^{\beta}$, onde (α,β) é o ponto sobre o seguimento $(\alpha_i, \beta_i)(\alpha_{i+1}, \beta_{i+1})$ incluindo os extremos.

Definimos $G(t,u) = u^{\beta_2}\phi(u) + tp(t,u) = F(a + t^r, b + t^s u) / t^p$ e seja c um raiz de ϕ . Então a parametrização de F em (a,b) é dado por $x = a + t^r, y = b + t^s u$ onde (t,u) é a parametrização de $G^{-1}(0)$ com centro $(0,c)$. Caso c seja raiz simples de ϕ , $(0,c)$ é o ponto não singular de G da forma $\partial G(0,c) / \partial u \neq 0$ e podemos aplicar a proposição (2.2) para encontrar o u . Caso c seja raiz múltipla de ϕ , aplicaremos novamente o método de polígono de Newton em $G(t,u)$ com centro $(0,c)$ para encontrar o (t,u) .

Observação 2.4: Dada a equação do lado do polígono de Newton, já temos o valor de r da expressão (2.1) e assim, podemos encontrar a expressão de y de maneira análoga ao caso de (2.2), mas o processo não garante qual das parametrizações vai ser encontrada

Teorema 2.3 (Observação da pag. 56 de [SIMIS]): *Seja $F: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ uma função polinomial irredutível. Então:*

- i) *Aplicando um número finito de etapas, o método do polígono de Newton (substituição da forma $x = a + t^r, y = b + t^s u$), sempre obtém um polinômio $\phi(u)$ cujas raízes são simples.*
- ii) *Aplicando o método em todos os lados do polígono de Newton, obteremos todos os ramos de F com centro em (a,b) .*
- iii) *Lados distintos do polígono dão origem a ramos distintos.*

Observação 2.5: As raízes distintas de $\phi(u)$ nem sempre dão origem a ramos distintos.

Observação 2.6: Mais geralmente, dado $f(x,y) \in K(x)^*[y] \setminus K(x)^*$ onde $K(x)^*$ é corpo das séries formais com "expoentes quase fracionárias" sobre o corpo completo K de característica zero, $\{(x,y): f(x,y) = 0\}$ pode ser resolvido como $y = y(x) \in K(x)^*$. A demonstração é feita em [WALKER] (Teorema 3.1 da pag. 98) e utiliza o método de polígono de Newton.

Exemplo 2.2: Vamos encontrar os ramos da curva alébrica plana com centro $(0,0)$ determinado pelo polinômio $F(x,y) = y^5 + 2xy^3 - 3x^2y + x^3y^2 + 5x^4 + x^5$.

Temos que $\text{ef}(F) = \{(0,5), (1,3), (2,1), (3,2), (4,0), (5,0)\}$ e o polígono de Newton ficaria como na fig. 2.1.

Os vértices do polígono de Newton são $\{(0,5), (2,1), (4,0)\}$.

Vamos encontrar o ramo associado ao primeiro lado $\overline{(0,5), (2,1)}$. A equação da reta associada a este lado é $2\alpha + \beta = 5$ e portanto $r=2$, $s=1$ e $p=5$. $\phi(u) = u^{-1}(u^5 + 2u^3 - 3u) = u^4 + 2u^2 - 3$, onde $u = \pm 1$ e $u = \pm\sqrt{3}i$ são raízes de ϕ . Escolhendo uma raiz, por exemplo $u=1$, temos:

$$G(t,u) = \frac{F(t^2, tu)}{t^5} = \frac{t^5 u^5 + 2t^5 u^3 - 3t^5 u + t^8 u^2 + 5t^8 + t^{10}}{t^5}$$

$$= u^5 + 2u^3 - 3u + t^3 u^2 + 5t^3 + t^5$$

fig. 2.1

Como 1 é raiz simples de ϕ , podemos aplicar o algoritmo da proposição 2.2 para encontrar (t,u) .

Tomemos $t = 0 + \tau$, $u = 1 + b_1\tau$ e substituindo em G , temos

$$\begin{aligned} G(t,u) &= (1+b_1\tau)^5 + 2(1+b_1\tau)^3 - 3(1+b_1\tau) + \tau^3(1+b_1\tau)^2 + 5\tau^3 + \tau^5 \\ &= (1+5b_1\tau+\dots) + 2(1+3b_1\tau+\dots) - 3(1+b_1\tau) + \tau^3(1+2b_1\tau+\dots) + 5\tau^3 + \tau^5 \\ &= 0 + 8b_1\tau + \dots \end{aligned}$$

onde os termos que não foram escritos são de potência maior que 1.

Igualando o coeficiente de τ a zero, temos que $8b_1 = 0 \Rightarrow b_1 = 0$

Agora, temos que $t = 0 + \tau$, $u = 1 + 0\tau + b_2\tau^2$ e encontramos $G(t,u) = 8b_2\tau^2 + \dots$ e conseqüentemente, $b_2 = 0$. Assim, $t = 0 + \tau$, $u = 1 + b_3\tau^3$ e isto implica que $b_3 = 3/4$.

A parametrização do ramo encontrado até agora é $t = 0 + \tau$, $u = 1 + 3/4\tau^3 + \dots$ que, substituindo na expressão de x e y , nos fornece:

$$\begin{cases} x = \tau^2 \\ y = \tau(1 + 3/4\tau^3 + \dots) = \tau + 3/4\tau^4 + \dots \end{cases}$$

Continuando-se o processo, podemos encontrar os termos restantes do ramo associado ao primeiro lado e a raiz $c=1$. Outros ramos são encontradas, variando os lados e as raízes.

Agora que já sabemos como encontrar os ramos de V , veremos como obter uma sequência de pares de inteiros associada a um ramo, denominada de sequência de pares de Puiseux.

Seja $V = f^{-1}(0)$, uma curva aléblica plana irredutível na origem (isto é, o desenvolvimento em série de Taylor de f em torno da origem é um polinômio irredutível) e

$$\begin{cases} x = t^n, & n > 0 \\ y = b_1t + b_2t^2 + \dots \end{cases} \quad (2.3)$$

uma parametrização irredutível com centro na origem (como a superfície de nível pode ser transladada, podemos supor que centro em questão é origem).

A sequência de Puiseux é determinada pelo seguinte algoritmo ([TRÁNG] e [CARNEIRO&SOARES]).

1) Seja β_1 o menor inteiro tal que $b_{\beta_1} \neq 0$ e n não divide β_1 . Defina

$$\begin{cases} e_1 = (\beta_1, n) \\ m_1 = \beta_1 / e_1 \\ n_1 = n / e_1 \end{cases}$$

Se $n_1 = n$, pare.

2) Se $n_1 < n$, seja $\beta_2 > \beta_1$, o menor inteiro tal que $b_{\beta_2} \neq 0$ e e_1 não divide β_2 .

Defina

$$\begin{cases} e_2 = (\beta_2, e_1) \\ m_2 = \beta_2 / e_2 \\ n_2 = e_1 / e_2 \end{cases}$$

Se $n_1 n_2 = n$ pare.

2) Se $n_1 n_2 < n$, seja $\beta_3 > \beta_2$, o menor inteiro tal que $b_{\beta_3} \neq 0$ e e_2 não divide β_3 .

Defina

$$\begin{cases} e_3 = (\beta_3, e_2) \\ m_3 = \beta_3 / e_3 \\ n_3 = e_2 / e_3 \end{cases}$$

Se $n_1 n_2 n_3 = n$ pare.

Assim, sucessivamente, definimos $\beta_i > \beta_{i-1}$, o menor inteiro tal que $b_{\beta_i} \neq 0$ e e_{i-1} não divide β_i . Defina

$$\begin{cases} e_i = (\beta_i, e_{i-1}) \\ m_i = \beta_i / e_i \\ n_i = e_{i-1} / e_i \end{cases}$$

Para algum g , temos $n_1 n_2 \dots n_g = n$ (equivalentemente, $e_g = 1$). A sequência obtida desta forma satisfaz

- i) $n_1 n_2 \dots n_g = n$
- ii) $(m_i, n_i) = 1$
- iii) $\beta_i = (m_i / n_1 \dots n_i) n$

Observação 2.7: Também temos:

- i) $n_p \dots n_i = e_{p-1} / e_i$
- ii) $n_1 \dots n_i = n / e_i$
- iii) $\beta_i = m_i e_i$

Definição 2.7: A sequência $(m_1, n_1), \dots, (m_g, n_g)$ é denominada *sequência de pares de Puiseux* do ramo, g é o *gênero* do ramo e $n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_g$ são os *expoentes característicos*.

Proposição 2.4 (Comentário da pag. 10 do [CARNEIRO&SOARES]): Dada uma sequência de pares de inteiros positivos e primos entre si $(m_1, n_1), (m_2, n_2), \dots, (m_g, n_g)$, ele é uma sequência de pares de Puiseux se, e somente se, $m_{i-1} n_i < m_i$ para $i=2, 3, \dots, g$.

Exemplo 2.3: Vamos encontrar a sequência de pares de Puiseux associada ao ramo

$$\begin{cases} x = t^{12} \\ y = 2t^4 - 5t^6 + 1/2t^7 + t^{10} + \dots \end{cases}$$

Temos que $n=12$.

- 1) $\beta_1 = 4, e_1 = (12, 4) = 4, n_1 = n / e_1 = 3, m_1 = \beta_1 / e_1 = 1.$
- 2) $\beta_2 = 6, e_2 = (4, 6) = 2, n_2 = e_1 / e_2 = 2, m_2 = \beta_2 / e_2 = 3.$
- 1) $\beta_3 = 7, e_3 = (2, 7) = 1, n_3 = e_2 / e_3 = 2, m_3 = \beta_3 / e_3 = 7.$

Como $n = n_1 n_2 n_3, g=3$ e a sequência de Puiseux associado ao ramo é $\{(1, 3), (3, 2), (7, 2)\}$ com os expoentes característicos $n=12, \beta_1 = 4, \beta_2 = 6, \beta_3 = 7$.

Para o próximo resultado, precisamos do conceito de nó iterado no toro. A definição de nó iterado no toro na teoria das singularidades é um pouco diferente daquela em teoria de nós.

Na teoria de nós, nó iterado no toro K_g dado pela sequência $(m_1, n_1), \dots, (m_g, n_g)$ é construído a partir de nó trivial, da seguinte forma:

- 1) Tome o nó toral do tipo (m_1, n_1)

2) Para $i=2,\dots,g$, tome o bordo da vizinhança tubular do nó iterado no toro dado pela sequência $(m_1, n_1), \dots, (m_{i-1}, n_{i-1})$ e trivialize de forma que a intersecção da superfície de Seifert com este bordo seja um paralelo no toro e coloque o nó toral do tipo (m_i, n_i) sobre ele. Usando o homeomorfismo trivializador, mergulhe este novo nó no bordo da vizinhança tubular (Em suma, enrolar o nó do tipo (m_i, n_i) em torno da vizinhança tubular do nó anterior).

Na teoria das singularidades, obtém-se uma nova sequência de pares $(n_1, \ell_1), \dots, (n_g, \ell_g)$ onde $\ell_1 = m_1$ e $\ell_i = m_i - m_{i-1}n_i + \ell_{i-1}n_{i-1}$ para $i=2,\dots,g$. O nó K_g do tipo $(m_1, n_1), \dots, (m_g, n_g)$ no sentido de teoria da singularidade é o nó do tipo $(n_1, \ell_1), \dots, (n_g, \ell_g)$ no sentido da teoria de nós.

Exemplo 2.4: Para entender melhor, o nó iterado no toro, vamos construir o nó do tipo $\{(2,3),(2,3)\}$, no sentido da teoria de nós.

fig. 2.2

Tomemos o nó trefoil (nó do tipo $(2,3)$) e construimos a superfície de Seifert (fig. 2.2). Então a intersecção do bordo da vizinhança tubular do trefoil com a superfície de Seifert, dá três voltas na projeção, isto é, ele cruza três vezes a silueta "escolhida" da vizinhança tubular, associada a projeção usual (fig. 2.3).

Paralelo sobre o trefoil

fig. 2.3

Agora lembremos que, para se construir um nó do tipo (m,n) , tomamos m paralelos e nele, fazemos n cortes. Em seguida, remendamos este corte, o primeiro com o segundo, o segundo com o terceiro e assim por diante até o último com o primeiro (fig. 2.4).

fig 2.4

Como queremos construir o nó $(2,3)$ sobre a vizinhança tubular, tomemos dois paralelos, damos três cortes e remendamos (fig. 2.5). Obtendo assim, o nó da figura (2.6).

2 paralelos sobre o trefoil

Nó $(2,3)$ sobre o trefoil

fig. 2.5

Nó $\{(2,3),(2,3)\}$

fig. 2.6

Definição 2.8: Um polinômio $f \in \mathbb{C}[x,y]$ é dito *analiticamente irredutível* em 0 quando ideal $\langle f \rangle$ gerado por f é primo nos anéis formais $\mathbb{C}[[x,y]]$ e zero é ponto crítico (necessariamente isolado, já que $\langle f \rangle$ é primo) de f . No caso em que f é um polinômio irredutível, é suficiente que 0 seja singularidade de f para que seja analiticamente irredutível em zero.

Teorema 2.5 (Brauner) (Pag. 9 de [CARNEIRO&SOARES]): *Seja $f: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ uma aplicação polinomial satisfazendo $f(0)=0$ e que seja analiticamente irredutível em 0. Então para ε suficientemente pequeno, o nó $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ em S_ε tem o tipo do nó K_g determinado pela sequência de pares de Puiseux de v em 0 (o nó iterado em toro no sentido da teoria das singularidades), onde v é um ramo com centro em $(0,0)$.*

Devido ao teorema de Brauner, o nó K no caso acima sempre será um nó iterado no toro. Assim, para estes casos, o estudo das singularidades reduz-se ao caso de estudar o nó iterado no toro gerado pela sequência de pares de Puiseux.

Observação 2.8: O tipo topológico da curva plana parametrizada por (2.3) é mesmo que o tipo topológico da curva

$$\begin{cases} x = t^n \\ y = t^{\beta_1} + t^{\beta_2} + \dots + t^{\beta_g} \end{cases}$$

onde $n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_g$ são os expoentes característicos de (2.3).

Sabemos que o polinômio de Alexander do nó iterado no toro definido pela sequência de pares $(n_1, \ell_1), \dots, (n_g, \ell_g)$ (no sentido de teoria de nós) é da forma

$\Delta(t) = \prod \Delta_{n_i, \ell_i}(t^{v_i})$ onde $\Delta_{m,n}(t) = \frac{(t^{mn} - 1)(t - 1)}{(t^m - 1)(t^n - 1)}$, $v_i = n_{i+1}n_{i+2} \dots n_g$ para $i = 1, 2, \dots, g-1$ e $v_g = 1$ [LIVINGSTON&MELUIN].

Teorema 2.6 [CARNEIRO&SOARES]: *O tipo do nó alébrico é determinado pelo seu polinómio de Alexander.*

Demonstração: Devido ao que acabamos de discutir, devemos mostrar que se $\Delta(t)$ e $\Delta'(t)$ são polinómios de Alexander do nó iterado no toro (no sentido da teoria das singularidades) determinado pela sequência de pares de Puiseux $(m_1, n_1), \dots, (m_g, n_g)$ e $(m'_1, n'_1), \dots, (m'_g, n'_g)$ e se $\Delta(t) = \Delta'(t)$ então as duas sequências são iguais.

Afirmção 2.6.1: $\ell_g > \ell_i n_i n_{i+1} \dots n_g$ (consequentemente, $\ell_g > n_g$)

Solução: Como $m_{i-1}n_i < m_i$ temos que $m_i - n_i m_{i-1} > 0$. Logo $\ell_i = m_i - m_{i-1}n_i + \ell_{i-1}n_i n_{i-1} > \ell_{i-1}n_i n_{i-1}$. Aplicando indutivamente a desigualdade acima, substituindo os valores de ℓ_k 's temos

$$\ell_g = \ell_{g-1}n_g n_{g-1} \geq \ell_{g-1}n_g > \ell_{g-2}n_{g-1}n_{g-2}n_g \geq \ell_{g-2}n_{g-1}n_g > \dots > \ell_i n_i n_{i+1} \dots n_g.$$

Afirmção 2.6.2: $\ell_g n_g$ é o maior inteiro tal que a raiz da unidade desta ordem é raiz de $\Delta(t)$.

Solução: Como cada fator de $\Delta(t)$ é da forma

$$\Delta_{n_i, \ell_i}(t^{v_i}) = \frac{(t^{\ell_i n_i n_{i+1} \dots n_g} - 1)(t^{n_{i+1} n_{i+2} \dots n_g} - 1)}{(t^{\ell_i n_{i+1} n_{i+2} \dots n_g} - 1)(t^{n_i n_{i+1} \dots n_g} - 1)} \text{ tais que } \ell_i n_i n_{i+1} \dots n_g < \ell_g < \ell_g n_g \text{ e}$$

$n_{i+1}n_{i+2} \dots n_g < \ell_g < \ell_g n_g$, todas as raízes de $\Delta_{n_i, \ell_i}(t^{v_i})$ tem ordem menor que $\ell_g n_g$.

Afirmção 2.6.3: $\ell_g = \ell'_g$, $n_g = n'_g$.

Por hipótese, $\Delta(t) = \Delta'(t)$. Assim, $\ell_g n_g = \ell'_g n'_g$. Logo basta mostrar que $\ell_g = \ell'_g$. Suponhamos por absurdo que $\ell_g < \ell'_g$. Como a k -ésima raiz da unidade é raiz de $\Delta_{m,n}(t)$ se, é somente se, k divide mn e k não divide m nem n , temos que ℓ'_g -ésimo raiz da unidade é raiz de $\Delta_{n_g, \ell'_g}(t)$. Assim, ℓ'_g -ésimo raiz da unidade é raiz de $\Delta(t) = \Delta'(t)$. Mas devido a desigualdade obtida na solução de afirmação 2.7.2, a ℓ'_g -ésima raiz da unidade só pode ser raiz do último fator de $\Delta'(t)$, o que não é verdade.

Como $(n_g, \ell_g) = (n'_{g'}, \ell'_{g'})$, temos $\Delta_{n_g \ell_g}(t) = \Delta_{n'_{g'} \ell'_{g'}}(t)$. Cancelando estes dois fatores de $\Delta(t) = \Delta'(t)$ e substituindo t^{n_g} por τ , temos que o polinômio de Alexander determinado pela sequência de pares de Puiseux $(m_1, n_1), \dots, (m_{g-1}, n_{g-1})$ e $(m'_1, n'_1), \dots, (m'_{g'-1}, n'_{g'-1})$ são iguais. Aplicando a indução sobre g , temos que $g-1 = g'-1$ e $(n_1, \ell_1), (n_2, \ell_2), \dots, (n_{g-1}, \ell_{g-1}) = (n'_1, \ell'_1), (n'_2, \ell'_2), \dots, (n'_{g'-1}, \ell'_{g'-1})$ e assim, a sequência $(n_1, \ell_1), (n_2, \ell_2), \dots, (n_g, \ell_g)$ é igual a $(n'_1, \ell'_1), (n'_2, \ell'_2), \dots, (n'_{g'}, \ell'_{g'})$. Como os m_i 's podem ser obtidos pela recorrência $m_1 = \ell_1$, $m_i = \ell_i + m_{i-1}n_i - \ell_{i-1}n_{i-1}$, as duas sequência de Puiseux $(m_1, n_1), \dots, (m_g, n_g)$ e $(m'_1, n'_1), \dots, (m'_{g'}, n'_{g'})$ são iguais. ■

III Variedades de Brieskorn no caso esférico.

Neste capítulo, vamos estudar um caso particular da variedade $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ onde $f: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ é um polinômio da forma $f(z_1, z_2, z_3) = z_1^p + z_2^q + z_3^r$ com $p, q, r > 1$. Neste caso, f é denominado de polinômio de Brieskorn e K é denotado por $M = M(p, q, r)$ e é denominado de Variedade de Brieskorn. No [MILNOR2] encontra uma classificação de M , mostrando que $M \cong G/\Pi$, onde G é um grupo de Lie simplesmente conexo de dimensão 3 e $\Pi = \pi_1(M)$ é um subgrupo discreto de G . Aqui, trataremos somente o caso em que $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1 > 0$, denominado caso esférico. Neste caso, $M(p, q, r) \cong \text{SU}(2)/\Pi$ onde Π é comutador do grupo binário do subgrupo discreto de $\text{SO}(3)$. Os grupos $\text{SU}(2)$, $\text{SO}(3)$ e Π são analisados no apêndice.

Inicialmente, vamos analisar um grupo especial denominado de grupo triangular.

Dado os inteiros $p, q, r > 1$, denotamos por $T = T(p, q, r)$, o triângulo com ângulos internos π/p , π/q e π/r no plano hiperbólico, euclideano ou elíptico respectivamente se a soma dos ângulos internos de T for menor, igual ou maior que π . Isto equivale a dizer que $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1$ é menor, igual ou maior que zero.

Proposição 3.1: *No caso em que $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1 > 0$, (p, q, r) é um dos seguintes casos: $(2, 2, k)$, $(2, 3, 3)$, $(2, 3, 4)$ e $(2, 3, 5)$.*

Demonstração: Basta supor que $2 \leq p \leq q \leq r$ e analisar a desigualdade. ■

Definição 3.1: Definimos o grupo triangular completo de Scharts como sendo $\Sigma^* = \Sigma^*(p, q, r) = [\delta_1, \delta_2, \delta_3]$ onde δ_1, δ_2 e δ_3 são reflexões relativamente aos lados do triângulo $T(p, q, r)$ e $[\delta_1, \delta_2, \delta_3]$ denota o grupo gerado por δ_1, δ_2 e δ_3 .

O grupo triangular completo possui apresentação (pag. 180 do [MILNOR2])

$$\Sigma^* = \langle \delta_1, \delta_2, \delta_3 : \delta_1^2 = \delta_2^2 = \delta_3^2 = (\delta_1 \delta_2)^p = (\delta_2 \delta_3)^q = (\delta_3 \delta_1)^r = 1 \rangle.$$

Definição 3.2: O subgrupo $\Sigma = \Sigma(p, q, r) < \Sigma^*$ de índice 2 consistindo de elementos de Σ^* que preservam a orientação é denominado de grupo triangular.

O Teorema de Poincaré (Teorema 2.2 da pag. 179 do [MILNOR2]) garante que $\bigcup_{\delta \in \Sigma^*} \delta(T)$ preenche o plano de forma que se $\delta \neq \tau$ então $\delta(T)$ e $\tau(T)$ só podem ter sobreposição nos bordos. Mais precisamente, o plano pode ser preenchido, rotacionando e refletindo o triângulo em torno da trajetória de cada vértice. O número de triângulos que compartilham os lados é 2, os que compartilham os vértices correspondentes a p , q e r são $2p$, $2q$ e $2r$ respectivamente. Seu subgrupo Σ preenche a "metade" do plano, rotacionando o triângulo em torno da órbita de cada vértice. Não haverá nenhuma sobreposição de lados e o número de triângulos que compartilham o mesmo vértice correspondente a p , q e r são p , q e r respectivamente.

Σ preenche metade do plano

fig. 3.1

Uma das consequências do Teorema de Poincaré é que a ordem de Σ^* é o quociente de área do plano pela área do triângulo, pois $\delta \in \Sigma^*$ são isometrias. No caso esférico, a área do plano é finita e logo a ordem de Σ^* é finita e temos:

Proposição 3.2: $|\Sigma^*| = 4 / (p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)$.

Demonstração: Veja o corolário 2.4 da pag. 182 de [MILNOR2]. ■

Corolário 3.3: Σ tem apresentação

$$\Sigma = \langle \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 : \sigma_1^p = \sigma_2^q = \sigma_3^r = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = 1 \rangle \text{ e } |\Sigma| = 2 / (p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1).$$

Demonstração: Para mostrar que a apresentação é esta, basta tomar $\sigma_1 = \delta_1 \delta_2$, $\sigma_2 = \delta_2 \delta_3$ e $\sigma_3 = \delta_3 \delta_1$. O caso da ordem é imediato. ■

Como $\sigma \in \Sigma$ é uma isometria que preserva a orientação, Σ é subgrupo do grupo de isometrias do plano que preservam a orientação, denotado por $\overline{G}$. Seja G o grupo de recobrimento universal de $\overline{G}$.

Definição 3.3: A imagem inversa completa de $\Sigma(p, q, r)$ pela projeção canônica de G em $\overline{G}$ é denominado de *grupo triangular centralmente estendido* e, é denotado por $\Gamma = \Gamma(p, q, r)$.

Teorema 3.4: Γ possui apresentação $\Gamma = \langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 : \gamma_1^p = \gamma_2^q = \gamma_3^r = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \rangle$.

Demonstração: Veja o Lema 3.1 da pag. 186 de [MILNOR2]. ■

Proposição 3.5: Seja $G = \langle x, r \rangle$, uma apresentação de grupos. Então $|G/[G, G]| = |\det[\bar{r}]|$ onde $[\bar{r}]$ é a matriz da relação abelianizada $\bar{r}$ de r .

Demonstração (esboço): Temos que $G/[G, G] \cong F(x)/H(\bar{r})$ onde $F(x)$ é o grupo abeliano livre finitamente gerado por x e $H(\bar{r})$ é o sub-grupo de $F(x)$ gerado por relações $\bar{r}$. A matriz $[\bar{r}]$ pode ser diagonalizada, sem alterar o valor absoluto do determinante, através de mudança de base conveniente em $F(x)$ e $H(\bar{r})$, isto é,

$$[\bar{r}] \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ o que implica que } G/[G, G] = Z_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus Z_{\lambda_n} \text{ e consequentemente,}$$

$$|G/[G, G]| = |\lambda_1 \dots \lambda_n| = |\det[\bar{r}]|. \blacksquare$$

Denotamos o subgrupo dos comutadores (também denominado de abelianizador) de Γ por $\Pi = [\Gamma, \Gamma]$.

Corolário 3.6 [MILNOR2]: Considerando a ordem do grupo infinito como sendo zero, temos que $|\Gamma / \Pi| = pqr|p^{-1}q^{-1}r^{-1} - 1|$.

Demonstração: Como $\Gamma = |\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 : \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_1^{-p}, \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_2^{-q}, \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_3^{-r}|$, a matriz das relações é dada por

$$R = \begin{bmatrix} 1-p & 1 & 1 \\ 1 & 1-q & 1 \\ 1 & 1 & 1-r \end{bmatrix}$$

onde seu determinante é:

$$\det(R) = [(1-p)(1-q)(1-r) + 2] - [(1-p) + (1-q) + (1-r)] \\ = qr + pr + pq - pqr = pqr(p^{-1}q^{-1}r^{-1} - 1)$$

e pela proposição 3.5, teremos $|\Gamma / \Pi| = |\det(R)| = pqr|p^{-1}q^{-1}r^{-1} - 1|$. ■

Corolário 3.7: Para o caso esférico, temos:

- i) $|\Sigma| = 2 / (p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)$
- ii) $|\Gamma| = 4 / (p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)$
- iii) $|\Pi| = 4 / [pqr(p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)]$

Agora considere o grupo $SU(2)$ que opera $\mathbb{C}$ -linearmente sobre S^3 e consequentemente, opera sobre $CP^1 = S^3 / S^1$. Como $-1 \in S^1$, $SU(2) / \{\pm I\}$ opera sobre $CP^1 \cong S^2$ que serve como modelo do plano esférico. Veremos no apêndice que $SU(2) / \{\pm I\} \cong SO(3)$. Além disso, toda isometria de S^2 que preserva a orientação é elemento de $SO(3)$. Logo, no caso esférico, $\overline{G} \cong SO(3)$, $G = SU(2) \cong S^3$ e o triângulo em questão está no $CP^1 \cong S^2$. Assim, o nosso grupo triangular Σ é um subgrupo discreto de $SO(3)$, a saber:

- 1) $\Sigma(2, 2, k) = D_{2k} = \langle \alpha, \beta : \alpha^2 = \beta^k = 1, \beta\alpha = \alpha\beta^{-1} \rangle$
com $\gamma_1 = \alpha, \gamma_2 = \alpha\beta^{-1}, \gamma_3 = \beta$.
- 2) $\Sigma(2, 3, 3) = A_4$ com $\gamma_1 = (1\ 2)(3\ 4), \gamma_2 = (1\ 2\ 3), \gamma_3 = (4\ 2\ 3)$.
- 3) $\Sigma(2, 3, 4) = S_4$ com $\gamma_1 = (2\ 3), \gamma_2 = (1\ 3\ 4), \gamma_3 = (1\ 4\ 3\ 2)$.
- 4) $\Sigma(2, 3, 5) = A_5$ com $\gamma_1 = (1\ 2)(3\ 4), \gamma_2 = (1\ 5\ 4), \gamma_3 = (1\ 2\ 4\ 3\ 5)$.

Os subgrupos Γ e Π são relatados no apêndice.

Agora, deixemos de lado o $\Gamma(p, q, r)$ e tomemos um subgrupo discreto arbitrário Γ de $SU(2)$.

Definição 3.4: Um *polinômio homogêneo* f de grau n é um polinômio que satisfaz a condição $f(tz) = t^n f(z)$, para todo t .

Em consequência, um polinômio homogêneo de grau n é combinação linear dos monômios do tipo $z_1^{a_1} z_2^{a_2} \dots z_m^{a_m}$ tal que $\sum a_i = n$ onde $z = (z_1, z_2, \dots, z_m)$.

Definição 3.5: $f \in C[x, y]$ é dito Γ -invariante se $\forall \gamma \in \Gamma, f(\gamma(z)) = f(z)$, para todo $z \in C^2$.

Denotamos o espaço dos polinômios homogêneos Γ -invariantes de grau n por $H_\Gamma^{n,1}$. Uma generalização de $H_\Gamma^{n,1}$ é obtida pela seguinte definição, onde um caracter em Γ é um homomorfismo $\chi: \Gamma \rightarrow S^1$.

Definição 3.6: $H_\Gamma^{n,\chi}$ é o espaço vetorial dos polinômios f homogêneos de grau n satisfazendo a condição $f(\gamma(z)) = \chi(\gamma)f(z)$, para todo $\gamma \in \Gamma$ e $z \in C^2$.

O produto dos elementos de $H_\Gamma^{n,\chi}$ por elementos de $H_\Gamma^{m,\rho}$ são elementos de $H_\Gamma^{n+m,\chi\rho}$ e assim, $H_\Gamma^{*,*} = \cup H_\Gamma^{n,\chi}$ forma uma álgebra com elemento neutro $1 \in H_\Gamma^{0,1}$.

Dado $f \in H_\Gamma^{n,\chi}$, pelo teorema fundamental da álgebra, existem retas $L_1, L_2, \dots, L_n$ passando na origem tais que $f(L_i) = 0$ para $i=1,2,\dots,n$. Além disso, $\{L_1, L_2, \dots, L_n\}$ é invariante pela ação de Γ e determina f a menos de multiplicação por uma constante.

Reciprocamente, se $\{L_1, L_2, \dots, L_n\}$ for um conjunto de retas invariantes por Γ (isto é, Γ permuta as retas de $\{L_1, L_2, \dots, L_n\}$) então existe $f \in H_\Gamma^{n,\chi}$ para algum χ tal que f anula exatamente em $\{L_1, L_2, \dots, L_n\}$.

Observação 3.1: Dada f , χ é determinado pela fórmula $\chi(\gamma) = f \circ \gamma / f$.

Observação 3.2: $H_\Gamma^{n,\chi} \subset H_\Pi^{n,1}$ para todo χ onde $\Pi = [\Gamma, \Gamma]$. De fato, todo gerador de Π é da forma $ghg^{-1}h^{-1}$ com $g, h \in \Gamma$. Como χ é um homomorfismo, $\chi(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$ e daí, $\chi(\Pi) = 1$. Logo $f(\pi(z)) = \chi(\pi)f(z) = f(z)$ para todo $\pi \in \Pi$.

Agora voltemos ao caso do grupo triangular $\Gamma(p, q, r) \subset SU(2)$. Sabemos que $\Sigma = \Gamma / \{\pm I\}$ possui ordem $k = 2 / (p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)$, a órbita dos pontos pela ação de Σ exceto nos vértices possui k pontos e a órbita dos vértices correspondentes a p, q e r

compõem-se de k/p , k/q e k/r pontos (devido ao número de triângulos que compartilham os vértices).

Escolhemos $f_1 \in H_{\Gamma}^{k/p, \chi_1}$ como sendo o polinômio homogêneo de grau k/p que se anula sobre as retas correspondentes aos pontos da órbita do vértice associado a p , para χ_1 apropriado. Da mesma forma, escolhemos $f_2 \in H_{\Gamma}^{k/q, \chi_2}$ e $f_3 \in H_{\Gamma}^{k/r, \chi_3}$.

Proposição 3.8 [MILNOR2]: $\chi_1^p = \chi_2^q = \chi_3^r = \chi_0$, para algum χ_0 .

Demonstração: Escolhemos o representante $\gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_k \in \Gamma$ das classes laterais de $\Gamma / \{\pm I\}$. Para cada forma linear $\ell(z) = az_1 + bz_2$ que determina a reta passando pela origem, definimos $f(z) = \ell(\gamma'_1(z))\ell(\gamma'_2(z))\dots\ell(\gamma'_k(z))$.

Como γ'_i representa a classe lateral em $\Gamma / \{\pm I\}$, $f(\gamma z) = f(z)$ a menos da troca de representantes da classe lateral. Mas a troca de representante da classe lateral difere apenas por multiplicação por $\pm I$. Assim,

$$\{\gamma'_1\gamma, \gamma'_2\gamma, \dots, \gamma'_k\gamma\} = \{\sigma_1(\gamma)\gamma'_1, \sigma_2(\gamma)\gamma'_2, \dots, \sigma_k(\gamma)\gamma'_k\}$$

onde $\sigma_i(\gamma) = \pm 1$. Usando o fato de que ℓ é $\mathbb{C}$ -linear, temos:

$$f(\gamma(z)) = \ell(\sigma_1(\gamma)\gamma'_1(z))\ell(\sigma_2(\gamma)\gamma'_2(z))\dots\ell(\sigma_k(\gamma)\gamma'_k(z))$$

$$= \sigma_1(\gamma)\sigma_2(\gamma)\dots\sigma_k(\gamma)\ell(\gamma'_1(z))\ell(\gamma'_2(z))\dots\ell(\gamma'_k(z))$$

$$= \sigma_1(\gamma)\sigma_2(\gamma)\dots\sigma_k(\gamma)f(z) = \sigma(\gamma)f(z)$$

$$\text{onde } \sigma(\gamma) = \sigma_1(\gamma)\sigma_2(\gamma)\dots\sigma_k(\gamma) = \pm 1.$$

Então $\chi_0(\gamma) = f \circ \gamma / f = \sigma(\gamma)$ não depende da escolha da forma $\mathbb{C}$ -linear ℓ .

Logo $f \in H_{\Gamma}^{k, \chi_0}$, qualquer que seja a escolha de ℓ .

Quando ℓ anula a reta passando pelo primeiro vértice, temos que $f = f_1^p$ e logo $f_1^p \in H_{\Gamma}^{k, \chi_0}$. Então $\chi_1(\gamma)^p f_1^p(z) = f_1(\gamma(z))^p = f_1^p(\gamma(z)) = \chi_0(\gamma) f_1^p(z)$ e consequentemente, $\chi_1(\gamma)^p = \chi_0(\gamma)$ para todo γ e daí $\chi_1^p = \chi_0$. Analogamente, $\chi_2^q = \chi_3^r = \chi_0$. ■

Proposição 3.9 [MILNOR2]: f_1, f_2 e f_3 geram o H_{Γ}^{**} , como $\mathbb{C}$ -álgebra.

Demonstração: Seja $f \in H_{\Gamma}^{n, \chi}$ um elemento não constante (Observe que os constantes são gerado por $1 = f_1 f_1^{-1}$) e considere a raiz α de f . Se α pertence a reta associada a algum vértice do triângulo, f é divisível por algum dos f_i 's. Caso contrário, a órbita de α é constituída de k pontos distintos (Note que se α é raiz, $\gamma(\alpha)$ também é raiz). Para um escalar complexo $\lambda \neq 0$, convenientemente escolhido, $f_1^p + \lambda f_2^q \in H_{\Gamma}^{k, \chi_0}$ anula-se em α (e consequentemente, em todos os pontos da sua órbita) e assim, f é divisível por

$f_1^p + \lambda f_2^q$. Usando a indução sobre a ordem de f , f é produto de escalar complexo, f_1, f_2, f_3 e combinação C-linear de f_1^p e f_2^q . ■

Colorário 3.10 [MILNOR2]: *Multiplicando por constantes convenientes os f_i 's, temos que $f_1^p + f_2^q + f_3^r = 0$ e f_1, f_2 e f_3 geram o H_Γ^{**} .*

Demonstração: O fato de f_1, f_2 e f_3 gerar o H_Γ^{**} é óbvio. Agora, f_3^r é divisível por $f_1^p + \lambda f_2^q$, para $\lambda \in \mathbb{C}$ convenientemente escolhido. Como o grau de f_3^r é k , existe $\lambda' \in \mathbb{C}$ tal que $f_3^r = \lambda'(f_1^p + \lambda f_2^q)$.

Assim, $\lambda' f_1^p + \lambda' \lambda f_2^q - f_3^r = 0$, isto é, $f_1^p + f_2^q + f_3^r = 0$ a menos de multiplicação conveniente de constante em f_1, f_2 e f_3 . ■

Proposição 3.11 [MILNOR2]: *O espaço $H_\Gamma^{n,1}$ dos polinômios Π -invariantes de grau n é soma direta de seus sub-espacos $H_\Gamma^{n,\chi}$, onde χ varia entre os caracteres de Γ .*

Demonstração: Pela observação 3.3, temos $H_\Gamma^{n,\chi} \subset H_\Pi^{n,1}$.

Para mostrar que $H_\Pi^{n,1}$ se escreve como soma direta de $H_\Gamma^{n,\chi}$, tomemos um $f \in H_\Pi^{n,1}$ arbitrário e defina o novo polinômio $f\gamma$ como sendo $(f\gamma)(z) = f(\gamma(z))$. Neste caso, $f\gamma$ é Π -invariante. De fato, como Π é normal em Γ , temos que $(f\gamma)\pi = (f(\gamma\pi\gamma^{-1}))\gamma = f\gamma$. É óbvio que $f\gamma = f\gamma' \Leftrightarrow \gamma = \gamma' \bmod \Pi$. Logo Γ/Π opera homeomorficamente e C-linearmente sobre $H_\Pi^{n,1}$. Como Γ/Π é abeliano e finito, $H_\Pi^{n,1}$ decompõe como soma direta de seus auto-espacos $H_\Gamma^{n,\chi}$ correspondentes a vários caracteres de Γ/Π . ■

Agora vamos mostrar que, para o caso esférico, $SU(2)/\Pi(p,q,r)$ é difeomorfo a $M(p,q,r)$.

Lema 3.12: *Seja $f: M^k \rightarrow N^k$, uma função contínua e injetiva onde M e N são variedades topológicas compactas e conexas de mesma dimensão. Então f é homeomorfismo.*

Demonstração: Como f é contínua, $f(M)$ é compacto e também, temos que f é uma aplicação fechado de M em $f(M)$, pois leva compacto no compacto. Consequentemente, f é homeomorfismo entre M e $f(M)$ e portanto, $f(M)$ é uma variedade sem bordo de dimensão k . Logo, para todo ponto de $f(M)$, existe uma vizinhança homeomorfo ao aberto de $\mathbb{R}^k$. Como dimensão de N é k , tal vizinhança é aberto em N e

consequentemente, $f(M)$ é aberto em N . Mas $f(M)$ é fechado em N , pois é um subconjunto compacto, o que implica que $f(M)=N$. ■

Teorema 3.13 [MILNOR2]: Para $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1 > 0$,
 $SU(2) / \Pi(p, q, r) \cong S^3 / \Pi(p, q, r) \cong M(p, q, r)$.

Demonstração: Considere a aplicação

$$(f_1, f_2, f_3): S_\varepsilon^3 \rightarrow V(p, q, r) = \{(v_1, v_2, v_3): v_1^p + v_2^q + v_3^r = 0\}$$

$$z \mapsto [f_1(z), f_2(z), f_3(z)]$$

Como f_1, f_2 e f_3 pertencem a $H_\Gamma^{k/p, \chi_1}, H_\Gamma^{k/q, \chi_2}$ e $H_\Gamma^{k/r, \chi_3}$ respectivamente, eles são Π -invariantes e consequentemente, a aplicação acima também é Π -invariante. Logo (f_1, f_2, f_3) aplica S_ε^3 / Π em $V(p, q, r)$ diferenciavelmente.

Afirmção 3.13.1: (f_1, f_2, f_3) é injetor em S_ε^3 / Π .

Solução: Sejam z' e z'' tal que $\Pi z' \neq \Pi z''$. Assim, $z' \neq \pi z''$ para todo $\pi \in \Pi$. Seja g , um polinômio que se anula em z' , mas não se anula em z'' e definimos $f(z) = g(\pi_1(z))g(\pi_2(z))\dots g(\pi_k(z))$, onde $\Pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k\}$. Então f é Π -invariante. Escrevendo f como soma de polinômios homogêneos Π -invariantes e aplicando a proposição 3.11, f se escreve como soma de polinômios homogêneos de $H_\Gamma^{n, \chi}$ e algum desses termos h satisfaz $h(z') \neq h(z'')$. Pela proposição 3.9, h é gerado pelos polinômios f_1, f_2 e f_3 . Logo $f_i(z') \neq f_i(z'')$ para algum $i=1,2,3$. Como z' e z'' são arbitrários, temos que (f_1, f_2, f_3) é injetor em S_ε^3 / Π .

Afirmção 3.13.2: Para ε suficientemente pequeno, S_ε^3 / Π é homeomorfo a $M_\varepsilon(p, q, r)$, onde $M_\varepsilon(p, q, r) = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ e $f(z_1, z_2, z_3) = z_1^p + z_2^q + z_3^r$.

Solução: Como (f_1, f_2, f_3) são homogêneos de grau k/p , k/q e k/r respectivamente, ele leva a semi-reta tz passando pela origem numa curva $(t^{k/p}f_1(z), t^{k/q}f_2(z), t^{k/r}f_3(z))$ que intercepta transversalmente e de forma única, a esfera S_ε^3 em $M_\varepsilon(p, q, r)$.

Passando ao quociente por Π , S_ε^3 / Π é mergulhado diferenciavelmente em $M_\varepsilon(p, q, r)$. Como veremos no próximo capítulo, M é uma variedade compacta e conexa. Logo, pelo Lema 3.12, a aplicação acima é homeomorfismo.

Agora, temos também que uma aplicação holomorfa bijetiva entre duas variedades complexas é necessariamente um difeomorfismo (Veja o teorema 8.5 da pag. 27 de [KAUP]). Logo a aplicação acima é um difeomorfismo. ■

Colorário 3.14 [MILNOR2]: $D_\varepsilon / \Pi(p, q, r)$ é homeomorfo a $D_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ onde $f(z_1, z_2, z_3) = z_1^p + z_2^q + z_3^r$.

Demonstração: Na prova do teorema acima, podemos variar o valor de ε e essa variação fornece um difeomorfismo entre $C^2 - \{0\} / \Pi$ e $V(p, q, r) - \{0\}$, que pode ser estendido a um homeomorfismo de C^2 / Π em $V(p, q, r)$, pois a imagem tende uniformemente a origem quando o ponto do domínio tende a zero. ■

Observação 3.3: Milnor afirma que se Π for um sub-grupo discreto de $SU(2)$, então $SU(2) / \Pi$ é homeomorfo a $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$ para algum polinômio quase-homogêneo f e relata todos os casos de $SU(2) / \Pi$ onde Π é comutador do grupo binário (o caso que tratamos) ou simplesmente o grupo binário do sub-grupo discreto de $SO(3)$ (Veja o exemplo 9.8 da pag. 79 de [MILNOR1]). Isto inclui mais dois sub-grupos de $SU(2)$ a saber, diedral binário e octaedral binário. O polinômio associado ao diedral binário é $f(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + z_2^2 z_3 + z_3^{k+1}$ e o polinômio associado ao octaedral binário é $f(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + z_2^3 + z_2 z_3^3$.

IV Fibração de Milnor, topologia da fibra e de K

Neste capítulo, veremos que, dado uma função polinômial $f: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}$ e considerando-se $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$, podemos definir $\phi = f/|f|: S_\varepsilon - K \rightarrow S^1$ que constitui a projeção de uma fibração denominada de Fibração de Milnor. A fibra típica $F_\theta = \phi^{-1}(e^{i\theta})$ é um objeto muito interessante de ser estudado e, é fundamental no entendimento de K . O objetivo é encontrar um invariante associado a esta fibra o qual decidirá se K é ou não uma esfera topológica.

Para facilitar, colocamos $n = m - 1$ que será a metade da dimensão euclideana de $f^{-1}(0)$. De agora em diante, aparecerão resultados envolvendo tanto m como n e por isso, precisamos ficar atentos.

Seja $f: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}$ uma função analítica. Definimos o vetor gradiente de f como sendo $\text{grad } f = (\partial \bar{f} / \partial z_1, \partial \bar{f} / \partial z_2, \dots, \partial \bar{f} / \partial z_m)$. Este vetor tem a propriedade de que dada uma curva $p: I \rightarrow \mathbb{C}^m$, temos $d(f \circ p) / dt = \langle dp / dt, \text{grad } f \rangle$, onde o produto interno complexo é definido como sendo $\langle z, w \rangle = \sum z_i \overline{w_i}$. Seja $K = S_\varepsilon \cap f^{-1}(0)$, definimos $\phi: S_\varepsilon - K \rightarrow S^1$ por $\phi(z) = f(z)/|f(z)| = e^{i\theta(z)}$, onde $\theta = \text{Re}(-i \log f)$ é o argumento de $f(z)$. Dada uma curva $z = p(t)$, a derivada de θ ao longo desta é dado por $d(\theta \circ p) / dt = \text{Re} \langle dp / dt, i \text{grad}(\log f) \rangle$ e através desta propriedade, podemos provar que:

Lema 4.1 (Lema 4.1 da pag. 33 de [MILNOR1]): *Os pontos críticos de ϕ são exatamente os pontos onde $i \text{grad}(\log f)$ é múltiplo real de z .*

Lema 4.2 (Lema 4.3 da pag. 35 de [MILNOR1]): *Para ε suficientemente pequeno, ou z e $\text{grad}(\log f(z))$ são linearmente independente sobre $\mathbb{C}$ ou $\text{grad}(\log f(z)) = \lambda z$, para algum $\lambda \in \mathbb{C}$ satisfazendo $|\arg \lambda| < \pi / 4$.*

Corolário 4.3 [MILNOR1]: *Para ε suficientemente pequeno, z e $i \text{grad}(\log f(z))$ são linearmente independente sobre $\mathbb{R}$ e consequentemente, $F_\theta = \phi^{-1}(\theta)$ é uma sub-variedade de S_ε de dimensão $2m - 2$.*

Demonstrao: Pelo Lema 4.2, z e $\text{igrad}(\log f(z))$ so linearmente independente sobre $\mathbb{R}$ para ε suficientemente pequeno e pelo Lema 4.1, ϕ no possui singularidade. Logo, segue imediatamente pelo Teorema de Whitney que $F_\theta = \phi^{-1}(\theta)$ e uma subvariedade diferenciavel de S_ε de dimenso $2m - 2$. ■

Lema 4.4 [MILNOR1]: Para ε suficientemente pequeno, existe um campo v de vetores diferenciaveis tangentes a $S_\varepsilon - K$ tal que $\langle v(z), \text{igrad}(\log f(z)) \rangle \neq 0$ e $|\arg \langle v(z), \text{igrad}(\log f(z)) \rangle| < \pi/4$.

Demonstrao: Vamos construir localmente o campo e junt-lo atravs da partio da unidade.

Caso 4.4.1: Se z^α e $\text{igrad}(\log f(z^\alpha))$ so linearmente independente sobre $\mathbb{C}$, ento o sistema

$$\begin{cases} \langle v, z^\alpha \rangle = 0 \\ \langle v, \text{igrad}(\log f(z^\alpha)) \rangle = 1 \end{cases}$$

tem pelo menos uma soluo (por exemplo, v pode ser um mltiplo linear do ortogonalizado de $\text{igrad}(\log f(z^\alpha))$ relativamente a z^α) numa vizinhana U^α de z^α . A primeira equao do sistema garante que $v(z^\alpha)$ e tangente a S_ε em z^α (Note que $\text{Re} \langle z, w \rangle$ e o produto interno euclideo entre z e w e conseqentemente, $\text{Re} \langle z, w \rangle = 0$ implica que z e w so ortogonais).

Caso 4.4.2: Se $\text{grad}(\log f(z^\alpha)) = \lambda z^\alpha$ com $|\arg \lambda| < \pi/4$, tome $v(z^\alpha) = iz^\alpha$. Ento temos $\text{Re} \langle v(z^\alpha), z^\alpha \rangle = \text{Re} \langle iz^\alpha, z^\alpha \rangle = 0$ e

$$\langle v(z^\alpha), \text{igrad}(\log f(z^\alpha)) \rangle = \langle iz^\alpha, \text{igrad}(\log f(z^\alpha)) \rangle = \langle iz^\alpha, i\lambda z^\alpha \rangle = \bar{\lambda} \lambda \|z^\alpha\|^2$$

Logo, v e tangente a esfera S_ε e satisfaz a propriedade requerida numa vizinhana suficientemente pequena U^α de z^α .

Juntando estes campos locais usando a partio da unidade, obteremos o campo v requisitado. ■

Corolrio 4.5: Para ε suficientemente pequeno, existe pelo menos um campo de vetores w tangentes a S_ε tais que $\text{Re} \langle w(z), \text{igrad}(\log f(z)) \rangle = 1$ e $|\text{Im} \langle w(z), \text{igrad}(\log f(z)) \rangle| = |\text{Re} \langle w(z), \text{grad}(\log f(z)) \rangle| < 1$.

Demonstrao: Basta tomar $w(z) = \frac{v(z)}{\operatorname{Re} \langle v(z), \operatorname{igrad}(\log f(z)) \rangle}$. ■

Lema 4.6 [MILNOR1]: Para ε suficientemente pequeno e para qualquer $z_0 \in S_\varepsilon - K$ existe pelo menos um caminho suave $p: \mathbb{R} \rightarrow S_\varepsilon - K$ satisfazendo: $dp(t)/dt = w(p(t))$ e $p(0) = z_0$.

Demonstrao: Considere $p(t)$ como sendo a curva soluo da equao diferencial

$$\begin{cases} dp(t)/dt = w(p(t)) \\ p(0) = z_0 \end{cases}$$

Agora, basta mostrar que p pode ser estendida para todo $\mathbb{R}$, ou equivalentemente, $p(t)$ no tende a K para t finito. Suponha por absurdo que exista t_0 tal que $p(t) \rightarrow k_0 \in K$, quando $t \rightarrow t_0$. Neste caso, temos que $f(p(t)) \rightarrow 0$ e consequentemente $\operatorname{Re}[\operatorname{Log} f(p(t))] = \ln|f(p(t))| \rightarrow -\infty$ quando $t \rightarrow t_0$, o que no pode ocorrer, uma vez que $d \operatorname{Re}[\operatorname{Log} f(p(t))] = \operatorname{Re} \langle w(p(t)), \operatorname{grad} \operatorname{Log} f(p(t)) \rangle$ limitado. ■

Teorema 4.7: (Teorema da Fibrção de Milnor) [MILNOR1]: Para ε suficientemente pequeno, $(S_\varepsilon - K, S^1, \phi)$ com $\phi(z) = f(z)/|f(z)|$ é uma fibrção diferenciável localmente trivial.

Demonstrao: Como $\phi(z) = e^{i\theta(z)}$, temos que

$$d\theta(p(t))/dt = \operatorname{Re} \langle dp(t)/dt, \operatorname{igrad}(\log f(p(t))) \rangle = 1$$

o que implica que $\theta(p(t)) = t + \text{constante}$. Desta forma, $p(t)$ projeta sobre S^1 via ϕ numa curva de velocidade constante igual a 1. Seja h , o fluxo de fase associado a equao diferencial $dz/dt = w(z)$, isto é, $h_t(z_0) = p_{z_0}(t)$ onde p_{z_0} é a curva soluo com condio inicial z_0 . Ento $\phi(h_t(z)) = \phi(p_z(t)) = e^{i\theta(p_z(t))} = e^{i(\theta(z)+t)}$ e consequentemente, h_t leva $F_\theta = \phi^{-1}(e^{i\theta})$ difeomorficamente em $F_{\theta+t} = \phi^{-1}(e^{i(\theta+t)})$.

Seja $e^{i\theta} \in S^1$ e U , uma vizinhança de $e^{i\theta}$. A correspondncia $(e^{i(\theta+t)}, z) \mapsto h_t(z)$ para $t: e^{i(\theta+t)} \in U$ e $z \in F_\theta$ leva $U \times F_\theta$ difeomorficamente a $\phi^{-1}(U)$. ■

fig. 4.1

A nossa preocupação agora é relacionar a fibra F_θ com a superfície de nível num nível bem próximo do valor crítico 0.

Lema 4.8 [MILNOR1]: *Existe um campo não singular v sobre $D_\varepsilon - V$ onde $V = f^{-1}(0)$ tal que*

$$\begin{cases} \langle v(z), \text{grad}(\log f(z)) \rangle \in \mathbb{R}_+^*, \forall z \in D_\varepsilon - V \\ \text{Re} \langle v(z), z \rangle > 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

Demonstração: A construção deste campo é inteiramente análoga ao caso do Lema 4.4. ■

Teorema 4.9 [MILNOR1]: *Para c suficientemente próximo de zero, $D_\varepsilon \cap f^{-1}(c)$ é difeomorfo a porção da fibra F_θ determinada pela desigualdade $|f(z)| > |c|$.*

Demonstração: Considere a curva integral $p(t)$ da equação diferencial $dp(t)/dt = v(p(t))$ com a condição inicial $p(0) = z$ em $D_\varepsilon - V$. A primeira condição de (4.1) implica que $\arg f(p(t)) = \theta = \text{constante}$ e $|f(z)|$ é estritamente crescente, e a segunda condição de (4.1) implica que $|p(t)|$ é estritamente crescente. Logo $p(t)$ percorre o $\Phi^{-1}(e^{i\theta})$ onde $\Phi: D_\varepsilon - V \rightarrow S^1$ é definido como $\Phi(z) = f(z)/|f(z)|$, de forma que $|f(p(t))|$ é estritamente crescente. O fluxo determinado desta forma, percorre $D_\varepsilon - V$ do centro para fora, de forma que a cada $\varepsilon e^{i\theta} \in D_\varepsilon \cap f^{-1}(c)$ associa um único $z' \in F_\theta = \Phi^{-1}(e^{i\theta})$. Este é o difeomorfismo entre F_θ e $D_\varepsilon \cap f^{-1}(c)$. ■

fig. 4.1 [MILNOR1]

Teorema 4.10: Para $c \neq 0$ suficientemente pequeno, $D_\varepsilon \cap f^{-1}(c)$ é difeomorfo a fibra F_0 .

Demonstração: Veja o Teorema 5.11 da pag. 53 de [MILNOR1]. ■

Partir de agora, assumiremos que 0 é uma singularidade isolada, a não ser que especifique o contrário.

Lema 4.11 [MILNOR1]: Para ε suficientemente pequeno, $\overline{F_0} \subset S_\varepsilon$ é uma variedade diferenciável com bordo de dimensão $2m-2$, cujo interior é F_0 e cujo bordo é K .

Demonstração: Para ε suficientemente pequeno, f não possui singularidade sobre S_ε e logo K é uma sub-variedade de S_ε .

Mostraremos a afirmação para o caso de F_0 , pois para outras fibras, a demonstração é análoga. Como f não possui pontos singulares sobre S_ε , f pode ser escrita na forma $f(z) = u_1(z) + iu_2(z)$, onde F_0 corresponde aos pontos z tais que $u_1 > 0$ e $u_2 = 0$. Assim, $U \cap F_0$ corresponde aos pontos z tais que $u_1 \geq 0$ e $u_2 = 0$. Consequentemente, $F_0 \cap U$ é o interior de $\overline{F_0}$ e $K \cap U = \{z: u_1 = u_2 = 0\}$ é bordo de $\overline{F_0}$ em U . Como a vizinhança é arbitrária, segue-se que F_0 e K são interior e bordo de $\overline{F_0}$ respectivamente. ■

Corolário 4.12 [MILNOR1]: $\overline{F_0}$ está mergulhada em S_ε de forma que sua homologia tem o mesmo tipo da homologia de seu complementar $S_\varepsilon - \overline{F_0}$

Demonstração: $S_\varepsilon - \overline{F_0}$ é um fibrado localmente trivial sobre uma variedade contrátil $S^1 - e^{i0}$ e daí segue que é retrátil à fibra F_0 . Como $\overline{F_0}$ é retrátil a F_0 , concluímos a demonstração. ■.

Usando este fato, podemos obter mais 3 resultados importantes [MILNOR 1]:

Lema 4.13: *Toda fibra F_0 é $(n-1)$ -conexa.*

Demonstração: Veja o Lema 6.4 da pag. 57 de [MILNOR1]. ■

Teorema 4.14: *Toda fibra possui a homologia de $S^n \vee S^n \dots \vee S^n$ (bouquet de esferas de dimensão n).*

Demonstração: Veja o Teorema 6.5 da pag. 57 de [MILNOR1]. ■

Teorema 4.15: *Para $n \neq 2$, $\overline{F_0}$ é difeomorfo ao disco D^{2n} com alças onde o número de alças é igual ao número de pontos com índice de ordem n.*

Demonstração: Veja o Teorema 6.6 da pag. 58 de [MILNOR1]. ■

Mesmo que 0 não seja uma singularidade isolada, ainda podemos obter resultados similares, aplicando a teoria de Morse sobre a função $a(z) = a_0(z) = \log|f(z)|$ definida sobre $S_\varepsilon - K$ em R [MILNOR 1]. A seguir, enunciaremos 3 resultados importantes no caso geral, sem demonstração.

Teorema 4.16: *Cada fibra F_0 é paralelizável e possui a homologia de um CW-complexo de dimensão n.*

Demonstração: Veja o Teorema 5.1 da pag. 45 de [MILNOR1]. ■

Teorema 4.17: *K é $(n-2)$ -conexo.*

Demonstração: Veja o Teorema 5.2 da pag. 45 de [MILNOR1]. ■

Teorema 4.18 (Observação da pag. 51 de [MILNOR1]): $S_e - K$ possui a homologia de um CW-complexo de dimensão $n+1$.

Definição 4.1: O número de esferas que compõe o bouquet do Teorema 4.14 é denominado *número de Milnor* de f e denotado por μ .

A seguir, veremos mais duas maneiras de calcular o número de Milnor.

Definição 4.2: Se $g: C^m \rightarrow C^m$, uma aplicação polinomial onde 0 é um zero isolado de g . A *multiplicidade* de 0 é grau da aplicação $g(z)/|g(z)|: S_e \rightarrow S^{2m-1}$.

Sobre a definição de grau, veja a pag. 27 de [MILNOR4].

Definição 4.3: Seja $f: C^m \rightarrow C$ uma função polinomial tal que 0 é singularidade isolada. A *multiplicidade gradiente* denotada por μ_g é a multiplicidade do 0 da derivada $f'(z) = (\partial f(z)/\partial z_1, \partial f(z)/\partial z_2, \dots, \partial f(z)/\partial z_m)$ de f .

Se 0 for ponto regular ou ponto singular isolado então $\mu_g = 1$ (Proposição IV.2 da pag. 71 de [CARNEIRO&SOARES]). além disso, se 0 for ponto singular isolado, podemos obter μ_g pontos singulares não degenerados na vizinhança de 0 através de uma pequena perturbação linear $f(z_1, \dots, z_m) + \sum_{j=1}^m a_j z_j$ de f (comentário da pag. 73 de [CARNEIRO&SOARES]).

Teorema 4.19: $\mu = \mu_g$.

Demonstração: Veja o Teorema 7.2 da pag. 60 de [MILNOR1]. ■

Observação 4.1: Dada uma função holomorfa $f: C^m \rightarrow C$, existe um invariante denominado de *multiplicidade algébrica* denotada por μ_a que pode ser calculado por

$\mu_a = \dim_C \frac{C[[z_1, z_2, \dots, z_m]]}{\langle Jf \rangle}$, onde $\langle Jf \rangle$ é o ideal gerado pelas derivadas parciais de f no anel das séries formais $C[[z_1, z_2, \dots, z_m]]$ (Veja a pag. 78 de [CARNEIRO&SOARES]).

Temos que 0 é singularidade isolado se, e somente se $\mu_a < \infty$. Temos ainda que existem vizinhanças U e V de 0 em C^m tal que $f': U \rightarrow V$ é um recobrimento ramificado de μ_a folhas (Teorema IV.3 da pag. 88 de [CARNEIRO&SOARES]). No caso do

exemplo da introdução, $f(x, y, z) = z^2 - yx^2$, 0 não é singularidade isolada, pois μ_a não é finito.

Teorema 4.20 (Palamodov): $\mu_a = \mu_g$.

Demonstração: Veja o Teorema IV.2 (Palamodov) da pag. 84 de [CARNEIRO&SOARES].■

Observação 4.2: No cálculo do número de Milnor, a multiplicidade algébrica é mais usada entre outros.

Agora estamos prontos para discutir sobre o invariante associado a fibra que será bastante utilizado nos capítulos V e VI abaixo, que é o polinômio característico da monodromia $h_*: H_n(F_0) \rightarrow H_n(F_0)$.

Lema 4.21: Para $n \neq 2$, K é uma esfera topológica S^{2n-1} (isto é, homeomorfo a esfera) se, e somente se for esfera homológica (isto é, possui a homologia de uma esfera).

Demonstração: Veja o Lema 8.1 da pag. 65 de [MILNOR1].■

Lema 4.22 [MILNOR1]: K é uma esfera homológica se, e somente se $H_{n-1}(K) = 0$.

Demonstração: Pela dualidade de Poincaré, $H^q(K) \cong H_{2n-1-q}(K)$ e pela dualidade de Alexander, $H^q(K) = H_{2n-q+1}(S_\varepsilon, S_\varepsilon - K)$ e consequentemente, $H_i(K) = H_{i+2}(S_\varepsilon, S_\varepsilon - K)$. Agora tome a sequência exata de pares $(S_\varepsilon, S_\varepsilon - K)$ cuja sequência exata de homologia associada é $\dots \rightarrow H_i(S_\varepsilon - K) \rightarrow H_i(S_\varepsilon) \rightarrow H_i(S_\varepsilon, S_\varepsilon - K) \rightarrow H_{i+1}(S_\varepsilon - K) \rightarrow \dots$. Como sabemos que $S_\varepsilon - K$ possui o tipo de homotopia de um CW-complexo de dimensão $n+1$ (teorema 4.18) e consequentemente, $H_i(S_\varepsilon - K) = 0$ para $i > n+1$, $H_i(S_\varepsilon) = H_i(S_\varepsilon, S_\varepsilon - K) = H_{i-2}(K)$ para mesmo i , isto é: $H_i(K) = H_i(S_\varepsilon)$ para $i \geq n$.

Por outro lado, como K é $(n-2)$ -conexo, $H_0(K) = \mathbb{Z}$ e pelo teorema de isomorfismo de Hurewicz [SPANIER], $H_i(K) = 0$ para $i = 2, 3, \dots, n-2$. Consequentemente, K tem o tipo da homotopia de uma esfera se, e somente se $H_{n-1}(K) = 0$.■

No teorema 4.9 usamos um fluxo h para mostrar que as fibras F_θ 's são difeomorfos. No caso em que $\theta = 2\pi$, isto é, o argumento de $f(z)$ dá uma volta completa, $h = h_{2\pi}$ é um difeomorfismo denominado de *difeomorfismo característico* da fibra típica F_0 . Este h é um dos representantes do levantamento de caminhos de S^1 na fibra típica e $h_*: H_n(F_0) \rightarrow H_n(F_0)$ é denominado de *monodromia* da fibra F_0 .

Lema 4.23 (Wang): *Seja $\phi: E \rightarrow S^1$, uma fibrção e o automorfismo $h_*: H_*(F_0) \rightarrow H_*(F_0)$ é uma ação de $\pi_1(S^1)$ sobre a homologia da fibra F_0 . Então existe uma sequência exata de homologia da forma*

$$\dots \rightarrow H_{j+1}(E) \rightarrow H_j(F_0) \xrightarrow{h_* - I_*} H_j(F_0) \rightarrow H_j(E) \rightarrow \dots$$

onde $I = \text{Id}_{F_0}$.

Demonstração: Veja o Lema 8.4 da pag. 67 de [MILNOR1]. ■

Definição 4.4: $\Delta(t) = \det(tI_* - h_*)$ é denominado de *polinômio característico* de monodromia ou simplesmente de polinômio característico associado a fibra típica.

Observação 4.3: $\Delta(t)$ não é o polinômio de Alexander apesar de usarmos a mesma notação. Mas no caso em que $m=2$, ele está associado ao polinômio de Alexander da seguinte forma: sejam r e $\bar{\Delta}(t_1, t_2, \dots, t_r)$, o número de componentes de K e o polinômio de Alexander de K , respectivamente. Então, se $r=1$, $\bar{\Delta}$ é o próprio polinômio de Alexander e se $r>1$, $\pm t^i \Delta(t) = (t-1) \bar{\Delta}(t, t, \dots, t)$. Veja o [MILNOR 1].

Teorema 4.24 [MILNOR1]: *K é esfera homológica se, e somente se $\Delta(1) = \det(I_* - h_*) = \pm 1$.*

Demonstração: Se $n>1$, pelo teorema de Wang (teorema 4.23), temos a sequência

$$\dots \rightarrow H_{n-1}(S_\varepsilon - K) \rightarrow H_n(F_0) \xrightarrow{h_* - I_*} H_n(F_0) \rightarrow H_n(S_\varepsilon - K) \rightarrow \dots$$

Pela dualidade de Alexander, $H_{n-1}(S_\varepsilon - K) \cong H^{n-1}(K)$ e pela dualidade de Poincaré, $H^{n-1}(K) \cong H_{n-2}(K)$. Logo $H_{n-1}(S_\varepsilon - K) \cong H^{n-1}(K) \cong H_{n-2}(K) = 0$ e da mesma forma, $H_n(S_\varepsilon - K) \cong H^n(K) \cong H_{n-1}(K)$. Pelo teorema 4.23, K é uma esfera homológica se, e somente se $H_{n-1}(K) = 0$ que equivale a dizer que a sequência se reduz a $0 \rightarrow H_n(F_0) \xrightarrow{h_* - I_*} H_n(F_0) \rightarrow 0$, ou seja, $I_* - h_*$ é um isomorfismo, isto é, $\det(I_* - h_*)$ é

inversível. Como $H_n(F_0)$ é soma direta de $\mathbb{Z}$'s, o determinante é um inteiro (assim, é inversível se, e somente se for igual a ± 1). Portanto, K é uma esfera homológica se, e somente se $\Delta(1) = \pm 1$. ■

Colorário 4.25: *Para $m \neq 3$, K é uma esfera topológica, se e somente se $\Delta(1) = \pm 1$.*

Observação 4.4: Se $m=3$, $\Delta(1) = \pm 1$ não implica que K é esfera, mas $\Delta(1) \neq \pm 1$ garante que K não é esfera.

V Variedades de Brieskorn

Neste capítulo, estudaremos o caso em que $f: C^m \rightarrow C$ é um polinômio especial da forma $f(z_1, z_2, \dots, z_m) = z_1^{a_1} + z_2^{a_2} + \dots + z_m^{a_m}$, onde $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ é uma m -upla de inteiros maiores que 1. Este polinômio é denominado de Polinômio de Brieskorn e K é denominado de Variedade de Brieskorn. Neste caso especial, denotamos K por $\Sigma = \Sigma(a) = \Sigma(a_1, a_2, \dots, a_m)$ que não deve ser confundido com o grupo triangular estudado no capítulo III. Vamos mostrar que Σ é um recobrimento cíclico ramificado de a_m folhas de S^{2m-3} com conjunto de ramificação $\Sigma(a_1, a_2, \dots, a_{m-1})$. Em seguida, estudaremos o invariante $\Delta(t)$ discutido no capítulo IV.

Notação 5.1: Dado $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ uma m -upla de inteiros maiores que 1, denotamos por $(a, k) = (a_1, a_2, \dots, a_m, k)$ com $k > 1$, uma nova $(m+1)$ -upla. A variedade de Brieskorn associado a (a, k) é denotada por $\Sigma_k = \Sigma_k(a) = \Sigma(a, k) = \Sigma(a_1, a_2, \dots, a_m, k)$.

Teorema 5.1 [KAUFFMAN]: *Existe uma aplicação $\pi: \Sigma_k \rightarrow S^{2m-1}$ exibindo Σ_k como recobrimento cíclico ramificado de k -folhas de S^{2m-1} com conjunto de ramificação Σ .*

Demonstração: Considere $f(z) = z_1^{a_1} + z_2^{a_2} + \dots + z_m^{a_m}$ e $C^{m+1} = C^m \times C$, definimos $F(z, x) = f(z) + x^k$ com $z \in C^m$, $x \in C$ e $V(F) = F^{-1}(0) = \{(z, x): f(z) + x^k = 0\}$. Agora tome $p: V(F) \rightarrow C^m$ como sendo $p(z, x) = z$. Neste caso, $p^{-1}(z) = \{(x, z): x^k = -f(z)\}$ e para $z \neq 0$, temos que $\#p^{-1}(z) = k$. Desta forma, p é recobrimento cíclico de k -folhas de C^m com conjunto de ramificação $V(f) = f^{-1}(0)$. Vamos modificar p para obtermos π . Considere $\rho = p|_{\Sigma_k}: \Sigma_k \rightarrow \Omega = \rho(\Sigma_k) \subset S^{2m}$. Como $\rho(z, x) = z$, $\rho(\Sigma, 0) = \Sigma \subset \Omega$ e daí, Σ_k é recobrimento singular cíclico de k -folhas de Ω com conjunto de ramificação Σ . Agora falta mostrar que $\Omega \cong S^{2m}$.

Afirmamos que $0 \notin \Omega$. De fato, se $0 \in \Omega$ então $f(z, x) = 0$, o que implicaria que $z = 0$. Agora pela equação $f(z) + x^k = 0$, temos que $x = 0$. Assim $(0, 0) \in \Sigma$, o que é um absurdo.

Agora definimos uma operação de número real não negativo sobre C^m por $\rho * z = (\rho^{1/a_1} z_1, \rho^{1/a_2} z_2, \dots, \rho^{1/a_m} z_m)$, para $\rho \in \mathbb{R}^+$ e $z \in C^m$. Então $f(\rho * z) = \rho f(z)$.

Tomemos $E: \Omega \rightarrow S^{2m}$ como sendo $E(z) = \rho * z$, para $\rho > 0$ tais que $|\rho * z| = 1$. Tal ρ é único por $|\rho * z|$ ser uma função estritamente crescente.

Afirmção 5.1.2: $E: \Omega \rightarrow S^{2m}$ é um difeomorfismo.

Solução: Como E é diferenciável, basta mostrar que existe uma inversa diferenciável. Observemos que $z \in \Omega \Leftrightarrow \exists x: (z, x) \in \Sigma_k$. Neste caso, $f(z) + x^k = 0$ e $|z|^2 + |x|^2 = 1$, isto é, implica que $x = \sqrt[k]{-f(z)}$ e $|z|^2 + |x|^2 = 1$. Logo

$$z \in \Omega \Leftrightarrow |z|^2 + \sqrt[k]{|f(z)|^2} = 1 \quad (5.1)$$

Dado $z \in S^{2m}$, existe um único $t > 0$ tal que t^*z satisfaz (5.1). De fato, substituindo o t^*z em (5.1) temos

$$t^2|z| + (t^2)^{1/k} \sqrt[k]{|f(z)|^2} = 1 \quad (5.2)$$

Como $t^2|z| + (t^2)^{1/k} \sqrt[k]{|f(z)|^2}$ é estritamente crescente em t^2 , existe um único $t > 0$ que satisfaz a condição (5.2). Definimos $g: S^{2m} \rightarrow \Omega$ como sendo $g(z) = t^*z$, para o único $t > 0$ que satisfaz (5.1). Então g é diferenciável e $g = E^{-1}$.

A composta $E \circ P$ é a projeção π procurada. ■

Agora vamos construir um conjunto homeomorfo a Σ_k , a partir de colagem de esferas, que será um recobrimento cíclico de k -folhas com conjunto de ramificação Σ .

Note que $h: S^{2m} \rightarrow \Sigma_k$, definido por $h(z) = (E^{-1}(z), \sqrt[k]{-f(E^{-1}(z))})$ possui uma descontinuidade em $\{z: \arg(f(E^{-1}(z))) \leq 0\}$ ou seja, dada uma fibração de Milnor $\phi = f/|f|$, h é descontínua em F_π .

Deslocando a descontinuidade de $\sqrt[k]{}$ no eixo negativo, podemos assumir que h possui descontinuidade em F_0 . Agora cortamos S^{2m} ao longo da fibra $\overline{F_0}$ e colamos um atrás do outro formando uma espécie de superfície de Riemann S de modo que a correspondente de $\sqrt[k]{}$ seja analítica em S . Para isso, colamos o lado da esfera em que $\arg f < 0$ no lado da próxima esfera, em que $\arg f > 0$, sempre ao longo de $\overline{F_0}$. Neste caso, h é um difeomorfismo e S é homeomorfo a Σ_k .

fig. 5.1

Na figura 5.1 e 5.2 mostramos como a esfera será cortada e colada. "+" e "-" indicam, respectivamente, $\arg f(z)$ é maior que, ou menor que zero.

fig. 5.2

Observação 5.1: Como $\partial \overline{F_0} = \Sigma$, $\overline{F_0}$ é uma superfície de Seifert de Σ e a construção de Σ_k é análoga a construção do recobrimento cíclico do complementar do nó.

Exemplo 5.1: Seja $f(z_1, z_2) = z_1^p + z_2^q$ Então K é um nó toral do tipo (p, q) .

Solução: Tomamos a parametrização $z_1 = e^{ti/p}$, $z_2 = e^{ti/q}$, o que implica obviamente a afirmação.

Agora vamos construir Σ_k para entender como funciona a construção por colagem de esferas.

Temos que $f(z) = z^p$ e $F(z, x) = f(z) + x^q$. Como $f(z)=0$ se, e somente se $z=0$,

K é um nó vazio e para todo $z \in S^1$, $\phi(z) = \frac{z^p}{|z|^p} = z^p$ o que implica que a fibra F_0 são as raízes p -ésimas da unidade. Então cortamos S^1 nas raízes p -ésima da unidade e colocamos q cópias delas e em seguida, colamos os pedaços, um atrás do outro (fig. 5.3). As figuras 5.3 e 5.4 são feitas para $p=2$ e $q=3$. Para podermos fazer as colagem em ciclos com facilidade, basta colocar as esferas S^m cortadas, ao longo de $S^m \times S^1$. Para o nosso caso, temos a figura 5.4 que é um nó do tipo (p,q) .

fig. 5.3

fig. 5.4

Agora que já sabemos a configuração topológica da variedade de Brieskorn, vamos tentar relacionar os expoentes do polinômio de Brieskorn com o polinômio característico da monodromia.

Proposição 5.2: *O difeomorfismo característico da variedade de Brieskorn é dado por $h(z) = (e^{2\pi i/a_1} z_1, e^{2\pi i/a_2} z_2, \dots, e^{2\pi i/a_m} z_m)$.*

Demonstração: Basta notar que o difeomorfismo a um parâmetro definido por $h_t(z) = (e^{ti/a_1} z_1, e^{ti/a_2} z_2, \dots, e^{ti/a_m} z_m)$, leva a fibra F_0 em F_t difeomorficamente. ■

Inicialmente, estendemos a fibração de Milnor ϕ a $\Psi = f/|f|: C^m - f^{-1}(0) \rightarrow S^1$.

Agora seja Ω_k , o grupo cíclico das k -ésimas raízes da unidade e definimos a junção $J = \Omega_{a_1} * \Omega_{a_2} * \dots * \Omega_{a_m}$ de $\Omega_{a_1}, \Omega_{a_2}, \dots, \Omega_{a_m}$. Os elementos de J são da forma $(t_1 w_1, t_2 w_2, \dots, t_m w_m): t_i \geq 0, \sum t_i = 1, w_i \in \Omega_{a_i}$. Note que $J \subset F_0 = \Psi^{-1}(1)$. De fato, $f(t_1 z_1, t_2 z_2, \dots, t_m z_m) = t_1^{a_1} z_1 + t_2^{a_2} z_2 + \dots + t_m^{a_m} z_m = \sum t_i = 1$, para todo elemento de J . Logo $J \subset \Psi^{-1}(1)$.

Lema 5.3 (Phan) [MILNOR1]: *Esta junção é retrato de deformação da fibra $F_0 = \Psi^{-1}(1)$.*

Demonstração: Seja $z \in F_0$. Para cada coordenada z_j , tomemos uma reta $r_j = \overline{z_j^{a_j}, \text{Re}(z_j^{a_j})}$ e definimos uma curva α em C^m de forma que $\alpha_j(t)^{a_j} = r_j(t)$ para toda coordenada α_i de α . Então a curva α está contida em F_0 e tem como ponto inicial z e ponto final z' , onde $\text{Im}(z'^{a_j}) = 0$ para toda coordenada de z' . A deformação ao longo de α é um retrato tal que os pontos de J continuam fixos.

Agora, para cada coordenada z'_j tais que $(z'_j)^{a_j} < 0$, definimos uma reta $s_j = \overline{(z'_j)^{a_j}, 0}$ e tomemos uma curva β tal que $\beta_j(t)^{a_j} = s_j(t)$. A deformação ao longo de β também é um retração de F_0 tal que os pontos de J ficam fixos. O ponto final de β é o ponto z'' tais que $f(z'') \geq f(z') > 0$ e $(z'')^{a_j} \geq 0$. Então para cada j , existe $t_j > 0$ tal que $z_j = t_j w_j$ para algum a_j -ésima raiz da unidade w_j . Seja $w = z'' / \sum t_j$ e movendo sobre a reta ligando z'' e w , teremos um retrato que mantém os pontos de J fixos. A combinação de todas estas etapas é o retrato procurado. ■

Proposição 5.4 [MILNOR3]: *Sejam A e B , espaços tais que sua homologia seja livre de torção. Então $\tilde{H}_k(A * B) = \sum_{i+j=k-1} \tilde{H}_i(A) \otimes \tilde{H}_j(B)$, onde $\tilde{H}$ denota o grupo de homologia reduzida.*

Demonstração: Como $A * B$ é conexa por caminhos, a afirmação é trivialmente satisfeita para $k=0$. Para $k>0$, definimos $\bar{A} = \{((1-t)a, tb): 0 \leq t \leq 1/2\}$ e

$\bar{B} = \{((1-t)a, tb) : 1/2 \leq t \leq 1\}$. Então $\bar{A} \cap \bar{B} = \frac{1}{2}A \times B \cong A \times B$ (fig. 5.5). Como a sequência de tripla $(A * B, \bar{A}, \bar{B})$ é exata, temos a sequência de Mayer-Vietoris

$$\dots \rightarrow \tilde{H}_k(A * B) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(\bar{A} \cap \bar{B}) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(\bar{A}) \oplus \tilde{H}_{k-1}(\bar{B}) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(A * B) \rightarrow \dots$$

As inclusões de $\bar{A}$ e $\bar{B}$ em $A * B$ são homotópicas a constante. Para mostrar isto, basta tomar $F_t(a) = (ta, (1-t)b_0)$ e $F_t(b) = (ta_0, (1-t)b)$ respectivamente.

Assim, $H_{k-1}(\bar{A}) \oplus H_{k-1}(\bar{B}) \rightarrow H_{k-1}(A * B)$ é trivial. Logo, temos uma sequência exata

$$0 \rightarrow \tilde{H}_k(A * B) \rightarrow \tilde{H}_{k-1}(\bar{A} \cap \bar{B}) \xrightarrow{i_* - j_*} \tilde{H}_{k-1}(\bar{A}) \oplus \tilde{H}_{k-1}(\bar{B}) \rightarrow 0$$

Como $H_*(A)$ não tem torção, temos $H_{k-1}(A \times B) \cong \bigoplus_{i=0}^{k-1} H_i(A) \otimes H_{k-1-i}(B)$

(fórmula de Künneth) onde o isomorfismo leva cada gerador $a \times b$ em $a - b$. Além disso, A e B são retratos por deformação de $\bar{A}$ e $\bar{B}$ respectivamente. Logo a sequência torna

$$0 \rightarrow \tilde{H}_k(A * B) \rightarrow \bigoplus_{i=0}^{k-1} H_i(A) \otimes H_{k-1-i}(B) \xrightarrow{\Psi} \tilde{H}_{k-1}(A) \oplus \tilde{H}_{k-1}(B) \rightarrow 0$$

onde $\Psi(a \otimes b) = a - b$ para cada gerador a e b .

Temos $\tilde{H}_n(A * B) = \text{Ker} \Psi$

(Para $k=1$)

Temos

$$0 \rightarrow \tilde{H}_1(A * B) \rightarrow H_0(A) \otimes H_0(B) \xrightarrow{\Psi} \tilde{H}_0(A) \oplus \tilde{H}_0(B) \rightarrow 0$$

Dados geradores a, a' de $H_0(A)$ e b, b' de $H_0(B)$,

$$\Psi[(a - a') \otimes (b - b')] = \Psi[a \otimes b - a \otimes b' - a' \otimes b + a' \otimes b'] = 0$$

Assim, $\text{Ker} \Psi = \tilde{H}_0(A) \otimes \tilde{H}_0(B)$ uma vez que $\tilde{H}_0(X)$ é gerado por $\{e - e' : e, e' \text{ são geradores de } \tilde{H}_0(X)\}$.

(Para $k > 1$)

Notemos que se $i \neq 0, k-1$ então $\Psi(a \otimes b) = a - b = 0$ pois a e b são células de dimensão menor que $k-1$. Assim,

$$H_i(A) \otimes H_{k-1-i}(B) \cap \text{Ker} \Psi = H_i(A) \otimes H_{k-1-i}(B) = \tilde{H}_i(A) \otimes \tilde{H}_{k-1-i}(B)$$

Se $i=0$, temos que $\Psi(a \otimes b) = -b$ para todo gerador a e b e logo,

$$\Psi[(a - a') \otimes b] = \Psi[a \otimes b - a' \otimes b] = 0$$

e consequentemente

$$H_0(A) \otimes H_{k-1}(B) \cap \text{Ker} \Psi = \tilde{H}_0(A) \otimes H_{k-1}(B) = \tilde{H}_0(A) \otimes \tilde{H}_{k-1}(B).$$

Analogamente, $H_{k-1}(A) \otimes H_0(B) \cap \text{Ker} \Psi = \tilde{H}_{k-1}(A) \otimes \tilde{H}_0(B).$

$$\text{Assim, Ker}\Psi = \bigoplus_{k=0}^{n-1} \tilde{H}_k(A) \otimes \tilde{H}_{n-1-k}(B) \blacksquare$$

fig. 5.5

Lema 5.5 [MILNOR1]: Para $n > 0$, temos:

$$H_n(J) = \tilde{H}_n(J) = \tilde{H}_0(\Omega_{a_1}) \otimes \tilde{H}_1(\Omega_{a_2}) \otimes \dots \otimes \tilde{H}_{m-1}(\Omega_{a_m}) \text{ e } \tilde{H}_i(J) = 0, \text{ para } i \neq n.$$

Demonstração: Como Ω_{a_k} é um conjunto discreto finito, este possui homologia somente em dimensão 0 e, é livre de torsão. Logo aplicando indutivamente a proposição acima, obtemos o resultado. ■

Teorema 5.6 [MILNOR1]: O polinômio característico da monodromia é dado por $\Delta(t) = \Pi(t - w_{i_1} w_{i_2} \dots w_{i_m})$, onde w_{i_k} percorre todas as i_k -ésimas raízes da unidade diferente de 1.

Demonstração: O difeomorfismo característico h em J é dado por $h = (r_{a_1}, r_{a_2}, \dots, r_{a_m})$ onde r_{a_k} é a rotação por ângulo de $2\pi/a_k$, isto é $h = r_{a_1} * r_{a_2} * \dots * r_{a_m}$.

Note que os auto-valores de $r_{a_k}^*: \tilde{H}_0(\Omega_{a_k}, C) \rightarrow \tilde{H}_0(\Omega_{a_k}, C)$ são raízes da unidade diferente de 1. De fato, para cada gerador $[w^v]$ de $\tilde{H}_0(\Omega_{a_k})$ onde $w = e^{2\pi i/a_k}$ é raiz a_k -ésima primitiva da unidade e $v \in \{1, 2, \dots, a_k - 1\}$ então $r_{a_k}(w^v) = e^{2\pi v i/a_k} w^v$, o que implica que $r_{a_k}^*[w^v] = e^{2\pi v i/a_k} [w^v]$.

Consequentemente, os auto-valores de h^* são produtos $w_{a_1} w_{a_2} \dots w_{a_m}$ onde w_{a_k} percorre as raízes a_k -ésimas da unidade diferente de 1 e portanto $\Delta(t) = \Pi(t - w_{a_1} w_{a_2} \dots w_{a_m})$. ■

VI Polinômios quase-homogêneos

Neste capítulo, veremos como calcular o invariante $\Delta(t)$ e $\Delta(1)$ para uma classe de polinômios mais geral que o polinômio de Brieskorn, denominado de polinômios quase-homogêneos.

Definição 6.1: Consideremos uma m -upla de números racionais positivos $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$. Um polinômio f é dito *quase-homogêneo* do tipo w se for combinação linear dos monômios da forma $z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_m^{i_m}$ tais que $i_1/w_1 + i_2/w_2 + \dots + i_m/w_m = 1$. Sempre assumiremos que $w_i = u_i/v_i$ é fração irredutível.

Proposição 6.1: f é um polinômio quase-homogêneo do tipo w se, e somente se $f(e^{c/w_1} z_1, e^{c/w_2} z_2, \dots, e^{c/w_m} z_m) = e^c f(z_1, z_2, \dots, z_m)$, para todo número complexo c .

Demonstração: ($\Rightarrow$) Como f é quase-homogêneo, f é combinação linear dos monômios do tipo $z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_m^{i_m}$ tal que $\sum i_k / w_k = 1$. Logo basta mostrar para este monômio e assim, assumimos que $f(z_1, z_2, \dots, z_m) = z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_m^{i_m}$ com $\sum i_k / w_k = 1$.

Temos

$$\begin{aligned} f(e^{c/w_1} z_1, e^{c/w_2} z_2, \dots, e^{c/w_m} z_m) &= e^{c \cdot i_1 / w_1} z_1^{i_1} e^{c \cdot i_2 / w_2} z_2^{i_2} \dots e^{c \cdot i_m / w_m} z_m^{i_m} \\ &= e^{c \sum i_k / w_k} z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_m^{i_m} = e^c z_1^{i_1} z_2^{i_2} \dots z_m^{i_m} = e^c f(z_1, z_2, \dots, z_m) \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Agora suponha que $f(e^{c/w_1} z_1, e^{c/w_2} z_2, \dots, e^{c/w_m} z_m) = e^c f(z_1, z_2, \dots, z_m)$.

Queremos mostrar que f é quase-homogêneo. Como $f(z_1, z_2, \dots, z_m) = \sum_k \alpha_k z_1^{i_1^k} z_2^{i_2^k} \dots z_m^{i_m^k}$, $f(e^{c/w_1} z_1, e^{c/w_2} z_2, \dots, e^{c/w_m} z_m) = e^c f(z_1, z_2, \dots, z_m)$, isto implica que

$$\sum_k \alpha_k e^c z_1^{i_1^k} z_2^{i_2^k} \dots z_m^{i_m^k} = \sum_k \alpha_k e^{c \sum_j i_j^k / a_j} z_1^{i_1^k} z_2^{i_2^k} \dots z_m^{i_m^k}, \text{ para todo } c \text{ e } z. \text{ Assim, temos que } e^c = e^{c \sum_j i_j^k / a_j}. \text{ Portanto, } 1 = \sum_j i_j^k / a_j. \blacksquare$$

Lema 6.2: Se $G: C^m \rightarrow C^m$ for uma aplicação polinomial tal que para cada i , a i -ésima coordenada é um polinômio homogêneo de grau d_i , e se $G^{-1}(0) = 0$ então o grau local de G em 0 é $d_1 d_2 \dots d_m$.

Demonstração [MILNOR&ORLIK]: A hipersuperfície $G_i^{-1}(0) \subset \mathbb{C}^m$ estende-se para uma hipersuperfície projetiva $H_i \subset \mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ de mesmo grau. A multiplicidade total da intersecção de $H_1, H_2, \dots, H_m$ é igual ao produto $d_1 d_2 \dots d_m$ dos graus. Mas a intersecção $H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_m$ é um único ponto $0 \in \mathbb{C}^m \subset \mathbb{P}^m(\mathbb{C})$. ■

Sobre a definição de grau, veja a pag. 27 de [MILNOR4].

Teorema 6.3 [MILNOR&ORLIK]: *Seja $f(z_1, z_2, \dots, z_m)$, o polinômio quase-homogêneo do tipo $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ onde 0 é uma singularidade isolada. Então o número de Milnor de f é dado por $\mu = (w_1 - 1)(w_2 - 1) \dots (w_m - 1)$.*

Demonstração: Cada w_i é escrito de forma única como fração irredutível u_i / v_i . Definimos $d = [u_1, u_2, \dots, u_m]$ o mínimo múltiplo comum e $q_i = d / w_i$. Então

$$(1/w_1, 1/w_2, \dots, 1/w_m) = \frac{1}{d} (q_1, q_2, \dots, q_m) \text{ onde } d \text{ é o menor inteiro que satisfaz esta}$$

condição. Definimos uma função $G: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$ como sendo $G(z) = (z_1^{q_1}, z_2^{q_2}, \dots, z_m^{q_m})$, então $f \circ G$ é polinômio homogêneo de grau d e consequentemente a i -ésima coordenada de $f' \circ G$ é um polinômio homogêneo de grau $d - q_i$. Assim, $\text{grau}(f' \circ G) = (d_1 - q_1)(d_2 - q_2) \dots (d_m - q_m)$. Como $\text{grau}(G) = q_1 \cdot q_2 \dots q_m$ e grau da composta é produto dos graus, $(d_1 - q_1)(d_2 - q_2) \dots (d_m - q_m) = \text{grau}(f')(q_1 q_2 \dots q_m)$, o

$$\text{que implica que } \text{grau}(f') = \frac{d_1 - q_1}{q_1} \frac{d_2 - q_2}{q_2} \dots \frac{d_m - q_m}{q_m} = (w_1 - 1)(w_2 - 1) \dots (w_m - 1). \blacksquare$$

Proposição 6.4: *Para todo $c \neq 0$, as hipersuperfícies de nível $f^{-1}(c)$ são difeomorfas.*

Demonstração: Basta mostrar que $f^{-1}(c)$ é difeomorfo a $f^{-1}(1)$. Seja z tal que

$f(z) = c$. Então $\frac{1}{c} f(z) = 1 \Rightarrow e^d f(z) = 1$, com $d = -\text{Log}(c) = -\ln|c| - i \arg(c)$. Como f é quase-homogêneo do tipo w , definimos um difeomorfismo $g(z_1, z_2, \dots, z_m) = (e^{d/a_1} z_1, e^{d/a_2} z_2, \dots, e^{d/a_m} z_m)$. Então $g(z) \in f^{-1}(1)$ e $g: f^{-1}(c) \rightarrow f^{-1}(1)$ é um difeomorfismo. ■

Corolário 6.5: $F' = f^{-1}(1)$ é difeomorfa a fibra F_0 .

Demonstração: Como a fibra F_0 é difeomorfa a $f^{-1}(c)$ para algum c , o resultado segue imediatamente. ■

Dado um polinômio quase-homogêneo do tipo w , definimos um difeomorfismo $h_t(z_1, z_2, \dots, z_m) = (e^{ti/a_1} z_1, e^{ti/a_2} z_2, \dots, e^{ti/a_m} z_m)$. Então $h_{2\pi}$ é o difeomorfismo característico da fibra F_0 .

Note que o difeomorfismo característico associado a F' é igual ao difeomorfismo característico da fibra F_0 . Agora considere $h^j(z_1, z_2, \dots, z_m) = (e^{2\pi ji/a_1} z_1, e^{2\pi ji/a_2} z_2, \dots, e^{2\pi ji/a_m} z_m)$, a composta de h , j vezes. Note que $h^j(z) = z \Leftrightarrow e^{2\pi ji/a_k} = 1$ ou $z_k = 0$ para cada k e consequentemente, a hipersuperfície correspondente ao ponto fixo de h^j é $L_j = \text{Fix}(h^j) = \{z: z_{i_1} = z_{i_2} = \dots = z_{i_k} = 0\}$. Como f não possui singularidade sobre F' , $F(j) = F' \cap L_j$ é uma hipersuperfície não singular.

Teorema 6.6 [MILNOR1]: $\Delta(t)^{(-1)^m} = \frac{t-1}{\prod_{j|p} (t^j-1)^{s_j/j}}$, onde p é o período de h e

s_j , verifica a igualdade $\chi_n = \sum_{j|n} s_j$, onde $\chi_n = \chi(F(n))$ é a característica de Euler da hipersuperfície $F(n)$.

Demonstração: Considere a função zeta de Weyl $\xi(t) = \exp \sum_{j=1}^{\infty} \chi_j \frac{t^j}{j}$ que pode

ser expressa como $\xi(t) = \prod_{j|p} (1-t^j)^{-s_j/j}$, onde p é o período de h e s_j é tal que $\chi_n = \sum_{j|n} s_j$

[MILNOR1]. Além disso, $\xi(t)$ pode ser escrita como sendo $\xi(t) = p_0(t)^{-1} p_1(t) p_2(t)^{-1} \dots p_{m-1}(t)^{\pm 1}$, onde $p_i(t)$ é o polinômio característico de $h_i: H_i(F') \rightarrow H_i(F')$. Como F' possui homologia não trivial somente em dimensão 0 e n , $\xi(t) = p_0(t)^{-1} p_n(t)^{\pm 1} = (1-t)\Delta(t)^{(-1)^{m-1}}$, pois $H_0(F') = \mathbb{Z}$. Logo

$$(1-t)\Delta(t)^{(-1)^{m-1}} = \prod_{j|p} (1-t^j)^{-s_j/j}. \blacksquare$$

Teorema 6.7 [MILNOR&ORLIK]: A característica de Euler da variedade $F(n)$ é dada por $1 - \chi_n = \prod \{1 - w_i : n \equiv 0 \pmod{u_i}\}$.

Demonstração: $F(n)$ é definida pela equação

$$\begin{cases} f(z_1, z_2, \dots, z_m) = 1 \\ e^{2\pi ni/w_1} z_1 = e^{2\pi n i u_1 / u_1} z_1 = z_1 \\ \vdots \\ e^{2\pi ni/w_m} z_m = e^{2\pi n i u_m / u_m} z_m = z_m \end{cases}$$

Reordenando as coordenadas se necessário, podemos supor que $n \equiv 0 \pmod{u_i}$ se $i \leq k$ e $n \not\equiv 0 \pmod{u_i}$, para $i > k$. Desta forma, a equação se reduz a $f(z_1, z_2, \dots, z_m) = 1$ e $z_{k+1} = z_{k+2} = \dots = z_m = 0$ ou equivalentemente $f(z_1, z_2, \dots, z_k, 0, \dots, 0) = 1$. Note que $f(z_1, z_2, \dots, z_k, 0, \dots, 0)$ é um polinômio quase-homogêneo do tipo $(w_1, w_2, \dots, w_k)$ e daí, a hipersuperfície de nível no nível 1 é difeomorfa a sua fibra típica com número de Milnor $\mu(F(n)) = (1 - w_1)(1 - w_2) \dots (1 - w_k)$ e sua característica de Euler é

$$\begin{aligned} \chi_n &= \chi(F(n)) = 1 + (-1)^{k-1} \mu(F(n)) = 1 + (-1)^{k-1} (w_1 - 1)(w_2 - 1) \dots (w_k - 1) \\ &= 1 - (1 - w_1)(1 - w_2) \dots (1 - w_k) = 1 - \prod_{i \leq k} (1 - w_i) \end{aligned}$$

e como tínhamos reordenado as coordenadas de forma que $i \leq k \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{u_i}$, obtemos $\chi_n = 1 - \prod \{1 - w_i : n \equiv 0 \pmod{u_i}\}$ onde $\prod \emptyset = 1$. ■

Já descobrimos a expressão de $\Delta(t)$ em termos de $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$. O nosso próximo passo é encontrar $\Delta(1)$ sem apelar para $\Delta(t)$.

Definição 6.1: Seja $f(t) = (t - \alpha_1)(t - \alpha_2) \dots (t - \alpha_n)$. Definimos $\text{divisor}(f) = \langle \alpha_1 \rangle + \langle \alpha_2 \rangle + \dots + \langle \alpha_n \rangle$ que é uma soma formal das raízes de f .

Quando considerarmos como elementos do anel de grupos ZC^* , introduziremos uma notação especial $\Lambda_n = \text{divisor}(t^n - 1) = \langle 1 \rangle + \langle \xi \rangle + \dots + \langle \xi^{n-1} \rangle$, onde $\xi = e^{2\pi i/n}$ é a raiz n -ésima primitiva da unidade. Definimos também um elemento idem

potente em QC^* como sendo $E_n = \frac{\Lambda_n}{n}$, onde o elemento $\Lambda_1 = E_1 = \langle 1 \rangle$ é denotado simplesmente por 1.

A regra de produto é dada por $\Lambda_a \Lambda_b = (a, b) \Lambda_{[a, b]}$ e $E_a E_b = E_{[a, b]}$, onde (a, b) e $[a, b]$ denotam o máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum entre a e b .

Lema 6.8 [MILNOR&ORLIK]: *Seja $\Delta = a_1 \Lambda_1 + a_2 \Lambda_2 + \dots + a_s \Lambda_s$. Definimos dois números $k = k(\Delta)$ e $\rho = \rho(\Delta)$ pela fórmula $k = \sum a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_s$ e $\rho = \prod i^{a_i} = 1.2^{a_2} . 3^{a_3} \dots s^{a_s}$. Então k e ρ são inteiros não negativos e $\Delta(1) = \rho$ se $k=0$ e $\Delta(1) = 0$ se $k>0$.*

Demonstração: divisor $\Delta = k\Lambda_1 + \sum_{r=2}^s a_r (\Lambda_r - \Lambda_1)$ e como $\Lambda_r - \Lambda_1 = \text{divisor}(t^r - 1) / (t - 1)$ onde $(t^r - 1) / (t - 1) = 1 + t + t^2 + \dots + t^{r-1}$, temos que $\Delta(t) = (t - 1)^k \prod_{r=2}^s (1 + t + t^2 + \dots + t^{r-1})^{a_r}$. Para $t=1$, temos o resultado desejado. ■

Observação 6.2: No caso de Δ do Teorema 6.6, temos que divisor $\Delta = (-1)^m [1 - \sum (s_j / j) \Lambda_j]$ e consequentemente, $a_1 = (-1)^m (1 - s_1)$ e $a_j = (-1)^{m+1} s_j / j$, para $j > 1$.

Para estabelecer uma regra que facilite o cálculo do divisor Δ , k e ρ para polinômio característico Δ , introduziremos um novo conceito.

Seja $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ uma m -upla de racionais positivos. Definimos $\chi_j(w)$ e $s_j(w)$ como no teorema 6.7 e teorema 6.6 respectivamente. Definimos também,

$\delta(w) = (-1)^m \left(1 - \sum_{j \geq 1} s_j(w) E_j \right)$ que será divisor Δ , caso w determina um polinômio quase-homogêneo em que 0 é singularidade isolada.

Teorema 6.9 [MILNOR&ORLIK]:

$$\delta(w_1, \dots, w_n) = \delta(w_1, \dots, w_m) \delta(w_{m+1}, \dots, w_n).$$

Demonstração: Sejam χ_j e s_j associados a $(w_1, \dots, w_m)$, χ'_j e s'_j associados a $(w_{m+1}, \dots, w_n)$ e χ''_j e s''_j associados a $(w_1, \dots, w_n)$. Então

$$1 - \chi_j'' = \prod_{i \leq m} \{1 - w_i' : n \equiv 0 \pmod{u_i'}\} = \prod_{i \leq m} \{1 - w_i : n \equiv 0 \pmod{u_i}\} \prod_{i > m} \{1 - w_i : n \equiv 0 \pmod{u_i}\}$$

$= (1 - \chi_j)(1 - \chi_j')$, o que implica que $\chi_j'' = \chi_j + \chi_j' - \chi_j \chi_j'$. Logo

$$\sum_{j|n} s_j'' = \chi_j'' = \sum_{j|n} s_j + \sum_{j|n} s_j' - \sum_{a|n} s_a \sum_{b|n} s_b' = \sum_{j|n} s_j + \sum_{j|n} s_j' - \sum_{a|n} \sum_{b|n} s_a s_b'$$

uma vez que $\sum x_i \sum y_j = \sum \sum x_i y_j$. Escrevendo o último termo da igualdade em

termos de $j=[a,b]$ e comparando as somatórias termo a termo, temos $s_j'' = s_j + s_j' - \sum_{[a,b]=j} s_a s_b'$.

Multiplicando por E_j e somando, obteremos

$$\begin{aligned} \sum s_j'' E_j &= \sum_{j|n} s_j E_j + \sum_{j|n} s_j' E_j - \sum_{[a,b]=j} s_a s_b' E_j = \sum_{j|n} s_j E_j + \sum_{j|n} s_j' E_j - \sum_{[a,b]=j} (s_a E_a)(s_b' E_b) \\ &= \sum_{j|n} s_j E_j + \sum_{j|n} s_j' E_j - \sum_{a|n} s_a E_a \sum_{b|n} s_b' E_b \end{aligned}$$

e consequentemente, $1 - \sum_{j|n} s_j'' E_j = \left(1 - \sum_{j|n} s_j E_j\right) \left(1 - \sum_{j|n} s_j' E_j\right)$ e portanto

$$\delta(w_1, \dots, w_n) = \delta(w_1, \dots, w_m) \delta(w_{m+1}, \dots, w_n). \blacksquare$$

Teorema 6.10 [MILNOR&ORLIK]:

$$\begin{aligned} \delta(w) &= (w_1 E_{u_1} - 1)(w_2 E_{u_2} - 1) \dots (w_m E_{u_m} - 1) \\ &= (v_1^{-1} \Lambda_{u_1} - 1)(v_2^{-1} \Lambda_{u_2} - 1) \dots (v_m^{-1} \Lambda_{u_m} - 1). \end{aligned}$$

Demonstração: Para $m=1$ temos $\chi_j(w_1) = w_1$, se $j \equiv 0 \pmod{u_1}$ e $\chi_j(w_1) = 0$, se $j \not\equiv 0 \pmod{u_1}$. $s_j(w_1) = w_1$, se $j = u_1$ e $s_j(w_1) = 0$, se $j \neq u_1$. Desta forma, $\delta(w_1) = -(1 - w_1 E_{u_1}) = w_1 E_{u_1} - 1$.

Aplicando a indução sobre m e usando o fato de que $\delta(w_1, \dots, w_n) = \delta(w_1, \dots, w_m) \delta(w_{m+1}, \dots, w_n)$, temos que $\delta(w) = (w_1 E_{u_1} - 1)(w_2 E_{u_2} - 1) \dots (w_m E_{u_m} - 1)$. $\blacksquare$

Corolário 6.11 [MILNOR&ORLIK]: Seja f , um polinômio quase-homogêneo do tipo w , tendo 0 como singularidade isolada. Então:

$$\text{divisor } \Delta = \delta(w) = \sum_s (-1)^{m-s} w_{i_1} w_{i_2} \dots w_{i_s} E_{[u_{i_1}, \dots, u_{i_s}]}$$

$$= \sum_s (-1)^{m-s} \frac{w_{i_1} w_{i_2} \dots w_{i_s}}{[u_{i_1}, u_{i_2} \dots u_{i_s}]} \Lambda_{[u_{i_1}, \dots, u_{i_s}]} \text{ onde } \{i_1, i_2, \dots, i_s\} \text{ percorre o sub-conjunto}$$

das partes de $\{1, 2, \dots, m\}$.

Demonstração: Basta desenvolver o produto do teorema 6.11. ■

Pelo teorema 6.10 e o corolário 6.11, podemos determinar tanto $\Delta(t)$ como o valor de $\Delta(1)$ usando apenas os w_i 's. A próxima proposição ajudará no cálculo de $\Delta(1)$.

Proposição 6.12 [MILNOR&ORLIK]: *Seja $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$, $\Delta = \delta(w)$, $\Delta_1 = \delta(w_1, w_2, \dots, w_m)$ e $\Delta_2 = \delta(w_{m+1}, w_{m+2}, \dots, w_n)$. Se $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ e $\{u_{m+1}, u_{m+2}, \dots, u_n\}$ são relativamente primos então $k = k_1 k_2$ e $\rho = \rho_1^{k_2} \rho_2^{k_1}$.*

Demonstração: Seja $\delta_1 = \delta(w_1, \dots, w_m) = \sum a_i \Lambda_i$ e $\delta_2 = \delta(w_{m+1}, \dots, w_n) = \sum b_j \Lambda_j$. Como i e j são primos para $a_i \neq 0$ e $b_j \neq 0$, $\Lambda_i \Lambda_j = \Lambda_{ij}$ e consequentemente $\text{divisor } \Delta = \delta = \delta_1 \delta_2 = (\sum a_i \Lambda_i)(\sum b_j \Lambda_j) = \sum \sum a_i b_j \Lambda_{ij}$. Logo $k = \sum \sum a_i b_j = (\sum a_i)(\sum b_j) = k_1 k_2$ e

$$\begin{aligned} \rho &= \prod_{i,j} (ij)^{a_i b_j} = \prod_{i,j} (i^{a_i b_j} j^{a_i b_j}) = \prod_{i,j} i^{a_i b_j} \prod_{i,j} j^{a_i b_j} = \prod_{i,j} (i^{a_i})^{b_j} \prod_{i,j} (j^{b_j})^{a_i} \\ &= \prod_j \left(\prod_i i^{a_i} \right)^{b_j} \prod_i \left(\prod_j j^{b_j} \right)^{a_i} = \left(\prod_i i^{a_i} \right)^{\sum_j b_j} \left(\prod_j j^{b_j} \right)^{\sum_i a_i} = \rho_1^{k_2} \rho_2^{k_1}. \blacksquare \end{aligned}$$

Exemplo 6.1: Vamos determinar os valores de k e ρ para o polinômio $f(z_1, z_2, z_3, z_4) = z_1 z_2 - z_2 z_3^2 + z_1 z_3^4 + z_3^3 z_4$.

Os w_i 's satisfazem o sistema

$$1/w_1 + 1/w_2 = 1/w_2 + 2/w_3 = 1/w_1 + 4/w_3 = 3/w_3 + 1/w_4 = 1$$

pela definição de polinômio quase-homogêneo e como ele possui uma solução, f é polinômio quase-homogêneo do tipo $\{3, 3/2, 6, 2\}$. O número de Milnor de f é

$$\mu = (3-1)(3/2-1)(6-1)(2-1) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 1 = 5 \text{ e o polinômio característico é dado por}$$

$$\begin{aligned} \text{divisor } \Delta &= (\Lambda_3 - 1)(2\Lambda_3 - 1)(\Lambda_6 - 1)(\Lambda_2 - 1) \\ &= (6\Lambda_3 - \Lambda_3 - 3\Lambda_3 + 1)(2\Lambda_6 - \Lambda_6 - \Lambda_2 + 1) \\ &= (2\Lambda_3 + 1)(\Lambda_6 - \Lambda_2 + 1) = 6\Lambda_6 - 2\Lambda_6 + 2\Lambda_3 + \Lambda_6 - \Lambda_2 + 1 = 5\Lambda_6 + 2\Lambda_3 - \Lambda_2 + 1 \end{aligned}$$

Logo $k = 5 + 2 - 1 + 1 = 7$ e $\rho = 1^1 2^{-1} 3^2 6^5 = \frac{9}{2} 6^5 = 27 \cdot 6^4$. Como $k > 0$, $\Delta(1) = 0$ e portanto, K não é homeomorfo a esfera.

Observação 6.2: Caso $m=3$, K é uma variedade de dimensão 3 mas neste caso, o fato de ser simplesmente conexo e ter homologia da esfera não garante que é uma esfera topológica.

Observação 6.3: Se 0 for ponto singular isolada de f , os algoritmos acima são válidos e por isso, se o valor obtido, por exemplo, no cálculo do número de Milnor pela expressão $\mu = (w_1 - 1)(w_2 - 1) \dots (w_m - 1)$ não for inteiro, então 0 não é singularidade isolada de f .

Apêndice

SU(2), SO(3) e seus sub-grupos discretos

Neste capítulo, vamos estudar o grupo SU(2) e seus sub-grupos binários que foram utilizados no capítulo III. O objetivo deste capítulo é listar os sub-grupos discretos de SO(3), seus contadores, binários e comutadores dos binários.

Para desenvolver o estudo sobre SU(2), usamos os quatérnios. Sejam $1, i, j, k$ a base canônica de $\mathbb{R}^4$ e definimos uma multiplicação, $ij = -ji = k$, $jk = -kj = i$, $ki = -ik = j$. Assim $\mathbb{R}^4$ será um corpo não abeliano, denominado de corpo dos quatérnios e será denotado por $H = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, onde os elementos em $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ são denotados por $x + jy$, e $jz = \bar{z}j$, para todo número complexo z . A parte real de um quatérnio é a primeira coordenada de $H = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ e a segunda coordenada é denominada de parte pura. Se $q = x + iy + jz + kw$ então $\text{Re}(q) = x$ e $\text{Pura}(q) = iy + jz + kw$, denotam a parte real e parte pura respectivamente. O conjugado quatérnico é definido como $\bar{q} = \text{Re}(q) - \text{Pura}(q)$. Quando nos referirmos a $\mathbb{R}^3 \subset H$, este será a parte pura dos quatérnios e $\mathbb{C} \subset H$ é o primeiro fator de H , a não ser que especifiquemos o contrário. Agora, S^2 e S^1 são as esferas em $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{C}$ dentro dos quatérnios.

Proposição A.1: *O conjunto dos quatérnios unitários coincide com S^3 e, é um sub-grupo multiplicativo de $H^* = H - \{0\}$.*

Demonstração: Basta notar que $q\bar{q} = |q|$. ■

Proposição A.2 [PORTEOUS]: *Os elementos de $U(2)$ são representados univocamente pela classe $\{(q, c), -(q, c)\}$, com $(q, c) \in S^3 \times S^1$.*

Demonstração: Definimos um homomorfismo $\rho: S^3 \times S^1 \rightarrow U(2)$ por $\rho(q, c): H \rightarrow H$, uma aplicação $\mathbb{C}$ -linear definida por $\rho(q, c)x = qxc$, onde a multiplicação se efetua nos quatérnios. Como $|\rho(q, c)x| = |x|$, $\rho(q, c) \in U(2)$, pois toda transformação $\mathbb{C}$ -linear que preserva a norma é unitária.

Agora queremos mostrar que ρ é sobrejetora e $\text{Ker}(\rho) = \{\pm(1, 1)\}$. Dado $t \in U(2)$, seja $r = t(1) = t_1$ onde t_1 é o quatérnio correspondente ao primeiro vetor coluna

de t . Se $t = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{bmatrix}$ então $r = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = (x_1, y_1)$. Definimos uma nova transformação $s: H \rightarrow H$ por $s(x) = \bar{r}t(x)$ onde a multiplicação é efetuada nos quatérnios. Efetuando os cálculos e notando que $\bar{r} = (\bar{x}_1, -y_1)$, obtemos uma representação matricial de s como sendo $s = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \det(t) \end{bmatrix}$ onde $\det(t) = x_1y_2 - x_2y_1$. Logo s é simplesmente uma rotação no segundo plano complexo. Como $\bar{c}(x+jy)c = x+jc^2y$, $s(x+jy) = \bar{c}(x+jy)c$, onde $c = -\sqrt{\det(t)}$ que está bem definido a menos de antipodais. Mas $|r|=1 \Rightarrow r^{-1} = \bar{r}$ e $s = \bar{r}t$, $t = r.s$ ou seja, $t(x) = qxc$ onde $c = \pm\sqrt{\det(t)}$ e $q = r.c$ e o par (q,c) está bem definido a menos de antipodais. Logo ρ é sobrejetor e $\text{Ker}(\rho) = \{\pm(1,1)\}$. ■

Corolário A.3 [PORTEOUS]: $U(2)$ é isomorfo a $S^3 \times S^1$.

Demonstração: O ρ acima não é um isomorfismo, pois o seu núcleo não é trivial. Para encontrarmos um isomorfismo, definimos $\pi: S^3 \times S^1 \rightarrow S^3 \times S^1$ por $\pi(q,c) = (qc, c^2)$ onde $\text{Ker}(\pi) = \{\pm(1,1)\}$. Assim teremos o diagrama

$$\begin{array}{ccc} S^3 \times S^1 & \xrightarrow{\rho} & U(2) \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{\rho} & \\ S^3 \times S^1 & & \end{array}$$

Como $\text{Ker}(\rho) = \text{Ker}(\pi)$ e ambos, ρ e π são homomorfismos de grupos, a aplicação $\bar{\rho} = \rho\pi^{-1}: S^3 \times S^1 \rightarrow U(2)$ está bem definida e é um isomorfismo. Como

$$\rho(q,c) = c \begin{bmatrix} q_1 & -\overline{q_2} \\ q_2 & q_1 \end{bmatrix}, \bar{\rho} \text{ é definido como } \bar{\rho}(q,c) = \begin{bmatrix} q_1 & -\overline{q_2 c} \\ q_2 & q_1 c \end{bmatrix}. \blacksquare$$

Teorema A.4: $SU(2)$ é isomorfo a S^3 .

Demonstração: Inicialmente, vamos construir um homomorfismo de $S^3 \times S^1$ em $SU(2)$ e em seguida, vamos definir outro homomorfismo de $S^3 \times S^1$ em S^3 com o mesmo núcleo e partir daí, definiremos o isomorfismo entre $SU(2)$ e S^3 .

Dado $t \in U(2)$, $s = \frac{1}{\sqrt{\det(t)}} r \in SU(2)$ e a aplicação que associa cada r a s , é sobrejetora. Composto com a aplicação $\bar{\rho}: S^3 \times S^1 \rightarrow U(2)$ do corolário A.3, obtemos

uma aplicação $\varphi: S^3 \times S^1 \rightarrow SU(2)$ definido por $\varphi(q, c) = \begin{bmatrix} q_1 \sqrt{c} & -\bar{q}_2 \sqrt{c} \\ q_2 \sqrt{c} & \bar{q}_1 \sqrt{c} \end{bmatrix}$, pois

$\det(\bar{\rho}(q, c)) = c$. Temos que $\varphi(x) = \varphi(y) \Leftrightarrow \exists s \in S^1: y = sx$, ou seja $\text{Ker}(\varphi) = S^1$. Agora vamos definir um homomorfismo de $S^3 \times S^1$ em S^3 tal que o núcleo coincide com o núcleo do φ . Tome $\psi: S^3 \times S^1 \rightarrow S^3$ definido como $\psi(q, c) = q\sqrt{c}$. Então $\psi(x) = \psi(y) \Leftrightarrow \exists s \in S^1: y = sx$, o que implica que o isomorfismo $\varphi\psi^{-1}: S^3 \rightarrow SU(2)$ está bem definido. ■

As relações entre S^3 , $S^3 \times S^1$, $SU(2)$ e $U(2)$ são dadas pelo seguinte diagrama:

As funções inversas de f e g são respectivamente $f^{-1}(t) = (\overline{t(1)}, s)$ e $g^{-1}(t) = \overline{t(1)} \cdot s$ onde $s = \sqrt{\det(t)}$.

Para relacionar o $SU(2)$ com $SO(3)$, notemos que os elementos de $SU(2)$ podem ser parametrizados por:

$$u(\theta, \psi, \phi) = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} e^{\frac{i}{2}(\psi+\phi)} & \sin \frac{\theta}{2} e^{\frac{i}{2}(\psi-\phi)} \\ -\sin \frac{\theta}{2} e^{\frac{i}{2}(\psi-\phi)} & \cos \frac{\theta}{2} e^{\frac{i}{2}(\psi+\phi)} \end{bmatrix}$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \psi \leq 4\pi$ e $0 \leq \phi \leq 2\pi$ enquanto que os elementos do grupo de rotações no R^3 , o $SO(3)$ pode ser parametrizado por:

$$T(\theta, \psi, \phi) = \begin{bmatrix} -\sin\phi \sin\psi + \cos\theta \cos\psi & \cos\phi \sin\psi + \cos\theta \sin\phi \cos\psi & -\sin\phi \cos\psi \\ -\sin\phi \cos\psi + \cos\theta \cos\phi \sin\psi & \cos\phi \cos\psi - \cos\theta \sin\phi \sin\psi & \sin\theta \sin\psi \\ \sin\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \end{bmatrix}$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \psi \leq 2\pi$ e $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

Segundo [CORNWELL], existe um homeomorfismo $R: SU(2) \rightarrow SO(3)$ dado por $R(u(\theta, \psi, \phi)) = T(\theta, \psi, \phi)$, com $\text{Ker}(R) = \{\pm I\}$. Em termos das entradas das matrizes,

temos $R(u)_{i,j} = \frac{1}{2} \text{tr}(\delta_j u \delta_k u^{-1})$, com $j, k = 1, 2, 3$ onde $\delta_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\delta_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ e

$$\delta_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Como $SU(2) \cong S^3$, $SO(3) \cong SU(2) / \{\pm I\} \cong S^3 / \{\pm I\} \cong \mathbb{RP}^3$. Temos que, $R: SU(2) \rightarrow SO(3)$ é um recobrimento duplo e dado um subgrupo $H < SO(3)$, $\tilde{H} = R^{-1}(H) < SU(2)$ é denominado de binário de H . Como os subgrupos de $SU(2)$ são binários, ou seus subgrupos, o conhecimento dos subgrupos discretos de $SO(3)$ implica no conhecimento dos subgrupos discretos de $SU(2)$.

Segundo [WEYL] (pp. 149-154), os subgrupos discretos de $SO(3)$ são:

- 1) Z_n - Rotação de ângulo $2\pi/n$ em torno do eixo Z .
- 2) D_{2n} - Simetria de polígono regular de n lados contidos no plano XY .
- 3) A_4 - Simetria de tetraedro regular.
- 4) S_4 - Simetria de octaedro regular ou cubo.
- 5) A_5 - Simetria de icosaedro ou dodecaedro regular.

Para mostrar que os grupos octaédrais e icosaédrais são S_4 e A_5 , podemos colocar letras nas faces e analisar o grupo de permutação associado às simetrias (Exercício (1) da pag. 388 de [KAUFFMAN]).

No capítulo III, vimos que esses grupos exceto os Z_n 's estão associados ao grupo triangular central Σ e podemos calcular a ordem dos comutadores dos binários. Agora vamos montar uma tabela de subgrupos discretos de SO(3), seus comutadores, binários e comutadores dos binários. Antes de mais nada, notemos que $[R^{-1}(H), R^{-1}(H)] \subset R^{-1}[H, H]$, pois $\text{Ker}(R) \subset Z(\text{SU}(2))$, ou seja $[\tilde{H}, \tilde{H}] \subset [\tilde{H}, \tilde{H}]$ onde $\tilde{G}$ denota o binário de G e $[G, G] = [ghg^{-1}h^{-1} : g, h \in G]$ é o comutador (ou abelianizador) de G .

Usando a notação do capítulo III, $\Sigma \subset \text{SO}(3)$ é um subgrupo discreto e, $\Gamma = R^{-1}(\Sigma)$ e $\Pi = [\Gamma, \Gamma]$.

$$1) \Sigma = Z_n.$$

Como Z_n é abeliano, $[\Sigma, \Sigma] = 0$.

Afirmamos que $\Gamma = Z_{2n}$. De fato, como podemos supor que $Z_n = \langle \beta \rangle$ onde β é a rotação em torno do eixo Z por um ângulo de $2\pi/n$, β possui uma representação

$$\text{matricial } \beta = \begin{bmatrix} \cos\theta_n & -\sin\theta_n & 0 \\ \sin\theta_n & \cos\theta_n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ com } \theta_n = 2\pi/n. \text{ Neste caso, } \beta = T(0, 0, -2\pi/n) \text{ e}$$

$$\text{portanto, } \pm\tilde{\beta} = \pm R^{-1}(T) = \pm u(0, 0, -2\pi/n) = \pm \begin{bmatrix} 0 & e^{-\pi i/n} \\ -e^{\pi i/n} & 0 \end{bmatrix} = \pm \begin{bmatrix} 0 & e^{-\theta_{2n}i} \\ -e^{\theta_{2n}i} & 0 \end{bmatrix} \text{ com}$$

$\theta_{2n} = 2\pi/2n$ que possui ordem $2n$. Como $|\Gamma| = 2|\Sigma| = 2n$, $\Gamma = \tilde{Z}_n = \langle \tilde{\beta} \rangle = Z_{2n}$. Consequentemente, $\Pi = 0$.

$$2) \Sigma = D_{2n}.$$

$$\text{Vamos mostrar que } [\Sigma, \Sigma] = \begin{cases} Z_n, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ Z_{n/2}, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}.$$

Como $D_{2n} = \langle \alpha, \beta : \alpha^2 = \beta^n = 1, \beta\alpha = \alpha\beta^{-1} \rangle$, seus elementos são do tipo $\alpha\beta^i$ ou β^i . Logo

$$[\Sigma, \Sigma] = \langle (\alpha\beta^i)(\alpha\beta^j)(\alpha\beta^i)^{-1}(\alpha\beta^j)^{-1}, (\alpha\beta^k)\beta^\ell(\alpha\beta^k)^{-1}\beta^{-\ell} \rangle =$$

$$= \langle \beta^{2(j-i)}, \beta^{-2\ell} \rangle = \langle \beta^2 \rangle. \text{ Como } o(\beta^2) = \begin{cases} n, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ n/2, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases}, \text{ temos o que queríamos.}$$

$$\text{Agora, } \Pi = [\Gamma, \Gamma] \langle [\Sigma, \Sigma] \rangle = \begin{cases} \tilde{Z}_n = \tilde{Z}_{2n}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ \tilde{Z}_{n/2} = \tilde{Z}_n, & \text{se } n \text{ é par} \end{cases} \text{ e portanto, } \Pi \text{ é cíclico.}$$

No capítulo III, vimos que $D_{2n} = \Sigma(2, 2, n)$ e consequentemente,

$$|\Pi| = \frac{4}{pqr(p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} - 1)^2} \text{ com } p=q=2, r=n \text{ e portanto } |\Pi| = n. \text{ Portanto } \Pi = Z_n$$

$$3) \Sigma = A_4$$

O comutador $[\Sigma, \Sigma]$ de A_4 é o subgrupo de Klein que é $K = Z_2 \times Z_2$ e temos que $\Pi < \tilde{K}$. Mas $A_4 = \Sigma(2, 3, 3)$, de modo que $|\Pi| = 8$. Como $\Pi < \tilde{K}$ com $|\tilde{K}| = 2|K| = 8$ e consequentemente, $\Pi = \tilde{K}$.

Vamos mostrar que $\tilde{K} = Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ que é grupo dos quatérnios.

Como $|\tilde{K}| = 2|K| = 8$ e $|Q| = 8$ também, basta mostrar que $Q < \tilde{K}$, ou seja, $R(Q) = K$. A representação matricial de Q em SU(2) é

$$Q = \left\{ \pm \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \pm \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \pm \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \pm \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \right\}$$

$$= \{\pm u(0, 0, 0), \pm u(\pi, \pi/2, -\pi/2), \pm u(\pi, \pi/2, \pi/2), \pm u(0, -\pi, 0)\}$$

e consequentemente,

$$R(Q) = \{T(0, 0, 0), T(\pi, \pi/2, -\pi/2), T(\pi, \pi/2, \pi/2), T(0, -\pi, 0)\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Como

$$T(0, -\pi, 0) = T(\pi, \pi/2, -\pi/2)T(\pi, \pi/2, \pi/2),$$

$$R(Q) = \{e, \alpha, \beta, \alpha\beta\} = Z_2 \times Z_2 = K$$

$$\text{onde } e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } \beta = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

4) $\Sigma = S_4$

Como S_4 / A_4 é abeliano, $[S_4, S_4] < A_4$ e consequentemente, $\Pi < \tilde{A}_4$. Mas $|\tilde{A}_4| = 2|A_4| = 24$ e como $S_4 = \Sigma(2, 3, 4)$, $|\Pi| = 24$. Desta forma, $\Pi = \tilde{A}_4$.

5) $\Sigma = A_5$

Temos que $A_5 = \Sigma(2, 3, 5)$ e portanto $|\Gamma| = |\Pi| = 120$ e daí, $\Pi = \Gamma = \tilde{A}_5$.

Abaixo, temos a tabela completa de subgrupos discretos de SO(3), seus comutadores, binários e comutadores dos binários.

(p,q,r)	Σ	$[\Sigma, \Sigma]$	Γ	Π
-----	Z_n	0	Z_{2n}	0
(2,2,n)	D_{2n}	$\begin{cases} Z_n \text{ se } n \text{ é ímpar} \\ Z_{2/n} \text{ se } n \text{ é par} \end{cases}$	$\tilde{D}_{2n}$	Z_n
(2,3,3)	A_4	$K = Z_2 \times Z_2$	$\tilde{A}_4$	Q
(2,3,4)	S_4	A_4	$\tilde{S}_4$	$\tilde{A}_4$
(2,3,5)	A_5	A_5	$\tilde{A}_5$	$\tilde{A}_5$

Bibliografia

[BRÖCKER&JÄNICH] *Th. Bröcker & K. Jänich*, Introduction to Differential Topology (1982) (translated by C. B. & M. J. Thomas) - Cambridge University Press.

[BRÖCKER&LANDER] *Th. Bröcker & L. Lander*, Differentiable Germs and Catastrophes (London Mathematical Society - Lecture Note Series: 17) (1975) (translated by L. Lander) - Cambridge University Press.

[CARNEIRO&SOARES] *Mario Jorge Dias Carneiro & Marcio Gomes Soares*, Introdução à Topologia de Singularidades Complexas (15^o Colóquio Brasileiro de Matemática) (1985) - IMPA (Instituto de Matematica Pura e Aplicada).

[CORNWELL] *J. F. Cornwell*, Group Theory in Fisics Vol. I (Thechniques of Physics: 7) (1984) - Academic Press.

[GREENBERG&HARPER] *Marvin J. Greenberg & John R. Harper*, Albebraic Topology (a first course) (1981) - The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.

[CROWELL&FOX] *Richard H. Crowell & Ralph H. Fox*, Introduction to Knot Theory (GTM - Graduate Texts in Mathematics: 57) (1963) - Springer-Verlag.

[KAUFFMAN] *Louis H. Kauffman*, On Knots (Annals of Mathematics Studies: 115) - Princeton University Press.

[KAUP] *Ludger Kaup & Burchard Kaup*, Holomorphic Functions of Several Variables (An Introduction to fundamental Theory) (1983) - Walter de Gruyter Co.

[LIVINGSTON&MELUIN] *Charles Livingston & Paul Melvin*, Abelian Invaliants of Satellite Knots (pp. 217-227), (LNM - Lecture Notes on Mathematics: 1167) (1985) - Springer-Verlag .

[LOOIJENGA] *E. J. N. Looijenga*, Isolated Singular Point on Complex Intersections (London Mathematical Society - Lecture Note Series: 77) (1984) - Cambridge University Press.

Bibliografia

- [MASSEY] *William S. Massey*, Singular Homology Theory (GTM - Graduate Texts in Mathematics: 70) (1980) - Springer-Verlag New York Inc.
- [MILNOR1] *John Milnor*, Singular Points of Complex Hypersurfaces (1968) - Princeton University Press.
- [MILNOR2] *John Milnor*, On the 3-dimensional Brieskorn Manifolds $M(p,q,r)$ (pp. 175-225), Knots, Groups, and 3-Manifolds (Annal of Mathematics, Number 84) - Princeton University Press.
- [MILNOR3] *John Milnor*, Construction of Universal Bundles, II (pp. 430-436), Annals of Mathematics Vol. 63, Number 3 (1956)
- [MILNOR4] *John Milnor*, Topology from the Differentiable Viewpoint (1976) - The University Press of Virginia.
- [MILNOR&ORLIK] *John Milnor & Peter Orlik*, Isolated Singularities Defined by Weighted Homogeneous Polynomials (pp. 385-393), Topology vol. 9 (1970).
- [PORTEOUS] *Ian R. Porteous*, Topological Geometry (The New University Mathematics Series) (1969) - Van Nostrand Reinhold Company LTD.
- [ROLFSEN] *Dale Rolfsen*, Knots and Links (MLS - Mathematics Lectures Series: 7) (1976), Publish or Perish, INC.
- [SIMIS] *Aron Simis*, Introdução às Funções Algébricas e Funções Abelianas (10^o Colóquio Brasileiro de Matemática) (1975) - IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada).
- [SPANIER] *Edwin H. Spanier*, Algebraic Topology (1966) - McGraw-Hill Book Company.
- [TRÁNG] *Lê Dũng Tráng*, Sur les Nœuds Algébriques (pp. 281-321), Compositio Mathematica, Vol. 25, Fasc. 3 (1972).
- [WALKER] *Robert J. Walker*, Algebraic Curves (1950) - Princeton University Press.
- [WEIL] *Hermann Weyl*, Symmetry (1952) - Princeton University Press.